

Communiqué de presse

Embargo: 8.6.2020, 8h30

14 Santé

Soins palliatifs dans les hôpitaux en 2018

Près de 12% des décès dans les hôpitaux sont précédés de soins palliatifs

Près de 12% des personnes décédées à l'hôpital en 2018 ont reçu lors de leur dernière hospitalisation des soins palliatifs complexes ou spécialisés, visant notamment à éviter douleurs et complications. Cette proportion culmine à 29% pour les personnes atteintes d'une tumeur. En tout, quelque 5900 personnes ont reçu des soins palliatifs à l'hôpital en 2018, dont plus de 80% souffraient de tumeur. C'est ce qui ressort d'une nouvelle publication de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les soins palliatifs englobent le soutien et les traitements médicaux apportés aux personnes souffrant de maladies incurables, potentiellement mortelles. Ils visent à éviter la souffrance et les complications. Les soins palliatifs peuvent être dispensés dans les hôpitaux, mais également à domicile, dans des établissements spécialisés ou pour personnes âgées. Les données présentées dans la première publication sur ce thème ne concernent que les traitements complexes de médecine palliative et les soins palliatifs spécialisés délivrés dans les hôpitaux, les autres situations ne faisant pas l'objet d'un relevé systématique national (cf. encadré).

Quatre cinquièmes des bénéficiaires souffrent de tumeur

En 2018, quelque 5900 personnes ont reçu lors d'une hospitalisation des traitements complexes de médecine palliative ou des soins palliatifs spécialisés. Les personnes atteintes d'une tumeur sont très fortement surreprésentées: elles font plus de quatre cinquièmes des cas (81,8%). C'est l'inverse pour les personnes souffrant de maladies de l'appareil circulatoire, qui ne constituent que 4,2% des patientes et des patients ayant reçu des soins palliatifs à l'hôpital. Un peu plus de la moitié (52,0%) des personnes ayant reçu des soins palliatifs à l'hôpital en 2018 sont décédées lors de leur dernière hospitalisation avec de tels soins.

Peu de soins palliatifs pour les maladies de l'appareil circulatoire

Quelque 39% de la totalité des décès intervenus en Suisse en 2018 ont eu lieu à l'hôpital. 11,8% d'entre eux ont été précédés de soins palliatifs complexes ou spécialisés. Cette proportion varie fortement en fonction de la maladie. Elle était ainsi de 29,2% pour les personnes atteintes d'une tumeur, et même de presque 40% pour les femmes décédées d'un cancer du sein. Par contre, elle n'est que de 2,5% pour les personnes décédées à l'hôpital des suites d'une maladie de l'appareil circulatoire et de 3,6% pour celles atteintes d'une maladie de l'appareil respiratoire. Ces trois groupes

de patients sont les plus nombreux parmi les personnes décédées à l'hôpital: les tumeurs sont le diagnostic principal pour 33% des décès, les maladies de l'appareil circulatoire pour 23% et les maladies de l'appareil respiratoire pour 10%.

L'âge des personnes décédées ayant reçu des soins palliatifs est bas

Les personnes décédées à l'hôpital ayant reçu des soins palliatifs sont plus jeunes que celles décédées à l'hôpital sans en avoir reçu, avec un âge moyen au décès de 71,0 ans contre 75,9 ans. Cela s'explique principalement par le fait que les personnes recevant des soins palliatifs souffrent dans leur très grande majorité de cancer. Or les personnes atteintes d'un cancer décèdent sensiblement plus jeunes que celles souffrant d'une maladie de l'appareil circulatoire ou de l'appareil respiratoire.

Les femmes sont légèrement plus représentées parmi les personnes ayant reçu des soins palliatifs avant de décéder que parmi celles n'en ayant pas reçu (46,4% contre 44,9%). C'est en particulier la conséquence du fait que les décès précédés de soins palliatifs en cas de cancers spécifiques aux femmes, comme les cancers du sein, des ovaires ou de l'utérus, sont nettement plus nombreux que ceux en cas de cancers spécifiques aux hommes, comme celui de la prostate.

Longues hospitalisations avant le décès

Les personnes décédées à l'hôpital après avoir reçu des soins palliatifs complexes ou spécialisés ont un parcours de soins plus intense que celles qui n'ont pas reçu de soins palliatifs. Au cours de l'année précédant leur décès, elles ont été hospitalisées à 3,6 reprises en moyenne pour une durée totale moyenne de 49 jours. Cette durée totale moyenne n'est que de 29 jours pour les personnes décédées sans avoir reçu de soins palliatifs, effectués lors de 2,7 hospitalisations en moyenne.

Source des données

Les données proviennent de la statistique médicale des hôpitaux (MS). Dans ce relevé, les traitements sont codés selon la Classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP). Celle-ci comprend deux groupes de codes pour désigner les soins palliatifs:
- traitement complexe de médecine palliative, selon le nombre de jours de traitement (codes 93.8A.25/26/27/28/2A),
- soins palliatifs spécialisés, selon le nombre de jours de traitement (codes 93.8A.35/36/37/38/3A).
L'attribution de ces codes n'est autorisée que si plusieurs caractéristiques minimales sont réunies, portant notamment sur le lieu d'hospitalisation, la composition de l'équipe de prise en charge et sa formation ou la fréquence des visites interprofessionnelles et des soins. Seuls les soins palliatifs répondant à ces conditions exigeantes sont recensés dans cette étude.
Plusieurs types de soins palliatifs ne sont donc pas couverts par la source de données utilisée et ne font pas l'objet d'autres relevés systématiques à l'échelle nationale:
- les soins palliatifs fournis par les équipes mobiles intra-hospitalières, qui ne sont en principe pas enregistrés au moyen des codes CHOP énumérés ci-dessus, même si la pratique peut varier d'une institution hospitalière à une autre;
- les consultations ambulatoires en soins palliatifs proposées dans certains hôpitaux;
- les soins palliatifs des équipes mobiles extra-hospitalières, intervenant à domicile ou dans des institutions pour personnes âgées;
- les soins palliatifs dispensés par les institutions non-hospitalières spécialisées en soins de longue durée et avec un mandat de soins palliatifs spécialisés, ainsi que des structures de jour ou de nuit.

Renseignements

Jean-François Marquis , OFS, Section Services de la santé, tél.: +41 58 463 67 54,
e-mail: jeanfrancois.marquis@bfs.admin.ch
Service des médias OFS, tél.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Nouvelles parutions

Les hospitalisations avec des soins palliatifs en 2018, numéro OFS: 2028-1800
Commandes de publications: tél.: +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch

Offre en ligne

Autres informations et publications: www.bfs.admin.ch/news/fr/2020-0383
La statistique compte pour vous: www.la-statistique-compte.ch
Abonnement aux NewsMails de l'OFS: www.news-stat.admin.ch
Le site de l'OFS: www.statistique.ch

Accès aux résultats

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et placés sous embargo.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a eu connaissance de ce communiqué de presse trois jours ouvrables avant sa publication.