2020

14

Santé

Neuchâtel 2020

CIM-10-GM 2020

Index alphabétique – Version française

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de la statistique OFS

Domaine «Santé»

Publications actuelles sur des thèmes apparentés

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, veuillez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).

Santé – Statistique de poche 2019, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2020, numéro OFS: 1541-1900, 44 pages

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2021, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2020, numéro OFS: 544-2100, 190 pages

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP) Index systématique, Version 2021, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2020, numéro OFS: 661-2100

Statistique médicale des hôpitaux – Tableaux standard 2018, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, numéro OFS: su-b-14.04.01.02-MKS-2018

Statistique des causes de décès, La mortalité en Suisse et les principales causes de décès, en 2016, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, numéro OFS: 1258-1600, 4 pages

Enquête suisse sur la santé 2017 – Tableaux standard, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, communiqué de presse, 3 pages

Accouchements et santé maternelle en 2017, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, numéro OFS: 1921-1700-05, 8 pages

Le cancer en Suisse 2012–2016, Office fédéral de la statistique/Institut National pour l'Epidémiologie et l'Enregistrement du Cancer (NICER), Neuchâtel 2020

Statistique des cabinets médicaux et des centres ambulatoires (MAS), Les cabinets médicaux et centres ambulatoires en 2017, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, numéro OFS: 1804-1700, 12 pages

Statistiques des hôpitaux en 2018, Stagnation des coûts dans le domaine stationnaire des hôpitaux, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, communiqué de presse, 3 pages

Domaine «Santé» sur Internet

www.statistique.ch → Trouver des statistiques → 14 – santé
oder www.health-stat.admin.ch

CIM-10-GM 2020

Index alphabétique – Version française

Rédaction Section Santé de la population,
domaine Classifications médicales
Éditeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Neuchâtel 2020

Éditeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Renseignements: Secrétariat de codage
codeinfo@bfs.admin.ch

Rédaction: Office fédéral de la statistique (OFS)
Traduction basée sur
la version de l'institut allemand pour
la documentation et l'information médicale (DIMDI)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: allemand

Traduction: Services linguistiques de l'OFS

Mise en page: section DIAM, Prepress / Print
Ce document a été produit automatiquement à partir de banques de données. Il ne répond donc pas aux normes typographiques des publications de l'OFS.

En ligne: www.statistique.ch

Imprimés: www.statistique.ch
Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel,
order@bfs.admin.ch, tél. 058 463 60 60
Impression réalisée en Suisse

Copyright: OFS, Neuchâtel 2020
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales,
si la source est mentionnée.

Numéro OFS: 1188-2034

ISBN: 978-3-303-14331-5

Table des matières

Introduction V

Index alphabétique – Volume 1 (A–L)

A 3

B 73

C 93

D 159

E 201

F 237

G 261

H 289

I 321

J 353

K 357

L 363

Index alphabétique – Volume 2 (M–Z)

M 389

N 437

O 457

P 487

Q 555

R 557

S 585

T 633

U 679

V 687

W 713

X 715

Y 717

Z 719

Annexe

Tableau des tumeurs I

Introduction

Contexte

La présente version de l'index alphabétique de la CIM-10-GM 2020 se base sur la version française de l'index systématique de la CIM-10-GM 2020. Cette dernière se fondant sur l'index systématique de référence, l'ICD-10-GM 2020 publié par l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI).[1] De plus, les enrichissements introduits dans l'index alphabétique allemand entre 2010 et 2020 ont été pris en compte et intégrés dans la version française, si la traduction en est pertinente.

Validité

La présente version de l'index alphabétique CIM-10-GM 2020, publiée en novembre 2020, entre en vigueur dès le 1er janvier 2021.

Langues, formats, accès

L'index alphabétique CIM-10-GM 2020 est publié en français et en italien par l'OFS. Pour la version allemande, veuillez-vous référer aux publications du BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).

La version française de l'index alphabétique est disponible aux formats PDF, CSV et papier. Les versions PDF et CSV peuvent être téléchargées directement sur le site Internet de l'OFS. Une version imprimée payante peut également être commandée sur ce dernier.

Les instruments pour le codage médical sont disponibles sous www.bfs.admin.ch:

Office fédéral de la statistique → Trouver des statistiques → 14 – Santé → Bases statistiques et enquêtes: Nomenclatures → Classifications et codage médicaux → Instruments pour le codage médical → Instruments en vigueur pour le codage médical, par année.

[1] Le Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) et d'importantes unités fonctionnelles du Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) ont été, le 26 mai 2020, réunis sous l'autorité du BfArM. […] Jusqu'à nouvel avis, les prestations du DIMDI restent accessibles à l'adresse www.dimdi.de. Après une phase de transition, tous les contenus seront transférés sur le site internet du BfArM. Les utilisateurs seront déviés automatiquement vers ce site.» Communiqué du 5.06.2020: BfArM-DIMDI Aktuell | BfArM und wesentliche Funktionseinheiten des DIMDI zusammengeführt

Remarques techniques

Compte tenu du peu de temps qui s'écoule entre la mise au point des versions systématiques et l'établissement de l'index alphabétique dans les deux langues, ce dernier est produit selon un procédé en grande partie automatique.

Une première étape consiste à sélectionner les titres et les inclusions de l'index systématique à permuter.

Dans une deuxième étape les libellés à reprendre de l'index alphabétique allemand sont identifiés, traduits et intégrés comme enrichissements dans la base de données afin qu'ils soient également permutés.

Dans une troisième étape, les textes sélectionnés sont décomposés en leurs termes. Un fichier de règles défini la forme sous laquelle ces termes apparaissent dans l'index alphabétique. Par exemple, des mots sans contenu informatif et ne devant pas apparaître comme entrée dans l'index sont éliminés. Des mots de faible importance sémantique, resp. très fréquents, n'apparaissent pas comme entrée principale de l'index, mais figurent encore dans les textes permutés. Ce sont p. ex. des mots abondants comme acquis, idiopathique, interstitiel. Certains substantifs et adjectifs sont réduits à leur forme neutre. Pour certains termes composés, des «voir» ou «voir aussi» sous la seconde ou troisième partie du terme renvoient au terme complet, p. ex. pour le terme ostéo-articulaire (= ostéo; articulaire), un voir aussi sous articulaire fait référence à ostéo-articulaire. Dans une quatrième étape, les textes apurés sont permutés. Par le biais de cette permutation, chaque terme sémantiquement important apparaît comme terme principal (entrée dans l'index). Dans l'index alphabétique l'ordre initial des mots dans les libellés peut être reconstitué grâce à des retraits, traits et signes introduits automatiquement (voir les explications dans le paragraphe consacré à l'utilisation de l'index).

Dans une cinquième étape les règles liées aux «voir» et «voir aussi» sont intégrées par ordre alphabétique sous les entrées principales concernées de l'index.

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne sert, dans un premier temps, qu'à trouver un code. Ce code doit ensuite impérativement être vérifié dans l'index systématique.

Tous les termes importants peuvent être trouvés en raison de la permutation des textes existants de l'index systématique, resp. des enrichissements choisis. Comme tous les termes

sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer selon la morphologie (par ex. cirrhose), l'étiologie (par ex. alcoolique), l'agent pathogène (par ex. Escherichia), le diagnostic (par ex. varicelle), la localisation (par ex. poumon) ou certains adjectifs particuliers (par ex. antiallergique). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières :

C 84.6 Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif
Lymphome anaplasique à grandes cellules, CD30 positif

Apparaît sous

ALK
[…]
- Positif ¬ Lymphome
- - Anaplasique à grandes cellules, C 84.6

Anaplasique
[…]
- Grand cellule
- - ALK
[…]
- - - Positif ¬ Lymphome C 84.6
- - CD30 positif ¬ Lymphome C 84.6

CD30 positif ¬
- Lymphome
- - Anaplasique à grandes cellules, C 84.6

Cellule
[…]
- ALK
[…]
- - Positif ¬ Lymphome
- - - Anaplasique à grandes C 84.6
[…]
- CD30 positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes C 84.6

Lymphome
[...]
- Anaplasique grand cellule
- - ALK
[...]
- - - Positif ¬ C 84.6
- - CD30 positif ¬ C 84.6

Positif
[...]
- ¬
[...]
- - Lymphome
- - - Anaplasique grand cellule
- - - - ALK C 84.6
- - - - CD30 C 84.6

Les combinaisons de codes primaires, codes dague (†), codes étoile (*) ou codes avec point d'exclamation (!) sont reprises dans l'index alphabétique.

P. ex. l'enrichissement «Méningite typhoïde A01.0† G01*» apparaît sous :

Méningite
[…]
- Typhoïde ¬ A01.0†, G01*

Typhoïde
[...]
- ¬
[...]
- - Méningite A01.0†, G01*

À noter :

Lisibilité : Il convient de remarquer que l'effacement des mots vides, la réduction à la forme neutre de certains termes et le réarrangement des mots rendent les textes moins lisibles. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (¬) pour marquer le début et la fin du texte des codes. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut lire le mot clé qui figure juste après le symbole, y compris les autres termes jusqu'à ce que l'on tombe sur le contenu recherché avec le code.

Entrées en anglais : les termes anglais forment un tout. Les entrées en anglais n'apparaissent donc que sous la première lettre du premier mot ; p. ex. «Vertical shear fracture» apparaît qu'à la lettre «V» (pour «Vertical») mais pas aux lettres «S» (pour «shear») ou «F» (pour «fracture»).

Renvois : Trois types de renvois sont utilisés dans l'index alphabétique de la CIM-10-GM :

- «Voir» (v.) : l'entrée où se trouve le renvoi n'apparaît pas comme telle dans l'index systématique. «Voir» renvoie à une autre entrée, p. ex. Acylcarnitine v. carnitine-acylcarnitine,
- «Voir aussi» (v.a.) : l'entrée figure comme telle dans l'index systématique. «Voir également» renvoie à des entrées apparentées (synonymes, hyponymes, etc.), p. ex. Embolie v.a. thromboembolie,
- «Voir type de maladie» (v. Type de maladie) : Renvoi pour les termes très fréquents indiquant que les libellés les contenant ne sont pas permutés. Ce renvoi invite à chercher sous une entrée plus spécifique, p. ex. Aigu v. Type de maladie.

De plus nous aimerions attirer votre attention sur le fait que le tableau des tumeurs se trouve à la fin de l'index alphabétique.

Incidences sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. Ainsi, en cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. À l'avenir, nous aimerions intégrer d'autres terminologies médicales. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinerons volontiers toute suggestion et toute proposition d'amélioration dans la perspective des prochaines éditions.

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées à établir cet index alphabétique. Nous sommes également reconnaissants à tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger.

Index alphabétique

A/H1N1
- Pandémie de 2009 [grippe porcine] ¬ Influenza *U69.20!*
- ¬ Influenza *J09, U69.20!*

A/H5N1
- Épidémie de 2009 [grippe aviaire] ¬ Influenza *U69.21!*
- ¬ Influenza *J09, U69.21!*

Aarskog-Scott ¬ Syndrome d' *Q87.1*

Aase-Smith type
- 1 ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- II ¬ Syndrome d' *D61.0*

Abactérienne ¬ Conjonctivite *H10.8*

Abandon ¬ Délaissement et *T74.0*

Abattement ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R53*

ABCA3 ¬ Pneumopathie interstitielle par déficit en *J84.8*

ABCB4 ¬ Cholélithiase par mutation du gène *K80.80*

Abcès
- Abdomino-pelvien ¬ *K65.0*
- Aigu
- - Chronique non puerpéral
- - - Aréole ¬ *N61*
- - - Sein ¬ *N61*
- - Sinus de la face ¬ *J01*
- - Tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique ¬ *L04*
- Amibes ¬ *A06.4†, K77.0**
- Amibien
- - Cerveau
- - - Foie) (et du poumon) ¬ *A06.6†*
- - - ¬ *A06.6†, G07**
- - Foie
- - - Abcès cérébral ¬ *A06.6†, G07**
- - - Poumon ¬ *A06.5†, J99.8**
- - - ¬ *A06.4†, K77.0**
- - Poumon
- - - Abcès cérébral ¬ *A06.6†, G07**
- - - Pneumonie ¬ *A06.5†, J17.3**
- - - ¬ *A06.5†, J99.8**
- Amygdale ¬ *J36*
- Anal ¬ *K61.0*
- Ano-rectal ¬ *K61.2*
- Articulaire tuberculeux NCA ¬ *A18.0†, M01.19**
- Aspergillaire du poumon ¬ *B44.1*
- Bouche
- - Sans autre précision ¬ Phlegmon et *K12.29*
- - ¬ Phlegmon et *K12.2*
- Bourses séreuses ¬ *M71.0*
- Brodie ¬ *M86.8*
- Buccal ¬ Autres phlegmon ou *K12.28*
- Candida ¬ *B37.9*
- Cérébral
- - Gonocoques ¬ *A54.8†, G07**

Abcès *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - ¬ Abcès amibien
- - - Foie avec *A06.6†, G07**
- - - Poumon avec *A06.6†, G07**
- Chromomycotique du cerveau ¬ *B43.1†, G07**
- Chronique) d'un sinus (de la face) ¬ *J32*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Corps
- - Caverneux et de la verge ¬ *N48.2*
- - Vitré ¬ *H44.0*
- Cutané furoncle anthrax
- - Cou ¬ *L02.1*
- - Face ¬ *L02.0*
- - Fesse ¬ *L02.3*
- - Localisations ¬ *L02.8*
- - Membre ¬ *L02.4*
- - Sans précision ¬ *L02.9*
- - Tronc ¬ *L02.2*
- - ¬ *L02*
- Dentaire
- - Fistule ¬ *K04.6*
- - SAI ¬ *K04.7*
- Dento alvéolaire
- - Fistule ¬ *K04.6*
- - SAI ¬ *K04.7*
- Dysentérique du foie ¬ *A06.4†, K77.0**
- Embolique
- - Cérébelleux ¬ *G06.0*
- - Cérébral ¬ *G06.0*
- - Cerveau [toute région] ¬ *G06.0*
- - Moelle épinière [toute localisation] ¬ *G06.1*
- - Otogène ¬ *G06.0*
- Épididyme ou du testicule ¬ *N45.0*
- Épidural tuberculeux ¬ *A17.8†, G07**
- Épiploïque ¬ *K65.0*
- Extra-dural et sous-dural, sans précision ¬ *G06.2*
- Fascia ¬ *M72.8*
- Foie
- - Entamoeba histolytica ¬ *A06.4†, K77.0**
- - ¬ *K75.0*
- Fosse ischio-rectale ¬ *K61.3*
- Furoncle et anthrax du nez ¬ *J34.0*
- Gaine du tendon ¬ *M65.0*
- Glande
- - Bartholin ¬ *N75.1*
- - Cowper ¬ *N34.0*
- - Littré ¬ *N34.0*
- - Salivaires ¬ *K11.3*
- - Sébacée ¬ *L02.9*
- - Tarsiennes ¬ *H00.0*
- Gonococcique des glandes de Bartholin ¬ *A54.1*

Abcès *–suite*
- Gonorrhéique de la prostate ¬ *A54.2†, N51.0**
- Granulome
- - Intracrânien
- - - Épidural ¬ *G06.0*
- - - Extra-dural ¬ *G06.0*
- - - Intrarachidien
- - - - Cours d'affections classées ailleurs ¬ *G07**
- - - - ¬ *G06*
- - - Sous-dural ¬ *G06.0*
- - - ¬ *G06.0*
- - Intrarachidien
- - - Épidural ¬ *G06.1*
- - - Extra-dural ¬ *G06.1*
- - - Sous-dural ¬ *G06.1*
- - - ¬ *G06.1*
- Hépatique
- - Angiocholique ¬ *K75.0*
- - Hématogène ¬ *K75.0*
- - Lymphogène ¬ *K75.0*
- - Pyléphlébitique ¬ *K75.0*
- - SAI ¬ *K75.0*
- Hypophyse ¬ *E23.6*
- Indication saignement ¬
- - Diverticulite de l'intestin grêle sans perforation , *K57.12*
- - Diverticulose de l'intestin grêle sans perforation , *K57.10*
- Intestin ¬ *K63.0*
- Intestinal tuberculeux ¬ *A18.3†, K93.0**
- Intra-abdominal après des actes médicaux ¬ *T81.4*
- Intrasphinctérien ¬ *K61.4*
- Ischio-rectal
- - Tuberculeux ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K61.3*
- Joue ¬ *K12.23*
- Kyste phaeohyphomycosiques sous-cutanés ¬ *B43.2*
- Langue ¬ *K14.0*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Ligament large précisé aigu ¬ *N73.0*
- Lombaire tuberculeux ¬ *A18.0†, M49.06**
- Mamelon
- - Gestationnel ¬ *O91.0*
- - Puerpéral ¬ *O91.0*
- Mammaire gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ *O91.1*
- Mastoïde ¬ *H70.0*
- Maxillaire
- - Indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ *K10.21*
- - Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ *K10.20*
- Médiastin ¬ *J85.3*

Abcès *–suite*
- Médullaire tuberculeux ¬ *A17.8†, G07**
- Méningé tuberculeux ¬ *A17.0†, G01**
- Mésentérique ¬ *K65.0*
- Non puerpéral du col utérin ¬ *N72*
- Œsophage ¬ *K20*
- Orbite ¬ *H05.0*
- Oreille externe ¬ *H60.0*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Ovaire ¬ *N70*
- Paramètre précisé aigu ¬ *N73.0*
- Parapharyngé et rétropharyngé ¬ *J39.0*
- Parodontal ¬ *K05.2*
- Paupière ¬ *H00.0*
- Pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe ¬ *H60.0*
- Périamygdalien ¬ *J36*
- Périanal
- - Tuberculeux ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K61.0*
- Périapical
- - Fistule ¬ *K04.6*
- - SAI ¬ *K04.7*
- - Sans fistule ¬ *K04.7*
- Périmandibulaire ¬ *K12.28*
- Périnéphrétique tuberculeux ¬ *A18.1†, N29.1**
- Périodontal ¬ *K05.2*
- Péripharyngé ¬ *J39.0*
- Périrectal
- - Tuberculeux ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K61.1*
- Périrénal ¬ *N15.11*
- Péritonéal ¬
- - *K65.0*
- - Appendicite aiguë avec *K35.32*
- Périurétral
- - Glande annexe ¬ Infection gonococcique partie inférieur appareil génito-urinaire
- - - *A54.1*
- - - Sans *A54.0*
- - ¬ *N34.0*
- Phaeohyphomycosique
- - Cerveau ¬ *B43.1*
- - ¬ Chromomycose [chromoblastomycose] et *B43*
- Pharynx ¬ Autres *J39.1*
- Plaie après des actes médicaux ¬ *T81.4*
- Pleural ¬ *J86*
- Poumon
- - Médiastin ¬ *J85*
- - Pneumonie ¬ *J85.1*
- - SAI ¬ *J85.2*
- - Sans pneumonie ¬ *J85.2*
- Prostate ¬ *N41.2*

Abcès *–suite*
- Psoas ¬ *M60.05*
- Rate
- - Amibes ¬ *A06.8†, D77**
- - ¬ *D73.3*
- Rectal ¬ *K61.1*
- Région anal rectal
- - Sans fistule ¬ *K61*
- - ¬ *K61*
- Rénal
- - Périrénal ¬ *N15.1*
- - ¬ *N15.10*
- Rétro-cæcal ¬ *K65.0*
- Rétropéritonéal ¬ *K65.0*
- Rhinopharyngé ¬ *J39.1*
- Saignement ¬
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation, *K57.23*
- - - - Sans perforation ni *K57.33*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation, *K57.43*
- - - - - Côlon sans perforation ni *K57.53*
- - - - - Perforation, *K57.03*
- - - - - Sans perforation ni *K57.13*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation, *K57.83*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.93*
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Perforation, *K57.21*
- - - - Sans perforation ni *K57.31*
- - - Grêle et du colon sans perforation ni *K57.51*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation, *K57.41*
- - - - - Perforation, *K57.01*
- - - - - Sans perforation ni *K57.11*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation, *K57.81*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.91*
- Sans indication saignement ¬
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation et *K57.22*
- - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite du côlon sans perforation ni *K57.32*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation et *K57.42*
- - - - - Côlon sans perforation ni *K57.52*

Abcès *–suite*
- Sans indication saignement ¬ *–suite*
- - Diverticulite *–suite*
- - - Intestin *–suite*
- - - - Grêle *–suite*
- - - - - Perforation et *K57.02*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et *K57.82*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.92*
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Perforation et *K57.20*
- - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulose du côlon sans perforation ni *K57.30*
- - - Grêle et du colon avec perforation et *K57.40*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon sans perforation ni *K57.50*
- - - - - Perforation et *K57.00*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et *K57.80*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.90*
- Sein associé à l'accouchement ¬ *O91.1*
- Sous-diaphragmatique
- - Tuberculeux ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K65.0*
- Sous-hépatique ¬ *K65.0*
- Sous-mandibulaire
- - Indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ *K12.22*
- - Sans indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ *K12.21*
- Sous-phrénique
- - Actes médicaux ¬ *T81.4*
- - ¬ *K65.0*
- Staphylocoque
- - Langue ¬ *K14.0, B95.8!*
- - Moelle épinière ¬ *G06.1, B95.8!*
- Subaréolaire gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ *O91.1*
- Sutures après des actes médicaux ¬ *T81.4*
- Thoracique ¬ *J86*
- Thymus ¬ *E32.1*
- Thyroïde ¬ *E06.0*
- Trompe de Fallope ¬ *N70*
- Tuberculeux
- - Appareil génito-urinaire ¬ *A18.1*
- - Bassin féminin ¬ *A18.1†, N74.1**
- - Cerveau ¬ *A17.8†, G07**
- - Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Dure-mère ¬ *A17.8†, G07**
- - Genou ¬ *A18.0†, M01.16**

Abcès *–suite*
- Tuberculeux *–suite*
- - Glande de Cowper ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Hanche ¬ *A18.0†, M01.15**
- - Intestin ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Muscle ¬ *A18.8†, M63.09**
- - Organe
- - - Génitaux NCA ¬ *A18.1*
- - - Urinaires et génitaux ¬ *A18.1*
- - Os ¬ *A18.0†, M90.09**
- - Péritoine ¬ *A18.3†, K67.3**
- - Rein ¬ *A18.1†, N29.1**
- - Scrotum ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Testicule ¬ *A18.1†, N51.1**
- Tubo-ovarien ¬ *N70*
- Urétral
- - Glande urétrale) ¬ *N34.0*
- - ¬ *N34.0*
- Utérin ¬ *N71*
- Vésicule biliaire sans calcul ¬ *K81.0*
- Vessie ¬ *N30.8*
- Vulve ¬ *N76.4*
- ¬
- - Chromomycose sous-cutanée avec *B43.2†, L99.8**
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Intestin grêle, sans perforation ni *K57.5*
- - - - Perforation et *K57.2*
- - - - Sans perforation ni *K57.3*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation et *K57.4*
- - - - - Perforation et *K57.0*
- - - - - Sans perforation ni *K57.1*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et *K57.8*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.9*
- - Kyste sacro-coccygien avec *L05.0*
- - Orchite épididymite épididymo-orchite
- - - *N45.0*
- - - Sans *N45.9*
- - Sinus pilonidal
- - - *L05.0*
- - - Sans *L05.9*
- - Tuberculose du rectum avec *A18.3†, K93.0**
- - Vaginite gonorrhéique avec *A54.1†, N77.1**
- - Vulvite gonorrhéique avec *A54.1†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite à gonocoques avec *A54.1†, N77.1**

Abdomen
- Lombes bassin
- - Partie non précisée ¬ Lésion traumatique superficielle de l' *S30.9*
- - Sans précision ¬

Abdomen *–suite*
- Lombes bassin *–suite*
- - Sans précision ¬ *–suite*
- - - Gelure du thorax, de l' *T35.3*
- - - Lésion traumatique
- - - - *S39*
- - - - *S39.9*
- - ¬
- - - Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l' *S38.3*
- - - Écrasement
- - - - Amputation traumatique d'une partie de l' *S38*
- - - - Parties autres et non précisées de l' *S38.1*
- - - Lésion traumatique
- - - - Multiple
- - - - - *S39.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S35.7*
- - - - Muscles et de tendons de l' *S39.0*
- - - - Nerf
- - - - - Moelle épinière lombaire au niveau de l' *S34*
- - - - - Non précisés au niveau de l' *S34.8*
- - - - - S) périphérique(s) de l' *S34.6*
- - - - Précisées de l' *S39.8*
- - - - Superficiel
- - - - - *S30*
- - - - - *S30.8*
- - - - - Multiples de l' *S30.7*
- - - - - Thorax, de l' *T00.1*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguins au niveau de l' *S35*
- - - - - Sanguins au niveau de l' *S35.88*
- - - - - Sanguins non précisés, au niveau de l' *S35.9*
- - - Plaie
- - - - Ouverte de l' *S31*
- - - - Ouvertes
- - - - - Multiples de l' *S31.7*
- - - - - Thorax avec plaies ouvertes de l' *T01.1*
- Membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du thorax, de l' *T04.7*
- Penduleux (ventre en besace) ¬ Soins maternels pour: *O34.8*
- Région
- - Lombo-sacré bassin ¬ Lésion traumatique vaisseau sanguin
- - - Épiduraux au niveau de l' *S35.80*
- - - Sous-arachnoïdiens au niveau de l' *S35.82*
- - - Sous-duraux au niveau de l' *S35.81*
- - Lombo-sacrée bassin
- - - Associée à une lésion intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l' *S31.83!*
- - - SAI ¬ Plaie ouverte de l' *S31*

Abdomen *–suite*
- Région *–suite*
- - Lombo-sacrée bassin *–suite*
- - - ¬ Autres lésions précisées de l' *S39.88*
- Sensible SAI ¬ *R10.4*
- Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ Écrasement du thorax et de l' *T04.1*
- Y compris l'espace rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l' *R93.5*
- ¬
- - Dissection transversale de: *T05.8*
- - Douleur localisé partie
- - - Inférieures de l' *R10.3*
- - - Supérieure de l' *R10.1*
- - Plaie ouverte partie non précis
- - - *S31.8*
- - - *S31.80*
- - Symptôme
- - - Précis du système digestif et de l' *R19.88*
- - - Signe
- - - - Précisés relatifs à l'appareil digestif et à l' *R19.8*
- - - - Relatifs à l'appareil digestif et à l' *R19*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l' *D21.4*
- - - Malign
- - - - *C76.2*
- - - - Nerfs périphériques de l' *C47.4*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous de l' *C49.4*

Abdominal
- Aigu ¬ Syndrome *R10.0*
- Anormaux ¬ Bruits *R19.1*
- Antérieur
- - Gangrène ¬ Autres hernies de la paroi *K43.78*
- - Non précis
- - - Gangrène ¬ hernie paroi
- - - - *K43.7*
- - - - *K43.79*
- - - Occlusion sans gangrène ¬ hernie paroi
- - - - *K43.6*
- - - - *K43.69*
- - - Sans occlusion gangrène ¬ hernie paroi
- - - - *K43.9*
- - - - *K43.99*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres hernies de la paroi *K43.68*
- - SAI ¬ Hernies de la paroi *K43.99*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres hernies de la paroi *K43.98*
- - ¬ Hernie de la paroi *K43*
- Descendant ¬ Rupture
- - Anévrysme de l'aorte *I71.3*
- - Aorte *I71.3*

Abdominal *–suite*
- Excessifs ¬ Bruits *R19.1*
- Fœtus viable ¬ Soins maternels pour grossesse *O36.7*
- Gazeuse) ¬ Distension *R14*
- Généralisée) (localisée) ¬ Douleur abdominale intense (avec contracture *R10.0*
- Intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée) ¬ Douleur *R10.0*
- Lombes bassin
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la paroi *T34.3*
- - ¬ Gelure superficielle de la paroi *T33.3*
- Non précis
- - Gangrène ¬ Hernie *K46.1*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K46.0*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K46.9*
- - ¬
- - - Douleurs *R10.4*
- - - Hernie *K46*
- Pelvienne ¬ Douleur *R10*
- Précis
- - Gangrène ¬ Autres hernies *K45.1*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres hernies *K45.8*
- Rompu ¬ Anévrisme aortique *I71.3*
- Rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.06*
- SAI ¬ Hernie *K46.9*
- Sans
- - Indication de rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.02*
- - Mention de rupture ¬ Anévrisme aortique *I71.4*
- Siège précis
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres hernies *K45.0*
- - ¬ hernie: *K45*
- ¬
- - Absence de bruits *R19.1*
- - Actinomycose *A42.1*
- - Adhérences (de): paroi *K66.0*
- - Anévrisme familial de l'aorte *I71.4*
- - Aplasie congénitale de la musculature *Q79.4*
- - Carcinome cutané de la paroi *C44.5*
- - Coarctation de l'aorte *Q25.1*
- - Contracture *R19.3*
- - Contusion de la paroi *S30.1*
- - Embolie et thrombose de l'aorte *I74.0*
- - Grossesse
- - - *O00.0*
- - - *P01.4*
- - Hernie
- - - *K45*
- - - Paroi *K43.99*
- - - Sur cicatrice *K43.2*
- - Lésion traumatique de l'aorte *S35.0*

Abdominal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Malformations congénitales de la paroi *Q79.5*
- - Paroi
- - - *C49.4*
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - Plaie ouverte de la paroi *S31.1*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité *R85*
- - Situs inversus ou transversus: *Q89.3*
- - Syndrome compartiment
- - - *R19.80*
- - Syphilis de l'aorte *A52.0†, I79.1**
- - Thrombose d'une veine *I82.88*
- - Transposition des viscères: *Q89.3*
- - Tularémie *A21.3*
- - Tumeur maligne: Œsophage *C15.2*
- - Typhus *A01.0*

Abdominis ¬ Syndrome rectus *G58.0*

Abdomino-pelvien ¬ Abcès: *K65.0*

Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et *S56.3*

Aberfeld
v. Schwartz-Jampel-Aberfeld

Aberrant ¬
- Artère
- - Pulmonaire *Q25.7*
- - Sous-clavière *Q27.8*
- Vaisseau rénal *Q27.8*

Aberration
- Mammaire ¬ *Q83.88*
- Rate ¬ *Q89.08*

ABeta2M variante ¬ Amylose *E85.1*

ABeta2Mwt ¬ Amylose *E85.3*

Abêtalipoprotéinémie ¬ *E78.6*

Abidi ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

ABL
- Négative ¬ Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ *C92.2*
- Positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ *C92.1*

Ablation
- Clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans *Z91.73*
- Organe à titre prophylactique ¬ Admission pour *Z40.0*
- Partiel complet partie extérieurement visible clitoris

Ablation *–suite*
- Partiel complet partie extérieurement visible clitoris *–suite*
- - Lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ *Z91.72*
- - Prépuce clitoridien ¬ *Z91.71*
- Petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l' *Z91.73*
- Prothèse ostéo-articulaire ¬ Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l' *M96.88*
- Sutures ¬ *Z48.0*

Ablépharie ¬ *Q10.3*

Ablépharie-macrostomie ¬ Syndrome d' *Q87.0*

ABO
- Fœtus et du nouveau-né ¬ Iso-immunisation *P55.1*
- ¬
- - Iso-immunisation: *O36.1*
- - Réaction d'incompatibilité *T80.3*

Abortive ¬ Peste: *A20.8*

Abortus ¬ Brucellose à Brucella *A23.1*

Abouchement veine cave supérieur
- Droite dans l'oreillette gauche ¬ *Q26.8*
- Gauche
- - Oreillette gauche par le sinus coronaire ¬ *Q26.1*
- - Toit de l'oreillette gauche ¬ *Q26.1*

Abrasion
- Cornée sans mention de corps étranger ¬ Lésion traumatique de la conjonctive et *S05.0*
- Dentifrice des dents ¬ *K03.1*
- Dents ¬ *K03.1*
- Éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: *S40.81*
- Habituelle des dents ¬ *K03.1*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Professionnelle des dents ¬ *K03.1*
- Rituelle des dents ¬ *K03.1*
- Sur
- - Coude ¬ *S50.81*
- - Genou ¬ *S80.81*
- - Main ¬ *S60.81*
- Traditionnelle des dents ¬ *K03.1*
- ¬
- - Lésion traumatique superficiel
- - - Avant-bras: *S50.81*
- - - Cheville et du pied: *S90.81*
- - - Hanche et de la cuisse: *S70.81*
- - - Jambe: *S80.81*
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.01*
- - - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.01*
- - - Partie du corps non précisée: *T14.01*

Abrasion *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion traumatique superficiel *–suite*
- - - Poignet et de la main: *S60.81*
- - - Tronc, niveau non précisé: *T09.01*
- - Ulcère [escarre] de pression avec *L89.1*

Abruzzo-Erickson ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ Folliculite et périfolliculite capitis *L66.3*

Absence
- Acquis
- - Deux bras ¬ *Z89.3*
- - Doigt s
- - - Bilatérale ¬ *Z89.3*
- - - Y compris le pouce], unilatérale ¬ *Z89.0*
- - Fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau] ¬ *Z89.8*
- - Main et poignet, unilatéral ¬ *Z89.1*
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Au-dessus du genou ¬ *Z89.6*
- - - - Niveau du genou ou au-dessous ¬ *Z89.5*
- - - Sans précision ¬ *Z89.9*
- - - Supérieur au-dessus du poignet, unilatérale ¬ *Z89.2*
- - - ¬ *Z89*
- - Organe
- - - Non classée ailleurs ¬ *Z90*
- - - S) génital(aux) ¬ *Z90.7*
- - - Voies urinaires ¬ *Z90.6*
- - - ¬ *Z90.8*
- - Partie
- - - Appareil digestif ¬ *Z90.4*
- - - Estomac ¬ *Z90.3*
- - - Tête et du cou ¬ *Z90.0*
- - Pied et cheville, unilatérale ¬ *Z89.4*
- - Poumon [partie de] ¬ *Z90.2*
- - Rein ¬ *Z90.5*
- - Sein(s) ¬ *Z90.1*
- Adolescence ¬ Épilepsie (avec): *G40.3*
- Agénésie
- - Appareil lacrymal ¬ *Q10.4*
- - Cils ¬ *Q10.3*
- - Paupière ¬ *Q10.3*
- Aplasie
- - Congénitales du pénis ¬ *Q55.5*
- - Cordon spermatique ¬ *Q55.4*
- - Prostate ¬ *Q55.4*
- - Testicule ¬ *Q55.0*
- Artère
- - Pulmonaire ¬ *Q25.7*
- - Veine NCA ¬ *Q27.8*
- Atrésie
- - Rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) ¬ *Q16.1*
- - Sténose congénital

Absence *–suite*
- Atrésie *–suite*
- - Sténose congénital *–suite*
- - - Anus
- - - - Fistule ¬ *Q42.2*
- - - - Sans fistule ¬ *Q42.3*
- - - Côlon
- - - - Sans précision de localisation ¬ *Q42.9*
- - - - ¬ *Q42*
- - - Duodénum ¬ *Q41.0*
- - - Iléon ¬ *Q41.2*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Sans précision de localisation ¬ *Q41.9*
- - - - - ¬ *Q41*
- - - - SAI ¬ *Q41.9*
- - - Jéjunum ¬ *Q41.1*
- - - Localisation
- - - - Côlon ¬ *Q42.8*
- - - - Précisées de l'intestin grêle ¬ *Q41.8*
- - - Rectum
- - - - Fistule ¬ *Q42.0*
- - - - Sans fistule ¬ *Q42.1*
- Bronches ¬ *Q32.4*
- Bruits abdominaux ¬ *R19.1*
- Cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Complète) (partielle) des voies digestives SAI ¬ *Q45.8*
- Congénital
- - Articulation d'une extrémité, n.c.a. ¬ *Q74.8*
- - Avant-bras et de la main ¬ *Q71.2*
- - Bras et de l'avant-bras, main présente ¬ *Q71.1*
- - Col de l'utérus ¬ *Q51.5*
- - Complet membre s
- - - Inférieur(s) ¬ *Q72.0*
- - - Supérieur(s) ¬ *Q71.0*
- - Cuisse et de la jambe, pied présent ¬ *Q72.1*
- - E
- - - Aorte ¬ *Q25.4*
- - - Vulve ¬ *Q52.7*
- - Hypoplasie de l'artère ombilicale ¬ *Q27.0*
- - Jambe et du pied ¬ *Q72.2*
- - Lobe de l'oreille ¬ *Q17.8*
- - Main et de(s) doigt(s) ¬ *Q71.3*
- - Membre(s) non précisé(s) ¬ *Q73.0*
- - Musculature du ventre ¬ *Q79.4*
- - Nez ¬ *Q30.1*
- - Oreille SAI ¬ *Q16.9*
- - Organes respiratoires ¬ *Q34.9*
- - Os du crâne ¬ *Q75.8*
- - Ovaire(s) ¬ *Q50.0*
- - Pancréas ¬ *Q45.0*
- - Pavillon de l'oreille ¬ *Q16.0*

Absence *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Pied et d'un (des) orteil(s) ¬ *Q72.3*
- - Pouce ¬ *Q71.3*
- - Rein(s) ¬ *Q60*
- - Rotule ¬ *Q74.1*
- - Sein avec absence de mamelon ¬ *Q83.0*
- - Sternum ¬ *Q76.7*
- - Utérus ¬ *Q51.0*
- - Vagin ¬
- - - *Q52.0*
- - Vertèbres sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- - Vésicule biliaire ¬ *Q44.0*
- - Vessie et de l'urètre ¬ *Q64.5*
- Côtes congénitale ¬ *Q76.6*
- Diaphragme ¬ *Q79.1*
- Enfance [pyknolepsie] ¬ Épilepsie (avec): *G40.3*
- Épileptiques ¬ État d' *G41.1*
- Fibres sensitives myélinisées de gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec surdité, déficience intellectuelle et *G60.0*
- Foie congénital(e) ¬ *Q44.7*
- Glandes ou de canaux salivaires ¬ *Q38.4*
- Iris ¬ *Q13.1*
- Luette ¬ *Q38.5*
- Mamelon
- - Congénitale) ¬ *Q83.2*
- - ¬ Absence congénitale de sein avec *Q83.0*
- Membres de la famille ¬ *Z63*
- Menstruation SAI ¬ *N91.2*
- Muscle ¬ *Q79.8*
- Myocloniques ¬ Épilepsie avec: *G40.4*
- Œsophage ¬ *Q39.8*
- Orifice lacrymal ¬ *Q10.4*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Partiel acquis deux membre
- - Inférieurs ¬ *Z89.7*
- - Supérieurs ¬ *Z89.3*
- Perte de désir sexuel ¬ *F52.0*
- Poumon (lobe) ¬ *Q33.3*
- Radius ¬ Syndrome de: thrombopénie avec *Q87.2*
- Rate ¬ *Q89.01*
- Reconnue de fibrose kystique du pancréas ¬ Iléus méconial en l' *P76.0*
- Tendon ¬ *Q79.8*
- Trompe
- - Eustache ¬ *Q16.2*
- - Fallope ou du ligament large ¬ *Q50.6*
- Uretère ¬ *Q62.4*
- Veine
- - Cave (inférieure) (supérieure) ¬ *Q26.8*
- - Innominée ¬ *Q26.8*

Absent
- Cæcum et du côlon ¬ Rotation: *Q43.3*
- Lent dans le corps) ¬ Blessure de reperfusion (retour *T88.8*
- ¬ Syndrome d'aniridie-rotule *Q87.8*

Absolu ¬ Glaucome *H44.5*

Absorbant
- Post-opératoire ¬
- - Infection d'un coussinet *H59.8*
- - Inflammation non infectieuse d'un coussinet *H59.8*
- ¬ Endophtalmie associée à un coussinet *H59.8*

Absorption
- Aliments et de liquides ¬ Autres symptômes et signes relatifs à l' *R63.8*
- Intestinal hydrates carbone ¬
- - Anomalies de l' *E74.3*
- - Trouble de l' *E74.3*
- Transport des acides aminés ¬ Trouble de l' *E72.0*

Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d' *C96.0*

Abus
- Antiacides ¬ *F55*
- Chronique d'alcool ¬ *F10.2*
- Médicament
- - Toxicomanie ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- - ¬ Rééducation des drogués et après *Z50.3!*
- Préparations à base de plantes ou remèdes populaires ¬ *F55*
- Sans précision ¬ *Z91.8*
- Sexuel allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un *Z04.5*
- Stéroïdes ou hormones ¬ *F55*
- Substances psycho-actives ¬ Antécédents personnels d' *Z86.4*
- Vitamines ¬ *F55*
- ¬ Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d' *T43.6*

AC
- Accélératrice) ¬ Déficit héréditaire en globuline *D68.22*
- Globuline ¬ Carence en *D68.22*

Acalculie
- Développement ¬ *F81.2*
- ¬ *R48.8*

Acanthamoeba ¬
- Conjonctivite due à *B60.1†, H13.1**
- Kératoconjonctivite interstitielle à *B60.1†, H19.2**

Acanthamœbiose
- Conjonctive ¬ *B60.1†, H13.1**
- Kératite ¬ *B60.1†, H19.2**
- Kératoconjonctivite ¬ *B60.1†, H19.2**
- ¬ *B60.1*

Acanthocéphalose ¬ *B83.8*

Acanthocytose ¬ *E78.6*

Acantholyse
- Sans précision ¬ *L11.9*
- ¬
- - *L11*
- - Formes précisées d' *L11.8*

Acantholytique
- Transitoire [Grover] ¬ Dermatose *L11.1*
- ¬ Epidermolyse bulleuse létale *Q81.0*

Acanthose buccale ¬ *K13.2*

Acanthosis nigricans ¬ *L83*

Acariase
- Infestations ¬ Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l' *Z20.7*
- ¬ Autres *B88.0*

Acarien ¬
- Dermatite due aux *B88.0*
- Dermite (due à): *B88.0*
- Infestation SAI par des *B88.9*

Acarodermatite ¬ *B88.0*

Acatalasie [Takahara] ¬ *E80.3*

Accélération vitesse sédimentation
- Anomalies de la viscosité plasmatique ¬ *R70*
- ¬ *R70.0*

Accélératrice) ¬ Déficit héréditaire en globuline AC (*D68.22*

Accéléré
- Dysmorphie faciale-retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse *Q87.3*
- ¬
- - Angine: *I20.0*
- - Conduction auriculoventriculaire: *I45.6*

Accentuation de certains traits de la personnalité ¬ *Z73*

Acceptation intervention
- Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et *Z64.8*
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et *Z64.8*

Accès
- Établissements de santé et autres structures d'aide ¬ Non disponibilité ou impossibilité d' *Z75.8*
- Vasculaire
- - Non précisé ¬ Adaptation et manipulation d'un autre *Z45.29*
- - ¬ Ajustement et entretien d'un dispositif d' *Z45.2*

Accessoire
v. Type de maladie

Accident
- Accident non précisé ¬ Autre *X59.9!*
- Aiguille à injection ¬ *W49.9!*
- Armes à feu ¬ *W49.9!*
- Bicyclette ¬ *V99!*
- Bus ¬ *V99!*

Accident *–suite*
- Camion ¬ *V99!*
- Cardio-vasculaire SAI ¬ *I51.6*
- Cérébrovasculaire
- - Imminent ¬ *G45.9*
- - SAI ¬ *I64*
- Chaleur artificielle ¬ *W92.9!*
- Changement de pression atmosphérique ¬ *W94.9!*
- Chute (dans l'eau) ¬ *X59.9!*
- Complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux ¬ *Y69!*
- Contact avec des plantes vénéneuses ou des animaux venimeux ¬ *X29.9!*
- Corps de feu d'artifice ¬ *W49.9!*
- Coup de couteau ¬ *W49.9!*
- Courant électrique ¬ *W87.9!*
- Dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre *Y34.9!*
- Équitation ou accident de véhicule attelé à un animal ¬ *V99!*
- Explosion de chaudière/bouilloire ¬ *W49.9!*
- Exposition forces mécanique objet
- - Animés ¬ *W64.9!*
- - Inanimés ¬ *W49.9!*
- Extraction ou affection périodontale localisée ¬ Perte de dents consécutive à *K08.1*
- Froid artificiel ¬ *W93.9!*
- Ischémique
- - Cérébral transitoire
- - - AIT] ¬ *G45*
- - - Sans précision ¬ *G45.9*
- - - Syndrome apparent ¬
- - - - *G45*
- - - - *G45.8*
- - Transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux ¬ *G45.2*
- Machines ¬ *W49.9!*
- Moto ¬ *V99!*
- Non précisé ¬ Autre accident et *X59.9!*
- Objet (jeté) (tombant) ¬ *W49.9!*
- Outils ¬ *W49.9!*
- Pénétration d'un corps étranger à travers la peau ¬ *W49.9!*
- Piéton ¬ *V99!*
- Radiation ¬ *W91.9!*
- Train ¬ *V99!*
- Tram ¬ *V99!*
- Transport
- - Aérien ¬ *V99!*
- - ¬
- - - *V99!*
- - - Examen et mise en observation après un *Z04.1*

Accident *–suite*

- Travail ¬ Examen et mise en observation après un *Z04.2*
- Vasculaire cérébral
- - Non précis étant hémorragique infarctus ¬
- - - *I64*
- - - Séquelles d' *I69.4*
- - ¬ Antécédents personnels d' *Z86.7*
- Véhicule
- - Aquatique ¬ *V99!*
- - Attelé à un animal ¬ Accident d'équitation ou *V99!*
- - Livraison ¬ *V99!*
- - Moteur causé délibérément ¬ *Y09.9!*
- - Spécialisé ¬ *V99!*
- Voiture ¬ *V99!*
- ¬ Examen et mise en observation après un autre *Z04.3*

Accommodation ¬

- Paralysie hystérique de l' *F44.88†, H58.1**
- Parésie de l' *H52.5*
- Spasme de l' *H52.5*
- Troubles de l' *H52.5*
- Vices de réfraction et troubles de l' *H52*

Accompagnant un sujet malade ¬ Personne en bonne santé *Z76.3*

Accompagné d'autres manifestations neurologiques ¬ Zona *B02.2†*

Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du fœtus avec menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ *O35.8*

Accouchement

- Administration de médicaments ¬ détresse fœtale au cours du travail ou de l' *O68*
- Anomalie
- - Coagulation ¬ Hémorragie
- - - Pendant l' *O67.0*
- - - Précédant l' *O46.0*
- - Implantation du placenta ¬ Complication de l' *O44.00*
- Associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- Avant terme ¬ Ictère
- - Néonatal associé à un *P59.0*
- - Retard de la glycuronoconjugaison associée à un *P59.0*
- Césarienne ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.4*
- Compliqué
- - Anomalie
- - - Cordon ombilical
- - - - Sans précision ¬ Travail et *O69.9*

Accouchement *–suite*

- Compliqué *–suite*
- - Anomalie *–suite*
- - - Cordon ombilical *–suite*
- - - - ¬
- - - - - Travail et *O69*
- - - - - Travail et *O69.8*
- - - Rythme cardiaque fœtus
- - - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et *O68.2*
- - - - ¬ Travail et *O68.0*
- - Brièveté du cordon ¬ Travail et *O69.3*
- - Circulaire du cordon, avec compression ¬ Travail et *O69.1*
- - Détresse fœtal
- - - Sans précision ¬ Travail et *O68.9*
- - - ¬ Travail et *O68*
- - Forme d'enchevêtrement du cordon ¬ Travail et *O69.2*
- - Hémorragie, non classée ailleurs ¬ Travail et *O67*
- - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ Travail et *O69.4*
- - Lésions vasculaires du cordon ¬ Travail et *O69.5*
- - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et *O68.1*
- - Prolapsus du cordon ¬ Travail et *O69.0*
- - Signe
- - - Biochimiques de détresse fœtale ¬ Travail et *O68.3*
- - - Détresse fœtale ¬ Travail et *O68.8*
- Enfant ¬ Hémorragie après expulsion du fœtus ou *O72*
- Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.3*
- Extraction par le siège ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.0*
- Forceps
- - Césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un *O66.5*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.2*
- Important associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie pendant l' *O67.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie pendant l' *O67.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie pendant l' *O67.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie pendant l' *O67.0*
- Mère ¬ Lacération du tissu péri-urétral en tant que lésion due à l' *O70.0*
- Non classé ¬
- - Complications du travail et de l' *O75*
- - Hémorragie précédant l' *O46*
- Précipité ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.5*
- Prématuré

Accouchement *–suite*

- Prématuré *–suite*
- - Césarienne
- - - Sans travail spontané ¬ *O60.3*
- - - ¬ Travail prématuré spontané avec *O60.1*
- - Induit ¬ *O60.3*
- - Sans travail spontané ¬ *O60.3*
- - ¬ Travail prématuré spontané avec *O60.1*
- Présence d'un léiomyome utérin ¬ *O34.1*
- Puerpéralité
- - Sans précision ¬
- - - Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.9*
- - - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l' *O98.9*
- - ¬
- - - Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l' *O26.6*
- - - Anémie compliquant la grossesse, l' *O99.0*
- - - Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l' *Z87.5*
- - - Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.3*
- - - Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.1*
- - - Cours
- - - - *O24*
- - - - Travail, de l' *O87*
- - - Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l' *O95*
- - - Embolies de la grossesse, de l' *O88*
- - - Gonococcie compliquant la grossesse, l' *O98.2*
- - - Hépatite virale compliquant la grossesse, l' *O98.4*
- - - Hypertension
- - - - Essentielle préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.0*
- - - - Préexistante compliquant la grossesse, l' *O10*
- - - - Secondaire préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.4*
- - - Maladie
- - - - Affections précisées compliquant la grossesse, l' *O99.8*
- - - - Appareil
- - - - - Circulatoire compliquant la grossesse, l' *O99.4*
- - - - - Digestif compliquant la grossesse, l' *O99.6*
- - - - - Respiratoire compliquant la grossesse, l' *O99.5*
- - - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l' *O98.3*
- - - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l' *O99.2*
- - - - Infectieux

Accouchement *–suite*
- Puerpéralité *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Maladie *–suite*
- - - - Infectieux *–suite*
- - - - - Parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l' *O98*
- - - - - Parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l' *O98.8*
- - - - Mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l' *O99*
- - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l' *O99.7*
- - - - Protozoaires compliquant la grossesse, l' *O98.6*
- - - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l' *O99.1*
- - - - Virales compliquant la grossesse, l' *O98.5*
- - - - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l' *O98.7*
- - - Malnutrition au cours de l' *O25*
- - - Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.2*
- - - Séquelles de complications de la grossesse, de l' *O94*
- - - Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l' *O26.7*
- - - Syphilis compliquant la grossesse, l' *O98.1*
- - - Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l' *O99.3*
- - - Tuberculose compliquant la grossesse, l' *O98.0*
- Retardé
- - Deuxième jumeau, triplé, etc. ¬ *O63.2*
- - Rupture
- - - Artificielle des membranes ¬ *O75.5*
- - - Spontanée ou non précisée des membranes ¬ *O75.6*
- SAI ¬
- - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l' *O75.4*
- - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l' *O75.4*
- - Dépression (du): après un *F53.0*
- - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l' *O75.4*
- - Travail prématuré avec *O60.1*
- Sans

Accouchement *–suite*
- Sans *–suite*
- - Hémorragie ¬ Rétention de produits de la conception après l' *O73.1*
- - Précision ¬
- - - Complication
- - - - Anesthésie au cours du travail et de l' *O74.9*
- - - - Travail et de l' *O75.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l' *P03.9*
- - - Hémorragie
- - - - Pendant l' *O67.9*
- - - - Précédant l' *O46.9*
- - - Mastopathies associées à l' *O92.2*
- - - Résultat de l' *Z37.9!*
- - Saignement ¬ Adhérence du placenta en tant que complication de l' *O43.20, O73.0*
- Spontané avec présentation en tête ¬ *O80*
- Terme
- - Césarienne ¬ Travail prématuré spontané avec *O60.2*
- - ¬ Travail prématuré avec *O60.2*
- Tout à fait normal ¬ *O80*
- Unique
- - Césarienne ¬ *O82*
- - Forceps et ventouse ¬ *O81*
- - Spontané ¬ *O80*
- Voie vaginale après une césarienne ¬ *O75.7*
- ¬
- - Abcès du sein associé à l' *O91.1*
- - Amputation
- - - Col utérin en tant que complication de l' *O65.5*
- - - Fœtus pour faciliter l' *P03.8*
- - Anomalie du tissu pelvien lors de l' *O34.9*
- - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.3*
- - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.2*
- - Atrésie du col utérin en tant que complication de l' *O65.5*
- - Blessure de la mère par un instrument pendant l' *O71.9*
- - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l' *O74.5*
- - Cervicite après *O86.1*
- - Choc pendant ou après le travail et l' *O75.1*
- - Cicatrice au col utérin en tant que complication de l' *O65.5*
- - Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.1*
- - Complication
- - - Anesthésie au cours du travail et de l' *O74.8*
- - - Cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.2*

Accouchement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Complication *–suite*
- - - Intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.3*
- - - Précisées du travail et de l' *O75.8*
- - - Pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.1*
- - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l' *O74.6*
- - Contraction hypotonique de l'utérus en tant que complication de l' *O62.2*
- - Crevasses du mamelon associées à l' *O92.1*
- - Décès dû à l'anesthésie en tant que complication de l' *O74.9*
- - Déchirure
- - - Rupture
- - - - Périnatal
- - - - - Intéressant): fourchette au cours de l' *O70.0*
- - - - - Intéressant): légère au cours de l' *O70.0*
- - - - - Intéressant): lèvres au cours de l' *O70.0*
- - - - - Intéressant): peau au cours de l' *O70.0*
- - - - - Intéressant): vagin au cours de l' *O70.0*
- - - - - Intéressant): vulve au cours de l' *O70.0*
- - - - - O70.0, intéressant aussi: muscles du: périnée au cours de l' *O70.1*
- - - - - O70.0, intéressant aussi: muscles du: vagin au cours de l' *O70.1*
- - - - - O70.0, intéressant aussi: plancher pelvien au cours de l' *O70.1*
- - - - - O70.1, intéressant aussi: cloison recto-vaginale au cours de l' *O70.2*
- - - - - O70.1, intéressant aussi: sphincter: anal au cours de l' *O70.2*
- - - - - O70.1, intéressant aussi: sphincter: SAI au cours de l' *O70.2*
- - - - - O70.2, intéressant aussi la muqueuse anale au cours de l' *O70.3*
- - - - - O70.2, intéressant aussi la muqueuse rectale au cours de l' *O70.3*
- - - - Tissus périurétraux au cours de l' *O70.0*
- - - Sillon vaginal pendant l' *O71.4*
- - - Tiers
- - - - Moyen du vagin pendant l' *O71.4*
- - - - Supérieur du vagin pendant l' *O71.4*
- - - Utérus pendant l' *O71.1*
- - Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l' *O74.7*
- - Épuisement maternel au cours du travail et de l' *O75.0*
- - Fœtus nouveau-né affecté
- - - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l' *P04.0*
- - - Complication
- - - - Précisées du travail et de l' *P03.8*
- - - - Travail et de l' *P03*

Accouchement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fœtus nouveau-né affecté *–suite*
- - - Présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l' *P03.1*
- - Fracture proximale de l'humérus en tant que traumatisme dû à l' *P13.3*
- - Galactorrhée sans relation avec un *N64.3*
- - Hémorragie
- - - Importante pendant l' *O67.8*
- - - Pendant l' *O67.8*
- - - Précédant l' *O46.8*
- - Hyperthermie d'origine inconnue, après *O86.4*
- - Hypotonie de l'utérus en tant que complication de l' *O62.2*
- - Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l' *P20.1*
- - Infection
- - - Mamelon associée à l' *O91.0*
- - - Mammaires associées à l' *O91*
- - - Suture: périnéale après *O86.0*
- - - Voie
- - - - Génitales, après *O86.1*
- - - - Génito-urinaires, après *O86.3*
- - - - Urinaires, après *O86.2*
- - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.2*
- - Intervention destructrice pour faciliter l' *P03.8*
- - Invagination du mamelon associée à l' *O92.0*
- - Lacération vaginale en tant que complication de l' *O70.0*
- - Lésion du nerf optique au cours de l' *P11.4*
- - Malformation des organes pelviens lors de l' *O34.9*
- - Mastite non purulente associée à l' *O91.2*
- - Mastopathies et anomalies de la lactation associées à l' *O92*
- - Mort
- - - Origine obstétricale survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96*
- - - Séquelle relevant
- - - - Cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96.9*
- - - - Directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96.0*
- - - - Indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96.1*
- - Pneumonie
- - - Aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*

Accouchement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pneumonie *–suite*
- - - Chimique d'aspiration dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - - Infectieuse acquise in utero ou pendant l' *P23*
- - Réaction
- - - Intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l' *P04.0*
- - - Toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l' *O74.4*
- - Résultat de l' *Z37!*
- - Rétention de produits de la conception SAI, après l' *O72.2*
- - Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de: *N35.0*
- - Soins et examens immédiatement après l' *Z39.0*
- - Syndrome
- - - Défibrination avec hémorragie pendant l' *O67.0*
- - - Hépato-rénal consécutif au travail et à l' *O90.4*
- - - Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - Thrombophlébite des veines pelviennes, avant l' *O22.3*
- - Thrombose veineuse profonde, avant l' *O22.3*
- - Travail prématuré
- - - *O60*
- - - Sans *O60.0*
- - Vaginite après *O86.1*

Accreta
- Sans saignement ¬ Placenta *O43.20, O73.0*
- ¬ Placenta *O43.20*

Accretio cordis ¬ *I31.0*

Accrétion sur dent
- Bétel ¬ Dépôts [*K03.6*
- Materia alba ¬ Dépôts [*K03.6*
- Noir ¬ Dépôts [*K03.6*
- Orange ¬ Dépôts [*K03.6*
- Tabac ¬ Dépôts [*K03.6*
- Vert ¬ Dépôts [*K03.6*
- ¬ Dépôts [*K03.6*

Acculturation ¬ Difficultés liées à l' *Z60*

Acéphalie ¬ *Q00.0*

Acétabulaire
- Congénitale ¬ Dysplasie *Q65.8*
- ¬ Protrusion *M24.7*

Acétabulum ¬
- Fracture de l' *S32.4*
- Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*

Acétazolamide ¬
- *T50.2*
- Myotonie répondant à l' *G71.1*

Acétique ¬ Taux urinaires élevés de: acide indol- *R82.5*

Acétoacétate transférase ¬ Déficit en succinyl-CoA *E71.3*

Acétoacétyl
v.a. alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA

Acétoacétyl-CoA thiolase mitochondriale ¬ Déficit en *E71.1*

Acétonurie ¬ *R82.4*

Acétyl
v.a. alpha-N-acétyl-galactosaminidase
v.a. N-acétyl-6-sulfatase

Acetylgalactosamine
v. N-acetylgalactosamine

Acétylgalactosaminidase
v. alpha-N-acétylgalactosaminidase

Acétylglucosamine
v. N-acétylglucosamine-1-phosphotransférase

Acétylsalicylique ¬ Acide *Z92.2*

Acétyltransférase ¬ Déficit en composé dihydrolipoamide *E74.4*

Achalasie
- Cardia ¬ *K22.0*
- Idiopathique
- - Œsophage ¬ *K22.0*
- - ¬ *K22.0*
- Précoce ¬ Maladie de Moyamoya avec *I67.5*
- Primitive de l'œsophage ¬ *K22.0*
- SAI ¬ *K22.0*
- ¬ Cardialgie gastrique au cours d' *K22.0*

Achalasie-microcéphalie ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Acheirie ¬ *Q71.3*

Achiasma congénital ¬ *H47.4*

Achille
- Acquise) ¬ Brièveté du tendon d' *M67.0*
- ¬
- - Bursite du tendon d' *M76.6*
- - Lésion traumatique du tendon d' *S86.0*
- - Tendinite du tendon d' *M76.6*

Achlorhydrie ¬ *K31.8*

Acholurique (familial) ¬ Ictère: *D58.0*

Achondrogénésie ¬ *Q77.0*

Achondroplasie ¬ *Q77.4*

Achromatopsie ¬
- *E70.3*
- *H53.5*

Achromie ¬ *E70.3*

Achromique
- Lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.3*
- Pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.2*

Acide
- Acétylsalicylique ¬ *Z92.2*
- Amidohydrolase ¬ Déficit en N-acyl-L-amino *E72.8*
- Aminés
- - Aromatiques

Acide *–suite*
- Aminés *–suite*
- - Aromatiques *–suite*
- - - Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme des *E70.9*
- - - ¬
- - - - Anomalie
- - - - - Métabolisme des *E70*
- - - - - Métabolisme des *E70.8*
- - - - Déficit en décarboxylase des *G24.8*
- - Chaîne ramifié
- - - Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du métabolisme des *E71*
- - - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E71.2*
- - - ¬ Autres anomalies du métabolisme des *E71.1*
- - Non ramifiés ¬ Trouble du métabolisme des *E72.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E72.9*
- - Soufrés ¬ Anomalies du métabolisme des *E72.1*
- - ¬
- - - Anémie (par): carence en *D53.0*
- - - Anomalie
- - - - Métabolisme des *E72*
- - - - Précisées du métabolisme des *E72.8*
- - - - Transport des *E72.0*
- - - Carence en *E72.9*
- - - Trouble
- - - - Absorption et du transport des *E72.0*
- - - - Congénital du métabolisme des *E72.9*
- - - - Métabolisme des *E72.9*
- Ascorbique ¬ Carence en *E54*
- Biliaire
- - Cholestase et malabsorption ¬ Défaut de synthèse des *K76.8*
- - ¬
- - - Déficit congénital de synthèse des *K76.8*
- - - Malabsorption idiopathique par défaut de synthèse des *K90.8*
- Chlorhydrique ¬ *T54.2*
- Corrosifs et substances similaires ¬ Effet toxique: *T54.2*
- Esters nitriques ¬ Effet toxique: Nitroglycérine et autres *T65.5*
- Folinique ¬ Convulsions sensibles à l' *G40.3*
- Folique
- - Médicaments ¬ Anémie par carence en *D52.1*
- - SAI ¬ Anémie par carence en *D52.9*
- - Sans précision ¬ Anémie par carence en *D52.9*
- - ¬
- - - Anémie
- - - - Carence
- - - - - *D52*
- - - - - *D52.8*

Acide *–suite*
- Folique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Anémie *–suite*
- - - - Carence *–suite*
- - - - - Alimentaire en *D52.0*
- - - - Mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l' *D53*
- - - Carence en: *E53.8*
- Gallique ¬ Allergie à l' *T78.4*
- Gamma-aminobutyrique ¬
- - Déficit en transaminase de l' *E72.8*
- - Trouble du métabolisme de l' *E72.8*
- Gras
- - Chaîne
- - - Court ¬
- - - - Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - - - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - - - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - - Long ¬ Déficit
- - - - 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - - - Acyl-CoA-déshydrogénase des *E71.3*
- - - Moyenne ¬ Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - Essentiels ¬ Carence en *E63.0*
- - Métabolisme des corps cétoniques ¬ Trouble de l'oxydation des *E71.3*
- - ¬
- - - Anomalie métabolisme
- - - - *E71.3*
- - - - Acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des *E71*
- - - Déficit d'oxydoréduction des alcools d' *Q87.1*
- - - Neurodégénérescence associée à l'hydroxylase des *G23.0*
- Homogentisique ¬ Déficit en oxydase de l' *E70.2*
- Iminés ¬ Maladie des *E72.8*
- Indol-acétique ¬ Taux urinaires élevés de: *R82.5*
- Lactique déshydrogénase ¬ Augmentation des taux de transaminase et d' *R74.0*
- Lysergique] ¬ Intoxication au LSD [diéthylamide de l' *T40.8*
- Lysosomale ¬ Déficit en lipase *E75.5*
- Nicotinique
- - Dérivés) ¬ *T46.7*
- - Pellagre] ¬ Carence en *E52*
- - Tryptophane) ¬ Carence en: *E52*
- - ¬ Démence au cours de carence en *E52†, F02.8**
- Normale ¬ Glycogénose lysosomale à activité maltase *E74.0*

Acide *–suite*
- Pantothénique ¬ Carence en: *E53.8*
- Sialique libre ¬ Maladie de surcharge en *E77.8*
- Sulfurique ¬ *T54.2*
- Urique ¬
- - Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l' *T50.4*
- - Néphrolithiase avec calcul d' *M10.09†, N22.8**
- Valproïque ¬
- - *T42.6*
- - Intoxication à l' *T42.6*
- ¬
- - Anomalies des taux de: phosphatase: *R74.8*
- - Déficit
- - - Alpha-1,4-glucosidase *E74.0*
- - - Céramidase *E75.2*
- - - Phosphatase *E83.38*
- - Exposition à l' *T54.9*
- - Glycogénose par déficit en maltase *E74.0*

Acidémie
- 2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Argininosuccinique ¬ *E72.2*
- D-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Fœtale ¬ *O68.3*
- Glutarique type
- - 1 ¬ *E72.3*
- - 2 ¬ *E71.3*
- Isovalérique ¬ *E71.1*
- L-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Méthylmalonique
- - Résistante à la vitamine B12 ¬ *E71.1*
- - Sensible vitamine B12
- - - Type cblB ¬ *E71.1*
- - - ¬ *E71.1*
- - ¬ *E71.1*
- Pipécolique ¬ *E72.3*
- Propionique ¬ *E71.1*

Acidifiants ¬ *T50.9*

Acido-basique
- Fœtale ¬ Anomalie de l'équilibre *O68.3*
- ¬
- - Anomalie mixte de l'équilibre *E87.4*
- - Déséquilibres hydro-électrolytiques et *E87*

Acidophile
- Basophile de l'hypophyse ¬ Carcinome mixte *C75.1*
- Hypophyse ¬
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome
- - - *C75.1*
- - - Mixte basophile et *C75.1*

Acidose
v.a. Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes

Acidose *–suite*
- Fœtale ou intra-utérine ¬ *P20*
- Lactique
- - Congénitale type Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ *G31.88*
- - Déficit en MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique mitochondriale avec *I42.2*
- - Épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, *G31.81*
- - Fatale avec acidurie méthylmalonique ¬ *E71.1, E87.2*
- - Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, *G31.81*
- - ¬ *E87.2*
- Métabolique
- - Tardive du nouveau-né ¬ *P74.0*
- - ¬ *E87.2*
- Respiratoire ¬ *E87.2*
- SAI ¬ *E87.2*
- Tubulaire
- - Rénal
- - - Distale ¬ *N25.8*
- - - Proximale ¬ *N25.8*
- - - Type 2 ¬ *N25.8*
- - SAI ¬ *N25.8*
- - Type I[Syndrome de Lightwood-Albright] ¬ *N25.8*
- ¬ *E87.2*

Acidurie
- 2
- - Hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- - Méthylbutyrique ¬ *E71.1*
- 3
- - Hydroxy-3-méthylglutarique ¬ *E71.1*
- - Méthylglutaconique type
- - - 1 ¬ *E71.1*
- - - 2 ¬ *E71.1*
- - - 3-méthylglutaconique type 3 ¬ *E71.1*
- - - 4 ¬ *E71.1*
- - - 5 ¬ *E71.1†, I43.1**
- - - 7 ¬ *E71.1*
- 4-hydroxybutyrique ¬ *E72.8*
- Alpha-méthyl-acétoacétylique ¬ *E71.1*
- Argininosuccinique ¬
- - *E72.2*
- D,L-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- D-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Formiminoglutamique ¬ *E70.8*
- Gamma-hydroxybutyrique ¬ *E72.8*
- Glutarique type
- - 1 ¬ *E72.3*
- - 2 ¬ *E71.3*
- - 3 ¬ *E72.3*
- Glycolique ¬ *E74.8*

Acidurie *–suite*
- Hydroxyméthylglutarique ¬ *E71.1*
- Isobutyrique ¬ *E71.1*
- L-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Malonique ¬ *E72.8*
- Méthylmalonique
- - Déficit
- - - Méthylmalonyl-CoA épimérase ¬ *E71.1*
- - - Récepteur de la transcobalamine ¬ *E71.1*
- - Résistante à la vitamine B12 ¬ *E71.1*
- - Sensible vitamine B12
- - - Type cblA ¬ *E71.1*
- - - ¬ *E71.1*
- - ¬ Acidose lactique fatale avec *E71.1, E87.2*
- Mévalonique ¬ *E88.8*
- Orotique héréditaire ¬ *E79.8*
- Propionique ¬ *E71.1*
- Xanthurénique ¬ *E70.8*

Acinetobacter
- Baumannii multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Groupe *U81.11!*
- - 3MRGN ¬ Groupe *U81.31!*
- - 4MRGN ¬ Groupe *U81.51!*
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Pseudomonas et *U81.1!*
- - 3MRGN ¬ Pseudomonas et *U81.3!*
- - 4MRGN ¬ Pseudomonas et *U81.5!*
- ¬ *B96.5!*

Acineuses du pancréas ¬ Carcinome à cellules *C25.9*

Ackerman ¬ Syndrome de molaires avec racines fusionnées d' *Q87.8*

Acné
- Apocrine ¬ *L73.2*
- Chéloïde [Folliculite sclerotisans nuchae] ¬ *L73.0*
- Conglobata ¬ *L70.1*
- Excoriée
- - Jeunes filles ¬ *L70.5*
- - ¬ *L70.5*
- Infantile ¬ *L70.4*
- Inversée ¬ *L73.2*
- Laissant des cicatrices ¬ *L70.9*
- Miliaire nécrosante ¬ *L70.2*
- Rosacée
- - Sans précision ¬ *L71.9*
- - ¬
- - - *L71*
- - - Blépharite au cours d' *L71.8†, H03.8**
- - - Blépharo-conjonctivite au cours d' *L71.8†, H13.2**
- - - Conjonctivite au cours d' *L71.9†, H13.2**
- - - Formes d' *L71.8*
- - - Kératite au cours d' *L71.8†, H19.3**

Acné *–suite*
- Sans précision ¬ *L70.9*
- Stéroïdes ¬ *L70.8*
- Tropicale ¬ *L70.3*
- Varioliforme ¬ *L70.2*
- Vulgaire ¬ *L70.0*
- ¬
- - *L70*
- - Formes d' *L70.8*

Acnéiforme ¬ Érythème *L66.4*

Acnéique ¬ Triade *L73.2*

Acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique ¬ Hypo- et *N31.81*

Acouphènes ¬ *H93.1*

Acoustique
- Conduction osseuse ¬ Appareil *Z96.2*
- Cours de la syphilis ¬ Névrite *A52.1†, H94.0**
- Inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite *H94.0**
- N. stato-acoustique] ¬ Nerf *S04.6*
- ¬
- - Nerf acoustique [N. stato- *S04.6*
- - Neurinome de l' *D33.3*
- - Syphilis du nerf *A52.1†, H94.0**
- - Traumatisme *H83.3*

Acquired Renal Cystic Disease] ¬ ACRD [*N28.1*

Acquis
v. Type de maladie

Acquisition
- Arithmétique ¬ Trouble
- - *F81.2*
- - Spécifique de l' *F81.2*
- Articulation ¬ Trouble spécifique de l' *F80.0*
- Connaissances SAI ¬ Incapacité (de): concernant l' *F81.9*
- Coordination ¬ Trouble de l' *F82*
- Expression écrite ¬ Trouble de l' *F81.8*
- Langage type
- - Expressif ¬ Trouble de l' *F80.1*
- - Réceptif ¬ Trouble de l' *F80.2*
- Orthographe ¬ Trouble spécifique de l' *F81.1*
- Scolaires
- - Sans précision ¬ Trouble du développement des *F81.9*
- - ¬ trouble
- - - Développement des *F81.8*
- - - Mixte des *F81.3*
- - - Spécifiques du développement des *F81*

Acrânie ¬ *Q00.0*

ACRD [Acquired Renal Cystic Disease] ¬ *N28.1*

Acro-calleux ¬ Syndrome *Q04.0*

Acrocardiofacial ¬ Syndrome *Q87.8*

Acrocéphalie ¬ *Q75.0*

Acrocéphalopolydactylie ¬ *Q87.0*
Acrocéphalopolysyndactylie ¬ *Q87.0*
Acrocéphalosyndactylie
- Apert] ¬ *Q87.0*
- Type
- - 3 ¬ *Q87.0*
- - 4 ¬ *Q87.0*
- - 5 ¬ *Q87.0*
Acrochordon
- Anus ¬ *K64.4*
- ¬ *Q82.8*
Acro-cranio-faciale ¬ Dysostose *Q87.0*
Acrocyanose ¬
- *I73.8*
- Syndrome de kératodermie palmoplantaire diffuse- *Q82.8*
Acrodermatite
- Chronique atrophiante ¬ *L90.4*
- Continue de Hallopeau ¬ *L40.2*
- Entéropathique ¬ *E83.2*
- Érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] ¬ *L44.4*
Acrodermatitis enteropathica ¬ *E83.2*
Acrodysostose
- Résistance aux multiples hormones ¬ *Q75.4*
- ¬ *Q75.4*
Acrofacial
- Kennedy-Teebi ¬ Dysostose *Q75.4*
- Postaxiale ¬ Dysostose *Q75.4*
- Type
- - Catane ¬ Dysostose *Q75.4*
- - Palagonia ¬ Dysostose *Q75.4*
- - Rodríguez ¬ Dysostose *Q75.4*
- - Weyers ¬ Dysostose *Q75.4*
Acrofrontofacionasale ¬ Dysostose *Q75.1*
Acrogérie type Gottron ¬ *E34.8*
Acrokératose verruciforme de Hopf ¬ *Q82.8*
Acromégalie
- Gigantisme ¬ *E22.0*
- Hyperactivité ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Infantile et juvénile ¬ *E22.0*
- ¬
- - Arthropathie au cours de l' *E22.0†, M14.59**
- - Forme infantile de l' *E22.0*
Acromélanose ¬ *L81.4*
Acromésomélique type Maroteaux ¬ Dysplasie *Q77.8*
Acromicrie
- Ménopause prématurée ¬ Syndrome de polyneuropathie-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-calvitie-luxation de la rotule- *Q87.8*
Acromicrique ¬ Dysplasie *Q77.8*
Acromio-claviculaire ¬
- Articulation *T84.10*
Acromio-claviculaire ¬ *–suite*
- Entorse et foulure de l'articulation *S43.5*
- Ligament *S43.5*
- Luxation de l'articulation *S43.1*
Acromion ¬ Fracture de l'omoplate: *S42.12*
Acroostéolyse phalangienne idiopathique ¬ *M89.58*
Acrootooculaire ¬ Syndrome *Q87.0*
Acroparesthésie
- Simple [type Schultze] ¬ *I73.8*
- Vasomotrice [type Nothnagel] ¬ *I73.8*
Acro-pectoro-vertébrale ¬ Dysgénésie *Q74.8*
Acrophobie ¬ *F40.2*
Acro-rénal ¬ Syndrome *Q87.2*
Acrorénomandibulaire ¬ Syndrome *Q87.8*
Acrosarcome ¬ *C46.0*
Acroscyphodysplasie métaphysaire ¬ *Q78.5*
Acrostéolyse autosomique dominante ¬ *M89.59*
ACS ¬ *Q87.0*
ACS3 ¬ *Q87.0*
ACS5 ¬ *Q87.0*
ACTH
- Hormone adrénocorticotrope
- - Extra-hypophysaire ¬ Syndrome d' *E24.3*
- - ¬ Syndrome de Cushing dû à la production ectopique d' *E24.3*
- Non associée à la maladie de Cushing ¬ Hypersécrétion d' *E27.0*
- ¬
- - Déficit congénital isolé en *E23.0*
- - Hypersécrétion hypophysaire d' *E24.0*
- - Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- - Syndrome
- - - Cushingoïde de sécrétion ectopique d' *E24.3*
- - - Sécrétion ectopique d' *E24.3*
Actif
v. Type de maladie
Actine ¬ Myopathie avec surcharge en *G71.2*
Actinique
- Superficielle disséminée ¬ Porokératose *Q82.8*
- ¬
- - Granulome *L57.5*
- - Kératose *L57.0*
- - Otite aiguë externe: *H60.5*
- - Prurigo *L56.4*
Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, *B96.3!*
Actinomycètes
- Origine ¬ alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, *J67*
- Thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des *J67.7*
Actinomycètes *–suite*
- ¬ Mycétome à *B47.1*
Actinomycétome ¬ *B47.1*
Actinomycose
- Abdominale ¬ *A42.1*
- Cervico-faciale ¬ *A42.2*
- Pneumonie ¬ *A42.0†, J17.0**
- Pulmonaire ¬ *A42.0*
- Sans précision ¬ *A42.9*
- ¬
- - *A42*
- - Canaliculite au cours d' *A42.8†, H06.0**
- - Encéphalite au cours d' *A42.8†, G05.0**
- - Formes d' *A42.8*
- - Méningite au cours d' *A42.8†, G01**
- - Méningo-encéphalomyélite au cours d' *A42.8†, G05.0**
Actinomycosique ¬ Septicémie *A42.7*
Actinoréticulose ¬ *L57.1*
Action
- Centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d' *T44.8*
- Similaire ¬ Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d' *T46.0*
Activateur du plasminogène ¬ Déficit congénital en inhibiteur 1 de l' *D68.8*
Activée [mutation du facteur V Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C *D68.5*
Activité
- Accrue de la phosphoribosylpyrophosphatase synthétase ¬ *E79.8*
- Anti-MAG ¬ Polyneuropathie associée à une gammopathie monoclonale IgM ayant une *D47.2†, G63.1**
- Attention ¬ Perturbation de l' *F90.0*
- Cérébrale du nouveau-né ¬ Baisse de l' *P91.4*
- Continue familiale de la fibre musculaire ¬ *G71.1*
- Électrique sans pouls, non classée ailleurs ¬ *R00.3*
- Incapacité ¬ Limites imposées aux *Z73*
- Inflammatoire
- - Faible réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, AgHBe négatif, sans *B18.13*
- - Forte réplication ¬ Hépatite viral chronique B sans agent delta AgHBe
- - - Négatif, avec *B18.14*
- - - Positif
- - - - *B18.12*
- - - - Sans agent delta: AgHBe positif, sans *B18.11*
- Maltase acide normale ¬ Glycogénose lysosomale à *E74.0*
- Répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- Sexuelle excessive ¬ *F52.7*

Activité *–suite*
- Vie quotidienne NCA ¬ Thérapie concernant les *Z50.8!*

Acute Kidney Injury
- AKI] ¬ *N17*
- ¬ AKI [*N17.99*

Acylcarnitine
v. carnitine-acylcarnitine

Acyl-CoA
- Déshydrogénase
- - Acide gras chaîne
- - - Courte ¬ Déficit en *E71.3*
- - - Moyenne ¬ Déficit en *E71.3*
- - ¬ Déficit multiple en *E71.3*
- Oxydase ¬ Déficit en *E71.3*

Acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue ¬ Déficit en *E71.3*

Acyltransférase
v. lécithine-cholestérol-acyltransférase

ADA] ¬ Déficit en adénosine désaminase [*D81.3*

ADA2 ¬ Vascularite par déficit en *M30.8*

Adamantinome des os longs ¬ *C40.9*

Adams-Oliver ¬ Syndrome d' *Q87.2*

Adams-Stokes ¬ Maladie d' *I45.9*

Adaptation
- Éducative ¬ Mauvaise *Z55*
- Manipulation
- - Accès vasculaire, non précisé ¬ *Z45.29*
- - Appareils médicaux implantés ¬ *Z45.88*
- - Défibrillateur cardiaque implanté ¬ *Z45.01*
- - Dispositif cardiaque électronique ¬
- - - *Z45.0*
- - - *Z45.08*
- - Extenseur
- - - Bronchique ¬ *Z45.84*
- - - Trachéal ¬ *Z45.85*
- - Neurostimulateur ¬ *Z45.80*
- - Stimulateur
- - - Cardiaque implanté ¬ *Z45.00*
- - - Diaphragmatique ¬ *Z45.81*
- - Système
- - - Assistance cardiaque ¬ *Z45.02*
- - - Cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement ¬ *Z45.20*
- Pompe
- - Extracorporelle ¬ *Z45.02*
- - Intracorporelle ¬ *Z45.02*
- - Paracorporelle ¬ *Z45.02*
- Travail ¬ Mauvaise *Z56*
- ¬
- - Réaction
- - - Dépressif
- - - - Courte durée au cours d'un trouble de l' *F43.2*
- - - - Prolongée au cours d'un trouble de l' *F43.2*

Adaptation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réaction *–suite*
- - - Facteur de stress sévère, et troubles de l' *F43*
- - Troubles de l' *F43.2*

Adapté ¬ Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge *Z75.8*

Addison
- Auto-immune ¬ Maladie d' *E27.1*
- Tuberculeuse ¬ Maladie d' *A18.7†, E35.1**
- ¬
- - Anémie (de): *D51.0*
- - Maladie d' *E27.1*
- - Myopathie au cours de maladie d' *E27.1†, G73.5**
- - Syndrome d'hypoparathyroïdie auto-immune-candidose chronique-maladie d' *E31.0*

Addisonienne ¬ Crise *E27.2*

Addison-Schilder ¬
- Adrénoleucodystrophie [*E71.3*
- Maladie d' *E71.3*

Adducteurs de la cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S76.2*

Adduction-arthrogrypose, type Dundar ¬ Syndrome des pouces en *Q79.6*

ADEM ¬ *G04.0*

Adénite
- Chronique, de tout ganglion autre que mésentérique ¬ *I88.1*
- Gonorrhéique ¬ *A54.8*
- Tuberculeuse ¬ *A18.2*

Adéno
- Cutanéo-muqueux [Kawasaki] ¬ Syndrome *M30.3*
- Splénomégalie et leucopénie ¬ Arthrite rhumatoïde avec *M05.0*

Adénocarcinome
- Acidophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Basophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Canal anal ¬ *C21.1*
- Cellules claires de l'ovaire ¬ *C56*
- Chromophobe de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- Diffus de l'estomac ¬ *C16.9*
- Endométrioïde de l'ovaire ¬ *C56*
- Éosinophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Estomac ¬ *C16.9*
- Gastrique diffus héréditaire ¬ *C16.9*
- Hypophysaire à cellules mucoïdes ¬ *C75.1*
- Intestin grêle ¬ *C17.9*
- Mucineux
- - Appendice ¬ *C18.1*
- - Ovaire ¬ *C56*
- Œsophage ¬ *C15.9*
- Ovaire ¬ *C56*

Adénocarcinome *–suite*
- Papillaire
- - Kystique de l'ovaire ¬ *C56*
- - Ovaire ¬ *C56*
- Paratesticulaire ¬ *C63.9*
- Parathyroïdien à cellules eau de roche ¬ *C75.0*
- Pseudo-mucineux de l'ovaire ¬ *C56*
- Pulmonaire bien différencié de type fœtal ¬ *C34.9*
- Verge ¬ *C60.9*
- Vésicule biliaire ¬ *C23*
- Voies biliaires extra-hépatiques ¬ *C24.0*
- Vulve ¬ *C51.9*

Adénofibrome géant du sein ¬ *D24*

Adénofibrose du sein ¬ *N60.2*

Adénohypophysaires] ¬ Hormones antéhypophysaires [*T38.8*

Adénoïde
- Basal du col de l'utérus ¬ Carcinome *C53.9*
- Kystique du col de l'utérus ¬ Carcinome *C53.9*
- SAI ¬ Maladie (chronique) des amygdales et des végétations *J35.9*
- Sans précision ¬ Maladie chronique des amygdales et des végétations *J35.9*
- ¬
- - Hyperplasie des végétations *J35.2*
- - Hypertrophie
- - - Amygdales et des végétations *J35.3*
- - - Végétations *J35.2*
- - Maladies chroniques des amygdales et des végétations *J35.8*
- - Tissu *C11.1*

Adénoïdienne) ¬ Cicatrice amygdalienne (et *J35.8*

Adénolipomatose de Launois-Bensaude ¬ *E88.8*

Adénomateux
- Endomètre ¬ Hyperplasie *N85.1*
- Familial
- - Atténué
- - - Liée à MUTYH ¬ Polypose *D12.6*
- - - ¬ Polypose *D12.6*
- - ¬ Polypose *D12.6*
- Prostate ¬ Hyperplasie *N40*
- ¬
- - Hyperplasie atypique de l'endomètre (*N85.1*
- - Polype *D28*

Adénomatoïde kystique du poumon ¬ Malformation *Q33.0*

Adénomatose
- Côlon ¬ *D12.6*
- Endocrinien multiple ¬
- - *D44.8*
- Pluriendocrinienne ¬ *D44.8*

Adénome
v.a. Chorio-adénome
- Adrénocortical ¬ *D35.0*
- Alvéoles pulmonaires ¬ *D14.3*
- Canal de Wolff chez la femme ¬ *D28.7*
- Cellules principales de la parathyroïde ¬ *D35.1*
- Corticotrope hypophysaire ¬ *D35.2*
- Gonadotrope fonctionnel ¬ *D35.2*
- Hépatocellulaire télangiectasique ¬ *D13.4*
- Hypophysaire
- - Cellules mucoïdes ¬ *D35.2*
- - Non fonctionnel ¬ *D35.2*
- - PRL ¬ *D35.2*
- - Prolactine ¬ *D35.2*
- - ¬ *D35.2*
- Lactotrope hypophysaire ¬ *D35.2*
- Microkystique ¬ *D13.6*
- Pancréas ¬ *D13.6*
- Pancréatique microkystique ¬ *D13.6*
- Parathyroïdien
- - Cellules eau de roche ¬ *D35.1*
- - Familial ¬ *D35.1*
- Para-urétral ¬ *D36.7*
- Pituitaire isolé familial ¬ *D35.2*
- Sigmoïde ¬ *D12.5*
- Surrénalien (bilatéral) ¬ Hyperaldostéronisme primaire dû à un *E26.0*
- Thyréotrope ¬ *D35.2*

Adénomyose ¬ *N80.0*

Adénopathie
v.a. Sialo-adénopathie
- Généralisées ¬ *R59.1*
- Localisées ¬ *R59.0*
- Massive ¬ Histiocytose sinusale avec *D76.3*
- Sans précision ¬ *R59.9*
- Tuberculeuse périphérique ¬ *A18.2*
- ¬
- - *R59*
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, R59.9*

Adénosarcome
- Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*

Adénosine
- Désaminase
- - ADA] ¬ Déficit en *D81.3*
- - ¬
- - - Anémie hémolytique due à une surproduction d' *D55.3*
- - - Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en *D81.3*
- Phosphoribosyltransférase ¬ Déficit en *E79.8*

Adénosine-kinase ¬ Hyperméthioninémie provoquée par un déficit en *E72.1*

Adénosylhomocystéine
v. S-adénosylhomocystéine

Adénosyltransférase ¬ Démyélinisation du cerveau par déficit en méthionine *E72.1*

Adénovirale
- Siège non précisé ¬ Infection *B34.0*
- ¬ Pneumonie *J12.0*

Adénovirus
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.0!*
- ¬
- - Conjonctivite
- - - *B30.1†, H13.1**
- - - Folliculaire aigu
- - - - *B30.1†*
- - - - *B30.1†, H13.1**
- - Encéphalite à *A85.1†, G05.1**
- - Encéphalomyélite à *A85.1†, G05.1**
- - Entérite à *A08.2*
- - Kératite à *B30.0†, H19.2**
- - Kératoconjonctivite à *B30.0†, H19.2**
- - Méningite à *A87.1†, G02.0**
- - Méningo-encéphalite
- - - *A85.1†*
- - - *A85.1†, G05.1**
- - Myélite à *A85.1†, G05.1**

Adénylate kinase ¬ Anémie hémolytique par déficit en *D55.3*

Adénylosuccinase ¬ Déficit en *E79.8*

Adénylosuccinate lyase ¬ Déficit en *E79.8*

Adermatoglyphie congénitale isolée ¬ *Q82.8*

Adhaerens
- Saignement ¬ Placenta *O43.20, O72.0*
- Sans saignement ¬ Placenta *O43.20, O73.0*
- ¬ Placenta *O43.20*

Adhérence
- Appendice vermiculaire ¬ *K66.0*
- Brides congénital
- - Épiploïques anormales ¬ *Q43.3*
- - Péritonéales ¬ *Q43.3*
- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Col de l'utérus ¬ *N88.1*
- Congénital
- - Langue ¬ *Q38.3*
- - Méninges spinales ¬ *Q06.8*
- Diaphragmatiques ¬ *K66.0*
- Endocardiques ¬ *I38*
- Épiploïques ¬ *K66.0*
- Gastriques ¬ *K66.0*
- Intestin [brides] avec occlusion ¬ *K56.5*
- Intestinales ¬ *K66.0*
- Intra-utérines ¬ *N85.6*
- Localisées du péricarde ¬ *I31.8*
- Méningées (cérébrales) (rachidiennes) ¬ *G96.1*
- Mésentériques ¬ *K66.0*

Adhérence *–suite*
- Paroi
- - Abdominale ¬ *K66.0*
- - Extérieure de l'utérus ¬ *N73.6*
- Pathologique du placenta ¬ *O43.2*
- Pelvi péritonéal
- - Actes médicaux ¬ *N99.4*
- - Femme ¬ *N73.6*
- Pelviennes, chez l'homme ¬ *K66.0*
- Péricarde
- - Rhumatismale ¬ *I09.2*
- - ¬ *I31.0*
- Péritonéal
- - Brides), avec occlusion intestinale ¬ *K56.5*
- - ¬ *K66.0*
- Perturbations de l'iris et du corps ciliaire ¬ Autres *H21.5*
- Placenta
- - Tant que complication de l'accouchement sans saignement ¬ *O43.20, O73.0*
- - ¬ Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l' *O72.0*
- Pleurales ¬ *J94.8*
- S) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire ¬ *T81.5*
- Tuberculeux
- - Bassin ¬ *A18.1†, N74.1**
- - Péricarde ¬ *A18.8†, I32.0**
- Vagin ¬ *N89.5*
- Vaginales post-opératoires ¬ *N99.2*
- Vulve ¬ *N90.8*
- ¬
- - Brides d' *K66.0*
- - Strabisme dû à des *H50.6*

Adhérent
- Peau) ¬ Cicatrice: *L90.5*
- ¬
- - Leucome *H17.0*
- - Prépuce: *N47*

Adhésif
- Arachnoïde ¬ Syphilis *A52.1†, G01**
- Chronique ¬ Péricardite *I31.0*
- Méninges ¬ Neurosyphilis *A52.1†, G01**
- Oreille moyenne ¬ Maladie *H74.1*
- Syphilitique ¬ Arachnoïdite *A52.1†, G01**
- ¬
- - Arachnoïdite *G03.9*
- - Dermite allergique de contact due aux *L23.1*
- - Médiastino-péricardite *I31.0*
- - Otite *H74.1*

Adhésion
- Leucocytes type II ¬ Déficit d' *D84.8*
- Tuberculeuse des méninges ¬ *A17.0†, G01**

Adiaspiromycose ¬ *B48.8*

Adie
v. Holmes-Adie

Adipeux
- Segmentaire) du sein ¬ Nécrose *N64.1*
- ¬
- - Bourrelet *E65*
- - Tissu
- - - *C49*
- - - *D21*

Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.6*

Adipose douloureuse ¬ *E88.29*

Adipositas
- Gigantea ¬ *E66.82*
- Permagna ¬ *E66.82*

Adiposité localisée ¬ *E65*

Adiposo-génitale ¬ Dystrophie *E23.6*

Adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents *K07.3*

Administration
- Accidentelle ou prise erronée d'un médicament ¬ *X49.9!*
- Anesthésique général local analgésique sédatif cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l' *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l' *O89*
- Chloramphénicol au nouveau-né ¬ Syndrome gris dû à l' *P93*
- Immunoglobuline ¬ *Z29.1*
- Locale prophylactique d'antibiotiques ¬ *Z29.20*
- Médicaments ¬ détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l' *O68*

Administré
- Mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants *P04.0*
- Nouveau-né ¬ Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou *P58.4*
- Voie générale ¬ Intoxication: Antibiotiques antifongiques *T36.7*
- ¬
- - Anurie due aux sulfamides utilisés comme un médicament approprié à l'indication et correctement *R34, Y57.9!*
- - Choc
- - - Anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.6*
- - - Anesthésique dû à une substance appropriée et correctement *T88.2*
- - Effet indésirable dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.7*
- - Hypersensibilité dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.7*

Administré *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Idiosyncrasie dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.7*
- - Réaction allergique dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.7*

Admise dans un établissement de prise en charge adapté ¬ Personne attendant d'être *Z75.8*

Admission
- Ablation d'un organe à titre prophylactique ¬ *Z40.0*
- Hôpital ¬ Arrêt cardio-circulatoire avant l' *U69.13!*
- Ligature des trompes de Fallope ou vasectomie ¬ *Z30.2*
- Lors hospitalisation connu
- - 29 jusqu'à 90 jours ¬ Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, soit présente à l'admission, soit survenue dans un délai de 48 heures après l' *U69.03!*
- - Jusqu'à 28 jours ¬ Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, soit présente à l'admission, soit survenue dans un délai de 48 heures après l' *U69.02!*
- Prélèvement ou implantation d'ovules ¬ *Z31.2*
- Protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ *Z29.0*
- Soit survenu 48 heure admission lors hospitalisation connu
- - 29 jusqu'à 90 jours ¬ Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, soit présente à l' *U69.03!*
- - Jusqu'à 28 jours ¬ Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, soit présente à l' *U69.02!*
- ¬ Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l' *U69.01!*

ADN
- Mitochondrial
- - Forme encéphalomyopathique avec tubulopathie rénale ¬ Déplétion de l' *G31.81†, N16.8**
- - ¬
- - - Cardiomyopathie hypertrophique et tubulopathie dues à une mutation de l' *I42.2*
- - - Insuffisance hépatique infantile aiguë par défaut de synthèse des protéines codées par l' *K72.0*
- ¬ Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l' *G11.3*

Adolescence
- SAI ¬ Réaction hyperkinétique de l'enfance ou de l' *F90.9*
- Sans précision ¬ Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l' *F98.9*
- ¬
- - Épilepsie (avec): absences de l' *G40.3*
- - Evitement de l'enfance et de l' *F93.2*

Adolescence *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Trouble
- - - Attention sans hyperactivité survenant dans l'enfance et l' *F98.80*
- - - Comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l' *F98*
- - - Dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance et l' *F44.82*
- - - Fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l' *F94*
- - - Précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l' *F98.88*

Adolescent
- Cours de croissance ¬ Examen de l' *Z00.3*
- Type non transsexuel ¬ Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l' *F64.1*
- ¬
- - Obésité
- - - Endogène chez l'enfant et l' *E66.84*
- - - Enfant et l' *E66.94*
- - - Excès calorique chez l'enfant et l' *E66.04*
- - - Extrême
- - - - Excès calorique chez l'enfant et l' *E66.05*
- - - - Hypoventilation alvéolaire chez l'enfant et l' *E66.25*
- - - Hypoventilation alvéolaire chez l'enfant et l' *E66.24*
- - - Médicamenteux
- - - - Enfant et l' *E66.14*
- - - - Extrême chez l'enfant et l' *E66.15*
- - Scoliose de l' *M41.1*
- - Syndrome détresse respiratoire
- - - Aiguë chez l' *J80.09*
- - - Enfant et de l' *J80*

Adoption ¬ Examen en vue de: *Z02*

Adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: attente d'une famille *Z76.2*

Adrénalite
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, E35.1**
- Hémorragique à méningocoques ¬ *A39.1†, E35.1**

Adrénergique
- Action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents bloquants neuronaux *T44.8*
- ¬ Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta- *T44.9*

Adrénocortical
- Nodulaire pigmentée primaire ¬ Maladie *E24.8*
- ¬
- - Adénome *D35.0*
- - Syndrome *E27.0*

Adrénocorticotrope
- Extra-hypophysaire ¬ Syndrome d'ACTH [hormone *E24.3*
- ¬ Syndrome de Cushing dû à la production ectopique d'ACTH [hormone *E24.3*

Adrénogénital
- Congénital lié déficit enzymatique
- - Sans précision ¬ Anomalie *E25.09*
- - ¬ Autres anomalies *E25.08*
- Perte de sel ¬ Syndrome *E25.0*

Adrénoleucodystrophie
- Addison-Schilder] ¬ *E71.3*
- Liée à l'X ¬ *E71.3*
- Néonatal ¬
- - *E71.3*
- - Pseudo-ALDN [*E71.3*
- ¬ *E71.3*

Adrénomyéloneuropathie ¬ *E71.3*

Adriblastine ¬ Lésion par *T88.7*

ADULT ¬ Syndrome *Q87.8*

Adult respiratory distress syndrome [ARDS] ¬ *J80.09*

Adulte
v. Type de maladie

Adynamie épisodique héréditaire ¬ *G72.3*

Aegyptius ¬ Infection généralisée à Haemophilus *A48.4*

Aérien
- Poussière
- - Coton ¬ Affection des voies *J66.0*
- - Organiques précisées ¬ Affection des voies *J66.8*
- SAI ¬ Maladie: chronique obstructive des voies *J44.9*
- Supérieur virus influenza saisonnier identifié sauf virus grippe aviaire porcine ¬
- - Grippe [influenza] avec infection des voies *J10.1*
- - Infection aiguë des voies *J10.1*
- ¬ Accident de transport *V99!*

Aerobacter aerogenes ¬ Entérite infectieuse à *A04.8, B96.2!*

Aérobie Gram
- Négatif SAI ¬ Pneumonie due à: des bactéries (*J15.6*
- Positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes *B95.90!*

Aerogene
- Capsulatus ¬ Gangrène à Bacillus *A48.0*
- ¬ Entérite infectieux
- - Aerobacter *A04.8, B96.2!*
- - Enterobacter *A04.8, B96.2!*

Aérophagie ¬ Formes psychogènes de: *F45.3*

Aérosols ¬ pulseurs pour *T59*

Aeruginosa
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Pseudomonas *U81.10!*

Aeruginosa *–suite*
- Multirésistant *–suite*
- - 3MRGN ¬ Pseudomonas *U81.30!*
- - 4MRGN ¬ Pseudomonas *U81.50!*
- ¬
- - Otite externe à Pseudomonas *H60.2, B96.5!*
- - Pseudomonas *B96.5!*

Affaissé
- Acquis ¬ Pied *M21.63*
- Perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou *L98.7*
- SAI ¬ Peau flasque ou *L98.7*
- Valgus acquis ¬ Pied *M21.63*

Affaissement de la peau du visage après une perte de poids ¬ *L98.7*

Affectant
- Cou et le dos ¬ Panniculite *M54.0*
- Fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) ¬ Diabète sucré de la mère (préexistant), *P70.1*
- Fois les canaux biliaires intra- et extra-hépatiques ¬ Tumeur maligne *C24.8*
- Fonction palpébrale ¬ Autres troubles *H02.5*
- Principalement système nerveux central cours
- - Affections classées ailleurs ¬ Affections dégénératives systémiques *G13.8**
- - Maladies tumorales ¬ Autres affections dégénératives systémiques *G13.1**

Affecté
- Accouchement
- - Césarienne ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.4*
- - Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.3*
- - Extraction par le siège ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.0*
- - Forceps ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.2*
- - Précipité ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.5*
- Affection
- - Cordon ombilical, autres et sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.6*
- - Maternel
- - - Éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle ¬ Fœtus et nouveau-né *P00*
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.9*
- - - ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.8*
- Alcoolisme de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.3*
- Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.0*
- Anhydramnios ¬
- - Fœtus *P01.2*
- - Nouveau-né *P01.2*
- Anomalie
- - Membrane

Affecté *–suite*
- Anomalie *–suite*
- - Membrane *–suite*
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.9*
- - - ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.8*
- - Morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.2*
- Béance du col ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.0*
- Chorio-amniotite ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.7*
- Complication
- - Concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ Fœtus et nouveau-né *P02*
- - Grossesse mère
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.9*
- - - ¬ Fœtus nouveau-né
- - - - *P01*
- - - - *P01.8*
- - Précisées du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.8*
- - Travail accouchement
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.9*
- - - ¬ Fœtus et nouveau-né *P03*
- Contractions anormales de l'utérus ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.6*
- Effet nocif
- - Maternel
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.9*
- - - ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.8*
- - Transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel ¬ Fœtus et nouveau-né *P04*
- Exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.6*
- Forme
- - Compression du cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.5*
- - Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.1*
- Grossesse
- - Extra-utérine ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.4*
- - Multiple ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.5*
- Hépatite aigu mère ¬
- - Fœtus *P00.2*
- - Nouveau-né *P00.2*
- Hydramnios ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.3*
- Infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.8*
- Intervention
- - Chirurgicale chez la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.6*
- - Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.7*

Affecté *–suite*
- Lupus érythémateux disséminé de la mère ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.8*
- Maladie
- - Circulatoires et respiratoires de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.3*
- - Infectieuses et parasitaires de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.2*
- - Rénales et des voies urinaires de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.1*
- - Virus Zika contracté mère ¬
- - - Fœtus *P00.2*
- - - Nouveau-né *P00.2*
- Malformation du placenta ¬ Nouveau-né *P02.2*
- Médicaments absorbés par la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.1*
- Mort de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.6*
- Oligoamnios ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.2*
- Placenta praevia ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.0*
- Présentation
- - Anormale avant le travail ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.7*
- - Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.1*
- Procidence du cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.4*
- Radiologie chez la mère ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.7*
- Rupture prématurée des membranes ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.1*
- Salpingo-oophorite de la mère pendant la grossesse ¬ Nouveau-né *P00.8*
- Syndromes de transfusion placentaire ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.3*
- Tabagisme de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.2*
- Toxicomanie de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.4*
- Traumatisme de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.5*
- Trouble
- - Hypertensifs de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.0*
- - Nutritionnels de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.4*
- Utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.5*
- ¬ Code
- - U07
- - - 0 non *U07.0*
- - - 1 non *U07.1*
- - - 2 non *U07.2*
- - - 3 non *U07.3*
- - - 4 non *U07.4*
- - - 5 non *U07.5*
- - - 6 non *U07.6*

Affecté *–suite*
- ¬ Code *–suite*
- - U07 *–suite*
- - - 7 non *U07.7*
- - - 8 non *U07.8*
- - - 9 non *U07.9*
- - - Non *U07*
- - U99 non *U99!*

Affectif
- Bipolaire
- - Actuellement en rémission ¬ Trouble *F31.7*
- - Épisode actuel
- - - Dépression
- - - - Légère ou moyenne ¬ Trouble *F31.3*
- - - - Sévère
- - - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.4*
- - - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.5*
- - - Hypomaniaque ¬ Trouble *F31.0*
- - - Maniaque
- - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.1*
- - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.2*
- - - Mixte ¬ Trouble *F31.6*
- - Sans précision ¬ Trouble *F31.9*
- - ¬ Trouble
- - - *F31*
- - - *F31.8*
- Forme de négligence d'un enfant ¬ Négligence *Z62*
- Isolés ¬ Autres troubles de l'humeur [*F38.0*
- Mixte
- - Isolé ¬ Episode *F38.0*
- - ¬ Psychose schizophrénique et *F25.2*
- Organique de l'hémisphère droit ¬ Trouble *F07.8*
- Pendant l'enfance ¬ Perte de relation *Z61*
- Persistant, sans précision ¬ Trouble de l'humeur [*F34.9*
- Persistants ¬ Autres troubles de l'humeur [*F34.8*
- Précisés ¬ Autres troubles de l'humeur [*F38.8*
- Récurrents ¬ Autres troubles de l'humeur [*F38.1*
- SAI ¬ Psychose *F39*
- Sans précision ¬ Trouble de l'humeur [*F39*
- ¬
- - Épilepsie partielle bénigne à symptômes *G40.02*
- - Personnalité: *F34.0*
- - Psychopathie de privation *F94.2*
- - Psychose schizophrénique de type *F25.9*
- - Trouble
- - - Humeur [*F38*
- - - Organiques de l'humeur [*F06.3*

Afférente chirurgicale ¬ Vessie neurogène: après dénervation *N31.2*

Afib ¬ Amylose *E85.0†, N08.4**

Afibrinogénémie
- Acquise ¬ *D65.0*
- Congénitale ¬ *D68.20*
- Familiale ¬ *D68.20*
- Post-partum ¬ *O72.3*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.1*
- ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*

Aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments ¬ Effet toxique de l' *T64*

Africain
- Est répandue ¬ Trypanosomiase SAI, en des lieux où la trypanosomiase *B56.9*
- Sans précision ¬ Trypanosomiase *B56.9*
- Tiques ¬ Typhus *A77.1*
- ¬
- - Démence au cours de trypanosomiase *B56.9†, F02.8**
- - Hémochromatose *E83.1*
- - Histoplasmose *B39.5*
- - Trypanosomiase
- - - *B56*
- - - *B56.9*

Afrique
- Occidentale ¬ Maladie du sommeil de l' *B56.0*
- Orientale ¬ Maladie du sommeil de l' *B56.1*

Agalactie
- Primaire ¬ *O92.3*
- Secondaire ¬ *O92.5*
- Thérapeutique ¬ *O92.5*
- ¬ *O92.3*

Agammaglobulinémie
- Autosomique récessive (type suisse) ¬ *D80.0*
- Commune variable ¬ *D80.1*
- Liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance) ¬ *D80.0*
- Lymphocytes B porteurs d'immunoglobulines ¬ *D80.1*
- Microcéphalie-craniosténose-dermatite sévère ¬ Syndrome d' *D80.0*

Aganglionique ¬ Mégacôlon *Q43.1*

Aganglionose
- Intestinale congénitale ¬ *Q43.1*
- ¬ *Q43.1*

AGAT ¬ Déficit en *E72.8*

Âge

- Gestationnel
- - Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du Fœtus [trop grand pour l' *O36.6*
- - ¬
- - - Enfant
- - - - Gros pour l' *P08.1*
- - - - Né après terme, qui n'est pas gros pour l' *P08.2*
- - - Faible poids pour l' *P05.0*
- - - Léger pour l' *P05.0*
- - - Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l' *P05.2*
- - - Petit
- - - - *P05.1*
- - - - Léger pour l' *P05.1*
- - - - Taille pour l' *P05.1*
- - - Soin maternel cause connu présumé fœtus
- - - - Léger pour l' *O36.5*
- - - - Petit pour l' *O36.5*
- Humide ¬ Dégénérescence de la macula liée à l' *H35.30*
- Néovasculaire ¬ Dégénérescence de la macula liée à l' *H35.30*
- Sèche ¬ Dégénérescence maculaire liée à l' *H35.31*
- ¬
- - Mort subit
- - - Inexpliquée mort subit nourrisson
- - - - *R96.0*
- - - - Avant l' *R95*
- - - Nourrisson
- - - - *R96.0*
- - - - Avant l' *R95.9*
- - SIDS [Sudden infant death syndrome], après l' *R96.0*
- - Sudden infant death syndrome, avant l' *R95.9*

Agénésie

- Aplasie
- - Col de l'utérus ¬ *Q51.5*
- - Hypoplasie
- - - Pancréas ¬ *Q45.0*
- - - Vésicule biliaire ¬ *Q44.0*
- - Utérus ¬ *Q51.0*
- Appareil lacrymal ¬ Absence et *Q10.4*
- Artère pulmonaire ¬ *Q25.7*
- Bronches ¬ *Q32.4*
- Carotide interne ¬ *Q28.18*
- Cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Cérébelleuse ¬ *Q04.3*
- Cils ¬ Absence ou *Q10.3*
- Congénitale du scrotum ¬ *Q55.2*
- Corps calleux

Agénésie *–suite*

- Corps calleux *–suite*
- - Déficience intellectuelle, colobome et micrognathie ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - Quadriparésie spastique ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- - ¬
- - - *Q04.0*
- - - Forme isolée d' *Q04.0*
- Dentaire sélective ¬ *K00.0*
- Humérus ¬ *Q71.8*
- Hypoplasie du nez ¬ *Q30.1*
- Nerf ¬ *Q07.8*
- Œil ¬ *Q11.1*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Paupière ¬ Absence ou *Q10.3*
- Pénis ¬ *Q55.5*
- Poumon ¬ *Q33.3*
- Pulmonaire-anomalie cardiaque-pouce triphalangé ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Rate ¬ *Q89.01*
- Rénal
- - Bilatérale ¬ *Q60.1*
- - Défauts de développement rénal ¬ *Q60*
- - Retard psychomoteur ¬ Syndrome d'aniridie- *Q87.8*
- - Sans précision ¬ *Q60.2*
- - Unilatéral ¬
- - - *Q60.0*
- Uretère ¬ *Q62.4*
- Vaginale isolée partielle ¬ *Q52.0*
- Valve
- - Pulmonaires ¬ *Q22.3*
- - Tricuspides ¬ *Q22.4*
- Veine cave supérieure ¬ *Q26.8*

Agent

- Alkylants ¬ Syndrome myélodysplasique induit
- - *D46*
- - *D46.9*
- Anti-infectieux ¬ Antécédents personnels d'allergie à d'autres *Z88.3*
- Bactérien
- - Précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B96.8!*
- - ¬ Pneumonie congénitale due à d'autres *P23.6*
- Bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.8*
- Chimique
- - Émanation fumée gaz
- - - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des *J68.2*
- - - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des *J68.9*
- - - ¬
- - - - Affection

Agent *–suite*

- Chimique *–suite*
- - Émanation fumée gaz *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Affection *–suite*
- - - - - Respiratoires aiguës et subaiguës dues à des *J68.3*
- - - - - Respiratoires chroniques dues à des *J68.4*
- - - - - Respiratoires dues à des *J68.8*
- - - - - Respiratoires dues à l'inhalation d' *J68*
- - - - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d' *J68.4*
- - - - Bronchite et pneumonie dues à des *J68.0*
- - - - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d' *J68.4*
- - - - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d' *J68.4*
- - - - Œdème du poumon dû à des *J68.1*
- - ¬
- - - Bronchite (aiguë) due à des *J68.0*
- - - Œdème (aigu) du poumon dû à des *J68.1*
- - - Voies de fait/agression par : *Y09.9!*
- Delta
- - AgHBe
- - - Négatif
- - - - Activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.14*
- - - - Sans activité inflammatoire, faible réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.13*
- - - Positif
- - - - Activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.12*
- - - - Sans activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.11*
- - Coma hépatique ¬ Hépatite aigu B
- - - *B16.0*
- - - Co-infection à *B16.0, K72.74!*
- - - Sans
- - - - *B16.2*
- - - - Co-infection à *B16.2, K72.74!*
- - Cours de l'hépatite B chronique ¬ Infection aiguë à *B17.0*
- - Phase
- - - 1 ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.11*
- - - 2 ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.12*
- - - 3 ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.13*
- - - 4 ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.14*
- - - Immunotolérance ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.11*
- - Sans coma hépatique ¬ Hépatite aigu B

Agent *–suite*
- Delta *–suite*
- - Sans coma hépatique ¬ Hépatite aigu B *–suite*
- - - *B16.1*
- - - Co-infection à *B16.1*
- - - Sans coma hépatique ¬ Hépatite aiguë B, sans *B16.9*
- - Sujet porteur de l'hépatite B ¬ (Sur)infection aiguë par *B17.0*
- - ¬ Hépatite viral chronique B
- - - *B18.0*
- - - Sans *B18.1*
- Diagnostic ¬ Intoxication: *T50.8*
- Externe
- - Précisés ¬ Affections respiratoires dues à d'autres *J70.8*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à un *J70.9*
- - ¬
- - - Affections respiratoires dues à d'autres *J70*
- - - Anémies aplastiques due à d'autres *D61.2*
- - - Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres *G21.2*
- Immunologiques ¬ *T50.9*
- Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T44.3*
- Pathogène ¬
- - Klebsiella pneumoniae comme *B96.2!*
- - Proteus
- - - Mirabilis comme *B96.2!*
- - - Morganii comme *B96.2!*
- Principalement
- - Alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.4*
- - Bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.5*
- Sclérosants ¬ Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les *T46.8*
- Toxique ¬
- - Myopathie due à d'autres *G72.2*
- - Polynévrite due à d'autres *G62.2*
- Viral ¬ Pneumonie congénitale due à un *P23.0*
- ¬ Dermite
- - Allergique de contact due à d'autres *L23.8*
- - Contact, sans précision, due à d'autres *L25.8*
- - Irritante de contact due à d'autres *L24.8*

Agglutinine froid ¬
- Hémoglobinurie à *D59.1*
- Maladie à *D59.1*

Aggrécane ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

AgHBe
- Négatif

AgHBe *–suite*
- Négatif *–suite*
- - Activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.14*
- - Sans activité inflammatoire, faible réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.13*
- Positif
- - Activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.12*
- - Sans activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta: *B18.11*

AgHBs] ¬ Porteur de l'antigène de surface du virus de l'hépatite B [*B18.13*

Agissant
- Essentiellement sur
- - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ Intoxication: Substances *T48.7*
- - Muscle
- - - Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances *T48*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substances *T48.2*
- - Peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique *T49*
- - Système
- - - Cardio-vasculaire
- - - - Sans précision ¬ Intoxication: Substances *T46.9*
- - - - ¬ Intoxication par substances *T46*
- - - Nerveux autonome
- - - - Sans précision ¬ Intoxication: Médicaments *T44.9*
- - - - ¬ Intoxication par médicaments *T44*
- - Tractus gastro-intestinal
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substance *T47.9*
- - - ¬ Intoxication: Autres substances *T47.8*
- Sur
- - Équilibre électrolytique, calorique et hydrique ¬ Intoxication: Produits *T50.3*
- - Fibrinolyse ¬ Intoxication: Médicaments *T45.6*
- - Métabolisme de l'acide urique ¬ Intoxication: Médicaments *T50.4*
- - Protozoaires du sang ¬ Intoxication: Antipaludiques et médicaments *T37.2*

Agitante ¬
- Démence
- - Cours de paralysie *G20.90†, F02.3**
- - Paralysie *F02.3**
- Paralysie *G20*

Agitation
- Utilisation d'hypnotiques ¬ *F13.8*
- ¬ *R45.1*

Agitée épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F32.2*

Aglossie ¬ *Q38.3*

Agnathie-holoprosencéphalie-situs inversus ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Agnosie
- Développement ¬ *F88*
- ¬ *R48.1*

Agoraphobie
- Sans mention de trouble panique ¬ *F40.00*
- Trouble panique ¬ *F40.01*
- ¬ *F40.0*

Agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou *Z91.73*

Agranulocytaire ¬ Angine *D70*

Agranulocytose
- Génétique infantile ¬ *D70.0*
- Neutropénie
- - Congénitale ¬ *D70.0*
- - Médicament
- - - Non précisées ¬ *D70.19*
- - - Phase critique
- - - - 4
- - - - - Jours ¬ *D70.10*
- - - - - Jours à moins de 7 jours ¬ *D70.13*
- - - - 7 jours à moins de 10 jours ¬ *D70.14*
- - - SAI ¬ *D70.19*
- - - ¬
- - - - *D70.1*
- - - - Formes évolutives d' *D70.18*
- - Phase critique
- - - 10 à moins de 20 jours ¬ *D70.11*
- - - 20 jours ou plus ¬ *D70.12*
- - Traitement ¬ *D70.1*
- - ¬ *D70*
- SAI ¬ *D70.3*
- ¬
- - *D70.3*
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, D70.3*

Agraphie ¬ *R48.8*

Agressif
- Cellules NK ¬ Leucémie *C94.7*
- Type mal socialisé ¬ Trouble (des): *F91.1*
- ¬
- - Fibromatose *D48.1*
- - Mastocytose systémique *C96.2*
- - Personnalité: passive- *F60.8*
- - Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypotonie-dysmorphie faciale-comportement *Q87.8*
- - Trouble
- - - Conduites, type solitaire- *F91.1*
- - - Personnalité: *F60.30*

Agression
- Agent chimique ¬ Voies de fait/ *Y09.9!*
- Armes ¬ Voies de fait/ *Y09.9!*
- Faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou *Y34.9!*
- Médicament ¬ Voies de fait/ *Y09.9!*
- Moyens non précisés ¬ Effets non précisés de: *T76*
- ¬
- - *Y09!*
- - Examen
- - - Mise en observation après d'autres blessures dues à une *Z04.5*
- - - Victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une *Z04.5*
- - Voies de fait/ *Y09.9!*

Agricoles et industrielles ¬ Substances toxiques *Z57*

Agrumes ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*

Aguirre Negrete
v. Hernández-Aguirre Negrete

Agyrie
- Dysplasie rétinienne ¬ Syndrome d'hydrocéphalie- *Q04.3*
- ¬ *Q04.3*

Ahn-Lerman-Sagie ¬ Syndrome d' *Q87.8*

AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [SM- *D47.0*

Aicardi ¬ Syndrome d' *Q04.0*

Aide
- Toux) ¬ Dépendance (de longue durée) envers: insufflateur/exsufflateur (appareil d' *Z99.0*
- ¬ Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d' *Z75.8*

Aigu
v. Type de maladie

Aiguille à injection ¬ Accident dû à: *W49.9!*

Aine
- SAI ¬ *C76.3*
- ¬
- - *C49.5*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *S31.1*
- - *T21*
- - Dermatophytose de l' *B35.6*

Aïnhum ¬ *L94.6*

Aïnhumoïde et mutilante ¬ Kératodermie *Q82.8*

AINS] ¬ Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [*T39.3*

Air
- Ambiant ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible teneur en oxygène de l' *T71*

Air *–suite*
- Comprimé ¬ Maladie de l' *T70.3*
- ¬
- - Hypoplasie dermique en *Q82.8*
- - Mal de: *T75.3*
- - Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d'humidification de l' *J67.7*
- - Pollution de l' *Z58*
- - Poussières et autres impuretés dans l' *Z57*

Aird
v. Flynn-Aird

Aisselle
v.a. creux axillaire
- Membre supérieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l' *C77.3*
- SAI ¬ *C76.1*
- ¬
- - *C49.3*
- - *D21.3*
- - *L02.4*
- - *L04.2*
- - *T22*

AIT] ¬ Accidents ischémiques cérébraux transitoires [*G45*

Ajustement
- Appareil
- - Auditif ¬ Mise en place et *Z46.1*
- - Dispositifs médicaux ¬ Mise en place et *Z46*
- - Orthodontique ¬ Mise en place et *Z46.4*
- - Orthopédique ¬ Mise en place et *Z46.7*
- - Précisés ¬ Mise en place et *Z46.8*
- - Prothèse externe
- - - Non précisé ¬ Mise en place et *Z44.9*
- - - ¬ Mise place
- - - - *Z44*
- - - - *Z44.8*
- - Rapport avec le système nerveux et les organes des sens ¬ Mise en place et *Z46.2*
- - Sans précision ¬ Mise en place et *Z46.9*
- - Urinaire ¬ Mise en place et *Z46.6*
- Bras artificiel (total) (partiel) ¬ Mise en place et *Z44.0*
- Entretien
- - Dispositif d'accès vasculaire ¬ *Z45.2*
- - Pompe à perfusion ¬ *Z45.1*
- - Prothèse
- - - Auditive implantée ¬ *Z45.3*
- - - Interne
- - - - Non précisée ¬ *Z45.9*
- - - - ¬ *Z45.8*
- Iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux ¬ Mise en place et *Z46.5*
- Jambe artificielle (totale) (partielle) ¬ Mise en place et *Z44.1*
- Lunettes et verres de contact ¬ Mise en place et *Z46.0*

Ajustement *–suite*
- Œil artificiel ¬ Mise en place et *Z44.2*
- Prothèse
- - Dentaire ¬ Mise en place et *Z46.3*
- - Externe du sein ¬ Mise en place et *Z44.3*
- Transitions entre les différentes périodes de vie ¬ Difficultés d' *Z60*

Akari ¬ Rickettsiose varicelliforme due à Rickettsia *A79.1*

Akathisie (induite par le traitement) (médicamenteuse) ¬ *G25.88*

Akée ¬ Intoxication aiguë par le fruit d' *T62.2*

AKI
- Acute Kidney Injury] ¬ *N17.99*
- ¬ Acute Kidney Injury [*N17*

AKT2 ¬ Lipodystrophie partielle familiale associée à *E88.1*

Al Awadi-Raas-Rothschild ¬ Syndrome d' *Q87.2*

Alacrymie congénitale isolée ¬ *Q10.6*

Alagille
- Microdélétion 20p12 ¬ Syndrome d' *Q44.7*
- ¬ Syndrome d' *Q44.7*

Alagille-Watsons
- Monosomie 20p12 ¬ Syndrome d' *Q44.7*
- Mutation ponctuelle de JAG1 ¬ Syndrome d' *Q44.7*

Alajouanine] ¬ Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix- *G37.4*

Alanine aminotransférase ¬ Taux anormal d' *R74.8*

Alanine-glyoxylate aminotransférase peroxysomale ¬ Déficit en *E74.8*

Alba ¬
- Dépôts [accrétions] sur les dents: materia *K03.6*
- Piedra blanche [Piedra *B36.2*
- Pityriasis *L30.5*
- Pneumonia *A50.0†, J17.0**

Albers-Schönberg ¬ Syndrome d' *Q78.2*

Albescente
- Vitelliforme) ¬ Dystrophie: rétinienne (pigmentaire) (ponctuée *H35.5*
- ¬ Rétinite ponctuée *H35.5*

Albinisme
- Anomalies digitales ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.8*
- Cutané ¬ *E70.3*
- Cutanéo-oculaire ¬ *E70.3*
- Isolé ¬ *E70.3*
- Oculaire
- - Récessif lié à l'X ¬ *E70.3*
- - Surdité
- - - Neurosensorielle congénitale ¬ *E70.3*
- - - Sensorielle tardive ¬ *E70.3*
- - Type Nettleship-Falls ¬ *E70.3*
- - ¬ *E70.3*
- Oculo-cutané

Albinisme *–suite*
- Oculo-cutané *–suite*
- - Jaune ¬ *E70.3*
- - Rouge ¬ *E70.3*
- - Type
- - - 3 ¬ *E70.3*
- - - Amish ¬ *E70.3*
- - Tyrosinase-négatif ¬ *E70.3*
- - ¬ *E70.3*
- Partiel ¬ *E70.3*
- ¬ *E70.3*

Albinisme-surdité ¬ Syndrome d' *H90.5*

Albipunctatus ¬ Fundus *H35.5*

Albo-papuloïde ¬ Dystrophie cutanée bulleuse atrophiante et *Q81.2*

Albright(-McCune-Sternberg) ¬ Syndrome d' *Q78.1*

Albuginée du corps caverneux du pénis ¬ Lésion de la tunique *S39.80*

Albumine ¬ Anomalie de l' *R77.0*

Albuminurie SAI ¬ *R80*

Albuminurique ¬ Rétinite *N18.9†, H32.8**

Alcaline ¬ Anomalies des taux de: phosphatase: *R74.8*

Alcalinisants ¬ *T50.9*

Alcalis corrosifs et substances similaires ¬ Effet toxique: *T54.3*

Alcalose
- Métabolique ¬ *E87.3*
- Respiratoire ¬ *E87.3*
- SAI ¬ *E87.3*
- ¬ *E87.3*

Alcaptonurie ¬
- *E70.2*
- Arthrose au cours d' *E70.2†, M36.8**

Alcock] ¬ hernie: honteuse [du canal d' *K45*

Alcool
- Acides gras ¬ Déficit d'oxydoréduction des *Q87.1*
- Amylique ¬ *T51.3*
- Butylique [1-butanol] ¬ *T51.3*
- Cétylstéarylique ¬ Hypersensibilité à l' *T78.4*
- Drogue dans le sang ¬ Recherche d' *Z04.8*
- Éthylique ¬ *T51.0*
- Isopropylique ¬ *T51.2*
- Méthylique ¬ *T51.1*
- Propylique [1-propanol] ¬ *T51.3*
- Sang ¬ Présence d' *R78.0*
- Sans précision ¬ Effet toxique: *T51.9*
- Substance psycho actif ¬
- - Delirium, non induit par l' *F05*
- - Syndrome amnésique organique, non induit par l' *F04*
- Sur la moelle osseuse ¬ Effets toxiques de l' *D61.2*
- Tabac, de médicaments ou de drogues ¬ Difficultés liées à: la consommation d' *Z72.0*

Alcool *–suite*
- ¬
- - Abus chronique d' *F10.2*
- - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- - Dégénérescence du système nerveux liée à l' *G31.2*
- - Dysfonctionnement du système nerveux végétatif du à l' *G31.2*
- - Effet toxique
- - - *T51*
- - - *T51.8*
- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- - Pseudosyndrome Cushing
- - - *E24.4*
- - Sevrage d' *Z50.2!*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d' *F10*

Alcoolique
- Aigu
- - Subaigu(ë) ¬ état confusionnel (non *F05*
- - ¬ Insuffisance hépatique *K70.4*
- Chronique ¬ Insuffisance hépatique *K70.4*
- Foie
- - Hémorragie par rupture des varices œsophagiennes ¬ Cirrhose *K70.3†, I98.3**
- - Saignement de varices gastriques ¬ Cirrhose *K70.3†, I98.3**
- - Sans précision ¬ Maladie *K70.9*
- - Varice
- - - Gastriques ¬ Cirrhose *K70.3†, I98.2**
- - - Œsophagiennes ¬ Cirrhose *K70.3†, I98.2**
- - ¬
- - - Cirrhose *K70.3*
- - - Dégénérescence graisseuse *K70.0*
- - - Fibrose et sclérose *K70.2*
- NASH] ¬ Stéatohépatite non *K75.8*
- SAI ¬
- - Cirrhose *K70.3*
- - Insuffisance hépatique *K70.4*
- Sans coma hépatique ¬ Insuffisance hépatique *K70.4*
- Subaiguë ¬ Insuffisance hépatique *K70.4*
- ¬
- - Ataxie cérébelleuse *G31.2*
- - Dégénérescence
- - - Cérébelleuse *G31.2*
- - - Cérébrale *G31.2*
- - Encéphalopathie *G31.2*
- - État hallucinatoire organique (non *F06.0*
- - Gastrite *K29.2*
- - Hépatite *K70.1*
- - Insuffisance hépatique *K70.4*
- - Myocardiopathie *I42.6*
- - Myopathie *G72.1*
- - Pancréatite

Alcoolique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pancréatite *–suite*
- - - Aiguë *K85.2*
- - - Chronique *K86.0*
- - Pellagre (*E52*
- - Polynévrite *G62.1*
- - Produits de désintoxication *T50.6*
- - Psychose ou syndrome de Korsakov non *F04*
- - Stéatohépatite *K70.1*
- - Stéatose hépatique non *K76.0*

Alcoolisation fœtale ¬ Syndrome d' *Q86.0*

Alcoolisme
- Fœtal (dysmorphique) ¬ Syndrome d' *Q86.0*
- Maternel ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l' *O35.4*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l' *P04.3*
- ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*

Aldéhyde
v.a. succinate-semi-aldéhyde
- Oxydase
- - Type A ¬ Déficit combiné en sulfite oxydase, xanthine déshydrogénase et *E72.1*
- - ¬ Déficit combiné en xanthine déshydrogénase et xanthine *E79.8*

Alder ¬ Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: *D72.0*

Aldolase
- A musculaire ¬
- - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - GSD par déficit en *E74.0*
- ¬
- - Carence héréditaire en *E74.1*
- - Déficit héréditaire en fructose-1-phosphate *E74.1*

Aldostérone
- Synthase
- - Non lié à CYP11B2 ¬ Déficit en *E27.4*
- - ¬ Déficit en *E27.4*
- ¬ Carcinome corticosurrénalien à hypersécrétion pure d' *C74.0, E26.0*

Aldrich
v. Wiskott-Aldrich

Aleucémique de la leucémie à mastocytes ¬ Variante *C94.30*

Alexie ¬ Dyslexie et *R48.0*

Al-Gazali ¬ Dysplasie épiphysaire multiple type *Q77.3*

Algie
- Céphalique ¬ Syndrome
- - *G44*
- - Précisés d' *G44.8*
- Dentaires SAI ¬ *K08.8*
- Faciale atypique ¬ *G50.1*
- Vasculaire face
- - Chronique ¬ *G44.0*

Algie *–suite*
- Vasculaire face *–suite*
- - Épisodique ¬ *G44.0*
- - ¬ Syndrome d' *G44.0*

Algique chronique ¬ Modification durable de la personnalité liée à un syndrome *F62.80*

Algoneurodystrophie ¬ *M89.0*

Alibert-Bazin ¬ Syndrome d' *C84.0*

Aliment
- Contact peau ¬ Dermite
- - Allergique de contact due à des *L23.6*
- - Contact avec la peau ¬ Dermite de contact, sans précision, due à des *L25.4*
- - Irritante de contact due à des *L24.6*
- Liquides ¬ Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d' *R63.8*
- Régurgités ¬
- - Aspiration néonatale de lait et d' *P24.3*
- - Pneumonie par aspiration (de): *J69.0*
- - Suffocation par: *T17*
- Sans précision ¬ Effet toxique: Substance nocive absorbée par le biais d' *T62.9*
- Vomissements ¬ Pneumonie due à des *J69.0*
- ¬
- - Dermite
- - - Allergique de contact due aux végétaux, sauf *L23.7*
- - - Contact, sans précision, due aux végétaux, sauf *L25.5*
- - - Ingestion d' *L27.2*
- - - Irritante de contact due aux végétaux, sauf *L24.7*
- - Effet toxique
- - - Aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des *T64*
- - - Substance nocif
- - - - Absorbées par le biais d' *T62*
- - - - Précisées absorbées par le biais d' *T62.8*

Alimentaire
- Acide folique ¬ Anémie par carence *D52.0*
- Bacillus cereus ¬ Intoxication *A05.4*
- Base de poissons ¬ Poumon des: travailleurs de préparations *J67.8*
- Calcium ¬ Carence *E58*
- Carencé ¬ Arthropathie lors d'un état *E63.9†, M14.59**
- Classique à Clostridium botulinum ¬ Intoxication *A05.1*
- Clostridium
- - Difficile ¬ Intoxication d'origine *A04.7*
- - Perfringens [Clostridium welchii] ¬ Intoxication *A05.2*
- Inadéquats ¬ Régime et habitudes *Z72.8*
- Non classé ¬
- - Intoxications bactériennes d'origine *A05*
- - Réactions d'intolérance *T78.1*
- Nouveau-né

Alimentaire *–suite*
- Nouveau-né *–suite*
- - Sans précision ¬ Problème *P92.9*
- - ¬ Problème
- - - *P92*
- - - *P92.8*
- Précisées ¬ Autres intoxications bactériennes d'origine *A05.8*
- Sans précision ¬ Intoxication bactérienne d'origine *A05.9*
- Sélénium ¬ Carence *E59*
- Staphylocoques ¬ Intoxication *A05.0*
- Toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi ¬ infection ou intoxication *A02*
- Vibrio parahaemolyticus ¬ Intoxication *A05.3*
- Vitamine B12 ¬
- - Anémies par carence *D51.3*
- - Polyneuropathie au cours de l'anémie par carence *D51.3†, G63.4**
- Zinc ¬ Carence *E60*
- ¬
- - Choc anaphylactique dû à une intolérance *T78.0*
- - Déséquilibre *E63.1*
- - Érosion des dents: due à: régime *K03.2*
- - Gastroentérite colite
- - - Allergiques et *K52.2*
- - - Hypersensibilité *K52.2*
- - Infection
- - - Listeria d'origine *A32.9*
- - - Listérienne d'origine *A32*
- - Listériose d'origine *A32.9*
- - Peau flasque ou affaissée: après une perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime *L98.7*

Alimentation
- Défectueuse ¬ *Z59*
- Enfant ¬ Trouble de l' *F98.2*
- Excessive ¬ *R63.2*
- Lente du nouveau-né ¬ *P92.2*
- Rapport avec le sommeil ¬ Troubles de l' *F51.3*
- SAI ¬ Difficultés d' *R63.3*
- Sans précision ¬ Trouble de l' *F50.9*
- Sein difficile chez le nouveau-né ¬ *P92.5*
- ¬
- - Cataracte au cours de trouble de l' *E63.9†, H28.1**
- - Épilepsie réflexe à l' *G40.8*
- - Polyneuropathie liée à l' *E63.9†, G63.4**
- - Trouble
- - - *F50*
- - - *F50.8*

Aliphatiques
- Aromatiques
- - Sans précision ¬ Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures *T53.9*

Aliphatiques *–suite*
- Aromatiques *–suite*
- - ¬ Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures *T53*
- ¬ Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures *T53.6*

ALK
- Négatif ¬ Lymphome anaplasique à grandes cellules, *C84.7*
- Positif ¬ Lymphome
- - Anaplasique à grandes cellules, *C84.6*
- - B à grandes cellules *C83.3*

Alkaptonurica ¬ Osteoarthrosis deformans *E70.2†, M36.8**

Alkylants ¬ Syndrome myélodysplasique induit agent
- *D46*
- *D46.9*

Allaitement
- Maternel ¬ Soins et examens de l' *Z39.1*
- ¬ Surveillance de l' *Z39.1*

Allbright ¬ Ostéodystrophie héréditaire d' *E20.1*

Allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus sexuel *Z04.5*

Allen-Masters] ¬ Syndrome de déchirure du ligament large [*N83.8*

Allergènes ¬ Désensibilisation aux *Z51.6*

Allergie
- Acide gallique ¬ *T78.4*
- Agents anti-infectieux ¬ Antécédents personnels d' *Z88.3*
- Analgésiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.6*
- Anesthésiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.4*
- Antibiotiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.1*
- Cucurbitacées ¬ *T78.1*
- Dérivé
- - Azole ¬ *T88.7*
- - Triazole ¬ *T88.7*
- Gallate de propyle ¬ *T78.4*
- Graisses industrielles ¬ *L23.5*
- Huile de sésame ¬ *T78.1*
- Lait de vache ¬ *L27.2*
- Légumineuses ¬ *T78.1*
- Médicament substance biologique
- - Sans précision ¬ Antécédents personnels d' *Z88.9*
- - ¬ antécédent personel
- - - *Z88.8*
- - - *Z91.0*
- Moisissures ¬ *J30.3*
- Narcotiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.5*
- Paragroupes ¬ *T78.4*
- Pénicilline ¬

Allergie *–suite*
- Pénicilline ¬ *–suite*
- - *T88.7*
- - Antécédents personnels d' *Z88.0*
- Plumes ¬ *J30.3*
- Poisson ¬ *T78.1*
- Produits cosmétiques ¬ *L23.2*
- Protéine
- - Cacahuètes ¬ *T78.1*
- - Poulet ¬ *T78.1*
- SAI due au pollen ¬ *J30.1*
- Sans précision ¬ *T78.4*
- Sérum et vaccin ¬ Antécédents personnels d' *Z88.7*
- Solvants organiques ¬ *L23.5*
- Sulfamides ¬ Antécédents personnels d' *Z88.2*
- ¬ Tests (de): *Z01.5*

Allergique
v. Type de maladie

Allescheriase ¬ *B48.2*

Alloanticorps contre facteur
- IX ¬ Hémophilie B avec *D67*
- VIII ¬ Hémophilie A avec *D66*

Allodynie ¬ *R20.8*

Allogénique de cellules souches ¬ Status post greffe *Z94.80*

Allo-immune ¬
- Neutropénie néonatale *P61.5*
- Thrombopénie materno-fœtale et néonatale *P61.0*

Allongé ¬
- Dent *K00.2*
- Syndrome du processus styloïde *M77.9*

Allongement
- Acquis du côlon ¬ *K59.8*
- Hypertrophique du col de l'utérus ¬ *N88.4*

Allumer des incendies [pyromanie] ¬ Tendance pathologique à *F63.1*

Allure schizophrénique
- Cours d'une épilepsie ¬ Psychose d' *F06.2*
- ¬ Trouble
- - Délirant organique [d' *F06.2*
- - Psychotique aigu d' *F23.2*

Alopécie
v.a. folliculaire-alopécie-photophobie
- Androgénique
- - Médicamenteuse ¬ *L64.0*
- - Sans précision ¬ *L64.9*
- - ¬
- - - *L64*
- - - Formes d' *L64.8*
- Anomalies génitales ¬ Dysplasie frontonasale avec *Q87.0*
- Cicatriciel
- - Sans précision ¬ *L66.9*
- - ¬

Alopécie *–suite*
- Cicatriciel *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - *L66*
- - - Formes d' *L66.8*
- Circonscrite-polydactylie ¬ Syndrome d' *Q87.2*
- Congénital
- - Autosomique dominante ¬ Kératodermie palmoplantaire et *Q82.8*
- - ¬ *Q84.0*
- Contractures-nanisme-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Épilepsie-pyorrhée-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Frontale fibrosante ¬ *L66.1*
- Masculine ¬ *L64*
- Médicament cytotoxique ¬ *L65.8*
- Mucineuse de Pinkus ¬ *L65.2*
- Post-infectieuse ¬ *L65.8*
- SAI ¬ *L65.9*
- Suite d'une infection ¬ *L65.8*
- Syphilitique ¬ *A51.3†, L99.8**
- Totale ¬ *L63.0*
- ¬ Syphilis avec *A51.3†, L99.8**

Alorainy
v. Bosley-Salih-Alorainy

Alpers ¬ Polydystrophie
- Cérébrale progressive [syndrome d' *G31.88*
- Sclérosante progressive d' *G31.88*

Alpers-Huttenlocher ¬ Syndrome d' *G31.88*

Alpha
- Bêta
- - Adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs *T44.9*
- - Gamma-delta ¬ Contient des cellules de type *C86.1*
- Bloquants, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.6*
- Fibrinogène A ¬ Amylose à chaîne *E85.0†, N08.4**
- Fœtoprotéine ¬
- - Anomalie de l' *R77.2*
- - Dépistage prénatal d'un taux élevé d' *Z36.1*
- HSV-2 ¬ Dermite vésiculaire
- - Lèvre due au virus humain type 2 (*B00.1*
- - Oreille due au virus humain type 2 (*B00.1*
- Réductase (avec pseudo-hermaphroditisme masculin) ¬ Déficit en 5- *E29.1*
- Sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents principalement *T44.4*
- Thalassémie
- - Déficience intellectuelle liée à l'X ¬ *D56.0*
- - Syndrome myélodysplasique ¬ Syndrome d' *D56.0, D46.9*
- - ¬ *D56.0*
- ¬ Maladie des chaînes lourdes *C88.3*

Alpha 2 ¬ Dystrophie musculaire congénitale par déficit en laminine *G71.2*

Alpha-1
- Antitrypsine ¬ Déficit en *E88.0*
- Protéinase ¬ Déficit en inhibiteur d' *E88.0*

Alpha-1,4-glucosidase acide ¬ Déficit en *E74.0*

Alpha-1-antichymotrypsine ¬ Déficit en *E88.0*

Alpha2-antiplasmine ¬ Déficit congénital en *D68.8*

Alpha-7 ¬ Dystrophie musculaire congénitale par déficit en intégrine *G71.2*

Alpha-B cristalline ¬ Myopathie distale tardive associée à l' *G71.0*

Alphabétisation ¬ Difficultés liées à l'éducation et l' *Z55*

Alpha-cétoglutarate réductase ¬ Déficit en lysine *E72.3*

Alpha-D-mannosidase lysosomale ¬ Déficit en *E77.1*

Alpha-galactosidase A ¬ Déficit en *E75.2*

Alpha-hydroxylase ¬ Déficit en 25-hydroxyvitamine-D-1- *E83.31*

Alphahydroxylase ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 17- *E25.08*

Alpha-hydroxyphénylpyruvate hydroxylase ¬ Déficit en 4- *E70.2*

Alpha-L-fucosidase ¬ Déficit en *E77.1*

Alpha-L-iduronidase ¬ Déficit en *E76.0*

Alpha-mannosidose ¬ *E77.1*

Alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA thiolase ¬ Déficit en *E71.1*

Alpha-méthyl-acétoacétylique ¬ Acidurie *E71.1*

Alpha-méthylacyl-CoA racémase ¬ Déficit en *K76.8*

Alpha-N-acétylgalactosaminidase ¬ Déficit en *E77.1*

Alpha-N-acétyl-galactosaminidase de l'adulte ¬ Déficit en *E77.1*

Alpha-sarcoglycanopathie ¬ *G71.0*

Alport
- Lié à l'X-léiomyomatose diffuse ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬ Syndrome de: *Q87.8*

ALPS ¬ *D47.9*

Alström ¬ Syndrome d' *Q87.8*

ALTE] ¬ Apparent life-threatening event [*R06.80*

Altération
- Attention
- - Syndrome avec hyperactivité ¬ *F90.0*
- - Trouble avec hyperactivité ¬ *F90.0*
- Audition oreille ¬ Surdité
- - Neurosensorielle unilatérale sans *H90.4*
- - Unilatéral
- - - Mixte de transmission et neurosensorielle sans *H90.7*
- - - Transmission sans *H90.1*
- État général ¬ *R53*
- Fonction rénale ¬ Goutte due à une *M10.3*
- Gène MLL ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec *C92.6*

Altération *–suite*
- Osseuse diabétique ¬ *E14.60†, M90.89**
- Vasculaire
- - Rétine ¬
- - - *H35.0*
- - - Maladie due au VIH avec *B23.8, H35.0*
- - Rétiniennes ¬ Autres rétinopathies et *H35.0*
- - ¬ Diabète sucré
- - - *E14.50†, I79.2**
- - - Type
- - - - 1 avec *E10.50†, I79.2**
- - - - 2 avec *E11.50†, I79.2**

Altérée au glucose ¬ Tolérance *R73.0*

Alternante
- Enfance ¬ Hémiplégie *Q07.8*
- Monoculaire
- - Non intermittent ¬
- - - Ésotropie (*H50.0*
- - - Exotropie (*H50.1*
- - ¬
- - - Ésotropie [strabisme convergent] intermittente (*H50.3*
- - - Exotropie [strabisme divergens] intermittente (*H50.3*
- Nerf oculomoteur ¬ Paralysie *G83.8*
- ¬ Hémiplégie faciale *G83.8*

Alternaria ¬ Infection à *B48.7*

Altitude
- Non précisés ¬ Effets de l' *T70.2*
- ¬
- - Anoxie due à l' *T70.2*
- - Polycythémie: due à: *D75.1*

Aluminium
- Dialyse ¬ Anémie induite par l' *N18.5†, D63.8**
- ¬ Maladie osseuse due à l' *M83.4*

Aluminose (du poumon) ¬ *J63.0*

Alvéolaire
- Centrale congénital ¬ Syndrome d'hypoventilation *G47.32*
- Diffuse ¬ Hémorragie *R04.8*
- Édentée
- - Associées à un traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la crête *K06.2*
- - Sans précision ¬ Affection de la gencive et de la crête *K06.9*
- - ¬
- - - Affection
- - - - Gencive et de la crête *K06*
- - - - Précisées de la gencive et de la crête *K06.8*
- - - Atrophie de la crête *K08.2*
- Enfant adolescent ¬ Obésité
- - Extrême avec hypoventilation *E66.25*
- - Hypoventilation *E66.24*
- Fistule ¬ Abcès: dento- *K04.6*
- Foie ¬ Échinococcose *B67.5†, K77.0**

Alvéolaire *–suite*
- Indice masse corporelle IMC
- - 40 ou plus ¬ Obésité avec hypoventilation *E66.22*
- - Compris
- - - 30 et moins de 35 ¬ Obésité avec hypoventilation *E66.20*
- - - 35 et moins de 40 ¬ Obésité avec hypoventilation *E66.21*
- Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus multilocularis [échinococcose *B67.6*
- Non obstructive idiopathique du sommeil ¬ Hypoventilation *G47.32*
- Pariéto-alvéolaires ¬ Pneumonies *J84.0*
- Poumon ¬ Microlithiase *J84.0*
- Primaires ¬ Multiples tumeurs *C34.9, C97!*
- Pulmonaire
- - Auto-immune ¬ Protéinose *J84.0*
- - Congénitale ¬ Protéinose *J84.0*
- - Idiopathique ¬ Protéinose *J84.0*
- - Secondaire ¬ Protéinose *J84.0*
- - Sévère par déficit en MARS à début précoce ¬ Protéinose *J84.0*
- SAI ¬
- - Abcès: dento- *K04.7*
- - Hypertrophie de la crête *K08.8*
- Sans précision ¬ Infection à Echinococcus multilocularis [échinococcose *B67.7*
- Tissus mous ¬ Sarcome *C49.9*
- ¬
- - Affections précisées des dents et de l'appareil *K08.88*
- - Echinococcose *B67.7*
- - Fente
- - - Labiale avec fente de la partie *Q37.5*
- - - Processus) *K08.8*
- - Fracture du maxillaire inférieur: Partie *S02.67*
- - Infection hépatique à Echinococcus multilocularis [échinococcose *B67.5*
- - Irrégularité de la crête *K08.8*
- - Kyste (de): naso-labial [naso- *K09.1*
- - Lésion des parois *J84.0*
- - Muqueuse (de la crête) *C03*
- - Obésité grade
- - - I (OMS) avec hypoventilation *E66.20*
- - - II (OMS) avec hypoventilation *E66.21*
- - - III (OMS) avec hypoventilation *E66.22*
- - Ostéite *K10.3*
- - Plaie ouverte
- - - Lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus *S01.53*
- - - Zone de l'os *S01.59*
- - Pneumonies alvéolaires et pariéto- *J84.0*
- - Protéinose *J84.0*
- - Syndrome de l'hypoventilation *E66.29*

Alvéole
- Dentaire
- - Cours de scorbut ¬ Inflammation des *E54†, K93.8**
- - ¬ *S02.8*
- Pulmonaire ¬
- - Adénome des *D14.3*
- - Collapsus primitif des *P28.0*

Alvéolie (antérieure) (postérieure) ¬ Supra- *K07.2*

Alvéolite
- Allergique
- - Actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ *J67.7*
- - Extrinsèque) SAI ¬ *J67.9*
- - Poussière organique
- - - Sans précision ¬ *J67.9*
- - - ¬
- - - - *J67*
- - - - *J67.8*
- Aspergillus clavatus ¬ *J67.4*
- Cryptostroma corticale ¬ *J67.6*
- Fibreuse (cryptogénique) ¬ *J84.1*
- Mâchoires ¬ *K10.3*
- Pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine ¬ *J67*
- Sèche ¬ *K10.3*

Alymphoplasie thymique ¬ *D82.1*

Alzheimer
- Apparition
- - Présénile ¬ Démence dégénérative primaire de type *G30.0†, F00.0**
- - Sénile ¬ Démence dégénérative primaire de type *G30.1†, F00.1**
- Début
- - Précoce (type 2) ¬ Démence de la maladie d' *G30.0†, F00.0**
- - Présénile ¬ Démence dégénérative primaire de type *F00.0**
- - Sénile ¬ Démence dégénérative primaire de type *F00.1**
- - Tardif
- - - Type 1) ¬ Démence de la maladie d' *G30.1†, F00.1**
- - - ¬ Démence de la maladie d' *G30.1†, F00.1**
- DSTA) ¬ Démence sénile, de type *F00.1**
- Forme
- - Atypique ¬ Démence de type *G30.8†, F00.2**
- - Mixte ¬ Démence de type *G30.8†, F00.2**
- Précoce autosomique dominante ¬ Maladie d' *G30.0*
- Type
- - 1 ¬ Maladie d' *F00.1**
- - 2 ¬ Maladie d' *F00.0**
- ¬ Démence

Alzheimer *–suite*
- ¬ Démence *–suite*
- - *G30.9†, F00.9**
- - Atypique, de type *F00.2**
- - Cours
- - - Maladie d' *G30.9†, F00.9**
- - - Sclérose d' *G30.9†, F00.9**
- - Dégénérative primaire de type *G30.9†, F00.9**
- - Présénile
- - - Cours de maladie d' *G30.0†, F00.0**
- - - Type *F00.0**
- - Sénile au cours de maladie d' *G30.1†, F00.1**

Alzheimerlike ¬ Maladie à prions familiale *A81.9*

Amantadine ¬ *T42.8*

Amastie
- Congénitale isolée ¬ *Q83.0*
- ¬ *Q83.88*

Amaurose
- Congénitale de Leber ¬ *H35.5*
- Fugace ¬ *G45.3*
- Traumatique ¬ *S05.9*

Amaurotique
- Familiale ¬ Idiotie *E75.4*
- Infantile ¬ Idiotie *E75.4*
- Juvénile ¬ Idiotie *E75.4*
- ¬
- - Forme tardive de l'idiotie *E75.4*
- - Idiotie *E75.4*

Ambiant
- Eau ¬ Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique *T70.0*
- ¬
- - Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique *T70.1*
- - Hypothermie, non associée à une baisse de la température *R68.0*
- - Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible teneur en oxygène de l'air *T71*

Ambiguïté des organes génitaux ¬ *Q56.4*

Ambiguus ¬ Situs *Q89.3*

Amblyopie
- Anisométrique ¬ *H53.0*
- Défaut d'usage ¬ *H53.0*
- Ex anopsia ¬ *H53.0*
- Strabisme ¬ *H53.0*

AMC ¬ *Q74.3*

Amégacaryocytique ¬ Syndrome de synostose radioulnaire-thrombocytopénie *Q87.2*

Amélie
- Malformations multiples ¬ Syndrome de tetra- *Q87.8*
- SAI ¬ *Q73.0*

Améloblastique
- Mandibule ¬

Améloblastique *–suite*
- Mandibule ¬ *–suite*
- - Carcinome *C41.1*
- - Fibrosarcome *C41.1*
- - Odontosarcome *C41.1*
- - Sarcome *C41.1*
- ¬
- - Carcinome *C41.1*
- - Fibro-odontosarcome *C41.1*

Améloblastome ¬ *D16.5*

Amélogenèse imparfaite-néphrocalcinose ¬ Syndrome d' *K00.5†, N29.8**

Amelogenesis imperfecta ¬ *K00.5*

Amélosarcome de la mandibule ¬ *C41.1*

Aménorrhée
- Oligoménorrhée et hypoménorrhée ¬ *N91*
- Primaire ¬ *N91.0*
- Sans précision ¬ *N91.2*
- Secondaire ¬ *N91.1*

Américaine
- Atteinte cardiaque ¬ Trypanosomiase *B57.2†, I41.2**
- SAI ¬ Trypanosomiase: *B57.2*
- ¬
- - Histoplasmose *B39.4*
- - Trypanosomiase *B57*

Americanus ¬ Infection à Necator *B76.1*

Amérindienne ¬ Myopathie *G71.2*

Amérique du Nord ¬ Cirrhose héréditaire des enfants indiens d' *K74.6*

Amiante et à d'autres fibres minérales ¬ Pneumoconiose due à l' *J61*

Amiantose ¬ *J61*

Amibes ¬
- Abcès
- - *A06.4†, K77.0**
- - Rate dû à des *A06.8†, D77**
- Cystite due à des *A06.8†, N33.8**
- Dermatite due à des *A06.7*
- Pneumonie due à des *A06.5†, J17.3**
- Vésiculite due à des *A06.8†, N51.8**
- Vulvo-vaginite due à des *A06.8†, N77.1**

Amibiase
- Aiguë ¬ *A06.0*
- Cutanée ¬ *A06.7*
- Entamoeba histolytica ¬ *A06.9*
- Foie ¬ *A06.4†, K77.0**
- Hépatique ¬ *A06.4†, K77.0**
- Intestinal
- - Chronique ¬ *A06.1*
- - SAI ¬ *A06.0*
- Poumon ¬ *A06.5†, J99.8**
- Sans précision ¬ *A06.9*
- ¬ *A06*

Amibien
- Aiguë ¬ Dysenterie *A06.0*

Amibien *–suite*
- Cerveau
- - Foie) (et du poumon) ¬ Abcès *A06.6†*
- - ¬ Abcès *A06.6†, G07**
- Foie
- - Abcès cérébral ¬ Abcès *A06.6†, G07**
- - Poumon ¬ Abcès *A06.5†, J99.8**
- - ¬ Abcès *A06.4†, K77.0**
- Non dysentérique ¬ Colite *A06.2*
- Poumon
- - Abcès cérébral ¬ Abcès *A06.6†, G07**
- - Pneumonie ¬ Abcès *A06.5†, J17.3**
- - ¬ Abcès *A06.5†, J99.8**
- Primitive] ¬ MEAP [méningo-encéphalite *B60.2†, G05.2**
- ¬
- - Appendicite *A06.8*
- - Balanite *A06.8†, N51.2**
- - Cystite *A06.8†, N33.8**
- - Infection *A06.9*
- - Kératite *B60.1†, H19.2**
- - Localisations d'une infection *A06.8*
- - Proctite aiguë *A06.8*

Amidinotransférase ¬ Déficit en l-arginine:glycine *E72.8*

Amidohydrolase ¬ Déficit en N-acyl-L-amino acide *E72.8*

Amidon ¬ Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*

Amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l' *U81.6!*

Aminés
- Aromatiques
- - Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme des acides *E70.9*
- - ¬
- - - Anomalie métabolisme acide
- - - - *E70*
- - - - *E70.8*
- - - Déficit en décarboxylase des acides *G24.8*
- Chaîne ramifié
- - Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du métabolisme des acides *E71*
- - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des acides *E71.2*
- - ¬ Autres anomalies du métabolisme des acides *E71.1*
- Nitroaminés du benzène et de ses homologues ¬ Effet toxique: Dérivés *T65.3*
- Non ramifiés ¬ Trouble du métabolisme des acides *E72.8*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des acides *E72.9*
- Soufrés ¬ Anomalies du métabolisme des acides *E72.1*

Aminés *–suite*
- ¬
- - Anémie (par): carence en acides *D53.0*
- - Anomalie
- - - Métabolisme des acides *E72*
- - - Précisées du métabolisme des acides *E72.8*
- - - Transport des acides *E72.0*
- - Carence en acides *E72.9*
- - Trouble
- - - Absorption et du transport des acides *E72.0*
- - - Congénital du métabolisme des acides *E72.9*
- - - Métabolisme des acides *E72.9*

Amino
v. N-acyl-L-amino

Amino-4-imidazole carboxamide ribosidurie ¬ 5- *E79.8*

Aminoacidopathie ¬ *E72.9*

Aminoacidurie
- Hyperdibasique type
- - 1 ¬ *E72.0*
- - 2 ¬ *E72.0*
- ¬
- - *E72.9*
- - Camptodactylie familiale avec une *Q68.1*

Aminoacylase 2 ¬ Déficit en *E75.2*

Aminobenzène] ¬ Aniline [*T65.3*

Aminobutyrique
v. gamma-aminobutyrique

Aminoglycoside
- Non résistant glycopeptides ¬ Enterococcus
- - Faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux *U80.21!*
- - Faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux *U80.31!*
- ¬ Enterococcus
- - Faecalis résistant aux glycopeptides et fortement résistant aux *U80.20!*
- - Faecium résistant aux glycopeptides et hautement résistant aux *U80.30!*

Aminolévulinate
v. delta-aminolévulinate

Aminophénol ¬ Intoxication: Dérivés du 4- *T39.1*

Aminoptérine ¬ Embryofœtopathie à l' *Q86.88*

Aminosides ¬
- Enterococcus
- - Faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement résistant aux *U80.2!*
- - Faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement résistant aux *U80.3!*
- Intoxication: *T36.5*

Aminotransférase
- Peroxysomale ¬ Déficit en alanine-glyoxylate *E74.8*

Aminotransférase *–suite*
- ¬
- - Déficit
- - - Ornithine *E72.4*
- - - Phosphosérine *E72.8*
- - Taux anormal
- - - Alanine *R74.8*
- - - Aspartate *R74.8*
- - Tyrosinémie par déficit en tyrosine *E70.2*

Amish ¬
- Albinisme oculo-cutané type *E70.3*
- Microcéphalie létale type *Q02*
- Myopathie némaline type *G71.2*
- Syndrome d'épilepsie infantile type *E77.8*

AMME ¬ Syndrome *Q87.8*

Ammoniac
v. histidine-ammoniac-lyase
- ¬ Trouble métabolisme
- - *E72.2*
- - Cycle de l'urée et de la détoxification de l' *E72.2*

Ammoniaque ¬ Taux accru d' *R79.8*

Ammonium quaternaire ¬ Hypersensibilité aux composés d' *T78.4*

Amnésie
- Antérograde ¬ *R41.1*
- Dissociative ¬ *F44.0*
- Globale transitoire ¬ *G45.4*
- Rétrograde ¬ *R41.2*
- SAI ¬ *R41.3*
- ¬ Autres formes d' *R41.3*

Amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives ¬ Syndrome *F04*

Amnii) ¬ Aspiration de liquor (*P24.1*

Amniocentèse
- Césarienne ou déclenchement chirurgical ¬ Lésion du placenta par *P02.1*
- ¬
- - *Z36.0*
- - Dépistages prénatals par *Z36.2*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*

Amniotique
- Membrane
- - Sans précision ¬ Anomalie du liquide *O41.9*
- - ¬
- - - Anomalie
- - - - Liquide *O41*
- - - - Précisées du liquide *O41.8*
- - - Infection du sac *O41.1*
- Mucus ¬ Aspiration néonatale de liquide *P24.1*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): liquide *O08.2*
- Unique ¬ Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac *O69.2*
- ¬

Amniotique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Embolie *O88.1*
- - Présence de méconium dans le liquide *P20*
- - Travail accouchement compliqué
- - - Anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide *O68.2*
- - - Présence de méconium dans le liquide *O68.1*

Amniotite
v.a. Chorio-amniotite
- ¬
- - *O41.1*
- - *P02.7*

Amœbome
- Intestin ¬ *A06.3*
- SAI ¬ *A06.3*

Amorale ¬ Personnalité: *F60.2*

Amphétamine méthamphétamine ¬
- Consommation non intraveineuse de produits contenant de l' *U69.34!*
- Utilisation intraveineuse de produits contenant de l' *U69.33!*

Amphibien ¬ Venin d' *T63.8*

Ampoule
- Rectale ¬ *C20*
- Vater ¬
- - *D01.5*
- - *D37.6*
- - Carcinome de l' *C24.1*
- - Tumeur maligne: *C24.1*

Amputation
- Col utérin en tant que complication de l'accouchement ¬ *O65.5*
- Fœtus pour faciliter l'accouchement ¬ *P03.8*
- Partie inférieure du membre inférieur ¬ *S88.9*
- Traumatique
- - Articulation
- - - Coude ¬ *S58.0*
- - - Épaule ¬ *S48.0*
- - - Hanche ¬ *S78.0*
- - Associations de parties du corps ¬ *T05.8*
- - Associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main ¬ *S68.3*
- - Avant-bras
- - - Niveau non précisé ¬ *S58.9*
- - - ¬ *S58*
- - Bras SAI ¬ *T11.6*
- - Cheville et du pied ¬ *S98*
- - Coude et le poignet ¬ *S58.1*
- - Deux
- - - Doigts ou plus (complète) (partielle) ¬ *S68.2*
- - - Mains ¬ *T05.0*
- - - Membre

Amputation *–suite*
- Traumatique *–suite*
- - Deux *–suite*
- - - Membre *–suite*
- - - - Inférieurs [tout niveau] ¬ *T05.5*
- - - - Supérieurs [tout niveau] ¬ *T05.2*
- - - Orteils ou plus ¬ *S98.2*
- - - Pieds ¬ *T05.3*
- - Doigt (complète) (partielle) ¬ *S68.1*
- - Épaule
- - - Bras
- - - - Niveau non précisé ¬ *S48.9*
- - - - ¬ *S48*
- - - Coude ¬ *S48.1*
- - Genou et la cheville ¬ *S88.1*
- - Hanche
- - - Cuisse
- - - - Niveau non précisé ¬ *S78.9*
- - - - ¬ *S78*
- - - Genou ¬ *S78.1*
- - Jambe
- - - Niveau non précisé ¬ *S88.9*
- - - SAI ¬ *T13.6*
- - - ¬ *S88*
- - Main
- - - Membre supérieur [tout niveau, sauf la main] ¬ *T05.1*
- - - Niveau du poignet ¬ *S68.4*
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Niveau non précisé ¬ *T13.6*
- - - - ¬ Séquelles d'écrasement et d' *T93.6*
- - - Supérieur
- - - - Inférieurs, toute association [tout niveau] ¬ *T05.6*
- - - - Niveau non précisé ¬ *T11.6*
- - - - ¬ Séquelles d'écrasement et d' *T92.6*
- - Multiples, sans précision ¬ *T05.9*
- - Niveau
- - - Cou ¬ *S18*
- - - Genou ¬ *S88.0*
- - Oreille ¬ *S08.1*
- - Organes génitaux externes ¬ *S38.2*
- - Orteil
- - - S) et d'autres parties du pied ¬ *S98.3*
- - - ¬ *S98.1*
- - Partie
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Écrasement et *S38*
- - - Corps non précisée ¬ Écrasement et *T14.7*
- - - Non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S38.3*
- - - Pied ¬ *S98.3*
- - - Poignet et de la main ¬ *S68.8*
- - - Tête

Amputation *–suite*
- Traumatique *–suite*
- - Partie *–suite*
- - - Tête *–suite*
- - - - Non précisée ¬ *S08.9*
- - - - ¬
- - - - - *S08*
- - - - - *S08.8*
- - - Thorax ¬
- - - - *S28.1*
- - - - Écrasement du thorax et *S28*
- - Pied
- - - Membre inférieur [tout niveau, sauf le pied] ¬ *T05.4*
- - - Niveau
- - - - Cheville ¬ *S98.0*
- - - - Non précisé ¬ *S98.4*
- - Plusieurs parties du corps ¬ *T05*
- - Poignet main
- - - Niveau non précisé ¬ *S68.9*
- - - ¬ *S68*
- - Pouce (complète) (partielle) ¬ *S68.0*
- - SAI ¬ *T14.7*
- - Tronc, niveau non précisé ¬ *T09.6*
- ¬
- - Complication
- - - Non précisées au niveau d'un moignon d' *T87.6*
- - - Propres à une réimplantation et une *T87*
- - Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d' *T87.6*
- - Hématome au niveau d'un moignon d' *T87.6*
- - Infection d'un moignon d' *T87.4*
- - Nécrose d'un moignon d' *T87.5*
- - Névrome sur moignon d' *T87.3*
- - Œdème au niveau d'un moignon d' *T87.6*

AMS-C
- Atrophie multisystématisée de type cérébelleux] ¬ *G23.3*
- ¬ Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse [*G23.3*

AMS-P
- Atrophie multisystématisée de type parkinsonien] ¬ *G23.2*
- ¬ Atrophie multisystématisée de forme Parkinsonne [*G23.2*

Amyélie ¬ *Q06.0*

Amygdale
- Antérieur) (postérieur) ¬ Tumeur maligne: Pilier de l' *C09.1*
- Lingual ¬
- - *D10.1*
- - Syphilis tardive des *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur maligne: *C02.4*
- Palatin ¬
- - *C09.9*

Amygdale *–suite*
- Palatin ¬ *–suite*
- - *D10.4*
- Pharyngien ¬
- - *C11.1*
- - *D10.6*
- SAI ¬ *C09.9*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C09.9*
- Végétation adénoïde
- - SAI ¬ Maladie (chronique) des *J35.9*
- - Sans précision ¬ Maladie chronique des *J35.9*
- - ¬
- - - Hypertrophie des *J35.3*
- - - Maladies chroniques des *J35.8*
- ¬
- - Abcès de l' *J36*
- - Aspergillose des *B44.2†, J99.8**
- - Fosse des *D10.5*
- - Gomme d' *A52.7†, J99.8**
- - Hyperplasie des *J35.1*
- - Hypertrophie des *J35.1*
- - Piliers des *D10.5*
- - Syphilis des *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D10.4*
- - - Malign
- - - - *C09*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C09.8*

Amygdalien
- Adénoïdienne) ¬ Cicatrice *J35.8*
- ¬
- - Aspergillose *B44.2*
- - Diphtérie *A36.0*
- - Tumeur maligne: Fosse *C09.0*
- - Ulcère *J35.8*

Amygdalite
- Aigu
- - Folliculaire ¬ *J03.9*
- - Gangréneuse ¬ *J03.9*
- - Infectieuse ¬ *J03.9*
- - Micro-organismes précisés ¬ *J03.8*
- - SAI ¬ *J03.9*
- - Sans précision ¬ *J03.9*
- - Ulcéreuse ¬ *J03.9*
- - ¬ *J03*
- Aspergillus ¬ *B44.2†, J99.8**
- Chronique ¬ *J35.0*
- Pneumocoques ¬ *J03.8, B95.3!*
- Staphylocoques ¬ *J03.8, B95.8!*
- Streptocoques ¬ *J03.0*
- Virus de l'herpès ¬ Gingivo-stomatite et pharyngo- *B00.2*

Amygdalolithe ¬ *J35.8*

Amylase ¬ Anomalies des taux de: *R74.8*

Amylique ¬ Alcool: *T51.3*

Amylo-1,6-glucosidase ¬ Déficit en *E74.0*

Amyloïde

- Autonome ¬ Neuropathie *E85.9†, G99.0**
- Familiale ¬ Néphropathie *E85.0†, N08.4**
- Héréditaire ¬ Néphropathie *E85.0†, N08.4**
- Moelle épinière ¬ Dégénérescence *E85.4†, G32.8**
- Rate ¬ Maladie *E85.4†, D77**
- Système nerveux ¬ Dégénérescence *E85.4†, G99.8**
- Transthyrétine ¬ Cardiopathie *E85.4†, I43.1**
- Type portugais ¬ Polyneuropathie *E85.1†, G63.3**
- ¬
- - Angiopathie cérébrale *E85.4†, I68.0**
- - Dégénérescence capillaire *E85.8†, I79.8**
- - Glomérulopathie fibrillaire non *N03.8*
- - Lichen *E85.4†, L99.0**
- - Maladie gastro-intestinale *E85.4†, K93.8**
- - Néphropathie *E85.4†, N08.4**
- - Névrite *E85.4†, G63.3**
- - Polyneuropathie *E85.1†, G63.3**

Amylopectinose ¬ *E74.0*

Amylose

- AA ¬ *E85.3*
- AApoAI ¬ *E85.0*
- ABeta2M variante ¬ *E85.1*
- ABeta2Mwt ¬ *E85.3*
- Afib ¬ *E85.0†, N08.4**
- AL
- - Localisée ¬ *E85.4*
- - ¬ *E85.9*
- Apolipoprotéine
- - A-I ¬ *E85.0*
- - A-IV ¬ *E85.8*
- Associée à hémodialyse ¬ *E85.3*
- ATTR wild type ¬ *E85.8*
- ATTRV30M ¬ *E85.1†, G63.3**
- Cardiaque ¬ *E85.4†, I43.1**
- Chaîne
- - Alpha du fibrinogène A ¬ *E85.0†, N08.4**
- - Légère ¬ *E85.9*
- - Lourde ¬ *E85.9*
- Conjonctivale ¬ *E85.4†, H13.8**
- Cutané
- - Nodulaire ¬ *E85.4†, L99.0**
- - ¬ *E85.4†, L99.0**
- Dépôt conjonctival ¬ *E85.4†, H13.8**
- Familial
- - Type finlandais ¬ *E85.1*
- - ¬ Polyneuropathie au cours d' *E85.1†, G63.3**
- Gastrique ¬ *E85.4†, K93.8**
- Généralisée secondaire ¬ *E85.3*

Amylose *–suite*

- Hérédofamiliale
- - Neuropathique ¬ *E85.1*
- - Non neuropathique ¬ *E85.0*
- - Sans précision ¬ *E85.2*
- Intestin grêle ¬ *E85.4†, K93.8**
- Intestinale ¬ *E85.4†, K93.8**
- Larynx ¬ *E85.4†, J99.8**
- Limitée à un ou plusieurs organe(s) ¬ *E85.4*
- Localisée ¬ *E85.4*
- Maculaire ¬ *E85.9†, L99.0**
- Maculeuse ¬ *E85.4†, L99.0**
- Pleurale ¬ *E85.4†, J99.8**
- Primitive ¬ *E85.9*
- Pulmonaire ¬ *E85.4†, J99.8**
- Rénale ¬ *E85.4†, N29.8**
- Sans précision ¬ *E85.9*
- Secondaire ¬ *E85.3*
- Sous-glottique ¬ *E85.4†, J99.8**
- Sujet âgé ¬ *E85.8*
- Systémique sénile ¬ *E85.8*
- Transthyrétine héréditaire] ¬ h-ATTR [*E85.2*
- ¬
- - *E85*
- - *E85.8*
- - Arthrite au cours d' *E85.4†, M14.49**
- - Arthropathie au cours d' *E85.9†, M14.49**
- - Glaucome au cours d' *E85.9†, H42.0**
- - Glomérulonéphrite au cours d' *E85.9†, N08.4**
- - Maladie
- - - Glomérulaire au cours d' *E85.9†, N08.4**
- - - Pulmonaire au cours d' *E85.4†, J99.8**
- - Myopathie au cours d' *E85.4†, G73.6**
- - Neuropathie des nerfs périphériques autonomes au cours d' *E85.4†, G99.0**

Amyoplasie congénitale ¬ *Q79.8*

Amyotrophie

- Bulbospinale ¬ *G12.2*
- Congénitale ¬ *Q79.8*
- Diabétique ¬ *E14.40†, G73.0**
- Névralgique de l'épaule ¬ *G54.5*
- Péronière (type axonal) (type hypertrophique) ¬ *G60.0*
- Spinal
- - Adulte ¬ *G12.1*
- - Détresse respiratoire type
- - - 1 ¬ *G12.2*
- - - 2 ¬ *G12.2*
- - Distale ¬ *G12.1*
- - Enfant, type II ¬ *G12.1*
- - Forme
- - - Juvénile, type III [Kugelberg-Welander] ¬ *G12.1*
- - - Scapulo-péronière ¬ *G12.1*
- - Héréditaires ¬ Autres *G12.1*

Amyotrophie *–suite*

- Spinal *–suite*
- - Infantile, type I [Werdnig-Hoffman] ¬ *G12.0*
- - Progressive ¬ *G12.2*
- - Proximal
- - - Autosomique dominant
- - - - Adulte ¬ *G12.1*
- - - - Enfance ¬ *G12.1*
- - - Type
- - - - 1 ¬ *G12.0*
- - - - 3 ¬ *G12.1*
- - - ¬ *G12.1*
- - Sans précision ¬ *G12.9*
- - Syndrome apparent ¬
- - - *G12*
- - - *G12.8*
- ¬
- - *G71.8*
- - Diabète sucré de type 2 avec *E11.40†, G73.0**

Amyotrophique

- Type 4 ¬ Sclérose latérale *G12.2*
- ¬
- - Maladie de Charcot [sclérose latérale *G12.2*
- - Névralgie *G54.5*
- - Sclérose latéral
- - - *G12.2*
- - SLA [Sclérose latérale *G12.2*

Anabolisants ¬ Intoxication: Androgènes et autres *T38.7*

Anadysplasie métaphysaire ¬ *Q78.5*

Anaérobies

- Gram
- - Négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus fragilis et autres micro-organismes *B96.6!*
- - Positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes *B95.91!*
- Sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes *B96.7!*
- ¬
- - Sepsis du nouveau-né dû à des *P36.5*
- - Septicémie à micro-organismes *A41.4*

Anagène ¬ *L65.1*

Anagènes caduc ¬

- Maladie des cheveux *L65.1*
- Syndrome Noonan-like avec cheveux *Q87.1*

Anal
v. Type de maladie

Analeptiques et antagonistes des opiacés ¬ Intoxication: *T50.7*

Analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une *P04.0*

Analgésique
- Non opioïde
- - Antipyrétique
- - - Antirhumatismal
- - - - Sans précision ¬ Intoxication: *T39.9*
- - - - ¬ Intoxication par *T39*
- - - Non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T39.8*
- - ¬ Intoxication par *T39.9*
- Sédatif cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un *O89*
- ¬
- - Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.6*
- - Asthme non allergique médicamenteux [asthme due aux *J45.1*
- - Néphropathie due à un *N14.0*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.2*

Analogues synthétiques ¬ Intoxication: Glucocorticoïdes et *T38.0*

Analphabétisme ¬ *Z55*

Analphalipoprotéinémie ¬ *E78.6*

Anankastique ¬
- Névrose: *F42*
- Personnalité *F60.5*

Anaphylactique
- Effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ Choc *T88.6*
- Intolérance alimentaire ¬ Choc *T78.0*
- Myorelaxants ¬ Réaction *T88.6*
- SAI ¬ Réaction *T78.2*
- Sans précision ¬ Choc *T78.2*
- Sérum ¬ Choc *T80.5*

Anaphylactoïde
- Pendant la grossesse ¬ Syndrome *O88.1*
- ¬ Purpura: *D69.0*

Anaphylaxie SAI ¬ *T78.2*

Anaplasique
- Grand cellule
- - ALK
- - - Négatif ¬ Lymphome *C84.7*
- - - Positif ¬ Lymphome *C84.6*
- - CD30 positif ¬ Lymphome *C84.6*
- - ¬ Lymphome cutané *C86.6*
- Thyroïde ¬ Cancer *C73*
- ¬
- - Astrocytome *C71.9*
- - Épendymome *C71.9*
- - Ganglioglíome *C71.9*
- - Lymphome diffus à grandes cellules B *C83.3*

Anaplasique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Oligoastrocytome *C71.9*
- - Oligodendrogliome *C71.9*

Anarthrie ¬ Dysarthrie et *R47.1*

Anasarque fœto-placentaire
- Iso-immunisation ¬ *P56.0*
- Maladie hémolytique
- - Sans précision ¬ *P56.9*
- - ¬ *P56*
- Non
- - Associée à une iso-immunisation ¬ *O36.2*
- - Maladie hémolytique ¬ *P83.2*
- SAI ¬
- - *O36.2*
- - *P83.2*
- ¬
- - Incompatibilité Rh (avec *O36.0*
- - Iso-immunisation: SAI (avec *O36.1*
- - Soins maternels pour *O36.2*

Anastomose
- Intestinale ¬ Status post dérivation ou *Z98.0*
- Suture opération
- - Anus ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Estomac ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Intestin ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Œsophage ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Organes du système digestif ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Pancréas ¬ Insuffisances d' *K91.82*
- - Rectum ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Trachée, des bronches et des poumons ¬ Insuffisances d' *J95.82*
- - Vésicule et des voies biliaires ¬ Insuffisances d' *K91.81*
- Vasculaire ¬
- - Complication mécanique due à une *T82.3*
- - Infection d'une *T82.7*
- - Inflammation d'une *T82.7*
- Voies digestives ¬ Insuffisance d'une *K91.83*
- ¬ *Z49.0*

Anastomotique ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*

Anatomique ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col *S42.23*

Anauxétique ¬ Dysplasie *Q77.7*

ANCA ¬ Vascularite associée aux *I77.6*

Ancien
v. Type de maladie

Ancrage osseux [BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse auditive à *Z96.2*

Ancylostoma ¬ Infection à *B76.0*

Andersen ¬ Maladie de: *E74.0*

Anderson ¬ Maladie d' *E78.6*

Anderson-Fabry ¬ Dégénérescence cérébrale au cours de maladie d' *E75.2†, G32.8**

Androgène
- Anabolisants ¬ Intoxication: *T38.7*
- CAIS] ¬ Insensibilité totale aux *E34.51*
- Ovariens ¬ Hypersécrétion des *E28.1*
- PAIS] ¬ Insensibilité partielle aux *E34.50*
- Sans précision ¬ Syndrome de résistance aux *E34.59*
- Testiculaire SAI ¬ Biosynthèse défectueuse de l'hormone *E29.1*
- ¬
- - Insensibilité aux *E34.5*
- - Pseudo-hermaphrodisme masculin avec résistance aux *E34.5*
- - Syndrome résistance
- - - *E34.5*
- - - Partielle aux *E34.50*
- - - Totale aux *E34.51*

Androgénique
- Médicamenteuse ¬ Alopécie *L64.0*
- Sans précision ¬ Alopécie *L64.9*
- ¬
- - Alopécie *L64*
- - Formes d'alopécie *L64.8*

ANE ¬ Syndrome *Q87.8*

Anémie
- Addison ¬ *D51.0*
- Anomalie
- - Enzymatique
- - - Sans précision ¬ *D55.9*
- - - ¬
- - - - *D55*
- - - - *D55.8*
- - Enzymes glycolytiques ¬ *D55.2*
- - Métabolisme
- - - Glutathion ¬ *D55.1*
- - - Nucléotides ¬ *D55.3*
- Aplastique
- - Acquis pur
- - - Chronique ¬ Aplasie médullaire [*D60.0*
- - - Érythroblastopénie] ¬ Aplasie médullaire [*D60*
- - - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [*D60.9*
- - - Transitoire ¬ Aplasie médullaire [*D60.1*
- - - ¬ Autres aplasies médullaires [*D60.8*
- - Agents externes ¬ *D61.2*
- - Constitutionnelle ¬ *D61.0*
- - Idiopathique ¬ *D61.3*
- - Médicamenteux
- - - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [*D61.19*
- - - Traitement cytostatique ¬ Aplasie médullaire [*D61.10*
- - - ¬
- - - - *D61.1*
- - - - Aplasie médullaire [*D61.18*
- - Précisées ¬ Autres *D61.8*

Anémie *–suite*
- Aplastique *–suite*
- - Pure congénitale ¬ *D61.0*
- - Sans précision ¬ *D61.9*
- - ¬ Autres *D61*
- Associé carence
- - Cuivre ¬ *D53.8*
- - Molybdène ¬ *D53.8*
- - Zinc ¬ *D53.8*
- Biermer ¬ *D51.0*
- Bothriocephalus ¬ *B70.0†, D63.8**
- Carence
- - Acide
- - - Aminés ¬ *D53.0*
- - - Folique
- - - - Médicaments ¬ *D52.1*
- - - - SAI ¬ *D52.9*
- - - - Sans précision ¬ *D52.9*
- - - - ¬
- - - - - *D52*
- - - - - *D52.8*
- - Alimentaire
- - - Acide folique ¬ *D52.0*
- - - Vitamine B12 ¬
- - - - *D51.3*
- - - - Polyneuropathie au cours de l' *D51.3†, G63.4**
- - Fer
- - - Sans précision ¬ *D50.9*
- - - Secondaire à une perte de sang (chronique) ¬ *D50.0*
- - - ¬ Autres *D50.8*
- - G6PD ¬ *D55.0*
- - Glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] ¬ *D55.0*
- - Protéines ¬ *D53.0*
- - Vitamine B12
- - - Carence en vitamine B12 due à une carence en facteur intrinsèque ¬ *D51.0*
- - - Malabsorption sélective de la vitamine B12, avec protéinurie ¬ *D51.1*
- - - Sans précision ¬ *D51.9*
- - - ¬
- - - - *D51*
- - - - *D51.8*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, D53.9*
- Chronique simple ¬ *D53.9*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O99.0*
- Congénital
- - Corps de Heinz ¬ *D58.2*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *P61.4*
- - Perte de sang fœtal ¬ *P61.3*
- - SAI ¬ *P61.4*
- Cours
- - Maladies chroniques classées ailleurs ¬ *D63.8**

Anémie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Néphropathie chronique stade
- - - 3 ¬ *N18.3†, D63.8**
- - - 4 ¬ *N18.4†, D63.8**
- - - 5 ¬ *N18.5†, D63.8**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, D63.0**
- Déficience en glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ *D55.2*
- Déficit
- - Enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ *D55.1*
- - Fer réfractaire au traitement par le fer ¬ *D50.8*
- - Hexokinase ¬ *D55.2*
- - Pyruvate kinase [PK] ¬ *D55.2*
- - Triose-phosphate isomérase ¬ *D55.2*
- Dégénérescence combinée de la moelle épinière NCA ¬ *D51.0†, G32.0**
- Diphyllobothrium ¬ *B70.0†, D63.8**
- Drépanocytaire] avec crises ¬ Anémie à hématies falciformes [*D57.0*
- Dysérythropoïétique congénital
- - Type
- - - 2 ¬ *D64.4*
- - - 3 ¬ *D64.4*
- - - 4 ¬ *D64.4*
- - - I ¬ *D64.4*
- - ¬ *D64.4*
- Dyshématopoïétique (congénitale) ¬ *D64.4*
- Fanconi ¬ *D61.0*
- Ferriprive ¬ *D50*
- Fièvre
- - Marais ¬ *B54†, D63.8**
- - Tierce bénigne ¬ *B54†, D63.8**
- Hématies falciformes
- - Anémie drépanocytaire] avec crises ¬ *D57.0*
- - Drépanocytaire] SAI ¬ *D57.1*
- - Sans crises ¬ *D57.1*
- Hémolytique
- - Acquis
- - - Sans précision ¬ *D59.9*
- - - ¬
- - - - *D59*
- - - - *D59.8*
- - - - Maladie due au VIH avec *B23.8, D59.9*
- - Auto-immun
- - - Médicaments ¬ *D59.0*
- - - Mixte ¬ *D59.1*
- - - Néonatale ¬ *D59.1*
- - - ¬ Autres *D59.1*
- - Carence en glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ *D55.2*
- - Déficit
- - - Adénylate kinase ¬ *D55.3*
- - - Glutathion réductase ¬ *D55.1*

Anémie *–suite*
- Hémolytique *–suite*
- - Déficit *–suite*
- - - Phosphoglucose isomérase ¬ *D55.2*
- - - Phosphoglycéromutase ¬ *D55.2*
- - - Pyrimidine 5' nucléotidase ¬ *D55.3*
- - - Pyruvate kinase du globule rouge ¬ *D55.2*
- - Donath-Landsteiner ¬ *D59.6*
- - Héréditaire
- - - Précisées ¬ Autres *D58.8*
- - - Sans précision ¬ *D58.9*
- - - ¬ Autres *D58*
- - Idiopathique chronique ¬ *D59.9*
- - Non sphérocytaire héréditaire type
- - - I ¬ *D55.1*
- - - II ¬ *D55.2*
- - Surproduction d'adénosine désaminase ¬ *D55.3*
- - Type
- - - Chaud (secondaire) (symptomatique) ¬ *D59.1*
- - - Froid (secondaire) (symptomatique) ¬ *D59.1*
- Hémorragie per- et postopératoire ¬ *D62*
- Hémosidérotique pulmonaire ¬ *E83.1†, J99.8**
- Héréditaire juvénile mégaloblastique due à une carence en facteur intrinsèque ¬ *D51.0*
- Hypochrome
- - Sidéroblastique liée au sexe ¬ *D64.0*
- - ¬ *D50*
- Hypoplasique
- - Congénitale de Blackfan-Diamond ¬ *D61.0*
- - Familiale ¬ *D61.0*
- - SAI ¬ *D61.9*
- Induite par l'aluminium après dialyse ¬ *N18.5†, D63.8**
- Leuco-érythroblastique ¬ *D64.8*
- Méditerranéen
- - Hémoglobinopathie) ¬ *D56.9*
- - ¬ *D56.9*
- Mégaloblastique
- - Héréditaire ¬ *D51.1*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *D53.1*
- - Nutritionnelle ¬ *D52.0*
- - Répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l'acide folique ¬ *D53*
- - SAI ¬ *D53.1*
- Myélofibreuse ¬ *D47.4†, D63.0**
- Myélose funiculaire NCA ¬ *D51.0†, G32.0**
- Myxœdème ¬ *E03.9†, D63.8**
- Nutritionnel
- - Précisées ¬ Autres *D53.8*
- - Sans précision ¬ *D53.9*
- - ¬ Autres *D53*
- Orotacidurique ¬ *D53.0*
- Paludisme ¬ *B54†, D63.8**

Anémie *–suite*
- Paranéoplasique ¬ *C80.9†, D63.0**
- Pernicieuse
- - Acquise ¬ *D51.0*
- - Congénital ¬
- - - *D51.0*
- - Glossite ¬ *D51.0*
- - Juvénile ¬ *D51.0*
- - ¬ Polyneuropathie au cours de l' *D51.0†, G63.4**
- Post-hémorragique
- - Aiguë ¬ *D62*
- - Chronique) ¬ *D50.0*
- Précisées ¬ Autres *D64.8*
- Prématurité ¬ *P61.2*
- Réfractaire
- - Crise blastique
- - - Cours de transformation ¬ *C92.00*
- - - Prolifération de blastes en transformation) ¬ *C92.0*
- - Dysplasie multilignées ¬ *D46.5*
- - Excès blastes
- - - AREB] ¬ *D46.2*
- - - Transformation ¬ *D46.2*
- - - Type
- - - - I [AREB I] ¬ *D46.2*
- - - - II [AREB II] ¬ *D46.2*
- - - ¬ *D46.2*
- - Non
- - - Précisée ¬ *D46.4*
- - - Sidéroblastique, ainsi précisée ¬ *D46.0*
- - Sans sidéroblastes ¬ *D46.0*
- - Sidéroblastes en couronne ¬ *D46.1*
- Rénale ¬ *N18.9†, D63.8**
- Sans précision ¬ *D64.9*
- Scorbutique ¬ *D53.2*
- Sidéroblastique
- - Associée à GLRX5 ¬ *D64.0*
- - Autosomique récessive ¬ *D64.0*
- - Héréditaire ¬ *D64.0*
- - Idiopathique acquis ¬
- - - *D46.1*
- - - *D64.3*
- - Liée à l'X avec ataxie ¬ *D64.0*
- - Primaire acquise ¬ *D64.3*
- - Réagissant à la pyridoxine NCA ¬ *D64.3*
- - SAI ¬ *D64.3*
- - Secondaire
- - - Maladie ¬ *D64.1*
- - - Médicaments et des toxines ¬ *D64.2*
- - ¬
- - - *D64.3*
- - - Myopathie mitochondriale et *G71.3*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, D63.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, D63.8**

Anémie *–suite*
- Tumorale (tumeur primaire inconnue) ¬ *D48.9†, D63.0**
- Végétariens stricts ¬ *D51.3*
- ¬
- - *D64*
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, D64.9*

Anémone de mer ¬ *T63.6*

Anencéphalie
- Malformations similaires ¬ *Q00*
- ¬ *Q00.0*

Anencéphalomyélie ¬ *Q00.0*

Anendocrinose entérique ¬ *K90.8*

Anesthésie
- Analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P04.0*
- Cornée ¬ *H18.8*
- Cours
- - Grossesse
- - - Sans précision ¬ Complication d'une *O29.9*
- - - ¬
- - - - Anoxie cérébrale due à une *O29.2*
- - - - Arrêt cardiaque dû (due) à une *O29.1*
- - - - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à une *O29.0*
- - - - Complication
- - - - - *O29*
- - - - - *O29.8*
- - - - - Cardiaques d'une *O29.1*
- - - - - Impliquant le système nerveux central dues à une *O29.2*
- - - - - Pulmonaires d'une *O29.0*
- - - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une *O29.0*
- - - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une *O29.1*
- - - - Pneumonie
- - - - - Aspiration dû (due) à une *O29.0*
- - - - - Chimique d'aspiration dû (due) à une *O29.0*
- - - - Syndrome de Mendelson dû (due) à une *O29.0*
- - Puerpéralité
- - - Sans précision ¬ Complication de l' *O89.9*
- - - ¬
- - - - Anoxie cérébrale due à une *O89.2*
- - - - Arrêt cardiaque dû (due) à une *O89.1*
- - - - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à l' *O89.0*
- - - - Complication
- - - - - *O89.8*
- - - - - Cardiaques de l' *O89.1*
- - - - - Intéressant le système nerveux central dues à une *O89.2*
- - - - - Pulmonaires de l' *O89.0*
- - - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à l' *O89.0*

Anesthésie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Puerpéralité *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une *O89.1*
- - - - Pneumonie
- - - - - Aspiration dû (due) à l' *O89.0*
- - - - - Chimique d'aspiration dû (due) à l' *O89.0*
- - - - Syndrome de Mendelson dû (due) à l' *O89.0*
- - Travail accouchement
- - - Sans précision ¬ Complication de l' *O74.9*
- - - ¬
- - - - Anoxie cérébrale due à une *O74.3*
- - - - Arrêt cardiaque dû (due) à une *O74.2*
- - - - Collapsus pulmonaire par compression dû à une *O74.1*
- - - - Complication
- - - - - *O74.8*
- - - - - Cardiaques de l' *O74.2*
- - - - - Intéressant le système nerveux central dues à l' *O74.3*
- - - - - Pulmonaires de l' *O74.1*
- - - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une *O74.0*
- - - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une *O74.2*
- - - - Pneumonie
- - - - - Aspiration due à une *O74.0*
- - - - - Chimique d'aspiration dû (due) à une *O74.0*
- - - - Syndrome de Mendelson dû (due) à une *O74.0*
- Cutanée ¬ *R20.0*
- Dissociative et atteintes sensorielles ¬ *F44.6*
- Épidural cours
- - Grossesse ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une *O29.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une *O29.5*
- - Puerpéralité ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une *O89.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une *O89.5*
- - Travail accouchement ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une *O74.5*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une *O74.6*
- Local cours
- - Grossesse ¬ Réaction toxique au cours d'une *O29.3*
- - Puerpéralité ¬ Réaction toxique à une *O89.3*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Réaction toxique à une *O74.4*

Anesthésie *–suite*
- Tant que complication de l'accouchement ¬ Décès dû à l' *O74.9*
- ¬
- - Complications consécutives à une *T88.5*
- - Hyperthermie maligne due à une *T88.3*
- - Hypothermie consécutive à une *T88.5*
- - Pneumonie chimique d'aspiration due à l' *J95.4*

Anesthésique
- Gaz thérapeutiques ¬ Intoxication par *T41*
- Gazeux ¬ Intoxication: *T41.0*
- Général
- - Local analgésique sédatif cours
- - - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un *O29*
- - - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un *O89*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T41.2*
- Inhalés ¬ Intoxication aux *T41.0*
- Intraveineux ¬ Intoxication
- - *T41.1*
- Local ¬ Intoxication à l' *T41.3*
- Locaux ¬ Intoxication: *T41.3*
- Sans précision ¬ Intoxication: *T41.4*
- Substance appropriée et correctement administrée ¬ Choc *T88.2*
- ¬
- - Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.4*
- - Choc *T88.2*

Anétodermie
v.a. exostoses-anétodermie-brachydactylie
- Familiale ¬ *L90.8*
- Jadassohn-Pellizzari ¬ *L90.2*
- Schweninger-Buzzi ¬ *L90.1*

Anévrismal
- Lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste *K09*
- Os ¬ Kyste *M85.5*
- ¬ Kyste de la mâchoire: *K09.2*

Anévrisme
v.a. Micro-anévrisme
- Acquis d'artères précérébrales ¬ *I72.5*
- Aorte
- - Abdominale descendante ¬ Rupture d' *I71.3*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I79.0**
- - ¬
- - - *I71.9*
- - - Calcification d'un *I71.9*
- Aortique
- - Abdominal
- - - Rompu ¬ *I71.3*
- - - Sans mention de rupture ¬ *I71.4*
- - Dissection ¬ *I71*

Anévrisme *–suite*
- Aortique *–suite*
- - Localisation non précis
- - - Rompu ¬ *I71.8*
- - - Sans mention de rupture ¬ *I71.9*
- - Thoracique
- - - Rompu ¬ *I71.1*
- - - Sans mention de rupture ¬ *I71.2*
- - Thoraco-abdominal
- - - Rompu ¬ *I71.5*
- - - Sans mention de rupture ¬ *I71.6*
- Artère
- - Carotide interne dans sa portion intracrânienne ¬ *I67.10*
- - Coronaire ¬ *I25.4*
- - Précérébrales ¬ Rupture d' *I72.5*
- - Pulmonaire ¬ *I28.1*
- Artérioscléreux
- - Cérébral ¬ Rupture d' *I60.7*
- - Cerveau ¬ Rupture d' *I60.7*
- Artérioveineux
- - Acquis ¬ *I77.0*
- - Congénital vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.20*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.00*
- - Pulmonaire ¬ *Q25.7*
- - Sinus caverneux ¬ *Q28.20*
- - ¬ *Q27.3*
- Cérébral
- - Acquis) ¬ *I67.10*
- - Fistule artérioveineuse cérébrale ¬ *I67.1*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†*, *I68.8**
- - ¬ Neurosyphilis avec *A52.0†*, *I68.8**
- Cirsoïde) (faux) (rompu) ¬ *I72*
- Congénital
- - Artère
- - - Coronaire ¬ *Q24.5*
- - - Pulmonaire ¬ *Q25.7*
- - Coronaire (artère) ¬ *Q24.5*
- - E) de l'aorte ¬ *Q25.4*
- - Rétine ¬ *Q14.1*
- - Vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.30*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.10*
- - ¬ Autre *Q28.80*
- Conjonctive ¬ *H11.4*
- Coronarien syphilitique ¬ *A52.0†*, *I52.0**
- Dissection
- - Artère
- - - Basilaire (tronc) ¬ *I72.5*
- - - Carotide ¬ *I72.0*
- - - Iliaque ¬ *I72.3*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ *I72.4*
- - - - Supérieur ¬ *I72.1*

Anévrisme *–suite*
- Dissection *–suite*
- - Artère *–suite*
- - - Précérébrale ¬ *I72.5*
- - - Précisées ¬ *I72.8*
- - - Rénale ¬ *I72.2*
- - - Vertébrale ¬ *I72.6*
- - Localisation non précisée ¬ *I72.9*
- - ¬ Autres *I72*
- Disséquant de l'aorte ¬ *I71.0*
- Familial de l'aorte abdominale ¬ *I71.4*
- Fistule (artérioveineux) traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Intrathoracique syphilitique ¬ *A52.0†*, *I79.0**
- Médiastinal syphilitique ¬ *A52.0†*, *I79.8**
- Pariétal) du cœur ¬ *I25.3*
- Périphérique) congénital(e) ¬ *Q27.8*
- Pulmonaire
- - Artérioveineux ¬ *Q25.7*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†*, *I79.8**
- Rétinien diabétique ¬ *E14.30†*, *H36.0**
- Septum
- - Interauriculaire ¬ *Q21.0*
- - Interventriculaire ¬ *Q21.1*
- Sinus de Valsalva (rompu) ¬ *Q25.4*
- Spinal syphilitique ¬ *A52.0†*, *I79.8**
- Syphilitique
- - Aorte
- - - Thoracique ¬ *A52.0†*, *I79.0**
- - - ¬ *A52.0†*, *I79.0**
- - Artère
- - - Cérébrale ¬ Rupture d'un *A52.0†*, *I68.8**
- - - Sous-clavière ¬ *A52.0†*, *I79.8**
- - Carotide ¬ *A52.0†*, *I79.8**
- - Congénital ¬ *A50.5†*, *I79.0**
- - Intracrânien
- - - Artère carotide ¬ *A52.0†*, *I68.8**
- - - Carotide ¬ *A52.0†*, *I68.8**
- - Tronc brachio-céphalique ¬ *A52.0†*, *I79.8**
- Système nerveux central ¬ Syphilis avec *A52.0†*, *I68.8**
- Variqueux ¬ *I77.0*
- Veine de Galien ¬ *Q28.20*
- Ventriculaire ¬ *I25.3*
- ¬ Compression chiasmatique par *I67.10†*, *H48.8**

Angéite
- Allergique ¬ *M31.0*
- Cutanée leucocytoclasique ¬ *M31.0*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88*
- Granulomateuse allergique [Syndrome de Churg-Strauss] ¬ *M30.1*
- Hypersensibilité ¬ *M31.0*
- Limitée à la peau, non classée ailleurs ¬ Vascularite [*L95*
- Primaire du système nerveux central ¬ *I67.7*

Angéite *–suite*
- Vascularite] cryoglobulinémique ¬ *D89.1*
Angelman ¬ Syndrome d' *Q93.5*
Angine
- Accélérée ¬ *I20.0*
- Aggravée à l'effort ¬ *I20.0*
- Agranulocytaire ¬ *D70*
- Aigu
- - Pneumocoques ¬ *J03.8, B95.3!*
- - SAI ¬ *J02.9*
- - Staphylocoques ¬ *J03.8, B95.8!*
- - ¬ *J02*
- Chronique ¬ *J31.2*
- Diphtérique pseudomembraneuse ¬ *A36.0*
- Effort ¬ *I20.8*
- Infarctus imminent [Impending infarction] ¬ *I20.0*
- Monocytes ¬ *B27*
- Novo à l'effort ¬ *I20.0*
- Poitrine
- - Angiospastique ¬ *I20.1*
- - Instable ¬ *I20.0*
- - Prinzmetal ¬ *I20.1*
- - SAI ¬ *I20.9*
- - Sans précision ¬ *I20.9*
- - Spasme
- - - Coronaire vérifié ¬ *I20.1*
- - - ¬ *I20.1*
- - Variable ¬ *I20.1*
- - ¬
- - - *I20*
- - - Formes d' *I20.8*
- Streptocoques ¬ *J02.0*
- Vincent ¬ *A69.1*
Angineux ¬ Syndrome *I20.9*
Angio Œdème
- Bradykinique
- - Acquis ¬ *T78.3*
- - Héréditaire ¬ *D84.1*
- Héréditaire type
- - I ¬ *D84.1*
- - II ¬ *D84.1*
- Non histaminique
- - Acquis ¬ *T78.3*
- - Héréditaire ¬ *D84.1*
Angioblastome de Nakagawa ¬ *D18.01*
Angiocentrique
- Éosinophiles ¬ Fibrose *J39.88*
- ¬
- - Gliome *C71.9*
- - Lésion immunoproliférative *C86.0*
- - Lymphome T *C86.0*
Angiocholécystite sans calcul ¬ *K81.0*
Angiocholique ¬ Abcès hépatique: *K75.0*
Angiocholite
- Ascendante ¬ *K83.0*
- Cholangite] ¬ *K83.0*
- Cholécystite ¬
- - Calcul
- - - Bloqué) d'un canal biliaire SAI sans précision ou sans *K80.5*
- - - Canaux biliaires sans *K80.5*
- - Cholédocholithiase sans précision ou sans *K80.5*
- - Cholélithiase
- - - Hépatique sans précision ou sans *K80.5*
- - - Intrahépatique sans précision ou sans *K80.5*
- - Colique hépatique (récidivante) sans précision ou sans *K80.5*
- - Lithiase du canal cholédoque sans précision ou sans *K80.5*
- Destructive chronique, non suppurée ¬ *K74.3*
- Primaire ¬ *K83.0*
- Récidivante ¬ *K83.0*
- SAI ¬ *K83.0*
- Sclérosante ¬ *K83.0*
- Secondaire ¬ *K83.0*
- Sténosante ¬ *K83.0*
- Suppurée ¬ *K83.0*
- ¬ Calcul des canaux biliaires avec *K80.3*
Angiodysplasie
- Côlon
- - SAI ¬ *K55.21*
- - Saignement ¬ *K55.22*
- - Sans indication de saignement ¬ *K55.21*
- - ¬ *K55.2*
- Estomac duodénum
- - Saignement ¬ *K31.82*
- - Sans indication de saignement ¬ *K31.81*
- Intestin grêle
- - Hémorragie ¬ *K55.32*
- - Sans indication d'une hémorragie ¬ *K55.31*
- - ¬ *K55.3*
Angiofibrome nasopharyngé juvénile ¬ *D10.6*
Angiofolliculaire ¬ Hyperplasie lymphoïde *D47.7*
Angiohémophilie
- A ¬ *D68.09*
- B ¬ *D68.09*
- ¬
- - *D68.0*
- - *D68.09*
Angiohypertrophique sub-aiguë ¬ Myélomalacie *G37.4*
Angioid streaks] ¬ Stries angioïdes [*H35.38*
Angioïdes [Angioid streaks] ¬ Stries *H35.38*
Angio-immunoblastique
- Cellules T ¬ Lymphome *C86.5*
Angio-immunoblastique *–suite*
- Dysprotéinémie [LAID] ¬ Lymphadénopathie *C86.5*
- ¬
- - Lymphadénome *C86.5*
- - Lymphome non-hodgkinien *C86.5*
Angioimmunoblastome ¬ *C86.5*
Angiokératome diffus de Fabry ¬ *E75.2*
Angiolipomatose familiale ¬ *D17.9*
Angiomatose
- Bacillaire ¬ *A44.8*
- Cérébellorétinienne familiale ¬ *Q85.8*
- Cutanéoméningospinale ¬ *Q27.3*
- Encéphalofaciale ¬ *Q85.8*
- Encéphalotrigéminée ¬ *Q85.8*
- Hépatique ¬ *K76.4*
- Rétinocérébelleuse de von Hippel-Lindau ¬ *Q85.8*
- Sturge-Weber-Krabbe ¬ *Q85.8*
Angiome
- Laryngotrachéal ¬ *D18.08*
- SAI ¬ *D18.0*
- Serpigineux ¬ *L81.7*
- Stellaire] ¬ Téléangiectasie [*I78.1*
- Touffes ¬ *D18.01*
Angioneurotique
- Familial ¬ Œdème *D84.1*
- Héréditaire ¬
- - Œdème *D84.1*
- - Urticaire avec œdème *D84.1*
- ¬ Œdème *T78.3*
Angio-ostéo-hypertrophique ¬ Syndrome *Q87.2*
Angiopathie
v.a. macro-angiopathie
v.a. Microangiopathie
- Cérébrale amyloïde ¬ *E85.4†, I68.0**
- Périphérique au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I79.2**
- Syphilitique rétinienne ¬ *A52.0†, H36.8**
- ¬ Diabète sucré
- - *E14.50†, I79.2**
- - Type
- - - 1 avec *E10.50†, I79.2**
- - - 2 avec *E11.50†, I79.2**
Angioplastie coronarienne SAI ¬ Suites d'une *Z95.5*
Angiosarcome
- Foie ¬ *C22.3*
- ¬ *C49.9*
Angiospastique ¬ Angine de poitrine (de): *I20.1*
Angiostrongyloïdose
- Angiostrongylose] intestinale ¬ *B81.3*
- Angiostrongylus
- - Cantonensis ¬ *B83.2*
- - Costaricensis ¬ *B81.3*

Angiostrongyloïdose *–suite*
- Parastrongylus
- - Cantonensis ¬ *B83.2*
- - Costaricensis ¬ *B81.3*

Angiostrongylose] intestinale ¬ Angiostrongyloïdose [*B81.3*

Angiostrongylus
- Cantonensis ¬
- - Angiostrongyloïdose à *B83.2*
- - Méningo-encéphalite à *B83.2†, G05.2**
- Costaricensis ¬ Angiostrongyloïdose due à: *B81.3*

Angle
- Droit côlon
- - Hepatica] ¬ Tumeur maligne: *C18.3*
- - Hépatique] ¬ *D12.3*
- Étroit ¬ Glaucome primitif à *H40.2*
- Fermé primitif
- - Résiduel
- - - Aigu ¬ Glaucome à *H40.2*
- - - Chronique ¬ Glaucome à *H40.2*
- - - Intermittent ¬ Glaucome à *H40.2*
- - - Retardé ¬ Glaucome à *H40.2*
- - ¬ Glaucome à *H40.2*
- Gauche côlon splénique ¬
- - *D12.3*
- - Tumeur maligne: *C18.5*
- Iridocornéen ¬ Récession de l' *H21.5*
- Maxillaire ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.65*
- Ouvert ¬ Glaucome primitif à *H40.1*

Angoisse
- Séparation de l'enfance ¬ *F93.0*
- ¬
- - Hystérie d' *F41.8*
- - Rêves d' *F51.5*

Angor stable ¬ *I20.8*

Anguillulose
- Cutanée ¬ *B78.1†, L99.8**
- Disséminée ¬ *B78.7*
- Intestinale ¬ *B78.0*
- Sans précision ¬ *B78.9*
- Strongyloïdose] ¬ *B78*
- ¬ *B78.9*

Angulaire
- Carence vitamine
- - B NCA ¬ Stomatite *E53.9†, K93.8**
- - B2 ¬ Stomatite *E53.0†, K93.8**
- ¬ Grossesse: *O00.8*

Anhédonie
- Sexuelle ¬ *F52.1*
- ¬ *R45.8*

Anhidrose ¬ *L74.4*

Anhidrotique
- Immunodéficience ¬ Dysplasie ectodermique *Q82.4*

Anhidrotique *–suite*
- Liée à l'X ¬ Dysplasie ectodermique *Q82.4*
- ¬ Dysplasie ectodermique (*Q82.4*

Anhydramnios ¬
- *O41.0*
- Fœtus affecté par un *P01.2*
- Nouveau-né affecté par un *P01.2*

Anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l' *T50.2*

Aniline [aminobenzène] ¬ *T65.3*

Animal
- Marins ¬ Effet toxique d'un contact avec d'autres *T63.6*
- Multiples SAI ¬ Morsures d' *T01.9*
- Non venimeux) ¬ Morsure *W64.9!*
- Piqûre d'insecte venimeux ¬ Morsure d' *X29.9!*
- SAI ¬ Morsure d' *T14.1*
- Venimeux
- - Plante veineux ¬
- - - Consommation d' *X49.9!*
- - - Contact avec des *X29!*
- - Sans précision ¬ Effet toxique d'un contact avec un *T63.9*
- - ¬
- - - Accident dû au contact avec des plantes vénéneuses ou des *X29.9!*
- - - Effet toxique d'un contact avec d'autres *T63.8*
- ¬
- - Accident d'équitation ou accident de véhicule attelé à un *V99!*
- - Phobie(s) (des): *F40.2*

Animés ¬
- Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets *W64.9!*
- Exposition à des forces mécaniques d'objets *W64!*

Aniridie
- Agénésie rénale-retard psychomoteur ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Rotule absente ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬
- - *Q13.1*
- - Glaucome avec *Q13.1†, H42.8**

Anisakiase ¬ *B81.0*

Anisakis ¬ Infection à larve d' *B81.0*

Aniséiconie ¬ Anisométrie et *H52.3*

Anisocorie congénitale ¬ *Q13.2*

Anisocytose ¬ *R71*

Anisométrie et aniséiconie ¬ *H52.3*

Anisométrique ¬ Amblyopie: *H53.0*

Ankyloblépharon
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microphtalmie- *Q11.2*
- Filiforme
- - Adnatum isolé ¬ *Q10.3*

Ankyloblépharon *–suite*
- Filiforme *–suite*
- - Fente palatine ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- - Imperforation anale ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬ *H02.5*

Ankyloglossie ¬ *Q38.1*

Ankylosante
- Atteinte pulmonaire ¬ Spondylite *M45.09†, J99.8**
- Forestier] ¬ Hyperostose *M48.1*
- Juvénile ¬ Spondylarthrite *M08.1*
- Tylose ¬ Hyperostose vertébrale *M48.19*
- ¬
- - Iridocyclite au cours de spondylarthrite *M45.09†, H22.1**
- - Spondylite *M45.0*
- - Troubles respiratoires au cours de spondylarthrite *M45.09†, J99.8**

Ankylose
- Articulaire ¬ *M24.6*
- Articulation vertébrale ¬ *M43.2*
- Congénitale temporomandibulaire ¬ *K07.6*
- Dentaire ¬ *K03.5*
- Étrier avec pouces et orteils larges ¬ *Q87.8*
- Osselets ¬ *H74.3*
- Postopératoire ¬ *Z98.1*

Ankylostomiase
- Sans précision ¬ *B76.9*
- ¬ Autres *B76.8*

Ankylostomose ¬ *B76.0*

Anneau
- Cartilagineux de la trachée ¬ Fracture des *S12.8*
- Contraction ¬ Dystocie (de) (par): *O62.4*
- Dicentrique ¬ Chromosome remplacé par un *Q93.2*
- Hémorroïdaire ¬ *K64.9*
- Hyménal serré ¬ *N89.6*
- Kayser-Fleischer ¬ *H18.0*
- Mitral ¬ Hypoplasie de l' *Q23.2*
- Sidérose de la cornée ¬ *H18.0, T90.4*
- Soemmering ¬ *H26.4*
- Supravalvulaire mitral ¬ *Q23.2*
- Vasculaire de l'aorte] ¬ Double arc aortique [*Q25.4*
- Waldeyer ¬ Tumeur maligne: *C14.2*
- ¬ Chromosome
- - 1 en *Q93.2*
- - 2 en *Q93.2*
- - 3 en *Q93.2*
- - 4 en *Q93.2*
- - 5 en *Q93.2*
- - 6 en *Q93.2*
- - 7 en *Q93.2*
- - 8 en *Q93.2*
- - 9 en *Q93.2*

Anneau *–suite*
- ¬ Chromosome *–suite*
- - 10 en *Q93.2*
- - 11 en *Q93.2*
- - 12 en *Q93.2*
- - 13 en *Q93.2*
- - 14 en *Q93.2*
- - 15 en *Q93.2*
- - 16 en *Q93.2*
- - 17 en *Q93.2*
- - 18 en *Q93.2*
- - 19 en *Q93.2*
- - 20 en *Q93.2*
- - 21 en *Q93.2*
- - 22 en *Q93.2*
- - Y en *Q98.6*

Annexe
- Acte médicaux
- - Non classées ailleurs ¬ Affections de l'œil et de ses *H59*
- - Sans précision ¬ Affection de l'œil et de ses *H59.9*
- - ¬ Autres affections de l'œil et de ses *H59.8*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte de l'œil et de ses *H58.2**
- Cours maladies classées ailleurs ¬ affection
- - Œil et de ses *H58**
- - Précisées de l'œil et de ses *H58.8**
- Partie non précis ¬
- - Brûlure de l'œil et de ses *T26.4*
- - Corrosion de l'œil et de ses *T26.9*
- Sans précision ¬ Affection de l'œil et de ses *H57.9*
- Utérus
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C57.4*
- - ¬ Région génitale, vessie, prostate, *I97.87*
- ¬
- - Affection
- - - Œil et de ses *H57*
- - - Précisées de l'œil et de ses *H57.8*
- - Brûlure
- - - Corrosion limitées à l'œil et ses *T26*
- - - Parties de l'œil et de ses *T26.3*
- - Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses *T26.8*
- - Infection gonococcique partie inférieur appareil génito-urinaire
- - - Abcès périurétral et des glandes *A54.1*
- - - Sans abcès périurétral ou des glandes *A54.0*
- - Tuberculose des *A18.1†, N74.1**
- - Tumeur
- - - Bénigne de l'œil et de ses *D31*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses *C69.8*

Annexe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Malign *–suite*
- - - - Œil et de ses *C69*

Annexite gonorrhéique ¬ *A54.2†, N74.3**

Annuel
- Périodique) ¬ Examen pelvien (*Z01.4*
- Physique) ¬ Examen périodique (*Z00.0*

Annulaire
- Atrophique ¬ Lichen plan *L43.8*
- Centrifuge ¬ Érythème *L53.1*
- Col de l'utérus ¬ Décollement *O71.3*
- Concentrique bénigne ¬ Dystrophie maculaire *H35.5*
- Perforant ¬ Granulome *L92.0*
- ¬
- - Granulome *L92.0*
- - Ichtyose épidermolytique *Q80.3*
- - Kératite: *H16.1*
- - Lichen plan *L43.8*
- - Pancréas *Q45.1*
- - Scotome (de): *H53.4*
- - Ulcère de (la): cornée: *H16.0*

Annulati ¬ Pili *Q84.1*

Annulo-ectasiante ¬ Maladie aortique *I71.01*

Ano
- Génital
- - Sans précision ¬ Prurit *L29.3*
- - Vénériens) ¬ Condylomes *A63.0*
- - Virus herpès
- - - Herpes simplex] ¬ Infection *A60*
- - - Sans précision ¬ Infection *A60.9*
- Rectal ¬
- - *C21.8*
- - Abcès *K61.2*
- - Fistule *K60.5*
- - Jonction *C21.8*

Anoctaminopathie distale ¬ *G71.0*

Anodins ¬ Souffles cardiaques bénins et *R01.0*

Anodontie
- Partielle ¬ *K00.0*
- ¬ *K00.0*

Anonychie
- Congénitale isolée ¬ *Q84.3*
- ¬ *Q84.3*

Anophtalmie
- Mégalocornée-cardiopathie-anomalies squelettiques ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Microphtalmie et macrophtalmie ¬ *Q11*
- Waardenburg ¬ Syndrome d' *Q87.2*
- ¬ Autres formes d' *Q11.1*

Anopsia ¬ Amblyopie ex *H53.0*

Anopsie d'un quadrant ¬ *H53.4*

Anorchidie bilatérale ¬ *Q55.0*

Anorectal ¬ Constipation lors d'un trouble fonctionnel *K59.01*

Anorexie
- Mental
- - Anorexie mentale non précisée ¬ Autres types d' *F50.08*
- - Atypique ¬ *F50.1*
- - Mesures de perte de poids ¬ *F50.01*
- - Non précisée ¬ Autres types d'anorexie mentale et *F50.08*
- - SAI ¬ *F50.08*
- - Sans mesures de perte de poids ¬ *F50.00*
- - Type
- - - Actif ¬ *F50.01*
- - - Boulimique ¬ *F50.01*
- - - Restrictif ¬ *F50.00*
- - ¬ *F50.0*
- ¬ *R63.0*

Anorexigènes ¬ Intoxication: *T50.5*

Anorgasmie psychogène ¬ *F52.3*

Anormal
v. Type de maladie

Anosmie
- Congénitale isolée ¬ *Q07.8*
- ¬
- - *R43.0*
- - Hypogonadisme hypogonadotrope congénital avec *E23.0*

ANOTHER ¬ Syndrome *Q82.4*

Anotie ¬ *Q17.8*

Anovulation ¬ Stérilité associée à une *N97.0*

Anoxie
- Altitude ¬ *T70.2*
- Cérébral
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.2*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.2*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.3*
- - Survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ *O75.4*
- Fœtale ou intra-utérine ¬ *P20*
- Hypoxie ¬ hémorragie intracrânienne due à une *P52*
- SAI ¬ *P21.9*

Anoxique, non classée ailleurs ¬ Lésion cérébrale *G93.1*

Anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ Encéphalopathie *P91.6*

Anse
- Borgne
- - Congénital ¬ Syndrome de l' *Q43.8*
- - Non classé ailleurs ¬ Syndrome de l' *K90.2*
- - SAI ¬ Syndrome de l' *K90.2*
- - ¬ Syndrome post-chirurgical de l' *K91.2*
- Seau

Anse *–suite*
- Seau *–suite*
- - Ménisque
- - - Externe ¬ Déchirure "en *S83.2*
- - - Interne ¬ Déchirure "en *S83.2*
- - SAI ¬ Déchirure "en *S83.2*
- - ¬ Déchirure ancienne "en *M23.2*
- ¬ Intoxication: Diurétiques de l' *T50.1*

Antagonistes
- Anticoagulants, vitamine K et autres coagulants ¬ Intoxication: *T45.7*
- Hormonaux, autres et sans précision ¬ Intoxication: *T38.9*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et *T38*
- Opiacés ¬ Intoxication: Analeptiques et *T50.7*
- Vitamine K ¬
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des coumarines (*D68.33*
- - Troubles hémorragiques dus aux coumarines (*D68.33*
- ¬ Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs *T50.0*

Antécédent
- Avortement ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.1*
- Contraception ¬ *Z92.8*
- Familial
- - Affection
- - - Précisées ¬ *Z84.8*
- - - ¬ *Z84*
- - Certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité ¬ *Z82*
- - Consanguinité ¬ *Z84.3*
- - Diabète sucré ¬ *Z83.3*
- - Leucémie ¬ *Z80.6*
- - Maladie
- - - Appareil
- - - - Digestif ¬ *Z83.7*
- - - - Génito-urinaire ¬ *Z84.2*
- - - - Respiratoire ¬ *Z83.6*
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *Z83.4*
- - - Infectieuses et parasitaires ¬ *Z83.1*
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *Z84.0*
- - - Rénales et de l'uretère ¬ *Z84.1*
- - - Sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ *Z83.2*
- - - Spécifiques ¬ *Z83*
- - Trouble
- - - Mentaux et du comportement ¬ *Z81*
- - - Vue et de l'audition ¬ *Z83.5*
- - Tumeur
- - - Malign
- - - - Organe

Antécédent *–suite*
- Familial *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Malign *–suite*
- - - - Organe *–suite*
- - - - - Digestifs ¬ *Z80.0*
- - - - - Génitaux ¬ *Z80.4*
- - - - - Respiratoires et intrathoraciques ¬ *Z80.2*
- - - - Peau ¬ *Z80.8*
- - - - Sans précision ¬ *Z80.9*
- - - - Sein ¬ *Z80.3*
- - - - Systèmes et organes ¬ *Z80.8*
- - - - Trachée, des bronches et des poumons ¬ *Z80.1*
- - - - Voies urinaires ¬ *Z80.5*
- - - - ¬ *Z80*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ¬ *Z80.7*
- Infarctus du myocarde ¬ *I25.29*
- Mesures de réadaptation ¬ *Z92.8*
- Môle
- - Hydatiforme ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.1*
- - Vésiculaire ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.1*
- Mort
- - Néonatales ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.2*
- - Nés ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.2*
- Obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres *Z35.2*
- Personel
- - Abus de substances psycho-actives ¬ *Z86.4*
- - Accident vasculaire cérébral ¬ *Z86.7*
- - Allergie
- - - Agents anti-infectieux ¬ *Z88.3*
- - - Analgésiques ¬ *Z88.6*
- - - Anesthésiques ¬ *Z88.4*
- - - Antibiotiques ¬ *Z88.1*
- - - Médicament substance biologique
- - - - Sans précision ¬ *Z88.9*
- - - - ¬
- - - - - *Z88.8*
- - - - - *Z91.0*
- - - Narcotiques ¬ *Z88.5*
- - - Pénicilline ¬ *Z88.0*
- - - Sérum et vaccin ¬ *Z88.7*
- - - Sulfamides ¬ *Z88.2*
- - Apoplexie ¬ *Z86.7*
- - Certain
- - - Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale ¬ *Z87.6*
- - - Maladies ¬ *Z86*

Antécédent *–suite*
- Personel *–suite*
- - Chimiothérapie pour tumeur maligne ¬ *Z92.6*
- - Complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ *Z87.5*
- - Diabète gestationnel ¬ *Z87.5*
- - États précisés ¬ *Z87.8*
- - Facteur risque
- - - Non classés ailleurs ¬ *Z91*
- - - Précisés, non classés ailleurs ¬ *Z91.8*
- - Fibrose pulmonaire d'origine médicamenteuse ¬ *Z87.0*
- - Gestose ¬ *Z87.5*
- - Infection à VZV [virus de la varicelle et du zona] ¬ *Z86.1*
- - Intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs ¬ *Z92.4*
- - Irradiation ¬ *Z92.3*
- - Leucémie ¬ *Z85.6*
- - Maladie
- - - Appareil
- - - - Circulatoire ¬ *Z86.7*
- - - - Digestif ¬ *Z87.1*
- - - - Génito-urinaire ¬ *Z87.4*
- - - - Respiratoire ¬ *Z87.0*
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *Z86.3*
- - - Infectieuses et parasitaires ¬ *Z86.1*
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *Z87.2*
- - - Sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ *Z86.2*
- - - Système
- - - - Nerveux et des organes des sens ¬ *Z86.6*
- - - - Ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif ¬ *Z87.3*
- - - Trophoblastique ¬ *Z87.5*
- - - ¬ *Z87*
- - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ¬ *Z87.7*
- - Mutilation génital féminin
- - - Plastie de correction ¬ *Z91.70*
- - - Type
- - - - 1 ¬ *Z91.71*
- - - - 2 ¬ *Z91.72*
- - - - 3 ¬ *Z91.73*
- - - - 4 ¬ *Z91.74*
- - - - Sans précision ¬ *Z91.70*
- - - ¬ *Z91.7*
- - Non-observance d'un traitement médical et d'un régime ¬ *Z91.1*
- - Thrombo-embolie ¬ *Z86.7*
- - Traitement
- - - Médical
- - - - Sans précision ¬ *Z92.9*

Antécédent *–suite*
- Personel *–suite*
- - Traitement *–suite*
- - - Médical *–suite*
- - - - ¬ *Z92*
- - - Médicaux ¬ *Z92.8*
- - Traumatisme crânio-cérébral ¬ *Z87.8*
- - Troubles mentaux et du comportement ¬ *Z86.5*
- - Tumeur
- - - Malign
- - - - Organe
- - - - - Digestifs ¬ *Z85.0*
- - - - - Génitaux ¬ *Z85.4*
- - - - - Respiratoires et intrathoraciques ¬ *Z85.2*
- - - - - Systèmes ¬ *Z85.8*
- - - - Sans précision ¬ *Z85.9*
- - - - Sein ¬ *Z85.3*
- - - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ¬ *Z85.7*
- - - - Trachée, des bronches et des poumons ¬ *Z85.1*
- - - - Voies urinaires ¬ *Z85.5*
- - - - ¬ *Z85*
- - - ¬ *Z86.0*
- - Utilisation actuel long terme
- - - Anticoagulants ¬ *Z92.1*
- - - Médicaments ¬ *Z92.2*
- Soins prénatals insuffisants ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.3*
- Stérilité ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.0*

Antécubital ¬ Syndrome du ptérygium *Q87.2*

Antéhypophysaires [adénohypophysaires] ¬ Hormones *T38.8*

Anténatale
- Canal artériel ¬ Fermeture *Q25.8*
- CMV ¬ Infection *P35.1*

Antepartum ¬ Hémorragie: *P02.1*

Antérieur
v. Type de maladie

Antéro-apical
v. Type de maladie

Antérograde ¬ Amnésie *R41.1*

Antéro-latéral
v. Type de maladie

Antéro-septal
v. Type de maladie

Antéversion
- Col du fémur ¬ *Q65.8*
- Utérus ¬ *N85.4*

Anthelminthiques ¬ Intoxication: *T37.4*

Anthracis ¬ infection à Bacillus *A22*

Anthracose ¬ *J60*

Anthracosilicose ¬ *J60*

Anthrax
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.2*

Anthrax *–suite*
- Cou ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.1*
- Face ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.0*
- Fesse ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.3*
- Localisations ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.8*
- Malin ¬ *A22.0*
- Membre ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.4*
- Nez ¬ Abcès, furoncle et *J34.0*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe ¬ *H60.0*
- Sans précision ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.9*
- Tronc ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.2*
- ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02*

Anthropophobie ¬ *F40.1*

Anthropozoonose bactérien
- Non classées ailleurs ¬ Autres *A28*
- Précisées, non classées ailleurs ¬ Autres *A28.8*
- Sans précision ¬ *A28.9*

Antiacides
- Antisécrétoires gastriques ¬ Intoxication: Autres *T47.1*
- ¬
- - Abus de: *F55*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.3*

Antiagrégant plaquettaire
- Sans hémorragie ¬ Traitement continu par des *Z92.2*
- ¬
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des *D69.80*
- - Troubles hémorragiques dus à des *D69.80*

Antiallergiques et antiémétiques ¬ Intoxication: Médicaments *T45.0*

Anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, *T38.6*

Anti-anémiantes ¬ Préparation à base de foie et autres substances *T45.8*

Antiartériosclérosants ¬ Intoxication: Antihyperlipidémiants et *T46.6*

Antiarythmisants, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T46.2*

Antiasthmatiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T48.6*

Antibiothérapie prophylactique SAI ¬ *Z29.28*

Antibiotique
- Antifongiques administrés par voie générale ¬ Intoxication: *T36.7*
- Antitumoraux ¬ *T45.1*
- Endocardite ¬ Prophylaxie *Z29.21*
- Nécessitant mesure thérapeutique hygiéniques spécial ¬ micro-organisme Gram
- - Négatif résistants à certains *U81!*
- - Positifs résistants à certains *U80!*

Antibiotique *–suite*
- Selon l'anamnèse personelle ¬ Colite associée aux *Z86.1*
- Systémique
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T36.9*
- - ¬ Intoxication
- - - *T36*
- - - *T36.8*
- ¬
- - Administration locale prophylactique d' *Z29.20*
- - Antécédents personnels d'allergie à d'autres *Z88.1*
- - Bactérie Gram
- - - Négatif multirésistantes aux *U81.8!*
- - - Positives multirésistantes aux *U80.8!*
- - Entérite, colite ou entérocolite associée aux *A04.79*
- - Prophylaxie locale par des *Z29.20*

Anti-cardiolipine ¬ Syndrome des *D68.6*

Anticholinergique
- Antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [*T44.3*
- ¬ Délire *T44.3*

Anticholinestérasiques ¬ Intoxication: *T44.0*

Anticoagulant
- Anticorps circulants ¬ Troubles hémorragiques dus à des *D68.3*
- Circulants ¬ Troubles hémorragiques dus aux *D68.35*
- Lupus ¬ Présence de l' *D68.6*
- Sans saignement ¬ Thérapie à long terme avec *Z92.1*
- Vitamine K et autres coagulants ¬ Intoxication: Antagonistes des *T45.7*
- ¬
- - Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d' *Z92.1*
- - Hématurie sous traitement *D68.35*
- - Hémorragie sous utilisation à long terme d'autres *D68.35*
- - Intoxication: *T45.5*
- - Troubles hémorragiques dus à d'autres *D68.35*

Anticorps
- Anti-D [Rh] ¬ *O36.0*
- Anti-érythrocytaires ¬ Détection d' *R76.8*
- Anti-facteur VIII ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d' *D68.31*
- Anti-hirudine ¬ Détection d' *R76.8*
- Anti-membrane basale glomérulaire ¬ Maladie des *M31.0†, N08.5**
- Antiphospholipides ¬ Syndrome des *D68.6*
- Anti-polysaccharide ¬ Immunodéficience par déficit sélectif en *D80.6*
- Anti-streptokinase ¬ Détection d' *R76.8*
- Anti-thrombocytes ¬ Détection d' *R76.8*
- Anti-thyroïde ¬ Détection d' *R76.8*
- Anti-VHA ¬ Présence d' *B19.9*

Anticorps *–suite*
- Anti-VHB ¬ Présence d' *B19.9*
- Anti-VHC ¬ Présence d' *B19.9*
- Circulants ¬ Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants et *D68.3*
- Dirigés contre facteur
- - Coagulation ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d' *D68.32*
- - VIII ¬ Hémophilie due aux *D68.31*
- - Von Willebrand ¬
- - - Augmentation des *D68.32*
- - - Hémophilie due aux *D68.32*
- - Xa ¬ Hémophilie due aux *D68.32*
- - Xia ¬ Hémophilie due aux *D68.32*
- Humoraux ¬ Déficit en *D80.9*
- Immunoglobulines presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en *D80.6*
- Inhibant la coagulation ¬ Hémophilie due à des *D68.38*
- Membrane basale antiglomérulaire ¬ Maladie des *M31.0†, N08.5**
- Non précisés ¬ Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres *D68.38*
- Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d' *D80.9*
- ¬
- - Augmentation du taux d' *R76.0*
- - Déficits immunitaires avec déficit prédominant de la production d' *D80.8*

Anti-D [Rh] ¬ Anticorps *O36.0*

Antidépresseurs
- Inhibiteurs de la monoamine-oxydase ¬ Intoxication: *T43.1*
- Non précisés ¬ Intoxication: *T43.2*
- Tétracycliques ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*
- Tricycliques et tétracycliques ¬ Intoxication: *T43.0*
- ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.0*

Antidiabétiques] ¬ Intoxication: Insuline et hypoglycémiants oraux [*T38.3*

Antidiarrhéiques ¬ Intoxication: *T47.6*

Antidiurèse inappropriée ¬ Syndrome néphrogénique d' *E22.2*

Antidiurétique ¬ Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone *E22.2*

Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T50.6*

Antiémétiques ¬ Intoxication: Médicaments antiallergiques et *T45.0*

Anti-épileptiques
- Association, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T42.5*
- Sédatif hypnotiques
- - Antiparkinsoniens ¬ Intoxication par *T42*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T42.7*
- - ¬ Intoxication: Autres *T42.6*
- ¬ Embryopathie due aux *Q86.1*

Anti-érythrocytaires ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Anti-facteur VIII ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps *D68.31*

Antifongiques
- Administrés par voie générale ¬ Intoxication: Antibiotiques *T36.7*
- Anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments *T49.0*

Antigène
- 1 (LFA-1) ¬ Anomalie de la fonction lymphocytaire *D84.0*
- Australia ¬ Hépatite avec *B18.19*
- HBc identifié ¬ Hépatite B avec *B18.19*
- HBe identifié ¬ Hépatite B avec *B18.19*
- HBs
- - Identifié ¬ Hépatite B avec *B18.19*
- - ¬ Hépatite associée à l' *B18.19*
- Spécifique de la prostate [PSA] ¬ Modification du taux d' *R77.80*
- Surface du virus de l'hépatite B [AgHBs] ¬ Porteur de l' *B18.13*
- ¬ Hépatite associée aux *B18.19*

Antiglomérulaire ¬ Maladie des anticorps de la membrane basale *M31.0†, N08.5**

Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T38.6*

Anti-hirudine ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants ¬ Intoxication: *T46.6*

Antihypertenseurs, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T46.5*

Anti-infectieux
- Anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments antifongiques, *T49.0*
- Antiparasitaire systémique
- - Précisés ¬ Intoxication: Autres *T37.8*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T37.9*
- - ¬ Intoxication par d'autres *T37*
- Ophtalmiques ¬ *T49.5*
- Oto-rhino-laryngologiques ¬ *T49.6*
- ¬ Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents *Z88.3*

Anti-inflammatoire
- Non stéroïdien
- - AINS] ¬ Intoxication: Autres *T39.3*
- - ¬ Ulcère
- - - Estomac dû aux *K25.9, Y57.9!*
- - - Gastro-duodénal dû aux *K27.9, Y57.9!*
- - - Peptique dû aux *K27.9, Y57.9!*
- Usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et *T49.0*

Anti-interféron-gamma acquis ¬ Déficit immunitaire de l'adulte avec autoanticorps *D84.8*

Anti-IXa ¬ Augmentation des *D68.32*

Anti-lymphocytes B ou T ¬ Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps *D83.2*

Anti-MAG ¬ Polyneuropathie associée à une gammopathie monoclonale IgM ayant une activité *D47.2†, G63.1**

Anti-membrane basale glomérulaire ¬ Maladie des anticorps *M31.0†, N08.5**

Anti-Müller ¬ Déficit de l'hormone *E29.1*

Antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et *T44.3*

Antimycobactériens ¬ Intoxication: *T37.1*

Anti-nucléaires ¬ Polyarthrite juvénile sans facteur rhumatoïde avec facteurs *M08.3*

Anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Antigonadotropines, *T38.6*

Anti-p200 ¬ Pemphigoïde *L12.8*

Antipaludéens ¬ Maculopathie toxique due aux *H35.38*

Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang ¬ Intoxication: *T37.2*

Antiparasitaire systémique
- Précisés ¬ Intoxication: Autres anti-infectieux et *T37.8*
- Sans précision ¬ Intoxication: Anti-infectieux et *T37.9*
- ¬ Intoxication par d'autres anti-infectieux et *T37*

Antiparkinsoniens
- Dépresseurs centraux du tonus musculaire ¬ Intoxication: *T42.8*
- ¬ Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et *T42*

Antiphospholipides
- Néonatal ¬ Syndrome des *D68.6*
- ¬
- - SAPL [syndrome des *D68.6*
- - Syndrome
- - - *D68.6*
- - - Anticorps *D68.6*
- - - Catastrophique des *D68.6*

Anti-polysaccharide ¬ Immunodéficience par déficit sélectif en anticorps *D80.6*

Antiprotozoaires ¬ Intoxication: Autres *T37.3*

Antiprurigineux ¬ Intoxication: *T49.1*

Antipyrétique
- Antirhumatismal
- - Sans précision ¬ Intoxication: Analgésique non opioïde, *T39.9*
- - ¬ Intoxication par analgésiques non opioïdes, *T39*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et *T39.8*

Anti-reflux ¬ Complication mécanique d'un dispositif œsophagien *T85.50*

Anti-Rh ¬ Soins maternels pour iso-immunisation *O36.0*

Antirhumatismal
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T39.4*

Antirhumatismal *–suite*
- Sans précision ¬ Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et *T39.9*
- ¬ Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et *T39*

Antisécrétoires gastriques ¬ Intoxication: Autres antiacides et *T47.1*

Antisociale ¬ Personnalité: *F60.2*

Anti-streptokinase ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Antisynthétases ¬ Syndrome des *M35.8*

Antitétanique ¬ Polyneuropathie due au sérum *G61.1, Y59.9!*

Antithrombine ¬
- Carence en: *D68.5*
- Thrombophilie héréditaire due au déficit congénital en *D68.5*

Anti-thrombocytes ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Anti-thyroïde ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Antitrypsine ¬ Déficit en alpha-1- *E88.0*

Antituberculeux (de première ligne) ¬ Mycobactéries résistantes aux *U82!*

Antitumoraux
- Immunosuppresseurs ¬ Intoxication: Médicaments *T45.1*
- ¬ Antibiotiques *T45.1*

Antitussifs ¬ Intoxication: *T48.3*

Antivariqueuses, y compris les agents sclérosants ¬ Intoxication: Substances *T46.8*

Anti-VHA ¬ Présence d'anticorps *B19.9*

Anti-VHB ¬ Présence d'anticorps *B19.9*

Anti-VHC ¬ Présence d'anticorps *B19.9*

Anti-VIIIa ¬ Augmentation des *D68.31*

Antiviraux ¬ Intoxication: *T37.5*

Anti-vitamine K ¬ Embryofœtopathie aux *Q86.2*

Anti-Xa ¬ Augmentation des *D68.32*

Anti-XIa ¬ Augmentation des *D68.32*

Antley-Bixler ¬ Syndrome d' *Q87.0*

Antral ¬ Gastrite chronique, type: *K29.5*

Antrale
- Chronique ¬ Maladie attico- *H66.2*
- Suppurée ¬ Otite moyenne chronique attico- *H66.2*

Antre
- Estomac ¬ *C16.3*
- Highmore) (maxillaire) ¬ *C31.0*
- Pylorique ¬ Tumeur maligne: *C16.3*

Antrite aiguë ¬ *J01.0*

Anurie
- Oligurie ¬ *R34*
- Sulfamides utilisés comme un médicament approprié à l'indication et correctement administrés ¬ *R34, Y57.9!*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- Traumatique ¬ *T79.5*

Anus
- Canal anal ¬
- - Carcinoma in situ: *D01.3*
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - *D12.9*
- - - - Côlon, du rectum, de l' *D12*
- - - Malign
- - - - *C21*
- - - - Lésion à localisations contiguës du rectum, de l' *C21.8*
- Fistule ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q42.2*
- Rectum
- - Sans précision ¬ Maladie de l' *K62.9*
- - Virus de l'herpès ¬ Infection de la marge cutanée de l' *A60.1*
- - ¬
- - - Corps étranger dans l' *T18.5*
- - - Hémorragie de l' *K62.5*
- - - Infection
- - - - Chlamydia de l' *A56.3*
- - - - Gonococcique de l' *A54.6*
- - - Maladie
- - - - *K62*
- - - - Précisées de l' *K62.8*
- - - Sténose de l' *K62.4*
- - - Ulcère de l' *K62.6*
- SAI ¬ *D37.78*
- Sans
- - Fistule ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q42.3*
- - Précision ¬ Tumeur maligne: *C21.0*
- Sphincter) ¬ Rétrécissement de l' *K62.4*
- ¬
- - *S31.80*
- - *T21*
- - Acrochordon de l' *K64.4*
- - Ectopie de l' *Q43.5*
- - Fistule congénitale du rectum et de l' *Q43.6*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- - Spasme de l' *K59.4*
- - Syndrome du muscle releveur de l' *K59.4*
- - Syphilis de l' *A52.7†, K93.8**
- - Tuberculose de l' *A18.3†, K93.0**
- - Ulcère variqueux
- - - *K64.8*
- - - Externe de l' *K64.5*
- - - Interne de l' *K64.8*

Anxiété
- Épisodique paroxystique] ¬ Trouble panique [*F41.0*
- Généralisée ¬ *F41.1*
- SAI ¬ *F41.9*
- Sociale de l'enfance ¬ *F93.2*

Anxieux
- Dépressif mixte ¬ Trouble *F41.2*
- Évitante] ¬ Personnalité *F60.6*
- Légère ou non persistante) ¬ Dépression *F41.2*
- Mixtes ¬ Autres troubles *F41.3*
- Organique ¬ Trouble *F06.4*
- Persistante ¬ Dépression: *F34.1*
- Phobique
- - Enfance ¬ Trouble *F93.1*
- - Sans précision ¬ Trouble *F40.9*
- - ¬ trouble
- - - *F40*
- - - *F40.8*
- Précisés ¬ Autres troubles *F41.8*
- Sans précision ¬ Trouble *F41.9*
- ¬
- - État *F41.1*
- - Névrose *F41.1*
- - Réaction *F41.1*
- - Troubles *F41*

AO artériopathie oblitérante
- Type
- - Bassin
- - - Cuisse ¬ *I70.29*
- - - ¬ *I70.29*
- - Cuisse ¬ *I70.29*
- ¬ *I70.29*

AO1 ¬ *E70.3*

AOA1 ¬ *G11.3*

AOA2 ¬ *G60.2*

AOA4 ¬ *G11.1*

AOC ¬ *E70.3*

AOC1A ¬ *E70.3*

AOC2 ¬ *E70.3*

AOC3 ¬ *E70.3*

AOC4 ¬ *E70.3*

AOMI
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs] ¬ *I70.29*
- SAI ¬ Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [*I70.29*
- Sans précision du stade (de Leriche et Fontaine) ¬ Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [*I70.29*
- Type bassin-jambe stade
- - IIb de Leriche et Fontaine ¬ *I70.22*
- - III de Leriche et Fontaine ¬ *I70.23*
- - IV de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- - IVa de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- - IVb de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*

AOPC [atrophie olivo-ponto-cérébelleuse] ¬ *G23.3*

Aorte
- Abdominal
- - Descendant ¬ Rupture

Aorte *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - Descendant ¬ Rupture *–suite*
- - - *I71.3*
- - - Anévrysme de l' *I71.3*
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.06*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.02*
- - ¬
- - - Anévrisme familial de l' *I71.4*
- - - Coarctation de l' *Q25.1*
- - - Embolie et thrombose de l' *I74.0*
- - - Lésion traumatique de l' *S35.0*
- - - Syphilis de l' *A52.0†, I79.1**
- Ascendante ¬ Anomalie de l' *Q25.4*
- Autosomique dominante ¬ Coarctation de l' *Q25.1*
- Congénitale) ¬ Sténose de l' *Q25.3*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anévrisme de l' *I79.0**
- Hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l' *Q21.3*
- Localisation non précis
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.04*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.00*
- Non précisées ¬ Embolie et thrombose de parties de l' *I74.1*
- SAI ¬
- - *S25.0*
- - Rupture de l' *I71.8*
- Thoracique
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.05*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.01*
- - ¬
- - - Anévrisme syphilitique de l' *A52.0†, I79.0**
- - - Lésion traumatique de l' *S25.0*
- - - Syphilis de l' *A52.0†, I79.1**
- Thoraco-abdominal
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.07*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.03*
- ¬
- - Absence congénital(e) de l' *Q25.4*
- - Anévrisme
- - - *I71.9*
- - - Congénital(e) de l' *Q25.4*
- - - Disséquant de l' *I71.0*
- - - Syphilitique de l' *A52.0†, I79.0**
- - Aplasie congénital(e) de l' *Q25.4*
- - Artère pulmonaire naissant de l' *Q25.7*
- - Athérosclérose de l' *I70.0*
- - Atrésie de l' *Q25.2*
- - Calcification d'un anévrysme de l' *I71.9*
- - Coarctation de l' *Q25.1*

Aorte *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dextroposition de l' *Q20.3*
- - Dilatation
- - - *I71.9*
- - - Congénital(e) de l' *Q25.4*
- - - Syphilitique de l' *A52.0†, I39.1**
- - Dissection de l' *I71.0*
- - Double arc aortique [anneau vasculaire de l' *Q25.4*
- - Hypoplasie de l' *Q25.4*
- - Insuffisance syphilitique de l' *A52.0†, I39.1**
- - Lipoïdose de l' *E75.6*
- - Malformations congénitales de l' *Q25.4*
- - Médianécrose kystique de l' *I71.00*
- - Nécrose hyaline de l' *I71.9*
- - Occlusion congénitale de l' *Q25.3*
- - Régurgitation syphilitique de l' *A52.0†, I39.1**
- - Rupture syphilitique de l' *A52.0†, I79.0**
- - Sténose syphilitique de l' *A52.0†, I39.1**
- - Syphilis
- - - *A52.0†, I79.1**
- - - Crosse de l' *A52.0†, I79.1**

Aorte-artère pulmonaire congénitale ¬ Fistule *Q21.4*

Aortique
- Abdominal
- - Rompu ¬ Anévrisme *I71.3*
- - Sans mention de rupture ¬ Anévrisme *I71.4*
- Anneau vasculaire de l'aorte] ¬ Double arc *Q25.4*
- Annulo-ectasiante ¬ Maladie *I71.01*
- Anomalie des mains ¬ Syndrome de persistance du canal artériel-bicuspidie valvulaire *Q87.2*
- Anormaux ¬ Arcs *Q25.4*
- Atypique ¬ Coarctation *Q25.1*
- Avant le canal) (après le canal) ¬ Coarctation de l'isthme *Q25.1*
- Bicuspide ¬ Valvule *Q23.1*
- Cervicale ¬ Crosse *Q25.4*
- Combinées ¬ Atteintes des valves mitrale et *I08.0*
- Congénital ¬
- - Atrésie *Q23.0*
- - Dysplasie valvulaire *Q23.9*
- - Insuffisance *Q23.1*
- - Sténose *Q23.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la valvule *I39.1**
- Dissection ¬ Anévrisme *I71*
- Droit ¬ Persistance de: arc *Q25.4*
- Familial ¬
- - Bicuspidie *Q23.1*
- - Dissection *I71.00*
- Insuffisance ¬ Sténose (de la valvule) *I35.2*

Aortique *–suite*
- Localisation non précis
- - Rompu ¬ Anévrisme *I71.8*
- - Sans mention de rupture ¬ Anévrisme *I71.9*
- Mitral
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des valvules *Q23.9*
- - ¬ Autres malformations congénitales des valvules *Q23.8*
- Paraganglions ¬ Tumeur
- - Bénigne: Glomus *D35.6*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Glomus *D44.7*
- - Maligne: Glomus *C75.5*
- Précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée ¬ Lésions des valves mitrale et *I08.0*
- Rhumatismal
- - E) ¬ Reflux *I06.1*
- - Insuffisance
- - - Reflux ¬ Sténose *I06.2*
- - - ¬ Sténose *I06.2*
- - ¬
- - - Insuffisance *I06.1*
- - - Sténose *I06.0*
- SAI cause précis sauf rhumatismal ¬
- - Insuffisance (de la valvule) *I35.1*
- - Régurgitation (de la valvule) *I35.1*
- Sans précision ¬
- - Atteinte de la valvule *I35.9*
- - Maladie rhumatismale de la valvule *I06.9*
- Sous-valvulaire ¬ Rétrécissement *Q24.4*
- Streptocoques ¬ Endocardite de la valvule *I33.0, B95.5!*
- Supravalvulaire ¬ Sténose *Q25.3*
- Syndrome de Leriche] ¬ Syndrome de la bifurcation *I74.0*
- Takayasu] ¬ Syndrome de la crosse *M31.4*
- Thoracique
- - Rompu ¬ Anévrisme *I71.1*
- - Sans mention de rupture ¬ Anévrisme *I71.2*
- Thoraco-abdominal
- - Rompu ¬ Anévrisme *I71.5*
- - Sans mention de rupture ¬ Anévrisme *I71.6*
- Tricuspide combiné ¬ atteinte valve
- - *I08.2*
- - Mitrale, *I08.3*
- Valvulaire
- - Congénitale ¬ Sténose *Q23.0*
- - Rhumatismale SAI ¬ Maladie *I06.9*
- ¬
- - Anomalie congénital
- - - Feuillets de la valve *Q23.9*
- - - Valve *Q23.9*
- - Atrésie valvulaire *Q23.0*
- - Atteinte
- - - Non rhumatismales de la valvule *I35*

Aortique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Atteinte *–suite*
- - - Valvule *I35.8*
- - Endocardite
- - - Syphilitique de la valve *A52.0†, I39.1**
- - - Tuberculeuse de la valve *A18.8†, I39.1**
- - Inflammation syphilitique de la valve *A52.0†, I39.1**
- - Insuffisance
- - - Congénitale de la valvule *Q23.1*
- - - Valvule) *I35.1*
- - Interruption de la crosse *Q25.4*
- - Maladies rhumatismales de la valvule *I06.8*
- - Malformation du septum *Q21.4*
- - Persistance
- - - Cinquième arc *Q25.4*
- - - Convolution de l'arc *Q25.4*
- - Quadricuspidie valvulaire *Q23.8*
- - Régurgitation syphilitique de la valve *A52.0†, I39.1**
- - Rétrécissement rhumatismal (de la valvule) *I06.0*
- - Sclérose rhumatismale de la valve *I06.8*
- - Sténose
- - - Congénitale de la valvule *Q23.0*
- - - Syphilitique de la valve *A52.0†, I39.1**
- - - Valvule) *I35.0*
- - Valvulite syphilitique de la valve *A52.0†, I39.1**

Aortite
- Aspergillus ¬ *B44.8†, I79.1**
- Associée à IgG4 ¬ *I77.6*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I79.1**
- SAI ¬ *I77.6*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.5†, I79.1**
- - ¬ *A52.0†, I79.1**

Aorto-coronaire ¬ Présence d'un pontage *Z95.1*

Aorto-pulmonaire
- Congénitale ¬ Fenêtre *Q21.4*
- ¬
- - Communication *Q21.4*
- - Fistule *Q21.4*

Aorto-ventriculaire
- Droit ¬ Tunnel *Q20.8*
- Gauche ¬ Tunnel *Q20.8*
- ¬ Tunnel *Q20.8*

AOSD ¬ *M06.10*

Aoûtats ¬ Dermatite due aux *B88.0*

Apallique
- Nouveau-né ¬ Syndrome d'enfermement et syndrome *P91.80*
- ¬ Syndrome *G93.80*

Apathie ¬
- *R45.3*
- Découragement et *R45.3*

APDS ¬ *D81.8*

Apert] ¬ Acrocéphalosyndactylie [*Q87.0*

Aperta
- Kystique) ¬ spina bifida (*Q05*
- ¬ Spina bifida *Q05.9*

Apesanteur ¬ Effets de: *T75.8*

Apex ventriculaire en ballon ¬ Syndrome de l' *I42.88*

Apexite [pétrosite] ¬ *H70.2*

Apgar minute
- 0 et 3 ¬ Asphyxie avec indice d' *P21.0*
- 4 et 7 ¬ Asphyxie avec indice d' *P21.1*

Aphakie
- Congénitale ¬ *Q12.3*
- Primaire congénitale ¬ *Q12.3*
- ¬ *H27.0*

Aphalangie-hémivertèbre-dysgénésie uro-génitointestinale ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Aphalangie-syndactylie-microcéphalie ¬ Syndrome d' *Q87.2*

Aphaque] ¬ Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la cataracte [de l' *H59.0*

Aphasie
- Acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] ¬ *F80.3*
- Cours de syphilis tertiaire ¬ *A52.1†, G94.8**
- Développement type
- - Expressif ¬ Dysphasie ou *F80.1*
- - Réceptif ¬ Dysphasie ou *F80.2*
- - Wernicke ¬ *F80.2*
- Primaire progressif
- - Agrammatique ¬ *G31.0†, F02.0**
- - Logopénique ¬ *G31.0†, F02.0**
- Progressif
- - Isolée ¬ *G31.0*
- - Primaire [PPA] ¬ *G31.0†, F02.0**
- Syphilitique tertiaire ¬ *A52.1†, G94.8**
- ¬ Dysphasie et *R47.0*

Aphérèse ¬ *Z51.81*

Aphonie
- Psychogène ¬ *F44.4*
- ¬ *R49.1*

Aphtes buccaux récidivants ¬ *K12.0*

Aphteuse
- Majeure) (mineure) ¬ Stomatite: *K12.0*
- Récidivante ¬ Ulcération *K12.0*
- ¬ Fièvre (de): *B08.8*

Aphtose de Bednar ¬ *K12.0*

Apical
- Aigu
- - Origine pulpaire ¬ Périodontite *K04.4*
- - SAI ¬ Périodontite *K04.4*
- Chronique ¬ Périodontite *K04.5*

Apical *–suite*
- Périapical ¬ Granulome *K04.5*
- Périodontal) ¬ Kyste: *K04.8*
- SAI ¬ Périodontite *K04.5*
- ¬
- - Infarctus
- - - Myocarde, à répétition (aigu): latéro- *I22.8*
- - - Répété (aigu): antéro- *I22.0*
- - - Transmural aigu
- - - - Antéro- *I21.0*
- - - - Latéro- *I21.2*
- - Syndrome de ballonisation *I42.88*
- - Thrombose (ancienne): *I51.3*

Apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, *D68.35*

Aplasia
- Cutis congenita
- - Récessive des membres ¬ *Q84.8*
- - ¬ *Q84.8*
- Extracorticalis axialis ¬ *E75.2*

Aplasie
- Col de l'utérus ¬ Agénésie et *Q51.5*
- Congénital
- - Bilatérale des canaux déférents ¬ *Q55.4*
- - E) de l'aorte ¬ *Q25.4*
- - Musculature abdominale ¬ *Q79.4*
- - Pénis ¬ Absence et *Q55.5*
- Cordon spermatique ¬ Absence ou *Q55.4*
- Ectodermique congénitale ¬ *Q84.8*
- Hypoplasie
- - Cément ¬ *K00.4*
- - Pancréas ¬ Agénésie, *Q45.0*
- - Thymique avec déficit immunitaire ¬ *D82.1*
- - Vésicule biliaire ¬ Agénésie, *Q44.0*
- Labyrinthe, microtie et microdontie ¬ Surdité avec *Q16.5*
- Médullaire anémie aplastique
- - Acquis pur
- - - Chronique ¬ *D60.0*
- - - Érythroblastopénie] ¬ *D60*
- - - Sans précision ¬ *D60.9*
- - - Transitoire ¬ *D60.1*
- - - ¬ Autres *D60.8*
- - Médicamenteux
- - - Sans précision ¬ *D61.19*
- - - Traitement cytostatique ¬ *D61.10*
- - - ¬ Autre *D61.18*
- Moniliforme ¬ *Q84.1*
- Müllérienne-aplasie rénale-anomalies cervicothoraciques ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Œil ¬ *Q11.1*
- Ovarienne ¬ *Q50.3*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*

Aplasie *–suite*
- Péroné-brachydactylie ¬ Syndrome d' *Q73.8*
- Péroné-ectrodactylie ¬ Syndrome d' *Q73.8*
- Prostate ¬ Absence ou *Q55.4*
- Pure des globules rouges de l'adulte ¬ *D60.0*
- Radiale ¬ Syndrome de craniosynostose- *Q75.0*
- Rénale-anomalies cervicothoraciques ¬ Syndrome d'aplasie müllérienne- *Q87.8*
- Testicule ¬ Absence et *Q55.0*
- Thyroïde (avec myxœdème) ¬ *E03.1*
- Trochlée de l'humérus ¬ *Q74.0*
- Unilatérale des canaux de Müller ¬ *Q51.4*
- Utérus ¬ Agénésie et *Q51.0*

Aplasticosebacea ¬ Didymosis *Q84.8*

Aplastique
- Acquis pur
- - Chronique ¬ Aplasie médullaire [anémie *D60.0*
- - Érythroblastopénie] ¬ Aplasie médullaire [anémie *D60*
- - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [anémie *D60.9*
- - Transitoire ¬ Aplasie médullaire [anémie *D60.1*
- - ¬ Autres aplasies médullaires [anémie *D60.8*
- Agents externes ¬ Anémies *D61.2*
- Constitutionnelle ¬ Anémies *D61.0*
- Ectrodactylie ¬ Syndrome de tibia *Q73.8*
- Idiopathique ¬ Anémies *D61.3*
- Médicamenteux
- - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [anémie *D61.19*
- - Traitement cytostatique ¬ Aplasie médullaire [anémie *D61.10*
- - ¬
- - - Anémies *D61.1*
- - - Aplasie médullaire [anémie *D61.18*
- Précisées ¬ Autres anémies *D61.8*
- Pure congénitale ¬ Anémie *D61.0*
- Sans précision ¬ Anémies *D61.9*
- ¬ Autres anémies *D61*

Apnée
- Nouveau-né ¬ Autres *P28.4*
- Obstructive du nouveau-né ¬ *P28.4*
- Prématuré ¬ *P28.4*
- Primitive du sommeil chez le nouveau-né ¬ *P28.3*
- SAI ¬ *R06.88*
- Sommeil
- - Central ¬ Syndrome d' *G47.30*
- - Non précisée ¬ *G47.39*
- - Nouveau-né
- - - Centrale ¬ *P28.3*
- - - Obstructive ¬ *P28.3*
- - - SAI ¬ *P28.3*
- - Obstructif ¬ Syndrome d' *G47.31*

Apnée *–suite*
- Sommeil *–suite*
- - ¬
- - - *G47.3*
- - - *G47.38*

Apnée-bradycardie du prématuré ¬ Syndrome d' *P28.4*

ApoA-I ¬ Déficit familial en *E78.6*

Apocrine
- Sans précision ¬ Affection des glandes sudoripares *L75.9*
- Sein ¬ Métaplasie des glandes *N60.8*
- ¬
- - Acné *L73.2*
- - Affections des glandes sudoripares *L75.8*
- - Miliaire *L75.2*

Apodie ¬ *Q72.3*

Apolipoprotéine
- A-I ¬
- - Amylose à *E85.0*
- - Déficit en *E78.6*
- A-IV ¬ Amylose à *E85.8*

Apollo ¬ Conjonctivite *B30.3†, H13.1**

Aponévrose
- Palmaire [Dupuytren] ¬ Fibromatose de l' *M72.0*
- Plantaire ¬ Fibromatose de l' *M72.2*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*

Aponévrotique
- Juvénile ¬ Fibromatose *M72.89*
- Traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie épicrânienne sous- *P12.2*

Apophyse
- Condylienne ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.61*
- Coracoïde ¬ Fracture de l'omoplate: *S42.13*
- Coronoïde
- - Cubitus ¬ Fracture de la partie supérieure du cubitus: *S52.02*
- - ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.63*
- Épineux
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*
- Mastoïde
- - Acte médicaux
- - - Non classées ailleurs ¬ Affections de l'oreille et de l' *H95*
- - - Sans précision ¬ Affection de l'oreille et de l' *H95.9*
- - - ¬ Autres affections de l'oreille et de l' *H95.8*
- - Cours maladies classées ailleurs ¬ affection
- - - Oreille moyenne et de l' *H75**

Apophyse *–suite*
- Mastoïde *–suite*
- - Cours maladies classées ailleurs ¬ affection *–suite*
- - - Précisées de l'oreille moyenne et de l' *H75.8**
- - Sans précision ¬ Affection de l'oreille moyenne et de l' *H74.9*
- - ¬
- - - Affection
- - - - Oreille moyenne et de l' *H74*
- - - - Précisées de l'oreille moyenne et de l' *H74.8*
- - - Carie tuberculeuse de l' *A18.0†, H75.0**
- Styloïde du cubitus ¬ *S52.8*
- Tibiale externe [Haglund] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.6*
- Transverse
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*

Apophysite
- Calcaneum ¬ *M92.8*
- Interne du coude ¬ *M77.0*
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*

Apoplexie
- Hypophysaire ¬ *E23.6*
- Ischémique ¬ *I63.9*
- Surrénales due à un sepsis à méningocoques ¬ *A39.1†, E35.1**
- Urémique ¬ *N18.89†, I68.8**
- ¬ Antécédents personnels d' *Z86.7*

Apparence
- Comportement ¬ Autres symptômes et signes relatifs à l' *R46.8*
- Personnelle bizarre ¬ *R46.1*

Apparent
- Décès ¬ Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause *R98*
- Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale ¬ Autres affections *P25.8*
- Évolution imprévisible inconnu
- - Sans précision ¬ Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *D47.9*
- - ¬ tumeur
- - - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *D47.7*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et *D47*
- Liées à une carence en iode ¬ Autres affections thyroïdiennes et *E01.8*
- Non précisées ¬ Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *C96*
- Périartérite noueuse ¬ Autres affections *M30.8*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *C96.9*

Apparent *–suite*
- Survenant pendant la période périnatale ¬ Emphysème interstitiel et affections *P25*
- ¬
- - Accident ischémique cérébral transitoire Syndrome
- - - *G45*
- - - *G45.8*
- - Amyotrophie spinal Syndrome
- - - *G12*
- - - *G12.8*
- - Antécédent
- - - Familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *Z80.7*
- - - Personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *Z85.7*
- - Flatulence et troubles *R14*
- - Mastoïdite affection
- - - *H70*
- - - *H70.8*
- - Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et *C79.3*
- - Périartérite noueuse et affections *M30*
- - Péristaltisme *R19.2*
- - Stomatites et affections *K12*
- - Tumeur malign
- - - Glandes endocrines et structures *C75*
- - - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *C96.7*

Apparent life-threatening event [ALTE] ¬ *R06.80*

Apparition
- Présénile ¬ Démence dégénérative primaire de type Alzheimer avec *G30.0†, F00.0**
- Sénile ¬ Démence dégénérative primaire de type Alzheimer avec *G30.1†, F00.1**
- Tardif
- - Autosomique dominante ¬ Dégénérescence rétinienne d' *H35.5*
- - ¬
- - - État de mal épileptique réfractaire d' *G41.8*
- - - Syndrome de Marie-Pierre II d' *G11.2*

Appendice
- Oreille ¬ *Q17.0*
- Préauriculaire ¬
- - *Q17.0*
- - Syndrome de déficience intellectuelle avec hypoplasie du corps calleux et *Q87.8*
- Sans précision ¬ Maladie de l' *K38.9*
- Vermiculaire ¬ Adhérences de l' *K66.0*
- ¬
- - Adénocarcinome mucineux de l' *C18.1*
- - Diverticule de l' *K38.2*
- - Fécalome de l' *K38.1*
- - Fistule de l' *K38.3*
- - Hyperplasie de l' *K38.0*

Appendice *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Invagination de l' *K38.8*
- - Maladie
- - - *K38*
- - - Précisées de l' *K38.8*
- - Méga- *Q43.8*
- - Néoplasme neuroendocrine
- - - *C18.1*
- - - *D12.1*
- - - Incertain de l' *D37.3*
- - Stercolithe de l' *K38.1*
- - Transposition de: *Q43.8*
- - Tuberculose de l' *A18.3†, K93.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.1*
- - - Carcinoïde productrice de mucus de l' *C18.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.3*
- - - Maligne: *C18.1*

Appendicite
- Aigu
- - Abcès péritonéal ¬ *K35.32*
- - Péritonite
- - - Généralisé
- - - - Diffuse) après perforation ou rupture ¬ *K35.2*
- - - - ¬ *K35.2*
- - - Localisé
- - - - Perforation ou rupture ¬ *K35.31*
- - - - Sans perforation ni rupture ¬ *K35.30*
- - - - ¬ *K35.3*
- - Sans
- - - Mention de péritonite localisée ou généralisée ¬ *K35.8*
- - - Précision ¬ *K35.8*
- - ¬ *K35*
- Amibienne ¬ *A06.8*
- Chronique ¬ *K36*
- Récidivante ¬ *K36*
- Sans précision ¬ *K37*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- ¬ Autres formes d' *K36*

Appendiculaires ¬ Concrétions *K38.1*

Appétit
- Psychogène ¬ Perte d' *F50.8*
- ¬ Perte de l' *R63.0*

Apple peel ¬ Syndrome d' *Q41.1*

Application
- Rouge lèvre ¬ Lèvre
- - Inférieure: zone d' *C00.1*
- - Supérieure: zone d' *C00.0*
- Thérapeutique de substances radioactives ¬ *Z51.0*
- Ventouse forceps
- - Sans précision ¬ Echec de l' *O66.5*

Application *–suite*
- Ventouse forceps *–suite*
- - Suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne ¬ *O66.5*

Apport ¬
- Excès
- - *E67*
- - Précisés d' *E67.8*
- Séquelles d'excès d' *E68*

Apprentissage SAI ¬
- Incapacité (de): *F81.9*
- Trouble de l' *F81.9*

Apprêteurs du lin ¬ Maladie des *J66.1*

Approprié
- Correctement administré ¬
- - Choc
- - - Anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse *T88.6*
- - - Anesthésique dû à une substance *T88.2*
- - Effet indésirable dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- - Hypersensibilité dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- - Idiosyncrasie dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- - Réaction allergique dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- Indication et correctement administrés ¬ Anurie due aux sulfamides utilisés comme un médicament *R34, Y57.9!*

Approvisionnement insuffisant en eau potable ¬ *Z58*

Apraxie
- Oculomoteur type
- - 1 ¬ Syndrome d'ataxie- *G11.3*
- - 4 ¬ Syndrome d'ataxie- *G11.1*
- - Cogan ¬ *H51.8*
- ¬ *R48.2*

Apraxiedéficience intellectuelle lié à l'X ¬ Syndrome d'ataxie- *G11.8*

APS ¬ *E31.0*

APS2) ¬ Syndrome de polyendocrinopathie auto-immune de type II (*E31.0*

Aptitudes sociales insuffisantes, non classées ailleurs ¬ *Z73*

Apudom ¬ *D44.9*

Aquatique ¬ Accident dû à un véhicule *V99!*

Aqueduc Sylvius ¬
- Anomalie de l' *Q03.0*
- Malformations de l' *Q03.0*
- Obstruction congénitale de l' *Q03.0*
- Sténose de l' *Q03.0*

Aqueuse ¬ Diarrhée: aiguë *A09.0*

Arachnéen ¬ Nævus: *I78.1*

Arachnodactylie
- Congénitale avec contractures ¬ *Q68.8*
- Déficience intellectuel
- - Dysmorphie ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Arachnodactylie *–suite*
- Déficience intellectuel *–suite*
- - ¬ Syndrome de cryptorchidie- *Q87.8*
- Ossification anormale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Arachnoïde ¬
- Neurosyphilis de l' *A52.1†, G01**
- Syphilis
- - Adhésive de l' *A52.1†, G01**
- - Cérébrale de l' *A52.1†, G01**
- - Spinale de l' *A52.1†, G01**
- Tuberculose *A17.0†, G01**

Arachnoïdien
v.a. sous-arachnoïdien
- Artère
- - Basilaire ¬ Hémorragie sous- *I60.4*
- - Cérébral
- - - Moyenne ¬ Hémorragie sous- *I60.1*
- - - SAI ¬ Hémorragie sous- *I60.7*
- - Communicant
- - - Antérieure ¬ Hémorragie sous- *I60.2*
- - - Postérieure ¬ Hémorragie sous- *I60.3*
- - - SAI ¬ Hémorragie sous- *I60.7*
- - Intracrânien
- - - Sans précision ¬ Hémorragie sous- *I60.7*
- - - ¬ Hémorragie sous- *I60.6*
- - Vertébrale ¬ Hémorragie sous- *I60.5*
- Bifurcation et du siphon carotidien ¬ Hémorragie sous- *I60.0*
- Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie sous- *P52.5*
- Postopératoire ¬ Hémorragie rachidienne sous- *G97.84*
- Sans précision ¬ Hémorragie sous- *I60.9*
- Traumatique ¬ Hémorragie sous- *S06.6*
- Traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie sous- *P10.3*
- ¬
- - Hémorragie sous
- - - *I60*
- - - *I60.8*
- - Kyste: *G93.0*
- - Séquelles d'hémorragie sous- *I69.0*
- - Vasospasme au cours d'hémorragie sous- *I67.80!*

Arachnoïdite
- Adhésif
- - Syphilitique ¬ *A52.1†, G01**
- - ¬ *G03.9*
- Bactérienne ¬ *G00*
- Causes autres et non précisées ¬ *G03*
- Cérébrale syphilitique ¬ *A52.1†, G01**
- Méningocoques ¬ *A39.0†, G01**
- Spinal
- - SAI ¬ *G03.9*
- - Syphilitique ¬ *A52.1†, G01**
- Syphilitique tardive ¬ *A52.1†, G01**

Arachnoïdite *–suite*
- Tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**

Araignée ¬ Effet toxique: Venin d' *T63.3*

ARAN-NM ¬ *G60.0*

Arborescens à herpès simplex ¬ Keratitis *B00.5†, H19.1**

Arbovirus
- SAI ¬
- - Fièvre à *A94*
- - Infection à *A94*
- ¬ Méningite à *A87.8†, G02.0**

ARC
- Aortique
- - Anneau vasculaire de l'aorte] ¬ Double *Q25.4*
- - Anormaux ¬ *Q25.4*
- - Droit ¬ Persistance de: *Q25.4*
- - ¬ Persistance
- - - Cinquième *Q25.4*
- - - Convolution de l' *Q25.4*
- Axis ¬ Fracture bilatérale de la pédicule de l' *S12.1*
- Palmaire
- - Profond ¬ Lésion traumatique de l' *S65.3*
- - Superficiel ¬ Lésion traumatique de l' *S65.2*
- SAI ¬ Complexe relatif au SIDA [*B24*
- Sénile ¬ *H18.4*
- Vertébral
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*

Arcade dentaire ¬
- Anomalies de rapport entre les *K07.2*
- Déviation médiane de l' *K07.2*

Arciforme ¬ Scotome (de): *H53.4*

ARDS] ¬ Adult respiratory distress syndrome [*J80.09*

AREB
- I] ¬ Anémie réfractaire avec excès de blastes, type I [*D46.2*
- II] ¬ Anémie réfractaire avec excès de blastes, type II [*D46.2*
- ¬ Anémie réfractaire avec excès de blastes [*D46.2*

AREDYLD ¬ Syndrome *Q87.8*

Aréflexie
- Détresse respiratoire-dysphagie ¬ Syndrome de myopathie à début précoce- *G71.2*
- Vésicale ¬ *G95.81*

Aréflexique héréditaire de type Roussy-Lévy ¬ Dystasie *G60.0*

Arénavirus
- Chapare ¬ Fièvre hémorragique à *A96.8*
- Lujo ¬ Fièvre hémorragique à *A96.8*
- Sans précision ¬ Fièvre hémorragique à *A96.9*
- ¬ Fièvre hémorragique
- - *A96*

Arénavirus *–suite*
- ¬ Fièvre hémorragique *–suite*
- - *A96.8*

Aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire) ¬ Dystrophie choroïdienne (*H31.2*

Aréole ¬
- Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de: *N61*
- Tumeur maligne: Mamelon et *C50.0*

Argentine ¬ Fièvre hémorragique d' *A96.0*

Arginase ¬ Déficit en *E72.2*

Arginine
v. l-arginine
- ¬
- - Hyperaminoacidurie provoquée par l' *E72.2*
- - Trouble du métabolisme de l' *E72.2*

Argininémie ¬ *E72.2*

Argininosuccinase ¬ Déficit en *E72.2*

Argininosuccinique ¬
- Acidémie *E72.2*
- Acidurie
- - *E72.2*

Arginosuccinate lyase ¬ Déficit en *E72.2*

Argyll Robertson syphilitique ¬ Signe d' *A52.1†, H58.0**

Argyrie] de la conjonctive ¬ Argyrose [*H11.1*

Argyrose
- Argyrie] de la conjonctive ¬ *H11.1*
- ¬ *T56.8*

Arhinencéphalie ¬ *Q04.1*

Arhinie
- Atrésie des choanes-microphtalmie ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- Isolée ¬ *Q30.1*

Arias ¬ Syndrome d' *E80.5*

Ariboflavinose ¬ *E53.0*

Arithmétique ¬ Trouble
- Acquisition de l' *F81.2*
- Spécifique de l'acquisition de l' *F81.2*

Arlequin ¬ Fœtus *Q80.4*

Armature orthopédique(s) ¬ *Z46.7*

Arme
- Feu ¬
- - Accident dû à: *W49.9!*
- - Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou *Y35.7!*
- ¬ Voies de fait/agression par : *Y09.9!*

Armées ¬ Examen général en série de: membres des forces *Z10*

Armfield ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Arndt-Gottron ¬ Maladie d' *L98.5*

Arnold-Chiari
- Type
- - 1 ¬ Malformation d' *Q07.0*
- - 2 ¬ Malformation d' *Q07.0*

Arnold-Chiari *–suite*
- ¬ Syndrome d' *Q07.0*

Aromatase ¬
- Déficit en *E25.8*
- Syndrome d'excès d' *E30.1*

Aromatiques
- Sans précision ¬
- - Anomalies du métabolisme des acides aminés *E70.9*
- - Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et *T53.9*
- ¬
- - Anomalie métabolisme acide aminés
- - - *E70*
- - - *E70.8*
- - Déficit en décarboxylase des acides aminés *G24.8*
- - Effet toxique dérivé halogéné hydrocarbures
- - - *T53.7*
- - - Aliphatiques et *T53*

AR-PKD ¬ *Q61.1*

Arquée syphilitique ¬ Jambe *A50.5†, M90.29**

Arrachement
- Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- Cartilage interne de la symphyse (pubienne) obstétrical(e) ¬ *O71.6*
- Cuir chevelu ¬ *S08.0*
- Frein lingual ¬ *S01.54*
- Hile splénique ¬ *S36.04*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- Œil ¬ *S05.7*
- Plusieurs parties du corps ¬ *T05*
- Pulmonaire ¬ *S27.32*
- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*

Arrêt
- Auriculaire ¬ *I45.5*
- Cardiaque
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.1*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.1*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.2*
- - Réanimation sans succès ¬ *I46.9*
- - Réanimé avec succès ¬ *I46.0*
- - Sans précision ¬ *I46.9*
- - Survenant
- - - Césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ *O75.4*
- - - États classés en O00-O07 ¬ *O08.8*
- - ¬ *I46*
- Cardio-circulatoire avant l'admission à l'hôpital ¬ *U69.13!*
- Croissance dû à la malnutrition ¬ *E45*
- Épiphysaire ¬ *M89.1*

Arrêt *–suite*
- Phase active du travail ¬ *O62.1*
- Prématuré du traitement ¬ *Y69!*
- Profondeur en position transverse ¬ *O64.0*
- Respiratoire ¬ *R09.2*

Arriération mental
- Grave ¬ *F72*
- Légère ¬ *F70*
- Moyenne ¬ *F71*
- Profonde ¬ *F73*

Arroyo
v. Ramos-Arroyo

Arsenic et ses composés ¬ Effet toxique: *T57.0*

Artefacte ¬ *L98.1*

Artère
- Artérioles
- - Capillaires au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres atteintes des *I79.8**
- - Sans précision ¬ Atteinte des *I77.9*
- - ¬ atteinte
- - - *I77*
- - - Précisées des *I77.8*
- Axillaire ¬ Lésion traumatique de l' *S45.0*
- Basilaire
- - Carotide vertébral
- - - N entraînant infarctus cérébral ¬
- - - - Embolie des *I65*
- - - - Obstruction (complète) (partielle) des *I65*
- - - - Sténose des *I65*
- - - - Thrombose des *I65*
- - - ¬
- - - - *I63.0*
- - - - *I63.1*
- - - - *I63.2*
- - Tronc) ¬ Anévrisme et dissection de l' *I72.5*
- - ¬
- - - Artériosclérose de l' *I65.1*
- - - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.4*
- - - Occlusion et sténose de l' *I65.1*
- Brachiale ¬ Lésion traumatique de l' *S45.1*
- Carotide
- - Interne dans sa portion intracrânienne ¬ Anévrysme de l' *I67.10*
- - ¬
- - - Anévrisme
- - - - Dissection de l' *I72.0*
- - - - Syphilitique intracrânien de l' *A52.0†, I68.8**
- - - Artériosclérose de l' *I65.2*
- - - Occlusion et sténose de l' *I65.2*
- Centrale de la rétine ¬ Occlusion de l' *H34.1*
- Cérébelleux
- - N entraînant infarctus cérébral ¬

Artère *–suite*
- Cérébelleux *–suite*
- - N entraînant infarctus cérébral ¬ *–suite*
- - - Embolie des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des *I66*
- - - Obstruction (complète) (partielle) des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des *I66*
- - - Sténose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des *I66*
- - - Thrombose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des *I66*
- - ¬
- - - Artère cérébral moyen antérieur postérieur
- - - - *I63.3*
- - - - *I63.4*
- - - - *I63.5*
- - - Occlusion et sténose des *I66.3*
- Cérébral
- - Antérieur ¬
- - - Occlusion et sténose de l' *I66.1*
- - - Syndrome de l' *I66.1†, G46.1**
- - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des *I63.5*
- - Moyen antérieur postérieur artère cérébelleux
- - - N entraînant infarctus cérébral ¬
- - - - Embolie des *I66*
- - - - Obstruction (complète) (partielle) des *I66*
- - - - Sténose des *I66*
- - - - Thrombose des *I66*
- - - ¬
- - - - *I63.3*
- - - - *I63.4*
- - - - *I63.5*
- - Moyenne ¬
- - - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.1*
- - - Occlusion et sténose de l' *I66.0*
- - - Syndrome de l' *I66.0†, G46.0**
- - Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et sténose des *I66.4*
- - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des *I66*
- - Postérieur ¬
- - - Occlusion et sténose de l' *I66.2*
- - - Syndrome de l' *I66.2†, G46.2**
- - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des *I63*
- - SAI ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une *I60.7*
- - Sans précision ¬ Occlusion et sténose d'une *I66.9*
- - ¬

Artère *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Athérome d' *I67.2*
- - - Dissection d' *I67.0*
- - - Gomme des *A52.0†, I68.8**
- - - Infarctus cérébral
- - - - Embolie des *I63.4*
- - - - Thrombose des *I63.3*
- - - Occlusion
- - - - *I66.9*
- - - - Sténose d'une autre *I66.8*
- - - Rupture d'un anévrisme syphilitique de l' *A52.0†, I68.8**
- - - Spasme de l' *G45.9*
- - - Sténose d'une *I66.9*
- - - Tuberculose d'une *A18.8†, I68.1**
- Cervicales et cérébrales ¬ Dissection familiale des *I72.9*
- Cœliaque
- - Mésentérique ¬ Lésion traumatique de l' *S35.2*
- - ¬ Syndrome de compression de l' *I77.4*
- Communicant
- - Antérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.2*
- - Postérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.3*
- - SAI ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une *I60.7*
- Coronaire
- - Gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de l' *I25.14*
- - ¬
- - - Anévrisme
- - - - *I25.4*
- - - - Congénital d'une *Q24.5*
- - - Anomalie congénitale des *Q24.5*
- - - Athérome des (*I25.1*
- - - Athérosclérose des (*I25.1*
- - - Dissection spontanée idiopathique de l' *I25.4*
- - - Maladie des (*I25.1*
- - - Occlusion des (*I25.1*
- - - Présence de prothèse de l' *Z95.5*
- - - Rétrécissement syphilitique
- - - - *A52.0†, I52.0**
- - - - Congénital des *A50.5†, I52.0**
- - - Sclérose des (*I25.1*
- - - Sténose des (*I25.1*
- - - Thrombose syphilitique des *A52.0†, I52.0**
- - - Vasospasme des *I20.1*
- Coronarienne avec rupture ¬ Dissection d' *I21.9*
- Cou ¬ Artériosclérose d'une *I70.8*
- Cubital niveau

Artère *–suite*
- Cubital niveau *–suite*
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de l' *S55.0*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de l' *S65.0*
- Distal
- - Non précisées ¬ Athérosclérose des *I70.29*
- - Sans précision ¬ Embolie et thrombose des *I74.4*
- - Type
- - - Bassin-jambe
- - - - Douleur
- - - - - Ischémique à l'effort, distance de marche de 200 m et plus ¬ Athérosclérose des *I70.21*
- - - - - Ischémique à l'effort, distance de marche de moins de 200 m ¬ Athérosclérose des *I70.22*
- - - - - Repos ¬ Athérosclérose des *I70.23*
- - - - Gangrène ¬ Athérosclérose des *I70.25*
- - - - Sans douleurs ¬ Athérosclérose des *I70.20*
- - - - Stade IV selon Fontaine avec ulcération ¬ Athérosclérose des *I70.24*
- - - - Ulcération ¬ Athérosclérose des *I70.24*
- - - Épaule-bras, tous stades ¬ Athérosclérose des *I70.26*
- - ¬ Athérosclérose des *I70.2*
- Dorsale du pied ¬ Lésion traumatique de l' *S95.0*
- Extrémité
- - Inférieure ¬ Oblitération d'une *I74.3*
- - ¬ Artériosclérose d'une *I70.29*
- Fémoral ¬
- - Athérosclérose de l' *I70.29*
- - Lésion traumatique de l' *S75.0*
- Gastrique ¬ *S35.2*
- Gastro-duodénale ¬ *S35.2*
- Hépatique
- - Congénitale) ¬ Fistule entre la veine porte et l' *Q26.6*
- - ¬
- - - *S35.2*
- - - Syphilis des *A52.0†, I79.8**
- Heubner ¬ Maladie de l' *A52.0†, I68.1**
- Iliaque ¬
- - Anévrisme et dissection de l' *I72.3*
- - Embolie et thrombose de l' *I74.5*
- - Occlusion de l' *I74.5*
- Innominée ou sous-clavière ¬ Lésion traumatique de l' *S25.1*
- Intracrânien
- - Sans précision ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une *I60.7*
- - ¬
- - - Atteinte de plusieurs *I60.6*
- - - Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres *I60.6*

Artère *–suite*
- Jambe ¬ Oblitération d'une *I74.3*
- Membre
- - Inférieur ¬
- - - Anévrisme et dissection d'une *I72.4*
- - - Embolie et thrombose des *I74.3*
- - Supérieur ¬
- - - Anévrisme et dissection d'une *I72.1*
- - - Embolie et thrombose des *I74.2*
- Mésentérique
- - Inférieure) (supérieure) ¬ *S35.2*
- - Supérieure ¬ Thrombose de l' *K55.0*
- Moelle épinière ¬ Thrombose syphilitique d'une *A52.0†, I79.8**
- Non précisées ¬ Embolie et thrombose d' *I74.9*
- Ombilical
- - Unique ¬ *Q27.0*
- - ¬ Absence congénitale et hypoplasie de l' *Q27.0*
- Perforante ¬ Occlusion et sténose d'une *I66.8*
- Périphérique ¬
- - Oblitération d'une *I74.4*
- - Sclérose d'une *I70.29*
- Péronière ¬ Lésion traumatique de l' *S85.2*
- Pied ¬ Oblitération d'une *I74.3*
- Plantaire du pied ¬ Lésion traumatique de l' *S95.1*
- Poplité
- - Piégé
- - - Popliteal artery entrapment syndrome] ¬ Syndrome de l' *I77.1*
- - - ¬ Syndrome de l' *I77.1*
- - ¬
- - - Lésion traumatique de l' *S85.0*
- - - Oblitération de l' *I74.3*
- Précérébral
- - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des *I63.2*
- - Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et sténose des *I65.3*
- - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des *I65*
- - SAI ¬ *I65.9*
- - Sans précision ¬ Occlusion et sténose d'une *I65.9*
- - ¬
- - - Anévrisme
- - - - Acquis d' *I72.5*
- - - - Dissection d'une autre *I72.5*
- - - Infarctus cérébral
- - - - Embolie des *I63.1*
- - - - Thrombose des *I63.0*
- - - Occlusion et sténose d'une autre *I65.8*
- - - Rupture d'anévrysme d' *I72.5*

Artère *–suite*

- Précisées ¬ Anévrisme et dissection d'autres *I72.8*
- Pulmonaire
- - Aberrante ¬ *Q25.7*
- - Naissant
- - - Aorte ¬ *Q25.7*
- - - Canal artériel ¬ *Q25.7*
- - Origine anormale ¬ *Q25.7*
- - ¬
- - - Absence d'une *Q25.7*
- - - Agénésie de l' *Q25.7*
- - - Anévrisme
- - - - *I28.1*
- - - - Congénital de l' *Q25.7*
- - - Anomalie de l' *Q25.7*
- - - Atrésie de l' *Q25.5*
- - - Dilatation idiopathique de l' *I28.8*
- - - Hypoplasie
- - - - *Q25.7*
- - - Malformations congénitales de l' *Q25.7*
- - - Sténose
- - - - Congénitale) de l' *Q25.6*
- - - - Supravalvulaire de l' *Q25.6*
- - - Syphilis des *A52.0†*, *I98.0**
- Radial niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de l' *S55.1*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de l' *S65.1*
- Rate ¬ Calcification d' *I70.8*
- Rénal
- - Multiples ¬ *Q27.2*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de l' *Q27.2*
- - ¬
- - - Anévrisme et dissection de l' *I72.2*
- - - Athérosclérose de l' *I70.1*
- - - Embolie de l' *N28.0*
- - - Malformations congénitales de l' *Q27.2*
- - - Obstruction de l' *N28.0*
- - - Occlusion de l' *N28.0*
- - - Sténose congénitale de l' *Q27.1*
- - - Thrombose de l' *N28.0*
- Rétine ¬
- - Occlusion
- - - *H34.2*
- - - Transitoire de l' *H34.0*
- - Tortuosité des *Q14.1*
- Sous-clavière
- - Aberrante ¬ *Q27.8*
- - ¬
- - - Anévrisme syphilitique de l' *A52.0†*, *I79.8**
- - - Athérosclérose de l' *I70.26*
- Spinal
- - Antérieure ¬ Syndrome de compression de l' *M47.09†*, *G99.2**

Artère *–suite*

- Spinal *–suite*
- - ¬ Syndrome de compression des *M47.09†*, *G99.2**
- Splénique ¬ *S35.2*
- Tibial antérieur
- - Piégée ¬ Syndrome de l' *T79.62*
- - Postérieure) ¬ Lésion traumatique de l' *S85.1*
- Veine
- - Hypogastrique ¬ *S35.88*
- - Iliaque ¬ *S35.5*
- - Mammaire ¬ *S25.88*
- - N entraînant infarctus myocarde ¬
- - - Embolie coronaire (*I24.0*
- - - Occlusion coronaire (*I24.0*
- - - Thrombo-embolie coronaire (*I24.0*
- - Ovarienne ¬ *S35.88*
- - Pulmonaire ¬
- - - Infarctus (d'une *I26*
- - - Thromboembolie (d'une *I26*
- - - Thrombose (d'une *I26*
- - Rénale ¬ *S35.4*
- - Utérine ¬ *S35.88*
- - ¬
- - - Absence d'une *Q27.8*
- - - Atrésie d'une *Q27.8*
- - - Embolie mésentérique (*K55.0*
- - - Infarctus mésentérique (*K55.0*
- - - Thrombose mésentérique (*K55.0*
- Vertébral ¬
- - Anévrisme et dissection de l' *I72.6*
- - Artériosclérose de l' *I65.0*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.5*
- - Lésion traumatique de l' *S15.1*
- - Occlusion et sténose de l' *I65.0*
- - Syndrome de compression de l' *M47.09†*, *G99.2**
- - ¬
- - Anévrisme congénital coronaire (*Q24.5*
- - Athérosclérose d'autres *I70.8*
- - Compression d' *I77.1*
- - Embolie et thrombose d'autres *I74.8*
- - Gomme des *A52.0†*, *I79.8**
- - Nécrose d'une *I77.5*
- - Oblitération d'une *I74.9*
- - Occlusion d'une *I74.9*
- - Rupture d'une *I77.2*
- - Sténose d'une *I77.1*
- - Transposition
- - - Complète des grosses *Q20.3*
- - - Isolée congénitalement non corrigée des grosses *Q20.3*
- - Tuberculose des *A18.8†*, *I79.8**

Artériel

- Bicuspidie valvulaire aortique-anomalie des mains ¬ Syndrome de persistance du canal *Q87.2*
- Commun ¬ Tronc *Q20.0*
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement *Q27.8*
- Élevée ¬ Tension *I10*
- Érosion ¬ Hémorragie *I77.2*
- Essentielle) (primitive) (systémique) ¬ Hypertension (*I10*
- Familiale ¬ Persistance du canal *Q25.0*
- Généralisée infantile ¬ Calcification *Q28.88*
- Idiopathique infantile ¬ Calcification *Q28.88*
- Jambe ¬
- - Occlusion *I74.3*
- - Ulcère *I70.24*
- Moelle épinière ¬ Thrombose *G95.18*
- Occlusive syphilitique ¬ Maladie *A52.0†*, *I79.8**
- Périphérique
- - Aiguë ¬ Occlusion *I74.4*
- - ¬ Embolie *I74.4*
- Précérébraux multiples et bilatéraux ¬ Accident ischémique transitoire de territoires *G45.2*
- Pulmonaire
- - Familiale ¬ Hypertension *I27.0*
- - Idiopathique ¬ Hypertension *I27.0*
- Rate ¬ Thrombose *D73.5*
- Rétinien
- - Branche ¬ Occlusion *H34.2*
- - Partielle ¬ Occlusion *H34.2*
- Sans diagnostic
- - Hypertension ¬ Constatation d'une élévation de la tension *R03.0*
- - ¬ Constatation d'une anomalie de la tension *R03*
- Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Hématome *T14.5*
- Veineuse SAI ¬ Anomalie *Q27.9*
- ¬
- - Artère pulmonaire naissant du canal *Q25.7*
- - Bruits (*R09.8*
- - Constatation d'une baisse non spécifique de la tension *R03.1*
- - Dégénérescence
- - - *I70*
- - - Media *I70.29*
- - - Tunique intermédiaire *I70.29*
- - Diabète sucré
- - - MOA [maladie occlusive *E14.50†*, *I79.2**
- - - Type
- - - - 1 avec MOA [maladie occlusive *E10.50†*, *I79.2**
- - - - 2 avec MOA [maladie occlusive *E11.50†*, *I79.2**
- - Dysplasie fibromusculaire *I77.3*
- - Embolie et thrombose *I74*

Artériel *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Érosion *I77.8*
- - Fermeture anténatale du canal *Q25.8*
- - Fistule *I77.2*
- - Infarctus *I74.9*
- - Mesure de la tension *Z01.3*
- - Obturation retardée du canal *P29.3*
- - Perméabilité du canal *Q25.0*
- - Persistance
- - - Canal *Q25.0*
- - - Tronc *Q20.0*
- - Spasme *I73.9*
- - Syndrome de tortuosité *I77.1*
- - Ulcération *I77.8*

Artério-hépatique
- Monosomie 20p12 ¬ Dysplasie *Q44.7*
- Mutation ponctuel
- - JAG1 ¬ Dysplasie *Q44.7*
- - NOTCH2 ¬ Dysplasie *Q44.7*
- ¬ Dysplasie *Q44.7*

Artérioles
- Capillaires au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres atteintes des artères, *I79.8**
- Sans précision ¬ Atteinte des artères et *I77.9*
- ¬ atteinte
- - Artères et *I77*
- - Précisées des artères et *I77.8*

Artériolosclérose ¬ *I70*

Artériopathie
- Oblitérante
- - Cérébrale ¬ *I66.9*
- - Membre inférieur
- - - AOMI
- - - - SAI ¬ *I70.29*
- - - - Sans précision du stade (de Leriche et Fontaine) ¬ *I70.29*
- - - ¬
- - - - AOMI [*I70.29*
- - - - Claudication intermittente avec *I70.29*
- - Périphérique ¬ *I70.29*
- - Type
- - - Bassin
- - - - Cuisse
- - - - - ¬ *I70.29*
- - - - - ¬ AO [*I70.29*
- - - - ¬
- - - - - *I70.29*
- - - - - AO [*I70.29*
- - - Cuisse ¬
- - - - *I70.29*
- - - - AO [*I70.29*
- - - Jambe ¬ *I70.29*
- - ¬
- - - *I70.29*

Artériopathie *–suite*
- Oblitérante *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - AO [*I70.29*
- - - Douleurs ischémiques dans le cadre d'une *I70.29*
- - - Syndrome d' *I70.29*
- Obstructive périphérique des extrémités ¬ *I70.2*
- Occlusive infantile ¬ *Q28.88*

Artériopathique ¬ démence *F01*

Artérioscléreux
- Cérébral ¬ Rupture d'anévrysme *I60.7*
- Cerveau ¬ Rupture d'anévrysme *I60.7*
- Chronique) (interstitielle) ¬ Néphrite *I12*
- Implication
- - Bitronculaire ¬ Cardiopathie *I25.12*
- - Monotronculaire ¬ Cardiopathie *I25.11*
- - Tritronculaire ¬ Cardiopathie *I25.13*
- Sans
- - Précision ¬ Cardiopathie *I25.19*
- - Sténoses ayant un effet hémodynamique ¬ Cardiopathie *I25.10*
- Sous-corticale ¬ Encéphalopathie *I67.3*
- Sténose
- - Stents ¬ Cardiopathie *I25.16*
- - Tronc commun de l'artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie *I25.14*
- - Vaisseaux de pontage ¬ Cardiopathie *I25.15*
- ¬
- - Cardiopathie *I25.1*
- - Gangrène
- - - *I70.25*
- - - Sénile *I70.25*

Artériosclérotique
v. Type de maladie

Artériovasculaire ¬ Dégénérescence: *I70*

Artérioveineux
- Acquis ¬
- - Anévrisme: *I77.0*
- - Fistule *I77.0*
- Cérébral
- - Acquise) ¬ Fistule *I67.11*
- - ¬
- - - Anévrisme cérébral et fistule *I67.1*
- - - Malformation *Q28.29*
- - - Shunt *Q28.21*
- Cérébro-facial
- - Type
- - - 1 ¬ Syndrome métamérique *Q28.28*
- - - 3 ¬ Syndrome métamérique *Q28.28*
- - ¬ Syndrome métamérique *Q28.28*
- Congénital vaisseau
- - Cérébral
- - - Non précisée ¬ Malformation *Q28.29*

Artérioveineux *–suite*
- Congénital vaisseau *–suite*
- - Cérébral *–suite*
- - - ¬
- - - - Anévrisme *Q28.20*
- - - - Fistule *Q28.21*
- - - - Malformations *Q28.28*
- - Précérébral
- - - Non précisée ¬ Malformation *Q28.09*
- - - ¬
- - - - Anévrisme *Q28.00*
- - - - Fistule *Q28.01*
- - - - Malformations *Q28.08*
- Coronaire, acquise ¬ Fistule *I25.4*
- Dural crâne ¬
- - Fistule *Q28.21*
- - Malformations *Q28.28*
- Faciale ¬ Malformation *Q27.3*
- Fronto-nasale ¬ Malformation *Q27.3*
- Intracrânienne ¬ Malformation *Q28.29*
- Mandibulaire ¬ Malformation *Q27.3*
- Maxillaire ¬ Malformation *Q27.3*
- Périphérique ¬ Malformation *Q27.3*
- Pulmonaire
- - Congénitale ¬ Fistule *Q25.7*
- - ¬ Anévrysme *Q25.7*
- Rétinienne congénitale ¬ Communication *Q14.8*
- Sinus caverneux ¬ Anévrysme *Q28.20*
- Spinal ¬
- - Malformation *G37.4*
- - Syndrome métamérique *Q27.3*
- Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Anévrisme ou fistule (*T14.5*
- Vaisseau
- - Cérébraux ¬ Malformation *Q28.2*
- - Précérébraux ¬ Malformation *Q28.0*
- - Pulmonaires ¬ Fistule *I28.0*
- ¬
- - Anévrisme
- - - *Q27.3*
- - - Pulmonaire *Q25.7*
- - Malformation capillaire-malformation *Q27.3*

Artérite
- Cellule géant
- - Polymyalgie rhumatismale ¬ *M31.5*
- - ¬
- - - *M31.6*
- - - Myopathie au cours d' *M31.6†, G73.7**
- Cérébral
- - Cours
- - - Listériose ¬ *A32.8†, I68.1**
- - - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, I68.2**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *I68.2**

Artérite *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - Cours *–suite*
- - - Maladies infectieuses et parasitaires ¬ *I68.1**
- - Non classée ailleurs ¬ *I67.7*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I68.1**
- - Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I68.1**
- - ¬ Neurosyphilis avec *A52.0†, I68.1**
- Coronaire
- - Rhumatismal
- - - Aiguë ¬ *I01.8*
- - - Chronique ¬ *I09.8*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- Sans précision ¬ *I77.6*
- Sénile ¬ *I70*
- Spinale syphilitique ¬ *A52.0†, I79.8**
- Syphilitique généralisée ¬ *A52.0†, I79.8**
- Takayasu ¬ *M31.4*
- Temporal
- - Juvénile ¬ *L95.8*
- - ¬ *M31.6*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I79.8**

Artéropathie oblitérante périphérique ¬ *I70.29*

Arthrite
- Allergique ¬ *M13.8*
- Associée aux enthésopathies ¬ *M08.89*
- Bactérie pyogène
- - Sans précision ¬ *M00.9*
- - ¬ *M00*
- Bactérienne dysentérique ¬ *A03.9†, M01.39**
- Charcot
- - Diabétique ¬ *E14.60†, M14.69**
- - ¬ Diabète sucré type
- - - 1 avec *E10.60†, M14.69**
- - - 2 avec *E11.60†, M14.69**
- Chronique juvénile
- - Début systémique ¬ *M08.2*
- - Forme oligo(pauci)- articulaire ¬ *M08.4*
- - Séronégative), forme polyarticulaire ¬ *M08.3*
- Cours
- - Affection
- - - Endocrinienne NCA ¬ *E34.9†, M14.59**
- - - Gastro-intestinale NCA ¬ *K63.9†, M03.69**
- - - Neurologique NCA ¬ *G98†, M14.69**
- - - Respiratoire NCA ¬ *J98.9†, M14.89**
- - Amylose ¬ *E85.4†, M14.49**
- - Endocardite infectieuse ¬ *I33.0†, M03.69**
- - Entérite NCA ¬ *A09.9†, M03.29**
- - Fièvre
- - - Méditerranéenne familiale ¬ *E85.0†, M14.49**
- - - Paratyphoïde ¬ *A01.4†, M01.39**
- - - Typhoïde ¬ *A01.0†, M01.39**

Arthrite *–suite*
- Cours *–suite*
- - Helminthiase NCA ¬ *B83.9†, M01.89**
- - Hyperparathyroïdie NCA ¬ *E21.3†, M14.19**
- - Hypogammaglobulinémie ¬ *D80.1†, M14.89**
- - Leucémie NCA ¬ *C95.90†, M36.1**
- - Maladie
- - - Bactérien
- - - - Classées ailleurs ¬ *M01.3**
- - - - ¬ *A49.9†, M01.39**
- - - Infectieux
- - - - Parasitaires classées ailleurs ¬ *M01.8**
- - - - ¬ *B99†, M01.89**
- - - Lyme ¬ *A69.2†, M01.29**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, M01.89**
- - - Viral
- - - - Classées ailleurs ¬ *M01.5**
- - - - ¬ *B34.9†, M01.59**
- - - Whipple ¬ *K90.8†, M14.89**
- - Ochronose ¬ *E70.2†, M14.59**
- - Réaction d'hypersensibilité NCA ¬ *T78.4†, M36.4**
- - Recto-colite hémorragique ¬ *K51.9†, M07.59**
- - Réticulose maligne ¬ *C86.0†, M36.1**
- - Rubéole ¬ *B06.8†, M01.49**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, M14.89**
- - Scorbut ¬ *E54†, M14.59**
- - Sporotrichose ¬ *B42.8†, M01.69**
- - Syphilis congénitale ¬ *A50.5†, M03.19**
- - Thalassémie NCA ¬ *D56.9†, M36.3**
- Dérivation intestinale ¬ *M02.0*
- Dysentérique, NCA ¬ *A09.0†, M03.29**
- Enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois ¬ *M08*
- Entéropathiques ¬ Autres *M07.6**
- Escherichia coli ¬ *M00.89, B96.2!*
- Gonocoques ¬ *A54.4†, M01.39**
- Haemophilus influenzae ¬ *M00.89, B96.3!*
- Infectieux
- - Directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *M01**
- - SAI ¬ *M00.9*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B20, M00.99*
- Inflammatoire et de maladie tophacée ¬ Hyperuricémie sans signes d' *E79.0*
- Juvénile
- - Chronique ¬ *M08.99*
- - Cours
- - - Entérite régionale ¬ *K50.9†, M09.19**
- - - Maladie de Crohn ¬ *K50.9†, M09.19**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *M09.8**
- - - Recto-colite hémorragique ¬ *K51.9†, M09.29**
- - Idiopathique
- - - Associée au psoriasis ¬ *L40.5†, M09.09**

Arthrite *–suite*
- Juvénile *–suite*
- - Idiopathique *–suite*
- - - Oligoarticulaire ¬ *M08.49*
- - - ¬ *M08.99*
- - Rhumatoïde ¬ *M08.99*
- - Sans précision ¬ *M08.9*
- - ¬
- - - *M08*
- - - *M08.8*
- - - Vasculite au cours d' *M08.7*
- Méningococcique ¬ *A39.8†, M01.09**
- Mycosique NCA ¬ *B49†, M01.69**
- Neuropathique
- - Cours de syphilis ¬ *A52.1†, M14.69**
- - Non syphilitique NCA ¬ *G98†, M14.69**
- Ourlienne ¬ *B26.8†, M01.59**
- Polyarthrite
- - Bactéries précisées ¬ *M00.8*
- - Pneumocoques ¬ *M00.1*
- - Staphylocoques ¬ *M00.0*
- - Streptocoques ¬ Autres *M00.2*
- Post infectieux
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *M03.2**
- - Réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs ¬ *M03**
- Post-dysentérique ¬ *M02.1*
- Post-infectieuse au cours d'une entérite à Yersinia enterocolitica ¬ *A04.6†, M03.29**
- Post-méningococcique ¬ *A39.8†, M03.09**
- Post-vaccinale ¬ *M02.2*
- Précisées ¬ Autres *M13.8*
- Pseudomonas ¬ *M00.89, B96.5!*
- Psoriasique
- - Entéropathiques ¬ *M07**
- - ¬ *L40.5†, M07.39**
- Purulente ¬ Maladie due au VIH avec *B20, M00.99*
- Réactionnel
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *M03.6**
- - Sans précision ¬ *M02.9*
- - ¬
- - - *M02*
- - - *M02.8*
- Rhumatismale aiguë ou subaiguë ¬ *I00*
- Rhumatoïde
- - Adéno-splénomégalie et leucopénie ¬ *M05.0*
- - Juvénile avec ou sans facteur rhumatismal ¬ *M08.0*
- - Séropositive chronique ¬
- - - Cardite lors d' *M05.30†, I52.8**
- - - Endocardite lors d' *M05.30†, I39.8**
- - - Myocardite lors d' *M05.30†, I41.8**
- - - Myopathie lors d' *M05.30†, G73.7**

Arthrite *–suite*
- Rhumatoïde *–suite*
- - Séropositive chronique ¬ *–suite*
- - - Polynévrite lors d' *M05.30†, G63.6**
- - - Vascularite lors d' *M05.2*
- - ¬ Atteinte vertébrale au cours de la *M45*
- Salmonella ¬ *A02.2†, M01.39**
- Sans précision ¬ *M13.9*
- Syphilitique
- - Post-infectieuse ¬ *M03.1**
- - Tardive ¬ *A52.1†, M03.19**
- Tabique ¬ *A52.1†, M03.19**
- Tuberculeux
- - Chronique ¬ *A18.0†, M01.19**
- - Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - ¬ *A18.0†, M01.19**
- Vénérienne ¬ *M02.39*
- ¬
- - *M13*
- - Gonorrhée avec *A54.4†, M01.39**
- - Maladie de Caisson avec *T70.3†, M14.89**

Arthritique
- Épidémique ¬ Érythème *A25.1*
- ¬ Purpura *D69.0†, M36.4**

Arthritis
- Mutilans psoriatica ¬ *L40.5†, M07.19**
- Urethritica [syndrome de Reiter] ¬ *M02.39*

Arthrodèse ¬
- Guérison osseuse retardée après fusion ou *M96.82*
- Pseudarthrose après fusion ou *M96.0*
- Status post *Z98.1*

Arthrogrypose
v.a. adduction-arthrogrypose
- Congénital multiple
- - Neurogénique ¬ *Q74.3*
- - ¬ *Q74.3*
- Distal type
- - 1 ¬ *Q68.8*
- - 2B ¬ *Q68.8*
- - 4 ¬ *Q68.8*
- - 5 ¬ *Q68.8*
- - 5D ¬ *Q68.8*
- - 6 ¬ *Q68.8*
- - 7 ¬ *Q68.8*
- Insuffisance rénale-cholestase ¬ Syndrome d' *Q89.7*
- Multiple congénitale myogénique autosomique récessive ¬ *Q74.3*

Arthrogryposique ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Arthrolithe du genou ¬ *M23.4*

Arthromyodysplasia congenita ¬ *Q74.3*

Arthro-ophtalmoplégie héréditaire progressive ¬ *Q87.0*

Arthro-ostéodysplasie ¬ Syndrome de: onycho- *Q87.2*

Arthropathie
v.a. Cranio-ostéo-arthropathie
- Charcot
- - Cours de syphilis ¬ *A52.1†, M14.69**
- - Diabétique ¬ *E14.60†, M14.69**
- - ¬ *G98†, M14.69**
- Chronique post-rhumatismale [Jaccoud] ¬ *M12.0*
- Cours
- - Acromégalie ¬ *E22.0†, M14.59**
- - Amylose ¬ *E85.9†, M14.49**
- - Endocardite infectieuse ¬ *I33.0†, M03.69**
- - Entérite régionale ¬ *K50.9†, M07.49**
- - Érythème
- - - Noueux ¬ *L52†, M14.89**
- - - Polymorphe ¬ *L51.9†, M14.89**
- - Hémochromatose ¬ *E83.1†, M14.59**
- - Hémoglobinopathie NCA ¬ *D58.2†, M36.3**
- - Hémophilie NCA ¬ *D66†, M36.2**
- - Histiocytose maligne ¬ *C96.8†, M36.1**
- - Hyperthyroïdie ¬ *E05.9†, M14.59**
- - Hypothyroïdie ¬ *E03.9†, M14.59**
- - Leucémie NCA ¬ *C95.90†, M36.1**
- - Maladie
- - - Crohn ¬ *K50.9†, M07.49**
- - - Endocrinien
- - - - Nutritionnelles et métaboliques ¬ *M14.5**
- - - - ¬ *E34.9†, M14.59**
- - - Métabolique NCA ¬ *E88.9†, M14.59**
- - - Précisées classées ailleurs ¬ *M14.8**
- - - Sang NCA ¬ *D75.9†, M36.3**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *M14**
- - Myélome multiple ¬ *C90.00†, M36.1**
- - Plasmocytome
- - - Rémission complète ¬ *C90.01†, M36.1**
- - - ¬ *C90.00†, M36.1**
- - Purpura de Schoenlein-Henoch ¬ *D69.0†, M36.4**
- - Réactions d'hypersensibilité classées ailleurs ¬ *M36.4**
- - Syphilis tardive ¬ *A52.7†, M03.19**
- - Syringomyélie ¬ *G95.0†, M14.69**
- - Thyréotoxicose ¬ *E05.9†, M14.59**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.0†, M36.1**
- Diabétique NCA ¬ *E14.60†, M14.29**
- Goutte au cours de drépanocytose ¬ *D57.8†, M14.09**
- Goutteux
- - Cours de syndrome de Lesch-Nyhan ¬ *E79.1†, M14.09**
- - Déficit enzymatique et autres troubles héréditaires ¬ *M14.0**
- Inflammatoire SAI ¬ *M13.9*
- Lors
- - Entérite infectieuse ¬ *A09.0*
- - État alimentaire carencé ¬ *E63.9†, M14.59**

Arthropathie *–suite*
- Microcristaux
- - Cours
- - - Hyperparathyroïdie ¬ *E21.3†, M14.19**
- - - Troubles métaboliques classés ailleurs ¬ *M14.1**
- - Précisés ¬ Autres *M11.8*
- - Sans précision ¬ *M11.9*
- - ¬ Autres *M11*
- Neuropathique
- - Diabète sucré ¬ *E14.60†, M14.69**
- - Tabique ¬ *A52.1†, M14.69**
- - ¬ *M14.6**
- Non syphilitique de Charcot NCA ¬ *G98†, M14.69**
- Post-infectieux
- - Cours
- - - Entérite à Yersinia enterocolitica ¬ *A04.6†, M03.29**
- - - Hépatite virale NCA ¬ *B19.9†, M03.29**
- - ¬ *B99†, M03.29**
- Progressive ¬ Dysplasie spondylo-épiphysaire avec *Q77.7*
- Psoriasique
- - Distale interphalangienne ¬ *L40.5†, M07.09**
- - ¬ *L40.5†, M07.39**
- Rubéole ¬ *B06.8†, M01.49**
- SAI ¬ *M25.9*
- Sarcoïdose ¬ *D86.8†, M14.89**
- Spécifique
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *M12.8*
- - ¬ Autres *M12*
- Syphilitique
- - Charcot ¬ *A52.1†, M14.69**
- - Congénitale tardive ¬ *A50.5†, M03.19**
- - Déformante ¬ *A52.1†, M14.69**
- - ¬ *A52.1†, M14.69**
- Syringomyélique de Charcot ¬ *G95.0†, M49.49**
- Tabétique ¬ *A52.1†, M14.69**
- Tabique de Charcot ¬ *A52.1†, M14.69**
- Transitoire ¬ *M12.8*
- Traumatique ¬ *M12.5*
- ¬ Nodosités
- - Bouchard (avec *M15.2*
- - Heberden (avec *M15.1*

Arthroplastie
- Digitale ¬ *Z96.68*
- Métatarsophalangienne du gros orteil ¬ *Z96.68*

Arthropodes
- Non classées ailleurs ¬ Autres fièvres virales transmises par des *A93*
- Sans précision ¬
- - Encéphalite virale transmise par des *A85.2*
- - Fièvre virale transmise par des *A94*

Arthropodes *–suite*

- ¬
- - Effet toxique: Venin d'autres *T63.4*
- - Fièvres virales précisées, transmises par des *A93.8*
- - Infestations par *B88.2*
- - Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les *Z24.1*

Arthrose

- Cours d'alcaptonurie ¬ *E70.2†, M36.8**
- Érosive ¬ (Ostéo) *M15.4*
- Genou] ¬ Gonarthrose [*M17*
- Hanche] ¬ Coxarthrose [*M16*
- Interépineuse [Maladie de Baastrup] ¬ *M48.2*
- Lipoïde ¬ Dermato- *M14.3**
- Mention de plus d'une localisation ¬ *M15*
- Ostéoarthrite vertébrale ¬ *M47*
- Post-traumatique
- - Articulations ¬ *M19.1*
- - Premier articulation carpo-métacarpien
- - - Bilatérale ¬ *M18.2*
- - - SAI ¬ *M18.3*
- - - Unilatérale ¬ *M18.3*
- - SAI ¬ *M19.1*
- Post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne ¬ Autres *M18.3*
- Précisées ¬ Autres *M19.8*
- Premier articulation carpo-métacarpien
- - Sans précision ¬ *M18.9*
- - ¬ *M18*
- Primaire
- - Articulations ¬ *M19.0*
- - Généralisée ¬ (Ostéo) *M15.0*
- - Premier articulation carpo-métacarpien
- - - Bilatérale ¬ *M18.0*
- - - SAI ¬ *M18.1*
- - - Unilatérale ¬ *M18.1*
- - - ¬ Autres *M18.1*
- - SAI ¬ *M19.0*
- Sans précision ¬ *M19.9*
- Secondaire
- - Multiple ¬ *M15.3*
- - Premier articulation carpo-métacarpien
- - - Bilatérale ¬ Autres *M18.4*
- - - SAI ¬ *M18.5*
- - - Unilatérale ¬ *M18.5*
- - - ¬ Autres *M18.5*
- - SAI ¬ *M19.2*
- - ¬ Autres *M19.2*
- ¬ Autres *M19*

Articulaire
v.a. ostéo-articulaire

- Aigu
- - Atteinte cardiaque ¬ Rhumatisme *I01*

Articulaire *–suite*

- Aigu *–suite*
- - Sans mention d'atteinte cardiaque ¬ Rhumatisme *I00*
- - ¬ Présence d'une insuffisance cardiaque gauche au cours de rhumatisme *I01.8*
- Anomalies osseuses de la face ¬ Syndrome de camptodactylie-raideur *Q87.0*
- Articulation
- - Cheville ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.06*
- - Coude ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.01*
- - Épaule ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.00*
- - Genou ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.05*
- - Hanche ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.04*
- - Poignet ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.03*
- - Précisées ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.08*
- Charcot ¬ Syphilis *A52.1†, M14.69**
- Clavicule ¬ Tumeur
- - Bénigne des os et du cartilage *D16.72*
- - Maligne des os et du cartilage *C41.32*
- Contracture ¬ Raideur *M24.5*
- Côté ¬ Tumeur
- - Bénigne des os et du cartilage *D16.70*
- - Maligne des os et du cartilage *C41.30*
- Disque intervertébral ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.07*
- Évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)- *M08.3*
- Genou ¬
- - Déchirure récente du cartilage *S83.3*
- - Souris *M23.4*
- Interne ¬
- - Complication mécanique d'une prothèse *T84.0*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse *T84.5*
- Limitation
- - Complète des mouvements ¬ Raideur *M25.69*
- - Partielle des mouvements ¬ Raideur *M25.69*
- Mâchoire ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.08*
- Membre
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: Os et cartilage *C40.9*
- - ¬ Tumeur malign
- - - Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage *C40.8*
- - - Os et du cartilage *C40*
- Non classé ¬
- - Affections *M25*
- - Raideur *M25.6*

Articulaire *–suite*

- Orthopédique
- - Partiel) (total) ¬ Présence d'un implant *Z96.6*
- - Sans précisions ¬ Présence d'autres prothèses *Z96.68*
- Pianiques ¬ Nodules juxta- *A66.7*
- Plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse *M96.6*
- Précisées ¬ Autres affections *M25.8*
- Purulente ¬ Maladie *M00.99*
- Récidivantes ¬ Luxation et subluxation *M24.4*
- Sans précision ¬
- - Affection
- - - *M24.9*
- - - *M25.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Os et cartilage *D16.9*
- - - Maligne: Os et cartilage *C41.9*
- Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur maligne des os et du cartilage *C41*
- Spécifique
- - Non classées ailleurs ¬ Autres affections *M24.8*
- - ¬ Autres affections *M24*
- Sternum ¬ Tumeur
- - Bénigne des os et du cartilage *D16.71*
- - Maligne des os et du cartilage *C41.31*
- Tendon (gaine) ¬ Kyste *M67.4*
- Tête radiale ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.02*
- Tuberculeux ¬
- - Abcès *A18.0†, M01.19**
- - Gonflement *A18.0†, M01.19**
- - Synovite *A18.0†, M01.19**
- ¬
- - Ankylose *M24.6*
- - Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- *M08.4*
- - Atteintes du cartilage *M24.1*
- - Chondromatose *D48.0*
- - Dégénérescence des facettes *M47*
- - Douleur *M25.5*
- - Epanchement *M25.4*
- - Fistule *M25.1*
- - Gonorrhée *A54.4†, M01.39**
- - Hyperlaxité *M25.2*
- - Instabilités *M25.3*
- - Ostéophyte à la facette *M47.99*
- - Pian avec lésion *A66.6†, M14.89**
- - Présence d'une prothèse *Z96.68*
- - TBC [Tuberculose] *A18.0†, M01.19**
- - Tumeur
- - - Bénigne des os et du cartilage *D16*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage *D48.0*

Articulaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage *C41.8*

Articulation
- Acromio-claviculaire ¬
- - *T84.10*
- - Entorse et foulure de l' *S43.5*
- - Luxation de l' *S43.1*
- Atlanto
- - Axiale ¬ *S13.4*
- - Occipitale ¬ *S13.4*
- Basale du gros orteil ¬ *T84.08*
- Capsule SAI ¬
- - Arrachement de *T14.3*
- - Déchirure traumatique de *T14.3*
- - Entorse de *T14.3*
- - Foulure de *T14.3*
- - Hémarthrose traumatique de *T14.3*
- - Lacération de *T14.3*
- - Rupture traumatique de *T14.3*
- - Subluxation traumatique de *T14.3*
- Carpienne ¬ Entorse et foulure du poignet: (*S63.51*
- Carpo-métacarpien
- - Bilatéral ¬ Arthrose
- - - Post-traumatique de la première *M18.2*
- - - Primaire de la première *M18.0*
- - - Secondaires de la première *M18.4*
- - SAI ¬ Arthrose
- - - Post-traumatique de la première *M18.3*
- - - Primaire de la première *M18.1*
- - - Secondaire de la première *M18.5*
- - Sans précision ¬ Arthrose de la première *M18.9*
- - Unilatéral ¬ Arthrose
- - - Post-traumatique de la première *M18.3*
- - - Primaire de la première *M18.1*
- - - Secondaire de la première *M18.5*
- - ¬
- - - Arthrose
- - - - Post-traumatiques de la première *M18.3*
- - - - Première *M18*
- - - - Primaires de la première *M18.1*
- - - - Secondaires de la première *M18.5*
- - - Entorse et foulure du poignet: (*S63.53*
- - - Luxation du poignet: (*S63.04*
- Charcot ¬ Tabo-paralysie avec *A52.1†, M14.69**
- Cheville ¬
- - *T84.16*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.06*
- Chondro-costales [Tietze] ¬ Syndrome des *M94.0*

Articulation *–suite*
- Coude ¬
- - *T84.11*
- - Amputation traumatique à dans l' *S58.0*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.01*
- Cubito-humérale ¬ *S53.1*
- Doigt ¬
- - *T84.08*
- - Kyste mucoïde à l' *M67.44*
- Dysmorphie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-épilepsie-contracture progressive des *Q87.8*
- Épaule
- - Articulation gléno-humérale] ¬ Luxation de l' *S43.0*
- - ¬
- - - *T84.10*
- - - Amputation traumatique de l' *S48.0*
- - - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.00*
- - - Empyème de l' *M00.97*
- - - Entorse et foulure de l' *S43.4*
- - - Infection
- - - - *M00.91*
- - - - Consécutive à une endoprothèse de l' *T84.5*
- - - Lésion labrum
- - - - *S43.4*
- - - - Atteinte dégénérative de l' *M75.6*
- - - Tuberculose de l' *A18.0†, M01.11**
- Extrémité, n.c.a. ¬ Absence congénitale d'une *Q74.8*
- Genou ¬
- - *T84.15*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.05*
- - Hémarthrose
- - - Non traumatique de l' *M25.06*
- - - Traumatique de l' *S80.0*
- - Inflammation tuberculeuse de l' *A18.0†, M01.16**
- - TBC [Tuberculose] de l' *A18.0†, M01.16**
- Gléno huméral
- - SAI ¬ Luxation de l'épaule [*S43.00*
- - ¬ Luxation de l'articulation de l'épaule [*S43.0*
- Hanche ¬
- - *T84.14*
- - Amputation traumatique de l' *S78.0*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.04*
- - Tuberculose de l' *A18.0†, M01.15**
- Interphalangienne ¬
- - Entorse et foulure de doigt(s): (*S63.62*
- - Luxation
- - - Doigt: (*S63.12*
- - - Orteil(s): (*S93.12*

Articulation *–suite*
- Ligament
- - Ceinture scapulaire ¬ Luxation, entorse et foulure des *S43*
- - Coude ¬ Luxation, entorse et foulure des *S53*
- - Crico
- - - Aryténoïdien(ne) ¬ *S13.5*
- - - Thyroïdien(ne) ¬ *S13.5*
- - Genou ¬ Luxation, entorse et foulure des *S83*
- - Hanche ¬ Luxation, entorse et foulure de l' *S73*
- - Niveau
- - - Cheville et du pied ¬ Luxation, entorse et foulure des *S93*
- - - Cou ¬ Luxation, entorse et foulure des *S13*
- - - Poignet et de la main ¬ Luxation, entorse et foulure d' *S63*
- - Non précis
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une *T13.2*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une *T11.2*
- - - Tronc ¬ Luxation, entorse et foulure d' *T09.2*
- - Partie non précis
- - - Cou ¬ Entorse et foulure des *S13.6*
- - - Tête ¬ Entorse et foulure de l' *S03.5*
- - Pelviens ¬ Lésions obstétricales intéressant les *O71.6*
- - Rachis lombaire et du bassin ¬ Luxation, entorse et foulure des *S33*
- - Radiocarpien ¬ Entorse et foulure du poignet: (*S63.52*
- - Tête ¬ Luxation, entorse et foulure d' *S03*
- - Thorax ¬ Luxation, entorse et foulure des *S23*
- Médiocarpienne ¬ Luxation du poignet: (*S63.03*
- Médiotarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (*S93.32*
- Métacarpo-phalangien
- - Interphalangienne ¬ Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des *S63.4*
- - ¬
- - - Entorse et foulure de doigt(s): (*S63.61*
- - - Luxation du doigt: (*S63.11*
- Métatarsophalangienne ¬ Luxation d'un (des) orteil(s): (*S93.11*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Luxation et subluxation pathologiques d'une *M24.3*
- - Précis
- - - Main ¬ Entorse et foulure d' *S63.7*
- - - ¬ Luxation partie non précis pied
- - - - Métatarsien (os), *S93.34*
- - - - Os) carpe, *S93.31*

Articulation *–suite*
- Orthopédiques ¬ Présence d'implants d' *Z96.6*
- Plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation ¬ Contracture (flexion) (de l' *T87.6*
- Poignet ¬
- - *T84.12*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.03*
- Précisées ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: autres *T84.08*
- Radiocarpienne ¬ Luxation du poignet: (*S63.02*
- Radio-cubitale ¬ Luxation du poignet: (*S63.01*
- Radio-humérale ¬ *S53.0*
- S
- - Interphalangienne(s) ¬ *S93.5*
- - Métatarsophalangienne(s) ¬ *S93.5*
- Sacro-iliaque
- - Congénital ¬
- - - Fusion de l' *Q74.2*
- - - Malformation de: *Q74.2*
- - Sacro-coccygienne ¬ Luxation des *S33.2*
- - ¬
- - - *T84.14*
- - - Entorse et foulure de l' *S33.6*
- - - Tuberculose de l' *A18.0†, M49.08**
- Sterno-claviculaire ¬
- - *T84.10*
- - Entorse et foulure de l' *S43.6*
- - Luxation de l' *S43.2*
- - Tuberculose de l' *A18.0†, M01.11**
- Talo-crurale ¬ Syndrome d'empiètement de l' *M24.87*
- Tarsométatarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (*S93.33*
- Temporo-mandibulaire
- - Ligament) ¬ *S03.4*
- - ¬
- - - *S03.0*
- - - *T84.08*
- - - Dysfonctionnement de l' *K07.6*
- - - Lésions de l' *K07.6*
- - - Syndrome de dysfonctionnement douloureux de l' *K07.6*
- Tibio-péronier
- - Supérieure et ses ligaments ¬ *S83.6*
- - ¬ *S83.1*
- Vertébrale ¬ Ankylose d' *M43.2*
- ¬
- - Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l' *M70*
- - Arthrose
- - - Post-traumatique d'autres *M19.1*
- - - Primaire d'autres *M19.0*
- - Entorse foulure coude

Articulation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Entorse foulure coude *–suite*
- - - Humérocubitale (*S53.44*
- - - Huméroradiale (*S53.43*
- - Inflammation gonorrhéique des *A54.4†, M01.39**
- - Nœud syphilitique à proximité de l' *A52.7†, M14.89**
- - Séquelles de tuberculose des os et des *B90.2*
- - Trouble
- - - Développement (de): l' *F80.0*
- - - Fonctionnel de l' *F80.0*
- - - Spécifique de l'acquisition de l' *F80.0*
- - Tuberculose des os et des *A18.0†*

Articulation du genou
v.a. genou

Artifice ¬ Accident dû à: Corps de feu d' *W49.9!*

Arts ¬ Syndrome d' *E79.8*

Ary-épiglottique
- SAI ¬ Repli
- - *C13.1*
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- Versant
- - Hypopharyngé ¬
- - - Repli
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- - - Tumeur maligne: Repli *C13.1*
- - Laryngé ¬ Repli
- - - *C32.1*
- - - *D02.0*
- - - *D38.0*
- Zone marginal ¬ Repli
- - *C13.1*
- - *D00.0*
- - *D37.0*

Arylsulfatase
- A ¬ Déficit en *E75.2*
- B ¬ Déficit en *E76.2*

Aryténoïdien(ne) ¬ Articulation (ligament): crico- *S13.5*

Arythmie
- Atriale ¬ *I49.8*
- Cardiaque
- - Néonatale ¬ *P29.1*
- - Précisées ¬ Autres *I49.8*
- - SAI ¬ *I49.9*
- - Sans précision ¬ *I49.9*
- - ¬ Autres *I49*
- Complet
- - Cours d'une fibrillation auriculaire ¬ *I48.9*
- - Intermittente ¬ *I48.9*

Arythmie *–suite*
- Complet *–suite*
- - ¬ *I48.9*
- Extrasystolique ¬ *I49.4*
- Fibrillation
- - Auriculaire ¬ *I48.9*
- - ¬ *I48.9*
- Nœud atrio-ventriculaire ¬ *I49.8*
- Ventriculaire de réentrée ¬ *I47.0*

Arythmogène
- CVDA] ¬ Cardiomyopathie ventriculaire droite *I42.80*
- Familiale isolée ¬ Dysplasie ventriculaire droite *I42.80*
- ¬
- - Dysplasie ventriculaire droite *I42.80*
- - Syndrome d'hyperkératose palmoplantaire-cardiomyopathie *Q87.8*

Asbestose ¬
- *J61*
- Plaque pleural
- - *J92.0*
- - Sans *J92.9*

Ascaridiase
- Complication
- - Intestinales ¬ *B77.0†, K93.8**
- - ¬ *B77.8*
- Sans précision ¬ *B77.9*
- ¬ *B77*

Ascaridiose ¬ *B77*

Ascaridose ¬
- Pneumonie au cours de l' *B77.8†, J17.3**
- Pneumopathie au cours de l' *B77.8†, J17.3**

Ascaris ¬
- Infection à *B77*
- Pneumonie à *B77.8†, J17.3**

Ascendant
- Aiguë ¬ myélite *G04*
- Héréditaire ¬ Paralysie spastique infantile *G12.2*
- Nécrosante sub-aiguë ¬ Myélite *G37.4*
- ¬
- - Angiocholite: *K83.0*
- - Anomalie de l'aorte *Q25.4*
- - Lésion traumatique du côlon: Côlon *S36.51*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Côlon *D12.2*
- - - Maligne: Côlon *C18.2*

Ascher ¬ Syndrome d' *Q87.0*

Ascite
v.a. néphroblastomatose-ascite
- Chyleuse ¬ *I89.8*
- Fœtus
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- - ¬ Dystocie due à: *O66.3*
- Gélatineuse ¬ *C78.6*

Ascite *–suite*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3*
- ¬ *R18*

Ascorbique ¬ Carence en acide *E54*

ASD
- Type
- - Ostium secundum ¬ *Q21.1*
- - Sinus coronaire ¬ *Q21.1*
- ¬ *Q21.1*

Aseptique
- Condyles huméraux ¬ Nécrose *M92.0*
- Idiopathique ¬ Ostéonécrose *M87.0*
- Nouveau-né ¬ Myocardite *B33.2†, I41.1**
- Pancréas ¬ Nécrose: *K86.8*
- Semi-lunaire ¬ Nécrose *M92.2*
- ¬
- - Maladie due au VIH avec méningite *B20, G03.0*
- - Mesures insuffisantes de précautions *Y69!*
- - Péritonite: *T81.6*

Asherman ¬ Syndrome d' *N85.6*

Asiatique
- Influenza virus
- - Grippe
- - - Aviaire identifié ¬ Grippe *J09, U69.21!*
- - - Porcine identifié ¬ Grippe *J09, U69.20!*
- - Influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe *J10.1*
- ¬
- - Fièvre russo- *A77.2*
- - Schistosomiase *B65.2*

Asie
- Centrale ¬ Fièvre hémorragique d' *A98.0*
- Sud-Est ¬ Ovalocytose de l' *D58.1*

Asocial
- Sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: comportement *Z03.2*
- ¬ Personnalité: *F60.2*

Asomatognosie ¬ *R29.5*

Aspartate
v.a. glutamate-aspartate
- Aminotransférase ¬ Taux anormal d' *R74.8*

Aspartoacylase ¬ Déficit en *E75.2*

Aspartylglucosaminidase ¬ Déficit en *E77.1*

Aspartylglucosaminurie ¬ *E77.1*

Aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l' *Q87.0*

Asperger ¬ Syndrome d' *F84.5*

Aspergillaire du poumon ¬ Abcès *B44.1*

Aspergillome ¬ *B44*

Aspergillose
- Amygdales ¬ *B44.2†, J99.8**
- Amygdalienne ¬ *B44.2*
- Broncho-pulmonaire
- - Allergique ¬ *B44.1†, J99.8**

Aspergillose *–suite*
- Broncho-pulmonaire *–suite*
- - ¬ *B44.1*
- Disséminée ¬ *B44.7*
- Généralisée ¬ *B44.7*
- Invasif
- - Pneumonie ¬ *B44.0†, J17.2**
- - Poumon ¬ *B44.0†, J99.8**
- Pneumonie ¬ *B44.1†, J17.2**
- Pulmonaire
- - Invasive ¬ *B44.0*
- - ¬ *B44.1†, J99.8**
- Sans précision ¬ *B44.9*
- ¬
- - *B44*
- - Formes d' *B44.8*
- - Otite externe au cours de *B44.8†, H62.2**
- - Otomycose au cours d' *B44.8†, H62.2**

Aspergillus
- Clavatus ¬ Alvéolite due à *J67.4*
- ¬
- - Amygdalite à *B44.2†, J99.8**
- - Aortite à *B44.8†, I79.1**
- - Bronchiolite à *B44.1†, J99.8**
- - Bronchite à *B44.1†, J99.8**
- - Bronchopneumonie à *B44.1†, J17.2**
- - Duodénite à *B44.8†, K93.8**
- - Endocardite à *B44.8†, I39.8**
- - Entérite à *B44.8†, K93.8**
- - Gastrite à *B44.8†, K93.8**
- - Hypersensibilité à l'extrait d' *T78.4*
- - Iléite à *B44.8†, K93.8**
- - Jéjunite à *B44.8†, K93.8**
- - Méningite à *B44.8†, G02.1**
- - Myocardite à *B44.8†, I41.2**
- - Néphrite à *B44.8†, N08.0**
- - Œsophagite à *B44.8†, K23.8**
- - Péricardite à *B44.8†, I32.1**
- - Prostatite à *B44.8†, N51.0**
- - Thyroïdite à *B44.8†, E35.0**
- - Trachéo-bronchite à *B44.1†, J99.8**

Asphyxiante Jeune ¬
- Dysplasie thoracique *Q77.2*
- Dystrophie thoracique *Q77.2*

Asphyxie
- Blanche ¬ *P21.0*
- Bleue ¬ *P21.1*
- Corps étranger ¬ *T17*
- Fœtale ou intra-utérine ¬ *P20*
- Indice Apgar minute
- - 0 et 3 ¬ *P21.0*
- - 4 et 7 ¬ *P21.1*
- Obstétrical
- - Grave ¬ *P21.0*

Asphyxie *–suite*
- Obstétrical *–suite*
- - Légère ou modérée ¬ *P21.1*
- - Sans précision ¬ *P21.9*
- - ¬ *P21*
- SAI ¬ *P21.9*
- ¬
- - *R09.0*
- - *T71*

Aspirateur
- Sans précision ¬ Dépendance (de longue durée) envers: *Z99.0*
- ¬ Dépendance long durée envers
- - *Z99.0*

Aspiration
- Aliments (régurgités) ¬ Pneumonie par *J69.0*
- Anesthésie
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Pneumonie
- - - - *O29.0*
- - - - Chimique d' *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ Pneumonie
- - - - *O89.0*
- - - - Chimique d' *O89.0*
- - - Travail accouchement ¬ Pneumonie
- - - - *O74.0*
- - - - Chimique d' *O74.0*
- - ¬ Pneumonie chimique d' *J95.4*
- Canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une *R13.1*
- Lait ¬ Pneumonie par *J69.0*
- Liquor (amnii) ¬ *P24.1*
- Néonatal
- - Lait et d'aliments régurgités ¬ *P24.3*
- - Liquide amniotique et de mucus ¬ *P24.1*
- - Méconium ¬ *P24.0*
- - Sang ¬ *P24.2*
- SAI ¬
- - Pneumonie par *J69.0*
- - Pneumopathie néonatale d' *P24.9*
- Sans précision ¬ Syndrome néonatal d' *P24.9*
- Sécrétions gastriques ¬ Pneumonie par *J69.0*
- Vomissements ¬ Pneumonie par *J69.0*
- ¬
- - *X59.9!*
- - Pneumonie néonatale résultant d'une *P24*
- - Syndrome néonatal
- - - *P24*
- - - *P24.8*

Asplénie
- Congénital
- - Familiale isolée ¬ *Q89.01*

Asplénie *–suite*
- Congénital *–suite*
- - ¬ *Q89.01*
- Polysplénie ¬ Isomérisme des auricules cardiaques avec *Q20.6*
- Post-chirurgicale ¬ *D73.0*

Assistance
- Cardiaque ¬ Adaptation et manipulation d'un système d' *Z45.02*
- Cardio-vasculaire ¬ Présence d'un autre système d' *Z95.80*
- Domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d' *Z74.2*
- Minime ou sans assistance ¬ cas avec *O80*
- Soins d'hygiène ¬ Difficultés liées à: besoin d' *Z74.1*
- ¬ cas avec assistance minime ou sans *O80*

Assistée ¬ Autres méthodes de fécondation *Z31.3*

Associant
- Hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome *O14.2*
- Tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme *F95.2*

Association
- CHARGE] ¬ Syndrome CHARGE [*Q87.8*
- Dérivés ¬ *T38.5*
- Ligaments (latéraux) (croisés) ¬ Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en *S83.7*
- Maladies infectieuses ¬ Nécessité d'une vaccination contre d'autres *Z27.8*
- MURCS ¬ *Q87.8*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Anti-épileptiques en *T42.5*
- Partie corps ¬
- - Amputation traumatique avec d'autres *T05.8*
- - Écrasement d'autres *T04.8*
- - Fractures avec d'autres *T02.8*
- - Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres *T00.8*
- - Luxations, entorses et foulures avec d'autres *T03.8*
- - Plaies ouvertes avec d'autres *T01.8*
- Pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l' *U81.6!*
- Tout niveau] ¬ Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute *T05.6*
- VACTERL ¬ *Q87.2*

Associé
- Accouchement
- - Avant terme ¬ Ictère
- - - Néonatal *P59.0*
- - - Retard de la glycuronoconjugaison *P59.0*
- - Sans précision ¬ Mastopathies *O92.2*

Associé *–suite*
- Accouchement *–suite*
- - ¬
- - - Abcès du sein *O91.1*
- - - Crevasses du mamelon *O92.1*
- - - Infection
- - - - Mamelon *O91.0*
- - - - Mammaires *O91*
- - - Invagination du mamelon *O92.0*
- - - Mastite non purulente *O91.2*
- - - Mastopathies et anomalies de la lactation *O92*
- Afibrinogénémie ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) *O67.0*
- AKT2 ¬ Lipodystrophie partielle familiale *E88.1*
- Alpha-B cristalline ¬ Myopathie distale tardive *G71.0*
- ANCA ¬ Vascularite *I77.6*
- Anomalie
- - Chromosomique isolée del(5q) ¬ Syndrome myélodysplasique *D46.6*
- - Congénital
- - - Trompes ¬ *N97.1*
- - - Utérus ¬ *N97.2*
- - Facteur
- - - I ¬ Déficit immunitaire *D84.1*
- - - ¬ Déficit immunitaire *D84.1*
- - Jonction
- - - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - Majeur
- - - Précisées ¬ Déficit immunitaire *D82.8*
- - - Sans précision ¬ Déficit immunitaire *D82.9*
- - - ¬ Déficit immunitaire *D82*
- - Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- Anovulation ¬ Stérilité *N97.0*
- Antibiotique
- - Selon l'anamnèse personelle ¬ Colite *Z86.1*
- - ¬ Entérite, colite ou entérocolite *A04.79*
- Antigène
- - HBs ¬ Hépatite *B18.19*
- - ¬ Hépatite *B18.19*
- Asthme bronchique ¬ Les affections mentionnées, *J44*
- Ataxie héréditaire ¬ Neuropathie *G60.2*
- Baisse de la température ambiante ¬ Hypothermie, non *R68.0*
- Brièveté de la gestation ¬ Hypoplasie pulmonaire *P28.0*

Associé *–suite*
- Bronches [lymphome BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes *C88.4*
- Brûlure ¬
- - Calcification et ossification de muscles *M61.3*
- - Myosite ossifiante *M61.3*
- Carence
- - Cuivre ¬ Anémie *D53.8*
- - Molybdène ¬ Anémie *D53.8*
- - Zinc ¬ Anémie *D53.8*
- CIDEC ¬ Lipodystrophie partielle familiale *E88.1*
- Coagulation intravasculaire disséminé ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) *O67.0*
- COG2 ¬ Maladie de glycosylation congénitale *E77.8*
- Contre
- - Diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination *Z27.1*
- - Plusieurs maladie infectieux
- - - Sans précision ¬ Nécessité d'une vaccination *Z27.9*
- - - ¬ Nécessité d'une vaccination *Z27*
- Coudure
- - Jonction
- - - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- Coussinet absorbant ¬ Endophtalmie *H59.8*
- Déficit
- - Glucoamylase ¬ Diarrhée chronique *E74.3*
- - Pantothénate kinase ¬ Neurodégénérescence *G23.0*
- Développement sexuel et à son orientation ¬ Problèmes psychologiques et comportementaux *F66*
- E) au HTLV-1) ¬ Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (*C91.5*
- Entéropathies ¬ Lymphome à cellules T *C86.2*
- Enthésopathies ¬ Arthrite *M08.89*
- Facteurs relevant de l'homme ¬ Stérilité de la femme *N97.4*
- Ferritine ¬ Neurodégénérescence *G23.0*
- Fluorose ¬ Taches de l'émail non *K00.3*
- Fracture luxation
- - Lésion
- - - Intracrânienne ¬ Plaie ouverte *S01*
- - - Intrathoracique ¬ Plaie ouverte *S21*
- - ¬ Plaie ouverte
- - - *S51*

Associé *–suite*

- Fracture luxation *–suite*
- - ¬ Plaie ouverte *–suite*
- - - *S61*
- - - *S71*
- - - *S81*
- Gammopathie monoclonale IgM ayant une activité anti-MAG ¬ Polyneuropathie *D47.2†, G63.1**
- GLRX5 ¬ Anémie sidéroblastique *D64.0*
- Grossesse ¬ Autres maladies non précisées *O26.88*
- Hémodialyse ¬ Amylose *E85.3*
- Hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique *D47.0*
- HPRT ¬ Hyperuricémie *E79.8*
- Hydroxylase des acides gras ¬ Neurodégénérescence *G23.0*
- Hyperfibrinolyse ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) *O67.0*
- Hypofibrinogénémie ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) *O67.0*
- IgG4 ¬
- - Aortite *I77.6*
- - Hépatopathie *K75.4*
- - Maladie
- - - Glande submandibulaire *K11.2*
- - - Rénale *N11.8*
- - Médiastinite *J98.50*
- - Pachyméningite *G03.8*
- IL10 ¬ Maladie inflammatoire de l'intestin précoce *K52.8*
- Infection ¬ Syndrome hémophagocytaire *D76.2*
- Insémination artificielle ¬ Infection *N98.0*
- Inv
- - 3)(q21q26.2) ¬ Leucémie myéloïde aiguë *C92.00*
- - 16)(p13q22) ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec éosinophiles médullaires anormaux *C92.50*
- Iso-immunisation ¬ Anasarque fœto-placentaire: non *O36.2*
- KCNQ2 ¬ Encéphalopathie épileptique *G40.4*
- KLHL9 ¬ Myopathie distale précoce *G71.0*
- KRT14 ¬ Epidermolyse bulleuse simple autosomique récessive *Q81.0*
- Kyste de la poche de Rathke ¬ Déficit hypophysaire *E23.6*

Associé *–suite*

- Lésion
- - Intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) *S31.83!*
- - Intracrânienne ¬ Plaie ouverte (toute partie de la tête) *S01.83!*
- LIPE ¬ Lipodystrophie partielle familiale *E88.1*
- Maladie
- - Cushing ¬ Hypersécrétion d'ACTH, non *E27.0*
- - Troubles classés ailleurs ¬ Facteurs psychologiques et comportementaux *F54*
- Marcoumar ¬ Hémorragie *D68.33*
- Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes *C88.4*
- Mutations somatiques de NPM1 ¬ Leucémie myéloïde aiguë *C92.00*
- Nébuline ¬ Myopathie distale précoce *G71.0*
- Obésité ¬ Syndrome d'hypoventilation *E66.29*
- Obstruction
- - Jonction
- - - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- Odorat et du goût ¬ Troubles *R43.8*
- Ostéosclérose ¬ Leucémie *D47.4*
- Ovulation induite ¬ Hyperstimulation des ovaires: *N98.1*
- Parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main ¬ Amputation traumatique *S68.3*
- Perturbation
- - Physiologiques et à des facteurs physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés *F59*
- - Psychologique ¬
- - - Hyperphagie *F50.4*
- - - Vomissements *F50.5*
- PGM3 ¬ Anomalie congénitale de la glycosylation *E77.8*
- Phospholipase A2 ¬ Neurodégénérescence *G31.88*
- PLIN1 ¬ Lipodystrophie partielle familiale *E88.1*
- PNPO ¬ Encéphalopathie épileptique néonatale *G40.8*
- Polyarthrite rhumatoïde) ¬ Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (*C91.7*
- PPARG ¬ Lipodystrophie partielle familiale *E88.1*
- Principalement à une petite taille ¬ Syndromes congénitaux malformatifs *Q87.1*
- Protéine
- - Bêta-propeller ¬ Neurodégénérescence *G23.0*
- - COASY ¬ Neurodégénérescence *G23.0*

Associé *–suite*

- Protéine *–suite*
- - Membrane mitochondriale ¬ Neurodégénérescence *G23.0*
- Psoriasis ¬ Arthrite juvénile idiopathique *L40.5†, M09.09**
- Puerpéralité non classé ¬ trouble mental comportement
- - *F53.8*
- - Légers *F53.0*
- - Sévères *F53.1*
- Reflux
- - Vésico urétéral ¬
- - - Pyélonéphrite (chronique) *N11.0*
- - - Uropathie *N13.7*
- - ¬ Pyélonéphrite non obstructive chronique *N11.0*
- Retard mental et à des mouvements stéréotypés ¬ Hyperactivité *F84.4*
- Rétention
- - Incarcération ou l'adhérence du placenta ¬ Hémorragie *O72.0*
- - Partielle du placenta ou des membranes ¬ Hémorragie *O72.2*
- Rétrécissement
- - Jonction
- - - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- Scoliose ¬
- - Absence congénitale de vertèbres sans précision ou non *Q76.4*
- - Cyphose congénitale sans précision ou non *Q76.4*
- - Hémivertèbre [hémispondylie] sans précision ou non *Q76.4*
- - Lordose congénitale sans précision ou non *Q76.4*
- - Malformation
- - - Congénital
- - - - Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non *Q76.4*
- - - - Rachis, non *Q76.4*
- - - Rachis sans précision ou non *Q76.4*
- - Platyspondylie sans précision ou non *Q76.4*
- - Synostose vertébrale congénitale sans précision ou non *Q76.4*
- - Vertèbre surnuméraire sans précision ou non *Q76.4*
- SHOX ¬ Petite taille *Q87.1*
- Spectrine ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique récessive *G11.1*
- STING ¬ Vasculopathie de l'enfant *M35.8*
- Syndrome de la selle turcique vide ¬ Déficit hypophysaire *E23.0*
- T
- - 1;22)(p13;q13) ¬ Leucémie myéloïde aiguë mégacaryoblastique *C94.20*

Associé *–suite*
- T *–suite*
- - 3;3)(q21;q26.2) ¬ Leucémie myéloïde aiguë *C92.00*
- - 6;9)(p23;q34) ¬ Leucémie myéloïde aiguë *C92.00*
- - 9;11)(p22;q23) ¬ Leucémie myéloïde aiguë *C92.00*
- - 16;16)(p13;q22) ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec éosinophiles médullaires anormaux *C92.50*
- Thyroïdite auto-immune ¬ Encéphalopathie sensible aux stéroïdes *G04.8, E06.3*
- Tissu
- - Conjonctif [Syndrome de Sharp] ¬ Maladies *M35.1*
- - Cutanés [lymphome SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes *C88.4*
- Translocation t 8
- - 16)(p11;p13) ¬ Leucémie myéloblastique aiguë *C92.00*
- - 21)(q22;q22) ¬ Leucémie myéloblastique aiguë type *C92.00*
- Traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, *K06.2*
- Trouble
- - Conduites ¬ Trouble hyperkinétique *F90.1*
- - Dépressif en F32.- ¬ Trouble des conduites en F91.- *F92.0*
- - Émotionnel en F93.- ¬ Troubles des conduites en F91.- *F92.8*
- - Névrotique en F40-F48 ¬ Troubles des conduites en F91.- *F92.8*
- Tuberculose ¬ Pneumoconiose *J65*
- Tubulinopathie ¬ Dysgyrie *Q04.3*
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ Carcinome gastrique *C16.9*
- - Lymphotrope des lymphocytes T humains ¬ Myélopathie *G04.1*
- - T-lymphotrope humain de type I ¬ Dermatite infectieuse *L30.3*
- - Vaccinal ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, *A80.0*
- VPS11 ¬ Leucodystrophie hypomyélinisante autosomique récessive *E75.2*
- ¬
- - Asthme *J45.8*
- - Sarcoïdose de localisations autres et *D86.8*
- - Toutes formes *T74.8*

Assoupissement ¬ *R40.0*

Assourdis, augmentés ou diminués ¬ Bruits cardiaques *R01.2*

Assurance ¬ inscription dans: *Z02*

Astato-myocloniques ¬ Épilepsie avec: crises *G40.4*

Asthénie
- Chronique ¬ *R53*
- Émotionnelle organique ¬ Labilité [*F06.6*
- Neurocirculatoire ¬
- - *F45.3*
- - *F45.30*

Asthénie *–suite*
- SAI ¬
- - *R53*
- Sénile ¬ *R54*

Asthénique ¬
- Syndrome *F48.0*
- Trouble de la personnalité: dépendante (*F60.7*

Asthénopie ¬ *H53.1*

Asthénozoospermie ¬ Infertilité masculine non syndromique par *N46*

Asthmatique
- Obstructif
- - Chronique ¬ bronchite: *J44*
- - SAI chronique ¬ Bronchite: *J44.8*
- SAI ¬ Bronchite *J45.9*
- ¬ État de mal *J46*

Asthme
- Allergique de cause exogène [extrinsèque] ¬ *J45.0*
- Analgésiques] ¬ Asthme non allergique médicamenteux [*J45.1*
- Associé ¬ *J45.8*
- Atopique ¬ *J45.0*
- Bronchique
- - Psychogène ¬ *F54, J45.9*
- - ¬ Les affections mentionnées, associées à l' *J44*
- Cardiaque ¬ *I50.1*
- Éosinophiles ¬ *J82*
- Grave aigu ¬ *J46*
- Intrinsèque] ¬ Asthme non allergique endogène [*J45.1*
- Non allergique
- - Endogène [asthme intrinsèque] ¬ *J45.1*
- - Médicamenteux [asthme due aux analgésiques] ¬ *J45.1*
- - ¬ *J45.1*
- Prédominance allergique ¬ *J45.0*
- Sans précision ¬ *J45.9*
- Tardif ¬ *J45.9*
- ¬
- - *J45*
- - Rhinite allergique avec *J45.0*
- - Rhume des foins avec *J45.0*

Astigmatisme ¬ *H52.2*

Astley-Kendall ¬ Dysplasie type *Q77.3*

Astragale
- Diaz] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.6*
- Vertical ¬ *Q66.8*
- ¬
- - *S92.1*
- - *S93.0*
- - Fracture de l' *S92.1*

Astringents et détergents locaux ¬ Intoxication: *T49.2*

Astroblastome ¬ *C71.9*

Astrocytome
- Anaplasique ¬ *C71.9*
- Diffus ¬ *C71.9*
- Pilocytique ¬ *C71.9*
- Sous-épendymaire à cellules géantes ¬ *D43.2*
- ¬ *C71.9*

Asymétrie
- Facial
- - Pleurs isolée ¬ *Q18.8*
- - Strabisme-incisure du lobe de l'oreille ¬ Syndrome de retard de langage- *Q87.0*
- - ¬ *Q67.0*
- Mâchoires ¬ *K07.1*
- Mammaire ¬ *Q83.88*

Asymétrique ¬ Pied bot: *Q66.8*

Asymptomatique
- Maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG] ¬ Infection *U60.1!*
- Moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais *I25.2*
- Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Infection *Z21*
- ¬
- - Hyperuricémie *E79.0*
- - Ischémie myocardique *I25.6*
- - Peste: *A20.8*
- - Syphilis nerveuse *A52.2*

Ataxie
v.a. cataracte-ataxie-surdité
- Apraxie oculomoteur type
- - 1 ¬ Syndrome d' *G11.3*
- - 4 ¬ Syndrome d' *G11.1*
- Apraxiedéficience intellectuelle lié à l'X ¬ Syndrome d' *G11.8*
- Autosomique récessive par déficit en PEX10 ¬ *G11.8*
- Cérébelleux
- - Acquise ¬ *G31.9*
- - Alcoolique ¬ *G31.2*
- - Autosomique
- - - Dominant
- - - - Épilepsie-déficience intellectuelle par déficit de WWOX ¬ Syndrome d' *G11.1*
- - - - Surdité-narcolepsie ¬ Syndrome d' *G11.2*
- - - - ¬ *G11.8*
- - - Récessif
- - - - Adulte ¬ *G11.2*
- - - - Associée à la spectrine ¬ *G11.1*
- - - - Cécité-surdité ¬ Syndrome d' *G11.1*
- - - - Déficit en ubiquinone ¬ *G11.1*
- - - - Retard psychomoteur ¬ Syndrome d' *G11.1*
- - - - Saccade oculaire ¬ Syndrome d' *G11.8*
- - - - Type Beauce ¬ *G11.2*
- - Cours

Ataxie *–suite*
- Cérébelleux *–suite*
- - Cours *–suite*
- - - Myxœdème ¬ *E03.9†, G13.2**
- - - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G13.1**
- - Début précoce ¬ *G11.1*
- - Défaut de réparation de l'ADN ¬ *G11.3*
- - Dysplasie ectodermique ¬ Syndrome d' *G11.1*
- - Liée à l'X non progressive ¬ *G11.0*
- - Modérée et Œdème de la substance blanche ¬ Leucoencéphalopathie avec *E75.2*
- - Non progressif déficience intellectuel ¬
- - - *G11.0*
- - - Syndrome d' *G11.8*
- - Précoce
- - - Myoclonies [Ramsay-Hunt] ¬ *G11.1*
- - - Persistance des réflexes tendineux ¬ *G11.1*
- - - Tremblement essentiel ¬ *G11.1*
- - Surdité ¬ Syndrome de myoclonie- *G11.1*
- - Tardive ¬ *G11.2*
- - ¬
- - - Neurosyphilis avec *A52.1†, G99.8**
- - - Syndrome de tubulopathie proximale-diabète sucré- *Q87.8*
- Congénitale non progressive ¬ *G11.0*
- Cordon postérieur-rétinite pigmentaire ¬ Syndrome d' *G11.1*
- Déficit en vitamine E ¬ *G11.1*
- Épisodique
- - Héréditaire ¬ *G11.8*
- - Spasticité ¬ Choréoathétose dystonique paroxystique avec *G24.8*
- - Type
- - - 1 ¬ *G11.8*
- - - 3 ¬ *G11.8*
- - - 4 ¬ *G11.8*
- - - 5 ¬ *G11.8*
- - - 6 ¬ *G11.8*
- - - 7 ¬ *G11.8*
- - - 8 ¬ *G11.8*
- Friedreich (autosomique récessive) ¬ *G11.1*
- Héréditaire
- - Sans précision ¬ *G11.9*
- - ¬
- - - *G11*
- - - *G11.8*
- - - Neuropathie associée à une *G60.2*
- Mitochondriale récessive ¬ Syndrome d' *G11.8*
- Myosis congénital ¬ Syndrome d' *G11.4*
- Neuropathique sensorielle-dysarthrie-ophtalmoplégie ¬ Syndrome d' *G31.81, H49.4*
- Paroxystique familiale ¬ *G11.8*

Ataxie *–suite*
- SAI cérébelleux (cérébelleuse) héréditaire ¬ *G11.9*
- Sans précision ¬ *R27.0*
- Spastique autosomique
- - Dominante type 1 ¬ *G11.4*
- - Récessif
- - - Atrophie optique-dysarthrie ¬ Syndrome d' *G11.4*
- - - Charlevoix-Saguenay ¬ *G11.1*
- - - Leucoencéphalopathie ¬ *G11.4*
- - - Type
- - - - 4 ¬ *G11.4*
- - - - 5 ¬ *G11.4*
- Spinocérébelleuse
- - Autosomique récessif type
- - - 2 ¬ *G11.0*
- - - 6 ¬ *G11.0*
- - - 7 ¬ *G11.1*
- - - 10 ¬ *G11.2*
- - - 12 ¬ *G11.1*
- - - 15 ¬ *G11.1*
- - - 16 ¬ *G11.1*
- - - 17 ¬ *G11.1*
- - - 19 ¬ *G11.1*
- - - 20 ¬ *G11.1*
- - - 21 ¬ *G11.1†, K77.8**
- - - 23 ¬ *G11.1*
- - Dysmorphie ¬ Syndrome d' *G11.1*
- - Dystrophie cornéenne ¬ Syndrome d' *G11.8*
- - Infantile ¬ *G11.1*
- - Lié X type
- - - 3 ¬ *G11.1*
- - - 4 ¬ *G11.1*
- - Neuropathie axonale type 1 ¬ Syndrome d' *G60.2*
- - Récessive liée au chromosome X ¬ *G11.1*
- - Type
- - - 1 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 2 ¬ *G11.2*
- - - 3 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 4 ¬ *G11.2*
- - - 5 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 6 ¬ *G11.2*
- - - 7 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 8 ¬ *G11.2*
- - - 10 ¬ *G11.2*
- - - 11 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 12 ¬ *G11.2*
- - - 13 ¬ *G11.2*
- - - 14 ¬ *G11.2*
- - - 15/16 ¬ *G11.2*
- - - 17 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 18 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 19/22 ¬ *G11.2*

Ataxie *–suite*
- Spinocérébelleuse *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 20 ¬ *G11.2*
- - - 23 ¬ *G11.2*
- - - 25 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 26 ¬ *G11.2*
- - - 28 ¬ *G11.1*
- - - 29 ¬ *G11.0*
- - - 30 ¬ *G11.2*
- - - 31 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 32 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 34 ¬ *G11.2*
- - - 35 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 36 ¬ *G11.2*
- - - 37 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 38 ¬ *G11.2*
- - - 40 ¬ *G11.2*
- - - 41 ¬ *G11.2*
- - - 42 ¬ *G11.8*
- Surdité-atrophie optique-létalité ¬ Syndrome d' *E79.8*
- Télangiectasique [Louis-Bar] ¬ *G11.3*
- Type
- - Caïman ¬ *G11.0*
- - Friedreich-like ¬ *G11.1*
- - ¬
- - Anémie sidéroblastique liée à l'X avec *D64.0*
- - Cardiomyopathie avec dilatation et *E71.1†, I43.1**

Ataxique
- Polynévritique ¬ Hérédopathie *G60.1*
- - ¬
- - Démarche *R26.0*
- - Paralysie cérébrale *G80.4*

Atélectasie
- Nouveau-né, autres et sans précision ¬ *P28.1*
- Partielle ¬ *P28.1*
- Primitive du nouveau-né ¬ *P28.0*
- Résorption, sans syndrome de détresse respiratoire ¬ *P28.1*
- SAI ¬ *P28.1*
- Secondaire ¬ *P28.1*
- ¬ *J98.1*

Atélomyélie ¬ *Q06.1*

Atélostéogenèse type
- 1 ¬ *Q78.8*
- 2 ¬ *Q77.5*
- 3 ¬ *Q78.8*

Atério-veineuse de la veine de Galien ¬ Malformation *Q28.28*

Athabascan ¬ Dysgénésie du tronc cérébral type *Q87.8*

Athérome
- Artère

Athérome *–suite*
- Artère *–suite*
- - Cérébrales ¬ *I67.2*
- - Coronaires ¬ *I25.1*
- ¬ *I70*

Athéroscléreuse
- Bitronculaire ¬ Maladie *I25.12*
- Tritronculaire ¬ Maladie *I25.13*
- ¬
- - Gangrène *I70.25*
- - Rétinopathie *I70.8†, H36.8**

Athérosclérose
- Aorte ¬ *I70.0*
- Artère
- - Coronaires ¬ *I25.1*
- - Distal
- - - Non précisées ¬ *I70.29*
- - - Type
- - - - Bassin-jambe
- - - - - Douleur ischémique à l'effort, distance de marche de 200 m et plus ¬ *I70.21*
- - - - - Douleur ischémique à l'effort, distance de marche de moins de 200 m ¬ *I70.22*
- - - - - Douleurs au repos ¬ *I70.23*
- - - - - Gangrène ¬ *I70.25*
- - - - - Sans douleurs ¬ *I70.20*
- - - - - Stade IV selon Fontaine avec ulcération ¬ *I70.24*
- - - - - Ulcération ¬ *I70.24*
- - - - Épaule-bras, tous stades ¬ *I70.26*
- - - ¬ *I70.2*
- - Fémorale ¬ *I70.29*
- - Rénale ¬ *I70.1*
- - Sous-clavière ¬ *I70.26*
- - ¬ *I70.8*
- Cardio-vasculaire, décrite ainsi ¬ *I25.0*
- Cérébrale ¬ *I67.2*
- Extrémité
- - Inférieure ¬ *I70.29*
- - ¬ *I70.29*
- Généralisée et sans précision ¬ *I70.9*
- Membre inférieur ¬ *I70.29*
- Mésentérique ¬ *K55.1*
- Périphérique ¬ *I70.29*
- ¬
- - *I70*
- - Gangrène par *I70.2*

Athetotique ¬ Parésie cérébrale *G80.3*

Athlète ¬ Pied d' *B35.3*

Athyréose ¬ *E03.1*

Atkin-Flaitz ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Atlanto
- Axiale ¬ Articulation: *S13.4*
- Occipitale ¬ Articulation: *S13.4*

Atlas ¬
- *S12.0*
- Fracture de l' *S12.0*

Atloïdo axoïdien
- Myélopathie ¬ Subluxation récidivante *M43.3*
- Récidivantes ¬ Autres subluxations *M43.4*

Atmosphérique
- Ambiant
- - Eau ¬ Effets sur l'oreille des changements de la pression *T70.0*
- - ¬ Effets sur les sinus des changements de la pression *T70.1*
- Élevé basse
- - Changement de pression atmosphérique ¬ Exposition à une pression *W94!*
- - Sans relation avec les conditions météorologiques) ¬ Exposition à une pression *W94.9!*
- Pression eau
- - Sans précision ¬ Effet de la pression *T70.9*
- - ¬ effet pression
- - - *T70*
- - - *T70.8*
- ¬
- - Accident dû à un changement de pression *W94.9!*
- - Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression *W94!*

Atonie
- Côlon ¬ *K59.8*
- Intestinale ¬ médicaments pour l' *T47.4*
- Utérine) SAI ¬ Hémorragie (du): post-partum (*O72.1*
- Vésicale ¬ *G95.81*

Atonique
- Motrice) (sensorielle) ¬ Vessie neurogène: *N31.2*
- ¬ Crises non spécifiques: *G40.3*

Atopique
- Aiguë ¬ Conjonctivite *H10.1*
- Endogène
- - Sans précision ¬ Dermite *L20.9*
- - ¬ Autres dermites *L20.8*
- ¬
- - Asthme: *J45.0*
- - Kératoconjonctivite *H16.2*
- - Névrodermite: *L20.8*

ATP-binding cassette A1 ¬ Déficit du transporteur à *E78.6*

Atransferrinémie congénitale ¬ *E88.0*

Atrésie
- Anal
- - Malformation génito-urinaire ¬ Syndrome de dysostose spondylocostale- *Q87.8*
- - Uropathie ¬ Syndrome de cataracte-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Aorte ¬ *Q25.2*

Atrésie *–suite*
- Aortique congénitale ¬ *Q23.0*
- Appareil lacrymal ¬ *Q10.5*
- Artère
- - Pulmonaire ¬ *Q25.5*
- - Veine NCA ¬ *Q27.8*
- Bronches ¬ *Q32.4*
- Canal déférent ¬ *Q55.3*
- Cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Choanes
- - Microphtalmie ¬ Syndrome d'arhinie- *Q87.0*
- - Surdité-cardiopathie-dysmorphie cranio-faciale ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - ¬ *Q30.0*
- Col utérin en tant que complication de l'accouchement ¬ *O65.5*
- Côlon ¬ *Q42.9*
- Fentes de Luschka et du foramen de Magendie ¬ *Q03.1*
- Glandes ou de canaux salivaires ¬ *Q38.4*
- Larynx ¬ *Q31.8*
- Mitral
- - Congénitale ¬ *Q23.2*
- - ¬ *Q23.2*
- Multiples de l'intestin ¬ *Q43.8*
- Œsophage
- - Fistule
- - - Broncho-œsophagienne ¬ *Q39.1*
- - - Trachéo-œsophagienne ¬ *Q39.1*
- - SAI ¬ *Q39.0*
- - Sans fistule ¬ *Q39.0*
- Orifice
- - Col utérin ¬ *Q51.8*
- - Nasal (antérieur) (postérieur) ¬ *Q30.0*
- Ostiale coronaire ¬ *Q24.5*
- Portion vaginale du col utérin ¬ *Q51.8*
- Pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou *Q21.3*
- Pupille ¬ *Q13.2*
- Pylore ¬ Epidermolyse bulleuse simple avec *Q81.0*
- Rétrécissement
- - Congénitaux du conduit auditif (externe) ¬ Absence, *Q16.1*
- - Méat auditif osseux ¬ *Q16.1*
- Rhinopharynx ¬ *Q34.8*
- Sinus coronaire ¬ *Q21.1*
- Sténose
- - Congénital
- - - Anus
- - - - Fistule ¬ Absence, *Q42.2*
- - - - Sans fistule ¬ Absence, *Q42.3*
- - - Côlon
- - - - Sans précision de localisation ¬ Absence, *Q42.9*

Atrésie *–suite*
- Sténose *–suite*
- - Congénital *–suite*
- - - Côlon *–suite*
- - - - ¬ Absence, *Q42*
- - - Duodénum ¬ Absence, *Q41.0*
- - - Iléon ¬ Absence, *Q41.2*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Sans précision de localisation ¬ Absence, *Q41.9*
- - - - - ¬ Absence, *Q41*
- - - - SAI ¬ Absence, *Q41.9*
- - - Jéjunum ¬ Absence, *Q41.1*
- - - Localisation
- - - - Côlon ¬ Absence, *Q42.8*
- - - - Précisées de l'intestin grêle ¬ Absence, *Q41.8*
- - - Rectum
- - - - Fistule ¬ Absence, *Q42.0*
- - - - Sans fistule ¬ Absence, *Q42.1*
- - - Urètre et du col de la vessie ¬ Autres formes d' *Q64.3*
- - Uretère ¬ *Q62.1*
- Trachée ¬ *Q32.1*
- Trompe de Fallope ou du ligament large ¬ *Q50.6*
- Vagin ¬ Rétrécissement et *N89.5*
- Valve pulmonaire ¬ *Q22.0*
- Valvulaire aortique ¬ *Q23.0*
- Valvule tricuspide ¬ *Q22.4*
- Veines pulmonaires ¬ *Q26.3*
- Voie biliaire
- - Isolée ¬ *Q44.2*
- - ¬ *Q44.2*
- ¬ Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans *Q39.2*

Atrial
- Chaotique ¬ Tachycardie *I47.1*
- Conduction cardiaque ¬ Trouble *I45.9*
- Intervalle PR court ¬ Tachyarythmie *I45.6*
- Multifocale ¬ Tachycardie *I47.1*
- Trouble de conduction cardiaque infra-Hisienne familiales ¬ Tachyarythmie *I45.8*
- Type ostium secundum ¬ Anomalie du septum *Q21.1*
- ¬
- - Arythmie *I49.8*
- - Myxome *D15.1*
- - Tachycardie (paroxystique): *I47.1*

Atrichie congénitale ¬ *Q84.0*

Atrio-digitale type
- 1 ¬ Dysplasie *Q87.2*
- 3 ¬ Dysplasie *Q87.2*

Atrioventriculaire
- Complet

Atrioventriculaire *–suite*
- Complet *–suite*
- - Anomalies obstructives du cœur gauche ¬ Canal *Q21.2*
- - Hypoplasie ventriculaire ¬ Canal *Q21.2*
- - ¬ Canal *Q21.2*
- Partiel ¬ Canal *Q21.2*
- ¬
- - Anomalie du canal *Q21.2*
- - Communication *Q21.2*
- - Défaut complet du septum *Q21.2*
- - Syndrome de communication interauriculaire-trouble de la conduction *Q21.1*

Atrio-ventriculaire
- AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- Complet ¬ Bloc: *I44.2*
- ¬
- - Anomalie du canal *Q21.2*
- - Arythmie du nœud *I49.8*
- - Discordance ventriculo-artérielle avec concordance *Q20.3*

Atrophia gyrata chorioideae ¬ *H31.2*

Atrophiante
- Albo-papuloïde ¬ Dystrophie cutanée bulleuse *Q81.2*
- Maligne ¬ Papulose *I77.8*
- Vasculaire] ¬ Poïkilodermie généralisée type Petges-Cléjat [*L94.5*
- ¬ Acrodermatite chronique *L90.4*

Atrophie
- Acquis
- - Ovaire et de la trompe de Fallope ¬ *N83.3*
- - Utérus ¬ *N85.8*
- Bifocale choriorétinienne progressive ¬ *H35.5*
- Blanche (en plaques) ¬ *L95.0*
- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- - Déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Cérébral
- - Circonscrit ¬
- - - *G31.0*
- - - Démence au cours d' *G31.0†, F02.0**
- - Présénile ¬ Démence au cours d' *G31.88†, F02.8**
- - ¬ Syndrome de microphtalmie- *Q11.2*
- Choroïde ¬ *H31.1*
- Congénitale de la thyroïde ¬ *E03.1*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.8*
- Crête alvéolaire édentée ¬ *K08.2*
- Dentato-rubro-pallido-luysienne ¬ *G11.8*
- Dystrophie jaune du foie ¬ *K72*

Atrophie *–suite*
- Fonte musculaires, non classées ailleurs ¬ *M62.5*
- Génitale ¬ *N95.8*
- Glande
- - Lacrymale ¬ *H04.1*
- - Salivaires ¬ *K11.0*
- Globe oculaire ¬ *H44.5*
- Héréditaire du nerf optique au cours de la maladie de Leber ¬ *H47.2*
- Hypertrophie hémifaciale ¬ *Q67.4*
- Hypophyse ¬ *E23.6*
- Inactivité NCA ¬ *M62.5*
- Inanition ¬ *E45*
- Iris (essentielle) (progressive) ¬ *H21.2*
- Langue ¬ *K14.8*
- Maculaire syphilitique de la peau en stries ¬ *A52.7†, L99.8**
- Malnutrition ¬ *E45*
- Mammaire ¬ *N64.2*
- Microvillositaire congénitale ¬ *K90.8*
- Multisystématisé
- - Forme
- - - Cérébelleuse [AMS-C] ¬ *G23.3*
- - - Parkinsonne [AMS-P] ¬ *G23.2*
- - Type
- - - Cérébelleux ¬
- - - - *G23.3*
- - - - AMS-C [*G23.3*
- - - Parkinsonien ¬
- - - - *G23.2*
- - - - AMS-P [*G23.2*
- - ¬ *G23.2*
- Muqueuse buccale ¬ *K13.7*
- Muscles posturaux ¬ Myopathie liée à l'X avec *G71.0*
- Musculaire
- - Neuritique ¬ *G58.9†, M63.89**
- - Spinobulbaire de type Kennedy [Maladie de Kennedy] ¬ *G12.2*
- - Syphilitique ¬ *A52.7†, M63.89**
- Nerf
- - Optique au cours de la maladie de Leber ¬ *H47.2*
- - Périphérique ¬ *G58.9*
- Olivo-ponto-cérébelleuse ¬
- - *G23.3*
- - AOPC [*G23.3*
- Optique
- - Autosomique dominant
- - - Classique ¬ *H47.2*
- - - Kjer ¬ *H47.2*
- - - Plus ¬ *H47.2*
- - Bosch-Boonstra-Schaaf ¬ Syndrome d' *H47.2*
- - Cataracte autosomique dominante ¬ Syndrome d' *H47.2*

Atrophie *–suite*
- Optique *–suite*
- - Costeff ¬ *E71.1*
- - Cours
- - - Carence en vitamine ¬ *E56.9†, H48.0**
- - - Leucodystrophie ¬ *E75.2†, H48.0**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *H48.0**
- - Dysarthrie ¬ Syndrome d'ataxie spastique autosomique récessive- *G11.4*
- - Infantile avec chorée et paraplégie spastique ¬ *E71.1*
- - Isolée autosomique récessive ¬ *H47.2*
- - Syphilitique tardive ¬ *A52.1†, H48.0**
- - Type 3 autosomique
- - - Dominante ¬ *H47.2*
- - - Récessive ¬ *E71.1*
- - ¬
- - - *H47.2*
- - - Neurosyphilis avec *A52.1†, H48.0**
- Optique-létalité ¬ Syndrome d'ataxie-surdité- *E79.8*
- Optique-surdité-polyneuropathie-myopathie ¬ Syndrome d' *H47.2*
- Orbite ¬ *H05.3*
- Osseux
- - Sudeck-Leriche ¬ *G90.5*
- - Tabique neurogène ¬ *A52.1†, M90.29**
- Pancréas ¬ *K86.8*
- Papilles de la langue ¬ *K14.4*
- Paupière ¬ *H02.5*
- Pluriglandulaire auto-immune ¬ *E31.0*
- Prostate ¬ *N42.2*
- Rate ¬ *D73.0*
- Rénal
- - Congénitale ¬ *Q60*
- - Infantile ¬ *Q60*
- - Terminale) ¬ *N26*
- Rétino-choroïdienne paraveineuse pigmentée ¬ *H35.8*
- Sclérotique ¬ *H15.8*
- Sénile des organes génitaux ¬ *N95.8*
- Sinueuse de la choroïde et de la rétine ¬ Hyperornithinémie avec *E72.4*
- Surrénales ¬ *E27.8*
- Syphilitique
- - Congénitale du nerf optique ¬ *A50.4†, H48.0**
- - Nerf optique ¬ *A52.1†, H48.0**
- - Peau en stries ¬ *A52.7†, L99.8**
- Systémique système nerveux central cours
- - Myxœdème ¬ *E03.9†, G13.2**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G13.1**
- Temporale à droite ¬ Démence fronto-temporale, variante d' *G31.0†, F02.0**
- Testicule ¬ *N50.0*
- Thyroïde (acquise) ¬ *E03.4*
- Tunique vaginal vésicule séminal ¬

Atrophie *–suite*
- Tunique vaginal vésicule séminal ¬ *–suite*
- - Atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- Vulve ¬ *N90.5*

Atrophique
v. Type de maladie

Atrophoderma
- Maculatum
- - Striatum syphilitique ¬ *A52.7†, L99.8**
- - Syphilitique ¬ *A51.3†, L99.8**
- Vermiforme ¬ *L66.4*

Atrophodermie
- Linéaire de Moulin ¬ *L90.8*
- Pasini et Pierini ¬ *L90.3*

Attachement enfance
- Désinhibition ¬ Trouble de l' *F94.2*
- ¬ Trouble réactionnel de l' *F94.1*

Attaque de panique ¬ *F41.0*

Atteignant
- Épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte cutanée partielle *L89.1*
- Plusieurs systèmes ¬ Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés *Q87*
- Principalement l'aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux malformatifs *Q87.0*

Atteinte
- Appareil digestif après des actes médicaux, non classées ailleurs ¬ Autres *K91.88*
- Artère artérioles
- - Capillaires au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *I79.8**
- - ¬ Autres *I77*
- Cartilage articulaire ¬ Autres *M24.1*
- Disque
- - Cervical ¬
- - - *M50*
- - - *M50.8*
- - Dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés ¬ *M51*
- - Intervertébraux ¬ *M51*
- Endocriniennes ¬ Hypertension secondaire à des *I15.2*
- Fonctions vestibulaires ¬ Autres *H81.8*
- Hépatique cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ *K77.8**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *K77.0**
- Ménisque

Atteinte *–suite*
- Ménisque *–suite*
- - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Autres *M23.34*
- - - - Interne ¬ Autres *M23.31*
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Autres *M23.35*
- - - - Interne ¬ Autres *M23.32*
- - Localisations multiples ¬ Autres *M23.30*
- - Ménisque SAI ¬ Autres *M23.39*
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe ¬ Autres *M23.36*
- - - Interne ¬ Autres *M23.33*
- - ¬ Autres *M23.3*
- Musculaire
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *M63.8**
- - Précisées ¬ Autres *M62.8*
- - ¬ Autres *M62*
- Non
- - Infectieux
- - - Précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques ¬ Autres *I89.8*
- - - Vaisseaux et des ganglions lymphatiques ¬ Autres *I89*
- - Rhumatismal valvule
- - - Aortique ¬ *I35*
- - - Mitral ¬
- - - - *I34*
- - - - *I34.8*
- - - Tricuspide ¬ Autres *I36.8*
- Œsophage au cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *K23.8**
- Organe
- - Appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs ¬ *K93**
- - Digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs ¬ *K93.8**
- Péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs ¬ Autres *K67.8**
- Précis
- - Artères et artérioles ¬ Autres *I77.8*
- - Disque intervertébral ¬ Autres *M51.8*
- - Synoviale et du tendon ¬ Autres *M67.8*
- Rénales ¬ Hypertension secondaire à d'autres *I15.1*
- Sacro-coccygiennes, non classées ailleurs ¬ *M53.3*
- Sensorielles ¬ Anesthésie dissociative et *F44.6*
- Synovial tendon
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *M68.8**
- - ¬ Autres *M67*
- Systémique
- - Précisées du tissu conjonctif ¬ Autres *M35.8*

Atteinte *–suite*
- Systémique *–suite*
- - Tissu conjonctif
- - - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *M36.8**
- - - ¬ Autres *M35*
- Tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds ¬ *N14*
- Valve
- - Aortique et tricuspide, combinées ¬ *I08.2*
- - Mitral
- - - Aortique
- - - - Combinées ¬ *I08.0*
- - - - Tricuspide, combinées ¬ *I08.3*
- - - Tricuspide, combinées ¬ *I08.1*
- Valvulaire
- - Cardiaques au cours de maladies classées ailleurs ¬ Endocardite et *I39**
- - Multiples au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.4**
- Valvule
- - Aortique
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.1**
- - - ¬ Autres *I35.8*
- - Mitrale au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.0**
- - Pulmonaire
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.3**
- - - ¬ Autres *I37.8*
- - Tricuspide au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.2**
- Veineux
- - Précisées ¬ Autres *I87.8*
- - ¬ Autres *I87*
- Vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ *K87**

Attelé à un animal ¬ Accident d'équitation ou accident de véhicule *V99!*

Attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté ¬ Personne *Z75.8*

Attendu ¬ Retard de: stade de développement physiologique *R62.0*

Attente
- Famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: *Z76.2*
- Investigation et traitement ¬ Autre période d' *Z75.2*

Attention
- Hyperactivité] ¬ TDAH [trouble du déficit de l' *F90.0*
- Sans hyperactivité survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ Trouble de l' *F98.80*
- Syndrome avec hyperactivité ¬ Altération de l' *F90.0*
- Trouble avec hyperactivité ¬ Altération de l' *F90.0*

Attention *–suite*
- ¬ Perturbation de l'activité et de l' *F90.0*

Atténué
- Liée à MUTYH ¬ Polypose adénomateuse familiale *D12.6*
- ¬
- - Mucopolysaccharidose type II, forme *E76.1*
- - Polypose adénomateuse familiale *D12.6*

Attenuée
- Liée à MUTYH ¬ PAF *D12.6*
- ¬ PAF *D12.6*

Attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical *O34.30*

Attico antrale
- Chronique ¬ Maladie *H66.2*
- Suppurée ¬ Otite moyenne chronique *H66.2*

Attique ¬ Perforation du tympan, partie *H72.1*

Attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité ¬ Conseils relatifs aux *Z70*

ATTR wild type ¬ Amylose *E85.8*

Attribuable
- Lésion et une maladie cérébrales ¬ Modification durable de la personnalité non *F62*
- Syphilis ¬ Nez en selle *A50.5*

Attrition excessive des dents ¬ *K03.0*

ATTRV30M ¬ Amylose *E85.1†, G63.3**

Atypique
- BCR/ABL négative ¬ Leucémie myéloïde chronique *C92.2*
- Bénigne ¬ Épilepsie *G40.00*
- Disséminée ¬ Infection mycobactérienne *A31.80*
- Endomètre (adénomateuse) ¬ Hyperplasie *N85.1*
- Mycobacterium SAI ¬ Infection *A31.9*
- Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ Mycobactéries *U82.2!*
- Plexus choroïdes ¬ Papillome *C71.5*
- Type Alzheimer ¬ Démence *F00.2**
- Virus système nerveux central
- - Sans précision ¬ Infection *A81.9*
- - ¬ Autres infections *A81.8*
- ¬
- - Algie faciale *G50.1*
- - Anorexie mentale *F50.1*
- - Autisme *F84.1*
- - Boulimie *F50.3*
- - Coarctation aortique *Q25.1*
- - Déficit en HSD10 *G25.5*
- - Démence de type Alzheimer avec forme *G30.8†, F00.2**
- - Dépression *F32.8*
- - Endocardite verruqueuse *M32.1†, I39.8**

Atypique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Flutter auriculaire, *I48.4*
- - Lèpre
- - - Lépromateuse de type intermédiaire *A30.4*
- - - Tuberculoïde de type intermédiaire *A30.2*
- - - Type intermédiaire *A30.3*
- - Lymphome de Burkitt *C83.7*
- - Psychose infantile *F84.1*
- - Schizophrénie *F20.3*
- - Situation parentale *Z60*
- - Syndrome
- - - Familial des nævus *D48.5*
- - - Hémolytique et urémique *D58.8*
- - - Werner *E34.8*

Audiogènes ¬ Crises *G40.8*

Audiologiques ¬ Présence d'implants otologiques et *Z96.2*

Auditif
- Ancrage osseux [BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse *Z96.2*
- Anormales ¬ Autres perceptions *H93.2*
- Bruit ¬ Perte *H83.3*
- Brutale SAI ¬ Perte *H91.2*
- Canal auditif
- - Externe ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.34*
- - ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.35*
- Congénital ¬ Trouble réceptif *F80.2*
- Cours maladie
- - Infectieuse NCA ¬ Névrite du nerf *B99†, H94.0**
- - Parasitaire NCA ¬ Névrite du nerf *B89†, H94.0**
- Externe ¬
- - Abcès pavillon de l'oreille ou conduit *H60.0*
- - Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit *Q16.1*
- - Anthrax pavillon de l'oreille ou conduit *H60.0*
- - Appareil *Z97.8*
- - Carcinoma in situ: Peau de l'oreille et du conduit *D04.2*
- - Cellulite phlegmoneuse du: conduit *H60.1*
- - Exostose du conduit *H61.8*
- - Furoncle pavillon de l'oreille ou conduit *H60.0*
- - Mélanome
- - - In situ de l'oreille et du conduit *D03.2*
- - - Malin de l'oreille et du conduit *C43.2*
- - Nævus à mélanocytes de l'oreille et du conduit *D22.2*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal *S01.34*
- - Rétrécissement du conduit *H61.3*
- - Sténose acquise du conduit *H61.3*
- - Tumeur

Auditif *–suite*
- Externe ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Bénigne: Peau de l'oreille et du conduit *D23.2*
- - - Maligne: Peau de l'oreille et du conduit *C44.2*
- Implantée ¬ Ajustement et entretien d'une prothèse *Z45.3*
- Nerf crânien VIII ¬
- - Affections du nerf *H93.3*
- - Tumeur maligne: Nerf *C72.4*
- Neurosensoriel
- - Bilatéral ¬ Déficit *H90.3*
- - SAI ¬ Déficit *H90.5*
- - Unilatéral ¬ Déficit *H90.4*
- Oreille interne ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.38*
- Osselets ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.36*
- Osseux ¬ Atrésie ou rétrécissement du méat *Q16.1*
- Partie
- - Non précisée ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.30*
- - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.39*
- Pavillon de l'oreille ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.31*
- Tragus ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.33*
- Tympan ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.37*
- ¬
- - Anomalie congénitale du conduit *Q16.1*
- - Canal *T16*
- - Hallucinations *R44.0*
- - Lésion traumatique du nerf *S04.6*
- - Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.1*
- - Modification temporaire du seuil *H93.2*
- - Nerf *S04.6*
- - Plaie ouverte oreille appareil
- - - *S01.3*
- - - Auditif
- - - - Canal *S01.35*
- - - - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil *S01.39*
- - Recrutement *H93.2*
- - Syphilis
- - - Canal *A52.7†, H94.8**
- - - Nerf *A52.1†, H94.0**
- - Trouble de l'élaboration et de la perception *F80.20*

Audition
- Conduction SAI ¬ Perte de l' *H90.2*
- Neurosensorielle SAI ¬ Perte de l' *H90.5*
- Oreille ¬ Surdité

Audition *–suite*
- Oreille ¬ Surdité *–suite*
- - Neurosensorielle unilatérale sans altération de l' *H90.4*
- - Unilatéral
- - - Mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l' *H90.7*
- - - Transmission sans altération de l' *H90.1*
- Ototoxicité ¬ Perte de l' *H91.0*
- Sans précision ¬
- - Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l' *Q16.9*
- - Perte de l' *H91.9*
- - ¬
- - Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l' *Z83.5*
- - Examen des oreilles et de l' *Z01.1*
- - Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l' *Q16*
- - Neuropathie avec trouble de l' *G60.8*
- - Perte
- - - *H91*
- - - Précisées de l' *H91.8*

Augmentation
- Anticorps
- - Anti-facteur VIII ¬ Troubles hémorragiques dus à l' *D68.31*
- - Dirigés contre facteur
- - - Coagulation ¬ Troubles hémorragiques dus à l' *D68.32*
- - - Von Willebrand ¬ *D68.32*
- - Non précisés ¬ Autres troubles hémorragiques dus à l' *D68.38*
- Anti-IXa ¬ *D68.32*
- Anti-VIIIa ¬ *D68.31*
- Anti-Xa ¬ *D68.32*
- Anti-XIa ¬ *D68.32*
- Glycémie ¬ *R73*
- Immunoglobuline M [IgM] ¬ Déficit immunitaire avec *D80.5*
- Marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec *E88.22*
- Pathologique
- - Pression télédiastolique ventriculaire gauche ¬ *R94.3*
- - Taux de protéine C-réactive ¬ *R77.88*
- Taux
- - Anticorps ¬ *R76.0*
- - Immunoglobulines SAI ¬ *R76.8*
- - Transaminase et d'acide lactique déshydrogénase ¬ *R74.0*
- Urines du taux de médicaments et de substances biologiques ¬ *R82.5*

Aura
- Migraine
- - Classique] ¬ Migraine avec *G43.1*
- - Commune] ¬ Migraine sans *G43.0*

Aura *–suite*
- Prolongée ¬ Migraine: avec: *G43.1*
- Sans céphalée ¬ Migraine: *G43.1*
- Typique ¬ Migraine: avec: *G43.1*
- ¬ Migraine: avec: installation aiguë de l' *G43.1*

Aureus
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Staphylococcus *B95.6!*
- ¬
- - Choc septique à Staphylococcus *A41.0, R57.2*
- - Infection cutanée locale à Staphylococcus *L08.9, B95.6!*

Auriculaire
- Atypique ¬ Flutter *I48.4*
- Chronique ¬
- - Fibrillation *I48.2*
- - Flutter *I48.9*
- Discordante ¬ Communication ventriculo- *Q20.3*
- Familiale ¬ Fibrillation *I48.9*
- Idiopathique du nouveau-né ¬ Flutter *P29.1*
- Intermittente ¬ Fibrillation *I48.0*
- Miroir avec situs inversus ¬ Disposition *Q89.3*
- Paroxystique ¬
- - Fibrillation *I48.0*
- - Flutter *I48.9*
- Permanente ¬ Fibrillation
- - *I48.2*
- Persistante ¬ Fibrillation *I48.1*
- Prématurée ¬ Dépolarisation *I49.1*
- Sans autre précision ¬ Fibrillation et flutter *I48.9*
- Syphilitique ¬ Fibrillation *A52.0†, I52.0**
- Traumatique ¬ Hématome *S00.48*
- Type
- - I ¬ Flutter *I48.3*
- - II ¬ Flutter *I48.4*
- Typique ¬ Flutter *I48.3*
- ¬
- - Anomalie du septum *Q21.1*
- - Arrêt *I45.5*
- - Arythmie
- - - Complète au cours d'une fibrillation *I48.9*
- - - Fibrillation *I48.9*
- - Déformation acquise: *H61.1*
- - Extrasystoles *I49.1*
- - Fibrillation
- - - *I49.8*
- - - Flutter *I48*
- - Fistule (du): cervico- *Q18.1*
- - Myiase *B87.4†, H94.8**
- - Périchondrite: *H61.0*
- - Tachyarythmie
- - - Complet paroxystique cours

Auriculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tachyarythmie *–suite*
- - - Complet paroxystique cours *–suite*
- - - - Fibrillation *I48.0*
- - - - Flutter *I48.9*
- - - Cours d'une fibrillation *I48.9*
- - Thrombose (ancienne): *I51.3*
- - Vertige: *H81.3*

Auriculaire-bloc cardiaque ¬ Syndrome de cardiomyopathie *I45.5*

Auricularis ¬ Herpès zoster *B02.2†, H94.0**

Auricule
- Cardiaque
- - Asplénie ou polysplénie ¬ Isomérisme des *Q20.6*
- - ¬ Isomérisme des *Q20.6*
- Droite ¬ Ectasie de l' *Q20.8*
- Gauche ¬ Ectasie de l' *Q20.8*
- Ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Thrombose de l'oreillette, de l' *I23.6*
- ¬
- - Anomalie
- - - *Q20.8*
- - - Acquise du septum (ancienne): communication interauriculaire, *I51.0*
- - Juxtaposition des *Q20.8*
- - Thrombose (ancienne): *I51.3*

Auriculo-condylaire ¬ Syndrome *Q75.8*

Auriculo-ostéodysplasie ¬ *Q87.5*

Auriculo-ventriculaire
- 3ème degré ¬ Bloc: *I44.2*
- Accélérée ¬ Conduction *I45.6*
- Accessoire ¬ Conduction *I45.6*
- Anormale ¬ Excitation *I45.6*
- AV
- - SAI ¬ Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- - ¬ Dissociation: *I45.8*
- Commun ¬ Canal *Q21.2*
- Complet ¬ Bloc *I44.2*
- Congénital ¬ Bloc *Q24.6*
- Discordante ¬ Communication *Q20.5*
- Pré-excitée ¬ Conduction *I45.6*
- Premier degré ¬ Bloc *I44.0*
- SAI ¬ Bloc *I44.3*
- Sans précision ¬ Blocs *I44.3*
- Second degré ¬ Bloc *I44.1*
- TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) *I47.1*
- Type I et II ¬ Bloc (de) (du): *I44.1*
- Unique ¬ Cœur univentriculaire à valve *Q20.4*
- ¬
- - Bloc de branche gauche et *I44*
- - CAV [communication *Q21.2*
- - Communication *Q21.2*

Auris ¬ Candidose à Candida *B37.9*

Austin ¬ Sulfatidose juvénile type *E75.2*

Australis ¬ Fièvre pourprée due à Rickettsia *A77.3*

Autisme
- Atypique ¬ *F84.1*
- Infantile ¬ *F84.0*
- Petite enfance ¬ *F84.0*

Autistique ¬
- Psychopathie *F84.5*
- Retard mental avec caractéristiques *F84.1*
- Trouble *F84.0*

Autoanticorps
- Anti-interféron-gamma acquis ¬ Déficit immunitaire de l'adulte avec *D84.8*
- Anti-lymphocytes B ou T ¬ Déficit immunitaire commun variable avec *D83.2*

Autodestructeur
- Selon l'anamnèse familiale ¬ Comportement *Z81*
- ¬ Comportement *Z72.8*

Autoempoisonnement ¬ *Z91.8*

Auto-immun
- Candidose chronique-maladie d'Addison ¬ Syndrome d'hypoparathyroïdie *E31.0*
- Dianzani ¬ Maladie lymphoproliférative *D47.9*
- Haploinsuffisance de CTLA-4 ¬ Syndrome lymphoprolifératif *D47.9*
- Médicaments ¬ Anémie hémolytique *D59.0*
- Mixte ¬ Anémie hémolytique *D59.1*
- Néonatale ¬ Anémie hémolytique *D59.1*
- Systémique) SAI ¬ Maladie (du): *M35.9*
- Type
- - 1 ¬
- - - Entéropathie *E31.0*
- - - Polyendocrinopathie *E31.0*
- - - Syndrome polyglandulaire *E31.0*
- - 2 ¬ Syndrome polyglandulaire *E31.0*
- - 3 ¬ Entéropathie *K52.8*
- - Chaud) (type froid) ¬ Maladie hémolytique *D59.1*
- - II (APS2) ¬ Syndrome de polyendocrinopathie *E31.0*
- ¬
- - Anémies hémolytiques *D59.1*
- - Atrophie pluriglandulaire *E31.0*
- - Encéphalopathie sensible aux stéroïdes associée à une thyroïdite *G04.8, E06.3*
- - Hépatite
- - - *K75.4*
- - - Chronique *K75.4*
- - Hypoparathyroïdie *E20.0*
- - Insuffisance
- - - Pluriglandulaire *E31.0*
- - - Polyglandulaire *E31.0*
- - Maladie d'Addison *E27.1*
- - Myasthénie *G70.0*

Auto-immun *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Myopathie nécrosante à médiation *G72.4*
- - Pancréatite *K86.1*
- - Polyendocrinopathie *E31.0*
- - Protéinose alvéolaire pulmonaire *J84.0*
- - Surrénalite *E27.1*
- - Syndrome
- - - Hypoglycémique
- - - - *E16.0*
- - - - *E16.1*
- - - Lymphoprolifératif *D47.9*
- - Thyroïdite *E06.3*

Auto-inflammatoire
- Familial ¬ Syndrome hypothermique *L50.2*
- Froid ¬ Syndrome familial *L50.2*

Auto-infligé
- Agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage *Y34.9!*
- Délibéré
- - E) ¬ Empoisonnement ou lésion *X84.9!*
- - Suicide) par moyens non précisés ¬ Effets non précisés de: lésion *T76*
- - ¬ Lésion
- - - *X84!*
- - - *X84.9!*
- Exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion *Y34.9!*
- ¬ mouvement stéréotypés
- - Lésion *F98.41*
- - Sans
- - - Lésion *F98.40*
- - - Précision d'une lésion *F98.49*

Autologue ¬ Status post greffe de peau *Z94.5*

Automutilation et autres blessures physiques ¬ *Z91.8*

Autonome
- Cours
- - Amylose ¬ Neuropathie des nerfs périphériques *E85.4†, G99.0**
- - Hyperthyroïdie ¬ Neuropathie des nerfs périphériques *E05.9†, G99.0**
- - Maladie
- - - Endocrinien
- - - - Métaboliques ¬ Neuropathie du système nerveux *G99.0**
- - - - ¬ Neuropathie des nerfs périphériques *E34.9†, G99.0**
- - - Métabolique NCA ¬ Neuropathie des nerfs périphériques *E88.9†, G99.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du système nerveux *G99.1**

Autonome *–suite*
- Diabète sucré ¬ Neuropathie des nerfs périphériques *E14.40†, G99.0**
- Goutte ¬ Neuropathie des nerfs périphériques *M10.09†, G63.6**
- Manifestée crise
- - Hypertoniques ¬ Dysréflexie *G90.40*
- - Transpiration ¬ Dysréflexie *G90.41*
- Non précisée ¬ Dysréflexie *G90.49*
- Périphérique idiopathique
- - Non précisée ¬ Neuropathie *G90.09*
- - ¬ Autre neuropathie *G90.08*
- SAI ¬ Dysréflexie *G90.49*
- Sans précision ¬
- - Affection du système nerveux *G90.9*
- - Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux *T44.9*
- - Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux *C47.9*
- ¬
- - Affection système nerveux
- - - *G90*
- - - *G90.8*
- - Dysréflexie
- - - *G90.4*
- - - *G90.48*
- - Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux *T44*
- - Neuropathie amyloïde *E85.9†, G99.0**
- - Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une neuropathie *N31.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux *D36.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux *D48.2*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux *C47.8*
- - - - Nerfs périphériques et du système nerveux *C47*
- - Vessie neurogène
- - - *N31.2*
- - - Neuropathie *N31.2*

Autophagie excessive liée à l'X ¬ Myopathie avec *G71.8*

Autopsie ¬ Syndrome mort subit nourrisson
- Mention d' *R95.0*
- Sans mention d' *R95.9*

Autorités ¬ Examen psychiatrique général à la demande des *Z04.8*

Autosensibilisation cutanée ¬ *L30.2*

Autosomes
- Non classé ¬
- - Monosomies et délétions des *Q93*
- - Trisomies et trisomies partielles des *Q92*

Autosomes *–suite*
- Sans précision ¬
- - Délétion des *Q93.9*
- - Trisomie et trisomie partielle des *Q92.9*
- ¬
- - Délétions des *Q93.8*
- - Trisomies et trisomies partielles précisées des *Q92.8*

Autosomique
- Dominant
- - A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire *G60.0*
- - Adulte ¬ Amyotrophie spinale proximale *G12.1*
- - B ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire *G60.0*
- - C ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire *G60.0*
- - Classique ¬ Atrophie optique *H47.2*
- - D ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire *G60.0*
- - Déficit
- - - Kir6.2 ¬ Hyperinsulinisme *E16.1*
- - - Partiel récepteur
- - - - 1 de l'interféron gamma ¬ MSMD *D84.8*
- - - - 2 de l'interféron gamma ¬ MSMD *D84.8*
- - - SUR1 ¬ Hyperinsulinisme *E16.1*
- - E ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire *G60.0*
- - Enfance ¬ Amyotrophie spinale proximale *G12.1*
- - Épilepsie-déficience intellectuelle par déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse *G11.1*
- - Hyperuricémie ¬ Maladie rénale kystique médullaire *Q61.5*
- - Hypocalciurie ¬ Hypomagnésémie primaire *E83.4*
- - Intolérance à l'effort ¬ Myopathie mitochondriale *G71.3*
- - Kjer ¬ Atrophie optique *H47.2*
- - Plus ¬ Atrophie optique *H47.2*
- - Surdité-narcolepsie ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse *G11.2*
- - Type
- - - 1 ¬
- - - - Ataxie spastique *G11.4*
- - - - Ostéopétrose *Q78.2*
- - - 1A ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 1B ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 1C ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 1D ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 1E ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 1F ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*

Autosomique *–suite*
- Dominant *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 1G ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 1H ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2
- - - - Axones géants ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - - Mutation
- - - - - KIF5A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - - - TFG ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - - ¬ Ostéopétrose *Q78.2*
- - - 2A1 ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2A2 ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2B ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2C ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2D ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2E ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2F ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2I ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2J ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2K ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2L ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2M ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2N ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2O ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2P ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2U ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2V ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2W ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2Y ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2Z ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 3 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 4 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 6 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 8 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 9 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 10 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 12 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*

Autosomique *–suite*
- Dominant *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 13 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 17 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 19 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 29 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 31 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 36 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 37 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 38 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 41 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 42 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 73 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - DFNA ¬ Surdité de perception non syndromique *H90.3*
- - - DYT25 ¬ Dystonie focale *G24.1*
- - - F ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire *G60.0*
- - - Glaudemans ¬ Hypomagnésémie isolée *E83.4*
- - - Norrbotten ¬ Kératodermie palmoplantaire diffuse *Q82.8*
- - - Worth ¬ Ostéosclérose *Q78.2*
- - ¬
- - - Acrostéolyse *M89.59*
- - - Ataxie cérébelleuse *G11.8*
- - - Atrophie optique type 3 *H47.2*
- - - Coarctation de l'aorte *Q25.1*
- - - Cutis laxa *Q82.8*
- - - Décollement de la rétine rhegmatogène *H33.0*
- - - Dégénérescence rétinienne d'apparition tardive *H35.5*
- - - Dysplasie des ongles *L60.3*
- - - Dystonie dopa-sensible *G24.1*
- - - Dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss *G71.0*
- - - Hémochromatose héréditaire *E83.1*
- - - HIES [syndrome d'hyperimmunoglobulinémie E] *D82.4*
- - - Hypomagnésémie isolée *E83.4*
- - - Kératodermie palmoplantaire et alopécie congénitale *Q82.8*
- - - Macrothrombocytopénie *D69.41*
- - - Maladie d'Alzheimer précoce *G30.0*
- - - Myoglobinurie *R82.1*
- - - Myopathie centronucléaire *G71.2*
- - - Neutropénie congénitale sévère *D70.0*
- - - Ophtalmoplégie externe progressive *H49.4*
- - - Polykystose hépatique *Q44.6*
- - - Pseudohypoaldostéronisme type 1 *N25.8*
- - - Rachitisme hypophosphatémique *E83.30*
- - - Rein polykystique, *Q61.2*
- - - Syndrome
- - - - Atrophie optique-cataracte *H47.2*
- - - - Ptérygiums poplités *Q87.8*

Autosomique *–suite*
- Dominant *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Syndrome *–suite*
- - - - Segawa *G24.1*
- - - Vitréo-rétino-choroïdopathie *H35.5*
- - - Vitréo-rétinopathie inflammatoire néovasculaire *H35.2*
- Équilibré sujet anormal ¬ Réarrangement
- - *Q95.2*
- - Sexuel/ *Q95.3*
- Fragile ¬ Sujet avec site *Q95.5*
- Récessif
- - Adulte ¬ Ataxie cérébelleuse *G11.2*
- - Associé
- - - KRT14 ¬ Epidermolyse bulleuse simple *Q81.0*
- - - Spectrine ¬ Ataxie cérébelleuse *G11.1*
- - - VPS11 ¬ Leucodystrophie hypomyélinisante *E75.2*
- - Atrophie optique-dysarthrie ¬ Syndrome d'ataxie spastique *G11.4*
- - Cécité-surdité ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse *G11.1*
- - Charlevoix-Saguenay ¬ Ataxie spastique *G11.1*
- - Défaut de cytotoxicité spontanée des cellules Natural Killer ¬ Déficit immunitaire primaire *D84.8*
- - Déficit
- - - CD27 ¬ Maladie lymphoproliférative *D47.9*
- - - CSF3R ¬ Neutropénie congénitale sévère *D70.0*
- - - CXCR2 ¬ Neutropénie congénitale sévère *D70.0*
- - - G6PC3 ¬ Neutropénie congénitale sévère *D70.0*
- - - JAGN1 ¬ Neutropénie congénitale sévère *D70.0*
- - - Kir6.2 ¬ Hyperinsulinisme *E16.1*
- - - Partiel
- - - - IFNgammaR2 ¬ MSMD *D84.8*
- - - - Récepteur 1 de l'interféron gamma ¬ MSMD *D84.8*
- - - PEX10 ¬ Ataxie *G11.8*
- - - SUR1 ¬ Hyperinsulinisme *E16.1*
- - - TYK2 ¬ Syndrome hyper-IgE *D82.4*
- - - Ubiquinone ¬ Ataxie cérébelleuse *G11.1*
- - Infantile, de type Duchenne ou Becker ¬ Dystrophie musculaire: *G71.0*
- - Leucoencéphalopathie ¬ Ataxie spastique *G11.4*
- - Retard psychomoteur ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse *G11.1*
- - Saccade oculaire ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse *G11.8*
- - Type
- - - 1 ¬ Cutis laxa *Q82.8*
- - - 1C ¬ Cutis laxa *Q82.8*

Autosomique *–suite*
- Récessif *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 2 ¬
- - - - Ataxie spinocérébelleuse *G11.0*
- - - - Cutis laxa *Q82.8*
- - - 2A ¬
- - - - Cutis laxa *Q82.8*
- - - - Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2B ¬
- - - - Cutis laxa *Q82.8*
- - - - Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2C ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2D ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2E ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2F ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2G ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2H ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2I ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2J ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2K ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2L ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2M ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2N ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2O ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2P ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2Q ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2R ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2S ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2U ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2W ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2X ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2Y ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 4 ¬ Ataxie spastique *G11.4*
- - - 5 ¬ Ataxie spastique *G11.4*
- - - 5A ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 6 ¬ Ataxie spinocérébelleuse *G11.0*
- - - 7 ¬ Ataxie spinocérébelleuse *G11.1*
- - - 10 ¬ Ataxie spinocérébelleuse *G11.2*

Autosomique *–suite*
- Récessif *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 11 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 12 ¬ Ataxie spinocérébelleuse *G11.1*
- - - 14 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 15 ¬
- - - - Ataxie spinocérébelleuse *G11.1*
- - - - Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 16 ¬ Ataxie spinocérébelleuse *G11.1*
- - - 17 ¬ Ataxie spinocérébelleuse *G11.1*
- - - 18 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 19 ¬ Ataxie spinocérébelleuse *G11.1*
- - - 20 ¬
- - - - Ataxie spinocérébelleuse *G11.1*
- - - - Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 21 ¬
- - - - Ataxie spinocérébelleuse *G11.1†, K77.8**
- - - - Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 23 ¬
- - - - Ataxie spinocérébelleuse *G11.1*
- - - - Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 24 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 25 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 26 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 27 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 28 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 32 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 35 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 39 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 43 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 44 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 45 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 46 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 48 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 49 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 53 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 54 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 55 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 56 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 57 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 59 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 60 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 61 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 62 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 63 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 64 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 66 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 67 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 68 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 69 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 70 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 71 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 74 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*

Autosomique *–suite*
- Récessif *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 75 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 76 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 77 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - 78 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - - A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire *G60.0*
- - - B ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire *G60.0*
- - - Beauce ¬ Ataxie cérébelleuse *G11.2*
- - - C ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire *G60.0*
- - - D ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire *G60.0*
- - - DFNB ¬ Surdité de perception non syndromique *H90.3*
- - - Mégarbané ¬ Dysplasie spondylo-métaphysaire *Q77.8*
- - - Suisse) ¬ Agammaglobulinémie: *D80.0*
- - ¬
- - - Anémie sidéroblastique *D64.0*
- - - Arthrogrypose multiple congénitale myogénique *Q74.3*
- - - Ataxie (de): Friedreich (*G11.1*
- - - Atrophie optique
- - - - Isolée *H47.2*
- - - - Type 3 *E71.1*
- - - Bestrophinopathie *H35.5*
- - - Dysostose spondylo-costale *Q76.8*
- - - Dysplasie des ongles *Q84.6*
- - - Dystonie dopa-sensible *G24.1*
- - - Dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss *G71.0*
- - - HIES [syndrome d'hyperimmunoglobulinémie E] *D82.4*
- - - Hypercalcémie infantile *E83.58*
- - - Ichtyose épidermolytique *Q80.3*
- - - Myopathie centronucléaire *G71.2*
- - - Ophtalmoplégie externe progressive *H49.4*
- - - Ostéopétrose maligne *Q78.2*
- - - Pseudohypoaldostéronisme type 1 *N25.8*
- - - Rachitisme hypophosphatémique *E83.30*
- - - Rein polykystique, *Q61.1*
- - - Syndrome
- - - - Choriorétinopathie-microcéphalie *Q87.8*
- - - - Faciodigitogénital *Q87.0*
- - - - Segawa *G24.1*
- Type
- - 30 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - 58 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - 72 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*

Auxiliaire
- CD4
- - Microlitre sang ¬ 200
- - - 499 lymphocytes T *U61.2!*

Auxiliaire *–suite*
- CD4 *–suite*
- - Microlitre sang ¬ 200 *–suite*
- - - Lymphocytes T *U61.3!*
- - Non précisé ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.9!*
- - Plus par microlitre de sang ¬ 500 lymphocytes T *U61.1!*
- Maladie VIH
- - Catégorie
- - - 1 ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.1!*
- - - 2 ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.2!*
- - - 3 ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.3!*
- - ¬ Nombre de lymphocytes T *U61!*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ Dépendance (de longue durée) envers des appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils *Z99*
- - Précisé ¬ Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil *Z99.9*
- ¬ Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils *Z99.8*

AV
- Fœtus avec menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc *O35.8*
- Réentrée
- - Nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [*I47.1*
- - ¬ Tachycardie de la jonction *I47.1*
- SAI ¬ Tachycardie (paroxystique): auriculoventriculaire [*I47.1*
- ¬ Dissociation: auriculoventriculaire [*I45.8*

Avalé SAI ¬ Corps étranger *T18.9*

Avant-bras
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.81*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.84*
- Distal sans précision ¬ *S52.8*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.82*
- Main
- - Présente ¬ Absence congénitale du bras et de l' *Q71.1*
- - ¬ Absence congénitale de l' *Q71.2*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du bras et de l' *T34.4*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de l' *S58.9*
- Partie non précis ¬
- - Écrasement de l' *S57.9*
- - Fracture de l' *S52.9*
- - Plaie ouverte de l' *S51.9*

Avant-bras *–suite*

- Poignet ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.02*
- Proximal sans précision ¬ *S52.8*
- SAI ¬ Plaie ouverte de l' *S51*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - *S59*
- - *S59.9*
- - Superficielle de l' *S50.9*
- ¬
- - *L03.10*
- - Amputation traumatique de l' *S58*
- - Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.12*
- - Contusion de parties autres et non précisées de l' *S50.1*
- - Écrasement
- - - *S57*
- - - Parties de l' *S57.8*
- - Fracture
- - - *S52*
- - - Luxation ouverte de l' *S52.9, S51.87!*
- - - Multiples de l' *S52.7*
- - - Ouverte de l' *S52.9, S51.87!*
- - - Parties de l' *S52.8*
- - Gelure superficielle du bras et de l' *T33.4*
- - Lésion
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de l' *S51.84!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de l' *S51.87!*
- - - - II
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de l' *S51.85!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de l' *S51.88!*
- - - - III
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de l' *S51.86!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de l' *S51.89!*
- - - Traumatique
- - - - Artère
- - - - - Cubitale au niveau de l' *S55.0*
- - - - - Radiale au niveau de l' *S55.1*
- - - - Multiple
- - - - - *S59.7*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de l' *S56.7*
- - - - - Nerfs au niveau de l' *S54.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S55.7*
- - - - Muscle
- - - - - Tendon extenseurs au niveau de l' *S56.5*

Avant-bras *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Muscle *–suite*
- - - - - Tendon fléchisseurs au niveau de l' *S56.2*
- - - - - Tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l' *S56.0*
- - - - - Tendons au niveau de l' *S56*
- - - - - Tendons autres et non précisés, au niveau de l' *S56.8*
- - - - - Tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l' *S56.4*
- - - - - Tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l' *S56.3*
- - - - - Tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l' *S56.1*
- - - - Nerf
- - - - - Cubital au niveau de l' *S54.0*
- - - - - Médian au niveau de l' *S54.1*
- - - - - Niveau de l' *S54.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de l' *S54.9*
- - - - - Radial au niveau de l' *S54.2*
- - - - - Sensitif cutané au niveau de l' *S54.3*
- - - - Précisées de l' *S59.8*
- - - - Superficiel
- - - - - *S50*
- - - - - *S50.8*
- - - - - *S50.88*
- - - - - Multiples de l' *S50.7*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau de l' *S55.9*
- - - - - Sanguins au niveau de l' *S55.8*
- - - - Veine au niveau de l' *S55.2*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - *S51*
- - - - Non précisée d'autres parties de l' *S51.80*
- - - - Parties de l' *S51.8*
- - - Ouvertes multiples de l' *S51.7*
- - Séquelles d'une fracture du bras et de l' *T92.1*

Avant-pied ¬ Malformation de l' *M21.68*

Avasculaire

- Idiopathique ¬ Nécrose *M87.09*
- Traumatique ¬ Nécrose *M87.29*

AVC

- Ischémique ¬ *I63.9*
- Spasme vasculaire ¬ *I63.8*
- ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, acidose lactique et épisodes ressemblant à des *G31.81*

Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel ¬ *F52.1*

Aveugle ¬ Elargissement de la tache *H53.4*

Aviaire

- Grippe porcine ¬
- - Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe *J10.8†, G05.1**
- - Encéphalopathie lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe *J10.8†, G94.3**
- - Grippe [Influenza] avec otite, virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe *J10.8†, H67.1**
- - Influenza, virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe *J10.1*
- - Myocardite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe *J10.8†, I41.1**
- - Polio-encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe *J10.8†, G05.1**
- Identification du virus ¬ Grippe *J09, U69.21!*
- Identifié ¬
- - Grippe
- - - Asiatique [influenza], virus de grippe *J09, U69.21!*
- - - Influenza
- - - - Encéphalite, virus de la grippe *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - Entérite, virus de la grippe *J09, U69.21!*
- - - - Épanchement pleural, virus de la grippe *J09, U69.21!*
- - - - Gastroentérite, virus de la grippe *J09, U69.21!*
- - - - Infection des voies respiratoires supérieures, virus de la grippe *J09, U69.21!*
- - - - Laryngite, virus de la grippe *J09, U69.21!*
- - - - Méningisme, virus de la grippe *J09, U69.21!*
- - - - Otite moyenne, virus de la grippe *J09†, H67.1*, U69.21!*
- - - - Pharyngite, virus de la grippe *J09, U69.21!*
- - - - Pneumonie, virus de la grippe *J09, U69.21!*
- - - - Polio-encéphalite, virus de la grippe *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - Virus de la grippe *J09, U69.21!*
- - Myocardite grippale par virus de la grippe *J09, U69.21!*
- Porcine ¬
- - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe *J10.0*
- - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.8*
- - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*

Aviaire *–suite*
- Porcine ¬ *–suite*
- - Gastroentérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.8*
- - Grippe
- - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - Influenza
- - - - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - - Laryngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - - Pharyngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - Infection
- - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - Virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.0*
- - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe *J10.8*
- - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.0*
- Zoonotique pandémique identifié ¬ Grippe Influenza
- - Encéphalite, virus de la grippe *J09†, G05.1**
- - Encéphalopathie, virus de la grippe *J09†, G94.3**
- - Myocardite, virus de la grippe *J09†, I41.1**
- - Otite moyenne, virus de la grippe *J09†, H67.1**
- - Polio-encéphalite, virus de la grippe *J09†, G05.1**
- ¬ Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe *U69.21!*

Avis
- Général
- - Concernant la contraception ¬ Conseils et *Z30.0*
- - Matière de procréation ¬ Conseils et *Z31.6*
- Médicaux, non classés ailleurs ¬ Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et *Z71*

Avitaminose
- Groupe B
- - Sans précision ¬ *E53.9*
- - ¬ Autres *E53*
- Précisées du groupe B ¬ Autres *E53.8*
- Sans précision ¬ *E56.9*
- ¬
- - *E56*
- - Polyneuropathie au cours d' *E56.9†, G63.4**

Avitaminose A
- Cicatrices xérophtalmiques de la cornée ¬ *E50.6†, H19.8**
- Héméralopie ¬ *E50.5†, H58.1**
- Kératomalacie ¬ *E50.4†, H19.8**
- Sans précision ¬ *E50.9*
- Taches de Bitot et xérosis conjonctival ¬ *E50.1†, H13.8**
- Xérosis
- - Conjonctival ¬ *E50.0†, H13.8**
- - Cornéen ¬ *E50.2†, H19.8**
- - Ulcération de la cornée ¬ *E50.3†, H19.8**
- ¬
- - *E50*
- - Kératose folliculaire due à l' *E50.8†, L86**
- - Manifestation
- - - *E50.8*
- - - Oculaires de l' *E50.7*
- - Séquelles d' *E64.1*
- - Xérodermie due à l' *E50.8†, L86**

Avitaminose B6 ¬ *E53.1*

Avitaminose C ¬ Séquelles d' *E64.2*

Avitaminose D ¬ *E55.9*

Avitaminose K ¬ Carence en facteur de coagulation due à: *D68.4*

Avium
- Intracellulaire ¬ Maladie due au VIH avec infection à Mycobacterium *B20, A31.0*
- ¬ Infection à Mycobacterium: *A31.0*

Avortement
- Grossesse extra-utérin molaire
- - Sans précision ¬ Complication consécutive à un *O08.9*
- - ¬
- - - Choc consécutif à un *O08.3*
- - - Complication
- - - - Consécutif
- - - - - *O08*
- - - - - *O08.8*
- - - - Veineuses consécutives à un *O08.7*
- - - Embolie consécutive à un *O08.2*
- - - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un *O08.1*
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un *O08.0*
- - - Insuffisance rénale consécutive à un *O08.4*

Avortement *–suite*
- Grossesse extra-utérin molaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un *O08.6*
- - - Troubles du métabolisme consécutifs à un *O08.5*
- Médical
- - Complications autres et non précisées ¬ Echec d'une tentative d' *O07.3*
- - Compliqué
- - - Embolie ¬ Echec d'une tentative d' *O07.2*
- - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Echec d'une tentative d' *O07.1*
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Echec d'une tentative d' *O07.0*
- - SAI ¬ Echec d'une tentative d' *O07.4*
- - Sans complication ¬ Echec d'une tentative d' *O07.4*
- - ¬ *O04*
- Phase de suivi ¬ Lacération due à un *O08.6*
- Plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la grossesse après *O31.1*
- Provoqué SAI ¬ *O06*
- Répétition ¬
- - *N96*
- - Soins au cours de la grossesse pour *O26.2*
- SAI ¬ Echec d'une tentative d' *O07.9*
- Sans précision
- - Complications autres et non précisées ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.8*
- - Compliqué
- - - Embolie ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.7*
- - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.6*
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.5*
- - Sans précision, sans complication ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.9*
- - ¬ *O06*
- Septique ¬ Saignement lors d'un *O06.5, O08.1*
- Spontané
- - Fœtus ¬ *P01.8*
- - ¬ *O03*
- Thérapeutique ¬ *O04*
- Tubaire ¬ *O00.1*
- ¬
- - Choc septique après *O08.0, R57.2*
- - Echec d'une tentative d' *O07*
- - Formes d' *O05*
- - Hémorragie
- - - Accidentelle après un *O08.1*
- - - Menace d' *O20.0*
- - Menace d' *O20.0*
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent d' *Z35.1*

Axe central [myopathie à cores centraux] ¬ Myopathie: à *G71.2*

Axenfeld
v.a. Rieger-Axenfeld

- Rieger ¬ Syndrome d' *Q13.8*
- ¬ Anomalie d' *Q13.8*

Axial

- Non radiologique ¬ Spondylarthrite
- - *M45*
- - *M45.09*
- Tétanie ¬ Syndrome *R29.0*
- ¬
- - Articulation: atlanto- *S13.4*
- - Dysplasie mésodermique *Q87.8*

Axillaire

- Brachiale ¬ Lésion traumatique de la veine *S45.2*
- Sein ¬ Tumeur maligne: Prolongement *C50.6*
- Stade
- - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.81*
- - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.82*
- - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.83*
- ¬
- - Lésion traumatique
- - - Artère *S45.0*
- - - Nerf *S44.3*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.81*

Axillaris ¬ Tinea *B35.8*

Axis ¬

- *S12.1*
- Fracture bilatérale de la pédicule de l'arc de l' *S12.1*

Axoïdien

- Myélopathie ¬ Subluxation récidivante atloïdo- *M43.3*
- Récidivantes ¬ Autres subluxations atloïdo- *M43.4*

Axonal

- Aiguë ¬ Neuropathie sensitivo-motrice *G61.0*
- Cellules gliales pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à sphéroïdes *E75.2*
- Motrice aiguë ¬ Neuropathie *G61.0*
- Sévère précoce par déficit en chaîne légère des neurofilaments ¬ Neuropathie *G60.0*
- Type
- - 1 ¬ Syndrome d'ataxie spinocérébelleuse-neuropathie *G60.2*
- - Hypertrophique) ¬ Amyotrophie péronière (type *G60.0*

Axone géant ¬

- Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 avec *G60.0*

Axone géant ¬ *–suite*

- Neuropathie à *G60.8*

Azole ¬ Allergie aux dérivés d' *T88.7*

Azoospermie SAI ¬ *N46*

Azote ¬ Effet toxique: Oxydes d' *T59.0*

Azotémique ¬ Ostéodystrophie *N25.0*

Azygos ¬

- Continuation de la veine cave inférieure dans la veine *Q26.8*
- Veine *S25.88*

B6-dépendante ¬ Épilepsie vitamine *G40.8*

Baastrup] ¬ Arthrose interépineuse [Maladie de *M48.2*

Babésiose ¬ *B60.0*

Bacillaire

- SAI ¬ Dysenterie *A03.9*
- ¬ Angiomatose *A44.8*

Bacille

- Battey] ¬ Infection à Mycobacterium: intracellulare [*A31.0*
- Ducrey ¬ Balanite à *A57†, N51.2**
- Friedländer ¬ Méningite
- - *G00.8*
- - *G00.8, B96.2!*
- Non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Pseudomonas et autres *B96.5!*

Bacillose péritonéale par tuberculose bovine contagieuse ¬ *A18.3†, K93.0**

Bacillus

- Aerogenes capsulatus ¬ Gangrène à *A48.0*
- Anthracis ¬ infection à *A22*
- Cereus ¬ Intoxication alimentaire à *A05.4*
- Fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.6!*

Bactérie

- Aérobies) à Gram négatif SAI ¬ Pneumonie due à: des *J15.6*
- Gram
- - Négatif
- - - Multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres *U81.8!*
- - - ¬ Pneumonie due à d'autres *J15.6*
- - Positives multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres *U80.8!*
- Précisées ¬ Arthrite et polyarthrite dues à d'autres *M00.8*
- Pyogène
- - Sans précision ¬ Arthrite à *M00.9*
- - ¬ Arthrites à *M00*
- S. pneumoniae et H. influenzae ¬ bronchopneumonie due à des *J15*

Bactériémie

- Méningococcique SAI ¬ *A39.4*
- Méningocoques ¬ *A39.4*
- SAI ¬ *A49.9*

Bactérien
v. Type de maladie

Bactériologique

- Biologie moléculaire histologique ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse sans confirmation *A16.0*
- - Empyème tuberculeux
- - - Confirmation *A15.6*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.5*
- - Fibrose tuberculeuse sans confirmation *A16.0*
- - Forme tuberculose appareil respiratoire

Bactériologique *–suite*

- Biologie moléculaire histologique ¬ *–suite*
- - Forme tuberculose appareil respiratoire *–suite*
- - - Confirmation, *A15.8*
- - - Sans mention de confirmation *A16.8*
- - Pleurésie tuberculeux
- - - Confirmation *A15.6*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.5*
- - - Sans mention de confirmation *A16.5*
- - Pneumonie tuberculeuse sans confirmation *A16.0*
- - Pneumothorax tuberculeux sans confirmation *A16.0*
- - Primo infection tuberculeux appareil respiratoire
- - - Confirmation *A15.7*
- - - Sans mention de confirmation *A16.7*
- - Tuberculose
- - - Appareil respiratoire
- - - - Confirmation *A15*
- - - - Sans
- - - - - Confirmation *A16*
- - - - - Précision, avec confirmation *A15.9*
- - - - - Précision, sans mention de confirmation *A16.9*
- - - Bronche
- - - - Confirmation *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.4*
- - - Ganglion intrathoracique
- - - - Confirmation *A15.4*
- - - - Sans mention de confirmation, *A16.3*
- - - Ganglionnaire
- - - - Hilaire
- - - - - Confirmation *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.3*
- - - - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation *A16.3*
- - - - Médiastinal
- - - - - Confirmation *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.3*
- - - - Trachéo-bronchique
- - - - - Confirmation *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.3*
- - - Glotte
- - - - Confirmation *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.4*
- - - Larynx
- - - - Confirmation *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.4*
- - - - Trachée
- - - - - Bronches, avec confirmation *A15.5*

Bactériologique *–suite*

- Biologie moléculaire histologique ¬ *–suite*
- - Tuberculose *–suite*
- - - Larynx *–suite*
- - - - Trachée *–suite*
- - - - - Bronches, sans mention de confirmation *A16.4*
- - - Médiastinal
- - - - Confirmation *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.8*
- - - Nasal
- - - - Confirmation *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.8*
- - - Plèvre
- - - - Confirmation *A15.6*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.5*
- - - Pulmonaire
- - - - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - - Sans
- - - - - Confirmation *A16.0*
- - - - - Examen *A16.1*
- - - - - Mention de confirmation *A16.2*
- - - Rhinopharyngé
- - - - Confirmation *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.8*
- - - Sinus face
- - - - Confirmation *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.8*
- - - Trachée
- - - - Confirmation *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.4*
- Histologique ¬
- - Épanchement pleural tuberculeux primaire, confirmé par analyse *A15.7†, J91**
- - Pleurésie tuberculeuse primaire avec épanchement, confirmée par analyse *A15.7†, J91**
- ¬ Tuberculose pulmonaire confirmée par analyse *A15.0*

BADI ¬ *H21.2*

Bagasse ¬

- Maladie due à la *J67.1*
- Pneumopathie due à la *J67.1*

Bagassose ¬ *J67.1*

BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse auditive à ancrage osseux [*Z96.2*

Baies ingérées ¬ Effet toxique: *T62.1*

Bain ¬ Conjonctivite due au *B30.1†, H13.1**

Baird
v. Basan-Baird

Baisse

- Activité cérébrale du nouveau-né ¬ *P91.4*
- Désir sexuel ¬ *F52.0*
- Non spécifique de la tension artérielle ¬ Constatation d'une *R03.1*
- Performance ¬ *R53*
- Température
- - Ambiante ¬ Hypothermie, non associée à une *R68.0*
- - Sans précision ¬ Effet d'une *T69.9*
- - ¬ effet
- - - *T69*
- - - Précisés d'une *T69.8*
- Vision
- - Binoculaire ¬ Cécité et forte *H54.0*
- - Monoculaire ¬ Cécité et forte *H54.4*
- - ¬ Cécité et *H54*

Baker

- Tuberculeux ¬ Kyste de *A18.0†, M01.16**
- ¬ Kyste synovial poplité [*M71.2*

Bakrania-Ragge ¬ Syndrome de *Q11.2*

Balanique ¬ Hypospadias *Q54.0*

Balanite

- Amibienne ¬ *A06.8†, N51.2**
- Bacilles de Ducrey ¬ *A57†, N51.2**
- Candida ¬ *B37.4†, N51.2**
- Candidosique ¬ *B37.4†, N51.2**
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *N51.2**
- Fongique ¬ *B37.4†, N51.2**
- Gonorrhéique ¬ *A54.0†, N51.2**
- Scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans] ¬ *N48.0*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N51.2**
- Vénérienne NCA ¬ *A64†, N51.2**
- Virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N51.2**
- ¬ *N48.1*

Balanitis

- Candidomycetica ¬ *B37.4†, N51.2**
- Mycotica ¬ *B37.4†, N51.2**
- Xerotica obliterans] ¬ Balanite scléreuse oblitérante [*N48.0*

Balano-posthite

- Candidose ¬ *B37.4†, N51.2**
- Gonorrhéique ¬ *A54.0†, N51.2**
- Ulcéreuse spécifique ¬ *A63.8†, N51.2**
- ¬ *N48.1*

Balantidienne ¬ Dysenterie *A07.0*

Balantidiose ¬ *A07.0*

Balint-Holmes ¬ Syndrome de *H51.8*

Balkans ¬ Néphropathie

- *N15.0*
- Endémique des *N15.0*

Baller-Gerold ¬ Syndrome de *Q75.0*

Ballon ¬ Syndrome de l'apex ventriculaire en *I42.88*

Ballonisation apicale ¬ Syndrome de *I42.88*

Ballonnement ¬ *R14*

Ballonnet ¬ Complication mécanique due à un dispositif gastro-intestinal à *T85.59*

Ballonnisantes sur la conjonctive ¬ Nævus à cellules *D31.0*

Baló] ¬ Sclérose concentrique [*G37.5*

BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches [lymphome *C88.4*

Bamberger ¬ Maladie de Marie- *M89.4*

Banal ¬

- Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume *T48.5*
- Rhinopharyngite aiguë [rhume *J00*

Bancroft [Filariose lymphatique] ¬ Filariose de *B74.0*

Bancrofti ¬ Filariose à Wuchereria *B74.0*

Bancroftien ¬ Eléphantiasis *B74.0*

Bande

- Sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: activité répréhensible en *Z03.2*
- Ventriculaires ¬ *C32.1*
- ¬
- - Délits commis en *F91.2*
- - Hétérotopie sous-corticale en *Q04.3*
- - Kératodermie palmoplantaire striée ou en *Q82.8*

Bandelette

- Maissiat [ilio-tibiale] ¬ Syndrome de la *M76.3*
- Vaginale sans tension] ¬ Rétention urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, *T83.8*
- ¬
- - 46
- - - XX avec ovaire en *Q99.1*
- - - XY avec ovaire en *Q99.1*
- - Kératopathie en *H18.4*

Bang ¬

- Fièvre ondulante [Maladie de *A23.1*
- Maladie de *A23.1*

Bannayan-Riley-Ruvalcaba ¬ Syndrome de *Q89.8*

Bantoue ¬ Sidérose *E83.1*

Bar] ¬ Ataxie télangiectasique [Louis- *G11.3*

Barabas
v. Sack-Barabas

Baraitser
v. Nicolaides-Baraitser
v. Schaap-Taylor-Baraitser

Baraitser-Winter cérébrofrontofacial ¬ Syndrome de *Q87.0*

Barbae ¬ Mycosis *B35.0*

Barbe

- Cuir chevelu ¬ Teigne de la *B35.0*
- Dermatophytie] ¬ Dermatophytose de la *B35.0*
- ¬
- - Mycose de la *B35.0*
- - Pseudofolliculite de la *L73.1*
- - Sycosis
- - - *L73.8*
- - - Parasitaire de la *B35.0*

Barber
v. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson
v. Say-Barber-Miller

Barbituriques ¬ Intoxication

- *T42.3*

Bardet-Biedl ¬ Syndrome

- *Q87.8*
- Laurence-Moon- *Q87.8*

Barel
v. Birk-Barel

Barett
v. Eagle-Barett

- ¬ Syndrome d'Eagle- *Q79.4*

Barlow [prolapsus mitral] ¬ Syndrome de *I34.1*

Barnes ¬ Syndrome de *Q77.2*

Baroréflexe ¬ Insuffisance du *G90.8*

Barotraumatique ¬

- Otite moyenne *T70.0*
- Sinusite *T70.1*

Barotraumatisme

- Oreille ¬ *T70.0*
- SAI ¬ *T70.2*
- Sinus ¬ *T70.1*

Barr
v. Epstein-Barr

Barraquer-Simons ¬ Syndrome de *E88.1*

Barré
v.a. Guillain-Barré-Strohl

Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique) ¬ *N40*

Barret
v. Eagle-Barret

Barrett ¬

- Endobrachyœsophage [œsophage de *K22.7*
- Maladie de *K22.7*
- Syndrome de *K22.7*

Barrière de Mercier] (prostatique) ¬ Barre moyenne [*N40*

Barrow
v. Donnai-Barrow

Barth ¬ Syndrome de *E71.1*

Barthel
v. Index de Barthel
v. Index de Barthel élargi
v. Indice de Barthel de la réadaptation précoce

Bartholin

- Glande vestibulaire principale] ¬ Glande de *C51.0*

Bartholin *–suite*
- Sans précision ¬ Affection de la glande de *N75.9*
- ¬
- - Abcès
- - - Glande de *N75.1*
- - - Gonococcique des glandes de *A54.1*
- - Affection glande
- - - *N75*
- - - *N75.8*
- - Kyste de la glande de *N75.0*

Bartholinite ¬
- *N75.1*
- *N75.8*

Barton ¬ Fracture de *S52.52*

Bartonella henselae ¬ Bartonellose à *A28.1*

Bartonellose
- Bartonella henselae ¬ *A28.1*
- Cutanée et cutanéo-muqueuse ¬ *A44.1*
- Généralisée ¬ *A44.0*
- Sans précision ¬ *A44.9*
- ¬
- - *A44*
- - Formes de *A44.8*

Bart-Pumphrey ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bartsocas-Papas ¬ Syndrome de *Q87.2*

Bartter ¬ Syndrome de *E26.8*

Bas
- Degré
- - Prostate [PIN] ¬ Néoplasie intraépithéliale de *N40*
- - ¬ Épendymome de *D43.2*
- Grade
- - LSIL] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de *N87.0*
- - Prostate ¬ Dysplasie de *N42.3*

Basal
- Col de l'utérus ¬ Carcinome adénoïde *C53.9*
- ¬ Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): latéro- *I22.8*
- - Transmural (aigu): latéro- *I21.2*

Basan-Baird ¬ Syndrome de *Q82.8*

Basedow
- Exophtalmie ¬ Maladie de *E05.0†, H06.2**
- Maladie
- - Cardiaque ¬ Maladie de *E05.0†, I43.8**
- - Oculaire ¬ Maladie de *E05.0†, H58.8**
- Orbitopathie endocrinien
- - Ésotropie ¬ Maladie de *E05.0†, H06.3**
- - Hypotropie ¬ Maladie de *E05.0†, H06.3**
- - Rétraction de paupière ¬ Maladie de *E05.0†, H06.3**
- - ¬ Maladie de *E05.0†, H06.3**
- ¬
- - Exophtalmie au cours de maladie de *E05.0†, H06.2**

Basedow *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie
- - - *E05.0*
- - - *E05.0†, H06.2**

Basilaire
- Carotide vertébral
- - N entraînant infarctus cérébral ¬
- - - Embolie des artères *I65*
- - - Obstruction (complète) (partielle) des artères *I65*
- - - Sténose des artères *I65*
- - - Thrombose des artères *I65*
- - ¬ artère
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- Primitive ¬ Invagination *Q75.8*
- Tronc) ¬ Anévrisme et dissection de l'artère *I72.5*
- Tuberculeuse ¬ Méningite *A17.0†, G01**
- ¬
- - Artériosclérose de l'artère *I65.1*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.4*
- - Migraine: *G43.1*
- - Occlusion et sténose de l'artère *I65.1*
- - Syndrome vertébro- *G45.0*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.80*

BASM ¬ Syndrome *Q87.8*

Basocellulaire
- Lèvre ¬ Carcinome *C44.0*
- Vulve ¬ Carcinome *C51.9*
- ¬ Nævomatose *Q85.8*

Basophile
- Acidophile de l'hypophyse ¬ Carcinome mixte *C75.1*
- Éosinophile de l'hypophyse ¬ Carcinome *C75.1*
- Hypophyse ¬
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome
- - - *C75.1*
- - - Mixte acidophile et *C75.1*
- ¬ Leucémie
- - *C94.30*
- - Aiguë à *C94.7*

Basophilie ¬ *D75.8*

Bassin
- Associée à une lésion intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du *S31.83!*
- Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.82*
- Cuisse ¬
- - AO [artériopathie oblitérante] de type *I70.29*

Bassin *–suite*
- Cuisse ¬ *–suite*
- - Artériopathie oblitérante de type *I70.29*
- Entraînant disproportion
- - SAI ¬ Malformation du *O33.0*
- - ¬ Rétrécissement
- - - Cavité médiane (*O33.3*
- - - Détroit
- - - - Inférieur (*O33.3*
- - - - Supérieur (du *O33.2*
- Féminin
- - Cours de gonorrhée ¬ Inflammation du *A54.2†, N74.3**
- - ¬
- - - Abcès tuberculeux du *A18.1†, N74.1**
- - - Inflammation syphilitique
- - - - Secondaire du *A51.4†, N74.2**
- - - - Tardive du *A52.7†, N74.2**
- - - Tuberculose du *A18.1†, N74.1**
- Généralement rétréci ¬ Dystocie due à un *O65.1*
- Ischion ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.81*
- Maternel
- - Généralement rétréci ¬ Soins maternels pour disproportion due à un *O33.1*
- - ¬ Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du *O33.2*
- Membre s ¬
- - Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du *T04.7*
- - Fractures du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membre(s), ou du thorax, du *T02.7*
- Mère ¬ Soins maternels pour disproportion due à une malformation du *O33.0*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du *T34.3*
- Partie non précisée ¬ Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du *S30.9*
- Rétréci
- - SAI entraînant une disproportion ¬ *O33.1*
- - ¬ *P03.1*
- Sacrum et coccyx ¬ Tumeur bénigne: *D16.8*
- SAI ¬ Plaie ouverte de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du *S31*
- Sans précision ¬
- - Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du *T35.3*
- - Lésion traumatique abdomen lombes
- - - *S39*
- - - *S39.9*
- - Ostéochondrite juvénile de la hanche et du *M91.9*
- ¬
- - *S31.0*

Bassin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Adhérence tuberculeuse du *A18.11†, N74.1**
- - Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du *S38.3*
- - AO [artériopathie oblitérante] de type *I70.29*
- - Artériopathie oblitérante de type *I70.29*
- - Contusion des lombes et du *S30.0*
- - Déformation acquise du *M95.5*
- - Écrasement
- - - Amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du *S38*
- - - Parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du *S38.1*
- - - Thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du *T04.1*
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S33.7*
- - Fracture
- - - Complexes du *S32.7*
- - - Multiples du rachis lombaire et du *S32.7*
- - - Ouverte du *S32.89, S31.87!*
- - - Parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.8*
- - - Rachis lombaire et du *S32*
- - - Thorax avec fractures des lombes et du *T02.1*
- - Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du *T33.3*
- - Lésion
- - - Précisées de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du *S39.88*
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du *S31.84!*
- - - - - Lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du *S31.87!*
- - - - II
- - - - - Lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du *S31.85!*
- - - - - Lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du *S31.88!*
- - - - III
- - - - - Lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du *S31.86!*
- - - - - Lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du *S31.89!*
- - - Traumatique
- - - - Multiple
- - - - - Abdomen, des lombes et du *S39.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35.7*
- - - - Muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du *S39.0*
- - - - Nerf
- - - - - Moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S34*

Bassin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Nerf *–suite*
- - - - - Non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S34.8*
- - - - - S) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du *S34.6*
- - - - - Sympathiques lombaires, sacrés et du *S34.5*
- - - - Organe du *S37.88*
- - - - Précisées de l'abdomen, des lombes et du *S39.8*
- - - - Superficiel
- - - - - Abdomen, des lombes et du *S30*
- - - - - Abdomen, des lombes et du *S30.8*
- - - - - Multiples de l'abdomen, des lombes et du *S30.7*
- - - - - Thorax, de l'abdomen, des lombes et du *T00.1*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35.88*
- - - - - Sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35*
- - - - - Sanguins épiduraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du *S35.80*
- - - - - Sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35.9*
- - - - - Sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du *S35.82*
- - - - - Sanguins sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du *S35.81*
- - Luxation
- - - Entorse foulure
- - - - Articulations et des ligaments du rachis lombaire et du *S33*
- - - - Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du *T03.1*
- - - Parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S33.3*
- - Ostéochondrite juvénile
- - - *M91.0*
- - - Hanche
- - - - *M91*
- - - - *M91.8*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - Abdomen, des lombes et du *S31*
- - - - Lombes et du *S31.0*
- - - - Non précisée d'autres parties de la ceinture du *S71.80*
- - - Ouvertes
- - - - Multiples de l'abdomen, des lombes et du *S31.7*
- - - - Thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du *T01.1*

Bassin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Séquelles d'autres fractures du thorax et du *T91.2*
- - Tuberculose du *A18.0†, M90.05**
- - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du *D21.5*

Bassinet

- Malformations congénitales de l'uretère ¬ Anomalies congénitales obstructives du *Q62*
- Non traumatique ¬ Rupture du *N28.80*
- Rein ¬ Déchirure de la capsule et du *S37.02*
- Rénal ¬
- - Défaut congénitale du *Q63.8*
- - Tumeur bénigne: *D30.1*
- Uretère ¬ Autres anomalies obstructives du *Q62.3*
- ¬ Tumeur
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.1*
- - Malign
- - - *C65*
- - - Rein, à l'exception du *C64*
- - - Secondaire du rein et du *C79.0*

Bassin-jambe

- Douleur
- - Ischémique effort distance marche 200 m
- - - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.21*
- - - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.22*
- - Repos ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.23*
- Gangrène ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.25*
- Sans douleurs ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.20*
- Stade
- - IIb de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.22*
- - III de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.23*
- - IV
- - - Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.25*
- - - Selon Fontaine avec ulcération ¬ Athérosclérose des artères distales de type *I70.24*
- - IVa de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.25*
- - IVb de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.25*
- Ulcération ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.24*
- ¬
- - Artériosclérose de type *I70.29*
- - Ulcère de jambe mixte de type *I70.24*

Bathing suit ichthyosis ¬ *Q80.2*

Bâtiment en feu ¬ Effondrement d'un *X59.9!*

Bâtonnets

- Némaline] ¬ Myopathie: à *G71.2*
- ¬

Bâtonnets *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dystrophie des cônes et des *H35.5*
- - Monochromatie à *H53.5*
- - Myopathie congénitale à *G71.2*
- - Syndrome de dysplasie spondylo-métaphysaire-dystrophie des cônes et des *Q77.8*

Battements cardiaque
- Prématurés [extrasystoles] ¬ *I49.4*
- ¬ Perception des *R00.2*

Batten
v.a. Batten-Kufs
- ¬ Maladie de: *E75.4*

Batten-Kufs de la rétine ¬ Syndrome de *E75.4†, H36.8**

Batten-Mayou ¬ Syndrome de *E75.4*

Battey] ¬ Infection à Mycobacterium: intracellulare [bacille de *A31.0*

Battu SAI ¬ Bébé ou enfant *T74.1*

Baumannii multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Groupe Acinetobacter *U81.11!*
- 3MRGN ¬ Groupe Acinetobacter *U81.31!*
- 4MRGN ¬ Groupe Acinetobacter *U81.51!*

Bauxite ¬ Fibrose (du poumon) due à la *J63.1*

Bayer
v. Braun-Bayer

Bazex-Dupré-Christol ¬ Syndrome de *Q82.8*

Bazin
v. Alibert-Bazin

BB) proprement dite ¬ Borderline (*A30.3*

BCG] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [*Z23.2*

BCR ABL
- Négative ¬ Leucémie myéloïde chronique atypique, *C92.2*
- Positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], *C92.1*

Bean ¬ Syndrome de *Q27.8*

Béance
- Cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ Recherche et soins d'une *N88.3*
- Col
- - Utérus ¬ *N88.3*
- - ¬
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par la *P01.0*
- - - Soin maternel
- - - - *O34.3*
- - - - Cerclage avec ou sans mention de *O34.3*
- - - - Opération de Shirodkar avec ou sans mention de *O34.3*
- Occlusale dentaire (antérieure) (postérieure) ¬ *K07.2*

Beare-Stevenson ¬ Syndrome de *Q87.8*

Beau ¬ Lignes de *L60.4*

Beauce ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique récessive type *G11.2*

Beaux-parents ¬ Difficultés dans les rapports avec les parents et les *Z63*

Bébé
- Bronzé ¬ Syndrome du *P83.8*
- Collodion
- - Guérison spontanée ¬ *Q80.2*
- - ¬ *Q80.2*
- Enfant battu SAI ¬ *T74.1*
- Poupée de son" ¬ Syndrome non spécifique du *P94.2*

Bêche (congénitale) ¬ Main en *Q68.1*

Beck ¬ Maladie de Kaschin- *M12.1*

Becker ¬
- Dystrophie musculaire
- - Autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou *G71.0*
- - Bénigne [*G71.0*
- Myotonie: congénitale: récessive [*G71.1*

Beckwith-Wiedemann
- Défaut d'empreinte de la région 11p15 ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Disomie uniparentale d'origine paternelle du chromosome 11 ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Microdélétion 11p15 ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Mutation de CDKN1C ¬ Syndrome de *Q87.3*
- ¬ Syndrome de: *Q87.3*

Bednar ¬ Aphtose de *K12.0*

Beemer-Ertbruggen ¬ Syndrome de *Q87.8*

Beemer-Langer ¬ Syndrome des côtes courte-spolydactylie type *Q77.2*

Bégaiement ¬ *F98.5*

Behçet ¬
- Syndrome de *M35.2*
- Ulcération de la vulve au cours de la maladie de *M35.2†, N77.8**

Behmel
v. Simpson-Golabi-Behmel

Behnke
v. Thiel-Behnke

Beighton ¬ Dysplasie épiphysaire multiple type *Q77.3*

Béjel ¬ *A65*

Bell
v.a. Martin-Bell
- SAI ¬ Paralysie faciale (de) *G51.0*

Belli et Isospora hominis ¬ Infection due à Isospora *A07.3*

Bellussi
v. Gurrieri-Sammito-Bellussi

Bence Jones ¬ Protéinurie (de): *R80*

Bencze ¬ Syndrome de *Q67.4*

Benedikt ¬ Syndrome de *I67.9†, G46.3**

Bénin
v. Type de maladie

Bennett ¬ Fracture de *S62.21*

Bensaude ¬ Adénolipomatose de Launois- *E88.8*

Benzène
- Homologues ¬ Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du *T65.3*
- ¬ Effet toxique
- - *T52.1*
- - Homologues du *T52.2*

Benzodiazépines ¬ Intoxication
- *T42.4*

Benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, *T50.2*

Berant ¬ Syndrome de *Q87.8*

Berardinelli-Seip ¬ Lipodystrophie congénitale de *E88.1*

Berger ¬ Maladie de *N02.8*

Béribéri
- Humide avec implication du système circulatoire ¬ *E51.1†, I98.8**
- Sec ¬ *E51.1*
- ¬
- - *E51.1*
- - Cardiomyopathie avec *E51.1†, I43.2**
- - Dégénérescence cérébrale avec *E51.1†, G32.8**
- - Polio-encéphalomyélite avec *E51.2†, G32.8**
- - Polyneuropathie avec *E51.1†, G63.4**

Berlin
- Breakage ¬ Syndrome *Q87.8*
- ¬ Dysplasie ectodermique type *Q82.8*

Bernard
v. Claude-Bernard-Horner
- Horner ¬ Syndrome de Claude *G90.2*
- Soulier [plaquettes géantes] ¬ Syndrome de(s): *D69.1*

Bernuth ¬
- Pseudohémophilie de *D68.09*
- Syndrome de *D68.09*

Berry
v. Forster-McCarthy-Berry

Bertini ¬ Syndrome neurodégénératif lié à l'X type *G31.88*

Bérylliose ¬
- *J63.2*
- Granulomes hépatiques au cours de *J63.2†, K77.8**

Béryllium et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.7*

Besace) ¬ Soins maternels pour: abdomen penduleux (ventre en *O34.8*

Besnier ¬
- Érythème marginé discoïde de *L53.2*
- Prurigo de *L20.0*

Bessel-Hagen ¬ Maladie de *Q78.6*

Best ¬ Syndrome de *H35.5*

Bestrophinopathie autosomique récessive ¬ *H35.5*

Bêta
- 1 de l'interleukine 12 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en récepteur *D84.8*
- Adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et *T44.9*
- Bloquants, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.7*
- Gamma-delta ¬ Contient des cellules de type alpha- *C86.1*
- Glucoronidase ¬ Carence en *E76.2*
- Îlots de Langerhans SAI ¬ Hyperplasie des cellules *E16.1*
- Mineure ¬ Thalassémie (*D56.3*
- Sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents principalement *T44.5*
- Thalassémie
- - Grave ¬ *D56.1*
- - Mineure ¬ *D56.3*
- - ¬
- - - *D56.1*
- - - Delta- *D56.2*
- - - Hémoglobine Lepore- *D56.8*
- - - HPFH - *D56.4*
- - - Syndrome de persistance familiale de l'hémoglobine fœtale- *D56.4*
- Thalassemie à hématies falciformes ¬ *D57.2*

Bêta-1,4-galactosyltransférase ¬ Déficit en *E77.8*

Bêta-alanine synthase ¬ Déficit en *E79.8*

Bêta-cétothiolase ¬ Déficit en *E71.1*

Bêta-énolase musculaire ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Bêta-galactosidase-1 ¬ Déficit en *E75.1*

Bêta-hydroxylase ¬
- Déficit en dopamine *G90.8*
- Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 11- *E25.08*

Bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase
- 3 ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XY par déficit en 17- *E29.1*
- Type 3 ¬
- - Déficit en 17- *E29.1*
- - Pseudo-hermaphrodisme masculin par déficit en 17- *E29.1*
- ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 3- *E25.08*

Bétaïne clorale ¬ Dépendance à la *F13.2*

Bêtalactamines ¬ Intoxication: Céphalosporines et autres *T36.1*

Bêtalipoprotéinémie large ou flottante ¬ *E78.2*

Bêta-mannosidase lysosomale ¬ Déficit en *E77.1*

Bêta-mannosidose ¬ *E77.1*

Bêta-oxydation peroxysomale ¬ Anomalie de la *E71.3*

Bêta-propeller ¬ Neurodégénérescence associée à une protéine *G23.0*

Bêta-sarcoglycanopathie ¬ *G71.0*

Bêta-synthase ¬
- Déficit en cystathionine *E72.1*
- Homocystinurie par déficit en cystathionine *E72.1*

Bêta-uréidopropionase ¬ Déficit en *E79.8*

Bétel ¬ Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*

Bethlem ¬ Myopathie de *G71.0*

Beukes ¬ Dysplasie de la hanche type *Q65.8*

Beuren
v. Williams-Beuren

Bhan
v. Irons-Bhan

Biais
- Aliment
- - Sans précision ¬ Effet toxique: Substance nocive absorbée par le *T62.9*
- - ¬ Effet toxique substance nocif
- - - Absorbées par le *T62*
- - - Précisées absorbées par le *T62.8*
- Fruits de mer ¬ Effet toxique de substances nocives absorbées par le *T61*

Biauriculaire ¬ Cœur triloculaire *Q20.4*

Biceps brachial ¬
- Lésion traumatique muscle tendon
- - Chef long du *S46.1*
- - Parties du *S46.2*
- Tendinite du muscle *M75.2*

Bickel-Fanconi ¬ Glycogénose de *E74.0*

Bickerstaff ¬ Rhombencéphalite de *G61.0*

Biclonale ¬ Leucémie aiguë *C95.0*

Bicorne
- Bicervical
- - Col et vagin perméables ¬ Utérus *Q51.3*
- - Hémivagin borgne ¬ Utérus *Q51.3*
- Unicervical ¬ Utérus *Q51.3*
- ¬
- - Soins maternels pour utérus: *O34.0*
- - Utérus *Q51.3*

Bicuspide ¬ Valvule aortique *Q23.1*

Bicuspidie
- Aortique familiale ¬ *Q23.1*
- Valvulaire aortique-anomalie des mains ¬ Syndrome de persistance du canal artériel- *Q87.2*

Bicyclette ¬ Accident de *V99!*

Biedl
v. Bardet-Biedl

Bieganski ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Bielschowsky
v. Jansky-Bielschowsky
- Jansky ¬ Maladie de: *E75.4*

Biemond ¬ Syndrome de *Q87.8*

Biermer ¬ Anémie (de): *D51.0*

Biesecker
v. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson

Bietti ¬ Dystrophie cristalline de *H31.2*

Bifasciculaire ¬ Bloc *I45.2*

Bifida
- Aperta
- - Kystique) ¬ spina *Q05*
- - ¬ Spina *Q05.9*
- Cervical
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.0*
- - Sans hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.5*
- Dorsal
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.1*
- - SAI ¬ Spina *Q05.6*
- Dorso lombaire
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.1*
- - SAI ¬ Spina *Q05.6*
- Hydrocéphalie, sans précision ¬ Spina *Q05.4*
- Kystique ¬ Spina *Q05.9*
- Lombaire
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.2*
- - Sans hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.7*
- Lombo-sacré
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.2*
- - SAI ¬ Spina *Q05.7*
- Occulta ¬ Spina *Q76.0*
- Présumé(e)) du fœtus ¬ Soins maternels pour: spina *O35.0*
- Sacré
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.3*
- - Sans hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.8*
- Sans précision ¬ Spina *Q05.9*
- Thoracique
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.1*
- - Sans hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.6*

Bifide
- Anomalies des extrémités ¬ Syndrome de trigonocéphalie-nez *Q87.0*
- Héréditaire ¬ Crâne *Q75.8*
- ¬
- - Langue *Q38.3*
- - Luette *Q35.7*
- - Pied *Q72.7*
- - Sternum *Q76.7*

Bifidité de la luette ¬ *Q35.7*

Bifidum ¬ Sternum *Q76.7*

Bifonctionnelle ¬ Déficit en enzyme *E71.3*

Bifurcati ¬ Pili *L67.8*

Bifurcation
- Aortique [syndrome de Leriche] ¬ Syndrome de la *I74.0*
- Siphon carotidien ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de la *I60.0*

Bilan de santé ¬ *Z00.0*

Bilatéral
v. Type de maladie

Bile
- Épaisse" ¬ Syndrome de la " *P59.1*
- ¬ Péritonite (due à): *K65.8*

Bilharziose
- Urinaire] ¬ Snail fever [*B65*
- ¬
- - Calcul urinaire au cours de *B65.0†, N22.0**
- - Glomérulopathie au cours de *B65.0†, N08.0**
- - Schistosomiase [*B65*

Biliaire
- Angiocholite ¬ Calcul des canaux *K80.3*
- Cholécystite
- - Aiguë ¬ Calcul de la vésicule *K80.0*
- - ¬ Calcul des canaux *K80.4*
- Cholestase et malabsorption ¬ Défaut de synthèse des acides *K76.8*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la vésicule biliaire et des voies *K87.0**
- Exclue ¬ Vésicule *R93.2*
- Extra-hépatique
- - Vésicule biliaire ¬ Tumeur bénigne: Voies *D13.5*
- - ¬
- - - Adénocarcinome des voies *C24.0*
- - - Carcinome épidermoïde des voies *C24.0*
- - - Tumeur maligne: Canal *C24.0*
- Faible niveau de phospholipides ¬ Lithiase *K80.80*
- Foie ¬ Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies *Q44*
- Forme de cholécystite ¬ Calcul de la vésicule *K80.1*
- Intracrânien ¬
- - Carcinome
- - - Épidermoïde du foie et des voies *C22.0, C22.1*
- - - Indifférencié du foie et des voies *C22.9, C22.1*
- - Cystadénome des voies *D13.4*
- - Tumeur malign
- - - Foie et des voies *C22*
- - - Secondaire du foie et des voies *C78.7*
- Intrahépatique ¬
- - Carcinome du canal *C22.1*
- - Vésicule *Q44.1*
- Intra-hépatique ¬
- - Tumeur maligne affectant à la fois les canaux *C24.8*
- - Voies *D13.4*
- Isolée ¬ Atrésie des voies *Q44.2*
- Pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la vésicule biliaire, des voies *K87**
- Primitif
- - Stade Child-Pugh
- - - A ¬ Cirrhose *K74.3, K74.70!*
- - - B ¬ Cirrhose *K74.3, K74.71!*
- - - C ¬ Cirrhose *K74.3, K74.72!*
- - ¬
- - - Cholangite *K74.3*

Biliaire *–suite*
- Primitif *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Cirrhose *K74.3*
- Récidivante) sans précision ou sans cholécystite ¬ Colique *K80.2*
- SAI
- - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul (bloqué) d'un canal *K80.5*
- - ¬
- - - Canal: *C24.0*
- - - Malformation congénital
- - - - Vésicule *Q44.1*
- - - - Voies *Q44.5*
- Sans
- - Angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul des canaux *K80.5*
- - Calcul ¬
- - - Abcès de la vésicule *K81.0*
- - - Empyème de la vésicule *K81.0*
- - - Gangrène de la vésicule *K81.0*
- - - Occlusion canal
- - - - *K83.1*
- - - - Cystique ou de la vésicule *K82.0*
- - - Rétrécissement canal
- - - - *K83.1*
- - - - Cystique ou de la vésicule *K82.0*
- - - Sténose canal
- - - - *K83.1*
- - - - Cystique ou de la vésicule *K82.0*
- - Cholécystite ¬ Calcul de la vésicule *K80.2*
- - Précision
- - - Sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: vésicule *K80.2*
- - - ¬
- - - - Cirrhose *K74.5*
- - - - Maladie
- - - - - Vésicule *K82.9*
- - - - - Voies *K83.9*
- - - - Tumeur maligne: Voies *C24.9*
- Secondaire
- - Stade Child-Pugh
- - - A ¬ Cirrhose *K74.4, K74.70!*
- - - B ¬ Cirrhose *K74.4, K74.71!*
- - - C ¬ Cirrhose *K74.4, K74.72!*
- - ¬ Cirrhose *K74.4*
- Stade Child-Pugh
- - A ¬ Cirrhose *K74.5, K74.70!*
- - B ¬ Cirrhose *K74.5, K74.71!*
- - C ¬ Cirrhose *K74.5, K74.72!*
- Syndromique
- - Monosomie 20p12 ¬ Paucité des voies *Q44.7*
- - Mutation ponctuelle de JAG1 ¬ Paucité des voies *Q44.7*
- Voie biliaire

Biliaire *–suite*
- Voie biliaire *–suite*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la vésicule *K87.0**
- - Foie ¬ Malformations congénitales de la vésicule *Q44*
- - Pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la vésicule *K87**
- - ¬
- - Absence congénitale de la vésicule *Q44.0*
- - Adénocarcinome de la vésicule *C23*
- - Adhérence canal
- - - *K83.8*
- - - Cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule *Q44.0*
- - Atrésie des voies *Q44.2*
- - Atrophie canal
- - - *K83.8*
- - - Cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Carcinoma in situ: Foie, vésicule et voies *D01.5*
- - Choléstérolose de la vésicule *K82.4*
- - Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les voies *T85.53*
- - Cystadénocarcinome *C22.1*
- - Déficit congénital de synthèse des acides *K76.8*
- - Distomiase des voies *B66.3†, K87.0**
- - Duplication du canal: *Q44.5*
- - Dyskinésie du canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Exclusion du canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Fistule
- - - Vésicule *K82.3*
- - - Voies *K83.3*
- - Gastrite *K29.6*
- - Hypertrophie canal
- - - *K83.8*
- - - Cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Iléus *K56.3*
- - Infection purulente aiguë de la vésicule *K81.0*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la vésicule et des voies *K91.81*
- - Kyste
- - - *K83.5*
- - - Canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Lésion traumatique
- - - Canal *S36.18*
- - - Foie et de la vésicule *S36.1*
- - - Vésicule *S36.17*
- - Malabsorption idiopathique par défaut de synthèse des acides *K90.8*
- - Maladie
- - - Précis
- - - - Vésicule *K82.8*

Biliaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Précis *–suite*
- - - - Voies *K83.8*
- - - Vésicule *K82*
- - - Voies *K83*
- - Malformation congénital
- - - Vésicule *Q44.1*
- - - Voies *Q44.5*
- - Mucocèle de la vésicule *K82.1*
- - Obstruction des voies *K83.1*
- - Occlusion
- - - Intestin par calculs *K56.3*
- - - Vésicule *K82.0*
- - Pancréatite aigu
- - - Origine *K85.1*
- - - Secondaire à des calculs *K85.1*
- - Perforation
- - - Vésicule *K82.2*
- - - Voies *K83.2*
- - Reflux *K29.6*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies *R93.2*
- - Rupture canal
- - - *K83.2*
- - - Cystique ou de la vésicule *K82.2*
- - Sténose et rétrécissement congénitaux des voies *Q44.3*
- - Syphilis tardive de la vésicule *A52.7†, K87.0**
- - Tuberculose de la vésicule *A18.8†, K87.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule *D13.5*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies *D37.6*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës des voies *C24.8*
- - - - Vésicule *C23*
- - - Neuroendocrine de la vésicule *C23*
- - Ulcère canal
- - - *K83.8*
- - - Cystique ou de la vésicule *K82.8*

Bilirubine
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme de la *E80.7*
- Uridine-diphosphate glucuronosyltransférase
- - Type
- - - 1 ¬ Déficit en *E80.5*
- - - 2 ¬ Déficit en *E80.5*
- - ¬ Déficit en *E80.5*
- ¬ Autres anomalies du métabolisme de la *E80.6*

Biliurie ¬ *R82.2*

Bimalléolaire ¬ Fracture *S82.81*

Binder ¬ Syndrome de *Q75.8*

Bindewald-Ulmer-Müller ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bing ¬
- Erythroprosopalgie de type *G44.0*
- Syndrome de Taussig- *Q20.1*

Binoculaire
- Non précisée ¬ Atteinte de la vision (*H54.9*
- Sans précision ¬ Anomalie des mouvements *H51.9*
- ¬
- - Anomalie
- - - Mouvements *H51*
- - - Précisées des mouvements *H51.8*
- - Atteinte
- - - Légère de la vision *H54.3*
- - - Modérée de la vision *H54.2*
- - - Sévère de la vision *H54.1*
- - Cécité et forte baisse de la vision *H54.0*
- - Disparition de la vision *H53.3*
- - Troubles de la vision *H53.3*

Binswanger ¬
- Démence de *F01.2*
- Maladie de *I67.3*
- Syndrome de *G31.88*

Biochimiques
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.1*
- Détresse fœtale ¬ Travail et accouchement compliqués de signes *O68.3*

Biocides ¬ Intoxication par des *T60.9*

Bioélectrique pendant le sommeil ¬ État de mal épileptique *G40.01*

Biologie moléculaire
- Histologique ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - Empyème tuberculeux
- - - Confirmation bactériologique, par *A15.6*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.5*
- - Fibrose tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - Forme tuberculose appareil respiratoire
- - - Confirmation, bactériologique, par *A15.8*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - Pleurésie tuberculeux
- - - Confirmation bactériologique, par *A15.6*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.5*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.5*
- - Pneumonie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - Pneumothorax tuberculeux sans confirmation bactériologique, par *A16.0*

Biologie moléculaire *–suite*
- Histologique ¬ *–suite*
- - Primo infection tuberculeux appareil respiratoire
- - - Confirmation bactériologique, par *A15.7*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.7*
- - Tuberculose
- - - Appareil respiratoire
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15*
- - - - Sans
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A16*
- - - - - Précision, avec confirmation bactériologique, par *A15.9*
- - - - - Précision, sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.9*
- - - Bronche
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - Ganglion intrathoracique
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - Sans mention de confirmation, bactériologique, par *A16.3*
- - - Ganglionnaire
- - - - Hilaire
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - - Médiastinal
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - - Trachéo-bronchique
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - Glotte
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - Larynx
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - - Trachée
- - - - - Bronches, avec confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - - Bronches, sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - Médiastinal
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*

Biologie moléculaire *–suite*
- Histologique ¬ *–suite*
- - Tuberculose *–suite*
- - - Nasal
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - - Plèvre
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.6*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.5*
- - - Pulmonaire
- - - - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - Sans
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - - - - Examen bactériologique, par *A16.1*
- - - - - Mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - Rhinopharyngé
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - - Sinus face
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - - Trachée
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*

Biologique
- Actif
- - Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances *Y59.9!*
- - ¬
- - - Complications dues à des vaccins ou à des substances *Y59.9!*
- - - Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances *Y59!*
- - - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Médicament, drogues et autres substances *X49.9!*
- Sans précision ¬
- - Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance *Z88.9*
- - Intoxication
- - - Diurétiques et médicaments et substances *T50*
- - - Médicaments et substances *T50.9*
- - Néphropathie due à un médicament ou une substance *N14.2*
- ¬
- - Antécédent personel allergie médicament substance
- - - *Z88.8*
- - - *Z91.0*
- - Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances *R82.5*
- - Néphropathie due à d'autres médicaments et substances *N14.1*
- - Séquelles d'intoxications par médicaments et substances *T96*

Biomécanique
- Non classées ailleurs ¬ Lésions *M99*
- Sans précision ¬ Lésion *M99.9*
- ¬ Autres lésions *M99.8*

Biopsie ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*

Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène testiculaire SAI ¬ *E29.1*

Biotine
- Dépendante ¬ Déficit en carboxylase *D81.8*
- ¬
- - Carence en: *E53.8*
- - Déficit en carboxylase dépendant de la *D81.8*
- - Maladie des ganglions de la base sensible à la *G25.88*

Biovar
- Cholerae ¬ A Vibrio cholerae 01, *A00.0*
- El Tor ¬ A Vibrio cholerae 01, *A00.1*

Biphénotypique ¬ Leucémie aiguë *C95.0*

Bipolaire
- Actuellement en rémission ¬ Trouble affectif *F31.7*
- Épisode
- - Actuel

Bipolaire *–suite*
- Épisode *–suite*
- - Actuel *–suite*
- - - Dépression
- - - - Légère ou moyenne ¬ Trouble affectif *F31.3*
- - - - Sévère
- - - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.4*
- - - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.5*
- - - Hypomaniaque ¬ Trouble affectif *F31.0*
- - - Maniaque
- - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.1*
- - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.2*
- - - Mixte ¬ Trouble affectif *F31.6*
- - Maniaque isolé ¬ trouble *F30*
- II ¬ Trouble *F31.8*
- Sans précision ¬ Trouble affectif *F31.9*
- Type I ¬ Trouble *F31.8*
- ¬ Trouble affectif
- - *F31*
- - *F31.8*

Birdshot ¬
- Choriorétinopathie type *H30.1*
- Rétinochoroïdopathie type *H30.1*

Birk-Barel ¬ Déficience intellectuelle type *Q87.8*

Bisalbuminemie ¬ *E88.0*

Bitot
- Jeune enfant ¬ Taches de *E50.1*
- Xérosis conjonctival ¬ Avitaminose A avec taches de *E50.1†, H13.8**

Bitronculaire
- Tritronculaire ¬ Maladie coronarienne *I25.13*
- ¬
- - Cardiopathie artérioscléreuse: Implication *I25.12*
- - Maladie athéroscléreuse *I25.12*

Bivalent ¬ Travestisme *F64.1*

Bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, *D68.35*

Bixler
v. Antley-Bixler

Bizarre ¬ Apparence personnelle *R46.1*

Bjerrum ¬ Scotome (de): *H53.4*

BK ¬ Infection à virus *B34.4*

BL) ¬ Borderline lépromateuse (*A30.4*

Blackfan-Diamond ¬
- Anémie hypoplasique congénitale de *D61.0*
- Syndrome de *D61.0*

Blake ¬ Persistance du kyste de la poche de *Q03.1*

Blanca ¬ Tinea *B36.2*

Blanchisseurs ¬ Gale des *B35.6*

Blastes

- AREB] ¬ Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- Transformation ¬ Anémie réfractaire
- - Crise blastique (prolifération de *C92.0*
- - Excès de *D46.2*
- Type
- - I [AREB I] ¬ Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- - II [AREB II] ¬ Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- ¬
- - Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- - Myélodysplasie avec excès de *D46.9*

Blastique

- Cellules NK ¬ Lymphome *C86.4*
- Cours
- - Leucémie myéloïde
- - - Chronique [LMC] ¬ Crise *C94.8!*
- - - ¬ Poussée *C92.10, C94.8!*
- - Transformation ¬ Anémie réfractaire avec crise *C92.00*
- Prolifération de blastes en transformation) ¬ Anémie réfractaire avec crise *C92.0*

Blastocystis ¬ Infection à *B60.8*

Blastome pulmonaire ¬ *C34.9*

Blastomycose

- Brésilienne ¬ *B41*
- Chéloïdienne ¬ *B48.0*
- Cutanée ¬ *B40.3†, L99.8**
- Disséminée ¬ *B40.7*
- Généralisée ¬ *B40.7*
- Primaire du poumon ¬ *B40.0†, J99.8**
- Pulmonaire
- - Aiguë ¬ *B40.0†, J99.8**
- - Chronique ¬ *B40.1†, J99.8**
- - ¬ *B40.2†, J99.8**
- Sans précision ¬ *B40.9*
- ¬
- - Formes de *B40.8*
- - Méningo-encéphalite au cours de *B40.8†, G05.2**

Blennorhéique ¬

- Épididymite *A54.2†, N51.1**
- Vaginite *A54.0†, N77.1**

Blennorragique

- Aiguë ¬ Orchite *A54.2†, N51.1**
- Néonatale ¬ Conjonctivite *A54.3†, H13.1**
- ¬
- - Endométrite *A54.2†, N74.3**
- - Vulvite *A54.0†, N77.1**

Blennorrhée

- Inclusion ¬ *A74.0†, H13.1**
- Nouveau-né ¬ *A54.3†, H13.1**

Blénorragie ¬ Sujet porteur de: *Z22.4*

Blépharite

- Cours
- - Acné rosacée ¬ *L71.8†, H03.8**
- - Herpès ¬ *B00.5†, H03.1**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H03.1**
- ¬ *H01.0*

Blépharochalasis ¬ *H02.3*

Blépharo-cheilo-odontique ¬ Syndrome *Q87.0*

Blépharo-conjonctivite

- Cours d'acné rosacée ¬ *L71.8†, H13.2**
- ¬ *H10.5*

Blépharo-naso-facial ¬ Syndrome *Q87.0*

Blépharophimosis

- Congénital ¬ *Q10.3*
- Ptosis-ésotropie-syndactylie-petite taille ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬ *H02.5*

Blépharophimosis-ptosis-épicanthus inversus ¬ Syndrome de *Q10.3*

Blépharospasme ¬ *G24.5*

Blessure

- Agression ¬ Examen
- - Mise en observation après d'autres *Z04.5*
- - Victime ou du coupable après d'autres *Z04.5*
- Cervicale de l'œsophage ¬ *S19.9*
- Crânienne sévère non ouverte ¬ *S06.20*
- Crânio-cérébrale ¬ Démence après une *T90.9†, F02.8**
- Épiglotte, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Gorge, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Intracrânien
- - Coma prolongé ¬ *S06.9, S06.79!*
- - ¬ Séquelles d'une fracture du crâne avec *T90.2*
- Larynx ¬
- - *S19.9*
- Mère par un instrument pendant l'accouchement ¬ *O71.9*
- Moelle épinière cervicale ¬ Multiples *S14.10*
- Non perforante de la sclérotique ¬ *S05.8*
- Ouverte
- - Bout charnu du doigt ¬ *S61.0*
- - Crâne ¬ *S06.20, S01.83!*
- - Hémothorax ¬ *S27.1, S21.83!*
- - Pneumothorax ¬ *S27.0, S21.83!*
- - Rein ¬ *S37.00, S31.83!*
- - Urètre ¬ *S37.1, S31.83!*
- - Vessie ¬ *S37.20, S31.83!*
- Partie cervicale de la trachée, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Pharynx ¬
- - *S19.88*
- - *S19.9*
- Physiques ¬ Automutilation et autres *Z91.8*
- Pression d'une explosion, n.c.a. ¬ *T70.8*

Blessure *–suite*

- Reperfusion (retour absent ou lent dans le corps) ¬ *T88.8*
- Superficiel
- - Lèvre et de la cavité buccale ¬ *S00.5*
- - Multiples de la tête ¬ *S00.7*
- - Nez ¬ *S00.3*
- - Oreille ¬ *S00.4*
- - Parties de la tête ¬ *S00.8*
- - Tête, partie non précisée ¬ *S00.9*
- Thyroïde, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Traumatique par poignardement du cœur ¬ Hémopéricarde dû à une *S26.0*
- Utérus par incision lors d'une intervention chirurgicale ¬ *T81.2*
- Vaisseau sanguin intracrânien ¬ *S06.8*
- ¬ Paralysie ischémique de Volkmann en tant que complication de *T79.60*

Blizzard
v. Johanson-Blizzard

Bloc

- Atrio-ventriculaire complet ¬ *I44.2*
- Auriculo-ventriculaire
- - 3ème degré ¬ *I44.2*
- - Complet ¬ *I44.2*
- - Congénital ¬ *Q24.6*
- - Premier degré ¬ *I44.0*
- - SAI ¬ *I44.3*
- - Sans précision ¬ *I44.3*
- - Second degré ¬ *I44.1*
- - Type I et II ¬ *I44.1*
- AV du fœtus avec menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un *O35.8*
- Bifasciculaire ¬ *I45.2*
- Branche
- - Droit
- - - SAI ¬ *I45.1*
- - - Sans précision ¬ *I45.1*
- - Gauche
- - - Auriculoventriculaire ¬ *I44*
- - - Sans précision ¬ *I44.7*
- - Héréditaire ¬ *I45.8*
- - SAI ¬ *I45.4*
- Cardiaque
- - Complet SAI ¬ *I44.2*
- - Précisé ¬ Autre *I45.5*
- - SAI ¬ *I45.9*
- Congénital du cœur ¬ *Q24.6*
- Fasciculaire
- - Antérieur gauche ¬ *I44.4*
- - Droit ¬ *I45.0*
- - Postérieur gauche ¬ *I44.5*
- - Sans précision ¬ *I44.6*
- Möbitz, type I et II ¬ *I44.1*
- Second degré, type I et II ¬ *I44.1*
- Sino-atrial ¬ *I45.5*

Bloc *–suite*
- Sino-auriculaire ¬ *I45.5*
- Trifasciculaire ¬ *I45.3*
- Ventriculaire non spécifique ¬ *I45.4*
- Vertébral tuberculeux ¬ *A18.0†, M49.09**
- Wenckebach ¬ *I44.1*

Blocage
- Ménisque ¬ *M23.3*
- Pupillaire ¬ Glaucome dû à un *H40.2*

Bloch-Siemens ¬ Syndrome de *Q82.3*

Bloch-Sulzberger ¬ Syndrome de *Q82.3*

Blomstrand ¬ Chondrodysplasie de *Q78.8*

Bloquants
- Neuromusculaires] ¬ Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [*T48.1*
- Neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents *T44.8*
- Non classé ¬ Intoxication
- - Alpha- *T44.6*
- - Bêta- *T44.7*

Bloqué
- Canal
- - Biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul (*K80.5*
- - Cystique sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (*K80.2*
- Vésicule biliaire sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (*K80.2*
- ¬ Epaule *M75.0*

Blount] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse supérieure du tibia [*M92.5*

Blow-out » ¬ Fracture « *S02.3*

Blumberg
v. Meier-Blumberg-Imahorn

BNAR ¬ Syndrome *Q87.8*

Bochdalek ¬ Hernie de *K44.9*

Bockenheimer ¬ Syndrome de *Q27.4*

Bockhart ¬ Impétigo de *L01.0*

BOD ¬ Syndrome *Q87.1*

Boeck ¬ Maladie de *D86.9*

Bœuf ¬
- Hypersensibilité aux protéines de *T78.1*
- Ver solitaire du *B68.1*

Bogaert
v. Van Bogaert
v. van Bogaert-Scherer-Epstein

Bohring-Opitz ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bois ¬
- Intoxication par des produits de protection du *T60.9*
- Produits de conservation du *T60*

Boisson
- Suite de négligence de soi ¬ Prise insuffisante de nourriture et de *R63.6*
- ¬ Prise insuffisante de nourriture et de *R63.6*

Bolivie ¬ Fièvre hémorragique de *A96.1*

Boltshauser
v. Poretti-Boltshauser

Bombé ¬ Iris *H21.4*

Böök ¬ Syndrome de *Q82.4*

Boomerang ¬ Dysplasie en *Q87.1*

Boonstra
v. Bosch-Boonstra-Schaaf

BOR ¬ Syndrome *Q87.8*

Bord
- Latéraux de la langue ¬ Tumeur maligne: Pointe et *C02.1*
- Libre
- - Face intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ Lèvre (*D10.0*
- - Lèvre
- - - Inférieure et le sillon mentolabial ¬ Peau pileuse entre le *C44.0*
- - - Supérieure et le nez ¬ Peau pileuse entre le *C44.0*
- - - ¬ *D00.0*
- - Marge] ¬ Epiglotte, *C10.1*
- - ¬ Tumeur malign Lèvre
- - - Inférieure, *C00.1*
- - - Sans précision, *C00.2*
- - - Supérieure, *C00.0*
- Postérieur cloison nasal choanes ¬
- - *C11.3*
- - *D10.6*

Borderline
- BB) proprement dite ¬ *A30.3*
- Lépromateuse (BL) ¬ *A30.4*
- Tuberculoïde (BT) ¬ *A30.2*
- ¬
- - Personnalité émotionnellement labile: Type *F60.31*
- - Schizophrénie: *F21*

Bordetella
- Parapertussis ¬ Coqueluche à *A37.1*
- Pertussis ¬ Coqueluche à *A37.0*
- ¬ Coqueluche due à d'autres espèces de *A37.8*

Borer
v. Dahlberg-Borer-Newcomer

Borghgraef
v. Grubben-de Cock-Borghgraef

Borgne
- Congénital ¬ Syndrome de l'anse *Q43.8*
- Non classé ailleurs ¬ Syndrome de l'anse *K90.2*
- SAI ¬ Syndrome de l'anse *K90.2*
- ¬
- - Syndrome post-chirurgical de l'anse *K91.2*
- - Utérus bicorne bicervical avec hémivagin *Q51.3*

Borjeson-Forssman-Lehmann ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bork ¬ Syndrome de *Q82.8*

Bornholm ¬ Maladie de *B33.0*

Borrelia
- Burgdorferi ¬ Érythème chronique migrateur à *A69.2*
- Recurrentis ¬ Fièvre récurrent
- - *A68.0*
- - Borrelia recurrentis ¬ Fièvre récurrente à Borrelia, sauf *A68.1*
- Sauf Borrelia recurrentis ¬ Fièvre récurrente à *A68.1*

Borréliose
- Lyme ¬ *A69.2*
- Poux ¬ Fièvre récurrente [*A68.0*
- Sans précision ¬ Fièvre récurrente [*A68.9*
- Tiques ¬ Fièvre récurrente [*A68.1*
- ¬ Fièvres récurrentes [*A68*

Borrmann 4 ¬ Cancer de l'estomac type *C16.9*

Bosch-Boonstra-Schaaf ¬ Syndrome d'atrophie optique *H47.2*

Bosley-Salih-Alorainy ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bosma-Henkin-Christiansen ¬ Syndrome de *Q87.0*

Boston ¬
- Exanthème de *A88.0*
- Fièvre exanthémateuse à entérovirus [exanthème de *A88.0*

Botal ¬ Perméabilité du canal de *Q25.0*

Bothnie ¬ Dystrophie rétinienne type *H35.5*

Bothriocephalus ¬ Anémie à *B70.0†, D63.8**

Botulinum ¬ Intoxication alimentaire classique à Clostridium *A05.1*

Botulisme ¬ *A05.1*

Bouba] ¬ Pian [*A66*

Bouc émissaire ¬ Hostilité envers un enfant transformé en *Z62*

Bouchard (avec arthropathie) ¬ Nodosités de *M15.2*

Bouche
- Feu ¬ Syndrome de la *K14.6*
- Non précisées ¬ Tumeur bénigne: Parties de la *D10.3*
- Partie non précis ¬
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.50*
- - Tumeur malign
- - - *C06*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C06.8*
- Pharynx ¬
- - Brûlure de la *T28.0*
- - Corrosion de la *T28.5*
- - Malformations congénitales de la langue, de la *Q38*
- - Tumeur bénigne de la *D10*
- Plancher) ¬ Phlegmon de la *K12.20*
- SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q38.6*
- Sans précision ¬
- - Phlegmon et abcès de la *K12.29*
- - Sécheresse de la *R68.2*

Bouche *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Tumeur malign
- - - *C06.9*
- - - Plancher de la *C04.9*
- ¬
- - Corps étranger dans la *T18.0*
- - Fibrose sous-muqueuse de la *K13.5*
- - Kyste
- - - Dermoïde de la *K09.8*
- - - Épidermoïde de la *K09.8*
- - - Lympho-épithélial de la *K09.8*
- - Maladie due au VIH avec candidose de la *B20, B37.0*
- - Malformations congénitales de la *Q38.6*
- - Phlegmon et abcès de la *K12.2*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la *S01.54*
- - Respiration par la *R06.5*
- - Syndrome pied-main- *B08.4*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, K93.8**
- - Tuberculose de la *A18.8†, K93.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: Plancher de la *D10.2*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës du plancher de la *C04.8*
- - - - Plancher
- - - - - *C04*
- - - - - Antérieur de la *C04.0*
- - - - - Latéral de la *C04.1*
- - - - Vestibule de la *C06.1*

Bouchon
- Cérumen ¬ *H61.2*
- Méconial ¬ Syndrome du *P76.0*
- ¬ Œsophage en tire- *K22.4*

Bouffée
- Chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que *N95.1*
- Délirant
- - Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ *F23.0*
- - Symptômes schizophréniques ¬ *F23.1*

Bougie ¬ passage de sonde ou de *Z43*

Bouillantes ¬ Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances *X19!*

Bouilloire ¬ Accident dû à: Explosion de chaudière/ *W49.9!*

Boulimie
- Atypique ¬ *F50.3*
- Bulimia nervosa) ¬ *F50.2*
- SAI ¬ *F50.2*

Bourneville ¬ Maladie de *Q85.1*

Bourrelet adipeux ¬ *E65*

Bourse
- Séreux

Bourse *–suite*
- Séreux *–suite*
- - Précisées ¬ Autres affections des *M71.8*
- - Sans précision ¬ Affections des *M71.9*
- - ¬
- - - *C49*
- - - *D21*
- - - Abcès des *M71.0*
- - - Affections des *M71*
- - - Dépôts calciques dans une *M71.4*
- - - Kystes des *M71.3*
- - - Tuberculose des *A18.0†, M73.89**
- ¬
- - Gonorrhée de la *A54.4†, M73.09**
- - Syphilis tardive d'une *A52.7†, M73.19**

Bouton d'Orient ¬ *B55.1*

Boutonneuse
- Méditerranéenne ¬ Fièvre *A77.1*
- ¬ Fièvre (à) (de): *A77.1*

Boutonnière et en col de cygne ¬ Déformation en *M20.0*

Bouveret(-Hoffmann) ¬ Syndrome de *I47.9*

Bovine
- Contagieuse ¬ Bacillose péritonéale par tuberculose *A18.3†, K93.0**
- Paupière ¬ Variole *B08.0†, H03.1**
- ¬ Variole *B08.0*

Bowen-Conradi ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bowman type II ¬ Dystrophie cornéenne de la membrane de *H18.5*

Boydii ¬
- Infection à Pseudallescheria *B48.2*
- Shigellose à Shigella *A03.2*

BP230 ¬ Epidermolyse bulleuse simple par déficit en *Q81.0*

Brachial
v.a. thoracobrachial
- Déplacement disque intervertébral ¬ Névrite
- - Nerf *M50.1†, G55.1**
- - Plexus *M50.1†, G55.1**
- Inférieur ¬ paralysie du plexus *P14.1*
- SAI ¬ Névrite ou radiculite: *M54.1*
- Supérieur ¬ paralysie du plexus *P14.0*
- Traumatisme obstétrical ¬ Autres lésions du plexus *P14.3*
- ¬
- - Affections du plexus *G54.0*
- - Anomalie du plexus *Q07.8*
- - Lésion traumatique
- - - Artère *S45.1*
- - - Muscle tendon
- - - - Chef long du biceps *S46.1*
- - - - Parties du biceps *S46.2*
- - - Plexus *S14.3*
- - - Veine axillaire et *S45.2*
- - Syndrome cervico- *M53.1*

Brachial *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tendinite du muscle biceps *M75.2*

Brachialgie ¬ Syndrome cervical chronique avec *M53.1*

Brachio-céphalique
- Entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (y compris tronc *I63*
- Sous-aortique ¬ Veine *Q26.8*
- ¬
- - Anévrisme syphilitique du tronc *A52.0†, I79.8**
- - Infarctus cérébral
- - - Embolie du tronc *I63.1*
- - - Occlusion du tronc *I63.2*
- - - Sténose du tronc *I63.2*
- - - Thrombose du tronc *I63.0*

Brachycéphalie isolée ¬ *Q75.0*

Brachydactylie
v.a. exostoses-anétodermie-brachydactylie
v.a. long-brachydactylie
- Doigts ¬ *Q71.8*
- Orteils ¬ *Q72.8*
- Préaxiale de Temtamy ¬ Syndrome de *Q87.2*
- Type B ¬ Syndrome de colobome maculaire- *Q87.8*
- ¬
- - *Q73.8*
- - Syndrome de Pierre Robin-déficience intellectuelle- *Q87.0*

Brachyolmie ¬ *Q76.4*

Brachytéléphalangie ¬ Chondrodysplasie ponctuée avec *Q77.3*

Bradyarythmie complète ¬ *I48.9*

Bradycardie
- Fœtale ¬ *O68.0*
- Sans précision ¬ *R00.1*
- Sinoatriale ¬ *R00.1*
- Sinusale ¬ *R00.1*
- Vagale ¬ *R00.1*
- ¬ Syndrome de tachycardie- *I49.5*

Bradykinique
- Acquis ¬ Angio-Œdème *T78.3*
- Héréditaire ¬ Angio-Œdème *D84.1*

Bradyopsie ¬ *H53.8*

Brailsford
v. Morquio-Ullrich-Brailsford
- ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête radiale [*M92.1*

Branchante
- Forme neuromusculaire périnatal fatale ¬
- - Glycogénose par déficit en enzyme *E74.0*
- - GSD par déficit en enzyme *E74.0*
- ¬ GSD par déficit en enzyme *E74.0*

Branche
- Droit
- - SAI ¬ Bloc de *I45.1*

Branche *–suite*
- Droit *–suite*
- - Sans précision ¬ Blocs de *I45.1*
- Gauche
- - Auriculoventriculaire ¬ Bloc de *I44*
- - SAI ¬ Hémibloc de *I44.6*
- - Sans précision ¬ Bloc de *I44.7*
- Héréditaire ¬ Bloc de *I45.8*
- Maxillaire, SAI ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.64*
- SAI ¬ Bloc de *I45.4*
- Terminale externe du nerf tibial antérieur ¬ *S94.2*
- ¬ Occlusion
- - Artérielle rétinienne (d'une): *H34.2*
- - Veine de la rétine (d'une): *H34.8*

Branchement ¬ Déficit en enzymes de *E74.0*

Branchial
- SAI ¬ Malformations de la fente *Q18.2*
- Siège de la tumeur] ¬ Kyste *C10.4*
- ¬
- - Anomalie
- - - Deuxième fente *Q18.0*
- - - Première fente *Q18.0*
- - - Quatrième fente *Q18.0*
- - - Troisième fente *Q18.0*
- - Fissure, fistule et kyste d'origine *Q18.0*
- - Malformations d'origine *Q18.2*
- - Syndrome de la poche *D82.1*
- - Tumeur maligne: Fente *C10.4*
- - Vestiges *Q18.0*

Branchio-oculo-facial ¬ Syndrome *Q18.8*

Branchio-otique ¬ Syndrome *Q18.2*

Branchio-oto-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Branchiosquelettogénital ¬ Syndrome *Q87.8*

Brandt ¬ Syndrome de *E83.2*

Bras
v.a. avant-bras
v.a. Stuart-Bras
- Abrasion/éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.81*
- Artificiel (total) (partiel) ¬ Mise en place et ajustement d'un *Z44.0*
- Avant-bras
- - Main présente ¬ Absence congénitale du *Q71.1*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.4*
- - ¬
- - - Gelure superficielle du *T33.4*
- - - Séquelles d'une fracture du *T92.1*
- Cassé SAI ¬ *T10*
- Chromosome ¬ Duplication
- - *Q92.3*
- - Complète d'au moins un *Q92.2*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.84*

Bras *–suite*
- Coude ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l'épaule, *R02.01*
- Court chromosome
- - 4 ¬ Délétion du *Q93.3*
- - 5 ¬
- - - Délétion du *Q93.4*
- - - Syndrome de délétion du *D46.6*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.82*
- Lymphangite ¬
- - Infection purulente du *L03.10*
- - Inflammation purulente du *L03.10*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.83*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de l'épaule et du *S48.9*
- SAI ¬
- - *Z89.2*
- - Amputation traumatique du *T11.6*
- - Fracture du *T10*
- - Lésion traumatique du *T11.9*
- - Plaie ouverte de l'épaule ou du *S41*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - Épaule
- - - *S49*
- - - *S49.9*
- - Superficielle de l'épaule et du *S40.9*
- Sauf poignet main
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure de l'épaule et du *T22.2*
- - - Corrosion de l'épaule et du *T22.6*
- - Degré
- - - 2a ¬
- - - - Brûlure de l'épaule et du *T22.2*
- - - - Corrosion de l'épaule et du *T22.6*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure de l'épaule et du *T22.8*
- - - - Corrosion de l'épaule et du *T22.9*
- Toute partie, sauf poignet et main seuls] ¬ *T22*
- ¬
- - *L03.10*
- - Absence acquise des deux *Z89.3*
- - Amputation traumatique de l'épaule et du *S48*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.11*
- - Contusion de l'épaule et du *S40.0*
- - Écrasement de l'épaule et du *S47*
- - Fracture
- - - Épaule et du *S42*
- - - Ouverte du *S42.3, S41.87!*
- - - Parties de l'épaule et du *S42.8*
- - Lésion

Bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S41.84!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S41.87!*
- - - - II
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S41.85!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S41.88!*
- - - - III
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S41.86!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S41.89!*
- - - Traumatique
- - - - Multiple
- - - - - Épaule et du *S49.7*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de l'épaule et du *S46.7*
- - - - - Nerfs au niveau de l'épaule et du *S44.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du *S45.7*
- - - - Muscle
- - - - - Tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du *S46.9*
- - - - - Tendons au niveau de l'épaule et du *S46.8*
- - - - Nerf
- - - - - Cubital au niveau du *S44.0*
- - - - - Cutané sensitif au niveau de l'épaule et du *S44.5*
- - - - - Médian au niveau du *S44.1*
- - - - - Niveau de l'épaule et du *S44.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de l'épaule et du *S44.9*
- - - - - Radial au niveau du *S44.2*
- - - - Précisées de l'épaule et du *S49.8*
- - - - Superficiel
- - - - - Épaule et du *S40*
- - - - - Épaule et du *S40.8*
- - - - - Épaule et du *S40.88*
- - - - - Multiples de l'épaule et du *S40.7*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du *S45.9*
- - - - - Sanguins au niveau de l'épaule et du *S45.8*
- - - - Veine superficielle au niveau de l'épaule et du *S45.3*
- - - Vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du *S45*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - *S41.1*
- - - - Épaule et du *S41*

Bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plaie *–suite*
- - - Ouvertes multiples de l'épaule et du *S41.7*
- - Procidence d'un *O64.4*
- - Thrombose veineuse du *I80.88*
Brauer ¬ Syndrome de *Q82.8*
Braun-Bayer ¬ Syndrome de *Q87.8*
Braun-Tinschert ¬ Dysplasie métaphysaire type *Q78.5*
Breakage ¬ Syndrome
- Berlin *Q87.8*
- Nijmegen *Q87.8*
Bréchet congénital ¬ Thorax en *Q67.7*
Bredouillement [langage précipité] ¬ *F98.6*
Breloque ¬ Dermite
- *L56.2*
- Photocontact [dermite de *L56.2*
Brenner maligne ¬ Tumeur de *C56*
BRESEK ¬ Syndrome *Q87.8*
Brésil ¬ Fièvre purpurique du *A48.4*
Brésilien
- Fogo selvagem] ¬ Pemphigus *L10.3*
- ¬
- - Blastomycose *B41*
- - Fièvre
- - - Hémorragique *A96.8*
- - - Sao Paulo [maculeuse *A77.0*
Brève
- Injection conjonctivale ¬ Céphalée névralgique unilatérale *G44.8*
- SAI ¬ Psychose réactionnelle (*F23.9*
Brides
- Adhérence ¬ *K66.0*
- Congénital
- - Épiploïques anormales ¬ Adhérences [*Q43.3*
- - Péritonéales ¬ Adhérences [*Q43.3*
- - ¬ *Q79.8*
- Occlusion
- - Intestinale ¬ Adhérences péritonéales (*K56.5*
- - ¬ Adhérences de l'intestin [*K56.5*
Brièveté
- Anormale du frein de la langue ¬ *Q38.1*
- Congénitale d'un tendon ¬ *Q79.8*
- Cordon ¬ Travail et accouchement compliqués d'une *O69.3*
- Gestation
- - Poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une *P07*
- - ¬ Hypoplasie pulmonaire associée à une *P28.0*
- Tendon d'Achille (acquise) ¬ *M67.0*
Brill
- Zinsser ¬ Maladie de *A75.1*

Brill *–suite*
- ¬ Typhus résurgent [maladie de *A75.1*
Briquet ¬ Syndrome de *F45.0*
Broad-beta ¬ Dyslipoprotéinémie à *E78.2*
Broche ¬ Enlèvement de: *Z47.0*
Brock ¬ Érythrodermie congénitale ichtyosiforme bulleuse de *Q80.3*
Brocks
v. Townes-Brocks
Brocq
v. Duhring-Brocq
- ¬ Pseudo-pelade [de *L66.0*
Brodie ¬
- Abcès de *M86.8*
- Cystosarcome phyllode [tumeur de *D48.6*
Brody ¬ Myopathie de *G71.8*
Bromhidrose ¬ *L75.0*
Bronche
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique ¬ Tuberculose
- - *A15.5*
- - Larynx, de la trachée et des *A15.5*
- Lymphome BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux *C88.4*
- Non classées ailleurs ¬ Affections des *J98.0*
- Poumon
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C34.9*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de tumeur maligne de la trachée, des *Z80.1*
- - - - Personnels de tumeur maligne de la trachée, des *Z85.1*
- - - Carcinoma in situ: *D02.2*
- - - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la trachée, des *J95.82*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D14.3*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, *D38.1*
- - - - Malign
- - - - - *C34*
- - - - - Lésion à localisations contiguës des *C34.8*
- - - - - Lobe inférieur, *C34.3*
- - - - - Lobe moyen, *C34.2*
- - - - - Lobe supérieur, *C34.1*
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du larynx, de la trachée et des *A16.4*
- Souche ¬
- - Carcinome bronchique de *C34.0*
- - Tumeur maligne: *C34.0*
- ¬
- - Absence des *Q32.4*

Bronche *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Agénésie des *Q32.4*
- - Atrésie des *Q32.4*
- - Calcification des *J98.0*
- - Corps étranger dans les *T17.5*
- - Lésion traumatique des *S27.4*
- - Malformation congénital
- - - *Q32.4*
- - - SAI des *Q32.4*
- - - Trachée et des *Q32*
- - Rétrécissement syphilitique des *A52.7†, J99.8**
- - Sténose
- - - *J98.0*
- - - Syphilitique des *A52.7†, J99.8**
- - Ulcère des *J98.0*
Bronchectasie
- Congénitale ¬ *Q33.4*
- Idiopathique ¬ *J47*
- Tuberculeux
- - Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose pulmonaire: *A16.2*
- - Sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*
- ¬ *J47*
Bronchiolectasie ¬ *J47*
Bronchioles ¬ *T17.8*
Bronchiolite
- Aigu
- - Metapneumovirus humain ¬ *J21.1*
- - Micro-organismes précisés ¬ *J21.8*
- - Sans précision ¬ *J21.9*
- - Virus respiratoire syncytial [VRS] ¬ *J21.0*
- - ¬
- - - *J21*
- - - *J21.9*
- Aspergillus ¬ *B44.1†, J99.8**
- Candida ¬ *B37.88*
- Candidose ¬ *B37.88*
- Cytomégalovirus ¬ *J21.8*
- Oblitérante
- - Chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ *J68.4*
- - Organisation pneumonique ¬ *J84.0*
- - Trouble ventilatoire obstructif ¬ *J44.89*
- Respiratoire avec pneumopathie interstitielle ¬ *J68.4*
Bronchique
- Atteinte de plusieurs localisations contiguës ¬ Carcinome *C34.8*

Bronchique *–suite*
- Bronche souche ¬ Carcinome *C34.0*
- Congénitale ¬ Sténose *Q32.3*
- Lobe moyen ¬ Carcinome *C34.2*
- Psychogène ¬ Asthme *F54, J45.9*
- Tardive ¬ Syphilis *A52.7†, J99.8**
- ¬
- - Adaptation et manipulation d'un extenseur *Z45.84*
- - Affections mentionnées, associées à l'asthme *J44*
- - Diverticule *Q32.4*
- - Moniliase *B37.1†, J99.8**
- - Présence d'un extenseur *Z96.80*
- - Résultats anormaux de: lavage *R84*
- - Syphilis *A52.7†, J99.8**

Bronchite
- Aigu
- - Agents chimiques ¬ *J68.0*
- - Haemophilus influenzae ¬ *J20.1*
- - Micro-organismes précisés ¬ *J20.8*
- - Mycoplasma pneumoniae ¬ *J20.0*
- - Obstruction ¬ *J20.9*
- - Rhinovirus ¬ *J20.6*
- - Sans précision ¬ *J20.9*
- - Streptocoques ¬ *J20.2*
- - Subaigu
- - - Bronchospasme ¬ *J20*
- - - Fibrineuse ¬ *J20*
- - - Membraneuse ¬ *J20*
- - - Obstructive ¬ *J20*
- - - Purulente ¬ *J20*
- - - Septique ¬ *J20*
- - - Trachéite ¬ *J20*
- - Virus
- - - Coxsackie ¬ *J20.3*
- - - ECHO ¬ *J20.7*
- - - Paragrippaux ¬ *J20.4*
- - - Respiratoire syncytial [VRS] ¬ *J20.5*
- - ¬ *J20*
- Allergique SAI ¬ *J45.0*
- Aspergillus ¬ *B44.1†, J99.8**
- Asthmatique
- - Obstructif
- - - Chronique ¬ *J44*
- - - SAI chronique ¬ *J44.8*
- - SAI ¬ *J45.9*
- Candida ¬ *B37.88*
- Candidosique ¬ *B37.88†, J99.8**
- Catarrhale ¬ *J40*
- Chronique
- - Mucopurulente ¬ *J41.1*
- - SAI ¬ *J42*
- - Sans précision ¬ *J42*
- - Simple

Bronchite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Simple *–suite*
- - - Mucopurulente ¬
- - - - *J41*
- - - - *J41.8*
- - - ¬ *J41.0*
- Emphysémateuse
- - Chronique ¬ *J44*
- - SAI chronique ¬ *J44.8*
- Emphysème chronique ¬ *J44*
- Métapneumovirus humain ¬ *J20.8*
- Non précisée comme aiguë ou chronique ¬ *J40*
- Obstructif
- - Chronique ¬ *J44*
- - SAI chronique ¬ *J44.8*
- Pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ *J68.0*
- SAI
- - 15 ans ¬ *J20*
- - ¬ *J40*
- Spirochètes NCA ¬ *A69.8†, J99.8**
- Trachéite SAI ¬ *J40*
- Virale ¬ *J20.9*

Broncho
- Œsophagienne ¬ Atrésie de l'œsophage avec fistule *Q39.1*
- Pneumonie virale, sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ (*J11.0*
- Pneumopathie grippale, virus d'influenza saisonnière identifié ¬ (*J10.0*

Bronchoaspergillose ¬ *B44.1†, J99.8**

Broncho-cutané
- Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.5*
- ¬ Fistule tuberculeuse *A16.4*

Bronchogénique ¬ Kyste *J98.4*

Broncholithiase ¬ *J98.0*

Bronchomalacie congénitale ¬ *Q32.2*

Broncho-médiastinal
- Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.5*
- ¬ Fistule tuberculeuse *A16.4*

Bronchomycose
- Candida ¬ *B37.88†, J99.8**
- ¬ *B49†, J99.8**

Broncho-pleural
- Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.5*
- ¬ Fistule tuberculeuse *A16.4*

Bronchopneumonie
- Aspergillus ¬ *B44.1†, J17.2**
- Bactéries autres que S. pneumoniae et H. influenzae ¬ *J15*

Bronchopneumonie *–suite*
- Candida ¬ *B37.1†, J17.2**
- Candidosique ¬ *B37.1†, J17.2**
- Champignons ¬ *B49†, J17.2**
- Cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.0*
- Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- S. pneumoniae ¬ *J13*
- Sans précision ¬ *J18.0*
- Virus autres que des virus grippaux ¬ *J12*

Broncho-pulmonaire
- Allergique ¬ Aspergillose *B44.1†, J99.8**
- Survenant pendant la période périnatale ¬ Dysplasie *P27.1*
- ¬ Aspergillose *B44.1*

Bronchospasme ¬
- *J21*
- Bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*

Bronzé
- Tuberculeuse ¬ Maladie *A18.7†, E35.1**
- ¬ Syndrome du bébé *P83.8*

Brooks ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Broussailles ¬ Typhus des *A75.3*

Brousse ¬ Fièvre jaune de: *A95.0*

Brown ¬ Syndrome de *H50.6*

Brown-Séquard ¬
- Maladie de *G83.8*
- Paralysie de *G83.8*
- Syndrome de *G83.8*

Brubakk
v. Verloove-Van Horick-Brubakk

Brucei
- Gambiense ¬ Infection à Trypanosoma *B56.0*
- Rhodesiense ¬ Infection à Trypanosoma *B56.1*

Brucella
- Abortus ¬ Brucellose à *A23.1*
- Canis ¬ Brucellose à *A23.3*
- Melitensis ¬ Brucellose à *A23.0*
- Suis ¬ Brucellose à *A23.2*

Brucellose
- Brucella
- - Abortus ¬ *A23.1*
- - Canis ¬ *A23.3*
- - Melitensis ¬ *A23.0*
- - Suis ¬ *A23.2*
- Porc et du sanglier ¬ *A23.2*
- Sans précision ¬ *A23.9*
- ¬
- - *A23.8*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *A23.9†, N16.0**
- - Pyélonéphrite au cours de *A23.9†, N16.0**
- - Spondylite au cours de *A23.9†, M49.19**

Bruck ¬ Syndrome de *Q78.0*
Brugada ¬
- Fibrillation ventriculaire idiopathique type *I49.8*
- Syndrome de *I49.8*
Brugia
- Malayi ¬ Filariose à *B74.1*
- Timori ¬ Filariose à *B74.2*
Bruit
- Abdominal
- - Anormaux ¬ *R19.1*
- - Excessifs ¬ *R19.1*
- - ¬ Absence de *R19.1*
- Artériels) ¬ *R09.8*
- Cardiaque
- - Assourdis, augmentés ou diminués ¬ *R01.2*
- - ¬
- - - *R01.2*
- - - Souffles et autres *R01*
- Sur oreille interne ¬
- - Conséquences du *H83.3*
- - Effets nuisibles de *H83.3*
- ¬
- - *Z57*
- - *Z58*
- - Exposition à : *W49.9!*
- - Perte auditive due au *H83.3*
Brûlant ¬ Brûlure échaudage
- Gaz *X19.9!*
- Liquides *X19.9!*
- Matériel *X19.9!*
- Nourriture *X19.9!*
- Objets *X19.9!*
- Vapeur *X19.9!*
Brûlure
- 1er degré
- - Corps entier ¬ *T29.1*
- - Vagin ¬ *T28.3*
- 2ème degré
- - Corps entier ¬ *T29.20*
- - SAI
- - - Partie du corps non précisée ¬ *T30.20*
- - - ¬ *T30.20*
- - Vagin ¬ *T28.3*
- 3ème degré
- - Corps entier ¬ *T29.3*
- - Vagin ¬ *T28.3*
- Bouche et du pharynx ¬ *T28.0*
- Cheville et du pied, degré non précisé ¬ *T25.0*
- Chimique
- - 1er degré du vagin ¬ *T28.8*
- - 2e degré du vagin ¬ *T28.8*
- - 3e degré du vagin ¬ *T28.8*
Brûlure *–suite*
- Chimique *–suite*
- - Vaginal degré
- - - 2a ¬ *T28.8*
- - - 2b ¬ *T28.8*
- Classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte ¬ *T31!*
- Comprenant le larynx et la trachée avec les poumons ¬ *T27.1*
- Cornée et du sac conjonctival ¬ *T26.1*
- Corrosion
- - Cheville et du pied ¬ *T25*
- - Classées selon leur étendue sur la surface du corps ¬ Séquelles de *T95.4*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22*
- - Gelure
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Séquelles de *T95.3*
- - - - Supérieur ¬ Séquelles de *T95.2*
- - - Précisées ¬ Séquelles d'autres *T95.8*
- - - Sans précision ¬ Séquelles de *T95.9*
- - - Tête ou du cou ¬ Séquelles de *T95.0*
- - - Tronc ¬ Séquelles de *T95.1*
- - - ¬ Séquelles de *T95*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24*
- - Limitées à l'œil et ses annexes ¬ *T26*
- - Organes internes ¬ *T28*
- - Partie
- - - Corps non précisée ¬ *T30*
- - - Multiples du corps ¬ *T29*
- - Poignet et de la main ¬ *T23*
- - Tête et du cou ¬ *T20*
- - Tronc ¬ *T21*
- - Voies respiratoires ¬ *T27*
- Courant électrique ¬ *W87.9!*
- Couvrant
- - 10 et 19% de la surface du corps ¬ *T31.1!*
- - 10% de la surface du corps ¬ *T31.0!*
- - 20 et 29% de la surface du corps ¬ *T31.2!*
- - 30 et 39% de la surface du corps ¬ *T31.3!*
- - 40 et 49% de la surface du corps ¬ *T31.4!*
- - 50 et 59% de la surface du corps ¬ *T31.5!*
- - 60 et 69% de la surface du corps ¬ *T31.6!*
- - 70 et 79% de la surface du corps ¬ *T31.7!*
- - 80 et 89% de la surface du corps ¬ *T31.8!*
- - 90 % ou plus de la surface du corps ¬ *T31.9!*
- Degré
- - 2a, partie du corps non précisé ¬ *T30.20*
- - 2b, partie du corps non précisée ¬ *T30.21*
- Échaudage
- - Chaleur ou des substances bouillantes ¬ *X19!*
- - Gaz brûlants ¬ *X19.9!*
- - Liquides brûlants ¬ *X19.9!*
Brûlure *–suite*
- Échaudage *–suite*
- - Matériel brûlant ¬ *X19.9!*
- - Nourriture brûlante ¬ *X19.9!*
- - Objets brûlants ¬ *X19.9!*
- - Vapeur brûlante ¬ *X19.9!*
- Épaule
- - Bras sauf poignet main
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T22.2*
- - - Degré
- - - - 2a ¬ *T22.2*
- - - - 2b ¬ *T22.8*
- - Membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé ¬ *T22.0*
- Hanche
- - Jambe sauf région malléolaire pied
- - - 2ème degré sans autre précision ¬ *T24.20*
- - - Degré
- - - - 2a ¬ *T24.20*
- - - - 2b
- - - - - ¬ *T24.21*
- - - - - ¬ *T24.61*
- - Membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé ¬ *T24.0*
- Larynx et de la trachée ¬ *T27.0*
- Mentionné dépassant
- - Premier degré ¬ Brûlures de parties multiples du corps, pas de *T29.1*
- - Second degré ¬ Brûlures de parties multiples du corps, pas de *T29.2*
- Multiples SAI ¬ *T29.0*
- Œil et de ses annexes, partie non précisée ¬ *T26.4*
- Œsophage ¬ *T28.1*
- Organe
- - Génito-urinaires internes ¬ *T28.3*
- - Internes, autres et sans précision ¬ *T28.4*
- Partie
- - Corps non précisée, degré non précisé ¬ *T30.0*
- - Multiple corps
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T29.20*
- - - Brûlure
- - - - Mentionné
- - - - - Dépassant le premier degré ¬ *T29.1*
- - - - - Dépassant le second degré ¬ *T29.2*
- - - - Troisième degré mentionnée ¬ *T29.3*
- - - Degré non précisé ¬ *T29.0*
- - - Indication degré
- - - - 2a au maximum ¬ *T29.20*
- - - - 2b au maximum ¬ *T29.21*
- - Œil et de ses annexes ¬ *T26.3*
- - Voie
- - - Digestives ¬ *T28.2*
- - - Respiratoires ¬ *T27.2*

Brûlure *–suite*
- Paupière et de la région périoculaire ¬ *T26.0*
- Poignet main
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T23.20*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T23.20*
- - - 2b ¬ *T23.21*
- - - Non précisé ¬ *T23.0*
- Premier degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.1*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.1*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.1*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.1*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.1*
- - SAI ¬ *T30.1*
- - Tête et du cou ¬ *T20.1*
- - Tronc ¬ *T21.1*
- Provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire ¬ *T26.2*
- Rayons X ¬ *T30.0*
- Région malléolaire pied
- - 2ème degré sans autre précision ¬ *T25.20*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T25.20*
- - - 2b ¬ *T25.21*
- SAI ¬ *T30.0*
- Second degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.2*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.2*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.2*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.2*
- - Tête et du cou ¬ *T20.2*
- Tête cou
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T20.20*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T20.20*
- - - 2b ¬ *T20.21*
- - - Non précisé ¬ *T20.0*
- Troisième degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.3*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.3*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.3*
- - Mentionnée ¬ Brûlures de parties multiples du corps, au moins une *T29.3*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.3*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.3*
- - SAI ¬ *T30.3*
- - Tête et du cou ¬ *T20.3*
- - Tronc ¬ *T21.3*
- Tronc
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T21.2*
- - Degré

Brûlure *–suite*
- Tronc *–suite*
- - Degré *–suite*
- - - 2a ¬ *T21.2*
- - - 2b ¬ *T21.8*
- - - Non précisé ¬ *T21.0*
- Vaginal degré
- - 2a ¬ *T28.3*
- - 2b ¬ *T28.3*
- Voies respiratoires, partie non précisée ¬ *T27.3*
- ¬
- - Calcification et ossification de muscles associées à des *M61.3*
- - Myosite ossifiante associée à des *M61.3*

Brunescente ¬ Cataracte *H25.1*

Brutale SAI ¬ Perte auditive *H91.2*

Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance) ¬ Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [*D80.0*

Bruxisme) psychogène ¬ Grincement des dents (*F45.8*

BT) ¬ Borderline tuberculoïde (*A30.2*

BTHS ¬ *E71.1*

Bubon climatique ou tropical ¬ *A55*

Bubonique ¬ Peste *A20.0*

Bubonocèle ¬ *K40*

Buccal
- Bouche, partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.50*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte de la muqueuse *K93.4**
- Gencive (processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.53*
- Langue et plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.54*
- Lèvre ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.51*
- Muqueuse de la joue ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.52*
- Non
- - Classés ailleurs ¬ Autres kystes de la région *K09.8*
- - Liés au développement dentaire ¬ Kystes de la région *K09.1*
- Œsophage et de l'estomac ¬ Carcinome in situ de la cavité *D00*
- Organe digestif évolution imprévisible inconnu
- - Organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs ¬ Tumeur de la cavité *D37.78*
- - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité *D37.70*
- - ¬ Tumeur de la cavité *D37*
- Palais ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.55*
- Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.59*
- Pharynx

Buccal *–suite*
- Pharynx *–suite*
- - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité *C14*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: Lèvre, cavité *D00.0*
- - - Tumeur
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité *D37.0*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité *C14.8*
- Récidivants ¬ Aphtes *K12.0*
- SAI ¬
- - Cavité *C06.9*
- - Muqueuse *C06.0*
- Sans précision ¬
- - Kyste de la région *K09.9*
- - Lésions de la muqueuse *K13.7*
- Stade
- - 1 ¬ Maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.05†, K93.41**
- - 2 ¬ Maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.06†, K93.42**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.07†, K93.43**
- Supérieure) (inférieure) ¬ Gouttière: *C06.1*
- Y compris langue ¬
- - Érythroplasie de l'épithélium *K13.2*
- - Leuco-œdème de l'épithélium *K13.2*
- - Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium *K13.2*
- ¬
- - Acanthose *K13.2*
- - Atrophie de la muqueuse *K13.7*
- - Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité *S00.5*
- - Granulome
- - - Éosinophile de la muqueuse *K13.4*
- - - Lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse *K13.4*
- - - Pyogène de la muqueuse *K13.4*
- - - Télangiectasique de la muqueuse *K13.4*
- - Hyperplasie inflammatoire de la muqueuse *K13.6*
- - Kyste du plancher *K11.6*
- - Maladie
- - - Lèvres et de la muqueuse *K13*
- - - VIH avec leucoplasie de la muqueuse *B23.8, K13.2*
- - Malocclusion due à: respiration *K07.5*
- - Muguet *B37.0*
- - Phlegmon ou abcès *K12.28*
- - Plaie ouverte lèvre cavité
- - - *S01.5*
- - - Buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité *S01.59*
- - Troubles spécifiques du développement de la motricité *F82.2*
- - Ulcère de la muqueuse *K12.1*

Buccal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Xanthome verruqueux de la muqueuse *K13.4*

Bucco facial
- Idiopathique ¬ Dystonie *G24.4*
- ¬ Dyskinésie *G24.4*

Buchanan] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): crête iliaque [*M91.0*

Buckel
v. Pott-Buckel

Bücklers
v. Reis-Bücklers

Budd-Chiari ¬ Syndrome de *I82.0*

Buerger] ¬ Thrombo-angéite oblitérante [*I73.1*

Buissonnière ¬ Ecole *F91.2*

Bulbaire
- Myéloïde ¬ Polio-encéphalite *A80.9†, G05.1**
- Progressif
- - Enfant [Fazio-Londe] ¬ Paralysie *G12.1*
- - ¬ Paralysie *G12.2*
- ¬ Polio-encéphalite *A80.9†, G05.1**

Bulbe
- Olfactif ¬
- - *C72.2*
- - *D33.3*
- Sans protrusion ¬ Perforation du *S05.6*
- Veine jugulaire ¬ Thrombose du *I82.81*

Bulbospinale ¬ Amyotrophie *G12.2*

Bulbo-urétrales ¬ Tuberculose des glandes *A18.1†, N51.8**

Bulimia nervosa) ¬ Boulimie (*F50.2*

Bulle d'emphysème pulmonaire ¬ *J43.9*

Bulleux
- Acquise ¬ Epidermolyse *L12.3*
- Atrophiante et albo-papuloïde ¬ Dystrophie cutanée *Q81.2*
- Brock ¬ Érythrodermie congénitale ichtyosiforme *Q80.3*
- Chirurgie de la cataracte [de l'aphaque] ¬ Kératopathie (*H59.0*
- Congénitale ¬ Érythrodermie ichtyosiforme *Q80.3*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Dermatoses *L14**
- Dermolytique ¬ Epidermolyse *Q81.2*
- Dystrophique
- - Acrale ¬ Epidermolyse *Q81.2*
- - Dominant
- - - Généralisée ¬ Epidermolyse *Q81.2*
- - - Isolée des ongles ¬ Epidermolyse *Q81.2*
- - Prétibiale ¬ Epidermolyse *Q81.2*
- - Prurigineuse ¬ Epidermolyse *Q81.2*
- - Récessive centripète ¬ Epidermolyse *Q81.2*
- - ¬ Epidermolyse *Q81.2*
- Enfance ¬ Maladie chronique *L12.2*
- Jonctionnelle

Bulleux *–suite*
- Jonctionnelle *–suite*
- - Généralisée sévère ¬ Epidermolyse *Q81.1*
- - Létale ¬ Epidermolyse *Q81.1*
- - Type
- - - Herlitz ¬ Epidermolyse *Q81.1*
- - - Herlitz-Pearson ¬ Epidermolyse *Q81.1*
- - - Non-Herlitz ¬ Epidermolyse *Q81.8*
- Létal
- - Acantholytique ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - ¬ Epidermolyse *Q81.1*
- Précisées ¬ Autres dermatoses *L13.8*
- Sans précision ¬
- - Dermatose *L13.9*
- - Epidermolyse *Q81.9*
- Simple
- - Atrésie du pylore ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - Autosomique récessive associée à KRT14 ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - Déficit
- - - BP230 ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - - Exophiline 5 ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - - Plakophiline ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - Dystrophie musculaire ¬ Epidermolyse *Q81.0†, G73.7**
- - Généralisée intermédiaire ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - Localisée ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - Pigmentation mouchetée ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - Superficielle ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - Type
- - - Dowling-Meara ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - - Ogna ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- Transitoire du nouveau-né ¬ Dermolyse *Q81.2*
- ¬
- - Emphysème (pulmonaire): *J43.9*
- - Épidermolyse
- - - *Q81*
- - - *Q81.8*
- - Érythème polymorphe
- - - *L51.1*
- - - Non *L51.0*
- - Kératopathie *H18.1*
- - Lichen
- - - *L43.1*
- - - Plan *L43.1*
- - Myringite *H73.0*
- - Pemphigoïde *L12.0*

Bullosa ¬ Culicosis *L13.8*

Buphtalmie ¬ *Q15.0*

Burgdorferi ¬ Érythème chronique migrateur à Borrelia *A69.2*

Bürger-Grütz ¬ Hépatosplénomégalie hyperlipémique de type *E78.3†, K77.8**

Burkholderia
- Mallei ¬ Infection à *A24.0*
- Pseudomallei SAI ¬ Infection à *A24.4*
- Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ *U81.6!*
- ¬ *B96.5!*

Burkitt
- Atypique ¬ Lymphome de *C83.7*
- ¬
- - LLA-B à cellules matures de type *C91.8*
- - Lymphome de *C83.7*
- - Maladie VIH
- - - Lymphome de *B21, C83.7*
- - - Tumeur de *B21, C83.7*

Burkitt-like" ¬ Lymphome " *C83.7*

Burnetii
- Coxiella burnetii] ¬ Infection à Rickettsia *A78*
- ¬
- - Endocardite à Coxiella *A78†, I39.8**
- - Infection à Rickettsia burnetii [Coxiella *A78*

Burn-out] ¬ Surmenage [*Z73*

Burns] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse inférieure du cubitus [*M92.1*

Bursite
- Calcifiante de l'épaule ¬ *M75.3*
- Coude ¬ Autres *M70.3*
- Épaule ¬ *M75.5*
- Genou ¬ Autres *M70.5*
- Gonococcique ¬ *A54.4†, M73.09**
- Gonocoques ¬ *A54.4†, M73.09**
- Goutteuse ¬ *M10.0*
- Hanche ¬ Autres *M70.7*
- Infectieuses ¬ Autres *M71.1*
- Ischiale ¬ *M70.7*
- Ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] ¬ *M76.4*
- Main ¬ *M70.1*
- Non classées ailleurs ¬ Autres *M71.5*
- Olécrânienne ¬ *M70.2*
- Prépatellaire ¬ *M70.4*
- Rhumatoïde ¬ *M06.2*
- SAI ¬ *M71.9*
- Syphilitique
- - Tardive ¬ *A52.7†, M73.19**
- - ¬ *A52.7†, M73.19**
- Tendon d'Achille ¬ *M76.6*
- Trochantérienne ¬ *M70.6*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M73.89**
- ¬ Gonorrhée avec *A54.4†, M73.09**

Bursts
v. suppression-bursts

Buruli] ¬ Infection par Mycobacterium: ulcerans [Ulcère de *A31.1*

Bus ¬ Accident de *V99!*

Buschke
v. Busse-Buschke
- ¬ Sclérœdème de *M34.8*
Buschke-Ollendorff ¬ Syndrome de *Q89.8*
Buski ¬ Infection par Fasciolopsis *B66.5*
Busse-Buschke ¬ Maladie de *B45.3†, M90.29**
Butanol] ¬ Alcool: butylique [1- *T51.3*
Butylique [1-butanol] ¬ Alcool: *T51.3*
Butyrophénone et thioxanthène ¬ Intoxication: Neuroleptiques de type *T43.4*
Buzzi ¬ Anétodermie de Schweninger- *L90.1*
BWS ¬ *Q87.3*
Byssinose ¬ *J66.0*

C5-désaturase ¬ Déficit en stérol *Q87.8*

C9ORF72 ¬ Maladie de Huntington-like due à des expansions *G10*

Cabezas ¬ Syndrome de *Q87.8*

Cacahuètes ¬ Allergie aux protéines de *T78.1*

Cacchi-Ricci ¬ Maladie de *Q61.5*

CACH ¬ Syndrome *E75.2*

Cachectiques ¬ Syndromes *B22*

Cachexie

- Hypophysaire ¬ *E23.0*
- ¬
- - *R64*
- - Maladie due au VIH avec *B22, R64*

Cadavre

- Sans cause apparente de décès ¬ Découverte fortuite d'un *R98*
- ¬ Découverte d'un *R98*

CADDS ¬ *Q87.8*

Cadmium et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.3*

Cadre

- Artériopathie oblitérante ¬ Douleurs ischémiques dans le *I70.29*
- Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Méningisme dans le *J10.8*
- Maladie greffon contre hôte GVH chronique ¬
- - Atteinte
- - - Foie dans le *K77.2**
- - - Muqueuse buccale dans le *K93.4**
- - - Œil et de ses annexes dans le *H58.2**
- - - Pulmonaire dans le *J99.2**
- - - Tissu conjonctif dans le *M36.5**
- - - Voies digestives dans le *K93.3**
- - Ulcérations vulvo-vaginales dans le *N77.2**
- Mesures diagnostiques ou thérapeutiques ¬ Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le *Y82!*
- Programme de recherche clinique ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le *Z00.6*

Cæcal
v.a. rétro-cæcal

Cæcum

- Côlon ¬ Rotation
- - Absente du *Q43.3*
- - Incomplète du *Q43.3*
- - Insuffisante du *Q43.3*
- ¬
- - Nécrose du *K35.8*
- - Tuberculose du *A18.3†, K93.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.0*
- - - Maligne: *C18.0*

Café

- Lait ¬

Café *–suite*

- Lait ¬ *–suite*
- - Syndrome de sténose pulmonaire-taches *Q85.0*
- - Taches *L81.3*
- ¬ Poumon des: torréfacteurs de *J67.8*

Caféine ¬

- Consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors *U69.36!*
- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la *F15*
- Utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors *U69.35!*

Caffey
v.a. Kenny-Caffey

CAGSSS ¬ *Q87.8*

CAHMR ¬ Syndrome de *Q87.8*

Caillot sanguin

- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- ¬ Embolie obstétrical
- - *O88.2*
- - *O88.28*

Caïman ¬ Ataxie type *G11.0*

CAIS] ¬ Insensibilité totale aux androgènes [*E34.51*

Caisson

- Arthrite ¬ Maladie de *T70.3†, M14.89**
- Maladie de la décompression] ¬ Maladie des *T70.3*
- ¬ Ostéonécrose de la maladie des *T70.3†, M90.39**

Calabar ¬ Œdème de *B74.3*

Calcanéenne ¬ Exostose *M77.3*

Calcanéopéronier ¬ Entorse et foulure de la cheville: Ligament *S93.42*

Calcanéum

- Sever] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.6*
- ¬
- - Apophysite du *M92.8*
- - Fracture du *S92.0*

Calcifiante

- Épaule ¬
- - Bursite *M75.3*
- - Tendinite *M75.3*
- ¬
- - Chondrodystrophie congénitale *Q77.3*
- - Tendinite *M65.2*

Calcification

- Anévrysme de l'aorte ¬ *I71.9*
- Artère de la rate ¬ *I70.8*
- Artériel
- - Généralisée infantile ¬ *Q28.88*
- - Idiopathique infantile ¬ *Q28.88*
- Bronches ¬ *J98.0*
- Cardio-vasculaire ¬ Syndrome de maladie de Gaucher-ophtalmoplégie- *E75.2*

Calcification *–suite*

- Conjonctive ¬ *H11.1*
- Muscles ¬ Autres *M61.4*
- Noyaux gris centraux ¬ *G23.8*
- Ossification
- - Muscle
- - - Associées à des brûlures ¬ *M61.3*
- - - Sans précision ¬ *M61.9*
- - - ¬ *M61*
- - Paralytiques d'un muscle ¬ *M61.2*
- Péricarde ¬ *I31.1*
- Poumon ¬ *J98.4*
- Pulpaires ¬ *K04.2*
- Tuberculeux
- - Glande surrénale ¬ *B90.8†, E35.1**
- - Rein ¬ *B90.1†, N29.1**
- Vessie ¬ *N32.8*

Calcinose

- Cutanée ¬ *L94.2*
- Maladie de Raynaud-troubles moteurs œsophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de *M34.1*
- Pleurale ¬ *E83.58†, J99.8**
- Striopallidodentée bilatérale ¬ *G23.8*

Calciphylaxie ¬ *E83.50*

Calcique

- Bourse séreuse ¬ Dépôts *M71.4*
- ¬ Intoxication: Inhibiteurs *T46.1*

Calcitonine ¬ Hypersécrétion de *E07.0*

Calcium

- Dihydraté ¬ Maladie des dépôts de pyrophosphate de *M11.19*
- Magnésium
- - Nouveau-né
- - - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du métabolisme du *P71.9*
- - - ¬ anomalie transitoire métabolisme
- - - - *P71*
- - - - *P71.8*
- - ¬ Tétanie néonatale sans carence en *P71.3*
- Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme du *E83.59*
- ¬
- - Anomalie métabolisme
- - - *E83.5*
- - - *E83.58*
- - Carence alimentaire en *E58*
- - Hypocalcémie due à une anomalie du métabolisme du *E83.58*
- - Néphrite à oxalate de *E74.8*

Calcul

- Acide urique ¬ Néphrolithiase avec *M10.09†, N22.8**
- Biliaire ¬
- - Occlusion de l'intestin par *K56.3*
- - Pancréatite aiguë secondaire à des *K85.1*
- Bloqué

Calcul *–suite*
- Bloqué *–suite*
- - Canal
- - - Biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- - - Cystique sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- - Vésicule biliaire sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- Canal
- - Biliaire
- - - Angiocholite ¬ *K80.3*
- - - Cholécystite ¬ *K80.4*
- - - Sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- - Parotidien ¬ *K11.5*
- Coralliforme ¬ *N20.0*
- Cystinique ¬ *E72.0†, N22.8**
- Diverticule vésical ¬ *N21.0*
- Glandes salivaires ou d'un canal excréteur ¬ *K11.5*
- Intrarénal ¬ *N20.0*
- Pancréas ¬ *K86.8*
- Prostate ¬ *N42.0*
- Rein
- - Calcul de l'uretère ¬ *N20.2*
- - Uretère ¬ *N20*
- - ¬ *N20.0*
- Rénal ¬ *N20.0*
- Urétéral ¬ *N20.1*
- Uretère ¬
- - *N20.1*
- - Calcul de l'uretère ¬ Calcul du rein avec *N20.2*
- Urètre ¬ *N21.1*
- Urinaire
- - Cours
- - - Bilharziose ¬ *B65.0†, N22.0**
- - - Schistosomiase ¬ *B65.0†, N22.0**
- - Sans précision ¬ *N20.9*
- Vésical
- - Néovessie ¬ *N21.0*
- - ¬ *N21.0*
- Vésicule biliaire
- - Cholécystite aiguë ¬ *K80.0*
- - Forme de cholécystite ¬ *K80.1*
- - Sans cholécystite ¬ *K80.2*
- Vessie ¬ *N21.0*
- Voie urinaire
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *N22.8**
- - Inférieur
- - - Sans précision ¬ *N21.9*
- - - ¬ Autres *N21.8*
- ¬
- - Abcès de la vésicule biliaire sans *K81.0*
- - Angiocholécystite sans *K81.0*

Calcul *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Cholécystite
- - - Emphysémateuse (aiguë) sans *K81.0*
- - - Gangréneuse sans *K81.0*
- - - Suppurée sans *K81.0*
- - Empyème de la vésicule biliaire sans *K81.0*
- - Gangrène de la vésicule biliaire sans *K81.0*
- - Occlusion canal
- - - Biliaire, sans *K83.1*
- - - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans *K82.0*
- - Rétrécissement canal
- - - Biliaire, sans *K83.1*
- - - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans *K82.0*
- - Sténose canal
- - - Biliaire, sans *K83.1*
- - - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans *K82.0*

Calculeuse rénale et urétérale ¬ Hydronéphrose avec obstruction *N13.2*

Calice rénal, non traumatique [rupture de fornix] ¬ Rupture d'un *N28.80*

Calices ¬ *C65*

Californie ¬
- Encéphalite de *A83.5*
- Méningo-encéphalite de *A83.5*
- Pseudotyphus de la *A79.8*

Calleux
v. acro-calleux
- Appendices pré-auriculaires ¬ Syndrome de déficience intellectuelle avec hypoplasie du corps *Q87.8*
- Déficience intellectuelle, colobome et micrognathie ¬ Syndrome d'agénésie du corps *Q87.8*
- Fin
- - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microcéphalie-corps *Q87.8*
- - Microcéphalie post-natale progressive ¬ Syndrome tétraplégie spastique-corps *Q02*
- Quadriparésie spastique ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-agénésie du corps *Q87.8*
- ¬
- - Agénésie du corps *Q04.0*
- - Démyélinisation centrale du corps *G37.1*
- - Forme isolée d'agénésie du corps *Q04.0*
- - Malformations congénitales du corps *Q04.0*

Callosités ¬ Cors et *L84*

Calmants et protecteurs ¬ Intoxication: Emollients, *T49.3*

Calorique
- Enfant adolescent ¬ Obésité
- - Excès *E66.04*
- - Extrême due à un excès *E66.05*
- Hydrique ¬ Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, *T50.3*

Calorique *–suite*
- Indice masse corporelle IMC
- - 40 ou plus ¬ Obésité due à un excès *E66.02*
- - Compris
- - - 30 et moins de 35 ¬ Obésité due à un excès *E66.00*
- - - 35 et moins de 40 ¬ Obésité due à un excès *E66.01*
- ¬ Obésité
- - Excès *E66.0*
- - Grade
- - - I (OMS) due à un excès *E66.00*
- - - II (OMS) due à un excès *E66.01*
- - - III (OMS) due à un excès *E66.02*

Calvé
- Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg- *M91.1*
- ¬ Maladie de: *M42.0*

Calvitie-luxation de la rotule-acromicrie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*

Camion ¬ Accident de *V99!*

Camp de concentration ¬ Modification de la personnalité après: expériences de *F62.0*

Campomélie type Cumming ¬ *Q87.8*

Campomélique ¬ Dysplasie *Q87.1*

Camptocormie idiopathique ¬ *F44.4*

Camptodactylie
- Doigts ¬ *Q68.1*
- Familiale avec une aminoacidurie ¬ *Q68.1*
- Guadalajara type
- - 1 ¬ *Q87.1*
- - 2 ¬ *Q87.1*
- Raideur articulaire-anomalies osseuses de la face ¬ Syndrome de *Q87.0*

Campylobacter ¬ Entérite à *A04.5*

Camurati-Engelmann ¬ Syndrome de *Q78.3*

Canada
v. Cronkhite-Canada

Canal
- Alcock] ¬ hernie: honteuse [du *K45*
- Anal ¬
- - *D37.78*
- - *K62*
- - Adénocarcinome du *C21.1*
- - Carcinoma in situ: Anus et *D01.3*
- - Carcinome épidermoïde du *C21.1*
- - Néoplasie du *D37.78*
- - Prolapsus du *K62.2*
- - Tumeur
- - - *D37.78*
- - - Bénin
- - - - Anus et *D12.9*
- - - - Côlon, du rectum, de l'anus et du *D12*
- - - Malign
- - - - *C21.1*
- - - - Anus et du *C21*

Canal *–suite*
- Anal ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Malign *–suite*
- - - - Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du *C21.8*
- Artériel
- - Bicuspidie valvulaire aortique-anomalie des mains ¬ Syndrome de persistance du *Q87.2*
- - Familiale ¬ Persistance du *Q25.0*
- - ¬
- - - Artère pulmonaire naissant du *Q25.7*
- - - Fermeture anténatale du *Q25.8*
- - - Obturation retardée du *P29.3*
- - - Perméabilité du *Q25.0*
- - - Persistance du *Q25.0*
- Atrioventriculaire
- - Complet
- - - Anomalies obstructives du cœur gauche ¬ *Q21.2*
- - - Hypoplasie ventriculaire ¬ *Q21.2*
- - - ¬ *Q21.2*
- - Partiel ¬ *Q21.2*
- - ¬ Anomalie du *Q21.2*
- Atrio-ventriculaire ¬ Anomalie du *Q21.2*
- Auditif
- - Externe ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.34*
- - ¬
- - - *T16*
- - - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.35*
- - - Syphilis du *A52.7†, H94.8**
- Auriculo-ventriculaire commun ¬ *Q21.2*
- Biliaire
- - Angiocholite ¬ Calcul des *K80.3*
- - Cholécystite ¬ Calcul des *K80.4*
- - Extra-hépatique ¬ Tumeur maligne: *C24.0*
- - Intra- et extra-hépatiques ¬ Tumeur maligne affectant à la fois les *C24.8*
- - Intrahépatique ¬ Carcinome du *C22.1*
- - SAI
- - - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul (bloqué) d'un *K80.5*
- - - ¬ *C24.0*
- - Sans
- - - Angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul des *K80.5*
- - - Calcul ¬
- - - - Occlusion d'un *K83.1*
- - - - Rétrécissement d'un *K83.1*
- - - - Sténose d'un *K83.1*
- - ¬
- - - Adhérences d'un *K83.8*
- - - Atrophie d'un *K83.8*
- - - Duplication du *Q44.5*

Canal *–suite*
- Biliaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hypertrophie d'un *K83.8*
- - - Lésion traumatique: *S36.18*
- - - Rupture d'un *K83.2*
- - - Ulcère d'un *K83.8*
- Botal ¬ Perméabilité du *Q25.0*
- Canal) ¬ Coarctation de l'isthme aortique (avant le *Q25.1*
- Carpien
- - Pendant la grossesse ¬ Syndrome du *O26.82*
- - ¬ Syndrome du *G56.0*
- Cervical ¬ Présence congénitale d'épithélium pavimenteux dans le *Q51.8*
- Cholédoque
- - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Lithiase du *K80.5*
- - ¬ *C24.0*
- CRAC ¬ Déficit immunitaire combiné par dysfonctionnement du *D81.8*
- Cranio pharyngien ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D35.3*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.4*
- Cystique
- - Sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: *K80.2*
- - Vésicule biliaire
- - - Sans calcul ¬
- - - - Occlusion du *K82.0*
- - - - Rétrécissement du *K82.0*
- - - - Sténose du *K82.0*
- - - ¬
- - - - Adhérences du *K82.8*
- - - - Atrophie du *K82.8*
- - - - Dyskinésie du *K82.8*
- - - - Exclusion du *K82.8*
- - - - Hypertrophie du *K82.8*
- - - - Kyste du *K82.8*
- - - - Rupture du *K82.2*
- - - - Ulcère du *K82.8*
- - ¬
- - - *C24.0*
- - - Duplication du *Q44.5*
- Déférent
- - Cordon spermatique scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - - Atrophie du *N50.8*
- - - Hypertrophie du *N50.8*
- - - Œdème du *N50.8*
- - - Ulcère du *N50.8*
- - Épididyme vésicule séminal prostate
- - - SAI ¬ Malformation congénitale du *Q55.4*
- - - ¬ Autres malformations congénitales du *Q55.4*

Canal *–suite*
- Déférent *–suite*
- - ¬
- - - Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du *N49.1*
- - - Atrésie du *Q55.3*
- - - Gonorrhée
- - - - *A54.2†, N51.8**
- - - - Aiguë du *A54.2†, N51.8**
- - - Lésion traumatique: *S37.84*
- - - Rétrécissement de: *N50.8*
- - - Syphilis tardive du *A52.7†, N51.8**
- - - Tuberculose du *A18.1†, N51.8**
- Déférents ¬ Aplasie congénitale bilatérale des *Q55.4*
- Excréteur ¬
- - Calcul des glandes salivaires ou d'un *K11.5*
- - Lithiase des glandes salivaires ou d'un *K11.5*
- Galactophores ¬ Ectasie des *N60.4*
- Gartner ¬ Kyste (de): *Q50.5*
- Glande sébacée du sein ¬ Kyste d'un *N60.8*
- Hépatique
- - Commune ¬ *C24.0*
- - Surnuméraire ¬ *Q44.5*
- - ¬ *C24.0*
- Incisif ¬ Kyste
- - *K09.1*
- - Naso-palatin [*K09.1*
- Lacrymal
- - Lacrymonasal ¬ Sténose du: *H04.5*
- - ¬
- - - Fibrose du *H04.5*
- - - Sténose ou rétrécissement congénital du *Q10.5*
- - - Traumatisme du *S05.8*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Glande lacrymale et *D31.5*
- - - - Maligne: Glande lacrymale et *C69.5*
- Lacrymo-nasal ¬
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- Médullaire ¬ Rétrécissement du *M48.0*
- Müller ¬
- - Aplasie unilatérale des *Q51.4*
- - Syndrome
- - - Anomalies des membres-anomalies des *Q87.8*
- - - Persistance des *Q55.8*
- Nück, congénital ¬ Kyste (du): *Q52.4*
- Omphalo-mésentérique ¬ Persistance du *Q43.0*
- Pancréatique
- - SAI ¬ Malformation congénitale du pancréas et du *Q45.3*
- - ¬

Canal *–suite*
- Pancréatique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Malformations congénitales du pancréas et du *Q45.3*
- - - Tumeur maligne: *C25.3*
- Parotidien ¬ Calcul du *K11.5*
- Pylorique ¬ *C16.4*
- Rachidien
- - Lésion discale ¬ Rétrécissement du *M99.5*
- - Subluxation ¬ Rétrécissement du *M99.2*
- - Tissu conjonctif ¬ Rétrécissement du *M99.4*
- - ¬
- - - Claudicatio spinalis cours sténose
- - - - *M48.09†, G55.3**
- - - - Lombaire du *M48.06†, G55.3**
- - - Myélopathie au cours de sténose du *M48.09†, G99.2**
- - - Rétrécissement osseux du *M99.3*
- Salivaire
- - Surnuméraires ¬ Glandes ou *Q38.4*
- - ¬
- - - Absence de glandes ou de *Q38.4*
- - - Atrésie de glandes ou de *Q38.4*
- - - Malformations congénitales des glandes et des *Q38.4*
- - - Rétrécissement d'un *K11.8*
- - - Sténose d'un *K11.8*
- Semi-circulaire ¬ Syndrome de déhiscence du *H83.8*
- Spermatique ¬ Torsion: *N44.0*
- Tarsien ¬ Syndrome du *G57.5*
- Thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.82*
- Thyréoglosse ¬ Persistance du *Q89.2*
- Vitellin ¬ Persistance du *Q43.0*
- Wharton ¬ Kyste du *K11.6*
- Wolff
- - Femme ¬ Adénome du *D28.7*
- - ¬ Corps ou *C57.7*
- ¬ Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le *Q25.1*

Canalaire ¬ Carcinome *C50.9*

Canale-Smith ¬ Syndrome de *D47.9*

Canaliculaire précalicielle ¬ Ectasie *Q61.5*

Canalicule lacrymal, lacrymonasal ¬ Sténose du: *H04.5*

Canaliculi ¬ Pili trianguli et *Q84.1*

Canaliculite
- Cours d'actinomycose ¬ *A42.8†, H06.0**
- Lacrymal
- - Aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ *H04.3*
- - Chronique ¬ *H04.4*

Canavan ¬ Maladie de *E75.2*

Cancer
- Anaplasique de la thyroïde ¬ *C73*
- Côlon héréditaire non polyposique [HNPCC] ¬ *C18.9, Z80.0*
- Duodénum ¬ *C17.0*
- Estomac
- - Diffus
- - - Familial ¬ *C16.9*
- - - Héréditaire ¬ *C16.9*
- - Type Borrmann 4 ¬ *C16.9*
- Familial de la prostate ¬ *C61*
- Folliculaire de la thyroïde ¬ *C73*
- Gastrique SAI ¬ *C16.9*
- Médullaire de la thyroïde ¬ *C73*
- Multiple
- - SAI ¬ *C80.9*
- - ¬ *C80.9*
- Ovaire ¬ *C56*
- Papillaire
- - Rénal héréditaire ¬ *C64*
- - Thyroïde ¬ *C73*
- Paroi postérieure du pharynx ¬ *C14.0*
- Peau dû aux goudrons ¬ *C44.9*
- Poumon à petites cellules ¬ *C34.9*
- Pulmonaire dû aux goudrons ¬ *C34.9*
- SAI ¬
- - *C80.9*
- - Généralisé (secondaire): *C79.9*
- Secondaires multiples SAI ¬ *C79.9*
- Sein
- - Héréditaire ¬ *C50.9, Z80.3*
- - Ovaire ¬ Syndrome héréditaire de prédisposition au *C56, C97!, C50.9*
- - Type glande salivaire ¬ *C50.9*
- Vessie dû aux goudrons ¬ *C67.9*
- ¬
- - Chimiothérapie du *P04.1*
- - Dissémination secondaire du *C79.9*

Cancéreuse secondaire ¬ Infiltration *C79.9*

Cancrum oris ¬ *A69.0*

Candida
- Auris ¬ Candidose à *B37.9*
- Résistants au fluconazole ou au voriconazole ¬ *U83!*
- ¬
- - Abcès à *B37.9*
- - Balanite à *B37.4†, N51.2**
- - Bronchiolite à *B37.88*
- - Bronchite à *B37.88*
- - Bronchomycose à *B37.88†, J99.8**
- - Bronchopneumonie à *B37.1†, J17.2**
- - Chéilite due à *B37.88*
- - Cystite à *B37.4†, N33.8**
- - Endocardite à *B37.6†, I39.8**
- - Entérite due à *B37.88*

Candida *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Kératite à *B37.88†, H19.2**
- - Maladie VIH
- - - Infection à *B20, B37.9*
- - - Rétinite à *B20†, H32.0*, B37.88*
- - Myocardite à *B37.88†, I41.2**
- - Néphrite à *B37.4†, N08.0**
- - Œsophagite à *B37.81*
- - Onyxis à *B37.2*
- - Périonyxis à *B37.2*
- - Péritonite à *B37.88†, K67.8**
- - Pneumonie à *B37.1†, J17.2**
- - Prostatite à *B37.4†, N51.0**
- - Pyélonéphrite à *B37.4†, N16.0**
- - Septicémie à *B37.7*
- - Stomatite à *B37.0*
- - Trachéite à *B37.88*
- - Urétrite à *B37.4†, N37.0**
- - Vaginite à *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite à *B37.3†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite
- - - *B37.3†*
- - - *B37.3†, N77.1**

Candidiase ¬ *B37*

Candidide [lévuride] ¬ *L30.2*

Candidomycetica ¬
- Balanitis *B37.4†, N51.2**
- Urethritis *B37.4†, N37.0**
- Vaginitis *B37.3†, N77.1**
- Vulvovaginitis *B37.3†, N77.1**

Candidomycétique ¬ Vulvo-vaginite *B37.3†*

Candidomycose vulvo-vaginale ¬ *B37.3†, N77.1**

Candidose
- Appareil génital féminin ¬ *B37.3†, N77.1**
- Bouche ¬ Maladie due au VIH avec *B20, B37.0*
- Candida auris ¬ *B37.9*
- Chronique-maladie d'Addison ¬ Syndrome d'hypoparathyroïdie auto-immune- *E31.0*
- Disséminée ¬ Maladie due au VIH avec *B20, B37.88*
- Gland du pénis ¬ *B37.4†, N51.2**
- Localisations uro-génitales ¬ *B37.4*
- Néonatale ¬ *P37.5*
- Œil ¬ *B37.88†, H58.8**
- Peau ongle ¬
- - *B37.2*
- - Maladie due au VIH avec *B20, B37.2*
- Poumon ¬
- - *B37.1†, J99.8**
- - Maladie due au VIH avec *B20, B37.1*
- Pulmonaire ¬
- - *B37.1*
- - *B37.1†, J99.8**

Candidose *–suite*
- Sans précision ¬ *B37.9*
- Vaginale ¬ *B37.3†, N77.1**
- Vulve et du vagin ¬ *B37.3†, N77.1**
- ¬
- - *B37*
- - Balano-posthite due à une *B37.4†, N51.2**
- - Bronchiolite due à une *B37.88*
- - Endocardite au cours de *B37.6†, I39.8**
- - Localisation
- - - *B37.8*
- - - *B37.88*
- - Maladie due au VIH avec *B20, B37.9*
- - Méningite due à une *B37.5†, G02.1**
- - Otite externe au cours de *B37.2†, H62.2**
- - Otomycose au cours de *B37.88†, H62.2**
- - Pneumonie due à une *B37.1†, J17.2**
- - Trachéite due à une *B37.88*
- - Urétrite due à une *B37.4†, N37.0**
- - Vaginite due à une *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite due à une *B37.3†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite due à une *B37.3†, N77.1**

Candidosique
- Chronique récidivante ¬ Vaginite *B37.3†, N77.1**
- Gland du pénis ¬ Mycose *B37.4†, N51.2**
- Vagin ¬ Mycose *B37.3†, N77.1**
- ¬
- - Balanite *B37.4†, N51.2**
- - Bronchite *B37.88†, J99.8**
- - Bronchopneumonie *B37.1†, J17.2**
- - Méningite *B37.5†, G02.1**
- - Péritonite *B37.88†, K67.8**
- - Pneumonie *B37.1†, J17.2**
- - Pyélonéphrite *B37.4†, N16.0**
- - Vaginite *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite *B37.3†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite *B37.3†, N77.1**

Canine ¬
- Abcès maxillaire
- - Indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse *K10.21*
- - Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse *K10.20*
- Avant de la jonction prémolaire- *C04.0*

Canis ¬ Brucellose à Brucella *A23.3*

Canitie ¬ *L67.1*

Cannabinose ¬ *J66.2*

Cannabis
- Dérivés) ¬ Intoxication: *T40.7*
- ¬
- - Intoxication
- - - *T40.7*
- - - Dérivé de *T40.7*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du *F12*

CANOMAD ¬ Syndrome *G61.8*

Cantagrel ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Canthus ¬
- Carcinoma in situ: Peau de la paupière, y compris le *D04.1*
- Mélanome
- - In situ de la paupière, y compris le *D03.1*
- - Malin de la paupière, y compris le *C43.1*
- Nævus à mélanocytes de la paupière, y compris le *D22.1*
- Tumeur
- - Bénigne: Peau de la paupière, y compris le *D23.1*
- - Maligne: Peau de la paupière, y compris le *C44.1*

Cantonensis ¬
- Angiostrongyloïdose
- - Angiostrongylus *B83.2*
- - Parastrongylus *B83.2*
- Méningo-encéphalite
- - Angiostrongylus *B83.2†, G05.2**
- - Parastrongylus *B83.2†, G05.2**

Cantrell ¬ Syndrome de *Q87.8*

Cantu ¬
- Dysplasie spondylo-épiphysaire type *Q77.7*
- Ostéochondrodysplasie hypertrichotique type *Q87.3*

Canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec *R13.1*

Caoutchouc ¬ *L23.5*

Cap
- Polypose ¬ *D12.6*
- ¬ Myopathie à *G71.2*

Capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant *Z74.2*

Capacité
- Respiratoire ¬ Diminution de la *R94.2*
- Vitale ¬ Diminution de la *R94.2*

Capillaire
- Amyloïde ¬ Dégénérescence *E85.8†, I79.8**
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres atteintes des artères, artérioles et *I79.8**
- Familial ¬ Hémangiome *D18.00*
- Héréditaire) ¬ Fragilité *D69.88*
- Idiopathique ¬ Purpura due à une fragilité *D69.88*
- Malformation artérioveineux ¬ Malformation *Q27.3*
- Polymicrogyrie ¬ Syndrome mégalencéphalie-malformation *Q87.3*
- Primitif ¬ Saignement *D69.88*
- Rétine ¬ Malformation *D18.06*
- Sans précision ¬
- - Anomalie de la pigmentation et de la gaine *L67.9*
- - Maladie des *I78.9*

Capillaire *–suite*
- ¬
- - Anomalie pigmentation gaine
- - - *L67*
- - - *L67.8*
- - Fragilité
- - - *L67.8*
- - - Congénitale des *D69.88*
- - Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations *T49.4*
- - Lymphangiome *D18.19*
- - Maladies des *I78.8*
- - Malformation lymphatique *D18.19*
- - Syndrome
- - - Fuite *I78.8*
- - - Macrocéphalie-malformation *Q87.3*
- - - Mégalencéphalie-malformation *Q87.3*
- - - Microcéphalie-malformation *Q87.8*
- - Transplantation *Z41.8*

Capillaria phyilippinensis ¬ Infection à *B81.1*

Capillariose
- Hépatique ¬ *B83.8*
- Intestinale ¬ *B81.1*
- SAI ¬ *B81.1*

Capillary leak syndrome ¬ *I78.8*

Capillitii ¬
- Mycosis *B35.0*
- Tinea *B35.0*

Capitis
- Abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ Folliculite et périfolliculite *L66.3*
- ¬
- - Pédiculose due à Pediculus humanus *B85.0*
- - Trichophytia *B35.0*

Caplan-Colinet ¬ Syndrome de *M05.19†, J99.0**

Capsulaire
- Pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ Glaucome (primitif) (résiduel): *H40.1*
- Sein due à une prothèse ou un implant mammaire ¬ Fibrose *T85.82*
- ¬
- - Déchirure *S37.02*
- - Instabilité chronique du genou: Ligament *M23.57*
- - Lésion interne genou
- - - Ligament *M23.87*
- - - Sans précision: Ligament *M23.97*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: Ligament *M23.67*

Capsulatum
- Sans précision ¬ Histoplasmose
- - Histoplasma *B39.4*
- - Pulmonaire à Histoplasma *B39.2*
- ¬ Histoplasmose

Capsulatum *–suite*
- ¬ Histoplasmose *–suite*
- - Disséminée à Histoplasma *B39.3*
- - Généralisée à Histoplasma *B39.3*
- - Pulmonaire
- - - Aiguë à Histoplasma *B39.0*
- - - Chronique à Histoplasma *B39.1*

Capsule
- Bassinet du rein ¬ Déchirure de la *S37.02*
- Labyrinthique ¬ Otosclérose intéressant la: *H80.2*
- Rate, sans atteinte plus importante du parenchyme ¬ Déchirure de la *S36.02*
- SAI ¬
- - Arrachement de articulation (*T14.3*
- - Déchirure traumatique de articulation (*T14.3*
- - Entorse de articulation (*T14.3*
- - Foulure de articulation (*T14.3*
- - Hémarthrose traumatique de articulation (*T14.3*
- - Lacération de articulation (*T14.3*
- - Rupture traumatique de articulation (*T14.3*
- - Subluxation traumatique de articulation (*T14.3*

Capsulite
- Rétractile de l'épaule ¬ *M75.0*
- SAI ¬ *M77.9*

Captation de la carnitine cellulaire ¬ Défaut de *E71.3*

Captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*

Caractère
- SAI ¬ Névrose de *F60.9*
- Soupçonneux et évasif ¬ *R46.5*

Caractériel SAI ¬ Trouble: *F68.8*

Caraté ¬
- Chancre (initial) de la pinta [*A67.0*
- Hyperkératose de la pinta [*A67.1*
- Lésion
- - Cutané
- - - Achromique
- - - - Lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [*A67.3*
- - - - Pinta [*A67.2*
- - - Cicatricielles de la pinta [*A67.2*
- - - Dyschromiques de la pinta [*A67.2*
- - Hyperchromiques de la pinta [*A67.1*
- Papule (initiale) de la pinta [*A67.0*
- Pinta [*A67*
- Plaques érythémateuses de la pinta [*A67.1*

Carbamates ¬ Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et *T60.0*

Carbamazépine ¬
- *T42.1*
- Embryofœtopathie à la *Q86.88*
- Intoxication à la *T42.1*

Carbamoyl-phosphate synthétase
- I ¬ Déficit en *E72.2*
- ¬ Déficit en *E72.2*

Carbamoyltransférase ¬ Déficit en ornithine *E72.4*

Carbone
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des hydrates de *E74.9*
- ¬
- - Anomalie
- - - Absorption intestinale des hydrates de *E74.3*
- - - Métabolisme des hydrates de *E74*
- - - Précisées du métabolisme des hydrates de *E74.8*
- - Démence au cours d'intoxication au dioxyde de *T58†, F02.8**
- - Dioxyde de *T41.5*
- - Effet toxique
- - - Dioxyde de *T59.7*
- - - Monoxyde de *T58*
- - - Sulfure de *T65.4*
- - - Tétrachlorure de *T53.0*
- - Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: déplétion des hydrates de *O21.1*
- - Intoxication au dioxyde de *T41.5*
- - Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - Trouble de l'absorption intestinale des hydrates de *E74.3*

Carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase *T50.2*

Carboxamide ribosidurie ¬ 5-amino-4-imidazole *E79.8*

Carboxykinase
- Phosphoénolpyruvate ¬ Déficit en: *E74.4*
- ¬ Déficit en phosphoénolpyruvate *E74.4*

Carboxylase
- Biotine-dépendante ¬ Déficit en *D81.8*
- Dépendant de la biotine ¬ Déficit en *D81.8*
- ¬ Déficit
- - 3-méthylcrotonyl-CoA *E71.1*
- - Multiple en *E53.8*
- - Propionyl-CoA *E71.1*
- - Pyruvate: *E74.4*

Carboxylate
v. pyrroline-5-carboxylate

Carburant halogéné ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*

Carcinofibrome du corps de l'utérus ¬ *C54.9*

Carcinoïde
- Productrice mucus
- - Appendice ¬ Tumeur *C18.1*
- - Poumons ¬ Tumeur *C34.9*
- ¬ Syndrome *E34.0*

Carcinoma in situ
- Anus et canal anal ¬ *D01.3*
- Appareil respiratoire, sans précision ¬ *D02.4*
- Bronches et poumon ¬ *D02.2*
- Col de l'utérus, sans précision ¬ *D06.9*
- Côlon ¬ *D01.0*
- Endocol ¬ *D06.0*
- Endomètre ¬ *D07.0*
- Estomac ¬ *D00.2*
- Exocol ¬ *D06.1*
- Foie, vésicule et voies biliaires ¬ *D01.5*
- Jonction recto-sigmoïdienne ¬ *D01.1*
- Larynx ¬ *D02.0*
- Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ *D00.0*
- Œil ¬ *D09.2*
- Œsophage ¬ *D00.1*
- Organe
- - Digestif
- - - Précisés ¬ *D01.7*
- - - Sans précision ¬ *D01.9*
- - Génital
- - - Femme, autres et non précisés ¬ *D07.3*
- - - Homme, autres et non précisés ¬ *D07.6*
- - Urinaires, autres et non précisés ¬ *D09.1*
- Partie
- - Appareil respiratoire ¬ *D02.3*
- - Col de l'utérus ¬ *D06.7*
- - Intestin, autres et non précisées ¬ *D01.4*
- Peau
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *D04.4*
- - Lèvre ¬ *D04.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D04.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D04.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D04.2*
- - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D04.3*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *D04.1*
- - Sans précision ¬ *D04.9*
- - Sièges ¬ *D04.8*
- - Tronc ¬ *D04.5*
- Prostate ¬ *D07.5*
- Rectum ¬ *D01.2*
- Thyroïde et autres glandes endocrines ¬ *D09.3*
- Trachée ¬ *D02.1*
- Vagin ¬ *D07.2*
- Verge ¬ *D07.4*
- Vessie ¬ *D09.0*
- Vulve ¬ *D07.1*

Carcinomateux ¬
- Kyste *C80.9*
- Neuropathie *C80.9†, G13.0**
- Pleurésie *C78.2*

Carcinomatose
- Péritonéale ¬ *C78.6*
- Secondaire) SAI ¬ *C79.9*

Carcinome
- Acidophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Adénoïde
- - Basal du col de l'utérus ¬ *C53.9*
- - Kystique du col de l'utérus ¬ *C53.9*
- Améloblastique
- - Mandibule ¬ *C41.1*
- - ¬ *C41.1*
- Ampoule de Vater ¬ *C24.1*
- Basocellulaire
- - Lèvre ¬ *C44.0*
- - Vulve ¬ *C51.9*
- Basophile
- - Éosinophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- - Hypophyse ¬ *C75.1*
- Bronchique
- - Atteinte de plusieurs localisations contiguës ¬ *C34.8*
- - Bronche souche ¬ *C34.0*
- - Lobe moyen ¬ *C34.2*
- Canal biliaire intrahépatique ¬ *C22.1*
- Canalaire ¬ *C50.9*
- Cellule
- - Acineuses du pancréas ¬ *C25.9*
- - Transitionnelle
- - - Corps de l'utérus ¬ *C54.1*
- - - ¬ *C68.9*
- - Vitreuses du col de l'utérus ¬ *C53.9*
- Chromophobe de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Corticosurrénalien à hypersécrétion pure d'aldostérone ¬ *C74.0, E26.0*
- Cutané de la paroi abdominale ¬ *C44.5*
- Diaphragme ¬ *C49.3*
- Embryonnaire ¬ *C80.9*
- Endométrioïde de l'ovaire ¬ *C56*
- Éosinophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Épidermoïde
- - Canal anal ¬ *C21.1*
- - Cavité orale ¬ *C06.9*
- - Col cervical ¬ *C53.9*
- - Côlon ¬ *C18.9*
- - Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- - Estomac ¬ *C16.9*
- - Foie et des voies biliaires intrahépatiques ¬ *C22.0, C22.1*
- - Fosses nasales et des sinus paranasaux ¬ *C30.0*
- - Hypopharynx ¬ *C13.9*
- - Intestin grêle ¬ *C17.9*
- - Langue mobile ¬ *C02.9*
- - Larynx ¬ *C32.9*
- - Lèvre ¬ *C00.9*
- - Œsophage ¬ *C15.9*

Carcinome *–suite*
- Épidermoïde *–suite*
- - Oropharyngé ¬ *C10.9*
- - Pancréas ¬ *C25.9*
- - Rectum ¬ *C20*
- - Sinus ¬ *C31.9*
- - Verge ¬ *C60.9*
- - Voies biliaires extra-hépatiques ¬ *C24.0*
- - Vulve ¬ *C51.9*
- Foie précisés ¬ Autres *C22.7*
- Gastrique
- - Associé au virus Epstein-Barr ¬ *C16.9*
- - Diffus ¬ *C16.9*
- Glande parotide ¬ *C07*
- Hépatocellulaire
- - Fibrolamellaire ¬ *C22.0*
- - ¬
- - - *C22.0*
- - - CHC [*C22.0*
- Hypophysaire à cellules mucoïdes ¬ *C75.1*
- In situ
- - Cavité buccale, de l'œsophage et de l'estomac ¬ *D00*
- - Col de l'utérus ¬ *D06*
- - Intracanalaire ¬ *D05.1*
- - Lobulaire ¬ *D05.0*
- - Oreille moyenne et de l'appareil respiratoire ¬ *D02*
- - Organe
- - - Digestifs, autres et non précisés ¬ *D01*
- - - Génitaux, autres et non précisés ¬ *D07*
- - Peau ¬ *D04*
- - Sans précision ¬ *D09.9*
- - Sein
- - - Sans précision ¬ *D05.9*
- - - ¬
- - - - *D05*
- - - - *D05.7*
- - Siège
- - - Non précisés ¬ *D09*
- - - Précisés ¬ *D09.7*
- Indifférencié
- - Cellules géantes de type ostéoclastique du pancréas ¬ *C25.9*
- - Endomètre ¬ *C54.1*
- - Estomac ¬ *C16.9*
- - Foie et des voies biliaires intrahépatiques ¬ *C22.9, C22.1*
- - Œsophage ¬ *C15.9*
- Intracanalaire
- - Papillaire mucineux du pancréas ¬ *C25.3*
- - Prostate [IDC-P] ¬ *C61*
- Lympho-épithélial-like ¬ *C80.9*
- Mammaire invasif à récepteurs hormonaux positifs ¬ *C50.9*
- Métaplasique du sein ¬ *C50.9*

Carcinome *–suite*
- Mixte
- - Acidophile et basophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- - Basophile et acidophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Nasopharyngé ¬ *C11.9*
- Neuroendocrine
- - Côlon ¬ *C18.9*
- - Cutané ¬ *C44.9*
- - Haut grade du col de l'utérus ¬ *C53.9*
- - Hépatique primaire ¬ *C22.7*
- - Pancréas ¬ *C25.9*
- - ¬ *C80.9*
- Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*
- Œsophage
- - Type glande salivaire ¬ *C15.9*
- - ¬ *C15.9*
- Pancréatique familial ¬ *C25.9*
- Papillaire
- - Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- - Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- - Folliculaire familial de la thyroïde ¬ *C73*
- - Kystique de l'ovaire ¬ *C56*
- Parathyroïdien à cellules eau de roche ¬ *C75.0*
- Péri-ampullaire ¬ *C26.9*
- Péritonéal primaire ¬ *C48.2*
- Petites cellules de l'ovaire ¬ *C56*
- Pilomatriciel ¬ *C44.9*
- Plexus choroïdes ¬ *C71.5*
- Pseudo-papillaire et solide du pancréas ¬ *C25.9*
- Pulmonaire
- - Non à petites cellules ¬ *C34.9*
- - Petites cellules ¬ *C34.9*
- - Sur cicatrice ¬ *C34.9*
- Rénal
- - Cellules claires ¬ *C64*
- - Chromophobe ¬ *C64*
- - Héréditaire à cellules claires ¬ *C64*
- - Médullaire ¬ *C64*
- - Papillaire ¬ *C64*
- - Tubulokystique ¬ *C64*
- - Tubulo-mucineux à cellules fusiformes ¬ *C64*
- - ¬ *C64*
- SAI ¬ *C80.9*
- Thymique ¬ *C37*
- Thyroïde ¬ *C73*
- Tubes collecteurs ¬ *C64*
- Vésico-vaginal ¬ *C57.9*

Carcinosarcome
- Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*

CARD11 ¬ Immunodéficience combinée sévère par déficit en *D81.2*

Cardia

- Travers le hiatus œsophagien ¬ Glissement du *Q40.1*
- ¬
- - Achalasie du *K22.0*
- - Insuffisance du *K31.88*
- - Tumeur maligne: *C16.0*

Cardialgie gastrique au cours d'achalasie ¬ *K22.0*

Cardiaque
v.a. cranio-cérébello-cardiaque
v.a. génito-palato-cardiaque
v.a. Type de maladie

- Anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Complications *O29.1*
- - Puerpéralité ¬ Complications *O89.1*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Complications *O74.2*
- Asplénie ou polysplénie ¬ Isomérisme des auricules *Q20.6*
- Assourdis, augmentés ou diminués ¬ Bruits *R01.2*
- Bénins et anodins ¬ Souffles *R01.0*
- Congénitales précisées ¬ Autres malformations *Q24.8*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Endocardite et atteintes valvulaires *I39**
- Électroniques) ¬ Adaptation et manipulation d'autres dispositifs *Z45.08*
- Mal définies ¬ Complications de cardiopathies et maladies *I51*
- Précisées ¬ Autres arythmies *I49.8*
- Prématurés [extrasystoles] ¬ Battements *I49.4*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale des cavités et des orifices *Q20.9*
- Vasculaire
- - Sans précision ¬
- - - Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe *T82.9*
- - - Présence d'implant et de greffe *Z95.9*
- - ¬
- - - Complication
- - - - Mécanique d'autres prothèses et implants *T82.5*
- - - - Prothèses, implants et greffes *T82.8*
- - - Douleur due à prothèses, implants et greffes *T82.8*
- - - Embolie due à prothèses, implants et greffes *T82.8*
- - - Fibrose due à prothèses, implants et greffes *T82.8*
- - - Hémorragie due à prothèses, implants et greffes *T82.8*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes *T82.7*
- - - Présence implant
- - - - Greffe
- - - - - *Z95*

Cardiaque *–suite*

- Vasculaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Présence implant *–suite*
- - - - Greffe *–suite*
- - - - - *Z95.8*
- - - - Transplants *Z95.88*
- - - Sténose due à prothèses, implants et greffes *T82.8*
- - - Thrombose due à prothèses, implants et greffes *T82.8*
- ¬
- - Arythmies *I49*
- - Bruits *R01.2*
- - Isomérisme des auricules *Q20.6*
- - Malformation congénital
- - - *Q24*
- - - Cavité orifice
- - - - *Q20*
- - - - *Q20.8*
- - - Cloisons *Q21.8*
- - - Septums *Q21.88*
- - Perception des battements *R00.2*
- - Rééducation des *Z50.0!*
- - Souffles et autres bruits *R01*

Cardiaque-pied bot ¬ Syndrome

- Pierre Robin-malformations *Q87.8*
- Séquence de Pierre Robin-malformations *Q87.8*

Cardiaques-hétérotaxie ¬ Syndrome d'anomalies *Q28.88*

Cardinale postérieure gauche ¬ Persistance de la veine *Q26.8*

Cardio
v.a. microcéphalie-facio-cardio-squelettique

Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, *B96.3!*

Cardio-facio-cutané ¬ Syndrome *Q87.8*

Cardiogénique ¬ Choc *R57.0*

Cardiogénital ¬ Syndrome *Q87.8*

Cardiomégalie

- Cours de maladie glycogénique ¬ *E74.0†, I43.1**
- ¬ *I51.7*

Cardiomélique type 3 ¬ Syndrome *Q87.2*

Cardiomyopathie
v.a. microcéphalie-cardiomyopathie

- Arythmogène ¬ Syndrome d'hyperkératose palmoplantaire- *Q87.8*
- Auriculaire-bloc cardiaque ¬ Syndrome de *I45.5*
- Béribéri ¬ *E51.1†, I43.2**
- Cirrhotique ¬ *I42.88*
- Cours de sarcoïdose ¬ *D86.8†, I43.8**
- Dilatation et ataxie ¬ *E71.1†, I43.1**
- Dilatée familiale isolée ¬ *I42.0*
- Histiocytoïde ¬ *I42.0*

Cardiomyopathie *–suite*

- Hypertrophique
- - Infantile létal déficit
- - - Complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ *I42.2*
- - - NADH-coenzyme Q réductase ¬ *I42.2*
- - - NADH-CoQ réductase ¬ *I42.2*
- - Mitochondriale avec acidose lactique par déficit en MTO1 ¬ *I42.2*
- - Myopathie mitochondriale ¬ Syndrome de cataracte congénitale- *Q87.8*
- - Néphropathie tubulaire ¬ Syndrome d'encéphalopathie- *E88.8*
- - Tubulopathie dues à une mutation de l'ADN mitochondrial ¬ *I42.2*
- Létale ¬ Myopathie précoce avec *G71.8*
- Métabolique ¬ *E88.9†, I43.8**
- Post-partum ¬ *O90.3*
- Restrictive familiale isolée ¬ *I42.5*
- Stress ¬ *I42.88*
- Tako-Tsubo ¬ *I42.88*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I43.0**
- Ventriculaire droite arythmogène [CVDA] ¬ *I42.80*
- ¬
- - *I42.88*
- - Examens liés à une prédisposition aux *Z01.81*
- - Syndrome de Leigh avec *G31.88†, I43.8**

Cardiomyopathique ¬ Lentiginose *Q87.1*

Cardionéphropathie hypertensif

- Insuffisance
- - Cardiaque congestive
- - - Rénale ¬ *I13.2*
- - - ¬ *I13.0*
- - Rénale ¬ *I13.1*
- Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.3*
- Sans précision ¬ *I13.9*
- ¬ *I13*

Cardio-œsophagienne ¬ Jonction: *C16.0*

Cardiopathie
v.a. microcéphalie-cardiopathie-malsegmentation

- Aiguë ou évolutive ¬ *I01.9*
- Amyloïde de la transthyrétine ¬ *E85.4†, I43.1**
- Anomalies squelettiques ¬ Syndrome d'anophtalmie-mégalocornée- *Q87.8*
- Artérioscléreux
- - Implication
- - - Bitronculaire ¬ *I25.12*
- - - Monotronculaire ¬ *I25.11*
- - - Tritronculaire ¬ *I25.13*
- - Sans
- - - Précision ¬ *I25.19*
- - - Sténoses ayant un effet hémodynamique ¬ *I25.10*
- - Sténose

Cardiopathie *–suite*
- Artérioscléreux *–suite*
- - Sténose *–suite*
- - - Stents ¬ *I25.16*
- - - Tronc commun de l'artère coronaire gauche ¬ *I25.14*
- - - Vaisseaux de pontage ¬ *I25.15*
- - ¬ *I25.1*
- Congénital
- - Polydactylie postaxiale ¬ Syndrome de malformations cérébrales- *Q87.8*
- - SAI ¬ *Q24.9*
- - ¬ Syndrome d'hypoplasie pancréatique-diabète- *Q87.8*
- Coronarien
- - Chronique ¬ *I25.19*
- - Insuffisance fonctionnelle du ventricule gauche ¬ *I25.19*
- - ¬ *I25.19*
- Cours
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ Autres *I52.0**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Autres *I52.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Autres *I52.8**
- - Mucopolysaccharidose ¬ *E76.3†, I52.8**
- Cyphoscoliose ¬ *I27.1*
- Dysmorphie cranio-faciale ¬ Syndrome d'atrésie des choanes-surdité- *Q87.8*
- Hypertensif
- - Insuffisance cardiaque (congestive) ¬ *I11.0*
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.1*
- - SAI ¬ *I11.9*
- - Sans insuffisance cardiaque (congestive) ¬ *I11.9*
- - ¬ *I11*
- Ischémique
- - Aigu
- - - Sans précision ¬ *I24.9*
- - - ¬
- - - - *I24*
- - - - Formes de *I24.8*
- - Chronique
- - - Sans précision ¬ *I25.9*
- - - ¬
- - - - *I25*
- - - - Formes de *I25.8*
- Mal définies ¬ Autres *I51.8*
- Maladies cardiaques mal définies ¬ Complications de *I51*
- Méningocoques ¬ *A39.5†, I52.0**
- Rhumatismal
- - Aigu
- - - Sans précision ¬ *I01.9*
- - - ¬ Autres *I01.8*
- - Précisées ¬ Autres *I09.8*

Cardiopathie *–suite*
- Rhumatismal *–suite*
- - Sans précision ¬ *I09.9*
- - ¬ Autres *I09*
- Sans précision ¬ *I51.9*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- Thyréotoxique ¬ *E05.9†, I43.8**
- ¬ Syndrome
- - Fente labiopalatine-malrotation- *Q87.8*
- - Microcéphalie-épilepsie-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - Séquence de Potter-fente- *Q87.8*

Cardiopulmonaire
- Chronique ¬ Maladie *I27.9*
- Cours d'obésité ¬ Syndrome *E66.29*
- Précisées ¬ Autres affections *I27.8*
- Sans précision ¬ Affection *I27.9*
- Virus
- - Han ¬ Syndrome *B33.4†, J17.1**
- - Hanta [SCPH] ¬ Syndrome *B33.4†, J17.1**
- ¬ Autres affections *I27*

Cardioquelettique et neutropénie liée à l'X ¬ Myopathie *E71.1*

Cardio-rénal ¬
- Maladie: *I13*
- Syndrome *I13.90*

Cardio-respiratoire ¬ Insuffisance *R09.2*

Cardiospasme ¬ *K22.0*

Cardiosquelettique avec neutropénie et mitochondriopathie ¬ Myopathie *E71.1*

Cardiosquelettique-neutropénie ¬ Syndrome de myopathie *E71.1*

Cardiotoniques et médicaments d'action similaire ¬ Intoxication: Glucosides *T46.0*

Cardio-vasculaire
- Congénitale ¬ Anomalie *Q28.88*
- Cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Troubles *I98.1**
- Décrite ainsi ¬ Athérosclérose *I25.0*
- SAI ¬ Accident *I51.6*
- Sans précision ¬
- - Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système *T46.9*
- - Maladie *I51.6*
- Survenant pendant période périnatal
- - Sans précision ¬ Affection *P29.9*
- - ¬ affection
- - - *P29*
- - - *P29.8*
- Tardive ¬ Syphilis *A52.0†, I98.0**
- Tertiaire ¬ Syphilis *A52.0†, I98.0**
- ¬
- - Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Système *F45.30*
- - Examen spécial de dépistage des affections *Z13.6*
- - Gomme du système *A52.0†, I98.0**

Cardio-vasculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système *T46*
- - Maladie de Gaucher, forme *E75.2*
- - Mise en observation pour suspicion d'autres affections *Z03.5*
- - Présence d'un autre système d'assistance *Z95.80*
- - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.3*
- - Syndrome de maladie de Gaucher-ophtalmoplégie-calcification *E75.2*
- - Syphilis
- - - *A52.0†*
- - - *A52.0†, I98.0**
- - - *I98.0**
- - - Congénitale tardive *A50.5†, I98.0**
- - Syphilome *A52.0†, I98.0**

Cardio-vasculo-rénale ¬ maladie: *I13*

Cardite
- Aigu
- - Chronique) ¬ *I51.8*
- - Rhumatismale ¬ *I01.9*
- Cours de polyarthrite chronique ¬ *M05.30†, I52.8**
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.30†, I52.8**
- Méningocoques ¬
- - *A39.5†*
- - *A39.5†, I52.0**
- Rhumatismale ¬ *I09.9*
- Rhumatoïde ¬ *M05.39†, I52.8**
- Viral ¬
- - *B33.2*
- - *B33.2†, I52.1**
- Virus Coxsackie ¬ *B33.2†, I52.1**

Carencé ¬ Arthropathie lors d'un état alimentaire *E63.9†, M14.59**

Carène congénital ¬ Thorax en *Q67.7*

Carey
v. Toriello-Carey

Carey-Fineman-Ziter ¬ Syndrome de *Q87.0*

Carie
- Cément ¬ *K02.2*
- Dentaire
- - Inactive ¬ *K02.3*
- - Sans précision ¬ *K02.9*
- - Stabilisée ¬ *K02.3*
- - ¬
- - - *K02*
- - - *K02.8*
- Dentine ¬ *K02.1*
- Exposition de la pulpe ¬ *K02.5*
- Initiales] ¬ Taches blanches [*K02.0*
- Limitée à l'émail ¬ *K02.0*
- Osseux

Carie *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Mastoïde] ¬ Ostéite mastoïdienne [*H70.1*
- - Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, M90.29**
- - ¬ *A18.0†, M90.09**
- Tuberculeux
- - Apophyse mastoïde ¬ *A18.0†, H75.0**
- - Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Nez ¬ *A18.0†, M90.08**
- - Orbites ¬ *A18.0†, M90.08**
- - Sacrum ¬ *A18.0†, M49.08**
- - ¬ *A18.0†, M90.09**

Carinii ¬
- Infection à Pneumocystis *B48.5†, J17.2**
- Maladie due au VIH avec pneumonie à Pneumocystis *B20, B48.5*
- Pneumonie Pneumocystis
- - *B48.5†*
- - *B48.5†, J17.2**

Carman
v. Wellesley-Carman-French

Carnevale
v. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

Carney-Stratakis ¬ Syndrome de *D44.8*

Carnitine
- Cellulaire ¬ Défaut de captation de la *E71.3*
- Palmitoyltransférase
- - I hépatique ¬ Déficit en *E71.3*
- - IA ¬ Déficit en *E71.3*
- - II ¬ Déficit en *E71.3*
- Palmityltransférase musculaire ¬ Carence en *E71.3*
- Travers la membrane plasmique ¬ Défaut du transporteur de *E71.3*
- ¬
- - Carence en *E63.8*
- - Déficit systémique primaire en *E71.3*

Carnitine-acylcarnitine translocase ¬ Déficit en *E71.3*

Caroline du Nord ¬ Dystrophie maculaire de la *H35.5*

Caronculaire œil ¬ Tumeur
- Bénigne *D31.0*
- Maligne *C69.0*

Caroncule urétrale ¬ *N36.2*

Carotide
- A carotide
- - Commune ¬ Lésion traumatique de la *S15.01*
- - Externe ¬ Lésion traumatique de la *S15.02*
- - Interne ¬ Lésion traumatique de la *S15.03*
- Carotide, partie non précisée ¬ Lésion traumatique de la *S15.00*
- Commune ¬ Lésion traumatique de la carotide: A. *S15.01*
- Externe ¬ Lésion traumatique de la carotide: A. *S15.02*
- Interne

Carotide *–suite*
- Interne *–suite*
- - Sa portion intracrânienne ¬ Anévrysme de l'artère *I67.10*
- - ¬
- - - Agénésie de la *Q28.18*
- - - Lésion traumatique de la carotide: A. *S15.03*
- Partie non précisée ¬ Lésion traumatique de la carotide: *S15.00*
- Vertébral
- - N entraînant infarctus cérébral ¬
- - - Embolie des artères basilaires, *I65*
- - - Obstruction (complète) (partielle) des artères basilaires, *I65*
- - - Sténose des artères basilaires, *I65*
- - - Thrombose des artères basilaires, *I65*
- - ¬ artère basilaire
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- ¬
- - Anévrisme
- - - Dissection de l'artère *I72.0*
- - - Syphilitique
- - - - *A52.0†, I79.8**
- - - - Intracrânien
- - - - - *A52.0†, I68.8**
- - - - - Artère *A52.0†, I68.8**
- - Artériosclérose de l'artère *I65.2*
- - Lésion traumatique de la *S15.0*
- - Occlusion et sténose de l'artère *I65.2*

Carotidien
- Hémisphérique) ¬ Syndrome *G45.1*
- Syncope) ¬ Syndrome du sinus *G90.00*
- ¬
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon *I60.0*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Corpuscule *D35.5*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule *D44.6*
- - - Maligne: Corpuscule *C75.4*

Carpe
- Articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (os) *S93.31*
- Carpe: Carpe, sans précision ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.10*
- Grand os ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.16*
- Os
- - Crochu ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.17*
- - Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.13*
- - Pyramidal ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.12*
- - Semi-lunaire ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.11*

Carpe *–suite*
- Os *–suite*
- - Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.14*
- - Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.15*
- Sans précision ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.10*
- Surnuméraire ¬ Os du *Q74.0*
- ¬
- - Fracture
- - - Plusieurs os du *S62.19*
- - - S) os du *S62.1*
- - Rupture traumatique de ligament du poignet et du *S63.3*

Carpenter
v.a. Cole-Carpenter
v.a. Miles-Carpenter
- ¬ Syndrome de *Q87.0*

Carpenter-Waziri ¬ Syndrome de *Q87.0*

Carpien
v.a. médiocarpien
v.a. radio-carpien
- Palmaire) ¬ Ligament: cubito- *S63.3*
- Pendant la grossesse ¬ Syndrome du canal *O26.82*
- Tarsien ¬ os naviculaire *S62.0*
- ¬
- - Entorse et foulure du poignet: (Articulation) *S63.51*
- - Spasme pédo- *R29.0*
- - Syndrome du canal *G56.0*

Carpo
v.a. cranio-carpo-tarsien
- Tarsales-oligodontie ¬ Syndrome de fente palatine-anomalies *Q87.8*

Carpocyphose [maladie de Madelung] ¬ *Q74.0*

Carpo-métacarpien
- Bilatéral ¬ Arthrose
- - Post-traumatique de la première articulation *M18.2*
- - Primaire de la première articulation *M18.0*
- - Secondaires de la première articulation *M18.4*
- SAI ¬ Arthrose
- - Post-traumatique de la première articulation *M18.3*
- - Primaire de la première articulation *M18.1*
- - Secondaire de la première articulation *M18.5*
- Sans précision ¬ Arthrose de la première articulation *M18.9*
- Unilatéral ¬ Arthrose
- - Post-traumatique de la première articulation *M18.3*
- - Primaire de la première articulation *M18.1*
- - Secondaire de la première articulation *M18.5*
- ¬
- - Arthrose

Carpo-métacarpien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Arthrose *–suite*
- - - Post-traumatiques de la première articulation *M18.3*
- - - Première articulation *M18*
- - - Primaires de la première articulation *M18.1*
- - - Secondaires de la première articulation *M18.5*
- - Entorse et foulure du poignet: (Articulation) *S63.53*
- - Luxation du poignet: (Articulation) *S63.04*

Carrefour pharyngo-laryngé de l'oropharynx ¬ *C10.8*

CAR-T ¬ Syndrome de libération de cytokines après une thérapie cellulaire *D76.4*

Carteaud] ¬ Papillomatose confluente et réticulée [Gougerot- *L83*

Cartilage
- Articulaire
- - Clavicule ¬ Tumeur
- - - Bénigne des os et du *D16.72*
- - - Maligne des os et du *C41.32*
- - Côté ¬ Tumeur
- - - Bénigne des os et du *D16.70*
- - - Maligne des os et du *C41.30*
- - Genou ¬ Déchirure récente du *S83.3*
- - Membre
- - - Sans précision ¬ Tumeur maligne: Os et *C40.9*
- - - ¬ Tumeur malign
- - - - Lésion à localisations contiguës des os et du *C40.8*
- - - - Os et du *C40*
- - Sans précision ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Os et *D16.9*
- - - Maligne: Os et *C41.9*
- - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur maligne des os et du *C41*
- - Sternum ¬ Tumeur
- - - Bénigne des os et du *D16.71*
- - - Maligne des os et du *C41.31*
- - ¬
- - - Atteintes du *M24.1*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne des os et du *D16*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Os et *D48.0*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du *C41.8*
- Cricoïde
- - Épiglotte glotte larynx cartilage thyroïdien ¬
- - - Absence de *Q31.8*
- - - Agénésie de *Q31.8*
- - - Atrésie de *Q31.8*
- - ¬
- - - *S12.8*

Cartilage *–suite*
- Cricoïde *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Fissure (de): postérieure du *Q31.8*
- Interne de la symphyse (pubienne) obstétrical(e) ¬ Arrachement du *O71.6*
- Intervertébral ¬ Tuberculose du *A18.0†, M49.09**
- Laryngé ¬ Tumeur maligne: *C32.3*
- Ménisque
- - Genou ¬ Lésion récidivante du *M23.39*
- - ¬ Mâchoire (*S03.0*
- Nez ¬
- - *C30.0*
- - *D14.0*
- - *D38.5*
- Sans précision ¬ Affection du *M94.9*
- Thyroïde ¬
- - *S12.8*
- - *S13.5*
- Thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du *Q31.8*
- - Fissure (de): *Q31.8*
- Trachéal ¬ Anomalie du *Q32.1*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Affection
- - - *M94*
- - - Précisées du *M94.8*
- - Tuberculose du *A18.0†, M01.19**

Cartilagineux
- Multiples ¬ Exostoses *Q78.6*
- Trachée ¬ Fracture des anneaux *S12.8*

Carvajal ¬ Syndrome de *Q87.8*

Caryomégalique ¬ Néphrite interstitielle *N11.8*

Caryotype
- 45,X ¬ *Q96.0*
- 46
- - X
- - - Chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) ¬ *Q96.2*
- - - Iso (Xq) ¬ *Q96.1*
- - XX ¬
- - - Phénotype masculin avec *Q98.3*
- - - Syndrome de Klinefelter, homme avec *Q98.2*
- - XY ¬ Femme avec un *Q97.3*
- 47
- - XXX ¬ *Q97.0*

Caryotype *–suite*
- 47 *–suite*
- - XXY ¬ Syndrome de Klinefelter, *Q98.0*
- - XYY ¬ *Q98.5*

Casamassima-Morton-Nance ¬ Syndrome de *Q87.8*

Cassette A1 ¬ Déficit du transporteur à ATP-binding *E78.6*

Castleman ¬ Tumeur de *D47.7*

Castroviejo
v. Pascual-Castroviejo

Catalase
- Peroxydase ¬ Déficit en *E80.3*
- ¬ Déficit en *E80.3*

Catalepsie schizophrénique ¬ *F20.2*

Cataméniale ¬
- Extraction *Z30.3*
- Régulation *Z30.3*

Catane ¬ Dysostose acrofaciale type *Q75.4*

Cataplexie ¬ Narcolepsie
- *G47.4*
- Sans *G47.4*

Cataracta diabetica ¬ Diabète sucré avec *E14.30†, H28.0**

Cataracte
v.a. hydrocéphalie-fibroélastoses-cataracte
- Affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs ¬ *H28**
- Anomalies squelettiques ¬ Syndrome de surdité- *Q87.8*
- Aphaque] ¬ Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la *H59.0*
- Autosomique dominante ¬ Syndrome d'atrophie optique- *H47.2*
- Brunescente ¬ *H25.1*
- Compliquée ¬ *H26.2*
- Congénital
- - Cardiomyopathie hypertrophique-myopathie mitochondriale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Dysmorphie faciale-neuropathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ *Q12.0*
- Coralliforme ¬ *Q12.0*
- Cours
- - Hypoparathyroïdie ¬ *E20.9†, H28.1**
- - Iridocyclite chronique ¬ *H26.2*
- - Maladie
- - - Endocrinien
- - - - Nutritionnelles et métaboliques ¬ *H28.1**
- - - - ¬ *E34.9†, H28.1**
- - - Métabolique NCA ¬ *E88.9†, H28.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H28.2**
- - Malnutrition-déshydratation ¬ *E46†, H28.1**
- - Myxœdème ¬ *E03.9†, H28.1**
- - Secondaire à des affections oculaires ¬ *H26.2*

Cataracte *–suite*
- Cours *–suite*
- - Trouble de l'alimentation NCA ¬ *E63.9†, H28.1**
- Déficience intellectuelle-atrésie anale-uropathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Incipiente sénile ¬ *H25.0*
- Infantile
- - Hypogonadisme ¬ Syndrome de dystrophie musculaire congénitale- *G71.2*
- - Juvénile et présénile ¬ *H26.0*
- Médicamenteuse ¬ *H26.3*
- Membraneuse congénitale ¬ *Q12.0*
- Myotonique ¬ *G71.1†, H28.2**
- Précisées ¬ Autres *H26.8*
- Sans précision ¬ *H26.9*
- Sapin de Noël ¬ *G71.1†, H28.2**
- Secondaire ¬ *H26.4*
- Sénile
- - Coronaire ¬ *H25.0*
- - Corticale ¬ *H25.0*
- - Hypermûre ¬ *H25.2*
- - Nucléaire ¬ *H25.1*
- - Polaire sous-capsulaire (antérieure) (postérieure) ¬ *H25.0*
- - Punctiforme ¬ *H25.0*
- - Sans précision ¬ *H25.9*
- - Type Morgagni ¬ *H25.2*
- - ¬
- - - *H25*
- - - *H25.8*
- - - Formes combinées de *H25.8*
- Sous-capsulaire postérieure ¬ *H26.8*
- Traumatique ¬ *H26.1*
- ¬
- - *H26*
- - Diabète sucré type
- - - 1 avec *E10.30†, H28.0**
- - - 2 avec *E11.30†, H28.0**
- - Séquelles de *H26.4*

Cataracte-ataxie-surdité ¬ Syndrome de *G11.2*

Catarrhale ¬
- Bronchite: *J40*
- Laryngite: *J37.0*
- Otite moyenne: *H65.9*
- Trachéite (aiguë): *J04.1*

Catarrhe
- Intestinal ¬ *A09.0*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, J99.8**
- Tubo-tympanique chronique ¬ *H65.2*

Catastrophe
- Guerre et autres hostilités ¬ Exposition à une *Z65*
- Naturelles ¬ Chute d'objets lors de *X59.9!*
- ¬ Modification durable de la personnalité après une expérience de *F62.0*

Catatonie
- Organique ¬ *F06.1*
- Schizophrénique ¬ *F20.2*

Catatonique ¬
- Schizophrénie *F20.2*
- Stupeur *F20.2*

Catécholamine ¬
- Hypersécrétion de *E27.5*
- Taux urinaires élevés de: *R82.5*

Catécholaminergique ¬ Tachycardie ventriculaire polymorphe *I47.2*

Catel-Manzke ¬ Syndrome de *Q87.8*

Cathéter
- Broviac® ¬ *Z95.81*
- Broviak® ¬ *Z45.20*
- Cours acte visée diagnostique thérapeutique ¬ Perforation accidentel
- - Nerf par *T81.2*
- - Organe par *T81.2*
- - Vaisseau sanguin par *T81.2*
- Dialyse péritonéale ¬ Infection et réaction inflammatoire due à un *T85.71*
- Spinal de perfusion ¬ Sepsis dû à un *T85.72*
- Vasculaire
- - Demeure
- - - Implanté chirurgicalement ¬ Adaptation et manipulation d'un système de *Z45.20*
- - - Mis en place par voie chirurgicale ¬ Présence d'un système de *Z95.81*
- - Dialyse ¬ Complication mécanique d'un *T82.4*
- ¬ enlèvement d'un *Z43*

Catlin ¬ Marques de *Q75.8*

CATSHL ¬ Syndrome *Q87.2*

Cauchemars ¬ *F51.5*

Caudal
- Familiale ¬ Dysgénésie *Q87.8*
- ¬ Rétrécissement *M48.0*

Causalgie ¬
- *G90.6*
- *G90.69*

CAV [communication auriculoventriculaire] ¬ *Q21.2*

Cave
- Inférieur
- - Oreillette gauche ¬ Drainage anormal de la veine *Q26.8*
- - Supérieur
- - - SAI ¬ Anomalie de la veine *Q26.9*
- - - ¬
- - - - Absence de veine *Q26.8*
- - - - Sténose congénitale de la veine *Q26.0*
- - - - Syndrome de la veine *I87.1*
- - Veine azygos ¬ Continuation de la veine *Q26.8*
- - ¬
- - - Interruption de la veine *Q26.8*

Cave *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lésion traumatique de la veine *S35.1*
- SAI ¬ Veine *S25.2*
- Supérieur
- - Droite dans l'oreillette gauche ¬ Abouchement de la veine *Q26.8*
- - Gauche
- - - Oreillette gauche par le sinus coronaire ¬ Abouchement de la veine *Q26.1*
- - - Toit de l'oreillette gauche ¬ Abouchement de la veine *Q26.1*
- - - ¬
- - - - Persistance de la veine *Q26.1*
- - - - Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec communication interatriale, séquence de Robin et persistance de la veine *Q87.8*
- - ¬
- - - Agénésie de la veine *Q26.8*
- - - Lésion traumatique de la veine *S25.2*
- ¬
- - Embolie et thrombose de la veine *I82.2*
- - Sténose congénitale de la veine *Q26.0*

Caverneux
- Cérébral
- - Familial ¬
- - - Hémangiome *Q28.38*
- - - Malformation *Q28.38*
- - Héréditaire ¬ Malformation *Q28.38*
- Pénis ¬ Lésion de la tunique albuginée du corps *S39.80*
- Verge ¬
- - Abcès des corps *N48.2*
- - Anthrax des corps *N48.2*
- - Atrophie des corps *N48.8*
- - Furoncle des corps *N48.2*
- - Hypertrophie des corps *N48.8*
- - Phlegmon des corps *N48.2*
- - Thrombose des corps *N48.8*
- ¬
- - Anévrysme artérioveineux du sinus *Q28.20*
- - Corps *C60.2*
- - Induration plastique des corps *N48.6*
- - Malformation lymphatique *D18.19*

Cavernite (de la verge) ¬ *N48.2*

Cavernomatose cérébrale familiale ¬ *Q28.38*

Cavité
- Abdominale ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la *R85*
- Buccal
- - Bouche, partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.50*
- - Gencive (processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.53*

Cavité *–suite*
- Buccal *–suite*
- - Langue et plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.54*
- - Lèvre ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.51*
- - Muqueuse de la joue ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.52*
- - Œsophage et de l'estomac ¬ Carcinome in situ de la *D00*
- - Organe digestif évolution imprévisible inconnu
- - - Organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs ¬ Tumeur de la *D37.78*
- - - Pancréas ¬ Tumeur de la *D37.70*
- - - ¬ Tumeur de la *D37*
- - Palais ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.55*
- - Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.59*
- - Pharynx
- - - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la *C14*
- - - ¬
- - - - Carcinoma in situ: Lèvre, *D00.0*
- - - - Tumeur
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, *D37.0*
- - - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la *C14.8*
- - SAI ¬ *C06.9*
- - ¬
- - - Blessure superficielle de la lèvre et de la *S00.5*
- - - Plaie ouverte lèvre
- - - - *S01.5*
- - - - Cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la *S01.59*
- Cœur ¬ Déchirure cardiaque
- - Ouverture d'une *S26.83*
- - Sans ouverture d'une *S26.82*
- Corporelle plaie opératoire
- - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- - ¬
- - - Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- - - Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- - - Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- Glénoïde et col de l'omoplate ¬ Fracture de l'omoplate: *S42.14*
- Médiane (bassin) entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement de: *O33.3*
- Moyenne ¬ Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la *O65.3*
- Orale ¬ Carcinome épidermoïde de la *C06.9*

Cavité *–suite*
- Orifice cardiaque
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q20.9*
- - ¬ malformation congénital
- - - *Q20*
- - - *Q20.8*
- Thoracique ¬ *T27.2*
- ¬ Myiase des *B87.8*

CblA ¬ Acidurie méthylmalonique sensible à la vitamine B12 type *E71.1*

CBP ¬ *K74.3*

CCAM ¬ *Q33.0*

CD27 ¬ Maladie lymphoproliférative autosomique récessive par déficit en *D47.9*

CD30 positif ¬
- Lymphome
- - Anaplasique à grandes cellules, *C84.6*
- - Cutané à grandes cellules T, *C86.6*
- - Diffus à grandes cellules B *C83.3*
- Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, *C86.6*

CD4
- Idiopathique ¬ Lymphocytopénie *D72.8*
- Microlitre sang ¬ 200
- - 499 lymphocytes T auxiliaires (*U61.2!*
- - Lymphocytes T auxiliaires (*U61.3!*
- Non précisé ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires (*U61.9!*
- Plus par microlitre de sang ¬ 500 lymphocytes T auxiliaires (*U61.1!*
- ¬
- - Lymphome T cutané à cellules pléomorphes de taille petite à moyenne *C84.4*
- - Nombre réduit de lymphocytes *R72*

CD59 ¬ Déficit primaire en *D84.1*

CD8 ¬ Nombre réduit de lymphocytes *R72*

CDA type 2 ¬ *D64.4*

CDG
- Type IIc ¬ Syndrome *D84.8*
- ¬
- - *E77.8*
- - Syndrome *E77.8*

CDG-IIg ¬ *E77.8*

CDG-IIh ¬ *E77.8*

CDHS ¬ *Q87.0*

CDKN1C ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une mutation de *Q87.3*

CDPX2 ¬ *Q77.3*

CEBPA ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec mutations somatiques de *C92.00*

Cécité
- Baisse de la vision ¬ *H54*
- Diurne ¬ *H53.1*
- Forte baisse vision
- - Binoculaire ¬ *H54.0*
- - Monoculaire ¬ *H54.4*

Cécité *–suite*
- Nocturne
- - Anomalies squelettiques-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Stationnaire congénitale ¬ *H53.6*
- - ¬ *H53.6*
- Pingelap ¬ *H53.5*
- Rivières ¬ *B73*
- Surdité ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique récessive- *G11.1*
- ¬
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, H54.0*
- - Syndrome de dysplasie ectodermique- *Q87.8*

CEDNIK ¬ Syndrome *Q82.8*

Ceelen-Gellerstedt ¬ Syndrome de *E83.1†, J99.8**

Ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la *U81.6!*

Ceinture
- Autosomique
- - Dominant type
- - - 1A ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 1B ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 1C ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 1D ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 1E ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 1F ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 1G ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 1H ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - Récessif type
- - - 2A ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2B ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2C ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2D ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2E ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2F ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2G ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2H ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2I ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2J ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2K ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2L ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2M ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2N ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2O ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2P ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2Q ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2R ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2S ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2U ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2W ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2X ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*

Ceinture *–suite*
- Autosomique *–suite*
- - Récessif type *–suite*
- - - 2Y ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- Bassin ¬ Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la *S71.80*
- Déficit
- - Delta-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - FKRP ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - Gamma-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - Lamine A/C ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - POMK ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- Orthopédique(s) ¬ *Z46.7*
- Pelvien ¬
- - Malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la *Q74.2*
- - Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la *S71.8*
- Scapulaire
- - Partie non précisée ¬ Fracture de la *S42.9*
- - SAI ¬
- - - Entorse et foulure de la *S43.7*
- - - Luxation de la *S43.3*
- - ¬
- - - Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la *S43.7*
- - - Luxation
- - - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments de la *S43*
- - - - Parties autres et non précisées de la *S43.3*
- - - Malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la *Q74.0*
- - - Plaie ouverte
- - - - Non précisée de parties autres et non précisées de la *S41.80*
- - - - Parties autres et non précisées de la *S41.8*
- ¬ Dystrophie musculaire: des *G71.0*

Cellulaire
- CAR-T ¬ Syndrome de libération de cytokines après une thérapie *D76.4*
- CR3] ¬ Déficit en complexe récepteur de la membrane *D71*
- Indifférencié ¬ Lymphome de type *C83.9*
- S) avec chromosome sexuel anormal ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) *Q96.4*
- Sous-cutané
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de la peau et du tissu *O99.7*
- - Cours maladies classées ailleurs ¬ affection
- - - Peau et du tissu *L99**
- - - Précisées de la peau et du tissu *L99.8**
- - Lié irradiation

Cellulaire *–suite*
- Sous-cutané *–suite*
- - Lié irradiation *–suite*
- - - Sans précision ¬ Affection de la peau et du tissu *L59.9*
- - - ¬ affection
- - - - Peau et du tissu *L59*
- - - - Précisées de la peau et du tissu *L59.8*
- - Niveau
- - - Cou ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.1*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.4*
- - - - Supérieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.3*
- - - Tête ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.0*
- - - Tronc ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.2*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres affections de la peau et du tissu *L98*
- - Sans précision ¬
- - - Affection de la peau et du tissu *L98.9*
- - - Infection localisée de la peau et du tissu *L08.9*
- - - Kyste folliculaire de la peau et du tissu *L72.9*
- - - Lésion granulomateuse de la peau et du tissu *L92.9*
- - - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.9*
- - Sièges multiples ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.7*
- - ¬
- - - Affections précisées de la peau et du tissu *L98.8*
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de maladies de la peau et du tissu *Z84.0*
- - - - Personnels de maladies de la peau et du tissu *Z87.2*
- - - Formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu *L72.8*
- - - Infection localisé
- - - - Peau et du tissu *L08*
- - - - Précisées de la peau et du tissu *L08.8*
- - - Kystes folliculaires de la peau et du tissu *L72*
- - - Lésion
- - - - Granulomateuses de la peau et du tissu *L92.8*
- - - - Infiltrantes de la peau et du tissu *L98.6*
- - - Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu *R93.8*
- - - Tuberculose de la peau et du tissu *A18.4*
- - - Tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu *R22*
- ¬
- - Défaut
- - - Captation de la carnitine *E71.3*

Cellulaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Défaut *–suite*
- - - Immunité *D84.8*
- - Mucolipidose II [maladie à inclusion *E77.0*

Cellularité mixte ¬ Lymphome de Hodgkin (classique) à *C81.2*

Cellule
- Accessoires) ¬ Sarcome à cellules dendritiques (*C96.4*
- Acineuses du pancréas ¬ Carcinome à *C25.9*
- ALK
- - Négatif ¬ Lymphome anaplasique à grandes *C84.7*
- - Positif ¬ Lymphome
- - - Anaplasique à grandes *C84.6*
- - - B à grandes *C83.3*
- B
- - Anaplasique ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - CD30 positif ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - Centroblastique ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - Effusion primaire ¬ Lymphome à *C83.8*
- - Immunoblastique ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - Inflammation chronique ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à *C88.4*
- - Monocytoïdes ¬ Lymphome à *C85.9*
- - Plasmablastique ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - Riche cellule T
- - - Histiocytes ¬ Lymphome à grandes *C83.3*
- - - ¬ Lymphome diffus grand
- - - - *C83.3*
- - Sans précision ¬ Lymphomes à *C85.1*
- - Sous-type non différencié ¬ Lymphome diffus grand
- - - *C83.3*
- - Système nerveux central ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - T ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de *D81.1*
- - Zone marginale ¬ Lymphome nodulaire à *C83.0*
- - ¬
- - - Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de *D81.2*
- - - Leucémie
- - - - Lymphoïde chronique [LLC] à *C91.1*
- - - - Prolymphocytaire à *C91.3*
- - - Lymphome
- - - - Cérébral à *C85.1*
- - - - Diffus

Cellule *–suite*
- B *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lymphome *–suite*
- - - - Diffus *–suite*
- - - - - Centroblastique à grandes *C83.3*
- - - - - Grandes *C83.3*
- - - - Grandes *C83.3*
- - - - Intravasculaire à grandes *C83.8*
- - - - Lymphoblastique à *C83.5*
- - - - Médiastinal
- - - - - Thymique à grandes *C85.2*
- - - - - Thymique) à grandes *C85.2*
- - - - Non hodgkinien à *C85.1*
- - - - Petites *C83.0*
- - - - Splénique diffus de la pulpe rouge à petites *C83.0*
- Ballonnisantes sur la conjonctive ¬ Nævus à *D31.0*
- Bêta des îlots de Langerhans SAI ¬ Hyperplasie des *E16.1*
- C de la thyroïde ¬ Hyperplasie des *E07.0*
- CD30 positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes *C84.6*
- Clair
- - Ovaire ¬ Adénocarcinome à *C56*
- - Rein ¬ Sarcome à *C64*
- - ¬
- - - Carcinome rénal
- - - - *C64*
- - - - Héréditaire à *C64*
- - - Sarcome rénal à *C64*
- Clivées ¬ Lymphome folliculaire
- - *C82.9*
- - Non-hodgkinien à petites *C82.9*
- - Petites *C82.0*
- Cylindres dans les urines ¬ *R82.9*
- Dendritique
- - Cellules accessoires) ¬ Sarcome à *C96.4*
- - Folliculaires ¬ Sarcome à *C96.4*
- - Interdigitées ¬ Sarcome à *C96.4*
- Eau roche ¬
- - Adénocarcinome parathyroïdien à *C75.0*
- - Adénome parathyroïdien à *D35.1*
- - Carcinome parathyroïdien à *C75.0*
- Endocrine pancréas
- - Hypersécrétion de glucagon ¬ Hyperplasie des *E16.3*
- - SAI ¬ Hyperplasie des *E16.9*
- Fusiforme
- - Type
- - - A ¬ Mélanome malin du corps ciliaire, à *C69.4*
- - - B ¬ Mélanome malin du corps ciliaire, à *C69.4*
- - ¬
- - - Carcinome rénal tubulo-mucineux à *C64*

Cellule *–suite*
- Fusiforme *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hémangiome à *D18.00*
- G ¬ Tumeur à *D37.70*
- Géant
- - Central ¬ Granulome à *K10.1*
- - Polymyalgie rhumatismale ¬ Artérite à *M31.5*
- - SAI ¬ Granulome à *K10.1*
- - Type ostéoclastique du pancréas ¬ Carcinome indifférencié à *C25.9*
- - ¬
- - - Artérites à *M31.6*
- - - Astrocytome sous-épendymaire à *D43.2*
- - - Epulis (à): *K06.8*
- - - Granulome: périphérique à *K06.8*
- - - Hépatite foetale ou néonatale, à *P59.2*
- - - Myocardite idiopathique à *I40.8*
- - - Myopathie au cours d'artérite à *M31.6†, G73.7**
- - - Réticulohistiocytome (à *D76.3*
- - - Thyroïdite (à) (de): *E06.1*
- Gliales pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à sphéroïdes axonaux et *E75.2*
- Globoïdes ¬ Leucodystrophie à *E75.2*
- Îlot
- - Langerhans SAI ¬ Hyperplasie des *E16.9*
- - Pancréatiques ¬ Tumeur à *D37.70*
- Insulaires ¬ Tumeur à *D13.7*
- Ki-1+ ¬ Lymphome à grandes *C84.6*
- Kupffer ¬ Sarcome des *C22.3*
- Langerhans
- - Multifocale
- - - Multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à *C96.0*
- - - Unisystémique ¬ Histiocytose à *C96.5*
- - SAI ¬ Histiocytose à *C96.6*
- - ¬
- - - Granulomatose
- - - - *C96.6*
- - - - Chronique à *C96.6*
- - - Histiocytose unifocale à *C96.6*
- - - Sarcome à *C96.4*
- Manteau ¬ Lymphome à *C83.1*
- Mastoïdiennes ¬ *C30.1*
- Matures de type Burkitt ¬ LLA-B à *C91.8*
- Mixte ¬ Lymphome
- - *C85.9*
- - Diffus à *C83.9*
- Mucoïde ¬
- - Adénocarcinome hypophysaire à *C75.1*
- - Adénome hypophysaire à *D35.2*
- - Carcinome hypophysaire à *C75.1*

Cellule *–suite*
- Natural Killer ¬ Déficit immunitaire primaire autosomique récessif avec un défaut de cytotoxicité spontanée des *D84.8*
- Neuroendocrines du nourrisson ¬ Hyperplasie des *J84.8*
- NK ¬
- - Entéropathie à *K52.8*
- - Leucémie agressive à *C94.7*
- - Lymphome blastique à *C86.4*
- Non
- - Clivées ¬ Lymphome diffus à *C83.9*
- - Précis ¬ Leucémie
- - - *C95*
- - - *C95.7*
- - - Aiguë à *C95.0*
- - - Chronique à *C95.1*
- Ovaire ¬ Carcinome à petites *C56*
- Pléomorphes de taille petite à moyenne CD4+ ¬ Lymphome T cutané à *C84.4*
- Précisées ¬ Autres leucémies à *C94*
- Précurseur
- - B ¬ Lymphome à *C83.5*
- - T ¬ Lymphome à *C83.5*
- Principales de la parathyroïde ¬ Adénome à *D35.1*
- Souche
- - Hématopoïétique
- - - Immunosuppression actuelle ¬ État consécutif à une transplantation de *Z94.81*
- - - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un transplant de *T86.0*
- - - Sans immunosuppression actuelle ¬ État consécutif à une transplantation de *Z94.80*
- - - ¬ Échec d'un transplant de *T86.00*
- - Lignée incertaine ¬ Leucémie à *C95.0*
- - ¬
- - - Donneur de *Z52.01*
- - - Rejet de greffon après transplantation de *T86.00*
- - - Status post greffe allogénique de *Z94.80*
- T
- - Adulte
- - - Associé(e) au HTLV-1) ¬ Lymphome/leucémie à *C91.5*
- - - Rémission complète ¬ Lymphome aigu à *C91.51*
- - - ¬ Lymphome lymphomateux à *C91.50*
- - Associé à des entéropathies ¬ Lymphome à *C86.2*
- - CD30 positif ¬
- - - Lymphome cutané à grandes *C86.6*
- - - Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à *C86.6*
- - Histiocytes ¬ Lymphome à grandes cellules B riche en *C83.3*
- - NK
- - - Matures

Cellule *–suite*
- T *–suite*
- - NK *–suite*
- - - Matures *–suite*
- - - - Sans précision ¬ Lymphome à *C84.9*
- - - - ¬ Autres lymphomes à *C84.5*
- - - Sans précision ¬ Lymphome à *C84.9*
- - - Spécifiés ¬ Autres lymphomes à *C86*
- - - Type nasal ¬ Lymphome extranodal à *C86.0*
- - Non spécifié ¬ Lymphome périphérique à *C84.4*
- - Positive au virus Epstein-Barr chez l'enfant ¬ Maladie lymphoproliférative systémique à *D82.3*
- - Sans précision ¬ Lymphome cutané à *C84.8*
- - Type
- - - Entéropathique ¬ Lymphome à *C86.2*
- - - Panniculite ¬ Lymphome sous-cutané à *C86.3*
- - ¬
- - - Leucémie
- - - - Prolymphocytaire à *C91.6*
- - - - Promyélocytaire à *C91.60*
- - - Lymphome
- - - - *C84.4*
- - - - Angio-immunoblastique à *C86.5*
- - - - Diffus
- - - - - Grandes cellules B riche en *C83.3*
- - - - - Grandes cellules B, riche en *C83.3*
- - - - Hépatosplénique à *C86.1*
- - - - Lymphoblastique à *C83.5*
- - - - Non hodgkinien à *C84.4*
- Transitionnelle
- - Corps de l'utérus ¬ Carcinome à *C54.1*
- - ¬ Carcinome à *C68.9*
- Type alpha-bêta et gamma-delta ¬ Contient des *C86.1*
- Vitreuses du col de l'utérus ¬ Carcinome à *C53.9*
- ¬
- - Cancer du poumon à petites *C34.9*
- - Carcinome pulmonaire
- - - Non à petites *C34.9*
- - - Petites *C34.9*
- - Lymphome
- - - Cutané anaplasique à grandes *C86.6*
- - - Grandes *C85.9*
- - - Non-hodgkinien à grandes *C85.9*

Cellulite
- Orbite ¬ *H05.0*
- Phlegmoneuse
- - Conduit auditif externe ¬ *H60.1*
- - Oreille externe ¬ *H60.1*
- - Pavillon de l'oreille ¬ *H60.1*

Celse ¬ Kérion de *B35.0*

Cément ¬
- Aplasie et hypoplasie du *K00.4*
- Carie du *K02.2*

Cémentaire ¬ Hyperplasie *K03.4*

Cénestopathique ¬ Schizophrénie *F20.8*

Centre respiratoire immature du prématuré ¬ *P28.8*

Centrifuge ¬
- Érythème annulaire *L53.1*
- Lipodystrophie *E88.1*

Centripète ¬ Epidermolyse bulleuse dystrophique récessive *Q81.2*

Centroblastique
- Diffus ¬ Lymphome *C83.3*
- Grandes cellules B ¬ Lymphome diffus *C83.3*
- Non-hodgkinien ¬ Lymphome *C83.3*
- ¬ Lymphome
- - Diffus à grandes cellules B *C83.3*
- - Folliculaire *C82.2*

Centroblastique-centrocytaire
- Diffus ¬ Lymphome *C83.9*
- ¬ Lymphome *C83.9*

Centroblastome ¬ *C83.3*

Centrocytaire ¬ Lymphome *C83.1*

Centrocytome ¬ *C83.1*

Centrofolliculaire
- Cutané
- - Primitif ¬ Lymphomes B *C82.6*
- - ¬ Lymphome *C82.6*
- Diffus ¬ Lymphome *C82.5*

Centro-lobulaire ¬ Emphysème *J43.2*

Centronucléaire
- Autosomique
- - Dominante ¬ Myopathie *G71.2*
- - Récessive ¬ Myopathie *G71.2*
- Liée à l'X ¬ Myopathie *G71.2*

Centro-nucléaire) ¬ Myopathie: myotubulaire (*G71.2*

Centropontine ¬ Myélinolyse *G37.2*

Centro-temporaux [Rolando] ¬ Épilepsie bénigne à pics *G40.08*

Cénurose ¬ *B71.8*

CEP ¬ *E80.0*

CEP19 ¬ Obésité par déficit en *E66.89*

Céphalée
- Cause allergique ¬ *G44.8*
- Chronique
- - Dite de tension ¬ *G44.2*
- - Post-traumatique ¬ *G44.3*
- Dite de tension ¬ *G44.2*
- Grappe ¬ *G44.0*
- Histaminique
- - Horton ¬ *G44.0*
- - ¬ *G44.0*
- Hypnique ¬ *G44.8*

Céphalée *–suite*
- Inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, *N95.1*
- Médicamenteuse, non classée ailleurs ¬ *G44.4*
- Névralgique unilatérale brève avec injection conjonctivale ¬ *G44.8*
- Origine vertébrale ¬ *M54.2*
- Provoqué rachianesthésie anesthésie épidural cours
- - Grossesse ¬ *O29.4*
- - Puerpéralité ¬ *O89.4*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.5*
- Tension
- - Épisodique ¬ *G44.2*
- - SAI ¬ *G44.2*
- Unilatérale dans le sens d'une migraine ¬ *G43.9*
- Vasculaire
- - Non classée ailleurs ¬ *G44.1*
- - SAI ¬ *G44.1*
- ¬
- - *R51*
- - Migraine: aura, sans *G43.1*
- - Psychogène: *F45.40*

Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.0*

Céphalique
- Bénigne ¬ Histiocytose *D76.3*
- Fémoral ¬ Anomalie du noyau *Q72.4*
- ¬
- - Syndrome
- - - Algies *G44*
- - - Cervico- *M53.0*
- - - Précisés d'algies *G44.8*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.80*

Céphalo-pelvienne SAI ¬ Disproportion: *O33.9*

Céphalopolysyndactylie de Greig ¬ Syndrome de *Q75.2*

Céphalorachidien
- Postopératoire ¬ Fistule de liquide *G97.80*
- Rachicentèse ¬ Écoulement de liquide *G97.0*
- ¬
- - Écoulement de liquide *G96.0*
- - Présence d'un appareil de drainage du liquide *Z98.2*
- - Résultats anormaux de l'examen du liquide *R83*

Céphalosporines et autres bêtalactamines ¬ Intoxication: *T36.1*

Céphalothoracique progressive ¬ Lipodystrophie *E88.1*

CEPT ¬ Déficit en *E78.4*

Céramidase acide ¬ Déficit en *E75.2*

Cercarienne ¬ Dermite *B65.3*

Cerclage avec ou sans mention de béance du col ¬ Soins maternels pour: *O34.3*

Cérébellaire localisée de cause traumatique ¬ Hémorragie *S06.34*

Cerebellaris myoclonica ¬ Dyssynergia *G11.1*

Cérébelleux

- Acquis ¬
- - Ataxie *G31.9*
- - Dégénérescence *G31.9*
- Alcoolique ¬
- - Ataxie *G31.2*
- - Dégénérescence *G31.2*
- AMS-C] ¬ Atrophie multisystématisée de forme *G23.3*
- Autosomique
- - Dominant
- - - Épilepsie-déficience intellectuelle par déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie *G11.1*
- - - Surdité-narcolepsie ¬ Syndrome d'ataxie *G11.2*
- - - ¬ Ataxie *G11.8*
- - Récessif
- - - Adulte ¬ Ataxie *G11.2*
- - - Associée à la spectrine ¬ Ataxie *G11.1*
- - - Cécité-surdité ¬ Syndrome d'ataxie *G11.1*
- - - Déficit en ubiquinone ¬ Ataxie *G11.1*
- - - Retard psychomoteur ¬ Syndrome d'ataxie *G11.1*
- - - Saccade oculaire ¬ Syndrome d'ataxie *G11.8*
- - - Type Beauce ¬ Ataxie *G11.2*
- Cérébelleux héréditaire ¬
- - Ataxie SAI *G11.9*
- - Dégénérescence *G11.9*
- - Maladie *G11.9*
- - Syndrome *G11.9*
- Circonscrit ¬
- - Contusion *S06.32*
- - Hématome *S06.34*
- - Lésions cérébrales et *S06.38*
- Cours
- - Myxœdème ¬ Ataxie *E03.9†, G13.2**
- - Tumeur NCA ¬ Ataxie *D48.9†, G13.1**
- Début précoce ¬ Ataxie *G11.1*
- Défaut de réparation de l'ADN ¬ Ataxie *G11.3*
- Dégénérescence tapéto-rétinienne ¬ Syndrome d'hypoplasie *Q04.3*
- Diffus
- - SAI ¬ Lésion traumatique cérébrale et *S06.20*
- - ¬
- - - Contusion *S06.22*
- - - Lésions cérébrales et *S06.28*
- Dysplasie ectodermique ¬ Syndrome d'ataxie *G11.1*
- Fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.6*

Cérébelleux *–suite*

- Héréditaire ¬
- - Ataxie SAI cérébelleux (*G11.9*
- - Dégénérescence cérébelleux (*G11.9*
- - Maladie cérébelleux (*G11.9*
- - Syndrome cérébelleux (*G11.9*
- Liée à l'X non progressive ¬ Ataxie *G11.0*
- Modérée et Œdème de la substance blanche ¬ Leucoencéphalopathie avec ataxie *E75.2*
- Multiple ¬
- - Déchirures cérébrales et *S06.28*
- - Hématomes cérébral et *S06.23*
- N entraînant infarctus cérébral ¬
- - Embolie des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères *I66*
- - Obstruction (complète) (partielle) des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères *I66*
- - Sténose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères *I66*
- - Thrombose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères *I66*
- Non progressif déficience intellectuel ¬
- - Ataxie *G11.0*
- - Syndrome d'ataxie *G11.8*
- Postopératoire ¬ Mutisme (*G97.81*
- Précoce
- - Myoclonies [Ramsay-Hunt] ¬ Ataxie (de): *G11.1*
- - Persistance des réflexes tendineux ¬ Ataxie (de): *G11.1*
- - Tremblement essentiel ¬ Ataxie (de): *G11.1*
- Surdité ¬ Syndrome de myoclonie-ataxie *G11.1*
- Tardive ¬ Ataxie *G11.2*
- Type
- - A ¬ Lissencéphalie-hypoplasie *Q04.3*
- - B ¬ Lissencéphalie-hypoplasie *Q04.3*
- - C ¬ Lissencéphalie-hypoplasie *Q04.3*
- - D ¬ Lissencéphalie-hypoplasie *Q04.3*
- - E ¬ Lissencéphalie-hypoplasie *Q04.3*
- - F ¬ Lissencéphalie-hypoplasie *Q04.3*
- ¬
- - Abcès (embolique) (du): *G06.0*
- - Agénésie *Q04.3*
- - AMS-C [atrophie multisystématisée de type *G23.3*
- - Artère cérébral moyen antérieur postérieur artère
- - - *I63.3*
- - - *I63.4*
- - - *I63.5*
- - Atrophie multisystématisée de type *G23.3*
- - Déchirure cérébrale et *S06.38*
- - Hémorragie
- - - *S06.34*

Cérébelleux *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Hémorragie *–suite*
- - - Intracérébrale *I61.4*
- - - Traumatique, hématome traumatique, contusion: *S06.8*
- - Hypoplasie isolée du vermis *Q04.3*
- - Liponeurocytome *D43.1*
- - Neurosyphilis avec ataxie *A52.1†, G99.8**
- - Occlusion et sténose des artères *I66.3*
- - Syndrome
- - - *I67.9†, G46.4**
- - - Ichtyose-hépatosplénomégalie-dégénérescence *Q87.8*
- - - Sclérose endostéale hypoplasie *Q87.8*
- - - Tubulopathie proximale-diabète sucré-ataxie *Q87.8*

Cérébello
v.a. cranio-cérébello-cardiaque

Cérébellofaciodentaire ¬ Syndrome *Q87.0*

Cérébellorétinienne familiale ¬ Angiomatose *Q85.8*

Cérébral
v. crânio-cérébral
v. méningo-cérébral
v. Type de maladie

Cérébro
v.a. endocrino-cérébro-ostéodysplasique
v.a. oculo-cérébro-facial

Cérebro-cérébelleuse ¬ Syndrome d'épilepsie focale-déficience intellectuelle-malformation *Q04.8*

Cérébrocostomandibulaire ¬ Syndrome *Q87.5*

Cérébro-facial

- Type
- - 1 ¬ Syndrome métamérique artérioveineux *Q28.28*
- - 3 ¬ Syndrome métamérique artérioveineux *Q28.28*
- ¬ Syndrome métamérique artérioveineux *Q28.28*

Cérébrofaciothoracique ¬ Dysplasie *Q87.5*

Cérébrofrontofacial ¬ Syndrome de Baraitser-Winter *Q87.0*

Cérébro-hépato-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Cérébro-maculaire ¬ Dystrophie *E75.4*

Cérébro-méningée ¬ Cryptococcose *B45.1*

Cérébrooculonasal ¬ Syndrome *Q87.0*

Cérébrorétinienne ¬ Lipidose *E75.4*

Cérébroside ¬ Lipidose *E75.2*

Cérébrosidose ¬ *E75.2*

Cérébrospinale

- Épidémique ¬ Méningite *A39.0†, G01**
- Méningocoques ¬
- - Fièvre *A39.0†, G01**
- - Infection *A39.0†, G01**
- Tuberculeuse ¬ Méningite *A17.0†, G01**
- Typhus ¬ Méningite *A75.9†, G01**
- ¬

Cérébrospinale *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Liquorrhée *G96.0*
- - Tuberculose *A17.8†*, *G07**

Cerebrospinalis epidemica ¬ Meningitis *A39.0†*, *G01**

Cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ Cholestérose *E75.5*

Cérébrovasculaire
- Aiguë, SAI ¬ Insuffisance *I67.88*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres troubles *I68.8**
- Dégénérative ¬ Lésion *I67.9†*, *G32.8**
- Imminent ¬ Accident *G45.9*
- Non précisées ¬ Séquelles de maladies *I69.8*
- Précis ¬ maladie
- - *I67.8*
- - *I67.88*
- SAI ¬ Accident *I64*
- Sans précision ¬ Maladie *I67.9*
- ¬
- - Dégénérescence *I67.9†*, *G32.8**
- - Maladies *I67*
- - Séquelles de maladies *I69*
- - Syndrome
- - - Vaisseaux cérébraux au cours de maladies *I67.9†*, *G46.8**
- - - Vasculaire au cours de maladies *I67.9†*, *G46.8**
- - Syphilis *A52.0†*, *I68.8**

Cereus ¬ Intoxication alimentaire à Bacillus *A05.4*

Cernunnos ¬ Déficit en *D81.1*

Cernunnos-XLF ¬ Déficit en *D81.1*

Céroïde-lipofuscinose neuronal
- Adulte ¬ *E75.4*
- Infantile tardive ¬ *E75.4*
- Variante épilepsie nordique ¬ *E75.4*
- ¬ *E75.4*

Céroïdes neuronaux ¬ Lipofuscinose à *E75.4*

Certificat médical ¬ Établissement d'un *Z02*

Cérumen ¬ Bouchon de *H61.2*

Cerveau
- Contusion localisée ¬ Compression du *S06.31*
- Cours maladies classées ailleurs ¬ affection
- - *G94**
- - Précisées du *G94.8**
- Déficit en méthionine adénosyltransférase ¬ Démyélinisation du *E72.1*
- Enfant ¬ Dégénérescence congénitale du *Q04.9*
- Foie) (et du poumon) ¬ Abcès amibien du *A06.6†*
- Hémorragie et pression cérébrale lors d'une lésion crânio-cérébrale couverte grave ¬ Compression du *S06.21*, *S01.83!*
- Méninges cérébrales ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.3*

Cerveau *–suite*
- Méningocoques ¬ Infection du *A39.8†*, *G05.0**
- Nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou ¬ Lésions traumatiques du *T06.0*
- Sans précision ¬ Affection du *G93.9*
- Toute région] ¬ Abcès (embolique) (du): *G06.0*
- Tronc cérébral ¬
- - Compression du *G93.5*
- - Hernie du *G93.5*
- ¬
- - Abcès
- - - Amibien du *A06.6†*, *G07**
- - - Chromomycotique du *B43.1†*, *G07**
- - - Phaeohyphomycosique du *B43.1*
- - - Tuberculeux du *A17.8†*, *G07**
- - Affection
- - - *G93*
- - - Précisées du *G93.8*
- - Compression du *G93.5*
- - Cryptococcose du *B45.1†*, *G05.2**
- - Endartérite syphilitique du *A52.0†*, *I68.1**
- - Kyste hydatique du *B67.9†*, *G94.8**
- - Maladie due au VIH avec lymphome primaire du *B21*, *C85.9*
- - Rupture d'anévrysme artérioscléreux du *I60.7*
- - Syphilis vasculaire du *A52.0†*, *I68.8**
- - TBC [Tuberculose] du *A17.8†*, *G07**
- - Tuberculome de *A17.8†*, *G07**
- - Tuberculose du *A17.8†*, *G07**

Cervelet
- Traumatisme obstétrical ¬ Déchirure de la tente du *P10.4*
- ¬
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- - Tuberculose du *A17.8†*, *G07**
- - Tumeur maligne: *C71.6*

Cervical
v. Type de maladie

Cervicalgie ¬
- *M54.2*
- Atteinte des disques: cervicaux avec *M50*

Cervicite
- Accouchement ¬ *O86.1*
- Chlamydia ¬ *A56.0*
- Gonococcique SAI ¬ *A54.0*
- Sans érosion ou ectropion ¬ *N72*
- Syphilitique
- - Tardive ¬ *A52.7†*, *N74.2**
- - ¬ *A52.7†*, *N74.2**
- Trichomonas ¬ *A59.0†*, *N74.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†*, *N74.0**
- Virus de l'herpès ¬ *A60.0†*, *N74.8**

Cervico
- Auriculaire ¬ Fistule (du): *Q18.1*
- Brachial ¬ Syndrome *M53.1*
- Céphalique ¬ Syndrome *M53.0*
- Dorsaux ¬ atteinte des disques: *M50*
- Faciale ¬ Actinomycose *A42.2*
- Utérin
- - Non précisé ¬ Suivi de la mère en cas d'insuffisance *O34.39*
- - ¬ Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance *O34.38*
- Vésicale ¬ Fistule: *N82.1*

Cervicothoracique
- Noyau gélatineux
- - Névrite ¬ Hernie *M50.1†*, *G55.1**
- - Radiculopathie ¬ Hernie *M50.1†*, *G55.1**
- ¬ Syndrome d'aplasie müllérienne-aplasie rénale-anomalies *Q87.8*

Cervicotrochantérienne ¬ Portion *S72.05*

Cervico-vaginite à Chlamydia ¬ *A56.0*

Césarienne
- Acte chirurgie obstétrical acte visée diagnostique thérapeutique y compris accouchement SAI ¬
- - Anoxie cérébrale survenant après une *O75.4*
- - Arrêt cardiaque survenant après une *O75.4*
- - Insuffisance cardiaque survenant après une *O75.4*
- Antérieure ¬ Soins maternels pour cicatrice due à une *O34.2*
- Avant début travail ¬ lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris
- - *O32*
- - *O33*
- - *O34*
- Déclenchement chirurgical ¬ Lésion du placenta par amniocentèse, *P02.1*
- Sans travail spontané ¬ Accouchement prématuré (par): *O60.3*
- ¬
- - Accouchement
- - - Unique par *O82*
- - - Voie vaginale après une *O75.7*
- - Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par *O66.5*
- - Echec de l'épreuve de travail, suivi d'une *O66.4*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par *P03.4*
- - Infection d'une suture: après *O86.0*
- - Rupture d'une suture de *O90.0*
- - Travail prématuré spontané accouchement
- - - Prématuré spontané avec accouchement prématuré par *O60.1*
- - - Terme par *O60.2*

Cesioflammea ¬ Phacomatose *Q85.8*

Cesiomarmorata ¬ Phacomatose *Q85.8*

Cestan Chenais ¬ Syndrome de *I63.0†, G46.3**

Cestodes

- Adultes (Taenia saginata) ¬ Infection par *B68.1*
- Chien ¬
- - Dipylidiose [infection par *B71.1*
- - Infection par *B67.4*
- Poisson (infection) ¬ *B70.0*
- Porc ¬ Infection par *B68.0*
- Précisées ¬ Autres infections par *B71.8*
- Rat ¬ Infection (à) (par): *B71.0*
- SAI ¬ Infection à *B71.9*
- Sans précision ¬ Infection par *B71.9*
- ¬ Autres infections à *B71*

Cétoacide

- CoA transférase ¬ Déficit en succinyl-CoA:3- *E71.3*
- Déshydrogénase des chaînes ramifiées ¬ Déficit en 2- *E71.0*

Cétoacidurie à chaînes ramifiées ¬ *E71.0*

Cétoglutarate
v. alpha-cétoglutarate

Cétohexokinase ¬ Déficit en *E74.1*

Cétolyse ¬ Trouble de la *E71.3*

Cétones ¬

- Effet toxique: *T52.4*
- Solvants du groupe: *L24.2*

Cétoniques ¬ Trouble de l'oxydation des acides gras et du métabolisme des corps *E71.3*

Cétonurie ¬ *R82.4*

Cétose ¬

- *E88.8*
- Diabète (sucré): sujet à *E10*

Cétosique ¬

- Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): non *E11*
- Glycinémie *E71.1*
- Hyperglycinémie non *E72.5*

Cétostéroïde

- Réductase ¬ Déficit en 17- *E29.1*
- ¬ Taux urinaires élevés de: 17- *R82.5*

Cétothiolase
v. bêta-cétothiolase

- ¬ Déficit en 3- *E71.1*

Cétylstéarylique ¬ Hypersensibilité à l'alcool *T78.4*

CF ¬ *E84.9*

CFA ¬ *J84.1*

CFC ¬ Syndrome *Q87.8*

CGD ¬ *D71*

Chagas

- Atteinte cardiaque ¬ Forme aiguë de la maladie de *B57.0†, I98.1**
- Chronique
- - Atteinte

Chagas *–suite*

- Chronique *–suite*
- - Atteinte *–suite*
- - - Appareil digestif ¬ Maladie de *B57.3†, K93.8**
- - - Cardiaque ¬ Maladie de *B57.2†, I98.1**
- - - Organes ¬ Maladie de *B57.5*
- - - Système nerveux ¬ Maladie de *B57.4†, G99.8**
- - SAI ¬ Maladie de *B57.2*
- Est répandue ¬ Trypanosomiase: SAI, en des lieux où la maladie de *B57.2*
- SAI ¬ Forme aiguë de la maladie de *B57.1*
- Sans atteinte cardiaque ¬ Forme aiguë de la maladie de *B57.1*
- ¬ Maladie de *B57*

Chaîne

- Alpha du fibrinogène A ¬ Amylose à *E85.0†, N08.4**
- Court ¬
- - Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- Gamma] ¬ Gangliosidose GM [marqueur de *E75.1*
- Léger
- - Kappa ¬ Déficit de la *D80.8*
- - Neurofilaments ¬ Neuropathie axonale sévère précoce par déficit en *G60.0*
- - ¬ Amylose à *E85.9*
- Long ¬ Déficit
- - 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- - Acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- Lourd
- - Alpha ¬ Maladie des *C88.3*
- - Gamma ¬ Maladie des *C88.2*
- - Mu ¬ Maladie des *C88.2*
- - ¬ Autre maladie des *C88.2*
- Lourde
- - Immunoglobulines ¬ Déficit en *D80.8*
- - ¬ Amylose à *E85.9*
- Moyenne ¬ Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- Ramifié
- - Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du métabolisme des acides aminés à *E71*
- - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des acides aminés à *E71.2*
- - ¬
- - - Anomalies du métabolisme des acides aminés à *E71.1*
- - - Cétoacidurie à *E71.0*
- - - Déficit en 2-cétoacide déshydrogénase des *E71.0*

Chaîne *–suite*

- Respiratoire mitochondrial ¬
- - Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en complexe I de la *I42.2*
- - Déficit isolé complexe
- - - I de la *G31.81*
- - - IV de la *G31.81*
- - - V de la *G31.81*

Chalazion ¬

- *H00.1*
- Orgelet et *H00*

Chalcose ¬ *H44.3*

Chaleur

- Artificiel
- - Excessif ¬ Exposition
- - - *W92!*
- - - *W92.9!*
- - ¬ Accident dû à la *W92.9!*
- Froid naturel excessif ¬ Exposition à: *X59.9!*
- Insolation ¬ Coup de *T67.0*
- Insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de *N95.1*
- Lumière
- - Sans précision ¬ Effet de la *T67.9*
- - ¬ effet
- - - *T67*
- - - *T67.8*
- Multiples SAI ¬ Phlyctènes (non dues à la *T00.9*
- Perte
- - Hydrique ¬ Épuisement dû à la *T67.3*
- - Sel
- - - Eau) ¬ Prostration due à la *T67.4*
- - - ¬ Épuisement dû à la *T67.4*
- SAI ¬ Prostration due à la *T67.5*
- Sans précision ¬ Épuisement dû à la *T67.5*
- Substances bouillantes ¬ Brûlure ou échaudage par la *X19!*
- ¬
- - Collapsus dû à la *T67.1*
- - Crampes dues à la *T67.2*
- - Fatigue transitoire due à la *T67.6*
- - Œdème dû à la *T67.7*
- - Syncope due à la *T67.1*
- - Syndrome de pertes hydrosodées par la *T67.8*
- - Urticaire provoquée par le froid et la *L50.2*

Chambre

- Antérieur œil
- - Exsudatif ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Implant ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Parasitaire ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - SAI ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*

Chambre *–suite*
- Antérieur œil *–suite*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q13.9*
- - ¬
- - - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - - Malformations congénitales de la *Q13.8*
- - - Rétention ancien corps étranger
- - - - Magnétique dans: *H44.6*
- - - - Non magnétique dans: *H44.7*
- Postérieur œil
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q14.9*
- - ¬ Autres malformations congénitales de la *Q14.8*

Champ visuel ¬
- Anomalies du *H53.4*
- Rétrécissement généralisé du *H53.4*

Champignonnistes ¬ Poumon des *J67.5*

Champignons
- Ingérés ¬ Effet toxique: *T62.0*
- ¬ Bronchopneumonie due à des *B49†, J17.2**

Chanarin
v. Dorfman-Chanarin

Chancre
- Conjonctive ¬ *A51.2†, H13.1**
- Initial) de la pinta [caraté] ¬ *A67.0*
- Mou ¬ *A57*
- Paupières ¬ *A51.2†, H13.1**
- Pianique ¬ *A66.0*
- Syphilitique SAI ¬ *A51.0*
- ¬ *A51.0*

Chancrelle ¬ *A57*

Chandler ¬ Syndrome de *H21.8*

Changement
- Couleur pendant la formation de la dent ¬ *K00.8*
- Emploi ¬ *Z56*
- Générateur d'un stimulateur cardiaque ¬ *Z45.00*
- Pansement ¬ *Z48.0*
- Pression atmosphérique
- - Ambiant
- - - Eau ¬ Effets sur l'oreille des *T70.0*
- - - ¬ Effets sur les sinus des *T70.1*
- - ¬
- - - Accident dû à un *W94.9!*
- - - Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un *W94!*
- Stimulateur cardiaque ¬ *Z45.00*
- Timbre SAI ¬ *R49.8*
- Tissu des relations familiales pendant l'enfance ¬ *Z61*
- Vérification enlèvement
- - Appareils externes de fixation ou de traction ¬ *Z47.8*

Changement *–suite*
- Vérification enlèvement *–suite*
- - Plâtre ¬ *Z47.8*

Chapare ¬ Fièvre hémorragique à arénavirus *A96.8*

Char ¬ Syndrome de *Q87.8*

Charbon
- Cérébral ¬ *A22.8†, G01**
- Cutané ¬ *A22.0*
- Gastro-intestinal ¬
- - *A22.2*
- - *A22.2†, K93.8**
- Inhalation ¬
- - *A22.1*
- - *A22.1†, J17.0**
- Organes respiratoires ¬ *A22.1†, J17.0**
- Pneumonie ¬ *A22.1†, J17.0**
- Pulmonaire ¬
- - *A22.1*
- - *A22.1†, J17.0**
- Respiratoire ¬ *A22.1†, J17.0**
- Sans précision ¬ *A22.9*
- ¬
- - *A22*
- - Formes de *A22.8*
- - Pneumoconiose des mineurs de *J60*
- - Poumon des mineurs de *J60*

Charbonneuse ¬
- Méningite *A22.8†, G01**
- Septicémie *A22.7*

Charcot
v.a. Erb-Charcot
- Cours de syphilis ¬ Arthropathie de *A52.1†, M14.69**
- Diabétique ¬
- - Arthrite de *E14.60†, M14.69**
- - Arthropathie de *E14.60†, M14.69**
- II ¬ Syndrome de *G12.2*
- Sclérose latérale amyotrophique] ¬ Maladie de *G12.2*
- ¬
- - Arthropathie
- - - *G98†, M14.69**
- - - Non syphilitique de *G98†, M14.69**
- - - Syphilitique de *A52.1†, M14.69**
- - - Syringomyélique de *G95.0†, M49.49**
- - - Tabique de *A52.1†, M14.69**
- - Diabète sucré type
- - - 1 avec arthrite de *E10.60†, M14.69**
- - - 2 avec arthrite de *E11.60†, M14.69**
- - Syphilis articulaire de *A52.1†, M14.69**
- - Tabo-paralysie avec articulation de *A52.1†, M14.69**

Charcot-Marie-Tooth
- Autosomique dominant type
- - 2

Charcot-Marie-Tooth *–suite*
- Autosomique dominant type *–suite*
- - 2 *–suite*
- - - Axones géants ¬ Maladie de *G60.0*
- - - Mutation
- - - - KIF5A ¬ Maladie de *G60.0*
- - - - TFG ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2A1 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2A2 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2B ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2C ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2D ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2E ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2F ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2I ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2J ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2K ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2L ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2M ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2N ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2O ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2P ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2U ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2V ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2W ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2Y ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2Z ¬ Maladie de *G60.0*
- Intermédiaire autosomique
- - Dominant
- - - A ¬ Maladie de *G60.0*
- - - B ¬ Maladie de *G60.0*
- - - C ¬ Maladie de *G60.0*
- - - D ¬ Maladie de *G60.0*
- - - E ¬ Maladie de *G60.0*
- - - Type F ¬ Maladie de *G60.0*
- - Récessif type
- - - A ¬ Maladie de *G60.0*
- - - B ¬ Maladie de *G60.0*
- - - C ¬ Maladie de *G60.0*
- - - D ¬ Maladie de *G60.0*
- Lié X type
- - 1 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 3 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 4 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 5 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 6 ¬ Maladie de *G60.0*
- Type 2T ¬ Maladie de *G60.0*
- ¬ Maladie
- - *G60.0*

Charge
- Adapté ¬ Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en *Z75.8*
- Association CHARGE] ¬ Syndrome *Q87.8*
- Contraception

Charge *–suite*
- Contraception *–suite*
- - Sans précision ¬ Prise en *Z30.9*
- - ¬ Prise
- - - *Z30*
- - - *Z30.8*
- Domicile, nécessitant des soins ¬ Parent à *Z63*
- Normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en *Z76.2*
- Personne dépendante pendant un congé de ses proches ¬ Prise en *Z75.8*
- Sécrétions ¬ Dépendance (de longue durée) envers: appareils de prise en *Z99.0*
- ¬ Syndrome CHARGE [Association *Q87.8*

Charlevoix-Saguenay ¬ Ataxie spastique autosomique récessive de *G11.1*

Charlie M ¬ Syndrome *Q87.0*

Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Malformation congénitale (*Q76.4*

Chassaing-Lacombe ¬ Chondrodysplasie dominante liée à l'X type *Q78.9*

Chasse ¬ Syndrome (de): *K91.1*

Chat ¬
- Distomatose hépatique à douve du foie du *B66.0†, K77.0**
- Infection par: douve du foie du *B66.0*
- Maladie des griffes du *A28.1*
- Syndrome des yeux de *Q92.8*

Chaud
- Secondaire) (symptomatique) ¬ Anémie hémolytique: type *D59.1*
- Type froid) ¬ Maladie hémolytique auto-immune (type *D59.1*

Chaudhry
v. Gorlin-Chaudhry-Moss

Chaudière/bouilloire ¬ Accident dû à: Explosion de *W49.9!*

Chauffard ¬ Syndrome de Minkowski- *D58.0*

Chaussures orthopédique(s) ¬ *Z46.7*

CHC [carcinome hépatocellulaire] ¬ *C22.0*

Chediak(-Steinbrinck)-Higashi ¬ Syndrome de: *E70.3*

Cheilite
- Candida ¬ *B37.88*
- Commissurale ¬ *K13.0*
- Exfoliatrice ¬ *K13.0*
- Glandulaire ¬ *K13.0*
- SAI ¬ *K13.0*

Cheilodynie ¬ *K13.0*

Chéilo-gnatho-palatoschisis unilatéral ou SAI ¬ *Q37.5*

Cheiloschisis ¬ *Q36*

Cheilose
- Cours
- - Carence en vitamine B2 ¬ *E53.0†, K93.8**

Cheilose *–suite*
- Cours *–suite*
- - Pellagre ¬ *E52†, K93.8**
- ¬ *K13.0*

Chélateurs, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Antidotes et *T50.6*

Chéloïde
- Folliculite sclerotisans nuchae] ¬ Acné *L73.0*
- ¬
- - *L91.0*
- - Cicatrice *L91.0*

Chéloïdienne ¬ Blastomycose *B48.0*

Chenais
v. Cestan Chenais

Cherstvoy
v. Von Voss-Cherstvoy

Chérubisme ¬ *K10.8*

Cheval
- Complet ¬ Syndrome de la queue de *G83.40*
- Incomplet ¬ Syndrome de la queue de *G83.41*
- Non précisé ¬ Syndrome de la queue de *G83.49*
- Rétine, sans décollement ¬ Déchirure en fer à *H33.3*
- ¬
- - Gomme de la queue de *A52.1†, G07**
- - Lésion
- - - Non précisée de la queue de *S34.38*
- - - Traumatique de la queue de *S34.3*
- - Malformations congénitales de la queue de *Q06.3*
- - Rein lobulé, soudé et en fer à *Q63.1*
- - Syndrome
- - - Queue de *G83.4*
- - - Traumatique
- - - - Complet de la queue de *S34.30*
- - - - Incomplet de la queue de *S34.31*
- - Tumeur maligne: Queue de *C72.1*

Chevauchement
- Juvénile ¬ Myosite de *M33.0*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*

Chevelu
- Cou ¬
- - Carcinoma in situ: Peau du cuir *D04.4*
- - Mélanome
- - - In situ du cuir *D03.4*
- - - Malin du cuir *C43.4*
- - Nævus à mélanocytes du cuir *D22.4*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau du cuir *D23.4*
- - - Maligne: Peau du cuir *C44.4*
- Dermatophytie] ¬ Dermatophytose du cuir *B35.0*
- Liée à une surveillance électronique continue ¬ Lésion du cuir *P12.4*
- Toute partie] ¬ cuir *T20*

Chevelu *–suite*
- Traumatisme obstétrical
- - Sans précision ¬ Lésion du cuir *P12.9*
- - ¬
- - - Lésions du cuir *P12.8*
- - - Meurtrissure du cuir *P12.3*
- ¬
- - Arrachement du cuir *S08.0*
- - Cuir
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Favus du cuir *B35.0*
- - Lésion traumatique superficielle du cuir *S00.0*
- - Pachydermie vorticellée primaire essentielle du cuir *Q82.8*
- - Plaie ouverte du cuir *S01.0*
- - Teigne de la barbe et du cuir *B35.0*

Chevelure par des poux ¬ Infestation de la *B85.0*

Cheveux
- Anagènes caduc ¬
- - Maladie des *L65.1*
- - Syndrome Noonan-like avec *Q87.1*
- Crépus
- - Fil de fer) ¬ Maladie de: Menkes (*E83.0*
- - ¬ Syndrome des *E83.0*
- Fils de fer de Menkes ¬ Syndrome des *E83.0*
- Gris (prématurément) ¬ *L67.1*
- Laineux
- - Sur nævus ¬ *Q82.5*
- - ¬ *Q84.1*
- Non classées ailleurs ¬ Anomalies congénitales de la morphologie des *Q84.1*
- SAI ¬ Malformation congénitale des *Q84.2*
- ¬
- - Anomalie
- - - Congénitales des *Q84.2*
- - - Couleur des *L67.1*
- - Hétérochromie des *L67.1*

Cheville
- Congénitale ¬ Malformation de: *Q74.2*
- Ligament
- - Calcanéopéronier ¬ Entorse et foulure de la *S93.42*
- - Deltoïde ¬ Entorse et foulure de la *S93.41*
- - Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et foulure de la *S93.43*
- Partie
- - Non précisée ¬ Entorse et foulure de la *S93.40*
- - ¬ Entorse et foulure de la *S93.48*
- Pied
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.81*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.84*

Cheville *–suite*
- Pied *–suite*
- - Degré non précis ¬
- - - Brûlure
- - - - *T25.0*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.0*
- - - Corrosion
- - - - *T25.4*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.4*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.82*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.83*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.8*
- - Orteils ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la *R02.07*
- - Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S99.9*
- - - Superficielle de la *S90.9*
- - Seuls] ¬ jambe [toute partie, sauf *T24*
- - ¬
- - - Amputation traumatique de la *S98*
- - - Brûlure
- - - - Corrosion
- - - - - *T25*
- - - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24*
- - - - Premier
- - - - - Degré de la *T25.1*
- - - - - Degré de la hanche et du membre inférieur, sauf *T24.1*
- - - - Second
- - - - - Degré de la *T25.2*
- - - - - Degré de la hanche et du membre inférieur, sauf *T24.2*
- - - - Troisième
- - - - - Degré de la *T25.3*
- - - - - Degré de la hanche et du membre inférieur, sauf *T24.3*
- - - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.16*
- - - Corrosion
- - - - Premier
- - - - - Degré de la *T25.5*
- - - - - Degré de la hanche et du membre inférieur, sauf *T24.5*
- - - - Second
- - - - - Degré de la *T25.6*
- - - - - Degré de la hanche et du membre inférieur, sauf *T24.6*
- - - - Troisième
- - - - - Degré de la *T25.7*
- - - - - Degré de la hanche et du membre inférieur, sauf *T24.7*
- - - Déformations acquises de la *M21.68*

Cheville *–suite*
- Pied *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Écrasement
- - - - *S97*
- - - - Parties de la *S97.8*
- - - Gelure superficielle de la *T33.8*
- - - Lésion traumatique
- - - - Multiple
- - - - - *S99.7*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de la *S96.7*
- - - - - Nerfs au niveau de la *S94.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la *S95.7*
- - - - Muscle
- - - - - Tendon intrinsèques au niveau de la *S96.2*
- - - - - Tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la *S96.1*
- - - - - Tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la *S96.0*
- - - - - Tendon non précisés, au niveau de la *S96.9*
- - - - - Tendons au niveau de la *S96.8*
- - - - Nerf
- - - - - Cutané sensitif au niveau de la *S94.3*
- - - - - Niveau de la *S94.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la *S94.9*
- - - - - Tibial antérieur au niveau de la *S94.2*
- - - - Précisées de la *S99.8*
- - - - Superficiel
- - - - - *S90.88*
- - - - - Multiples de la *S90.7*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau de la *S95.9*
- - - - - Sanguins au niveau de la *S95.8*
- - - Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la *S93*
- - - Plaie
- - - - Ouverte de la *S91*
- - - - Ouvertes multiples de la *S91.7*
- - - Rupture de ligaments au niveau de la *S93.2*
- Pronation ¬ *M21.68*
- SAI ¬ *S82.88*
- Unilatérale ¬ Absence acquise de pied et *Z89.4*
- ¬
- - Amputation traumatique
- - - Genou et la *S88.1*
- - - Pied au niveau de la *S98.0*
- - Articulation de la *T84.16*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la *T84.06*
- - Contusion de la *S90.0*

Cheville *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Déformation acquise de la *M21.68*
- - Écrasement de la *S97.0*
- - Entorse et foulure de la *S93.4*
- - Fracture
- - - Jambe, y compris la *S82*
- - - Pied, sauf la *S92*
- - Luxation de la *S93.0*
- - Malformation acquise de la *M21.68*
- - Péroné, impliquant: *S82.6*
- - Plaie ouverte de la *S91.0*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.66*
- - Tibia, impliquant: *S82.5*
- - Tuberculose de la *A18.0†, M01.17**

Cheyne-Stokes ¬ Dyspnée de *R06.3*

Chiari
v. Arnold-Chiari
- ¬ Syndrome de Budd- *I82.0*

Chiasma optique ¬
- *S04.0*
- Affections du *H47.4*

Chiasmatique par anévrysme ¬ Compression *I67.10†, H48.8**

Chien ¬
- Dipylidiose [infection par cestodes du *B71.1*
- Infection par cestodes du *B67.4*

Chiffonniers [maladie des trieurs de laine] ¬ Maladie des *A22.1*

Chignon dû à un traumatisme obstétrical ¬ Hématome en *P12.1*

Chikungunya ¬ Fièvre
- *A92.0*
- Hémorragique de *A92.0*

Chilblain ¬ Lupus érythémateux type *L93.2*

CHILD ¬ Syndrome *Q87.8*

Child-Pugh
- A ¬ Cirrhose
- - Biliaire
- - - Primitive, stade *K74.3, K74.70!*
- - - Secondaire, stade *K74.4, K74.70!*
- - - Stade *K74.5, K74.70!*
- - Foie stade
- - - *K74.6, K74.70!*
- - - *K74.70!*
- B ¬ Cirrhose
- - Biliaire
- - - Primitive, stade *K74.3, K74.71!*
- - - Secondaire, stade *K74.4, K74.71!*
- - - Stade *K74.5, K74.71!*
- - Foie stade
- - - *K74.6, K74.71!*
- - - *K74.71!*
- C ¬ Cirrhose
- - Biliaire
- - - Primitive, stade *K74.3, K74.72!*

Child-Pugh *–suite*
- C ¬ Cirrhose *–suite*
- - Biliaire *–suite*
- - - Secondaire, stade *K74.4, K74.72!*
- - - Stade *K74.5, K74.72!*
- - Foie stade
- - - *K74.6, K74.72!*
- - - *K74.72!*

CHIME ¬ Syndrome *Q87.8*

Chimère 46 XX 46 XY
- Hermaphrodite vrai ¬ *Q99.0*
- ¬ *Q99.0*

Chimioprophylaxie SAI ¬ *Z29.28*

Chimiothérapie
- Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.2*
- Cancer ¬ *P04.1*
- Entretien SAI ¬ *Z51.2*
- Mesures immunosuppressives ¬ Immunocompromission après radiothérapie, *D90*
- Néoplasie maligne ¬ Cure combinée de radiothérapie et *Z51.82*
- Prophylactique
- - Locale ¬ *Z29.20*
- - Systémique ¬ *Z29.21*
- - ¬ mesure
- - - *Z29.2*
- - - *Z29.28*
- Tumeur malign ¬
- - Antécédents personnels de *Z92.6*
- - Examen de contrôle après *Z08.2*
- - Séance de *Z51.1*
- ¬
- - Convalescence après *Z54.2!*
- - Envie de vomir au cours de *R11, Y57.9!*
- - Formes de *Z51.2*
- - Nausées au cours de *R11, Y57.9!*
- - Vomissements au cours de *R11, Y57.9!*

Chimique
- 1er degré du vagin ¬ Brûlure *T28.8*
- 2e degré du vagin ¬ Brûlure *T28.8*
- 3e degré du vagin ¬ Brûlure *T28.8*
- Aspiration anesthésie
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Pneumonie *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ Pneumonie *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Pneumonie *O74.0*
- - ¬ Pneumonie *J95.4*
- Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Émanation fumée gaz
- - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents *J68.2*

Chimique *–suite*
- Émanation fumée gaz *–suite*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents *J68.9*
- - ¬
- - - Affection respiratoire
- - - - Agents *J68.8*
- - - - Aiguës et subaiguës dues à des agents *J68.3*
- - - - Chroniques dues à des agents *J68.4*
- - - - Inhalation d'agents *J68*
- - - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents *J68.4*
- - - Bronchite et pneumonie dues à des agents *J68.0*
- - - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents *J68.4*
- - - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents *J68.4*
- - - Œdème du poumon dû à des agents *J68.1*
- Environnement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances *P04.6*
- Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Nutritionnel
- - Connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions physiques, *Z64.8*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances *P04.5*
- Sang
- - Sans précision ¬ Résultat anormal des examens *R79.9*
- - ¬ résultat anormal
- - - Examens *R79*
- - - Précisés des examens *R79.8*
- Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Vaginal degré
- - 2a ¬ Brûlure *T28.8*
- - 2b ¬ Brûlure *T28.8*
- Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- ¬
- - Bronchite (aiguë) due à des agents *J68.0*
- - Dermite
- - - Allergique de contact due à d'autres produits *L23.5*
- - - Contact, sans précision, due à d'autres produits *L25.3*

Chimique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dermite *–suite*
- - - Irritante de contact due à d'autres produits *L24.5*
- - Diabète: *R73.0*
- - Œdème (aigu) du poumon dû à des agents *J68.1*
- - Œsophagite: *K20*
- - Otite aiguë externe: *H60.5*
- - Péritonite: *T81.6*
- - Sclérose systémique due à des médicaments et des produits *M34.2*
- - Ulcère de l'œsophage: dû à l'ingestion de: produits *K22.1*
- - Voies de fait/agression par : Agent *Y09.9!*

Chinoise de la douve du foie ¬ Maladie: *B66.1*

Chique] ¬ Tungose [infestation par puce- *B88.1*

Chirurgie
- Bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou affaissée: après une perte de poids (*L98.7*
- Cardiaque
- - Présence prothèse cardiaque ¬
- - - Défaillance cardiaque après *I97.1*
- - - Insuffisance cardiaque après *I97.1*
- - ¬ Autres troubles fonctionnels après *I97.1*
- Cataracte [de l'aphaque] ¬ Kératopathie (bulleuse) après *H59.0*
- Obstétrical acte visée diagnostique thérapeutique
- - Y compris accouchement SAI ¬
- - - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de *O75.4*
- - - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de *O75.4*
- - - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de *O75.4*
- - ¬ Autres complications d'un acte de *O75.4*
- Plastique
- - Correctrice pour cicatrice après traumatisme ¬ *Z42*
- - Motifs cosmétiques ¬ *Z41.1*
- ¬
- - Echec du déclenchement (du travail) par: *O61.1*
- - Hypothyroïdie après: *E89.0*
- - Lordose après *M96.4*

Chlamydia
- Anus et du rectum ¬ Infection à *A56.3*
- Appareil génito-urinaire, sans précision ¬ Infection à *A56.2*
- Femme ¬ Affection inflammatoire pelvienne à *A56.1†, N74.4**
- Organes urinaires et génitaux ¬ Infection à *A56.2†, N29.1**
- Partie inférieure de l'appareil génito-urinaire ¬ Infection à *A56.0*

Chlamydia *–suite*
- Pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires ¬ Infection à *A56.1*
- Pharynx ¬ Infection à *A56.4*
- Précisées ¬ Autres infections à *A74.8*
- Psittaci ¬ Infection à *A70*
- Sans précision ¬ Infection à *A74.9*
- Trachomatis transmises par voie sexuelle ¬ infections à *A56*
- Transmis voie sexuel
- - Localisations ¬ Infection à *A56.8*
- - ¬ Autres infections à *A56*
- ¬
- - Cervicite à *A56.0*
- - Cervico-vaginite à *A56.0*
- - Conjonctivite
- - - *A74.0†, H13.1**
- - - Néonatale à *P39.1*
- - Cystite à *A56.0*
- - Endométrite à *A56.1†, N74.4**
- - Épididymite à *A56.1†, N51.1**
- - Infection
- - - *A74*
- - - Génitale à *A56.2*
- - Lymphogranulomatose vénérienne à *A55*
- - Orchite à *A56.1†, N51.1**
- - Périhépatite à *A74.8†, K67.0**
- - Péritonite à *A74.8†, K67.0**
- - Pneumonie
- - - *J16.0*
- - - Congénitale à *P23.1*
- - Rétrécissement du rectum dû à une infection à *A55†, K93.8**
- - Salpingite à *A56.1†, N74.4**
- - Syndrome de Fitz-Hugh-Curtis à *A74.8†, K67.0**
- - Urétrite à *A56.0*
- - Vulvo-vaginite à *A56.0*

Chlamydiose SAI ¬ *A74.9*

Chloasma
- Mélasme] ¬ *L81.1*
- Paupière
- - Hyperthyroïdie ¬ *E05.9†, H03.8**
- - ¬
- - - *H02.7*
- - - Ochronose avec *E70.2†, H03.8**

Chlonorchis sinensis ¬ Distomatose du foie à *B66.1†, K77.0**

Chloramphénicol
- Nouveau-né ¬ Syndrome gris dû à l'administration de *P93*
- ¬ Intoxication: Groupe du *T36.2*

Chloré
- Congénitale ¬ Diarrhée *P78.3*
- ¬ Solvants du groupe: composés *L24.2*

Chlore gazeux ¬ Effet toxique: *T59.4*

Chlorhydrique ¬ Acide: *T54.2*

Chlorofluorocarbures ¬
- Effet toxique: *T53.5*
- Intoxication par *T53.5*

Chloroforme ¬ Effet toxique: *T53.1*

Chlorome ¬ *C92.3*

Chloroquine ¬ Maculopathie toxique provoquée par l'(hydroxy-) *H35.38*

Chlorure de méthylène ¬ *T53.4*

CHM ¬ *H31.2*

Choanes
- Microphtalmie ¬ Syndrome d'arhinie-atrésie des *Q87.0*
- Surdité-cardiopathie-dysmorphie cranio-faciale ¬ Syndrome d'atrésie des *Q87.8*
- ¬
- - Atrésie des *Q30.0*
- - Bord postérieur cloison nasal
- - - *C11.3*
- - - *D10.6*
- - Polype (des): *J33.0*
- - Sténose acquise des *J34.8*

Choc
- Allergique SAI ¬ *T78.2*
- Anaphylactique
- - Effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.6*
- - Intolérance alimentaire ¬ *T78.0*
- - Sans précision ¬ *T78.2*
- - Sérum ¬ *T80.5*
- Anesthésique
- - Substance appropriée et correctement administrée ¬ *T88.2*
- - ¬ *T88.2*
- Cardiogénique ¬ *R57.0*
- Consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.3*
- Courant électrique ¬ *T75.4*
- Culturel ¬ *F43.2*
- Émotionnel et tension, sans précision ¬ État de *R45.7*
- Endotoxique
- - Hypovolémique) pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.1*
- - ¬ *R57.8*
- Foudre ¬ *T75.0*
- Hypovolémique ¬ *R57.1*
- Immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme ¬ *T79.4*
- Non classé ailleurs ¬ *R57*
- Obstétrical ¬ *O75.1*
- Pendant
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs ¬ *T81.1*
- - Travail et l'accouchement ¬ *O75.1*
- Post-opératoire

Choc *–suite*
- Post-opératoire *–suite*
- - SAI ¬ *T81.1*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.3*
- Psychique ¬ *F43.0*
- Rachidien ¬ Trouble des fonctions vésicales du à un *G95.82*
- Sans précision ¬ *R57.9*
- Septique
- - Avortement ¬ *O08.0, R57.2*
- - Escherichia coli ¬ *A41.51, R57.2*
- - Grossesse
- - - Extra-utérine ¬ *O08.0, R57.2*
- - - Molaire ¬ *O08.0, R57.2*
- - Haemophilus influenzae ¬ *A41.3, R57.2*
- - Mesures chirurgicales ¬ *T81.1, R57.2*
- - Micro-organismes Gram négatif ¬ *A41.58, R57.2*
- - Pendant une intervention chirurgicale ¬ *T81.1, R57.2*
- - Perfusion, injection thérapeutique ou transfusion ¬ *T80.2, R57.2*
- - Post-opératoire ¬ *T81.1, R57.2*
- - Pseudomonas ¬ *A41.52, R57.2*
- - Staphylococcus aureus ¬ *A41.0, R57.2*
- - Staphylocoque
- - - Coagulase-négatifs ¬ *A41.1, R57.2*
- - - ¬ *A41.2, R57.2*
- - Streptocoques ¬ *A40.9, R57.2*
- - ¬ *R57.2*
- Toxique
- - Bactérien ¬ Syndrome du *A48.3*
- - Utilisation de tampon ¬ Syndrome du *A48.3*
- - ¬
- - - SCT [Syndrome de *A48.3*
- - - Syndrome du *A48.3*
- Traumatique ¬ *T79.4*
- ¬ Autres *R57.8*

Cholangiectasie ¬ *K83.8*

Cholangiocarcinome
- Hilaire ¬ *C24.0*
- ¬ *C22.1*

Cholangite
- Biliaire primitive ¬ *K74.3*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, K93.8**
- Scarlatineuse ¬ *A38†, K87.0**
- Sclérosant
- - IgG4 ¬ *K83.0*
- - ¬ *K83.0*
- ¬ Angiocholite [*K83.0*

Cholécystite
- Aigu ¬
- - *K81.0*
- - Calcul de la vésicule biliaire avec *K80.0*

Cholécystite *–suite*
- Cholélithiase SAI ¬ *K80.1*
- Chronique ¬ *K81.1*
- Emphysémateuse (aiguë) sans calcul ¬ *K81.0*
- Gangréneuse sans calcul ¬ *K81.0*
- Lithiasique ¬ *K80.10*
- Sans précision ¬ *K81.9*
- Suppurée sans calcul ¬ *K81.0*
- ¬
- - *K81*
- - *K81.8*
- - Calcul
- - - Bloqué
- - - - Canal
- - - - - Biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - - - - Cystique sans précision ou sans *K80.2*
- - - - Vésicule biliaire sans précision ou sans *K80.2*
- - - Canal biliaire
- - - - *K80.4*
- - - - Sans angiocholite ni *K80.5*
- - - Vésicule biliaire
- - - - Forme de *K80.1*
- - - - Sans *K80.2*
- - Cholécystolithiase sans précision ou sans *K80.2*
- - Cholédocholithiase sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - Cholélithiase
- - - Hépatique sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - - Intrahépatique sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - - Sans précision ou sans *K80.2*
- - Colique
- - - Biliaire (récidivante) sans précision ou sans *K80.2*
- - - Hépatique (récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - Lithiase du canal cholédoque sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*

Cholécysto
- Colique ¬ Fistule *K82.3*
- Duodénale ¬ Fistule *K82.3*

Cholécystolithiase sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*

Cholédocholithiase sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*

Cholédoco-duodénale ¬ Fistule *K83.3*

Cholédoque
- Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Lithiase du canal *K80.5*
- ¬
- - Canal: *C24.0*
- - Kyste du *Q44.4*

Cholélithiase
- Hépatique sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Intrahépatique sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Mutation du gène ABCB4 ¬ *K80.80*
- SAI ¬ Cholécystite avec *K80.1*
- Sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- ¬
- - *K80*
- - *K80.8*

Choléocystocholedocholithiase ¬ *K80.80*

Choléra
- Classique ¬ *A00.0*
- El Tor ¬ *A00.1*
- Sans précision ¬ *A00.9*
- Seul ¬ Nécessité d'une vaccination contre le *Z23.0*
- TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-parathyphoïde [*Z27.0*
- Typhoïde-parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le *Z27.0*
- ¬ *A00*

Cholerae
- 01 biovar
- - Cholerae ¬ A Vibrio *A00.0*
- - El Tor ¬ A Vibrio *A00.1*
- ¬ A Vibrio cholerae 01, biovar *A00.0*

Cholestase
- Gravidique ¬ *O26.60*
- Intrahépatique
- - Cours de la grossesse ¬ *O26.60*
- - Familiale ¬ *K71.0*
- - Gestationnelle récidivante ¬ *O26.60*
- - Néonatale par déficit en citrine ¬ *E72.2*
- Lésion des hépatocytes ¬ *K71.0*
- Malabsorption ¬ Défaut de synthèse des acides biliaires avec *K76.8*
- Pure" ¬ *K71.0*
- ¬
- - Maladie toxique du foie avec *K71.0*
- - Syndrome d'arthrogrypose-insuffisance rénale- *Q89.7*

Cholestéatome
- Oreille
- - Externe ¬ *H60.4*
- - Moyenne ¬ *H71*
- Réaction inflammatoire ¬ *H71*
- Récidivant après mastoïdectomie ¬ *H95.0*
- Tympan ¬ *H71*

Cholestérol
v.a. lécithine-cholestérol-acyltransférase
- 7alpha-hydroxylase ¬ Hypercholestérolémie due au déficit en *E78.0*
- ¬
- - Déficit en protéine de transfert des esters de *E78.4*
- - Maladie de stockage des esters du *E75.5*

Choléstérolose de la vésicule biliaire ¬ *K82.4*

Cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ *E75.5*

Choline ¬ Carence en *E63.8*

Cholinergique
- Aigu ¬ Syndrome *T44.1*
- ¬
- - Intoxication: Autres parasympathomimétiques [*T44.1*
- - Urticaire *L50.5*

Chômage
- Sans précisions ¬ *Z56*
- ¬ Difficultés liées à l'emploi et au *Z56*

Chondral
v. costo-chondral
v. sterno-chondral

Chondrite tuberculeux
- Intervertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬ *A18.0†, M01.19**

Chondro
- Costales [Tietze] ¬ Syndrome des articulations *M94.0*
- Ectodermique ¬ Dysplasie *Q77.6*
- Ostéoplastique ¬ Trachéo-bronchopathie *J98.0*

Chondrocalcinose
- Familiale ¬ *M11.1*
- SAI ¬ *M11.2*
- ¬ Autre *M11.2*

Chondrodermite nodulaire chronique de l'hélix ¬ *H61.0*

Chondrodysplasia punctata type Sheffield ¬ *Q77.3*

Chondrodysplasie
- Anomalie du développement sexuel ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Blomstrand ¬ *Q78.8*
- Dominante liée à l'X type Chassaing-Lacombe ¬ *Q78.9*
- Goldblatt ¬ *Q78.8*
- Métaphysaire type
- - Jansen ¬ *Q78.5*
- - Kaitila ¬ *Q78.5*
- - McKusick ¬ *Q78.5*
- - Schmid ¬ *Q78.5*
- - Spahr ¬ *Q78.5*
- Ponctuée
- - Brachytéléphalangie ¬ *Q77.3*
- - Dominante liée à l'X ¬ *Q77.3*
- - Liée à X type 2 ¬ *Q77.3*
- - Rhizomélique
- - - Type
- - - - 1 ¬ *Q77.3*
- - - - 2 ¬ *Q77.3*
- - - - 3 ¬ *Q77.3*
- - - - 5 ¬ *Q77.3*
- - - ¬ *Q77.3*
- - Tibiométacarpienne ¬ *Q77.3*

Chondrodysplasie *–suite*
- Ponctuée *–suite*
- - Type Toriello ¬ *Q77.3*
- - ¬ *Q77.3*
Chondrodystrophie
- Congénitale calcifiante ¬ *Q77.3*
- SAI ¬ *Q78.9*
Chondrodystrophique ¬ Myotonie
- *G71.1*
- *Q78.8*
Chondrolyse ¬ *M94.3*
Chondromalacie
- Patellaire familiale ¬ *M22.4*
- ¬ *M94.2*
Chondromalacique ¬ Rotule *M22.4*
Chondromatose articulaire ¬ *D48.0*
Chondrosarcome
- Myxoïde extrasquelettique ¬ *C49.9*
- ¬ *C41.9*
CHOPS ¬ Syndrome de *Q87.8*
Chordée congénitale ¬ *Q54.4*
Chordoïde ¬ Gliome *C71.5*
Chordome ¬ *C80.9*
Chorée
- Bénigne familiale ¬ *G25.5*
- Chronique progressive héréditaire de Huntington ¬ *G10*
- Huntington
- - Démence ¬ *G10†, F02.2**
- - ¬
- - - *G10*
- - - Démence de la *F02.2**
- Médicamenteuse ¬ *G25.4*
- Paraplégie spastique ¬ Atrophie optique infantile avec *E71.1*
- Rhumatismal
- - Atteinte cardiaque
- - - Tout type classée en I01.- ¬ *I02.0*
- - - ¬ *I02.0*
- - SAI ¬ *I02.9*
- - Sans atteinte cardiaque ¬ *I02.9*
- - ¬ *I02*
- SAI
- - Atteinte cardiaque ¬ *I02.0*
- - ¬ *G25.5*
- Sydenham ¬ *I02*
- ¬ Autres *G25.5*
Choréoathétose
- Dystonique paroxystique avec ataxie épisodique et spasticité ¬ *G24.8*
- ¬ Syndrome de convulsions infantiles- *G40.4*
Chorio-adénome destruens ¬ *D39.2*
Chorio-amniotite ¬
- *O41.1*
- Fœtus et nouveau-né affectés par une *P02.7*
Choriocarcinome
- Gestationnel ¬ *C58*
- Ovarien primitif non gestationnel ¬ *C56*
- SAI ¬ *C58*
Chorio-encéphalite
- Aiguë ¬ *A87.2†, G05.1**
- Lymphocitaire ¬ *A87.2†, G05.1**
- Séreuse ¬ *A87.2†, G05.1**
Chorio-épithéliome SAI ¬ *C58*
Chorioideae ¬ Atrophia gyrata *H31.2*
Chorioïdienne ¬ Effusion *H31.4*
Chorioïdite syphilitique
- Congénital
- - Tardive ¬ *A50.3†, H32.0**
- - ¬ *A50.0†, H32.0**
- Tardive ¬ *A52.7†, H32.0**
Chorioméningite
- Aiguë ¬ *A87.2†, G02.0**
- Lymphocytaire
- - Séreuse aiguë ¬ *A87.2†, G02.0**
- - ¬ *A87.2†, G02.0**
- Séreuse ¬ *A87.2†, G02.0**
Choriorétinien
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections *H32.8**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Affections *H32.0**
- Péripapillaire hélicoïdale ¬ Dégénérescence *H31.2*
- Progressive ¬ Atrophie bifocale *H35.5*
- Traitement chirurgical du décollement ¬ Cicatrices *H59.8*
- ¬ Cicatrices *H31.0*
Choriorétinite
- Congénitale à toxoplasmose ¬ *P37.1†, H32.0**
- Cours de syphilis tardive ¬ *A52.7†, H32.0**
- Disséminé
- - Cours de neurosyphilis ¬ *A52.1†, H32.0**
- - ¬ *H30.1*
- Foyer ¬ *H30.0*
- SAI ¬ *H30.9*
- Sans précision ¬ *H30.9*
- Syphilitique
- - Congénital
- - - Tardive ¬ *A50.3†, H32.0**
- - - ¬ *A50.0†, H32.0**
- - Disséminée ¬ *A52.7†, H32.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, H32.0**
- - ¬ *A51.4†, H32.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.0†, H32.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H32.0**
- ¬
- - *H30*
- - *H30.8*
Choriorétinopathie
- Microcéphalie autosomique récessive ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Séreuse centrale ¬ *H35.7*
- Type birdshot ¬ *H30.1*
Choroïde
- Rétine ¬ Hyperornithinémie avec atrophie sinueuse de la *E72.4*
- Sans précision ¬ Affection de la *H31.9*
- ¬
- - Affection
- - - *H31*
- - - Précisées de la *H31.8*
- - Atrophie de la *H31.1*
- - Carcinome des plexus *C71.5*
- - Décollement de la *H31.4*
- - Dystrophie héréditaire de la *H31.2*
- - Hémorragie et rupture de la *H31.3*
- - Malformation congénitale de la *Q14.3*
- - Papillome
- - - Atypique des plexus *C71.5*
- - - Plexus *D33.0*
- - Sclérose de la *H31.1*
- - Syphilis secondaire de la *A51.4†, H32.0**
- - Tuberculose de la *A18.5†, H32.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D31.3*
- - - Maligne: *C69.3*
Choroïdérémie
- Surdité et obésité ¬ *Q87.8*
- ¬ *H31.2*
Choroïdien
- Aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire) ¬ Dystrophie *H31.2*
- Expulsive ¬ Hémorragie *H31.3*
- SAI ¬ Hémorragie *H31.3*
- ¬
- - Dégénérescence *H31.1*
- - Mélanome *C69.3*
- - Néovascularisation *H31.8*
Choroïdite
- Disséminée ¬ *H30.1*
- Foyer ¬ *H30.0*
- SAI ¬ *H30.9*
- Serpigineuse ¬ *H30.8*
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H32.0**
Chotzen
v. Saethre-Chotzen
Chou-fleur" ¬ Oreille "en *M95.1*
Christian
v. Hand-Schüller-Christian
v. Weber-Christian
Christiansen
v. Bosma-Henkin-Christiansen
Christianson ¬ Syndrome de *Q87.8*
Christianson-Fourie ¬ Dysplasie ectodermique hidrotique type *Q82.8*

Christmas ¬ Maladie de *D67*

Christol
v. Bazex-Dupré-Christol

Christ-Siemens-Touraine ¬ Syndrome de *Q82.8*

Chrome

- Composés ¬ Effet toxique: *T56.2*
- ¬
- - *L23.0*
- - Carence en *E61.4*

Chromhidrose ¬ *L75.1*

Chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique ¬ Chromomycose [*B43*

Chromomycose

- Chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique ¬ *B43*
- Cutanée ¬ *B43.0†, L99.8**
- Sans précision ¬ *B43.9*
- Sous-cutané
- - Abcès ¬ *B43.2†, L99.8**
- - Kyste ¬ *B43.2†, L99.8**
- ¬ Autres formes de *B43.8*

Chromomycotique du cerveau ¬ Abcès *B43.1†, G07**

Chromophobe

- Hypophyse ¬
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome *C75.1*
- ¬ Carcinome rénal *C64*

Chromosome

- 1 en anneau ¬ *Q93.2*
- 2
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale maternelle du *Q99.8*
- 3 en anneau ¬ *Q93.2*
- 4
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Délétion du bras court du *Q93.3*
- 5
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - Del(5q)] ¬ Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du *D46.6*
- - ¬
- - - Délétion du bras court du *Q93.4*
- - - Syndrome de délétion du bras court du *D46.6*
- 6
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale
- - - Maternelle du *Q99.8*
- - - Paternelle du *Q99.8*
- 7 en anneau ¬ *Q93.2*
- 8 en anneau ¬ *Q93.2*
- 9 en anneau ¬ *Q93.2*
- 10 en anneau ¬ *Q93.2*

Chromosome *–suite*

- 11
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une disomie uniparentale d'origine paternelle du *Q87.3*
- 12 en anneau ¬ *Q93.2*
- 13 en anneau ¬ *Q93.2*
- 14 en anneau ¬ *Q93.2*
- 15 en anneau ¬ *Q93.2*
- 16
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale maternelle du *Q99.8*
- 17 en anneau ¬ *Q93.2*
- 18 en anneau ¬ *Q93.2*
- 18p ¬ Monosomie partielle du *Q93.5*
- 19 en anneau ¬ *Q93.2*
- 20 en anneau ¬ *Q93.2*
- 21 en anneau ¬ *Q93.2*
- 22 en anneau ¬ *Q93.2*
- Entier
- - Mosaïque chromosomique non-disjonction mitotique ¬
- - - Monosomie d'un *Q93.1*
- - - Trisomie
- - - - *Q92.1*
- - Non-disjonction méiotique ¬
- - - Monosomie d'un *Q93.0*
- - - Trisomie d'un *Q92.0*
- Marqueurs supplémentaires ¬ *Q92.6*
- Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des *Q99*
- Philadelphie (Ph1) positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], *C92.1*
- Remplacé par un anneau ou dicentrique ¬ *Q93.2*
- Sexuel
- - Anormal
- - - Sauf iso (Xq) ¬ Caryotype 46,X avec *Q96.2*
- - - ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec *Q96.4*
- - Phénotype
- - - Féminin
- - - - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des *Q97*
- - - - Sans précision ¬ Anomalie des *Q97.9*
- - - - ¬ Autres anomalies précisées des *Q97.8*
- - - Masculin
- - - - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des *Q98*
- - - - Sans précision ¬ Anomalie des *Q98.9*
- - - - ¬ Autres anomalies précisées des *Q98.8*
- - Structure anormale ¬ Homme avec *Q98.6*
- - ¬ Homme avec mosaïque des *Q98.7*
- X

Chromosome *–suite*

- X *–suite*
- - Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance) ¬ Agammaglobulinémie: liée au *D80.0*
- - Fragile ¬ *Q99.2*
- - ¬
- - - Ataxie (de): spinocérébelleuse récessive liée au *G11.1*
- - - Femme avec plus de trois *Q97.1*
- - - Ichtyose liée au *Q80.1*
- - - Maladie lymphoproliférative liée au *D82.3*
- - - Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de *Q97.2*
- - - Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux *Q98.1*
- Y en anneau ¬ *Q98.6*
- ¬
- - Anomalies précisées des *Q99.8*
- - Délétions partielles d'un *Q93.5*
- - Duplication
- - - Bras du *Q92.3*
- - - Complète d'au moins un bras du *Q92.2*

Chromosomique

- 45 X
- - 46,XX ou XY ¬ Mosaïque *Q96.3*
- - S) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal ¬ Mosaïque *Q96.4*
- Génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.5*
- Isolée del(5q) ¬ Syndrome myélodysplasique associé à une anomalie *D46.6*
- Lignées avec divers nombres de chromosomes X ¬ Mosaïque *Q97.2*
- Non-disjonction mitotique ¬
- - Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque *Q93.1*
- - Trisomie
- - - 13, mosaïque *Q91.5*
- - - 18, mosaïque *Q91.1*
- - - 21, mosaïque *Q90.1*
- - - Chromosome entier mosaïque
- - - - *Q92.1*
- Présumée) du fœtus ¬ Soins maternels pour anomalie *O35.1*
- Sans précision ¬ Anomalie *Q99.9*
- Sujet normal ¬ Inversion *Q95.1*
- ¬
- - Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies *Z87.7*
- - Dépistage prénatal d'anomalies *Z36.0*
- - Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies *Z13.7*

Chronic fatigue syndrome] ¬ Syndrome de fatigue chronique [*G93.3*

Chronic regional pain syndrome [CRPS] Typ I ¬ *G90.59*

Chronique
v. Type de maladie

Chudley-Lowry ¬ Syndrome de *Q87.0*

Churg
v. Wegener-Klinger-Churg

Churg-Strauss ¬

- Angéite granulomateuse allergique [Syndrome de *M30.1*
- Syndrome de *M30.1*

Chute

- Affections peu claires ¬ Tendance aux *R29.6*
- Eau) ¬ Accident par *X59.9!*
- Objets lors de catastrophes naturelles ¬ *X59.9!*
- Personne âgée ¬ Tendance aux *R29.6*
- Prématurée des dents temporaires ¬ *K00.6*
- Répétition, non classées ailleurs ¬ *R29.6*
- Volume plasmatique ¬ Polycythémie: due à: *D75.1*

Chyleux

- Mésentère ¬ Kyste *I89.8†, K67.8**
- Péritoine ¬ Kyste *I89.8†, K67.8**
- ¬
- - Ascite *I89.8*
- - Epanchement *J94.0*

Chyliforme ¬ Epanchement *J94.0*

Chylocèle

- Non filarienne) ¬ *I89.8*
- Tunique vaginale (non filarienne) SAI ¬ *N50.8*

Chylomicronémie familiale ¬ Syndrome de *E78.3*

Chylomicrons ¬ Maladie de rétention des *E78.6*

Chylopéricarde ¬ *I31.3*

Chylothorax congénital ¬ *J94.0*

Chylurie ¬ *R82.0*

Chypriote ¬ Syndrome neuro-musculosquelettique type *Q87.8*

CIA

- Type
- - Ostium
- - - Primum ¬ *Q21.2*
- - - Secondum ¬ *Q21.1*
- - Sinus venosus ¬ *Q21.1*
- ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication interatriale [*I51.0*

Cible d'une discrimination ou d'une persécution ¬ *Z60*

Cicatrice

- Abdominale ¬ Hernie sur *K43.2*
- Adhérente (peau) ¬ *L90.5*
- Amygdalienne (et adénoïdienne) ¬ *J35.8*
- Césarienne antérieure ¬ Soins maternels pour *O34.2*
- Chéloïde ¬ *L91.0*
- Choriorétinien
- - Traitement chirurgical du décollement ¬ *H59.8*

Cicatrice *–suite*

- Choriorétinien *–suite*
- - ¬ *H31.0*
- Col utérin en tant que complication de l'accouchement ¬ *O65.5*
- Conjonctive ¬ *H11.2*
- Cornée ¬ Carence en vitamine A avec *E50.6†, H19.8**
- Cornéenne tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.8**
- Cutanée ¬ Endométriose sur *N80.6*
- Fibrose cutanées ¬ *L90.5*
- Hémorroïdaires cutanées résiduelles ¬ *K64.4*
- Hypertrophique ¬ *L91.0*
- Muqueuse nasale ¬ *J34.8*
- Ombilicale ¬ Hernie sur *K43.2*
- Opacité cornéen
- - Sans précision ¬ *H17.9*
- - ¬
- - - *H17*
- - - *H17.8*
- Peau) ¬ Difformité de la *L90.5*
- Post-inflammatoire) (post-traumatique) de la macula (pôle postérieur) ¬ *H31.0*
- SAI ¬ *L90.5*
- Traumatisme ¬ chirurgie plastique et correctrice pour *Z42*
- Utérine due à une intervention chirurgicale antérieure ¬ Soins maternels pour *O34.2*
- Xérophtalmique cornée ¬
- - Avitaminose A avec *E50.6†, H19.8**
- - Carence en vitamine A avec *E50.6†, H19.8**
- ¬
- - Acné laissant des *L70.9*
- - Carcinome pulmonaire sur *C34.9*
- - Défiguration due à des *L90.5*
- - Reflux vésico-urétéral: avec *N13.7*

Cicatriciel

- Pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.2*
- Précisées de raréfaction du système pileux ¬ Autres formes non *L65.8*
- Raréfaction du système pileux ¬ Autres formes non *L65*
- Réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu *Z91.73*
- Sans précision ¬
- - Alopécie *L66.9*
- - Raréfaction du système pileux non *L65.9*
- ¬
- - Alopécie *L66*
- - Formes d'alopécie *L66.8*
- - Opération réparation d'un tissu *Z42*
- - Pemphigoïde
- - - *L12.1*
- - - Oculaire *L12.1†, H13.3**

Cicatriciel *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Soins maternels pour: plancher pelvien: *O34.8*

Cicatrisation

- Secondaire d'une plaie ¬ *T89.03*
- ¬ Trouble de la *T89.03*

CIDEC ¬ Lipodystrophie partielle familiale associée à *E88.1*

Ciguatera ¬ *T61.0*

Ciliaire

- Cellule fusiforme type
- - A ¬ Mélanome malin du corps *C69.4*
- - B ¬ Mélanome malin du corps *C69.4*
- Chambre antérieur œil
- - Exsudatif ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - Implant ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - Parasitaire ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - SAI ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de l'iris et du corps *H22.8**
- Primitive ¬ Dyskinésie *Q34.8*
- Sans précision ¬ Affection de l'iris et du corps *H21.9*
- ¬
- - Adhérences et perturbations de l'iris et du corps *H21.5*
- - Affection
- - - Dégénératives de l'iris et du corps *H21.2*
- - - Iris et du corps *H21*
- - - Précisées de l'iris et du corps *H21.8*
- - - Vasculaires de l'iris et du corps *H21.1*
- - Gomme du corps *A52.7†, H22.8**
- - Néovascularisation de l'iris ou du corps *H21.1*
- - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: corps: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: corps: *H44.7*
- - Syphilis
- - - Secondaire du corps *A51.4†, H22.0**
- - - Tardive du corps *A52.7†, H22.0**
- - Tuberculose du corps *A18.5†, H22.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: Corps *D31.4*
- - - Maligne: Corps *C69.4*

Cilliers ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Cils ¬ Absence ou agénésie de: *Q10.3*

Ciment ¬

- *L23.5*
- *L24.5*
- *L25.3*

Cimeterre ¬ Syndrome du *Q26.8*

CINCA ¬ Syndrome *M35.8*

Cinétose ¬ *T75.3*

CIPO ¬ *K59.8*

Circadien ¬ Inversion psychogène du rythme (du): *F51.2*

Circoncision

- Féminine ¬ *Z91.70*
- Rituelle et de routine ¬ *Z41.2*

Circonscrit
v. Type de maladie

Circonstances

- Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*
- Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*
- Indéterminées ¬ Événement sans autre précision, *Y34!*
- Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*
- Non précisées ¬ Sujet ayant recours aux services de santé dans des *Z76.9*
- Précisées ¬ Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres *Z76.8*
- Psychosociales ¬ Autres difficultés liées à certaines *Z64.8*
- Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*
- ¬ Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres *Z76*

Circulaire

- Bénins multiples de la peau des membres ¬ Plis *Q82.8*
- Cordon
- - Compression ¬ Travail et accouchement compliqués d'une *O69.1*
- - Ombilical ¬ *P02.5*

Circulants ¬ trouble hémorragique anticoagulant

- *D68.35*
- Anticorps *D68.3*

Circulation

- Coronaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la *R93.1*
- Fœtale ¬ Persistance de la *P29.3*
- Maternelle ¬ Hémorragie vers la *P50.4*

Circulatoire

- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Non classés ailleurs ¬ Autres troubles de l'appareil *I97.89*
- - Sans précision ¬ Trouble de l'appareil *I97.9*
- Avant l'admission à l'hôpital ¬ Arrêt cardio- *U69.13!*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de l'appareil *O99.4*
- Cours maladies classées ailleurs ¬ trouble
- - Appareil *I98**

Circulatoire *–suite*

- Cours maladies classées ailleurs ¬ trouble *–suite*
- - Précisés de l'appareil *I98.8**
- Diabète sucré ¬ Trouble *E14.50†, I79.2**
- Greffe de peau ¬ Troubles *T86.50*
- Leriche et Fontaine ¬ Trouble *I70.29*
- Périphérique
- - SAI ¬ Insuffisance *R57.9*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de l'appareil *Q27.9*
- - ¬ malformation congénital
- - - Appareil *Q27*
- - - Précisées de l'appareil *Q27.8*
- Respiratoire
- - Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies *P00.3*
- - ¬ symptôme signe
- - - Précisés relatifs aux appareils *R09.8*
- - - Relatifs aux appareils *R09*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale de l'appareil *Q28.9*
- Selon Fontaine ¬ Troubles *I70.29*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ Maladie *A50.5†, I98.0**
- - ¬ Maladie *A52.0†, I98.0**
- Veineux ¬ Trouble *I87.20*
- ¬
- - Antécédents personnels de maladies de l'appareil *Z86.7*
- - Béribéri humide avec implication du système *E51.1†, I98.8**
- - Diabète sucré
- - - Trouble *E14.50†, I79.2**
- - - Type
- - - - 1 avec trouble *E10.50†, I79.2**
- - - - 2 avec trouble *E11.50†, I79.2**
- - Fistule congénitale de l'appareil *Q28.81*
- - Malformation congénital
- - - Appareil *Q28*
- - - Précisées de l'appareil *Q28.88*
- - Syphilome du système *A52.0†, I98.0**
- - Troubles autres et non précisés de l'appareil *I99*

Circumvallata ¬ Placenta: *O43.1*

Cireuse schizophrénique ¬ Flexibilité *F20.2*

Cirrhosa ¬ Ichtyoparasitose à Vandellia *B88.8*

Cirrhose

- Alcoolique
- - Foie
- - - Hémorragie par rupture des varices œsophagiennes ¬ *K70.3†, I98.3**
- - - Saignement de varices gastriques ¬ *K70.3†, I98.3**
- - - Varice
- - - - Gastriques ¬ *K70.3†, I98.2**
- - - - Œsophagiennes ¬ *K70.3†, I98.2**

Cirrhose *–suite*

- Alcoolique *–suite*
- - Foie *–suite*
- - - ¬ *K70.3*
- - SAI ¬ *K70.3*
- Biliaire
- - Primitif
- - - Stade Child-Pugh
- - - - A ¬ *K74.3, K74.70!*
- - - - B ¬ *K74.3, K74.71!*
- - - - C ¬ *K74.3, K74.72!*
- - - ¬ *K74.3*
- - Sans précision ¬ *K74.5*
- - Secondaire
- - - Stade Child-Pugh
- - - - A ¬ *K74.4, K74.70!*
- - - - B ¬ *K74.4, K74.71!*
- - - - C ¬ *K74.4, K74.72!*
- - - ¬ *K74.4*
- - Stade Child-Pugh
- - - A ¬ *K74.5, K74.70!*
- - - B ¬ *K74.5, K74.71!*
- - - C ¬ *K74.5, K74.72!*
- Congénitale (du foie) ¬ *P78.8*
- Foie
- - Cryptogénique ¬ *K74.6*
- - Dite) cardiaque ¬ *K76.1*
- - Hémorragie par rupture des varices œsophagiennes ¬ *K74.6†, I98.3**
- - Macronodulaire ¬ *K74.6*
- - Micronodulaire ¬ *K74.6*
- - Portale ¬ *K74.6*
- - Post-nécrotique ¬ *K74.6*
- - SAI ¬ *K74.6*
- - Sans précision ¬ *K74.6*
- - Stade Child-Pugh
- - - A ¬
- - - - *K74.6, K74.70!*
- - - - *K74.70!*
- - - B ¬
- - - - *K74.6, K74.71!*
- - - - *K74.71!*
- - - C ¬
- - - - *K74.6, K74.72!*
- - - - *K74.72!*
- - Type mixte ¬ *K74.6*
- - Varices œsophagiennes ¬ *K74.6†, I98.2**
- - ¬
- - - Fibrose et *K74*
- - - Glycogénose avec *E74.0*
- - - Maladie toxique du foie avec fibrose et *K71.7*
- - - Stades cliniques de la *K74.7!*
- Héréditaire des enfants indiens d'Amérique du Nord ¬ *K74.6*

Cirrhose *–suite*
- Pancréas ¬ *K86.8*
- Syphilitique du foie ¬ *A52.7†, K77.0**
- Toxique foie
- - Hémorragie par rupture des varices œsophagiennes ¬ *K71.7†, I98.3**
- - Varices œsophagiennes ¬ *K71.7†, I98.2**

Cirrhotique ¬ Cardiomyopathie *I42.88*

Cirsoïde) (faux) (rompu) ¬ anévrisme (*I72*

Cisaillement verticale [Vertical shear fracture] ¬ Fracture de *S32.7*

Citadine ¬
- Fièvre jaune *A95.1*
- Rage des rues [rage *A82.1*

Citrine ¬ Cholestase intrahépatique néonatale par déficit en *E72.2*

Citrobacter freundii multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Genre *U81.05!*
- 3MRGN ¬ Genre *U81.25!*
- 4MRGN ¬ Genre *U81.45!*

Citrulline ¬ Trouble du métabolisme de la *E72.2*

Citrullinémie ¬ *E72.2*

Citrullinurie ¬ *E72.2*

CIV
- Communication interventriculaire] sous-pulmonaire non-committed ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec *Q20.1*
- ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication interventriculaire [*I51.0*

Civatte ¬ Poïkilodermie de *L57.3*

Civil ou pénal ¬ Condamnation, sans emprisonnement, après procès *Z65*

Claes-Jensen ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X syndromique de type *Q87.8*

Clair
- Môle non hydatiforme ¬ Œuf *O02.0*
- Ovaire ¬ Adénocarcinome à cellules *C56*
- Rein ¬ Sarcome à cellules *C64*
- ¬
- - Carcinome rénal
- - - Cellules *C64*
- - - Héréditaire à cellules *C64*
- - Méningite à liquide *G03.0*
- - Sarcome rénal à cellules *C64*
- - Tendance aux chutes due à d'autres affections peu *R29.6*

Clampage du cordon ombilical ¬ Déplacement d'un *P51.8*

CLAPO ¬ Syndrome *Q87.3*

Claude
- Bernard-Horner ¬ Syndrome de *G90.2*
- ¬ Syndrome de *I66.8†, G46.3**

Claude-Bernard-Horner ¬ Syndrome congénital de *G90.2*

Claudicatio spinalis cours
- Atteinte lombaire des disques intervertébraux ¬ *M51.1†, G55.1**
- Sténose
- - Canal rachidien ¬ *M48.09†, G55.3**
- - Lombaire du canal rachidien ¬ *M48.06†, G55.3**

Claudication
- Intermittent
- - Artériopathie oblitérante des membres inférieurs ¬ *I70.29*
- - Médullaire (lors de myélopathie vasculaire) ¬ *G95.18*
- - SAI ¬ *I73.9*
- Syphilitique intermittente ¬ *A52.0†, I79.8**

Clausen
v. Dyggve-Melchior-Clausen

Claustrophobie ¬ *F40.2*

Clavatus ¬ Alvéolite due à Aspergillus *J67.4*

Clavicule
- Multiples ¬ Fracture de la *S42.09*
- Omoplate et de l'humérus ¬ Fractures multiples de la *S42.7*
- Partie non précisée ¬ Fracture de la *S42.00*
- SAI ¬ *S42.00*
- Tiers
- - Latéral ¬ Fracture de la *S42.03*
- - Médian ¬ Fracture de la *S42.01*
- - Moyen ¬ Fracture de la *S42.02*
- Traumatisme obstétrical ¬ Fracture de la *P13.4*
- ¬
- - *T84.10*
- - Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- - Fracture de la *S42.0*
- - Ostéite condensante médiane de la *M85.31*
- - Pseudarthrose congénitale de la *Q74.0*
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - Côtes, sternum et *D16.7*
- - - - Os et du cartilage articulaire: *D16.72*
- - - Malign
- - - - Côtes, sternum et *C41.3*
- - - - Os et du cartilage articulaire: *C41.32*

Clefts (fentes) ¬ Water *H25.0*

Cléido-crânien ¬
- Dysostose *Q74.0*
- Dysplasie *Q74.0*

Cléjat [atrophiante vasculaire] ¬ Poïkilodermie généralisée type Petges- *L94.5*

Clignement ¬ Mâchoire à *Q07.8*

Climatère féminin ¬ Troubles de la ménopause et du *N95.1*

Climatérique ¬ Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Climatique
- Gouttelettes ¬ Kératopathie *H18.5*
- Tropical ¬ Bubon *A55*

Climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [*J67.7*

Clinique
- Cirrhose du foie ¬ Stades *K74.7!*
- Infection VIH
- - Catégorie
- - - A ¬ Catégories *U60.1!*
- - - B ¬ Catégories *U60.2!*
- - - C ¬ Catégories *U60.3!*
- - ¬ Catégories *U60!*
- Maladie due au VIH non précisée ¬ Catégorie *U60.9!*
- Sérologie positive ¬ Pian sans signes *A66.8*
- ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche *Z00.6*

Cliniquement, sans confirmation parasitologique. ¬ Paludisme diagnostiqué *B54*

Clinodactylie des doigts familiale isolée ¬ *Q68.1*

CLIPPERS ¬ *G04.8*

Clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du prépuce *Z91.71*

Clitoris
- Infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du *Z91.73*
- Lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du *Z91.72*
- Prépuce clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du *Z91.71*
- ¬
- - Hypertrophie du *N90.8*
- - Malformation congénitale du *Q52.6*
- - Tumeur maligne: *C51.2*

Clivées ¬ Lymphome
- Diffus à cellules non *C83.9*
- Folliculaire
- - Cellules *C82.9*
- - Non-hodgkinien à petites cellules *C82.9*
- - Petites cellules *C82.0*

CLN
- Adulte ¬ *E75.4*
- Congénitale ¬ *E75.4*
- Infantile ¬ *E75.4*
- Juvénile ¬ *E75.4*

CLN1 ¬ Maladie *E75.4*

CLN10 ¬ Maladie *E75.4*

CLN2 ¬ Maladie *E75.4*
CLN3 ¬ Maladie *E75.4*
CLN4A ¬ Maladie *E75.4*
CLN4B ¬ Maladie *E75.4*
CLN5 ¬ Maladie *E75.4*
CLN6 ¬ Maladie *E75.4*
CLN7 ¬ Maladie *E75.4*
CLN8 ¬ Maladie *E75.4*
CLN9 ¬ Maladie *E75.4*
Cloacae multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Genre Enterobacter *U81.04!*
- 3MRGN ¬ Genre Enterobacter *U81.24!*
- 4MRGN ¬ Genre Enterobacter *U81.44!*
Cloacale ¬ Tumeur maligne: Zone *C21.2*
Cloaque
- SAI ¬ *Q43.7*
- ¬ Persistance du *Q43.7*
Cloison
- Cardiaque
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale d'une *Q21.9*
- - ¬ Autres malformations congénitales des *Q21.8*
- Nasal
- - Acquise) ¬ Déviation de la *J34.2*
- - Choanes ¬ Bord postérieur
- - - *C11.3*
- - - *D10.6*
- - SAI ¬ Perforation de la *J34.8*
- - ¬
- - - *C30.0*
- - - Déviation
- - - - *J34.2*
- - - - Congénitale de la *Q67.4*
- - - Nécrose du nez et de la *J34.0*
- - - Perforation congénitale de la *Q30.3*
- - - Phlegmon du nez et de la *J34.0*
- - - Syphilis de la *A52.7†, J99.8**
- - - Ulcération du nez et de la *J34.0*
- Nez ¬ Luxation de la *S03.1*
- Recto-vaginal
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: *O70.2*
- - ¬ Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: *C76.3*
- Recto-vésicale ¬ Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: *C76.3*
- ¬ nez (*T20*
Cloisonné
- Total ¬ Utérus *Q51.2*
- ¬ Vagin *Q52.1*
Cloisonnement du vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
Clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie *D47.0*
Clonidine ¬ *T46.5*
Clonique ¬
- Crise non spécifique
- - *G40.3*
- - Tonico- *G40.3*
- État de mal épileptique tonico- *G41.0*
- Spasme hémifacial *G51.3*
Clonorchiase
- Foie ¬ *B66.1†, K77.0**
- ¬ *B66.1*
Clonorchis sinensis ¬ Infection à *B66.1*
Clorale ¬ Dépendance à la bétaïne *F13.2*
Clostridium
- Botulinum ¬ Intoxication alimentaire classique à *A05.1*
- Difficile
- - Mégacôlon
- - - Complications organiques ¬ Entérocolite à *A04.73*
- - - Sans autres complications organiques ¬ Entérocolite à *A04.72*
- - Sans
- - - Mégacôlon
- - - - Complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à *A04.71*
- - - - Sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à *A04.70*
- - - Précision ¬ Entérocolite à *A04.79*
- - ¬
- - - Colite
- - - - Infectieuse à *A04.79*
- - - - Toxique à *A04.79*
- - - Entérite
- - - - Infectieuse à *A04.79*
- - - - Toxique à *A04.79*
- - - Entérocolite à *A04.7*
- - - Infection
- - - - *A04.79*
- - - - Récurrente par *U69.40!*
- - - Intoxication d'origine alimentaire à *A04.7*
- - - Sepsis à *A41.4*
- Perfringens
- - Clostridium perfringens [Clostridium welchii] ¬ Intoxication alimentaire à *A05.2*
- - Micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.7!*
- - ¬
- - - Entérite infectieuse à *A04.8, B96.7!*
- - - Sepsis à *A41.4*
- Welchii] ¬ Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [*A05.2*
- ¬
- - Infection congénitale à *P37.8, B96.7!*
- - Myonécrose à *A48.0*
- - Phlegmon à *A48.0*
Clou ¬
- *L02*
- Enlèvement de: *Z47.0*
Clouston ¬ Syndrome de *Q82.8*
CLOVES ¬ Syndrome *Q87.3*
Clutton ¬ Hydarthrose de *A50.5†, M03.19**
CM-AVM ¬ *Q27.3*
CMO I ¬ *E27.4*
CMUSE ¬ *K63.3*
CMV
- Cytomégalovirus
- - VIH positif ¬ Décollement de la rétine au cours de rétinite à *B20†, H32.0*, B25.88*
- - ¬ Maladie VIH
- - - Récidive de rétinite à *B20†, H32.0*, B25.88*
- - - Rétinite à *B20†, H32.0*, B25.88*
- ¬ Infection anténatale au *P35.1*
CoA
v.a. acyl-CoA-déshydrogénase
v.a. alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA
v.a. propionyl-CoA
- Déshydrogénase acide gras chaîne court ¬
- - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl- *E71.3*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl- *E71.3*
- Mutase ¬ Déficit complet en Méthylmalonyl- *E71.1*
- Transférase ¬ Déficit succinyl-CoA 3
- - Cétoacide *E71.3*
- - Oxoacide *E71.3*
Coagulants ¬ Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres *T45.7*
Coagulase-négatif ¬
- Choc septique à staphylocoques *A41.1, R57.2*
- Septicémie à staphylocoques *A41.1*
Coagulation
- Affections du foie ¬ Carence en facteur de *D68.4*
- Avitaminose K ¬ Carence en facteur de *D68.4*
- Cours du post-partum ¬ Anomalie de la *O72.3*
- Dépendants de la vitamine K ¬ Déficit héréditaire combiné en facteurs de la *D68.28*
- Intravasculaire
- - Disséminé
- - - Fœtus et le nouveau-né ¬ *P60*
- - - Syndrome de défibrination] ¬ *D65*
- - - ¬
- - - - *D65.1*
- - - - Glomérulonéphrite au cours de *D65.1†, N08.2**
- - - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- - - - Hémorragie

Coagulation *–suite*
- Intravasculaire *–suite*
- - Disséminé *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Hémorragie *–suite*
- - - - - Importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - - - - Pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*
- - - - Maladie glomérulaire au cours de *D65.1†, N08.2**
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.1*
- Pendant la période néonatale ¬ Autres affections transitoires de la *P61.6*
- Prolongé ¬ Temps de *R79.8*
- Sanguin
- - Durablement acquis ¬ Troubles de la *U69.11!*
- - ¬ Trouble provisoire de la *U69.12!*
- Sans précision ¬ Anomalie de la *D68.9*
- ¬
- - Anomalie
- - - *D68*
- - - Précisées de la *D68.8*
- - Carence
- - - Acquise en facteur de *D68.4*
- - - Héréditaire facteur
- - - - *D68.2*
- - - - *D68.28*
- - Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la *O45.0*
- - Déficience de facteurs de *D68.28*
- - Déficit héréditaire en facteurs de *D68.28*
- - Hémophilie due à des anticorps inhibant la *D68.38*
- - Hémorragie
- - - Pendant l'accouchement avec anomalie de la *O67.0*
- - - Précédant l'accouchement avec anomalie de la *O46.0*
- - Réduction des facteurs de *D68.9*
- - Trouble
- - - Facteurs de *D68.28*
- - - Hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de *D68.32*

Coagulopathie de consommation ¬ *D65.1*

Coalescence
- Côtes congénitale ¬ *Q76.6*
- Doigts ¬ *Q70.0*
- Orteils ¬ *Q70.2*
- Osselets ¬ *Q16.3*
- Phalanges SAI ¬ *Q70.9*
- Tarsale ¬ *Q66.8*

Coalition tarsocarpienne ¬ Syndrome de *Q74.8*

Coarctation
- Aorte

Coarctation *–suite*
- Aorte *–suite*
- - Abdominale ¬ *Q25.1*
- - Autosomique dominante ¬ *Q25.1*
- - ¬ *Q25.1*
- Aortique atypique ¬ *Q25.1*
- Isthme aortique (avant le canal) (après le canal) ¬ *Q25.1*
- ¬
- - TGV avec *Q20.3*
- - Transposition congénitalement non corrigée des gros vaisseaux avec *Q20.3*

COASY ¬ Neurodégénérescence associée à la protéine *G23.0*

Coats ¬ Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*

Cobalamine ¬
- Carence en: *E53.8*
- Homocystinurie due à un défaut du métabolisme du cofacteur *E72.1*

Cobalamine-protéinurie ¬ Syndrome de malabsorption sélective de la *D51.1*

Cobalt ¬ Taux anormal de: *R79.0*

Cobb ¬ Syndrome de *Q27.3*

Cocaïne
- Sang ¬ Présence de *R78.2*
- ¬
- - Embryofœtopathie à la *Q86.88*
- - Intoxication: *T40.5*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F14*

Cocardes ¬ Erythrokératodermie en *Q82.8*

Coccidioides ¬ Infection à *B38.9*

Coccidioïdomycose
- Aiguë ¬ Pneumonie au cours de *B38.0†, J17.2**
- Chronique ¬ Pneumonie au cours de *B38.1†, J17.2**
- Cutanée ¬ *B38.3†, L99.8**
- Disséminée ¬ *B38.7*
- Généralisée ¬ *B38.7*
- Prostate ¬ *B38.8†, N51.0**
- Pulmonaire
- - Aiguë ¬ *B38.0†, J17.2**
- - Chronique ¬ *B38.1†, J17.2**
- - ¬ *B38.2†, J17.2**
- Sans précision ¬ *B38.9*
- ¬
- - *B38*
- - *B38.9*
- - Formes de *B38.8*
- - Maladie due au VIH avec *B20, B38.9*
- - Méningite à *B38.4†, G02.1**

Coccidiose
- Intestinale ¬ *A07.3*
- ¬ Maladie due au VIH avec *B20, A07.3*

Coccygien pilonidal e ¬
- Fistule *L05*

Coccygien pilonidal e ¬ *–suite*
- Kyste *L05*

Coccygodynie ¬ *M53.3*

Coccyx
- Obstétrical(e) ¬ Lésion du *O71.6*
- ¬
- - *C41.4*
- - *D16.8*
- - Fracture du *S32.2*
- - Tumeur bénigne: Bassin, sacrum et *D16.8*

Cochléaire
v.a. vestibulo-cochléaire
- ¬
- - Otosclérose *H80.2*
- - Prothèse (de): *Z45.3*

Cochlée ¬
- *S01.38*
- *Z96.2*

Cochrane ¬ Syndrome de *E71.1*

Cockayne ¬ Syndrome de: *Q87.1*

CODAS ¬ Syndrome *Q87.8*

Codéine ¬ *T40.2*

Cœliaque
- Gluten ¬ Sensibilité non *K90.4*
- Mésentérique ¬ Lésion traumatique de l'artère *S35.2*
- ¬
- - Ganglion ou plexus *S34.5*
- - Maladie *K90.0*
- - Syndrome de compression de l'artère *I77.4*

Cœur
- Artificiel ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Dépendance de longue durée envers un *Z99.4*
- Chronique) SAI ¬ Maladie ischémique du *I25.9*
- Circulation coronaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R93.1*
- Croisé ¬ *Q24.8*
- Droit ¬ Hypoplasie du *Q22.6*
- Gauche ¬
- - Canal atrioventriculaire complet - anomalies obstructives du *Q21.2*
- - Hypoplasie du *Q23.4*
- Main ¬ Syndrome *Q87.2*
- Médiastin plèvre ¬ Tumeur malign
- - *C38*
- - Lésion à localisations contiguës du *C38.8*
- Membres type slovène ¬ Syndrome *Q87.2*
- Myocarde
- - Graisseuse ¬ Dégénérescence du *I51.5*
- - Sénile ¬ Dégénérescence du *I51.5*
- Poumon
- - Niveau urgence

Cœur *–suite*
- Poumon *–suite*
- - Niveau urgence *–suite*
- - - HU [High Urgency]] ¬ Inscription pour transplantation *U55.32*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription pour transplantation *U55.31*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour transplantation *U55.30*
- - ¬
- - - Echec et rejet d'une greffe *T86.3*
- - - Inscription pour transplantation *U55.3*
- - - Status post greffe de *Z94.3*
- Pulmonaire
- - Aigu
- - - SAI ¬ *I26.0*
- - - ¬ Embolie pulmonaire
- - - - Mention de *I26.0*
- - - - Sans mention de *I26.9*
- - Chronique) SAI ¬ *I27.9*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique du *S26.9*
- Triatrial
- - Droit ¬ *Q24.2*
- - Gauche ¬ *Q24.2*
- - ¬ *Q24.2*
- Triloculaire biauriculaire ¬ *Q20.4*
- Univentriculaire
- - Valve auriculoventriculaire unique ¬ *Q20.4*
- - ¬ *Q20.4*
- ¬
- - *D48.7*
- - Anévrisme (pariétal) du *I25.3*
- - Bloc congénital du *Q24.6*
- - Déchirure cardiaque
- - - Ouverture d'une cavité du *S26.83*
- - - Sans ouverture d'une cavité du *S26.82*
- - Dégénérescence murale du *I51.5*
- - Dilatation du *I51.7*
- - Diverticule du *Q24.8*
- - Donneur de *Z52.7*
- - Echec et rejet d'une greffe de *T86.2*
- - Gomme du *A52.0†*, *I52.0**
- - Gonorrhée du *A54.8†*, *I52.0**
- - Hémopéricarde dû à une blessure traumatique par poignardement du *S26.0*
- - Lésion
- - - *S26.88*
- - - Traumatique
- - - - *S26*
- - - - *S26.8*
- - Maladie glycogénique du *E74.0†*, *I43.1**
- - Malposition du *Q24.8*
- - Neuropathie diabétique du *E14.40†*, *G99.0**
- - Status post greffe du *Z94.1*

Cœur *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syphilis congénitale du *A50.5†*, *I52.0**
- - Tophus goutteux du *M10.09†*, *I43.8**
- - Tuberculose du *A18.8†*, *I43.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D15.1*
- - - Malign
- - - - *C38.0*
- - - - Secondaires du *C79.84*

Cofacteur cobalamine ¬ Homocystinurie due à un défaut du métabolisme du *E72.1*

Cofacteurs molybdène
- Type A ¬ Déficit en sulfite oxydase dû à un déficit en *E72.1*
- ¬ Déficit en sulfite oxydase dû à un déficit en *E72.1*

Coffin-Siris ¬ Syndrome de *Q87.1*

COG2 ¬ Maladie de glycosylation congénitale associée au *E77.8*

COG2-CDG ¬ *E77.8*

Cogan ¬
- Apraxie oculomotrice type *H51.8*
- Syndrome de *H16.3*

Cogan-Reese ¬ Syndrome de *H21.8*

Cognitif
- 5-10 points ¬ FIM *U51.21*
- 11-29 points ¬ FIM *U51.11*
- 30-35 points ¬ FIM *U51.01*
- Conscience
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux fonctions *R41.8*
- - ¬ Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions *R41*
- Léger ¬ Trouble *F06.7*
- Moyenne ¬ Limitation fonctionnelle *U51.1*
- Sévère ¬ Limitation fonctionnelle *U51.2*
- ¬
- - Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U51.0*
- - Limitation fonctionnelle *U51*

Cohen
v.a. Lowe-Kohn-Cohen
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Coiffe rotateurs
- Non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la *M75.1*
- ¬
- - *S43.4*
- - Lésion traumatique de muscles et de tendons de la *S46.0*
- - Syndrome de la *M75.1*

Coin SAI des dents ¬ Anomalie en *K03.1*

Co-infection agent delta
- Coma hépatique ¬ Hépatite aigu B
- - *B16.0*, *K72.74!*
- - Sans *B16.2*, *K72.74!*

Co-infection agent delta *–suite*
- Sans coma hépatique ¬ Hépatite aiguë B avec *B16.1*

Coït douloureux pour l'homme ¬ *N48.8*

Col
- Anatomique ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: *S42.23*
- Cervical ¬ Carcinome épidermoïde du *C53.9*
- Chirurgical ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: *S42.22*
- Cygne ¬ Déformation en boutonnière et en *M20.0*
- Fémoral ¬ Fracture à la base du *S72.05*
- Fémur
- - Base ¬ Fracture du *S72.05*
- - Épiphyse (proximale), décollement épiphysaire ¬ Fracture du *S72.02*
- - Intracapsulaire ¬ Fracture du *S72.01*
- - Mésocervicale ¬ Fracture du *S72.04*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Fracture du *S72.00*
- - - ¬ Fracture du *S72.08*
- - Souscapitale ¬ Fracture du *S72.03*
- - ¬
- - - Antéversion du *Q65.8*
- - - Fracture
- - - - *S72.0*
- - - - Transcervicale ouverte du *S72.04*, *S71.87!*
- Néovessie ¬ Sténose du *N32.0*
- Omoplate ¬ Fracture de l'omoplate: Cavité glénoïde et *S42.14*
- Pancréas ¬ *C25.7*
- SAI ¬ Prolapsus (de): *N81.2*
- Utérin
- - Tant complication accouchement ¬
- - - Amputation du *O65.5*
- - - Atrésie du *O65.5*
- - - Cicatrice au *O65.5*
- - ¬
- - - Abcès non puerpéral du *N72*
- - - Atrésie
- - - - Orifice du *Q51.8*
- - - - Portion vaginale du *Q51.8*
- - - Kyste du *N88.8*
- - - Mélanome in situ du *D03.8*
- Utérus
- - Inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du *O34.30*
- - NIC stade
- - - I ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N87.0*
- - - II ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N87.1*
- - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ néoplasie intraépithéliale du *D06*
- - Non classée ailleurs ¬ Dysplasie sévère du *N87.2*

Col *–suite*
- Utérus *–suite*
- - SAI ¬ Dysplasie sévère du *N87.2*
- - Sans précision ¬
- - - Affection non inflammatoire du *N88.9*
- - - Carcinoma in situ: *D06.9*
- - - Dysplasie du *N87.9*
- - - Malformation congénitale de l'utérus et du *Q51.9*
- - - Tumeur maligne: *C53.9*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- - Trichomonas ¬ Infection du *A59.0†, N74.8**
- - ¬
- - - Absence congénitale du *Q51.5*
- - - Adénocarcinome du *C53.9*
- - - Adénosarcome du *C53.9*
- - - Adhérences du *N88.1*
- - - Affection
- - - - Inflammatoires du *N72*
- - - - Non
- - - - - Inflammatoires du *N88*
- - - - - Inflammatoires précisées du *N88.8*
- - - Agénésie et aplasie du *Q51.5*
- - - Allongement hypertrophique du *N88.4*
- - - Béance du *N88.3*
- - - Carcinoma in situ: Autres parties du *D06.7*
- - - Carcinome
- - - - Adénoïde
- - - - - Basal du *C53.9*
- - - - - Kystique du *C53.9*
- - - - Cellules vitreuses du *C53.9*
- - - - In situ du *D06*
- - - - Neuroendocrine de haut grade du *C53.9*
- - - - Papillaire du *C53.9*
- - - Carcinosarcome du *C53.9*
- - - Déchirure
- - - - Ancienne du *N88.1*
- - - - Obstétricale du *O71.3*
- - - Décollement annulaire du *O71.3*
- - - Dysplasie
- - - - *N87*
- - - - Légère du *N87.0*
- - - - Moyenne du *N87.1*
- - - Érosion et ectropion du *N86*
- - - Eversion du *N86*
- - - Examen spécial de dépistage de tumeur du *Z12.4*
- - - Frottis de Papanicolaou au niveau du *Z01.4*
- - - Hypoplasie de l'utérus et du *Q51.8*
- - - Kyste embryonnaire du *Q51.6*
- - - Léiomyosarcome du *C53.9*
- - - Leucoplasie du *N88.0*

Col *–suite*
- Utérus *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Malformation congénital utérus
- - - - *Q51*
- - - - *Q51.8*
- - - Polype du *N84.1*
- - - Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: *R87*
- - - Rétrécissement et sténose du *N88.2*
- - - Rhabdomyosarcome du *C53.9*
- - - Syphilis tardive du *A52.7†, N74.2**
- - - Tuberculose du *A18.1†, N74.0**
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D26.0*
- - - - Germinale maligne du *C53.9*
- - - - Malign
- - - - - *C53*
- - - - - Lésion à localisations contiguës du *C53.8*
- - - - Neuroectodermique primitive du *C53.9*
- - - Ulcère trophique du *N86*
- Vagin
- - Perméables ¬ Utérus bicorne bicervical avec *Q51.3*
- - ¬ Utérus double avec duplication du *Q51.1*
- Vésical ¬
- - Dyssynergie du détrusor du *N32.0*
- - Tumeur maligne: *C67.5*
- Vessie
- - Acquise) ¬ Sténose du *N32.0*
- - Congénital(e) ¬ Occlusion du *Q64.3*
- - ¬
- - - Formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du *Q64.3*
- - - Obstruction du *N32.0*
- ¬
- - *S82.41*
- - Affection
- - - Inflammatoire
- - - - Aiguë de l'utérus, à l'exclusion du *N71.0*
- - - - Chronique de l'utérus, à l'exclusion du *N71.1*
- - - - Utérus
- - - - - Exclusion du *N71*
- - - - - Sans précision, à l'exclusion du *N71.9*
- - - Non inflammatoires de l'utérus, sauf le *N85*
- - Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du *O62*
- - Dilatation insuffisante du *O62.0*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du *P01.0*
- - Fracture
- - - Extrémité supérieure du radius: *S52.12*
- - - Os du métacarpe: *S62.33*
- - - Premier métacarpien: *S62.23*

Col *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Polype muqueux du *N84.1*
- - Soin maternel
- - - Anomalies du *O34.4*
- - - Béance du *O34.3*
- - - Cerclage avec ou sans mention de béance du *O34.3*
- - - Intervention chirurgicale antérieure sur le *O34.4*
- - - Opération de Shirodkar avec ou sans mention de béance du *O34.3*
- - - Polype du *O34.4*
- - - Rétrécissement ou sténose du *O34.4*
- - - Tumeur du *O34.4*

Colchicine ¬ Intoxication par la *T50.4*

Cole-Carpenter ¬ Syndrome de *Q78.0*

Colère ¬
- *R45.4*
- Irritabilité et *R45.4*

Coli
- E. coli] ¬ Septicémie: escherichia *A41.51*
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Escherichia *U81.00!*
- - 3MRGN ¬ Escherichia *U81.20!*
- - 4MRGN ¬ Escherichia *U81.40!*
- SAI ¬ Entérite à Escherichia *A04.4*
- ¬
- - Arthrite à Escherichia *M00.89, B96.2!*
- - Choc septique à Escherichia *A41.51, R57.2*
- - Diarrhée entéropathogène à Escherichia *A04.0*
- - Entérite
- - - Entéro-aggrégative à Escherichia *A04.4*
- - - Entéro-hémorragique à Escherichia *A04.3*
- - - Entéro-invasive à Escherichia *A04.2*
- - - Entérotoxigène à Escherichia *A04.1*
- - Hypersensibilité aux protéines d'E. *T78.4*
- - Infection
- - - Congénitale à Escherichia *P37.8, B96.2!*
- - - Entéro-hémorragique à Escherichia *A04.3*
- - - Entéro-invasive à Escherichia *A04.2*
- - - Entéropathogène à Escherichia *A04.0*
- - - Entérotoxigène à Escherichia *A04.1*
- - - Escherichia *A49.8*
- - - Généralisée à Escherichia *A41.51*
- - - Intestinales à Escherichia *A04.4*
- - - Voies urinaires à Escherichia *N39.0, B96.2!*
- - Méningite à Escherichia *G00.8, B96.2!*
- - Méningo-encéphalite à Escherichia *G04.2, B96.2!*
- - Pneumonie
- - - Congénitale à Escherichia *P23.4*
- - - Escherichia *J15.5*
- - Sepsis du nouveau-né à Escherichia *P36.4*

Coli *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Septicémie: escherichia coli [E. *A41.51*
Colibacillaire ¬ Cystite *N30.8, B96.2!*
Colibacilles ¬ Sepsis à *A41.51*
Colibacillose
- Généralisée NCA ¬ *A41.51*
- ¬ *A49.8*
Colinet
v. Caplan-Colinet
Colipase pancréatique ¬ Déficit
- *K90.3*
- Combiné en lipase- *K90.3*
Colique
- Aiguë ¬ Pseudo-obstruction *K56.0*
- Biliaire (récidivante) sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- Hépatique (récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Infantile ¬ *R10.4*
- Néphrétique, sans précision ¬ *N23*
- SAI ¬ *R10.4*
- Utérine ¬ *N94.8*
- ¬
- - Constipation lors d'un trouble du transit *K59.00*
- - Fistule cholécysto- *K82.3*
- - Varices *I86.81*
Colite
v.a. recto-colite
- Allergiques et alimentaires ¬ Gastroentérite et *K52.2*
- Amibienne non dysentérique ¬ *A06.2*
- Associée aux antibiotiques selon l'anamnèse personelle ¬ *Z86.1*
- Collagène ¬ *K52.8*
- Cytomégalovirus ¬
- - *B25.80†, K93.8**
- Entérocolite associée aux antibiotiques ¬ Entérite, *A04.79*
- Granulomateuse ¬ *K50.1*
- Hémorragique ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- Hypersensibilité alimentaire ¬ Gastroentérite ou *K52.2*
- Indéterminé
- - Côlon rectosigmoïde ¬ *K52.32*
- - Latérale gauche ¬ *K52.31*
- - Subtotale ¬ *K52.30*
- - ¬
- - - *K52.3*
- - - *K52.38*
- Infectieuse à Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- Irradiation ¬ Gastroentérite et *K52.0*
- Ischémique
- - Chronique ¬ *K55.1*
- - Fulminante aigu(ë) ¬ *K55.0*
- - SAI ¬ *K55.9*
Colite *–suite*
- Ischémique *–suite*
- - Subaiguë ¬ *K55.0*
- Latérale gauche ¬ *K51.5*
- Lymphocytaire ¬ *K52.8*
- Médicamenteuses ¬ Gastroentérite et *K52.1*
- Microscopique (collagène ou lymphocytaire) ¬ *K52.8*
- Muqueuse psychogène ¬ *F54, K58.8*
- Non
- - Infectieux
- - - Précisées ¬ Autres Gastroentérites et *K52.8*
- - - Sans précision ¬ Gastroentérite et *K52.9*
- - - ¬ Autres Gastroentérites et *K52*
- - Précis origine
- - - Infectieux
- - - - Non précisées d'origine infectieuse et non précisée ¬ Gastroentérites et *A09*
- - - - ¬ Gastroentérites et *A09.0*
- - - Non précisées d'origine non précisée ¬ Gastroentérites et *A09.9*
- Protozoaires ¬ *A07.9*
- Pseudomembraneuse ¬
- - *A04.7*
- - *A04.79*
- Régionale ¬ *K50.1*
- SAI ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- Toxique
- - Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- - ¬ Gastroentérite et *K52.1*
- Tuberculeux
- - Ulcéreuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *A18.3†, K93.0**
- Ulcéreuse
- - Chronique) subtotale ¬ *K51.0*
- - ¬
- - - CU [*K51.9*
- - - Recto-colite hémorragique [*K51*
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**
- - Herpès ¬ *B00.8†, K93.8**
Collagène
- 9 ¬ Dysplasie épiphysaire multiple due à une anomalie du *Q77.3*
- Lymphocytaire) ¬ Colite microscopique (*K52.8*
- Type III ¬ Glomérulopathie à dépôts de *N07.6*
- Vasculaire) SAI ¬ Maladie (du): *M35.9*
- ¬ Colite *K52.8*
Collagénome perforant verruciforme ¬ *L87.1*
Collagénose
- Perforante réactionnelle familiale ¬ *L87.1*
- ¬ Polyneuropathie au cours de *M35.9†, G63.5**
Collapsus
- Chaleur ¬ *T67.1*
- Pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.1*
- Poumon ¬ *J98.1*
- Primitif des alvéoles pulmonaires ¬ *P28.0*
- Pulmonaire
- - Compression anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.1*
- - ¬ *J98.1*
- Trachéo-bronchique ¬ *J98.0*
- Vasculaire survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.3*
- ¬ Syncope et *R55*
Collatéral
- Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament externe [Lig. péronier *M23.94*
- Cubital ¬ Entorse et foulure du coude: Ligament *S53.42*
- Doigt ¬ Lésion traumatique du nerf *S64.4*
- Médial du genou ¬ Distorsion du ligament *S83.42*
- Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [Lig. tibial *M23.93*
- Pouce ¬ Lésion traumatique du nerf *S64.3*
- Radial ¬ Entorse et foulure du coude: Ligament *S53.41*
- ¬
- - Instabilité chronique genou Ligament
- - - Externe [Lig. péronier *M23.54*
- - - Interne [Lig. tibial *M23.53*
- - Lésion interne genou ligament
- - - Externe [Lig. péronier *M23.84*
- - - Interne [Lig. tibial *M23.83*
Colle ¬ Intoxication à la *T65.8*
Collecteurs ¬ Carcinome des tubes *C64*
Collègues ¬ Désaccords avec des supérieurs ou des *Z56*
Colles ¬ Fracture de Pouteau- *S52.51*
Colli ¬ Pterygium *Q18.3*
Collins] ¬ Syndrome de Franceschetti [Syndrome de Treacher *Q75.4*
Collodion
- Guérison spontanée ¬ Bébé *Q80.2*
- ¬ Bébé *Q80.2*
Colloïde
- Kystique) (thyroïdien) ¬ Nodule: *E04.1*
- ¬
- - Cystadénome *D27*
- - Goitre, non toxique: diffus (*E04.0*
Colobomateux
- Obésité-hypogénitalisme-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microphtalmie *Q87.8*

Colobomateux *–suite*
- Papille ¬ Fossette *Q14.2*
- ¬ Syndrome de microphtalmie-kyste *Q11.2*

Colobome
- Congénital de la papille optique ¬ *Q14.2*
- Cristallin ¬ *Q12.2*
- Déficience intellectuelle petite taille ¬ Syndrome de polydactylie préaxiale- *Q87.2*
- Fond de l'œil ¬ *Q14.8*
- Iris ¬ *Q13.0*
- Maculaire
- - Brachydactylie type B ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ *Q14.8*
- Micrognathie ¬ Syndrome d'agénésie du corps calleux avec déficience intellectuelle, *Q87.8*
- Papillaire ¬ *Q14.2*
- Paupière
- - Inférieure ¬ *Q10.3*
- - Supérieure ¬ *Q10.3*
- - ¬ *Q10.3*
- SAI ¬ *Q13.0*

Côlon
- Ascendant ¬
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.51*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.2*
- - - Maligne: *C18.2*
- Côlon
- - Ascendant ¬ Lésion traumatique du *S36.51*
- - Descendant ¬ Lésion traumatique du *S36.53*
- - Sigmoïde ¬ Lésion traumatique du *S36.54*
- - Transverse ¬ Lésion traumatique du *S36.52*
- Descendant ¬
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.53*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.4*
- - - Maligne: *C18.6*
- Grêle ¬
- - Diverticule de l'intestin (*K57*
- - Diverticulite de l'intestin (*K57*
- - Diverticulose de l'intestin (*K57*
- Gros intestin/côlon, partie non précisée ¬ Lésion traumatique du *S36.50*
- Hepatica] ¬ Tumeur maligne: Angle droit du *C18.3*
- Hépatique] ¬ Angle: droit du *D12.3*
- Héréditaire non polyposique [HNPCC] ¬ Cancer du *C18.9, Z80.0*
- Intestin
- - Grêle
- - - Péritonite ¬ Diverticulose du *K57.4*
- - - Sans perforation ni abcès ¬ Diverticulose du *K57.5*
- - ¬

Côlon *–suite*
- Intestin *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Étranglement du *K56.2*
- - - Occlusion du *K56.6*
- - - Rétrécissement du *K56.6*
- - - Sténose du *K56.6*
- - - Torsion du *K56.2*
- Irritable ¬
- - *K58*
- - Formes psychogènes de: " *F45.3*
- Partie
- - Non précisée ¬ Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/ *S36.50*
- - Parties et parties multiples du gros intestin ¬ Lésion traumatique du *S36.59*
- Pelvien] ¬ Sigmoïde [*C18.7*
- Perforation abcès
- - Saignement ¬
- - - Diverticulite
- - - - *K57.23*
- - - - Intestin grêle et du *K57.43*
- - - Diverticulose
- - - - *K57.21*
- - - - Intestin grêle et du *K57.41*
- - Sans indication saignement ¬
- - - Diverticulite
- - - - *K57.22*
- - - - Intestin grêle et du *K57.42*
- - - Diverticulose
- - - - *K57.20*
- - - - Grêle et du *K57.40*
- - ¬ Diverticulose
- - - *K57.2*
- - - Intestin grêle et du *K57.4*
- Péritonite ¬ Diverticulose du *K57.2*
- Recto-sigmoïde ¬
- - *C19*
- - Colite indéterminée du *K52.32*
- Rectum
- - Anus et du canal anal ¬ Tumeur bénigne du *D12*
- - ¬ *C19*
- SAI ¬
- - Angiodysplasie du *K55.21*
- - Diverticulose
- - - *K57.3*
- - - Intestin grêle et du *K57.5*
- Saignement ¬ Angiodysplasie du *K55.22*
- Sans
- - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie du *K55.21*
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite
- - - - - *K57.33*

Côlon *–suite*
- Sans *–suite*
- - Perforation abcès *–suite*
- - - Saignement ¬ *–suite*
- - - - Diverticulite *–suite*
- - - - - Intestin grêle et du *K57.53*
- - - - Diverticulose
- - - - - *K57.31*
- - - - - Grêle et du *K57.51*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite
- - - - - *K57.32*
- - - - - Intestin grêle et du *K57.52*
- - - - Diverticulose
- - - - - *K57.30*
- - - - - Intestin grêle et du *K57.50*
- - - ¬ Diverticulose du *K57.3*
- - Précision
- - - Localisation ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q42.9*
- - - ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: *D12.6*
- - - - Maligne: *C18.9*
- Sigmoïde ¬
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.54*
- - Tuberculose du *A18.3†, K93.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.5*
- - - Maligne: *C18.7*
- Splénique ¬
- - Angle: gauche du *D12.3*
- - Tumeur maligne: Angle gauche du *C18.5*
- Transverse ¬
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.52*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.3*
- - - Maligne: *C18.4*
- - ¬
- - Absence atrésie sténose congénital
- - - *Q42*
- - - Localisations du *Q42.8*
- - Adénomatose du *D12.6*
- - Allongement acquis du *K59.8*
- - Angiodysplasie du *K55.2*
- - Anomalies fonctionnelles congénitales du *Q43.2*
- - Atonie du *K59.8*
- - Atrésie du *Q42.9*
- - Carcinoma in situ: *D01.0*
- - Carcinome
- - - Épidermoïde du *C18.9*
- - - Neuroendocrine du *C18.9*
- - Corps étranger dans le *T18.4*
- - Dilatation
- - - *K59.3*

Côlon *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dilatation *–suite*
- - - Congénitale du *Q43.2*
- - Diverticulite congénitale du *Q43.8*
- - Duplication du *Q43.41*
- - Fistule du vagin au *N82.3*
- - Invagination de: *K56.1*
- - Lésion traumatique du *S36.5*
- - Maladie de Crohn [entérite régionale] du: *K50.1*
- - Malrotation du *Q43.3*
- - Mélanome malin du *C18.9*
- - Obstruction (du): *K56.4*
- - Obturation du *K56.4*
- - Occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du *Q42*
- - Paralysie: du *K56.0*
- - Polype
- - - *K63.5*
- - - Inflammatoires du *K51.4*
- - Polypose (héréditaire) du *D12.6*
- - Rotation
- - - Absente du cæcum et du *Q43.3*
- - - Incomplète du cæcum et du *Q43.3*
- - - Insuffisante du cæcum et du *Q43.3*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, K93.8**
- - Transposition de: *Q43.8*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.4*
- - - Malign
- - - - *C18*
- - - - Lésion à localisations contiguës du *C18.8*
- - - Neuroendocrine
- - - - *C18.9*
- - - - Incertain du *D37.4*
- - - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] du *C18.9*

Colonie de vacances ¬ inscription dans: *Z02*

Colonne
- Iliaque supérieure ¬ Tuberculose de la *A18.0†, M90.05**
- Lombaire
- - Bassin ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture luxation
- - - - Fermée de la *S31.84!*
- - - - Ouverte de la *S31.87!*
- - - II lors fracture luxation
- - - - Fermée de la *S31.85!*
- - - - Ouverte de la *S31.88!*
- - - III lors fracture luxation
- - - - Fermée de la *S31.86!*
- - - - Ouverte de la *S31.89!*
- - Hernie discale ¬ Syndrome de la *M51.1†, G55.1**

Colonne *–suite*
- Lombaire *–suite*
- - Sacrum, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: *S32.82*
- - SAI ¬ *S32.00*
- Lombosacrée sans autre précision ¬ Entorse/foulure et déchirure de la *S33.50*
- Vertébral
- - Lésion de la moelle épinière ¬ Fracture de la *T08.0, T09.3*
- - Moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie ¬ Lésion de la *P11.59*
- - Tuberculose ¬ Déformation de la *A18.0†, M49.09**
- - ¬
- - - Abcès tuberculeux de la *A18.0†, M49.09**
- - - Arthrite tuberculeuse de la *A18.0†, M49.09**
- - - Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la *M46.0*
- - - Carie tuberculeuse de la *A18.0†, M49.09**
- - - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: *T84.20*
- - - Granulome tuberculeux de la *A18.0†, M49.09**
- - - Nécrose tuberculeuse de la *A18.0†, M49.09**
- - - Synovite tuberculeuse de la *A18.0†, M49.09**
- - - TBC [Tuberculose] de la *A18.0†, M49.09**
- - - Ténosynovite tuberculeuse de la *A18.0†, M49.09**
- - - Tuberculose de *A18.0†, M49.09**
- - - Ulcère tuberculeux de la *A18.0†, M49.09**

Colorado ¬ Fièvre à tiques du *A93.2*

Colorants ¬ Intoxication par des *T65.6*

Coloration anormal
- Ongle ¬ *L60.8*
- ¬ *R19.5*

Colostomie
- Entérostomie ¬ Mauvais résultats fonctionnels d'une *K91.4*
- ¬
- - Présence d'une *Z93.3*
- - Surveillance de *Z43.3*

Colpite
- Atrophique à Haemophilus influenzae ¬ *N95.2, B96.3!*
- Mycosique ¬ *B37.3†, N77.1**

Colpocèle ¬ Soins maternels pour: *O34.8*

Coma
- Hépatique
- - SAI ¬ *K72*
- - ¬
- - - *K72.9, K72.74!*
- - - Encéphalopathie hépatique et *K72.7!*
- - - Hépatite
- - - - A

Coma *–suite*
- Hépatique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hépatite *–suite*
- - - - A *–suite*
- - - - - *B15.0, K72.74!*
- - - - - Sans *B15.9*
- - - - Aigu
- - - - - B avec agent delta, avec *B16.0*
- - - - - B avec agent delta, sans *B16.1*
- - - - - B avec co-infection à agent delta, avec *B16.0, K72.74!*
- - - - - B avec co-infection à agent delta, sans *B16.1*
- - - - - B sans agent delta, avec *B16.2*
- - - - - B sans co-infection à agent delta, avec *B16.2, K72.74!*
- - - - - B, sans agent delta et sans *B16.9*
- - - - - D avec *B16.0*
- - - - - D sans *B16.1*
- - - - B sans *B18.19*
- - - - Épidémique avec *B15.0, K72.74!*
- - - - Infectieuse avec *B15.0, K72.74!*
- - - - Viral
- - - - - *B19.0, K72.74!*
- - - - - Sans précision, avec *B19.0*
- - - - - Sans précision, sans *B19.9*
- - - Ictère
- - - - Épidémique avec *B15.0, K72.74!*
- - - - Infectieux avec *B15.0, K72.74!*
- - - Insuffisance hépatique alcoolique: avec ou sans *K70.4*
- Hypoglycémique
- - Non diabétique ¬ *E15*
- - SAI ¬ *E15*
- - ¬
- - - Encéphalopathie due à un *E16.1†, G94.3**
- - - Hyperinsulinisme avec *E15*
- Hypo-osmolaire ¬ *E87.1*
- Insulinique induit, chez un non diabétique ¬ *E15*
- Lors traumatisme crânio-cérébral
- - 30 minute
- - - 24 heures ¬ Perte de connaissance/ *S06.71!*
- - - ¬ Perte de connaissance/ *S06.70!*
- - Durée non précisée ¬ Perte de connaissance/ *S06.79!*
- - Plus 24 heure
- - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/ *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/ *S06.73!*
- Myxœdémateux ¬ *E03.5*
- Nouveau-né ¬ *P91.5*

Coma *–suite*
- Prolongé ¬ Blessure intracrânienne avec *S06.9, S06.79!*
- Sans précision ¬ *R40.2*
- Vigile] ¬ Semi-coma [*R40.1*
- ¬
- - Hypoglycémie médicamenteuse, sans *E16.0*
- - Somnolence, stupeur et *R40*

Combat ¬ Fatigue de *F43.0*

Combiné
v. Type de maladie

Comédocarcinome non invasif du sein ¬ *D05.1*

Comèl-Netherton ¬ Syndrome de *Q80.8*

Commençant
- Avant
- - 16 ans et durant plus de 3 mois ¬ arthrites chez l'enfant, *M08*
- - Fin 20ème gestation
- - - Trouble métabolique
- - - - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, *O21.1*
- - - - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, *O21.1*
- - - - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, *O21.1*
- - - ¬ Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, *O21.0*
- Fin de la 20ème semaine de gestation ¬ Vomissements importants *O21.2*

Commettre des vols [kleptomanie] ¬ Tendance pathologique à *F63.2*

Commis en bande ¬ Délits *F91.2*

Commissurale ¬ Chéilite: *K13.0*

Commissure des lèvres ¬ Tumeur maligne: *C00.6*

Commotion
- Cérébrale ¬ *S06.0*
- ¬ *S06.0*

Commun
- Artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc *I25.14*
- III) ¬ Paralysie du nerf moteur oculaire *H49.0*
- Variable
- - Anomalie prédominant
- - - Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire *D83.1*
- - - Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire *D83.0*
- - Autoanticorps anti-lymphocytes B ou T ¬ Déficit immunitaire *D83.2*
- - Sans précision ¬ Déficit immunitaire *D83.9*
- - ¬
- - - Agammaglobulinémie: *D80.1*
- - - Déficit immunitaire
- - - - *D83*
- - - - *D83.8*
- - - - *D83.9*

Commun *–suite*
- ¬
- - Canal
- - - Auriculo-ventriculaire *Q21.2*
- - - Hépatique *C24.0*
- - Lésion traumatique
- - - Carotide: A. carotide *S15.01*
- - - Nerf moteur oculaire *S04.1*
- - Migraine sans aura [migraine *G43.0*
- - Tronc artériel *Q20.0*
- - Ventricule: *Q20.4*

Communicant
- Antérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.2*
- Congénitale ¬ Hydrocèle vaginale *P83.5*
- Fracture luxation
- - Plaie intraabdominale ¬ Plaie ouverte *S31*
- - ¬ Plaie ouverte
- - - *S11*
- - - *S41*
- - - *S91*
- Postérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.3*
- SAI ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère: *I60.7*
- ¬ Hydrocéphalie
- - *G91.0*
- - Congénitale *Q03.8*
- - Obstructive (non *G91.1*

Communication
- Aorto-pulmonaire ¬ *Q21.4*
- Artérioveineuse rétinienne congénitale ¬ *Q14.8*
- Atrioventriculaire ¬ *Q21.2*
- Auriculo-ventriculaire
- - Discordante ¬ *Q20.5*
- - ¬
- - - *Q21.2*
- - - CAV [*Q21.2*
- Cardiaque) SAI ¬ *Q21.9*
- Interatriale
- - CIA] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): *I51.0*
- - Séquence de Robin et persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec *Q87.8*
- - ¬ *Q21.1*
- Interauriculaire
- - Auricules ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): *I51.0*
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.1*
- - Dysmorphie ¬ Syndrome de Lymphœdème- *Q87.8*
- - Trouble de la conduction atrioventriculaire ¬ Syndrome de *Q21.1*
- - ¬ *Q21.1*
- Interventriculaire

Communication *–suite*
- Interventriculaire *–suite*
- - CIV] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): *I51.0*
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.2*
- - Sous-aortique
- - - Sous-aortique sous-pulmonaire sténose pulmonaire ¬
- - - - VDDI avec *Q20.1*
- - - - Ventricule droit à double issue avec *Q20.1*
- - - ¬ Ventricule droit double issue
- - - - *Q20.1*
- - - - Double outlet right ventricle] avec *Q20.1*
- - Sous-pulmonaire
- - - Non-committed ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec CIV [*Q20.1*
- - - ¬ Ventricule droit à double issue avec *Q20.1*
- - Sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ *Q21.3*
- - ¬ *Q21.0*
- Ventriculo-auriculaire discordante ¬ *Q20.3*
- ¬ Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (*T85.0*

Communiquant avec une lésion intrathoracique ¬ Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) *S21.83!*

Compaction
v. Non-compaction

Comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique ¬ Examen de *Z00.6*

Compartiment
- Abdominal ¬ syndrome
- - *R19.80*
- Non traumatique ¬ Syndrome de *M62.2*

Compensateur ¬ Emphysème *J98.3*

Compensation ¬ Névrose de *F68.0*

Complément ¬ Déficit
- *D84.1*
- Facteur C3 du *D84.1*

Complet
v. Type de maladie

Complexe
- Bassin ¬ Autres fractures *S32.7*
- Démence de Guam-Parkinson ¬ *G21.8†, F02.8**
- Doigts avec synostose ¬ Syndactylie *Q70.0*
- Évoluant vers des crises secondairement généralisées ¬ Crises: partielles *G40.2*
- Fibrocartilagineux triangulaire
- - TFCC] ¬ *S63.3*
- - ¬ Rupture traumatique
- - - *S63.3*
- - - TFCC [*S63.3*
- Focales ¬ Épilepsie bénigne du nourrisson à crises *G40.08*

Complexe *–suite*

- I chaîne respiratoire mitochondrial ¬
- - Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en *I42.2*
- - Déficit isolé en *G31.81*
- IV de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ Déficit isolé en *G31.81*
- Majeur histocompatibilité classe
- - I ¬ Déficit en *D81.6*
- - II ¬ Déficit en *D81.7*
- Membre
- - Inférieur type
- - - I ¬ Syndrome douloureux régional *G90.51*
- - - II ¬ Syndrome douloureux régional *G90.61*
- - Supérieur type
- - - I ¬ Syndrome douloureux régional *G90.50*
- - - II ¬ Syndrome douloureux régional *G90.60*
- Orteils avec synostose ¬ Syndactylie *Q70.2*
- Primaire tuberculeux ¬ *A16.7*
- Pyruvate déshydrogénase ¬ Déficit en phosphatase du *E74.4*
- Récepteur de la membrane cellulaire [CR3] ¬ Déficit en *D71*
- Relatif au SIDA [ARC] SAI ¬ *B24*
- Sarcosine déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.5*
- SIDA-démence ¬ *B22†, F02.4**
- Syndrome de Costen ¬ *K07.6*
- Type
- - 1 ¬ Syndrome douloureux régional *G90.59*
- - I ¬ Syndrome douloureux régional *G90.5*
- - II
- - - Extrémité
- - - - Inférieure ¬ Syndrome douloureux régional *G90.61*
- - - - Supérieure ¬ Syndrome douloureux régional *G90.60*
- - - ¬ Syndrome douloureux régional *G90.6*
- V de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ Déficit isolé en *G31.81*
- Vertébrale) ¬ Subluxation *M99.1*
- ¬
- - Délétions avec autres réarrangements *Q93.7*
- - Duplications avec autres réarrangements *Q92.5*
- - Dystocie due à une présentation *O64.5*
- - Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles *G40.2*
- - État de mal épileptique partiel *G41.2*
- - Périodontite: *K05.3*
- - Soins maternels pour présentation *O32.6*

Compliance, fixée organiquement ¬ Vessie à faible *N31.80*

Complication

- Accouchement

Complication *–suite*

- Accouchement *–suite*
- - Anomalie d'implantation du placenta ¬ *O44.00*
- - Sans saignement ¬ Adhérence du placenta en tant que *O43.20, O73.0*
- - ¬
- - - Amputation du col utérin en tant que *O65.5*
- - - Atrésie du col utérin en tant que *O65.5*
- - - Cicatrice au col utérin en tant que *O65.5*
- - - Contraction hypotonique de l'utérus en tant que *O62.2*
- - - Décès dû à l'anesthésie en tant que *O74.9*
- - - Hypotonie de l'utérus en tant que *O62.2*
- - - Lacération vaginale en tant que *O70.0*
- Acte
- - Chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Autres *O75.4*
- - Visée diagnostique thérapeutique non classé ¬
- - - *T81*
- - - *T81.8*
- Anesthésie cours
- - Grossesse
- - - Sans précision ¬ *O29.9*
- - - ¬
- - - - *O29*
- - - - *O29.8*
- - Puerpéralité
- - - Sans précision ¬ *O89.9*
- - - ¬ Autres *O89.8*
- - Travail accouchement
- - - Sans précision ¬ *O74.9*
- - - ¬ Autres *O74.8*
- Blessure ¬ Paralysie ischémique de Volkmann en tant que *T79.60*
- Cardiaque anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.1*
- - Puerpéralité ¬ *O89.1*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.2*
- Cardiopathies et maladies cardiaques mal définies ¬ *I51*
- Cérébral ¬
- - Malaria tropica avec *B50.0†, G94.8**
- - Paludisme Plasmodium falciparum
- - - *B50.0*
- - - *B50.0†, G94.8**
- Concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P02*
- Consécutif
- - Actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs ¬ *P96.5*
- - Anesthésie ¬ Autres *T88.5*
- - Avortement grossesse extra-utérin molaire
- - - Sans précision ¬ *O08.9*

Complication *–suite*

- Consécutif *–suite*
- - Avortement grossesse extra-utérin molaire *–suite*
- - - ¬
- - - - *O08*
- - - - *O08.8*
- - Injection thérapeutique perfusion transfusion
- - - Sans précision ¬ *T80.9*
- - - ¬
- - - - *T80*
- - - - *T80.8*
- - Vaccination, non classées ailleurs ¬ Autres *T88.1*
- Cours d'actes médicaux et chirurgicaux ¬ Accidents et *Y69!*
- Fécondation artificiel
- - Sans précision ¬ *N98.9*
- - ¬
- - - *N98*
- - - *N98.8*
- Grossesse
- - Accouchement puerpéralité ¬
- - - Antécédents personnels de *Z87.5*
- - - Séquelles de *O94*
- - Mère
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.9*
- - - ¬ Fœtus nouveau-né affecté
- - - - *P01*
- - - - *P01.8*
- Impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse ¬ *O29.2*
- Insémination artificiel
- - Conjoint [IAC] ¬ *N98.8*
- - Donneur [IAD] ¬ *N98.8*
- Intéressant système nerveux central anesthésie cours
- - Puerpéralité ¬ *O89.2*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.3*
- Intestinal ¬
- - Ascaridiase avec *B77.0†, K93.8**
- - Rougeole avec *B05.4†, K93.8**
- Maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la grossesse ¬ *O29*
- Mécanique
- - Anastomose vasculaire ¬ *T82.3*
- - Appareil
- - - Cardiaque électronique ¬ *T82.1*
- - - Fixation interne os
- - - - Colonne vertébrale ¬ *T84.20*
- - - - Membre
- - - - - Avant-bras ¬ *T84.12*
- - - - - Bras ¬ *T84.11*

Complication *–suite*
- Mécanique *–suite*
- - Appareil *–suite*
- - - Fixation interne os *–suite*
- - - - Membre *–suite*
- - - - - Cheville et pied ¬ *T84.16*
- - - - - Jambe ¬ *T84.15*
- - - - - Main ¬ *T84.13*
- - - - - Os d'un membre: autres os précisés d'un membre ¬ *T84.18*
- - - - - Région pelvienne et cuisse ¬ *T84.14*
- - - - - Région scapulaire ¬ *T84.10*
- - - - - ¬ *T84.1*
- - - - Os: autres os précisés ¬ *T84.28*
- - - - ¬ *T84.2*
- - - Implant greffe
- - - - Orthopédiques internes ¬ *T84.4*
- - - - Os ¬ *T84.3*
- - Cathéter vasculaire de dialyse ¬ *T82.4*
- - Dispositif
- - - Gastro-intestinal à ballonnet ¬ *T85.59*
- - - Intra-utérin contraceptif ¬ *T83.3*
- - - Œsophagien anti-reflux ¬ *T85.50*
- - Endoprothèse articulaire
- - - Articulation
- - - - Cheville ¬ *T84.06*
- - - - Coude ¬ *T84.01*
- - - - Épaule ¬ *T84.00*
- - - - Genou ¬ *T84.05*
- - - - Hanche ¬ *T84.04*
- - - - Poignet ¬ *T84.03*
- - - - Précisées ¬ *T84.08*
- - - Disque intervertébral ¬ *T84.07*
- - - Mâchoire ¬ *T84.08*
- - - Tête radiale ¬ *T84.02*
- - Greffe
- - - Organe urinaire ¬ *T83.2*
- - - Vasculaires ¬ *T82.3*
- - Implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux ¬ *T85.1*
- - Lentille intra-oculaire ¬ *T85.2*
- - Pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque ¬ *T82.2*
- - Prothèse
- - - Articulaire interne ¬ *T84.0*
- - - Implant
- - - - Cardiaques et vasculaires ¬ *T82.5*
- - - - Greffe
- - - - - Appareil génital ¬ *T83.4*
- - - - - Gastro-intestinaux ¬ *T85.5*
- - - - - Oculaires ¬ *T85.3*
- - - - - Œsophage ¬ *T85.50*
- - - - - Pancréas ¬ *T85.54*
- - - - - Parties du tractus gastro-intestinal supérieur ¬ *T85.51*

Complication *–suite*
- Mécanique *–suite*
- - Prothèse *–suite*
- - - Implant *–suite*
- - - - Greffe *–suite*
- - - - - Tractus gastro-intestinal inférieur ¬ *T85.52*
- - - - - Voies biliaires ¬ *T85.53*
- - - - Mammaires ¬ *T85.4*
- - - - Urinaires ¬ *T83.1*
- - - Valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- - Shunt ventriculaire intracrânien (communication) ¬ *T85.0*
- - Sonde
- - - Gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG] ¬ *T85.51*
- - - Jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ] ¬ *T85.52*
- - - Urinaire (à demeure) ¬ *T83.0*
- Médicaments ou à des drogues ¬ *Y57.9!*
- Membres recousus ¬ *T87.2*
- Mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité ¬ *O89*
- Neurologique ¬
- - Diabète sucré
- - - *E14.40*
- - - Insulino-dépendant de type 2 avec *E11.40†, G63.2**
- - - Non insulino-dépendant
- - - - Primaire avec *E11.40†, G63.2**
- - - - Type 2 avec *E11.40†, G63.2**
- - - Type
- - - - 1 avec *E10.40†, G63.2**
- - - - 2 avec *E11.40†, G63.2**
- - Diphtérie avec *A36.8†, G99.8**
- - Rubéole
- - - *B06.0†, G99.8**
- Niveau organe ¬ Entérocolite Clostridium difficile sans mégacôlon
- - *A04.71*
- - Sans mégacôlon, sans autres *A04.70*
- Non précis
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.9*
- - Niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- - ¬ échec tentative avortement
- - - Médical, avec *O07.3*
- - - Sans précision, avec *O07.8*
- Oculaire
- - Diabétique
- - - Diabète type
- - - - 1 ¬ Saignement ponctuel comme *E10.30†, H58.8**
- - - - 2 ¬ Saignement ponctuel comme *E11.30†, H58.8**
- - - ¬ Saignement ponctuel comme *E14.30†, H58.8**

Complication *–suite*
- Oculaire *–suite*
- - ¬ Diabète sucré
- - - Insulino-dépendant de type 2 avec *E11.30†, H58.8**
- - - Non insulino-dépendant
- - - - Primaire avec *E11.30†, H58.8**
- - - - Type 2 avec *E11.30†, H58.8**
- Organique ¬
- - Entérocolite Clostridium difficile mégacôlon
- - - *A04.73*
- - - Sans autres *A04.72*
- - Syndrome réponse inflammatoire systémique SIRS origine
- - - Infectieux
- - - - *R65.1!*
- - - - Sans *R65.0!*
- - - Non infectieux
- - - - *R65.3!*
- - - - Sans *R65.2!*
- Pendant les contractions ¬ Anomalie du cordon ombilical, avec *O69.9*
- Plaie ouverte
- - Corps étranger (avec ou sans infection) ¬ *T89.01*
- - Infection ¬ *T89.02*
- - Sans précision ¬ *T89.00*
- - ¬ *T89.03*
- Précis
- - Soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs ¬ Autres *T88.8*
- - Traumatisme ¬ Autres *T89*
- - Travail accouchement ¬
- - - *O75.8*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P03.8*
- Précoce traumatisme
- - Non classées ailleurs ¬ Certaines *T79*
- - Sans précision ¬ *T79.9*
- - ¬
- - - *T79.8*
- - - Séquelles de certaines *T98.2*
- Propres à une réimplantation et une amputation ¬ *T87*
- Prothèse implant
- - Greffe
- - - Appareil génito-urinaire
- - - - Sans précision ¬ *T83.9*
- - - - ¬ Autres *T83.8*
- - - Cardiaque vasculaire
- - - - Sans précision ¬ *T82.9*
- - - - ¬ Autres *T82.8*
- - - Génito-urinaires ¬ *T83*
- - - Interne
- - - - Non classées ailleurs ¬ Autres *T85.88*
- - - - SAI ¬ *T85.9*

Complication *–suite*
- Prothèse implant *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Interne *–suite*
- - - - Sans précision ¬ *T85.9*
- - - - Système nerveux ¬ Autres *T85.81*
- - - - ¬ *T85*
- - - Orthopédique interne
- - - - Sans précision ¬ *T84.9*
- - - - ¬ Autres *T84.8*
- - Mammaire ¬ Autres *T85.83*
- Puerpéral
- - Non classé ¬
- - - *O90*
- - - *O90.8*
- - Sans précision ¬ *O90.9*
- Pulmonaire anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Autres *O74.1*
- Rachianesthésie anesthésie épidural cours
- - Grossesse ¬ Autres *O29.5*
- - Puerpéralité ¬ Autres *O89.5*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Autres *O74.6*
- Récent infarctus aigu myocarde ¬
- - *I23.8*
- - Certaines *I23*
- - Communication
- - - Interauriculaire comme *I23.1*
- - - Interventriculaire comme *I23.2*
- - Hémopéricarde comme *I23.0*
- - Rupture
- - - Cordages tendineux comme *I23.4*
- - - Muscle papillaire comme *I23.5*
- - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme *I23.3*
- - Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme *I23.6*
- Réimplantation partie
- - Corps ¬ *T87.2*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *T87.1*
- - - Supérieur ¬ *T87.0*
- Rénal ¬ Diabète sucré
- - *E14.30*
- - Insulino-dépendant de type 2 avec *E11.20†, N08.3**
- - Non insulino-dépendant de type 2 avec *E11.20†, N08.3**
- - Type
- - - 1 avec *E10.20†, N08.3**
- - - 2 avec *E11.20†, N08.3**
- Soin chirurgical médicaux
- - Non classé ¬

Complication *–suite*
- Soin chirurgical médicaux *–suite*
- - Non classé ¬ *–suite*
- - - *T88*
- - - Séquelles de *T98.3*
- - Sans précision ¬ *T88.9*
- Spécifique grossesse multiple ¬
- - *O31*
- - *O31.8*
- Tentative implantation
- - Embryon en cas de transfert d'embryon ¬ *N98.3*
- - Œuf fécondé après fécondation in vitro ¬ *N98.2*
- Traitement par inhalation ¬ *T81.8*
- Travail accouchement
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *O75*
- - Sans précision ¬
- - - *O75.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P03.9*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P03*
- Ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de *Y84.9!*
- Vaccins ou à des substances biologiques actives ¬ *Y59.9!*
- Vasculaire
- - Consécutif
- - - Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ¬ *T81.7*
- - - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ *T80.1*
- - Périphérique ¬ Diabète sucré
- - - Insulino-dépendant
- - - - Primaire avec *E10.50†, I79.2**
- - - - Type 1 avec *E10.50†, I79.2**
- - - Type 1 avec *E10.50†, I79.2**
- - Suite d'actes médicaux ¬ *I97.9*
- Veineux
- - Consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Autres *O08.7*
- - Cours puerpéralité
- - - Sans précision ¬ *O87.9*
- - - ¬ Autres *O87.8*
- - Grossesse
- - - Sans précision ¬ *O22.9*
- - - ¬ Autres *O22.8*
- - Hémorroïdes cours
- - - Grossesse ¬ *O22*
- - - Puerpéralité ¬ *O87*
- ¬
- - Ascaridiase avec autres *B77.8*
- - Échec tentative avortement

Complication *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Échec tentative avortement *–suite*
- - - Médical, sans *O07.4*
- - - Sans précision, sans *O07.9*
- - Hémorroïdes sans *K64.0*
- - Oreillons
- - - *B26.8*
- - - Sans *B26.9*
- - Paludisme Plasmodium
- - - Malariae
- - - - *B52.8*
- - - - Sans *B52.9*
- - - Vivax
- - - - *B51.8*
- - - - Sans *B51.9*
- - Rougeole
- - - *B05.8*
- - - Sans *B05.9*
- - Rubéole
- - - *B06.8*
- - - Sans *B06.9*
- - Soins et mise en observation, cas sans *Z39.0*
- - Varicelle
- - - *B01.8*
- - - Sans *B01.9*
- - Zona
- - - *B02.8*
- - - Sans *B02.9*

Compliquant
- Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ Hémorragie et hématome *T81.0*
- Grossesse
- - Accouchement puerpéralité
- - - Sans précision ¬
- - - - Hypertension préexistante *O10.9*
- - - - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère *O98.9*
- - - ¬
- - - - Anémie *O99.0*
- - - - Cardionéphropathie hypertensive préexistante *O10.3*
- - - - Cardiopathie hypertensive préexistante *O10.1*
- - - - Gonococcie *O98.2*
- - - - Hépatite virale *O98.4*
- - - - Hypertension
- - - - - Essentielle préexistante *O10.0*
- - - - - Préexistante *O10*
- - - - - Secondaire préexistante *O10.4*
- - - - Maladie
- - - - - Affections précisées *O99.8*
- - - - - Appareil circulatoire *O99.4*
- - - - - Appareil digestif *O99.6*

Compliquant *–suite*
- Grossesse *–suite*
- - Accouchement puerpéralité *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Maladie *–suite*
- - - - - Appareil respiratoire *O99.5*
- - - - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, *O98.3*
- - - - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques *O99.2*
- - - - - Infectieuses et parasitaires de la mère *O98.8*
- - - - - Infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais *O98*
- - - - - Mère classées ailleurs, mais *O99*
- - - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané *O99.7*
- - - - - Protozoaires *O98.6*
- - - - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire *O99.1*
- - - - - Virales *O98.5*
- - - - - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et *O98.7*
- - - - Néphropathie hypertensive préexistante *O10.2*
- - - - Syphilis *O98.1*
- - - - Troubles mentaux et maladies du système nerveux *O99.3*
- - - - Tuberculose *O98.0*
- - Aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux ¬ les états mentionnés *O98*
- - ¬ vomissements
- - - *O21.8*
- - - Maladies classées ailleurs, *O21.8*

Compliqué
- Anomalie
- - Cordon ombilical
- - - Sans précision ¬ Travail et accouchement *O69.9*
- - - ¬ Travail accouchement
- - - - *O69*
- - - - *O69.8*
- - Insertion placentaire ¬ Grossesse *O44.00*
- - Rythme cardiaque fœtus
- - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement *O68.2*
- - - ¬ Travail et accouchement *O68.0*
- Brièveté du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.3*
- Circulaire du cordon, avec compression ¬ Travail et accouchement *O69.1*
- Détresse fœtal
- - Sans précision ¬ Travail et accouchement *O68.9*
- - ¬ Travail et accouchement *O68*
- Embolie ¬ échec tentative avortement
- - Médical, *O07.2*

Compliqué *–suite*
- Embolie ¬ échec tentative avortement *–suite*
- - Sans précision, *O07.7*
- Forme d'enchevêtrement du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.2*
- Hémorragie
- - Non classée ailleurs ¬ Travail et accouchement *O67*
- - Retardé sévère ¬ échec tentative avortement
- - - Médical, *O07.1*
- - - Sans précision, *O07.6*
- Infection appareil génital organe pelvien ¬ échec tentative avortement
- - Médical, *O07.0*
- - Sans précision, *O07.5*
- Insertion vélamenteuse du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.4*
- Lésions vasculaires du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.5*
- Paludisme à Plasmodium falciparum ¬ Autres formes sévères et *B50.8*
- Plasmodium falciparum SAI ¬ Paludisme sévère ou *B50.8*
- Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement *O68.1*
- Prolapsus du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.0*
- Signe
- - Biochimiques de détresse fœtale ¬ Travail et accouchement *O68.3*
- - Détresse fœtale ¬ Travail et accouchement *O68.8*
- ¬
- - Cataracte *H26.2*
- - Migraine *G43.3*

Comportant
- Modification de conscience ¬ Crises: ne *G40.1*
- Souvent des automatismes ¬ Crises: avec modification de conscience, *G40.2*

Comportement
- A une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision ¬ Trouble organique de la personnalité et du *F07.9*
- Adulte
- - Sans précision ¬ Trouble de la personnalité et du *F69*
- - ¬ trouble
- - - Personnalité et du *F68*
- - - Précisés de la personnalité et du *F68.8*
- Affection lésion dysfonctionnement cérébral ¬ trouble
- - Organiques de la personnalité et du *F07.8*
- - Personnalité et du *F07*
- Agressif ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypotonie-dysmorphie faciale- *Q87.8*

Comportement *–suite*
- Asocial sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- Associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Autres troubles mentaux et du *F53.8*
- Autodestructeur
- - Selon l'anamnèse familiale ¬ *Z81*
- - ¬ *Z72.8*
- Compulsif
- - Rituels obsessionnels] au premier plan ¬ Avec *F42.1*
- - ¬ Forme mixte, avec idées obsédantes et *F42.2*
- Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-petite taille-troubles du *Q87.8*
- Enfant SAI ¬ Trouble (des) (du): *F91.9*
- Étrange et inexplicable ¬ *R46.2*
- Légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles mentaux et du *F53.0*
- Lié utilisation
- - Alcool ¬ Troubles mentaux et du *F10*
- - Cocaïne ¬ Troubles mentaux et du *F14*
- - Dérivés du cannabis ¬ Troubles mentaux et du *F12*
- - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du *F19*
- - Hallucinogènes ¬ Troubles mentaux et du *F16*
- - Opiacés ¬ Troubles mentaux et du *F11*
- - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles mentaux et du *F13*
- - Solvants volatils ¬ Troubles mentaux et du *F18*
- - Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du *F15*
- - Tabac ¬ Troubles mentaux et du *F17*
- Orientation
- - Matière de sexualité ¬ Conseils relatifs aux attitudes, *Z70*
- - Tiers en matière de sexualité ¬ Conseil relatif au *Z70*
- Provoqués par ces substances ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.3!*
- Répétitifs ¬ Stéréotypies/ *F98.4*
- Sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles mentaux et du *F53.1*
- Sexuel à risques ¬ *Z72.8*
- Trouble émotionnel apparaissant habituellement enfance adolescence
- - Sans précision ¬ Trouble du *F98.9*
- - ¬ trouble
- - - *F98*
- - - Précisés du *F98.88*
- ¬
- - Antécédent

Comportement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Antécédent *–suite*
- - - Familiaux de troubles mentaux et du *Z81*
- - - Personnels d'autres troubles mentaux et du *Z86.5*
- - Maladies psychiques et troubles du *Z13.8*
- - Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du *Z03.2*
- - Refus de manger en tant qu'anomalie du *F50.8*
- - Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au *R46.8*

Comportemental
- Associé
- - Développement sexuel et à son orientation ¬ Problèmes psychologiques et *F66*
- - Maladies ou des troubles classés ailleurs ¬ Facteurs psychologiques et *F54*
- Non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques ¬ Syndromes *F59*
- Psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions *Z64.8*
- ¬ Démence fronto-temporale, variante *G31.0†, F02.0**

Composants du sang ¬ Donneur d'autres *Z52.08*

Compressif du nerf fémoral ¬ Syndrome *G57.2*

Compression
- Anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Collapsus pulmonaire par *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Collapsus pulmonaire par *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Collapsus pulmonaire par *O74.1*
- Artère
- - Cœliaque ¬ Syndrome de *I77.4*
- - Spinal
- - - Antérieure ¬ Syndrome de *M47.09†, G99.2**
- - - ¬ Syndrome de *M47.09†, G99.2**
- - Vertébrale ¬ Syndrome de *M47.09†, G99.2**
- - ¬ *I77.1*
- Cerveau
- - Contusion localisée ¬ *S06.31*
- - Hémorragie et pression cérébrale lors d'une lésion crânio-cérébrale couverte grave ¬ *S06.21, S01.83!*
- - Tronc cérébral) ¬ *G93.5*
- - ¬ *G93.5*
- Chiasmatique par anévrysme ¬ *I67.10†, H48.8**
- Cordon
- - Ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de *P02.5*
- - SAI ¬ *O69.2*
- Latérale ¬ Fracture de *S32.7*

Compression *–suite*
- Médullaire, sans précision ¬ *G95.2*
- Moelle épinière due à une hernie discale cervicale ¬ *M50.0†, G99.2**
- Nerf
- - Optique ¬ *H47.0*
- - Périphérique ¬ *G58.9*
- Œsophage ¬ *K22.2*
- Racine
- - Nerveux
- - - Cours
- - - - Spondylarthrose ¬ *M47.29†, G55.2**
- - - - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G55.0**
- - - Lors atteinte disque intervertébral
- - - - Cervicaux avec myélopathie ¬ *M50.0†, G99.2**
- - - - Myélopathie ¬ *M51.0†, G99.2**
- - - - ¬ *M51.1†, G55.1**
- - - ¬ Atteinte des disques intervertébraux cervicaux avec *M50.1†, G55.1**
- - Plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *G55.8**
- Spondylogène de la moelle épinière ¬ *M47.19†, G99.2**
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.1*
- Veineuse ¬ *I87.1*
- ¬
- - Anomalie morphologique faciale par *Q67.1*
- - Enchevêtrement du cordon, sans *O69.8*
- - Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec *O69.1*

Compressus ¬ Fœtus *O31.0*

Comprimé
- SAI ¬ Somnifères: *T42.7*
- ¬ Maladie de l'air *T70.3*

Compte d'un tiers ¬ Conseil et surveillance pour: Personne consultant pour le *Z71*

Compton-North ¬ Myopathie létale congénitale type *G71.2*

Compulsif
- Rituels obsessionnels] au premier plan ¬ Avec comportements *F42.1*
- Sans précision ¬ Trouble obsessionnel- *F42.9*
- ¬
- - Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements *F42.2*
- - Jeu *F63.0*
- - Névrose: obsessionnelle- *F42*
- - Trouble
- - - Obsessionnel
- - - - *F42*
- - - - *F42.8*
- - - Personnalité: *F60.5*

Concentration
- Réduite de peptides C ¬ *R79.8*
- ¬ Modification de la personnalité après: expériences de camp de *F62.0*

Concentrique
- Baló] ¬ Sclérose *G37.5*
- Bénigne ¬ Dystrophie maculaire annulaire *H35.5*
- ¬ Démyélinisation *G37.5*

Conception
- Accouchement, sans hémorragie ¬ Rétention de produits de la *O73.1*
- Précisés ¬ Autres produits anormaux de la *O02.8*
- SAI, après l'accouchement ¬ Rétention de produits de la *O72.2*
- Sans précision ¬ Produit anormal de la *O02.9*
- ¬ Autres produits anormaux de la *O02*

Concomitant
- SAI ¬ Strabisme *H50.4*
- ¬ Strabisme
- - Convergent *H50.0*
- - Divergent *H50.1*

Concrescence dentaire ¬ *K00.2*

Concretio cordis ¬ *I31.1*

Concrétions appendiculaires ¬ *K38.1*

Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal ¬ *Z65*

Condensante
- Médiane de la clavicule ¬ Ostéite *M85.31*
- ¬ Ostéïte *M85.3*

Conditionnement et d'humidification de l'air ¬ Maladie pulmonaire due aux systèmes de *J67.7*

Conditions
- Économiques ¬ Difficultés liées au logement et aux *Z59*
- Météorologiques) ¬ Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les *W94.9!*
- Travail difficiles ¬ *Z56*

Conduction
- Atrioventriculaire ¬ Syndrome de communication interauriculaire-trouble de la *Q21.1*
- Auriculo-ventriculaire
- - Accélérée ¬ *I45.6*
- - Accessoire ¬ *I45.6*
- - Pré-excitée ¬ *I45.6*
- Cardiaque
- - Infra-Hisienne familiales ¬ Tachyarythmie atriale et trouble de *I45.8*
- - ¬ trouble
- - - *I45*
- - - Atrial de la *I45.9*
- - - Familial progressif de la *I45.8*
- Osseux ¬
- - Appareil acoustique de *Z96.2*
- - Prothèse (de): *Z45.3*
- SAI ¬ Perte de l'audition par *H90.2*
- Sans précision ¬ Trouble de la *I45.9*
- ¬ Autres troubles précisés de la *I45.8*

Conduire ¬ inscription dans: obtention du permis de *Z02*

Conduisant à l'invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques *Z82*

Conduit

- Auditif
- - Externe ¬
- - - Abcès pavillon de l'oreille ou *H60.0*
- - - Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du *Q16.1*
- - - Anthrax pavillon de l'oreille ou *H60.0*
- - - Carcinoma in situ: Peau de l'oreille et du *D04.2*
- - - Cellulite phlegmoneuse du: *H60.1*
- - - Exostose du *H61.8*
- - - Furoncle pavillon de l'oreille ou *H60.0*
- - - Mélanome
- - - - In situ de l'oreille et du *D03.2*
- - - - Malin de l'oreille et du *C43.2*
- - - Nævus à mélanocytes de l'oreille et du *D22.2*
- - - Rétrécissement du *H61.3*
- - - Sténose acquise du *H61.3*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Peau de l'oreille et du *D23.2*
- - - - Maligne: Peau de l'oreille et du *C44.2*
- - ¬ Anomalie congénitale du *Q16.1*
- ¬ Kératose obturante de l'oreille externe (*H60.4*

Conduite

- Dépression ¬ Troubles des *F92.0*
- Échec ¬ Trouble de la personnalité: à *F60.7*
- Enfant SAI ¬ Trouble (des) (du): *F91.9*
- F91 associé trouble
- - Dépressif en F32.- ¬ Trouble des *F92.0*
- - Émotionnel en F93.- ¬ Troubles des *F92.8*
- - Névrotique en F40-F48 ¬ Troubles des *F92.8*
- Limité au milieu familial ¬ Trouble des *F91.0*
- Sans précision ¬ Trouble des *F91.9*
- Trouble émotionnel
- - Sans précision ¬ Trouble mixte des *F92.9*
- - ¬ Autres troubles mixtes des *F92.8*
- Type
- - Groupe" ¬ Troubles des *F91.2*
- - Mal socialisé ¬ Trouble des *F91.1*
- - Socialisé ¬ Trouble des *F91.2*
- - Solitaire-agressif ¬ Trouble (des): *F91.1*
- ¬ Trouble
- - *F91.8*
- - Hyperkinétique
- - - Associé à un trouble des *F90.1*
- - - Trouble des *F90.1*

Condyle

- Huméral

Condyle *–suite*

- Huméral *–suite*
- - Panner] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.0*
- - ¬ Nécrose aseptique des *M92.0*
- Humérus ¬ Fracture du *S42.44*
- Latéral
- - Médial du tibia ¬ *S82.1*
- - Médian) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: *S72.41*

Condylien

- Mandibule ¬ Hyperplasie ou hypoplasie unilatérale du processus *K10.8*
- ¬ Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse *S02.61*

Condylome

- Ano-génitaux (vénériens) ¬ *A63.0*
- Plat ¬ *A51.3*

Cône

- Bâtonnets ¬
- - Dystrophie des *H35.5*
- - Syndrome de dysplasie spondylo-métaphysaire-dystrophie des *Q77.8*
- Bleus ¬ Monochromatisme à *H53.5*
- Réponse scotopique supranormale ¬ Dystrophie des *H35.5*
- ¬ Dystrophie progressive des *H35.5*

Confinement en fauteuil ¬ *R26.3*

Conflit de rôle social, non classé ailleurs ¬ *Z73*

Confluente et réticulée [Gougerot-Carteaud] ¬ Papillomatose *L83*

Confusion

- SAI ¬ *R41.0*
- ¬ Psychogène: *F44.88*

Confusionnel (non alcoolique) aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ état *F05*

Congé de ses proches ¬ Prise en charge d'une personne dépendante pendant un *Z75.8*

Congenita

- Récessive des membres ¬ Aplasia cutis *Q84.8*
- ¬
- - Aplasia cutis *Q84.8*
- - Arthromyodysplasia *Q74.3*
- - Cutis marmorata telangiectatica *Q27.8*
- - Syndrome
- - - Macrocéphalie-cutis marmorata telangiectatica *Q87.3*
- - - Mégalencéphalie-cutis marmorata telangiectatica *Q87.3*
- - - Miastenica *G70.2*

Congénital
v. Type de maladie

Congestion

- Conjonctive ¬ *H11.4*
- Faciale due à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.4*
- Hémorragie prostatiques ¬ *N42.1*

Congestion *–suite*

- Passive chronique du foie ¬ *K76.1*
- Pulmonaire (passive) ¬ *J81*
- ¬ Trachéo-bronchite par *J42*

Congestive

- Chronique ¬ Splénomégalie *D73.2*
- Rénale ¬ Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (*I13.2*
- ¬
- - Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (*I13.0*
- - Cardiopathie hypertensif
- - - Insuffisance cardiaque (*I11.0*
- - - Sans insuffisance cardiaque (*I11.9*
- - Myocardite *I42.0*

Conglobata ¬ Acné *L70.1*

Congo] ¬ Fièvre hémorragique de Crimée [du *A98.0*

Congruents humeur ¬ Manie symptôme psychotique

- *F30.2*
- Non *F30.2*

Conique ¬ Dent: *K00.2*

Conjoint

- IAC] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: *N98.8*
- Partenaire ¬ Difficultés dans les rapports avec le *Z63*

Conjonctif

- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte du tissu *M36.5**
- Cours
- - Hypogammaglobulinémie ¬
- - - Affection systémique du tissu *D80.9†, M36.8**
- - - Maladie systémique du tissu *D80.1†, M36.8**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Atteintes systémiques du tissu *M36.8**
- - Ochronose ¬ Affection systémique du tissu *E70.2†, M36.8**
- Discal ¬ Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu *M99.7*
- Orbite ¬ Tissu
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Oreille ¬ Tissu
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Paupière ¬ Tissu
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Sans précision ¬
- - Affection localisée du tissu *L94.9*
- - Atteinte systémique du tissu *M35.9*
- - Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *M95.9*

Conjonctif *–suite*

- Sein ¬ tissu
- - *C50*
- - *D48.6*
- Stade
- - 1 ¬ Maladie GVH chronique du tissu *T86.05†, M36.51**
- - 2 ¬ Maladie GVH chronique du tissu *T86.06†, M36.52**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique du tissu *T86.07†, M36.53**
- Syndrome de Sharp] ¬ Maladies associées du tissu *M35.1*
- Tissu mous
- - Abdomen ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.4*
- - - Maligne: Tissu *C49.4*
- - Bassin ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D21.5*
- - Cou ¬ Tumeur maligne secondaire du tissu *C79.85*
- - Membre
- - - Inférieur y compris hanche ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: Tissu *D21.2*
- - - - Maligne: Tissu *C49.2*
- - - Supérieur y compris épaule ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: Tissu *D21.1*
- - - - Maligne: Tissu *C49.1*
- - - ¬ Tumeur maligne secondaire du tissu *C79.86*
- - Pelvis ¬ Tumeur maligne: Tissu *C49.5*
- - Sans précision ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.9*
- - - Maligne: Tissu *C49.9*
- - Sièges précisés ¬ Tumeur maligne secondaire du tissu *C79.88*
- - Tête face cou ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.0*
- - - Maligne: Tissu *C49.0*
- - Thorax ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.3*
- - - Maligne: Tissu *C49.3*
- - Tronc sans précision ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.6*
- - - Maligne: Tissu *C49.6*
- - ¬ Tumeur
- - - Bénignes du tissu *D21*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Tissu *D48.1*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës du tissu *C49.8*
- - - - Tissu *C49*
- ¬
- - Affection localisé
- - - Précisées du tissu *L94.8*
- - - Tissu *L94*

Conjonctif *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *Z87.3*
- - Atteinte systémique
- - - Précisées du tissu *M35.8*
- - - Tissu *M35*
- - Déformation acquis
- - - Précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *M95.8*
- - - Système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *M95*
- - Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu *N08.5**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu *N16.4**
- - Métastase sur tissu *C79.88*
- - Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu *M35.9†, G63.5**
- - Rétrécissement du canal rachidien par tissu *M99.4*
- - Sein: tissu *D24*
- - Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu *J99.1**
- - Tuberculose systémique du tissu *A18.8†, M36.8**

Conjonctival
v.a. pharyngo-conjonctival

- Traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie sous- *P15.3*
- Virale ¬ Maladie *B30.9†, H13.1**
- ¬
- - Amylose
- - - *E85.4†, H13.8**
- - - Dépôt *E85.4†, H13.8**
- - Avitaminose A
- - - Taches de Bitot et xérosis *E50.1†, H13.8**
- - - Xérosis *E50.0†, H13.8**
- - Brûlure de la cornée et du sac *T26.1*
- - Céphalée névralgique unilatérale brève avec injection *G44.8*
- - Corps étranger dans le sac *T15.1*
- - Corrosion de la cornée et du sac *T26.6*
- - Hémorragie
- - - *H11.3*
- - - Sous- *H11.3*
- - Thrombose *H11.4*
- - Xanthome *E75.5†, H13.8**

Conjonctive

- Abrasion de la cornée sans mention de corps étranger ¬ Lésion traumatique de la *S05.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de la *H13.8**
- Sans précision ¬ Affection de la *H11.9*
- VIH ¬ Syndrome de microangiopathie de la *B23.8, M31.1*
- ¬
- - Acanthamœbiose de la *B60.1†, H13.1**

Conjonctive *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Affection
- - - *H11*
- - - Précisées de la *H11.8*
- - Anévrisme de la *H11.4*
- - Argyrose [argyrie] de la *H11.1*
- - Calcification de la *H11.1*
- - Chancre de la *A51.2†, H13.1**
- - Cicatrices de la *H11.2*
- - Congestion de la *H11.4*
- - Dépôts et affections dégénératives de la *H11.1*
- - Érythème multiforme de la *L51.1†, H13.8**
- - Infection varicelleuse de la cornée et de la *B01.8†, H19.2**
- - Lymphome primitif de la *C85.9*
- - Nævus à cellules ballonnisantes sur la *D31.0*
- - Œdème de la *H11.4*
- - Pigmentation de la *H11.1*
- - Troubles vasculaires et kystes de la *H11.4*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D31.0*
- - - Maligne: *C69.0*
- - Xérosis SAI de la *H11.1*

Conjonctivite
v.a. Blépharo-conjonctivite
v.a. Pharyngo-conjonctivite

- Abactérienne ¬ *H10.8*
- Acanthamoeba ¬ *B60.1†, H13.1**
- Adénovirus ¬ *B30.1†, H13.1**
- Aigu
- - Sans précision ¬ *H10.3*
- - ¬ Autres *H10.2*
- Apollo ¬ *B30.3†, H13.1**
- Atopique aiguë ¬ *H10.1*
- Bain ¬ *B30.1†, H13.1**
- Blennorragique néonatale ¬ *A54.3†, H13.1**
- Chlamydia ¬ *A74.0†, H13.1**
- Chronique ¬ *H10.4*
- Cours
- - Acné rosacée ¬ *L71.9†, H13.2**
- - Herpès zoster ¬ *B02.3†, H13.1**
- - Maladie
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H13.1**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, H13.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H13.2**
- Dacryocystite néonatales ¬ *P39.1*
- Diphtérique ¬ *A36.8†, H13.1**
- Entérovirus
- - 70 ¬ *B30.3†*
- - Type 70 ¬ *B30.3†, H13.1**
- Folliculaire
- - Aigu

Conjonctivite *–suite*
- Folliculaire *–suite*
- - Aigu *–suite*
- - - Adénovirus ¬
- - - - *B30.1†*
- - - - *B30.1†, H13.1**
- - - ¬ *H10.2†, H13.1**
- - Trachomateuse ¬ *A71.1*
- - ¬ *H10.4†, H13.1**
- Gonocoques ¬ *A54.3†, H13.1**
- Gonorrhéique
- - Nouveau-né ¬ *A54.3†, H13.1**
- - ¬ *A54.3†, H13.1**
- Granuleuse (trachomateuse) ¬ *A71.1*
- Hémorragique
- - Aigu
- - - Épidémique) ¬ *B30.3†*
- - - ¬ *B30.3†, H13.1**
- - Entérovirus type 70 ¬ *B30.3†, H13.1**
- - Épidémique ¬ *B30.3†, H13.1**
- - ¬ *B30.3†, H13.1**
- Inclusion ¬ *A74.0†, H13.1**
- Infectieuse, n.c.a. ¬ *H10.8*
- Ligneuse ¬ *H10.4*
- Méningocoques ¬ *A39.8†, H13.1**
- Mucopurulente ¬ *H10.0*
- Néonatale à Chlamydia ¬ *P39.1*
- Newcastle ¬ *B30.8†*
- Piscines ¬ *B30.1†*
- Pneumocoques ¬ *H10.8, B95.3!*
- Sans précision ¬ *H10.9*
- Sèche au sens du syndrome de Sjögren ¬ *M35.0†, H13.2**
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, H13.1**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H13.1**
- Tularémie ¬ *A21.1†, H13.1**
- Viral
- - Épidémique ¬ *B30.9†, H13.1**
- - Sans précision ¬ *B30.9*
- - ¬ *B30*
- Virus
- - Coxsackie
- - - 24 ¬ *B30.3†*
- - - A24 ¬ *B30.3†, H13.1**
- - Herpès ¬ *B00.5†, H13.1**
- - Maladie de Newcastle ¬ *B30.8†, H13.1**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H13.1**
- ¬
- - *H10*
- - *H10.8*
- - Kératite superficiel
- - - *H16.2*
- - - Sans *H16.1*

Conjugaison du regard ¬ Paralysie de la *H51.0*

Conjugale SAI ¬ Violence *T74.1*

Conjunctivae ¬ Pemphigus *L12.1†, H13.3**

Conn ¬ Syndrome de *E26.0*

Connaissance
- 30 minute
- - 24 heures lors d'un traumatisme crânio-cérébral ¬ Perte de *S06.9, S06.71!*
- - Lors d'un traumatisme crânio-cérébral ¬ Perte de *S06.9, S06.70!*
- Antérieur
- - Lors traumatisme crânio-cérébral ¬ Perte connaissance plus 24 heure
- - - Retour au stade de *S06.9, S06.72!*
- - - Sans retour au stade de *S06.9, S06.73!*
- - ¬ Perte connaissance coma lors traumatisme crânio-cérébral Plus 24 heure
- - - Retour au stade de *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de *S06.73!*
- Coma lors traumatisme crânio-cérébral
- - 30 minute
- - - 24 heures ¬ Perte de *S06.71!*
- - - ¬ Perte de *S06.70!*
- - Durée non précisée ¬ Perte de *S06.79!*
- - Plus 24 heure
- - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de *S06.73!*
- Lors traumatisme crânio-cérébral ¬ Perte
- - *S06.7!*
- - *S06.9, S06.79!*
- Plus 24 heure
- - Retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un traumatisme crânio-cérébral ¬ Perte de *S06.9, S06.72!*
- - Sans retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un traumatisme crânio-cérébral ¬ Perte de *S06.9, S06.73!*
- SAI ¬ Incapacité (de): concernant l'acquisition des *F81.9*
- ¬ Perte de *R55*

Connectivite
- Indifférenciée ¬ *M35.8*
- Mixte ¬ *M35.1*

Conodysplasie cranio-faciale ¬ *Q87.5*

Conorii ¬ Fièvre pourprée à Rickettsia *A77.1*

Conradi
v. Bowen-Conradi

Conradi-Hünermann-Happle ¬ Syndrome de *Q77.3*

Consanguinité ¬
- Antécédents familiaux de *Z84.3*
- Conseil: à propos de la *Z71*

Conscience
- Comportant souvent des automatismes ¬ Crises: avec modification de *G40.2*
- Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la *R41.8*
- SAI ¬ Perte de *R40.2*

Conscience *–suite*
- ¬
- - Crises: ne comportant pas de modification de *G40.1*
- - Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la *R41*

Conscription ¬ Examen avant *Z02*

Conseil
- Avis
- - Général
- - - Concernant la contraception ¬ *Z30.0*
- - - Matière de procréation ¬ *Z31.6*
- - Médicaux, non classés ailleurs ¬ Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres *Z71*
- Génétique ¬ *Z31.5*
- Médical, sans précisions ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- Propos
- - Consanguinité ¬ *Z71*
- - Tabagisme ¬ *Z71*
- - VIH [virus de l'immunodéficience humaine] ¬ *Z71*
- Relatif
- - Attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité ¬ *Z70*
- - Comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité ¬ *Z70*
- Surveillance
- - Abus de médicaments ou toxicomanie ¬ *Z71*
- - Alcoolisme ¬ *Z71*
- - Conseil
- - - Médical, sans précisions ¬ *Z71*
- - - Surveillance pour: Conseil et surveillance diététiques ¬ *Z71*
- - Consultation pour l'explication de résultats d'examen ¬ *Z71*
- - Diététiques ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- - Personne consultant pour le compte d'un tiers ¬ *Z71*
- - Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) ¬ *Z71*

Conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les *Z64.8*

Conséquence
- Bruit sur l'oreille interne ¬ *H83.3*
- Hémorragie sous-durale traumatique ¬ *T90.5*

Conservation du bois ¬ produits de *T60*

Consolidation d'une fracture ¬ Retard de *M84.2*

Consolidée
- Pseudarthrose] ¬ Fracture non *M84.1*
- ¬ Fracture mal *M84.0*

Consommation
- Alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues ¬ Difficultés liées à: la *Z72.0*

Consommation *–suite*
- Animaux venimeux ou de plantes vénéneuses ¬ *X49.9!*
- Héroïne voie
- - Intraveineuse ¬ *U69.30!*
- - Non intraveineuse ¬ *U69.31!*
- Non intraveineux
- - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ *U69.34!*
- - Stimulants hors caféine ¬ *U69.36!*
- Substance psycho actif
- - Troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.3!*
- - Voie intraveineuse ¬ *U69.32!*
- ¬ Coagulopathie de *D65.1*

Constatation
- Anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic ¬ *R03*
- Baisse non spécifique de la tension artérielle ¬ *R03.1*
- Élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension ¬ *R03.0*
- Rejet ¬ Détérioration fonctionnelle aiguë sans *T86.10*

Constipation
- Fonctionnelle ¬ Syndrome de *K59.01*
- Lors trouble
- - Défécation ¬ *K59.01*
- - Fonctionnel anorectal ¬ *K59.01*
- - Transit colique ¬ *K59.00*
- Origine médicamenteuse ¬ *K59.02*
- Prédominante [SII-C] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec *K58.2*
- Transit lent ¬ *K59.00*
- ¬ *K59.0*

Constituant un risque vital chez le nourrisson ¬ Événement aigu *R06.80*

Constitutionnel
- Proconvertine ¬ Déficit *D68.23*
- ¬
- - Anémies aplastiques *D61.0*
- - Haute stature *E34.4*
- - Insuffisance staturale: *E34.3*
- - Retard de développement *E30.0*
- - Thrombopathie *D68.00*

Constriction
- Anormale congénitale d'un ligament des méninges ¬ *Q07.8*
- Congénital(e) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- Duodénum ¬ *K31.5*
- Œsophage ¬ *K22.2*

Constrictive
- Chronique ¬ Péricardite *I31.1*
- SAI ¬ Myocardiopathie *I42.5*

Consultant pour le compte d'un tiers ¬ Conseil et surveillance pour: Personne *Z71*

Consultation
- Explication de résultats d'examen ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- Gênant le contact ¬ Prolixité et détails masquant les raisons de la *R46.7*

Contagieuse
- Ovine] ¬ Orf [dermatite pustuleuse *B08.0*
- ¬ Bacillose péritonéale par tuberculose bovine *A18.3†, K93.0**

Contagiosum
- Paupière ¬ Molluscum *B08.1†, H03.1**
- ¬ Molluscum *B08.1*

Contaminant des aliments ¬ Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines *T64*

Contaminées ¬ Substances *Y69!*

Contenant
- Amphétamine méthamphétamine ¬
- - Consommation non intraveineuse de produits *U69.34!*
- - Utilisation intraveineuse de produits *U69.33!*
- Seule et plusieurs substances ¬ Préparations *T38.4*

Contenu sécrétion gastrique s SAI anesthésie cours
- Grossesse ¬ Inhalation du *O29.0*
- Puerpéralité ¬ Inhalation du *O89.0*
- Travail et de l'accouchement ¬ Inhalation du *O74.0*

Contient des cellules de type alpha-bêta et gamma-delta ¬ *C86.1*

Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos ¬ *Q26.8*

Continuité osseux
- Sans précision ¬ Anomalie de la *M84.9*
- ¬ Autres anomalies de la *M84.8*

Contraceptif
- Intra-utérin
- - Stérilet] ¬ Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif *Z30.5*
- - ¬
- - - Mise en place d'un dispositif *Z30.1*
- - - Pessaire *Z97.8*
- - - Surveillance d'un dispositif *Z30.5*
- Oraux ¬ Intoxication: *T38.4*
- ¬
- - Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin *T83.3*
- - Première prescription de moyens *Z30.0*
- - Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres *Z30.4*
- - Surveillance de *Z30.4*

Contraception
- Contraceptifs ¬ Renouvellement d'une prescription de pilules *Z30.4*
- Sans précision ¬ Prise en charge d'une *Z30.9*
- ¬
- - Antécédents de *Z92.8*

Contraception *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Conseils et avis généraux concernant la *Z30.0*
- - Examen de routine pour entretien de la *Z30.4*
- - Prise charge
- - - *Z30*
- - - *Z30.8*

Contraction
- Hypotonique de l'utérus en tant que complication de l'accouchement ¬ *O62.2*
- Sablier de l'estomac ¬ *K31.8*
- Utérine et de la dilatation du col ¬ Anomalies de la *O62*
- ¬ Dystocie (de) (par): anneau de *O62.4*

Contractions
- Anormales de l'utérus ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P03.6*
- Initiales insuffisantes ¬ *O62.0*
- Non coordonnées de l'utérus ¬ *O62.4*
- Sablier de l'utérus ¬ *O62.4*
- SAI ¬ *R25.3*
- Tétaniques ¬ *O62.4*
- Utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées ¬ *O62.4*
- ¬
- - Anomalie du cordon ombilical, avec complication pendant les *O69.9*
- - Déchirure de l'utérus avant le début des *O71.0*
- - Faibles *O62.2*
- - Hyperactivité de l'utérus due à une stimulation excessive par des médicaments déclencheurs de *O62.8, Y57.9!*

Contracture
- Abdominal
- - Généralisée) (localisée) ¬ Douleur abdominale intense (avec *R10.0*
- - ¬ *R19.3*
- Congénitales multiples ¬ *Q74.3*
- Dysplasie ectodermique-fente labiopalatine ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- Muscle sterno-cléido-mastoïdien ¬ *Q68.0*
- Musculaire ¬ *M62.4*
- Nanisme-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'alopécie- *Q87.8*
- Précoces [Emery-Dreifuss] ¬ Dystrophie musculaire: scapulo-péronière: bénigne avec *G71.0*
- Progressive des articulations-dysmorphie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-épilepsie- *Q87.8*
- ¬
- - Arachnodactylie congénitale avec *Q68.8*
- - Raideur articulaire par *M24.5*

Contre-indication ¬ Vaccination non effectué raison
- *Z28*
- *Z53*

Contrôle
- Cadre d'un programme de recherche clinique ¬ Examen de comparaison et de *Z00.6*
- Chimiothérapie
- - Affections ¬ Examen de *Z09.2*
- - Tumeur maligne ¬ Examen de *Z08.2*
- Chirurgical
- - Précisés ¬ Autres soins de *Z48.8*
- - Sans précision ¬ Soin de *Z48.9*
- - ¬ Autres soins de *Z48*
- Comprenant opération plastique
- - Extrémité
- - - Inférieures ¬ Soins de *Z42.4*
- - - Supérieures ¬ Soins de *Z42.3*
- - Partie
- - - Corps ¬ Soins de *Z42.8*
- - - Tronc ¬ Soins de *Z42.2*
- - Sans précision ¬ Soins de *Z42.9*
- - Sein ¬ Soins de *Z42.1*
- - Tête et du cou ¬ Soins de *Z42.0*
- - ¬ Soins de *Z42*
- Impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation ¬ Soins de *Z47.0*
- Inadéquats de la part des parents ¬ Surveillance et *Z62*
- Orthopédique
- - Précisés ¬ Autres soins de *Z47.8*
- - Sans précision ¬ Soin de *Z47.9*
- - ¬ Autres soins de *Z47*
- Paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments ¬ *Z45.82*
- Psychothérapie ¬ Examen de *Z09.3*
- Radiographique thoracique ¬ *Z01.6*
- Radiothérapie
- - Affections ¬ Examen de *Z09.1*
- - Tumeur maligne ¬ Examen de *Z08.1*
- Routine au cours du post-partum ¬ *Z39.2*
- Stimulateur cardiaque ¬ *Z45.00*
- Traitement
- - Affection
- - - Sans précision ¬ Examen de *Z09.9*
- - - Tumeurs malignes ¬ Examen de *Z09*
- - - ¬ Examen de *Z09.8*
- - Chirurgical
- - - Affections ¬ Examen de *Z09.0*
- - - Tumeur maligne ¬ Examen de *Z08.0*
- - Combiné
- - - Affections ¬ Examen de *Z09.7*
- - - Tumeur maligne ¬ Examen de *Z08.7*
- - Fracture ¬ Examen de *Z09.4*
- - Tumeur malign

Contrôle *–suite*
- Traitement *–suite*
- - Tumeur malign *–suite*
- - - Sans précision ¬ Examen de *Z08.9*
- - - ¬ Examen de *Z08.8*
- Vérification d'un dispositif cardiaque (électronique) ¬ *Z45.0*

Contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les conseillers, par exemple les *Z64.8*

Contusion
- Cardiaque ¬ *S26.81*
- Cérébelleux
- - Circonscrite ¬ *S06.32*
- - Diffuse ¬ *S06.22*
- - ¬ Hémorragie traumatique, hématome traumatique, *S06.8*
- Cérébral
- - Circonscrite ¬ *S06.31*
- - Diffuse ¬ *S06.21*
- - ¬ Hématome cérébral avec *S06.21*
- Cheville ¬ *S90.0*
- Cordon ¬ *O69.5*
- Coude ¬ *S50.0*
- Cuisse ¬ *S70.1*
- Doigt s
- - Lésion de l'ongle ¬ *S60.1*
- - SAI ¬ *S60.0*
- - Sans lésion de l'ongle ¬ *S60.0*
- Épaule et du bras ¬ *S40.0*
- Épiglotte ¬ *S10.0*
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- Genou ¬ *S80.0*
- Globe oculaire et des tissus de l'orbite ¬ *S05.1*
- Gorge ¬ *S10.0*
- Hanche ¬ *S70.0*
- Hématome
- - Foie ¬ *S36.11*
- - Poumon ¬ *S27.31*
- - Rein ¬ *S37.01*
- Intracrânienne SAI ¬ Hémorragie traumatique, hématome traumatique, *S06.8*
- Localisée ¬ Compression du cerveau par une *S06.31*
- Lombes et du bassin ¬ *S30.0*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Œdème moelle
- - Cervicale ¬ *S14.0*
- - Dorsale ¬ *S24.0*
- - Lombaire [Conus medullaris] ¬ *S34.0*
- Organes génitaux externes ¬ *S30.2*
- Orteil s
- - Lésion de l'ongle ¬ *S90.2*
- - SAI ¬ *S90.1*
- - Sans lésion de l'ongle ¬ *S90.1*
- Paroi abdominale ¬ *S30.1*

Contusion *–suite*
- Partie
- - Non précis
- - - Avant-bras ¬ *S50.1*
- - - Jambe ¬ *S80.1*
- - - Pied ¬ *S90.3*
- - Poignet et de la main ¬ *S60.2*
- Paupière et de la région périoculaire ¬ *S00.1*
- Sein ¬ *S20.0*
- Sous-galéale ¬ *S00.05*
- Thorax ¬ *S20.2*
- Vessie ¬ *S37.21*
- ¬
- - Ictère néonatal dû à des *P58.0*
- - Lésion traumatique superficiel
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.05*
- - - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.05*
- - - Partie du corps non précisée: *T14.05*
- - - Tronc, niveau non précisé: *T09.05*

Conus medullaris] ¬ Contusion et œdème de la moelle lombaire [*S34.0*

Convalescence
- Chimiothérapie ¬ *Z54.2!*
- Intervention chirurgicale ¬ *Z54.0!*
- Psychothérapie ¬ *Z54.3!*
- Radiothérapie ¬ *Z54.1!*
- Traitement
- - Combinés ¬ *Z54.7!*
- - Fracture ¬ *Z54.4!*
- - Non précisé ¬ *Z54.9!*
- - ¬ *Z54.8!*
- ¬ *Z54!*

Convergence ¬ Excès et insuffisance de *H51.1*

Convergent
- Concomitant ¬ Strabisme *H50.0*
- Intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Ésotropie [strabisme *H50.3*

Conversion
- Mixte ¬ Trouble dissociatif [de *F44.7*
- Sans précision ¬ Trouble dissociatif [de *F44.9*
- Transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles dissociatifs [de *F44.82*
- ¬
- - Hystérie de *F44*
- - Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de *T46.4*
- - Réaction de *F44*
- - Trouble
- - - Dissociatifs [de *F44.8*
- - - Dissociation [troubles de *F44.88*

Convertase I ¬ Obésité par déficit en prohormone *E66.89*

Convolution de l'arc aortique ¬ Persistance de: *Q25.4*

Convulsion

- Déficience intellectuelle par hydroxylysinurie ¬ Syndrome de *E72.3*
- Dissociatives ¬ *F44.5*
- Épileptiques SAI ¬ *G40.9*
- Fébrile
- - Plus ¬ Épilepsie généralisée avec *G40.3*
- - ¬
- - - *R56.0*
- - - Épilepsie temporale mésiale familiale avec *G40.2*
- Hypertension préexistante ou gestationnelle ¬ *O15*
- Infantiles-choréoathétose ¬ Syndrome de *G40.4*
- Néonatal bénin
- - Familiales) ¬ *G40.3*
- - Idiopathiques ¬ *G40.3*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ *R56*
- - Précisées ¬ *R56.8*
- Nouveau-né ¬ *P90*
- Sensible
- - Acide folinique ¬ *G40.3*
- - Phosphate de pyridoxal ¬ *G40.8*

Convulsive) SAI ¬ Crise (*R56.8*

Cooley ¬ Maladie de *D56.1*

Coombs ¬ Résultat positif au test de *R76.8*

Cooper ¬ Névralgie mammaire de *N64.4*

Cooper-Jabs ¬ Syndrome de *Q87.8*

Coordination

- Non précisés ¬ Troubles de la *R27.8*
- ¬ Trouble
- - *R27*
- - Acquisition de la *F82*

COP ¬ *J84.0*

Coproporphyrie héréditaire ¬ *E80.2*

Coqueluche

- Bordetella
- - Parapertussis ¬ *A37.1*
- - Pertussis ¬ *A37.0*
- DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos- *Z27.1*
- Espèces de Bordetella ¬ *A37.8*
- Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la *Z27.8*
- Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos- *Z27.3*
- Sans précision ¬ *A37.9*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.7*
- Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos- *Z27.2*
- ¬

Coqueluche *–suite*

- ¬ *–suite*
- - *A37*
- - Pneumonie au cours de *A37.9†, J17.0**

Coquillage ¬

- *T63.6*
- Intoxications par poissons et *T61.2*

Coquille ¬ Dent en *K00.5*

Cor au pied ¬ *L84*

Coraco-huméral ¬ Ligament *S43.4*

Coracoïde ¬ Fracture de l'omoplate: Apophyse *S42.13*

Coralliforme ¬

- Calcul: *N20.0*
- Cataracte *Q12.0*

Cordages

- Tendineux
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture des *I23.4*
- - Non classée ailleurs ¬ Rupture des *I51.1*
- Tricuspide ¬ Insertion anormale des *Q22.8*

Corde vocale

- Larynx
- - Bilatérale, partielle ¬ Paralysie des *J38.03*
- - Non
- - - Classées ailleurs ¬ Maladies des *J38*
- - - Précisée ¬ Paralysie des *J38.00*
- - Unilatéral
- - - Partielle ¬ Paralysie des *J38.01*
- - - Totale ¬ Paralysie des *J38.02*
- - ¬
- - - Paralysie des *J38.0*
- - - Polype des *J38.1*
- Vraie) SAI ¬ *C32.0*
- ¬
- - Abcès des *J38.3*
- - Fausses *C32.1*
- - Granulome des *J38.3*
- - Hyperkératose des *J38.3*
- - Leucoplasie des *J38.3*
- - Maladies des *J38.3*
- - Myopathie distale avec faiblesse des *G71.0*
- - Nodules des *J38.2*
- - Parakératose des *J38.3*
- - Paralysie congénitale des *J38.00*
- - Phlegmon des *J38.3*

Cordis ¬

- Accretio *I31.0*
- Concretio *I31.1*
- Ectopia *Q24.8*

Cordite (fibrineuse) (nodulaire) (tubéreuse) ¬ *J38.2*

Cordon

- Compression ¬ Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du *O69.1*
- Court ¬ *P02.6*

Cordon *–suite*

- Jumeau
- - Sac amniotique unique ¬ Enchevêtrement des *O69.2*
- - ¬ Perte de sang fœtal au niveau de la section du *P50.5*
- Ombilical
- - Complication pendant les contractions ¬ Anomalie du *O69.9*
- - Membranes ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le *P02*
- - Provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du *P02.3*
- - Sans précision ¬
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du *P02.6*
- - - Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du *O69.9*
- - ¬
- - - Circulaire du *P02.5*
- - - Déplacement d'un clampage du *P51.8*
- - - Fœtus nouveau-né affecté
- - - - Formes de compression du *P02.5*
- - - - Procidence du *P02.4*
- - - Nœud du *P02.5*
- - - Torsion du *P02.5*
- - - Travail accouchement compliqué anomalie
- - - - *O69*
- - - - *O69.8*
- Postérieur
- - Rétinite pigmentaire ¬ Syndrome d'ataxie du *G11.1*
- - ¬
- - - Sclérose tabique du *A52.1†, G32.8**
- - - Syphilis sclérosante du *A52.1†, G32.8**
- SAI ¬ Compression du *O69.2*
- Sans compression ¬ Enchevêtrement du *O69.8*
- Sexuels et du stroma ¬ Tumeur testiculaire des *C62.9*
- Spermatique
- - Scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - - Atrophie du canal déférent, du *N50.8*
- - - Hypertrophie du canal déférent, du *N50.8*
- - - Œdème du canal déférent, du *N50.8*
- - - Ulcère du canal déférent, du *N50.8*
- - Testicule ou de la (tunique) vaginale ¬ hydrocèle du *N43*
- - Tunique vaginale du testicule et du canal déférent ¬ Affections inflammatoires du *N49.1*
- - ¬
- - - *D29.7*
- - - Absence ou aplasie de: *Q55.4*
- - - Rétrécissement de: *N50.8*
- - - Tuberculose du *A18.1†, N51.8**

Cordon *–suite*
- Spermatique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Tumeur
- - - - Lipomateuse bénigne du *D17.6*
- - - - Maligne: *C63.1*
- ¬
- - Contusion du *O69.5*
- - Hématome du *O69.5*
- - Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du *O69.4*
- - Nœud du *O69.2*
- - Perte sang fœtal
- - - Insertion vélamenteuse du *P50.0*
- - - Rupture du *P50.1*
- - Procidence des vaisseaux du *P02.6*
- - Travail accouchement compliqué
- - - Brièveté du *O69.3*
- - - Forme d'enchevêtrement du *O69.2*
- - - Insertion vélamenteuse du *O69.4*
- - - Lésions vasculaires du *O69.5*
- - - Prolapsus du *O69.0*

Corectopie ¬ *Q13.2*

Corée ¬ Fièvre hémorragique (de): *A98.5*

Cores centraux] ¬ Myopathie: à axe central [myopathie à *G71.2*

Cori ¬ Maladie de: *E74.0*

Corne
- Antérieur
- - Ménisque
- - - Externe ¬
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.34*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.04*
- - - - Lésion
- - - - - Interne du genou, sans précision: Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou *M23.94*
- - - - - Ménisque externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.24*
- - - Interne ¬
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.31*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.01*
- - - - Lésion
- - - - - Interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament croisé antérieur ou *M23.91*
- - - - - Ménisque interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.21*
- - ¬
- - - Maladie de la *G12.2*
- - - Syndrome de la *S24.12*
- Cutanée ¬ *L85.8*
- Postérieur
- - Ménisque
- - - Externe ¬
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.35*

Corne *–suite*
- Postérieur *–suite*
- - Ménisque *–suite*
- - - Externe ¬ *–suite*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.05*
- - - - Lésion
- - - - - Interne du genou, sans précision: *M23.95*
- - - - - Ménisque externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.25*
- - - Interne ¬
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.32*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.02*
- - - - Lésion
- - - - - Interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament croisé postérieur ou *M23.92*
- - - - - Ménisque interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.22*
- - ¬ Syndrome de la *S24.12*

Cornea plana ¬ *Q13.4*

Cornée
- Annulaire ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Central ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Conjonctive ¬ Infection varicelleuse de la *B01.8†, H19.2**
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de la sclérotique et de la *H19.8**
- Épithéliale ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Filaments sinueux ¬ Dystrophie de la *H18.5*
- Fragile ¬ Syndrome de la *Q79.6*
- Granuleuse ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Grillagée en réseau ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Herpès simplex ¬ Ulcus dendriticum de la *B00.5†, H19.1**
- Hypopyon ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Maculaire ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Marginal ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Œil ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de *T86.83*
- Perforé ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Sac conjonctival ¬
- - Brûlure de la *T26.1*
- - Corrosion de la *T26.6*
- SAI ¬
- - Malformation congénitale de la *Q13.4*
- - Ulcère de (la): *H16.0*
- Sans
- - Mention de corps étranger ¬ Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la *S05.0*
- - Précision ¬ Affection de la *H18.9*
- ¬
- - Affection
- - - *H18*
- - - Précisées de la *H18.8*

Cornée *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anesthésie de la *H18.8*
- - Anneau de sidérose de la *H18.0, T90.4*
- - Avitaminose A
- - - Cicatrices xérophtalmiques de la *E50.6†, H19.8**
- - - Xérosis et ulcération de la *E50.3†, H19.8**
- - Carence vitamine A cicatrice
- - - *E50.6†, H19.8**
- - - Xérophtalmique de la *E50.6†, H19.8**
- - Corps étranger dans la *T15.0*
- - Déformations de la *H18.7*
- - Dégénérescence de la *H18.4*
- - Donneur de *Z52.5*
- - Ectasie de la *H18.7*
- - Érosion récidivante de la *H18.8*
- - Herpès de la *B00.5†, H19.1**
- - Hypoesthésie de la *H18.8*
- - Malformations congénitales de la *Q13.4*
- - Néovaisseaux (de la *H16.4*
- - Œdème de la *H18.2*
- - Opacité congénitale de la *Q13.3*
- - Pannus (de la *H16.4*
- - Staphylome de la *H18.7*
- - Status post greffe de *Z94.7*
- - Syphilis
- - - *A52.7†, H19.2**
- - - Tardive de la *A52.7†, H19.2**
- - Tuberculose de la *A18.5†, H19.2**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D31.1*
- - - Maligne: *C69.1*
- - Ulcère
- - - *H16.0*
- - - Tuberculeux de la *A18.5†, H19.2**

Cornéen
- Amorphe postérieure ¬ Dystrophie *H18.5*
- Centrales ¬ Autres opacités *H17.1*
- Endothéliale liée à l'X ¬ Dystrophie *H18.5*
- Grayson-Wilbrandt ¬ Dystrophie *H18.5*
- Héréditaires ¬ Dystrophies *H18.5*
- Lisch ¬ Dystrophie *H18.5*
- Membrane de Bowman type II ¬ Dystrophie *H18.5*
- Rayon de miel ¬ Dystrophie *H18.5*
- Reis-Bücklers ¬ Dystrophie *H18.5*
- Sans précision ¬ Cicatrice et opacité *H17.9*
- Schnyder ¬ Dystrophie *H18.5*
- Sous-épithéliale mucineuse ¬ Dystrophie *H18.5*
- Stromale ¬ Dystrophie *H18.5*
- Thiel-Behnke ¬ Dystrophie *H18.5*
- Tuberculeuse ¬ Cicatrice *A18.5†, H19.8**
- Waardenburg-Jonker ¬ Dystrophie *H18.5*

Cornéen *–suite*
- ¬
- - Avitaminose A avec xérosis *E50.2†, H19.8**
- - Cicatrice opacité
- - - *H17*
- - - *H17.8*
- - Lésions des membranes *H18.3*
- - Nécrose *H18.8*
- - Néovascularisation *H16.4*
- - Pigmentation et dépôts *H18.0*
- - Syndrome d'ataxie spinocérébelleuse-dystrophie *G11.8*

Cornéo
v. irido-cornéo-endothélial

Cornet nasal ¬ Ulcère de *J34.0*

Cornets
- Nez ¬ Hypertrophie des *J34.3*
- ¬
- - *C30.0*
- - *C41.02*
- - *D16.42*

CORO1A ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en *D81.2*

Coronaire
- Acquise ¬ Fistule artérioveineuse *I25.4*
- Artère
- - Veine n entraînant infarctus myocarde ¬
- - - Embolie *I24.0*
- - - Occlusion *I24.0*
- - - Thrombo-embolie *I24.0*
- - ¬ Anévrisme congénital *Q24.5*
- Couleur rose (pink spot) ¬ Dyschromie *K03.3*
- Gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de l'artère *I25.14*
- Interaortopulmonaire ¬ *Q24.5*
- Intermédiaire ¬ Syndrome (de): *I20.0*
- Intramurale ¬ *Q24.5*
- Intramyocardique ¬ *Q24.5*
- N'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ Thrombose *I24.0*
- Rhumatismal
- - Aiguë ¬ Artérite *I01.8*
- - Chronique ¬ Artérite *I09.8*
- Syphilis ¬ Thrombose *A52.0†, I52.0**
- Syphilitique ¬ Artérite *A52.0†, I52.0**
- Vérifié ¬ Angine de poitrine avec spasme *I20.1*
- ¬
- - Abouchement de la veine cave supérieure gauche dans l'oreillette gauche par le sinus *Q26.1*
- - Anévrisme
- - - Artère *I25.4*
- - - Congénital d'une artère *Q24.5*
- - Anomalie
- - - Congénital
- - - - Artères *Q24.5*

Coronaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anomalie *–suite*
- - - Congénital *–suite*
- - - - Sinus *Q21.1*
- - - Position des ostia *Q24.5*
- - ASD type sinus *Q21.1*
- - Athérome des (artères) *I25.1*
- - Athérosclérose des (artères) *I25.1*
- - Atrésie
- - - Ostiale *Q24.5*
- - - Sinus *Q21.1*
- - Cataracte sénile: *H25.0*
- - Dissection spontanée idiopathique de l'artère *I25.4*
- - Insuffisance *I24.8*
- - Maladie des (artères) *I25.1*
- - Malformation
- - - Sinus: *Q21.1*
- - - Vaisseaux *Q24.5*
- - Occlusion des (artères) *I25.1*
- - Présence
- - - Implant et de greffe vasculaires *Z95.5*
- - - Pontage aorto- *Z95.1*
- - - Prothèse de l'artère *Z95.5*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation *R93.1*
- - Rétrécissement syphilitique
- - - Artères *A52.0†, I52.0**
- - - Congénital des artères *A50.5†, I52.0**
- - Sclérose des (artères) *I25.1*
- - Sténose
- - - Artères) *I25.1*
- - - Ostiale *Q24.5*
- - - Sinus *Q21.1*
- - Thrombose syphilitique des artères *A52.0†, I52.0**
- - Trouble du rythme (du): sinus *I49.8*
- - Vasospasme des artères *I20.1*

Coronal ¬ Hypospadias: *Q54.0*

Coronarien
- Bitronculaire à tritronculaire ¬ Maladie *I25.13*
- Chronique ¬ Cardiopathie *I25.19*
- Flux lent (Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome *I20.8*
- Greffe valvulaire cardiaque ¬ Complication mécanique d'un pontage *T82.2*
- Insuffisance fonctionnelle du ventricule gauche ¬ Cardiopathie *I25.19*
- Monotronculaire ¬ Maladie *I25.11*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Vasodilatateurs *T46.3*
- Quadritronculaire ¬ Maladie *I25.14*
- Rupture ¬ Dissection d'artère *I21.9*
- SAI ¬ Suites d'une angioplastie *Z95.5*

Coronarien *–suite*
- Syphilitique ¬ Anévrisme *A52.0†, I52.0**
- ¬
- - Cardiopathie *I25.19*
- - Maladie *I25.19*

Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome coronarien à flux lent (*I20.8*

Coronavirale, siège non précisé ¬ Infection *B34.2*

Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.2!*

Coronoïde
- Cubitus ¬ Fracture de la partie supérieure du cubitus: Apophyse *S52.02*
- ¬ Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse *S02.63*

Corporelle
- IMC
- - 40 plus ¬
- - - Indice de masse *E66.92*
- - - Obésité
- - - - Endogène avec un indice de masse *E66.82*
- - - - Excès calorique avec un indice de masse *E66.02*
- - - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de masse *E66.22*
- - - - Médicamenteuse avec un indice de masse *E66.12*
- - Compris
- - - 30 35 ¬
- - - - Indice de masse *E66.90*
- - - - Obésité
- - - - - Endogène avec un indice de masse *E66.80*
- - - - - Excès calorique avec un indice de masse *E66.00*
- - - - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de masse *E66.20*
- - - - - Médicamenteuse avec un indice de masse *E66.10*
- - - 35 40 ¬
- - - - Indice de masse *E66.91*
- - - - Obésité
- - - - - Endogène avec un indice de masse *E66.81*
- - - - - Excès calorique avec un indice de masse *E66.01*
- - - - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de masse *E66.21*
- - - - - Médicamenteuse avec un indice de masse *E66.11*
- Plaie opératoire
- - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- - ¬
- - - Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*

Corporelle *–suite*

- Plaie opératoire *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*

- - - Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*

- Plus ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface *L00.1*

- SAI ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface *L51.20*

- ¬

- - Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface *L51.21*

- - Peur d'une dysmorphie *F45.2*

- - Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface *L00.0*

Corporis ¬ Pédiculose due à Pediculus humanus *B85.1*

Corpus sterni ¬ Fracture du sternum: *S22.22*

Corpuscule carotidien ¬ Tumeur

- Bénigne: *D35.5*

- Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.6*

- Maligne: *C75.4*

Correcte ¬ effet secondaire indésirable

- Médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique *Y57.9!*

- Vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique *Y59.9!*

Correctement administré ¬

- Anurie due aux sulfamides utilisés comme un médicament approprié à l'indication et *R34, Y57.9!*

- Choc

- - Anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et *T88.6*

- - Anesthésique dû à une substance appropriée et *T88.2*

- Effet indésirable dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et *T88.7*

- Hypersensibilité dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et *T88.7*

- Idiosyncrasie dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et *T88.7*

- Réaction allergique dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et *T88.7*

Correction ¬ Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, avec plastie de *Z91.70*

Correctrice pour cicatrice après traumatisme ¬ chirurgie plastique et *Z42*

Correspondance rétinienne ¬ Anomalies de la *H53.3*

Corrigée

- Gros

- - Artères ¬ Transposition isolée congénitalement non *Q20.3*

- - Vaisseau

- - - Coarctation ¬ Transposition congénitalement non *Q20.3*

- - - ¬ Transposition

- - - - Congénitalement

- - - - - *Q20.5*

- - - - - Non *Q20.3*

- - - - Isolée congénitalement non *Q20.3*

- ¬ Transposition: *Q20.5*

Corrosif

- Couvrant 90 % ou plus de la surface du corps ¬ Lésions *T32.9!*

- Sans précision ¬ Effet toxique: Substance *T54.9*

- Substance similaire ¬ Effet toxique

- - Acides *T54.2*

- - Alcalis *T54.3*

- ¬

- - Effet toxique

- - - Composés organiques *T54.1*

- - - Substances *T54*

- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Liquide *X49.9!*

Corrosion

- 2ème degré sans précision

- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.60*

- - ¬ *T30.60*

- Bouche et du pharynx ¬ *T28.5*

- Cheville pied

- - Degré non précisé ¬ *T25.4*

- - ¬ Brûlure et *T25*

- Classé selon étendue

- - Sur la surface du corps ¬ Séquelles de brûlure et *T95.4*

- - Surface du corps atteinte ¬ *T32!*

- Comprenant le larynx et la trachée avec les poumons ¬ *T27.5*

- Cornée et du sac conjonctival ¬ *T26.6*

- Couvrant

- - 10 et 19% de la surface du corps ¬ *T32.1!*

- - 10% de la surface du corps ¬ *T32.0!*

- - 20 et 29% de la surface du corps ¬ *T32.2!*

- - 30 et 39% de la surface du corps ¬ *T32.3!*

- - 40 et 49% de la surface du corps ¬ *T32.4!*

- - 50 et 59% de la surface du corps ¬ *T32.5!*

- - 60 et 69% de la surface du corps ¬ *T32.6!*

- - 70 et 79% de la surface du corps ¬ *T32.7!*

- - 80 et 89% de la surface du corps ¬ *T32.8!*

- Degré

- - 2a, partie du corps non précisée ¬ *T30.60*

- - 2b, partie du corps non précisée ¬ *T30.61*

- Épaule

- - Bras sauf poignet main

Corrosion *–suite*

- Épaule *–suite*

- - Bras sauf poignet main *–suite*

- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T22.6*

- - - Degré

- - - - 2a ¬ *T22.6*

- - - - 2b ¬ *T22.9*

- - Membre supérieur sauf poignet main

- - - Degré non précisé ¬ *T22.4*

- - - ¬ Brûlure et *T22*

- Gelure

- - Membre

- - - Inférieur ¬ Séquelles de brûlure, *T95.3*

- - - Supérieur ¬ Séquelles de brûlure, *T95.2*

- - Précisées ¬ Séquelles d'autres brûlures, *T95.8*

- - Sans précision ¬ Séquelles de brûlure, *T95.9*

- - Tête ou du cou ¬ Séquelles de brûlure, *T95.0*

- - Tronc ¬ Séquelles de brûlure, *T95.1*

- - ¬ Séquelles de brûlures, *T95*

- Hanche

- - Jambe sauf région malléolaire pied

- - - 2ème degré sans autre précision ¬ *T24.60*

- - - Degré 2b ¬ *T24.60*

- - Membre inférieur sauf cheville pied

- - - Degré non précisé ¬ *T24.4*

- - - ¬ Brûlure et *T24*

- Larynx et de la trachée ¬ *T27.4*

- Limitées à l'œil et ses annexes ¬ Brûlure et *T26*

- Mentionné dépassant

- - Premier degré ¬ Corrosions de parties multiples du corps, pas de *T29.5*

- - Second degré ¬ Corrosions de parties multiples du corps, pas de *T29.6*

- Multiples SAI ¬ *T29.4*

- Œil et de ses annexes, partie non précisée ¬ *T26.9*

- Œsophage ¬ *T28.6*

- Organe

- - Génito-urinaires internes ¬ *T28.8*

- - Interne

- - - Sans précision ¬ *T28.9*

- - - ¬ Brûlure et *T28*

- Partie

- - Corps non précis

- - - Degré non précisé ¬ *T30.4*

- - - ¬ Brûlure et *T30*

- - Multiple corps

- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T29.60*

- - - Corrosion

- - - - Mentionné

- - - - - Dépassant le premier degré ¬ *T29.5*

Corrosion *–suite*
- Partie *–suite*
- - Multiple corps *–suite*
- - - Corrosion *–suite*
- - - - Mentionné *–suite*
- - - - - Dépassant le second degré ¬ *T29.6*
- - - - Troisième degré mentionnée ¬ *T29.7*
- - - Degré non précisé ¬ *T29.4*
- - - Indication degré 2a maximum ¬
- - - - *T29.60*
- - - - *T29.61*
- - - ¬ Brûlures et *T29*
- - Œil et de ses annexes ¬ *T26.8*
- - Voie
- - - Digestives ¬ *T28.7*
- - - Respiratoires ¬ *T27.6*
- Paupière et de la région périoculaire ¬ *T26.5*
- Poignet main
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T23.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T23.60*
- - - 2b ¬ *T23.61*
- - - Non précisé ¬ *T23.4*
- - ¬ Brûlure et *T23*
- Premier degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.5*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.5*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.5*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.5*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.5*
- - SAI ¬ *T30.5*
- - Tête et du cou ¬ *T20.5*
- - Tronc ¬ *T21.5*
- Provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire ¬ *T26.7*
- Région malléolaire pied
- - 2ème degré sans précision ¬ *T25.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T25.60*
- - - 2b ¬ *T25.61*
- SAI ¬ *T30.4*
- Second degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.6*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.6*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.6*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.6*
- - Tête et du cou ¬ *T20.6*
- Tête cou
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T20.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T20.60*
- - - 2b ¬ *T20.61*
- - - Non précisé ¬ *T20.4*

Corrosion *–suite*
- Tête cou *–suite*
- - ¬ Brûlure et *T20*
- Troisième degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.7*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.7*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.7*
- - Mentionnée ¬ Corrosions de parties multiples du corps, au moins une *T29.7*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.7*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.7*
- - SAI ¬ *T30.7*
- - Tête et du cou ¬ *T20.7*
- - Tronc ¬ *T21.7*
- Tronc
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T21.6*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T21.6*
- - - 2b ¬ *T21.9*
- - - Non précisé ¬ *T21.4*
- - ¬ Brûlure et *T21*
- Voie respiratoire
- - Partie non précisée ¬ *T27.7*
- - ¬ Brûlure et *T27*

Cors et callosités ¬ *L84*

Corset orthopédique(s) ¬ *Z46.7*

Cortex
- Cérébral ¬ Défaut congénital d'une partie du *Q04.8*
- Frontal ¬ Vessie neurogène: due à un syndrome du *N31.2*
- Surrénale ¬ Tumeur maligne: *C74.0*
- Visuel ¬
- - *S04.0*
- - Affections du *H47.6*

Corti ¬ Anomalie de: organe de *Q16.5*

Cortical
- Aigu
- - Stade
- - - 1 ¬
- - - - Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.11*
- - - - Nécrose *N17.11*
- - - 2 ¬
- - - - Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.12*
- - - - Nécrose *N17.12*
- - - 3 ¬
- - - - Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.13*
- - - - Nécrose *N17.13*
- - ¬
- - - Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.1*
- - - Nécrose *N17.1*

Cortical *–suite*
- Déformante juvénile ¬ Hyperostose *M88.99*
- Familiale ¬ Myoclonie *G25.3*
- Infantiles ¬ Hyperostoses *M89.8*
- Rénal
- - Stade
- - - 1 ¬ Nécrose
- - - - *N17.11*
- - - - *N17.13*
- - - 2 ¬ Nécrose *N17.12*
- - ¬ Nécrose *N17.1*
- SAI ¬ Nécrose *N17.1*
- Sous-corticale ¬ Démence vasculaire mixte, *F01.3*
- ¬
- - Alvéolite due à Cryptostroma *J67.6*
- - Cataracte sénile: *H25.0*
- - Démence à prédominance *F01.1*
- - Hémorragie intracérébrale hémisphérique, *I61.1*
- - Syphilis des surrénales avec hypofonctionnement *A52.7†, E35.1**

Cortico-basal
- DCB] ¬ Dégénérescence *G31.0†, F02.0**
- ¬ Syndrome *G31.0†, F02.0**

Cortico-résistant ¬ Syndrome néphrotique idiopathique sporadique *N04.9*

Cortico-sensible
- Glomérulosclérose segmentaire focale ¬ Syndrome néphrotique idiopathique *N04.1*
- ¬ Syndrome néphrotique idiopathique *N04.0*

Corticostérone méthyloxydase type I ¬ Déficit en *E27.4*

Corticosurrénal
- Hypersécrétion pure d'aldostérone ¬ Carcinome *C74.0, E26.0*
- Médicamenteuse ¬ Insuffisance *E27.3*
- Médullaire) après des actes médicaux ¬ Hypofonctionnement *E89.6*
- Primaire ¬ Insuffisance *E27.1*
- SAI ¬ Insuffisance *E27.4*
- Sans précision ¬ Insuffisances *E27.4*
- ¬
- - Hyperfonctionnements *E27.0*
- - Pseudohermaphroditisme féminin dû à un trouble *E25.8*

Corticotrope hypophysaire ¬ Adénome *D35.2*

Cortisol ¬ Déficit de la globuline fixant le *E27.8*

Cortisone réductase ¬ Hyperandrogénie due à un déficit en *E25.08*

Corynébactéries ¬ *B95.90!*

Corynebacterium diphtheriae ¬ Radiculomyélite toxique à *A36.8†, G05.0**

Coryza
- Aigu) ¬ *J00*
- Nouveau-né ¬ *P28.8*
- Rhume banal] ¬ Intoxication: Médicaments contre le *T48.5*

Coryza *–suite*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, J99.8**

Cosmétiques ¬
- Allergie aux produits *L23.2*
- Chirurgie plastique pour motifs *Z41.1*
- Dermite
- - Allergique de contact due aux *L23.2*
- - Contact, sans précision, due aux *L25.0*
- - Irritante de contact due aux *L24.3*

Costa
v. Naguib-Richieri-Costa
v. Richieri-Costa-da Silva
v. Richieri-Costa-Pereira
- ¬ Syndrome de Da *F45.3*

Costal
- Tietze] ¬ Syndrome des articulations chondro- *M94.0*
- ¬
- - Région *S20.8*
- - Volet *S22.5*

Costaricensis ¬ Angiostrongyloïdose
- Angiostrongylus *B81.3*
- Parastrongylus *B81.3*

Costeff ¬
- Atrophie optique de *E71.1*
- Syndrome de *E71.1*

Costello ¬ Syndrome de *Q87.8*

Costen ¬ Complexe ou syndrome de *K07.6*

Costochondrite ¬ *M94.0*

Costo-vertébrale-anomalie de Sprengel ¬ Syndrome d'hydrocéphalie-dysplasie *Q87.8*

Côte
- Cervicale ¬ *Q76.5*
- S), du sternum et du rachis dorsal ¬ Fracture de *S22*
- SAI ¬ Malformation congénitale d'une *Q76.6*
- Sans précision ¬ Fracture de *S22.32*
- Surnuméraire
- - Cervicale ¬ *Q76.5*
- - ¬ *Q76.6*
- ¬
- - Fracture
- - - *S22.3*
- - - *S22.32*
- - - 1ère *S22.31*
- - - Multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère *S22.41*
- - Toute fracture multiple de côtes avec fracture de la 1ère *S22.41*

Côté
- Congénital ¬
- - Absence de *Q76.6*
- - Coalescence des *Q76.6*
- Court
- - Spolydactylie
- - - Type
- - - - Beemer-Langer ¬ Syndrome des *Q77.2*

Côté *–suite*
- Court *–suite*
- - Spolydactylie *–suite*
- - - Type *–suite*
- - - - Majewski ¬ Syndrome des *Q77.2*
- - - - Saldino-Noonan ¬ Syndrome des *Q77.2*
- - - - Verma-Naumoff ¬ Syndrome des *Q77.2*
- - - ¬ Syndrome des *Q77.2*
- - ¬ Syndrome des *Q77.2*
- Fracture
- - 1er côte ¬
- - - Fractures multiples de *S22.41*
- - - Toute fracture multiple de *S22.41*
- - Deux côtes ¬ Fractures multiples de *S22.42*
- - Quatre côtes ou plus ¬ Fractures multiples de *S22.44*
- - Trois côtes ¬ Fractures multiples de *S22.43*
- Gauche ¬ Négligence du *R29.5*
- Plus ¬ Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre *S22.44*
- SAI ¬ Fractures multiples de *S22.40*
- Sternum
- - Clavicule ¬ Tumeur
- - - Bénigne: *D16.7*
- - - Maligne: *C41.3*
- - ¬ Entorse et foulure des *S23.4*
- ¬
- - *T84.28*
- - Déformation acquise du thorax et des *M95.4*
- - Fracture multiple
- - - *S22.4*
- - - Côté Fracture
- - - - Deux *S22.42*
- - - - Trois *S22.43*
- - Malformations congénitales des *Q76.6*
- - Tumeur
- - - Bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.70*
- - - Maligne des os et du cartilage articulaire: *C41.30*

Coton ¬ Affection des voies aériennes due aux poussières de *J66.0*

Cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au *U81.6!*

Couchée ¬ Syndrome hypotensif en position *O26.5*

Couches
- Peau ¬ gelure avec atteinte partielle des *T33*
- Rétine ¬ Décollement des *H35.7*

Coude
- Antérieure ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.11*

Coude *–suite*
- Humérocubitale (articulation) ¬ Entorse et foulure du *S53.44*
- Huméroradiale (articulation) ¬ Entorse et foulure du *S53.43*
- Latérale ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.14*
- Ligament collatéral
- - Cubital ¬ Entorse et foulure du *S53.42*
- - Radial ¬ Entorse et foulure du *S53.41*
- Médiane ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.13*
- Partie
- - Non précisée ¬ Entorse et foulure du *S53.40*
- - ¬ Entorse et foulure du *S53.48*
- Poignet ¬ Amputation traumatique entre le *S58.1*
- Postérieure ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.12*
- SAI ¬
- - *S52.00*
- - Lésion traumatique superficielle du *S50.9*
- Sans autre précision ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.10*
- ¬
- - Abrasion sur le *S50.81*
- - Amputation traumatique
- - - Articulation du *S58.0*
- - - Épaule et le *S48.1*
- - Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- - Apophysite interne du *M77.0*
- - Articulation du *T84.11*
- - Bursites du *M70.3*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du *T84.01*
- - Contusion du *S50.0*
- - Écrasement du *S57.0*
- - Entorse et foulure du *S53.4*
- - Luxation
- - - Congénitale de: *Q68.8*
- - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments du *S53*
- - - Partie non précis
- - - - *S53.1*
- - - - *S53.18*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l'épaule, bras et *R02.01*
- - Plaie
- - - Ouverte du *S51.0*
- - - Superficielle du *S50.88*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.61*
- - Rupture traumatique ligament latéral
- - - Externe du *S53.2*
- - - Interne du *S53.3*
- - Tuberculose du *A18.0†, M01.12**

Coudure
- Jonction
- - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose ¬ *N13.5*
- Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*

Couleur
- Cheveux ¬ Anomalies de la *L67.1*
- Expectoration ¬ Anomalie de: *R09.3*
- Pendant la formation de la dent ¬ Changement de *K00.8*
- Rose (pink spot) ¬ Dyschromie coronaire de *K03.3*
- ¬
- - Incapacité acquise de la vision des *H53.5*
- - Troubles de la vision des *H53.5*

Coumarine
- Antagonistes vitamine K ¬
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des *D68.33*
- - Troubles hémorragiques dus aux *D68.33*
- ¬ Embryopathie due aux *Q86.2*

Coumariniques, sans hémorragie ¬ Traitement continu par des *Z92.1*

Coup
- Chaleur et insolation ¬ *T67.0*
- Couteau ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- Lapin" ¬ " *S13.4*
- Matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, *Y35.7!*
- Sabre ¬ Lésions en *L94.1*
- Soleil
- - Deuxième degré ¬ *L55.1*
- - Premier degré ¬ *L55.0*
- - Sans précision ¬ *L55.9*
- - Troisième degré ¬ *L55.2*
- - ¬ Autres *L55.8*

Coupable
- Blessures dues à une agression ¬ Examen de la victime ou du *Z04.5*
- Viol ou un abus sexuel allégué ¬ Examen de la victime ou du *Z04.5*

Couplage court ¬ Syndrome des torsades de pointes à *I47.2*

Coupure
- Multiples SAI ¬ *T01.9*
- SAI ¬ *T14.1*

Courant électrique ¬
- Accident dû au *W87.9!*
- Brûlure due au *W87.9!*
- Choc dû au *T75.4*
- Effets du *T75.4*
- Exposition à du *W87!*

Courbure
- Estomac sans précision ¬ Tumeur malign
- - Grande *C16.6*
- - Petite *C16.5*
- Pénis (latérale) ¬ *Q55.6*

Couronne ¬ Anémie réfractaire à sidéroblastes en *D46.1*

Cousin ¬ Syndrome de *Q87.5*

Coussinet
- Absorbant
- - Post-opératoire ¬
- - - Infection d'un *H59.8*
- - - Inflammation non infectieuse d'un *H59.8*
- - ¬ Endophtalmie associée à un *H59.8*
- Graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa] ¬ Hypertrophie du *M79.4*
- Phalanges [Knuckle pads] ¬ *M72.1*

Couteau ¬ Accident dû à: Coup de *W49.9!*

Couverture sociale et secours insuffisants ¬ *Z59*

Couvrant
- 10 19% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.1!*
- - Corrosions *T32.1!*
- 10% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.0!*
- - Corrosions *T32.0!*
- 20 29% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.2!*
- - Corrosions *T32.2!*
- 30 39% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.3!*
- - Corrosions *T32.3!*
- 40 49% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.4!*
- - Corrosions *T32.4!*
- 50 59% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.5!*
- - Corrosions *T32.5!*
- 60 69% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.6!*
- - Corrosions *T32.6!*
- 70 79% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.7!*
- - Corrosions *T32.7!*
- 80 89% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.8!*
- - Corrosions *T32.8!*
- 90 % plus surface corps ¬
- - Brûlures *T31.9!*
- - Lésions corrosives *T32.9!*

Cowden ¬ Syndrome de *Q89.8*

Cowper ¬
- Abcès
- - Glande de: *N34.0*

Cowper ¬ *–suite*
- Abcès *–suite*
- - Tuberculeux de la glande de *A18.1†, N51.8**
- Tuberculose de la glande de *A18.1†, N51.8**

COX
- Type franco-canadien ¬ Déficit en *G31.88*
- ¬ Myopathie mitochondriale avec déficit réversible en *G71.3*

Coxa
- Plana ¬ *M91.2*
- Valga congénitale ¬ *Q65.8*
- Vara
- - Congénitale ¬ *Q65.8*
- - Retrosa) (non traumatique) ¬ Épiphysiolyse de la tête fémorale (*M93.0*

Coxalgie
v.a. Pseudocoxalgie
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M01.15**

Coxarthrose
- Arthrose de la hanche] ¬ *M16*
- Dysplasique
- - SAI ¬ *M16.3*
- - Unilatérale ¬ *M16.3*
- - ¬ Autres *M16.3*
- Origine dysplasique, bilatérale ¬ *M16.2*
- Post-traumatique
- - Bilatérale ¬ *M16.4*
- - SAI ¬ *M16.5*
- - Unilatérale ¬ *M16.5*
- Post-traumatiques ¬ Autres *M16.5*
- Primaire
- - Bilatérale ¬ *M16.0*
- - SAI ¬ *M16.1*
- - Unilatérale ¬ *M16.1*
- - ¬ Autres *M16.1*
- Sans précision ¬ *M16.9*
- Secondaire
- - Bilatérales ¬ Autres *M16.6*
- - SAI ¬ *M16.7*
- - Unilatérale ¬ *M16.7*
- - ¬ Autres *M16.7*

Coxiella burnetii ¬
- Endocardite à *A78†, I39.8**
- Infection à Rickettsia burnetii [*A78*

Coxite tuberculeuse ¬ *A18.0†, M01.15**

Coxitis tuberculosa [Ischiophthisis] ¬ *A18.0†, M01.15**

COXPD10 ¬ *I42.2*

Coxsackie
- 24 ¬ Conjonctivite (due à): virus *B30.3†*
- A24 ¬ Conjonctivite à virus *B30.3†, H13.1**
- ¬
- - Bronchite aiguë due au virus *J20.3*
- - Cardite à virus *B33.2†, I52.1**
- - Endocardite à virus *B33.2†, I39.8**

Coxsackie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hépatite à virus *B33.8†, K77.0**
- - Infection SAI à virus: *B34.1*
- - Méningite à virus *A87.0†, G02.0**
- - Myocardite à virus *B33.2†, I41.1**
- - Péricardite à virus *B33.2†, I32.1**
- - Virus: *B97.1!*

CPEO de transmission maternelle ¬ *H49.4*

CPPD familiale ¬ *M11.19*

CPS1 ¬ Déficit en *E72.2*

CPT-1A ¬ Déficit en *E71.3*

CPTII ¬ *E71.3*

CR(E)ST ¬ Syndrome *M34.1*

CR3] ¬ Déficit en complexe récepteur de la membrane cellulaire [*D71*

Crabe) ¬ Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian- *A66.1*

CRAC ¬ Déficit immunitaire combiné par dysfonctionnement du canal *D81.8*

Crampe
- Chaleur ¬ *T67.2*
- Écrivain ¬ Névrose: professionnelle, y compris *F48.8*
- Gastro-intestinale ¬ *R10.4*
- Généralisée ¬ *R56.8*
- Nageurs ¬ *T75.1*
- Spasme ¬ *R25.2*

Crâne
- Bifide héréditaire ¬ *Q75.8*
- Blessure intracrânienne ¬ Séquelles d'une fracture du *T90.2*
- Face
- - Mâchoire ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du *Q67.4*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des os du *Q75.9*
- - ¬
- - - Fractures d'autres os du *S02.8*
- - - Malformation congénital
- - - - Os du *Q75*
- - - - Précisées des os du *Q75.8*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Os du *D16.4*
- - - - Maligne: Os du *C41.0*
- Os face
- - Partie non précisée ¬ Fracture du *S02.9*
- - ¬
- - - Fracture
- - - - *S02*
- - - - Multiples du *S02.7*
- - - Séquelles d'une fracture du *T90.2*
- SAI ¬ Anomalie de: *Q75.9*
- Tête, non classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R93.0*
- Traumatisme obstétrical ¬
- - Fracture du *P13.0*

Crâne *–suite*
- Traumatisme obstétrical ¬ *–suite*
- - Lésions du *P13.1*
- Trèfle
- - Anomalies congénitales multiples ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Isolé ¬ *Q75.0*
- - ¬
- - *S01.80*
- - *T84.28*
- - Absence congénitale d'os du *Q75.8*
- - Anomalie
- - - Rapport entre les mâchoires et la base du *K07.1*
- - - Suture des os du *Q75.0*
- - Blessure ouverte du *S06.20, S01.83!*
- - Dépressions des os du *Q67.4*
- - Écrasement du *S07.1*
- - Fistule artérioveineuse durale du *Q28.21*
- - Fracture
- - - Base du *S02.1*
- - - Voûte du *S02.0*
- - Hyperostose
- - - *M85.2*
- - - Os autres que ceux du *M85.8*
- - Maladie de Paget du *M88.0*
- - Malformations artérioveineuses durales du *Q28.28*

Craniale ¬ Méningocèle *Q01.9*

Crânien
- Cours
- - Maladie
- - - Infectieuse NCA ¬ Paralysie de plusieurs nerfs *B99†, G53.1**
- - - Parasitaire NCA ¬ Paralysie de plusieurs nerfs *B89†, G53.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ affection nerf
- - - *G53**
- - - *G53.8**
- - Sarcoïdose ¬ Paralysie de plusieurs nerfs *D86.8†, G53.2**
- - Tumeur NCA ¬ Paralysie de plusieurs nerfs *D48.9†, G53.3**
- Herpès zoster ¬ Névralgie *B02.2†, G53.0**
- I] ¬ Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf *C72.2*
- II ¬
- - Nerf *S04.0*
- - Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf *C72.3*
- III ¬ Nerf *S04.1*
- Interne ¬ Hyperostose *M85.2*
- IV ¬ Nerf *S04.2*
- IX] ¬ Affections du nerf glossopharyngien [nerf *G52.1*
- Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou ¬ Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs *T06.0*
- Liée à l'X ¬ Hyperostose de la voûte *M85.2*

Crânien *–suite*
- Non précisés ¬ Tumeur maligne: Nerfs *C72.5*
- Paralysies multiples ¬ Syphilis du nerf *A52.1†, G53.1**
- Parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs *C72*
- Précisés ¬ Affections d'autres nerfs *G52.8*
- SAI ¬ Nerf *C72.5*
- Sans précision ¬
- - Affection des nerfs *G52.9*
- - Lésion traumatique d'un nerf *S04.9*
- Sévère non ouverte ¬ Blessure *S06.20*
- Syndrome de Guillain-Barré ¬ Variant *G61.0*
- Teevan ¬ Fracture *S02.0*
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion des autres nerfs *P11.4*
- V ¬
- - Affections du nerf trijumeau [nerf *G50*
- - Nerf *S04.3*
- VI ¬ Nerf *S04.4*
- VII ¬
- - Affections du nerf facial [nerf *G51*
- - Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [nerf *P11.3*
- - Nerf *S04.5*
- VIII
- - Vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [inflammation du nerf *H94.0**
- - ¬
- - - Affections du nerf auditif [nerf *H93.3*
- - - Nerf *S04.6*
- - - Névrite syphilitique du nerf *A52.1†, H94.0**
- - - Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf *C72.4*
- X] ¬ Affections du nerf vagal [nerf *G52.2*
- XI ¬ Nerf *S04.7*
- XII] ¬ Affections du nerf grand hypoglosse [nerf *G52.3*
- ¬
- - Affection
- - - Nerf
- - - - *G52*
- - - - Olfactif [premier nerf *G52.0*
- - - Plusieurs nerfs *G52.7*
- - Hydroméningocèle *Q01*
- - Lésion traumatique nerf
- - - *S04*
- - - *S04.8*
- - Paralysie syphilitique des nerfs *A52.1†, G53.8**
- - Plaque *Z96.7*
- - Polynévrite *G52.7*
- - Retard de fermeture des sutures *P96.3*
- - Séquelles de lésion traumatique de nerfs *T90.3*

Crânien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syphilis des nerfs *A52.1†, G53.8**
- - Tuberculose de la dure-mère *A17.0†, G01**
- - Tumeur
- - - Bénigne: Nerfs *D33.3*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs *D43.3*

Cranio
v.a. acro-cranio-faciale
- Frontonasale-anomalie de Poland ¬ Syndrome de dysplasie *Q87.8*
- Pharyngien ¬ Tumeur
- - Bénigne: Canal *D35.3*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Canal *D44.4*
- - Maligne: Tractus *C75.2*
- Rachischisis ¬ *Q00.1*

Crânio
- Cérébral
- - Couverte grave ¬ Compression du cerveau, hémorragie et pression cérébrale lors d'une lésion *S06.21, S01.83!*
- - ¬ Démence après une blessure *T90.9†, F02.8**
- Faciale ¬ Dysostose *Q75.1*

Cranio-carpo-tarsien ¬ Syndrome *Q87.0*

Cranio-cérébello-cardiaque ¬ Dysplasie *Q87.0*

Crânio-cérébral
- 1er degré ¬ Traumatisme *S06.0*
- 30 minute
- - 24 heures ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.71!*
- - ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.70!*
- Durée non précisée ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.79!*
- Non ouvert ¬ Traumatisme *S06.9*
- Plus 24 heure
- - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.72!*
- - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.73!*
- ¬
- - Antécédents personnels de traumatisme *Z87.8*
- - Perte connaissance
- - - 30 minute
- - - - 24 heures lors d'un traumatisme *S06.9, S06.71!*
- - - - Lors d'un traumatisme *S06.9, S06.70!*
- - - Lors traumatisme
- - - - *S06.7!*
- - - - *S06.9, S06.79!*
- - - Plus 24 heure

Crânio-cérébral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Perte connaissance *–suite*
- - - Plus 24 heure *–suite*
- - - - Retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un traumatisme *S06.9, S06.72!*
- - - - Sans retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un traumatisme *S06.9, S06.73!*

Cranio-diaphysaire ¬ Dysplasie *M85.2*

Cranio-digital de Scott ¬ Syndrome *Q87.0*

Cranio-ectodermique ¬ Dysplasie *Q87.5*

Cranio-facial
- Simosa ¬ Syndrome *Q87.0*
- ¬
- - Conodysplasie *Q87.5*
- - Dyssynostose *Q87.0*
- - Malformation *Q75.9*
- - Microsomie *Q87.0*
- - Syndrome
- - - Atrésie des choanes-surdité-cardiopathie-dysmorphie *Q87.8*
- - - Surdité-syndrome *Q87.0*

Cranio-facio-cubito-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Cranio-facio-digito-génital ¬ Syndrome *Q87.8*

Cranio-fronto-nasale ¬ Dysplasie *Q75.1*

Cranio-lenticulo-suturale ¬ Dysplasie *Q75.8*

Cranio-métaphysaire ¬ Dysplasie *Q78.8*

Cranio-micromélique ¬ Syndrome *Q87.0*

Cranio-ostéo-arthropathie ¬ *M89.48*

Craniopages ¬ *Q89.4*

Craniopharyngiome ¬ *D44.4*

Cranio-sténose-dermatite sévère ¬ Syndrome d'agammaglobulinémie-microcéphalie- *D80.0*

Craniosynostose
v.a. holoprosencéphalie-craniosynostose
- Anomalies anales-porokératose ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Aplasie radiale ¬ Syndrome de *Q75.0*
- ¬ *Q75.0*

Craniotabès du nouveau-né ¬ *P96.3*

Cranio-télencéphalique ¬ Dysplasie *Q04.3*

Crapaud ¬ Peau de *E50.8†, L86**

C-réactive ¬ Augmentation pathologique du taux de protéine *R77.88*

Création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la *Z91.73*

Crénelée ¬ Langue *K14.8*

Crépus
- Fil de fer) ¬ Maladie de: Menkes (cheveux *E83.0*
- ¬ Syndrome des cheveux *E83.0*

Crête
- Alvéolaire
- - Édentée
- - - Associées à un traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la *K06.2*
- - - Sans précision ¬ Affection de la gencive et de la *K06.9*
- - - ¬
- - - - Affection
- - - - - Gencive et de la *K06*
- - - - - Précisées de la gencive et de la *K06.8*
- - - - Atrophie de la *K08.2*
- - SAI ¬ Hypertrophie de la *K08.8*
- - ¬
- - - Irrégularité de la *K08.8*
- - - Muqueuse (de la *C03*
- Édentée (due à une prothèse) ¬ Hyperplasie par irritation de la *K06.2*
- Gingivale flottante ¬ *K06.8*
- Iliaque
- - Buchanan] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*
- - ¬ Exostose de la *M76.2*

Crête ¬ Pneumonie de *A78†, J17.8**

Crétinisme
- Endémique
- - Hypothyroïdien ¬ *E00.1*
- - SAI ¬ *E00.9*
- - Type
- - - Mixte ¬ *E00.2*
- - - Myxœdémateux ¬ *E00.1*
- - - Neurologique ¬ *E00.0*
- ¬ Myopathie dans le *E00.9†, G73.5**

Creutzfeldt-Jakob
- Acquise ¬ Maladie de *A81.0*
- Héréditaire ¬ Maladie de *A81.0*
- Sporadique ¬ Maladie de *A81.0*
- ¬
- - Démence de la maladie de *A81.0†, F02.1**
- - Maladie de *A81.0*
- - Psychose organique due à la maladie de *A81.0†, F02.1**

Creux
- Acquis ¬ Pied
- - *M21.60*
- Valgus acquis ¬ Pied *M21.63*
- ¬ Pied *Q66.7*

Creux axillaire ¬
- *L03.10*
- *S41.80*

Crevasses du mamelon associées à l'accouchement ¬ *O92.1*

Cri du chat ¬ Syndrome du *Q93.4*

Crico
- Aryténoïdien(ne) ¬ Articulation (ligament): *S13.5*

Crico *–suite*
- Thyroïdien(ne) ¬ Articulation (ligament): *S13.5*

Cricoïde
- Épiglotte glotte larynx cartilage thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage *Q31.8*
- ¬
- - Cartilage *S12.8*
- - Fissure (de): postérieure du cartilage *Q31.8*

Cricoïdien
v.a. rétro-cricoïdien

Crigler et Najjar ¬ Maladie de *E80.5*

Crime, d'actes terroristes ou de tortures ¬ Victime d'un *Z65*

Crimée [du Congo] ¬ Fièvre hémorragique de *A98.0*

Crimée-Congo ¬ Fièvre hémorragique de *A98.0*

Crise
- Addisonienne ¬ *E27.2*
- Astato-myocloniques ¬ Épilepsie avec: *G40.4*
- Audiogènes ¬ *G40.8*
- Blastique
- - Cours
- - - Leucémie myéloïde chronique [LMC] ¬ *C94.8!*
- - - Transformation ¬ Anémie réfractaire avec *C92.00*
- - Prolifération de blastes en transformation) ¬ Anémie réfractaire avec *C92.0*
- Complexes focales ¬ Épilepsie bénigne du nourrisson à *G40.08*
- Comportant pas de modification de conscience ¬ *G40.1*
- Convulsive) SAI ¬ *R56.8*
- Cyanose du nouveau-né ¬ *P28.2*
- Début focal ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec *G40.0*
- Épileptiforme au cours de cysticercose ¬ *B69.0†, G94.8**
- Épileptique
- - Facteur suivant
- - - Alcool ¬ *G40.5*
- - - Médicaments et drogues ¬ *G40.5*
- - - Modifications hormonales ¬ *G40.5*
- - - Privation de sommeil ¬ *G40.5*
- - - Stress ¬ *G40.5*
- - SAI ¬ *G40.9*
- Gastrique au cours de syphilis ¬ *A52.7†, K93.8**
- Grand mal
- - Réveil ¬ Épilepsie (avec): *G40.3*
- - Sans précision (avec ou sans petit mal) ¬ *G40.6*
- - ¬ Petit mal, sans précision, sans *G40.7*

Crise *–suite*
- Hypertoniques ¬ Dysréflexie autonome manifestée par des *G90.40*
- Induit
- - Orgasme ¬ *G40.8*
- - Praxis ¬ *G40.8*
- Initialement focal
- - Sans précision ¬ Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à *G40.09*
- - ¬ Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à *G40.08*
- Insuffisance surrénale ¬ *E27.2*
- Modification de conscience, comportant souvent des automatismes ¬ *G40.2*
- Myoclonoastatiques ¬ Épilepsie avec *G40.4*
- Non spécifique
- - Atoniques ¬ *G40.3*
- - Cloniques ¬ *G40.3*
- - Myocloniques ¬ *G40.3*
- - Tonico-cloniques ¬ *G40.3*
- - Toniques ¬ *G40.3*
- Partiel
- - Complexe
- - - Évoluant vers des crises secondairement généralisées ¬ *G40.2*
- - - ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des *G40.2*
- - Simple
- - - Évoluant vers des crises secondairement généralisées ¬ *G40.1*
- - - ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec *G40.1*
- Secondairement généralisé ¬ crise partiel
- - Complexes évoluant vers des *G40.2*
- - Simples évoluant vers des *G40.1*
- Terreur] ¬ Épilepsie psychomotrice bénigne [*G40.02*
- Thyréotoxique aiguë ¬ *E05.5*
- Transpiration ¬ Dysréflexie autonome manifestée par des *G90.41*
- ¬
- - Anémie hématies falciformes
- - - Anémie drépanocytaire] avec *D57.0*
- - - Sans *D57.1*
- - État de *F43.0*
- - Maladie Hb-SS avec *D57.0*
- - Réaction aiguë (au) (de): *F43.0*

Crisponi ¬ Syndrome de *Q74.3*

Cristallin
- Cours maladies classées ailleurs ¬
- - Affections du *H28.8**
- - Cataracte et autres affections du *H28**
- Mégalocornée ¬ Glaucome secondaire à une sphérophakie/ectopie du *Q15.8*
- Sans précision ¬

Cristallin *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Affection du *H27.9*
- - Malformation congénitale du *Q12.9*
- ¬
- - Affection
- - - *H27*
- - - Précisées du *H27.8*
- - Anomalie congénitale du *Q12.9*
- - Colobome du *Q12.2*
- - Déplacement acquis du *H27.8*
- - Inclusions pigmentaires dans le *H26.8*
- - Luxation
- - - *H27.1*
- - - Congénitale du *Q12.1*
- - Malformations congénitales du *Q12.8*
- - Opacification d'un *T85.2*
- - Phacocèle [hernie du *H27.8*
- - Présence d'implants intra-oculaires de *Z96.1*
- - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: *H44.7*
- - Syphilis du *A52.7†, H28.8**

Cristalline
- Bietti ¬ Dystrophie *H31.2*
- Corps vitré ¬ Opacités *H43.2*
- ¬
- - Miliaire *L74.1*
- - Myopathie distale tardive associée à l'alpha-B *G71.0*

Cristallinienne ¬ Glaucome (primitif) (résiduel): capsulaire avec pseudo-exfoliation *H40.1*

Cristallurie ¬ *R82.9*

Critique
- 4 jours
- - 7 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase *D70.13*
- - ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase *D70.10*
- 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase *D70.14*
- 10 à moins de 20 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie: Phase *D70.11*
- 20 jours ou plus ¬ Agranulocytose et neutropénie: Phase *D70.12*

Crochu ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.17*

Crohn
- Entérite régional
- - Côlon ¬ Maladie de *K50.1*
- - Duodénale ¬ Maladie de *K50.0*
- - Gros intestin ¬ Maladie de *K50.1*
- - Iléale ¬ Maladie de *K50.0*
- - Jéjunale ¬ Maladie de *K50.0*
- - Rectum ¬ Maladie de *K50.1*

Crohn *–suite*

- Entérite régional *–suite*
- - ¬ Maladie de *K50*
- Gastrique ¬ Maladie de *K50.80*
- Gros intestin ¬ Maladie de *K50.1*
- Intestin grêle
- - Gros intestin ¬ Maladie de *K50.82*
- - ¬ Maladie de *K50.0*
- Œsophage
- - Tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments ¬ Maladie de *K50.82*
- - ¬ Maladie de *K50.81*
- Sans précision ¬ Maladie de *K50.9*
- ¬
- - Arthrite juvénile au cours de maladie de *K50.9†, M09.19**
- - Arthropathie au cours de maladie de *K50.9†, M07.49**
- - Forme maladie
- - - *K50.8*
- - - *K50.88*

Croisé

- Antérieur
- - Corne antérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament *M23.91*
- - ¬
- - - Entorse foulure ligament croisé genou antérieur postérieur
- - - - Déchirure du ligament *S83.53*
- - - - Distorsion du ligament *S83.51*
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament *M23.51*
- - - Lésions internes du genou: Ligament *M23.81*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: Ligament *M23.61*
- Genou antérieur postérieur
- - Déchirure ligament croisé
- - - Antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.53*
- - - Postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.54*
- - Distorsion ligament croisé
- - - Antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.51*
- - - Postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.52*
- - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.50*
- - ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.5*
- Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Ligament *S83.50*
- Postérieur
- - Corne postérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament *M23.92*

Croisé *–suite*

- Postérieur *–suite*
- - ¬
- - - Entorse foulure ligament croisé genou antérieur postérieur
- - - - Déchirure du ligament *S83.54*
- - - - Distorsion du ligament *S83.52*
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament *M23.52*
- - - Lésions internes du genou: Ligament *M23.82*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: Ligament *M23.62*
- SAI ¬ Déchirure de ligament *S83.50*
- ¬
- - Cœur *Q24.8*
- - Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (*S83.7*
- - Polysyndactylie *Q70.4*
- - Ventricules *Q24.8*

Croissance

- Développement osseux ¬ Autres troubles de la *M89.2*
- Excessif
- - Fœtus
- - - Trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de *O36.6*
- - - ¬ Soins maternels pour *O36.6*
- - Lié à DNMT3A ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Fœtale retardée SAI ¬ *P05.9*
- Fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de retard de *Z36.4*
- Idiopathique ¬ Insuffisance (de): hormone de *E23.0*
- Insuffisante du fœtus ¬ Soins maternels pour *O36.5*
- Lente du fœtus, sans précision ¬ *P05.9*
- Malnutrition
- - Fœtus ¬ Retard de *P05*
- - ¬ Arrêt de *E45*
- Nourrisson ou de l'enfant ¬ Surveillance de la *Z00.1*
- Os long rachis
- - Sans précision ¬ Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la *Q77.9*
- - ¬ Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la *Q77.8*
- Rapide de l'enfance ¬ Examen à la période de *Z00.2*
- Ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la protéine de liaison du facteur de *R77.88*
- Sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie-retard de *D81.1*
- ¬
- - Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de *D80.0*

Croissance *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Déficit congénital isolé en hormone de *E23.0*
- - Examen de l'adolescent en cours de *Z00.3*
- - Hypersécrétion du pancréas endocrine de: "releasing factor" de l'hormone de *E16.8*
- - Insuffisance (de): isolée en: hormone de *E23.0*
- - Petite taille par déficit en récepteur des secrétagogues de l'hormone de *E34.3*
- - Retard (de): *R62.8*

Crome ¬ Syndrome de *Q87.8*

Cronkhite-Canada ¬ Syndrome de *Q82.8*

Cross ¬ Syndrome de: *E70.3*

Crosse

- Aorte ¬ Syphilis de la *A52.0†, I79.1**
- Aortique
- - Cervicale ¬ *Q25.4*
- - Takayasu] ¬ Syndrome de la *M31.4*
- - ¬ Interruption de la *Q25.4*
- ¬ Encéphalite de La *A83.5*

Crosti] ¬ Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti- *L44.4*

Croup

- Épiglottite aiguë ¬ Laryngite obstructive aiguë [*J05*
- ¬
- - Faux *J38.5*
- - Laryngite obstructive aiguë [*J05.0*

Croûte lait

- Endogène ¬ *L20.8*
- ¬ *L21.0*

Crouzon ¬ Maladie de *Q75.1*

Croyances ¬ Vaccination non effectué raison

- *Z28*
- *Z53*

CRPS

- Typ I ¬ Chronic regional pain syndrome [*G90.59*
- Type II membre
- - Inférieur ¬ Syndrome de douleur chronique localisée [*G90.61*
- - Supérieur ¬ Syndrome de douleur chronique localisée [*G90.60*

Cruchet
v. Von Economo-Cruchet

Crurale

- Bilatéral
- - Gangrène ¬ Hernie *K41.1*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K41.0*
- - Récidivant
- - - Gangrène ¬ Hernie *K41.11*
- - - ¬ Hernie *K41.21*
- - SAI ¬ Hernie *K41.2*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K41.2*
- Récidivant

Crurale *–suite*
- Récidivant *–suite*
- - Gangrène ¬ Hernie *K41.41*
- - Occlusion ¬ Hernie *K41.31*
- - ¬ Hernie *K41.91*
- Unilatéral
- - Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - Occlusion, avec gangrène ¬ Hernie *K41.40*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - Récidivante, avec occlusion ¬ Hernie *K41.31*
- - SAI ¬ Hernie *K41.9*
- - Sans précision
- - - Gangrène ¬ Hernie *K41.4*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - - Sans précision, sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K41.9*
- - ¬ Hernie *K41.90*
- ¬
- - Hernie *K41*
- - Teigne inguinale [teigne *B35.6*

Cruzi ¬ infection à Trypanosoma *B57*

Cryoglobulinémie
- Atteinte pulmonaire ¬ *D89.1†, J99.8**
- Essentielle ¬ *D89.1*
- Idiopathique ¬ *D89.1*
- Mixte ¬
- - *D89.1*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *D89.1†, N16.2**
- Primitive ¬ *D89.1*
- Secondaire ¬ *D89.1*
- ¬
- - *D89.1*
- - Glomérulonéphrite au cours de *D89.1†, N08.2**
- - Glomérulopathie au cours de *D89.1†, N08.2**
- - Pyélonéphrite au cours de *D89.1†, N16.2**
- - Troubles respiratoires au cours de *D89.1†, J99.8**

Cryoglobulinémique ¬
- Angéite [vascularite] *D89.1*
- Purpura *D89.1*

Cryohydrocytose héréditaire
- Réduction de stomatine ¬ *D58.8*
- Stomatine normale ¬ *D58.8*

Cryptococcose
- Cérébral ¬
- - *B45.1*
- - *B45.1†, G05.2**
- Cérébro-méningée ¬ *B45.1*
- Cerveau ¬ *B45.1†, G05.2**
- Cutané ¬ *B45.2†, L99.8**

Cryptococcose *–suite*
- Disséminée ¬ *B45.7*
- Généralisée ¬ *B45.7*
- Méninges ¬ *B45.1†, G02.1**
- Méningo-cérébrale ¬ *B45.1†, G02.1**
- Osseuse ¬ *B45.3†, M90.29**
- Poumons ¬ *B45.0†, J99.8**
- Pulmonaire ¬
- - *B45.0*
- - *B45.0†, J99.8**
- Sans précision ¬ *B45.9*
- ¬
- - *B45*
- - Encéphalite au cours de *B45.1†, G05.2**
- - Formes de *B45.8*
- - Maladie due au VIH avec *B20, B45.9*

Cryptocoques
- SIDA ¬ Méningite à *B20†, G02.0*, B45.9*
- ¬
- - Encéphalite à *B45.1†, G05.2**
- - Méningite à *B45.1†, G02.1**
- - Méningomyélite à *B45.1†, G05.2**
- - Pneumonie à *B45.0†, J17.2**

Cryptogénétique ¬ Entérite sténosante ulcéreuse multifocale *K63.3*

Cryptogénique ¬
- Alvéolite fibreuse (*J84.1*
- Cirrhose (du foie): *K74.6*
- Pneumopathie organisée *J84.0*

Cryptophtalmie
- Isolée ¬ *Q11.2*
- SAI ¬ *Q11.2*

Cryptophtalmie-syndactylie ¬ Syndrome *Q87.0*

Cryptophtalmique ¬ Syndrome (de): *Q87.0*

Cryptorchidie
- Arachnodactylie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Bilatérale ¬ *Q53.2*
- Hernie de Spiegel ¬ Syndrome de *K43.68*
- SAI ¬ *Q53.9*
- Sans précision ¬ *Q53.9*
- Unilatérale ¬ *Q53.1*
- ¬
- - *Q53*
- - Tumeur maligne: *C62.0*

Cryptosporidiose ¬ *A07.2*

Cryptosporidium ¬
- Infection à *A07.2*
- Maladie due au VIH avec infection à *B20, A07.2*

Cryptostroma corticale ¬ Alvéolite due à *J67.6*

CSF3R ¬ Neutropénie congénitale sévère autosomique récessive par déficit en *D70.0*

CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] ¬ POCS (*G40.01*

CTLA-4 ¬ Syndrome lymphoprolifératif auto-immun dû à une haploinsuffisance de *D47.9*

CTPS1 ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en *D81.8*

CU [colite ulcéreuse] ¬ *K51.9*

Cubital
v.a. fémoro-péronéo-cubital
v.a. radio-cubital
- Luxation de la tête du radius ¬ Fracture proximale de la diaphyse *S52.21*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique
- - - Artère *S55.0*
- - - Nerf *S54.0*
- - Bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S44.0*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique
- - - Artère *S65.0*
- - - Nerf *S64.0*
- Partie non précisée ¬ Fracture de la diaphyse *S52.20*
- Radiale ¬ Fracture des deux diaphyses, *S52.4*
- SAI ¬ Nerf *S54.0*
- ¬
- - Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral *S53.42*
- - Hypertrichose *Q84.2*
- - Lésion du nerf *G56.2*
- - Paralysie lente du nerf *G56.2*

Cubito
v.a. cranio-facio-cubito-rénal
- Carpien (palmaire) ¬ Ligament: *S63.3*
- Humérale ¬ Articulation *S53.1*

Cubitus
- Apophyse coronoïde du cubitus ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.02*
- Burns] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse inférieure du *M92.1*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypoplasie du *Q87.2*
- Olécrâne ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.01*
- Partie
- - Non précisée ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.00*
- - Parties et parties multiples ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.09*
- Radius, combinée ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S52.6*
- SAI ¬
- - *S52.20*
- - Partie proximale du *S52.00*
- Valgus-dysmorphie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- ¬
- - Apophyse styloïde du *S52.8*
- - Extrémité inférieure du *S52.8*
- - Fracture
- - - Diaphyse du *S52.2*

Cubitus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fracture *–suite*
- - - Distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du *S52.31*
- - - Partie supérieur
- - - - *S52.0*
- - - - Cubitus: Apophyse coronoïde du *S52.02*
- - Ostéochondrite juvénile du radius et du *M92.1*
- - Raccourcissement longitudinal du *Q71.5*
- - Tête du *S52.8*

Cuboïde ¬ Fracture: os *S92.22*

Cucurbitacées ¬ Allergie aux *T78.1*

Cuir chevelu
- Cou ¬
- - Carcinoma in situ: Peau du *D04.4*
- - Mélanome
- - - In situ du *D03.4*
- - - Malin du *C43.4*
- - Nævus à mélanocytes du *D22.4*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau du *D23.4*
- - - Maligne: Peau du *C44.4*
- Dermatophytie] ¬ Dermatophytose du *B35.0*
- Liée à une surveillance électronique continue ¬ Lésion du *P12.4*
- Toute partie] ¬ *T20*
- Traumatisme obstétrical
- - Sans précision ¬ Lésion du *P12.9*
- - ¬
- - - Lésions du *P12.8*
- - - Meurtrissure du *P12.3*
- ¬
- - *L02.8*
- - *L03.8*
- - Arrachement du *S08.0*
- - Favus du *B35.0*
- - Lésion traumatique superficielle du *S00.0*
- - Pachydermie vorticellée primaire essentielle du *Q82.8*
- - Plaie ouverte du *S01.0*
- - Teigne de la barbe et du *B35.0*

Cuisse
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.81*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.84*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.82*
- Hanche ¬ Ischémie traumatique des muscles de la *T79.61*
- Jambe, pied présent ¬ Absence congénitale de la *Q72.1*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.83*

Cuisse *–suite*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la hanche et de la *T34.6*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de la hanche et de la *S78.9*
- SAI ¬ Plaie ouverte de la hanche et de la *S71*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - Hanche et de la *S79.9*
- - Superficielle de la hanche et de la *S70.9*
- ¬
- - *L03.11*
- - Amputation traumatique de la hanche et de la *S78*
- - AO artériopathie oblitérante type
- - - *I70.29*
- - - Bassin et *I70.29*
- - Artériopathie oblitérante type
- - - *I70.29*
- - - Bassin et *I70.29*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: région pelvienne et *T84.14*
- - Contusion de la *S70.1*
- - Écrasement
- - - *S77.1*
- - - Hanche et de la *S77.2*
- - Fracture ouverte de la *S72.9, S71.87!*
- - Gelure superficielle de la hanche et de la *T33.6*
- - Lésion traumatique
- - - Multiple
- - - - Hanche et de la *S79.7*
- - - - Muscles et tendons au niveau de la hanche et de la *S76.7*
- - - - Nerfs au niveau de la hanche et de la *S74.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la *S75.7*
- - - Muscle tendon
- - - - Adducteurs de la *S76.2*
- - - - Niveau de la hanche et de la *S76*
- - - - Non précisés, au niveau de la *S76.4*
- - - - Postérieurs au niveau de la *S76.3*
- - - Nerf
- - - - Cutané sensitif au niveau de la hanche et de la *S74.2*
- - - - Fémoral au niveau de la hanche et de la *S74.1*
- - - - Niveau de la hanche et de la *S74.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la hanche et de la *S74.9*
- - - - Sciatique au niveau de la hanche et de la *S74.0*
- - - Précisées de la hanche et de la *S79.8*
- - - Superficielles multiples de la hanche et de la *S70.7*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau de la hanche et de la *S75.8*

Cuisse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion traumatique *–suite*
- - - Vaisseau sanguin *–suite*
- - - - Non précisé, au niveau de la hanche et de la *S75.9*
- - - Veine
- - - - Fémorale au niveau de la hanche et de la *S75.1*
- - - - Saphène interne au niveau de la hanche et de la *S75.2*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région pelvienne et *R02.05*
- - Phlébite profonde de la *I80.28*
- - Phlébothrombose profonde de la *I80.28*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - *S71.1*
- - - - Hanche et de la *S71*
- - - Ouvertes multiples de la hanche et de la *S71.7*
- - Thrombophlébite profonde de la *I80.28*
- - Thrombose profonde de la *I80.28*

Cuivre
- Composés ¬ Effet toxique: *T56.4*
- Lié à l'X ¬ Déficit en *E83.0*
- ¬
- - Anémie associée à carence en: *D53.8*
- - Anomalies du métabolisme du *E83.0*
- - Carence en *E61.0*
- - Déficit familial bénin en *E83.0*
- - Intoxication au *T56.4*
- - Taux anormal de: *R79.0*

Cul-de-sac
- Douglas ¬ Tuberculose du *A18.1†, N74.1**
- Recto-utérin, comme rectum de remplacement ¬ Fistule entre le vagin et le *N82.80*

Culicosis bullosa ¬ *L13.8*

Cultivateur ¬ Peau de: *L57.8*

Culture
- Positives ¬ *R82.7*
- Procédé biologie moléculaire ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- Seulement ¬ Tuberculose pulmonaire, confirmée par *A15.1*

Culturel ¬ Choc *F43.2*

Cumming ¬ Campomélie type *Q87.8*

Cunéiforme

- Intermédiaire) (latéral) (médian) ¬ Fracture: Os *S92.23*
- Ostéoporotiques ¬ tassement vertébral et vertèbre *M80*
- SAI ¬ Vertèbre *M48.5*

Curatifs ¬ Exercices thérapeutiques et *Z50.1!*

Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne ¬ *Z51.82*

Currarino ¬ Syndrome de *Q42.9*

Curry-Jones ¬ Syndrome de *Q87.0*

Curth-Macklin ¬ Ichtyose hystrix de *Q80.8*

Curtis
v. Fitz-Hugh-Curtis

Cushing

- Alcool ¬ Pseudosyndrome
- - *E24.4*
- Hyperplasie macronodulaire des surrénales ¬ Syndrome de *E24.8*
- Hypophyso-dépendante ¬ Maladie de *E24.0*
- Médicamenteux ¬ Syndrome de *E24.2*
- Production ectopique d'ACTH [hormone adrénocorticotrope] ¬ Syndrome de *E24.3*
- Sans précision ¬ Syndrome de *E24.9*
- ¬
- - Hypersécrétion d'ACTH, non associée à la maladie de *E27.0*
- - Maladie de *E24.0*
- - Myopathie dans le syndrome de *E24.9†, G73.5**
- - Syndrome
- - - *E24*
- - - *E24.8*

Cushingoïde de sécrétion ectopique d'ACTH ¬ Syndrome *E24.3*

Cutané
v.a. cardio-facio-cutané
v.a. oculo-ostéo-cutané
v.a. recto-cutané

- Achromique
- - Lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.3*
- - Pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2*
- Anaplasique à grandes cellules ¬ Lymphome *C86.6*
- Anus et du rectum, par le virus de l'herpès ¬ Infection de la marge *A60.1*
- Bulleuse atrophiante et albo-papuloïde ¬ Dystrophie *Q81.2*
- Cellule
- - Pléomorphes de taille petite à moyenne CD4+ ¬ Lymphome T *C84.4*
- - T, sans précision ¬ Lymphome *C84.8*
- Cicatricielles de la pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2*
- Cinq ans après l'infection ¬ Pian *A66.2*
- Circonscrit ¬ Lymphangiome *D18.19*

Cutané *–suite*

- Congénitale précoce ¬ Syphilis *A50.0†, L99.8**
- Cutanéo-muqueuse ¬ Bartonellose *A44.1*
- Diagnostic et de sensibilisation ¬ Tests *Z01.5*
- Diffus ¬
- - Mastocytose *Q82.2*
- - Sclérodermie systémique *M34.0*
- - Sclérose systémique *M34.0*
- Dyschromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2*
- Furoncle anthrax
- - Cou ¬ Abcès *L02.1*
- - Face ¬ Abcès *L02.0*
- - Fesse ¬ Abcès *L02.3*
- - Localisations ¬ Abcès *L02.8*
- - Membre ¬ Abcès *L02.4*
- - Sans précision ¬ Abcès *L02.9*
- - Tronc ¬ Abcès *L02.2*
- - ¬ Abcès *L02*
- Gonococcique(s) ¬ Lésions *A54.8*
- Grandes cellules T, CD30 positif ¬ Lymphome *C86.6*
- Greffe-contre-hôte stade
- - 1 ¬ Maladie aiguë de rejet *T86.01†, L99.11**
- - 2 ¬ Maladie aiguë de rejet *T86.01†, L99.12**
- - 3 ¬ Maladie aiguë de rejet *T86.01†, L99.13**
- - 4 ¬ Maladie aiguë de rejet *T86.02†, L99.14**
- Hyperchromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées achromiques avec lésions *A67.3*
- Idiopathique ¬ Sarcomatose *C46.0*
- Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface *E88.21*
- Jessner ¬ Infiltration lymphocytaire *L98.6*
- Leucocytoclasique ¬ Angéite *M31.0*
- Lèvre ¬ Tumeur maligne: Face *C44.0*
- Limitée ¬ Sclérose systémique *M34.1*
- Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface *E88.20*
- Local
- - Staphylococcus aureus ¬ Infection *L08.9, B95.6!*
- - Staphylocoques ¬ Infection *L08.9, B95.8!*
- - Streptocoques ¬ Infection *L08.9, B95.5!*
- Lymphome SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus *C88.4*
- Maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (*A66.2*
- Médicament ¬ Dermite de contact toxique par contact *L24.4*
- Mycobacterium ¬ Infection *A31.1*
- Néonatale ¬ Hémorragie *P54.5*

Cutané *–suite*

- Niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf sensitif *S54.3*
- Nodulaire ¬ Amylose *E85.4†, L99.0**
- Non
- - Précisés ¬ Troubles de la sensibilité *R20.8*
- - Spécifiques ¬ Rash et autres éruptions *R21*
- Non-mélanome ¬ Métastase *C79.2*
- Paroi abdominale ¬ Carcinome *C44.5*
- Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte *L89.1*
- Précoces du pian ¬ Autres lésions *A66.2*
- Primitif
- - Cellules T, CD30 positif ¬ Syndrome lymphoprolifératif *C86.6*
- - ¬
- - - Lymphomes B centrofolliculaire *C82.6*
- - - Plasmocytose *D47.9*
- Rampante ¬ Myiase *B87.0*
- Rare ¬ Lupus érythémateux *L93.0*
- Recherche
- - Hypersensibilité ¬ Tests (de): *Z01.5*
- - Maladie bactérienne ¬ Tests (de): *Z01.5*
- Résiduelles ¬ Cicatrices hémorroïdaires *K64.4*
- SAI ¬
- - Larva migrans *B76.9*
- - Ulcère
- - - *L98.4*
- - - Chronique *L98.4*
- - - Escarre] de pression avec perte *L89.1*
- Sensitif niveau
- - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S94.3*
- - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S44.5*
- - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S74.2*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S84.2*
- Sous-cutané
- - Pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du tissu *E88.22*
- - Présence d'un corps étranger ¬ Granulome *L92.3*
- Spontanément régressive ¬ Mucinose *L98.5*
- Subaigu ¬ Lupus érythémateux *L93.1*
- Tardive ¬ Porphyrie *E80.1*
- Tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture *Z91.73*
- Zone marginale ¬ Lymphome B *C83.0*
- ¬
- - Albinisme *E70.3*

Cutané *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Amibiase *A06.7*
- - Amylose *E85.4†, L99.0**
- - Anesthésie *R20.0*
- - Anguillulose *B78.1†, L99.8**
- - Autosensibilisation *L30.2*
- - Blastomycose *B40.3†, L99.8**
- - Calcinose *L94.2*
- - Carcinome neuroendocrine *C44.9*
- - Charbon *A22.0*
- - Chromomycose *B43.0†, L99.8**
- - Cicatrices et fibrose *L90.5*
- - Coccidioïdomycose *B38.3†, L99.8**
- - Corne *L85.8*
- - Cryptococcose *B45.2†, L99.8**
- - Diphtérie *A36.3*
- - Endométriose sur cicatrice *N80.6*
- - Erysipéloïde *A26.0*
- - Hypoesthésie *R20.1*
- - Infestations *B88*
- - Larva migrans *B76.9*
- - Leishmaniose *B55.1*
- - Listériose *A32.0*
- - Lymphome
- - - *C84.8*
- - - Centrofolliculaire *C82.6*
- - Maladie due au VIH avec éruption *B23.8, R21*
- - Mastocytome *Q82.2*
- - Modifications du tissu *R23.4*
- - Mucinose *L98.5*
- - Mucormycose *B46.3†, L99.8**
- - Myiase
- - - *B87.0*
- - - *B87.0†, L99.8**
- - - Plaies *B87.1*
- - Nocardiose *A43.1*
- - Paresthésie *R20.2*
- - Peste *A20.1*
- - Pseudolymphome *L98.8*
- - Strongyloïdose *B78.1†, L99.8**
- - Syndrome du nerf fémoro- *G57.1*
- - Syphilis congénitale précoce: *A50.0*
- - Troubles de la sensibilité *R20*
- - Vascularite des petits vaisseaux *M31.0*
- - Xérosis *L85.3*

Cutanéo
v.a. facio-cutanéo-squelettique
- Muqueux
- - Kawasaki] ¬ Syndrome adéno- *M30.3*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres infections virales caractérisées par des lésions *B08*
- - Sans précision ¬ Infection virale caractérisée par des lésions *B09*

Cutanéo *–suite*
- Muqueux *–suite*
- - ¬ Autres infections virales précisées, caractérisées par des lésions *B08.8*
- Oculaire ¬ Albinisme: *E70.3*

Cutanéoméningospinale ¬ Angiomatose *Q27.3*

Cutanéomuqueuse ¬ Malformation veineuse *Q27.8*

Cutanéo-muqueux ¬
- Bartonellose cutanée et *A44.1*
- Hyalinose *E78.8*
- Leishmaniose *B55.2*
- Syphilis congénitale précoce: *A50.0*

Cutis
- Congenita
- - Récessive des membres ¬ Aplasia *Q84.8*
- - ¬ Aplasia *Q84.8*
- Laxa
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *Q82.8*
- - - Récessif type
- - - - 1 ¬ *Q82.8*
- - - - 1C ¬ *Q82.8*
- - - - 2 ¬ *Q82.8*
- - - - 2A ¬ *Q82.8*
- - - - 2B ¬ *Q82.8*
- - Hyperelastica) ¬ *Q82.8*
- - Hyperlaxité ligamentaire-retard de développement ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - Senilis ¬ *L57.4*
- Marmorata telangiectatica congenita ¬
- - *Q27.8*
- - Syndrome
- - - Macrocéphalie- *Q87.3*
- - - Mégalencéphalie- *Q87.3*
- Rhomboidalis ¬ *L57.2*
- Verticis gyrata primitif non essentiel ¬ *Q82.8*

CVDA] ¬ Cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène [*I42.80*

CVID ¬ *D83.9*

CXCR2 ¬ Neutropénie congénitale sévère autosomique récessive par déficit en *D70.0*

Cyanocobalamine ¬ Carence en: *E53.8*

Cyanopsie ¬ *H53.5*

Cyanose
- Nouveau-né ¬ Crises de *P28.2*
- ¬ *R23.0*

Cyanure
- Hydrogène ¬ Effet toxique: *T57.3*
- ¬ Effet toxique: *T65.0*

Cyclase 2C ¬ Iléus méconial par déficit en guanylate *P76.0*

Cycle
- Gamma-glutamyl ¬ Trouble du *E72.8*
- Menstruel

Cycle *–suite*
- Menstruel *–suite*
- - Irrégulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec *N92.1*
- - Régulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec *N92.0*
- - Sans précision ¬ Affection des organes génitaux de la femme et du *N94.9*
- - ¬
- - - Affections précisées des organes génitaux de la femme et du *N94.8*
- - - Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du *N94*
- Méthionine ¬ Trouble du métabolisme du *E72.1*
- Urée et de la détoxification de l'ammoniac ¬ Trouble du métabolisme du *E72.2*
- Uréogenèse ¬ Anomalies du *E72.2*
- Veille sommeil
- - Anormal ¬ *Z91.8*
- - ¬ Troubles du *G47.2*

Cyclique ¬
- Neutropénie *D70.5*
- Schizophrénie *F25.2*

Cyclite
- Aiguë, subaiguë ou à répétition ¬ *H20.0*
- Postérieure ¬ *H30.2*

Cyclodésaminase ¬ Déficit en formiminotransférase *E70.8*

Cyclohexane ¬ Solvants du groupe: *L24.2*

Cyclohydrolase I ¬ Déficit en GTP *E70.1*

Cycloïde
- Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ Psychose *F23.0*
- Symptômes schizophréniques ¬ Psychose *F23.1*
- ¬ Personnalité: *F34.0*

Cyclopie ¬ *Q87.0*

Cyclosporose ¬ *A07.3*

Cyclothymie ¬ *F34.0*

Cyclothymique ¬ Personnalité: *F34.0*

Cyclotropie ¬ *H50.4*

Cygne ¬ Déformation en boutonnière et en col de *M20.0*

Cylindres dans les urines ¬ Cellules et *R82.9*

CYP11A1 ¬ Insuffisance surrénalienne héréditaire isolée par déficit partiel en *E27.1*

CYP11B2 ¬ Déficit en aldostérone synthase non lié à *E27.4*

Cyphoscoliose
- Problèmes d'ouïe ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos de type *Q79.6*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - *M41*
- - Cardiopathie due à *I27.1*

Cyphoscoliotique ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Cyphose
- Congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Irradiation ¬ *M96.2*
- Juvénile de Scheuermann familiale ¬ *M42.09*
- Laminectomie ¬ *M96.3*
- Lordose ¬ *M40*
- Non précisées ¬ *M40.2*
- Posturale ¬ *M40.0*
- Secondaires ¬ Autres *M40.1*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.5†, M49.39**
- Tant que conséquence tardive du rachitisme ¬ *E64.3, M40.19*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M49.09**

Cystadénocarcinome
- Biliaire ¬ *C22.1*
- Endométrioïde
- - Femme ¬ *C56*
- - Ovaire ¬ *C56*
- Mucineux
- - Ovaire ¬ *C56*
- - Pancréas ¬ *C25.9*
- Papillaire de l'ovaire ¬ *C56*
- Pseudo-mucineux de l'ovaire ¬ *C56*
- Séreux du pancréas ¬ *C25.9*

Cystadénome
- Colloïde ¬ *D27*
- Mucineux
- - Ovaire à la limite de la malignité ¬ *C56*
- - ¬ *D27*
- Ovarien ¬ *D27*
- Pancréatique ¬ *D13.6*
- Voies biliaires intrahépatiques ¬ *D13.4*

Cystathionase
v.a. gamma-cystathionase
- ¬ Déficit en *E72.1*

Cystathionine
- Bêta-synthase ¬
- - Déficit en *E72.1*
- - Homocystinurie par déficit en *E72.1*
- Gamma-lyase ¬ Déficit en *E72.1*
- ¬ Trouble du métabolisme de la *E72.1*

Cystathioninémie ¬ *E72.1*

Cystathioninurie ¬ *E72.1*

Cystic eyeball] ¬ Œil kystique [*Q11.0*

Cysticercose
- Cérébrale ¬ *B69.0†, G94.8**
- Localisations ¬ *B69.8*
- Oculaire ¬ *B69.1†, H45.1**
- Œil ¬ *B69.1†, H45.1**
- Sans précision ¬ *B69.9*
- Système nerveux central ¬ *B69.0†, G99.8**
- ¬
- - *B69*

Cysticercose *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Crise épileptiforme au cours de *B69.0†, G94.8**
- - Endophtalmie au cours de *B69.1†, H45.1**
- - Épilepsie au cours de *B69.0†, G94.8**
- - Myosite au cours de *B69.8†, M63.19**

Cystine ¬ Hyperaminoacidurie provoquée par la *E72.0*

Cystinique
- Maladie de Lignac) ¬ Thésaurismose *E72.0*
- ¬
- - Calcul *E72.0†, N22.8**
- - Diathèse *E72.8*
- - Thésaurismose *E72.0†, N29.8**

Cystinose
- Maligne ¬ *E72.0*
- ¬
- - *E72.0*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *E72.0†, N16.3**
- - Néphrosclérose au cours de *E72.0†, N29.8**
- - Pyélonéphrite au cours de *E72.0†, N16.3**

Cystinurie
- Type
- - A ¬ *E72.0*
- - B ¬ *E72.0*
- ¬ *E72.0*

Cystinurie-lysinurie ¬ Syndrome de *E72.0*

Cystique
- Sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: canal *K80.2*
- Vésicule biliaire
- - Sans calcul ¬
- - - Occlusion du canal *K82.0*
- - - Rétrécissement du canal *K82.0*
- - - Sténose du canal *K82.0*
- - ¬
- - - Adhérences du canal *K82.8*
- - - Atrophie du canal *K82.8*
- - - Dyskinésie du canal *K82.8*
- - - Exclusion du canal *K82.8*
- - - Hypertrophie du canal *K82.8*
- - - Kyste du canal *K82.8*
- - - Rupture du canal *K82.2*
- - - Ulcère du canal *K82.8*
- ¬
- - Canal: *C24.0*
- - Duplication du canal: *Q44.5*

Cystite
- Aiguë ¬ *N30.0*
- Amibes ¬ *A06.8†, N33.8**
- Amibienne ¬ *A06.8†, N33.8**
- Candida ¬ *B37.4†, N33.8**
- Chlamydia ¬ *A56.0*

Cystite *–suite*
- Chroniques ¬ Autres *N30.2*
- Colibacillaire ¬ *N30.8, B96.2!*
- Diphtérique ¬ *A36.8†, N33.8**
- Gonococcique SAI ¬ *A54.0*
- Interstitielle (chronique) ¬ *N30.1*
- Irradiation ¬ *N30.4*
- Sans précision ¬ *N30.9*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, N33.8**
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N33.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N33.0**
- Urétrite ¬ avec *N21*
- ¬
- - *N30*
- - *N30.8*
- - Prostato- *N41.3*

Cystocèle
- Urétrocèle ¬ *N81.1*
- ¬ *N81.1*

Cystoïde
- Multiple
- - Type
- - - Fleischner ¬ Ostéite *D86.8*
- - - Jüngling ¬ Ostéite *D86.8*
- - ¬ Ostéite *D86.8*
- ¬ Dystrophie maculaire *H35.5*

Cystosarcome phyllode [tumeur de Brodie] ¬ *D48.6*

Cystostomie ¬
- *Z93.5*
- Surveillance de *Z43.5*

Cytarabine ¬ *T45.1*

Cytochrome
- Oxydase C type franco-canadien ¬ Déficit en *G31.88*
- P450 oxydoréductase ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en *E25.08*

Cytokine
- Cytokine release syndrome] ¬ Syndrome de libération de *D76.4*
- Immunothérapie ¬ Syndrome de libération de *D76.4*
- Thérapie cellulaire CAR-T ¬ Syndrome de libération de *D76.4*
- ¬
- - Hypersensibilité aux *T88.7*
- - Syndrome de libération de *T88.7*

Cytokine release syndrome] ¬ Syndrome de libération de cytokines [*D76.4*

Cytologique
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.2*
- Histologique des urines ¬ Résultats anormaux de l'examen *R82.8*

Cytomégalie ¬ Maladie
- Reins au cours de *B25.88†, N29.1**
- Urètre au cours de *B25.88†, N29.1**

Cytomégalie ¬ Maladie *–suite*

- Vessie au cours de *B25.88†, N33.8**
- VIH avec *B20, B25.9*

Cytomégalique ¬ Hypoplasie surrénalienne congénitale *E27.1*

Cytomégalovirus

- Appareil digestif ¬ Infection à *B25.80†*
- Sans précision ¬ Maladie à *B25.9*
- VIH positif ¬ Décollement de la rétine au cours de rétinite à CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*
- ¬
- - Adrénalite à *B25.88†, E35.1**
- - Angéite à *B25.88*
- - Bronchiolite à *J21.8*
- - Cholangite à *B25.88†, K93.8**
- - Colite
- - - *B25.80†, K93.8**
- - Dermite à *B25.88†, L99.8**
- - Duodénite
- - - *B25.80†, K93.8**
- - Encéphalite à *B25.88†, G05.1**
- - Encéphalomyélite à *B25.88†, G05.1**
- - Entérite à *B25.80†, K93.8**
- - Entérocolite à *B25.80†, K93.8**
- - Épendymite à *B25.88†, G05.1**
- - Gastrite
- - - *B25.80†, K93.8**
- - Glomérulonéphrite à *B25.88†, N08.0**
- - Glossite à *B25.88†, K93.8**
- - Hépatite à *B25.1†, K77.0**
- - Hypophysite à *B25.88†, G05.1**
- - Iléite due à un *B25.80†, K93.8**
- - Infection
- - - *B25.88*
- - - Congénitale à *P35.1*
- - Jéjunite à *B25.80†, K93.8**
- - Maladie
- - - *B25.8*
- - - Rénale tubulo-interstitielle à *B25.88†, N16.0**
- - - VIH
- - - - Récidive de rétinite à CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*
- - - - Rétinite à CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*
- - Mononucléose à *B27.1*
- - Myélite à *B25.88†, G05.1**
- - Myosite à *B25.88†, M63.29**
- - Œsophagite due à un *B25.80†, K23.8**
- - Pancréatite à *B25.2†, K87.1**
- - Parathyroïdite à *B25.88†, E35.8**
- - Pharyngite à *J02.8, B97.8!*
- - Pneumonie à *B25.0†, J17.1**
- - Proctite à *B25.80†, K93.8**
- - Prostatite à *B25.88†, N51.0**
- - Rétinite à *B25.88†, H32.0**

Cytomégalovirus *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Sialoadénite à *B25.88†, K93.8**
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par: *O35.3*
- - Thyroïdite à *B25.88†, E35.0**
- - Urétrite à *B25.88†, N37.0**
- - Vasculite à *B25.88*
- - Vésiculite à *B25.88†, N51.8**

Cytopathie mitochondriale ¬ *G31.81*

Cytosolique du groupement méthyle ¬ Anomalie du transfert *E72.1*

Cytostatique

- Maladies non malignes ¬ Traitement *Z51.2*
- Néoplasie) ¬ Lyse (spontanée) des tumeurs (après traitement *E88.3*
- ¬
- - Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement *D61.10*
- - Leucopénie après un traitement *D70.19*

Cytostéatonécrose du sein ¬ *N64.1*

Cytotoxicité spontanée des cellules Natural Killer ¬ Déficit immunitaire primaire autosomique récessif avec un défaut de *D84.8*

Cytotoxique ¬

- Alopécie due à un médicament *L65.8*
- Hypotrichose due à un médicament *L65.8*
- Médicaments *P04.1*

Czeizel-Losonci ¬ Syndrome de *Q87.8*

D-2-hydroxyglutarique ¬
- Acidémie *E72.8*
- Acidurie *E72.8*

Da Silva
v. Richieri-Costa-da Silva

Dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple *D68.35*

Dacryoadénite
- Sialadénite à IgG4 ¬ *K11.8*
- ¬ *H04.0*

Dacryocèle ¬ *H04.6*

Dacryocystite
- Chronique ¬ *H04.4*
- Néonatales ¬ Conjonctivite et *P39.1*
- Phlegmoneuse) aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ *H04.3*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.0†, H06.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, H06.0**

Dacryolithe ¬ *H04.5*

Dacryopéricystite aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ *H04.3*

Dacryops ¬ *H04.1*

Dactylite
- Syphilitique ¬ *A52.7†, M90.19**
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M90.09**

Dahlberg ¬ Syndrome de *Q87.8*

Dahlberg-Borer-Newcomer ¬ Syndrome de *Q87.8*

Daim ¬ fièvre (de): mouche du *A21*

Daltonisme ¬ *H53.5*

Dana ¬ Syndrome de *D51.3†, G32.0**

Danbolt ¬ Syndrome de *E83.2*

Dandy-Walker
- Hémangiome facial ¬ Syndrome de *Q03.1*
- Isolée avec hydrocéphalie ¬ Malformation de *Q03.1*
- Polydactylie postaxiale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬ Syndrome
- - *Q03.1*
- - Dysmorphie-macrocéphalie-myopie-malformation de *Q87.8*

Danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un *F62.0*

Dangereuses nuisibles ¬ Recherche acceptation intervention
- Comportementales et psychologiques connues comme *Z64.8*
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme *Z64.8*

Danlos
v. Ehlers-Danlos

Darier-White ¬
- Kératose: folliculaire [*Q82.8*

Darier-White ¬ *–suite*
- Maladie de *Q82.8*

Dates ¬
- Heavy-or-large-for- *P08.1*
- Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du Fœtus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for- *O36.6*

Davies ¬ Maladie de *I42.3*

Dawson ¬ Encéphalite
- *A81.1*
- Subaiguë à inclusions de *A81.1*

Day
v. Riley-Day

DCB] ¬ Dégénérescence corticobasale [*G31.0†, F02.0**

DCLRE1C ¬ Immunodéficience combinée sévère due au déficit en *D81.1*

DCMA ¬ Syndrome *E71.1†, I43.1**

De Cock
v. Grubben-de Cock-Borghgraef

De Morsier
v.a. Kallmann-De Morsier

De Vries
v. Koolen-De Vries

Débarquement ¬ Mal de *H81.8*

Débilité
v.a. Pseudodébilité
- Congénitale SAI ¬ *P96.9*
- Mentale SAI ¬ *F79*
- Motrice de l'enfant ¬ *F82*
- ¬ *F70*

Débit ¬ Insuffisance cardiaque à haut *I50.9*

Débranchante ¬ GSD par déficit en enzyme *E74.0*

Débranchement ¬ Déficit en enzymes de *E74.0*

Debré
v. De-Toni-Debré-Fanconi
v. Kocher-Debré-Semelaigne
- Fanconi ¬ Syndrome de: de Toni- *E72.0*

Débutante
- Oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme *M08.3*
- ¬ Occlusion de la veine de la rétine (d'une): *H34.8*

Decalvans de Siemens ¬ Kératose folliculaire spinulosa *Q82.8*

Décalvante
- Quinquaud ¬ Folliculite *L66.2*
- ¬ Folliculite *L66.2*

Décapitation ¬ *S18*

Décarboxylase
- Acides aminés aromatiques ¬ Déficit en *G24.8*
- Orotidylique ¬ Déficit en *E79.8*
- ¬ Déficit
- - *E71.0*
- - Malonyl-CoA *E72.8*

Décès
- Anesthésie en tant que complication de l'accouchement ¬ *O74.9*
- Mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité ¬ *O95*
- On sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue ¬ *R96.1*
- SAI ¬ *R99*
- Sans
- - Signe de maladie ¬ *R96.1*
- - Témoin ¬ *R98*
- Supposé) d'un membre de la famille ¬ Disparition ou *Z63*
- Survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication ¬ *R96.1*
- ¬ Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de *R98*

Déchaussement dentaire ¬ *K08.88*

Déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges *G31.81*

Déchirure
- Accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ¬ Perforation et *T81.2*
- Ancien
- - Anse de seau" ¬ *M23.2*
- - Col de l'utérus ¬ *N88.1*
- - Muscles du plancher pelvien ¬ *N81.8*
- - Vagin ¬ *N89.8*
- Anse seau
- - Ménisque
- - - Externe ¬ *S83.2*
- - - Interne ¬ *S83.2*
- - SAI ¬ *S83.2*
- Capsulaire ¬ *S37.02*
- Capsule
- - Bassinet du rein ¬ *S37.02*
- - Rate, sans atteinte plus importante du parenchyme ¬ *S36.02*
- Cardiaque
- - Ouverture d'une cavité du cœur ¬ *S26.83*
- - Sans ouverture d'une cavité du cœur ¬ *S26.82*
- Cérébral cérébelleux
- - Multiples ¬ *S06.28*
- - ¬ *S06.38*
- Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ Entorse/foulure et *S33.50*
- Fer à cheval de la rétine, sans décollement ¬ *H33.3*
- Frein
- - Langue ¬ *S01.54*
- - Lingual ¬ *S01.54*
- Hémorragie intracrânien
- - Non précisées, dues à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.9*

Déchirure *–suite*
- Hémorragie intracrânien *–suite*
- - Traumatisme obstétrical ¬
- - - *P10*
- - - *P10.8*
- Hépatique
- - Majeure ¬ *S36.15*
- - Modérée ¬ *S36.14*
- - SAI ¬ *S36.12*
- Jonction lombosacrée et de ses ligaments ¬ Entorse/foulure et *S33.51*
- Kyste
- - Poplité ¬ *M66.0*
- - Synoviale ¬ *M66.1*
- Lésion origine chimique
- - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- Ligament
- - Croisé
- - - Antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.53*
- - - Postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.54*
- - - SAI ¬ *S83.50*
- - Large [Allen-Masters] ¬ Syndrome de *N83.8*
- - Latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.43*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.44*
- Ligamentaire SAI ¬ *S83.40*
- Minime hépatique ¬ *S36.13*
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- Musculaires (non traumatiques) ¬ Autres *M62.1*
- Niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique ¬ *M66.5*
- Obstétrical
- - Col de l'utérus ¬ *O71.3*
- - Périnée
- - - Deuxième degré ¬ *O70.1*
- - - Premier degré ¬ *O70.0*

Déchirure *–suite*
- Obstétrical *–suite*
- - Périnée *–suite*
- - - Quatrième degré ¬ *O70.3*
- - - Sans précision ¬ *O70.9*
- - - Troisième degré ¬ *O70.2*
- - - ¬ *O70*
- - Vaginale haute isolée ¬ *O71.4*
- Partiel complet ¬
- - *S83.43*
- - *S83.44*
- - *S83.53*
- - *S83.54*
- Périnée ¬ Rupture d'une suture de: *O90.1*
- Périurétrale avec atteinte de l'urètre ¬ *O71.5*
- Poumon ¬ *S27.32*
- Rate, avec atteinte du parenchyme ¬ *S36.03*
- Récent
- - Cartilage articulaire du genou ¬ *S83.3*
- - Ménisque ¬ *S83.2*
- Rein ¬ *S37.02*
- Rétine ¬ Décollement
- - *H33*
- - Rétine ¬ Décollement de la rétine: sans *H33.2*
- Rétinien
- - SAI ¬ *H33.3*
- - Sans décollement ¬ *H33.3*
- - ¬ Décollement de la rétine avec *H33.0*
- Rupture
- - Périnatal
- - - Intéressant
- - - - Fourchette au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Légère au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Lèvres au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Peau au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Vulve au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - O70
- - - - 0
- - - - - Intéressant aussi: muscles du: périnée au cours de l'accouchement ¬ *O70.1*
- - - - - Intéressant aussi: muscles du: vagin au cours de l'accouchement ¬ *O70.1*
- - - - - Intéressant aussi: plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ *O70.1*
- - - - 1
- - - - - Intéressant aussi: cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ *O70.2*
- - - - - Intéressant aussi: sphincter: anal au cours de l'accouchement ¬ *O70.2*

Déchirure *–suite*
- Rupture *–suite*
- - Périnatal *–suite*
- - - O70 *–suite*
- - - - 1 *–suite*
- - - - - Intéressant aussi: sphincter: SAI au cours de l'accouchement ¬ *O70.2*
- - - - 2
- - - - - Intéressant aussi la muqueuse anale au cours de l'accouchement ¬ *O70.3*
- - - - - Intéressant aussi la muqueuse rectale au cours de l'accouchement ¬ *O70.3*
- - Tissus périurétraux au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- Secondaire du périnée ¬ *O90.1*
- Sillon vaginal pendant l'accouchement ¬ *O71.4*
- Spontané
- - Survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale ¬ les *M66*
- - Synoviale et du tendon ¬ *M66*
- - Tendon
- - - Extenseurs ¬ *M66.2*
- - - Fléchisseurs ¬ *M66.3*
- - - Sans précision ¬ *M66.5*
- - - ¬ *M66.4*
- Synoviale ¬ *M66.1*
- Tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.4*
- Tiers
- - Moyen du vagin pendant l'accouchement ¬ *O71.4*
- - Supérieur du vagin pendant l'accouchement ¬ *O71.4*
- Traumatique
- - Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Traumatisme ancien
- - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.24*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.21*
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.25*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.22*
- - Localisations multiples ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.20*
- - Ménisque SAI ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.29*
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.26*
- - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.23*
- - ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.2*

Déchirure *–suite*
- Utérus
- - Avant le début des contractions ¬ *O71.0*
- - Pendant l'accouchement ¬ *O71.1*
- ¬
- - Entorse
- - - *S46*
- - - Foulure
- - - - *S16*
- - - - *S56*
- - - - *S66*
- - - - *S76*
- - - - *S86*
- - - - *S96*
- - Épisiotomie agrandie par *O70*

Déciduale
- Acrale ¬ Syndrome de peau *Q80.8*
- Généralisée ¬ Peau *Q80.8*

Déclenchement
- Chirurgical ¬ Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou *P02.1*
- Instrumental du travail ¬ Echec du *O61.1*
- Médical du travail ¬ Echec du *O61.0*
- Travail
- - Chirurgie ¬ Echec du *O61.1*
- - Moyens mécaniques ¬ Echec du *O61.1*
- - Ocytocique ¬ Echec du *O61.0*
- - Prostaglandines ¬ Echec du *O61.0*
- - Sans précision ¬ Echec du *O61.9*
- - ¬ Autres échecs du *O61.8*

Déclencheurs de contractions ¬ Hyperactivité de l'utérus due à une stimulation excessive par des médicaments *O62.8, Y57.9!*

Décollement
- Annulaire du col de l'utérus ¬ *O71.3*
- Choroïde ¬ *H31.4*
- Corps vitré ¬ *H43.8*
- Couches de la rétine ¬ *H35.7*
- Déchirure de la rétine ¬ *H33*
- Épiphysaire ¬ Fracture
- - Col du fémur: Épiphyse (proximale), *S72.02*
- - Extrémité inférieure du fémur: Épiphyse, *S72.42*
- Épithélium pigmentaire rétinien ¬ *H35.7*
- Hémorragie placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de *P02.1*
- Prématuré placenta
- - Anomalie de la coagulation ¬ *O45.0*
- - Hématome rétro-placentaire] ¬ *O45*
- - Sans précision ¬ *O45.9*
- - ¬
- - - *O45.8*
- - - *P02.1*
- Rétine

Décollement *–suite*
- Rétine *–suite*
- - Cours de rétinite à CMV [cytomégalovirus], VIH positif ¬ *B20†, H32.0*, B25.88*
- - Déchirure rétinienne ¬ *H33.0*
- - Rhegmatogène
- - - Autosomique dominant ¬ *H33.0*
- - - ¬ *H33.0*
- - SAI ¬ *H33.2*
- - Sans déchirure de la rétine ¬ *H33.2*
- - ¬ Vitréo-rétinopathie proliférante avec *H33.4*
- Rétiniens ¬ Autres *H33.5*
- Séreux de la rétine ¬ *H33.2*
- Traction de la rétine ¬ *H33.4*
- Tractionnel
- - Cours rétinopathie diabétique diabète sucré type
- - - 1 ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - 2 ¬ *E11.30†, H36.0**
- - Rétinopathie diabétique ¬ *E14.30†, H36.0**
- ¬
- - Cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du *H59.8*
- - Déchirure
- - - Fer à cheval de la rétine, sans *H33.3*
- - - Rétiniennes sans *H33.3*
- - Opercule rétinien sans *H33.3*
- - Trou rond de la rétine, sans *H33.3*

Décompensation
- Cardiaque syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- Hépatique ¬ *K72.9*

Décompression] ¬ Maladie des caissons [maladie de la *T70.3*

Découragement et apathie ¬ *R45.3*

Découvert
- Cadavre ¬ *R98*
- Corps ¬ Trichophytie des parties *B35.4*
- ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien *I25.2*
- Fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès ¬ *R98*

DECR ¬ Encéphalopathie progressive avec leucodystrophie par déficit en *G31.81*

Décrit
- Ainsi ¬
- - Athérosclérose cardio-vasculaire, *I25.0*
- - Mort cardiaque subite, *I46.1*
- ¬ Delirium non surajouté à une démence, ainsi *F05.0*

Décubitus
- 1er degré ¬ Ulcère de *L89.0*
- 2e degré ¬ Ulcère de *L89.1*
- 3e degré ¬ Ulcère de *L89.2*
- 4e degré ¬ Ulcère de *L89.3*
- Degré non précisé ¬ *L89.9*
- Zone de pression ¬ Ulcère de *L89*

Décubitus *–suite*
- ¬ Escarre (de *L89*

Dédoublement
- Estomac ¬ *Q40.2*
- Œsophage ¬ *Q39.8*
- Vagin ¬ *Q52.1*

Déefférentation motrice] ¬ Locked-in syndrome [syndrome de *G83.5*

Défaillance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque ¬ *I97.1*

Défaillante ¬ Hygiène personnelle *Z91.8*

Défaut
- Captation de la carnitine cellulaire ¬ *E71.3*
- Complet du septum atrioventriculaire ¬ *Q21.2*
- Congénital
- - Bassinet rénal ¬ *Q63.8*
- - Diaphragme, avec éventration ¬ *Q79.1*
- - Partie
- - - Cortex cérébral ¬ *Q04.8*
- - - Substance cérébrale ¬ *Q04.3*
- Cytotoxicité spontanée des cellules Natural Killer ¬ Déficit immunitaire primaire autosomique récessif avec un *D84.8*
- Dégradation glycoprotéines ¬
- - *E77.1*
- Développement rénal ¬ Agénésie rénale et autres *Q60*
- Éducation ¬ Pression parentale inappropriée et autres *Z62*
- Empreinte région 11p15 ¬ Syndrome
- - Beckwith-Wiedemann dû à un *Q87.3*
- - Silver-Russell dû à un *Q87.1*
- Immunité cellulaire ¬ *D84.8*
- Métabolisme du cofacteur cobalamine ¬ Homocystinurie due à un *E72.1*
- Myocarde ¬ *I51.5*
- Osseux ¬ Fracture ouverte de la mandibule avec *S02.60, S01.87!*
- Parole ¬ *R47.8*
- Pigmentation ¬ Syndrome de dysplasie osseuse terminale- *Q87.2*
- Remplissage
- - Rein ¬ *R93.4*
- - Uretère ¬ *R93.4*
- - Vessie ¬ *R93.4*
- Réparation de l'ADN ¬ Ataxie cérébelleuse avec *G11.3*
- Segmentation avec scoliose ¬ Synostose d'hémivertèbres ou *Q76.3*
- Synthèse
- - Acide biliaire
- - - Cholestase et malabsorption ¬ *K76.8*
- - - ¬ Malabsorption idiopathique par *K90.8*
- - Protéine
- - - Codées par l'ADN mitochondrial ¬ Insuffisance hépatique infantile aiguë par *K72.0*

Défaut *–suite*
- Synthèse *–suite*
- - Protéine *–suite*
- - - Mitochondriales ¬ Maladie mitochondriale par *E88.8*
- Transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux ¬ *E77.0*
- Transport du glutamate-aspartate ¬ *E72.0*
- Transporteur de carnitine à travers la membrane plasmique ¬ *E71.3*
- Tympan ¬ *H72.9*
- Usage ¬
- - Amblyopie: par *H53.0*
- - Nystagmus (de): *H55*
- Zone pellucide ¬ Infertilité féminine par *N97.8*

Défécation
- Douloureuse ¬ *R19.88*
- ¬
- - Constipation lors d'un trouble de la *K59.01*
- - Trouble de la *K59.8*

Défectueux
- Hormone androgène testiculaire SAI ¬ Biosynthèse *E29.1*
- Trachéostome ¬ Fonctionnement *J95.0*
- ¬
- - Alimentation *Z59*
- - Hygiène personnelle très *R46.0*

Défenses immunitaires ¬ Faiblesse des *D89.9*

Déférent
- Cordon spermatique scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - Atrophie du canal *N50.8*
- - Hypertrophie du canal *N50.8*
- - Œdème du canal *N50.8*
- - Ulcère du canal *N50.8*
- Épididyme vésicule séminal prostate
- - SAI ¬ Malformation congénitale du canal *Q55.4*
- - ¬ Autres malformations congénitales du canal *Q55.4*
- ¬
- - Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal *N49.1*
- - Atrésie du canal *Q55.3*
- - Gonorrhée
- - - Aiguë du canal *A54.2†, N51.8**
- - - Canal *A54.2†, N51.8**
- - Lésion traumatique: canal *S37.84*
- - Rétrécissement de: canal *N50.8*
- - Syphilis tardive du canal *A52.7†, N51.8**
- - Tuberculose du canal *A18.1†, N51.8**

Déférentite
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N51.8**
- ¬ *N49.1*

Défibrillateur
- Cardiaque
- - Implanté ¬ Adaptation et manipulation d'un *Z45.01*
- - ¬ Présence de: *Z95.0*
- Thérapie de resynchronisation cardiaque ¬ Présence de: *Z95.0*

Défibrination
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ Syndrome de *P60*
- Hémorragie pendant l'accouchement ¬ Syndrome de *O67.0*
- Sans précision ¬ Syndrome de *D65.9*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Syndrome de *O08.1*
- ¬
- - Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de *D65*
- - Glomérulonéphrite au cours de syndrome de *D65.9†, N08.2**
- - Maladie glomérulaire au cours de syndrome de *D65.9†, N08.2**

Déficience
- Facteur
- - Coagulation, n.c.a. ¬ *D68.28*
- - Hageman ¬ *D68.25*
- Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ Anémie due à une *D55.2*
- Intellectuel
- - Absence de fibres sensitives myélinisées de gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec surdité, *G60.0*
- - Acromicrie-ménopause prématurée ¬ Syndrome de polyneuropathie- *Q87.8*
- - Atrésie anale-uropathie ¬ Syndrome de cataracte- *Q87.8*
- - Brachydactylie ¬ Syndrome de Pierre Robin- *Q87.0*
- - Calvitie-luxation de la rotule-acromicrie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Cardiopathie ¬ Syndrome de microcéphalie-épilepsie- *Q87.8*
- - Colobome et micrognathie ¬ Syndrome d'agénésie du corps calleux avec *Q87.8*
- - Déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante-épilepsie- *G11.1*
- - Dysmorphie
- - - Faciale par haploinsuffisance de SETD5 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - ¬ Syndrome d'arachnodactylie- *Q87.8*
- - Hydroxylysinurie ¬ Syndrome de convulsions- *E72.3*
- - Hypoplasie du corps calleux et appendices pré-auriculaires ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Lié
- - - A l'X ¬ Syndrome d'anomalies squelettiques- *Q87.5*
- - - X
- - - - Acromégalie-hyperactivité ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - - Agénésie du corps calleux-quadriparésie spastique ¬ Syndrome de *Q87.8*

Déficience *–suite*
- Intellectuel *–suite*
- - Lié *–suite*
- - - X *–suite*
- - - - Cubitus valgus-dysmorphie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - - Épilepsie
- - - - - Contracture progressive des articulations-dysmorphie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - - - Psoriasis ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - - Hypogonadisme-ichtyose-obésité-petite taille ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - - Hypotonie-dysmorphie faciale-comportement agressif ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - - Macrocéphalie-emacroorchidie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - - Syndromique
- - - - - Type 10 ¬ *G25.5*
- - - - - Type 7 ¬ *Q87.8*
- - - - - Type Claes-Jensen ¬ *Q87.8*
- - - - Type
- - - - - Abidi ¬ *Q87.8*
- - - - - Armfield ¬ *Q87.8*
- - - - - Brooks ¬ *Q87.8*
- - - - - Cantagrel ¬ *Q87.8*
- - - - - Cilliers ¬ *Q87.8*
- - - - - Miles-Carpenter ¬ *Q87.8*
- - - - - Nascimento ¬ *Q87.8*
- - - - - Schimke ¬ *Q87.8*
- - - - - Seemanova ¬ *Q87.8*
- - - - - Shashi ¬ *Q87.8*
- - - - - Shrimpton ¬ *Q87.8*
- - - - - Siderius ¬ *Q87.8*
- - - - - Stevenson ¬ *Q87.8*
- - - - - Stocco Dos Santos ¬ *Q87.8*
- - - - - Stoll ¬ *Q87.8*
- - - - - Turner ¬ *Q87.8*
- - - - - Van Esch ¬ *Q87.8*
- - - - - Wilson ¬ *Q87.8*
- - - - ¬
- - - - - Alpha-thalassémie- *D56.0*
- - - - - Syndrome de surdité- *Q87.8*
- - - - - Syndrome marfanoïde avec *Q87.8, F79.9*
- - Malformation
- - - Cérebro-cérébelleuse ¬ Syndrome d'épilepsie focale- *Q04.8*
- - - Système nerveux central ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique- *Q87.8*
- - Petit taille
- - - Hypertélorisme ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - ¬ Syndrome
- - - - Goniodysgénésie- *Q87.8*
- - - - Polydactylie préaxiale-colobome- *Q87.2*
- - Sévère

Déficience *–suite*
- Intellectuel *–suite*
- - Sévère *–suite*
- - - Épilepsie-anomalies anales-hypoplasie des phalanges ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - Petite taille-troubles du comportement-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Surdité-hypogénitalisme ¬ Syndrome de rétinite pigmentaire- *Q87.8*
- - Type
- - - Birk-Barel ¬ *Q87.8*
- - - Finnois ¬ Syndrome d'épilepsie- *E75.4*
- - ¬
- - - Ataxie cérébelleuse non progressive avec *G11.0*
- - - Dystrophie musculaire congénital
- - - - *G71.2*
- - - - Sans *G71.2*
- - - Syndrome
- - - - Alopécie
- - - - - Contractures-nanisme- *Q87.8*
- - - - - Épilepsie-pyorrhée- *Q87.8*
- - - - Arachnodactylie-ossification anormale- *Q87.8*
- - - - Ataxie cérébelleuse non progressive- *G11.8*
- - - - Cryptorchidie-arachnodactylie- *Q87.8*
- - - - Dentinogenèse imparfaite-petite taille-surdité- *Q87.8*
- - - - Hypogonadisme-prolapsus de la valve mitrale- *Q87.8*
- - - - Hypoplasie du cubitus- *Q87.2*
- - - - Microcéphalie
- - - - - Corps calleux fin- *Q87.8*
- - - - - Surdité- *Q87.8*
- - - - Microphtalmie
- - - - - Ankyloblépharon- *Q11.2*
- - - - - Colobomateuse-obésité-hypogénitalisme- *Q87.8*
- - - - Ostéogenèse imparfaite-rétinopathie-épilepsie- *Q87.8*
- - - - Paralysie du larynx- *J38.00*
- - - - Polydactylie postaxiale- *Q87.2*
- Organique de la puissance sexuelle ¬ *N48.4*

Déficit
- 1-pyrroline-5-carboxylate déshydrogénase ¬ *E72.5*
- 2
- - Cétoacide déshydrogénase des chaînes ramifiées ¬ *E71.0*
- - Méthylbutyryl-CoA déshydrogénase ¬
- - - *E71.1*
- - - Retard de développement par *E71.1*
- 3
- - Bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par *E25.08*
- - Cétothiolase ¬ *E71.1*
- - Hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA

Déficit *–suite*
- 3 *–suite*
- - Hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA *–suite*
- - - Lyase ¬ *E71.1*
- - - Synthétase ¬ *E71.3*
- - Hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne longue ¬ *E71.3*
- - Hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase ¬ Neurodégénérescence par *E71.1*
- - Hydroxylacyl CoA déshydrogénase acide gras chaîne court ¬
- - - Hyperinsulinisme par *E71.3*
- - - Hypoglycémie hyperinsulinémique par *E71.3*
- - Méthylcrotonyl-CoA carboxylase ¬ *E71.1*
- - Méthylglutaconyl-CoA hydratase ¬ *E71.1*
- - Phosphoglycerate déshydrogénase
- - - Forme infantile/juvénile ¬ *E72.8*
- - - ¬ *E72.8*
- - Phosphosérine phosphatase ¬ *E72.8*
- 4
- - Alpha-hydroxyphénylpyruvate hydroxylase ¬ *E70.2*
- - HPPD ¬ *E70.2*
- - Hydroxyphénylpyruvate dioxygénase ¬
- - - *E70.2*
- - - Tyrosinémie par *E70.2*
- 4a-hydroxy-tétrahydrobioptérine déshydratase ¬ *E70.1*
- 5
- - Alpha-réductase (avec pseudo-hermaphroditisme masculin) ¬ *E29.1*
- - Oxoprolinase ¬ *E72.8*
- 6-pyruvoyl-tétrahydroptérine synthase ¬ Hyperphénylalaninémie par *E70.1*
- 7-déhydrocholestérol réductase ¬ *Q87.1*
- 11-bêta-hydroxylase ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par *E25.08*
- 17
- - 20-desmolase testiculaire ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XY par *E29.1*
- - Alphahydroxylase ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par *E25.08*
- - Bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase
- - - 3 ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XY par *E29.1*
- - - Type 3 ¬
- - - - *E29.1*
- - - - Pseudo-hermaphrodisme masculin par *E29.1*
- - Cétostéroïde réductase ¬ *E29.1*
- 18
- - Hydroxylase ¬ *E27.4*
- - Oxydase ¬ *E27.4*
- 21 hydroxylase
- - Classique
- - - Perte de sel ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par *E25.00*

Déficit *–suite*
- 21 hydroxylase *–suite*
- - Classique *–suite*
- - - ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par *E25.00*
- - SAG type 3 forme
- - - Classique ¬ *E25.00*
- - - Tardive ¬ *E25.01*
- 25-hydroxyvitamine-D-1-alpha-hydroxylase ¬ *E83.31*
- ABCA3 ¬ Pneumopathie interstitielle par *J84.8*
- Acétoacétyl-CoA thiolase mitochondriale ¬ *E71.1*
- Acquis
- - Facteur II ¬ *D68.4*
- - Fibrinogène ¬ *D65.0*
- - Protéine S ¬ *D68.8*
- Acyl-CoA
- - Déshydrogénase acide gras chaîne
- - - Courte ¬ *E71.3*
- - - Moyenne ¬ *E71.3*
- - Oxydase ¬ *E71.3*
- Acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue ¬ *E71.3*
- ADA2 ¬ Vascularite par *M30.8*
- Adénosine
- - Désaminase
- - - ADA] ¬ *D81.3*
- - - ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par *D81.3*
- - Phosphoribosyltransférase ¬ *E79.8*
- Adénosine-kinase ¬ Hyperméthioninémie provoquée par un *E72.1*
- Adénylate kinase ¬ Anémie hémolytique par *D55.3*
- Adénylosuccinase ¬ *E79.8*
- Adénylosuccinate lyase ¬ *E79.8*
- Adhésion des leucocytes type II ¬ *D84.8*
- AGAT ¬ *E72.8*
- Alanine-glyoxylate aminotransférase peroxysomale ¬ *E74.8*
- Aldolase A musculaire ¬
- - Glycogénose par *E74.0*
- - GSD par *E74.0*
- Aldostérone synthase
- - Non lié à CYP11B2 ¬ *E27.4*
- - ¬ *E27.4*
- Alpha-1,4-glucosidase acide ¬ *E74.0*
- Alpha-1-antichymotrypsine ¬ *E88.0*
- Alpha-1-antitrypsine ¬ *E88.0*
- Alpha-D-mannosidase lysosomale ¬ *E77.1*
- Alpha-galactosidase A ¬ *E75.2*
- Alpha-L-fucosidase ¬ *E77.1*
- Alpha-L-iduronidase ¬ *E76.0*
- Alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA thiolase ¬ *E71.1*
- Alpha-méthylacyl-CoA racémase ¬ *K76.8*

Déficit *–suite*
- Alpha-N-acétylgalactosaminidase ¬ *E77.1*
- Alpha-N-acétyl-galactosaminidase de l'adulte ¬ *E77.1*
- Aminoacylase 2 ¬ *E75.2*
- Amylo-1,6-glucosidase ¬ *E74.0*
- Anticorps
- - Humoraux ¬ *D80.9*
- - Immunoglobulines presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ *D80.6*
- Apolipoprotéine A-I ¬ *E78.6*
- Arginase ¬ *E72.2*
- Argininosuccinase ¬ *E72.2*
- Arginosuccinate lyase ¬ *E72.2*
- Aromatase ¬ *E25.8*
- Arylsulfatase
- - A ¬ *E75.2*
- - B ¬ *E76.2*
- Aspartoacylase ¬ *E75.2*
- Aspartylglucosaminidase ¬ *E77.1*
- Attention / hyperactivité] ¬ TDAH [trouble du *F90.0*
- Auditif neurosensoriel
- - Bilatéral ¬ *H90.3*
- - SAI ¬ *H90.5*
- - Unilatéral ¬ *H90.4*
- Bêta-1,4-galactosyltransférase ¬ *E77.8*
- Bêta-alanine synthase ¬ *E79.8*
- Bêta-cétothiolase ¬ *E71.1*
- Bêta-énolase musculaire ¬ Glycogénose par *E74.0*
- Bêta-galactosidase-1 ¬ *E75.1*
- Bêta-mannosidase lysosomale ¬ *E77.1*
- Bêta-uréidopropionase ¬ *E79.8*
- Bilirubine uridine-diphosphate glucuronosyltransférase
- - Type
- - - 1 ¬ *E80.5*
- - - 2 ¬ *E80.5*
- - ¬ *E80.5*
- BP230 ¬ Epidermolyse bulleuse simple par *Q81.0*
- C1 ¬ Immunodéficence due à un *D84.1*
- C2 ¬ Immunodéficence due à un *D84.1*
- C4 ¬ Immunodéficence due à un *D84.1*
- C5 ¬ Immunodéficence due à un *D84.1*
- C6 ¬ Immunodéficence due à un *D84.1*
- C7 ¬ Immunodéficence due à un *D84.1*
- C8 ¬ Immunodéficence due à un *D84.1*
- C9 ¬ Immunodéficence due à un *D84.1*
- Carbamoyl-phosphate synthétase
- - I ¬ *E72.2*
- - ¬ *E72.2*
- Carboxykinase phosphoénolpyruvate ¬ *E74.4*
- Carboxylase
- - Biotine-dépendante ¬ *D81.8*

Déficit *–suite*
- Carboxylase *–suite*
- - Dépendant de la biotine ¬ *D81.8*
- CARD11 ¬ Immunodéficience combinée sévère par *D81.2*
- Carnitine palmitoyltransférase
- - I hépatique ¬ *E71.3*
- - IA ¬ *E71.3*
- - II ¬ *E71.3*
- Carnitine-acylcarnitine translocase ¬ *E71.3*
- Catalase
- - Peroxydase ¬ *E80.3*
- - ¬ *E80.3*
- CD27 ¬ Maladie lymphoproliférative autosomique récessive par *D47.9*
- CEP19 ¬ Obésité par *E66.89*
- CEPT ¬ *E78.4*
- Céramidase acide ¬ *E75.2*
- Cernunnos ¬ *D81.1*
- Cernunnos-XLF ¬ *D81.1*
- Cétohexokinase ¬ *E74.1*
- Chaîne
- - Léger
- - - Kappa ¬ *D80.8*
- - - Neurofilaments ¬ Neuropathie axonale sévère précoce par *G60.0*
- - Lourde des immunoglobulines ¬ *D80.8*
- Cholestérol 7alpha-hydroxylase ¬ Hypercholestérolémie due au *E78.0*
- Citrine ¬ Cholestase intrahépatique néonatale par *E72.2*
- Cofacteurs molybdène
- - Type A ¬ Déficit en sulfite oxydase dû à un *E72.1*
- - ¬ Déficit en sulfite oxydase dû à un *E72.1*
- Colipase pancréatique ¬ *K90.3*
- Combiné
- - Lipase-colipase pancréatique ¬ *K90.3*
- - Phosphorylation oxydative
- - - Type
- - - - 1 ¬ Hépatoencéphalopathie par *E88.8, K72.79!*
- - - - 2 ¬ *G31.81*
- - - - 4 ¬ *G31.81*
- - - - 7 ¬ *G31.81*
- - - - 8 ¬ *I42.2*
- - - - 9 ¬ *I42.2*
- - - - 10 ¬ *I42.2*
- - - - 11 ¬ *G31.81*
- - - - 13 ¬ *G31.81*
- - - - 14 ¬ *G31.81*
- - - - 15 ¬ *G31.81*
- - - - 16 ¬ *I42.2*
- - - - 17 ¬ *I42.2*
- - - - 20 ¬ *G31.81*
- - - - 21 ¬ *G31.81*
- - - - 23 ¬ *I42.2*

Déficit *–suite*
- Combiné *–suite*
- - Phosphorylation oxydative *–suite*
- - - Type *–suite*
- - - - 24 ¬ *G31.81*
- - - - 25 ¬ *G31.81*
- - - - 27 ¬ *G31.81*
- - - - 28 ¬ *I42.2*
- - - ¬
- - - - *E88.8*
- - - - Surdité neurosensorielle syndromique due à un *G31.81, H90.8*
- - Sulfite oxydase, xanthine déshydrogénase et aldéhyde oxydase type A ¬ *E72.1*
- - Xanthine déshydrogénase et xanthine aldéhyde oxydase ¬ *E79.8*
- Complément ¬ *D84.1*
- Complet
- - IFNgammaR1 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par *D84.8*
- - IFNgammaR2 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par *D84.8*
- - IL12B ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par *D84.8*
- - ISG15 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par *D84.8*
- - Méthylmalonyl-CoA mutase ¬ *E71.1*
- - Mévalonate kinase ¬ *E88.8*
- - Récepteur bêta 1 de l'interleukine 12 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par *D84.8*
- Complexe
- - I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par *I42.2*
- - Majeur histocompatibilité classe
- - - I ¬ *D81.6*
- - - II ¬ *D81.7*
- - Récepteur de la membrane cellulaire [CR3] ¬ *D71*
- - Sarcosine déshydrogénase ¬ *E72.5*
- Composé dihydrolipoamide acétyltransférase ¬ *E74.4*
- Congénital
- - Alpha2-antiplasmine ¬ *D68.8*
- - Antithrombine ¬ Thrombophilie héréditaire due au *D68.5*
- - Facteur
- - - Stuart ¬ *D68.24*
- - - XI ¬ *D68.1*
- - Histidine-rich (poly-L) glycoprotéine ¬ Thrombophilie héréditaire due au *D68.5*
- - Inhibiteur 1 de l'activateur du plasminogène ¬ *D68.8*
- - Isolé
- - - ACTH ¬ *E23.0*
- - - Hormone de croissance ¬ *E23.0*
- - Kininogène de haut poids moléculaire ¬ *D68.8*

Déficit *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Lactase ¬ *E73.0*
- - Leptine ¬ Obésité par *E66.89*
- - Longitudinal
- - - Fibula ¬ *Q72.6*
- - - Radius ¬ *Q71.4*
- - NADH-méthémoglobine-réductase ¬ *D74.0*
- - Prékallicréine ¬ *D68.8*
- - Protéine S ¬ Thrombophilie héréditaire sévère due au *D68.5*
- - Saccharase-isomaltase ¬ *E74.3*
- - Synthèse des acides biliaires ¬ *K76.8*
- - TPMT (thiopurine méthyltransférase) ¬ *E88.8*
- Constitutionnel en proconvertine ¬ *D68.23*
- CORO1A ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par *D81.2*
- Corticostérone méthyloxydase type I ¬ *E27.4*
- Cortisone réductase ¬ Hyperandrogénie due à un *E25.08*
- COX type franco-canadien ¬ *G31.88*
- CPS1 ¬ *E72.2*
- CPT-1A ¬ *E71.3*
- CSF3R ¬ Neutropénie congénitale sévère autosomique récessive par *D70.0*
- CTPS1 ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par *D81.8*
- Cuivre lié à l'X ¬ *E83.0*
- CXCR2 ¬ Neutropénie congénitale sévère autosomique récessive par *D70.0*
- Cystathionase ¬ *E72.1*
- Cystathionine
- - Bêta-synthase ¬
- - - *E72.1*
- - - Homocystinurie par *E72.1*
- - Gamma-lyase ¬ *E72.1*
- Cytochrome
- - Oxydase C type franco-canadien ¬ *G31.88*
- - P450 oxydoréductase ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par *E25.08*
- DCLRE1C ¬ Immunodéficience combinée sévère due au *D81.1*
- Décarboxylase
- - Acides aminés aromatiques ¬ *G24.8*
- - Orotidylique ¬ *E79.8*
- - ¬ *E71.0*
- DECR ¬ Encéphalopathie progressive avec leucodystrophie par *G31.81*
- Delta-aminolévulinate déshydratase ¬ Porphyrie par *E80.2*
- Delta-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par *G71.0*
- D-glycérate
- - Déshydrogénase ¬ *E74.8*
- - Kinase ¬ *E74.8*
- Dihydrolipoamide déshydrogénase ¬ *E74.4*
- Dihydroptéridine réductase ¬ *E70.1*

Déficit *–suite*
- Dihydropyrimidinase ¬ *E79.8*
- Dihydropyrimidine déshydrogénase ¬ *E79.8*
- Diméthylglycine déshydrogénase ¬ *E72.5*
- DLD ¬ *E74.4*
- DNA ligase IV ¬ *D81.1*
- DNAJC12 ¬ Hyperphénylalaninémie par *E70.1*
- DNA-PKcs ¬ Immunodéficience combinée sévère par *D81.1*
- DOCK8 ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.1*
- Dolichol
- - Kinase ¬ *E77.8*
- - Phosphate ¬ Hypotonie et ichtyose par *E77.8*
- Dolichyl-phosphate N-acetylgalactosamine phosphotransférase ¬ *E77.8*
- Dol-P-mannosyltransférase ¬ *E77.8*
- Dopamine bêta-hydroxylase ¬ *G90.8*
- Entéropeptidase ¬ Entéropathie congénitale due à un *K90.8*
- Enzymatique
- - Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): *D55.1*
- - Sans précision ¬ Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un *E25.09*
- - Troubles héréditaires ¬ Arthropathie goutteuse due à un *M14.0**
- - ¬
- - - *E88.0*
- - - Anomalie
- - - - Adrénogénitales congénitales liées à un *E25.08*
- - - - Génito-surrénaliennes congénitales liées à un *E25.0*
- Enzyme
- - Bifonctionnelle ¬ *E71.3*
- - Branchante
- - - Forme neuromusculaire périnatal fatale ¬
- - - - Glycogénose par *E74.0*
- - - - GSD par *E74.0*
- - - ¬ GSD par *E74.0*
- - Branchement ¬ *E74.0*
- - Débranchante ¬ GSD par *E74.0*
- - Débranchement ¬ *E74.0*
- Exophiline 5 ¬ Epidermolyse bulleuse simple par *Q81.0*
- Facteur
- - C3 du complément ¬ *D84.1*
- - I ¬ *D68.20*
- - IX ¬ *D67*
- - Rosenthal ¬ *D68.1*
- - Stuart-Prower ¬ *D68.24*
- - VII ¬ *D68.23*
- - VIII
- - - Dysfonction vasculaire ¬ *D68.09*
- - - Trouble fonctionnel endothélial ¬ *D68.09*

Déficit *–suite*
- Facteur *–suite*
- - XII ¬ *D68.25*
- Familial
- - ApoA-I ¬ *E78.6*
- - Bénin en cuivre ¬ *E83.0*
- - Complet en LCAT ¬ *E78.6*
- - Isolé en récepteur de la prolactine ¬ *E22.1*
- Fer réfractaire au traitement par le fer ¬ Anémie par *D50.8*
- Ficoline 3 ¬ Déficit immunitaire par *D84.1*
- FKRP ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par *G71.0*
- Fonctionnel méthionine synthase
- - Type cblG ¬ *E72.1*
- - ¬ *E72.1*
- Formiminotransférase cyclodésaminase ¬ *E70.8*
- Fructokinase ¬ *E74.1*
- Fructose-1,6-diphosphatase ¬ *E74.1*
- FTCD ¬ *E70.8*
- Fumarylacétoacétase ¬ *E70.2*
- G6P translocase ¬ *E74.0*
- G6PC3 ¬ Neutropénie congénitale sévère autosomique récessive par *D70.0*
- G6PT type Ib ¬ *E74.0*
- GABA transaminase ¬ *E72.8*
- Galactocérébrosidase ¬ *E75.2*
- Galactokinase ¬ *E74.2*
- Galactose épimérase ¬ *E74.2*
- Galactose-1-phosphate uridyltransférase ¬ *E74.2*
- Galactosylcéramidase ¬ *E75.2*
- GALK ¬ *E74.2*
- Gamma-cystathionase ¬ *E72.1*
- Gamma-glutamyl transpeptidase ¬ *E72.8*
- Gamma-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par *G71.0*
- GHR ¬ Petite taille par *E34.3*
- GINS1 ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- Globuline fixant le cortisol ¬ *E27.8*
- Glucoamylase ¬ Diarrhée chronique associée à un *E74.3*
- Glucocérébrosidase ¬ *E75.2*
- Glucokinase ¬
- - Hyperinsulinisme par *E16.1*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique par *E16.1*
- Glucosamine N-acétyl-6-sulfatase ¬ *E76.2*
- Glucose-6-phosphatase ¬ Glycogénose par *E74.0*
- Glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PDH] ¬ *E74.8*
- Glucosidase 1 ¬ *E77.8*
- Glucosyltransférase
- - 1 ¬ *E77.8*
- - 2 ¬ *E77.8*

Déficit *–suite*
- Glucuronyltransférase ¬ *E80.5*
- GLUT2 ¬
- - Glycogénose par *E74.0*
- - GSD par *E74.0*
- Glutamate formiminotransférase ¬ *E70.8*
- Glutamine synthétase ¬ Dysgénésie cérébrale congénitale par *E72.8*
- Glutaryl-CoA
- - Déshydrogénase ¬ *E72.3*
- - Oxydase ¬ *E72.3*
- Glutathion réductase ¬ Anémie hémolytique due à un *D55.1*
- Glycine-N-méthyltransférase ¬ Hyperméthioninémie provoquée par un *E72.1*
- Glycogène
- - Phosphorylase musculaire ¬ Glycogénose par *E74.0*
- - Synthase hépatique ¬
- - - *E74.0*
- - - GSD par *E74.0*
- GTP cyclohydrolase I ¬ *E70.1*
- GTPCH ¬ *E70.1*
- Guanylate cyclase 2C ¬ Iléus méconial par *P76.0*
- Hélice "winged" ¬ *D82.8*
- Héparane sulfamidase ¬ *E76.2*
- Héparane-alpha-glucosaminide N-acétyltransférase ¬ *E76.2*
- Héréditaire
- - Combiné facteur
- - - Coagulation dépendants de la vitamine K ¬ *D68.28*
- - - II, VII, IX et X ¬ *D68.28*
- - Facteur
- - - Coagulation, n.c.a. ¬ *D68.28*
- - - Labile ¬ *D68.22*
- - - Stabilisant de la fibrine ¬ *D68.26*
- - Fibrinogène ¬ *D68.20*
- - Fructose-1-phosphate aldolase ¬ *E74.1*
- - Globuline AC (accélératrice) ¬ *D68.22*
- - Glutamine synthétase ¬ *E72.8*
- - Proaccélérine ¬ *D68.22*
- - Proconvertine ¬ *D68.23*
- Hexokinase ¬ Anémie (due à): *D55.2*
- Hexosaminidase A ¬ *E75.0*
- Histidase ¬ *E70.8*
- Histidine-ammoniac-lyase ¬ *E70.8*
- HNF1A ¬ Hyperinsulinisme par *E16.1*
- HNF4A ¬ Hyperinsulinisme par *E16.1*
- Homocarnosinase ¬ *E72.8*
- Hormone
- - Anti-Müller ¬ *E29.1*
- - Croissance) ¬ Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [Bruton] (avec *D80.0*
- HPRT grade IV ¬ *E79.1*

Déficit *–suite*
- HSD10 atypique ¬ *G25.5*
- Hyaluronidase ¬ *E76.2*
- Hypophysaire
- - Associé
- - - Kyste de la poche de Rathke ¬ *E23.6*
- - - Syndrome de la selle turcique vide ¬ *E23.0*
- - ¬ *E23.7*
- Hypoxanthine guanine phosphoribosyltransférase grade IV ¬ *E79.1*
- Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase grade I ¬ *E79.8*
- Iduronate 2-sulfatase ¬ *E76.1*
- IKAROS ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- IKK2 ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par *D81.2*
- IL21R ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- Immunitaire
- - Adulte avec autoanticorps anti-interféron-gamma acquis ¬ *D84.8*
- - Associé anomalie
- - - Facteur
- - - - I ¬ *D84.1*
- - - - ¬ *D84.1*
- - - Majeur
- - - - Précisées ¬ *D82.8*
- - - - Sans précision ¬ *D82.9*
- - - - ¬ *D82*
- - Augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] ¬ *D80.5*
- - Combiné
- - - Déficit
- - - - DOCK8 ¬ *D81.1*
- - - - GINS1 ¬ *D81.8*
- - - - IKAROS ¬ *D81.8*
- - - - IL21R ¬ *D81.8*
- - - - LRBA ¬ *D81.8*
- - - - MAGT1 ¬ *D81.8*
- - - - MALT1 ¬ *D81.8*
- - - - OX40 ¬ *D81.8*
- - - - Partiel en RAG1 ¬ *D81.8*
- - - - RAG1/2 ¬ *D81.1*
- - - - STK4 ¬ *D81.8*
- - - - TFRC ¬ *D81.8*
- - - - ZAP70 ¬ *D81.8*
- - - Dysfonctionnement du canal CRAC ¬ *D81.8*
- - - Hyperéosinophilie ¬ *D81.8*
- - - Microcéphalie-retard de croissance-sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de *D81.1*
- - - Sans précision ¬ *D81.9*
- - - Sévère
- - - - Déficit
- - - - - Adénosine désaminase ¬ *D81.3*

Déficit *–suite*
- Immunitaire *–suite*
- - Combiné *–suite*
- - - Sévère *–suite*
- - - - Déficit *–suite*
- - - - - CORO1A ¬ *D81.2*
- - - - - CTPS1 ¬ *D81.8*
- - - - - IKK2 ¬ *D81.2*
- - - - - LAT ¬ *D81.2*
- - - - DICS
- - - - - Dysgénésie réticulaire ¬ *D81.0*
- - - - - Nombre faible de cellules B et T ¬ *D81.1*
- - - - - Nombre faible ou normal de cellules B ¬ *D81.2*
- - - - - SAI ¬ *D81.9*
- - - - T-B- ¬ *D81.1*
- - - - T-B+
- - - - - Déficit en JAK3 ¬ *D81.2*
- - - - - Lié à l'X ¬ *D81.2*
- - - - ¬
- - - - - SCID [*D81.9*
- - - - - Syndrome de dysplasie osseuse à membres courts- *D82.2*
- - - ¬
- - - - *D81*
- - - - *D81.8*
- - Commun variable
- - - Anomalie prédominant
- - - - Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ *D83.1*
- - - - Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ *D83.0*
- - - Autoanticorps anti-lymphocytes B ou T ¬ *D83.2*
- - - Sans précision ¬ *D83.9*
- - - ¬
- - - - *D83*
- - - - *D83.8*
- - - - *D83.9*
- - Déficit
- - - Ficoline 3 ¬ *D84.1*
- - - Prédominant production anticorps
- - - - Sans précision ¬ *D80.9*
- - - - ¬ Autres *D80.8*
- - Micromélie ¬ *D82.2*
- - Neutrophile ¬ Syndrome de *D71*
- - Précisés ¬ Autres *D84.8*
- - Primaire
- - - Autosomique récessif avec un défaut de cytotoxicité spontanée des cellules Natural Killer ¬ *D84.8*
- - - Déficit en MCM4 ¬ *D84.8*
- - - Infection virale disséminée post-vaccination ROR ¬ *D84.8, T88.0*
- - - ¬ *D84.9*
- - Réponse héréditaire anormal virus Epstein-Barr ¬

Déficit *–suite*
- Immunitaire *–suite*
- - Réponse héréditaire anormal virus Epstein-Barr ¬ *–suite*
- - - *D82.3*
- - Sans précision ¬ *D84.9*
- - Thrombocytopénie et eczéma ¬ *D82.0*
- - ¬
- - - *D84*
- - - Aplasie ou hypoplasie thymique avec *D82.1*
- - - Syndrome de maladie veino-occlusive hépatique- *D82.8, K76.5*
- Inhibiteur
- - Alpha-1 protéinase ¬ *E88.0*
- - C1 estérase [C1-INH] ¬ *D84.1*
- Intégrine alpha-7 ¬ Dystrophie musculaire congénitale par *G71.2*
- Interleukin-1 receptor-associated kinase-4 ¬ Immunodéficience par *D84.8*
- Isobutyryl-CoA déshydrogénase ¬ *E71.1*
- Isolé
- - 17,20-lyase ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XY par *E29.1*
- - Complexe
- - - I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ *G31.81*
- - - IV de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ *G31.81*
- - - V de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ *G31.81*
- - Familial en glucocorticoïdes ¬ *E27.1*
- - Glycérol kinase ¬ *E74.8*
- - NADH-coenzyme Q réductase ¬ *G31.81*
- - NADH-ubiquinone réductase ¬ *G31.81*
- - Stockage des granules plaquettaires delta ¬ *D69.1*
- - Sulfite oxydase ¬ *E72.1*
- Isovaléryl-CoA déshydrogénase ¬ *E71.1*
- JAGN1 ¬ Neutropénie congénitale sévère autosomique récessive par *D70.0*
- JAK3 ¬ Déficit immunitaire combiné sévère T-B+ par *D81.2*
- Kir6 2 ¬ Hyperinsulinisme
- - Autosomique
- - - Dominant par *E16.1*
- - - Récessif par *E16.1*
- - Focal résistant au diazoxide par *E16.1*
- Kynuréninase ¬ *E70.8*
- Lactate déshydrogénase ¬
- - Glycogénose par *E74.4*
- - GSD par *E74.4*
- LAL ¬ *E75.5*
- Lamine A/C ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par *G71.0*
- Laminine alpha 2 ¬ Dystrophie musculaire congénitale par *G71.2*
- LAMP-2 ¬ Glycogénose par *E74.0*

Déficit *–suite*
- L-arginine:glycine amidinotransférase ¬ *E72.8*
- LAT ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par *D81.2*
- LCAT ¬ *E78.6*
- LCHAD ¬ *E71.3*
- LDH ¬ *E74.4*
- Lécithine-cholestérol-acyltransférase ¬
- - *E78.6*
- - Glomérulonéphrite au cours d'un *E78.6†, N08.4**
- - Glomérulopathie au cours de *E78.6†, N08.4**
- Lipase
- - Acide lysosomale ¬ *E75.5*
- - Hépatique ¬ Hyperlipidémie due à un *E78.4*
- Lipoprotéines
- - Haute densité ¬ *E78.6*
- - ¬ *E78.6*
- LRBA ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- Lysine alpha-cétoglutarate réductase ¬ *E72.3*
- MAGT1 ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- Malonyl-CoA décarboxylase ¬ *E72.8*
- MALT1 ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- Maltase acide ¬ Glycogénose par *E74.0*
- Mannosyltransférase
- - 1 ¬ *E77.8*
- - 2 ¬ *E77.8*
- - 6 ¬ *E77.8*
- - 7-9 ¬ *E77.8*
- - 8 ¬ *E77.8*
- MARS à début précoce ¬ Protéinose alvéolaire pulmonaire sévère par *J84.0*
- MASP-2 ¬ Immunodéficience par *D84.1*
- MCAD ¬ *E71.3*
- MCC ¬ *E71.1*
- MCM4 ¬ Déficit immunitaire primaire par *D84.8*
- Mental SAI ¬ *F79*
- Méthionine adénosyltransférase ¬ Démyélinisation du cerveau par *E72.1*
- Méthylcobalamine
- - Type
- - - CblE ¬ *E72.1*
- - - CblG ¬ *E72.1*
- - ¬ *E72.1*
- Méthylène tétrahydrofolate réductase ¬
- - *E72.1*
- - Homocystinurie
- - - *E72.1*
- Méthylmalonate semialdéhyde déshydrogénase ¬ Retard de développement par *E71.1*

Déficit *–suite*
- Méthylmalonyl-CoA épimérase ¬ Acidurie méthylmalonique par *E71.1*
- Monoamine-oxydase A ¬ *E70.8*
- MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique mitochondriale avec acidose lactique par *I42.2*
- Multiple
- - Acyl-CoA déshydrogénases ¬ *E71.3*
- - Carboxylases ¬ *E53.8*
- - Sulfatases ¬ *E75.2*
- Myéloperoxydase ¬ *E80.3*
- Myophosphorylase ¬ Maladie glycogénique par *E74.0*
- N-acétylglucosamine-1-phosphotransférase ¬ *E77.0*
- N-acétylglucosaminyltransférase 2 ¬ *E77.8*
- N-acétylglutamate synthase ¬
- - *E72.2*
- - Hyperammoniémie par *E72.2*
- N-acyl-L-amino acide amidohydrolase ¬ *E72.8*
- NADH-coenzyme Q réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par *I42.2*
- NADH-CoQ réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par *I42.2*
- NAGS ¬ *E72.2*
- NET ¬ Intolérance orthostatique par *I95.1*
- Noradrénaline ¬ *G90.8*
- Ornithine
- - Aminotransférase ¬ *E72.4*
- - Carbamoyltransférase ¬ *E72.4*
- - Transcarbamylase ¬ *E72.4*
- OTC ¬ *E72.4*
- OX40 ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- Oxoprolinase ¬ Oxoprolinurie liée à un *E72.8*
- OXPHOS combiné ¬ *E88.8*
- Oxydase de l'acide homogentisique ¬ *E70.2*
- Oxydoréduction des alcools d'acides gras ¬ *Q87.1*
- Pantothénate kinase ¬ Neurodégénérescence associée à un *G23.0*
- Partiel
- - CYP11A1 ¬ Insuffisance surrénalienne héréditaire isolée par *E27.1*
- - Facteur 8 régulateur de l'interféron ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par *D84.8*
- - Hypoxanthine guanine phosphoribosyltransférase ¬ *E79.8*
- - IFNgammaR2 ¬ MSMD autosomique récessive par *D84.8*
- - Méthylmalonyl-CoA mutase ¬ *E71.1*
- - Mévalonate kinase ¬ *D89.9*
- - RAG1 ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- - Récepteur
- - - 1 interféron gamma ¬ MSMD autosomique

Déficit *–suite*
- Partiel *–suite*
- - Récepteur *–suite*
- - - 1 interféron gamma ¬ MSMD autosomique *–suite*
- - - - Dominante par *D84.8*
- - - - Récessive par *D84.8*
- - - 2 de l'interféron gamma ¬ MSMD autosomique dominante par *D84.8*
- - STAT1 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par *D84.8*
- PEPCK ¬ *E74.4*
- PEX10 ¬ Ataxie autosomique récessive par *G11.8*
- Phénylalanine hydroxylase ¬ *E70.1*
- PhK ¬ Glycogénose par *E74.0*
- Phosphatase
- - Acide ¬ *E83.38*
- - Complexe pyruvate déshydrogénase ¬ *E74.4*
- Phosphoénolpyruvate carboxykinase ¬ *E74.4*
- Phosphofructokinase
- - Musculaire ¬
- - - *E74.0*
- - - Glycogénose par *E74.0*
- - ¬ *E74.0*
- Phosphoglucomutase
- - 1 ¬ *E74.0*
- - ¬ GSD par *E74.0*
- Phosphoglucose isomérase ¬ Anémie hémolytique due à un *D55.2*
- Phosphoglycérate
- - Kinase ¬ GSD par *E74.0*
- - Kinase 1 ¬ Maladie glycogénique par *E74.0*
- - Mutase ¬ Glycogénose par *E74.0†, G73.6**
- Phosphoglycéromutase ¬ Anémie hémolytique due à un *D55.2*
- Phosphomannomutase 2 ¬ *E77.8*
- Phosphomannose isomérase ¬ *E77.8*
- Phosphoribosylpyrophosphate
- - Synthétase ¬ *E79.8*
- - Transférase ¬ *E79.8*
- Phosphorylase
- - Hépatique ¬
- - - *E74.0*
- - - Glycogénose par *E74.0*
- - Kinase
- - - Hépatique et musculaire ¬ Glycogénose par *E74.0*
- - - Musculaire ¬ GSD par *E74.0*
- - - ¬
- - - - Glycogénose par *E74.0*
- - - - GSD par *E74.0*
- - Musculaire ¬ *E74.0*
- Phosphosérine aminotransférase ¬ *E72.8*
- Plakophiline ¬ Epidermolyse bulleuse simple par *Q81.0*

Déficit *–suite*
- POMK ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par *G71.0*
- Potassium [K] ¬ *E87.6*
- Précurseur de thromboplastine plasmatique [PTA] ¬ *D68.1*
- Prédominant production anticorps
- - Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec *D80.9*
- - ¬ Autres déficits immunitaires avec *D80.8*
- Primaire en CD59 ¬ *D84.1*
- Prohormone convertase I ¬ Obésité par *E66.89*
- Prolidase ¬ *E72.8*
- Proline oxydase ¬ *E72.5*
- Pro-opiomélanocortine ¬ Obésité par *E66.89*
- Properdine ¬ *D84.1*
- Propionyl-CoA carboxylase ¬ *E71.1*
- Prosaposine ¬ Encéphalopathie par *E75.2*
- Protéine
- - C du surfactant ¬ Pneumopathie interstitielle par *J84.8*
- - Transfert des esters de cholestérol ¬ *E78.4*
- Protoporphyrinogène oxydase ¬ *E80.2*
- Pseudovitamine D ¬ *E83.31*
- Purine nucléoside phosphorylase [PNP] ¬ *D81.5*
- Pyridoxamine 5'-phosphate oxydase ¬ *G40.8*
- Pyrimidine 5' nucléotidase ¬ Anémie hémolytique due à un *D55.3*
- Pyruvate
- - Carboxylase ¬ *E74.4*
- - Déshydrogénase
- - - E1-alpha ¬ *E74.4*
- - - E2 ¬ *E74.4*
- - - E3 ¬ *E74.4*
- - - ¬ *E74.4*
- - Kinase
- - - Érythrocytaire ¬ *D55.2*
- - - Globule rouge ¬ Anémie hémolytique due à un *D55.2*
- - - PK] ¬ Anémie (due à): *D55.2*
- RAG1/2 ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.1*
- Récepteur
- - Insuline ¬ Hypoglycémie hyperinsulinémique par *E16.1*
- - Leptine ¬ Obésité par *E66.89*
- - Mélanocortine 4 ¬ Obésité par *E66.89*
- - Secrétagogues de l'hormone de croissance ¬ Petite taille par *E34.3*
- - Transcobalamine ¬ Acidurie méthylmalonique par *E71.1*
- - TRH ¬ Hypothyroïdie centrale due à un *E03.1*
- Réversible en COX ¬ Myopathie mitochondriale avec *G71.3*
- Rh ¬ Syndrome de *D58.8*
- Ribose-5-phosphate isomérase ¬ *E74.8*

Déficit *–suite*
- Saccharase-isomaltase ¬ *E74.3*
- Saccharopine déshydrogénase ¬ *E72.3*
- S-adénosylhomocystéine hydrolase ¬
- - Hyperméthioninémie par *E72.1*
- - Retard psychomoteur par *E72.1*
- SCAD ¬ *E71.3*
- SCHAD ¬ *E71.3*
- SCOT ¬ *E71.3*
- Secondaire en lactase ¬ *E73.1*
- Sélectif
- - Anticorps anti-polysaccharide ¬ Immunodéficience par *D80.6*
- - Immunoglobuline
- - - A [IgA] ¬ *D80.2*
- - - M [IgM] ¬ *D80.4*
- - Sous-classes d'immunoglobulines G [IgG] ¬ *D80.3*
- Sérine ¬ Maladie neurométabolique par *E72.8*
- SLC16A1 ¬ Hyperinsulinisme par *E16.1*
- Sodium [Na] ¬ *E87.1*
- SPCA [serum prothrombin conversion accelerator] ¬ *D68.23*
- SSADH ¬ *E72.8*
- STAR ¬ Hyperplasie congénitale lipoïde des surrénales par *E25.08*
- STAT1 ¬ *D84.8*
- Stéroïdes
- - Déshydrogénase-anomalies dentaires ¬ Syndrome de *K76.8*
- - Sulfatase ¬ *Q80.1*
- Stérol
- - 27-hydroxylase ¬ *E75.5*
- - C5-désaturase ¬ *Q87.8*
- STK4 ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- Succinate-semi-aldéhyde déshydrogénase ¬ *E72.8*
- Succinyl-CoA
- - 3
- - - Cétoacide CoA transférase ¬ *E71.3*
- - - Oxoacide CoA transférase ¬ *E71.3*
- - Acétoacétate transférase ¬ *E71.3*
- Sucrase ¬ *E74.3*
- Sulfatase ¬ *E75.2*
- Sulfite oxydase
- - Déficit cofacteurs molybdène
- - - Type A ¬ *E72.1*
- - - ¬ *E72.1*
- - ¬
- - - *E72.1*
- - - Encéphalopathie par *E72.1*
- SUR1 ¬ Hyperinsulinisme
- - Autosomique
- - - Dominant par *E16.1*
- - - Récessif par *E16.1*

Déficit *–suite*
- SUR1 ¬ Hyperinsulinisme *–suite*
- - Focal résistant au diazoxide par *E16.1*
- Synthèse de la thromboxane ¬ Troubles hémorragiques par *D69.88*
- Systémique primaire en carnitine ¬ *E71.3*
- Tétrahydrobioptérine ¬
- - *E88.8*
- - Hyperphénylalaninémie par *E70.1*
- TFRC ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- Tissulaire limité à la peau [derme] et au tissu sous-cutané ¬ *I70.24*
- Transaldolase ¬ *E74.8*
- Transaminase de l'acide gamma-aminobutyrique ¬ *E72.8*
- Transcortine ¬ *E27.8*
- Transport cérébral des folates ¬ Syndrome neurodégénératif dû au *G31.88*
- Transporteur à ATP-binding cassette A1 ¬ *E78.6*
- Tréhalase ¬ Diarrhée et vomissements dus à un *E74.3*
- Triglycéride lipase pancréatique ¬ *K90.3*
- Triose-phosphate isomérase ¬ Anémie (due à): *D55.2*
- TYK2 ¬ Syndrome hyper-IgE autosomique récessif par *D82.4*
- Tyrosine
- - Aminotransférase ¬ Tyrosinémie par *E70.2*
- - Hydroxylase ¬
- - - *G24.1*
- - - Dystonie dopa-sensible par *G24.1*
- Ubiquinone ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique récessive par *G11.1*
- UCP2 ¬
- - Hyperinsulinisme par *E16.1*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique par *E16.1*
- Uridine
- - Diphosphate-galactose-4-épimérase ¬ *E74.2*
- - Monophosphate synthase ¬ *E79.8*
- Urocanase ¬ Encéphalopathie par *E70.8*
- Vitamine E ¬ Ataxie par *G11.1*
- WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante-épilepsie-déficience intellectuelle par *G11.1*
- Xanthine
- - Déshydrogénase ¬ *E79.8*
- - Oxydase ¬ *E79.8*
- - Oxydoréductase ¬ *E79.8*
- Xylitol déshydrogénase ¬ *E74.8*
- ZAP70 ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*

Défiguration due à des cicatrices ¬ *L90.5*

Défini
- Appareil
- - Digestif ¬ Tumeur

Défini *–suite*
- Appareil *–suite*
- - Digestif ¬ Tumeur *–suite*
- - - Bénin
- - - - Parties autres et mal *D13*
- - - - Sièges mal *D13.9*
- - - Maligne: Sièges mal *C26.9*
- - Respiratoire ¬ Tumeur maligne: sièges mal *C39.9*
- Localisation focal partiel crise
- - Début focal ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques *G40.0*
- - Partiel
- - - Complexes ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques *G40.2*
- - - Simples ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques *G40.1*
- Non précisées ¬ Autres causes de mortalité mal *R99*
- ¬
- - Cardiopathies mal *I51.8*
- - Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal *I51*
- - Examen général de routine d'une sous-population *Z10*
- - Tumeur malign
- - - Appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal *C39*
- - - Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal *C76.8*
- - - Lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal *C14*
- - - Organes digestifs, de sièges autres et mal *C26*
- - - Sièges mal *C76.7*

Définissant le SIDA) ¬ Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies *U60.3!*

Deformans
- Alkaptonurica ¬ Osteoarthrosis *E70.2†, M36.8**
- Cours de tumeur maligne de l'os ¬ Osteodystrophia *C41.9†, M90.69**

Déformante
- Juvénile ¬ Hyperostose corticale *M88.99*
- Oblitérante ¬ Endartérite: *I70*
- Tibia ¬ Ostéochondrose *M92.5*
- ¬
- - Arthropathie syphilitique *A52.1†, M14.69**
- - Dystonie musculaire *G24.1*
- - Maladie osseuse de Paget [ostéite *M88*
- - Polypose rhino-sinusienne *J33.1*

Déformation
- Acquis
- - Auriculaire ¬ *H61.1*
- - Bassin ¬ *M95.5*
- - Cheville
- - - Pied ¬ Autres *M21.68*
- - - ¬ *M21.68*

Déformation *–suite*
- Acquis *–suite*
- - Cou ¬ *M95.3*
- - Doigts et des orteils ¬ *M20*
- - Gros orteil ¬ Autres *M20.3*
- - Membre
- - - Sans précision ¬ *M21.9*
- - - ¬ Autres *M21*
- - Nez ¬ *M95.0*
- - Orteil(s) ¬ Autres *M20.5*
- - Pavillon de l'oreille ¬ *H61.1*
- - Précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif ¬ Autres *M95.8*
- - S) d'(es) orteil(s), sans précision ¬ *M20.6*
- - Système ostéo-articulaire muscle tissu conjonctif
- - - Sans précision ¬ *M95.9*
- - - ¬ Autres *M95*
- - Tête ¬ Autres *M95.2*
- - Thorax et des côtes ¬ *M95.4*
- Appareil urinaire SAI ¬ congénitale: *Q64.9*
- Boutonnière et en col de cygne ¬ *M20.0*
- Colonne vertébrale due à la tuberculose ¬ *A18.0†, M49.09**
- Congénital
- - Doigts ¬ *Q68.1*
- - Rate ¬ *Q89.08*
- Cornée ¬ Autres *H18.7*
- Doigt(s) ¬ *M20.0*
- Flexion ¬ *M21.2*
- Hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure ¬ *M91.2*
- Orbite ¬ *H05.3*
- Oreille ¬ Autres *Q17.3*
- Pelvienne ¬ Dystocie due à une *O65.0*
- Précis
- - Membres ¬ Autres *M21.8*
- - ¬ Autres dorsopathies avec *M43.8*
- SAI
- - Téguments/phanères SAI ¬ *Q84.9*
- - ¬ congénitale: *Q89.9*
- Sans précision ¬ Dorsopathie avec *M43.9*
- Syphilitique
- - Tardive du nez ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Tibia en lame de sabre ¬ *A50.5†, M90.26**
- Valgus, non classée ailleurs ¬ *M21.0*
- Varus, non classée ailleurs ¬ *M21.1*
- ¬ Autres dorsopathies avec *M43*

Déformée en forme de pelle ¬ Incisive *K00.2*

Dégénératif
v. Type de maladie

Dégénérescence
- Amyloïde
- - Moelle épinière ¬ *E85.4†, G32.8**
- - Système nerveux ¬ *E85.4†, G99.8**

Dégénérescence *–suite*
- Artérielle ¬ *I70*
- Artériovasculaire ¬ *I70*
- Capillaire amyloïde ¬ *E85.8†, I79.8**
- Cérébelleux
- - Acquise ¬ *G31.9*
- - Alcoolique ¬ *G31.2*
- - Cérébelleuse) héréditaire ¬ *G11.9*
- - ¬ Syndrome d'ichtyose-hépatosplénomégalie- *Q87.8*
- Cérébral
- - Alcoolique ¬ *G31.2*
- - Artériosclérotique ¬ *I67.2†, G32.8**
- - Béribéri ¬ *E51.1†, G32.8**
- - Cours
- - - Carence en vitamine B12 ¬ *E53.8†, G32.8**
- - - Lipidose
- - - - Cérébrale au cours de lipidose cérébrale ¬ *E75.4†, G32.8**
- - - - Généralisée ¬ *E75.6†, G32.8**
- - - Maladie
- - - - Anderson-Fabry ¬ *E75.2†, G32.8**
- - - - Niemann-Pick ¬ *E75.2†, G32.8**
- - - - Vaisseaux cérébraux ¬ *I67.9†, G32.8**
- - - Mucopolysaccharidose ¬ *E76.3†, G32.8**
- - - Myxœdème ¬ *E03.9†, G32.8**
- - - Sphingolipidose ¬ *E75.3†, G32.8**
- - - Syndrome
- - - - Gaucher ¬ *E75.2†, G32.8**
- - - - Hunter ¬ *E76.1†, G32.8**
- - - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G32.8**
- - Sénile, non classée ailleurs ¬ *G31.1*
- Cérébro-vasculaire ¬ *I67.9†, G32.8**
- Choriorétinienne péripapillaire hélicoïdale ¬ *H31.2*
- Choroïdienne ¬ *H31.1*
- Cœur myocarde
- - Graisseuse ¬ *I51.5*
- - Sénile ¬ *I51.5*
- Combiné
- - Moelle épinière NCA ¬ Anémie avec *D51.0†, G32.0**
- - Subaigu moelle épinière cours
- - - Carence en vitamine B12 ¬ *E53.8†, G32.0**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *G32.0**
- Congénitale du cerveau chez l'enfant ¬ *Q04.9*
- Cornée ¬ *H18.4*
- Corps vitré ¬ *H43.8*
- Corticobasale [DCB] ¬ *G31.0†, F02.0**
- Discale ¬ Radiculite due à une *M51.1†, G55.1**
- Disque
- - Intervertébral
- - - Cervical

Dégénérescence *–suite*
- Disque *–suite*
- - Intervertébral *–suite*
- - - Cervical *–suite*
- - - - Myélopathie ¬ *M50.0†, G99.2**
- - - - Névrite ¬ *M50.1†, G55.1**
- - - - Radiculopathie ¬ *M50.1†, G55.1**
- - - Lombaires avec myélopathie ¬ *M51.0†, G99.2**
- - - Thoraciques avec radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**
- - - ¬ Myélopathie avec *M51.0†, G99.2**
- - Névrite ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**
- Facettes articulaires ¬ *M47*
- Familiale du neurone moteur ¬ *G12.2*
- Globe oculaire ¬ *H44.5*
- Graisseux
- - Alcoolique du foie ¬ *K70.0*
- - Foie, non classée ailleurs ¬ *K76.0*
- - Rein
- - - Diabète sucré type
- - - - 1 ¬ *E10.20†, N29.8**
- - - - 2 ¬ *E11.20†, N29.8**
- - - ¬ *E14.20†, N29.8**
- Hépatocytes ¬ *K76.8*
- Hépato-lenticulaire ¬ *E83.0*
- Hépatolenticulaire ¬ Démence au cours de *E83.0†, F02.8**
- Iris (pigmentaire) ¬ *H21.2*
- Macula
- - Lié âge
- - - Humide ¬ *H35.30*
- - - Néovasculaire ¬ *H35.30*
- - Pôle postérieur ¬ *H35.3*
- Maculaire
- - Juvénile ¬ Hypotrichose avec *Q87.8*
- - Liée à l'âge, sèche ¬ *H35.31*
- - Vitelliforme de l'adulte ¬ *H35.5*
- Maladie fibrokystique du rein ¬ *Q61.8*
- Media artérielle ¬ *I70.29*
- Ménisque ¬ *M23.3*
- Mönckeberg ¬ *I70.29*
- Multisystématisée ¬ *G23.2*
- Murale du cœur ¬ *I51.5*
- Myocarde ¬ *I51.5*
- Nerf optique ¬ *H47.0*
- Neuronale progressive de l'enfant avec maladie du foie ¬ *G31.88*
- Olivo-ponto-cérébelleuse
- - Familiale ¬ *G23.3*
- - Héréditaire ¬ *G23.3*
- Pallidale pigmentaire ¬ *G23.0*
- Partie irienne de la rétine ¬ *H21.2*
- Pulpaire ¬ *K04.2*
- Rebord pupillaire ¬ *H21.2*

Dégénérescence *–suite*
- Rétinien
- - Apparition tardive autosomique dominante ¬ *H35.5*
- - Entrecroisée ¬ *H35.4*
- - Microcystoïde ¬ *H35.4*
- - Palissade ¬ *H35.4*
- - Pavimenteuse ¬ *H35.4*
- - Périphérique ¬ *H35.4*
- - Réticulaire ¬ *H35.4*
- - SAI ¬ *H35.4*
- Syphilitique du myocarde ¬ *A52.0†, I52.0**
- Système nerveux liée à l'alcool ¬ *G31.2*
- Tapéto-rétinienne ¬ Syndrome d'hypoplasie cérébelleuse- *Q04.3*
- Tuberculeuse de la moelle épinière ¬ *A17.8†, G07**
- Tunique intermédiaire artérielle ¬ *I70.29*
- Vasculaire ¬ *I70*
- Vitréo-rétinien
- - Flocons de neige ¬ *H35.5*
- - Wagner ¬ *H35.5*

Déglutition
- Anormale ¬ Malocclusion due à: *K07.5*
- SAI ¬ Troubles de la *R13.9*
- Sang maternel ¬
- - Hématémèse et mélæna néonatals dus à une *P78.2*
- - Ictère néonatal dû à une *P58.5*

Degos
v. Dowling-Degos

Dégradation glycoprotéines ¬ défaut
- *E77.1*

DEH ¬ *Q82.4*

Déhiscence
- Canal semi-circulaire ¬ Syndrome de *H83.8*
- Plaie opératoire ¬ *T81.3*

Déhydrocholestérol réductase ¬ Déficit en 7- *Q87.1*

Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de *P14.1*

Déjerine-Sottas ¬ Maladie de: *G60.0*

Del(5q) ¬ Syndrome myélodysplasique
- Associé à une anomalie chromosomique isolée *D46.6*
- Délétion isolée du chromosome 5 [*D46.6*

Délaissement et abandon ¬ *T74.0*

Délétion
- 1p36 ¬
- - *Q93.5*
- - Syndrome de *Q93.5*
- 15q11q13 d'origine paternelle ¬ Syndrome de Prader-Willi dû à une *Q87.1*
- 22q13 ¬ *Q93.5*
- Autosomes
- - Non classées ailleurs ¬ Monosomies et *Q93*
- - Sans précision ¬ *Q93.9*

Délétion *–suite*
- Autosomes *–suite*
- - ¬ Autres *Q93.8*
- Bras court chromosome
- - 4 ¬ *Q93.3*
- - 5 ¬
- - - *Q93.4*
- - - Syndrome de *D46.6*
- Distale 3p ¬ *Q93.5*
- Isolée du chromosome 5 [del(5q)] ¬ Syndrome myélodysplasique avec *D46.6*
- Partielles d'un chromosome ¬ Autres *Q93.5*
- Réarrangements complexes ¬ *Q93.7*
- Subtélomérique 1p36 ¬ *Q93.5*
- Vues seulement à la prométaphase ¬ *Q93.6*

Délibéré
- E) ¬ Empoisonnement ou lésion auto-infligé(e) *X84.9!*
- Suicide) par moyens non précisés ¬ Effets non précisés de: lésion auto-infligée *T76*
- ¬ Lésion auto-infligé
- - *X84!*
- - *X84.9!*

Délibérément ¬ Accident de véhicule à moteur causé *Y09.9!*

Délinquance "de groupe" ¬ *F91.2*

Délirant
- États délirants et hallucinatoires d'origine organique ¬ Etats *F06.2*
- Hallucinatoires d'origine organique ¬ Etats délirants et états *F06.2*
- Induit ¬ Trouble *F24*
- Organique [d'allure schizophrénique] ¬ Trouble *F06.2*
- Persistant, sans précision ¬ Trouble *F22.9*
- Persistants ¬ Autres troubles *F22.8*
- Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ Bouffée *F23.0*
- Symptômes schizophréniques ¬ Bouffée *F23.1*
- ¬
- - Dysmorphophobie
- - - *F22.8*
- - - Non *F45.2*
- - Trouble
- - - *F22.0*
- - - Psychotique aigu, essentiellement *F23.3*

Délire
- Anticholinergique ¬ *T44.3*
- Postopératoire ¬ *F05.8*
- Relation des sensitifs ¬ *F22.0*

Delirium
- Non
- - Induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives ¬ *F05*
- - Surajouté à une démence, ainsi décrit ¬ *F05.0*
- Origine mixte ¬ *F05.8*

Delirium *–suite*
- Sans précision ¬ *F05.9*
- Surajouté à une démence ¬ *F05.1*
- ¬ Autres formes de *F05.8*

Délits commis en bande ¬ *F91.2*

Délivrance
- Troisième période) ¬ Hémorragie de la *O72.0*
- ¬ Hémorragie (du): consécutive à la *O72.1*

Delleman ¬ Syndrome de *Q87.8*

Delta
- AgHBe
- - Négatif
- - - Activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent *B18.14*
- - - Sans activité inflammatoire, faible réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent *B18.13*
- - Positif
- - - Activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent *B18.12*
- - - Sans activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent *B18.11*
- Bêta-thalassémie ¬ *D56.2*
- Coma hépatique ¬ Hépatite aigu B
- - Agent *B16.0*
- - Co-infection à agent *B16.0, K72.74!*
- - Sans
- - - Agent *B16.2*
- - - Co-infection à agent *B16.2, K72.74!*
- Cours de l'hépatite B chronique ¬ Infection aiguë à agent *B17.0*
- Phase
- - 1 ¬ Hépatite virale chronique B sans agent *B18.11*
- - 2 ¬ Hépatite virale chronique B sans agent *B18.12*
- - 3 ¬ Hépatite virale chronique B sans agent *B18.13*
- - 4 ¬ Hépatite virale chronique B sans agent *B18.14*
- - Immunotolérance ¬ Hépatite virale chronique B sans agent *B18.11*
- Sans coma hépatique ¬ Hépatite aigu B
- - Agent *B16.1*
- - Co-infection à agent *B16.1*
- - Sans coma hépatique ¬ Hépatite aiguë B, sans agent *B16.9*
- Sujet porteur de l'hépatite B ¬ (Sur)infection aiguë par agent *B17.0*
- ¬
- - Contient des cellules de type alpha-bêta et gamma- *C86.1*
- - Déficit isolé de stockage des granules plaquettaires *D69.1*
- - Hépatite viral chronique B
- - - Agent *B18.0*
- - - Sans agent *B18.1*

Delta-aminolévulinate déshydratase ¬ Porphyrie par déficit en *E80.2*

Delta-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.0*

Delta-sarcoglycanopathie ¬ *G71.0*

Deltoïde ¬ Entorse et foulure de la cheville: Ligament *S93.41*

Demande
- Autorités ¬ Examen psychiatrique général à la *Z04.8*
- Expertise ¬ *Z04.8*

Démangeaison SAI ¬ *L29.9*

Démarche
- Ataxique ¬ *R26.0*
- Ébrieuse ¬ *R26.0*
- Instable SAI ¬ *R26.8*
- Motilité
- - Non précisées ¬ Anomalies de la *R26.8*
- - ¬ Anomalies de la *R26*
- Paralytique ¬ *R26.1*
- Spastique ¬ *R26.1*

Démence
v.a. SIDA-démence
- Ainsi décrit ¬ Delirium non surajouté à une *F05.0*
- Alzheimer ¬ *G30.9†, F00.9**
- Artériopathique ¬ *F01*
- Atypique, de type Alzheimer ¬ *F00.2**
- Binswanger ¬ *F01.2*
- Blessure crânio-cérébrale ¬ *T90.9†, F02.8**
- Chorée de Huntington ¬ *F02.2**
- Corps de Lewy ¬ *G31.82†, F02.8**
- Cours
- - Atrophie cérébral
- - - Circonscrite ¬ *G31.0†, F02.0**
- - - Présénile ¬ *G31.88†, F02.8**
- - Carence
- - - Acide nicotinique ¬ *E52†, F02.8**
- - - Vitamine B12 ¬ *E53.8†, F02.8**
- - Dégénérescence hépatolenticulaire ¬ *E83.0†, F02.8**
- - Encéphalopathie ¬ *G93.4†, F02.8**
- - Hypercalcémie ¬ *E83.58†, F02.8**
- - Hypothyroïdie acquis
- - - Carence en iode ¬ *E01.8†, F02.8**
- - - ¬ *E03.9†, F02.8**
- - Intoxication au dioxyde de carbone ¬ *T58†, F02.8**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, F02.8**
- - Maladie
- - - Alzheimer ¬ *G30.9†, F00.9**
- - - Parkinson ¬ *G20.90†, F02.3**
- - - Wilson ¬ *E83.0†, F02.8**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *F02.8**
- - Neurosyphilis ¬ *A52.1†, F02.8**
- - Paralysie agitante ¬ *G20.90†, F02.3**

Démence *–suite*
- Cours *–suite*
- - Pellagre ¬ *E52†, F02.8**
- - Périartérite noueuse ¬ *M30.0†, F02.8**
- - Sclérose
- - - Alzheimer ¬ *G30.9†, F00.9**
- - - Cérébrale lobaire atrophique ¬ *G31.0†, F02.0**
- - - Présénile ¬ *G30.0†, F00.0**
- - Sclérose en plaques ¬ *G35.9†, F02.8**
- - Trouble cérébral du métabolisme des lipides ¬ *E75.6†, F02.8**
- - Trypanosomiase africaine ¬ *B56.9†, F02.8**
- - Tumeur intracrânienne incertaine ¬ *D43.2†, F02.8**
- Dégénératif primaire
- - SAI ¬ *F03*
- - Type Alzheimer
- - - Apparition
- - - - Présénile ¬ *G30.0†, F00.0**
- - - - Sénile ¬ *G30.1†, F00.1**
- - - Début
- - - - Présénile ¬ *F00.0**
- - - - Sénile ¬ *F00.1**
- - - ¬ *G30.9†, F00.9**
- Dialytique ¬ *N18.5†, F02.8**
- Encéphalique ¬ *G04.9†, F02.8**
- Épileptique ¬ *G40.9†, F02.8**
- Forme dépressive ou paranoïde ¬ Démence sénile: *F03*
- Fronto temporal
- - FTD] ¬ *G31.0†, F02.0**
- - Variante
- - - Atrophie temporale à droite ¬ *G31.0†, F02.0**
- - - Comportementale ¬ *G31.0†, F02.0**
- Guam-Parkinson ¬ Complexe de *G21.8†, F02.8**
- Heller ¬ *F84.3*
- Infantile ¬ *F84.3*
- Inhalation de drogues ¬ *F18.7*
- Maladie
- - Alzheimer début
- - - Précoce (type 2) ¬ *G30.0†, F00.0**
- - - Tardif
- - - - Type 1) ¬ *G30.1†, F00.1**
- - - - ¬ *G30.1†, F00.1**
- - Creutzfeldt-Jakob ¬ *A81.0†, F02.1**
- - Pick ¬ *G31.0†, F02.0**
- Paralysante au cours de syphilis ¬ *A52.1†, F02.8**
- Paralysie agitante ¬ *F02.3**
- Paralytique
- - Congénitale ¬ *A50.4†, F02.8**
- - Juvénile
- - - Syphilitique ¬ *A50.4†, F02.8**
- - - ¬

Démence *–suite*
- Paralytique *–suite*
- - Juvénile *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - *A50.4*
- - - - *A50.4†, F02.8**
- - Syphilitique progressive ¬ *A52.1†, F02.8**
- - ¬ *A52.1†, F02.8**
- Parkinsonisme ¬ *F02.3**
- Prédominance corticale ¬ *F01.1*
- Présénile
- - Cours de maladie d'Alzheimer ¬ *G30.0†, F00.0**
- - SAI ¬ *F03*
- - Type Alzheimer ¬ *F00.0**
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B22†, F02.4**
- Pugilistique ¬ *F07.2*
- Sans précision ¬ *F03*
- Sémantique ¬ *G31.0†, F02.0**
- Sénile
- - Cours de maladie d'Alzheimer ¬ *G30.1†, F00.1**
- - Démence: forme dépressive ou paranoïde ¬ *F03*
- - SAI ¬ *F03*
- - Type Alzheimer (DSTA) ¬ *F00.1**
- Syphilitique progressive ¬ *A52.1†, F02.8**
- Type Alzheimer forme
- - Atypique ¬ *G30.8†, F00.2**
- - Mixte ¬ *G30.8†, F00.2**
- Urémique ¬ *N18.89†, F02.8**
- Vasculaire
- - Début aigu ¬ *F01.0*
- - Infarctus multiples ¬ *F01.1*
- - Mixte, corticale et sous-corticale ¬ *F01.3*
- - Sans précision ¬ *F01.9*
- - Sous-corticale ¬ *F01.2*
- - ¬
- - - *F01*
- - - Formes de *F01.8*
- ¬
- - *B22*
- - Chorée de Huntington avec *G10†, F02.2**
- - Delirium surajouté à une *F05.1*
- - Maladie
- - - Huntington avec *G10†, F02.2**
- - - Parkinson avec *G20.90†, F02.3**
- - - VIH avec *B22†, F02.4**
- - Pseudosclérose spastique avec *A81.0†, F02.1**

Demeure
- Implanté chirurgicalement ¬ Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à *Z45.20*
- Mis en place par voie chirurgicale ¬ Présence d'un système de cathéter vasculaire à *Z95.81*

Demeure *–suite*
- ¬ Complication mécanique d'une sonde urinaire (à *T83.0*

Deminutus ¬ Infestation par: Ternidens *B81.8*

Démodécie ¬ *B88.0*

Demodex ¬
- Dermatite des paupières due à l'espèce *B88.0†, H03.0**
- Dermite (due à): *B88.0*

Demons-Meigs ¬ Syndrome de *D27*

Démyélinisante
- Aigu disséminé
- - Précisées ¬ Autres affections *G36.8*
- - Sans précision ¬ Affection *G36.9*
- - ¬ Autres affections *G36*
- Inflammatoire aiguë ¬ Polyradiculonévrite *G61.0*
- Précisées du système nerveux central ¬ Autres affections *G37.8*
- Système nerveux
- - Central
- - - Sans précision ¬ Affection *G37.9*
- - - ¬
- - - - Affections *G37*
- - - - Myélite transverse aiguë au cours d'affections *G37.3*
- - Périphérique ¬ Maladie *G62.88*

Démyélinisation
- Centrale du corps calleux ¬ *G37.1*
- Cerveau par déficit en méthionine adénosyltransférase ¬ *E72.1*
- Concentrique ¬ *G37.5*
- Cours d'une névrite optique ¬ *G36.0*
- ¬ Maladie due au VIH avec *B22†, G94.8**

Denborough
v. King-Denborough

Dendritica à herpès simplex ¬ Keratitis *B00.5†, H19.1**

Dendriticum
- Cornée à herpès simplex ¬ Ulcus *B00.5†, H19.1**
- ¬ Infection (à): Dicrocoelium *B66.2*

Dendritique
- Cellules accessoires) ¬ Sarcome à cellules *C96.4*
- Disciforme ¬ Kératite *H19.1**
- Folliculaires ¬ Sarcome à cellules *C96.4*
- Interdigitées ¬ Sarcome à cellules *C96.4*

Dénervation afférente chirurgicale ¬ Vessie neurogène: après *N31.2*

Dengue
- Hémorragique
- - Grades 1 et 2 ¬ *A97.0*
- - Sans signes d'alerte ¬ *A97.0*
- - Sévère ¬ *A97.2*
- - Signes d'alertes ¬ *A97.1*
- - ¬ DHF [*A97.9*

Dengue *–suite*
- SAI ¬ *A97.9*
- Sans
- - Précision ¬ *A97.9*
- - Signes d'alerte ¬ *A97.0*
- Sévère ¬ *A97.2*
- Signes d'alerte ¬ *A97.1*
- ¬
- - *A97*
- - Maladie à virus de la *A97.9*

Dens in dente ¬ *K00.2*

Densité
- LDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse *E78.0*
- Structure osseux
- - Sans précision ¬ Anomalie de la *M85.9*
- - ¬ anomalie
- - - *M85*
- - - Précisées de la *M85.8*
- VLDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de très basse *E78.1*
- ¬ Déficit en: lipoprotéines de haute *E78.6*

Dent
- Adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des *K07.3*
- Allongée ¬ *K00.2*
- Appareil alvéolaire ¬ Autres affections précisées des *K08.88*
- Bétel ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Bruxisme) psychogène ¬ Grincement des *F45.8*
- Cassée ¬ *S02.5*
- Conique ¬ *K00.2*
- Consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée ¬ Perte de *K08.1*
- Coquille ¬ *K00.5*
- Dents adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces *K07.3*
- Enclavées ¬ *K01.1*
- Évaginée ¬ *K00.2*
- Extrinsèque SAI ¬ Pigmentation des *K03.6*
- Hutchinson ¬ *A50.5*
- Hypoplasique de Turner ¬ *K00.4*
- Idiopathique ¬ Érosion des *K03.2*
- Incluses
- - Enclavées
- - - Position anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ *K07.3*
- - - ¬ *K01*
- - ¬ *K01.0*
- Inférieures ¬ Occlusion linguale postérieure des *K07.2*
- Invaginée ¬ *K00.2*
- Jumelles ¬ *K00.2*
- Materia alba ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*

Dent *–suite*
- Médiale causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- Médicaments ¬ Érosion des *K03.2*
- Natale ¬ *K00.6*
- Néonatale ¬ *K00.6*
- Noir ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Ongle de Fried ¬ Syndrome *Q82.8*
- Opalescentes sans OI ¬ *K00.5*
- Orange ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Parodonte
- - Sans précision ¬ Affection des *K08.9*
- - ¬ affection
- - - *K08*
- - - Précisées des *K08.8*
- Précoce ¬ *K00.6*
- Professionnelle ¬ Érosion des *K03.2*
- Régime alimentaire ¬ Érosion des *K03.2*
- SAI ¬
- - Érosion des *K03.2*
- - Pigmentation
- - - *K03.6*
- - - Intrinsèque des *K00.8*
- - Troubles du développement des *K00.9*
- Supplémentaire
- - Causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- - ¬ *K00.1*
- Surnuméraire
- - Causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- - ¬ *K00.1*
- Tabac ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Tachetées ¬ *K00.3*
- Temporaire
- - Persistantes] ¬ Rétention dentaire [*K00.6*
- - ¬ Chute prématurée des *K00.6*
- Vert ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Vomissements persistants ¬ Érosion des *K03.2*
- ¬
- - Abrasion
- - - *K03.1*
- - - Dentifrice des *K03.1*
- - - Habituelle des *K03.1*
- - - Professionnelle des *K03.1*
- - - Rituelle des *K03.1*
- - - Traditionnelle des *K03.1*
- - Anomalie
- - - Coin SAI des *K03.1*
- - - Volume et de forme des *K00.2*
- - Attrition excessive des *K03.0*
- - Changement de couleur pendant la formation de la *K00.8*
- - Chevauchement d'une ou de plusieurs *K07.3*

Dent *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dent
- - - Médiale causant un rapprochement des *K07.3*
- - - Supplémentaire causant un rapprochement des *K07.3*
- - - Surnuméraire causant un rapprochement des *K07.3*
- - Déplacement d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- - Diastème d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Érosion des *K03.2*
- - Espacement anormal d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Fracture pathologique de *K08.81*
- - Malposition des *K07.3*
- - Paramolaire causant un rapprochement des *K07.3*
- - Résorption pathologique des *K03.3*
- - Rotation d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Transposition d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Troubles de la formation des *K00.4*
- - Usure
- - - Occlusale des *K03.0*
- - - Proximale des *K03.0*

Dentaire
v.a. dermo-dentaire
v.a. oculo-dentaire
v.a. oto-dentaire
v.a. tricho-dentaire
- Antérieure) (postérieure) ¬ Béance occlusale *K07.2*
- Causes générales ¬ Exfoliation *K08.0*
- Complète)(partielle) ¬ Prothèse *Z97.8*
- Cours de scorbut ¬ Inflammation des alvéoles *E54†, K93.8**
- Dents temporaires persistantes] ¬ Rétention *K00.6*
- Durs
- - Éruption ¬ Modification de la teinte des tissus *K03.7*
- - Pulpe ¬ Formation anormale de tissus *K04.3*
- - Sans précision ¬ Maladie des tissus *K03.9*
- - ¬ maladie
- - - Précisées des tissus *K03.8*
- - - Tissus *K03*
- Dysfonctionnement oro-facial ¬ Malocclusion *K07.5*
- Externe) ¬ Résorption *K03.3*
- Fistule ¬ Abcès: *K04.6*
- Inactive ¬ Carie *K02.3*
- Laissée en place ¬ Racine *K08.3*
- Liés au développement (odontogènes) ¬ Kystes *K09.0*
- Non classées ailleurs ¬ Anomalies héréditaires de la structure *K00.5*
- Prématurée ¬ Éruption *K00.6*
- SAI ¬

Dentaire *–suite*
- SAI ¬ *–suite*
- - Abcès: *K04.7*
- - Algies *K08.8*
- Sans précision ¬ Carie *K02.9*
- Sélective ¬ Agénésie *K00.0*
- Sous-gingival ¬ Tartre (*K03.6*
- Stabilisée ¬ Carie *K02.3*
- Supra-gingival ¬ Tartre (*K03.6*
- Usage topique ¬ Intoxication: Médicaments *T49.7*
- Vertébrales ¬ Syndrome de polydactylie postaxiale-anomalies *Q87.2*
- ¬
- - Affections (des): *Z13.8*
- - Alvéole (*S02.8*
- - Ankylose *K03.5*
- - Anomalies de rapport entre les arcades *K07.2*
- - Carie
- - - *K02*
- - - *K02.8*
- - Concrescence *K00.2*
- - Déchaussement *K08.88*
- - Déviation médiane de l'arcade *K07.2*
- - Dislocation du germe *K00.4*
- - Examen *Z01.2*
- - Fluorose *K00.3*
- - Fracture *S02.5*
- - Fusion *K00.2*
- - Gémination *K00.2*
- - Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et *T49*
- - Kyste
- - - Lame *K09.0*
- - - Lié à l'éruption *K09.0*
- - - Région buccale non liés au développement *K09.1*
- - Luxation *S03.2*
- - Mise en place et ajustement d'une prothèse *Z46.3*
- - Présence d'implants maxillaires et sur racines *Z96.5*
- - Syndrome
- - - Déficit en stéroïde déshydrogénase-anomalies *K76.8*
- - - Éruption *K00.7*
- - Troubles de l'éruption *K00.6*

Dentato-rubro-pallido-luysienne ¬ Atrophie *G11.8*

Dente ¬ Dens in *K00.2*

Denticules ¬ *K04.2*

Dentifrice des dents ¬ Abrasion: par *K03.1*

Dentigère ¬ Kyste: *K09.0*

Dentine
- Secondaire ou irrégulière ¬ *K04.3*
- ¬
- - Carie de la *K02.1*
- - Dysplasie de la *K00.5*
- - Hypersensibilité de la *K03.8*

Dentinogenèse imparfaite-petite taille-surdité-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*

Dentinogenesis imperfecta ¬ *K00.5*

Dentition anormale ¬ Syndrome de dysplasie spondylo-épimétaphysaire- *Q77.7*

Dento
v.a. lacrymo-auriculo-dento-digital
- Alvéolaire
- - Fistule ¬ Abcès: *K04.6*
- - SAI ¬ Abcès: *K04.7*
- Facial
- - Fonctionnelles ¬ Anomalies *K07.5*
- - Sans précision ¬ Anomalie *K07.9*
- - Y compris les malocclusions] ¬ Anomalies *K07*
- - ¬ Autres anomalies *K07.8*

Denys-Drash ¬ Syndrome de *N04.1*

Départ du foyer pendant l'enfance ¬ *Z61*

Dépassant
- Premier degré ¬
- - Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées *T29.1*
- - Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées *T29.5*
- Second degré ¬
- - Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées *T29.2*
- - Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées *T29.6*

Dépendance
- Analgésiques ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.2*
- Antiacides ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.3*
- Antidépresseurs ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.0*
- Bétaïne clorale ¬ *F13.2*
- Envers personne donne soin
- - Sans précision ¬ Difficulté liée à une *Z74.9*
- - ¬ difficulté lié
- - - *Z74*
- - - *Z74.8*
- Laxatifs ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.1*
- Long durée
- - Envers
- - - Appareil
- - - - Prise en charge des sécrétions ¬ *Z99.0*
- - - - Soutien
- - - - - Appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé ¬ *Z99.9*

Dépendance *–suite*
- Long durée *–suite*
- - Envers *–suite*
- - - Appareil *–suite*
- - - - Soutien *–suite*
- - - - - Appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires ¬ *Z99.8*
- - - - - Appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs ¬ *Z99*
- - - Aspirateur
- - - - Sans précision ¬ *Z99.0*
- - - - ¬
- - - - - *Z99.0*
- - - - - *Z99.0*
- - - Cœur artificiel ¬ *Z99.4*
- - - Dialyse en cas d'insuffisance rénale ¬ *Z99.2*
- - - Fauteuil roulant ¬ *Z99.3*
- - - Insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la toux) ¬ *Z99.0*
- - - Respirateur ¬ *Z99.1*
- - Respirateur ¬ *Z99.1*
- Médicamenteuse ¬ Syndromes de sevrage lors de *F19.3*
- Mobilité restreinte ¬ Difficultés liées à: *Z74.0*
- Multiple ¬ *F19.2*
- Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.6*
- Propofol ¬ *F19.2*
- Stéroïdes et hormones ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.5*
- Substance
- - Non précisée ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.9*
- - ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.8*
- Vitamines ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.4*
- ¬
- - Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une *R78.4*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55*

Dépendant
- Asthénique) ¬ Trouble de la personnalité: *F60.7*
- Biotine ¬ Déficit en carboxylase *D81.8*
- Gonadotropines ¬ Puberté précoce *E22.8*
- Pendant un congé de ses proches ¬ Prise en charge d'une personne *Z75.8*
- Vitamine D ¬ Rachitisme *E83.31*
- ¬
- - Déficit en carboxylase biotine- *D81.8*
- - Hypercorticisme hypophyso- *E24.0*
- - Maladie de Cushing hypophyso- *E24.0*
- - Personnalité *F60.7*

Dépérissement ¬ Syndrome de *B22*

Dépersonnalisation-déréalisation ¬ Syndrome de *F48.1*

Dépigmentation aiguë bilatérale des iris ¬ *H21.2*

Dépistage

- Affection
- - Cardio-vasculaires ¬ Examen spécial de *Z13.6*
- - Yeux et des oreilles ¬ Examen spécial de *Z13.5*
- Certains troubles du développement de l'enfance ¬ Examen spécial de *Z13.4*
- Diabète sucré ¬ Examen spécial de *Z13.1*
- Hémoglobinopathie ¬ *Z36.8*
- Maladie
- - États pathologiques ¬ Examen spécial de *Z13*
- - Infectieuses et parasitaires ¬ Examen spécial de *Z11*
- - Précisées ¬ Examen spécial de *Z13.8*
- - Sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ Examen spécial de *Z13.0*
- Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ¬ Examen spécial de *Z13.7*
- Prénatal
- - Amniocentèse ¬ Autres *Z36.2*
- - Anomalies chromosomiques ¬ *Z36.0*
- - Iso-immunisation ¬ *Z36.5*
- - Malformations par échographie et autres méthodes physiques ¬ *Z36.3*
- - Retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ *Z36.4*
- - Sans précision ¬ *Z36.9*
- - Taux élevé d'alpha-fœtoprotéines ¬ *Z36.1*
- - ¬
- - - *Z36*
- - - *Z36.8*
- Sans précision ¬ Examen spécial de *Z13.9*
- Troubles de la nutrition ¬ Examen spécial de *Z13.2*
- Tumeur
- - Appareil respiratoire ¬ Examen spécial de *Z12.2*
- - Col de l'utérus ¬ Examen spécial de *Z12.4*
- - Estomac ¬ Examen spécial de *Z12.0*
- - Intestin ¬ Examen spécial de *Z12.1*
- - Localisations ¬ Examen spécial de *Z12.8*
- - Prostate ¬ Examen spécial de *Z12.5*
- - Sans précision ¬ Examen spécial de *Z12.9*
- - Sein ¬ Examen spécial de *Z12.3*
- - Vessie ¬ Examen spécial de *Z12.6*
- - ¬ Examen spécial de *Z12*

Déplacement

- Acquis du cristallin ¬ *H27.8*
- Clampage du cordon ombilical ¬ *P51.8*
- Congénital
- - Estomac ¬ *Q40.2*

Déplacement *–suite*

- Congénital *–suite*
- - Œsophage ¬ *Q39.8*
- - Rein ¬ *Q63.2*
- Disque intervertébral ¬
- - Myélopathie avec *M51.0†, G99.2**
- - Névrite
- - - *M51.1†, G55.1**
- - - Nerf
- - - - Brachial due au *M50.1†, G55.1**
- - - - Sciatique due au *M51.1†, G55.1**
- - - Plexus brachial due au *M50.1†, G55.1**
- - Radiculite
- - - *M51.1†, G55.1**
- - - Cervicale due au *M50.1†, G55.1**
- Latéral) du globe SAI ¬ *H05.2*
- Médiastin ¬ *J98.58*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*
- Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- SAI ¬ Fracture: avec: *T14.2*
- Uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*

Déplétion

- ADN mitochondrial, forme encéphalomyopathique avec tubulopathie rénale ¬ *G31.81†, N16.8**
- Hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: *O21.1*
- Lymphocytaire
- - Fibrose diffuse ¬ Lymphome de Hodgkin classique en *C81.3*
- - ¬ Lymphome Hodgkin classique
- - - *C81.3*
- - - Type réticulaire en *C81.3*
- Volume du plasma ou du liquide extracellulaire ¬ *E86*

Dépolarisation

- Auriculaire prématurée ¬ *I49.1*
- Jonctionnelle prématurée ¬ *I49.2*
- Prématurées, autres et sans précision ¬ *I49.4*
- Ventriculaire prématurée ¬ *I49.3*

Dépôt

- Accrétion sur dent
- - Bétel ¬ *K03.6*
- - Materia alba ¬ *K03.6*
- - Noir ¬ *K03.6*
- - Orange ¬ *K03.6*
- - Tabac ¬ *K03.6*
- - Vert ¬ *K03.6*
- - ¬ *K03.6*
- Affections dégénératives de la conjonctive ¬ *H11.1*
- Calciques dans une bourse séreuse ¬ *M71.4*
- Collagène de type III ¬ Glomérulopathie à *N07.6*
- Conjonctival ¬ Amylose avec *E85.4†, H13.8**

Dépôt *–suite*

- Cornéens ¬ Pigmentation et *H18.0*
- Fibronectine ¬ Glomérulopathie à *N07.6*
- Hydroxyapatite ¬ Maladie par *M11.0*
- Iode ¬ Inflammation des glandes salivaires au cours d'une réaction à des *K11.2*
- Pyrophosphate de calcium dihydraté ¬ Maladie des *M11.19*

Dépresseurs centraux du tonus musculaire ¬ Intoxication: Antiparkinsoniens et autres *T42.8*

Dépressif
v. Type de maladie

Dépression

- Accouchement SAI ¬ *F53.0*
- Agitée épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- Anxieux
- - Légère ou non persistante) ¬ *F41.2*
- - Persistante ¬ *F34.1*
- Atypique ¬ *F32.8*
- Endogène
- - Sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- - Symptômes psychotiques ¬ *F33.3*
- Légère ou moyenne ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de *F31.3*
- Majeur
- - Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- - Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- - Symptôme psychotique ¬ épisode
- - - Isolés de: *F32.3*
- - - Récurrents sévères de: *F33.3*
- Masquée" SAI ¬ Episodes isolés d'une *F32.8*
- Médullaire
- - Toxicité ¬ *D61.9*
- - ¬ *D61.9*
- Névrotique ¬ *F34.1*
- Os du crâne ¬ *Q67.4*
- Post-partum SAI ¬ *F53.0*
- Post-schizophrénique ¬ *F20.4*
- Psychogène ¬ épisode
- - Isolés de: *F32*
- - Récurrents de (F33.0 ou F33.1): *F33*
- Psychotique ¬ épisode
- - Isolés de: *F32.3*
- - Récurrents sévères de: *F33.3*
- Réactionnel ¬ épisode
- - Isolés de: *F32*
- - Récurrents de (F33.0 ou F33.1): *F33*
- SAI ¬ *F32.9*
- Sévère
- - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de *F31.4*
- - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de *F31.5*
- Unipolaire SAI ¬ *F33.9*

Dépression *–suite*
- Vital
- - Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- - Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- ¬ Troubles des conduites avec *F92.0*

Dercum] ¬ Lipomatose douloureuse [maladie de *E88.29*

Déréalisation ¬ Syndrome de dépersonnalisation- *F48.1*

Dérèglement immunitaire-polyendocrinopathie-entéropathie lié à l'X ¬ Syndrome de *E31.0*

Dérivation
- Anastomose intestinale ¬ Status post *Z98.0*
- Intestinale ¬ Arthrite après *M02.0*
- LCR ¬ *Z98.2*

Dérivé
- 4-aminophénol ¬ Intoxication: *T39.1*
- Aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues ¬ Effet toxique: *T65.3*
- Azole ¬ Allergie aux *T88.7*
- Cannabis ¬
- - Intoxication au *T40.7*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F12*
- Halogéné hydrocarbures
- - Aliphatiques
- - - Aromatiques
- - - - Sans précision ¬ Effet toxique: *T53.9*
- - - - ¬ Effet toxique de *T53*
- - - ¬ Effet toxique: Autres *T53.6*
- - Aromatiques ¬ Effet toxique: Autres *T53.7*
- Hydantoïne ¬ Intoxication
- - *T42.0*
- Hydroxyquinoléine ¬ *T37.8*
- Pétrole ¬ Effet toxique: Produits *T52.0*
- Phénothiazine ¬ Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques *T43.3*
- Pyrazolés ¬ Intoxication: *T39.2*
- Rapamycine ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*
- Scopolamine ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*
- Triazole ¬ Allergie aux *T88.7*
- ¬
- - Acide nicotinique (*T46.7*
- - Associations et *T38.5*
- - Hormones parathyroïdiennes et leurs *T50.9*
- - Intoxication
- - - Cannabis (*T40.7*
- - - Hormones thyroïdiennes et leurs *T38.1*

Dermanyssus gallinae ¬ Dermite (due à): *B88.0*

Dermatillomanie ¬ *F63.9*

Dermatite
- Acariens ¬ *B88.0*
- Amibes ¬ *A06.7*

Dermatite *–suite*
- Aoûtats ¬ *B88.0*
- Diabétique ¬ *E14.60†, L99.8**
- Exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter von Rittershain] ¬ *L00*
- Infectieuse associée au virus T-lymphotrope humain de type I ¬ *L30.3*
- Migrante ¬ *B83.1*
- Paupières due à l'espèce Demodex ¬ *B88.0†, H03.0**
- Pustuleuse contagieuse ovine] ¬ Orf [*B08.0*
- Sévère ¬ Syndrome d'agammaglobulinémie-microcéphalie-craniosténose- *D80.0*
- Verruqueuse ¬ *B43.0*

Dermato-arthrite lipoïdique ¬ *E78.8†, M14.39**

Dermato-arthrose lipoïde ¬ *M14.3**

Dermatofibrosarcoma protuberans ¬ *C44.9*

Dermatoglyphes ¬ Anomalies des *Q82.8*

Dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies *Q87.8*

Dermatomycose ¬ Maladie due au VIH avec *B20, B36.9*

Dermatomyosite
- Adulte ¬ *M33.1*
- Atteinte pulmonaire ¬ *M33.9†, J99.1**
- Cours de tumeur NCA ¬ *D48.9†, M36.0**
- Juvénile ¬ *M33.0*
- ¬ Autres *M33.1*

Dermatopathie réticulaire pigmentaire ¬ *Q82.4*

Dermatophytide ¬ *L30.2*

Dermatophytie ¬
- Dermatophytose
- - Barbe [*B35.0*
- - Cuir chevelu [*B35.0*
- - Profonde [*B35.8*
- Maladie due au VIH avec dermatophytose [*B20, B35.9*

Dermatophytique ¬ Onyxis *B35.1*

Dermatophytose
- Aine ¬ *B35.6*
- Barbe [dermatophytie] ¬ *B35.0*
- Cuir chevelu [dermatophytie] ¬ *B35.0*
- Dermatophytie] ¬ Maladie due au VIH avec *B20, B35.9*
- Disséminée ¬ *B35.8*
- Granulomateuse ¬ *B35.8*
- Main ¬ *B35.2*
- Ongle ¬ *B35.1*
- Pied ¬ *B35.3*
- Profond
- - Dermatophytie] ¬ *B35.8*
- - ¬ *B35.8*
- Sans précision ¬ *B35.9*
- Sycosis ¬ *B35.0*

Dermatophytose *–suite*
- Tinea] ¬ *B35*
- - ¬ Autres *B35.8*

Dermato-polymyosite
- Cours de tumeur NCA ¬ *D48.9†, M36.0**
- Sans précision ¬ *M33.9*
- - ¬ *M33*

Dermatose
- Acantholytique transitoire [Grover] ¬ *L11.1*
- Bulleux
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *L14**
- - Précisées ¬ Autres *L13.8*
- - Sans précision ¬ *L13.9*
- Érosive et vésiculaire congénitale ¬ *P83.8*
- Gonorrhéique ¬ *A54.8†, L99.8**
- IgA linéaire ¬ *L13.8*
- Neutrophile fébrile [Sweet] ¬ *L98.2*
- Non infectieuses de la paupière ¬ *H01.1*
- Papuleuse noire ¬ *L82*
- Psychogène ¬ *F54, L98.9*
- Psychosomatogène ¬ *F54, L98.9*
- Purpurique pigmentée ¬ *L81.7*
- Pustuleuse sous-cornée ¬ *L13.1*
- Réticulée des plis ¬ *L81.8*
- ¬ Impétiginisation d'autres *L01.1*

Dermatosparaxis ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Dermatostomatite type Stevens-Johnson ¬ *L51.1*

Derme
- Moyen ¬ Elastolyse du *L90.8*
- Tissu sous-cutané ¬ Déficit tissulaire limité à la peau [*I70.24*
- ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le *L89.1*

Dermique
- Aires ¬ Hypoplasie *Q82.8*
- Facial focal
- - Type I ¬ Dysplasie *Q82.8*
- - ¬ Dysplasie *Q82.8*
- Kala-azar ¬ Leishmaniose *B55.0*
- Papillaire, type pseudoxanthome élastique ¬ Elastolyse *L90.8*

Dermite
- Acarienne ¬ *B88.0*
- Allergique
- - Contact
- - - Adhésifs ¬ *L23.1*
- - - Agents ¬ *L23.8*
- - - Aliments en contact avec la peau ¬ *L23.6*
- - - Cause non précisée ¬ *L23.9*
- - - Cosmétiques ¬ *L23.2*
- - - Médicaments en contact avec la peau ¬ *L23.3*
- - - Métaux ¬ *L23.0*
- - - Produits chimiques ¬ *L23.5*

Dermite *–suite*
- Allergique *–suite*
- - Contact *–suite*
- - - Teintures ¬ *L23.4*
- - - Végétaux, sauf aliments ¬ *L23.7*
- - - ¬ *L23*
- - Paupière ¬ *H01.1*
- Atopique endogène
- - Sans précision ¬ *L20.9*
- - ¬ Autres *L20.8*
- Breloque ¬
- - *L56.2*
- - Dermite de breloque] ¬ Dermite de photocontact [*L56.2*
- Cercarienne ¬ *B65.3*
- Contact
- - Paupière ¬ *H01.1*
- - Professionnelle) SAI ¬ *L25.9*
- - Sans précision
- - - Agents ¬ *L25.8*
- - - Aliments en contact avec la peau ¬ *L25.4*
- - - Cause non précisée ¬ *L25.9*
- - - Cosmétiques ¬ *L25.0*
- - - Médicaments en contact avec la peau ¬ *L25.1*
- - - Produits chimiques ¬ *L25.3*
- - - Teintures ¬ *L25.2*
- - - Végétaux, sauf aliments ¬ *L25.5*
- - - ¬ *L25*
- - Toxique par contact cutané avec un médicament ¬ *L24.4*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, L99.8**
- Demodex ¬ *B88.0*
- Dermanyssus gallinae ¬ *B88.0*
- Eczémateuse de la paupière ¬ *H01.1*
- Eczématoïde
- - Déshydratation ¬ *L30.8*
- - Infectieuse ¬ *L30.3*
- - ¬ *L30.3*
- Exfoliatrice ¬ *L26*
- Factice ¬ *L98.1*
- Fessière du nourrisson ¬ *L22*
- Feu] ¬ Érythème dû au feu [*L59.0*
- Gangréneuse ¬
- - *L08.0*
- - *L88*
- Herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] ¬ *L13.0*
- Ingestion d'aliments ¬ *L27.2*
- Irritant contact
- - Agents ¬ *L24.8*
- - Aliments en contact avec la peau ¬ *L24.6*
- - Cause non précisée ¬ *L24.9*
- - Cosmétiques ¬ *L24.3*
- - Détergents ¬ *L24.0*
- - Huiles et aux graisses ¬ *L24.1*

Dermite *–suite*
- Irritant contact *–suite*
- - Médicaments en contact avec la peau ¬ *L24.4*
- - Produits chimiques ¬ *L24.5*
- - Solvants ¬ *L24.2*
- - Végétaux, sauf aliments ¬ *L24.7*
- - ¬ *L24*
- Liponyssoides sanguineus ¬ *B88.0*
- Non allergique de contact ¬ *L24*
- Nummulaire ¬ *L30.0*
- Paupière due au virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H03.1**
- Peau sèche ¬ *L85.3*
- Périorale ¬ *L71.0*
- Photocontact [dermite de breloque] ¬ *L56.2*
- Précisées ¬ Autres *L30.8*
- Purulente ¬ *L08.0*
- Sans précision ¬ *L30.9*
- Séborrhéique
- - Infantile ¬ *L21.1*
- - Sans précision ¬ *L21.9*
- - ¬
- - - *L21*
- - - *L21.8*
- Septique ¬ *L08.0*
- Solaire ¬ *L57.8*
- Stase SAI ¬ *I83.1*
- Substance
- - Non précisée prise par voie interne ¬ *L27.9*
- - Prises par voie interne ¬ *L27.8*
- Suppurée ¬ *L08.0*
- Toxique due à un irritant exogène, n.c.a. ¬ *L24.9*
- Vésiculaire
- - Lèvre due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ *B00.1*
- - Oreille due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ *B00.1*
- - Virus de l'herpès ¬ *B00.1*
- ¬ Autres *L30*

Dermo-dentaire ¬ Dysplasie *Q82.4*

Dermographisme
- Urticarien ¬ *L50.3*
- ¬ *L50.3*

Dermoïde
- Bouche ¬ Kyste: *K09.8*
- Transformation maligne ¬ Tumeur ovarienne *C56*

Dermolyse bulleuse transitoire du nouveau-né ¬ *Q81.2*

Dermolytique ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.2*

Désaccord
- Conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ *Z64.8*
- Supérieurs ou des collègues ¬ *Z56*
- Voisins, les locataires et le propriétaire ¬ *Z59*

Désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière ¬ Douleur de *G95.85*

Désaminase
- ADA] ¬ Déficit en adénosine *D81.3*
- ¬
- - Anémie hémolytique due à une surproduction d'adénosine *D55.3*
- - Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en adénosine *D81.3*

Désastres ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*

Désaturase
v. C5-désaturase

Desbuquois
v. Rolland-Desbuquois
- ¬ Syndrome de *Q78.8*

DESC ¬ Syndrome *G40.5*

Descemet ¬
- Plis de la membrane de *H18.3*
- Rupture de la membrane de *H18.3*

Descemétocèle ¬ *H18.7*

Descendant ¬
- Lésion traumatique du côlon: Côlon *S36.53*
- Rupture
- - Anévrysme de l'aorte abdominale *I71.3*
- - Aorte abdominale *I71.3*
- Tumeur
- - Bénigne: Côlon *D12.4*
- - Maligne: Côlon *C18.6*

Descendu ¬ Tumeur maligne: Testicule *C62.1*

Descente placenta
- Hémorragie actuel ¬
- - *O44.10*
- - Placenta praevia et *O44.1*
- Sans
- - Hémorragie actuel ¬
- - - *O44.00*
- - - Placenta praevia et *O44.0*
- - Précisions ¬ Placenta praevia et *O44.0*

Désensibilisation aux allergènes ¬ *Z51.6*

Déséquilibre
- Alimentaire ¬ *E63.1*
- Électrolytique
- - SAI ¬ *E87.8*
- - ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: *O21.1*
- Hydro électrolytique
- - Acido-basiques ¬ Autres *E87*
- - Non classés ailleurs ¬ Autres *E87.8*
- Métabolisme du potassium ¬ *E87.8*
- Protéino-énergétique SAI ¬ *E46*

Déshydratase ¬
- Déficit en 4a-hydroxy-tétrahydrobioptérine *E70.1*

Déshydratase ¬ *–suite*
- Porphyrie par déficit en delta-aminolévulinate *E80.2*

Déshydratation
- Nouveau-né ¬ *P74.1*
- ¬
- - *E86*
- - Dermite eczématoïde de *L30.8*
- - Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: *O21.1*

Déshydrogénase
- 3 ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XY par déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde *E29.1*
- Acide gras chaîne
- - Court ¬
- - - Déficit en acyl-CoA *E71.3*
- - - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl-CoA *E71.3*
- - - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA *E71.3*
- - Longue ¬ Déficit en 3-hydroxyacyl-CoA *E71.3*
- - Moyenne ¬ Déficit en acyl-CoA *E71.3*
- Aldéhyde oxydase type A ¬ Déficit combiné en sulfite oxydase, xanthine *E72.1*
- Anomalies dentaires ¬ Syndrome de déficit en stéroïde *K76.8*
- Chaînes ramifiées ¬ Déficit en 2-cétoacide *E71.0*
- E1-alpha ¬ Déficit en pyruvate *E74.4*
- E2 ¬ Déficit en pyruvate *E74.4*
- E3 ¬ Déficit en pyruvate *E74.4*
- Forme infantile/juvénile ¬ Déficit en 3-phosphoglycerate *E72.8*
- G6PD] ¬ Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate *D55.0*
- G6PDH] ¬ Déficit en glucose-6-phosphate *E74.8*
- Type 3 ¬
- - Déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde *E29.1*
- - Pseudo-hermaphrodisme masculin par déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde *E29.1*
- Xanthine aldéhyde oxydase ¬ Déficit combiné en xanthine *E79.8*
- ¬
- - Anémie
- - - Déficience en glycéraldéhyde-3-phosphate *D55.2*
- - - Hémolytique due à une carence en glycéraldéhyde-3-phosphate *D55.2*
- - Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique *R74.0*
- - Déficit
- - - 1-pyrroline-5-carboxylate *E72.5*
- - - 2-méthylbutyryl-CoA *E71.1*
- - - 3-phosphoglycerate *E72.8*
- - - Complexe sarcosine *E72.5*
- - - D-glycérate *E74.8*

Déshydrogénase *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Déficit *–suite*
- - - Dihydrolipoamide *E74.4*
- - - Dihydropyrimidine *E79.8*
- - - Diméthylglycine *E72.5*
- - - Glutaryl-CoA *E72.3*
- - - Isobutyryl-CoA *E71.1*
- - - Isovaléryl-CoA *E71.1*
- - - Multiple en acyl-CoA *E71.3*
- - - Phosphatase du complexe pyruvate *E74.4*
- - - Pyruvate: *E74.4*
- - - Saccharopine *E72.3*
- - - Succinate-semi-aldéhyde *E72.8*
- - - Xanthine *E79.8*
- - - Xylitol *E74.8*
- - Glycogénose par déficit en lactate *E74.4*
- - GSD par déficit en lactate *E74.4*
- - Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 3-bêta-hydroxystéroïde *E25.08*
- - Retard développement déficit
- - - 2-méthylbutyryl-CoA *E71.1*
- - - Méthylmalonate semialdéhyde *E71.1*

Désinhibée d'origine centrale ¬ Vessie *N31.0*

Désinhibition ¬ Trouble de l'attachement de l'enfance avec *F94.2*

Désintégratif
- Enfance ¬ Autre trouble *F84.3*
- ¬ Psychose: *F84.3*

Désintoxication alcoolique ¬ Produits de *T50.6*

Désir sexuel ¬
- Absence ou perte de *F52.0*
- Baisse du *F52.0*

Désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, *D68.35*

Desmine
- Inclusions de corps de Mallory ¬ Myopathie avec surcharge en *G71.8*
- ¬ Myopathie myofibrillaire liée à la *G71.8*

Desminopathie ¬ *G71.8*

Desmoïde ¬ Tumeur *D48.1*

Desmolase testiculaire ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XY par déficit en 17,20- *E29.1*

Desmostérolose ¬ *Q87.8*

Désorganisée ¬ Schizophrénie *F20.1*

Désorientation, sans précision ¬ *R41.0*

Desquamation de la peau ¬ *R23.4*

Desquamative ¬
- Érythrodermie *L21.1*
- Gingivite (chronique): *K05.1*

Destinés à des usages particuliers ¬ Autres codes secondaires *U69!*

Destombes-Rosaï-Dorfman ¬ Maladie de *D76.3*

Destruction globe oculaire ¬
- Brûlure provoquant la rupture et la *T26.2*
- Corrosion provoquant la rupture et la *T26.7*

Destructive chronique, non suppurée ¬ Angiocholite *K74.3*

Destructrice pour faciliter l'accouchement ¬ Intervention *P03.8*

Destruens ¬ Chorio-adénome *D39.2*

Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs ¬ *T81.3*

Détaché ¬ Ménisque *M23.3*

Détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact ¬ Prolixité et *R46.7*

Détection anticorps
- Anti-érythrocytaires ¬ *R76.8*
- Anti-hirudine ¬ *R76.8*
- Anti-streptokinase ¬ *R76.8*
- Anti-thrombocytes ¬ *R76.8*
- Anti-thyroïde ¬ *R76.8*

Détergents
- Locaux ¬ Intoxication: Astringents et *T49.2*
- ¬
- - Dermite irritante de contact due aux *L24.0*
- - Effet toxique de savons et *T55*

Détérioration
- Disque
- - Cervical ¬ Autre *M50.3*
- - Intervertébral précisé ¬ *M51.3*
- Fonctionnel
- - 29 jours et plus après la transplantation ¬ *T86.41*
- - Aigu
- - - Greffe
- - - - Foie ¬ *T86.40*
- - - - Rein ¬ *T86.10*
- - - Sans constatation de rejet ¬ *T86.10*
- - Chronique greffe
- - - Foie ¬ *T86.41*
- - - Rein ¬ *T86.11*
- - Pendant les premiers 28 jours après la transplantation ¬ *T86.40*

De-Toni-Debré-Fanconi ¬ Syndrome de *E72.0*

Détoxification de l'ammoniac ¬ Trouble du métabolisme du cycle de l'urée et de la *E72.2*

Détresse
- Fœtal
- - Cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments ¬ *O68*
- - Échographiques ¬ Signes de *O68.8*
- - Électrocardiographiques ¬ Signes de *O68.8*
- - Intra-utérine ¬ *P20*
- - Sans précision ¬ Travail et accouchement compliqués d'une *O68.9*
- - ¬ Travail accouchement compliqué
- - - *O68*

Détresse *–suite*
- Fœtal *–suite*
- - ¬ Travail accouchement compliqué *–suite*
- - - Signe
- - - - *O68.8*
- - - - Biochimiques de *O68.3*
- Maternelle ¬ *O75.0*
- Respiratoire
- - Adulte [SDRA] ¬ Syndrome de *J80.0*
- - Aigu
- - - Adolescent ¬ Syndrome de *J80.09*
- - - Adulte ¬ Syndrome de *J80.09*
- - - Enfant ¬ Syndrome de *J80.09*
- - Dysphagie ¬ Syndrome de myopathie à début précoce-aréflexie- *G71.2*
- - Enfant et de l'adolescent ¬ Syndrome de *J80*
- - Infantile ¬ Syndrome de *P22.0*
- - Nouveau-né
- - - Sans précision ¬ *P22.9*
- - - ¬
- - - - *P22.0*
- - - - *P22.8*
- - Respiratory distress syndrome] du nourrisson ¬ Syndrome de *P22.0*
- - SDRA
- - - Léger chez l'adulte ¬ Syndrome de *J80.01*
- - - Modéré chez l'adulte ¬ Syndrome de *J80.02*
- - - Sévère chez l'adulte ¬ Syndrome de *J80.03*
- - Type
- - - 1 ¬ Amyotrophie spinale avec *G12.2*
- - - 2 ¬ Amyotrophie spinale avec *G12.2*
- - ¬ Atélectasie (de): résorption, sans syndrome de *P28.1*

Détroit
- Inférieur
- - Bassin) entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement de: *O33.3*
- - Cavité moyenne ¬ Dystocie due à un rétrécissement du *O65.3*
- - ¬ Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du *O33.3*
- Supérieur
- - Bassin
- - - Entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement du *O33.2*
- - - Maternel ¬ Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du *O33.2*
- - ¬ Dystocie due à un rétrécissement du *O65.2*

Détrusor
- Col vésicale ¬ Dyssynergie du *N32.0*
- Neuropathie autonome ¬ Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du *N31.1*
- Origine cérébrale ¬ Instabilité du *N31.0*

Détrusor *–suite*
- Sphincter de la vessie ¬ Dysfonctionnement neurogène du *N31.88*

Deuil ¬ Réaction de *F43.2*

Deutéranomalie ¬ *H53.5*

Deutéranopie ¬ *H53.5*

Développement
- Acquisition scolaires
- - Sans précision ¬ Trouble du *F81.9*
- - ¬ trouble
- - - *F81.8*
- - - Spécifiques du *F81*
- Articulation ¬ Trouble: du *F80.0*
- Constitutionnel ¬ Retard de *E30.0*
- Déficit
- - 2-méthylbutyryl-CoA déshydrogénase ¬ Retard de *E71.1*
- - Méthylmalonate semialdéhyde déshydrogénase ¬ Retard de *E71.1*
- Dentaire ¬ Kystes de la région buccale non liés au *K09.1*
- Dents SAI ¬ Troubles du *K00.9*
- Encéphale ¬ Autres anomalies localisées du *Q04.3*
- Enfance ¬ Examen spécial de dépistage de certains troubles du *Z13.4*
- Excessif du système pileux ¬ *L68*
- Fonctions motrices, sans précision ¬ Troubles spécifiques du *F82.9*
- Insuffisant des glandes mammaires] ¬ Micromastie [*Q83.88*
- Langage ¬ Trouble spécifique du *F80.9*
- Mâchoires ¬ Maladies liées au *K10.0*
- Malnutrition protéino-énergétique ¬ Retard de *E45*
- Moteur ¬ Trouble spécifique du *F82*
- Motricité
- - Buccale ¬ Troubles spécifiques du *F82.2*
- - Fine et graphique ¬ Troubles spécifiques du *F82.1*
- - Globale ¬ Troubles spécifiques du *F82.0*
- Nourrisson ¬ Maladie due au VIH avec retard de *B22, P05.9*
- Odontogènes) ¬ Kystes dentaires liés au *K09.0*
- Osseux ¬ Autres troubles de la croissance et du *M89.2*
- Ostéopénie-anomalies ectodermiques ¬ Syndrome de retard de *Q87.8*
- Parole langage
- - Sans précision ¬ Trouble du *F80.9*
- - ¬ trouble
- - - *F80.8*
- - - Spécifiques du *F80*
- Phonologique ¬ Trouble: du *F80.0*
- Physiologique
- - Attendu ¬ Retard de: stade de *R62.0*
- - Sans précision ¬ Retard du *R62.9*
- - ¬

Développement *–suite*
- Physiologique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Retard du *R62*
- - - Retards du *R62.8*
- Physique dû à la malnutrition ¬ Retard de *E45*
- Psychologique
- - Sans précision ¬ Trouble du *F89*
- - ¬ Autres troubles du *F88*
- Psychosexuel
- - Sans précision ¬ Trouble du *F66.9*
- - ¬
- - - Problème de *F66.9*
- - - Troubles du *F66.8*
- Rénal ¬ Agénésie rénale et autres défauts de *Q60*
- SAI ¬ Trouble du *F89*
- Sans précision ¬ Trouble envahissant du *F84.9*
- Sexuel
- - 46
- - - XX
- - - - Origine génétique ¬ Anomalie du *Q99.1*
- - - - ¬
- - - - - Anomalie du *Q56.2*
- - - - - Anomalie testiculaire du *Q99.1*
- - - XY déficit
- - - - 17
- - - - - 20-desmolase testiculaire ¬ Anomalie du *E29.1*
- - - - - Bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase 3 ¬ Anomalie du *E29.1*
- - - - Isolé en 17,20-lyase ¬ Anomalie du *E29.1*
- - Orientation ¬ Problèmes psychologiques et comportementaux associés au *F66*
- - Retardé ¬ *E30.0*
- - ¬ Syndrome de chondrodysplasie-anomalie du *Q87.1*
- Type
- - Expressif ¬ Dysphasie ou aphasie de *F80.1*
- - Réceptif ¬ Dysphasie ou aphasie de *F80.2*
- - Wernicke ¬ Aphasie de *F80.2*
- - ¬
- - Acalculie de *F81.2*
- - Agnosie de *F88*
- - Dyslexie de *F81.0*
- - Dyspraxie de *F82*
- - Kyste ovarien au cours du *Q50.1*
- - Multikystique: rein (*Q61.4*
- - Myasthénie congénitale et au cours du *G70.2*
- - Syndrome
- - - Cutis laxa-hyperlaxité ligamentaire-retard de *Q82.8*
- - - Neuropathie viscérale-anomalies cérébrales-dysmorphie-retard du *Q87.8*

Développement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Trouble
- - - Envahissants du *F84.8*
- - - Spécifiques mixtes du *F83*

Déviation
- Cloison nasal
- - Acquise) ¬ *J34.2*
- - ¬ *J34.2*
- Congénital
- - Cloison nasale ¬ *Q67.4*
- - E) du nez ¬ Écrasement ou *Q67.4*
- Médiane de l'arcade dentaire ¬ *K07.2*
- Médiastinale ¬ *R93.8*
- Sexuelle SAI ¬ *F65.9*
- Uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*

Devic] ¬ Neuromyélite optique [*G36.0*

Dextrinose limite ¬ *E74.0*

Dextrocardie
- Situs inversus ¬ *Q89.3*
- ¬ *Q24.0*

Dextroposition aorte
- Hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, *Q21.3*
- ¬ *Q20.3*

DFNA ¬ Surdité de perception non syndromique autosomique dominante type *H90.3*

DFNB ¬ Surdité de perception non syndromique autosomique récessive type *H90.3*

D-glycérate
- Déshydrogénase ¬ Déficit en *E74.8*
- Kinase ¬ Déficit en *E74.8*

Dhat ¬ Syndrome de *F48.8*

DHF [Dengue hémorragique] ¬ *A97.9*

Dhobie itch ¬ *B35.6*

Diabète
- Cardiopathie congénitale ¬ Syndrome d'hypoplasie pancréatique- *Q87.8*
- Chimique ¬ *R73.0*
- Galactosique ¬ *E74.2*
- Gestationnel ¬ Antécédents personnels de *Z87.5*
- Gluco-aminophosphaté ¬ *E72.0*
- Grossesse ¬ Syndrome de l'enfant dont la mère a un *P70.0*
- Insipide
- - Central ¬ *E23.2*
- - Néphrogénique ¬ *N25.1*
- - Neurogène ¬ *E23.2*
- - ¬ *E23.2*
- Juvénile ¬ Syndrome kystes rénaux- *E11.20†, N29.8**
- Latent ¬ *R73.0*
- Phosphaté ¬ *E83.30*
- SAI ¬ *E14*

Diabète *–suite*
- Sucré
- - Altération vasculaire ¬ *E14.50†, I79.2**
- - Angiopathie ¬ *E14.50†, I79.2**
- - Ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de tubulopathie proximale- *Q87.8*
- - Cataracta diabetica ¬ *E14.30†, H28.0**
- - Complication
- - - Neurologique ¬ *E14.40*
- - - Rénale ¬ *E14.30*
- - Cours grossesse
- - - Diabète sucré préexistant
- - - - Lié à la malnutrition ¬ *O24.2*
- - - - Sans précision ¬ *O24.3*
- - - - Type
- - - - - 1 ¬ *O24.0*
- - - - - 2 ¬ *O24.1*
- - - Sans précision ¬ *O24.9*
- - - ¬ *O24*
- - Gestationnel SAI ¬ *O24.4*
- - Glomérulosclérose ¬ *E14.20†, N08.3**
- - Hépatogène ¬ *E13.90*
- - Instable ¬ *E10*
- - Insulino-dépendant
- - - Primaire avec complication vasculaire périphérique ¬ *E10.50†, I79.2**
- - - Type
- - - - 1 avec complication vasculaire périphérique ¬ *E10.50†, I79.2**
- - - - 2
- - - - - Complication neurologique ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - - Complication oculaire ¬ *E11.30†, H58.8**
- - - - - Complication rénale ¬ *E11.20†, N08.3**
- - Juvénile ¬ *E10*
- - Maculopathie ¬ *E14.30†, H36.0**
- - Maladie oculaire ¬ *E14.30†, H58.8**
- - Malnutrition
- - - Type
- - - - 1 ¬ *E12*
- - - - 2 ¬ *E12*
- - - ¬ *E12*
- - Mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) ¬ *P70.1*
- - Microangiopathie et macro-angiopathie ¬ *E14.50†, I79.2**
- - MOA [maladie occlusive artérielle] ¬ *E14.50†, I79.2**
- - Myatrophie ¬ *E14.40†, G73.0**
- - Néonatal ¬ *P70.2*
- - Néphropathie ¬ *E14.20†, N08.3**
- - Neuropathie ¬ *E14.40†, G63.2**
- - Non
- - - Insulino-dépendant
- - - - Primaire

Diabète *–suite*
- Sucré *–suite*
- - Non *–suite*
- - - Insulino-dépendant *–suite*
- - - - Primaire *–suite*
- - - - - Complication neurologique ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - - Complication oculaire ¬ *E11.30†, H58.8**
- - - - Type
- - - - - 2 avec complication neurologique ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - - 2 avec complication oculaire ¬ *E11.30†, H58.8**
- - - - - 2 avec complication rénale ¬ *E11.20†, N08.3**
- - - Type 1 ou 2 ¬ *E13.90*
- - Obésité sans obésité
- - - Adulte ¬ *E11*
- - - Maturité ¬ *E11*
- - - Non
- - - - Cétosique ¬ *E11*
- - - - Insulino-dépendant du sujet jeune ¬ *E11*
- - - Stable ¬ *E11*
- - - Type 2 sous insulinothérapie ¬ *E11*
- - Œdème de la macula ¬ *E14.30†, H36.0**
- - Pancréatoprive ¬
- - - *E13*
- - - *E13.90*
- - Polyneuropathie ¬ *E14.40†, G63.2**
- - Préexistant
- - - Lié à la malnutrition ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.2*
- - - Sans précision ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.3*
- - - Type
- - - - 1 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.0*
- - - - 2 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.1*
- - Prurit ¬ *E14.60†, L99.8**
- - Rétinopathie ¬ *E14.30†, H36.0**
- - Sans précision ¬ *E14*
- - Sujet à cétose ¬ *E10*
- - Survenant au cours de la grossesse ¬ *O24.4*
- - Trouble circulatoire ¬ *E14.50†, I79.2**
- - Type
- - - 1
- - - - Altération vasculaire ¬ *E10.50†, I79.2**
- - - - Angiopathie ¬ *E10.50†, I79.2**
- - - - Arthrite de Charcot ¬ *E10.60†, M14.69**
- - - - Cataracte ¬ *E10.30†, H28.0**
- - - - Complication
- - - - - Neurologique ¬ *E10.40†, G63.2**
- - - - - Rénale ¬ *E10.20†, N08.3**
- - - - - Vasculaire périphérique ¬ *E10.50†, I79.2**

Diabète *–suite*
- Sucré *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 1 *–suite*
- - - - Maculopathie ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - - Maladie oculaire ¬ *E10.30†, H58.8**
- - - - Manifestation ophtalmologique ¬ *E10.30†, H58.8**
- - - - MOA [maladie occlusive artérielle] ¬ *E10.50†, I79.2**
- - - - Myatrophie ¬ *E10.40†, G73.0**
- - - - Névralgie ¬ *E10.40†, G63.2**
- - - - Névrite ¬ *E10.40†, G63.2**
- - - - Polyneuropathie ¬ *E10.40†, G63.2**
- - - - Prurit ¬ *E10.60†, L99.8**
- - - - Rétinite ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - - Rétinopathie diabétique ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - - Trouble circulatoire ¬ *E10.50†, I79.2**
- - - - ¬
- - - - - *E10*
- - - - - Décollement tractionnel au cours de rétinopathie diabétique dans le *E10.30†, H36.0**
- - - - - Dégénérescence graisseuse du rein dans le *E10.20†, N29.8**
- - - - - Foie diabétique dans le *E10.60†, K77.8**
- - - - - Fond d'œil diabétique dans le *E10.30†, H36.0**
- - - - - Gastroparésie diabétique dans le *E10.40†, G99.0**
- - - - - Glaucome de néovascularisation au cours de rétinopathie diabétique dans le *E10.30†, H36.0**
- - - - - Glomérulonéphrite diabétique dans le *E10.20†, N08.3**
- - - - - Glomérulosclérose diabétique dans le *E10.20†, N08.3**
- - - - - Microangiopathie diabétique dans le *E10.50†, I79.2**
- - - - - Nécrobiose lipoïdique diabétique dans le *E10.60†, L99.8**
- - - - - Neuropathie diabétique dans le *E10.40†, G63.2**
- - - - - Polyneuropathie diabétique dans le *E10.40†, G63.2**
- - - - - Rubeosis diabetica dans le *E10.60†, L99.8**
- - - - - Syndrome de Kimmelstiel et Wilson extracapillaire diabétique dans le *E10.20†, N08.3**
- - - - - Syndrome de Kimmelstiel-Wilson dans le *E10.20†, N08.3**
- - - - - Vulvitis diabetica dans le *E10.60†, N77.8**
- - - 2
- - - - Altération vasculaire ¬ *E11.50†, I79.2**
- - - - Amyotrophie ¬ *E11.40†, G73.0**
- - - - Angiopathie ¬ *E11.50†, I79.2**
- - - - Arthrite de Charcot ¬ *E11.60†, M14.69**
- - - - Cataracte ¬ *E11.30†, H28.0**

Diabète *–suite*
- Sucré *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 2 *–suite*
- - - - Complication
- - - - - Neurologique ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - - Rénale ¬ *E11.20†, N08.3**
- - - - Maculopathie ¬ *E11.30†, H36.0**
- - - - Maladie oculaire ¬ *E11.30†, H58.8**
- - - - MOA [maladie occlusive artérielle] ¬ *E11.50†, I79.2**
- - - - Myatrophie ¬ *E11.40†, G73.0**
- - - - Néphropathie ¬ *E11.20†, N08.3**
- - - - Neuropathie ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - Névralgie ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - Névrite ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - Prurit ¬ *E11.60†, L99.8**
- - - - Rétinite ¬ *E11.30†, H36.0**
- - - - Rétinopathie diabétique ¬ *E11.30†, H36.0**
- - - - Trouble circulatoire ¬ *E11.50†, I79.2**
- - - - ¬
- - - - - *E11*
- - - - - Décollement tractionnel au cours de rétinopathie diabétique dans le *E11.30†, H36.0**
- - - - - Dégénérescence graisseuse du rein dans le *E11.20†, N29.8**
- - - - - Foie diabétique dans le *E11.60†, K77.8**
- - - - - Fond d'œil diabétique dans le *E11.30†, H36.0**
- - - - - Gastroparésie diabétique dans le *E11.40†, G99.0**
- - - - - Glaucome de néovascularisation au cours de rétinopathie diabétique dans le *E11.30†, H36.0**
- - - - - Glomérulonéphrite diabétique dans le *E11.20†, N08.3**
- - - - - Glomérulosclérose diabétique dans le *E11.20†, N08.3**
- - - - - Microangiopathie diabétique dans le *E11.50†, I79.2**
- - - - - Nécrobiose lipoïdique diabétique dans le *E11.60†, L99.8**
- - - - - Polyneuropathie diabétique dans le *E11.40†, G63.2**
- - - - - Rubeosis diabetica dans le *E11.60†, L99.8**
- - - - - Syndrome de Kimmelstiel et Wilson extracapillaire diabétique dans le *E11.20†, N08.3**
- - - - - Syndrome de Kimmelstiel-Wilson dans le *E11.20†, N08.3**
- - - - - Vulvitis diabetica dans le *E11.60†, N77.8**
- - ¬
- - - Antécédents familiaux de *Z83.3*
- - - Arthropathie neuropathique dans le *E14.60†, M14.69**
- - - Examen spécial de dépistage de *Z13.1*

Diabète *–suite*
- Sucré *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Neuropathie des nerfs périphériques autonomes dans le *E14.40†, G99.0**
- - - Syndrome myasthénique dans le *E14.40†, G73.0**
- - - Trouble circulatoire dans le *E14.50†, I79.2**
- Type
- - 1 ¬ Saignement ponctuel comme complication oculaire diabétique du *E10.30†, H58.8**
- - 2 ¬ Saignement ponctuel comme complication oculaire diabétique du *E11.30†, H58.8**
- ¬ Hémochromatose avec *E83.1*

Diabetes renalis ¬ *E74.8*

Diabetica
- Diabète sucré type
- - 1 ¬
- - - Rubeosis *E10.60†, L99.8**
- - - Vulvitis *E10.60†, N77.8**
- - 2 ¬
- - - Rubeosis *E11.60†, L99.8**
- - - Vulvitis *E11.60†, N77.8**
- ¬ Diabète sucré avec Cataracta *E14.30†, H28.0**

Diabétique
v. Type de maladie

Diabolo] ¬ Tube(s) de myringotomie [*Z96.2*

Diagnostic
- Hypertension ¬ Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans *R03.0*
- N est rapporté ¬ Examen
- - Général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun *Z00*
- - Spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun *Z01*
- Sensibilisation ¬ Tests cutanés de *Z01.5*
- ¬
- - Conseil et surveillance pour: Sujet inquiet de son état de santé (sans *Z71*
- - Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans *R03*
- - Intoxication: Agents de *T50.8*
- - Transfusion sanguine, sans mention de *Z51.3*

Diagnostique
- Appareil urinaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.4*
- Cliniquement, sans confirmation parasitologique. ¬ Paludisme *B54*
- Cœur et de la circulation coronaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.1*
- Crâne et de la tête, non classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.0*
- Foie et des voies biliaires ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.2*

Diagnostique *–suite*

- Membres ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.6*
- Non précisée quant au siège ou au système concerné ¬ Maladie: non *R69*
- Partie
- - Abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.5*
- - Corps
- - - Précisées ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.8*
- - - ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93*
- - Système ostéo-musculaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.7*
- - Voies digestives ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.3*
- Poumon ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R91*
- Sein ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R92*
- Système nerveux central ¬ Autres résultats anormaux d'imagerie *R90.8*
- Thérapeutique
- - Intra-utérins, non classées ailleurs ¬ Complications consécutives à des actes à visée *P96.5*
- - Localisations, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.88*
- - Non classé ¬
- - - Choc pendant ou après un acte à visée *T81.1*
- - - Complication
- - - - Acte
- - - - - Visée *T81*
- - - - - Visée *T81.8*
- - - - Vasculaires consécutives à un acte à visée *T81.7*
- - - Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée *T81.0*
- - - Infection après un acte à visée *T81.4*
- - - Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée *I97.89*
- - Sans précision ¬
- - - Affection du système nerveux après un acte à visée *G97.9*
- - - Trouble de l'appareil circulatoire après un acte à visée *I97.9*
- - Sur
- - - Appareil uro-génital, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.87*
- - - Territoire drainage lymphatique
- - - - Axillaire
- - - - - Stade I ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.81*
- - - - - Stade II ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.82*
- - - - - Stade III ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.83*

Diagnostique *–suite*

- Thérapeutique *–suite*
- - Sur *–suite*
- - - Territoire drainage lymphatique *–suite*
- - - - Cervical, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.80*
- - - - Inguinal
- - - - - Stade I ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.84*
- - - - - Stade II ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.85*
- - - - - Stade III ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.86*
- - Y compris accouchement SAI ¬
- - - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée *O75.4*
- - - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée *O75.4*
- - - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée *O75.4*
- - ¬
- - - Choc (endotoxique) (hypovolémique) pendant ou après un acte à visée *T81.1*
- - - Collapsus pendant ou après un acte à visée *T81.1*
- - - Complication
- - - - Acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée *O75.4*
- - - - Non précisée d'un acte à visée *T81.9*
- - - Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée *T81.5*
- - - Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée *T81.7*
- - - Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée *T81.8*
- - - Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée *T81.0*
- - - Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures *Y82!*
- - - Perforation accidentel
- - - - Nerf
- - - - - Cathéter au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Endoscope au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Instrument au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Sonde au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Organe
- - - - - Cathéter au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Endoscope au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Instrument au cours d'un acte à visée *T81.2*

Diagnostique *–suite*

- Thérapeutique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Perforation accidentel *–suite*
- - - - Organe *–suite*
- - - - - Sonde au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin par cathéter au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Sanguin par endoscope au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Sanguin par instrument au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Sanguin par sonde au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée *T81.6*
- - - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée *O35.7*

Dialyse

- Extracorporelle ¬ *Z49.1*
- Insuffisance rénale ¬ Dépendance de longue durée envers une *Z99.2*
- Longue durée lors d'une insuffisance rénale ¬ *Z99.2*
- Péritonéal ¬
- - *Z49.2*
- - Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de *T85.71*
- Rénale) SAI ¬ *Z49.1*
- Traitement ¬ préparation d'une *Z49*
- ¬
- - *Z49.2*
- - Anémie induite par l'aluminium après *N18.5†, D63.8**
- - Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de *T82.4*
- - Insuffisance rénale chronique, nécessitant une *N18.5*
- - Soins préparatoires en vue d'une *Z49.0*
- - Surveillance d'une *Z49*

Dialytique ¬

- Démence *N18.5†, F02.8**
- Encéphalopathie *N18.5†, G94.8**

Diamond
v. Blackfan-Diamond
v. Gardner-Diamond

Dianzani ¬ Maladie lymphoproliférative auto-immune de *D47.9*

Diaphragmatique

- Anomalies des membres ¬ Syndrome d'hernie *Q87.8*
- Congénitale ¬ Hernie *Q79.0*
- Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- Gangrène ¬ Hernie *K44.1*
- Gangréneuse ¬ Hernie *K44.1*
- Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*

Diaphragmatique *–suite*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- SAI ¬ Hernie *K44.9*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K44.9*
- ¬
- - Adaptation et manipulation d'un stimulateur *Z45.81*
- - Adhérences (de): *K66.0*
- - Hernie *K44*
- - Infarctus
- - - Répété (aigu) (de): paroi *I22.1*
- - - Transmural (aigu) (de): paroi *I21.1*
- - Relâchement *J98.6*

Diaphragme
- Éventration ¬ Défaut congénital du *Q79.1*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q79.1*
- ¬
- - *C49.3*
- - *D21.3*
- - Absence de *Q79.1*
- - Carcinome du *C49.3*
- - Eventration du *Q79.1*
- - Inflammation du *J98.6*
- - Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.81*
- - Maladies du *J98.6*
- - Malformations congénitales du *Q79.1*
- - Paralysie du *J98.6*

Diaphysaire
- Progressive ¬ Dysplasie *Q78.3*
- Tachetée ¬ Dysplasie *Q77.3*

Diaphyse
- Cubital
- - Luxation de la tête du radius ¬ Fracture proximale de la *S52.21*
- - Partie non précisée ¬ Fracture de la *S52.20*
- - Radiale ¬ Fracture des deux *S52.4*
- Cubitus ¬ Fracture de la *S52.2*
- Fémorale ¬ Fracture de la *S72.3*
- Humérus ¬ Fracture de la *S42.3*
- Radiale ¬ Fracture ouverte de la *S52.30, S51.87!*
- Radius
- - Luxation de la tête du cubitus ¬ Fracture distale de la *S52.31*
- - Partie non précisée ¬ Fracture de la *S52.30*
- - ¬ Fracture de la *S52.3*
- Tibia
- - Fracture du péroné (toute partie) ¬ Fracture de la *S82.21*
- - Isolée ¬ *S82.28*
- - SAI ¬ *S82.28*
- - ¬ Fracture de la *S82.28*
- ¬ Fracture

Diaphyse *–suite*
- ¬ Fracture *–suite*
- - Multiples de la *S42.3*
- - Os du métacarpe: *S62.32*
- - Péroné seul: *S82.42*
- - Premier métacarpien: *S62.22*

Diarrhée
- Aigu
- - Aqueuse ¬ *A09.0*
- - Exsiccose ¬ *A09.9, E86*
- - Hémorragique ¬ *A09.0*
- Chlorée congénitale ¬ *P78.3*
- Chronique associée à un déficit en glucoamylase ¬ *E74.3*
- Dysentérique ¬ *A09.0*
- Entéropathogène à Escherichia coli ¬ *A04.0*
- Épidémique ¬ *A09.0*
- Flagellés ¬ *A07.9*
- Fonctionnelle ¬ *K59.1*
- Hémorragique aiguë ¬ *A09.0*
- Infectieux
- - Exsiccose ¬ *A09.0, E86*
- - Néonatale ¬ *A09.0*
- - Nouveau-né ¬ *A09.0*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B20, A09.0*
- Médicaments ¬ *K52.1*
- Mycosique NCA ¬ *B49†, K93.8**
- Néonatale SAI ¬ *A09.9*
- Non infectieuse néonatale ¬ *P78.3*
- Post-antibiothérapie ¬ *K52.1*
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*
- Prédominante [SII-D] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec *K58.1*
- Probablement d'origine infectieuse, avec exsiccose ¬ *A09.0, E86*
- Protozoaires ¬ *A07.9*
- Sodée congénitale ¬ *P78.3*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Vomissements
- - Déficit en tréhalase ¬ *E74.3*
- - Exsiccose ¬
- - - *A09.9, E86*
- ¬
- - Formes psychogènes de: *F45.3*
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, K52.9*
- - Syndrome hémolytique et urémique avec *D59.3*

Diastasis musculaire ¬ *M62.0*

Diastématomyélie ¬ *Q06.2*

Diastème d'une ou de plusieurs dents ¬ *K07.3*

Diastolique ¬ Insuffisance cardiaque *I50.1*

Diastrophique ¬ Dysplasie *Q77.5*

Diathèse cystinique ¬ *E72.8*

Diaz] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: astragale [*M92.6*

Diazoxide
- Déficit
- - Kir6.2 ¬ Hyperinsulinisme focal résistant au *E16.1*
- - SUR1 ¬ Hyperinsulinisme focal résistant au *E16.1*
- ¬
- - Hyperinsulinisme diffus sensible au *E16.1*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique, forme diffuse sensible au *E16.1*

Dicarboxylique ¬ Hyperaminoacidurie *E72.0*

Dicentrique ¬ Chromosome remplacé par un anneau ou *Q93.2*

Dicéphales ¬ *Q89.4*

Dichlorométhane ¬ Effet toxique: *T53.4*

Dicrocœliase ¬ *B66.2*

Dicrocoelium dendriticum ¬ Infection (à): *B66.2*

DICS
- Dysgénésie réticulaire ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.0*
- Nombre faible
- - Cellules B et T ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.1*
- - Normal de cellules B ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.2*
- SAI ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.9*

Didelphe ¬ Utérus *Q51.2*

Didymosis aplasticosebacea ¬ *Q84.8*

Dieker
v. Miller-Dieker

Diététiques ¬ Conseil et surveillance pour: Conseil et surveillance *Z71*

Diéthylamide de l'acide lysergique] ¬ Intoxication au LSD [*T40.8*

Dietz
v. Loeys-Dietz

Différenciation
- Intermédiaire ¬ Tumeur du parenchyme pinéal à *D44.5*
- Minimale ¬ Leucémie
- - Aiguë myéloblastique avec *C92.00*
- - Myéloïde aiguë à *C92.0*

Difficile
- Famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation socio-économique *Z76.2*
- Mégacôlon
- - Complications organiques ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.73*
- - Sans autres complications organiques ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.72*
- Nouveau-né ¬ Alimentation au sein *P92.5*
- Sans
- - Mégacôlon
- - - Complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.71*
- - - Sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.70*

Difficile *–suite*
- Sans *–suite*
- - Précision ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.79*
- ¬
- - Colite
- - - Infectieuse à Clostridium *A04.79*
- - - Toxique à Clostridium *A04.79*
- - Conditions de travail *Z56*
- - Entérite
- - - Infectieuse à Clostridium *A04.79*
- - - Toxique à Clostridium *A04.79*
- - Entérocolite à Clostridium *A04.7*
- - Infection
- - - Clostridium *A04.79*
- - - Récurrente par Clostridium *U69.40!*
- - Intoxication d'origine alimentaire à Clostridium *A04.7*
- - Sepsis à Clostridium *A41.4*

Difficulté
- Ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie ¬ *Z60*
- Alimentation SAI ¬ *R63.3*
- Enseignants et les autres élèves ¬ *Z55*
- Intubation
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Echec ou *O29.6*
- - - Puerpéralité ¬ Echec ou *O89.6*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Echec ou *O74.7*
- - ¬ Echec ou *T88.4*
- Langage ¬ *R47.8*
- Lié
- - Acculturation ¬ *Z60*
- - Besoin
- - - Assistance
- - - - Domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ *Z74.2*
- - - - Soins d'hygiène ¬ *Z74.1*
- - - Surveillance permanente ¬ *Z74.3*
- - Certain
- - - Circonstances psychosociales ¬ Autres *Z64.8*
- - - Situations psycho-sociales ¬ *Z64*
- - Consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues ¬ *Z72.0*
- - Dépendance
- - - Envers personne donne soin
- - - - Sans précision ¬ *Z74.9*
- - - - ¬
- - - - - *Z74*
- - - - - *Z74.8*
- - - Mobilité restreinte ¬ *Z74.0*
- - Éducation
- - - Alphabétisation ¬ *Z55*
- - - ¬ Autres *Z62*

Difficulté *–suite*
- Lié *–suite*
- - Emploi et au chômage ¬ *Z56*
- - Enfance malheureuse ¬ *Z61*
- - Entourage immédiat, y compris la situation familiale ¬ Autres *Z63*
- - Environnement
- - - Physique ¬ *Z58*
- - - Social ¬ *Z60*
- - Grossesse non désirée ¬ *Z64.0*
- - Installation médical soin santé
- - - Sans précision ¬ *Z75.9*
- - - ¬ Autres *Z75.8*
- - Libération de prison ¬ *Z65*
- - Logement et aux conditions économiques ¬ *Z59*
- - Mode vie
- - - Sans précision ¬ *Z72.9*
- - - ¬
- - - - *Z72*
- - - - *Z72.8*
- - Multiparité ¬ *Z64.1*
- - Orientation de son mode de vie ¬ *Z73*
- - Possible sévices
- - - Physiques infligés à un enfant ¬ *Z61*
- - - Sexuels infligés à un enfant ¬ *Z61*
- - Situations psycho-sociales ¬ *Z65*
- - Vie en institution ¬ *Z59*
- Marche, non classée ailleurs ¬ *R26.2*
- Mastication ¬ *R19.88*
- Nutritionnelles et nutrition inadaptée ¬ *R63.3*
- Procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et *Z35.2*
- Rapport
- - Conjoint ou le partenaire ¬ *Z63*
- - Parents et les beaux-parents ¬ *Z63*

Difformité de la cicatrice (Peau) ¬ *L90.5*

Diffus
v. Type de maladie

Digestif
- Abdomen ¬ symptôme
- - Précis du système *R19.88*
- - Signe
- - - Précisés relatifs à l'appareil *R19.8*
- - - Relatifs à l'appareil *R19*
- Acte médicaux
- - Non classées ailleurs ¬ Autres atteintes de l'appareil *K91.88*
- - Sans précision ¬ Atteinte de l'appareil *K91.9*
- Basses ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: voies *F45.32*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte des voies *K93.3**
- Cavité abdominale ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil *R85*

Digestif *–suite*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de l'appareil *O99.6*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes d'autres organes de l'appareil *K93**
- Évolution imprévisible inconnu
- - Organes digestifs ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes *D37.78*
- - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes *D37.70*
- - ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes *D37*
- Greffe-contre-hôte stade
- - 1 ¬ Maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.01†, K93.21**
- - 2 ¬ Maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.02†, K93.22**
- - 3 ¬ Maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.02†, K93.23**
- - 4 ¬ Maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.02†, K93.24**
- Haut ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil *F45.31*
- Inférieures, n.c.a. ¬ Anomalie congénitale des voies *Q43.9*
- Maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte ¬ Atteinte de l'appareil *K93.2**
- Non précis ¬
- - Carcinome in situ des organes *D01*
- - Tumeur maligne secondaire des organes *C78.8*
- Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les voies *T18.9*
- Précis
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes d'autres organes *K93.8**
- - ¬ Carcinoma in situ: Autres organes *D01.7*
- SAI ¬
- - Absence (complète) (partielle) des voies *Q45.8*
- - Appareil
- - - *D13.9*
- - - *T18.9*
- - Duplication des organes *Q45.8*
- - Malposition congénitale des organes *Q45.8*
- - Tube ou appareil *C26.9*
- Sans précision ¬
- - Affection périnatale de l'appareil *P78.9*
- - Carcinoma in situ: Organe *D01.9*
- - Maladie du système *K92.9*
- - Malformation congénitale de l'appareil *Q45.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil *D37.9*
- Siège
- - Mal définis ¬ Tumeur maligne des organes *C26*
- - Non précisé ¬ Ulcère *K27*
- Stade

Digestif *–suite*
- Stade *–suite*
- - 1 ¬ Maladie GVH chronique des voies *T86.05†, K93.31**
- - 2 ¬ Maladie GVH chronique des voies *T86.06†, K93.32**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique des voies *T86.07†, K93.33**
- Supérieur
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des voies *Q40.9*
- - ¬
- - - Anomalie congénital
- - - - SAI des voies *Q40.9*
- - - - Voies *Q40.9*
- - - Malformation congénital
- - - - Précisées des voies *Q40.8*
- - - - Voies *Q40*
- Utéro-urinaire ¬ Fistule congénitale utéro- *Q51.7*
- ¬
- - Absence acquise d'autres parties de l'appareil *Z90.4*
- - Affection périnatal
- - - Appareil *P78*
- - - Précisées de l'appareil *P78.8*
- - Anomalie congénitale SAI de l'appareil *Q45.9*
- - Antécédent
- - - Familial
- - - - Maladies de l'appareil *Z83.7*
- - - - Tumeur maligne des organes *Z80.0*
- - - Personel
- - - - Maladies de l'appareil *Z87.1*
- - - - Tumeur maligne des organes *Z85.0*
- - Brûlure d'autres parties des voies *T28.2*
- - Corps étranger
- - - Localisations autres et multiples dans les voies *T18.8*
- - - Voies *T18*
- - Corrosion d'autres parties des voies *T28.7*
- - Infection
- - - Cytomégalovirus de l'appareil *B25.80†*
- - - Fongique du tube *B49†, K93.8**
- - Insuffisance anastomose
- - - Sutures après opérations d'autres organes du système *K91.83*
- - - Voies *K91.83*
- - Maladie
- - - Chagas chronique avec atteinte de l'appareil *B57.3†, K93.8**
- - - Précisées du système *K92.8*
- - - Système *K92*
- - Malformation congénital
- - - Appareil *Q45*
- - - Précisées de l'appareil *Q45.8*
- - Présence d'une autre stomie de l'appareil *Z93.4*

Digestif *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies *R93.3*
- - Spasme psychogène des voies *F45.32*
- - Surveillance d'autres stomies de l'appareil *Z43.4*
- - Tuberculose des organes *A18.3†, K93.0**
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - Parties autres et mal définies de l'appareil *D13*
- - - - Sièges mal définis de l'appareil *D13.9*
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D37.78*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D37.7*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës de l'appareil *C26.8*
- - - - Secondaire des organes respiratoires et *C78*
- - - - Sièges mal définis de l'appareil *C26.9*

Digestion ¬ Intoxication: Médicaments facilitant la *T47.5*

Digital
v.a. cranio-digital
v.a. lacrymo-auriculo-dento-digital
v.a. oro-facio-digital
v.a. oto-palato-digital
- Congénital
- - Isolé ¬ Hippocratisme *Q68.1*
- - ¬ Hippocratisme *Q68.1*
- ¬
- - Arthroplastie *Z96.68*
- - Hippocratisme *R68.3*
- - Myopathie à empreintes *G71.2*
- - Pachydermopériostose avec hippocratisme *M89.49†, L62.0**
- - Syndrome de microcéphalie-albinisme-anomalies *Q87.8*

Digito
v. cranio-facio-digito-génital
v. facio-digito-génital
v. onycho-digito-mammaire

Dihydraté ¬ Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium *M11.19*

Dihydrolipoamide
- Acétyltransférase ¬ Déficit en composé *E74.4*
- Déshydrogénase ¬ Déficit en *E74.4*

Dihydroptéridine réductase ¬ Déficit en *E70.1*

Dihydropyrimidinase ¬ Déficit en *E79.8*

Dihydropyrimidine déshydrogénase ¬ Déficit en *E79.8*

Dihydropyrimidinurie ¬ *E79.8*

Dilacération hémorragique gastro-œsophagienne ¬ Syndrome de *K22.6*

Dilatation
- Aiguë de l'estomac ¬ *K31.0*

Dilatation *–suite*
- Aorte ¬ *I71.9*
- Ataxie ¬ Cardiomyopathie avec *E71.1†, I43.1**
- Cardiaque ¬ *I51.7*
- Cœur ¬ *I51.7*
- Col ¬ Anomalies de la contraction utérine et de la *O62*
- Côlon ¬ *K59.3*
- Congénital
- - Côlon ¬ *Q43.2*
- - E) de l'aorte ¬ *Q25.4*
- - Œsophage ¬ *Q39.5*
- - Trachée ¬ *Q32.1*
- - Uretère ¬ *Q62.2*
- Idiopathique
- - Artère pulmonaire ¬ *I28.8*
- - Familiale de l'oreillette droite ¬ *Q20.8*
- Insuffisante du col ¬ *O62.0*
- Syphilitique de l'aorte ¬ *A52.0†, I39.1**
- Ventriculaire ¬ *I51.7*
- ¬
- - Myocardiopathie avec *I42.0*
- - Prolongation de la première période [*O63.0*

Dimension des mâchoires ¬ Anomalies importantes de *K07.0*

Diméthylbenzène] ¬ Xylène [*T52.2*

Diméthylglycine déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.5*

Diminués ¬ Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou *R01.2*

Diminution
- Capacité
- - Respiratoire ¬ *R94.2*
- - Vitale ¬ *R94.2*
- Formation de mélanine ¬ Autres anomalies liées à une *L81.6*
- Œstrogènes ¬ *E28.3*

Diminutus [ternidensiase] ¬ Infection par: Ternidens *B81.8*

Dimitri
v. Sturge-Weber-Dimitri

Diones ¬ Intoxication: Succinimides et oxazolidine- *T42.2*

Dioxyde
- Carbone ¬
- - *T41.5*
- - Démence au cours d'intoxication au *T58†, F02.8**
- - Effet toxique: *T59.7*
- - Intoxication au *T41.5*
- Soufre ¬ Effet toxique: *T59.1*

Dioxygénase ¬
- Déficit en 4-hydroxyphénylpyruvate *E70.2*
- Tyrosinémie par déficit en 4-hydroxyphénylpyruvate *E70.2*

Diparésie et diplégie des membres supérieurs ¬ *G83.0*

Diphallie ¬ *Q55.6*

Diphosphatase ¬ Déficit en fructose-1,6- *E74.1*

Diphosphate-galactose-4-épimérase ¬ Déficit en uridine *E74.2*

Diphtérie

- Amygdalienne ¬ *A36.0*
- Complication neurologique ¬ *A36.8†, G99.8**
- Cutanée ¬ *A36.3*
- Laryngée ¬ *A36.2*
- Oreille moyenne ¬ *A36.8†, H67.0**
- Pharyngée ¬ *A36.0*
- Rhinopharyngée ¬ *A36.1*
- Sans précision ¬ *A36.9*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.6*
- Tétanos
- - Coqueluche
- - - DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre *Z27.1*
- - - Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre *Z27.3*
- - - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre *Z27.2*
- - Poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la *Z27.8*
- Vaginale ¬ *A36.8†, N77.1**
- ¬
- - *A36*
- - Formes de *A36.8*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *A36.8†, N16.0**
- - Myocardiopathie au cours de *A36.8†, I43.0**
- - Paralysie de l'iris due à la *A36.8†, H22.8**
- - Polyneuropathie au cours de *A36.8†, G63.0**
- - Pyélonéphrite au cours de *A36.8†, N16.0**
- - Sujet porteur de *Z22.2*

Diphtérique

- Pseudomembraneuse ¬ Angine *A36.0*
- ¬
- - Conjonctivite *A36.8†, H13.1**
- - Cystite *A36.8†, N33.8**
- - Laryngo-trachéite *A36.2*
- - Myocardite *A36.8†, I41.0**
- - Névrite *A36.8†, G59.8**
- - Ophtalmie *A36.8†, H13.1**
- - Paralysie pharyngée *A36.0†, G99.8**
- - Péritonite *A36.8†, K67.8**
- - Polynévrite *A36.8†, G63.0**

Diphtheriae ¬ Radiculomyélite toxique à Corynebacterium *A36.8†, G05.0**

Diphyllobothriase

- Larvaire ¬ *B70.1*
- Sparganose ¬ *B70*
- ¬ *B70.0*

Diphyllobothrium

- Adulte), (D. latum) (D. pacificum) ¬ Infection à *B70.0*
- ¬ Anémie à *B70.0†, D63.8**

Diplacousie ¬ *H93.2*

Diplégie

- Membres supérieurs ¬ Diparésie et *G83.0*
- Supérieure ¬ *G83.0*

Diplégique ¬ Paralysie cérébrale spastique *G80.1*

Diplocoques ¬ Méningite à *A39.0†, G01**

Diplopie ¬ *H53.2*

Dipylidiose [infection par cestodes du chien] ¬ *B71.1*

Dipylidium ¬ Infection à *B71.1*

Dipyridamole ¬ *T46.3*

Dirigés contre facteur

- Coagulation ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps *D68.32*
- VIII ¬ Hémophilie due aux anticorps *D68.31*
- Von Willebrand ¬
- - Augmentation des anticorps *D68.32*
- - Hémophilie due aux anticorps *D68.32*
- Xa ¬ Hémophilie due aux anticorps *D68.32*
- Xia ¬ Hémophilie due aux anticorps *D68.32*

Dirofilariose ¬ *B74.8*

Discal

- Cervicale ¬ Compression de la moelle épinière due à une hernie *M50.0†, G99.2**
- ¬
- - Lumbago dû à une hernie *M51.2*
- - Névrite
- - - Hernie *M51.1†, G55.1**
- - - Rupture *M51.1†, G55.1**
- - Radiculite
- - - Cervical
- - - - Prolapsus *M50.1†, G55.1**
- - - - Rupture *M50.1†, G55.1**
- - - Dégénérescence *M51.1†, G55.1**
- - - Prolapsus *M51.1†, G55.1**
- - - Rupture *M51.1†, G55.1**
- - Rétrécissement
- - - Canal rachidien par lésion *M99.5*
- - - Espaces intervertébraux par tissu conjonctif et *M99.7*
- - Syndrome de la colonne lombaire dû à une hernie *M51.1†, G55.1**

Disciforme ¬ Kératite dendritique et *H19.1**

Disciformis

- Cours de varicelle ¬ Keratitis *B01.8†, H19.2**
- Herpès simplex ¬ Keratitis *B00.5†, H19.1**

Discite, sans précision ¬ *M46.4*

Discoïde

- Besnier ¬ Érythème marginé *L53.2*
- Congénital
- - Localisations multiples ¬ Ménisque *M23.10*

Discoïde *–suite*

- Congénital *–suite*
- - Ménisque
- - - Externe ¬ Ménisque *M23.16*
- - - Interne ¬ Ménisque *M23.13*
- - - SAI ¬ Ménisque *M23.19*
- - ¬ Ménisque *M23.1*
- Paupière ¬ Lupus érythémateux *H01.1*
- ¬ Lupus érythémateux chronique *L93.0*

Discopathie

- Intervertébrale ¬ Sciatique due à une *M51.1†, G55.1**
- ¬ Myélopathie au cours de *M51.0†, G99.2**

Discordance ventriculo-artériel

- Concordance atrio-ventriculaire ¬ *Q20.3*
- Isolée ¬ *Q20.3*

Discordante ¬ Communication

- Auriculo-ventriculaire *Q20.5*
- Ventriculo-auriculaire *Q20.3*

Discrimination ou d'une persécution ¬ Cible d'une *Z60*

Disease) ¬ Émaciation (slim *B22*

Dislocation

- Famille par séparation ou divorce ¬ *Z63*
- Germe dentaire ¬ *K00.4*
- Multiples au niveau de la tête et du cou ¬ *T03.0*
- Osselets ¬ Dissociation et *H74.2*

Disomie uniparentale

- Maternel chromosome
- - 2 ¬ *Q99.8*
- - 6 ¬ *Q99.8*
- - 16 ¬ *Q99.8*
- Origine paternelle du chromosome 11 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une *Q87.3*
- Paternelle du chromosome 6 ¬ *Q99.8*

Disparition

- Décès (supposé) d'un membre de la famille ¬ *Z63*
- Vision binoculaire ¬ *H53.3*
- ¬ Noyade et *X59.9!*

Disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide ¬ Non *Z75.8*

Disponibles ¬ Soins à domicile non *Z75.8*

Dispositif

- Accès vasculaire ¬ Ajustement et entretien d'un *Z45.2*
- Cardiaque électronique ¬
- - Adaptation manipulation
- - - *Z45.0*
- - - *Z45.08*
- - Contrôle et vérification d'un *Z45.0*
- - Présence d'un *Z95.0*
- Contraceptif intra-utérin
- - Stérilet] ¬ Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un *Z30.5*

Dispositif *–suite*
- Contraceptif intra-utérin *–suite*
- - ¬
- - - Mise en place d'un *Z30.1*
- - - Surveillance d'un *Z30.5*
- Gastro-intestinal
- - Ballonnet ¬ Complication mécanique due à un *T85.59*
- - ¬ Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres *Z46.5*
- Intra-utérin
- - Contraceptif ¬ Complication mécanique d'un *T83.3*
- - ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*
- Médicaux ¬ Mise en place et ajustement d'autres appareils ou *Z46*
- Œsophagien anti-reflux ¬ Complication mécanique d'un *T85.50*
- Ostéosynthèse interne ¬ Infection péri-implantaire par *T84.6*

Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus ¬ *Q89.3*

Disproportion
- Anomalies du fœtus ¬ Soins maternels pour *O33.7*
- Bassin maternel généralement rétréci ¬ Soins maternels pour *O33.1*
- Céphalo-pelvienne SAI ¬ *O33.9*
- Fœtale SAI ¬ *O33.5*
- Fœto-pelvienne
- - Connue ou présumée ¬ Soins maternels pour *O33*
- - Cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et *P03.1*
- - Origine mixte, maternelle et fœtale ¬ Soins maternels pour *O33.4*
- - SAI ¬ *O33.9*
- - Sans précision ¬ Dystocie due à une *O65.4*
- Fœtus
- - Anormalement gros ¬ Soins maternels pour *O33.5*
- - Hydrocéphale ¬ Soins maternels pour *O33.6*
- Malformation du bassin de la mère ¬ Soins maternels pour *O33.0*
- Origine
- - Fœtale avec fœtus normal ¬ *O33.5*
- - ¬ Soins maternels pour *O33.8*
- Rétrécissement détroit
- - Inférieur ¬ Soins maternels pour *O33.3*
- - Supérieur du bassin maternel ¬ Soins maternels pour *O33.2*
- SAI ¬ Malformation du bassin entraînant une *O33.0*
- Sans précision ¬ Soins maternels pour *O33.9*
- Type fibre
- - Musculaires ¬ Myopathie congénitale avec *G71.2*

Disproportion *–suite*
- Type fibre *–suite*
- - ¬ *G71.2*
- ¬
- - Ascite du fœtus entraînant une *O33.7*
- - Bassin rétréci SAI entraînant une *O33.1*
- - Hydropisie du fœtus entraînant une *O33.7*
- - Jumeaux soudés entraînant une *O33.7*
- - Méningomyélocèle du fœtus entraînant une *O33.7*
- - Rétrécissement
- - - Cavité médiane (bassin) entraînant une *O33.3*
- - - Détroit
- - - - Inférieur (bassin) entraînant une *O33.3*
- - - - Supérieur (du bassin) entraînant une *O33.2*
- - Tératome sacro-coccygien du fœtus entraînant une *O33.7*
- - Tumeur du fœtus entraînant une *O33.7*

Disque
- Cervical
- - Cervicalgie ¬ atteinte des *M50*
- - Myélopathie ¬ Atteinte d'un *M50.0†, G99.2**
- - Radiculopathie ¬ Atteinte d'un *M50.1*
- - Sans précision ¬ Atteinte d'un *M50.9*
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - *M50*
- - - - *M50.8*
- - - Détérioration d'un *M50.3*
- - - Hernie d'un *M50.2*
- Cervico-dorsaux ¬ atteinte des *M50*
- Dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés ¬ atteintes de *M51*
- Intervertébral
- - Cervical
- - - Compression des racines nerveuses ¬ Atteinte des *M50.1†, G55.1**
- - - Myélopathie ¬
- - - - Compression des racines nerveuses lors d'une atteinte des *M50.0†, G99.2**
- - - - Dégénérescence des *M50.0†, G99.2**
- - - Névralgie cervicale ¬ Atteinte des *M50.8†, G55.1**
- - - Névrite ¬ Dégénérescence des *M50.1†, G55.1**
- - - Radiculopathie ¬ Dégénérescence des *M50.1†, G55.1**
- - - ¬ Rupture traumatique d'un *S13.0*
- - Dorsal ¬ Rupture traumatique d'un *S23.0*
- - Lombaire
- - - Myélopathie ¬ Dégénérescence des *M51.0†, G99.2**
- - - ¬ Rupture traumatique d'un *S33.0*
- - Myélopathie ¬ Compression des racines nerveuses lors d'une atteinte des *M51.0†, G99.2**
- - Précis ¬

Disque *–suite*
- Intervertébral *–suite*
- - Précis ¬ *–suite*
- - - Détérioration d'un autre *M51.3*
- - - Hernie d'un autre *M51.2*
- - Sans précision ¬ Atteinte d'un *M51.9*
- - Thoraciques avec radiculopathie ¬ Dégénérescence des *M51.1†, G55.1**
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - *M51*
- - - - Précisées d'un *M51.8*
- - - Claudicatio spinalis au cours d'atteinte lombaire des *M51.1†, G55.1**
- - - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.07*
- - - Compression des racines nerveuses lors d'une atteinte des *M51.1†, G55.1**
- - - Infection (pyogène) d'un *M46.3*
- - - Lumbago avec ischialgie due à une atteinte des *M51.1†, G55.1**
- - - Myélopathie
- - - - Cours d'atteinte des *M51.0†, G99.2**
- - - - Dégénérescence des *M51.0†, G99.2**
- - - - Déplacement de *M51.0†, G99.2**
- - - Neuropathie radiculaire avec atteinte des *M51.1†, G55.1**
- - - Névrite
- - - - Atteinte des *M51.1†, G55.1**
- - - - Déplacement de *M51.1†, G55.1**
- - - - Nerf
- - - - - Brachial due au déplacement de *M50.1†, G55.1**
- - - - - Sciatique due au déplacement de *M51.1†, G55.1**
- - - - Plexus brachial due au déplacement de *M50.1†, G55.1**
- - - Présence d'une prothèse de *Z96.67*
- - - Radiculite
- - - - Atteinte des *M51.1†, G55.1**
- - - - Cervicale due au déplacement de *M50.1†, G55.1**
- - - - Déplacement de *M51.1†, G55.1**
- - - Tuberculose du *A18.0†, M49.09**
- Névrite ¬ Dégénérescence des *M51.1†, G55.1**
- Radiculopathie ¬ Dégénérescence des *M51.1†, G55.1**

Dissection
- Aorte
- - Abdominal
- - - Rupture ¬ *I71.06*
- - - Sans indication de rupture ¬ *I71.02*
- - Localisation non précis
- - - Rupture ¬ *I71.04*
- - - Sans indication de rupture ¬ *I71.00*
- - Thoracique
- - - Rupture ¬ *I71.05*

Dissection *–suite*
- Aorte *–suite*
- - Thoracique *–suite*
- - - Sans indication de rupture ¬ *I71.01*
- - Thoraco-abdominal
- - - Rupture ¬ *I71.07*
- - - Sans indication de rupture ¬ *I71.03*
- - ¬ *I71.0*
- Aortique familiale ¬ *I71.00*
- Artère
- - Basilaire (tronc) ¬ Anévrisme et *I72.5*
- - Carotide ¬ Anévrisme et *I72.0*
- - Cérébrales ¬ *I67.0*
- - Coronarienne avec rupture ¬ *I21.9*
- - Iliaque ¬ Anévrisme et *I72.3*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Anévrisme et *I72.4*
- - - Supérieur ¬ Anévrisme et *I72.1*
- - Précérébrale ¬ Anévrisme et *I72.5*
- - Précisées ¬ Anévrisme et *I72.8*
- - Rénale ¬ Anévrisme et *I72.2*
- - Vertébrale ¬ Anévrisme et *I72.6*
- Familiale des artères cervicales et cérébrales ¬ *I72.9*
- Localisation non précisée ¬ Anévrisme et *I72.9*
- Spontanée idiopathique de l'artère coronaire ¬ *I25.4*
- Transversale
- - Abdomen ¬ *T05.8*
- - Thorax ¬ *T05.8*
- ¬ Anévrisme
- - *I72*
- - Aortique et *I71*

Dissémination secondaire du cancer ¬ *C79.9*

Disséminé
v. Type de maladie

Disséquant
- Aorte ¬ Anévrisme *I71.0*
- ¬ Ostéochondrite
- - *M93.2*
- - *M93.29*

Dissimulée ¬ Grossesse *Z35.3*

Dissociatif
- Atteintes sensorielles ¬ Anesthésie *F44.6*
- Conversion
- - Mixte ¬ Trouble *F44.7*
- - Sans précision ¬ Trouble *F44.9*
- - Transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles *F44.82*
- - ¬ Autres troubles *F44.8*
- Crépusculaire» ¬ Psychogène: état *F44.88*
- Organique ¬ Trouble *F06.5*
- ¬
- - Amnésie *F44.0*
- - Convulsions *F44.5*

Dissociatif *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fugue *F44.1*
- - Stupeur *F44.2*
- - Troubles moteurs *F44.4*

Dissociation
- Auriculoventriculaire [AV] ¬ *I45.8*
- Dislocation des osselets ¬ *H74.2*
- Interférente ¬ *I45.8*
- Troubles de conversion] ¬ Autres troubles de *F44.88*

Dissocié ¬
- Intelligence *F74*
- Nystagmus (de): *H55*

Distal
- 3p ¬ Délétion *Q93.5*
- 10q ¬ Trisomie *Q92.3*
- 19q ¬ Duplication *Q92.3*
- Adulte due à des mutations de VCP ¬ Myopathie *G71.0*
- Atteinte
- - Initiale des membres supérieurs, type finlandais ¬ Myopathie *G71.0*
- - Muscles postérieurs des jambes et des muscles antérieurs des mains ¬ Myopathie *G71.0*
- - Respiratoire précoce ¬ Myopathie *G71.0*
- Diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus ¬ Fracture *S52.31*
- Faiblesse des cordes vocales ¬ Myopathie *G71.0*
- Interphalangienne ¬ Arthropathie psoriasique *L40.5†, M07.09**
- Muscle tibial antérieur ¬ Myopathie *G71.0*
- Non précisées ¬ Athérosclérose des artères *I70.29*
- Précoce
- - Associé
- - - KLHL9 ¬ Myopathie *G71.0*
- - - Nébuline ¬ Myopathie *G71.0*
- - Type Laing ¬ Myopathie *G71.0*
- SAI ¬ Partie
- - *S42.40*
- - *S52.50*
- Sans précision ¬
- - Avant-bras *S52.8*
- - Embolie et thrombose des artères *I74.4*
- Scapulohuméropéronière progressive ¬ Myopathie *G71.0*
- Tardif
- - Associée à l'alpha-B cristalline ¬ Myopathie *G71.0*
- - Type Markesbery-Griggs ¬ Myopathie *G71.0*
- Tibia
- - Isolée ¬ Fracture *S82.38*
- - SAI ¬ Fracture *S82.38*
- Type

Distal *–suite*
- Type *–suite*
- - 1 ¬ Arthrogrypose *Q68.8*
- - 2B ¬ Arthrogrypose *Q68.8*
- - 4 ¬ Arthrogrypose *Q68.8*
- - 5 ¬ Arthrogrypose *Q68.8*
- - 5D ¬ Arthrogrypose *Q68.8*
- - 6 ¬ Arthrogrypose *Q68.8*
- - 7 ¬ Arthrogrypose *Q68.8*
- - Bassin-jambe
- - - Douleur
- - - - Ischémique
- - - - - Effort, distance de marche de 200 m et plus ¬ Athérosclérose des artères *I70.21*
- - - - - Effort, distance de marche de moins de 200 m ¬ Athérosclérose des artères *I70.22*
- - - - Repos ¬ Athérosclérose des artères *I70.23*
- - - Gangrène ¬ Athérosclérose des artères *I70.25*
- - - Sans douleurs ¬ Athérosclérose des artères *I70.20*
- - - Stade IV selon Fontaine avec ulcération ¬ Athérosclérose des artères *I70.24*
- - - Ulcération ¬ Athérosclérose des artères *I70.24*
- - Épaule-bras, tous stades ¬ Athérosclérose des artères *I70.26*
- - Miyoshi ¬ Myopathie *G71.0*
- - Nonaka ¬ Myopathie *G71.8*
- - Tateyama ¬ Myopathie *G71.0*
- - Welander ¬ Myopathie *G71.0*
- Vacuoles bordées ¬ Myopathie *G71.8*
- ¬
- - Acidose tubulaire rénale *N25.8*
- - Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- - Anoctaminopathie *G71.0*
- - Athérosclérose des artères *I70.2*
- - Dystrophie musculaire: *G71.0*
- - Entorse et foulure de la cheville: Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), *S93.43*
- - Épiphyse *S42.44*
- - Fracture
- - - Doigt: Phalange *S62.63*
- - - Ouverte du radius *S52.50, S51.87!*
- - - Pouce: Phalange *S62.52*
- - Luxation postérieure du fémur *S83.11*
- - Myopathie oculo-pharyngée *G71.0*
- - Myotilinopathie *G71.0*
- - Syndrome
- - - Microdélétion 22q11.2 *Q93.5*
- - - Microduplication 22q11.2 *Q92.3*
- - - Occlusion intestinale *E84.1*

Distance marche 200 m
- Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, *I70.21*
- ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, *I70.22*

Distension
- Abdominale (gazeuse) ¬ *R14*
- Aiguë de l'estomac ¬ *K31.0*
- Trompe d'Eustache ¬ *H69.0*

Distichiase ¬ *Q10.3*

Distichiasis isolé ¬ *Q10.3*

Distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de *Y34.9!*

Distocclusion ¬ *K07.2*

Distomatose
- Foie à Chlonorchis sinensis ¬ *B66.1†, K77.0**
- Hépatique
- - Douve foie
- - - Chat ¬ *B66.0†, K77.0**
- - - Sibérienne ¬ *B66.0†, K77.0**
- - Fasciola hepatica ¬ *B66.3†, K77.0**
- - Opisthorchis felineus ¬ *B66.0†, K77.0**
- Intestinale ¬ *B66.5*
- Pulmonaire ¬ *B66.4†, J99.8**
- ¬
- - *B66.9*
- - Infections par douves [*B66*

Distomiase
- Hépatique ¬ *B66.3†, K77.0**
- Voies biliaires ¬ *B66.3†, K87.0**
- ¬ *B66.9*

Distomolaire ¬ *K00.1*

Distorsion ligament
- Collatéral médial du genou ¬ *S83.42*
- Croisé
- - Antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.51*
- - Postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.52*
- Latéral
- - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.41*
- - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.42*

DITRA ¬ *L40.1*

Diurétiques
- Anse ¬ Intoxication: *T50.1*
- Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision ¬ Intoxication par *T50*

Diurétiques *–suite*
- ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres *T50.2*

Diutinum ¬ Erythema elevatum *L95.1*

Divergens] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Exotropie [strabisme *H50.3*

Divergent concomitant ¬ Strabisme *H50.1*

Diverticule
- Acquis de l'œsophage ¬ *K22.5*
- Appendice ¬ *K38.2*
- Bronchique ¬ *Q32.4*
- Cœur ¬ *Q24.8*
- Congénital
- - Estomac ¬ *Q40.2*
- - Intestin ¬ *Q43.8*
- - Ventricule gauche ¬ *Q24.8*
- - Vessie ¬ *Q64.6*
- Gastrique ¬ *K31.4*
- Intestin (côlon) (grêle) ¬ *K57*
- Kommerel ¬ *Q25.4*
- Meckel ¬
- - *Q43.0*
- - Tumeur maligne: *C17.3*
- Œsophage (congénital) ¬ *Q39.6*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Pharynx ¬ *Q38.7*
- Urétral ¬ *N36.1*
- Vésical ¬ Calcul: dans un *N21.0*
- Vessie ¬ *N32.3*

Diverticulite
- Côlon
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.23*
- - - Sans indication de saignement ¬ *K57.22*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.33*
- - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.32*
- Congénitale du côlon ¬ *Q43.8*
- Intestin
- - Côlon) (grêle) ¬ *K57*
- - Grêle
- - - Côlon
- - - - Perforation
- - - - - Abcès et saignement ¬ *K57.43*
- - - - - Abcès sans indication de saignement ¬ *K57.42*
- - - - Sans
- - - - - Perforation ni abcès, avec saignement ¬ *K57.53*
- - - - - Perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.52*
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.03*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.02*
- - - Sans perforation abcès

Diverticulite *–suite*
- Intestin *–suite*
- - Grêle *–suite*
- - - Sans perforation abcès *–suite*
- - - - Indication de saignement ¬ *K57.12*
- - - - Saignement ¬ *K57.13*
- - Siège non précis
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.83*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.82*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.93*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.92*

Diverticulose
- Côlon
- - Intestin grêle
- - - Péritonite ¬ *K57.4*
- - - Sans perforation ni abcès ¬ *K57.5*
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.21*
- - - Sans indication de saignement ¬ *K57.20*
- - - ¬ *K57.2*
- - Péritonite ¬ *K57.2*
- - SAI ¬ *K57.3*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.31*
- - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.30*
- - - ¬ *K57.3*
- Grêle côlon
- - Perforation et abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.40*
- - Sans perforation ni abcès, avec saignement ¬ *K57.51*
- Intestin
- - Côlon) (grêle) ¬ *K57*
- - Grêle
- - - Côlon
- - - - Perforation
- - - - - Abcès ¬ *K57.4*
- - - - - Abcès et saignement ¬ *K57.41*
- - - - SAI ¬ *K57.5*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.50*
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.01*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.00*
- - - - ¬ *K57.0*
- - - Péritonite ¬ *K57.0*
- - - SAI ¬ *K57.1*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Indication de saignement ¬ *K57.10*
- - - - Saignement ¬ *K57.11*
- - - - ¬ *K57.1*
- - SAI

Diverticulose *–suite*
- Intestin *–suite*
- - SAI *–suite*
- - - Péritonite ¬ *K57.8*
- - - ¬ *K57.9*
- - Siège non précis
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.81*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.80*
- - - - ¬ *K57.8*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.91*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.90*
- - - - ¬ *K57.9*
- - ¬ *K57*

Divorce ¬ Dislocation de la famille par séparation ou *Z63*

DLD ¬ Déficit en *E74.4*

DM1 ¬ *G71.1*

DMD ¬ *G71.0*

DMED ¬ *G71.0*

DNA ligase IV ¬ Déficit en *D81.1*

DNAJC12 ¬ Hyperphénylalaninémie par déficit en *E70.1*

DNA-PKcs ¬ Immunodéficience combinée sévère par déficit en *D81.1*

DNMT3A ¬ Syndrome de croissance excessive lié à *Q87.3*

DOCK8 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.1*

Doigt
- Articulation
- - Interphalangienne ¬ Luxation du *S63.12*
- - Métacarpo-phalangienne ¬ Luxation du *S63.11*
- Complète) (partielle) ¬ Amputation traumatique d'un autre *S68.1*
- Familiale isolée ¬ Clinodactylie des *Q68.1*
- Lymphangite ¬
- - Infection purulente du *L03.01*
- - Inflammation purulente du *L03.01*
- Nez ¬ Se mettre les *F98.88*
- Niveau
- - Articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ Rupture traumatique de ligaments du *S63.4*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs d'un autre *S66.3*
- - - Fléchisseurs d'un autre *S66.1*
- - - Intrinsèques d'un autre *S66.5*
- Ongle) ¬ *T23*
- Orteil ¬
- - Déformations acquises des *M20*
- - Phlegmon des *L03.0*
- Partie non précis ¬
- - Fracture d'un autre *S62.60*

Doigt *–suite*
- Partie non précis ¬ *–suite*
- - Luxation du *S63.10*
- Phalange
- - Distale ¬ Fracture d'un autre *S62.63*
- - Médiane ¬ Fracture d'un autre *S62.62*
- - Proximale ¬ Fracture d'un autre *S62.61*
- Plus (complète) (partielle) ¬ Amputation traumatique de deux *S68.2*
- Ressort" ¬ *M65.3*
- S
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ Entorse et foulure de *S63.62*
- - - Métacarpo-phalangienne ¬ Entorse et foulure de *S63.61*
- - Bilatérale ¬ Absence acquise de *Z89.3*
- - Lésion ongle ¬
- - - Contusion de(s) *S60.1*
- - - Plaie ouverte de(s) *S61.1*
- - Niveau avant-bras ¬ Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs d'autre(s) *S56.4*
- - - Fléchisseurs d'autre(s) *S56.1*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et foulure de *S63.60*
- - - Poignet et de la main ¬ Amputation traumatique associée de (parties de) *S68.3*
- - - ¬ Entorse et foulure de *S63.68*
- - SAI ¬
- - - Contusion de(s) *S60.0*
- - - Plaie ouverte de(s) *S61.0*
- - Sans lésion ongle ¬
- - - Contusion de(s) *S60.0*
- - - Plaie ouverte de(s) *S61.0*
- - Surnuméraire(s) ¬ *Q69.0*
- - Y compris le pouce], unilatérale ¬ Absence acquise de *Z89.0*
- - ¬
- - - Absence congénitale de la main et de(s) *Q71.3*
- - - Déformation de(s) *M20.0*
- - - Écrasement du pouce et d'autre(s) *S67.0*
- - - Entorse et foulure de *S63.6*
- Sans synostose ¬ Simple syndactylie des *Q70.1*
- Synostose ¬ Syndactylie complexe des *Q70.0*
- ¬
- - Articulation du *T84.08*
- - Blessure ouverte du bout charnu du *S61.0*
- - Brachydactylie des *Q71.8*
- - Camptodactylie des *Q68.1*
- - Coalescence des *Q70.0*
- - Déformations congénitales des *Q68.1*
- - Fracture

Doigt *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fracture *–suite*
- - - *S62.6*
- - - Métacarpe et du *S62.8*
- - - Multiples de *S62.7*
- - Kyste mucoïde à l'articulation du *M67.44*
- - Lésion traumatique
- - - Nerf collatéral d'un autre *S64.4*
- - - Vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre *S65.5*
- - Luxation
- - - *S63.1*
- - - Multiples des *S63.2*
- - Macrodactylie (*Q74.0*
- - Malocclusion due à: habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les *K07.5*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: main et *R02.03*
- - Onychomatricome des ongles de *D21.1*
- - Palmure des *Q70.1*
- - Phlegmon de *L03.01*

Dolichocéphalie ¬ *Q67.2*

Dolichocôlon ¬ *Q43.8*

Dolichol
- Kinase ¬ Déficit en *E77.8*
- Phosphate ¬ Hypotonie et ichtyose par déficit en *E77.8*

Dolichyl-phosphate N-acetylgalactosamine phosphotransférase ¬ Déficit en *E77.8*

Dol-P-mannosyltransférase ¬ Déficit en *E77.8*

Dôme de la vessie ¬ Tumeur maligne: *C67.1*

Domicile
- Aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à *Z74.2*
- Nécessitant des soins ¬ Parent à charge au *Z63*
- Non disponibles ¬ Soins à *Z75.8*

Dominant
- A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire autosomique *G60.0*
- Adulte ¬ Amyotrophie spinale proximale autosomique *G12.1*
- B ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire autosomique *G60.0*
- C ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire autosomique *G60.0*
- Classique ¬ Atrophie optique autosomique *H47.2*
- D ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire autosomique *G60.0*
- Déficit
- - Kir6.2 ¬ Hyperinsulinisme autosomique *E16.1*
- - Partiel récepteur
- - - 1 de l'interféron gamma ¬ MSMD autosomique *D84.8*

Dominant *–suite*

- Déficit *–suite*
- - Partiel récepteur *–suite*
- - - 2 de l'interféron gamma ¬ MSMD autosomique *D84.8*
- - SUR1 ¬ Hyperinsulinisme autosomique *E16.1*
- E ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire autosomique *G60.0*
- Enfance ¬ Amyotrophie spinale proximale autosomique *G12.1*
- Épilepsie-déficience intellectuelle par déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique *G11.1*
- Généralisée ¬ Epidermolyse bulleuse dystrophique *Q81.2*
- Hyperuricémie ¬ Maladie rénale kystique médullaire autosomique *Q61.5*
- Hypocalciurie ¬ Hypomagnésémie primaire autosomique *E83.4*
- Intolérance à l'effort ¬ Myopathie mitochondriale autosomique *G71.3*
- Isolée des ongles ¬ Epidermolyse bulleuse dystrophique *Q81.2*
- Kjer ¬ Atrophie optique autosomique *H47.2*
- Lié X
- - Type Chassaing-Lacombe ¬ Chondrodysplasie *Q78.9*
- - ¬
- - - Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*
- - - Protoporphyrie *E80.0*
- Plus ¬ Atrophie optique autosomique *H47.2*
- Surdité-narcolepsie ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique *G11.2*
- Thomsen] ¬ Myotonie: congénitale: *G71.1*
- Type
- - 1 ¬
- - - Ataxie spastique autosomique *G11.4*
- - - Ostéopétrose autosomique *Q78.2*
- - 1A ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 1B ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 1C ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 1D ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 1E ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 1F ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 1G ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 1H ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2
- - - Axones géants ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - - Mutation
- - - - KIF5A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*

Dominant *–suite*

- Type *–suite*
- - 2 *–suite*
- - - Mutation *–suite*
- - - - TFG ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - - ¬ Ostéopétrose autosomique *Q78.2*
- - 2A1 ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2A2 ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2B ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2C ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2D ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2E ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2F ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2I ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2J ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2K ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2L ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2M ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2N ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2O ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2P ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2U ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2V ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2W ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2Y ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 2Z ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique *G60.0*
- - 3 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 4 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 6 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 8 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 9 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 10 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 12 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 13 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*

Dominant *–suite*

- Type *–suite*
- - 17 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 19 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 29 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 31 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 36 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 37 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 38 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 41 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 42 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 73 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - DFNA ¬ Surdité de perception non syndromique autosomique *H90.3*
- - DYT25 ¬ Dystonie focale autosomique *G24.1*
- - F ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire autosomique *G60.0*
- - Glaudemans ¬ Hypomagnésémie isolée autosomique *E83.4*
- - Norrbotten ¬ Kératodermie palmoplantaire diffuse autosomique *Q82.8*
- - Worth ¬ Ostéosclérose autosomique *Q78.2*
- - ¬
- - Acrostéolyse autosomique *M89.59*
- - Ataxie cérébelleuse autosomique *G11.8*
- - Atrophie optique type 3 autosomique *H47.2*
- - Coarctation de l'aorte autosomique *Q25.1*
- - Cutis laxa autosomique *Q82.8*
- - Décollement de la rétine rhegmatogène autosomique *H33.0*
- - Dégénérescence rétinienne d'apparition tardive autosomique *H35.5*
- - Dysplasie des ongles autosomique *L60.3*
- - Dystonie dopa-sensible autosomique *G24.1*
- - Dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss autosomique *G71.0*
- - Hémochromatose héréditaire autosomique *E83.1*
- - HIES [syndrome d'hyperimmunoglobulinémie E] autosomique *D82.4*
- - Hypomagnésémie isolée autosomique *E83.4*
- - Kératodermie palmoplantaire et alopécie congénitale autosomique *Q82.8*
- - Macrothrombocytopénie autosomique *D69.41*
- - Maladie d'Alzheimer précoce autosomique *G30.0*
- - Myoglobinurie autosomique *R82.1*

Dominant *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Myopathie centronucléaire autosomique *G71.2*
- - Neuropathie sensitive héréditaire à transmission: *G60.8*
- - Neutropénie congénitale sévère autosomique *D70.0*
- - Ophtalmoplégie externe progressive autosomique *H49.4*
- - Polykystose hépatique autosomique *Q44.6*
- - Pseudohypoaldostéronisme type 1 autosomique *N25.8*
- - Rachitisme hypophosphatémique autosomique *E83.30*
- - Rein polykystique, autosomique *Q61.2*
- - Syndrome
- - - Atrophie optique-cataracte autosomique *H47.2*
- - - Ptérygiums poplités autosomique *Q87.8*
- - - Segawa autosomique *G24.1*
- - Vitréo-rétino-choroïdopathie autosomique *H35.5*
- - Vitréo-rétinopathie inflammatoire néovasculaire autosomique *H35.2*

Dommage
- Auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, *Y34.9!*
- Froid et à l'humidité ¬ *T69.9*

Donath-Landsteiner ¬
- Anémie hémolytique de *D59.6*
- Syndrome de *D59.6*

Donnai
v. Thakker-Donnai

Donnai-Barrow ¬ Syndrome de *Q87.8*

Donné ¬ examen de routine limité à un organe *Z01*

Donne soin
- Sans précision ¬ Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui *Z74.9*
- ¬ difficulté lié dépendance envers personne
- - *Z74*
- - *Z74.8*

Donneur
- Cellules souches ¬ *Z52.01*
- Cœur ¬ *Z52.7*
- Composants du sang ¬ *Z52.08*
- Cornée ¬ *Z52.5*
- Éventuel d'organe et de tissu ¬ Examen d'un *Z00.5*
- Foie ¬ *Z52.6*
- IAD] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: *N98.8*
- Moelle osseuse ¬ *Z52.3*
- Organe tissu
- - Non précisés ¬ *Z52.9*
- - ¬ *Z52.88*

Donneur *–suite*
- Os ¬ *Z52.2*
- Peau ¬ *Z52.1*
- Poumons ¬ *Z52.80*
- Rein ¬ *Z52.4*
- SAI ¬ *Z52.9*
- Sang
- - Entier ¬ *Z52.00*
- - ¬ *Z52.0*
- Sperme ¬ *Z52.88*

Donohue ¬ Syndrome de *E34.8*

Donovanose ¬ *A58*

DOOR ¬ Syndrome *Q87.8*

Dopamine bêta-hydroxylase ¬ Déficit en *G90.8*

Dopa-sensible
- Autosomique
- - Dominante ¬ Dystonie *G24.1*
- - Récessive ¬ Dystonie *G24.1*
- Déficit en tyrosine hydroxylase ¬ Dystonie *G24.1*

Doré
- Résistant
- - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque *U80.01!*
- - Méthicilline ¬ Staphylocoque *U80.0!*
- - Oxacilline
- - - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque *U80.0!*
- - - Méticilline
- - - - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque *U80.00!*
- - - - MRSA] ¬ Staphylocoque *U80.00!*
- ¬
- - Endocardite à staphylocoque *I33.0, B95.6!*
- - Sepsis du nouveau-né à staphylocoques *P36.2*
- - Septicémie à staphylocoques *A41.0*

Dorfman
v.a. Destombes-Rosaï-Dorfman

Dorfman-Chanarin ¬ Maladie de *E75.5*

Dorsal
v. Type de maladie

Dorsalgie
- Basse ¬ *M54.5*
- Sans précision ¬ *M54.9*
- ¬
- - *M54*
- - *M54.8*
- - Psychogène: *F45.40*

Dorso lombaire
- Hydrocéphalie ¬ Spina bifida: *Q05.1*
- Lombo-sacrés ¬ atteintes de disques dorsaux, *M51*

Dorso lombaire *–suite*
- SAI ¬ Spina bifida: *Q05.6*

Dorsopathie
- Déformation
- - Précisées ¬ Autres *M43.8*
- - Sans précision ¬ *M43.9*
- - ¬ Autres *M43*
- Non classées ailleurs ¬ Autres *M53*
- Précisées ¬ Autres *M53.8*
- Sans précision ¬ *M53.9*

DORV ¬ *Q20.1*

Dos
- Nez ¬ Fistule du *Q18.8*
- Plat ¬ Syndrome du *M40.3*
- SAI ¬
- - *C49.6*
- - *D21.6*
- - Mal de *M54.9*
- Tout
- - Partie
- - - Fesse] ¬ *L02.2*
- - - Sauf les fesses] ¬ *R02.04*
- - - ¬ *L03.3*
- - ¬ *T21*
- Voûté en tant que conséquence tardive du rachitisme ¬ *E64.3, M40.29*
- ¬ Panniculite affectant le cou et le *M54.0*

Dosage ¬ Erreur de *Y69!*

Dose thérapeutique prophylactique correcte ¬ effet secondaire indésirable
- Médicament utilisé conformément aux indications et à *Y57.9!*
- Vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à *Y59.9!*

Doss ¬ Porphyrie de *E80.2*

Double
- Arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte] ¬ *Q25.4*
- Duplication du col et du vagin ¬ Utérus *Q51.1*
- Orifice de la valve mitrale ¬ *Q23.8*
- SAI ¬ Utérus *Q51.2*
- ¬
- - Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes *D57.2*
- - Méat urinaire *Q64.7*
- - Monstre *Q89.4*
- - Soins maternels pour utérus: *O34.0*
- - Uretère: *Q62.5*
- - Urètre *Q64.7*
- - Vision *H53.2*

Double inlet ventricle] ¬ Ventricule à double issue [*Q20.4*

Double issue
- Communication interventriculaire
- - Sous-aortique

Double issue *–suite*

- Communication interventriculaire *–suite*
- - Sous-aortique *–suite*
- - - Sous-aortique ou sous-aortique et sous-pulmonaire et sténose pulmonaire ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- - - ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- - Sous-pulmonaire ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- Double inlet ventricle] ¬ Ventricule à *Q20.4*
- Double outlet left ventricle] ¬ Ventricule gauche à *Q20.2*
- Double outlet right ventricle
- - CIV [communication interventriculaire] sous-pulmonaire non-committed ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- - Communication interventriculaire sous-aortique ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- - ¬ Ventricule droit à *Q20.1*

Double outlet left ventricle] ¬ Ventricule gauche à double issue [*Q20.2*

Double outlet right ventricle

- CIV [communication interventriculaire] sous-pulmonaire non-committed ¬ Ventricule droit à double issue [*Q20.1*
- Communication interventriculaire sous-aortique ¬ Ventricule droit à double issue [*Q20.1*
- ¬ Ventricule droit à double issue [*Q20.1*

Douglas ¬

- Hernie du *N81.5*
- Tuberculose du cul-de-sac de *A18.1†, N74.1**

Douleur

- Abdominal
- - Intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée) ¬ *R10.0*
- - Non précisées ¬ *R10.4*
- - Pelvienne ¬ *R10*
- Affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel ¬ *N94*
- Aiguë ¬ *R52.0*
- Articulaire ¬ *M25.5*
- Chronique
- - Irréductible ¬ *R52.1*
- - Localisé CRPS type II membre
- - - Inférieur ¬ Syndrome de *G90.61*
- - - Supérieur ¬ Syndrome de *G90.60*
- - Où interviennent des facteurs somatiques et psychiques ¬ *F45.41*
- - ¬ Autres *R52.2*
- Désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière ¬ *G95.85*
- Épigastrique ¬ *R10.1*
- Facial
- - Cours des maladies de l'appareil manducateur ¬ *K10.8*
- - Idiopathique persistante ¬ *G50.1*
- - SAI ¬ *R51*
- Généralisées SAI ¬ *R52.9*
- Gorge ¬ *R07.0*

Douleur *–suite*

- Intermenstruelles ¬ *N94.0*
- Intermittentes ¬ *R52.9*
- Ischémique
- - Cadre d'une artériopathie oblitérante ¬ *I70.29*
- - Effort distance marche 200 m
- - - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.21*
- - - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.22*
- Localisé partie
- - Inférieures de l'abdomen ¬ *R10.3*
- - Supérieure de l'abdomen ¬ *R10.1*
- Lombaire ¬ *M54.5*
- Miction
- - SAI ¬ *R30.9*
- - ¬ *R30*
- Niveau
- - Gorge et du thorax ¬ *R07*
- - Membre ¬ *M79.6*
- Non classée ailleurs ¬ *R52*
- Oculaire ¬ *H57.1*
- Organes génitaux féminins ¬ *N94.8*
- Paroi thoracique antérieure SAI ¬ *R07.3*
- Paupière ¬ *H02.8*
- Pelvienne et périnéale ¬ *R10.2*
- Pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps ¬ *R52*
- Précordiale ¬ *R07.2*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Repos ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.23*
- Sans précision ¬ *R52.9*
- Somatoforme ¬ *F45.40*
- Thoracique
- - Ischémique ¬ *I20.9*
- - Musculosquelettiques ¬ *R07.3*
- - Respiratoire ¬ *R07.1*
- - Sans précision ¬ *R07.4*
- - ¬ Autres *R07.3*
- Utérines ¬ *N94.8*
- Zostériennes ¬ *B02.9*
- ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans *I70.20*

Douloureux

- Articulation temporo-mandibulaire ¬ Syndrome de dysfonctionnement *K07.6*
- Épisodique familial ¬ Syndrome *M79.89*
- Face [Trousseau] ¬ Tic *G50.0*
- Homme ¬ Coït *N48.8*
- Maladie de Dercum] ¬ Lipomatose *E88.29*
- Membre fantôme ¬ Syndrome *G54.6*
- Œdème

Douloureux *–suite*

- Œdème *–suite*
- - Augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.22*
- - SAI ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.28*
- - Stade non précisé ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.28*
- - Surface cutané
- - - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.21*
- - - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.20*
- Persistant ¬ Syndrome *F45.4*
- Régional complexe
- - Membre
- - - Inférieur type
- - - - I ¬ Syndrome *G90.51*
- - - - II ¬ Syndrome *G90.61*
- - - Supérieur type
- - - - I ¬ Syndrome *G90.50*
- - - - II ¬ Syndrome *G90.60*
- - Type
- - - 1 ¬ Syndrome *G90.59*
- - - I ¬ Syndrome *G90.5*
- - - II
- - - - Extrémité
- - - - - Inférieure ¬ Syndrome *G90.61*
- - - - - Supérieure ¬ Syndrome *G90.60*
- - - - ¬ Syndrome *G90.6*
- Sans précision ¬ Miction *R30.9*
- Somatoforme persistant ¬ Syndrome *F45.40*
- ¬
- - Adipose *E88.29*
- - Défécation *R19.88*
- - Erection *N48.3*
- - Foie *R10.1*
- - Respiration *R07.1*
- - Syndrome
- - - Hématurie *N39.81*
- - - Membre fantôme sans élément *G54.7*
- - - Vessie *N30.1*

Douve

- Distomatoses] ¬ Autres infections par *B66*
- Foie
- - Chat ¬
- - - Distomatose hépatique à *B66.0†, K77.0**
- - - Infection par: *B66.0*
- - Mouton ¬ Maladie due à la *B66.3*
- - Sibérienne ¬ Distomatose hépatique à *B66.0†, K77.0**

Douve *–suite*
- Foie *–suite*
- - ¬
- - - Infection (à): petite *B66.2*
- - - Maladie
- - - - Chinoise de la *B66.1*
- - - - Orientale de la *B66.1*
- Précisées ¬ Autres infections par *B66.8*
- Pulmonaire ¬ *B66.4*
- Sans précision ¬ Infection par *B66.9*
- ¬ Infection par *B66.9*

Dowling-Degos ¬ Maladie de *L81.8*

Dowling-Meara ¬ Epidermolyse bulleuse simple type *Q81.0*

Down
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q90.9*
- ¬
- - Kératocône dans le syndrome de *Q90.9†, H19.8**
- - Syndrome de *Q90*

Dracontiase
- Dracunculus medinensis ¬ Infection [*B72*
- Ver de Guinée ¬ Infection [*B72*

Dracunculose ¬ *B72*

Dracunculus medinensis ¬ Infection [dracontiase] (à): *B72*

Drager] ¬ Hypotension orthostatique neurogène [syndrome de Shy- *G23.8*

Drainage
- Anormal de la veine cave inférieure dans l'oreillette gauche ¬ *Q26.8*
- Liquide céphalorachidien ¬ Présence d'un appareil de *Z98.2*
- Lymphatique
- - Axillaire stade
- - - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.81*
- - - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.82*
- - - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.83*
- - Cervical, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.80*
- - Inguinal stade
- - - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.84*
- - - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.85*
- - - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.86*
- ¬
- - Ostéomyélite chronique avec fistule de *M86.4*
- - Perforation due au *T81.2*

Drash
v. Denys-Drash

Dravet ¬ Syndrome de *G40.4*

Drechslera hawaiiensis ¬ Infection à *B43.8*

Dreifuss
v. Emery-Dreifuss

Drépanocytaire
- Crises ¬ Anémie à hématies falciformes [anémie *D57.0*
- Hétérozygotes doubles ¬ Affections à hématies falciformes [*D57.2*
- Proliférative ¬ Rétinopathie *D57.8†, H36.8**
- SAI ¬
- - Anémie à hématies falciformes [*D57.1*
- - Maladie à hématies falciformes [*D57.1*
- - Trouble à hématies falciformes [*D57.1*
- ¬
- - Affection hématies falciformes
- - - *D57*
- - - *D57.8*
- - Trait de la maladie des hématies falciformes [*D57.3*

Drépanocytose ¬
- *D57.1*
- Arthropathie de la goutte au cours de *D57.8†, M14.09**
- Maladie glomérulaire au cours de *D57.8†, N08.2**
- Néphropathie au cours de *D57.1†, N08.2**

Dressler II ¬ Syndrome de *I24.1*

Driscoll
v. Lucey-Driscoll

Drogue
- Multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F19*
- SAI ¬ utilisation inadéquate de *F19*
- Sang ¬ Recherche d'alcool ou de *Z04.8*
- Substance
- - Biologiques actives ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Médicament, *X49.9!*
- - Non trouvées normalement dans le sang ¬ Présence de *R78*
- ¬
- - Complications dues à des médicaments ou à des *Y57.9!*
- - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: médicaments et *G40.5*
- - Démence par inhalation de *F18.7*
- - Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de *Z72.0*
- - Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une *X49.9!*

Drogués et après abus de médicaments ¬ Rééducation des *Z50.3!*

Drought
v. Worster-Drought

Drug fever] ¬ Fièvre due à des médicaments [*R50.2*

Drummond ¬ Syndrome de *E70.8*

Drusen familiaux ¬ *H35.5*

Druses
- Dégénératives) au pôle postérieur ¬ *H35.38*
- Papille optique ¬ *H47.3*
- ¬ Maculopathie avec présence de *H35.31*

DSTA) ¬ Démence sénile, de type Alzheimer (*F00.1**

DTCoq
- Polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [*Z27.3*
- TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [*Z27.2*
- ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [*Z27.1*

Duane ¬ Syndrome
- Rétraction de *H50.8*
- Stilling-Türk- *H50.8*

Dubin-Johnson ¬ Syndrome de: *E80.6*

Dubium ¬ Trachoma *A71.0*

Duboisii ¬ Histoplasmose à Histoplasma *B39.5*

Dubowitz ¬ Syndrome de: *Q87.1*

Duchenne
- Becker ¬ Dystrophie musculaire: autosomique récessive, infantile, de type *G71.0*
- Erb due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de *P14.0*
- ¬
- - Dystrophie musculaire: sévère [*G71.0*
- - Dystrophinopathie de *G71.0*

Ducrey ¬ Balanite à bacilles de *A57†, N51.2**

Duhring-Brocq] ¬ Dermite herpétiforme [Maladie de *L13.0*

Dundar ¬ Syndrome des pouces en adduction-arthrogrypose, type *Q79.6*

Dunnigan ¬ Lipodystrophie partielle familiale de *E88.1*

Duodénal
v.a. duodénum
v.a. gastro-duodénal
v.a. gastroduodénale
v.a. pancréatico-duodénal
- Chronique) ¬ Iléus *K31.5*
- Origine médicamenteuse ¬ Ulcère *K26.9, Y57.9!*
- ¬
- - Fistule
- - - Cholécysto- *K82.3*
- - - Cholédoco- *K83.3*
- - Infection à Helicobacter pylori au cours d'ulcère *K26.9, B98.0!*
- - Maladie de Crohn [entérite régionale]: *K50.0*
- - Ulcère: *K26*

Duodénite
- Aspergillus ¬ *B44.8†, K93.8**
- Cytomégalovirus ¬

Duodénite *–suite*
- Cytomégalovirus ¬ *–suite*
- - *B25.80†, K93.8**
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**
- - Herpès ¬ *B00.8†, K93.8**
- ¬
- - *K29.8*
- - Gastrite et *K29*

Duodénum
- Saignement ¬ Angiodysplasie de l'estomac ou du *K31.82*
- Sans
- - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie de l'estomac ou du *K31.81*
- - Précision ¬ Maladie de l'estomac et du *K31.9*
- ¬
- - Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q41.0*
- - Affections précisées de l'estomac ou du *K31.88*
- - Cancer du *C17.0*
- - Constriction du *K31.5*
- - Fistule de l'estomac et du *K31.6*
- - Lésion traumatique de l'intestin grêle: *S36.41*
- - Maladie
- - - Estomac et du *K31*
- - - Précisées de l'estomac et du *K31.8*
- - Obstruction du *K31.5*
- - Polype de l'estomac et du *K31.7*
- - Rétrécissement du *K31.5*
- - Sténose du *K31.5*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D13.2*
- - - Maligne: *C17.0*
- - Ulcère du *K26*
- - Ulcères aigus de l'estomac et du *K27.3*

Duplication
- 8p23.1 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 17p13.3 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- Bras du chromosome. ¬ *Q92.3*
- Canal
- - Biliaire ¬ *Q44.5*
- - Cystique ¬ *Q44.5*
- Col et du vagin ¬ Utérus double avec *Q51.1*
- Côlon ¬ *Q43.41*
- Complète d'au moins un bras du chromosome. ¬ *Q92.2*
- Distale 19q ¬ *Q92.3*
- Intestin
- - Grêle ¬ *Q43.40*
- - Non précisée ¬ *Q43.49*
- - ¬ *Q43.4*
- Organes digestifs SAI ¬ *Q45.8*
- Réarrangements complexes ¬ *Q92.5*

Duplication *–suite*
- Rectum ¬ *Q43.42*
- Uretère ¬ *Q62.5*
- Utérus ¬ Autres *Q51.2*
- Vues seulement à la prométaphase ¬ *Q92.4*

Dupré
v. Bazex-Dupré-Christol

Dupuytren ¬
- Fibromatose de l'aponévrose palmaire [*M72.0*
- Fracture ouverte de *S82.81, S81.87!*

Durablement acquis ¬ Troubles de la coagulation sanguine *U69.11!*

Dural
v. extra-dural
v. sous-dural
- Crâne ¬
- - Fistule artérioveineuse *Q28.21*
- - Malformations artérioveineuses *Q28.28*

Durand-)Nicolas-Favre ¬ Maladie de (*A55*

Durante ¬ Maladie de Porak et *Q78.0*

Dure-mère
- Crânienne ¬ Tuberculose de la *A17.0†, G01**
- Spinale ¬ Tuberculose de la *A17.0†, G01**
- ¬
- - Abcès tuberculeux de la *A17.8†, G07**
- - Anomalie congénitale de la *Q04.9*
- - Neurosyphilis de la *A52.1†, G01**
- - Syphilis de la *A52.1†, G01**

Durillon ¬ *L84*

Duroziez ¬ Maladie de *Q23.2*

Durrie
v. Stern-Lubinsky-Durrie

Durs
- Éruption ¬ Modification de la teinte des tissus dentaires *K03.7*
- Pulpe ¬ Formation anormale de tissus dentaires *K04.3*
- Sans précision ¬ Maladie des tissus dentaires *K03.9*
- ¬ maladie
- - Précisées des tissus dentaires *K03.8*
- - Tissus dentaires *K03*

Dyggve-Melchior-Clausen ¬ Syndrome de *Q77.7*

Dysarthrie
- Anarthrie ¬ *R47.1*
- Ophtalmoplégie ¬ Syndrome d'ataxie neuropathique sensorielle- *G31.81, H49.4*
- ¬ Syndrome d'ataxie spastique autosomique récessive-atrophie optique- *G11.4*

Dysautonomie familiale [Riley-Day] ¬ *G90.1*

Dysbêtalipoprotéinémie familiale ¬ *E78.2*

Dyschésie ¬ *K59.01*

Dyschondroplasie ¬ *Q78.4*

Dyschromatopsie du bleu ¬ *H53.5*

Dyschromatose
- Héréditaire universelle ¬ *L81.8*

Dyschromatose *–suite*
- Symétrique des extrémités ¬ *L81.8*

Dyschromie coronaire de couleur rose (pink spot) ¬ *K03.3*

Dyschromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.2*

Dysembryoplasique ¬ Tumeur neuroépithéliale *D33.2*

Dysenteriae ¬ Shigellose à Shigella *A03.0*

Dysenterie
- Amibienne aiguë ¬ *A06.0*
- Bacillaire SAI ¬ *A03.9*
- Balantidienne ¬ *A07.0*
- Protozoaires ¬ *A07.9*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**

Dysentérique
- Foie ¬ Abcès *A06.4†, K77.0**
- ¬
- - Arthrite
- - - *A09.0†, M03.29**
- - - Bactérienne *A03.9†, M01.39**
- - Colite amibienne non *A06.2*
- - Diarrhée: *A09.0*

Dysérythropoïétique congénital
- Type
- - 2 ¬ Anémie *D64.4*
- - 3 ¬ Anémie *D64.4*
- - 4 ¬ Anémie *D64.4*
- - I ¬ Anémie *D64.4*
- ¬ Anémie *D64.4*

Dysfibrinogénémie (congénitale) ¬ *D68.20*

Dysfonction
- Appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) ¬ Échec ou *Y82.8!*
- Ovarien
- - Hyperandrogénie ¬ *E28.1*
- - Hyperœstrogénie ¬ *E28.0*
- - Sans précision ¬ *E28.9*
- - ¬
- - - *E28*
- - - *E28.8*
- Placentaire ¬ *P02.2*
- Testiculaire
- - Sans précision ¬ *E29.9*
- - ¬ Autres *E29.8*
- Thymus ¬ *E32.9*
- Vasculaire ¬ Déficit en facteur VIII avec *D68.09*
- Vésicale d'origine neuromusculaire ¬ Autre *N31.88*
- Voies respiratoires ¬ Syndrome réactionnel de *J68.3*

Dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI ¬ Saignements *N93.8*

Dysfonctionnement
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ *K07.6*

Dysfonctionnement *–suite*
- Canal CRAC ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- Cérébral
- - Affection
- - - Physique ¬ trouble mental
- - - - Précisés dus à une lésion cérébrale et un *F06.8*
- - - - Sans précision, dû à une lésion cérébrale et un *F06.9*
- - - Somatique ¬ Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un *F06*
- - Sans précision ¬ Trouble organique de la personnalité et du comportement dû a une affection, une lésion et un *F07.9*
- - ¬ trouble
- - - Organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un *F07.8*
- - - Personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un *F07*
- Douloureux de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Syndrome de *K07.6*
- Érectile psychogène ¬ *F52.2*
- Euthyroïdien ¬ Syndrome de *E07.8*
- Glande pinéale [Épiphyse] ¬ *E34.8*
- Hypophysaire ¬ *E23.7*
- Immunitaires ¬ Syndrome de fatigue chronique lors de *G93.3*
- Muscles lisses ¬ Syndrome multisystémique de *I73.8*
- Neurogène du détrusor/sphincter de la vessie ¬ *N31.88*
- Neuromusculaire de la vessie, sans précision ¬ *N31.9*
- Neuromusculaires de la vessie ¬ Autres *N31.8*
- Neurovégétatif somatoforme
- - Appareil
- - - Digestif haut ¬ *F45.31*
- - - Uro-génital ¬ *F45.34*
- - Organe système
- - - Non précisé ¬ *F45.39*
- - - ¬ *F45.38*
- - Plusieurs organes et systèmes ¬ *F45.37*
- - Système
- - - Cardio-vasculaire ¬ *F45.30*
- - - Respiratoire ¬ *F45.33*
- - Voies digestives basses ¬ *F45.32*
- - ¬ *F45.3*
- Orgasmique ¬ *F52.3*
- Oro-facial ¬ Malocclusion dentaire due à un *K07.5*
- Physiologique psychogène SAI ¬ *F59*
- Placenta ¬ *O43.8*
- Pluriglandulaire
- - Sans précision ¬ *E31.9*
- - ¬
- - - *E31*
- - - *E31.8*

Dysfonctionnement *–suite*
- Segmentaire et somatique ¬ *M99.0*
- Sexuel non trouble maladie organique
- - Sans précision ¬ *F52.9*
- - ¬
- - - *F52*
- - - *F52.8*
- Sinusal
- - Maladie du nœud sinusal] ¬ Syndrome de *I49.5*
- - ¬ Syndrome de *I49.5*
- Sphincter rectal ¬ *K59.9*
- Symphysaire ¬ Grossesse avec *O26.7*
- Symphyse pubienne ¬ *M25.55*
- Système nerveux végétatif du à l'alcool ¬ *G31.2*
- Vessie neurogène SAI ¬ *N31.9*

Dysgénésie
- Acro-pectoro-vertébrale ¬ *Q74.8*
- Caudale familiale ¬ *Q87.8*
- Cérébrale congénitale par déficit en glutamine synthétase ¬ *E72.8*
- Gonadique
- - Complète 46,XY ¬ *Q99.1*
- - Partielle 46,XY ¬ *Q56.1*
- - Pure ¬ *Q99.1*
- Réticulaire ¬
- - *D72.0*
- - Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec *D81.0*
- Tronc cérébral type Athabascan ¬ *Q87.8*
- Tubulaire rénale ¬ *Q63.8*
- Uro-génitointestinale ¬ Syndrome d'aphalangie-hémivertèbre- *Q87.8*

Dysgerminomateuse
- Maligne de l'ovaire ¬ Tumeur germinale *C56*
- Ovaire ¬ Tumeur germinale maligne non *C56*

Dysgyrie associée à une tubulinopathie ¬ *Q04.3*

Dyshématopoïétique (congénitale) ¬ Anémie *D64.4*

Dyshidrose [pompholyx] ¬ *L30.1*

Dyshormonosynthèse thyroïdienne ¬ *E03.0*

Dysimmunitaire subaiguë ¬ Polyradiculonévrite *G61.8*

Dyskératome verruqueux ¬ *D23.9*

Dyskinésie
- Bucco-faciale ¬ *G24.4*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Ciliaire primitive ¬ *Q34.8*
- Familiale avec myokymie faciale ¬ *G24.8, G51.4*
- Non kinésigénique paroxystique ¬ *G24.8*
- Œsophage ¬ *K22.4*
- Paroxystique
- - Induite par l'effort ¬ *G24.8*
- - Kinésigénique ¬ *G24.8*

Dyskinésie *–suite*
- Paroxystique *–suite*
- - ¬ Syndrome d'épilepsie généralisée- *G40.3, G24.8*
- SAI ¬ *G24.9*
- Tardive ¬ *G24.0*
- Trachéo-bronchique ¬ *J98.0*
- ¬ *G24*

Dyskinétique ¬ Paralysie cérébrale *G80.3*

Dyslalie ¬ *F80.0*

Dyslexie
- Alexie ¬ *R48.0*
- Développement ¬ *F81.0*
- Troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs ¬ *R48*

Dyslipoprotéinémie à broad-beta ¬ *E78.2*

Dysmaturité pulmonaire ¬ *P27.0*

Dysménorrhée
- Primaire ¬ *N94.4*
- Psychogène ¬ *F45.8*
- Sans précision ¬ *N94.6*
- Secondaire ¬ *N94.5*

Dysmorphie
- Cause extérieure, n.c.a. ¬ *Q86.88*
- Corporelle ¬ Peur d'une *F45.2*
- Cranio-faciale ¬ Syndrome d'atrésie des choanes-surdité-cardiopathie- *Q87.8*
- Facial
- - Comportement agressif ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypotonie- *Q87.8*
- - Haploinsuffisance de SETD5 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- - Neuropathie ¬ Syndrome de cataracte congénitale- *Q87.8*
- - Retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse accélérée- *Q87.3*
- - ¬ Syndrome
- - - Cécité nocturne-anomalies squelettiques- *Q87.8*
- - - Déficience intellectuelle sévère-petite taille-troubles du comportement- *Q87.8*
- - - Fibromatose gingivale- *Q87.0*
- - - Malformation de Klippel-Feil-myopathie- *Q76.1*
- Macrocéphalie-myopie-malformation de Dandy-Walker ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Retard du développement ¬ Syndrome de neuropathie viscérale-anomalies cérébrales- *Q87.8*
- ¬ Syndrome
- - Arachnodactylie-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - Ataxie spinocérébelleuse- *G11.1*
- - Déficience intellectuel lié X
- - - Cubitus valgus- *Q87.8*
- - - Épilepsie-contracture progressive des articulations- *Q87.8*
- - Lymphœdème-communication interauriculaire- *Q87.8*

Dysmorphie *–suite*
- ¬ Syndrome *–suite*
- - Macrocéphalie-paraplégie spastique- *Q87.8*

Dysmorphique
- Infantile ¬ Sialidose *E77.1*
- ¬ Syndrome d'alcoolisme fœtal (*Q86.0*

Dysmorphisme dû à la warfarine ¬ *Q86.2*

Dysmorphophobie
- Délirante ¬ *F22.8*
- Non délirante) ¬ *F45.2*

Dyson
v. Walker-Dyson

Dysostéosclérose ¬ *Q78.8*

Dysostose
- Acro-cranio-faciale ¬ *Q87.0*
- Acrofacial
- - Kennedy-Teebi ¬ *Q75.4*
- - Postaxiale ¬ *Q75.4*
- - Type
- - - Catane ¬ *Q75.4*
- - - Palagonia ¬ *Q75.4*
- - - Rodríguez ¬ *Q75.4*
- - - Weyers ¬ *Q75.4*
- Acrofrontofacionasale ¬ *Q75.1*
- Cléido-crânienne ¬ *Q74.0*
- Crânio-faciale ¬ *Q75.1*
- Facio-crânienne hypomandibulaire ¬ *Q75.4*
- Fémoro-péronéo-cubitale ¬ *Q72.4*
- Mandibulo-facial
- - Liée à l'X ¬ *Q75.4*
- - Macroblépharon-macrostomie ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Sans anomalies des extrémités ¬ *Q75.4*
- - ¬ *Q75.4*
- Oculo-mandibulaire ¬ *Q75.5*
- Oculo-maxillo-faciale ¬ *Q75.1*
- Scapulo-iliaque ¬ *Q87.5*
- Spondylo-costale
- - Atrésie anale-malformation génito-urinaire ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Autosomique récessive ¬ *Q76.8*
- Type Stanescu ¬ *Q78.8*

Dyspareunie
- Non organique ¬ *F52.6*
- Psychogène ¬ *F52.6*
- ¬ *N94.1*

Dyspepsie
- Allergique fonctionnelle ¬ *K30*
- Chronique ¬ *R10.1*
- Fonctionnelle ¬ *K30*
- Gastro-intestinale fonctionnelle ¬ *K30*
- SAI ¬ *R10.1*
- ¬ Formes psychogènes de: *F45.3*

Dyspeptiques ¬ Troubles *R10.1*

Dysphagie
- Nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture ¬ *R13.0*
- Non précisés ¬ *R13.9*
- Sidéropénique ¬ *D50.1*
- Sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ *R13.1*
- Y compris la "boule hystérique" psychogène ¬ *F45.8*
- ¬
- - *R13*
- - Syndrome de myopathie à début précoce-aréflexie-détresse respiratoire- *G71.2*

Dysphagocytose congénitale ¬ *D71*

Dysphasie aphasie
- Développement type
- - Expressif ¬ *F80.1*
- - Réceptif ¬ *F80.2*
- ¬ *R47.0*

Dysphonie
- Psychogène ¬ *F44.4*
- ¬ *R49.0*

Dysplasie
- Acétabulaire congénitale ¬ *Q65.8*
- Acromésomélique type Maroteaux ¬ *Q77.8*
- Acromicrique ¬ *Q77.8*
- Anauxétique ¬ *Q77.7*
- Artério-hépatique
- - Monosomie 20p12 ¬ *Q44.7*
- - Mutation ponctuel
- - - JAG1 ¬ *Q44.7*
- - - NOTCH2 ¬ *Q44.7*
- - ¬ *Q44.7*
- Atrio-digitale type
- - 1 ¬ *Q87.2*
- - 3 ¬ *Q87.2*
- Bas grade de la prostate ¬ *N42.3*
- Boomerang ¬ *Q87.1*
- Broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale ¬ *P27.1*
- Campomélique ¬ *Q87.1*
- Cérébrofaciothoracique ¬ *Q87.5*
- Chondro-ectodermique ¬ *Q77.6*
- Cléido-crânienne ¬ *Q74.0*
- Col utérus
- - Sans précision ¬ *N87.9*
- - ¬ *N87*
- Congénitale de la valve tricuspide ¬ *Q22.8*
- Costo-vertébrale-anomalie de Sprengel ¬ Syndrome d'hydrocéphalie- *Q87.8*
- Cranio-cérébello-cardiaque ¬ *Q87.0*
- Cranio-diaphysaire ¬ *M85.2*
- Cranio-ectodermique ¬ *Q87.5*
- Cranio-fronto-nasale ¬ *Q75.1*
- Cranio-frontonasale-anomalie de Poland ¬ Syndrome de *Q87.8*

Dysplasie *–suite*
- Cranio-lenticulo-suturale ¬ *Q75.8*
- Cranio-métaphysaire ¬ *Q78.8*
- Cranio-télencéphalique ¬ *Q04.3*
- Dentine ¬ *K00.5*
- Dermique facial focal
- - Type I ¬ *Q82.8*
- - ¬ *Q82.8*
- Dermo-dentaire ¬ *Q82.4*
- Diaphysaire
- - Progressive ¬ *Q78.3*
- - Tachetée ¬ *Q77.3*
- Diastrophique ¬ *Q77.5*
- Dyssegmentaire type
- - Rolland-Desbuquois ¬ *Q77.7*
- - Silverman-Handmaker ¬ *Q77.7*
- Ectodermique
- - 1 ¬ Syndrome de syndactylie- *Q82.8*
- - 2 ¬ Syndrome de syndactylie- *Q82.8*
- - Anhidrotique
- - - Immunodéficience ¬ *Q82.4*
- - - Liée à l'X ¬ *Q82.4*
- - - ¬ *Q82.4*
- - Cécité ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Déficience intellectuelle-malformation du système nerveux central ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Fente labiopalatine ¬ Syndrome de contractures- *Q87.8*
- - Hidrotique
- - - Type
- - - - Christianson-Fourie ¬ *Q82.8*
- - - - Halal ¬ *Q82.8*
- - - ¬ *Q82.8*
- - Hypohidrotique
- - - Liée à l'X ¬ *Q82.4*
- - - ¬ *Q82.4*
- - Trichoodonto-onychiale ¬ *Q82.8*
- - Type Berlin ¬ *Q82.8*
- - ¬
- - - *Q82.4*
- - - Syndrome d'ataxie cérébelleuse- *G11.1*
- Épiphysaire
- - Hémimélique ¬ *Q74.8*
- - Multiple
- - - Anomalie du collagène 9 ¬ *Q77.3*
- - - Dysplasie fémorale sévère ¬ *Q77.3*
- - - Type
- - - - Al-Gazali ¬ *Q77.3*
- - - - Beighton ¬ *Q77.3*
- - - ¬ *Q77.3*
- Épithéliale intestinale ¬ *K63.8*
- Facio-cardio-mélique létale ¬ *Q87.8*
- Faciogénitale ¬ *Q87.1*
- Fémorale sévère ¬ Dysplasie épiphysaire multiple avec *Q77.3*

Dysplasie *–suite*
- Fibreux
- - Localisée) ¬ *M85.0*
- - Mâchoire ¬ *K10.8*
- - Os ¬ *M85.09*
- Fibromusculaire artérielle ¬ *I77.3*
- Frontonasale avec alopécie et anomalies génitales ¬ *Q87.0*
- Géléophysique ¬ *Q87.1*
- Hanche type Beukes ¬ *Q65.8*
- Ischio-patellaire ¬ *Q74.1*
- Kyphomélique ¬ *Q78.8*
- Léger
- - Col de l'utérus ¬ *N87.0*
- - Vagin ¬ *N89.0*
- - Vulve ¬ *N90.0*
- Mammaire bénin
- - Sans précision ¬ *N60.9*
- - ¬ Autres *N60.8*
- Mandibulo-acrale ¬ *Q87.5*
- Mésodermique axiale ¬ *Q87.8*
- Mésomélique type
- - Kantaputra ¬ *Q78.8*
- - Reardon ¬ *Q78.8*
- - Savarirayan ¬ *Q78.8*
- Métacarpienne ¬ Syndrome de lissencéphalie type 3 *Q04.3*
- Métaphysaire
- - Type Braun-Tinschert ¬ *Q78.5*
- - ¬ *Q78.5*
- Métatropique ¬ *Q77.8*
- Moelle épinière ¬ Hypoplasie et *Q06.1*
- Moyenne
- - Col de l'utérus ¬ *N87.1*
- - Vagin ¬ *N89.1*
- - Vulve ¬ *N90.1*
- Multilignées ¬ Anémie réfractaire avec *D46.5*
- Multilinéaire ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec *C92.8*
- Oculo-auriculo-vertébrale ¬ *Q87.0*
- Odonto-maxillaire segmentaire ¬ *K00.4*
- Odonto-onychodermique ¬ *Q82.8*
- Œil ¬ *Q11.2*
- Olfacto-génitale de Kallmann-De Morsier ¬ *E23.0*
- Ongle autosomique
- - Dominante ¬ *L60.3*
- - Récessive ¬ *Q84.6*
- Ophtalmo-mandibulo-mélique ¬ *Q87.8*
- Osseux
- - Membres courts-déficit immunitaire combiné sévère ¬ Syndrome de *D82.2*
- - Terminale-défauts de pigmentation ¬ Syndrome de *Q87.2*
- Ostéodysplasique microcéphalique type Saul-Wilson ¬ *Q87.5*
- Ostéoglophonique ¬ *Q87.1*

Dysplasie *–suite*
- Oto-spondylo-mégaépiphysaire ¬ *Q77.7*
- Polyostotique fibreuse [maladie de Jaffe-Lichtenstein] ¬ *Q78.1*
- Poumon ¬ Hypoplasie et *Q33.6*
- Prostate ¬ *N42.3*
- Pseudodiastrophique ¬ *Q78.8*
- Rénal
- - Multikystique [Potter type II] ¬ *Q61.4*
- - ¬
- - - *Q61.4*
- - - Multikystique: *Q61.4*
- Rétinienne ¬ Syndrome d'hydrocéphalie-agyrie- *Q04.3*
- Septum et des voies optiques ¬ *Q04.4*
- Sévère
- - Col utérus
- - - Non classée ailleurs ¬ *N87.2*
- - - SAI ¬ *N87.2*
- - Vagin
- - - Non classée ailleurs ¬ *N89.2*
- - - SAI ¬ *N89.2*
- - Vulve
- - - Non classée ailleurs ¬ *N90.2*
- - - SAI ¬ *N90.2*
- - ¬ néoplasie intraépithéliale
- - - Col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de *D06*
- - - Vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de *D07.2*
- - - Vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de *D07.1*
- SPONASTRIME ¬ *Q77.7*
- Spondylo-enchondrale ¬ *Q77.7*
- Spondylo-épimétaphysaire
- - Dentition anormale ¬ Syndrome de *Q77.7*
- - Liée à l'X ¬ *Q77.7*
- - Luxations multiples ¬ *Q77.7*
- - Type
- - - Aggrécane ¬ *Q77.7*
- - - Bieganski ¬ *Q77.7*
- - - Geneviève ¬ *Q77.7*
- - - Handigodu ¬ *Q77.7*
- - - Irapa ¬ *Q77.7*
- - - Missouri ¬ *Q77.7*
- - - Pakistani ¬ *Q77.7*
- - - Shohat ¬ *Q77.7*
- - - Strudwick ¬ *Q77.7*
- Spondylo-épiphysaire
- - Arthropathie progressive ¬ *Q77.7*
- - Congénitale ¬ *Q77.7*
- - Tardive type Kohn ¬ *Q77.7*
- - Type
- - - Cantu ¬ *Q77.7*
- - - Kimberley ¬ *Q77.7*
- - - MacDermot ¬ *Q77.7*

Dysplasie *–suite*
- Spondylo-épiphysaire *–suite*
- - Type *–suite*
- - - Maroteaux ¬ *Q77.7*
- - - Nishimura ¬ *Q77.7*
- - - Reardon ¬ *Q77.7*
- - - Stanescu ¬ *Q77.7*
- - ¬ *Q77.7*
- Spondylo-métaphysaire
- - Autosomique récessive type Mégarbané ¬ *Q77.8*
- - Dystrophie des cônes et des bâtonnets ¬ Syndrome de *Q77.8*
- - Type
- - - A4 ¬ *Q77.8*
- - - Golden ¬ *Q77.8*
- - - Kozlowski ¬ *Q77.8*
- - - Schmidt ¬ *Q77.8*
- - - Sutcliffe ¬ *Q77.8*
- Spondylo-métaphysaire-hypotrichose ¬ Syndrome de *Q77.7*
- Squelettique
- - Létale type Greenberg ¬ *Q77.3*
- - Type Greenberg ¬ *Q77.3*
- - ¬ Syndrome d'épilepsie-microcéphalie *Q87.8*
- Tegmentum pontique ¬ *Q04.8*
- Tête du fémur type Meyer ¬ *Q78.8*
- Thoracique
- - Asphyxiante [Jeune] ¬ *Q77.2*
- - Hydrocéphalie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Tricho-odonto-onychiale ¬ *Q82.8*
- Type Astley-Kendall ¬ *Q77.3*
- Vagin, sans précision ¬ *N89.3*
- Valvulaire
- - Aortique congénitale ¬ *Q23.9*
- - Congénitale ¬ *Q24.8*
- - Pulmonaire ¬ *I37.0*
- Ventriculaire droit arythmogène
- - Familiale isolée ¬ *I42.80*
- - ¬ *I42.80*
- Vulve, sans précision ¬ *N90.3*

Dysplasique
- Bilatérale ¬ Coxarthrose d'origine *M16.2*
- SAI ¬ Coxarthrose *M16.3*
- Unilatérale ¬ Coxarthrose *M16.3*
- ¬ Autres coxarthroses *M16.3*

Dyspnée
- Cheyne-Stokes ¬ *R06.3*
- ¬
- - *R06.0*
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, R06.0*

Dyspraxie
- Développement ¬ *F82*
- Parole ¬ Syndrome d'épilepsie rolandique- *G40.08, R48.2*

Dysprotéinémie [LAID] ¬ Lymphadénopathie angio-immunoblastique avec *C86.5*

Dysprothrombinémie ¬ *D68.21*

Dysréflexie autonome

- Manifestée crise
- - Hypertoniques ¬ *G90.40*
- - Transpiration ¬ *G90.41*
- Non précisée ¬ *G90.49*
- SAI ¬ *G90.49*
- ¬
- - *G90.4*
- - *G90.48*

Dysrythmies malignes ¬ Examens liés à une prédisposition aux *Z01.80*

Dyssegmentaire type

- Rolland-Desbuquois ¬ Dysplasie *Q77.7*
- Silverman-Handmaker ¬ Dysplasie *Q77.7*

Dyssociale ¬ Personnalité *F60.2*

Dyssynergia cerebellaris myoclonica ¬ *G11.1*

Dyssynergie

- Détrusor du col vésicale ¬ *N32.0*
- Vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière ¬ *G95.84*

Dyssynostose cranio-faciale ¬ *Q87.0*

Dystasie aréflexique héréditaire de type Roussy-Lévy ¬ *G60.0*

Dysthymie ¬ *F34.1*

Dystocie

- Anneau de contraction ¬ *O62.4*
- Anomalie
- - Fœtales ¬ *O66.3*
- - Organes pelviens de la mère ¬ *O65.5*
- - Pelvien mère
- - - Sans précision ¬ *O65.9*
- - - ¬
- - - - *O65*
- - - - *O65.8*
- Ascite du fœtus ¬ *O66.3*
- Bassin généralement rétréci ¬ *O65.1*
- Déformation pelvienne ¬ *O65.0*
- Disproportion fœto-pelvienne, sans précision ¬ *O65.4*
- Dystocie des épaules ¬ *O66.0*
- Épaules ¬ Dystocie due à une *O66.0*
- Fœtale SAI ¬ *O66.9*
- Fœtus
- - Anormalement gros ¬ *O66.2*
- - Hydrocéphale ¬ *O66.3*
- Gémellaire ¬ *O66.1*
- Hydropisie du fœtus ¬ *O66.3*
- Jumeaux soudés ¬ *O66.3*
- Maternelle SAI ¬ *O66.9*
- Méningomyélocèle du fœtus ¬ *O66.3*
- Persistance position occipito
- - Iliaque ¬ *O64.0*
- - Postérieure ¬ *O64.0*

Dystocie *–suite*

- Persistance position occipito *–suite*
- - Sacrée ¬ *O64.0*
- - Transverse ¬ *O64.0*
- Position présentation anormal
- - Fœtus ¬ *O64*
- - Sans précision ¬ *O64.9*
- - ¬ *O64.8*
- Précisées ¬ Autres *O66.8*
- Présentation
- - Complexe ¬ *O64.5*
- - Épaule ¬ *O64.4*
- - Face ¬ *O64.2*
- - Front ¬ *O64.3*
- - Pieds ¬ *O64.1*
- - Siège ¬
- - - *O64.1*
- Protrusion d'un membre inférieur ¬ *O64.1*
- Rétrécissement détroit
- - Inférieur et de la cavité moyenne ¬ *O65.3*
- - Supérieur ¬ *O65.2*
- Rotation incomplète de la tête du fœtus ¬ *O64.0*
- SAI ¬ *O66.9*
- Sans précision ¬ *O66.9*
- Tératome sacro-coccygien du fœtus ¬ *O66.3*
- Tumeur du fœtus ¬ *O66.3*
- Utérus SAI ¬ *O62.4*
- ¬ Autres *O66*

Dystonie

- Bucco-faciale idiopathique ¬ *G24.4*
- Cervical
- - Combinée ¬ *G24.3*
- - Principalement rotatoire ¬ *G24.3*
- Dopa-sensible
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *G24.1*
- - - Récessive ¬ *G24.1*
- - Déficit en tyrosine hydroxylase ¬ *G24.1*
- Focale autosomique dominante, type DYT25 ¬ *G24.1*
- Généralisée à début précoce par les membres ¬ *G24.1*
- Idiopathique
- - Familiale ¬ *G24.1*
- - Non familiale ¬ *G24.2*
- - SAI ¬ *G24.1*
- Médicamenteuse ¬ *G24.0*
- Musculaire déformante ¬ *G24.1*
- Oppenheim ¬ *G24.1*
- Oromandibulaire ¬ *G24.4*
- Primaire type
- - DYT13 ¬ *G24.1*
- - DYT17 ¬ *G24.1*
- - DYT2 ¬ *G24.1*

Dystonie *–suite*

- Primaire type *–suite*
- - DYT21 ¬ *G24.1*
- - DYT27 ¬ *G24.1*
- - DYT4 ¬ *G24.1*
- - DYT6 ¬ *G24.1*
- Progressive héréditaire avec fluctuations diurnes marquées ¬ *G24.1*
- Psychogène ¬ *F44.4*
- Sans précision ¬ *G24.9*
- Torsion à début précoce ¬ *G24.1*
- ¬
- - *G24*
- - *G24.8*
- - Myoclonus- *G24.1*

Dystonie-parkinsonisme liée à l'X ¬ *G24.1*

Dystonique

- Paroxystique avec ataxie épisodique et spasticité ¬ Choréoathétose *G24.8*
- ¬ Paralysie cérébrale *G80.3*

Dystrophia Smolandiensis ¬ *H18.5*

Dystrophie

- Adiposo-génitale ¬ *E23.6*
- Cérébro-maculaire ¬ *E75.4*
- Choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire) ¬ *H31.2*
- Cône
- - Bâtonnets ¬
- - - *H35.5*
- - - Syndrome de dysplasie spondylo-métaphysaire- *Q77.8*
- - Réponse scotopique supranormale ¬ *H35.5*
- Cornée
- - Épithéliale ¬ *H18.5*
- - Filaments sinueux ¬ *H18.5*
- - Granuleuse ¬ *H18.5*
- - Grillagée en réseau ¬ *H18.5*
- - Maculaire ¬ *H18.5*
- Cornéen
- - Amorphe postérieure ¬ *H18.5*
- - Endothéliale liée à l'X ¬ *H18.5*
- - Grayson-Wilbrandt ¬ *H18.5*
- - Héréditaires ¬ *H18.5*
- - Lisch ¬ *H18.5*
- - Membrane de Bowman type II ¬ *H18.5*
- - Rayon de miel ¬ *H18.5*
- - Reis-Bücklers ¬ *H18.5*
- - Schnyder ¬ *H18.5*
- - Sous-épithéliale mucineuse ¬ *H18.5*
- - Stromale ¬ *H18.5*
- - Thiel-Behnke ¬ *H18.5*
- - Waardenburg-Jonker ¬ *H18.5*
- - ¬ Syndrome d'ataxie spinocérébelleuse- *G11.8*
- Cristalline de Bietti ¬ *H31.2*

Dystrophie *–suite*
- Cutanée bulleuse atrophiante et albo-papuloïde ¬ *Q81.2*
- Endothélial congénital héréditaire type
- - 1 ¬ *H18.5*
- - 2 ¬ *H18.5*
- Fuchs ¬ *H18.5*
- Héréditaire de la choroïde ¬ *H31.2*
- Inanition ¬ *E45*
- Jaune du foie ¬ atrophie ou *K72*
- Kandori ¬ *H35.5*
- Maculaire
- - Ailes de papillon ¬ *H35.5*
- - Annulaire concentrique bénigne ¬ *H35.5*
- - Caroline du Nord ¬ *H35.5*
- - Cystoïde ¬ *H35.5*
- - Occulte ¬ *H35.5*
- Malnutrition ¬ *E45*
- Musculaire
- - Autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou Becker ¬ *G71.0*
- - Bénigne [Becker] ¬ *G71.0*
- - Ceinture
- - - Autosomique
- - - - Dominant
- - - - - Type 1A ¬ *G71.0*
- - - - - Type 1B ¬ *G71.0*
- - - - - Type 1C ¬ *G71.0*
- - - - - Type 1D ¬ *G71.0*
- - - - - Type 1E ¬ *G71.0*
- - - - - Type 1F ¬ *G71.0*
- - - - - Type 1G ¬ *G71.0*
- - - - - Type 1H ¬ *G71.0*
- - - - Récessif
- - - - - Type 2A ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2B ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2C ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2D ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2E ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2F ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2G ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2H ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2I ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2J ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2K ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2L ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2M ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2N ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2O ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2P ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2Q ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2R ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2S ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2U ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2W ¬ *G71.0*

Dystrophie *–suite*
- Musculaire *–suite*
- - Ceinture *–suite*
- - - Autosomique *–suite*
- - - - Récessif *–suite*
- - - - - Type 2X ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2Y ¬ *G71.0*
- - - Déficit
- - - - Delta-sarcoglycane ¬ *G71.0*
- - - - FKRP ¬ *G71.0*
- - - - Gamma-sarcoglycane ¬ *G71.0*
- - - - Lamine A/C ¬ *G71.0*
- - - - POMK ¬ *G71.0*
- - - ¬ *G71.0*
- - Congénital
- - - Anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurelles] ¬ *G71.2*
- - - Cataracte infantile-hypogonadisme ¬ Syndrome de *G71.2*
- - - Déficience intellectuelle ¬ *G71.2*
- - - Déficit
- - - - Intégrine alpha-7 ¬ *G71.2*
- - - - Laminine alpha 2 ¬ *G71.2*
- - - Liée à LMNA ¬ *G71.2*
- - - SAI ¬ *G71.2*
- - - Sans déficience intellectuelle ¬ *G71.2*
- - - Type
- - - - 1A ¬ *G71.2*
- - - - 1B ¬ *G71.2*
- - - - Fukuyama ¬ *G71.2*
- - - Ullrich ¬ *G71.2*
- - - ¬ *G71.2*
- - Distale ¬ *G71.0*
- - Emery-Dreifuss
- - - Autosomique
- - - - Dominante ¬ *G71.0*
- - - - Récessive ¬ *G71.0*
- - - Liée à l'X ¬ *G71.0*
- - Facio-scapulo-humérale ¬ *G71.0*
- - Oculaire ¬ *G71.0*
- - Oculo-pharyngée ¬ *G71.0*
- - Scapulo-péronière
- - - Bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss] ¬ *G71.0*
- - - Liée à l'X ¬ *G71.0*
- - - ¬ *G71.0*
- - Sévère [Duchenne] ¬ *G71.0*
- - Tibiale ¬ *G71.0*
- - Type Selcen ¬ *G71.0*
- - ¬
- - - *G71.0*
- - - Epidermolyse bulleuse simple avec *Q81.0†, G73.7**
- Myotonique
- - Proximale ¬ *G71.1*

Dystrophie *–suite*
- Myotonique *–suite*
- - Steinert] ¬ *G71.1*
- - Type 1 ¬ *G71.1*
- Neuroaxonale infantile [maladie de Seitelberger] ¬ *G31.88*
- Nuageuse centrale de François ¬ *H18.5*
- Oculo-cérébro-rénale ¬ *E72.0*
- Ongles ¬ *L60.3*
- Postérieure polymorphe ¬ *H18.5*
- Progressive des cônes ¬ *H35.5*
- Pseudo-inflammatoire de Sorsby ¬ *H35.5*
- Rétinien
- - Cours
- - - Lipidose systémique ¬ *E75.6†, H36.8**
- - - Maladie de stockage des lipides ¬ *E75.6†, H36.8**
- - Héréditaire ¬ *H35.5*
- - Pigmentaire) (ponctuée albescente) (vitelliforme) ¬ *H35.5*
- - Sévère de l'enfance ¬ *H35.5*
- - Type Bothnie ¬ *H35.5*
- Sympathique réflexe ¬
- - *G90.5*
- - *G90.59*
- Tapétochoroïdienne ¬ *H31.2*
- Tapéto-rétinienne ¬ *H35.5*
- Thoracique asphyxiante de Jeune ¬ *Q77.2*
- Thrombocytaire hémorragipare ¬ *D69.1*
- Vingt ongles ¬ *L60.3*
- Vitréo-rétinienne ¬ *H35.5*
- Vulve ¬ *N90.4*

Dystrophinopathie de Duchenne ¬ *G71.0*

Dystrophique
- Acrale ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.2*
- Dominant
- - Généralisée ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.2*
- - Isolée des ongles ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.2*
- Prétibiale ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.2*
- Prurigineuse ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.2*
- Récessive centripète ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.2*
- ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.2*

Dysurie ¬
- *R30.0*
- Formes psychogènes de: *F45.3*

DYT13 ¬ Dystonie primaire type *G24.1*

DYT17 ¬ Dystonie primaire type *G24.1*

DYT2 ¬ Dystonie primaire type *G24.1*

DYT21 ¬ Dystonie primaire type *G24.1*

DYT25 ¬ Dystonie focale autosomique dominante, type *G24.1*

DYT27 ¬ Dystonie primaire type *G24.1*

DYT4 ¬ Dystonie primaire type *G24.1*

DYT6 ¬ Dystonie primaire type *G24.1*

E1-alpha ¬ Déficit en pyruvate déshydrogénase *E74.4*

E2 ¬ Déficit en pyruvate déshydrogénase *E74.4*

E3 ¬ Déficit en pyruvate déshydrogénase *E74.4*

Eagle-Barett ¬ Syndrome d' *Q79.4*

Eales ¬ Maladie d' *H35.0*

EAST ¬ Syndrome *Q87.8*

Eaton
v. Lambert-Eaton

Eau

- Chaude ¬ Épilepsie réflexe à l' *G40.8*
- Potable ¬ Approvisionnement insuffisant en *Z58*
- Roche ¬
- - Adénocarcinome parathyroïdien à cellules *C75.0*
- - Adénome parathyroïdien à cellules *D35.1*
- - Carcinome parathyroïdien à cellules *C75.0*
- Sans précision ¬ Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l' *T70.9*
- ¬
- - Accident par chute (dans l' *X59.9!*
- - Effet
- - - Pression atmosphérique pression
- - - - *T70*
- - - - *T70.8*
- - - Sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l' *T70.0*
- - Pollution de l' *Z58*
- - Privation d' *T73.1*
- - Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d' *T67.4*

EBDR sévère généralisée ¬ *Q81.2*

Éblouissements ¬ Étourdissements et *R42*

Ebola ¬

- Fièvre hémorragique à virus *A98.4*
- Maladie à virus *A98.4*

Ébrieuse ¬ Démarche *R26.0*

Ebstein

- Valve tricuspide ¬ Anomalie d' *Q22.5*
- ¬ Maladie d' *Q22.5*

Écaille temporal ¬

- Os: temporal, *S02.0*
- Temporal, à l'exclusion de l' *S02.1*

Écartement traumatique de la symphyse (pubienne) obstétrical(e) ¬ *O71.6*

Ecchymoses

- Fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Spontanées ¬ *R23.3*

ECG

- Moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien découvert par *I25.2*

ECG *–suite*

- ¬ Anomalies (de): électrocardiogramme [*R94.3*

Échancrure et fente nasales ¬ Fissure, *Q30.2*

Échantillons ¬ Incision pour prise d' *P12.4*

Écharde ¬ lésion traumatique superficiel

- Avant-bras: Corps étranger superficiel (*S50.84*
- Cheville et du pied: Corps étranger superficiel (*S90.84*
- Épaule et du bras: Corps étranger superficiel (*S40.84*
- Hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (*S70.84*
- Jambe: Corps étranger superficiel (*S80.84*
- Membre
- - Inférieur, niveau non précisé: Corps étranger superficiel (*T13.04*
- - Supérieur, niveau non précisé: Corps étranger superficiel (*T11.04*
- Partie du corps non précisée: Corps étranger superficiel (*T14.04*
- Poignet et de la main: Corps étranger superficiel (*S60.84*
- Tronc, niveau non précisé: Corps étranger superficiel (*T09.04*

Échaudage

- Chaleur ou des substances bouillantes ¬ Brûlure ou *X19!*
- Gaz brûlants ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Liquides brûlants ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Matériel brûlant ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Nourriture brûlante ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Objets brûlants ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Vapeur brûlante ¬ Brûlure ou *X19.9!*

Échaudée Syndrome SSS

- Atteinte 30% surface corporelle
- - Plus ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.1*
- - ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.0*
- SAP ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.0*

Échec

- Application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision ¬ *O66.5*
- Déclenchement
- - Instrumental du travail ¬ *O61.1*
- - Médical du travail ¬ *O61.0*
- - Travail
- - - Chirurgie ¬ *O61.1*
- - - Moyens mécaniques ¬ *O61.1*
- - - Ocytocique ¬ *O61.0*
- - - Prostaglandines ¬ *O61.0*
- - - Sans précision ¬ *O61.9*
- - - ¬ Autres *O61.8*
- Difficulté intubation
- - Cours
- - - Grossesse ¬ *O29.6*

Échec *–suite*

- Difficulté intubation *–suite*
- - Cours *–suite*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.6*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.7*
- - ¬ *T88.4*
- Dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) ¬ *Y82.8!*
- Épreuve travail
- - Sans précision ¬ *O66.4*
- - Suivi d'une césarienne ¬ *O66.4*
- Examens ¬ *Z55*
- Lactation ¬ *O92.3*
- Rejet
- - Greffe
- - - Cœur
- - - - Poumon ¬ *T86.3*
- - - - ¬ *T86.2*
- - - Foie ¬ Troubles fonctionnels, *T86.4*
- - - Intestin ¬ *T86.88*
- - - Os ¬ *T86.88*
- - - Peau ¬ *T86.5*
- - - Rein
- - - - Non précisé ¬ Trouble fonctionnel, *T86.19*
- - - - ¬ Troubles fonctionnels, *T86.1*
- - Non précis greffe
- - - Foie ¬ Autre trouble fonctionnel, *T86.49*
- - - Peau ¬ Autre trouble fonctionnel, *T86.59*
- - Organe tissu greffé
- - - Greffe
- - - - Cornée de l'œil ¬ *T86.83*
- - - - Pancréas ¬ *T86.82*
- - - - Poumon ¬ *T86.81*
- - - Non précisés ¬ *T86.9*
- - - Organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés ¬ *T86.88*
- - - ¬ *T86.8*
- Réponse génitale ¬ *F52.2*
- Tentative avortement
- - Médical
- - - Complications autres et non précisées ¬ *O07.3*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ *O07.2*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ *O07.1*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ *O07.0*
- - - SAI ¬ *O07.4*
- - - Sans complication ¬ *O07.4*
- - SAI ¬ *O07.9*
- - Sans précision
- - - Complications autres et non précisées ¬ *O07.8*
- - - Compliqué

Échec *–suite*
- Tentative avortement *–suite*
- - Sans précision *–suite*
- - - Compliqué *–suite*
- - - - Embolie ¬ *O07.7*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ *O07.6*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ *O07.5*
- - - Sans précision, sans complication ¬ *O07.9*
- - ¬ *O07*
- Transplant cellule souche hématopoïétique
- - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ *T86.0*
- - ¬ *T86.00*
- ¬ Trouble de la personnalité: à conduite d' *F60.7*

Échinococcose
- Alvéolaire
- - Foie ¬ *B67.5†, K77.0**
- - Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus multilocularis [*B67.6*
- - Sans précision ¬ Infection à Echinococcus multilocularis [*B67.7*
- - ¬
- - - *B67.7*
- - - Infection hépatique à Echinococcus multilocularis [*B67.5*
- Foie NCA ¬ *B67.8†, K77.0**
- Kystique
- - Foie ¬ *B67.0†, K77.0**
- - Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus granulosus [*B67.3*
- - Os ¬ *B67.2†, M90.29**
- - Poumon ¬ *B67.1†, J99.8**
- - Sans précision ¬ Infection à Echinococcus granulosus [*B67.4*
- Orbite ¬ *B67.9†, H06.1**
- SAI ¬ *B67.9*

Echinococcus
- Granulosus
- - Échinococcose kystique
- - - Localisations multiples ¬ Infections à *B67.3*
- - - Sans précision ¬ Infection à *B67.4*
- - ¬
- - - Infection
- - - - Hépatique à *B67.0†, K77.0**
- - - - Osseuse à *B67.2†, M90.29**
- - - - Pulmonaire à *B67.1†, J99.8**
- - - - Thyroïde à *B67.3†, E35.0**
- - - Kyste hydatique du foie à *B67.0*
- Multilocularis
- - Échinococcose alvéolaire
- - - Localisations multiples ¬ Infections à *B67.6*
- - - Sans précision ¬ Infection à *B67.7*
- - - ¬ Infection hépatique à *B67.5*
- - ¬ Infection du foie à *B67.5†, K77.0**

Echinococcus *–suite*
- Sans précision ¬ Infection
- - *B67.9*
- - Hépatique à *B67.8*
- ¬ Infection
- - Foie à *B67.8†, K77.0**
- - Orbite due à *B67.9†, H06.1**

Échinocoques ¬ Ostéomyélite due à *B67.2†, M90.29**

Echinostomose ¬ *B66.8*

ECHO ¬
- Bronchite aiguë due à des virus *J20.7*
- Infection SAI à virus: *B34.1*
- Méningite à virus *A87.0†, G02.0**
- Virus: *B97.1!*

Echocardiogramme anormal SAI ¬ *R93.1*

Echoencéphalogramme anormal ¬ *R90.8*

Échographie
- Méthode physique ¬ Dépistage prénatal
- - Malformations par *Z36.3*
- - Retard de croissance du fœtus par *Z36.4*
- Vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l' *O34.30*

Échographiques
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.3*
- ¬ Signes de détresse fœtale: *O68.8*

Eclampsie
- Cours
- - Grossesse ¬ *O15.0*
- - Puerpéralité ¬ *O15.2*
- - Travail ¬ *O15.1*
- SAI ¬ *O15.9*
- Sans précision quant à la période ¬ *O15.9*
- ¬ *O15*

Ecole buissonnière ¬ *F91.2*

Économique
- Difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation socio- *Z76.2*
- ¬ Difficultés liées au logement et aux conditions *Z59*

Economo
v. Von Economo-Cruchet

Écorceurs d'érables ¬ Poumon des *J67.6*

Écoulement
- Aigu et subaigu de l'oreille moyenne ¬ *H65.0*
- Liquide céphalorachidien
- - Rachicentèse ¬ *G97.0*
- - ¬ *G96.0*
- Mamelon ¬
- - *N64.5*
- - Résultats anormaux de: *R89*
- Oreille ¬ Otalgie et *H92*
- Pénien ¬ *R36*

Écoulement *–suite*
- Urétral ¬ *R36*

ECP syndrome ¬ *Q82.8*

Écrasement
- Amputation traumatique
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles d' *T93.6*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d' *T92.6*
- - Partie
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S38*
- - - Corps non précisée ¬ *T14.7*
- Associations de parties du corps ¬ *T04.8*
- Avant-bras
- - Partie non précisée ¬ *S57.9*
- - ¬ *S57*
- Cheville
- - Pied ¬ *S97*
- - ¬ *S97.0*
- Cou
- - Partie non précisée ¬ *S17.9*
- - ¬
- - - *S17*
- - - Écrasement du cou ¬ Écrasement de la tête avec *T04.0*
- Coude ¬ *S57.0*
- Crâne ¬ *S07.1*
- Cuisse ¬ *S77.1*
- Déviation congénital(e) du nez ¬ *Q67.4*
- Épaule et du bras ¬ *S47*
- Face ¬ *S07.0*
- Genou ¬ *S87.0*
- Hanche
- - Cuisse ¬ *S77.2*
- - ¬ *S77.0*
- Jambe ¬ *S87*
- Larynx et de la trachée ¬ *S17.0*
- Membre
- - Inférieur SAI ¬ *T04.3*
- - Supérieur SAI ¬ *T04.2*
- Multiples, sans précision ¬ *T04.9*
- Organes génitaux externes ¬ *S38.0*
- Orteil(s) ¬ *S97.1*
- Partie
- - Avant-bras ¬ *S57.8*
- - Cheville et du pied ¬ *S97.8*
- - Cou ¬ *S17.8*
- - Non précis
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S38.1*
- - - Jambe ¬ *S87.8*
- - - Poignet et de la main ¬ *S67.8*
- - Tête ¬ *S07.8*
- Pied SAI ¬ *S97.8*
- Plusieurs partie
- - Corps ¬ *T04*

Écrasement *–suite*
- Plusieurs partie *–suite*
- - Membre s
- - - Inférieur(s) ¬ *T04.3*
- - - Supérieur s
- - - - Membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ¬ *T04.4*
- - - - ¬ *T04.2*
- Poignet et de la main ¬ *S67*
- Pouce et d'autre(s) doigt(s) ¬ *S67.0*
- Tête
- - Écrasement du cou ¬ *T04.0*
- - Partie non précisée ¬ *S07.9*
- - ¬ *S07*
- Thorax
- - Abdomen
- - - Membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ *T04.7*
- - - Thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ *T04.1*
- - Amputation traumatique d'une partie du thorax ¬ *S28*
- - ¬ *S28.0*
- Traumatique SAI ¬ *T14.7*
- Tronc SAI ¬ *T04.1*
- ¬
- - Insuffisance rénale après *T79.5*
- - Syndrome d' *T79.5*

Écrite ¬ Trouble de l'acquisition de l'expression *F81.8*

Écriture ¬ Faible niveau de lecture et d' *Z55*

Écrivain ¬ Névrose: professionnelle, y compris crampe de l' *F48.8*

Ectasie
- Auricule
- - Droite ¬ *Q20.8*
- - Gauche ¬ *Q20.8*
- Canaliculaire précalicielle ¬ *Q61.5*
- Canaux galactophores ¬ *N60.4*
- Cornée ¬ *H18.7*

Ectodermique
v.a. cranio-ectodermique
- 1 ¬ Syndrome de syndactylie-dysplasie *Q82.8*
- 2 ¬ Syndrome de syndactylie-dysplasie *Q82.8*
- Anhidrotique
- - Immunodéficience ¬ Dysplasie *Q82.4*
- - Liée à l'X ¬ Dysplasie *Q82.4*
- - ¬ Dysplasie *Q82.4*
- Cécité ¬ Syndrome de dysplasie *Q87.8*
- Congénitale ¬ Aplasie *Q84.8*
- Déficience intellectuelle-malformation du système nerveux central ¬ Syndrome de dysplasie *Q87.8*

Ectodermique *–suite*
- Fente labiopalatine ¬ Syndrome de contractures-dysplasie *Q87.8*
- Hidrotique
- - Type
- - - Christianson-Fourie ¬ Dysplasie *Q82.8*
- - - Halal ¬ Dysplasie *Q82.8*
- - ¬ Dysplasie *Q82.8*
- Hypohidrotique
- - Liée à l'X ¬ Dysplasie *Q82.4*
- - ¬ Dysplasie *Q82.4*
- Trichoodonto-onychiale ¬ Dysplasie *Q82.8*
- Type Berlin ¬ Dysplasie *Q82.8*
- ¬
- - Dysplasie
- - - *Q82.4*
- - - Chondro- *Q77.6*
- - Syndrome
- - - Ataxie cérébelleuse-dysplasie *G11.1*
- - - Retard de développement-ostéopénie-anomalies *Q87.8*

Ectopia cordis ¬ *Q24.8*

Ectopie
- Anus ¬ *Q43.5*
- Cristallin et mégalocornée ¬ Glaucome secondaire à une sphérophakie/ *Q15.8*
- Testiculaire unilatérale ou bilatérale ¬ *Q53.0*
- Thyroïdienne ¬ *E03.1*
- Tissu du sein ¬ *Q83.88*
- Uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*
- Vésicale ¬ *Q64.1*

Ectopique
- ACTH
- - Hormone adrénocorticotrope] ¬ Syndrome de Cushing dû à la production *E24.3*
- - ¬ Syndrome
- - - Cushingoïde de sécrétion *E24.3*
- - - Sécrétion *E24.3*
- Intrapulmonaire (congénital) ¬ Tissu *Q33.5*
- Non classée ailleurs ¬ Sécrétion hormonale *E34.2*
- Siège de la tumeur] ¬ Testicule: *C62.0*
- ¬
- - Rein *Q63.2*
- - Tachycardie jonctionnelle *I47.1*
- - Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens *E05.3*
- - Trouble du rythme (du): *I49.8*

Ectrodactylie ¬
- *Q73.8*
- Syndrome de tibia aplastique- *Q73.8*

Ectromélie SAI d'un (des) membre(s) SAI ¬ *Q73.8*

Ectropion
- Col de l'utérus ¬ Érosion et *N86*
- Congénital
- - Isolé ¬ *Q10.1*

Ectropion *–suite*
- Congénital *–suite*
- - ¬ *Q10.1*
- Palpébral ¬ *H02.1*
- Uvéal congénital ¬ *Q10.1*
- ¬
- - Cervicite avec ou sans érosion ou *N72*
- - Endocervicite avec ou sans érosion ou *N72*
- - Exocervicite avec ou sans érosion ou *N72*

Eczéma
- Allergique contact
- - SAI ¬ *L23.9*
- - ¬ *L23*
- Bactérien ¬ *L30.3*
- Contact
- - Professionnel) SAI ¬ *L25.9*
- - Sans précision ¬ *L25*
- Frottement ¬ *L30.4*
- Goutteux ¬ *M10.99†, L99.8**
- Herpétique ¬ *B00.0*
- Infantile (aigu) (chronique) ¬ *L20.8*
- Intrinsèque (allergique) ¬ *L20.8*
- Irritant contact
- - SAI ¬ *L24.9*
- - ¬ *L24*
- Irritation ¬ *L30.4*
- Marginé de Hebra [Jock itch] ¬ *B35.6*
- Plis de flexion NCA ¬ *L20.8*
- SAI ¬ *L30.9*
- Séborrhéique ¬ *L21*
- Surinfecté ¬ *L30.3*
- ¬ Déficit immunitaire avec thrombocytopénie et *D82.0*

Eczémateuse de la paupière ¬ Dermite: *H01.1*

Eczématide ¬ *L30.2*

Eczématoïde
- Déshydratation ¬ Dermite *L30.8*
- Infectieuse ¬ Dermite *L30.3*
- ¬
- - Dermite *L30.3*
- - Otite aiguë externe: *H60.5*

Édentée
- Associées à un traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la crête alvéolaire *K06.2*
- Prothèse) ¬ Hyperplasie par irritation de la crête *K06.2*
- Sans précision ¬ Affection de la gencive et de la crête alvéolaire *K06.9*
- ¬
- - Affection
- - - Gencive et de la crête alvéolaire *K06*
- - - Précisées de la gencive et de la crête alvéolaire *K06.8*
- - Atrophie de la crête alvéolaire *K08.2*

Édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, *D68.35*

EDS type

- Kosho ¬ *Q79.6*
- Progéroïde ¬ *Q79.6*

EDSS1 ¬ *Q82.8*

EDSS2 ¬ *Q82.8*

Éducation

- Alphabétisation ¬ Difficultés liées à l' *Z55*
- Institution ¬ Séjour et *Z62*
- Vision [orthoptique] ¬ *Z50.6!*
- ¬
- - Difficultés liées à l' *Z62*
- - Pression parentale inappropriée et autres défauts de l' *Z62*

Éducative ¬ Mauvaise adaptation *Z55*

Edwards

- Sans précision ¬ Syndrome d' *Q91.3*
- Syndrome de Patau ¬ Syndrome d' *Q91*

EEG] ¬ Electro-encéphalogramme anormal [*R94.0*

EEM ¬ Syndrome *Q87.8*

Effondrement d'un bâtiment en feu ¬ *X59.9!*

Effort

- Distance marche 200 m
- - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l' *I70.21*
- - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l' *I70.22*
- Important ¬ Insuffisance cardiaque
- - Droit
- - - Primaire avec symptôme en cas d' *I50.00, I50.03!*
- - - Symptôme en cas d' *I50.01, I50.03!*
- - Gauche: Avec symptôme en cas d' *I50.12*
- Incontinence de stress] ¬ Incontinence urinaire d' *N39.3*
- Intensif ¬ Épuisement dû à un *T73.3*
- Léger ¬ Insuffisance cardiaque
- - Droit
- - - Primaire avec symptôme en cas d' *I50.00, I50.04!*
- - - Symptôme en cas d' *I50.01, I50.04!*
- - Gauche: Avec symptôme en cas d' *I50.13*
- Spontanément réductible
- - Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l' *K64.2*
- - ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l' *K64.1*
- Type suédois ¬ Myopathie avec intolérance à l' *G71.3*
- ¬
- - Angine

Effort *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Angine *–suite*
- - - *I20.8*
- - - Aggravée à l' *I20.0*
- - - Novo à l' *I20.0*
- - Dyskinésie paroxystique induite par l' *G24.8*
- - Hémoglobinurie (de): *D59.6*
- - Hyperinsulinisme induit par l' *E16.1*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique induite par l' *E16.1*
- - Myopathie mitochondriale autosomique dominante avec intolérance à l' *G71.3*

Effusion

- Chorioïdienne ¬ *H31.4*
- Primaire ¬ Lymphome à cellules B à *C83.8*
- Uvéale idiopathique ¬ Syndrome d' *H33.2*

Égodystonique ¬ Orientation sexuelle *F66.1*

EH ¬ *D58.1*

Ehlers-Danlos

- Hétérotopie périventriculaire ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Hypermobile ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Lié à l'X ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Type
- - Arthrogryposique ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Cardiaque valvulaire ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Cyphoscoliose avec problèmes d'ouïe ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Cyphoscoliotique ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Dermatosparaxis ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Kosho ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Musculo-contractural ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Progéroïde ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Vasculaire ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- ¬ Syndrome d' *Q79.6*

Ehrlichia sennetsu] ¬ Rickettsiose à Neorickettsia sennetsu [*A79.8*

Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, *B96.3!*

Eisenmenger ¬

- Malformation cardiaque congénitale d' *Q21.88*
- Syndrome d' *I27.8*

Ejaculation précoce ¬ *F52.4*

El Tor ¬

- A Vibrio cholerae 01, biovar *A00.1*
- Choléra *A00.1*

Élaboration et de la perception auditive ¬ Trouble de l' *F80.20*

Elargissement de la tache aveugle ¬ *H53.4*

Elastodermie ¬ *L98.8*

Elastofibrome dorsal ¬ *D21.6*

Elastolyse

- Derme moyen ¬ *L90.8*
- Dermique papillaire, type pseudoxanthome élastique ¬ *L90.8*

Elastome

- Perforant serpigineux ¬ *L87.2*
- ¬ *Q82.8*

Elastose

- Focale linéaire ¬ *L94.8*
- Sénile ¬ *L57.4*

Elbow ¬ Tennis *M77.1*

Électif ¬ Mutisme *F94.0*

Électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique ¬ Sternum laissé *M96.80*

Électrique

- Pendant le sommeil lent] ¬ ESES [état de mal épileptique *G40.01*
- Sans pouls, non classée ailleurs ¬ Activité *R00.3*
- ¬
- - Accident dû au courant *W87.9!*
- - Brûlure due au courant *W87.9!*
- - Choc dû au courant *T75.4*
- - Effets du courant *T75.4*
- - Exposition à du courant *W87!*

Électro

- Encéphalogramme anormal [EEG] ¬ *R94.0*
- Oculogramme [EOG] ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Électrocardiogramme [ECG] ¬ Anomalies (de): *R94.3*

Électrocardiographiques ¬ Signes de détresse fœtale: *O68.8*

Electrocution ¬

- *T75.4*
- *W87.9!*

Électrode ¬ Lésion due à la présence d'une *P12.4*

Électrolytique

- Acido-basiques ¬ Autres déséquilibres hydro- *E87*
- Calorique et hydrique ¬ Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre *T50.3*
- Métaboliques transitoires du nouveau-né ¬ Autres anomalies *P74*
- Non classés ailleurs ¬ Autres déséquilibres hydro- *E87.8*
- SAI ¬ Déséquilibre *E87.8*
- Transitoires du nouveau-né ¬ Autres anomalies *P74.4*
- ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: déséquilibre *O21.1*

Électromyogramme [EMG] ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Électrons carence

- Flavoprotéine ¬ Trouble du transport d' *E71.3*
- Flavoprotéine-ubiquinone oxydoréductase ¬ Trouble du transport d' *E71.3*

Électrophysiologiques intracardiaques ¬ Anomalies (de): épreuves *R94.3*

Électrorétinogramme [ERG] ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Élément
- Douloureux ¬ Syndrome du membre fantôme sans *G54.7*
- Nutritionnel
- - Précisés ¬ Carence en autres *E61.8*
- - Sans précision ¬ Carence en *E61.9*
- - ¬ carence
- - - *E61*
- - - Plusieurs *E61.7*
- ¬ Épuisement dû aux *T73.2*

Eléphantiasis
- Bancroftien ¬ *B74.0*
- Mastectomie ¬ *I97.22*
- Membre
- - Inférieur ¬ *I89.02*
- - Supérieur ¬ *I89.02*
- Scrotum ¬ *I89.05†, N51.8**
- Testicule ¬ *I89.05*

Élévation
- Enzymes hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome associant une hémolyse, une *O14.2*
- Pression intracrânienne ¬ *G93.2*
- Segment ST [NSTEMI] SAI ¬ Infarctus sans *I21.4*
- Tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension ¬ Constatation d'une *R03.0*

Elevatum diutinum ¬ Erythema *L95.1*

Élèves ¬ Difficultés avec les enseignants et les autres *Z55*

Éleveurs
- Perruches ¬ Maladie ou poumon des *J67.2*
- Pigeons ¬ Maladie ou poumon des *J67.2*

Élimination transépidermique
- Sans précision ¬ Anomalie de l' *L87.9*
- ¬ anomalie
- - *L87*
- - *L87.8*

Elliptocytose
- Congénitale) ¬ *D58.1*
- Héréditaire ¬ *D58.1*

Ellison ¬ Syndrome de Zollinger- *E16.4*

Ellis-van Creveld ¬ Syndrome d' *Q77.6*

Ellis-Yale-Winter ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Elschnig ¬ Syndrome d' *Q87.0*

Émaciation (slim disease) ¬ *B22*

Emacroorchidie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-macrocéphalie- *Q87.8*

EMAD] ¬ Encéphalomyélite aiguë disséminée [*G37.8*

Émail
- Irradié ¬ *K03.8*
- Néonatale) (post-natale) (prénatale) ¬ Hypoplasie de l' *K00.4*
- Non associées à la fluorose ¬ Taches de l' *K00.3*
- Tacheté ¬ *K00.3*
- ¬ Carie limitée à l' *K02.0*

Émanation
- Fumée gaz
- - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des *J68.2*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents chimiques, des *J68.9*
- - ¬
- - - Affection respiratoire
- - - - Agents chimiques, des *J68.8*
- - - - Aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des *J68.3*
- - - - Chroniques dues à des agents chimiques, des *J68.4*
- - - - Inhalation d'agents chimiques, d' *J68*
- - - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d' *J68.4*
- - - Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des *J68.0*
- - - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d' *J68.4*
- - - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d' *J68.4*
- - - Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des *J68.1*
- Gaz fumée
- - Précisés ¬ Effet toxique: Autres *T59.8*
- - Sans précision ¬ Effet toxique: *T59.9*
- - ¬ Effets toxiques d'autres *T59*

Emanuel ¬ Syndrome d' *Q92.6*

EMARDD ¬ *G71.2*

Embauche ¬ Examen avant *Z02*

Embolie
v.a. thromboembolie
- Amniotique ¬ *O88.1*
- Artère
- - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus cérébral ¬ *I65*
- - Cérébral
- - - Moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I66*
- - - ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.4*
- - Précérébrales ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.1*
- - Rénale ¬ *N28.0*
- Artérielle périphérique ¬ *I74.4*
- Caillot sanguin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.2*
- Coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*
- Gazeux
- - Consécutif
- - - Acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA ¬ *T81.7*
- - - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ *T80.0*
- - Obstétricale ¬ *O88.0*

Embolie *–suite*
- Gazeux *–suite*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - Traumatique) ¬ *T79.0*
- Graisseux
- - Obstétricale ¬ *O88.8*
- - Traumatique) ¬ *T79.1*
- Grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité ¬ *O88*
- Liquide amniotique survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Mésentérique (artère) (veine) ¬ *K55.0*
- Obstétrical
- - Caillot sanguin ¬
- - - *O88.2*
- - - *O88.28*
- - SAI ¬ *O88.28*
- - ¬
- - - *O88*
- - - *O88.8*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Puerpérale SAI ¬ *O88.28*
- Pulmonaire
- - Cours de la puerpéralité ¬ *O88.20*
- - Fulminante ¬ *I26.0*
- - Massive ¬ *I26.0*
- - Mention de cœur pulmonaire aigu ¬ *I26.0*
- - Non massive ¬ *I26.9*
- - Obstétricale ¬ *O88.20*
- - Postopératoire ¬ *I26*
- - SAI ¬ *I26.9*
- - Sans mention de cœur pulmonaire aigu ¬ *I26.9*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - ¬ *I26*
- Pyohémique
- - Septique, obstétricale ¬ *O88.3*
- - Staphylocoques ¬ *A41.2*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Rénale massive unilatérale ¬ *N28.0*
- Rétinienne ¬ Micro- *H34.2*
- SAI survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Savon survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Septique
- - Septicopyohémique survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - Sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Thrombose
- - Aorte abdominale ¬ *I74.0*
- - Artère
- - - Distales, sans précision ¬ *I74.4*

Embolie *–suite*
- Thrombose *–suite*
- - Artère *–suite*
- - - Iliaque ¬ *I74.5*
- - - Membre
- - - - Inférieurs ¬ *I74.3*
- - - - Supérieurs ¬ *I74.2*
- - - Non précisées ¬ *I74.9*
- - - ¬ *I74.8*
- - Artérielles ¬ *I74*
- - Membre inférieur SAI ¬ *I80.3*
- - Parties de l'aorte, autres et non précisées ¬ *I74.1*
- - Veine
- - - Cave ¬ *I82.2*
- - - Jugulaire ¬ *I82.81*
- - - Non précisée ¬ *I82.9*
- - - Précisées ¬ *I82.88*
- - - Rénale ¬ *I82.3*
- - - Splénique ¬ *I82.80*
- - Veineuses ¬ Autres *I82*
- Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus cérébral par *I63.1*
- Veineuse SAI ¬ *I82.9*
- ¬ échec tentative avortement
- - Médical, compliqué d'une *O07.2*
- - Sans précision, compliqués d'une *O07.7*

Embolique
- Cérébelleux ¬ Abcès (*G06.0*
- Cérébral ¬ Abcès (*G06.0*
- Cerveau [toute région] ¬ Abcès (*G06.0*
- Moelle épinière [toute localisation] ¬ Abcès (*G06.1*
- Non embolique) ¬ Infarctus aigu de la moelle épinière (*G95.18*
- Otogène ¬ Abcès (*G06.0*
- Tant événement cours ¬
- - Hémiplégie *I63.4, G81.9*
- - Monoplégie *I63.4, G83.3*
- - Tétraplégie *I63.4, G82.52*
- ¬
- - Infarctus
- - - *I74*
- - - Aigu de la moelle épinière (embolique) (non *G95.18*
- - Occlusion: *I74*
- - Pneumonie *I26.9†, J17.8**

Embouchure du nez ¬ Kyste de l' *K09.1*

Embrasement thérapeutique (flare phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ Phénomène d' *T88.7*

Embryofœtopathie
- Aminoptérine ¬ *Q86.88*
- Anti-vitamine K ¬ *Q86.2*
- Carbamazépine ¬ *Q86.88*
- Cocaïne ¬ *Q86.88*
- Indométacine ¬ *Q86.88*

Embryofœtopathie *–suite*
- Isotrétinoïne ¬ *Q86.88*
- Méthimazole ¬ *Q86.88*
- Phénylhydantoïne ¬ *Q86.1*
- Rubéolique ¬ *P35.0*

Embryon
- Transfert d'embryon ¬ Complications de tentative d'implantation d'un *N98.3*
- ¬ Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d' *N98.3*

Embryonnaire
- Col de l'utérus ¬ Kyste *Q51.6*
- Indifférencié du foie ¬ Sarcome *C22.4*
- Ligament large ¬ Kyste *Q50.5*
- Trompe de Fallope ¬ Kyste *Q50.4*
- Vaginal ¬ Kyste (du): *Q52.4*
- ¬ Carcinome *C80.9*

Embryopathie
- Anti-épileptiques ¬ *Q86.1*
- Cause externe, n.c.a. ¬ *Q86.88*
- Coumarines ¬ *Q86.2*
- Diabétique ¬ *P70.1*
- Mycophénolate mofétil ¬ *Q86.88*
- Parvovirus ¬ *P35.8*
- Phénobarbital ¬ *Q86.88*
- Phénylcétonurique ¬ *E70.1*
- Rétinoïdes ¬ *Q86.88*
- Thalidomide ¬ *Q86.80*
- Toluène ¬ *Q86.88*
- Triméthadione ¬ *Q86.88*
- Valproate ¬ *Q86.88*

Émérinopathie ¬ *G71.0*

Emery-Dreifuss
- Autosomique
- - Dominante ¬ Dystrophie musculaire d' *G71.0*
- - Récessive ¬ Dystrophie musculaire d' *G71.0*
- Liée à l'X ¬ Dystrophie musculaire d' *G71.0*
- ¬ Dystrophie musculaire: scapulo-péronière: bénigne avec contractures précoces [*G71.0*

Emery-Nelson ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Emétiques ¬ Intoxication: *T47.7*

EMG] ¬ Anomalies (de): électromyogramme [*R94.1*

Émission de méconium ¬ *P20*

Emollients, calmants et protecteurs ¬ Intoxication: *T49.3*

Émotionnel
- Apparaissant
- - Habituellement enfance adolescence
- - - Sans précision ¬ Trouble du comportement et trouble *F98.9*
- - - ¬ trouble
- - - - Comportement et troubles *F98*
- - - - Précisés du comportement et troubles *F98.88*

Émotionnel *–suite*
- Apparaissant *–suite*
- - Spécifiquement dans l'enfance ¬ Troubles *F93*
- Enfance
- - Sans précision ¬ Trouble *F93.9*
- - ¬ Autres troubles *F93.8*
- F93.- ¬ Troubles des conduites en F91.- associés à un trouble: *F92.8*
- Organique ¬ Labilité [asthénie] *F06.6*
- Sans précision ¬ Trouble mixte des conduites et troubles *F92.9*
- Sommeil SAI ¬ Trouble *F51.9*
- Tension, sans précision ¬ État de choc *R45.7*
- ¬ Autres troubles mixtes des conduites et troubles *F92.8*

Émotionnellement labile
- Type
- - Borderline ¬ Personnalité *F60.31*
- - Impulsif ¬ Personnalité *F60.30*
- ¬ Personnalité *F60.3*

Émotive ¬ Polycythémie: *D75.1*

Emphysémateuse
- Aiguë) sans calcul ¬ Cholécystite: *K81.0*
- Chronique ¬ bronchite: *J44*
- SAI chronique ¬ Bronchite: *J44.8*

Emphysème
- Centro-lobulaire ¬ *J43.2*
- Chronique ¬ bronchite: avec *J44*
- Compensateur ¬ *J98.3*
- Diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ *J68.4*
- Interstitiel
- - Affections apparentées survenant pendant la période périnatale ¬ *P25*
- - Survenant pendant période périnatal ¬
- - - *P25.0*
- - - Affections apparentées à l' *P25.8*
- - ¬ *J98.2*
- Lobaire congénital ¬ *Q33.8*
- Médiastinal ¬ *J98.2*
- Panacinaire ¬ *J43.1*
- Panlobulaire ¬ *J43.1*
- Pulmonaire
- - Bulleux ¬ *J43.9*
- - SAI ¬ *J43.9*
- - Vésiculaire ¬ *J43.9*
- - ¬ Bulle d' *J43.9*
- Sans précision ¬ *J43.9*
- Sous-cutané
- - Origine traumatique ¬ *T79.7*
- - Résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.8*
- Unilatéral ¬ *J43.0*
- ¬

Emphysème *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *J43*
- - *J43.8*

Empiétant sur plusieurs organe pelvien cloison
- Recto-vaginale ¬ Localisation *C76.3*
- Recto-vésicale ¬ Localisation *C76.3*

Empiètement
- Articulation talo-crurale ¬ Syndrome d' *M24.87*
- Épaule ¬ Syndrome d' *M75.4*

Emploi
- Chômage ¬ Difficultés liées à l' *Z56*
- ¬
- - Changement d' *Z56*
- - Menace de perte d' *Z56*

Empoisonnement
- Accidentel
- - Exposition
- - - Alcool ¬ *X49.9!*
- - - Carburant halogéné ¬ *X49.9!*
- - - Liquide corrosif ¬ *X49.9!*
- - - Médicament, drogues et autres substances biologiques actives ¬ *X49.9!*
- - - Pesticides ¬ *X49.9!*
- - - Solvant organique ¬ *X49.9!*
- - - Substances nocives ¬ *X49!*
- - ¬ *X49.9!*
- Lésion auto-infligé(e) délibéré(e) ¬ *X84.9!*

Empreinte
- Digitales ¬ Myopathie à *G71.2*
- Région 11p15 ¬ Syndrome
- - Beckwith-Wiedemann dû à un défaut d' *Q87.3*
- - Silver-Russell dû à un défaut d' *Q87.1*

Emprisonnement
- Formes de privation de liberté ¬ *Z65*
- Procès civil ou pénal ¬ Condamnation, sans *Z65*

Empyème
- Aigu(ë), d'un sinus de la face ¬ *J01*
- Articulation de l'épaule ¬ *M00.97*
- Chronique) d'un sinus (de la face) ¬ *J32*
- Mastoïde ¬ *H70.0*
- Pleural (chronique), SAI ¬ *J86.9*
- Tuberculeux
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.6*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.5*
- Vésicule biliaire sans calcul ¬ *K81.0*
- ¬ *J86*

Enamélome ¬ *K00.2*

Enanthème viral SAI ¬ *B09*

Encéphale
- Infratentoriel ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D33.1*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.1*
- Partie système nerveux central ¬ Tumeur
- - Bénigne de l' *D33*
- - Maligne: Lésion à localisations contiguës de l' *C72.8*
- Sans précision ¬
- - Malformation congénitale de l' *Q04.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D33.2*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.2*
- - - Maligne: *C71.9*
- Sauf lobes et ventricules ¬ Tumeur maligne: *C71.0*
- Supratentoriel ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D33.0*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.0*
- Système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l' *D43*
- ¬
- - Absence d'une partie de l' *Q04.3*
- - Agénésie d'une partie de l' *Q04.3*
- - Anomalies localisées du développement de l' *Q04.3*
- - Aplasie d'une partie de l' *Q04.3*
- - Congénital
- - - Anomalie
- - - - Multiples SAI de l' *Q04.9*
- - - - SAI de l' *Q04.9*
- - - Maladie ou lésion SAI de l' *Q04.9*
- - Hypoplasie d'une partie de l' *Q04.3*
- - Malformation congénital
- - - *Q04*
- - - Précisées de l' *Q04.8*
- - Micro- *Q02*
- - Tuberculose de l' *A17.8†, G07**
- - Tumeur malign
- - - *C71*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*

Encéphalique ¬ Démence *G04.9†, F02.8**

Encéphalite
v.a. Chorio-encéphalite
v.a. Leucoencéphalite
v.a. méningo-encéphalite
v.a. Méningo-encéphalite
- Adénovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Aiguë disséminée ¬ *G04.0*
- Australienne ¬ *A83.4*
- Californie ¬ *A83.5*
- Congénitale à toxoplasmose ¬ *P37.1†, G05.2**
- Cours
- - Actinomycose ¬ *A42.8†, G05.0**
- - Cryptococcose ¬ *B45.1†, G05.2**
- - Herpès zoster ¬ *B02.0†, G05.1**

Encéphalite *–suite*
- Cours *–suite*
- - Listériose ¬ *A32.1†, G05.0**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, G05.8**
- - Maladie parasitaire NCA ¬ *B89†, G05.2**
- - Nægleriase ¬ *B60.2†, G05.2**
- - Syphilis
- - - Congénitale ¬ *A50.4†, G05.0**
- - - Tardive ¬ *A52.1†, G05.0**
- - Torulose ¬ *B45.1†, G05.2**
- - Trichinose ¬ *B75†, G05.2**
- - Tuberculose ¬ *A17.8†, G05.0**
- Crosse ¬ *A83.5*
- Cryptocoques ¬ *B45.1†, G05.2**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**
- Dawson ¬ *A81.1*
- Encéphalomyélite post-infectieuses SAI ¬ *G04.8*
- Entérovirus ¬ *A85.0†, G05.1**
- Équin
- - Occidentale ¬ *A83.1*
- - Orientale ¬ *A83.2*
- Europe centrale transmise par des tiques ¬ *A84.1*
- Grippale [Influenza] ¬ *J11.8†, G05.1**
- Japonaise
- - Type B ¬ *A83.0*
- - ¬ *A83.0*
- Léthargique ¬ *A85.8†, G05.1**
- Limbique
- - Aiguë après transplantation ¬ *T85.78†, G05.1**
- - Neuromyotonie-hyperhidrose-polyneuropathie ¬ Syndrome d' *G60.8*
- Lors grippe Influenza virus grippe saisonnier identifié
- - Exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ *J10.8†, G05.1**
- - ¬ *J10.8†, G05.1**
- Lymphocytaire ¬ *A87.2†, G05.1**
- Méningocoques ¬ *A39.8†, G05.0**
- Métapneumovirus humain ¬ *A85.8†, G05.1**
- Murray Valley ¬ *A83.4*
- Myélite encéphalomyélite
- - Cours
- - - Affection classé ¬
- - - - *G05**
- - - - *G05.8**
- - - Infection
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *G05.0**
- - - - Virales classées ailleurs ¬ *G05.1**
- - - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *G05.2**
- - Sans précision ¬ *G04.9*
- - ¬
- - - *G04*

Encéphalite *–suite*
- Myélite encéphalomyélite *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - *G04.8*
- Oreillons ¬ *B26.2†, G05.1**
- Otogène disséminée pNCA ¬ *H66.4†, G05.8**
- Périaxiale ¬ *G37.0*
- Plomb ¬ *T56.0†, G05.8**
- Post-morbilleuse ¬ *B05.0†*
- Post-vaccinale ¬ *G04.0*
- Post-varicelleuse ¬ *B01.1†*
- Rasmussen ¬ *G04.8*
- Rio Bravo ¬ *A85.8†, G05.1**
- Rubéole ¬ *B06.0†, G05.1**
- Saint-Louis ¬ *A83.3*
- Subaiguë à inclusions de Dawson ¬ *A81.1*
- Syphilitique
- - Congénitale tardive ¬ *A50.4†, G05.0**
- - Tardive ¬ *A52.1†, G05.0**
- - ¬ *A52.1†, G05.0**
- Taïga [encéphalite verno-estivale russe] ¬ *A84.0*
- Tiques ¬ *A84.9*
- Trauma chronique ¬ *F07.2*
- Varicelleuse ¬ *B01.1†, G05.1**
- Verno estival
- - Europe centrale (FSME) ¬ *A84.1*
- - Russe] ¬ Encéphalite de la taïga [*A84.0*
- Viral
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *A85*
- - Précisées ¬ Autres *A85.8*
- - Sans précision ¬ *A86*
- - Transmis
- - - Arthropodes
- - - - Sans précision ¬ *A85.2*
- - - - ¬ Nécessité d'une vaccination contre l' *Z24.1*
- - - Moustiques
- - - - Sans précision ¬ *A83.9*
- - - - ¬
- - - - - *A83*
- - - - - *A83.8*
- - - Tiques
- - - - Sans précision ¬ *A84.9*
- - - - ¬
- - - - - *A84*
- - - - - *A84.8*
- - ¬ Séquelles d' *B94.1*
- Virus
- - Grippe aviaire
- - - Identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, G05.1**
- - Herpès ¬ *B00.4†, G05.1**
- - Herpes simiae ¬ *B00.4†, G05.1**

Encéphalite *–suite*
- Virus *–suite*
- - Mengo ¬ *A85.8†, G05.1**
- - Poliomyélite ¬ *A80.9†, G05.1**
- Zostérienne ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬
- - Grippe [Influenza] avec *J11.8†, G05.1**
- - Maladie due au VIH avec *B22†, G05.1**
- - Rougeole avec *B05.0†, G05.1**

Encephalitis saturnina ¬ *T56.0†, G05.8**

Encéphalocèle
- Acquis ¬ *G93.5*
- Frontale ¬ *Q01.0*
- Isolée ¬ *Q01.9*
- Localisations ¬ *Q01.8*
- Naso-frontale ¬ *Q01.1*
- Occipitale ¬ *Q01.2*
- Sans précision ¬ *Q01.9*
- ¬
- - *Q01*
- - Hydro- *Q01*

Encéphalo-crâniocutanée ¬ Lipomatose *E88.29*

Encéphalofaciale ¬ Angiomatose *Q85.8*

Encéphalogramme anormal [EEG] ¬ Electro- *R94.0*

Encéphalomyélite
v.a. Polio-encéphalomyélite
- Adénovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Aiguë disséminée [EMAD] ¬ *G37.8*
- Cours
- - Affection classé ¬ Encéphalite myélite
- - - *G05**
- - - *G05.8**
- - Infection
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.0**
- - - Virales classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.1**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.2**
- - Nægleriase ¬ *B60.2†, G05.2**
- - Rougeole ¬ *B05.0†, G05.1**
- - Rubéole ¬ *B06.0†, G05.1**
- - Syphilis
- - - Congénitale ¬ *A50.4†, G05.0**
- - - Tardive ¬ *A52.1†, G05.0**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.2†, G05.2**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**
- Entérovirus ¬ *A85.0†, G05.1**
- Herpès simien type 1 (Virus B) ¬ *B00.4†*
- Myalgique ¬ *G93.3*
- Oreillons ¬ *B26.2†, G05.1**
- Ovine [louping ill] ¬ *A84.8*
- Post-infectieuses SAI ¬ Encéphalite et *G04.8*
- Précisée virale NCA ¬ *A85*

Encéphalomyélite *–suite*
- Sans précision ¬ Encéphalite, myélite et *G04.9*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G05.0**
- Varicelleuse ¬
- - *B01.1†*
- - *B01.1†, G05.1**
- Virus
- - Herpes simiae ¬ *B00.4†, G05.1**
- - SAI ¬ *A86*
- Zona ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬
- - Encéphalite myélite
- - - *G04*
- - - *G04.8*
- - Maladie due au VIH avec *B22†, G05.1**

Encéphalomyélocèle ¬ *Q01*

Encéphalomyélopathie
- Nécrosante subaiguë [syndrome de Leigh] ¬ *G31.88*
- Post-vaccinale ¬ *G04.0*

Encéphalomyopathie mitochondrial
- Neuro-gastro-intestinale ¬ *G31.81*
- Sévère liée à l'X ¬ *G31.81*

Encéphalomyopathique avec tubulopathie rénale ¬ Déplétion de l'ADN mitochondrial, forme *G31.81†, N16.8**

Encéphalopathie
v.a. Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes
v.a. Polio-encéphalopathie
- Acidose lactique
- - Épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec *G31.81*
- - Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, *G31.81*
- Alcoolique ¬ *G31.2*
- Anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ *P91.6*
- Artérioscléreuse sous-corticale ¬ *I67.3*
- Cardiomyopathie hypertrophique-néphropathie tubulaire ¬ Syndrome d' *E88.8*
- Coma hypoglycémique ¬ *E16.1†, G94.3**
- Cours
- - Carence vitamine
- - - B NCA ¬ *E53.9†, G32.8**
- - - ¬ *E56.9†, G32.8**
- - Lupus érythémateux ¬ *M32.1†, G05.8**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *G94.3**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G13.1**
- Déficit
- - Prosaposine ¬ *E75.2*
- - Sulfite oxydase ¬ *E72.1*
- - Urocanase ¬ *E70.8*
- Dialytique ¬ *N18.5†, G94.8**
- Épileptique
- - Associée à KCNQ2 ¬ *G40.4*

Encéphalopathie *–suite*
- Épileptique *–suite*
- - Infantile précoce ¬ *G40.3*
- - Néonatale associée à PNPO ¬ *G40.8*
- Éthylmalonique ¬ *G31.81*
- Glycinique ¬ *E72.5*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.8*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- Hépatique
- - Coma hépatique ¬ *K72.7!*
- - Degré
- - - 1 ¬ *K72.71!*
- - - 2 ¬ *K72.72!*
- - - 3 ¬ *K72.73!*
- - - 4 ¬ *K72.74!*
- - - Non précisé ¬ *K72.79!*
- - SAI ¬ *K72*
- - ¬ *K72.9, K72.79!*
- Hyperinsulinisme ¬ *E16.1†, G94.3**
- Hypertensive ¬ *I67.4*
- Limbique paranéoplasique ¬ *D48.9†, G13.1**
- Lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ *J10.8†, G94.3**
- Myoclonique précoce
- - Suppression-bursts"" ¬ *G40.4*
- - Symptomatique) ¬ *G40.4*
- Non-progressives ¬ Épilepsie myoclonique des *G40.4*
- Pellagreuse ¬ *E52†, G32.8**
- Porto-cave ¬ *K72.9, K72.79!*
- Postérieure réversible ¬ Syndrome d' *G93.6*
- Post-hypoglycémique ¬ *E16.1†, G94.3**
- Post-radiothérapie ¬ *G93.88*
- Post-radique ¬ *G93.88, W91.9!*
- Progressive avec leucodystrophie par déficit en DECR ¬ *G31.81*
- Sans précision ¬ *G93.4*
- Sensible aux stéroïdes associée à une thyroïdite auto-immune ¬ *G04.8, E06.3*
- Spongieuse subaiguë ¬ *A81.0*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G94.3**
- Toxique ¬ *G92*
- Urémique ¬ *N18.89†, G94.3**
- Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, G94.3**
- Wernicke ¬ *E51.2†, G32.8**
- ¬
- - *B22*
- - Démence au cours d' *G93.4†, F02.8**
- - Grippe [Influenza] avec *J11.8†, G94.3**
- - Maladie due au VIH avec *B22†, G94.3**
- - Syndrome: post-contusionnel (*F07.2*

Encéphalotrigéminée ¬ Angiomatose *Q85.8*

Enchevêtrement cordon
- Jumeaux dans un sac amniotique unique ¬ *O69.2*
- Sans compression ¬ *O69.8*
- ¬ Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d' *O69.2*

Enchondromatose ¬ *Q78.4*

Enclavées
- Position anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ Dents incluses ou *K07.3*
- ¬ dent
- - *K01.1*
- - Incluses et *K01*

Encoprésie
- Fonctionnelle ¬ *F98.1*
- Non organique ¬ *F98.1*
- Psychogène ¬ *F98.1*
- SAI ¬ *R15*

Endartérite
- Cérébrale syphilitique ¬ *A52.0†, I68.1**
- Déformante ou oblitérante ¬ *I70*
- SAI ¬ *I77.6*
- Sénile ¬ *I70*
- Syphilitique
- - Cerveau ¬ *A52.0†, I68.1**
- - Congénitale ¬ *A50.5†, I79.8**
- - Oblitérante d'un vaisseau cérébral ¬ *A52.0†, I68.1**
- - ¬ *A52.0†, I79.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I79.8**

Endemica ¬ Panneuritis *E51.1†, G63.4**

Endémique
- Balkans ¬ Néphropathie *N15.0*
- Hypothyroïdien ¬ Crétinisme *E00.1*
- Lié carence iode
- - Sans précision ¬ Goitre (*E01.2*
- - ¬ Goitre
- - - Diffus (*E01.0*
- - - Multinodulaire (*E01.1*
- SAI ¬
- - Crétinisme *E00.9*
- - Goitre *E01.2*
- Tabardillo] ¬ Typhus murin [typhus mexicain, typhus *A75.9*
- Type
- - Mixte ¬ Crétinisme *E00.2*
- - Myxœdémateux ¬ Crétinisme *E00.1*
- - Neurologique ¬ Crétinisme *E00.0*
- ¬
- - Funiculite tuberculeuse *A18.1†, N51.8**
- - Névrite *E51.1†, G63.4**
- - Polynévrite *E51.1†, G63.4**
- - Syphilis *A65*
- - Typhus *A75.0*

Endo(myo)métrite ¬ *N71*

Endobrachyœsophage [œsophage de Barrett] ¬ *K22.7*

Endocarde
- Cours de syphilis ¬ Maladie de l' *A52.0†, I39.8**
- Gonocoques ¬ Maladie de l' *A54.8†, I39.8**
- Méningocoques ¬ Infection de l' *A39.5†, I39.8**
- ¬
- - *C79.84*
- - Gonorrhée de l' *A54.8†, I39.8**
- - Lipoïdose de l' *E75.6*
- - Tuberculose de l' *A18.8†, I39.8**

Endocardique ¬
- Adhérences *I38*
- Fibroélastose *I42.4*
- Malformation des replis *Q21.2*

Endocardite
- Aigu
- - Sans précision ¬ *I33.9*
- - Subaigu
- - - Bactérienne ¬ *I33.0*
- - - Infectieuse SAI ¬ *I33.0*
- - - Lente ¬ *I33.0*
- - - Maligne ¬ *I33.0*
- - - Septique ¬ *I33.0*
- - - Ulcéreuse ¬ *I33.0*
- - - ¬
- - - - *I33*
- - - - *I33.9*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, I39.8**
- Atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39**
- Bactérienne sub-aiguë ¬ Glomérulonéphrite au cours d' *I33.0†, N08.8**
- Candida ¬ *B37.6†, I39.8**
- Chronique
- - Rhumatismale ¬ *I09.1*
- - SAI ¬ *I38*
- Cours
- - Candidose ¬ *B37.6†, I39.8**
- - Fièvre Q ¬ *A78†, I39.8**
- - Lupus érythémateux ¬ *M32.1†, I39.8**
- Coxiella burnetii ¬ *A78†, I39.8**
- Entérocoques ¬ *I33.0, B95.2!*
- Éosinophiles ¬ *I42.3*
- Gonocoques ¬ *A54.8†, I39.8**
- Infectieux
- - Aiguë et subaiguë ¬ *I33.0*
- - ¬
- - - Arthrite au cours d' *I33.0†, M03.69**
- - - Arthropathie au cours d' *I33.0†, M03.69**
- Listeria ¬ *A32.8†, I39.8**
- Löffler ¬ *I42.3*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.30†, I39.8**

Endocardite *–suite*
- Méningocoques ¬ *A39.5†, I39.8**
- Pneumocoques ¬ *I33.0, B95.3!*
- Rhumatismal
- - Aiguë ¬ *I01.1*
- - Valvule non précisée ¬ *I09.1*
- Staphylocoque doré ¬ *I33.0, B95.6!*
- Streptocoques ¬ *I33.0, B95.5!*
- Syphilitique
- - Valve
- - - Aortique ¬ *A52.0†, I39.1**
- - - Pulmonaire ¬ *A52.0†, I39.3**
- - ¬ *A52.0†, I39.8**
- Tuberculeux
- - Valve
- - - Aortique ¬ *A18.8†, I39.1**
- - - Mitrale ¬ *A18.8†, I39.0**
- - - Pulmonaire ¬ *A18.8†, I39.3**
- - - Tricuspide ¬ *A18.8†, I39.2**
- - ¬ *A18.8†, I39.8**
- Typhoïde ¬ *A01.0†, I39.8**
- Valvule
- - Aortique à streptocoques ¬ *I33.0, B95.5!*
- - Non précis
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.8**
- - - ¬ *I38*
- Verruqueux
- - Atypique ¬ *M32.1†, I39.8**
- - Löffler ¬ *I42.3*
- - Non rhumatismale ¬ *M32.1†, I39.8**
- Virus Coxsackie ¬ *B33.2†, I39.8**
- ¬ Prophylaxie
- - *Z29.21*
- - Antibiotique de l' *Z29.21*

Endocervical ¬ Polype *N84.1*

Endocervicite avec ou sans érosion ou ectropion ¬ *N72*

Endocol ¬
- Carcinoma in situ: *D06.0*
- Tumeur maligne: *C53.0*

Endocrine
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies d'autres glandes *E35.8**
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des glandes *D44*
- Métabolisme ¬ Affections (des): glandes *Z13.8*
- Non précisées ¬ Tumeur bénigne des glandes *D35*
- Pancréas
- - Hypersécrétion de glucagon ¬ Hyperplasie des cellules *E16.3*
- - SAI ¬ Hyperplasie des cellules (des): *E16.9*
- Polypeptide
- - Intestinal vaso-actif ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*

Endocrine *–suite*
- Polypeptide *–suite*
- - Pancréatique ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- Précisées ¬ Tumeur bénigne: Autres glandes *D35.7*
- Releasing factor" de l'hormone de croissance ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- Sans précision ¬ Tumeur
- - Bénigne: Glande *D35.9*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Glande *D44.9*
- - Maligne: Glande *C75.9*
- Somatostatine ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- Structures apparentées ¬ Tumeur maligne d'autres glandes *C75*
- ¬
- - Carcinoma in situ: Thyroïde et autres glandes *D09.3*
- - Malformations congénitales des autres glandes *Q89.2*
- - Tuberculose des glandes *A18.8†, E35.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: Pancréas *D13.7*
- - - Maligne: Pancréas *C25.4*

Endocrinien
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies *E35**
- Ésotropie ¬ Maladie de Basedow avec orbitopathie *E05.0†, H06.3**
- Hypotropie ¬ Maladie de Basedow avec orbitopathie *E05.0†, H06.3**
- Métabolique
- - Acte médicaux
- - - Non classées ailleurs ¬ Anomalies *E89*
- - - Sans précision ¬ Anomalie *E89.9*
- - - ¬ Autres anomalies *E89.8*
- - ¬ Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies *G99.0**
- Multiple
- - Type
- - - 1 ¬ Néoplasie *D44.8*
- - - 2 ¬ Néoplasie *D44.8*
- - - 4 ¬ Néoplasie *D44.8*
- - ¬ Adénomatose
- - - *D44.8*
- Nutritionnel métabolique
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies *O99.2*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux d'autres maladies *Z83.4*
- - - - Personnels de maladies *Z86.3*
- - - Arthropathie au cours d'autres maladies *M14.5**
- - - Cataracte au cours d'autres maladies *H28.1**
- - - Glaucome au cours de maladies *H42.0**

Endocrinien *–suite*
- Nutritionnel métabolique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Glomérulopathie au cours de maladies *N08.4**
- Précisés ¬ Autres troubles *E34.8*
- Pseudoglaucome ¬ Orbitopathie *E05.0†, H06.2**
- Rétraction de paupière ¬ Maladie de Basedow avec orbitopathie *E05.0†, H06.3**
- SAI ¬ Trouble: *E34.9*
- Sans précision ¬ Anomalie *E34.9*
- Transitoire
- - Nouveau-né
- - - Sans précision ¬ Anomalie *P72.9*
- - - ¬ Autres anomalies *P72*
- - Précisées du nouveau-né ¬ Autres anomalies *P72.8*
- ¬
- - Arthrite au cours d'une affection *E34.9†, M14.59**
- - Arthropathie au cours d'une maladie *E34.9†, M14.59**
- - Cataracte au cours d'une maladie *E34.9†, H28.1**
- - Glaucome au cours d'une maladie *E34.9†, H42.0**
- - Hypertension secondaire à des atteintes *I15.2*
- - Maladie de Basedow avec orbitopathie *E05.0†, H06.3**
- - Myopathie
- - - *E34.9†, G73.5**
- - - Cours maladie
- - - - *E34.9†, G73.5**
- - - - *G73.5**
- - Neuropathie des nerfs périphériques autonomes au cours d'une maladie *E34.9†, G99.0**
- - Ophtalmopathie *E05.0†, H06.2**
- - Ostéoporose au cours d'une maladie *E34.9†, M82.19**
- - Polyneuropathie au cours d'une maladie *E34.9†, G63.3**
- - Présence d'implants *Z96.4*
- - Psychose
- - - Aiguë au cours d'un trouble *F05.8*
- - - Subaiguë dans au cours d'un trouble *F05.8*
- - Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles *R94.7*
- - Syndrome myasthénique cours maladie
- - - *E34.9†, G73.0**
- - - *G73.0**
- - Troubles *E34*

Endocrino-cérébro-ostéodysplasique ¬ Syndrome *Q87.8*

Endocrinologique
v. rétino-hépato-endocrinologique

Endogène
- Asthme intrinsèque] ¬ Asthme non allergique *J45.1*
- Enfant et l'adolescent ¬ Obésité *E66.84*
- Grade
- - I (OMS) ¬ Obésité *E66.80*
- - II (OMS) ¬ Obésité *E66.81*
- - III (OMS) ¬ Obésité *E66.82*
- Indice masse corporelle IMC
- - 40 ou plus ¬ Obésité *E66.82*
- - Compris
- - - 30 et moins de 35 ¬ Obésité *E66.80*
- - - 35 et moins de 40 ¬ Obésité *E66.81*
- Sans
- - Précision ¬ Dermite atopique (*L20.9*
- - Symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F33.2*
- Symptômes psychotiques ¬ Dépression *F33.3*
- ¬
- - Croûte de lait, *L20.8*
- - Dermites atopiques [*L20.8*
- - Hypercholestérolémie avec hyperglycéridémie *E78.2*
- - Hyperglycéridémie *E78.1*
- - Obésité *E66.8*
- - Ochronose *E70.2*

Endomètre
- Adénomateuse) ¬ Hyperplasie atypique de l' *N85.1*
- Glandulo-kystique ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- Kystique ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- Polypoïde ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- SAI ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- ¬
- - Carcinoma in situ: *D07.0*
- - Carcinome indifférencié de l' *C54.1*
- - Épaississement de l' *R93.5*
- - Hyperplasie
- - - Adénomateuse de l' *N85.1*
- - - Glandulaire de l' *N85.0*
- - Polype de: *N84.0*
- - Tuberculose de l' *A18.1†, N74.1**
- - Tumeur maligne: *C54.1*

Endométrioïde
- Femme ¬ Cystadénocarcinome *C56*
- Ovaire ¬
- - Adénocarcinome *C56*
- - Carcinome *C56*
- - Cystadénocarcinome *C56*

Endométriose
- Intestin ¬ *N80.5*
- Ovaire ¬ *N80.1*
- Péritoine pelvien ¬ *N80.3*
- Sans précision ¬ *N80.9*
- Septum recto-vaginal et du vagin ¬ *N80.4*

Endométriose *–suite*
- Sur cicatrice cutanée ¬ *N80.6*
- Thoracique ¬ *N80.8*
- Trompe de Fallope ¬ *N80.2*
- Utérus ¬ *N80.0*
- ¬
- - *N80*
- - *N80.8*

Endométrite
- Blennorragique ¬ *A54.2†, N74.3**
- Chlamydia ¬ *A56.1†, N74.4**
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N74.3**
- Puerpérale ¬ *O85*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tuberculeux ¬
- - *A18.1†, N74.1**
- - *N74.1**

Endomyocardique
- Éosinophilique) ¬ Maladie *I42.3*
- Tropicale) ¬ Fibrose *I42.3*
- ¬ Fibroélastose *I42.4*

Endophlébite
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- ¬ *I80*

Endophtalmie
- Aiguë ¬ *H44.1*
- Associée à un coussinet absorbant ¬ *H59.8*
- Cours
- - Cysticercose ¬ *B69.1†, H45.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H45.1**
- - Toxocarose ¬ *B83.0†, H45.1**
- Gonorrhéique ¬ *A54.3†, H45.1**
- Infectieuse ¬ *H44.1*
- Parasitaire SAI ¬ *H44.1*
- Purulente ¬ *H44.0*
- ¬ Autres *H44.1*

Endoplastite à Staphylococcus epidermidis ¬ *T82.7, B95.7!*

Endoprothèse
- Articulaire
- - Articulation
- - - Cheville ¬ Complication mécanique d'une *T84.06*
- - - Coude ¬ Complication mécanique d'une *T84.01*
- - - Épaule ¬ Complication mécanique d'une *T84.00*
- - - Genou ¬ Complication mécanique d'une *T84.05*
- - - Hanche ¬ Complication mécanique d'une *T84.04*
- - - Poignet ¬ Complication mécanique d'une *T84.03*
- - - Précisées ¬ Complication mécanique d'une *T84.08*

Endoprothèse *–suite*
- Articulaire *–suite*
- - Disque intervertébral ¬ Complication mécanique d'une *T84.07*
- - Mâchoire ¬ Complication mécanique d'une *T84.08*
- - Tête radiale ¬ Complication mécanique d'une *T84.02*
- Articulation de l'épaule ¬ Infection consécutive à une *T84.5*

Endormissement et du maintien du sommeil ¬ Troubles de l' *G47.0*

Endoscope cours acte visée diagnostique thérapeutique ¬ Perforation accidentel
- Nerf par *T81.2*
- Organe par *T81.2*
- Vaisseau sanguin par *T81.2*

Endostéale hypoplasie cérébelleuse ¬ Syndrome de sclérose *Q87.8*

Endothélial
- Congénital héréditaire type
- - 1 ¬ Dystrophie *H18.5*
- - 2 ¬ Dystrophie *H18.5*
- Liée à l'X ¬ Dystrophie cornéenne *H18.5*
- ¬ Déficit en facteur VIII avec trouble fonctionnel *D68.09*

Endothéliose
- Infectieuse hémorragique ¬ *D69.88*
- ¬ *D69.88*

Endotoxique
- Hypovolémique) pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Choc (*T81.1*
- ¬ Choc *R57.8*

Énergétique
- Grave
- - E43
- - - Forme intermédiaire ¬ Malnutrition protéino- *E42*
- - - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition protéino- *E42*
- - Sans précision ¬ Malnutrition protéino- *E43*
- Léger
- - Modérée ¬ Malnutrition protéino- *E44*
- - ¬ Malnutrition protéino- *E44.1*
- Modérée ¬ Malnutrition protéino- *E44.0*
- SAI ¬ Déséquilibre protéino- *E46*
- Sans précision ¬ Malnutrition protéino- *E46*
- ¬
- - Retard de développement après malnutrition protéino- *E45*
- - Séquelles de malnutrition protéino- *E64.0*

Enfance
- Adolescence
- - SAI ¬ Réaction hyperkinétique de l' *F90.9*
- - Sans précision ¬ Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l' *F98.9*
- - ¬

Enfance *–suite*
- Adolescence *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Evitement de l' *F93.2*
- - - Trouble
- - - - Attention sans hyperactivité survenant dans l' *F98.80*
- - - - Comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l' *F98*
- - - - Dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l' *F44.82*
- - - - Fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l' *F94*
- - - - Précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l' *F98.88*
- Désinhibition ¬ Trouble de l'attachement de l' *F94.2*
- Familiale) ¬ hématurie: bénigne (de l' *N02*
- Malheureuse ¬ Difficultés liées à une *Z61*
- Pyknolepsie] ¬ Épilepsie (avec): absences de l' *G40.3*
- Sans précision ¬ Trouble
- - Émotionnel de l' *F93.9*
- - Fonctionnement social de l' *F94.9*
- ¬
- - Amyotrophie spinale proximale autosomique dominante de l' *G12.1*
- - Angoisse de séparation de l' *F93.0*
- - Anxiété sociale de l' *F93.2*
- - Autisme de la petite *F84.0*
- - Changements dans le tissu des relations familiales pendant l' *Z61*
- - Départ du foyer pendant l' *Z61*
- - Dystrophie rétinienne sévère de l' *H35.5*
- - Épilepsie myoclonique bénin
- - - *G40.3*
- - Erythroblastopénie transitoire de l' *D60.1*
- - Evénements ayant entraîné la perte de l'estime de soi pendant l' *Z61*
- - Examen
- - - Période de croissance rapide de l' *Z00.2*
- - - Spécial de dépistage de certains troubles du développement de l' *Z13.4*
- - Expérience personnelle terrifiante pendant l' *Z61*
- - Hémiplégie alternante de l' *Q07.8*
- - Hypogammaglobulinémie transitoire de l' *D80.7*
- - Maladie chronique bulleuse de l' *L12.2*
- - Mérycisme de l' *F98.2*
- - Perte de relation affective pendant l' *Z61*
- - Pneumopathie chronique de l' *J84.0*
- - Psychose de la petite *F84.0*
- - Syndrome épileptique de l' *G40.8*
- - Trouble
- - - Anxieux phobique de l' *F93.1*
- - - Désintégratif de l' *F84.3*

Enfance *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Trouble *–suite*
- - - Émotionnel
- - - - *F93.8*
- - - - Apparaissant spécifiquement dans l' *F93*
- - - Fonctionnement social de l' *F94.8*
- - - Identité sexuelle de l' *F64.2*
- - - Réactionnel de l'attachement de l' *F94.1*
- - - Schizoïde de l' *F84.5*

Enfant
- Adolescent ¬
- - Obésité
- - - *E66.94*
- - - Endogène chez l' *E66.84*
- - - Excès calorique chez l' *E66.04*
- - - Extrême
- - - - Excès calorique chez l' *E66.05*
- - - - Hypoventilation alvéolaire chez l' *E66.25*
- - - Hypoventilation alvéolaire chez l' *E66.24*
- - - Médicamenteux
- - - - *E66.14*
- - - - Extrême chez l' *E66.15*
- - Syndrome de détresse respiratoire de l' *J80*
- Associée à STING ¬ Vasculopathie de l' *M35.8*
- Battu SAI ¬ Bébé ou *T74.1*
- Bon santé
- - Selon circonstances
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - - Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - - Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - ¬ Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et *Z76.2*
- Commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois ¬ arthrites chez l' *M08*
- Dont la mère a un diabète de la grossesse ¬ Syndrome de l' *P70.0*
- Exceptionnellement gros ¬ *P08.0*
- Fazio-Londe] ¬ Paralysie bulbaire progressive de l' *G12.1*
- Forme neuromusculaire ¬ Glycogénose type 4 de l' *E74.0*
- Gros pour l'âge gestationnel ¬ Autres *P08.1*
- Indiens d'Amérique du Nord ¬ Cirrhose héréditaire des *K74.6*
- Maladie du foie ¬ Dégénérescence neuronale progressive de l' *G31.88*
- Mère

Enfant *–suite*
- Mère *–suite*
- - Diabétique ¬ Syndrome de l' *P70.1*
- - Toxicomane ¬ Syndrome de sevrage chez un *P96.1*
- Mort-né ¬ Naissance unique, *Z37.1!*
- Né
- - Terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel ¬ *P08.2*
- - Vivant SAI ¬ *Z38.2*
- Nés
- - Avant terme ¬ Autres *P07.3*
- - Hôpital ¬ Autres naissances multiples, *Z38.6*
- - Hors d'un hôpital ¬ Autres naissances multiples, *Z38.7*
- - Vivant
- - - Selon le lieu de naissance ¬ *Z38*
- - - ¬ Autres naissances multiples, certains *Z37.6!*
- SAI ¬
- - Effets de sévices infligés à un *T74.9*
- - Trouble
- - - Comportement chez l' *F91.9*
- - - Conduites chez l' *F91.9*
- Scolarisés ¬ Examen général en série de: *Z10*
- Transformé en bouc émissaire ¬ Hostilité envers un *Z62*
- Trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: *Z76.2*
- Trouvés ¬ Surveillance médicale et soins médicaux des *Z76.1*
- Type II ¬ Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- Unique
- - Lieu de naissance non précisé ¬ *Z38.2*
- - Né
- - - Hôpital ¬ *Z38.0*
- - - Hors d'un hôpital ¬ *Z38.1*
- - ¬ Naissance spontanée par voie vaginale d'un *O80*
- Vivant ¬ Naissance unique, *Z37.0!*
- ¬
- - Débilité motrice de l' *F82*
- - Dégénérescence congénitale du cerveau chez l' *Q04.9*
- - Difficulté lié possible sévices
- - - Physiques infligés à un *Z61*
- - - Sexuels infligés à un *Z61*
- - Examen de routine de l' *Z00.1*
- - Hémorragie après expulsion du fœtus ou accouchement de l' *O72*
- - Hospitalisme chez l' *F43.2*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique persistante de l' *E16.1*

Enfant *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie lymphoproliférative systémique à cellules T positive au virus Epstein-Barr chez l' *D82.3*
- - Myopathie némaline de l' *G71.2*
- - Négligence affective ou autre forme de négligence d'un *Z62*
- - Neuropathie: hypertrophique de l' *G60.0*
- - Pica du nourrisson et de l' *F98.3*
- - Procédure de garde ou d'entretien d' *Z65*
- - Rhinite syphilitique chez le jeune *A50.0†, J99.8**
- - Sclérose en plaques de l' *G35.9*
- - Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l' *Z00.1*
- - Syndrome de détresse respiratoire aiguë chez l' *J80.09*
- - Taches de Bitot chez le jeune *E50.1*
- - Torticolis paroxystique bénin de l' *G24.3*
- - Trouble de l'alimentation de l' *F98.2*

Enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né ¬ Syndrome d' *P91.80*

Engagée ¬ Epaule *O66.0*

Engelmann ¬ Syndrome de Camurati- *Q78.3*

Engelures ¬ *T69.1*

Engorgement du sein chez le nouveau-né ¬ *P83.4*

Engrais ¬ Intoxication aux *T65.8*

Enkystée ¬ Hydrocèle *N43.0*

Enlèvement
- Appareils externes de fixation ou de traction ¬ Changement, vérification ou *Z47.8*
- Broche ¬ *Z47.0*
- Cathéter ¬ *Z43*
- Clou ¬ *Z47.0*
- Dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] ¬ Vérification, réinsertion ou *Z30.5*
- Plaque
- - Prothèse interne de fixation ¬ Soins de contrôle impliquant l' *Z47.0*
- - ¬ *Z47.0*
- Plâtre ¬ Changement, vérification ou *Z47.8*
- Tige ¬ *Z47.0*
- Vis ¬ *Z47.0*

Ennuis SAI ¬ *R45.2*

Énolase
v. bêta-énolase

Enophtalmie ¬ *H05.4*

Enquêtes de population ¬ Examen sanitaire au cours d' *Z00.8*

Enrouement ¬ *R49.0*

Enseignants et les autres élèves ¬ Difficultés avec les *Z55*

Enseignement inadéquat ¬ *Z55*

Entamoeba histolytica ¬
- Abcès du foie à *A06.4†, K77.0**
- Amibiase à *A06.9*
- Hépatite à *A06.4†, K77.0**

Entamoeba histolytica ¬ *–suite*
- Infection
- - *A06*
- - *A06.9*

Entérique ¬
- Anendocrinose *K90.8*
- Fièvre *A01.0*

Entérite
- Adénovirus ¬ *A08.2*
- Aigu
- - Exsiccose ¬ *A09.9, E86*
- - Nécrosante ¬ *A05.2*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, K93.8**
- Bactérienne SAI ¬ *A04.9*
- Campylobacter ¬ *A04.5*
- Candida ¬ *B37.88*
- Colite ou entérocolite associée aux antibiotiques ¬ *A04.79*
- Cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.8*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Entéro-aggrégative à Escherichia coli ¬ *A04.4*
- Entéro-hémorragique à Escherichia coli ¬ *A04.3*
- Entéro-invasive à Escherichia coli ¬ *A04.2*
- Entérotoxigène à Escherichia coli ¬ *A04.1*
- Escherichia coli SAI ¬ *A04.4*
- Granulomateuse ¬ *K50*
- Hémorragique ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- Infectieux
- - Aerobacter aerogenes ¬ *A04.8, B96.2!*
- - Clostridium
- - - Difficile ¬ *A04.79*
- - - Perfringens ¬ *A04.8, B96.7!*
- - Enterobacter aerogenes ¬ *A04.8, B96.2!*
- - ¬ Arthropathie lors d' *A09.0*
- Ischémique
- - Chronique ¬ *K55.1*
- - SAI ¬ *K55.9*
- Norovirus ¬ *A08.1*
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*
- Probablement d'origine infectieuse, avec exsiccose ¬ *A09.0, E86*
- Régional
- - Côlon ¬ Maladie de Crohn [*K50.1*
- - Duodénale ¬ Maladie de Crohn [*K50.0*
- - Gros intestin ¬ Maladie de Crohn [*K50.1*
- - Iléale ¬ Maladie de Crohn [*K50.0*
- - Jéjunale ¬ Maladie de Crohn [*K50.0*
- - Rectum ¬ Maladie de Crohn [*K50.1*
- - SAI ¬ *K50.9*
- - ¬
- - - Arthrite juvénile au cours d' *K50.9†, M09.19**

Entérite *–suite*
- Régional *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Arthropathie au cours d' *K50.9†, M07.49**
- - - Maladie de Crohn [*K50*
- Rotavirus ¬ *A08.0*
- SAI ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- Salmonella ¬ *A02.0*
- Staphylocoques ¬ *A04.8, B95.8!*
- Sténosante ulcéreuse multifocale cryptogénétique ¬ *K63.3*
- Toxique à Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Viral
- - SAI ¬ *A08.4*
- - ¬ Autres *A08.3*
- Virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09, U69.21!*
- - Influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- Yersinia enterocolitica ¬
- - *A04.6*
- - Arthrite post-infectieuse au cours d'une *A04.6†, M03.29**
- - Arthropathie post-infectieuse au cours d'une *A04.6†, M03.29**
- ¬ Arthrite au cours de l' *A09.9†, M03.29**

Entéro-aggrégative à Escherichia coli ¬ Entérite *A04.4*

Enterobacter
- Aerogenes ¬ Entérite infectieuse à *A04.8, B96.2!*
- Cloacae multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Genre *U81.04!*
- - 3MRGN ¬ Genre *U81.24!*
- - 4MRGN ¬ Genre *U81.44!*

Entérobiase ¬ *B80*

Entérocèle
- Vaginale ¬ *N81.5*
- ¬ *K46*

Enterococcus
- Faecalis résistant
- - Glycopeptides
- - - Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ *U80.20!*
- - - Oxazolidinones
- - - - Fortement résistant aux aminosides ¬ *U80.2!*
- - - - Streptogramines ¬ *U80.20!*
- - - ¬ *U80.20!*
- - Oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ *U80.21!*
- Faecium résistant
- - Glycopeptides
- - - Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ *U80.30!*

Enterococcus *–suite*
- Faecium résistant *–suite*
- - Glycopeptides *–suite*
- - - Oxazolidinones streptogramines
- - - - Fortement résistant aux aminosides ¬ *U80.3!*
- - - - ¬ *U80.30!*
- - - ¬ *U80.30!*
- - Oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ *U80.31!*

Entérocolite
- Associée aux antibiotiques ¬ Entérite, colite ou *A04.79*
- Clostridium difficile
- - Mégacôlon
- - - Complications organiques ¬ *A04.73*
- - - Sans autres complications organiques ¬ *A04.72*
- - Sans
- - - Mégacôlon
- - - - Complications au niveau des organes ¬ *A04.71*
- - - - Sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes ¬ *A04.70*
- - - Précision ¬ *A04.79*
- - ¬ *A04.7*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Ischémique
- - Chronique ¬ *K55.1*
- - SAI ¬ *K55.9*
- Nécrosante du fœtus et du nouveau-né ¬ *P77*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**

Enterocolitica ¬
- Arthrite post-infectieuse au cours d'une entérite à Yersinia *A04.6†, M03.29**
- Arthropathie post-infectieuse au cours d'une entérite à Yersinia *A04.6†, M03.29**
- Entérite à Yersinia *A04.6*

Entérocoques
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques de groupe D et *B95.2!*
- Siège non précisé ¬ Infection à streptocoques et *A49.1*
- ¬
- - Endocardite à *I33.0, B95.2!*
- - Infection des voies urinaires à *N39.0, B95.2!*
- - Septicémie à streptocoques, groupe D, et *A40.2*

Entéro-hémorragique Escherichia coli ¬
- Entérite *A04.3*
- Infection *A04.3*

Entéro-invasive Escherichia coli ¬
- Entérite *A04.2*
- Infection *A04.2*

Entérolithe ¬ *K56.4*

Entéromyiase ¬ *B87.8†, K93.8**

Enteropathica ¬ Acrodermatitis *E83.2*

Entéropathie
- Auto-immun type
- - 1 ¬ *E31.0*
- - 3 ¬ *K52.8*
- Cellules NK ¬ *K52.8*
- Congénitale due à un déficit de l'entéropeptidase ¬ *K90.8*
- Lié à l'X ¬ Syndrome de dérèglement immunitaire-polyendocrinopathie- *E31.0*
- Perte de protéines ¬ *K90.4*
- ¬ Lymphome
- - Cellules T associé à des *C86.2*
- - T type *C86.2*

Entéropathique ¬
- Acrodermatite *E83.2*
- Arthrite
- - *M07.6**
- - Psoriasiques et *M07**
- Lymphome à cellules T de type *C86.2*

Entéropathogène Escherichia coli ¬
- Diarrhée *A04.0*
- Infection *A04.0*

Entéropeptidase ¬ Entéropathie congénitale due à un déficit de l' *K90.8*

Entéroptose ¬ *K63.4*

Entérosténose ¬ *K56.6*

Entérostomie ¬ Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une *K91.4*

Entérotoxigène Escherichia coli ¬
- Entérite *A04.1*
- Infection *A04.1*

Entérovirale, siège non précisé ¬ Infection *B34.1*

Entérovirus
- 70 ¬ Conjonctivite (due à): *B30.3†*
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.1!*
- Exanthème de Boston] ¬ Fièvre exanthémateuse à *A88.0*
- Type 70 ¬ Conjonctivite
- - *B30.3†, H13.1**
- - Hémorragique à *B30.3†, H13.1**
- ¬
- - Encéphalite à *A85.0†, G05.1**
- - Encéphalomyélite à *A85.0†, G05.1**
- - Fièvre avec exanthème à *A88.0*
- - Infection congénitale à *P35.8*
- - Méningite à *A87.0†, G02.0**
- - Myélite à *A85.0†, G05.1**
- - Pharyngite
- - - Lymphonodulaire à *B08.8*
- - - Vésiculaire due à un *B08.5*
- - Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un *B08.4*

Enthésopathie
- Membre inférieur
- - Sans précision ¬ *M76.9*
- - Sauf le pied ¬ Autres *M76.8*
- Non classées ailleurs ¬ Autres *M77.8*
- Pied ¬ Autres *M77.5*
- Sans précision ¬ *M77.9*
- Spinale ¬ *M46.0*
- ¬
- - *M77*
- - Arthrite associée aux *M08.89*

Entomophthorose ¬ *B46.8*

Entonnoir
- Cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un *O34.30*
- Congénital ¬ Thorax en *Q67.6*

Entorse
- Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- Déchirure ¬ *S46*
- Foulure
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ *S43.5*
- - - Épaule ¬ *S43.4*
- - - Ligament
- - - - Ceinture scapulaire ¬ Luxation, *S43*
- - - - Coude ¬ Luxation, *S53*
- - - - Genou ¬ Luxation, *S83*
- - - - Hanche ¬ Luxation, *S73*
- - - - Niveau
- - - - - Cheville et du pied ¬ Luxation, *S93*
- - - - - Cou ¬ Luxation, *S13*
- - - - - Poignet et de la main ¬ Luxation, *S63*
- - - - Non
- - - - - Précisés du membre inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, *T13.2*
- - - - - Précisés du membre supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, *T11.2*
- - - - - Précisés du tronc ¬ Luxation, *T09.2*
- - - - Partie
- - - - - Non précisées de la tête ¬ *S03.5*
- - - - - Non précisées du cou ¬ *S13.6*
- - - - Rachis lombaire et du bassin ¬ Luxation, *S33*
- - - - Tête ¬ Luxation, *S03*
- - - - Thorax ¬ Luxation, *S23*
- - - Non précisées de la main ¬ *S63.7*
- - - Sacro-iliaque ¬ *S33.6*
- - - Sterno-claviculaire ¬ *S43.6*
- - Associations de parties du corps ¬ Luxations, *T03.8*
- - Ceinture scapulaire SAI ¬ *S43.7*
- - Cheville
- - - Ligament
- - - - Calcanéopéronier ¬ *S93.42*
- - - - Deltoïde ¬ *S93.41*

Entorse *–suite*
- Foulure *–suite*
- - Cheville *–suite*
- - - Ligament *–suite*
- - - - Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ *S93.43*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S93.40*
- - - - ¬ *S93.48*
- - - ¬ *S93.4*
- - Côtes et du sternum ¬ *S23.4*
- - Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, *T03.0*
- - Coude
- - - Humérocubitale (articulation) ¬ *S53.44*
- - - Huméroradiale (articulation) ¬ *S53.43*
- - - Ligament collatéral
- - - - Cubital ¬ *S53.42*
- - - - Radial ¬ *S53.41*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S53.40*
- - - - ¬ *S53.48*
- - - ¬ *S53.4*
- - Déchirure
- - - Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ *S33.50*
- - - Jonction lombosacrée et de ses ligaments ¬ *S33.51*
- - - ¬
- - - - *S16*
- - - - *S56*
- - - - *S66*
- - - - *S76*
- - - - *S86*
- - - - *S96*
- - Doigt s
- - - Articulation
- - - - Interphalangienne ¬ *S63.62*
- - - - Métacarpo-phalangienne ¬ *S63.61*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S63.60*
- - - - ¬ *S63.68*
- - - ¬ *S63.6*
- - Hanche
- - - Ligament
- - - - Iliofémoral ¬ *S73.11*
- - - - Ischiocapsulaire ¬ *S73.12*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S73.10*
- - - - ¬ *S73.18*
- - - ¬ *S73.1*
- - Ligament
- - - Croisé genou antérieur postérieur
- - - - Déchirure
- - - - - Ligament croisé antérieur ¬ *S83.53*
- - - - - Ligament croisé postérieur ¬ *S83.54*

Entorse *–suite*
- Foulure *–suite*
- - Ligament *–suite*
- - - Croisé genou antérieur postérieur *–suite*
- - - - Distorsion
- - - - - Ligament croisé antérieur ¬ *S83.51*
- - - - - Ligament croisé postérieur ¬ *S83.52*
- - - - Ligament croisé non précisé ¬ *S83.50*
- - - - ¬ *S83.5*
- - - Latéral genou interne externe
- - - - Déchirure
- - - - - Ligament latéral péronier (Ligament latéral) ¬ *S83.43*
- - - - - Ligament latéral tibial (Ligament médian) ¬ *S83.44*
- - - - Distorsion
- - - - - Ligament latéral péronier (Ligament latéral) ¬ *S83.41*
- - - - - Ligament latéral tibial (Ligament médian) ¬ *S83.42*
- - - - Ligament latéral non précisé ¬ *S83.40*
- - - - ¬ *S83.4*
- - Mâchoire ¬ *S03.4*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles de luxation, *T93.3*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d'une luxation, *T92.3*
- - Multiples, sans précision ¬ Luxations, *T03.9*
- - Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- - Orteil(s) ¬ *S93.5*
- - Partie
- - - Corps non précisée ¬ Luxation, *T14.3*
- - - Non précis
- - - - Ceinture scapulaire ¬ *S43.7*
- - - - Genou ¬ *S83.6*
- - - - Pied ¬ *S93.6*
- - - - Rachis lombaire et du bassin ¬ *S33.7*
- - - - Thorax ¬ *S23.5*
- - Plusieurs partie
- - - Corps ¬ Luxations, *T03*
- - - Membre s
- - - - Inférieur(s) ¬ Luxations, *T03.3*
- - - - Supérieur
- - - - - S) supérieur(s) ¬ Luxations, *T03.2*
- - - - - S) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ¬ Luxations, *T03.4*
- - Poignet
- - - Articulation
- - - - Carpienne ¬ *S63.51*
- - - - Carpo-métacarpienne ¬ *S63.53*
- - - - Ligament) radiocarpien ¬ *S63.52*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S63.50*
- - - - ¬ *S63.58*
- - - ¬ *S63.5*
- - Rachis

Entorse *–suite*
- Foulure *–suite*
- - Rachis *–suite*
- - - Cervical ¬ *S13.4*
- - - Dorsal ¬ *S23.3*
- - - Lombaire ¬ *S33.5*
- - Région thyroïdienne ¬ *S13.5*
- - Tête avec luxations, entorses et foulures du cou ¬ Luxations, *T03.0*
- - Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ Luxations, *T03.1*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*

Entourage immédiat, y compris la situation familiale ¬ Autres difficultés liées à l' *Z63*

Entraînant
- Dépendance
- - Analgésiques ¬ Usage nocif de substances n' *F55.2*
- - Antiacides ¬ Usage nocif de substances n' *F55.3*
- - Antidépresseurs ¬ Usage nocif de substances n' *F55.0*
- - Laxatifs ¬ Usage nocif de substances n' *F55.1*
- - Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage nocif de substances n' *F55.6*
- - Stéroïdes et hormones ¬ Usage nocif de substances n' *F55.5*
- - Substance
- - - Non précisée ¬ Usage nocif de substances n' *F55.9*
- - - ¬ Usage nocif de substances n' *F55.8*
- - Vitamines ¬ Usage nocif de substances n' *F55.4*
- - ¬ Usage nocif de substances n' *F55*
- Disproportion
- - SAI ¬ Malformation du bassin *O33.0*
- - ¬
- - - Ascite du fœtus *O33.7*
- - - Bassin rétréci SAI *O33.1*
- - - Hydropisie du fœtus *O33.7*
- - - Jumeaux soudés *O33.7*
- - - Méningomyélocèle du fœtus *O33.7*
- - - Rétrécissement
- - - - Cavité médiane (bassin) *O33.3*
- - - - Détroit
- - - - - Inférieur (bassin) *O33.3*
- - - - - Supérieur (du bassin) *O33.2*
- - - Tératome sacro-coccygien du fœtus *O33.7*
- - - Tumeur du fœtus *O33.7*
- Infarctus
- - Cérébral ¬
- - - Embolie artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n' *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n' *I66*

Entraînant *–suite*
- Infarctus *–suite*
- - Cérébral ¬ *–suite*
- - - Obstruction complet partiel artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n' *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n' *I66*
- - - Occlusion sténose artère
- - - - Cérébral
- - - - - N' *I66*
- - - - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), *I63*
- - - - Précérébrales, n' *I65*
- - - Sténose artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n' *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n' *I66*
- - - Thrombose artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n' *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n' *I66*
- - Myocarde ¬
- - - Embolie coronaire (artère) (veine) n' *I24.0*
- - - Occlusion coronaire (artère) (veine) n' *I24.0*
- - - Thrombo-embolie coronaire (artère) (veine) n' *I24.0*
- - - Thrombose coronaire n' *I24.0*

Entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance ¬ Evénements ayant *Z61*

Entraîner une dépendance ¬ Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d' *R78.4*

Entrant pas dans la catégorie A ou C ¬ Maladie symptomatique due au VIH, n' *U60.2!*

Entrecroisée ¬ Dégénérescence rétinienne: *H35.4*

Entretien
- Contraception ¬ Examen de routine pour *Z30.4*
- Dispositif d'accès vasculaire ¬ Ajustement et *Z45.2*
- Enfants ¬ Procédure de garde ou d' *Z65*
- Pompe à perfusion ¬ Ajustement et *Z45.1*
- Prothèse
- - Auditive implantée ¬ Ajustement et *Z45.3*
- - Interne
- - - Non précisée ¬ Ajustement et *Z45.9*
- - - ¬ Ajustement et *Z45.8*
- SAI ¬ Chimiothérapie d' *Z51.2*

Entropion
- Congénital ¬ *Q10.2*
- Trichiasis de la paupière ¬ *H02.0*

Enucléation traumatique ¬ *S05.7*

Énurésie
- Diurne ¬ *F98.01*
- Énurésie non organique non précisée ¬ Autre *F98.08*
- Fonctionnelle ¬ *F98.0*
- Nocturne
- - Ainsi que diurne ¬ *F98.02*
- - ¬ *F98.00*
- Non organique
- - Non organique non précisée ¬ Autre énurésie et *F98.08*
- - ¬ *F98.0*
- Primaire) (secondaire) d'origine non organique ¬ *F98.0*
- Psychogène ¬ *F98.0*
- SAI ¬ *R32*

Envahissant développement
- Sans précision ¬ Trouble *F84.9*
- ¬ Autres troubles *F84.8*

Envahissement
- Intraventriculaire ¬ Hémorragie sous-épendymaire
- - *P52.1*
- - Sans *P52.0*
- Moelle osseuse ¬ Tumeur maligne avec *C79.5*

Envenimation suite morsure
- Scorpion ¬ *T63.2*
- Serpent ¬ *T63.0*

Envie
- SAI ¬ *Q82.5*
- Vomir
- - Cours de chimiothérapie ¬ *R11, Y57.9!*
- - Sous radiothérapie ¬ *R11, Y57.9!*

Environnement
- Physique ¬ Difficultés liées à l' *Z58*
- Social ¬ Difficultés liées à l' *Z60*
- ¬
- - Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l' *P04.6*
- - Hyperthermie du nouveau-né due à l' *P81.0*

Enzymatique
- Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit *D55.1*
- Sans précision ¬
- - Anémie due à des anomalies *D55.9*
- - Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit *E25.09*
- Troubles héréditaires ¬ Arthropathie goutteuse due à un déficit *M14.0**
- ¬
- - Anémie anomalie
- - - *D55*
- - - *D55.8*
- - Anomalie

Enzymatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anomalie *–suite*
- - - Adrénogénitales congénitales liées à un déficit *E25.08*
- - - Génito-surrénaliennes congénitales liées à un déficit *E25.0*
- - Déficit *E88.0*

Enzyme
- Bifonctionnelle ¬ Déficit en *E71.3*
- Branchante
- - Forme neuromusculaire périnatal fatale ¬
- - - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - - GSD par déficit en *E74.0*
- - ¬ GSD par déficit en *E74.0*
- Branchement ¬ Déficit en *E74.0*
- Conversion ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l' *T46.4*
- Débranchante ¬ GSD par déficit en *E74.0*
- Débranchement ¬ Déficit en *E74.0*
- Glycolytiques ¬
- - Anémie due à des anomalies des *D55.2*
- - Anomalie des *E74.8*
- Hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome associant une hémolyse, une élévation des *O14.2*
- Lysosomiaux ¬ Défauts de la transformation post-traductionnelle des *E77.0*
- Non classées ailleurs ¬ Intoxication: *T45.3*
- Sérique
- - Sans précision ¬ Anomalie du taux d'un *R74.9*
- - ¬ anomalie taux
- - - *R74*
- - - *R74.8*

Eo avec inv(16) ou t(16;16) ¬ LMA M4 *C92.5*

EoE ¬ *K20*

EOG] ¬ Anomalies (de): électro-oculogramme [*R94.1*

Éosinophile
- Facial ¬ Granulome *L92.2*
- Hypophyse ¬
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome
- - - *C75.1*
- - - Basophile et *C75.1*
- Idiopathique
- - Aiguë ¬ Pneumonie à *J82*
- - ¬
- - - Myosite *M60.89*
- - - Pneumonie à *J82*
- Médullaire anormal associé
- - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22) ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec *C92.50*
- Muqueuse buccale ¬ Granulome: *K13.4*

Éosinophile *–suite*
- Syndrome hyperéosinophilique] ¬ Leucémie chronique à *D47.5*
- Wells] ¬ Phlegmon à *L98.3*
- ¬
- - Asthme avec *J82*
- - Endocardite à *I42.3*
- - Fasciite disséminée (à *M35.4*
- - Fibrose angiocentrique à *J39.88*
- - Gastrite ou Gastroentérite à *K52.8*
- - Granulome *C96.6*
- - Hépatite à *K71.6*
- - Méningite *B83.2†, G02.8**
- - Méningo-encéphalite *B83.2†, G05.2**
- - Œsophagite à *K20*
- - Péritonite
- - - *K65.8*
- - - Aiguë à *K65.0*
- - Pneumopathie chronique idiopathique à *J82*

Éosinophilie
- Allergique ¬ *D72.1*
- Héréditaire ¬ *D72.1*
- Œsophagienne répondant aux inhibiteurs de la pompe à protons ¬ *K20*
- Pulmonaire, non classée ailleurs ¬ *J82*
- Tropicale (pulmonaire) SAI ¬ *J82*
- ¬
- - *D72.1*
- - LMMC avec *C93.1*

Éosinophilique
- Os ¬ Granulome *C96.6*
- Polyangéite ¬ Granulomatose *M30.1*
- Poumons ¬ Granulome *C96.6*
- ¬ Maladie endomyocardique (*I42.3*

EOSRD ¬ *H35.5*

Épaissi ¬
- Lipohypertrophie symétrique membre localisé douloureux œdème surface cutané
- - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané *E88.21*
- - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément *E88.20*
- Occlusion intestinale due à un lait *P76.2*

Épaississement
- Endomètre ¬ *R93.5*
- Épiderme
- - Sans précision ¬ *L85.9*
- - ¬
- - - *L85*
- - - Formes précisées d' *L85.8*
- Pleural fibreux ¬ *J92*

Épanchement
- Articulaire ¬ *M25.4*
- Chyleux ¬ *J94.0*
- Chyliforme ¬ *J94.0*

Épanchement *–suite*
- Confirmée par analyse bactériologique ou histologique ¬ Pleurésie tuberculeuse primaire avec *A15.7†, J91**
- Glandes salivaires ¬ Kyste muqueux: par *K11.6*
- Non purulent ¬ Otite moyenne
- - *H65.9*
- - Chronique: avec *H65.4*
- Péricardique
- - Aigu ¬ *I30*
- - Non inflammatoire) ¬ *I31.3*
- Péritonéal ¬ *R18*
- Pleural
- - Cours
- - - Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *J91**
- - - Tumeur maligne secondaire de la plèvre ¬ *C78.2†, J91**
- - Grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.1*
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: *J10.1*
- - Non classé ailleurs ¬ *J90*
- - Tuberculeux
- - - Primaire, confirmé par analyse bactériologique ou histologique ¬ *A15.7†, J91**
- - - ¬ *A16.5†, J91**
- - Virus
- - - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09, U69.21!*
- - - Influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- - ¬ Mésothéliome de la plèvre avec *C45.0†, J91**
- Tuberculeux NCA ¬ Pleurésie avec *A16.5†, J91**
- ¬ Pleurite avec *J90*

Épargnant le quadriceps ¬ Myopathie *G71.8*

Épaule
v.a. aisselle
- Articulation gléno huméral
- - SAI ¬ Luxation de l' *S43.00*
- - ¬ Luxation de l'articulation de l' *S43.0*
- Bloquée ¬ *M75.0*
- Bras
- - Abrasion/éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.81*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.84*
- - Coude ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l' *R02.01*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.82*

Épaule *–suite*
- Bras *–suite*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.83*
- - Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de l' *S48.9*
- - SAI ¬ Plaie ouverte de l' *S41*
- - Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S49*
- - - *S49.9*
- - - Superficielle de l' *S40.9*
- - Sauf poignet main
- - - 2ème degré sans précision ¬
- - - - Brûlure de l' *T22.2*
- - - - Corrosion de l' *T22.6*
- - - Degré
- - - - 2a
- - - - - ¬ Brûlure de l' *T22.2*
- - - - - ¬ Corrosion de l' *T22.6*
- - - - 2b
- - - - - ¬ Brûlure de l' *T22.8*
- - - - - ¬ Corrosion de l' *T22.9*
- - ¬
- - - Amputation traumatique de l' *S48*
- - - Contusion de l' *S40.0*
- - - Écrasement de l' *S47*
- - - Fracture
- - - - *S42*
- - - - Parties de l' *S42.8*
- - - Lésion
- - - - Traumatique
- - - - - Multiples de l' *S49.7*
- - - - - Multiples muscles et tendons au niveau de l' *S46.7*
- - - - - Multiples nerfs au niveau de l' *S44.7*
- - - - - Multiples vaisseaux sanguins au niveau de l' *S45.7*
- - - - - Muscle et de tendon non précisés, au niveau de l' *S46.9*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de l' *S46.8*
- - - - - Nerf cutané sensitif au niveau de l' *S44.5*
- - - - - Nerf non précisé, au niveau de l' *S44.9*
- - - - - Nerfs au niveau de l' *S44.8*
- - - - - Précisées de l' *S49.8*
- - - - - Superficielle de l' *S40*
- - - - - Superficielles de l' *S40.8*
- - - - - Superficielles de l' *S40.88*
- - - - - Superficielles multiples de l' *S40.7*
- - - - - Vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l' *S45.9*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S45.8*
- - - - - Veine superficielle au niveau de l' *S45.3*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S45*

Épaule *–suite*
- Bras *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Plaie
- - - - Ouverte de l' *S41*
- - - - Ouvertes multiples de l' *S41.7*
- Coude ¬ Amputation traumatique entre l' *S48.1*
- Engagée ¬ *O66.0*
- Main ¬ Syndrome *M89.0*
- Membre supérieur sauf poignet main
- - Degré non précis ¬
- - - Brûlure de l' *T22.0*
- - - Corrosion de l' *T22.4*
- - ¬
- - - Brûlure
- - - - Corrosion de l' *T22*
- - - - Premier degré de l' *T22.1*
- - - - Troisième degré de l' *T22.3*
- - - Corrosion
- - - - Premier degré de l' *T22.5*
- - - - Troisième degré de l' *T22.7*
- SAI ¬ Fracture de l' *S42.9*
- Sans précision ¬ Lésion de l' *M75.9*
- ¬
- - *L02.4*
- - *L03.10*
- - *L04.2*
- - Amputation traumatique de l'articulation de l' *S48.0*
- - Amyotrophie névralgique de l' *G54.5*
- - Articulation de l' *T84.10*
- - Bursite
- - - *M75.5*
- - - Calcifiante de l' *M75.3*
- - Capsulite rétractile de l' *M75.0*
- - Carcinoma in situ: Peau du membre supérieur, y compris l' *D04.6*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de l' *T84.00*
- - Dystocie
- - - Dystocie des *O66.0*
- - - Présentation de l' *O64.4*
- - Empyème de l'articulation de l' *M00.97*
- - Entorse et foulure de l'articulation de l' *S43.4*
- - Infection
- - - Articulation de l' *M00.91*
- - - Consécutive à une endoprothèse de l'articulation de l' *T84.5*
- - Lésion
- - - *M75*
- - - *M75.8*
- - - Labrum
- - - - Articulation de l' *S43.4*

Épaule *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Labrum *–suite*
- - - - Atteinte dégénérative de l'articulation de l' *M75.6*
- - Luxation
- - - Congénital
- - - - *Q68.8*
- - - - Vraie de l' *Q68.8*
- - - Partie de l' *S43.08*
- - Mélanome
- - - In situ du membre supérieur, y compris l' *D03.6*
- - - Malin du membre supérieur, y compris l' *C43.6*
- - Nævus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l' *D22.6*
- - Périarthrite de l' *M75.0*
- - Plaie ouverte de l' *S41.0*
- - Présence d'une prothèse d' *Z96.60*
- - Syndrome d'empiètement de l' *M75.4*
- - Tendinite calcifiante de l' *M75.3*
- - Tissu mou: *C79.86*
- - Tuberculose de l'articulation de l' *A18.0†, M01.11**
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - Peau du membre supérieur, y compris l' *D23.6*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l' *D21.1*
- - - Malign
- - - - Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l' *C47.1*
- - - - Peau du membre supérieur, y compris l' *C44.6*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l' *C49.1*

Épaule-bras
- Tous stades ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.26*
- ¬ Ulcère vasculaire mixte de type *I70.26*

Épendymaire ¬ Kyste glioépendymaire/ *Q04.6*

Épendymite à cytomégalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**

Ependymoblastome ¬ *C71.9*

Épendymome
v. Sub-épendymome
- Anaplasique ¬ *C71.9*
- Bas degré ¬ *D43.2*
- ¬ *C71.9*

Eperon ¬ *C34.0*

Éphélides ¬ *L81.2*

Epiblépharon ¬ *Q10.3*

Épicanthus
v. blépharophimosis-ptosis-épicanthus

Épicardiques ¬ Plaques *I31.8*

Épicondyle
- Épicondyles, non précisé ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.44*
- Latéral ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.42*
- Médial ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.43*
- Non précisé ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle, *S42.44*

Epicondylite ¬ *M77.1*

Épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie *P12.2*

Epidemica ¬
- Meningitis cerebrospinalis *A39.0†, G01**
- Nephropathia *A98.5*

Épidémie de 2009 [grippe aviaire] ¬ Influenza A/H5N1, *U69.21!*

Épidémiologiques particulières ¬ Codes secondaires utilisés à des fins *U69.2!*

Épidémique
v. Type de maladie

Épiderme
- Derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte cutanée partielle atteignant l' *L89.1*
- Sans précision ¬ Epaississement de l' *L85.9*
- ¬
- - Épaississements de l' *L85*
- - Formes précisées d'épaississement de l' *L85.8*

Epidermidis ¬ Endoplastite à Staphylococcus *T82.7, B95.7!*

Épidermique
- Toxique ¬
- - NET [nécrolyse *L51.20*
- - Spectre syndrome de Stevens-Johnson/nécrolyse *L51.20*
- ¬ Kyste
- - *L72.0*
- - Inclusion *L72.0*

Epidermodysplasie verruciforme ¬ *B07*

Épidermoïde
- Bouche ¬ Kyste: *K09.8*
- Canal anal ¬ Carcinome *C21.1*
- Cavité orale ¬ Carcinome *C06.9*
- Col cervical ¬ Carcinome *C53.9*
- Côlon ¬ Carcinome *C18.9*
- Corps de l'utérus ¬ Carcinome *C54.9*
- Estomac ¬ Carcinome *C16.9*
- Foie et des voies biliaires intrahépatiques ¬ Carcinome *C22.0, C22.1*
- Fosses nasales et des sinus paranasaux ¬ Carcinome *C30.0*
- Hypopharynx ¬ Carcinome *C13.9*
- Intestin grêle ¬ Carcinome *C17.9*
- Langue mobile ¬ Carcinome *C02.9*
- Larynx ¬ Carcinome *C32.9*
- Lèvre ¬ Carcinome *C00.9*
- Œsophage ¬ Carcinome *C15.9*
- Oropharyngé ¬ Carcinome *C10.9*

Épidermoïde *–suite*
- Pancréas ¬ Carcinome *C25.9*
- Rectum ¬ Carcinome *C20*
- Sinus ¬ Carcinome *C31.9*
- Verge ¬ Carcinome *C60.9*
- Voies biliaires extra-hépatiques ¬ Carcinome *C24.0*
- Vulve ¬ Carcinome *C51.9*

Épidermolyse
- Bulleux
- - Acquise ¬ *L12.3*
- - Dermolytique ¬ *Q81.2*
- - Dystrophique
- - - Acrale ¬ *Q81.2*
- - - Dominant
- - - - Généralisée ¬ *Q81.2*
- - - - Isolée des ongles ¬ *Q81.2*
- - - Prétibiale ¬ *Q81.2*
- - - Prurigineuse ¬ *Q81.2*
- - - Récessive centripète ¬ *Q81.2*
- - - ¬ *Q81.2*
- - Jonctionnelle
- - - Généralisée sévère ¬ *Q81.1*
- - - Létale ¬ *Q81.1*
- - - Type
- - - - Herlitz ¬ *Q81.1*
- - - - Herlitz-Pearson ¬ *Q81.1*
- - - - Non-Herlitz ¬ *Q81.8*
- - Létal
- - - Acantholytique ¬ *Q81.0*
- - - ¬ *Q81.1*
- - Sans précision ¬ *Q81.9*
- - Simple
- - - Atrésie du pylore ¬ *Q81.0*
- - - Autosomique récessive associée à KRT14 ¬ *Q81.0*
- - - Déficit
- - - - BP230 ¬ *Q81.0*
- - - - Exophiline 5 ¬ *Q81.0*
- - - - Plakophiline ¬ *Q81.0*
- - - Dystrophie musculaire ¬ *Q81.0†, G73.7**
- - - Généralisée intermédiaire ¬ *Q81.0*
- - - Localisée ¬ *Q81.0*
- - - Pigmentation mouchetée ¬ *Q81.0*
- - - Superficielle ¬ *Q81.0*
- - - Type
- - - - Dowling-Meara ¬ *Q81.0*
- - - - Ogna ¬ *Q81.0*
- - - ¬ *Q81.0*
- - ¬
- - - *Q81*
- - - *Q81.8*
- Nécrosante suraiguë
- - Lyell
- - - Atteinte 30%

Épidermolyse *–suite*
- Nécrosante suraiguë *–suite*
- - Lyell *–suite*
- - - Atteinte 30% *–suite*
- - - - Plus de la surface corporelle ¬ *L51.21*
- - - - Surface corporelle SAI ¬ *L51.20*
- - - ¬ *L51.2*
- - Syndrome de Lyell) SAI ¬ *L51.20*
- Staphylococcique du nourrisson ¬ Syndrome d' *L00*

Épidermolytique
- Annulaire ¬ Ichtyose *Q80.3*
- Autosomique récessive ¬ Ichtyose *Q80.3*
- Superficielle ¬ Ichtyose *Q80.8*
- ¬
- - Hyperkératose *Q80.3*
- - Ichtyose *Q80.3*

Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les espèces appartenant aux genres *B35*

Épididyme
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections du testicule et de l' *N51.1**
- Testicule ¬ Abcès de l' *N45.0*
- Vésicule séminal prostate
- - SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l' *Q55.4*
- - ¬ Autres malformations congénitales du canal déférent, de l' *Q55.4*
- ¬
- - Gonorrhée de l' *A54.2†, N51.1**
- - Syphilis
- - - *A52.7†, N51.1**
- - - Tardive de l' *A52.7†, N51.1**
- - Torsion: *N44.0*
- - Tuberculose
- - - *A18.1†, N51.1**
- - - Sinus de l' *A18.1†, N51.1**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D29.3*
- - - Maligne: *C63.0*

Épididymite
- Blennorhéique ¬ *A54.2†, N51.1**
- Chlamydia ¬ *A56.1†, N51.1**
- Épididymo-orchite
- - Abcès ¬ Orchite, *N45.0*
- - Sans abcès ¬ Orchite, *N45.9*
- Gonocoques ¬ *A54.2†, N51.1**
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.1**
- SAI ¬ *N45.9*
- Syphilitique
- - Tardive ¬ *A52.7†, N51.1**
- - ¬ *A52.7†, N51.1**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N51.1**
- Virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N51.1**
- ¬ Orchite et *N45*

Épididymo-orchite
- Abcès ¬ Orchite, épididymite et *N45.0*
- Neisseria gonorrhoeae ¬ *A54.2†, N51.1**
- Sans abcès ¬ Orchite, épididymite et *N45.9*

Épidural
- Cours
- - Grossesse ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie *O29.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie *O29.5*
- - Puerpéralité ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie *O89.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie *O89.5*
- - Travail accouchement ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie *O74.5*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie *O74.6*
- Extradural] ¬ Hématome *S06.4*
- Niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S35.80*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S15.80*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.80*
- Non traumatique ¬ Hémorragie *I62.1*
- Postopératoire ¬ Hémorragie rachidienne *G97.82*
- Tuberculeux ¬ Abcès *A17.8†, G07**
- ¬
- - Abcès granulome
- - - Intracrânien: *G06.0*
- - - Intrarachidien: *G06.1*
- - Hémorragie *S06.4*

Epigastre ¬ *S31.1*

Épigastrique
- Causant une occlusion ¬ Hernie *K43.60*
- Gangrène ¬ Hernie *K43.70*
- Incarcérée ¬ Hernie *K43.60*
- Non réductible ¬ Hernie *K43.60*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K43.60*
- Partiellement incarcérée ¬ Hernie *K43.60*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K43.90*
- ¬ Douleur *R10.1*

Épiglotte
- Bord libre [marge] ¬ *C10.1*
- Face antérieure ¬ *D10.5*
- Glotte larynx cartilage thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l' *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l' *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l' *Q31.8*
- Partie sus-hyoïdien
- - SAI ¬ *C32.1*

Épiglotte *–suite*
- Partie sus-hyoïdien *–suite*
- - ¬
- - - *D02.0*
- - - *D14.1*
- - - *D38.0*
- ¬
- - *S11.01*
- - Blessure de l' *S19.9*
- - Contusion de l' *S10.0*
- - Face postérieure (laryngée) de l' *C32.1*
- - Fissure (de): *Q31.8*
- - Plaie ouverte de l' *S11.01*
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur maligne: Face antérieure de l' *C10.1*

Épiglottique
- S) ¬ Pli(s) glosso- *C10.1*
- ¬ Tumeur maligne: Sillon glosso- *C10.0*

Épiglottite
- Aigu ¬
- - *J05.1*
- - Laryngite obstructive aiguë [croup] et *J05*
- SAI ¬ *J05.1*

Épignathe ¬ Tératome *Q89.4*

Épilepsie
- Absence
- - Adolescence ¬ *G40.3*
- - Enfance [pyknolepsie] ¬ *G40.3*
- - Myocloniques ¬ *G40.4*
- Anomalies anales-hypoplasie des phalanges ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère- *Q87.8*
- Atypique bénigne ¬ *G40.00*
- Bénin
- - Nourrisson
- - - Crises complexes focales ¬ *G40.08*
- - - Watanabe] ¬ *G40.08*
- - Paroxysmes occipitaux ¬ *G40.08*
- - Pics centro-temporaux [Rolando] ¬ *G40.08*
- Contracture progressive des articulations-dysmorphie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Cours de cysticercose ¬ *B69.0†, G94.8**
- Crise
- - Astato-myocloniques ¬ *G40.4*
- - Grand mal au réveil ¬ *G40.3*
- - Myoclonoastatiques ¬ *G40.4*
- Déficience intellectuel
- - Cardiopathie ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.8*
- - Déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante- *G11.1*
- - Type finnois ¬ Syndrome d' *E75.4*
- - ¬ Syndrome d'ostéogenèse imparfaite-rétinopathie- *Q87.8*

Épilepsie *–suite*
- Focale-déficience intellectuelle-malformation cérébro-cérébelleuse ¬ Syndrome d' *Q04.8*
- Généralisé
- - Convulsions fébriles plus ¬ *G40.3*
- - Dyskinésie paroxystique ¬ Syndrome d' *G40.3, G24.8*
- Idiopathique partiel localisé focal Syndrome épileptique crise initialement focal
- - Sans précision ¬ *G40.09*
- - ¬ Autres *G40.08*
- Infantile type Amish ¬ Syndrome d' *E77.8*
- Landau-Kleffner] ¬ Aphasie acquise avec *F80.3*
- Microcéphalie dysplasie squelettique ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Myoclonique
- - Bénin
- - - Enfance ¬
- - - - *G40.3*
- - - Familiale de l'adulte ¬ *G40.3*
- - Encéphalopathies non-progressives ¬ *G40.4*
- - Fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [*G31.81*
- - Infantile familiale ¬ *G40.3*
- - Petit mal impulsif] juvénile ¬ *G40.3*
- - Progressive ¬ *G40.3*
- Nordique ¬
- - *E75.4*
- - Céroïde-lipofuscinose neuronale, variante *E75.4*
- Parasitaire NCA ¬ *B71.9†, G94.8**
- Partiel
- - Bénigne à symptômes affectifs ¬ *G40.02*
- - Continue [Kojevnikov] ¬ *G40.5*
- - Familiale ¬ *G40.1*
- Photosensible ¬ *G40.8*
- Pointes occipitales ¬ *G40.08*
- Psoriasis ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Psychomotrice bénigne [crises de terreur] ¬ *G40.02*
- Pyorrhée-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'alopécie- *Q87.8*
- Pyridoxino-dépendante ¬ *G40.8*
- Réflexe
- - Alimentation ¬ *G40.8*
- - Eau chaude ¬ *G40.8*
- Rolandique
- - Dyspraxie de la parole ¬ Syndrome d' *G40.08, R48.2*
- - ¬ *G40.08*
- Sans précision ¬ *G40.9*
- Syndrome épileptique
- - Généralisé
- - - Idiopathiques ¬ *G40.3*

Épilepsie *–suite*
- Syndrome épileptique *–suite*
- - Généralisé *–suite*
- - - ¬ Autres *G40.4*
- - Idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal ¬ *G40.0*
- - Non précisés comme focaux ou généralisés ¬ *G40.8*
- - Symptomatique défini localisation focal partiel crise partiel
- - - Complexes ¬ *G40.2*
- - - Simples ¬ *G40.1*
- Système limbique ¬ Psychosyndrome de l' *F07.0*
- Temporal
- - Familiale ¬ *G40.2*
- - Mésiale familial
- - - Bénigne ¬ *G40.2*
- - - Convulsions fébriles ¬ *G40.2*
- Type
- - 2 ¬ Syndrome d'anomalies congénitales multiples-hypotonie- *Q87.8*
- - 3 ¬ Syndrome d'anomalies congénitales multiples-hypotonie- *Q87.8*
- Vitamine B6-dépendante ¬ *G40.8*
- ¬
- - *G40*
- - *G40.8*
- - Psychose d'allure schizophrénique au cours d'une *F06.2*
- - Syndrome d'anomalies congénitales multiples-hypotonie- *Q87.8*

Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus *G31.81*

Épileptiforme au cours de cysticercose ¬ Crise *B69.0†, G94.8**

Épileptique
- Associée à KCNQ2 ¬ Encéphalopathie *G40.4*
- Bioélectrique pendant le sommeil ¬ État de mal *G40.01*
- Crise initialement focal
- - Sans précision ¬ Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes *G40.09*
- - ¬ Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes *G40.08*
- Électrique pendant le sommeil lent] ¬ ESES [état de mal *G40.01*
- Enfance ¬ Syndrome *G40.8*
- Facteur suivant
- - Alcool ¬ Crises *G40.5*
- - Médicaments et drogues ¬ Crises *G40.5*
- - Modifications hormonales ¬ Crises *G40.5*
- - Privation de sommeil ¬ Crises *G40.5*
- - Stress ¬ Crises *G40.5*
- Généralisé

Épileptique *–suite*
- Généralisé *–suite*
- - Idiopathiques ¬ Épilepsie et syndromes *G40.3*
- - ¬ Autres épilepsies et syndromes *G40.4*
- Idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal ¬ Épilepsie et syndromes *G40.0*
- Infantile précoce ¬ Encéphalopathie *G40.3*
- Néonatale associée à PNPO ¬ Encéphalopathie *G40.8*
- Non précisés comme focaux ou généralisés ¬ Epilepsies et syndromes *G40.8*
- Particuliers ¬ Syndromes *G40.5*
- Partiel complexe ¬ État de mal *G41.2*
- Réfractaire d'apparition tardive ¬ État de mal *G41.8*
- SAI ¬
- - Convulsions *G40.9*
- - Crises *G40.9*
- - Psychose *F06.8*
- Sans précision ¬ État de mal *G41.9*
- Symptomatique défini localisation focal partiel crise partiel
- - Complexes ¬ Épilepsie et syndromes *G40.2*
- - Simples ¬ Épilepsie et syndromes *G40.1*
- Tonico-clonique ¬ État de mal *G41.0*
- ¬
- - Démence *G40.9†, F02.8**
- - État
- - - Absences *G41.1*
- - - Grand mal *G41.0*
- - - Mal
- - - - *G41*
- - - - *G41.8*
- - - Petit mal *G41.1*
- - Syndrome *G40.9*

Epiloïa ¬ *Q85.1*

Épimérase
v.a. diphosphate-galactose-4-épimérase
- ¬
- - Acidurie méthylmalonique par déficit en méthylmalonyl-CoA *E71.1*
- - Déficit en galactose *E74.2*

Epine scapulaire ¬ *S42.12*

Épineux
- Cervical(e) ¬ apophyse: *S12*
- Dorsal(e) ¬ apophyse: *S22*
- Lombo-sacré(e) ¬ apophyse: *S32*

Épingle [sténopéique] SAI ¬ Méat en trou d' *N35.9*

Épinière
- C1-C3 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.60!*
- C4-C5 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.61!*
- C6-C8 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.62!*

Épinière *–suite*
- Cervicale ¬ Multiples blessures de la moelle *S14.10*
- Cours
- - Carence en vitamine B12 ¬ Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle *E53.8†, G32.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle *G32.0**
- D11-L1 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.65!*
- D1-D6 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.63!*
- D7-D10 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.64!*
- Embolique) (non embolique) ¬ Infarctus aigu de la moelle *G95.18*
- Hernie discale cervicale ¬ Compression de la moelle *M50.0†, G99.2**
- L2-S1 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.66!*
- Lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique des nerfs et de la moelle *S34*
- Méninges ¬
- - Anomalie congénitale SAI de la moelle *Q06.9*
- - Lésion congénitale SAI de la moelle *Q06.9*
- - Maladie congénitale SAI de la moelle *Q06.9*
- Nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne de la moelle *C72*
- Niveau
- - Cou ¬ Lésion traumatique
- - - Cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle *T06.0*
- - - Nerfs et de la moelle *S14*
- - Non précisé ¬ Lésion traumatique de la moelle *T09.3*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique des nerfs et de la moelle *S24*
- Non précisée ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.69!*
- Plusieurs autres parties du corps ¬ Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle *T06.1*
- S2-S5 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.67!*
- Sans précision ¬
- - Affection de la moelle *G95.9*
- - Malformation congénitale de la moelle *Q06.9*
- Toute localisation] ¬ Abcès (embolique) de la moelle *G06.1*
- Traumatisme obstétrical
- - Non précisé ¬ Lésion du rachis et de la moelle *P11.59*
- - Paraplégie
- - - Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la moelle *P11.50*
- - - Chronique ¬ Lésion du rachis et de la moelle *P11.51*
- - ¬ Lésion du rachis et de la moelle *P11.5*

Épinière *–suite*
- ¬
- - Abcès à staphylocoques de la moelle *G06.1, B95.8!*
- - Affection
- - - Moelle *G95*
- - - Précisées de la moelle *G95.8*
- - Anémie avec dégénérescence combinée de la moelle *D51.0†, G32.0**
- - Compression spondylogène de la moelle *M47.19†, G99.2**
- - Dégénérescence
- - - Amyloïde de la moelle *E85.4†, G32.8**
- - - Tuberculeuse de la moelle *A17.8†, G07**
- - Douleur de désafférentation liée à une lésion de la moelle *G95.85*
- - Dyssynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle *G95.84*
- - Fracture
- - - Colonne vertébrale avec lésion de la moelle *T08.0, T09.3*
- - - Sacrum avec lésion de la moelle *S32.1, S34.18*
- - - Vertèbre
- - - - Cervicales avec lésion de la moelle *S12.9, S14.10*
- - - - Lombaires avec lésion de la moelle *S32.00, S34.18*
- - - - Thoraciques avec lésion de la moelle *S22.00, S24.10*
- - Gomme de la moelle *A52.1†, G07**
- - Hauteur fonctionnelle de la lésion de la moelle *G82.6!*
- - Hypoplasie et dysplasie de la moelle *Q06.1*
- - Infection à streptocoques de la moelle *G04.8, B95.5!*
- - Maladies précisées de la moelle *G95.88*
- - Malformation congénital
- - - Moelle *Q06*
- - - Précisées de la moelle *Q06.8*
- - Myélodysplasie de la moelle *Q06.1*
- - Œdème de la moelle *G95.18*
- - Paralysie de la moelle *G83.8*
- - Sclérose en plaques (de): moelle *G35*
- - Séquelles de lésion traumatique de la moelle *T91.3*
- - Thrombose
- - - Artérielle de la moelle *G95.18*
- - - Syphilitique d'une artère de la moelle *A52.0†, I79.8**
- - Tuberculome de moelle *A17.8†, G07**
- - Tuberculose de la moelle *A17.8†, G07**
- - Tumeur
- - - Bénigne: Moelle *D33.4*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Moelle *D43.4*
- - - Maligne: Moelle *C72.0*

Épinière-élévation des lactates ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie avec atteinte du tronc cérébral et de la moelle *G31.81*

Epiphora ¬ *H04.2*

Épiphysaire
v.a. spondylo-épiphysaire
- Hémimélique ¬ Dysplasie *Q74.8*
- Multiple
- - Anomalie du collagène 9 ¬ Dysplasie *Q77.3*
- - Dysplasie fémorale sévère ¬ Dysplasie *Q77.3*
- - Type
- - - Al-Gazali ¬ Dysplasie *Q77.3*
- - - Beighton ¬ Dysplasie *Q77.3*
- - ¬ Dysplasie *Q77.3*
- ¬
- - Arrêt *M89.1*
- - Fracture
- - - Col du fémur: Épiphyse (proximale), décollement *S72.02*
- - - Extrémité inférieure du fémur: Épiphyse, décollement *S72.42*

Épiphyse
- Décollement épiphysaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: *S72.42*
- Distale ¬ *S42.44*
- Glande pinéal ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D35.4*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.5*
- - Maligne: *C75.3*
- Inférieure du cubitus [Burns] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.1*
- Proximal
- - Décollement épiphysaire ¬ Fracture du col du fémur: *S72.02*
- - Ulna ¬ Fracture de l' *S52.00*
- - ¬ *S42.21*
- Supérieure du tibia [Blount] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.5*
- ¬ Dysfonctionnement de la glande pinéale [*E34.8*

Épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) ¬ *M93.0*

Épiphysite
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, M90.29**

Épiplocèle ¬ *K46*

Épiploïque
- Anormales ¬ Adhérences [brides] congénitales: *Q43.3*
- ¬
- - Abcès: *K65.0*
- - Adhérences (de): *K66.0*

Épiploon ¬
- *C45.1*
- *C48.1*

Épipodophyllotoxine ¬ Syndrome myélodysplasique induit
- *D46*

Épipodophyllotoxine ¬ Syndrome myélodysplasique induit *–suite*
- *D46.9*

Épirétinienne ¬ Gliose *H35.38*

Épisclérale élevée ¬ Glaucome secondaire à une pression veineuse *H40.5*

Épisclérite
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Sclérite et *H19.0**
- Goutte ¬ *M10.99†, H19.0**
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, H19.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.0**
- ¬ *H15.1*

Épisiotomie
- Agrandie par déchirure ¬ *O70*
- ¬
- - Infection d'une plaie d' *O86.0*
- - Rupture d'une suture de: *O90.1*

Épisode
- Actuel
- - Dépression
- - - Légère ou moyenne ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.3*
- - - Sévère
- - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.4*
- - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.5*
- - Hypomaniaque ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.0*
- - Léger ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.0*
- - Maniaque
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.1*
- - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.2*
- - Mixte ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.6*
- - Moyen ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.1*
- - Sévère
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.2*
- - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.3*
- Affectif mixte isolé ¬ *F38.0*
- Aigus, sans précision ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec *J44.1*
- Dépressif
- - Léger ¬ *F32.0*
- - Moyen ¬ *F32.1*
- - Récurrents de courte durée ¬ *F38.1*
- - Sans précision ¬ *F32.9*
- - Sévère
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- - - Symptômes psychotiques ¬ *F32.3*
- - ¬
- - - *F32*
- - - *F32.8*
- Hypotension-hyporéactivité ¬ *T88.1*

Épisode *–suite*
- Isolé sans symptôme psychotique ¬ Dépression
- - Agitée *F32.2*
- - Majeure *F32.2*
- - Vitale *F32.2*
- Isolés
- - Dépression
- - - Majeure avec symptômes psychotiques ¬ *F32.3*
- - - Masquée" SAI ¬ *F32.8*
- - - Psychogène ¬ *F32*
- - - Psychotique ¬ *F32.3*
- - - Réactionnelle ¬ *F32*
- - Psychose dépressif
- - - Psychogène ¬ *F32.3*
- - - Réactionnelle ¬ *F32.3*
- - Réaction dépressive (F32.0, F32.1, F32.2) ¬ *F32*
- Maniaque
- - Isolé ¬ trouble bipolaire, *F30*
- - Récurrents SAI ¬ *F31.8*
- - Sans précision ¬ *F30.9*
- - ¬
- - - *F30*
- - - *F30.8*
- Récurrent
- - F33 0 F33 1
- - - Dépression
- - - - Psychogène ¬ *F33*
- - - - Réactionnelle ¬ *F33*
- - - Réaction dépressive ¬ *F33*
- - Sévère
- - - Dépression
- - - - Majeure, avec symptômes psychotiques ¬ *F33.3*
- - - - Psychotique ¬ *F33.3*
- - - Psychose dépressif
- - - - Psychogène ¬ *F33.3*
- - - - Réactionnelle ¬ *F33.3*
- Ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, acidose lactique et *G31.81*

Épisodique
- Familial ¬ Syndrome douloureux *M79.89*
- Héréditaire ¬
- - Adynamie *G72.3*
- - Ataxie *G11.8*
- Paroxystique] ¬ Trouble panique [anxiété *F41.0*
- Spasticité ¬ Choréoathétose dystonique paroxystique avec ataxie *G24.8*
- Type
- - 1 ¬ Ataxie *G11.8*
- - 3 ¬ Ataxie *G11.8*
- - 4 ¬ Ataxie *G11.8*
- - 5 ¬ Ataxie *G11.8*

Épisodique *–suite*
- Type *–suite*
- - 6 ¬ Ataxie *G11.8*
- - 7 ¬ Ataxie *G11.8*
- - 8 ¬ Ataxie *G11.8*
- ¬
- - Algie vasculaire de la face: *G44.0*
- - Céphalée (de): tension: *G44.2*

Épispadias ¬ *Q64.0*

Epistaxis ¬ *R04.0*

Épithélial
- Bénigne des glandes salivaires ¬ Tumeur *D11.9*
- Intestinale ¬ Dysplasie *K63.8*
- Malign glande
- - Salivaires ¬ Tumeur *C07*
- - Sous-mandibulaire ¬ Tumeur *C08.0*
- - Sublinguale ¬ Tumeur *C08.1*
- Origine infectieuse ¬ Kératite *B00.5†, H19.1**
- Ovaire, à la limite de la malignité ¬ Tumeur *C56*
- ¬
- - Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*
- - Mastopathie kystique avec prolifération *N60.3*

Épithélioïde ¬
- Sarcome *C49.9*
- Tumeur trophoblastique *D39.2*

Épithélium
- Buccal y compris langue ¬
- - Érythroplasie de l' *K13.2*
- - Leuco-œdème de l' *K13.2*
- - Leucoplasie et autres anomalies de l' *K13.2*
- Langue ¬ anomalies de l' *K13*
- Pavimenteux
- - Canal cervical ¬ Présence congénitale d' *Q51.8*
- - Muqueuse utérine ¬ Présence congénitale d' *Q51.8*
- Pigmentaire
- - Rétine ¬ Hamartome combiné de l' *D31.2*
- - Rétinien ¬ Décollement de l' *H35.7*
- Vaginal ¬ Érosion de l' *N89.8*

Éponge SAI ¬ Rein en *Q61.5*

Époophoron ¬ Kyste (de): *Q50.5*

EPP ¬ *E80.0*

Épreuve
- Électrophysiologiques intracardiaques ¬ Anomalies (de): *R94.3*
- Fixation de radio-isotopes [radionucléides] ¬ résultats anormaux de: *R94*
- Fonctionnel
- - Rénales ¬ Anomalie des *R94.4*
- - Spléniques ¬ Anomalie de: *R94.8*
- - Vessie ¬ Anomalie de: *R94.8*

Épreuve *–suite*
- Sensorielles spéciales ¬ Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et *R94.1*
- Tolérance au glucose ¬ Anomalie de l' *R73.0*
- Travail
- - Sans précision ¬ Echec de l' *O66.4*
- - Suivi d'une césarienne ¬ Echec de l' *O66.4*

Epstein
v. van Bogaert-Scherer-Epstein
v.a. van Bogaert-Scherer-Epstein
- ¬
- - Perles d' *K09.8*
- - Syndrome d' *N04.9*

Epstein-Barr
- Enfant ¬ Maladie lymphoproliférative systémique à cellules T positive au virus *D82.3*
- ¬
- - Carcinome gastrique associé au virus *C16.9*
- - Colite à virus d' *B27.0†, K93.8**
- - Déficit immunitaire réponse héréditaire anormal virus
- - - *D82.3*
- - Duodénite à virus d' *B27.0†, K93.8**
- - Gastrite à virus d' *B27.0†, K93.8**
- - Iléite à virus d' *B27.0†, K93.8**
- - Infection congénitale au virus d' *P35.8*
- - Maladie
- - - Glomérulaire à virus d' *B27.0†, N08.0**
- - - Reins à virus d' *B27.0†, N29.1**
- - - Rénale tubulo-interstitielle à virus d' *B27.0†, N16.0**
- - - Urètre à virus d' *B27.0†, N29.1**
- - - Vessie à virus d' *B27.0†, N33.8**
- - Mononucléose due au virus d' *B27.0*
- - Œsophagite à virus d' *B27.0†, K23.8**
- - Pneumonie à virus d' *B27.0†, J17.1**
- - Syndrome d'infection chronique au virus *B27.0*
- - Urétrite à virus d' *B27.0†, N37.0**

Épuisement
- Chaleur
- - Perte
- - - Hydrique ¬ *T67.3*
- - - Sel ¬ *T67.4*
- - Sans précision ¬ *T67.5*
- Effort intensif ¬ *T73.3*
- Éléments ¬ *T73.2*
- Fatigue ¬ *O26.88*
- Maternel au cours du travail et de l'accouchement ¬ *O75.0*
- Total ¬ État d' *Z73*

Epulis
- Cellules géantes ¬ *K06.8*
- Congénital ¬ *K06.8*
- Fibreux ¬ *K06.8*

Équatorial ¬ Staphylome *H15.8*

Équilibre
- Acido-basique
- - Fœtale ¬ Anomalie de l' *O68.3*
- - ¬ Anomalie mixte de l' *E87.4*
- Électrolytique, calorique et hydrique ¬ Intoxication: Produits agissant sur l' *T50.3*
- Potassique du nouveau-né ¬ Anomalies de l' *P74.3*
- Sodique du nouveau-né ¬ Anomalies de l' *P74.2*

Équilibré
- Marqueur
- - Structuraux, non classés ailleurs ¬ Réarrangements *Q95*
- - Structurel
- - - Sans précision ¬ Réarrangement *Q95.9*
- - - ¬ Autres réarrangements *Q95.8*
- Sujet
- - Anormal ¬ Réarrangement
- - - Autosomique *Q95.2*
- - - Sexuel/autosomique *Q95.3*
- - Normal ¬ Translocation ou insertion *Q95.0*
- ¬ translocation insertion
- - Non *Q92*
- - Réciproques robertsoniennes et *Q95*

Équin
- Acquis ¬ Pied *M21.62*
- Occidentale ¬ Encéphalite *A83.1*
- Orientale ¬ Encéphalite *A83.2*
- Vénézuélienne ¬ Fièvre *A92.2*
- ¬ Pied bot varus *Q66.0*

Equinovarus avec communication interatriale, séquence de Robin et persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome TARP (Talipes *Q87.8*

Équipe
- Sportives ¬ Examen général en série de: *Z10*
- ¬ Travail en *Z56*

Équitation ou accident de véhicule attelé à un animal ¬ Accident d' *V99!*

Équivalents migraineux ¬ Migraine: *G43.1*

Érable ¬
- Maladie
- - Menkes I [syndrome du sirop d' *E71.0*
- - Urines à odeur de sirop d' *E71.0*
- Poumon des écorceurs d' *J67.6*

Éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Abrasion/ *S40.81*

Erb due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de Duchenne- *P14.0*

Erb-Charcot ¬ Maladie d' *G11.4*

Érectile
- Organique ¬ Insuffisance *N48.4*
- Psychogène ¬ Dysfonctionnement *F52.2*

Érection
- Douloureuse ¬ *N48.3*

Érection *–suite*
- Homme ¬ Trouble de: *F52.2*
- Insuffisante ¬ *N48.4*

ERG] ¬ Anomalies (de): électrorétinogramme [*R94.1*

Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs ¬ *Z50.7!*

Erickson
v. Abruzzo-Erickson

Érosion
- Aiguë) de l'estomac ¬ *K29.6*
- Anastomotique ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Artérielle ¬ *I77.8*
- Dent
- - Idiopathique ¬ *K03.2*
- - Médicaments ¬ *K03.2*
- - Professionnelle ¬ *K03.2*
- - Régime alimentaire ¬ *K03.2*
- - SAI ¬ *K03.2*
- - Vomissements persistants ¬ *K03.2*
- - ¬ *K03.2*
- Ectropion
- - Col de l'utérus ¬ *N86*
- - ¬
- - - Cervicite avec ou sans *N72*
- - - Endocervicite avec ou sans *N72*
- - - Exocervicite avec ou sans *N72*
- Épithélium vaginal ¬ *N89.8*
- Gastro-colique ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Gastro-intestinal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Gastro-jéjunal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Jéjunal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Marginal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Œsophage ¬ *K20*
- Postopératoire post-TVT ¬ *T83.4*
- Récidivante de la cornée ¬ *H18.8*
- Stomal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- ¬ Hémorragie artérielle par *I77.2*

Érosive
- Hémorragie ¬ Gastrite aiguë (*K29.0*
- Vésiculaire congénitale ¬ Dermatose *P83.8*
- ¬ (Ostéo)arthrose *M15.4*

Erreur de dosage ¬ *Y69!*

Erronée d'un médicament ¬ Administration accidentelle ou prise *X49.9!*

Ertbruggen
v. Beemer-Ertbruggen

Éructation
- Nerveuse ¬ *F45.31*
- Psychogène ¬ *F45.31*
- ¬ *R14*

Éruptif
- Généralisée ¬ Histiocytose *D76.3*
- ¬ Xanthome: tubéro- *E78.2*

Éruption
- Consécutive à vaccination ¬ *T88.1*
- Cutané
- - Non spécifiques ¬ Rash et autres *R21*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R21*
- Dentaire
- - Prématurée ¬ *K00.6*
- - ¬
- - - Kyste: lié à l' *K09.0*
- - - Syndrome d' *K00.7*
- - - Troubles de l' *K00.6*
- Généralisée due à des médicaments ¬ *L27.0*
- Localisée due à des médicaments ¬ *L27.1*
- Polymorphe de la grossesse ¬ *O26.88*
- Sérique ¬ *T80.6*
- ¬ Modification de la teinte des tissus dentaires durs après l' *K03.7*

Érysipèle
- Oreille externe ¬ *A46†, H62.0**
- ¬
- - *A46*
- - Otite externe au cours d' *A46†, H62.0**

Érysipéloïde
- Cutanée ¬ *A26.0*
- Sans précision ¬ *A26.9*
- ¬
- - *A26*
- - Formes d' *A26.8*

Erysipelothrix ¬ Septicémie à *A26.7*

Erythema elevatum diutinum ¬ *L95.1*

Érythémateux
- Chronique discoïde ¬ Lupus *L93.0*
- Cutané
- - Rare ¬ Lupus *L93.0*
- - Subaigu ¬ Lupus *L93.1*
- Discoïde de la paupière ¬ Lupus *H01.1*
- Disséminé
- - Atteinte
- - - Organes et d'appareils ¬ Lupus *M32.1†*
- - - Poumons ¬ Lupus *M32.1†, J99.1**
- - - Rénale tubulo-interstitielle ¬ Lupus *M32.1†, N16.4**
- - Médicamenteux ¬ Lupus *M32.0*
- - Mère ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: lupus *P00.8*
- - Sans précision ¬ Lupus *M32.9*
- - ¬
- - - Artérite cérébrale au cours de lupus *M32.1†, I68.2**
- - - Démence au cours de lupus *M32.1†, F02.8**
- - - Encéphalite au cours d'un lupus *M32.1†, G05.8**
- - - Formes de lupus *M32.8*
- - - Glomérulonéphrite
- - - - Cours de lupus *M32.1†, N08.5**

Érythémateux *–suite*
- Disséminé *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Glomérulonéphrite *–suite*
- - - - Proliférative diffuse au cours de lupus *M32.1†, N08.5**
- - - Glomérulopathie au cours de lupus *M32.1†, N08.5**
- - - Lupus *M32*
- - - Myopathie au cours de lupus *M32.1†, G73.7**
- - - Néphrite au cours de lupus *M32.1†, N08.5**
- - - Néphrose au cours de lupus *M32.1†, N08.5**
- - - Péricardite au cours de lupus *M32.1†, I32.8**
- - - Polyneuropathie au cours de lupus *M32.1†, G63.5**
- Localisés ¬ Autres lupus *L93.2*
- Néonatal ¬ Lupus *P00.8*
- Pinta [caraté] ¬ Plaques *A67.1*
- Profond ¬ Lupus *L93.2*
- Réticulée ¬
- - Folliculite *L66.4*
- - Mucinose *L98.5*
- SAI ¬ Lupus *L93.0*
- Systémique ¬ Lupus *M32.9*
- Type Chilblain ¬ Lupus *L93.2*
- Verruqueux ou hypertrophique ¬ Lupus *L93.2*
- ¬
- - Encéphalopathie au cours de lupus *M32.1†, G05.8**
- - Endocardite au cours de lupus *M32.1†, I39.8**
- - Intertrigo *L30.4*
- - Mucinose réticulée *L98.5*
- - Pemphigus *L10.4*

Erythematodes integumentalis ¬ Lupus *L93.0*

Érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite *L44.4*

Érythème
- Acnéiforme ¬ *L66.4*
- Annulaire centrifuge ¬ *L53.1*
- Arthritique épidémique ¬ *A25.1*
- Chronique migrateur à Borrelia burgdorferi ¬ *A69.2*
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *L54.8**
- Fessier ¬ *L22*
- Feu [dermite due au feu] ¬ *L59.0*
- Figuré chronique ¬ Autres formes d' *L53.3*
- Gingival linéaire ¬ *K05.1*
- Induré tuberculeux ¬ *A18.4*
- Infectieux [cinquième maladie] ¬ *B08.3*
- Iris ¬ *L51.1†, H22.8**
- Kératolytique hivernal ¬ *Q82.8*
- Marginé

Érythème *–suite*
- Marginé *–suite*
- - Cours d'une fièvre rhumatismale aiguë ¬ *I00†, L54.0**
- - Discoïde de Besnier ¬ *L53.2*
- Migrant [rouget du porc] ¬ *A26.0*
- Multiforme de la conjonctive ¬ *L51.1†, H13.8**
- Nécrolytique acral ¬ *L53.8*
- Noueux ¬
- - *L52*
- - Arthropathie au cours d' *L52†, M14.89**
- Pigmenté fixe ¬ *L27.1*
- Plantaire ¬ *L53.8*
- Polymorphe
- - Bulleux ¬ *L51.1*
- - Non bulleux ¬ *L51.0*
- - Sans précision ¬ *L51.9*
- - ¬
- - - *L51*
- - - Arthropathie au cours d' *L51.9†, M14.89**
- - - Formes d' *L51.8*
- SAI ¬ *L53.9*
- Sans précision ¬ *L53.9*
- Toxique
- - Nouveau-né ¬ *P83.1*
- - ¬ *L53.0*
- ¬ forme
- - *L53*
- - Précisées d' *L53.8*

Érythrasma ¬ *L08.1*

Érythrémie chronique
- Rémission complète ¬ *D45*
- ¬ *D45*

Érythroblastique
- Héréditaire avec test de lyse positif dans un sérum acidifié ¬ Multinucléarité *D64.4*
- ¬ Anémie leuco- *D64.8*

Érythroblastopénie
- Acquise) (adulte) (avec thymome) ¬ *D60*
- Congénitale ¬ *D61.0*
- Pur
- - Congénitale ¬ *D61.0*
- - Nourrisson ¬ *D61.0*
- - Primaire ¬ *D61.0*
- Transitoire de l'enfance ¬ *D60.1*
- ¬ Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure [*D60*

Érythroblastose chronique type Heilmeyer-Schöner
- Rémission complète ¬ *D45*
- ¬ *D45*

Erythrocyanose ¬ *I73.8*

Érythrocytaire ¬ Déficit en pyruvate kinase *D55.2*

Erythrocytose
- Congénitale primitive ¬ *D75.0*
- Familiale ¬ *D75.0*
- Liée au stress ¬ *D75.1*
- SAI ¬ *D75.1*

Érythrodermie
- Congénital ichtyosiforme
- - Bulleuse de Brock ¬ *Q80.3*
- - Non-bulleuse ¬ *Q80.2*
- - Réticulaire ¬ *Q80.3*
- Desquamative ¬ *L21.1*
- Ichtyosiforme bulleuse congénitale ¬ *Q80.3*
- Réticulo-leucémique maligne ¬ *C84.1*
- SAI ¬ *L53.9*

Érythrodermique diffuse type Voerner ¬ Kératodermie palmoplantaire *Q82.8*

Érythrodysesthésie palmoplantaire ¬ *L27.1*

Erythrokératodermie
- Cocardes ¬ *Q82.8*
- Progressive et symétrique ¬ *Q82.8*
- Variable ¬ *Q82.8*

Erythroleucémie ¬ *C94.0*

Érythroleucose ¬ Polyglobulie primitive aiguë et *C94.0*

Erythromélalgie
- Primaire ¬ *I73.8*
- ¬ *I73.8*

Érythroplasie
- Épithélium buccal, y compris la langue ¬ *K13.2*
- Queyrat
- - SAI ¬ *D07.4*
- - ¬ *D07.4*

Érythropoïétine ¬ Polycythémie: due à: *D75.1*

Érythropoïétique
- Congénitale ¬ Porphyrie *E80.0*
- Héréditaire ¬ Porphyrie *E80.0*
- ¬ Protoporphyrie *E80.0*

Erythroprosopalgie de type Bing ¬ *G44.0*

Érythrose chronique
- Rémission complète ¬ *D45*
- ¬ *D45*

Escarre
- Décubitus) ¬ *L89*
- Pression
- - Abrasion ¬ Ulcère [*L89.1*
- - Perte cutané
- - - Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [*L89.1*
- - - SAI ¬ Ulcère [*L89.1*
- - Phlyctène ¬ Ulcère [*L89.1*
- - Sans indication de degré ¬ Ulcère [*L89.9*

Escher-Hort ¬ Syndrome de *H90.0*

Escherichia coli
- E. coli] ¬ Septicémie: *A41.51*
- Multirésistant

Escherichia coli *–suite*
- Multirésistant *–suite*
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.00!*
- - 3MRGN ¬ *U81.20!*
- - 4MRGN ¬ *U81.40!*
- SAI ¬ Entérite à *A04.4*
- ¬
- - Arthrite à *M00.89, B96.2!*
- - Choc septique à *A41.51, R57.2*
- - Diarrhée entéropathogène à *A04.0*
- - Entérite
- - - Entéro-aggrégative à *A04.4*
- - - Entéro-hémorragique à *A04.3*
- - - Entéro-invasive à *A04.2*
- - - Entérotoxigène à *A04.1*
- - Infection
- - - *A49.8*
- - - Congénitale à *P37.8, B96.2!*
- - - Entéro-hémorragique à *A04.3*
- - - Entéro-invasive à *A04.2*
- - - Entéropathogène à *A04.0*
- - - Entérotoxigène à *A04.1*
- - - Généralisée à *A41.51*
- - - Intestinales à *A04.4*
- - - Voies urinaires à *N39.0, B96.2!*
- - Méningite à *G00.8, B96.2!*
- - Méningo-encéphalite à *G04.2, B96.2!*
- - Pneumonie
- - - *J15.5*
- - - Congénitale à *P23.4*
- - Sepsis du nouveau-né à *P36.4*

ESES [état de mal épileptique électrique pendant le sommeil lent] ¬ *G40.01*

Esophorie ¬ *H50.5*

Ésotropie
- Alternante) (monoculaire) non intermittente ¬ *H50.0*
- Strabisme convergent] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ *H50.3*
- Syndactylie-petite taille ¬ Syndrome de blépharophimosis-ptosis- *Q87.8*
- ¬ Maladie de Basedow avec orbitopathie endocrinienne et *E05.0†, H06.3**

Espace
- Intervertébral
- - Ossification et subluxation ¬ Rétrécissement des *M99.6*
- - Tissu conjonctif et discal ¬ Rétrécissement des *M99.7*
- Rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l' *R93.5*

Espacement anormal d'une ou de plusieurs dents ¬ *K07.3*

Espèce
- Appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les *B35*

Espèce *–suite*

- Bordetella ¬ Coqueluche due à d'autres *A37.8*
- Demodex ¬ Dermatite des paupières due à l' *B88.0†, H03.0**
- Paragonimus ¬ Infection par l' *B66.4*
- Plasmodium
- - Exception Plasmodium falciparum
- - - Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres *B52*
- - - ¬ infections mixtes à Plasmodium vivax et autres *B51*
- - ¬ Infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre *B50*
- Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi ¬ infection ou intoxication alimentaire due à toute *A02*

Espundia ¬ *B55.2*

Essence ¬

- *T52.0*
- Pneumonie due à des huiles et des *J69.1*

Essentiel

- Bénigne ¬ Hypertension *I10.0*
- Cuir chevelu ¬ Pachydermie vorticellée primaire *Q82.8*
- Hémorragique) ¬ Thrombocytémie *D47.3*
- Maligne ¬ Hypertension *I10.1*
- Non précisée ¬ Hypertension *I10.9*
- Préexistant
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Hypertension *O10.0*
- - Cours de la grossesse, avec prééclampsie surajoutée ¬ Hypertension *O11*
- Primitif
- - Systémique) ¬ Hypertension (artérielle) (*I10*
- - ¬ Hypertension *I10*
- Progressive) ¬ Atrophie de l'iris (*H21.2*
- ¬
- - Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: tremblement *G11.1*
- - Carence en acides gras *E63.0*
- - Cryoglobulinémie: *D89.1*
- - Cutis verticis gyrata primitif non *Q82.8*
- - Fructosurie *E74.1*
- - Histiocytose lipoïde *E75.2*
- - Hypercholestérolémie *E78.0*
- - Hyperglycéridémie *E78.1*
- - Pentosurie *E74.8*
- - Polyglobulie *D45*
- - Télangiectasie *L81.7*
- - Thrombocytose *D47.3*
- - Tremblement *G25.0*

Essentiellement

- Délirant ¬ Autre trouble psychotique aigu, *F23.3*
- Non médicinale ¬ Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine *T97*

Essentiellement *–suite*

- Sexuel
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies dont le mode de transmission est *O98.3*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres maladies dont le mode de transmission est *A63*
- - ¬
- - - Maladies précisées dont le mode de transmission est *A63.8*
- - - Sujet
- - - - Contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est *Z20.2*
- - - - Porteur de maladies dont le mode de transmission est *Z22.4*
- Sur
- - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ Intoxication: Substances agissant *T48.7*
- - Muscle
- - - Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances agissant *T48*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substances agissant *T48.2*
- - Peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant *T49*
- - Système
- - - Cardio-vasculaire
- - - - Sans précision ¬ Intoxication: Substances agissant *T46.9*
- - - - ¬ Intoxication par substances agissant *T46*
- - - Nerveux autonome
- - - - Sans précision ¬ Intoxication: Médicaments agissant *T44.9*
- - - - ¬ Intoxication par médicaments agissant *T44*
- - Tractus gastro-intestinal
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substance agissant *T47.9*
- - - ¬ Intoxication: Autres substances agissant *T47.8*
- Systémique hématologique
- - Non classées ailleurs ¬ Intoxication par substances *T45*
- - Sans précision ¬ Intoxication: Substance *T45.9*
- - ¬ Intoxication: Autres substances *T45.8*

Essoufflement ¬ *R06.0*

Ester

- Cholestérol ¬
- - Déficit en protéine de transfert des *E78.4*
- - Maladie de stockage des *E75.5*
- Nitriques ¬ Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et *T65.5*
- ¬ Solvants du groupe: *L24.2*

Estérase [C1-INH] ¬ Déficit de l'inhibiteur de la C1 *D84.1*

Esthésioneuroblastome ¬ *C30.0*

Esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération *U69.10!*

Esthiomène ¬ *A55*

Estime de soi pendant l'enfance ¬ Evénements ayant entraîné la perte de l' *Z61*

Estival

- Europe centrale (FSME) ¬ Encéphalite verno- *A84.1*
- Russe] ¬ Encéphalite de la taïga [encéphalite verno- *A84.0*

Estomac

- Anti-inflammatoires non stéroïdiens ¬ Ulcère de l' *K25.9, Y57.9!*
- Diffus
- - Familial ¬ Cancer de l' *C16.9*
- - Héréditaire ¬ Cancer de l' *C16.9*
- Duodénum
- - Saignement ¬ Angiodysplasie de l' *K31.82*
- - Sans
- - - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie de l' *K31.81*
- - - Précision ¬ Maladie de l' *K31.9*
- - ¬
- - - Affections précisées de l' *K31.88*
- - - Fistule de l' *K31.6*
- - - Maladie
- - - - *K31*
- - - - Précisées de l' *K31.8*
- - - Polype de l' *K31.7*
- - - Ulcères aigus de l' *K27.3*
- Origine médicamenteuse ¬ Ulcère de l' *K25.9, Y57.9!*
- Sablier
- - Congénital ¬ *Q40.2*
- - Sténose de l'estomac ¬ *K31.2*
- Sans précision ¬
- - Malformation congénitale de l' *Q40.3*
- - Tumeur malign
- - - *C16.9*
- - - Grande courbure de l' *C16.6*
- - - Petite courbure de l' *C16.5*
- Type Borrmann 4 ¬ Cancer de l' *C16.9*
- ¬
- - Absence acquise de partie d' *Z90.3*
- - Adénocarcinome
- - - *C16.9*
- - - Diffus de l' *C16.9*
- - Antre de l' *C16.3*
- - Carcinoma in situ: *D00.2*
- - Carcinome
- - - Épidermoïde de l' *C16.9*
- - - In situ de la cavité buccale, de l'œsophage et de l' *D00*
- - - Indifférencié de l' *C16.9*
- - Contraction en sablier de l' *K31.8*

Estomac *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Corps étranger dans l' *T18.2*
- - Dédoublement de l' *Q40.2*
- - Déplacement congénital de l' *Q40.2*
- - Dilatation aiguë de l' *K31.0*
- - Distension aiguë de l' *K31.0*
- - Diverticule congénital de l' *Q40.2*
- - Érosion (aiguë) de l' *K29.6*
- - Estomac ¬ Estomac en sablier et sténose de l' *K31.2*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur de l' *Z12.0*
- - Infection à Helicobacter pylori au cours d'ulcère de l' *K25.9, B98.0!*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- - Lésion traumatique de l' *S36.3*
- - Linite plastique de l' *C16.9*
- - Malformations congénitales précisées de l' *Q40.2*
- - Œsophage et *C16.0*
- - Orifice œsophagien de l' *C16.0*
- - Rupture de l' *K31.88*
- - Syphilis de l' *A52.7†, K93.8**
- - Troubles fonctionnels de l' *K31*
- - Tuberculose de l' *A18.8†, K93.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D13.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.1*
- - - Malign
- - - - *C16*
- - - - Corps de l' *C16.2*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C16.8*
- - - Neuroendocrine
- - - - *C16.9*
- - - - *D13.1*
- - - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l' *C16.9*
- - Ulcère de l' *K25*

Établissement
- Certificat médical ¬ *Z02*
- Formation ¬ inscription dans: *Z02*
- Institutionnels ¬ Examen général en série de: résidents d' *Z10*
- Pénitentiaire ¬ inscription dans: *Z02*
- Prise en charge adapté ¬ Personne attendant d'être admise dans un *Z75.8*
- Résidentiel ¬ inscription dans: *Z02*
- Santé et autres structures d'aide ¬ Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux *Z75.8*
- Soins ¬ Autres pensionnaires d' *Z76.4*

Etage
- Sous-glottique ¬ Tumeur maligne: *C32.2*
- Sus-glottique ¬ Tumeur maligne: *C32.1*

Etain et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.6*

Étalage sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: vol à l' *Z03.2*

Étalé en eventail, acquis ¬ Pied *M21.63*

État
- Classé O00 O07 ¬
- - Afibrinogénémie survenant après les *O08.1*
- - Anurie survenant après les *O08.4*
- - Arrêt cardiaque survenant après les *O08.8*
- - Choc (post-opératoire) survenant après les *O08.3*
- - Coagulation intravasculaire survenant après les *O08.1*
- - Collapsus vasculaire survenant après les *O08.3*
- - Embolie
- - - Caillot sanguin survenant après les *O08.2*
- - - Gazeuse survenant après les *O08.2*
- - - Liquide amniotique survenant après les *O08.2*
- - - Pulmonaire survenant après les *O08.2*
- - - Pyohémique survenant après les *O08.2*
- - - SAI survenant après les *O08.2*
- - - Savon survenant après les *O08.2*
- - - Septique ou septicopyohémique survenant après les *O08.2*
- - Endométrite survenant après les *O08.0*
- - Infection des voies urinaires survenant après les *O08.8*
- - Insuffisance rénale (aiguë) survenant après les *O08.4*
- - Lacération perforation déchirure lésion origine chimique
- - - Col de l'utérus survenant après les *O08.6*
- - - Intestin survenant après les *O08.6*
- - - Ligament large survenant après les *O08.6*
- - - Tissu périurétral survenant après les *O08.6*
- - - Utérus survenant après les *O08.6*
- - - Vessie survenant après les *O08.6*
- - Nécrose tubulaire survenant après les *O08.4*
- - Oligurie survenant après les *O08.4*
- - Ovarite survenant après les *O08.0*
- - Paramétrite survenant après les *O08.0*
- - Péritonite pelvienne survenant après les *O08.0*
- - Salpingite survenant après les *O08.0*
- - Salpingo-ovarite survenant après les *O08.0*
- - Syndrome
- - - Défibrination survenant après les *O08.1*
- - - Infectieux survenant après les *O08.0*
- - Urémie survenant après les *O08.4*
- Délirant
- - États délirants et hallucinatoires d'origine organique ¬ *F06.2*
- - Hallucinatoires d'origine organique ¬ Etats délirants et *F06.2*
- Hypertensifs préexistants ¬ Prééclampsie surajoutée dans: les *O11*

État *–suite*
- Inflammatoires précisés de la mâchoire ¬ Autres *K10.28*
- Mal épileptique ¬ Autres *G41.8*
- Mentionné
- - Ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie hypophysaire ou hypothalamique ¬ les *E23*
- - Compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux ¬ les *O98*
- - Cours grossesse puerpéralité lactation ¬
- - - *O91*
- - - *O92*
- - Protéinurie préexistante ¬ les *O10*
- - Sans précision cause mortalité morbidité soin supplémentaire
- - - Fœtus ou du nouveau-né ¬ les *P08*
- - - Nouveau-né ¬ les *P07*
- Pathologiques ¬ Examen spécial de dépistage d'autres maladies et *Z13*
- Post-chirurgical
- - Précisés ¬ Autres *Z98.8*
- - ¬ Autres *Z98*
- Précis ¬
- - Antécédents personnels d'autres *Z87.8*
- - Maladie par VIH à l'origine d'autres *B23.8*
- Transe et de possession ¬ *F44.3*

Étendue
- Sur la surface du corps ¬ Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur *T95.4*
- Surface corps atteinte ¬
- - Brûlures classées selon l' *T31!*
- - Corrosions classées selon l' *T32!*

Eternuement ¬ *R06.7*

Ethanol ¬ Effet toxique: *T51.0*

Éthanolaminurie ¬ *E72.8*

Ether de pétrole ¬ *T52.0*

Ethmoïdal
- Aiguë ¬ Sinusite *J01.2*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.2*
- SAI ¬ Sinusite *J32.2*
- ¬
- - Polypes du sinus (de): *J33.8*
- - Sinus: *S02.1*
- - Tumeur maligne: Sinus *C31.1*

Ethmoïde ¬ Os
- *C41.01*
- *D16.41*

Ethmoïdite de Woakes ¬ Syndrome ou *J33.1*

Éthylique ¬ Alcool *T51.0*

Éthylmalonique ¬ Encéphalopathie *G31.81*

Étiologie
- Inconnue ¬ Fièvre d' *R50.80*
- Non précis ¬
- - *I07*
- - *I08*

ETO ¬ LMA 1/ *C92.0*

Étoile

- Mer ¬ *T63.6*
- ¬ Hyalose syphilitique tardive en forme d' *A52.7†, H45.8**

Étouffement

- Lit ¬ *X59.9!*
- ¬ Sensation d' *R06.88*

Étourdissements et éblouissements ¬ *R42*

Étrange et inexplicable ¬ Comportement *R46.2*

Étranglé

- Sans gangrène ¬ Hernie
- - Crurale (unilatérale): *K41.3*
- - Diaphragmatique: *K44.0*
- - Incisionnelle: *K43.0*
- - Inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - Ombilicale: *K42.0*
- - Parastomale: *K43.3*
- - Ventrale *K43.69*
- ¬
- - Hémorroïdes
- - - Externes *K64.5*
- - - Internes *K64.8*
- - Hernie
- - - Hypogastrique *K43.68*
- - - Ligne médiane *K43.68*
- - - Sous-xiphoïdienne *K43.68*
- - - Spieghel *K43.68*

Étranglement

- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.2*
- Ischémique de l'intestin ¬ *K55.1*
- ¬ *X59.9!*

Étrier

- Pouces et orteils larges ¬ Ankylose de l' *Q87.8*
- ¬ *Z96.2*

Étroit ¬

- Glaucome primitif à angle *H40.2*
- Orifice hyménal *N89.6*

Étudiants ¬ Examen général en série de: *Z10*

Eulenburg] ¬ Paramyotonie congénitale [Maladie d' *G71.1*

Eumycétome ¬ *B47.0*

Eunuchoïdisme fertile ¬ Syndrome de: *E23.0*

Europe central

- FSME) ¬ Encéphalite verno-estivale d' *A84.1*
- Transmise par des tiques ¬ Encéphalite d' *A84.1*

Eustache

- Persistante ¬ Valve d' *Q26.8*
- Sans précision ¬ Affection de la trompe d' *H69.9*
- ¬
- - Absence de trompe d' *Q16.2*
- - Affection

Eustache *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Affection *–suite*
- - - Précisées de la trompe d' *H69.8*
- - - Trompe d' *H69*
- - Compression de la trompe d' *H68.1*
- - Distension de la trompe d' *H69.0*
- - Obstruction de la trompe d' *H68.1*
- - Orifice de la trompe d' *C11.2*
- - Rétrécissement de la trompe d' *H68.1*
- - Salpingite
- - - Obstruction de la trompe d' *H68*
- - - Trompe d' *H68.0*
- - Sténose de la trompe d' *H68.1*
- - Syphilis de la trompe d' *A52.7†, J99.8**
- - Trompe
- - - *C30.1*
- - - *Z96.2*
- - Tuberculose de la trompe d' *A18.6†, H75.0**

Euthyroïdien ¬ Syndrome de dysfonctionnement *E07.8*

Évaginée ¬ Dent: *K00.2*

Evanouissement ¬ *R55*

Evans ¬ Syndrome d' *D69.3*

Évasif ¬ Caractère soupçonneux et *R46.5*

Événement

- Aigu constituant un risque vital chez le nourrisson ¬ *R06.80*
- Cours ¬
- - Hémiplégie
- - - Embolique en tant qu' *I63.4, G81.9*
- - - Thrombotique en tant qu' *I63.3, G81.9*
- - Monoplégie
- - - Embolique en tant qu' *I63.4, G83.3*
- - - Thrombotique en tant qu' *I63.3, G83.3*
- - Tétraplégie
- - - Embolique en tant qu' *I63.4, G82.52*
- - - Thrombotique en tant qu' *I63.3, G82.52*
- Entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance ¬ *Z61*
- Sans autre précision, circonstances indéterminées ¬ *Y34!*
- Sources de tension ¬ Inquiétude et préoccupation exagérées pour les *R46.6*

Eventail, acquis ¬ Pied étalé en *M21.63*

Éventration

- Diaphragme ¬ *Q79.1*
- ¬
- - *K43.99*
- - Défaut congénital du diaphragme, avec *Q79.1*

Eversion

- Col de l'utérus ¬ *N86*
- Point lacrymal ¬ *H04.5*

Évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Mise en *R75*

Évident ¬ Mise observation

- Activité répréhensible en bande sans trouble psychiatrique *Z03.2*
- Comportement asocial sans trouble psychiatrique *Z03.2*
- Pyromanie sans trouble psychiatrique *Z03.2*
- Vol à l'étalage sans trouble psychiatrique *Z03.2*

Évitante] ¬ Personnalité anxieuse [*F60.6*

Evitement de l'enfance et de l'adolescence ¬ *F93.2*

Évoluant vers crise secondairement généralisé ¬ crise partiel

- Complexes *G40.2*
- Simples *G40.1*

Évolutif

- Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament ¬ Autres formes *D70.18*
- ¬
- - Cardiopathie aiguë ou *I01.9*
- - Rachitisme *E55.0*

Évolution

- Imprévisible inconnu
- - Appareil
- - - Digestif, sans précision ¬ Tumeurs à *D37.9*
- - - Respiratoire, sans précision ¬ Tumeurs à *D38.6*
- - Appendice ¬ Tumeurs à *D37.3*
- - Atteinte pluriglandulaire ¬ Tumeurs à *D44.8*
- - Bassinet ¬ Tumeurs à *D41.1*
- - Canal cranio-pharyngien ¬ Tumeurs à *D44.4*
- - Côlon ¬ Tumeurs à *D37.4*
- - Corpuscule carotidien ¬ Tumeurs à *D44.6*
- - Encéphale
- - - Infratentoriel ¬ Tumeurs à *D43.1*
- - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D43.2*
- - - Supratentoriel ¬ Tumeurs à *D43.0*
- - Épiphyse [glande pinéale] ¬ Tumeurs à *D44.5*
- - Estomac ¬ Tumeurs à *D37.1*
- - Foie, vésicule et voies biliaires ¬ Tumeurs à *D37.6*
- - Glande endocrine, sans précision ¬ Tumeurs à *D44.9*
- - Glomus aortique et autres paraganglions ¬ Tumeurs à *D44.7*
- - Hypophyse ¬ Tumeurs à *D44.3*
- - Intestin grêle ¬ Tumeurs à *D37.2*
- - Larynx ¬ Tumeurs à *D38.0*
- - Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ Tumeurs à *D37.0*
- - Médiastin ¬ Tumeurs à *D38.3*
- - Méninges
- - - Cérébrales ¬ Tumeurs à *D42.0*
- - - Rachidiennes ¬ Tumeurs à *D42.1*

Évolution *–suite*
- Imprévisible inconnu *–suite*
- - Méninges *–suite*
- - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D42.9*
- - Moelle épinière ¬ Tumeurs à *D43.4*
- - Nerf
- - - Crâniens ¬ Tumeurs à *D43.3*
- - - Périphériques et du système nerveux autonome ¬ Tumeurs à *D48.2*
- - Organe
- - - Digestif ¬ tumeur
- - - - *D37.7*
- - - - Cavité buccale et des organes digestifs à *D37.78*
- - - Génital
- - - - Femme
- - - - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D39.9*
- - - - - ¬ Tumeurs à *D39.7*
- - - - Homme
- - - - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D40.9*
- - - - - ¬ Tumeurs à *D40.7*
- - - Respiratoires ¬ Tumeurs à *D38.5*
- - - Urinaire
- - - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D41.9*
- - - - ¬ Tumeurs à *D41.7*
- - Os et cartilage articulaire ¬ Tumeurs à *D48.0*
- - Ovaire ¬ Tumeurs à *D39.1*
- - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à *D37.70*
- - Parathyroïde ¬ Tumeurs à *D44.2*
- - Parties du système nerveux central ¬ Tumeurs à *D43.7*
- - Peau ¬ Tumeurs à *D48.5*
- - Péritoine ¬ Tumeurs à *D48.4*
- - Placenta ¬ Tumeurs à *D39.2*
- - Plèvre ¬ Tumeurs à *D38.2*
- - Prostate ¬ Tumeurs à *D40.0*
- - Rectum ¬ Tumeurs à *D37.5*
- - Rein ¬ Tumeurs à *D41.0*
- - Rétropéritoine ¬ Tumeurs à *D48.3*
- - Sans précision ¬ Tumeur
- - - *D48.9*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à *D47.9*
- - Sein ¬ Tumeurs à *D48.6*
- - Sièges précisés ¬ Tumeurs à *D48.7*
- - Surrénale ¬ Tumeurs à *D44.1*
- - Système nerveux central, sans précision ¬ Tumeurs à *D43.9*
- - Testicule ¬ Tumeurs à *D40.1*
- - Thymus ¬ Tumeurs à *D38.4*
- - Thyroïde ¬ Tumeurs à *D44.0*
- - Tissu conjonctif et autres tissus mous ¬ Tumeurs à *D48.1*
- - Trachée, bronches et poumon ¬ Tumeurs à *D38.1*

Évolution *–suite*
- Imprévisible inconnu *–suite*
- - Uretère ¬ Tumeurs à *D41.2*
- - Urètre ¬ Tumeurs à *D41.3*
- - Utérus ¬ Tumeurs à *D39.0*
- - Vessie ¬ Tumeurs à *D41.4*
- - ¬ Tumeur
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à *D37*
- - - Encéphale et du système nerveux central à *D43*
- - - Glandes endocrines à *D44*
- - - Histiocytaires à *D47.7*
- - - Histiocytes et mastocytes à *D47.0*
- - - Méninges à *D42*
- - - Oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à *D38*
- - - Organe
- - - - Génital
- - - - - Femme à *D39*
- - - - - Homme à *D40*
- - - - Urinaires à *D41*
- - - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à *D47.7*
- - - Sièges autres et non précisés à *D48*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à *D47*
- Polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d' *M08.3*
- Poussées) ¬ Sclérose en plaques rémittente (*G35.1*
- Rapide ¬
- - Glomérulonéphrite d' *N01*
- - Glomérulopathie d' *N01*
- - Néphrite d' *N01*
- - Syndrome néphritique d' *N01*

Évoqués visuellement ¬ Anomalies (de): potentiels *R94.1*

Ewing
- Extrasquelettique ¬ Sarcome d' *C49.9*
- ¬ Sarcome d' *C41.9*

Exagérées pour les événements sources de tension ¬ Inquiétude et préoccupation *R46.6*

Examen
- Adolescent en cours de croissance ¬ *Z00.3*
- Allaitement maternel ¬ Soins et *Z39.1*
- Avant
- - Conscription ¬ *Z02*
- - Embauche ¬ *Z02*
- Bactériologique, par biologie moléculaire et histologique ¬ Tuberculose pulmonaire, sans *A16.1*
- Chimique sang
- - Sans précision ¬ Résultat anormal des *R79.9*
- - ¬ résultat anormal
- - - *R79*
- - - Précisés des *R79.8*

Examen *–suite*
- Comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique ¬ *Z00.6*
- Contrôle
- - Chimiothérapie
- - - Affections ¬ *Z09.2*
- - - Tumeur maligne ¬ *Z08.2*
- - Psychothérapie ¬ *Z09.3*
- - Radiothérapie
- - - Affections ¬ *Z09.1*
- - - Tumeur maligne ¬ *Z08.1*
- - Traitement
- - - Affection
- - - - Sans précision ¬ *Z09.9*
- - - - Tumeurs malignes ¬ *Z09*
- - - - ¬ *Z09.8*
- - - Chirurgical
- - - - Affections ¬ *Z09.0*
- - - - Tumeur maligne ¬ *Z08.0*
- - - Combiné
- - - - Affections ¬ *Z09.7*
- - - - Tumeur maligne ¬ *Z08.7*
- - - Fracture ¬ *Z09.4*
- - - Tumeur malign
- - - - Sans précision ¬ *Z08.9*
- - - - ¬ *Z08.8*
- Cytologique et histologique des urines ¬ Résultats anormaux de l' *R82.8*
- Dentaire ¬ *Z01.2*
- Donneur éventuel d'organe et de tissu ¬ *Z00.5*
- Fins médico-légales ¬ *Z04*
- Général
- - Investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté ¬ *Z00*
- - Routine d'une sous-population définie ¬ *Z10*
- - Série
- - - Enfants scolarisés ¬ *Z10*
- - - Équipes sportives ¬ *Z10*
- - - Étudiants ¬ *Z10*
- - - Membres des forces armées ¬ *Z10*
- - - Résidents d'établissements institutionnels ¬ *Z10*
- - ¬ Autres *Z00.8*
- Gynécologique (de routine) (général) ¬ *Z01.4*
- Hématologiques ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*
- Immédiatement après l'accouchement ¬ Soins et *Z39.0*
- Laboratoire
- - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Mise en évidence par des *R75*
- - ¬ *Z01.7*
- Lié prédisposition

Examen *–suite*
- Lié prédisposition *–suite*
- - Cardiomyopathies ¬ *Z01.81*
- - Dysrythmies malignes ¬ *Z01.80*
- Liquide céphalorachidien ¬ Résultats anormaux de l' *R83*
- Médecine du travail ¬ *Z10*
- Médical
- - Général ¬ *Z00.0*
- - Prise de contact à des fins administratives ¬ *Z02*
- - Suspicion de maladies, suspicion exclue ¬ Mise en observation et *Z03*
- Microbiologique des urines ¬ Résultats anormaux de l' *R82.7*
- Microscopique expectoration sans culture procédé biologie moléculaire ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par *A15.0*
- Mise observation
- - Accident
- - - Transport ¬ *Z04.1*
- - - Travail ¬ *Z04.2*
- - - ¬ *Z04.3*
- - Blessures dues à une agression ¬ *Z04.5*
- - Raison
- - - Non précisée ¬ *Z04.9*
- - - Précisées ¬ *Z04.8*
- - - ¬ *Z04*
- Oreilles et de l'audition ¬ *Z01.1*
- Parasitologique
- - Non classés ailleurs ¬ Autres paludismes, confirmés par *B53.8*
- - SAI ¬ Paludisme confirmé par *B53.8*
- - ¬ Autres paludismes confirmés par *B53*
- Pelvien (annuel) (périodique) ¬ *Z01.4*
- Période de croissance rapide de l'enfance ¬ *Z00.2*
- Périodique (annuel) (physique) ¬ *Z00.0*
- Post-partum ¬ Soins et *Z39*
- Prénatal systématique mère
- - Sans précision ¬ Résultat anormal constaté au cours de l' *O28.9*
- - ¬ résultat
- - - Anormal
- - - - Constatés au cours de l' *O28*
- - - - Cours de l' *O28.8*
- - - Biochimiques anormaux au cours de l' *O28.1*
- - - Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l' *O28.5*

Examen *–suite*
- Prénatal systématique mère *–suite*
- - ¬ résultat *–suite*
- - - Cytologiques anormaux au cours de l' *O28.2*
- - - Échographiques anormaux au cours de l' *O28.3*
- - - Hématologiques anormaux au cours de l' *O28.0*
- - - Radiologiques anormaux au cours de l' *O28.4*
- Psychiatrique général
- - Demande des autorités ¬ *Z04.8*
- - Non classé ailleurs ¬ *Z00.4*
- Radiologique, non classé ailleurs ¬ *Z01.6*
- Routine
- - Enfant ¬ *Z00.1*
- - Entretien de la contraception ¬ *Z30.4*
- - Limité à un organe donné ¬ *Z01*
- Sanitaire au cours d'enquêtes de population ¬ *Z00.8*
- Soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses couches ¬ *N96*
- Spécial
- - Dépistage
- - - Affection
- - - - Cardio-vasculaires ¬ *Z13.6*
- - - - Yeux et des oreilles ¬ *Z13.5*
- - - Certains troubles du développement de l'enfance ¬ *Z13.4*
- - - Diabète sucré ¬ *Z13.1*
- - - Maladie
- - - - États pathologiques ¬ *Z13*
- - - - Infectieuses et parasitaires ¬ *Z11*
- - - - Précisées ¬ *Z13.8*
- - - - Sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ *Z13.0*
- - - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ¬ *Z13.7*
- - - Sans précision ¬ *Z13.9*
- - - Troubles de la nutrition ¬ *Z13.2*
- - - Tumeur
- - - - Appareil respiratoire ¬ *Z12.2*
- - - - Col de l'utérus ¬ *Z12.4*
- - - - Estomac ¬ *Z12.0*
- - - - Intestin ¬ *Z12.1*
- - - - Localisations ¬ *Z12.8*
- - - - Prostate ¬ *Z12.5*
- - - - Sans précision ¬ *Z12.9*
- - - - Sein ¬ *Z12.3*
- - - - Vessie ¬ *Z12.6*
- - - - ¬ *Z12*
- - Investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté ¬ Autres *Z01*
- - Non précisés ¬ Autres *Z01.88*
- - Précisés ¬ Autres *Z01.8*

Examen *–suite*
- Spécial *–suite*
- - Sans précision ¬ *Z01.9*
- Suivi
- - Traitement d'autres maladies ¬ *Z09.88*
- - Transplantation d'organe ¬ *Z09.80*
- Test de grossesse ¬ *Z32*
- Urine
- - Non précisés ¬ Résultats anormaux de l' *R82.9*
- - ¬ Autres résultats anormaux de l' *R82*
- Victime coupable
- - Blessures dues à une agression ¬ *Z04.5*
- - Viol ou un abus sexuel allégué ¬ *Z04.5*
- Vue de: adoption ¬ *Z02*
- Yeux et de la vision ¬ *Z01.0*
- ¬
- - Conseil et surveillance pour: Consultation pour l'explication de résultats d' *Z71*
- - Echec aux *Z55*
- - Infarctus du myocarde: ancien découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l' *I25.2*

Exanthémateuse
- Entérovirus [exanthème de Boston] ¬ Fièvre *A88.0*
- ¬ Polyarthrite épidémique *B33.1*

Exanthématique
- Aigu généralisé ¬
- - PEAG [pustulose *L27.0*
- - Pustulose
- - - *L27.0*
- - - *L27.1*
- Méditerranéenne ¬ Fièvre (à) (de): *A77.1*

Exanthème
- 4 ¬ *B01.8*
- Boston ¬
- - *A88.0*
- - Fièvre exanthémateuse à entérovirus [*A88.0*
- Entérovirus ¬
- - Fièvre avec *A88.0*
- - Stomatite vésiculaire avec *B08.4*
- Épidémique avec méningite ¬ *A88.0†, G02.0**
- Subit [fièvre des trois jours] ¬ *B08.2*
- Toxique dû au contact de la peau avec un médicament ¬ *L24.4*
- Viral SAI ¬ *B09*

Excavation de la papille optique ¬ *H47.2*

Excédentaire et flasque ¬ Peau et tissu sous-cutané *L98.7*

Excentrique ¬ Personnalité: *F60.8*

Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, *D55.1*

Exception
- Bassinet ¬ Tumeur maligne du rein, à l' *C64*
- Orteil lymphangite ¬
- - Infection purulente du pied (à l' *L03.11*
- - Inflammation purulente du pied (à l' *L03.11*
- Plasmodium falciparum
- - Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l' *B52*
- - ¬ infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l' *B51*
- Virus grippe aviaire grippe porcine ¬
- - Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l' *J10.8†, G05.1**
- - Encéphalopathie lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l' *J10.8†, G94.3**
- - Grippe [Influenza] avec otite, virus de la grippe saisonnière identifié, à l' *J10.8†, H67.1**
- - Influenza, virus de la grippe saisonnière identifié, à l' *J10.1*
- - Myocardite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l' *J10.8†, I41.1**
- - Polio-encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l' *J10.8†, G05.1**
- Yeux) ¬ Nævus d'Ota sur la peau du visage (à l' *D22.3*

Exceptionnellement gros ¬ Enfant *P08.0*

Excès
- Apport ¬
- - *E67*
- - Séquelles d' *E68*
- Aromatase ¬ Syndrome d' *E30.1*
- Blastes
- - AREB] ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - Transformation ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - Type
- - - I [AREB I] ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - - II [AREB II] ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - ¬
- - - Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - - Myélodysplasie avec *D46.9*
- Calorique
- - Enfant adolescent ¬ Obésité
- - - *E66.04*
- - - Extrême due à un *E66.05*
- - Indice masse corporelle IMC
- - - 40 ou plus ¬ Obésité due à un *E66.02*
- - - Compris
- - - - 30 et moins de 35 ¬ Obésité due à un *E66.00*
- - - - 35 et moins de 40 ¬ Obésité due à un *E66.01*
- - ¬ Obésité

Excès *–suite*
- Calorique *–suite*
- - ¬ Obésité *–suite*
- - - *E66.0*
- - - Grade
- - - - I (OMS) due à un *E66.00*
- - - - II (OMS) due à un *E66.01*
- - - - III (OMS) due à un *E66.02*
- Insuffisance de convergence ¬ *H51.1*
- Potassium [K] ¬ *E87.5*
- Précisés d'apport ¬ Autres *E67.8*
- Sel dans le sang ¬ *E87.0*
- Sodium [Na] ¬ *E87.0*

Excessif
- Articulation ¬ Affections des tissus mous par sollicitation *M70*
- Cours de la grossesse ¬ Prise de poids *O26.0*
- Dents ¬ Attrition *K03.0*
- Fœtus
- - Trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance *O36.6*
- - ¬ Soins maternels pour croissance *O36.6*
- Lié
- - DNMT3A ¬ Syndrome de croissance *Q87.3*
- - X ¬ Myopathie avec autophagie *G71.8*
- Médicaments déclencheurs de contractions ¬ Hyperactivité de l'utérus due à une stimulation *O62.8, Y57.9!*
- Mouvements stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au stress *X59.9!*
- Non classée ailleurs ¬ Fracture par sollicitation *M84.3*
- Nourrisson ¬ Pleurs *R68.1*
- Overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue ¬ Prise *X49.9!*
- Précisées ¬ Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses *P58.8*
- Sans précision ¬
- - Affection des tissus mous par sollicitation *M70.9*
- - Ictère néonatal dû à une hémolyse *P58.9*
- Système pileux ¬ développement *L68*
- ¬
- - Activité sexuelle *F52.7*
- - Affections des tissus mous par sollicitation *M70.8*
- - Alimentation *R63.2*
- - Bruits abdominaux *R19.1*
- - Expectoration *R09.3*
- - Exposition
- - - Chaleur
- - - - Artificiel
- - - - - *W92!*
- - - - - *W92.9!*
- - - - Froid naturel *X59.9!*
- - - Froid artificiel

Excessif *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Exposition *–suite*
- - - Froid artificiel *–suite*
- - - - *W93!*
- - - - *W93.9!*
- - Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses *P58*
- - Masturbation *F98.88*
- - Rougeur *R23.2*
- - Soif *R63.1*
- - Troubles du sommeil par somnolence *G47.1*

Excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes avec ou sans *Z91.72*

Excitation auriculoventriculaire anormale ¬ *I45.6*

Exclusion
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Col ¬ affection inflammatoire
- - Aiguë de l'utérus, à l' *N71.0*
- - Chronique de l'utérus, à l' *N71.1*
- - Utérus
- - - *N71*
- - - Sans précision, à l' *N71.9*
- Écaille temporale ¬ Temporal, à l' *S02.1*
- Rejet sociaux ¬ *Z60*

Excoriation névrotique ¬ *L98.1*

Excoriée
- Jeunes filles ¬ Acné *L70.5*
- ¬ Acné *L70.5*

Excréteur ¬
- Calcul des glandes salivaires ou d'un canal *K11.5*
- Lithiase des glandes salivaires ou d'un canal *K11.5*

Exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l' *Y84.9!*

Exedens ¬ Lupus: *A18.4*

Exercice
- Physique ¬ Manque d' *Z72.8*
- Thérapeutiques et curatifs ¬ *Z50.1!*

Exfoliatif ¬
- Ichtyose *Q80.8*
- Psoriasis *L40.8*

Exfoliation
- Dentaire due à des causes générales ¬ *K08.0*
- Peau ¬ *R23.4*

Exfoliatrice
- Marginée ¬ Glossite: *K14.1*
- Staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter von Rittershain] ¬ Dermatite *L00*

Exfoliatrice *–suite*
- ¬
- - Chéilite: *K13.0*
- - Dermite *L26*

Exhibitionnisme ¬ *F65.2*

Existence
- Stomies ¬ *Z93.88*
- Thoracostomie ¬ *Z93.80*

Exocervicite avec ou sans érosion ou ectropion ¬ *N72*

Exocol ¬
- Carcinoma in situ: *D06.1*
- Tumeur maligne: *C53.1*

Exocrines
- Sans précision ¬ Affection des glandes sudoripares *L74.9*
- ¬ Autres affections des glandes sudoripares *L74.8*

Exogène
- Connu
- - Non classés ailleurs ¬ Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes *Q86*
- - ¬ Syndrome congénital malformatifs causé
- - - *Q86.8*
- - - *Q86.88*
- Extrinsèque] ¬ Asthme: allergique de cause *J45.0*
- SAI ¬ Obésité *E66.9*
- ¬
- - Dermite toxique due à un irritant *L24.9*
- - Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits *E03.2*

Exomphale ¬ *Q79.2*

Exophiline 5 ¬ Epidermolyse bulleuse simple par déficit en *Q81.0*

Exophorie ¬ *H50.5*

Exophtalmie
- Cours
- - Goitre ¬ *E05.0†, H06.2**
- - Maladie de Basedow ¬ *E05.0†, H06.2**
- - Thyréotoxicose ¬ *E05.0†, H06.2**
- Thyréotrope ¬ *E05.0†, H06.2**
- ¬
- - *H05.2*
- - Maladie de Basedow avec *E05.0†, H06.2**
- - Trouble de la fonction thyroïdienne avec *E05.0†, H06.2**

Exophtalmique ou toxique SAI ¬ Goitre: *E05.0*

Exostose
- Calcanéenne ¬ *M77.3*
- Cartilagineuses multiples ¬ *Q78.6*
- Conduit auditif externe ¬ *H61.8*
- Crête iliaque ¬ *M76.2*
- Gonorrhéique ¬ *A54.4†, M90.29**
- Haglund ¬ *M77.3*
- Mâchoire ¬ *K10.8*

Exostose *–suite*
- Multiples congénitales ¬ *Q78.6*
- Orbite ¬ *H05.3*
- SAI ¬ *M77.9*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, M90.29**

Exostoses-anétodermie-brachydactylie type E ¬ Syndrome d' *Q87.5*

Exotropie
- Alternante) (monoculaire) non intermittente ¬ *H50.1*
- Strabisme divergens] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ *H50.3*

Expansions C9ORF72 ¬ Maladie de Huntington-like due à des *G10*

Expansive
- Familiale ¬ Ostéolyse *M89.59*
- Paranoïaque ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.0*

Expectorants ¬ Intoxication: *T48.4*

Expectoration
- Anormale ¬ *R09.3*
- Excessive ¬ *R09.3*
- Sanglantes ¬ *R04.2*
- Sans culture procédé biologie moléculaire ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l' *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l' *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l' *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l' *A15.0*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l' *A15.0*
- ¬
- - Anomalie
- - - Couleur de l' *R09.3*
- - - Odeur de l' *R09.3*
- - - Quantité de l' *R09.3*
- - Résultats anormaux de: *R84*

Expérience
- Camp de concentration ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*
- Catastrophe ¬ Modification durable de la personnalité après une *F62.0*
- Personnelle terrifiante pendant l'enfance ¬ *Z61*

Expertise ¬ Demande d' *Z04.8*

Explication
- Résultats d'examen ¬ Conseil et surveillance pour: Consultation pour l' *Z71*
- ¬ Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre *R96.1*

Exploration
- Fonctionnel
- - Cardio-vasculaires ¬ Résultats anormaux d' *R94.3*
- - Endocriniennes ¬ Résultats anormaux d'autres *R94.7*

Exploration *–suite*
- Fonctionnel *–suite*
- - Hépatiques ¬ Résultats anormaux d' *R94.5*
- - Organes et appareils ¬ Résultats anormaux d' *R94.8*
- - Pulmonaires ¬ Résultats anormaux d' *R94.2*
- - Rénales ¬ Résultats anormaux d' *R94.4*
- - Système nerveux
- - - Central ¬ Résultats anormaux d' *R94.0*
- - - Périphérique et épreuves sensorielles spéciales ¬ Résultats anormaux d' *R94.1*
- - Thyroïdiennes ¬ Résultats anormaux d' *R94.6*
- - ¬ Résultats anormaux d' *R94*
- Infections principalement transmises lors des rapports sexuels ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- Maladies intestinales d'origine infectieuse ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- Protozooses et helminthiases ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- Tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*

Explosif
- Intermittent ¬ Trouble *F63.8*
- ¬ (Trouble de la) personnalité: irritable (*F60.30*

Explosion
- Chaudière/bouilloire ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- ¬
- - Blessure par la pression d'une *T70.8*
- - Syndrome dû au souffle d'une *T70.8*

Exposés
- Hépatite virale ¬ Sujets en contact avec et *Z20.5*
- Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel ¬ Sujets en contact avec et *Z20.2*
- Maladie
- - Infectieuses intestinales ¬ Sujets en contact avec et *Z20.0*
- - Transmissible
- - - Non précisée ¬ Sujets en contact avec et *Z20.9*
- - - ¬ Sujets en contact avec et *Z20.8*
- Pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations ¬ Sujets en contact avec et *Z20.7*
- Rage ¬ Sujets en contact avec et *Z20.3*
- Rubéole ¬ Sujets en contact avec et *Z20.4*
- Tuberculose ¬ Sujets en contact avec et *Z20.1*
- Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Sujets en contact avec et *Z20.6*

Exposition
- Accidentel facteur
- - Non précisés ¬ *X59!*

Exposition *–suite*
- Accidentel facteur *–suite*
- - ¬ *X59.9!*
- Acide ¬ *T54.9*
- Alcool ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Bruit ¬ *W49.9!*
- Carburant halogéné ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Catastrophe, une guerre et autres hostilités ¬ *Z65*
- Chaleur
- - Artificiel excessif ¬
- - - *W92!*
- - - *W92.9!*
- - Froid naturel excessif ¬ *X59.9!*
- Chronique rayonnement non ionisant
- - Sans précision ¬ Modification de la peau due à une *L57.9*
- - ¬ Autres modifications de la peau dues à une *L57.8*
- Conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, *Y34.9!*
- Courant électrique ¬ *W87!*
- Feu et flammes ¬ *X59.9!*
- Forces mécanique objet
- - Animés ¬
- - - *W64!*
- - - Accident dû à l' *W64.9!*
- - Inanimés ¬
- - - *W49!*
- - - Accident dû à l' *W49.9!*
- Froid artificiel excessif ¬
- - *W93!*
- - *W93.9!*
- Fumée ¬ *X59.9!*
- Irradiation
- - Ionisante ¬ *W91.9!*
- - Isotopes ¬ *W91.9!*
- - Rayons X ¬ *W91.9!*
- Liquide corrosif ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Lumière
- - Artificiel
- - - Ultraviolette ¬ *W91.9!*
- - - Visible ¬ *W91.9!*
- - Soleil ¬ *X59.9!*
- Médicament, drogues et autres substances biologiques actives ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l' *P04.6*
- Pesticides ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Pression atmosphérique élevé basse

Exposition *–suite*
- Pression atmosphérique élevé basse *–suite*
- - Changement de pression atmosphérique ¬ *W94!*
- - Sans relation avec les conditions météorologiques) ¬ *W94.9!*
- Professionnelle à des facteurs de risque ¬ *Z57*
- Prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*
- Pulpe ¬ Carie avec *K02.5*
- Rayonnements ¬ *W91!*
- Solvant organique ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Substances nocives ¬ Empoisonnement accidentel par *X49!*
- Vibration ¬ *W49.9!*
- VIH ¬ Prophylaxie avant *Z29.22*
- ¬ Kératoconjonctivite: d' *H16.2*

Expressif ¬
- Dysphasie ou aphasie de développement, de type *F80.1*
- Trouble de l'acquisition du langage, de type *F80.1*

Expression écrite ¬ Trouble de l'acquisition de l' *F81.8*

Expulsion
- Fœtus ou accouchement de l'enfant ¬ Hémorragie après *O72*
- ¬
- - Prolongation de la deuxième période [*O63.1*
- - Rapidité de l' *P03.5*

Expulsive ¬ Hémorragie choroïdienne: *H31.3*

Exsanguino-transfusion ¬ Thrombopénie néonatale due à: *P61.0*

Exsiccose ¬
- Diarrhée
- - Aiguë avec *A09.9, E86*
- - Infectieuse avec *A09.0, E86*
- - Probablement d'origine infectieuse, avec *A09.0, E86*
- - Vomissements
- - - *A09.9, E86*
- Entérite
- - Aiguë avec *A09.9, E86*
- - Probablement d'origine infectieuse, avec *A09.0, E86*
- Gastroentérite
- - *A09.9, E86*
- - Aiguë avec *A09.9, E86*
- - Nourrisson avec *A09.9, E86*
- - Probablement d'origine infectieuse, avec *A09.0, E86*

Exstrophie vésicale ¬ *Q64.1*

Exsudatif ¬
- Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: *H21.3*

Exsudatif ¬ *–suite*
- Otite moyenne
- - *H65.9*
- - Chronique: *H65.4*
- Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*

Exsufflateur (appareil d'aide à la toux) ¬ Dépendance (de longue durée) envers: insufflateur/ *Z99.0*

Extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [*M08.3*

Extenseur
- Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S56.3*
- Bronchique ¬
- - Adaptation et manipulation d'un *Z45.84*
- - Présence d'un *Z96.80*
- Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.3*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon *S56.5*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et tendons *S66.7*
- Orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long *S96.1*
- Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.2*
- S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S56.4*
- Trachéal ¬
- - Adaptation et manipulation d'un *Z45.85*
- - Présence d'un *Z96.81*
- ¬ Déchirure spontanée des tendons *M66.2*

Extension
- Intracérébrale et intraventriculaire ¬ Hémorragie sous-épendymaire avec *P52.2*
- Médiastinal parapharyngé cervical ¬ Abcès sous-mandibulaire
- - Indication d' *K12.22*
- - Sans indication d' *K12.21*
- Rétromaxillaire fosse canine ¬ Abcès maxillaire
- - Indication d' *K10.21*
- - Sans indication d' *K10.20*
- ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en *S52.51*

Extensive ¬ Syndrome de polyangéite *M30.8*

Extérieur
- Lèvre
- - SAI ¬ *C00.2*
- - ¬ *D37.0*
- Utérus ¬ Adhérences de la paroi *N73.6*
- ¬
- - Dysmorphie due à une cause *Q86.88*
- - Lèvre

Extérieur *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lèvre *–suite*
- - - Inférieure: *C00.1*
- - - Supérieure: *C00.0*

Extérieurement visible clitoris
- Lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie *Z91.72*
- Prépuce clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie *Z91.71*

Externe
v. Type de maladie

Extinction sensorielle ¬ *R29.5*

Extracapillaire diabétique
- Diabète sucré type
- - 1 ¬ Syndrome de Kimmelstiel et Wilson *E10.20†, N08.3**
- - 2 ¬ Syndrome de Kimmelstiel et Wilson *E11.20†, N08.3**
- ¬
- - Glomérulosclérose *E14.20†, N08.3**
- - Syndrome de Kimmelstiel et Wilson *E14.20†, N08.3**

Extracellulaire ¬ Déplétion du volume du plasma ou du liquide *E86*

Extracorporel ¬
- Adaptation d'une pompe *Z45.02*
- Dialyse *Z49.1*
- Pompe
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*

Extracorticalis axialis ¬ Aplasia *E75.2*

Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par *P03.3*

Extraction
- Affection périodontale localisée ¬ Perte de dents consécutive à accident, *K08.1*
- Cataméniale ¬ *Z30.3*
- Siège ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une *P03.0*

Extra-cutané ¬ Mastocytome *C96.2*

Extra-dural
- Non traumatique ¬ Hémorragie *I62.1*
- Sous-dural, sans précision ¬ Abcès *G06.2*
- Traumatique) ¬ Hémorragie *S06.4*
- ¬ Abcès granulome
- - Intracrânien: *G06.0*
- - Intrarachidien: *G06.1*

Extradural] ¬ Hématome épidural [*S06.4*

Extragonadique ¬ Tératome *D48.9*

Extra-hépatique
- Vésicule biliaire ¬ Tumeur bénigne: Voies biliaires *D13.5*
- ¬
- - Adénocarcinome des voies biliaires *C24.0*
- - Carcinome épidermoïde des voies biliaires *C24.0*

Extra-hépatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne: Canal biliaire *C24.0*

Extra-hypophysaire ¬ Syndrome d'ACTH [hormone adrénocorticotrope] *E24.3*

Extra-intestinale ¬ Yersiniose *A28.2*

Extrait d'Aspergillus ¬ Hypersensibilité à l' *T78.4*

Extramammaire ¬ Maladie Paget
- *C21.0*
- *C44.5*

Extramédullaire ¬ Tumeur myéloïde *C92.30*

Extraneural ¬ Périneuriome *D36.1*

Extranodal
- Cellules T/NK, type nasal ¬ Lymphome *C86.0*
- Zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome *C88.4*

Extra-oculaire ¬ Muscle
- *C69.6*
- *D31.6*

Extrapéritonéale ¬ *S37.22*

Extrapyramidal trouble motricité
- Cours d'affections classées ailleurs ¬ Syndromes *G26**
- Sans précision ¬ Syndrome *G25.9*
- ¬ Syndrome
- - *G25*
- - Précisés *G25.88*

Extrarénale ¬ Urémie *R39.2*

Extrasquelettique ¬
- Chondrosarcome myxoïde *C49.9*
- Sarcome d'Ewing *C49.9*

Extrasystoles
- Auriculaires ¬ *I49.1*
- SAI ¬ *I49.4*
- Supraventriculaire ¬ *I49.4*
- Ventriculaires avec syncopes-pérodactylie-séquence de Robin ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬ Battements cardiaques prématurés [*I49.4*

Extrasystolique ¬ Arythmie *I49.4*

Extraurétrale ¬ Incontinence urinaire *N39.43*

Extra-utérin
- Molaire
- - Sans précision ¬ Complication consécutive à un avortement, une grossesse *O08.9*
- - ¬
- - - Choc consécutif à un avortement, une grossesse *O08.3*
- - - Complication
- - - - Consécutif
- - - - - Avortement, une grossesse *O08*
- - - - - Avortement, une grossesse *O08.8*
- - - - Veineuses consécutives à un avortement, une grossesse *O08.7*
- - - Embolie consécutive à un avortement, une grossesse *O08.2*

Extra-utérin *–suite*
- Molaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse *O08.1*
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse *O08.0*
- - - Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse *O08.4*
- - - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse *O08.6*
- - - Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse *O08.5*
- Sans précision ¬ Grossesse *O00.9*
- ¬
- - Choc septique après grossesse *O08.0, R57.2*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse *P01.4*
- - Grossesse
- - - *O00*
- - - *O00.8*
- - Rupture de grossesse *O00*

Extravasation d'urine ¬ *R39.0*

Extraventriculaire ¬ Neurocytome *D43.2*

Extrême
- Enfant et l'adolescent ¬ Obésité médicamenteuse *E66.15*
- Excès calorique chez l'enfant et l'adolescent ¬ Obésité *E66.05*
- Hypoventilation alvéolaire chez l'enfant et l'adolescent ¬ Obésité *E66.25*
- ¬
- - Immaturité *P07.2*
- - Pauvreté *Z59*
- - Température *Z57*

Extrêmement faible naissance
- Poids naissance
- - 500 à moins de 750 grammes ¬ Poids *P07.01*
- - 750 à moins de 1000 grammes ¬ Poids *P07.02*
- - Inférieur à 500 grammes ¬ Poids *P07.00*
- ¬ Poids *P07.0*

Extrémité
- Inférieur
- - Cubitus
- - - Radius, combinée ¬ Fracture de l' *S52.6*
- - - ¬ *S52.8*
- - Fémur
- - - Condyle (latéral) (médian) ¬ Fracture de l' *S72.41*
- - - Épiphyse, décollement épiphysaire ¬ Fracture de l' *S72.42*
- - - Intercondylaire ¬ Fracture de l' *S72.44*
- - - Partie non précisée ¬ Fracture de l' *S72.40*

Extrémité *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - Fémur *–suite*
- - - Supracondylaire ¬ Fracture de l' *S72.43*
- - - ¬ Fracture de l' *S72.4*
- - Humérus
- - - Épicondyle
- - - - Épicondyles, non précisé ¬ Fracture de l' *S42.44*
- - - - Latéral ¬ Fracture de l' *S42.42*
- - - - Médial ¬ Fracture de l' *S42.43*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ Fracture de l' *S42.40*
- - - - Parties ou parties multiples ¬ Fracture de l' *S42.49*
- - - Supracondylaire ¬ Fracture de l' *S42.41*
- - - Transcondylaire (en T ou en Y) ¬ Fracture de l' *S42.45*
- - - ¬ Fracture de l' *S42.4*
- - Péroné ¬ *S93.0*
- - Radius
- - - Fracture
- - - - Extension ¬ Fracture de l' *S52.51*
- - - - Flexion ¬ Fracture de l' *S52.52*
- - - Parties et parties multiples ¬ Fracture de l' *S52.59*
- - - Sans autre précision ¬ Fracture de l' *S52.50*
- - - ¬ Fracture de l' *S52.5*
- - Tibia
- - - Fracture du péroné (toute partie) ¬ Fracture de l' *S82.31*
- - - ¬
- - - - *S93.0*
- - - - Fracture de l' *S82.38*
- - ¬
- - - Artériosclérose de l' *I70.29*
- - - Athérosclérose de l' *I70.29*
- - - Inflammation thrombotique veineuse profonde de l' *I80.28*
- - - Oblitération d'une artère de l' *I74.3*
- - - Phlébothrombose profonde de l' *I80.28*
- - - Soins de contrôle comprenant une opération plastique des *Z42.4*
- - - Syndrome douloureux régional complexe de type II de l' *G90.61*
- - - Thrombose profonde de l' *I80.28*
- Proximale ¬ *S82.1*
- Supérieur
- - Humérus
- - - Col
- - - - Anatomique ¬ Fracture de l' *S42.23*
- - - - Chirurgical ¬ Fracture de l' *S42.22*
- - - Grand tubercule ¬ Fracture de l' *S42.24*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ Fracture de l' *S42.20*
- - - - Parties et parties multiples ¬ Fracture de l' *S42.29*

Extrémité *–suite*
- Supérieur *–suite*
- - Humérus *–suite*
- - - Tête ¬ Fracture de l' *S42.21*
- - - ¬ Fracture de l' *S42.2*
- - Radius
- - - Col ¬ Fracture de l' *S52.12*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ Fracture de l' *S52.10*
- - - - Parties et parties multiples ¬ Fracture de l' *S52.19*
- - - Tête ¬ Fracture de l' *S52.11*
- - - ¬ Fracture de l' *S52.1*
- - Tibia
- - - Fracture du péroné (toute partie) ¬ Fracture de l' *S82.11*
- - - ¬ Fracture de l' *S82.18*
- - ¬
- - - Soins de contrôle comprenant une opération plastique des *Z42.3*
- - - Syndrome douloureux régional complexe de type II de l' *G90.60*
- ¬
- - Absence congénitale d'une articulation d'une *Q74.8*
- - Artériopathie obstructive périphérique des *I70.2*
- - Artériosclérose
- - - *I70.29*
- - - Artère d'une *I70.29*
- - Athérosclérose d'une *I70.29*
- - Dyschromatose symétrique des *L81.8*
- - Dysostose mandibulo-faciale sans anomalies des *Q75.4*
- - Syndrome de trigonocéphalie-nez bifide-anomalies des *Q87.0*

Extrinsèque
- SAI ¬
- - Alvéolite allergique (*J67.9*
- - Pigmentation des dents: *K03.6*
- ¬
- - Asthme: allergique de cause exogène [*J45.0*
- - Larynx *C32.1*

Extroversion de la vessie ¬ *Q64.1*

Eyeball] ¬ Œil kystique [cystic *Q11.0*

FAB) SAI ¬ LMA (sans classification *C92.0*

Fabry ¬ Angiokératome diffus de *E75.2*

Fabry-Anderson ¬ Glomérulopathie au cours de maladie de *E75.2†, N08.4**

Face

- Antérieur
- - Épiglotte ¬ Tumeur maligne: *C10.1*
- - ¬ Epiglotte, *D10.5*
- Avant le travail ¬ Présentation (de): *P01.7*
- Chronique ¬ Algie vasculaire de la *G44.0*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose (de): sinus de la *A15.8*
- Cou
- - SAI ¬ Anomalie congénitale de la *Q18.9*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q18.9*
- - ¬
- - - Fistule médian(e) de la *Q18.8*
- - - Kyste médian(e) de la *Q18.8*
- - - Malformation congénital
- - - - *Q18*
- - - - Précisées de la *Q18.8*
- - - Sinus médian(e) de la *Q18.8*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la *D21.0*
- - - - Lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la *D17.0*
- - - - Malign
- - - - - Ganglions lymphatiques de la tête, de la *C77.0*
- - - - - Nerfs périphériques de la tête, de la *C47.0*
- - - - - Tête, *C76.0*
- - - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la *C49.0*
- Cutanée de la lèvre ¬ Tumeur maligne: *C44.0*
- Dorsale de la langue ¬ Tumeur maligne: *C02.0*
- Épisodique ¬ Algie vasculaire de la *G44.0*
- Front et du menton ¬ Soins maternels pour présentation de la *O32.3*
- Inférieur
- - Langue ¬ Tumeur maligne: *C02.2*
- - ¬ Deux tiers antérieurs de la langue, *C02.2*
- Intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ Lèvre (bord libre) (*D10.0*
- Interne
- - Joue ¬ *C06.0*
- - ¬ Tumeur malign Lèvre
- - - Inférieure, *C00.4*
- - - Sans précision, *C00.5*
- - - Supérieure, *C00.3*
- Mâchoire ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la *Q67.4*
- Muqueux ¬ Lèvre
- - Inférieure: *C00.4*

Face *–suite*

- Muqueux ¬ Lèvre *–suite*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: *C00.5*
- - Supérieure: *C00.3*
- Non précis ¬
- - Carcinoma in situ: Peau des parties de la *D04.3*
- - Mélanome in situ de parties de la *D03.3*
- - Nævus à mélanocytes des parties de la *D22.3*
- - Tumeur bénigne: Peau des parties de la *D23.3*
- Oral ¬ Lèvre
- - Inférieure: *C00.4*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: *C00.5*
- - Supérieure: *C00.3*
- Partie non précis ¬
- - Fracture du crâne et des os de la *S02.9*
- - Mélanome malin de la *C43.3*
- - Tumeur maligne: Peau de la *C44.3*
- Postérieure (laryngée) de l'épiglotte ¬ *C32.1*
- Rachis et du thorax ¬ Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la *Q67*
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose (de): sinus de la *A16.8*
- - ¬
- - - Anomalie de: os de la *Q75.9*
- - - Lésion traumatique de: *S09.9*
- Sans précision ¬
- - Malformation congénitale des os du crâne et de la *Q75.9*
- - Os
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Tumeur maligne: Sinus de la *C31.9*
- Siffleur ¬ Syndrome de la *Q87.0*
- Supérieur
- - Base de la langue ¬ *C01*
- - ¬ Deux tiers antérieurs de la langue, *C02.0*
- Tête cou ¬
- - Lymphadénite aiguë de la *L04.0*
- - Œil avec d'autres parties de la *T20*
- Trousseau] ¬ Tic douloureux de la *G50.0*
- ¬
- - Abcès
- - - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - - Cutané, furoncle et anthrax de la *L02.0*
- - Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la *Q30.8*
- - Dystocie due à une présentation de la *O64.2*
- - Écrasement de la *S07.0*

Face *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Empyème
- - - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - Fracture
- - - Crâne et des os de la *S02*
- - - Multiples du crâne et des os de la *S02.7*
- - - Os du crâne et de la *S02.8*
- - Herpes simplex de: *B00.1*
- - Infection
- - - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - Inflammation aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - Malformation congénital
- - - Os du crâne et de la *Q75*
- - - Précisées des os du crâne et de la *Q75.8*
- - Phlegmon de la *L03.2*
- - Polypes du sinus (de): *J33.8*
- - Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la *T90.2*
- - Sinus
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - Suppuration
- - - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - Syndrome
- - - Algie vasculaire de la *G44.0*
- - - Camptodactylie-raideur articulaire-anomalies osseuses de la *Q87.0*
- - - Congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la *Q87.0*
- - Tête tout partie
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la *D14.0*
- - - - Os du crâne et de la *D16.4*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës des sinus de la *C31.8*
- - - - Os
- - - - - *C41.02*
- - - - - Crâne et de la *C41.0*
- - - - Sinus de la *C31*

Facette articulaire ¬

- Dégénérescence des *M47*
- Ostéophyte à la *M47.99*

Facial
v.a. acro-cranio-faciale
v.a. blépharo-naso-facial
v.a. fémoro-facial
v.a. oculo-cérébro-facial
v.a. oculo-maxillo-facial

- 4 de Tessier ¬ Fente *Q18.8*

Facial *–suite*
- 5 de Tessier ¬ Fente *Q18.8*
- 6 de Tessier ¬ Fente *Q18.8*
- Alternante ¬ Hémiplégie *G83.8*
- Atypique ¬ Algie *G50.1*
- Bell SAI ¬ Paralysie *G51.0*
- Centrale ¬ Paralysie *G83.6*
- Comportement agressif ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypotonie-dysmorphie *Q87.8*
- Compression ¬ Anomalie morphologique *Q67.1*
- Congénital héréditaire
- - Isolée ¬ Paralysie *Q07.8*
- - Surdité variable ¬ Syndrome de paralysie *Q87.0*
- Cours des maladies de l'appareil manducateur ¬ Douleurs *K10.8*
- Faiblesse faciale) due à une lésion du neurone moteur inférieur ¬ Paralysie faciale (parésie *G51.0*
- Focal
- - Type I ¬ Dysplasie dermique *Q82.8*
- - ¬ Dysplasie dermique *Q82.8*
- Fonctionnelles ¬ Anomalies dento- *K07.5*
- Haploinsuffisance de SETD5 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie *Q87.0*
- Idiopathique
- - Persistante ¬ Douleur *G50.1*
- - ¬ Dystonie bucco- *G24.4*
- Lésion neurone moteur
- - Inférieur ¬ Paralysie faciale (parésie faciale) (faiblesse *G51.0*
- - Supérieur ¬ Paralysie (parésie) (faiblesse) *G83.6*
- Liée à l'infection par le virus varicelle zona ¬ Paralysie *B02.2†, G53.0**
- Nerf crânien VII] ¬ Affections du nerf *G51*
- Neuropathie ¬ Syndrome de cataracte congénitale-dysmorphie *Q87.8*
- Oblique ¬ Fente *Q18.8*
- Parésie faciale) (faiblesse faciale) due à une lésion du neurone moteur inférieur ¬ Paralysie *G51.0*
- Paroxystique ¬ Névralgie *G50.0*
- Périphérique récurrente familiale ¬ Paralysie *G51.0*
- Pleurs isolée ¬ Asymétrie *Q18.8*
- Progressive ¬ Hémiatrophie *G51.8*
- Retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse accélérée-dysmorphie *Q87.3*
- SAI ¬ Douleur *R51*
- Sans précision ¬
- - Affection du nerf *G51.9*
- - Anomalie dento- *K07.9*
- Strabisme-incisure du lobe de l'oreille ¬ Syndrome de retard de langage-asymétrie *Q87.0*
- Traumatisme obstétrical
- - Nerf crânien VII] ¬ Lésion du nerf *P11.3*

Facial *–suite*
- Traumatisme obstétrical *–suite*
- - ¬
- - - Congestion *P15.4*
- - - Lésion *P15.4*
- - - Paralysie *P11.3*
- Y compris les malocclusions] ¬ Anomalies dento- *K07*
- ¬
- - Actinomycose cervico- *A42.2*
- - Affections du nerf *G51.8*
- - Anomalies dento- *K07.8*
- - Asymétrie *Q67.0*
- - Dyskinésie
- - - Bucco- *G24.4*
- - - Familiale avec myokymie *G24.8, G51.4*
- - Dysostose crânio- *Q75.1*
- - Fente *Q18.8*
- - Granulome éosinophile *L92.2*
- - Hémispasme *G51.3*
- - Herpès zoster du nerf *B02.2†, G53.0**
- - Lésion traumatique du nerf *S04.5*
- - Malformation artérioveineux *Q27.3*
- - Myokymies *G51.4*
- - Paralysie *G51.0*
- - Syndrome
- - - Cécité nocturne-anomalies squelettiques-dysmorphie *Q87.8*
- - - Dandy-Walker-hémangiome *Q03.1*
- - - Déficience intellectuelle sévère-petite taille-troubles du comportement-dysmorphie *Q87.8*
- - - Fibromatose gingivale-dysmorphie *Q87.0*
- - - Malformation de Klippel-Feil-myopathie-dysmorphie *Q76.1*
- - - Surdité-oreille anormale-paralysie *Q87.8*
- - Syphilis du nerf *A52.1†, G53.8**

Faciaux-pseudocicatrice sus-ombilicale ¬ Syndrome d'hémangiomes *D18.01*

Faciei ¬ Tinea *B35.0*

Faciès particulier ¬ Syndrome d'hypoplasie du fémur *Q87.8*

Facilitant la digestion ¬ Intoxication: Médicaments *T47.5*

Faciliter accouchement ¬
- Amputation du fœtus pour *P03.8*
- Intervention destructrice pour *P03.8*

Facio
v.a. cardio-facio-cutané
v.a. cranio-facio-cubito-rénal
v.a. cranio-facio-digito-génital
v.a. microcéphalie-facio-cardio-squelettique
v.a. oro-facio-digital
v.a. oto-facio-cervical
v.a. vélo-facio-squelettique

Facio-cardio-mélique létale ¬ Dysplasie *Q87.8*

Facio-cardio-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Facio-crânienne hypomandibulaire ¬ Dysostose *Q75.4*

Facio-cutanéo-squelettique ¬ Syndrome *Q87.8*

Facio-digito-génital
- Autosomique récessif ¬ Syndrome *Q87.0*
- ¬ Syndrome *Q87.1*

Faciogénitale ¬ Dysplasie *Q87.1*

Facio-scapulo-humérale ¬ Dystrophie musculaire: *G71.0*

Facteur
- 8 régulateur de l'interféron ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit partiel en *D84.8*
- Anti-nucléaires ¬ Polyarthrite juvénile sans facteur rhumatoïde avec *M08.3*
- C3 du complément ¬ Déficit en *D84.1*
- Coagulation
- - Affections du foie ¬ Carence en *D68.4*
- - Avitaminose K ¬ Carence en *D68.4*
- - Dépendants de la vitamine K ¬ Déficit héréditaire combiné en *D68.28*
- - ¬
- - - Carence
- - - - Acquise en *D68.4*
- - - - Héréditaire
- - - - - *D68.2*
- - - - - *D68.28*
- - - Déficience de *D68.28*
- - - Déficit héréditaire en *D68.28*
- - - Réduction des *D68.9*
- - - Trouble
- - - - *D68.28*
- - - - Hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres *D68.32*
- Croissance ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la protéine de liaison du *R77.88*
- Hageman ¬
- - Carence en *D68.25*
- - Déficience du *D68.25*
- I ¬
- - Carence héréditaire en *D68.20*
- - Déficit
- - - *D68.20*
- - - Immunitaire associé à une anomalie du *D84.1*
- II
- - VII, IX et X ¬ Déficit héréditaire combiné en *D68.28*
- - ¬
- - - Carence héréditaire en *D68.21*
- - - Déficit acquis en *D68.4*
- IIa
- - Exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (*D68.35*

Facteur *–suite*
- IIa *–suite*
- - ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs réversibles du *D68.35*
- Intrinsèque ¬
- - Anémie
- - - Carence en vitamine B12 due à une carence en *D51.0*
- - - Héréditaire juvénile mégaloblastique due à une carence en *D51.0*
- - Carence congénitale en *D51.0*
- IX
- - Anomalie fonctionnelle) ¬ Carence en: *D67*
- - ¬
- - - Carence héréditaire en *D67*
- - - Déficit en *D67*
- - - Hémophilie B avec alloanticorps contre le *D67*
- Labile ¬
- - Carence en *D68.22*
- - Déficit héréditaire en *D68.22*
- Non précisés ¬ Exposition accidentelle à des *X59!*
- Physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des *F59*
- Psychologique
- - Comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs ¬ *F54*
- - Influençant une affection physique ¬ *F54*
- Relevant de l'homme ¬ Stérilité de la femme associée à des *N97.4*
- Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion ¬ Réaction due au *T80.4*
- Rhumatismal ¬ Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans *M08.0*
- Rhumatoïde
- - Facteurs anti-nucléaires ¬ Polyarthrite juvénile sans *M08.3*
- - ¬ Polyarthrite juvénile
- - - *M08.00*
- - - Sans *M08.3*
- Risque
- - Non classés ailleurs ¬ Antécédents personnels de *Z91*
- - Précisés, non classés ailleurs ¬ Antécédents personnels d'autres *Z91.8*
- - Tumeur malign
- - - Opération prophylactique
- - - - Organes ¬ Opération prophylactique pour *Z40.08*
- - - - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour *Z40.01*
- - - - Sein ¬ Opération prophylactique pour *Z40.00*
- - - ¬ Opération prophylactique pour *Z40.0*
- - ¬ Exposition professionnelle à des *Z57*
- Rosenthal ¬ Déficit en *D68.1*
- Somatiques et psychiques ¬ Douleur chronique où interviennent des *F45.41*

Facteur *–suite*
- Stabilisant fibrine ¬
- - Carence en *D68.26*
- - Déficit héréditaire en *D68.26*
- Stable ¬ Carence en *D68.23*
- Stress
- - Sévère
- - - Sans précision ¬ Réaction à un *F43.9*
- - - Troubles de l'adaptation ¬ Réaction à un *F43*
- - - ¬ Autres réactions à un *F43.8*
- - ¬ Réaction aiguë à un *F43.0*
- Stuart ¬ Déficit congénital en *D68.24*
- Stuart-Prower ¬
- - Carence en *D68.24*
- - Déficit en *D68.24*
- Suivant
- - Alcool ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Médicaments et drogues ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Modifications hormonales ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Privation de sommeil ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Stress ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- Thromboplastine plasmatique ¬ Carence en: *D67*
- V
- - Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C activée [mutation du *D68.5*
- - ¬ Carence héréditaire en *D68.22*
- VII ¬
- - Carence héréditaire en *D68.23*
- - Déficit en *D68.23*
- VIII
- - Anomalie
- - - Fonctionnelle) ¬ Carence en *D66*
- - - Vasculaire ¬ Carence en *D68.0*
- - Dysfonction vasculaire ¬ Déficit en *D68.09*
- - Trouble fonctionnel endothélial ¬ Déficit en *D68.09*
- - ¬
- - - Carence héréditaire en *D66*
- - - Hémophilie
- - - - A avec alloanticorps contre le *D66*
- - - - Anticorps dirigés contre le *D68.31*
- Von Willebrand ¬
- - Augmentation des anticorps dirigés contre le *D68.32*
- - Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le *D68.32*
- X ¬ Carence héréditaire en *D68.24*
- Xa

Facteur *–suite*
- Xa *–suite*
- - Exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du *D68.35*
- - ¬ Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le *D68.32*
- XI ¬
- - Carence héréditaire en *D68.1*
- - Déficit congénital en *D68.1*
- Xia ¬ Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le *D68.32*
- XII ¬
- - Carence héréditaire en *D68.25*
- - Déficit en *D68.25*
- XIII ¬ Carence héréditaire en *D68.26*
- ¬
- - Déficit immunitaire associé à une anomalie du *D84.1*
- - Exposition (accidentelle) à d'autres *X59.9!*

Facteur Rh
v. Rh

Factice ¬
- Dermite *L98.1*
- Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble *F68.1*
- Thyréotoxicose *E05.4*

Faecalis résistant
- Glycopeptides
- - Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus *U80.20!*
- - Oxazolidinones
- - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus *U80.2!*
- - - Streptogramines ¬ Enterococcus *U80.20!*
- - ¬ Enterococcus *U80.20!*
- Oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ Enterococcus *U80.21!*

Faecium résistant
- Glycopeptides
- - Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus *U80.30!*
- - Oxazolidinones streptogramines
- - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus *U80.3!*
- - - ¬ Enterococcus *U80.30!*
- - ¬ Enterococcus *U80.30!*
- Oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ Enterococcus *U80.31!*

Fahl
v. Melhem-Fahl

Faim ¬ Effets de la *T73.0*

Faisceaux de Krukenberg ¬ *H18.0*

Falciformes
- Anémie drépanocytaire] avec crises ¬ Anémie à hématies *D57.0*
- Drépanocytaire
- - Hétérozygotes doubles ¬ Affections à hématies *D57.2*
- - SAI ¬
- - - Anémie à hématies *D57.1*
- - - Maladie à hématies *D57.1*
- - - Trouble à hématies *D57.1*
- - ¬
- - - Affection hématies
- - - - *D57*
- - - - *D57.8*
- - - Trait de la maladie des hématies *D57.3*
- Sans crises ¬ Anémie à hématies *D57.1*
- ¬ Béta-thalassemie à hématies *D57.2*

Falciparum
- Complication cérébral ¬ Paludisme Plasmodium
- - *B50.0*
- - *B50.0†, G94.8**
- Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium *B52*
- SAI ¬ Paludisme sévère ou compliqué à Plasmodium *B50.8*
- Sans précision ¬ Paludisme à Plasmodium *B50.9*
- Toute autre espèce de Plasmodium ¬ Infections mixtes à Plasmodium *B50*
- ¬
- - Formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium *B50.8*
- - Infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium *B51*
- - Paludisme
- - - Congénital à Plasmodium *P37.3*
- - - Plasmodium *B50*

Falithrom ¬ Hémorragie
- *D68.33*
- Sous traitement par *D68.33*

Fallope
- Grossesse ¬ Rupture de la trompe (de *O00.1*
- Ligament large
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la trompe de *Q50.6*
- - ¬
- - - Absence de la trompe de *Q50.6*
- - - Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de *N83.8*
- - - Atrésie de la trompe de *Q50.6*
- - - Malformation congénital
- - - - Ovaires, des trompes de *Q50*
- - - - Trompes de *Q50.6*
- - - Présence en surnombre de la trompe de *Q50.6*

Fallope *–suite*
- Vasectomie ¬ Admission pour ligature des trompes de *Z30.2*
- ¬
- - Abcès (de): trompe de *N70*
- - Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de *N83.3*
- - Endométriose de la trompe de *N80.2*
- - Gonorrhée de la trompe de *A54.2†, N74.3**
- - Grossesse dans une trompe de *O00.1*
- - Kyste embryonnaire de la trompe de *Q50.4*
- - Lésion traumatique de la trompe de *S37.5*
- - Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de *N83.4*
- - Rétrécissement
- - - Gonorrhéique de la trompe de *A54.2†, N74.3**
- - - Tuberculeux de la trompe de *A18.1†, N74.1**
- - Rupture de la trompe de *N83.8*
- - Syphilis tardive de la trompe de *A52.7†, N74.2**
- - Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de *N83.5*
- - Trompe de *D28.2*
- - Tuberculose
- - - Aiguë de la trompe de *A18.1†, N74.1**
- - - Chronique de la trompe de *A18.1†, N74.1**
- - Tumeur maligne: Trompe de *C57.0*

Fallot ¬
- Pentalogie de *Q21.80*
- Tétralogie de *Q21.3*

Falls
v. Nettleship-Falls

Familial
v. Type de maladie

Familiale-néphrocalcinose-indicanurie ¬ Syndrome d'hypercalcémie *E70.8*

Familiare ¬ Iperchilomicronemia *E78.3*

Famille
- Adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: attente d'une *Z76.2*
- Séparation ou divorce ¬ Dislocation de la *Z63*
- ¬
- - Absence d'un des membres de la *Z63*
- - Disparition ou décès (supposé) d'un membre de la *Z63*
- - Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation socio-économique difficile de la *Z76.2*

Famine ¬
- *T73.0*
- Œdème de *E43*

Fanatique ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.0*

Fanconi
v.a. Bickel-Fanconi
v.a. De-Toni-Debré-Fanconi
- Secondaire ¬ Syndrome de *E83.38*
- ¬
- - Anémie (de): *D61.0*
- - Pancytopénie de *D61.0*
- - Syndrome
- - - Lowe avec syndrome de *E72.0*
- - - Toni-Debré- *E72.0*

Faneurs ¬ Poumon des: *J67.0*

Fantôme
- SAI ¬ Syndrome du membre *G54.7*
- Sans élément douloureux ¬ Syndrome du membre *G54.7*
- ¬ Syndrome douloureux du membre *G54.6*

FAP ¬ *D12.6*

Farber ¬
- Lipogranulomatose de *E75.2*
- Syndrome de *E75.2*

Fascia ¬
- Abcès de *M72.8*
- Tuberculose de *A18.8†, M73.89**

Fasciculaire
- Antérieur gauche ¬ Bloc *I44.4*
- Droit ¬ Bloc *I45.0*
- Postérieur gauche ¬ Bloc *I44.5*
- Sans précision ¬ Blocs *I44.6*

Fasciculation
- Musculaires ¬ *R25.3*
- ¬ *R25.3*

Fasciite
- Disséminée (à éosinophiles) ¬ *M35.4*
- Nécrosante ¬ *M72.6*
- Nodulaire ¬ *M72.4*
- Plantaire ¬ *M72.2*
- SAI ¬ *M72.9*

Fasciola
- Gigantica ¬ Infection à *B66.3*
- Hepatica ¬
- - Distomatose hépatique à *B66.3†, K77.0**
- - Infection à *B66.3*
- Indica ¬ Infection à *B66.3*

Fasciolase ¬ *B66.3*

Fasciolopsiase ¬ *B66.5*

Fasciolopsis buski ¬ Infection par *B66.5*

Fatigabilité ¬ *R53*

Fatigue
- Chronique
- - Chronic fatigue syndrome] ¬ Syndrome de *G93.3*
- - Lors de dysfonctionnements immunitaires ¬ Syndrome de *G93.3*
- Combat ¬ *F43.0*
- Post-virale ¬ Syndrome de *G93.3*
- Transitoire due à la chaleur ¬ *T67.6*

Fatigue *–suite*
- ¬
- - Épuisement et *O26.88*
- - Fracture vertébrale de *M48.4*
- - Malaise et *R53*

Fausse
- Cordes vocales ¬ *C32.1*
- Règles ¬ *P54.6*
- Voie urétrale ¬ *N36.0*

Fausse couche ¬
- *O03*
- Examen ou soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs *N96*

Faussement positif
- Test sérologique de la syphilis ¬ Résultats *R76.2*
- ¬ Réaction de Wassermann *R76.2*

Faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, *Y34.9!*

Fauteuil
- Roulant ¬
- - *Z46.8*
- - Dépendance de longue durée envers un *Z99.3*
- ¬ Confinement en *R26.3*

Faux
- Croup ¬ *J38.5*
- Rompu) ¬ anévrisme (cirsoïde) (*I72*
- Travail
- - 37ème semaine entière de gestation ¬ *O47.1*
- - Avant 37 semaines entières de gestation ¬ *O47.0*
- - Sans précision ¬ *O47.9*
- - ¬ *O47*

Favisme ¬ *D55.0*

Favre
v.a. Goldmann-Favre
- ¬ Maladie de (Durand-)Nicolas- *A55*

Favus
- Cuir chevelu ¬ *B35.0*
- ¬ *B35*

Fazio-Londe] ¬ Paralysie bulbaire progressive de l'enfant [*G12.1*

FCU ¬ *L50.2*

Fébrile
v. Type de maladie

Fécale
- Origine non organique ¬ Incontinence *F98.1*
- ¬
- - Anomalies des matières *R19.5*
- - Incontinence des matières *R15*
- - Obstruction (du): *K56.4*

Fécalome
- Appendice ¬ *K38.1*

Fécalome *–suite*
- ¬ *K56.4*

Fécondation
- Artificiel
- - Sans précision ¬ Complication de la *N98.9*
- - ¬ complication
- - - *N98*
- - - *N98.8*
- Assistée ¬ Autres méthodes de *Z31.3*
- In vitro ¬
- - *Z31.2*
- - Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après *N98.2*

Fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de tentative d'implantation d'un œuf *N98.2*

Feil
v. Klippel-Feil

Feingold ¬ Syndrome de *Q87.8*

Felineus
- Viverrini) ¬ Infection par: Opisthorchis (*B66.0*
- ¬ Distomatose hépatique à Opisthorchis *B66.0†, K77.0**

Felty ¬ Syndrome de *M05.0*

Female genital mutilation
- FGM type
- - 1 ¬ *Z91.71*
- - 2 ¬ *Z91.72*
- - 3 ¬ *Z91.73*
- - 4 ¬ *Z91.74*
- MGF], type non précisé ¬ *Z91.70*

Féminin
v. Type de maladie

Femininum ¬ Pudendum *C51.9*

Féminisation testiculaire (syndrome) ¬ *E34.51*

Femme
- Associée à des facteurs relevant de l'homme ¬ Stérilité de la *N97.4*
- Caryotype 46,XY ¬ *Q97.3*
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Affections inflammatoires pelviennes de la *N74.8**
- Cycle menstruel
- - Sans précision ¬ Affection des organes génitaux de la *N94.9*
- - ¬
- - - Affections précisées des organes génitaux de la *N94.8*
- - - Douleurs et autres affections des organes génitaux de la *N94*
- Enceinte ¬ Présence hypertension
- - Préexistante, due à une néphropathie, chez la *O10.4*
- - Rénale préexistante chez la *O10.4*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes génitaux de la *D39*
- Homme ¬ Inhibition de l'orgasme chez la *F52.3*

Femme *–suite*
- Non
- - Enceinte
- - - Plusieurs fausses couches ¬ Examen ou soins chez une *N96*
- - - ¬ Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une *N88.3*
- - Précis ¬
- - - Carcinoma in situ: Organes génitaux de la *D07.3*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne des organes génitaux de la *D28*
- - - - Maligne des organes génitaux de la *C57*
- Origines ¬ Stérilité de la *N97.8*
- Plus de trois chromosomes X ¬ *Q97.1*
- Précis
- - Aigu ¬ Phlegmon pelvien chez la *N73.0*
- - ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Autres organes génitaux de la *D28.7*
- - - Maligne: Autres organes génitaux de la *C57.7*
- SAI ¬
- - Infection ou inflammation pelvienne de la *N73.9*
- - Organes génitaux externes de la *C51.9*
- - Stérilité de la *N97*
- - Voies génito-urinaires de la *C57.9*
- Sans précision ¬
- - Affection inflammatoire pelvienne de la *N73.9*
- - Fistule de l'appareil génital de la *N82.9*
- - Malformation congénitale des organes génitaux de la *Q52.9*
- - Pelvipéritonite chez la *N73.5*
- - Polype de l'appareil génital de la *N84.9*
- - Stérilité de la *N97.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Organe génital de la *D28.9*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la *D39.9*
- - - Maligne: Organe génital de la *C57.9*
- ¬
- - Adénome du canal de Wolff chez la *D28.7*
- - Adhérences pelvi-péritonéales chez la *N73.6*
- - Affection inflammatoire pelvien
- - - *N73*
- - - Chlamydia de la *A56.1†, N74.4**
- - - Gonococcique de la *A54.2†, N74.3**
- - - Précisées de la *N73.8*
- - Cystadénocarcinome endométrioïde chez la *C56*
- - Fistule
- - - Appareil
- - - - Génital
- - - - - *N82*
- - - - - *N82.8*

Femme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fistule *–suite*
- - - Appareil *–suite*
- - - - Génital *–suite*
- - - - - *N82.88*
- - - - Génito-urinaire de la *N82.1*
- - - Génito-cutanée chez la *N82.5*
- - - Intestino-génitales chez la *N82.4*
- - Gangrène de Fournier chez la *N76.80*
- - Hématocèle chez la *N94.8*
- - Hydrocèle chez la *N94.8*
- - Malformation congénital
- - - Organes génitaux de la *Q52*
- - - Précisées des organes génitaux de la *Q52.8*
- - Peau organe génital
- - - *D28*
- - - *D39.7*
- - Pelvipéritonite
- - - Aiguë chez la *N73.3*
- - - Chronique chez la *N73.4*
- - Polype
- - - Appareil génital de la *N84*
- - - Parties de l'appareil génital de la *N84.8*
- - Prolapsus
- - - Muqueuse urétrale chez la *N81.0*
- - - Urètre chez la *N81.0*
- - Pseudo-hermaphrodisme surrénalien chez la *E25*
- - Pseudo-puberté hétérosexuelle précoce chez la *E25*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la *R87*
- - Stérilité de la *N97*
- - Trouble de: réponse sexuelle chez la *F52.2*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la *D39.7*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la *C57.8*
- - Urétrocèle chez la *N81.0*
- - Virilisme (chez la *E25*

Fémoral
v.a. ilio-fémoral
- Coxa vara retrosa) (non traumatique) ¬ Épiphysiolyse de la tête *M93.0*
- Niveau hanche cuisse ¬ Lésion traumatique
- - Nerf *S74.1*
- - Veine *S75.1*
- Sévère ¬ Dysplasie épiphysaire multiple avec dysplasie *Q77.3*
- ¬
- - Anomalie du noyau céphalique *Q72.4*
- - Athérosclérose de l'artère *I70.29*
- - Fracture
- - - Base du col *S72.05*

Fémoral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Fracture *–suite*
- - - Diaphyse *S72.3*
- - Lésion
- - - Nerf *G57.2*
- - - Traumatique de l'artère *S75.0*
- - Syndrome compressif du nerf *G57.2*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine *I80.1*

Fémoro
- Cutané ¬ Syndrome du nerf *G57.1*
- Patellaires ¬ Maladies *M22.2*

Fémoro-facial ¬ Syndrome *Q87.8*

Fémoro-péronéo-cubitale ¬ Dysostose *Q72.4*

Fémur
- Base ¬ Fracture du col du *S72.05*
- Condyle (latéral) (médian) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.41*
- Distal ¬ Luxation postérieure du *S83.11*
- Épiphyse
- - Décollement épiphysaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.42*
- - Proximale), décollement épiphysaire ¬ Fracture du col du *S72.02*
- Faciès particulier ¬ Syndrome d'hypoplasie du *Q87.8*
- Intercondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.44*
- Intracapsulaire ¬ Fracture du col du *S72.01*
- Legg-Calvé-Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du *M91.1*
- Mésocervicale ¬ Fracture du col du *S72.04*
- Partie
- - Non précis ¬ Fracture
- - - *S72.9*
- - - Col du *S72.00*
- - - Extrémité inférieure du *S72.40*
- - ¬ Fracture du col du *S72.08*
- SAI ¬ Tête du *S72.08*
- Souscapitale ¬ Fracture du col du *S72.03*
- Supracondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.43*
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion du *P13.2*
- Type Meyer ¬ Dysplasie de la tête du *Q78.8*
- ¬
- - Antéversion du col du *Q65.8*
- - Fracture
- - - *S72*
- - - Col du *S72.0*
- - - Extrémité inférieure du *S72.4*
- - - Multiples du *S72.7*
- - - Parties du *S72.8*
- - - Transcervicale ouverte du col du *S72.04, S71.87!*
- - Hypoplasie du *Q72.4*
- - Incurvation congénitale du *Q68.3*

Fémur *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la hanche et du *S71.84!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la hanche et du *S71.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la hanche et du *S71.85!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la hanche et du *S71.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la hanche et du *S71.86!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la hanche et du *S71.89!*
- - Raccourcissement longitudinal du *Q72.4*
- - Séquelles d'une fracture du *T93.1*

Fendus-surdité ¬ Syndrome de mains et pieds *Q87.2*

Fenêtre
- Aorto-pulmonaire congénitale ¬ *Q21.4*
- Ovale
- - Non oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la *H80.0*
- - Oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la *H80.1*
- Ronde ¬ Otosclérose intéressant la: *H80.2*

Fentanyl ¬ Intoxication par *T40.2*

Fente
- Branchial
- - SAI ¬ Malformations de la *Q18.2*
- - ¬
- - - Anomalie
- - - - Deuxième *Q18.0*
- - - - Première *Q18.0*
- - - - Quatrième *Q18.0*
- - - - Troisième *Q18.0*
- - - Tumeur maligne: *C10.4*
- Cardiopathie ¬ Syndrome de séquence de Potter- *Q87.8*
- Cervicale médiane ¬ *Q18.8*
- Facial
- - 4 de Tessier ¬ *Q18.8*
- - 5 de Tessier ¬ *Q18.8*
- - 6 de Tessier ¬ *Q18.8*
- - Oblique ¬ *Q18.8*
- - ¬ *Q18.8*
- Labial
- - Bilatéral ¬
- - - *Q36.0*
- - - Fente
- - - - Palatine, sans précision, avec *Q37.8*
- - - - Voile du palais avec *Q37.2*
- - - - Voûte
- - - - - Palais avec *Q37.0*

Fente *–suite*
- Labial *–suite*
- - Bilatéral ¬ *–suite*
- - - Fente *–suite*
- - - - Voûte *–suite*
- - - - - Voile du palais avec *Q37.4*
- - Fente de la partie alvéolaire ¬ *Q37.5*
- - Isolée ¬ *Q36.9*
- - Médiane ¬ *Q36.1*
- - SAI ¬
- - - *Q36.9*
- - - Fente
- - - - Voile du palais avec *Q37.3*
- - - - Voûte
- - - - - Palais avec *Q37.1*
- - - - - Voile du palais avec *Q37.5*
- - Unilatéral ¬
- - - *Q36.9*
- - - Fente
- - - - Palatine, sans précision, avec *Q37.9*
- - - - Voile du palais avec *Q37.3*
- - - - Voûte
- - - - - Palais avec *Q37.1*
- - - - - Voile du palais avec *Q37.5*
- - ¬
- - - *Q36*
- - - Syndrome de microbrachycéphalie-ptosis- *Q87.8*
- Labio
- - Maxillaire
- - - Bilatérale ¬ *Q37.0*
- - - Unilatérale ou SAI ¬ *Q37.1*
- - Maxillo-palatine, bilatérale ¬ *Q37.4*
- - Palatin
- - - SAI ¬ *Q37.9*
- - - ¬ *Q37*
- Labiomaxillopalatine unilatérale ¬ *Q37.5*
- Labiopalatine
- - Malrotation-cardiopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Surdité-lipome sacré ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ Syndrome de contractures-dysplasie ectodermique- *Q87.8*
- Luette ¬ *Q35.7*
- Luschka et du foramen de Magendie ¬ Atrésie des *Q03.1*
- Nasales ¬ Fissure, échancrure et *Q30.2*
- Palais, sans précision ¬ *Q35.9*
- Palatin
- - Anomalies carpo-tarsales-oligodontie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Pigmentation rétinienne anormale ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.8*
- - Sans précision fente labial
- - - Bilatérale ¬ *Q37.8*
- - - Unilatérale ¬ *Q37.9*

Fente *–suite*
- Palatin *–suite*
- - Submuqueuse ¬ *Q35.9*
- - Synéchies latérales ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ Syndrome
- - - Ankyloblépharon filiforme- *Q87.0*
- - - Létal d'omphalocèle- *Q87.8*
- - - Macrosomie-microphtalmie- *Q87.0*
- Partie alvéolaire ¬ Fente labiale avec *Q37.5*
- Processus) alvéolaire ¬ *K08.8*
- Vélaire ¬ *Q35.3*
- Voile palais
- - Fente labial
- - - Bilatérale ¬ *Q37.2*
- - - SAI ¬ *Q37.3*
- - - Unilatérale ¬ *Q37.3*
- - ¬ *Q35.3*
- Voûte
- - Palais
- - - Fente labial
- - - - Bilatérale ¬ *Q37.0*
- - - - SAI ¬ *Q37.1*
- - - - Unilatérale ¬ *Q37.1*
- - - ¬ *Q35.1*
- - Voile palais
- - - Fente labial
- - - - Bilatérale ¬ *Q37.4*
- - - - SAI ¬ *Q37.5*
- - - - Unilatérale ¬ *Q37.5*
- - - ¬ *Q35.5*
- ¬ Water clefts (*H25.0*

Fer
- Cheval
- - Rétine, sans décollement ¬ Déchirure en *H33.3*
- - ¬ Rein lobulé, soudé et en *Q63.1*
- Composés ¬ Intoxication: *T45.4*
- Menkes ¬ Syndrome des cheveux en fils de *E83.0*
- Réfractaire au traitement par le fer ¬ Anémie par déficit en *D50.8*
- Sans précision ¬ Anémie par carence en *D50.9*
- Secondaire à une perte de sang (chronique) ¬ Anémie par carence en *D50.0*
- Type 1 ¬ Neurodégénérescence avec surcharge cérébrale en *G23.0*
- ¬
- - Anémie
- - - Carence en *D50.8*
- - - Déficit en fer réfractaire au traitement par le *D50.8*
- - Anomalies du métabolisme du *E83.1*
- - Carence en *E61.1*
- - Maladie de: Menkes (cheveux crépus) (en fil de *E83.0*
- - Taux anormal de: *R79.0*

Fermé
- Colonne lombaire bassin ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors de fracture ou de luxation *S31.84!*
- - II lors de fracture ou de luxation *S31.85!*
- - III lors de fracture ou de luxation *S31.86!*
- Luxation
- - Avant-bras ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S51.84!*
- - - II lors de fracture *S51.85!*
- - - III lors de fracture *S51.86!*
- - Bras ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S41.84!*
- - - II lors de fracture *S41.85!*
- - - III lors de fracture *S41.86!*
- - Cou ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S11.84!*
- - - II lors de fracture *S11.85!*
- - - III lors de fracture *S11.86!*
- - Hanche fémur ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S71.84!*
- - - II lors de fracture *S71.85!*
- - - III lors de fracture *S71.86!*
- - Jambe ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S81.84!*
- - - II lors de fracture *S81.85!*
- - - III lors de fracture *S81.86!*
- - Pied ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S91.84!*
- - - II lors de fracture *S91.85!*
- - - III lors de fracture *S91.86!*
- - Poignet main ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S61.84!*
- - - II lors de fracture *S61.85!*
- - - III lors de fracture *S61.86!*
- - Tête ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S01.84!*
- - - II lors de fracture *S01.85!*
- - - III lors de fracture *S01.86!*
- - Thorax ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S21.84!*
- - - II lors de fracture *S21.85!*
- - - III lors de fracture *S21.86!*
- Primitif
- - Résiduel
- - - Aigu ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- - - Chronique ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- - - Intermittent ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- - - Retardé ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- - ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- SAI ¬ Fracture: *T14.2*

Fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Pseudomonas et autres bacilles non *B96.5!*

Fermeture
- Anormale des maxillaires ¬ *K07.5*
- Anténatale du canal artériel ¬ *Q25.8*
- Cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une *Z91.73*
- Sutures crâniennes ¬ Retard de *P96.3*

Fermier ¬ Poumon de *J67.0*

Ferriprive ¬ anémie: *D50*

Ferrique ¬ Pigmentation: *L81.8*

Ferritine ¬ Neurodégénérescence associée à la *G23.0*

Ferroportine ¬ Maladie *E83.1*

Fertile ¬ Syndrome de: eunuchoïdisme *E23.0*

Fesse ¬
- *C49.5*
- *R02.05*
- *S31.0*
- Abcès cutané, furoncle et anthrax de la *L02.3*
- Dos tout partie
- - *L02.2*
- - Sauf les *R02.04*
- Rougeurs des *L22*

Fessier
- Psoriasiforme ¬ Rash *L22*
- ¬ Érythème *L22*

Fessière
- Nourrisson ¬ Dermite *L22*
- ¬
- - Région
- - - *L02.3*
- - - *T21*
- - Tendinite de la région *M76.0*

Fétichisme
- Travestisme ¬ *F65.1*
- ¬ *F65.0*

Fétichiste ¬ Travestisme *F65.1*

Fétide ¬ Haleine *R19.6*

Feu
- Artifice ¬ Accident dû à: Corps de *W49.9!*
- Dermite due au feu] ¬ Érythème dû au *L59.0*
- Flammes ¬ Exposition à: *X59.9!*
- ¬
- - Accident dû à: Armes à *W49.9!*
- - Effondrement d'un bâtiment en *X59.9!*
- - Érythème dû au feu [dermite due au *L59.0*
- - Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à *Y35.7!*
- - Syndrome de la bouche en *K14.6*

Fever
- Bilharziose urinaire] ¬ Snail *B65*
- ¬ Fièvre due à des médicaments [Drug *R50.2*

FGM type
- 1 ¬ Female genital mutilation [*Z91.71*
- 2 ¬ Female genital mutilation [*Z91.72*
- 3 ¬ Female genital mutilation [*Z91.73*
- 4 ¬ Female genital mutilation [*Z91.74*

FH1 ¬ *E26.0*

FH3 ¬ *E26.0*

Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red *G31.81*

Fibre
- Hyaloïdes ¬ Membranes et *H43.3*
- Minérales ¬ Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres *J61*
- Musculaire
- - Myopathies avec anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des *G71.2*
- - ¬
- - - Activité continue familiale de la *G71.1*
- - - Myopathie congénitale avec disproportion des types de *G71.2*
- Rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec *G31.81*
- Sensitives myélinisées de gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec surdité, déficience intellectuelle et absence de *G60.0*
- ¬ Disproportion des types de *G71.2*

Fibreux
- Cryptogénique) ¬ Alvéolite *J84.1*
- Localisée) ¬ Dysplasie *M85.0*
- Mâchoire ¬ Dysplasie *K10.8*
- Maladie de Jaffe-Lichtenstein] ¬ Dysplasie polyostotique *Q78.1*
- Os ¬ Dysplasie *M85.09*
- Solitaire ¬ Tumeur *D21.9*
- ¬
- - Épaississement pleural *J92*
- - Epulis (à): *K06.8*
- - Thyroïdite (de): chronique: *E06.5*

Fibrillaire non amyloïde ¬ Glomérulopathie *N03.8*

Fibrillation
- Auriculaire
- - Chronique ¬ *I48.2*
- - Familiale ¬ *I48.9*
- - Intermittente ¬ *I48.0*
- - Paroxystique ¬ *I48.0*
- - Permanente ¬
- - - *I48.2*
- - Persistante ¬ *I48.1*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- - ¬
- - - *I49.8*
- - - Arythmie

Fibrillation *–suite*
- Auriculaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Arythmie *–suite*
- - - - *I48.9*
- - - - Complète au cours d'une *I48.9*
- - - Tachyarythmie
- - - - Complète paroxystique au cours d'une *I48.0*
- - - - Cours d'une *I48.9*
- Flutter
- - Auriculaire
- - - Sans autre précision ¬ *I48.9*
- - - ¬ *I48*
- - Ventriculaires ¬ *I49.0*
- Ventriculaire idiopathique type Brugada ¬ *I49.8*
- ¬ Arythmie par *I48.9*

Fibrine ¬
- Carence en facteur stabilisant de la *D68.26*
- Déficit héréditaire en facteur stabilisant de la *D68.26*

Fibrineuse
- Nodulaire) (tubéreuse) ¬ Cordite (*J38.2*
- ¬ bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*

Fibrinogène
- A ¬ Amylose à chaîne alpha du *E85.0†, N08.4**
- ¬ Déficit
- - Acquis en *D65.0*
- - Héréditaire en *D68.20*

Fibrinogénopénie
v.a. Fibrinopénie
- Congénitale ¬ *D68.20*

Fibrinolyse
- Post-partum ¬ *O72.3*
- ¬ Intoxication: Médicaments agissant sur la *T45.6*

Fibrinolytique
- Acquise ¬ Hémorragie *D65.2*
- ¬ Purpura *D65.2*

Fibrinopénie
v.a. Fibrinogénopénie
- Héréditaire ¬ *D68.20*
- ¬ *D68.20*

Fibroadénomes multiples de la poitrine ¬ *D24*

Fibroblastique
- Sans précision ¬ Affection *M72.9*
- ¬ affection
- - *M72*
- - *M72.8*

Fibrocartilagineux triangulaire
- TFCC] ¬ Complexe *S63.3*
- ¬ Rupture traumatique
- - Complexe *S63.3*
- - TFCC [Complexe *S63.3*

Fibrochondrogenèse ¬ *Q77.7*

Fibrodysplasie ossifiante progressif ¬

- *M61.1*
- *M61.19*

Fibroélastose

- Endocardique ¬ *I42.4*
- Endomyocardique ¬ *I42.4*

Fibrohistiocytome myxoïde malin ¬ *C49.9*

Fibrokystique

- Foie ¬ Maladie *Q44.6*
- Généralisé
- - Maladie osseuse de von Recklinghausen] ¬ Ostéite *E21.0†, M90.89**
- - ¬ Ostéite *E21.0†, M90.89**
- Rein ¬ Dégénérescence ou maladie *Q61.8*
- ¬
- - Mastopathie *N60*
- - Rein *Q61.8*

Fibrolamellaire ¬ Carcinome hépatocellulaire *C22.0*

Fibromatose

- Agressive ¬ *D48.1*
- Aponévrose
- - Palmaire [Dupuytren] ¬ *M72.0*
- - Plantaire ¬ *M72.2*
- Aponévrotique juvénile ¬ *M72.89*
- Congénitale généralisée ¬ *D48.1*
- Gingival
- - Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Surdité ¬ Syndrome de *H90.3*
- - ¬
- - - *K06.1*
- - - Syndrome d'hypertrichose avec *L68.8, K06.1*
- Pseudo-sarcomateuse ¬ *M72.4*
- SAI ¬ *M72.9*

Fibrome

- Invasif ¬ *D48.1*
- Ovarien ¬ *D27*
- Utérus ¬ Soins maternels pour: *O34.1*

Fibromusculaire

- Artérielle ¬ Dysplasie *I77.3*
- Modérée ¬ Sténose subaortique *Q24.4*

Fibromyalgie

- Juvénile ¬ *M79.7*
- ¬ *M79.7*

Fibromyome de l'utérus ¬ *D25*

Fibromyosite ¬ *M79.7*

Fibromyxosarcome ¬ *C49.9*

Fibronectine ¬ Glomérulopathie à dépôts de *N07.6*

Fibro-odontosarcome améloblastique ¬ *C41.1*

Fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste anévrismal et d'une autre lésion *K09*

Fibroplasie rétrocristallinienne ou rétrolentale ¬ *H35.1*

Fibrosa osteoplastica ¬ Osteodystrophia *E21.0†, M90.89**

Fibrosante

- Myopathie rétractile-fibrose pulmonaire ¬ Syndrome de poïkilodermie héréditaire *Q82.8*
- ¬ Alopécie frontale *L66.1*

Fibrosarcome

- Améloblastique de la mandibule ¬ *C41.1*
- Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*
- ¬ *C49.9*

Fibrosclérose

- Multiple ¬ *M35.5*
- Sein ¬ *N60.3*

Fibrose

- Angiocentrique à éosinophiles ¬ *J39.88*
- Canal lacrymal ¬ *H04.5*
- Capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire ¬ *T85.82*
- Cirrhose foie ¬
- - *K74*
- - Maladie toxique du foie avec *K71.7*
- Congénitale des muscles oculomoteurs ¬ *H49.8*
- Cutanées ¬ Cicatrices et *L90.5*
- Diffuse ¬ Lymphome de Hodgkin classique en déplétion lymphocytaire, avec *C81.3*
- Endomyocardique (tropicale) ¬ *I42.3*
- Hépatique
- - Sclérose hépatique ¬ *K74.2*
- - ¬ *K74.0*
- Kystique
- - Manifestation
- - - Intestinales ¬ *E84.1*
- - - Pulmonaires ¬ *E84.0*
- - - ¬ *E84.8*
- - Pancréas ¬
- - - *E84.9†, K87.1**
- - - Iléus méconial en l'absence reconnue de *P76.0*
- - Sans précision ¬ *E84.9*
- - ¬
- - - *E84*
- - - Iléus méconial au cours de *E84.1†, P75**
- Médiastinale ¬ *J98.58*
- Moelle osseuse ¬ *D47.4*
- Myocarde ¬ *I51.4*
- Origine médicamenteuse ¬ *M79.89*
- Pancréas ¬ *K86.8*
- Périnée ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- Poumon
- - Bauxite ¬ *J63.1*
- - Graphite ¬ *J63.3*
- - Irradiation ¬ *J70.1*

Fibrose *–suite*

- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Pulmonaire
- - Chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ *J68.4*
- - Congénitale ¬ *P27.8*
- - Diffuse ¬ *J84.1*
- - Idiopathique ¬ *J84.1*
- - Origine médicamenteuse ¬ Antécédents personnels de *Z87.0*
- - Tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- - ¬ Syndrome de poïkilodermie héréditaire fibrosante-myopathie rétractile- *Q82.8*
- Rate SAI ¬ *D73.8*
- Rétripéritonéale idiopathique avec infection du rein ¬ *K66.2*
- Rétropéritonéal
- - Idiopathique ¬ *K66.2*
- - ¬ *K66.2*
- Sclérose alcooliques du foie ¬ *K70.2*
- Silicotique (massive) du poumon ¬ *J62*
- Sous-muqueux
- - Bouche ¬ *K13.5*
- - Langue ¬ *K13.5*
- - Voies respiratoires supérieures ¬ *J39.88*
- Syphilitique chronique du testicule ¬ *A52.7†, N51.1**
- Systémique néphrogénique ¬ *M35.8*
- Tuberculeux
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose pulmonaire: *A16.2*
- - Sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*
- Utérus SAI ¬ *N85.8*
- ¬ Autres affections pulmonaires interstitielles avec *J84.1*

Fibrosite ¬ *M79.7*

Fibrothécome ovarien ¬ *D27*

Fibrothorax ¬ *J94.1*

Fibula ¬ Déficit congénital longitudinal de la *Q72.6*

Ficoline 3 ¬ Déficit immunitaire par déficit en *D84.1*

Fiessinger-Leroy-Reiter] ¬ Syndrome oculo-urétro-synovial [*M02.3*

Fièvre

- Aphteuse ¬ *B08.8*
- Arbovirus SAI ¬ *A94*
- Boutonneuse
- - Méditerranéenne ¬ *A77.1*
- - ¬ *A77.1*
- Causé morsure rat
- - Sans précision ¬ *A25.9*

Fièvre *–suite*
- Causé morsure rat *–suite*
- - ¬ *A25*
- Cérébrospinale à méningocoques ¬ *A39.0†, G01**
- Chikungunya ¬ *A92.0*
- Entérique ¬ *A01.0*
- Équine vénézuélienne ¬ *A92.2*
- Étiologie inconnue ¬ *R50.80*
- Exanthémateuse à entérovirus [exanthème de Boston] ¬ *A88.0*
- Exanthématique méditerranéenne ¬ *A77.1*
- Exanthème à entérovirus ¬ *A88.0*
- Fluviale du Japon ¬ *A75.3*
- Frissons ¬ *R50.88*
- Ganglionnaire ¬ *B27*
- Hantavirus ¬ *A98.5*
- Haverhill ¬ *A25.1*
- Hémorragique
- - Arénavirus
- - - Chapare ¬ *A96.8*
- - - Lujo ¬ *A96.8*
- - - Sans précision ¬ *A96.9*
- - - ¬
- - - - *A96*
- - - - *A96.8*
- - Argentine ¬ *A96.0*
- - Asie centrale ¬ *A98.0*
- - Bolivie ¬ *A96.1*
- - Brésilienne ¬ *A96.8*
- - Chikungunya ¬ *A92.0*
- - Corée ¬ *A98.5*
- - Crimée [du Congo] ¬ *A98.0*
- - Crimée-Congo ¬ *A98.0*
- - Épidémique ¬ *A98.5*
- - Junin ¬ *A96.0*
- - Kyasanur ¬ *A98.2*
- - Lassa ¬ *A96.2*
- - Machupo ¬ *A96.1*
- - Marbourg ¬ *A98.3*
- - Omsk ¬ *A98.1*
- - Russe ¬ *A98.5*
- - Syndrome rénal ¬ *A98.5†, N08.0**
- - Vénézuélienne ¬ *A96.8*
- - Viral
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres *A98*
- - - Précisées ¬ Autres *A98.8*
- - - Sans précision ¬ *A99*
- - Virus Ebola ¬ *A98.4*
- Indiana] ¬ Stomatite vésiculaire virale [*A93.8*
- Indienne à tiques ¬ *A77.1*
- Jaune
- - Brousse ¬ *A95.0*
- - Citadine ¬ *A95.1*
- - Jungle ¬ *A95.0*

Fièvre *–suite*
- Jaune *–suite*
- - Sans précision ¬ *A95.9*
- - Sylvatique ¬ *A95.0*
- - ¬
- - - *A95*
- - - Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.3*
- Kew Garden] ¬ Rickettsiose vésiculaire [*A79.1*
- Lassa ¬ *A96.2*
- Malte ¬
- - *A23*
- - *A23.0*
- Marais ¬ Anémie due à la *B54†, D63.8**
- Marseille ¬ *A77.1*
- Médicaments [Drug fever] ¬ *R50.2*
- Méditerranéen
- - Familial ¬
- - - *E85.0*
- - - Arthrite au cours de *E85.0†, M14.49**
- - ¬
- - - *A23*
- - - *A23.9*
- Montana ¬ *A78*
- Morsures de rat ¬ *A25.9*
- Mouche du daim ¬ *A21*
- Nile occidental ¬ *A92.3*
- Nouveau-né SAI ¬ *P81.9*
- Ondulante
- - Maladie de Bang] ¬ *A23.1*
- - ¬ *A23*
- Origine
- - Centrale ¬ *R50.88*
- - Inconnue ¬ *R50*
- Oropouche ¬ *A93.0*
- Oroya ¬ *A44.0*
- Pappataci ¬ *A93.1*
- Paratyphoïde ¬
- - *A01.4*
- - Arthrite au cours de *A01.4†, M01.39**
- Perroquets ¬ *A70*
- Persistante ¬ *R50.88*
- Pharyngo-conjonctivale épidémique ¬ *B30.2†, H13.1**
- Phlébotome ¬ *A93.1*
- Pontiac] ¬ Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [*A48.2*
- Pourpré
- - Montagnes rocheuses ¬ *A77.0*
- - Rickettsia
- - - Australis ¬ *A77.3*
- - - Conorii ¬ *A77.1*
- - - Rickettsii ¬ *A77.0*
- - - Sibirica ¬ *A77.2*
- - Rickettsioses à tiques] ¬ *A77*

Fièvre *–suite*
- Pourpré *–suite*
- - Sans précision ¬ *A77.9*
- - ¬ Autres *A77.8*
- Précis ¬
- - *R50.8*
- - *R50.88*
- Puerpérale ¬ *O85*
- Purpurique du Brésil ¬ *A48.4*
- Q ¬
- - *A78*
- - Endocardite au cours de *A78†, I39.8**
- - Pneumonie au cours de *A78†, J17.8**
- Quadrilatérale ¬ *A78*
- Quintane ¬ *A79.0*
- Récurrent
- - Borrelia
- - - Recurrentis ¬ *A68.0*
- - - Sauf Borrelia recurrentis ¬ *A68.1*
- - Borréliose
- - - Poux ¬ *A68.0*
- - - Sans précision ¬ *A68.9*
- - - Tiques ¬ *A68.1*
- - - ¬ *A68*
- Rhumatismal
- - Aiguë ¬ Érythème marginé au cours d'une *I00†, L54.0**
- - Pneumonie ¬ *I00†, J17.8**
- Ross River ¬ *B33.1*
- Russo-asiatique ¬ *A77.2*
- Sans précision ¬ *R50.9*
- Sao Paulo [maculeuse brésilienne] ¬ *A77.0*
- Sévère avec syndrome de thrombocytopénie [SFTG] ¬ *A93.8*
- Songo ¬ *A98.5†, N08.0**
- Streptobacillaire causée par morsure de rat ¬ *A25.1*
- Thrombocytopénie sévère à Haemaphysalis longicornis ¬ Syndrome de *A93.8*
- Tierce bénigne ¬ Anémie due à la *B54†, D63.8**
- Tiques
- - Colorado ¬ *A93.2*
- - Haemaphysalis longicornis ¬ *A93.8*
- - Kenya ¬ *A77.1*
- - Queensland ¬ *A77.3*
- Tranchées ¬ *A79.0*
- Transmise par le lapin ¬ *A21*
- Trois jours] ¬ Exanthème subit [*B08.2*
- Typhoïde
- - Paratyphoïde ¬ *A01*
- - ¬
- - - *A01.0*
- - - Arthrite au cours de *A01.0†, M01.39**
- - - Pneumonie au cours de *A01.0†, J17.0**
- Uvéo-parotidienne [Heerfordt] ¬ *D86.8*

Fièvre *–suite*
- Vallée du Rift ¬ *A92.4*
- Viral
- - Précis transmis
- - - Arthropodes ¬ Autres *A93.8*
- - - Moustiques ¬ Autres *A92.8*
- - Transmis
- - - Arthropodes
- - - - Non classées ailleurs ¬ Autres *A93*
- - - - Sans précision ¬ *A94*
- - - Moustiques
- - - - Sans précision ¬ *A92.9*
- - - - ¬ Autres *A92*
- Virus
- - O'nyong-nyong ¬ *A92.1*
- - West-Nile ¬ *A92.3*
- - Zika ¬ *A92.5*
- Volhynie ¬ *A79.0*
- Yaba ¬ *B08.8*
- ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R50.9*

Figuré chronique ¬ Autres formes d'érythème *L53.3*

Fil fer
- Menkes ¬ Syndrome des cheveux en *E83.0*
- ¬ Maladie de: Menkes (cheveux crépus) (en *E83.0*

Filamenteuse ¬ Kératite: *H16.1*

Filaminopathie musculaire ¬ *G71.8*

Filarienne
- SAI ¬ Chylocèle de la tunique vaginale (non *N50.8*
- ¬ Chylocèle (non *I89.8*

Filariose
- Bancroft [Filariose lymphatique] ¬ *B74.0*
- Brugia
- - Malayi ¬ *B74.1*
- - Timori ¬ *B74.2*
- Loa loa ¬ *B74.3*
- Lymphatique] ¬ Filariose de Bancroft [*B74.0*
- Sans précision ¬ *B74.9*
- Wuchereria bancrofti ¬ *B74.0*
- ¬
- - *B74*
- - *B74.8*

Filiforme
- Adnatum isolé ¬ Ankyloblépharon *Q10.3*
- Fente palatine ¬ Syndrome d'ankyloblépharon *Q87.0*
- Imperforation anale ¬ Syndrome d'ankyloblépharon *Q87.8*

Filippi ¬ Syndrome de *Q87.8*

Filles ¬ Acné excoriée des jeunes *L70.5*

FIM
- Cognitif
- - 5-10 points ¬ *U51.21*
- - 11-29 points ¬ *U51.11*

FIM *–suite*
- Cognitif *–suite*
- - 30-35 points ¬ *U51.01*
- Moteur
- - 13-30 points ¬ *U50.51*
- - 31-42 points ¬ *U50.41*
- - 43-58 points ¬ *U50.31*
- - 59-68 points ¬ *U50.21*
- - 69-84 points ¬ *U50.11*
- - 85-91 points ¬ *U50.01*

FIME ¬ *G40.3*

Fin
- Administratives
- - Particulières ¬ Codes secondaires utilisés à des *U69.1!*
- - ¬ Examen médical et prise de contact à des *Z02*
- Épidémiologiques particulières ¬ Codes secondaires utilisés à des *U69.2!*
- Médico-légales ¬ examen à des *Z04*
- Thérapeutiques ¬ Ulcère dû au plâtre utilisé à des *L89*

Fine-Lubinsky ¬ Syndrome de *Q87.8*

Fineman
v. Carey-Fineman-Ziter
v. Smith-Fineman-Myers

Finlay-Marks ¬ Syndrome de *Q87.8*

Finrinogène ¬ Carence en *D68.20*

Fisher ¬ Syndrome de Miller- *G61.0*

Fissuraire ¬ Kyste *K09.1*

Fissure
- Anal
- - Aiguë ¬ *K60.0*
- - Chronique ¬ *K60.1*
- - Sans précision ¬ *K60.2*
- Cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Congénitale de la langue ¬ *Q38.3*
- Échancrure et fente nasales ¬ *Q30.2*
- Épiglotte ¬ *Q31.8*
- Fistule
- - Kyste d'origine branchiale ¬ *Q18.0*
- - Mamelon ¬ *N64.0*
- - Régions anale et rectale ¬ *K60*
- Labiale congénitale ¬ *Q36*
- Mamelon gestationnelles ou puerpérales ¬ *O92.1*
- Palais ¬ *Q35*
- Postérieure du cartilage cricoïde ¬ *Q31.8*

Fissurée ¬ Langue: *K14.5*

Fistulans sinifica ¬ Pyodermia *L73.2*

Fistule
- Anal
- - Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K60.3*
- Ano-rectale ¬ *K60.5*
- Aorte-artère pulmonaire congénitale ¬ *Q21.4*
- Aorto-pulmonaire ¬ *Q21.4*

Fistule *–suite*
- Appareil
- - Génital femme
- - - Sans précision ¬ *N82.9*
- - - ¬
- - - - *N82*
- - - - *N82.8*
- - - - *N82.88*
- - Génito-urinaire de la femme ¬ Autres *N82.1*
- Appendice ¬ *K38.3*
- Artérielle ¬ *I77.2*
- Artérioveineux
- - Acquise ¬ *I77.0*
- - Cérébral
- - - Acquise) ¬ *I67.11*
- - - ¬ Anévrisme cérébral et *I67.1*
- - Congénital vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.21*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.01*
- - Coronaire, acquise ¬ *I25.4*
- - Durale du crâne ¬ *Q28.21*
- - Pulmonaire congénitale ¬ *Q25.7*
- - Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Anévrisme ou *T14.5*
- - Vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.0*
- Articulaire ¬ *M25.1*
- Broncho-œsophagienne ¬ Atrésie de l'œsophage avec *Q39.1*
- Cervico
- - Auriculaire ¬ *Q18.1*
- - Vésicale ¬ *N82.1*
- Cholécysto
- - Colique ¬ *K82.3*
- - Duodénale ¬ *K82.3*
- Cholédoco-duodénale ¬ *K83.3*
- Coccygien(ne) ou pilonidal(e) ¬ *L05*
- Congénital
- - Appareil circulatoire ¬ Autre *Q28.81*
- - Glandes salivaires ¬ *Q38.4*
- - Lèvre ¬ *Q38.0*
- - Rectum et de l'anus ¬ *Q43.6*
- - Utéro-digestive et utéro-urinaire ¬ *Q51.7*
- - Vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.31*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.11*
- Dos du nez ¬ *Q18.8*
- Drainage ¬ Ostéomyélite chronique avec *M86.4*
- Estomac et du duodénum ¬ *K31.6*
- Gastro-colique
- - Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K31.6*
- Gastro-gastrique ¬ *K31.6*
- Gastro-jéjuno-colique ¬ *K31.6*
- Génito-cutanée chez la femme ¬ *N82.5*

Fistule *–suite*
- Glandes salivaires ¬ *K11.4*
- Intestin ¬ *K63.2*
- Intestino-génitales chez la femme ¬ Autres *N82.4*
- Intestino-utérine ¬ *N82.4*
- Kyste
- - Origine branchiale ¬ Fissure, *Q18.0*
- - Préauriculaires ¬ *Q18.1*
- Labiale inférieure ¬ *Q38.0*
- Labyrinthique ¬ *H83.1*
- Lacrymale ¬ *H04.6*
- Liquide céphalorachidien postopératoire ¬ *G97.80*
- Lombaire tuberculeuse ¬ *A18.0†, M49.06**
- Mamelon ¬ Fissure et *N64.0*
- Mastoïde ¬ *H70.1*
- Médian(e) de la face et du cou ¬ *Q18.8*
- Œsophage ¬ *K22.80*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Pavillon, congénitale ¬ *Q18.1*
- Périlymphatique ¬ Surdité mixte liée à l'X avec *H90.8*
- Périnéale tuberculeuse ¬ *A18.1†, N37.8**
- Périnéo-vaginale ¬ *N82.5*
- Périrectale tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Poche-intestin ¬ *N32.1*
- Post-opératoire persistante ¬ *T81.8*
- Rectal
- - Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K60.4*
- Recto-cutanée ¬ *K60.4*
- Recto-urétrale congénitale ¬ *Q64.7*
- Recto-vaginal
- - Congénitale ¬ *Q52.2*
- - Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N74.1**
- - ¬ *N82.3*
- Régions anale et rectale ¬ Fissure et *K60*
- Trachéo-œsophagien
- - Congénital
- - - SAI ¬ *Q39.2*
- - - Sans atrésie ¬ *Q39.2*
- - Consécutive à une trachéotomie ¬ *J95.0*
- - Isolée ¬ *Q39.2*
- - ¬
- - - *J86.0*
- - - Atrésie de l'œsophage avec *Q39.1*
- Tuberculeux
- - Broncho-cutané
- - - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.5*
- - - ¬ *A16.4*
- - Broncho-médiastinal
- - - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.5*
- - - ¬ *A16.4*

Fistule *–suite*
- Tuberculeux *–suite*
- - Broncho-pleural
- - - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.5*
- - - ¬ *A16.4*
- - Pleurale, confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.6*
- - Scrotum ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Urètre ¬ *A18.1†, N37.8**
- Urétéro-vaginale ¬ *N82.1*
- Urétrale ¬ *N36.0*
- Urétro
- - Périnéale ¬ *N36.0*
- - Rectale ¬ *N36.0*
- - Scrotale ¬ *N50.8*
- - Vaginale ¬ *N82.1*
- Urinaire SAI ¬ *N36.0*
- Utéro
- - Pariétale ¬ *N82.5*
- - Urétérale ¬ *N82.1*
- - Vésicale ¬ *N82.1*
- Vagin
- - Côlon ¬ *N82.3*
- - Cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement ¬ *N82.80*
- - Intestin grêle ¬ *N82.2*
- - Vessie de remplacement ¬ *N82.81*
- Veine porte et l'artère hépatique (congénitale) ¬ *Q26.6*
- Vésicale, non classée ailleurs ¬ *N32.2*
- Vésico
- - Intestinale ¬ *N32.1*
- - Rectale ¬ *N32.1*
- Vésico-vaginale ¬ *N82.0*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.3*
- Voies biliaires ¬ *K83.3*
- ¬
- - Abcès
- - - Dentaire avec *K04.6*
- - - Dento-alvéolaire avec *K04.6*
- - - Périapical
- - - - *K04.6*
- - - - Sans *K04.7*
- - - Régions anale et rectale, avec ou sans *K61*
- - Absence atrésie sténose congénital
- - - Anus
- - - - *Q42.2*
- - - - Sans *Q42.3*
- - - Rectum
- - - - *Q42.0*
- - - - Sans *Q42.1*
- - Atrésie de l'œsophage, sans *Q39.0*
- - Phlegmon des régions anale et rectale, avec ou sans *K61*

Fistule *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pyothorax
- - - *J86.0*
- - - Sans *J86.9*
- - Tuberculose du rectum avec *A18.3†, K93.0**

Fitz-Hugh-Curtis
- Chlamydia ¬ Syndrome de *A74.8†, K67.0**
- ¬ Syndrome de *A54.8†, K67.1**

Fixation
- Interne
- - Os
- - - Colonne vertébrale ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.20*
- - - Membre
- - - - Avant-bras ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.12*
- - - - Bras ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.11*
- - - - Cheville et pied ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.16*
- - - - Jambe ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.15*
- - - - Main ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.13*
- - - - Os d'un membre: autres os précisés d'un membre ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.18*
- - - - Région
- - - - - Pelvienne et cuisse ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.14*
- - - - - Scapulaire ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.10*
- - - - ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.1*
- - - Os: autres os précisés ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.28*
- - - ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.2*
- - Toute localisation] ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de *T84.6*
- Intestin ¬ Malformations congénitales de *Q43.3*
- Radio-isotopes [radionucléides] ¬ résultats anormaux de: épreuves de *R94*
- Traction ¬ Changement, vérification ou enlèvement de: appareils externes de *Z47.8*
- ¬ Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de *Z47.0*

Fixe
- Langue SAI ¬ Partie *C01*
- ¬ Érythème pigmenté *L27.1*

Fixée organiquement ¬ Vessie à faible compliance, *N31.80*

FKRP ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.0*

Flaccida ¬ Perforation de la pars *H72.1*

Flagellés ¬ Diarrhée à *A07.9*

Flaitz
v. Atkin-Flaitz

Flammes ¬ Exposition à: Feu et *X59.9!*

Flammeus ¬ Nævus: *Q82.5*

Flanc ¬

- *S31.1*
- *T21*

Flare phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ Phénomène d'embrasement thérapeutique (*T88.7*

Flasque

- Affaissé
- - Perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau *L98.7*
- - SAI ¬ Peau *L98.7*
- Périphérique), non classée ailleurs ¬ Vessie neurogène *N31.2*
- ¬
- - Hémiparésie ou hémiplégie *G81.0*
- - Paraparésie et paraplégie *G82.0*
- - Peau et tissu sous-cutané excédentaire et *L98.7*
- - Tétraparésie et tétraplégie *G82.3*

Flatulence

- Troubles apparentés ¬ *R14*
- ¬ Formes psychogènes de: *F45.3*

Flava ¬ Tinea: *B36.0*

Flavimaculatus ¬ Fundus *H35.5*

Flavoprotéine ¬ Trouble du transport d'électrons par carence en *E71.3*

Flavoprotéine-ubiquinone oxydoréductase ¬ Trouble du transport d'électrons par carence en *E71.3*

Fléchisseur

- Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.1*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon *S56.2*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et tendons *S66.6*
- Orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long *S96.0*
- Pouce niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S56.0*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon longs *S66.0*
- S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S56.1*
- ¬ Déchirure spontanée des tendons *M66.3*

Fleischer ¬ Anneau de Kayser- *H18.0*

Fleischner ¬ Ostéite cystoïde multiple type *D86.8*

Flexibilité cireuse schizophrénique ¬ *F20.2*

Flexion

- Articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation ¬ Contracture (*T87.6*
- Dorsale, acquis ¬ Pied en *M21.68*
- ¬

Flexion *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Déformation en *M21.2*
- - Eczéma (de): plis de *L20.8*
- - Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en *S52.52*
- - Psoriasis des plis de *L40.8*

Flexneri ¬ Shigellose à Shigella *A03.1*

Floating-Harbor ¬ Syndrome de *Q87.8*

Flottante ¬

- Bêtalipoprotéinémie large ou *E78.2*
- Crête gingivale *K06.8*

Floue au cours d'hystérie ¬ Vision *F44.6†, H58.1**

Fluconazole ou au voriconazole ¬ Candida résistants au *U83!*

Fluctuations diurnes marquées ¬ Dystonie progressive héréditaire avec *G24.1*

Fluide haut pression

- Industrielle) ¬ Injection traumatique de *T70.4*
- ¬ Effets des *T70.4*

Fluor

- Gaz) et fluorure d'hydrogène ¬ Effet toxique: *T59.5*
- Mycosique ¬ *B37.3†, N77.1**
- Trichomonas vaginalis ¬ *A59.0†, N77.1**

Fluorée ¬ Ostéose *M85.1*

Fluorose

- Dentaire ¬ *K00.3*
- ¬ Taches de l'émail non associées à la *K00.3*

Fluorouracile ¬ Intoxication au 5- *T45.1*

Fluorure d'hydrogène ¬ Effet toxique: Fluor (gaz) et *T59.5*

Flutter

- Auriculaire
- - Atypique ¬ *I48.4*
- - Chronique ¬ *I48.9*
- - Idiopathique du nouveau-né ¬ *P29.1*
- - Paroxystique ¬ *I48.9*
- - Sans autre précision ¬ Fibrillation et *I48.9*
- - Type
- - - I ¬ *I48.3*
- - - II ¬ *I48.4*
- - Typique ¬ *I48.3*
- - ¬
- - - Fibrillation et *I48*
- - - Tachyarythmie complète paroxystique au cours d'un *I48.9*
- Ventriculaires ¬ Fibrillation et *I49.0*

Fluviale du Japon ¬ Fièvre *A75.3*

Flux lent (Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome coronarien à *I20.8*

Flynn-Aird ¬ Syndrome de *Q87.8*

FMF ¬ *E85.0*

FMPP ¬ *E30.1*

Focal

- Autosomique dominante, type DYT25 ¬ Dystonie *G24.1*
- Déficience intellectuelle-malformation cérebro-cérébelleuse ¬ Syndrome d'épilepsie *Q04.8*
- Généralisés ¬ Epilepsies et syndromes épileptiques non précisés comme *G40.8*
- Gingivale ¬ Hyperkératose palmoplantaire *Q82.8*
- Linéaire ¬ Elastose *L94.8*
- Orale ¬ Mucinose *K13.7*
- Partiel crise
- - Début focal ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (*G40.0*
- - Partiel
- - - Complexes ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (*G40.2*
- - - Simples ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (*G40.1*
- Résistant diazoxide déficit
- - Kir6.2 ¬ Hyperinsulinisme *E16.1*
- - SUR1 ¬ Hyperinsulinisme *E16.1*
- Sans précision ¬ Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement *G40.09*
- Segmentaire ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux stéroïdes avec hyalinose *N04.1*
- Syndrome épileptique crise initialement focal
- - Sans précision ¬ Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (*G40.09*
- - ¬ Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (*G40.08*
- Télangiectasique du foie ¬ Hyperplasie nodulaire *D13.4*
- Type I ¬ Dysplasie dermique faciale *Q82.8*
- ¬
- - Dysplasie dermique faciale *Q82.8*
- - Épilepsie
- - - Bénigne du nourrisson à crises complexes *G40.08*
- - - Idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement *G40.08*
- - - Syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début *G40.0*
- - Hyperplasie hépatique nodulaire *K76.8*
- - Myosite *M60.89*
- - Syndrome néphrotique idiopathique cortico-sensible avec glomérulosclérose segmentaire *N04.1*

Fœtal

v. Type de maladie

Fœto-maternelle ¬ Transfusion (de): *O43.0*

Fœto-pelvienne

- Connue ou présumée ¬ Soins maternels pour disproportion *O33*

Fœto-pelvienne *–suite*

- Cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions *P03.1*
- Origine mixte, maternelle et fœtale ¬ Soins maternels pour disproportion *O33.4*
- SAI ¬ Disproportion: *O33.9*
- Sans précision ¬ Dystocie due à une disproportion *O65.4*

Fœto-placentaire

- Iso-immunisation ¬ Anasarque *P56.0*
- Maladie hémolytique
- - Sans précision ¬ Anasarque *P56.9*
- - ¬ Anasarque *P56*
- Non
- - Associée à une iso-immunisation ¬ Anasarque *O36.2*
- - Maladie hémolytique ¬ Anasarque *P83.2*
- SAI ¬ Anasarque
- - *O36.2*
- - *P83.2*
- ¬
- - Incompatibilité Rh (avec anasarque *O36.0*
- - Iso-immunisation: SAI (avec anasarque *O36.1*
- - Soins maternels pour anasarque *O36.2*

Fœtoprotéine ¬

- Anomalie de l'alpha- *R77.2*
- Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha- *Z36.1*

Fœtus
v.a. Nouveau-né

- Accouchement de l'enfant ¬ Hémorragie après expulsion du *O72*
- Affecté
- - Anhydramnios ¬ *P01.2*
- - Hépatite aiguë de la mère ¬ *P00.2*
- - Maladie à virus Zika contractée par la mère ¬ *P00.2*
- Anormalement gros ¬
- - Dystocie due à un *O66.2*
- - Soins maternels pour disproportion due à un *O33.5*
- Arlequin ¬ *Q80.4*
- Compressus ¬ *O31.0*
- Disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du *P03.1*
- Échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de retard de croissance du *Z36.4*
- Entraînant disproportion ¬
- - Ascite du *O33.7*
- - Hydropisie du *O33.7*
- - Méningomyélocèle du *O33.7*
- - Tératome sacro-coccygien du *O33.7*
- - Tumeur du *O33.7*

Fœtus *–suite*

- Faciliter l'accouchement ¬ Amputation du *P03.8*
- Hydrocéphale ¬
- - Dystocie due à: *O66.3*
- - Soins maternels pour disproportion due à un *O33.6*
- Léger pour l'âge gestationnel ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de: *O36.5*
- Menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du *O35.8*
- Mort in utero ¬ Rétention d'un *O02.1*
- Non classée ailleurs ¬ Infection intra-amniotique du *P39.2*
- Normal ¬ Disproportion: d'origine fœtale avec *O33.5*
- Nouveau-né
- - Affecté
- - - Accouchement
- - - - Césarienne ¬ *P03.4*
- - - - Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ *P03.3*
- - - - Extraction par le siège ¬ *P03.0*
- - - - Forceps ¬ *P03.2*
- - - - Précipité ¬ *P03.5*
- - - Affection
- - - - Cordon ombilical, autres et sans précision ¬ *P02.6*
- - - - Maternel
- - - - - Éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle ¬ *P00*
- - - - - Sans précision ¬ *P00.9*
- - - - - ¬ *P00.8*
- - - Alcoolisme de la mère ¬ *P04.3*
- - - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ *P04.0*
- - - Anomalie
- - - - Membrane
- - - - - Sans précision ¬ *P02.9*
- - - - - ¬ *P02.8*
- - - - Morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision ¬ *P02.2*
- - - Béance du col ¬ *P01.0*
- - - Chorio-amniotite ¬ *P02.7*
- - - Complication
- - - - Concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ *P02*
- - - - Grossesse
- - - - - Mère ¬ *P01*
- - - - - Mère ¬ *P01.8*
- - - - - Mère, sans précision ¬ *P01.9*
- - - - Précisées du travail et de l'accouchement ¬ *P03.8*
- - - - Travail
- - - - - Accouchement ¬ *P03*
- - - - - Accouchement, sans précision ¬ *P03.9*

Fœtus *–suite*

- Nouveau-né *–suite*
- - Affecté *–suite*
- - - Contractions anormales de l'utérus ¬ *P03.6*
- - - Effet nocif
- - - - Maternel
- - - - - Sans précision ¬ *P04.9*
- - - - - ¬ *P04.8*
- - - - Transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel ¬ *P04*
- - - Exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ *P04.6*
- - - Forme
- - - - Compression du cordon ombilical ¬ *P02.5*
- - - - Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ *P02.1*
- - - Grossesse
- - - - Extra-utérine ¬ *P01.4*
- - - - Multiple ¬ *P01.5*
- - - Hydramnios ¬ *P01.3*
- - - Infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées ¬ *P00.8*
- - - Intervention
- - - - Chirurgicale chez la mère ¬ *P00.6*
- - - - Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ *P00.7*
- - - Lupus érythémateux disséminé de la mère ¬ *P00.8*
- - - Maladie
- - - - Circulatoires et respiratoires de la mère ¬ *P00.3*
- - - - Infectieuses et parasitaires de la mère ¬ *P00.2*
- - - - Rénales et des voies urinaires de la mère ¬ *P00.1*
- - - Médicaments absorbés par la mère ¬ *P04.1*
- - - Mort de la mère ¬ *P01.6*
- - - Oligoamnios ¬ *P01.2*
- - - Placenta praevia ¬ *P02.0*
- - - Présentation
- - - - Anormale avant le travail ¬ *P01.7*
- - - - Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ *P03.1*
- - - Procidence du cordon ombilical ¬ *P02.4*
- - - Radiologie chez la mère ¬ *P00.7*
- - - Rupture prématurée des membranes ¬ *P01.1*
- - - Syndromes de transfusion placentaire ¬ *P02.3*
- - - Tabagisme de la mère ¬ *P04.2*
- - - Toxicomanie de la mère ¬ *P04.4*
- - - Traumatisme de la mère ¬ *P00.5*
- - - Trouble
- - - - Hypertensifs de la mère ¬ *P00.0*
- - - - Nutritionnels de la mère ¬ *P00.4*

Fœtus *–suite*
- Nouveau-né *–suite*
- - Affecté *–suite*
- - - Utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ *P04.5*
- - Hypoglycémie) ¬ Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le *P70.1*
- - Sans précision ¬
- - - Affection des téguments spécifiques du *P83.9*
- - - Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le *P70.9*
- - - Hémorragie
- - - - Intracrânienne (non traumatique) du *P52.9*
- - - - Intraventriculaire (non traumatique) du *P52.3*
- - - Maladie hémolytique du *P55.9*
- - ¬
- - - Affection
- - - - Précisées des téguments spécifiques du *P83.8*
- - - - Téguments spécifiques du *P83*
- - - Anomalie transitoire métabolisme glucides
- - - - *P70.8*
- - - - Spécifiques du *P70*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée chez le *P60*
- - - Contusions du *P54.5*
- - - Ecchymoses du *P54.5*
- - - Entérocolite nécrosante du *P77*
- - - États mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du *P08*
- - - Hématome superficiel du *P54.5*
- - - Hémorragie
- - - - Cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du *P52.6*
- - - - Intracérébrale (non traumatique) du *P52.4*
- - - - Intracrânien
- - - - - Non traumatique du *P52*
- - - - - Non traumatiques) du *P52.8*
- - - - Intraventriculaire
- - - - - Non traumatique), degré 1, du *P52.0*
- - - - - Non traumatique), degré 2, du *P52.1*
- - - - - Non traumatique), degré 3, du *P52.2*
- - - - Sous-arachnoïdienne (non traumatique) du *P52.5*
- - - Interruption de la grossesse source d'affections chez le *P96.4*
- - - Iso-immunisation
- - - - ABO du *P55.1*
- - - - Rhésus du *P55.0*
- - - Maladie
- - - - Hémolytique
- - - - - *P55*
- - - - - *P55.8*

Fœtus *–suite*
- Nouveau-né *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Maladie *–suite*
- - - - Hémorragique du *P53*
- - - Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du *P83.3*
- - - Pétéchies du *P54.5*
- - - Réactions et intoxications médicamenteuses du *P93*
- - - Syndrome de défibrination du *P60*
- Papyracé ¬ *O31.0*
- Petit pour l'âge gestationnel ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de: *O36.5*
- Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du *O68.2*
- Sans
- - Mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel ¬ Malnutrition du *P05.2*
- - Précision ¬
- - - Croissance lente du *P05.9*
- - - Soin maternel
- - - - Affection du *O36.9*
- - - - Présentation anormale du *O32.9*
- Trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du *O36.6*
- Viable ¬ Soins maternels pour grossesse abdominale avec *O36.7*
- ¬
- - Avortement spontané, *P01.8*
- - Dystocie
- - - Ascite du *O66.3*
- - - Hydropisie du *O66.3*
- - - Méningomyélocèle du *O66.3*
- - - Position et une présentation anormales du *O64*
- - - Rotation incomplète de la tête du *O64.0*
- - - Tératome sacro-coccygien du *O66.3*
- - - Tumeur du *O66.3*
- - Poursuite grossesse
- - - Avortement d'un ou plusieurs *O31.1*
- - - Mort intra-utérine d'un ou plusieurs *O31.2*
- - Retard de croissance et malnutrition du *P05*
- - Soin maternel
- - - Affection
- - - - Connues ou présumées du *O36*
- - - - Précisées du *O36.8*
- - - Anomalie chromosomique (présumée) du *O35.1*
- - - Croissance
- - - - Excessive du *O36.6*
- - - - Insuffisante du *O36.5*
- - - Disproportion due à d'autres anomalies du *O33.7*

Fœtus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Soin maternel *–suite*
- - - Grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs *O32.5*
- - - Maladie héréditaire (présumée) du *O35.2*
- - - Malformation (présumée) du système nerveux central du *O35.0*
- - - Mort intra-utérine du *O36.4*
- - - Présentation anormal
- - - - *O32.8*
- - - - Connue ou présumée du *O32*
- - - Spina bifida (présumé(e)) du *O35.0*
- - Thrombose de la veine rénale chez le *P29.8*
- - Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du *O68.0*

Fogo selvagem] ¬ Pemphigus brésilien [*L10.3*

Foie
- Abcès cérébral ¬ Abcès amibien du *A06.6†, G07**
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte du *K77.2**
- Chat ¬
- - Distomatose hépatique à douve du *B66.0†, K77.0**
- - Infection par: douve du *B66.0*
- Chlonorchis sinensis ¬ Distomatose du *B66.1†, K77.0**
- Cholestase ¬ Maladie toxique du *K71.0*
- Congénital(e) ¬ Absence de *Q44.7*
- Cryptogénique ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ *E10.60†, K77.8**
- - - 2 ¬ *E11.60†, K77.8**
- - ¬ *E14.60†, K77.8**
- Dite) cardiaque ¬ Cirrhose du *K76.1*
- Douloureux ¬ *R10.1*
- Echinococcus
- - Granulosus ¬ Kyste hydatique du *B67.0*
- - Multilocularis ¬ Infection du *B67.5†, K77.0**
- - ¬ Infection du *B67.8†, K77.0**
- Entamoeba histolytica ¬ Abcès du *A06.4†, K77.0**
- Fibrose et cirrhose du foie ¬ Maladie toxique du *K71.7*
- Ficelé syphilitique ¬ *A52.7†, K77.0**
- Granulomes hépatiques ¬ Maladie toxique du *K71.88*
- Hémorragie rupture Varice œsophagien ¬ Cirrhose
- - *K74.6†, I98.3**
- - Alcoolique du *K70.3†, I98.3**
- - Toxique du *K71.7†, I98.3**
- Hépatite
- - Aiguë ¬ Maladie toxique du *K71.2*
- - Chronique

Foie *–suite*
- Hépatite *–suite*
- - Chronique *–suite*
- - - Active ¬ Maladie toxique du *K71.5*
- - - Lobulaire ¬ Maladie toxique du *K71.4*
- - - Persistante ¬ Maladie toxique du *K71.3*
- - Lupoïde ¬ Maladie toxique du *K71.5*
- - Non classée ailleurs ¬ Maladie toxique du *K71.6*
- Hyperplasie nodulaire en foyer ¬ Maladie toxique du *K71.88*
- Lésion foie ¬ Maladie toxique
- - *K71.8*
- - *K71.88*
- Macronodulaire ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte ¬ Atteinte du *K77.1**
- Micronodulaire ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Mouton ¬ Maladie due à la douve du *B66.3*
- Nécrose hépatique ¬ Maladie toxique du *K71.1*
- Non classée ailleurs ¬ Dégénérescence graisseuse du *K76.0*
- Origine cardiaque ¬ Sclérose du *K76.1*
- Péliose hépatique ¬ Maladie toxique du *K71.88*
- Portale ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Post-nécrotique ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Poumon ¬ Abcès amibien
- - *A06.5†, J99.8**
- - Cerveau (et du *A06.6†*
- Précisés ¬ Autres carcinomes du *C22.7*
- Reins ¬ Maladie glycogénique du *E74.0*
- Rejet greffe-contre-hôte stade
- - 1 ¬ Maladie aiguë du *T86.01†, K77.11**
- - 2 ¬ Maladie aiguë du *T86.02†, K77.12**
- - 3 ¬ Maladie aiguë du *T86.02†, K77.13**
- - 4 ¬ Maladie aiguë du *T86.02†, K77.14**
- SAI
- - Congénital(e) ¬ Malformation du *Q44.7*
- - ¬
- - - Cirrhose (du *K74.6*
- - - Lésion du *S36.10*
- Saignement de varices gastriques ¬ Cirrhose alcoolique du *K70.3†, I98.3**
- Sans précision ¬
- - Cirrhoses du *K74.6*
- - Maladie
- - - *K76.9*
- - - Alcoolique du *K70.9*
- - - Inflammatoire du *K75.9*
- - - Toxique du *K71.9*
- - Tumeur maligne: *C22.9*
- Sibérienne ¬ Distomatose hépatique à douve du *B66.0†, K77.0**
- Stade Child-Pugh
- - A ¬ Cirrhose

Foie *–suite*
- Stade Child-Pugh *–suite*
- - A ¬ Cirrhose *–suite*
- - - *K74.6, K74.70!*
- - - *K74.70!*
- - B ¬ Cirrhose
- - - *K74.6, K74.71!*
- - - *K74.71!*
- - C ¬ Cirrhose
- - - *K74.6, K74.72!*
- - - *K74.72!*
- Substances anti-anémiantes ¬ Préparation à base de *T45.8*
- Surnuméraire ¬ *Q44.7*
- Traumatisme obstétrical ¬ Rupture du *P15.0*
- Type mixte ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Varice
- - Gastriques ¬ Cirrhose alcoolique du *K70.3†, I98.2**
- - Œsophagien ¬ Cirrhose
- - - *K74.6†, I98.2**
- - - Alcoolique du *K70.3†, I98.2**
- - - Toxique du *K71.7†, I98.2**
- Vésicule
- - Biliaire ¬ Lésion traumatique du *S36.1*
- - Voie biliaire ¬
- - - Carcinoma in situ: *D01.5*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.6*
- Voie biliaire
- - Intracrânien ¬
- - - Carcinome
- - - - Épidermoïde du *C22.0, C22.1*
- - - - Indifférencié du *C22.9, C22.1*
- - - Tumeur malign
- - - - *C22*
- - - - Secondaire du *C78.7*
- - ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R93.2*
- - ¬
- - Abcès
- - - *K75.0*
- - - Amibien du *A06.4†, K77.0**
- - - Dysentérique du *A06.4†, K77.0**
- - Amibiase du *A06.4†, K77.0**
- - Angiosarcome du *C22.3*
- - Atrophie ou dystrophie jaune du *K72*
- - Carence en facteur de coagulation due à: affections du *D68.4*
- - Cirrhose
- - - Alcoolique du *K70.3*
- - - Congénitale (du *P78.8*
- - - Syphilitique du *A52.7†, K77.0**
- - Clonorchiase du *B66.1†, K77.0**
- - Congestion passive chronique du *K76.1*
- - Contusion et hématome du *S36.11*

Foie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dégénérescence
- - - Graisseuse alcoolique du *K70.0*
- - - Neuronale progressive de l'enfant avec maladie du *G31.88*
- - Détérioration fonctionnel
- - - Aiguë d'une greffe de *T86.40*
- - - Chronique d'une greffe de *T86.41*
- - Donneur de *Z52.6*
- - Échinococcose
- - - *B67.8†, K77.0**
- - - Alvéolaire du *B67.5†, K77.0**
- - - Kystique du *B67.0†, K77.0**
- - Fibrose
- - - Cirrhose du *K74*
- - - Sclérose alcooliques du *K70.2*
- - Glycogénose avec cirrhose du *E74.0*
- - Gomme du *A52.7†, K77.0**
- - Hémochromatose du *E83.1†, K77.8**
- - Hyperplasie nodulaire
- - - Focale télangiectasique du *D13.4*
- - - Régénérative du *K76.8*
- - Infection (à): petite douve (du *B66.2*
- - Infiltration de glycogène du *E74.0†, K77.8**
- - Kyste hydatique du *B67.8†, K77.0**
- - Lésion du *S36.16*
- - Maladie
- - - *K76*
- - - Chinoise de la douve du *B66.1*
- - - Fibrokystique du *Q44.6*
- - - Inflammatoire
- - - - *K75*
- - - - Précisées du *K75.8*
- - - Kystique du *Q44.6*
- - - Orientale de la douve du *B66.1*
- - - Précisées du *K76.8*
- - - Syphilitique du *A52.7†, K77.0**
- - - Toxique
- - - - *K71*
- - - - Foie
- - - - - Fibrose et cirrhose du *K71.7*
- - - - - Lésions du *K71.8*
- - - - - Lésions du *K71.88*
- - - - Veino-occlusive du *K71.80*
- - - Veino-occlusive du *K76.5*
- - Malformation congénital
- - - *Q44.7*
- - - Vésicule biliaire, des voies biliaires et du *Q44*
- - Nécrose hémorragique centrale du *K76.2*
- - Sarcome
- - - *C22.4*
- - - Embryonnaire indifférencié du *C22.4*
- - - Non différencié du *C22.4*

Foie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Stades cliniques de la cirrhose du *K74.7!*
- - Status post greffe de *Z94.4*
- - Syphilis
- - - *A52.7†, K77.0**
- - - Secondaire du *A51.4†, K77.0**
- - Traumatisme obstétrical du *P15.0*
- - Trouble fonctionnel échec rejet
- - - Greffe de *T86.4*
- - - Non précisé d'une greffe de *T86.49*
- - Tuberculose du *A18.8†, K77.0**
- - Tumeur bénigne: *D13.4*

Foin
- Asthme ¬ Rhume des *J45.0*
- ¬
- - Maladie des moisissures de *J67.0*
- - Rhume des *J30.1*

Foix-Alajouanine] ¬ Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de *G37.4*

Folate ¬
- Carence en: *E53.8*
- Syndrome neurodégénératif dû au déficit de transport cérébral des *G31.88*

Foliacé ¬ Pemphigus *L10.2*

Folie à deux ¬ *F24*

Foliées ¬ Hypertrophie des papilles *K14.3*

Folinique ¬ Convulsions sensibles à l'acide *G40.3*

Folique
- Médicaments ¬ Anémie par carence en acide *D52.1*
- SAI ¬ Anémie par carence en acide *D52.9*
- Sans précision ¬ Anémie par carence en acide *D52.9*
- ¬
- - Anémie
- - - Carence
- - - - Acide
- - - - - *D52*
- - - - - *D52.8*
- - - - Alimentaire en acide *D52.0*
- - - Mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l'acide *D53*
- - Carence en: acide *E53.8*

Folliculaire
- Acquise ¬ Kératose *L11.0*
- Aigu
- - Adénovirus ¬ Conjonctivite
- - - *B30.1†*
- - - *B30.1†, H13.1**
- - ¬ Conjonctivite *H10.2†, H13.1**
- Avitaminose A ¬ Kératose *E50.8†, L86**
- Cellules clivées ¬ Lymphome *C82.9*
- Centroblastique ¬ Lymphome *C82.2*
- Darier-White] ¬ Kératose: *Q82.8*

Folliculaire *–suite*
- Familial de la thyroïde ¬ Carcinome papillaire ou *C73*
- Grade
- - I ¬ Lymphome *C82.0*
- - II ¬ Lymphome *C82.1*
- - III, sans précision ¬ Lymphome *C82.2*
- - IIIa ¬ Lymphome *C82.3*
- - IIIb ¬ Lymphome *C82.4*
- Hémorragique (de l'ovaire) ¬ Kyste (de): *N83.0*
- Non hodgkinien avec ou sans zones diffuses ¬ lymphome *C82*
- Non-hodgkinien à petites cellules clivées ¬ Lymphome *C82.9*
- Ovaire ¬ Kyste *N83.0*
- Parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] ¬ Kératose *L87.0*
- Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Sans précision ¬ Kyste *L72.9*
- - ¬
- - - Formes de kyste *L72.8*
- - - Kystes *L72*
- Pénétrante ¬ Hyperkératose *L87.0*
- Petites cellules clivées ¬ Lymphome *C82.0*
- Sans précision ¬
- - Affection *L73.9*
- - Lymphome
- - - *C82.9*
- - - Non *C83.9*
- Spinulosa decalvans de Siemens ¬ Kératose *Q82.8*
- Thyroïde ¬ Cancer *C73*
- Trachomateuse ¬ Conjonctivite: *A71.1*
- ¬
- - Affections *L73*
- - Amygdalite (aiguë): *J03.9*
- - Conjonctivite *H10.4†, H13.1**
- - Forme
- - - Lymphome, *C82.7*
- - - Précisées d'affections *L73.8*
- - Germinoblastome *C82.9*
- - Kyste: *K09.0*
- - Lichen plan *L66.1*
- - Lymphome
- - - *C82*
- - - Non
- - - - *C83*
- - - - *C83.8*
- - - Non-hodgkinien diffus non *C83.9*
- - Sarcome à cellules dendritiques *C96.4*

Folliculaire-alopécie-photophobie ¬ Syndrome d'ichtyose *Q80.0*

Follicule
- Graaf ¬ Kyste (de): *N83.0*
- Pileux ¬
- - Inflammation de la glande du *L73.9*

Follicule *–suite*
- Pileux ¬ *–suite*
- - Tumeurs bénignes de: *D23*

Folliculite
v.a. Pseudofolliculite
- Décalvante
- - Quinquaud ¬ *L66.2*
- - ¬ *L66.2*
- Érythémateuse réticulée ¬ *L66.4*
- Périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ *L66.3*
- Sclerotisans nuchae] ¬ Acné chéloïde [*L73.0*

Folliculotrope ¬ Mycosis fongoïde *C84.0*

Fonction
- Cérébrale ¬ Perte irréversible de la *G93.88*
- Cognitif conscience
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux *R41.8*
- - ¬ Autres symptômes et signes relatifs aux *R41*
- Greffe ¬ Reprise retardée de la *T86.12*
- Labyrinthe ¬ Perte de la *H83.2*
- Labyrinthiques ¬ Troubles des *H83.2*
- Lymphocytaire antigène-1 (LFA-1) ¬ Anomalie de la *D84.0*
- Lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la *D83.0*
- Motrices, sans précision ¬ Troubles spécifiques du développement des *F82.9*
- Palpébrale ¬ Autres troubles affectant la *H02.5*
- Rénal
- - Chronique, unilatéral ¬ Trouble de la *N18.80*
- - ¬ Goutte due à une altération de la *M10.3*
- Symbolique non
- - Classés ailleurs ¬ Dyslexie et autres troubles de la *R48*
- - Précisés ¬ Troubles de la *R48.8*
- Thyroïdien
- - Exophtalmie ¬ Trouble de la *E05.0†, H06.2**
- - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies néonatales de la *P72.2*
- - Normale ¬ Goitre congénital transitoire avec *P72.0*
- Vésicales du à un choc rachidien ¬ Trouble des *G95.82*
- Vestibulaire
- - Sans précision ¬ Atteinte des *H81.9*
- - ¬ Autres atteintes des *H81.8*

Fonctionnel
v. Type de maladie

Fonctionnement
- Défectueux d'un trachéostome ¬ *J95.0*
- Pompe à médicaments ¬ Contrôle des paramètres de *Z45.82*
- Social

Fonctionnement *–suite*
- Social *–suite*
- - Apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles du *F94*
- - Enfance
- - - Sans précision ¬ Trouble du *F94.9*
- - - ¬ Autres troubles du *F94.8*
- Stomie de l'appareil urinaire ¬ Mauvais *N99.5*

Fond
- Œil
- - Diabétique
- - - Diabète sucré type
- - - - 1 ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - - 2 ¬ *E11.30†, H36.0**
- - - ¬ *E14.30†, H36.0**
- - SAI ¬ Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*
- - ¬
- - - Artériosclérose du *I70.8†, H36.8**
- - - Colobome du *Q14.8*
- Utérus ¬ Tumeur maligne: *C54.3*

Fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple *D68.35*

Fongémie SAI ¬ *B49*

Fongicides ¬ Effet toxique: Herbicides et *T60.3*

Fongique
- Ongle
- - Orteil ¬ Infection *B35.1*
- - ¬ Infection *B35.1*
- Tube digestif ¬ Infection *B49†, K93.8**
- ¬
- - Balanite *B37.4†, N51.2**
- - Maladie due au VIH avec infection *B20, B49*
- - Ulcère de l'œsophage: *K22.1*

Fongoïde
- Folliculotrope ¬ Mycosis *C84.0*
- ¬ Mycosis *C84.0*

Fongus bénin du testicule ¬ *A18.1†, N51.8**

Fontaine
- Gangrène ¬ Stade IV de Leriche et *I70.25*
- Ulcération ¬
- - Athérosclérose des artères distales de type bassin-jambe, stade IV selon *I70.24*
- - Stade IV de Leriche et *I70.24*
- ¬
- - AOMI type bassin-jambe stade
- - - IIb de Leriche et *I70.22*
- - - III de Leriche et *I70.23*
- - - IV de Leriche et *I70.25*
- - - IVa de Leriche et *I70.25*
- - - IVb de Leriche et *I70.25*

Fontaine *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI], sans précision du stade (de Leriche et *I70.29*
- - Gangrène
- - - Humide, stade IVb de Leriche et *I70.25*
- - - Sèche, stade IVa de Leriche et *I70.25*
- - Stade
- - - I de Leriche et *I70.20*
- - - IIa de Leriche et *I70.21*
- - - IIb de Leriche et *I70.22*
- - - III de Leriche et *I70.23*
- - Trouble circulatoire
- - - Leriche et *I70.29*
- - - Selon *I70.29*

Fonte musculaire
- Non classées ailleurs ¬ Atrophie et *M62.5*
- ¬ *M62.89*

FOP ¬ *M61.19*

Foramen
- Macula ¬ Trou (*H35.38*
- Magendie ¬ Atrésie des fentes de Luschka et du *Q03.1*
- Ovale ¬ Perméabilité ou persistance de: *Q21.1*

Foramina parietalia permagna ¬ *Q75.8*

Forbes ¬ Maladie de: *E74.0*

Forceps
- Césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par *O66.5*
- Sans précision ¬ Echec de l'application d'une ventouse et d'un *O66.5*
- Suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un *O66.5*
- Ventouse ¬ Accouchement unique par *O81*
- ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par *P03.2*

Forces
- Armées ¬ Examen général en série de: membres des *Z10*
- Gravité [G] anormales ¬ Effets de: *T75.8*
- Jeu cours travail
- - Sans précision ¬ Anomalie des *O62.9*
- - ¬ Autres anomalies des *O62.8*
- Mécanique objet
- - Animés ¬
- - - Accident dû à l'exposition à des *W64.9!*
- - - Exposition à des *W64!*
- - Inanimés ¬
- - - Accident dû à l'exposition à des *W49.9!*
- - - Exposition à des *W49!*

Fordyce ¬ Maladie de Fox- *L75.2*

Forestier] ¬ Hyperostose ankylosante [*M48.1*

Forêt de Kyasanur ¬ Maladie de la *A98.2*

Formaldéhyde ¬ Effet toxique: *T59.2*

Formation
- Anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe ¬ *K04.3*
- Dent ¬
- - Changement de couleur pendant la *K00.8*
- - Troubles de la *K00.4*
- Entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de *O34.30*
- Mélanine ¬ Autres anomalies liées à une diminution de la *L81.6*
- Tuberculeuse de phlyctènes ¬ *A18.5†, H19.2**
- Vésicule non thermique ¬ lésion traumatique superficiel
- - Avant-bras: *S50.82*
- - Cheville et du pied: *S90.82*
- - Épaule et du bras: *S40.82*
- - Hanche et de la cuisse: *S70.82*
- - Jambe: *S80.82*
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.02*
- - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.02*
- - Partie du corps non précisée: *T14.02*
- - Poignet et de la main: *S60.82*
- - Tronc, niveau non précisé: *T09.02*
- ¬ inscription dans: établissement de *Z02*

Forme
- Acné
- - Rosacée ¬ Autres *L71.8*
- - ¬ Autres *L70.8*
- Actinomycose ¬ Autres *A42.8*
- Aigu maladie Chagas
- - Atteinte cardiaque ¬ *B57.0†, I98.1**
- - SAI ¬ *B57.1*
- - Sans atteinte cardiaque ¬ *B57.1*
- Alopécie
- - Androgénique ¬ Autres *L64.8*
- - Cicatricielle ¬ Autres *L66.8*
- Amnésie ¬ Autres *R41.3*
- Angine de poitrine ¬ Autres *I20.8*
- Anophtalmie ¬ Autres *Q11.1*
- Appendicite ¬ Autres *K36*
- Aspergillose ¬ Autres *B44.8*
- Associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ *F95.2*
- Associées ¬ Toutes *T74.8*
- Atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col de la vessie ¬ Autres *Q64.3*
- Atténuée ¬ Mucopolysaccharidose type II, *E76.1*
- Atypique ¬ Démence de type Alzheimer avec *G30.8†, F00.2**
- Avortement ¬ Autres *O05*
- Bartonellose ¬ Autres *A44.8*
- Blastomycose ¬ Autres *B40.8*

Forme *–suite*

- Cardiopathie ischémique
- - Aiguës ¬ Autres *I24.8*
- - Chronique ¬ Autres *I25.8*
- Cardio-vasculaire ¬ Maladie de Gaucher, *E75.2*
- Cérébelleuse [AMS-C] ¬ Atrophie multisystématisée de *G23.3*
- Charbon ¬ Autres *A22.8*
- Chimiothérapie ¬ Autres *Z51.2*
- Cholécystite ¬ Calcul de la vésicule biliaire avec une autre *K80.1*
- Chromomycose ¬ Autres *B43.8*
- Classique ¬ Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], *E25.00*
- Coccidioïdomycose ¬ Autres *B38.8*
- Combinées de cataracte sénile ¬ *H25.8*
- Compression du cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P02.5*
- Cryptococcose ¬ Autres *B45.8*
- Débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ *M08.3*
- Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P02.1*
- Delirium ¬ Autres *F05.8*
- Démence vasculaire ¬ Autres *F01.8*
- Dents ¬ Anomalies de volume et de *K00.2*
- Dépressif
- - Paranoïde ¬ Démence sénile: démence: *F03*
- - Sans symptômes psychotiques ¬ Psychose maniaco-dépressive, *F33.2*
- - Symptômes psychotiques ¬ Psychose maniaco-dépressive, *F33.3*
- Diffuse sensible au diazoxide ¬ Hypoglycémie hyperinsulinémique, *E16.1*
- Diphtérie ¬ Autres *A36.8*
- Encéphalomyopathique avec tubulopathie rénale ¬ Déplétion de l'ADN mitochondrial, *G31.81†, N16.8**
- Enchevêtrement du cordon ¬ Travail et accouchement compliqués d'une autre *O69.2*
- Érysipéloïde ¬ Autres *A26.8*
- Érythème
- - Figuré chronique ¬ Autres *L53.3*
- - Polymorphe ¬ Autres *L51.8*
- - ¬ Autres *L53*
- Étoile ¬ Hyalose syphilitique tardive en *A52.7†, H45.8**
- Évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament ¬ Autres *D70.18*
- Familiale ¬ Maladie du nœud sinusal, *I49.5*
- Hépatique de la glycogénose] ¬ Syndrome de Wagner-Parnas [*E74.0*
- Hypertrichose ¬ Autres *L68.8*
- Hypothermie du nouveau-né ¬ Autres *P80.8*
- Incontinence urinaire précisées ¬ Autres *N39.4*

Forme *–suite*

- Inertie utérine ¬ Autres *O62.2*
- Infantile
- - Acromégalie ¬ *E22.0*
- - Juvénile ¬ Déficit en 3-phosphoglycerate déshydrogénase, *E72.8*
- Infection due au virus de l'herpès ¬ Autres *B00.8*
- Intermédiaire ¬ Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: *E42*
- Isolée d'agénésie du corps calleux ¬ *Q04.0*
- Juvénile, type III [Kugelberg-Welander] ¬ Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ Autres *L72.8*
- Légère ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, *T86.05†*
- Lèpre ¬ Autres *A30.8*
- Leptospirose ¬ Autres *A27.8*
- Listériose ¬ Autres *A32.8*
- Lupus érythémateux disséminé ¬ Autres *M32.8*
- Lymphome
- - Folliculaire ¬ Autres *C82.7*
- - Hodgkin (classique) ¬ Autres *C81.7*
- Maladie Crohn ¬
- - *K50.8*
- - *K50.88*
- Mixte
- - Idées obsédantes et comportements compulsifs ¬ *F42.2*
- - ¬ Démence de type Alzheimer avec *G30.8†, F00.2**
- Modérée ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, *T86.06†*
- Négligence d'un enfant ¬ Négligence affective ou autre *Z62*
- Neuromusculaire
- - Congénitale ¬ GSD type 4, *E74.0*
- - Périnatal fatale ¬
- - - Glycogénose
- - - - Déficit en enzyme branchante, *E74.0*
- - - - Type 4, *E74.0*
- - - GSD
- - - - Déficit en enzyme branchante, *E74.0*
- - - - Type 4, *E74.0*
- - ¬ Glycogénose type 4
- - - Adulte, *E74.0*
- - - Enfant, *E74.0*
- Nocardiose ¬ Autres *A43.8*
- Non cicatriciel
- - Précisées de raréfaction du système pileux ¬ Autres *L65.8*
- - Raréfaction du système pileux ¬ Autres *L65*
- Oligo(pauci)- articulaire ¬ Arthrite chronique juvénile, *M08.4*
- Paludisme congénital ¬ Autres *P37.4*
- Paracoccidioïdomycose ¬ Autres *B41.8*

Forme *–suite*

- Parkinsonne [AMS-P] ¬ Atrophie multisystématisée de *G23.2*
- Passage ¬ Autres *M35.1*
- Pelade ¬ Autres *L63.8*
- Pelle ¬ Incisive déformée en *K00.2*
- Pemphigus ¬ Autres *L10.8*
- Péricardite aiguë ¬ Autres *I30.8*
- Peste ¬ Autres *A20.8*
- Polyarticulaire ¬ Arthrite chronique juvénile (séronégative), *M08.3*
- Précis
- - Acantholyse ¬ Autres *L11.8*
- - Affections folliculaires ¬ Autres *L73.8*
- - Épaississement de l'épiderme ¬ Autres *L85.8*
- - Érythème ¬ Autres *L53.8*
- - Ictère nucléaire ¬ Autres *P57.8*
- - Soins médicaux ¬ Autres *Z51.8*
- - Tremblement ¬ Autres *G25.2*
- Privation de liberté ¬ Emprisonnement et autres *Z65*
- Prurigo ¬ Autres *L28.2*
- Psychogène
- - Aérophagie ¬ *F45.3*
- - Côlon irritable" ¬ *F45.3*
- - Diarrhée ¬ *F45.3*
- - Dyspepsie ¬ *F45.3*
- - Dysurie ¬ *F45.3*
- - Flatulence ¬ *F45.3*
- - Hoquet ¬ *F45.3*
- - Hyperventilation ¬ *F45.3*
- - Mictions fréquentes ¬ *F45.3*
- - Spasme du pylore ¬ *F45.3*
- - Toux ¬ *F45.3*
- Retard mental ¬ Autres *F78*
- Scapulo-péronière ¬ Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- Schistosomiase ¬ Autres *B65.8*
- Schizophrénie ¬ Autres *F20.8*
- Sclérose systémique ¬ Autres *M34.8*
- Scoliose
- - Secondaire ¬ Autres *M41.5*
- - ¬ Autres *M41.8*
- Sénile et présénile ¬ *G30†*
- Sévère
- - Compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum ¬ Autres *B50.8*
- - ¬
- - - Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, *T86.07†*
- - - Mucopolysaccharidose type II, *E76.1*
- Spastique hémiplégique ¬ Infirmité motrice cérébrale, *G80.2*
- Sporotrichose ¬ Autres *B42.8*
- Stomatite ¬ Autres *K12.1*
- Syndrome de Turner ¬ Autres *Q96.8*

Forme *–suite*
- Syphilis secondaire ¬ Autres *A51.4*
- Tardif
- - Idiotie amaurotique ¬ *E75.4*
- - Syphilis
- - - Congénitale, symptomatique ¬ Autres *A50.5*
- - - Symptomatique ¬ Autres *A52.7*
- - ¬ Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], *E25.01*
- Tétanos ¬ Autres *A35*
- Tuberculoïde (T)] ¬ Lèpre tuberculoïde [*A30.1*
- Tuberculose
- - Appareil respiratoire
- - - Confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Autres *A15.8*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Autres *A16.8*
- - Système nerveux ¬ Autres *A17.8†*
- Tularémie ¬ Autres *A21.8*
- Urticaire ¬ Autres *L50.8*
- Von Zumbusch ¬ Psoriasis pustuleux généralisé, *L40.1*

Formiminoglutamique ¬ Acidurie *E70.8*

Formiminotransférase
- Cyclodésaminase ¬ Déficit en *E70.8*
- ¬ Déficit en glutamate *E70.8*

Formule leucocytaire anormale SAI ¬ *R72*

Fornix] ¬ Rupture d'un calice rénal, non traumatique [rupture de *N28.80*

Forssman
v. Borjeson-Forssman-Lehmann

Forster-McCarthy-Berry ¬ Syndrome de Hyde *Q87.0*

Fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès ¬ Découverte *R98*

Fortuitement ¬ Grossesse constatée *Z33!*

Fosse
- Amygdales ¬ *D10.5*
- Amygdalienne ¬ Tumeur maligne: *C09.0*
- Antérieure ¬ *S02.1*
- Canine ¬ Abcès maxillaire
- - Indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la *K10.21*
- - Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la *K10.20*
- Ischio-rectale ¬ Abcès de la *K61.3*
- Moyenne ¬ *S02.1*
- Nasal
- - Oreille moyenne ¬ Tumeur maligne des *C30*
- - Sinus
- - - Face ¬ Tumeur bénigne: Oreille moyenne, *D14.0*
- - - Paranasaux ¬ Carcinome épidermoïde des *C30.0*
- - ¬

Fosse *–suite*
- Nasal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - - Polype des *J33.0*
- - - Tumeur maligne: *C30.0*
- - - Vestibule des *C30.0*
- Postérieur
- - Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie cérébelleuse et de la *P52.6*
- - ¬
- - - *S02.1*
- - - Syndrome de la *G97.81*

Fossette
- Colobomateuse de la papille ¬ *Q14.2*
- Rosenmüller ¬ *C11.2*
- ¬ *D10.5*

Foster-)Kennedy ¬ Syndrome de (*H47.0*

Foudre ¬
- Choc par la *T75.0*
- Effets de la *T75.0*

Foule
- Mouvement de panique de foule ¬ Être pressé ou poussé par une *W64.9!*
- ¬ Être pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de *W64.9!*

Foulure
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Entorse et *S43.5*
- - Capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Épaule ¬ Entorse et *S43.4*
- - Ligament
- - - Ceinture scapulaire ¬ Luxation, entorse et *S43*
- - - Coude ¬ Luxation, entorse et *S53*
- - - Genou ¬ Luxation, entorse et *S83*
- - - Hanche ¬ Luxation, entorse et *S73*
- - - Niveau
- - - - Cheville et du pied ¬ Luxation, entorse et *S93*
- - - - Cou ¬ Luxation, entorse et *S13*
- - - - Poignet et de la main ¬ Luxation, entorse et *S63*
- - - Non précis
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et *T13.2*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et *T11.2*
- - - - Tronc ¬ Luxation, entorse et *T09.2*
- - - Partie non précis
- - - - Cou ¬ Entorse et *S13.6*
- - - - Tête ¬ Entorse et *S03.5*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ Luxation, entorse et *S33*
- - - Tête ¬ Luxation, entorse et *S03*

Foulure *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Ligament *–suite*
- - - Thorax ¬ Luxation, entorse et *S23*
- - Non précisées de la main ¬ Entorse et *S63.7*
- - Sacro-iliaque ¬ Entorse et *S33.6*
- - Sterno-claviculaire ¬ Entorse et *S43.6*
- Associations de parties du corps ¬ Luxations, entorses et *T03.8*
- Ceinture scapulaire SAI ¬ Entorse et *S43.7*
- Cheville
- - Ligament
- - - Calcanéopéronier ¬ Entorse et *S93.42*
- - - Deltoïde ¬ Entorse et *S93.41*
- - - Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et *S93.43*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S93.40*
- - - ¬ Entorse et *S93.48*
- - ¬ Entorse et *S93.4*
- Côtes et du sternum ¬ Entorse et *S23.4*
- Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et *T03.0*
- Coude
- - Humérocubitale (articulation) ¬ Entorse et *S53.44*
- - Huméroradiale (articulation) ¬ Entorse et *S53.43*
- - Ligament collatéral
- - - Cubital ¬ Entorse et *S53.42*
- - - Radial ¬ Entorse et *S53.41*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S53.40*
- - - ¬ Entorse et *S53.48*
- - ¬ Entorse et *S53.4*
- Déchirure
- - Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ Entorse/ *S33.50*
- - Jonction lombosacrée et de ses ligaments ¬ Entorse/ *S33.51*
- - ¬ Entorse
- - - *S16*
- - - *S56*
- - - *S66*
- - - *S76*
- - - *S86*
- - - *S96*
- Doigt s
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ Entorse et *S63.62*
- - - Métacarpo-phalangienne ¬ Entorse et *S63.61*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S63.60*
- - - ¬ Entorse et *S63.68*
- - ¬ Entorse et *S63.6*

Foulure *–suite*
- Hanche
- - Ligament
- - - Iliofémoral ¬ Entorse et *S73.11*
- - - Ischiocapsulaire ¬ Entorse et *S73.12*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S73.10*
- - - ¬ Entorse et *S73.18*
- - ¬ Entorse et *S73.1*
- Ligament
- - Croisé genou antérieur postérieur
- - - Déchirure ligament croisé
- - - - Antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et *S83.53*
- - - - Postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et *S83.54*
- - - Distorsion ligament croisé
- - - - Antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et *S83.51*
- - - - Postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et *S83.52*
- - - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et *S83.50*
- - - ¬ Entorse et *S83.5*
- - Latéral genou interne externe
- - - Déchirure ligament latéral
- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et *S83.43*
- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et *S83.44*
- - - Distorsion ligament latéral
- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et *S83.41*
- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et *S83.42*
- - - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et *S83.40*
- - - ¬ Entorse et *S83.4*
- - SAI ¬ *T14.3*
- Mâchoire ¬ Entorse et *S03.4*
- Membre
- - Inférieur ¬ Séquelles de luxation, entorse et *T93.3*
- - Supérieur ¬ Séquelles d'une luxation, entorse et *T92.3*
- Multiples, sans précision ¬ Luxations, entorses et *T03.9*
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ Entorses/ *T14.6*
- Musculaire ¬ *M62.6*
- Orteil(s) ¬ Entorse et *S93.5*
- Partie
- - Corps non précisée ¬ Luxation, entorse et *T14.3*
- - Non précis
- - - Ceinture scapulaire ¬ Entorse et *S43.7*
- - - Genou ¬ Entorse et *S83.6*
- - - Pied ¬ Entorse et *S93.6*

Foulure *–suite*
- Partie *–suite*
- - Non précis *–suite*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ Entorse et *S33.7*
- - - Thorax ¬ Entorse et *S23.5*
- Plusieurs partie
- - Corps ¬ Luxations, entorses et *T03*
- - Membre s
- - - Inférieur(s) ¬ Luxations, entorses et *T03.3*
- - - Supérieur s
- - - - Membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ¬ Luxations, entorses et *T03.4*
- - - - ¬ Luxations, entorses et *T03.2*
- Poignet
- - Articulation
- - - Carpienne ¬ Entorse et *S63.51*
- - - Carpo-métacarpienne ¬ Entorse et *S63.53*
- - - Ligament) radiocarpien ¬ Entorse et *S63.52*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S63.50*
- - - ¬ Entorse et *S63.58*
- - ¬ Entorse et *S63.5*
- Rachis
- - Cervical ¬ Entorse et *S13.4*
- - Dorsal ¬ Entorse et *S23.3*
- - Lombaire ¬ Entorse et *S33.5*
- Région thyroïdienne ¬ Entorse et *S13.5*
- Tête avec luxations, entorses et foulures du cou ¬ Luxations, entorses et *T03.0*
- Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ Luxations, entorses et *T03.1*

Fountain ¬ Syndrome de *Q87.8*

Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*

Fourie
v. Christianson-Fourie

Fourmillements ¬ *R20.2*

Fournier
- Femme ¬ Gangrène de *N76.80*
- Homme ¬ Gangrène de *N49.80*

Fourreurs ¬ Poumon des: *J67.8*

Fovéale-cataracte présénile ¬ Syndrome d'hypoplasie *H35.8†, H28.2**

Foville
v.a. Millard-Gubler-Foville
- ¬ Syndrome de *I67.88†, G46.3**

Fox-Fordyce ¬ Maladie de *L75.2*

Foyer
- N'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du *Z74.2*
- Osseux (médullaires) de lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ *C79.5*
- Pendant l'enfance ¬ Départ du *Z61*

Foyer *–suite*
- ¬
- - Choriorétinite en *H30.0*
- - Choroïdite en *H30.0*
- - Lésion traumatique cérébrale en *S06.3*
- - Maladie toxique du foie avec: hyperplasie nodulaire en *K71.88*
- - Mucinose en *L98.5*
- - Rétinite en *H30.0*
- - Rétinochoroïdite en *H30.0*

Fractionnement de la miction ¬ *R39.1*

Fragile ¬
- Chromosome X *Q99.2*
- Sujet avec site autosomique *Q95.5*
- Syndrome
- - Cornée *Q79.6*
- - X *Q99.2*

Fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus *B96.6!*

Fragilité
- Capillaire
- - Héréditaire) ¬ *D69.88*
- - Idiopathique ¬ Purpura due à une *D69.88*
- - ¬ *L67.8*
- Congénitale des capillaires ¬ *D69.88*
- Osseuse ¬ *Q78.0*

Fragments de la tête humérale ¬ Fracture de deux à quatre *S42.21*

Fraise ¬
- Nævus: *Q82.5*
- Vésicule *K82.4*

Framboesia
- Initiale ou primaire ¬ *A66.0*
- ¬ *A66*

Framboesial initial ¬ Ulcère *A66.0*

Framboeside
- Gommeuse ¬ *A66.4*
- Pian récent ¬ *A66.2*

Framboesome ¬ *A66.1*

Franceschetti
v. Naegeli-Franceschetti-Jadassohn
- Syndrome de Treacher Collins] ¬ Syndrome de *Q75.4*

Franceschetti-Klein ¬ Syndrome de *Q75.4*

Francfort
v. Stoll-Lévy-Francfort

Francisella tularensis
- Subsp. tularensis [Francisella tularensis] ¬ infection à *A21*
- ¬ infection à Francisella tularensis subsp. tularensis [*A21*

François ¬ Dystrophie nuageuse centrale de *H18.5*

Frange ovarienne ¬ Kyste de la *Q50.4*

Franklin ¬ Maladie de *C88.2*

Frank-Ter Haar ¬ Syndrome de *Q87.8*

Fraser ¬ Syndrome de *Q87.0*

Frasier ¬ Syndrome de *N04.1*

Fratrie ¬

- Jalousie dans la *F93.3*
- Rivalité dans la *F93.3*

Fredrickson

- Type
- - I ou V ¬ Hyperlipoprotéinémie de *E78.3*
- - IIb ou III ¬ Hyperlipoprotéinémie de *E78.2*
- ¬ Hyperlipoprotéinémie type
- - IIa de *E78.0*
- - IV de *E78.1*

Freeman-Sheldon] ¬ Visage de siffleur [syndrome de *Q87.0*

Freiberg] ¬ Ostéochondrite (juvénile) du: deuxième métatarsien [maladie de *M92.7*

Frein

- Langue ¬
- - *C02.2*
- - Brièveté anormale du *Q38.1*
- - Déchirure du *S01.54*
- - Rupture du *S01.54*
- Lingual ¬
- - Arrachement du *S01.54*
- - Déchirure du *S01.54*
- Muqueuse) ¬ Lèvre (bord libre) (face intérieure) (*D10.0*
- ¬ Lèvre
- - Inférieure: *C00.4*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: *C00.5*
- - Supérieure: *C00.3*

French
v. Wellesley-Carman-French

Fréquences

- Basses ¬ Surdité partielle ou totale (pour): *H91.9*
- Hautes ¬ Surdité partielle ou totale (pour): *H91.9*

Fréquente

- Cycle menstruel
- - Irrégulier ¬ Menstruation trop abondante et trop *N92.1*
- - Régulier ¬ Menstruation trop abondante et trop *N92.0*
- ¬
- - Formes psychogènes de: mictions *F45.3*
- - Mictions *R35*
- - Selles *R19.4*

Freundii multirésistant

- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Genre Citrobacter *U81.05!*
- 3MRGN ¬ Genre Citrobacter *U81.25!*
- 4MRGN ¬ Genre Citrobacter *U81.45!*

Frias
v. Opitz-Frias

Fried ¬ Syndrome

- *Q87.8*

Fried ¬ Syndrome *–suite*

- Dent et ongle de *Q82.8*

Friedländer ¬ Méningite bacille

- *G00.8*
- *G00.8, B96.2!*

Friedman
v.a. Game-Friedman-Paradice

Friedman-Goodman ¬ Syndrome de *Q87.0*

Friedmann ¬ Syndrome de *G40.3*

Friedreich (autosomique récessive) ¬ Ataxie (de): *G11.1*

Friedreich-like ¬ Ataxie type *G11.1*

Frigidité ¬ *F52.0*

Frigore ¬ Hémoglobinurie (de): paroxystique a *D59.6*

Frissons ¬ Fièvre avec *R50.88*

Froid

- Artificiel
- - Excessif ¬ Exposition
- - - *W93!*
- - - *W93.9!*
- - ¬ Accident dû au *W93.9!*
- Chaleur ¬ Urticaire provoquée par le *L50.2*
- Humidité ¬ Dommages dus au *T69.9*
- Moite ¬ Peau *R23.1*
- Naturel excessif ¬ Exposition à: Chaleur ou *X59.9!*
- Secondaire) (symptomatique) ¬ Anémie hémolytique: type *D59.1*
- ¬
- - Hémoglobinurie à agglutinines *D59.1*
- - Maladie
- - - Agglutinines *D59.1*
- - - Chronique à hémagglutinines *D59.1*
- - - Hémolytique auto-immune (type chaud) (type *D59.1*
- - Syndrome familial auto-inflammatoire au *L50.2*

Fromage ¬ Poumon des: laveurs de *J67.8*

Front

- Menton ¬ Soins maternels pour présentation de la face, du *O32.3*
- SAI ¬ *S01.80*
- ¬
- - Dystocie due à une présentation du *O64.3*
- - Malformation congénitale du *Q75.8*

Frontal

- Aiguë ¬ Sinusite *J01.1*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.1*
- Fibrosante ¬ Alopécie *L66.1*
- Interne ¬ Hyperostose *M85.2*
- SAI ¬ Sinusite *J32.1*
- ¬
- - Encéphalocèle
- - - *Q01.0*
- - - Naso- *Q01.1*
- - Lobe

Frontal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Lobe *–suite*
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Os
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - - *S02.0*
- - Sinus: *S02.1*
- - Syndrome (des): *F07.0*
- - Tumeur malign
- - - Lobe *C71.1*
- - - Sinus *C31.2*
- - Vessie neurogène: due à un syndrome du cortex *N31.2*

Fronto temporal

- FTD] ¬ Démence *G31.0†, F02.0**
- Variante
- - Atrophie temporale à droite ¬ Démence *G31.0†, F02.0**
- - Comportementale ¬ Démence *G31.0†, F02.0**

Fronto-nasal

- Alopécie et anomalies génitales ¬ Dysplasie *Q87.0*
- Anomalie de Poland ¬ Syndrome de dysplasie cranio- *Q87.8*
- ¬ Malformation artérioveineux *Q27.3*

Frottement

- Précordial ¬ *R01.2*
- Thoracique(s) ¬ *R09.8*
- ¬ Eczéma de *L30.4*

Frotteurisme ¬ *F65.8*

Frottis

- Col de l'utérus ¬ Résultats anormaux de sécrétions et *R87*
- Papanicolaou au niveau du col de l'utérus ¬ *Z01.4*
- Vagin ¬ Résultats anormaux de sécrétions et *R87*
- Vulve ¬ Résultats anormaux de sécrétions et *R87*

Fructokinase ¬ Déficit en *E74.1*

Fructose

- 1,6-diphosphatase ¬ Déficit en *E74.1*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme du *E74.1*
- - Intolérance
- - - *E74.1*
- - - Héréditaire au *E74.1*

Fructose-1-phosphate aldolase ¬ Déficit héréditaire en *E74.1*

Fructosémie

- Congénitale ¬ *E74.1*
- ¬ *E74.1*

Fructosurie essentielle ¬ *E74.1*

Fruit
- Akée ¬ Intoxication aiguë par le *T62.2*
- Mer
- - Non précisé ¬ Effets toxiques d'un *T61.9*
- - ¬ Effet toxique
- - - *T61.8*
- - - Substances nocives absorbées par le biais de *T61*

Fryns
v.a. Haspeslagh-Fryns-Muelenaere
- ¬ Syndrome
- - *Q87.8*
- - Microphtalmie de *Q87.8*

FSME) ¬ Encéphalite verno-estivale d'Europe centrale (*A84.1*

FTCD ¬ Déficit en *E70.8*

FTD] ¬ Démence fronto-temporale [*G31.0†, F02.0**

Fuchs ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*

Fucosidase
v. alpha-L-fucosidase

Fucosidose ¬ *E77.1*

Fugace ¬
- Amaurose *G45.3*
- Proctalgie *K59.4*

Fugue dissociative ¬ *F44.1*

Fuite
- Capillaire ¬ Syndrome de *I78.8*
- Implant gastro-intestinal ¬ *T85.59*
- Phosphatée ¬ Tubulopathies avec *N25.0*
- Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*

Fujimoto
v. Kikuchi-Fujimoto

Fukuyama ¬ Dystrophie musculaire congénitale type *G71.2*

Fulminans
- Acquis ¬ Purpura *D65.9*
- ¬
- - Purpura *D65*
- - Sepsis acutissima hyperergica *A39.1†, E35.1**

Fulminant
- Aigu(ë) ¬ Colite ischémique *K55.0*
- Insuffisance hépatique ¬ hépatite: *K72*
- Méningocoques ¬ Sepsis *A39.2*
- ¬ Embolie pulmonaire *I26.0*

Fumarylacétoacétase ¬ Déficit en *E70.2*

Fumée
- Gaz
- - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des *J68.2*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des *J68.9*
- - ¬
- - - Affection respiratoire

Fumée *–suite*
- Gaz *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Affection respiratoire *–suite*
- - - - Agents chimiques, des émanations, des *J68.8*
- - - - Aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des *J68.3*
- - - - Chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des *J68.4*
- - - - Inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68*
- - - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68.4*
- - - Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des *J68.0*
- - - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68.4*
- - - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68.4*
- - - Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des *J68.1*
- Précisés ¬ Effet toxique: Autres émanations, gaz et *T59.8*
- Sans précision ¬ Effet toxique: Emanation, gaz et *T59.9*
- Vapeurs de métaux ¬ *T56*
- ¬
- - Effets toxiques d'autres émanations, gaz et *T59*
- - Exposition à: *X59.9!*

Fumeur ¬ Palais du *K13.2*

Fundique ¬ Gastrite chronique, type: *K29.5*

Fundus
- Albipunctatus ¬ *H35.5*
- Flavimaculatus ¬ *H35.5*
- Pulverulentus ¬ *H35.5*
- ¬ Tumeur maligne: *C16.1*

Fungi imperfecti ¬ Infection à *B43.8*

Fungoides ¬ Granuloma *C84.0*

Funiculaire ¬
- Anémie avec myélose *D51.0†, G32.0**
- Myélite *E53.8†, G32.0**

Funiculite
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.8**
- Tuberculeux
- - Aiguë ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Chronique ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Endémique ¬ *A18.1†, N51.8**

Furoncle
- Anthrax
- - Cou ¬ Abcès cutané, *L02.1*
- - Face ¬ Abcès cutané, *L02.0*
- - Fesse ¬ Abcès cutané, *L02.3*
- - Localisations ¬ Abcès cutané, *L02.8*
- - Membre ¬ Abcès cutané, *L02.4*

Furoncle *–suite*
- Anthrax *–suite*
- - Nez ¬ Abcès, *J34.0*
- - Sans précision ¬ Abcès cutané, *L02.9*
- - Tronc ¬ Abcès cutané, *L02.2*
- - ¬ Abcès cutané, *L02*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.2*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Paupière ¬ *H00.0*
- Pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe ¬ *H60.0*
- Sein ¬ *N61*
- Vulve ¬ *N76.4*

Furonculoïde ¬ Myiase *B87.0*

Furonculose
- SAI ¬ *L02.9*
- ¬ *L02*

Furukawa-Takagi-Nakao ¬ Syndrome de *G11.8*

Fusariose ¬ *B48.7*

Fusarium ¬ Infection à *B48.7*

Fusel ¬ Effet toxique: Huile de *T51.3*

Fusion
- Anomalie de la vision stéréoscopique ¬ *H53.3*
- Arthrodèse ¬
- - Guérison osseuse retardée après *M96.82*
- - Pseudarthrose après *M96.0*
- Articulation sacro-iliaque congénitale ¬ *Q74.2*
- Dentaire ¬ *K00.2*
- Incisives mandibulaires ¬ *K00.2*
- Splénogonadique
- - Anomalie transversale des membres-microgrnathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Isolée ¬ *Q89.08*
- Testicules ¬ *Q55.1*
- Vertèbre
- - Cervicales ¬ Syndrome de microcéphalie-*Q87.8*
- - Progressive non infectieuse ¬ *Q87.5*
- Vulve ¬ *Q52.5*
- ¬ Perception simultanée sans *H53.3*

Fusospirochètes ¬
- Gangrène à *A69.0*
- Pharyngite à *A69.1*
- Stomatite à *A69.1*

FXS ¬ *Q99.2*

FXTAS ¬ Syndrome *G11.2*

G6P translocase ¬ Déficit en *E74.0*

G6PC3 ¬ Neutropénie congénitale sévère autosomique récessive par déficit en *D70.0*

G6PD

- Voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté *D55.1*
- ¬ Anémie carence
- - *D55.0*
- - Glucose-6-phosphate déshydrogénase [*D55.0*

G6PDH] ¬ Déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase [*E74.8*

G6PT type Ib ¬ Déficit en *E74.0*

GABA

- Transaminase ¬ Déficit en *E72.8*
- ¬ Trouble du métabolisme de *E72.8*

Gaine

- Capillaire
- - Sans précision ¬ Anomalie de la pigmentation et de la *L67.9*
- - ¬ anomalie pigmentation
- - - *L67*
- - - *L67.8*
- Nerf
- - Optique ¬ Hémorragie de la *H47.0*
- - Périphériques ¬ Tumeur maligne des *C47.9*
- Tendon ¬ Abcès de la *M65.0*
- Vasculaire rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- ¬
- - Kyste articulaire ou du tendon (*M67.4*
- - Rétractions tendineuses (*M67.1*
- - Tendon
- - - *C49*
- - - *D21*

Galactocèle

- Puerpérale ¬ *O92.7*
- ¬ *N64.8*

Galactocérébrosidase ¬ Déficit en *E75.2*

Galactokinase ¬ Déficit en *E74.2*

Galactophores ¬ Ectasie des canaux *N60.4*

Galactorrhée

- Sans relation avec un accouchement ¬ *N64.3*
- ¬ *O92.6*

Galactosaminidase
v. alpha-N-acétyl-galactosaminidase

Galactose
v.a. diphosphate-galactose-4-épimérase
v.a. glucose-galactose

- Épimérase ¬ Déficit en *E74.2*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme du *E74.2*
- - Intolérance au *E74.2*
- - Malabsorption de *E74.2*

Galactose-1-phosphate uridyltransférase ¬ Déficit en *E74.2*

Galactosémie ¬

- *E74.2*
- Ictère néonatal dû à la *E74.2*

Galactosidase
v.a. alpha-galactosidase
v.a. bêta-galactosidase-1

Galactosique ¬ Diabète *E74.2*

Galactosurie ¬ *E74.2*

Galactosylcéramidase ¬ Déficit en *E75.2*

Gale

- Blanchisseurs ¬ *B35.6*
- ¬
- - *B86*
- - Prurit dû à la *B86*

Galéal
v. sous-galéal

Galeazzi ¬ Fracture de *S52.31*

Galien ¬

- Anévrisme de la veine de *Q28.20*
- Malformation atério-veineuse de la veine de *Q28.28*

GALK ¬ Déficit en *E74.2*

Gallate de propyle ¬ Allergie au *T78.4*

Gallinae ¬ Dermite (due à): Dermanyssus *B88.0*

Gallique ¬ Allergie à l'acide *T78.4*

Galopante ¬ Mélioïdose aiguë et *A24.1*

Gambiense ¬

- Infection à Trypanosoma brucei *B56.0*
- Trypanosomiase à Trypanosoma *B56.0*

Gamborg-Nielsen ¬ Kératodermie palmoplantaire héréditaire type *Q82.8*

Game-Friedman-Paradice ¬ Syndrome de *Q87.8*

Gamma

- Delta ¬ Contient des cellules de type alpha-bêta et *C86.1*
- ¬
- - Gangliosidose GM [marqueur de chaînes *E75.1*
- - Hépatite au cours de mononucléose à virus de l'herpès *B27.0†, K77.0**
- - Hépatomégalie au cours de mononucléose à virus de l'herpès *B27.0†, K77.0**
- - Maladie des chaînes lourdes *C88.2*
- - Mononucléose due à herpès virus *B27.0*
- - MSMD autosomique
- - - Dominant déficit partiel récepteur
- - - - 1 de l'interféron *D84.8*
- - - - 2 de l'interféron *D84.8*
- - - Récessive par déficit partiel en récepteur 1 de l'interféron *D84.8*

Gamma-aminobutyrique ¬

- Déficit en transaminase de l'acide *E72.8*
- Trouble du métabolisme de l'acide *E72.8*

Gamma-cystathionase ¬ Déficit en *E72.1*

Gamma-glutamyl

- Transpeptidase ¬ Déficit en *E72.8*

Gamma-glutamyl *–suite*

- ¬ Trouble du cycle du *E72.8*

Gamma-hydroxybutyrique ¬ Acidurie *E72.8*

Gamma-lyase ¬ Déficit en cystathionine *E72.1*

Gammapathie

- Monoclonale de signification indéterminée [GMSI] ¬ *D47.2*
- Polyclonale SAI ¬ *D89.0*

Gamma-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.0*

Gamma-sarcoglycanopathie ¬ *G71.0*

Gammopathie monoclonale IgM ayant une activité anti-MAG ¬ Polyneuropathie associée à une *D47.2†, G63.1**

Gamstorp ¬ Maladie de *G72.3*

Gang
v. Holmes-Gang

Gangliocytome ¬ *D36.1*

Ganglioglíome

- Anaplasique ¬ *C71.9*
- ¬ *D43.2*

Ganglion

- Base
- - Sensible à la biotine ¬ Maladie des *G25.88*
- - ¬ Tumeur maligne des *C71.0*
- Géniculé
- - Zostérien ¬ Névrite du *B02.2†, G53.0**
- - ¬ Atteinte
- - - *G51.1*
- - - Post-herpétique du *B02.2†, G53.0**
- Intrathoracique
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose des *A15.4*
- - Sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose des *A16.3*
- Lymphatique
- - Aisselle et du membre supérieur ¬ Tumeur maligne: *C77.3*
- - Inguinaux et du membre inférieur ¬ Tumeur maligne: *C77.4*
- - Intra-abdominaux ¬ Tumeur maligne: *C77.2*
- - Intrapelviens ¬ Tumeur maligne: *C77.5*
- - Intrathoraciques ¬ Tumeur maligne: *C77.1*
- - Péritonéaux ¬ Tuberculose des *A18.3†, K93.0**
- - Sans précision ¬
- - - Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des *I89.9*
- - - Tumeur maligne: *C77.9*
- - Sauf mésentérique ¬
- - - Abcès (aigu) tout *L04*
- - - Lymphadénite aiguë tout *L04*
- - Secondaire et non précisée ¬ Tumeur maligne des *C77*
- - Sièges multiples ¬ Tumeur maligne: *C77.8*

Ganglion *–suite*
- Lymphatique *–suite*
- - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur maligne: *C77.0*
- - ¬
- - - Atteinte non infectieux
- - - - Précisées des vaisseaux et des *I89.8*
- - - - Vaisseaux et des *I89*
- - - Sarcoïdose
- - - - *D86.1*
- - - - Poumon avec sarcoïdose des *D86.2*
- - - Sarcome de Kaposi des *C46.3*
- - - Syphilis
- - - - Secondaire précoce d'un *A51.4*
- - - - Tardive d'un *A52.7†, I98.8**
- - - Tuberculose
- - - - Mésentérique des *A18.3†, K93.0**
- - - - Rétropéritonéale (*A18.3*
- - - Tumeur bénigne: *D36.0*
- Mésentérique ¬
- - Adénite chronique, de tout *I88.1*
- - Lymphadénite chronique, de tout *I88.1*
- - Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des *A18.3*
- Pectoraux ¬ *C77.3*
- Plexus cœliaque ¬ *S34.5*
- Stellaire ¬ *S24.4*
- Sus-claviculaires ¬ *C77.0*
- Sympathique
- - Parasympathiques ¬ nerfs et *C47*
- - Thoracique ¬ *S24.4*
- ¬ Mégacôlon congénital (sans *Q43.1*

Ganglioneuroblastome ¬ *C47.9*

Ganglioneurome ¬ *D36.1*

Ganglionite
- Cours d'herpès zoster ¬ *B02.2†, G53.0**
- Géniculée zostérienne ¬ *B02.2†, G53.0**
- Trigéminale après herpès zoster ¬ *B02.3†, H58.8**

Ganglionnaire
- Hilaire
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A15.4*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- Inguinale rétropéritonéale ¬ Métastase *C77.8*
- Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- Médiastinal
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A15.4*

Ganglionnaire *–suite*
- Médiastinal *–suite*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- - ¬ Métastase *C77.1*
- Susclaviculaire ¬ Métastase *C77.0*
- Trachéo-bronchique
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A15.4*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- ¬
- - Fièvre *B27*
- - Tuberculose *A18.0†, M68.09**
- - Tuméfaction *R59*

Ganglioplégiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.2*

Gangliosides ¬ Thésaurismose des *E75.1*

Gangliosidose
- GM [marqueur de chaînes Gamma] ¬ *E75.1*
- GM1
- - Adulte ¬ *E75.1*
- - Infantile ¬ *E75.1*
- - Juvénile ¬ *E75.1*
- - ¬ *E75.1*
- GM2
- - Adulte ¬ *E75.0*
- - Juvénile ¬ *E75.0*
- - SAI ¬ *E75.0*
- - Variant
- - - 0 ¬ *E75.0*
- - - AB ¬ *E75.0*
- - - B, B1 ¬ *E75.0*
- - ¬ *E75.0*
- GM3 ¬
- - *E75.1*
- SAI ¬ *E75.1*
- ¬ Autres *E75.1*

Gangosa ¬
- *A66.5*
- *A66.5†, J99.8**

Gangrène
- Artérioscléreuse ¬ *I70.25*
- Athérosclérose ¬ *I70.25*
- Athérosclérose ¬ *I70.2*
- Bacillus aerogenes capsulatus ¬ *A48.0*
- Fournier
- - Femme ¬ *N76.80*
- - Homme ¬ *N49.80*
- Fusospirochètes ¬ *A69.0*
- Gangrène non précisée, non classée ailleurs ¬ Autre *R02.8*
- Gazeuse ¬ *A48.0*

Gangrène *–suite*
- Humide, stade IVb de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- Intestinale ¬ Iléus avec *K56.6*
- Mésentère ¬ Iléus avec *K56.6*
- Nécrose du poumon ¬ *J85.0*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ *R02*
- - Précisée, non classée ailleurs ¬ Autre gangrène et *R02.8*
- Pulpaire ¬ *K04.1*
- Raynaud ¬ *I73.0*
- Sèche, stade IVa de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- Sénile
- - Artérioscléreuse ¬ *I70.25*
- - Liée à l'artériosclérose ¬ *I70.25*
- Vésicule biliaire sans calcul ¬ *K81.0*
- ¬
- - Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.25*
- - Hernie
- - - Abdominal
- - - - Non
- - - - - Précisée, avec *K46.1*
- - - - - Précisée, avec occlusion, sans *K46.0*
- - - - - Précisée, sans occlusion ni *K46.9*
- - - - Précis
- - - - - *K45.1*
- - - - - Sans occlusion ni *K45.8*
- - - - Siège précisé, avec occlusion, sans *K45.0*
- - - Crurale
- - - - Bilatéral
- - - - - *K41.1*
- - - - - Occlusion, sans *K41.0*
- - - - - Récidivante, avec *K41.11*
- - - - - Sans occlusion ni *K41.2*
- - - - Récidivante, avec *K41.41*
- - - - Unilatéral
- - - - - Étranglée sans *K41.3*
- - - - - Incarcérée sans *K41.3*
- - - - - Irréductible sans *K41.3*
- - - - - Occlusion, avec *K41.40*
- - - - - Provoquant une occlusion sans *K41.3*
- - - - - Sans précision, avec *K41.4*
- - - - - Sans précision, avec occlusion, sans *K41.3*
- - - - - Sans précision, sans occlusion ni *K41.9*
- - - Diaphragmatique
- - - - *K44.1*
- - - - Étranglée sans *K44.0*
- - - - Incarcérée sans *K44.0*
- - - - Irréductible sans *K44.0*
- - - - Occlusion, sans *K44.0*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K44.0*

Gangrène *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hernie *–suite*
- - - Diaphragmatique *–suite*
- - - - Sans occlusion ni *K44.9*
- - - Épigastrique
- - - - *K43.70*
- - - - Occlusion, sans *K43.60*
- - - - Sans occlusion ni *K43.90*
- - - Incisionnel
- - - - *K43.1*
- - - - Étranglée sans *K43.0*
- - - - Incarcérée sans *K43.0*
- - - - Irréductible sans *K43.0*
- - - - Occlusion, sans *K43.0*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K43.0*
- - - - Sans occlusion ni *K43.2*
- - - Inguinal
- - - - Bilatéral
- - - - - *K40.1*
- - - - - Occlusion, sans *K40.0*
- - - - - Sans occlusion ni *K40.2*
- - - - SAI, avec *K40.4*
- - - - Unilatéral
- - - - - Étranglée sans *K40.3*
- - - - - Incarcérée sans *K40.3*
- - - - - Irréductible sans *K40.3*
- - - - - Provoquant une occlusion sans *K40.3*
- - - - - Sans précision, avec *K40.4*
- - - - - Sans précision, avec occlusion, sans *K40.3*
- - - - - Sans précision, sans occlusion ni *K40.9*
- - - Ombilical
- - - - *K42.1*
- - - - Étranglée sans *K42.0*
- - - - Incarcérée sans *K42.0*
- - - - Irréductible sans *K42.0*
- - - - Occlusion, sans *K42.0*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K42.0*
- - - - Sans occlusion ni *K42.9*
- - - Parastomale
- - - - *K43.4*
- - - - Étranglée sans *K43.3*
- - - - Incarcérée sans *K43.3*
- - - - Irréductible sans *K43.3*
- - - - Occlusion, sans *K43.3*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K43.3*
- - - - Sans occlusion ni *K43.5*
- - - Paroi abdominal antérieur
- - - - *K43.78*
- - - - Non
- - - - - Précisées avec *K43.7*
- - - - - Précisées avec *K43.79*
- - - - - Précisées avec occlusion sans *K43.6*

Gangrène *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hernie *–suite*
- - - Paroi abdominal antérieur *–suite*
- - - - Non *–suite*
- - - - - Précisées avec occlusion, sans *K43.69*
- - - - - Précisées sans occlusion ni *K43.9*
- - - - - Précisées sans occlusion ni *K43.99*
- - - - Occlusion, sans *K43.68*
- - - - Sans occlusion ni *K43.98*
- - - Ventral
- - - - Causant une occlusion, sans *K43.69*
- - - - Étranglée, sans *K43.69*
- - - - Incarcérée sans *K43.69*
- - - - Non réductible, sans *K43.69*
- - Stade IV de Leriche et Fontaine, avec *I70.25*
- - Strangulation de l'intestin due à une hernie avec *K46.1*

Gangréneuse
- Sans calcul ¬ Cholécystite: *K81.0*
- ¬
- - Amygdalite (aiguë): *J03.9*
- - Dermite
- - - *L08.0*
- - - *L88*
- - Hernie
- - - Diaphragmatique *K44.1*
- - - Ombilicale *K42.1*
- - Pharyngite (aiguë): *J02.9*
- - Pyodermite *L88*
- - Stomatite *A69.0*

Ganong-Levine ¬ Syndrome de: Lown- *I45.6*

Ganser ¬ Syndrome de *F44.80*

GAPO ¬ Syndrome *Q87.8*

Garcia
v. Stratton-Garcia-Young

Garde ou d'entretien d'enfants ¬ Procédure de *Z65*

Garden] ¬ Rickettsiose vésiculaire [Fièvre de Kew *A79.1*

Gardner-Diamond ¬ Syndrome de *D69.2*

Gardner-Silengo-Wachtel ¬ Syndrome de *Q87.8*

Gartner ¬ Kyste (de): canal de *Q50.5*

Gasping syndrome (syndrome de suffocation) ¬ *T51.9*

Gastaut
v. Lennox-Gastaut

Gastrine ¬ Sécrétion anormale de *E16.4*

Gastrinome ¬ *D37.78*

Gastrique
- Associé au virus Epstein-Barr ¬ Carcinome *C16.9*
- Cours
- - Achalasie ¬ Cardialgie *K22.0*
- - Maladie classé chapitre

Gastrique *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie classé chapitre *–suite*
- - - Mention d'hémorragie ¬ Varices œsophagiennes et *I98.3**
- - - Sans indication d'hémorragie ¬ Varices œsophagiennes et *I98.2**
- - Schistosomiase ¬ Varices *B65.9†, I98.2**
- - Syphilis ¬ Crise *A52.7†, K93.8**
- Diffus
- - Héréditaire ¬ Adénocarcinome *C16.9*
- - ¬ Carcinome *C16.9*
- Indication hémorragie cours schistosomiase ¬ Varice
- - *B65.9†, I98.3**
- Psychogène ¬ Ulcère *F54, K25.9*
- S SAI anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Inhalation du contenu ou de sécrétions *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Inhalation du contenu ou de sécrétions *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Inhalation du contenu ou de sécrétions *O74.0*
- SAI ¬
- - Cancer *C16.9*
- - Hémorragie: *K92.2*
- Tardive avec polypose ¬ Syphilis *A52.7†, K93.8**
- ¬
- - Adhérences (de): *K66.0*
- - Amylose *E85.4†, K93.8**
- - Artère: *S35.2*
- - Cirrhose alcoolique foie
- - - Saignement de varices *K70.3†, I98.3**
- - - Varices *K70.3†, I98.2**
- - Diverticule *K31.4*
- - Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires *T47.1*
- - Jonction: œsophago- *C16.0*
- - Maladie de Crohn *K50.80*
- - Névrose: *F45.3*
- - Pneumonie par aspiration (de): sécrétions *J69.0*
- - Ptose *K31.8*
- - Syndromes consécutifs à une intervention *K91.1*
- - Ulcère: *K25*
- - Varices *I86.4*

Gastrite
- Aigu
- - Érosive) avec hémorragie ¬ *K29.0*
- - ¬ Autres *K29.1*
- Alcoolique ¬ *K29.2*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, K93.8**
- Atrophique ¬ *K29.4*
- Biliaire ¬ *K29.6*
- Chronique
- - Atrophique ¬ *K29.4*

Gastrite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Helicobacter pylori ¬ *K29.5*
- - Sans précision ¬ *K29.5*
- - Superficielle ¬ *K29.3*
- - Type
- - - Antral ¬ *K29.5*
- - - Fundique ¬ *K29.5*
- Cytomégalovirus ¬
- - *B25.80†, K93.8**
- Duodénite ¬ *K29*
- Gastroentérite à éosinophiles ¬ *K52.8*
- Granulomateuse ¬ *K29.6*
- Helicobacter pylori ¬ *K29.7, B98.0!*
- Hémorragique aiguë ¬ *K29.0*
- Hypertrophique géant ¬
- - *K29.6*
- Nerveuse ¬ *F54, K29.7*
- Psychosomatique ¬ *F54, K29.7*
- Sans précision ¬ *K29.7*
- Sous-alimentation ¬ *E63.9†, K93.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, K93.8**
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**
- - Herpès ¬ *B00.8†, K93.8**
- ¬ Autres *K29.6*

Gastro-colique
- Tuberculeuse ¬ Fistule *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Fistule: *K31.6*
- - Ulcère (peptique) ou érosion: *K28*

Gastro-duodénal
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens ¬ Ulcère *K27.9, Y57.9!*
- Nouveau-né ¬ Ulcère *P78.8*
- Origine médicamenteuse ¬ Ulcère *K27.9, Y57.9!*
- SAI ¬ ulcère *K27*
- ¬ Artère: *S35.2*

Gastro-duodénite, sans précision ¬ *K29.9*

Gastroentérite
- Aigu
- - Exsiccose ¬ *A09.9, E86*
- - Norovirus ¬ *A08.1*
- Colite
- - Allergiques et alimentaires ¬ *K52.2*
- - Hypersensibilité alimentaire ¬ *K52.2*
- - Irradiation ¬ *K52.0*
- - Médicamenteuses ¬ *K52.1*
- - Non
- - - Infectieux
- - - - Précisées ¬ Autres *K52.8*
- - - - Sans précision ¬ *K52.9*
- - - - ¬ Autres *K52*
- - - Précis origine

Gastroentérite *–suite*
- Colite *–suite*
- - Non *–suite*
- - - Précis origine *–suite*
- - - - Infectieux
- - - - - Non précisées d'origine infectieuse et non précisée ¬ *A09*
- - - - - ¬ *A09.0*
- - - - Non précisées d'origine non précisée ¬ *A09.9*
- - Toxiques ¬ *K52.1*
- Cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.8*
- Éosinophiles ¬ Gastrite ou *K52.8*
- Exsiccose ¬ *A09.9, E86*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.8*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- Hémorragique ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- Infectieuse ¬ Maladie due au VIH avec *B20, A09.0*
- Non infectieuse ¬ Maladie par VIH avec *B23.8, K52.9*
- Nourrisson avec exsiccose ¬ *A09.9, E86*
- Probablement d'origine infectieuse, avec exsiccose ¬ *A09.0, E86*
- SAI ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Virale SAI ¬ *A08.4*
- Virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09, U69.21!*
- - Influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*

Gastro-entérocolite ¬ *A09.9*

Gastro-gastrique ¬ Fistule *K31.6*

Gastro-intestinal
- Amyloïde ¬ Maladie *E85.4†, K93.8**
- Ballonnet ¬ Complication mécanique due à un dispositif *T85.59*
- E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- Fonctionnelle ¬ Dyspepsie *K30*
- Inférieur ¬ Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le tractus *T85.52*
- Juvénile ¬ Polypose *D12.6*
- Néonatales ¬ Autres hémorragies *P54.3*
- Neuroendocrine ¬ Tumeur *C26.9*
- Psychogène ¬
- - Hypomotilité *F45.37*
- - Irritation *F45.37*
- - Trouble *F45.37*
- SAI ¬ Tractus *C26.9*
- Sans précision ¬
- - Hémorragie *K92.2*

Gastro-intestinal *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus *T47.9*
- Supérieur ¬ Complication mécanique de prothèses, implants et greffes dans d'autres parties du tractus *T85.51*
- Sur plusieurs segments ¬ Maladie de Crohn de l'œsophage et du tractus *K50.82*
- TSGI GIST
- - Côlon ¬ Tumeur stromale *C18.9*
- - Estomac ¬ Tumeur stromale *C16.9*
- - Intestin grêle ¬ Tumeur stromale *C17.9*
- - Œsophage ¬ Tumeur stromale *C15.9*
- - Péritoine ¬ Tumeur stromale *C48.2*
- ¬
- - Anomalie congénitale du système *Q45.9*
- - Arthrite au cours d'affection *K63.9†, M03.69**
- - Charbon
- - - *A22.2*
- - - *A22.2†, K93.8**
- - Complication mécanique de prothèses, implants et greffes *T85.5*
- - Crampe *R10.4*
- - Fuite d'un implant *T85.59*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus *T85.76*
- - Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus *T47.8*
- - Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs *Z46.5*
- - Mucormycose *B46.2†, K93.8**
- - Tuberculose *A18.3†, K93.0**
- - Tularémie *A21.3*
- - Tumeur stromale *C26.9*
- - Vomissements consécutifs à une intervention *K91.0*

Gastro-jéjunal
- Aigu ¬ Ulcère *K28.3*
- E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- ¬ Ulcère *K28*

Gastro-jéjuno-colique ¬ Fistule: *K31.6*

Gastro-œsophagien
- Œsophagite ¬ Reflux *K21.0*
- Sans œsophagite ¬ Reflux *K21.9*
- ¬
- - Reflux *K21*
- - Syndrome de dilacération hémorragique *K22.6*

Gastro-œsophagienne ¬ Tumeur rare *D37.1*

Gastroparésie diabétique
- Diabète sucré type
- - 1 ¬ *E10.40†, G99.0**
- - 2 ¬ *E11.40†, G99.0**
- ¬ *E14.40†, G99.0**

Gastropathie hypertrophique sans hypoprotéinémie ¬ *K29.6*

Gastroschisis ¬ *Q79.3*

Gastrostomie

- Endoscopique percutané sonde PEG ¬
- - Complication mécanique de sonde de *T85.51*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de *T85.74*
- ¬
- - *Z46.5*
- - Présence d'une *Z93.1*
- - Surveillance de *Z43.1*

Gaucher

- Adulte ¬ Maladie de *E75.2*
- Cérébral
- - Infantile ¬ Maladie de *E75.2*
- - Juvénile et de l'adulte ¬ Maladie de *E75.2*
- Forme cardio-vasculaire ¬ Maladie de *E75.2*
- Infantile ¬
- - Maladie de *E75.2*
- - Splénomégalie de *E75.2*
- Juvénile non cérébrale ¬ Maladie de *E75.2*
- Neuronopathique subaiguë ¬ Maladie de *E75.2*
- Ophtalmoplégie-calcification cardio-vasculaire ¬ Syndrome de maladie de *E75.2*
- Périnatale létale ¬ Maladie de *E75.2*
- ¬
- - Dégénérescence cérébrale au cours de syndrome de *E75.2†, G32.8**
- - Maladie de: *E75.2*
- - Splénomégalie de *E75.2*

Gaz

- Brûlants ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Fluorure d'hydrogène ¬ Effet toxique: Fluor (*T59.5*
- Fumée
- - Précisés ¬ Effet toxique: Autres émanations, *T59.8*
- - Sans précision ¬ Effet toxique: Emanation, *T59.9*
- - ¬ Effets toxiques d'autres émanations, *T59*
- Lacrymogène
- - Coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que *Y35.7!*
- - ¬ Effet toxique: *T59.3*
- Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.2*
- Sang ¬ Taux anormal des *R79.8*
- Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.9*
- Thérapeutique ¬ Intoxication
- - *T41.5*
- - Anesthésiques et *T41*
- ¬

Gaz *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Affection respiratoire
- - - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.8*
- - - Aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.3*
- - - Chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.4*
- - - Inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68*
- - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68.4*
- - Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.0*
- - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68.4*
- - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68.4*
- - Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.1*

Gazeux

- Consécutif
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA ¬ Embolie *T81.7*
- - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ Embolie *T80.0*
- Obstétricale ¬ Embolie *O88.0*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- Traumatique) ¬ Embolie *T79.0*
- ¬
- - Distension abdominale (*R14*
- - Effet toxique: Chlore *T59.4*
- - Gangrène *A48.0*
- - Intoxication: Anesthésiques *T41.0*

Géant

- Central ¬ Granulome à cellules *K10.1*
- Infantile ¬ Hémangiome *D18.00*
- Polymyalgie rhumatismale ¬ Artérite à cellules *M31.5*
- SAI ¬ Granulome à cellules *K10.1*
- Sein ¬ Adénofibrome *D24*
- Type ostéoclastique du pancréas ¬ Carcinome indifférencié à cellules *C25.9*
- ¬
- - Artérites à cellules *M31.6*
- - Astrocytome sous-épendymaire à cellules *D43.2*
- - Epulis (à): cellules *K06.8*
- - Gastrite hypertrophique
- - - *K29.6*
- - Granulome: périphérique à cellules *K06.8*
- - Hépatite foetale ou néonatale, à cellules *P59.2*

Géant *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 avec axones *G60.0*
- - Myocardite idiopathique à cellules *I40.8*
- - Myopathie au cours d'artérite à cellules *M31.6†, G73.7**
- - Neuropathie à axones *G60.8*
- - Rein hyperplasique et *Q63.3*
- - Réticulohistiocytome (à cellules *D76.3*
- - Syndrome
- - - Bernard-Soulier [plaquettes *D69.1*
- - - Plaquettes sanguines *D69.1*
- - Thyroïdite (à) (de): cellules *E06.1*
- - Urticaire *T78.3*

Gélatine ¬ Hypersensibilité à la *T78.1*

Gélatineux

- Myélopathie ¬ Hernie du noyau *M51.0†, G99.2**
- Névrite ¬ Hernie
- - Cervicale du noyau *M50.1†, G55.1**
- - Cervico-thoracique du noyau *M50.1†, G55.1**
- Radiculopathie ¬ Hernie
- - Cervicale du noyau *M50.1†, G55.1**
- - Cervico-thoracique du noyau *M50.1†, G55.1**
- - Lombaire du noyau *M51.1†, G55.1**
- - Lombosacrée du noyau *M51.1†, G55.1**
- - Thoracique du noyau *M51.1†, G55.1**
- - Thoraco-lombaire du noyau *M51.1†, G55.1**
- ¬
- - Ascite *C78.6*
- - Névrite au cours d'une hernie du noyau *M51.1†, G55.1**

Géléophysique ¬ Dysplasie *Q87.1*

Gélineau ¬ Maladie de *G47.4*

Gellerstedt
v. Ceelen-Gellerstedt

Gelure

- Atteinte partielle des couches de la peau ¬ *T33*
- Bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus ¬ *T34.4*
- Cheville et du pied, avec nécrose des tissus ¬ *T34.8*
- Cou, avec nécrose des tissus ¬ *T34.1*
- Genou et de la jambe, avec nécrose des tissus ¬ *T34.7*
- Hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus ¬ *T34.6*
- Localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus ¬ *T34.9*
- Membre
- - Inférieur
- - - Sans précision ¬ *T35.5*
- - - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.3*

Gelure *–suite*
- Membre *–suite*
- - Supérieur
- - - Sans précision ¬ *T35.4*
- - - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.2*
- Multiple
- - Nécrose des tissus SAI ¬ *T35.1*
- - SAI ¬ *T35.6*
- Nécrose tissu
- - Membre inférieur SAI ¬ *T34.9*
- - SAI ¬ *T34.9*
- - Tronc SAI ¬ *T34.9*
- - ¬ *T34*
- Paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus ¬ *T34.3*
- Partie multiple corps
- - Nécrose des tissus ¬ *T35.1*
- - Sans précision ¬
- - - *T35*
- - - *T35.6*
- Poignet et de la main, avec nécrose des tissus ¬ *T34.5*
- Précisées ¬ Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou *T95.8*
- SAI ¬ *T35.7*
- Sans précision
- - Localisation non précisée ¬ *T35.7*
- - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion ou *T95.9*
- Superficiel
- - Bras et de l'avant-bras ¬ *T33.4*
- - Cheville et du pied ¬ *T33.8*
- - Cou ¬ *T33.1*
- - Genou et de la jambe ¬ *T33.7*
- - Hanche et de la cuisse ¬ *T33.6*
- - Localisations autres et non précisées ¬ *T33.9*
- - Membre inférieur SAI ¬ *T33.9*
- - Multiples SAI ¬ *T35.0*
- - Paroi abdominale, des lombes et du bassin ¬ *T33.3*
- - Parties multiples du corps ¬ *T35.0*
- - Poignet et de la main ¬ *T33.5*
- - SAI ¬ *T33.9*
- - Tête ¬ *T33.0*
- - Thorax ¬ *T33.2*
- - Tronc SAI ¬ *T33.9*
- - ¬ *T33*
- Tête
- - Cou
- - - Sans précision ¬ *T35.2*
- - - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.0*
- - Nécrose des tissus ¬ *T34.0*
- Thorax
- - Abdomen, des lombes et du bassin, sans précision ¬ *T35.3*
- - Nécrose des tissus ¬ *T34.2*

Gelure *–suite*
- Tronc
- - SAI ¬ *T35.3*
- - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.1*
- ¬ Séquelles de brûlures, corrosions et *T95*

Gémellaire
- Jumeau
- - Morts-nés ¬ Naissance *Z37.4!*
- - Né vivant, l'autre mort-né ¬ Naissance *Z37.3!*
- - Nés vivants ¬ Naissance *Z37.2!*
- ¬
- - Dystocie *O66.1*
- - Grossesse: *P01.5*

Gémination dentaire ¬ *K00.2*

Gênant le contact ¬ Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et *R46.7*

Gencive
- Crête alvéolaire édentée
- - Sans précision ¬ Affection de la *K06.9*
- - ¬ affection
- - - *K06*
- - - Précisées de la *K06.8*
- Inférieure ¬ Tumeur maligne: *C03.1*
- Processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.53*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C03.9*
- Scorbutique ¬ *E54†, K93.8**
- Supérieure ¬ Tumeur maligne: *C03.0*
- ¬
- - *C03*
- - Anomalie congénitale de la *Q38.6*
- - Tumeur maligne de la *C03*

Gène
- ABCB4 ¬ Cholélithiase par mutation du *K80.80*
- MLL ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec altérations du *C92.6*
- Prothrombine ¬ Mutation du *D68.5*

Gêne mécanique à la respiration ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: *T71*

Général
v. Type de maladie

Généralisé
v. Type de maladie

Générateur d'un stimulateur cardiaque ¬ Changement du *Z45.00*

Génétique
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats chromosomiques et *O28.5*
- Infantile ¬ Agranulocytose *D70.0*
- Leucocytes ¬ Anomalies *D72.0*
- Non syndromique
- - Postlinguale ¬ Surdité *H90.5*
- - Prélinguale ¬ Surdité *H90.5*
- ¬

Génétique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anomalie du développement sexuel 46,XX d'origine *Q99.1*
- - Conseil *Z31.5*
- - Hyperaldostéronisme *E26.0*
- - Myoglobinurie récurrente *R82.1*

Geneviève ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Géniculé
- Zostérien ¬
- - Ganglionite *B02.2†, G53.0**
- - Névrite du ganglion *B02.2†, G53.0**
- ¬ Atteinte
- - Ganglion *G51.1*
- - Post-herpétique du ganglion *B02.2†, G53.0**

Géniospasme héréditaire ¬ *G25.3*

Génital
v.a. cranio-facio-digito-génital
v.a. facio-digito-génital
- Accouchement ¬ Autres infections des voies *O86.1*
- Appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès ¬ Infection des organes *A60.0*
- Chlamydia ¬ Infection *A56.2*
- Cours
- - Grossesse ¬
- - - Infections de l'appareil *O23.5*
- - - Varices des organes *O22.1*
- - Puerpéralité ¬ Varices des organes *O87.8*
- Externe
- - Femme SAI ¬ Organes *C51.9*
- - Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations *Q87.8*
- - Non précisés ¬ Plaie ouverte des organes *S31.5*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Lésion des organes *P15.5*
- - ¬
- - - Amputation traumatique des organes *S38.2*
- - - Contusion des organes *S30.2*
- - - Écrasement des organes *S38.0*
- Féminin
- - Plastie de correction ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.70*
- - SAI ¬ Mutilations *Z91.70*
- - Type
- - - 1 ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.71*
- - - 2 ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.72*
- - - 3 ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.73*
- - - 4 ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.74*

Génital *–suite*
- Féminin *–suite*
- - Type *–suite*
- - - Sans précision ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.70*
- - ¬
- - - Antécédents personnels de mutilation *Z91.7*
- - - Candidose de l'appareil *B37.3†, N77.1**
- - - Douleurs des organes *N94.8*
- - - Kératose des organes *N94.8*
- - - Mutilation *Z91.70*
- - - Thrombose des organes *N94.8*
- Femme
- - Cycle menstruel
- - - Sans précision ¬ Affection des organes *N94.9*
- - - ¬
- - - - Affections précisées des organes *N94.8*
- - - - Douleurs et autres affections des organes *N94*
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes *D39*
- - Non précis ¬
- - - Carcinoma in situ: Organes *D07.3*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne des organes *D28*
- - - - Maligne des organes *C57*
- - Précis ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Autres organes *D28.7*
- - - Maligne: Autres organes *C57.7*
- - Sans précision ¬
- - - Fistule de l'appareil *N82.9*
- - - Malformation congénitale des organes *Q52.9*
- - - Polype de l'appareil *N84.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Organe *D28.9*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe *D39.9*
- - - - Maligne: Organe *C57.9*
- - ¬
- - - Fistule appareil
- - - - *N82*
- - - - *N82.8*
- - - - *N82.88*
- - - Malformation congénital
- - - - Organes *Q52*
- - - - Précisées des organes *Q52.8*
- - - Peau organe
- - - - *D28*
- - - - *D39.7*
- - - Polype
- - - - Appareil *N84*
- - - - Parties de l'appareil *N84.8*
- - - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes *R87*

Génital *–suite*
- Femme *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Tumeur
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D39.7*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes *C57.8*
- Homme
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections des organes *N51.8**
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes *D40*
- - Non
- - - Classées ailleurs ¬ Affections inflammatoires des organes *N49*
- - - Précis ¬
- - - - Carcinoma in situ: Organes *D07.6*
- - - - Tumeur maligne des organes *C63*
- - Précisés ¬ Tumeur maligne: Autres organes *C63.7*
- - Sans précision ¬
- - - Affection des organes *N50.9*
- - - Malformation congénitale des organes *Q55.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Organe *D29.9*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe *D40.9*
- - - - Maligne: Organe *C63.9*
- - Virus de l'herpès ¬ Infection de l'appareil *A60.0†, N51.8**
- - ¬
- - - Affection
- - - - Organes *N50*
- - - - Précisées des organes *N50.8*
- - - - Vasculaires des organes *N50.1*
- - - Anomalie congénitale SAI des organes *Q55.9*
- - - Hématocèle SAI des organes *N50.1*
- - - Hémorragie des organes *N50.1*
- - - Inflammation de localisations multiples des organes *N49.8*
- - - Malformation congénital
- - - - Organes *Q55*
- - - - Précisées des organes *Q55.8*
- - - Peau organe
- - - - *D29*
- - - - *D40.7*
- - - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes *R86*
- - - Thrombose des organes *N50.1*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Autres organes *D29.7*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D40.7*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes *C63.8*
- Masculin

Génital *–suite*
- Masculin *–suite*
- - Précisés ¬ Maladies inflammatoires d'autres organes *N49.88*
- - ¬
- - - Mycose des organes *B49†, N51.8**
- - - Tuberculose des organes *A18.1†, N51.8**
- Mère et autres infections localisées ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: infection de l'appareil *P00.8*
- Non précis
- - Homme ¬
- - - Abcès des organes *N49.9*
- - - Affection inflammatoire des organes *N49.9*
- - - Anthrax des organes *N49.9*
- - - Furoncle des organes *N49.9*
- - - Phlegmon des organes *N49.9*
- - ¬ Carcinome in situ d'organes *D07*
- Organe pelvien
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Infection de l'appareil *O08.0*
- - ¬ échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une infection de l'appareil *O07.0*
- - - Sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil *O07.5*
- Précisés de l'homme ¬ Affections inflammatoires d'autres organes *N49.8*
- Primaire ¬ Syphilis *A51.0*
- Sans précision ¬
- - Prolapsus *N81.9*
- - Prurit ano- *L29.3*
- Synostoses métacarpiennes et métatarsiennes ¬ Syndrome de surdité-anomalies *Q87.8*
- Vénériens) ¬ Condylomes ano- *A63.0*
- Vessie, prostate, annexe, utérus ¬ Région *I97.87*
- Virus herpès
- - Herpes simplex] ¬ Infection ano- *A60*
- - Sans précision ¬ Infection ano- *A60.9*
- ¬
- - Abcès tuberculeux organe
- - - *A18.1*
- - - Urinaires et *A18.1*
- - Absence acquise d'organe(s) *Z90.7*
- - Ambiguïté des organes *Q56.4*
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne des organes *Z80.4*
- - - Personnels de tumeur maligne des organes *Z85.4*
- - Atrophie
- - - *N95.8*
- - - Sénile des organes *N95.8*
- - Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil *T83.4*

Génital *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dysplasie frontonasale avec alopécie et anomalies *Q87.0*
- - Dystrophie adiposo- *E23.6*
- - Echec de la réponse *F52.2*
- - Infection
- - - Chlamydia des organes urinaires et *A56.2†, N29.1**
- - - Réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil *T83.6*
- - Lissencéphalie liée à l'X avec anomalies *Q04.3*
- - Maladie de Queyrat des lèvres *D07.1*
- - Mélanome in situ des organes *D03.8*
- - Prolapsus
- - - *N81*
- - - *N81.8*
- - Tête cou paroi thoracique région
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - Tuberculose des organes *A18.1*
- - Tumeur maligne secondaire des organes *C79.82*

Genitalis ¬ Tinea *B35.8*

Génito-cutanée chez la femme ¬ Fistule *N82.5*

Génito-palato-cardiaque ¬ Syndrome *Q87.8*

Génito-patellaire ¬ Syndrome *Q87.8*

Génito-surrénalien
- Congénitales liées à un déficit enzymatique ¬ Anomalies *E25.0*
- Idiopathique ¬ Anomalie *E25.8*
- SAI ¬ Syndrome *E25.9*
- Sans précision ¬ Anomalie *E25.9*
- ¬ anomalie
- - *E25*
- - *E25.8*

Génito-urinaire
- Abcès périurétral et des glandes annexes ¬ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil *A54.1*
- Accouchement ¬ Autres infections des voies *O86.3*
- Acte médicaux
- - Non classées ailleurs ¬ Affections de l'appareil *N99*
- - Sans précision ¬ Affection de l'appareil *N99.9*
- - ¬ Autres affections de l'appareil *N99.8*
- Cours grossesse
- - SAI ¬ Infection de l'appareil *O23.9*
- - Sans précision ¬ Infections de l'appareil *O23.9*

Génito-urinaire *–suite*
- Cours grossesse *–suite*
- - ¬ Infections de l'appareil *O23*
- Femme
- - SAI ¬ Voies *C57.9*
- - ¬ Autres fistules de l'appareil *N82.1*
- Gonococciques ¬ Pelvipéritonite gonococcique et autres infections *A54.2*
- Homme SAI ¬ Voies *C63.9*
- Interne ¬
- - Brûlure des organes *T28.3*
- - Corrosion des organes *T28.8*
- Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les voies *T19.9*
- SAI ¬ Infection puerpérale des voies *O86.3*
- Sans
- - Abcès périurétral ou des glandes annexes ¬ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil *A54.0*
- - Précision ¬
- - - Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil *T83.9*
- - - Infection à Chlamydia de l'appareil *A56.2*
- Virus de l'herpès ¬ Infection des organes génitaux et de l'appareil *A60.0*
- ¬
- - Abcès tuberculeux de l'appareil *A18.1*
- - Antécédent
- - - Familiaux d'autres maladies de l'appareil *Z84.2*
- - - Personnels de maladies de l'appareil *Z87.4*
- - Complication prothèse implant greffe
- - - *T83*
- - - Appareil *T83.8*
- - Corps étranger
- - - Localisations autres et multiples dans les voies *T19.8*
- - - Voies *T19*
- - Infection Chlamydia
- - - Partie inférieure de l'appareil *A56.0*
- - - Pelvi-péritonéale et des autres organes *A56.1*
- - Myiase: *B87.8*
- - Séquelles de tuberculose *B90.1*
- - Syndrome de dysostose spondylocostale-atrésie anale-malformation *Q87.8*
- - Tuberculose de l'appareil *A18.1*

Génochondromatose type
- 1 ¬ *Q78.4*
- 2 ¬ *Q78.4*

Genou
v.a. articulation du genou
- Antérieur postérieur
- - Déchirure ligament croisé
- - - Antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.53*

Genou *–suite*
- Antérieur postérieur *–suite*
- - Déchirure ligament croisé *–suite*
- - - Postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.54*
- - Distorsion ligament croisé
- - - Antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.51*
- - - Postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.52*
- - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.50*
- - ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.5*
- Au-dessous ¬ Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du *Z89.5*
- Cheville ¬ Amputation traumatique entre le *S88.1*
- Interne externe
- - Déchirure ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.43*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.44*
- - Distorsion ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.41*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.42*
- - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.40*
- - ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.4*
- Jambe
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.7*
- - ¬ Gelure superficielle du *T33.7*
- Ligament
- - Capsulaire ¬
- - - Instabilité chronique du *M23.57*
- - - Lésions internes du *M23.87*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.67*
- - Croisé
- - - Antérieur ¬
- - - - Instabilité chronique du *M23.51*
- - - - Lésions internes du *M23.81*
- - - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.61*
- - - Postérieur ¬
- - - - Instabilité chronique du *M23.52*
- - - - Lésions internes du *M23.82*
- - - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.62*
- - Externe
- - - Ligament péronier collatéral ¬
- - - - Instabilité chronique du *M23.54*
- - - - Lésions internes du *M23.84*

Genou *–suite*
- Ligament *–suite*
- - Externe *–suite*
- - - ¬ Autres ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.64*
- - Interne
- - - Ligament tibial collatéral ¬
- - - - Instabilité chronique du *M23.53*
- - - - Lésions internes du *M23.83*
- - - ¬ Autres ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.63*
- - Non précis ¬
- - - Instabilité chronique du *M23.59*
- - - Lésions internes du *M23.89*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.69*
- Localisation multiple ¬
- - Instabilité chronique du *M23.50*
- - Lésions internes du *M23.80*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.60*
- Luxation
- - Antérieure du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.11*
- - Latérale du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.14*
- - Médiane du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.13*
- - Postérieure du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.12*
- Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du ligament latéral interne du *M76.4*
- Ressort" ¬ *M23.8*
- Sans précision
- - Corne postérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du *M23.95*
- - Ligament
- - - Capsulaire ¬ Lésion interne du *M23.97*
- - - Croisé
- - - - Antérieur ou corne antérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du *M23.91*
- - - - Postérieur ou corne postérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du *M23.92*
- - - Externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du *M23.94*
- - - Interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du *M23.93*
- - - Non précisé ou ménisque non précisé ¬ Lésion interne du *M23.99*
- - Localisations multiples ¬ Lésion interne du *M23.90*
- - Partie autre et non précisée du ménisque externe ¬ Lésion interne du *M23.96*
- - ¬
- - - Lésion interne du *M23.9*
- - - Luxation du *S83.10*
- ¬

Genou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Abcès tuberculeux du *A18.0†, M01.16**
- - Abrasion sur le *S80.81*
- - Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du *Z89.6*
- - Amputation traumatique
- - - Hanche et le *S78.1*
- - - Niveau du *S88.0*
- - Anomalie morphologique congénitale du *Q68.2*
- - Arthrolithe du *M23.4*
- - Articulation du *T84.15*
- - Bursites du *M70.5*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du *T84.05*
- - Contusion du *S80.0*
- - Corps
- - - Étranger riziforme intra-articulaire du *M23.4*
- - - Libre intra-articulaire du *M23.4*
- - Déchirure récente du cartilage articulaire du *S83.3*
- - Distorsion du ligament collatéral médial du *S83.42*
- - Écrasement du *S87.0*
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S83.6*
- - Gonarthrose [arthrose du *M17*
- - Hémarthrose
- - - Non traumatique de l'articulation du *M25.06*
- - - Traumatique de l'articulation du *S80.0*
- - Inflammation tuberculeuse de l'articulation du *A18.0†, M01.16**
- - Instabilité chronique du *M23.5*
- - Laxité des ligaments du *M23.8*
- - Lésion
- - - Interne
- - - - *M23*
- - - - *M23.8*
- - - Intra-articulaire récidivante du *M23.99*
- - - Récidivant
- - - - *M23.99*
- - - - Cartilage du ménisque du *M23.39*
- - - Traumatique de multiples parties du *S83.7*
- - Luxation
- - - *S83.18*
- - - Congénitale du *Q68.2*
- - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments du *S83*
- - Malformation congénitale du *Q74.1*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: jambe et *R02.06*
- - Plaie ouverte du *S81.0*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.65*

Genou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.6*
- - Souris
- - - Articulaire du *M23.4*
- - - Intra-articulaire du *M23.4*
- - TBC [Tuberculose] de l'articulation du *A18.0†, M01.16**

Genouillés et des radiations optiques de Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps *H47.5*

Genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les espèces appartenant aux *B35*

Genu
- Recurvatum congénital ¬ *Q68.2*
- Valgum congénital ¬ *Q74.1*
- Varum congénital ¬ *Q74.1*

Géographique ¬ Langue *K14.1*

George ¬ Syndrome de Di *D82.1*

Géotrichose ¬ *B48.3*

Geotrichum ¬ Stomatite à *B48.3*

Gerbode ¬ Anomalie congénitale de *Q21.0*

German ¬ Syndrome de *Q87.8*

Germe
- Dentaire ¬ Dislocation du *K00.4*
- Responsables d'une maladie infectieuse ¬ Sujet porteur de *Z22*

Germinale
- Dysgerminomateuse maligne de l'ovaire ¬ Tumeur *C56*
- Malign
- - Col de l'utérus ¬ Tumeur *C53.9*
- - Corps de l'utérus ¬ Tumeur *C54.9*
- - Mixte ¬ Tumeur *C80.9*
- - Non dysgerminomateuse de l'ovaire ¬ Tumeur *C56*
- - Vagin ¬ Tumeur *C52*
- Non séminomateuse des testicules ¬ Tumeur *C62.9*

Germinoblastome
- Diffus ¬ *C83.9*
- Folliculaire ¬ *C82.9*
- ¬ *C85.9*

Gérodermie ostéodysplasique ¬ *Q82.8*

Gerold
v. Baller-Gerold

Gerstmann ¬ Syndrome de *F81.2*

Gerstmann–Sträussler–Scheinker ¬ Syndrome de *A81.8*

Gestation
- Multiple SAI ¬ *O30.9*
- Poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une brièveté de la *P07*
- Prolongée et un poids élevé à la naissance ¬ Anomalies liées à une *P08*
- Trouble métabolique

Gestation *–suite*
- Trouble métabolique *–suite*
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.1*
- - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.1*
- ¬
- - Faux travail
- - - 37ème semaine entière de *O47.1*
- - - Avant 37 semaines entières de *O47.0*
- - Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.0*
- - Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la *P28.0*
- - Vomissements importants commençant après la fin de la 20ème semaine de *O21.2*

Gestationis ¬ Herpes *O26.4*

Gestationnel
- Hypertension induite par la grossesse] ¬ Hypertension *O13*
- Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du Fœtus [trop grand pour l'âge *O36.6*
- Liés à la grossesse] sans hypertension ¬ Œdème et protéinurie *O12*
- Protéinurie ¬ Œdème *O12.2*
- Puerpéral
- - E ¬
- - - Abcès
- - - - Mammaire *O91.1*
- - - - Subaréolaire *O91.1*
- - - Mastite purulente *O91.1*
- - ¬
- - - Fissures du mamelon *O92.1*
- - - Lymphangite du sein *O91.2*
- - - Mastite
- - - - Interstitielle *O91.2*
- - - - Parenchymateuse *O91.2*
- - - - SAI *O91.2*
- Récidivante ¬ Cholestase intrahépatique *O26.60*
- SAI ¬
- - Diabète sucré *O24.4*
- - Phlébite *O22.9*
- - Phlébopathie *O22.9*
- - Thrombose *O22.9*
- Transitoire) SAI ¬ Hypertension *O13*
- ¬
- - Abcès du mamelon: *O91.0*
- - Antécédents personnels de diabète *Z87.5*
- - Choriocarcinome
- - - *C58*
- - - Ovarien primitif non *C56*

Gestationnel *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Convulsions avec hypertension préexistante ou *O15*
- - Enfant
- - - Gros pour l'âge *P08.1*
- - - Né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge *P08.2*
- - Faible poids pour l'âge *P05.0*
- - Léger pour l'âge *P05.0*
- - Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge *P05.2*
- - Œdème *O12.0*
- - Petit
- - - Âge *P05.1*
- - - Léger pour l'âge *P05.1*
- - - Taille pour l'âge *P05.1*
- - Protéinurie *O12.1*
- - Soin maternel cause connu présumé fœtus
- - - Léger pour l'âge *O36.5*
- - - Petit pour l'âge *O36.5*

Gestose ¬ Antécédents personnels de *Z87.5*

GHR ¬ Petite taille par déficit en *E34.3*

Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [*L44.4*

Giardiase [lambliase] ¬ *A07.1*

Gibbosité pottique ¬ *A18.0†, M49.09**

Gibbs
v. Xia-Gibbs

Gibert ¬ Pityriasis rosé de *L42*

Giedion
v. Langer-Giedion
v. Schinzel-Giedion

Gierke
v. Van Creveld von Gierke
v. Von Gierke

Gigantea ¬ Adipositas *E66.82*

Gigantica ¬ Infection à Fasciola: *B66.3*

Gigantisme
v.a. omphalocèle-macroglossie-gigantisme
- Cérébral ¬ *Q87.3*
- Hypophysaire ¬ *E22.0*
- Infantile familial ¬ *E22.0*
- Néonatal ¬ Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un *Q87.3*
- ¬ Acromégalie et *E22.0*

Gigantomastie juvénile familiale ¬ *N62*

Gilbert Meulengracht ¬ Syndrome de *E80.4*

Gilford
v. Hutchinson-Gilford

Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de *F95.2*

Gillespie ¬ Syndrome de *G11.0*

Gingival
- Crête alvéolaire édentée, associées à un traumatisme ¬ Lésions *K06.2*
- Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de fibromatose *Q87.0*
- Flottante ¬ Crête *K06.8*

Gingival *–suite*
- Généralisé) (localisé) (post-infectieux) (post-opératoire) ¬ Retrait *K06.0*
- Linéaire ¬ Érythème *K05.1*
- Pyogène ¬ Granulome: *K06.8*
- Surdité ¬ Syndrome de fibromatose *H90.3*
- ¬
- - Fibromatose *K06.1*
- - Hyperkératose palmoplantaire focale et *Q82.8*
- - Hyperplasie *K06.1*
- - Kyste: *K09.0*
- - Rétraction *K06.0*
- - Syndrome d'hypertrichose avec fibromatose *L68.8, K06.1*
- - Tartre (dentaire): supra- *K03.6*

Gingivite
- Aiguë ¬ *K05.0*
- Chronique
- - Desquamative ¬ *K05.1*
- - Hyperplasique ¬ *K05.1*
- - Marginale simple ¬ *K05.1*
- - SAI ¬ *K05.1*
- - Ulcérative ¬ *K05.1*
- - ¬ *K05.1*
- Maladies périodontales ¬ *K05*
- Pellagreuse ¬ *E52†, K93.8**
- Ulcéro-nécrotique aigu ¬
- - *A69.1*
- - GUNA [*A69.1*
- Vincent ¬ *A69.1*

Gingivo stomatite
- Pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès ¬ *B00.2*
- Ulcéro-nécrotique (aiguë) ¬ *A69.1*

GINS1 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

GIST
- Côlon ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C18.9*
- Estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C16.9*
- Intestin grêle ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C17.9*
- Œsophage ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C15.9*
- Péritoine ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C48.2*

Gitelman ¬ Syndrome de *N15.8*

Glabellaire anormal ¬ Réflexe *R29.2*

Glabre ¬ Teigne de la peau *B35.4*

Gland
- Pénis ¬
- - Candidose du *B37.4†, N51.2**
- - Mycose candidosique du *B37.4†, N51.2**
- ¬
- - Inflammation gonorrhéique du *A54.0†, N51.2**

Gland *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne: *C60.1*

Glande
- Annexe ¬ Infection gonococcique partie inférieur appareil génito-urinaire
- - Abcès périurétral et des *A54.1*
- - Sans abcès périurétral ou des *A54.0*
- Apocrines du sein ¬ Métaplasie des *N60.8*
- Bartholin
- - Glande vestibulaire principale] ¬ *C51.0*
- - Sans précision ¬ Affection de la *N75.9*
- - ¬
- - - Abcès
- - - - *N75.1*
- - - - Gonococcique des *A54.1*
- - - Affection
- - - - *N75*
- - - - *N75.8*
- - - Kyste de la *N75.0*
- Bulbo-urétrales ¬ Tuberculose des *A18.1†*, *N51.8**
- Canal salivaire
- - Surnuméraires ¬ *Q38.4*
- - ¬
- - - Absence de *Q38.4*
- - - Atrésie de *Q38.4*
- - - Malformations congénitales des *Q38.4*
- Cowper ¬
- - Abcès
- - - *N34.0*
- - - Tuberculeux de la *A18.1†*, *N51.8**
- - Tuberculose de la *A18.1†*, *N51.8**
- Endocrine
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies d'autres *E35.8**
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des *D44*
- - Métabolisme ¬ Affections (des): *Z13.8*
- - Non précisées ¬ Tumeur bénigne des *D35*
- - Précisées ¬ Tumeur bénigne: Autres *D35.7*
- - Sans précision ¬ Tumeur
- - - Bénigne: *D35.9*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.9*
- - - Maligne: *C75.9*
- - Structures apparentées ¬ Tumeur maligne d'autres *C75*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: Thyroïde et autres *D09.3*
- - - Malformations congénitales des autres *Q89.2*
- - - Tuberculose des *A18.8†*, *E35.8**
- Follicule pileux ¬ Inflammation de la *L73.9*
- Lacrymal
- - Canal lacrymal ¬ Tumeur
- - - Bénigne: *D31.5*

Glande *–suite*
- Lacrymal *–suite*
- - Canal lacrymal ¬ Tumeur *–suite*
- - - Maligne: *C69.5*
- - ¬
- - - Affections des *H04.1*
- - - Atrophie de la *H04.1*
- - - Hypertrophie chronique de la *H04.0*
- - - Kyste de la *H04.1*
- - - Syphilis des *A52.7†*, *H06.0**
- Littré ¬ Abcès (de): *N34.0*
- Mammaire ¬
- - Grosseur dans la *R92*
- - Micromastie [développement insuffisant des *Q83.88*
- Mésentériques ¬ Tuberculose des *A18.3†*, *K93.0**
- Parathyroïde
- - Sans précision ¬ Maladie de la *E21.5*
- - Thyroïde ¬ Malformation congénitale de la *Q89.2*
- - ¬
- - - Hyperparathyroïdie et autres maladies de la *E21*
- - - Hyperplasie de la *E21.0*
- - - Maladies précisées de la *E21.4*
- - - Ostéite au cours d'une affection de la *E21.0†*, *M90.89**
- - - Ostéodystrophie
- - - - Cours d'une affection de la *E21.0†*, *M90.89**
- - - - Secondaire au cours d'une affection de la *E21.1†*, *M90.89**
- - - Tuberculose de la *A18.8†*, *E35.8**
- Para-urétrales ¬ *D30.7*
- Parotide ¬
- - Carcinome de la *C07*
- - Tuberculose de la *A18.8†*, *K93.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D11.0*
- - - Maligne de la *C07*
- Pinéal
- - Épiphyse] ¬ Dysfonctionnement de la *E34.8*
- - ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Épiphyse [*D35.4*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Épiphyse [*D44.5*
- - - Maligne: Épiphyse [*C75.3*
- Salivaire
- - Accessoire
- - - SAI ¬ *D10.3*
- - - Siège non précisé ¬ *C06.9*
- - Canal excréteur ¬
- - - Calcul des *K11.5*
- - - Lithiase des *K11.5*
- - Cours d'une réaction à des dépôts d'iode ¬ Inflammation des *K11.2*

Glande *–suite*
- Salivaire *–suite*
- - Principale
- - - Accessoires ¬ *D37.0*
- - - Non précisées ¬ Tumeur maligne des *C08*
- - - SAI ¬ *C08.9*
- - - Sans précision ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: *D11.9*
- - - - Maligne: *C08.9*
- - - ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: Autres *D11.7*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C08.8*
- - Sans précision ¬ Maladie des *K11.9*
- - ¬
- - - Abcès des *K11.3*
- - - Atrophie des *K11.0*
- - - Cancer du sein type *C50.9*
- - - Carcinome de l'œsophage type *C15.9*
- - - Fistule
- - - - *K11.4*
- - - - Congénitale des *Q38.4*
- - - Hypertrophie des *K11.1*
- - - Kyste muqueux
- - - - Épanchement des *K11.6*
- - - - Rétention des *K11.6*
- - - Lésion lympho-épithéliale bénigne des *K11.8*
- - - Maladie
- - - - *K11.8*
- - - - VIH avec maladie des *B23.8*, *K11.9*
- - - Mucocèle des *K11.6*
- - - Tuberculose des *A18.8†*, *K93.8**
- - - Tumeur épithélial
- - - - Bénigne des *D11.9*
- - - - Maligne des *C07*
- Sébacé
- - Scrotum ¬ Kyste de *L72.1*
- - Sein ¬ Kyste d'un canal de *N60.8*
- - ¬
- - - Abcès de *L02.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénignes de: *D23*
- - - - Maligne des *C44*
- Sous-mandibulaire ¬ Tumeur
- - Épithéliale maligne de la *C08.0*
- - Maligne: *C08.0*
- Sous-maxillaire ¬
- - *C08.0*
- - *D11.7*
- Sublingual ¬
- - *D11.7*
- - Tumeur
- - - Épithéliale maligne de la *C08.1*

Glande *–suite*
- Sublingual ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Maligne: *C08.1*
- Submandibulaire associée à IgG4 ¬ Maladie de la *K11.2*
- Sudoripares
- - Apocrine
- - - Sans précision ¬ Affection des *L75.9*
- - - ¬ Autres affections des *L75.8*
- - Exocrines
- - - Sans précision ¬ Affection des *L74.9*
- - - ¬ Autres affections des *L74.8*
- - SAI ¬ Affection des *L74.9*
- - ¬ tumeur
- - - Bénignes de: *D23*
- - - Maligne des *C44*
- Surrénale
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies de la *E35.1**
- - Sans précision ¬ Maladie de la *E27.9*
- - ¬
- - - Calcification tuberculeuse de la *B90.8†*, *E35.1**
- - - Maladie
- - - - *E27*
- - - - Précisées de la *E27.8*
- - - Tuberculose de la *A18.7†*, *E35.1**
- - - Tumeur maligne secondaire de la *C79.7*
- Tarsiennes ¬ Abcès des *H00.0*
- Thyroïde
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies de la *E35.0**
- - ¬ Syphilis tardive de la *A52.7†*, *E35.0**
- Urétral ¬
- - Abcès (de): urétral (*N34.0*
- - Tumeur maligne: *C68.1*
- Vestibulaire principale] ¬ Glande de Bartholin [*C51.0*
- ¬ Maladie due au VIH avec gonflement des *B23.8*, *R59.9*

Glandulaire
- Endomètre ¬ Hyperplasie *N85.0*
- ¬
- - Chéilite: *K13.0*
- - Hypospadias: *Q54.0*
- - Tularémie ulcéro- *A21.0*

Glandulo-kystique ¬ Hyperplasie de l'endomètre: *N85.0*

Glanzmann ¬ Maladie de *D69.1*

Glaucomateuses (sous-capsulaires) ¬ Opacités *H26.2*

Glaucome
- Absolu ¬ *H44.5*
- Angle fermé primitif
- - Résiduel
- - - Aigu ¬ *H40.2*

Glaucome *–suite*
- Angle fermé primitif *–suite*
- - Résiduel *–suite*
- - - Chronique ¬ *H40.2*
- - - Intermittent ¬ *H40.2*
- - - Retardé ¬ *H40.2*
- - ¬ *H40.2*
- Aniridie ¬ *Q13.1†*, *H42.8**
- Blocage pupillaire ¬ *H40.2*
- Congénital ¬
- - *Q15.0*
- - Macrophtalmie au cours d'un *Q15.0*
- Cours
- - Amylose ¬ *E85.9†*, *H42.0**
- - Maladie
- - - Endocrinien
- - - - Nutritionnelles et métaboliques ¬ *H42.0**
- - - - ¬ *E34.9†*, *H42.0**
- - - Métabolique NCA ¬ *E88.9†*, *H42.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H42.8**
- - Syndrome de Lowe ¬ *E72.0†*, *H42.0**
- Juvénile ¬ *Q15.0*
- Limite ¬ *H40.0*
- Lors de syndrome de Rieger ¬ *Q13.8†*, *H42.8**
- Médicamenteux ¬ *H40.6*
- Néovasculaire ¬ *H40.5*
- Néovascularisation
- - Cours rétinopathie diabétique diabète sucré type
- - - 1 ¬ *E10.30†*, *H36.0**
- - - 2 ¬ *E11.30†*, *H36.0**
- - Rétinopathie diabétique ¬ *E14.30†*, *H36.0**
- Nouveau-né ¬ *Q15.0*
- PEX [glaucome pseudo-exfoliatif] ¬ *H40.1*
- Phakolitique ¬ *H40.5*
- Primitif
- - Angle
- - - Étroit ¬ *H40.2*
- - - Ouvert ¬ *H40.1*
- - Résiduel
- - - Capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ *H40.1*
- - - Chronique simple ¬ *H40.1*
- - - Pigmentaire ¬ *H40.1*
- - - Tension basse ¬ *H40.1*
- Pseudo-exfoliatif] ¬ Glaucome PEX [*H40.1*
- Sans précision ¬ *H40.9*
- Secondaire
- - Affections oculaires ¬ *H40.5*
- - Inflammation de l'œil ¬ *H40.4*
- - Pression veineuse épisclérale élevée ¬ *H40.5*
- - Sphérophakie/ectopie du cristallin et mégalocornée ¬ *Q15.8*

Glaucome *–suite*
- Secondaire *–suite*
- - Traumatisme oculaire ¬ *H40.3*
- Syphilitique ¬ *A52.7†*, *H42.8**
- Traumatique dû (due) à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.3*
- Tuberculeux ¬ *A18.5†*, *H42.8**
- ¬
- - *H40*
- - *H40.8*
- - Kératoglobe congénital avec *Q15.0*
- - Macrocornée avec *Q15.0*
- - Mégalocornée avec *Q15.0*

Glaudemans ¬ Hypomagnésémie isolée autosomique dominante type *E83.4*

Gléno huméral
- SAI ¬ Luxation de l'épaule [articulation *S43.00*
- Supérieur) (moyen) (inférieur) ¬ Ligament *S43.4*
- ¬ Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation *S43.0*

Glénoïde et col de l'omoplate ¬ Fracture de l'omoplate: Cavité *S42.14*

Gliales pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à sphéroïdes axonaux et cellules *E75.2*

Glioblastome multiforme ¬ *C71.9*

Glioépendymaire/épendymaire ¬ Kyste *Q04.6*

Gliomatose cérébrale ¬ *C71.0*

Gliome
- Angiocentrique ¬ *C71.9*
- Chordoïde ¬ *C71.5*
- Infiltrant du tronc cérébral ¬ *C71.7*
- Nasal ¬ *Q30.8*
- Voies optiques ¬ *D33.3*
- ¬ *C71.9*

Glioneuronale papillaire ¬ Tumeur *D43.2*

Gliosarcome ¬ *C71.9*

Gliose épirétinienne ¬ *H35.38*

Glissement
- Cardia à travers le hiatus œsophagien ¬ *Q40.1*
- Ligature ombilicale SAI ¬ *P51.8*
- ¬
- - Hernie: hiatale (œsophagienne) (par *K44*
- - Syndrome de *R54*

Globale
- Transitoire ¬ Amnésie *G45.4*
- ¬
- - Insuffisance cardiaque *I50.01*
- - Troubles spécifiques du développement de la motricité *F82.0*

Globe
- Oculaire
- - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du *S05.5*

Globe *–suite*

- Oculaire *–suite*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du corps vitré et du *H45.8**
- - Sans
- - - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du *S05.6*
- - - Précision ¬ Affection du *H44.9*
- - Tissus de l'orbite ¬ Contusion du *S05.1*
- - ¬
- - - *C69.9*
- - - *D31.9*
- - - Affection
- - - - *H44.8*
- - - - Dégénératives du *H44.3*
- - - Atrophie du *H44.5*
- - - Brûlure provoquant la rupture et la destruction du *T26.2*
- - - Corrosion provoquant la rupture et la destruction du *T26.7*
- - - Dégénérescence du *H44.5*
- - - Luxation du *H44.8*
- - - Mélanocytome du *D31.9*
- - - Phtisie du *H44.5*
- - - Rétention ancien corps étranger
- - - - Magnétique dans: paroi postérieure du *H44.6*
- - - - Non magnétique dans: paroi postérieure du *H44.7*
- SAI ¬ Déplacement (latéral) du *H05.2*

Globoïdes ¬ Leucodystrophie à cellules *E75.2*

Globule

- Blancs, non classées ailleurs ¬ Anomalies des *R72*
- Rouge
- - Adulte ¬ Aplasie pure des *D60.0*
- - ¬
- - - Anémie hémolytique due à un déficit en pyruvate kinase du *D55.2*
- - - Anomalies des *R71*

Globuline

- AC (accélératrice) ¬ Déficit héréditaire en *D68.22*
- Fixant le cortisol ¬ Déficit de la *E27.8*
- ¬
- - Anomalie de la *R77.1*
- - Carence en AC- *D68.22*

Glomérulaire

- Cours
- - Amylose ¬ Maladie *E85.9†, N08.4**
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Maladie *D65.1†, N08.2**
- - Drépanocytose ¬ Maladie *D57.8†, N08.2**
- - Malaria quartana ¬ Maladie *B52.0†, N08.0**
- - Myélome multiple ¬ Trouble *C90.00†, N08.1**

Glomérulaire *–suite*

- Cours *–suite*
- - Périartérite noueuse ¬ Maladie *M30.0†, N08.5**
- - Plasmocytome en rémission complète ¬ Maladie *C90.01†, N08.1**
- - Purpura de Schoenlein-Henoch ¬ Maladie *D69.0†, N08.2**
- - Sepsis NCA ¬ Maladie *A41.9†, N08.0**
- - Strongyloïdose ¬ Maladie *B78.9†, N08.0**
- - Syndrome
- - - Défibrination ¬ Maladie *D65.9†, N08.2**
- - - Hémolytique urémique ¬ Maladie *D59.3†, N08.2**
- - Syphilis ¬ Maladie *A52.7†, N08.0**
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ Maladie *B27.0†, N08.0**
- - Herpès ¬ Maladie *B00.8†, N08.0**
- ¬ Maladie des anticorps anti-membrane basale *M31.0†, N08.5**

Glomérulonéphrite
v.a. Minimal changes glomerulonephritis

- Aiguë ¬ *N00*
- Chronique ¬ *N03*
- Cours
- - Amylose ¬ *E85.9†, N08.4**
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *D65.1†, N08.2**
- - Cryoglobulinémie ¬ *D89.1†, N08.2**
- - Déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase ¬ *E78.6†, N08.4**
- - Endocardite bactérienne sub-aiguë ¬ *I33.0†, N08.8**
- - Granulomatose
- - - Polyangéite ¬ *M31.3†, N08.5**
- - - Wegener ¬ *M31.3†, N08.5**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, N08.5**
- - Macroglobulinémie de Waldenström ¬ *C88.00†, N08.1**
- - Myélome multiple ¬ *C90.00†, N08.1**
- - Périartérite noueuse ¬ *M30.0†, N08.5**
- - Purpura
- - - Schoenlein-Henoch ¬ *D69.0†, N08.2**
- - - Thrombotique-thrombocytopénique ¬ *M31.1†, N08.5**
- - Sepsis
- - - Streptocoques ¬ *A40.9†, N08.0**
- - - ¬ *A41.9†, N08.0**
- - Strongyloïdose ¬ *B78.9†, N08.0**
- - Syndrome
- - - Défibrination ¬ *D65.9†, N08.2**
- - - Hémolytique urémique ¬ *D59.3†, N08.2**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, N08.0**
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ *E10.20†, N08.3**
- - - 2 ¬ *E11.20†, N08.3**

Glomérulonéphrite *–suite*

- Diabétique *–suite*
- - ¬ *E14.20†, N08.3**
- Évolution rapide ¬ *N01*
- Extra membraneuse primitive ¬ *N05.2*
- IgA en croissant ¬ *N02.7*
- Plasmodium malariae ¬ *B52.0†, N08.0**
- Proliférative diffuse au cours de lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, N08.5**
- SAI ¬ *N05*
- Sclérosante diffuse, sans précision ¬ *N18.9*

Glomérulopathie

- Aiguë ¬ *N00*
- Chronique ¬ *N03*
- Cours
- - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ *N08.5**
- - Bilharziose ¬ *B65.0†, N08.0**
- - Cryoglobulinémie ¬ *D89.1†, N08.2**
- - Déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase ¬ *E78.6†, N08.4**
- - Granulomatose
- - - Polyangéite ¬ *M31.3†, N08.5**
- - - Wegener ¬ *M31.3†, N08.5**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, N08.5**
- - Macroglobulinémie de Waldenström ¬ *C88.00†, N08.1**
- - Maladie
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *N08.4**
- - - Fabry-Anderson ¬ *E75.2†, N08.4**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *N08.0**
- - - Sang et des anomalies du système immunitaire ¬ *N08.2**
- - - Tumorales ¬ *N08.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *N08.8**
- - Myélome multiple ¬ *C90.00†, N08.1**
- - Oreillons ¬ *B26.8†, N08.0**
- - Plasmocytome ¬ *C90.00†, N08.1**
- - Purpura thrombocytopénique thrombotique ¬ *M31.1†, N08.5**
- - Syndrome de Goodpasture ¬ *M31.0†, N08.5**
- Dépôt
- - Collagène de type III ¬ *N07.6*
- - Fibronectine ¬ *N07.6*
- Évolution rapide ¬ *N01*
- Fibrillaire non amyloïde ¬ *N03.8*
- Immunotactoïde ¬ *N03.6*
- Lipoprotéines ¬ *N07.8*
- SAI ¬ *N05*

Glomérulosclérose

- Diabétique diabète sucré type
- - 1 ¬ *E10.20†, N08.3**
- - 2 ¬ *E11.20†, N08.3**
- Extracapillaire diabétique ¬ *E14.20†, N08.3**

Glomérulosclérose *–suite*
- Intercapillaire ¬ *E14.20†, N08.3**
- Segmentaire focale ¬ Syndrome néphrotique idiopathique cortico-sensible avec *N04.1*
- ¬ Diabète sucré avec *E14.20†, N08.3**

Glomus
- Aortique paraganglions ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D35.6*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.7*
- - Maligne: *C75.5*
- ¬ Tumeur du *D18.00*

Glossalgie ¬ *K14.6*

Glossite
- Atrophique ¬ *K14.4*
- Cours de pellagre ¬ *E52†, K93.8**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, K93.8**
- Exfoliatrice marginée ¬ *K14.1*
- Losangique médiane ¬ *K14.2*
- Migratoire bénigne ¬ *K14.1*
- Möller Hunter due à une carence en vitamine B ¬ *E53.9†, K93.8**
- Syphilitique interstitielle ¬ *A52.7†, K93.8**
- ¬
- - *K14.0*
- - Anémie pernicieuse avec *D51.0*

Glosso épiglottique
- S) ¬ Pli(s) *C10.1*
- ¬ Tumeur maligne: Sillon *C10.0*

Glossodynie ¬ *K14.6*

Glossopathie SAI ¬ *K14.9*

Glossopharyngien
- IX] ¬ Nerf: *S04.8*
- Nerf crânien IX] ¬ Affections du nerf *G52.1*
- ¬ Névralgie du nerf *G52.1*

Glossopyrosis ¬ *K14.6*

Glotte
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de: *A15.5*
- Larynx cartilage thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la *Q31.8*
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- ¬
- - Œdème (de la): *J38.4*
- - Paralysie de la *J38.0*
- - Tumeur maligne: *C32.0*

Glottique ¬ Ptérygion du larynx: *Q31.0*

GLRX5 ¬ Anémie sidéroblastique associée à *D64.0*

Glucagon ¬
- Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec hypersécrétion de *E16.3*
- Hypersécrétion de *E16.3*

Glucagonome
- Incertain ¬ *D37.70*
- Pancréatique incertain ¬ *D37.70*
- ¬ *C25.4*

Glucides
- Fœtus nouveau-né
- - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du métabolisme des *P70.9*
- - ¬ Autres anomalies transitoires du métabolisme des *P70.8*
- Spécifiques du fœtus et du nouveau-né ¬ Anomalies transitoires du métabolisme des *P70*
- ¬ Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*

Gluco-aminophosphaté ¬ Diabète *E72.0*

Glucoamylase ¬ Diarrhée chronique associée à un déficit en *E74.3*

Glucocérébrosidase ¬ Déficit en *E75.2*

Glucocorticoïdes
- Analogues synthétiques ¬ Intoxication: *T38.0*
- Usage topique ¬ *T49*
- ¬
- - Déficit isolé familial en *E27.1*
- - Hyperaldostéronisme pouvant être traité par des *E26.0*
- - Hypertension sensible aux *E26.0*

Glucoglycinurie ¬ *E72.5*

Glucokinase ¬
- Hyperinsulinisme par déficit en *E16.1*
- Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en *E16.1*

Gluconéogenèse ¬ Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la *E74.4*

Glucoronidase ¬ Carence en bêta- *E76.2*

Glucosamine N-acétyl-6-sulfatase ¬ Déficit en *E76.2*

Glucosaminide
v. héparane-alpha-glucosaminide

Glucosaminoglycanes
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E76.9*
- ¬ anomalie métabolisme
- - *E76*
- - *E76.8*

Glucose ¬
- Anomalie
- - Épreuve de tolérance au *R73.0*
- - Transport du *E74.8*
- Tolérance altérée au *R73.0*

Glucose-6-phosphatase ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Glucose-6-phosphate déshydrogénase
- G6PD] ¬ Anémie due à une carence en *D55.0*

Glucose-6-phosphate déshydrogénase *–suite*
- G6PDH] ¬ Déficit en *E74.8*

Glucose-galactose ¬
- Intolérance congénitale au *E74.3*
- Malabsorption *E74.3*

Glucosidase
v.a. alpha-1,4-glucosidase
v.a. amylo-1,6-glucosidase
- 1 ¬ Déficit en *E77.8*

Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire ¬ Intoxication: *T46.0*

Glucosurie rénale familiale ¬ *E74.8*

Glucosyltransférase
- 1 ¬ Déficit en *E77.8*
- 2 ¬ Déficit en *E77.8*

Glucuronosyltransférase
- Type
- - 1 ¬ Déficit en bilirubine uridine-diphosphate *E80.5*
- - 2 ¬ Déficit en bilirubine uridine-diphosphate *E80.5*
- ¬ Déficit en bilirubine uridine-diphosphate *E80.5*

Glucuronyltransférase ¬ Déficit en *E80.5*

GLUT2 ¬
- Glycogénose par déficit en *E74.0*
- GSD par déficit en *E74.0*

Glutamate formiminotransférase ¬ Déficit en *E70.8*

Glutamate-aspartate ¬ Défaut de transport du *E72.0*

Glutamine
- Synthétase ¬
- - Déficit héréditaire en *E72.8*
- - Dysgénésie cérébrale congénitale par déficit en *E72.8*
- ¬ Trouble du métabolisme de la *E72.8*

Glutaracidurie ¬ *E72.3*

Glutarique type
- 1 ¬
- - Acidémie *E72.3*
- - Acidurie *E72.3*
- 2 ¬
- - Acidémie *E71.3*
- - Acidurie *E71.3*
- 3 ¬ Acidurie *E72.3*

Glutaryl-CoA
- Déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.3*
- Oxydase ¬ Déficit en *E72.3*

Glutathion
- Réductase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.1*
- ¬
- - Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du *D55.1*
- - Taux réduit de *R79.8*

Glutathionurie ¬ *E72.8*

Gluten ¬
- Intolérance au *K90.0*
- Sensibilité non cœliaque au *K90.4*

Glycémie ¬ Augmentation de la *R73*

Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ Anémie
- Déficience en *D55.2*
- Hémolytique due à une carence en *D55.2*

Glycérol kinase ¬ Déficit isolé en *E74.8*

Glycine
- Amidinotransférase ¬ Déficit en l-arginine: *E72.8*
- ¬ Anomalies du métabolisme de la *E72.5*

Glycinémie cétosique ¬ *E71.1*

Glycine-N-méthyltransférase ¬ Hyperméthioninémie provoquée par un déficit en *E72.1*

Glycinique ¬ Encéphalopathie *E72.5*

Glycinurie ¬
- *E72.0*
- 3-méthylcrotonyl *E71.1*

Glycogène
- Foie ¬ Infiltration de *E74.0†, K77.8**
- Phosphorylase musculaire ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*
- Synthase hépatique ¬
- - Déficit en *E74.0*
- - GSD par déficit en *E74.0*
- ¬
- - Infiltration de *E74.0*
- - Myopathie au cours d'anomalies de stockage du *E74.0†, G73.6**

Glycogenica
- Diffusa ¬ Hepatomegalia *E74.0†, K77.8**
- ¬ Hepatonephromegalia *E74.0*

Glycogénique
- Cœur ¬ Maladie *E74.0†, I43.1**
- Déficit
- - Myophosphorylase ¬ Maladie *E74.0*
- - Phosphoglycérate kinase 1 ¬ Maladie *E74.0*
- Foie et des reins ¬ Maladie *E74.0*
- ¬
- - Cardiomégalie au cours de maladie *E74.0†, I43.1**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladie *E74.0†, N16.3**
- - Pyélonéphrite au cours de maladie *E74.0†, N16.3**
- - Thésaurismose *E74.0*

Glycogénose
- Bickel-Fanconi ¬ *E74.0*
- Cardiaque ¬ *E74.0*
- Cirrhose du foie ¬ *E74.0*
- Déficit
- - Aldolase A musculaire ¬ *E74.0*
- - Bêta-énolase musculaire ¬ *E74.0*

Glycogénose *–suite*
- Déficit *–suite*
- - Enzyme branchante, forme neuromusculaire périnatale fatale ¬ *E74.0*
- - Glucose-6-phosphatase ¬ *E74.0*
- - GLUT2 ¬ *E74.0*
- - Glycogène phosphorylase musculaire ¬ *E74.0*
- - Lactate déshydrogénase ¬ *E74.4*
- - LAMP-2 ¬ *E74.0*
- - Maltase acide ¬ *E74.0*
- - PhK ¬ *E74.0*
- - Phosphofructokinase musculaire ¬ *E74.0*
- - Phosphoglycérate mutase ¬ *E74.0†, G73.6**
- - Phosphorylase
- - - Hépatique ¬ *E74.0*
- - - Kinase
- - - - Hépatique et musculaire ¬ *E74.0*
- - - - ¬ *E74.0*
- Hépato-rénale ¬ *E74.0*
- Interstitielle pulmonaire ¬ *P22.8*
- Lysosomale à activité maltase acide normale ¬ *E74.0*
- Type 4
- - Adulte, forme neuromusculaire ¬ *E74.0*
- - Enfant, forme neuromusculaire ¬ *E74.0*
- - Forme neuromusculaire périnatale fatale ¬ *E74.0*
- ¬ Syndrome de Wagner-Parnas [Forme hépatique de la *E74.0*

Glycol ¬
- Effet toxique: *T52.3*
- Solvants du groupe: *L24.2*

Glycolipoïde ¬ Lipidose *E75.2*

Glycolique ¬ Acidurie *E74.8*

Glycolytiques ¬
- Anémie due à des anomalies des enzymes *D55.2*
- Anomalie des enzymes *E74.8*

Glycopeptides
- Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux *U80.20!*
- Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecium résistant aux *U80.30!*
- Oxazolidinones
- - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux *U80.2!*
- - Streptogramines
- - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecium résistant aux *U80.3!*
- - - ¬ Enterococcus
- - - - Faecalis résistant aux *U80.20!*
- - - - Faecium résistant aux *U80.30!*
- Quinolones streptogramines oxazolidinones
- - Non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux *U80.01!*

Glycopeptides *–suite*
- Quinolones streptogramines oxazolidinones *–suite*
- - ¬ Staphylocoque doré résistant oxacilline
- - - *U80.0!*
- - - Méticilline et le cas échéant aux *U80.00!*
- ¬ Enterococcus
- - Faecalis résistant
- - - *U80.20!*
- - - Oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux *U80.21!*
- - Faecium résistant
- - - *U80.30!*
- - - Oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au *U80.31!*

Glycoprotéine ¬ Thrombophilie héréditaire due au déficit congénital en histidine-rich (poly-L) *D68.5*

Glycoprotéines
- Déficientes en hydrates de carbone ¬ Syndrome des *E77.8*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E77.9*
- ¬
- - Anomalie métabolisme
- - - *E77*
- - - *E77.8*
- - Défaut dégradation
- - - *E77.1*

Glycosurie
- Rénale ¬ *E74.8*
- ¬ *R81*

Glycosylation
- Associée à PGM3 ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- Congénitale associée au COG2 ¬ Maladie de *E77.8*
- Type Ia ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*

Glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme ¬ Ictère dû à un retard de la *P59.0*

Glyoxylate
v. alanine-glyoxylate

GM [marqueur de chaînes Gamma] ¬ Gangliosidose *E75.1*

GM1
- Adulte ¬ Gangliosidose à *E75.1*
- Infantile ¬ Gangliosidose à *E75.1*
- Juvénile ¬ Gangliosidose à *E75.1*
- ¬ Gangliosidose: *E75.1*

GM2
- Adulte ¬ Gangliosidose *E75.0*
- Juvénile ¬ Gangliosidose *E75.0*
- SAI ¬ Gangliosidose *E75.0*
- Variant
- - 0 ¬ Gangliosidose à *E75.0*

GM2 *–suite*
- Variant *–suite*
- - AB ¬ Gangliosidose à *E75.0*
- - B, B1 ¬ Gangliosidose à *E75.0*
- ¬ Gangliosidose *E75.0*

GM3 ¬ Gangliosidose
- *E75.1*

GMSI] ¬ Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [*D47.2*

Gnathostomiase ¬ *B83.1*

Goitre
- Congénital
- - Non toxique
- - - Parenchymateux ¬ *E03.0*
- - - SAI ¬ *E03.0*
- - Transitoire avec fonction thyroïdienne normale ¬ *P72.0*
- Diffus
- - Endémique) lié à une carence en iode ¬ *E01.0*
- - Non toxique ¬ *E04.0*
- - ¬
- - - Hypothyroïdie congénitale, avec *E03.0*
- - - Thyréotoxicose avec *E05.0*
- Endémique
- - Lié à une carence en iode, sans précision ¬ *E01.2*
- - SAI ¬ *E01.2*
- Exophtalmique ou toxique SAI ¬ *E05.0*
- Familial dû à un trouble de l'hormonosynthèse ¬ *E07.1*
- Kystique SAI ¬ *E04.2*
- Multinodulaire
- - Endémique) lié à une carence en iode ¬ *E01.1*
- - Kystique) SAI ¬ *E04.2*
- - Non toxique ¬ *E04.2*
- - Toxique ¬ Thyréotoxicose avec *E05.2*
- Néonatal, non classé ailleurs ¬ *P72.0*
- Nodulaire
- - Lié à une carence en iode ¬ *E01.1*
- - Non toxique) SAI ¬ *E04.9*
- - Toxique SAI ¬ *E05.2*
- Non toxique
- - Diffus (colloïde) ¬ *E04.0*
- - Précisés ¬ Autres *E04.8*
- - Sans précision ¬ *E04.9*
- - Simple ¬ *E04.0*
- - ¬ Autres *E04*
- SAI ¬ *E04.9*
- Toxique diffus ¬ *E05.0*
- Trouble de l'hormonosynthèse ¬ *E07.1*
- Uninodulaire
- - Non toxique ¬ *E04.1*
- - Toxique ¬ Thyréotoxicose avec *E05.1*
- ¬

Goitre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Exophtalmie au cours de *E05.0†, H06.2**
- - Hypothyroïdie congénitale, sans *E03.1*

Golabi
v. Simpson-Golabi-Behmel

Goldberg
v. Shprintzen-Goldberg

Goldberg-Shprintzen avec mégacôlon ¬ Syndrome de *Q87.8*

Goldblatt ¬
- Chondrodysplasie de *Q78.8*
- Rein de *I70.1*

Golden ¬ Dysplasie spondylo-métaphysaire type *Q77.8*

Goldenhar ¬ Syndrome (de): *Q87.0*

Goldmann-Favre ¬ Syndrome de *H35.5*

Gole
v. Touraine-Solente-Gole

Goltz
v. Gorlin-Goltz

Gomme
- Amygdales ¬ *A52.7†, J99.8**
- Artère
- - Cérébrales ¬ *A52.0†, I68.8**
- - ¬ *A52.0†, I79.8**
- Cœur ¬ *A52.0†, I52.0**
- Corps ciliaire ¬ *A52.7†, H22.8**
- Foie ¬ *A52.7†, K77.0**
- Hypophyse ¬ *A52.7†, E35.8**
- Intracrânienne ¬ *A52.1†, G07**
- Iris ¬ *A52.7†, H22.8**
- Langue ¬ *A52.7†, K93.8**
- Larynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- Leptoméninge ¬ *A52.1†, G07**
- Méninges ¬ *A52.1†, G07**
- Moelle épinière ¬ *A52.1†, G07**
- Neurosyphilitique ¬ *A52.3†, G07**
- Nez ¬ *A52.7†, J99.8**
- Orbites ¬ *A52.7†, H06.3**
- Os ¬ *A52.7†, M90.29**
- Osseuse du pian (tardif) ¬ *A66.6*
- Peau ¬ *A52.7†, L99.8**
- Pénis ¬ *A52.7†, N51.8**
- Péricarde ¬ *A52.0†, I32.0**
- Pharynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- Queue de cheval ¬ *A52.1†, G07**
- Région rhino-pharyngée ¬ *A52.7†, J99.8**
- Rein ¬ *A52.7†, N29.0**
- Syphilis congénitale ¬ *A50.5*
- Syphilitique système nerveux central
- - SAI ¬ *A52.3*
- - ¬ *A52.3†, G07**
- Système cardiovasculaire ¬ *A52.0†, I98.0**
- Trachée ¬ *A52.7†, J99.8**
- Ulcères pianiques ¬ *A66.4*

Gomme *–suite*
- Uretère ¬ *A52.7†, N29.1**
- Voile du palais ¬ *A52.7†, K93.8**
- ¬ Syphilis tardive de la paupière avec *A52.7†, H03.1**

Gommeuse
- Pian (tardif) ¬ Ostéite ou périostite *A66.6*
- - ¬ Framboeside *A66.4*

Gonadique
- Complète 46,XY ¬ Dysgénésie *Q99.1*
- Partielle 46,XY ¬ Dysgénésie *Q56.1*
- Pure ¬ Dysgénésie *Q99.1*

Gonadotrope fonctionnel ¬ Adénome *D35.2*

Gonadotrophine ¬
- Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- Syndrome de l'ovaire résistant aux *E28.3*

Gonadotropines ¬ Puberté précoce dépendante des *E22.8*

Gonarthrite gonorrhéique ¬ *A54.4†, M01.36**

Gonarthrose
- Arthrose du genou] ¬ *M17*
- Post-traumatique
- - Bilatérale ¬ *M17.2*
- - SAI ¬ *M17.3*
- - Unilatérale ¬ *M17.3*
- Post-traumatiques ¬ Autres *M17.3*
- Primaire
- - Bilatérale ¬ *M17.0*
- - SAI ¬ *M17.1*
- - Unilatérale ¬ *M17.1*
- - ¬ Autres *M17.1*
- Sans précision ¬ *M17.9*
- Secondaire
- - Bilatérales ¬ Autres *M17.4*
- - SAI ¬ *M17.5*
- - Unilatérale ¬ *M17.5*
- - ¬ Autres *M17.5*

Gondii ¬
- Infection à Toxoplasma *B58*
- Maladie due au VIH avec infection à Toxoplasma *B20, B58.9*

Gonflement
- Articulaire tuberculeux ¬ *A18.0†, M01.19**
- Glandes ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R59.9*

Gongylonémose ¬ *B83.8*

Goniodysgénésie-déficience intellectuelle-petite taille ¬ Syndrome de *Q87.8*

Goniosynéchies ¬ *H21.5*

Gonite gonorrhéique ¬ *A54.4†, M01.36**

Gonoblennorrhée ¬ *A54.3†, H13.1**

Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.2*

Gonococcique
- Anus et du rectum ¬ Infection *A54.6*
- Femme ¬ Affection inflammatoire pelvienne *A54.2†, N74.3**

Gonococcique *–suite*

- Glandes de Bartholin ¬ Abcès *A54.1*
- Infections génito-urinaires gonococciques ¬ Pelvipéritonite *A54.2*
- Nouveau-né ¬ Ophtalmie *A54.3*
- Œil ¬ Infection *A54.3*
- Partie inférieur appareil génito-urinaire
- - Abcès périurétral et des glandes annexes ¬ Infection *A54.1*
- - Sans abcès périurétral ou des glandes annexes ¬ Infection *A54.0*
- S ¬
- - Lésions cutanées *A54.8*
- - Septicémie *A54.8*
- SAI ¬
- - Cervicite *A54.0*
- - Cystite *A54.0*
- - Urétrite *A54.0*
- - Vulvo-vaginite *A54.0*
- Sans précision ¬ Infection *A54.9*
- Système ostéo-articulaire et des muscles ¬ Infection *A54.4†*
- ¬
- - Bursite *A54.4†, M73.09**
- - Infection
- - - *A54*
- - - *A54.8*
- - Méningite *A54.8†, G01**
- - Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires *A54.2*
- - Pharyngite *A54.5*
- - Urétrite: non *N34.1*

Gonocoques

- Abcès ¬ Vulvo-vaginite à *A54.1†, N77.1**
- ¬
- - Abcès cérébral à *A54.8†, G07**
- - Arthrite à *A54.4†, M01.39**
- - Bursite à *A54.4†, M73.09**
- - Conjonctivite à *A54.3†, H13.1**
- - Endocardite à *A54.8†, I39.8**
- - Épididymite à *A54.2†, N51.1**
- - Hydrarthrose à *A54.4†, M14.89**
- - Iridocyclite à *A54.3†, H22.0**
- - Irite à *A54.3†, H22.0**
- - Kératose à *A54.8†, L86**
- - Maladie de l'endocarde à *A54.8†, I39.8**
- - Méningite à *A54.8†, G01**
- - Myocardite à *A54.8†, I41.0**
- - Ophtalmie néonatale à *A54.3†, H13.1**
- - Orchite à *A54.2†, N51.1**
- - Ostéomyélite à *A54.4†, M90.29**
- - Péricardite à *A54.8†, I32.0**
- - Péritonite à *A54.8†, K67.1**
- - Pneumonie à *A54.8†, J17.0**
- - Prostatite à *A54.2†, N51.0**
- - Spondylite à *A54.4†, M49.39**

Gonocoques *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Synovite à *A54.4†, M68.09**
- - Ténosynovite à *A54.4†, M68.09**
- - Vulvo-vaginite à *A54.0†, N77.1**

Gonorrhée

- Aigu
- - Canal déférent ¬ *A54.2†, N51.8**
- - Vésicule séminale ¬ *A54.2†, N51.8**
- Arthrite ¬ *A54.4†, M01.39**
- Articulaire ¬ *A54.4†, M01.39**
- Bourse ¬ *A54.4†, M73.09**
- Bursite ¬ *A54.4†, M73.09**
- Canal déférent ¬ *A54.2†, N51.8**
- Chronique de la vésicule séminale ¬ *A54.2†, N51.8**
- Cœur ¬ *A54.8†, I52.0**
- Endocarde ¬ *A54.8†, I39.8**
- Épididyme ¬ *A54.2†, N51.1**
- Œil chez le nouveau-né ¬ *A54.3†, H13.1**
- Ovaire ¬ *A54.2†, N74.3**
- Peau ¬ *A54.8†, L99.8**
- Prépuce ¬ *A54.0†, N51.2**
- Prostate ¬ *A54.2†, N51.0**
- Rein ¬ *A54.2†, N29.1**
- Trompe de Fallope ¬ *A54.2†, N74.3**
- Utérus ¬ *A54.2†, N74.3**
- Vésicule séminale ¬ *A54.2†, N51.8**
- ¬
- - Inflammation du bassin féminin au cours de *A54.2†, N74.3**
- - Pneumonie au cours de *A54.8†, J17.0**

Gonorrhéique

- Abcès ¬
- - Vaginite *A54.1†, N77.1**
- - Vulvite *A54.1†, N77.1**
- Aiguë ¬ Orchite *A54.2†, N51.1**
- Articulations ¬ Inflammation *A54.4†, M01.39**
- Chronique ¬ Orchite *A54.2†, N51.1**
- Congénitale ¬ Kératite *A54.3†, H19.2**
- Gland ¬ Inflammation *A54.0†, N51.2**
- Nouveau-né ¬
- - Conjonctivite *A54.3†, H13.1**
- - Ophtalmie *A54.3†, H13.1**
- Péritoine ¬ Inflammation *A54.8†, K67.1**
- Prénatale ¬ Kératite *A54.3†, H19.2**
- Prostate ¬ Abcès *A54.2†, N51.0**
- Trompe de Fallope ¬ Rétrécissement *A54.2†, N74.3**
- ¬
- - Adénite *A54.8*
- - Annexite *A54.2†, N74.3**
- - Balanite *A54.0†, N51.2**
- - Balano-posthite *A54.0†, N51.2**
- - Conjonctivite *A54.3†, H13.1**

Gonorrhéique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Déférentite *A54.2†, N51.8**
- - Dermatose *A54.8†, L99.8**
- - Endométrite *A54.2†, N74.3**
- - Endophtalmie *A54.3†, H45.1**
- - Épididymite *A54.2†, N51.1**
- - Exostose *A54.4†, M90.29**
- - Funiculite *A54.2†, N51.8**
- - Gonarthrite *A54.4†, M01.36**
- - Gonite *A54.4†, M01.36**
- - Hyperkératose *A54.8†, L86**
- - Iridocyclite *A54.3†, H22.0**
- - Irite *A54.3†, H22.0**
- - Kératodermie *A54.8†, L86**
- - Néphrite *A54.2†, N08.0**
- - Orchite *A54.2†, N51.1**
- - Ovarite *A54.2†, N74.3**
- - Périarthrite *A54.4†, M73.89**
- - Périhépatite *A54.8†, K67.1**
- - Périostite *A54.4†, M90.19**
- - Prostatite *A54.2†, N51.0**
- - Pyélite *A54.2†, N29.1**
- - Pyosalpinx *A54.2†, N74.3**
- - Salpingite *A54.2†, N74.3**
- - Salpingo-ovarite *A54.2†, N74.3**
- - Spermatocystite *A54.2†, N51.8**
- - Synovite *A54.4†, M68.09**
- - Tendinite *A54.4†, M68.09**
- - Ténosynovite *A54.4†, M68.09**
- - Urétérite *A54.2†, N29.1**
- - Vaginite *A54.0†, N77.1**
- - Vésiculite *A54.2†, N51.8**
- - Vulvite *A54.0†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite *A54.0†, N77.1**

Gonorrhoeae ¬ Épididymo-orchite à Neisseria *A54.2†, N51.1**

Gonosomes ¬ Anomalies des *Q99.8*

Goodman
v.a. Friedman-Goodman

- ¬ Syndrome de *Q87.0*

Goodpasture ¬

- Glomérulopathie au cours de syndrome de *M31.0†, N08.5**
- Syndrome de *M31.0*

Gorge

- SAI ¬ *T17.2*
- Sans précision ¬ Lésions traumatiques superficielles de la *S10.1*
- Thorax ¬ Douleur au niveau de la *R07*
- ¬
- - Blessure de la *S19.9*
- - Contusion de la *S10.0*
- - Douleur de la *R07.0*
- - Hémorragie de la *R04.1*

Gorge *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Résultats anormaux de: prélèvements de *R84*
- - Syndrome de la langue et de la *G24.0*

Gorham ¬
- Maladie de *M89.59*
- Ostéolyse massive de *M89.59*

Gorham-Stout ¬ Maladie de *M89.59*

Gorlin
v.a. Meier-Gorlin

Gorlin-Chaudhry-Moss ¬ Syndrome de *Q87.0*

Gorlin-Goltz ¬ Syndrome de *Q85.8*

GOSHS ¬ *Q87.8*

Gottron
v.a. Arndt-Gottron
- ¬
- - Acrogérie type *E34.8*
- - Papules de *L94.4*

Goudron ¬ Cancer
- Peau dû aux *C44.9*
- Pulmonaire dû aux *C34.9*
- Vessie dû aux *C67.9*

Gougerot-Carteaud] ¬ Papillomatose confluente et réticulée [*L83*

Gougerot-Sjögren
- Atteinte pulmonaire ¬ Syndrome de *M35.0†, J99.1**
- ¬ Syndrome de *M35.0*

Goût
- Non précisés ¬ Troubles de l'odorat et du *R43.8*
- ¬ trouble
- - Associés de l'odorat et du *R43.8*
- - Odorat et du *R43*

Goutte
- Altération de la fonction rénale ¬ *M10.3*
- Cours de drépanocytose ¬ Arthropathie de la *D57.8†, M14.09**
- Idiopathique ¬ *M10.0*
- Médicamenteuse ¬ *M10.2*
- Primitive ¬ *M10.0*
- Sans précision ¬ *M10.9*
- Saturnine ¬ *M10.1*
- Secondaire ¬ Autre *M10.4*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, M14.89**
- ¬
- - *M10*
- - Épisclérite dans la *M10.99†, H19.0**
- - Néphrite dans la *M10.99†, N29.8**
- - Néphrolithiase dans la *M10.09†, N22.8**
- - Néphropathie dans la *M10.99†, N29.8**
- - Néphrosclérose dans la *M10.99†, N29.8**
- - Neuropathie des nerfs périphériques autonomes dans la *M10.09†, G63.6**
- - Psoriasis en *L40.4*

Gouttelettes ¬ Kératopathie climatique en *H18.5*

Goutteux
- Cœur ¬ Tophus *M10.09†, I43.8**
- Cours de syndrome de Lesch-Nyhan ¬ Arthropathie *E79.1†, M14.09**
- Déficit enzymatique et autres troubles héréditaires ¬ Arthropathie *M14.0**
- ¬
- - Bursite *M10.0*
- - Eczéma *M10.99†, L99.8**
- - Irite *M10.99†, H22.1**
- - Névrite *M10.09†, G63.6**

Gouttière
- Buccale (supérieure) (inférieure) ¬ *C06.1*
- Labiale (supérieure) (inférieure) ¬ *C06.1*

GPA ¬ *M31.3*

Graaf ¬ Kyste (de): follicule de De *N83.0*

Grabataire ¬ *R26.3*

GRACILE ¬ Syndrome *E88.8*

Graham
v. Khalifa-Graham

Graisses
- Industrielles ¬ Allergie aux *L23.5*
- ¬
- - Dermite irritante de contact due aux huiles et aux *L24.1*
- - Stockage des *E75.6*

Graisseux
- Alcoolique du foie ¬ Dégénérescence *K70.0*
- Foie, non classée ailleurs ¬ Dégénérescence *K76.0*
- Obstétricale ¬ Embolie *O88.8*
- Pancréas ¬ Nécrose: *K86.8*
- Rein
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ Dégénérescence *E10.20†, N29.8**
- - - 2 ¬ Dégénérescence *E11.20†, N29.8**
- - ¬ Dégénérescence *E14.20†, N29.8**
- Rotulien) [Maladie de Hoffa] ¬ Hypertrophie du coussinet *M79.4*
- Stéato-nécrose] mésentérique ¬ Nécrose *K65.8*
- Traumatique) ¬ Embolie *T79.1*
- ¬
- - Dégénérescence du cœur ou du myocarde: *I51.5*
- - Syndrome de surcharge *T80.8*

Gram
- Négatif
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies *B96.6!*
- - Multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres bactéries *U81.8!*
- - Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ Micro-organismes *U81!*

Gram *–suite*
- Négatif *–suite*
- - SAI ¬
- - - Pneumonie due à: des bactéries (aérobies) à *J15.6*
- - - Septicémie à micro-organismes *A41.5*
- - ¬
- - - Choc septique à micro-organismes *A41.58, R57.2*
- - - Pneumonie due à d'autres bactéries à *J15.6*
- - - Septicémie micro-organisme
- - - - *A41.5*
- - - - *A41.58*
- Positif
- - Causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants *B96.7!*
- - Multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres bactéries *U80.8!*
- - Non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes anaérobies *B95.91!*
- - Précis cause maladie classé chapitre ¬ micro-organisme
- - - *B95.9!*
- - - Aérobies *B95.90!*
- - Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ Micro-organismes *U80!*

Grammes ¬ Poids
- Extrêmement faible naissance Poids naissance
- - 500 à moins de 750 *P07.01*
- - 750 à moins de 1000 *P07.02*
- - Inférieur à 500 *P07.00*
- Faible naissance Poids naissance
- - 1000 à moins de 1250 *P07.10*
- - 1250 à moins de 1500 *P07.11*
- - 1500 à moins de 2500 *P07.12*

Grange ¬ Syndrome de *Q87.8*

Grant ¬ Syndrome de *Q87.5*

Granulation granulocyte syndrome
- Alder ¬ Anomalie (*D72.0*
- May-Hegglin ¬ Anomalie (*D72.0*
- Pelger-Huët ¬ Anomalie (*D72.0*

Granules plaquettaires delta ¬ Déficit isolé de stockage des *D69.1*

Granuleux
- Associée à la polyarthrite rhumatoïde) ¬ Leucémie à grands lymphocytes T *C91.7*
- Trachomateuse) ¬ Conjonctivite: *A71.1*
- ¬
- - Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*
- - Pharyngite (chronique): *J31.2*

Granulocytaire ¬
- Leucémie: *C92*

Granulocytaire ¬ *–suite*
- Sarcome
- - *C92.3*
- - *C92.30*

Granulocyte
- Neutrophiles ¬ Anomalies fonctionnelles des *D71*
- Syndrome
- - Alder ¬ Anomalie (granulation) (*D72.0*
- - May-Hegglin ¬ Anomalie (granulation) (*D72.0*
- - Pelger-Huët ¬ Anomalie (granulation) (*D72.0*

Granulocytique chronique ¬ Leucémie *C92.10*

Granulocytopénie
- Allergique ¬ *D70.6*
- Induite par des médicaments ¬ *D70.19*

Granuloma fungoides ¬ *C84.0*

Granulomateuse
- Allergique [Syndrome de Churg-Strauss] ¬ Angéite *M30.1*
- Chronique (infantile) ¬ Maladie *D71*
- Non classée ailleurs ¬ Hépatite *K75.3*
- Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Sans précision ¬ Lésion *L92.9*
- - ¬ Autres lésions *L92.8*
- ¬
- - Colite: *K50.1*
- - Dermatophytose: *B35.8*
- - Entérite *K50*
- - Gastrite: *K29.6*
- - Mastite *N61*
- - Rhinite (chronique): *J31.0*
- - Thyroïdite (à) (de): *E06.1*

Granulomatis multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Klebsiella *U81.03!*

Granulomatose
- Cellules de Langerhans ¬ *C96.6*
- Chronique à cellules de Langerhans ¬ *C96.6*
- Éosinophilique avec polyangéite ¬ *M30.1*
- Lipophagique intestinale ¬ *K90.8†*, *M14.89**
- Lymphoïde ¬ *C83.8*
- Lymphomatoïde ¬ *C83.8*
- Polyangéite
- - Atteinte pulmonaire ¬ *M31.3†*, *J99.1**
- - ¬
- - - Glomérulonéphrite au cours de *M31.3†*, *N08.5**
- - - Glomérulopathie au cours de *M31.3†*, *N08.5**
- - - Maladies respiratoires lors de *M31.3†*, *J99.1**
- Polyangite avec atteinte rénale ¬ *M31.3†*, *N08.5**
- Respiratoire nécrosante ¬ *M31.3*
- Septique
- - Chronique ¬ *D71*

Granulomatose *–suite*
- Septique *–suite*
- - Progressive ¬ *D71*
- Wegener ¬
- - *M31.3*
- - Glomérulonéphrite au cours de *M31.3†*, *N08.5**
- - Glomérulopathie au cours de *M31.3†*, *N08.5**

Granulome
- Actinique ¬ *L57.5*
- Annulaire
- - Perforant ¬ *L92.0*
- - ¬ *L92.0*
- Apical ou périapical ¬ *K04.5*
- Cellule géant
- - Central ¬ *K10.1*
- - SAI ¬ *K10.1*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger ¬ *L92.3*
- Éosinophile
- - Facial ¬ *L92.2*
- - Muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- - ¬ *C96.6*
- Éosinophilique
- - Os ¬ *C96.6*
- - Poumons ¬ *C96.6*
- Gingival pyogène ¬ *K06.8*
- Hépatique
- - Cours
- - - Bérylliose ¬ *J63.2†*, *K77.8**
- - - Sarcoïdose ¬ *D86.8†*, *K77.8**
- - ¬ Maladie toxique du foie avec: *K71.88*
- Inguinal ¬ *A58*
- Intracrânien
- - Épidural ¬ Abcès ou *G06.0*
- - Extra-dural ¬ Abcès ou *G06.0*
- - Intrarachidien
- - - Cours d'affections classées ailleurs ¬ Abcès et *G07**
- - - ¬ Abcès et *G06*
- - Sous-dural ¬ Abcès ou *G06.0*
- - ¬ Abcès et *G06.0*
- Intrarachidien
- - Épidural ¬ Abcès ou *G06.1*
- - Extra-dural ¬ Abcès ou *G06.1*
- - Sous-dural ¬ Abcès ou *G06.1*
- - ¬ Abcès et *G06.1*
- Intraspinal syphilitique ¬ *A52.1†*, *G07**
- Lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Mastoïdectomie ¬ *H95.1*
- Orbite ¬ *H05.1*
- Périphérique à cellules géantes ¬ *K06.8*

Granulome *–suite*
- Péritoine dû à des œufs d'helminthes NCA ¬ *B83.9†*, *K67.8**
- Prostatique ¬ *N42.8*
- Pulpaire ¬ *K03.3*
- Pyogène de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Pyogénique ¬ *L98.0*
- Télangiectasique de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs ¬ *M60.2*
- Tuberculeux de la colonne vertébrale ¬ *A18.0†*, *M49.09**

Granulosus
- Échinococcose kystique
- - Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus *B67.3*
- - Sans précision ¬ Infection à Echinococcus *B67.4*
- ¬
- - Infection
- - - Hépatique à Echinococcus *B67.0†*, *K77.0**
- - - Osseuse à Echinococcus *B67.2†*, *M90.29**
- - - Pulmonaire à Echinococcus *B67.1†*, *J99.8**
- - - Thyroïde à Echinococcus *B67.3†*, *E35.0**
- - Kyste hydatique du foie à Echinococcus *B67.0*

Graphique ¬ Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et *F82.1*

Graphite ¬ Fibrose (du poumon) due au *J63.3*

Grappe ¬ Céphalée en *G44.0*

Gras
- Chaîne
- - Court ¬
- - - Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- - - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- - - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- - Long ¬ Déficit
- - - 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- - - Acyl-CoA-déshydrogénase des acides *E71.3*
- - Moyenne ¬ Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- Essentiels ¬ Carence en acides *E63.0*
- Métabolisme des corps cétoniques ¬ Trouble de l'oxydation des acides *E71.3*
- ¬
- - Anomalie métabolisme acide
- - - *E71.3*
- - - Aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides *E71*

Gras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Déficit d'oxydoréduction des alcools d'acides *Q87.1*
- - Neurodégénérescence associée à l'hydroxylase des acides *G23.0*

Gräsbeck) ¬ Syndrome d'Imerslund(- *D51.1*

Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations optiques de *H47.5*

Grave
- Aigu ¬ Asthme *J46*
- E43
- - Forme intermédiaire ¬ Malnutrition protéino-énergétique *E42*
- - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition protéino-énergétique *E42*
- Marasme ¬ Malnutrition *E41*
- Sans précision ¬ Malnutrition protéino-énergétique *E43*
- ¬
- - Arriération mentale *F72*
- - Asphyxie obstétricale *P21.0*
- - Bêta-thalassémie *D56.1*
- - Compression du cerveau, hémorragie et pression cérébrale lors d'une lésion crânio-cérébrale couverte *S06.21, S01.83!*
- - Retard mental *F72*

Gravide ¬ soin maternel
- Anomalies de l'utérus *O34.5*
- Incarcération de l'utérus *O34.5*
- Prolapsus de l'utérus *O34.5*
- Rétroversion de l'utérus *O34.5*

Gravidique
- Bénin
- - Sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ Hyperémèse *O21.0*
- - ¬ Hyperémèse *O21.0*
- Commençant avant fin 20ème gestation trouble métabolique
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse *O21.1*
- - Déshydratation ¬ Hyperémèse *O21.1*
- Troubles métaboliques ¬ Hyperémèse *O21.1*
- ¬
- - Cholestase *O26.60*
- - Toxémie *O14.9*

Gravité
- G] anormales ¬ Effets de: forces de *T75.8*
- Psoriasis ¬ *L40.7!*

Grayson-Wilbrandt ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*

Greenberg ¬ Dysplasie squelettique
- Létale type *Q77.3*
- Type *Q77.3*

Greenfield [Leucodystrophie métachromatique] ¬ Maladie de *E75.2*

Greffe
- Allogénique de cellules souches ¬ Status post *Z94.80*
- Appareil
- - Génital ¬
- - - Complication mécanique d'autres prothèses, implants et *T83.4*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une *T83.6*
- - Génito-urinaire
- - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T83.9*
- - - ¬ Autres complications de prothèses, implants et *T83.8*
- - Urinaire ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une *T83.5*
- Cardiaque vasculaire
- - Sans précision ¬
- - - Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T82.9*
- - - Présence d'implant et de *Z95.9*
- - ¬
- - - Complications de prothèses, implants et *T82.8*
- - - Douleur due à prothèses, implants et *T82.8*
- - - Embolie due à prothèses, implants et *T82.8*
- - - Fibrose due à prothèses, implants et *T82.8*
- - - Hémorragie due à prothèses, implants et *T82.8*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et *T82.7*
- - - Présence implant
- - - - *Z95*
- - - - *Z95.8*
- - - Sténose due à prothèses, implants et *T82.8*
- - - Thrombose due à prothèses, implants et *T82.8*
- Cœur
- - Poumon ¬
- - - Echec et rejet d'une *T86.3*
- - - Status post *Z94.3*
- - ¬
- - - Echec et rejet d'une *T86.2*
- - - Status post *Z94.1*
- Cornée
- - Œil ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: *T86.83*
- - ¬ Status post *Z94.7*
- Foie ¬
- - Détérioration fonctionnel
- - - Aiguë d'une *T86.40*
- - - Chronique d'une *T86.41*
- - Status post *Z94.4*
- - Trouble fonctionnel échec rejet
- - - *T86.4*

Greffe *–suite*
- Foie ¬ *–suite*
- - Trouble fonctionnel échec rejet *–suite*
- - - Non précisé d'une *T86.49*
- Gastro-intestinaux ¬ Complication mécanique de prothèses, implants et *T85.5*
- Génito-urinaires ¬ Complications de prothèses, implants et *T83*
- Hétérologue ou homologue ¬ organe ou tissu remplacé par *Z94*
- Interne
- - Non classées ailleurs ¬ Autres complications dues à des prothèses, implants et *T85.88*
- - Partie du tractus gastro-intestinal ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou *T85.76*
- - SAI ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T85.9*
- - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T85.9*
- - Système
- - - Hépatobiliaire et le pancréas ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et *T85.75*
- - - Nerveux ¬
- - - - Complications dues à des prothèses, implants et *T85.81*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et *T85.72*
- - ¬
- - - Complications d'autres prothèses, implants et *T85*
- - - Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et *T85.78*
- Intestin ¬ Échec ou rejet de *T86.88*
- Oculaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses, implants et *T85.3*
- Œsophage ¬ Complication mécanique de prothèses, implants et *T85.50*
- Organe
- - Tissu
- - - Sans précision ¬ Status post *Z94.9*
- - - ¬ Status post d'autre *Z94.8*
- - Urinaire ¬ Complication mécanique d'une *T83.2*
- Orthopédique interne
- - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T84.9*
- - ¬
- - - Complication
- - - - Mécanique d'autres appareils, implants et *T84.4*
- - - - Prothèses, implants et *T84.8*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et *T84.7*
- Os ¬
- - Complication mécanique d'autres appareils, implants et *T84.3*
- - Échec ou rejet de *T86.88*
- Osseuse ¬ Status post *Z94.6*
- Pancréas ¬

Greffe *–suite*

- Pancréas ¬ *–suite*
- - Complication mécanique de prothèses, implants ou *T85.54*
- - Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: *T86.82*
- Parties du tractus gastro-intestinal supérieur ¬ Complication mécanique de prothèses, implants et *T85.51*
- Peau
- - Autologue ¬ Status post *Z94.5*
- - ¬
- - - Échec et rejet d'une *T86.5*
- - - Nécrose d'une *T86.51*
- - - Rejet/perte d'une *T86.52*
- - - Status post *Z94.5*
- - - Trouble
- - - - Circulatoires d'une *T86.50*
- - - - Fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une *T86.59*
- Poumon ¬
- - Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: *T86.81*
- - Status post *Z94.2*
- Rein
- - Non précisé ¬ Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une *T86.19*
- - ¬
- - - Détérioration fonctionnel
- - - - Aiguë d'une *T86.10*
- - - - Chronique d'une *T86.11*
- - - Rejet
- - - - Aigu d'une *T86.10*
- - - - Chronique d'une *T86.11*
- - - Status post *Z94.0*
- - - Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une *T86.1*
- Tractus gastro-intestinal inférieur ¬ Complication mécanique de prothèses, implants ou *T85.52*
- Valvulaire cardiaque ¬ Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une *T82.2*
- Vasculaire
- - Coronaires ¬ Présence d'implant et de *Z95.5*
- - ¬ Complication mécanique d'autres *T82.3*
- Voies biliaires ¬ Complication mécanique de prothèses, implants ou *T85.53*
- ¬
- - Pyélonéphrite au cours d'un rejet de *T86.9†, N16.5**
- - Reprise retardée de la fonction de la *T86.12*

Greffé

- Greffe
- - Cornée de l'œil ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus *T86.83*
- - Pancréas ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus *T86.82*

Greffé *–suite*

- Greffe *–suite*
- - Poumon ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus *T86.81*
- Lors d'hypertension ¬ Prééclampsie *O11*
- Non précisés ¬ Echec et rejet d'un organe et d'un tissu *T86.9*
- Organes ou tissus greffés ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus *T86.88*
- ¬ échec rejet organe tissu
- - *T86.8*
- - Greffés: Autres organes ou tissus *T86.88*

Greffe-contre-hôte

- Stade
- - 1 ¬ Maladie aigu
- - - Foie de rejet de *T86.01†, K77.11**
- - - Rejet
- - - - Appareil digestif *T86.01†, K93.21**
- - - - Cutané de *T86.01†, L99.11**
- - 2 ¬ Maladie aigu
- - - Foie de rejet de *T86.02†, K77.12**
- - - Rejet
- - - - Appareil digestif *T86.02†, K93.22**
- - - - Cutané de *T86.01†, L99.12**
- - 3 ¬ Maladie aigu
- - - Foie de rejet de *T86.02†, K77.13**
- - - Rejet
- - - - Appareil digestif *T86.02†, K93.23**
- - - - Cutané de *T86.01†, L99.13**
- - 4 ¬ Maladie aigu
- - - Foie de rejet de *T86.02†, K77.14**
- - - Rejet
- - - - Appareil digestif *T86.02†, K93.24**
- - - - Cutané de *T86.02†, L99.14**
- ¬ Atteinte
- - Appareil digestif dans la maladie aiguë de rejet *K93.2**
- - Foie dans la maladie aiguë de rejet *K77.1**
- - Peau dans la maladie chronique de rejet *L99.2**

Greffon

- Contre hôte
- - GVH chronique
- - - Forme
- - - - Légère ¬ Maladie du *T86.05†*
- - - - Modérée ¬ Maladie du *T86.06†*
- - - - Sévère ¬ Maladie du *T86.07†*
- - - ¬
- - - - Atteinte
- - - - - Foie dans le cadre de la maladie du *K77.2**
- - - - - Muqueuse buccale dans le cadre de la maladie du *K93.4**
- - - - - Œil et de ses annexes dans le cadre de la maladie du *H58.2**
- - - - - Pulmonaire dans le cadre de la maladie du *J99.2**

Greffon *–suite*

- Contre hôte *–suite*
- - GVH chronique *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Atteinte *–suite*
- - - - - Tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du *M36.5**
- - - - - Voies digestives dans le cadre de la maladie du *K93.3**
- - - - Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du *N77.2**
- - Sans précision ¬ Maladie chronique du *T86.09*
- - Stade
- - - I et II ¬ Maladie aiguë du *T86.01†*
- - - III et IV ¬ Maladie aiguë du *T86.02†*
- - ¬ Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiétiques et maladie du *T86.0*
- Transplantation de cellules souches ¬ Rejet de *T86.00*

Greig ¬ Syndrome de céphalopolysyndactylie de *Q75.2*

Greither ¬ Maladie de *Q82.8*

Grêle

- Aigu(ë) ¬ Ischémie de l'intestin *K55.0*
- Côlon
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.43*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.41*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.42*
- - - - Diverticulose du *K57.40*
- - - ¬ Diverticulose de l'intestin *K57.4*
- - SAI ¬ Diverticulose de l'intestin *K57.5*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.53*
- - - - Diverticulose du *K57.51*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.52*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.50*
- Duodénum ¬ Lésion traumatique de l'intestin *S36.41*
- Gros intestin ¬ Maladie de Crohn de l'intestin *K50.82*
- Hémorragie ¬ Angiodysplasie de l'intestin *K55.32*
- Intestin
- - Grêle, partie non précisée ¬ Lésion traumatique de l'intestin *S36.40*
- - SAI ¬ obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin *Q41*
- Non précisées ¬ Tumeur bénigne: Parties de l'intestin *D13.3*
- Partie
- - Non précisée ¬ Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin *S36.40*

Grêle *–suite*
- Partie *–suite*
- - Parties et parties multiples de l'intestin grêle ¬ Lésion traumatique de l'intestin *S36.49*
- Perforation abcès
- - Saignement ¬
- - - Diverticulite de l'intestin *K57.03*
- - - Diverticulose de l'intestin *K57.01*
- - Sans indication saignement ¬
- - - Diverticulite de l'intestin *K57.02*
- - - Diverticulose de l'intestin *K57.00*
- - ¬ Diverticulose de l'intestin *K57.0*
- Péritonite ¬ Diverticulose
- - Côlon et de l'intestin *K57.4*
- - Intestin *K57.0*
- SAI ¬ Diverticulose de l'intestin *K57.1*
- Sans
- - Indication d'une hémorragie ¬ Angiodysplasie de l'intestin *K55.31*
- - Perforation abcès
- - - Indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.12*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.10*
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.13*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.11*
- - - ¬ Diverticulose
- - - - Côlon et de l'intestin *K57.5*
- - - - Intestin *K57.1*
- - Précision
- - - Localisation ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin *Q41.9*
- - - ¬ Tumeur maligne: Intestin *C17.9*
- Type méditerranéen ¬ Maladie immunoproliférative de l'intestin *C88.3*
- ¬
- - Absence atrésie sténose congénital
- - - Intestin *Q41*
- - - Localisations précisées de l'intestin *Q41.8*
- - Adénocarcinome de l'intestin *C17.9*
- - Amylose de l'intestin *E85.4†, K93.8**
- - Angiodysplasie de l'intestin *K55.3*
- - Carcinome épidermoïde de l'intestin *C17.9*
- - Corps étranger dans l'intestin *T18.3*
- - Diverticule de l'intestin (côlon) (*K57*
- - Diverticulite de l'intestin (côlon) (*K57*
- - Diverticulose de l'intestin (côlon) (*K57*
- - Duplication de l'intestin *Q43.40*
- - Fistule du vagin à l'intestin *N82.2*
- - Léiomyosarcome de l'intestin *C17.9*
- - Lésion traumatique intestin
- - - *S36.4*
- - - Grêle: Autres parties et parties multiples de l'intestin *S36.49*
- - Maladie

Grêle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Crohn de l'intestin *K50.0*
- - - Immunoproliférative de l'intestin *C88.3*
- - Polype de l'intestin *K63.8*
- - Syphilis de l'intestin *A52.7†, K93.8**
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Intestin *D37.2*
- - - Malign
- - - - Intestin *C17*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l'intestin *C17.8*
- - - - Secondaire de l'intestin *C78.4*
- - - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l'intestin *C17.9*
- - Ulcère primaire de l'intestin *K63.3*

Grêliques ¬ Varices *I86.80*

Grenouillette ¬ *K11.6*

Griffe
- Acquis(e) ¬ Main et pied bot(e) ou en *M21.5*
- Chat ¬ Maladie des *A28.1*

Griggs
v. Markesbery-Griggs

Grillagée en réseau ¬ Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*

Grincement des dents (bruxisme) psychogène ¬ *F45.8*

Grippal
- Influenza ¬
- - Encéphalite *J11.8†, G05.1**
- - Otite *J11.8†, H67.1**
- Sans précision virus spécifique non identifié ¬
- - Encéphalopathie *J11.8*
- - Epanchement pleural *J11.1*
- - Gastroentérite *J11.8*
- - Laryngite *J11.1*
- - Myocardite (aiguë) *J11.8*
- - Pharyngite *J11.1*
- Virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Myocardite *J09, U69.21!*
- - Influenza saisonnier identifié ¬
- - - Broncho)pneumopathie *J10.0*
- - - Encéphalopathie *J10.8*
- - - Gastroentérite *J10.8*
- - - Grippe
- - - - Épanchement pleural *J10.1*
- - - - Laryngite *J10.1*
- - - - Pharyngite *J10.1*
- - - Myocardite (aiguë) *J10.8*
- Voies respiratoires supérieures sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ Infection *J11.1*
- ¬

Grippal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Bronchopneumonie due à des virus autres que des virus *J12*
- - Infection *J06.9*

Grippe
- Asiatique influenza virus
- - Grippe
- - - Aviaire identifié ¬ *J09, U69.21!*
- - - Porcine identifié ¬ *J09, U69.20!*
- - Influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- Aviaire
- - Grippe porcine ¬
- - - Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la *J10.8†, G05.1**
- - - Encéphalopathie lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la *J10.8†, G94.3**
- - - Grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ Grippe [Influenza] avec otite, virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la *J10.8†, H67.1**
- - - Influenza, virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la *J10.1*
- - - Myocardite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la *J10.8†, I41.1**
- - - Polio-encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la *J10.8†, G05.1**
- - Identification du virus ¬ *J09, U69.21!*
- - Identifié ¬
- - - Grippe
- - - - Asiatique [influenza], virus de *J09, U69.21!*
- - - - Influenza
- - - - - Encéphalite, virus de la *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - - Entérite, virus de la *J09, U69.21!*
- - - - - Épanchement pleural, virus de la *J09, U69.21!*
- - - - - Gastroentérite, virus de la *J09, U69.21!*
- - - - - Infection des voies respiratoires supérieures, virus de la *J09, U69.21!*
- - - - - Laryngite, virus de la *J09, U69.21!*
- - - - - Méningisme, virus de la *J09, U69.21!*
- - - - - Otite moyenne, virus de la *J09†, H67.1*, U69.21!*
- - - - - Pharyngite, virus de la *J09, U69.21!*
- - - - - Pneumonie, virus de la *J09, U69.21!*
- - - - - Polio-encéphalite, virus de la *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - - Virus de la *J09, U69.21!*
- - - Myocardite grippale par virus de la *J09, U69.21!*
- - Porcine ¬

Grippe *–suite*

- Aviaire *–suite*

- - Porcine ¬ *–suite*

- - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de *J10.0*

- - - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.8*

- - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*

- - - Gastroentérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.8*

- - - Grippe

- - - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*

- - - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*

- - - - Influenza

- - - - - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*

- - - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*

- - - - - Laryngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*

- - - - - Pharyngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*

- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*

- - - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*

- - - Infection

- - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*

- - - - Virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*

- - - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.0*

- - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de *J10.8*

- - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.0*

- - Zoonotique pandémique identifié ¬ Grippe Influenza

- - - Encéphalite, virus de la *J09†, G05.1**

- - - Encéphalopathie, virus de la *J09†, G94.3**

- - - Myocardite, virus de la *J09†, I41.1**

- - - Otite moyenne, virus de la *J09†, H67.1**

- - - Polio-encéphalite, virus de la *J09†, G05.1**

- - ¬ Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [*U69.21!*

- Épanchement pleural grippal à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*

Grippe *–suite*

- Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*

- Influenza

- - Encéphalite

- - - Virus grippe aviaire

- - - - Identifié ¬ *J09†, G05.1*, U69.21!*

- - - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09†, G05.1**

- - - ¬ *J11.8†, G05.1**

- - Encéphalopathie

- - - Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09†, G94.3**

- - - ¬ *J11.8†, G94.3**

- - Entérite virus

- - - Grippe aviaire identifié ¬ *J09, U69.21!*

- - - Influenza] avec entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Épanchement pleural virus

- - - Grippe aviaire identifié ¬ *J09, U69.21!*

- - - Influenza] avec épanchement pleural, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Gastroentérite virus

- - - Grippe aviaire identifié ¬ *J09, U69.21!*

- - - Influenza] avec Gastroentérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- - Infection

- - - Respiratoire supérieure, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - - Voie

- - - - Aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- - - - Respiratoires supérieures, virus de la grippe aviaire identifié ¬ *J09, U69.21!*

- - Laryngite virus

- - - Grippe aviaire identifié ¬ *J09, U69.21!*

- - - Influenza

- - - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- - - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Méningisme virus

- - - Grippe aviaire identifié ¬ *J09, U69.21!*

- - - Influenza] avec méningisme, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Myocardite virus grippe

- - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09†, I41.1**

- - - Porcine identifié ¬ *J09, U69.20!*

Grippe *–suite*

- Influenza *–suite*

- - Otite

- - - Moyenne virus grippe aviaire

- - - - Identifié ¬ *J09†, H67.1*, U69.21!*

- - - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09†, H67.1**

- - - Virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ *J10.8†, H67.1**

- - Pharyngite virus

- - - Grippe aviaire identifié ¬ *J09, U69.21!*

- - - Influenza

- - - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- - - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Pneumonie virus

- - - Grippe aviaire identifié ¬ *J09, U69.21!*

- - - Influenza] avec pneumonie, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Polio-encéphalite virus grippe aviaire

- - - Identifié ¬ *J09†, G05.1*, U69.21!*

- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09†, G05.1**

- - Virus

- - - Grippe

- - - - Aviaire identifié ¬ *J09, U69.21!*

- - - - Saisonnier

- - - - - Identifié ¬ Encéphalite lors de *J10.8†, G05.1**

- - - - - Identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ Encéphalite lors de *J10.8†, G05.1**

- - - - - Identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ Encéphalopathie lors de *J10.8†, G94.3**

- - - - - Identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ Myocardite lors de *J10.8†, I41.1**

- - - - - Identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ Polio-encéphalite lors de *J10.8†, G05.1**

- - - Influenza

- - - - B ou C identifié ¬ *J10.8*

- - - - Saisonnier

- - - - - Identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Bronchopneumonie au cours de *J10.0*

- - - - - Identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Méningisme dans le cadre de la *J10.8*

- - - - - Identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- - - - - Identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Entérite au cours de la *J10.8*

- - - - - Identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Épanchement pleural au cours de la *J10.1*

Grippe *–suite*
- Influenza *–suite*
- - Virus *–suite*
- - - Influenza *–suite*
- - - - Saisonnier *–suite*
- - - - - Identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Gastroentérite au cours de la *J10.8*
- - - - - Identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Pneumonie au cours de la *J10.0*
- - ¬
- - - Myocardite lors de *J11.8†, I41.1**
- - - Otite moyenne nécrosante aiguë lors de *J11.8†, H67.1**
- - - Polio-encéphalite lors de *J11.8†, G05.1**
- Laryngite grippale à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- Manifestation
- - Respiratoire virus
- - - Influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- - - Non identifié ¬ *J11.1*
- - Virus
- - - Influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- - - Non identifié ¬ *J11.8*
- Pharyngite grippale à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- Pneumonie virus
- - Influenza saisonnière identifié ¬ *J10.0*
- - Non identifié ¬ *J11.0*
- Porcine
- - Identifié ¬ Grippe
- - - Asiatique [influenza], virus de *J09, U69.20!*
- - - Influenza] avec myocardite, virus de *J09, U69.20!*
- - ¬
- - - Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la *J10.8†, G05.1**
- - - Encéphalopathie lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la *J10.8†, G94.3**
- - - Grippe porcine ¬ Grippe [Influenza] avec otite, virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la *J10.8†, H67.1**
- - - Influenza
- - - - A/H1N1, pandémie de 2009 [*U69.20!*
- - - - Virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la *J10.1*
- - - Myocardite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la *J10.8†, I41.1**
- - - Polio-encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la *J10.8†, G05.1**
- SAI ¬ *J11.1*

Grippe *–suite*
- Saisonnier identifié
- - Exception virus grippe aviaire grippe porcine ¬
- - - Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la *J10.8†, G05.1**
- - - Encéphalopathie lors de grippe [Influenza], virus de la *J10.8†, G94.3**
- - - Grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ Grippe [Influenza] avec otite, virus de la *J10.8†, H67.1**
- - - Influenza, virus de la *J10.1*
- - - Myocardite lors de grippe [Influenza], virus de la *J10.8†, I41.1**
- - - Polio-encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la *J10.8†, G05.1**
- - ¬ Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la *J10.8†, G05.1**
- Sans mention d'identification d'un virus spécifique ¬ *J11*
- Virale sans mention d'identification d'un virus spécifique ¬ *J11*
- Virus
- - Influenza
- - - B ou C identifié ¬ *J10*
- - - Saisonnier identifié
- - - - Sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la *J10.1*
- - - - ¬ *J10.1*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Non identifié ¬ *J11*
- Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z25.1*

Gris
- Administration de chloramphénicol au nouveau-né ¬ Syndrome *P93*
- Central
- - Sans précision ¬ Maladie dégénérative des noyaux *G23.9*
- - ¬
- - - Calcification des noyaux *G23.8*
- - - Maladie dégénératif
- - - - Noyaux *G23*
- - - - Précisées des noyaux *G23.8*
- Prématurément) ¬ Cheveux *L67.1*
- ¬ Syndrome de(s): plaquettes *D69.1*

Griscelli ¬ Syndrome de *E70.3*

Grosse atteinte du tissu cérébral ¬ *S06.2*

Grossesse
- 5
- - 13 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.1!*
- - Révolues ¬ Durée de la *O09.0!*
- 14e semaine à 19 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.2!*
- 20e semaine à 25 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.3!*

Grossesse *–suite*
- 26e semaine à 33 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.4!*
- 34e semaine à 36 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.5!*
- 37e semaine à 41 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.6!*
- Abdominal
- - Fœtus viable ¬ Soins maternels pour *O36.7*
- - ¬
- - - *O00.0*
- - - *P01.4*
- Accouchement puerpéralité
- - Sans précision ¬
- - - Hypertension préexistante compliquant la *O10.9*
- - - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la *O98.9*
- - ¬
- - - Affections hépatiques au cours de la *O26.6*
- - - Anémie compliquant la *O99.0*
- - - Antécédents personnels de complications de la *Z87.5*
- - - Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la *O10.3*
- - - Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la *O10.1*
- - - Embolies de la *O88*
- - - Gonococcie compliquant la *O98.2*
- - - Hépatite virale compliquant la *O98.4*
- - - Hypertension
- - - - Essentielle préexistante compliquant la *O10.0*
- - - - Préexistante compliquant la *O10*
- - - - Secondaire préexistante compliquant la *O10.4*
- - - Maladie
- - - - Affections précisées compliquant la *O99.8*
- - - - Appareil
- - - - - Circulatoire compliquant la *O99.4*
- - - - - Digestif compliquant la *O99.6*
- - - - - Respiratoire compliquant la *O99.5*
- - - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la *O98.3*
- - - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la *O99.2*
- - - - Infectieux
- - - - - Parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la *O98*
- - - - - Parasitaires de la mère compliquant la *O98.8*
- - - - Mère classées ailleurs, mais compliquant la *O99*
- - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la *O99.7*
- - - - Protozoaires compliquant la *O98.6*

Grossesse *–suite*
- Accouchement puerpéralité *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Maladie *–suite*
- - - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la *O99.1*
- - - - Virales compliquant la *O98.5*
- - - - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la *O98.7*
- - - Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la *O10.2*
- - - Séquelles de complications de la *O94*
- - - Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la *O26.7*
- - - Syphilis compliquant la *O98.1*
- - - Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la *O99.3*
- - - Tuberculose compliquant la *O98.0*
- Actuelle ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la *P00*
- Aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux ¬ les états mentionnés compliquant la *O98*
- Angulaire ¬ *O00.8*
- Antécédent
- - Avortement ¬ Surveillance d'une *Z35.1*
- - Môle
- - - Hydatiforme ¬ Surveillance d'une *Z35.1*
- - - Vésiculaire ¬ Surveillance d'une *Z35.1*
- - Mort
- - - Néonatales ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - - Nés ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - Obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - Soins prénatals insuffisants ¬ Surveillance d'une *Z35.3*
- - Stérilité ¬ Surveillance d'une *Z35.0*
- Avortement
- - Plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la *O31.1*
- - Répétition ¬ Soins au cours de la *O26.2*
- Cervicale ¬ *O00.8*
- Compliquée par une anomalie d'insertion placentaire ¬ *O44.00*
- Constatée fortuitement ¬ *Z33!*
- Diabète sucré préexistant
- - Lié à la malnutrition ¬ Diabète sucré au cours de la *O24.2*
- - Sans précision ¬ Diabète sucré au cours de la *O24.3*
- - Type
- - - 1 ¬ Diabète sucré au cours de la *O24.0*
- - - 2 ¬ Diabète sucré au cours de la *O24.1*
- Dissimulée ¬ *Z35.3*
- Dysfonctionnement symphysaire ¬ *O26.7*
- Extra-utérin
- - Molaire
- - - Sans précision ¬ Complication consécutive à un avortement, une *O08.9*

Grossesse *–suite*
- Extra-utérin *–suite*
- - Molaire *–suite*
- - - ¬
- - - - Choc consécutif à un avortement, une *O08.3*
- - - - Complication
- - - - - Consécutives à un avortement, une *O08*
- - - - - Consécutives à un avortement, une *O08.8*
- - - - - Veineuses consécutives à un avortement, une *O08.7*
- - - - Embolie consécutive à un avortement, une *O08.2*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une *O08.1*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une *O08.0*
- - - - Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une *O08.4*
- - - - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une *O08.6*
- - - - Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une *O08.5*
- - Sans précision ¬ *O00.9*
- - ¬
- - - *O00*
- - - *O00.8*
- - - Choc septique après *O08.0, R57.2*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.4*
- - - Rupture de *O00*
- Gémellaire ¬ *P01.5*
- Haut risque
- - Sans précision ¬ Surveillance de *Z35.9*
- - ¬ Surveillance
- - - *Z35*
- - - *Z35.8*
- Interstitielle ¬ *O00.8*
- Intraligamentaire ¬ *O00.8*
- Légale ¬ interruption de *O04*
- Mère
- - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la *P01.9*
- - ¬ Fœtus nouveau-né affecté complication
- - - *P01*
- - - *P01.8*
- Molaire ¬ Choc septique après *O08.0, R57.2*
- Mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la *O31.2*
- Multiparité élevée ¬ Surveillance de *Z35.4*
- Multiple
- - Présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus ¬ Soins maternels pour *O32.5*
- - Sans précision ¬ *O30.9*
- - ¬
- - - *O30*

Grossesse *–suite*
- Multiple *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - *O30.8*
- - - Complication spécifique
- - - - *O31*
- - - - *O31.8*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.5*
- Naissance et de la perpuéralité ¬ Autres affections hépatiques au cours de la *O26.68*
- Non
- - Désirée ¬ Difficultés liées à une *Z64.0*
- - Précisée ¬ Durée de la *O09.9!*
- Normale ¬ Surveillance d'une *Z34*
- Origine de soins obstétricaux ¬ les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la *O98*
- Ovarienne ¬ *O00.2*
- Plus de 41 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.7!*
- Prééclampsie surajoutée ¬ Hypertension essentielle préexistante au cours de la *O11*
- Prolongée ¬ *O48*
- Puerpéralité lactation ¬ état mentionné cours
- - *O91*
- - *O92*
- Risques liée à des problèmes sociaux ¬ *Z35.8*
- SAI ¬
- - *Z33!*
- - Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la *O23.9*
- Sans
- - Hypertension ¬ Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la *O12*
- - Précision ¬
- - - Affection liée à la *O26.9*
- - - Complication
- - - - Anesthésie au cours de la *O29.9*
- - - - Veineuse de la *O22.9*
- - - Diabète sucré au cours de la *O24.9*
- - - Hémorragie du début de la *O20.9*
- - - Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la *O23.9*
- - - Vomissements de la *O21.9*
- Source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né ¬ Interruption de la *P96.4*
- Terme ¬ incapacité de mener une *N97*
- Thérapeutique ¬ interruption de *O04*
- Travail accouchement
- - Puerpéralité ¬ Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la *O95*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la *P04.0*
- Trigémellaire ¬ *P01.5*
- Trompe de Fallope ¬ *O00.1*

Grossesse *–suite*
- Tubaire ¬ *O00.1*
- ¬
- - Affections précisées liées à la *O26.8*
- - Anomalie du tissu pelvien lors de la *O34.9*
- - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la *O29.2*
- - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.1*
- - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la *O29.4*
- - Cholestase (intrahépatique) au cours de la *O26.60*
- - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Complication
- - - Anesthésie cours
- - - - *O29*
- - - - *O29.8*
- - - Cardiaques d'une anesthésie au cours de la *O29.1*
- - - Impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la *O29.2*
- - - Maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la *O29*
- - - Pulmonaires d'une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la *O29.5*
- - - Veineux
- - - - *O22.8*
- - - - Hémorroïdes au cours de la *O22*
- - Diabète sucré
- - - Cours de la *O24*
- - - Survenant au cours de la *O24.4*
- - Durée de la *O09!*
- - Echec ou difficulté d'intubation au cours de la *O29.6*
- - Eclampsie au cours de la *O15.0*
- - Éruption polymorphe de la *O26.88*
- - Examen et test de *Z32*
- - Faible prise de poids au cours de la *O26.1*
- - Hémorragie début
- - - *O20*
- - - *O20.8*
- - Hémorroïdes au cours de la *O22.4*
- - Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la *O13*
- - Infection
- - - Appareil
- - - - Génital au cours de la *O23.5*
- - - - Génito-urinaire au cours de la *O23*
- - - Non précisée de l'appareil urinaire au cours de la *O23.4*
- - - Parties de l'appareil urinaire au cours de la *O23.3*

Grossesse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Infection *–suite*
- - - Rénales au cours de la *O23.0*
- - - Urétrales au cours de la *O23.2*
- - - Vésicales au cours de la *O23.1*
- - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.1*
- - Interruption de *Z30.3*
- - Lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris interruption
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- - Maladies non précisées associées à la *O26.88*
- - Malformation des organes pelviens lors de la *O34.9*
- - Malnutrition au cours de la *O25*
- - Néphrite pendant la *O26.81*
- - Néphropathie liée à la *O26.81*
- - Névrite périphérique pendant la *O26.83*
- - Nouveau-né affecté par une salpingo-oophorite de la mère pendant la *P00.8*
- - Phlébothrombose profonde au cours de la *O22.3*
- - Pneumonie
- - - Aspiration dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - - Chimique d'aspiration dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Prise de poids excessive au cours de la *O26.0*
- - Prurit pendant la *O26.88*
- - Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la *O29.3*
- - Rétention d'un stérilet au cours d'une *O26.3*
- - Rupture de la trompe (de Fallope), due à la *O00.1*
- - Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la *O26*
- - Stéatose hépatique aiguë de la *O26.68*
- - Syndrome
- - - Anaphylactoïde pendant la *O88.1*
- - - Canal carpien pendant la *O26.82*
- - - Enfant dont la mère a un diabète de la *P70.0*
- - - Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Thrombophlébite
- - - Membres inférieurs au cours de la *O22.2*
- - - Superficielle au cours de la *O22.2*
- - Thrombose
- - - Sinus veineux cérébral au cours de la *O22.5*
- - - Veineuse cérébrale au cours de la *O22.5*

Grossesse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Varice
- - - Membres inférieurs au cours de la *O22.0*
- - - Organes génitaux au cours de la *O22.1*
- - - Périnée, de vagin et de vulve au cours de la *O22.1*
- - - SAI au cours de la *O22.0*
- - Vomissements
- - - Compliquant la *O21.8*
- - - Incoercibles au cours de la *O21*
- - - Maladies classées ailleurs, compliquant la *O21.8*
- - - Tardifs de la *O21.2*

Grosseur dans la glande mammaire ¬ *R92*

Grouchy de type I ¬ Syndrome de *Q93.5*

Groupe
- A
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques, *B95.0!*
- - Shiga-Kruse] ¬ Infection à Shigella du *A03.0*
- - ¬
- - - Hyperlipidémie, *E78.0*
- - - Septicémie à streptocoques, *A40.0*
- Acinetobacter baumannii multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.11!*
- - 3MRGN ¬ *U81.31!*
- - 4MRGN ¬ *U81.51!*
- C
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques, *B95.41!*
- - ¬
- - - Hyperlipidémie, *E78.2*
- - - Infection à Shigella du *A03.2*
- Cétones ¬ Solvants du *L24.2*
- Chloramphénicol ¬ Intoxication: *T36.2*
- Composés chlorés ¬ Solvants du *L24.2*
- Cyclohexane ¬ Solvants du *L24.2*
- D
- - Entérocoques
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques de *B95.2!*
- - - ¬ Septicémie à streptocoques, *A40.2*
- - ¬
- - - Hyperlipidémie, *E78.3*
- - - Infection à Shigella du *A03.3*
- Ester ¬ Solvants du *L24.2*
- G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques, *B95.42!*
- Glycol ¬ Solvants du *L24.2*
- HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ *B96.3!*
- Hydrocarbures ¬ Solvants du *L24.2*
- Indéterminé (I) ¬ *A30.0*

Groupe *–suite*
- Sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ Réaction à une incompatibilité de *T80.3*
- ¬
- - Vaccination non effectué raison pression
- - - *Z28*
- - - *Z53*
- - Vols en *F91.2*

Grover] ¬ Dermatose acantholytique transitoire [*L11.1*

Grubben-de Cock-Borghgraef ¬ Syndrome de *Q87.8*

Gruber ¬ Syndrome de Meckel- *Q61.9*

Grütz
v. Bürger-Grütz

GSD
- Déficit
- - Aldolase A musculaire ¬ *E74.0*
- - Enzyme
- - - Branchante
- - - - Forme neuromusculaire périnatale fatale ¬ *E74.0*
- - - - ¬ *E74.0*
- - - Débranchante ¬ *E74.0*
- - GLUT2 ¬ *E74.0*
- - Glycogène synthase hépatique ¬ *E74.0*
- - Lactate déshydrogénase ¬ *E74.4*
- - Phosphoglucomutase ¬ *E74.0*
- - Phosphoglycérate kinase ¬ *E74.0*
- - Phosphorylase kinase
- - - Musculaire ¬ *E74.0*
- - - ¬ *E74.0*
- Type
- - 0a ¬ *E74.0*
- - 0b ¬ *E74.0*
- - 1 ¬ *E74.0*
- - 1b ¬ *E74.0*
- - 2 ¬ *E74.0*
- - 3 ¬ *E74.0*
- - 4
- - - Forme neuromusculaire
- - - - Congénitale ¬ *E74.0*
- - - - Périnatale fatale ¬ *E74.0*
- - - ¬ *E74.0*
- - 5 ¬ *E74.0*
- - 6 ¬ *E74.0*
- - 7 ¬ *E74.0*
- - 9 ¬ *E74.0*
- - 9B ¬ *E74.0*
- - 9D ¬ *E74.0*
- - 9E ¬ *E74.0*
- - 12 ¬ *E74.0*
- ¬ *E74.0*

GSDX type 13 ¬ *E74.0*

GTP cyclohydrolase I ¬ Déficit en *E70.1*

GTPCH ¬ Déficit en *E70.1*

Guadalajara type
- 1 ¬ Camptodactylie de *Q87.1*
- 2 ¬ Camptodactylie de *Q87.1*

Guam-Parkinson ¬ Complexe de démence de *G21.8†, F02.8**

Guanéthidine ¬ *T46.5*

Guanine phosphoribosyltransférase
- Grade IV ¬ Déficit en hypoxanthine *E79.1*
- ¬ Déficit partiel en hypoxanthine *E79.8*

Guanylate cyclase 2C ¬ Iléus méconial par déficit en *P76.0*

Gubler
v. Millard-Gubler-Foville

Guéri ¬ Infarctus du myocarde: *I25.2*

Guérison
- Osseux retardé
- - Fusion ou arthrodèse ¬ *M96.82*
- - Ostéotomie ¬ *M96.82*
- Retardé ¬ *T89.03*
- Spontanée ¬ Bébé collodion à *Q80.2*

Guerre
- Hostilités ¬ Exposition à une catastrophe, une *Z65*
- ¬ lésion fait
- - *Y36!*
- - *Y36.9!*

Guillain-Barré ¬
- Syndrome de *G61.0*
- Variant
- - Crânien du syndrome de *G61.0*
- - Paraparétique du syndrome de *G61.0*
- - Pharyngo-cervico-brachial du syndrome de *G61.0*

Guillain-Barré-Strohl ¬ Syndrome de *G61.0*

Guillermo
v. Nestor-Guillermo

Guinée ¬ Infection [dracontiase] (à): ver de *B72*

GUNA [gingivite ulcéro-nécrotique aiguë] ¬ *A69.1*

Gunn ¬ Phénomène de Marcus *Q07.8*

Günther ¬ Maladie de *E80.0*

Gupta
v. Van den Ende-Gupta

Gurrieri-Sammito-Bellussi ¬ Syndrome de *Q87.5*

Guttata modéré à sévère ¬ Psoriasis *L40.4, L40.70!*

GVH
- Chronique
- - Forme
- - - Légère ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (*T86.05†*
- - - Modérée ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (*T86.06†*
- - - Sévère ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (*T86.07†*
- - Muqueux buccal stade

GVH *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Muqueux buccal stade *–suite*
- - - 1 ¬ Maladie *T86.05†, K93.41**
- - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, K93.42**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, K93.43**
- - Peau stade
- - - 1 ¬ Maladie *T86.05†, L99.21**
- - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, L99.22**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, L99.23**
- - Poumon stade
- - - 1 ¬ Maladie *T86.06†, J99.21**
- - - 2 ¬ Maladie *T86.07†, J99.22**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, J99.23**
- - Tissu conjonctif stade
- - - 1 ¬ Maladie *T86.05†, M36.51**
- - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, M36.52**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, M36.53**
- - Voie digestif stade
- - - 1 ¬ Maladie *T86.05†, K93.31**
- - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, K93.32**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, K93.33**
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - Foie dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*K77.2**
- - - - Muqueuse buccale dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*K93.4**
- - - - Œil et de ses annexes dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*H58.2**
- - - - Pulmonaire dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*J99.2**
- - - - Tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*M36.5**
- - - - Voies digestives dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*K93.3**
- - - Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*N77.2**
- Hépatique chronique stade
- - 1 ¬ Maladie *T86.05†, K77.21**
- - 2 ¬ Maladie *T86.06†, K77.22**
- - 3 ¬ Maladie *T86.07†, K77.23**
- Oculaire chronique stade
- - 1 ¬ Maladie *T86.05†, H58.21**
- - 2 ¬ Maladie *T86.06†, H58.22**
- - 3 ¬ Maladie *T86.07†, H58.23**
- Vulvo-vaginal chronique stade
- - 1 ¬ Maladie *T86.05†, N77.21**
- - 2 ¬ Maladie *T86.06†, N77.22**
- - 3 ¬ Maladie *T86.07†, N77.23**

Gynécologique (de routine) (général) ¬ Examen *Z01.4*

Gynécomastie ¬ *N62*

Gyrata

- Chorioideae ¬ Atrophia *H31.2*
- Primitif non essentiel ¬ Cutis verticis *Q82.8*

H. influenzae
v. Haemophilus influenzae

H. pylori
v. Helicobacter pylori

Haas] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête de l'humérus [*M92.0*

Haberland ¬ Syndrome de *E88.29*

Habermann] ¬ Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha- *L41.0*

Habitudes

- Alimentaires inadéquats ¬ Régime et *Z72.8*
- Impliquant la langue, les lèvres ou les doigts ¬ Malocclusion due à: *K07.5*
- Impulsions
- - Sans précision ¬ Trouble des *F63.9*
- - ¬ Autres troubles des *F63.8*

HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe *B96.3!*

Haddad ¬ Syndrome de *G47.30*

Hadziselimovic ¬ Syndrome

- *Q87.8*
- Microcéphalie-facio-cardio-squelettique, type *Q87.8*

Haemaphysalis longicornis ¬

- Fièvre à tiques *A93.8*
- Syndrome de fièvre avec thrombocytopénie sévère à *A93.8*

Haematobium [schistosomiase urinaire] ¬ Schistosomiase due à Schistosoma *B65.0*

Haemophilus

- Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [*B96.3!*
- Aegyptius ¬ Infection généralisée à *A48.4*
- Influenza
- - Influenzae [H. influenzae] ¬ *B96.3!*
- - Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.3!*
- - Siège non précisé ¬ Infection à *A49.2*
- - Type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, *Z27.8*
- - ¬
- - - Arthrite à *M00.89, B96.3!*
- - - Bronchite aiguë due à *J20.1*
- - - Bronchopneumonie à *J14*
- - - Choc septique à *A41.3, R57.2*
- - - Colpite atrophique à *N95.2, B96.3!*
- - - Laryngite à *J04.0, B96.3!*
- - - Laryngotrachéite à *J04.2, B96.3!*
- - - Méningite à *G00.0*
- - - Méningo-encéphalite à *G04.2, B96.3!*
- - - Méningo-encéphalomyélite à *G04.2, B96.3!*
- - - Pneumonie
- - - - *J14*
- - - - Congénitale à *P23.6, B96.3!*
- - - Septicémie à *A41.3*

Haemorrhagicum] ¬ Sarcome de Kaposi [Sarcoma idiopathicum multiplex *C46*

Hagberg-Santavuori ¬ Maladie de *E75.4*

Hageman ¬

- Carence en facteur *D68.25*
- Déficience du facteur *D68.25*
- Maladie d' *D68.25*

Haglund

- I ¬ Syndrome de *M77.3*
- ¬
- - Exostose de *M77.3*
- - Ostéochondrite (juvénile) de: apophyse tibiale externe [*M92.6*

Hailey

- Hailey-Hailey] ¬ Pemphigus bénin familial [*Q82.8*
- ¬ Pemphigus bénin familial [Hailey- *Q82.8*

Haim-Munk ¬ Syndrome de *Q82.8*

Hairy cell leukemia ¬ *C91.40*

Hakola
v. Nasu-Hakola

Halal ¬ Dysplasie ectodermique hidrotique type *Q82.8*

Halasz ¬ Syndrome de *Q26.8*

Haleine fétide ¬ *R19.6*

Hall
v. Pallister-Hall
v. Sheldon-Hall

Hallervorden-Spatz ¬ Maladie de *G23.0*

Hall-Hittner ¬ Syndrome de *Q87.8*

Hallopeau ¬ Acrodermatite continue de *L40.2*

Hall-Riggs ¬ Syndrome de *Q87.8*

Hallucinations

- Auditives ¬ *R44.0*
- Sans précision ¬ *R44.3*
- Visuelles ¬ *R44.1*
- ¬ Autres *R44.2*

Hallucinatoire

- Chronique ¬ Psychose *F28*
- Organique
- - Non alcoolique) ¬ État *F06.0*
- - ¬ État *F06.0*
- Origine organique ¬ Etats délirants et états délirants et *F06.2*

Hallucinogène

- Sang ¬ Présence d' *R78.3*
- Sans précision ¬ Intoxication: Psychodysleptiques [*T40.9*
- ¬
- - Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [*T40*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d' *F16*

Hallux

- Rigidus ¬ *M20.2*
- Valgus (acquis) ¬ *M20.1*
- Varus
- - Congénital ¬ *Q66.3*
- - ¬ *M20.3*

Halogéné

- Hydrocarbures
- - Aliphatiques
- - - Aromatiques
- - - - Sans précision ¬ Effet toxique: Dérivé *T53.9*
- - - - ¬ Effet toxique de dérivés *T53*
- - - ¬ Effet toxique: Autres dérivés *T53.6*
- - Aromatiques ¬ Effet toxique: Autres dérivés *T53.7*
- ¬
- - Effet toxique: Insecticides *T60.1*
- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Carburant *X49.9!*

Halos visuels ¬ *H53.1*

Halothane ¬ Lésion due à l' *T41.0*

Hamartome

- Combiné de l'épithélium pigmentaire et de la rétine ¬ *D31.2*
- Kystique hépatique ¬ *D13.4*
- SAI ¬ *Q85.9*

Hamel ¬ Syndrome neurodégénératif lié à l'X type *G31.88*

Hamman-Rich ¬ Syndrome de *J84.1*

Han ¬ Syndrome cardio-pulmonaire à virus *B33.4†, J17.1**

Hanche

- Antérieure ¬ Luxation de la *S73.02*
- Bassin
- - Sans précision ¬ Ostéochondrite juvénile de la *M91.9*
- - ¬ Ostéochondrite juvénile
- - - *M91*
- - - *M91.8*
- Bilatéral ¬
- - Luxation congénitale de la *Q65.1*
- - Subluxation congénitale de la *Q65.4*
- Cuisse
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.81*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.84*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.82*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.83*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.6*
- - Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de la *S78.9*
- - SAI ¬ Plaie ouverte de la *S71*
- - Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S79.9*
- - - Superficielle de la *S70.9*
- - ¬
- - - Amputation traumatique de la *S78*
- - - Écrasement de la *S77.2*

Hanche *–suite*
- Cuisse *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Gelure superficielle de la *T33.6*
- - - Lésion traumatique
- - - - Multiple
- - - - - *S79.7*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de la *S76.7*
- - - - - Nerfs au niveau de la *S74.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la *S75.7*
- - - - Muscles et de tendons au niveau de la *S76*
- - - - Nerf
- - - - - Cutané sensitif au niveau de la *S74.2*
- - - - - Fémoral au niveau de la *S74.1*
- - - - - Niveau de la *S74.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la *S74.9*
- - - - - Sciatique au niveau de la *S74.0*
- - - - Précisées de la *S79.8*
- - - - Superficielles multiples de la *S70.7*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau de la *S75.9*
- - - - - Sanguins au niveau de la *S75.8*
- - - - Veine
- - - - - Fémorale au niveau de la *S75.1*
- - - - - Saphène interne au niveau de la *S75.2*
- - - Plaie
- - - - Ouverte de la *S71*
- - - - Ouvertes multiples de la *S71.7*
- Fémur ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la *S71.84!*
- - - Ouverte ou de luxation de la *S71.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la *S71.85!*
- - - Ouverte ou de luxation de la *S71.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la *S71.86!*
- - - Ouverte ou de luxation de la *S71.89!*
- Genou ¬ Amputation traumatique entre la *S78.1*
- Instable (congénitale) ¬ *Q65.6*
- Irritable ¬ *M65.8*
- Jambe sauf région malléolaire pied
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure de la *T24.20*
- - - Corrosion de la *T24.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ Brûlure de la *T24.20*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure
- - - - - *T24.21*
- - - - - *T24.61*

Hanche *–suite*
- Jambe sauf région malléolaire pied *–suite*
- - Degré *–suite*
- - - 2b ¬ *–suite*
- - - - Corrosion de la *T24.60*
- Ligament
- - Iliofémoral ¬ Entorse et foulure de la *S73.11*
- - Ischiocapsulaire ¬ Entorse et foulure de la *S73.12*
- Luxable ¬ *Q65.6*
- Membre inférieur sauf cheville pied
- - Degré non précis ¬
- - - Brûlure de la *T24.0*
- - - Corrosion de la *T24.4*
- - ¬
- - - Brûlure
- - - - Corrosion de la *T24*
- - - - Premier degré de la *T24.1*
- - - - Second degré de la *T24.2*
- - - - Troisième degré de la *T24.3*
- - - Corrosion
- - - - Premier degré de la *T24.5*
- - - - Second degré de la *T24.6*
- - - - Troisième degré de la *T24.7*
- Ostéochondrite juvénile antérieure ¬ Déformation de la *M91.2*
- Partie
- - Non précisée ¬ Entorse et foulure de la *S73.10*
- - ¬ Entorse et foulure de la *S73.18*
- Postérieure ¬ Luxation de la *S73.01*
- Ressort" ¬ *R29.4*
- SAI ¬ Fracture de la *S72.08*
- Sans précision ¬
- - Luxation
- - - *S73.00*
- - - Congénitale de la *Q65.2*
- - Malformation congénitale de la *Q65.9*
- - Subluxation congénitale de la *Q65.5*
- Subluxable ¬ *Q65.6*
- Type Beukes ¬ Dysplasie de la *Q65.8*
- Unilatéral ¬
- - Luxation congénitale de la *Q65.0*
- - Subluxation congénitale de la *Q65.3*
- ¬
- - *L02.4*
- - *L03.11*
- - *L04.3*
- - *R02.05*
- - Abcès tuberculeux de la *A18.0†, M01.15**
- - Amputation traumatique de l'articulation de la *S78.0*
- - Anomalie
- - - Congénitale de la *Q74.2*
- - - Morphologiques congénitales de la *Q65*

Hanche *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Articulation de la *T84.14*
- - Bursites de la *M70.7*
- - Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la *D04.7*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la *T84.04*
- - Contusion de la *S70.0*
- - Coxarthrose [arthrose de la *M16*
- - Écrasement de la *S77.0*
- - Entorse et foulure de la *S73.1*
- - Fracture ouverte de la *S72.08, S71.87!*
- - Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la *T79.61*
- - Lésion traumatique de muscles et de tendons de la *S76.0*
- - Luxation
- - - *S73.08*
- - - Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la *S73*
- - Malformations congénitales de la *Q65.8*
- - Mélanome
- - - In situ du membre inférieur, y compris la *D03.7*
- - - Malin du membre inférieur, y compris la *C43.7*
- - Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la *D22.7*
- - Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la *M91.8*
- - Plaie ouverte de la *S71.0*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.64*
- - TBC [Tuberculose] de la *A18.0†, M01.15**
- - Tissu mou: *C79.86*
- - Tuberculose de l'articulation de la *A18.0†, M01.15**
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - Peau du membre inférieur, y compris la *D23.7*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la *D21.2*
- - - Malign
- - - - Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la *C47.2*
- - - - Peau du membre inférieur, y compris la *C44.7*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la *C49.2*

Handicap
- Handicap léger ¬ Maladie de Parkinson sans *G20.0*
- Léger ¬ Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un *G20.0*
- Modéré à lourd ¬ Maladie de Parkinson avec un *G20.1*
- ¬ Maladie de Parkinson avec un très lourd *G20.2*

Handigodu ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Handmaker
v. Silverman-Handmaker

Hand-Schüller-Christian ¬

- Maladie de *C96.5*
- Syndrome de *C96.5*

Hanhart
v. Richner-Hanhart

Hansen] ¬ Lèpre [maladie de *A30*

Hanta

- Hantavirus] avec manifestations rénales ¬ Maladie à virus *A98.5†, N08.0**
- Manifestations pulmonaires ¬ Maladie à virus *B33.4†*
- SCPH] ¬ Syndrome cardio-pulmonaire à virus *B33.4†, J17.1**

Hantavirus

- Manifestations rénales ¬ Maladie à virus Hanta [*A98.5†, N08.0**
- SPH] ¬ Syndrome pulmonaire à *B33.4†, J17.1**
- ¬ Fièvre à *A98.5*

Haploinsuffisance

- CTLA-4 ¬ Syndrome lymphoprolifératif auto-immun dû à une *D47.9*
- SETD5 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie faciale par *Q87.0*

Happle
v. Conradi-Hünermann-Happle

Harada ¬ Maladie de *H30.8*

HARD ¬ Syndrome *Q04.3*

Harlequin ¬ Syndrome de *G90.8*

Hartnup ¬ Maladie de *E72.0*

Hartsfield ¬ Syndrome de *Q87.8*

Hasard ou des paris ¬ Participation à des jeux de *Z72.8*

Hasharon
v. Rambam-Hasharon

Hashimoto ¬ Thyroïdite (de): *E06.3*

Hashimoto-Pritzker ¬ Syndrome d' *P83.8*

Hashitoxicose (transitoire) ¬ *E06.3*

Haspeslagh-Fryns-Muelenaere ¬ Syndrome de *Q87.8*

H-ATTR [Amylose à transthyrétine héréditaire] ¬ *E85.2*

Hauser
v.a. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Hautes ¬ Surdité partielle ou totale (pour): fréquences *H91.9*

Hauteur fonctionnel lésion moelle épinière

- C1-C3 ¬ *G82.60!*
- C4-C5 ¬ *G82.61!*
- C6-C8 ¬ *G82.62!*
- D11-L1 ¬ *G82.65!*
- D1-D6 ¬ *G82.63!*
- D7-D10 ¬ *G82.64!*
- L2-S1 ¬ *G82.66!*
- Non précisée ¬ *G82.69!*
- S2-S5 ¬ *G82.67!*

Hauteur fonctionnel lésion moelle épinière *–suite*

- ¬ *G82.6!*

Haverhill ¬ Fièvre (de): *A25.1*

Hawaiiensis ¬ Infection à Drechslera *B43.8*

Hawkinsinurie ¬ *E70.2*

Hayward
v. Juberg-Hayward

Hay-Wells ¬ Syndrome de *Q82.4*

Hb Cologne) ¬ Hémoglobine instable (*D58.2*

Hb Zurich) ¬ Hémoglobine instable (*D58.2*

Hb-C ¬ Maladie à *D58.2*

HBc identifié ¬ Hépatite B avec antigène *B18.19*

Hb-D ¬ Maladie à *D58.2*

Hb-E ¬ Maladie à *D58.2*

HBe identifié ¬ Hépatite B avec antigène *B18.19*

HbF] ¬ Persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [*D56.4*

HBID ¬ *Q82.8*

Hb-M] ¬ Hémoglobinose M [*D74.0*

HBs

- Identifié ¬ Hépatite B avec antigène *B18.19*
- ¬ Hépatite associée à l'antigène *B18.19*

Hb-S ¬ Trait *D57.3*

Hb-SC ¬ Maladie à *D57.2*

Hb-SD ¬ Maladie à *D57.2*

Hb-SE ¬ Maladie à *D57.2*

Hb-SS avec crise ¬ Maladie *D57.0*

HCL ¬ *C91.40*

HDR ¬ Syndrome *Q87.8*

Heavy chain disease ¬ *C88.20*

Heavy-or-large-for-dates ¬ Autres *P08.1*

Hébéphrénie ¬ *F20.1*

Hébéphrénique ¬ Schizophrénie *F20.1*

Heberden (avec arthropathie) ¬ Nodosités d' *M15.1*

Hebra

- Jock itch] ¬ Eczéma marginé de *B35.6*
- ¬
- - Pityriasis rubra (*L26*
- - Prurigo (de): *L28.2*

HEC ¬ Syndrome *Q87.8*

Hecht ¬ Syndrome de *Q68.8*

Hecht-Scott ¬ Syndrome de *Q87.2*

Heerfordt] ¬ Fièvre uvéo-parotidienne [*D86.8*

Hegglin
v. May-Hegglin

Heidenhain ¬ Syndrome de *A81.0†, H58.1**

Heilmeyer-Schöner

- Rémission complet ¬
- - Érythroblastose chronique type *D45*
- - Maladie de *D45*
- ¬
- - Érythroblastose chronique type *D45*
- - Maladie de *D45*

Heinz ¬ Anémie congénitale à corps de *D58.2*

Hélice "winged" ¬ Déficit en *D82.8*

Helicobacter pylori

- Cours ulcère
- - Duodénal ¬ Infection à *K26.9, B98.0!*
- - Estomac ¬ Infection à *K25.9, B98.0!*
- Pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B98.0!*
- ¬ Gastrite
- - *K29.7, B98.0!*
- - Chronique à *K29.5*

Hélicoïdale ¬ Dégénérescence choriorétinienne péripapillaire *H31.2*

Hélix ¬ Chondrodermite nodulaire chronique de l' *H61.0*

Heller ¬

- Démence de *F84.3*
- Syndrome de *F84.3*

HELLP ¬ Syndrome *O14.2*

Helminthes NCA ¬ Granulome du péritoine dû à des œufs d' *B83.9†, K67.8**

Helminthiase

- Intestinal
- - Mixtes ¬ *B81.4*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *B81*
- - Précisées ¬ Autres *B81.8*
- - Sans précision ¬ *B82.0*
- Mixte SAI ¬ *B81.4*
- Précisées ¬ Autres *B83.8*
- Sans précision ¬ *B83.9*
- ¬
- - *B83*
- - Arthrite au cours de l' *B83.9†, M01.89**
- - Méthodes spéciales pour l'exploration de: Protozooses et *Z11*

Hémagglutinines froides ¬ Maladie chronique à *D59.1*

Hémangioblastome ¬ *D48.1*

Hémangioendothéliome

- Composite ¬ *D18.00*
- Rétiforme ¬ *D48.1*

Hémangiomatose néonatale diffuse ¬ *Q82.8*

Hémangiome

- Capillaire familial ¬ *D18.00*
- Caverneux cérébral familial ¬ *Q28.38*
- Cellules fusiformes ¬ *D18.00*
- Facial ¬ Syndrome de Dandy-Walker- *Q03.1*
- Faciaux-pseudocicatrice sus-ombilicale ¬ Syndrome d' *D18.01*
- Géant infantile ¬ *D18.00*
- Intraosseux ¬ *D18.08*
- Lymphangiome ¬ *D18*
- Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [*Q87.8*

Hémangiome *–suite*
- Verruqueux ¬ *D18.00*
- ¬ *D18.0*

Hémangiome-thrombocytopénie ¬ Syndrome d' *D18.00*

Hémangiopéricytome ¬ *D48.1*

Hémarthrose
- Non traumatique de l'articulation du genou ¬ *M25.06*
- Traumatique
- - Articulation
- - - Capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - - Genou ¬ *S80.0*
- - Ligament SAI ¬ *T14.3*
- ¬ *M25.0*

Hématémèse
- Mélæna néonatals dus à une déglutition de sang maternel ¬ *P78.2*
- Néonatale ¬ *P54.0*
- ¬ *K92.0*

Hématies
- Falciformes
- - Anémie drépanocytaire] avec crises ¬ Anémie à *D57.0*
- - Drépanocytaire
- - - Hétérozygotes doubles ¬ Affections à *D57.2*
- - - SAI ¬
- - - - Anémie à *D57.1*
- - - - Maladie à *D57.1*
- - - - Trouble à *D57.1*
- - - ¬
- - - - Affection
- - - - - *D57*
- - - - - *D57.8*
- - - - Trait de la maladie des *D57.3*
- - Sans crises ¬ Anémie à *D57.1*
- - ¬ Béta-thalassemie à *D57.2*
- Morphologique SAI ¬ Anomalie des *R71*
- Volume SAI ¬ Anomalie des *R71*

Hématocèle
- Femme ¬ *N94.8*
- SAI des organes génitaux de l'homme ¬ *N50.1*

Hématochézie ¬ *K92.1*

Hématocolpos
- Hématométrie ou hématosalpinx ¬ *N89.7*
- ¬ *N89.7*

Hématocornée ¬ *H18.0*

Hématogène
- Aiguë ¬ Ostéomyélite *M86.0*
- Chroniques ¬ Autres ostéomyélites *M86.5*
- ¬ Abcès hépatique: *K75.0*

Hématologique
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.0*

Hématologique *–suite*
- Non classées ailleurs ¬ Intoxication par substances essentiellement systémiques et *T45*
- Période périnatal
- - Sans précision ¬ Affection *P61.9*
- - ¬ Autres affections *P61*
- Précisées de la période périnatale ¬ Autres affections *P61.8*
- Sans précision ¬ Intoxication: Substance essentiellement systémique et *T45.9*
- ¬
- - Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et *T45.8*
- - Maladie par VIH avec trouble *B23.8*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: examens *O35.7*

Hématome
- Artériel traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Auriculaire traumatique ¬ *S00.48*
- Cérébelleux circonscrit ¬ *S06.34*
- Cérébral
- - Cérébelleux multiples ¬ *S06.23*
- - Circonscrit ¬ *S06.33*
- - Contusion cérébrale ¬ *S06.21*
- Chignon dû à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.1*
- Compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ Hémorragie et *T81.0*
- Cordon ¬ *O69.5*
- Épidural [extradural] ¬ *S06.4*
- Foie ¬ Contusion et *S36.11*
- Intracérébral ¬ *S06.33*
- Ligament large ¬ *N83.7*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Musculaire non traumatique ¬ *M62.8*
- Niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- Non traumatique du pavillon de l'oreille ¬ *H61.1*
- Obstétrical
- - Périnée ¬ *O71.7*
- - Vagin ¬ *O71.7*
- - Vulve ¬ *O71.7*
- Organes sexuels féminins ¬ *N94.8*
- Pelvien d'origine obstétricale ¬ *O71.7*
- Périanal
- - Cause non traumatique ¬ *K64.5*
- - ¬ *K64.5*
- Plaie obstétricale ¬ *O90.2*
- Poumon ¬ Contusion et *S27.31*
- Rein ¬ Contusion et *S37.01*
- Rétroplacentaire
- - Hémorragie important associé
- - - Afibrinogénémie ¬ *O45.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *O45.0*

Hématome *–suite*
- Rétroplacentaire *–suite*
- - Hémorragie important associé *–suite*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ *O45.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ *O45.0*
- - SAI ¬ *O45.9*
- - ¬
- - - *P02.1*
- - - Décollement prématuré du placenta [*O45*
- Sous-dural
- - Chronique non traumatique ¬ *I62.02*
- - Localisé) dû à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.0*
- Sous-galéal
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P12.2*
- - ¬ *S00.05*
- Spinal subdural de cause non traumatique ¬ *G95.10*
- Splénique ¬ *S36.01*
- Subdural de cause non traumatique chez le nouveau-né ¬ *P52.8*
- Superficiel du fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- Traumatique contusion
- - Cérébelleuse ¬ Hémorragie traumatique, *S06.8*
- - Intracrânienne SAI ¬ Hémorragie traumatique, *S06.8*

Hématométrie
- Hématosalpinx ¬ Hématocolpos avec *N89.7*
- ¬
- - *N85.7*
- - Hématosalpinx avec *N85.7*

Hématomyélie
- Traumatique SAI ¬ *T14.4*
- ¬ *G95.10*

Hématopoïétique
- Apparent
- - Évolution imprévisible inconnu
- - - Sans précision ¬ Tumeur des tissus lymphoïde, *D47.9*
- - - ¬ tumeur
- - - - Précisées des tissus lymphoïde, *D47.7*
- - - - Tissus lymphoïde, *D47*
- - Non précisées ¬ Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, *C96*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne des tissus lymphoïde, *C96.9*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, *Z80.7*
- - - - Personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, *Z85.7*
- - - Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, *C79.3*
- - - Tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, *C96.7*
- Certain

Hématopoïétique *–suite*
- Certain *–suite*
- - Anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du sang et des organes *O99.1*
- - Trouble système immunitaire ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de maladies du sang et des organes *Z83.2*
- - - - Personnels de maladies du sang et des organes *Z86.2*
- - - Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes *Z13.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres maladies du sang et des organes *D77**
- Immunosuppression actuelle ¬ État consécutif à une transplantation de cellules-souches *Z94.81*
- Maladie du greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un transplant de cellules souches *T86.0*
- Sans
- - Immunosuppression actuelle ¬ État consécutif à une transplantation de cellules-souches *Z94.80*
- - Précision ¬ Maladie du sang et des organes *D75.9*
- ¬
- - Échec d'un transplant de cellules souches *T86.00*
- - Maladie
- - - Précisées du sang et des organes *D75.8*
- - - Sang et des organes *D75*
- - - VIH
- - - - Maladie des organes *B23.8, D75.9*
- - - - Tumeur maligne du tissu *B21, C96.9*

Hématosalpinx
- Hématométrie ¬ *N85.7*
- ¬
- - *N83.6*
- - Hématocolpos avec hématométrie ou *N89.7*

Hématurie
- Bénigne (de l'enfance) (familiale) ¬ *N02*
- Douloureuse ¬ Syndrome d' *N39.81*
- Récidivante et persistante ¬ *N02*
- Sans précision ¬ *R31*
- Sous traitement anticoagulant ¬ *D68.35*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1*

Hémendothéliome ¬ *D48.1*

Héméralopie ¬ Avitaminose A avec *E50.5†, H58.1**

Hémi 3 ¬ Syndrome *Q87.3*

Hémiagénésie de la thyroïde ¬ *E03.1*

Hémiakinésie ¬ *R29.5*

Hémianencéphalie ¬ *Q00.0*

Hémianopsie
- Hétéronyme) (homonyme) ¬ *H53.4*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, H58.1**

Hémiatrophie faciale progressive ¬ *G51.8*

Hémibloc
- Antérieur gauche ¬ *I44.4*
- Branche gauche SAI ¬ *I44.6*
- Postérieur gauche ¬ *I44.5*

Hémicéphalie ¬ *Q00.0*

Hemicolite gauche ¬ *K51.5*

Hémiconvulsion-hémiplégie-épilepsie idiopathique ¬ Syndrome *G40.4*

Hémicrânie
- Continue ¬ *G44.0*
- Paroxystique chronique ¬ *G44.0*
- Sens d'une migraine ¬ *G43.9*

Hémidysplasie congénitale-nævus ichtyosiforme-anomalies des membres ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Hémifacial
- Clonique ¬ Spasme *G51.3*
- ¬
- - Atrophie ou hypertrophie *Q67.4*
- - Myokymie *G51.3*

Hémihyperplasie
v.a. multiple-hémihyperplasie
- Isolée ¬ *Q87.3*

Hémilatérale ¬ Négligence *R29.5*

Hémimégalencéphalie ¬ *Q04.5*

Hémimélie
- Fibulaire ¬ *Q72.6*
- Radiale ¬ *Q71.4*
- SAI d'un (des) membre(s) SAI ¬ *Q73.8*
- Tibial
- - Polysyndactylie-pouce triphalangé ¬ Syndrome d' *Q87.2*
- - ¬ *Q72.5*
- Ulnaire ¬ *Q71.5*

Hémimélique ¬ Dysplasie épiphysaire *Q74.8*

Héminégligence ¬ *R29.5*

Hémiparésie hémiplégie
- Flasque ¬ *G81.0*
- Sans précision ¬ *G81.9*
- Spastique ¬ *G81.1*
- ¬ *G81*

Hémiparkinsonisme ¬ *G20*

Hémiplégie
- Alternante de l'enfance ¬ *Q07.8*
- Embolique en tant qu'événement en cours ¬ *I63.4, G81.9*
- Faciale alternante ¬ *G83.8*
- Flasque ¬ Hémiparésie ou *G81.0*
- Post-critique ¬ *G83.8*
- Sans précision ¬ Hémiparésie ou *G81.9*
- Spastique ¬ Hémiparésie ou *G81.1*
- Thrombotique en tant qu'événement en cours ¬ *I63.3, G81.9*
- Transitoire ¬ *G83.8*
- ¬ Hémiparésie et *G81*

Hémiplégique ¬
- Infirmité motrice cérébrale, forme spastique *G80.2*
- Migraine: familiale, *G43.1*

Hémispasme facial ¬ *G51.3*

Hémisphère
- Cérébral ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Droit ¬ Trouble affectif organique de l' *F07.8*

Hémisphérique
- Corticale ¬ Hémorragie intracérébrale *I61.1*
- Non précisée ¬ Hémorragie intracérébrale *I61.2*
- Sous-corticale ¬ Hémorragie intracérébrale *I61.0*
- ¬ Syndrome carotidien (*G45.1*

Hémispondylie] sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Hémivertèbre [*Q76.4*

Hémivagin borgne ¬ Utérus bicorne bicervical avec *Q51.3*

Hémivertèbre
- Défaut de segmentation avec scoliose ¬ Synostose d' *Q76.3*
- Dysgénésie uro-génitointestinale ¬ Syndrome d'aphalangie- *Q87.8*
- Hémispondylie] sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*

Hémochromatose
- Africaine ¬ *E83.1*
- Diabète ¬ *E83.1*
- Foie ¬ *E83.1†, K77.8**
- Héréditaire
- - Autosomique dominante ¬ *E83.1*
- - Rare ¬ *E83.1*
- Juvénile ¬ *E83.1*
- Liée à TFR2 ¬ *E83.1*
- Myocarde ¬ *E83.1†, I43.1**
- Néonatale ¬ *E83.1*
- Type
- - 2 ¬ *E83.1*
- - 3 ¬ *E83.1*
- - 4 ¬ *E83.1*
- - 5 ¬ *E83.1*
- ¬
- - *E83.1*
- - Arthropathie au cours de *E83.1†, M14.59**

Hémodialyse ¬ Amylose associée à *E85.3*

Hémodynamique ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet *I25.10*

Hémoglobine
- Anormale SAI ¬ *D58.2*
- Fœtal
- - Bêta-thalassémie ¬ Syndrome de persistance familiale de l' *D56.4*
- - HbF] ¬ Persistance héréditaire de l' *D56.4*

Hémoglobine *–suite*
- Instable
- - Hb Cologne) ¬ *D58.2*
- - Hb Zurich) ¬ *D58.2*
- - ¬ Maladie hémolytique à *D58.2*
- Lepore-bêta-thalassémie ¬ *D56.8*
- S hétérozygote ¬ *D57.3*

Hémoglobinopathie
- SAI ¬ *D58.2*
- Sans précision) ¬ Thalassémie (mixte) (avec autre *D56.9*
- Toms River ¬ *D58.2*
- ¬
- - *D58.2*
- - Anémie méditerranéenne (avec autre *D56.9*
- - Arthropathie au cours d'une *D58.2†, M36.3**
- - Dépistage d' *Z36.8*
- - Ostéonécrose au cours d'une *D58.2†, M90.49**

Hémoglobinose M [Hb-M] ¬ *D74.0*

Hémoglobinurie
- Agglutinines froides ¬ *D59.1*
- Effort ¬ *D59.6*
- Hémolyse relevant d'autres causes externes ¬ *D59.6*
- Marche ¬ *D59.6*
- Nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] ¬ *D59.5*
- Paroxystique a frigore ¬ *D59.6*
- ¬ *R82.3*

Hémolymphangiome ¬ *D18.1*

Hémolyse
- Élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome associant une *O14.2*
- Excessif
- - Précisées ¬ Ictère néonatal dû à d'autres *P58.8*
- - Sans précision ¬ Ictère néonatal dû à une *P58.9*
- - ¬ Ictère néonatal dû à d'autres *P58*
- Relevant d'autres causes externes ¬ Hémoglobinurie due à une *D59.6*

Hémolytique
v. Type de maladie

Hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une *D47.0*

Hémopéricarde
- Blessure traumatique par poignardement du cœur ¬ *S26.0*
- Complication récent infarctus aigu myocarde ¬
- - *I23.0*
- - Rupture de la paroi cardiaque sans *I23.3*
- Non classé ailleurs ¬ *I31.2*
- Traumatique ¬ *S26.0*

Hémopéritoine ¬ *K66.1*

Hémophagocytaire
- Associé à une infection ¬ Syndrome *D76.2*
- Familiale ¬ Réticulose *D76.1*
- ¬
- - Lymphohistiocytose *D76.1*
- - Syndrome *D76.1*

Hémophilie
v.a. Pseudohémophilie
- A
- - Alloanticorps contre le facteur VIII ¬ *D66*
- - ¬ *D66*
- Acquise ¬ *D68.4*
- Anticorps
- - Dirigés contre facteur
- - - VIII ¬ *D68.31*
- - - Von Willebrand ¬ *D68.32*
- - - Xa ¬ *D68.32*
- - - Xia ¬ *D68.32*
- - Inhibant la coagulation ¬ *D68.38*
- B
- - Alloanticorps contre le facteur IX ¬ *D67*
- - ¬ *D67*
- C ¬ *D68.1*
- Classique ¬ *D66*
- Inhibiteurs produits par le système immunitaire ¬ *D68.38*
- SAI ¬ *D66*
- Vasculaire ¬
- - *D68.0*
- - *D68.09*
- ¬ Arthropathie au cours de l' *D66†, M36.2**

Hémophtalmie ¬ *H44.8*

Hémopneumothorax
- Traumatique ¬ *S27.2*
- ¬ *J94.2*

Hémoptysie ¬ *R04.2*

Hémorragie
- Accidentel
- - Avortement ¬ *O08.1*
- - ¬ *P02.1*
- Actuel ¬
- - Descente placenta
- - - *O44.10*
- - - Sans *O44.00*
- - Placenta praevia
- - - *O44.11*
- - - Descente placenta
- - - - *O44.1*
- - - - Sans *O44.0*
- - - Sans *O44.01*
- Alvéolaire diffuse ¬ *R04.8*
- Antepartum ¬ *P02.1*
- Anus et du rectum ¬ *K62.5*
- Artérielle par érosion ¬ *I77.2*
- Associé

Hémorragie *–suite*
- Associé *–suite*
- - Marcoumar ¬ *D68.33*
- - Rétention
- - - Incarcération ou l'adhérence du placenta ¬ *O72.0*
- - - Partielle du placenta ou des membranes ¬ *O72.2*
- Cérébellaire localisée de cause traumatique ¬ *S06.34*
- Cérébelleux
- - Fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.6*
- - ¬ *S06.34*
- Cérébral
- - Syphilis ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P10.1*
- Choroïdien
- - Expulsive ¬ *H31.3*
- - SAI ¬ *H31.3*
- Conjonctivale ¬ *H11.3*
- Consécutive à la délivrance ¬ *O72.1*
- Corps vitré
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *H45.0**
- - ¬
- - - *H43.1*
- - - Syphilis tardive avec *A52.7†, H45.0**
- Cours schistosomiase ¬ Varice gastrique indication
- - *B65.9†, I98.3**
- Cutanée néonatale ¬ *P54.5*
- Début grossesse
- - Sans précision ¬ *O20.9*
- - ¬
- - - *O20*
- - - *O20.8*
- Délivrance (troisième période) ¬ *O72.0*
- Épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.2*
- Épidural
- - Non traumatique ¬ *I62.1*
- - ¬ *S06.4*
- Expulsion du fœtus ou accouchement de l'enfant ¬ *O72*
- Extra-dural
- - Non traumatique ¬ *I62.1*
- - Traumatique) ¬ *S06.4*
- Falithrom ¬ *D68.33*
- Fibrinolytique acquise ¬ *D65.2*
- Fœtale SAI ¬ *P50.9*
- Gaine du nerf optique ¬ *H47.0*
- Gastrique SAI ¬ *K92.2*
- Gastro-intestinal
- - Néonatales ¬ Autres *P54.3*
- - Sans précision ¬ *K92.2*
- Gorge ¬ *R04.1*

Hémorragie *–suite*
- Hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ *T81.0*
- Immédiates du post-partum ¬ Autres *O72.1*
- Important
- - Associé
- - - Afibrinogénémie ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - Pendant l'accouchement ¬ *O67.8*
- - Précédant accouchement associé
- - - Afibrinogénémie ¬ *O46.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *O46.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ *O46.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ *O46.0*
- Insertion vélamenteuse du cordon ¬ *O69.4*
- Intestinale SAI ¬ *K92.2*
- Intracérébelleuse ¬ *S06.34*
- Intracérébral
- - Cérébelleuse ¬ *I61.4*
- - Hémisphérique
- - - Corticale ¬ *I61.1*
- - - Non précisée ¬ *I61.2*
- - - Sous-corticale ¬ *I61.0*
- - Intraventriculaire ¬ *I61.5*
- - Localisations multiples ¬ *I61.6*
- - Massive ¬ *I61.6*
- - Multiple ¬
- - - *I61.6*
- - - *S06.23*
- - Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.4*
- - Profonde ¬ *I61.0*
- - Sans précision ¬ *I61.9*
- - Superficielle ¬ *I61.1*
- - Traumatiques multiples ¬ *S06.23*
- - Tronc cérébral ¬ *I61.3*
- - ¬
- - - *I61*
- - - *I61.8*
- - - *S06.33*
- - - Séquelles d' *I69.1*
- Intracrânien
- - Anoxie ou une hypoxie ¬ *P52*
- - Non
- - - Précisées, dues à un traumatisme obstétrical ¬ Déchirure et *P10.9*
- - - Traumatique
- - - - Fœtus
- - - - - Nouveau-né ¬ *P52*

Hémorragie *–suite*
- Intracrânien *–suite*
- - Non *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Fœtus *–suite*
- - - - - Nouveau-né ¬ Autres *P52.8*
- - - - - Nouveau-né, sans précision ¬ *P52.9*
- - - - Sans précision ¬ *I62.9*
- - - - ¬
- - - - - *I62*
- - - - - Séquelles d'autres *I69.2*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Déchirure
- - - *P10*
- - - *P10.8*
- Intraventriculaire
- - Grade 4, de cause non traumatique, chez le nouveau-né ¬ *P52.2*
- - Non traumatique
- - - Degré
- - - - 1, du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.0*
- - - - 2, du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.1*
- - - - 3, du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.2*
- - - Fœtus et du nouveau-né, sans précision ¬ *P52.3*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P10.2*
- Légère ¬ Omphalite du nouveau-né, avec ou sans *P38*
- Lobe cérébral ¬ *I61.1*
- Menace d'avortement ¬ *O20.0*
- Méningée ¬ *I60.8*
- Mère ¬ *P02.1*
- Négligence ¬ Incision, ponction, perforation ou *Y69!*
- Néonatal
- - Précisées ¬ Autres *P54.8*
- - Sans précision ¬ *P54.9*
- - ¬ Autres *P54*
- Nez ¬ *R04.0*
- Non classé ¬
- - *R58*
- - Travail et accouchement compliqués d'une *O67*
- Œsophage ¬ *K22.81*
- Ombilical
- - Massive du nouveau-né ¬ *P51.0*
- - Nouveau-né
- - - Sans précision ¬ *P51.9*
- - - ¬
- - - - *P51*
- - - - *P51.8*
- Orbite ¬ *H05.2*
- Organes génitaux de l'homme ¬ *N50.1*
- Parties des voies respiratoires ¬ *R04.8*
- Pendant accouchement
- - Anomalie de la coagulation ¬ *O67.0*
- - Important associé

Hémorragie *–suite*
- Pendant accouchement *–suite*
- - Important associé *–suite*
- - - Afibrinogénémie ¬ *O67.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *O67.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ *O67.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ *O67.0*
- - Sans précision ¬ *O67.9*
- - ¬
- - - *O67.8*
- - - Syndrome de défibrination avec *O67.0*
- Per- et postopératoire ¬ Anémie après *D62*
- Placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d' *P02.1*
- Post-partum
- - Atonie utérine) SAI ¬ *O72.1*
- - Tardive et secondaire ¬ *O72.2*
- - ¬ *O72*
- Précédant accouchement
- - Anomalie de la coagulation ¬ *O46.0*
- - Non classée ailleurs ¬ *O46*
- - Sans précision ¬ *O46.9*
- - ¬ Autres *O46.8*
- Pression cérébrale lors d'une lésion crânio-cérébrale couverte grave ¬ Compression du cerveau, *S06.21, S01.83!*
- Prolongée ¬ *R79.8*
- Prostatiques ¬ Congestion et *N42.1*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Pulmonaire
- - Massive survenant pendant la période périnatale ¬ *P26.1*
- - Non précisée survenant pendant la période périnatale ¬ *P26.9*
- - SAI ¬ *R04.8*
- - Survenant pendant période périnatal ¬
- - - *P26*
- - - *P26.8*
- Rachidien
- - Épidurale postopératoire ¬ *G97.82*
- - Non traumatique ¬ *G95.10*
- - Sous-arachnoïdienne postopératoire ¬ *G97.84*
- - Sous-durale postopératoire ¬ *G97.83*
- Rectale néonatale ¬ *P54.2*
- Retardé sévère
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.1*
- - ¬ échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une *O07.1*
- - - Sans précision, compliqués d'une *O07.6*
- Rétinienne ¬ *H35.6*
- Rupture
- - Choroïde ¬ *H31.3*
- - Varice œsophagien ¬ Cirrhose

Hémorragie *–suite*
- Rupture *–suite*
- - Varice œsophagien ¬ Cirrhose *–suite*
- - - Alcoolique du foie avec *K70.3†, I98.3**
- - - Foie avec *K74.6†, I98.3**
- - - Toxique du foie avec *K71.7†, I98.3**
- SAI ¬ *R58*
- Sous
- - Arachnoïdien
- - - Artère
- - - - Basilaire ¬ *I60.4*
- - - - Cérébral
- - - - - Moyenne ¬ *I60.1*
- - - - - SAI ¬ *I60.7*
- - - - Communicant
- - - - - Antérieure ¬ *I60.2*
- - - - - Postérieure ¬ *I60.3*
- - - - - SAI ¬ *I60.7*
- - - - Intracrânien
- - - - - Sans précision ¬ *I60.7*
- - - - - ¬ *I60.6*
- - - - Vertébrale ¬ *I60.5*
- - - Bifurcation et du siphon carotidien ¬ *I60.0*
- - - Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.5*
- - - Sans précision ¬ *I60.9*
- - - Traumatique ¬ *S06.6*
- - - Traumatisme obstétrical ¬ *P10.3*
- - - ¬
- - - - *I60*
- - - - *I60.8*
- - - - Séquelles d' *I69.0*
- - - - Vasospasme au cours d' *I67.80!*
- - Conjonctival
- - - Traumatisme obstétrical ¬ *P15.3*
- - - ¬ *H11.3*
- - Traitement
- - - Falithrom ¬ *D68.33*
- - - Héparine ¬ *D68.34*
- - - Marcoumar ¬ *D68.33*
- - Utilisation long terme
- - - Antiagrégants plaquettaires ¬ *D69.80*
- - - Anticoagulants ¬ *D68.35*
- - - Coumarines (antagonistes de la vitamine K) ¬ *D68.33*
- - - Héparines ¬ *D68.34*
- Sous-dural
- - Chronique non traumatique ¬ *I62.02*
- - Non traumatique ¬ *I62.0*
- - Traumatique
- - - Aiguë ¬ *S06.5*
- - - ¬
- - - - *S06.5*
- - - - Conséquences d'une *T90.5*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P10.0*

Hémorragie *–suite*
- Sous-épendymaire
- - Envahissement intraventriculaire ¬ *P52.1*
- - Extension intracérébrale et intraventriculaire ¬ *P52.2*
- - Sans envahissement intraventriculaire) ¬ *P52.0*
- Surrénale
- - Sepsis à méningocoques ¬ *A39.1†, E35.1**
- - ¬ *E27.4*
- Surrénalienne néonatale ¬ *P54.4*
- Thyroïde ¬ *E07.8*
- Toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.0*
- Trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale ¬ *P26.0*
- Trachéostome ¬ *J95.0*
- Traumatique
- - Hématome traumatique contusion
- - - Cérébelleuse ¬ *S06.8*
- - - Intracrânienne SAI ¬ *S06.8*
- - Secondaire et récidivante ¬ *T79.2*
- Vaginale néonatale ¬ *P54.6*
- Vers
- - Circulation maternelle ¬ *P50.4*
- - Jumeau ¬ *P50.3*
- Voie respiratoire
- - Sans précision ¬ *R04.9*
- - ¬ *R04*
- ¬
- - Angiodysplasie intestin grêle
- - - *K55.32*
- - - Sans indication d'une *K55.31*
- - Gastrite aiguë (érosive) avec *K29.0*
- - Rétention
- - - Partielle du placenta et des membranes, sans *O73.1*
- - - Placenta
- - - - Membranes, sans *O73*
- - - - Sans *O73.0*
- - - Produits de la conception après l'accouchement, sans *O73.1*
- - Toux avec *R04.2*
- - Traitement continu
- - - Antiagrégants plaquettaires, sans *Z92.2*
- - - Coumariniques, sans *Z92.1*
- - - Héparines, sans *Z92.1*
- - Varice œsophagien gastrique cours maladie classé chapitre
- - - Mention d' *I98.3**
- - - Sans indication d' *I98.2**

Hémorragipare ¬ Dystrophie thrombocytaire *D69.1*

Hémorragique
v. Type de maladie

Hémorroïdaire
- Cutanées résiduelles ¬ Cicatrices *K64.4*

Hémorroïdaire *–suite*
- Stade III ¬ Thrombose *K64.2*
- Thrombose ¬ Paquet *K64.8*
- ¬
- - Affection *K64.9*
- - Anneau *K64.9*
- - Maladie *K64.9*
- - Marisques *K64.4*
- - Paquet
- - - *K64*
- - - *K64.9*
- - Symptômes *K64.9*
- - Thrombose des plexus *K64.5*
- - Varices *K64.9*

Hémorroïdes
- Cours
- - Grossesse ¬
- - - *O22.4*
- - - Complications veineuses et *O22*
- - Puerpéralité ¬
- - - *O87.2*
- - - Complications veineuses et *O87*
- Deuxième degré ¬ *K64.1*
- Externe
- - Étranglées ¬ *K64.5*
- - Hémorragiques ¬ *K64.5*
- - Incarcérés ¬ *K64.5*
- - ¬
- - - Prolapsus d' *K64.5*
- - - Protrusion d' *K64.5*
- - - Thrombose d' *K64.5*
- - - Ulcère d' *K64.5*
- Interne
- - Étranglées ¬ *K64.8*
- - Incarcérés ¬ *K64.8*
- - ¬
- - - Prolapsus d' *K64.9*
- - - Protrusion d' *K64.9*
- - - Thrombose d' *K64.8*
- - - Ulcère d' *K64.8*
- Premier degré ¬ *K64.0*
- Quatrième degré ¬ *K64.3*
- Saignement
- - Procidence
- - - Effort spontanément réductible
- - - - Réintroduction manuelle possible ¬ *K64.2*
- - - - ¬ *K64.1*
- - - Réintroduction manuelle impossible ¬ *K64.3*
- - SAI ¬ *K64.9*
- - Sans
- - - Indication du degré ¬ *K64.9*
- - - Procidence ¬ *K64.0*
- Sans

Hémorroïdes *–suite*
- Sans *–suite*
- - Complication ¬ *K64.0*
- - Précision ¬ *K64.9*
- Stade
- - 1 ¬ *K64.0*
- - 2 ¬ *K64.1*
- - 3 ¬ *K64.2*
- - 4 ¬ *K64.3*
- Troisième degré ¬ *K64.2*
- ¬
- - *K64.8*
- - Inflammation d' *K64.8*

Hémosidérose pulmonaire
- Idiopathique ¬ *E83.1†, J99.8**
- ¬ *E83.1†, J99.8**

Hémosidérotique pulmonaire ¬ Anémie *E83.1†, J99.8**

Hémothorax
- Traumatique ¬ *S27.1*
- ¬
- - *J94.2*
- - Blessure ouverte avec *S27.1, S21.83!*

Hendra ¬ Infection virus
- *A85.8*
- *B33.8*

Henkin
v. Bosma-Henkin-Christiansen

Hennekam ¬ Syndrome de *Q87.8*

Henoch
v. Schoenlein-Henoch
- ¬ Purpura: rhumatoïde [Schönlein- *D69.0*

Henselae ¬ Bartonellose à Bartonella *A28.1*

HEP ¬ *E80.2*

Héparane sulfamidase ¬ Déficit en *E76.2*

Héparane-alpha-glucosaminide N-acétyltransférase ¬ Déficit en *E76.2*

Héparine
- Sans hémorragie ¬ Traitement continu par des *Z92.1*
- Type
- - I ¬ Thrombopénie induite par l' *D69.52*
- - II ¬ Thrombopénie induite par l' *D69.53*
- ¬
- - Hémorragie sous
- - - Traitement par une *D68.34*
- - - Utilisation à long terme des *D68.34*
- - Troubles hémorragiques dus aux *D68.34*

Héparino-induite ¬ Thrombocytopénie *D69.52*

Hepatica ¬
- Distomatose hépatique à Fasciola *B66.3†, K77.0**
- Infection à Fasciola: *B66.3*
- Tumeur maligne: Angle droit du côlon [*C18.3*

Hépatique
v.a. artério-hépatique
- Aigu
- - Chronique) médicamenteuse ¬ Insuffisance *K71.1*
- - Grossesse ¬ Stéatose *O26.68*
- - Infantile-manifestations multisystémiques ¬ Syndrome d'insuffisance *K72.0*
- - Subaiguë ¬ Insuffisance *K72.0*
- - ¬ Porphyrie *E80.2*
- Alcoolique
- - Aiguë ¬ Insuffisance *K70.4*
- - Chronique ¬ Insuffisance *K70.4*
- - SAI ¬ Insuffisance *K70.4*
- - Sans coma hépatique ¬ Insuffisance *K70.4*
- - Subaiguë ¬ Insuffisance *K70.4*
- - ¬ Insuffisance *K70.4*
- Angiocholique ¬ Abcès *K75.0*
- Autosomique dominante ¬ Polykystose *Q44.6*
- Chronique
- - Stade
- - - 1 ¬ Maladie GVH *T86.05†, K77.21**
- - - 2 ¬ Maladie GVH *T86.06†, K77.22**
- - - 3 ¬ Maladie GVH *T86.07†, K77.23**
- - ¬ Insuffisance *K72.1*
- Coma hépatique ¬ Encéphalopathie *K72.7!*
- Commune ¬ Canal: *C24.0*
- Congénitale) ¬ Fistule entre la veine porte et l'artère *Q26.6*
- Cours
- - Bérylliose ¬ Granulomes *J63.2†, K77.8**
- - Grossesse
- - - Accouchement et de la puerpéralité ¬ Affections *O26.6*
- - - Naissance et de la perpuéralité ¬ Autres affections *O26.68*
- - Maladies classées ailleurs ¬ Atteintes *K77.8**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Atteintes *K77.0**
- - Sarcoïdose ¬ Granulomes *D86.8†, K77.8**
- Début tardif [late-onset] ¬ Insuffisance *K72.0*
- Déficit immunitaire ¬ Syndrome de maladie veino-occlusive *D82.8, K76.5*
- Degré
- - 1 ¬ Encéphalopathie *K72.71!*
- - 2 ¬ Encéphalopathie *K72.72!*
- - 3 ¬ Encéphalopathie *K72.73!*
- - 4 ¬ Encéphalopathie *K72.74!*
- - Non précisé ¬ Encéphalopathie *K72.79!*
- Douve foie
- - Chat ¬ Distomatose *B66.0†, K77.0**
- - Sibérienne ¬ Distomatose *B66.0†, K77.0**
- Echinococcus
- - Granulosus ¬ Infection *B67.0†, K77.0**
- - Multilocularis [échinococcose alvéolaire] ¬ Infection *B67.5*

Hépatique *–suite*
- Echinococcus *–suite*
- - Sans précision ¬ Infection *B67.8*
- Fasciola hepatica ¬ Distomatose *B66.3†, K77.0**
- Glycogénose] ¬ Syndrome de Wagner-Parnas [Forme *E74.0*
- Hématogène ¬ Abcès *K75.0*
- Idiosyncrasique (imprévisible) médicamenteuse ¬ lésion *K71*
- Infantile aiguë par défaut de synthèse des protéines codées par l'ADN mitochondrial ¬ Insuffisance *K72.0*
- Isolée ¬ Polykystose *Q44.6*
- Lymphogène ¬ Abcès *K75.0*
- Majeure ¬ Déchirure *S36.15*
- Médicaments ¬ Insuffisance *K71.9*
- Modérée ¬ Déchirure *S36.14*
- Musculaire ¬ Glycogénose par déficit en phosphorylase kinase *E74.0*
- Nodulaire focale ¬ Hyperplasie *K76.8*
- Non
- - Alcoolique ¬ Stéatose *K76.0*
- - Classée ailleurs ¬ Insuffisance *K72*
- Opisthorchis felineus ¬ Distomatose *B66.0†, K77.0**
- Origine médicamenteuse ¬ Insuffisance *K71.1, Y57.9!*
- Primaire ¬ Carcinome neuroendocrine *C22.7*
- Pyléphlébitique ¬ Abcès *K75.0*
- Récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Colique *K80.5*
- SAI ¬
- - Abcès *K75.0*
- - Coma *K72*
- - Déchirure *S36.12*
- - Encéphalopathie *K72*
- Sans précision
- - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Cholélithiase *K80.5*
- - ¬ Insuffisance *K72.9*
- Sclérose hépatique ¬ Fibrose *K74.2*
- Simple ¬ Kyste *K76.8*
- Surnuméraire ¬ Canal *Q44.5*
- Tardive ¬ Insuffisance *K72.0*
- Thrombopénie ¬ Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes *O14.2*
- Toxicomanie ¬ Insuffisance *K71.1, Y57.9!*
- Toxique (prévisible) médicamenteuse ¬ lésion *K71*
- ¬
- - Amibiase *A06.4†, K77.0**
- - Angiomatose *K76.4*
- - Angle: droit du côlon [*D12.3*
- - Artère: *S35.2*
- - Canal: *C24.0*
- - Capillariose *B83.8*
- - Coma *K72.9, K72.74!*

Hépatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Déchirure minime *S36.13*
- - Décompensation *K72.9*
- - Déficit
- - - Carnitine palmitoyltransférase I *E71.3*
- - - Glycogène synthase *E74.0*
- - - Phosphorylase *E74.0*
- - Distomiase *B66.3†, K77.0**
- - Encéphalopathie
- - - *K72.9, K72.79!*
- - - Hépatique et coma *K72.7!*
- - Fibrose
- - - *K74.0*
- - - Hépatique, avec sclérose *K74.2*
- - Glycogénose par déficit en phosphorylase *E74.0*
- - GSD par déficit en glycogène synthase *E74.0*
- - Hamartome kystique *D13.4*
- - Hépatite
- - - A
- - - - Coma *B15.0, K72.74!*
- - - - Sans coma *B15.9*
- - - Aigu
- - - - B
- - - - - Agent delta, avec coma *B16.0*
- - - - - Agent delta, sans coma *B16.1*
- - - - - Co-infection à agent delta, avec coma *B16.0, K72.74!*
- - - - - Co-infection à agent delta, sans coma *B16.1*
- - - - - Sans agent delta et sans coma *B16.9*
- - - - - Sans agent delta, avec coma *B16.2*
- - - - - Sans co-infection à agent delta, avec coma *B16.2, K72.74!*
- - - - D
- - - - - Coma *B16.0*
- - - - - Sans coma *B16.1*
- - - B sans coma *B18.19*
- - - Épidémique avec coma *B15.0, K72.74!*
- - - Fulminante NCA, avec insuffisance *K72*
- - - Infectieuse avec coma *B15.0, K72.74!*
- - - Maligne NCA, avec insuffisance *K72*
- - - Viral
- - - - Coma *B19.0, K72.74!*
- - - - Sans
- - - - - Précision, avec coma *B19.0*
- - - - - Précision, sans coma *B19.9*
- - Hyperlipidémie due à un déficit en lipase *E78.4*
- - Ictère
- - - Épidémique avec coma *B15.0, K72.74!*
- - - Infectieux avec coma *B15.0, K72.74!*
- - Infarctus *K76.3*
- - Insuffisance hépatique alcoolique: avec ou sans coma *K70.4*

Hépatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie toxique foie
- - - Granulomes *K71.88*
- - - Nécrose *K71.1*
- - - Péliose *K71.88*
- - Nécrose des hépatocytes avec insuffisance *K72*
- - Péliose *K76.4*
- - Phlébite d'une veine *I80.88*
- - Porphyrie: aiguë intermittente (*E80.2*
- - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.5*
- - Sclérose *K74.1*
- - Syphilis des artères *A52.0†, I79.8**
- - Thrombophlébite d'une veine *I80.88*
- - Toxoplasmose *B58.1†, K77.0**
- - Veine *S35.1*

Hépatite
- A
- - Aiguë) (virale) SAI ¬ *B15.9*
- - Coma hépatique ¬ *B15.0, K72.74!*
- - Sans coma hépatique ¬ *B15.9*
- Acquise à toxoplasmose ¬ *B58.1†, K77.0**
- Active chronique B ¬ *B18.12*
- Aigu
- - A ¬ *B15*
- - B
- - - Agent delta
- - - - Coma hépatique ¬ *B16.0*
- - - - Sans coma hépatique ¬ *B16.1*
- - - Co-infection agent delta
- - - - Coma hépatique ¬ *B16.0, K72.74!*
- - - - Sans coma hépatique ¬ *B16.1*
- - - Sans
- - - - Agent
- - - - - Delta et sans coma hépatique ¬ *B16.9*
- - - - - Delta, avec coma hépatique ¬ *B16.2*
- - - - Co-infection à agent delta, avec coma hépatique ¬ *B16.2, K72.74!*
- - - ¬ *B16*
- - C ¬ *B17.1*
- - D
- - - Coma hépatique ¬ *B16.0*
- - - Sans coma hépatique ¬ *B16.1*
- - E ¬ *B17.2*
- - Mère ¬
- - - Fœtus affecté par une *P00.2*
- - - Nouveau-né affecté par une *P00.2*
- - Non virale ¬ *K72.0*
- - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.2*
- Alcoolique ¬ *K70.1*
- Antigène Australia ¬ *B18.19*
- Associé antigène
- - HBs ¬ *B18.19*

Hépatite *–suite*
- Associé antigène *–suite*
- - ¬ *B18.19*
- Auto-immune ¬ *K75.4*
- B
- - AgHBs] ¬ Porteur de l'antigène de surface du virus de l' *B18.13*
- - Aiguë (virale) SAI ¬ *B16.9*
- - Antigène
- - - HBc identifié ¬ *B18.19*
- - - HBe identifié ¬ *B18.19*
- - - HBs identifié ¬ *B18.19*
- - Chronique ¬ Infection aiguë à agent delta au cours de l' *B17.0*
- - D ¬ *B18.0*
- - Réactivée ¬ *B18.14*
- - Sans coma hépatique ¬ *B18.19*
- - ¬
- - - Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l' *B17.0*
- - - Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l' *Z27.8*
- B-C ¬ *B18.19*
- B-E ¬ *B18.19*
- B-S ¬ *B18.19*
- Chronique
- - Actif
- - - Non classée ailleurs ¬ *K73.2*
- - - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.5*
- - Auto-immune ¬ *K75.4*
- - Lobulaire
- - - Non classée ailleurs ¬ *K73.1*
- - - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.4*
- - Non classé ¬
- - - *K73*
- - - *K73.8*
- - Persistante
- - - Non classée ailleurs ¬ *K73.0*
- - - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.3*
- - Sans précision ¬ *K73.9*
- Congénitale à toxoplasmose ¬ *P37.1†, K77.0**
- Cours
- - Mononucléose à virus de l'herpès gamma ¬ *B27.0†, K77.0**
- - Paludisme ¬ *B54†, K77.0**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.1†, K77.0**
- D ¬ Virus de l' *B17.8*
- Entamoeba histolytica ¬ *A06.4†, K77.0**
- Éosinophiles ¬ *K71.6*
- Épidémique avec coma hépatique ¬ *B15.0, K72.74!*
- Fœtal néonatal
- - Cellules géantes ¬ *P59.2*
- - Idiopathique) ¬ *P59.2*

Hépatite *–suite*
- Fulminante NCA, avec insuffisance hépatique ¬ *K72*
- Granulomateuse, non classée ailleurs ¬ *K75.3*
- Immunisation ¬ *B19.9*
- Infectieux
- - Aiguë ¬ *B17.9*
- - Coma hépatique ¬ *B15.0, K72.74!*
- - Subaiguë ¬ *B17.9*
- Inoculation ¬ *B19.9*
- Lupoïde
- - Non classée ailleurs ¬ *K75.4*
- - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.5*
- Maligne NCA, avec insuffisance hépatique ¬ *K72*
- Médicaments ¬ *K71.6*
- Nécrosante ¬ *K72.9*
- Non
- - A non B (aiguë) (virale) NCA ¬ *B17.8*
- - Classée ailleurs ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.6*
- - Virale ¬ *K75.9*
- Oreillons ¬ *B26.8†, K77.0**
- Post-transfusionnelle ¬ *B19.9*
- Réactive non spécifique ¬ *K75.2*
- SAI ¬ *K75.9*
- Sérique (ictère sérique homologue) ¬ *B19.9*
- Subaiguë non virale ¬ *K72.0*
- Syphilitique
- - Congénital
- - - Précoce ¬ *A50.0†, K77.0**
- - - Stade tardif ¬ *A50.5†, K77.0**
- - - Tardive ¬ *A50.5†, K77.0**
- - - ¬ *A50.0†, K77.0**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, K77.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, K77.0**
- - ¬ *A52.7†, K77.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.1†, K77.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, K77.0**
- Viral
- - Aigu
- - - Précisées ¬ Autres *B17.8*
- - - Sans précision ¬ *B17.9*
- - - ¬ Autres *B17*
- - Chronique
- - - B
- - - - Agent delta ¬ *B18.0*
- - - - Sans
- - - - - Agent delta ¬ *B18.1*
- - - - - Agent delta, AgHBe négatif, avec activité inflammatoire, forte réplication ¬ *B18.14*
- - - - - Agent delta, AgHBe négatif, sans activité inflammatoire, faible réplication ¬ *B18.13*

Hépatite *–suite*
- Viral *–suite*
- - Chronique *–suite*
- - - B *–suite*
- - - - Sans *–suite*
- - - - - Agent delta, AgHBe positif, avec activité inflammatoire, forte réplication ¬ *B18.12*
- - - - - Agent delta, phase 1 ¬ *B18.11*
- - - - - Agent delta, phase 2 ¬ *B18.12*
- - - - - Agent delta, phase 3 ¬ *B18.13*
- - - - - Agent delta, phase 4 ¬ *B18.14*
- - - - - Agent delta: AgHBe positif, sans activité inflammatoire, forte réplication ¬ *B18.11*
- - - - - Agent delta: Phase d'immunotolérance ¬ *B18.11*
- - - C ¬ *B18.2*
- - - D ¬ *B18.0*
- - - E ¬ *B18.8*
- - - Sans précision ¬ *B18.9*
- - - ¬
- - - - *B18*
- - - - *B18.8*
- - Coma hépatique ¬ *B19.0, K72.74!*
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.4*
- - Congénitale ¬ *P35.3*
- - Infectieuse) aiguë SAI ¬ *B17.9*
- - SAI ¬ *B19.9*
- - Sans précision
- - - Coma hépatique ¬ *B19.0*
- - - Sans précision, sans coma hépatique ¬ *B19.9*
- - - ¬ *B19*
- - ¬
- - - Arthropathie post-infectieuse au cours d' *B19.9†, M03.29**
- - - Nécessité d'une vaccination contre l' *Z24.6*
- - - Séquelles d' *B94.2*
- - - Sujets en contact avec et exposés à l' *Z20.5*
- Virus
- - Coxsackie ¬ *B33.8†, K77.0**
- - Herpes ¬ *B00.8†, K77.0**
- ¬
- - Herpès simplex avec *B00.8†, K77.0**
- - Infection par le virus de l' *B19.9*

Hépato
v.a. cérébro-hépato-rénal
v.a. rétino-hépato-endocrinologique
- Rénal
- - Consécutif au travail et à l'accouchement ¬ Syndrome *O90.4*
- - ¬ Syndrome *K76.7*

Hépatobiliaire
- Cause toxique ¬ Affection *K71.9*

Hépatobiliaire *–suite*
- Néonatale au cours de mucoviscidose ¬ Maladie *E84.88*
- Pancréas ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes dans le système *T85.75*
- ¬
- - Maladie *K83.9*
- - Obstruction *K83.1*

Hépatoblastome ¬ *C22.2*

Hépatocellulaire
- Fibrolamellaire ¬ Carcinome *C22.0*
- Sans précision ¬ Ictère néonatal dû à des lésions *P59.2*
- Télangiectasique ¬ Adénome *D13.4*
- ¬
- - Carcinome *C22.0*
- - CHC [carcinome *C22.0*

Hépatocytes
- Insuffisance hépatique ¬ nécrose des *K72*
- ¬
- - Cholestase: avec lésion des *K71.0*
- - Dégénérescence des *K76.8*

Hépatoencéphalopathie par déficit combiné de la phosphorylation oxydative de type 1 ¬ *E88.8, K72.79!*

Hépatoérythropoïétique ¬ Porphyrie *E80.2*

Hépatogène ¬ Diabète sucré *E13.90*

Hépato-lenticulaire ¬ Dégénérescence *E83.0*

Hépatolenticulaire ¬ Démence au cours de dégénérescence *E83.0†, F02.8**

Hépatome (malin) ¬ *C22.0*

Hepatomegalia glycogenica diffusa ¬ *E74.0†, K77.8**

Hépatomégalie
- Congénital(e) ¬ *Q44.7*
- Cours de mononucléose à virus de l'herpès gamma ¬ *B27.0†, K77.0**
- Non classée ailleurs ¬ *R16.0*
- SAI ¬ *R16.0*
- Splénomégalie, non classées ailleurs ¬ *R16.2*
- ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R16.0*

Hepatonephromegalia glycogenica ¬ *E74.0*

Hépatopathie associée aux IgG4 ¬ *K75.4*

Hépatophlébite ¬ *I80.88*

Hépatoptose ¬ *K76.8*

Hépato-rénal ¬
- Glycogénose *E74.0*
- Tyrosinémie *E70.2*

Hépatosplénique à cellules T ¬ Lymphome *C86.1*

Hépatosplénomégalie
- Dégénérescence cérébelleuse ¬ Syndrome d'ichtyose- *Q87.8*
- Hyperlipémique de type Bürger-Grütz ¬ *E78.3†, K77.8**
- Myéloïde mégacaryocytaire ¬ *D47.4*

Hépatosplénomégalie *–suite*
- SAI ¬ *R16.2*

Herbicides et fongicides ¬ Effet toxique: *T60.3*

Héréditaire
v. Type de maladie

Hérédofamiliale
- Neuropathique ¬ Amylose *E85.1*
- Non neuropathique ¬ Amylose *E85.0*
- Sans précision ¬ Amylose *E85.2*

Hérédopathie ataxique polynévritique ¬ *G60.1*

Hérédosyphilis ¬ *A50.9*

Herlitz ¬
- Epidermolyse bulleuse jonctionnelle type *Q81.1*
- Syndrome de *Q81.1*

Herlitz-Pearson ¬ Epidermolyse bulleuse jonctionnelle type *Q81.1*

Hermansky-Pudlak ¬ Syndrome de: *E70.3*

Hermaphrodisme, non classé ailleurs ¬ *Q56.0*

Hermaphrodite vrai
- 46,XX ¬ *Q99.1*
- ¬ Chimère 46,XX/46,XY *Q99.0*

Hermaphroditisme
v.a. Pseudohermaphroditisme

Hernández-Aguirre Negrete ¬ Syndrome de *Q87.8*

Hernie
- Abdominal
- - Non précis
- - - Gangrène ¬ *K46.1*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K46.0*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K46.9*
- - - ¬ *K46*
- - Précis
- - - Gangrène ¬ Autres *K45.1*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres *K45.8*
- - SAI ¬ *K46.9*
- - Siège précis
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres *K45.0*
- - - ¬ *K45*
- - ¬ Autres *K45*
- Bochdalek ¬ *K44.9*
- Cérébrale de cause traumatique ¬ *S06.38*
- Cerveau (tronc cérébral) ¬ *G93.5*
- Cervical noyau gélatineux
- - Névrite ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Radiculopathie ¬ *M50.1†, G55.1**
- Cervicothoracique noyau gélatineux
- - Névrite ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Radiculopathie ¬ *M50.1†, G55.1**
- Congénitale de la vessie ¬ *Q64.7*
- Corps vitré ¬ *H43.0*
- Cristallin] ¬ Phacocèle [*H27.8*

Hernie *–suite*
- Crurale
- - Bilatéral
- - - Gangrène ¬ *K41.1*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K41.0*
- - - Récidivant
- - - - Gangrène ¬ *K41.11*
- - - - ¬ *K41.21*
- - - SAI ¬ *K41.2*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K41.2*
- - Récidivant
- - - Gangrène ¬ *K41.41*
- - - Occlusion ¬ *K41.31*
- - - ¬ *K41.91*
- - Unilatéral
- - - Étranglée sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - Incarcérée sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - Irréductible sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - Occlusion, avec gangrène ¬ *K41.40*
- - - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - Récidivante, avec occlusion ¬ *K41.31*
- - - SAI ¬ *K41.9*
- - - Sans précision
- - - - Gangrène ¬ *K41.4*
- - - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - - Sans précision, sans occlusion ni gangrène ¬ *K41.9*
- - - ¬ *K41.90*
- - ¬ *K41*
- Diaphragmatique
- - Anomalies des membres ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - Congénitale ¬ *Q79.0*
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K44.0*
- - Gangrène ¬ *K44.1*
- - Gangréneuse ¬ *K44.1*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K44.0*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K44.0*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K44.0*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K44.0*
- - SAI ¬ *K44.9*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K44.9*
- - ¬ *K44*
- Discal
- - Cervicale ¬ Compression de la moelle épinière due à une *M50.0†, G99.2**
- - ¬
- - - Lumbago dû à une *M51.2*
- - - Névrite due à une *M51.1†, G55.1**
- - - Syndrome de la colonne lombaire dû à une *M51.1†, G55.1**
- Disque
- - Cervical ¬ Autre *M50.2*
- - Intervertébral précisé ¬ *M51.2*

Hernie *–suite*
- Douglas ¬ *N81.5*
- Épigastrique
- - Causant une occlusion ¬ *K43.60*
- - Gangrène ¬ *K43.70*
- - Incarcérée ¬ *K43.60*
- - Non réductible ¬ *K43.60*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K43.60*
- - Partiellement incarcérée ¬ *K43.60*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.90*
- Gangrène ¬ Strangulation de l'intestin due à une *K46.1*
- Hiatale
- - Congénitale ¬ *Q40.1*
- - Œsophagienne) (par glissement) ¬ *K44*
- Honteuse [du canal d'Alcock] ¬ *K45*
- Hypogastrique
- - Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- - Étranglée ¬ *K43.68*
- - Incarcérée ¬ *K43.68*
- - Non réductible ¬ *K43.68*
- - ¬
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- Incarcérée de Spieghel ¬ *K43.68*
- Incisionnel
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K43.0*
- - Gangrène ¬ *K43.1*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K43.0*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K43.0*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K43.0*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K43.0*
- - SAI ¬ *K43.2*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.2*
- Inguinal
- - Bilatéral
- - - Gangrène ¬ *K40.1*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K40.0*
- - - SAI ¬ *K40.2*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K40.2*
- - - ¬ *K40*
- - Directe ¬ *K40*
- - Indirecte ¬ *K40*
- - Oblique ¬ *K40*
- - SAI
- - - Gangrène ¬ *K40.4*
- - - ¬ *K40*
- - Unilatéral
- - - Étranglée sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - Incarcérée sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - Irréductible sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K40.3*

Hernie *–suite*
- Inguinal *–suite*
- - Unilatéral *–suite*
- - - SAI ¬ *K40.9*
- - - Sans précision
- - - - Gangrène ¬ *K40.4*
- - - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - - Sans précision, sans occlusion ni gangrène ¬ *K40.9*
- - ¬ *K40*
- Interstitielle ¬ *K46*
- Intestinale ¬ *K46*
- Intra-abdominale ¬ *K46*
- Larrey ¬ *K44.9*
- Ligne
- - Blanc ¬
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- - Médian
- - - Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- - - Étranglée ¬ *K43.68*
- - - Incarcérée ¬ *K43.68*
- - - Non réductible ¬ *K43.68*
- Lombaire
- - Noyau gélatineux avec radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**
- - ¬ *K45*
- Lombosacrée du noyau gélatineux avec radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**
- Médiastinale ¬ *J98.58*
- Morgagni ¬ *K44.9*
- Musculaire ¬ *M62.8*
- Noyau gélatineux
- - Myélopathie ¬ *M51.0†, G99.2**
- - ¬ Névrite au cours d'une *M51.1†, G55.1**
- Obturatrice ¬ *K45*
- Occlusion intestinale ¬ *K46.0*
- Ombilical
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K42.0*
- - Gangrène ¬ *K42.1*
- - Gangréneuse ¬ *K42.1*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K42.0*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K42.0*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K42.0*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K42.0*
- - SAI ¬ *K42.9*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K42.9*
- - ¬ *K42*
- Ovaire et de la trompe de Fallope ¬ Prolapsus et *N83.4*
- Para-œsophagienne ¬ *K44*
- Para-ombilicale ¬ *K42*
- Parastomale
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K43.3*

Hernie *–suite*
- Parastomale *–suite*
- - Gangrène ¬ *K43.4*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K43.3*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K43.3*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K43.3*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K43.3*
- - SAI ¬ *K43.5*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.5*
- Paroi abdominal
- - Antérieur
- - - Gangrène ¬ Autres *K43.78*
- - - Non précis
- - - - Gangrène
- - - - - ¬ *K43.79*
- - - - - ¬ Autres *K43.7*
- - - - Occlusion
- - - - - Sans gangrène ¬ *K43.69*
- - - - - Sans gangrène ¬ Autres *K43.6*
- - - - Sans
- - - - - Occlusion ni gangrène ¬ *K43.99*
- - - - - Occlusion ni gangrène ¬ Autres *K43.9*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres *K43.68*
- - - SAI ¬ *K43.99*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres *K43.98*
- - - ¬ *K43*
- - ¬ *K43.99*
- Rétropéritonéale ¬ *K45*
- SAI ¬ *K46*
- Sciatique ¬ *K45*
- Scrotale ¬ *K40*
- Sous-xiphoïdien
- - Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- - Étranglée ¬ *K43.68*
- - Incarcérée ¬ *K43.68*
- - Non réductible ¬ *K43.68*
- - ¬
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- Spiegel ¬
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- - Syndrome de cryptorchidie- *K43.68*
- Spieghel
- - Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- - Étranglée ¬ *K43.68*
- - Non réductible ¬ *K43.68*
- Sur cicatrice
- - Abdominale ¬ *K43.2*
- - Ombilicale ¬ *K43.2*

Hernie *–suite*
- Thoracique du noyau gélatineux avec radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**
- Thoraco-lombaire du noyau gélatineux avec radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**
- Ventral
- - Causant une occlusion, sans gangrène ¬ *K43.69*
- - Étranglée, sans gangrène ¬ *K43.69*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K43.69*
- - Non réductible
- - - Sans gangrène ¬ *K43.69*
- - - ¬ *K43.69*
- ¬ Iléus paralytique et occlusion intestinale sans *K56*

Héroïne
- Voie
- - Intraveineuse ¬ Consommation d' *U69.30!*
- - Non intraveineuse ¬ Consommation d' *U69.31!*
- ¬ Intoxication: *T40.1*

Herpangine ¬ *B08.5*

Herpes
- Gestationis ¬ *O26.4*
- Simiae ¬
- - Encéphalite à virus *B00.4†, G05.1**
- - Encéphalomyélite à virus *B00.4†, G05.1**
- Simplex
- - Face ¬ *B00.1*
- - Lèvre ¬ *B00.1*
- - SAI ¬ Infection à *B00.9*
- - ¬
- - - Infection
- - - - Ano-génitale par le virus de l'herpès [*A60*
- - - - Virale congénitale herpétique [*P35.2*
- - - - Virus de l'herpès [*B00*
- - - Otite externe au cours de l'infection due au virus de l'herpès [*B00.1†, H62.1**
- Tonsurans ¬ *B35.0*
- Zoster
- - Ophthalmicus NCA ¬ *B02.3†, H58.8**
- - ¬
- - - *B02*
- - - Zona [*B02*
- ¬ Hépatite due au virus de l' *B00.8†, K77.0**

Herpès
- Cornée ¬ *B00.5†, H19.1**
- Gamma ¬
- - Hépatite au cours de mononucléose à virus de l' *B27.0†, K77.0**
- - Hépatomégalie au cours de mononucléose à virus de l' *B27.0†, K77.0**
- Herpes simplex ¬
- - Infection
- - - Ano-génitale par le virus de l' *A60*
- - - Virus de l' *B00*

Herpès *–suite*
- Herpes simplex ¬ *–suite*
- - Otite externe au cours de l'infection due au virus de l' *B00.1†, H62.1**
- Peau périanale ¬ *A60.1*
- Pénis ¬ *A60.0†, N51.8**
- Rectum ¬ *A60.1†, K93.8**
- Résistants aux virostatiques ¬ Virus de l' *U84!*
- Sans précision ¬ Infection
- - Ano-génitale par le virus de l' *A60.9*
- - Virus de l' *B00.9*
- Scrotum ¬ *A60.0†, N51.8**
- Simien type 1 (Virus B) ¬ Encéphalomyélite à *B00.4†*
- Simplex
- - Hépatite ¬ *B00.8†, K77.0**
- - Œil ¬ *B00.5†, H58.8**
- - Oreille externe ¬ *B00.1†, H62.1**
- - Paupière ¬ *B00.5†, H03.1**
- - ¬
- - - Infection congénitale au virus de l' *P35.2*
- - - Keratitis
- - - - Arborescens à *B00.5†, H19.1**
- - - - Dendritica à *B00.5†, H19.1**
- - - - Disciformis à *B00.5†, H19.1**
- - - - Interstitialis à *B00.5†, H19.1**
- - - Maladie due au VIH avec *B20, B00.9*
- - - Ulcus dendriticum de la cornée à *B00.5†, H19.1**
- Virus gamma ¬ Mononucléose due à *B27.0*
- Viscéral ¬ *B00.8†, K93.8**
- Vulve ¬ *A60.0†, N77.1**
- Zoster
- - Auricularis ¬ *B02.2†, H94.0**
- - Nerf facial ¬ *B02.2†, G53.0**
- - Névralgie ¬ *B02.2†, G53.0**
- - Oticus ¬ *B02.2†, H94.0**
- - Paupière ¬ *B02.3†, H03.1**
- - ¬
- - - Conjonctivite au cours d' *B02.3†, H13.1**
- - - Encéphalite au cours d' *B02.0†, G05.1**
- - - Ganglionite
- - - - Cours d' *B02.2†, G53.0**
- - - - Trigéminale après *B02.3†, H58.8**
- - - Iridocyclite au cours d' *B02.3†, H22.0**
- - - Méningite à *B02.1†, G02.0**
- - - Névralgie crânienne après *B02.2†, G53.0**
- - ¬
- - Affections oculaires dues au virus de l' *B00.5†, H58.8**
- - Balanite due au virus de l' *A60.0†, N51.2**
- - Blépharite au cours d' *B00.5†, H03.1**
- - Cervicite due au virus de l' *A60.0†, N74.8**
- - Colite à virus de l' *B00.8†, K93.8**

Herpès *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Conjonctivite due au virus de l' *B00.5†, H13.1**
- - Dermite
- - - Paupière due au virus de l' *B00.5†, H03.1**
- - - Vésiculaire due au virus de l' *B00.1*
- - Duodénite à virus de l' *B00.8†, K93.8**
- - Encéphalite due au virus de l' *B00.4†, G05.1**
- - Épididymite due au virus de l' *A60.0†, N51.1**
- - Formes d'infection due au virus de l' *B00.8*
- - Gastrite à virus de l' *B00.8†, K93.8**
- - Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l' *B00.2*
- - Iléite à virus de l' *B00.8†, K93.8**
- - Infection
- - - Appareil génital de l'homme par le virus de l' *A60.0†, N51.8**
- - - Marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l' *A60.1*
- - - Organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l' *A60.0*
- - Iridocyclite due au virus de l' *B00.5†, H22.0**
- - Iritis due au virus de l' *B00.5†, H22.0**
- - Kératite
- - - Cours d' *B00.5†, H19.1**
- - - Virus de l' *B00.5†, H19.1**
- - Kératoconjonctivite due au virus de l' *B00.5†, H19.1**
- - Maladie
- - - Disséminée due au virus de l' *B00.7*
- - - Glomérulaire à virus de l' *B00.8†, N08.0**
- - - Reins à virus de l' *B00.8†, N29.1**
- - - Rénale tubulo-interstitielle à virus de l' *B00.8†, N16.0**
- - - Urètre à virus de l' *B00.8†, N29.1**
- - - Vessie à virus de l' *B00.8†, N33.8**
- - Méningite due au virus de l' *B00.3†, G02.0**
- - Méningo-encéphalite
- - - Cours d' *B00.4†, G05.1**
- - - Virus de l' *B00.4†, G05.1**
- - Myélite à virus de l' *B00.4†, G05.1**
- - Œsophagite au cours d' *B00.8†, K23.8**
- - Orchite due au virus de l' *A60.0†, N51.1**
- - Pharyngite due au virus de l' *B00.2*
- - Pneumonie à virus de l' *B00.8†, J17.1**
- - Proctite due au virus de l' *A60.1†, K93.8**
- - Prostatite due au virus de l' *A60.0†, N51.0**
- - Septicémie due au virus de l' *B00.7*
- - Ulcère de la vulve dû au virus de l' *A60.0†, N77.0**
- - Urétrite à virus de l' *B00.8†, N37.0**
- - Uvéite due au virus de l' *B00.5†, H22.0**
- - Vaginite due au virus de l' *A60.0†, N77.1**
- - Vulvite due au virus de l' *A60.0†, N77.1**

Herpès *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Vulvo-vaginite due au virus de l' *A60.0†, N77.1**

Herpétiforme
- Maladie de Duhring-Brocq] ¬ Dermite *L13.0*
- ¬
- - Impétigo *L40.1*
- - Pemphigus *L10.2*
- - Stomatite: *K12.0*

Herpétique
- Herpes simplex] ¬ Infection virale congénitale *P35.2*
- Humain de type 5 ¬ Infection par le virus *B25.9*
- Oropharyngée ¬ Infection *B00.2*
- Périanale ¬ Infection *A60.1*
- ¬
- - Eczéma *B00.0*
- - Panaris *B00.8†, L99.8**
- - Rétinite *B00.5†, H32.0**
- - Vulvo-vaginite *A60.0†, N77.0**

Hers ¬ Maladie de: *E74.0*

Herxheimer ¬ Maladie de *L90.4*

Hétérochromatine ¬ Sujet avec marqueur d' *Q95.4*

Hétérochromie des cheveux ¬ *L67.1*

Hétérologue ou homologue ¬ organe ou tissu remplacé par greffe *Z94*

Hétéronyme) (homonyme) ¬ Hémianopsie (*H53.4*

Hétérophorie ¬ *H50.5*

Hétérophyiase ¬ *B66.8*

Hétéroplasie osseuse progressive ¬ *M61.59*

Hétérosexuelle précoce chez la femme ¬ pseudo-puberté *E25*

Hétérotaxie
v. cardiaque-hétérotaxie

Hétérotopie
- Périventriculaire ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos avec *Q79.6*
- Sous-corticale en bandes ¬ *Q04.3*

Hétérotropie
- Intermittente ¬ *H50.3*
- Sans précision ¬ *H50.4*

Hétérozygote
- Doubles ¬ Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] *D57.2*
- ¬ Hémoglobine S *D57.3*

Heubner ¬ Maladie de l'artère d' *A52.0†, I68.1**

Hexokinase ¬ Anémie (due à): déficit en: *D55.2*

Hexosaminidase A ¬ Déficit en *E75.0*

Hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l' *D55.1*

HHH ¬ Syndrome *E72.4*

HHML ¬ *Q87.3*

HHT ¬ *I78.0*

Hiatale

- Congénitale ¬ Hernie *Q40.1*
- Œsophagienne) (par glissement) ¬ hernie: *K44*

Hiatus œsophagien ¬ Glissement du cardia à travers le *Q40.1*

Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (*Z27.8*

Hidrosadénite suppurée ¬ *L73.2*

HIES syndrome hyperimmunoglobulinémie E autosomique

- Dominant ¬ *D82.4*
- Récessif ¬ *D82.4*

Higashi ¬ Syndrome de: Chediak(-Steinbrinck)- *E70.3*

High Urgency ¬ Inscription

- Effectué transplantation
- - Organe
- - - Niveau d'urgence HU (*Z75.7*
- - - Sans niveau d'urgence HU (*Z75.6*
- - Pulmonaire
- - - Niveau d'urgence HU [*U55.22*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [*U55.20*
- Transplantation
- - Cardiaque
- - - Niveau d'urgence HU [*U55.12*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [*U55.10*
- - Cœur poumon
- - - Niveau d'urgence HU [*U55.32*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [*U55.30*

High-flow ¬ Priapisme de type *N48.31*

Highmore) (maxillaire) ¬ Antre (de *C31.0*

HIGM avec susceptibilité aux infections opportunistes ¬ *D80.5*

HIGM4 ¬ *D80.5*

Hilaire

- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A15.4*
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A16.3*
- ¬ Cholangiocarcinome *C24.0*

Hile

- Poumon) ¬ *C34.0*
- Splénique ¬ Arrachement du *S36.04*

Hines
v. Sommer-Hines

Hinman ¬ Syndrome de *N32.8*

Hiob ¬ Syndrome de *D82.4*

Hippel
v. von Hippel-Lindau

Hippocratisme

- Digital
- - Congénital
- - - Isolé ¬ *Q68.1*
- - - ¬ *Q68.1*
- - ¬
- - - *R68.3*
- - - Pachydermopériostose avec *M89.49†, L62.0**
- Ongles ¬ *R68.3*
- Unguéal congénital(e) ¬ *Q84.6*

Hirschorn ¬ Syndrome de Wolff- *Q93.3*

Hirschsprung ¬

- HSCR [Maladie de *Q43.1*
- Maladie de *Q43.1*

Hirsutisme ¬ *L68.0*

Hirudine ¬ Troubles hémorragiques dus à l' *D68.35*

Hirudiniase

- Externe ¬ *B88.3*
- Interne ¬ *B83.4*

Hisien

- Familiales ¬ Tachyarythmie atriale et trouble de conduction cardiaque infra- *I45.8*
- ¬ Tachycardie *I47.1*

Histamine ¬ Maux de tête dus à l' *G44.0*

Histaminique

- Acquis ¬ Angio-Œdème non *T78.3*
- H2 ¬ Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs *T47.0*
- Héréditaire ¬ Angio-Œdème non *D84.1*
- Horton ¬ Céphalée *G44.0*
- ¬
- - Céphalée *G44.0*
- - Syndrome de type *T61.1*

Histidase ¬ Déficit en *E70.8*

Histidine ¬ Anomalies du métabolisme de: *E70.8*

Histidine-ammoniac-lyase ¬ Déficit en *E70.8*

Histidinémie ¬ *E70.8*

Histidinémique ¬ Syndrome *E70.8*

Histidine-rich (poly-L) glycoprotéine ¬ Thrombophilie héréditaire due au déficit congénital en *D68.5*

Histidinurie ¬ *E70.8*

Histiocytaire

- Diffus ¬ Lymphome *C83.9*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeurs *D47.7*
- Vrai ¬ Lymphome *C96.8*
- ¬
- - Lymphome de type *C85.9*
- - Réticulose médullaire *C96.8*
- - Sarcome *C96.8*
- - Syndromes *D76.3*

Histiocytaire-lymphocytaire ¬ Sarcome *C85.9*

Histiocytes

- Mastocytes à évolution imprévisible et inconnue ¬ Tumeurs à *D47.0*
- ¬ Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T/ *C83.3*

Histiocytoïde ¬ Cardiomyopathie *I42.0*

Histiocytose

- Cellule Langerhans
- - Multifocale
- - - Multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ *C96.0*
- - - Unisystémique ¬ *C96.5*
- - SAI ¬ *C96.6*
- Céphalique bénigne ¬ *D76.3*
- Éruptive généralisée ¬ *D76.3*
- Langerhansienne aiguë et disséminée ¬ *C96.0*
- Lipoïde essentielle ¬ *E75.2*
- Lipoïdique ¬ *C96.6*
- Malign ¬
- - *C96.8*
- - Arthropathie au cours de l' *C96.8†, M36.1**
- Phagocytes mononucléés ¬ *D76.1*
- Progressif
- - Mucineuse héréditaire ¬ *D76.3*
- - Nodulaire ¬ *D76.3*
- Pulmonaire X ¬ *C96.5*
- Sinusale avec adénopathie massive ¬ *D76.3*
- Unifocale à cellules de Langerhans ¬ *C96.6*
- X
- - Chronique ¬ *C96.6*
- - Multifocale ¬ *C96.5*
- - Multisystémique ¬ *C96.0*
- - SAI ¬ *C96.6*
- - Unifocale ¬ *C96.6*

Histocompatibilité classe

- I ¬ Déficit en complexe majeur d' *D81.6*
- II ¬ Déficit en complexe majeur d' *D81.7*

Histologique

- Kyste anévrismal et d'une autre lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques *K09*
- Stade
- - 1 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats *N17.81*
- - 2 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats *N17.82*
- - 3 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats *N17.83*
- Urines ¬ Résultats anormaux de l'examen cytologique et *R82.8*
- ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*
- - Empyème tuberculeux
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.6*

Histologique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Empyème tuberculeux *–suite*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.5*
- - Épanchement pleural tuberculeux primaire, confirmé par analyse bactériologique ou *A15.7†, J91**
- - Fibrose tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*
- - Forme tuberculose appareil respiratoire
- - - Confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- - Insuffisance rénal aigu
- - - Résultat
- - - - *N17.8*
- - - - *N17.89*
- - - Sans résultat *N17.9*
- - Pleurésie tuberculeux
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.6*
- - - Primaire avec épanchement, confirmée par analyse bactériologique ou *A15.7†, J91**
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.5*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.5*
- - Pneumonie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*
- - Pneumothorax tuberculeux sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*
- - Primo infection tuberculeux appareil respiratoire
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.7*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.7*
- - Tuberculose
- - - Appareil respiratoire
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15*
- - - - Sans
- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16*
- - - - - Précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et *A15.9*
- - - - - Précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.9*
- - - Bronche
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*

Histologique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Tuberculose *–suite*
- - - Bronche *–suite*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*
- - - Ganglion intrathoracique
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.4*
- - - - Sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*
- - - Ganglionnaire
- - - - Hilaire
- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*
- - - - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*
- - - - Médiastinal
- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*
- - - - Trachéo-bronchique
- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*
- - - Glotte
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*
- - - Larynx
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*
- - - - Trachée
- - - - - Bronches, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*
- - - - - Bronches, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*
- - - Médiastinal
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- - - Nasal
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*

Histologique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Tuberculose *–suite*
- - - Nasal *–suite*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- - - Plèvre
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.6*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.5*
- - - Pulmonaire
- - - - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - - Confirmation *A15.2*
- - - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - - Sans
- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*
- - - - - Examen bactériologique, par biologie moléculaire et *A16.1*
- - - - - Mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - Rhinopharyngé
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- - - Sinus face
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- - - Trachée
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*

Histolytica ¬

- Abcès du foie à Entamoeba *A06.4†, K77.0**
- Amibiase à Entamoeba *A06.9*
- Hépatite à Entamoeba *A06.4†, K77.0**
- Infection Entamoeba

Histolytica ¬ *–suite*
- Infection Entamoeba *–suite*
- - *A06*
- - *A06.9*
- Méningo-encéphalomyélite à Torula *B45.1†, G05.2**
- Méningomyélite à Torula *B45.1†, G05.2**

Histoplasma
- Capsulatum
- - Sans précision ¬ Histoplasmose
- - - *B39.4*
- - - Pulmonaire à *B39.2*
- - ¬ Histoplasmose
- - - Disséminée à *B39.3*
- - - Généralisée à *B39.3*
- - - Pulmonaire
- - - - Aiguë à *B39.0*
- - - - Chronique à *B39.1*
- Duboisii ¬ Histoplasmose à *B39.5*

Histoplasmose
- Africaine ¬ *B39.5*
- Aigu
- - Poumon ¬ *B39.0†, J99.8**
- - ¬ Pneumonie au cours d' *B39.0†, J17.2**
- Américaine ¬ *B39.4*
- Chronique
- - Poumon ¬ *B39.1†, J99.8**
- - ¬ Pneumonie au cours d' *B39.1†, J17.2**
- Disséminée à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.3*
- Généralisée à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.3*
- Histoplasma
- - Capsulatum, sans précision ¬ *B39.4*
- - Duboisii ¬ *B39.5*
- Pulmonaire
- - Aiguë à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.0*
- - Chronique à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.1*
- - Histoplasma capsulatum, sans précision ¬ *B39.2*
- - ¬ *B39.2†, J99.8**
- Sans précision ¬ *B39.9*
- ¬
- - *B39*
- - Maladie due au VIH avec *B20, B39.9*

Histrionique ¬ Personnalité *F60.4*

Hittner
v. Hall-Hittner

HIV-1 ¬ *U85!*

HIV-2 ¬ *U85!*

HLHS ¬ *Q23.4*

HLP type 3 ¬ *E78.2*

HMC ¬ Syndrome *Q87.0*

HMI] ¬ Hypominéralisation molaires-incisives [*K00.4*

HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [*D55.1*

HNF1A ¬ Hyperinsulinisme par déficit en *E16.1*

HNF4A ¬ Hyperinsulinisme par déficit en *E16.1*

HNPCC] ¬ Cancer du côlon héréditaire non polyposique [*C18.9, Z80.0*

Hodes
v. Ulbright-Hodes

Hodgkin
- Classique
- - Cellularité mixte ¬ Lymphome de *C81.2*
- - Déplétion lymphocytaire
- - - Fibrose diffuse ¬ Lymphome de *C81.3*
- - - ¬ Lymphome de *C81.3*
- - Riche en lymphocytes ¬ Lymphome de *C81.4*
- - Sclérose nodulaire ¬ Lymphome de *C81.1*
- - Type
- - - Non précisé ¬ Lymphome de *C81.7*
- - - Réticulaire en déplétion lymphocytaire ¬ Lymphome de *C81.3*
- - ¬ Autres formes de lymphome de *C81.7*
- Diffus riche en lymphocytes ¬ Lymphome de *C81.4*
- Lymphogranulomatose maligne] ¬ Lymphome de *C81*
- Nodulaire
- - Prédominance lymphocytaire ¬ Lymphome de *C81.0*
- - Riche en lymphocytes ¬ Lymphome de *C81.4*
- Sans précision ¬ Lymphome de *C81.9*
- ¬ Sarcome de *C81.3*

Hodgkinien
- Cellule
- - B ¬ Lymphome non *C85.1*
- - T ¬ Lymphome non *C84.4*
- Non précisé ¬ Lymphome non *C85.9*
- SAI ¬ Lymphome: non *C85.9*
- Sans zones diffuses ¬ lymphome folliculaire non *C82*
- Types autres et non précisés ¬ Lymphome non *C85*
- ¬
- - Maladie due au VIH avec lymphome non *B21, C85.9*
- - Paragranulome *C81.0*
- - Types précisés de lymphome non *C85.7*

Hoehn Yahr ¬ stade
- 0 à moins de 3 selon *G20.0*
- 3 à 4 selon *G20.1*
- 5 selon *G20.2*

Hoffa] ¬ Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de *M79.4*

Hoffa-Castert ¬ Maladie idiopathique de *E88.8*

Hoffman] ¬ Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig- *G12.0*

Hoffmann ¬
- Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [*L66.3*
- Syndrome de Bouveret(- *I47.9*

Hollenhorst ¬ Plaque d' *H34.2*

Holmes
v. Balint-Holmes

Holmes-Adie ¬ Syndrome de *H57.0*

Holmes-Gang ¬ Syndrome de *Q87.0*

Holoprosencéphalie
- Situs inversus ¬ Syndrome d'agnathie- *Q87.8*
- ¬ *Q04.2*

Holoprosencéphalie-craniosynostose ¬ Syndrome d' *Q04.2*

Holt-Oram ¬ Syndrome de: *Q87.2*

Holzgreve-Wagner-Rehder ¬ Syndrome de *Q87.8*

Homard ¬ Main en pince de *Q71.6*

Homicide ¬ *Y09.9!*

Hominis
- Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium *B96.3!*
- ¬ Infection due à Isospora belli et Isospora *A07.3*

Homme
- Caryotype 46,XX ¬ Syndrome de Klinefelter, *Q98.2*
- Chromosomes sexuels de structure anormale ¬ *Q98.6*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections des organes génitaux de l' *N51.8**
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes génitaux de l' *D40*
- Mosaïque des chromosomes sexuels ¬ *Q98.7*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Affections inflammatoires des organes génitaux de l' *N49*
- - Précis ¬
- - - Carcinoma in situ: Organes génitaux de l' *D07.6*
- - - Tumeur maligne des organes génitaux de l' *C63*
- Pierre ¬ Maladie de l' *M61.19*
- Plus de deux chromosomes X ¬ Syndrome de Klinefelter, *Q98.1*
- Précisés ¬ Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l' *C63.7*
- Raide [rigidité musculaire] ¬ Syndrome de l' *G25.88*
- SAI ¬ Voies génito-urinaires de l' *C63.9*
- Sans précision ¬
- - Affection des organes génitaux de l' *N50.9*
- - Malformation congénitale des organes génitaux de l' *Q55.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Organe génital de l' *D29.9*

Homme *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l' *D40.9*
- - - Maligne: Organe génital de l' *C63.9*
- Virus de l'herpès ¬ Infection de l'appareil génital de l' *A60.0†, N51.8**
- ¬
- - Abcès des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Adhérences (de): pelviennes, chez l' *K66.0*
- - Affection
- - - Inflammatoire organe génital
- - - - Non précisés de l' *N49.9*
- - - - Précisés de l' *N49.8*
- - - Organes génitaux de l' *N50*
- - - Précisées des organes génitaux de l' *N50.8*
- - - Vasculaires des organes génitaux de l' *N50.1*
- - Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l' *Q55.9*
- - Anthrax des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Coït douloureux pour l' *N48.8*
- - Furoncle des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Gangrène de Fournier chez l' *N49.80*
- - Hématocèle SAI des organes génitaux de l' *N50.1*
- - Hémorragie des organes génitaux de l' *N50.1*
- - Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l' *N49.8*
- - Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l' *F52.3*
- - Macrogénitosomie précoce chez l' *E25*
- - Malformation congénital
- - - Organes génitaux de l' *Q55*
- - - Précisées des organes génitaux de l' *Q55.8*
- - Peau organe génital
- - - *D29*
- - - *D40.7*
- - Péritonite (aiguë): pelvienne, chez l' *K65.0*
- - Phlegmon des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale chez l' *E25*
- - Prolapsus de l'urètre chez l' *N36.3*
- - Pseudo-puberté isosexuelle précoce chez l' *E25*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l' *R86*
- - Stérilité
- - - *N46*
- - - Femme associée à des facteurs relevant de l' *N97.4*

Homme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Thrombose des organes génitaux de l' *N50.1*
- - Trouble de: érection chez l' *F52.2*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Autres organes génitaux de l' *D29.7*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l' *D40.7*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l' *C63.8*
- - Urétrocèle chez l' *N36.3*

Homocarnosinase ¬ Déficit en *E72.8*

Homocarnosinose ¬ *E72.8*

Homocystine ¬ Trouble du métabolisme de l' *E72.1*

Homocystinurie
- Défaut du métabolisme du cofacteur cobalamine ¬ *E72.1*
- Déficit
- - Cystathionine bêta-synthase ¬ *E72.1*
- - Méthylène tétrahydrofolate réductase ¬
- - - *E72.1*
- ¬ *E72.1*

Homologue
- Benzène ¬ Effet toxique: *T52.2*
- Phénol ¬ Effet toxique: Phénol et *T54.0*
- ¬
- - Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses *T65.3*
- - Hépatite sérique (ictère sérique *B19.9*
- - Organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou *Z94*

Homonyme) ¬ Hémianopsie (hétéronyme) (*H53.4*

Homozygote ¬
- Hypercholestérolémie familiale *E78.0*
- Phytostérolémie *E75.5*

Honteuse [du canal d'Alcock] ¬ hernie: *K45*

Hopf ¬ Acrokératose verruciforme de *Q82.8*

Hôpital
- Classé
- - Soit présente admission soit survenu 48 heure admission lors hospitalisation connu
- - - 29 jusqu'à 90 jours ¬ Pneumonie acquise à l' *U69.03!*
- - - Jusqu'à 28 jours ¬ Pneumonie acquise à l' *U69.02!*
- - Survenue plus de 48 heures après l'admission ¬ Pneumonie acquise à l' *U69.01!*
- - ¬ Pneumonie acquise à l' *U69.0!*
- ¬
- - Arrêt cardio-circulatoire avant l'admission à l' *U69.13!*
- - Enfant unique né
- - - *Z38.0*
- - - Hors d'un *Z38.1*

Hôpital *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Jumeau nés
- - - *Z38.3*
- - - Hors d'un *Z38.4*
- - Naissance multiple enfant nés
- - - *Z38.6*
- - - Hors d'un *Z38.7*

Hopkins
v. Pitt-Hopkins

Hoquet ¬
- *R06.6*
- Formes psychogènes de: *F45.3*

Horan
v. Nance-Horan

Horizontal ¬
- Nystagmus *H55*
- Surocclusion: *K07.2*

Hormonal
- Ectopique, non classée ailleurs ¬ Sécrétion *E34.2*
- Périphériques ¬ Anomalies des récepteurs *E34.5*
- Positifs ¬ Carcinome mammaire invasif à récepteurs *C50.9*
- SAI ¬ Trouble: *E34.9*
- Sans précision ¬ Intoxication: Antagonistes *T38.9*
- ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: modifications *G40.5*

Hormone
- Adrénocorticotrope
- - Extra-hypophysaire ¬ Syndrome d'ACTH [*E24.3*
- - ¬ Syndrome de Cushing dû à la production ectopique d'ACTH [*E24.3*
- Androgène testiculaire SAI ¬ Biosynthèse défectueuse de l' *E29.1*
- Antéhypophysaires [adénohypophysaires] ¬ *T38.8*
- Antidiurétique ¬ Syndrome de sécrétion anormale de l' *E22.2*
- Anti-Müller ¬ Déficit de l' *E29.1*
- Croissance
- - Idiopathique ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- - ¬
- - - Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l' *D80.0*
- - - Déficit congénital isolé en *E23.0*
- - - Hypersécrétion du pancréas endocrine de: "releasing factor" de l' *E16.8*
- - - Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- - - Petite taille par déficit en récepteur des secrétagogues de l' *E34.3*
- Hypophysaire ¬ Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- Intestinales ¬ Autres hypersécrétions d' *E34.1*
- Parathyroïdiennes et leurs dérivés ¬ *T50.9*

Hormone *–suite*

- Somatotrope ¬ Hypersécrétion de l' *E22.0*
- Substituts synthétiques
- - Antagonistes, non classés ailleurs ¬ Intoxication par *T38*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T38.8*
- Testiculaires ¬ Hypersécrétion d' *E29.0*
- Thyroïdien
- - Dérivés ¬ Intoxication: *T38.1*
- - ¬ Hypothyroïdie due à une résistance périphérique aux *E03.8*
- ¬
- - Abus de: stéroïdes ou *F55*
- - Acrodysostose avec résistance aux multiples *Q75.4*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Stéroïdes et *F55.5*

Hormonosynthèse ¬ Goitre

- Familial dû à un trouble de l' *E07.1*
- Trouble de l' *E07.1*

Horner
v.a. Claude-Bernard-Horner

- Congénital ¬ Syndrome de *G90.2*
- ¬
- - Pupille de *G90.2*
- - Syndrome de Claude Bernard- *G90.2*
- - Triade de *G90.2*

Hors

- Caféine ¬
- - Consommation non intraveineuse d'autres stimulants *U69.36!*
- - Utilisation intraveineuse d'autres stimulants *U69.35!*
- Hôpital ¬
- - Enfant unique, né *Z38.1*
- - Jumeaux, nés *Z38.4*
- - Naissances multiples, enfants nés *Z38.7*
- Virus grippe aviaire porcine ¬
- - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, *J10.0*
- - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, *J10.8*

Hort
v. Escher-Hort

Horton ¬

- Céphalée histaminique de *G44.0*
- Maladie de *M31.6*
- Névralgie de *G44.0*

Hospitalisation

- Connu
- - 29 jusqu'à 90 jours ¬ Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, soit présente à l'admission, soit survenue dans un délai de 48 heures après l'admission, lors d'une *U69.03!*

Hospitalisation *–suite*

- Connu *–suite*
- - Jusqu'à 28 jours ¬ Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, soit présente à l'admission, soit survenue dans un délai de 48 heures après l'admission, lors d'une *U69.02!*
- Soin obstétrical y compris
- - Césarienne avant début travail ¬ lorsqu y a mise observation
- - - *O32*
- - - *O33*
- - - *O34*
- - Interruption grossesse ¬ lorsqu y a mise observation
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*

Hospitalisme

- Enfant ¬ *F43.2*
- ¬ *F68.1*

Hostilité

- Envers un enfant transformé en bouc émissaire ¬ *Z62*
- ¬
- - *R45.5*
- - Exposition à une catastrophe, une guerre et autres *Z65*

Hôte

- GVH chronique
- - Forme
- - - Légère ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.05†*
- - - Modérée ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.06†*
- - - Sévère ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.07†*
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - Foie dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *K77.2**
- - - - Muqueuse buccale dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *K93.4**
- - - - Œil et de ses annexes dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *H58.2**
- - - - Pulmonaire dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *J99.2**
- - - - Tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *M36.5**
- - - - Voies digestives dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *K93.3**
- - - Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *N77.2**
- Sans précision ¬ Maladie chronique du greffon contre l' *T86.09*
- Stade
- - I et II ¬ Maladie aiguë du greffon contre l' *T86.01†*
- - III et IV ¬ Maladie aiguë du greffon contre l' *T86.02†*

Hôte *–suite*

- ¬ Échec d'un transplant de cellules souches hématopoïétiques et maladie du greffon contre l' *T86.0*

Houlston-Ironton-Temple ¬ Syndrome de *Q87.8*

HPA modérée ¬ *E70.1*

HPE ¬ *Q04.2*

HPFH - bêta-thalassémie ¬ *D56.4*

HPN ¬ *D59.5*

HPPD ¬ Déficit en 4- *E70.2*

HPRT

- Grade IV ¬ Déficit en *E79.1*
- ¬ Hyperuricémie associée à *E79.8*

HPTC ¬ *I27.20*

HSAN1 ¬ *G60.8*

HSCR [Maladie de Hirschsprung] ¬ *Q43.1*

HSD10 atypique ¬ Déficit en *G25.5*

HSH ¬ *E83.4*

HSN1E ¬ *G60.8*

HSP ¬ *G11.4*

HSV-2 ¬ Dermite vésiculaire

- Lèvre due au virus humain type 2 (alpha) [*B00.1*
- Oreille due au virus humain type 2 (alpha) [*B00.1*

HTLV-1 ¬

- Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au *C91.5*
- Myélopathie due à une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 (*G04.1*
- Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [*Z22.6*

Huët ¬ Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: Pelger- *D72.0*

Hugh
v. Fitz-Hugh-Curtis

Hughes ¬ Syndrome de *D68.6*

Hughes-Stovin ¬ Syndrome de *M35.2*

Huile

- Essences ¬ Pneumonie due à des *J69.1*
- Fusel ¬ Effet toxique: *T51.3*
- Graisses ¬ Dermite irritante de contact due aux *L24.1*
- Sésame ¬ Allergie à l' *T78.1*
- Toxique ¬ Syndrome de l' *T62.8*

Huileuse ¬ Pneumonie *J69.1*

Humain

- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Papillomavirus *B97.7!*
- Maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l'immunodéficience *Z11*
- Orthopoxvirus ¬ Infection *B08.0*
- Résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases ¬ Virus de l'immunodéficience *U85!*
- Type

Humain *–suite*
- Type *–suite*
- - 1 HTLV-1 ¬
- - - Myélopathie due à une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T *G04.1*
- - - Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T *Z22.6*
- - 2 alpha HSV-2 ¬ Dermite vésiculaire
- - - Lèvre due au virus *B00.1*
- - - Oreille due au virus *B00.1*
- - 5 ¬ Infection par le virus herpétique *B25.9*
- - I ¬ Dermatite infectieuse associée au virus T-lymphotrope *L30.3*
- VIH
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladie due au virus de l'immunodéficience *O98.7*
- - ¬
- - - Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience *Z21*
- - - Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience *R75*
- - - Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience *Z20.6*
- Viral VIH
- - Origine
- - - Affections précisées ¬ Immunodéficience *B22*
- - - Maladie
- - - - Infectieuses et parasitaires ¬ Immunodéficience *B20*
- - - - ¬ Immunodéficience *B23*
- - - Tumeurs malignes ¬ Immunodéficience *B21*
- - Sans précision ¬ Immunodéficience *B24*
- ¬
- - Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus *J21.1*
- - Bronchite à métapneumovirus *J20.8*
- - Conseil: à propos du VIH [virus de l'immunodéficience *Z71*
- - Encéphalite à métapneumovirus *A85.8†, G05.1**
- - Métapneumovirus *B97.8!*
- - Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T *G04.1*
- - Pneumonie due au Metapneumovirus *J12.3*
- - Vaccination contre le papillomavirus *Z25.8*

Humanus
- Capitis ¬ Pédiculose due à Pediculus *B85.0*
- Corporis ¬ Pédiculose due à Pediculus *B85.1*

Huméral
v.a. radio-huméral
- Panner] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: condyle *M92.0*
- SAI ¬ Luxation de l'épaule [articulation gléno- *S43.00*
- Supérieur) (moyen) (inférieur) ¬ Ligament gléno- *S43.4*

Huméral *–suite*
- ¬
- - Articulation cubito- *S53.1*
- - Fracture de deux à quatre fragments de la tête *S42.21*
- - Ligament coraco- *S43.4*
- - Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno- *S43.0*
- - Nécrose aseptique des condyles *M92.0*

Humérocubitale (articulation) ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.44*

Huméroradiale
- Articulation) ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.43*
- ¬ Synostose *Q74.0*

Huméro-radio-ulnaire ¬ Synostose *Q74.0*

Huméro-ulnaire ¬ Synostose *Q74.0*

Humérus
- Col
- - Anatomique ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.23*
- - Chirurgical ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.22*
- Épicondyle
- - Épicondyles, non précisé ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.44*
- - Latéral ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.42*
- - Médial ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.43*
- Grand tubercule ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.24*
- Haas] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête de l' *M92.0*
- Partie
- - Non précis ¬ Fracture extrémité
- - - Inférieure de l' *S42.40*
- - - Supérieure de l' *S42.20*
- - Partie multiple ¬ Fracture extrémité
- - - Inférieure de l' *S42.49*
- - - Supérieure de l' *S42.29*
- Proximal ¬ *S43.0*
- SAI ¬ *S42.3*
- Supracondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.41*
- Tant que traumatisme dû à l'accouchement ¬ Fracture proximale de l' *P13.3*
- Tête ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.21*
- Transcondylaire (en T ou en Y) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.45*
- ¬
- - Agénésie de l' *Q71.8*
- - Aplasie de la trochlée de l' *Q74.0*
- - Fracture
- - - Condyle de l' *S42.44*
- - - Diaphyse de l' *S42.3*
- - - Extrémité
- - - - Inférieure de l' *S42.4*

Humérus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fracture *–suite*
- - - Extrémité *–suite*
- - - - Supérieure de l' *S42.2*
- - - Multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l' *S42.7*
- - Luxation
- - - Antérieure de l' *S43.01*
- - - Inférieure de l' *S43.03*
- - - Postérieure de l' *S43.02*
- - Ostéochondrite juvénile de l' *M92.0*

Humeur
- Affectif
- - Isolés ¬ Autres troubles de l' *F38.0*
- - Persistant, sans précision ¬ Trouble de l' *F34.9*
- - Persistants ¬ Autres troubles de l' *F34.8*
- - Précisés ¬ Autres troubles de l' *F38.8*
- - Récurrents ¬ Autres troubles de l' *F38.1*
- - Sans précision ¬ Trouble de l' *F39*
- - ¬ trouble
- - - *F38*
- - - Organiques de l' *F06.3*
- ¬
- - Manie symptôme psychotique
- - - Congruents à l' *F30.2*
- - - Non congruents à l' *F30.2*
- - Symptômes et signes relatifs à l' *R45.8*

Humide
- Implication du système circulatoire ¬ Béribéri *E51.1†, I98.8**
- Pian-crabe) ¬ Papillomes multiples et pian plantaire *A66.1*
- Stade IVb de Leriche et Fontaine ¬ Gangrène *I70.25*
- ¬ Dégénérescence de la macula liée à l'âge, *H35.30*

Humidification de l'air ¬ Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d' *J67.7*

Humidité ¬ Dommages dus au froid et à l' *T69.9*

Humoraux ¬ Déficit en anticorps *D80.9*

Hünermann
v. Conradi-Hünermann-Happle

Hunt
v.a. Tolosa-Hunt
- ¬
- - Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: myoclonies [Ramsay- *G11.1*
- - Syndrome de *B02.2†, G53.0**

Hunter ¬
- Dégénérescence cérébrale au cours de syndrome de *E76.1†, G32.8**
- Syndrome de *E76.1*

Hunter-Hurler ¬ Syndrome de *E76.1*

Hunter-McAlpine ¬ Syndrome de *Q87.0*

Huntington
- Démence ¬
- - Chorée de *G10†, F02.2**
- - Maladie de *G10†, F02.2**
- Juvénile ¬ Maladie de *G10*
- ¬
- - Chorée
- - - *G10*
- - - Chronique progressive héréditaire de *G10*
- - Démence de la chorée de *F02.2**
- - Maladie de *G10*

Huntington-like due à des expansions C9ORF72 ¬ Maladie de *G10*

Huriez ¬ Syndrome de *Q82.8*

Hurler
v.a. Hunter-Hurler
- Scheie ¬ Syndrome de: *E76.0*
- ¬
- - Mucolipidose III [polydystrophie de type *E77.0*
- - Syndrome de: Pfaundler- *E76.0*

Hurst] ¬ Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [*G36.1*

Hutchinson ¬
- Dents de *A50.5*
- Triade de *A50.5*

Hutchinson-Gilford ¬ Syndrome de *E34.8*

Huttenlocher
v. Alpers-Huttenlocher

Hyaline
- Adulte ¬ Maladie membrane
- - *J80*
- - *J80.09*
- Aorte ¬ Nécrose *I71.9*
- Nouveau-né ¬ Maladie des membranes *P22.0*

Hyalinose
- Cutanéo-muqueuse ¬ *E78.8*
- Focale et segmentaire ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux stéroïdes avec *N04.1*
- Systémique infantile ¬ *E78.8*

Hyalins ¬ Myopathie à corps *G71.2*

Hyalite syphilitique
- Tardive ¬ *A52.7†, H45.8**
- ¬ *A52.7†, H45.8**

Hyaloïdes ¬ Membranes et fibres *H43.3*

Hyalose syphilitique tardive en forme d'étoile ¬ *A52.7†, H45.8**

Hyaluronidase ¬ Déficit en *E76.2*

Hydantoïne ¬
- Intoxication dérivé
- - *T42.0*
- Syndrome fœtal dû à l' *Q86.1*

Hydarthrose
- Clutton ¬ *A50.5†, M03.19**
- Intermittente ¬ *M12.4*

Hydarthrose *–suite*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.5†, M03.19**
- - Tardive ¬ *A52.7†, M14.89**

Hydatide
- Morgagni ¬ Torsion (de): *N83.5*
- ¬ Torsion
- - *N44.1*
- - Testicule et torsion *N44*

Hydatidose ¬
- *B67*
- *B67.9*

Hydatiforme
- Classique ¬ Môle *O01.0*
- Complète ¬ Môle *O01.0*
- Incomplète et partielle ¬ Môle *O01.1*
- Invasive ¬ Môle *D39.2*
- Maligne ¬ Môle *D39.2*
- Sans précision ¬ Môle *O01.9*
- ¬
- - Môle *O01.9*
- - Œuf clair et môle non *O02.0*
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle: *Z35.1*

Hydatique
- Cerveau ¬ Kyste *B67.9†, G94.8**
- Foie
- - Echinococcus granulosus ¬ Kyste *B67.0*
- - ¬ Kyste *B67.8†, K77.0**
- Poumon NCA ¬ Kyste *B67.9†, J99.8**
- Rate NCA ¬ Kyste *B67.9†, D77**

Hyde
- Forster-McCarthy-Berry ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬ Prurigo nodulaire de *L28.1*

Hydramnios ¬
- *O40*
- *P01.3*
- Fœtus et nouveau-né affectés par un *P01.3*

Hydranencéphalie ¬ *Q04.3*

Hydrarthrose à gonocoques ¬ *A54.4†, M14.89**

Hydratase ¬ Déficit en 3-méthylglutaconyl-CoA *E71.1*

Hydrates carbone
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E74.9*
- ¬
- - Anomalie
- - - Absorption intestinale des *E74.3*
- - - Métabolisme des *E74*
- - - Précisées du métabolisme des *E74.8*
- - Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: déplétion des *O21.1*

Hydrates carbone *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - Trouble de l'absorption intestinale des *E74.3*

Hydrique ¬
- Épuisement dû à la chaleur avec perte *T67.3*
- Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et *T50.3*

Hydro
- Électrolytique
- - Acido-basiques ¬ Autres déséquilibres *E87*
- - Non classés ailleurs ¬ Autres déséquilibres *E87.8*
- Encéphalocèle ¬ *Q01*
- Uretère ¬ *N13.4*

Hydroa vacciniforme ¬
- *L56.4*
- Lymphome à type d' *C84.5*

Hydrocarbures
- Aliphatiques
- - Aromatiques
- - - Sans précision ¬ Effet toxique: Dérivé halogéné d' *T53.9*
- - - ¬ Effet toxique de dérivés halogénés d' *T53*
- - ¬ Effet toxique: Autres dérivés halogénés d' *T53.6*
- Aromatiques ¬ Effet toxique: Autres dérivés halogénés d' *T53.7*
- ¬ Solvants du groupe: *L24.2*

Hydrocèle
- Congénitale ¬ *P83.5*
- Cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale ¬ *N43*
- Enkystée ¬ *N43.0*
- Femme ¬ *N94.8*
- Infectée ¬ *N43.1*
- Sans précision ¬ *N43.3*
- Spermatocèle ¬ *N43*
- Vaginale communicante congénitale ¬ *P83.5*
- ¬ Autres *N43.2*

Hydrocéphale ¬
- Dystocie due à: fœtus *O66.3*
- Soins maternels pour disproportion due à un fœtus *O33.6*

Hydrocéphalie
v.a. VACTERL-hydrocéphalie
- Acquis
- - Nouveau-né ¬ *P91.7*
- - ¬ *G91*
- Agyrie-dysplasie rétinienne ¬ Syndrome d' *Q04.3*
- Communicante ¬ *G91.0*
- Congénital
- - Communicante ¬ *Q03.8*
- - Obstructive ¬ *Q03.8*

Hydrocéphalie *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Sans précision ¬ *Q03.9*
- - ¬
- - - *Q03*
- - - *Q03.8*
- Cours
- - Maladie
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, G94.0**
- - - Parasitaire ¬ *B89†, G94.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *G94.2**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G94.1**
- Dysplasie costo-vertébrale-anomalie de Sprengel ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Grande taille-hyperlaxité ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Nouveau-né ¬ *Q03*
- Obstructive (non communicante) ¬ *G91.1*
- Post-hémorragique du nouveau-né ¬ *P91.7*
- Post-traumatique, sans précision ¬ *G91.3*
- Pression normal
- - Idiopathique ¬ *G91.20*
- - Non précisée ¬ *G91.29*
- - Secondaire ¬ *G91.21*
- - ¬ *G91.2*
- Sans précision ¬
- - *G91.9*
- - Spina bifida, avec *Q05.4*
- Sclérotiques bleues-néphropathie ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.4†, G94.0**
- Toxoplasmose congénitale ¬ *P37.1*
- ¬
- - *G91*
- - *G91.8*
- - Malformation de Dandy-Walker isolée avec *Q03.1*
- - Spina bifida
- - - Cervical
- - - - *Q05.0*
- - - - Sans *Q05.5*
- - - Dorsal avec *Q05.1*
- - - Dorso-lombaire avec *Q05.1*
- - - Lombaire
- - - - *Q05.2*
- - - - Sans *Q05.7*
- - - Lombo-sacré avec *Q05.2*
- - - Sacré
- - - - *Q05.3*
- - - - Sans *Q05.8*
- - - Thoracique
- - - - *Q05.1*
- - - - Sans *Q05.6*
- - Syndrome de dysplasie thoracique- *Q87.8*

Hydrocéphalie-fibroélastoses-cataracte ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Hydrocholécyste ¬ *K82.1*

Hydrogène ¬ Effet toxique
- Cyanure d' *T57.3*
- Fluor (gaz) et fluorure d' *T59.5*
- Sulfure d' *T59.6*

Hydrolabyrinthe ¬ *H81.0*

Hydrolase ¬
- Hyperméthioninémie par déficit en S-adénosylhomocystéine *E72.1*
- Neurodégénérescence par déficit en 3-hydroxyisobutyryl-CoA *E71.1*
- Retard psychomoteur par déficit en S-adénosylhomocystéine *E72.1*

Hydrolethalus ¬ *Q87.8*

Hydroméningocèle
- Crânienne ¬ *Q01*
- Rachidienne) ¬ *Q05*

Hydromicrocéphalie ¬ *Q02*

Hydromyélie ¬ *Q06.4*

Hydronéphrose
- Congénitale ¬ *Q62.0*
- Obstruction
- - Calculeuse rénale et urétérale ¬ *N13.2*
- - Jonction pyélo-urétérale ¬ *N13.0*
- Rétrécissement urétéral, non classée ailleurs ¬ *N13.1*
- Sans précision ¬ *N13.3*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬ Coudure et rétrécissement urétéral, sans *N13.5*

Hydrophtalmie ¬ *Q15.0*

Hydropisie fœtus
- Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- ¬ Dystocie due à: *O66.3*

Hydrorachis ¬ *Q06.4*

Hydrosalpinx ¬ *N70.1*

Hydrosodées par la chaleur ¬ Syndrome de pertes *T67.8*

Hydrothorax ¬ *J94.8*

Hydroxy-)chloroquine ¬ Maculopathie toxique provoquée par l'(*H35.38*

Hydroxy-3-méthylglutarique ¬ Acidurie 3- *E71.1*

Hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA
- Lyase ¬ Déficit en 3- *E71.1*
- Synthétase ¬ Déficit en 3- *E71.3*

Hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne longue ¬ Déficit en 3- *E71.3*

Hydroxyapatite ¬ Maladie par dépôt d' *M11.0*

Hydroxybutyrique
v.a. gamma-hydroxybutyrique
- ¬ Acidurie 4- *E72.8*

Hydroxyde
- Potassium [potasse] ¬ *T54.3*
- Sodium [soude] ¬ *T54.3*

Hydroxyglutarique
v.a. D-2-hydroxyglutarique
v.a. L-2-hydroxyglutarique

Hydroxyglutarique *–suite*
- ¬
- - Acidémie 2- *E72.8*
- - Acidurie 2- *E72.8*

Hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase ¬ Neurodégénérescence par déficit en 3- *E71.1*

Hydroxykynuréninurie ¬ *E70.8*

Hydroxylacyl CoA déshydrogénase acide gras chaîne court ¬
- Hyperinsulinisme par déficit en 3- *E71.3*
- Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3- *E71.3*

Hydroxylase
- Acides gras ¬ Neurodégénérescence associée à l' *G23.0*
- Classique
- - Perte de sel ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21- *E25.00*
- - ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21- *E25.00*
- SAG type 3 forme
- - Classique ¬ Déficit en 21- *E25.00*
- - Tardive ¬ Déficit en 21- *E25.01*
- ¬
- - Déficit
- - - 4-alpha-hydroxyphénylpyruvate *E70.2*
- - - 18- *E27.4*
- - - Phénylalanine *E70.1*
- - - Stérol 27- *E75.5*
- - - Tyrosine *G24.1*
- - Dystonie dopa-sensible par déficit en tyrosine *G24.1*
- - Hypercholestérolémie due au déficit en cholestérol 7alpha- *E78.0*

Hydroxylysine ¬ Anomalies du métabolisme de la lysine et de l' *E72.3*

Hydroxylysinémie ¬ *E72.3*

Hydroxylysinurie ¬ Syndrome de convulsions-déficience intellectuelle par *E72.3*

Hydroxyméthylglutarique ¬ Acidurie *E71.1*

Hydroxyphénylpyruvate
v. alpha-hydroxyphénylpyruvate
- Dioxygénase ¬
- - Déficit en 4- *E70.2*
- - Tyrosinémie par déficit en 4- *E70.2*

Hydroxyquinoléine ¬ Dérivés de l' *T37.8*

Hydroxystéroïde
v. bêta-hydroxystéroïde

Hydroxy-tétrahydrobioptérine déshydratase ¬ Déficit en 4a- *E70.1*

Hydroxyvitamine-D-1-alpha-hydroxylase ¬ Déficit en 25- *E83.31*

Hygiène
- Personel
- - Défaillante ¬ *Z91.8*
- - Défectueuse ¬ *R46.0*
- ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance et de soins d' *Z74.1*

Hygiéniques spécial ¬ micro-organisme Gram
- Négatif résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou *U81!*
- Positifs résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou *U80!*

Hygrome kystique ¬ *D18.10*

Hymen ¬
- Imperforation de l' *Q52.3*
- Rigidité de l' *N89.6*

Hyménal
- Étroit ¬ Orifice *N89.6*
- Serré ¬ Anneau *N89.6*

Hyménolépiase ¬ *B71.0*

Hymenolepis nana ¬ Infection (à) (par): *B71.0*

Hyoïde ¬ Os *S12.8*

Hyper- et hypopigmentation progressive familiale ¬ *L81.8*

Hyperacousie ¬ *H93.2*

Hyperactive ¬ Vessie: *N32.8*

Hyperactivité
- Associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés ¬ *F84.4*
- PRPP synthétase ¬ *E79.8*
- Survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ Trouble de l'attention sans *F98.80*
- Utérus due à une stimulation excessive par des médicaments déclencheurs de contractions ¬ *O62.8, Y57.9!*
- ¬
- - Altération attention
- - - Syndrome avec *F90.0*
- - - Trouble avec *F90.0*
- - Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-acromégalie- *Q87.8*
- - TDAH [trouble du déficit de l'attention / *F90.0*

Hyperadrénocorticisme ¬
- *E24.9*
- Myopathie au cours de l' *E24.9†, G73.5**

Hyperaldostéronisme
- Familial
- - Type
- - - 1 ¬ *E26.0*
- - - 2 ¬ *E26.0*
- - - 3 ¬ *E26.0*
- - ¬ *E26.0*
- Génétique ¬ *E26.0*
- Pouvant être traité par des glucocorticoïdes ¬ *E26.0*
- Primaire
- - Adénome surrénalien (bilatéral) ¬ *E26.0*
- - ¬ *E26.0*
- Sans précision ¬ *E26.9*
- Secondaire ¬ *E26.1*
- Type 1 ¬ Pseudo- *I15.10*

Hyperaldostéronisme *–suite*
- ¬ Autres *E26.8*

Hyperalphalipoprotéinémie familiale ¬ *E78.4*

Hyperalvéolie ¬ *K08.88*

Hyperaminoacidurie
- Dicarboxylique ¬ *E72.0*
- Provoqué
- - Arginine ¬ *E72.2*
- - Cystine ¬ *E72.0*
- - Ornithine ¬ *E72.4*
- ¬ *E72.9*

Hyperammoniémie
v.a. hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie
- Déficit en N-acétylglutamate synthase ¬ *E72.2*
- ¬ *E72.2*

Hyperandrogénie
- Déficit en cortisone réductase ¬ *E25.08*
- ¬ Dysfonction ovarienne: *E28.1*

Hyperanxiété ¬ *F93.8*

Hyperargininémie ¬ *E72.2*

Hyper-bêta-alaninémie ¬ *E79.8*

Hyperbêtalipoprotéinémie
- Prébêtalipoprotéinémie ¬ *E78.2*
- ¬ *E78.0*

Hyperbilirubinémie
- Conjuguée familiale ¬ *E80.6*
- Héréditaire ¬ *E80.6*
- Indication d'ictère, non classée ailleurs ¬ *R17.0*
- Non conjugué
- - Familiale ¬ *E80.5*
- - Héréditaire type
- - - 1 ¬ *E80.5*
- - - 2 ¬ *E80.5*
- Prématurité ¬ *P59.0*
- Sans ictère, non classée ailleurs ¬ *R17*
- Type
- - 2 ¬ *E80.6*
- - Rotor ¬ *E80.6*

Hyperbiliverdinémie ¬ *K76.8*

Hypercalcémie
- Familiale-néphrocalcinose-indicanurie ¬ Syndrome d' *E70.8*
- Hypocalciurique
- - Bénigne familiale ¬ *E83.58*
- - Familiale ¬ *E83.58*
- Infantile autosomique récessive ¬ *E83.58*
- ¬ Démence au cours de *E83.58†, F02.8**

Hypercalciurie
- Idiopathique ¬ *E83.58*
- Néphrocalcinose
- - Atteinte oculaire sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec *E83.4*

Hypercalciurie *–suite*
- Néphrocalcinose *–suite*
- - Sans atteinte oculaire sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec *E83.4*

Hypercalprotectinémie ¬ Hyperzincémie et *E83.2*

Hypercaroténémie ¬ *E67.1*

Hypercémentose ¬ *K03.4*

Hyperchlorémie ¬ *E87.8*

Hypercholestérolémie
- Déficit en cholestérol 7alpha-hydroxylase ¬ *E78.0*
- Essentielle ¬ *E78.0*
- Familial
- - Homozygote ¬ *E78.0*
- - ¬ *E78.0*
- Hyperglycéridémie endogène ¬ *E78.2*
- ¬ Xanthomatose au cours d' *E78.0*

Hyperchromiques pinta caraté ¬ lésion
- *A67.1*
- Cutanées achromiques avec lésions cutanées *A67.3*

Hyperchylomicronémie ¬ *E78.3*

Hyperclarté pulmonaire unilatérale ¬ *J43.0*

Hypercorticisme hypophyso-dépendant ¬ *E24.0*

Hypercortisolisme ¬ *E24.9*

Hyperdibasique type
- 1 ¬ Aminoacidurie *E72.0*
- 2 ¬ Aminoacidurie *E72.0*

Hyperekplexie héréditaire ¬ *G25.88*

Hyperelastica) ¬ Cutis laxa (*Q82.8*

Hyperémèse gravidique
- Bénin
- - Sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ *O21.0*
- - ¬ *O21.0*
- Commençant avant fin 20ème gestation trouble métabolique
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ *O21.1*
- - Déshydratation ¬ *O21.1*
- Troubles métaboliques ¬ *O21.1*

Hyperéosinophilie ¬ Déficit immunitaire combiné avec *D81.8*

Hyperéosinophilique
- Idiopathique ¬ Syndrome *D47.5*
- ¬ Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome *D47.5*

Hyperergica fulminans ¬ Sepsis acutissima *A39.1†, E35.1**

Hyperesthésie ¬ *R20.3*

Hyperexplexie sporadique ¬ *G25.88*

Hyperfibrinolyse ¬
- Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- Hémorragie

Hyperfibrinolyse ¬ *–suite*
- Hémorragie *–suite*
- - Importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - Pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*

Hyperfonction
- Ovarienne SAI ¬ *E28.8*
- Testiculaire ¬ *E29.0*
- Thymus ¬ *E32.8*

Hyperfonctionnement
- Corticosurrénaux ¬ Autres *E27.0*
- Médullosurrénale ¬ *E27.5*
- Pluriglandulaire ¬ *E31.1*

Hypergammaglobulinémie
- Polyclonale ¬ *D89.0*
- Sans précision ¬ *D89.2*

Hypergammaglobulinémique bénin [de Waldenström] ¬ Purpura *D89.0*

Hypergastrinémie ¬ *E16.4*

Hyperglobulinémie SAI ¬ *R77.1*

Hyperglycémie
- Pancréatectomie ¬ *E89.1*
- Sans précision ¬ *R73.9*

Hyperglycéridémie
- Endogène ¬
- - *E78.1*
- - Hypercholestérolémie avec *E78.2*
- Essentielle ¬ *E78.1*
- Mixte ¬ *E78.3*

Hyperglycérolémie ¬ *E74.8*

Hyperglycinémie non cétosique ¬ *E72.5*

Hypergonadotrope ¬ Insuffisance ovarienne *E28.3*

Hyperhéparinémie ¬ *D68.34*

Hyperhidrose
- Généralisée ¬ *R61.1*
- Localisée ¬ *R61.0*
- Polyneuropathie ¬ Syndrome d'encéphalite limbique-neuromyotonie- *G60.8*
- Sans précision ¬ *R61.9*
- ¬
- - *R61*
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, R61.9*

Hyperhomocystéinémie ¬ *E72.1*

Hyperhydroxyprolinémie ¬ *E72.5*

Hyper-IgE autosomique récessif par déficit en TYK2 ¬ Syndrome *D82.4*

Hyper-IgM
- Sans susceptibilité aux infections opportunistes ¬ Syndrome *D80.5*
- Susceptibilité aux infections opportunistes ¬ Syndrome *D80.5*
- Type 4 ¬ Syndrome *D80.5*

Hyperimidodipeptidurie ¬ *E72.8*

Hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales ou avec *D80.6*

Hyperimmunoglobulinémie
- D ¬ Syndrome d' *D89.9*
- E
- - Autosomique
- - - Dominant ¬ HIES [syndrome d' *D82.4*
- - - Récessif ¬ HIES [syndrome d' *D82.4*
- - IgE] ¬ Syndrome d' *D82.4*

Hyperinsulinémique
- Déficit
- - 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte ¬ Hypoglycémie *E71.3*
- - Glucokinase ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- - Récepteur à l'insuline ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- - UCP2 ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- Fonctionnelle ¬ Hypoglycémie non *E16.1*
- Forme diffuse sensible au diazoxide ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- Induite par l'effort ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- Persistante
- - Adulte noninsulinome ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- - Enfant ¬ Hypoglycémie *E16.1*

Hyperinsulinisme
- Autosomique
- - Dominant déficit
- - - Kir6.2 ¬ *E16.1*
- - - SUR1 ¬ *E16.1*
- - Récessif déficit
- - - Kir6.2 ¬ *E16.1*
- - - SUR1 ¬ *E16.1*
- Coma hypoglycémique ¬ *E15*
- Congénital ¬ *E16.1*
- Déficit
- - 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte ¬ *E71.3*
- - Glucokinase ¬ *E16.1*
- - HNF1A ¬ *E16.1*
- - HNF4A ¬ *E16.1*
- - SLC16A1 ¬ *E16.1*
- - UCP2 ¬ *E16.1*
- Diffus sensible au diazoxide ¬ *E16.1*
- Focal résistant diazoxide déficit
- - Kir6.2 ¬ *E16.1*
- - SUR1 ¬ *E16.1*
- Fonctionnel ¬ *E16.1*
- Induit par l'effort ¬ *E16.1*
- SAI ¬ *E16.1*
- ¬
- - *E16.1*
- - Encéphalopathie due à l' *E16.1†, G94.3**

Hyperkaliémie ¬ *E87.5*

Hyperkaliémique ¬ Paralysie périodique (familiale): *G72.3*

Hyperkératose
- Cordes vocales ¬ *J38.3*

Hyperkératose *–suite*
- Épidermolytique ¬ *Q80.3*
- Folliculaire pénétrante ¬ *L87.0*
- Gonorrhéique ¬ *A54.8†, L86**
- Palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au pian ¬ *A66.3*
- Palmoplantaire
- - Cardiomyopathie arythmogène ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - Focale et gingivale ¬ *Q82.8*
- Palmoplantaire-périodontopathie-onychogrypose ¬ Syndrome d' *Q82.8*
- Pianique ¬ *A66.3*
- Pinta [caraté] ¬ *A67.1*

Hyperkératosiques et trichophytoïdes ¬ Pianides plantaires *A66.3*

Hyperkinésie ventriculaire ¬ *R93.1*

Hyperkinétique
- Associé à un trouble des conduites ¬ Trouble *F90.1*
- Enfance ou de l'adolescence SAI ¬ Réaction *F90.9*
- SAI ¬ Syndrome *F90.9*
- Sans précision ¬ Trouble *F90.9*
- Trouble des conduites ¬ Trouble *F90.1*
- ¬ Autres troubles *F90.8*

Hyperlaxité
- Articulaire ¬ *M25.2*
- Ligamentaire-retard de développement ¬ Syndrome de cutis laxa- *Q82.8*
- ¬ Syndrome d'hydrocéphalie-grande taille- *Q87.8*

Hyperleucine-isoleucinémie ¬ *E71.1*

Hyperlipémique de type Bürger-Grütz ¬ Hépatosplénomégalie *E78.3†, K77.8**

Hyperlipidémie
- Combinée ¬ *E78.2*
- Déficit en lipase hépatique ¬ *E78.4*
- Groupe
- - A ¬ *E78.0*
- - C ¬ *E78.2*
- - D ¬ *E78.3*
- Groupe B ¬ *E78.1*
- Mixte
- - Familiale ¬ *E78.4*
- - ¬ *E78.2*
- Post-transplantation ¬ *E78.5*
- Sans précision ¬ *E78.5*
- ¬ Autres *E78.4*

Hyperlipidose ¬ *E75.6*

Hyperlipoprotéinémie
- Fredrickson type
- - I ou V ¬ *E78.3*
- - IIb ou III ¬ *E78.2*
- Lipoprotéines basse densité
- - LDL] ¬ *E78.0*
- - VLDL] ¬ *E78.1*

Hyperlipoprotéinémie *–suite*
- Type
- - IIa de Fredrickson ¬ *E78.0*
- - IV de Fredrickson ¬ *E78.1*

Hyperlysinémie
- Type
- - I ¬ *E72.3*
- - II ¬ *E72.3*
- ¬ *E72.3*

Hypermagnésiémie ¬ *E83.4*

Hypermélanose naevoïde linéaire et spiralée ¬ *L81.4*

Hyperméthioninémie
- Déficit en S-adénosylhomocystéine hydrolase ¬ *E72.1*
- Provoqué déficit
- - Adénosine-kinase ¬ *E72.1*
- - Glycine-N-méthyltransférase ¬ *E72.1*
- ¬ *E72.1*

Hypermétropie ¬ *H52.0*

Hypermobile ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos *Q79.6*

Hypermobilité ¬ Syndrome d' *M35.7*

Hypermûre ¬ Cataracte sénile *H25.2*

Hypernasalité et hyponasalité ¬ *R49.2*

Hypernatrémie ¬ Hyperosmolarité et *E87.0*

Hypernyctéméral ¬ Syndrome *G47.2*

Hyperœstrogénie ¬ Dysfonction ovarienne: *E28.0*

Hyperorexia nervosa ¬ *F50.2*

Hyperornithinémie avec atrophie sinueuse de la choroïde et de la rétine ¬ *E72.4*

Hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie ¬ Syndrome d' *E72.4*

Hyperosmolarité et hypernatrémie ¬ *E87.0*

Hyperostose
- Ankylosante [Forestier] ¬ *M48.1*
- Cortical
- - Déformante juvénile ¬ *M88.99*
- - Infantiles ¬ *M89.8*
- Crâne ¬ *M85.2*
- Crânienne interne ¬ *M85.2*
- Diffuse idiopathique ¬ *M48.1*
- Frontale interne ¬ *M85.2*
- Os autres que ceux du crâne ¬ *M85.8*
- Vertébrale ankylosante avec tylose ¬ *M48.19*
- Voûte crânienne liée à l'X ¬ *M85.2*

Hyperoxalurie
- Primitif
- - Type
- - - 1 ¬ *E74.8*
- - - 2 ¬ *E74.8*
- - - 3 ¬ *E74.8*
- - ¬ *E74.8*
- Secondaire ¬ *E74.8*

Hyperparathyroïdie
v.a. néphropathie-surdité-hyperparathyroïdie

Hyperparathyroïdie *–suite*
- Isolée familiale ¬ *E21.0*
- Maladies de la glande parathyroïde ¬ *E21*
- Primaire ¬ *E21.0*
- Primitif
- - Familiale ¬ *E21.0*
- - Sévère néonatale ¬ *E21.0*
- Sans précision ¬ *E21.3*
- Secondaire
- - Non classée ailleurs ¬ *E21.1*
- - Origine rénale ¬ *N25.8*
- Tertiaire ¬ *E21.2*
- ¬
- - *E21.2*
- - Arthrite au cours de l' *E21.3†, M14.19**
- - Arthropathie due à des microcristaux au cours d' *E21.3†, M14.19**
- - Myopathie au cours de l' *E21.3†, G73.5**

Hyperpéristaltisme ¬ *R19.2*

Hyperphagie
- Associée à d'autres perturbations psychologiques ¬ *F50.4*
- Psychogène ¬ *F50.4*

Hyperphalangie ¬ *Q74.8*

Hyperphénylalaninémie
- Déficit
- - 6-pyruvoyl-tétrahydroptérine synthase ¬ *E70.1*
- - DNAJC12 ¬ *E70.1*
- - Tétrahydrobioptérine ¬ *E70.1*
- Maternelle ¬ *E70.1*
- Modérée ¬ *E70.1*
- ¬ Autres *E70.1*

Hyperpigmentation
- Mélanine ¬ Autres *L81.4*
- Post-inflammatoire ¬ *L81.0*
- Progressive familiale ¬ *L81.4*

Hyperplasie
- Adénomateux
- - Endomètre ¬ *N85.1*
- - Prostate ¬ *N40*
- Amygdales ¬ *J35.1*
- Appendice ¬ *K38.0*
- Atypique de l'endomètre (adénomateuse) ¬ *N85.1*
- Bénigne) de la prostate ¬ *N40*
- Cellule
- - Bêta des îlots de Langerhans SAI ¬ *E16.1*
- - C de la thyroïde ¬ *E07.0*
- - Endocrine pancréas
- - - Hypersécrétion de glucagon ¬ *E16.3*
- - - SAI ¬ *E16.9*
- - Îlots de Langerhans SAI ¬ *E16.9*
- - Neuroendocrines du nourrisson ¬ *J84.8*
- Cémentaire ¬ *K03.4*
- Congénital

Hyperplasie *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Lipoïde des surrénales par déficit en STAR ¬ *E25.08*
- - Surrénale déficit
- - - 3-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase ¬ *E25.08*
- - - 11-bêta-hydroxylase ¬ *E25.08*
- - - 17-alphahydroxylase ¬ *E25.08*
- - - 21 hydroxylase classique
- - - - Perte de sel ¬ *E25.00*
- - - - ¬ *E25.00*
- - - Cytochrome P450 oxydoréductase ¬ *E25.08*
- Endomètre
- - Glandulo-kystique ¬ *N85.0*
- - Kystique ¬ *N85.0*
- - Polypoïde ¬ *N85.0*
- - SAI ¬ *N85.0*
- Gingivale ¬ *K06.1*
- Glande parathyroïde ¬ *E21.0*
- Glandulaire de l'endomètre ¬ *N85.0*
- Hépatique nodulaire focale ¬ *K76.8*
- Hypoplasie
- - Mandibulaire ¬ *K07.0*
- - Maxillaire ¬ *K07.0*
- - Unilatérale du processus condylien de la mandibule ¬ *K10.8*
- Inflammatoire de la muqueuse buccale ¬ *K13.6*
- Irritation de la crête édentée (due à une prothèse) ¬ *K06.2*
- Lymphoïde angiofolliculaire ¬ *D47.7*
- Macronodulaire des surrénales ¬ Syndrome de Cushing dû à une *E24.8*
- Médullosurrénale ¬ *E27.5*
- Moelle osseuse ¬ *D47.4*
- Nodulaire
- - Focale télangiectasique du foie ¬ *D13.4*
- - Foyer ¬ Maladie toxique du foie avec: *K71.88*
- - Régénérative du foie ¬ *K76.8*
- Persistante du thymus ¬ *E32.0*
- Primaire de la parathyroïde ¬ *E21.0*
- Prostate ¬ *N40*
- Surrénale
- - Congénitale ¬ *E25.0*
- - Homme ¬ précocité sexuelle avec *E25*
- Végétations adénoïdes ¬ *J35.2*

Hyperplasique
- Géant ¬ Rein *Q63.3*
- Ulcéreuse) ¬ Pulpite chronique (*K04.0*
- ¬
- - Gingivite (chronique): *K05.1*
- - Polype
- - - *K31.7*
- - - *K63.5*

Hyperplasique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Polypose *D12.6*
- - Tuberculose iléo-cæcale *A18.3†, K93.0**
- - Vitré primitif persistant *Q14.0*

Hyperprébêtalipoprotéinémie ¬ *E78.1*

Hyperproduction de thyrotrophine ¬ *E05.8*

Hyperprolactinémie
- Familiale ¬ *E22.1*
- ¬ *E22.1*

Hyperprolinémie (type I, II) ¬ *E72.5*

Hyperpyrexie SAI ¬ *R50.9*

Hyperréninémique familial type
- 1 ¬ Hypoaldostéronisme *E27.4*
- 2 ¬ Hypoaldostéronisme *E27.4*

Hypersécrétion
- ACTH, non associée à la maladie de Cushing ¬ *E27.0*
- Androgènes ovariens ¬ *E28.1*
- Calcitonine ¬ *E07.0*
- Catécholamine ¬ *E27.5*
- Glucagon ¬
- - *E16.3*
- - Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec *E16.3*
- Hormone
- - Intestinales ¬ Autres *E34.1*
- - Somatotrope ¬ *E22.0*
- - Testiculaires ¬ *E29.0*
- Hypophysaire d'ACTH ¬ *E24.0*
- Hypophyse
- - Sans précision ¬ *E22.9*
- - ¬
- - - *E22*
- - - *E22.8*
- Pancréas endocrine
- - Polypeptide
- - - Intestinal vaso-actif ¬ *E16.8*
- - - Pancréatique ¬ *E16.8*
- - Releasing factor" de l'hormone de croissance ¬ *E16.8*
- - Somatostatine ¬ *E16.8*
- Pure d'aldostérone ¬ Carcinome corticosurrénalien à *C74.0, E26.0*
- Thyrocalcitonine ¬ *E07.0*

Hypersegmentation leucocytaire, héréditaire ¬ *D72.0*

Hypersensibilité
- 2-phénoxyéthanol ¬ *T78.4*
- Agrumes ¬ *T78.1*
- Alcool cétylstéarylique ¬ *T78.4*
- Alimentaire ¬ Gastroentérite ou colite par *K52.2*
- Antidépresseurs tétracycliques ¬ *T88.7*
- Classées ailleurs ¬ Arthropathie au cours de réactions d' *M36.4**

Hypersensibilité *–suite*
- Composés d'ammonium quaternaire ¬ *T78.4*
- Cytokines ¬ *T88.7*
- Dentine ¬ *K03.8*
- Dérivé
- - Rapamycine ¬ *T88.7*
- - Scopolamine ¬ *T88.7*
- Extrait d'Aspergillus ¬ *T78.4*
- Gélatine ¬ *T78.1*
- Labyrinthe ¬ *H83.2*
- Médicament SAI ¬ *T88.7*
- Métaux lourds ¬ *T78.4*
- Noix ¬ *T78.1*
- Polysorbate 20 ¬ *T78.4*
- Prasugrel ¬ *T88.7*
- Pression ¬ Neuropathie héréditaire avec *G60.0*
- Protéine
- - Bœuf ¬ *T78.1*
- - E. coli ¬ *T78.4*
- - Poisson ¬ *T78.1*
- SAI ¬
- - *T78.4*
- - Pneumopathie d' *J67.9*
- Sirolimus ¬ *T88.7*
- Streptomycine ¬ *T88.7*
- Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.7*
- Succinimides ¬ *T88.7*
- Thiourée ¬ *T78.4*
- Ticlopidine ¬ *T88.7*
- Vinca-alcaloïdes ¬ *T88.7*
- Voies respiratoires supérieures, localisation non précisée ¬ Réaction d' *J39.3*
- ¬
- - Angéite d' *M31.0*
- - Arthrite au cours de réaction d' *T78.4†, M36.4**
- - Pneumopathie d' *J67.9*
- - Tests (de): cutanés à la recherche d'une: *Z01.5*

Hypersomnie
- Idiopathique) ¬ *G47.1*
- Non organique ¬ *F51.1*

Hypersplénisme ¬
- *D73.1*
- Maladie due au VIH avec *B23.8, D73.1*
- Neutropénie lors d' *D70.6*

Hyperstimulation ovaire
- Associée à une ovulation induite ¬ *N98.1*
- SAI ¬ *N98.1*
- ¬ *N98.1*

Hypersudation ¬ *R61.9*

Hypertélorisme
- Teebi ¬ *Q87.0*

Hypertélorisme *–suite*
- ¬
- - *Q75.2*
- - Syndrome de déficience intellectuelle-petite taille- *Q87.8*

Hypertensif
- Insuffisance
- - Cardiaque congestive
- - - Rénale ¬ Cardionéphropathie *I13.2*
- - - ¬
- - - - Cardionéphropathie *I13.0*
- - - - Cardiopathie *I11.0*
- - Rénal ¬
- - - Cardionéphropathie *I13.1*
- - - Néphropathie *I12.0*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles *P00.0*
- Préexistant
- - Compliquant grossesse accouchement puerpéralité ¬
- - - Cardionéphropathie *O10.3*
- - - Cardiopathie *O10.1*
- - - Néphropathie *O10.2*
- - ¬ Prééclampsie surajoutée dans: les états *O11*
- SAI ¬
- - Cardiopathie *I11.9*
- - Néphropathie *I12.9*
- Sans
- - Insuffisance
- - - Cardiaque (congestive) ¬ Cardiopathie *I11.9*
- - - Rénale ¬ Néphropathie *I12.9*
- - Précision ¬ Cardionéphropathie *I13.9*
- ¬
- - Cardionéphropathie *I13*
- - Cardiopathie *I11*
- - Encéphalopathie *I67.4*
- - Insuffisance
- - - Cardiaque *I11.0*
- - - Rénale *I12.0*
- - Myocardite *I11.90†, I41.8**
- - Néphropathie *I12*
- - Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*

Hypertension
- Artériel
- - Essentielle) (primitive) (systémique) ¬ *I10*
- - Pulmonaire
- - - Familiale ¬ *I27.0*
- - - Idiopathique ¬ *I27.0*
- Chronique avec prééclampsie surajoutée ¬ *O11*
- Essentiel
- - Bénigne ¬ *I10.0*
- - Maligne ¬ *I10.1*
- - Non précisée ¬ *I10.9*

Hypertension *–suite*
- Essentiel *–suite*
- - Préexistant
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.0*
- - - Cours de la grossesse, avec prééclampsie surajoutée ¬ *O11*
- - Primitive) ¬ *I10*
- Gestationnel
- - Hypertension induite par la grossesse] ¬ *O13*
- - Transitoire) SAI ¬ *O13*
- Induite par la grossesse] ¬ Hypertension gestationnelle [*O13*
- Intracrânien
- - Bénin
- - - Hypertension intracrânienne idiopathique] ¬ *G93.2*
- - - ¬ *G93.2*
- - Idiopathique ¬
- - - *G93.2*
- - - Hypertension intracrânienne idiopathique] ¬ Hypertension intracrânienne bénigne [*G93.2*
- Mère, sans précision ¬ *O16*
- Néonatale ¬ *P29.2*
- Oculaire ¬ *H40.0*
- Portale ¬ *K76.6*
- Préexistant
- - Compliquant grossesse accouchement puerpéralité
- - - Sans précision ¬ *O10.9*
- - - ¬ *O10*
- - Gestationnelle ¬ convulsions avec *O15*
- - Néphropathie, chez la femme enceinte ¬ Présence d'une *O10.4*
- - Prééclampsie surajoutée ¬ *O11*
- Pulmonaire
- - Persistante) du nouveau-né ¬ *P29.3*
- - Présence d'une thromboembolie chronique ¬ *I27.20*
- - Primitive ¬ *I27.0*
- - Secondaire
- - - Précisées ¬ Autres *I27.28*
- - - ¬ Autres *I27.2*
- - Thromboembolique chronique ¬ *I27.20*
- Rénale préexistante chez la femme enceinte ¬ Présence d'une *O10.4*
- Rénoparenchymateuse ¬ *I15.1*
- SAI ¬ Prééclampsie surajoutée dans: l' *O11*
- Secondaire
- - Atteinte
- - - Endocriniennes ¬ *I15.2*
- - - Rénales ¬ *I15.1*
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.4*
- - Sans précision ¬ *I15.9*
- - ¬

Hypertension *–suite*
- Secondaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - *I15*
- - - *I15.8*
- Sensible aux glucocorticoïdes ¬ *E26.0*
- Vasculo-rénale ¬ *I15.0*
- ¬
- - Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d' *R03.0*
- - Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans *O12*
- - Prééclampsie greffée lors d' *O11*

Hyperthermie
- Malign
- - Anesthésie ¬ *T88.3*
- - ¬ Syndrome des ptérygiums multiples- *Q87.8*
- Nouveau-né due à l'environnement ¬ *P81.0*
- Origine inconnue, après accouchement ¬ *O86.4*

Hyperthyroïdie
- Familiale par mutation du récepteur de la TSH ¬ *E05.8*
- Non-immune familiale ¬ *E05.8*
- SAI ¬ *E05.9*
- Transitoire néonatale ¬ *P72.1*
- ¬
- - Arthropathie au cours de l' *E05.9†, M14.59**
- - Chloasma des paupières dû à l' *E05.9†, H03.8**
- - Myopathie au cours de l' *E05.9†, G73.5**
- - Neuropathie des nerfs périphériques autonomes au cours de l' *E05.9†, G99.0**
- - Syndrome myasthénique au cours de *E05.9†, G73.0**
- - Thyréotoxicose [*E05*

Hyperthyroïdien ¬ Maladie
- Cardiaque *E05.9†, I43.8**
- Oculaire *E05.9†, H58.8**

Hypertonie
- Congénitale ¬ *P94.1*
- Utérine ¬ *O62.4*

Hypertonique
- Non coordonnées et prolongées ¬ Contractions utérines *O62.4*
- ¬
- - Dysréflexie autonome manifestée par des crises *G90.40*
- - Travail *P03.6*

Hypertrabéculation ventriculaire gauche ¬ *I42.88*

Hypertrichose
- Cervicale antérieure isolée ¬ *L68.2*
- Congénital
- - Lanugineuse ¬ *Q84.2*
- - ¬ *Q84.2*
- Cubitale ¬ *Q84.2*

Hypertrichose *–suite*
- Fibromatose gingivale ¬ Syndrome d' *L68.8, K06.1*
- Lanugineuse acquise ¬ *L68.1*
- Localisée ¬ *L68.2*
- Paupières ¬ *H02.8*
- Sans précision ¬ *L68.9*
- ¬
- - *L68*
- - Formes d' *L68.8*

Hypertrichotique type Cantu ¬ Ostéochondrodysplasie *Q87.3*

Hypertrophiantes ¬ Autres ostéoarthropathies *M89.4*

Hypertrophie
- Amygdale
- - Végétations adénoïdes ¬ *J35.3*
- - ¬ *J35.1*
- Bénigne) de la prostate ¬ *N40*
- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- - Déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Cardiaque ¬ *I51.7*
- Chronique de la glande lacrymale ¬ *H04.0*
- Clitoris ¬ *N90.8*
- Congénital
- - E) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- - Lèvre ¬ *Q18.6*
- Cornets du nez ¬ *J34.3*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.8*
- Coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa] ¬ *M79.4*
- Crête alvéolaire SAI ¬ *K08.8*
- Glandes salivaires ¬ *K11.1*
- Hémifaciale ¬ Atrophie ou *Q67.4*
- Langue ¬ *K14.8*
- Lèvres ¬ *N90.6*
- Mammaire
- - Juvénile familiale ¬ *N62*
- - Massive de la puberté ¬ *N62*
- - SAI ¬ *N62*
- - ¬ *N62*
- Ongles (congénitale) ¬ *Q84.5*
- Osseuse ¬ *M89.3*
- Papille
- - Foliées ¬ *K14.3*
- - Linguales ¬ *K14.3*
- Prépuce, phimosis et paraphimosis ¬ *N47*
- Rénale ¬ *N28.88*
- Synoviale, non classée ailleurs ¬ *M67.2*
- Thymus ¬ *E32.0*
- Utérus ¬ *N85.2*
- Végétations adénoïdes ¬ *J35.2*

Hypertrophie *–suite*
- Ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et *Q21.3*
- Vulve ¬ *N90.6*
- ¬ Pli anal *K64.4*

Hypertrophique
v.a. angio-ostéo-hypertrophique
- Adulte ¬ Sténose pylorique *K31.1*
- Col de l'utérus ¬ Allongement *N88.4*
- Congénitale du pylore ¬ Sténose *Q40.0*
- Enfant ¬ Neuropathie: *G60.0*
- Géant ¬ Gastrite
- - *K29.6*
- Infantile létal déficit
- - Complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- - NADH-coenzyme Q réductase ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- - NADH-CoQ réductase ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- Mitochondriale avec acidose lactique par déficit en MTO1 ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- Myopathie mitochondriale ¬ Syndrome de cataracte congénitale-cardiomyopathie *Q87.8*
- Néphropathie tubulaire ¬ Syndrome d'encéphalopathie-cardiomyopathie *E88.8*
- Non obstructive ¬ Myocardiopathie *I42.2*
- Peau
- - Sans précision ¬ Affection *L91.9*
- - ¬ Autres affections *L91.8*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ Périostite (*A66.6*
- Sans hypoprotéinémie ¬ Gastropathie *K29.6*
- Tubulopathie dues à une mutation de l'ADN mitochondrial ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- ¬
- - Amyotrophie péronière (type axonal) (type *G60.0*
- - Cicatrice *L91.0*
- - Laryngite: *J37.0*
- - Lichen plan *L43.0*
- - Lupus érythémateux verruqueux ou *L93.2*
- - Myocardiopathie
- - - *I42.2*
- - - Obstructive *I42.1*
- - Pharyngite (chronique): *J31.2*
- - Rhinite (chronique): *J31.0*
- - Sténose subaortique *I42.1*

Hypertropie ¬ *H50.2*

Hypertryptophanémie familiale ¬ *E70.8*

Hypertyrosinémie ¬ *E70.2*

Hyperuricémie
- Associée à HPRT ¬ *E79.8*
- Asymptomatique ¬ *E79.0*
- Sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée ¬ *E79.0*

Hyperuricémie *–suite*
- ¬ Maladie rénale kystique médullaire autosomique dominante avec *Q61.5*

Hypervalinémie ¬ *E71.1*

Hyperventilation ¬
- *R06.4*
- Formes psychogènes de: *F45.3*

Hypervitaminose
- A ¬ *E67.0*
- B6 ¬
- - *E67.2*
- - Syndrome d' *E67.2*
- D ¬ *E67.3*
- E ¬ *E67.8*

Hyperzincémie et hypercalprotectinémie ¬ *E83.2*

Hyphéma
- Traumatique ¬ *S05.1*
- ¬ *H21.0*

Hypnique ¬ Céphalée *G44.8*

Hypnotiques
- Antiparkinsoniens ¬ Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, *T42*
- Sans précision ¬ Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et *T42.7*
- ¬
- - Agitation après utilisation d' *F13.8*
- - Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et *T42.6*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d' *F13*

Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique ¬ *N31.81*

Hypoalbuminémie du nouveau-né ¬ *P74.8*

Hypoaldostéronisme
- Familial ¬ *E27.4*
- Hyperréninémique familial type
- - 1 ¬ *E27.4*
- - 2 ¬ *E27.4*
- ¬ *E27.4*

Hypoalphalipoprotéinémie ¬ *E78.6*

Hypobaropathie ¬ *T70.2*

Hypobêtalipoprotéinémie
- Sévère précoce ¬ *E78.6*
- ¬ *E78.6*

Hypocalcémie
- Anomalie du métabolisme du calcium ¬ *E83.58*
- Nouveau-né
- - Lait de vache ¬ *P71.0*
- - ¬ Autres *P71.1*
- Secondaire ¬ Hypomagnésémie
- - Intestinale avec *E83.4*
- - Primaire avec *E83.4*

Hypocalciurie ¬ Hypomagnésémie primaire autosomique dominante avec *E83.4*

Hypocalciurique
- Bénigne familiale ¬ Hypercalcémie *E83.58*
- Familiale ¬ Hypercalcémie *E83.58*

Hypochlorémie ¬ *E87.8*

Hypochondrogénésie ¬ *Q77.0*

Hypochondroplasie ¬ *Q77.4*

Hypochrome
- Sidéroblastique liée au sexe ¬ Anémie *D64.0*
- ¬ anémie: *D50*

Hypocomplémentémique ¬ Vascularite urticarienne *M31.8*

Hypocondre ¬ *C49.4*

Hypocondriaque ¬
- Névrose *F45.2*
- Trouble *F45.2*

Hypocondrie ¬ *F45.2*

Hypodontie ¬
- *K00.0*
- Syndrome d'hypomyélinisation-hypogonadisme hypogonadotrope- *G11.1*

Hypoesthésie
- Cornée ¬ *H18.8*
- Cutanée ¬ *R20.1*

Hypofibrinogénémie
- Congénitale ¬ *D68.20*
- Familiale ¬ *D68.20*
- ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*

Hypofonction
- Labyrinthe ¬ *H83.2*
- Testiculaire ¬ *E29.1*

Hypofonctionnement
- Cortical ¬ Syphilis des surrénales avec *A52.7†, E35.1**
- Corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux ¬ *E89.6*
- Testiculaire après des actes médicaux ¬ *E89.5*

Hypogalactie ¬ *O92.4*

Hypogammaglobulinémie
v.a. verrues-hypogammaglobulinémie-infections-myélokathexis
- Héréditaire ¬ *D80.0*
- Non familiale ¬ *D80.1*
- SAI ¬ *D80.1*
- Transitoire
- - Enfance ¬ *D80.7*
- - Nourrisson ¬ *D80.7*
- ¬
- - Affection systémique du tissu conjonctif au cours d'une *D80.9†, M36.8**
- - Arthrite au cours d'une *D80.1†, M14.89**

Hypogammaglobulinémie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie systémique du tissu conjonctif au cours d'une *D80.1†, M36.8**

Hypogastrique
- Causant une occlusion ¬ Hernie *K43.68*
- Étranglée ¬ Hernie *K43.68*
- Incarcérée ¬ Hernie *K43.68*
- Non réductible ¬ Hernie *K43.68*
- ¬
- - Artère ou veine: *S35.88*
- - Hernie
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- - Plexus: *S34.5*

Hypogénésie pulmonaire ¬ *Q26.8*

Hypogénitalisme
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microphtalmie colobomateuse-obésité- *Q87.8*
- ¬ Syndrome de rétinite pigmentaire-déficience intellectuelle-surdité- *Q87.8*

Hypoglosse
- Nerf crânien XII] ¬ Affections du nerf grand *G52.3*
- XII] ¬ Nerf: grand *S04.8*

Hypoglossie ¬ *Q38.3*

Hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] ¬ Intoxication: Insuline et *T38.3*

Hypoglycémie
- Hyperinsulinémique
- - Déficit
- - - 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte ¬ *E71.3*
- - - Glucokinase ¬ *E16.1*
- - - Récepteur à l'insuline ¬ *E16.1*
- - - UCP2 ¬ *E16.1*
- - Forme diffuse sensible au diazoxide ¬ *E16.1*
- - Induite par l'effort ¬ *E16.1*
- - Persistante
- - - Adulte noninsulinome ¬ *E16.1*
- - - Enfant ¬ *E16.1*
- Médicamenteuse, sans coma ¬ *E16.0*
- Néonatal
- - Iatrogène ¬ *P70.3*
- - ¬ Autres *P70.4*
- Non hyperinsulinémique fonctionnelle ¬ *E16.1*
- Réactive non induite par les médicaments ¬ *E16.1*
- Sans précision ¬ *E16.2*
- Transitoire du nouveau-né ¬ *P70.4*
- ¬
- - *E16.1*

Hypoglycémie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec *P70.1*
- - Polyneuropathie au cours de l' *E16.2†, G63.3**

Hypoglycémique
- Auto-immun ¬ Syndrome
- - *E16.0*
- - *E16.1*
- Non diabétique ¬ Coma *E15*
- SAI ¬ Coma: *E15*
- ¬
- - Encéphalopathie due à un coma *E16.1†, G94.3**
- - Hyperinsulinisme avec coma *E15*

Hypogonadisme
- Hypogonadotrope
- - Congénital avec anosmie ¬ *E23.0*
- - Hypodontie ¬ Syndrome d'hypomyélinisation- *G11.1*
- Hypogonadotrophique ¬ *E23.0*
- Ichtyose-obésité-petite taille ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Prolapsus de la valve mitrale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Testiculaire SAI ¬ *E29.1*
- ¬ Syndrome de dystrophie musculaire congénitale-cataracte infantile- *G71.2*

Hypogonadotrope
- Congénital avec anosmie ¬ Hypogonadisme *E23.0*
- Hypodontie ¬ Syndrome d'hypomyélinisation-hypogonadisme *G11.1*

Hypogonadotrophique ¬ Hypogonadisme *E23.0*

Hypohidrose ¬ *L74.4*

Hypohidrotique
- Liée à l'X ¬ Dysplasie ectodermique *Q82.4*
- ¬ Dysplasie ectodermique *Q82.4*

Hypoinsulinémie
- Actes médicaux ¬ *E89.1*
- Postchirurgicale ¬ *E89.1*

Hypokaliémie ¬ *E87.6*

Hypokaliémique ¬ Paralysie périodique (familiale): *G72.3*

Hypomagnésémie
- Intestinal
- - Hypocalcémie secondaire ¬ *E83.4*
- - Type 1 ¬ *E83.4*
- Isolé autosomique dominant
- - Type Glaudemans ¬ *E83.4*
- - ¬ *E83.4*
- Malabsorption sélective de magnésium ¬ *E83.4*
- Néonatale ¬ *P71.2*
- Primaire

Hypomagnésémie *–suite*
- Primaire *–suite*
- - Autosomique dominante avec hypocalciurie ¬ *E83.4*
- - Familial
- - - Hypercalciurie néphrocalcinose
- - - - Atteinte oculaire sévère ¬ *E83.4*
- - - - Sans atteinte oculaire sévère ¬ *E83.4*
- - - Normocalciurie et normocalcémie ¬ *E83.4*
- - - ¬ *E83.4*
- - Hypocalcémie secondaire ¬ *E83.4*
- Rénal type
- - 2 ¬ *E83.4*
- - 3 ¬ *E83.4*
- - 4 ¬ *E83.4*

Hypomagnésiémie ¬ *E83.4*

Hypomandibulaire ¬ Dysostose facio-crânienne *Q75.4*

Hypomaniaque ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel *F31.0*

Hypomanie ¬ *F30.0*

Hypomastie ¬ *Q83.88*

Hypoménorrhée
- SAI ¬ *N91.5*
- ¬ Aménorrhée, oligoménorrhée et *N91*

Hypominéralisation molaires-incisives [HMI] ¬ *K00.4*

Hypomotilité gastro-intestinale psychogène ¬ *F45.37*

Hypomyélinisante autosomique récessive associée à VPS11 ¬ Leucodystrophie *E75.2*

Hypomyélinisation-cataracte congénitale ¬ Syndrome d' *G37.8†, H28.2**

Hypomyélinisation-hypogonadisme hypogonadotrope-hypodontie ¬ Syndrome d' *G11.1*

Hyponasalité ¬ Hypernasalité et *R49.2*

Hyponatrémie ¬ Hypo-osmolarité et *E87.1*

Hypo-osmolaire ¬ Coma *E87.1*

Hypo-osmolarité et hyponatrémie ¬ *E87.1*

Hypoparathyroïdie
v.a. lymphœdème-hypoparathyroïdie
v.a. Pseudohypoparathyroïdie
v.a. Pseudo-hypoparathyroïdie
- Actes médicaux ¬ *E89.2*
- Auto-immun
- - Candidose chronique-maladie d'Addison ¬ Syndrome d' *E31.0*
- - ¬ *E20.0*
- Idiopathique ¬ *E20.0*
- Isolée familiale ¬ *E20.8*
- Néonatale transitoire ¬ *P71.4*
- Sans précision ¬ *E20.9*
- ¬
- - *E20*
- - *E20.8*
- - Cataracte au cours de l' *E20.9†, H28.1**
- - Myopathie au cours de l' *E20.9†, G73.5**

Hypopéristaltisme intestinal-microcôlon-mégavessie ¬ Syndrome d' *Q43.8*

Hypopharyngé

- SAI ¬ Paroi *C13.9*
- ¬
- - Repli ary-épiglottique versant
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant *C13.1*

Hypopharynx

- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C13.9*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde de l' *C13.9*
- - Saignement de l' *R04.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D10.7*
- - - Malign
- - - - *C13*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C13.8*
- - - - Paroi postérieure de l' *C13.2*

Hypophosphatasie

- Syndrome de Rathbun] ¬ Hypophosphatémie familiale [*E83.38*
- ¬ *E83.38*

Hypophosphatémie

- Familiale [hypophosphatasie] [syndrome de Rathbun] ¬ *E83.38*
- Liée à l'X ¬ *E83.30*

Hypophosphatémique

- Autosomique
- - Dominant ¬ Rachitisme *E83.30*
- - Récessif ¬ Rachitisme *E83.30*
- Familial ¬ Rachitisme *E83.30*

Hypophysaire

- ACTH ¬ Hypersécrétion *E24.0*
- Associé
- - Kyste de la poche de Rathke ¬ Déficit *E23.6*
- - Syndrome de la selle turcique vide ¬ Déficit *E23.0*
- Cellule mucoïde ¬
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Adénome *D35.2*
- - Carcinome *C75.1*
- Hypothalamique ¬ les états mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie *E23*
- Non fonctionnel ¬ Adénome *D35.2*
- Précoce ¬ Puberté *E22.8*
- PRL ¬ Adénome *D35.2*
- Prolactine ¬ Adénome *D35.2*
- ¬
- - Adénome
- - - *D35.2*
- - - Corticotrope *D35.2*
- - - Lactotrope *D35.2*
- - Apoplexie *E23.6*

Hypophysaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Cachexie *E23.0*
- - Déficit *E23.7*
- - Dysfonctionnement *E23.7*
- - Gigantisme *E22.0*
- - Insuffisance (de): isolée en: hormone *E23.0*
- - Syndrome d'interruption de la tige *E23.6*

Hypophyse

- Sans précision ¬
- - Anomalie de l' *E23.7*
- - Hypersécrétion de l' *E22.9*
- ¬
- - Abcès de l' *E23.6*
- - Adénocarcinome
- - - Acidophile de l' *C75.1*
- - - Basophile de l' *C75.1*
- - - Chromophobe de l' *C75.1*
- - - Éosinophile de l' *C75.1*
- - Anomalies de l' *E23.6*
- - Atrophie de l' *E23.6*
- - Carcinome
- - - Acidophile de l' *C75.1*
- - - Basophile
- - - - *C75.1*
- - - - Éosinophile de l' *C75.1*
- - - Chromophobe de l' *C75.1*
- - - Éosinophile de l' *C75.1*
- - - Mixte
- - - - Acidophile et basophile de l' *C75.1*
- - - - Basophile et acidophile de l' *C75.1*
- - Gomme de l' *A52.7†, E35.8**
- - Hypersécrétion
- - - *E22*
- - - *E22.8*
- - Hyposécrétion et autres anomalies de l' *E23*
- - Syphilis de l' *A52.7†, E35.8**
- - Tuberculose de l' *A18.8†, E35.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D35.2*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.3*
- - - Maligne: *C75.1*

Hypophysite

- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**
- Toxoplasmes ¬ *B58.2†, G05.2**

Hypophyso dépendant ¬

- Hypercorticisme *E24.0*
- Maladie de Cushing *E24.0*

Hypopigmentation progressive familiale ¬ Hyper- et *L81.8*

Hypopituitarisme

- Actes médicaux ¬ *E89.3*
- Irradiation ¬ *E89.3*
- Médicamenteux ¬ *E23.1*

Hypopituitarisme *–suite*

- ¬
- - *E23.0*
- - Myopathie au cours de l' *E23.0†, G73.5**

Hypoplasie

- Anneau mitral ¬ *Q23.2*
- Aorte ¬ *Q25.4*
- Artère
- - Ombilicale ¬ Absence congénitale et *Q27.0*
- - Pulmonaire ¬
- - - *Q25.7*
- Cément ¬ Aplasie et *K00.4*
- Cérébelleux
- - Dégénérescence tapéto-rétinienne ¬ Syndrome d' *Q04.3*
- - Type
- - - A ¬ Lissencéphalie- *Q04.3*
- - - B ¬ Lissencéphalie- *Q04.3*
- - - C ¬ Lissencéphalie- *Q04.3*
- - - D ¬ Lissencéphalie- *Q04.3*
- - - E ¬ Lissencéphalie- *Q04.3*
- - - F ¬ Lissencéphalie- *Q04.3*
- - ¬ Syndrome de sclérose endostéale *Q87.8*
- Cœur
- - Droit ¬ *Q22.6*
- - Gauche ¬ *Q23.4*
- Congénitale du pouce ¬ *Q71.8*
- Corps calleux et appendices pré-auriculaires ¬ Syndrome de déficience intellectuelle avec *Q87.8*
- Cubitus-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.2*
- Dermique en aires ¬ *Q82.8*
- Dysplasie
- - Moelle épinière ¬ *Q06.1*
- - Poumon ¬ *Q33.6*
- Émail (néonatale) (post-natale) (prénatale) ¬ *K00.4*
- Fémur
- - Faciès particulier ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - ¬ *Q72.4*
- Fovéale-cataracte présénile ¬ Syndrome d' *H35.8†, H28.2**
- Isolée du vermis cérébelleux ¬ *Q04.3*
- Langue ¬ *Q38.3*
- Larynx ¬ *Q31.2*
- Mammaire
- - Congénitale isolée ¬ *Q83.88*
- - ¬ *Q83.88*
- Mandibulaire ¬ Hyperplasie, *K07.0*
- Maxillaire ¬ Hyperplasie, *K07.0*
- Médullaire ¬ *D61.9*
- Nez ¬ Agénésie et *Q30.1*
- Œil ¬ *Q11.2*
- Pancréas ¬ Agénésie, aplasie et *Q45.0*
- Pancréatique-diabète-cardiopathie congénitale ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Hypoplasie *–suite*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Pénis ¬ *Q55.6*
- Phalanges ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-épilepsie-anomalies anales- *Q87.8*
- Pontocérébelleuse type
- - 1 ¬ *Q04.3*
- - 2 ¬ *Q04.3*
- - 3 ¬ *Q04.3*
- - 4 ¬ *Q04.3*
- - 5 ¬ *Q04.3*
- - 6 ¬ *Q04.3*
- - 7 ¬ *Q04.3*
- - 8 ¬ *Q04.3*
- - 9 ¬ *Q04.3*
- - 10 ¬ *Q04.3*
- Pulmonaire
- - Associée à une brièveté de la gestation ¬ *P28.0*
- - Congénitale unilatérale ¬ *Q33.6*
- Radius-pouces triphalangés-hypospadias-progénie ¬ Syndrome d' *Q87.2*
- Rate ¬ *Q89.08*
- Rénal
- - Bilatérale ¬ *Q60.4*
- - Sans précision ¬ *Q60.5*
- - Unilatérale ¬ *Q60.3*
- Surrénalienne congénitale cytomégalique ¬ *E27.1*
- Testicule(s) et du scrotum ¬ *Q55.1*
- Thymique avec déficit immunitaire ¬ Aplasie ou *D82.1*
- Thyroïde ¬ *E03.1*
- Unilatérale du processus condylien de la mandibule ¬ Hyperplasie ou *K10.8*
- Utérus et du col de l'utérus ¬ *Q51.8*
- Ventriculaire
- - Droite isolée ¬ *Q22.6*
- - ¬ Canal atrioventriculaire complet - *Q21.2*
- Vésicule biliaire ¬ Agénésie, aplasie et *Q44.0*

Hypoplasique
- Congénitale de Blackfan-Diamond ¬ Anémie *D61.0*
- Familiale ¬ Anémie (de): *D61.0*
- SAI ¬ Anémie *D61.9*
- Turner ¬ Dent *K00.4*

Hypoproaccélérinémie ¬ *D68.22*

Hypoproconvertinémie
- Congénital
- - Héréditaire ¬ *D68.23*
- - ¬ *D68.23*
- ¬ *D68.23*

Hypoprotéinémie ¬ Gastropathie hypertrophique sans *K29.6*

Hypoprothrombinémie
- Acquise ¬ *D68.4*

Hypoprothrombinémie *–suite*
- Héréditaire ¬ *D68.21*
- Idiopathique ¬ *D68.21*
- ¬ *D68.21*

Hypoptyalisme ¬ *K11.7*

Hypopyon ¬ Ulcère de (la): cornée: avec *H16.0*

Hyporéactivité
v. hypotension-hyporéactivité

Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse ¬ *E23*

Hyposegmentation leucocytaire, héréditaire ¬ *D72.0*

Hyposomnie ¬ *G47.0*

Hypospadias
- Balanique ¬ *Q54.0*
- Coronal ¬ *Q54.0*
- Glandulaire ¬ *Q54.0*
- Pénien ¬ *Q54.1*
- Pénoscrotal ¬ *Q54.2*
- Périnéal ¬ *Q54.3*
- Progénie ¬ Syndrome d'hypoplasie du radius-pouces triphalangés- *Q87.2*
- Sans précision ¬ *Q54.9*
- ¬
- - *Q54*
- - *Q54.8*

Hyposphagme ¬ *H11.3*

Hypospléniisme ¬ *D73.0*

Hypostatique, sans précision ¬ Pneumonie *J18.2*

Hyposurrénalisme tuberculeux ¬ *A18.7†, E35.1**

Hypotensif en position couchée ¬ Syndrome *O26.5*

Hypotension
- Chronique ¬ *I95.8*
- Idiopathique ¬ *I95.0*
- Intracrânien
- - Spontanée ¬ *G96.0*
- - Suite à un pontage ventriculaire ¬ *G97.2*
- Maternelle ¬ Syndrome d' *O26.5*
- Médicamenteuse ¬ *I95.2*
- Orthostatique
- - Neurogène
- - - Syndrome de Shy-Drager] ¬ *G23.8*
- - - ¬ Syndrome parkinsonien au cours d' *G23.8*
- - Symptomatique ¬ Syndrome parkinsonien au cours d' *G23.8*
- - ¬
- - - *I95.1*
- - - Syndrome parkinsonien au cours d' *G23.8*
- Posturale ¬ *I95.1*
- Sans précision ¬ *I95.9*
- ¬
- - *I95*
- - *I95.8*

Hypotension-hyporéactivité ¬ Épisode d' *T88.1*

Hypothalamique
- Non classée ailleurs ¬ Anomalie *E23.3*
- ¬ les états mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie hypophysaire ou *E23*

Hypothermie
- Accidentelle ¬ *T68*
- Consécutive à une anesthésie ¬ *T88.5*
- Légère du nouveau-né ¬ *P80.8*
- Non associée à une baisse de la température ambiante ¬ *R68.0*
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬ *P80.9*
- - ¬
- - - *P80*
- - - Formes d' *P80.8*
- Périodique spontanée ¬ *G90.8*
- ¬ *T68*

Hypothermique
- Auto-inflammatoire familial ¬ Syndrome *L50.2*
- Nouveau-né ¬ Syndrome *P80.0*

Hypothyroïdie
- Acquis
- - Carence en iode ¬ Démence au cours d' *E01.8†, F02.8**
- - ¬ Démence au cours d' *E03.9†, F02.8**
- Actes médicaux ¬ *E89.0*
- Carence
- - Acquise en iode SAI ¬ *E01.8*
- - Inapparente en iode ¬ *E02*
- Centrale due à un déficit du récepteur de la TRH ¬ *E03.1*
- Chirurgie ¬ *E89.0*
- Congénital
- - Centrale avec macroorchidie tardive liée à l'X ¬ *E03.1*
- - Goitre diffus ¬ *E03.0*
- - SAI ¬ *E03.1*
- - Sans goitre ¬ *E03.1*
- Insuffisance congénitale en iode SAI ¬ *E00.9*
- Irradiation ¬ *E89.0*
- Médicaments et à d'autres produits exogènes ¬ *E03.2*
- Mutation du récepteur de la TSH ¬ *E03.1*
- Post-infectieuse ¬ *E03.3*
- Précisées ¬ Autres *E03.8*
- Résistance périphérique aux hormones thyroïdiennes ¬ *E03.8*
- Sans précision ¬ *E03.9*
- Transitoire néonatale ¬ *P72.2*
- ¬
- - *E03*
- - Arthropathie au cours de l' *E03.9†, M14.59**
- - Myopathie au cours de l' *E03.9†, G73.5**

Hypothyroïdie *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Syndrome de pseudohypertrophie musculaire- *E03.1*

Hypothyroïdien ¬ Crétinisme endémique (de): *E00.1*

Hypotonie

- Congénitale ¬ *P94.2*

- Dysmorphie faciale-comportement agressif ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*

- Épilepsie

- - Type

- - - 2 ¬ Syndrome d'anomalies congénitales multiples- *Q87.8*

- - - 3 ¬ Syndrome d'anomalies congénitales multiples- *Q87.8*

- - ¬ Syndrome d'anomalies congénitales multiples- *Q87.8*

- Ichtyose par déficit en dolichol phosphate ¬ *E77.8*

- Œil ¬ *H44.4*

- Utérin

- - Post-partum ¬ *O72.1*

- - Primitive ¬ *O62.0*

- - SAI ¬ *O62.2*

- - Secondaire ¬ *O62.1*

- Utérus en tant que complication de l'accouchement ¬ *O62.2*

Hypotonie-cystinurie ¬ Syndrome d' *E72.0*

Hypotonique de l'utérus en tant que complication de l'accouchement ¬ Contraction *O62.2*

Hypotrichose
v.a. ichtyose-hypotrichose
v.a. spondylo-métaphysaire-hypotrichose

- Dégénérescence maculaire juvénile ¬ *Q87.8*

- Médicament cytotoxique ¬ *L65.8*

- Post-infectieuse ¬ *L65.8*

- Simple ¬ *L65.8*

- Type Marie Unna ¬ *Q84.0*

Hypotrophie mammaire ¬ *Q83.88*

Hypotropie ¬

- *H50.2*

- Maladie de Basedow avec orbitopathie endocrinienne et *E05.0†, H06.3**

Hypo-uricémie rénale héréditaire ¬ *N25.8*

Hypoventilation

- Alvéolaire

- - Centrale congénital ¬ Syndrome d' *G47.32*

- - Enfant adolescent ¬ Obésité

- - - *E66.24*

- - - Extrême avec *E66.25*

- - Indice masse corporelle IMC

- - - 40 ou plus ¬ Obésité avec *E66.22*

- - - Compris

- - - - 30 et moins de 35 ¬ Obésité avec *E66.20*

- - - - 35 et moins de 40 ¬ Obésité avec *E66.21*

Hypoventilation *–suite*

- Alvéolaire *–suite*

- - Non obstructive idiopathique du sommeil ¬ *G47.32*

- - ¬

- - - Obésité grade

- - - - I (OMS) avec *E66.20*

- - - - II (OMS) avec *E66.21*

- - - - III (OMS) avec *E66.22*

- - - Syndrome de l' *E66.29*

- Associée à l'obésité ¬ Syndrome d' *E66.29*

- SOH] ¬ Syndrome obésité *E66.2*

- Sommeil ¬ Syndrome d' *G47.32*

Hypovitaminose A SAI ¬ *E50.9*

Hypovolémie ¬

- *E86*

- Maladie due au VIH avec *B23.8, E86*

Hypovolémique

- Pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Choc (endotoxique) (*T81.1*

- ¬ Choc *R57.1*

Hypoxanthine guanine phosphoribosyltransférase

- Grade IV ¬ Déficit en *E79.1*

- ¬ Déficit partiel en *E79.8*

Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase grade I ¬ Déficit en *E79.8*

Hypoxémique ¬ Polycythémie: *D75.1*

Hypoxie

- Fœtal

- - Intra-utérine ¬ *P20*

- - ¬ Soins maternels pour signes d' *O36.3*

- Intra-utérin

- - Constaté premier fois

- - - Avant le début du travail ¬ *P20.0*

- - - Pendant le travail et l'accouchement ¬ *P20.1*

- - Sans précision ¬ *P20.9*

- - ¬ *P20*

- Périnatale ¬ *P21.9*

- SAI ¬ *P21.9*

- ¬ hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une *P52*

Hypoxique

- Ischémique] du nouveau-né ¬ Encéphalopathie anoxo-ischémique [*P91.6*

- ¬ Insuffisance respiratoire *J96.90*

Hypsicéphalie ¬ *Q75.0*

Hystérectomie ¬ Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après *N99.3*

Hystérie

- Angoisse ¬ *F41.8*

- Conversion ¬ *F44*

- ¬

- - *F44*

- - Vision floue au cours d' *F44.6†, H58.1**

Hystérique
v. Type de maladie

Hystrix de Curth-Macklin ¬ Ichtyose *Q80.8*

IAC] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: conjoint [*N98.8*

IAD] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: donneur [*N98.8*

IAEP ¬ *J82*

Iatrogène ¬

- Hypoglycémie néonatale *P70.3*
- Pneumothorax *J95.80*

IBS-C] ¬ Irritable bowel syndrome with predominant constipation [*K58.2*

IBS-D] ¬ Irritable bowel syndrome with predominant diarrhoea [*K58.1*

IBS-M] ¬ Irritable bowel syndrome with mixed bowel habits [*K58.3*

IC/BPS ¬ *N30.1*

ICCA ¬ Syndrome *G40.4*

ICE ¬ Syndrome *H21.8*

Ichthyosis ¬ Bathing suit *Q80.2*

Ichtyoparasitose à Vandellia cirrhosa ¬ *B88.8*

Ichtyose

- Acquise ¬ *L85.0*
- Congénital
- - Microcéphalie-tétraplégie ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - Sans précision ¬ *Q80.9*
- - ¬ Autres *Q80.8*
- Déficit en dolichol phosphate ¬ Hypotonie et *E77.8*
- Épidermolytique
- - Annulaire ¬ *Q80.3*
- - Autosomique récessive ¬ *Q80.3*
- - Superficielle ¬ *Q80.8*
- - ¬ *Q80.3*
- Exfoliative ¬ *Q80.8*
- Folliculaire-alopécie-photophobie ¬ Syndrome d' *Q80.0*
- Hépatosplénomégalie-dégénérescence cérébelleuse ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Hystrix de Curth-Macklin ¬ *Q80.8*
- Lamellaire ¬ *Q80.2*
- Liée au chromosome X ¬ *Q80.1*
- Obésité-petite taille ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypogonadisme- *Q87.8*
- Récessive liée à l'X syndromique ¬ *Q80.1*
- Trichothiodystrophie ¬ *L67.8*
- Vulgaire ¬ *Q80.0*
- ¬
- - Kératodermie mutilante avec *Q82.8*
- - Lipidose avec surcharge en triglycérides et *E75.5*

Ichtyose-hypotrichose ¬ Syndrome d' *Q80.8*

Ichtyose-prématurité ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Ichtyosiforme

- Anomalies des membres ¬ Syndrome d'hémidysplasie congénitale-nævus *Q87.8*
- Bulleux
- - Brock ¬ Érythrodermie congénitale *Q80.3*

Ichtyosiforme *–suite*

- Bulleux *–suite*
- - Congénitale ¬ Érythrodermie *Q80.3*
- Non-bulleuse ¬ Érythrodermie congénitale *Q80.2*
- Réticulaire ¬ Érythrodermie congénitale *Q80.3*

Ictère

- Acholurique (familial) ¬ *D58.0*
- Épidémique avec coma hépatique ¬ *B15.0, K72.74!*
- Hémolytique congénital (sphérocytaire) ¬ *D58.0*
- Infectieux avec coma hépatique ¬ *B15.0, K72.74!*
- Néonatal
- - Associé à un accouchement avant terme ¬ *P59.0*
- - Causé
- - - Précisées ¬ *P59.8*
- - - Sans précision ¬ *P59*
- - Contusions ¬ *P58.0*
- - Déglutition de sang maternel ¬ *P58.5*
- - Galactosémie ¬ *E74.2*
- - Hémolyse excessif
- - - Précisées ¬ *P58.8*
- - - Sans précision ¬ *P58.9*
- - - ¬ *P58*
- - Infection ¬ *P58.2*
- - Inhibiteurs de la lactation ¬ *P59.3*
- - Lésions hépatocellulaires, autres et sans précision ¬ *P59.2*
- - Médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né ¬ *P58.4*
- - Polycythémie ¬ *P58.3*
- - Saignement ¬ *P58.1*
- - Sans précision ¬ *P59.9*
- Non classé ¬ Hyperbilirubinémie
- - Indication d' *R17.0*
- - Sans *R17*
- Nucléaire
- - Iso-immunisation ¬ *P57.0*
- - Sans précision ¬ *P57.9*
- - ¬
- - - *P57*
- - - Formes précisées d' *P57.8*
- Physiologique (intense) (prolongé) SAI ¬ *P59.9*
- Réaction hémolytique à la transfusion ¬ *T80.8*
- Retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme ¬ *P59.0*
- Sérique homologue) ¬ Hépatite sérique (*B19.9*
- Transfusion ¬ *T80.8*

Icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirose à Leptospira interrogans serovar *A27.0*

Ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] ¬ Leptospirose *A27.0*

IDC-P] ¬ Carcinome intracanalaire de la prostate [*C61*

Idées

- Obsédantes et comportements compulsifs ¬ Forme mixte, avec *F42.2*
- Ruminations obsédantes au premier plan ¬ Avec *F42.0*
- Tendances] suicidaires ¬ *R45.8*

Identifié

- Exception virus grippe aviaire grippe porcine ¬
- - Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière *J10.8†, G05.1**
- - Encéphalopathie lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière *J10.8†, G94.3**
- - Grippe [Influenza] avec otite, virus de la grippe saisonnière *J10.8†, H67.1**
- - Influenza, virus de la grippe saisonnière *J10.1*
- - Myocardite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière *J10.8†, I41.1**
- - Polio-encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière *J10.8†, G05.1**
- Hors virus grippe aviaire porcine ¬
- - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.0*
- - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- Sauf virus grippe aviaire porcine ¬
- - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Gastroentérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - Grippe
- - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Influenza
- - - - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Laryngite, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Pharyngite, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Infection

Identifié *–suite*

- Sauf virus grippe aviaire porcine ¬ *–suite*
- - Infection *–suite*
- - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière *J10.0*
- - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.0*
- ¬
- - Broncho
- - - Pneumonie virale, sans précision ou virus spécifique non *J11.0*
- - - Pneumopathie grippale, virus d'influenza saisonnière *J10.0*
- - Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière *J10.8†, G05.1**
- - Encéphalopathie grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non *J11.8*
- - - Virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - Epanchement pleural grippal sans précision ou virus spécifique non *J11.1*
- - Gastroentérite grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non *J11.8*
- - - Virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - Grippe
- - - Asiatique influenza virus grippe
- - - - Aviaire *J09, U69.21!*
- - - - Porcine *J09, U69.20!*
- - - Épanchement pleural grippal à virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Influenza
- - - - Encéphalite
- - - - - Virus de la grippe aviaire *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - - Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique *J09†, G05.1**
- - - - Encéphalopathie, virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique *J09†, G94.3**
- - - - Entérite
- - - - - Virus de la grippe aviaire *J09, U69.21!*
- - - - - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Épanchement
- - - - - Pleural, virus de la grippe aviaire *J09, U69.21!*
- - - - - Pleural, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Gastroentérite
- - - - - Virus de la grippe aviaire *J09, U69.21!*
- - - - - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*

Identifié *–suite*

- - ¬ *–suite*
- - Grippe *–suite*
- - - Influenza *–suite*
- - - - Infection
- - - - - Respiratoire supérieure, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - - Voies respiratoires supérieures, virus de la grippe aviaire *J09, U69.21!*
- - - - Laryngite
- - - - - Virus de la grippe aviaire *J09, U69.21!*
- - - - - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Méningisme
- - - - - Virus de la grippe aviaire *J09, U69.21!*
- - - - - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Myocardite
- - - - - Virus de grippe porcine *J09, U69.20!*
- - - - - Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique *J09†, I41.1**
- - - - Otite
- - - - - Moyenne, virus de la grippe aviaire *J09†, H67.1*, U69.21!*
- - - - - Moyenne, virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique *J09†, H67.1**
- - - - Pharyngite
- - - - - Virus de la grippe aviaire *J09, U69.21!*
- - - - - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Pneumonie
- - - - - Virus de la grippe aviaire *J09, U69.21!*
- - - - - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Polio-encéphalite
- - - - - Virus de la grippe aviaire *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - - Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique *J09†, G05.1**
- - - - Virus
- - - - - Grippe aviaire *J09, U69.21!*
- - - - - Influenza], virus d'influenza B ou C *J10.8*
- - - Laryngite grippale à virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Manifestation
- - - - Respiratoire
- - - - - Virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - - Virus non *J11.1*
- - - - Virus
- - - - - Influenza saisonnière *J10.8*
- - - - - Non *J11.8*
- - - Pharyngite grippale à virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Pneumonie virus
- - - - Influenza saisonnière *J10.0*
- - - - Non *J11.0*
- - - Virus

Identifié *–suite*

- - ¬ *–suite*
- - Grippe *–suite*
- - - Virus *–suite*
- - - - Influenza
- - - - - B ou C *J10*
- - - - - Saisonnière *J10.1*
- - - - - Zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Non *J11*
- - Hépatite B antigène
- - - HBc *B18.19*
- - - HBe *B18.19*
- - - HBs *B18.19*
- - Infection grippale des voies respiratoires supérieures sans précision ou virus spécifique non *J11.1*
- - Laryngite grippale sans précision ou virus spécifique non *J11.1*
- - Myocardite
- - - Aigu grippal
- - - - Sans précision ou virus spécifique non *J11.8*
- - - - Virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - - Grippale par virus de la grippe aviaire *J09, U69.21!*
- - Pharyngite grippale sans précision ou virus spécifique non *J11.1*

Identité

- Sexuel
- - Adulte ou l'adolescent, type non transsexuel ¬ Trouble de l' *F64.1*
- - Enfance ¬ Trouble de l' *F64.2*
- - Sans précision ¬ Trouble de l' *F64.9*
- - ¬ Autres troubles de l' *F64.8*
- ¬ Trouble de l' *F93.8*

Idiopathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcome de Kaposi [Sarcoma *C46*

Idiopathique
v. Type de maladie

Idiosyncrasie

- SAI ¬ *T78.4*
- Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.7*

Idiosyncrasique (imprévisible) médicamenteuse ¬ lésion hépatique: *K71*

Idiotie amaurotique

- Familiale ¬ *E75.4*
- Infantile ¬ *E75.4*
- Juvénile ¬ *E75.4*
- ¬
- - *E75.4*
- - Forme tardive de l' *E75.4*

Iduronate 2-sulfatase ¬ Déficit en *E76.1*

Iduronidase
v. alpha-L-iduronidase

Ieshima-Koeda-Inagaki ¬ Syndrome de *Q87.8*

IFF ¬ *A81.8*

IFNgammaR1 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en *D84.8*

IFNgammaR2 ¬

- MSMD autosomique récessive par déficit partiel en *D84.8*
- Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en *D84.8*

IgA

- Croissant ¬ Glomérulonéphrite à *N02.7*
- Linéaire ¬ Dermatose à *L13.8*
- ¬
- - Déficit sélectif en immunoglobuline A [*D80.2*
- - Vascularite à *D69.0*

IgE] ¬ Syndrome d'hyperimmunoglobulinémie E [*D82.4*

IgG] ¬ Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [*D80.3*

IgG4 ¬

- Aortite associée à *I77.6*
- Cholangite sclérosante à *K83.0*
- Dacryoadénite et sialadénite à *K11.8*
- Hépatopathie associée aux *K75.4*
- Maladie
- - Glande submandibulaire associée à *K11.2*
- - Rénale associée à *N11.8*
- Médiastinite associée à *J98.50*
- Pachyméningite associée à *G03.8*

IgM

- Activité anti-MAG ¬ Polyneuropathie associée à une gammopathie monoclonale *D47.2†, G63.1**
- Rémission complète ¬ Lymphome lymphoplasmocytaire avec production d' *C88.01*
- ¬
- - Déficit
- - - Immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [*D80.5*
- - - Sélectif en immunoglobuline M [*D80.4*
- - Lymphome lymphoplasmocytaire avec production d' *C88.0*

IKAROS ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

IKK2 ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en *D81.2*

IL10 ¬ Maladie inflammatoire de l'intestin précoce associée à *K52.8*

IL12B ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en *D84.8*

IL21R ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Iléale ¬

- Maladie de Crohn [entérite régionale]: *K50.0*
- Mucosite *K92.8*

Iléite

- Aspergillus ¬ *B44.8†, K93.8**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**

Iléite *–suite*

- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*
- Reflux ¬ *K51.0*
- Régionale ¬ *K50.0*
- Terminale ¬ *K50.0*
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**
- - Herpès ¬ *B00.8†, K93.8**

Iléo-cæcal

- Hyperplasique ¬ Tuberculose *A18.3†, K93.0**
- - ¬ Valvule
- - *C18.0*
- - *D12.0*

Iléocolite tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**

Iléon ¬

- Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q41.2*
- Tuberculose de l' *A18.3†, K93.0**
- Tumeur
- - Maligne: *C17.2*
- - Neuroendocrine
- - - *C17.2*
- - - *D13.3*
- - - Incertain de l' *D37.2*

Iléostomie

- Dispositifs gastro-intestinaux ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z46.5*
- ¬
- - Présence d'une *Z93.2*
- - Surveillance d' *Z43.2*

Iléus

- Biliaire ¬ *K56.3*
- Duodénal (chronique) ¬ *K31.5*
- Gangrène
- - Intestinale ¬ *K56.6*
- - Mésentère ¬ *K56.6*
- Méconial
- - Absence reconnue de fibrose kystique du pancréas ¬ *P76.0*
- - Cours de fibrose kystique ¬ *E84.1†, P75**
- - Déficit en guanylate cyclase 2C ¬ *P76.0*
- - ¬ Mucoviscidose avec *E84.1†, P75**
- Occlusif SAI ¬ *K56.6*
- Paralytique
- - Occlusion intestinale sans hernie ¬ *K56*
- - ¬ *K56.0*
- Sans précision ¬ *K56.7*
- Strangulation ¬ *K56.2*
- Transitoire du nouveau-né ¬ *P76.1*

Iliaque
v.a. scapulo-iliaque

- Buchanan] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): crête *M91.0*
- Supérieure ¬ Tuberculose de la colonne *A18.0†, M90.05**
- ¬

Iliaque *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Anévrisme et dissection de l'artère *I72.3*
- - Artère ou veine *S35.5*
- - Dystocie due à la persistance en position: occipito- *O64.0*
- - Embolie et thrombose de l'artère *I74.5*
- - Exostose de la crête *M76.2*
- - Lésion traumatique des vaisseaux sanguins *S35.5*
- - Occlusion de l'artère *I74.5*
- - Os *D16.8*
- - Région *S31.1*
- - Thrombose de la veine *I80.20*

Ilio-fémoral
v. iliofémoral

- ¬ Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) *S73.11*

Ilion ¬ Fracture de l' *S32.3*

Ilio-tibiale] ¬ Syndrome de la bandelette de Maissiat [*M76.3*

Îlot

- Langerhans
- - SAI ¬ Hyperplasie cellule
- - - *E16.9*
- - - Bêta des *E16.1*
- - ¬ *C25.4*
- Pancréatiques ¬ Tumeur à cellules des *D37.70*

Image cardiaque anormale ¬ *R93.1*

Imagerie diagnostique

- Appareil urinaire ¬ Résultats anormaux d' *R93.4*
- Cœur et de la circulation coronaire ¬ Résultats anormaux d' *R93.1*
- Crâne et de la tête, non classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d' *R93.0*
- Foie et des voies biliaires ¬ Résultats anormaux d' *R93.2*
- Membres ¬ Résultats anormaux d' *R93.6*
- Partie
- - Abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d' *R93.5*
- - Corps
- - - Précisées ¬ Résultats anormaux d' *R93.8*
- - - ¬ Résultats anormaux d' *R93*
- - Système ostéo-musculaire ¬ Résultats anormaux d' *R93.7*
- - Voies digestives ¬ Résultats anormaux d' *R93.3*
- Poumon ¬ Résultats anormaux d' *R91*
- Sein ¬ Résultats anormaux d' *R92*
- Système nerveux central ¬ Autres résultats anormaux d' *R90.8*

Imahorn
v. Meier-Blumberg-Imahorn

Imbriquée ¬ Teigne *B35.5*

IMC

- 40 plus ¬

IMC *–suite*
- 40 plus ¬ *–suite*
- - Indice de masse corporelle [*E66.92*
- - Obésité
- - - Endogène avec un indice de masse corporelle [*E66.82*
- - - Excès calorique avec un indice de masse corporelle [*E66.02*
- - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de masse corporelle [*E66.22*
- - - Médicamenteuse avec un indice de masse corporelle [*E66.12*
- Compris
- - 30 35 ¬
- - - Indice de masse corporelle [*E66.90*
- - - Obésité
- - - - Endogène avec un indice de masse corporelle [*E66.80*
- - - - Excès calorique avec un indice de masse corporelle [*E66.00*
- - - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de masse corporelle [*E66.20*
- - - - Médicamenteuse avec un indice de masse corporelle [*E66.10*
- - 35 40 ¬
- - - Indice de masse corporelle [*E66.91*
- - - Obésité
- - - - Endogène avec un indice de masse corporelle [*E66.81*
- - - - Excès calorique avec un indice de masse corporelle [*E66.01*
- - - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de masse corporelle [*E66.21*
- - - - Médicamenteuse avec un indice de masse corporelle [*E66.11*

Imerslund(-Gräsbeck) ¬ Syndrome d' *D51.1*

Imidazolique ¬ Syndrome *E70.8*

Iminés ¬ Maladie des acides *E72.8*

Iminoglycinurie ¬ *E72.0*

Iminostilbènes ¬ Intoxication
- *T42.1*

Immature
- Prématuré ¬ Centre respiratoire *P28.8*
- ¬
- - Personnalité: *F60.8*
- - Prématuré *P07.3*

Immaturité
- Extrême ¬ *P07.2*
- Pulmonaire SAI ¬ *P28.0*

Immersion ¬
- *T75.1*
- Main et pied d' *T69.0*

Immigration ¬ inscription dans: *Z02*

Imminent
- Impending infarction] ¬ Angine: Infarctus *I20.0*
- ¬ Accident cérébrovasculaire *G45.9*

Immobilité
- Paraplégique) ¬ Syndrome d' *M62.3*

Immobilité *–suite*
- ¬ *R26.3*

Immun
v.a. auto-immun
- ¬ Syndrome
- - Réactivation *D89.3*
- - Reconstitution *D89.3*

Immunisation
v.a. iso-immunisation
- ¬ Hépatite par *B19.9*

Immunitaire
- Adulte avec autoanticorps anti-interféron-gamma acquis ¬ Déficit *D84.8*
- Associé anomalie
- - Facteur
- - - I ¬ Déficit *D84.1*
- - - ¬ Déficit *D84.1*
- - Majeur
- - - Précisées ¬ Déficit *D82.8*
- - - Sans précision ¬ Déficit *D82.9*
- - - ¬ Déficit *D82*
- Augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] ¬ Déficit *D80.5*
- Combiné
- - Déficit
- - - DOCK8 ¬ Déficit *D81.1*
- - - GINS1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - IKAROS ¬ Déficit *D81.8*
- - - IL21R ¬ Déficit *D81.8*
- - - LRBA ¬ Déficit *D81.8*
- - - MAGT1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - MALT1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - OX40 ¬ Déficit *D81.8*
- - - Partiel en RAG1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - RAG1/2 ¬ Déficit *D81.1*
- - - STK4 ¬ Déficit *D81.8*
- - - TFRC ¬ Déficit *D81.8*
- - - ZAP70 ¬ Déficit *D81.8*
- - Dysfonctionnement du canal CRAC ¬ Déficit *D81.8*
- - Hyperéosinophilie ¬ Déficit *D81.8*
- - Microcéphalie-retard de croissance-sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit *D81.1*
- - Sans précision ¬ Déficit *D81.9*
- - Sévère
- - - Déficit
- - - - Adénosine désaminase ¬ Déficit *D81.3*
- - - - CORO1A ¬ Déficit *D81.2*
- - - - CTPS1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - - IKK2 ¬ Déficit *D81.2*
- - - - LAT ¬ Déficit *D81.2*
- - - DICS
- - - - Dysgénésie réticulaire ¬ Déficit *D81.0*
- - - - Nombre
- - - - - Faible de cellules B et T ¬ Déficit *D81.1*

Immunitaire *–suite*
- Combiné *–suite*
- - Sévère *–suite*
- - - DICS *–suite*
- - - - Nombre *–suite*
- - - - - Faible ou normal de cellules B ¬ Déficit *D81.2*
- - - - SAI ¬ Déficit *D81.9*
- - - T-B- ¬ Déficit *D81.1*
- - - T-B+
- - - - Déficit en JAK3 ¬ Déficit *D81.2*
- - - - Lié à l'X ¬ Déficit *D81.2*
- - - ¬
- - - - SCID [Déficit *D81.9*
- - - - Syndrome de dysplasie osseuse à membres courts-déficit *D82.2*
- - ¬ déficit
- - - *D81*
- - - *D81.8*
- Commun variable
- - Anomalie prédominant
- - - Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ Déficit *D83.1*
- - - Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ Déficit *D83.0*
- - Autoanticorps anti-lymphocytes B ou T ¬ Déficit *D83.2*
- - Sans précision ¬ Déficit *D83.9*
- - ¬ Déficit
- - - *D83*
- - - *D83.8*
- - - *D83.9*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système *O99.1*
- Déficit
- - Ficoline 3 ¬ Déficit *D84.1*
- - Prédominant production anticorps
- - - Sans précision ¬ Déficit *D80.9*
- - - ¬ Autres déficits *D80.8*
- Micromélie ¬ Déficit *D82.2*
- Neutrophile ¬ Syndrome de déficit *D71*
- Non classé ¬ anomalie
- - Précisées du système *D89.8*
- - Système *D89*
- Polyendocrinopathie-entéropathie lié à l'X ¬ Syndrome de dérèglement *E31.0*
- Précisés ¬ Autres déficits *D84.8*
- Primaire
- - Autosomique récessif avec un défaut de cytotoxicité spontanée des cellules Natural Killer ¬ Déficit *D84.8*
- - Déficit en MCM4 ¬ Déficit *D84.8*
- - Infection virale disséminée post-vaccination ROR ¬ Déficit *D84.8, T88.0*
- - ¬ Déficit *D84.9*
- Réponse héréditaire anormal virus Epstein-Barr ¬ Déficit

Immunitaire *–suite*
- Réponse héréditaire anormal virus Epstein-Barr ¬ Déficit *–suite*
- - *D82.3*
- SAI ¬ Maladie *D89.9*
- Sans précision ¬
- - Anomalie du système *D89.9*
- - Déficit *D84.9*
- SIRI] ¬ Syndrome inflammatoire de restauration *D89.3*
- Thrombocytopénie et eczéma ¬ Déficit *D82.0*
- ¬
- - Antécédent
- - - Familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système *Z83.2*
- - - Personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système *Z86.2*
- - Aplasie ou hypoplasie thymique avec déficit *D82.1*
- - Déficits *D84*
- - Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système *Z13.0*
- - Faiblesse des défenses *D89.9*
- - Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système *N08.2**
- - Hémophilie due aux inhibiteurs produits par le système *D68.38*
- - Maladie
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système *N16.2**
- - - VIH avec trouble *B23.8*
- - Syndrome
- - - Fatigue chronique lors de dysfonctionnements *G93.3*
- - - Maladie veino-occlusive hépatique-déficit *D82.8, K76.5*

Immunité cellulaire ¬ Défaut de l' *D84.8*

Immunoblastique
- Diffus ¬
- - Lymphome *C83.3*
- - Sarcome *C83.3*
- Non-hodgkinien ¬ Lymphome *C83.3*
- ¬
- - Lymphome
- - - Diffus à grandes cellules B *C83.3*
- - - T *C84.9*
- - Maladie par VIH avec sarcome *B21, C83.3*

Immunoblastome
- Malin ¬ *C83.3*
- ¬ *C83.3*

Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives ¬ *D90*

Immunodéficience
- Acquise [SIDA] SAI ¬ Syndrome d' *B24*

Immunodéficience *–suite*
- Combiné sévère
- - Déficit
- - - CARD11 ¬ *D81.2*
- - - DCLRE1C ¬ *D81.1*
- - - DNA-PKcs ¬ *D81.1*
- - T-B+ ¬ *D81.2*
- Déficit
- - C1 ¬ *D84.1*
- - C2 ¬ *D84.1*
- - C4 ¬ *D84.1*
- - C5 ¬ *D84.1*
- - C6 ¬ *D84.1*
- - C7 ¬ *D84.1*
- - C8 ¬ *D84.1*
- - C9 ¬ *D84.1*
- - Interleukin-1 receptor-associated kinase-4 ¬ *D84.8*
- - MASP-2 ¬ *D84.1*
- - Sélectif en anticorps anti-polysaccharide ¬ *D80.6*
- Humain
- - Maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l' *Z11*
- - Résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases ¬ Virus de l' *U85!*
- - VIH
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladie due au virus de l' *O98.7*
- - - ¬
- - - - Infection asymptomatique par le virus de l' *Z21*
- - - - Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l' *R75*
- - - - Sujets en contact avec et exposés au virus de l' *Z20.6*
- - Viral VIH
- - - Origine
- - - - Affections précisées ¬ *B22*
- - - - Maladie
- - - - - Infectieuses et parasitaires ¬ *B20*
- - - - - ¬ *B23*
- - - - Tumeurs malignes ¬ *B21*
- - - Sans précision ¬ *B24*
- - ¬ Conseil: à propos du VIH [virus de l' *Z71*
- ¬
- - Dysplasie ectodermique anhidrotique avec *Q82.4*
- - Inflammation généralisée des muqueuses par *K91.80*

Immunoglobuline
- A [IgA] ¬ Déficit sélectif en *D80.2*
- G [IgG] ¬ Déficit sélectif en sous-classes d' *D80.3*
- M IgM ¬ Déficit
- - Immunitaire avec augmentation de l' *D80.5*
- - Sélectif en *D80.4*

Immunoglobuline *–suite*
- Presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en anticorps avec *D80.6*
- SAI ¬ Augmentation du taux des *R76.8*
- ¬
- - *T50.9*
- - Administration d' *Z29.1*
- - Agammaglobulinémie: avec lymphocytes B porteurs d' *D80.1*
- - Déficit en chaîne lourde des *D80.8*

Immunologiques
- Sérique
- - Sans précision ¬ Anomalie de résultats *R76.9*
- - ¬ anomalie
- - - Précisées de résultats *R76.8*
- - - Résultats *R76*
- ¬ Agents *T50.9*

Immunoprolifératif
- Angiocentrique ¬ Lésion *C86.0*
- Intestin grêle
- - Type méditerranéen ¬ Maladie *C88.3*
- - ¬ Maladie *C88.3*
- Malign
- - Sans précision ¬ Maladie *C88.9*
- - ¬ Autres maladies *C88.7*
- SAI ¬ Maladie *C88.9*

Immunoreconstitution ¬ Syndrome d' *D89.3*

Immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T *D83.1*

Immunosuppresseurs ¬ Intoxication: Médicaments antitumoraux et *T45.1*

Immunosuppression actuel ¬ État consécutif transplantation cellule souche hématopoïétique
- *Z94.81*
- Sans *Z94.80*

Immunosuppressives ¬ Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures *D90*

Immunotactoïde ¬ Glomérulopathie *N03.6*

Immunothérapie
- Prophylactique ¬ *Z29.1*
- ¬ Syndrome de libération de cytokines après une *D76.4*

Immunotolérance ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta: Phase d' *B18.11*

Imparfaite
- Néphrocalcinose ¬ Syndrome d'amélogenèse *K00.5†, N29.8**
- Petite taille-surdité-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de dentinogenèse *Q87.8*
- Rétinopathie-épilepsie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'ostéogenèse *Q87.8*
- ¬
- - Maladie des os de verre [ostéogenèse *Q78.0*

Imparfaite *–suite*
- ¬ *–suite*
- - OI [Ostéogenèse *Q78.0*
- - Ostéogenèse *Q78.0*

Impending infarction] ¬ Angine: Infarctus imminent [*I20.0*

Imperfecta ¬
- Amelogenesis *K00.5*
- Dentinogenesis *K00.5*
- Odontogenesis *K00.5*

Imperfecti ¬ Infection à Fungi *B43.8*

Imperforation
- Anal
- - Anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une *Q87.8*
- - ¬
- - - *Q42.3*
- - - Syndrome d'ankyloblépharon filiforme- *Q87.8*
- Hymen ¬ *Q52.3*
- Jéjunum ¬ *Q41.1*
- Rectum ¬ *Q42.1*

Imperméabilité
- Tubaire ¬ *N97.1*
- Uretère ¬ *Q62.1*
- Urètre ¬ *Q64.3*

Impétiginisation d'autres dermatoses ¬ *L01.1*

Impétigo
- Bockhart ¬ *L01.0*
- Herpétiforme ¬ *L40.1*
- Oreille externe ¬ *L01.0†, H62.4**
- Tout micro-organisme] [toute localisation] ¬ *L01.0*
- ¬
- - *L01*
- - Atteinte de la paupière au cours d' *L01.0†, H03.8**
- - Otite externe avec *L01.0†, H62.4**

Implant
- Articulaire orthopédique (partiel) (total) ¬ Présence d'un *Z96.6*
- Articulations orthopédiques ¬ Présence d' *Z96.6*
- Cardiaques et vasculaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses et *T82.5*
- Endocriniens ¬ Présence d' *Z96.4*
- Fonctionnel
- - Précis ¬ Présence
- - - *Z96.8*
- - - *Z96.88*
- - Sans précision ¬ Présence d' *Z96.9*
- - ¬ Présence d'autres *Z96*
- Gastro-intestinal ¬ Fuite d'un *T85.59*
- Greffe
- - Appareil

Implant *–suite*
- Greffe *–suite*
- - Appareil *–suite*
- - - Génital ¬
- - - - Complication mécanique d'autres prothèses, *T83.4*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un *T83.6*
- - - Génito-urinaire
- - - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T83.9*
- - - - ¬ Autres complications de prothèses, *T83.8*
- - - Urinaire ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un *T83.5*
- - Cardiaque vasculaire
- - - Sans précision ¬
- - - - Complication d'une prothèse, d'un *T82.9*
- - - - Présence d' *Z95.9*
- - - ¬
- - - - Complications de prothèses, *T82.8*
- - - - Douleur due à prothèses, *T82.8*
- - - - Embolie due à prothèses, *T82.8*
- - - - Fibrose due à prothèses, *T82.8*
- - - - Hémorragie due à prothèses, *T82.8*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, *T82.7*
- - - - Présence
- - - - - *Z95*
- - - - - *Z95.8*
- - - - Sténose due à prothèses, *T82.8*
- - - - Thrombose due à prothèses, *T82.8*
- - Gastro-intestinaux ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.5*
- - Génito-urinaires ¬ Complications de prothèses, *T83*
- - Interne
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres complications dues à des prothèses, *T85.88*
- - - Partie du tractus gastro-intestinal ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, *T85.76*
- - - SAI ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T85.9*
- - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T85.9*
- - - Système
- - - - Hépatobiliaire et le pancréas ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, *T85.75*
- - - - Nerveux
- - - - - ¬ Autres complications dues à des prothèses, *T85.81*
- - - - - ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, *T85.72*
- - - ¬
- - - - Complications d'autres prothèses, *T85*
- - - - Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, *T85.78*

Implant *–suite*
- Greffe *–suite*
- - Oculaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses, *T85.3*
- - Œsophage ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.50*
- - Orthopédique interne
- - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T84.9*
- - - ¬
- - - - Complication
- - - - - Mécanique d'autres appareils, *T84.4*
- - - - - Prothèses, *T84.8*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, *T84.7*
- - Os ¬ Complication mécanique d'autres appareils, *T84.3*
- - Pancréas ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.54*
- - Parties du tractus gastro-intestinal supérieur ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.51*
- - Tractus gastro-intestinal inférieur ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.52*
- - Vasculaires coronaires ¬ Présence d' *Z95.5*
- - Voies biliaires ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.53*
- Intra-oculaires de cristallin ¬ Présence d' *Z96.1*
- Mammaire ¬
- - *Z41.1*
- - Complication
- - - Mécanique d'une prothèse et d'un *T85.4*
- - - Prothèse ou un *T85.83*
- - Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un *T85.82*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un *T85.73*
- Maxillaires et sur racines dentaires ¬ Présence d' *Z96.5*
- Osseux et tendineux ¬ Présence d'autres *Z96.7*
- Otologiques et audiologiques ¬ Présence d' *Z96.2*
- Prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un *M96.6*
- Transplants cardiaques ou vasculaires ¬ Présence d'autres *Z95.88*
- Urinaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses et *T83.1*
- Uro-génitaux ¬ Présence d' *Z96.0*
- ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: après *H21.3*

Implantation
- Anormale de l'uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*
- Embryon en cas de transfert d'embryon ¬ Complications de tentative d' *N98.3*
- Œuf fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de tentative d' *N98.2*

Implantation *–suite*

- Ovules ¬ Admission pour prélèvement ou *Z31.2*
- Placenta ¬ Complication de l'accouchement par une anomalie d' *O44.00*
- Stimulateur électronique du système nerveux ¬ Complication mécanique de l' *T85.1*
- Utilisation) ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après *Y82.8!*
- ¬ Tumeur du site d' *D39.2*

Implanté

- Chirurgicalement ¬ Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure *Z45.20*
- ¬
- - Adaptation manipulation
- - - Appareils médicaux *Z45.88*
- - - Défibrillateur cardiaque *Z45.01*
- - - Stimulateur cardiaque *Z45.00*
- - Ajustement et entretien d'une prothèse auditive *Z45.3*

Implication

- Bitronculaire ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.12*
- Monotronculaire ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.11*
- Système circulatoire ¬ Béribéri humide avec *E51.1†, I98.8**
- Tritronculaire ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.13*

Impliquant

- Cheville ¬
- - Péroné, *S82.6*
- - Tibia, *S82.5*
- Enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation ¬ Soins de contrôle *Z47.0*
- Langue, les lèvres ou les doigts ¬ Malocclusion due à: habitudes *K07.5*
- Malléole ¬
- - Péroné, *S82.6*
- - Tibia, *S82.5*
- Moyens de rééducation ¬ Soins *Z50.8!*
- Principalement les membres ¬ Syndromes congénitaux malformatifs *Q87.2*
- Rééducation
- - Sans précision ¬ Soin *Z50.9!*
- - ¬ Soins *Z50!*
- Système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse ¬ Complications *O29.2*

Important

- Associé
- - Afibrinogénémie ¬
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (*O45.0*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (*O67.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminé ¬

Important *–suite*

- Associé *–suite*
- - Coagulation intravasculaire disséminé ¬ *–suite*
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (*O45.0*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (*O67.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (*O45.0*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (*O67.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (*O45.0*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (*O67.0*
- Commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ Vomissements *O21.2*
- Dimension des mâchoires ¬ Anomalies *K07.0*
- Non classée ailleurs ¬ Antécédents personnels d'intervention chirurgicale *Z92.4*
- Parenchyme ¬ Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus *S36.02*
- Pendant l'accouchement ¬ Hémorragie *O67.8*
- Précédant accouchement associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie (*O46.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie (*O46.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie (*O46.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie (*O46.0*
- ¬ Insuffisance cardiaque
- - Droit
- - - Primaire avec symptôme en cas d'effort *I50.00, I50.03!*
- - - Symptôme en cas d'effort *I50.01, I50.03!*
- - Gauche: Avec symptôme en cas d'effort *I50.12*

Importé ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage *A80.1*

Imposées aux activités par une incapacité ¬ Limites *Z73*

Impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide ¬ Non disponibilité ou *Z75.8*

Imprévisible
v. Type de maladie

Impuissance

- Origine organique ¬ *N48.4*
- Psychogène ¬ *F52.2*

Impulsif

- Juvénile ¬ Épilepsie (avec): myoclonique [petit mal *G40.3*
- ¬ Personnalité émotionnellement labile: Type *F60.30*

Impulsions

- Sans précision ¬ Trouble des habitudes et des *F63.9*

Impulsions *–suite*

- ¬ Autres troubles des habitudes et des *F63.8*

Impuretés dans l'air ¬ Poussières et autres *Z57*

In vitro ¬

- Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation *N98.2*
- Fécondation *Z31.2*

Inaccessible ¬ Scolarisation inexistante ou *Z55*

Inactive ¬ Carie dentaire *K02.3*

Inactivité

- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose d' *M80.2*
- ¬
- - Atrophie due à l' *M62.5*
- - Ostéoporose d' *M81.2*

Inadaptée ¬ Difficultés nutritionnelles et nutrition *R63.3*

Inadéquat

- Drogues SAI ¬ utilisation *F19*
- Part des parents ¬ Surveillance et contrôle *Z62*
- ¬
- - Enseignement *Z55*
- - Logement *Z59*
- - Régime et habitudes alimentaires *Z72.8*
- - Soutien familial *Z63*
- - Trouble de la personnalité: *F60.7*

Inagaki
v. Ieshima-Koeda-Inagaki

Inanimés ¬

- Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets *W49.9!*
- Exposition à des forces mécaniques d'objets *W49!*

Inanition ¬

- Atrophie d' *E45*
- Dystrophie d' *E45*

Inapparente en iode ¬ Hypothyroïdie par carence *E02*

Inappétence psychogène ¬ *F50.8*

Inappropriée

- Défauts de l'éducation ¬ Pression parentale *Z62*
- ¬ Syndrome néphrogénique d'antidiurèse *E22.2*

Inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, *N95.1*

Incapacité

- Acquise de la vision des couleurs ¬ *H53.5*
- Apprentissage SAI ¬ *F81.9*
- Concernant l'acquisition des connaissances SAI ¬ *F81.9*
- Maladies chroniques conduisant à l'invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines *Z82*
- Mener une grossesse à terme ¬ *N97*

Incapacité *–suite*

- Soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une *F68.1*
- ¬ Limites imposées aux activités par une *Z73*

Incarcération

- Adhérence du placenta ¬ Hémorragie associée à la rétention, l' *O72.0*
- Utérus gravide ¬ Soins maternels pour: *O34.5*
- ¬ *Z65*

Incarcéré

- Sans gangrène ¬ Hernie
- - Crurale (unilatérale): *K41.3*
- - Diaphragmatique: *K44.0*
- - Incisionnelle: *K43.0*
- - Inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - Ombilicale: *K42.0*
- - Parastomale: *K43.3*
- - Ventrale *K43.69*
- Spieghel ¬ Hernie *K43.68*
- ¬
- - Hémorroïdes
- - - Externes *K64.5*
- - - Internes *K64.8*
- - Hernie
- - - Épigastrique
- - - - *K43.60*
- - - - Partiellement *K43.60*
- - - Hypogastrique *K43.68*
- - - Ligne médiane *K43.68*
- - - Sous-xiphoïdienne *K43.68*

Incarnatus ¬ Unguis *L60.0*

Incarné ¬ Ongle *L60.0*

Incendies [pyromanie] ¬ Tendance pathologique à allumer des *F63.1*

Incertain

- Appendice ¬ Néoplasme neuroendocrine *D37.3*
- Côlon ¬ Tumeur neuroendocrine *D37.4*
- Iléon ¬ Tumeur neuroendocrine *D37.2*
- Jéjunum ¬ Tumeur neuroendocrine *D37.2*
- ¬
- - Démence au cours d'une tumeur intracrânienne *D43.2†, F02.8**
- - Glucagonome
- - - *D37.70*
- - - Pancréatique *D37.70*
- - Insulinome
- - - *D37.70*
- - - Pancréatique *D37.70*
- - Leucémie à cellules souches de lignée *C95.0*

Incident

- Appareil produit médicaux
- - Utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques ¬ *Y82!*

Incident *–suite*

- Appareil produit médicaux *–suite*
- - ¬ *Y82.8!*
- Mesures médicales, sans précision ¬ *Y84.9!*
- Moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d' *Y84.9!*

Incipiente sénile ¬ Cataracte *H25.0*

Incisif ¬ Kyste

- Canal *K09.1*
- Naso-palatin [canal *K09.1*

Incision

- Lors d'une intervention chirurgicale ¬ Blessure de l'utérus par *T81.2*
- Ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence ¬ *Y69!*
- Prise d'échantillons ¬ *P12.4*

Incisionnel

- Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- Gangrène ¬ Hernie *K43.1*
- Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- SAI ¬ Hernie *K43.2*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K43.2*

Incisive

- Déformée en forme de pelle ¬ *K00.2*
- Mandibulaires ¬ Fusion des *K00.2*

Incisure du lobe de l'oreille ¬ Syndrome de retard de langage-asymétrie faciale-strabisme- *Q87.0*

Incluses

- Enclavées
- - Position anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ Dents *K07.3*
- - ¬ Dents *K01*
- ¬ Dents *K01.0*

Inclusion

- Cellulaire] ¬ Mucolipidose II [maladie à *E77.0*
- Corps de Mallory ¬ Myopathie avec surcharge en desmine et *G71.8*
- Dawson ¬ Encéphalite subaiguë à *A81.1*
- Épidermique ¬ Kyste d' *L72.0*
- Héréditaire type
- - 2 ¬ Myopathie à *G71.8*
- - 3 ¬ Myopathie à *G71.8*
- - 4 ¬ Myopathie à *G71.8*
- Pigmentaires dans le cristallin ¬ *H26.8*
- Type 2 ¬ Myopathie à corps d' *G71.8*
- ¬
- - Blennorrhée à *A74.0†, H13.1**
- - Conjonctivite à *A74.0†, H13.1**
- - Myopathie à *G71.8*
- - Myosite à *G72.4*

Incoercibles au cours de la grossesse ¬ Vomissements *O21*

Incompatibilité

- ABO ¬ Réaction d' *T80.3*
- Groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ Réaction à une *T80.3*
- Rh
- - Anasarque fœto-placentaire) ¬ *O36.0*
- - ¬ Réaction d' *T80.4*

Incompatible ¬ Transfusion de sang *T80.3*

Incomplet

- Cæcum et du côlon ¬ Rotation: *Q43.3*
- Moelle
- - Cervicale ¬ Autres lésions transversales *S14.13*
- - Dorsale SAI ¬ Lésions transversales *S24.12*
- - Lombaire ¬ Lésion transversale *S34.11*
- Partielle ¬ Môle hydatiforme *O01.1*
- Queue de cheval ¬ Syndrome traumatique *S34.31*
- Sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou *M75.1*
- Tête du fœtus ¬ Dystocie due à une rotation *O64.0*
- ¬
- - Lésion central moelle
- - - Cervicale (lésion transversale *S14.12*
- - - Dorsale (lésion transversale *S24.12*
- - Situs inversus *Q89.3*
- - Syndrome de la queue de cheval *G83.41*

Inconnu

- Accouchement ¬ Hyperthermie d'origine *O86.4*
- Ainsi précisée ¬ Tumeur maligne, siège primitif *C80.0*
- Appareil
- - Digestif, sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.9*
- - Respiratoire, sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.6*
- Appendice ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.3*
- Atteinte pluriglandulaire ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.8*
- Bassinet ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.1*
- Bilatéral ¬ Petit rein de cause *N27.1*
- Canal cranio-pharyngien ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.4*
- Côlon ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.4*
- Corpuscule carotidien ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.6*
- Encéphale
- - Infratentoriel ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.1*
- - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.2*
- - Supratentoriel ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.0*

Inconnu *–suite*

- Épiphyse [glande pinéale] ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.5*
- Estomac ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.1*
- Foie, vésicule et voies biliaires ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.6*
- Glande endocrine, sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.9*
- Glomus aortique et autres paraganglions ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.7*
- Hypophyse ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.3*
- Intestin grêle ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.2*
- Larynx ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.0*
- Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.0*
- Médiastin ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.3*
- Méninges
- - Cérébrales ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D42.0*
- - Rachidiennes ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D42.1*
- - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D42.9*
- Moelle épinière ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.4*
- Mortalité ¬ Cause *R99*
- Nerf
- - Crâniens ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.3*
- - Périphériques et du système nerveux autonome ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.2*
- Non précisées de morbidité ¬ Causes *R69*
- Organe
- - Digestif ¬ tumeur
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou *D37.78*
- - - Évolution imprévisible ou *D37.7*
- - Génital
- - - Femme
- - - - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.9*
- - - - ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.7*
- - - Homme
- - - - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D40.9*
- - - - ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D40.7*
- - Respiratoires ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.5*
- - Urinaire
- - - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.9*
- - - ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.7*
- Os et cartilage articulaire ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.0*

Inconnu *–suite*

- Ovaire ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.1*
- Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou *D37.70*
- Parathyroïde ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.2*
- Parties du système nerveux central ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.7*
- Peau ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.5*
- Péritoine ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.4*
- Placenta ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.2*
- Plèvre ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.2*
- Prostate ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D40.0*
- Rectum ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.5*
- Rein ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.0*
- Rétropéritoine ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.3*
- Sans précision ¬
- - Petit rein de cause *N27.9*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou *D48.9*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou *D47.9*
- Sein ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.6*
- Sièges précisés ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.7*
- Surrénale ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.1*
- Système nerveux central, sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.9*
- Testicule ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D40.1*
- Thymus ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.4*
- Thyroïde ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.0*
- Tissu conjonctif et autres tissus mous ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.1*
- Trachée, bronches et poumon ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.1*
- Unilatéral ¬ Petit rein de cause *N27.0*
- Uretère ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.2*
- Urètre ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.3*
- Utérus ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.0*
- Vessie ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.4*
- ¬
- - Anémie tumorale (tumeur primaire *D48.9†, D63.0**

Inconnu *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste *R96.1*
- - Fièvre
- - - Étiologie *R50.80*
- - - Origine autre et *R50*
- - Mort subite de cause *R96*
- - Petit rein de cause *N27*
- - Tumeur
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou *D37*
- - - Encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou *D43*
- - - Glandes endocrines à évolution imprévisible ou *D44*
- - - Histiocytaires à évolution imprévisible ou *D47.7*
- - - Histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et *D47.0*
- - - Méninges à évolution imprévisible ou *D42*
- - - Oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou *D38*
- - - Organe
- - - - Génital
- - - - - Femme à évolution imprévisible ou *D39*
- - - - - Homme à évolution imprévisible ou *D40*
- - - - Urinaires à évolution imprévisible ou *D41*
- - - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou *D47.7*
- - - Sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou *D48*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou *D47*

Incontinence

- Fécale d'origine non organique ¬ *F98.1*
- Matières fécales ¬ *R15*
- Pression ¬ *N39.42*
- Récidivante ¬ *N39.47!*
- Réflexe ¬ *N39.40*
- Regorgement ¬ *N39.41*
- Stress] ¬ Incontinence urinaire d'effort [*N39.3*
- Urinaire
- - Effort [incontinence de stress] ¬ *N39.3*
- - Extraurétrale ¬ *N39.43*
- - Origine non organique ¬ *F98.0*
- - Précis ¬
- - - *N39.48*
- - - Formes d' *N39.4*
- - Sans précision ¬ *R32*

Incontinentia pigmenti ¬ *Q82.3*

Incoordonné ¬ Travail *O62.4*

Increta
- Percreta ¬ Placenta *O43.21*
- Sans saignement ¬ Placenta *O43.21, O73.0*

Incurvation
- Congénital
- - Fémur ¬ *Q68.3*
- - Os long
- - - Membre inférieur, sans précision ¬ *Q68.5*
- - - ¬ *Q68.8*
- - Tibia et du péroné ¬ *Q68.4*
- Vertébrale SAI ¬ *M43.9*

Index ¬ Polydactylie de l' *Q69.0*

Index de Barthel
- 0-15 points ¬ *U50.50*
- 20-35 points ¬ *U50.40*
- 40-55 points ¬ *U50.30*
- 60-75 points ¬ *U50.20*
- 80-95 points ¬ *U50.10*
- 100 points ¬ *U50.00*

Index de Barthel élargi
- 0-15 points ¬ *U51.20*
- 20-65 points ¬ *U51.10*
- 70-90 points ¬ *U51.00*

Index de Barthel en début de réadaptation ¬ *U52*

Indiana] ¬ Stomatite vésiculaire virale [fièvre de l' *A93.8*

Indicanurie
v. familiale-néphrocalcinose-indicanurie

Indication
- Correctement administrés ¬ Anurie due aux sulfamides utilisés comme un médicament approprié à l' *R34, Y57.9!*
- Degré
- - 2a maximum ¬
- - - Brûlures de parties multiples du corps, avec *T29.20*
- - - Corrosion partie multiple corps
- - - - *T29.60*
- - - - *T29.61*
- - 2b au maximum ¬ Brûlures de parties multiples du corps, avec *T29.21*
- - ¬
- - - Hémorroïdes (avec saignement): sans *K64.9*
- - - Ulcère [escarre] de pression sans *L89.9*
- Dose thérapeutique prophylactique correcte ¬ effet secondaire indésirable
- - Médicament utilisé conformément aux *Y57.9!*
- - Vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux *Y59.9!*
- Extension
- - Médiastinal parapharyngé cervical ¬ Abcès sous-mandibulaire
- - - *K12.22*
- - - Sans *K12.21*
- - Rétromaxillaire fosse canine ¬ Abcès maxillaire

Indication *–suite*
- Extension *–suite*
- - Rétromaxillaire fosse canine ¬ Abcès maxillaire *–suite*
- - - *K10.21*
- - - Sans *K10.20*
- Hémorragie
- - Cours schistosomiase ¬ Varice gastrique
- - - *B65.9†, I98.3**
- - ¬
- - - Angiodysplasie de l'intestin grêle sans *K55.31*
- - - Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans *I98.2**
- Ictère, non classée ailleurs ¬ Hyperbilirubinémie, avec *R17.0*
- Incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans *Y84.9!*
- Inférieur supérieur
- - Face
- - - Muqueuse ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- - - Orale ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- - Frein ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- - Muqueuse ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- Rupture ¬ Dissection aorte
- - Abdominale, sans *I71.02*
- - Localisation non précisée, sans *I71.00*
- - Thoracique, sans *I71.01*
- - Thoracoabdominale, sans *I71.03*
- Saignement ¬
- - Angiodysplasie
- - - Côlon: Sans *K55.21*
- - - Estomac ou du duodénum sans *K31.81*
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation et abcès, sans *K57.22*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans *K57.32*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation et abcès sans *K57.42*
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans *K57.52*
- - - - - Perforation et abcès, sans *K57.02*
- - - - - Sans perforation , abcès ou *K57.12*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et abcès, sans *K57.82*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, sans *K57.92*
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Perforation et abcès, sans *K57.20*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans *K57.30*

Indication *–suite*
- Saignement ¬ *–suite*
- - Diverticulose *–suite*
- - - Grêle et du colon avec perforation et abcès, sans *K57.40*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans *K57.50*
- - - - - Perforation et abcès, sans *K57.00*
- - - - - Sans perforation , abcès ou *K57.10*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et abcès, sans *K57.80*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, sans *K57.90*
- ¬ Trouble mental, sans autre *F99*

Indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA) ¬ Présente de maladies *U60.3!*

Indifférencié
- Cellules géantes de type ostéoclastique du pancréas ¬ Carcinome *C25.9*
- Endomètre ¬ Carcinome *C54.1*
- Estomac ¬ Carcinome *C16.9*
- Foie
- - Voies biliaires intrahépatiques ¬ Carcinome *C22.9, C22.1*
- - ¬ Sarcome embryonnaire *C22.4*
- Œsophage ¬ Carcinome *C15.9*
- ¬
- - Connectivite *M35.8*
- - Lymphome
- - - Non-hodgkinien *C83.9*
- - - Type
- - - - Cellulaire *C83.9*
- - - - Non-Burkitt, *C83.3*
- - Sarcome pléomorphe *C49.9*
- - Schizophrénie
- - - *F20.3*
- - - Aiguë (*F23.2*
- - - Chronique *F20.5*
- - Trouble
- - - Psychosomatique *F45.1*
- - - Somatoforme *F45.1*

Indigestion ¬ *K30*

Indirect
v. Type de maladie

Indol-acétique ¬ Taux urinaires élevés de: acide *R82.5*

Indolente ¬ Mastocytose systémique *D47.0*

Indométacine ¬ Embryofœtopathie à l' *Q86.88*

Induction
- Standard ¬ Leucémie, réfractaire au traitement d' *C95.8!*
- ¬ Leucémie myéloïde aiguë réfractaire à un traitement d' *C92.00*

Induration
- Peau ¬ *R23.4*
- Plastique des corps caverneux ¬ *N48.6*
- Sein ¬ *N64.5*

Induré tuberculeux ¬ Érythème *A18.4*

Inégalité des membres (acquise) ¬ *M21.7*

Inertie utérin
- Pendant la phase de latence ¬ *O62.0*
- SAI ¬ *O62.2*
- Secondaire ¬ *O62.1*
- ¬
- - *P03.6*
- - Formes d' *O62.2*

Inexistante ou inaccessible ¬ Scolarisation *Z55*

Inexplicable ¬ Comportement étrange et *R46.2*

Inexpliquée mort subit nourrisson
- Âge d'un an ¬ Mort subite *R96.0*
- Avant l'âge d'un an ¬ Mort subite *R95*

Infantile
v. Type de maladie

Infantilisme
- Pancréatique ¬ *K86.8*
- SAI ¬ *R62.8*

Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique) ¬ *M62.2*

Infarctus
- Aigu
- - Moelle épinière (embolique) (non embolique) ¬ *G95.18*
- - Myocarde
- - - Sans précision ¬ *I21.9*
- - - ¬
- - - - *I21*
- - - - Certaines complications récentes d'un *I23*
- - - - Communication
- - - - - Interauriculaire comme complication récente d'un *I23.1*
- - - - - Interventriculaire comme complication récente d'un *I23.2*
- - - - Complications récentes d'un *I23.8*
- - - - Hémopéricarde comme complication récente d'un *I23.0*
- - - - Rupture
- - - - - Cordages tendineux comme complication récente d'un *I23.4*
- - - - - Muscle papillaire comme complication récente d'un *I23.5*
- - - - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un *I23.3*
- - - - Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un *I23.6*
- Artère) (d'une veine) pulmonaire ¬ *I26*
- Artériel ¬ *I74.9*
- Cérébral

Infarctus *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - Embolie
- - - Artère
- - - - Cérébrales ¬ *I63.4*
- - - - Précérébrales ¬ *I63.1*
- - - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.1*
- - Occlusion
- - - Sténose artère
- - - - Cérébrales, de mécanisme non précisé ¬ *I63.5*
- - - - Précérébrales, de mécanisme non précisé ¬ *I63.2*
- - - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.2*
- - Sans précision ¬ *I63.9*
- - Sténose du tronc brachio-céphalique ¬ *I63.2*
- - Thrombose
- - - Artère
- - - - Cérébrales ¬ *I63.3*
- - - - Précérébrales ¬ *I63.0*
- - - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.0*
- - - Veineuse cérébrale, non pyogène ¬ *I63.6*
- - ¬
- - - *I63*
- - - *I63.8*
- - - Embolie artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un *I66*
- - - Obstruction complet partiel artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un *I66*
- - - Occlusion sténose artère
- - - - Cérébral
- - - - - N'entraînant pas un *I66*
- - - - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un *I63*
- - - - Précérébrales, n'entraînant pas un *I65*
- - - Séquelles d' *I69.3*
- - - Sténose artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un *I66*
- - - Thrombose artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un *I66*
- Embolique ¬ *I74*
- Hépatique ¬ *K76.3*

Infarctus *–suite*
- Imminent [Impending infarction] ¬ Angine: *I20.0*
- Intestin aigu(ë) ¬ *K55.0*
- Lacunaire ¬ *I63.5*
- Mésentérique (artère) (veine) ¬ *K55.0*
- Multiples ¬ Démence vasculaire par *F01.1*
- Myocarde
- - Aigu) SAI ¬ *I21.9*
- - Ancien
- - - Découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ *I25.2*
- - - Sans précision ¬ *I25.29*
- - - Survenu
- - - - 4 mois et moins d'un an plus tôt ¬ *I25.21*
- - - - 29 jours et moins de 4 mois plus tôt 29 ¬ *I25.20*
- - - - Y a 1 an ou plus ¬ *I25.22*
- - - ¬ *I25.2*
- - Guéri ¬ *I25.2*
- - Non transmural SAI ¬ *I21.4*
- - Récidivant ¬ *I22*
- - Répétition
- - - Aigu
- - - - Latéral
- - - - - Haut ¬ *I22.8*
- - - - - Paroi) SAI ¬ *I22.8*
- - - - Latéro
- - - - - Apical ¬ *I22.8*
- - - - - Basal ¬ *I22.8*
- - - - Postérieur (vrai) ¬ *I22.8*
- - - - Postéro-basal ¬ *I22.8*
- - - - Postéro-latéral ¬ *I22.8*
- - - - Postéro-septal ¬ *I22.8*
- - - - Septal SAI ¬ *I22.8*
- - - Localisation
- - - - Non précisée ¬ *I22.9*
- - - - ¬ *I22.8*
- - - Paroi
- - - - Antérieure ¬ *I22.0*
- - - - Inférieure ¬ *I22.1*
- - - ¬ *I22*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- - ¬
- - - Antécédent d' *I25.29*
- - - Embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un *I24.0*
- - - Mise en observation pour suspicion d' *Z03.4*
- - - Occlusion coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un *I24.0*
- - - Thrombo-embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un *I24.0*
- - - Thrombose coronaire n'entraînant pas un *I24.0*
- Placentaire ¬

Infarctus *–suite*
- Placentaire ¬ *–suite*
- - *O43.8*
- - *P02.2*
- Rate ¬ *D73.5*
- Récidivant ¬ *I22*
- Rein ¬ Ischémie et *N28.0*
- Rénal ¬ *N28.0*
- Répété aigu
- - Antérieur (paroi) SAI ¬ *I22.0*
- - Antéro
- - - Apical ¬ *I22.0*
- - - Latéral ¬ *I22.0*
- - - Septal ¬ *I22.0*
- - Inférieur SAI ¬ *I22.1*
- - Inféro-latéral ¬ *I22.1*
- - Paroi
- - - Diaphragmatique ¬ *I22.1*
- - - Postérieur SAI ¬ *I22.1*
- - Postéro-inférieur ¬ *I22.1*
- Sans élévation du segment ST [NSTEMI] SAI ¬ *I21.4*
- Sous-endocardique
- - Aigu du myocarde ¬ *I21.4*
- - SAI ¬ *I21.4*
- Surrénale ¬ *E27.4*
- Thrombotique ¬ *I74*
- Thyroïde ¬ *E07.8*
- Transmural
- - Aigu
- - - Antérieur SAI ¬ *I21.0*
- - - Antéro
- - - - Apical ¬ *I21.0*
- - - - Latéral ¬ *I21.0*
- - - - Septal ¬ *I21.0*
- - - Inférieur (paroi) SAI ¬ *I21.1*
- - - Inféro-latéral ¬ *I21.1*
- - - Latéral
- - - - Haut ¬ *I21.2*
- - - - SAI ¬ *I21.2*
- - - Latéro
- - - - Apical ¬ *I21.2*
- - - - Basal ¬ *I21.2*
- - - Myocarde
- - - - Localisation
- - - - - Non précisée ¬ *I21.3*
- - - - - ¬ *I21.2*
- - - - Paroi
- - - - - Antérieure ¬ *I21.0*
- - - - - Inférieure ¬ *I21.1*
- - - Paroi
- - - - Antérieure SAI ¬ *I21.0*
- - - - Diaphragmatique ¬ *I21.1*
- - - - Latéral SAI ¬ *I21.2*
- - - Postérieur

Infarctus *–suite*
- Transmural *–suite*
- - Aigu *–suite*
- - - Postérieur *–suite*
- - - - Paroi postérieur] SAI ¬ *I21.1*
- - - - Vrai) ¬ *I21.2*
- - - Postéro-basal ¬ *I21.2*
- - - Postéro-inférieur ¬ *I21.1*
- - - Postéro-latéral ¬ *I21.2*
- - - Postéro-septal ¬ *I21.2*
- - - Septal SAI ¬ *I21.2*
- - Myocarde SAI ¬ *I21.3*
- ¬
- - Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par *I64*
- - Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par *I69.4*

Infectée ¬ Hydrocèle *N43.1*

Infectieux
v. Type de maladie

Inférieur
v. Type de maladie

Inféro-externe du sein ¬ Tumeur maligne: Quadrant *C50.5*

Inféro-interne du sein ¬ Tumeur maligne: Quadrant *C50.3*

Inféro-latéral ¬ Infarctus
- Répété (aigu) (de): *I22.1*
- Transmural (aigu) (de): *I21.1*

Infertilité
- Féminine par défaut de la zone pellucide ¬ *N97.8*
- Masculin
- - Anomalie de la spermatogenèse ¬ *N46*
- - Non syndromique par asthénozoospermie ¬ *N46*

Infestation
- Arthropodes ¬ Autres *B88.2*
- Chevelure par des poux ¬ *B85.0*
- Corps par des poux ¬ *B85.1*
- Cutanées ¬ Autres *B88*
- Larves de mouches ¬ *B87*
- Mixte, pédiculose et phtiriase ¬ *B85.4*
- Morpions ¬ *B85.3*
- Parasitaire des paupières NCA ¬ *B89†, H03.0**
- Paupière
- - Cours
- - - Loase ¬ *B74.3†, H03.0**
- - - Onchocercose ¬ *B73†, H03.0**
- - - Phtiriase ¬ *B85.3†, H03.0**
- - Parasites NCA ¬ *B89†, H03.0**
- Phthirus pubis ¬ *B85.3*
- Poux du pubis] ¬ Phtiriase [*B85.3*
- Précisées ¬ Autres *B88.8*
- Puce-chique] ¬ Tungose [*B88.1*
- SAI par des acariens ¬ *B88.9*

Infestation *–suite*
- Sangsues SAI ¬ *B88.3*
- Sans précision ¬ *B88.9*
- Ternidens deminutus ¬ *B81.8*
- ¬ Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres *Z20.7*

Infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [*Z91.73*

Infiltration
- Cancéreuse secondaire ¬ *C79.9*
- Glycogène
- - Foie ¬ *E74.0†, K77.8**
- - ¬ *E74.0*
- Lymphatique ¬ *D47.9*
- Lymphocytaire cutanée de Jessner ¬ *L98.6*

Infirmiers surveillance médical enfant bon santé selon circonstances
- Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*
- Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*
- Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*
- Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*

Infirmité motrice cérébral
- Forme spastique hémiplégique ¬ *G80.2*
- ¬ Autres *G80.8*

Inflammation
- Aigu
- - Orbite ¬ *H05.0*
- - Sans précision des voies lacrymales ¬ *H04.3*
- - Sinus de la face ¬ *J01*
- Alvéoles dentaires au cours de scorbut ¬ *E54†, K93.8**
- Anastomose vasculaire ¬ *T82.7*
- Bassin féminin au cours de gonorrhée ¬ *A54.2†, N74.3**
- Chronique
- - Mastoïdectomie ¬ *H95.1*
- - Voies lacrymales ¬ *H04.4*
- - ¬ Lymphome diffus à grandes cellules B avec *C83.3*
- Diaphragme ¬ *J98.6*
- Généralisée des muqueuses par immunodéficience ¬ *K91.80*
- Glande
- - Follicule pileux ¬ *L73.9*
- - Salivaires au cours d'une réaction à des dépôts d'iode ¬ *K11.2*
- Gonorrhéique
- - Articulations ¬ *A54.4†, M01.39**
- - Gland ¬ *A54.0†, N51.2**

Inflammation *–suite*

- Gonorrhéique *–suite*
- - Péritoine ¬ *A54.8†, K67.1**
- Hémorroïdes ¬ *K64.8*
- Localisations multiples des organes génitaux de l'homme ¬ *N49.8*
- Localisée purulente d'une plaie d'opération ¬ *T81.4*
- Nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [*H94.0**
- Non infectieuse d'un coussinet absorbant postopératoire ¬ *H59.8*
- Œil ¬ Glaucome secondaire à une *H40.4*
- Paupière
- - Sans précision ¬ *H01.9*
- - ¬ Autres *H01*
- Pelvienne de la femme SAI ¬ Infection ou *N73.9*
- Plèvre ¬ *R09.1*
- Précis
- - Paupière ¬ Autres *H01.8*
- - Vagin et de la vulve ¬ Autres *N76.8*
- Profondes de la paupière ¬ Orgelet et autres *H00.0*
- Purulent
- - Aiguë de la rate ¬ *D73.8*
- - Bras avec lymphangite ¬ *L03.10*
- - Doigt avec lymphangite ¬ *L03.01*
- - Main avec lymphangite ¬ *L03.10*
- - Membre inférieur avec lymphangite ¬ *L03.11*
- - Ongle ¬ *L03.01*
- - Orteil avec lymphangite ¬ *L03.02*
- - Pied (à l'exception des orteils) avec lymphangite ¬ *L03.11*
- - Utérus ¬ *N71.9*
- Rocher (aiguë) (chronique) ¬ *H70.2*
- Shunt vasculaire ¬ *T82.7*
- Sonde vésicale ¬ *T83.5*
- Syphilitique
- - Rate ¬ *A52.7†, D77**
- - Secondaire du bassin féminin ¬ *A51.4†, N74.2**
- - Tardive du bassin féminin ¬ *A52.7†, N74.2**
- - Valve
- - - Aortique ¬ *A52.0†, I39.1**
- - - Cardiaque ¬ *A52.0†, I39.8**
- - - Mitrale ¬ *A52.0†, I39.0**
- - - Pulmonaire ¬ *A52.0†, I39.3**
- - - Tricuspide ¬ *A52.0†, I39.2**
- Thrombotique veineuse profonde de l'extrémité inférieure ¬ *I80.28*
- Tuberculeux
- - Articulation du genou ¬ *A18.0†, M01.16**
- - Organes pelviens féminins ¬ *A18.1†, N74.1**
- Vagin et de la vulve ¬ Autres *N76*

Inflammation *–suite*

- Veineuse ¬ *I80*
- Voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs ¬ *J68.2*
- Vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Ulcération et *N77.8**
- Zone postérieure ¬ *H30.2*
- ¬ Varice membre inférieur
- - *I83.1*
- - Sans ulcère ou *I83.9*
- - Ulcère et *I83.2*

Inflammatoire
v.a. auto-inflammatoire

- Aigu
- - Utérus, à l'exclusion du col ¬ Affection *N71.0*
- - ¬ Polyradiculonévrite démyélinisante *G61.0*
- Appareil de fixation interne [toute localisation] ¬ Infection et réaction *T84.6*
- Cathéter de dialyse péritonéale ¬ Infection et réaction *T85.71*
- Chronique
- - Orbite ¬ Affections *H05.1*
- - Utérus, à l'exclusion du col ¬ Affection *N71.1*
- Col utérus
- - Sans précision ¬ Affection non *N88.9*
- - ¬ affection
- - - *N72*
- - - Non *N88*
- Côlon ¬ Polypes *K51.4*
- Cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent ¬ Affections *N49.1*
- Faible réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, AgHBe négatif, sans activité *B18.13*
- Foie
- - Sans précision ¬ Maladie *K75.9*
- - ¬ Autres maladies *K75*
- Forte réplication ¬ Hépatite viral chronique B sans agent delta AgHBe
- - Négatif, avec activité *B18.14*
- - Positif
- - - Activité *B18.12*
- - - Sans agent delta: AgHBe positif, sans activité *B18.11*
- Intestin précoce associée à IL10 ¬ Maladie *K52.8*
- Mâchoire
- - Sans autre précision ¬ État *K10.29*
- - ¬ Affections *K10.2*
- Maladie tophacée ¬ Hyperuricémie sans signes d'arthrite *E79.0*
- Muqueuse buccale ¬ Hyperplasie *K13.6*
- Néovasculaire autosomique dominante ¬ Vitréo-rétinopathie *H35.2*
- Non classée ailleurs ¬ Myopathie *G72.4*

Inflammatoire *–suite*

- Organe génital
- - Homme, non classées ailleurs ¬ Affections *N49*
- - Masculins précisés ¬ Maladies *N49.88*
- - Non précisés de l'homme ¬ Affection *N49.9*
- - Précisés de l'homme ¬ Affections *N49.8*
- Ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large ¬ Autres affections non *N83.8*
- Pelvien
- - Chlamydia de la femme ¬ Affection *A56.1†, N74.4**
- - Femme
- - - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Affections *N74.8**
- - - Sans précision ¬ Affection *N73.9*
- - - ¬ Autres affections *N73*
- - Gonococcique de la femme ¬ Affection *A54.2†, N74.3**
- - Précisées de la femme ¬ Autres affections *N73.8*
- Précis
- - Col de l'utérus ¬ Autres affections non *N88.8*
- - Foie ¬ Autres maladies *K75.8*
- - Mâchoire ¬ Autres états *K10.28*
- - Utérus ¬ Autres affections non *N85.8*
- - Vagin
- - - Vulve ¬ Autre maladie *N76.88*
- - - ¬ Autres affections non *N89.8*
- - Vulve et du périnée ¬ Autres affections non *N90.8*
- - ¬ Autres spondylopathies *M46.8*
- Prostate
- - Sans précision ¬ Affection *N41.9*
- - ¬ Autres affections *N41.8*
- Prothèse
- - Articulaire interne ¬ Infection et réaction *T84.5*
- - Implant
- - - Greffe
- - - - Appareil
- - - - - Génital ¬ Infection et réaction *T83.6*
- - - - - Urinaire ¬ Infection et réaction *T83.5*
- - - - Cardiaques et vasculaires ¬ Infection et réaction *T82.7*
- - - - Interne
- - - - - Partie du tractus gastro-intestinal ¬ Infection et réaction *T85.76*
- - - - - Système hépatobiliaire et le pancréas ¬ Infection et réaction *T85.75*
- - - - - Système nerveux ¬ Infection et réaction *T85.72*
- - - - - ¬ Infection et réaction *T85.78*
- - - - Orthopédiques internes ¬ Infection et réaction *T84.7*
- - - Mammaire ¬ Infection et réaction *T85.73*
- - Valvulaire cardiaque ¬ Infection et réaction *T82.6*

Inflammatoire *–suite*

- Restauration immunitaire [SIRI] ¬ Syndrome *D89.3*
- SAI ¬ Arthropathie *M13.9*
- Sans précision ¬
- - Polynévrite *G61.9*
- - Spondylopathie *M46.9*
- Scrotum ¬ Affections *N49.2*
- Sein ¬ Affections *N61*
- Sonde
- - Gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG] ¬ Infection et réaction *T85.74*
- - Jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ] ¬ Infection et réaction *T85.74*
- Système nerveux central ¬ Séquelles d'affections *G09*
- Systémique SIRS
- - Non précisé ¬ Syndrome de réponse *R65.9!*
- - Origine
- - - Infectieux
- - - - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.1!*
- - - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.0!*
- - - Non infectieux
- - - - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.3!*
- - - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.2!*
- - ¬ Syndrome de réponse *R65!*
- Tubo-ovarienne ¬ affection *N70*
- Utérus
- - Exclusion du col ¬ Affections *N71*
- - Sans précision
- - - Exclusion du col ¬ Affection *N71.9*
- - - ¬ Affection non *N85.9*
- - Sauf le col ¬ Autres affections non *N85*
- Vagin
- - Sans précision ¬ Affection non *N89.9*
- - ¬ Autres affections non *N89*
- Verge ¬ Autres affections *N48.2*
- Vésicules séminales ¬ Affections *N49.0*
- Vulve périnée
- - Sans précision ¬ Affection non *N90.9*
- - ¬ Autres affections non *N90*
- ¬
- - Cholestéatome avec réaction *H71*
- - Epanchement péricardique (non *I31.3*
- - Polyarthropathie *M06.4*
- - Polynévrites *G61.8*
- - Spondylopathies *M46*
- - Tumeur myofibroblastique *D48.9*

Influenza

- A/H1N1
- - Pandémie de 2009 [grippe porcine] ¬ *U69.20!*
- - ¬ *J09, U69.20!*

Influenza *–suite*

- A/H5N1
- - Épidémie de 2009 [grippe aviaire] ¬ *U69.21!*
- - ¬ *J09, U69.21!*
- B C identifié ¬ Grippe
- - Influenza], virus d' *J10.8*
- - Virus d' *J10*
- Encéphalite
- - Virus grippe aviaire
- - - Identifié ¬ Grippe [*J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09†, G05.1**
- - ¬ Grippe [*J11.8†, G05.1**
- Encéphalopathie
- - Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09†, G94.3**
- - ¬ Grippe [*J11.8†, G94.3**
- Entérite virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [*J09, U69.21!*
- - Influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Épanchement pleural virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [*J09, U69.21!*
- - Influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Gastroentérite virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [*J09, U69.21!*
- - Influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- Infection
- - Respiratoire supérieure, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- - Voie
- - - Aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- - - Respiratoires supérieures, virus de la grippe aviaire identifié ¬ Grippe [*J09, U69.21!*
- Influenzae] ¬ Haemophilus *B96.3!*
- Laryngite virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [*J09, U69.21!*
- - Influenza
- - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Méningisme virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [*J09, U69.21!*
- - Influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*

Influenza *–suite*

- Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Haemophilus *B96.3!*
- Myocardite virus grippe
- - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09†, I41.1**
- - Porcine identifié ¬ Grippe [*J09, U69.20!*
- Otite
- - Moyenne virus grippe aviaire
- - - Identifié ¬ Grippe [*J09†, H67.1*, U69.21!*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09†, H67.1**
- - Virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ Grippe [*J10.8†, H67.1**
- Pharyngite virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [*J09, U69.21!*
- - Influenza
- - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Pneumonie virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [*J09, U69.21!*
- - Influenza
- - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.0*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Polio-encéphalite virus grippe aviaire
- - Identifié ¬ Grippe [*J09†, G05.1*, U69.21!*
- - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09†, G05.1**
- Saisonnier identifié
- - Hors virus grippe aviaire porcine ¬
- - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d' *J10.0*
- - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d' *J10.8*
- - Sauf virus grippe aviaire porcine ¬
- - - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d' *J10.8*
- - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d' *J10.1*
- - - Gastroentérite au cours de la grippe [influenza], virus d' *J10.8*
- - - Grippe
- - - - Asiatique [influenza], virus d' *J10.1*
- - - - Épidémique [influenza], virus d' *J10.1*
- - - - Influenza
- - - - - Hautement fébrile, virus d' *J10.1*
- - - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d' *J10.1*
- - - - - Laryngite, virus d' *J10.1*
- - - - - Pharyngite, virus d' *J10.1*
- - - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza], virus d' *J10.1*
- - - - Vraie [influenza], virus d' *J10.1*

Influenza *–suite*

- Saisonnier identifié *–suite*
- - Sauf virus grippe aviaire porcine ¬ *–suite*
- - - Infection
- - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d' *J10.1*
- - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la grippe, virus d' *J10.1*
- - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Influenza avec pneumonie, virus d' *J10.0*
- - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d' *J10.0*
- - ¬
- - - Broncho)pneumopathie grippale, virus d' *J10.0*
- - - Encéphalopathie grippale à virus d' *J10.8*
- - - Gastroentérite grippale à virus d' *J10.8*
- - - Grippe
- - - - Épanchement pleural grippal à virus d' *J10.1*
- - - - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d' *J10.1*
- - - - Laryngite grippale à virus d' *J10.1*
- - - - Manifestation
- - - - - Respiratoires, virus d' *J10.1*
- - - - - Virus d' *J10.8*
- - - - Pharyngite grippale à virus d' *J10.1*
- - - - Pneumonie, virus d' *J10.0*
- - - - Virus d' *J10.1*
- - - Myocardite (aiguë) grippale à virus d' *J10.8*
- Siège non précisé ¬ Infection à Haemophilus *A49.2*
- Type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus *Z27.8*
- Virus
- - Grippe
- - - Aviaire identifié ¬ Grippe
- - - - *J09, U69.21!*
- - - - Asiatique [*J09, U69.21!*
- - - Porcine identifié ¬ Grippe asiatique [*J09, U69.20!*
- - - Saisonnier identifié
- - - - Exception
- - - - - Virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ *J10.1*
- - - - - Virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ Encéphalite lors de grippe [*J10.8†, G05.1**
- - - - - Virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ Encéphalopathie lors de grippe [*J10.8†, G94.3**

Influenza *–suite*

- Virus *–suite*
- - Grippe *–suite*
- - - Saisonnier identifié *–suite*
- - - - Exception *–suite*
- - - - - Virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ Myocardite lors de grippe [*J10.8†, I41.1**
- - - - - Virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ Polio-encéphalite lors de grippe [*J10.8†, G05.1**
- - - - ¬ Encéphalite lors de grippe [*J10.8†, G05.1**
- - Influenza
- - - B ou C identifié ¬ Grippe [*J10.8*
- - - Saisonnier identifié
- - - - Hors
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Bronchopneumonie au cours de grippe [*J10.0*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Méningisme dans le cadre de la grippe [*J10.8*
- - - - Sauf
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Entérite au cours de la grippe [*J10.8*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Épanchement pleural au cours de la grippe [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Gastroentérite au cours de la grippe [*J10.8*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe asiatique [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe épidémique [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe vraie [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Pneumonie au cours de la grippe [*J10.0*
- Zoonotique pandémique identifié ¬ Grippe
- - Influenza
- - - Entérite, virus d' *J09*
- - - Épanchement pleural, virus d' *J09*
- - - Gastroentérite, virus d' *J09*
- - - Infection respiratoire supérieure, virus d' *J09*
- - - Laryngite, virus d' *J09*
- - - Méningisme, virus d' *J09*

Influenza *–suite*

- Zoonotique pandémique identifié ¬ Grippe *–suite*
- - Influenza *–suite*
- - - Pharyngite, virus d' *J09*
- - - Pneumonie, virus d' *J09*
- - Virus d' *J09*
- ¬
- - Arthrite à Haemophilus *M00.89, B96.3!*
- - Bronchite aiguë due à Haemophilus *J20.1*
- - Bronchopneumonie
- - - Bactéries autres que S. pneumoniae et H. *J15*
- - - Haemophilus *J14*
- - Choc septique à Haemophilus *A41.3, R57.2*
- - Colpite atrophique à Haemophilus *N95.2, B96.3!*
- - Encéphalite grippale [*J11.8†, G05.1**
- - Haemophilus influenzae [H. *B96.3!*
- - Laryngite à Haemophilus *J04.0, B96.3!*
- - Laryngotrachéite à Haemophilus *J04.2, B96.3!*
- - Méningite à Haemophilus *G00.0*
- - Méningo-encéphalite à Haemophilus *G04.2, B96.3!*
- - Méningo-encéphalomyélite à Haemophilus *G04.2, B96.3!*
- - Myocardite lors de grippe [*J11.8†, I41.1**
- - Otite
- - - Grippale [*J11.8†, H67.1**
- - - Moyenne nécrosante aiguë lors de grippe [*J11.8†, H67.1**
- - Pneumonie
- - - Congénitale à Haemophilus *P23.6, B96.3!*
- - - Haemophilus *J14*
- - Polio-encéphalite lors de grippe [*J11.8†, G05.1**
- - Septicémie à Haemophilus *A41.3*

Infra

- Hisienne familiales ¬ Tachyarythmie atriale et trouble de conduction cardiaque *I45.8*
- Sons ¬ Vertige dû aux *T75.2*

Infratentoriel

- SAI ¬ *C71.7*
- ¬ Tumeur
- - Bénigne: Encéphale, *D33.1*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, *D43.1*

Infundibulum pulmonaire ¬ Sténose de l' *Q24.3*

Ingéré ¬

- Effet toxique
- - Baies *T62.1*
- - Champignons *T62.0*
- - Parties de) plantes *T62.2*
- Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances *Z03.6*

Ingestion
- Aliments ¬ Dermite due à l' *L27.2*
- Médicaments ¬ Ulcère de l'œsophage: dû à l' *K22.1*
- Produits chimiques ¬ Ulcère de l'œsophage: dû à l' *K22.1*

Inguinal
- Bilatéral
- - Gangrène ¬ Hernie *K40.1*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K40.0*
- - SAI ¬ Hernie *K40.2*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K40.2*
- - ¬ hernie *K40*
- Directe ¬ hernie *K40*
- Indirecte ¬ hernie *K40*
- Membre inférieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques *C77.4*
- Oblique ¬ hernie *K40*
- Rétropéritonéale ¬ Métastase ganglionnaire *C77.8*
- SAI
- - Gangrène ¬ Hernie *K40.4*
- - ¬ hernie *K40*
- Stade
- - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.84*
- - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.85*
- - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.86*
- Teigne crurale] ¬ Teigne *B35.6*
- Unilatéral
- - Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - SAI ¬ Hernie *K40.9*
- - Sans précision
- - - Gangrène ¬ Hernie *K40.4*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - - Sans précision, sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K40.9*
- ¬
- - Granulome *A58*
- - Hernie *K40*
- - Lymphadénopathie *R59.0*
- - Région *S31.1*

INH] ¬ Déficit de l'inhibiteur de la C1 estérase [C1- *D84.1*

Inhalation
- Agent chimique émanation fumée gaz ¬
- - Affections respiratoires dues à l' *J68*
- - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l' *J68.4*

Inhalation *–suite*
- Agent chimique émanation fumée gaz ¬ *–suite*
- - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l' *J68.4*
- - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l' *J68.4*
- Contenu sécrétion gastrique s SAI anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.0*
- Drogues ¬ Démence par *F18.7*
- Liquides ou de vomissements SAI ¬ *T17*
- Poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine ¬ alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l' *J67*
- Sang ¬ Pneumonie due à l' *J69.8*
- ¬
- - Charbon
- - - *A22.1*
- - - *A22.1†, J17.0**
- - Complication d'un traitement par *T81.8*

Inhibant la coagulation ¬ Hémophilie due à des anticorps *D68.38*

Inhibée, non classée ailleurs ¬ Vessie neurogène non *N31.0*

Inhibiteur
- 1 de l'activateur du plasminogène ¬ Déficit congénital en *D68.8*
- Alpha-1 protéinase ¬ Déficit en *E88.0*
- Anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: *T50.2*
- C1 estérase [C1-INH] ¬ Déficit de l' *D84.1*
- Calciques ¬ Intoxication: *T46.1*
- Enzyme de conversion ¬ Intoxication: *T46.4*
- Lactation ¬ Ictère néonatal dû à des *P59.3*
- Monoamine-oxydase ¬ Intoxication: Antidépresseurs *T43.1*
- Pompe à protons ¬ Eosinophilie œsophagienne répondant aux *K20*
- Produits par le système immunitaire ¬ Hémophilie due aux *D68.38*
- Protéases ¬ Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux *U85!*
- Récepteurs histaminiques H2 ¬ Intoxication: *T47.0*
- Réversible
- - Facteur IIa ¬ Troubles hémorragiques dus à des *D68.35*
- - Thrombine ¬ Troubles hémorragiques dus à des *D68.35*
- Sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des *D68.35*

Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l'homme ¬ *F52.3*

Iniencéphalie ¬ *Q00.2*

Initial
- Insuffisantes ¬ Contractions *O62.0*
- Membres supérieurs, type finlandais ¬ Myopathie distale avec atteinte *G71.0*
- Pian ¬ Lésions *A66.0*
- Pinta
- - Caraté ¬
- - - Chancre (*A67.0*
- - - Papule (*A67.0*
- - ¬ Lésions *A67.0*
- Primaire ¬ Framboesia *A66.0*
- Trachome ¬ Phase *A71.0*
- ¬
- - Taches blanches [caries *K02.0*
- - Ulcère framboesial *A66.0*

Initialement focal
- Sans précision ¬ Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises *G40.09*
- ¬ Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises *G40.08*

Injection
- Conjonctivale ¬ Céphalée névralgique unilatérale brève avec *G44.8*
- Thérapeutique
- - Perfusion transfusion
- - - Sans précision ¬ Complication consécutive à une *T80.9*
- - - ¬
- - - - Complication
- - - - - Consécutives à une *T80*
- - - - - Consécutives à une *T80.8*
- - - - - Vasculaires consécutives à une *T80.1*
- - - - Embolie gazeuse consécutive à une *T80.0*
- - - - Infection
- - - - - Consécutif(ve) à *T80.2*
- - - - - Consécutives à une *T80.2*
- - - - Phlébite consécutive à *T80.1*
- - - - Septicémie consécutif(ve) à *T80.2*
- - - - Thrombo-embolie consécutive à *T80.1*
- - - - Thrombophlébite consécutive à *T80.1*
- - Transfusion ¬ Choc septique après perfusion, *T80.2, R57.2*
- Traumatique de fluide à haute pression (industrielle) ¬ *T70.4*
- ¬ Accident dû à: Aiguille à *W49.9!*

Innominée
- Sous-clavière ¬ Lésion traumatique
- - Artère *S25.1*
- - Veine *S25.3*
- ¬ Absence de veine *Q26.8*

Inoculation ¬ Hépatite par *B19.9*

Inorganiques
- Précisées ¬ Pneumoconiose due à d'autres poussières *J63.8*

Inorganiques *–suite*
- ¬ Pneumoconiose due à d'autres poussières *J63*

Inositol ¬ Carence en *E63.8*

Inquiet de son état de santé (sans diagnostic) ¬ Conseil et surveillance pour: Sujet *Z71*

Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension ¬ *R46.6*

Inscription
- Assurance ¬ *Z02*
- Colonie de vacances ¬ *Z02*
- Effectué transplantation
- - Organe
- - - Niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ *Z75.7*
- - - Sans niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ *Z75.6*
- - - ¬ *U55*
- - Pulmonaire
- - - Niveau urgence
- - - - HU [High Urgency] ¬ *U55.22*
- - - - U [Urgency] ¬ *U55.21*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ *U55.20*
- Établissement
- - Formation ¬ *Z02*
- - Pénitentiaire ¬ *Z02*
- - Résidentiel ¬ *Z02*
- Immigration ¬ *Z02*
- Mariage ¬ *Z02*
- Naturalisation ¬ *Z02*
- Obtention du permis de conduire ¬ *Z02*
- Pratique sportive ¬ *Z02*
- Transplantation
- - Cardiaque
- - - Niveau urgence
- - - - HU [High Urgency] ¬ *U55.12*
- - - - U [Urgency] ¬ *U55.11*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ *U55.10*
- - - ¬ *U55.1*
- - Cœur poumon
- - - Niveau urgence
- - - - HU [High Urgency]] ¬ *U55.32*
- - - - U [Urgency] ¬ *U55.31*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ *U55.30*
- - - ¬ *U55.3*
- - Pulmonaire ¬ *U55.2*

Insecte
- Non venimeux
- - Multiples SAI ¬ Piqûres d' *T00.9*
- - ¬
- - - Lésion traumatique superficiel
- - - - Avant-bras: Morsure ou piqûre d' *S50.83*
- - - - Cheville et du pied: Morsure ou piqûre d' *S90.83*

Insecte *–suite*
- Non venimeux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lésion traumatique superficiel *–suite*
- - - - Épaule et du bras: Morsure ou piqûre d' *S40.83*
- - - - Hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d' *S70.83*
- - - - Jambe: Morsure ou piqûre d' *S80.83*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d' *T13.03*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d' *T11.03*
- - - - Partie du corps non précisée: Morsure ou piqûre d' *T14.03*
- - - - Poignet et de la main: Morsure ou piqûre d' *S60.83*
- - - - Tronc, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d' *T09.03*
- - - Piqûre d' *W64.9!*
- Venimeux ¬
- - Morsure d'animal ou piqûre d' *X29.9!*
- - Piqûre ou morsure d' *T63.4*

Insecticide
- Halogénés ¬ Effet toxique: *T60.1*
- Insecticides sans autre précision ¬ Effet toxique: autres *T60.2*
- Organo-phosphorés et carbamates ¬ Effet toxique: *T60.0*
- Sans autre précision ¬ Effet toxique: autres insecticides et *T60.2*
- ¬
- - *L23.5*
- - *L24.5*
- - *L25.3*
- - Intoxication par *T60.2*

Insémination artificiel
- Conjoint [IAC] ¬ Complications de l' *N98.8*
- Donneur [IAD] ¬ Complications de l' *N98.8*
- ¬
- - *Z31.1*
- - Infection associée à l' *N98.0*

Insensibilité
- Androgènes ¬ *E34.5*
- Partielle aux androgènes [PAIS] ¬ *E34.50*
- Totale aux androgènes [CAIS] ¬ *E34.51*

Insertion
- Anormale des cordages de la tricuspide ¬ *Q22.8*
- Équilibrée chez un sujet normal ¬ Translocation ou *Q95.0*
- Ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale ¬ Atteinte des *M46.0*
- Non équilibrées ¬ translocations et *Q92*
- Placentaire ¬ Grossesse compliquée par une anomalie d' *O44.00*
- Réciproques robertsoniennes et équilibrées ¬ translocations et *Q95*

Insertion *–suite*
- Vélamenteuse cordon ¬
- - Hémorragie due à une *O69.4*
- - Perte de sang fœtal due à une *P50.0*
- - Travail et accouchement compliqués par une *O69.4*
- ¬ Tendinite d' *M77.9*

Insipide
- Central ¬ Diabète *E23.2*
- Néphrogénique ¬ Diabète *N25.1*
- Neurogène ¬ Diabète *E23.2*
- ¬ Diabète *E23.2*

Insolation ¬
- *T67.0*
- Coup de chaleur et *T67.0*

Insomnie
- Céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de chaleur, *N95.1*
- Fatale familiale ¬ *A81.8*
- Non organique ¬ *F51.0*
- ¬ *G47.0*

Instabilité
- Articulaires ¬ Autres *M25.3*
- Chronique genou
- - Ligament
- - - Capsulaire ¬ *M23.57*
- - - Croisé
- - - - Antérieur ¬ *M23.51*
- - - - Postérieur ¬ *M23.52*
- - - Externe [Lig. péronier collatéral] ¬ *M23.54*
- - - Interne [Lig. tibial collatéral] ¬ *M23.53*
- - - Non précisé ¬ *M23.59*
- - Localisations multiples ¬ *M23.50*
- - ¬ *M23.5*
- Détrusor
- - Neuropathie autonome ¬ Trouble fonctionnel vésical avec *N31.1*
- - Origine cérébrale ¬ *N31.0*
- Secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire ¬ *M24.2*
- Système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire ¬ *M96.88*
- Vertébrales ¬ *M53.2*

Instable
- Avant le travail ¬ Position *P01.7*
- Congénitale) ¬ Hanche *Q65.6*
- Hb Cologne) ¬ Hémoglobine *D58.2*
- Hb Zurich) ¬ Hémoglobine *D58.2*
- Intervention chirurgicale thoracique ¬ Thorax *M96.81*
- SAI ¬ Démarche *R26.8*
- Sans substrat neurologique ¬ Vessie *N31.82*
- ¬
- - Angine de poitrine *I20.0*
- - Diabète (sucré): *E10*
- - Maladie hémolytique à hémoglobine *D58.2*

Instable *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Soins maternels pour position *O32.0*
Installation
- Aiguë de l'aura ¬ Migraine: avec: *G43.1*
- Médical soin santé
- - Sans précision ¬ Difficulté liée aux *Z75.9*
- - ¬ Autres difficultés liées aux *Z75.8*
Instantanée
- Dont la cause reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou *R96.1*
- ¬ Mort *R96.0*
Institution ¬
- Difficulté liée à la vie en *Z59*
- Séjour et éducation en *Z62*
Institutionnel ¬
- Examen général en série de: résidents d'établissements *Z10*
- Syndrome *F94.2*
Instrument
- Cours acte visée diagnostique thérapeutique ¬ Perforation accidentel
- - Nerf par *T81.2*
- - Organe par *T81.2*
- - Vaisseau sanguin par *T81.2*
- Pendant l'accouchement ¬ Blessure de la mère par un *O71.9*
Instrumental
- Travail ¬ Echec du déclenchement *O61.1*
- ¬ lésions par manœuvre *O71*
Insuffisance
- Anastomose
- - Suture opération
- - - Anus ¬ *K91.83*
- - - Estomac ¬ *K91.83*
- - - Intestin ¬ *K91.83*
- - - Œsophage ¬ *K91.83*
- - - Organes du système digestif ¬ *K91.83*
- - - Pancréas ¬ *K91.82*
- - - Rectum ¬ *K91.83*
- - - Trachée, des bronches et des poumons ¬ *J95.82*
- - - Vésicule et des voies biliaires ¬ *K91.81*
- - Voies digestives ¬ *K91.83*
- Aortique
- - Congénitale ¬ *Q23.1*
- - Rhumatismale ¬ *I06.1*
- Baroréflexe ¬ *G90.8*
- Cardia ¬ *K31.88*
- Cardiaque
- - Aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du fœtus avec menace d' *O35.8*
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.1*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.1*

Insuffisance *–suite*
- Cardiaque *–suite*
- - Anesthésie cours *–suite*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.2*
- - Chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque ¬ *I97.1*
- - Congestive
- - - Rénale ¬ Cardionéphropathie hypertensive, avec *I13.2*
- - - ¬
- - - - Cardionéphropathie hypertensive, avec *I13.0*
- - - - Cardiopathie
- - - - - Hypertensive, avec *I11.0*
- - - - - Hypertensive, sans *I11.9*
- - Diastolique ¬ *I50.1*
- - Droit
- - - Consécutive à une insuffisance cardiaque gauche ¬ *I50.01*
- - - Primaire
- - - - Sans symptôme ¬ *I50.00, I50.02!*
- - - - Stade
- - - - - NYHA I ¬ *I50.00, I50.02!*
- - - - - NYHA II ¬ *I50.00, I50.03!*
- - - - - NYHA III ¬ *I50.00, I50.04!*
- - - - - NYHA IV ¬ *I50.00, I50.05!*
- - - - Symptôme
- - - - - Effort important ¬ *I50.00, I50.03!*
- - - - - Effort léger ¬ *I50.00, I50.04!*
- - - - - Repos ¬ *I50.00, I50.05!*
- - - - ¬ *I50.00*
- - - SAI ¬ *I50.01*
- - - Sans symptôme ¬ *I50.01, I50.02!*
- - - Secondaire ¬ *I50.01*
- - - Stade NYHA
- - - - II
- - - - - ¬ *I50.01, I50.02!*
- - - - - ¬ *I50.01, I50.03!*
- - - - III ¬ *I50.01, I50.04!*
- - - - IV ¬ *I50.01, I50.05!*
- - - Symptôme
- - - - Effort
- - - - - Important ¬ *I50.01, I50.03!*
- - - - - Léger ¬ *I50.01, I50.04!*
- - - - Repos ¬ *I50.01, I50.05!*
- - - ¬ *I50.0*
- - Gauche
- - - Cours de rhumatisme articulaire aigu ¬ Présence d'une *I01.8*
- - - Sans symptôme ¬ *I50.11*
- - - Symptôme
- - - - Effort
- - - - - Important ¬ *I50.12*
- - - - - Léger ¬ *I50.13*
- - - - Repos ¬ *I50.14*
- - - ¬

Insuffisance *–suite*
- Cardiaque *–suite*
- - Gauche *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - *I50.1*
- - - - Insuffisance cardiaque gauche ¬ Insuffisance cardiaque droite consécutive à une *I50.01*
- - Globale ¬ *I50.01*
- - Haut débit ¬ *I50.9*
- - Hypertensive ¬ *I11.0*
- - Intervention chirurgicale ¬ *I97.89*
- - Myocardique SAI ¬ *I50.9*
- - Néonatale ¬ *P29.0*
- - Rhumatismale ¬ *I09.9*
- - Sans précision ¬ *I50.9*
- - Survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ *O75.4*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- - Thyréotoxique ¬ *E05.9†, I43.8**
- - ¬
- - - *I50*
- - - Œdème pulmonaire (aigu) avec mention de maladie cardiaque SAI ou d' *I50.1*
- Cardio-respiratoire ¬ *R09.2*
- Cérébrovasculaire aiguë, SAI ¬ *I67.88*
- Cervico utérin
- - Non précisé ¬ Suivi de la mère en cas d' *O34.39*
- - ¬ Suivi de la mère dans les autres cas d' *O34.38*
- Circulatoire périphérique SAI ¬ *R57.9*
- Congénital
- - Iode SAI ¬ Hypothyroïdie par *E00.9*
- - Valve pulmonaire ¬ *Q22.2*
- - Valvule aortique ¬ *Q23.1*
- Convergence ¬ Excès et *H51.1*
- Coronaire ¬ *I24.8*
- Corticosurrénal
- - Médicamenteuse ¬ *E27.3*
- - Primaire ¬ *E27.1*
- - SAI ¬ *E27.4*
- - Sans précision ¬ *E27.4*
- Érectile organique ¬ *N48.4*
- Fonctionnelle du ventricule gauche ¬ Cardiopathie coronarienne avec *I25.19*
- Hépatique
- - Aigu
- - - Chronique) médicamenteuse ¬ *K71.1*
- - - Infantile-manifestations multisystémiques ¬ Syndrome d' *K72.0*
- - - Subaiguë ¬ *K72.0*
- - Alcoolique
- - - Aiguë ¬ *K70.4*
- - - Chronique ¬ *K70.4*
- - - SAI ¬ *K70.4*

Insuffisance *–suite*
- Hépatique *–suite*
- - Alcoolique *–suite*
- - - Sans coma hépatique ¬ *K70.4*
- - - Subaiguë ¬ *K70.4*
- - - ¬ *K70.4*
- - Chronique ¬ *K72.1*
- - Début tardif [late-onset] ¬ *K72.0*
- - Infantile aiguë par défaut de synthèse des protéines codées par l'ADN mitochondrial ¬ *K72.0*
- - Médicaments ¬ *K71.9*
- - Non classée ailleurs ¬ *K72*
- - Origine médicamenteuse ¬ *K71.1, Y57.9!*
- - Sans précision ¬ *K72.9*
- - Tardive ¬ *K72.0*
- - Toxicomanie ¬ *K71.1, Y57.9!*
- - ¬
- - - Hépatite
- - - - Fulminante NCA, avec *K72*
- - - - Maligne NCA, avec *K72*
- - - Nécrose des hépatocytes avec *K72*
- Hormone de croissance idiopathique ¬ *E23.0*
- Intestinale chronique ¬ *K90.9*
- Isolé
- - ACTH ¬ *E23.0*
- - Gonadotrophine ¬ *E23.0*
- - Hormone
- - - Croissance ¬ *E23.0*
- - - Hypophysaire ¬ *E23.0*
- - Prolactine ¬ *E23.0*
- - Thyréotropine ¬ *E23.0*
- Mitral
- - Congénitale ¬ *Q23.3*
- - Rhumatismale ¬ *I05.1*
- - ¬ Sténose non rhumatismale de la valvule mitrale avec *I34.80*
- Myocardique syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- Non rhumatismale (de la valvule) tricuspide ¬ *I36.1*
- Ovarien
- - Actes médicaux ¬ *E89.4*
- - Hypergonadotrope ¬ *E28.3*
- - Primaire ¬ *E28.3*
- Oxygénation systémique
- - Faible teneur en oxygène de l'air ambiant ¬ *T71*
- - Gêne mécanique à la respiration ¬ *T71*
- Périnéale ¬ *N81.8*
- Placenta ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de: *O36.5*
- Placentaire ¬ *P02.2*
- Pluriglandulaire auto-immune ¬ *E31.0*
- Polyglandulaire auto-immune ¬ *E31.0*
- Pulmonaire
- - Aigu consécutif intervention chirurgical

Insuffisance *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Aigu consécutif intervention chirurgical *–suite*
- - - Non thoracique ¬ *J95.2*
- - - Thoracique ¬ *J95.1*
- - Chronique consécutive à une intervention chirurgicale ¬ *J95.3*
- - Mesures médicales ¬ *J95.88*
- Reflux ¬ Sténose aortique rhumatismale avec *I06.2*
- Régurgitation ¬ Sténose mitrale avec *I05.2*
- Rénal
- - Actes médicaux ¬ *N99.0*
- - Aigu
- - - Nécrose
- - - - Cortical
- - - - - Aiguë avec nécrose corticale aiguë ¬ *N17.1*
- - - - - Aiguë avec nécrose corticale aiguë, stade 1 ¬ *N17.11*
- - - - - Aiguë avec nécrose corticale aiguë, stade 2 ¬ *N17.12*
- - - - - Aiguë avec nécrose corticale aiguë, stade 3 ¬ *N17.13*
- - - - Médullaire
- - - - - Stade 1 ¬ *N17.21*
- - - - - Stade 2 ¬ *N17.22*
- - - - - Stade 3 ¬ *N17.23*
- - - - - ¬ *N17.2*
- - - - Papillaire
- - - - - Stade 1 ¬ *N17.21*
- - - - - Stade 2 ¬ *N17.22*
- - - - - Stade 3 ¬ *N17.23*
- - - - Tubulaire
- - - - - Stade 1 ¬ *N17.01*
- - - - - Stade 2 ¬ *N17.02*
- - - - - Stade 3 ¬ *N17.03*
- - - - - ¬ *N17.0*
- - - Post-partum ¬ *O90.4*
- - - Prérénale ¬ *N17*
- - - Résultat histologique
- - - - Stade
- - - - - 1 ¬ *N17.81*
- - - - - 2 ¬ *N17.82*
- - - - - 3 ¬ *N17.83*
- - - - ¬
- - - - - *N17.8*
- - - - - *N17.89*
- - - Sans
- - - - Précision ¬ *N17.9*
- - - - Résultat histologique ¬ *N17.9*
- - - Stade
- - - - 1 ¬ *N17.91*
- - - - 2 ¬ *N17.92*
- - - - 3 ¬ *N17.93*

Insuffisance *–suite*
- Rénal *–suite*
- - Aigu *–suite*
- - - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- - - ¬
- - - - *N17*
- - - - *N17.8*
- - Cholestase ¬ Syndrome d'arthrogrypose- *Q89.7*
- - Chronique
- - - Nécessitant une dialyse ¬ *N18.5*
- - - ¬ *N18*
- - Congénitale ¬ *P96.0*
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.4*
- - Diabétique ¬ *E14.20†, N08.3**
- - Écrasement ¬ *T79.5*
- - Hypertensive ¬ *I12.0*
- - Non précisée comme aiguë ou chronique ¬ *N19*
- - Préterminale ¬ *N18.4*
- - SAI ¬ *N19*
- - Sans précision ¬ *N19*
- - Terminale ¬ *N18.5*
- - ¬
- - - Cardionéphropathie hypertensive, avec *I13.1*
- - - Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d' *Z99.2*
- - - Dialyse de longue durée lors d'une *Z99.2*
- - - Néphropathie hypertensif
- - - - *I12.0*
- - - - Sans *I12.9*
- Respiratoire
- - Aigu
- - - Non classée ailleurs ¬ *J96.0*
- - - Type
- - - - I ¬ *J96.00*
- - - - II ¬ *J96.01*
- - Chronique
- - - Non classée ailleurs ¬ *J96.1*
- - - Type
- - - - I ¬ *J96.10*
- - - - II ¬ *J96.11*
- - Hypoxique ¬ *J96.90*
- - Non classée ailleurs ¬ *J96*
- - Nouveau-né ¬ *P28.5*
- - Postopératoire ¬ *J95.88*
- - Sans précision ¬ *J96.9*
- - Type
- - - I ¬ *J96.90*
- - - II ¬ *J96.91*
- Statural
- - Constitutionnelle ¬ *E34.3*
- - Non classée ailleurs ¬ *E34.3*

Insuffisance *–suite*
- Statural *–suite*
- - Nutritionnelle ¬ *E45*
- - Origine rénale ¬ *N25.0*
- - Pituitaire SAI ¬ *E23.0*
- - Psychosociale ¬ *E34.3*
- - SAI ¬ *E34.3*
- - Thanatophore ¬ *Q77.1*
- - Type Laron ¬ *E34.3*
- Surrénale
- - Aiguë ¬ *E27.2*
- - ¬ Crise d' *E27.2*
- Surrénalien
- - Aiguë ¬ *E27.2*
- - Héréditaire isolée par déficit partiel en CYP11A1 ¬ *E27.1*
- Syphilitique
- - Aorte ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Valve pulmonaire ¬ *A52.0†, I39.3**
- Thyroïdien congénital
- - Sans précision ¬ Syndrome d' *E00.9*
- - Type
- - - Mixte ¬ Syndrome d' *E00.2*
- - - Myxœdémateux ¬ Syndrome d' *E00.1*
- - - Neurologique ¬ Syndrome d' *E00.0*
- Tricuspidienne ¬ *I07.1*
- Valvule
- - Aortique
- - - SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I35.1*
- - - ¬ *I35.1*
- - Mitral
- - - E) SAI ou de cause précisée sauf rhumatismale ¬ *I34.0*
- - - ¬ *I34.0*
- - Non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- - Pulmonaire
- - - SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I37.1*
- - - ¬ *I37.1*
- - Tricuspide
- - - Cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I36.1*
- - - Rhumatismale) ¬ *I07.1*
- Vasculaire mésentérique ¬ *K55.1*
- Veine
- - Perforantes ¬ *I87.20*
- - Profondes du membre inférieur ¬ *I87.20*
- Veineux
- - Chronique
- - - Membre inférieur ¬ *I87.20*
- - - Périphérique
- - - - SAI ¬ *I87.20*
- - - - Sans ulcération ¬ *I87.20*
- - - - Ulcération ¬ *I87.21*

Insuffisance *–suite*
- Veineux *–suite*
- - Chronique *–suite*
- - - Périphérique *–suite*
- - - - ¬ *I87.2*
- - Membres inférieurs, avec ulcération ¬ *I87.21*
- - ¬ Ulcère de jambe dû à une *I87.21*
- Ventriculaire gauche: Non précisée ¬ *I50.19*
- Voies lacrymales ¬ Sténose et *H04.5*
- ¬ Sténose
- - Aortique rhumatismale avec *I06.2*
- - Mitrale avec *I05.2*
- - Non rhumatismale (de la valvule) tricuspide avec *I36.2*
- - Tricuspidienne avec *I07.2*
- - Valvule
- - - Aortique avec *I35.2*
- - - Pulmonaire avec *I37.2*

Insuffisant
- Cæcum et du côlon ¬ Rotation: *Q43.3*
- Col ¬ Dilatation *O62.0*
- Eau potable ¬ Approvisionnement *Z58*
- Fœtus ¬ Soins maternels pour croissance *O36.5*
- Glandes mammaires] ¬ Micromastie [développement *Q83.88*
- Naissance, non classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids *P07*
- Non classées ailleurs ¬ Aptitudes sociales *Z73*
- Nourriture boisson
- - Suite de négligence de soi ¬ Prise *R63.6*
- - ¬ Prise *R63.6*
- Précautions aseptiques ¬ Mesures *Y69!*
- ¬
- - Contractions initiales *O62.0*
- - Couverture sociale et secours *Z59*
- - Érection *N48.4*
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals *Z35.3*

Insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la toux) ¬ Dépendance (de longue durée) envers: *Z99.0*

Insufflation tubaire ¬ *Z31.4*

Insulaires ¬ Tumeur à cellules *D13.7*

Insuline
- Hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] ¬ Intoxication: *T38.3*
- Type A ¬ Syndrome de résistance à l' *E13.60*
- ¬
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en récepteur à l' *E16.1*
- - Pompe à *Z96.4*
- - Taux réduit de la protéine de liaison du facteur de croissance ressemblant à l' *R77.88*

Insulinique induit, chez un non diabétique ¬ Coma: *E15*

Insulino-dépendant
- Primaire complication
- - Neurologique ¬ Diabète sucré non *E11.40†, G63.2**
- - Oculaire ¬ Diabète sucré non *E11.30†, H58.8**
- - Vasculaire périphérique ¬ Diabète sucré *E10.50†, I79.2**
- Sujet jeune ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): non *E11*
- Type
- - 1 avec complication vasculaire périphérique ¬ Diabète sucré *E10.50†, I79.2**
- - 2 complication
- - - Neurologique ¬ Diabète sucré
- - - - *E11.40†, G63.2**
- - - - Non *E11.40†, G63.2**
- - - Oculaire ¬ Diabète sucré
- - - - *E11.30†, H58.8**
- - - - Non *E11.30†, H58.8**
- - - Rénal ¬ Diabète sucré
- - - - *E11.20†, N08.3**
- - - - Non *E11.20†, N08.3**

Insulinome
- Incertain ¬ *D37.70*
- Pancréatique incertain ¬ *D37.70*
- ¬ *D13.7*

Insulino-résistance type B ¬ Syndrome d' *E13.70*

Insulinothérapie ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): type 2 sous *E11*

Intacte ¬ Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs *L89.0*

Intégrine alpha-7 ¬ Dystrophie musculaire congénitale par déficit en *G71.2*

Integumentalis ¬ Lupus erythematodes *L93.0*

Intellectuel
- Absence de fibres sensitives myélinisées de gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec surdité, déficience *G60.0*
- Acromicrie-ménopause prématurée ¬ Syndrome de polyneuropathie-déficience *Q87.8*
- Atrésie anale-uropathie ¬ Syndrome de cataracte-déficience *Q87.8*
- Brachydactylie ¬ Syndrome de Pierre Robin-déficience *Q87.0*
- Calvitie-luxation de la rotule-acromicrie ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- Cardiopathie ¬ Syndrome de microcéphalie-épilepsie-déficience *Q87.8*
- Colobome et micrognathie ¬ Syndrome d'agénésie du corps calleux avec déficience *Q87.8*
- Déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante-épilepsie-déficience *G11.1*
- Dysmorphie

Intellectuel *–suite*
- Dysmorphie *–suite*
- - Faciale par haploinsuffisance de SETD5 ¬ Syndrome de déficience *Q87.0*
- - ¬ Syndrome d'arachnodactylie-déficience *Q87.8*
- Hydroxylysinurie ¬ Syndrome de convulsions-déficience *E72.3*
- Hypoplasie du corps calleux et appendices pré-auriculaires ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- Lié
- - A l'X ¬ Syndrome d'anomalies squelettiques-déficience *Q87.5*
- - X
- - - Acromégalie-hyperactivité ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- - - Agénésie du corps calleux-quadriparésie spastique ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- - - Cubitus valgus-dysmorphie ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- - - Épilepsie
- - - - Contracture progressive des articulations-dysmorphie ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- - - - Psoriasis ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- - - Hypogonadisme-ichtyose-obésité-petite taille ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- - - Hypotonie-dysmorphie faciale-comportement agressif ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- - - Macrocéphalie-emacroorchidie ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- - - Syndromique type
- - - - 7 ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - 10 ¬ Déficience *G25.5*
- - - - Claes-Jensen ¬ Déficience *Q87.8*
- - - Type
- - - - Abidi ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Armfield ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Brooks ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Cantagrel ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Cilliers ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Miles-Carpenter ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Nascimento ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Schimke ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Seemanova ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Shashi ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Shrimpton ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Siderius ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Stevenson ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Stocco Dos Santos ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Stoll ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Turner ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Van Esch ¬ Déficience *Q87.8*
- - - - Wilson ¬ Déficience *Q87.8*
- - - ¬
- - - - Alpha-thalassémie-déficience *D56.0*

Intellectuel *–suite*
- Lié *–suite*
- - X *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Syndrome
- - - - - Ataxie-apraxiedéficience *G11.8*
- - - - - Marfanoïde avec déficience *Q87.8, F79.9*
- - - - - Surdité-déficience *Q87.8*
- Malformation
- - Cérebro-cérébelleuse ¬ Syndrome d'épilepsie focale-déficience *Q04.8*
- - Système nerveux central ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique-déficience *Q87.8*
- Petit taille
- - Hypertélorisme ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- - ¬ Syndrome
- - - Goniodysgénésie-déficience *Q87.8*
- - - Polydactylie préaxiale-colobome-déficience *Q87.2*
- Sévère
- - Épilepsie-anomalies anales-hypoplasie des phalanges ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- - Petite taille-troubles du comportement-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de déficience *Q87.8*
- Surdité-hypogénitalisme ¬ Syndrome de rétinite pigmentaire-déficience *Q87.8*
- Type
- - Birk-Barel ¬ Déficience *Q87.8*
- - Finnois ¬ Syndrome d'épilepsie-déficience *E75.4*
- ¬
- - Ataxie cérébelleuse non progressive avec déficience *G11.0*
- - Dystrophie musculaire congénital
- - - Déficience *G71.2*
- - - Sans déficience *G71.2*
- - Syndrome
- - - Alopécie
- - - - Contractures-nanisme-déficience *Q87.8*
- - - - Épilepsie-pyorrhée-déficience *Q87.8*
- - - Arachnodactylie-ossification anormale-déficience *Q87.8*
- - - Ataxie cérébelleuse non progressive-déficience *G11.8*
- - - Cryptorchidie-arachnodactylie-déficience *Q87.8*
- - - Dentinogenèse imparfaite-petite taille-surdité-déficience *Q87.8*
- - - Hypogonadisme-prolapsus de la valve mitrale-déficience *Q87.8*
- - - Hypoplasie du cubitus-déficience *Q87.2*
- - - Lymphœdème-lymphangiectasie-déficience *Q87.8*
- - - Microcéphalie
- - - - Corps calleux fin-déficience *Q87.8*
- - - - Surdité-déficience *Q87.8*
- - - Microphtalmie

Intellectuel *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Microphtalmie *–suite*
- - - - Ankyloblépharon-déficience *Q11.2*
- - - - Colobomateuse-obésité-hypogénitalisme-déficience *Q87.8*
- - - Ostéogenèse imparfaite-rétinopathie-épilepsie-déficience *Q87.8*
- - - Paralysie du larynx-déficience *J38.00*
- - - Polydactylie postaxiale-déficience *Q87.2*

Intelligence dissociée ¬ *F74*

Intense
- Contracture abdominale) (généralisée) (localisée) ¬ Douleur abdominale *R10.0*
- Prolongé) SAI ¬ Ictère physiologique (*P59.9*

Intensif ¬ Épuisement dû à un effort *T73.3*

Intention
- Personne de léser ou de tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l' *Y09.9!*
- Suicidaire ¬ Intoxication aux somnifères avec *T42.7*

Intentionnel
- Simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production *F68.1*
- ¬ Tremblement *G25.2*

Interaortopulmonaire ¬ Coronaire *Q24.5*

Interatriale
- CIA] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication *I51.0*
- Séquence de Robin et persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec communication *Q87.8*
- ¬ Communication *Q21.1*

Interauriculaire
- Auricules ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication *I51.0*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Communication *I23.1*
- Dysmorphie ¬ Syndrome de Lymphœdème-communication *Q87.8*
- Trouble de la conduction atrioventriculaire ¬ Syndrome de communication *Q21.1*
- ¬
- - Anévrisme du septum *Q21.0*
- - Communication *Q21.1*

Intercalatum ¬ Infection à Schistosoma: *B65.8*

Intercapillaire ¬ Glomérulosclérose *E14.20†, N08.3**

Intercondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: *S72.44*

Intercostal ¬
- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.5*
- Névrite *G58.0*

Interdigital membre
- Inférieur ¬ Névrome *G57.8*
- Supérieur ¬ Névrome *G56.8*

Interdigitées ¬ Sarcome à cellules dendritiques *C96.4*

Interépineuse [Maladie de Baastrup] ¬ Arthrose *M48.2*

Intéressant

- Articulations et les ligaments pelviens ¬ Lésions obstétricales *O71.6*
- Capsule labyrinthique ¬ Otosclérose *H80.2*
- Cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, *O70.2*
- Fenêtre
- - Ovale
- - - Non oblitérante ¬ Otosclérose *H80.0*
- - - Oblitérante ¬ Otosclérose *H80.1*
- - Ronde ¬ Otosclérose *H80.2*
- Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Légère au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Lèvres au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Muqueux
- - Anale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, *O70.3*
- - Rectale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, *O70.3*
- Muscle
- - Périnée au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, *O70.1*
- - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, *O70.1*
- Peau au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, *O70.1*
- Sphincter
- - Anal au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, *O70.2*
- - SAI au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, *O70.2*
- Système nerveux central anesthésie cours
- - Puerpéralité ¬ Complications *O89.2*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Complications *O74.3*
- Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Vulve au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*

Interférente ¬ Dissociation: *I45.8*

Interféron

- Gamma ¬ MSMD autosomique
- - Dominant déficit partiel récepteur
- - - 1 de l' *D84.8*
- - - 2 de l' *D84.8*

Interféron *–suite*

- Gamma ¬ MSMD autosomique *–suite*
- - Récessive par déficit partiel en récepteur 1 de l' *D84.8*
- - ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit partiel en facteur 8 régulateur de l' *D84.8*

Intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ Lèvre (bord libre) (face *D10.0*

Interleukin-1 receptor-associated kinase-4 ¬ Immunodéficience par déficit en *D84.8*

Interleukine 12 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en récepteur bêta 1 de l' *D84.8*

Intermédiaire

- Artérielle ¬ Dégénérescence de la tunique *I70.29*
- Atypique ¬ Lèpre
- - Lépromateuse de type *A30.4*
- - Tuberculoïde de type *A30.2*
- - Type *A30.3*
- Autosomique
- - Dominant
- - - A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - B ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - C ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - D ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - E ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - Type F ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - Récessif type
- - - A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - B ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - C ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - D ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- Latéral) (médian) ¬ Fracture: Os cunéiforme (*S92.23*
- Moyenne ¬ Thalassémie: *D56.1*
- Pinta ¬ Lésions *A67.1*
- ¬
- - Epidermolyse bulleuse simple généralisée *Q81.0*
- - Lymphome nodulaire de type *C82.9*
- - Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: forme *E42*
- - Ostéopétrose *Q78.2*
- - Syndrome (de): coronaire *I20.0*
- - Tumeur du parenchyme pinéal à différenciation *D44.5*
- - Uvéite *H30.2*

Intermittent

- Alternante monoculaire ¬

Intermittent *–suite*

- Alternante monoculaire ¬ *–suite*
- - Ésotropie [strabisme convergent] *H50.3*
- - Exotropie [strabisme divergens] *H50.3*
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs ¬ Claudication *I70.29*
- Hépatique) ¬ Porphyrie: aiguë *E80.2*
- Médullaire (lors de myélopathie vasculaire) ¬ Claudication *G95.18*
- SAI ¬ Claudication *I73.9*
- ¬
- - Arythmie complète *I48.9*
- - Claudication syphilitique *A52.0†, I79.8**
- - Douleurs *R52.9*
- - Ésotropie (alternante) (monoculaire) non *H50.0*
- - Exotropie (alternante) (monoculaire) non *H50.1*
- - Fibrillation auriculaire *I48.0*
- - Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel): *H40.2*
- - Hétérotropie *H50.3*
- - Hydarthrose *M12.4*
- - Trouble explosif *F63.8*

Internucléaire ¬ Ophtalmoplégie *H51.2*

Interphalangienne

- S) ¬ Articulation(s): *S93.5*
- ¬
- - Arthropathie psoriasique distale *L40.5†, M07.09**
- - Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) *S63.62*
- - Luxation
- - - Doigt: (Articulation) *S63.12*
- - - Orteil(s): (Articulation) *S93.12*
- - Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et *S63.4*

Interrogans serovar icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirose à Leptospira *A27.0*

Interruption

- Crosse aortique ¬ *Q25.4*
- Grossesse
- - Légale ¬ *O04*
- - Source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né ¬ *P96.4*
- - Thérapeutique ¬ *O04*
- - ¬
- - - *Z30.3*
- - - Lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris
- - - - *O35*
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- Tige hypophysaire ¬ Syndrome d' *E23.6*
- Veine cave inférieure ¬ *Q26.8*

Interscapulaire ¬ région *T21*

Interstitiel
v. Type de maladie

Intertrigo érythémateux ¬ *L30.4*

Intervalle

- PR court ¬ Tachyarythmie atriale avec *I45.6*
- Raccourcis et irréguliers entre les règles ¬ *N92.1*

Intervention

- Chirurgical
- - Antérieur
- - - Sur
- - - - Col ¬ Soins maternels pour: *O34.4*
- - - - Périnée ou la vulve ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- - - - Vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- - - ¬ Soins maternels pour cicatrice utérine due à une *O34.2*
- - Importante, non classée ailleurs ¬ Antécédents personnels d' *Z92.4*
- - Intra-utérine ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*
- - Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P00.6*
- - Non thoracique ¬ Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une *J95.2*
- - Post-traumatique ¬ perte d'une partie du corps NCA après *Z90*
- - Thoracique ¬
- - - Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une *J95.1*
- - - Sternum laissé électivement ouvert après *M96.80*
- - - Thorax instable après *M96.81*
- - ¬
- - - Blessure de l'utérus par incision lors d'une *T81.2*
- - - Choc septique pendant une *T81.1*, *R57.2*
- - - Convalescence après *Z54.0!*
- - - Insuffisance
- - - - Cardiaque après *I97.89*
- - - - Pulmonaire chronique consécutive à une *J95.3*
- - - Perte d'un membre: après *Z89*
- Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d' *Z64.8*
- Destructrice pour faciliter l'accouchement ¬ *P03.8*
- Gastrique ¬ Syndromes consécutifs à une *K91.1*
- Gastro-intestinale ¬ Vomissements consécutifs à une *K91.0*
- Implantation) (durant leur utilisation) ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une *Y82.8!*
- Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P00.7*
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d' *Z64.8*

Interventriculaire

- CIV] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication *I51.0*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Communication *I23.2*
- Sous-aortique
- - Sous-aortique sous-pulmonaire sténose pulmonaire ¬
- - - VDDI avec communication *Q20.1*
- - - Ventricule droit à double issue avec communication *Q20.1*
- - ¬ Ventricule droit double issue
- - - Communication *Q20.1*
- - - Double outlet right ventricle] avec communication *Q20.1*
- Sous-pulmonaire
- - Non-committed ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec CIV [communication *Q20.1*
- - ¬ Ventricule droit à double issue avec communication *Q20.1*
- Sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication *Q21.3*
- ¬
- - Anévrisme du septum *Q21.1*
- - Communication *Q21.0*

Intervertébral

- Cervical
- - Compression des racines nerveuses ¬ Atteinte des disques *M50.1†*, *G55.1**
- - Myélopathie ¬
- - - Compression des racines nerveuses lors d'une atteinte des disques *M50.0†*, *G99.2**
- - - Dégénérescence des disques *M50.0†*, *G99.2**
- - Névralgie cervicale ¬ Atteinte des disques *M50.8†*, *G55.1**
- - Névrite ¬ Dégénérescence des disques *M50.1†*, *G55.1**
- - Radiculopathie ¬ Dégénérescence des disques *M50.1†*, *G55.1**
- - ¬ Rupture traumatique d'un disque *S13.0*
- Dorsal ¬ Rupture traumatique d'un disque *S23.0*
- Lombaire
- - Myélopathie ¬ Dégénérescence des disques *M51.0†*, *G99.2**
- - ¬ Rupture traumatique d'un disque *S33.0*
- Myélopathie ¬ Compression des racines nerveuses lors d'une atteinte des disques *M51.0†*, *G99.2**
- Ossification et subluxation ¬ Rétrécissement des espaces *M99.6*
- Précis ¬
- - Détérioration d'un autre disque *M51.3*
- - Hernie d'un autre disque *M51.2*
- Sans précision ¬ Atteinte d'un disque *M51.9*
- Thoraciques avec radiculopathie ¬ Dégénérescence des disques *M51.1†*, *G55.1**

Intervertébral *–suite*

- Tissu conjonctif et discal ¬ Rétrécissement des espaces *M99.7*
- ¬
- - Atteinte
- - - Disques *M51*
- - - Précisées d'un disque *M51.8*
- - Chondrite tuberculeuse *A18.0†*, *M49.09**
- - Claudicatio spinalis au cours d'atteinte lombaire des disques *M51.1†*, *G55.1**
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: disque *T84.07*
- - Compression des racines nerveuses lors d'une atteinte des disques *M51.1†*, *G55.1**
- - Infection (pyogène) d'un disque *M46.3*
- - Lumbago avec ischialgie due à une atteinte des disques *M51.1†*, *G55.1**
- - Myélopathie
- - - Cours d'atteinte des disques *M51.0†*, *G99.2**
- - - Dégénérescence des disques *M51.0†*, *G99.2**
- - - Déplacement de disque *M51.0†*, *G99.2**
- - Neuropathie radiculaire avec atteinte des disques *M51.1†*, *G55.1**
- - Névrite
- - - Atteinte des disques *M51.1†*, *G55.1**
- - - Déplacement de disque *M51.1†*, *G55.1**
- - - Nerf
- - - - Brachial due au déplacement de disque *M50.1†*, *G55.1**
- - - - Sciatique due au déplacement de disque *M51.1†*, *G55.1**
- - - Plexus brachial due au déplacement de disque *M50.1†*, *G55.1**
- - Présence d'une prothèse de disque *Z96.67*
- - Radiculite
- - - Atteinte des disques *M51.1†*, *G55.1**
- - - Cervicale due au déplacement de disque *M50.1†*, *G55.1**
- - - Déplacement de disque *M51.1†*, *G55.1**
- - Sciatique due à une discopathie *M51.1†*, *G55.1**
- - Tuberculose
- - - Cartilage *A18.0†*, *M49.09**
- - - Disque *A18.0†*, *M49.09**

Intestin

- Aigu(ë) ¬ Infarctus de l' *K55.0*
- Brides] avec occlusion ¬ Adhérences de l' *K56.5*
- Calculs biliaires ¬ Occlusion de l' *K56.3*
- Côlon
- - Grêle ¬
- - - Diverticule de l' *K57*
- - - Diverticulite de l' *K57*
- - - Diverticulose de l' *K57*
- - Partie non précisée ¬ Lésion traumatique du côlon: Gros *S36.50*
- Court

Intestin *–suite*
- Court *–suite*
- - Congénital ¬ Syndrome de l' *Q41.9*
- - Thrombose ¬ Syndrome de l' *K91.2, K55.0*
- - Volvulus ¬ Syndrome de l' *K91.2, K56.2*
- - ¬ Syndrome de l' *K91.2*
- Grêle
- - Aigu(ë) ¬ Ischémie de l' *K55.0*
- - Côlon
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement
- - - - - ¬ Diverticulite de l' *K57.43*
- - - - - ¬ Diverticulose de l' *K57.41*
- - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.42*
- - - - ¬ Diverticulose de l' *K57.4*
- - - SAI ¬ Diverticulose de l' *K57.5*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.53*
- - - - Sans
- - - - - Indication de saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.52*
- - - - - Indication de saignement ¬ Diverticulose de l' *K57.50*
- - Duodénum ¬ Lésion traumatique de l' *S36.41*
- - Gros intestin ¬ Maladie de Crohn de l' *K50.82*
- - Hémorragie ¬ Angiodysplasie de l' *K55.32*
- - Intestin
- - - Grêle: Intestin grêle, partie non précisée ¬ Lésion traumatique de l' *S36.40*
- - - SAI ¬ obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l' *Q41*
- - Non précisées ¬ Tumeur bénigne: Parties de l' *D13.3*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Lésion traumatique de l'intestin grêle: *S36.40*
- - - Parties et parties multiples de l'intestin grêle ¬ Lésion traumatique de l' *S36.49*
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.03*
- - - - Diverticulose de l' *K57.01*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.02*
- - - - Diverticulose de l' *K57.00*
- - - ¬ Diverticulose de l' *K57.0*
- - Péritonite ¬ Diverticulose
- - - *K57.0*
- - - Côlon et de l' *K57.4*
- - SAI ¬ Diverticulose de l' *K57.1*
- - Sans
- - - Indication d'une hémorragie ¬ Angiodysplasie de l' *K55.31*
- - - Perforation abcès
- - - - Indication

Intestin *–suite*
- Grêle *–suite*
- - Sans *–suite*
- - - Perforation abcès *–suite*
- - - - Indication *–suite*
- - - - - Saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.12*
- - - - - Saignement ¬ Diverticulose de l' *K57.10*
- - - - Saignement
- - - - - ¬ Diverticulite de l' *K57.13*
- - - - - ¬ Diverticulose de l' *K57.11*
- - - - ¬
- - - - - Diverticulose de l' *K57.1*
- - - - - Diverticulose du côlon et de l' *K57.5*
- - - Précision
- - - - Localisation ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q41.9*
- - - - ¬ Tumeur maligne: *C17.9*
- - Type méditerranéen ¬ Maladie immunoproliférative de l' *C88.3*
- - ¬
- - - Absence atrésie sténose congénital
- - - - *Q41*
- - - - Localisations précisées de l' *Q41.8*
- - - Adénocarcinome de l' *C17.9*
- - - Amylose de l' *E85.4†, K93.8**
- - - Angiodysplasie de l' *K55.3*
- - - Carcinome épidermoïde de l' *C17.9*
- - - Corps étranger dans l' *T18.3*
- - - Duplication de l' *Q43.40*
- - - Fistule du vagin à l' *N82.2*
- - - Léiomyosarcome de l' *C17.9*
- - - Lésion traumatique
- - - - *S36.4*
- - - - Intestin grêle: Autres parties et parties multiples de l' *S36.49*
- - - Maladie
- - - - Crohn de l' *K50.0*
- - - - Immunoproliférative de l' *C88.3*
- - - Polype de l' *K63.8*
- - - Syphilis de l' *A52.7†, K93.8**
- - - Tumeur
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.2*
- - - - Malign
- - - - - *C17*
- - - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C17.8*
- - - - - Secondaire de l' *C78.4*
- - - - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l' *C17.9*
- - - Ulcère primaire de l' *K63.3*
- Hernie avec gangrène ¬ Strangulation de l' *K46.1*
- Irritable
- - Constipation prédominante [SII-C] ¬ Syndrome de l' *K58.2*

Intestin *–suite*
- Irritable *–suite*
- - Diarrhée prédominante [SII-D] ¬ Syndrome de l' *K58.1*
- - Troubles du transit changeants (mixtes) [SII-M] ¬ Syndrome de l' *K58.3*
- - ¬ Syndrome de l' *K58*
- Neurogène, non classé ailleurs ¬ *K59.2*
- Non
- - Précis ¬
- - - Carcinoma in situ: Parties de l' *D01.4*
- - - Duplication de l' *Q43.49*
- - Traumatique) ¬ Perforation de l' *K63.1*
- Péritoine et des ganglions mésentériques ¬ Tuberculose de l' *A18.3*
- Précoce associée à IL10 ¬ Maladie inflammatoire de l' *K52.8*
- Rectum ¬ Tumeur maligne secondaire du gros *C78.5*
- SAI
- - Péritonite ¬ Diverticulose de l' *K57.8*
- - ¬
- - - *C26.0*
- - - *D13.9*
- - - *D37.78*
- - - Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q41.9*
- - - Diverticulose de l' *K57.9*
- - - Gros
- - - - *C18.9*
- - - - *D12.6*
- - - Obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l' *Q41*
- Sans précision ¬
- - Maladie de l' *K63.9*
- - Malformation congénitale de l' *Q43.9*
- - Trouble
- - - Fonctionnel de l' *K59.9*
- - - Vasculaire de l' *K55.9*
- Siège non précis
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.83*
- - - - Diverticulose de l' *K57.81*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.82*
- - - - Diverticulose de l' *K57.80*
- - - ¬ Diverticulose de l' *K57.8*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.93*
- - - - Diverticulose de l' *K57.91*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.92*
- - - - Diverticulose de l' *K57.90*
- - - ¬ Diverticulose de l' *K57.9*

Intestin *–suite*

- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- ¬
- - *Z94.88*
- - Abcès
- - - *K63.0*
- - - Tuberculeux de l' *A18.3†, K93.0**
- - Amœbome de l' *A06.3*
- - Atrésies multiples de l' *Q43.8*
- - Diverticule congénital de l' *Q43.8*
- - Diverticulose de l' *K57*
- - Duplication de l' *Q43.4*
- - Échec ou rejet de greffe de: *T86.88*
- - Endométriose de l' *N80.5*
- - Étranglement
- - - Côlon ou de l' *K56.2*
- - - Ischémique de l' *K55.1*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur de l' *Z12.1*
- - Fistule de l' *K63.2*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- - Invagination de: *K56.1*
- - Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros *S36.59*
- - Maladie
- - - *K63*
- - - Crohn
- - - - Entérite régionale] du: gros *K50.1*
- - - - Gros *K50.1*
- - - - Intestin grêle et du gros *K50.82*
- - - Précisées de l' *K63.8*
- - Malformation congénital
- - - *Q43*
- - - Fixation de l' *Q43.3*
- - - Précisées de l' *Q43.8*
- - Mycose de l' *B49†, K93.8**
- - Obstructions de l' *K56.4*
- - Occlusion du côlon ou de l' *K56.6*
- - Paralysie: *K56.0*
- - Rétrécissement du côlon ou de l' *K56.6*
- - Sténose du côlon ou de l' *K56.6*
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, K93.8**
- - TBC [Tuberculose] de l' *A18.3†, K93.0**
- - Torsion du côlon ou de l' *K56.2*
- - Transposition de: *Q43.8*
- - Trouble
- - - Fonctionnel
- - - - *K59*
- - - - Précisés de l' *K59.8*
- - - Vasculaire
- - - - *K55.8*
- - - - Aigus de l' *K55.0*
- - - - Chroniques de l' *K55.1*

Intestin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Ulcère
- - - *K63.3*
- - - Tuberculeux de l' *A18.3†, K93.0**

Intestinal
v. Type de maladie

Intestino-génitales chez la femme ¬ Autres fistules *N82.4*

Intolérance

- Alimentaire
- - Non classées ailleurs ¬ Autres réactions d' *T78.1*
- - ¬ Choc anaphylactique dû à une *T78.0*
- Amidon ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Congénital
- - Glucose-galactose ¬ *E74.3*
- - Saccharose-isomaltose ¬ *E74.3*
- Effort
- - Type suédois ¬ Myopathie avec *G71.3*
- - ¬ Myopathie mitochondriale autosomique dominante avec *G71.3*
- Fructose ¬ *E74.1*
- Galactose ¬ *E74.2*
- Glucides ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Gluten ¬ *K90.0*
- Héréditaire
- - Fructose ¬ *E74.1*
- - Lévulose ¬ *E74.1*
- Lactose
- - Sans précision ¬ *E73.9*
- - ¬ Autres *E73.8*
- Lentilles de contact ¬ *H18.8*
- Lipides ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Non classée ailleurs ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Orthostatique par déficit en NET ¬ *I95.1*
- Protéines dibasiques avec lysinurie] ¬ LP [*E72.0*
- Protides ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Saccharose ¬ *E74.3*
- Sérum ¬ *T88.1*
- Sucrose ¬ *E74.3*
- Vaccins ¬ *T88.1*

Intoxication

- 5-fluorouracile ¬ *T45.1*
- Acide valproïque ¬ *T42.6*
- Agent
- - Bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ *T44.8*
- - Diagnostic ¬ *T50.8*
- - Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ *T44.3*
- - Principalement
- - - Alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ *T44.4*

Intoxication *–suite*

- Agent *–suite*
- - Principalement *–suite*
- - - Bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ *T44.5*
- Aiguë par le fruit d'akée ¬ *T62.2*
- Alimentaire
- - Bacillus cereus ¬ *A05.4*
- - Classique à Clostridium botulinum ¬ *A05.1*
- - Clostridium perfringens [Clostridium welchii] ¬ *A05.2*
- - Staphylocoques ¬ *A05.0*
- - Toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi ¬ infection ou *A02*
- - Vibrio parahaemolyticus ¬ *A05.3*
- Alpha-bloquants, non classés ailleurs ¬ *T44.6*
- Aminosides ¬ *T36.5*
- Analeptiques et antagonistes des opiacés ¬ *T50.7*
- Analgésique non opioïde
- - Antipyrétique
- - - Antirhumatismal
- - - - Sans précision ¬ *T39.9*
- - - - ¬ *T39*
- - - Non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs ¬ *T39.8*
- - ¬ *T39.9*
- Androgènes et autres anabolisants ¬ *T38.7*
- Anesthésique
- - Gaz thérapeutiques ¬ *T41*
- - Gazeux ¬ *T41.0*
- - Généraux, autres et sans précision ¬ *T41.2*
- - Inhalés ¬ *T41.0*
- - Intraveineux ¬
- - - *T41.1*
- - Local ¬ *T41.3*
- - Locaux ¬ *T41.3*
- - Sans précision ¬ *T41.4*
- Anorexigènes ¬ *T50.5*
- Antagonistes
- - Anticoagulants, vitamine K et autres coagulants ¬ *T45.7*
- - Hormonaux, autres et sans précision ¬ *T38.9*
- Anthelminthiques ¬ *T37.4*
- Antiacides et antisécrétoires gastriques ¬ *T47.1*
- Antiarythmisants, non classés ailleurs ¬ *T46.2*
- Antiasthmatiques, non classés ailleurs ¬ *T48.6*
- Antibiotique
- - Antifongiques administrés par voie générale ¬ *T36.7*
- - Systémique
- - - Sans précision ¬ *T36.9*
- - - ¬

Intoxication *–suite*
- Antibiotique *–suite*
- - Systémique *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - *T36*
- - - - *T36.8*
- Anticholinestérasiques ¬ *T44.0*
- Anticoagulants ¬ *T45.5*
- Antidépresseurs
- - Inhibiteurs de la monoamine-oxydase ¬ *T43.1*
- - Non précisés ¬ *T43.2*
- - Tricycliques et tétracycliques ¬ *T43.0*
- Antidiarrhéiques ¬ *T47.6*
- Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs ¬ *T50.6*
- Anti-épileptiques
- - Association, non classés ailleurs ¬ *T42.5*
- - Sédatif hypnotiques
- - - Antiparkinsoniens ¬ *T42*
- - - Sans précision ¬ *T42.7*
- - - ¬ *T42.6*
- Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ *T38.6*
- Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants ¬ *T46.6*
- Antihypertenseurs, non classés ailleurs ¬ *T46.5*
- Anti-infectieux antiparasitaire systémique
- - Précisés ¬ *T37.8*
- - Sans précision ¬ *T37.9*
- - ¬ *T37*
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] ¬ *T39.3*
- Antimycobactériens ¬ *T37.1*
- Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang ¬ *T37.2*
- Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire ¬ *T42.8*
- Antiprotozoaires ¬ *T37.3*
- Antiprurigineux ¬ *T49.1*
- Antirhumatismaux, non classés ailleurs ¬ *T39.4*
- Anti-thyroïdiens ¬ *T38.2*
- Antitussifs ¬ *T48.3*
- Antiviraux ¬ *T37.5*
- Astringents et détergents locaux ¬ *T49.2*
- Bactérien origine alimentaire
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *A05*
- - Précisées ¬ Autres *A05.8*
- - Sans précision ¬ *A05.9*
- Barbituriques ¬
- - *T42.3*
- Benzodiazépines ¬
- - *T42.4*
- Bêta-bloquants, non classés ailleurs ¬ *T44.7*
- Biocides ¬ *T60.9*

Intoxication *–suite*
- Cannabis
- - Dérivés) ¬ *T40.7*
- - ¬ *T40.7*
- Carbamazépine ¬ *T42.1*
- Céphalosporines et autres bêtalactamines ¬ *T36.1*
- Chlorofluorocarbures ¬ *T53.5*
- Cocaïne ¬ *T40.5*
- Colchicine ¬ *T50.4*
- Colle ¬ *T65.8*
- Colorants ¬ *T65.6*
- Contraceptifs oraux ¬ *T38.4*
- Cuivre ¬ *T56.4*
- Dérivé
- - 4-aminophénol ¬ *T39.1*
- - Cannabis ¬ *T40.7*
- - Hydantoïne ¬
- - - *T42.0*
- - Pyrazolés ¬ *T39.2*
- Dioxyde carbone ¬
- - *T41.5*
- - Démence au cours d' *T58†, F02.8**
- Diurétiques
- - Anse ¬ *T50.1*
- - Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision ¬ *T50*
- Emétiques ¬ *T47.7*
- Emollients, calmants et protecteurs ¬ *T49.3*
- Engrais ¬ *T65.8*
- Enzymes, non classées ailleurs ¬ *T45.3*
- Expectorants ¬ *T48.4*
- Fentanyl ¬ *T40.2*
- Fer et ses composés ¬ *T45.4*
- Ganglioplégiques, non classés ailleurs ¬ *T44.2*
- Gaz thérapeutique ¬
- - *T41.5*
- Glucocorticoïdes et analogues synthétiques ¬ *T38.0*
- Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire ¬ *T46.0*
- Groupe du chloramphénicol ¬ *T36.2*
- Héroïne ¬ *T40.1*
- Hormone
- - Substituts synthétiques
- - - Antagonistes, non classés ailleurs ¬ *T38*
- - - Sans précision ¬ *T38.8*
- - Thyroïdiennes et leurs dérivés ¬ *T38.1*
- Iminostilbènes ¬
- - *T42.1*
- Inhibiteur
- - Anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ *T50.2*
- - Calciques ¬ *T46.1*
- - Enzyme de conversion ¬ *T46.4*

Intoxication *–suite*
- Inhibiteur *–suite*
- - Récepteurs histaminiques H2 ¬ *T47.0*
- Insecticide ¬ *T60.2*
- Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] ¬ *T38.3*
- Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ¬ *T49.4*
- Laxatifs
- - Salins et osmotiques ¬ *T47.3*
- - Stimulants ¬ *T47.2*
- - ¬ *T47.4*
- Lithium ¬ *T43.8*
- LSD [diéthylamide de l'acide lysergique] ¬ *T40.8*
- Lysergide
- - LSD] ¬ *T40.8*
- - ¬ *T40.8*
- Macrolides ¬ *T36.3*
- Médicament
- - Agissant
- - - Essentiellement sur système nerveux autonome
- - - - Sans précision ¬ *T44.9*
- - - - ¬ *T44*
- - - Sur
- - - - Fibrinolyse ¬ *T45.6*
- - - - Métabolisme de l'acide urique ¬ *T50.4*
- - Antiallergiques et antiémétiques ¬ *T45.0*
- - Antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ *T49.0*
- - Antitumoraux et immunosuppresseurs ¬ *T45.1*
- - Contre le coryza [rhume banal] ¬ *T48.5*
- - Dentaires à usage topique ¬ *T49.7*
- - Facilitant la digestion ¬ *T47.5*
- - Préparation
- - - Ophtalmologiques ¬ *T49.5*
- - - Utilisés en oto-rhino-laryngologie ¬ *T49.6*
- - Psychotrope
- - - Non classés ailleurs ¬ *T43.8*
- - - Sans précision ¬ *T43.9*
- - Substance biologique
- - - Sans précision ¬ *T50.9*
- - - ¬ Séquelles d' *T96*
- Médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né ¬ Réactions et *P93*
- Mescaline ¬ *T40.9*
- Métaux lourds ¬ *T56.9*
- Méthadone ¬ *T40.3*
- Méthanol ¬ *T51.1*
- Méthaqualone ¬ *T42.6*
- Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes ¬ *T50.0*
- Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires] ¬ *T48.1*

Intoxication *–suite*
- Narcotiques
- - Psychodysleptiques [hallucinogènes] ¬ *T40*
- - Sans précision ¬ *T40.6*
- - Synthétiques ¬ *T40.4*
- Neuroleptiques
- - Type butyrophénone et thioxanthène ¬ *T43.4*
- - ¬ *T43.5*
- Nucléides transuraniens de métaux lourds ¬ *T66*
- Ocytociques ¬ *T48.0*
- Œstrogènes et progestatifs ¬ *T38.5*
- Opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et *P04.0*
- Opioïdes ¬ *T40.2*
- Opium ¬ *T40.0*
- Origine alimentaire à Clostridium difficile ¬ *A04.7*
- Oxazolidine ¬ *T42.2*
- Oxygène ¬ *T41.5*
- Paraquat ¬ *T60.3*
- Parasympathomimétiques [cholinergiques] ¬ *T44.1*
- Peinture ¬ *T65.6*
- Pénicillines ¬ *T36.0*
- Pesticide ¬ *T60.9*
- Plomb ¬ *T56.0*
- Poisson
- - Coquillages ¬ Autres *T61.2*
- - Scombridés ¬ *T61.1*
- Produit
- - Agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique ¬ *T50.3*
- - Protection du bois ¬ *T60.9*
- Psilocine ¬ *T40.9*
- Psilocybine ¬ *T40.9*
- Psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et sans précision ¬ *T40.9*
- Psycholeptiques neuroleptiques
- - Dérivés de la phénothiazine ¬ *T43.3*
- - Non précisés ¬ *T43.5*
- Psychostimulants présentant un risque d'abus ¬ *T43.6*
- Rifamycines ¬ *T36.6*
- SAI ¬ *T65.9*
- Salicylés ¬ *T39.0*
- Savon ¬ *T55*
- Sérique ¬ *T80.6*
- Somnifères
- - Intention suicidaire ¬ *T42.7*
- - ¬ *T42.7*
- Substance
- - Agissant essentiellement sur
- - - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ *T48.7*
- - - Muscle

Intoxication *–suite*
- Substance *–suite*
- - Agissant essentiellement sur *–suite*
- - - Muscle *–suite*
- - - - Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ *T48*
- - - - Sans précision ¬ *T48.2*
- - - Système cardio-vasculaire
- - - - Sans précision ¬ *T46.9*
- - - - ¬ *T46*
- - - Tractus gastro-intestinal
- - - - Sans précision ¬ *T47.9*
- - - - ¬ *T47.8*
- - Antivariqueuses, y compris les agents sclérosants ¬ *T46.8*
- - Essentiellement systémique hématologique
- - - Non classées ailleurs ¬ *T45*
- - - Sans précision ¬ *T45.9*
- - - ¬ *T45.8*
- - Usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ *T49*
- Succinimide
- - Oxazolidine-diones ¬ *T42.2*
- - ¬ *T42.2*
- Sulfamides ¬ *T37.0*
- Systémique au monochloroacétate ¬ *T60.3*
- Tétracyclines ¬ *T36.4*
- Thiobarbituriques ¬ *T41.1*
- Topique
- - Sans précision ¬ *T49.9*
- - ¬ *T49.8*
- Tranquillisants ¬ *T43.5*
- Vaccin ¬ *T50.9*
- Vasodilatateur
- - Coronariens, non classés ailleurs ¬ *T46.3*
- - Périphériques ¬ *T46.7*
- Vitamines, non classées ailleurs ¬ *T45.2*
- ¬ Mise en observation pour suspicion de: *Z03.6*

Intra-abdominal
- Actes médicaux ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- Non précisé ¬ Lésion traumatique d'un organe *S36.9*
- Organe
- - Intrathoraciques et pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et *T06.5*
- - S) pelvien(s) ¬ Lésion traumatique d'organe(s) *S39.6*
- Pelvien ¬
- - Séquelles de lésion traumatique d'organes *T91.5*
- - Tuméfaction et masse *R19.0*
- SAI ¬ Tuméfaction diffuse ou généralisée: *R19.0*
- ¬

Intra-abdominal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hernie: *K46*
- - Lésion traumatique
- - - Multiples organes *S36.7*
- - - Organe
- - - - *S36*
- - - - *S36.8*
- - - - *S36.88*
- - Plaie ouverte
- - - Communicant avec une fracture, une luxation ou plaie *S31*
- - - Toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion *S31.83!*
- - Tumeur
- - - Lipomateuse bénigne des organes *D17.5*
- - - Maligne: Ganglions lymphatiques *C77.2*

Intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs ¬ Infection *P39.2*

Intra-articulaire
- Genou ¬
- - Corps
- - - Étranger riziforme *M23.4*
- - - Libre *M23.4*
- - Souris *M23.4*
- Récidivante du genou ¬ Lésion *M23.99*
- ¬
- - Fracture *S52.59*
- - Souris *M24.0*

Intracanalaire
- Papillaire mucineux du pancréas ¬ Carcinome *C25.3*
- Prostate [IDC-P] ¬ Carcinome *C61*
- ¬ Carcinome in situ *D05.1*

Intracapsulaire ¬ Fracture du col du fémur: *S72.01*

Intracardiaque
- Non classée ailleurs ¬ Thrombose *I51.3*
- ¬ Anomalies (de): épreuves électrophysiologiques *R94.3*

Intracellulaire ¬ Maladie due au VIH avec infection à Mycobacterium avium *B20, A31.0*

Intracellulare [bacille de Battey] ¬ Infection à Mycobacterium: *A31.0*

Intracérébelleuse ¬ Hémorragie *S06.34*

Intracérébral
- Cérébelleuse ¬ Hémorragie *I61.4*
- Hémisphérique
- - Corticale ¬ Hémorragie *I61.1*
- - Non précisée ¬ Hémorragie *I61.2*
- - Sous-corticale ¬ Hémorragie *I61.0*
- Intraventriculaire ¬ Hémorragie
- - *I61.5*
- - Sous-épendymaire avec extension *P52.2*
- Localisations multiples ¬ Hémorragie *I61.6*
- Massive ¬ Hémorragie *I61.6*

Intracérébral *–suite*
- Multiple ¬ hémorragie
- - *I61.6*
- - *S06.23*
- Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.4*
- Profonde ¬ Hémorragie *I61.0*
- Sans précision ¬ Hémorragie *I61.9*
- Superficielle ¬ Hémorragie (du): *I61.1*
- Traumatiques multiples ¬ Hémorragies *S06.23*
- Tronc cérébral ¬ Hémorragie *I61.3*
- ¬
- - Hématome *S06.33*
- - Hémorragie
- - - *I61*
- - - *I61.8*
- - - *S06.33*
- - Séquelles d'hémorragie *I69.1*

Intracorporelle ¬
- Adaptation d'une pompe *Z45.02*
- Pompe
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*

Intracrânien
v. Type de maladie
- ¬
- - Carcinome
- - - Épidermoïde du foie et des voies biliaires *C22.0, C22.1*
- - - Indifférencié du foie et des voies biliaires *C22.9, C22.1*
- - Cystadénome des voies biliaires *D13.4*
- - Tumeur malign
- - - Foie et des voies biliaires *C22*
- - - Secondaire du foie et des voies biliaires *C78.7*

Intraligamentaire ¬ Grossesse: *O00.8*

Intramural
- Utérus ¬ Léiomyome *D25.1*
- ¬ Coronaire *Q24.5*

Intramyocardique ¬ Coronaire *Q24.5*

Intraneural ¬ Périneuriome *D36.1*

Intra-oculaire
- Corps étranger
- - Magnétique ¬ Rétention (ancienne) *H44.6*
- - Non magnétique ¬ Rétention (ancienne) *H44.7*
- ¬ Médulloépithéliome *C69.9*

Intraosseux ¬ Hémangiome *D18.08*

Intrapelviens ¬ Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques *C77.5*

Intrapéritonéale ¬ *S37.22*

Intrapulmonaire (congénital) ¬ Tissu ectopique *Q33.5*

Intrarachidien
- Cours d'affections classées ailleurs ¬ Abcès et granulome intracrâniens et *G07**

Intrarachidien *–suite*
- Épidural ¬ Abcès ou granulome *G06.1*
- Extra-dural ¬ Abcès ou granulome *G06.1*
- Origine non pyogène ¬ Phlébite et thrombophlébite *G95.18*
- Sous-dural ¬ Abcès ou granulome *G06.1*
- ¬
- - Abcès granulome
- - - *G06.1*
- - - Intracrâniens et *G06*
- - Embolie septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - Endophlébite septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - Phlébite
- - - Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - - Thrombophlébite intracrâniennes et *G08*
- - Thrombophlébite septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - Thrombose septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*

Intrarénal ¬ Calcul: *N20.0*

Intrasphinctérien ¬ Abcès *K61.4*

Intraspinal syphilitique ¬ Granulome *A52.1†, G07**

Intrathoracique
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose des ganglions *A15.4*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et *D38*
- Intra-abdominaux ou des organes intrathoraciques et pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes *T06.5*
- Non précis ¬
- - Lésion traumatique organe
- - - *S27*
- - - *S27.9*
- - Tumeur bénigne des organes *D15*
- Pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et intra-abdominaux ou des organes *T06.5*
- Précis
- - Canal thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.82*
- - Diaphragme ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.81*
- - Œsophage, partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.83*
- - Organes et structures intrathoraciques précisées ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.88*
- - Thymus ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.84*
- - ¬
- - - Lésion traumatique organe structurel
- - - - *S27.8*
- - - - Intrathoraciques précisés: Autres organes et structures *S27.88*

Intrathoracique *–suite*
- Précis *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Tumeur bénigne: Autres organes *D15.7*
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A16.3*
- - ¬ *C76.1*
- Sans
- - Mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose des ganglions *A16.3*
- - Précision ¬ Tumeur bénigne: Organe *D15.9*
- Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes *C39*
- Syphilitique ¬ Anévrisme *A52.0†, I79.0**
- ¬
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et *Z80.2*
- - - Personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et *Z85.2*
- - Lésions traumatiques multiples des organes *S27.7*
- - Plaie ouverte
- - - Associée à une fracture ou une luxation ou avec une lésion *S21*
- - - N'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion *S21.83!*
- - Séquelles de lésion traumatique d'organes *T91.4*
- - Tumeur
- - - Lipomateuse bénigne des organes *D17.4*
- - - Malign
- - - - Ganglions lymphatiques *C77.1*
- - - - Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et *C39.8*

Intravasculaire
- Disséminé
- - Fœtus et le nouveau-né ¬ Coagulation *P60*
- - Syndrome de défibrination] ¬ Coagulation *D65*
- - ¬
- - - Coagulation *D65.1*
- - - Glomérulonéphrite au cours de coagulation *D65.1†, N08.2**
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: coagulation *O45.0*
- - - Hémorragie
- - - - Importante) précédant l'accouchement associée à: coagulation *O46.0*
- - - - Pendant l'accouchement (importante) associée à: coagulation *O67.0*
- - - Maladie glomérulaire au cours de coagulation *D65.1†, N08.2**
- Grandes cellules B ¬ Lymphome *C83.8*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Coagulation *O08.1*

Intravasculaire *–suite*
- ¬ Léiomyomatose *D48.1*
Intraveineux ¬ Intoxication anesthésique
- *T41.1*
Intraventriculaire
- Grade 4, de cause non traumatique, chez le nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.2*
- Non traumatique
- - Degré
- - - 1, du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.0*
- - - 2, du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.1*
- - - 3, du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.2*
- - Fœtus et du nouveau-né, sans précision ¬ Hémorragie *P52.3*
- Traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie *P10.2*
- ¬ Hémorragie
- - Intracérébrale *I61.5*
- - Sous-épendymaire
- - - Envahissement *P52.1*
- - - Extension intracérébrale et *P52.2*
- - - Sans envahissement *P52.0*
Intrinsèque
- Allergique) ¬ Eczéma (de): *L20.8*
- Dents SAI ¬ Pigmentation *K00.8*
- Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S66.5*
- Larynx ¬ Musculature *C32.0*
- Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon *S96.2*
- Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S66.4*
- ¬
- - Anémie
- - - Carence en vitamine B12 due à une carence en facteur *D51.0*
- - - Héréditaire juvénile mégaloblastique due à une carence en facteur *D51.0*
- - Asthme non allergique endogène [asthme *J45.1*
- - Carence congénitale en facteur *D51.0*
Intubation
- Cours
- - Grossesse ¬ Echec ou difficulté d' *O29.6*
- - Puerpéralité ¬ Echec ou difficulté d' *O89.6*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Echec ou difficulté d' *O74.7*
- ¬ Echec ou difficulté d' *T88.4*
Inv
- 3)(q21q26.2) ¬ Leucémie myéloïde aiguë associée à *C92.00*
- 16
- - P13q22) ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec éosinophiles médullaires anormaux associée à *C92.50*
Inv *–suite*
- 16 *–suite*
- - T(16;16) ¬ LMA M4 Eo avec *C92.5*
Invagination
- Appendice ¬ *K38.8*
- Basilaire primitive ¬ *Q75.8*
- Côlon ¬ *K56.1*
- Intestin ¬ *K56.1*
- Mamelon associée à l'accouchement ¬ *O92.0*
- Rectum ¬ *K56.1*
- ¬ *K56.1*
Invaginée ¬ Dent: *K00.2*
Invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l' *Z82*
Invasif
- Pneumonie ¬ Aspergillose *B44.0†, J17.2**
- Poumon ¬ Aspergillose *B44.0†, J99.8**
- Récepteurs hormonaux positifs ¬ Carcinome mammaire *C50.9*
- Sein ¬ Comédocarcinome non *D05.1*
- ¬
- - Aspergillose pulmonaire *B44.0*
- - Fibrome *D48.1*
- - Môle
- - - *D39.2*
- - - Hydatiforme: *D39.2*
- - Salmonellose non typhique *A02.8*
Inversa modéré à sévère ¬ Psoriasis *L40.8, L40.70!*
Inverse ¬ Syndrome de Klippel-Trénaunay *Q87.2*
Inversée ¬ Acné *L73.2*
Inversion
- Chromosomique chez un sujet normal ¬ *Q95.1*
- Congénitale des mamelons ¬ *Q83.88*
- Post-partum de l'utérus ¬ *O71.2*
- Psychogène rythme
- - Circadien ¬ *F51.2*
- - Nycthéméral ¬ *F51.2*
- - Sommeil ¬ *F51.2*
- Utérus ¬ *N85.5*
- Ventriculaire ¬ *Q20.5*
Inversus
- Incomplet ¬ Situs *Q89.3*
- Partiel ¬ Situs *Q89.3*
- Total ¬ Situs *Q89.3*
- Totalis ¬ Situs *Q89.3*
- Transversus
- - Abdominal ¬ Situs *Q89.3*
- - Thoracique ¬ Situs *Q89.3*
- ¬
- - Dextrocardie avec situs *Q89.3*
- - Disposition auriculaire en miroir avec situs *Q89.3*
Inversus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lévocardie-situs *Q24.1*
- - Situs *Q89.3*
- - Syndrome
- - - Agnathie-holoprosencéphalie-situs *Q87.8*
- - - Blépharophimosis-ptosis-épicanthus *Q10.3*
Investigation
- Anormal
- - Non précisés ¬ Mouvements *R25.8*
- - ¬ Mouvements *R25*
- Mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien découvert par ECG ou autre moyen d' *I25.2*
- Sujet plaignant rien lesquels aucun diagnostic n est rapporté ¬ Examen
- - Général et *Z00*
- - Spéciaux et *Z01*
- Traitement ¬ Autre période d'attente pour *Z75.2*
Involution ¬ État paranoïaque d' *F22.8*
Iode
- SAI ¬ Hypothyroïdie
- - Carence acquise en *E01.8*
- - Insuffisance congénitale en *E00.9*
- Sans précision ¬ Goitre (endémique) lié à une carence en *E01.2*
- ¬
- - Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en *E01.8*
- - Démence au cours d'hypothyroïdie acquise due à une carence en *E01.8†, F02.8**
- - Goitre
- - - Diffus (endémique) lié à une carence en *E01.0*
- - - Multinodulaire (endémique) lié à une carence en *E01.1*
- - - Nodulaire lié à une carence en *E01.1*
- - Hypothyroïdie par carence inapparente en *E02*
- - Inflammation des glandes salivaires au cours d'une réaction à des dépôts d' *K11.2*
Ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie-retard de croissance-sensibilité aux radiations *D81.1*
IPAH ¬ *I27.0*
Iperchilomicronemia familiare ¬ *E78.3*
Irapa ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*
IRD ¬ *G60.1*
Irido-cornéo-endothélial ¬ Syndrome *H21.8*
Iridocyclite
- Aiguë et subaiguë ¬ *H20.0*
- Chronique ¬
- - *H20.1*
- - Cataracte (au cours de): *H26.2*
- Cours
- - Herpès zoster ¬ *B02.3†, H22.0**

Iridocyclite *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie
- - - Infectieux
- - - - Parasitaires classées ailleurs ¬ *H22.0**
- - - - ¬ *B99†, H22.0**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, H22.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H22.1**
- - Spondylarthrite ankylosante ¬ *M45.09†, H22.1**
- Gonocoques ¬ *A54.3†, H22.0**
- Gonorrhéique ¬ *A54.3†, H22.0**
- Lentilles de contact ¬ *H20.2*
- Sans précision ¬ *H20.9*
- Sarcoïdose ¬ *D86.8†, H22.1**
- Syphilitique
- - Congénitale tardive ¬ *A50.3†, H22.0**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, H22.0**
- - ¬ *A51.4†, H22.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H22.0**
- Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H22.0**
- ¬
- - *H20*
- - *H20.8*

Iridodialyse ¬ *H21.5*

Iridoschisis ¬ *H21.2*

Iris
- Antérieures ¬ Synéchies (*H21.5*
- Bombé ¬ *H21.4*
- Corps ciliaire
- - Chambre antérieur œil
- - - Exsudatif ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - Implant ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - Parasitaire ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - SAI ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de l' *H22.8**
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H21.9*
- - ¬
- - - Adhérences et perturbations de l' *H21.5*
- - - Affection
- - - - *H21*
- - - - Dégénératives de l' *H21.2*
- - - - Précisées de l' *H21.8*
- - - - Vasculaires de l' *H21.1*
- - - Néovascularisation de l' *H21.1*
- Diphtérie ¬ Paralysie de l' *A36.8†, H22.8**
- Essentielle) (progressive) ¬ Atrophie de l' *H21.2*
- Pigmentaire) ¬ Dégénérescence de: *H21.2*
- Postérieures ¬ Synéchies (*H21.5*
- SAI ¬
- - Malformation congénitale de l' *Q13.2*
- - Synéchies (*H21.5*

Iris *–suite*
- ¬
- - Absence d' *Q13.1*
- - Anomalie congénitale de l' *Q13.2*
- - Colobome de l' *Q13.0*
- - Dépigmentation aiguë bilatérale des *H21.2*
- - Érythème de l' *L51.1†, H22.8**
- - Gomme de l' *A52.7†, H22.8**
- - Malformations congénitales de l' *Q13.2*
- - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: *H44.7*
- - Rubéose de l' *H21.1*
- - Syphilis secondaire de l' *A51.4†, H22.0**
- - Translucidité de l' *H21.2*
- - Tuberculose de l' *A18.5†, H22.0**

Irite
- Diabétique ¬ *E14.30†, H22.1**
- Gonocoques ¬ *A54.3†, H22.0**
- Gonorrhéique ¬ *A54.3†, H22.0**
- Goutteuse ¬ *M10.99†, H22.1**
- Syphilitique
- - Congénital
- - - Précoce ¬ *A50.0†, H22.0**
- - - Tardive ¬ *A50.3†, H22.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, H22.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H22.0**

Iritis
- Aiguë, subaiguë ou à répétition ¬ *H20.0*
- Papulosa ¬ *A52.7†, H22.0**
- Syphilitique secondaire ¬ *A51.4†, H22.0**
- Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H22.0**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H22.0**

Irons-Bhan ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Ironton
v. Houlston-Ironton-Temple

Irradiation
- Ionisante ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Isotopes ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Rayons X ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Sans précision ¬ Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une *L59.9*
- ¬
- - Affection
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une *L59*
- - - Précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une *L59.8*
- - - Pulmonaire
- - - - Aiguës dues à une *J70.0*
- - - - Chroniques et autres dues à une *J70.1*
- - Antécédents personnels d' *Z92.3*
- - Cyphose après *M96.2*
- - Cystite due à une *N30.4*
- - Fibrose du poumon après *J70.1*
- - Gastroentérite et colite dues à une *K52.0*

Irradiation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hypopituitarisme après *E89.3*
- - Hypothyroïdie après: *E89.0*
- - Leucémie secondaire due à l' *C95.90*
- - Ostéonécrose de la mâchoire due à l' *K10.28*
- - Phénomène de rappel d' *T78.8*
- - Pneumopathie par *J70.0*
- - Polynévrite due à une *G62.8*
- - Rectite due à une *K62.7*
- - Scoliose après *M96.5*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une *O35.6*

Irradié ¬ Émail *K03.8*

Irréductible
- Sans gangrène ¬ Hernie
- - Crurale (unilatérale): *K41.3*
- - Diaphragmatique: *K44.0*
- - Incisionnelle: *K43.0*
- - Inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - Ombilicale: *K42.0*
- - Parastomale: *K43.3*
- ¬ Douleur chronique *R52.1*

Irrégularité
- Crête alvéolaire ¬ *K08.8*
- Menstruel
- - Précisées ¬ Autres *N92.5*
- - Sans précision ¬ *N92.6*
- Rythme
- - Cardiaque fœtale ¬ *O68.0*
- - Veille-sommeil ¬ *G47.2*

Irrégulier
- Ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée *E88.21*
- Règles ¬ Intervalles raccourcis et *N92.1*
- SAI ¬
- - Règles *N92.6*
- - Saignements *N92.6*
- ¬
- - Dentine secondaire ou *K04.3*
- - Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel *N92.1*
- - Saignements intermenstruels *N92.1*
- - Travail *O62.2*

Irréversible
- Fonction cérébrale ¬ Perte *G93.88*
- ¬ Pulpite *K04.0*

Irritabilité
- Cérébrale du nouveau-né ¬ *P91.3*
- Colère ¬ *R45.4*

Irritable
- Constipation prédominante [SII-C] ¬ Syndrome de l'intestin *K58.2*

Irritable *–suite*
- Diarrhée prédominante [SII-D] ¬ Syndrome de l'intestin *K58.1*
- Explosive) ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.30*
- Troubles du transit changeants (mixtes) [SII-M] ¬ Syndrome de l'intestin *K58.3*
- ¬
- - Côlon *K58*
- - Formes psychogènes de: "côlon *F45.3*
- - Hanche *M65.8*
- - Nourrisson *R68.1*
- - Syndrome de l'intestin *K58*

Irritable bowel syndrome with mixed bowel habits [IBS-M] ¬ *K58.3*

Irritable bowel syndrome with predominant constipation [IBS-C] ¬ *K58.2*

Irritable bowel syndrome with predominant diarrhoea [IBS-D] ¬ *K58.1*

Irritant
- Contact
- - Agents ¬ Dermite *L24.8*
- - Aliments en contact avec la peau ¬ Dermite *L24.6*
- - Cause non précisée ¬ Dermite *L24.9*
- - Cosmétiques ¬ Dermite *L24.3*
- - Détergents ¬ Dermite *L24.0*
- - Huiles et aux graisses ¬ Dermite *L24.1*
- - Médicaments en contact avec la peau ¬ Dermite *L24.4*
- - Produits chimiques ¬ Dermite *L24.5*
- - SAI ¬ Eczéma *L24.9*
- - Solvants ¬ Dermite *L24.2*
- - Végétaux, sauf aliments ¬ Dermite *L24.7*
- - ¬
- - - Dermite *L24*
- - - Eczéma *L24*
- Exogène, n.c.a. ¬ Dermite toxique due à un *L24.9*

Irritation
- Crête édentée (due à une prothèse) ¬ Hyperplasie par *K06.2*
- Gastro-intestinale psychogène ¬ *F45.37*
- Nerf périphérique ¬ *G58.9*
- Racine nerveuse lombaire ¬ Syndrome d' *M51.1†, G55.1**
- ¬ Eczéma d' *L30.4*

IRVAN ¬ Syndrome *H35.0*

Isaacs] ¬ Neuromyotonie [*G71.1*

Ischémie
- Cérébral
- - Chronique) ¬ *I67.88*
- - Néonatale ¬ *P91.0*
- - Transitoire SAI ¬ *G45.9*
- Infarctus du rein ¬ *N28.0*
- Intestin grêle aigu(ë) ¬ *K55.0*
- Myocardique asymptomatique ¬ *I25.6*

Ischémie *–suite*
- Transitoire du myocarde du nouveau-né ¬ *P29.4*
- Traumatique muscle
- - Cuisse et de la hanche ¬ *T79.61*
- - Jambe ¬ *T79.62*
- - Localisation
- - - Non précisée ¬ *T79.69*
- - - ¬ *T79.68*
- - Membre supérieur ¬ *T79.60*
- - Pied ¬ *T79.63*
- - ¬ *T79.6*

Ischémique
- Aigu
- - Sans précision ¬ Cardiopathie *I24.9*
- - ¬
- - - Cardiopathies *I24*
- - - Formes de cardiopathies *I24.8*
- Cadre d'une artériopathie oblitérante ¬ Douleurs *I70.29*
- Cérébral transitoire
- - AIT] ¬ Accidents *G45*
- - Sans précision ¬ Accident *G45.9*
- - Syndrome apparent ¬ accident
- - - *G45*
- - - *G45.8*
- Chronique
- - Sans précision ¬ Cardiopathie *I25.9*
- - ¬
- - - Cardiopathie *I25*
- - - Colite *K55.1*
- - - Entérite *K55.1*
- - - Entérocolite *K55.1*
- - - Formes de cardiopathie *I25.8*
- Cœur (chronique) SAI ¬ Maladie *I25.9*
- Effort distance marche 200 m
- - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur *I70.21*
- - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur *I70.22*
- Fulminante aigu(ë) ¬ Colite *K55.0*
- Hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ Encéphalopathie anoxo- *P91.6*
- Intestin ¬ Étranglement *K55.1*
- Musculaire (non traumatique) ¬ Infarcissement *M62.2*
- Nouveau-né ¬ Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique *P91.6*
- SAI ¬
- - Colite *K55.9*
- - Entérite *K55.9*
- - Entérocolite *K55.9*
- Subaiguë ¬ Colite *K55.0*
- Transitoire
- - Territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux ¬ Accident *G45.2*
- - ¬ Surdité *H93.0*

Ischémique *–suite*
- Volkmann en tant que complication de blessure ¬ Paralysie *T79.60*
- ¬
- - Apoplexie *I63.9*
- - AVC *I63.9*
- - Douleur thoracique *I20.9*
- - Myocardiopathie *I25.5*
- - Neuropathie optique
- - - *H47.0*
- - - Non *H46*
- - Ostéonécrose *M87*
- - Paralysie musculaire *T79.60*
- - Syndrome de Volkmann [rétraction musculaire *T79.60*

Ischiadicus ¬ Zoster *B02.2†, G59.8**

Ischiale ¬ Bursite *M70.7*

Ischialgie due à une atteinte des disques intervertébraux ¬ Lumbago avec *M51.1†, G55.1**

Ischiocapsulaire ¬ Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) *S73.12*

Ischion ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: *S32.81*

Ischio-patellaire ¬ Dysplasie *Q74.1*

Ischiophthisis] ¬ Coxitis tuberculosa [*A18.0†, M01.15**

Ischio-pubienne [van Neck] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*

Ischio-rectal
- Tuberculeux ¬ Abcès *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Abcès
- - - *K61.3*
- - - Fosse *K61.3*
- - Tuberculose *A18.3†, K93.0**

Iselin] ¬ Ostéochondrite (juvénile) du: cinquième métatarsien [*M92.7*

ISG15 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en *D84.8*

Iso Xq ¬ Caryotype 46 X
- *Q96.1*
- Chromosome sexuel anormal, sauf *Q96.2*

Isobutyrique ¬ Acidurie *E71.1*

Isobutyryl-CoA déshydrogénase ¬ Déficit en *E71.1*

Isochromosome 21 ¬ *Q99.8*

Isochromosomie Yq ¬ *Q98.6*

Iso-immunisation
- ABO
- - Fœtus et du nouveau-né ¬ *P55.1*
- - ¬ *O36.1*
- Anti-Rh ¬ Soins maternels pour *O36.0*
- Rhésus du fœtus et du nouveau-né ¬ *P55.0*
- SAI (avec anasarque fœto-placentaire) ¬ *O36.1*
- ¬

Iso-immunisation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anasarque fœto-placentaire
- - - *P56.0*
- - - Non associée à une *O36.2*
- - Dépistage prénatal d' *Z36.5*
- - Ictère nucléaire dû à une *P57.0*
- - Soins maternels pour une autre *O36.1*
- - Thrombopénie néonatale due à: *P61.0*

Isolé
v. Type de maladie

Isolement prophylactique ¬ *Z29.0*

Isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l' *Z29.0*

Isolés
- Dépression
- - Majeure avec symptômes psychotiques ¬ Episodes *F32.3*
- - Masquée" SAI ¬ Episodes *F32.8*
- - Psychogène ¬ épisodes *F32*
- - Psychotique ¬ Episodes *F32.3*
- - Réactionnelle ¬ épisodes *F32*
- Psychose dépressif
- - Psychogène ¬ Episodes *F32.3*
- - Réactionnelle ¬ Episodes *F32.3*
- Réaction dépressive (F32.0, F32.1, F32.2) ¬ épisodes *F32*
- ¬ Autres troubles de l'humeur [affectifs] *F38.0*

Isoleucinémie ¬ Hyperleucine- *E71.1*

Isomaltase
v. saccharase-isomaltase

Isomaltose
v.a. saccharose-isomaltose
- ¬ Malabsorption d' *E74.3*

Isomérase ¬
- Anémie
- - Déficit en: triose-phosphate *D55.2*
- - Hémolytique due à un déficit en phosphoglucose *D55.2*
- Déficit
- - Phosphomannose *E77.8*
- - Ribose-5-phosphate *E74.8*

Isomérisme auricule cardiaque
- Asplénie ou polysplénie ¬ *Q20.6*
- ¬ *Q20.6*

Isopropylique ¬ Alcool *T51.2*

Isosexuelle précoce chez l'homme ¬ pseudo-puberté *E25*

Isospora
- Belli et Isospora hominis ¬ Infection due à *A07.3*
- Hominis ¬ Infection due à Isospora belli et *A07.3*
- ¬
- - Infection à *A07.3*

Isospora *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie due au VIH avec infection à *B20, A07.3*

Isosporose ¬ *A07.3*

Isotopes ¬ Exposition à : irradiation par *W91.9!*

Isotrétinoïne ¬ Embryofœtopathie à l' *Q86.88*

Isovalérique ¬ Acidémie: *E71.1*

Isovaléryl-CoA déshydrogénase ¬ Déficit en *E71.1*

Issue
v.a. Double issue

Isthme
- Aortique (avant le canal) (après le canal) ¬ Coarctation de l' *Q25.1*
- Utérus ¬ Tumeur maligne: *C54.0*

Itch ¬
- Dhobie *B35.6*
- Eczéma marginé de Hebra [Jock *B35.6*

Itinérant ¬ Patient *F68.1*

Ivemark ¬ Syndrome d' *Q20.6*

Jabs
v. Cooper-Jabs

Jaccoud] ¬ Arthropathie chronique post-rhumatismale [*M12.0*

Jackson ¬

- Membrane de *Q43.3*
- Paralysie de *G83.8*

Jackson-Weiss ¬ Syndrome de *Q87.8*

Jacobsen ¬ Syndrome de *Q93.5*

Jadassohn
v. Naegeli-Franceschetti-Jadassohn

- Pellizzari ¬ Anétodermie de *L90.2*

Jaffe-Lichtenstein ¬

- Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de *Q78.1*
- Maladie de *M85.09*

JAG1 ¬

- Dysplasie artério-hépatique due à une mutation ponctuelle de *Q44.7*
- Paucité des voies biliaires syndromique due à une mutation ponctuelle de *Q44.7*
- Syndrome d'Alagille-Watsons dû à une mutation ponctuelle de *Q44.7*

JAGN1 ¬ Neutropénie congénitale sévère autosomique récessive par déficit en *D70.0*

JAK3 ¬ Déficit immunitaire combiné sévère T-B+ par déficit en *D81.2*

Jakob
v. Creutzfeldt-Jakob

Jalousie dans la fratrie ¬ *F93.3*

Jambe

- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.81*
- Arquée syphilitique ¬ *A50.5†, M90.29**
- Artificielle (totale) (partielle) ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z44.1*
- Cassée SAI ¬ *T12*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.84*
- Cours du sommeil ¬ Mouvements périodiques des *G25.80*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.82*
- Genou ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.06*
- Insuffisance veineuse ¬ Ulcère de *I87.21*
- Mixte de type bassin-jambe ¬ Ulcère de *I70.24*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.83*
- Muscles antérieurs des mains ¬ Myopathie distale avec atteinte des muscles postérieurs des *G71.0*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du genou et de la *T34.7*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de la *S88.9*
- Non variqueux ¬ Ulcère de *I87.21*
- Partie non précis ¬
- - Fracture de la *S82.9*

Jambe *–suite*

- Partie non précis ¬ *–suite*
- - Plaie ouverte de la *S81.9*
- Pied
- - Présent ¬ Absence congénitale de la cuisse et de la *Q72.1*
- - ¬ Absence congénitale de la *Q72.2*
- Post-thrombotique ¬ Ulcère de *I83.0*
- SAI ¬
- - *Z89.6*
- - Amputation traumatique de la *T13.6*
- - Fracture de la *T12*
- - Lésion traumatique de la *T13.9*
- - Plaie ouverte de la *S81*
- Sans
- - Précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S89.9*
- - - Superficielle de la *S80.9*
- - Repos [Restless Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) *G25.81*
- - Varices ¬ Ulcère veineux de la *I87.21*
- Sauf région malléolaire pied
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure de la hanche et de la *T24.20*
- - - Corrosion de la hanche et de la *T24.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ Brûlure de la hanche et de la *T24.20*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure
- - - - - Hanche et de la *T24.21*
- - - - - Hanche et de la *T24.61*
- - - - Corrosion de la hanche et de la *T24.60*
- Toute partie, sauf cheville et pied seuls] ¬ *T24*
- Y compris la cheville ¬ Fracture de la *S82*
- ¬
- - *L03.11*
- - Amputation traumatique de la *S88*
- - Artériopathie oblitérante de type *I70.29*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.15*
- - Contusion de parties autres et non précisées de la *S80.1*
- - Écrasement
- - - *S87*
- - - Parties autres et non précisées de la *S87.8*
- - Fracture
- - - Multiples de la *S82.7*
- - - Ouverte de la *S82.9, S81.87!*
- - - Partie
- - - - *S82.8*
- - - - *S82.88*
- - Gelure superficielle du genou et de la *T33.7*
- - Ischémie traumatique des muscles de la *T79.62*
- - Lésion

Jambe *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de la *S81.84!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de la *S81.87!*
- - - - II
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de la *S81.85!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de la *S81.88!*
- - - - III
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de la *S81.86!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de la *S81.89!*
- - - Traumatique
- - - - Multiple
- - - - - *S89.7*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de la *S86.7*
- - - - - Nerfs au niveau de la *S84.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la *S85.7*
- - - - Muscle
- - - - - S) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la *S86.2*
- - - - - S) et de tendon(s) péroniers au niveau de la *S86.3*
- - - - - Tendon non précisés, au niveau de la *S86.9*
- - - - - Tendons au niveau de la *S86.8*
- - - - Nerf
- - - - - Cutané sensitif au niveau de la *S84.2*
- - - - - Niveau de la *S84.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la *S84.9*
- - - - - Sciatique poplité externe au niveau de la *S84.1*
- - - - - Sciatique poplité interne au niveau de la *S84.0*
- - - - Précisées de la *S89.8*
- - - - S) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la *S86.1*
- - - - Superficiel
- - - - - *S80.88*
- - - - - Multiples de la *S80.7*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau de la *S85.9*
- - - - - Sanguins au niveau de la *S85.8*
- - - - Veine
- - - - - Saphène externe au niveau de la *S85.4*
- - - - - Saphène interne au niveau de la *S85.3*
- - Oblitération d'une artère d'une *I74.3*
- - Occlusion artérielle de la *I74.3*
- - Phlébite profonde de la *I80.28*

Jambe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Phlébothrombose profonde de la *I80.28*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - *S81*
- - - - Non précisée d'autres parties de la *S81.80*
- - - - Parties de la *S81.8*
- - - Ouvertes multiples de la *S81.7*
- - Thrombophlébite profonde de la *I80.28*
- - Thrombose profonde de la *I80.28*
- - Ulcère
- - - Artériel de *I70.24*
- - - Infectieux de *L97*

Jampel
v. Schwartz-Jampel-Aberfeld

Jansen ¬ Chondrodysplasie métaphysaire type *Q78.5*

Jansky ¬ Maladie de: Bielschowsky- *E75.4*

Jansky-Bielschowsky ¬ Maladie de *E75.4*

Japon ¬ Fièvre fluviale du *A75.3*

Japonaise
- Type B ¬ Encéphalite *A83.0*
- ¬ Encéphalite *A83.0*

Japonicum ¬ Schistosomiase due à Schistosoma *B65.2*

Jarcho-Levin ¬ Syndrome de *Q76.8*

Jaune
- Brousse ¬ Fièvre *A95.0*
- Citadine ¬ Fièvre *A95.1*
- Foie ¬ atrophie ou dystrophie *K72*
- Jungle ¬ Fièvre *A95.0*
- Sans précision ¬ Fièvre *A95.9*
- Sylvatique ¬ Fièvre *A95.0*
- ¬
- - Albinisme oculo-cutané *E70.3*
- - Fièvre *A95*
- - Kyste
- - - Corps *N83.1*
- - - Hémorragique du corps *N83.1*
- - Lymphœdème avec ongles *L60.5*
- - Nécessité d'une vaccination contre la fièvre *Z24.3*
- - Syndrome des ongles *L60.5*

Jawad ¬ Syndrome de *Q87.8*

Jeavons ¬ Syndrome de *G40.3*

JEB-nH ¬ *Q81.8*

Jefferson ¬ Fracture de *S12.0*

Jeghers ¬ Syndrome de: Peutz- *Q85.8*

Jéjunal
- E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- ¬ Maladie de Crohn [entérite régionale]: *K50.0*

Jéjunite
- Aspergillus ¬ *B44.8†, K93.8**

Jéjunite *–suite*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*

Jéjunostomie endoscopique percutané sonde PEJ ¬
- Complication mécanique de sonde de *T85.52*
- Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de *T85.74*

Jéjunum ¬
- Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q41.1*
- Imperforation du *Q41.1*
- Tuberculose du *A18.3†, K93.0**
- Tumeur
- - Maligne: *C17.1*
- - Neuroendocrine
- - - *C17.1*
- - - *D13.3*
- - - Incertain du *D37.2*

Jensen
v. Claes-Jensen

Jervell et Lange-Nielsen ¬ Syndrome de *I49.8*

Jessner ¬ Infiltration lymphocytaire cutanée de *L98.6*

Jet urinaire ¬ Troubles du *R39.1*

Jeté) (tombant) ¬ Accident dû à: Objet (*W49.9!*

Jeu
- Compulsif ¬ *F63.0*
- Cours travail
- - Sans précision ¬ Anomalie des forces en *O62.9*
- - ¬ Autres anomalies des forces en *O62.8*
- Hasard ou des paris ¬ Participation à des *Z72.8*
- Pathologique ¬ *F63.0*

Jeune
- Enfant ¬
- - Rhinite syphilitique chez le *A50.0†, J99.8**
- - Taches de Bitot chez le *E50.1*
- Filles ¬ Acné excoriée des *L70.5*
- ¬
- - Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): non insulino-dépendant du sujet *E11*
- - Dysplasie thoracique asphyxiante [*Q77.2*
- - Dystrophie thoracique asphyxiante de *Q77.2*
- - Surveillance d'une primigeste très *Z35.6*

Jirovecii ¬ Pneumonie Pneumocystis
- *B48.5†*
- *B48.5†, J17.2**

Jock itch] ¬ Eczéma marginé de Hebra [*B35.6*

Johanson-Blizzard ¬ Syndrome de *Q87.8*

Johansson
v. Sinding-Larsen-Johansson

Johnson
v.a. Stevens-Johnson
- ¬ Syndrome
- - Dubin- *E80.6*
- - Neuroectodermique de *Q87.8*

Johnson-McMillin ¬ Syndrome de *Q87.8*

Jonction
- Ano-rectale ¬ *C21.8*
- AV par réentrée ¬ Tachycardie de la *I47.1*
- Cardio-œsophagienne ¬ *C16.0*
- Lombosacrée et de ses ligaments ¬ Entorse/foulure et déchirure de la *S33.51*
- Musculo-tendineuse, non traumatique ¬ Déchirure au niveau de la *M66.5*
- Œsophago-gastrique ¬ *C16.0*
- Pelvi-urétérale ¬
- - *C65*
- - Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie de *N11.1*
- - - Coudure de *N11.1*
- - - Obstruction de *N11.1*
- - - Rétrécissement de *N11.1*
- Prémolaire-canine ¬ En avant de la *C04.0*
- Pyélo urétéral ¬
- - Hydronéphrose avec obstruction de la *N13.0*
- - Occlusion congénitale de: *Q62.1*
- - Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie de *N11.1*
- - - Coudure de *N11.1*
- - - Obstruction de *N11.1*
- - - Rétrécissement de *N11.1*
- Recto-sigmoïdien ¬
- - *D37.5*
- - *T18.5*
- - Carcinoma in situ: *D01.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.7*
- - - Maligne de la *C19*

Jonctionnelle
- Ectopique ¬ Tachycardie *I47.1*
- Généralisée sévère ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.1*
- Létale ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.1*
- Prématurée ¬ Dépolarisation *I49.2*
- Type
- - Herlitz ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.1*
- - Herlitz-Pearson ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.1*
- - Non-Herlitz ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.8*
- ¬ Tachycardie (paroxystique): *I47.1*

Jones
v.a. Curry-Jones
- ¬ Protéinurie (de): Bence *R80*

Jonker
v. Waardenburg-Jonker

Joubert type A ¬ Syndrome de *Q04.3*

Joubert-Boltshauser ¬ Syndrome de *Q04.3*

Joue

- Lèvre ¬ Morsure de la *K13.1*
- Région
- - Temporo maxillaire
- - - Joue et de la région temporo-maxillaire: Joue ¬ Plaie ouverte de la *S01.41*
- - - Parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la *S01.49*
- - - Région maxillaire
- - - - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la *S01.43*
- - - - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la *S01.42*
- - - ¬ Plaie ouverte de la *S01.4*
- - Temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la *S01.49*
- SAI ¬ *C76.0*
- ¬
- - Abcès de la *K12.23*
- - Face interne de la *C06.0*
- - Plaie ouverte
- - - Joue et de la région temporo-maxillaire: *S01.41*
- - - Lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la *S01.52*
- - Tumeur maligne: Muqueuse de la *C06.0*

Juberg-Hayward ¬ Syndrome de *Q87.8*

Juberg-Marsidi ¬ Syndrome de *Q87.0*

Judiciaire

- Gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures *Y35.7!*
- Travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs *Z64.8*
- ¬ Lésion mesure
- - *Y35!*
- - *Y35.7!*

Jugulaire

- Externe ¬ Lésion traumatique de la veine *S15.2*
- Interne ¬ Lésion traumatique de la veine *S15.3*
- ¬
- - Embolie et thrombose de la veine *I82.81*
- - Thrombose
- - - Bulbe de la veine *I82.81*
- - - Veine *I82.81*

Jumeau

- Jumeau ¬ Transfusion (de): *O43.0*
- Lieu de naissance non précisé ¬ *Z38.5*
- Morts-nés ¬ Naissance gémellaire, *Z37.4!*
- Né vivant, l'autre mort-né ¬ Naissance gémellaire, l'un des *Z37.3!*
- Nés
- - Hôpital ¬ *Z38.3*
- - Hors d'un hôpital ¬ *Z38.4*

Jumeau *–suite*

- Nés *–suite*
- - Vivants ¬ Naissance gémellaire, *Z37.2!*
- Sac amniotique unique ¬ Enchevêtrement des cordons de *O69.2*
- Soudé
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- - ¬
- - - *Q89.4*
- - - Dystocie due à: *O66.3*
- Transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre *P02.3*
- Triplé, etc. ¬ Accouchement retardé du deuxième *O63.2*
- ¬
- - *O30.0*
- - Hémorragie vers un *P50.3*
- - Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un *P50.5*
- - Transfusion (de): jumeau à *O43.0*

Jungle ¬ Fièvre jaune de: *A95.0*

Jüngling
v.a. Perthes-Jüngling

- ¬ Ostéite cystoïde multiple type *D86.8*

Junin ¬ Fièvre hémorragique de *A96.0*

Juvénile
v. Type de maladie

Juxta-articulaire au cours de syphilis ¬ Nodule *A52.7†, M14.89**

Juxtaposition des auricules ¬ *Q20.8*

Kaeser ¬ Syndrome scapulo-péronier neurogénique type *G12.1*

Kahler ¬ Maladie de *C90.0*

Kaitila ¬ Chondrodysplasie métaphysaire type *Q78.5*

Kala-azar ¬

- *B55.0*
- Leishmaniose dermique après *B55.0*

Kallmann ¬ Syndrome de: *E23.0*

Kallmann-De Morsier ¬ Dysplasie olfacto-génitale de *E23.0*

Kandori ¬ Dystrophie de *H35.5*

Kanner ¬ Syndrome de *F84.0*

Kansasii ¬ Infection à Mycobacterium: *A31.0*

Kantaputra ¬ Dysplasie mésomélique type *Q78.8*

Kanzaki ¬ Maladie de *E77.1*

Kaposi

- Ganglions lymphatiques ¬ Sarcome de *C46.3*
- Organes multiples ¬ Sarcome de *C46.8*
- Palais ¬ Sarcome de *C46.2*
- Peau ¬ Sarcome de *C46.0*
- Sans précision ¬ Sarcome de *C46.9*
- Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcome de *C46*
- Sièges ¬ Sarcome de *C46.7*
- Tissus mous ¬ Sarcome de *C46.1*
- ¬
- - Maladie due au VIH avec sarcome de *B21*, *C46.9*
- - Pustulose varicelliforme de *B00.0*

Kappa ¬ Déficit de la chaîne légère *D80.8*

Kapur-Toriello ¬ Syndrome de *Q87.8*

Kartagener ¬ Syndrome de *Q89.3*

Kasabach-Merritt ¬ Syndrome de *D18.00*

Kaschin-Beck ¬ Maladie de *M12.1*

Kaufman ¬ Syndrome oculo-cérébro-facial type *Q87.0*

Kaurah
v. Teebi-Kaurah

Kaveggia
v. Opitz-Kaveggia

Kawasaki] ¬ Syndrome adéno-cutanéo-muqueux [*M30.3*

Kaye
v. Zunich-Kaye

Kayser-Fleischer ¬ Anneau de *H18.0*

KBG ¬ Syndrome *Q87.8*

KCNQ2 ¬ Encéphalopathie épileptique associée à *G40.4*

Kearns et Sayre ¬ Syndrome de *H49.8*

Keipert ¬ Syndrome de *Q87.0*

Kelley-Seegmiller ¬ Syndrome de *E79.8*

Kelly-Paterson ¬ Syndrome de: *D50.1*

Kendall
v. Astley-Kendall

Kennedy

- Maladie de Kennedy] ¬ Atrophie musculaire spinobulbaire de type *G12.2*
- ¬
- - Atrophie musculaire spinobulbaire de type Kennedy [Maladie de *G12.2*
- - Maladie de *G12.2*
- - Syndrome de (Foster-) *H47.0*

Kennedy-Teebi ¬ Dysostose acrofaciale de *Q75.4*

Kenny-Caffey ¬ Syndrome de *Q87.1*

Kenya ¬ Fièvre (à) (de): tiques du *A77.1*

Keppen-Lubinsky ¬ Syndrome de *E88.1*

Kératite

- Adénovirus ¬ *B30.0†, H19.2**
- Amibienne ¬ *B60.1†, H19.2**
- Annulaire ¬ *H16.1*
- Candida ¬ *B37.88†, H19.2**
- Cours
- - Acné rosacée ¬ *L71.8†, H19.3**
- - Herpès ¬ *B00.5†, H19.1**
- - Maladie
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, H19.2**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, H19.2**
- - Rougeole ¬ *B05.8†, H19.2**
- - Syphilis congénitale ¬ *A50.3†, H19.2**
- Dendritique et disciforme ¬ *H19.1**
- Épithéliale d'origine infectieuse ¬ *B00.5†, H19.1**
- Filamenteuse ¬ *H16.1*
- Gonorrhéique
- - Congénitale ¬ *A54.3†, H19.2**
- - Prénatale ¬ *A54.3†, H19.2**
- Héréditaire ¬ *H16.8*
- Interstitiel
- - Cours de zona ¬ *B02.3†, H19.2**
- - Profonde ¬ *H16.3*
- - Syphilitique congénital
- - - Précoce ¬ *A50.0†, H19.2**
- - - Tardive ¬ *A50.3†, H19.2**
- - Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.2**
- Kératoconjonctivite cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H19.3**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H19.2**
- Nummulaire ¬ *H16.1*
- Ponctuée superficiel
- - Thygeson ¬ *H16.1*
- - ¬ *H16.1*
- Sans précision ¬ *H16.9*
- Stellaire ¬ *H16.1*
- Striée ¬ *H16.1*
- Stromale ¬ *H16.3*
- Superficiel
- - Conjonctivite ¬ *H16.2*
- - Sans conjonctivite ¬ Autres *H16.1*

Kératite *–suite*

- Syphilitique congénitale ¬ *A50.3†, H19.2**
- Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H19.1**
- Xérotique ¬ Carence en vitamine A avec *E50.4†, H19.3**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H19.2**
- ¬
- - *H16.8*
- - Acanthamœbiose avec *B60.1†, H19.2**

Keratitis

- Arborescens à herpès simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Dendritica à herpès simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Disciformis
- - Cours de varicelle ¬ *B01.8†, H19.2**
- - Herpès simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Interstitialis à herpès simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Punctata syphilitica ¬ *A50.3†, H19.2**

Kératoacanthome familial ¬ *L85.8*

Kératocône

- Syndrome de Down ¬ *Q90.9†, H19.8**
- ¬ *H18.6*

Kératoconjonctivite

- Adénovirus ¬ *B30.0†, H19.2**
- Atopique ¬ *H16.2*
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Kératite et *H19.3**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Kératite et *H19.2**
- - Rougeole ¬ *B05.8†, H19.2**
- - Syphilis congénitale ¬ *A50.3†, H19.2**
- Épidémique ¬
- - *B30.0†*
- - *B30.0†, H19.2**
- Exposition ¬ *H16.2*
- Infectieuse ¬ *B30.0†, H19.2**
- Interstitiel
- - Acanthamœba ¬ *B60.1†, H19.2**
- - Cours
- - - Rougeole ¬ *B05.8†, H19.2**
- - - Syphilis ¬ *A50.3†, H19.2**
- - - Zona ¬ *B02.3†, H19.2**
- - Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.2**
- Neurotrophique ¬ *H16.2*
- Phlycténulaire
- - Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.2**
- - ¬ *H16.2*
- SAI ¬ *H16.2*
- Vernale ¬ *H16.2*
- Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H19.1**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H19.2**
- ¬
- - *H16.2*

Kératoconjonctivite *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Acanthamœbiose avec *B60.1†, H19.2**
- - Syndrome
- - - Sec avec *M35.0†, H19.3**
- - - Sjögren avec *M35.0†, H19.3**

Kératodermie
- Aïnhumoïde et mutilante ¬ *Q82.8*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *L86**
- Gonorrhéique ¬ *A54.8†, L86**
- Mutilante avec ichtyose ¬ *Q82.8*
- Palmaire et plantaire acquise ¬ Kératose [*L85.1*
- Palmoplantaire
- - Alopécie congénitale autosomique dominante ¬ *Q82.8*
- - Diffus
- - - Acrocyanose ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - - Autosomique dominante type Norrbotten ¬ *Q82.8*
- - Érythrodermique diffuse type Voerner ¬ *Q82.8*
- - Héréditaire type Gamborg-Nielsen ¬ *Q82.8*
- - Mutilante avec plaques kératosiques péri-orificielles ¬ *Q82.8*
- - Nummulaire ¬ *Q82.8*
- - Ponctuée type
- - - 1 ¬ *Q82.8*
- - - 2 ¬ *Q82.8*
- - Striée ou en bandes ¬ *Q82.8*
- - Surdité ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - Transgrediens et progrediens ¬ *Q82.8*
- - Type Nagashima ¬ *Q82.8*
- Palmoplantaire-périodontopathie ¬ Syndrome de *Q82.8*
- Sclérosante ¬ Syndrome de kératose linéaireichtyose congénitale- *Q82.8*
- Syndrome de Reiter ¬ *M02.39†, L86**

Kératoglobe congénital avec glaucome ¬ *Q15.0*

Kérato-irite
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.3†, H22.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H22.0**

Kératokyste
- Odontogène
- - Maxillaire ¬ *D16.42*
- - ¬ *D16.5*
- ¬ *D16.5*

Kératokystique
- Mandibule ¬ Tumeur odontogène *D16.5*
- Maxillaire ¬ Tumeur odontogène *D16.42*

Kératolytique
- Hivernal ¬ Érythème *Q82.8*
- Kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ¬ Intoxication: *T49.4*

Kératomalacie ¬ Avitaminose A avec *E50.4†, H19.8**

Kératomycose ¬ *B49†, H19.2**

Keratomycosis nigricans palmaris ¬ *B36.1*

Kératopathie
- Bandelettes ¬ *H18.4*
- Bulleux
- - Chirurgie de la cataracte [de l'aphaque] ¬ *H59.0*
- - ¬ *H18.1*
- Climatique en gouttelettes ¬ *H18.5*
- Neurotrophique ¬ *B00.5†, H19.1**

Kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ¬ Intoxication: Kératolytiques, *T49.4*

Kératosclérite tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.2**

Kératose
- Actinique ¬ *L57.0*
- Folliculaire
- - Acquise ¬ *L11.0*
- - Avitaminose A ¬ *E50.8†, L86**
- - Darier-White] ¬ *Q82.8*
- - Parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] ¬ *L87.0*
- - Spinulosa decalvans de Siemens ¬ *Q82.8*
- Gonocoques ¬ *A54.8†, L86**
- Kératodermie] palmaire et plantaire acquise ¬ *L85.1*
- Linéaireichtyose congénitale-kératodermie sclérosante ¬ Syndrome de *Q82.8*
- Obturante de l'oreille externe (conduit) ¬ *H60.4*
- Orale ¬ *K13.2*
- Organes génitaux féminins ¬ *N94.8*
- Palmoplantaire héréditaire ¬ *Q82.8*
- Ponctuée (palmaire et plantaire) ¬ *L85.2*
- SAI ¬ *L57.0*
- Séborrhéique ¬ *L82*
- Sénile ¬ *L57.0*
- Solaire ¬ *L57.0*
- ¬ Carence en vitamine A avec *E50.8†, L86**

Kératosiques péri-orificielles ¬ Kératodermie palmoplantaire mutilante avec plaques *Q82.8*

Keratosis
- Palmoplantaris transgrediens de Siemens ¬ *Q82.8*
- Vegetans ¬ *Q82.8*

Kératovitréen ¬ Syndrome *H59.0*

Kérion
- Celse ¬ *B35.0*
- ¬ *B35.0*

Kérosène [pétrole lampant] ¬ *T52.0*

Keshan ¬ Maladie de *E59*

Keutel ¬ Syndrome de *Q87.8*

Kew Garden] ¬ Rickettsiose vésiculaire [Fièvre de *A79.1*

Khalifa-Graham ¬ Syndrome de *Q87.0*

Ki-1+ ¬ Lymphome à grandes cellules *C84.6*

KID ¬ Syndrome *Q80.8*

Kienböck
- Adulte ¬ Maladie de *M93.1*
- ¬
- - Maladie de *M92.2*
- - Ostéochondrite (juvénile) (de): semi-lunaire [*M92.2*

Kieser
v. Turner-Kieser

KIF5A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 due à une mutation de *G60.0*

Kikuchi-Fujimoto ¬ Maladie de *I88.1*

Killian
v. Pallister-Killian

Kimberley ¬ Dysplasie spondylo-épiphysaire type *Q77.7*

Kimmelstiel Wilson extracapillaire diabétique
- Diabète sucré type
- - 1 ¬ Syndrome de *E10.20†, N08.3**
- - 2 ¬ Syndrome de *E11.20†, N08.3**
- ¬ Syndrome de *E14.20†, N08.3**

Kimmelstiel-Wilson
- Diabète sucré type
- - 1 ¬ Syndrome de *E10.20†, N08.3**
- - 2 ¬ Syndrome de *E11.20†, N08.3**
- ¬ Syndrome de *E14.20†, N08.3**

Kimura ¬ Maladie de *D21.9*

Kinase
- Érythrocytaire ¬ Déficit en pyruvate *D55.2*
- Globule rouge ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en pyruvate *D55.2*
- Hépatique et musculaire ¬ Glycogénose par déficit en phosphorylase *E74.0*
- Musculaire ¬ GSD par déficit en phosphorylase *E74.0*
- PK] ¬ Anémie (due à): déficit en: pyruvate *D55.2*
- ¬
- - Anémie hémolytique par déficit en adénylate *D55.3*
- - Déficit
- - - Complet en mévalonate *E88.8*
- - - D-glycérate *E74.8*
- - - Dolichol *E77.8*
- - - Isolé en glycérol *E74.8*
- - - Partiel en mévalonate *D89.9*
- - Glycogénose par déficit en phosphorylase *E74.0*
- - GSD déficit
- - - Phosphoglycérate *E74.0*
- - - Phosphorylase *E74.0*
- - Neurodégénérescence associée à un déficit en pantothénate *G23.0*

Kinase 1 ¬ Maladie glycogénique par déficit en phosphoglycérate *E74.0*

Kinase-4 ¬ Immunodéficience par déficit en interleukin-1 receptor-associated *D84.8*

Kinésigénique
- Paroxystique ¬ Dyskinésie non *G24.8*

Kinésigénique *–suite*
- ¬ Dyskinésie paroxystique *G24.8*
King-Denborough ¬ Syndrome de *G71.2*
Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, *B96.3!*
Kininogène de haut poids moléculaire ¬ Déficit congénital en *D68.8*
Kir6 2 ¬ Hyperinsulinisme
- Autosomique
- - Dominant par déficit en *E16.1*
- - Récessif par déficit en *E16.1*
- Focal résistant au diazoxide par déficit en *E16.1*
Kjer ¬
- Atrophie optique autosomique dominante de *H47.2*
- Maladie de *H47.2*
Klatskin ¬ Tumeur de *C24.0*
Klebsiella
- Granulomatis multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.03!*
- Oxytoca multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.02!*
- - 3MRGN ¬ *U81.22!*
- - 4MRGN ¬ *U81.42!*
- Pneumoniae
- - Agent pathogène ¬ *B96.2!*
- - Multirésistant
- - - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.01!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.21!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.41!*
- - ¬ Pneumonie
- - - *J15.0*
- - - Congénitale à *P23.6, B96.2!*
- ¬ Méningite à *G00.8, B96.2!*
Klebsielle multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Autres *U81.03!*
- 3MRGN ¬ Autres *U81.23!*
- 4MRGN ¬ Autres *U81.43!*
Kleefstra ¬ Syndrome de *Q87.8*
Kleestadt ¬ Kyste de *K09.1*
Kleffner] ¬ Aphasie acquise avec épilepsie [Landau- *F80.3*
Klein
v. Franceschetti-Klein
Kleine-Levin ¬ Syndrome de *G47.8*
Klein-Waardenburg ¬ Syndrome de *E70.3*
Kleptomanie] ¬ Tendance pathologique à commettre des vols [*F63.2*
KLHL9 ¬ Myopathie distale précoce associée à *G71.0*
Klinefelter
- Caryotype 47,XXY ¬ Syndrome de *Q98.0*
- Homme
- - Caryotype 46,XX ¬ Syndrome de *Q98.2*
Klinefelter *–suite*
- Homme *–suite*
- - Plus de deux chromosomes X ¬ Syndrome de *Q98.1*
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q98.4*
Klinger
v. Wegener-Klinger-Churg
Klippel-Feil
- Myopathie-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de malformation de *Q76.1*
- ¬ Syndrome de *Q76.1*
Klippel-Trénaunay inverse ¬ Syndrome de *Q87.2*
Klippel-Trénaunay-Weber ¬ Syndrome de: *Q87.2*
Klumpke due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de Dejerine- *P14.1*
Knuckle pads] ¬ Coussinet des phalanges [*M72.1*
Köbberling ¬ Lipodystrophie partielle familiale type *E88.1*
Kocher-Debré-Semelaigne ¬ Syndrome de *E03.1*
Koeda
v. Ieshima-Koeda-Inagaki
Köhler ¬ Ostéochondrite juvénile
- Corps patellaire [*M92.4*
- Scaphoïde tarsien [*M92.6*
Kohn
v.a. Lowe-Kohn-Cohen
- ¬ Dysplasie spondylo-épiphysaire tardive type *Q77.7*
Koïlonychie congénital(e) ¬ *Q84.6*
Kojevnikov] ¬ Épilepsie partielle continue [*G40.5*
Kok ¬ Maladie de *G25.88*
Kommerel ¬ Diverticule de *Q25.4*
Koolen-De Vries ¬ Syndrome de *Q93.5*
Korsakov non alcoolique ¬ Psychose ou syndrome de *F04*
Kosho ¬
- EDS type *Q79.6*
- Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*
Kostmann ¬ Syndrome de *D70.0*
Kousseff ¬ Syndrome de *Q87.8*
Kozlowski ¬ Dysplasie spondylo-métaphysaire type *Q77.8*
KPP diffuse progressive ¬ *Q82.8*
Krabbe
v. Sturge-Weber-Krabbe
- ¬ Maladie de: *E75.2*
Kraniofazial ¬ Tumeur
- Bénigne: *D16.41*
- Maligne: *C41.01*
Kraurosis
- Verge ¬ *N48.0*
- Vulve ¬ *N90.4*
Kreiborg-Pakistani ¬ Syndrome de *Q75.0*
KRT14 ¬ Epidermolyse bulleuse simple autosomique récessive associée à *Q81.0*
Krukenberg ¬ Faisceaux de *H18.0*
Kruse] ¬ Infection à Shigella du groupe A [Shiga- *A03.0*
Kufor-Rakeb ¬ Syndrome de *G23.0*
Kugelberg-Welander] ¬ Amyotrophie spinale (de): forme juvénile, type III [*G12.1*
Kunjin ¬ Maladie virale de *A83.4*
Kupffer ¬ Sarcome des cellules de *C22.3*
Kuroki
v. Niikawa-Kuroki
Kuru ¬ *A81.8*
Küster
v. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
Kwashiorkor
- Marasme ¬
- - *E42*
- - Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: avec signes de *E42*
- ¬ *E40*
Kyasanur ¬
- Fièvre hémorragique de *A98.2*
- Maladie de la forêt de *A98.2*
Kynuréninase ¬ Déficit en *E70.8*
Kyphomélique ¬ Dysplasie *Q78.8*
Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [*L87.0*
Kyste
v.a. Pseudokyste
- Anévrismal
- - Lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un *K09*
- - Os ¬ *M85.5*
- Apical (périodontal) ¬ *K04.8*
- Arachnoïdien ¬ *G93.0*
- Articulaire ou du tendon (gaine) ¬ *M67.4*
- Baker tuberculeux ¬ *A18.0†, M01.16**
- Biliaire ¬ *K83.5*
- Bourses séreuses ¬ Autres *M71.3*
- Branchial [siège de la tumeur] ¬ *C10.4*
- Bronchogénique ¬ *J98.4*
- Canal
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- - Gartner ¬ *Q50.5*
- - Glande sébacée du sein ¬ *N60.8*
- - Incisif ¬ *K09.1*
- - Nück, congénital ¬ *Q52.4*
- - Wharton ¬ *K11.6*
- Carcinomateux ¬ *C80.9*
- Cérébral
- - Congénitaux ¬ *Q04.6*
- - ¬ *G93.0*
- Cholédoque ¬ *Q44.4*
- Chyleux
- - Mésentère ¬ *I89.8†, K67.8**
- - Péritoine ¬ *I89.8†, K67.8**
- Coccygien(ne) ou pilonidal(e) ¬ *L05*

Kyste *–suite*
- Col utérin ¬ *N88.8*
- Colobomateux ¬ Syndrome de microphtalmie- *Q11.2*
- Congénital
- - E) de la vulve ¬ *Q52.7*
- - Médiastin ¬ *Q34.1*
- Conjonctive ¬ Autres troubles vasculaires et *H11.4*
- Corps jaune ¬ *N83.1*
- Dentaires liés au développement (odontogènes) ¬ *K09.0*
- Dentigère ¬ *K09.0*
- Dermoïde de la bouche ¬ *K09.8*
- Embouchure du nez ¬ *K09.1*
- Embryonnaire
- - Col de l'utérus ¬ *Q51.6*
- - Ligament large ¬ *Q50.5*
- - Trompe de Fallope ¬ *Q50.4*
- - Vaginal ¬ *Q52.4*
- Épidermique ¬ *L72.0*
- Épidermoïde de la bouche ¬ *K09.8*
- Époophoron ¬ *Q50.5*
- Fissuraire ¬ *K09.1*
- Folliculaire
- - Hémorragique (de l'ovaire) ¬ *N83.0*
- - Ovaire ¬ *N83.0*
- - Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - - Sans précision ¬ *L72.9*
- - - ¬
- - - - *L72*
- - - - Formes de *L72.8*
- - ¬ *K09.0*
- Follicule de De Graaf ¬ *N83.0*
- Frange ovarienne ¬ *Q50.4*
- Gingival ¬ *K09.0*
- Glande
- - Bartholin ¬ *N75.0*
- - Lacrymale ¬ *H04.1*
- - Sébacée du scrotum ¬ *L72.1*
- Glioépendymaire/épendymaire ¬ *Q04.6*
- Hémorragique du corps jaune ¬ *N83.1*
- Hépatique simple ¬ *K76.8*
- Hydatique
- - Cerveau ¬ *B67.9†, G94.8**
- - Foie
- - - Echinococcus granulosus ¬ *B67.0*
- - - ¬ *B67.8†, K77.0**
- - Poumon NCA ¬ *B67.9†, J99.8**
- - Rate NCA ¬ *B67.9†, D77**
- Inclusion épidermique ¬ *L72.0*
- Iris corps ciliaire chambre antérieur œil
- - Exsudatif ¬ *H21.3*
- - Implant ¬ *H21.3*
- - Parasitaire ¬ *H21.3*

Kyste *–suite*
- Iris corps ciliaire chambre antérieur œil *–suite*
- - SAI ¬ *H21.3*
- - ¬ *H21.3*
- Kleestadt ¬ *K09.1*
- Lacrymo-nasal ¬ *H04.6*
- Lame dentaire ¬ *K09.0*
- Latent des maxillaires ¬ *K10.0*
- Latéral du cou ¬ *Q18.0*
- Lié à l'éruption dentaire ¬ *K09.0*
- Lingual ¬ *K14.8*
- Lympho-épithélial de la bouche ¬ *K09.8*
- Mâchoire
- - Anévrismal ¬ *K09.2*
- - Hémorragique ¬ *K09.2*
- - SAI ¬ *K09.2*
- - Traumatique ¬ *K09.2*
- - ¬ Autres *K09.2*
- Macula ¬ *H35.38*
- Médian(e) de la face et du cou ¬ *Q18.8*
- Médullaire du rein ¬ *Q61.5*
- Ménisque
- - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe ¬ *M23.04*
- - - - Interne ¬ *M23.01*
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe ¬ *M23.05*
- - - - Interne ¬ *M23.02*
- - Localisations multiples ¬ *M23.00*
- - Ménisque SAI ¬ *M23.09*
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe ¬ *M23.06*
- - - Interne ¬ *M23.03*
- - ¬ *M23.0*
- Mésentérique ¬ *K66.8*
- Mucocèle du nez et des sinus du nez ¬ *J34.1*
- Mucoïde à l'articulation du doigt ¬ *M67.44*
- Muqueux
- - Épanchement des glandes salivaires ¬ *K11.6*
- - Mastoïdectomie ¬ *H95.1*
- - Rétention des glandes salivaires ¬ *K11.6*
- Naso
- - Labial [naso-alvéolaire] ¬ *K09.1*
- - Palatin [canal incisif] ¬ *K09.1*
- Omphalo-mésentérique ¬ *Q43.0*
- Ora serrata ¬ *H33.1*
- Orbite ¬ *H05.8*
- Origine branchiale ¬ Fissure, fistule et *Q18.0*
- Osseux
- - Solitaire de la mâchoire ¬ *K09.2*
- - ¬ Autres *M85.6*
- Ouraque ¬ *Q64.4*

Kyste *–suite*
- Ovaire, autres et sans précision ¬ *N83.2*
- Ovarien
- - Cours du développement ¬ *Q50.1*
- - Tuberculeux ¬ *A18.1†, N74.1**
- Pancréas ¬ *K86.2*
- Pancréatique congénital ¬ *Q45.2*
- Paraovarien ¬ *Q50.5*
- Parasitaire de la rétine SAI ¬ *H33.1*
- Périapical ¬ *K04.8*
- Périodontal latéral ¬ *K09.0*
- Péri-radiculaire ¬ *G54.8*
- Périventriculaires acquis du nouveau-né ¬ *P91.1*
- Phaeohyphomycosiques sous-cutanés ¬ Abcès et *B43.2*
- Pharynx ou du rhinopharynx ¬ *J39.2*
- Pilaire ¬ *L72.1*
- Pileux ¬ *L72.1*
- Pilonidal SAI ¬ *L05.9*
- Plancher buccal ¬ *K11.6*
- Pleuro-péricardiques ¬ *Q24.8*
- Poche
- - Blake ¬ Persistance du *Q03.1*
- - Rathke ¬ Déficit hypophysaire associé à un *E23.6*
- Poplité ¬ Déchirure d'un *M66.0*
- Porencéphalique, acquis ¬ *G93.0*
- Préauriculaires ¬ Fistule et *Q18.1*
- Primordial ¬ *K09.0*
- Pulmonaire acquis ¬ *J98.4*
- Pupillaire miotique ¬ *H21.2*
- Radiculaire ¬ *K04.8*
- Rate ¬ *D73.4*
- Région buccal
- - Non
- - - Classés ailleurs ¬ Autres *K09.8*
- - - Liés au développement dentaire ¬ *K09.1*
- - Sans précision ¬ *K09.9*
- Rein
- - Acquis) (multiple) (solitaire) ¬ *N28.1*
- - Congénital unique ¬
- - - *Q61.0*
- - ¬ *N28.1*
- Rénaux-diabète juvénile ¬ Syndrome *E11.20†, N29.8**
- Résiduel radiculaire ¬ *K04.8*
- Rétentionnel de l'ovaire ¬ *N83.2*
- Rétiniens ¬ Rétinoschisis et *H33.1*
- Sacro-coccygien avec abcès ¬ *L05.0*
- Scrotal ¬ *L72.9*
- Sébacé ¬ *L72.1*
- Sein ¬ *N60.0*
- Simple de l'ovaire ¬ *N83.2*
- Solitaire
- - Os ¬ *M85.4*

Kyste *–suite*

- Solitaire *–suite*
- - Sein ¬ *N60.0*
- Sous-corticaux ¬ Leucoencéphalopathie mégalencéphalique avec *E75.2*
- Stafne ¬ *K10.0*
- Synovial
- - Poplité [Baker] ¬ *M71.2*
- - SAI ¬ *M71.3*
- - ¬ Déchirure d'un *M66.1*
- Thyréoglosse ¬ *Q89.2*
- Trachée ¬ *J39.88*
- Trichilemmal proliférant ¬ *L72.1*
- Vulve ¬ *N90.7*
- ¬
- - *M67.4*
- - Chromomycose sous-cutanée avec *B43.2†, L99.8**

Kystique
v. Type de maladie

L-2-HGA ¬ *E72.8*

L-2-hydroxyglutarique ¬

- Acidémie *E72.8*
- Acidurie
- - *E72.8*
- - D, *E72.8*

Laband
v. Zimmermann-Laband

Labhart
v. Prader-Labhart-Willi

Labial

- Bilatéral ¬ Fente
- - *Q36.0*
- - Palatine, sans précision, avec fente *Q37.8*
- - Voile du palais avec fente *Q37.2*
- - Voûte
- - - Palais avec fente *Q37.0*
- - - Voile du palais avec fente *Q37.4*
- Congénitale ¬ fissure *Q36*
- Fente de la partie alvéolaire ¬ Fente *Q37.5*
- Inférieure ¬ Fistule *Q38.0*
- Isolée ¬ Fente *Q36.9*
- Médiane ¬ Fente *Q36.1*
- Naso-alvéolaire] ¬ Kyste (de): naso- *K09.1*
- SAI ¬ Fente
- - *Q36.9*
- - Voile du palais avec fente *Q37.3*
- - Voûte
- - - Palais avec fente *Q37.1*
- - - Voile du palais avec fente *Q37.5*
- Supérieure) (inférieure) ¬ Gouttière: *C06.1*
- Unilatéral ¬ Fente
- - *Q36.9*
- - Palatine, sans précision, avec fente *Q37.9*
- - Voile du palais avec fente *Q37.3*
- - Voûte
- - - Palais avec fente *Q37.1*
- - - Voile du palais avec fente *Q37.5*
- ¬
- - Fente *Q36*
- - Syndrome de microbrachycéphalie-ptosis-fente *Q87.8*

Labile

- Type
- - Borderline ¬ Personnalité émotionnellement *F60.31*
- - Impulsif ¬ Personnalité émotionnellement *F60.30*
- ¬
- - Carence en facteur *D68.22*
- - Déficit héréditaire en facteur *D68.22*
- - Personnalité émotionnellement *F60.3*

Labilité [asthénie] émotionnelle organique ¬ *F06.6*

Labiomaxillopalatine unilatérale ¬ Fente *Q37.5*

Labiopalatine

- Malrotation-cardiopathie ¬ Syndrome de fente *Q87.8*
- Surdité-lipome sacré ¬ Syndrome de fente *Q87.8*
- ¬ Syndrome de contractures-dysplasie ectodermique-fente *Q87.8*

Laboratoire

- Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Mise en évidence par des examens de *R75*
- ¬ Examens de *Z01.7*

Labrum

- Articulation de l'épaule ¬ Lésion du *S43.4*
- Atteinte dégénérative de l'articulation de l'épaule ¬ Lésion du *M75.6*
- Non précisée comme traumatique ¬ Lésion du *M75.6*

Labyrinthe

- Membraneux ¬ Anomalie de: *Q16.5*
- Microtie et microdontie ¬ Surdité avec aplasie du *Q16.5*
- ¬
- - Hypersensibilité du *H83.2*
- - Hypofonction du *H83.2*
- - Perte de la fonction du *H83.2*
- - Vertige périphérique par atteinte du *H81.3*

Labyrinthiques ¬ Troubles des fonctions *H83.2*

Labyrinthite

- Syphilitique ¬ *A52.7†, H94.8**
- ¬ *H83.0*

Lacération

- Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- Avortement, en phase de suivi ¬ *O08.6*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Multiples SAI ¬ *T01.9*
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- Oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire ¬ *S05.3*
- Œil SAI ¬ *S05.3*
- Perforation déchirure lésion origine chimique
- - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- Rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire ¬ *S05.2*
- SAI ¬ *T14.1*
- Tissu péri-urétral en tant que lésion due à l'accouchement chez la mère ¬ *O70.0*
- Vaginale en tant que complication de l'accouchement ¬ *O70.0*

Lacération *–suite*

- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Vessie ¬ *S37.22*

Lacombe
v. Chassaing-Lacombe

Lacrymal

- Aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ Canaliculite *H04.3*
- Canal lacrymal ¬ Tumeur
- - Bénigne: Glande *D31.5*
- - Maligne: Glande *C69.5*
- Chronique ¬
- - Canaliculite *H04.4*
- - Mucocèle du sac *H04.4*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections de l'appareil *H06.0**
- Lacrymo-nasal ¬ Sténose
- - Canal *H04.5*
- - Canalicule *H04.5*
- - Sac *H04.5*
- Orbite
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections de l'appareil *H06**
- - ¬ Malformations congénitales des paupières, de l'appareil *Q10*
- SAI ¬ Malformation congénitale de l'appareil *Q10.6*
- Sans précision ¬ Affection de l'appareil *H04.9*
- ¬
- - Absence
- - - Agénésie de l'appareil *Q10.4*
- - - Orifice *Q10.4*
- - Affection
- - - Appareil
- - - - *H04*
- - - - *H04.8*
- - - Glandes *H04.1*
- - Atrésie de l'appareil *Q10.5*
- - Atrophie de la glande *H04.1*
- - Corps étranger dans le point *T15.8*
- - Eversion du point *H04.5*
- - Fibrose du canal *H04.5*
- - Fistule *H04.6*
- - Hypertrophie chronique de la glande *H04.0*
- - Inflammation
- - - Aiguë et sans précision des voies *H04.3*
- - - Chronique des voies *H04.4*
- - Kyste de la glande *H04.1*
- - Lésions des voies *H04.6*
- - Malformations congénitales de l'appareil *Q10.6*
- - Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire avec ou sans atteinte des voies *S01.1*
- - Sac
- - - *C69.5*
- - - *D31.5*

Lacrymal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Sténose
- - - Insuffisance des voies *H04.5*
- - - Rétrécissement congénital du canal *Q10.5*
- - Syphilis
- - - Glandes *A52.7†, H06.0**
- - - Tardive de l'appareil *A52.7†, H06.0**
- - Traumatisme du canal *S05.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Glande lacrymale et canal *D31.5*
- - - Maligne: Glande lacrymale et canal *C69.5*

Lacrymo-auriculo-dento-digital ¬ Syndrome *Q87.8*

Lacrymogène
- Coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz *Y35.7!*
- ¬ Effet toxique: Gaz *T59.3*

Lacrymo-nasal ¬
- Canal
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- Kyste *H04.6*
- Mucocèle *H04.6*
- Sténose
- - Canal lacrymal, *H04.5*
- - Canalicule lacrymal, *H04.5*
- - Sac lacrymal, *H04.5*

Lactamine
v. bêtalactamine

Lactase ¬ Déficit
- Congénital en *E73.0*
- Secondaire en *E73.1*

Lactate
- Déshydrogénase ¬
- - Glycogénose par déficit en *E74.4*
- - GSD par déficit en *E74.4*
- ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie avec atteinte du tronc cérébral et de la moelle épinière-élévation des *G31.81*

Lactation
- Associées à l'accouchement ¬ Autres mastopathies et anomalies de la *O92*
- Sans précision ¬ Anomalies de la *O92.7*
- ¬
- - Échec de *O92.3*
- - État mentionné cours grossesse puerpéralité
- - - *O91*
- - - *O92*
- - Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la *P59.3*
- - Subinvolution du sein (après *N64.8*
- - Suppression de la *O92.5*

Lactique
- Congénitale type Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ Acidose *G31.88*
- Déficit en MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique mitochondriale avec acidose *I42.2*
- Déshydrogénase ¬ Augmentation des taux de transaminase et d'acide *R74.0*
- Épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, acidose *G31.81*
- Fatale avec acidurie méthylmalonique ¬ Acidose *E71.1, E87.2*
- Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose *G31.81*
- ¬ Acidose: *E87.2*

Lactose
- Sans précision ¬ Intolérance au *E73.9*
- ¬ Autres intolérances au *E73.8*

Lactotrope hypophysaire ¬ Adénome *D35.2*

Lacunaire
- Moteur pur ¬ Syndrome *I67.9†, G46.5**
- Sensitif pur ¬ Syndrome *I67.9†, G46.6**
- ¬
- - Infarctus *I63.5*
- - Syndrome *I67.9†, G46.7**

LAD-II ¬ *D84.8*

Lafora
- Début précoce ¬ Maladie à corps de *G40.3*
- ¬ Maladie de *G40.3*

Lagophtalmie ¬ *H02.2*

LAID] ¬ Lymphadénopathie angio-immunoblastique avec dysprotéinémie [*C86.5*

Laine] ¬ Maladie des chiffonniers [maladie des trieurs de *A22.1*

Laineux
- Sur nævus ¬ Cheveux *Q82.5*
- ¬ Cheveux *Q84.1*

Laing ¬ Myopathie distale précoce type *G71.0*

Laissé
- Accidentellement
- - Cavité corporelle plaie opératoire
- - - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger *T81.5*
- - - ¬
- - - - Adhérences due(s) à un corps étranger *T81.5*
- - - - Occlusion due(s) à un corps étranger *T81.5*
- - - - Perforation due(s) à un corps étranger *T81.5*
- - Cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Réaction aiguë à une substance étrangère *T81.6*
- Électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique ¬ Sternum *M96.80*
- Place ¬ Racine dentaire *K08.3*

Lait
- Aliments régurgités ¬ Aspiration néonatale de *P24.3*
- Endogène ¬ Croûte de *L20.8*
- Épaissi ¬ Occlusion intestinale due à un *P76.2*
- Maternel ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le *P04*
- Vache ¬
- - Allergie au *L27.2*
- - Hypocalcémie du nouveau-né, due au *P71.0*
- ¬
- - Croûte de *L21.0*
- - Pneumonie par aspiration (de): *J69.0*
- - Syndrome de sténose pulmonaire-taches café au *Q85.0*
- - Taches café au *L81.3*

LAL ¬ Déficit en *E75.5*

Lallation ¬ *F80.0*

LAM M6 ¬ *C94.00*

LAMB2 ¬ Syndrome néphrotique infantile lié à *N04.8*

Lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands *E88.22*

Lambert ¬ Syndrome de *Q87.8*

Lambert-Eaton ¬ Syndrome myasthénique de *C80.9†, G73.1**

Lambliase] ¬ Giardiase [*A07.1*

Lame
- Dentaire ¬ Kyste de la *K09.0*
- Sabre ¬ Déformation syphilitique du tibia en *A50.5†, M90.26**

Lamellaire ¬ Ichtyose *Q80.2*

Lamine A/C ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.0*

Laminectomie ¬ Cyphose après *M96.3*

Laminine alpha 2 ¬ Dystrophie musculaire congénitale par déficit en *G71.2*

LAMP-2 ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Lampant] ¬ Kérosène [pétrole *T52.0*

Lamy (léger) (sévère) ¬ Syndrome de: Maroteaux- *E76.2*

Landau-Kleffner] ¬ Aphasie acquise avec épilepsie [*F80.3*

Landing
v.a. Norman-Landing
- ¬ Maladie de *E75.1*

Landsteiner
v. Donath-Landsteiner

Langage
- Asymétrie faciale-strabisme-incisure du lobe de l'oreille ¬ Syndrome de retard de *Q87.0*
- Non
- - Classés ailleurs ¬ Troubles du *R47*
- - Précisés ¬ Troubles du *R47.8*
- Précipité] ¬ Bredouillement [*F98.6*

Langage *–suite*
- SAI ¬ Trouble du *F80.9*
- Sans précision ¬ Trouble du développement de la parole et du *F80.9*
- Type
- - Expressif ¬ Trouble de l'acquisition du *F80.1*
- - Réceptif ¬ Trouble de l'acquisition du *F80.2*
- ¬
- - Difficultés de *R47.8*
- - Problèmes de *R47.8*
- - Retard de: *R62.0*
- - Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du *Z50.5!*
- - Trouble
- - - *R47.8*
- - - Développement de la parole et du *F80.8*
- - - Réceptifs du *F80.28*
- - - Spécifique développement
- - - - *F80.9*
- - - - Parole et du *F80*

Lange ¬ Syndrome
- *Q87.1*
- Cornelia de *Q87.1*

Lange-Nielsen ¬ Syndrome de Jervell et *I49.8*

Langer
v. Beemer-Langer

Langer-Giedion ¬ Syndrome de *Q87.8*

Langerhans
- Multifocale
- - Multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de *C96.0*
- - Unisystémique ¬ Histiocytose à cellules de *C96.5*
- SAI ¬
- - Histiocytose à cellules de *C96.6*
- - Hyperplasie cellule
- - - Bêta des îlots de *E16.1*
- - - Îlots de *E16.9*
- ¬
- - Granulomatose
- - - Cellules de *C96.6*
- - - Chronique à cellules de *C96.6*
- - Histiocytose unifocale à cellules de *C96.6*
- - Ilots de *C25.4*
- - Sarcome à cellules de *C96.4*

Langerhansienne aiguë et disséminée ¬ Histiocytose *C96.0*

Langes bleus ¬ Maladie des *E70.8*

Langue
- Bifide ¬ *Q38.3*
- Bouche et du pharynx ¬ Autres malformations congénitales de la *Q38*
- Chargée ¬ *K14.3*
- Crénelée ¬ *K14.8*
- Face

Langue *–suite*
- Face *–suite*
- - Inférieure ¬ Deux tiers antérieurs de la *C02.2*
- - Supérieure ¬ Deux tiers antérieurs de la *C02.0*
- Fissurée ¬ *K14.5*
- Géographique ¬ *K14.1*
- Gorge ¬ Syndrome de la *G24.0*
- Lèvres ou les doigts ¬ Malocclusion due à: habitudes impliquant la *K07.5*
- Mobile ¬ Carcinome épidermoïde de la *C02.9*
- Noir villeuse ¬
- - *K14.3*
- Parties autres et non précisées ¬ Tumeur maligne de la *C02*
- Plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.54*
- Plicaturée ¬ *K14.5*
- SAI ¬
- - Partie
- - - Fixe de la *C01*
- - - Mobile de la *C02.3*
- - Tiers moyen de la *C02.3*
- Sans précision ¬
- - Maladie de la *K14.9*
- - Tumeur malign
- - - *C02.9*
- - - Deux tiers antérieurs de la *C02.3*
- Scrotale ¬ *K14.5*
- Striée ¬ *K14.5*
- ¬
- - Abcès
- - - *K14.0*
- - - Staphylocoques à la *K14.0, B95.8!*
- - Adhérence congénitale de la *Q38.3*
- - Anomalies de l'épithélium de la *K13*
- - Atrophie
- - - *K14.8*
- - - Papilles de la *K14.4*
- - Brièveté anormale du frein de la *Q38.1*
- - Déchirure du frein de la *S01.54*
- - Érythroplasie de l'épithélium buccal, y compris la *K13.2*
- - Face supérieure de la base de la *C01*
- - Fibrose sous-muqueuse de la *K13.5*
- - Fissure congénitale de la *Q38.3*
- - Frein de la *C02.2*
- - Gomme de la *A52.7†, K93.8**
- - Hypertrophie de la *K14.8*
- - Hypoplasie de la *Q38.3*
- - Leuco-œdème de l'épithélium buccal, y compris la *K13.2*
- - Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y compris la *K13.2*
- - Maladies de la *K14.8*

Langue *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Malformation
- - - Congénitales de la *Q38.3*
- - - SAI congénitale de la *Q38.3*
- - Pointe de la *C02.1*
- - Rupture du frein de la *S01.54*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, K93.8**
- - Tiers postérieur de la *C01*
- - Tuberculose de la *A18.8†, K93.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D10.1*
- - - Malign
- - - - Base de la *C01*
- - - - Face
- - - - - Dorsale de la *C02.0*
- - - - - Inférieure de la *C02.2*
- - - - Lésion à localisations contiguës de la *C02.8*
- - - - Pointe et bords latéraux de la *C02.1*
- - Ulcération (traumatique) de la *K14.0*

Lanugineuse
- Acquise ¬ Hypertrichose *L68.1*
- ¬ Hypertrichose congénitale *Q84.2*

Lanugo ¬ Persistance du *Q84.2*

Laparocèle ¬ *K43.99*

Laparoschisis ¬ *Q79.3*

Lapin ¬
- Coup du *S13.4*
- Fièvre (de): transmise par le *A21*

L-arginine:glycine amidinotransférase ¬ Déficit en *E72.8*

Laron ¬
- Insuffisance staturale: de type *E34.3*
- Nanisme type *E34.3*

Larrey ¬ Hernie de *K44.9*

Larsen
v.a. Sinding-Larsen-Johansson
- ¬
- - Ostéochondrite (juvénile) de: pointe de la rotule [Sinding *M92.4*
- - Syndrome de *Q74.8*

Larsson
v. Sjögren-Larsson

Larva migrans
- Cutané
- - SAI ¬ *B76.9*
- - ¬ *B76.9*
- Viscérale ¬ *B83.0*

Larvaire ¬ Diphyllobothriase *B70.1*

Larve
- Anisakis ¬ Infection à *B81.0*
- Mouches ¬ infestation par *B87*
- Spirometra ¬ Infection à: *B70.1*
- Taenia solium ¬ infection par *B69*

Laryngé
- Épiglotte ¬ Face postérieure (*C32.1*
- Oropharynx ¬ Carrefour pharyngo- *C10.8*
- SAI ¬ Stridor congénital (*P28.8*
- ¬
- - Diphtérie *A36.2*
- - Myiase *B87.3*
- - Nodules *J38.2*
- - Repli ary-épiglottique versant
- - - *C32.1*
- - - *D02.0*
- - - *D38.0*
- - Spasme *J38.5*
- - Tumeur maligne: Cartilage *C32.3*

Laryngisme (striduleux) ¬ *J38.5*

Laryngite
- Aigu
- - Œdémateuse ¬ *J04.0*
- - SAI ¬ *J04.0*
- - Sous-glottique ¬ *J04.0*
- - Suppurée ¬ *J04.0*
- - Ulcéreuse ¬ *J04.0*
- - ¬
- - - *J04.0*
- - - Trachéite (aiguë) avec *J04.2*
- Atrophique (sèche) ¬ *J37.0*
- Catarrhale ¬ *J37.0*
- Chronique
- - Trachéite (chronique) ¬ *J37.1*
- - ¬ *J37.0*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.1*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: *J10.1*
- Haemophilus influenzae ¬ *J04.0, B96.3!*
- Hypertrophique ¬ *J37.0*
- Laryngo-trachéite chroniques ¬ *J37*
- Obstructif
- - Aigu croup
- - - Épiglottite aiguë ¬ *J05*
- - - ¬ *J05.0*
- - SAI ¬ *J05.0*
- Streptocoques ¬ *J04.0, B95.5!*
- Syphilitique
- - Congénital
- - - Précoce ¬
- - - - *A50.0*
- - - - *A50.0†, J99.8**
- - - ¬ *A50.5†, J99.8**
- - Tardive ¬ *A52.7†, J99.8**
- Trachéite aiguës ¬ *J04*
- Virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09, U69.21!*

Laryngite *–suite*
- Virus *–suite*
- - Influenza
- - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] avec *J10.1*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- ¬ Trachéite chronique avec *J37.1*

Laryngo
- Pharyngite aiguë ¬ *J06.0*
- Trachéite
- - Aiguë ¬ *J04.2*
- - Chronique ¬
- - - *J37.1*
- - - Laryngite et *J37*
- - Diphtérique ¬ *A36.2*
- - SAI ¬ *J04.2*

Laryngocèle ¬ *Q31.3*

Laryngomalacie congénitale ¬ *Q31.5*

Laryngoplégie ¬ *J38.0*

Laryngotrachéal ¬ Angiome *D18.08*

Laryngotrachéite
- Haemophilus influenzae ¬ *J04.2, B96.3!*
- Sous-glottique obstructive ¬ *J05.0*
- Streptocoques ¬ *J04.2, B95.5!*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.5†, J99.8**
- - Tardive ¬ *A52.7†, J99.8**

Larynx
- Artificiel ¬ Présence d'un *Z96.3*
- Bilatérale, partielle ¬ Paralysie des cordes vocales et du *J38.03*
- Cartilage thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du *Q31.8*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de: *A15.5*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de paralysie du *J38.00*
- Extrinsèque ¬ *C32.1*
- Glottique ¬ Ptérygion du *Q31.0*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Maladies des cordes vocales et du *J38*
- - Précisée ¬ Paralysie des cordes vocales et du *J38.00*
- Périchondrite ¬ Syphilis du *A52.7†, J99.8**
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- - ¬ Ptérygion du *Q31.0*
- Sans précision ¬

Larynx *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Malformation congénitale du *Q31.9*
- - Tumeur maligne: *C32.9*
- Sous-glottique ¬ Ptérygion du *Q31.0*
- Trachée
- - Bronche
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du *A15.5*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du *A16.4*
- - Poumon ¬
- - - Brûlure comprenant le *T27.1*
- - - Corrosion comprenant le *T27.5*
- - ¬
- - - Brûlure du *T27.0*
- - - Corrosion du *T27.4*
- - - Écrasement du *S17.0*
- - - Plaie ouverte avec atteinte du *S11.0*
- Unilatéral
- - Partielle ¬ Paralysie des cordes vocales et du *J38.01*
- - Totale ¬ Paralysie des cordes vocales et du *J38.02*
- ¬
- - *S10.0*
- - *S12.8*
- - *Z90.0*
- - Abcès du *J38.7*
- - Amylose du *E85.4†, J99.8**
- - Atrésie du *Q31.8*
- - Blessure
- - - *S19.9*
- - Carcinoma in situ: *D02.0*
- - Carcinome épidermoïde du *C32.9*
- - Corps étranger dans le *T17.3*
- - Gomme du *A52.7†, J99.8**
- - Hypoplasie du *Q31.2*
- - Lipoïdose du *E75.6*
- - Maladie
- - - *J38.7*
- - - SAI du *J38.7*
- - Malformations congénitales du *Q31.8*
- - Musculature intrinsèque du *C32.0*
- - Nécrose du *J38.7*
- - Néoplasie du *D38.0*
- - Œdème du *J38.4*
- - Pachydermie du *J38.7*
- - Paralysie
- - - Cordes vocales et du *J38.0*
- - - Muscles du *J38.00*
- - Périchondrite
- - - *J38.7*
- - - Syphilitique tardive du *A52.7†, J99.8**

Larynx *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Phlegmon du *J38.7*
- - Polype des cordes vocales et du *J38.1*
- - Ptérygion du *Q31.0*
- - Rétrécissement syphilitique
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Congénitale du *A50.5†, J99.8**
- - Sténose
- - - *J38.6*
- - - Congénitale du *Q31.8*
- - - Syphilitique
- - - - *A52.7†, J99.8**
- - - - Congénitale du *A50.5†, J99.8**
- - Syphilis
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Tardive du *A52.7†, J99.8**
- - Trachée thoracique: *S11.01*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D14.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D38.0*
- - - Malign
- - - - *C32*
- - - - Lésion à localisations contiguës du *C32.8*
- - Ulcération du *J38.7*

Lassa ¬ Fièvre
- *A96.2*
- Hémorragique de *A96.2*

Lassueur
v. Little-Piccardi-Lassueur

LAT ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en *D81.2*

Latence
- Lymphœdème ¬ Stade de *I89.08*
- ¬ Inertie utérine pendant la phase de *O62.0*

Latent
- Maxillaires ¬ Kyste (de): *K10.0*
- Non précisée précoce ou tardive ¬ Syphilis *A53.0*
- SAI ¬ Syphilis *A53.0*
- Variante ¬ *C91.5*
- ¬
- - Diabète: *R73.0*
- - Nystagmus (de): *H55*
- - Pian *A66.8*
- - Réaction schizophrénique *F21*
- - Schizophrénie: *F21*
- - Strabisme *H50.5*
- - Syphilis
- - - Congénital
- - - - Précoce, *A50.1*
- - - - Tardive, *A50.6*
- - - Précoce, *A51.5*
- - - Tardive, *A52.8*
- - Tuberculose *Z22.7*

Late-onset retinal degeneration] ¬ LORD [*H35.5*

Late-onset] ¬ Insuffisance hépatique à début tardif [*K72.0*

Latéral
- Amyotrophique
- - Type 4 ¬ Sclérose *G12.2*
- - ¬
- - - Maladie de Charcot [sclérose *G12.2*
- - - Sclérose
- - - - *G12.2*
- - - SLA [Sclérose *G12.2*
- Bouche ¬ Tumeur maligne: Plancher *C04.1*
- Cou ¬ Kyste *Q18.0*
- Croisés) ¬ Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (*S83.7*
- Externe du coude ¬ Rupture traumatique du ligament *S53.2*
- Gauche ¬ Colite
- - *K51.5*
- - Indéterminée *K52.31*
- Genou interne externe
- - Déchirure ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.43*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.44*
- - Distorsion ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.41*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.42*
- - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.40*
- - ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.4*
- Globe SAI ¬ Déplacement (*H05.2*
- Haut ¬ Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- - Transmural (aigu): *I21.2*
- Interne
- - Coude ¬ Rupture traumatique du ligament *S53.3*
- - Genou [Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du ligament *M76.4*
- Langue ¬ Tumeur maligne: Pointe et bords *C02.1*
- Médial du tibia ¬ Condyles *S82.1*
- Médian ¬ Fracture
- - Extrémité inférieure du fémur: Condyle (*S72.41*
- - Os cunéiforme (intermédiaire) (*S92.23*
- Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Ligament *S83.40*
- Oropharynx ¬ Tumeur maligne: Paroi *C10.2*
- Paroi
- - Latéral] SAI ¬ *I22.8*
- - SAI ¬ Infarctus du myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*

Latéral *–suite*
- Péronier Ligament latéral ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament *S83.43*
- - Distorsion du ligament *S83.41*
- Poignet ¬ *S63.3*
- Primitive ¬ Sclérose *G12.2*
- Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: Paroi *C11.2*
- SAI ¬
- - Infarctus transmural aigu
- - - *I21.2*
- - - Paroi *I21.2*
- - Latéral [de la paroi *I22.8*
- Tibia proximal ¬ Luxation du genou: Luxation *S83.14*
- Tibial Ligament médian ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament *S83.44*
- - Distorsion du ligament *S83.42*
- Vessie ¬ Tumeur maligne: Paroi *C67.2*
- ¬
- - *S63.4*
- - Courbure du pénis (*Q55.6*
- - Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament *S83.43*
- - - Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament *S83.41*
- - Fracture
- - - Clavicule: Tiers *S42.03*
- - - Compression *S32.7*
- - - Extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle *S42.42*
- - Infarctus
- - - Répété (aigu): antéro- *I22.0*
- - - Transmural (aigu): antéro- *I21.0*
- - Kyste: périodontal *K09.0*
- - Luxation d'une autre partie non précisée du coude: *S53.14*
- - Proboscis *Q30.8*
- - Syndrome
- - - Fente palatine-synéchies *Q87.8*
- - - Médullaire *I66.3†, G46.4**

Latéro
- Apical ¬ Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- - Transmural (aigu): *I21.2*
- Basal ¬ Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- - Transmural (aigu): *I21.2*

Lathostérolose ¬ *Q87.8*

Latum) (D. pacificum) ¬ Infection à Diphyllobothrium (adulte), (D. *B70.0*

Launois-Bensaude ¬ Adénolipomatose de *E88.8*

Laurence-Moon
- Bardet-Biedl ¬ Syndrome de: *Q87.8*
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Laurin-Sandrow ¬ Syndrome de *Q87.2*

Lavage bronchique ¬ Résultats anormaux de: *R84*

Laveurs de fromage ¬ Poumon des: *J67.8*

Lawrence ¬ Syndrome de *E88.1*

Laxa
- Autosomique
- - Dominante ¬ Cutis *Q82.8*
- - Récessif type
- - - 1 ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 1C ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 2 ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 2A ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 2B ¬ Cutis *Q82.8*
- Hyperelastica) ¬ Cutis *Q82.8*
- Hyperlaxité ligamentaire-retard de développement ¬ Syndrome de cutis *Q82.8*
- Senilis ¬ Cutis *L57.4*

Laxatifs
- Salins et osmotiques ¬ Intoxication: *T47.3*
- Stimulants ¬ Intoxication: *T47.2*
- ¬
- - Intoxication: Autres *T47.4*
- - Prise régulière de *F55*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.1*

Laxité
- Ligamentaire
- - Familiale ¬ *M35.7*
- - SAI ¬ *M24.2*
- Ligaments du genou ¬ *M23.8*

Laxova
v. Neu-Laxova
v. Petty-Laxova-Wiedemann

LBWC ¬ Syndrome *Q87.8*

LCAT ¬ Déficit
- *E78.6*
- Familial complet en *E78.6*

LCHAD ¬ Déficit en *E71.3*

LCR ¬ Dérivation du *Z98.2*

LDH ¬ Déficit en *E74.4*

LDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse densité [*E78.0*

Léage
v. Papillon-Léage-Psaume

Leary
v. Winship-Viljoen-Leary

Leber ¬
- Amaurose congénitale de *H35.5*
- Atrophie
- - Héréditaire du nerf optique au cours de la maladie de *H47.2*
- - Nerf optique au cours de la maladie de *H47.2*
- Neuropathie optique héréditaire de *H47.2*

Lécithine-cholestérol-acyltransférase ¬
- Déficit en: *E78.6*
- Glomérulonéphrite au cours d'un déficit en *E78.6†, N08.4**
- Glomérulopathie au cours de déficit en *E78.6†, N08.4**

Lecture
- Écriture ¬ Faible niveau de *Z55*
- ¬
- - Retard spécifique
- - - *F81.0*
- - - Orthographe (sans trouble de la *F81.1*
- - Trouble spécifique de la *F81.0*

Lefèvre
v. Papillon-Lefèvre

Legg-Calvé-Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [*M91.1*

Legionella pneumophila sans pneumonie ¬ Infection à *A48.2*

Légionellose ¬ *A48.1*

Légionnaires
- Pneumonie ¬ Maladie des *A48.1*
- Sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] ¬ Maladie des *A48.2*

Legius ¬ Syndrome de *Q85.0*

Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless *G25.81*

Lehmann
v. Borjeson-Forssman-Lehmann

Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C activée [mutation du facteur V *D68.5*

Leigh
- Cardiomyopathie ¬ Syndrome de *G31.88†, I43.8**
- Leucodystrophie ¬ Syndrome de *G31.88, E75.2*
- Syndrome néphrotique ¬ Syndrome de *G31.88†, N08.8**
- Transmission maternelle ¬ Maladie de *G31.88*
- Type
- - Franco-canadien ¬ Syndrome de *G31.88*
- - Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ Syndrome de *G31.88*
- ¬ Encéphalomyélopathie nécrosante subaiguë [syndrome de *G31.88*

Leiner-Moussous ¬ Maladie de *L21.1*

Léiomyomatose
- Diffuse ¬ Syndrome d'Alport lié à l'X- *Q87.8*
- Intravasculaire ¬ *D48.1*
- Péritonéale disséminée ¬ *D20.1*
- ¬ *D48.1*

Léiomyome
- Intramural de l'utérus ¬ *D25.1*
- Orbitaire ¬ *D31.6*
- Sous-muqueux de l'utérus ¬ *D25.0*
- Sous-séreux de l'utérus ¬ *D25.2*
- Utérin ¬ Accouchement en présence d'un *O34.1*
- Utérus

Léiomyome *–suite*
- Utérus *–suite*
- - Sans précision ¬ *D25.9*
- - ¬ *D25*

Léiomyosarcome
- Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Intestin grêle ¬ *C17.9*
- Mésentère ¬ *C48.1*
- ¬ *C49.9*

Leishmaniose
- Cutanée ¬ *B55.1*
- Cutanéo-muqueuse ¬ *B55.2*
- Dermique après kala-azar ¬ *B55.0*
- Sans précision ¬ *B55.9*
- Viscérale ¬ *B55.0*
- ¬
- - *B55*
- - Infection parasitaire de la paupière au cours de *B55.1†, H03.0**
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z26.0*

Lelis ¬ Syndrome de *Q87.8*

Lemierre ¬ Syndrome de *I80.88*

Lemli-Opitz ¬ Syndrome de: Smith- *Q87.1*

Lenaerts
v. Piussan-Lenaerts-Mathieu

Lenègre familiale ¬ Maladie de *I45.8*

Lennert ¬ Lymphome de *C84.4*

Lennox-Gastaut ¬ Syndrome
- *G40.4*

Lent
- Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome coronarien à flux *I20.8*
- Corps) ¬ Blessure de reperfusion (retour absent ou *T88.8*
- Fœtus, sans précision ¬ Croissance *P05.9*
- Nerf cubital ¬ Paralysie *G56.2*
- Nouveau-né ¬ Alimentation *P92.2*
- ¬
- - Constipation à transit *K59.00*
- - Endocardite (aiguë) (subaiguë): *I33.0*
- - ESES [état de mal épileptique électrique pendant le sommeil *G40.01*
- - Maladie due au VIH avec infection à virus *B20, A81.9*
- - POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil *G40.01*
- - Rythme cardiaque *R00.1*

Lenteur
- Manque de réactivité ¬ *R46.4*
- Travail SAI ¬ *O63.9*

Lenticulaire
v. hépato-lenticulaire

Lentigines
- Multiples familial ¬ Syndrome des *Q87.1*
- ¬ PUVA *L81.4*

Lentiginose
- Cardiomyopathique ¬ *Q87.1*
- Généralisée familiale ¬ *L81.4*

Lentigo ¬ *L81.4*

Lentille de contact ¬
- *Z97.8*
- Intolérance aux *H18.8*
- Iridocyclite due aux *H20.2*

Lentille intra-oculaire ¬ Complication mécanique d'une *T85.2*

Lentivirus ¬ *B97.3!*

Lenz ¬ Microphtalmie type *Q11.2*

Lenz-Majewski ¬ Nanisme de *Q87.1*

Léontiasis syphilitique congénitale ¬ *A50.5†, M90.89**

Lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, *D68.35*

Lepore-bêta-thalassémie ¬ Hémoglobine *D56.8*

Leprae ¬ infection à Mycobacterium *A30*

Lèpre
- Indéterminée ¬ *A30.0*
- Lépromateuse
- - Type intermédiaire atypique ¬ *A30.4*
- - ¬ *A30.5*
- Maladie de Hansen] ¬ *A30*
- Sans précision ¬ *A30.9*
- Tuberculoïde
- - Forme tuberculoïde (T)] ¬ *A30.1*
- - Type intermédiaire atypique ¬ *A30.2*
- Type intermédiaire atypique ¬ *A30.3*
- ¬
- - Formes de *A30.8*
- - Séquelles de *B92*

Lepréchaunisme ¬ *E34.8*

Lépromateuse
- BL) ¬ Borderline *A30.4*
- Polaire (LL) ¬ *A30.5*
- Type intermédiaire atypique ¬ Lèpre *A30.4*
- ¬ Lèpre *A30.5*

Leptine ¬ Obésité déficit
- Congénital en *E66.89*
- Récepteur de la *E66.89*

Leptoméninge ¬
- Gomme de la *A52.1†, G07**
- Neurosyphilis des *A52.1†, G01**
- Tuberculose *A17.0†, G01**

Leptoméningite
- Bactérienne ¬ *G00*
- Causes autres et non précisées ¬ *G03*
- Tuberculeux
- - Cérébrale ¬ *A17.0†, G01**
- - Spinale ¬ *A17.0†, G01**

Leptoméningite *–suite*
- Tuberculeux *–suite*
- - ¬ *A17.0†*

Leptospira
- Interrogans serovar icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirose à *A27.0*
- ¬ Méningite à *A27.9†, G01**

Leptospirose
- Ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] ¬ *A27.0*
- Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae ¬ *A27.0*
- Sans précision ¬ *A27.9*
- ¬
- - *A27*
- - Formes de *A27.8*

Lequesne] ¬ Ostéoporose localisée [*M81.6*

Leri
v. Roch-Leri

Léri II ¬ Syndrome de *Q78.8*

Leriche
- Fontaine
- - Gangrène ¬ Stade IV de *I70.25*
- - Ulcération ¬ Stade IV de *I70.24*
- - ¬
- - - AOMI type bassin-jambe stade
- - - - IIb de *I70.22*
- - - - III de *I70.23*
- - - - IV de *I70.25*
- - - - IVa de *I70.25*
- - - - IVb de *I70.25*
- - - Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI], sans précision du stade (de *I70.29*
- - - Gangrène
- - - - Humide, stade IVb de *I70.25*
- - - - Sèche, stade IVa de *I70.25*
- - - Stade
- - - - I de *I70.20*
- - - - IIa de *I70.21*
- - - - IIb de *I70.22*
- - - - III de *I70.23*
- - - Trouble circulatoire d'après *I70.29*
- ¬
- - Atrophie osseuse de Sudeck- *G90.5*
- - Syndrome de la bifurcation aortique [syndrome de *I74.0*

Léri-Weill ¬ Syndrome de *Q77.8*

Lerman
v. Ahn-Lerman-Sagie

Lermoyez ¬ Syndrome de *H81.3*

Leroy-Reiter] ¬ Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger- *M02.3*

Lesch-Nyhan ¬
- Arthropathie goutteuse au cours de syndrome de *E79.1†, M14.09**
- Syndrome de *E79.1*

Léser ou de tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre personne de *Y09.9!*

Leser-Trélat ¬ Maladie de *L82*

Létal
- Acantholytique ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.0*
- Congénitale type Compton-North ¬ Myopathie *G71.2*
- Déficit
- - Complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile *I42.2*
- - NADH-coenzyme Q réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile *I42.2*
- - NADH-CoQ réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile *I42.2*
- Infantile ¬ Myopathy mitochondriale *G71.3*
- Omphalocèle-fente palatine ¬ Syndrome *Q87.8*
- Type
- - Amish ¬ Microcéphalie *Q02*
- - Greenberg ¬ Dysplasie squelettique *Q77.3*
- ¬
- - Dysplasie facio-cardio-mélique *Q87.8*
- - Épidermolyse bulleux
- - - *Q81.1*
- - - Jonctionnelle *Q81.1*
- - Maladie de Gaucher périnatale *E75.2*
- - Myopathie précoce avec cardiomyopathie *G71.8*

Létalité
v. optique-létalité

Léthargie ¬ *R53*

Léthargique ¬ Encéphalite *A85.8†, G05.1**

Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt- *C96.0*

Leucémie
v.a. Pseudoleucémie
- Agressive à cellules NK ¬ *C94.7*
- Aigu
- - Basophiles ¬ *C94.7*
- - Biclonale ¬ *C95.0*
- - Biphénotypique ¬ *C95.0*
- - Cellules non précisées ¬ *C95.0*
- - Lignée mixte ¬ *C95.0*
- - Mégacaryocytes ¬ *C94.2*
- - Monoblastique ¬ *C93.00*
- - Myéloblastique avec différenciation minimale ¬ *C92.00*
- - Myéloïde
- - - Éosinophile médullaire anormal associé
- - - - Inv(16)(p13q22) ¬ *C92.50*
- - - - T(16;16)(p13;q22) ¬ *C92.50*
- - - Mutations somatiques de CEBPA ¬ *C92.00*
- Associée à une ostéosclérose ¬ *D47.4*
- Basophile ¬ *C94.30*

Leucémie *–suite*
- Cellule
- - Non précis ¬
- - - *C95*
- - - *C95.7*
- - Précisées ¬ Autres *C94*
- - Souches de lignée incertaine ¬ *C95.0*
- - T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1) ¬ Lymphome/ *C91.5*
- Chronique
- - Cellules non précisées ¬ *C95.1*
- - Éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] ¬ *D47.5*
- - Neutrophiles ¬ *D47.1*
- Grands lymphocytes T granuleux (associée à la polyarthrite rhumatoïde) ¬ *C91.7*
- Granulocytaire ¬ *C92*
- Granulocytique chronique ¬ *C92.10*
- Lymphoblastique aiguë ¬ *C91.00*
- Lymphocytique aiguë ¬ *C91.00*
- Lymphoïde
- - Aiguë [LLA] ¬ *C91.0*
- - Chronique [LLC] à cellules B ¬ *C91.1*
- - Sans précision ¬ *C91.9*
- - ¬
- - - *C91*
- - - *C91.7*
- Lymphoplasmocytoïde ¬ *C91.1*
- Mastocytes ¬
- - *C94.3*
- - Variante aleucémique de la *C94.30*
- Mégacaryocytaire aiguë ¬ *C94.2*
- Monoblastique/monocytaire aiguë ¬ *C93.0*
- Monocytaire
- - Chronique ¬
- - - *C93.1*
- - - *C93.10*
- - Naegeli
- - - Rémission complète ¬ *C93.11*
- - - ¬ *C93.10*
- - Sans précision ¬ *C93.9*
- - ¬ Autres *C93.7*
- Monocytoïde ¬ *C93*
- Myéloblastique aigu
- - Associée à une translocation t(8;16)(p11;p13) ¬ *C92.00*
- - LMA] ¬ *C92.0*
- - Type associée à une translocation t(8;21)(q22;q22) ¬ *C92.00*
- Myélogène
- - Chronique ¬ *C92.10*
- - ¬ *C92*
- Myéloïde
- - Aigu
- - - Altérations du gène MLL ¬ *C92.6*
- - - Anomalie 11q23 ¬ *C92.6*

Leucémie *–suite*
- Myéloïde *–suite*
- - Aigu *–suite*
- - - Associé
- - - - Inv(3)(q21q26.2) ¬ *C92.00*
- - - - Mutations somatiques de NPM1 ¬ *C92.00*
- - - - T
- - - - - 3;3)(q21;q26.2) ¬ *C92.00*
- - - - - 6;9)(p23;q34) ¬ *C92.00*
- - - - - 9;11)(p22;q23) ¬ *C92.00*
- - - Différenciation minimale ¬ *C92.0*
- - - Dysplasie multilinéaire ¬ *C92.8*
- - - M6 (a) (b) ¬ *C94.0*
- - - M7 ¬ *C94.2*
- - - Maturation) ¬ *C92.0*
- - - Mégacaryoblastique associée à t(1;22)(p13;q13) ¬ *C94.20*
- - - Réfractaire à un traitement d'induction ¬ *C92.00*
- - Chronique
- - - Atypique, BCR/ABL négative ¬ *C92.2*
- - - LMC
- - - - BCR/ABL positive ¬ *C92.1*
- - - - Chromosome Philadelphie (Ph1) positive ¬ *C92.1*
- - - - ¬ Crise blastique au cours d'une *C94.8!*
- - - T(9;22) (q34;q11) ¬ *C92.1*
- - Sans précision ¬ *C92.9*
- - ¬
- - - *C92*
- - - *C92.7*
- - - Poussée blastique au cours de *C92.10, C94.8!*
- Myélomonocytaire
- - Aiguë ¬ *C92.5*
- - Juvénile ¬ *C93.3*
- Plasmocytaire
- - Rémission complète ¬ *C90.11*
- - ¬ *C90.1*
- Plasmocytes ¬ *C90.1*
- Précisées ¬ Autres *C94.7*
- Prolymphocytaire cellule
- - B ¬ *C91.3*
- - T ¬ *C91.6*
- Promyélocytaire
- - Aiguë ¬ *C92.4*
- - Cellules T ¬ *C91.60*
- Réfractaire au traitement d'induction standard ¬ *C95.8!*
- Sans précision ¬ *C95.9*
- Secondaire due à l'irradiation ¬ *C95.90*
- Tricholeucocytes
- - Variante ¬ *C91.40*
- - ¬ *C91.4*
- ¬

Leucémie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Antécédent
- - - Familiaux de *Z80.6*
- - - Personnels de *Z85.6*
- - Arthrite au cours de *C95.90†, M36.1**
- - Arthropathie au cours de *C95.90†, M36.1**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *C95.90†, N16.1**
- - Pyélonéphrite au cours de *C95.90†, N16.1**
- - Trouble tubulo-interstitiel au cours de *C95.90†, N16.1**

Leucémique
v.a. réticulo-leucémique
- LLC-B ¬ Variante non *C83.0*
- ¬
- - Péricardite *C95.90†, I32.8**
- - Réticulo-endothéliose *C91.4*

Leucémoïde type
- Lymphocytaire ¬ Réaction *D72.8*
- Monocytaire ¬ Réaction *D72.8*
- Myélocytaire ¬ Réaction *D72.8*

Leucinose ¬ *E71.0*

Leuco
- Érythroblastique ¬ Anémie *D64.8*
- Œdème de l'épithélium buccal, y compris la langue ¬ *K13.2*

Leucocytaire
- Anormale SAI ¬ Formule *R72*
- Héréditaire ¬
- - Hypersegmentation *D72.0*
- - Hyposegmentation *D72.0*

Leucocytes
- Sans précision ¬ Anomalie des *D72.9*
- Type II ¬ Déficit d'adhésion des *D84.8*
- ¬ anomalie
- - *D72*
- - Génétiques des *D72.0*
- - Précisées des *D72.8*

Leucocytoclasique ¬ Angéite cutanée *M31.0*

Leucocytose ¬ *D72.8*

Leucoderme
- Syphilitique tardif ¬ *A52.7†, L99.8**
- ¬ Syphilis
- - *A51.3†, L99.8**
- - Tardive symptomatique avec *A52.7†, L99.8**

Leucodermie, non classée ailleurs ¬ *L81.5*

Leucodystrophie
- Cellules globoïdes ¬ *E75.2*
- Cérébrale ¬ *E75.2*
- Déficit en DECR ¬ Encéphalopathie progressive avec *G31.81*
- Hypomyélinisante autosomique récessive associée à VPS11 ¬ *E75.2*
- Métachromatique ¬
- - *E75.2*

Leucodystrophie *–suite*
- Métachromatique ¬ *–suite*
- - Maladie de Greenfield [*E75.2*
- Sudanophile
- - Pelizaeus-Merzbacher ¬ *E75.2*
- - ¬ *E75.2*
- ¬
- - Atrophie optique au cours de *E75.2†, H48.0**
- - Syndrome de Leigh avec *G31.88, E75.2*

Leucoencéphalite
- Hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst] ¬ *G36.1*
- Multifocale ¬ Maladie due au VIH avec *B22†, G05.1**

Leucoencéphalopathie
- Ataxie cérébelleuse modérée et Œdème de la substance blanche ¬ *E75.2*
- Atteinte du tronc cérébral et de la moelle épinière-élévation des lactates ¬ Syndrome de *G31.81*
- Héréditaire diffuse à sphéroïdes axonaux et cellules gliales pigmentées ¬ *E75.2*
- Mégalencéphalique avec kystes sous-corticaux ¬ *E75.2*
- Métachromatique ¬ *E75.2*
- Multifocale
- - Progressive ¬ *A81.2*
- - SAI ¬ *A81.2*
- Postérieure réversible (SLEPR) ¬ Syndrome de *G93.6*
- Sclérosante de Van Bogaert ¬ *A81.1*
- Vasculaire progressive ¬ *I67.3*
- ¬ Ataxie spastique autosomique récessive avec *G11.4*

Leucokératose nicotinique du palais ¬ *K13.2*

Leucomalacie cérébrale néonatale ¬ *P91.2*

Leucome adhérent ¬ *H17.0*

Leucomélanopathie héréditaire ¬ *D72.0*

Leuconychie congénitale ¬ *Q84.4*

Leucopénie
- Traitement cytostatique ¬ *D70.19*
- ¬ Arthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et *M05.0*

Leucoplasie
- Anomalies de l'épithélium buccal, y compris la langue ¬ *K13.2*
- Col de l'utérus ¬ *N88.0*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Muqueuse buccale ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, K13.2*
- Vagin ¬ *N89.4*
- Verge ¬ *N48.0*
- Vulve ¬ *N90.4*

Leucorrhée
- SAI ¬ *N89.8*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N77.1**
- Vaginale) à Trichomonas (vaginalis) ¬ *A59.0*

Leucosarcome
- Rémission complète ¬ *C85.9*
- ¬ *C85.9*

Leukopathia universalis ¬ *E70.3*

Lev familiale ¬ Maladie de *I45.8*

Leventhal ¬ Syndrome (de): Stein- *E28.2*

Lévi ¬ Syndrome de: Lorain- *E23.0*

Levin ¬ Syndrome de Kleine- *G47.8*

Levine ¬ Syndrome de: Lown-Ganong- *I45.6*

Lévocardie
- Situs inversus ¬ *Q24.1*
- ¬ *Q24.1*

Lèvre
- Bord libre) (face intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ *D10.0*
- Cavité buccal
- - Bouche, partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la *S01.50*
- - Gencive (processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la *S01.53*
- - Langue et plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la *S01.54*
- - Lèvre et de la cavité buccale: Lèvre ¬ Plaie ouverte de la *S01.51*
- - Muqueuse de la joue ¬ Plaie ouverte de la *S01.52*
- - Palais ¬ Plaie ouverte de la *S01.55*
- - Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ Plaie ouverte de la *S01.59*
- - Pharynx
- - - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de la *C14*
- - - ¬
- - - - Carcinoma in situ: *D00.0*
- - - - Tumeur
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.0*
- - - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës de la *C14.8*
- - ¬
- - - Blessure superficielle de la *S00.5*
- - - Plaie ouverte
- - - - *S01.5*
- - - - Lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des *S01.59*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*
- Doigts ¬ Malocclusion due à: habitudes impliquant la langue, les *K07.5*
- Externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes avec ou sans excision des *Z91.72*
- Génitales ¬ Maladie de Queyrat des *D07.1*
- Grandes) (petites) ¬ *S38.2*
- Inférieur
- - Bord libre ¬ Tumeur maligne: *C00.1*
- - Extérieur ¬ *C00.1*
- - Face

Lèvre *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - Face *–suite*
- - - Interne ¬ Tumeur maligne: *C00.4*
- - - Muqueuse ¬ *C00.4*
- - - Orale ¬ *C00.4*
- - Frein ¬ *C00.4*
- - Muqueuse ¬ *C00.4*
- - SAI ¬ *C00.1*
- - Sillon mentolabial ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la *C44.0*
- - Zone d'application du rouge à lèvres ¬ *C00.1*
- Internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des *Z91.72*
- Muqueuse buccale ¬ Autres maladies des *K13*
- Non classées ailleurs ¬ Malformations congénitales des *Q38.0*
- SAI ¬
- - Extérieur de la *C00.2*
- - Malformation congénitale de la *Q38.0*
- Sans
- - Ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes *Z91.73*
- - Indication inférieur supérieur
- - - Face
- - - - Muqueuse ¬ *C00.5*
- - - - Orale ¬ *C00.5*
- - - Frein ¬ *C00.5*
- - - Muqueuse ¬ *C00.5*
- - Précision
- - - Bord libre ¬ Tumeur maligne: *C00.2*
- - - Face interne ¬ Tumeur maligne: *C00.5*
- - - ¬ Tumeur maligne: *C00.9*
- Supérieur
- - Bord libre ¬ Tumeur maligne: *C00.0*
- - Extérieur ¬ *C00.0*
- - Face
- - - Interne ¬ Tumeur maligne: *C00.3*
- - - Muqueuse ¬ *C00.3*
- - - Orale ¬ *C00.3*
- - Frein ¬ *C00.3*
- - Muqueuse ¬ *C00.3*
- - Nez ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la *C44.0*
- - SAI ¬ *C00.0*
- - Zone d'application du rouge à lèvres ¬ *C00.0*
- Virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite vésiculaire de: *B00.1*
- Vulve (grande) (petite) ¬ *T21*
- ¬

Lèvre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *T20*
- - Bord libre de la *D00.0*
- - Carcinoma in situ: Peau de la *D04.0*
- - Carcinome
- - - Basocellulaire de la *C44.0*
- - - Épidermoïde de la *C00.9*
- - Extérieur de la *D37.0*
- - Fistule congénitale de la *Q38.0*
- - Herpes simplex de: *B00.1*
- - Hypertrophie
- - - *N90.6*
- - - Congénitale de la *Q18.6*
- - Lèvre
- - - Inférieure: zone d'application du rouge à *C00.1*
- - - Supérieure: zone d'application du rouge à *C00.0*
- - Maladies des *K13.0*
- - Mélanome
- - - In situ de la *D03.0*
- - - Malin de la *C43.0*
- - Morsure de la joue et de la *K13.1*
- - Nævus à mélanocytes de la *D22.0*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.51*
- - Polype des *N84.3*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, K93.8**
- - Tuberculose des *A18.8†, K93.8**
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - *D10.0*
- - - - Peau de la *D23.0*
- - - Malign
- - - - *C00*
- - - - Commissure des *C00.6*
- - - - Face cutanée de la *C44.0*
- - - - Grande *C51.0*
- - - - Lésion à localisations contiguës de la *C00.8*
- - - - Petite *C51.1*

Lévulose ¬ Intolérance héréditaire à la *E74.1*

Lévuride] ¬ Candidide [*L30.2*

Lévy
v. Roussy-Lévy
v. Stoll-Lévy-Francfort

Lewandowsky-Lutz ¬ Syndrome de *B07*

Lewy ¬
- Démence à corps de *G31.82†, F02.8**
- Maladie à corps de *G31.82*

Leydig
v. Sertoli-Leydig

Lézard ¬ Venin de *T63.1*

LFA-1) ¬ Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (*D84.0*

LGMD Limb-girdle muscular dystrophy Typ
- 2D ¬ *G71.0*
- 2E ¬ *G71.0*

LGMD1B ¬ *G71.0*

LGMD2C ¬ *G71.0*

LGMD2F ¬ *G71.0*

LGMD2I ¬ *G71.0*

LGMD2K ¬ *G71.0*

LGMD2M ¬ *G71.0*

LHF ¬ *D76.1*

LHON ¬ *H47.2*

Liaison du facteur de croissance ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la protéine de *R77.88*

Libération
- Cytokine
- - Cytokine release syndrome] ¬ Syndrome de *D76.4*
- - Immunothérapie ¬ Syndrome de *D76.4*
- - Thérapie cellulaire CAR-T ¬ Syndrome de *D76.4*
- - ¬ Syndrome de *T88.7*
- Prison ¬ Difficultés liées à une *Z65*

Liberté ¬ Emprisonnement et autres formes de privation de *Z65*

Libman-Sacks ¬
- Maladie de *M32.1†, I39.8**
- Syndrome de *M32.1†, I39.8**

Lichen
- Amyloïde ¬ *E85.4†, L99.0**
- Bulleux ¬ *L43.1*
- Myxœdémateux nodulaire ¬ *L98.5*
- Nitidus ¬ *L44.1*
- Plan
- - Annulaire
- - - Atrophique ¬ *L43.8*
- - - ¬ *L43.8*
- - Atrophique ¬ *L43.8*
- - Bulleux ¬ *L43.1*
- - Folliculaire ¬ *L66.1*
- - Hypertrophique ¬ *L43.0*
- - Linéaire ¬ *L43.8*
- - Pigmentaire ¬ *L43.8*
- - Sans précision ¬ *L43.9*
- - Subaigu (actif) ¬ *L43.3*
- - Tropical ¬ *L43.3*
- - ¬ *L43*
- Plano-pilaire ¬ *L66.1*
- Ruber moniliforme ¬ *L44.3*
- SAI ¬ *L28.0*
- Scléreux et atrophique ¬ *L90.0*
- Simplex chronique
- - Prurigo ¬ *L28*
- - Vidal] ¬ *L28.0*
- Strié ¬ *L44.2*

Lichéniforme
- Papulaire et sclérodermoïde généralisé ¬ Myxœdématose *L98.5*
- ¬ Myxœdématose *L98.5*

Lichénoïde
- Chronique ¬ Pityriasis *L41.1*
- Médicamenteuse ¬ Réaction *L43.2*
- Varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] ¬ Pityriasis *L41.0*

Lichens plans ¬ Autres *L43.8*

Lichtenstein
v. Jaffe-Lichtenstein

Liddle ¬ Syndrome de *I15.10*

Lié
- Développement
- - Dentaire ¬ Kystes de la région buccale non *K09.1*
- - Odontogènes) ¬ Kystes dentaires *K09.0*
- Grossesse] sans hypertension ¬ Œdème et protéinurie gestationnels [*O12*
- Prédisposition
- - Cardiomyopathies ¬ Examens *Z01.81*
- - Dysrythmies malignes ¬ Examens *Z01.80*
- Utilisation
- - Alcool ¬ Troubles mentaux et du comportement *F10*
- - Cocaïne ¬ Troubles mentaux et du comportement *F14*
- - Dérivés du cannabis ¬ Troubles mentaux et du comportement *F12*
- - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement *F19*
- - Hallucinogènes ¬ Troubles mentaux et du comportement *F16*
- - Opiacés ¬ Troubles mentaux et du comportement *F11*
- - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles mentaux et du comportement *F13*
- - Solvants volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement *F18*
- - Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du comportement *F15*
- - Substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles *F19*
- - Tabac ¬ Troubles mentaux et du comportement *F17*

Liebenberg ¬ Syndrome de *Q73.8*

Liège ¬ Maladie poumon
- Manipulateurs de *J67.3*
- Travailleurs du *J67.3*

Lieu
- Naissance
- - Non précis ¬
- - - Enfant unique, *Z38.2*
- - - Jumeaux, *Z38.5*
- - - Naissances multiples, *Z38.8*
- - ¬ Enfants nés vivants, selon le *Z38*

Lieu *–suite*

- Où

- - Maladie de Chagas est répandue ¬ Trypanosomiase: SAI, en des *B57.2*

- - Trypanosomiase africaine est répandue ¬ Trypanosomiase SAI, en des *B56.9*

Ligament

- Acromio-claviculaire ¬ *S43.5*

- Calcanéopéronier ¬ Entorse et foulure de la cheville: *S93.42*

- Capsulaire ¬

- - Instabilité chronique du genou: *M23.57*

- - Lésion interne genou

- - - *M23.87*

- - - Sans précision: *M23.97*

- - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.67*

- Ceinture scapulaire ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S43*

- Collatéral

- - Cubital ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.42*

- - Médial du genou ¬ Distorsion du *S83.42*

- - Radial ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.41*

- Coraco-huméral ¬ *S43.4*

- Coude ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S53*

- Crico

- - Aryténoïdien(ne) ¬ Articulation (*S13.5*

- - Thyroïdien(ne) ¬ Articulation (*S13.5*

- Croisé

- - Antérieur

- - - Corne antérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.91*

- - - ¬

- - - - Entorse

- - - - - Foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Déchirure du *S83.53*

- - - - - Foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Distorsion du *S83.51*

- - - - Instabilité chronique du genou: *M23.51*

- - - - Lésions internes du genou: *M23.81*

- - - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.61*

- - Genou antérieur postérieur

- - - Déchirure ligament croisé

- - - - Antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.53*

- - - - Postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.54*

- - - Distorsion ligament croisé

- - - - Antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.51*

Ligament *–suite*

- Croisé *–suite*

- - Genou antérieur postérieur *–suite*

- - - Distorsion ligament croisé *–suite*

- - - - Postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.52*

- - - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et foulure des *S83.50*

- - - ¬ Entorse et foulure des *S83.5*

- - Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.50*

- - Postérieur

- - - Corne postérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.92*

- - - ¬

- - - - Entorse

- - - - - Foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Déchirure du *S83.54*

- - - - - Foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Distorsion du *S83.52*

- - - - Instabilité chronique du genou: *M23.52*

- - - - Lésions internes du genou: *M23.82*

- - - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.62*

- - SAI ¬ Déchirure de *S83.50*

- Cubito-carpien (palmaire) ¬ *S63.3*

- Deltoïde ¬ Entorse et foulure de la cheville: *S93.41*

- Doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ Rupture traumatique de *S63.4*

- Externe

- - Ligament péronier collatéral

- - - Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.94*

- - - ¬

- - - - Instabilité chronique du genou: *M23.54*

- - - - Lésions internes du genou: *M23.84*

- - ¬ Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.64*

- Genou ¬

- - Laxité des *M23.8*

- - Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S83*

- Gléno-huméral (supérieur) (moyen) (inférieur) ¬ *S43.4*

- Hanche ¬ Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des *S73*

- Iliofémoral ¬ Entorse et foulure de la hanche: (*S73.11*

- Interne

- - Ligament tibial collatéral

- - - Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.93*

- - - ¬

Ligament *–suite*

- Interne *–suite*

- - Ligament tibial collatéral *–suite*

- - - ¬ *–suite*

- - - - Instabilité chronique du genou: *M23.53*

- - - - Lésions internes du genou: *M23.83*

- - ¬ Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.63*

- Ischiocapsulaire ¬ Entorse et foulure de la hanche: (*S73.12*

- Large

- - Allen-Masters] ¬ Syndrome de déchirure du *N83.8*

- - Précisé aigu ¬ Abcès de: *N73.0*

- - SAI ¬ Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*

- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*

- - ¬

- - - Absence de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*

- - - Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du *N83.8*

- - - Atrésie de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*

- - - Hématome du *N83.7*

- - - Kyste embryonnaire du *Q50.5*

- - - Malformation congénital

- - - - Ovaires, des trompes de Fallope et des *Q50*

- - - - Trompes de Fallope et des *Q50.6*

- - - Présence en surnombre de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*

- - - Tuberculose du *A18.1†, N74.1**

- - - Tumeur maligne: *C57.1*

- Latéral

- - Croisés) ¬ Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les *S83.7*

- - Externe du coude ¬ Rupture traumatique du *S53.2*

- - Genou interne externe

- - - Déchirure ligament latéral

- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des *S83.43*

- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des *S83.44*

- - - Distorsion ligament latéral

- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des *S83.41*

- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des *S83.42*

- - - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et foulure des *S83.40*

- - - ¬ Entorse et foulure des *S83.4*

- - Interne

- - - Coude ¬ Rupture traumatique du *S53.3*

- - - Genou [Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du *M76.4*

Ligament *–suite*

- Latéral *–suite*
- - Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.40*
- - Péronier Ligament latéral ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du *S83.43*
- - - Distorsion du *S83.41*
- - Tibial Ligament médian ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du *S83.44*
- - - Distorsion du *S83.42*
- - ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du ligament latéral péronier (*S83.43*
- - - Distorsion du ligament latéral péronier (*S83.41*
- Longitudinal
- - Antérieur cervical ¬ *S13.4*
- - Postérieur [OLLP] ¬ Ossification du *M48.8*
- Médian ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral tibial (*S83.44*
- - Distorsion du ligament latéral tibial (*S83.42*
- Méninges ¬ Constriction anormale congénitale d'un *Q07.8*
- Niveau
- - Cheville pied ¬
- - - Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S93*
- - - Rupture de *S93.2*
- - Cou ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S13*
- - Poignet et de la main ¬ Luxation, entorse et foulure d'articulations et de *S63*
- Non précis
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un *T13.2*
- - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un *T11.2*
- - Ménisque non précisé ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.99*
- - Tronc ¬ Luxation, entorse et foulure d'articulation et de *T09.2*
- - ¬
- - - Instabilité chronique du genou: *M23.59*
- - - Lésions internes du genou: *M23.89*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.69*
- Partie non précis
- - Cou ¬ Entorse et foulure des articulations et des *S13.6*
- - Tête ¬ Entorse et foulure de l'articulation et des *S03.5*
- Pelviens ¬ Lésions obstétricales intéressant les articulations et les *O71.6*

Ligament *–suite*

- Péronier collatéral
- - Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament externe [*M23.94*
- - ¬
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament externe [*M23.54*
- - - Lésions internes du genou: Ligament externe [*M23.84*
- Poignet et du carpe ¬ Rupture traumatique de *S63.3*
- Rachis lombaire et du bassin ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S33*
- Radio-carpien ¬
- - *S63.3*
- - Entorse et foulure du poignet: (Articulation) (*S63.52*
- Rond ¬ Tumeur maligne: *C57.2*
- Rotulien ¬ *S76.1*
- S genou
- - Ligament
- - - Capsulaire ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.67*
- - - Croisé
- - - - Antérieur ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.61*
- - - - Postérieur ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.62*
- - - Externe] ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.64*
- - - Interne ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.63*
- - - Non précisé ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.69*
- - Localisations multiples ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.60*
- - ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.6*
- SAI ¬
- - Arrachement de *T14.3*
- - Déchirure traumatique de *T14.3*
- - Entorse de *T14.3*
- - Foulure de *T14.3*
- - Hémarthrose traumatique de *T14.3*
- - Lacération de *T14.3*
- - Rupture traumatique de *T14.3*
- - Subluxation traumatique de *T14.3*
- Sauf utérus ¬
- - *C49*
- - *D21*
- Tarsien ¬ *S93.6*
- Tarso-métatarsien ¬ *S93.6*
- Tête ¬ Luxation, entorse et foulure d'articulations et de *S03*
- Thorax ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S23*
- Tibial collatéral
- - Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [*M23.93*

Ligament *–suite*

- Tibial collatéral *–suite*
- - ¬
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament interne [*M23.53*
- - - Lésions internes du genou: ligament interne [*M23.83*
- Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et foulure de la cheville: *S93.43*
- Utérus
- - Large) (rond) ¬ *D28.2*
- - SAI ¬ *C57.3*
- - ¬ Tumeur bénigne: Trompe et *D28.2*
- Volaire ¬ *S63.4*
- ¬
- - Articulation
- - - Temporo-mandibulaire (*S03.4*
- - - Tibio-péronière supérieure et ses *S83.6*
- - Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de ses *S33.51*

Ligamentaire

- Familiale ¬ Laxité *M35.7*
- Musculaires de la colonne vertébrale ¬ Atteinte des insertions *M46.0*
- Retard de développement ¬ Syndrome de cutis laxa-hyperlaxité *Q82.8*
- SAI ¬
- - Déchirure *S83.40*
- - Laxité *M24.2*
- ¬
- - Instabilité secondaire à une ancienne atteinte *M24.2*
- - Lésion *M24.2*
- - Xanthome *E75.5*

Ligase

- 4 ¬ Syndrome *D81.1*
- IV ¬ Déficit en DNA *D81.1*

Ligature

- Ombilicale SAI ¬ Glissement de la *P51.8*
- Trompes de Fallope ou vasectomie ¬ Admission pour *Z30.2*

Lightwood-Albright] ¬ Acidose tubulaire de type I[Syndrome de *N25.8*

Lignac ¬

- Syndrome de *E72.0*
- Thésaurismose cystinique (maladie de *E72.0*

Ligne

- Beau ¬ *L60.4*
- Blanc ¬ Hernie
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- Médian
- - Causant une occlusion ¬ Hernie de la *K43.68*
- - Étranglée ¬ Hernie de la *K43.68*
- - Incarcérée ¬ Hernie de la *K43.68*

Ligne *–suite*
- Médian *–suite*
- - Non réductible ¬ Hernie de la *K43.68*
- Stähli ¬ *H18.0*
- ¬
- - Mycobactérie
- - - Atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première *U82.2!*
- - - Résistantes aux antituberculeux (de première *U82!*
- - Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première *U82.0!*
- - Tuberculose avec résistance au médicament de première *A16.9, U82.0!*

Lignée
- Incertaine ¬ Leucémie à cellules souches de *C95.0*
- Mixte ¬ Leucémie aiguë de *C95.0*
- S) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) *Q96.4*

Lignées avec divers nombres de chromosomes X ¬ Mosaïque chromosomique, *Q97.2*

Ligneux ¬
- Conjonctivite *H10.4*
- Thyroïdite (de): *E06.5*

Limb-girdle muscular dystrophy Typ
- 2D ¬ LGMD [*G71.0*
- 2E ¬ LGMD [*G71.0*

Limbique
- Aiguë après transplantation ¬ Encéphalite *T85.78†, G05.1**
- Neuromyotonie-hyperhidrose-polyneuropathie ¬ Syndrome d'encéphalite *G60.8*
- Paranéoplasique ¬ Encéphalopathie *D48.9†, G13.1**
- ¬ Psychosyndrome de l'épilepsie du système *F07.0*

Limb-mammary ¬ Syndrome *Q87.2*

Limitation
- Complète des mouvements ¬ Raideur articulaire avec *M25.69*
- Fonctionnel
- - Cognitif
- - - Moyenne ¬ *U51.1*
- - - Sévère ¬ *U51.2*
- - - ¬
- - - - *U51*
- - - - Aucune limitation ou légère *U51.0*
- - Motrice
- - - Moyenne ¬ *U50.2*
- - - Moyennement sévère ¬ *U50.3*
- - - Sévère ¬
- - - - *U50.4*
- - - - *U50.5*
- - - ¬

Limitation *–suite*
- Fonctionnel *–suite*
- - Motrice *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - *U50*
- - - - Aucune limitation ou légère *U50.0*
- - - - Légère *U50.1*
- Léger limitation fonctionnel
- - Cognitive ¬ Aucune *U51.0*
- - Motrice ¬ Aucune *U50.0*
- Partielle des mouvements ¬ Raideur articulaire avec *M25.69*
- Traumatique des mouvements des muscles oculaires ¬ *H50.6*

Limite
- Imposées aux activités par une incapacité ¬ *Z73*
- Malignité ¬
- - Cystadénome mucineux de l'ovaire à la *C56*
- - Tumeur épithéliale de l'ovaire, à la *C56*
- ¬
- - Dextrinose *E74.0*
- - Glaucome *H40.0*

Limité
- Circonscrit tissu cérébral
- - SAI ¬ Atteinte *S06.30*
- - ¬ Atteinte *S06.3*
- Émail ¬ Carie *K02.0*
- Milieu familial ¬ Trouble des conduites *F91.0*
- Œil et ses annexes ¬ Brûlure et corrosion *T26*
- Organe donné ¬ examen de routine *Z01*
- Peau
- - Derme] et au tissu sous-cutané ¬ Déficit tissulaire *I70.24*
- - Non classée ailleurs ¬ Vascularite [angéite] *L95*
- - Sans précision ¬ Vascularite *L95.9*
- - ¬ Autres vascularites *L95.8*
- Plusieurs organe(s) ¬ Amylose *E85.4*
- ¬ Sclérose systémique cutanée *M34.1*

Lindau
v. von Hippel-Lindau

Linéaire
- Moulin ¬ Atrophodermie *L90.8*
- Spiralée ¬ Hypermélanose naevoïde *L81.4*
- ¬
- - Dermatose à IgA *L13.8*
- - Elastose focale *L94.8*
- - Érythème gingival *K05.1*
- - Lichen plan *L43.8*
- - Sclérodermie *L94.1*
- - Syndrome du nævus sébacé *Q85.8*

Linéaireichtyose congénitale-kératodermie sclérosante ¬ Syndrome de kératose *Q82.8*

Lingual
- Postérieure des dents inférieures ¬ Occlusion *K07.2*
- ¬
- - Amygdale *D10.1*
- - Arrachement du frein *S01.54*
- - Déchirure du frein *S01.54*
- - Hypertrophie des papilles *K14.3*
- - Kyste *K14.8*
- - Syphilis tardive des amygdales *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur maligne: Amygdale *C02.4*

Linguatulose ¬ *B88.8*

Linite plastique de l'estomac ¬ *C16.9*

Lipase
- Acide lysosomale ¬ Déficit en *E75.5*
- Colipase pancréatique ¬ Déficit combiné en *K90.3*
- Hépatique ¬ Hyperlipidémie due à un déficit en *E78.4*
- Pancréatique ¬ Déficit en triglycéride *K90.3*
- Triacylglycerol lipase] ¬ Anomalies des taux de: *R74.8*
- ¬ Anomalies des taux de: lipase [triacylglycerol *R74.8*

LIPE ¬ Lipodystrophie partielle familiale associée à *E88.1*

Lipidémies ¬ Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres *E78*

Lipides
- Sans précision ¬ Anomalie du stockage des *E75.6*
- ¬
- - Anomalie
- - - Métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des *E75*
- - - Stockage des *E75.5*
- - Démence au cours de trouble cérébral du métabolisme des *E75.6†, F02.8**
- - Dystrophie rétinienne au cours de maladie de stockage des *E75.6†, H36.8**
- - Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*
- - Myopathie au cours de maladie de stockage des *E75.6†, G73.6**

Lipidose
- Cérébral ¬
- - *E75.4*
- - Dégénérescence cérébrale au cours de *E75.4†, G32.8**
- Cérébrorétinienne ¬ *E75.4*
- Cérébroside ¬ *E75.2*
- Généralisée ¬ Dégénérescence cérébrale au cours de *E75.6†, G32.8**
- Glycolipoïde ¬ *E75.2*
- Sulfatidose ¬ *E75.2*
- Surcharge triglycéride
- - Ichtyose ¬ *E75.5*
- - ¬ *E75.5*

Lipidose *–suite*
- Systémique ¬ Dystrophie rétinienne au cours de *E75.6†, H36.8**
- ¬ *E75.6*

Lipo-atrophie
- Localisée due à la pression ¬ *E88.1*
- ¬ *E88.1*

Lipodystrophie
- Centrifuge ¬ *E88.1*
- Céphalothoracique progressive ¬ *E88.1*
- Congénital
- - Berardinelli-Seip ¬ *E88.1*
- - Généralisé
- - - Myopathie ¬ *E88.1*
- - - Type 4 ¬ *E88.1*
- Généralisée acquise ¬ *E88.1*
- Intestinale ¬ *K90.8*
- Localisée médicamenteuse ¬ *E88.1*
- Non classée ailleurs ¬ *E88.1*
- Partiel
- - Acquise ¬ *E88.1*
- - Familial
- - - Associé
- - - - AKT2 ¬ *E88.1*
- - - - CIDEC ¬ *E88.1*
- - - - LIPE ¬ *E88.1*
- - - - PLIN1 ¬ *E88.1*
- - - - PPARG ¬ *E88.1*
- - - Dunnigan ¬ *E88.1*
- - - Type Köbberling ¬ *E88.1*
- - - ¬ *E88.1*
- SAI ¬ *E88.1*

Lipœdème
- Lipœdème non précisé ¬ Autre *E88.28*
- Non précisé ¬ Autre lipœdème ou *E88.28*
- Stade
- - I ¬ *E88.20*
- - II ¬ *E88.21*
- - III ¬ *E88.22*
- ¬ *E88.28*

Lipofuscinose
v.a. Céroïde-lipofuscinose
- Céroïdes neuronaux ¬ *E75.4*
- Neuronale ¬ *E75.4*

Lipogranulomatose
- Farber ¬ *E75.2*
- Généralisée ¬ *E78.8*

Lipohypertrophie
- Symétrique membre localisé douloureux œdème
- - Augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ *E88.22*
- - SAI ¬ *E88.28*
- - Stade non précisé ¬ *E88.28*
- - Surface cutané

Lipohypertrophie *–suite*
- Symétrique membre localisé douloureux œdème *–suite*
- - Surface cutané *–suite*
- - - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ *E88.21*
- - - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ *E88.20*
- ¬ *E88.29*

Lipoïde
- Essentielle ¬ Histiocytose *E75.2*
- Surrénales par déficit en STAR ¬ Hyperplasie congénitale *E25.08*
- ¬ Dermato-arthrose *M14.3**

Lipoïdique
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ Nécrobiose *E10.60†, L99.8**
- - - 2 ¬ Nécrobiose *E11.60†, L99.8**
- - ¬ Nécrobiose *E14.60†, L99.8**
- Non classée ailleurs ¬ Nécrobiose *L92.1*
- ¬
- - Dermato-arthrite *E78.8†, M14.39**
- - Histiocytose *C96.6*
- - Néphrose *N04*

Lipoïdose
- Aorte ¬ *E75.6*
- Endocarde ¬ *E75.6*
- Larynx ¬ *E75.6*

Lipomateuse bénin
- Cordon spermatique ¬ Tumeur *D17.6*
- Organe
- - Intra-abdominaux ¬ Tumeur *D17.5*
- - Intrathoraciques ¬ Tumeur *D17.4*
- Peau tissu sous-cutané
- - Membres ¬ Tumeur *D17.2*
- - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur *D17.3*
- - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur *D17.0*
- - Tronc ¬ Tumeur *D17.1*
- Sans précision ¬ Tumeur *D17.9*
- Sièges ¬ Tumeur *D17.7*
- ¬ Tumeur *D17*

Lipomatose
- Douloureuse [maladie de Dercum] ¬ *E88.29*
- Encéphalo-crâniocutanée ¬ *E88.29*
- Mésosomatique de Roch-Leri ¬ *E88.29*
- Multiple familiale ¬ *E88.29*
- Multiple-hémihyperplasie ¬ Syndrome de la *Q87.3*
- Non classé ¬
- - *E88.2*
- - *E88.29*
- SAI ¬ *E88.29*

Lipome
- Sacré ¬ Syndrome de fente labiopalatine-surdité- *Q87.8*
- SAI ¬ *D17.9*
- Sein ¬ *D17.1*

Lipomélanique ¬ Réticulose *I89.8*

Lipomucopolysaccharidose ¬ *E77.1*

Lipomyéloméningocèle
- Anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un *Q87.8*
- ¬ *Q05.9*

Liponeurocytome cérébelleux ¬ *D43.1*

Liponyssoides sanguineus ¬ Dermite (due à): *B88.0*

Lipophagique intestinale ¬ Granulomatose *K90.8†, M14.89**

Lipoprotéinémie
v. bêtalipoprotéinémie

Lipoprotéines
- Basse densité
- - LDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à *E78.0*
- - VLDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à *E78.1*
- Haute densité ¬ Déficit en: *E78.6*
- Lipidémies ¬ Anomalies du métabolisme des *E78*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E78.9*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme des *E78.8*
- - Déficit en *E78.6*
- - Glomérulopathie à *N07.8*

Liporéticulose ¬ *C96.6*

Liposarcome ¬ *C49.9*

Lipotropes ¬ *T50.9*

Liquide
- Amniotique
- - Membrane
- - - Sans précision ¬ Anomalie du *O41.9*
- - - ¬ anomalie
- - - - *O41*
- - - - Précisées du *O41.8*
- - Mucus ¬ Aspiration néonatale de *P24.1*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- - ¬
- - - Présence de méconium dans le *P20*
- - - Travail accouchement compliqué
- - - - Anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le *O68.2*
- - - - Présence de méconium dans le *O68.1*
- Brûlants ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Céphalorachidien
- - Postopératoire ¬ Fistule de *G97.80*
- - Rachicentèse ¬ Écoulement de *G97.0*
- - ¬

Liquide *–suite*
- Céphalorachidien *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Écoulement de *G96.0*
- - - Présence d'un appareil de drainage du *Z98.2*
- - - Résultats anormaux de l'examen du *R83*
- Clair ¬ Méningite à *G03.0*
- Corrosif ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- Extracellulaire ¬ Déplétion du volume du plasma ou du *E86*
- Péritonéal ¬ Résultats anormaux de: *R85*
- Pleural ¬ Résultats anormaux de: *R84*
- Séminal ¬ Résultats anormaux de: sperme, *R86*
- Synovial ¬ Résultats anormaux de: *R89*
- Vomissements SAI ¬ inhalation de *T17*
- ¬
- - Pneumonie due à d'autres substances solides et *J69.8*
- - Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de *R63.8*

Liquidienne
- SAI ¬ Rétention *R60.9*
- ¬ Surcharge *E87.7*

Liquor (amnii) ¬ Aspiration de *P24.1*

Liquorrhée cérébrospinale ¬ *G96.0*

LIS1 ¬ Lissencéphalie par mutation de *Q04.3*

Lisch ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*

Lissencéphalie
- Hypoplasie cérébelleux type
- - A ¬ *Q04.3*
- - B ¬ *Q04.3*
- - C ¬ *Q04.3*
- - D ¬ *Q04.3*
- - E ¬ *Q04.3*
- - F ¬ *Q04.3*
- Liée à l'X avec anomalies génitales ¬ *Q04.3*
- Mutation
- - LIS1 ¬ *Q04.3*
- - TUBA1 ¬ *Q04.3*
- Pavimenteuse sans atteinte musculaire ou oculaire ¬ *Q04.3*
- Type
- - 1 liée à l'X ¬ *Q04.3*
- - 3 dysplasie métacarpienne ¬ Syndrome de *Q04.3*
- - Norman-Roberts ¬ *Q04.3*
- ¬ *Q04.3*

Lisses
- Striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles *T48*
- ¬ Syndrome multisystémique de dysfonctionnement des muscles *I73.8*

Listeria
- Monocytogenes ¬

Listeria *–suite*
- Monocytogenes ¬ *–suite*
- - Méningite à *A32.1†, G01**
- - Méningo-encéphalite à *A32.1†, G05.0**
- Origine alimentaire ¬ Infection à *A32.9*
- ¬ Endocardite à *A32.8†, I39.8**

Listérienne
- Origine alimentaire ¬ infection *A32*
- ¬
- - Méningite
- - - Cours de) *A32.1†, G01**
- - - Méningo-encéphalite *A32.1†*
- - Méningo-encéphalite *A32.1†, G05.0**
- - Septicémie *A32.7*

Listériose
- Cutanée ¬ *A32.0*
- Néonatale (disséminée) ¬ *P37.2*
- Oculo-glandulaire ¬ *A32.8*
- Origine alimentaire ¬ *A32.9*
- Sans précision ¬ *A32.9*
- ¬
- - *A32*
- - Artérite cérébrale au cours de *A32.8†, I68.1**
- - Encéphalite au cours de *A32.1†, G05.0**
- - Formes de *A32.8*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.8*

Lit ¬ Étouffement au *X59.9!*

Lithiase
- Biliaire à faible niveau de phospholipides ¬ *K80.80*
- Canal cholédoque sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Glandes salivaires ou d'un canal excréteur ¬ *K11.5*
- Prostatique ¬ *N42.0*
- Pulmonaire ¬ *J98.4*
- Rénale congénitale ¬ *Q63.8*

Lithiasique ¬ Cholécystite *K80.10*

Lithium
- Sang ¬ Présence d'un taux anormal de *R78.8*
- ¬ Intoxication au *T43.8*

Little-Piccardi-Lassueur ¬ Syndrome de Graham *L66.1*

Littré ¬ Abcès (de): glande de: *N34.0*

Livédoïde ¬ Vascularite *L95.0*

Livraison ¬ Accident de véhicule de *V99!*

LL) ¬ Lépromateuse polaire (*A30.5*

LLA] ¬ Leucémie lymphoïde aiguë [*C91.0*

LLA-B à cellules matures de type Burkitt ¬ *C91.8*

LLC
- B ¬ Variante non leucémique de la *C83.0*
- Cellules B ¬ Leucémie lymphoïde chronique [*C91.1*

LMA
- 1/ETO ¬ *C92.0*
- M0 ¬ *C92.0*
- M1 ¬ *C92.0*
- M2 ¬ *C92.0*
- M3 ¬ *C92.4*
- M4
- - Eo avec inv(16) ou t(16;16) ¬ *C92.5*
- - ¬ *C92.5*
- M5 ¬ *C93.0*
- M5a ¬ *C93.0*
- M5b ¬ *C93.0*
- Sans classification FAB) SAI ¬ *C92.0*
- T
- - 8;21) ¬ *C92.0*
- - 15;17) et variantes ¬ *C92.4*
- ¬ Leucémie myéloblastique aiguë [*C92.0*

LMC
- BCR/ABL positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [*C92.1*
- Chromosome Philadelphie (Ph1) positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [*C92.1*
- ¬ Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [*C94.8!*

LMIEHG] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade [*D06.9*

LMMC
- 1 ¬ *C93.1*
- 2 ¬ *C93.1*
- Éosinophilie ¬ *C93.1*

LMNA ¬
- Dystrophie musculaire congénitale liée à *G71.2*
- Syndrome progéroïde cardio-cutané lié à *E34.8*

LMNL] ¬ Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [*G95.81*

LMP ¬ *A81.2*

LNH ¬ *C85.9*

Loa
- Loa ¬
- - Filariose à *B74.3*
- - Infection à *B74.3*
- ¬
- - Filariose à Loa *B74.3*
- - Infection à Loa *B74.3*

Loase
- Loïase] ¬ *B74.3*
- ¬ Infestation des paupières au cours de *B74.3†, H03.0**

Lobaire
- Atrophique ¬ Démence au cours de sclérose cérébrale *G31.0†, F02.0**
- Congénital ¬ Emphysème *Q33.8*
- Sans précision ¬ Pneumonie *J18.1*

Lobe
- Cérébral ¬ Hémorragie (du): *I61.1*

Lobe *–suite*
- Frontal ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumeur maligne: *C71.1*
- Inférieur, bronches ou poumon ¬ Tumeur maligne: *C34.3*
- Moyen
- - Bronches ou poumon ¬ Tumeur maligne: *C34.2*
- - ¬ Carcinome bronchique de *C34.2*
- Occipital ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumeur maligne: *C71.4*
- Oreille ¬
- - Absence congénitale du *Q17.8*
- - Syndrome de retard de langage-asymétrie faciale-strabisme-incisure du *Q87.0*
- Pariétal ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumeur maligne: *C71.3*
- Pulmonaire surnuméraire ¬ *Q33.1*
- Supérieur, bronches ou poumon ¬ Tumeur maligne: *C34.1*
- Temporal ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumeur maligne: *C71.2*
- Ventricules ¬ Tumeur maligne: Encéphale, sauf *C71.0*
- ¬ Absence de poumon (*Q33.3*

Lobomycose ¬ *B48.0*

Lobotomisés ¬ Syndrome (des): *F07.0*

Lobstein ¬ Maladie de *Q78.0*

Lobulaire
- Non classée ailleurs ¬ Hépatite chronique *K73.1*
- ¬
- - Carcinome in situ *D05.0*
- - Maladie toxique du foie avec hépatite chronique *K71.4*

Lobulations spléniques ¬ Persistance de *Q89.08*

Lobule surnuméraire ¬ *Q17.0*

Lobulé, soudé et en fer à cheval ¬ Rein *Q63.1*

Local
- Analgésique sédatif cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou *O89*
- Antibiotiques ¬ Prophylaxie *Z29.20*
- Cours
- - Grossesse ¬ Réaction toxique au cours d'une anesthésie *O29.3*

Local *–suite*
- Cours *–suite*
- - Puerpéralité ¬ Réaction toxique à une anesthésie *O89.3*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Réaction toxique à une anesthésie *O74.4*
- Prophylactique d'antibiotiques ¬ Administration *Z29.20*
- Staphylococcus aureus ¬ Infection cutanée *L08.9, B95.6!*
- Staphylocoques ¬ Infection cutanée *L08.9, B95.8!*
- Streptocoques ¬ Infection cutanée *L08.9, B95.5!*
- ¬
- - Chimiothérapie prophylactique *Z29.20*
- - Intoxication à l'anesthésique *T41.3*

Localisation
- Associées ¬ Sarcoïdose de *D86.8*
- Candidose ¬
- - *B37.8*
- - *B37.88*
- Côlon ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres *Q42.8*
- Contigu
- - Amygdale ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C09.8*
- - Appareil digestif ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C26.8*
- - Bouche, parties autres et non précisées ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C06.8*
- - Bronches et du poumon ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C34.8*
- - Cœur, du médiastin et de la plèvre ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C38.8*
- - Col de l'utérus ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C53.8*
- - Côlon ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C18.8*
- - Corps de l'utérus ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C54.8*
- - Encéphale
- - - Parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C72.8*
- - - ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C71.8*
- - Estomac ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C16.8*
- - Glandes salivaires principales ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C08.8*
- - Hypopharynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C13.8*
- - Intestin grêle ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C17.8*
- - Langue ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C02.8*
- - Larynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C32.8*
- - Lèvre
- - - Cavité buccale et du pharynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C14.8*
- - - ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C00.8*
- - Mélanome malin de la peau ¬ Lésion à *C43.8*

Localisation *–suite*
- Contigu *–suite*
- - Nerfs périphériques et du système nerveux autonome ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C47.8*
- - Œil et de ses annexes ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C69.8*
- - Œsophage ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C15.8*
- - Organe
- - - Génital
- - - - Femme ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C57.8*
- - - - Homme ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C63.8*
- - - Respiratoires et intrathoraciques ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C39.8*
- - - Urinaires ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C68.8*
- - Oropharynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C10.8*
- - Os cartilage articulaire
- - - Membres ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C40.8*
- - - ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C41.8*
- - Palais ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C05.8*
- - Pancréas ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C25.8*
- - Peau ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C44.8*
- - Plancher de la bouche ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C04.8*
- - Rectum, de l'anus et du canal anal ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C21.8*
- - Rétropéritoine et du péritoine ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C48.8*
- - Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C11.8*
- - Sein ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C50.8*
- - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C76.8*
- - Sinus de la face ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C31.8*
- - Tissu conjonctif et des autres tissus mous ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C49.8*
- - Verge ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C60.8*
- - Vessie ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C67.8*
- - Voies biliaires ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C24.8*
- - Vulve ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C51.8*
- - ¬ Carcinome bronchique avec atteinte de plusieurs *C34.8*
- Empiétant sur plusieurs organe pelvien cloison
- - Recto-vaginale ¬ *C76.3*
- - Recto-vésicale ¬ *C76.3*
- Focal partiel crise
- - Début focal ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur *G40.0*
- - Partiel
- - - Complexes ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur *G40.2*

Localisation *–suite*
- Focal partiel crise *–suite*
- - Partiel *–suite*
- - - Simples ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur *G40.1*
- Infection amibienne ¬ Autres *A06.8*
- Localisation non précis ¬
- - Phlébectasie des membres inférieurs [toute *I83.9*
- - Varices des membres inférieurs [toute *I83.9*
- - Veines variqueuses des membres inférieurs [toute *I83.9*
- Multiple
- - Non précisées ¬ Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à *J06*
- - Organes génitaux de l'homme ¬ Inflammation de *N49.8*
- - Partie externe de l'œil ¬ Corps étranger de *T15.8*
- - Voie
- - - Digestives ¬ Corps étranger de *T18.8*
- - - Génito-urinaires ¬ Corps étranger de *T19.8*
- - - Respiratoires ¬ Corps étranger de *T17.8*
- - ¬
- - - Atteintes du ménisque: *M23.30*
- - - Hémorragie intracérébrale, *I61.6*
- - - Infection
- - - - Aiguës des voies respiratoires supérieures, à *J06.8*
- - - - Echinococcus
- - - - - Granulosus [echinococcose kystique], autres et à *B67.3*
- - - - - Multilocularis [échinococcose alvéolaire], autres et à *B67.6*
- - - Instabilité chronique du genou: *M23.50*
- - - Kyste du ménisque: *M23.00*
- - - Lésion
- - - - Interne
- - - - - Genou, sans précision: *M23.90*
- - - - - Genou: *M23.80*
- - - - Ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.20*
- - - Ménisque discoïde (congénital): *M23.10*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.60*
- Non précis
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de *T34.9*
- - Rompu ¬ Anévrisme aortique de *I71.8*
- - Rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.04*
- - Sans
- - - Indication de rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.00*
- - - Mention de rupture ¬ Anévrisme aortique de *I71.9*
- - ¬
- - - Anévrisme et dissection de *I72.9*
- - - Apophysite

Localisation *–suite*
- Non précis *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Apophysite *–suite*
- - - - Non précisée ¬ Apophysite non précisée juvénile ou chez l'adulte, de *M93.9*
- - - - Précisée ¬ Apophysite précisée juvénile, de *M92.9*
- - - Épiphysite
- - - - Non précisée ¬ Épiphysite non précisée juvénile ou chez l'adulte, de *M93.9*
- - - - Précisée ¬ Épiphysite précisée juvénile, de *M92.9*
- - - Gelure
- - - - Sans précision, de *T35.7*
- - - - Superficielle de *T33.9*
- - - Infarctus
- - - - Myocarde à répétition, de *I22.9*
- - - - Transmural aigu du myocarde, de *I21.3*
- - - Ischémie traumatique des muscles de *T79.69*
- - - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.09*
- - - Ostéochondrite
- - - - Non précisée ¬ Ostéochondrite non précisée juvénile ou chez l'adulte, de *M93.9*
- - - - Précisée ¬ Ostéochondrite précisée juvénile, de *M92.9*
- - - Ostéochondrose
- - - - Non précisée ¬ Ostéochondrose non précisée juvénile ou chez l'adulte, de *M93.9*
- - - - Précisée ¬ Ostéochondrose précisée juvénile, de *M92.9*
- - - Phlébectasie des membres inférieurs [toute localisation] ou de *I83.9*
- - - Réaction d'hypersensibilité des voies respiratoires supérieures, *J39.3*
- - - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de *I80.9*
- - - Varices des membres inférieurs [toute localisation] ou de *I83.9*
- - - Veines variqueuses des membres inférieurs [toute localisation] ou de *I83.9*
- Précis
- - Intestin grêle ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres *Q41.8*
- - ¬
- - - Tumeurs secondaires malignes d'autres *C79.88*
- - - Varice
- - - - *I86.8*
- - - - *I86.88*
- Résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Hémorragie de toute *T81.0*
- Stade
- - I ¬ Lymphœdème
- - - *I89.03*
- - - Héréditaire, autre *Q82.03*
- - II ¬ Lymphœdème

Localisation *–suite*
- Stade *–suite*
- - II ¬ Lymphœdème *–suite*
- - - *I89.04*
- - - Héréditaire, autre *Q82.04*
- - III ¬ Lymphœdème
- - - *I89.05*
- - - Héréditaire, autre *Q82.05*
- Tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, autres *I97.88*
- Trichomonase ¬ Autres *A59.8*
- Unique et précisée ¬ Tuberculose miliaire aiguë, *A19.0*
- Uro-génitales ¬ Candidose d'autres *B37.4*
- ¬
- - Abcès
- - - Cutané, furoncle et anthrax d'autres *L02.8*
- - - Embolique) de la moelle épinière [toute *G06.1*
- - Absence atrésie sténose congénital
- - - Côlon, sans précision de *Q42.9*
- - - Intestin grêle, sans précision de *Q41.9*
- - Arthrose avec mention de plus d'une *M15*
- - Cysticercose, autres *B69.8*
- - Encéphalocèle d'autres *Q01.8*
- - Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres *Z12.8*
- - Impétigo [tout micro-organisme] [toute *L01.0*
- - Infarctus
- - - Myocarde à répétition d'autres *I22.8*
- - - Transmural aigu du myocarde d'autres *I21.2*
- - Infection
- - - Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres *A56.8*
- - - Réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute *T84.6*
- - Ischémie traumatique des muscles d'autre *T79.68*
- - Lymphadénite aiguë d'autres *L04.8*
- - Myiase d'autres *B87.8*
- - Phlegmon d'autres *L03.8*
- - Syphilis primaire d'autres *A51.2*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres *I80.88*
- - Ulcère variqueux (membres inférieurs, toute *I83.0*
- - Varices d'autres *I86*

Localisé
v. Type de maladie

Locataires et le propriétaire ¬ Désaccord avec les voisins, les *Z59*

Locaux ¬ Intoxication
- Anesthésiques *T41.3*
- Astringents et détergents *T49.2*

Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice] ¬ *G83.5*

Loeys-Dietz ¬ Syndrome de *Q87.4*

Löffler ¬

- Endocardite
- - *I42.3*
- - Verruqueuse de *I42.3*
- Syndrome de *J82*

Löfgren ¬ Syndrome de *D86.8*

Loge

- Musculaire ¬ Syndrome de *T79.6*
- Tibiale antérieure ¬ Syndrome de la *M76.8*
- ¬ Syndrome de *T79.69*

Logement

- Conditions économiques ¬ Difficultés liées au *Z59*
- Inadéquat ¬ *Z59*

Logopénique ¬ Aphasie primaire progressive *G31.0†, F02.0**

Loïase] ¬ Loase [*B74.3*

Loiselet
v. Mégarbané-Loiselet

Loisirs ¬ Manque de repos ou de *Z73*

Loken
v. Senior-Loken

Lombaire
v. Type de maladie

Lombalgie basse ¬ *M54.5*

Lombes bassin

- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la paroi abdominale, des *T34.3*
- Partie non précisée ¬ Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des *S30.9*
- Sans précision ¬
- - Gelure du thorax, de l'abdomen, des *T35.3*
- - Lésion traumatique abdomen
- - - *S39*
- - - *S39.9*
- ¬
- - Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des *S38.3*
- - Contusion des *S30.0*
- - Écrasement
- - - Amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des *S38*
- - - Parties autres et non précisées de l'abdomen, des *S38.1*
- - Fractures du thorax avec fractures des *T02.1*
- - Gelure superficielle de la paroi abdominale, des *T33.3*
- - Lésion traumatique
- - - Multiple
- - - - Abdomen, des *S39.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des *S35.7*
- - - Muscles et de tendons de l'abdomen, des *S39.0*
- - - Nerf
- - - - Moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des *S34*

Lombes bassin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Lésion traumatique *–suite*
- - - Nerf *–suite*
- - - - Non précisés au niveau de l'abdomen, des *S34.8*
- - - - S) périphérique(s) de l'abdomen, des *S34.6*
- - - Précisées de l'abdomen, des *S39.8*
- - - Superficiel
- - - - Abdomen
- - - - - *S30*
- - - - - *S30.8*
- - - - Multiples de l'abdomen, des *S30.7*
- - - - Thorax, de l'abdomen, des *T00.1*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau
- - - - - Abdomen, des *S35*
- - - - - Abdomen, des *S35.88*
- - - - Non précisés, au niveau de l'abdomen, des *S35.9*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - *S31.0*
- - - - Abdomen, des *S31*
- - - Ouvertes
- - - - Multiples de l'abdomen, des *S31.7*
- - - - Thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des *T01.1*

Lombo-sacré
v. Type de maladie

Londe] ¬ Paralysie bulbaire progressive de l'enfant [Fazio- *G12.1*

Long

- Durée
- - Envers
- - - Appareil
- - - - Prise en charge des sécrétions ¬ Dépendance (de *Z99.0*
- - - - Soutien
- - - - - Appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé ¬ Dépendance de *Z99.9*
- - - - - Appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires ¬ Dépendance de *Z99.8*
- - - - - Appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs ¬ Dépendance (de *Z99*
- - - Aspirateur
- - - - Sans précision ¬ Dépendance (de *Z99.0*
- - - - ¬
- - - - - Dépendance (de *Z99.0*
- - - - - Dépendance (de *Z99.0*
- - - Cœur artificiel ¬ Dépendance de *Z99.4*
- - - Dialyse en cas d'insuffisance rénale ¬ Dépendance de *Z99.2*
- - - Fauteuil roulant ¬ Dépendance de *Z99.3*

Long *–suite*

- Durée *–suite*
- - Envers *–suite*
- - - Insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la toux) ¬ Dépendance (de *Z99.0*
- - - Respirateur ¬ Dépendance (de *Z99.1*
- - Lors d'une insuffisance rénale ¬ Dialyse de *Z99.2*
- - Respirateur ¬ Dépendance (de *Z99.1*
- Fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.0*
- Membre
- - Inférieur
- - - Sans précision ¬ Incurvation congénitale des os *Q68.5*
- - - ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: Os *D16.2*
- - - - Maligne: Os *C40.2*
- - Supérieur ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Omoplate et os *D16.0*
- - - Maligne: Omoplate et os *C40.0*
- Rachis
- - Sans précision ¬ Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os *Q77.9*
- - ¬ Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os *Q77.8*
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion d'autres os *P13.3*
- ¬
- - Adamantinome des os *C40.9*
- - Déficit
- - - 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne *E71.3*
- - - Acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à chaîne très *E71.3*
- - Incurvation congénitale des os *Q68.8*

Long-brachydactylie ¬ Syndrome de pouce *Q87.2*

Longicornis ¬

- Fièvre à tiques Haemaphysalis *A93.8*
- Syndrome de fièvre avec thrombocytopénie sévère à Haemaphysalis *A93.8*

Longitudinal

- Antérieur cervical ¬ Ligament *S13.4*
- Cubitus ¬ Raccourcissement *Q71.5*
- Fémur ¬ Raccourcissement *Q72.4*
- Fibula ¬ Déficit congénital *Q72.6*
- Membre(s) non précisé(s) ¬ Raccourcissement *Q73.8*
- Péroné ¬ Raccourcissement *Q72.6*
- Postérieur [OLLP] ¬ Ossification du ligament *M48.8*
- Radius ¬
- - Déficit congénital *Q71.4*
- - Raccourcissement *Q71.4*
- Tibia ¬ Raccourcissement *Q72.5*

Longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de *O34.30*

Lorain-Lévi ¬ Syndrome de: *E23.0*

LORD [Late-onset retinal degeneration] ¬ *H35.5*

Lordose

- Acquise ¬ *M40.4*
- Chirurgie ¬ *M96.4*
- Congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Posturale ¬ *M40.4*
- Sans précision ¬ *M40.5*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - *M40.4*
- - Cyphose et *M40*

Lorrain
v. Strümpell-Lorrain

Losangique médiane ¬ Glossite *K14.2*

Losonci
v. Czeizel-Losonci

Louis

- Bar] ¬ Ataxie télangiectasique [*G11.3*
- ¬ Encéphalite de Saint- *A83.3*

Louping ill] ¬ Encéphalomyélite ovine [*A84.8*

Lowe

- Syndrome de Fanconi ¬ Syndrome de *E72.0*
- ¬
- - Glaucome au cours de syndrome de *E72.0†, H42.0**
- - Syndrome de: *E72.0*

Lowe-Kohn-Cohen ¬ Syndrome de *Q87.8*

Low-flow ¬ Priapisme de type *N48.30*

Lown-Ganong-Levine ¬ Syndrome de: *I45.6*

Lowry
v. Chudley-Lowry

Lowry-MacLean ¬ Syndrome de *Q87.8*

Lowry-Wood ¬ Syndrome de *Q87.5*

LP [Intolérance aux protéines dibasiques avec lysinurie] ¬ *E72.0*

LPG] ¬ Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [*U60.1!*

LRBA ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

LSD

- Diéthylamide de l'acide lysergique] ¬ Intoxication au *T40.8*
- ¬ Intoxication: Lysergide [*T40.8*

LSIL] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade [*N87.0*

L-transposition des gros vaisseaux ¬ *Q20.5*

Lubinsky
v. Fine-Lubinsky
v. Keppen-Lubinsky
v. Stern-Lubinsky-Durrie

Lucey-Driscoll ¬ Syndrome de *P59.8*

Lucite polymorphe ¬ *L56.4*

Luette

- Bifide ¬ *Q35.7*
- ¬
- - Absence de *Q38.5*
- - Bifidité de la *Q35.7*
- - Fente de la *Q35.7*
- - Perforation syphilitique de la *A52.7†, K93.8**
- - Syphilis perforée tardive de la *A52.7†, K93.8**
- - Tuberculose de la *A18.8†, K93.8**
- - Tumeur maligne: *C05.2*

Lujo ¬ Fièvre hémorragique à arénavirus *A96.8*

Lumbago

- Hernie discale ¬ *M51.2*
- Ischialgie due à une atteinte des disques intervertébraux ¬ *M51.1†, G55.1**
- SAI ¬ *M54.5*
- Sciatique ¬ *M54.4*

Lumière

- Artificiel
- - Ultraviolette ¬ Exposition à : *W91.9!*
- - Visible ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Sans précision ¬ Effet de la chaleur et de la *T67.9*
- Soleil ¬ Exposition à: *X59.9!*
- ¬ effet chaleur
- - *T67*
- - *T67.8*

Lundborg
v. Unverricht-Lundborg

Lunettes

- Verres de contact ¬ Mise en place et ajustement de *Z46.0*
- ¬
- - *Z97.8*
- - Renouvellement d'une ordonnance pour: *Z76.0*

Lupique ¬ Panniculite *L93.2*

Lupoïde

- Non classée ailleurs ¬ Hépatite *K75.4*
- ¬ Maladie toxique du foie avec hépatite *K71.5*

Lupus

- Érythémateux
- - Chronique discoïde ¬ *L93.0*
- - Cutané
- - - Rare ¬ *L93.0*
- - - Subaigu ¬ *L93.1*
- - Discoïde de la paupière ¬ *H01.1*
- - Disséminé
- - - Atteinte
- - - - Organes et d'appareils ¬ *M32.1†*
- - - - Poumons ¬ *M32.1†, J99.1**
- - - - Rénale tubulo-interstitielle ¬ *M32.1†, N16.4**
- - - Médicamenteux ¬ *M32.0*

Lupus *–suite*

- Érythémateux *–suite*
- - Disséminé *–suite*
- - - Mère ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: *P00.8*
- - - Sans précision ¬ *M32.9*
- - - ¬
- - - - *M32*
- - - - Artérite cérébrale au cours de *M32.1†, I68.2**
- - - - Démence au cours de *M32.1†, F02.8**
- - - - Encéphalite au cours d'un *M32.1†, G05.8**
- - - - Formes de *M32.8*
- - - - Glomérulonéphrite
- - - - - Cours de *M32.1†, N08.5**
- - - - - Proliférative diffuse au cours de *M32.1†, N08.5**
- - - - Glomérulopathie au cours de *M32.1†, N08.5**
- - - - Myopathie au cours de *M32.1†, G73.7**
- - - - Néphrite au cours de *M32.1†, N08.5**
- - - - Néphrose au cours de *M32.1†, N08.5**
- - - - Péricardite au cours de *M32.1†, I32.8**
- - - - Polyneuropathie au cours de *M32.1†, G63.5**
- - Localisés ¬ Autres *L93.2*
- - Néonatal ¬ *P00.8*
- - Profond ¬ *L93.2*
- - SAI ¬ *L93.0*
- - Systémique ¬ *M32.9*
- - Type Chilblain ¬ *L93.2*
- - Verruqueux ou hypertrophique ¬ *L93.2*
- - ¬
- - - Encéphalopathie au cours de *M32.1†, G05.8**
- - - Endocardite au cours de *M32.1†, I39.8**
- Erythematodes integumentalis ¬ *L93.0*
- Exedens ¬ *A18.4*
- Tumidus ¬ *L93.2*
- Vulgaire
- - Paupière ¬ *A18.4†, H03.1**
- - SAI ¬ *A18.4*
- ¬ Présence de l'anticoagulant du *D68.6*

Luschka et du foramen de Magendie ¬ Atrésie des fentes de *Q03.1*

Lutz
v.a. Lewandowsky-Lutz

- ¬ maladie de *B41*

Luxable ¬ Hanche: *Q65.6*

Luxation

- Antérieur
- - Humérus ¬ *S43.01*
- - Tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.11*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ *S43.1*
- - Épaule [articulation gléno-humérale] ¬ *S43.0*

Luxation *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Sacro-iliaque et sacro-coccygienne ¬ *S33.2*
- - Sterno-claviculaire ¬ *S43.2*
- Avant-bras ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S51.84!*
- - - Ouverte ou de *S51.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S51.85!*
- - - Ouverte ou de *S51.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S51.86!*
- - - Ouverte ou de *S51.89!*
- Bras ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S41.84!*
- - - Ouverte ou de *S41.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S41.85!*
- - - Ouverte ou de *S41.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S41.86!*
- - - Ouverte ou de *S41.89!*
- Ceinture scapulaire SAI ¬ *S43.3*
- Cheville ¬ *S93.0*
- Cloison du nez ¬ *S03.1*
- Congénital
- - Coude ¬ *Q68.8*
- - Cristallin ¬ *Q12.1*
- - Épaule ¬ *Q68.8*
- - Genou ¬ *Q68.2*
- - Hanche
- - - Bilatérale ¬ *Q65.1*
- - - Sans précision ¬ *Q65.2*
- - - Unilatérale ¬ *Q65.0*
- - - ¬ Ostéochondrite juvénile après réduction d'une *M91.8*
- - Rotule ¬ *Q74.1*
- - Vraie de l'épaule ¬ *Q68.8*
- Cou ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S11.84!*
- - - Ouverte ou de *S11.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S11.85!*
- - - Ouverte ou de *S11.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S11.86!*
- - - Ouverte ou de *S11.89!*
- Cristallin ¬ *H27.1*
- Dentaire ¬ *S03.2*
- Doigt
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ *S63.12*

Luxation *–suite*
- Doigt *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Métacarpo-phalangienne ¬ *S63.11*
- - Partie non précisée ¬ *S63.10*
- - ¬ *S63.1*
- Entorse foulure
- - Articulation ligament
- - - Ceinture scapulaire ¬ *S43*
- - - Coude ¬ *S53*
- - - Genou ¬ *S83*
- - - Hanche ¬ *S73*
- - - Niveau
- - - - Cheville et du pied ¬ *S93*
- - - - Cou ¬ *S13*
- - - - Poignet et de la main ¬ *S63*
- - - Non précis
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ *T13.2*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ *T11.2*
- - - - Tronc ¬ *T09.2*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ *S33*
- - - Tête ¬ *S03*
- - - Thorax ¬ *S23*
- - Associations de parties du corps ¬ *T03.8*
- - Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la tête avec *T03.0*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles de *T93.3*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d'une *T92.3*
- - Multiples, sans précision ¬ *T03.9*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T14.3*
- - Plusieurs partie
- - - Corps ¬ *T03*
- - - Membre s
- - - - Inférieur(s) ¬ *T03.3*
- - - - Supérieur
- - - - - S) supérieur(s) ¬ *T03.2*
- - - - - S) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ¬ *T03.4*
- - Tête avec luxations, entorses et foulures du cou ¬ *T03.0*
- - Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ *T03.1*
- Épaule [articulation gléno-humérale] SAI ¬ *S43.00*
- Fermé colonne lombaire bassin ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors de fracture ou de *S31.84!*
- - II lors de fracture ou de *S31.85!*
- - III lors de fracture ou de *S31.86!*
- Genou
- - Luxation
- - - Antérieure du tibia proximal ¬ *S83.11*
- - - Latérale du tibia proximal ¬ *S83.14*
- - - Médiane du tibia proximal ¬ *S83.13*

Luxation *–suite*
- Genou *–suite*
- - Luxation *–suite*
- - - Postérieure du tibia proximal ¬ *S83.12*
- - Sans autre précision ¬ *S83.10*
- - ¬ *S83.18*
- Globe oculaire ¬ *H44.8*
- Hanche
- - Antérieure ¬ *S73.02*
- - Fémur ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de *S71.84!*
- - - - Ouverte ou de *S71.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de *S71.85!*
- - - - Ouverte ou de *S71.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de *S71.86!*
- - - - Ouverte ou de *S71.89!*
- - Postérieure ¬ *S73.01*
- - Sans autre précision ¬ *S73.00*
- - ¬ *S73.08*
- Inférieure de l'humérus ¬ *S43.03*
- Jambe ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S81.84!*
- - - Ouverte ou de *S81.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S81.85!*
- - - Ouverte ou de *S81.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S81.86!*
- - - Ouverte ou de *S81.89!*
- Latérale du tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.14*
- Lésion
- - Intracrânienne ¬ Plaie ouverte associée à une fracture, une *S01*
- - Intrathoracique ¬ Plaie ouverte associée à une fracture ou une *S21*
- Mâchoire ¬ *S03.0*
- Médiane du tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.13*
- Multiple
- - Cou ¬ *S13.3*
- - Doigts ¬ *S63.2*
- - ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire avec *Q77.7*
- Omoplate ¬ *S43.3*
- Orteil s
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ *S93.12*
- - - Métatarsophalangienne ¬ *S93.11*
- - Sans autre précision ¬ *S93.10*
- - ¬ *S93.1*
- Ouverte

Luxation *–suite*
- Ouverte *–suite*
- - Avant-bras ¬ Fracture de *S52.9, S51.87!*
- - Colonne lombaire bassin ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture ou de *S31.87!*
- - - II lors de fracture ou de *S31.88!*
- - - III lors de fracture ou de *S31.89!*
- - Pied ¬ *S93.30, S91.87!*
- - Sans précision stade ¬ Fracture
- - - *S01.87!*
- - - *S11.87!*
- - - *S21.87!*
- - - *S31.87!*
- - - *S41.87!*
- - - *S51.87!*
- - - *S61.87!*
- - - *S71.87!*
- - - *S81.87!*
- - - *S91.87!*
- Partie
- - Épaule ¬ *S43.08*
- - Non précis
- - - Ceinture scapulaire ¬ *S43.3*
- - - Cou ¬ *S13.2*
- - - Coude
- - - - Antérieure ¬ *S53.11*
- - - - Latérale ¬ *S53.14*
- - - - Médiane ¬ *S53.13*
- - - - Postérieure ¬ *S53.12*
- - - - Sans autre précision ¬ *S53.10*
- - - - ¬
- - - - - *S53.1*
- - - - - *S53.18*
- - - Pied
- - - - Articulation
- - - - - Médiotarsienne ¬ *S93.32*
- - - - - Tarsométatarsienne ¬ *S93.33*
- - - - Métatarsien (os), articulation non précisée ¬ *S93.34*
- - - - Os) carpe, articulation non précisée ¬ *S93.31*
- - - - Partie non précisée ¬ *S93.30*
- - - - ¬ *S93.38*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ *S33.3*
- - - Tête ¬ *S03.3*
- - - Thorax ¬ *S23.2*
- Pied ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S91.84!*
- - - Ouverte ou de *S91.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S91.85!*
- - - Ouverte ou de *S91.88!*
- - III lors fracture

Luxation *–suite*
- Pied ¬ Lésion tissu mous stade *–suite*
- - III lors fracture *–suite*
- - - Fermée ou de *S91.86!*
- - - Ouverte ou de *S91.89!*
- Plaie intraabdominale ¬ Plaie ouverte communicant avec une fracture, une *S31*
- Poignet
- - Articulation
- - - Carpo-métacarpienne ¬ *S63.04*
- - - Médiocarpienne ¬ *S63.03*
- - - Radiocarpienne ¬ *S63.02*
- - - Radio-cubitale ¬ *S63.01*
- - Main ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de *S61.84!*
- - - - Ouverte ou de *S61.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de *S61.85!*
- - - - Ouverte ou de *S61.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de *S61.86!*
- - - - Ouverte ou de *S61.89!*
- - Partie non précisée ¬ *S63.00*
- - ¬ *S63.08*
- Postérieur
- - Fémur distal ¬ *S83.11*
- - Humérus ¬ *S43.02*
- - Tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.12*
- Récidivante de la rotule ¬ *M22.0*
- Rotule
- - Acromicrie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-calvitie- *Q87.8*
- - ¬ *S83.0*
- SAI ¬ Fracture: avec: *T14.2*
- Subluxation
- - Articulaires récidivantes ¬ *M24.4*
- - Pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs ¬ *M24.3*
- Tête
- - Cubitus ¬ Fracture distale de la diaphyse du radius avec *S52.31*
- - Radiale ¬ *S53.0*
- - Radius ¬ Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec *S52.21*
- - ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de *S01.84!*
- - - - Ouverte ou de *S01.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de *S01.85!*
- - - - Ouverte ou de *S01.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de *S01.86!*
- - - - Ouverte ou de *S01.89!*
- Thorax ¬ Lésion tissu mous stade

Luxation *–suite*
- Thorax ¬ Lésion tissu mous stade *–suite*
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S21.84!*
- - - Ouverte ou de *S21.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S21.85!*
- - - Ouverte ou de *S21.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S21.86!*
- - - Ouverte ou de *S21.89!*
- Vertèbre
- - Cervical
- - - C1/C2 ¬ *S13.11*
- - - C2/C3 ¬ *S13.12*
- - - C3/C4 ¬ *S13.13*
- - - C4/C5 ¬ *S13.14*
- - - C5/C6 ¬ *S13.15*
- - - C6/C7 ¬ *S13.16*
- - - C7/D1 ¬ *S13.17*
- - - Niveau SAI ¬ *S13.10*
- - - ¬ *S13.18*
- - Dorsal
- - - D1/D2 et D2/D3 ¬ *S23.11*
- - - D11/D12 ¬ *S23.16*
- - - D12/L1 ¬ *S23.17*
- - - D3/D4 et D4/D5 ¬ *S23.12*
- - - D5/D6 et D6/D7 ¬ *S23.13*
- - - D7/D8 et D8/D9 ¬ *S23.14*
- - - D9/D10 et D10/D11 ¬ *S23.15*
- - - Niveau non précisé ¬ *S23.10*
- - - ¬ *S23.1*
- - Lombaire
- - - L1/L2 ¬ *S33.11*
- - - L2/L3 ¬ *S33.12*
- - - L3/L4 ¬ *S33.13*
- - - L4/L5 ¬ *S33.14*
- - - L5/S1 ¬ *S33.15*
- - - Niveau non précisé ¬ *S33.10*
- - - SAI ¬ *S33.10*
- - - ¬ *S33.1*
- ¬ Plaie ouverte
- - Associé fracture
- - - *S51*
- - - *S61*
- - - *S71*
- - - *S81*
- - Communicant fracture
- - - *S11*
- - - *S41*
- - - *S91*

Luysienne
v. dentato-rubro-pallido-luysienne

Lyase
v.a. gamma-lyase

Lyase *–suite*
- ¬
- - Anomalie du développement sexuel 46,XY par déficit isolé en 17,20- *E29.1*
- - Déficit
- - - 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA *E71.1*
- - - Adénylosuccinate *E79.8*
- - - Arginosuccinate *E72.2*

Lyell
- Atteinte 30%
- - Plus de la surface corporelle ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [*L51.21*
- - Surface corporelle SAI ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [*L51.20*
- SAI ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë (syndrome de *L51.20*
- Staphylococcique ¬ Syndrome de *L00*
- ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [*L51.2*

LYG ¬ *C83.8*

Lyme ¬
- Arthrite au cours de la maladie de *A69.2†, M01.29**
- Borréliose de *A69.2*
- Maladie de *A69.2*
- Méningite au cours de maladie de *A69.2†, G01**
- Polynévrite au cours de la maladie de *A69.2†, G63.0**

Lymphadénectomie stade
- I ¬ Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec *I97.20*
- II ¬ Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec *I97.21*
- III ¬ Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec *I97.22*

Lymphadénite
- Aigu
- - Face, de la tête et du cou ¬ *L04.0*
- - Localisations ¬ *L04.8*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *L04.3*
- - - Supérieur ¬ *L04.2*
- - Sans précision ¬ *L04.9*
- - Tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique ¬ *L04*
- - Tronc ¬ *L04.1*
- - ¬
- - - *L04*
- - - Maladie due au VIH avec *B23.8, L04.9*
- Chronique
- - Sauf mésentérique ¬ *I88.1*
- - Tout ganglion autre que mésentérique ¬ *I88.1*
- Mésentérique
- - Aiguë) (chronique) ¬ *I88.0*
- - Non spécifique ¬ *I88.0*
- - Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Non spécifique

Lymphadénite *–suite*
- Non spécifique *–suite*
- - Sans précision ¬ *I88.9*
- - ¬ Autres *I88.8*
- SAI ¬ *I88.9*
- Syphilitique
- - Précoce ¬ *A51.4*
- - Secondaire
- - - Précoce ¬ *A51.4, N77.1**
- - - ¬ *A51.4*
- ¬ Syphilis tardive avec *A52.7†, I98.8**

Lymphadénome angio-immunoblastique ¬ *C86.5*

Lymphadénopathie
- Angio-immunoblastique avec dysprotéinémie [LAID] ¬ *C86.5*
- Généralisé
- - Persistante
- - - LPG] ¬ Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou *U60.1!*
- - - ¬ *B23.8*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R59.1*
- Inguinale ¬ *R59.0*
- Médiastinale ¬ *R59.0*
- Mésentérique ¬ *R59.0*
- SAI ¬ *R59.1*
- Syphilitique secondaire ¬ *A51.4*
- Trachéo-bronchique ¬ *R59.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.2*

Lymphangiectasie
- Intestinal
- - Primitive ¬ *I89.09*
- - Secondaire ¬ *I89.09*
- - ¬ *I89.09*
- Pulmonaire congénitale ¬ *Q33.8*
- Scrotum ¬ *I89.09†, N51.8**
- ¬ *I89.0*

Lymphangioléiomyomatose ¬ *D48.1*

Lymphangiomatose
- Diffuse ¬ *D18.19*
- Disséminée ¬ *D18.19*
- Pulmonaire ¬ *Q33.8*

Lymphangiome
- Capillaire ¬ *D18.19*
- Circonscrit ¬ *D18.19*
- Cutané circonscrit ¬ *D18.19*
- Diffus ¬ *D18.19*
- Disséminé ¬ *D18.19*
- Superficiel ¬ *D18.19*
- ¬
- - *D18.1*
- - Hémangiome et *D18*

Lymphangite
- Aiguë ¬ *L03*
- Chronique ¬ *I89.1*

Lymphangite *–suite*
- SAI ¬ *I89.1*
- Sein gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*
- Subaiguë ¬ *I89.1*
- ¬
- - *I89.1*
- - Infection purulent
- - - Bras avec *L03.10*
- - - Doigt avec *L03.01*
- - - Main avec *L03.10*
- - - Membre inférieur avec *L03.11*
- - - Orteil avec *L03.02*
- - - Pied (à l'exception des orteils) avec *L03.11*
- - Inflammation purulent
- - - Bras avec *L03.10*
- - - Doigt avec *L03.01*
- - - Main avec *L03.10*
- - - Membre inférieur avec *L03.11*
- - - Orteil avec *L03.02*
- - - Pied (à l'exception des orteils) avec *L03.11*

Lymphatique
- Aisselle et du membre supérieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.3*
- Axillaire stade
- - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.81*
- - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.82*
- - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.83*
- Capillaire ¬ Malformation *D18.19*
- Caverneux ¬ Malformation *D18.19*
- Cervical, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.80*
- Hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus *C79.3*
- Inguinal
- - Membre inférieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.4*
- - Stade
- - - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.84*
- - - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.85*
- - - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.86*
- Intra-abdominaux ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.2*
- Intrapelviens ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.5*

Lymphatique *–suite*
- Intrathoraciques ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.1*
- Macrokystique ¬ Malformation *D18.19*
- Microkystique tissulaire infiltrante ¬ Malformation *D18.19*
- Péritonéaux ¬ Tuberculose des ganglions *A18.3†, K93.0**
- Rare ¬ Malformation *D18.19*
- SAI ¬ Maladie des vaisseaux *I89.9*
- Sans précision ¬
- - Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions *I89.9*
- - Tumeur maligne: Ganglion *C77.9*
- Sauf mésentérique ¬
- - Abcès (aigu) tout ganglion *L04*
- - Lymphadénite aiguë tout ganglion *L04*
- Secondaire et non précisée ¬ Tumeur maligne des ganglions *C77*
- Sièges multiples ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.8*
- Suite à mastectomie ¬ Oblitération des vaisseaux *I97.2*
- Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.0*
- ¬
- - Atteinte non infectieux
- - - Précisées des vaisseaux et des ganglions *I89.8*
- - - Vaisseaux et des ganglions *I89*
- - Filariose de Bancroft [Filariose *B74.0*
- - Infiltration *D47.9*
- - Sarcoïdose
- - - Ganglions *D86.1*
- - - Poumon avec sarcoïdose des ganglions *D86.2*
- - Sarcome de Kaposi des ganglions *C46.3*
- - Syphilis
- - - Secondaire précoce d'un ganglion *A51.4*
- - - Tardive d'un ganglion *A52.7†, I98.8**
- - Tuberculose
- - - Mésentérique des ganglions *A18.3†, K93.0**
- - - Rétropéritonéale (ganglions *A18.3*
- - Tumeur bénigne: Ganglions *D36.0*
- - Vaisseau
- - - *C49*
- - - *D21*

Lymphoblastique
- Aiguë ¬ Leucémie *C91.00*
- Cellule
- - B ¬ Lymphome *C83.5*
- - T ¬ Lymphome *C83.5*
- Diffus ¬ Lymphome *C85.9*
- ¬ Lymphome *C83.5*

Lymphoblastome
- Diffus ¬ *C85.9*
- ¬ *C85.9*

Lymphocitaire ¬ Chorio-encéphalite *A87.2†, G05.1**

Lympho-cutanée ¬ Sporotrichose *B42.1*

Lymphocytaire
- Aiguë ¬ Méningite *A87.2†, G02.0**
- Antigène-1 (LFA-1) ¬ Anomalie de la fonction *D84.0*
- Cutanée de Jessner ¬ Infiltration *L98.6*
- Fibrose diffuse ¬ Lymphome de Hodgkin classique en déplétion *C81.3*
- Séreuse aiguë ¬ Chorioméningite *A87.2†, G02.0**
- ¬
- - Chorioméningite *A87.2†, G02.0**
- - Colite
- - - *K52.8*
- - - Microscopique (collagène ou *K52.8*
- - Encéphalite *A87.2†, G05.1**
- - Lymphome Hodgkin
- - - Classique
- - - - Déplétion *C81.3*
- - - - Type réticulaire en déplétion *C81.3*
- - - Nodulaire à prédominance *C81.0*
- - Méningite *A87.2†, G02.0**
- - Méningo-encéphalite *A87.2†, G05.1**
- - Pneumopathie interstitielle *J84.1*
- - Réaction leucémoïde de type: *D72.8*
- - Sarcome *C85.9*
- - Thyroïdite (de): *E06.3*

Lymphocytaire-histiocytaire ¬ Lymphome mixte *C85.9*

Lymphocytes
- B
- - Porteurs d'immunoglobulines ¬ Agammaglobulinémie: avec *D80.1*
- - ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des *D83.0*
- CD4 ¬ Nombre réduit de *R72*
- CD8 ¬ Nombre réduit de *R72*
- Nus ¬ Syndrome des *D81.6*
- T
- - Auxiliaire
- - - CD4
- - - - Microlitre
- - - - - Sang ¬ 200 à 499 *U61.2!*
- - - - - Sang ¬ Moins de 200 *U61.3!*
- - - - Non précisé ¬ Nombre de *U61.9!*
- - - - Plus par microlitre de sang ¬ 500 *U61.1!*
- - - Maladie VIH
- - - - Catégorie
- - - - - 1 ¬ Nombre de *U61.1!*
- - - - - 2 ¬ Nombre de *U61.2!*
- - - - - 3 ¬ Nombre de *U61.3!*
- - - - ¬ Nombre de *U61!*
- - Granuleux (associée à la polyarthrite rhumatoïde) ¬ Leucémie à grands *C91.7*

Lymphocytes *–suite*
- T *–suite*
- - Humain
- - - Type 1 HTLV-1 ¬
- - - - Myélopathie due à une infection à virus lymphotrope des *G04.1*
- - - - Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des *Z22.6*
- - - ¬ Myélopathie associée à un virus lymphotrope des *G04.1*
- - Immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des *D83.1*
- ¬
- - *Z52.08*
- - Lymphome Hodgkin
- - - Classique) riche en *C81.4*
- - - Diffus riche en *C81.4*
- - - Nodulaire riche en *C81.4*

Lymphocytique aiguë ¬ Leucémie *C91.00*

Lymphocytopénie CD4 idiopathique ¬ *D72.8*

Lymphocytose
- B polyclonale persistante ¬ *D72.8*
- Symptomatique) ¬ *D72.8*

Lymphoedema praecox ¬ *I89.09*

Lymphœdème
v.a. microcéphalie-lymphœdème-choriorétinopathie
- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Localisations, tous les stades ¬ *I97.88*
- - Sur
- - - Appareil uro-génital, tous les stades ¬ *I97.87*
- - - Territoire drainage lymphatique
- - - - Axillaire
- - - - - Stade I ¬ *I97.81*
- - - - - Stade II ¬ *I97.82*
- - - - - Stade III ¬ *I97.83*
- - - - Cervical, tous les stades ¬ *I97.80*
- - - - Inguinal
- - - - - Stade I ¬ *I97.84*
- - - - - Stade II ¬ *I97.85*
- - - - - Stade III ¬ *I97.86*
- Communication interauriculaire-dysmorphie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Congénital primaire ¬ *Q82.09*
- Héréditaire
- - Localisation stade
- - - I ¬ *Q82.03*
- - - II ¬ *Q82.04*
- - - III ¬ *Q82.05*
- - Membre s supérieur s inférieur s stade
- - - I ¬ *Q82.00*
- - - II ¬ *Q82.01*
- - - III ¬ *Q82.02*
- - Sans précision ¬ *Q82.09*
- - Type

Lymphœdème *–suite*
- Héréditaire *–suite*
- - Type *–suite*
- - - I ¬ *Q82.09*
- - - II ¬ *Q82.09*
- - ¬ Autre *Q82.08*
- Localisation stade
- - I ¬ *I89.03*
- - II ¬ *I89.04*
- - III ¬ *I89.05*
- Mastectomie partiel
- - Lymphadénectomie stade
- - - I ¬ *I97.20*
- - - II ¬ *I97.21*
- - - III ¬ *I97.22*
- - Sans précision ¬ *I97.29*
- - ¬ *I97.2*
- Meige ¬ *Q82.09*
- Membre s supérieur s inférieur s stade
- - I ¬ *I89.00*
- - II ¬ *I89.01*
- - III ¬ *I89.02*
- Non classé ailleurs ¬ Autre *I89.08*
- Nonne-Milroy ¬ *Q82.09*
- Ongles jaunes ¬ *L60.5*
- Primaire
- - Tardif
- - - Non héréditaire ¬ *I89.09*
- - - ¬ *I89.09*
- - ¬ *I89.09*
- Sans précision ¬ *I89.09*
- ¬ Stade de latence du *I89.08*

Lymphœdème-hypoparathyroïdie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Lymphœdème-lymphangiectasie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*

Lympho-épithélial
- Bénigne des glandes salivaires ¬ Lésion *K11.8*
- Bouche ¬ Kyste: *K09.8*

Lympho-épithélial-like ¬ Carcinome *C80.9*

Lympho-épithélioïde ¬ Lymphome *C84.4*

Lymphogène ¬ Abcès hépatique: *K75.0*

Lymphogranulomatose
- Maligne] ¬ Lymphome de Hodgkin [*C81*
- Vénérienne à Chlamydia ¬ *A55*

Lymphogranulome vénérien ¬ Rétrécissement du rectum dû à un *A55†, K93.8**

Lymphohistiocytose hémophagocytaire ¬ *D76.1*

Lymphoïde
- Aiguë [LLA] ¬ Leucémie *C91.0*
- Angiofolliculaire ¬ Hyperplasie *D47.7*
- Associé
- - Bronches [lymphome BALT] ¬ Lymphome des tissus *C88.4*

Lymphoïde *–suite*
- Associé *–suite*
- - Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus *C88.4*
- - Tissus cutanés [lymphome SALT] ¬ Lymphome des tissus *C88.4*
- Chronique [LLC] à cellules B ¬ Leucémie *C91.1*
- Hématopoïétique apparent
- - Évolution imprévisible inconnu
- - - Sans précision ¬ Tumeur des tissus *D47.9*
- - - ¬ tumeur
- - - - Précisées des tissus *D47.7*
- - - - Tissus *D47*
- - Non précisées ¬ Tumeurs malignes des tissus *C96*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne des tissus *C96.9*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux d'autres tumeurs des tissus *Z80.7*
- - - - Personnels d'autres tumeurs malignes des tissus *Z85.7*
- - - Tumeurs malignes précisées des tissus *C96.7*
- Interstitiel ¬
- - Maladie due au VIH avec pneumonie *B22, B48.5*
- - Pneumonie *B22*
- Sans précision ¬ Leucémie *C91.9*
- ¬
- - Granulomatose *C83.8*
- - Leucémie
- - - *C91*
- - - *C91.7*

Lymphomateux
- Cellules T de l'adulte ¬ Lymphome *C91.50*
- Maligne ¬ Polypose *C83.1*
- Variante ¬ *C91.5*
- ¬ Strumite *E06.3*

Lymphomatoïde ¬
- Granulomatose *C83.8*
- Papulose *C86.6*

Lymphome
- Aigu à cellules T de l'adulte en rémission complète ¬ *C91.51*
- Anaplasique grand cellule
- - ALK
- - - Négatif ¬ *C84.7*
- - - Positif ¬ *C84.6*
- - CD30 positif ¬ *C84.6*
- Angio-immunoblastique à cellules T ¬ *C86.5*
- B
- - Centrofolliculaire cutané primitif ¬ *C82.6*
- - Cutané de la zone marginale ¬ *C83.0*

Lymphome *–suite*
- B *–suite*
- - Grandes cellules ALK positif ¬ *C83.3*
- BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches [*C88.4*
- Blastique à cellules NK ¬ *C86.4*
- Burkitt
- - Atypique ¬ *C83.7*
- - ¬
- - - *C83.7*
- - - Maladie due au VIH avec *B21, C83.7*
- Burkitt-like" ¬ *C83.7*
- Cellule
- - B
- - - Effusion primaire ¬ *C83.8*
- - - Monocytoïdes ¬ *C85.9*
- - - Sans précision ¬ *C85.1*
- - Manteau ¬ *C83.1*
- - Mixtes ¬ *C85.9*
- - Précurseur
- - - B ¬ *C83.5*
- - - T ¬ *C83.5*
- - T
- - - Associé à des entéropathies ¬ *C86.2*
- - - NK
- - - - Matures
- - - - - Sans précision ¬ *C84.9*
- - - - - ¬ Autres *C84.5*
- - - - Sans précision ¬ *C84.9*
- - - - Spécifiés ¬ Autres *C86*
- - - Type entéropathique ¬ *C86.2*
- - - ¬ *C84.4*
- Centroblastique
- - Diffus ¬ *C83.3*
- - Non-hodgkinien ¬ *C83.3*
- Centroblastique-centrocytaire
- - Diffus ¬ *C83.9*
- - ¬ *C83.9*
- Centrocytaire ¬ *C83.1*
- Centrofolliculaire
- - Cutané ¬ *C82.6*
- - Diffus ¬ *C82.5*
- Cérébral à cellules B ¬ *C85.1*
- Cutané
- - Anaplasique à grandes cellules ¬ *C86.6*
- - Cellules T, sans précision ¬ *C84.8*
- - Grandes cellules T, CD30 positif ¬ *C86.6*
- - ¬ *C84.8*
- Diffus
- - Cellule
- - - Mixtes ¬ *C83.9*
- - - Non clivées ¬ *C83.9*
- - Centroblastique à grandes cellules B ¬ *C83.3*
- - Grand cellule B

Lymphome *–suite*
- Diffus *–suite*
- - Grand cellule B *–suite*
- - - Anaplasique ¬ *C83.3*
- - - CD30 positif ¬ *C83.3*
- - - Centroblastique ¬ *C83.3*
- - - Immunoblastique ¬ *C83.3*
- - - Inflammation chronique ¬ *C83.3*
- - - Plasmablastique ¬ *C83.3*
- - - Riche cellule T ¬
- - - - *C83.3*
- - - Sous-type non différencié ¬
- - - - *C83.3*
- - - Système nerveux central ¬ *C83.3*
- - - ¬ *C83.3*
- - Modérément différencié ¬ *C83.0*
- Extranodal
- - Cellules T/NK, type nasal ¬ *C86.0*
- - Zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ *C88.4*
- Folliculaire
- - Cellules clivées ¬ *C82.9*
- - Centroblastique ¬ *C82.2*
- - Grade
- - - I ¬ *C82.0*
- - - II ¬ *C82.1*
- - - III, sans précision ¬ *C82.2*
- - - IIIa ¬ *C82.3*
- - - IIIb ¬ *C82.4*
- - Non hodgkinien avec ou sans zones diffuses ¬ *C82*
- - Non-hodgkinien à petites cellules clivées ¬ *C82.9*
- - Petites cellules clivées ¬ *C82.0*
- - Sans précision ¬ *C82.9*
- - ¬
- - - *C82*
- - - Formes de *C82.7*
- Grand cellule
- - B
- - - Riche en cellules T/histiocytes ¬ *C83.3*
- - - ¬ *C83.3*
- - Ki-1+ ¬ *C84.6*
- - ¬ *C85.9*
- Hépatosplénique à cellules T ¬ *C86.1*
- Histiocytaire
- - Diffus ¬ *C83.9*
- - Vrai ¬ *C96.8*
- Hodgkin
- - Classique
- - - Cellularité mixte ¬ *C81.2*
- - - Déplétion lymphocytaire
- - - - Fibrose diffuse ¬ *C81.3*
- - - - ¬ *C81.3*
- - - Riche en lymphocytes ¬ *C81.4*

Lymphome *–suite*
- Hodgkin *–suite*
- - Classique *–suite*
- - - Sclérose nodulaire ¬ *C81.1*
- - - Type
- - - - Non précisé ¬ *C81.7*
- - - - Réticulaire en déplétion lymphocytaire ¬ *C81.3*
- - - ¬ Autres formes de *C81.7*
- - Diffus riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- - Lymphogranulomatose maligne] ¬ *C81*
- - Nodulaire
- - - Prédominance lymphocytaire ¬ *C81.0*
- - - Riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- - Sans précision ¬ *C81.9*
- Immunoblastique
- - Diffus ¬ *C83.3*
- - Non-hodgkinien ¬ *C83.3*
- Intra-oculaire primaire ¬ *C85.7*
- Intravasculaire à grandes cellules B ¬ *C83.8*
- Lennert ¬ *C84.4*
- Leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1) ¬ *C91.5*
- Lymphoblastique
- - Cellule
- - - B ¬ *C83.5*
- - - T ¬ *C83.5*
- - Diffus ¬ *C85.9*
- - ¬ *C83.5*
- Lympho-épithélioïde ¬ *C84.4*
- Lymphomateux à cellules T de l'adulte ¬ *C91.50*
- Lymphoplasmocytaire
- - Production IgM
- - - Rémission complète ¬ *C88.01*
- - - ¬ *C88.0*
- - ¬ *C83.0*
- Malin
- - Maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ Foyers osseux (médullaires) de *C79.5*
- - SAI ¬ *C85.9*
- MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [*C88.4*
- Médiastinal
- - Thymique grand cellule B ¬
- - - *C85.2*
- - ¬ *C85.2*
- Méditerranéen ¬ *C88.30*
- Mixte lymphocytaire-histiocytaire ¬ *C85.9*
- Nodal de la zone marginale ¬ *C83.0*
- Nodulaire
- - Bien différencié ¬ *C82.9*
- - Cellules B de la zone marginale ¬ *C83.0*
- - Modérément différencié ¬ *C82.9*

Lymphome *–suite*
- Nodulaire *–suite*
- - Peu différencié ¬ *C82.9*
- - SAI ¬ *C82.9*
- - Type intermédiaire ¬ *C82.9*
- Non
- - Folliculaire
- - - Sans précision ¬ *C83.9*
- - - ¬
- - - - *C83*
- - - - *C83.8*
- - Hodgkinien
- - - Cellule
- - - - B ¬ *C85.1*
- - - - T ¬ *C84.4*
- - - Non hodgkinien, non précisé ¬ *C85.9*
- - - SAI ¬ *C85.9*
- - - Types autres et non précisés ¬ *C85*
- - - ¬
- - - - Maladie due au VIH avec *B21, C85.9*
- - - - Types précisés de *C85.7*
- Non hodgkinien
- - Angio-immunoblastique ¬ *C86.5*
- - Diffus non folliculaire ¬ *C83.9*
- - Grandes cellules ¬ *C85.9*
- - Indifférencié ¬ *C83.9*
- Périphérique à cellules T, non spécifié ¬ *C84.4*
- Petites cellules B ¬ *C83.0*
- Plasmoblastique ¬ *C83.3*
- Plasmocytaire ¬ *C83.0*
- Précurseurs B, n.c.a. ¬ *C83.5*
- Primaire du cerveau ¬ Maladie due au VIH avec *B21, C85.9*
- Primitif
- - Conjonctive ¬ *C85.9*
- - Os ¬ *C85.7*
- - Séreuses ¬ *C83.8*
- - Système nerveux central ¬ *C83.3*
- SAI ¬ *C85.9*
- SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [*C88.4*
- Sézary ¬ *C84.1*
- Sous-cutané à cellules T de type panniculite ¬ *C86.3*
- Splénique
- - Diffus de la pulpe rouge à petites cellules B ¬ *C83.0*
- - Zone marginale ¬ *C83.0*
- T
- - Angiocentrique ¬ *C86.0*
- - Cutané à cellules pléomorphes de taille petite à moyenne CD4+ ¬ *C84.4*
- - Immunoblastique ¬ *C84.9*
- - Sous-cutané type panniculite ¬ *C86.3*
- - Type entéropathie ¬ *C86.2*

Lymphome *–suite*
- Thyroïdien ¬ *C85.9*
- Tissu lymphoïde associé
- - Bronches [lymphome BALT] ¬ *C88.4*
- - Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, *C88.4*
- - Tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [lymphome SALT] ¬ *C88.4*
- Type
- - Cellulaire indifférencié ¬ *C83.9*
- - Histiocytaire ¬ *C85.9*
- - Hydroa vacciniforme ¬ *C84.5*
- - Non-Burkitt, indifférencié ¬ *C83.3*
- Zone
- - Marginale splénique ¬ *C83.0*
- - T ¬ *C84.4*
- ¬
- - Maladie
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours d'un *C85.9†, N16.1**
- - - VIH avec *B21, C85.9*
- - Pyélonéphrite au cours d'un *C85.9†, N16.1**

Lymphonodulaire à entérovirus ¬ Pharyngite *B08.8*

Lymphopénie ¬ *D72.8*

Lymphoplasmocytaire
- Production IgM
- - Rémission complète ¬ Lymphome *C88.01*
- - ¬ Lymphome *C88.0*
- ¬ Lymphome *C83.0*

Lymphoplasmocytoïde ¬ Leucémie *C91.1*

Lymphoprolifératif
- Auto-immun
- - Dianzani ¬ Maladie *D47.9*
- - Haploinsuffisance de CTLA-4 ¬ Syndrome *D47.9*
- - ¬ Syndrome *D47.9*
- Autosomique récessive par déficit en CD27 ¬ Maladie *D47.9*
- Cutané primitif à cellules T, CD30 positif ¬ Syndrome *C86.6*
- Liée au chromosome X ¬ Maladie *D82.3*
- Post-tranplantation ¬ Maladie *D47.9*
- SAI ¬ Maladie *D47.9*
- Systémique à cellules T positive au virus Epstein-Barr chez l'enfant ¬ Maladie *D82.3*
- Type T-gamma ¬ Maladie *D47.9*

Lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire ¬ Autres maladies précisées avec participation des tissus *D76*

Lymphoréticulosarcome ¬ *C85.9*

Lymphosarcome
v.a. Réticulolymphosarcome
- Diffus ¬
- - *C83.9*
- - *C85.9*
- Nodulaire ¬ *C82.9*

Lymphosarcome *–suite*
- ¬
- - *C85.9*

Lymphotrope lymphocytes T humain
- Type 1 HTLV-1 ¬
- - Myélopathie due à une infection à virus *G04.1*
- - Sujet porteur d'une infection à virus *Z22.6*
- ¬ Myélopathie associée à un virus *G04.1*

Lynch ¬ Syndrome de *C18.9*

Lyse
- Positif dans un sérum acidifié ¬ Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec test de *D64.4*
- Spontanée) des tumeurs (après traitement cytostatique d'une néoplasie) ¬ *E88.3*
- Tumorale ¬ Syndrome de *E88.3*

Lysergide
- LSD] ¬ Intoxication: *T40.8*
- ¬ Intoxication au *T40.8*

Lysergique] ¬ Intoxication au LSD [diéthylamide de l'acide *T40.8*

Lysine
- Alpha-cétoglutarate réductase ¬ Déficit en *E72.3*
- Hydroxylysine ¬ Anomalies du métabolisme de la *E72.3*

Lysinurie
v.a. cystinurie-lysinurie
- ¬ LP [Intolérance aux protéines dibasiques avec *E72.0*

Lysosomale
- Activité maltase acide normale ¬ Glycogénose *E74.0*
- ¬ Déficit
- - Alpha-D-mannosidase *E77.1*
- - Bêta-mannosidase *E77.1*
- - Lipase acide *E75.5*

Lysosomiaux ¬ Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes *E77.0*

MacDermot ¬ Dysplasie spondylo-épiphysaire type *Q77.7*

MacDermot-Winter ¬ Syndrome de *Q87.8*

Machines ¬ Accident dû à: *W49.9!*

Mâchoire

- Aigu chronique purulent ¬
- - Ostéite de la *K10.2*
- - Ostéomyélite (néonatale) de la *K10.2*
- - Ostéonécrose (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) de la *K10.2*
- - Ostéoradionécrose de la *K10.2*
- - Périostite de la *K10.2*
- Anévrismal ¬ Kyste de la *K09.2*
- Base du crâne ¬ Anomalies de rapport entre les *K07.1*
- Cartilage) (ménisque) ¬ *S03.0*
- Clignement ¬ *Q07.8*
- Hémorragique ¬ Kyste de la *K09.2*
- Inférieure (mandibule) ¬ *S02.6*
- Irradiation ¬ Ostéonécrose de la *K10.28*
- Médicaments ¬ Nécrose de la *K10.28*
- Ressort ¬ *K07.6*
- SAI ¬ Kyste de la *K09.2*
- Sans précision ¬
- - État inflammatoire de la *K10.29*
- - Maladie des *K10.9*
- Supérieur ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - *S02.4*
- Traumatique ¬ Kyste de la *K09.2*
- ¬
- - Affections inflammatoires des *K10.2*
- - Alvéolite des *K10.3*
- - Anomalie
- - - Importantes de dimension des *K07.0*
- - - Morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la *Q67.4*
- - Asymétrie des *K07.1*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire de la *T84.08*
- - Dysplasie fibreuse *K10.8*
- - Entorse et foulure de la *S03.4*
- - États inflammatoires précisés de la *K10.28*
- - Exostose *K10.8*
- - Kyste
- - - *K09.2*
- - - Osseux solitaire de la *K09.2*
- - Luxation de la *S03.0*
- - Maladie
- - - *K10*
- - - Liées au développement des *K10.0*
- - - Précisées des *K10.8*
- - Ostéite de la *K10.28*
- - Ostéonécrose de la *K10.28*
- - Plaie ouverte dans la région de la *S01.80*

Mâchoire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Tuberculose de la *A18.0†, M90.08**

Machupo ¬ Fièvre hémorragique de *A96.1*

Macklin
v. Curth-Macklin

MacLeod ¬ Syndrome de *J43.0*

Macro-angiopathie ¬ Diabète sucré avec Microangiopathie et *E14.50†, I79.2**

Macroblépharon-macrostomie ¬ Syndrome de dysostose mandibulo-faciale- *Q87.0*

Macrocéphalie

- Cutis marmorata telangiectatica congenita ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Emacroorchidie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Malformation capillaire ¬ Syndrome *Q87.3*
- Myopie-malformation de Dandy-Walker ¬ Syndrome de dysmorphie- *Q87.8*
- Paraplégie spastique-dysmorphie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬ *Q75.3*

Macrocheilie ¬ *Q18.6*

Macrocornée avec glaucome ¬ *Q15.0*

Macrodactylie

- Doigts) ¬ *Q74.0*
- Orteils ¬ *Q74.2*

Macrodontie ¬ *K00.2*

Macroencéphalie ¬ *Q04.5*

Macrogénitosomie précoce chez l'homme ¬ *E25*

Macroglobulinémie

- Monoclonale ¬ *D47.2*
- Primitive) (idiopathique) ¬ *C88.0*
- Waldenström ¬
- - *C88.0*
- - Glomérulonéphrite au cours de *C88.00†, N08.1**
- - Glomérulopathie au cours de *C88.00†, N08.1**

Macroglossie
v.a. omphalocèle-macroglossie-gigantisme

- Congénitale) ¬ *Q38.2*

Macrognathie (mandibulaire) (maxillaire) ¬ *K07.0*

Macrogyrie ¬ *Q04.8*

Macrokystique ¬ Malformation lymphatique *D18.19*

Macrolides

- Oxazolidinones streptogramines
- - Nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus pneumoniae résistant aux *U80.11!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae résistant pénicilline oxacilline
- - - *U80.1!*
- - - Échéant aux *U80.10!*
- ¬ Intoxication: *T36.3*

Macronodulaire

- Surrénales ¬ Syndrome de Cushing dû à une hyperplasie *E24.8*
- ¬ Cirrhose (du foie): *K74.6*

Macroorchidie tardive liée à l'X ¬ Hypothyroïdie congénitale centrale avec *E03.1*

Macrophages ¬ Myofasciite à *M60.89*

Macrophtalmie

- Cours d'un glaucome congénital ¬ *Q15.0*
- ¬
- - *Q11.3*
- - Anophtalmie, microphtalmie et *Q11*

Macrosome-tumeur de Wilms ¬ Syndrome de néphroblastomatose-ascite fœtale- *Q87.3*

Macrosomie-microphtalmie-fente palatine ¬ Syndrome de *Q87.0*

Macrostomie
v.a. ablépharie-macrostomie

- Anomalies préauriculaires-ophtalmoplégie externe ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬
- - *Q18.4*
- - Syndrome de dysostose mandibulo-faciale-macroblépharon- *Q87.0*

Macrothrombocytopénie autosomique dominant ¬ *D69.41*

Macrotie ¬ *Q17.1*

MACS ¬ Syndrome *Q82.8*

Macula

- Lié âge
- - Humide ¬ Dégénérescence de la *H35.30*
- - Néovasculaire ¬ Dégénérescence de la *H35.30*
- Pôle postérieur ¬
- - Cicatrice (post-inflammatoire) (post-traumatique) de la *H31.0*
- - Dégénérescence de la *H35.3*
- ¬
- - Diabète sucré avec œdème de la *E14.30†, H36.0**
- - Kyste *H35.38*
- - Trou (foramen) *H35.38*

Maculaire

- Ailes de papillon ¬ Dystrophie *H35.5*
- Annulaire concentrique bénigne ¬ Dystrophie *H35.5*
- Brachydactylie type B ¬ Syndrome de colobome *Q87.8*
- Caroline du Nord ¬ Dystrophie *H35.5*
- Cystoïde ¬ Dystrophie *H35.5*
- Juvénile ¬ Hypotrichose avec dégénérescence *Q87.8*
- Liée à l'âge, sèche ¬ Dégénérescence *H35.31*
- Maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (*A66.2*
- Occulte ¬ Dystrophie *H35.5*
- Syphilitique de la peau en stries ¬ Atrophie *A52.7†, L99.8**

Maculaire *–suite*
- Vitelliforme de l'adulte ¬ Dégénérescence *H35.5*
- ¬
- - Amylose *E85.9†, L99.0**
- - Colobome *Q14.8*
- - Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*
- - Télangiectasie *H35.0*
- - Traction vitréo- *H35.38*

Maculatum
- Striatum syphilitique ¬ Atrophoderma *A52.7†, L99.8**
- Syphilitique ¬ Atrophoderma *A51.3†, L99.8**

Maculeuse
- Brésilienne] ¬ Fièvre (de): Sao Paulo [*A77.0*
- ¬ Amylose *E85.4†, L99.0**

Maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (*A66.2*

Maculopathie
- Myopique ¬ *H35.38*
- Placoïde persistante ¬ *H35.38*
- Présence de druses ¬ *H35.31*
- Toxique
- - Antipaludéens ¬ *H35.38*
- - Provoquée par l'(hydroxy-)chloroquine ¬ *H35.38*
- - ¬ *H35.38*
- ¬ Diabète sucré
- - *E14.30†, H36.0**
- - Type
- - - 1 avec *E10.30†, H36.0**
- - - 2 avec *E11.30†, H36.0**

Madarosis de la paupière ¬ *H02.7*

Madelung] ¬ Carpocyphose [maladie de *Q74.0*

Madras ¬ Maladie du motoneurone type *G12.2*

Madura
- Mycosique ¬ Pied de *B47.0*
- SAI ¬ Pied de *B47.9*

Maduromycose ¬ *B47.0*

Maffucci ¬ Syndrome de *Q78.4*

Magendie ¬ Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de *Q03.1*

Magenis
v. Smith-Magenis

Magnésium
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du *P71.9*
- - ¬ anomalie transitoire métabolisme calcium
- - - *P71*
- - - *P71.8*
- Reins ¬ Perte isolée de *E83.4*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme du *E83.4*

Magnésium *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carence en *E61.2*
- - Hypomagnésémie par malabsorption sélective de *E83.4*
- - Syndrome de carence en *E83.4*
- - Taux anormal de: *R79.0*
- - Tétanie néonatale sans carence en calcium ou *P71.3*

MAGT1 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Mahvash ¬ Maladie de *E16.3*

Main
- 2ème degré sans précision ¬
- - Brûlure
- - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.2*
- - - Poignet et de la *T23.20*
- - Corrosion
- - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.6*
- - - Poignet et de la *T23.60*
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.81*
- Bêche (congénitale) ¬ *Q68.1*
- Bouche ¬ Syndrome pied- *B08.4*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.84*
- Degré
- - 2a ¬
- - - Brûlure
- - - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.2*
- - - - Poignet et de la *T23.20*
- - - Corrosion
- - - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.6*
- - - - Poignet et de la *T23.60*
- - 2b ¬
- - - Brûlure
- - - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.8*
- - - - Poignet et de la *T23.21*
- - - Corrosion
- - - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.9*
- - - - Poignet et de la *T23.61*
- - Non précis ¬
- - - Brûlure
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.0*
- - - - Poignet et de la *T23.0*
- - - Corrosion
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.4*
- - - - Poignet et de la *T23.4*
- Doigt
- - S) ¬ Absence congénitale de la *Q71.3*
- - ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.03*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.82*

Main *–suite*
- Lymphangite ¬
- - Infection purulente de la *L03.10*
- - Inflammation purulente de la *L03.10*
- Membre supérieur [tout niveau, sauf la main] ¬ Amputation traumatique d'une *T05.1*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du poignet et de la *T34.5*
- Niveau
- - Non précisé ¬ Amputation traumatique du poignet et de la *S68.9*
- - Poignet ¬ Amputation traumatique de la *S68.4*
- Partie non précisée ¬ Plaie ouverte du poignet et de la *S61.9*
- Pied
- - Fendus-surdité ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - Immersion ¬ *T69.0*
- - Sans précision ¬ Polydactylie (*Q69.9*
- Pied bot(e) ou en griffe acquis(e) ¬ *M21.5*
- Pince de homard ¬ *Q71.6*
- Poignet
- - Unilatéral ¬ Absence acquise de *Z89.1*
- - ¬ Ténosynovite sèche de la *M70.0*
- Présente ¬ Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, *Q71.1*
- SAI ¬ Plaie ouverte du poignet et de la *S61*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - Poignet
- - - *S69*
- - - *S69.9*
- - Superficielle du poignet et de la *S60.9*
- SAP ¬ *L03.10*
- Seuls] ¬ bras [toute partie, sauf poignet et *T22*
- Vampire ¬ *A66.3*
- ¬
- - Abrasion sur la *S60.81*
- - Absence congénitale de l'avant-bras et de la *Q71.2*
- - Amputation traumatique
- - - Associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la *S68.3*
- - - Deux *T05.0*
- - - Main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la *T05.1*
- - - Parties du poignet et de la *S68.8*
- - - Poignet et de la *S68*
- - Anomalie morphologique congénitale de la *Q68.1*
- - Brûlure
- - - Corrosion
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22*
- - - - Poignet et de la *T23*
- - - Premier degré

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Brûlure *–suite*
- - - Premier degré *–suite*
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.1*
- - - - Poignet et de la *T23.1*
- - - Second degré du poignet et de la *T23.2*
- - - Troisième degré
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.3*
- - - - Poignet et de la *T23.3*
- - Bursite de la *M70.1*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.13*
- - Contusion d'autres parties du poignet et de la *S60.2*
- - Corrosion
- - - Premier degré
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.5*
- - - - Poignet et de la *T23.5*
- - - Second degré du poignet et de la *T23.6*
- - - Troisième degré
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.7*
- - - - Poignet et de la *T23.7*
- - Dermatophytose de la *B35.2*
- - Écrasement
- - - Parties autres et non précisées du poignet et de la *S67.8*
- - - Poignet et de la *S67*
- - Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la *S63.7*
- - Fracture
- - - Multiples de la *S62.8*
- - - Niveau du poignet et de la *S62*
- - - Os scaphoïde de la *S62.0*
- - - Ouverte de la *S62.8, S61.87!*
- - - Parties autres et non précisées du poignet et de la *S62.8*
- - Gelure superficielle du poignet et de la *T33.5*
- - Lésion
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la *S61.84!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la *S61.87!*
- - - - II
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la *S61.85!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la *S61.88!*
- - - - III
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la *S61.86!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la *S61.89!*

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique
- - - - Artère
- - - - - Cubitale au niveau du poignet et de la *S65.0*
- - - - - Radiale au niveau du poignet et de la *S65.1*
- - - - Multiple
- - - - - Muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la *S66.7*
- - - - - Muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la *S66.6*
- - - - - Nerfs au niveau du poignet et de la *S64.7*
- - - - - Poignet et de la *S69.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la *S65.7*
- - - - Muscle
- - - - - Tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la *S66.2*
- - - - - Tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la *S66.3*
- - - - - Tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la *S66.1*
- - - - - Tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la *S66.0*
- - - - - Tendon non précisés, au niveau du poignet et de la *S66.9*
- - - - - Tendons au niveau du poignet et de la *S66.8*
- - - - - Tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la *S66.4*
- - - - - Tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la *S66.5*
- - - - Nerf
- - - - - Cubital au niveau du poignet et de la *S64.0*
- - - - - Médian au niveau du poignet et de la *S64.1*
- - - - - Niveau du poignet et de la *S64.8*
- - - - - Non précisé, au niveau du poignet et de la *S64.9*
- - - - - Radial au niveau du poignet et de la *S64.2*
- - - - Précisées du poignet et de la *S69.8*
- - - - Superficiel
- - - - - Multiples du poignet et de la *S60.7*
- - - - - Poignet et de la *S60.88*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la *S65.9*
- - - - - Sanguins au niveau du poignet et de la *S65.8*
- - Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la *S63*
- - Myopathie distale avec atteinte des muscles postérieurs des jambes et des muscles antérieurs des *G71.0*
- - Ostéochondrite juvénile de la *M92.2*

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Paume de la *S61.80*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - Non précisée d'autres parties du poignet et de la *S61.80*
- - - - Parties du poignet et de la *S61.8*
- - - - Poignet et de la *S61*
- - - Ouvertes multiples du poignet et de la *S61.7*
- - Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la *T92.2*
- - Symbrachydactylie des pieds et des *Q73.8*
- - Syndrome
- - - Cœur- *Q87.2*
- - - Épaule- *M89.0*
- - - Persistance du canal artériel-bicuspidie valvulaire aortique-anomalie des *Q87.2*
- - Teigne de la *B35.2*
- - Trichophytie de la *B35.2*

Main bote radiale ¬ *Q71.4*

Main-pied ¬ Syndrome *L27.1*

Main-pied-utérus ¬ Syndrome *Q87.8*

Maintien du sommeil ¬ Troubles de l'endormissement et du *G47.0*

Mainzer
v. Saldino-Mainzer

Maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la *Z76.2*

Maissiat [ilio-tibiale] ¬ Syndrome de la bandelette de *M76.3*

Majeur
- Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F32.2*
- Histocompatibilité classe
- - I ¬ Déficit en complexe *D81.6*
- - II ¬ Déficit en complexe *D81.7*
- Mineure) ¬ Stomatite: aphteuse (*K12.0*
- Précisées ¬ Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies *D82.8*
- Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F33.2*
- Sans précision ¬ Déficit immunitaire associé à une anomalie *D82.9*
- Symptôme psychotique ¬ épisode
- - Isolés de: dépression: *F32.3*
- - Récurrents sévères de: dépression: *F33.3*
- ¬
- - Déchirure hépatique *S36.15*
- - Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies *D82*
- - Thalassémie: *D56.1*
- - Trisomie partielle *Q92.2*

Majewski
v.a. Lenz-Majewski

Majewski *–suite*
- ¬ Syndrome des côtes courte-spolydactylie type *Q77.2*

Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques ¬ *F68.0*

Malabsorption
- Galactose ¬ *E74.2*
- Glucose-galactose ¬ *E74.3*
- Idiopathique par défaut de synthèse des acides biliaires ¬ *K90.8*
- Intestinal
- - Sans précision ¬ *K90.9*
- - ¬
- - - *K90*
- - - *K90.8*
- - - Maladie due au VIH avec *B23.8, K90.9*
- Intolérance
- - Amidon ¬ *K90.4*
- - Glucides ¬ *K90.4*
- - Lipides ¬ *K90.4*
- - Non classée ailleurs ¬ *K90.4*
- - Protides ¬ *K90.4*
- Isomaltose ¬ *E74.3*
- Méthionine ¬ Syndrome de *E72.1*
- Monosaccharide ¬ *E74.3*
- Post-chirurgical
- - Fracture pathologique ¬ Ostéoporose consécutive à une *M80.3*
- - Non classée ailleurs ¬ *K91.2*
- - ¬
- - - Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une *M83.2*
- - - Ostéoporose consécutive à une *M81.3*
- Saccharose-isomaltose ¬ *E74.3*
- Sélectif
- - Cobalamine-protéinurie ¬ Syndrome de *D51.1*
- - Magnésium ¬ Hypomagnésémie par *E83.4*
- - Vitamine B12, avec protéinurie ¬ Anémie par carence en vitamine B12 due à une *D51.1*
- ¬
- - Défaut de synthèse des acides biliaires avec cholestase et *K76.8*
- - Ostéomalacie de l'adulte par *M83.2*

Malade ¬ Personne en bonne santé accompagnant un sujet *Z76.3*

Maladie
v. Type de maladie

Malaires et maxillaires ¬ Fracture des os *S02.4*

Malaise
- Fatigue ¬ *R53*
- Vasovagale psychogène ¬ *F45.30*

Malakoplakie ¬
- *N28.88*
- *N32.8*

Malaria
- Quartana ¬ Maladie glomérulaire au cours de *B52.0†, N08.0**
- Tropica avec complication cérébrale ¬ *B50.0†, G94.8**

Malariae
- Atteinte rénale ¬ Paludisme à Plasmodium *B52.0†, N08.0**
- Complications ¬ Paludisme à Plasmodium *B52.8*
- Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium *B52*
- SAI ¬ Paludisme à Plasmodium *B52.9*
- Sans complication ¬ Paludisme à Plasmodium *B52.9*
- ¬
- - Glomérulonéphrite à Plasmodium *B52.0†, N08.0**
- - Paludisme à Plasmodium *B52*

Malayi ¬ Filariose à Brugia *B74.1*

Malformatifs
- Associés principalement à une petite taille ¬ Syndromes congénitaux *Q87.1*
- Atteignant principalement l'aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux *Q87.0*
- Causé exogène connu
- - Non classés ailleurs ¬ Syndromes congénitaux *Q86*
- - ¬ Syndrome congénital
- - - *Q86.8*
- - - *Q86.88*
- Comprenant un gigantisme néonatal ¬ Syndromes congénitaux *Q87.3*
- Impliquant principalement les membres ¬ Syndromes congénitaux *Q87.2*
- Modifications du squelette ¬ Autres syndromes congénitaux *Q87.5*
- Précis
- - Atteignant plusieurs systèmes ¬ Autres syndromes congénitaux *Q87*
- - Non classés ailleurs ¬ Autres syndromes congénitaux *Q87.8*

Malformation
- Acquis
- - Cheville, n.c.a. ¬ *M21.68*
- - Métatarse ¬ *M21.68*
- - Pied ¬ *M21.68*
- - Talon ¬ *M21.68*
- Adénomatoïde kystique du poumon ¬ *Q33.0*
- Aqueduc de Sylvius ¬ *Q03.0*
- Arnold-Chiari type
- - 1 ¬ *Q07.0*
- - 2 ¬ *Q07.0*
- Artérioveineux
- - Cérébrale ¬ *Q28.29*
- - Congénital vaisseau
- - - Cérébral
- - - - Non précisée ¬ *Q28.29*
- - - - ¬ Autres *Q28.28*

Malformation *–suite*
- Artérioveineux *–suite*
- - Congénital vaisseau *–suite*
- - - Précérébral
- - - - Non précisée ¬ *Q28.09*
- - - - ¬ Autres *Q28.08*
- - Durales du crâne ¬ *Q28.28*
- - Faciale ¬ *Q27.3*
- - Fronto-nasale ¬ *Q27.3*
- - Intracrânienne ¬ *Q28.29*
- - Mandibulaire ¬ *Q27.3*
- - Maxillaire ¬ *Q27.3*
- - Périphérique ¬ *Q27.3*
- - Spinale ¬ *G37.4*
- - Vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.2*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.0*
- - ¬ Malformation capillaire- *Q27.3*
- Articulation sacro-iliaque congénitale ¬ *Q74.2*
- Atério-veineuse de la veine de Galien ¬ *Q28.28*
- Avant-pied ¬ *M21.68*
- Bassin
- - Entraînant une disproportion SAI ¬ *O33.0*
- - Mère ¬ Soins maternels pour disproportion due à une *O33.0*
- Capillaire
- - Malformation artérioveineux ¬ *Q27.3*
- - Polymicrogyrie ¬ Syndrome mégalencéphalie- *Q87.3*
- - Rétine ¬ *D18.06*
- - ¬ Syndrome
- - - Macrocéphalie- *Q87.3*
- - - Mégalencéphalie- *Q87.3*
- - - Microcéphalie- *Q87.8*
- Cardiaque
- - Congénital
- - - Eisenmenger ¬ *Q21.88*
- - - Précisées ¬ Autres *Q24.8*
- - - Sans précision ¬ *Q24.9*
- - ¬ Syndrome de polysyndactylie- *Q87.8*
- Cardiaque-pied bot ¬ Syndrome
- - Pierre Robin- *Q87.8*
- - Séquence de Pierre Robin- *Q87.8*
- Caverneux cérébral
- - Familiale ¬ *Q28.38*
- - Héréditaire ¬ *Q28.38*
- Cérébrales-cardiopathie congénitale-polydactylie postaxiale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Cérebro-cérébelleuse ¬ Syndrome d'épilepsie focale-déficience intellectuelle- *Q04.8*
- Cheville congénitale ¬ *Q74.2*
- Congénital
- - Anomalie chromosomique ¬

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Anomalie chromosomique ¬ *–suite*
- - - Antécédents personnels de *Z87.7*
- - - Examen spécial de dépistage des *Z13.7*
- - Aorte ¬ Autres *Q25.4*
- - Appareil
- - - Circulatoire
- - - - Périphérique
- - - - - Sans précision ¬ *Q27.9*
- - - - - ¬ Autres *Q27*
- - - - Sans précision ¬ *Q28.9*
- - - - ¬ Autres *Q28*
- - - Digestif
- - - - Sans précision ¬ *Q45.9*
- - - - ¬ Autres *Q45*
- - - Lacrymal
- - - - SAI ¬ *Q10.6*
- - - - ¬ Autres *Q10.6*
- - - Respiratoire
- - - - Sans précision ¬ *Q34.9*
- - - - ¬ Autres *Q34*
- - - Urinaire
- - - - Sans précision ¬ *Q64.9*
- - - - ¬ Autres *Q64*
- - Artère
- - - Pulmonaire ¬ Autres *Q25.7*
- - - Rénal
- - - - SAI ¬ *Q27.2*
- - - - ¬ Autres *Q27.2*
- - Bouche
- - - SAI ¬ *Q38.6*
- - - ¬ Autres *Q38.6*
- - Bronches ¬ Autres *Q32.4*
- - Canal déférent épididyme vésicule séminal prostate
- - - SAI ¬ *Q55.4*
- - - ¬ Autres *Q55.4*
- - Cardiaques ¬ Autres *Q24*
- - Cavité orifice cardiaque
- - - Sans précision ¬ *Q20.9*
- - - ¬
- - - - *Q20*
- - - - *Q20.8*
- - Chambre
- - - Antérieur œil
- - - - Sans précision ¬ *Q13.9*
- - - - ¬ Autres *Q13.8*
- - - Postérieur œil
- - - - Sans précision ¬ *Q14.9*
- - - - ¬ Autres *Q14.8*
- - Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- - Cheveux SAI ¬ *Q84.2*

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Choroïde ¬ *Q14.3*
- - Clitoris ¬ *Q52.6*
- - Cloison cardiaque
- - - Sans précision ¬ *Q21.9*
- - - ¬ Autres *Q21.8*
- - Cornée
- - - SAI ¬ *Q13.4*
- - - ¬ Autres *Q13.4*
- - Corps
- - - Calleux ¬ *Q04.0*
- - - Vitré ¬ *Q14.0*
- - Côte SAI ¬ *Q76.6*
- - Côtes ¬ Autres *Q76.6*
- - Cristallin
- - - Sans précision ¬ *Q12.9*
- - - ¬ Autres *Q12.8*
- - Diaphragme
- - - SAI ¬ *Q79.1*
- - - ¬ Autres *Q79.1*
- - Encéphale
- - - Sans précision ¬ *Q04.9*
- - - ¬ Autres *Q04*
- - Estomac, sans précision ¬ *Q40.3*
- - Face cou
- - - Sans précision ¬ *Q18.9*
- - - ¬ Autres *Q18*
- - Fixation de l'intestin ¬ *Q43.3*
- - Foie ¬ Autres *Q44.7*
- - Front ¬ *Q75.8*
- - Genou ¬ *Q74.1*
- - Glande
- - - Canaux salivaires ¬ *Q38.4*
- - - Endocrines ¬ *Q89.2*
- - - Parathyroïde ou thyroïde ¬ *Q89.2*
- - Grand veine
- - - Sans précision ¬ *Q26.9*
- - - ¬ Autres *Q26.8*
- - Gros vaisseau
- - - Sans précision ¬ *Q25.9*
- - - ¬ Autres *Q25.8*
- - Hanche
- - - Sans précision ¬ *Q65.9*
- - - ¬ Autres *Q65.8*
- - Intestin
- - - Sans précision ¬ *Q43.9*
- - - ¬ Autres *Q43*
- - Iris
- - - SAI ¬ *Q13.2*
- - - ¬ Autres *Q13.2*
- - Langue
- - - Bouche et du pharynx ¬ Autres *Q38*
- - - ¬ Autres *Q38.3*

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Larynx
- - - Sans précision ¬ *Q31.9*
- - - ¬ Autres *Q31.8*
- - Lèvre
- - - Non classées ailleurs ¬ *Q38.0*
- - - SAI ¬ *Q38.0*
- - Membre s
- - - Inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne ¬ Autres *Q74.2*
- - - Non précisé(s), sans précision ¬ *Q74.9*
- - - Supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire ¬ Autres *Q74.0*
- - - ¬ Autres *Q74*
- - Moelle épinière
- - - Sans précision ¬ *Q06.9*
- - - ¬ Autres *Q06*
- - Multiples, non classées ailleurs ¬ *Q89.7*
- - Myocarde ¬ *Q24.8*
- - Nez
- - - Sans précision ¬ *Q30.9*
- - - ¬ Autres *Q30.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *Q89*
- - Œil
- - - Sans précision ¬ *Q15.9*
- - - ¬ Autres *Q15*
- - Œsophage
- - - Sans précision ¬ *Q39.9*
- - - ¬ Autres *Q39.8*
- - Ongle
- - - SAI ¬ *Q84.6*
- - - ¬ Autres *Q84.6*
- - Orbite ¬ *Q10.7*
- - Oreille
- - - Atteinte audition
- - - - Sans précision ¬ *Q16.9*
- - - - ¬ *Q16*
- - - Interne ¬ *Q16.5*
- - - Moyenne
- - - - SAI ¬ *Q16.4*
- - - - ¬ Autres *Q16.4*
- - - Sans précision ¬ *Q17.9*
- - - ¬ Autres *Q17*
- - Organe génital
- - - Femme
- - - - Sans précision ¬ *Q52.9*
- - - - ¬ Autres *Q52*
- - - Homme
- - - - Sans précision ¬ *Q55.9*
- - - - ¬ Autres *Q55*
- - Os crâne face
- - - Sans précision ¬ *Q75.9*
- - - ¬ Autres *Q75*
- - Osselets ¬ *Q16.3*

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Ovaire
- - - SAI ¬ *Q50.3*
- - - Trompes de Fallope et des ligaments larges ¬ *Q50*
- - - ¬ Autres *Q50.3*
- - Palais
- - - Non classées ailleurs ¬ *Q38.5*
- - - SAI ¬ *Q38.5*
- - Pancréas canal pancréatique
- - - SAI ¬ *Q45.3*
- - - ¬ Autres *Q45.3*
- - Papille optique ¬ *Q14.2*
- - Paroi abdominale ¬ Autres *Q79.5*
- - Paupière
- - - Appareil lacrymal et de l'orbite ¬ *Q10*
- - - SAI ¬ *Q10.3*
- - - ¬ Autres *Q10.3*
- - Pavillon de l'oreille ¬ *Q17.3*
- - Peau
- - - Phanères
- - - - Sans précision ¬ *Q84.9*
- - - - ¬ Autres *Q84*
- - - Sans précision ¬ *Q82.9*
- - - ¬ Autres *Q82*
- - Pénis
- - - SAI ¬ *Q55.6*
- - - ¬ Autres *Q55.6*
- - Péricarde ¬ *Q24.8*
- - Pharynx
- - - SAI ¬ *Q38.8*
- - - ¬ Autres *Q38.8*
- - Poumon
- - - Sans précision ¬ *Q33.9*
- - - ¬ Autres *Q33.8*
- - Précis
- - - Appareil
- - - - Circulatoire
- - - - - Périphérique ¬ Autres *Q27.8*
- - - - - ¬ Autres *Q28.88*
- - - - Digestif ¬ Autres *Q45.8*
- - - - Respiratoire ¬ Autres *Q34.8*
- - - - Urinaire ¬ Autres *Q64.8*
- - - Encéphale ¬ Autres *Q04.8*
- - - Estomac ¬ Autres *Q40.2*
- - - Face et du cou ¬ Autres *Q18.8*
- - - Intestin ¬ Autres *Q43.8*
- - - Membre(s) non précisé(s) ¬ Autres *Q74.8*
- - - Moelle épinière ¬ Autres *Q06.8*
- - - Œil ¬ Autres *Q15.8*
- - - Oreille ¬ Autres *Q17.8*
- - - Organe génital
- - - - Femme ¬ Autres *Q52.8*
- - - - Homme ¬ Autres *Q55.8*

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Précis *–suite*
- - - Os du crâne et de la face ¬ Autres *Q75.8*
- - - Peau
- - - - Phanères ¬ Autres *Q84.8*
- - - - ¬ Autres *Q82.8*
- - - Rein ¬ Autres *Q63.8*
- - - Système nerveux ¬ Autres *Q07.8*
- - - Voies digestives supérieures ¬ Autres *Q40.8*
- - - ¬ Autres *Q89.8*
- - Queue de cheval ¬ Autres *Q06.3*
- - Rachis
- - - Non associées à une scoliose ¬ Autres *Q76.4*
- - - Thorax osseux ¬ *Q76*
- - Rate ¬
- - - *Q89.08*
- - Rein
- - - Sans précision ¬ *Q63.9*
- - - ¬ Autres *Q63*
- - Rétine ¬ *Q14.1*
- - SAI des bronches ¬ *Q32.4*
- - Sans précision ¬ *Q89.9*
- - Sein
- - - Sans précision ¬ *Q83.9*
- - - ¬ Autres *Q83.88*
- - Septums cardiaques ¬ Autres *Q21.88*
- - Surrénales ¬ *Q89.1*
- - Système
- - - Nerveux
- - - - Sans précision ¬ *Q07.9*
- - - - ¬ Autres *Q07*
- - - Ostéo-articulaire muscle
- - - - Sans précision ¬ *Q79.9*
- - - - ¬ Autres *Q79.8*
- - Testicule s scrotum
- - - SAI ¬ *Q55.2*
- - - ¬ Autres *Q55.2*
- - Thorax osseux
- - - Sans précision ¬ *Q76.9*
- - - ¬ Autres *Q76.8*
- - Trachée
- - - Bronches ¬ *Q32*
- - - ¬
- - - - *Q32.1*
- - Trompe Fallope ligament large
- - - SAI ¬ *Q50.6*
- - - ¬ Autres *Q50.6*
- - Uretère ¬
- - - *Q62.8*
- - - Anomalies congénitales obstructives du bassinet et *Q62*
- - Utérus

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Utérus *–suite*
- - - Col utérus
- - - - Sans précision ¬ *Q51.9*
- - - - ¬
- - - - - *Q51*
- - - - - *Q51.8*
- - - ¬ Soins maternels pour *O34.0*
- - Vagin
- - - SAI ¬ *Q52.4*
- - - ¬ Autres *Q52.4*
- - Vaisseau
- - - Cérébral
- - - - Non précisée ¬ *Q28.39*
- - - - ¬ Autres *Q28.38*
- - - Précérébral
- - - - Non précisée ¬ *Q28.19*
- - - - ¬ Autres *Q28.18*
- - Valve pulmonaire
- - - SAI ¬ *Q22.3*
- - - Valvule tricuspide ¬ *Q22*
- - - ¬ Autres *Q22.3*
- - Valvule
- - - Aortique mitral
- - - - Sans précision ¬ *Q23.9*
- - - - ¬ Autres *Q23.8*
- - - Tricuspide
- - - - Sans précision ¬ *Q22.9*
- - - - ¬ Autres *Q22.8*
- - Vésicule biliaire
- - - SAI ¬ *Q44.1*
- - - Voies biliaires et du foie ¬ *Q44*
- - - ¬ Autres *Q44.1*
- - Vessie urètre
- - - SAI ¬ *Q64.7*
- - - ¬ Autres *Q64.7*
- - Voie
- - - Biliaire
- - - - SAI ¬ *Q44.5*
- - - - ¬ Autres *Q44.5*
- - - Digestif supérieur
- - - - Sans précision ¬ *Q40.9*
- - - - ¬ Autres *Q40*
- - Vulve ¬ Autres *Q52.7*
- Cranio-faciale ¬ *Q75.9*
- Dandy-Walker
- - Isolée avec hydrocéphalie ¬ *Q03.1*
- - ¬ Syndrome de dysmorphie-macrocéphalie-myopie- *Q87.8*
- Échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de *Z36.3*
- Fente branchiale SAI ¬ *Q18.2*
- Foie SAI congénital(e) ¬ *Q44.7*

Malformation *–suite*
- Génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de *Q87.8*
- Génito-urinaire ¬ Syndrome de dysostose spondylocostale-atrésie anale- *Q87.8*
- Klippel-Feil-myopathie-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q76.1*
- Lymphatique
- - Capillaire ¬ *D18.19*
- - Caverneux ¬ *D18.19*
- - Macrokystique ¬ *D18.19*
- - Microkystique tissulaire infiltrante ¬ *D18.19*
- - Rare ¬ *D18.19*
- Multiples ¬ Syndrome de tetra-amélie- *Q87.8*
- Neurocutanée héréditaire ¬ *D18.08*
- Organe pelvien lors
- - Accouchement ¬ *O34.9*
- - Grossesse ¬ *O34.9*
- Origine branchiale ¬ Autres *Q18.2*
- Osseuse congénitale ¬ Scoliose congénitale due à une *Q76.3*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Pied ¬ *M21.68*
- Placenta ¬
- - *O43.1*
- - Nouveau-né affecté par une *P02.2*
- Présumée) du système nerveux central du fœtus ¬ Soins maternels pour *O35.0*
- Rachis sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Replis endocardiques ¬ *Q21.2*
- SAI congénital
- - E) de la vulve ¬ *Q52.7*
- - Langue ¬ *Q38.3*
- Septum
- - Aortique ¬ *Q21.4*
- - Urorectal ¬ Succession de *Q87.8*
- Similaires ¬ Anencéphalie et *Q00*
- Sinus
- - Coronaire ¬ *Q21.1*
- - Veineux ¬ *Q21.1*
- Sprengel ¬ *Q74.0*
- Système nerveux central ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Tricuspide congénitale ¬ *Q22.9*
- Vaisseau
- - Cérébraux ¬ Autres *Q28.3*
- - Coronaires ¬ *Q24.5*
- - Précérébraux ¬ Autres *Q28.1*
- Veineux
- - Cutanéomuqueuse ¬ *Q27.8*
- - Osseux
- - - Primaire ¬ *D18.08*
- - - ¬ *D18.08*

Malformation *–suite*
- ¬ Pancytopénie avec *D61.0*

Malgaigne ¬ Fracture de *S32.7*

Malherbe ¬ Tumeur calcifiée de *D23.9*

Malheureuse ¬ Difficultés liées à une enfance *Z61*

Malin
v. Type de maladie

Mallei ¬ Infection
- Burkholderia *A24.0*
- Pseudomonas *A24.0*

Malléolaire
- Pied
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région *T24.20*
- - - - Région *T25.20*
- - - Corrosion
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région *T24.60*
- - - - Région *T25.60*
- - Degré
- - - 2a ¬
- - - - Brûlure
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf région *T24.20*
- - - - - Région *T25.20*
- - - - Corrosion de la région *T25.60*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf région *T24.21*
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf région *T24.61*
- - - - - Région *T25.21*
- - - - Corrosion
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf région *T24.60*
- - - - - Région *T25.61*
- - ¬ Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région *S91.80*
- ¬ Région *L03.11*

Malléole
- Externe ¬ Fracture de la *S82.6*
- Interne ¬ Fracture de la *S82.5*
- Pied
- - SAI ¬ Plaie ouverte de la *S91*
- - ¬ Plaie ouverte d'autre partie de la *S91.8*
- SAI ¬ *S82.88*
- ¬
- - *S82*
- - Péroné, impliquant: *S82.6*
- - Tibia, impliquant: *S82.5*

Malleus (morve) ¬ *A24.0*

Mallory
- Weiss ¬ Syndrome de *K22.6*

Mallory *–suite*
- ¬ Myopathie avec surcharge en desmine et inclusions de corps de *G71.8*

Malnutrition
- Carences nutritionnelles ¬ Séquelles de *E64*
- Cours
- - Accouchement et de la puerpéralité ¬ *O25*
- - Grossesse ¬ *O25*
- Fœtus
- - Sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel ¬ *P05.2*
- - ¬ Retard de croissance et *P05*
- Grave avec marasme ¬ *E41*
- Mère SAI ¬ *P00.4*
- Protéino énergétique
- - Grave
- - - E43
- - - - Forme intermédiaire ¬ *E42*
- - - - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ *E42*
- - - Sans précision ¬ *E43*
- - Léger
- - - Modérée ¬ *E44*
- - - ¬ *E44.1*
- - Modérée ¬ *E44.0*
- - Sans précision ¬ *E46*
- - ¬
- - - Retard de développement après *E45*
- - - Séquelles de *E64.0*
- SAI ¬ *E46*
- Type
- - 1 ¬ diabète sucré de *E12*
- - 2 ¬ diabète sucré de *E12*
- ¬
- - Arrêt de croissance dû à la *E45*
- - Atrophie due à la *E45*
- - Diabète sucré
- - - *E12*
- - - Cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la *O24.2*
- - Dystrophie due à la *E45*
- - Ostéomalacie de l'adulte due à la *M83.3*
- - Retard de développement physique dû à la *E45*

Malnutrition-déshydratation ¬ Cataracte au cours de *E46†, H28.1**

Malocclusion
- Déglutition anormale ¬ *K07.5*
- Dentaire due à un dysfonctionnement oro-facial ¬ *K07.5*
- Habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les doigts ¬ *K07.5*
- Respiration buccale ¬ *K07.5*
- Sans précision ¬ *K07.4*
- ¬ Anomalies dento-faciales [y compris les *K07*

Malonique ¬ Acidurie *E72.8*

Malonyl-CoA décarboxylase ¬ Déficit en *E72.8*

Malpighien intra-épithélial

- Bas grade [LSIL] ¬ Lésion *N87.0*
- Haut grade [LMIEHG] ¬ Lésion *D06.9*

Malposition

- Cœur ¬ *Q24.8*
- Congénitale des organes digestifs SAI ¬ *Q45.8*
- Dents ¬ *K07.3*
- Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Uretère ¬ *Q62.6*
- Utérus ¬ *N85.4*

Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale ¬ Syndrome *Q87.8*

Malrotation

- Cardiopathie ¬ Syndrome de fente labiopalatine- *Q87.8*
- Côlon ¬ *Q43.3*
- Rein ¬ *Q63.2*

Malsegmentation
v. microcéphalie-cardiopathie-malsegmentation

MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome *C88.4*

MALT1 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Maltase acide

- Normale ¬ Glycogénose lysosomale à activité *E74.0*
- ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Malte ¬ fièvre

- *A23*
- *A23.0*

Malteurs ¬ Poumon des *J67.4*

Malum vertebrale suboccipitale ¬ *A18.0†, M49.01**

Mamelon

- Accessoire ¬ *Q83.3*
- Aréole ¬ Tumeur maligne: *C50.0*
- Associé accouchement ¬
- - Crevasses du *O92.1*
- - Infection du *O91.0*
- - Invagination du *O92.0*
- Congénitale) ¬ Absence de *Q83.2*
- Gestationnel
- - Puerpérales ¬ Fissures du *O92.1*
- - ¬ Abcès du *O91.0*
- Puerpéral ¬ Abcès du *O91.0*
- Surnuméraire ¬ *Q83.3*
- ¬
- - Absence congénitale de sein avec absence de *Q83.0*
- - Écoulement par le *N64.5*
- - Fissure et fistule du *N64.0*
- - Inversion congénitale des *Q83.88*

Mamelon *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Résultats anormaux de: écoulement du *R89*
- - Rétraction
- - - *N64.5*
- - - Congénitale des *Q83.88*

Mammaire
v.a. onycho-digito-mammaire

- Associées à l'accouchement ¬ Infections *O91*
- Bénin
- - Sans précision ¬ Dysplasie *N60.9*
- - ¬ Autres dysplasies *N60.8*
- Congénitale isolée ¬ Hypoplasie *Q83.88*
- Cooper ¬ Névralgie *N64.4*
- Gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ Abcès: *O91.1*
- Invasif à récepteurs hormonaux positifs ¬ Carcinome *C50.9*
- Juvénile familiale ¬ Hypertrophie *N62*
- Massive de la puberté ¬ Hypertrophie *N62*
- S) SAI ¬ Nodule(s) *N63*
- SAI ¬ Hypertrophie *N62*
- Sans précision ¬ Tuméfaction *N63*
- ¬
- - Aberration *Q83.88*
- - Artère ou veine *S25.88*
- - Asymétrie *Q83.88*
- - Atrophie *N64.2*
- - Complication
- - - Mécanique d'une prothèse et d'un implant *T85.4*
- - - Prothèse ou un implant *T85.83*
- - Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant *T85.82*
- - Grosseur dans la glande *R92*
- - Hypertrophie *N62*
- - Hypoplasie *Q83.88*
- - Hypotrophie *Q83.88*
- - Implant *Z41.1*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant *T85.73*
- - Micromastie [développement insuffisant des glandes *Q83.88*

Mammographie de routine ¬ *Z01.6*

Mandibulaire

- Maxillaire ¬
- - Macrognathie (*K07.0*
- - Micrognathie (*K07.0*
- - Prognathie (*K07.1*
- - Rétrognathie (*K07.1*
- ¬
- - Fusion des incisives *K00.2*
- - Hyperplasie, hypoplasie: *K07.0*
- - Malformation artérioveineux *Q27.3*
- - Torus: *K10.0*

Mandibule

- Défaut osseux ¬ Fracture ouverte de la *S02.60, S01.87!*
- ¬
- - *S03.0*
- - Amélosarcome de la *C41.1*
- - Carcinome
- - - Améloblastique de la *C41.1*
- - - Odontogène de la *C41.1*
- - Fibrosarcome
- - - Améloblastique de la *C41.1*
- - - Odontogène de la *C41.1*
- - Fracture ouverte
- - - *S02.60, S01.87!*
- - - Corps de la *S02.68, S01.87!*
- - Hyperplasie ou hypoplasie unilatérale du processus condylien de la *K10.8*
- - Mâchoire inférieure (*S02.6*
- - Odontosarcome
- - - *C41.1*
- - - Améloblastique de la *C41.1*
- - Sarcome
- - - Améloblastique de la *C41.1*
- - - Odontogène de la *C41.1*
- - Tumeur
- - - Malign
- - - - *C41.1*
- - - - Odontogène de la *C41.1*
- - - Odontogène kératokystique de la *D16.5*

Mandibulo
v.a. ophtalmo-mandibulo-mélique

Mandibulo-acrale ¬ Dysplasie *Q87.5*

Mandibulo-facial

- Liée à l'X ¬ Dysostose *Q75.4*
- Macroblépharon-macrostomie ¬ Syndrome de dysostose *Q87.0*
- Sans anomalies des extrémités ¬ Dysostose *Q75.4*
- ¬ Dysostose *Q75.4*

Manducateur ¬ Douleurs faciales au cours des maladies de l'appareil *K10.8*

Manganèse

- Composés ¬ Effet toxique: *T57.2*
- ¬ Carence en *E61.3*

Maniaco dépressif

- Forme dépressif
- - Sans symptômes psychotiques ¬ Psychose *F33.2*
- - Symptômes psychotiques ¬ Psychose *F33.3*
- ¬
- - Maladie *F31*
- - Psychose *F31*
- - Réaction *F31*

Maniaque

- Isolé ¬ trouble bipolaire, épisode *F30*
- Récurrents SAI ¬ Episodes *F31.8*

Maniaque *–suite*
- Sans
- - Précision ¬ Episode *F30.9*
- - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel *F31.1*
- Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel *F31.2*
- ¬
- - Épisode
- - - *F30*
- - - *F30.8*
- - Psychose
- - - Schizo-affective, type *F25.0*
- - - Schizophréniforme, type *F25.0*
- - Stupeur *F30.2*
- - Trouble schizo-affectif, type *F25.0*

Manie
- SAI ¬ *F30.9*
- Sans symptômes psychotiques ¬ *F30.1*
- Symptôme psychotique
- - Congruents à l'humeur ¬ *F30.2*
- - Non congruents à l'humeur ¬ *F30.2*
- - ¬ *F30.2*

Manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle *Y09.9!*

Manifestation
- Avitaminose A ¬ Autres *E50.8*
- Carence en thiamine ¬ Autres *E51.8*
- Intestinales ¬ Fibrose kystique avec *E84.1*
- Multiples ¬ Mucoviscidose avec autres *E84.87*
- Multisystémiques ¬ Syndrome d'insuffisance hépatique aiguë infantile- *K72.0*
- Neurologiques ¬ Zona accompagné d'autres *B02.2†*
- Oculaires de l'avitaminose A ¬ Autres *E50.7*
- Ophtalmologique ¬ Diabète sucré de type 1 avec *E10.30†, H58.8**
- Pian ¬ Autres *A66.7*
- Pulmonaire
- - Intestinale ¬ Mucoviscidose à *E84.80*
- - ¬
- - - Fibrose kystique avec *E84.0*
- - - Maladie à virus Hanta avec *B33.4†*
- - - Polyarthrite chronique avec *M05.10†, J99.0**
- Rénales ¬ Maladie à virus Hanta [hantavirus] avec *A98.5†, N08.0**
- Respiratoire virus
- - Influenza saisonnière identifié ¬ Grippe avec d'autres *J10.1*
- - Non identifié ¬ Grippe avec d'autres *J11.1*
- Sclérose en plaques ¬ Première *G35.0*
- Virus
- - Influenza saisonnière identifié ¬ Grippe avec d'autres *J10.8*
- - Non identifié ¬ Grippe avec d'autres *J11.8*

Manifestation *–suite*
- ¬
- - Fibrose kystique avec autres *E84.8*
- - Mucoviscidose avec autres *E84.88*

Manifestée crise
- Hypertoniques ¬ Dysréflexie autonome *G90.40*
- Transpiration ¬ Dysréflexie autonome *G90.41*

Manipulateurs de liège ¬ Maladie ou poumon des: *J67.3*

Manipulation
- Accès vasculaire, non précisé ¬ Adaptation et *Z45.29*
- Appareils médicaux implantés ¬ Adaptation et *Z45.88*
- Défibrillateur cardiaque implanté ¬ Adaptation et *Z45.01*
- Dispositif cardiaque électronique ¬ Adaptation
- - *Z45.0*
- - *Z45.08*
- Extenseur
- - Bronchique ¬ Adaptation et *Z45.84*
- - Trachéal ¬ Adaptation et *Z45.85*
- Neurostimulateur ¬ Adaptation et *Z45.80*
- Stimulateur
- - Cardiaque implanté ¬ Adaptation et *Z45.00*
- - Diaphragmatique ¬ Adaptation et *Z45.81*
- Système
- - Assistance cardiaque ¬ Adaptation et *Z45.02*
- - Cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement ¬ Adaptation et *Z45.20*

Mannosidase
v. alpha-D-mannosidase
v. bêta-mannosidase

Mannosidose ¬ *E77.1*

Mannosyltransférase
v.a. Dol-P-mannosyltransférase
- 1 ¬ Déficit en *E77.8*
- 2 ¬ Déficit en *E77.8*
- 6 ¬ Déficit en *E77.8*
- 7-9 ¬ Déficit en *E77.8*
- 8 ¬ Déficit en *E77.8*

Manœuvre instrumentale ¬ lésions par *O71*

Manque
- Exercice physique ¬ *Z72.8*
- Plaisir sexuel ¬ Aversion sexuelle et *F52.1*
- Réactivité ¬ Lenteur et *R46.4*
- Repos ou de loisirs ¬ *Z73*

Mansonella
- Ozzardi ¬ Infection à *B74.4*
- Perstans ¬ Infection à *B74.4*
- Streptocerca ¬ Infection à *B74.4*

Mansonellose ¬ *B74.4*

Mansoni
- S. proliferum) ¬ Infection à: Sparganum (S. *B70.1*

Mansoni *–suite*
- Schistosomiase intestinale] ¬ Schistosomiase due à Schistosoma *B65.1*

Manteau ¬ Lymphome à cellules du *C83.1*

Mantoux ¬ Résultats anormaux au test de *R76.1*

Manubrium sterni ¬ Fracture du sternum: *S22.21*

Manuum et pedum ¬ Tinea *B35.8*

Manzke
v. Catel-Manzke

Maple syrup urine disease] ¬ MSUD [*E71.0*

Marais ¬ Anémie due à la fièvre des *B54†, D63.8**

Marasme
- Nutritionnel ¬ *E41*
- ¬
- - Kwashiorkor avec *E42*
- - Malnutrition
- - - Grave avec *E41*
- - - Protéino-énergétique grave [comme en E43]: avec signes de kwashiorkor et de *E42*

Marbourg ¬ Fièvre hémorragique de *A98.3*

Marburg ¬
- Maladie de *A98.3*
- Sclérose en plaques aiguë de *G35.9*

Marcescens
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Serratia *U81.06!*
- - 3MRGN ¬ Serratia *U81.26!*
- - 4MRGN ¬ Serratia *U81.46!*
- ¬ Pneumonie due à: Serratia *J15.6*

Marche
- 200 m
- - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de *I70.21*
- - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de *I70.22*
- Non classée ailleurs ¬ Difficulté à la *R26.2*
- SAI ¬ Fracture de *M84.3*
- Tardive ¬ *R62.0*
- ¬ Hémoglobinurie (de): *D59.6*

Marchesani
v. Weill-Marchesani

Marchiafava-Bignami ¬ Maladie de *G37.1*

Marchiafava-Micheli ¬
- Hémoglobinurie nocturne paroxystique [*D59.5*
- Maladie de *D59.5*

Marcoumar ¬ Hémorragie
- Associée à *D68.33*
- Sous traitement par *D68.33*

Marcus Gunn ¬ Phénomène de *Q07.8*

Marden-Walker ¬ Syndrome de *Q74.3*

Marfan
- Néonatal ¬ Syndrome de *Q87.4*
- Type
- - 1 ¬ Syndrome de *Q87.4*
- - 2 ¬ Syndrome de *Q87.4*
- ¬ Syndrome de *Q87.4*

Marfanoïde avec déficience intellectuelle liée à l'X ¬ Syndrome *Q87.8, F79.9*

Marge
- Anal ¬
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D03.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- Cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès ¬ Infection de la *A60.1*
- ¬ Epiglotte, bord libre [*C10.1*

Marginal
- Cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone *C88.4*
- E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- Simple ¬ Gingivite (chronique): *K05.1*
- Splénique ¬ Lymphome de la zone *C83.0*
- Tympan ¬ Autres perforations *H72.2*
- ¬
- - Lymphome
- - - B cutané de la zone *C83.0*
- - - Nodal de la zone *C83.0*
- - - Nodulaire à cellules B de la zone *C83.0*
- - - Splénique de la zone *C83.0*
- - Repli ary-épiglottique zone
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Ulcère de (la): cornée: *H16.0*

Marginé
- Cours d'une fièvre rhumatismale aiguë ¬ Érythème *I00†, L54.0**
- Discoïde de Besnier ¬ Érythème *L53.2*
- Hebra [Jock itch] ¬ Eczéma *B35.6*
- ¬ Glossite: exfoliatrice *K14.1*

Mariage ¬ inscription dans: *Z02*

Marie
v.a. Charcot-Marie-Tooth
- Bamberger ¬ Maladie de *M89.4*
- Unna ¬ Hypotrichose type *Q84.0*

Marie-Pierre II d'apparition tardive ¬ Syndrome de *G11.2*

Marin ¬
- Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux *T63.6*
- Peau de: *L57.8*
- Venin de serpent *T63.0*

Marinesco-Sjögren ¬ Syndrome de *G11.1*

Marinum ¬ Infection par Mycobacterium: *A31.1*

Marisques
- Hémorroïdaires ¬ *K64.4*
- Péri-anales ¬ *K64.4*
- Rectales ¬ *K64.4*

Markesbery-Griggs ¬ Myopathie distale tardive type *G71.0*

Markouizos
v. Qazi-Markouizos

Marks
v. Finlay-Marks

Marmorata telangiectatica congenita ¬
- Cutis *Q27.8*
- Syndrome
- - Macrocéphalie-cutis *Q87.3*
- - Mégalencéphalie-cutis *Q87.3*

Maroteaux
- Lamy (léger) (sévère) ¬ Syndrome de: *E76.2*
- ¬ Dysplasie
- - Acromésomélique type *Q77.8*
- - Spondylo-épiphysaire type *Q77.7*

Marques de Catlin ¬ *Q75.8*

Marqueur
- Chaînes Gamma] ¬ Gangliosidose GM [*E75.1*
- Hétérochromatine ¬ Sujet avec *Q95.4*
- Structuraux, non classés ailleurs ¬ Réarrangements équilibrés et *Q95*
- Structurel
- - Sans précision ¬ Réarrangement équilibré et *Q95.9*
- - ¬ Autres réarrangements équilibrés et *Q95.8*
- Supplémentaires ¬ Chromosomes *Q92.6*

MARS à début précoce ¬ Protéinose alvéolaire pulmonaire sévère par déficit en *J84.0*

Marseille ¬ Fièvre (à) (de): *A77.1*

Marshall ¬ Syndrome de *Q87.0*

Marshall-Smith ¬ Syndrome de *Q87.3*

Marsidi
v. Juberg-Marsidi

Marteau
- Acquis) ¬ Autre(s) orteil(s) en *M20.4*
- Congénital ¬ Orteil en *Q66.8*
- Piqueur ¬ Syndrome de: *T75.2*

Martin-Bell ¬ Syndrome de *Q99.2*

Martsolf ¬ Syndrome de *Q87.8*

Masculin
v. Type de maladie

Masochisme ¬
- *F65.5*
- Sado- *F65.5*

MASP-2 ¬ Immunodéficience par déficit en *D84.1*

Masquant les raisons de la consultation et gênant le contact ¬ Prolixité et détails *R46.7*

Masquée" SAI ¬ Episodes isolés d'une dépression " *F32.8*

Masse
- Corporelle IMC
- - 40 plus ¬
- - - Indice de *E66.92*
- - - Obésité
- - - - Endogène avec un indice de *E66.82*
- - - - Excès calorique avec un indice de *E66.02*
- - - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de *E66.22*
- - - - Médicamenteuse avec un indice de *E66.12*
- - Compris
- - - 30 35 ¬
- - - - Indice de *E66.90*
- - - - Obésité
- - - - - Endogène avec un indice de *E66.80*
- - - - - Excès calorique avec un indice de *E66.00*
- - - - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de *E66.20*
- - - - - Médicamenteuse avec un indice de *E66.10*
- - - 35 40 ¬
- - - - Indice de *E66.91*
- - - - Obésité
- - - - - Endogène avec un indice de *E66.81*
- - - - - Excès calorique avec un indice de *E66.01*
- - - - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de *E66.21*
- - - - - Médicamenteuse avec un indice de *E66.11*
- Intra-abdominales et pelviennes ¬ Tuméfaction et *R19.0*
- Localisé peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Niveau
- - - Cou ¬ Tuméfaction et *R22.1*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Tuméfaction et *R22.4*
- - - - Supérieur ¬ Tuméfaction et *R22.3*
- - - Tête ¬ Tuméfaction et *R22.0*
- - - Tronc ¬ Tuméfaction et *R22.2*
- - Sans précision ¬ Tuméfaction et *R22.9*
- - Sièges multiples ¬ Tuméfaction et *R22.7*
- - ¬ Autres tuméfactions et *R22*
- Pulmonaire SAI ¬ *R91*
- Télangiectasiques périphériques ¬ *D31.2*

Massif
v. Type de maladie

Mastectomie
- Partiel
- - Lymphadénectomie stade
- - - I ¬ Lymphœdème après *I97.20*
- - - II ¬ Lymphœdème après *I97.21*
- - - III ¬ Lymphœdème après *I97.22*

Mastectomie *–suite*
- Partiel *–suite*
- - Sans précision ¬ Lymphœdème après *I97.29*
- - ¬ Lymphœdème après *I97.2*
- ¬
- - Éléphantiasis après *I97.22*
- - Oblitération des vaisseaux lymphatiques suite à *I97.2*

Masters] ¬ Syndrome de déchirure du ligament large [Allen- *N83.8*

Mastication ¬ Difficultés de *R19.88*

Mastite
- Aigu subaigu non puerpéral
- - Infectieuse ¬ *N61*
- - SAI ¬ *N61*
- Granulomateuse ¬ *N61*
- Infectieuse néonatale ¬ *P39.0*
- Interstitielle gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*
- Non
- - Infectieuse du nouveau-né ¬ *P83.4*
- - Purulente associée à l'accouchement ¬ *O91.2*
- Parenchymateuse gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*
- Purulente gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ *O91.1*
- SAI gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*

Mastocytaire
- SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non *D47.0*
- ¬ Sarcome *C96.2*

Mastocytes
- Évolution imprévisible et inconnue ¬ Tumeurs à histiocytes et *D47.0*
- SAI ¬ Tumeur à *D47.0*
- Tissulaires ¬ Maladie systémique due aux *D47.0*
- ¬
- - Leucémie à *C94.3*
- - Sarcome à *C96.2*
- - Tumeur maligne à *C96.2*
- - Variante aleucémique de la leucémie à *C94.30*

Mastocytome
- Cutané ¬ *Q82.2*
- Extra-cutané ¬ *C96.2*
- SAI ¬ *D47.0*

Mastocytose
- Congénitale) ¬ *Q82.2*
- Cutanée diffuse ¬ *Q82.2*
- Systémique
- - Agressive ¬ *C96.2*
- - Associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ *D47.0*
- - Indolente ¬ *D47.0*
- - Type smoldering ¬ *D47.0*

Mastocytose *–suite*
- Systémique *–suite*
- - ¬ *D47.0*

Mastodynie ¬ *N64.4*

Mastoïde
- Acte médicaux
- - Non classées ailleurs ¬ Affections de l'oreille et de l'apophyse *H95*
- - Sans précision ¬ Affection de l'oreille et de l'apophyse *H95.9*
- - ¬ Autres affections de l'oreille et de l'apophyse *H95.8*
- Cours maladies classées ailleurs ¬ affection
- - Oreille moyenne et de l'apophyse *H75**
- - Précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse *H75.8**
- Sans précision ¬ Affection de l'oreille moyenne et de l'apophyse *H74.9*
- ¬
- - Abcès de la *H70.0*
- - Affection
- - - Oreille moyenne et de l'apophyse *H74*
- - - Précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse *H74.8*
- - Carie tuberculeuse de l'apophyse *A18.0†, H75.0**
- - Empyème de la *H70.0*
- - Fistule de la *H70.1*
- - Ostéite mastoïdienne [carie osseuse de la *H70.1*

Mastoïdectomie ¬
- Affections survenant après *H95.1*
- Cholestéatome récidivant après *H95.0*
- Granulome après *H95.1*
- Inflammation chronique après *H95.1*
- Kyste muqueux après *H95.1*

Mastoïdien
- Carie osseuse de la mastoïde] ¬ Ostéite *H70.1*
- Congénitale) ¬ Tuméfaction sterno- *Q68.0*
- ¬
- - Cellules *C30.1*
- - Torticolis congénital (sterno- *Q68.0*

Mastoïdite
- Affection apparent ¬
- - *H70*
- - *H70.8*
- Aiguë ¬ *H70.0*
- Chronique ¬ *H70.1*
- Cours maladie
- - Infectieux
- - - Parasitaires classées ailleurs ¬ *H75.0**
- - - ¬ *B99†, H75.0**
- - Parasitaire NCA ¬ *B89†, H75.0**
- Sans précision ¬ *H70.9*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, H75.0**

Mastopathie
- Anomalies de la lactation associées à l'accouchement ¬ Autres *O92*
- Associées à l'accouchement, autres et sans précision ¬ *O92.2*
- Fibrokystique ¬ *N60*
- Grade
- - I ¬ *N60.1*
- - II ¬ *N60.3*
- - III ¬ *N60.3*
- Kystique
- - Diffuse ¬ *N60.1*
- - Prolifération épithéliale ¬ *N60.3*

Masturbation excessive ¬ *F98.88*

MAT ¬ *I47.1*

Materia alba ¬ Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*

Matériel brûlant ¬ Brûlure ou échaudage par : Autre *X19.9!*

Maternel
- Cours du travail et de l'accouchement ¬ Épuisement *O75.0*
- Généralement rétréci ¬ Soins maternels pour disproportion due à un bassin *O33.1*
- Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif *P04.9*
- ¬
- - Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait *P04*
- - Hématémèse et mélæna néonatals dus à une déglutition de sang *P78.2*
- - Ictère néonatal dû à une déglutition de sang *P58.5*
- - Soin
- - - Examens de l'allaitement *Z39.1*
- - - Maternel
- - - - Disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin *O33.2*
- - - - Lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme *O35.4*

Materno fœtal
- Néonatale allo-immune ¬ Thrombopénie *P61.0*
- ¬ Transfusion (de): *O43.0*

Mathieu
v. Piussan-Lenaerts-Mathieu

Matière
- Fécale ¬
- - Anomalies des *R19.5*
- - Incontinence des *R15*
- Procréation ¬ Conseils et avis généraux en *Z31.6*
- Sexualité ¬ conseil relatif
- - Attitudes, comportement et orientation en *Z70*
- - Comportement ou à l'orientation de tiers en *Z70*

Matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de *Y35.7!*

Mattheei ¬ Infection à Schistosoma: *B65.8*

Matthew-Wood ¬ Syndrome de *Q11.2*

Maturation

- Osseuse accélérée-dysmorphie faciale-retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Retardée ¬ *R62.0*
- Sexuelle ¬ Trouble de la *F66.0*
- ¬ Leucémie myéloïde aiguë (avec *C92.0*

Matures

- Sans précision ¬ Lymphome à cellules T/NK *C84.9*
- Type Burkitt ¬ LLA-B à cellules *C91.8*
- ¬ Autres lymphomes à cellules T/NK *C84.5*

Maturity onset diabetes of young people ¬ *E11.90*

Mauclaire] ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): têtes métacarpiennes [*M92.2*

Maux de tête dus à l'histamine ¬ *G44.0*

Maxillaire

- Aiguë ¬ Sinusite *J01.0*
- Bilatérale ¬ Fente labio- *Q37.0*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.0*
- Indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ Abcès *K10.21*
- Inférieur
- - Angle maxillaire ¬ Fracture du *S02.65*
- - Apophyse
- - - Condylienne ¬ Fracture du *S02.61*
- - - Coronoïde ¬ Fracture du *S02.63*
- - Branche maxillaire, SAI ¬ Fracture du *S02.64*
- - Maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée ¬ Fracture du *S02.68*
- - Partie
- - - Alvéolaire ¬ Fracture du *S02.67*
- - - Multiples ¬ Fracture du *S02.69*
- - - Non précisée ¬ Fracture du *S02.60*
- - Sub-condylienne ¬ Fracture du *S02.62*
- - Symphyse maxillaire ¬ Fracture du *S02.66*
- - ¬
- - - *C41.1*
- - - Fracture du *S02.6*
- - - Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Région *S01.43*
- - - Tumeur bénigne: *D16.5*
- Joue ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.41*
- Partie partie
- - Multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.49*
- - Non précisée ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.68*
- Région maxillaire
- - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.43*
- - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.42*

Maxillaire *–suite*

- SAI ¬
- - Fracture du maxillaire inférieur: Branche *S02.64*
- - Sinusite *J32.0*
- Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ Abcès *K10.20*
- Supérieur ¬
- - *C41.0*
- - *S02.4*
- - Odontosarcome du *C41.02*
- - Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Région *S01.42*
- Sur racines dentaires ¬ Présence d'implants *Z96.5*
- Unilatérale ou SAI ¬ Fente labio- *Q37.1*
- ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - Antre (de Highmore) (*C31.0*
- - Fermeture anormale des *K07.5*
- - Fracture
- - - Maxillaire inférieur
- - - - Angle *S02.65*
- - - - Symphyse *S02.66*
- - - Os malaires et *S02.4*
- - - Ouverte du *S02.4, S01.87!*
- - Hyperplasie, hypoplasie: *K07.0*
- - Kératokyste odontogène du *D16.42*
- - Kyste (de): latent des *K10.0*
- - Macrognathie (mandibulaire) (*K07.0*
- - Malformation artérioveineux du *Q27.3*
- - Micrognathie (mandibulaire) (*K07.0*
- - Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.4*
- - Polypes du sinus (de): *J33.8*
- - Prognathie (mandibulaire) (*K07.1*
- - Rétrognathie (mandibulaire) (*K07.1*
- - Séquestre du *K10.2*
- - Tumeur
- - - Maligne: Sinus *C31.0*
- - - Odontogène kératokystique du *D16.42*

Maxillofazial ¬ Tumeur

- Bénigne: *D16.42*
- Maligne: *C41.02*

Maxillo-palatine, bilatérale ¬ Fente labio- *Q37.4*

Maximum ¬

- Brûlure partie multiple corps indication degré
- - 2a au *T29.20*
- - 2b au *T29.21*
- Corrosion partie multiple corps indication degré 2a
- - *T29.60*
- - *T29.61*

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser type

- 1 ¬ Syndrome de *Q51.8*
- 2 ¬ Syndrome de *Q87.8*

May-Hegglin ¬

- Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: *D72.0*
- Thrombopénie de *D72.0*

Mayou
v. Batten-Mayou

MCAD ¬ Déficit en *E71.3*

McAlpine
v. Hunter-McAlpine

McArdle ¬ Maladie de: *E74.0*

McArdle-Schmidt-Pearson ¬ Syndrome de *E74.0*

MCC ¬ Déficit en *E71.1*

McCarthy
v. Forster-McCarthy-Berry

McCune-Sternberg) ¬ Syndrome d'Albright(- *Q78.1*

McDonough ¬ Syndrome de *Q87.8*

McFarlane
v. Oliver-McFarlane

McGillivray ¬ Scaphocéphalie familiale type *Q75.0*

MCJ sporadique ¬ *A81.0*

McKusick ¬ Chondrodysplasie métaphysaire type *Q78.5*

MCL ¬ *C83.1*

MCM4 ¬ Déficit immunitaire primaire par déficit en *D84.8*

McMillin
v. Johnson-McMillin

MDR-TB] ¬ Tuberculose multirésistante [*U82.1!*

Meacham ¬ Syndrome de *Q87.8*

Meadows ¬ Syndrome de *O90.3*

MEAP [méningo-encéphalite amibienne primitive] ¬ *B60.2†, G05.2**

Meara
v. Dowling-Meara

Méat

- Auditif osseux ¬ Atrésie ou rétrécissement du *Q16.1*
- Trou d'épingle [sténopéique] SAI ¬ *N35.9*
- Urinaire
- - Congénital(e) ¬ Rétrécissement de: *Q64.3*
- - Double ¬ *Q64.7*
- - ¬ Prolapsus congénital de: *Q64.7*
- ¬ Ulcère de l'urètre (*N34.2*

Méatite urétrale ¬ *N34.2*

Mécanique
v. Type de maladie

Mécanisme non précis ¬ Infarctus cérébral occlusion sténose artère

- Cérébrales, de *I63.5*
- Précérébrales, de *I63.2*

Meckel

- Gruber ¬ Syndrome de *Q61.9*
- ¬

Meckel *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Diverticule de *Q43.0*
- - Tumeur maligne: Diverticule de *C17.3*

Méconial
- Absence reconnue de fibrose kystique du pancréas ¬ Iléus *P76.0*
- Cours de fibrose kystique ¬ Iléus *E84.1†, P75**
- Déficit en guanylate cyclase 2C ¬ Iléus *P76.0*
- ¬
- - Mucoviscidose avec iléus *E84.1†, P75**
- - Péritonite *P78.0*
- - Syndrome du bouchon *P76.0*

Méconium
- Liquide amniotique ¬
- - Présence de *P20*
- - Travail accouchement compliqué
- - - Anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de *O68.2*
- - - Présence de *O68.1*
- ¬
- - Aspiration néonatale de *P24.0*
- - Émission de *P20*

Médecine du travail ¬ Examen de *Z10*

Media
- Artérielle ¬ Dégénérescence de la *I70.29*
- ¬
- - Artériosclérose de la *I70.29*
- - Sclérose
- - - *I70.29*
- - - Mönckeberg (de la *I70.2*

Médial
- Causant un rapprochement des dents ¬ Dent *K07.3*
- Genou ¬ Distorsion du ligament collatéral *S83.42*
- Tibia ¬ Condyles latéral ou *S82.1*
- ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle *S42.43*

Médian
- Arcade dentaire ¬ Déviation *K07.2*
- Bassin) entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement de: cavité *O33.3*
- Causant une occlusion ¬ Hernie de la ligne *K43.68*
- Clavicule ¬ Ostéite condensante *M85.31*
- E face cou ¬
- - Fistule *Q18.8*
- - Kyste *Q18.8*
- - Sinus *Q18.8*
- Étranglée ¬ Hernie de la ligne *K43.68*
- Incarcérée ¬ Hernie de la ligne *K43.68*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S54.1*
- - Bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S44.1*

Médian *–suite*
- Niveau *–suite*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du nerf *S64.1*
- Non réductible ¬ Hernie de la ligne *K43.68*
- SAI ¬ Nerf *S54.1*
- Tibia proximal ¬ Luxation du genou: Luxation *S83.13*
- ¬
- - Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament *S83.44*
- - - Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament *S83.42*
- - Fente
- - - Cervicale *Q18.8*
- - - Labiale *Q36.1*
- - Fracture
- - - Clavicule: Tiers *S42.01*
- - - Doigt: Phalange *S62.62*
- - - Extrémité inférieure du fémur: Condyle (latéral) (*S72.41*
- - - Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (*S92.23*
- - Glossite losangique *K14.2*
- - Lésions du nerf *G56.1*
- - Luxation d'une autre partie non précisée du coude: *S53.13*

Médianécrose kystique de l'aorte ¬ *I71.00*

Médiastin
- Antérieur ¬ Tumeur maligne: *C38.1*
- Non classées ailleurs ¬ Autres maladies du *J98.58*
- Partie non précisée ¬ Tumeur maligne: *C38.3*
- Plèvre ¬ Tumeur malign
- - Cœur, du *C38*
- - Lésion à localisations contiguës du cœur, du *C38.8*
- Postérieur ¬ Tumeur maligne: *C38.2*
- ¬
- - Abcès
- - - *J85.3*
- - - Poumon et du *J85*
- - Déplacement du *J98.58*
- - Kyste congénital du *Q34.1*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D15.2*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D38.3*
- - - Maligne secondaire du *C78.1*

Médiastinal
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique ¬ Tuberculose
- - *A15.8*
- - Ganglionnaire: *A15.4*
- Parapharyngé cervical ¬ Abcès sous-mandibulaire

Médiastinal *–suite*
- Parapharyngé cervical ¬ Abcès sous-mandibulaire *–suite*
- - Indication d'extension *K12.22*
- - Sans indication d'extension *K12.21*
- SAI sans mention confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique ¬ Tuberculose
- - *A16.8*
- - Ganglionnaire: *A16.3*
- Syphilitique ¬ Anévrisme *A52.0†, I79.8**
- Thymique grand cellule B ¬ Lymphome
- - *C85.2*
- ¬
- - Déviation *R93.8*
- - Emphysème *J98.2*
- - Fibrose *J98.58*
- - Hernie *J98.58*
- - Lymphadénopathie *R59.0*
- - Lymphome *C85.2*
- - Métastase ganglionnaire *C77.1*

Médiastinite
- Associée à IgG4 ¬ *J98.50*
- Syphilitique
- - Tardive ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- ¬ *J98.50*

Médiastino péricardite
- Adhésive ¬ *I31.0*
- Rhumatismale chronique ¬ *I09.2*

Médiation auto-immune ¬ Myopathie nécrosante à *G72.4*

Médical
- Appareil auxiliaire non précisé ¬ Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil *Z99.9*
- Cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou *Y84.9!*
- Complications autres et non précisées ¬ Echec d'une tentative d'avortement *O07.3*
- Compliqué
- - Embolie ¬ Echec d'une tentative d'avortement *O07.2*
- - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Echec d'une tentative d'avortement *O07.1*
- - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Echec d'une tentative d'avortement *O07.0*
- Enfant bon santé selon circonstances
- - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance *Z76.2*
- - Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance *Z76.2*
- - Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance *Z76.2*

Médical *–suite*

- Enfant bon santé selon circonstances *–suite*
- - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance *Z76.2*
- Général ¬ Examen *Z00.0*
- Mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions *P00.7*
- Prise de contact à des fins administratives ¬ Examen *Z02*
- Régime ¬ Antécédents personnels de non-observance d'un traitement *Z91.1*
- SAI ¬ Echec d'une tentative d'avortement *O07.4*
- Sans
- - Complication ¬ Echec d'une tentative d'avortement *O07.4*
- - Précision ¬
- - - Antécédents personnels de traitement *Z92.9*
- - - Conseil et surveillance pour: Conseil *Z71*
- - - Incidents dus à des mesures *Y84.9!*
- - - Soin *Z51.9*
- - - Thérapie sans raison *Z41.9*
- Soin
- - Médicaux
- - - Enfants trouvés ¬ Surveillance *Z76.1*
- - - Nourrissons et enfants en bonne santé ¬ Surveillance *Z76.2*
- - Santé
- - - Sans précision ¬ Difficulté liée aux installations *Z75.9*
- - - ¬ Autres difficultés liées aux installations *Z75.8*
- Suspicion de maladies, suspicion exclue ¬ Mise en observation et examen *Z03*
- Traitement ¬ surveillance
- - *Z08*
- - *Z09*
- Travail ¬ Echec du déclenchement *O61.0*
- ¬
- - Antécédents personnels de traitement *Z92*
- - Avortement *O04*
- - Établissement d'un certificat *Z02*
- - Insuffisance pulmonaire après des mesures *J95.88*
- - Thérapies sans raison *Z41.8*

Médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée *U69.10!*

Médicament

- Absorbés par la mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P04.1*
- Action similaire ¬ Intoxication: Glucosides cardiotoniques et *T46.0*
- Agissant
- - Essentiellement sur système nerveux autonome

Médicament *–suite*

- Agissant *–suite*
- - Essentiellement sur système nerveux autonome *–suite*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: *T44.9*
- - - ¬ Intoxication par *T44*
- - Sur
- - - Fibrinolyse ¬ Intoxication: *T45.6*
- - - Métabolisme de l'acide urique ¬ Intoxication: *T50.4*
- - - Protozoaires du sang ¬ Intoxication: Antipaludiques et *T37.2*
- Antiallergiques et antiémétiques ¬ Intoxication: *T45.0*
- Antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T49.0*
- Antitumoraux et immunosuppresseurs ¬ Intoxication: *T45.1*
- Approprié à l'indication et correctement administrés ¬ Anurie due aux sulfamides utilisés comme un *R34, Y57.9!*
- Atonie intestinale ¬ *T47.4*
- Causes externes ¬ Myocardiopathie due à des *I42.7*
- Contact peau ¬ Dermite
- - Allergique de contact due à des *L23.3*
- - Contact avec la peau ¬ Dermite de contact, sans précision, due à des *L25.1*
- - Irritante de contact due à des *L24.4*
- Contre le coryza [rhume banal] ¬ Intoxication: *T48.5*
- Cytotoxique ¬
- - *P04.1*
- - Alopécie due à un *L65.8*
- - Hypotrichose due à un *L65.8*
- Déclencheurs de contractions ¬ Hyperactivité de l'utérus due à une stimulation excessive par des *O62.8, Y57.9!*
- Dentaires à usage topique ¬ Intoxication: *T49.7*
- Drogue
- - Substances biologiques actives ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- - ¬
- - - Complications dues à des *Y57.9!*
- - - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- - - Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de *Z72.0*
- - - Prise excessive (overdose) accidentelle d'un *X49.9!*
- Drug fever] ¬ Fièvre due à des *R50.2*
- Facilitant la digestion ¬ Intoxication: *T47.5*
- Métaux lourds ¬ Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des *N14*
- Non précisées ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.19*
- Nouveau-né ¬ Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de *P96.2*
- Phase critique

Médicament *–suite*

- Phase critique *–suite*
- - 4 jours
- - - 7 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.13*
- - - ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.10*
- - 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.14*
- Premier ligne ¬
- - Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs *U82.2!*
- - Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs *U82.0!*
- - Tuberculose avec résistance au *A16.9, U82.0!*
- Préparation
- - Capillaires ¬ Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres *T49.4*
- - Ophtalmologiques ¬ Intoxication: *T49.5*
- - Utilisés en oto-rhino-laryngologie ¬ Intoxication: *T49.6*
- Produit
- - Chimiques ¬ Sclérose systémique due à des *M34.2*
- - Exogènes ¬ Hypothyroïdie due à des *E03.2*
- Psychotrope
- - Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T43.8*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T43.9*
- SAI ¬
- - Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.19*
- - Hypersensibilité à un *T88.7*
- - Réaction à un *T88.7*
- - Somnifères: *T42.7*
- Sans précision ¬ Effet indésirable d'un *T88.7*
- Stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques ¬ *T44.9*
- Substance biologique
- - Sans précision ¬
- - - Antécédents personnels d'allergie à un *Z88.9*
- - - Intoxication
- - - - *T50.9*
- - - - Diurétiques et *T50*
- - - Néphropathie due à un *N14.2*
- - ¬
- - - Antécédent personel allergie
- - - - *Z88.8*
- - - - *Z91.0*
- - - Augmentation dans les urines du taux de *R82.5*
- - - Néphropathie due à d'autres *N14.1*
- - - Séquelles d'intoxications par *T96*
- Toxicomanie ¬ Conseil et surveillance pour: abus de *Z71*
- Toxines

Médicament *–suite*

- Toxines *–suite*
- - Transmis par la mère ou administrés au nouveau-né ¬ Ictère néonatal dû à des *P58.4*
- - ¬ Anémie sidéroblastique secondaire, due à des *D64.2*
- Usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par *T49*
- Utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à un *Y57.9!*
- ¬
- - Administration accidentelle ou prise erronée d'un *X49.9!*
- - Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.1*
- - Anémie
- - - Carence en acide folique due à des *D52.1*
- - - Hémolytique auto-immune, due à des *D59.0*
- - Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres *Z92.2*
- - Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à *Z45.82*
- - Dermite de contact toxique par contact cutané avec un *L24.4*
- - Détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de *O68*
- - Diarrhée due aux *K52.1*
- - Effet
- - - Résiduels dus aux *T88.7*
- - - Secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de *Y57!*
- - Érosion des dents: due à: *K03.2*
- - Éruption
- - - Généralisée due à des *L27.0*
- - - Localisée due à des *L27.1*
- - Exanthème toxique dû au contact de la peau avec un *L24.4*
- - Formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.18*
- - Granulocytopénie induite par des *D70.19*
- - Hépatite due aux *K71.6*
- - Hypoglycémie réactive non induite par les *E16.1*
- - Insuffisance hépatique due aux *K71.9*
- - Mise en observation pour suspicion de: effet indésirable d'un *Z03.6*
- - Nécrose de la mâchoire due à des *K10.28*
- - Réaction
- - - Photoallergique à un *L56.1*
- - - Phototoxique à un *L56.0*
- - Rééducation des drogués et après abus de *Z50.3!*
- - Renouvellement d'une ordonnance pour: *Z76.0*

Médicament *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Syndromes secondaires parkinsoniens dus à des *G21.1*
- - Tremblement dû à des *G25.1*
- - Ulcère de l'œsophage: dû à l'ingestion de: *K22.1*
- - Vascularite induite par les *D69.0*
- - Voies de fait/agression par : *Y09.9!*

Médicamenteux

- Adulte ¬ Autres ostéomalacies *M83.5*
- Approprié correctement administré ¬
- - Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance *T88.6*
- - Effet indésirable dû (due) à une substance *T88.7*
- - Hypersensibilité dû (due) à une substance *T88.7*
- - Idiosyncrasie dû (due) à une substance *T88.7*
- - Réaction allergique dû (due) à une substance *T88.7*
- Asthme due aux analgésiques] ¬ Asthme non allergique *J45.1*
- Enfant et l'adolescent ¬ Obésité *E66.14*
- Extrême chez l'enfant et l'adolescent ¬ Obésité *E66.15*
- Fœtus et du nouveau-né ¬ Réactions et intoxications *P93*
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose *M80.4*
- Grade
- - I (OMS) ¬ Obésité *E66.10*
- - II (OMS) ¬ Obésité *E66.11*
- - III (OMS) ¬ Obésité *E66.12*
- Indice masse corporelle IMC
- - 40 ou plus ¬ Obésité *E66.12*
- - Compris
- - - 30 et moins de 35 ¬ Obésité *E66.10*
- - - 35 et moins de 40 ¬ Obésité *E66.11*
- Mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ Ostéonécrose (induite par la radiothérapie) (*K10.2*
- Non classée ailleurs ¬ Céphalée *G44.4*
- Sans
- - Coma ¬ Hypoglycémie *E16.0*
- - Précision ¬
- - - Affection pulmonaire interstitielle, *J70.4*
- - - Aplasie médullaire [anémie aplastique] *D61.19*
- Systémique ¬ Prophylaxie *Z29.21*
- Tics d'origine organique ¬ Tics *G25.6*
- Traitement cytostatique ¬ Aplasie médullaire [anémie aplastique] *D61.10*
- ¬
- - Affection pulmonaire interstitiel
- - - Aiguës, *J70.2*
- - - Chroniques, *J70.3*
- - Akathisie (induite par le traitement) (*G25.88*

Médicamenteux *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Alopécie androgénique *L64.0*
- - Anémies aplastiques *D61.1*
- - Antécédents personnels de fibrose pulmonaire d'origine *Z87.0*
- - Aplasie médullaire [anémie aplastique] *D61.18*
- - Cataracte *H26.3*
- - Chorée *G25.4*
- - Constipation d'origine *K59.02*
- - Dystonie *G24.0*
- - Fibrose d'origine *M79.89*
- - Gastroentérite et colite *K52.1*
- - Glaucome *H40.6*
- - Goutte *M10.2*
- - Hypopituitarisme *E23.1*
- - Hypotension *I95.2*
- - Insuffisance
- - - Corticosurrénale *E27.3*
- - - Hépatique
- - - - Aiguë) (chronique) *K71.1*
- - - - Origine *K71.1, Y57.9!*
- - Lésion hépatique
- - - Idiosyncrasique (imprévisible) *K71*
- - - Toxique (prévisible) *K71*
- - Lipodystrophie localisée *E88.1*
- - Lupus érythémateux disséminé *M32.0*
- - Métaux de toutes origines, sauf substances *T56*
- - Mucite (orale) (oropharyngée) *K12.3*
- - Myélopathie: *G95.8*
- - Myoclonie *G25.3*
- - Myopathie *G72.0*
- - Myotonie: *G71.1*
- - Obésité *E66.19*
- - Ostéonécrose *M87.1*
- - Ostéoporose *M81.4*
- - Pancréatite aiguë *K85.3*
- - Pancytopénie *D61.1*
- - Pemphigus *L10.5*
- - Polynévrite *G62.0*
- - Réaction lichénoïde *L43.2*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.5*
- - Syndrome
- - - Cushing *E24.2*
- - - Sevrage lors de dépendance *F19.3*
- - Thyroïdite *E06.4*
- - Ulcère
- - - Duodénal d'origine *K26.9, Y57.9!*
- - - Estomac d'origine *K25.9, Y57.9!*
- - - Gastro-duodénal d'origine *K27.9, Y57.9!*
- - - Peptique d'origine *K27.9, Y57.9!*

Médicaux

- Appareil auxiliaire

Médicaux *–suite*

- Appareil auxiliaire *–suite*
- - Non classée ailleurs ¬ Dépendance (de longue durée) envers des appareils de soutien, appareils *Z99*
- - ¬ Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils *Z99.8*
- Chirurgical
- - Non classées ailleurs ¬ Autres complications précisées de soins *T88.8*
- - ¬ Accidents et complications au cours d'actes *Y69!*
- Enfants trouvés ¬ Surveillance médicale et soins *Z76.1*
- Implantés ¬ Adaptation et manipulation d'autres appareils *Z45.88*
- Infirmiers surveillance médical enfant bon santé selon circonstances
- - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins *Z76.2*
- - Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins *Z76.2*
- - Maladie de la mère ¬ Soins *Z76.2*
- - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins *Z76.2*
- Non classé ¬
- - Affection
- - - Appareil génito-urinaire après des actes *N99*
- - - Œil et de ses annexes après des actes *H59*
- - - Oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes *H95*
- - - Système
- - - - Nerveux après des actes *G97*
- - - - Ostéo-articulaire et des muscles après des actes *M96*
- - Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes *E89*
- - Atteintes de l'appareil digestif après des actes *K91.88*
- - Complications de soins chirurgicaux et *T88*
- - Séquelles de complications de soins chirurgicaux et *T98.3*
- - Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis *Z71*
- Nourrissons et enfants en bonne santé ¬ Surveillance médicale et soins *Z76.2*
- Précisés ¬ Autres traitements *Z51.88*
- Sans précision ¬
- - Affection
- - - Appareil génito-urinaire après des actes *N99.9*
- - - Œil et de ses annexes après des actes *H59.9*
- - - Oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes *H95.9*
- - - Système ostéo-articulaire et des muscles après des actes *M96.9*

Médicaux *–suite*

- Sans précision ¬ *–suite*
- - Anomalie endocrinienne et métabolique après des actes *E89.9*
- - Atteinte de l'appareil digestif après des actes *K91.9*
- - Complication de soins chirurgicaux et *T88.9*
- - Trouble respiratoire après des actes *J95.9*
- Spécifiques, non effectués ¬ Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes *Z53*
- Utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques ¬ Incidents dus à des appareils ou à des produits *Y82!*
- ¬
- - Abcès
- - - Intra-abdominal après des actes *T81.4*
- - - Plaie après des actes *T81.4*
- - - Sous-phrénique après des actes *T81.4*
- - - Sutures après des actes *T81.4*
- - Adhérences pelvi-péritonéales après des actes *N99.4*
- - Affection
- - - Appareil génito-urinaire après des actes *N99.8*
- - - Œil et de ses annexes après des actes *H59.8*
- - - Oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes *H95.8*
- - - Système
- - - - Nerveux après des actes *G97.8*
- - - - Ostéo-articulaire et des muscles après des actes *M96.88*
- - Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes *E89.8*
- - Antécédents personnels d'autres traitements *Z92.8*
- - Complication vasculaire à la suite d'actes *I97.9*
- - Formes précisées de soins *Z51.8*
- - Hypofonctionnement
- - - Corticosurrénal (de la médullaire) après des actes *E89.6*
- - - Testiculaire après des actes *E89.5*
- - Hypoinsulinémie après des actes *E89.1*
- - Hypoparathyroïdie après des actes *E89.2*
- - Hypopituitarisme après des actes *E89.3*
- - Hypothyroïdie après des actes *E89.0*
- - Incidents dus à des appareils ou à des produits *Y82.8!*
- - Insuffisance
- - - Ovarienne après des actes *E89.4*
- - - Rénale après des actes *N99.0*
- - Maladie
- - - Système nerveux après des actes *G97.88*
- - - Voies respiratoires après des actes *J95.88*
- - Mise en place et ajustement d'autres appareils ou dispositifs *Z46*

Médicaux *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Pseudoméningocèle après des actes *G97.88*
- - Rétrécissement urétral après des actes *N99.1*
- - Septicémie après des actes *T81.4*
- - Soins *Z51*
- - Sténose
- - - Sous-glottique après des actes *J95.5*
- - - Trachéale après des actes *J95.81*

Medinensis ¬ Infection [dracontiase] (à): Dracunculus *B72*

Médiocarpienne ¬ Luxation du poignet: (Articulation) *S63.03*

Médiotarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (Articulation) *S93.32*

Méditerranéen

- Familial ¬
- - Arthrite au cours de fièvre *E85.0†, M14.49**
- - Fièvre *E85.0*
- Hémoglobinopathie) ¬ Anémie *D56.9*
- ¬
- - Anémie *D56.9*
- - Fièvre
- - - *A23*
- - - *A23.9*
- - - Boutonneuse *A77.1*
- - - Exanthématique *A77.1*
- - Lymphome *C88.30*
- - Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle de type *C88.3*

MEDNIK ¬ Syndrome *Q87.8*

Médullaire

- Actes médicaux ¬ Hypofonctionnement corticosurrénal (de la *E89.6*
- Anémie aplastique
- - Acquis pur
- - - Chronique ¬ Aplasie *D60.0*
- - - Érythroblastopénie] ¬ Aplasie *D60*
- - - Sans précision ¬ Aplasie *D60.9*
- - - Transitoire ¬ Aplasie *D60.1*
- - - ¬ Autres aplasies *D60.8*
- - Médicamenteux
- - - Sans précision ¬ Aplasie *D61.19*
- - - Traitement cytostatique ¬ Aplasie *D61.10*
- - - ¬ Autre aplasie *D61.18*
- Anormal associé
- - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec éosinophiles *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22) ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec éosinophiles *C92.50*
- Autosomique dominante avec hyperuricémie ¬ Maladie rénale kystique *Q61.5*
- Central ¬ Syndrome *S24.12*
- Dorsale sans autre précision ¬ Lésion *S24.10*

Médullaire *–suite*
- Histiocytaire ¬ Réticulose *C96.8*
- Latéral ¬ Syndrome *I66.3†, G46.4**
- Lombo-sacrée
- - L1 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.71!*
- - L2 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.72!*
- - L3 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.73!*
- - L4 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.74!*
- - L5 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.75!*
- - Niveau SAI ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.70!*
- - S1 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.76!*
- - S2-S5 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.77!*
- - ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.7!*
- Lors de myélopathie vasculaire) ¬ Claudication intermittente *G95.18*
- Lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ Foyers osseux (*C79.5*
- Papillaire
- - Aiguë ¬ Nécrose *N17.2*
- - Rénale ¬ Nécrose *N17.2*
- - SAI ¬ Nécrose *N17.2*
- Rein ¬ Kyste *Q61.5*
- Rémission complète ¬ Plasmocytome *C90.01*
- Rénal stade
- - 1 ¬ Nécrose *N17.21*
- - 2 ¬ Nécrose *N17.22*
- - 4 ¬ Nécrose *N17.23*
- Sans précision ¬ Compression *G95.2*
- Stade
- - 1 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.21*
- - 2 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.22*
- - 3 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.23*
- Thyroïde ¬ Cancer *C73*
- Toxicité ¬ Dépression *D61.9*
- Tuberculeux ¬ Abcès *A17.8†, G07**
- ¬
- - Carcinome rénal *C64*
- - Dépression *D61.9*
- - Hypoplasie *D61.9*
- - Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.2*
- - Paralysie *G83.8*
- - Plasmocytome *C90.0*
- - Rétrécissement du canal *M48.0*
- - Tuberculose
- - - *A17.8†, G07**
- - - Méningée (cérébrale) (*A17.0†*

Medullaris] ¬ Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus *S34.0*

Méduloblastome ¬ *C71.6*

Médulloépithéliome
- Intraoculaire ¬ *C69.9*
- Système nerveux central ¬ *C72.9*

Médullosurrénale ¬
- Hyperfonctionnement de la *E27.5*
- Hyperplasie de la *E27.5*
- Tumeur maligne: *C74.1*

Méduse ¬ *T63.6*

Méga-appendice ¬ *Q43.8*

Mégacalicose congénitale ¬ *Q63.8*

Mégacaryoblastique associée à t(1;22)(p13;q13) ¬ Leucémie myéloïde aiguë *C94.20*

Mégacaryocytaire
- Aiguë ¬ Leucémie *C94.2*
- Chronique ¬ Myélose *D47.4*
- Métaplasie myéloïde ¬ Myélosclérose (*D47.4*
- ¬
- - Hépatosplénomégalie myéloïde *D47.4*
- - Ostéomyélosclérose *D47.4*

Mégacaryocytes ¬ Leucémie aiguë à *C94.2*

Méga-cisterna magna ¬ *Q03.1*

Mégacôlon
- Aganglionique ¬ *Q43.1*
- Complication
- - Niveau des organes ¬ Entérocolite à Clostridium difficile sans *A04.71*
- - Organiques ¬ Entérocolite à Clostridium difficile avec *A04.73*
- Congénital (sans ganglion) ¬ *Q43.1*
- Idiopathique ¬ *K59.3*
- Non classé ailleurs ¬ *K59.3*
- Sans complication
- - Niveau des organes ¬ Entérocolite à Clostridium difficile sans *A04.70*
- - Organiques ¬ Entérocolite à Clostridium difficile avec *A04.72*
- Toxique ¬ *K59.3*
- ¬ Syndrome de Goldberg-Shprintzen avec *Q87.8*

Mégaduodénum ¬ *Q43.8*

Mégalencéphalie
- Cutis marmorata telangiectatica congenita ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Malformation capillaire
- - Polymicrogyrie ¬ Syndrome *Q87.3*
- - ¬ Syndrome *Q87.3*
- ¬ *Q04.5*

Mégalencéphalique avec kystes sous-corticaux ¬ Leucoencéphalopathie *E75.2*

Mégaloblastique
- Carence en facteur intrinsèque ¬ Anémie héréditaire juvénile *D51.0*
- Héréditaire ¬ Anémie *D51.1*

Mégaloblastique *–suite*
- Non classées ailleurs ¬ Autres anémies *D53.1*
- Nutritionnelle ¬ Anémie *D52.0*
- Répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l'acide folique ¬ anémie *D53*
- SAI ¬ Anémie *D53.1*

Mégalocornée
- Cardiopathie-anomalies squelettiques ¬ Syndrome d'anophtalmie- *Q87.8*
- Glaucome ¬ *Q15.0*
- Isolée congénitale ¬ *Q15.8*
- ¬ Glaucome secondaire à une sphérophakie/ectopie du cristallin et *Q15.8*

Mégalogastrie ¬ *Q40.2*

Mégarbané ¬ Dysplasie spondylo-métaphysaire autosomique récessive type *Q77.8*

Mégarbané-Loiselet ¬ Syndrome de *Q87.0*

Méga-uretère
- Congénital ¬ *Q62.2*
- Primitif congénital ¬ *Q62.2*
- ¬ *N28.88*

Mégavessie ¬ Syndrome d'hypopéristaltisme intestinal-microcôlon- *Q43.8*

Mégavessie-méga-uretères ¬ Syndrome *Q62.7*

MEHMO ¬ Syndrome de *Q87.8*

Meier-Blumberg-Imahorn ¬ Syndrome de *E83.4*

Meier-Gorlin ¬ Syndrome de *Q87.1*

Meige ¬
- Lymphœdème de *Q82.09*
- Syndrome de *G24.4*

Meige-like ¬ Maladie de *I89.09*

Meigs
v. Demons-Meigs

Méïotique ¬
- Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction *Q93.0*
- Trisomie
- - 13, non-disjonction *Q91.4*
- - 18, non-disjonction *Q91.0*
- - 21, non-disjonction *Q90.0*
- - Chromosome entier, non-disjonction *Q92.0*

Mekongi ¬ Infection à Schistosoma: *B65.8*

Mélæna
- Néonatal
- - Déglutition de sang maternel ¬ Hématémèse et *P78.2*
- - ¬ *P54.1*
- ¬ *K92.1*

Mélanine ¬
- Anomalies liées à une diminution de la formation de *L81.6*
- Hyperpigmentations par la *L81.4*

Mélanocortine 4 ¬ Obésité par déficit du récepteur de la *E66.89*

Mélanocytaire ¬ Nævus: *D22*

Mélanocytes
- Cuir chevelu et du cou ¬ Nævus à *D22.4*
- Lèvre ¬ Nævus à *D22.0*
- Membre
- - Inférieur, y compris la hanche ¬ Nævus à *D22.7*
- - Supérieur, y compris l'épaule ¬ Nævus à *D22.6*
- Oreille et du conduit auditif externe ¬ Nævus à *D22.2*
- Parties de la face, autres et non précisées ¬ Nævus à *D22.3*
- Paupière, y compris le canthus ¬ Nævus à *D22.1*
- Sans précision ¬ Nævus à *D22.9*
- Tronc ¬ Nævus à *D22.5*
- ¬ Nævus à *D22*

Mélanocytome
- Globe oculaire ¬ *D31.9*
- Méningé ¬ *D42.9*

Mélanocytose neurocutanée ¬ *D22.9*

Mélanodontie infantile ¬ *K02.4*

Mélanodontoclasie ¬ *K02.4*

Mélanolysosomale ¬ Maladie neuroectodermique *E70.3*

Mélanome
- Anal ¬ *C21.0*
- Choroïdien ¬ *C69.3*
- In situ
- - Col utérin ¬ *D03.8*
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *D03.4*
- - Lèvre ¬ *D03.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D03.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D03.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D03.2*
- - Organes génitaux ¬ *D03.8*
- - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D03.3*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *D03.1*
- - Sans précision ¬ *D03.9*
- - Sièges ¬ *D03.8*
- - Tronc ¬ *D03.5*
- - ¬ *D03*
- Malin
- - Côlon ¬ *C18.9*
- - Corps ciliaire cellule fusiforme type
- - - A ¬ *C69.4*
- - - B ¬ *C69.4*
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *C43.4*
- - Face, parties autres et non précisées ¬ *C43.3*
- - Familial ¬ *C43.9*
- - Lèvre ¬ *C43.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *C43.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *C43.6*

Mélanome *–suite*
- Malin *–suite*
- - Méninges ¬ *C70.9*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *C43.2*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *C43.1*
- - Peau
- - - Sans précision ¬ *C43.9*
- - - ¬
- - - - *C43*
- - - - Lésion à localisations contiguës d'un *C43.8*
- - SAI ¬ *C43.9*
- - Tronc ¬ *C43.5*

Mélanurie ¬ *R82.9*

MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome *G31.81*

Mélasme] ¬ Chloasma [*L81.1*

Melchior
v. Dyggve-Melchior-Clausen

Melhem-Fahl ¬ Syndrome de *Q76.4*

Mélioïdose
- Aiguë et galopante ¬ *A24.1*
- Pneumonie ¬ *A24.1†, J17.0**
- Pulmonaire ¬ *A24.1*
- Sans précision ¬ *A24.4*
- Septicémique ¬ *A24.1*
- Subaiguë et chronique ¬ *A24.2*
- ¬
- - *A24.3*
- - Morve et *A24*

Melitensis ¬ Brucellose à Brucella *A23.0*

Melkersson-Rosenthal ¬ Syndrome de *G51.2*

Melliturie ¬ *E74.8*

Melnick-Needles ¬ Syndrome de *Q87.5*

Mélorhéostose ¬ *M85.89*

Membrane
- Basale antiglomérulaire ¬ Maladie des anticorps de la *M31.0†, N08.5**
- Bowman type II ¬ Dystrophie cornéenne de la *H18.5*
- Cellulaire [CR3] ¬ Déficit en complexe récepteur de la *D71*
- Cornéennes ¬ Lésions des *H18.3*
- Début travail
- - 1 à 7 jours ¬ Rupture prématurée des *O42.11*
- - 24 heures ¬ Rupture prématurée des *O42.0*
- - Delà de 24 heures ¬ Rupture prématurée des *O42.1*
- - Plus de 7 jours ¬ Rupture prématurée des *O42.12*
- Descemet ¬
- - Plis de la *H18.3*
- - Rupture de la *H18.3*
- Fibres hyaloïdes ¬ *H43.3*

Membrane *–suite*
- Hyaline
- - Adulte ¬ Maladie
- - - *J80*
- - - *J80.09*
- - Nouveau-né ¬ Maladie des *P22.0*
- Jackson ¬ *Q43.3*
- Mitochondriale ¬ Neurodégénérescence associée à la protéine de *G23.0*
- Muqueuses ¬ Pemphigoïde des *L12.1*
- Plasmique ¬ Défaut du transporteur de carnitine à travers la *E71.3*
- Pupillaires ¬ *H21.4*
- Sans
- - Hémorragie ¬ Rétention
- - - Partielle du placenta et des *O73.1*
- - - Placenta et des *O73*
- - Précision ¬
- - - Anomalie du liquide amniotique et des *O41.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des *P02.9*
- - - Rupture prématurée des *O42.9*
- Synoviale ¬ Syphilis de la *A52.7†, M68.09**
- Traitement tocolytique
- - Début travail
- - - 1 à 7 jours ¬ Rupture prématurée des *O42.21*
- - - 24 heures ¬ Rupture prématurée des *O42.20*
- - - Plus de 7 jours ¬ Rupture prématurée des *O42.22*
- - Sans précision du début du travail ¬ Rupture prématurée des *O42.29*
- Travail retardé par traitement ¬ Rupture prématurée des *O42.2*
- ¬
- - Accouchement retardé rupture
- - - Artificielle des *O75.5*
- - - Spontanée ou non précisée des *O75.6*
- - Anomalie
- - - Liquide amniotique et des *O41*
- - - Précisées du liquide amniotique et des *O41.8*
- - Fœtus nouveau-né affecté
- - - Anomalies des *P02.8*
- - - Complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les *P02*
- - - Rupture prématurée des *P01.1*
- - Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des *O72.2*
- - Infection du sac amniotique et des *O41.1*
- - Oligoamnios, sans mention de rupture des *O41.0*
- - Rupture prématurée des *O42*
- - Suivi de la mère en cas de prolapsus des *O34.31*

Membraneux
- Congénitale ¬ Cataracte *Q12.0*

Membraneux *–suite*
- Modérée ¬ Sténose subaortique *Q24.4*
- Primitive ¬ Glomérulonéphrite extra *N05.2*
- ¬
- - Anomalie de: labyrinthe *Q16.5*
- - Bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*
- - Lésion traumatique de l'urètre: Partie *S37.31*

Membranite ¬
- *O41.1*
- *P02.7*

Menace
- Avortement ¬
- - *O20.0*
- - Hémorragie due à une *O20.0*
- Insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du fœtus avec *O35.8*
- Perte d'emploi ¬ *Z56*

Ménarche ¬ Saignements abondants de la *N92.2*

MEND ¬ Syndrome *Q87.8*

Mendélien infection mycobactérien déficit
- Complet
- - IFNgammaR1 ¬ Prédisposition *D84.8*
- - IFNgammaR2 ¬ Prédisposition *D84.8*
- - IL12B ¬ Prédisposition *D84.8*
- - ISG15 ¬ Prédisposition *D84.8*
- - Récepteur bêta 1 de l'interleukine 12 ¬ Prédisposition *D84.8*
- Partiel
- - Facteur 8 régulateur de l'interféron ¬ Prédisposition *D84.8*
- - STAT1 ¬ Prédisposition *D84.8*

Mendelson
- Anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Syndrome de *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Syndrome de *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Syndrome de *O74.0*
- ¬ Syndrome de *J95.4*

Mendenhall
v. Rabson-Mendenhall

Mener une grossesse à terme ¬ incapacité de *N97*

Ménétrier ¬ Maladie de *K29.6*

Mengo ¬ Encéphalite à virus *A85.8†, G05.1**

Ménière ¬
- Maladie de *H81.0*
- Syndrome ou vertiges de *H81.0*

Méningé
- Cérébral
- - Médullaire) ¬ Tuberculose *A17.0†*
- - Rachidiennes) ¬ Adhérences *G96.1*
- Tuberculeux ¬ Abcès *A17.0†, G01**
- ¬
- - Hémorragie *I60.8*

Méningé *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Mélanocytome *D42.9*
- - Peste *A20.3†, G01**

Méninges
- Cérébral ¬
- - Tuberculome des *A17.1†, G07**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D32.0*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D42.0*
- - - Malign
- - - - *C70.0*
- - - - Secondaire du cerveau et des *C79.3*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des *D42*
- Non classée ailleurs ¬ Affection des *G96.1*
- Rachidien
- - Cervicales ¬ Lésion traumatique des *S19.80*
- - Dorsales ¬ Lésion traumatique des *S29.80*
- - Lombosacrées ¬ Lésion traumatique des *S39.81*
- - ¬ Tumeur
- - - Bénigne: *D32.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D42.1*
- - - Maligne: *C70.1*
- Sans précision ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D32.9*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D42.9*
- - Maligne: *C70.9*
- Spinal ¬
- - Adhérence congénitale de *Q06.8*
- - Tuberculome des *A17.1†, G07**
- ¬
- - Adhésion tuberculeuse des *A17.0†, G01**
- - Anomalie congénitale SAI de la moelle épinière et des *Q06.9*
- - Constriction anormale congénitale d'un ligament des *Q07.8*
- - Cryptococcose des *B45.1†, G02.1**
- - Gomme des *A52.1†, G07**
- - Lésion congénitale SAI de la moelle épinière et des *Q06.9*
- - Maladie congénitale SAI de la moelle épinière et des *Q06.9*
- - Mélanome malin des *C70.9*
- - Neurosyphilis adhésive des *A52.1†, G01**
- - Syphilis
- - - *A52.1†, G01**
- - - Aiguë des *A51.4†, G01**
- - TBC [tuberculose] *A17.0†, G01**
- - Thrombose d'une veine des *I67.6*
- - Tuberculome des *A17.1†, G07**
- - Tumeur
- - - Bénigne des *D32*
- - - Maligne des *C70*

Méningiome
- Multiples familiaux ¬ *D32.9*
- SAI ¬ *D32.9*
- ¬ *D32.9*

Méningisme
- Cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.8*
- Virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09, U69.21!*
- - Influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- ¬ *R29.1*

Méningite
- Adénovirus ¬ *A87.1†, G02.0**
- Aiguë ¬ Neurosyphilis avec *A52.1†, G01**
- Arbovirus ¬ *A87.8†, G02.0**
- Aseptique ¬ Maladie due au VIH avec *B20, G03.0*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, G02.1**
- Bacille Friedländer ¬
- - *G00.8*
- - *G00.8, B96.2!*
- Bactérien
- - Non classée ailleurs ¬ *G00*
- - Sans précision ¬ *G00.9*
- - ¬
- - - *G00*
- - - *G00.8*
- Basilaire tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**
- Candidose ¬ *B37.5†, G02.1**
- Candidosique ¬ *B37.5†, G02.1**
- Causé
- - Non précis ¬
- - - *G03*
- - Précisées ¬ *G03.8*
- Cérébrale tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**
- Cérébrospinale
- - Épidémique ¬ *A39.0†, G01**
- - Tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**
- - Typhus ¬ *A75.9†, G01**
- Charbonneuse ¬ *A22.8†, G01**
- Chronique ¬ *G03.1*
- Coccidioïdomycose ¬ *B38.4†, G02.1**
- Cours
- - Actinomycose ¬ *A42.8†, G01**
- - Affections bactériennes classées ailleurs ¬ *G01**
- - Infections virales classées ailleurs ¬ *G02.0**
- - Listérienne ¬ *A32.1†, G01**
- - Maladie
- - - Infectieux parasitaire
- - - - Classées ailleurs ¬ *G02**
- - - - Précisées classées ailleurs ¬ *G02.8**
- - - Lyme ¬ *A69.2†, G01**

Méningite *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, G02.8**
- - - Virale NCA ¬ *A87.9*
- - Mononucléose infectieuse ¬ *B27.9†, G02.0**
- - Mycoses classées ailleurs ¬ *G02.1**
- - Neurosyphilis ¬ *A52.1†, G01**
- - Rubéole ¬ *B06.0†, G02.0**
- - Sporotrichose ¬ *B42.8†, G02.1**
- - Syphilis
- - - Congénitale ¬ *A50.4†, G01**
- - - ¬ *A52.1†, G01**
- - Varicelle ¬ *B01.0†, G02.0**
- Cryptocoques
- - SIDA ¬ *B20†, G02.0*, B45.9*
- - ¬ *B45.1†, G02.1**
- Diplocoques ¬ *A39.0†, G01**
- Entérovirus ¬ *A87.0†, G02.0**
- Éosinophile ¬ *B83.2†, G02.8**
- Épidémique NCA ¬ *A39.0†, G01**
- Escherichia coli ¬ *G00.8, B96.2!*
- Gonococcique ¬ *A54.8†, G01**
- Gonocoques ¬ *A54.8†, G01**
- Haemophilus influenzae ¬ *G00.0*
- Herpès zoster ¬ *B02.1†, G02.0**
- Infectieuse à méningocoques ¬ *A39.0†, G01**
- Klebsiella ¬ *G00.8, B96.2!*
- Leptospira ¬ *A27.9†, G01**
- Liquide clair ¬ *G03.0*
- Listeria monocytogenes ¬ *A32.1†, G01**
- Lymphocytaire
- - Aiguë ¬ *A87.2†, G02.0**
- - ¬ *A87.2†, G02.0**
- Méningocoques ¬ *A39.0†, G01**
- Méningo-encéphalite listériennes ¬ *A32.1†*
- Mesures préventives ¬ *G03.8, Y84.9!*
- Mycoplasmes ¬ *G00.8, B96.0!*
- Mycosique ¬ *B49†, G02.1**
- Neisseria meningitidis ¬ *A39.0†, G01**
- Néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ *C79.3*
- Non suppurée ¬ *G03.0*
- Oreillons ¬ *B26.1†, G02.0**
- Pneumocoques ¬ *G00.1*
- Post-morbilleuse ¬ *B05.1†*
- Purulente SAI ¬ *G00.9*
- Pyogène SAI ¬ *G00.9*
- Récurrente bénigne [Mollaret] ¬ *G03.2*
- Salmonella ¬ *A02.2†, G01**
- Sans précision ¬ *G03.9*
- Scarlatineuse ¬ *A38†, G01**
- Spinale tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**

Méningite *–suite*
- Staphylocoques ¬ *G00.3*
- Streptocoques ¬ *G00.2*
- Suppurée SAI ¬ *G00.9*
- Syphilitique
- - Aiguë précoce ¬ *A51.4†, G01**
- - Congénitale tardive ¬ *A50.4†, G01**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, G01**
- - Tardive ¬ *A52.1†, G01**
- Torulose ¬ *B45.1†, G02.1**
- Tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Typhoïde ¬ *A01.0†, G01**
- Vaccination ¬ *G03.8, Y59.9!*
- Varicelleuse ¬ *B01.0†, G02.0**
- Viral ¬
- - *A87.8*
- - *A87.9*
- Virus
- - Coxsackie ¬ *A87.0†, G02.0**
- - ECHO ¬ *A87.0†, G02.0**
- - Herpès ¬ *B00.3†, G02.0**
- - Poliomyélite ¬ *A80.9†, G01**
- Zostérienne ¬ *B02.1†, G02.0**
- ¬
- - Exanthème épidémique avec *A88.0†, G02.0**
- - Rougeole avec *B05.1†, G02.0**

Meningitis cerebrospinalis epidemica ¬ *A39.0†, G01**

Méningocèle
- Cérébrale ¬ *Q01*
- Craniale ¬ *Q01.9*
- Postérieure ¬ *Q05.9*
- Rachidienne) ¬ *Q05*
- ¬ *Q05.9*

Méningo-cérébrale ¬ Cryptococcose *B45.1†, G02.1**

Méningococcémie
- Aiguë ¬ *A39.2*
- Chronique ¬ *A39.3*
- Sans précision ¬ *A39.4*

Méningococcique
- SAI ¬
- - Bactériémie *A39.4*
- - Maladie *A39.9*
- Sans précision ¬ Infection *A39.9*
- Surrénalien ¬ Syndrome *A39.1†*
- ¬ Arthrite *A39.8†, M01.09**

Méningocoques ¬
- Adrénalite hémorragique à *A39.1†, E35.1**
- Apoplexie des surrénales due à un sepsis à *A39.1†, E35.1**
- Arachnoïdite à *A39.0†, G01**
- Bactériémie à *A39.4*
- Cardiopathie à *A39.5†, I52.0**
- Cardite

Méningocoques ¬ *–suite*
- Cardite *–suite*
- - *A39.5†*
- - *A39.5†, I52.0**
- Conjonctivite à *A39.8†, H13.1**
- Encéphalite à *A39.8†, G05.0**
- Endocardite à *A39.5†, I39.8**
- Fièvre cérébrospinale à *A39.0†, G01**
- Hémorragie des surrénales due à un sepsis à *A39.1†, E35.1**
- Infection
- - *A39*
- - *A39.8*
- - Cérébrospinale à *A39.0†, G01**
- - Cerveau à *A39.8†, G05.0**
- - Endocarde à *A39.5†, I39.8**
- - Généralisée à *A39.4*
- - Myocarde à *A39.5†, I41.0**
- - Péricarde à *A39.5†, I32.0**
- Méningite
- - *A39.0†, G01**
- - Infectieuse à *A39.0†, G01**
- Méningomyélite à *A39.8†, G05.0**
- Myocardite à *A39.5†, I41.0**
- Névrite rétrobulbaire à *A39.8†, H48.1**
- Péricardite à *A39.5†, I32.0**
- Sepsis
- - *A39.4*
- - Fulminant à *A39.2*
- Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des: *Z22.3*
- Surrénalite hémorragique
- - *A39.1†*
- - *A39.1†, E35.1**
- Syndrome hémorragique surrénalien dû à un sepsis à *A39.1†, E35.1**

Méningo-encéphalite
- Acquise au cours de toxoplasmose ¬ *B58.2†, G05.2**
- Adénovirus ¬
- - *A85.1†*
- - *A85.1†, G05.1**
- Amibienne primitive] ¬ MEAP [*B60.2†, G05.2**
- Angiostrongylus cantonensis ¬ *B83.2†, G05.2**
- Californie ¬ *A83.5*
- Congénitale à toxoplasmose ¬ *P37.1†, G05.2**
- Cours
- - Blastomycose NCA ¬ *B40.8†, G05.2**
- - Herpès ¬ *B00.4†, G05.1**
- Éosinophile ¬ *B83.2†, G05.2**
- Épidémique ¬ *A39.8†, G05.0**
- Escherichia coli ¬ *G04.2, B96.2!*
- Haemophilus influenzae ¬ *G04.2, B96.3!*
- Listeria monocytogenes ¬ *A32.1†, G05.0**

Méningo-encéphalite *–suite*
- Listérienne ¬
- - *A32.1†, G05.0**
- - Méningite et *A32.1†*
- Lymphocytaire ¬ *A87.2†, G05.1**
- Méningomyélite
- - Bactériennes, non classées ailleurs ¬ *G04.2*
- - Cours d'affections classées ailleurs ¬ *G05**
- Nægleria ¬ *B60.2†, G05.2**
- Oreillons ¬ *B26.2†, G05.1**
- Parasitaire NCA ¬ *B89†, G05.2**
- Parastrongylus cantonensis ¬ *B83.2†, G05.2**
- Pneumocoques ¬ *G04.2, B95.3!*
- Précisée virale NCA ¬ *A85*
- Rubéoleuse ¬ *B06.0†, G05.1**
- Staphylocoques ¬ *G04.2, B95.8!*
- Streptocoques ¬ *G04.2, B95.5!*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G05.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.2†, G05.2**
- Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G05.0**
- Virale transmise par des tiques ¬ *A84*
- Virus
- - Herpès ¬ *B00.4†, G05.1**
- - SAI ¬ *A86*
- - Transmise par des moustiques ¬ *A83*
- Zostérienne ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬ *G04*

Méningo-encéphalocèle
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.4†, G94.8**
- - ¬ *A52.1†, G94.8**
- ¬ *Q01*

Méningo-encéphalomyélite
- Acquise au cours de toxoplasmose ¬ *B58.2†, G05.2**
- Congénitale à toxoplasmose ¬ *P37.1†, G05.2**
- Cours d'actinomycose ¬ *A42.8†, G05.0**
- Haemophilus influenzae ¬ *G04.2, B96.3!*
- Torula histolytica ¬ *B45.1†, G05.2**

Méningomyélite
- Bactériennes, non classées ailleurs ¬ Méningo-encéphalite et *G04.2*
- Cours d'affections classées ailleurs ¬ méningo-encéphalite et *G05**
- Cryptocoques ¬ *B45.1†, G05.2**
- Méningocoques ¬ *A39.8†, G05.0**
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G05.0**
- Torula histolytica ¬ *B45.1†, G05.2**
- Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G05.0**
- ¬ *G04*

Méningomyélocèle
- Fœtus
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- - ¬ Dystocie due à: *O66.3*

Méningomyélocèle *–suite*
- Spinal) ¬ *Q05*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G94.8**

Méningo-vasculaire
- Cérébrale ¬ Syphilis *A52.1†, G01**
- Congénitale ¬ Syphilis *A50.4†, G01**
- ¬ Neurosyphilis *A52.1†, G01**

Ménisque
- Corne
- - Antérieur ménisque
- - - Externe ¬
- - - - Atteintes du *M23.34*
- - - - Kyste du *M23.04*
- - - Interne ¬
- - - - Atteintes du *M23.31*
- - - - Kyste du *M23.01*
- - Postérieur ménisque
- - - Externe ¬
- - - - Atteintes du *M23.35*
- - - - Kyste du *M23.05*
- - - Interne ¬
- - - - Atteintes du *M23.32*
- - - - Kyste du *M23.02*
- Déchirure traumatisme ancien
- - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du *M23.24*
- - - - Interne ¬ Lésion du *M23.21*
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du *M23.25*
- - - - Interne ¬ Lésion du *M23.22*
- - Localisations multiples ¬ Lésion du *M23.20*
- - Ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: Ménisque SAI ¬ Lésion du *M23.29*
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe ¬ Lésion du *M23.26*
- - - Interne ¬ Lésion du *M23.23*
- - ¬ Lésion du *M23.2*
- Détaché ¬ *M23.3*
- Discoïde congénital
- - Localisations multiples ¬ *M23.10*
- - Ménisque
- - - Externe ¬ *M23.16*
- - - Interne ¬ *M23.13*
- - - SAI ¬ *M23.19*
- - ¬ *M23.1*
- Externe
- - Interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés) ¬ Lésion traumatique du *S83.7*
- - ¬
- - - Atteinte ménisque
- - - - Corne
- - - - - Antérieure du *M23.34*
- - - - - Postérieure du *M23.35*

Ménisque *–suite*
- Externe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Atteinte ménisque *–suite*
- - - - Partie et partie non précisée du *M23.36*
- - - Déchirure "en anse de seau" (de): *S83.2*
- - - Kyste ménisque
- - - - Corne
- - - - - Antérieure du *M23.04*
- - - - - Postérieure du *M23.05*
- - - - Partie et partie non précisée du *M23.06*
- - - Lésion
- - - - Interne
- - - - - Genou, sans précision: Corne postérieure du *M23.95*
- - - - - Genou, sans précision: Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du *M23.94*
- - - - - Genou, sans précision: Partie autre et non précisée du *M23.96*
- - - - Ménisque
- - - - - Déchirure ou un traumatisme ancien: Autre partie et partie non précisée du *M23.26*
- - - - - Déchirure ou un traumatisme ancien: Corne antérieure du *M23.24*
- - - - - Déchirure ou un traumatisme ancien: Corne postérieure du *M23.25*
- - - Ménisque externe ¬ Ménisque discoïde (congénital): *M23.16*
- Genou ¬ Lésion récidivante du cartilage du *M23.39*
- Interne ¬
- - Atteinte ménisque
- - - Corne
- - - - Antérieure du *M23.31*
- - - - Postérieure du *M23.32*
- - - Partie et partie non précisée du *M23.33*
- - Déchirure "en anse de seau" (de): *S83.2*
- - Kyste ménisque
- - - Corne
- - - - Antérieure du *M23.01*
- - - - Postérieure du *M23.02*
- - - Partie et partie non précisée du *M23.03*
- - Lésion
- - - Interne genou sans précision Ligament
- - - - Croisé
- - - - - Antérieur ou corne antérieure du *M23.91*
- - - - - Postérieur ou corne postérieure du *M23.92*
- - - - Interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du *M23.93*
- - - Ménisque déchirure traumatisme ancien
- - - - Corne
- - - - - Antérieure du *M23.21*
- - - - - Postérieure du *M23.22*

Ménisque *–suite*
- Interne ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Ménisque déchirure traumatisme ancien *–suite*
- - - - Partie et partie non précisée du *M23.23*
- - Ménisque interne ¬ Ménisque discoïde (congénital): *M23.13*
- Localisation multiple ¬
- - Atteintes du *M23.30*
- - Kyste du *M23.00*
- Ménisque SAI ¬
- - Atteintes du *M23.39*
- - Kyste du *M23.09*
- Non précisé ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament non précisé ou *M23.99*
- Partie partie non précis ménisque
- - Externe ¬
- - - Atteintes du *M23.36*
- - - Kyste du *M23.06*
- - Interne ¬
- - - Atteintes du *M23.33*
- - - Kyste du *M23.03*
- SAI ¬
- - Atteintes du ménisque: *M23.39*
- - Kyste du ménisque: *M23.09*
- - Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.29*
- - Ménisque SAI ¬ Ménisque discoïde (congénital): *M23.19*
- ¬
- - Atteintes du *M23.3*
- - Blocage du *M23.3*
- - Déchirure récente d'un *S83.2*
- - Dégénérescence du *M23.3*
- - Kyste du *M23.0*
- - Lésion récidivante du *M23.39*
- - Mâchoire (cartilage) (*S03.0*

Menkes
- Cheveux crépus) (en fil de fer) ¬ Maladie de: *E83.0*
- I [syndrome du sirop d'érable] ¬ Maladie de *E71.0*
- ¬ Syndrome des cheveux en fils de fer de *E83.0*

Ménométrorragie ¬ *N92.1*

Ménopause
- Artificiel ¬
- - Syndrome survenant après une *N95.3*
- - Troubles au cours d'une *N95.3*
- Climatère féminin ¬ Troubles de la *N95.1*
- Périménopause
- - Sans précision ¬ Trouble de la *N95.9*
- - ¬ Autres troubles précisés de la *N95.8*
- Prématuré
- - SAI ¬ *E28.3*

Ménopause *–suite*
- Prématuré *–suite*
- - ¬ Syndrome de polyneuropathie-déficience intellectuelle-acromicrie- *Q87.8*
- Troubles de la périménopause ¬ Troubles de la *N95*
- ¬
- - Saignement anormal dans la *N95.0*
- - Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la *N95.1*

Ménopausique
- Anormal ¬ Saignement utérin *N95.0*
- ¬ Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Ménorragie
- Métrorragie
- - Climatérique ¬ *N92.4*
- - Ménopausique ¬ *N92.4*
- - Préclimatérique ¬ *N92.4*
- - Préménopausique ¬ *N92.4*
- Polyménorrhée et métrorragie ¬ *N92*
- Puberté ¬ *N92.2*
- SAI ¬ *N92.0*

Menstruation
- Précoce ¬ *E30.1*
- SAI ¬ Absence de *N91.2*
- Trop abondant
- - Puberté ¬ *N92.2*
- - Trop fréquente cycle menstruel
- - - Irrégulier ¬ *N92.1*
- - - Régulier ¬ *N92.0*

Menstruel
- Irrégulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle *N92.1*
- Précisées ¬ Autres irrégularités *N92.5*
- Régulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle *N92.0*
- Sans précision ¬
- - Affection des organes génitaux de la femme et du cycle *N94.9*
- - Irrégularités *N92.6*
- ¬
- - Affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle *N94.8*
- - Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle *N94*

Mental
- Anorexie mentale non précisée ¬ Autres types d'anorexie *F50.08*
- Atypique ¬ Anorexie *F50.1*
- Caractéristiques autistiques ¬ Retard *F84.1*
- Comportement
- - Associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Autres troubles *F53.8*
- - Légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles *F53.0*
- - Lié utilisation
- - - Alcool ¬ Troubles *F10*

Mental *–suite*
- Comportement *–suite*
- - Lié utilisation *–suite*
- - - Cocaïne ¬ Troubles *F14*
- - - Dérivés du cannabis ¬ Troubles *F12*
- - - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles *F19*
- - - Hallucinogènes ¬ Troubles *F16*
- - - Opiacés ¬ Troubles *F11*
- - - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles *F13*
- - - Solvants volatils ¬ Troubles *F18*
- - - Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles *F15*
- - - Tabac ¬ Troubles *F17*
- - Sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles *F53.1*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de troubles *Z81*
- - - - Personnels d'autres troubles *Z86.5*
- - - Mise en observation pour suspicion de troubles *Z03.2*
- Grave ¬
- - Arriération *F72*
- - Retard *F72*
- Léger ¬
- - Arriération *F70*
- - Retard *F70*
- Lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique ¬ Autres troubles *F06*
- Maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Troubles *O99.3*
- Mesures de perte de poids ¬ Anorexie *F50.01*
- Mouvements stéréotypés ¬ Hyperactivité associée à un retard *F84.4*
- Moyen ¬ Retard *F71*
- Moyenne ¬ arriération *F71*
- Non précis ¬
- - Stress physique ou *Z73*
- - Types d'anorexie mentale et anorexie *F50.08*
- Organique
- - SAI ¬ Trouble *F06.9*
- - Symptomatique, sans précision ¬ Trouble *F09*
- Précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique ¬ Autres troubles *F06.8*
- Profond ¬
- - Arriération *F73*
- - Retard *F73*
- Puerpéralité, sans précision ¬ Trouble *F53.9*
- SAI ¬
- - Anorexie *F50.08*
- - Débilité *F79*

Mental *–suite*
- SAI ¬ *–suite*
- - Déficit *F79*
- - Maladie *F99*
- Sans
- - Indication ¬ Trouble *F99*
- - Mesures de perte de poids ¬ Anorexie *F50.00*
- - Précision
- - - Lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique ¬ Trouble *F06.9*
- - - ¬ Retard *F79*
- Type
- - Actif ¬ Anorexie *F50.01*
- - Boulimique ¬ Anorexie *F50.01*
- - Restrictif ¬ Anorexie *F50.00*
- ¬
- - Anorexie *F50.0*
- - Formes de retard *F78*

Mention
- Atteinte cardiaque ¬ Rhumatisme articulaire aigu, sans *I00*
- Autopsie ¬ Syndrome mort subit nourrisson
- - *R95.0*
- - Sans *R95.9*
- Béance col ¬ soin maternel
- - Cerclage avec ou sans *O34.3*
- - Opération de Shirodkar avec ou sans *O34.3*
- Cœur pulmonaire aigu ¬ Embolie pulmonaire
- - *I26.0*
- - Sans *I26.9*
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique ¬
- - Empyème tuberculeux SAI (sans *A16.5*
- - Formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, sans *A16.8*
- - Pleurésie tuberculeux
- - - SAI (sans *A16.5*
- - - Sans *A16.5*
- - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans *A16.7*
- - Tuberculose
- - - Appareil respiratoire sans précision, sans *A16.9*
- - - Bronches SAI (sans *A16.4*
- - - Ganglionnaire
- - - - Hilaire SAI (sans *A16.3*
- - - - Intrathoracique SAI (sans *A16.3*
- - - - Médiastinale SAI (sans *A16.3*
- - - - Trachéo-bronchique SAI (sans *A16.3*
- - - Ganglions intrathoraciques, sans *A16.3*
- - - Glotte SAI (sans *A16.4*
- - - Larynx
- - - - SAI (sans *A16.4*
- - - - Trachée et des bronches, sans *A16.4*
- - - Médiastinale SAI (sans *A16.8*

Mention *–suite*
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique ¬ *–suite*
- - Tuberculose *–suite*
- - - Nasale SAI (sans *A16.8*
- - - Plèvre SAI (sans *A16.5*
- - - Pulmonaire
- - - - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans *A16.2*
- - - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans *A16.2*
- - - - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans *A16.2*
- - - - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans *A16.2*
- - - - SAI (sans *A16.2*
- - - - Sans *A16.2*
- - - Rhinopharyngée SAI (sans *A16.8*
- - - Sinus de la face SAI (sans *A16.8*
- - - Trachée SAI (sans *A16.4*
- Corps étranger ¬ Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans *S05.0*
- Diagnostic ¬ Transfusion sanguine, sans *Z51.3*
- Dysplasie sévère ¬ néoplasie intraépithéliale
- - Col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans *D06*
- - Vagin [NIVA], stade III, avec ou sans *D07.2*
- - Vulve [NIV], stade III, avec ou sans *D07.1*
- Hémorragie ¬ Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec *I98.3**
- Identification virus spécifique ¬ Grippe
- - Sans *J11*
- - Virale sans *J11*
- Léger ou petit pour l'âge gestationnel ¬ Malnutrition du fœtus, sans *P05.2*
- Maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque ¬ Œdème pulmonaire (aigu) avec *I50.1*
- Péritonite localisée ou généralisée ¬ Appendicite aiguë, sans *K35.8*
- Plus d'une localisation ¬ arthrose avec *M15*
- Psychose ¬
- - Sénescence sans *R54*
- - Vieillesse sans *R54*
- Rupture
- - Membranes ¬ Oligoamnios, sans *O41.0*
- - ¬ Anévrisme aortique
- - - Abdominal, sans *I71.4*
- - - Localisation non précisée, sans *I71.9*
- - - Thoracique, sans *I71.2*
- - - Thoraco-abdominal(e), sans *I71.6*
- Trouble panique ¬ Agoraphobie: Sans *F40.00*

Mentolabial ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre inférieure et le sillon *C44.0*

Menton ¬
- *S01.80*
- Présentation du *O64.2*

Menton ¬ *–suite*
- Soins maternels pour présentation de la face, du front et du *O32.3*

Mer
- Non précisé ¬ Effets toxiques d'un fruit de *T61.9*
- ¬
- - Anémone de *T63.6*
- - Effet toxique
- - - Fruits de *T61.8*
- - - Substances nocives absorbées par le biais de fruits de *T61*
- - Etoile de *T63.6*
- - Mal de: *T75.3*

Méralgie paresthésique ¬ *G57.1*

Mercier] (prostatique) ¬ Barre moyenne [barrière de *N40*

Mercure et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.1*

Méromélie longitudinale
- Fibulaire ¬ *Q72.6*
- Radiale ¬ *Q71.4*
- ¬ *Q73.8*

MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome *G31.81*

Merritt
v. Kasabach-Merritt

Merten
v. Singleton-Merten

Mérycisme
- Enfance ¬ *F98.2*
- Nouveau-né ¬ Régurgitation et *P92.1*

Merzbacher
v. Pelizaeus-Merzbacher

Mésangiale diffus ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant stéroïdes
- Prolifération *N04.3*
- Sclérose *N04.8*

Mésartérite syphilitique ¬ *A52.0†, I79.8**

Mescaline ¬
- *T40.9*
- Intoxication à la *T40.9*

Mésencéphalique/tegmentale ¬ Paralysie *G83.8*

Mésentère
- Universel ¬ *Q43.3*
- ¬
- - *C45.1*
- - *C48.1*
- - Iléus avec gangrène du *K56.6*
- - Kyste chyleux du *I89.8†, K67.8**
- - Léiomyosarcome du *C48.1*
- - Lésion traumatique: *S36.82*

Mesenterica ¬ Tabes *A18.3†, K93.0**

Mésentérique
v.a. omphalo-mésentérique
- Aiguë) (chronique) ¬ Lymphadénite *I88.0*

Mésentérique *–suite*
- Artère veine ¬
- - Embolie *K55.0*
- - Infarctus *K55.0*
- - Thrombose *K55.0*
- Ganglions lymphatiques ¬ Tuberculose *A18.3†, K93.0**
- Inférieur supérieur ¬
- - Artère: *S35.2*
- - Plexus: *S34.5*
- - Veine *S35.3*
- Non spécifique ¬ Lymphadénite *I88.0*
- Supérieure ¬ Thrombose de l'artère *K55.0*
- Tuberculeuse ¬ Lymphadénite *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Abcès
- - - *K65.0*
- - - Aigu) tout ganglion lymphatique, sauf *L04*
- - Adénite chronique, de tout ganglion autre que *I88.1*
- - Adhérences (de): *K66.0*
- - Athérosclérose *K55.1*
- - Insuffisance vasculaire *K55.1*
- - Kyste *K66.8*
- - Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou *S35.2*
- - Lymphadénite
- - - Aiguë tout ganglion lymphatique, sauf *L04*
- - - Chronique
- - - - Sauf *I88.1*
- - - - Tout ganglion autre que *I88.1*
- - Lymphadénopathie *R59.0*
- - Nécrose graisseuse [stéato-nécrose] *K65.8*
- - Saponification *K65.8*
- - Tuberculose
- - - Glandes *A18.3†, K93.0**
- - - Intestin, du péritoine et des ganglions *A18.3*

Mésiale familial
- Bénigne ¬ Épilepsie temporale *G40.2*
- Convulsions fébriles ¬ Épilepsie temporale *G40.2*

Mésiocclusion ¬ *K07.2*

Mesiodens ¬ *K00.1*

Mésoblastique congénital ¬ Néphrome *D41.0*

Mésocardie ¬ *Q24.8*

Mésocervicale ¬ Fracture du col du fémur: *S72.04*

Mésocôlon ¬
- *C45.1*
- *C48.1*

Mésodermique axiale ¬ Dysplasie *Q87.8*

Mésomélique type
- Kantaputra ¬ Dysplasie *Q78.8*
- Reardon ¬ Dysplasie *Q78.8*

Mésomélique type *–suite*
- Savarirayan ¬ Dysplasie *Q78.8*

Mésosomatique de Roch-Leri ¬ Lipomatose *E88.29*

Mésothélial
- Péritoine ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D19.1*
- Plèvre ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D19.0*
- Sans précision ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D19.9*
- Sièges ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D19.7*
- ¬ Tumeur bénigne du tissu *D19*

Mésothéliome
- Bénin SAI ¬ *D19.9*
- Kystique du péritoine ¬ *D19.1*
- Péricarde ¬ *C45.2*
- Péritoine ¬ *C45.1*
- Péritonéal malin ¬ *C45.1*
- Plèvre
- - Épanchement pleural ¬ *C45.0†, J91**
- - ¬ *C45.0*
- Sans précision ¬ *C45.9*
- Sièges ¬ *C45.7*
- ¬ *C45*

Mesure
- Chimiothérapie prophylactique ¬
- - *Z29.2*
- - *Z29.28*
- Chirurgical
- - Médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ *Y84.9!*
- - ¬ Choc septique après *T81.1, R57.2*
- Diagnostiques ou thérapeutiques ¬ Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de *Y82!*
- Immunosuppressives ¬ Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres *D90*
- Insuffisantes de précautions aseptiques ¬ *Y69!*
- Judiciaire
- - Gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des *Y35.7!*
- - ¬ Lésion
- - - *Y35!*
- - - *Y35.7!*
- Médical
- - Sans précision ¬ Incidents dus à des *Y84.9!*
- - ¬ Insuffisance pulmonaire après des *J95.88*
- Perte poids ¬ Anorexie mental
- - *F50.01*
- - Sans *F50.00*
- Préventives ¬ Méningite due à des *G03.8, Y84.9!*
- Procréative
- - Sans précision ¬ *Z31.9*

Mesure *–suite*
- Procréative *–suite*
- - ¬ Autres *Z31.8*
- Prophylactique
- - Précisées ¬ Autres *Z29.8*
- - Sans précision ¬ *Z29.9*
- - ¬ Nécessité d'autres *Z29*
- Réadaptation ¬ Antécédents de *Z92.8*
- Tension artérielle ¬ *Z01.3*
- Thérapeutique hygiéniques spécial ¬ micro-organisme Gram
- - Négatif résistants à certains antibiotiques et nécessitant des *U81!*
- - Positifs résistants à certains antibiotiques et nécessitant des *U80!*
- ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la *Y84.9!*

Métabolique
- Acte médicaux
- - Non classées ailleurs ¬ Anomalies endocriniennes et *E89*
- - Sans précision ¬ Anomalie endocrinienne et *E89.9*
- - ¬ Autres anomalies endocriniennes et *E89.8*
- Classés ailleurs ¬ Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles *M14.1**
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies endocriniennes, nutritionnelles et *O99.2*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies nutritionnelles et *E90**
- Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles *O21.1*
- Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles *O21.1*
- Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles *O21.1*
- Précisées ¬ Autres anomalies *E88.8*
- Sans précision ¬ Anomalie *E88.9*
- Tardive du nouveau-né ¬ Acidose *P74.0*
- Transitoire nouveau-né
- - Sans précision ¬ Anomalie *P74.9*
- - ¬ anomalie
- - - *P74.8*
- - - Électrolytiques et *P74*
- ¬
- - Acidose: *E87.2*
- - Alcalose: *E87.3*
- - Anomalies *E88*
- - Antécédent
- - - Familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et *Z83.4*

Métabolique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Antécédent *–suite*
- - - Personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et *Z86.3*
- - Arthropathie cours maladie
- - - *E88.9†, M14.59**
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et *M14.5**
- - Cardiomyopathie *E88.9†, I43.8**
- - Cataracte cours maladie
- - - *E88.9†, H28.1**
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et *H28.1**
- - Glaucome cours maladie
- - - *E88.9†, H42.0**
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et *H42.0**
- - Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et *N08.4**
- - Hyperémèse gravidique avec troubles *O21.1*
- - Maladie
- - - Peau au cours de trouble *E88.9†, L99.8**
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies *N16.3**
- - Myocardiopathie au cours de maladies *I43.1**
- - Myopathie cours maladie
- - - *E88.9†, G73.6**
- - - *G73.6**
- - Neuropathie
- - - Nerfs périphériques autonomes au cours de maladie *E88.9†, G99.0**
- - - Système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et *G99.0**
- - Polyneuropathie au cours de maladie *E88.9†, G63.3**
- - Psychose aiguë au cours d'un trouble *F05.8*

Métabolisme
- Acide
- - Aminés
- - - Aromatiques
- - - - Sans précision ¬ Anomalies du *E70.9*
- - - - ¬
- - - - - Anomalies du *E70*
- - - - - Anomalies du *E70.8*
- - - Chaîne ramifié
- - - - Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du *E71*
- - - - Sans précision ¬ Anomalie du *E71.2*
- - - - ¬ Autres anomalies du *E71.1*
- - - Non ramifiés ¬ Trouble du *E72.8*
- - - Sans précision ¬ Anomalie du *E72.9*
- - - Soufrés ¬ Anomalies du *E72.1*
- - - ¬
- - - - Anomalie
- - - - - *E72*
- - - - - Précisées du *E72.8*
- - - - Trouble

Métabolisme *–suite*
- Acide *–suite*
- - Aminés *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Trouble *–suite*
- - - - - *E72.9*
- - - - - Congénital du *E72.9*
- - Gamma-aminobutyrique ¬ Trouble du *E72.8*
- - Gras ¬ anomalie
- - - *E71.3*
- - - Métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du *E71*
- - Urique ¬ Intoxication: Médicaments agissant sur le *T50.4*
- Ammoniac ¬ Trouble du *E72.2*
- Arginine ¬ Trouble du *E72.2*
- Base ¬ Anomalie de: *R94.8*
- Bilirubine
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E80.7*
- - ¬ Autres anomalies du *E80.6*
- Calcium
- - Magnésium nouveau-né
- - - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du *P71.9*
- - - ¬ anomalie transitoire
- - - - *P71*
- - - - *P71.8*
- - Sans précision ¬ Anomalies du *E83.59*
- - ¬
- - - Anomalie
- - - - *E83.5*
- - - - *E83.58*
- - - Hypocalcémie due à une anomalie du *E83.58*
- Citrulline ¬ Trouble du *E72.2*
- Cofacteur cobalamine ¬ Homocystinurie due à un défaut du *E72.1*
- Consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Troubles du *O08.5*
- Corps cétoniques ¬ Trouble de l'oxydation des acides gras et du *E71.3*
- Cuivre ¬ Anomalies du *E83.0*
- Cycle
- - Méthionine ¬ Trouble du *E72.1*
- - Urée et de la détoxification de l'ammoniac ¬ Trouble du *E72.2*
- Cystathionine ¬ Trouble du *E72.1*
- Fer ¬ Anomalies du *E83.1*
- Fructose ¬ Anomalies du *E74.1*
- GABA ¬ Trouble du *E72.8*
- Galactose ¬ Anomalies du *E74.2*
- Glucides
- - Fœtus nouveau-né
- - - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du *P70.9*
- - - ¬ Autres anomalies transitoires du *P70.8*

Métabolisme *–suite*
- Glucides *–suite*
- - Spécifiques du fœtus et du nouveau-né ¬ Anomalies transitoires du *P70*
- Glucosaminoglycanes
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E76.9*
- - ¬ anomalie
- - - *E76*
- - - *E76.8*
- Glutamine ¬ Trouble du *E72.8*
- Glutathion ¬ Anémie due à d'autres anomalies du *D55.1*
- Glycine ¬ Anomalies du *E72.5*
- Glycoprotéines
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E77.9*
- - ¬ anomalie
- - - *E77*
- - - *E77.8*
- Histidine ¬ Anomalies du *E70.8*
- Homocystine ¬ Trouble du *E72.1*
- Hydrates carbone
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E74.9*
- - ¬ anomalie
- - - *E74*
- - - Précisées du *E74.8*
- Lipides ¬ Démence au cours de trouble cérébral du *E75.6†, F02.8**
- Lipoprotéines
- - Lipidémies ¬ Anomalies du *E78*
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E78.9*
- - ¬ Autres anomalies du *E78.8*
- Lysine et de l'hydroxylysine ¬ Anomalies du *E72.3*
- Magnésium ¬ Anomalies du *E83.4*
- Minéraux
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E83.9*
- - ¬ Autres anomalies du *E83.8*
- Nucléotides ¬ Anémie due à des anomalies du *D55.3*
- Ornithine ¬ Anomalies du *E72.4*
- Pentoses-phosphates ¬ Trouble du *E74.8*
- Phosphore phosphatase
- - Sans précision ¬ Anomalies du *E83.39*
- - ¬ anomalie
- - - *E83.3*
- - - *E83.38*
- Potassium ¬ Déséquilibre du *E87.8*
- Protéines plasmatiques, non classés ailleurs ¬ Anomalies du *E88.0*
- Purine pyrimidine
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E79.9*
- - ¬ anomalie
- - - *E79*
- - - *E79.8*
- Pyruvate
- - Gluconéogenèse ¬ Anomalies du *E74.4*

Métabolisme *–suite*
- Pyruvate *–suite*
- - ¬ Trouble du *E74.4*
- Sérine ¬ Trouble du *E72.8*
- Sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides ¬ Anomalies du *E75*
- Thréonine ¬ Trouble du *E72.8*
- Tryptophane ¬ Anomalies du *E70.8*
- Tyrosine ¬ Anomalies du *E70.2*
- Valine ¬ Trouble du *E71.1*
- Zinc ¬ Anomalies du *E83.2*
- ¬ Affections (des): glandes endocrines et du *Z13.8*

Métacarpe
- Base ¬ Fracture d'un autre os du *S62.31*
- Col ¬ Fracture d'un autre os du *S62.33*
- Diaphyse ¬ Fracture d'un autre os du *S62.32*
- Doigt ¬ Fracture du *S62.8*
- Partie non précisée ¬ Fracture d'un autre os du *S62.30*
- Tête ¬ Fracture d'un autre os du *S62.34*
- ¬ Fracture d'un autre os du *S62.3*

Métacarpien
v.a. carpo-métacarpien
- Base ¬ Fracture du premier *S62.21*
- Col ¬ Fracture du premier *S62.23*
- Diaphyse ¬ Fracture du premier *S62.22*
- Mauclaire] ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): têtes *M92.2*
- Métatarsiennes ¬ Syndrome de surdité-anomalies génitales-synostoses *Q87.8*
- Partie non précisée ¬ Fracture du premier *S62.20*
- Tête ¬ Fracture du premier *S62.24*
- ¬
- - Fracture
- - - Multiples des *S62.4*
- - - Premier *S62.2*
- - Syndrome de lissencéphalie type 3 dysplasie *Q04.3*

Métacarpo-phalangien
- Interphalangienne ¬ Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations *S63.4*
- ¬
- - Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) *S63.61*
- - Luxation du doigt: (Articulation) *S63.11*

Métachondromatose ¬ *Q78.4*

Métachromatique ¬
- Leucodystrophie *E75.2*
- Leucoencéphalopathie *E75.2*
- Maladie de Greenfield [Leucodystrophie *E75.2*

Métagonimiase ¬ *B66.8*

Métal
- Lourd
- - Sang ¬ Présence d'un taux anormalement élevé de *R78.7*

Métal *–suite*
- Lourd *–suite*
- - Urines ¬ Taux anormal de *R82.6*
- - ¬
- - - Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des *N14*
- - - Hypersensibilité aux *T78.4*
- - - Intoxication
- - - - *T56.9*
- - - - Nucléides transuraniens de *T66*
- - - Néphropathie due à des *N14.3*
- Sans précision ¬ Effet toxique: *T56.9*
- Toutes origines, sauf substances médicamenteuses ¬ *T56*
- ¬
- - Dermite allergique de contact due aux *L23.0*
- - Effet toxique
- - - *T56*
- - - *T56.8*
- - Fumées et vapeurs de *T56*

Métamérique artérioveineux
- Cérébro-facial
- - Type
- - - 1 ¬ Syndrome *Q28.28*
- - - 3 ¬ Syndrome *Q28.28*
- - ¬ Syndrome *Q28.28*
- Spinal ¬ Syndrome *Q27.3*

Métamorphopsie ¬ *H53.1*

Métaphysaire
- Type
- - Braun-Tinschert ¬ Dysplasie *Q78.5*
- - Jansen ¬ Chondrodysplasie *Q78.5*
- - Kaitila ¬ Chondrodysplasie *Q78.5*
- - McKusick ¬ Chondrodysplasie *Q78.5*
- - Schmid ¬ Chondrodysplasie *Q78.5*
- - Spahr ¬ Chondrodysplasie *Q78.5*
- ¬
- - Acroscyphodysplasie *Q78.5*
- - Anadysplasie *Q78.5*
- - Dysplasie *Q78.5*

Métaplasie
- Glandes apocrines du sein ¬ *N60.8*
- Myéloïde ¬
- - Myélofibrose (idiopathique) (avec *D47.4*
- - Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec *D47.4*

Métaplasique du sein ¬ Carcinome *C50.9*

Métapneumovirus humain ¬
- *B97.8!*
- Bronchiolite aiguë au *J21.1*
- Bronchite à *J20.8*
- Encéphalite à *A85.8†, G05.1**
- Pneumonie due au *J12.3*

Métaraminol ¬ *T44.4*

Métastase
- Cutanée non-mélanome ¬ *C79.2*
- Ganglionnaire
- - Inguinale rétropéritonéale ¬ *C77.8*
- - Médiastinale ¬ *C77.1*
- - Susclaviculaire ¬ *C77.0*
- Ombilicale ¬ *C79.2*
- Sur tissu conjonctif ¬ *C79.88*
- ¬ Fracture vertébrale due à une *C79.5†, M49.59**

Métastatique ¬
- Fracture *C79.5†, M90.79**
- Tumeur neuroendocrinienne *C80.9*

Métastrongylose ¬ *B83.8*

Métatarsalgie
- Morton ¬ *G57.6*
- ¬ *M77.4*

Métatarse ¬
- Fracture
- - Os du *S92.3*
- - Ouverte du *S92.3, S91.87!*
- Malformation acquise du *M21.68*
- Ostéochondrite juvénile du *M92.7*
- Raccourcissement acquise du *M21.68*

Métatarsien
- Iselin] ¬ Ostéochondrite (juvénile) du: cinquième *M92.7*
- Maladie de Freiberg] ¬ Ostéochondrite (juvénile) du: deuxième *M92.7*
- Os), articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: *S93.34*
- ¬ Syndrome de surdité-anomalies génitales-synostoses métacarpiennes et *Q87.8*

Métatarsophalangien
- Gros orteil ¬ Arthroplastie *Z96.68*
- S) ¬ Articulation(s): *S93.5*
- ¬ Luxation d'un (des) orteil(s): (Articulation) *S93.11*

Metatarsus
- Valgus ¬ *Q66.6*
- Varus
- - Acquis ¬ Pied en *M21.68*
- - ¬ *Q66.2*

Métatropique ¬ Dysplasie *Q77.8*

Météorisme ¬ *R14*

Météorologiques) ¬ Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions *W94.9!*

Méthadone ¬
- Intoxication: *T40.3*
- Traitement de substitution à la *Z51.83*

Méthamphétamine ¬
- Consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la *U69.34!*
- Utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la *U69.33!*

Méthanol ¬
- Effet toxique: *T51.1*
- Intoxication au *T51.1*

Méthaqualone ¬
- *T42.6*
- Intoxication à la *T42.6*

Méthémoglobinémie
- Acquise (avec sulfhémoglobinémie) ¬ *D74.8*
- Congénitale ¬ *D74.0*
- Héréditaire ¬ *D74.0*
- Sans précision ¬ *D74.9*
- Toxique ¬ *D74.8*
- ¬
- - *D74*
- - *D74.8*

Méthicilline ¬ Staphylocoque doré résistant à la *U80.0!*

Méthimazole ¬ Embryofœtopathie au *Q86.88*

Méthionine
- Adénosyltransférase ¬ Démyélinisation du cerveau par déficit en *E72.1*
- Synthase
- - Type cblG ¬ Déficit fonctionnel en *E72.1*
- - ¬ Déficit fonctionnel en *E72.1*
- ¬
- - Syndrome de malabsorption de la *E72.1*
- - Trouble du métabolisme du cycle de la *E72.1*

Méthioninémie ¬ *E72.1*

Méthode
- Fécondation assistée ¬ Autres *Z31.3*
- Physique ¬ Dépistage prénatal
- - Malformations par échographie et autres *Z36.3*
- - Retard de croissance du fœtus par échographie et autres *Z36.4*
- Spécial exploration
- - Infections principalement transmises lors des rapports sexuels ¬ *Z11*
- - Maladies intestinales d'origine infectieuse ¬ *Z11*
- - Protozooses et helminthiases ¬ *Z11*
- - Tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes ¬ *Z11*
- - VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales ¬ *Z11*

Méthyl
v. alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA

Méthylacyl
v. alpha-méthylacyl-CoA

Méthylbenzène] ¬ Toluène [*T52.2*

Méthylbutyrique ¬ Acidurie 2- *E71.1*

Méthylbutyryl-CoA déshydrogénase ¬
- Déficit en 2- *E71.1*
- Retard de développement par déficit en 2- *E71.1*

Méthylcobalamine
- Type

Méthylcobalamine *–suite*
- Type *–suite*
- - CblE ¬ Déficit en *E72.1*
- - CblG ¬ Déficit en *E72.1*
- ¬ Déficit en *E72.1*

Méthylcrotonyl glycinurie ¬ 3- *E71.1*

Méthylcrotonyl-CoA carboxylase ¬ Déficit en 3- *E71.1*

Méthyle ¬ Anomalie du transfert cytosolique du groupement *E72.1*

Méthylène
- Tétrahydrofolate réductase ¬
- - Déficit en *E72.1*
- - Homocystinurie déficit
- - - *E72.1*
- ¬ Chlorure de *T53.4*

Méthylglutaconique type
- 1 ¬ Acidurie 3- *E71.1*
- 2 ¬ Acidurie 3- *E71.1*
- 3 ¬ Acidurie 3- *E71.1*
- 4 ¬ Acidurie 3- *E71.1*
- 5 ¬ Acidurie 3- *E71.1†, I43.1**
- 7 ¬ Acidurie 3- *E71.1*

Méthylglutaconyl-CoA hydratase ¬ Déficit en 3- *E71.1*

Méthylglutaryl
v. hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA

Méthylique ¬ Alcool *T51.1*

Méthylmalonate semialdéhyde déshydrogénase ¬ Retard de développement par déficit en *E71.1*

Méthylmalonique
- Déficit
- - Méthylmalonyl-CoA épimérase ¬ Acidurie *E71.1*
- - Récepteur de la transcobalamine ¬ Acidurie *E71.1*
- Résistant vitamine B12 ¬
- - Acidémie *E71.1*
- - Acidurie *E71.1*
- Sensible vitamine B12
- - Type
- - - CblA ¬ Acidurie *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidémie *E71.1*
- - ¬
- - - Acidémie *E71.1*
- - - Acidurie *E71.1*
- ¬
- - Acidémie: *E71.1*
- - Acidose lactique fatale avec acidurie *E71.1, E87.2*

Méthylmalonyl-CoA
- Épimérase ¬ Acidurie méthylmalonique par déficit en *E71.1*
- Mutase ¬ Déficit partiel en *E71.1*

Méthylmalonyl-CoA mutase ¬ Déficit complet en *E71.1*

Méthyloxydase type I ¬ Déficit en corticostérone *E27.4*

Méthyltransférase) ¬ Déficit congénital en TPMT (thiopurine *E88.8*

Méticilline
- Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la *U80.00!*
- MRSA] ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la *U80.00!*
- ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones non résistant à l'oxacilline ou à la *U80.01!*

Métrite ¬
- *N71*
- Endo(myo) *N71*

Métrorragie
- Climatérique ¬ Ménorragie ou *N92.4*
- Ménopausique ¬ Ménorragie ou *N92.4*
- Préclimatérique ¬ Ménorragie ou *N92.4*
- Préménopausique ¬ Ménorragie ou *N92.4*
- ¬
- - *N92.1*
- - Ménorragie, polyménorrhée et *N92*

Mettre les doigts dans le nez ¬ Se *F98.88*

Meulengracht ¬ Syndrome de Gilbert *E80.4*

Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.3*

Mévalonate kinase ¬ Déficit
- Complet en *E88.8*
- Partiel en *D89.9*

Mévalonique ¬ Acidurie *E88.8*

Meyer
v.a. Say-Meyer
- ¬ Dysplasie de la tête du fémur type *Q78.8*

MFDM ¬ Syndrome *Q87.8*

MFS ¬ *Q87.4*

MFS1 ¬ *Q87.4*

MFS2 ¬ *Q87.4*

MGF], type non précisé ¬ Female genital mutilation [*Z91.70*

MHA ¬ *D72.0*

MHF ¬ *A98.3*

Miastenica congenita ¬ Syndrome *G70.2*

Mibelli ¬ Porokératose de *Q82.8*

Micheli
v. Marchiafava-Micheli

Michels
v. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

Micro
- Embolie rétinienne ¬ *H34.2*
- Encéphale ¬ *Q02*
- Papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (*A66.2*
- ¬ Syndrome *Q04.3*

Micro-anévrisme
- Diabétique de la rétine ¬ *E14.30†, H36.0**

Micro-anévrisme *–suite*
- Rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*

Microangiopathie
- Conjonctive dû au VIH ¬ Syndrome de *B23.8, M31.1*
- Diabétique diabète sucré type
- - 1 ¬ *E10.50†, I79.2**
- - 2 ¬ *E11.50†, I79.2**
- Macro-angiopathie ¬ Diabète sucré avec *E14.50†, I79.2**
- Rétine dû au VIH ¬ Syndrome de *B23.8, H35.0*
- Thrombotique ¬ *M31.1*

Microbiologique des urines ¬ Résultats anormaux de l'examen *R82.7*

Microbrachycéphalie-ptosis-fente labiale ¬ Syndrome de *Q87.8*

Microcéphalie
v.a. achalasie-microcéphalie
v.a. aphalangie-syndactylie-microcéphalie
- Albinisme-anomalies digitales ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Autosomique récessive ¬ Syndrome de choriorétinopathie- *Q87.8*
- Corps calleux fin-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Craniosténose-dermatite sévère ¬ Syndrome d'agammaglobulinémie- *D80.0*
- Dysplasie squelettique ¬ Syndrome d'épilepsie- *Q87.8*
- Épilepsie-déficience intellectuelle-cardiopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Fente palatine-pigmentation rétinienne anormale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Fusions des vertèbres cervicales ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Létale type Amish ¬ *Q02*
- Maladie congénitale à virus Zika ¬ *P35.4*
- Malformation capillaire ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Microcornée type Seemanova ¬ *Q87.8*
- Post-natale progressive ¬ Syndrome tétraplégie spastique-corps calleux fin- *Q02*
- Retard de croissance-sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné- *D81.1*
- Surdité-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Tétraplégie ¬ Syndrome d'ichtyose congénitale- *Q87.8*
- ¬ *Q02*

Microcéphalie-cardiomyopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Microcéphalie-cardiopathie-malsegmentation pulmonaire ¬ Syndrome de *Q87.8*

Microcéphalie-facio-cardio-squelettique, type Hadziselimovic ¬ Syndrome de *Q87.8*

Microcéphalie-lymphœdème-choriorétinopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Microcéphalique
- Ostéodysplasique primordial type
- - I ¬ Nanisme *Q87.1*

Microcéphalique *–suite*
- Ostéodysplasique primordial type *–suite*
- - II ¬ Nanisme *Q87.1*
- - III ¬ Nanisme *Q87.1*
- Type Saul-Wilson ¬ Dysplasie ostéodysplasique *Q87.5*

Microcheilie ¬ *Q18.7*

Microcôlon
- Mégavessie ¬ Syndrome d'hypopéristaltisme intestinal- *Q43.8*
- ¬ *Q43.8*

Microcornée
- Type Seemanova ¬ Microcéphalie- *Q87.8*
- ¬ *Q13.4*

Microcristaux
- Cours
- - Hyperparathyroïdie ¬ Arthropathie due à des *E21.3†, M14.19**
- - Troubles métaboliques classés ailleurs ¬ Arthropathie à *M14.1**
- Précisés ¬ Autres arthropathies dues à des *M11.8*
- Sans précision ¬ Arthropathie due à des *M11.9*
- ¬ Autres arthropathies dues à des *M11*

Microcystoïde ¬ Dégénérescence rétinienne: *H35.4*

Microdélétion
- 1p35.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 1q21.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 1q41q42 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 1q44 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2p15p16.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2q23.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2q31.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2q33.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 3p25.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 3q29 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 4q21 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 5q14.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 7q31 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 8p23.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 8q21.11 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 9q22.3 ¬ *Q93.5*
- 11p15 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une *Q87.3*
- 12q14 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 14q12 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 14q22q23 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 15q11.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 15q13.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 15q24 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 16p11.2 proximale ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 16p11.2p12.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 16p13.11 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 16q24.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 17q12 ¬ Syndrome de *Q93.5*

Microdélétion *–suite*
- 19q13.11 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 20p12
- - 3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- - ¬ Syndrome d'Alagille dû à une *Q44.7*
- 22q11.2 distale ¬ Syndrome de *Q93.5*
- Xp22.3 ¬ Syndrome de *Q99.8*

Microdélétion-neurofibromatose type 1 ¬ Syndrome de *Q85.0*

Microdélétion-NF1 ¬ Syndrome de *Q85.0*

Microdontie ¬
- *K00.2*
- Surdité avec aplasie du labyrinthe, microtie et *Q16.5*

Microduplication
- 1q21.1 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 3q29 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 5p13 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 5q35 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 7q11.23 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 8q12 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 10q22.3q23.3 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 11p15.4 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 15q11q13 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 16p13.11 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 17p11.2 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 17q12 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 17q21.31 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 22q11.2
- - Distale ¬ Syndrome de *Q92.3*
- - ¬ Syndrome de *Q92.3*

Microgastrie
- Anomalie des membres ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬ *Q40.2*

Microgliome ¬ *C85.7*

Microglossie ¬ *Q38.3*

Micrognathie
- Mandibulaire) (maxillaire) ¬ *K07.0*
- ¬ Syndrome
- - Agénésie du corps calleux avec déficience intellectuelle, colobome et *Q87.8*
- - Fusion splénogonadique-anomalie transversale des membres- *Q87.8*

Microgyrie ¬ *Q04.3*

Micro-hémorragie ¬ *R58*

Microkystique
- Tissulaire infiltrante ¬ Malformation lymphatique *D18.19*
- ¬ Adénome
- - *D13.6*
- - Pancréatique *D13.6*

Microlissencéphalie ¬ *Q04.3*

Microlithiase alvéolaire du poumon ¬ *J84.0*

Micromastie
- Développement insuffisant des glandes mammaires] ¬ *Q83.88*

Micromastie *–suite*

- ¬ *Q83.88*

Micromélie ¬

- *Q73.8*
- Déficit immunitaire avec *D82.2*

Micronodulaire ¬ Cirrhose (du foie): *K74.6*

Micro-organisme

- Aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.90!*
- Anaérobies
- - Gram
- - - Négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus fragilis et autres *B96.6!*
- - - Positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.91!*
- - Sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres *B96.7!*
- - ¬ Septicémie à *A41.4*
- Développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres *J67.7*
- Gram
- - Négatif
- - - Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ *U81!*
- - - SAI ¬ Septicémie à *A41.5*
- - - ¬
- - - - Choc septique à *A41.58, R57.2*
- - - - Septicémie
- - - - - *A41.5*
- - - - - *A41.58*
- - Positif
- - - Précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.9!*
- - - Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ *U80!*
- Infectieux
- - Non classée ailleurs ¬ Pneumonie due à d'autres *J16*
- - Précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B98!*
- - ¬ Pneumonie due à d'autres *J16.8*
- Non précis ¬ Pneumonie
- - *J18*
- - *J18.8*
- Précis ¬
- - Amygdalite aiguë due à d'autres *J03.8*
- - Bronchiolite aiguë due à d'autres *J21.8*
- - Bronchite aiguë due à d'autres *J20.8*
- - Pharyngite aiguë due à d'autres *J02.8*
- Toute localisation] ¬ Impétigo [tout *L01.0*
- ¬ Pneumonie congénitale due à d'autres *P23.8*

Microphakia ¬ Isolated *Q12.8*

Microphtalmie

- Ankyloblépharon-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q11.2*
- Atrophie cérébrale ¬ Syndrome de *Q11.2*
- Colobomateuse-obésité-hypogénitalisme-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Fente palatine ¬ Syndrome de macrosomie- *Q87.0*
- Fryns ¬ Syndrome *Q87.8*
- Kyste colobomateux ¬ Syndrome de *Q11.2*
- Macrophtalmie ¬ Anophtalmie, *Q11*
- Syndromique type 5 ¬ *Q11.2*
- Type Lenz ¬ *Q11.2*
- ¬
- - *Q11.2*
- - Syndrome d'arhinie-atrésie des choanes- *Q87.0*

Micropolyangéite microscopique ¬ *M31.7*

Microscopique

- Collagène ou lymphocytaire) ¬ Colite *K52.8*
- Expectoration sans culture procédé biologie moléculaire ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen *A15.0*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen *A15.0*
- ¬
- - Micropolyangéite *M31.7*
- - MPA [polyangite *M31.7*
- - Polyartérite *M31.7*

Microsomie

- Cranio-faciale ¬ *Q87.0*
- Latéro-faciale ¬ *Q87.0*

Microsporosis nigra ¬ *B36.1*

Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les espèces appartenant aux genres Epidermophyton, *B35*

Microstomie ¬ *Q18.5*

Microtie

- Anomalies squelettiques-petite taille ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Microdontie ¬ Surdité avec aplasie du labyrinthe, *Q16.5*
- ¬ *Q17.2*

Microtropie ¬ *H50.4*

Microvillositaire congénitale ¬ Atrophie *K90.8*

Micro-Warburg ¬ Syndrome *Q04.3*

Miction

- Douloureuse, sans précision ¬ *R30.9*
- Fréquente ¬
- - *R35*
- - Formes psychogènes de: *F45.3*

Miction *–suite*

- Ralentie ¬ *R39.1*
- SAI ¬ Douleurs à la *R30.9*
- ¬
- - Douleur à la *R30*
- - Fractionnement de la *R39.1*
- - Troubles de la *R39.1*

Mictionnelle ¬ Syncope *R55*

Mid-aortic"" ¬ Syndrome *Q25.1*

MIDAS ¬ Syndrome *Q11.2*

Miel ¬ Dystrophie cornéenne en rayon de *H18.5*

Migraine

- Aura
- - Migraine classique] ¬ *G43.1*
- - Prolongée ¬ *G43.1*
- - Sans céphalée ¬ *G43.1*
- - Typique ¬ *G43.1*
- Basilaire ¬ *G43.1*
- Classique] ¬ Migraine avec aura [*G43.1*
- Commune] ¬ Migraine sans aura [*G43.0*
- Compliquée ¬ *G43.3*
- Équivalents migraineux ¬ *G43.1*
- Familiale, hémiplégique ¬ *G43.1*
- Installation aiguë de l'aura ¬ *G43.1*
- Ophtalmoplégique ¬ *G43.8*
- Rétinienne ¬ *G43.8*
- Sans
- - Aura [migraine commune] ¬ *G43.0*
- - Précision ¬ *G43.9*
- ¬
- - *G43.8*
- - Céphalée unilatérale dans le sens d'une *G43.9*
- - Hémicrânie dans le sens d'une *G43.9*

Migraineux ¬

- État de mal *G43.2*
- Migraine: équivalents *G43.1*
- Névralgie *G44.0*

Migrans

- Cutané
- - SAI ¬ Larva *B76.9*
- - ¬ Larva *B76.9*
- Viscérale ¬ Larva *B83.0*

Migrant

- Rouget du porc] ¬ Érythème *A26.0*
- ¬ Dermatite *B83.1*

Migrateur à Borrelia burgdorferi ¬ Érythème chronique *A69.2*

Migration du testicule ¬ *Q55.2*

Migratoire bénigne ¬ Glossite: *K14.1*

Migratrice ¬ Thrombophlébite *I82.1*

Mikity ¬ Syndrome de Wilson- *P27.0*

Mikulicz ¬ Maladie de *K11.8*

Miles-Carpenter ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Miliaire
- Aigu
- - Localisation unique et précisée ¬ Tuberculose *A19.0*
- - Sans précision ¬ Tuberculose *A19.2*
- - Sièges multiples ¬ Tuberculose *A19.1*
- Apocrine ¬ *L75.2*
- Cristalline ¬ *L74.1*
- Nécrosante ¬ Acné *L70.2*
- Profonde ¬ *L74.2*
- Rouge ¬ *L74.0*
- Sans précision ¬
- - *L74.3*
- - Tuberculose *A19.9*
- Tropicale ¬ *L74.2*
- Viscères NCA ¬ Tuberculose *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Pneumonie *J18.8*
- - Tuberculoses *A19.8*

Milieu
- Familial ¬ Trouble des conduites limité au *F91.0*
- Isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour protéger le sujet de son *Z29.0*

Millard-Gubler ¬ Syndrome de *I67.9†, G46.3**

Millard-Gubler-Foville ¬ Paralysie de *I67.9†, G46.3**

Miller
v. Say-Barber-Miller
- Fisher ¬ Syndrome de *G61.0*

Miller-Dieker ¬ Syndrome de *Q93.5*

Milroy
v. Nonne-Milroy

Minamata ¬ Maladie de *T56.1*

Minérale ¬
- Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres *J61*
- Taux anormal de: substance *R79.0*

Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes ¬ Intoxication: *T50.0*

Minéraux
- Sang ¬ Taux anormal de *R79.0*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E83.9*
- ¬ Autres anomalies du métabolisme des *E83.8*

Mingarelli
v. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

Mini-core" ¬ Myopathie: de type: " *G71.2*

Minimale ¬
- Leucémie
- - Aiguë myéloblastique avec différenciation *C92.00*
- - Myéloïde aiguë à différenciation *C92.0*
- Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux stéroïdes avec lésions *N04.0*

Minkowski-Chauffard ¬ Syndrome de *D58.0*

Miotique ¬ Kyste pupillaire *H21.2*

Mirabilis
- Agent pathogène ¬ Proteus *B96.2!*
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Proteus *U81.07!*
- - 3MRGN ¬ Proteus *U81.27!*
- - 4MRGN ¬ Proteus *U81.47!*

MIRAS ¬ *G11.8*

Miroir
- Congénitaux familiaux ¬ Mouvements en *G25.88*
- Segmentation vertébrale-anomalies des membres ¬ Syndrome de polydactylie en *Q87.2*
- Situs inversus ¬ Disposition auriculaire en *Q89.3*
- ¬ Polydactylie en *Q69.9*

Missouri ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Mitis ¬ Prurigo (de): *L28.2*

Mitochondrial
- Acidose lactique par déficit en MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique *I42.2*
- Anémie sidéroblastique ¬ Myopathie *G71.3*
- Autosomique dominante avec intolérance à l'effort ¬ Myopathie *G71.3*
- Défaut de synthèse des protéines mitochondriales ¬ Maladie *E88.8*
- Déficit réversible en COX ¬ Myopathie *G71.3*
- Encéphalopathie, acidose lactique et épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie *G31.81*
- Forme encéphalomyopathique avec tubulopathie rénale ¬ Déplétion de l'ADN *G31.81†, N16.8**
- Létale infantile ¬ Myopathy *G71.3*
- Neuro-gastro-intestinale ¬ Encéphalomyopathie *G31.81*
- Non classée ailleurs ¬ Myopathie *G71.3*
- Récessive ¬ Syndrome d'ataxie *G11.8*
- Sévère liée à l'X ¬ Encéphalomyopathie *G31.81*
- ¬
- - Cardiomyopathie hypertrophique
- - - Infantile létale par déficit en complexe I de la chaîne respiratoire *I42.2*
- - - Tubulopathie dues à une mutation de l'ADN *I42.2*
- - Cytopathie *G31.81*
- - Déficit
- - - Acétoacétyl-CoA thiolase *E71.1*
- - - Isolé complexe
- - - - I de la chaîne respiratoire *G31.81*
- - - - IV de la chaîne respiratoire *G31.81*
- - - - V de la chaîne respiratoire *G31.81*
- - Insuffisance hépatique infantile aiguë par défaut de synthèse des protéines codées par l'ADN *K72.0*
- - Maladie mitochondriale par défaut de synthèse des protéines *E88.8*

Mitochondrial *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Myoencéphalopathie *G31.81*
- - Neurodégénérescence associée à la protéine de membrane *G23.0*
- - Surdité neurosensorielle non syndromique *H90.5*
- - Syndrome de cataracte congénitale-cardiomyopathie hypertrophique-myopathie *Q87.8*

Mitochondriopathie ¬
- *G31.81*
- Myopathie cardiosquelettique avec neutropénie et *E71.1*

Mitotique ¬
- Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q93.1*
- Trisomie
- - 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q91.5*
- - 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q91.1*
- - 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q90.1*
- - Chromosome entier mosaïque chromosomique non-disjonction
- - - *Q92.1*

Mitral
- Accessoire ¬ Tissu valvulaire *Q23.8*
- Aortique
- - Combinées ¬ Atteintes des valves *I08.0*
- - Précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée ¬ Lésions des valves *I08.0*
- - Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des valves *I08.3*
- Chronique) SAI ¬ Atteinte (valvulaire) *I05.9*
- Congénital ¬
- - Atrésie *Q23.2*
- - Insuffisance *Q23.3*
- - Rétrécissement *Q23.2*
- - Sténose *Q23.2*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la valvule *I39.0**
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypogonadisme-prolapsus de la valve *Q87.8*
- E
- - Rhumatismal(e) ¬ Reflux *I05.1*
- - SAI cause précis sauf rhumatismal ¬
- - - Insuffisance (de la valvule) *I34.0*
- - - Régurgitation (de la valvule) *I34.0*
- - ¬ Prolapsus (de la valvule) *I34.1*
- Familial ¬ Prolapsus valvulaire *I34.1*
- Insuffisance
- - Mitrale ¬ Sténose non rhumatismale de la valvule *I34.80*
- - Régurgitation ¬ Sténose *I05.2*
- - ¬ Sténose *I05.2*

Mitral *–suite*
- Rhumatismale ¬ Insuffisance *I05.1*
- Sans précision ¬
- - Atteinte non rhumatismale de la valvule *I34.9*
- - Maladie de la valvule *I05.9*
- - Malformation congénitale des valvules aortique et *Q23.9*
- Subvalvulaire ¬ Anomalie de l'appareil *Q23.8*
- Syphilitique ¬ Sténose *A52.0†, I39.0**
- Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des valves *I08.1*
- ¬
- - Affection
- - - Non rhumatismales des valves *I34.88*
- - - Valve *I05.8*
- - Anneau supravalvulaire *Q23.2*
- - Anomalie de l'appareil sous-valvulaire *Q23.3*
- - Atrésie *Q23.2*
- - Atteinte non rhumatismal valvule
- - - *I34*
- - - *I34.8*
- - Double orifice de la valve *Q23.8*
- - Endocardite tuberculeuse de la valve *A18.8†, I39.0**
- - Hypoplasie de l'anneau *Q23.2*
- - Inflammation syphilitique de la valve *A52.0†, I39.0**
- - Insuffisance (de la valvule) *I34.0*
- - Maladie
- - - Rhumatismales de la valvule *I05*
- - - Valvule *I05.8*
- - Malformations congénitales des valvules aortique et *Q23.8*
- - Overriding de la valve *Q23.8*
- - Rétrécissement (rhumatismal) de la valvule *I05.0*
- - Sclérose rhumatismale de la valve *I05.8*
- - Sténose
- - - *I05.0*
- - - Non rhumatismal valvule
- - - - *I34.2*
- - - - Mitrale avec insuffisance *I34.80*
- - Straddling de la valve *Q23.8*
- - Syndrome de Barlow [prolapsus *I34.1*
- - Valvulite syphilitique de la valve *A52.0†, I39.0**
- - Valvulopathie *I05.8*

Miyoshi ¬ Myopathie distale type *G71.0*

MLD ¬ *E75.2*

MLL ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec altérations du gène *C92.6*

MMEP ¬ Syndrome *Q87.8*

MMSE
- 0-16 points ¬ *U51.22*
- 17-23 points ¬ *U51.12*
- 24-30 points ¬ *U51.02*

MNGIE ¬ *G31.81*

MOA maladie occlusif artériel ¬ Diabète sucré
- *E14.50†, I79.2**
- Type
- - 1 avec *E10.50†, I79.2**
- - 2 avec *E11.50†, I79.2**

Mobbing ¬ *Z60*

Mobilité restreinte ¬ Difficultés liées à: dépendance due à une *Z74.0*

Möbitz, type I et II ¬ Bloc (de) (du): *I44.1*

Modification
- Aigu
- - Peau rayons ultraviolet
- - - Sans précision ¬ *L56.9*
- - - ¬ Autres *L56*
- - Précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets ¬ Autres *L56.8*
- Conscience
- - Comportant souvent des automatismes ¬ Crises: avec *G40.2*
- - ¬ Crises: ne comportant pas de *G40.1*
- Durable personnalité
- - Expérience de catastrophe ¬ *F62.0*
- - Liée à un syndrome algique chronique ¬ *F62.80*
- - Maladie psychiatrique ¬ *F62.1*
- - Non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales ¬ *F62*
- - Sans précision ¬ *F62.9*
- - ¬
- - - *F62.8*
- - - *F62.88*
- Hormonales ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- Peau
- - Exposition chronique rayonnement non ionisant
- - - Sans précision ¬ *L57.9*
- - - ¬ Autres *L57.8*
- - Non précisées ¬ *R23.8*
- - ¬ Autres *R23*
- Personnalité
- - Captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment ¬ *F62.0*
- - Désastres ¬ *F62.0*
- - Expériences de camp de concentration ¬ *F62.0*
- - Exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ *F62.0*
- - Torture ¬ *F62.0*
- Précisées des taux de protéines plasmatiques ¬ Autres *R77.88*
- Qualitatives des plaquettes ¬ *D69.1*
- Squelette ¬ Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres *Q87.5*
- Taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA] ¬ *R77.80*

Modification *–suite*
- Teinte des tissus dentaires durs après l'éruption ¬ *K03.7*
- Temporaire du seuil auditif ¬ *H93.2*
- Tissu cutané ¬ *R23.4*
- Transit intestinal ¬ *R19.4*

MODY ¬ *E11.90*

MODY5 ¬ *E11.20†, N29.8**

Mœbius ¬ Syndrome
- *Q87.0*

Moelle
- Cervical
- - C1 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.71!*
- - C2 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.72!*
- - C3 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.73!*
- - C4 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.74!*
- - C5 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.75!*
- - C6 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.76!*
- - C7 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.77!*
- - C8 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.78!*
- - Lésion transversale incomplète) ¬ Lésion centrale de la *S14.12*
- - Niveau SAI ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.70!*
- - Non précisées ¬ Lésions traumatiques de la *S14.1*
- - SAI ¬
- - - *S14.70!*
- - - Lésion de la *S14.10*
- - ¬
- - - Contusion et œdème de la *S14.0*
- - - Lésion transversale
- - - - Complète de la *S14.11*
- - - - Incomplètes de la *S14.13*
- - - Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.7!*
- Dorsal
- - D1 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.71!*
- - D10/D11 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.76!*
- - D12 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.77!*
- - D2/D3 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.72!*
- - D4/D5 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.73!*
- - D6/D7 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.74!*
- - D8/D9 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.75!*
- - Lésion transversale incomplète) ¬ Lésion centrale de la *S24.12*

Moelle *–suite*
- Dorsal *–suite*
- - Niveau SAI ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.70!*
- - SAI ¬
- - - *S24.70!*
- - - Lésions transversales incomplètes de la *S24.12*
- - ¬
- - - Contusion et œdème de la *S24.0*
- - - Lésion
- - - - Transversale complète de la *S24.11*
- - - - Traumatiques autres et non précisées de la *S24.1*
- - - Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.7!*
- Épinière
- - C1-C3 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.60!*
- - C4-C5 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.61!*
- - C6-C8 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.62!*
- - Cervicale ¬ Multiples blessures de la *S14.10*
- - Cours
- - - Carence en vitamine B12 ¬ Dégénérescence combinée subaiguë de la *E53.8†, G32.0**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ Dégénérescence combinée subaiguë de la *G32.0**
- - D11-L1 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.65!*
- - D1-D6 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.63!*
- - D7-D10 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.64!*
- - Embolique) (non embolique) ¬ Infarctus aigu de la *G95.18*
- - Hernie discale cervicale ¬ Compression de la *M50.0†, G99.2**
- - L2-S1 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.66!*
- - Lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique des nerfs et de la *S34*
- - Méninges ¬
- - - Anomalie congénitale SAI de la *Q06.9*
- - - Lésion congénitale SAI de la *Q06.9*
- - - Maladie congénitale SAI de la *Q06.9*
- - Nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne de la *C72*
- - Niveau
- - - Cou ¬ Lésion traumatique
- - - - Cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la *T06.0*
- - - - Nerfs et de la *S14*
- - - Non précisé ¬ Lésion traumatique de la *T09.3*

Moelle *–suite*
- Épinière *–suite*
- - Niveau *–suite*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique des nerfs et de la *S24*
- - Non précisée ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.69!*
- - Plusieurs autres parties du corps ¬ Lésions traumatiques des nerfs et de la *T06.1*
- - S2-S5 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.67!*
- - Sans précision ¬
- - - Affection de la *G95.9*
- - - Malformation congénitale de la *Q06.9*
- - Toute localisation] ¬ Abcès (embolique) de la *G06.1*
- - Traumatisme obstétrical
- - - Non précisé ¬ Lésion du rachis et de la *P11.59*
- - - Paraplégie
- - - - Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la *P11.50*
- - - - Chronique ¬ Lésion du rachis et de la *P11.51*
- - - ¬ Lésion du rachis et de la *P11.5*
- - ¬
- - - Abcès à staphylocoques de la *G06.1, B95.8!*
- - - Affection
- - - - *G95*
- - - - Précisées de la *G95.8*
- - - Anémie avec dégénérescence combinée de la *D51.0†, G32.0**
- - - Compression spondylogène de la *M47.19†, G99.2**
- - - Dégénérescence
- - - - Amyloïde de la *E85.4†, G32.8**
- - - - Tuberculeuse de la *A17.8†, G07**
- - - Douleur de désafférentation liée à une lésion de la *G95.85*
- - - Dyssynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la *G95.84*
- - - Fracture
- - - - Colonne vertébrale avec lésion de la *T08.0, T09.3*
- - - - Sacrum avec lésion de la *S32.1, S34.18*
- - - - Vertèbre
- - - - - Cervicales avec lésion de la *S12.9, S14.10*
- - - - - Lombaires avec lésion de la *S32.00, S34.18*
- - - - - Thoraciques avec lésion de la *S22.00, S24.10*
- - - Gomme de la *A52.1†, G07**
- - - Hauteur fonctionnelle de la lésion de la *G82.6!*
- - - Hypoplasie et dysplasie de la *Q06.1*
- - - Infection à streptocoques de la *G04.8, B95.5!*
- - - Maladies précisées de la *G95.88*
- - - Malformation congénital

Moelle *–suite*
- Épinière *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Malformation congénital *–suite*
- - - - *Q06*
- - - - Précisées de la *Q06.8*
- - - Myélodysplasie de la *Q06.1*
- - - Œdème de la *G95.18*
- - - Paralysie de la *G83.8*
- - - Sclérose en plaques (de): *G35*
- - - Séquelles de lésion traumatique de la *T91.3*
- - - Thrombose
- - - - Artérielle de la *G95.18*
- - - - Syphilitique d'une artère de la *A52.0†, I79.8**
- - - Tuberculome de *A17.8†, G07**
- - - Tuberculose de la *A17.8†, G07**
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D33.4*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.4*
- - - - Maligne: *C72.0*
- Épinière-élévation des lactates ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie avec atteinte du tronc cérébral et de la *G31.81*
- Lombaire
- - Conus medullaris] ¬ Contusion et œdème de la *S34.0*
- - SAI ¬ *S34.70!*
- - ¬ lésion
- - - *S34.18*
- - - Transversale
- - - - Complète de la *S34.10*
- - - - Incomplète de la *S34.11*
- - - Traumatiques de la *S34.1*
- Osseux
- - Naissance, sans paraplégie ¬ Lésion de la colonne vertébrale et de la *P11.59*
- - ¬
- - - Donneur de *Z52.3*
- - - Effets toxiques de l'alcool sur la *D61.2*
- - - Fibrose de la *D47.4*
- - - Hyperplasie de la *D47.4*
- - - Lésions de la *D61.9*
- - - Tumeur malign
- - - - Envahissement de la *C79.5*
- - - - Secondaire des os et de la *C79.5*

Moersch-Woltman ¬ Syndrome de *G25.88*

Mofétil ¬ Embryopathie au mycophénolate *Q86.88*

Mohr ¬ Syndrome de *Q87.0*

Mohr-Tranebjaerg ¬ Syndrome de *G31.81*

Moignon amputation ¬
- Complications autres et non précisées au niveau d'un *T87.6*
- Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un *T87.6*

Moignon amputation ¬ *–suite*
- Hématome au niveau d'un *T87.6*
- Infection d'un *T87.4*
- Nécrose d'un *T87.5*
- Névrome sur *T87.3*
- Œdème au niveau d'un *T87.6*

Moisissure
- Actinomycètes, ou d'autre origine ¬ alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, *J67*
- Foin ¬ Maladie des *J67.0*
- Micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, *J67.7*
- ¬ Allergie aux *J30.3*

Moissonneurs ¬ Poumon des: *J67.0*

Moite ¬ Peau froide et *R23.1*

Molaire
- Racines fusionnées d'Ackerman ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Sans précision ¬ Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.9*
- ¬
- - Choc
- - - Consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.3*
- - - Septique après grossesse *O08.0, R57.2*
- - Complication
- - - Consécutif avortement grossesse extra-utérin
- - - - *O08*
- - - - *O08.8*
- - - Veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.7*
- - Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.2*
- - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.1*
- - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.0*
- - Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.4*
- - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.6*
- - Quatrième *K00.1*
- - Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.5*

Molaires-incisives [HMI] ¬ Hypominéralisation *K00.4*

Môle
- Charnue ¬ *O02.0*
- Hémorragique ¬ *O02.0*
- Hydatiforme
- - Classique ¬ *O01.0*

Môle *–suite*
- Hydatiforme *–suite*
- - Complète ¬ *O01.0*
- - Incomplète et partielle ¬ *O01.1*
- - Invasive ¬ *D39.2*
- - Maligne ¬ *D39.2*
- - Sans précision ¬ *O01.9*
- - ¬
- - - *O01.9*
- - - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de *Z35.1*
- Intra-utérine SAI ¬ *O02.0*
- Invasive ¬ *D39.2*
- Non hydatiforme ¬ Œuf clair et *O02.0*
- Vésiculaire
- - SAI ¬ *O01.9*
- - ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de *Z35.1*

Mollaret] ¬ Méningite récurrente bénigne [*G03.2*

Möller Hunter due à une carence en vitamine B ¬ Glossite de *E53.9†, K93.8**

Molluscum contagiosum
- Paupière ¬ *B08.1†, H03.1**
- ¬ *B08.1*

Molybdène
- Type A ¬ Déficit en sulfite oxydase dû à un déficit en cofacteurs du *E72.1*
- ¬
- - Anémie associée à carence en: *D53.8*
- - Carence en *E61.5*
- - Déficit en sulfite oxydase dû à un déficit en cofacteurs du *E72.1*

MOMO ¬ Syndrome *Q87.3*

Mönckeberg
- Media) ¬ Sclérose de *I70.2*
- ¬
- - Artériosclérose de *I70.29*
- - Dégénérescence de *I70.29*
- - Sclérose de *I70.29*

Mondor ¬ Maladie de *I80.88*

Monge ¬ Maladie de(s): *T70.2*

Monilethrix ¬ *Q84.1*

Monilia ¬ Vaginite à *B37.3†, N77.1**

Moniliase
- Bronchique ¬ *B37.1†, J99.8**
- Pulmonaire ¬ *B37.1†, J99.8**
- ¬
- - *B37*
- - Otomycose au cours de *B37.88†, H62.2**
- - Vulvite due à une *B37.3†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite due à une *B37.3†, N77.1**

Moniliforme ¬
- Aplasie *Q84.1*
- Lichen ruber *L44.3*

Moniliformis ¬ Infection à Streptobacillus *A25.1*

Monkeypox ¬ *B04*

Monoamine-oxydase
- A ¬ Déficit en *E70.8*
- ¬ Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la *T43.1*

Monoarthrite, non classée ailleurs ¬ *M13.1*

Monoblastique
- Monocytaire aiguë ¬ Leucémie *C93.0*
- ¬ Leucémie aiguë *C93.00*

Monochloroacétate ¬ Intoxication systémique au *T60.3*

Monochromatie à bâtonnets ¬ *H53.5*

Monochromatisme à cônes bleus ¬ *H53.5*

Monoclonale
- IgM ayant une activité anti-MAG ¬ Polyneuropathie associée à une gammopathie *D47.2†, G63.1**
- Signification indéterminée [GMSI] ¬ Gammapathie *D47.2*
- ¬ Macroglobulinémie *D47.2*

Monoculaire
- Non intermittent ¬
- - Ésotropie (alternante) (*H50.0*
- - Exotropie (alternante) (*H50.1*
- ¬
- - Atteinte
- - - Moyennement sévère de la vision *H54.6*
- - - Sévère de la vision *H54.5*
- - Cécité et forte baisse de la vision *H54.4*
- - Ésotropie [strabisme convergent] intermittente (alternante) (*H50.3*
- - Exotropie [strabisme divergens] intermittente (alternante) (*H50.3*

Monocytaire
- Aiguë ¬ Leucémie monoblastique/ *C93.0*
- Chronique ¬ Leucémie
- - *C93.1*
- - *C93.10*
- Naegeli
- - Rémission complète ¬ Leucémie *C93.11*
- - ¬ Leucémie *C93.10*
- Sans précision ¬ Leucémie *C93.9*
- ¬
- - Leucémies *C93.7*
- - Réaction leucémoïde de type: *D72.8*

Monocytes ¬ angine à *B27*

Monocytogenes ¬
- Méningite à Listeria *A32.1†, G01**
- Méningo-encéphalite à Listeria *A32.1†, G05.0**

Monocytoïde ¬
- Leucémie *C93*
- Lymphome à cellules B *C85.9*

Monocytopénie
- Syndrome de l'infection bactérienne ¬ *D81.8*
- ¬ *R72*

Monocytose (symptomatique) ¬ *D72.8*

Mononeuropathie
- Diabétique NCA ¬ *E14.40†, G59.0**
- Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G59.8**

Mononévrite
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *G59.8**
- Membre
- - Inférieur
- - - Sans précision ¬ *G57.9*
- - - ¬
- - - - *G57*
- - - - *G57.8*
- - Supérieur
- - - Sans précision ¬ *G56.9*
- - - ¬
- - - - *G56*
- - - - *G56.8*
- Multiple ¬ *G58.7*
- Précisées ¬ Autres *G58.8*
- Sans précision ¬ *G58.9*
- Sièges multiples ¬ *G58.7*
- ¬ Autres *G58*

Mononucléés ¬ Histiocytoses de phagocytes *D76.1*

Mononucléose
- Cytomégalovirus ¬ *B27.1*
- Herpès virus gamma ¬ *B27.0*
- Infectieux
- - Sans précision ¬ *B27.9*
- - ¬
- - - *B27*
- - - *B27.8*
- - - Méningite au cours de *B27.9†, G02.0**
- - - Polyneuropathie au cours de *B27.9†, G63.0**
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ *B27.0*
- - Herpès gamma ¬
- - - Hépatite au cours de *B27.0†, K77.0**
- - - Hépatomégalie au cours de *B27.0†, K77.0**

Monoparésie monoplégie
- Membre supérieur ¬ *G83.2*
- Sans précision ¬ *G83.3*

Monophosphate
- HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose *D55.1*
- Synthase ¬ Déficit en uridine *E79.8*

Monoplégie
- Embolique en tant qu'événement en cours ¬ *I63.4, G83.3*
- Membre
- - Inférieur ¬ *G83.1*
- - Supérieur ¬ Monoparésie et *G83.2*
- Sans précision ¬ Monoparésie et *G83.3*
- Thrombotique en tant qu'événement en cours ¬ *I63.3, G83.3*

Monorchidie ¬ *Q55.0*

Monosaccharide ¬ Malabsorption de *E74.3*

Monosomie
- 1p36 ¬ *Q93.5*
- 2q22 ¬ Syndrome de Mowat-Wilson dû à une *Q43.1*
- 9p ¬ *Q93.5*
- 18p ¬ *Q93.5*
- 18q ¬ *Q93.5*
- 20p12 ¬
- - Dysplasie artério-hépatique due à une *Q44.7*
- - Paucité des voies biliaires syndromique due à une *Q44.7*
- - Syndrome d'Alagille-Watsons dû à une *Q44.7*
- Chromosome entier
- - Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ¬ *Q93.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q93.0*
- Délétions des autosomes, non classées ailleurs ¬ *Q93*
- Partielle du chromosome 18p ¬ *Q93.5*
- X ¬ *Q96.9*

Monotronculaire ¬
- Cardiopathie artérioscléreuse: Implication *I25.11*
- Maladie coronarienne *I25.11*

Monoxyde de carbone ¬ Effet toxique du *T58*

Monstre
- Double ¬ *Q89.4*
- SAI ¬ *Q89.7*

Montagnes
- Rocheuses ¬ Fièvre (de): pourprée des *A77.0*
- ¬ Mal des *T70.2*

Montana ¬ Fièvre (du): *A78*

Monteggia ¬ Fracture de *S52.21*

Montréal ¬ Nanisme à tête d'oiseau type *Q87.1*

Moon
v. Laurence-Moon

Mooren ¬ Ulcère de (la): *H16.0*

Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Haemophilus influenzae et *B96.3!*

Morbidité
- Soin supplémentaire
- - Fœtus ou du nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de *P08*
- - Nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de *P07*
- ¬ Causes inconnues et non précisées de *R69*

Morgagni ¬
- Cataracte sénile, de type *H25.2*
- Hernie de *K44.9*
- Torsion (de): hydatide de *N83.5*

Morganii comme agent pathogène ¬ Proteus *B96.2!*

Morning glory ¬ Syndrome *Q14.2*

Morphée] ¬ Sclérodermie localisée [*L94.0*

Morphine ¬ *T40.2*

Morphologie des cheveux, non classées ailleurs ¬ Anomalies congénitales de la *Q84.1*

Morpions ¬ Infestation par: *B85.3*

Morquio (-semblable à) (classique) ¬ Syndrome de: *E76.2*

Morquio-Ullrich-Brailsford ¬ Syndrome de *E76.2*

Morsier ¬ Syndrome de De *E23.0*

Morsure
- Animal
- - Multiples SAI ¬ *T01.9*
- - Non venimeux) ¬ *W64.9!*
- - Piqûre d'insecte venimeux ¬ *X29.9!*
- - SAI ¬ *T14.1*
- Insecte venimeux ¬ Piqûre ou *T63.4*
- Joue et de la lèvre ¬ *K13.1*
- Piqûre insecte non venimeux ¬ lésion traumatique superficiel
- - Avant-bras: *S50.83*
- - Cheville et du pied: *S90.83*
- - Épaule et du bras: *S40.83*
- - Hanche et de la cuisse: *S70.83*
- - Jambe: *S80.83*
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.03*
- - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.03*
- - Partie du corps non précisée: *T14.03*
- - Poignet et de la main: *S60.83*
- - Tronc, niveau non précisé: *T09.03*
- Rat
- - Sans précision ¬ Fièvre causée par *A25.9*
- - ¬ Fièvre
- - - *A25.9*
- - - Causées par *A25*
- - - Streptobacillaire causée par *A25.1*
- Scorpion ¬ Envenimation suite à la *T63.2*
- Serpent ¬ Envenimation suite à une *T63.0*

Mort
- Cardiaque subite, décrite ainsi ¬ *I46.1*
- Fœtal
- - Cause non précisée ¬ *P95*
- - Précoce avec rétention ¬ *O02.1*
- In utero ¬ Rétention d'un fœtus *O02.1*
- Instantanée ¬ *R96.0*
- Intra-utérin
- - Fœtus ¬ Soins maternels pour *O36.4*
- - Plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la grossesse après *O31.2*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par la *P01.6*

Mort *–suite*
- Néonatales ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de: *Z35.2*
- Nés ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de: *Z35.2*
- Origine obstétrical
- - Cause non précisée ¬ *O95*
- - Survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ *O96*
- Séquelle relevant
- - Cause obstétrical
- - - Sans précision
- - - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ *O96.9*
- - - - ¬ *O97.9*
- - - ¬ *O97*
- - Directement cause obstétrical
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ *O96.0*
- - - ¬ *O97.0*
- - Indirectement cause obstétrical
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ *O96.1*
- - - ¬ *O97.1*
- Subit
- - Cause inconnue ¬ Autre *R96*
- - Inexpliquée mort subit nourrisson
- - - Âge d'un an ¬ *R96.0*
- - - Avant l'âge d'un an ¬ *R95*
- - Nourrisson
- - - Âge ¬
- - - - *R96.0*
- - - - Mort subite du nourrisson), après l'âge d'un an ¬ Mort subite inexpliquée (*R96.0*
- - - Avant âge ¬
- - - - *R95.9*
- - - - Mort subite du nourrisson), avant l'âge d'un an ¬ Mort subite inexpliquée (*R95*
- - - Mention d'autopsie ¬ Syndrome de la *R95.0*
- - - SAI ¬ Syndrome de la *R95.9*
- - - Sans mention d'autopsie ¬ Syndrome de la *R95.9*
- - - ¬
- - - - Quasi-syndrome de *R06.80*
- - - - Syndrome
- - - - - *R95*
- - - - - *R95.9*
- Violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une *R96.1*

Mortelle ¬ Noyade et submersion non *T75.1*

Mort-né
- SAI ¬ *P95*
- ¬ Naissance
- - Gémellaire Jumeau
- - - *Z37.4!*
- - - Né vivant, l'autre *Z37.3!*

Mort-né *–suite*
- ¬ Naissance *–suite*
- - Multiples, tous *Z37.7!*
- - Unique, enfant *Z37.1!*

Morton
v. Casamassima-Morton-Nance
- ¬ Métatarsalgie de *G57.6*

Morvan ¬ Maladie de *G60.8*

Morve
- Mélioïdose ¬ *A24*
- ¬
- - *A24.0*
- - Malleus (*A24.0*

Mosaïque
- Chromosomes sexuels ¬ Homme avec *Q98.7*
- Chromosomique
- - 45 X
- - - 46,XX ou XY ¬ *Q96.3*
- - - S) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal ¬ *Q96.4*
- - Lignées avec divers nombres de chromosomes X ¬ *Q97.2*
- - Non-disjonction mitotique ¬
- - - Monosomie d'un chromosome entier, *Q93.1*
- - - Trisomie
- - - - 13, *Q91.5*
- - - - 18, *Q91.1*
- - - - 21, *Q90.1*
- - - - Chromosome
- - - - - Entier, *Q92.1*
- - - - - Entier, *Q92.1*
- ¬ Trisomie
- - 1 en *Q92.1*
- - 2 en *Q92.1*
- - 3 en *Q92.1*
- - 4 en *Q92.1*
- - 5 en *Q92.1*
- - 7 en *Q92.1*
- - 8 en *Q92.1*
- - 9 en *Q92.1*
- - 10 en *Q92.1*
- - 12 en *Q92.1*
- - 14 en *Q92.1*
- - 15 en *Q92.1*
- - 16 en *Q92.1*
- - 17 en *Q92.1*
- - 20 en *Q92.1*
- - 22 en *Q92.1*

Moschcowitz] ¬ Purpura thrombopénique thrombotique [*M31.1*

Moss
v. Gorlin-Chaudhry-Moss

Moteur
- 13-30 points ¬ FIM *U50.51*
- 31-42 points ¬ FIM *U50.41*

Moteur *–suite*
- 43-58 points ¬ FIM *U50.31*
- 59-68 points ¬ FIM *U50.21*
- 69-84 points ¬ FIM *U50.11*
- 85-91 points ¬ FIM *U50.01*
- Causé délibérément ¬ Accident de véhicule à *Y09.9!*
- Dissociatifs ¬ Troubles *F44.4*
- Inférieur ¬ Paralysie faciale (parésie faciale) (faiblesse faciale) due à une lésion du neurone *G51.0*
- Oculaire
- - Commun
- - - III) ¬ Paralysie du nerf *H49.0*
- - - ¬ Lésion traumatique du nerf *S04.1*
- - Externe
- - - VI) ¬ Paralysie du nerf *H49.2*
- - - ¬ Lésion traumatique du nerf *S04.4*
- Œsophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de Raynaud-troubles *M34.1*
- Pur ¬ Syndrome lacunaire *I67.9†, G46.5**
- Supérieur ¬ Paralysie (parésie) (faiblesse) faciale due à une lésion du neurone *G83.6*
- Syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et tics *F95.2*
- Vocal chronique ¬ Tic *F95.1*
- ¬
- - Dégénérescence familiale du neurone *G12.2*
- - Maladies du neurone *G12.2*
- - Trouble spécifique du développement *F82*

Motifs cosmétiques ¬ Chirurgie plastique pour *Z41.1*

Motilité
- Non précisées ¬ Anomalies de la démarche et de la *R26.8*
- ¬ Anomalies de la démarche et de la *R26*

Moto ¬ Accident de *V99!*

Motoneurone type Madras ¬ Maladie du *G12.2*

Motrice
- Aiguë ¬ Neuropathie axonale *G61.0*
- Cérébral
- - Forme spastique hémiplégique ¬ Infirmité *G80.2*
- - ¬ Autres infirmités *G80.8*
- Enfant ¬ Débilité *F82*
- Moyenne ¬ Limitation fonctionnelle *U50.2*
- Moyennement sévère ¬ Limitation fonctionnelle *U50.3*
- Multifocale ¬
- - Neuropathie *G61.8*
- - NMM [neuropathie *G61.8*
- Sans précision ¬ Troubles spécifiques du développement des fonctions *F82.9*
- Sensoriel
- - Types I-IV ¬ Neuropathie: héréditaire *G60.0*
- - ¬

Motrice *–suite*
- Sensoriel *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Neuropathie héréditaire *G60.0*
- - - Vessie neurogène: atonique (*N31.2*
- Sévère ¬ Limitation fonctionnel
- - *U50.4*
- - *U50.5*
- ¬
- - Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U50.0*
- - Légère limitation fonctionnelle *U50.1*
- - Limitation fonctionnelle *U50*
- - Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation *G83.5*

Motricité
- Buccale ¬ Troubles spécifiques du développement de la *F82.2*
- Cours d'affections classées ailleurs ¬ Syndromes extrapyramidaux et troubles de la *G26**
- Fine et graphique ¬ Troubles spécifiques du développement de la *F82.1*
- Globale ¬ Troubles spécifiques du développement de la *F82.0*
- Sans précision ¬ Syndrome extrapyramidal et trouble de la *G25.9*
- ¬ Syndrome
- - Extrapyramidaux et troubles de la *G25*
- - Précisés extrapyramidaux et troubles de la *G25.88*

Mouche
- Daim ¬ fièvre (de): *A21*
- ¬ infestation par larves de *B87*

Moulin ¬ Atrophodermie linéaire de *L90.8*

Moussous
v. Leiner-Moussous

Moustiques
- Sans précision ¬
- - Encéphalite virale transmise par des *A83.9*
- - Fièvre virale transmise par des *A92.9*
- ¬
- - Encéphalite viral transmis
- - - *A83*
- - - *A83.8*
- - Fièvre viral
- - - Précisées, transmises par des *A92.8*
- - - Transmises par des *A92*
- - Méningo-encéphalite à virus transmise par des *A83*

Mouton ¬ Maladie due à la douve du foie de *B66.3*

Mouvement
- Anormal
- - Psychogènes ¬ *F44.4*
- - Tête ¬ *R25.0*
- Binoculaire
- - Sans précision ¬ Anomalie des *H51.9*

Mouvement *–suite*
- Binoculaire *–suite*
- - ¬ anomalie
- - - *H51*
- - - Précisées des *H51.8*
- Investigation anormal
- - Non précisés ¬ *R25.8*
- - ¬ *R25*
- Miroir congénitaux familiaux ¬ *G25.88*
- Muscles oculaires ¬ Limitation traumatique des *H50.6*
- Oculaires ¬ Nystagmus et autres anomalies des *H55*
- Panique de foule ¬ Être pressé ou poussé par une foule ou dans un *W64.9!*
- Périodiques des jambes au cours du sommeil ¬ *G25.80*
- Stéréotypés
- - Lésion auto-infligée ¬ *F98.41*
- - Sans
- - - Lésion auto-infligée ¬ *F98.40*
- - - Précision d'une lésion auto-infligée ¬ *F98.49*
- - ¬
- - - *F98.4*
- - - Hyperactivité associée à un retard mental et à des *F84.4*
- Stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des *X59.9!*
- ¬ Raideur articulaire limitation
- - Complète des *M25.69*
- - Partielle des *M25.69*

Mowat-Wilson dû à une monosomie 2q22 ¬ Syndrome de *Q43.1*

Moyamoya
- Achalasie précoce ¬ Maladie de *I67.5*
- ¬ Maladie de *I67.5*

Moyen
v. Type de maladie

Moyenne
- Aigu
- - SAI ¬ Otite *H66.9*
- - Subaigu
- - - Allergique (muqueuse) (sanglante) (séreuse) ¬ Otite *H65.1*
- - - Muqueuse ¬ Otite *H65.1*
- - - Non suppurée SAI ¬ Otite *H65.1*
- - - Sanglante ¬ Otite *H65.1*
- - - Séromuqueuse ¬ Otite *H65.1*
- - Suppurée ¬ Otite *H66.0*
- Allergique ¬ Otite *H65.9*
- Apophyse mastoïde
- - Cours maladies classées ailleurs ¬ affection
- - - Oreille *H75**
- - - Précisées de l'oreille *H75.8**
- - Sans précision ¬ Affection de l'oreille *H74.9*

Moyenne *–suite*
- Apophyse mastoïde *–suite*
- - ¬ affection
- - - Oreille *H74*
- - - Précisées de l'oreille *H74.8*
- Appareil respiratoire ¬
- - Carcinome in situ de l'oreille *D02*
- - Tumeur bénigne de l'oreille *D14*
- Barotraumatique ¬ Otite *T70.0*
- Barrière de Mercier] (prostatique) ¬ Barre *N40*
- Catarrhale ¬ Otite *H65.9*
- CD4+ ¬ Lymphome T cutané à cellules pléomorphes de taille petite à *C84.4*
- Chronique
- - Allergique ¬ Otite *H65.4*
- - Attico-antrale suppurée ¬ Otite *H66.2*
- - Épanchement (non purulent) ¬ Otite *H65.4*
- - Exsudative ¬ Otite *H65.4*
- - Muqueuse ¬ Otite *H65.3*
- - Non suppurée SAI ¬ Otite *H65.4*
- - SAI ¬ Otite *H66.9*
- - Sécrétoire ¬ Otite *H65.3*
- - Séromuqueuse ¬ Otite *H65.4*
- - Transsudative ¬ Otite *H65.3*
- Col de l'utérus ¬ Dysplasie *N87.1*
- Cours
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ Otite *H67.0**
- - - Viral
- - - - Classées ailleurs ¬ Otite *H67.1**
- - - - ¬ Otite *B34.9†*, *H67.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Otite *H67.8**
- - Rougeole ¬ Otite *B05.3†*, *H67.1**
- Épanchement (non purulent) ¬ Otite *H65.9*
- Exsudative ¬ Otite *H65.9*
- Fosses nasales et sinus de la face ¬ Tumeur bénigne: Oreille *D14.0*
- Mucoïde chronique ¬ Otite *H65.3*
- Muqueuse ¬ Otite *H65.9*
- Nécrosante aigu
- - Cours de scarlatine ¬ Otite *A38†*, *H67.0**
- - Lors de grippe [Influenza] ¬ Otite *J11.8†*, *H67.1**
- Non suppuré
- - Sans précision ¬ Otite *H65.9*
- - ¬ Otite *H65*
- Organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l'oreille *D38*
- Post-morbilleuse ¬ Otite *B05.3†*
- Purulente SAI ¬ Otite *H66.4*
- SAI ¬
- - Malformation congénitale de l'oreille *Q16.4*
- - Otite *H66.9*
- Sans précision ¬ Otite *H66.9*

Moyenne *–suite*
- Sécrétoire ¬ Otite *H65.9*
- Séreux
- - Aiguë ¬ Otite *H65.0*
- - Chronique ¬ Otite *H65.2*
- - ¬ Otite *H65.9*
- Séromuqueuse ¬ Otite *H65.9*
- Suppuré
- - Chronique
- - - Bénigne ¬ Otite *H66.1*
- - - SAI ¬ Otite *H66.3*
- - - Tubo-tympanique ¬ Otite *H66.1*
- - Sans précision ¬ Otite
- - - *H66*
- - - *H66.4*
- Transsudative ¬ Otite *H65.9*
- Tuberculeuse ¬ Otite *A18.6†, H67.0**
- Vagin ¬ Dysplasie *N89.1*
- Virus grippe aviaire
- - Identifié ¬ Grippe [Influenza] avec otite *J09†, H67.1*, U69.21!*
- - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [Influenza] avec otite *J09†, H67.1**
- Vulve ¬ Dysplasie *N90.1*
- ¬
- - Anomalie congénitale de l'oreille *Q16.4*
- - Arriération mentale *F71*
- - Cholestéatome de l'oreille *H71*
- - Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne *E71.3*
- - Diphtérie de l'oreille *A36.8†, H67.0**
- - Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité *O65.3*
- - Écoulement aigu et subaigu de l'oreille *H65.0*
- - Fosse: *S02.1*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale *I60.1*
- - Limitation fonctionnel
- - - Cognitive *U51.1*
- - - Motrice *U50.2*
- - Maladie adhésive de l'oreille *H74.1*
- - Malformations congénitales de l'oreille *Q16.4*
- - Occlusion et sténose de l'artère cérébrale *I66.0*
- - Oreille
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - Polype de l'oreille *H74.4*
- - Syndrome de l'artère cérébrale *I66.0†, G46.0**
- - Syphilis de l'oreille *A52.7†, H75.8**
- - Thalassémie: intermédiaire *D56.1*
- - Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou *F31.3*
- - Tuberculose de l'oreille *A18.6†, H67.0**
- - Tumeur malign

Moyenne *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur malign *–suite*
- - - Fosses nasales et de l'oreille *C30*
- - - Oreille *C30.1*

Moyennement sévère
- Vision monoculaire ¬ Atteinte *H54.6*
- ¬ Limitation fonctionnelle motrice *U50.3*

MPA [polyangite microscopique] ¬ *M31.7*

MPNST ¬ *C47.9*

MPSI ¬ *E76.0*

MPSIII ¬ *E76.2*

MPSVI ¬ *E76.2*

MRSA] ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [*U80.00!*

MSMD autosomique
- Dominant déficit partiel récepteur
- - 1 de l'interféron gamma ¬ *D84.8*
- - 2 de l'interféron gamma ¬ *D84.8*
- Récessif déficit partiel
- - IFNgammaR2 ¬ *D84.8*
- - Récepteur 1 de l'interféron gamma ¬ *D84.8*

MSUD [Maple syrup urine disease] ¬ *E71.0*

MTHFR ¬ *E72.1*

MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique mitochondriale avec acidose lactique par déficit en *I42.2*

Mucha-Habermann] ¬ Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de *L41.0*

Mucineux
- Appendice ¬ Adénocarcinome *C18.1*
- Héréditaire ¬ Histiocytose progressive *D76.3*
- Ovaire
- - Faible potentiel malignité ¬ Tumeur
- - - *C56*
- - - Papillaire *C56*
- - Limite de la malignité ¬ Cystadénome *C56*
- - ¬
- - - Adénocarcinome *C56*
- - - Cystadénocarcinome *C56*
- Pancréas ¬
- - Carcinome intracanalaire papillaire *C25.3*
- - Cystadénocarcinome *C25.9*
- Pinkus ¬ Alopécie *L65.2*
- ¬
- - Cystadénome *D27*
- - Dystrophie cornéenne sous-épithéliale *H18.5*

Mucinose
- Cutané
- - Spontanément régressive ¬ *L98.5*
- - ¬ *L98.5*
- Érythémateuse réticulée ¬ *L98.5*
- Focale orale ¬ *K13.7*
- Foyer ¬ *L98.5*
- Papuleuse

Mucinose *–suite*
- Papuleuse *–suite*
- - Acrale persistante ¬ *L98.5*
- - Infantile ¬ *L98.5*
- Réticulée érythémateuse ¬ *L98.5*

Mucite oral oropharyngé
- Induite par des rayonnements ¬ *K12.3*
- Médicamenteuse ¬ *K12.3*
- SAI ¬ *K12.3*
- Virale ¬ *K12.3*

Muckle-Wells ¬ Syndrome de *M35.8*

Mucocèle
- Glandes salivaires ¬ *K11.6*
- Lacrymo-nasal ¬ *H04.6*
- Nez et des sinus du nez ¬ Kyste et *J34.1*
- Sac lacrymal chronique ¬ *H04.4*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.1*

Mucoïde
- Articulation du doigt ¬ Kyste *M67.44*
- Chronique ¬ Otite moyenne *H65.3*
- ¬
- - Adénocarcinome hypophysaire à cellules *C75.1*
- - Adénome hypophysaire à cellules *D35.2*
- - Carcinome hypophysaire à cellules *C75.1*
- - Otite *H65.3*

Mucolipidose
- I] ¬ Sialidose [*E77.1*
- II [maladie à inclusion cellulaire] ¬ *E77.0*
- III [polydystrophie de type Hurler] ¬ *E77.0*
- IV ¬ *E75.1*

Mucopolysaccharidose
- Sans précision ¬ *E76.3*
- Type
- - I ¬ *E76.0*
- - II
- - - Forme
- - - - Atténuée ¬ *E76.1*
- - - - Sévère ¬ *E76.1*
- - - ¬ *E76.1*
- - III, IV, VI, VII ¬ *E76.2*
- - IS ¬ *E76.0*
- - ¬
- - *E76.2*
- - Cardiopathie au cours de *E76.3†, I52.8**
- - Dégénérescence cérébrale au cours de *E76.3†, G32.8**

Mucopurulente ¬
- Bronchite chronique
- - *J41.1*
- - Simple
- - - *J41*
- - - *J41.8*
- Conjonctivite *H10.0*

Mucormycose
- Cutanée ¬ *B46.3†*, *L99.8**
- Disséminée ¬ *B46.4*
- Gastro-intestinale ¬ *B46.2†*, *K93.8**
- Généralisée ¬ *B46.4*
- Pulmonaire ¬ *B46.0†*, *J99.8**
- Rhinocérébrale ¬ *B46.1†*, *G99.8**
- Sans précision ¬ *B46.5*
- Sous-cutanée ¬ *B46.3†*, *L99.8**

Mucosite
- Iléale ¬ *K92.8*
- Orale (ulcéreuse) ¬ *K12.3*
- Sigmoïde ¬ *K92.8*

Mucosulfatidose ¬ *E75.2*

Mucoviscidose
- Iléus méconial ¬ *E84.1†*, *P75**
- Manifestation
- - Multiples ¬ *E84.87*
- - Pulmonaire et intestinale ¬ *E84.80*
- - ¬ *E84.88*
- ¬
- - *E84*
- - Maladie hépatobiliaire néonatale au cours de *E84.88*

Mucus
- Appendice ¬ Tumeur carcinoïde productrice de *C18.1*
- Poumons ¬ Tumeur carcinoïde productrice de *C34.9*
- Selles ¬ *R19.5*
- ¬
- - Aspiration néonatale de liquide amniotique et de *P24.1*
- - Suffocation par: *T17*

Muelenaere
v. Haspeslagh-Fryns-Muelenaere

Muenke ¬ Syndrome de *Q87.0*

Muguet
- Buccal ¬ *B37.0*
- SAI ¬ *B37.9*
- Vaginal ¬ *B37.3†*

MUL ¬ *G40.3*

Mulcahy] ¬ Myélosclérose [type *D47.4*

Mulibrey ¬ Nanisme *Q87.8*

Müller
v.a. Anti-Müller
v.a. Bindewald-Ulmer-Müller
- ¬
- - Aplasie unilatérale des canaux de *Q51.4*
- - Syndrome
- - - Anomalies des membres-anomalies des canaux de *Q87.8*
- - - Persistance des canaux de *Q55.8*

Müllérienne
- Aplasie rénale-anomalies cervicothoraciques ¬ Syndrome d'aplasie *Q87.8*
- Ovaire ¬ Tumeur maligne mixte *C56*

Multicentrique ¬ Réticulohistiocytose *E78.8†*, *M14.39**

Multi-core" ¬ Myopathie: de type: " *G71.2*

Multifocale
- Chronique récurrente ¬ Ostéomyélite *M86.30*
- Cryptogénétique ¬ Entérite sténosante ulcéreuse *K63.3*
- Multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans *C96.0*
- Progressive ¬ Leucoencéphalopathie *A81.2*
- SAI ¬ Leucoencéphalopathie *A81.2*
- Unisystémique ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans *C96.5*
- ¬
- - Histiocytose X *C96.5*
- - Maladie due au VIH avec Leucoencéphalite *B22†*, *G05.1**
- - Neuropathie motrice *G61.8*
- - NMM [neuropathie motrice *G61.8*
- - Tachycardie atriale *I47.1*

Multiforme
- Conjonctive ¬ Érythème *L51.1†*, *H13.8**
- ¬ Glioblastome *C71.9*

Multigemini ¬ Pili *L67.8*

Multikystique
- Dysplasie rénale ¬ *Q61.4*
- Néphropathie ¬ *Q61.4*
- Potter type II] ¬ Dysplasie rénale *Q61.4*
- Rein (développement) ¬ *Q61.4*

Multilignées ¬ Anémie réfractaire avec dysplasie *D46.5*

Multilinéaire ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie *C92.8*

Multilocularis
- Échinococcose alvéolaire
- - Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus *B67.6*
- - Sans précision ¬ Infection à Echinococcus *B67.7*
- - ¬ Infection hépatique à Echinococcus *B67.5*
- ¬ Infection du foie à Echinococcus *B67.5†*, *K77.0**

Multinodulaire
- Endémique) lié à une carence en iode ¬ Goitre *E01.1*
- Kystique) SAI ¬ Goitre: *E04.2*
- Non toxique ¬ Goitre *E04.2*
- Toxique ¬ Thyréotoxicose avec goitre *E05.2*

Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec test de lyse positif dans un sérum acidifié ¬ *D64.4*

Multiparité
- Élevée ¬ Surveillance de grossesse avec *Z35.4*
- ¬ Difficultés liées à une *Z64.1*

Multiple
v. Type de maladie

Multiple-dents néonatales ¬ Syndrome de stéatocystome *L72.2*

Multiple-hémihyperplasie ¬ Syndrome de la lipomatose *Q87.3*

Multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Pseudomonas et Acinetobacter *U81.1!*
- 3MRGN ¬ Pseudomonas et Acinetobacter *U81.3!*
- 4MRGN ¬ Pseudomonas et Acinetobacter *U81.5!*

Multisystématisé
- Forme
- - Cérébelleuse [AMS-C] ¬ Atrophie *G23.3*
- - Parkinsonne [AMS-P] ¬ Atrophie *G23.2*
- Type
- - Cérébelleux ¬
- - - AMS-C [atrophie *G23.3*
- - - Atrophie *G23.3*
- - Parkinsonien ¬
- - - AMS-P [atrophie *G23.2*
- - - Atrophie *G23.2*
- ¬
- - Atrophie *G23.2*
- - Dégénérescence *G23.2*

Multisystémique
- Disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et *C96.0*
- Dysfonctionnement des muscles lisses ¬ Syndrome *I73.8*
- ¬
- - Histiocytose X *C96.0*
- - Syndrome d'insuffisance hépatique aiguë infantile-manifestations *K72.0*

Münchhausen ¬ Syndrome de *F68.1*

Munk
v. Haim-Munk

Muqueux
- Anale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la *O70.3*
- Bénin ¬ Pemphigoïde *L12.1*
- Buccal
- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte de la *K93.4**
- - SAI ¬ *C06.0*
- - Sans précision ¬ Lésions de la *K13.7*
- - Stade
- - - 1 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.05†*, *K93.41**
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.06†*, *K93.42**
- - - 3 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.07†*, *K93.43**
- - ¬
- - - Atrophie de la *K13.7*
- - - Granulome
- - - - Éosinophile de la *K13.4*

Muqueux *–suite*
- Buccal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Granulome *–suite*
- - - - Lésions pseudo-granulomateuses de la *K13.4*
- - - - Pyogène de la *K13.4*
- - - - Télangiectasique de la *K13.4*
- - - Hyperplasie inflammatoire de la *K13.6*
- - - Maladie
- - - - Lèvres et de la *K13*
- - - - VIH avec leucoplasie de la *B23.8, K13.2*
- - - Ulcère de la *K12.1*
- - - Xanthome verruqueux de la *K13.4*
- Col ¬ Polype *N84.1*
- Crête) alvéolaire ¬ *C03*
- Épanchement des glandes salivaires ¬ Kyste *K11.6*
- Immunodéficience ¬ Inflammation généralisée des *K91.80*
- Joue ¬
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.52*
- - Tumeur maligne: *C06.0*
- Kawasaki] ¬ Syndrome adéno-cutanéo- *M30.3*
- Lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux *C88.4*
- Mastoïdectomie ¬ Kyste *H95.1*
- Médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les *T49*
- Nasale ¬ Cicatrice de la *J34.8*
- Nécrotique récidivante ¬ Périadénite *K12.0*
- Non classées ailleurs ¬ Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéo- *B08*
- Pianiques ¬ Lésions *A66.7*
- Psychogène ¬ Colite *F54, K58.8*
- Rectal
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la *O70.3*
- - ¬ Prolapsus de la *K62.3*
- Rétention des glandes salivaires ¬ Kyste *K11.6*
- Sanglante) (séreuse) ¬ Otite moyenne, aiguë et subaiguë: allergique (*H65.1*
- Sans précision ¬ Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo- *B09*
- Syphilitique ¬ Plaque *A51.3*
- Urétral
- - Femme ¬ Prolapsus de *N81.0*
- - ¬ Prolapsus de la *N36.3*
- Utérine ¬ Présence congénitale d'épithélium pavimenteux dans la *Q51.8*
- ¬
- - Atteinte

Muqueux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Atteinte *–suite*
- - - *L00.1*
- - - *L51.21*
- - Infections virales précisées, caractérisées par des lésions cutanéo- *B08.8*
- - Lèvre
- - - Bord libre) (face intérieure) (frein) (*D10.0*
- - - Inférieur
- - - - *C00.4*
- - - - Face: *C00.4*
- - - Sans indication inférieur supérieur
- - - - *C00.5*
- - - - Face: *C00.5*
- - - Supérieur
- - - - *C00.3*
- - - - Face: *C00.3*
- - Nævus blanc
- - - *Q38.6*
- - - Spongieux des *Q38.6*
- - Otite moyenne
- - - *H65.9*
- - - Aiguë et subaiguë: *H65.1*
- - - Chronique: *H65.3*
- - Pemphigoïde des membranes *L12.1*
- - Prolapsus congénital de: vessie (*Q64.7*
- - Syphilis secondaire de la peau et des *A51.3*

MURCS ¬ Association *Q87.8*

Murin
- Puces) ¬ Typhus *A75.2*
- Typhus mexicain, typhus endémique, tabardillo] ¬ Typhus *A75.9*

Murray Valley ¬ Encéphalite de la *A83.4*

Muscle
- Acte médicaux
- - Non classées ailleurs ¬ Affections du système ostéo-articulaire et des *M96*
- - Sans précision ¬ Affection du système ostéo-articulaire et des *M96.9*
- - ¬ Autres affections du système ostéo-articulaire et des *M96.88*
- Antérieurs des mains ¬ Myopathie distale avec atteinte des muscles postérieurs des jambes et des *G71.0*
- Associées à des brûlures ¬ Calcification et ossification de *M61.3*
- Biceps brachial ¬ Tendinite du *M75.2*
- Cuisse et de la hanche ¬ Ischémie traumatique des *T79.61*
- Extra-oculaire ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Jambe ¬ Ischémie traumatique des *T79.62*
- Larynx ¬ Paralysie des *J38.00*
- Lisses

Muscle *–suite*
- Lisses *–suite*
- - Striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances agissant essentiellement sur les *T48*
- - ¬ Syndrome multisystémique de dysfonctionnement des *I73.8*
- Localisation
- - Non précisée ¬ Ischémie traumatique des *T79.69*
- - ¬ Ischémie traumatique des *T79.68*
- Membre supérieur ¬ Ischémie traumatique des *T79.60*
- Oculaire
- - Surnuméraire ¬ *Q10.3*
- - ¬ Limitation traumatique des mouvements des *H50.6*
- Oculomoteur ¬
- - Fibrose congénitale des *H49.8*
- - Paralysie congénitale de plusieurs nerfs de *H49.9*
- Papillaire
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture du *I23.5*
- - Non classée ailleurs ¬ Rupture du *I51.2*
- Périnée au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: *O70.1*
- Pied ¬ Ischémie traumatique des *T79.63*
- Plancher pelvien ¬ Déchirure ancienne des *N81.8*
- Postérieurs des jambes et des muscles antérieurs des mains ¬ Myopathie distale avec atteinte des *G71.0*
- Posturaux ¬ Myopathie liée à l'X avec atrophie des *G71.0*
- Précisées ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des *Q68.8*
- Releveur de l'anus ¬ Syndrome du *K59.4*
- S tendon s
- - Antérieurs au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de *S86.2*
- - Péroniers au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de *S86.3*
- - Postérieurs au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique d'autre(s) *S86.1*
- - SAI ¬
- - - Arrachement de *T14.6*
- - - Déchirures de *T14.6*
- - - Entorses/foulures de *T14.6*
- - - Lacération de *T14.6*
- - - Lésion traumatique de *T14.6*
- - - Rupture traumatique de *T14.6*
- - - Section de *T14.6*
- Sans précision ¬
- - Calcification et ossification d'un *M61.9*
- - Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les *T48.2*
- - Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des *Q79.9*

Muscle *–suite*
- Sterno-cléido-mastoïdien ¬
- - Anomalie morphologique congénitale des *Q68.0*
- - Contracture du *Q68.0*
- Strié
- - Bloquants neuromusculaires] ¬ Intoxication: Myorelaxants (*T48.1*
- - ¬ Spasticité d'origine rachidienne des *G95.83*
- Surnuméraire ¬ *Q79.8*
- Tendon
- - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S39.0*
- - Adducteurs de la cuisse ¬ Lésion traumatique de *S76.2*
- - Chef long du biceps brachial ¬ Lésion traumatique du *S46.1*
- - Coiffe des rotateurs ¬ Lésion traumatique de *S46.0*
- - Extenseur
- - - Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de *S56.3*
- - - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S66.3*
- - - Niveau
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre *S56.5*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples *S66.7*
- - - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S66.2*
- - - S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de *S56.4*
- - Fléchisseur
- - - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S66.1*
- - - Niveau
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre *S56.2*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples *S66.6*
- - - Pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique du *S56.0*
- - - S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de *S56.1*
- - Hanche ¬ Lésion traumatique de *S76.0*
- - Intrinsèque
- - - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de *S66.5*
- - - Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S96.2*
- - - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de *S66.4*
- - Long
- - - Extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S96.1*
- - - Fléchisseur
- - - - Orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S96.0*

Muscle *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Long *–suite*
- - - Fléchisseur *–suite*
- - - - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S66.0*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles de lésion traumatique de *T93.5*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d'une lésion traumatique de *T92.5*
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique
- - - - *S56*
- - - - Multiples *S56.7*
- - - Cheville pied ¬ Lésion traumatique
- - - - *S96.8*
- - - - Multiples *S96.7*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique des *S16*
- - - Épaule bras ¬ Lésion traumatique
- - - - *S46.8*
- - - - Multiples *S46.7*
- - - Hanche cuisse ¬ Lésion traumatique
- - - - *S76*
- - - - Multiples *S76.7*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique
- - - - *S86.8*
- - - - Multiples *S86.7*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'autres *S66.8*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique des *S29.0*
- - Non précis
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T13.5*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T11.5*
- - - Niveau
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de *S56.8*
- - - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S96.9*
- - - - Cuisse ¬ Lésion traumatique de *S76.4*
- - - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique de *S46.9*
- - - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un *S86.9*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un *S66.9*
- - - Tronc ¬ Lésion traumatique de *T09.5*
- - Partie
- - - Biceps brachial ¬ Lésion traumatique du *S46.2*
- - - Corps non précisée ¬ Lésion traumatique de *T14.6*
- - Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques de *T06.4*
- - Postérieurs au niveau de la cuisse ¬ Lésion traumatique de *S76.3*
- - Quadriceps ¬ Lésion traumatique de *S76.1*

Muscle *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Tête ¬ Lésion traumatique des *S09.1*
- - Triceps ¬ Lésion traumatique du *S46.3*
- Tibial antérieur ¬ Myopathie distale du *G71.0*
- Tissu conjonctif
- - Sans précision ¬ Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des *M95.9*
- - ¬
- - - Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des *Z87.3*
- - - Déformation acquis
- - - - Précisées du système ostéo-articulaire, des *M95.8*
- - - - Système ostéo-articulaire, des *M95*
- Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: *O70.1*
- Vésicale sans substrat neurologique ¬ Hypo- et acontractilité du *N31.81*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Abcès tuberculeux du *A18.8†, M63.09**
- - Absence de: *Q79.8*
- - Calcification
- - - *M61.4*
- - - Ossification
- - - - *M61*
- - - - Paralytiques d'un *M61.2*
- - Infection gonococcique du système ostéo-articulaire et des *A54.4†*
- - Ischémie traumatique d'un *T79.6*
- - Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des *Q79.8*
- - Ossifications d'un *M61.5*
- - Syphilis
- - - *A52.7†, M63.09**
- - - Secondaire du *A51.4†, M63.09**
- - Tuberculose du *A18.8†, M63.09**

Musculaire
v.a. ostéo-musculaire
- Accru ¬ Tonus *R29.8*
- Autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou Becker ¬ Dystrophie *G71.0*
- Bénigne [Becker] ¬ Dystrophie *G71.0*
- Ceinture
- - Autosomique
- - - Dominant type
- - - - 1A ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 1B ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 1C ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 1D ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 1E ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 1F ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 1G ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 1H ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - Récessif type

Musculaire *–suite*
- Ceinture *–suite*
- - Autosomique *–suite*
- - - Récessif type *–suite*
- - - - 2A ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2B ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2C ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2D ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2E ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2F ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2G ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2H ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2I ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2J ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2K ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2L ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2M ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2N ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2O ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2P ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2Q ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2R ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2S ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2U ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2W ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2X ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2Y ¬ Dystrophie *G71.0*
- - Déficit
- - - Delta-sarcoglycane ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - FKRP ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - Gamma-sarcoglycane ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - Lamine A/C ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - POMK ¬ Dystrophie *G71.0*
- - ¬ Dystrophie *G71.0*
- Colonne vertébrale ¬ Atteinte des insertions ligamentaires ou *M46.0*
- Congénital
- - Anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurelles] ¬ Dystrophie *G71.2*
- - Cataracte infantile-hypogonadisme ¬ Syndrome de dystrophie *G71.2*
- - Déficience intellectuelle ¬ Dystrophie *G71.2*
- - Déficit
- - - Intégrine alpha-7 ¬ Dystrophie *G71.2*
- - - Laminine alpha 2 ¬ Dystrophie *G71.2*
- - Liée à LMNA ¬ Dystrophie *G71.2*
- - SAI ¬ Dystrophie *G71.2*
- - Sans déficience intellectuelle ¬ Dystrophie *G71.2*
- - Type
- - - 1A ¬ Dystrophie *G71.2*
- - - 1B ¬ Dystrophie *G71.2*
- - - Fukuyama ¬ Dystrophie *G71.2*
- - Ullrich ¬ Dystrophie *G71.2*

Musculaire *–suite*
- Congénital *–suite*
- - ¬ Dystrophie *G71.2*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres atteintes *M63.8**
- Déformante ¬ Dystonie *G24.1*
- Distale ¬ Dystrophie *G71.0*
- Emery-Dreifuss
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - Récessive ¬ Dystrophie *G71.0*
- - Liée à l'X ¬ Dystrophie *G71.0*
- Facio-scapulo-humérale ¬ Dystrophie *G71.0*
- Hypothyroïdie ¬ Syndrome de pseudohypertrophie *E03.1*
- Ischémique ¬
- - Paralysie *T79.60*
- - Syndrome de Volkmann [rétraction *T79.60*
- Myopathies avec anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres *G71.2*
- Neuritique ¬ Atrophie *G58.9†, M63.89**
- Neuromusculaires au cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections *G73**
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Atrophie et fonte *M62.5*
- - Traumatique ¬
- - - Déchirures *M62.1*
- - - Hématome *M62.8*
- - - Infarcissement ischémique *M62.2*
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬ Anomalie du tonus *P94.9*
- - ¬ Autres anomalies du tonus *P94.8*
- Oculaire ¬
- - Dystrophie *G71.0*
- - Lissencéphalie pavimenteuse sans atteinte *Q04.3*
- Oculo-pharyngée ¬ Dystrophie *G71.0*
- Précisées ¬ Autres atteintes *M62.8*
- Primitif
- - Sans précision ¬ Affection *G71.9*
- - ¬ Autres affections *G71.8*
- Sans précision ¬ Atteinte *M62.9*
- Scapulo-péronière
- - Bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss] ¬ Dystrophie *G71.0*
- - Liée à l'X ¬ Dystrophie *G71.0*
- - ¬ Dystrophie *G71.0*
- Sévère [Duchenne] ¬ Dystrophie *G71.0*
- Spinobulbaire de type Kennedy [Maladie de Kennedy] ¬ Atrophie *G12.2*
- Syphilitique ¬ Atrophie *A52.7†, M63.89**
- Tibiale ¬ Dystrophie *G71.0*
- Type Selcen ¬ Dystrophie *G71.0*
- ¬
- - Activité continue familiale de la fibre *G71.1*

Musculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Atteintes *M62*
- - Carence en carnitine palmityltransférase *E71.3*
- - Contracture *M62.4*
- - Déficit
- - - Phosphofructokinase *E74.0*
- - - Phosphorylase *E74.0*
- - Diastasis *M62.0*
- - Dystrophie *G71.0*
- - Epidermolyse bulleuse simple avec dystrophie *Q81.0†, G73.7**
- - Fasciculations *R25.3*
- - Filaminopathie *G71.8*
- - Fonte *M62.89*
- - Foulure *M62.6*
- - Glycogénose déficit
- - - Aldolase A *E74.0*
- - - Bêta-énolase *E74.0*
- - - Glycogène phosphorylase *E74.0*
- - - Phosphofructokinase *E74.0*
- - - Phosphorylase kinase hépatique et *E74.0*
- - GSD déficit
- - - Aldolase A *E74.0*
- - - Phosphorylase kinase *E74.0*
- - Hernie *M62.8*
- - Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus *T42.8*
- - Myopathie congénitale avec disproportion des types de fibres *G71.2*
- - Syndrome
- - - Homme raide [rigidité *G25.88*
- - - Loge *T79.6*

Musculature
- Abdominale ¬ Aplasie congénitale de la *Q79.4*
- Intrinsèque du larynx ¬ *C32.0*
- Squelettique ¬ Rigidité de la *R29.8*
- Ventre ¬ Absence congénitale de la *Q79.4*

Musculo-contractural ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Mutase ¬
- Déficit
- - Complet en Méthylmalonyl-CoA *E71.1*
- - Partiel en méthylmalonyl-CoA *E71.1*
- Glycogénose par déficit en phosphoglycérate *E74.0†, G73.6**

Mutation
- ADN mitochondrial ¬ Cardiomyopathie hypertrophique et tubulopathie dues à une *I42.2*
- CDKN1C ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une *Q87.3*
- Facteur V Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C activée [*D68.5*
- Gène
- - ABCB4 ¬ Cholélithiase par *K80.80*

Mutation *–suite*
- Gène *–suite*
- - Prothrombine ¬ *D68.5*
- KIF5A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 due à une *G60.0*
- LIS1 ¬ Lissencéphalie par *Q04.3*
- Ponctuel
- - JAG1 ¬
- - - Dysplasie artério-hépatique due à une *Q44.7*
- - - Paucité des voies biliaires syndromique due à une *Q44.7*
- - - Syndrome d'Alagille-Watsons dû à une *Q44.7*
- - NOTCH2 ¬ Dysplasie artério-hépatique due à une *Q44.7*
- Récepteur TSH ¬
- - Hyperthyroïdie familiale par *E05.8*
- - Hypothyroïdie par *E03.1*
- Somatique
- - CEBPA ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec *C92.00*
- - NPM1 ¬ Leucémie myéloïde aiguë associée à des *C92.00*
- TFG ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 due à une *G60.0*
- TUBA1 ¬ Lissencéphalie due à une *Q04.3*
- VCP ¬ Myopathie distale de l'adulte due à des *G71.0*

Mutchinick ¬ Syndrome de *Q87.8*

Mutilante
- Ichtyose ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Plaques kératosiques péri-orificielles ¬ Kératodermie palmoplantaire *Q82.8*
- ¬
- - Kératodermie aïnhumoïde et *Q82.8*
- - Rhinopharyngite *A66.5*

Mutilation génital féminin
- Plastie de correction ¬ Antécédents personnels de *Z91.70*
- SAI ¬ *Z91.70*
- Type
- - 1 ¬ Antécédents personnels de *Z91.71*
- - 2 ¬ Antécédents personnels de *Z91.72*
- - 3 ¬ Antécédents personnels de *Z91.73*
- - 4 ¬ Antécédents personnels de *Z91.74*
- - Sans précision ¬ Antécédents personnels de *Z91.70*
- ¬
- - *Z91.70*
- - Antécédents personnels de *Z91.7*

Mutisme
- Cérébelleux) postopératoire ¬ *G97.81*
- Électif ¬ *F94.0*
- Sélectif ¬ *F94.0*

MUTYH ¬
- PAF attenuée liée à *D12.6*

MUTYH ¬ *–suite*
- Polypose adénomateuse familiale atténuée liée à *D12.6*

MVOP [maladie veino-occlusive pulmonaire] ¬ *I27.0*

Myalgie
- Épidémique ¬ *B33.0*
- ¬ *M79.1*

Myalgique ¬ Encéphalomyélite *G93.3*

Myasthénie
- Affections neuromusculaires ¬ *G70*
- Auto-immune ¬ *G70.0*
- Congénitale et au cours du développement ¬ *G70.2*
- Transitoire néonatale ¬ *P94.0*
- ¬ *G70.0*

Myasthénique
- Congénital ¬ Syndrome *G70.2*
- Cours
- - Hyperthyroïdie ¬ Syndrome *E05.9†, G73.0**
- - Maladie endocrinien ¬ Syndrome
- - - *E34.9†, G73.0**
- - - *G73.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Syndrome *G73.3**
- - Thyréotoxicose ¬ Syndrome *E05.9†, G73.0**
- - Tumeur
- - - Maligne NCA ¬ Syndrome *C80.9†, G73.2**
- - - ¬ Syndrome *D48.9†, G73.2**
- Diabète sucré ¬ Syndrome *E14.40†, G73.0**
- Lambert-Eaton ¬ Syndrome *C80.9†, G73.1**

Myatrophie ¬ Diabète sucré
- *E14.40†, G73.0**
- Type
- - 1 avec *E10.40†, G73.0**
- - 2 avec *E11.40†, G73.0**

Mycétome
- Actinomycètes ¬ *B47.1*
- Sans précision ¬ *B47.9*
- ¬ *B47*

Mycobactérie
- Atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ *U82.2!*
- Non-tuberculeuses ¬ Infection pulmonaire à *A31.0*
- Résistantes aux antituberculeux (de première ligne) ¬ *U82!*
- ¬ Infections dues à d'autres *A31*

Mycobactérien
- Atypique disséminée ¬ Infection *A31.80*
- Déficit
- - Complet
- - - IFNgammaR1 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- - - IFNgammaR2 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*

Mycobactérien *–suite*
- Déficit *–suite*
- - Complet *–suite*
- - - IL12B ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- - - ISG15 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- - - Récepteur bêta 1 de l'interleukine 12 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- - Partiel
- - - Facteur 8 régulateur de l'interféron ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- - - STAT1 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- ¬
- - Infections *A31.88*
- - Maladie due au VIH avec infection *B20, A31.9*

Mycobactériose SAI ¬ *A31.9*

Mycobacterium
- Avium
- - Intracellulaire ¬ Maladie due au VIH avec infection à *B20, A31.0*
- - ¬ Infection à *A31.0*
- Intracellulare [bacille de Battey] ¬ Infection à *A31.0*
- Kansasii ¬ Infection à *A31.0*
- Leprae ¬ infection à *A30*
- Marinum ¬ Infection par *A31.1*
- SAI ¬ Infection atypique à *A31.9*
- Sans précision ¬ Infection à *A31.9*
- Tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ *U82.0!*
- Ulcerans [Ulcère de Buruli] ¬ Infection par *A31.1*
- Xenopi ¬ Infection à *A31.88*
- ¬ Infection
- - *A31.8*
- - Cutanée à *A31.1*
- - Pulmonaire à *A31.0*

Mycophénolate mofétil ¬ Embryopathie au *Q86.88*

Mycoplasma
- Pneumoniae
- - M. pneumoniae] ¬ *B96.0!*
- - ¬
- - - Bronchite aiguë due à *J20.0*
- - - Pneumonie due à *J15.7*
- Siège non précisé ¬ Infection à *A49.3*
- Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.0!*

Mycoplasmes ¬
- Infection uro-génitale à *N39.0, B96.0!*
- Méningite à *G00.8, B96.0!*
- Pneumonie congénitale à *P23.6, B96.0!*

Mycose
- Barbe ¬ *B35.0*

Mycose *–suite*
- Candidosique
- - Gland du pénis ¬ *B37.4†, N51.2**
- - Vagin ¬ *B37.3†, N77.1**
- Classées ailleurs ¬ Méningite au cours de *G02.1**
- Intestin ¬ *B49†, K93.8**
- Myosite ¬ *B49†, M63.29**
- Non classées ailleurs ¬ Autres *B48*
- Occasionnelle ¬ *B48.7*
- Ongles ¬ *B35.1*
- Opportuniste ¬
- - *B48.7*
- Oreille ¬ *B36.9†, H62.2**
- Organes génitaux masculins ¬ *B49†, N51.8**
- Poumon ¬ *B49†, J99.8**
- Précisées ¬ Autres *B48.8*
- Pulmonaire NCA ¬ *B49†, J99.8**
- Sans précision ¬ *B49*
- Superficiel
- - Précisées ¬ Autres *B36.8*
- - Sans précision ¬ *B36.9*
- - ¬ Autres *B36*
- Urètre ¬ *B49†, N37.0**
- Vaginale ¬ *B37.3†, N77.1**
- Vulve ¬ *B37.3†, N77.1**
- Vulvo-vaginale ¬ *B37.3†, N77.1**
- Yeux ¬ *B49†, H58.8**
- ¬
- - Maladie due au VIH avec *B20, B49*
- - Otite externe cours
- - - *B36.9†, H62.2**
- - - *H62.2**
- - Pneumonie au cours de *J17.2**

Mycosique ¬
- Arthrite *B49†, M01.69**
- Colpite *B37.3†, N77.1**
- Diarrhée *B49†, K93.8**
- Fluor *B37.3†, N77.1**
- Maladie due au VIH avec rétinite *B20†, H32.0*, B49*
- Méningite *B49†, G02.1**
- Pied de Madura, *B47.0*
- Vaginite *B37.3†, N77.1**
- Vulvo-vaginite *B37.3†, N77.1**

Mycosis
- Barbae ¬ *B35.0*
- Capillitii ¬ *B35.0*
- Fongoïde
- - Folliculotrope ¬ *C84.0*
- - ¬ *C84.0*

Mycotica ¬
- Balanitis *B37.4†, N51.2**
- Vulvitis *B37.3†, N77.1**

Mycotoxines contaminant des aliments ¬ Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres *T64*

Myélatélie ¬ *Q06.1*

Myélinisées de gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec surdité, déficience intellectuelle et absence de fibres sensitives *G60.0*

Myélinoclastique diffuse ¬ Sclérose *G37.0*

Myélinolyse centropontine ¬ *G37.2*

Myélite
- Adénovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Ascendant
- - Aiguë ¬ *G04*
- - Nécrosante sub-aiguë ¬ *G37.4*
- Cours
- - Nægleriase ¬ *B60.2†, G05.2**
- - Rougeole ¬ *B05.0†, G05.1**
- - Rubéole ¬ *B06.0†, G05.1**
- - Syphilis
- - - Congénitale ¬ *A50.4†, G05.0**
- - - Tardive ¬ *A52.1†, G05.0**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.2†, G05.2**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**
- Encéphalomyélite
- - Cours
- - - Affection classé ¬ Encéphalite
- - - - *G05**
- - - - *G05.8**
- - - Infection
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ Encéphalite, *G05.0**
- - - - Virales classées ailleurs ¬ Encéphalite, *G05.1**
- - - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Encéphalite, *G05.2**
- - Sans précision ¬ Encéphalite, *G04.9*
- - ¬ Encéphalite
- - - *G04*
- - - *G04.8*
- Entérovirus ¬ *A85.0†, G05.1**
- Funiculaire ¬ *E53.8†, G32.0**
- Nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix-Alajouanine] ¬ *G37.4*
- Oreillons ¬ *B26.2†, G05.1**
- Radique ¬ *G97.88*
- Transverse
- - Aigu
- - - Cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central ¬ *G37.3*
- - - SAI ¬ *G37.3*
- - Syphilitique ¬ *A52.1†, G05.0**
- Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G05.0**
- Varicelleuse ¬ *B01.1†, G05.1**
- Virus de l'herpès ¬ *B00.4†, G05.1**
- Zona ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, G04.9*

Myéloblastique
- Aigu
- - Associée à une translocation t(8;16)(p11;p13) ¬ Leucémie *C92.00*
- - LMA] ¬ Leucémie *C92.0*
- - Type associée à une translocation t(8;21)(q22;q22) ¬ Leucémie *C92.00*
- Différenciation minimale ¬ Leucémie aiguë *C92.00*

Myélocèle ¬ *Q05*

Myélocystocèle ¬ *Q05.9*

Myélocytaire ¬ Réaction leucémoïde de type: *D72.8*

Myélodysplasie
- Excès de blastes ¬ *D46.9*
- Moelle épinière ¬ *Q06.1*
- SAI ¬ *D46.9*

Myélodysplasique
- Associé à une anomalie chromosomique isolée del(5q) ¬ Syndrome *D46.6*
- Délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] ¬ Syndrome *D46.6*
- Induit
- - Agent alkylants ¬ Syndrome
- - - *D46*
- - - *D46.9*
- - Épipodophyllotoxine ¬ Syndrome
- - - *D46*
- - - *D46.9*
- - Thérapie, SAI ¬ Syndrome *D46*
- - Traitement ¬ Syndrome *D46.9*
- Myéloproliférative, non classifiable ¬ Maladie *C94.6*
- Non-classifié ¬ Syndrome *D46.7*
- Sans précision ¬ Syndrome *D46.9*
- ¬ Syndrome
- - *D46*
- - *D46.7*
- - Alpha-thalassémie-syndrome *D56.0, D46.9*

Myélofibreuse ¬ Anémie *D47.4†, D63.0**

Myélofibrose
- Aiguë ¬ *C94.4*
- Chronique idiopathique ¬ *D47.4*
- Idiopathique) (avec métaplasie myéloïde) ¬ *D47.4*
- Primaire ¬ *D47.4*
- Secondaire à un syndrome myéloprolifératif ¬ *D47.4*
- ¬
- - *D47.4*
- - Ostéosclérose au cours d'une *D47.4*
- - Panmyélose aiguë avec *C94.4*

Myélogène
- Chronique ¬ Leucémie *C92.10*
- ¬ leucémie: *C92*

Myéloïde
- Aigu

Myéloïde *–suite*
- Aigu *–suite*
- - Altérations du gène MLL ¬ Leucémie *C92.6*
- - Anomalie 11q23 ¬ Leucémie *C92.6*
- - Associé
- - - Inv(3)(q21q26.2) ¬ Leucémie *C92.00*
- - - Mutations somatiques de NPM1 ¬ Leucémie *C92.00*
- - - T
- - - - 3;3)(q21;q26.2) ¬ Leucémie *C92.00*
- - - - 6;9)(p23;q34) ¬ Leucémie *C92.00*
- - - - 9;11)(p22;q23) ¬ Leucémie *C92.00*
- - Différenciation minimale ¬ Leucémie *C92.0*
- - Dysplasie multilinéaire ¬ Leucémie *C92.8*
- - M6 (a) (b) ¬ Leucémie *C94.0*
- - M7 ¬ Leucémie *C94.2*
- - Maturation) ¬ Leucémie *C92.0*
- - Mégacaryoblastique associée à t(1;22)(p13;q13) ¬ Leucémie *C94.20*
- - Réfractaire à un traitement d'induction ¬ Leucémie *C92.00*
- Chronique
- - Atypique, BCR/ABL négative ¬ Leucémie *C92.2*
- - LMC
- - - BCR/ABL positive ¬ Leucémie *C92.1*
- - - Chromosome Philadelphie (Ph1) positive ¬ Leucémie *C92.1*
- - - ¬ Crise blastique au cours d'une leucémie *C94.8!*
- - T(9;22) (q34;q11) ¬ Leucémie *C92.1*
- Éosinophile médullaire anormal associé
- - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucémie aiguë *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22) ¬ Leucémie aiguë *C92.50*
- Extramédullaire ¬ Tumeur *C92.30*
- Mégacaryocytaire ¬ Hépatosplénomégalie *D47.4*
- Mutations somatiques de CEBPA ¬ Leucémie aiguë *C92.00*
- Sans précision ¬ Leucémie *C92.9*
- ¬
- - Leucémie
- - - *C92*
- - - *C92.7*
- - Myélofibrose (idiopathique) (avec métaplasie *D47.4*
- - Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec métaplasie *D47.4*
- - Polio-encéphalite bulbaire *A80.9†, G05.1**
- - Poussée blastique au cours de leucémie *C92.10, C94.8!*
- - Sarcome *C92.3*

Myélokathexis
v. verrues-hypogammaglobulinémie-infections-myélokathexis

Myéloleucodystrophie ¬ *E75.2*

Myélomalacie angiohypertrophique sub-aiguë ¬ *G37.4*

Myélomatose
- Multiple ¬ Ostéoporose au cours de *C90.00†, M82.09**
- ¬ *C90.0*

Myélome
- Multiple
- - Tumeurs malignes à plasmocytes ¬ *C90*
- - ¬
- - - *C90.0*
- - - Arthropathie au cours de *C90.00†, M36.1**
- - - Glomérulonéphrite au cours de *C90.00†, N08.1**
- - - Glomérulopathie au cours de *C90.00†, N08.1**
- - - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *C90.00†, N16.1**
- - - Pyélonéphrite au cours de *C90.00†, N16.1**
- - - Trouble glomérulaire au cours de *C90.00†, N08.1**
- Plasmocytes
- - Rémission complète ¬ *C90.01*
- - ¬ *C90.0*
- Solitaire ¬ *C90.3*

Myéloméningocèle ¬
- *Q05*
- *Q05.9*

Myélomonocytaire
- Aiguë ¬ Leucémie *C92.5*
- Juvénile ¬ Leucémie *C93.3*

Myélopathie
- Associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains ¬ *G04.1*
- Cours
- - Atteinte des disques intervertébraux ¬ *M51.0†, G99.2**
- - Carence en vitamine B12 ¬ *E53.8†, G32.0**
- - Discopathie ¬ *M51.0†, G99.2**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *G99.2**
- - Spondylarthrose
- - - Cervicale ¬ *M47.12†, G99.2**
- - - Lombaire ¬ *M47.16†, G99.2**
- - - Lombosacrée ¬ *M47.17†, G99.2**
- - - Thoracique ¬ *M47.14†, G99.2**
- - Sténose du canal rachidien ¬ *M48.09†, G99.2**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G99.2**
- Dégénérescence des disques intervertébraux NCA ¬ *M51.0†, G99.2**
- Déplacement de disque intervertébral NCA ¬ *M51.0†, G99.2**
- Infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 (HTLV-1) ¬ *G04.1*
- Médicamenteuse ¬ *G95.8*
- Nécrotique subaiguë ¬ *G95.18*
- Post-radiothérapie ¬ *G95.8*
- Radiculopathie ¬ Spondylarthrose

Myélopathie *–suite*
- Radiculopathie ¬ Spondylarthrose *–suite*
- - Cervicale sans *M47.8*
- - Lombo-sacrée sans *M47.8*
- - Thoracique sans *M47.8*
- SAI ¬ *G95.9*
- Spondylogène NCA ¬ *M47.19†, G99.2**
- Vasculaire ¬
- - *G95.1*
- - *G95.18*
- - Claudication intermittente médullaire (lors de *G95.18*
- ¬
- - Atteinte d'un disque cervical avec *M50.0†, G99.2**
- - Compression racine nerveux lors atteinte disque intervertébral
- - - *M51.0†, G99.2**
- - - Cervicaux avec *M50.0†, G99.2**
- - Dégénérescence disque intervertébral
- - - Cervicaux avec *M50.0†, G99.2**
- - - Lombaires avec *M51.0†, G99.2**
- - Hernie du noyau gélatineux avec *M51.0†, G99.2**
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, G95.9*
- - Spondylarthrose
- - - *M47.1*
- - - *M47.99†, G99.2**
- - - Sacrale avec *M47.18†, G99.2**
- - - Sacro-coccygienne avec *M47.18†, G99.2**
- - Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec *M43.3*

Myéloperoxydase ¬ Déficit en *E80.3*

Myéloprolifératif
- Chronique ¬ Maladie *D47.1*
- Non classifiable ¬ Maladie myélodysplasique et *C94.6*
- Sans précision ¬ Maladie *D47.1*
- ¬ Myélofibrose secondaire à un syndrome *D47.4*

Myéloréticulose ¬ *D47.4*

Myélosclérose
- Aiguë ¬ *C94.40*
- Mégacaryocytaire) avec métaplasie myéloïde ¬ *D47.4*
- Type Mulcahy] ¬ *D47.4*

Myélose
- Chronique
- - Rémission complète ¬ *D47.1*
- - ¬ *D47.1*
- Funiculaire NCA ¬ Anémie avec *D51.0†, G32.0**
- Mégacaryocytaire chronique ¬ *D47.4*

Myers
v. Smith-Fineman-Myers

MYH9 ¬ Thrombocytopénie syndromique liée à *D69.41*

Myhre ¬ Syndrome de *Q87.8*

Myiase
- Auriculaire ¬ *B87.4†, H94.8**
- Cavités ¬ *B87.8*
- Cutané
- - Rampante ¬ *B87.0*
- - ¬
- - - *B87.0*
- - - *B87.0†, L99.8**
- Furonculoïde ¬ *B87.0*
- Génito-urinaire ¬ *B87.8*
- Intestinal ¬
- - *B87.8*
- - *B87.8†, K93.8**
- Laryngée ¬ *B87.3*
- Localisations ¬ *B87.8*
- Oculaire ¬ *B87.2†, H58.8**
- Plaies cutanées ¬ *B87.1*
- Rampante ¬ *B87.0*
- Rhinopharyngée ¬ *B87.3†, J99.8**
- Sans précision ¬ *B87.9*
- Traumatique ¬ *B87.1*
- ¬ *B87*

Myo)métrite ¬ endo(*N71*

Myocarde
- Aigu) SAI ¬ Infarctus du *I21.9*
- Ancien
- - Découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du *I25.2*
- - Sans précision ¬ Infarctus du *I25.29*
- - Survenu
- - - 4 mois et moins d'un an plus tôt ¬ Infarctus du *I25.21*
- - - 29 jours et moins de 4 mois plus tôt 29 ¬ Infarctus du *I25.20*
- - - Y a 1 an ou plus ¬ Infarctus du *I25.22*
- - ¬ Infarctus du *I25.2*
- Graisseuse ¬ Dégénérescence du cœur ou du *I51.5*
- Guéri ¬ Infarctus du *I25.2*
- Localisation
- - Non précisée ¬ Infarctus transmural aigu du *I21.3*
- - ¬ Infarctus transmural aigu du *I21.2*
- Méningocoques ¬ Infection du *A39.5†, I41.0**
- Non transmural SAI ¬ Infarctus du *I21.4*
- Nouveau-né ¬ Ischémie transitoire du *P29.4*
- Paroi
- - Antérieure ¬ Infarctus transmural aigu du *I21.0*
- - Inférieure ¬ Infarctus transmural aigu du *I21.1*
- Récidivant ¬ infarctus du *I22*
- Répétition
- - Aigu
- - - Latéral

Myocarde *–suite*
- Répétition *–suite*
- - Aigu *–suite*
- - - Latéral *–suite*
- - - - Haut ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - - Paroi) SAI ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - Latéro
- - - - Apical ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - - Basal ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - Postérieur (vrai) ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - Postéro-basal ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - Postéro-latéral ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - Postéro-septal ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - Septal SAI ¬ Infarctus du *I22.8*
- - Localisation
- - - Non précisée ¬ Infarctus du *I22.9*
- - - ¬ Infarctus du *I22.8*
- - Paroi
- - - Antérieure ¬ Infarctus du *I22.0*
- - - Inférieure ¬ Infarctus du *I22.1*
- - ¬ Infarctus du *I22*
- SAI ¬ Infarctus transmural du *I21.3*
- Sans précision ¬ Infarctus aigu du *I21.9*
- Sénile ¬ Dégénérescence du cœur ou du *I51.5*
- Spongieux ¬ *I42.88*
- Syphilitique ¬ Infarctus du *A52.0†, I52.0**
- ¬
- - *C79.84*
- - Antécédent d'infarctus du *I25.29*
- - Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du *I23*
- - Communication
- - - Interauriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.1*
- - - Interventriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.2*
- - Complications récentes d'un infarctus aigu du *I23.8*
- - Défaut du *I51.5*
- - Dégénérescence
- - - *I51.5*
- - - Syphilitique du *A52.0†, I52.0**
- - Embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du *I24.0*
- - Fibrose du *I51.4*
- - Hémochromatose du *E83.1†, I43.1**
- - Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.0*
- - Infarctus
- - - Aigu du *I21*
- - - Sous-endocardique aigu du *I21.4*
- - Maladie du *I51.5*
- - Malformation congénitale du: *Q24.8*
- - Mise en observation pour suspicion d'infarctus du *Z03.4*

Myocarde *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Occlusion coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du *I24.0*
- - Rupture
- - - Cordages tendineux comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.4*
- - - Muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.5*
- - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.3*
- - Syndrome post-infarctus du *I24.1*
- - Syphilis du *A52.0†, I41.0**
- - Thrombo-embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du *I24.0*
- - Thrombose
- - - Coronaire n'entraînant pas un infarctus du *I24.0*
- - - Oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.6*
- - Tuberculose de *A18.8†, I41.0**

Myocardiopathie
- Alcoolique ¬ *I42.6*
- Congénitale ¬ *I42.4*
- Constrictive SAI ¬ *I42.5*
- Cours
- - Diphtérie ¬ *A36.8†, I43.0**
- - Maladie
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *I43.0**
- - - Métaboliques ¬ *I43.1**
- - - Nutritionnelles ¬ *I43.2**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *I43.8**
- - Puerpéralité ¬ *O90.3*
- Dilatation ¬ *I42.0*
- Hypertrophique
- - Non obstructive ¬ *I42.2*
- - ¬ Autres *I42.2*
- Ischémique ¬ *I25.5*
- Médicaments et d'autres causes externes ¬ *I42.7*
- Nutritionnelle ¬ *E63.9†, I43.2**
- Obstructive hypertrophique ¬ *I42.1*
- Primitive) (secondaire) SAI ¬ *I42.9*
- Restrictives ¬ Autres *I42.5*
- Sans précision ¬ *I42.9*
- Virale ¬ *B33.2†, I43.0**
- ¬
- - *I42*
- - *I42.8*

Myocardique
- Asymptomatique ¬ Ischémie *I25.6*
- SAI ¬ Insuffisance cardiaque ou *I50.9*
- Syphilitique ¬ Insuffisance *A52.0†, I52.0**

Myocardite
- Aigu

Myocardite *–suite*
- Aigu *–suite*
- - Grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.8*
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- - Sans précision ¬ *I40.9*
- - ¬ Autres *I40.8*
- Aseptique chez le nouveau-né ¬ *B33.2†, I41.1**
- Aspergillus ¬ *B44.8†, I41.2**
- Candida ¬ *B37.88†, I41.2**
- Chronique (interstitielle) ¬ *I51.4*
- Congestive ¬ *I42.0*
- Cours
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *I41.0**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *I41.2**
- - - Virales classées ailleurs ¬ *I41.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *I41.8**
- - Paludisme ¬ *B50.8†, I41.2**
- - Polyarthrite chronique ¬ *M05.30†, I41.8**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, I41.8**
- - Scarlatine ¬ *A38†, I41.0**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.8†, I41.2**
- - Typhus NCA ¬ *A75.9†, I41.0**
- Diphtérique ¬ *A36.8†, I41.0**
- Épidémique chez le nouveau-né ¬ *B33.2†, I41.1**
- Gonocoques ¬ *A54.8†, I41.0**
- Grippale par virus de la grippe aviaire identifié ¬ *J09, U69.21!*
- Hypertensive ¬ *I11.90†, I41.8**
- Idiopathique à cellules géantes ¬ *I40.8*
- Infectieuse ¬ *I40.0*
- Isolée ¬ *I40.1*
- Lors
- - Arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.30†, I41.8**
- - Grippe Influenza
- - - Virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ *J10.8†, I41.1**
- - - ¬ *J11.8†, I41.1**
- Méningocoques ¬ *A39.5†, I41.0**
- Ourlienne ¬ *B26.8†, I41.1**
- Rhumatismal
- - Aiguë ¬ *I01.2*
- - ¬ *I09.0*
- Rhumatoïde ¬ *M05.39†, I41.8**
- SAI ¬ *I51.4*
- Sans précision ¬ *I51.4*
- Septique ¬ *I40.0*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I41.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.8†, I41.2**

Myocardite *–suite*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I41.0**
- Typhoïde ¬ *A01.0†, I41.0**
- Typhus épidémique à poux ¬ *A75.0†, I41.0**
- Virale chez le nouveau-né ¬ *B33.2†, I41.1**
- Virus
- - Coxsackie ¬ *B33.2†, I41.1**
- - Grippe
- - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, I41.1**
- - - Porcine identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09, U69.20!*

Myoclonica ¬ Dyssynergia cerebellaris *G11.1*

Myoclonie
v.a. opsoclonie-myoclonie
- Ataxie cérébelleuse-surdité ¬ Syndrome de *G11.1*
- Corticale familiale ¬ *G25.3*
- Médicamenteuse ¬ *G25.3*
- Ramsay-Hunt] ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: *G11.1*
- Taches rouge cerise ¬ Syndrome *E77.1*
- ¬ *G25.3*

Myoclonique
- Bénin
- - Enfance ¬ Épilepsie
- - - *G40.3*
- - Familiale de l'adulte ¬ Épilepsie *G40.3*
- Encéphalopathies non-progressives ¬ Épilepsie *G40.4*
- Fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie *G31.81*
- Infantile familiale ¬ Épilepsie *G40.3*
- Petit mal impulsif] juvénile ¬ Épilepsie (avec): *G40.3*
- Précoce
- - Suppression-bursts"" ¬ Encéphalopathie *G40.4*
- - Symptomatique) ¬ Encéphalopathie *G40.4*
- Progressive ¬ Épilepsie *G40.3*
- ¬
- - Crises non spécifiques: *G40.3*
- - Épilepsie
- - - Absences *G40.4*
- - - Crises astato- *G40.4*

Myoclonoastatiques ¬ Épilepsie avec crises *G40.4*

Myoclonus
- Dystonie ¬ *G24.1*
- Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [*G31.81*

Myoencéphalopathie mitochondriale ¬ *G31.81*

Myo-endocardite aiguë ou subaiguë ¬ *I33.9*

Myofasciite à macrophages ¬ *M60.89*

Myofibrillaire
- Liée à la desmine ¬ Myopathie *G71.8*
- ¬ Myopathie *G71.8*

Myofibroblastique inflammatoire ¬ Tumeur *D48.9*

Myofibrosite ¬ *M79.7*

Myogénique autosomique récessive ¬ Arthrogrypose multiple congénitale *Q74.3*

Myoglobinurie
- Autosomique dominante ¬ *R82.1*
- Récurrente génétique ¬ *R82.1*
- ¬ *R82.1*

Myokymie
- Facial ¬
- - *G51.4*
- - Dyskinésie familiale avec *G24.8, G51.4*
- Hémifaciale ¬ *G51.3*

Myomètre ¬ Tumeur maligne: *C54.2*

Myométrite ¬ *N71*

Myonécrose à Clostridium ¬ *A48.0*

Myopathie
v.a. Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes
- Agents toxiques ¬ *G72.2*
- Agrégats tubulaires ¬ *G71.2*
- Alcoolique ¬ *G72.1*
- Amérindienne ¬ *G71.2*
- Anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [*G71.2*
- Autophagie excessive liée à l'X ¬ *G71.8*
- Axe central [myopathie à cores centraux] ¬ *G71.2*
- Bâtonnets [némaline] ¬ *G71.2*
- Bethlem ¬ *G71.0*
- Brody ¬ *G71.8*
- Cap ¬ *G71.2*
- Cardioquelettique et neutropénie liée à l'X ¬ *E71.1*
- Cardiosquelettique avec neutropénie et mitochondriopathie ¬ *E71.1*
- Cardiosquelettique-neutropénie ¬ Syndrome de *E71.1*
- Centronucléaire
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *G71.2*
- - - Récessive ¬ *G71.2*
- - Liée à l'X ¬ *G71.2*
- Congénital
- - Bâtonnets ¬ *G71.2*
- - Disproportion des types de fibres musculaires ¬ *G71.2*
- - ¬ *G71.2*
- Cores centraux] ¬ Myopathie: à axe central [*G71.2*
- Corps
- - Hyalins ¬ *G71.2*
- - Inclusion type 2 ¬ *G71.8*

Myopathie *–suite*
- Corps *–suite*
- - Polyglucosane type
- - - 1 ¬ *E74.0*
- - - 2 ¬ *E74.0†, G73.6**
- - Réducteurs ¬ *G71.2*
- - Sphéroïdes ¬ *G71.2*
- - Zébrés ¬ *G71.2*
- Cours
- - Amylose ¬ *E85.4†, G73.6**
- - Anomalies de stockage du glycogène ¬ *E74.0†, G73.6**
- - Artérite à cellules géantes ¬ *M31.6†, G73.7**
- - Hyperadrénocorticisme ¬ *E24.9†, G73.5**
- - Hyperparathyroïdie NCA ¬ *E21.3†, G73.5**
- - Hyperthyroïdie ¬ *E05.9†, G73.5**
- - Hypoparathyroïdie ¬ *E20.9†, G73.5**
- - Hypopituitarisme ¬ *E23.0†, G73.5**
- - Hypothyroïdie ¬ *E03.9†, G73.5**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, G73.7**
- - Maladie
- - - Addison ¬ *E27.1†, G73.5**
- - - Endocrinien ¬
- - - - *E34.9†, G73.5**
- - - - *G73.5**
- - - Infectieux
- - - - Parasitaires classées ailleurs ¬ *G73.4**
- - - - ¬ *B99†, G73.4**
- - - Métabolique ¬
- - - - *E88.9†, G73.6**
- - - - *G73.6**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, G73.4**
- - - Stockage des lipides ¬ *E75.6†, G73.6**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *G73.7**
- - Myxœdème ¬ *E03.9†, G73.5**
- - Périartérite noueuse ¬ *M30.0†, G73.7**
- - Polyarthrite chronique ¬ *M05.30†, G73.7**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, G73.7**
- - Sclérodermie ¬ *M34.8†, G73.7**
- - Syndrome
- - - Sec ¬ *M35.0†, G73.7**
- - - Sjögren ¬ *M35.0†, G73.7**
- - Thyréotoxicose ¬ *E05.9†, G73.5**
- - Tumeur maligne ¬ *C80.9†, M63.89**
- Crétinisme ¬ *E00.9†, G73.5**
- Début précoce-aréflexie-détresse respiratoire-dysphagie ¬ Syndrome de *G71.2*
- Distal
- - Adulte due à des mutations de VCP ¬ *G71.0*
- - Atteinte
- - - Initiale des membres supérieurs, type finlandais ¬ *G71.0*
- - - Muscles postérieurs des jambes et des muscles antérieurs des mains ¬ *G71.0*

Myopathie *–suite*
- Distal *–suite*
- - Atteinte *–suite*
- - - Respiratoire précoce ¬ *G71.0*
- - Faiblesse des cordes vocales ¬ *G71.0*
- - Muscle tibial antérieur ¬ *G71.0*
- - Précoce
- - - Associé
- - - - KLHL9 ¬ *G71.0*
- - - - Nébuline ¬ *G71.0*
- - - Type Laing ¬ *G71.0*
- - Scapulohuméropéronière progressive ¬ *G71.0*
- - Tardif
- - - Associée à l'alpha-B cristalline ¬ *G71.0*
- - - Type Markesbery-Griggs ¬ *G71.0*
- - Type
- - - Miyoshi ¬ *G71.0*
- - - Nonaka ¬ *G71.8*
- - - Tateyama ¬ *G71.0*
- - - Welander ¬ *G71.0*
- - Vacuoles bordées ¬ *G71.8*
- Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de malformation de Klippel-Feil- *Q76.1*
- Empreintes digitales ¬ *G71.2*
- Encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [*G31.81*
- Endocrinienne ¬ *E34.9†, G73.5**
- Épargnant le quadriceps ¬ *G71.8*
- Héréditaire SAI ¬ *G71.9*
- Inclusion
- - Héréditaire type
- - - 2 ¬ *G71.8*
- - - 3 ¬ *G71.8*
- - - 4 ¬ *G71.8*
- - ¬ *G71.8*
- Inflammatoire, non classée ailleurs ¬ *G72.4*
- Intolérance à l'effort type suédois ¬ *G71.3*
- Létale congénitale type Compton-North ¬ *G71.2*
- Liée à l'X avec atrophie des muscles posturaux ¬ *G71.0*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.30†, G73.7**
- Médicamenteuse ¬ *G72.0*
- Mitochondrial
- - Anémie sidéroblastique ¬ *G71.3*
- - Autosomique dominante avec intolérance à l'effort ¬ *G71.3*
- - Déficit réversible en COX ¬ *G71.3*
- - Encéphalopathie, acidose lactique et épisodes ressemblant à des AVC ¬ *G31.81*
- - Non classée ailleurs ¬ *G71.3*
- - ¬ Syndrome de cataracte congénitale-cardiomyopathie hypertrophique- *Q87.8*
- Myofibrillaire

Myopathie *–suite*
- Myofibrillaire *–suite*
- - Liée à la desmine ¬ *G71.8*
- - ¬ *G71.8*
- Myotubulaire (centro-nucléaire) ¬ *G71.2*
- Nécrosante à médiation auto-immune ¬ *G72.4*
- Némaline
- - Adulte ¬ *G71.2*
- - Enfant ¬ *G71.2*
- - Type Amish ¬ *G71.2*
- Oculo-pharyngée distale ¬ *G71.0*
- Précis ¬
- - *G72.8*
- - *G72.88*
- Précoce avec cardiomyopathie létale ¬ *G71.8*
- Réanimation ¬ *G72.80*
- Rétractile-fibrose pulmonaire ¬ Syndrome de poïkilodermie héréditaire fibrosante- *Q82.8*
- Sans précision ¬ *G72.9*
- Spirales cylindriques ¬ *G71.2*
- Surcharge
- - Actine ¬ *G71.2*
- - Desmine et inclusions de corps de Mallory ¬ *G71.8*
- Syndrome de Cushing ¬ *E24.9†, G73.5**
- Thyréotoxique ¬ *E05.9†, G73.5**
- Type
- - Mini-core" ¬ *G71.2*
- - Multi-core" ¬ *G71.2*
- ¬
- - *G72*
- - Lipodystrophie congénitale généralisée avec *E88.1*
- - Sclérose systémique avec *M34.8†, G73.7**

Myopathy mitochondriale létale infantile ¬ *G71.3*

Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [*G31.81*

Myopéricardite rhumatismale chronique ¬ *I09.2*

Myophosphorylase ¬ Maladie glycogénique par déficit en *E74.0*

Myopie
v.a. polydactylie-myopie
- Dégénérative ¬ *H44.2*
- Forte-surdité neurosensorielle ¬ Syndrome de *H90.5*
- Malformation de Dandy-Walker ¬ Syndrome de dysmorphie-macrocéphalie- *Q87.8*
- Maligne ¬ *H44.2*
- ¬ *H52.1*

Myopique ¬ Maculopathie *H35.38*

Myorelaxants
- Muscles striés) [bloquants neuromusculaires] ¬ Intoxication: *T48.1*

Myorelaxants *–suite*
- ¬ Réaction anaphylactique aux *T88.6*

Myosis congénital ¬ Syndrome d'ataxie- *G11.4*

Myosite
- Bactérienne ¬ *M60.09*
- Chevauchement juvénile ¬ *M33.0*
- Cours
- - Cysticercose ¬ *B69.8†, M63.19**
- - Infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs ¬ *M63.1**
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *M63.0**
- - - Infectieuses classées ailleurs ¬ *M63.2**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, M63.39**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.8†, M63.19**
- - Trichinellose ¬ *B75†, M63.19**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, M63.29**
- Éosinophile idiopathique ¬ *M60.89*
- Focale ¬ *M60.89*
- Inclusions ¬ *G72.4*
- Infectieuse ¬ *M60.0*
- Interstitielle ¬ *M60.1*
- Ossifiante
- - Associée à des brûlures ¬ *M61.3*
- - Liée à une tétraplégie ou une paraplégie ¬ *M61.2*
- - Traumatique ¬ *M61.0*
- Purulente tropicale ¬ *M60.09*
- Sans précision ¬ *M60.9*
- Secondaire au cours de syphilis ¬ *A51.4†, M63.09**
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, M63.09**
- Toxoplasma ¬ *B58.8†, M63.19**
- Tropicale ¬ *M60.09*
- Typhoïde ¬ *A01.0†, M63.09**
- Virale ¬ *M60.09*
- ¬
- - *M60*
- - *M60.8*
- - Mycose avec *B49†, M63.29**

Myotilinopathie distale ¬ *G71.0*

Myotonie
v.a. Pseudomyotonie
- Chondrodystrophique ¬
- - *G71.1*
- - *Q78.8*
- Congénital
- - Dominante [Thomsen] ¬ *G71.1*
- - Récessive [Becker] ¬ *G71.1*
- - SAI ¬ *G71.1*
- Fluctuante ¬ *G71.1*
- Médicamenteuse ¬ *G71.1*
- Permanente ¬ *G71.1*
- Répondant à l'acétazolamide ¬ *G71.1*
- Symptomatique ¬ *G71.1*

Myotonique
- Proximale ¬ Dystrophie *G71.1*
- Steinert] ¬ Dystrophie *G71.1*
- Type 1 ¬ Dystrophie *G71.1*
- ¬
- - Affections *G71.1*
- - Cataracte *G71.1†, H28.2**
- - Paralysie périodique (familiale): *G72.3*

Myotubulaire (centro-nucléaire) ¬ Myopathie: *G71.2*

Myringite
- Aiguë ¬ *H73.0*
- Bulleuse ¬ *H73.0*
- Chronique ¬ *H73.1*
- ¬
- - *H65*
- - *H66*

Myringotomie [diabolo] ¬ Tube(s) de *Z96.2*

Myxœdémateux
- Nodulaire ¬ Lichen *L98.5*
- ¬
- - Coma *E03.5*
- - Crétinisme endémique (de): type *E00.1*
- - Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type *E00.1*

Myxœdématose lichéniforme
- Papulaire et sclérodermoïde généralisé ¬ *L98.5*
- ¬ *L98.5*

Myxœdème
- SAI ¬ *E03.9*
- ¬
- - Anémie due à un *E03.9†, D63.8**
- - Aplasie de la thyroïde (avec *E03.1*
- - Ataxie cérébelleuse au cours de *E03.9†, G13.2**
- - Atrophie systémique du système nerveux central au cours de *E03.9†, G13.2**
- - Cataracte au cours de *E03.9†, H28.1**
- - Dégénérescence cérébrale au cours de *E03.9†, G32.8**
- - Myopathie au cours de *E03.9†, G73.5**

Myxofibrosarcome ¬ *C49.9*

Myxoïde
- Extrasquelettique ¬ Chondrosarcome *C49.9*
- Malin ¬ Fibrohistiocytome *C49.9*

Myxome atrial ¬ *D15.1*

N-acétyl-6-sulfatase ¬ Déficit en glucosamine *E76.2*

N-acétylgalactosamine 4-sulfatase ¬ Carence en *E76.2*

N-acetylgalactosamine phosphotransférase ¬ Déficit en dolichyl-phosphate *E77.8*

N-acétylglucosamine-1-phosphotransférase ¬ Déficit en *E77.0*

N-acétylglucosaminyltransférase 2 ¬ Déficit en *E77.8*

N-acétylglutamate synthase ¬

- Déficit en *E72.2*
- Hyperammoniémie par déficit en *E72.2*

N-acétyltransférase ¬ Déficit en héparane-alpha-glucosaminide *E76.2*

N-acyl-L-amino acide amidohydrolase ¬ Déficit en *E72.8*

NADH-coenzyme Q réductase ¬

- Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en *I42.2*
- Déficit isolé en *G31.81*

NADH-CoQ réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en *I42.2*

NADH-méthémoglobine-réductase ¬ Déficit congénital en *D74.0*

NADH-ubiquinone réductase ¬ Déficit isolé en *G31.81*

Naegeli

- Rémission complète ¬ Leucémie monocytaire de *C93.11*
- ¬ Leucémie monocytaire de *C93.10*

Naegeli-Franceschetti-Jadassohn ¬ Syndrome de *Q82.4*

Nægleria ¬ Méningo-encéphalite à *B60.2†, G05.2**

Nægleriase ¬

- *B60.2*
- Encéphalite au cours de *B60.2†, G05.2**
- Encéphalomyélite au cours de *B60.2†, G05.2**
- Myélite au cours de *B60.2†, G05.2**

Naevoïde linéaire et spiralée ¬ Hypermélanose *L81.4*

Nævomatose basocellulaire ¬ *Q85.8*

Nævus

- Arachnéen ¬ *I78.1*
- Atypiques ¬ Syndrome familial des *D48.5*
- Blanc
- - Muqueuses ¬ *Q38.6*
- - Spongieux des muqueuses ¬ *Q38.6*
- Bleu ¬ *D22*
- Cellules ballonnisantes sur la conjonctive ¬ *D31.0*
- Congénital non néoplasique ¬ *Q82.5*
- Flammeus ¬ *Q82.5*
- Fraise ¬ *Q82.5*
- Ichtyosiforme-anomalies des membres ¬ Syndrome d'hémidysplasie congénitale- *Q87.8*
- Mélanocytaire ¬ *D22*

Nævus *–suite*

- Mélanocytes
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *D22.4*
- - Lèvre ¬ *D22.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D22.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D22.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D22.2*
- - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D22.3*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *D22.1*
- - Sans précision ¬ *D22.9*
- - Tronc ¬ *D22.5*
- - ¬ *D22*
- Non néoplasique ¬ *I78.1*
- Ota sur peau
- - Paupière ¬ *D22.1*
- - Visage (à l'exception des yeux) ¬ *D22.3*
- Pigmentaire ¬ *D22*
- Pileux ¬ *D22*
- Poils angora ¬ *Q82.5*
- SAI ¬ *D22*
- Sanguin ¬ *Q82.5*
- Sébacé linéaire ¬ Syndrome du *Q85.8*
- Spitz ¬ *D22.9*
- Stellaire ¬ *I78.1*
- Tache vin
- - Multiples familiaux ¬ *Q82.5*
- - ¬ *Q82.5*
- Vasculaire SAI ¬ *Q82.5*
- Verruqueux ¬ *Q82.5*
- ¬ Cheveux laineux sur *Q82.5*

Nagashima ¬ Kératodermie palmoplantaire type *Q82.8*

Nager ¬ Syndrome de *Q75.4*

Nageur ¬

- Crampe des *T75.1*
- Oreille du *H60.3*
- Prurit des *B65.3*

NAGS ¬ Déficit en *E72.2*

Naguib-Richieri-Costa ¬ Syndrome de *Q87.8*

Naissance

- 500 à moins de 750 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de *P07.01*
- 750 à moins de 1000 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de *P07.02*
- 1000 à moins de 1250 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: Poids de *P07.10*
- 1250 à moins de 1500 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: Poids de *P07.11*
- 1500 à moins de 2500 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: Poids de *P07.12*
- Gémellaire Jumeau

Naissance *–suite*

- Gémellaire Jumeau *–suite*
- - Morts-nés ¬ *Z37.4!*
- - Né vivant, l'autre mort-né ¬ *Z37.3!*
- - Nés vivants ¬ *Z37.2!*
- Inférieur à 500 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de *P07.00*
- Multiple
- - Certains enfants nés vivants ¬ Autres *Z37.6!*
- - Enfant nés
- - - Hôpital ¬ Autres *Z38.6*
- - - Hors d'un hôpital ¬ Autres *Z38.7*
- - Lieu de naissance non précisé ¬ Autre *Z38.8*
- - SAI ¬ *Z37.9!*
- - Tous
- - - Morts-nés ¬ Autres *Z37.7!*
- - - Nés vivants ¬ Autres *Z37.5!*
- Non
- - Classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la *P07*
- - Précis ¬
- - - Enfant unique, lieu de *Z38.2*
- - - Jumeaux, lieu de *Z38.5*
- - - Naissances multiples, lieu de *Z38.8*
- Perpuéralité ¬ Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la *O26.68*
- Poids naissance
- - 500 à moins de 750 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la *P07.01*
- - 750 à moins de 1000 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la *P07.02*
- - 1000 à moins de 1250 grammes ¬ Autres poids faibles à la *P07.10*
- - 1250 à moins de 1500 grammes ¬ Autres poids faibles à la *P07.11*
- - 1500 à moins de 2500 grammes ¬ Autres poids faibles à la *P07.12*
- - Inférieur à 500 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la *P07.00*
- Sans paraplégie ¬ Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la *P11.59*
- Spontanée par voie vaginale d'un enfant unique ¬ *O80*
- Terme ¬ *O48*
- Unique
- - Enfant
- - - Mort-né ¬ *Z37.1!*
- - - Vivant ¬ *Z37.0!*
- - SAI ¬ *Z37.9!*
- ¬
- - Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la *P08*
- - Enfants nés vivants, selon le lieu de *Z38*
- - Poids
- - - Extrêmement faible à la *P07.0*

Naissance *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Poids *–suite*
- - - Faibles à la *P07.1*

Najjar ¬ Maladie de Crigler et *E80.5*

Nakagawa ¬ Angioblastome de *D18.01*

Nakao
v. Furukawa-Takagi-Nakao

NALD ¬ *E71.3*

Nana ¬ Infection (à) (par): Hymenolepis *B71.0*

Nance
v. Casamassima-Morton-Nance

Nance-Horan ¬ Syndrome de *Q87.0*

Nanisme
v.a. Peters-nanisme
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'alopécie-contractures- *Q87.8*
- Lenz-Majewski ¬ *Q87.1*
- Microcéphalique ostéodysplasique primordial type
- - I ¬ *Q87.1*
- - II ¬ *Q87.1*
- - III ¬ *Q87.1*
- Mulibrey ¬ *Q87.8*
- Parastremmatique ¬ *Q87.1*
- Tête d'oiseau type Montréal ¬ *Q87.1*
- Thanatophore ¬ *Q77.1*
- Type Laron ¬ *E34.3*

Nanophyétiase ¬ *B66.8*

Narcissique ¬ Personnalité: *F60.8*

Narcolepsie
- Cataplexie ¬ *G47.4*
- Sans cataplexie ¬ *G47.4*
- ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante-surdité- *G11.2*

Narcotiques
- Psychodysleptiques [hallucinogènes] ¬ Intoxication par *T40*
- Sans précision ¬ Intoxication: *T40.6*
- Synthétiques ¬ Intoxication: Autres *T40.4*
- ¬ Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.5*

Narine ¬
- Corps étranger dans une *T17.1*
- Rétrécissement syphilitique
- - *A52.7†, J99.8**
- - Congénitale de la *A50.5†, J99.8**

NARP [Syndrome de neuropathie-ataxie-rétinite pigmentaire] ¬ *G31.81*

Nasal
v.a. cranio-fronto-nasal
- Acquise) ¬ Déviation de la cloison (*J34.2*
- Antérieur postérieur ¬
- - Atrésie d'un orifice *Q30.0*
- - Sténose congénitale d'un orifice *Q30.0*
- Choanes ¬ Bord postérieur cloison
- - *C11.3*

Nasal *–suite*
- Choanes ¬ Bord postérieur cloison *–suite*
- - *D10.6*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose (de): *A15.8*
- Oreille moyenne ¬ Tumeur maligne des fosses *C30*
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose (de): *A16.8*
- - ¬ Perforation de la cloison *J34.8*
- Sans précision ¬ Polype *J33.9*
- Sinus
- - Face ¬ Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses *D14.0*
- - Paranasaux ¬ Carcinome épidermoïde des fosses *C30.0*
- ¬
- - Anomalie congénitale de l'os *Q30.9*
- - Cicatrice de la muqueuse *J34.8*
- - Cloison *C30.0*
- - Corps étranger dans un sinus *T17.0*
- - Déviation
- - - Cloison *J34.2*
- - - Congénitale de la cloison *Q67.4*
- - Fissure, échancrure et fente *Q30.2*
- - Fosse
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - Gliome *Q30.8*
- - Lymphome extranodal à cellules T/NK, type *C86.0*
- - Nécrose du nez et de la cloison *J34.0*
- - Os
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Perforation congénitale de la cloison *Q30.3*
- - Phlegmon du nez et de la cloison *J34.0*
- - Plaie ouverte nez
- - - Orifice *S01.22*
- - - Septum *S01.23*
- - Polype
- - - *J33*
- - - Fosses *J33.0*
- - Résultats anormaux de: sécrétions *R84*
- - Septum *C30.0*
- - Syphilis de la cloison *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur maligne: Fosses *C30.0*
- - Ulcération du nez et de la cloison *J34.0*
- - Ulcère
- - - Cornet *J34.0*
- - - Variqueux du septum *I86.88*
- - Vestibule des fosses *C30.0*

Nascimento ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

NASH] ¬ Stéatohépatite non alcoolique [*K75.8*

Naso
- Alvéolaire] ¬ Kyste (de): naso-labial [*K09.1*
- Frontale ¬ Encéphalocèle *Q01.1*
- Labial [naso-alvéolaire] ¬ Kyste (de): *K09.1*
- Palatin [canal incisif] ¬ Kyste (de): *K09.1*

Nasopharyngé
- Juvénile ¬ Angiofibrome *D10.6*
- ¬ Carcinome *C11.9*

Nasu-Hakola ¬ Maladie de *E75.2*

Natale ¬ Dent: *K00.6*

Natural Killer ¬ Déficit immunitaire primaire autosomique récessif avec un défaut de cytotoxicité spontanée des cellules *D84.8*

Naturalisation ¬ inscription dans: *Z02*

Naturel
- Excessif ¬ Exposition à: Chaleur ou froid *X59.9!*
- ¬
- - Chute d'objets lors de catastrophes *X59.9!*
- - Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice *T98.0*

Naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Plantes et produits de *F55.6*

Naumoff
v. Verma-Naumoff

Nausées
- Cours
- - Chimiothérapie ¬ *R11, Y57.9!*
- - Radiothérapie ¬ *R11, Y57.9!*
- Vomissements ¬ *R11*

Naviculaire
- Carpien ou tarsien ¬ os *S62.0*
- Pied[scaphoide du tarse] ¬ Fracture :Os *S92.21*

Naxos ¬ Maladie de *Q87.8*

NBIA [Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation] Typ 1 ¬ *G23.0*

NCL ¬ *E75.4*

NCVG ¬ *I42.88*

Nébuline ¬ Myopathie distale précoce associée à la *G71.0*

Necator americanus ¬ Infection à *B76.1*

Nécatorose ¬ *B76.1*

Nécessitant
- Aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie *R13.1*
- Dialyse ¬ Insuffisance rénale chronique, *N18.5*
- Mesure thérapeutique hygiéniques spécial ¬ micro-organisme Gram
- - Négatif résistants à certains antibiotiques et *U81!*
- - Positifs résistants à certains antibiotiques et *U80!*
- Soins ¬ Parent à charge au domicile, *Z63*

Nécessitant *–suite*
- Surveillance pendant la prise de nourriture ¬ Dysphagie *R13.0*

Nécessité
- Mesures prophylactiques ¬ *Z29*
- Vaccination
- - Associé contre
- - - Diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq] ¬ *Z27.1*
- - - Plusieurs maladie infectieux
- - - - Sans précision ¬ *Z27.9*
- - - - ¬ *Z27*
- - Contre
- - - Associations de maladies infectieuses ¬ *Z27.8*
- - - Certaines maladies virales uniques ¬ *Z24*
- - - Choléra
- - - - Seul ¬ *Z23.0*
- - - - Typhoïde-parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ *Z27.0*
- - - Coqueluche seule ¬ *Z23.7*
- - - Diphtérie
- - - - Seule ¬ *Z23.6*
- - - - Tétanos
- - - - - Coqueluche et poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ *Z27.3*
- - - - - Coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ *Z27.2*
- - - Encéphalite virale transmise par les arthropodes ¬ *Z24.1*
- - - Fièvre jaune ¬ *Z24.3*
- - - Grippe ¬ *Z25.1*
- - - Hépatite virale ¬ *Z24.6*
- - - Leishmaniose ¬ *Z26.0*
- - - Maladie
- - - - Bactériennes uniques ¬ *Z23.8*
- - - - Infectieux
- - - - - Sans précision ¬ *Z26.9*
- - - - - Uniques ¬ *Z26*
- - - - - Uniques précisées ¬ *Z26.8*
- - - - Viral
- - - - - Uniques ¬ *Z25*
- - - - - Uniques précisées ¬ *Z25.8*
- - - Oreillons seuls ¬ *Z25.0*
- - - Peste ¬ *Z23.3*
- - - Poliomyélite ¬ *Z24.0*
- - - Rage ¬ *Z24.2*
- - - Rougeole
- - - - Oreillons-rubéole [ROR] ¬ *Z27.4*
- - - - Seule ¬ *Z24.4*
- - - Rubéole seule ¬ *Z24.5*
- - - Seule maladie bactérienne ¬ *Z23*
- - - Tétanos seul ¬ *Z23.5*
- - - Tuberculose [BCG] ¬ *Z23.2*
- - - Tularémie ¬ *Z23.4*
- - - Typhoïde-paratyphoïde seule [TAB] ¬ *Z23.1*

Nécessité *–suite*
- Vaccination *–suite*
- - SAI ¬ *Z26.9*

Neck
v. Van Neck

Nécrobiose lipoïdique
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ *E10.60†, L99.8**
- - - 2 ¬ *E11.60†, L99.8**
- - ¬ *E14.60†, L99.8**
- Non classée ailleurs ¬ *L92.1*

Nécrobiotique ¬ Xanthogranulome *D76.3*

Nécrolyse épidermique toxique ¬
- NET [*L51.20*
- Spectre syndrome de Stevens-Johnson/ *L51.20*

Nécrolytique acral ¬ Érythème *L53.8*

Nécrophilie ¬ *F65.8*

Nécrosante
- Aigu
- - Cours de scarlatine ¬ Otite moyenne *A38†, H67.0**
- - Lors de grippe [Influenza] ¬ Otite moyenne *J11.8†, H67.1**
- Fœtus et du nouveau-né ¬ Entérocolite *P77*
- Médiation auto-immune ¬ Myopathie *G72.4*
- Précisées ¬ Autres vasculopathies *M31.8*
- Sans précision ¬ Vasculopathie *M31.9*
- Staphylococcique ¬ Pneumonie *J15.2*
- Subaigu syndrome
- - Foix-Alajouanine] ¬ Myélite *G37.4*
- - Leigh] ¬ Encéphalomyélopathie *G31.88*
- Sub-aiguë ¬ Myélite ascendante *G37.4*
- Suraiguë
- - Lyell
- - - Atteinte 30%
- - - - Plus de la surface corporelle ¬ Epidermolyse *L51.21*
- - - - Surface corporelle SAI ¬ Epidermolyse *L51.20*
- - - ¬ Epidermolyse *L51.2*
- - Syndrome de Lyell) SAI ¬ Epidermolyse *L51.20*
- ¬
- - Acné miliaire *L70.2*
- - Entérite aiguë *A05.2*
- - Fasciite *M72.6*
- - Granulomatose respiratoire *M31.3*
- - Hépatite *K72.9*
- - Sialométaplasie *K11.8*
- - Vasculopathies *M31*

Nécrose
- Adipeuse (segmentaire) du sein ¬ *N64.1*
- Artère ¬ *I77.5*
- Aseptique
- - Condyles huméraux ¬ *M92.0*

Nécrose *–suite*
- Aseptique *–suite*
- - Pancréas ¬ *K86.8*
- - Semi-lunaire ¬ *M92.2*
- Avasculaire
- - Idiopathique ¬ *M87.09*
- - Traumatique ¬ *M87.29*
- Cæcum ¬ *K35.8*
- Cornéenne ¬ *H18.8*
- Cortical
- - Aigu
- - - Stade
- - - - 1
- - - - - ¬ *N17.11*
- - - - - ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.11*
- - - - 2
- - - - - ¬ *N17.12*
- - - - - ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.12*
- - - - 3
- - - - - ¬ *N17.13*
- - - - - ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.13*
- - - ¬
- - - - *N17.1*
- - - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.1*
- - Rénal
- - - Stade
- - - - 1
- - - - - ¬ *N17.11*
- - - - - ¬ *N17.13*
- - - - 2 ¬ *N17.12*
- - - ¬ *N17.1*
- - SAI ¬ *N17.1*
- Graisseux
- - Pancréas ¬ *K86.8*
- - Stéato-nécrose] mésentérique ¬ *K65.8*
- Greffe de peau ¬ *T86.51*
- Hémorragique centrale du foie ¬ *K76.2*
- Hépatique ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.1*
- Hépatocytes avec insuffisance hépatique ¬ *K72*
- Hyaline de l'aorte ¬ *I71.9*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Mâchoire due à des médicaments ¬ *K10.28*
- Médullaire
- - Papillaire
- - - Aiguë ¬ *N17.2*
- - - Rénale ¬ *N17.2*
- - - SAI ¬ *N17.2*
- - Rénal stade
- - - 1 ¬ *N17.21*
- - - 2 ¬ *N17.22*
- - - 4 ¬ *N17.23*

Nécrose *–suite*
- Médullaire *–suite*
- - Stade
- - - 1 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.21*
- - - 2 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.22*
- - - 3 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.23*
- - ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.2*
- Mésentérique ¬ Nécrose graisseuse [stéato- *K65.8*
- Moignon d'amputation ¬ *T87.5*
- Nez et de la cloison nasale ¬ *J34.0*
- Papillaire
- - Rénal stade
- - - 1 ¬ *N17.21*
- - - 2 ¬ *N17.22*
- - - 5 ¬ *N17.23*
- - Stade
- - - 1 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.21*
- - - 2 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.22*
- - - 3 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.23*
- Peau tissu sous-cutané non classé
- - Avant-bras et poignet ¬ *R02.02*
- - Jambe et genou ¬ *R02.06*
- - Localisation non précisée ¬ *R02.09*
- - Main et doigt ¬ *R02.03*
- - Région
- - - Cheville, pied et orteils ¬ *R02.07*
- - - Épaule, bras et coude ¬ *R02.01*
- - - Pelvienne et cuisse ¬ *R02.05*
- - Tête et cou ¬ *R02.00*
- - Tronc ¬ *R02.04*
- - ¬ *R02.0*
- Pituitaire (post-partum) ¬ *E23.0*
- Post-traumatique de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs ¬ *R02*
- Poumon ¬ Gangrène et *J85.0*
- Pulpaire ¬ *K04.1*
- Rénal stade
- - 1 ¬ *N17.91*
- - 2 ¬ *N17.92*
- - 3 ¬ *N17.93*
- SAI du pancréas ¬ *K86.8*
- Tissu
- - Membre inférieur SAI ¬ Gelure avec *T34.9*
- - SAI ¬ Gelure
- - - *T34.9*
- - - Multiples, avec *T35.1*
- - Tronc SAI ¬ Gelure avec *T34.9*
- - ¬ Gelure
- - - *T34*
- - - Bras et de l'avant-bras, avec *T34.4*
- - - Cheville et du pied, avec *T34.8*
- - - Cou, avec *T34.1*
- - - Genou et de la jambe, avec *T34.7*
- - - Hanche et de la cuisse, avec *T34.6*

Nécrose *–suite*
- Tissu *–suite*
- - ¬ Gelure *–suite*
- - - Localisations autres et non précisées, avec *T34.9*
- - - Paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec *T34.3*
- - - Parties multiples du corps, avec *T35.1*
- - - Poignet et de la main, avec *T34.5*
- - - Tête, avec *T34.0*
- - - Thorax, avec *T34.2*
- Tuberculeux
- - Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Os ¬ *A18.0†, M90.09**
- Tubulaire
- - Aigu
- - - Stade
- - - - 1 ¬ *N17.01*
- - - - 2 ¬ *N17.02*
- - - - 3 ¬ *N17.03*
- - - ¬ *N17.0*
- - Rénal
- - - Stade
- - - - 1 ¬ *N17.01*
- - - - 2 ¬ *N17.02*
- - - - 3 ¬ *N17.03*
- - - ¬ *N17.0*
- - SAI ¬ *N17.0*
- - Stade
- - - 1 ¬
- - - - *N17.01*
- - - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.01*
- - - 2 ¬
- - - - *N17.02*
- - - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.02*
- - - 3 ¬
- - - - *N17.03*
- - - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.03*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- - ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.0*

Nécrotique
- Récidivante ¬ Périadénite muqueuse *K12.0*
- Subaiguë ¬ Myélopathie *G95.18*

Needles
v. Melnick-Needles

Négligence
- Affective ou autre forme de négligence d'un enfant ¬ *Z62*
- Côté gauche ¬ *R29.5*
- Enfant ¬ Négligence affective ou autre forme de *Z62*
- Hémilatérale ¬ *R29.5*
- Neurologique ¬ *R29.5*
- Sensorielle ¬ *R29.5*
- Soi

Négligence *–suite*
- Soi *–suite*
- - SAI ¬ *R46.8*
- - ¬ Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de *R63.6*
- Visuo-spatiale ¬ *R29.5*
- ¬
- - *Y09.9!*
- - Corps étranger abandonné dans le corps par *Y69!*
- - Incision, ponction, perforation ou hémorragie due à la *Y69!*

NEHI ¬ *J84.8*

Neige ¬
- Dégénérescence vitréo-rétinienne en flocons de *H35.5*
- Ophtalmie des *H16.1*

Neisseria
- Gonorrhoeae ¬ Épididymo-orchite à *A54.2†, N51.1**
- Meningitidis ¬ Méningite à *A39.0†, G01**

Nélaton ¬ Syndrome de *G60.8*

Nelson
v.a. Emery-Nelson
- ¬ Syndrome de *E24.1*

NEM ¬ *G71.2*

NEM1 ¬ *D44.8*

Némaline
- Adulte ¬ Myopathie *G71.2*
- Enfant ¬ Myopathie *G71.2*
- Type Amish ¬ Myopathie *G71.2*
- ¬ Myopathie: à bâtonnets [*G71.2*

Nématodes ¬ Infection à *B80*

Néoformation SAI ¬ *D48.9*

Néonatal
v. Type de maladie

Néoplasie
- Anale ¬ *D37.78*
- Canal anal ¬ *D37.78*
- Endocrinien multiple type
- - 1 ¬ *D44.8*
- - 2 ¬ *D44.8*
- - 4 ¬ *D44.8*
- Intra-épithélial prostate NIP stade
- - I ¬ *N42.3*
- - II ¬ *N42.3*
- Intraépithéliale
- - Bas degré de la prostate [PIN] ¬ *N40*
- - Col utérus NIC stade
- - - I ¬ *N87.0*
- - - II ¬ *N87.1*
- - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ *D06*
- - Haut grade de la prostate [NIP de haut grade] ¬ *D07.5*
- - Vagin NIVA stade
- - - I ¬ *N89.0*

Néoplasie *–suite*
- Intraépithéliale *–suite*
- - Vagin NIVA stade *–suite*
- - - II ¬ *N89.1*
- - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ *D07.2*
- - Vulve
- - - NIV stade
- - - - I ¬ *N90.0*
- - - - II ¬ *N90.1*
- - - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ *D07.1*
- - - ¬ *N90.3*
- Larynx ¬ *D38.0*
- Maligne ¬ Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une *Z51.82*
- Œsophagienne ¬ *D37.78*
- ¬ Lyse (spontanée) des tumeurs (après traitement cytostatique d'une *E88.3*

Néoplasique
- Lors de tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite *C79.3*
- ¬ Nævus
- - Congénital non *Q82.5*
- - Non *I78.1*

Néoplasme neuroendocrine
- Appendice ¬
- - *C18.1*
- - *D12.1*
- Incertain de l'appendice ¬ *D37.3*
- Œsophage ¬ *C15.9*
- ¬ *C80.9*

Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] ¬ Rickettsiose à *A79.8*

Néovaisseaux (de la cornée) ¬ *H16.4*

Néovasculaire
- Autosomique dominante ¬ Vitréo-rétinopathie inflammatoire *H35.2*
- ¬
- - Dégénérescence de la macula liée à l'âge, *H35.30*
- - Glaucome *H40.5*

Néovascularisation
- Choroïdienne ¬ *H31.8*
- Cornéenne ¬ *H16.4*
- Cours rétinopathie diabétique diabète sucré type
- - 1 ¬ Glaucome de *E10.30†, H36.0**
- - 2 ¬ Glaucome de *E11.30†, H36.0**
- Iris ou du corps ciliaire ¬ *H21.1*
- Rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- Rétinopathie diabétique ¬ Glaucome de *E14.30†, H36.0**

Néovessie ¬
- Calcul vésical dans une *N21.0*
- Rupture de *N32.4*
- Sténose du col de la *N32.0*

Néphrétique, sans précision ¬ Colique *N23*

Néphrite
- Aiguë ¬ *N00*
- Artérioscléreuse (chronique) (interstitielle) ¬ *I12*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, N08.0**
- Candida ¬ *B37.4†, N08.0**
- Chronique ¬ *N03*
- Cours de lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, N08.5**
- Évolution rapide ¬ *N01*
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N08.0**
- Goutte ¬ *M10.99†, N29.8**
- Interstitiel
- - Caryomégalique ¬ *N11.8*
- - Infectieux
- - - Aiguë ¬ *N10*
- - - Chronique ¬ *N11*
- - SAI
- - - Chronique ¬ *N11.9*
- - - ¬ *N12*
- Ourlienne ¬ *B26.8†, N08.0**
- Oxalate de calcium ¬ *E74.8*
- Pendant la grossesse ¬ *O26.81*
- SAI ¬ *N05*
- Scarlatineuse ¬ *A38†, N29.1**
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.5†, N08.0**
- - Précoce ¬ *A51.4†, N08.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, N08.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N29.1**
- Tubulo-interstitiel
- - Aiguë ¬ *N10*
- - Chronique
- - - Sans précision ¬ *N11.9*
- - - ¬
- - - - *N11*
- - - - *N11.8*
- - Non précisée comme aiguë ou chronique ¬ *N12*
- - ¬ Syndrome de Sjögren avec *M35.0†, N16.4**

Néphritique
- Aigu ¬ Syndrome *N00*
- Chronique ¬ Syndrome *N03*
- Évolution rapide ¬ Syndrome *N01*
- Sans précision ¬ Syndrome *N05*

Néphroblastomatose-ascite fœtale-macrosome-tumeur de Wilms ¬ Syndrome de *Q87.3*

Néphroblastome ¬ *C64*

Néphrocalcinose
v. familiale-néphrocalcinose-indicanurie
- Atteinte oculaire sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec hypercalciurie et *E83.4*

Néphrocalcinose *–suite*
- Sans atteinte oculaire sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec hypercalciurie et *E83.4*
- ¬
- - *E83.58†, N29.8**
- - Syndrome d'amélogenèse imparfaite- *K00.5†, N29.8**

Néphrogène ¬ Polycythémie: *D75.1*

Néphrogénique
- Antidiurèse inappropriée ¬ Syndrome *E22.2*
- ¬
- - Diabète insipide *N25.1*
- - Fibrose systémique *M35.8*

Néphrolithiase
- Calcul d'acide urique ¬ *M10.09†, N22.8**
- Congénitale ¬ *Q63.8*
- Goutte ¬ *M10.09†, N22.8**
- Parenchymateuse ¬ *E83.58†, N29.8**
- SAI ¬ *N20.0*

Néphrome mésoblastique congénital ¬ *D41.0*

Nephropathia epidemica ¬ *A98.5*

Néphropathie
v.a. surdité-néphropathie
- Amyloïde
- - Familiale ¬ *E85.0†, N08.4**
- - Héréditaire ¬ *E85.0†, N08.4**
- - ¬ *E85.4†, N08.4**
- Analgésique ¬ *N14.0*
- Balkans ¬ *N15.0*
- Chronique stade
- - 3 ¬ Anémie au cours de *N18.3†, D63.8**
- - 4 ¬ Anémie au cours de *N18.4†, D63.8**
- - 5 ¬ Anémie au cours de *N18.5†, D63.8**
- - Non précisé ¬ Autre *N18.89*
- Cours
- - Drépanocytose ¬ *D57.1†, N08.2**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *N08**
- Endémique des Balkans ¬ *N15.0*
- Femme enceinte ¬ Présence d'une hypertension préexistante, due à une *O10.4*
- Goutte ¬ *M10.99†, N29.8**
- Héréditaire, non classée ailleurs ¬ *N07*
- Hypertensif
- - Insuffisance rénale ¬ *I12.0*
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.2*
- - SAI ¬ *I12.9*
- - Sans insuffisance rénale ¬ *I12.9*
- - ¬ *I12*
- Liée à la grossesse ¬ *O26.81*
- Médicament substance biologique
- - Sans précision ¬ *N14.2*
- - ¬ *N14.1*
- Métaux lourds ¬ *N14.3*
- Oxalate ¬ *E74.8*

Néphropathie *–suite*
- SAI ¬ *N28.9*
- Toxique, non classée ailleurs ¬ *N14.4*
- Tubulaire ¬ Syndrome d'encéphalopathie-cardiomyopathie hypertrophique- *E88.8*
- Urate ¬ *M10.99†, N29.8**
- ¬
- - Diabète sucré
- - - *E14.20†, N08.3**
- - - Type 2 avec *E11.20†, N08.3**
- - Multikystique: *Q61.4*
- - Syndrome d'hydrocéphalie-sclérotiques bleues- *Q87.8*

Néphropathie-surdité-hyperparathyroïdie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Néphroptose ¬ *N28.88*

Néphrosclérose
- Cours de cystinose ¬ *E72.0†, N29.8**
- Goutte ¬ *M10.99†, N29.8**
- ¬ *I12*

Néphrose
- Congénitale finlandaise ¬ *N04.8*
- Cours
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, N08.5**
- - Paludisme ¬ *B52.0†, N08.0**
- Lipoïdique ¬ *N04*
- Osmotique ¬ *N14.2*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, N08.0**

Néphrostomie ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Néphrotique
- Congénital ¬ syndrome *N04*
- Familial idiopathique résistant stéroïdes
- - Hyalinose focale et segmentaire ¬ Syndrome *N04.1*
- - Lésions minimales ¬ Syndrome *N04.0*
- - Prolifération mésangiale diffuse ¬ Syndrome *N04.3*
- - Sclérose mésangiale diffuse ¬ Syndrome *N04.8*
- Idiopathique
- - Cortico-sensible
- - - Glomérulosclérose segmentaire focale ¬ Syndrome *N04.1*
- - - ¬ Syndrome *N04.0*
- - Sporadique cortico-résistant ¬ Syndrome *N04.9*
- Infantile lié à LAMB2 ¬ Syndrome *N04.8*
- Syphilitique secondaire ¬ Syndrome *A51.4†, N08.0**
- ¬
- - Œdème au cours de syndrome *N04.9*
- - Syndrome
- - - *N04*
- - - Leigh avec syndrome *G31.88†, N08.8**

Nerf
- Acoustique
- - N. stato-acoustique] ¬ *S04.6*
- - ¬ Syphilis du *A52.1†, H94.0**
- Auditif
- - Cours maladie
- - - Infectieuse NCA ¬ Névrite du *B99†, H94.0**
- - - Parasitaire NCA ¬ Névrite du *B89†, H94.0**
- - Nerf crânien VIII ¬
- - - Affections du *H93.3*
- - - Tumeur maligne: *C72.4*
- - ¬
- - - *S04.6*
- - - Lésion traumatique du *S04.6*
- - - Syphilis du *A52.1†, H94.0**
- Axillaire ¬ Lésion traumatique du *S44.3*
- Brachial due au déplacement de disque intervertébral ¬ Névrite du *M50.1†, G55.1**
- Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Collatéral
- - Doigt ¬ Lésion traumatique du *S64.4*
- - Pouce ¬ Lésion traumatique du *S64.3*
- Cou, autres et non précisés ¬ Lésion traumatique de *S14.6*
- Crânien
- - Cours
- - - Maladie
- - - - Infectieuse NCA ¬ Paralysie de plusieurs *B99†, G53.1**
- - - - Parasitaire NCA ¬ Paralysie de plusieurs *B89†, G53.1**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ affection
- - - - *G53**
- - - - *G53.8**
- - - Sarcoïdose ¬ Paralysie de plusieurs *D86.8†, G53.2**
- - - Tumeur NCA ¬ Paralysie de plusieurs *D48.9†, G53.3**
- - I] ¬ Tumeur maligne: Nerf olfactif [*C72.2*
- - II ¬
- - - *S04.0*
- - - Tumeur maligne: Nerf optique [*C72.3*
- - III ¬ *S04.1*
- - IV ¬ *S04.2*
- - IX] ¬ Affections du nerf glossopharyngien [*G52.1*
- - Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou ¬ Lésions traumatiques du cerveau et des *T06.0*
- - Non précisés ¬ Tumeur maligne: *C72.5*
- - Paralysies multiples ¬ Syphilis du *A52.1†, G53.1**
- - Parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne de la moelle épinière, des *C72*
- - Précisés ¬ Affections d'autres *G52.8*

Nerf *–suite*
- Crânien *–suite*
- - SAI ¬ *C72.5*
- - Sans précision ¬
- - - Affection des *G52.9*
- - - Lésion traumatique d'un *S04.9*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Lésion des autres *P11.4*
- - V ¬
- - - *S04.3*
- - - Affections du nerf trijumeau [*G50*
- - VI ¬ *S04.4*
- - VII ¬
- - - *S04.5*
- - - Affections du nerf facial [*G51*
- - - Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [*P11.3*
- - VIII
- - - Vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [inflammation du *H94.0**
- - - ¬
- - - - *S04.6*
- - - - Affections du nerf auditif [*H93.3*
- - - - Névrite syphilitique du *A52.1†, H94.0**
- - - - Tumeur maligne: Nerf auditif [*C72.4*
- - X] ¬ Affections du nerf vagal [*G52.2*
- - XI ¬ *S04.7*
- - XII] ¬ Affections du nerf grand hypoglosse [*G52.3*
- - ¬
- - - Affection
- - - - *G52*
- - - - Nerf olfactif [premier *G52.0*
- - - - Plusieurs *G52.7*
- - - Lésion traumatique
- - - - *S04*
- - - - *S04.8*
- - - Paralysie syphilitique des *A52.1†, G53.8**
- - - Séquelles de lésion traumatique de *T90.3*
- - - Syphilis des *A52.1†, G53.8**
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D33.3*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.3*
- Cubital
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du *S54.0*
- - - Bras ¬ Lésion traumatique du *S44.0*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S64.0*
- - SAI ¬ *S54.0*
- - ¬
- - - Lésion du *G56.2*
- - - Paralysie lente du *G56.2*

Nerf *–suite*
- Cutané sensitif niveau
- - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S94.3*
- - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un *S44.5*
- - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un *S74.2*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un *S84.2*
- Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Facial
- - Nerf crânien VII] ¬ Affections du *G51*
- - Sans précision ¬ Affection du *G51.9*
- - Traumatisme obstétrical [nerf crânien VII] ¬ Lésion du *P11.3*
- - ¬
- - - Affections du *G51.8*
- - - Herpès zoster du *B02.2†, G53.0**
- - - Lésion traumatique du *S04.5*
- - - Syphilis du *A52.1†, G53.8**
- Fémoral
- - Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique du *S74.1*
- - ¬
- - - Lésion du *G57.2*
- - - Syndrome compressif du *G57.2*
- Fémoro-cutané ¬ Syndrome du *G57.1*
- Ganglions sympathiques et parasympathiques ¬ *C47*
- Glossopharyngien
- - IX] ¬ *S04.8*
- - Nerf crânien IX] ¬ Affections du *G52.1*
- - ¬ Névralgie du *G52.1*
- Grand hypoglosse
- - Nerf crânien XII] ¬ Affections du *G52.3*
- - XII] ¬ *S04.8*
- II voie optique
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections du *H48**
- - ¬ Autres affections du *H47*
- Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Médian
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du *S54.1*
- - - Bras ¬ Lésion traumatique du *S44.1*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S64.1*
- - SAI ¬ *S54.1*
- - ¬ Autres lésions du *G56.1*
- Membre
- - Inférieur ¬ Séquelles de lésion traumatique de *T93.4*
- - Supérieur ¬ Séquelles d'une lésion traumatique de *T92.4*

Nerf *–suite*
- Moelle épinière
- - Lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique des *S34*
- - Niveau
- - - Cou ¬ Lésion traumatique
- - - - *S14*
- - - - Cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des *T06.0*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique des *S24*
- - Plusieurs autres parties du corps ¬ Lésions traumatiques des *T06.1*
- Moteur oculaire
- - Commun
- - - III) ¬ Paralysie du *H49.0*
- - - ¬ Lésion traumatique du *S04.1*
- - Externe
- - - VI) ¬ Paralysie du *H49.2*
- - - ¬ Lésion traumatique du *S04.4*
- Muscles oculomoteurs ¬ Paralysie congénitale de plusieurs *H49.9*
- Musculo-cutané ¬ Lésion traumatique du *S44.4*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique
- - - *S54.8*
- - - Multiples *S54.7*
- - Cheville pied ¬ Lésion traumatique
- - - *S94.8*
- - - Multiples *S94.7*
- - Épaule bras ¬ Lésion traumatique
- - - *S44.8*
- - - Multiples *S44.7*
- - Hanche cuisse ¬ Lésion traumatique
- - - *S74.8*
- - - Multiples *S74.7*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique
- - - *S84.8*
- - - Multiples *S84.7*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique
- - - *S64.8*
- - - Multiples *S64.7*
- Non précis
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T13.3*
- - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T11.3*
- - Niveau
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S34.8*
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un *S54.9*
- - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S94.9*
- - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un *S44.9*

Nerf *–suite*
- Non précis *–suite*
- - Niveau *–suite*
- - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un *S74.9*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un *S84.9*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un *S64.9*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique d'un *S24.6*
- Oculomoteur ¬ Paralysie
- - Alternante du *G83.8*
- - Congénitale du *H49.0*
- Olfactif
- - I] ¬ *S04.8*
- - Nerf olfactif [Nerf crânien I] ¬ Tumeur maligne: *C72.2*
- - Premier nerf crânien] ¬ Affections du *G52.0*
- Optique
- - Cours
- - - Accouchement ¬ Lésion du *P11.4*
- - - Maladie Leber ¬ Atrophie
- - - - *H47.2*
- - - - Héréditaire du *H47.2*
- - Nerf optique [Nerf crânien II] ¬ Tumeur maligne: *C72.3*
- - Non classées ailleurs ¬ Affections du *H47.0*
- - ¬
- - - Anomalie congénitale de la papille du *Q14.2*
- - - Atrophie syphilitique
- - - - *A52.1†, H48.0**
- - - - Congénitale du *A50.4†, H48.0**
- - - Compression du *H47.0*
- - - Dégénérescence du *H47.0*
- - - Hémorragie de la gaine du *H47.0*
- - - Syphilis du *A52.1†, H48.0**
- - - Tuberculose du *A18.5†, H48.8**
- Pathétique
- - IV) ¬ Paralysie du *H49.1*
- - ¬ Lésion traumatique du *S04.2*
- Périphérique ¬
- - Atrophie d'un *G58.9*
- - Compression d'un *G58.9*
- - Irritation d'un *G58.9*
- - Lésion d'un *G58.9*
- - Syphilis d'un *A52.7†, G59.8**
- Périphériques
- - Abdomen ¬ Tumeur maligne: *C47.4*
- - Autonome
- - - Cours
- - - - Amylose ¬ Neuropathie des *E85.4†, G99.0**
- - - - Hyperthyroïdie ¬ Neuropathie des *E05.9†, G99.0**
- - - - Maladie

Nerf *–suite*
- Périphériques *–suite*
- - Autonome *–suite*
- - - Cours *–suite*
- - - - Maladie *–suite*
- - - - - Endocrinienne NCA ¬ Neuropathie des *E34.9†, G99.0**
- - - - - Métabolique NCA ¬ Neuropathie des *E88.9†, G99.0**
- - - Diabète sucré ¬ Neuropathie des *E14.40†, G99.0**
- - - Goutte ¬ Neuropathie des *M10.09†, G63.6**
- - Cou ¬ Lésion traumatique des *S14.4*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ Tumeur maligne: *C47.2*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ Tumeur maligne: *C47.1*
- - Orbite ¬
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - - *D48.7*
- - Pelvis ¬ Tumeur maligne: *C47.5*
- - Système nerveux autonome
- - - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C47.9*
- - - ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: *D36.1*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.2*
- - - - Malign
- - - - - *C47*
- - - - - Lésion à localisations contiguës des *C47.8*
- - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur maligne: *C47.0*
- - Thorax ¬
- - - Lésion traumatique de *S24.3*
- - - Tumeur maligne: *C47.3*
- - Tronc, sans précision ¬ Tumeur maligne: *C47.6*
- - ¬ Tumeur maligne des gaines des *C47.9*
- Péronier ¬ Paralysie du *G57.3*
- Phrénique due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie du *P14.2*
- Plantaire
- - Externe ¬ Lésion traumatique du *S94.0*
- - Interne ¬ Lésion traumatique du *S94.1*
- - ¬ Lésion du *G57.6*
- Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques des *T06.2*
- Pneumogastrique [X] ¬ *S04.8*
- Racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un *T09.4*
- Radial
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du *S54.2*

Nerf *–suite*
- Radial *–suite*
- - Niveau *–suite*
- - - Bras ¬ Lésion traumatique du *S44.2*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S64.2*
- - SAI ¬ *S54.2*
- - ¬ Lésion du *G56.3*
- S
- - Partie du corps non précisée ¬ Lésion traumatique de *T14.4*
- - Périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S34.6*
- SAI ¬ Lésions traumatiques multiples de *T06.2*
- Sciatique
- - Déplacement de disque intervertébral ¬ Névrite du *M51.1†, G55.1**
- - Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique du *S74.0*
- - Poplité
- - - Externe
- - - - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du *S84.1*
- - - - ¬ Lésion du *G57.3*
- - - Interne
- - - - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du *S84.0*
- - - - ¬ Lésion du *G57.4*
- - ¬ Lésion du *G57.0*
- Sensitif cutané au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un *S54.3*
- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Spinal ¬ Lésion traumatique du *S04.7*
- Splanchnique ¬ *S34.5*
- Sympathique
- - Cervicaux ¬ Lésion traumatique des *S14.5*
- - Lombaires, sacrés et du bassin ¬ Lésion traumatique des *S34.5*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de *S24.4*
- Thorax ¬ Lésion traumatique d'autres *S24.5*
- Tibial antérieur
- - Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique du *S94.2*
- - ¬ Branche terminale externe du *S94.2*
- Traumatique SAI ¬
- - Lésion d'un *T14.4*
- - Section d'un *T14.4*
- Trijumeau
- - Nerf crânien V] ¬ Affections du *G50*
- - Sans précision ¬ Affection du *G50.9*
- - ¬
- - - Affections du *G50.8*
- - - Lésion traumatique du *S04.3*
- Trochléaire ¬ Paralysie congénital
- - *H49.1*
- - Familiale du *H49.1*

Nerf *–suite*
- Vagal [nerf crânien X] ¬ Affections du *G52.2*
- Vestibulocochléaire ¬
- - Névrite syphilitique
- - - *A52.1†, H94.0**
- - - Tardive du *A52.1†, H94.0**
- - Syphilis du *A52.1†, H94.0**
- Vestibulo-cochléaire cours maladie
- - Infectieuse NCA ¬ Névrite du *B99†, H94.0**
- - Parasitaire NCA ¬ Névrite du *B89†, H94.0**
- Voie optique
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du *H48.8**
- - ¬ Lésion traumatique du *S04.0*
- ¬
- - Agénésie d'un *Q07.8*
- - Paralysie syphilitique
- - - *A52.1†, G59.8**
- - - Multiples des *A52.1†, G63.0**

Nerf pneumogastrique
v. nerf vagal

Nerveux
- Acte
- - Médicaux
- - - Non classées ailleurs ¬ Affections du système *G97*
- - - ¬
- - - - Affections du système *G97.8*
- - - - Maladies du système *G97.88*
- - Visée diagnostique et thérapeutique, sans précision ¬ Affection du système *G97.9*
- Asymptomatique ¬ Syphilis *A52.2*
- Autonome
- - Cours
- - - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du système *G99.1**
- - - Maladies endocriniennes et métaboliques ¬ Neuropathie du système *G99.0**
- - Sans précision ¬
- - - Affection du système *G90.9*
- - - Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système *T44.9*
- - - Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système *C47.9*
- - ¬
- - - Affection système
- - - - *G90*
- - - - *G90.8*
- - - Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système *T44*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Nerfs périphériques et du système *D36.1*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système *D48.2*
- - - - Malign

Nerveux *–suite*
- Autonome *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Tumeur *–suite*
- - - - Malign *–suite*
- - - - - Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système *C47.8*
- - - - - Nerfs périphériques et du système *C47*
- Central
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ Complications impliquant le système *O29.2*
- - - Puerpéralité ¬ Complications intéressant le système *O89.2*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Complications intéressant le système *O74.3*
- - Cours
- - - Affections classées ailleurs ¬ Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système *G13.8**
- - - Maladies tumorales ¬ Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système *G13.1**
- - - Myxœdème ¬ Atrophie systémique du système *E03.9†*, *G13.2**
- - - Tumeur NCA ¬ Atrophie systémique du système *D48.9†*, *G13.1**
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l'encéphale et du système *D43*
- - Fœtus ¬ Soins maternels pour malformation (présumée) du système *O35.0*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres infections virales du système *A88*
- - SAI ¬
- - - Gomme (syphilitique) du système *A52.3*
- - - Maladie à prion du système *A81.9*
- - - Syphilis (tardive) du système *A52.3*
- - - Syphilome du système *A52.3*
- - - Système
- - - - *D33.9*
- - - - *D43.9*
- - Sans précision ¬
- - - Affection
- - - - Démyélinisante du système *G37.9*
- - - - Système *G96.9*
- - - Infection
- - - - Atypiques à virus, du système *A81.9*
- - - - Virale du système *A89*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Système *D33.9*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Système *D43.9*
- - - - Maligne: Système *C72.9*
- - Traumatisme obstétrical
- - - Sans précision ¬ Lésion du système *P11.9*
- - - ¬ Autres lésions du système *P11*

Nerveux *–suite*
- Central *–suite*
- - ¬
- - - Affection
- - - - Démyélinisante
- - - - - Précisées du système *G37.8*
- - - - - Système *G37*
- - - - Précisées du système *G96.8*
- - - - Système *G96*
- - - Angéite primaire du système *I67.7*
- - - Cysticercose du système *B69.0†*, *G99.8**
- - - Gomme syphilitique du système *A52.3†*, *G07**
- - - Infection
- - - - Atypiques à virus, du système *A81.8*
- - - - Virales précisées du système *A88.8*
- - - Lymphome
- - - - Diffus à grandes cellules B du système *C83.3*
- - - - Primitif du système *C83.3*
- - - Maladie
- - - - Prions, du système *A81*
- - - - VIH avec affection du système *B22†*, *G94.8**
- - - Médulloépithéliome du système *C72.9*
- - - Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système *G37.3*
- - - Résultat anormal
- - - - Explorations fonctionnelles du système *R94.0*
- - - - Imagerie diagnostique du système *R90.8*
- - - Séquelle
- - - - Affections inflammatoires du système *G09*
- - - - Tuberculose du système *B90.0*
- - - Syndrome de dysplasie ectodermique-déficience intellectuelle-malformation du système *Q87.8*
- - - Syphilis
- - - - Anévrisme du système *A52.0†*, *I68.8**
- - - - Vasculaire du système *A52.0†*, *I68.8**
- - - Tuberculose du système *A17.9†*, *G99.8**
- - - Tumeur
- - - - Bénin
- - - - - Encéphale et d'autres parties du système *D33*
- - - - - Parties précisées du système *D33.7*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres parties du système *D43.7*
- - - - Malign
- - - - - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système *C72.8*
- - - - - Moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système *C72*
- - - - Neuroectodermique
- - - - - Primitive (PNET) du système *C72.9*

Nerveux *–suite*
- Central *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Tumeur *–suite*
- - - - Neuroectodermique *–suite*
- - - - - Primitive du système *C72.9*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Troubles mentaux et maladies du système *O99.3*
- Cours
- - Affections classées ailleurs ¬ Autres affections dégénératives du système *G32**
- - Maladies classées ailleurs ¬
- - - Affection
- - - - Dégénératives précisées du système *G32.8**
- - - - Précisées du système *G99.8**
- - - - Système *G99**
- - - Compression des racines et des plexus *G55.8**
- - Spondylarthrose ¬ Compression des racines *M47.29†*, *G55.2**
- - Tumeur NCA ¬ Compression des racines *D48.9†*, *G55.0**
- Liée à l'alcool ¬ Dégénérescence du système *G31.2*
- Lombaire ¬ Syndrome d'irritation de la racine *M51.1†*, *G55.1**
- Lors atteinte disque intervertébral
- - Cervicaux avec myélopathie ¬ Compression des racines *M50.0†*, *G99.2**
- - Myélopathie ¬ Compression des racines *M51.0†*, *G99.2**
- - ¬ Compression des racines *M51.1†*, *G55.1**
- Non
- - Classé ¬ affection
- - - Dégénératives du système *G31*
- - - Système *G98*
- - Précisées ¬ Tumeur maligne secondaire de parties du système *C79.4*
- Organe sens ¬
- - Antécédents personnels de maladies du système *Z86.6*
- - Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système *Z46.2*
- Ostéo-musculaire
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux systèmes *R29.8*
- - ¬ Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes *R29*
- Périphérique
- - Épreuves sensorielles spéciales ¬ Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système *R94.1*
- - SAI ¬ Affection du système *G64*
- - Traumatisme obstétrical
- - - Sans précision ¬ Lésion du système *P14.9*
- - - ¬ Lésion
- - - - Parties du système *P14.8*

Nerveux *–suite*
- Périphérique *–suite*
- - Traumatisme obstétrical *–suite*
- - - ¬ Lésion *–suite*
- - - - Système *P14*
- - ¬
- - - Affections du système *G64*
- - - Maladie démyélinisante du système *G62.88*
- Plexus rachidien du tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la racine *T09.4*
- Précisées ¬ Autres maladies dégénératives du système *G31.88*
- Rachis
- - Cervical ¬ Lésion traumatique d'une racine *S14.2*
- - Dorsal ¬ Lésion traumatique d'une racine *S24.2*
- - Lombaire et sacré ¬ Lésion traumatique de la racine *S34.2*
- SAI ¬
- - Affection du système *G98*
- - Surdité (de): *H90.5*
- - Système *C72.9*
- Sans précision ¬
- - Affection
- - - Dégénérative du système *G31.9*
- - - Racines et des plexus *G54.9*
- - Malformation congénitale du système *Q07.9*
- - Syphilis *A52.3*
- Symptomatique ¬ Syphilis *A52.1*
- Tabétique juvénile ¬ Syphilis *A50.4*
- Tardive [neurosyphilis juvénile] ¬ Syphilis congénitale *A50.4*
- Végétatif du à l'alcool ¬ Dysfonctionnement du système *G31.2*
- ¬
- - Affection
- - - Dégénératives précisées du système *G31.8*
- - - Racine plexus
- - - - *G54*
- - - - *G54.8*
- - Anomalie
- - - Congénitale SAI du système *Q07.9*
- - - Réponse à une stimulation *R94.1*
- - Atteinte des disques intervertébraux cervicaux avec compression des racines *M50.1†, G55.1**
- - Complication
- - - Mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système *T85.1*
- - - Prothèses, implants et greffes internes du système *T85.81*
- - Dégénérescence amyloïde du système *E85.4†, G99.8**
- - Éructation *F45.31*

Nerveux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Formes de tuberculose du système *A17.8†*
- - Gastrite *F54, K29.7*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système *T85.72*
- - Lésion congénitale SAI du système *Q07.9*
- - Maladie
- - - Chagas chronique avec atteinte du système *B57.4†, G99.8**
- - - Congénitale SAI du système *Q07.9*
- - Malformation congénital
- - - Précisées du système *Q07.8*
- - - Système *Q07*
- - Mise en observation pour suspicion d'affection du système *Z03.3*
- - Tension *R45.0*
- - Tuberculose
- - - *A17.8†, G59.8**
- - - Système
- - - - *A17.9†, G99.8**
- - - - *A17†*

Nervosa ¬
- Boulimie (bulimia *F50.2*
- Hyperorexia *F50.2*

Nervosité ¬ *R45.0*

Nés
- Avant terme ¬ Autres enfants *P07.3*
- Hôpital ¬
- - Jumeaux, *Z38.3*
- - Naissances multiples, enfants *Z38.6*
- Hors hôpital ¬
- - Jumeaux, *Z38.4*
- - Naissances multiples, enfants *Z38.7*
- Vivant
- - Selon le lieu de naissance ¬ Enfants *Z38*
- - ¬ Naissance
- - - Gémellaire, jumeaux *Z37.2!*
- - - Multiple
- - - - Certains enfants *Z37.6!*
- - - - Tous *Z37.5!*
- ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de: mort- *Z35.2*

Nestor-Guillermo ¬ Progéria de *E34.8*

NET
- Nécrolyse épidermique toxique] ¬ *L51.20*
- ¬ Intolérance orthostatique par déficit en *I95.1*

Netherton ¬ Syndrome de *Q80.8*

Nettleship-Falls ¬ Albinisme oculaire type *E70.3*

Nettoyage ¬ *Z43*

Neuhauser ¬ Anomalie de *Q25.4*

Neuhäuser ¬ Syndrome de *Q87.8*

Neu-Laxova ¬ Syndrome de *Q87.8*

Neural ¬ Anomalie du tube *Q05.9*

Neurasthénie ¬ *F48.0*

Neurilemmome ¬ *D36.1*

Neurinome de l'acoustique ¬ *D33.3*

Neuritique ¬ Atrophie musculaire *G58.9†, M63.89**

Neuro-avitaminose ¬ *E56.9†, G99.8**

Neuroaxonale infantile [maladie de Seitelberger] ¬ Dystrophie *G31.88*

Neuroblastome
- Olfactif ¬ *C30.0*
- ¬ *C74.9*

Neuroborréliose ¬ *A69.2†, G05.0**

Neurocirculatoire
- Psychogène ¬ Trouble *F45.30*
- ¬ Asthénie
- - *F45.3*
- - *F45.30*

Neurocutané
- Héréditaire ¬ Malformation *D18.08*
- ¬ Mélanocytose *D22.9*

Neurocysticercose ¬ *B69.0†, G99.8**

Neurocytome
- Central ¬ *D43.0*
- Extraventriculaire ¬ *D43.2*

Neurodégénératif
- Déficit de transport cérébral des folates ¬ Syndrome *G31.88*
- Lié X type
- - Bertini ¬ Syndrome *G31.88*
- - Hamel ¬ Syndrome *G31.88*

Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation] Typ 1 ¬ NBIA [*G23.0*

Neurodégénérescence
- Associé
- - Déficit en pantothénate kinase ¬ *G23.0*
- - Ferritine ¬ *G23.0*
- - Hydroxylase des acides gras ¬ *G23.0*
- - Phospholipase A2 ¬ *G31.88*
- - Protéine
- - - Bêta-propeller ¬ *G23.0*
- - - COASY ¬ *G23.0*
- - - Membrane mitochondriale ¬ *G23.0*
- Déficit en 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase ¬ *E71.1*
- Surcharge cérébrale en fer type 1 ¬ *G23.0*

Neuroectodermique
- Johnson ¬ Syndrome *Q87.8*
- Mélanolysosomale ¬ Maladie *E70.3*
- Primitif
- - Col de l'utérus ¬ Tumeur *C53.9*
- - Corps de l'utérus ¬ Tumeur *C54.9*
- - PNET) du système nerveux central ¬ Tumeur *C72.9*
- - Système nerveux central ¬ Tumeur *C72.9*
- Type Zunich ¬ Syndrome *Q87.8*

Neuroendocrine
- Appendice ¬ Néoplasme
- - *C18.1*
- - *D12.1*
- Côlon ¬
- - Carcinome *C18.9*
- - Tumeur *C18.9*
- Cutané ¬ Carcinome *C44.9*
- Estomac ¬ Tumeur
- - *C16.9*
- - *D13.1*
- Faible grade du corps de l'utérus ¬ Tumeur *C54.9*
- Haut grade du col de l'utérus ¬ Carcinome *C53.9*
- Hépatique primaire ¬ Carcinome *C22.7*
- Iléon ¬ Tumeur
- - *C17.2*
- - *D13.3*
- Incertain
- - Appendice ¬ Néoplasme *D37.3*
- - Côlon ¬ Tumeur *D37.4*
- - Iléon ¬ Tumeur *D37.2*
- - Jéjunum ¬ Tumeur *D37.2*
- Jéjunum ¬ Tumeur
- - *C17.1*
- - *D13.3*
- Métastatique ¬ Tumeur *C80.9*
- Non fonctionnel pancréas ¬ Tumeur
- - *C25.9*
- - *D13.7*
- Nourrisson ¬ Hyperplasie des cellules *J84.8*
- Œsophage ¬ Néoplasme *C15.9*
- Pancréas ¬
- - Carcinome *C25.9*
- - Tumeur *C25.9*
- Poumon ¬ Tumeur *C34.9*
- Vésicule biliaire ¬ Tumeur *C23*
- ¬
- - Carcinome *C80.9*
- - Néoplasme *C80.9*
- - Tumeur gastro-intestinale *C26.9*

Neuroépithéliale dysembryoplasique ¬ Tumeur *D33.2*

Neuroépithéliome ¬ *C71.9*

Neuro-facio-digito-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Neuroferritinopathie ¬ *G23.0*

Neurofibromatose
v.a. microdélétion-neurofibromatose
- Non maligne) ¬ *Q85.0*
- Syndrome de Noonan ¬ *Q87.1*
- ¬ *Q85.0*

Neurofibrome
- Malin ¬ *C47.9*
- ¬ *D36.1*

Neurofibrosarcome ¬ *C47.9*

Neurofilaments ¬ Neuropathie axonale sévère précoce par déficit en chaîne légère des *G60.0*

Neuro-gastro-intestinale ¬ Encéphalomyopathie mitochondriale *G31.81*

Neurogène
- Atonique (motrice) (sensorielle) ¬ Vessie *N31.2*
- Autonome ¬ Vessie *N31.2*
- Dénervation afférente chirurgicale ¬ Vessie *N31.2*
- Détrusor/sphincter de la vessie ¬ Dysfonctionnement *N31.88*
- Flasque (périphérique), non classée ailleurs ¬ Vessie *N31.2*
- Neuropathie autonome ¬ Vessie *N31.2*
- Non
- - Classé ailleurs ¬ Intestin *K59.2*
- - Inhibée, non classée ailleurs ¬ Vessie *N31.0*
- Non-réflexe ¬ Vessie *N31.2*
- Réflexe, non classée ailleurs ¬ Vessie *N31.1*
- SAI ¬ Dysfonctionnement de la vessie *N31.9*
- Syndrome
- - Cortex frontal ¬ Vessie *N31.2*
- - Shy-Drager] ¬ Hypotension orthostatique *G23.8*
- ¬
- - Atrophie osseuse tabique *A52.1†, M90.29**
- - Diabète insipide *E23.2*
- - Sarcome *C47.9*
- - Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension orthostatique *G23.8*

Neurogénique
- Type Kaeser ¬ Syndrome scapulo-péronier *G12.1*
- ¬ Arthrogrypose congénitale multiple *Q74.3*

Neuroleptiques
- Dérivés de la phénothiazine ¬ Intoxication: Psycholeptiques et *T43.3*
- Non précisés ¬ Intoxication: Psycholeptiques et *T43.5*
- Type butyrophénone et thioxanthène ¬ Intoxication: *T43.4*
- ¬
- - Intoxication aux *T43.5*
- - Syndrome malin des *G21.0*

Neurolipidose ¬ *E75.4*

Neurolipomatose ¬ *E88.29*

Neurologique
- Cours
- - Syringobulbie ¬ Spondylopathie *G95.0†, M49.49**
- - Syringomyélie ¬ Spondylopathie *G95.0†, M49.49**
- - Tabès ¬ Spondylopathie *A52.1†, M49.49**
- ¬
- - Arthrite au cours d'une affection *G98†, M14.69**
- - Crétinisme endémique, de type *E00.0*

Neurologique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Diabète sucré
- - - Complication *E14.40*
- - - Insulino-dépendant de type 2 avec complication *E11.40†, G63.2**
- - - Non insulino-dépendant
- - - - Primaire avec complication *E11.40†, G63.2**
- - - - Type 2 avec complication *E11.40†, G63.2**
- - - Type
- - - - 1 avec complication *E10.40†, G63.2**
- - - - 2 avec complication *E11.40†, G63.2**
- - Diphtérie avec complication *A36.8†, G99.8**
- - Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat *N31.81*
- - Négligence *R29.5*
- - Rubéole complication
- - - *B06.0†, G99.8**
- - Spondylopathie *M49.4**
- - Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type *E00.0*
- - Vessie instable sans substrat *N31.82*
- - Zona accompagné d'autres manifestations *B02.2†*

Neurométabolique par déficit en sérine ¬ Maladie *E72.8*

Neuromusculaire
- Congénitale ¬ GSD type 4, forme *E74.0*
- Périnatal fatale ¬
- - Glycogénose
- - - Déficit en enzyme branchante, forme *E74.0*
- - - Type 4, forme *E74.0*
- - GSD
- - - Déficit en enzyme branchante, forme *E74.0*
- - - Type 4, forme *E74.0*
- Sans précision ¬ Affection *G70.9*
- Vessie, sans précision ¬ Dysfonctionnement *N31.9*
- ¬
- - Dysfonction vésicale d'origine *N31.88*
- - Glycogénose type 4
- - - Adulte, forme *E74.0*
- - - Enfant, forme *E74.0*
- - Scoliose *M41.4*

Neuromusculaires
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections musculaires et *G73**
- Précisées ¬ Autres affections *G70.8*
- Toxiques ¬ Affections *G70.1*
- Vessie ¬ Autres dysfonctionnements *N31.8*
- ¬
- - Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants *T48.1*
- - Myasthénie et autres affections *G70*

Neuro-musculosquelettique type chypriote ¬ Syndrome *Q87.8*

Neuromyélite optique [Devic] ¬ *G36.0*

Neuromyopathie

- Neuropathie paranéoplasiques ¬ *G13.0**
- Paranéoplasique ¬ *D48.9†, G13.0**

Neuromyotonie

- Hyperhidrose-polyneuropathie ¬ Syndrome d'encéphalite limbique- *G60.8*
- Isaacs] ¬ *G71.1*

Neuronal

- Adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents bloquants *T44.8*
- Adulte ¬ Céroïde-lipofuscinose *E75.4*
- Infantile tardive ¬ Céroïde-lipofuscinose *E75.4*
- Progressive de l'enfant avec maladie du foie ¬ Dégénérescence *G31.88*
- Variante épilepsie nordique ¬ Céroïde-lipofuscinose *E75.4*
- ¬
- - Céroïde-lipofuscinose *E75.4*
- - Lipofuscinose
- - - *E75.4*
- - - Céroïdes *E75.4*

Neurone moteur

- Inférieur ¬ Paralysie faciale (parésie faciale) (faiblesse faciale) due à une lésion du *G51.0*
- Supérieur ¬ Paralysie (parésie) (faiblesse) faciale due à une lésion du *G83.6*
- ¬
- - Dégénérescence familiale du *G12.2*
- - Maladies du *G12.2*

Neuronite vestibulaire ¬ *H81.2*

Neuronopathique subaiguë ¬ Maladie de Gaucher *E75.2*

Neuropathie

- Amyloïde autonome ¬ *E85.9†, G99.0**
- Associée à une ataxie héréditaire ¬ *G60.2*
- Autonome
- - Périphérique idiopathique
- - - Non précisée ¬ *G90.09*
- - - ¬ Autre *G90.08*
- - ¬
- - - Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une *N31.1*
- - - Vessie neurogène: due à une *N31.2*
- Axonal
- - Motrice aiguë ¬ *G61.0*
- - Sévère précoce par déficit en chaîne légère des neurofilaments ¬ *G60.0*
- - Type 1 ¬ Syndrome d'ataxie spinocérébelleuse- *G60.2*
- Axones géants ¬ *G60.8*
- Carcinomateuse ¬ *C80.9†, G13.0**
- Cours de carence en vitamine B12 ¬ *E53.8†, G63.4**
- Diabétique

Neuropathie *–suite*

- Diabétique *–suite*
- - Cœur ¬ *E14.40†, G99.0**
- - Diabète sucré de type 1 ¬ *E10.40†, G63.2**
- Héréditaire
- - Hypersensibilité à la pression ¬ *G60.0*
- - Idiopathique
- - - Sans précision ¬ *G60.9*
- - - ¬ Autres *G60.8*
- - Motrice sensoriel
- - - Types I-IV ¬ *G60.0*
- - - ¬ *G60.0*
- - Sensitif autonomique type
- - - 1 ¬ *G60.8*
- - - 1B ¬ *G60.8*
- - - 2 ¬ *G60.8*
- - - 4 ¬ *G60.8*
- - - 5 ¬ *G60.8*
- - - 6 ¬ *G60.8*
- - - 7 ¬ *G60.8*
- - - 8 ¬ *G60.8*
- - Surdité, déficience intellectuelle et absence de fibres sensitives myélinisées de gros calibre ¬ *G60.0*
- Hypertrophique de l'enfant ¬ *G60.0*
- Motrice multifocale ¬
- - *G61.8*
- - NMM [*G61.8*
- Nerf périphériques autonome
- - Cours
- - - Amylose ¬ *E85.4†, G99.0**
- - - Hyperthyroïdie ¬ *E05.9†, G99.0**
- - - Maladie
- - - - Endocrinienne NCA ¬ *E34.9†, G99.0**
- - - - Métabolique NCA ¬ *E88.9†, G99.0**
- - Diabète sucré ¬ *E14.40†, G99.0**
- - Goutte ¬ *M10.09†, G63.6**
- Non systémique due à une vascularite ¬ *G61.8*
- Optique
- - Héréditaire de Leber ¬ *H47.2*
- - Ischémique ¬ *H47.0*
- - Non ischémique ¬ *H46*
- Paranéoplasique ¬
- - *D48.9†, G13.0**
- - Neuromyopathie et *G13.0**
- Progressive idiopathique ¬ *G60.3*
- Radiculaire avec atteinte des disques intervertébraux ¬ *M51.1†, G55.1**
- SAI ¬ *G62.9*
- Sensitif héréditaire transmission
- - Dominante ¬ *G60.8*
- - Récessive ¬ *G60.8*
- Sensitivo-motrice axonale aiguë ¬ *G61.0*
- Sensorimotrice héréditaire] ¬ NSMH [*G60.0*
- Sérique ¬ *G61.1*

Neuropathie *–suite*

- Système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques ¬ *G99.0**
- Trouble de l'audition ¬ *G60.8*
- Urémique ¬ *N18.89†, G63.8**
- Viscérale-anomalies cérébrales-dysmorphie-retard du développement ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬
- - Diabète sucré
- - - *E14.40†, G63.2**
- - - Type 2 avec *E11.40†, G63.2**
- - Syndrome de cataracte congénitale-dysmorphie faciale- *Q87.8*

Neuropathie-ataxie-rétinite pigmentaire ¬

- NARP [Syndrome de *G31.81*
- Syndrome de *G31.81*

Neuropathique

- Cours de syphilis ¬ Arthrite *A52.1†, M14.69**
- Diabète sucré ¬ Arthropathie *E14.60†, M14.69**
- Non syphilitique NCA ¬ Arthrite *G98†, M14.69**
- Sensorielle-dysarthrie-ophtalmoplégie ¬ Syndrome d'ataxie *G31.81, H49.4*
- Tabique ¬ Arthropathie *A52.1†, M14.69**
- ¬
- - Amylose hérédofamiliale
- - - *E85.1*
- - - Non *E85.0*
- - Arthropathie *M14.6**

Neurorécidive

- Syphilitique de la rétine ¬ *A52.1†, H36.8**
- ¬ Syphilis de l'oreille interne avec *A52.1†, H94.0**

Neurorétinite syphilitique ¬ *A52.1†, H36.8**

Neurosarcoïdose ¬ *D86.8†, G99.8**

Neurosensoriel

- Bilatéral ¬
- - Déficit auditif *H90.3*
- - Surdité *H90.3*
- Congénitale ¬ Albinisme oculaire avec surdité *E70.3*
- Lié X ¬ Surdité mixte transmission
- - *H90.3*
- - *H90.8*
- Non syndromique mitochondriale ¬ Surdité *H90.5*
- SAI ¬
- - Déficit auditif *H90.5*
- - Perte de l'audition *H90.5*
- Sans
- - Altération de l'audition de l'autre oreille ¬ Surdité unilatérale mixte de transmission et *H90.7*
- - Précision ¬ Surdité
- - - *H90.5*
- - - Mixte de transmission et *H90.8*

Neurosensoriel *–suite*

- Syndromique due à un déficit combiné de la phosphorylation oxydative ¬ Surdité *G31.81*, *H90.8*
- Unilatéral
- - Sans altération de l'audition de l'autre oreille ¬ Surdité *H90.4*
- - ¬ Déficit auditif *H90.4*
- ¬
- - Surdité
- - - Bilatérale mixte de transmission et *H90.6*
- - - Transmission et *H90*
- - Syndrome de myopie forte-surdité *H90.5*

Neurostimulateur ¬ Adaptation et manipulation d'un *Z45.80*

Neurosyphilis

- Adhésive des méninges ¬ *A52.1†*, *G01**
- Anévrisme cérébral ¬ *A52.0†*, *I68.8**
- Arachnoïde ¬ *A52.1†*, *G01**
- Artérite cérébrale ¬ *A52.0†*, *I68.1**
- Ataxie cérébelleuse ¬ *A52.1†*, *G99.8**
- Atrophie optique ¬ *A52.1†*, *H48.0**
- Dure-mère ¬ *A52.1†*, *G01**
- Hémorragique ¬ *A52.3†*, *I68.1**
- Juvénile] ¬ Syphilis congénitale nerveuse tardive [*A50.4*
- Leptoméninges ¬ *A52.1†*, *G01**
- Méningite aiguë ¬ *A52.1†*, *G01**
- Méningo-vasculaire ¬ *A52.1†*, *G01**
- Thrombose cérébrale ¬ *A52.0†*, *I68.8**
- Vasculaire NCA ¬ *A52.0†*, *I68.8**
- ¬
- - Choriorétinite disséminée au cours de *A52.1†*, *H32.0**
- - Démence au cours de *A52.1†*, *F02.8**
- - Méningite au cours de *A52.1†*, *G01**

Neurosyphilitique ¬ Gomme *A52.3†*, *G07**

Neurotrophique ¬

- Kératoconjonctivite: *H16.2*
- Kératopathie *B00.5†*, *H19.1**

Neurovégétatif somatoforme

- Appareil
- - Digestif haut ¬ Dysfonctionnement *F45.31*
- - Uro-génital ¬ Dysfonctionnement *F45.34*
- Organe système
- - Non précisé ¬ Dysfonctionnement *F45.39*
- - ¬ Dysfonctionnement *F45.38*
- Plusieurs organes et systèmes ¬ Dysfonctionnement *F45.37*
- Système
- - Cardio-vasculaire ¬ Dysfonctionnement *F45.30*
- - Respiratoire ¬ Dysfonctionnement *F45.33*
- Voies digestives basses ¬ Dysfonctionnement *F45.32*
- ¬ Dysfonctionnement *F45.3*

Neutropénie
v.a. cardiosquelettique-neutropénie

Neutropénie *–suite*

- Congénital
- - Sévère autosomique
- - - Dominante ¬ *D70.0*
- - - Récessif déficit
- - - - CSF3R ¬ *D70.0*
- - - - CXCR2 ¬ *D70.0*
- - - - G6PC3 ¬ *D70.0*
- - - - JAGN1 ¬ *D70.0*
- - ¬
- - - *D70.0*
- - - Agranulocytose et *D70.0*
- Cyclique ¬ *D70.5*
- Liée à l'X ¬ Myopathie cardioquelettique et *E71.1*
- Lors d'hypersplénisme ¬ *D70.6*
- Médicament
- - Non précisées ¬ Agranulocytose et *D70.19*
- - Phase critique
- - - 4 jours
- - - - 7 jours ¬ Agranulocytose et *D70.13*
- - - - ¬ Agranulocytose et *D70.10*
- - - 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et *D70.14*
- - SAI ¬ Agranulocytose et *D70.19*
- - ¬
- - - Agranulocytose et *D70.1*
- - - Formes évolutives d'agranulocytose et *D70.18*
- Mitochondriopathie ¬ Myopathie cardiosquelettique avec *E71.1*
- Néonatal
- - Allo-immune ¬ *P61.5*
- - Transitoire ¬ *P61.5*
- Périodique ¬ *D70.5*
- Phase critique
- - 10 à moins de 20 jours ¬ Agranulocytose et *D70.11*
- - 20 jours ou plus ¬ Agranulocytose et *D70.12*
- Sans précision ¬ *D70.7*
- Sévère congénitale liée à l'X ¬ *D70.0*
- Splénogène (primaire) ¬ *D70.6*
- Traitement ¬ Agranulocytose et *D70.1*
- ¬
- - *D70.6*
- - Agranulocytose et *D70*

Neutrophile

- Fébrile [Sweet] ¬ Dermatose *L98.2*
- ¬
- - Anomalies fonctionnelles des granulocytes *D71*
- - Leucémie chronique à *D47.1*
- - Syndrome de déficit immunitaire *D71*

Neutrophilie héréditaire ¬ *D72.8*

Névralgie

- Amyotrophique ¬ *G54.5*

Névralgie *–suite*

- Cervicale ¬ Atteinte des disques intervertébraux cervicaux avec *M50.8†*, *G55.1**
- Crânienne après herpès zoster ¬ *B02.2†*, *G53.0**
- Faciale paroxystique ¬ *G50.0*
- Horton ¬ *G44.0*
- Mammaire de Cooper ¬ *N64.4*
- Migraineuse ¬ *G44.0*
- Nerf glossopharyngien ¬ *G52.1*
- Névrite, sans précision ¬ *M79.2*
- Post-zostérienne du trijumeau ¬ *B02.2†*, *G53.0**
- Trigéminée post-herpétique ¬
- - *B02.2†*, *G53.0**
- - *G53.0**
- Trijumeau ¬ *G50.0*
- ¬
- - *O26.83*
- - Diabète sucré type
- - - 1 avec *E10.40†*, *G63.2**
- - - 2 avec *E11.40†*, *G63.2**
- - Herpès zoster avec *B02.2†*, *G53.0**
- - Maladie due au VIH avec *B23.8*, *M79.29*

Névralgique

- Épaule ¬ Amyotrophie *G54.5*
- Unilatérale brève avec injection conjonctivale ¬ Céphalée *G44.8*

Névrite

- Acoustique
- - Cours de la syphilis ¬ *A52.1†*, *H94.0**
- - Inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H94.0**
- Amyloïde ¬ *E85.4†*, *G63.3**
- Atteinte des disques intervertébraux ¬ *M51.1†*, *G55.1**
- Cours d'une hernie du noyau gélatineux ¬ *M51.1†*, *G55.1**
- Déplacement de disque intervertébral ¬ *M51.1†*, *G55.1**
- Diphtérique ¬ *A36.8†*, *G59.8**
- Endémique ¬ *E51.1†*, *G63.4**
- Ganglion géniculé zostérien ¬ *B02.2†*, *G53.0**
- Goutteuse ¬ *M10.09†*, *G63.6**
- Hernie discale ¬ *M51.1†*, *G55.1**
- Intercostale ¬ *G58.0*
- Nerf
- - Auditif cours maladie
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†*, *H94.0**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†*, *H94.0**
- - Brachial due au déplacement de disque intervertébral ¬ *M50.1†*, *G55.1**
- - Sciatique due au déplacement de disque intervertébral ¬ *M51.1†*, *G55.1**
- - Vestibulo-cochléaire cours maladie

Névrite *–suite*
- Nerf *–suite*
- - Vestibulo-cochléaire cours maladie *–suite*
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, H94.0**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, H94.0**
- Optique ¬
- - *H46*
- - Démyélinisation au cours d'une *G36.0*
- Périphérique pendant la grossesse ¬ *O26.83*
- Plexus brachial due au déplacement de disque intervertébral ¬ *M50.1†, G55.1**
- Radiculite
- - Brachiale SAI ¬ *M54.1*
- - Dorsale SAI ¬ *M54.1*
- - Lombaire SAI ¬ *M54.1*
- - Lombo-sacrée SAI ¬ *M54.1*
- Rétrobulbaire
- - Cours
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *H48.1**
- - - Sclérose en plaques ¬ *G35.9†, H48.1**
- - Méningocoques ¬ *A39.8†, H48.1**
- - SAI ¬ *H46*
- - Syphilitique
- - - Tardive ¬ *A52.1†, H48.1**
- - - ¬ *A52.1†, H48.1**
- Rupture discale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Sans précision ¬ Névralgie et *M79.2*
- Scapulaire ¬ *G54.5*
- Syphilitique
- - Nerf
- - - Crânien VIII ¬ *A52.1†, H94.0**
- - - Vestibulocochléaire ¬ *A52.1†, H94.0**
- - Tardive du nerf vestibulocochléaire ¬ *A52.1†, H94.0**
- - ¬ *A52.1†, G59.8**
- Zoster ¬ *B02.2†, G53.0**
- ¬
- - Dégénérescence disque
- - - *M51.1†, G55.1**
- - - Intervertébraux cervicaux avec *M50.1†, G55.1**
- - Diabète sucré type
- - - 1 avec *E10.40†, G63.2**
- - - 2 avec *E11.40†, G63.2**
- - Hernie
- - - Cervicale du noyau gélatineux avec *M50.1†, G55.1**
- - - Cervico-thoracique du noyau gélatineux avec *M50.1†, G55.1**
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, M79.29*

Névrodermite
- Atopique ¬ *L20.8*
- Circonscrite ¬ *L28.0*
- Diffuse ¬ *L20.8*

Névrome
- Interdigital membre

Névrome *–suite*
- Interdigital membre *–suite*
- - Inférieur ¬ *G57.8*
- - Supérieur ¬ *G56.8*
- Sur moignon d'amputation ¬ *T87.3*

Névrose
- Anankastique ¬ *F42*
- Anxieuse ¬ *F41.1*
- Caractère SAI ¬ *F60.9*
- Cardiaque ¬ *F45.3*
- Compensation ¬ *F68.0*
- Dépressive ¬ *F34.1*
- Gastrique ¬ *F45.3*
- Hypocondriaque ¬ *F45.2*
- Obsessionnelle-compulsive ¬ *F42*
- Professionnelle, y compris crampe de l'écrivain ¬ *F48.8*
- Psychasthénique ¬ *F48.8*
- SAI ¬ *F48.9*
- Sociale ¬ *F40.1*
- Traumatique ¬ *F43.1*

Névrotique
- F40-F48 ¬ Troubles des conduites en F91.- associés à un trouble: *F92.8*
- Précisés ¬ Autres troubles *F48.8*
- Sans précision ¬ Trouble *F48.9*
- ¬
- - Dépression: *F34.1*
- - Excoriation *L98.1*
- - Troubles *F48*

Newcastle ¬ Conjonctivite
- *B30.8†*
- Virus de la maladie de *B30.8†, H13.1**

Newcomer
v. Dahlberg-Borer-Newcomer

Nez
- Bifide-anomalies des extrémités ¬ Syndrome de trigonocéphalie- *Q87.0*
- Cloison
- - Nasal ¬
- - - Nécrose du *J34.0*
- - - Phlegmon du *J34.0*
- - - Ulcération du *J34.0*
- - ¬ *T20*
- Orifice nasal ¬ Plaie ouverte du *S01.22*
- Partie
- - Non précisée ¬ Plaie ouverte du *S01.20*
- - Parties ou parties multiples du nez ¬ Plaie ouverte du *S01.29*
- Peau externe du nez ¬ Plaie ouverte du *S01.21*
- SAI ¬
- - *C76.0*
- - *D36.7*
- - *T17.1*
- - Lésion traumatique de: *S09.9*

Nez *–suite*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale du *Q30.9*
- Selle attribuable à la syphilis ¬ *A50.5*
- Septum nasal ¬ Plaie ouverte du *S01.23*
- Sinus nez ¬
- - Kyste et mucocèle du *J34.1*
- - Maladie
- - - *J34*
- - - Précisées du *J34.8*
- Surnuméraire ¬ *Q30.8*
- ¬
- - *Z90.0*
- - Abcès, furoncle et anthrax du *J34.0*
- - Absence congénitale du *Q30.1*
- - Agénésie et hypoplasie du *Q30.1*
- - Blessure superficielle du *S00.3*
- - Carie tuberculeuse du *A18.0†, M90.08**
- - Cartilage
- - - *C30.0*
- - - *D14.0*
- - - *D38.5*
- - Déformation
- - - Acquise du *M95.0*
- - - Syphilitique tardive du *A52.7†, J99.8**
- - Écrasement ou déviation congénital(e) du *Q67.4*
- - Fistule du dos du *Q18.8*
- - Fracture
- - - Os du *S02.2*
- - - Ouverte des os du *S02.2, S01.87!*
- - Gomme du *A52.7†, J99.8**
- - Hémorragie du *R04.0*
- - Hypertrophie des cornets du *J34.3*
- - Kyste
- - - Embouchure du *K09.1*
- - - Mucocèle du nez et des sinus du *J34.1*
- - Luxation de la cloison du *S03.1*
- - Maladie
- - - Nez et des sinus du *J34*
- - - Précisées du nez et des sinus du *J34.8*
- - Malformations congénitales du *Q30.8*
- - Mettre les doigts dans le *F98.88*
- - Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre supérieure et le *C44.0*
- - Perforation syphilitique du *A52.7†, J99.8**
- - Plaie ouverte
- - - *S01.2*
- - - Nez
- - - - Parties ou parties multiples du *S01.29*
- - - - Peau externe du *S01.21*
- - Saignement de *R04.0*
- - Syphilis
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Tardive du *A52.7†, J99.8**

Nézelof ¬ Syndrome de *D81.4*

NF1 ¬ *Q85.0*

NF2 ¬ *Q85.0*

NFPA ¬ *D35.2*

N-glycosylation des protéines ¬ Trouble de la *E77.8*

NHSA1B ¬ *G60.8*

NHSA2 ¬ *G60.8*

NHSA5 ¬ *G60.8*

NHSA6 ¬ *G60.8*

NHSA7 ¬ *G60.8*

NHSA8 ¬ *G60.8*

NIC stade

- I ¬ Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [*N87.0*
- II ¬ Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [*N87.1*
- III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [*D06*

Nickel ¬ *L23.0*

Nicolaides-Baraitser ¬ Syndrome de *Q87.8*

Nicolas-Favre ¬ Maladie de (Durand-) *A55*

Nicotine ¬ Effet toxique: Tabac et *T65.2*

Nicotinique

- Dérivés) ¬ Acide *T46.7*
- Palais ¬ Leucokératose *K13.2*
- Pellagre] ¬ Carence en acide *E52*
- Tryptophane) ¬ Carence en: acide *E52*
- ¬ Démence au cours de carence en acide *E52†, F02.8**

Nid d'abeille, congénital ¬ Poumon en *Q33.0*

Nid vide ¬ Syndrome du *Z60*

Nielsen
v. Gamborg-Nielsen
v. Lange-Nielsen

Niemann Pick ¬ Splénomégalie de *E75.2*

Niemann-Pick ¬

- Dégénérescence cérébrale au cours de maladie de *E75.2†, G32.8**
- Maladie de: *E75.2*

Nigra ¬

- Microsporosis *B36.1*
- Piedra noire [Piedra *B36.3*
- Pityriasis *B36.1*
- Tinea *B36.1*

Nigricans

- Palmaris ¬ Keratomycosis *B36.1*
- ¬ Acanthosis *L83*

Niikawa-Kuroki ¬ Syndrome de *Q87.5*

Nijmegen breakage ¬ Syndrome *Q87.8*

Nile

- Occidental ¬ Fièvre du *A92.3*
- ¬ Fièvre due au virus West- *A92.3*

NIP

- Haut grade] ¬ Néoplasie intraépithéliale de haut grade de la prostate [*D07.5*
- Stade

NIP *–suite*

- Stade *–suite*
- - I ¬ Néoplasie intra-épithéliale de la prostate (*N42.3*
- - II ¬ Néoplasie intra-épithéliale de la prostate (*N42.3*

Nipah ¬ Maladie à virus *A85.8*

Nishimura ¬ Dysplasie spondylo-épiphysaire type *Q77.7*

Nitidus ¬ Lichen *L44.1*

Nitriques ¬ Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters *T65.5*

Nitroaminés du benzène et de ses homologues ¬ Effet toxique: Dérivés aminés et *T65.3*

Nitrobenzène ¬ *T65.3*

Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques ¬ Effet toxique: *T65.5*

NIV stade

- I ¬ Néoplasie intraépithéliale de la vulve [*N90.0*
- II ¬ Néoplasie intraépithéliale de la vulve [*N90.1*
- III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale de la vulve [*D07.1*

NIVA stade

- I ¬ Néoplasie intraépithéliale du vagin [*N89.0*
- II ¬ Néoplasie intraépithéliale du vagin [*N89.1*
- III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale du vagin [*D07.2*

Njovera ¬ *A65*

NK

- Matures
- - Sans précision ¬ Lymphome à cellules T/ *C84.9*
- - ¬ Autres lymphomes à cellules T/ *C84.5*
- Sans précision ¬ Lymphome à cellules T/ *C84.9*
- Spécifiés ¬ Autres lymphomes à cellules T/ *C86*
- Type nasal ¬ Lymphome extranodal à cellules T/ *C86.0*
- ¬
- - Entéropathie à cellules *K52.8*
- - Leucémie agressive à cellules *C94.7*
- - Lymphome blastique à cellules *C86.4*

NMC ¬ *C80.9*

NMM [neuropathie motrice multifocale] ¬ *G61.8*

Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ Mycobactéries atypiques ou *U82.2!*

Nocardiose

- Cutanée ¬ *A43.1*
- Poumon ¬ *A43.0†, J99.8**
- Sans précision ¬ *A43.9*
- ¬
- - *A43*

Nocardiose *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Formes de *A43.8*
- - Pneumonie au cours de *A43.0†, J17.0**

Nocif

- Absorbé biais
- - Aliment
- - - Sans précision ¬ Effet toxique: Substance *T62.9*
- - - ¬ Effet toxique d'autres substances *T62*
- - Fruits de mer ¬ Effet toxique de substances *T61*
- Maternel
- - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un effet *P04.9*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets *P04.8*
- Précisées absorbées par le biais d'aliments ¬ Effet toxique: Autres substances *T62.8*
- Substance n entraînant dépendance
- - Analgésiques ¬ Usage *F55.2*
- - Antiacides ¬ Usage *F55.3*
- - Antidépresseurs ¬ Usage *F55.0*
- - Laxatifs ¬ Usage *F55.1*
- - Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage *F55.6*
- - Stéroïdes et hormones ¬ Usage *F55.5*
- - Substance
- - - Non précisée ¬ Usage *F55.9*
- - - ¬ Usage *F55.8*
- - Vitamines ¬ Usage *F55.4*
- - ¬ Usage *F55*
- Transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des effets *P04*
- ¬ Empoisonnement accidentel par exposition à des substances *X49!*

Nocturne

- Ainsi que diurne ¬ Enurésie *F98.02*
- Anomalies squelettiques-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de cécité *Q87.8*
- Paroxystique [Marchiafava-Micheli] ¬ Hémoglobinurie *D59.5*
- Stationnaire congénitale ¬ Cécité *H53.6*
- ¬
- - Cécité *H53.6*
- - Enurésie *F98.00*
- - Sueurs *R61.9*
- - Terreurs *F51.4*

Nodal

- Auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (*I47.1*
- Zone marginale ¬ Lymphome *C83.0*
- ¬
- - Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- - Trouble du rythme (du): *I49.8*

Nodosa ¬ Ophtalmia *H16.2*

Nodosités
- Bouchard (avec arthropathie) ¬ *M15.2*
- Heberden (avec arthropathie) ¬ *M15.1*

Nodulaire
- Bien différencié ¬ Lymphome *C82.9*
- Cellules B de la zone marginale ¬ Lymphome *C83.0*
- Chronique de l'hélix ¬ Chondrodermite *H61.0*
- Focal
- - Télangiectasique du foie ¬ Hyperplasie *D13.4*
- - ¬ Hyperplasie hépatique *K76.8*
- Foyer ¬ Maladie toxique du foie avec: hyperplasie *K71.88*
- Hyde ¬ Prurigo *L28.1*
- Lié à une carence en iode ¬ Goitre *E01.1*
- Modérément différencié ¬ Lymphome *C82.9*
- Non toxique) SAI ¬ Goitre: *E04.9*
- Peu différencié ¬ Lymphome *C82.9*
- Pigmentée primaire ¬ Maladie adrénocorticale *E24.8*
- Prédominance lymphocytaire ¬ Lymphome de Hodgkin *C81.0*
- Régénérative du foie ¬ Hyperplasie *K76.8*
- Riche en lymphocytes ¬ Lymphome de Hodgkin *C81.4*
- SAI ¬ Lymphome, *C82.9*
- Toxique SAI ¬ Goitre *E05.2*
- Tubéreuse) ¬ Cordite (fibrineuse) (*J38.2*
- Type intermédiaire ¬ Lymphome *C82.9*
- Ulcéré) ¬ Pian tardif *A66.4*
- ¬
- - Amylose cutanée *E85.4†, L99.0**
- - Fasciite *M72.4*
- - Histiocytose progressive *D76.3*
- - Lésion tendineuse *M65.3*
- - Lichen myxœdémateux *L98.5*
- - Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose *C81.1*
- - Paragranulome *C81.0*
- - Réticulolymphosarcome *C82.9*
- - Réticulosarcome *C96.9*

Nodule
- Chanteur ¬ *J38.2*
- Colloïde (kystique) (thyroïdien) ¬ *E04.1*
- Cordes vocales ¬ *J38.2*
- Juxta-articulaire au cours de syphilis ¬ *A52.7†, M14.89**
- Juxta-articulaires pianiques ¬ *A66.7*
- Laryngés ¬ *J38.2*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*
- Pulmonaire SAI ¬ *R91*
- Rhumatoïde ¬ *M06.3*
- S) mammaire(s) SAI ¬ *N63*
- Schmorl ¬ *M51.4*
- Sous-cutanés (localisés) (superficiels) ¬ *R22*
- Thyroïdien

Nodule *–suite*
- Thyroïdien *–suite*
- - Ectopiques ¬ Thyréotoxicose due à des *E05.3*
- - Kystique) SAI ¬ *E04.1*
- - Simple
- - - Non toxique ¬ *E04.1*
- - - ¬ Thyréotoxicose avec *E05.1*
- Trayeurs] ¬ Pseudovaccine [*B08.0*

Noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des structures *E88.21*

Noël ¬ Cataracte en sapin de *G71.1†, H28.2**

Nœud
- Atrio-ventriculaire ¬ Arythmie du *I49.8*
- Cordon
- - Ombilical ¬ *P02.5*
- - ¬ *O69.2*
- Sinusal
- - Forme familiale ¬ Maladie du *I49.5*
- - ¬ Syndrome de dysfonctionnement sinusal [maladie du *I49.5*
- Syphilitique à proximité de l'articulation ¬ *A52.7†, M14.89**

Noir
- Piedra nigra] ¬ Piedra *B36.3*
- Villeuse ¬ Langue
- - *K14.3*
- ¬
- - Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*
- - Dermatose papuleuse *L82*
- - Œil au beurre *S00.1*

Noix ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*

Noma ¬ *A69.0*

Nombre
- Chromosomes X ¬ Mosaïque chromosomique, lignées avec divers *Q97.2*
- Faible
- - Cellules B et T ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec *D81.1*
- - Normal de cellules B ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec *D81.2*
- Fonction des lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du *D83.0*
- Lymphocytes T auxiliaire
- - CD4+) non précisé ¬ *U61.9!*
- - Maladie VIH
- - - Catégorie
- - - - 1 ¬ *U61.1!*
- - - - 2 ¬ *U61.2!*
- - - - 3 ¬ *U61.3!*
- - - ¬ *U61!*
- Réduit lymphocytes
- - CD4 ¬ *R72*
- - CD8 ¬ *R72*

Nombre *–suite*
- ¬ Maladie virus Sin
- - *B33.4†*
- - *B33.4†, J17.1**

Nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop *Z76.2*

Non hodgkinien
- Angio-immunoblastique ¬ Lymphome *C86.5*
- Diffus non folliculaire ¬ Lymphome *C83.9*
- Grandes cellules ¬ Lymphome *C85.9*
- Indifférencié ¬ Lymphome *C83.9*
- Petites cellules clivées ¬ Lymphome folliculaire *C82.9*
- ¬ Lymphome
- - Centroblastique *C83.3*
- - Immunoblastique *C83.3*

Non magnétique
v. Type de maladie

Non traumatique
v. Type de maladie

Nonaka ¬ Myopathie distale type *G71.8*

Non-Burkitt, indifférencié ¬ Lymphome de type *C83.3*

Non-compaction ventriculaire gauche ¬ *I42.88*

Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme ¬ *Q56*

Non-disjonction
- Méïotique ¬
- - Monosomie d'un chromosome entier, *Q93.0*
- - Trisomie
- - - 13, *Q91.4*
- - - 18, *Q91.0*
- - - 21, *Q90.0*
- - - Chromosome entier, *Q92.0*
- Mitotique ¬
- - Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (*Q93.1*
- - Trisomie
- - - 13, mosaïque chromosomique (*Q91.5*
- - - 18, mosaïque chromosomique (*Q91.1*
- - - 21, mosaïque chromosomique (*Q90.1*
- - - Chromosome entier mosaïque chromosomique
- - - - *Q92.1*

Non-engagement de la tête ¬ *O32.4*

Non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres *U81.6!*

Non-Herlitz ¬ Epidermolyse bulleuse jonctionnelle type *Q81.8*

Non-implantation de l'œuf ¬ *N97.2*

Noninsulinome ¬ Hypoglycémie hyperinsulinémique persistante de l'adulte *E16.1*

Non-mélanome ¬ Métastase cutanée *C79.2*

Nonne-Milroy ¬ Lymphœdème de *Q82.09*

Non-observance d'un traitement médical et d'un régime ¬ Antécédents personnels de *Z91.1*

Non-réflexe ¬ Vessie neurogène: *N31.2*

Non-tuberculeuses ¬ Infection pulmonaire à mycobactéries *A31.0*

Noonan
v.a. Saldino-Noonan

- ¬

- - Neurofibromatose-syndrome de *Q87.1*

- - Syndrome de: *Q87.1*

Noonan-like avec cheveux anagènes caducs ¬ Syndrome *Q87.1*

Noradrénaline ¬ Déficit en *G90.8*

Normal

- Hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque *D80.6*

- ¬ Thrombocytopénie héréditaire avec plaquettes *D69.41*

Norman-Landing ¬ Maladie de *E75.1*

Norman-Roberts ¬ Lissencéphalie type *Q04.3*

Normocalcémie ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec normocalciurie et *E83.4*

Normocalciurie et normocalcémie ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec *E83.4*

Normokaliémique ¬ Paralysie périodique (familiale): *G72.3*

Normomorphique ¬ Sialidose *E77.1*

Norovirus ¬

- Entérite à *A08.1*

- Gastroentérite aiguë à *A08.1*

Norrbotten ¬ Kératodermie palmoplantaire diffuse autosomique dominante type *Q82.8*

North
v. Compton-North

Norum ¬ Maladie de *E78.6*

Nosophobie ¬ *F45.2*

NOTCH2 ¬ Dysplasie artério-hépatique due à une mutation ponctuelle de *Q44.7*

Nothnagel] ¬ Acroparesthésie: vasomotrice [type *I73.8*

Noueux

- Affections apparentées ¬ Périartérite *M30*

- ¬

- - Affections apparentées à la périartérite *M30.8*

- - Arthropathie au cours d'érythème *L52†, M14.89**

- - Démence au cours de périartérite *M30.0†, F02.8**

- - Érythème *L52*

- - Glomérulonéphrite au cours de périartérite *M30.0†, N08.5**

- - Maladie glomérulaire au cours de périartérite *M30.0†, N08.5**

Noueux *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Myopathie au cours de périartérite *M30.0†, G73.7**

- - Périartérite *M30.0*

- - Polyartérite *M30.0*

- - Polyneuropathie au cours de périartérite *M30.0†, G63.5**

- - Trichorrhexie *L67.0*

Nourrisson
v.a. Fœtus
v.a. Nouveau-né

- Âge ¬ Mort subit

- - *R96.0*

- - Inexpliquée (mort subite du *R96.0*

- Avant âge ¬ Mort subit

- - *R95.9*

- - Inexpliquée (mort subite du *R95*

- Crises complexes focales ¬ Épilepsie bénigne du *G40.08*

- Enfant

- - Bonne santé ¬ Surveillance médicale et soins médicaux d'autres *Z76.2*

- - ¬

- - - Pica du *F98.3*

- - - Surveillance de la croissance du *Z00.1*

- Exsiccose ¬ Gastroentérite du *A09.9, E86*

- Irritable ¬ *R68.1*

- Maladie de Ritter von Rittershain] ¬ Dermatite exfoliatrice staphylococcique du *L00*

- Mention d'autopsie ¬ Syndrome de la mort subite du *R95.0*

- SAI ¬ Syndrome de la mort subite du *R95.9*

- Sans mention d'autopsie ¬ Syndrome de la mort subite du *R95.9*

- Watanabe] ¬ Épilepsie bénigne du *G40.08*

- ¬

- - Dermite fessière du *L22*

- - Erythroblastopénie (pure) (du): *D61.0*

- - Événement aigu constituant un risque vital chez le *R06.80*

- - Hyperplasie des cellules neuroendocrines du *J84.8*

- - Hypogammaglobulinémie transitoire du *D80.7*

- - Maladie due au VIH avec retard de développement chez le *B22, P05.9*

- - Pleurs excessifs du *R68.1*

- - Quasi-syndrome de mort subite du *R06.80*

- - Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les *R75*

- - Symptômes non spécifiques propres au *R68.1*

- - Syndrome

- - - Détresse respiratoire [Respiratory distress syndrome] du *P22.0*

- - - Épidermolyse staphylococcique du *L00*

- - - Mort subit

- - - - *R95*

Nourrisson *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Syndrome *–suite*

- - - Mort subit *–suite*

- - - - *R95.9*

Nourriture

- Boisson

- - Suite de négligence de soi ¬ Prise insuffisante de *R63.6*

- - ¬ Prise insuffisante de *R63.6*

- Brûlante ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*

- ¬

- - Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de *R13.0*

- - Privation de *T73.0*

Nouveau-né

- Affecté

- - Accouchement

- - - Césarienne ¬ Fœtus et *P03.4*

- - - Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et *P03.3*

- - - Extraction par le siège ¬ Fœtus et *P03.0*

- - - Forceps ¬ Fœtus et *P03.2*

- - - Précipité ¬ Fœtus et *P03.5*

- - Affection

- - - Cordon ombilical, autres et sans précision ¬ Fœtus et *P02.6*

- - - Maternel

- - - - Éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle ¬ Fœtus et *P00*

- - - - Sans précision ¬ Fœtus et *P00.9*

- - - - ¬ Fœtus et *P00.8*

- - Alcoolisme de la mère ¬ Fœtus et *P04.3*

- - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et *P04.0*

- - Anhydramnios ¬ *P01.2*

- - Anomalie

- - - Membrane

- - - - Sans précision ¬ Fœtus et *P02.9*

- - - - ¬ Fœtus et *P02.8*

- - - Morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision ¬ Fœtus et *P02.2*

- - Béance du col ¬ Fœtus et *P01.0*

- - Chorio-amniotite ¬ Fœtus et *P02.7*

- - Complication

- - - Concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ Fœtus et *P02*

- - - Grossesse mère

- - - - Sans précision ¬ Fœtus et *P01.9*

- - - - ¬

- - - - - Fœtus et *P01*

- - - - - Fœtus et *P01.8*

- - - Précisées du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et *P03.8*

- - - Travail accouchement

Nouveau-né *–suite*
- Affecté *–suite*
- - Complication *–suite*
- - - Travail accouchement *–suite*
- - - - Sans précision ¬ Fœtus et *P03.9*
- - - - ¬ Fœtus et *P03*
- - Contractions anormales de l'utérus ¬ Fœtus et *P03.6*
- - Effet nocif
- - - Maternel
- - - - Sans précision ¬ Fœtus et *P04.9*
- - - - ¬ Fœtus et *P04.8*
- - - Transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel ¬ Fœtus et *P04*
- - Exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ Fœtus et *P04.6*
- - Forme
- - - Compression du cordon ombilical ¬ Fœtus et *P02.5*
- - - Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ Fœtus et *P02.1*
- - Grossesse
- - - Extra-utérine ¬ Fœtus et *P01.4*
- - - Multiple ¬ Fœtus et *P01.5*
- - Hépatite aiguë de la mère ¬ *P00.2*
- - Hydramnios ¬ Fœtus et *P01.3*
- - Infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées ¬ Fœtus ou *P00.8*
- - Intervention
- - - Chirurgicale chez la mère ¬ Fœtus et *P00.6*
- - - Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et *P00.7*
- - Lupus érythémateux disséminé de la mère ¬ Fœtus ou *P00.8*
- - Maladie
- - - Circulatoires et respiratoires de la mère ¬ Fœtus et *P00.3*
- - - Infectieuses et parasitaires de la mère ¬ Fœtus et *P00.2*
- - - Rénales et des voies urinaires de la mère ¬ Fœtus et *P00.1*
- - - Virus Zika contractée par la mère ¬ *P00.2*
- - Malformation du placenta ¬ *P02.2*
- - Médicaments absorbés par la mère ¬ Fœtus et *P04.1*
- - Mort de la mère ¬ Fœtus et *P01.6*
- - Oligoamnios ¬ Fœtus et *P01.2*
- - Placenta praevia ¬ Fœtus et *P02.0*
- - Présentation
- - - Anormale avant le travail ¬ Fœtus et *P01.7*
- - - Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et *P03.1*
- - Procidence du cordon ombilical ¬ Fœtus et *P02.4*
- - Radiologie chez la mère ¬ Fœtus ou *P00.7*

Nouveau-né *–suite*
- Affecté *–suite*
- - Rupture prématurée des membranes ¬ Fœtus et *P01.1*
- - Salpingo-oophorite de la mère pendant la grossesse ¬ *P00.8*
- - Syndromes de transfusion placentaire ¬ Fœtus et *P02.3*
- - Tabagisme de la mère ¬ Fœtus et *P04.2*
- - Toxicomanie de la mère ¬ Fœtus et *P04.4*
- - Traumatisme de la mère ¬ Fœtus et *P00.5*
- - Trouble
- - - Hypertensifs de la mère ¬ Fœtus et *P00.0*
- - - Nutritionnels de la mère ¬ Fœtus et *P00.4*
- - Utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ Fœtus et *P04.5*
- Anaérobies ¬ Sepsis du *P36.5*
- Bonne santé SAI ¬ *Z38.2*
- Centrale ¬ Apnée du sommeil chez le *P28.3*
- Environnement ¬ Hyperthermie du *P81.0*
- Escherichia coli ¬ Sepsis du *P36.4*
- Hypoglycémie) ¬ Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le *P70.1*
- Lait de vache ¬ Hypocalcémie du *P71.0*
- Obstructive ¬ Apnée du sommeil chez le *P28.3*
- SAI ¬
- - Apnée du sommeil chez le *P28.3*
- - Fièvre du *P81.9*
- - Ophtalmie du *P39.1*
- Sans
- - Hémorragie légère ¬ Omphalite du *P38*
- - Précision ¬
- - - Affection
- - - - Cérébrale du *P91.9*
- - - - Respiratoire du *P28.9*
- - - - Téguments spécifiques du fœtus et du *P83.9*
- - - Anomalie
- - - - Endocrinienne transitoire du *P72.9*
- - - - Métabolique transitoire du *P74.9*
- - - - Tonus musculaire du *P94.9*
- - - - Transitoire
- - - - - Métabolisme des glucides chez le fœtus et le *P70.9*
- - - - - Métabolisme du calcium et du magnésium du *P71.9*
- - - Atélectasies du *P28.1*
- - - Détresse respiratoire du *P22.9*
- - - Hémorragie
- - - - Intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du *P52.9*
- - - - Intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du *P52.3*
- - - - Ombilicale du *P51.9*
- - - Hypothermie du *P80.9*
- - - Maladie hémolytique du fœtus et du *P55.9*

Nouveau-né *–suite*
- Sans *–suite*
- - Précision ¬ *–suite*
- - - Occlusion intestinale du *P76.9*
- - - Problème alimentaire du *P92.9*
- - - Sepsis bactérien du *P36.9*
- - - Trouble de la régulation thermique du *P81.9*
- Staphylocoque
- - Dorés ¬ Sepsis du *P36.2*
- - Sans précision ¬ Sepsis du *P36.3*
- Streptocoque
- - Groupe B ¬ Sepsis du *P36.0*
- - Sans précision ¬ Sepsis du *P36.1*
- Vitamine K ¬ Carence du *P53*
- ¬
- - Acidose métabolique tardive du *P74.0*
- - Affection
- - - Cérébral
- - - - *P91*
- - - - Précisées du *P91.8*
- - - Précisées des téguments spécifiques du fœtus et du *P83.8*
- - - Respiratoires précisées chez le *P28.8*
- - - Téguments spécifiques du fœtus et du *P83*
- - Alimentation
- - - Lente du *P92.2*
- - - Sein difficile chez le *P92.5*
- - Anomalie
- - - Électrolytique
- - - - Métaboliques transitoires du *P74*
- - - - Transitoires du *P74.4*
- - - Endocrinien transitoire
- - - - *P72*
- - - - Précisées du *P72.8*
- - - Équilibre
- - - - Potassique du *P74.3*
- - - - Sodique du *P74.2*
- - - Métaboliques transitoires du *P74.8*
- - - Tonus musculaire du *P94.8*
- - - Transitoire métabolisme
- - - - Calcium
- - - - - Magnésium du *P71*
- - - - - Magnésium du *P71.8*
- - - - Glucides
- - - - - Fœtus et le *P70.8*
- - - - - Spécifiques du fœtus et du *P70*
- - Apnée
- - - *P28.4*
- - - Obstructive du *P28.4*
- - - Primitive du sommeil chez le *P28.3*
- - Atélectasie primitive du *P28.0*
- - Baisse de l'activité cérébrale du *P91.4*
- - Blennorrhée chez le *A54.3†, H13.1**

Nouveau-né *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le *P60*
- - Coma du *P91.5*
- - Conjonctivite gonorrhéique chez le *A54.3†, H13.1**
- - Contusions du fœtus ou du *P54.5*
- - Convulsions du *P90*
- - Coryza du *P28.8*
- - Craniotabès du *P96.3*
- - Crises de cyanose du *P28.2*
- - Dermolyse bulleuse transitoire du *Q81.2*
- - Déshydratation du *P74.1*
- - Détresse respiratoire
- - - *P22.0*
- - - *P22.8*
- - Diarrhée infectieuse chez le *A09.0*
- - Ecchymoses du fœtus ou du *P54.5*
- - Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du *P91.6*
- - Engorgement du sein chez le *P83.4*
- - Entérocolite nécrosante du fœtus et du *P77*
- - Érythème toxique du *P83.1*
- - État mentionné sans précision cause mortalité morbidité soin supplémentaire
- - - *P07*
- - - Fœtus ou du *P08*
- - Flutter auriculaire idiopathique du *P29.1*
- - Formes d'hypothermie du *P80.8*
- - Glaucome du *Q15.0*
- - Gonorrhée de l'œil chez le *A54.3†, H13.1**
- - Hématome
- - - Subdural de cause non traumatique chez le *P52.8*
- - - Superficiel du fœtus ou du *P54.5*
- - Hémorragie
- - - Cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du *P52.6*
- - - Intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du *P52.4*
- - - Intracrânien non traumatique fœtus
- - - - *P52*
- - - - *P52.8*
- - - Intraventriculaire
- - - - Grade 4, de cause non traumatique, chez le *P52.2*
- - - - Non
- - - - - Traumatique), degré 1, du fœtus et du *P52.0*
- - - - - Traumatique), degré 2, du fœtus et du *P52.1*
- - - - - Traumatique), degré 3, du fœtus et du *P52.2*
- - - Ombilical
- - - - *P51*
- - - - *P51.8*

Nouveau-né *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hémorragie *–suite*
- - - Ombilical *–suite*
- - - - Massive du *P51.0*
- - - Sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du *P52.5*
- - Hydrocéphalie
- - - *Q03*
- - - Acquise du *P91.7*
- - - Post-hémorragique du *P91.7*
- - Hypertension pulmonaire (persistante) du *P29.3*
- - Hypoalbuminémie du *P74.8*
- - Hypocalcémies du *P71.1*
- - Hypoglycémie transitoire du *P70.4*
- - Hypothermie
- - - *P80*
- - - Légère du *P80.8*
- - Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au *P58.4*
- - Iléus transitoire du *P76.1*
- - Insuffisance respiratoire du *P28.5*
- - Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le *P96.4*
- - Irritabilité cérébrale du *P91.3*
- - Ischémie transitoire du myocarde du *P29.4*
- - Iso-immunisation
- - - ABO du fœtus et du *P55.1*
- - - Rhésus du fœtus et du *P55.0*
- - Kystes périventriculaires acquis du *P91.1*
- - Maladie
- - - Hémolytique fœtus
- - - - *P55*
- - - - *P55.8*
- - - Hémorragique du fœtus et du *P53*
- - - Membranes hyalines du *P22.0*
- - Mastite non infectieuse du *P83.4*
- - Myocardite
- - - Aseptique chez le *B33.2†, I41.1**
- - - Épidémique chez le *B33.2†, I41.1**
- - - Virale chez le *B33.2†, I41.1**
- - Occlusion intestinal
- - - *P76*
- - - Précisées du *P76.8*
- - Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du *P83.3*
- - Ophtalmie
- - - Gonococcique du *A54.3*
- - - Gonorrhéique chez le *A54.3†, H13.1**
- - Pemphigus épidémique du *L00*
- - Pétéchies du fœtus ou du *P54.5*
- - Polycythémie du *P61.1*
- - Polype ombilical du *P83.6*
- - Poumon de ventilation du *P27.8*

Nouveau-né *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Problème alimentaire
- - - *P92*
- - - *P92.8*
- - Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du *P93*
- - Reflux œsophagien chez le *P78.8*
- - Régurgitation et mérycisme du *P92.1*
- - Sclérème du *P83.0*
- - Sepsis bactérien
- - - *P36*
- - - *P36.8*
- - Sous-alimentation du *P92.3*
- - Suralimentation du *P92.4*
- - Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le *P96.2*
- - Syndrome
- - - Défibrination du fœtus ou du *P60*
- - - Enfermement et syndrome apallique chez le *P91.80*
- - - Gris dû à l'administration de chloramphénicol au *P93*
- - - Hypothermique du *P80.0*
- - Syphilis du *A50.9*
- - Tachycardie ventriculaire incessante du *I47.2*
- - Tachypnée transitoire du *P22.1*
- - Thrombose de la veine rénale chez le *P29.8*
- - Trouble
- - - Cérébraux précisés chez le *P91.88*
- - - Précisés de la régulation thermique du *P81.8*
- - - Régulation thermique du *P81*
- - Tyrosinémie transitoire du *P74.5*
- - Ulcère gastro-duodénal du *P78.8*
- - Urémie du *P96.0*
- - Urticaire du *P83.8*
- - Volvulus chez le *P76.8*
- - Vomissements du *P92.0*

Novo à l'effort ¬ Angine: de *I20.0*

Noyade
- Disparition ¬ *X59.9!*
- Submersion non mortelle ¬ *T75.1*

Noyau
- Céphalique fémoral ¬ Anomalie du *Q72.4*
- Gélatineux
- - Myélopathie ¬ Hernie du *M51.0†, G99.2**
- - Névrite ¬ Hernie
- - - Cervicale du *M50.1†, G55.1**
- - - Cervico-thoracique du *M50.1†, G55.1**
- - Radiculopathie ¬ Hernie
- - - Cervicale du *M50.1†, G55.1**
- - - Cervico-thoracique du *M50.1†, G55.1**
- - - Lombaire du *M51.1†, G55.1**
- - - Lombosacrée du *M51.1†, G55.1**

Noyau *–suite*
- Gélatineux *–suite*
- - Radiculopathie ¬ Hernie *–suite*
- - - Thoracique du *M51.1†, G55.1**
- - - Thoraco-lombaire du *M51.1†, G55.1**
- - ¬ Névrite au cours d'une hernie du *M51.1†, G55.1**
- Gris central
- - Sans précision ¬ Maladie dégénérative des *G23.9*
- - ¬
- - - Calcification des *G23.8*
- - - Maladie dégénératif
- - - - *G23*
- - - - Précisées des *G23.8*
- Rouge inférieur ¬ Syndrome du *I66.8†, G46.3**

NPM1 ¬ Leucémie myéloïde aiguë associée à des mutations somatiques de *C92.00*

NSIP] Pneumonie interstitielle non spécifique ¬ [*J84.1*

NSMH [neuropathie sensorimotrice héréditaire] ¬ *G60.0*

NSTEMI] SAI ¬ Infarctus sans élévation du segment ST [*I21.4*

Nuageuse centrale de François ¬ Dystrophie *H18.5*

Nuchae] ¬ Acné chéloïde [Folliculite sclerotisans *L73.0*

Nück, congénital ¬ Kyste (du): canal de *Q52.4*

Nucléaire
- Iso-immunisation ¬ Ictère *P57.0*
- Sans précision ¬ Ictère *P57.9*
- ¬
- - Cataracte sénile *H25.1*
- - Formes précisées d'ictère *P57.8*
- - Ictère *P57*
- - Sclérose *H25.1*

Nucléides transuraniens de métaux lourds ¬ Intoxication par des *T66*

Nucléoside phosphorylase [PNP] ¬ Déficit en purine *D81.5*

Nucléotidase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en pyrimidine 5' *D55.3*

Nucléotides ¬ Anémie due à des anomalies du métabolisme des *D55.3*

Nuisibles
- Bruit sur l'oreille interne ¬ Effets *H83.3*
- ¬ Recherche acceptation intervention
- - Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et *Z64.8*
- - Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et *Z64.8*

Nummulaire ¬
- Dermite *L30.0*
- Kératite: *H16.1*
- Kératodermie palmoplantaire *Q82.8*
- Psoriasis: *L40.0*

Nus ¬ Syndrome des lymphocytes *D81.6*

Nutans ¬ Spasmus *F98.49*

Nutrition
- Inadaptée ¬ Difficultés nutritionnelles et *R63.3*
- ¬ Examen spécial de dépistage des troubles de la *Z13.2*

Nutritionnel
- Connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions physiques, chimiques ou *Z64.8*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles *P00.4*
- Métabolique
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies endocriniennes, *O99.2*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies *E90**
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux d'autres maladies endocriniennes, *Z83.4*
- - - - Personnels de maladies endocriniennes, *Z86.3*
- - - Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, *M14.5**
- - - Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, *H28.1**
- - - Glaucome au cours de maladies endocriniennes, *H42.0**
- - - Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, *N08.4**
- Non précisée ¬ Séquelles d'une carence *E64.9*
- Nutrition inadaptée ¬ Difficultés *R63.3*
- Précis ¬
- - Anémies *D53.8*
- - Carence
- - - *E63.8*
- - - Éléments *E61.8*
- Sans précision ¬
- - Anémie *D53.9*
- - Carence
- - - *E63.9*
- - - Élément *E61.9*
- ¬
- - Anémie
- - - *D53*
- - - Mégaloblastique *D52.0*
- - Carence
- - - *E63*
- - - Éléments *E61*
- - - Plusieurs éléments *E61.7*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques *P04.5*
- - Insuffisance staturale *E45*
- - Maladie due au VIH avec maladie due à une carence *B22, E63.9*
- - Marasme *E41*

Nutritionnel *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Myocardiopathie
- - - *E63.9†, I43.2**
- - - Cours de maladies *I43.2**
- - Séquelle
- - - Carences *E64.8*
- - - Malnutrition et autres carences *E64*

Nycthéméral ¬ Inversion psychogène du rythme (du): *F51.2*

Nycturie ¬ *R35*

NYHA
- I ¬
- - Insuffisance cardiaque droite primaire, stade *I50.00, I50.02!*
- - Stade *I50.11*
- II ¬
- - Insuffisance cardiaque droit
- - - Primaire, stade *I50.00, I50.03!*
- - - Stade
- - - - *I50.01, I50.02!*
- - - - *I50.01, I50.03!*
- - Stade *I50.12*
- III ¬
- - Insuffisance cardiaque droit
- - - Primaire, stade *I50.00, I50.04!*
- - - Stade *I50.01, I50.04!*
- - Stade *I50.13*
- IV ¬
- - Insuffisance cardiaque droit
- - - Primaire, stade *I50.00, I50.05!*
- - - Stade *I50.01, I50.05!*
- - Stade *I50.14*

Nyhan
v. Lesch-Nyhan

Nymphomanie ¬ *F52.7*

Nyong
- Nyong ¬ Fièvre due au virus O' *A92.1*
- ¬ Fièvre due au virus O'nyong- *A92.1*

Nystagmus
- Anomalies des mouvements oculaires ¬ *H55*
- Central ¬ *H81.4*
- Congénital ¬ *H55*
- Défaut d'usage ¬ *H55*
- Dissocié ¬ *H55*
- Horizontal ¬ *H55*
- Latent ¬ *H55*
- SAI ¬ *H55*

OANA ¬ *T78.3*
OANH ¬ *D84.1*
Oasthouse ¬ Syndrome de *E72.1*
Obésité
- Adulte ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- Déficit
- - CEP19 ¬ *E66.89*
- - Congénital en leptine ¬ *E66.89*
- - Prohormone convertase I ¬ *E66.89*
- - Pro-opiomélanocortine ¬ *E66.89*
- - Récepteur
- - - Leptine ¬ *E66.89*
- - - Mélanocortine 4 ¬ *E66.89*
- Endogène
- - Enfant et l'adolescent ¬ *E66.84*
- - Grade
- - - I (OMS) ¬ *E66.80*
- - - II (OMS) ¬ *E66.81*
- - - III (OMS) ¬ *E66.82*
- - Indice masse corporelle IMC
- - - 40 ou plus ¬ *E66.82*
- - - Compris
- - - - 30 et moins de 35 ¬ *E66.80*
- - - - 35 et moins de 40 ¬ *E66.81*
- - ¬ *E66.8*
- Enfant et l'adolescent ¬ *E66.94*
- Excès calorique
- - Enfant et l'adolescent ¬ *E66.04*
- - Indice masse corporelle IMC
- - - 40 ou plus ¬ *E66.02*
- - - Compris
- - - - 30 et moins de 35 ¬ *E66.00*
- - - - 35 et moins de 40 ¬ *E66.01*
- - ¬ *E66.0*
- Exogène SAI ¬ *E66.9*
- Extrême
- - Excès calorique chez l'enfant et l'adolescent ¬ *E66.05*
- - Hypoventilation alvéolaire chez l'enfant et l'adolescent ¬ *E66.25*
- Grade
- - I OMS
- - - Excès calorique ¬ *E66.00*
- - - Hypoventilation alvéolaire ¬ *E66.20*
- - - ¬ *E66.90*
- - II OMS
- - - Excès calorique ¬ *E66.01*
- - - Hypoventilation alvéolaire ¬ *E66.21*
- - - ¬ *E66.91*
- - III OMS
- - - Excès calorique ¬ *E66.02*
- - - Hypoventilation alvéolaire ¬ *E66.22*
- - - ¬ *E66.92*

Obésité *–suite*
- Hypogénitalisme-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microphtalmie colobomateuse- *Q87.8*
- Hypoventilation
- - Alvéolaire
- - - Enfant et l'adolescent ¬ *E66.24*
- - - Indice masse corporelle IMC
- - - - 40 ou plus ¬ *E66.22*
- - - - Compris
- - - - - 30 et moins de 35 ¬ *E66.20*
- - - - - 35 et moins de 40 ¬ *E66.21*
- - SOH] ¬ Syndrome *E66.2*
- Maturité ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- Médicamenteux
- - Enfant et l'adolescent ¬ *E66.14*
- - Extrême chez l'enfant et l'adolescent ¬ *E66.15*
- - Grade
- - - I (OMS) ¬ *E66.10*
- - - II (OMS) ¬ *E66.11*
- - - III (OMS) ¬ *E66.12*
- - Indice masse corporelle IMC
- - - 40 ou plus ¬ *E66.12*
- - - Compris
- - - - 30 et moins de 35 ¬ *E66.10*
- - - - 35 et moins de 40 ¬ *E66.11*
- - ¬ *E66.19*
- Non
- - Cétosique ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- - Insulino-dépendant du sujet jeune ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- Petite taille ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypogonadisme-ichtyose- *Q87.8*
- Sans
- - Obésité
- - - Adulte ¬ diabète (sucré) (avec *E11*
- - - Maturité ¬ diabète (sucré) (avec *E11*
- - - Non
- - - - Cétosique ¬ diabète (sucré) (avec *E11*
- - - - Insulino-dépendant du sujet jeune ¬ diabète (sucré) (avec *E11*
- - - Stable ¬ diabète (sucré) (avec *E11*
- - - Type 2 sous insulinothérapie ¬ diabète (sucré) (avec *E11*
- - Précision ¬ *E66.9*
- Stable ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- Type 2 sous insulinothérapie ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- ¬
- - *E66*
- - *E66.8*
- - Choroïdérémie avec surdité et *Q87.8*
- - Syndrome

Obésité *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Cardiopulmonaire au cours d' *E66.29*
- - - Hypoventilation associée à l' *E66.29*
Objet
- Animés ¬
- - Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d' *W64.9!*
- - Exposition à des forces mécaniques d' *W64!*
- Brûlants ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Inanimés ¬
- - Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d' *W49.9!*
- - Exposition à des forces mécaniques d' *W49!*
- Jeté) (tombant) ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- Lors de catastrophes naturelles ¬ Chute d' *X59.9!*
Oblique ¬
- Fente faciale *Q18.8*
- Hernie inguinale: *K40*
- Présentation: *O32.2*
- Soins maternels pour position transverse et *O32.2*
Obliterans] ¬ Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica *N48.0*
Oblitérante
- Balanitis xerotica obliterans] ¬ Balanite scléreuse *N48.0*
- Buerger] ¬ Thrombo-angéite *I73.1*
- Cérébrale ¬ Artériopathie *I66.9*
- Chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ Bronchiolite *J68.4*
- Membre inférieur
- - AOMI
- - - SAI ¬ Artériopathie *I70.29*
- - - Sans précision du stade (de Leriche et Fontaine) ¬ Artériopathie *I70.29*
- - ¬
- - - AOMI [artériopathie *I70.29*
- - - Claudication intermittente avec artériopathie *I70.29*
- Organisation pneumonique ¬ Bronchiolite *J84.0*
- Périphérique ¬
- - Artériopathie *I70.29*
- - Artéropathie *I70.29*
- Trouble ventilatoire obstructif ¬ Bronchiolite *J44.89*
- Type
- - Bassin
- - - Cuisse ¬
- - - - AO [artériopathie *I70.29*
- - - - Artériopathie *I70.29*
- - - ¬
- - - - AO [artériopathie *I70.29*

Oblitérante *–suite*
- Type *–suite*
- - Bassin *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Artériopathie *I70.29*
- - Cuisse ¬
- - - AO [artériopathie *I70.29*
- - - Artériopathie *I70.29*
- - Jambe ¬ Artériopathie *I70.29*
- Vaisseau cérébral ¬ Endartérite syphilitique *A52.0†, I68.1**
- ¬
- - AO [artériopathie *I70.29*
- - Artériopathie *I70.29*
- - Douleurs ischémiques dans le cadre d'une artériopathie *I70.29*
- - Endartérite: déformante ou *I70*
- - Otosclérose intéressant fenêtre ovale
- - - *H80.1*
- - - Non *H80.0*
- - Syndrome d'artériopathie *I70.29*

Oblitération
- Artère
- - Extrémité inférieure ¬ *I74.3*
- - Jambe ¬ *I74.3*
- - Périphérique ¬ *I74.4*
- - Pied ¬ *I74.3*
- - Poplitée ¬ *I74.3*
- - ¬ *I74.9*
- Vaisseaux lymphatiques suite à mastectomie ¬ *I97.2*
- Veine du cou ¬ *I82.88*

Oblongata dorso-latéral ¬ Syndrome *I66.3†, G46.3**

Obsédantes
- Comportements compulsifs ¬ Forme mixte, avec idées *F42.2*
- Premier plan ¬ Avec idées ou ruminations *F42.0*

Observation
- Accident
- - Transport ¬ Examen et mise en *Z04.1*
- - Travail ¬ Examen et mise en *Z04.2*
- - ¬ Examen et mise en *Z04.3*
- Activité répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en *Z03.2*
- Blessures dues à une agression ¬ Examen et mise en *Z04.5*
- Comportement asocial sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en *Z03.2*
- Examen médical pour suspicion de maladies, suspicion exclue ¬ Mise en *Z03*
- Hospitalisation soin obstétrical y compris
- - Césarienne avant début travail ¬ lorsqu y a mise
- - - *O32*
- - - *O33*
- - - *O34*

Observation *–suite*
- Hospitalisation soin obstétrical y compris *–suite*
- - Interruption grossesse ¬ lorsqu y a mise
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- Pyromanie sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en *Z03.2*
- Raison
- - Non précisée ¬ Examen et mise en *Z04.9*
- - Précisées ¬ Examen et mise en *Z04.8*
- - ¬ Examen et mise en *Z04*
- SAI ¬ Mise en *Z04.9*
- Sans complications ¬ Soins et mise en *Z39.0*
- Suspicion
- - Affection
- - - Cardio-vasculaires ¬ Mise en *Z03.5*
- - - Système nerveux ¬ Mise en *Z03.3*
- - Effet
- - - Indésirable d'un médicament ¬ Mise en *Z03.6*
- - - Toxique de substances ingérées ¬ Mise en *Z03.6*
- - Infarctus du myocarde ¬ Mise en *Z03.4*
- - Intoxication ¬ Mise en *Z03.6*
- - Maladie
- - - Sans précision ¬ Mise en *Z03.9*
- - - ¬ Mise en *Z03.8*
- - Troubles mentaux et du comportement ¬ Mise en *Z03.2*
- - Tuberculose ¬ Mise en *Z03.0*
- - Tumeur maligne ¬ Mise en *Z03.1*
- Vol à l'étalage sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en *Z03.2*

Observés au niveau du sein ¬ Autres signes et symptômes *N64.5*

Obsessionnel
- Compulsif
- - Sans précision ¬ Trouble *F42.9*
- - ¬
- - - Névrose: *F42*
- - - Trouble
- - - - *F42*
- - - - *F42.8*
- Premier plan ¬ Avec comportements compulsifs [rituels *F42.1*

Obstétrical
- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Y compris accouchement SAI ¬
- - - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie *O75.4*
- - - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie *O75.4*
- - - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie *O75.4*

Obstétrical *–suite*
- Acte visée diagnostique thérapeutique *–suite*
- - ¬ Autres complications d'un acte de chirurgie *O75.4*
- Caillot sanguin ¬ Embolie
- - *O88.2*
- - *O88.28*
- Cause non précisée ¬ Mort d'origine *O95*
- Chirurgicale ¬ Infection d'une plaie d'origine *O86.0*
- Col de l'utérus ¬ Déchirure *O71.3*
- E ¬
- - Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne) *O71.6*
- - Écartement traumatique de la symphyse (pubienne) *O71.6*
- - Lésion du coccyx *O71.6*
- Foie ¬ Traumatisme *P15.0*
- Grave ¬ Asphyxie *P21.0*
- Intéressant les articulations et les ligaments pelviens ¬ Lésions *O71.6*
- Légère ou modérée ¬ Asphyxie *P21.1*
- Nerf crânien VII] ¬ Lésion du nerf facial due à un traumatisme *P11.3*
- Non précisé ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme *P11.59*
- Organes pelviens ¬ Autres lésions *O71.5*
- Paraplégie
- - Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme *P11.50*
- - Chronique ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme *P11.51*
- Pathologiques et difficultés à procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents *Z35.2*
- Périnée
- - Deuxième degré ¬ Déchirure *O70.1*
- - Premier degré ¬ Déchirure *O70.0*
- - Quatrième degré ¬ Déchirure *O70.3*
- - Sans précision ¬ Déchirure *O70.9*
- - Troisième degré ¬ Déchirure *O70.2*
- - ¬
- - - Déchirure *O70*
- - - Hématome *O71.7*
- - - Rupture d'une suture *O90.1*
- Plus 42 jours mais accouchement ¬ Mort Séquelle relevant
- - Directement d'une cause *O96.0*
- - Indirectement d'une cause *O96.1*
- Précis ¬ traumatisme
- - *O71.8*
- - *P15.8*
- Rate ¬ Traumatisme *P15.1*
- SAI ¬ Embolie *O88.28*
- Sans précision

Obstétrical *–suite*
- Sans précision *–suite*
- - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles relevant d'une cause *O96.9*
- - ¬
- - - Asphyxie *P21.9*
- - - Lésion
- - - - Cuir chevelu due à un traumatisme *P12.9*
- - - - Squelette due à un traumatisme *P13.9*
- - - - Système
- - - - - Nerveux central due à un traumatisme *P11.9*
- - - - - Nerveux périphérique due à un traumatisme *P14.9*
- - - Mort de séquelles relevant d'une cause *O97.9*
- - - Traumatisme
- - - - *O71.9*
- - - - *P15.9*
- Survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort d'origine *O96*
- Urètre ¬ Lésion *O71.5*
- Vagin ¬ Hématome *O71.7*
- Vaginale haute isolée ¬ Déchirure *O71.4*
- Vessie ¬ Lésion *O71.5*
- Vulve ¬ Hématome *O71.7*
- Y compris
- - Césarienne avant début travail ¬ lorsqu y a mise observation hospitalisation soin
- - - *O32*
- - - *O33*
- - - *O34*
- - Interruption grossesse ¬ lorsqu y a mise observation hospitalisation soin
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- ¬
- - Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme *P15.6*
- - Asphyxie *P21*
- - Céphalhématome dû à un traumatisme *P12.0*
- - Choc *O75.1*
- - Congestion faciale due à un traumatisme *P15.4*
- - Déchirure
- - - Hémorragie intracrânien
- - - - Non précisées, dues à un traumatisme *P10.9*
- - - - Traumatisme
- - - - - *P10*
- - - - - *P10.8*
- - - Tente du cervelet due à un traumatisme *P10.4*
- - Embolie

Obstétrical *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Embolie *–suite*
- - - *O88*
- - - *O88.8*
- - - Gazeuse *O88.0*
- - - Graisseuse, *O88.8*
- - - Pulmonaire *O88.20*
- - - Pyohémique et septique, *O88.3*
- - États mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins *O98*
- - Fracture
- - - Clavicule due à un traumatisme *P13.4*
- - - Crâne due à un traumatisme *P13.0*
- - - Rachis due à un traumatisme *P11.5*
- - Glaucome traumatique dû (due) à un traumatisme *P15.3*
- - Hématome
- - - Chignon dû à un traumatisme *P12.1*
- - - Pelvien d'origine *O71.7*
- - - Plaie *O90.2*
- - - Sous-dural (localisé) dû à un traumatisme *P10.0*
- - - Sous-galéal dû à un traumatisme *P12.2*
- - Hémorragie
- - - Cérébrale due à un traumatisme *P10.1*
- - - Épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme *P12.2*
- - - Intraventriculaire due à un traumatisme *P10.2*
- - - Sous
- - - - Arachnoïdienne due à un traumatisme *P10.3*
- - - - Conjonctivale dû (due) à un traumatisme *P15.3*
- - - Sous-durale due à un traumatisme *P10.0*
- - Lésion
- - - Cérébral
- - - - Non précisée, due à un traumatisme *P11.2*
- - - - Précisées, dues à un traumatisme *P11.1*
- - - Crâne dues à un traumatisme *P13.1*
- - - Cuir chevelu dues à un traumatisme *P12.8*
- - - Faciale due à un traumatisme *P15.4*
- - - Fémur due à un traumatisme *P13.2*
- - - Nerfs crâniens due à un traumatisme *P11.4*
- - - Œil due à un traumatisme *P15.3*
- - - Organes génitaux externes due à un traumatisme *P15.5*
- - - Os longs due à un traumatisme *P13.3*
- - - Partie
- - - - Squelette dues à un traumatisme *P13.8*
- - - - Système nerveux périphérique dues à un traumatisme *P14.8*
- - - Plexus brachial dues à un traumatisme *P14.3*

Obstétrical *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme *P11.5*
- - - Squelette due à un traumatisme *P13*
- - - Sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme *P15.2*
- - - Système nerveux
- - - - Central dues à un traumatisme *P11*
- - - - Périphérique due à un traumatisme *P14*
- - Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme *P12.3*
- - Mort Séquelle relevant
- - - Cause *O97*
- - - Directement d'une cause *O97.0*
- - - Indirectement d'une cause *O97.1*
- - Œdème cérébral dû à un traumatisme *P11.0*
- - Paralysie
- - - Dejerine-Klumpke due à un traumatisme *P14.1*
- - - Duchenne-Erb due à un traumatisme *P14.0*
- - - Faciale due à un traumatisme *P11.3*
- - - Nerf phrénique due à un traumatisme *P14.2*
- - Rupture
- - - Foie due à un traumatisme *P15.0*
- - - Rate due à un traumatisme *P15.1*
- - Tétanos *A34*
- - Traumatisme
- - - *O71*
- - - *P15*

Obstructif
v. Type de maladie

Obstruction
- Artère rénale ¬ *N28.0*
- Calculeuse rénale et urétérale ¬ Hydronéphrose avec *N13.2*
- Col de la vessie ¬ *N32.0*
- Côlon ¬ *K56.4*
- Complet partiel artère
- - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus cérébral ¬ *I65*
- - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I66*
- Congénitale de l'aqueduc de Sylvius ¬ *Q03.0*
- Duodénum ¬ *K31.5*
- Fécale ¬ *K56.4*
- Hépato-biliaire ¬ *K83.1*
- Intestin ¬ Autres *K56.4*
- Jonction
- - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- - Pyélo urétéral ¬
- - - Hydronéphrose avec *N13.0*

Obstruction *–suite*
- Jonction *–suite*
- - Pyélo urétéral ¬ *–suite*
- - - Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Mécanique dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI ¬ *Q41*
- Œsophage ¬ *K22.2*
- Pelvi-urétérale ¬ *N13.5*
- Prostatique SAI ¬ *N40*
- Rétrécissement congénitaux du côlon ¬ occlusion, *Q42*
- Supravésicale ¬ *N13.5*
- Trompe Eustache ¬
- - *H68.1*
- - Salpingite et *H68*
- Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Urinaire SAI ¬ *N13.9*
- Veine porte ¬ *I81*
- Voie
- - Biliaires ¬ *K83.1*
- - Respiratoire créée par la trachéotomie ¬ *J95.0*
- ¬ Bronchite aiguë avec *J20.9*

Obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) *R13.1*

Obtention du permis de conduire ¬ inscription dans: *Z02*

Obturante de l'oreille externe (conduit) ¬ Kératose *H60.4*

Obturation
- Côlon ¬ *K56.4*
- Retardée du canal artériel ¬ *P29.3*
- ¬ *Z43*

Obturatrice ¬ hernie: *K45*

Occidental ¬
- Encéphalite équine *A83.1*
- Fièvre du Nile *A92.3*
- Maladie du sommeil de l'Afrique *B56.0*

Occipital ¬
- *S02.1*
- Articulation: atlanto- *S13.4*
- Encéphalocèle *Q01.2*
- Épilepsie
- - Bénigne à paroxysmes *G40.08*
- - Pointes *G40.08*
- Lobe
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Os
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Tumeur maligne: Lobe *C71.4*

Occipito
- Iliaque ¬ Dystocie due à la persistance en position: *O64.0*
- Postérieur
- - Persistante ¬ Présentation *P03.1*
- - ¬ Dystocie due à la persistance en position: *O64.0*
- Sacrée ¬ Dystocie due à la persistance en position: *O64.0*
- Transverse ¬ Dystocie due à la persistance en position: *O64.0*

Occlusale
- Dentaire (antérieure) (postérieure) ¬ Béance *K07.2*
- Dents ¬ Usure: *K03.0*

Occlusif
v.a. veino-occlusif
- Artériel ¬ Diabète sucré
- - MOA [maladie *E14.50†, I79.2**
- - Type
- - - 1 avec MOA [maladie *E10.50†, I79.2**
- - - 2 avec MOA [maladie *E11.50†, I79.2**
- Infantile ¬ Artériopathie *Q28.88*
- SAI ¬ Iléus *K56.6*
- Syphilitique ¬ Maladie artérielle *A52.0†, I79.8**

Occlusion
- Acquise de l'œsophage ¬ *K22.2*
- Artère
- - Centrale de la rétine ¬ *H34.1*
- - Cérébrale ¬ *I66.9*
- - Coronaires ¬ *I25.1*
- - Iliaque ¬ *I74.5*
- - Rénale ¬ *N28.0*
- - Rétine ¬ Autres *H34.2*
- - ¬ *I74.9*
- Artériel
- - Jambe ¬ *I74.3*
- - Périphérique aiguë ¬ *I74.4*
- - Rétinien
- - - Branche ¬ *H34.2*
- - - Partielle ¬ *H34.2*
- Canal
- - Biliaire, sans calcul ¬ *K83.1*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul ¬ *K82.0*
- Col de la vessie congénital(e) ¬ *Q64.3*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.6*
- Congénital
- - Aorte ¬ *Q25.3*
- - Jonction pyélo-urétérale ¬ *Q62.1*
- - Œsophage ¬ *Q39.0*
- - Orifice vésico-urétéral ¬ *Q62.1*
- - Uretère ¬ *Q62.1*
- Coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*
- Embolique ¬ *I74*

Occlusion *–suite*
- Gangrène ¬ Hernie
- - Abdominal
- - - Non précisée, sans *K46.9*
- - - Précisées, sans *K45.8*
- - Crurale
- - - Bilatérale, sans *K41.2*
- - - Unilatéral
- - - - *K41.40*
- - - - Sans précision, sans *K41.9*
- - Diaphragmatique, sans *K44.9*
- - Épigastrique sans *K43.90*
- - Incisionnelle sans *K43.2*
- - Inguinal
- - - Bilatérale, sans *K40.2*
- - - Unilatérale ou sans précision, sans *K40.9*
- - Ombilicale, sans *K42.9*
- - Parastomale, sans *K43.5*
- - Paroi abdominal antérieur
- - - Non précis sans
- - - - *K43.9*
- - - - *K43.99*
- - - Sans *K43.98*
- Intestin par calculs biliaires ¬ *K56.3*
- Intestinal
- - Distale ¬ Syndrome d' *E84.1*
- - Lait épaissi ¬ *P76.2*
- - Nouveau-né
- - - Sans précision ¬ *P76.9*
- - - ¬ Autres *P76*
- - Post-opératoire, non classée ailleurs ¬ *K91.3*
- - Précisées du nouveau-né ¬ Autres *P76.8*
- - Sans
- - - Hernie ¬ Iléus paralytique et *K56*
- - - Précision ¬ *K56.6*
- - ¬
- - - Adhérences péritonéales (brides), avec *K56.5*
- - - Hernie avec *K46.0*
- Linguale postérieure des dents inférieures ¬ *K07.2*
- Obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon ¬ *Q42*
- Pupillaire ¬ *H21.4*
- Rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI ¬ obstruction, *Q41*
- S) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire ¬ *T81.5*
- Sans gangrène ¬ Hernie
- - Abdominal
- - - Non précisée, avec *K46.0*
- - - Siège précisé, avec *K45.0*
- - Crurale
- - - Bilatérale, avec *K41.0*
- - - Unilatéral

Occlusion *–suite*
- Sans gangrène ¬ Hernie *–suite*
- - Crurale *–suite*
- - - Unilatéral *–suite*
- - - - Provoquant une *K41.3*
- - - - Sans gangrène ¬ Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec *K41.3*
- - Diaphragmatique
- - - *K44.0*
- - - Provoquant une *K44.0*
- - Épigastrique avec *K43.60*
- - Incisionnel
- - - *K43.0*
- - - Provoquant une *K43.0*
- - Inguinal
- - - Bilatérale, avec *K40.0*
- - - Unilatéral
- - - - Provoquant une *K40.3*
- - - - Sans gangrène ¬ Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec *K40.3*
- - Ombilical
- - - *K42.0*
- - - Provoquant une *K42.0*
- - Parastomale
- - - *K43.3*
- - - Provoquant une *K43.3*
- - Paroi abdominal antérieur
- - - *K43.68*
- - - Non précis
- - - - *K43.6*
- - - - *K43.69*
- - Ventrale causant une *K43.69*
- Sténose artère
- - Basilaire ¬ *I65.1*
- - Carotide ¬ *I65.2*
- - Cérébelleuses ¬ *I66.3*
- - Cérébral
- - - Antérieure ¬ *I66.1*
- - - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.5*
- - - Moyenne ¬ *I66.0*
- - - Multiples et bilatérales ¬ *I66.4*
- - - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I66*
- - - Postérieure ¬ *I66.2*
- - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ *I63*
- - - Sans précision ¬ *I66.9*
- - - ¬ *I66.8*
- - Perforante ¬ *I66.8*
- - Précérébral
- - - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.2*
- - - Multiples et bilatérales ¬ *I65.3*

Occlusion *–suite*
- Sténose artère *–suite*
- - Précérébral *–suite*
- - - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I65*
- - - Sans précision ¬ *I65.9*
- - - ¬ *I65.8*
- - Vertébrale ¬ *I65.0*
- Thrombotique ¬ *I74*
- Transitoire de l'artère de la rétine ¬ *H34.0*
- Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus cérébral par *I63.2*
- Tubaire ¬ *N97.1*
- Vasculaire rétinien
- - Sans précision ¬ *H34.9*
- - ¬
- - - *H34*
- - - *H34.8*
- Veine rétine
- - Branche ¬ *H34.8*
- - Centrale ¬ *H34.8*
- - Débutante ¬ *H34.8*
- - Partielle ¬ *H34.8*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.0*
- ¬
- - Adhérences de l'intestin [brides] avec *K56.5*
- - Hernie
- - - Crurale
- - - - Récidivante, avec *K41.31*
- - - - Unilatérale récidivante, avec *K41.31*
- - - Épigastrique causant une *K43.60*
- - - Hypogastrique causant une *K43.68*
- - - Ligne médiane causant une *K43.68*
- - - Sous-xiphoïdienne causant une *K43.68*
- - - Spieghel causant une *K43.68*

Occulta ¬ Spina bifida *Q76.0*

Occulte
- Selles ¬ Sang *R19.5*
- ¬ Dystrophie maculaire *H35.5*

Ochronose
- Chloasma de la paupière ¬ *E70.2†, H03.8**
- Endogène ¬ *E70.2*
- Héréditaire ¬ *E70.2*
- ¬
- - *E70.2*
- - Affection systémique du tissu conjonctif au cours d' *E70.2†, M36.8**
- - Arthrite au cours d' *E70.2†, M14.59**

OCRL ¬ *E72.0*

Oculaire
v.a. rétro-oculaire
v.a. Spondylo-oculaire
- Avitaminose A ¬ Autres manifestations *E50.7*
- Chronique stade
- - 1 ¬ Maladie GVH *T86.05†, H58.21**

Oculaire *–suite*
- Chronique stade *–suite*
- - 2 ¬ Maladie GVH *T86.06†, H58.22**
- - 3 ¬ Maladie GVH *T86.07†, H58.23**
- Cicatricielle ¬ Pemphigoïde *L12.1†, H13.3**
- Commun
- - III) ¬ Paralysie du nerf moteur *H49.0*
- - ¬ Lésion traumatique du nerf moteur *S04.1*
- Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du globe *S05.5*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du corps vitré et du globe *H45.8**
- Diabétique
- - Diabète type
- - - 1 ¬ Saignement ponctuel comme complication *E10.30†, H58.8**
- - - 2 ¬ Saignement ponctuel comme complication *E11.30†, H58.8**
- - ¬ Saignement ponctuel comme complication *E14.30†, H58.8**
- Externe
- - VI) ¬ Paralysie du nerf moteur *H49.2*
- - ¬ Lésion traumatique du nerf moteur *S04.4*
- Hyperthyroïdienne ¬ Maladie *E05.9†, H58.8**
- Protrusion ou perte de tissu intra-oculaire ¬ Lacération et rupture *S05.2*
- Psychogènes ¬ Troubles *F45.8*
- Récessif lié à l'X ¬ Albinisme *E70.3*
- SAI ¬ Pénétration *S05.6*
- Sans
- - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du globe *S05.6*
- - Précision ¬ Affection du globe *H44.9*
- - Protrusion ou perte de tissu intra-oculaire ¬ Lacération *S05.3*
- Sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familial hypercalciurie néphrocalcinose
- - Atteinte *E83.4*
- - Sans atteinte *E83.4*
- Surdité
- - Neurosensorielle congénitale ¬ Albinisme *E70.3*
- - Sensorielle tardive ¬ Albinisme *E70.3*
- Surnuméraire ¬ Muscle *Q10.3*
- Thyréotoxique ¬ Maladie *E05.9†, H58.8**
- Tissus de l'orbite ¬ Contusion du globe *S05.1*
- Type Nettleship-Falls ¬ Albinisme *E70.3*
- Virus de l'herpès ¬ Affections *B00.5†, H58.8**
- ¬
- - Affection
- - - Dégénératives du globe *H44.3*
- - - Globe *H44.8*
- - Albinisme
- - - *E70.3*
- - - Cutanéo- *E70.3*
- - Atrophie du globe *H44.5*

Oculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe *T26.2*
- - Cataracte (au cours de): secondaire à des affections *H26.2*
- - Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes *T85.3*
- - Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe *T26.7*
- - Cysticercose *B69.1†, H45.1**
- - Dégénérescence du globe *H44.5*
- - Diabète sucré
- - - Insulino-dépendant de type 2 avec complication *E11.30†, H58.8**
- - - Maladie *E14.30†, H58.8**
- - - Non insulino-dépendant
- - - - Primaire avec complication *E11.30†, H58.8**
- - - - Type 2 avec complication *E11.30†, H58.8**
- - - Type
- - - - 1 avec maladie *E10.30†, H58.8**
- - - - 2 avec maladie *E11.30†, H58.8**
- - Douleur *H57.1*
- - Dystrophie musculaire: *G71.0*
- - Glaucome secondaire
- - - Affections *H40.5*
- - - Traumatisme *H40.3*
- - Globe
- - - *C69.9*
- - - *D31.9*
- - Hypertension *H40.0*
- - Limitation traumatique des mouvements des muscles *H50.6*
- - Lissencéphalie pavimenteuse sans atteinte musculaire ou *Q04.3*
- - Luxation du globe *H44.8*
- - Maladie de Basedow avec maladie *E05.0†, H58.8**
- - Mélanocytome du globe *D31.9*
- - Myiase *B87.2†, H58.8**
- - Nystagmus et autres anomalies des mouvements *H55*
- - Œdème *H57.9*
- - Phtisie du globe *H44.5*
- - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: paroi postérieure du globe *H44.6*
- - - Non magnétique dans: paroi postérieure du globe *H44.7*
- - Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique récessive-saccade *G11.8*
- - Tuberculose *A18.5*

Ocularis ¬ Pemphigus *L12.1†, H13.3**

Oculo-auriculo-frontonasal ¬ Syndrome *Q87.0*

Oculo-auriculo-vertébrale ¬ Dysplasie *Q87.0*

Oculo-cérébro-cutané ¬ Syndrome *Q87.8*

Oculo-cérébro-facial type Kaufman ¬ Syndrome *Q87.0*

Oculo-cérébro-rénale ¬ Dystrophie *E72.0*

Oculo-cutané
- Jaune ¬ Albinisme *E70.3*
- Rouge ¬ Albinisme *E70.3*
- Type
- - 3 ¬ Albinisme *E70.3*
- - Amish ¬ Albinisme *E70.3*
- Tyrosinase-négatif ¬ Albinisme *E70.3*
- ¬
- - Albinisme *E70.3*
- - Tyrosinémie *E70.2*

Oculo-dentaire de Rutherfurd ¬ Syndrome *Q87.8*

Oculo-glandulaire ¬
- Listériose *A32.8*
- Tularémie *A21.1*

Oculogramme [EOG] ¬ Anomalies (de): électro- *R94.1*

Oculo-mandibulaire ¬ Dysostose *Q75.5*

Oculo-maxillo-faciale ¬ Dysostose *Q75.1*

Oculomoteur
- Type
- - 1 ¬ Syndrome d'ataxie-apraxie *G11.3*
- - 4 ¬ Syndrome d'ataxie-apraxie *G11.1*
- - Cogan ¬ Apraxie *H51.8*
- ¬
- - Fibrose congénitale des muscles *H49.8*
- - Paralysie
- - - Alternante du nerf *G83.8*
- - - Congénital
- - - - Nerf *H49.0*
- - - - Plusieurs nerfs de muscles *H49.9*

Oculo-ostéo-cutané ¬ Syndrome *Q87.5*

Oculopathie
- Cours syphilis
- - Secondaire précoce ¬ *A51.4†, H58.8**
- - Tardive ¬ *A52.7†, H58.8**
- Syphilitique
- - Congénital
- - - Précoce ¬ *A50.0*
- - - Tardif ¬
- - - - *A50.3*
- - - - *A50.3†, H58.8**
- - Précoce ¬ *A51.4†, H58.8**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, H58.8**
- - Tardive ¬ *A52.7†, H58.8**
- - ¬ *A52.7†, H58.8**
- Toxoplasma ¬ *B58.0†*
- ¬ Syphilis congénitale précoce avec *A50.0†, H58.8**

Oculo-pharyngé
- Distale ¬ Myopathie *G71.0*
- ¬ Dystrophie musculaire: *G71.0*

Oculo-tricho-anal ¬ Syndrome *Q87.8*

Oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] ¬ Syndrome *M02.3*

Ocytocique ¬
- Echec du déclenchement (du travail) (par): *O61.0*
- Intoxication: *T48.0*

Oddi ¬ Spasme du sphincter d' *K83.4*

Odeur
- Expectoration ¬ Anomalie de: *R09.3*
- Poisson ¬ Syndrome de l' *E88.8*
- Sirop d'érable ¬ Maladie des urines à *E71.0*

Odontoclasie ¬ *K02.4*

Odontodysplasie
- Généralisée ¬ *K00.4*
- Régionale ¬ *K00.4*

Odontogène
- Kératokystique
- - Mandibule ¬ Tumeur *D16.5*
- - Maxillaire ¬ Tumeur *D16.42*
- Mandibule ¬
- - Carcinome *C41.1*
- - Fibrosarcome *C41.1*
- - Sarcome *C41.1*
- - Tumeur maligne *C41.1*
- Maxillaire ¬ Kératokyste *D16.42*
- ¬
- - Kératokyste *D16.5*
- - Kystes dentaires liés au développement (*K09.0*

Odontogénèse
- Sans précision ¬ Troubles de l' *K00.9*
- ¬ Autres troubles de l' *K00.8*

Odontogenesis imperfecta ¬ *K00.5*

Odonto-maxillaire segmentaire ¬ Dysplasie *K00.4*

Odonto-onychodermique ¬ Dysplasie *Q82.8*

Odontosarcome
- Améloblastique de la mandibule ¬ *C41.1*
- Mandibule ¬ *C41.1*
- Maxillaire supérieur ¬ *C41.02*

Odonto-trichomélique ¬ Syndrome *Q87.8*

Odorat goût
- Non précisés ¬ Troubles de l' *R43.8*
- ¬ trouble
- - *R43*
- - Associés de l' *R43.8*

Œdémateuse ¬ Laryngite (aiguë): *J04.0*

Œdème
v.a. Angio œdème
- Aigu) du poumon dû à des agents chimiques ¬ *J68.1*
- Angioneurotique
- - Familial ¬ *D84.1*
- - Héréditaire ¬
- - - *D84.1*
- - - Urticaire avec *D84.1*

Œdème *–suite*
- Angioneurotique *–suite*
- - ¬ *T78.3*
- Augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.22*
- Bradykinique
- - Acquis ¬ Angio- *T78.3*
- - Héréditaire ¬ Angio- *D84.1*
- Calabar ¬ *B74.3*
- Canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Cérébral
- - Traumatique ¬ *S06.1*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P11.0*
- - ¬ *G93.6*
- Chaleur ¬ *T67.7*
- Conjonctive ¬ *H11.4*
- Cornée ¬ Autre *H18.2*
- Cours de syndrome néphrotique ¬ *N04.9*
- Épithélium buccal, y compris la langue ¬ Leuco- *K13.2*
- Famine ¬ *E43*
- Fœtal généralisé ¬ *P83.2*
- Généralisé ¬ *R60.1*
- Gestationnel
- - Protéinurie ¬ *O12.2*
- - ¬ *O12.0*
- Glotte ¬ *J38.4*
- Héréditaire type
- - I ¬ Angio- *D84.1*
- - II ¬ Angio- *D84.1*
- Larynx ¬ *J38.4*
- Localisé ¬ *R60.0*
- Macula ¬ Diabète sucré avec *E14.30†, H36.0**
- Moelle
- - Cervicale ¬ Contusion et *S14.0*
- - Dorsale ¬ Contusion et *S24.0*
- - Épinière ¬ *G95.18*
- - Lombaire [Conus medullaris] ¬ Contusion et *S34.0*
- Niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- Non
- - Classé ailleurs ¬ *R60*
- - Histaminique
- - - Acquis ¬ Angio- *T78.3*
- - - Héréditaire ¬ Angio- *D84.1*
- Oculaire ¬ *H57.9*
- Orbite ¬ *H05.2*
- Palpébral ¬ *H02.8*
- Papillaire
- - Sans précision ¬ *H47.1*
- - Syphilitique ¬ *A52.1†, H48.0**

Œdème *–suite*
- Périodique héréditaire ¬ *D84.1*
- Périphérique ¬ *R60.0*
- Pharynx ou du rhinopharynx ¬ *J39.2*
- Poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ *J68.1*
- Protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension ¬ *O12*
- Pulmonaire
- - Aigu
- - - Mention de maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque ¬ *I50.1*
- - - ¬ *J81*
- - ¬ *J81*
- Quincke
- - Héréditaire ¬ *D84.1*
- - ¬ *T78.3*
- SAI ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.28*
- Sans précision
- - Spécifiques du fœtus et du nouveau-né ¬ *P83.3*
- - ¬ *R60.9*
- Sous-glottique ¬ *J38.4*
- Stade non précisé ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.28*
- Substance blanche ¬ Leucoencéphalopathie avec ataxie cérébelleuse modérée et *E75.2*
- Surface cutané
- - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.21*
- - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.20*
- Sus-glottique ¬ *J38.4*

Œil
- Annexe
- - Acte médicaux
- - - Non classées ailleurs ¬ Affections de l' *H59*
- - - Sans précision ¬ Affection de l' *H59.9*
- - - ¬ Autres affections de l' *H59.8*
- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte de l' *H58.2**
- - Cours maladies classées ailleurs ¬ affection
- - - *H58**
- - - Précisées de l' *H58.8**
- - Partie non précis ¬
- - - Brûlure de l' *T26.4*
- - - Corrosion de l' *T26.9*
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H57.9*
- - ¬
- - - Affection

Œil *–suite*
- Annexe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Affection *–suite*
- - - - *H57*
- - - - Précisées de l' *H57.8*
- - - Brûlure
- - - - Corrosion limitées à l' *T26*
- - - - Parties de l' *T26.3*
- - - Corrosion d'autres parties de l' *T26.8*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne de l' *D31*
- - - - Malign
- - - - - *C69*
- - - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C69.8*
- Artificiel ¬
- - *Z97.8*
- - Mise en place et ajustement d'un *Z44.2*
- Beurre noir ¬ *S00.1*
- Chat ¬ Syndrome des *Q92.8*
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ Fond d' *E10.30†, H36.0**
- - - 2 ¬ Fond d' *E11.30†, H36.0**
- - ¬ Fond d' *E14.30†, H36.0**
- Exsudatif ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- Implant ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- Kystique [cystic eyeball] ¬ *Q11.0*
- Nouveau-né ¬ Gonorrhée de l' *A54.3†, H13.1**
- Orbite
- - Non précisée ¬ Lésion traumatique de l' *S05.9*
- - ¬
- - - Lésion traumatique
- - - - *S05*
- - - - *S05.8*
- - - Séquelles de lésion traumatique de l' *T90.4*
- Oreilles ¬ Examen spécial de dépistage des affections des *Z13.5*
- Parasitaire ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- Parties de la face, de la tête et du cou ¬ *T20*
- Poisson ¬ Maladie des *E78.6*
- Rudimentaire ¬ *Q11.2*
- SAI ¬
- - Anomalie congénitale de l' *Q15.9*
- - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- - Lacération de l' *S05.3*
- - Lésion traumatique de l' *S05.9*
- - Rétinopathie (avec)(de): fond de l' *H35.0*
- Sans précision ¬

Œil *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Corps étranger dans la partie externe de l' *T15.9*
- - Malformation congénital
- - - *Q15.9*
- - - Chambre
- - - - Antérieure de l' *Q13.9*
- - - - Postérieure de l' *Q14.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D31.9*
- - - Maligne: *C69.9*
- Secs ¬ Syndrome des *H04.1*
- Toxoplasmes ¬ Affection des *B58.0†, H58.8**
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion de l' *P15.3*
- Vision ¬ Examen des *Z01.0*
- ¬
- - *D48.7*
- - *Z90.0*
- - Affections de plusieurs structures de l' *H44*
- - Agénésie de l' *Q11.1*
- - Aplasie de l' *Q11.1*
- - Arrachement de l' *S05.7*
- - Artériosclérose du fond de l' *I70.8†, H36.8**
- - Candidose de l' *B37.88†, H58.8**
- - Carcinoma in situ: *D09.2*
- - Colobome du fond de l' *Q14.8*
- - Corps étranger
- - - Localisations autres et multiples dans la partie externe de l' *T15.8*
- - - Partie externe de l' *T15*
- - Cysticercose de l' *B69.1†, H45.1**
- - Dysplasie de l' *Q11.2*
- - Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de cornée de l' *T86.83*
- - Glaucome secondaire à une inflammation de l' *H40.4*
- - Herpès simplex de l' *B00.5†, H58.8**
- - Hypoplasie de l' *Q11.2*
- - Hypotonie de l' *H44.4*
- - Infection gonococcique de l' *A54.3*
- - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- - Maladie virale de l' *B33.8†, H58.8**
- - Malformation congénital
- - - *Q15*
- - - Chambre
- - - - Antérieure de l' *Q13.8*
- - - - Postérieure de l' *Q14.8*
- - - Précisées de l' *Q15.8*
- - Mycose des *B49†, H58.8**
- - Nævus d'Ota sur la peau du visage (à l'exception des *D22.3*
- - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: chambre antérieure de l' *H44.6*

Œil *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Rétention ancien corps étranger *–suite*
- - - Non magnétique dans: chambre antérieure de l' *H44.7*
- - Sidérose de l' *H44.3*
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, H58.8**
- - Tuberculose de l' *A18.5*
- - Tumeur
- - - Bénigne caronculaire de l' *D31.0*
- - - Maligne caronculaire de l' *C69.0*

Œsophage
- Abdominal ¬ Tumeur maligne: *C15.2*
- Acquis) ¬ Ptérygion de l' *K22.2*
- Barrett] ¬ Endobrachyœsophage [*K22.7*
- Cervical
- - Œsophage cervical: Œsophage cervical ¬ Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l' *S11.22*
- - Pharynx ¬ Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l' *S11.21*
- - ¬
- - - *S10.0*
- - - Plaie ouverte atteinte pharynx
- - - - *S11.2*
- - - - Œsophage cervical: *S11.22*
- - - Tumeur maligne: *C15.0*
- Congénital) ¬ Diverticule de l' *Q39.6*
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de l' *K23.8**
- Estomac ¬
- - *C16.0*
- - Carcinome in situ de la cavité buccale, de l' *D00*
- Fistule
- - Broncho-œsophagienne ¬ Atrésie de l' *Q39.1*
- - Trachéo-œsophagienne ¬ Atrésie de l' *Q39.1*
- Fongique ¬ Ulcère de l' *K22.1*
- Ingestion
- - Médicaments ¬ Ulcère de l' *K22.1*
- - Produits chimiques ¬ Ulcère de l' *K22.1*
- Partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.83*
- Peptique ¬ Ulcère de l' *K22.1*
- SAI ¬
- - Atrésie de l' *Q39.0*
- - Ulcère de l' *K22.1*
- Sans
- - Fistule ¬ Atrésie de l' *Q39.0*
- - Précision ¬
- - - Maladie de l' *K22.9*
- - - Malformation congénitale de l' *Q39.9*
- - - Tumeur maligne: *C15.9*
- Thoracique ¬
- - Plaie ouverte de l' *S27.83, S21.83!*

Œsophage *–suite*
- Thoracique ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne: *C15.1*
- Tire-bouchon ¬ *K22.4*
- Tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments ¬ Maladie de Crohn de l' *K50.82*
- Type glande salivaire ¬ Carcinome de l' *C15.9*
- ¬
- - *D37.78*
- - Abcès de l' *K20*
- - Absence de l' *Q39.8*
- - Achalasie
- - - Idiopathique de l' *K22.0*
- - - Primitive de l' *K22.0*
- - Adénocarcinome de l' *C15.9*
- - Blessure cervicale de l' *S19.9*
- - Brûlure de l' *T28.1*
- - Carcinoma in situ: *D00.1*
- - Carcinome
- - - *C15.9*
- - - Épidermoïde de l' *C15.9*
- - - Indifférencié de l' *C15.9*
- - Complication mécanique de prothèses, implants et greffes à l' *T85.50*
- - Compression de l' *K22.2*
- - Constriction de l' *K22.2*
- - Corps étranger dans l' *T18.1*
- - Corrosion de l' *T28.6*
- - Dédoublement de l' *Q39.8*
- - Déplacement congénital de l' *Q39.8*
- - Dilatation congénitale de l' *Q39.5*
- - Diverticule acquis de l' *K22.5*
- - Dyskinésie de l' *K22.4*
- - Érosion de l' *K20*
- - Fistule de l' *K22.80*
- - Hémorragie de l' *K22.81*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- - Maladie
- - - *K22*
- - - Crohn de l' *K50.81*
- - - Précisées de l' *K22.88*
- - Malformations congénitales de l' *Q39.8*
- - Néoplasme neuroendocrine de l' *C15.9*
- - Obstruction de l' *K22.2*
- - Occlusion
- - - Acquise de l' *K22.2*
- - - Congénitale de l' *Q39.0*
- - Perforation de l' *K22.3*
- - Ptérygion congénital de l' *Q39.4*
- - Rétrécissement
- - - *K22.2*
- - - Syphilitique
- - - - *A52.7†, K23.8**
- - - - Congénitale de l' *A50.5†, K23.8**

Œsophage *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Rupture de l' *K22.3*
- - Spasme
- - - *K22.4*
- - - Diffus de l' *K22.4*
- - Sténose
- - - *K22.2*
- - - Rétrécissement congénitaux de l' *Q39.3*
- - - Syphilitique
- - - - *A52.7†, K23.8**
- - - - Congénitale de l' *A50.5†, K23.8**
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, K23.8**
- - Tuberculose de *A18.8†, K23.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D13.0*
- - - Malign
- - - - *C15*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C15.8*
- - - - Tiers
- - - - - Inférieur de l' *C15.5*
- - - - - Moyen de l' *C15.4*
- - - - - Supérieur de l' *C15.3*
- - - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l' *C15.9*
- - Ulcère de l' *K22.1*

Œsophagien
- Acquise ¬ Poche *K22.5*
- Anti-reflux ¬ Complication mécanique d'un dispositif *T85.50*
- Estomac ¬ Orifice *C16.0*
- Gastrique cours maladie classé chapitre
- - Mention d'hémorragie ¬ Varices *I98.3**
- - Sans indication d'hémorragie ¬ Varices *I98.2**
- Glissement) ¬ hernie: hiatale (*K44*
- Hémorragiques ¬ Varices *I85.0*
- Non hémorragiques ¬ Varices *I85.9*
- Nouveau-né ¬ Reflux *P78.8*
- Répondant aux inhibiteurs de la pompe à protons ¬ Eosinophilie *K20*
- SAI ¬
- - Reflux *K21.9*
- - Varices *I85.9*
- ¬
- - Atrésie de l'œsophage avec fistule broncho- *Q39.1*
- - Cirrhose
- - - Alcoolique foie
- - - - Hémorragie par rupture des varices *K70.3†, I98.3**
- - - - Varices *K70.3†, I98.2**
- - - Foie
- - - - Hémorragie par rupture des varices *K74.6†, I98.3**
- - - - Varices *K74.6†, I98.2**

Œsophagien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Cirrhose *–suite*
- - - Toxique foie
- - - - Hémorragie par rupture des varices *K71.7†, I98.3**
- - - - Varices *K71.7†, I98.2**
- - Glissement du cardia à travers le hiatus *Q40.1*
- - Néoplasie *D37.78*
- - Plexus: *S24.4*
- - Poche *Q39.6*
- - Tumeur rare gastro- *D37.1*
- - Varices *I85*

Œsophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de Raynaud-troubles moteurs *M34.1*

Œsophagite
- Aspergillus ¬ *B44.8†, K23.8**
- Candida ¬ *B37.81*
- Chimique ¬ *K20*
- Cours d'herpès ¬ *B00.8†, K23.8**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K23.8**
- Éosinophiles ¬ *K20*
- Peptique ¬ *K20*
- Reflux ¬ *K21.0*
- SAI ¬ *K20*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, K23.0**
- Ulcéreuse ¬ *K22.1*
- Virus d'Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K23.8**
- ¬
- - *K20*
- - Reflux gastro-œsophagien
- - - *K21.0*
- - - Sans *K21.9*

Œsophago-gastrique ¬ Jonction: *C16.0*

Œsophagostomose] ¬ Infection par: Oesophagostomum [*B81.8*

Oesophagostomum [œsophagostomose] ¬ Infection par: *B81.8*

Œstrogènes
- Progestatifs ¬ Intoxication: Autres *T38.5*
- ¬ Diminution des *E28.3*

Œuf
- Clair et môle non hydatiforme ¬ *O02.0*
- Fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de tentative d'implantation d'un *N98.2*
- Helminthes NCA ¬ Granulome du péritoine dû à des *B83.9†, K67.8**
- Pathologique ¬ *O02.0*
- ¬ Non-implantation de l' *N97.2*

OFCD ¬ Syndrome *Q87.0*

OFD ¬ *Q87.0*

Ogilvie ¬ Syndrome d' *K56.0*

Ogival ¬ Palais *Q38.5*

Ogna ¬ Epidermolyse bulleuse simple type *Q81.0*

Oguchi ¬ Maladie d' *H53.6*

Ohaha ¬ Syndrome *G11.1*

OI
- Ostéogenèse imparfaite] ¬ *Q78.0*
- ¬ Dents opalescentes sans *K00.5*

Oignon ¬ *M20.1*

Oiseau type Montréal ¬ Nanisme à tête d' *Q87.1*

Oiseleurs ¬ Poumon des *J67.2*

Okamoto ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Okihiro ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Olécrâne ¬ Fracture
- Ouverte de l' *S52.01, S51.87!*
- Partie supérieure du cubitus: *S52.01*

Olécrânienne ¬ Bursite *M70.2*

Oley ¬ Syndrome d' *Q82.8*

Olfactif
- I] ¬ Nerf: *S04.8*
- Nerf crânien I] ¬ Tumeur maligne: Nerf *C72.2*
- Premier nerf crânien] ¬ Affections du nerf *G52.0*
- ¬
- - Bulbe
- - - *C72.2*
- - - *D33.3*
- - Neuroblastome *C30.0*

Olfacto-génitale de Kallmann-De Morsier ¬ Dysplasie *E23.0*

Oligo pauci articulaire
- Évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante *M08.3*
- ¬ Arthrite chronique juvénile, forme *M08.4*

Oligoamnios
- Sans mention de rupture des membranes ¬ *O41.0*
- ¬
- - *O41.0*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par un *P01.2*

Oligoarthrite juvénile ¬ *M08.49*

Oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended *M08.3*

Oligoarticulaire ¬ Arthrite juvénile idiopathique *M08.49*

Oligoastrocytome
- Anaplasique ¬ *C71.9*
- ¬ *C71.9*

Oligodactylie ¬ Syndrome de séquence de Pierre Robin- *Q87.0*

Oligodendrogliome
- Anaplasique ¬ *C71.9*
- ¬ *C71.9*

Oligodontie ¬
- *K00.0*
- Syndrome de fente palatine-anomalies carpo-tarsales- *Q87.8*

Oligoméganéphronie ¬ *Q60.4*

Oligoménorrhée
- Hypoménorrhée ¬ Aménorrhée, *N91*
- Primaire ¬ *N91.3*
- Sans précision ¬ *N91.5*
- Secondaire ¬ *N91.4*

Oligophrenia phenylpyruvica ¬ *E70.0*

Oligosaccharidose ¬ *E77.1*

Oligospermie SAI ¬ *N46*

Oligurie
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- ¬ Anurie et *R34*

Oliver
v.a. Adams-Oliver

Oliver-McFarlane ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Olivo-ponto-cérébelleuse
- Familiale ¬ Dégénérescence *G23.3*
- Héréditaire ¬ Dégénérescence *G23.3*
- ¬
- - AOPC [atrophie *G23.3*
- - Atrophie *G23.3*

Ollendorff
v. Buschke-Ollendorff

Ollier ¬ Maladie d' *Q78.4*

OLLP] ¬ Ossification du ligament longitudinal postérieur [*M48.8*

Olszewski] ¬ Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson- *G23.1*

Ombilic ¬
- *L02.2*
- *L03.3*

Ombilical
- Complication pendant les contractions ¬ Anomalie du cordon *O69.9*
- Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K42.0*
- Gangrène ¬ Hernie *K42.1*
- Gangréneuse ¬ Hernie *K42.1*
- Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K42.0*
- Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K42.0*
- Massive du nouveau-né ¬ Hémorragie *P51.0*
- Membranes ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon *P02*
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬ Hémorragie *P51.9*
- - ¬
- - - Hémorragie
- - - - *P51*
- - - - *P51.8*
- - - Polype *P83.6*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K42.0*
- Provoquant
- - Occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K42.0*
- - Transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon *P02.3*
- SAI ¬

Ombilical *–suite*
- SAI ¬ *–suite*
- - Glissement de la ligature *P51.8*
- - Hernie *K42.9*
- Sans
- - Occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K42.9*
- - Précision ¬
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon *P02.6*
- - - Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon *O69.9*
- Unique ¬ Artère *Q27.0*
- ¬
- - Absence congénitale et hypoplasie de l'artère *Q27.0*
- - Circulaire du cordon *P02.5*
- - Déplacement d'un clampage du cordon *P51.8*
- - Fœtus nouveau-né affecté
- - - Formes de compression du cordon *P02.5*
- - - Procidence du cordon *P02.4*
- - Hernie
- - - *K42*
- - - Sur cicatrice *K43.2*
- - Métastase *C79.2*
- - Nœud du cordon *P02.5*
- - Périphlébite *I80.88*
- - Phlébite *I80.88*
- - Thrombose des vaisseaux *O69.5*
- - Torsion du cordon *P02.5*
- - Travail accouchement compliqué anomalie cordon
- - - *O69*
- - - *O69.8*
- - Tuméfaction diffuse ou généralisée: *R19.0*

Omenn ¬ Syndrome d' *D81.8*

Omodysplasie ¬ *Q78.8*

Omoplate
- Acromion ¬ Fracture de l' *S42.12*
- Apophyse coracoïde ¬ Fracture de l' *S42.13*
- Cavité glénoïde et col de l'omoplate ¬ Fracture de l' *S42.14*
- Corps ¬ Fracture de l' *S42.11*
- Humérus ¬ Fractures multiples de la clavicule, de l' *S42.7*
- Multiples ¬ Fracture de l' *S42.19*
- Os long membre supérieur ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D16.0*
- - Maligne: *C40.0*
- Partie non précisée ¬ Fracture de l' *S42.10*
- SAI ¬ *S42.10*
- ¬
- - *T84.10*
- - Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- - Fracture
- - - *S42.1*

Omoplate *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fracture *–suite*
- - - Omoplate: Cavité glénoïde et col de l' *S42.14*
- - Luxation de l' *S43.3*
- - Région de l' *S41.80*
- - Surélévation de l' *Q74.0*

Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère ¬ *P38*

Omphalocèle
- Fente palatine ¬ Syndrome létal d' *Q87.8*
- ¬ *Q79.2*

Omphalocèle-macroglossie-gigantisme ¬ Syndrome d' *Q87.3*

Omphalo-mésentérique ¬
- Kyste *Q43.0*
- Persistance du canal: *Q43.0*

OMS
- Excès calorique ¬ Obésité grade
- - I (*E66.00*
- - II (*E66.01*
- - III (*E66.02*
- Hypoventilation alvéolaire ¬ Obésité grade
- - I (*E66.20*
- - II (*E66.21*
- - III (*E66.22*
- ¬ Obésité
- - Endogène grade
- - - I (*E66.80*
- - - II (*E66.81*
- - - III (*E66.82*
- - Grade
- - - I (*E66.90*
- - - II (*E66.91*
- - - III (*E66.92*
- - Médicamenteux grade
- - - I (*E66.10*
- - - II (*E66.11*
- - - III (*E66.12*

Omsk ¬ Fièvre hémorragique d' *A98.1*

Onchocerca volvulus ¬ Infection à *B73*

Onchocercose ¬
- *B73*
- Infestation des paupières au cours de l' *B73†, H03.0**

Oncogénique ¬ Ostéomalacie *M83.89*

Oncovirus ¬ *B97.3!*

Onde
- Continues pendant le sommeil lent] ¬ POCS (CSWS) [pointes *G40.01*
- Pression ¬ Effet d'une *T70.9*

Ondine ¬ Syndrome d' *G47.32*

Ondulante
- Maladie de Bang] ¬ Fièvre *A23.1*
- ¬ fièvre (de): *A23*

Ongle
- Autosomique
- - Dominante ¬ Dysplasie des *L60.3*
- - Récessive ¬ Dysplasie des *Q84.6*
- Congénitale) ¬ Hypertrophie des *Q84.5*
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Maladies des *L62.8**
- Doigts ¬ Onychomatricome des *D21.1*
- Fried ¬ Syndrome dent et *Q82.8*
- Incarné ¬ *L60.0*
- Jaune ¬
- - Lymphœdème avec *L60.5*
- - Syndrome des *L60.5*
- Orteil ¬
- - Infection fongique d'un *B35.1*
- - Onychomatricome des *D21.2*
- SAI ¬ Malformation congénitale des *Q84.6*
- Sans précision ¬ Maladie des *L60.9*
- ¬
- - Candidose de la peau et des *B37.2*
- - Coloration anormale de l' *L60.8*
- - Contusion
- - - Doigt s
- - - - Lésion de l' *S60.1*
- - - - Sans lésion de l' *S60.0*
- - - Orteil s
- - - - Lésion de l' *S90.2*
- - - - Sans lésion de l' *S90.1*
- - Dermatophytose de l' *B35.1*
- - Doigt (*T23*
- - Dystrophie
- - - *L60.3*
- - - Vingt *L60.3*
- - Epidermolyse bulleuse dystrophique dominante isolée des *Q81.2*
- - Hippocratisme des *R68.3*
- - Infection
- - - *L03.0*
- - - Fongique d'un *B35.1*
- - - Purulente de l' *L03.01*
- - Inflammation purulente de l' *L03.01*
- - Maladie
- - - *L60.8*
- - - VIH avec candidose de la peau et des *B20, B37.2*
- - Malformations congénitales des *Q84.6*
- - Mycose des *B35.1*
- - Plaie ouverte
- - - Doigt s
- - - - Lésion de l' *S61.1*
- - - - Sans lésion de l' *S61.0*
- - - Orteil s
- - - - Lésion de l' *S91.2*
- - - - Sans lésion de l' *S91.1*
- - Pouce (*T23*

Ongle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Teigne de l' *B35.1*

Onirophrénie ¬ *F23.2*

Onychiale ¬ Dysplasie ectodermique trichoodonto- *Q82.8*

Onychie ¬ *L03.0*

Onycho
v.a. oto-onycho-péronéal
- Arthro-ostéodysplasie ¬ Syndrome de: *Q87.2*

Onychoclasie ¬ *L60.3*

Onycho-digito-mammaire ¬ Syndrome *Q87.2*

Onychodysplasie congénitale ¬ *Q84.6*

Onychodystrophie totalis ¬ *L60.3*

Onychogryphose] ¬ Onychogrypose [*L60.2*

Onychogrypose [Onychogryphose] ¬ *L60.2*

Oncholyse ¬ *L60.1*

Onychomatricome ongle
- Doigts ¬ *D21.1*
- Orteils ¬ *D21.2*

Onychomycose ¬ *B35.1*

Onycho-ostéodysplasie ¬ *Q87.2*

Onychophagie ¬ *F98.88*

Onychose congénitale ¬ *Q84.5*

Onyxis
- Candida ¬ *B37.2*
- Dermatophytique ¬ *B35.1*

Opacification d'un cristallin ¬ *T85.2*

Opacité
- Congénital
- - Cornée ¬ *Q13.3*
- - Corps vitré ¬ *Q14.0*
- Cornéen
- - Centrales ¬ Autres *H17.1*
- - Sans précision ¬ Cicatrice et *H17.9*
- - ¬ cicatrice
- - - *H17*
- - - *H17.8*
- Corps vitré ¬ Autres *H43.3*
- Cristallines du corps vitré ¬ *H43.2*
- Glaucomateuses (sous-capsulaires) ¬ *H26.2*

Opalescentes sans OI ¬ Dents *K00.5*

Opération
- Anus ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une *U69.10!*
- Estomac ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Intestin ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Œsophage ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Organes du système digestif ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*

Opération *–suite*
- Pancréas ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.82*
- Plastique
- - Extrémité
- - - Inférieures ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.4*
- - - Supérieures ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.3*
- - Partie
- - - Corps ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.8*
- - - Tronc ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.2*
- - Sans précision ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.9*
- - Sein ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.1*
- - Tête et du cou ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.0*
- - ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42*
- Prophylactique
- - Facteur risque tumeur malign
- - - Opération prophylactique
- - - - Organes ¬ *Z40.08*
- - - - Ovaire ¬ *Z40.01*
- - - - Sein ¬ *Z40.00*
- - - ¬ *Z40.0*
- - Organes ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: *Z40.08*
- - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: *Z40.01*
- - Sans précision ¬ *Z40.9*
- - Sein ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: *Z40.00*
- - ¬
- - - *Z40*
- - - *Z40.8*
- Rectum ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Réparation d'un tissu cicatriciel ¬ *Z42*
- Shirodkar avec ou sans mention de béance du col ¬ Soins maternels pour: *O34.3*
- Trachée, des bronches et des poumons ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *J95.82*
- Vésicule et des voies biliaires ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.81*
- ¬ Inflammation localisée purulente d'une plaie d' *T81.4*

Opératoire
- Non classée ailleurs ¬ Désunion d'une plaie *T81.3*
- Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie *T81.5*
- ¬
- - Adhérence

Opératoire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Adhérence *–suite*
- - - S) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie *T81.5*
- - - Vaginales post- *N99.2*
- - Déhiscence d'une plaie *T81.3*
- - Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie *T81.5*
- - Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie *T81.5*
- - Rupture d'une plaie *T81.3*

Opercule rétinien sans décollement ¬ *H33.3*

Ophiase ¬ *L63.2*

Ophryogène ¬ Ulérythème *L66.4*

Ophtalmia nodosa ¬ *H16.2*

Ophtalmie
- Diphtérique ¬ *A36.8†, H13.1**
- Gonococcique du nouveau-né ¬ *A54.3*
- Gonorrhéique chez le nouveau-né ¬ *A54.3†, H13.1**
- Neiges ¬ *H16.1*
- Néonatale à gonocoques ¬ *A54.3†, H13.1**
- Nouveau-né SAI ¬ *P39.1*
- Sympathique ¬ *H44.1*

Ophtalmique ¬
- Anti-infectieux *T49.5*
- Zona *B02.3*

Ophtalmoblennorrhée ¬ *A54.3†, H13.1**

Ophtalmologique
- Oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage *T49*
- ¬
- - Diabète sucré de type 1 avec manifestation *E10.30†, H58.8**
- - Intoxication: Médicaments et préparations *T49.5*

Ophtalmo-mandibulo-mélique ¬ Dysplasie *Q87.8*

Ophtalmopathie endocrinienne ¬ *E05.0†, H06.2**

Ophtalmoplégie
v.a. Arthro-ophtalmoplégie
- Calcification cardio-vasculaire ¬ Syndrome de maladie de Gaucher- *E75.2*
- Diabétique ¬ *E14.30†, H58.8**
- Externe
- - Progressif
- - - Autosomique
- - - - Dominante ¬ *H49.4*
- - - - Récessive ¬ *H49.4*
- - - Chronique de transmission maternelle ¬ *H49.4*
- - - Scoliose ¬ *H49.4*

Ophtalmoplégie *–suite*
- Externe *–suite*
- - Progressif *–suite*
- - - ¬ *H49.4*
- - SAI ¬ *H49.8*
- - ¬ Syndrome de macrostomie-anomalies préauriculaires- *Q87.0*
- Interne (complète) (totale) ¬ *H52.5*
- Internucléaire ¬ *H51.2*
- Supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski] ¬ *G23.1*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, H58.8**
- Totale (externe) ¬ *H49.3*
- ¬ Syndrome d'ataxie neuropathique sensorielle-dysarthrie- *G31.81, H49.4*

Ophtalmoplégique ¬ Migraine: *G43.8*

Ophthalmicus NCA ¬ Herpes zoster *B02.3†, H58.8**

Opiacé
- Sang ¬ Présence d' *R78.1*
- Tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et intoxications dues à des *P04.0*
- ¬
- - Intoxication: Analeptiques et antagonistes des *T50.7*
- - Traitement de substitution aux *Z51.83*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d' *F11*

Opioïde
- Antipyrétique
- - Antirhumatismal
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Analgésique non *T39.9*
- - - ¬ Intoxication par analgésiques non *T39*
- - Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres analgésiques non *T39.8*
- ¬ Intoxication
- - *T40.2*
- - Analgésiques non *T39.9*

Opisthorchiase ¬ *B66.0*

Opisthorchis felineus
- Viverrini) ¬ Infection par: *B66.0*
- ¬ Distomatose hépatique à *B66.0†, K77.0**

Opitz
v.a. Bohring-Opitz
- ¬ Syndrome de: Smith-Lemli- *Q87.1*

Opitz-Frias ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Opitz-Kaveggia ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Opitz-trigonocéphalie ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Opium ¬ Intoxication: *T40.0*

Oppenheim ¬ Dystonie d' *G24.1*

Oppenheim-Urbach ¬ Maladie d' *E14.60†, L99.8**

Opportuniste ¬
- HIGM avec susceptibilité aux infections *D80.5*
- Mycose
- - *B48.7*

Opportuniste ¬ *–suite*
- Syndrome hyper-IgM
- - Sans susceptibilité aux infections *D80.5*
- - Susceptibilité aux infections *D80.5*

Oppositionnel avec provocation ¬ Trouble *F91.3*

Opsoclonie-myoclonie ¬ Syndrome
- *B99†, G99.8**
- *C80.9†, G99.8**

Optique
- Autosomique dominant
- - Classique ¬ Atrophie *H47.2*
- - Kjer ¬ Atrophie *H47.2*
- - Plus ¬ Atrophie *H47.2*
- Bosch-Boonstra-Schaaf ¬ Syndrome d'atrophie *H47.2*
- Cataracte autosomique dominante ¬ Syndrome d'atrophie *H47.2*
- Corps genouillés et des radiations optiques de Gratiolet ¬ Affections des voies *H47.5*
- Costeff ¬ Atrophie *E71.1*
- Cours
- - Accouchement ¬ Lésion du nerf *P11.4*
- - Carence en vitamine ¬ Atrophie *E56.9†, H48.0**
- - Leucodystrophie ¬ Atrophie *E75.2†, H48.0**
- - Maladie Leber ¬ Atrophie
- - - Héréditaire du nerf *H47.2*
- - - Nerf *H47.2*
- - Maladies classées ailleurs ¬
- - - Affection nerf
- - - - II] et des voies *H48**
- - - - Voies *H48.8**
- - - Atrophie *H48.0**
- Devic] ¬ Neuromyélite *G36.0*
- Dysarthrie ¬ Syndrome d'ataxie spastique autosomique récessive-atrophie *G11.4*
- Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations *H47.5*
- Héréditaire de Leber ¬ Neuropathie *H47.2*
- Infantile avec chorée et paraplégie spastique ¬ Atrophie *E71.1*
- Ischémique ¬ Neuropathie *H47.0*
- Isolée autosomique récessive ¬ Atrophie *H47.2*
- Nerf crânien II] ¬ Tumeur maligne: Nerf *C72.3*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Affections du nerf *H47.0*
- - Ischémique ¬ Neuropathie *H46*
- Sans précision ¬ Affection des voies *H47.7*
- Syphilitique tardive ¬ Atrophie *A52.1†, H48.0**
- Type 3 autosomique
- - Dominante ¬ Atrophie *H47.2*
- - Récessive ¬ Atrophie *E71.1*
- ¬

Optique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Affection
- - - Chiasma *H47.4*
- - - Nerf [II] et des voies *H47*
- - - Papille *H47.3*
- - - Voies *H47.5*
- - Anomalie
- - - Acquise de la papille *H47.3*
- - - Congénitale de la papille du nerf *Q14.2*
- - Atrophie
- - - *H47.2*
- - - Syphilitique
- - - - Congénitale du nerf *A50.4†, H48.0**
- - - - Nerf *A52.1†, H48.0**
- - Chiasma *S04.0*
- - Colobome congénital de la papille *Q14.2*
- - Compression du nerf *H47.0*
- - Dégénérescence du nerf *H47.0*
- - Démyélinisation au cours d'une névrite *G36.0*
- - Druses de la papille *H47.3*
- - Dysplasie du septum et des voies *Q04.4*
- - Excavation de la papille *H47.2*
- - Gliome des voies *D33.3*
- - Hémorragie de la gaine du nerf *H47.0*
- - Lésion traumatique du nerf et des voies *S04.0*
- - Malformation congénitale de la papille *Q14.2*
- - Neurosyphilis avec atrophie *A52.1†, H48.0**
- - Névrite *H46*
- - Pâleur temporale de la papille *H47.2*
- - Papillite *H46*
- - Syphilis du nerf *A52.1†, H48.0**
- - Tuberculose du nerf *A18.5†, H48.8**

Optique-létalité ¬ Syndrome d'ataxie-surdité-atrophie *E79.8*

Optique-surdité-polyneuropathie-myopathie ¬ Syndrome d'atrophie *H47.2*

Ora serrata ¬ Kyste (de): *H33.1*

Oral
- Antidiabétiques] ¬ Intoxication: Insuline et hypoglycémiants *T38.3*
- Oropharyngé
- - Induite par des rayonnements ¬ mucite (*K12.3*
- - Médicamenteuse ¬ mucite (*K12.3*
- - SAI ¬ mucite (*K12.3*
- - Virale ¬ mucite (*K12.3*
- Purulente ¬ Infection *K12.28*
- Ulcéreuse) ¬ Mucosite *K12.3*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde de la cavité *C06.9*
- - Intoxication: Contraceptifs *T38.4*
- - Kératose *K13.2*
- - Lèvre

Oral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lèvre *–suite*
- - - Inférieure: face: *C00.4*
- - - Sans indication si inférieure ou supérieure: face: *C00.5*
- - - Supérieure: face: *C00.3*
- - Mucinose focale *K13.7*
- - Sels de réhydratation *T50.3*

Oram ¬ Syndrome de: Holt- *Q87.2*

Orange ¬ Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*

Orbitaire ¬
- Léiomyome *D31.6*
- Région *S00.2*

Orbital ¬ Os *C41.0*

Orbite
- Cours maladies classées ailleurs ¬
- - Affection
- - - *H06.3**
- - - Appareil lacrymal et de l' *H06**
- - Infection parasitaire de l' *H06.1**
- Echinococcus ¬ Infection de l' *B67.9†, H06.1**
- Non précisée ¬ Lésion traumatique de l'œil et de l' *S05.9*
- SAI ¬ *S02.8*
- Sans
- - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante de l' *S05.4*
- - Précision ¬
- - - Affection de l' *H05.9*
- - - Tumeur bénigne: *D31.6*
- ¬
- - Abcès de l' *H05.0*
- - Affection
- - - *H05*
- - - *H05.8*
- - - Inflammatoires chroniques de l' *H05.1*
- - Atrophie de l' *H05.3*
- - Carie tuberculeuse des *A18.0†, M90.08**
- - Cellulite de l' *H05.0*
- - Contusion du globe oculaire et des tissus de l' *S05.1*
- - Déformation de l' *H05.3*
- - Echinococcose de l' *B67.9†, H06.1**
- - Exostose de l' *H05.3*
- - Fracture du plancher de l' *S02.3*
- - Gomme des *A52.7†, H06.3**
- - Granulome de l' *H05.1*
- - Hémorragie de l' *H05.2*
- - Infection parasitaire de l' *B89†, H06.1**
- - Inflammation aiguë de l' *H05.0*
- - Kyste de l' *H05.8*
- - Lésion traumatique œil
- - - *S05*

Orbite *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion traumatique œil *–suite*
- - - *S05.8*
- - Malformation congénital
- - - *Q10.7*
- - - Paupières, de l'appareil lacrymal et de l' *Q10*
- - Nerf périphériques
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - - *D48.7*
- - Œdème de l' *H05.2*
- - Os
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - Ostéomyélite de l' *H05.0*
- - Périostite de l' *H05.0*
- - Plaie ouverte de l' *S05.9*
- - Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l' *H05.5*
- - Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l' *T90.4*
- - Syphilis
- - - Secondaire de l' *A51.4†, H06.3**
- - - Tardive des *A52.7†, H06.3**
- - Tissu conjonctif
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - Toit de l' *S02.1*
- - Tuberculose des *A18.5*
- - Tumeur maligne: *C69.6*

Orbitopathie endocrinien
- Ésotropie ¬ Maladie de Basedow avec *E05.0†, H06.3**
- Hypotropie ¬ Maladie de Basedow avec *E05.0†, H06.3**
- Pseudoglaucome ¬ *E05.0†, H06.2**
- Rétraction de paupière ¬ Maladie de Basedow avec *E05.0†, H06.3**
- ¬ Maladie de Basedow avec *E05.0†, H06.3**

Orchite
v.a. Epididymo-orchite
- Blennorragique aiguë ¬ *A54.2†, N51.1**
- Chlamydia ¬ *A56.1†, N51.1**
- Cours de parotidite épidémique ¬ *B26.0†, N51.1**
- Épididymite
- - Épididymo-orchite
- - - Abcès ¬ *N45.0*
- - - Sans abcès ¬ *N45.9*
- - ¬ *N45*
- Gonocoques ¬ *A54.2†, N51.1**
- Gonorrhéique
- - Aiguë ¬ *A54.2†, N51.1**
- - Chronique ¬ *A54.2†, N51.1**

Orchite *–suite*
- Gonorrhéique *–suite*
- - ¬ *A54.2†, N51.1**
- Oreillons ¬ *B26.0†, N51.1**
- SAI ¬ *N45.9*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, N51.1**
- Virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N51.1**

Ordonnance
- Appareil ¬ Renouvellement d'une *Z76.0*
- Lunettes ¬ Renouvellement d'une *Z76.0*
- Médicaments ¬ Renouvellement d'une *Z76.0*
- ¬ Renouvellement d'une *Z76.0*

Ordre publique ¬ Lésion due à des troubles de l' *Y36.9!*

Oreille
- Anormale-paralysie faciale ¬ Syndrome de surdité- *Q87.8*
- Apophyse mastoïde acte médicaux
- - Non classées ailleurs ¬ Affections de l' *H95*
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H95.9*
- - ¬ Autres affections de l' *H95.8*
- Appareil auditif
- - Canal auditif
- - - Externe ¬ Plaie ouverte de l' *S01.34*
- - - ¬ Plaie ouverte de l' *S01.35*
- - Oreille et de l'appareil auditif: Oreille interne ¬ Plaie ouverte de l' *S01.38*
- - Osselets ¬ Plaie ouverte de l' *S01.36*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Plaie ouverte de l' *S01.30*
- - - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif ¬ Plaie ouverte de l' *S01.39*
- - Pavillon de l'oreille ¬ Plaie ouverte de l' *S01.31*
- - Tragus ¬ Plaie ouverte de l' *S01.33*
- - Tympan ¬ Plaie ouverte de l' *S01.37*
- - ¬ Plaie ouverte
- - - *S01.3*
- - - Oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l' *S01.39*
- Atteinte audition
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de l' *Q16.9*
- - ¬ Malformations congénitales de l' *Q16*
- Audition ¬ Examen des *Z01.1*
- Changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau ¬ Effets sur l' *T70.0*
- Chou-fleur" ¬ *M95.1*
- Conduit auditif externe ¬
- - Abcès pavillon de l' *H60.0*
- - Anthrax pavillon de l' *H60.0*
- - Carcinoma in situ: Peau de l' *D04.2*
- - Furoncle pavillon de l' *H60.0*
- - Mélanome
- - - In situ de l' *D03.2*
- - - Malin de l' *C43.2*

Oreille *–suite*
- Conduit auditif externe ¬ *–suite*
- - Nævus à mélanocytes de l' *D22.2*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau de l' *D23.2*
- - - Maligne: Peau de l' *C44.2*
- Cours maladies classées ailleurs ¬ affection
- - *H94**
- - Précisées de l' *H94.8**
- Externe
- - Conduit) ¬ Kératose obturante de l' *H60.4*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de l' *H62.8**
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H61.9*
- - ¬
- - - Abcès de l' *H60.0*
- - - Affection
- - - - *H61*
- - - - Précisées de l' *H61.8*
- - - Cellulite phlegmoneuse de l' *H60.1*
- - - Cholestéatome de l' *H60.4*
- - - Érysipèle de l' *A46†, H62.0**
- - - Herpès simplex de l' *B00.1†, H62.1**
- - - Impétigo de l' *L01.0†, H62.4**
- - - Périchondrite de l' *H61.0*
- Interne
- - Neurorécidive ¬ Syphilis de l' *A52.1†, H94.0**
- - Sans précision ¬ Maladie de l' *H83.9*
- - ¬
- - - *C30.1*
- - - Conséquences du bruit sur l' *H83.3*
- - - Effets nuisibles de bruit sur l' *H83.3*
- - - Maladie
- - - - *H83*
- - - - Précisées de l' *H83.8*
- - - Malformation congénitale de l' *Q16.5*
- - - Otosclérose de l' *H80.2*
- - - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.38*
- - - Syphilis de l' *A52.7†, H94.8**
- - - Tuberculose de l' *A18.6*
- Moyenne
- - Apophyse mastoïde
- - - Cours maladies classées ailleurs ¬ affection
- - - - *H75**
- - - - Précisées de l' *H75.8**
- - - Sans précision ¬ Affection de l' *H74.9*
- - - ¬ affection
- - - - *H74*
- - - - Précisées de l' *H74.8*
- - Appareil respiratoire ¬
- - - Carcinome in situ de l' *D02*
- - - Tumeur bénigne de l' *D14*

Oreille *–suite*
- Moyenne *–suite*
- - Fosses nasales et sinus de la face ¬ Tumeur bénigne: *D14.0*
- - Organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l' *D38*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de l' *Q16.4*
- - ¬
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - - Anomalie congénitale de l' *Q16.4*
- - - Cholestéatome de l' *H71*
- - - Diphtérie de l' *A36.8†, H67.0**
- - - Écoulement aigu et subaigu de l' *H65.0*
- - - Maladie adhésive de l' *H74.1*
- - - Malformations congénitales de l' *Q16.4*
- - - Polype de l' *H74.4*
- - - Syphilis de l' *A52.7†, H75.8**
- - - Tuberculose de l' *A18.6†, H67.0**
- - - Tumeur malign
- - - - *C30.1*
- - - - Fosses nasales et de l' *C30*
- Nageur ¬ *H60.3*
- Non classées ailleurs ¬ Autres affections de l' *H93*
- Pointues ¬ *Q17.3*
- Proéminentes ¬ *Q17.5*
- SAI ¬
- - *S01.30*
- - Absence congénitale de l' *Q16.9*
- - Anomalie congénitale de l' *Q17.9*
- - Lésion traumatique de: *S09.9*
- Sans précision ¬
- - Affection de l' *H93.9*
- - Malformation congénitale de l' *Q17.9*
- Surnuméraire ¬ *Q17.0*
- Toute partie] ¬ *T20*
- Virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite vésiculaire de: *B00.1*
- ¬
- - Absence congénital
- - - Lobe de l' *Q17.8*
- - - Pavillon de l' *Q16.0*
- - Affection
- - - Non infectieuses du pavillon de l' *H61.1*
- - - Précisées de l' *H93.8*
- - - Vasculaires et dégénératives de l' *H93.0*
- - Amputation traumatique de l' *S08.1*
- - Anomalie
- - - Congénital
- - - - Osselets de l' *Q16.3*
- - - - Pavillon de l' *Q17.8*
- - - - Position du pavillon de l' *Q17.4*
- - - Position de l' *Q17.4*
- - Appendices de l' *Q17.0*

Oreille *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Barotraumatisme de l' *T70.0*
- - Blessure superficielle de l' *S00.4*
- - Cellulite phlegmoneuse du: pavillon de l' *H60.1*
- - Corps étranger dans l' *T16*
- - Déformation
- - - *Q17.3*
- - - Acquise: pavillon de l' *H61.1*
- - Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des *Z13.5*
- - Hématome non traumatique du pavillon de l' *H61.1*
- - Malformation congénital
- - - *Q17*
- - - Pavillon de l' *Q17.3*
- - - Précisées de l' *Q17.8*
- - Mycose de l' *B36.9†*, *H62.2**
- - Otalgie et écoulement par l' *H92*
- - Perçage d' *Z41.8*
- - Périchondrite: pavillon de l' *H61.0*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Pavillon de l' *S01.31*
- - Position basse de l' *Q17.4*
- - Surdité
- - - Neurosensorielle unilatérale sans altération de l'audition de l'autre *H90.4*
- - - Unilatéral
- - - - Mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l'audition de l'autre *H90.7*
- - - - Transmission sans altération de l'audition de l'autre *H90.1*
- - Syndrome de retard de langage-asymétrie faciale-strabisme-incisure du lobe de l' *Q87.0*
- - Syphilis de l' *A52.7†*, *H94.8**
- - Tissu
- - - Conjonctif
- - - - *C49.0*
- - - - *D21.0*
- - - - *D48.1*
- - - Mou: *C79.88*
- - Tuberculose de l' *A18.6*

Oreillette
- Auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Thrombose de l' *I23.6*
- Droite ¬ Dilatation idiopathique familiale de l' *Q20.8*
- Gauche
- - Sinus coronaire ¬ Abouchement de la veine cave supérieure gauche dans l' *Q26.1*
- - ¬
- - - Abouchement veine cave supérieur
- - - - Droite dans l' *Q26.8*
- - - - Gauche ¬ Abouchement de la veine cave supérieure gauche dans le toit de l' *Q26.1*

Oreillette *–suite*
- Gauche *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Drainage anormal de la veine cave inférieure dans l' *Q26.8*

Oreillons
- Complications ¬ *B26.8*
- Rubéole [ROR] ¬ Nécessité d'une vaccination contre rougeole- *Z27.4*
- SAI ¬ *B26.9*
- Sans complication ¬ *B26.9*
- Seuls ¬ Nécessité d'une vaccination contre les *Z25.0*
- Vaccination ¬ Maladie ressemblant aux *T88.1*
- ¬
- - *B26*
- - Encéphalite des *B26.2†*, *G05.1**
- - Encéphalomyélite des *B26.2†*, *G05.1**
- - Glomérulopathie au cours de *B26.8†*, *N08.0**
- - Hépatite des *B26.8†*, *K77.0**
- - Méningite des *B26.1†*, *G02.0**
- - Méningo-encéphalite des *B26.2†*, *G05.1**
- - Myélite des *B26.2†*, *G05.1**
- - Orchite des *B26.0†*, *N51.1**
- - Ovarite des *B26.8†*, *N74.8**
- - Pancréatite des *B26.3†*, *K87.1**

Orf [dermatite pustuleuse contagieuse ovine] ¬ *B08.0*

Organe
- Appareil
- - Digestif au cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes d'autres *K93**
- - Tissus ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres *R89*
- - ¬
- - - Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d' *M32.1†*
- - - Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres *M05.3†*
- - - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres *R94.8*
- Bassin ¬ Lésion traumatique: autre *S37.88*
- Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Corti ¬ Anomalie de: *Q16.5*
- Digestif
- - Évolution imprévisible inconnu
- - - Organes digestifs ¬ Tumeur de la cavité buccale et des *D37.78*
- - - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des *D37.70*
- - - ¬ Tumeur de la cavité buccale et des *D37*
- - Non précis ¬
- - - Carcinome in situ des *D01*
- - - Tumeur maligne secondaire des *C78.8*
- - Précis

Organe *–suite*
- Digestif *–suite*
- - Précis *–suite*
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes d'autres *K93.8**
- - - ¬ Carcinoma in situ: Autres *D01.7*
- - SAI ¬
- - - Duplication des *Q45.8*
- - - Malposition congénitale des *Q45.8*
- - Sans précision ¬ Carcinoma in situ: *D01.9*
- - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne des *C26*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de tumeur maligne des *Z80.0*
- - - - Personnels de tumeur maligne des *Z85.0*
- - - Tuberculose des *A18.3†*, *K93.0**
- - - Tumeur
- - - - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D37.78*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D37.7*
- Donné ¬ examen de routine limité à un *Z01*
- Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Génital
- - Appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès ¬ Infection des *A60.0*
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Varices des *O22.1*
- - - Puerpéralité ¬ Varices des *O87.8*
- - Externe
- - - Femme SAI ¬ *C51.9*
- - - Non précisés ¬ Plaie ouverte des *S31.5*
- - - Traumatisme obstétrical ¬ Lésion des *P15.5*
- - - ¬
- - - - Amputation traumatique des *S38.2*
- - - - Contusion des *S30.2*
- - - - Écrasement des *S38.0*
- - Féminin ¬
- - - Douleurs des *N94.8*
- - - Kératose des *N94.8*
- - - Thrombose des *N94.8*
- - Femme
- - - Cycle menstruel
- - - - Sans précision ¬ Affection des *N94.9*
- - - - ¬
- - - - - Affections précisées des *N94.8*
- - - - - Douleurs et autres affections des *N94*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des *D39*
- - - Non précis ¬
- - - - Carcinoma in situ: *D07.3*
- - - - Tumeur

Organe *–suite*
- Génital *–suite*
- - Femme *–suite*
- - - Non précis ¬ *–suite*
- - - - Tumeur *–suite*
- - - - - Bénigne des *D28*
- - - - - Maligne des *C57*
- - - Précis ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: Autres *D28.7*
- - - - Maligne: Autres *C57.7*
- - - Sans précision ¬
- - - - Malformation congénitale des *Q52.9*
- - - - Tumeur
- - - - - Bénigne: *D28.9*
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D39.9*
- - - - - Maligne: *C57.9*
- - - ¬
- - - - Malformation
- - - - - Congénitales des *Q52*
- - - - - Congénitales précisées des *Q52.8*
- - - - Peau
- - - - - *D28*
- - - - - *D39.7*
- - - - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les *R87*
- - - - Tumeur
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D39.7*
- - - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C57.8*
- - Homme
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections des *N51.8**
- - - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des *D40*
- - - Non
- - - - Classées ailleurs ¬ Affections inflammatoires des *N49*
- - - - Précis
- - - - - ¬ Carcinoma in situ: *D07.6*
- - - - - ¬ Tumeur maligne des *C63*
- - - Précisés ¬ Tumeur maligne: Autres *C63.7*
- - - Sans précision ¬
- - - - Affection des *N50.9*
- - - - Malformation congénitale des *Q55.9*
- - - - Tumeur
- - - - - Bénigne: *D29.9*
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D40.9*
- - - - - Maligne: *C63.9*
- - - ¬
- - - - Affection
- - - - - *N50*
- - - - - Précisées des *N50.8*
- - - - - Vasculaires des *N50.1*
- - - - Anomalie congénitale SAI des *Q55.9*

Organe *–suite*
- Génital *–suite*
- - Homme *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Hématocèle SAI des *N50.1*
- - - - Hémorragie des *N50.1*
- - - - Inflammation de localisations multiples des *N49.8*
- - - - Malformation
- - - - - Congénitales des *Q55*
- - - - - Congénitales précisées des *Q55.8*
- - - - Peau
- - - - - *D29*
- - - - - *D40.7*
- - - - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les *R86*
- - - - Thrombose des *N50.1*
- - - - Tumeur
- - - - - Bénigne: Autres *D29.7*
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D40.7*
- - - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C63.8*
- - Masculin
- - - Précisés ¬ Maladies inflammatoires d'autres *N49.88*
- - - ¬
- - - - Mycose des *B49†, N51.8**
- - - - Tuberculose des *A18.1†, N51.8**
- - Non précis
- - - Homme ¬
- - - - Abcès des *N49.9*
- - - - Affection inflammatoire des *N49.9*
- - - - Anthrax des *N49.9*
- - - - Furoncle des *N49.9*
- - - - Phlegmon des *N49.9*
- - - ¬ Carcinome in situ d' *D07*
- - Précisés de l'homme ¬ Affections inflammatoires d'autres *N49.8*
- - ¬
- - - Abcès tuberculeux des *A18.1*
- - - Ambiguïté des *Q56.4*
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de tumeur maligne des *Z80.4*
- - - - Personnels de tumeur maligne des *Z85.4*
- - - Atrophie sénile des *N95.8*
- - - Mélanome in situ des *D03.8*
- - - Tuberculose des *A18.1*
- - - Tumeur maligne secondaire des *C79.82*
- Génito-urinaire
- - Interne ¬
- - - Brûlure des *T28.3*
- - - Corrosion des *T28.8*
- - ¬ Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres *A56.1*
- Hématopoïétique

Organe *–suite*
- Hématopoïétique *–suite*
- - Certain
- - - Anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du sang et des *O99.1*
- - - Trouble système immunitaire ¬
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de maladies du sang et des *Z83.2*
- - - - - Personnels de maladies du sang et des *Z86.2*
- - - - Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des *Z13.0*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres maladies du sang et des *D77**
- - Sans précision ¬ Maladie du sang et des *D75.9*
- - ¬ maladie
- - - Précisées du sang et des *D75.8*
- - - Sang et des *D75*
- - - VIH avec maladie des *B23.8, D75.9*
- Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Interne
- - Sans précision ¬
- - - Brûlure des *T28.4*
- - - Corrosion des *T28.9*
- - ¬ Brûlure et corrosion d'autres *T28*
- Intra-abdominal
- - Non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *S36.9*
- - Pelviens ¬ Séquelles de lésion traumatique d' *T91.5*
- - ¬
- - - Lésion traumatique
- - - - *S36*
- - - - *S36.8*
- - - - *S36.88*
- - - - Multiples *S36.7*
- - - Tumeur lipomateuse bénigne des *D17.5*
- Intrathoracique
- - Intra-abdominaux ou des organes intrathoraciques et pelviens ¬ Lésions traumatiques des *T06.5*
- - Non précis ¬
- - - Lésion traumatique
- - - - *S27*
- - - - *S27.9*
- - - Tumeur bénigne des *D15*
- - Pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et intra-abdominaux ou des *T06.5*
- - Précisés ¬ Tumeur bénigne: Autres *D15.7*
- - Sans précision ¬ Tumeur bénigne: *D15.9*
- - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des *C39*

Organe *–suite*
- Intrathoracique *–suite*
- - ¬
- - - Lésions traumatiques multiples des *S27.7*
- - - Séquelles de lésion traumatique d' *T91.4*
- - - Tumeur lipomateuse bénigne des *D17.4*
- Multiples ¬ Sarcome de Kaposi d' *C46.8*
- Niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ Inscription effectuée pour transplantation d' *Z75.7*
- Non classée ailleurs ¬ Absence acquise d' *Z90*
- Pelvien
- - Cloison
- - - Recto-vaginale ¬ Localisation empiétant sur plusieurs *C76.3*
- - - Recto-vésicale ¬ Localisation empiétant sur plusieurs *C76.3*
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Infection de l'appareil génital et des *O08.0*
- - Féminins ¬ Inflammation tuberculeuse des *A18.1†, N74.1**
- - Lors
- - - Accouchement ¬ Malformation des *O34.9*
- - - Grossesse ¬ Malformation des *O34.9*
- - Mère ¬ Dystocie due à une anomalie des *O65.5*
- - Sans précision ¬ Soins maternels pour anomalie d'un *O34.9*
- - Urinaire
- - - Non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *S37.9*
- - - ¬ lésion traumatique
- - - - *S37.8*
- - - - Multiples *S37.7*
- - ¬
- - - Échec tentative avortement
- - - - Médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des *O07.0*
- - - - Sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des *O07.5*
- - - Lésions obstétricales des *O71.5*
- - - Soin maternel anomalie
- - - - *O34.8*
- - - - Connue ou présumée des *O34*
- Précisés ¬ Tuberculose d'autres *A18.8*
- Respiratoire
- - Digestifs ¬ Tumeur maligne secondaire des *C78*
- - Intrathoracique
- - - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l'oreille moyenne et des *D38*
- - - ¬
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de tumeur maligne des autres *Z80.2*
- - - - - Personnels de tumeur maligne d'autres *Z85.2*

Organe *–suite*
- Respiratoire *–suite*
- - Intrathoracique *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des *C39.8*
- - Non précisés ¬ Tumeur maligne secondaire des *C78.3*
- - Supérieur streptocoque ¬
- - - Infection des *J06.9, B95.5!*
- - - Maladie des *J06.9, B95.5!*
- - Virus ¬ Infection des *J98.7, B97.8!*
- - ¬
- - - Absence congénitale d' *Q34.9*
- - - Anomalie SAI congénitale d' *Q34.9*
- - - Charbon des *A22.1†, J17.0**
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D38.5*
- S
- - Génital(aux) ¬ Absence acquise d' *Z90.7*
- - Intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) ¬ Lésion traumatique d' *S39.6*
- - Pelvien(s) ¬ Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et *S39.6*
- - ¬ Amylose limitée à un ou plusieurs *E85.4*
- Sans niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ Inscription effectuée pour transplantation d' *Z75.6*
- Sens ¬
- - Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des *Z86.6*
- - Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les *Z46.2*
- Seule partie du corps ¬ douleur ne pouvant être rapportée à un seul *R52*
- Sexuels féminins ¬ Hématome des *N94.8*
- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Structurel intrathoracique précis
- - Canal thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.82*
- - Diaphragme ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.81*
- - Œsophage, partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.83*
- - Organes et structures intrathoraciques précisées ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.88*
- - Thymus ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.84*
- - ¬ Lésion traumatique
- - - *S27.8*
- - - Organes et structures intrathoraciques précisés: Autres *S27.88*
- Système
- - Digestif ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations d'autres *K91.83*
- - Non précisé ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: *F45.39*
- - ¬

Organe *–suite*
- Système *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres *Z85.8*
- - - Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme
- - - - *F45.38*
- - - - Plusieurs *F45.37*
- Tissu
- - Greffé
- - - Greffe
- - - - Cornée de l'œil ¬ Echec et rejet d'autres *T86.83*
- - - - Pancréas ¬ Echec et rejet d'autres *T86.82*
- - - - Poumon ¬ Echec et rejet d'autres *T86.81*
- - - Non précisés ¬ Echec et rejet d'un *T86.9*
- - - Organes ou tissus greffés ¬ Echec et rejet d'autres *T86.88*
- - - ¬ échec rejet
- - - - *T86.8*
- - - - Organes et tissus greffés: Autres *T86.88*
- - Non précisés ¬ Donneur d' *Z52.9*
- - Pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Lésions des *O08.6*
- - Remplacé par greffe hétérologue ou homologue ¬ *Z94*
- - Sans précision ¬ Status post greffe d' *Z94.9*
- - ¬
- - - Donneur d'autres *Z52.88*
- - - État consécutif à la transplantation d'autres *Z94.88*
- - - Examen d'un donneur éventuel d' *Z00.5*
- - - Status post d'autre greffe d' *Z94.8*
- Titre prophylactique ¬ Admission pour ablation d'un *Z40.0*
- Urinaire
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des *D41*
- - Génital ¬
- - - Abcès tuberculeux des *A18.1*
- - - Infection à Chlamydia des *A56.2†, N29.1**
- - Non précis ¬
- - - Carcinoma in situ: *D09.1*
- - - Tumeur malign
- - - - *C68*
- - - - Secondaire de la vessie et des *C79.1*
- - Sans précision ¬ Tumeur
- - - Bénigne: *D30.9*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.9*
- - - Maligne: *C68.9*
- - ¬
- - - Complication mécanique d'une greffe d' *T83.2*
- - - Infection tuberculeuse des *A18.1*

Organe *–suite*
- Urinaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Autres *D30.7*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D41.7*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C68.8*
- Voies urinaires ¬ Absence acquise d'autres *Z90.6*
- ¬
- - Absence acquise d'autres *Z90.8*
- - Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et *Z80.8*
- - Entérocolite Clostridium difficile sans mégacôlon
- - - Complications au niveau des *A04.71*
- - - Sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des *A04.70*
- - Examen de suivi après transplantation d' *Z09.80*
- - Inscription effectuée pour transplantation d' *U55*
- - Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres *B57.5*
- - Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique d'autres *Z40.08*
- - Séquelles de tuberculose d'autres *B90.8*
- - Toxoplasmose avec atteinte d'autres *B58.8*
- - Tuberculose d'autres *A18*

Organique
v. Type de maladie

Organo-phosphorés et carbamates ¬ Effet toxique: Insecticides *T60.0*

Orgasme
- Femme ou chez l'homme ¬ Inhibition de l' *F52.3*
- ¬ Crises induites par l' *G40.8*

Orgasmique ¬ Dysfonctionnement *F52.3*

Orgelet
- Chalazion ¬ *H00*
- Inflammations profondes de la paupière ¬ *H00.0*
- Paupière ¬ *H00.0*

Orient ¬ Bouton d' *B55.1*

Orientale
- Douve du foie ¬ Maladie: *B66.1*
- ¬
- - Encéphalite équine *A83.2*
- - Maladie du sommeil de l'Afrique *B56.1*

Orientation
- Matière de sexualité ¬ Conseils relatifs aux attitudes, comportement et *Z70*
- Mode de vie ¬ Difficultés liées à l' *Z73*
- Sexuelle égodystonique ¬ *F66.1*
- Tiers en matière de sexualité ¬ Conseil relatif au comportement ou à l' *Z70*

Orientation *–suite*
- ¬ Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son *F66*

Orifice
- Cardiaque
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des cavités et des *Q20.9*
- - ¬ malformation congénital cavité
- - - *Q20*
- - - *Q20.8*
- Col utérin ¬ Atrésie de l' *Q51.8*
- Hyménal étroit ¬ *N89.6*
- Lacrymal ¬ Absence d' *Q10.4*
- Nasal
- - Antérieur postérieur ¬
- - - Atrésie d'un *Q30.0*
- - - Sténose congénitale d'un *Q30.0*
- - ¬ Plaie ouverte du nez: *S01.22*
- Naturel ¬ Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un *T98.0*
- Œsophagien de l'estomac ¬ *C16.0*
- Piriformes ¬ Sténose congénitale isolée des *Q30.8*
- Trompe d'Eustache ¬ *C11.2*
- Urétéral ¬
- - Déplacement de l'uretère ou de l' *Q62.6*
- - Déviation de l'uretère ou de l' *Q62.6*
- - Ectopie de l'uretère ou de l' *Q62.6*
- - Implantation anormale de l'uretère ou de l' *Q62.6*
- - Tumeur maligne: *C67.6*
- Uretère ¬ Sténose congénitale de l' *Q62.1*
- Urétral interne ¬ *C67.5*
- Vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l' *Z91.73*
- Valve mitrale ¬ Double *Q23.8*
- Vésico
- - Urétéral ¬ Occlusion congénitale de: *Q62.1*
- - Urétral congénital(e) ¬ Rétrécissement de: *Q64.3*
- Vessie
- - Urétéral ¬ *D30.3*
- - Urétral ¬ *D30.3*

Origine
- Affections précisées ¬ Immunodéficience humaine virale [VIH], à l' *B22*
- Alimentaire
- - Clostridium difficile ¬ Intoxication d' *A04.7*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres intoxications bactériennes d' *A05*
- - Précisées ¬ Autres intoxications bactériennes d' *A05.8*
- - Sans précision ¬ Intoxication bactérienne d' *A05.9*
- - ¬

Origine *–suite*
- Alimentaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Infection
- - - - Listeria d' *A32.9*
- - - - Listérienne d' *A32*
- - - Listériose d' *A32.9*
- Anormale ¬ Artère pulmonaire d' *Q25.7*
- Biliaire ¬ Pancréatite aiguë d' *K85.1*
- Branchial ¬
- - Fissure, fistule et kyste d' *Q18.0*
- - Malformations d' *Q18.2*
- Cardiaque ¬ Sclérose du foie d' *K76.1*
- Central ¬
- - Fièvre d' *R50.88*
- - Vertige d' *H81.4*
- - Vessie désinhibée d' *N31.0*
- Cérébrale ¬ Instabilité du détrusor d' *N31.0*
- Cervicale ¬ Stérilité d' *N97.3*
- Chimique
- - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- Dysplasique, bilatérale ¬ Coxarthrose d' *M16.2*
- Essentiellement non médicinale ¬ Séquelles d'effets toxiques de substances d' *T97*
- États précisés ¬ Maladie par VIH à l' *B23.8*
- Fœtale avec fœtus normal ¬ Disproportion: d' *O33.5*
- Génétique ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XX d' *Q99.1*
- Inconnu
- - Accouchement ¬ Hyperthermie d' *O86.4*
- - ¬ Fièvre d' *R50*
- Infectieux
- - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' *R65.1!*
- - Exsiccose ¬
- - - Diarrhée, probablement d' *A09.0, E86*
- - - Entérite, probablement d' *A09.0, E86*
- - - Gastroentérite, probablement d' *A09.0, E86*
- - Non précisée ¬ Gastroentérites et colites autres et non précisées d' *A09*

Origine *–suite*
- Infectieux *–suite*
- - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' *R65.0!*
- - ¬
- - - Gastroentérites et colites autres et non précisées d' *A09.0*
- - - Kératite épithéliale d' *B00.5†, H19.1**
- - - Méthodes spéciales pour l'exploration de: maladies intestinales d' *Z11*
- Maladie
- - Infectieuses et parasitaires ¬ Immunodéficience humaine virale [VIH], à l' *B20*
- - ¬ Immunodéficience humaine virale [VIH], à l' *B23*
- Médicamenteux ¬
- - Antécédents personnels de fibrose pulmonaire d' *Z87.0*
- - Constipation d' *K59.02*
- - Fibrose d' *M79.89*
- - Insuffisance hépatique d' *K71.1, Y57.9!*
- - Ulcère
- - - Duodénal d' *K26.9, Y57.9!*
- - - Estomac d' *K25.9, Y57.9!*
- - - Gastro-duodénal d' *K27.9, Y57.9!*
- - - Peptique d' *K27.9, Y57.9!*
- Mixte
- - Maternelle et fœtale ¬ Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d' *O33.4*
- - ¬ Delirium d' *F05.8*
- Neuromusculaire ¬ Autre dysfonction vésicale d' *N31.88*
- Non
- - Infectieux
- - - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' *R65.3!*
- - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' *R65.2!*
- - Organique ¬
- - - Enurésie: (primaire) (secondaire) d' *F98.0*
- - - Incontinence
- - - - Fécale d' *F98.1*
- - - - Urinaire d' *F98.0*
- - Précis
- - - Survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité ¬ Décès de la mère d' *O95*
- - - ¬
- - - - Gastroentérites et colites autres et non précisées d' *A09.9*
- - - - Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d'origine rhumatismale ou d' *I08.0*
- - Pyogène ¬ Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d' *G95.18*
- Obstétrical
- - Cause non précisée ¬ Mort d' *O95*

Origine *–suite*
- Obstétrical *–suite*
- - Chirurgicale ¬ Infection d'une plaie d' *O86.0*
- - Survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort d' *O96*
- - ¬ Hématome pelvien d' *O71.7*
- Organique ¬
- - Etats délirants et états délirants et hallucinatoires d' *F06.2*
- - Impuissance d' *N48.4*
- - Tics médicamenteux et autres tics d' *G25.6*
- Paternelle
- - Chromosome 11 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une disomie uniparentale d' *Q87.3*
- - ¬ Syndrome de Prader-Willi dû à une délétion 15q11q13 d' *Q87.1*
- Placentaire ¬ Perte de sang fœtal d' *P50.2*
- Principalement non médicinale ¬ Taux anormal dans les urines de substances d' *R82.6*
- Professionnelle ¬ affections des tissus mous d' *M70*
- Pulpaire ¬ Périodontite apicale aiguë d' *K04.4*
- Rachidien
- - Muscles striés ¬ Spasticité d' *G95.83*
- - ¬ Vessie réflexe d' *G95.80*
- Rénal ¬
- - Hyperparathyroïdie secondaire d' *N25.8*
- - Insuffisance staturale d' *N25.0*
- Rhumatismal
- - Origine non précisée ¬ Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d' *I08.0*
- - ¬ précis
- - - *I07*
- - - *I08*
- Sauf substances médicamenteuses ¬ métaux de toutes *T56*
- Situe période périnatal
- - Sans précision ¬ Affection dont l' *P96.9*
- - ¬
- - - Affection
- - - - Dont l' *P96*
- - - - Précisées dont l' *P96.8*
- - - Antécédents personnels de certaines affections dont l' *Z87.6*
- Soins obstétricaux ¬ les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l' *O98*
- Traumatique ¬ Emphysème sous-cutané d' *T79.7*
- Tubaire ¬ Stérilité d' *N97.1*
- Tumeurs malignes ¬ Immunodéficience humaine virale [VIH], à l' *B21*
- Tumorale ¬ Rachitisme d' *E83.38*
- Utérine ¬ Stérilité d' *N97.2*
- Vertébrale ¬ Céphalée d' *M54.2*
- Virale ¬ Verrues d' *B07*

Origine *–suite*
- ¬
- - Alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre *J67*
- - Soins maternels pour disproportion d'autres *O33.8*
- - Stérilité de la femme d'autres *N97.8*
- - Toutes *T58*

Oris ¬ Cancrum *A69.0*

Or-large-for-dates ¬ Autres Heavy- *P08.1*

Ormond ¬ Maladie
- *K66.2*

Ornithine
- Aminotransférase ¬ Déficit en *E72.4*
- Carbamoyltransférase ¬ Déficit en *E72.4*
- Transcarbamylase ¬ Déficit en *E72.4*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme de l' *E72.4*
- - Hyperaminoacidurie provoquée par l' *E72.4*

Ornithinémie (type I, II) ¬ *E72.4*

Ornithose
- Pneumonie ¬ *A70†, J17.8**
- ¬ *A70*

Oro-facial ¬ Malocclusion dentaire due à un dysfonctionnement *K07.5*

Oro-facio-digital
- Type
- - I ¬ Syndrome *Q87.0*
- - II ¬ Syndrome *Q87.0*
- ¬ Syndrome (de): *Q87.0*

Oromandibulaire ¬ Dystonie *G24.4*

Oropharyngé
- Induite par des rayonnements ¬ mucite (orale) (*K12.3*
- Médicamenteuse ¬ mucite (orale) (*K12.3*
- SAI ¬ mucite (orale) (*K12.3*
- Virale ¬ mucite (orale) (*K12.3*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde *C10.9*
- - Infection herpétique *B00.2*

Oropharynx
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C10.9*
- ¬
- - Carrefour pharyngo-laryngé de l' *C10.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Autres parties de l' *D10.5*
- - - Malign
- - - - *C10*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C10.8*
- - - - Paroi
- - - - - Latérale de l' *C10.2*
- - - - - Postérieure de l' *C10.3*

Oropouche ¬ Fièvre d' *A93.0*

Orotacidurie congénitale ¬ *E79.8*

Orotacidurique ¬ Anémie (par): *D53.0*

Oroticacidurie ¬ *E79.8*

Orotidylique ¬ Déficit en décarboxylase *E79.8*

Orotique héréditaire ¬ Acidurie *E79.8*

Oroya ¬ Fièvre de *A44.0*

Orteil

- Larges ¬ Ankylose de l'étrier avec pouces et *Q87.8*
- Lymphangite ¬
- - Infection purulent
- - - *L03.02*
- - - Pied (à l'exception des *L03.11*
- - Inflammation purulent
- - - *L03.02*
- - - Pied (à l'exception des *L03.11*
- Marteau, congénital ¬ *Q66.8*
- Niveau cheville pied ¬ Lésion traumatique muscle tendon long
- - Extenseur d'un *S96.1*
- - Fléchisseur d'un *S96.0*
- Plus ¬ Amputation traumatique de deux *S98.2*
- S
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ Luxation d'un (des) *S93.12*
- - - Métatarsophalangienne ¬ Luxation d'un (des) *S93.11*
- - Bilatérale ¬ *Z89.4*
- - Lésion ongle ¬
- - - Contusion d'un (des) *S90.2*
- - - Plaie ouverte d'un (des) *S91.2*
- - Marteau (acquis) ¬ Autre(s) *M20.4*
- - Parties du pied ¬ Amputation traumatique d'un (des) *S98.3*
- - SAI ¬
- - - Contusion d'un (des) *S90.1*
- - - Plaie ouverte d'un (des) *S91.1*
- - Sans
- - - Lésion ongle ¬
- - - - Contusion d'un (des) *S90.1*
- - - - Plaie ouverte d'un (des) *S91.1*
- - - Précision ¬
- - - - Déformation acquise(s) d'(es) *M20.6*
- - - - Luxation d'un (des) *S93.10*
- - Surnuméraire(s) ¬ *Q69.2*
- - ¬
- - - *T25*
- - - Absence congénitale du pied et d'un (des) *Q72.3*
- - - Déformations (acquises) d'(es) *M20.5*
- - - Écrasement d'un (des) *S97.1*
- - - Entorse et foulure d'un (des) *S93.5*
- - - Luxation d'un (des) *S93.1*
- Sans synostose ¬ Simple syndactylie des *Q70.3*

Orteil *–suite*

- Surnuméraire ¬ Gros *Q69.2*
- Synostose ¬ Syndactylie complexe des *Q70.2*
- ¬
- - Amputation traumatique d'un *S98.1*
- - Arthroplastie métatarsophalangienne du gros *Z96.68*
- - Articulation basale du gros *T84.08*
- - Brachydactylie des *Q72.8*
- - Coalescence des *Q70.2*
- - Déformation acquis
- - - Doigts et des *M20*
- - - Gros *M20.3*
- - Fracture
- - - *S92.5*
- - - Gros *S92.4*
- - Infection fongique d'un ongle d' *B35.1*
- - Macrodactylie des *Q74.2*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la cheville, pied et *R02.07*
- - Onychomatricome des ongles d' *D21.2*
- - Palmure des *Q70.3*
- - Phlegmon
- - - *L03.02*
- - - Doigts et des *L03.0*
- - Polydactylie
- - - Centrale des *Q69.2*
- - - Postaxiale des *Q69.2*
- - - Préaxiale des *Q69.2*

Orthodontique ¬ Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.4*

Orthographe

- Sans trouble de la lecture) ¬ Retard spécifique de l' *F81.1*
- ¬ Trouble spécifique de l'acquisition de l' *F81.1*

Orthopédique

- Interne
- - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe *T84.9*
- - ¬
- - - Complication
- - - - Mécanique d'autres appareils, implants et greffes *T84.4*
- - - - Prothèses, implants et greffes *T84.8*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes *T84.7*
- Partiel) (total) ¬ Présence d'un implant articulaire *Z96.6*
- Précisés ¬ Autres soins de contrôle *Z47.8*
- S ¬
- - Armature *Z46.7*
- - Ceinture *Z46.7*
- - Chaussures *Z46.7*
- - Corset *Z46.7*

Orthopédique *–suite*

- Sans précision ¬
- - Présence d'autres prothèses articulaires *Z96.68*
- - Soin de contrôle *Z47.9*
- - ¬
- - Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.7*
- - Présence d'implants d'articulations *Z96.6*
- - Soins de contrôle *Z47*

Orthopnée ¬ *R06.0*

Orthopoxvirus ¬ infection

- *B08.0*
- Humaine à l' *B08.0*

Orthoptique] ¬ Education de la vision [*Z50.6!*

Orthostatique

- Déficit en NET ¬ Intolérance *I95.1*
- Neurogène
- - Syndrome de Shy-Drager] ¬ Hypotension *G23.8*
- - ¬ Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension *G23.8*
- Sans précision ¬ Protéinurie *N39.2*
- Symptomatique ¬ Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension *G23.8*
- ¬
- - Hypotension *I95.1*
- - Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension *G23.8*

Ortolani ¬ Phénomène d' *R29.4*

Os

- Alvéolaire ¬ Plaie ouverte dans la zone de l' *S01.59*
- Articulation
- - Non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: Métatarsien (*S93.34*
- - ¬
- - - Séquelles de tuberculose des *B90.2*
- - - Tuberculose des *A18.0†*
- Carpe
- - Articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (*S93.31*
- - Carpe, sans précision ¬ Fracture d'autre(s) *S62.10*
- - Grand os ¬ Fracture d'autre(s) *S62.16*
- - Os
- - - Crochu ¬ Fracture d'autre(s) *S62.17*
- - - Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) *S62.13*
- - - Pyramidal ¬ Fracture d'autre(s) *S62.12*
- - - Semi-lunaire ¬ Fracture d'autre(s) *S62.11*
- - - Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) *S62.14*
- - - Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) *S62.15*
- - Surnuméraire ¬ *Q74.0*
- - ¬ Fracture
- - - Plusieurs *S62.19*
- - - S) *S62.1*

Os *–suite*
- Cartilage articulaire
- - Clavicule ¬ Tumeur
- - - Bénigne des *D16.72*
- - - Maligne des *C41.32*
- - Côté ¬ Tumeur
- - - Bénigne des *D16.70*
- - - Maligne des *C41.30*
- - Membre
- - - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C40.9*
- - - ¬ Tumeur malign
- - - - *C40*
- - - - Lésion à localisations contiguës des *C40.8*
- - Sans précision ¬ Tumeur
- - - Bénigne: *D16.9*
- - - Maligne: *C41.9*
- - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur maligne des *C41*
- - Sternum ¬ Tumeur
- - - Bénigne des *D16.71*
- - - Maligne des *C41.31*
- - ¬ Tumeur
- - - Bénigne des *D16*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.0*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C41.8*
- Colonne vertébrale ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres *T84.20*
- Court membre
- - Inférieur ¬ Tumeur
- - - Bénigne: *D16.3*
- - - Maligne: *C40.3*
- - Supérieur ¬ Tumeur
- - - Bénigne: *D16.1*
- - - Maligne: *C40.1*
- Crâne
- - Face
- - - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q75.9*
- - - ¬
- - - - Fractures d'autres *S02.8*
- - - - Malformation
- - - - - Congénitales des *Q75*
- - - - - Congénitales précisées des *Q75.8*
- - - - Tumeur
- - - - - Bénigne: *D16.4*
- - - - - Maligne: *C41.0*
- - ¬
- - - Absence congénitale d' *Q75.8*
- - - Anomalie de suture des *Q75.0*
- - - Dépressions des *Q67.4*
- - - Hyperostose d' *M85.8*
- Crochu ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.17*
- Cuboïde ¬ Fracture: *S92.22*

Os *–suite*
- Cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian) ¬ Fracture: *S92.23*
- Ethmoïde ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Face
- - Partie non précisée ¬ Fracture du crâne et des *S02.9*
- - SAI ¬ Anomalie de: *Q75.9*
- - Sans précision ¬
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - ¬
- - - Fracture
- - - - Crâne et des *S02*
- - - - Multiples du crâne et des *S02.7*
- - - Séquelles d'une fracture du crâne ou des *T90.2*
- - - Tumeur maligne des *C41.02*
- Frontal ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- Hyoïde ¬ *S12.8*
- Iliaques ¬ *D16.8*
- Long
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Sans précision ¬ Incurvation congénitale des *Q68.5*
- - - - ¬
- - - - - Tumeur bénigne: *D16.2*
- - - - - Tumeur maligne: *C40.2*
- - - Supérieur ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: Omoplate et *D16.0*
- - - - Maligne: Omoplate et *C40.0*
- - Rachis
- - - Sans précision ¬ Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des *Q77.9*
- - - ¬ Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des *Q77.8*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Lésion d'autres *P13.3*
- - ¬
- - - Adamantinome des *C40.9*
- - - Incurvation congénitale des *Q68.8*
- Malaires et maxillaires ¬ Fracture des *S02.4*
- Membre
- - Avant-bras ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.12*
- - Bras ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.11*
- - Cheville et pied ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.16*
- - Jambe ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.15*

Os *–suite*
- Membre *–suite*
- - Main ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.13*
- - Os précisés d'un membre ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.18*
- - Région
- - - Pelvienne et cuisse ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.14*
- - - Scapulaire ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.10*
- - ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.1*
- Métacarpe
- - Base ¬ Fracture d'un autre *S62.31*
- - Col ¬ Fracture d'un autre *S62.33*
- - Diaphyse ¬ Fracture d'un autre *S62.32*
- - Partie non précisée ¬ Fracture d'un autre *S62.30*
- - Tête ¬ Fracture d'un autre *S62.34*
- - ¬ Fracture d'un autre *S62.3*
- Métatarse ¬ Fracture d' *S92.3*
- Moelle osseuse ¬ Tumeur maligne secondaire des *C79.5*
- Nasal ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - Anomalie congénitale de l' *Q30.9*
- Naviculaire
- - Carpien ou tarsien ¬ *S62.0*
- - Pied[scaphoide du tarse] ¬ Fracture : *S92.21*
- Nez ¬ Fracture
- - *S02.2*
- - Ouverte des *S02.2, S01.87!*
- Occipital ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Orbital ¬ *C41.0*
- Orbite ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Os précisés ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres *T84.28*
- Pariétal ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- Pétreux ¬
- - Suppuration aiguë de l' *H70.2*
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, M90.28**
- Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.13*
- Précis
- - Membre ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: autres *T84.18*

Os *–suite*
- Précis *–suite*
- - ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: autres *T84.28*
- Pyramidal ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.12*
- SAI ¬ Infection de l' *M86.9*
- Scaphoïde de la main ¬ Fracture de l' *S62.0*
- Semi-lunaire ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.11*
- Sphénoïde ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Talon ¬ *S92.0*
- Tarse
- - Sans précision ¬ Fracture: Un ou plusieurs autres *S92.20*
- - ¬ Fracture: autres *S92.28*
- Temporal
- - Écaille temporale ¬ *S02.0*
- - ¬
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- Thorax
- - Partie non précisée ¬ Fracture des *S22.9*
- - ¬ Fractures d'autres parties des *S22.8*
- Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.14*
- Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.15*
- Verre
- - Ostéogenèse imparfaite] ¬ Maladie des *Q78.0*
- - ¬ Maladie des *Q78.0*
- Zygomaticum ¬ *D16.42*
- Zygomatique ¬ *C41.02*
- ¬
- - Abcès tuberculeux des *A18.0†, M90.09**
- - Complication mécanique appareil
- - - Fixation interne d'autres *T84.2*
- - - Implants et greffes des *T84.3*
- - Donneur d' *Z52.2*
- - Dysplasie fibreuse des *M85.09*
- - Échec ou rejet de greffe de: *T86.88*
- - Échinococcose kystique des *B67.2†, M90.29**
- - Fracture d'autre(s) os du carpe: Grand *S62.16*
- - Gomme de l' *A52.7†, M90.29**
- - Granulome éosinophilique des *C96.6*
- - Kyste
- - - Anévrismal des *M85.5*
- - - Solitaire des *M85.4*
- - Lymphome primitif des *C85.7*
- - Maladie de Paget d'autres *M88.8*
- - Nécrose tuberculeuse des *A18.0†, M90.09**
- - Osteodystrophia deformans au cours de tumeur maligne de l' *C41.9†, M90.69**

Os *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syphilis
- - - *A52.7†, M90.29**
- - - Secondaire des *A51.4†, M90.29**
- - TBC [Tuberculose] des *A18.0†, M90.09**

Oscillopsie ¬ *H53.8*

Osgood-Schlatter] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tubercule tibial [*M92.5*

Osler
v.a. Rendu-Osler-Weber

Osler-Vaquez ¬ Maladie d' *D45*

Osselets
- Oreille ¬ Anomalie congénitale des *Q16.3*
- ¬
- - Ankylose des *H74.3*
- - Anomalies acquises des *H74.3*
- - Coalescence des *Q16.3*
- - Dissociation et dislocation des *H74.2*
- - Malformation congénitale des *Q16.3*
- - Perte partielle des *H74.3*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.36*

Osseux
v.a. tricho-dento-osseux
- Accélérée-dysmorphie faciale-retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation *Q87.3*
- Aluminium ¬ Maladie *M83.4*
- BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse auditive à ancrage *Z96.2*
- Canal rachidien ¬ Rétrécissement *M99.3*
- Congénitale ¬ Scoliose congénitale due à une malformation *Q76.3*
- Cours de maladies tumorales ¬ Fracture *D48.0†, M90.79**
- Diabétique ¬ Altération *E14.60†, M90.89**
- Echinococcus granulosus ¬ Infection *B67.2†, M90.29**
- Face ¬ Syndrome de camptodactylie-raideur articulaire-anomalies *Q87.0*
- Mastoïde] ¬ Ostéite mastoïdienne [carie *H70.1*
- Médullaires) de lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ Foyers *C79.5*
- Membres courts-déficit immunitaire combiné sévère ¬ Syndrome de dysplasie *D82.2*
- Mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture *M96.6*
- Naissance, sans paraplégie ¬ Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle *P11.59*
- Paget
- - Ostéite déformante] ¬ Maladie *M88*
- - Sans précision ¬ Maladie *M88.9*
- - ¬ Ostéosarcome au cours de maladie *C41.9†, M90.69**
- Pian (tardif) ¬ Gomme *A66.6*
- Précisées ¬ Autres maladies *M89.8*
- Primaire ¬ Malformation veineuse *D18.08*

Osseux *–suite*
- Progressive ¬ Hétéroplasie *M61.59*
- Retardé
- - Fusion ou arthrodèse ¬ Guérison *M96.82*
- - Ostéotomie ¬ Guérison *M96.82*
- Sans précision ¬
- - Anomalie
- - - Continuité *M84.9*
- - - Densité et de la structure *M85.9*
- - Maladie *M89.9*
- - Malformation congénitale du thorax *Q76.9*
- Solitaire de la mâchoire ¬ Kyste *K09.2*
- Sudeck-Leriche ¬ Atrophie *G90.5*
- Syphilitique congénitale ¬ Carie *A50.0†, M90.29**
- Tabique neurogène ¬ Atrophie *A52.1†, M90.29**
- Tardive ¬ Syphilis *A52.7†, M90.29**
- Tendineux ¬ Présence d'autres implants *Z96.7*
- Terminale-défauts de pigmentation ¬ Syndrome de dysplasie *Q87.2*
- Von Recklinghausen] ¬ Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie *E21.0†, M90.89**
- ¬
- - Anomalie
- - - Continuité *M84.8*
- - - Densité et de la structure *M85*
- - - Précisées de la densité et de la structure *M85.8*
- - Appareil acoustique de conduction *Z96.2*
- - Atrésie ou rétrécissement du méat auditif *Q16.1*
- - Carie *A18.0†, M90.09**
- - Cryptococcose *B45.3†, M90.29**
- - Donneur de moelle *Z52.3*
- - Effets toxiques de l'alcool sur la moelle *D61.2*
- - Fibrose de la moelle *D47.4*
- - Fracture ouverte de la mandibule avec défaut *S02.60, S01.87!*
- - Fragilité *Q78.0*
- - Hyperplasie de la moelle *D47.4*
- - Hypertrophie *M89.3*
- - Kystes *M85.6*
- - Lésions de la moelle *D61.9*
- - Maladies *M89*
- - Malformation
- - - Congénital
- - - - Rachis et du thorax *Q76*
- - - - Thorax *Q76.8*
- - - Veineuse *D18.08*
- - Pian avec lésion *A66.6†, M90.29**
- - Prothèse (de): conduction *Z45.3*
- - Sarcome *C41.9*
- - Status post greffe *Z94.6*
- - Tabès *A52.1†, M90.29**

Osseux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Troubles de la croissance et du développement *M89.2*
- - Tumeur malign
- - - Envahissement de la moelle *C79.5*
- - - Secondaire des os et de la moelle *C79.5*

Ossifiante
- Associée à des brûlures ¬ Myosite *M61.3*
- Liée à une tétraplégie ou une paraplégie ¬ Myosite *M61.2*
- Progressif ¬ Fibrodysplasie
- - *M61.1*
- - *M61.19*
- Traumatique ¬ Myosite *M61.0*

Ossification
- Anormale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'arachnodactylie- *Q87.8*
- Ligament longitudinal postérieur [OLLP] ¬ *M48.8*
- Muscle
- - Associées à des brûlures ¬ Calcification et *M61.3*
- - Sans précision ¬ Calcification et *M61.9*
- - ¬
- - - *M61.5*
- - - Calcification et *M61*
- Paralytiques d'un muscle ¬ Calcification et *M61.2*
- Sous-périostique post-traumatique ¬ *M89.8*
- Subluxation ¬ Rétrécissement des espaces intervertébraux par *M99.6*

Ostéite
- Alvéolaire ¬ *K10.3*
- Condensante
- - Médiane de la clavicule ¬ *M85.31*
- - ¬ *M85.3*
- Cours d'une affection de la glande parathyroïde ¬ *E21.0†, M90.89**
- Cystoïde multiple
- - Type
- - - Fleischner ¬ *D86.8*
- - - Jüngling ¬ *D86.8*
- - ¬ *D86.8*
- Déformante] ¬ Maladie osseuse de Paget [*M88*
- Fibrokystique généralisé
- - Maladie osseuse de von Recklinghausen] ¬ *E21.0†, M90.89**
- - ¬ *E21.0†, M90.89**
- Mâchoire
- - Aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*
- - ¬ *K10.28*
- Mastoïdienne [carie osseuse de la mastoïde] ¬ *H70.1*
- Périostite gommeuse du pian (tardif) ¬ *A66.6*
- Perthes-Jüngling ¬ *D86.8*

Ostéite *–suite*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.0†, M90.29**
- - Tardive ¬ *A52.7†, M90.29**

Ostéo
v.a. angio-ostéo-hypertrophique
v.a. oculo-ostéo-cutané
- Arthrose
- - Érosive ¬ (*M15.4*
- - Primaire généralisée ¬ (*M15.0*

Ostéoarthrite
- Généralisée SAI ¬ *M15.9*
- Vertébrale ¬ arthrose ou *M47*

Ostéoarthropathies hypertrophiantes ¬ Autres *M89.4*

Osteoarthrosis deformans alkaptonurica ¬ *E70.2†, M36.8**

Ostéo-articulaire
- Muscle
- - Acte médicaux
- - - Non classées ailleurs ¬ Affections du système *M96*
- - - Sans précision ¬ Affection du système *M96.9*
- - - ¬ Autres affections du système *M96.88*
- - Précisées ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales *Q68.8*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale du système *Q79.9*
- - Tissu conjonctif
- - - Sans précision ¬ Déformation acquise du système *M95.9*
- - - ¬
- - - - Antécédents personnels de maladies du système *Z87.3*
- - - - Déformation
- - - - - Acquises du système *M95*
- - - - - Acquises précisées du système *M95.8*
- - ¬
- - - Infection gonococcique du système *A54.4†*
- - - Malformations congénitales du système *Q79.8*
- Pianiques ¬ Lésions *A66.6*
- Suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire ¬ Instabilité du système *M96.88*
- ¬ Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse *M96.88*

Ostéoblastome ¬ *D16.9*

Ostéocalcine ¬ Taux accru d' *R79.8*

Ostéochondrite
- Disséquant ¬
- - *M93.2*
- - *M93.29*
- Juvénile
- - Acétabulum ¬ *M91.0*
- - Antérieure ¬ Déformation de la hanche due à une *M91.2*

Ostéochondrite *–suite*
- Juvénile *–suite*
- - Apophyse tibiale externe [Haglund] ¬ *M92.6*
- - Astragale [Diaz] ¬ *M92.6*
- - Bassin ¬ *M91.0*
- - Calcanéum [Sever] ¬ *M92.6*
- - Cinquième métatarsien [Iselin] ¬ *M92.7*
- - Condyle huméral [Panner] ¬ *M92.0*
- - Corps patellaire [Köhler] ¬ *M92.4*
- - Crête iliaque [Buchanan] ¬ *M91.0*
- - Deuxième métatarsien [maladie de Freiberg] ¬ *M92.7*
- - Épiphyse
- - - Inférieure du cubitus [Burns] ¬ *M92.1*
- - - Supérieure du tibia [Blount] ¬ *M92.5*
- - Hanche bassin
- - - Sans précision ¬ *M91.9*
- - - ¬
- - - - *M91*
- - - - *M91.8*
- - Humérus ¬ *M92.0*
- - Ischio-pubienne [van Neck] ¬ *M91.0*
- - Main ¬ *M92.2*
- - Membre supérieur ¬ Autres *M92.3*
- - Métatarse ¬ *M92.7*
- - Pointe de la rotule [Sinding Larsen] ¬ *M92.4*
- - Précisées ¬ Autres *M92.8*
- - Radius et du cubitus ¬ *M92.1*
- - Réduction d'une luxation congénitale de la hanche ¬ *M91.8*
- - Rotule ¬ *M92.4*
- - Sans précision ¬ *M92.9*
- - Scaphoïde tarsien [Köhler] ¬ *M92.6*
- - Semi-lunaire [Kienböck] ¬ *M92.2*
- - Symphyse pubienne [Pierson] ¬ *M91.0*
- - Tarse ¬ *M92.6*
- - Tête
- - - Fémur [Legg-Calvé-Perthes] ¬ *M91.1*
- - - Humérus [Haas] ¬ *M92.0*
- - - Métacarpiennes [Mauclaire] ¬ *M92.2*
- - - Radiale [Brailsford] ¬ *M92.1*
- - Tibia et du péroné ¬ *M92.5*
- - Tubercule tibial [Osgood-Schlatter] ¬ *M92.5*
- - ¬ Autres *M92*
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*
- Semi-lunaire
- - Adulte ¬ *M93.1*
- - ¬ *M92.2*
- Syphilitique
- - Congénitale précoce ¬ *A50.0†, M90.29**
- - ¬ *A50.0†, M90.29**
- Vertébral
- - Adulte ¬ *M42.1*

Ostéochondrite *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - Juvénile ¬ *M42.0*
- - Sans précision ¬ *M42.9*
- - ¬ *M42*

Ostéochondrodysplasie
- Anomalie croissance os long rachis
- - Sans précision ¬ *Q77.9*
- - ¬ Autres *Q77.8*
- Hypertrichotique type Cantu ¬ *Q87.3*
- Précisées ¬ Autres *Q78.8*
- Sans précision ¬ *Q78.9*
- ¬ Autres *Q78*

Ostéochondrodystrophie ¬ *E76.3*

Ostéochondromatose synoviale ¬ *D48.1*

Ostéochondromes multiples ¬ *Q78.6*

Ostéochondropathie
- Précisées ¬ Autres *M93.8*
- Sans précision ¬ *M93.9*
- Syphilitique congénital
- - Précoce ¬
- - - *A50.0*
- - - *A50.0†, M90.29**
- - Tardive ¬ *A50.5†, M90.29**
- ¬ Autres *M93*

Ostéochondrose
- Déformante du tibia ¬ *M92.5*
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*
- Syphilitique congénitale précoce ¬ *A50.0†, M90.29**

Ostéoclastique du pancréas ¬ Carcinome indifférencié à cellules géantes de type *C25.9*

Ostéodysplasie
v.a. Auriculo-ostéodysplasie
v.a. Onycho-ostéodysplasie
- ¬ Syndrome de: onycho-arthro- *Q87.2*

Ostéodysplasique
v. endocrino-cérébro-ostéodysplasique
- Microcéphalique type Saul-Wilson ¬ Dysplasie *Q87.5*
- Primordial type
- - I ¬ Nanisme microcéphalique *Q87.1*
- - II ¬ Nanisme microcéphalique *Q87.1*
- - III ¬ Nanisme microcéphalique *Q87.1*
- ¬ Gérodermie *Q82.8*

Osteodystrophia
- Deformans au cours de tumeur maligne de l'os ¬ *C41.9†, M90.69**
- Fibrosa osteoplastica ¬ *E21.0†, M90.89**

Ostéodystrophie
- Azotémique ¬ *N25.0*
- Cours d'une affection de la glande parathyroïde ¬ *E21.0†, M90.89**
- Héréditaire d'Allbright ¬ *E20.1*

Ostéodystrophie *–suite*
- Rénal ¬
- - *N25.0*
- - Ostéopathie au cours d' *N25.0†, M90.89**
- SAI ¬ *Q78.9*
- Secondaire au cours d'une affection de la glande parathyroïde ¬ *E21.1†, M90.89**

Ostéogène ¬ Sarcome *C41.9*

Ostéogenèse imparfaite
- Rétinopathie-épilepsie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬
- - *Q78.0*
- - Maladie des os de verre [*Q78.0*
- - OI [*Q78.0*

Ostéoglophonique ¬ Dysplasie *Q87.1*

Ostéolyse
- Expansive familiale ¬ *M89.59*
- Idiopathique massive ¬ *M89.59*
- Massif
- - Gorham ¬ *M89.59*
- - Progressive ¬ *M89.59*
- ¬ *M89.5*

Ostéomalacie
- Adulte
- - Consécutive à une malabsorption post-chirurgicale ¬ *M83.2*
- - Malabsorption ¬ *M83.2*
- - Malnutrition ¬ *M83.3*
- - Sans précision ¬ *M83.9*
- - ¬
- - - *M83*
- - - *M83.8*
- Infantile ¬ *E55.0*
- Juvénile ¬ *E55.0*
- Médicamenteuses de l'adulte ¬ Autres *M83.5*
- Oncogénique ¬ *M83.89*
- Puerpérale ¬ *M83.0*
- Résistante à la vitamine D ¬ *E83.30†, M90.89**
- Sénile ¬ *M83.1*

Ostéomésopycnose ¬ *Q78.2*

Ostéo-musculaire
- Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et *R29.8*
- ¬
- - Anomalie congénitale SAI du système *Q79.9*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système *R93.7*
- - Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et *R29*

Ostéomyélite
- Aiguës ¬ Autres *M86.1*
- Chronique
- - Fistule de drainage ¬ *M86.4*

Ostéomyélite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Multiple ¬ *M86.3*
- - ¬ Autres *M86.6*
- Échinocoques ¬ *B67.2†, M90.29**
- Gonocoques ¬ *A54.4†, M90.29**
- Hématogène
- - Aiguë ¬ *M86.0*
- - Chroniques ¬ Autres *M86.5*
- Multifocale chronique récurrente ¬ *M86.30*
- Néonatale) de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*
- Orbite ¬ *H05.0*
- Salmonella ¬ *A02.2†, M90.29**
- Sans précision ¬ *M86.9*
- Subaiguë ¬ *M86.2*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.0†, M90.29**
- - ¬ *A52.7†, M90.29**
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M90.09**
- Typhique ¬ *A01.0†, M90.29**
- Vertébrale ¬ *M46.2*
- ¬
- - *M86*
- - *M86.8*

Ostéomyélofibrose
- Généralisée idiopathique ¬ *D47.4*
- ¬ *D47.4*

Ostéomyéloréticulose ¬ *D47.4*

Ostéomyélosclérose
- Mégacaryocytaire ¬ *D47.4*
- ¬ *D47.4*

Ostéonécrose
- Aseptique idiopathique ¬ *M87.0*
- Cours
- - Hémoglobinopathie NCA ¬ *D58.2†, M90.49**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *M90.5**
- Induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*
- Ischémique ¬ *M87*
- Mâchoire
- - Irradiation ¬ *K10.28*
- - ¬ *K10.28*
- Maladie des caissons ¬ *T70.3†, M90.39**
- Médicamenteuse ¬ *M87.1*
- Secondaires ¬ Autres *M87.3*
- Traumatisme antérieur ¬ *M87.2*
- ¬
- - *M87.8*
- - *M87.99*

Ostéopathie
- Consécutive à une poliomyélite ¬ *M89.6*
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ *M90.8**

Ostéopathie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladies infectieuses classées ailleurs ¬ *M90.2**
- - Ostéodystrophie rénale ¬ *N25.0†, M90.89**

Ostéopénie-anomalies ectodermiques ¬ Syndrome de retard de développement- *Q87.8*

Ostéopétrose
- Autosomique dominant type
- - 1 ¬ *Q78.2*
- - 2 ¬ *Q78.2*
- Intermédiaire ¬ *Q78.2*
- Maligne autosomique récessive ¬ *Q78.2*
- ¬ *Q78.2*

Ostéophyte
- Facette articulaire ¬ *M47.99*
- ¬ *M25.7*

Osteoplastica ¬ Osteodystrophia fibrosa *E21.0†, M90.89**

Ostéoplastique ¬ Trachéo-bronchopathie chondro- *J98.0*

Ostéopoïkilose
- Isolée ¬ *Q78.8*
- ¬ *Q78.8*

Ostéoporose
- Consécutif malabsorption post-chirurgical
- - Fracture pathologique ¬ *M80.3*
- - ¬ *M81.3*
- Cours
- - Maladie endocrinienne NCA ¬ *E34.9†, M82.19**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *M82.8**
- - Myélomatose multiple ¬ *C90.00†, M82.09**
- Fracture pathologique
- - Sans précision ¬ *M80.9*
- - ¬
- - - *M80*
- - - *M80.8*
- Idiopathique
- - Fracture pathologique ¬ *M80.5*
- - ¬ *M81.5*
- Inactivité
- - Fracture pathologique ¬ *M80.2*
- - ¬ *M81.2*
- Juvénile idiopathique ¬ *M81.5*
- Liée à l'X avec fractures ¬ *M80.59*
- Localisée [Lequesne] ¬ *M81.6*
- Médicamenteux
- - Fracture pathologique ¬ *M80.4*
- - ¬ *M81.4*
- Ovariectomie
- - Fracture pathologique ¬ *M80.1*
- - ¬ *M81.1*
- Post-ménopausique
- - Fracture pathologique ¬ *M80.0*

Ostéoporose *–suite*
- Post-ménopausique *–suite*
- - ¬ *M81.0*
- Sans
- - Fracture pathologique ¬ *M81*
- - Précision ¬ *M81.9*
- Sénile ¬ *M81.8*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, M90.29**
- Transitoire ¬ *M81.6*
- ¬ Autres *M81.8*

Ostéoporose-pseudogliome ¬ Syndrome d' *Q87.5*

Ostéoporotiques ¬ tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, *M80*

Ostéopsathyrose ¬ *Q78.0*

Ostéoradionécrose de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*

Ostéosarcome
- Cours de maladie osseuse de Paget ¬ *C41.9†, M90.69**
- Sacrum ¬ *C41.4*
- ¬ *C41.9*

Ostéosclérose
- Acquise ¬ *M85.8*
- Autosomique dominante type Worth ¬ *Q78.2*
- Cours d'une myélofibrose ¬ *D47.4*
- ¬ Leucémie associée à une *D47.4*

Ostéose fluorée ¬ *M85.1*

Ostéosynthèse
- Interne ¬ Infection péri-implantaire par dispositif d' *T84.6*
- ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d' *M96.6*

Ostéotomie ¬ Guérison osseuse retardée après *M96.82*

Ostia coronaires ¬ Anomalie de position des *Q24.5*

Ostiale coronaire ¬
- Atrésie *Q24.5*
- Sténose *Q24.5*

Ostitis tuberculosa ¬ *A18.0†, M90.09**

Ostium
- Primum
- - Type I) ¬ Persistance de l' *Q21.2*
- - ¬ CIA type *Q21.2*
- Secondum ¬ CIA de type *Q21.1*
- Secundum
- - Type II) ¬ Perméabilité ou persistance de: *Q21.1*
- - ¬
- - - Anomalie du septum atrial type *Q21.1*
- - - ASD type *Q21.1*
- Urétral ¬ Sténose de l' *N35.9*

Ota sur peau
- Paupière ¬ Nævus d' *D22.1*
- Visage (à l'exception des yeux) ¬ Nævus d' *D22.3*

Otalgie
- Écoulement par l'oreille ¬ *H92*
- - ¬ *H92.0*

OTC ¬ Déficit en *E72.4*

Oticus ¬ Herpès zoster *B02.2†, H94.0**

Otite
- Adhésive ¬ *H74.1*
- Aigu externe
- - Actinique ¬ *H60.5*
- - Chimique ¬ *H60.5*
- - Contact ¬ *H60.5*
- - Eczématoïde ¬ *H60.5*
- - Réactionnelle ¬ *H60.5*
- - SAI ¬ *H60.5*
- Chronique externe SAI ¬ *H60.8*
- Externe
- - Aiguë, non infectieuse ¬ *H60.5*
- - Cours
- - - Aspergillose ¬ *B44.8†, H62.2**
- - - Candidose ¬ *B37.2†, H62.2**
- - - Érysipèle ¬ *A46†, H62.0**
- - - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ *B00.1†, H62.1**
- - - Maladie
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *H62.0**
- - - - Infectieux
- - - - - Parasitaires classées ailleurs ¬ *H62.3**
- - - - - ¬ *B99†, H62.3**
- - - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, H62.3**
- - - - Viral
- - - - - Classées ailleurs ¬ *H62.1**
- - - - - ¬ *B34.9†, H62.1**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *H62.4**
- - - Mycose ¬
- - - - *B36.9†, H62.2**
- - - - *H62.2**
- - - Zona ¬ *B02.8†, H62.1**
- - Diffuse ¬ *H60.3*
- - Hémorragique ¬ *H60.3*
- - Impétigo ¬ *L01.0†, H62.4**
- - Infectieuses ¬ Autres *H60.3*
- - Maligne ¬ *H60.2*
- - Pseudomonas aeruginosa ¬ *H60.2, B96.5!*
- - Sans précision ¬ *H60.9*
- - ¬
- - - *H60*
- - - *H60.8*
- Grippale [Influenza] ¬ *J11.8†, H67.1**
- Moyen
- - Aiguës, non suppurées ¬ Autres *H65.1*
- - Chroniques, non suppurées ¬ Autres *H65.4*
- - Suppurées chroniques ¬ Autres *H66.3*
- Moyenne
- - Aigu
- - - SAI ¬ *H66.9*

Otite *–suite*
- Moyenne *–suite*
- - Aigu *–suite*
- - - Subaigu
- - - - Allergique (muqueuse) (sanglante) (séreuse) ¬ *H65.1*
- - - - Muqueuse ¬ *H65.1*
- - - - Non suppurée SAI ¬ *H65.1*
- - - - Sanglante ¬ *H65.1*
- - - - Séromuqueuse ¬ *H65.1*
- - - Suppurée ¬ *H66.0*
- - Allergique ¬ *H65.9*
- - Barotraumatique ¬ *T70.0*
- - Catarrhale ¬ *H65.9*
- - Chronique
- - - Allergique ¬ *H65.4*
- - - Attico-antrale suppurée ¬ *H66.2*
- - - Épanchement (non purulent) ¬ *H65.4*
- - - Exsudative ¬ *H65.4*
- - - Muqueuse ¬ *H65.3*
- - - Non suppurée SAI ¬ *H65.4*
- - - SAI ¬ *H66.9*
- - - Sécrétoire ¬ *H65.3*
- - - Séromuqueuse ¬ *H65.4*
- - - Transsudative ¬ *H65.3*
- - Cours
- - - Maladie
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *H67.0**
- - - - Viral
- - - - - Classées ailleurs ¬ *H67.1**
- - - - - ¬ *B34.9†, H67.1**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *H67.8**
- - - Rougeole ¬ *B05.3†, H67.1**
- - Épanchement (non purulent) ¬ *H65.9*
- - Exsudative ¬ *H65.9*
- - Mucoïde chronique ¬ *H65.3*
- - Muqueuse ¬ *H65.9*
- - Nécrosante aigu
- - - Cours de scarlatine ¬ *A38†, H67.0**
- - - Lors de grippe [Influenza] ¬ *J11.8†, H67.1**
- - Non suppuré
- - - Sans précision ¬ *H65.9*
- - - ¬ *H65*
- - Post-morbilleuse ¬ *B05.3†*
- - Purulente SAI ¬ *H66.4*
- - SAI ¬ *H66.9*
- - Sans précision ¬ *H66.9*
- - Sécrétoire ¬ *H65.9*
- - Séreux
- - - Aiguë ¬ *H65.0*
- - - Chronique ¬ *H65.2*
- - - ¬ *H65.9*
- - Séromuqueuse ¬ *H65.9*
- - Suppuré

Otite *–suite*
- Moyenne *–suite*
- - Suppuré *–suite*
- - - Chronique
- - - - Bénigne ¬ *H66.1*
- - - - SAI ¬ *H66.3*
- - - - Tubo-tympanique ¬ *H66.1*
- - - Sans précision ¬
- - - - *H66*
- - - - *H66.4*
- - Transsudative ¬ *H65.9*
- - Tuberculeuse ¬ *A18.6†, H67.0**
- - Virus grippe aviaire
- - - Identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, H67.1*, U69.21!*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, H67.1**
- Mucoïde ¬ *H65.3*
- Scarlatineuse ¬ *A38†, H67.0**
- Virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ Grippe [Influenza] avec *J10.8†, H67.1**

Oto
v.a. branchio-oto-rénal

Otocéphalie ¬ *Q18.2*

Oto-dentaire ¬ Syndrome *Q87.0*

Oto-facio-cervical ¬ Syndrome *Q87.0*

Otogène
- Disséminée pNCA ¬ Encéphalite *H66.4†, G05.8**
- ¬
- - Abcès (embolique) (du): *G06.0*
- - Vertige: *H81.3*

Otologiques et audiologiques ¬ Présence d'implants *Z96.2*

Otomycose
- Cours
- - Aspergillose ¬ *B44.8†, H62.2**
- - Candidose ¬ *B37.88†, H62.2**
- - Moniliase ¬ *B37.88†, H62.2**
- Diffuse ¬ *B36.9†, H62.2**
- ¬ *B36.9†, H62.2**

Oto-onycho-péronéal ¬ Syndrome *Q87.5*

Oto-palato-digital ¬ Syndrome *Q87.0*

Oto-rhino-laryngologie ¬ Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en *T49.6*

Oto-rhino-laryngologique
- Dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, *T49*
- ¬ Anti-infectieux *T49.6*

Otorragie ¬ *H92.2*

Otorrhée ¬ *H92.1*

Otosclérose
- Cochléaire ¬ *H80.2*
- Intéressant

Otosclérose *–suite*
- Intéressant *–suite*
- - Capsule labyrinthique ¬ *H80.2*
- - Fenêtre
- - - Ovale
- - - - Non oblitérante ¬ *H80.0*
- - - - Oblitérante ¬ *H80.1*
- - - Ronde ¬ *H80.2*
- Oreille interne ¬ *H80.2*
- Sans précision ¬ *H80.9*
- ¬
- - *H80*
- - *H80.8*

Oto-spondylo-mégaépiphysaire ¬ Dysplasie *Q77.7*

Otospongiose ¬ *H80*

Ototoxicité ¬ Perte de l'audition par *H91.0*

Ouïe
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ Problèmes d' *A50.0†, H94.8**
- - ¬ Problèmes d' *A52.1†, H94.8**
- ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos de type cyphoscoliose avec problèmes d' *Q79.6*

Ouraque ¬
- Diverticule de l' *Q64.4*
- Fistule de l' *Q64.4*
- Kyste de l' *Q64.4*
- Malformation de l' *Q64.4*
- Persistance de l' *Q64.4*
- Prolapsus de l' *Q64.4*
- Sinus de l' *Q64.4*
- Tumeur maligne: *C67.7*

Ourlien
- SAI ¬ Parotidite *B26.9*
- ¬
- - Arthrite *B26.8†, M01.59**
- - Myocardite *B26.8†, I41.1**
- - Néphrite *B26.8†, N08.0**
- - Polynévrite *B26.8†, G63.0**

Outils ¬ Accident dû à: *W49.9!*

Ouvert
v. Type de maladie

Ouverture cavité cœur ¬ Déchirure cardiaque
- *S26.83*
- Sans *S26.82*

Ovaire
- Associée à une ovulation induite ¬ Hyperstimulation des *N98.1*
- Bandelette ¬ 46
- - XX avec *Q99.1*
- - XY avec *Q99.1*
- Faible potentiel malignité ¬ Tumeur
- - Mucineuse de l' *C56*
- - Papillaire mucineuse de l' *C56*
- Limite malignité ¬
- - Cystadénome mucineux de l' *C56*

Ovaire *–suite*
- Limite malignité ¬ *–suite*
- - Tumeur épithéliale de l' *C56*
- Pédicule ovarien et de la trompe de Fallope ¬ Torsion de l' *N83.5*
- Résistant aux gonadotrophines ¬ Syndrome de l' *E28.3*
- S) ¬ Absence congénitale d' *Q50.0*
- SAI ¬
- - Hyperstimulation des *N98.1*
- - Malformation congénitale de l' *Q50.3*
- Sans précision ¬ Kystes de l' *N83.2*
- Surnuméraire ¬ *Q50.3*
- Trompe Fallope
- - Ligament large ¬
- - - Affections non inflammatoires de l' *N83.8*
- - - Malformations congénitales des *Q50*
- - ¬
- - - Atrophie acquise de l' *N83.3*
- - - Prolapsus et hernie de l' *N83.4*
- ¬
- - Abcès (de): *N70*
- - Adénocarcinome
- - - *C56*
- - - Cellules claires de l' *C56*
- - - Endométrioïde de l' *C56*
- - - Mucineux de l' *C56*
- - - Papillaire
- - - - *C56*
- - - - Kystique de l' *C56*
- - - Pseudo-mucineux de l' *C56*
- - Cancer de l' *C56*
- - Carcinome
- - - Endométrioïde de l' *C56*
- - - Papillaire kystique de l' *C56*
- - - Petites cellules de l' *C56*
- - Cystadénocarcinome
- - - Endométrioïde de l' *C56*
- - - Mucineux de l' *C56*
- - - Papillaire de l' *C56*
- - - Pseudo-mucineux de l' *C56*
- - Endométriose de l' *N80.1*
- - Gonorrhée de l' *A54.2†, N74.3**
- - Hyperstimulation des *N98.1*
- - Kyste
- - - Folliculaire
- - - - *N83.0*
- - - - Hémorragique (de l' *N83.0*
- - - Rétentionnel de l' *N83.2*
- - - Simple de l' *N83.2*
- - Lésion traumatique de l' *S37.4*
- - Malformations congénitales de l' *Q50.3*
- - Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique de l' *Z40.01*

Ovaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome héréditaire de prédisposition au cancer du sein et de l' *C56, C97!, C50.9*
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, N74.2**
- - Tératome malin de l' *C56*
- - Torsion congénitale de l' *Q50.2*
- - Tuberculose de l' *A18.1†, N74.1**
- - Tumeur
- - - Bénigne de l' *D27*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D39.1*
- - - Germinale
- - - - Dysgerminomateuse maligne de l' *C56*
- - - - Maligne non dysgerminomateuse de l' *C56*
- - - Malign
- - - - *C56*
- - - - Mixte müllérienne de l' *C56*
- - - - Secondaire de l' *C79.6*
- - - - Sertoli-Leydig de l' *C56*

Ovale
- Non oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la fenêtre *H80.0*
- Oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la fenêtre *H80.1*
- ¬
- - Paludisme à Plasmodium *B53.0*
- - Perméabilité ou persistance de: foramen *Q21.1*

Ovalocytose
- Asie du Sud-Est ¬ *D58.1*
- Congénitale) (héréditaire) ¬ *D58.1*

Ovariectomie
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose après *M80.1*
- ¬ Ostéoporose après *M81.1*

Ovarien
- Actes médicaux ¬ Insuffisance *E89.4*
- Cours du développement ¬ Kyste *Q50.1*
- Dermoïde avec transformation maligne ¬ Tumeur *C56*
- Hyperandrogénie ¬ Dysfonction *E28.1*
- Hypergonadotrope ¬ Insuffisance *E28.3*
- Hyperœstrogénie ¬ Dysfonction *E28.0*
- Polykystique ¬
- - SOPK [Syndrome *E28.2*
- - Syndrome *E28.2*
- Primaire ¬ Insuffisance *E28.3*
- Primitif non gestationnel ¬ Choriocarcinome *C56*
- Résiduel ¬ Syndrome dû à la présence de tissu *N99.8*
- SAI ¬ Hyperfonction *E28.8*
- Sans précision ¬ Dysfonction *E28.9*
- Sclérokystique ¬ Syndrome (de): *E28.2*
- Trompe de Fallope ¬ Torsion de l'ovaire, du pédicule *N83.5*
- Tuberculeux ¬ Kyste *A18.1†, N74.1**

Ovarien *–suite*
- ¬
- - Aplasie *Q50.3*
- - Artère ou veine: *S35.88*
- - Cystadénome *D27*
- - Dysfonction
- - - *E28*
- - - *E28.8*
- - Fibrome *D27*
- - Fibrothécome *D27*
- - Grossesse *O00.2*
- - Hypersécrétion des androgènes *E28.1*
- - Kyste de la frange *Q50.4*
- - Saignement *N83.8*
- - Salpingo- *C57.8*
- - Utéro- *C57.8*

Ovarite
- Aiguës ¬ Salpingite et *N70.0*
- Chroniques ¬ Salpingite et *N70.1*
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N74.3**
- Oreillons ¬ *B26.8†, N74.8**
- Sans précision ¬ Salpingite et *N70.9*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N74.1**
- ¬ Salpingite et *N70*

Overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue ¬ Prise excessive (*X49.9!*

Overriding valve
- Mitrale ¬ *Q23.8*
- Tricuspide ¬ Straddling ou *Q22.8*

Oviducte ¬ *C57.0*

Ovine
- Louping ill] ¬ Encéphalomyélite *A84.8*
- ¬ Orf [dermatite pustuleuse contagieuse *B08.0*

Ovotestis ¬ *Q56.0*

Ovulation
- Induite ¬ Hyperstimulation des ovaires: associée à une *N98.1*
- ¬ Saignements de l' *N92.3*

Ovules ¬ Admission pour prélèvement ou implantation d' *Z31.2*

Owren ¬ Maladie
- *D68.22*

OX40 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Oxacilline
- Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l' *U80.10!*
- Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré résistant à l' *U80.0!*
- Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, à l' *U80.1!*

Oxacilline *–suite*

- Méticilline

- - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré résistant à l' *U80.00!*

- - MRSA] ¬ Staphylocoque doré résistant à l' *U80.00!*

- - ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones non résistant à l' *U80.01!*

- ¬ Streptococcus pneumoniae résistant

- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l' *U80.11!*

- - Pénicilline ou à l' *U80.10!*

Oxalate

- Calcium ¬ Néphrite à *E74.8*

- ¬ Néphropathie à *E74.8*

Oxalaturie ¬ *E74.8*

Oxalose ¬ *E74.8*

Oxalurie ¬ *E74.8*

Oxazolidine

- Diones ¬ Intoxication: Succinimides et *T42.2*

- ¬ Intoxication à l' *T42.2*

Oxazolidinones

- Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides, aux *U80.2!*

- Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux *U80.21!*

- Non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux *U80.01!*

- Streptogramines

- - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux *U80.3!*

- - Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ Enterococcus faecium résistant aux *U80.31!*

- - Nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux *U80.11!*

- - ¬

- - - Enterococcus

- - - - Faecalis résistant aux glycopeptides et aux *U80.20!*

- - - - Faecium résistant aux glycopeptides et aux *U80.30!*

- - - Streptococcus pneumoniae résistant pénicilline oxacilline

- - - - Échéant aux macrolides,aux *U80.10!*

- - - - Macrolides, aux *U80.1!*

- ¬ Staphylocoque doré résistant oxacilline

- - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux *U80.0!*

- - Méticilline et le cas échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux *U80.00!*

Oxo thiolase ¬ Carence en 3- *E71.1*

Oxoacide CoA transférase ¬ Déficit en succinyl-CoA:3- *E71.3*

Oxoprolinase ¬

- Déficit en 5- *E72.8*

- Oxoprolinurie liée à un déficit en *E72.8*

Oxoprolinurie liée à un déficit en oxoprolinase ¬ *E72.8*

OXPHOS combiné ¬ Déficit *E88.8*

Oxycéphalie

- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, M90.28**

- ¬ *Q75.0*

Oxydase

- Acide homogentisique ¬ Déficit en *E70.2*

- C type franco-canadien ¬ Déficit en cytochrome *G31.88*

- Déficit cofacteurs molybdène

- - Type A ¬ Déficit en sulfite *E72.1*

- - ¬ Déficit en sulfite *E72.1*

- Type A ¬ Déficit combiné en sulfite oxydase, xanthine déshydrogénase et aldéhyde *E72.1*

- Xanthine déshydrogénase et aldéhyde oxydase type A ¬ Déficit combiné en sulfite *E72.1*

- ¬

- - Déficit

- - - 18- *E27.4*

- - - Acyl-CoA *E71.3*

- - - Combiné en xanthine déshydrogénase et xanthine aldéhyde *E79.8*

- - - Glutaryl-CoA *E72.3*

- - - Isolé en sulfite *E72.1*

- - - Proline *E72.5*

- - - Protoporphyrinogène *E80.2*

- - - Pyridoxamine 5'-phosphate *G40.8*

- - - Sulfite- *E72.1*

- - - Xanthine *E79.8*

- - Encéphalopathie par déficit en sulfite *E72.1*

Oxydation des acides gras et du métabolisme des corps cétoniques ¬ Trouble de l' *E71.3*

Oxydative

- Type

- - 1 ¬ Hépatoencéphalopathie par déficit combiné de la phosphorylation *E88.8, K72.79!*

- - 2 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*

- - 4 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*

- - 7 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*

- - 8 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*

- - 9 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*

- - 10 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*

- - 11 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*

Oxydative *–suite*

- Type *–suite*

- - 13 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*

- - 14 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*

- - 15 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*

- - 16 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*

- - 17 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*

- - 20 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*

- - 21 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*

- - 23 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*

- - 24 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*

- - 25 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*

- - 27 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*

- - 28 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*

- ¬

- - Déficit combiné de la phosphorylation *E88.8*

- - Surdité neurosensorielle syndromique due à un déficit combiné de la phosphorylation *G31.81, H90.8*

Oxydes d'azote ¬ Effet toxique: *T59.0*

Oxydoréductase ¬

- Déficit en xanthine *E79.8*

- Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en cytochrome P450 *E25.08*

- Trouble du transport d'électrons par carence en flavoprotéine-ubiquinone *E71.3*

Oxydoréduction des alcools d'acides gras ¬ Déficit d' *Q87.1*

Oxygénation systémique

- Faible teneur en oxygène de l'air ambiant ¬ Insuffisance d' *T71*

- Gêne mécanique à la respiration ¬ Insuffisance d' *T71*

Oxygène

- Air ambiant ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible teneur en *T71*

- ¬

- - *T41.5*

- - Intoxication à l' *T41.5*

Oxytoca multirésistant

- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Klebsiella *U81.02!*

- 3MRGN ¬ Klebsiella *U81.22!*

- 4MRGN ¬ Klebsiella *U81.42!*

Oxyures ¬

- Infection à *B80*

- Vaginite au cours de l'infection par des *B80†, N77.1**

Oxyures ¬ *–suite*

- Vulvite au cours de l'infection par des *B80†, N77.1**
- Vulvo-vaginite au cours de l'infection par des *B80†, N77.1**

Oxyurose ¬ *B80*

Ozène ¬ *J31.0*

Ozzardi ¬ Infection à Mansonella: *B74.4*

P2Y12 ¬ Troubles hémorragiques par anomalie du récepteur *D69.88*

Pacemaker ¬ Syndrome de *I97.1*

Pachydermie

- Larynx ¬ *J38.7*
- Vorticellé primaire
- - Essentielle du cuir chevelu ¬ *Q82.8*
- - ¬ *Q82.8*

Pachydermopériostose

- Hippocratisme digital ¬ *M89.49†, L62.0**
- ¬ *M89.4*

Pachygyrie ¬ *Q04.3*

Pachyméningite

- Associée à IgG4 ¬ *G03.8*
- Bactérienne ¬ *G00*
- Causes autres et non précisées ¬ *G03*
- Tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**

Pachyonychie

- Congénitale ¬ *Q84.5*
- ¬ *Q84.5*

Pacificum) ¬ Infection à Diphyllobothrium (adulte), (D. latum) (D. *B70.0*

PAF attenuée

- Liée à MUTYH ¬ *D12.6*
- ¬ *D12.6*

PAFA ¬ *D12.6*

Paget

- Crâne ¬ Maladie de *M88.0*
- Extramammaire ¬ Maladie
- - *C21.0*
- - *C44.5*
- Juvénile ¬ Maladie de *M88.99*
- Os ¬ Maladie de *M88.8*
- Ostéite déformante] ¬ Maladie osseuse de *M88*
- Sans précision ¬ Maladie osseuse de *M88.9*
- ¬ Ostéosarcome au cours de maladie osseuse de *C41.9†, M90.69**

Pagétoïde localisée ¬ Réticulose *C84.0*

PAGOD ¬ Syndrome *Q87.8*

Pai ¬ Syndrome de *Q87.8*

PAIS] ¬ Insensibilité partielle aux androgènes [*E34.50*

Pakistani
v.a. Kreiborg-Pakistani

- ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Palagonia ¬ Dysostose acrofaciale type *Q75.4*

Palais

- Fente labial
- - Bilatéral ¬ Fente
- - - Voile du *Q37.2*
- - - Voûte
- - - - *Q37.0*
- - - - Voile du *Q37.4*
- - SAI ¬ Fente

Palais *–suite*

- Fente labial *–suite*
- - SAI ¬ Fente *–suite*
- - - Voile du *Q37.3*
- - - Voûte
- - - - *Q37.1*
- - - - Voile du *Q37.5*
- - Unilatéral ¬ Fente
- - - Voile du *Q37.3*
- - - Voûte
- - - - *Q37.1*
- - - - Voile du *Q37.5*
- Fumeur ¬ *K13.2*
- Mou ¬ Tuberculose du *A18.8†, K93.8**
- Non classées ailleurs ¬ Malformations congénitales du *Q38.5*
- Ogival ¬ *Q38.5*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q38.5*
- Sans précision ¬
- - Fente du *Q35.9*
- - Tumeur maligne: *C05.9*
- ¬
- - *S02.8*
- - Fente
- - - Voile du *Q35.3*
- - - Voûte
- - - - *Q35.1*
- - - - Voile du *Q35.5*
- - Fissure du *Q35*
- - Gomme du voile du *A52.7†, K93.8**
- - Leucokératose nicotinique du *K13.2*
- - Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du voile du *C11.3*
- - Perforation syphilitique du *A52.7†, K93.8**
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.55*
- - Sarcome de Kaposi du *C46.2*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, K93.8**
- - Tumeur malign
- - - *C05*
- - - Lésion à localisations contiguës du *C05.8*
- - - Voile du *C05.1*
- - Ulcère du *K12.1*

Palatin

- Anomalies carpo-tarsales-oligodontie ¬ Syndrome de fente *Q87.8*
- Bilatérale ¬ Fente labio-maxillo- *Q37.4*
- Canal incisif] ¬ Kyste (de): naso- *K09.1*
- Pigmentation rétinienne anormale ¬ Syndrome de microcéphalie-fente *Q87.8*
- SAI ¬ Fente labio- *Q37.9*
- Sans précision fente labial
- - Bilatérale ¬ Fente *Q37.8*
- - Unilatérale ¬ Fente *Q37.9*
- Submuqueuse ¬ Fente *Q35.9*

Palatin *–suite*

- Synéchies latérales ¬ Syndrome de fente *Q87.8*
- ¬
- - Amygdale
- - - *C09.9*
- - - *D10.4*
- - Fente labio- *Q37*
- - Perforation syphilitique congénitale de la voûte *A50.5†, K93.8**
- - Syndrome
- - - Ankyloblépharon filiforme-fente *Q87.0*
- - - Létal d'omphalocèle-fente *Q87.8*
- - - Macrosomie-microphtalmie-fente *Q87.0*
- - Torus: *K10.0*
- - Tumeur maligne: Voûte *C05.0*

Palato
v. génito-palato-cardiaque
v. oto-palato-digital

Palatoschisis ¬ *Q35*

Pâleur

- Temporale de la papille optique ¬ *H47.2*
- ¬ *R23.1*

Palindromique ¬ Rhumatisme *M12.3*

Palinopsie ¬ *F06.0*

Palissade ¬ Dégénérescence rétinienne: en *H35.4*

Palliatifs ¬ Soins *Z51.5*

Pallidale pigmentaire ¬ Dégénérescence *G23.0*

Pallido
v. dentato-rubro-pallido-luysienne

Pallido-pyramidal ¬ Syndrome *G20.90*

Pallidum SAI ¬ Infection due à Treponema *A53.9*

Pallister W ¬ Syndrome de *Q87.8*

Pallister-Hall ¬ Syndrome de *D33.0*

Pallister-Killian ¬ Syndrome de *Q99.8*

Palm
v. Pfeiffer-Palm-Teller

Palmaire

- Anormaux ¬ Plis *Q82.8*
- Dupuytren] ¬ Fibromatose de l'aponévrose *M72.0*
- Plantaire
- - Acquise ¬ Kératose [kératodermie] *L85.1*
- - Précoce) (tardive), due au pian ¬ Hyperkératose *A66.3*
- - ¬
- - - Kératose ponctuée (*L85.2*
- - - Pustulose *L40.3*
- Profond ¬ Lésion traumatique de l'arc *S65.3*
- Superficiel ¬ Lésion traumatique de l'arc *S65.2*
- ¬
- - *S63.4*
- - Ligament: cubito-carpien (*S63.3*
- - Papillome pianique plantaire ou *A66.1*

Palmaris ¬ Keratomycosis nigricans *B36.1*

Palmé ¬ Cou *Q18.3*

Palmitoyltransférase

- I hépatique ¬ Déficit en carnitine *E71.3*
- IA ¬ Déficit en carnitine *E71.3*
- II ¬ Déficit en carnitine *E71.3*

Palmityltransférase musculaire ¬ Carence en carnitine *E71.3*

Palmoplantaire

- Alopécie congénitale autosomique dominante ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Cardiomyopathie arythmogène ¬ Syndrome d'hyperkératose *Q87.8*
- Diffus
- - Acrocyanose ¬ Syndrome de kératodermie *Q82.8*
- - Autosomique dominante type Norrbotten ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Disséminée ¬ Porokératose *Q82.8*
- Érythrodermique diffuse type Voerner ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Focale et gingivale ¬ Hyperkératose *Q82.8*
- Héréditaire
- - Type Gamborg-Nielsen ¬ Kératodermie *Q82.8*
- - ¬ Kératose: *Q82.8*
- Mutilante avec plaques kératosiques péri-orificielles ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Nummulaire ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Ponctuée type
- - 1 ¬ Kératodermie *Q82.8*
- - 2 ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Striée ou en bandes ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Surdité ¬ Syndrome de kératodermie *Q82.8*
- Transgrediens et progrediens ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Type Nagashima ¬ Kératodermie *Q82.8*
- ¬ Érythrodysesthésie *L27.1*

Palmoplantaire-périodontopathie ¬ Syndrome de kératodermie *Q82.8*

Palmoplantaire-périodontopathie-onychogrypose ¬ Syndrome d'hyperkératose *Q82.8*

Palmoplantaris transgrediens de Siemens ¬ Keratosis *Q82.8*

Palmure

- Doigts ¬ *Q70.1*
- Orteils ¬ *Q70.3*

Palpébral ¬

- Ectropion *H02.1*
- Œdème *H02.8*
- Troubles affectant la fonction *H02.5*

Palpitations ¬ *R00.2*

Paludisme

- Cérébral
- - SAI ¬ *B50.0*
- - ¬ *B50.0†, G94.8**
- Confirmé examen parasitologique
- - Non classés ailleurs ¬ Autres *B53.8*

Paludisme *–suite*

- Confirmé examen parasitologique *–suite*
- - SAI ¬ *B53.8*
- - ¬ Autres *B53*
- Congénital
- - Plasmodium falciparum ¬ *P37.3*
- - ¬ Autres formes de *P37.4*
- Diagnostiqué cliniquement, sans confirmation parasitologique. ¬ *B54*
- Plasmodies simiennes ¬ *B53.1*
- Plasmodium
- - Falciparum
- - - Complication cérébral ¬
- - - - *B50.0*
- - - - *B50.0†, G94.8**
- - - Sans précision ¬ *B50.9*
- - - ¬
- - - - *B50*
- - - - Formes sévères et compliquées de *B50.8*
- - Malariae
- - - Atteinte rénale ¬ *B52.0†, N08.0**
- - - Complications ¬ *B52.8*
- - - SAI ¬ *B52.9*
- - - Sans complication ¬ *B52.9*
- - - ¬ *B52*
- - Ovale ¬ *B53.0*
- - Vivax
- - - Complications ¬ *B51.8*
- - - Rupture de la rate ¬ *B51.0†, D77**
- - - SAI ¬ *B51.9*
- - - Sans complication ¬ *B51.9*
- - - ¬ *B51*
- Sans précision ¬ *B54*
- Sévère ou compliqué à Plasmodium falciparum SAI ¬ *B50.8*
- ¬
- - Anémie due au *B54†, D63.8**
- - Hépatite au cours de *B54†, K77.0**
- - Myocardite au cours de *B50.8†, I41.2**
- - Néphrose au cours de *B52.0†, N08.0**
- - Splénomégalie au cours de *B54†, D77**

Pampiniforme ¬ Thrombose du plexus *I80.88*

PAN ¬ *M30.0*

Panacinaire ¬ Emphysème *J43.1*

Panaris herpétique ¬ *B00.8†, L99.8**

Panbronchiolite diffuse ¬ *J44.89*

Pancardite

- Aiguë) (chronique) ¬ *I51.8*
- Rhumatismale aiguë ¬ *I01.8*

Pancolite

- Indéterminée ¬ *K52.30*
- Ulcéreuse (chronique) ¬ *K51.0*

Pancréas

- Annulaire ¬ *Q45.1*

Pancréas *–suite*

- Canal pancréatique
- - SAI ¬ Malformation congénitale du *Q45.3*
- - ¬ Autres malformations congénitales du *Q45.3*
- Corps ¬ Lésion traumatique du *S36.22*
- Cours maladies classées ailleurs ¬ atteinte
- - *K87.1**
- - Vésicule biliaire, des voies biliaires et du *K87**
- Endocrine
- - Polypeptide
- - - Intestinal vaso-actif ¬ Hypersécrétion du *E16.8*
- - - Pancréatique ¬ Hypersécrétion du *E16.8*
- - Releasing factor" de l'hormone de croissance ¬ Hypersécrétion du *E16.8*
- - Somatostatine ¬ Hypersécrétion du *E16.8*
- - ¬ Tumeur
- - - Bénigne: *D13.7*
- - - Maligne: *C25.4*
- Hypersécrétion de glucagon ¬ Hyperplasie des cellules endocrines du *E16.3*
- Partie
- - Non précisée ¬ Lésion traumatique du *S36.20*
- - Parties et parties multiples ¬ Lésion traumatique du *S36.29*
- Queue ¬ Lésion traumatique du *S36.23*
- SAI ¬ Hyperplasie des cellules (des): endocrines du *E16.9*
- Sans précision ¬
- - Maladie du *K86.9*
- - Tumeur maligne: *C25.9*
- Surnuméraire ¬ *Q45.3*
- Tête ¬ Lésion traumatique du *S36.21*
- ¬
- - *D01.7*
- - *Z94.88*
- - Absence congénitale du *Q45.0*
- - Adénome du *D13.6*
- - Agénésie, aplasie et hypoplasie du *Q45.0*
- - Atrophie du *K86.8*
- - Calcul du *K86.8*
- - Carcinome
- - - Cellules acineuses du *C25.9*
- - - Épidermoïde du *C25.9*
- - - Indifférencié à cellules géantes de type ostéoclastique du *C25.9*
- - - Intracanalaire papillaire mucineux du *C25.3*
- - - Neuroendocrine du *C25.9*
- - - Pseudo-papillaire et solide du *C25.9*
- - Cirrhose du *K86.8*
- - Col du *C25.7*
- - Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes au *T85.54*
- - Cystadénocarcinome

Pancréas *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Cystadénocarcinome *–suite*
- - - Mucineux du *C25.9*
- - - Séreux du *C25.9*
- - Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de *T86.82*
- - Fibrose
- - - *K86.8*
- - - Kystique du *E84.9†, K87.1**
- - Iléus méconial en l'absence reconnue de fibrose kystique du *P76.0*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes dans le système hépatobiliaire et le *T85.75*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations du *K91.82*
- - Kyste du *K86.2*
- - Lésion traumatique du *S36.2*
- - Maladie
- - - *K86*
- - - Précisées du *K86.8*
- - Nécrose
- - - Aseptique du *K86.8*
- - - Graisseuse du *K86.8*
- - - SAI du *K86.8*
- - Pseudokyste du *K86.3*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, K87.1**
- - Tuberculose du *A18.8†, K87.1**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D13.6*
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.70*
- - - Malign
- - - - *C25*
- - - - Corps du *C25.1*
- - - - Lésion à localisations contiguës du *C25.8*
- - - - Parties du *C25.7*
- - - - Queue du *C25.2*
- - - - Tête du *C25.0*
- - - Neuroendocrine
- - - - *C25.9*
- - - - Non
- - - - - Fonctionnelle du *C25.9*
- - - - - Fonctionnelle du *D13.7*

Pancréatectomie ¬ Hyperglycémie après *E89.1*

Pancréatico-duodénale ¬ Tumeur *D37.70*

Pancréatique
- Congénital ¬ Kyste *Q45.2*
- Diabète-cardiopathie congénitale ¬ Syndrome d'hypoplasie *Q87.8*
- Familial ¬ Carcinome *C25.9*
- Incertain ¬
- - Glucagonome *D37.70*
- - Insulinome *D37.70*

Pancréatique *–suite*
- Interne
- - Sans précision ¬ Anomalie de la régulation de la sécrétion *E16.9*
- - ¬ anomalie
- - - Précisées de la sécrétion *E16.8*
- - - Sécrétion *E16*
- Microkystique ¬ Adénome *D13.6*
- SAI ¬ Malformation congénitale du pancréas et du canal *Q45.3*
- ¬
- - Cystadénome *D13.6*
- - Déficit
- - - Colipase *K90.3*
- - - Combiné en lipase-colipase *K90.3*
- - - Triglycéride lipase *K90.3*
- - Hypersécrétion du pancréas endocrine de: polypeptide: *E16.8*
- - Infantilisme *K86.8*
- - Malformations congénitales du pancréas et du canal *Q45.3*
- - Ppome [Polypeptidome *D37.70*
- - Stéatorrhée *K90.3*
- - Tumeur
- - - *D37.70*
- - - Cellules des îlots *D37.70*
- - - Maligne: Canal *C25.3*

Pancréatite
- Aigu
- - Alcoolique ¬ *K85.2*
- - Idiopathique ¬ *K85.0*
- - Médicamenteuse ¬ *K85.3*
- - Origine biliaire ¬ *K85.1*
- - Sans précision ¬ *K85.9*
- - Secondaire à des calculs biliaires ¬ *K85.1*
- - ¬
- - - *K85*
- - - *K85.8*
- Auto-immune ¬ *K86.1*
- Chronique
- - Alcoolique ¬ *K86.0*
- - Héréditaire ¬ *K86.1*
- - Infectieuse ¬ *K86.1*
- - Rechutes ¬ *K86.1*
- - Récidivante ¬ *K86.1*
- - SAI ¬ *K86.1*
- - ¬ Autres *K86.1*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.2†, K87.1**
- Oreillons ¬ *B26.3†, K87.1**
- Syphilitique ¬ *A52.7†, K87.1**
- Toxoplasmose ¬ *B58.8†, K87.1**
- Tropicale ¬ *K86.1*

Pancréatoblastome ¬ *C25.9*

Pancréatoprive ¬ Diabète sucré
- *E13*
- *E13.90*

Pancytopénie
- Fanconi ¬ *D61.0*
- Malformations ¬ *D61.0*
- Médicamenteuse ¬ *D61.1*

Pandémie de 2009 [grippe porcine] ¬ Influenza A/H1N1, *U69.20!*

Pandysautonomie aiguë ¬ *G61.0*

Panencéphalite
- Rubéoleuse ¬ *B06.0†, G05.1**
- Sclérosante subaiguë ¬ *A81.1*

Panhypopituitarisme ¬ *E23.0*

Panique
- Anxiété épisodique paroxystique] ¬ Trouble *F41.0*
- Foule ¬ Être pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de *W64.9!*
- ¬
- - Agoraphobie
- - - Sans mention de trouble *F40.00*
- - - Trouble *F40.01*
- - Attaque de *F41.0*
- - État de *F41.0*

Panlobulaire ¬ Emphysème *J43.1*

Panmyélopathie ¬ *D61.9*

Panmyélophtisie ¬ *D61.9*

Panmyélose aiguë avec myélofibrose ¬ *C94.4*

Panner] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: condyle huméral [*M92.0*

Panneuritis endemica ¬ *E51.1†, G63.4**

Panniculite
- Affectant le cou et le dos ¬ *M54.0*
- Lupique ¬ *L93.2*
- Récidivante [Weber-Christian] ¬ *M35.6*
- Sans précision ¬ *M79.3*
- ¬ Lymphome
- - Sous-cutané à cellules T de type *C86.3*
- - T sous-cutané type *C86.3*

Pannus
- Cornée) ¬ *H16.4*
- Trachomateux ¬ *A71.1*

Panophtalmie ¬ *H44.0*

Pansement
- Chirurgicaux ¬ Surveillance des sutures et *Z48.0*
- ¬ Changement de *Z48.0*

Pansinusite
- Aiguë ¬ *J01.4*
- Chronique ¬ *J32.4*
- SAI ¬ *J32.4*
- ¬ Sinusite
- - Aiguë de plus d'un sinus mais sans *J01.8*
- - Chronique) de plus d'un sinus mais sans *J32.8*

Pantothénate kinase ¬ Neurodégénérescence associée à un déficit en *G23.0*

Pantothénique ¬ Carence en: acide *E53.8*

Panuvéite

- Idiopathique ¬ *H44.1*
- Infectieuse ¬ *H44.1*

PAP idiopathique ¬ *J84.0*

Papanicolaou au niveau du col de l'utérus ¬ Frottis de *Z01.4*

Papas
v. Bartsocas-Papas

Papavérine ¬ *T44.3*

Papillaire

- Aiguë ¬ Nécrose médullaire [*N17.2*
- Col de l'utérus ¬ Carcinome *C53.9*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture du muscle *I23.5*
- Corps de l'utérus ¬ Carcinome *C54.9*
- Folliculaire familial de la thyroïde ¬ Carcinome *C73*
- Kystique
- - Ovaire ¬
- - - Adénocarcinome *C56*
- - - Carcinome *C56*
- - ¬ Tumeur *D37.78*
- Mucineux
- - Ovaire à faible potentiel de malignité ¬ Tumeur *C56*
- - Pancréas ¬ Carcinome intracanalaire *C25.3*
- Non classée ailleurs ¬ Rupture du muscle *I51.2*
- Ovaire ¬
- - Adénocarcinome *C56*
- - Cystadénocarcinome *C56*
- Région pinéale ¬ Tumeur *D44.5*
- Rénal
- - Héréditaire ¬ Cancer *C64*
- - Stade
- - - 1 ¬ Nécrose *N17.21*
- - - 2 ¬ Nécrose *N17.22*
- - - 5 ¬ Nécrose *N17.23*
- - ¬ Nécrose médullaire [*N17.2*
- SAI ¬ Nécrose médullaire [*N17.2*
- Sans précision ¬ Œdème *H47.1*
- Stade
- - 1 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.21*
- - 2 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.22*
- - 3 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.23*
- Syphilitique ¬ Œdème *A52.1†, H48.0**
- Thyroïde ¬ Cancer *C73*
- Type pseudoxanthome élastique ¬ Elastolyse dermique *L90.8*
- ¬
- - Carcinome rénal *C64*
- - Colobome *Q14.2*
- - Pseudo-œdème *H47.3*

Papillaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Tumeur glioneuronale *D43.2*

Papille

- Foliées ¬ Hypertrophie des *K14.3*
- Langue ¬ Atrophie des *K14.4*
- Linguales ¬ Hypertrophie des *K14.3*
- Nerf optique ¬ Anomalie congénitale de la *Q14.2*
- Optique ¬
- - Affections de la *H47.3*
- - Anomalie acquise de la *H47.3*
- - Colobome congénital de la *Q14.2*
- - Druses de la *H47.3*
- - Excavation de la *H47.2*
- - Malformation congénitale de la *Q14.2*
- - Pâleur temporale de la *H47.2*
- ¬ Fossette colobomateuse de la *Q14.2*

Papillite optique ¬ *H46*

Papillomatose

- Confluente et réticulée [Gougerot-Carteaud] ¬ *L83*
- Respiratoire récurrente ¬ *D14.4*

Papillomavirus humain

- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.7!*
- ¬ Vaccination contre le *Z25.8*

Papillome

- Atypique des plexus choroïdes ¬ *C71.5*
- Multiples et pian plantaire humide (pian-crabe) ¬ *A66.1*
- Pianique plantaire ou palmaire ¬ *A66.1*
- Plexus choroïdes ¬ *D33.0*

Papillon ¬

- Dystrophie maculaire en ailes de *H35.5*
- Fracture en *S32.7*

Papillon-Léage-Psaume ¬ Syndrome de *Q87.0*

Papillon-Lefèvre ¬ Syndrome de *Q82.8*

Papovavirale, siège non précisé ¬ Infection *B34.4*

Pappataci ¬ Fièvre à *A93.1*

Papulaire

- Micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo- *A66.2*
- Papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro- *A66.2*
- Sclérodermoïde généralisé ¬ Myxœdématose lichéniforme *L98.5*
- ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (*A66.2*

Papule

- Gottron ¬ *L94.4*
- Initiale) de la pinta [caraté] ¬ *A67.0*

Papuleuse

- Acrale persistante ¬ Mucinose *L98.5*
- Infantile ¬ Mucinose *L98.5*
- Noire ¬ Dermatose *L82*

Papuleuse *–suite*

- ¬ Urticaire *L28.2*

Papulo squameux

- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Lésions *L45**
- Précisées ¬ Autres lésions *L44.8*
- Sans précision ¬ Lésion *L44.9*
- ¬ Autres lésions *L44*

Papulosa ¬ Iritis *A52.7†, H22.0**

Papulose

- Atrophiante maligne ¬ *I77.8*
- Lymphomatoïde ¬ *C86.6*

Papyracé ¬ Fœtus *O31.0*

Paquet hémorroïdaire

- Thrombose ¬ *K64.8*
- ¬
- - *K64*
- - *K64.9*

Parachute ¬ Valve tricuspide en *Q22.8*

Paracoccidioïdomycose

- Disséminée ¬ *B41.7*
- Généralisée ¬ *B41.7*
- Pulmonaire ¬ *B41.0†, J17.2**
- Sans précision ¬ *B41.9*
- ¬
- - *B41*
- - Formes de *B41.8*

Paracorporelle ¬

- Adaptation d'une pompe *Z45.02*
- Pompe
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*

Paradice
v. Game-Friedman-Paradice

Paraffine ¬ *T52.0*

Parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et *L87.0*

Paragangliome non sécrétant ¬ *D44.7*

Paraganglions ¬ Tumeur

- Bénigne: Glomus aortique et autres *D35.6*
- Évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres *D44.7*
- Maligne: Glomus aortique et autres *C75.5*

Paragonimiase ¬ *B66.4*

Paragonimus ¬ Infection par l'espèce *B66.4*

Paragranulome

- Hodgkinien ¬ *C81.0*
- Nodulaire ¬ *C81.0*

Paragrippaux ¬

- Bronchite aiguë due aux virus *J20.4*
- Pneumonie due aux virus *J12.2*

Paragroupes ¬ Allergie des *T78.4*

Paragueusie ¬ *R43.2*

Parahaemolyticus ¬ Intoxication alimentaire à Vibrio *A05.3*

Parahémophilie ¬ *D68.22*

Parakératose des cordes vocales ¬ *J38.3*

Paralysante au cours de syphilis ¬ Démence *A52.1†, F02.8**

Paralysie
v.a. Tabo-paralysie
- Agitante ¬
- - *G20*
- - Démence
- - - *F02.3**
- - - Cours de *G20.90†, F02.3**
- Alternante du nerf oculomoteur ¬ *G83.8*
- Brown-Séquard ¬ *G83.8*
- Bulbaire progressif
- - Enfant [Fazio-Londe] ¬ *G12.1*
- - ¬ *G12.2*
- Cérébral
- - Ataxique ¬ *G80.4*
- - Dyskinétique ¬ *G80.3*
- - Dystonique ¬ *G80.3*
- - Sans précision ¬ *G80.9*
- - Spastique
- - - Diplégique ¬ *G80.1*
- - - Quadriplégique ¬ *G80.0*
- - - SAI ¬ *G80.1*
- - - ¬ Tétraplégie au cours de *G80.0*
- - ¬ Syndromes mixtes de *G80.8*
- Côlon ¬ *K56.0*
- Congénital
- - Cordes vocales ¬ *J38.00*
- - Familiale du nerf trochléaire ¬ *H49.1*
- - Nerf
- - - Oculomoteur ¬ *H49.0*
- - - Trochléaire ¬ *H49.1*
- - Plusieurs nerfs de muscles oculomoteurs ¬ *H49.9*
- Conjugaison du regard ¬ *H51.0*
- Corde vocale larynx
- - Bilatérale, partielle ¬ *J38.03*
- - Non précisée ¬ *J38.00*
- - Unilatéral
- - - Partielle ¬ *J38.01*
- - - Totale ¬ *J38.02*
- - ¬ *J38.0*
- Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical ¬ *P14.1*
- Deux membre
- - Inférieurs SAI ¬ *G82.2*
- - Supérieurs ¬ *G83.0*
- Diaphragme ¬ *J98.6*
- Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical ¬ *P14.0*
- Facial
- - Bell SAI ¬ *G51.0*
- - Centrale ¬ *G83.6*
- - Congénital héréditaire
- - - Isolée ¬ *Q07.8*

Paralysie *–suite*
- Facial *–suite*
- - Congénital héréditaire *–suite*
- - - Surdité variable ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Liée à l'infection par le virus varicelle zona ¬ *B02.2†, G53.0**
- - Parésie faciale) (faiblesse faciale) due à une lésion du neurone moteur inférieur ¬ *G51.0*
- - Périphérique récurrente familiale ¬ *G51.0*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P11.3*
- - ¬
- - - *G51.0*
- - - Syndrome de surdité-oreille anormale- *Q87.8*
- Générale juvénile ¬ *A50.4*
- Glotte ¬ *J38.0*
- Hystérique de l'accommodation ¬ *F44.88†, H58.1**
- Idiopathique du visage ¬ *G51.0*
- Intestin ¬ *K56.0*
- Iris due à la diphtérie ¬ *A36.8†, H22.8**
- Ischémique de Volkmann en tant que complication de blessure ¬ *T79.60*
- Jackson ¬ *G83.8*
- Larynx-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *J38.00*
- Lente du nerf cubital ¬ *G56.2*
- Médullaire ¬ *G83.8*
- Membre
- - Inférieur ¬ *G83.1*
- - Supérieur ¬ *G83.2*
- Mésencéphalique/tegmentale ¬ *G83.8*
- Millard-Gubler-Foville ¬ *I67.9†, G46.3**
- Moelle épinière ¬ *G83.8*
- Multiples ¬ Syphilis du nerf crânien avec *A52.1†, G53.1**
- Muscles du larynx ¬ *J38.00*
- Musculaire ischémique ¬ *T79.60*
- Nerf
- - Moteur oculaire
- - - Commun (III) ¬ *H49.0*
- - - Externe (VI) ¬ *H49.2*
- - Pathétique (IV) ¬ *H49.1*
- - Péronier ¬ *G57.3*
- - Phrénique due à un traumatisme obstétrical ¬ *P14.2*
- Parésie) (faiblesse) faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur ¬ *G83.6*
- Paupière supérieure ¬ *H02.5*
- Périodique
- - Familial
- - - Hyperkaliémique ¬ *G72.3*
- - - Hypokaliémique ¬ *G72.3*
- - - Myotonique ¬ *G72.3*
- - - Normokaliémique ¬ *G72.3*
- - Thyrotoxique ¬ *G72.3*
- - ¬ *G72.3*

Paralysie *–suite*
- Pharyngée diphtérique ¬ *A36.0†, G99.8**
- Plexus brachial
- - Inférieur ¬ *P14.1*
- - Supérieur ¬ *P14.0*
- Plongeurs ¬ *T70.3*
- Plusieurs nerf crânien cours
- - Maladie
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, G53.1**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, G53.1**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, G53.2**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G53.3**
- Post-épileptique de Todd ¬ *G83.8*
- Progressive ¬ Psychose syphilitique NCA au cours de *A52.1†, F02.8**
- Spastique
- - Cérébrale) congénitale ¬ *G80.1*
- - Infantile ascendante héréditaire ¬ *G12.2*
- - Tétraplégique congénitale (cérébrale) ¬ *G80.0*
- Spinale ¬ *G83.8*
- Supranucléaire progressive ¬ *G23.1*
- Syphilitique
- - Multiples des nerfs ¬ *A52.1†, G63.0**
- - Nerf
- - - Crâniens ¬ *A52.1†, G53.8**
- - - ¬ *A52.1†, G59.8**
- Tegmentale ¬ *G83.8*
- Todd (post-ictale) ¬ *G83.8*
- Transitoire) traumatique SAI ¬ *T14.4*
- Urémique ¬ *N18.89†, G99.8**
- Vésical lésion
- - Périphérique [LMNL] ¬ *G95.81*
- - Supranucléaire [UMNL] ¬ *G95.80*
- Volkmann ¬ *T79.60*

Paralytique
- Aigu
- - Associée au virus vaccinal ¬ Poliomyélite *A80.0*
- - Sans précision ¬ Poliomyélites *A80.3*
- - Virus sauvage
- - - Importé ¬ Poliomyélite *A80.1*
- - - Indigène ¬ Poliomyélite *A80.2*
- Congénitale ¬ Démence *A50.4†, F02.8**
- Juvénile
- - Syphilitique ¬ Démence *A50.4†, F02.8**
- - ¬ Démence
- - - *A50.4*
- - - *A50.4†, F02.8**
- Muscle ¬ Calcification et ossification *M61.2*
- Occlusion intestinale sans hernie ¬ Iléus *K56*
- Précisés ¬ Autres syndromes *G83.8*
- Sans précision ¬
- - Strabisme *H49.9*
- - Syndrome *G83.9*

Paralytique *–suite*
- Syphilitique progressive ¬ Démence *A52.1†, F02.8**
- ¬
- - Démarche *R26.1*
- - Démence *A52.1†, F02.8**
- - Iléus *K56.0*
- - Poliomyélite aiguë non *A80.4*
- - Strabismes *H49.8*
- - Syndromes *G83*

Paramètre
- Fonctionnement d'une pompe à médicaments ¬ Contrôle des *Z45.82*
- Précisé aigu ¬ Abcès de: *N73.0*
- ¬ Tumeur maligne: *C57.3*

Paramétrite
- Phlegmon pelvien
- - Aigus ¬ *N73.0*
- - Chroniques ¬ *N73.1*
- - Sans précision ¬ *N73.2*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*

Paramolaire
- Causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- ¬
- - *K00.1*
- - Tubercule *K00.2*

Paramyotonie congénitale [Maladie d'Eulenburg] ¬ *G71.1*

Parana ¬ Syndrome de *L91.8*

Paranasaux ¬ Carcinome épidermoïde des fosses nasales et des sinus *C30.0*

Paranéoplasique ¬
- Anémie *C80.9†, D63.0**
- Encéphalopathie limbique *D48.9†, G13.1**
- Neuromyopathie
- - *D48.9†, G13.0**
- - Neuropathie *G13.0**
- Neuropathie *D48.9†, G13.0**

Paranoïa
- Quérulente ¬ *F22.8*
- ¬ *F22.0*

Paranoïaque
- Induit ¬ Trouble: *F24*
- Involution ¬ État *F22.8*
- Psychogène ¬ Psychose *F23.3*
- ¬
- - État *F22.0*
- - Psychose *F22.0*
- - Réaction *F23.3*
- - Trouble personnalité
- - - *F60.0*
- - - Expansive- *F60.0*
- - - Sensitive *F60.0*

Paranoïde ¬
- Démence sénile: démence: forme dépressive ou *F03*
- Schizophrénie *F20.0*

Paraovarien ¬ Kyste (de): *Q50.5*

Paraparésie paraplégie
- Flasque ¬ *G82.0*
- Sans précision ¬ *G82.2*
- Spastique ¬ *G82.1*
- Tétraparésie et tétraplégie ¬ *G82*

Paraparétique du syndrome de Guillain-Barré ¬ Variant *G61.0*

Parapertussis ¬ Coqueluche à Bordetella *A37.1*

Parapharyngé
- Cervical ¬ Abcès sous-mandibulaire
- - Indication d'extension médiastinale, *K12.22*
- - Sans indication d'extension médiastinale, *K12.21*
- Rétropharyngé ¬ Abcès *J39.0*

Paraphilies ¬ *F65*

Paraphimosis ¬ Hypertrophie du prépuce, phimosis et *N47*

Paraphrénie (tardive) ¬ *F22.0*

Paraphrénique ¬ Schizophrénie *F20.0*

Paraplégie
- Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec *P11.50*
- Chronique ¬
- - *G82*
- - Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec *P11.51*
- Flasque ¬ Paraparésie et *G82.0*
- Inférieure) SAI ¬ *G82.2*
- Sans précision ¬ Paraparésie et *G82.2*
- Spastique
- - Autosomique
- - - Dominant type
- - - - 3 ¬ *G11.4*
- - - - 4 ¬ *G11.4*
- - - - 6 ¬ *G11.4*
- - - - 8 ¬ *G11.4*
- - - - 9 ¬ *G11.4*
- - - - 10 ¬ *G11.4*
- - - - 12 ¬ *G11.4*
- - - - 13 ¬ *G11.4*
- - - - 17 ¬ *G11.4*
- - - - 19 ¬ *G11.4*
- - - - 29 ¬ *G11.4*
- - - - 31 ¬ *G11.4*
- - - - 36 ¬ *G11.4*
- - - - 37 ¬ *G11.4*
- - - - 38 ¬ *G11.4*
- - - - 41 ¬ *G11.4*
- - - - 42 ¬ *G11.4*

Paraplégie *–suite*
- Spastique *–suite*
- - Autosomique *–suite*
- - - Dominant type *–suite*
- - - - 73 ¬ *G11.4*
- - - Récessif type
- - - - 5A ¬ *G11.4*
- - - - 11 ¬ *G11.4*
- - - - 14 ¬ *G11.4*
- - - - 15 ¬ *G11.4*
- - - - 18 ¬ *G11.4*
- - - - 20 ¬ *G11.4*
- - - - 21 ¬ *G11.4*
- - - - 23 ¬ *G11.4*
- - - - 24 ¬ *G11.4*
- - - - 25 ¬ *G11.4*
- - - - 26 ¬ *G11.4*
- - - - 27 ¬ *G11.4*
- - - - 28 ¬ *G11.4*
- - - - 32 ¬ *G11.4*
- - - - 35 ¬ *G11.4*
- - - - 39 ¬ *G11.4*
- - - - 43 ¬ *G11.4*
- - - - 44 ¬ *G11.4*
- - - - 45 ¬ *G11.4*
- - - - 46 ¬ *G11.4*
- - - - 48 ¬ *G11.4*
- - - - 49 ¬ *G11.4*
- - - - 53 ¬ *G11.4*
- - - - 54 ¬ *G11.4*
- - - - 55 ¬ *G11.4*
- - - - 56 ¬ *G11.4*
- - - - 57 ¬ *G11.4*
- - - - 59 ¬ *G11.4*
- - - - 60 ¬ *G11.4*
- - - - 61 ¬ *G11.4*
- - - - 62 ¬ *G11.4*
- - - - 63 ¬ *G11.4*
- - - - 64 ¬ *G11.4*
- - - - 66 ¬ *G11.4*
- - - - 67 ¬ *G11.4*
- - - - 68 ¬ *G11.4*
- - - - 69 ¬ *G11.4*
- - - - 70 ¬ *G11.4*
- - - - 71 ¬ *G11.4*
- - - - 74 ¬ *G11.4*
- - - - 75 ¬ *G11.4*
- - - - 76 ¬ *G11.4*
- - - - 77 ¬ *G11.4*
- - - - 78 ¬ *G11.4*
- - - Type
- - - - 30 ¬ *G11.4*
- - - - 58 ¬ *G11.4*
- - - - 72 ¬ *G11.4*

Paraplégie *–suite*

- Spastique *–suite*

- - Dysmorphie ¬ Syndrome de macrocéphalie- *Q87.8*

- - Familiale ¬ *G11.4*

- - Héréditaire ¬ *G11.4*

- - Lié X type

- - - 16 ¬ *G11.4*

- - - 34 ¬ *G11.4*

- - Transmission maternelle ¬ *G11.4*

- - Tropicale ¬ *G04.1*

- - Type 7 ¬ *G11.4*

- - ¬

- - - Atrophie optique infantile avec chorée et *E71.1*

- - - Paraparésie et *G82.1*

- Tétraparésie et tétraplégie ¬ Paraparésie et *G82*

- ¬

- - Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la naissance, sans *P11.59*

- - Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une *M61.2*

Paraplégique) ¬ Syndrome d'immobilité (*M62.3*

Parapsoriasis

- Grandes plaques ¬ *L41.4*

- Petites plaques ¬ *L41.3*

- Rétiforme ¬ *L41.5*

- Sans précision ¬ *L41.9*

- ¬ Autres *L41.8*

Paraquat ¬ Intoxication par le *T60.3*

Parasitaire

- Barbe ¬ Sycosis *B35.0*

- Classé ¬

- - Affection

- - - Choriorétiniennes au cours de maladies infectieuses et *H32.0**

- - - Rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et *N29.1**

- - Arthrite

- - - Cours d'autres maladies infectieuses et *M01.8**

- - - Infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et *M01**

- - Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et *K77.0**

- - Cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et *I52.1**

- - Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et *H13.1**

- - Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et *G05.2**

- - Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et *N08.0**

- - Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et *H22.0**

- - Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et *H19.2**

Parasitaire *–suite*

- Classé ¬ *–suite*

- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et *N16.0**

- - Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et *H75.0**

- - Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et *G02**

- - Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et *I43.0**

- - Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et *I41.2**

- - Myopathie au cours de maladies infectieuses et *G73.4**

- - Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et *H94.0**

- - Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et *H62.3**

- - Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et *I32.1**

- - Polynévrite au cours de maladies infectieuses et *G63.0**

- - Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et *M49.3**

- - Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et *I98.1**

- - Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et *N77.0**

- - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et *N77.1**

- Congénital

- - Précisées ¬ Autres maladies infectieuses et *P37.8*

- - Sans précision ¬ Maladie infectieuse ou *P37.9*

- - ¬ Autres maladies infectieuses et *P37*

- Mère

- - Classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies infectieuses et *O98*

- - Compliquant grossesse accouchement puerpéralité

- - - Sans précision ¬ Maladie infectieuse ou *O98.9*

- - - ¬ Autres maladies infectieuses et *O98.8*

- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et *P00.2*

- Non précisées ¬ Séquelles de maladies infectieuses et *B94*

- Orbite

- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Infection *H06.1**

- - ¬ Infection *B89†*, *H06.1**

- Paupière

- - Cours

- - - Leishmaniose ¬ Infection *B55.1†*, *H03.0**

- - - Maladies classées ailleurs ¬ Infection *H03.0**

- - ¬ Infestation *B89†*, *H03.0**

- Précis

- - Classées ailleurs ¬ Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et *G02.8**

Parasitaire *–suite*

- Précis *–suite*

- - ¬ Séquelles d'autres maladies infectieuses et *B94.8*

- Protozoaires classées ailleurs ¬ Myosite au cours d'infections *M63.1**

- Rétine SAI ¬ Kyste (de): *H33.1*

- SAI ¬ Endophtalmie *H44.1*

- Sans précision ¬ Séquelles de maladie infectieuse ou *B94.9*

- ¬

- - Antécédent

- - - Familiaux de maladies infectieuses et *Z83.1*

- - - Personnels de maladies infectieuses et *Z86.1*

- - Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et *I68.1**

- - Arthrite au cours de maladie *B89†*, *M01.89**

- - Conjonctivite au cours de maladie *B89†*, *H13.1**

- - Encéphalite au cours de maladie *B89†*, *G05.2**

- - Épilepsie *B71.9†*, *G94.8**

- - Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et *Z11*

- - Hydrocéphalie au cours de maladie *B89†*, *G94.0**

- - Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et *B20*

- - Iridocyclite au cours de maladie *B89†*, *H22.0**

- - Kératite au cours de maladie *B89†*, *H19.2**

- - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: *H21.3*

- - Maladie

- - - Cérébrale *B71.9†*, *G94.8**

- - - VIH

- - - - Infection *B20*, *B89*

- - - - Maladie *B20*, *B99*

- - Mastoïdite au cours de maladie *B89†*, *H75.0**

- - Méningite au cours de maladie *B89†*, *G02.8**

- - Méningo-encéphalite *B89†*, *G05.2**

- - Myopathie au cours de maladie *B89†*, *G73.4**

- - Névrite nerf

- - - Auditif au cours de maladie *B89†*, *H94.0**

- - - Vestibulo-cochléaire au cours de maladie *B89†*, *H94.0**

- - Otite externe au cours de maladie *B89†*, *H62.3**

- - Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladie *B89†*, *G53.1**

- - Pneumonie au cours de maladies *J17.3**

- - Polyneuropathie au cours de maladie *B89†*, *G63.0**

- - Sycosis *B35.0*

Parasites
- Peau SAI ¬ *B88.9*
- ¬ Infestation des paupières par des *B89†, H03.0**

Parasitologique
- Non classés ailleurs ¬ Autres paludismes, confirmés par examen *B53.8*
- SAI ¬ Paludisme confirmé par examen *B53.8*
- ¬ paludisme
- - Confirmés par examen *B53*
- - Diagnostiqué cliniquement, sans confirmation *B54*

Parasitose
- Intestinale, sans précision ¬ *B82.9*
- Sans précision ¬ *B89*

Parastomale
- Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K43.3*
- Gangrène ¬ Hernie *K43.4*
- Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K43.3*
- Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K43.3*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K43.3*
- Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K43.3*
- SAI ¬ Hernie *K43.5*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K43.5*

Parastremmatique ¬ Nanisme *Q87.1*

Parastrongylus
- Cantonensis ¬
- - Angiostrongyloïdose à *B83.2*
- - Méningo-encéphalite à *B83.2†, G05.2**
- Costaricensis ¬ Angiostrongyloïdose due à: *B81.3*

Parasuicide ¬ *Z91.8*

Parasympathiques ¬ nerfs et ganglions sympathiques et *C47*

Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents *T44.3*

Parasympathomimétiques [cholinergiques] ¬ Intoxication: Autres *T44.1*

Paratesticulaire ¬ Adénocarcinome *C63.9*

Parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde- *Z27.0*

Parathyréoprive ¬ Tétanie *E89.2*

Parathyroïde
- Sans précision ¬ Maladie de la glande *E21.5*
- Thyroïde ¬ Malformation congénitale de la glande *Q89.2*
- ¬
- - Adénome à cellules principales de la *D35.1*
- - Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande *E21*
- - Hyperplasie
- - - Glande *E21.0*
- - - Primaire de la *E21.0*
- - Maladies précisées de la glande *E21.4*

Parathyroïde *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ostéite au cours d'une affection de la glande *E21.0†, M90.89**
- - Ostéodystrophie
- - - Cours d'une affection de la glande *E21.0†, M90.89**
- - - Secondaire au cours d'une affection de la glande *E21.1†, M90.89**
- - Tuberculose de la glande *A18.8†, E35.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D35.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.2*
- - - Maligne: *C75.0*

Parathyroïdien
- Cellule eau roche ¬
- - Adénocarcinome *C75.0*
- - Adénome *D35.1*
- - Carcinome *C75.0*
- Dérivés ¬ Hormones *T50.9*
- Familial ¬ Adénome *D35.1*
- ¬ Tétanie *E20.9*

Parathyroïdite à cytomégalovirus ¬ *B25.88†, E35.8**

Paratrachome ¬ *A74.0†, H13.1**

Paratyphi
- SAI ¬ Infection due à Salmonella *A01.4*
- ¬ infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. *A02*

Paratyphoïde
- A ¬ *A01.1*
- B ¬ *A01.2*
- C ¬ *A01.3*
- DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde- *Z27.2*
- Sans précision ¬ *A01.4*
- Seule [TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde- *Z23.1*
- ¬
- - Arthrite au cours de fièvre *A01.4†, M01.39**
- - Fièvre
- - - *A01.4*
- - - Typhoïde et *A01*

Paravaccinia NCA ¬ Infection à *B08.0*

Paraveineuse pigmentée ¬ Atrophie rétino-choroïdienne *H35.8*

PARC ¬ Syndrome *Q87.8*

Parcheminée ¬ Syndrome de la peau *L98.8*

Parenchymateux
- Gestationnelle ou puerpérale ¬ Mastite: *O91.2*
- ¬
- - Goitre congénital (non toxique): *E03.0*
- - Néphrolithiase *E83.58†, N29.8**

Parenchyme
- Pinéal à différenciation intermédiaire ¬ Tumeur du *D44.5*
- Rate ¬ Rupture massive du *S36.04*
- Rénal ¬ Rupture totale du *S37.03*
- ¬ Déchirure
- - Capsule de la rate, sans atteinte plus importante du *S36.02*
- - Rate, avec atteinte du *S36.03*

Parent
- Beaux-parents ¬ Difficultés dans les rapports avec les *Z63*
- Charge au domicile, nécessitant des soins ¬ *Z63*
- ¬
- - Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux- *Z63*
- - Surveillance et contrôle inadéquats de la part des *Z62*

Parentale
- Atypique ¬ Situation *Z60*
- Inappropriée et autres défauts de l'éducation ¬ Pression *Z62*
- ¬ Surprotection *Z62*

Parésie
- Accommodation ¬ *H52.5*
- Cérébrale athetotique ¬ *G80.3*
- Faciale) (faiblesse faciale) due à une lésion du neurone moteur inférieur ¬ Paralysie faciale (*G51.0*
- Faiblesse) faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur ¬ Paralysie (*G83.6*

Paresseuse ¬ Vessie *N31.81*

Paresthésie cutanée ¬ *R20.2*

Paresthésique ¬ Méralgie *G57.1*

Pariétal
- Cœur ¬ Anévrisme (*I25.3*
- Pelvien) ¬ Péritoine (*C45.1*
- ¬
- - Fistule: utéro- *N82.5*
- - Lobe
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Os
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - - *S02.0*
- - Péritoine: *C48.1*
- - Tumeur maligne: Lobe *C71.3*

Parietalia permagna ¬ Foramina *Q75.8*

Pariéto-alvéolaires ¬ Pneumonies alvéolaires et *J84.0*

Paris ¬ Participation à des jeux de hasard ou des *Z72.8*

Parkes Weber ¬ Syndrome de *Q87.2*

Parkinson
v.a. Guam-Parkinson
- Démence ¬ Maladie de *G20.90†, F02.3**

Parkinson *–suite*
- Handicap modéré à lourd ¬ Maladie de *G20.1*
- Idiopathique ¬ Syndrome parkinsonien ou maladie de *G20*
- Lourd handicap ¬ Maladie de *G20.2*
- Non précisé ¬ Maladie de *G20.9*
- Primitif(ve) ¬ Syndrome parkinsonien ou maladie de *G20*
- SAI ¬ Syndrome parkinsonien ou maladie de *G20*
- Sans handicap ou avec un handicap léger ¬ Maladie de *G20.0*
- Syphilitique ¬ Syndrome de *A52.1†, G22**
- Vasculaire ¬ Maladie de *G21.4*
- White ¬ Syndrome de: Wolff- *I45.6*
- ¬
- - Démence au cours de maladie de *G20.90†, F02.3**
- - Maladie de *G20*

Parkinsonien
- Cours
- - Hypotension orthostatique
- - - Neurogène ¬ Syndrome *G23.8*
- - - Symptomatique ¬ Syndrome *G23.8*
- - - ¬ Syndrome *G23.8*
- - Maladies classées ailleurs ¬ Syndrome *G22**
- Maladie Parkinson
- - Idiopathique ¬ Syndrome *G20*
- - Primitif(ve) ¬ Syndrome *G20*
- - SAI ¬ Syndrome *G20*
- Médicaments ¬ Autres syndromes secondaires *G21.1*
- Post-encéphalitique ¬ Syndrome *G21.3*
- Secondaire
- - Agents externes ¬ Syndrome *G21.2*
- - Sans précision ¬ Syndrome *G21.9*
- - ¬ Syndrome
- - - *G21*
- - - *G21.8*
- ¬
- - AMS-P [atrophie multisystématisée de type *G23.2*
- - Atrophie multisystématisée de type *G23.2*

Parkinsonien-pyramidal ¬ Syndrome *G20.90*

Parkinsonisme
- Post-encéphalitique ¬ *G21.3*
- Secondaire ¬ *G21*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G22**
- ¬ Démence dans: *F02.3**

Parkinsonne [AMS-P] ¬ Atrophie multisystématisée de forme *G23.2*

Parnas
v. Wagner-Parnas

Parodontal ¬ Abcès: *K05.2*

Parodonte
- Sans précision ¬ Affection des dents et du *K08.9*
- ¬ affection
- - Dents et du *K08*
- - Précisées des dents et du *K08.8*

Parodontose
- Juvénile ¬ *K05.4*
- ¬ *K05.4*

Paroi
- Abdominal
- - Antérieur
- - - Gangrène ¬ Autres hernies de la *K43.78*
- - - Non précis
- - - - Gangrène
- - - - - ¬ Autres hernies de la *K43.7*
- - - - - ¬ Hernies de la *K43.79*
- - - - Occlusion
- - - - - Sans gangrène ¬ Autres hernies de la *K43.6*
- - - - - Sans gangrène ¬ Hernies de la *K43.69*
- - - - Sans
- - - - - Occlusion ni gangrène ¬ Autres hernies de la *K43.9*
- - - - - Occlusion ni gangrène ¬ Hernies de la *K43.99*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres hernies de la *K43.68*
- - - SAI ¬ Hernies de la *K43.99*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres hernies de la *K43.98*
- - - ¬ Hernie de la *K43*
- - Lombes bassin
- - - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.3*
- - - ¬ Gelure superficielle de la *T33.3*
- - ¬
- - - *C49.4*
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - - Adhérences (de): *K66.0*
- - - Carcinome cutané de la *C44.5*
- - - Contusion de la *S30.1*
- - - Hernie de la *K43.99*
- - - Malformations congénitales de la *Q79.5*
- - - Plaie ouverte de la *S31.1*
- Alvéolaires ¬ Lésion des *J84.0*
- Antérieur
- - Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: *C11.3*
- - SAI ¬
- - - Antérieur [de la *I22.0*
- - - Infarctus transmural (aigu): de la *I21.0*
- - - Prolapsus vaginal (*N81.1*
- - Vessie ¬ Tumeur maligne: *C67.3*
- - ¬ Infarctus

Paroi *–suite*
- Antérieur *–suite*
- - ¬ Infarctus *–suite*
- - - Myocarde à répétition, de la *I22.0*
- - - Transmural aigu du myocarde, de la *I21.0*
- Cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture de la *I23.3*
- Diaphragmatique ¬ Infarctus
- - Répété (aigu) (de): *I22.1*
- - Transmural (aigu) (de): *I21.1*
- Extérieure de l'utérus ¬ Adhérences de la *N73.6*
- Hypopharyngée SAI ¬ *C13.9*
- Inférieur ¬ Infarctus
- - Myocarde à répétition, de la *I22.1*
- - Transmural aigu du myocarde, de la *I21.1*
- Latéral
- - Oropharynx ¬ Tumeur maligne: *C10.2*
- - Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: *C11.2*
- - SAI ¬
- - - Infarctus transmural (aigu): de la *I21.2*
- - - Latéral] SAI ¬ latéral [de la *I22.8*
- - Vessie ¬ Tumeur maligne: *C67.2*
- Postérieur
- - Globe oculaire ¬ Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: *H44.7*
- - Hypopharynx ¬ Tumeur maligne: *C13.2*
- - Oropharynx ¬ Tumeur maligne: *C10.3*
- - Pharynx ¬ Cancer de la *C14.0*
- - Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: *C11.1*
- - SAI ¬ Infarctus
- - - Répété (aigu) (de): la *I22.1*
- - - Transmural (aigu) (de): postérieur [de la *I21.1*
- - Vessie ¬ Tumeur maligne: *C67.4*
- - ¬ Prolapsus vaginal de la *N81.6*
- Rhinopharyngé
- - SAI ¬ *C11.9*
- - Supérieure) (postérieure) du voile du palais ¬ *C11.3*
- SAI ¬ Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): latéral (*I22.8*
- - Répété (aigu): antérieur (*I22.0*
- - Transmural (aigu) (de): inférieur (*I21.1*
- Sinus de la face ¬ Anomalie congénitale de la *Q30.8*
- Supérieur
- - Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: *C11.0*
- - Vagin après hystérectomie ¬ Prolapsus de la *N99.3*
- Thoracique
- - Antérieur
- - - SAI ¬ Douleur de la *R07.3*
- - - ¬

Paroi *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Antérieur *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Lésions traumatiques superficielles de la *S20.3*
- - - - Plaie ouverte de la *S21.1*
- - Postérieur ¬
- - - Lésions traumatiques superficielles de la *S20.4*
- - - Plaie ouverte de la *S21.2*
- - Région génital ¬ Tête cou
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - SAI ¬
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- - - Anomalie morphologique congénitale de la *Q67.8*
- - ¬
- - - *I97.88*
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - - Plaies ouvertes multiples de la *S21.7*

Parole
- Langage
- - Sans précision ¬ Trouble du développement de la *F80.9*
- - ¬
- - - Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la *Z50.5!*
- - - Trouble
- - - - Développement de la *F80.8*
- - - - Spécifiques du développement de la *F80*
- ¬
- - Défaut de la *R47.8*
- - Syndrome d'épilepsie rolandique-dyspraxie de la *G40.08, R48.2*
- - Trouble de la *R47.8*

Paronychie ¬ *L03.0*

Parorexie
- Psychogène ¬ *F50.8*
- ¬ *F50.8*

Parosmie ¬ *R43.1*

Parotide ¬
- Carcinome de la glande *C07*
- Tuberculose de la glande *A18.8†, K93.8**
- Tumeur
- - Bénigne: Glande *D11.0*
- - Maligne de la glande *C07*

Parotidien
- Heerfordt] ¬ Fièvre uvéo- *D86.8*
- ¬ Calcul du canal *K11.5*

Parotidite
- Épidémique ¬
- - *B26*
- - Orchite au cours de *B26.0†, N51.1**
- Infectieuse ¬ *B26*
- Ourlienne SAI ¬ *B26.9*

Paroxysmes occipitaux ¬ Épilepsie bénigne à *G40.08*

Paroxystique
- A frigore ¬ Hémoglobinurie (de): *D59.6*
- Ataxie épisodique et spasticité ¬ Choréoathétose dystonique *G24.8*
- Atriale ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Auriculoventriculaire [AV] SAI ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Bénin
- - Enfant ¬ Torticolis *G24.3*
- - ¬ Péritonite *E85.0*
- Chronique ¬ Hémicrânie *G44.0*
- Cours
- - Fibrillation auriculaire ¬ Tachyarythmie complète *I48.0*
- - Flutter auriculaire ¬ Tachyarythmie complète *I48.9*
- Familiale ¬ Ataxie *G11.8*
- Induite par l'effort ¬ Dyskinésie *G24.8*
- Jonctionnelle ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Kinésigénique ¬ Dyskinésie *G24.8*
- Maligne ¬ Tachycardie ventriculaire *I47.2*
- Marchiafava-Micheli] ¬ Hémoglobinurie nocturne *D59.5*
- Nodale ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Sans précision ¬ Tachycardie *I47.9*
- Syphilitique ¬ Tachycardie *A52.0†, I52.0**
- ¬
- - Dyskinésie non kinésigénique *G24.8*
- - Fibrillation auriculaire, *I48.0*
- - Flutter auriculaire *I48.9*
- - Névralgie faciale *G50.0*
- - Syndrome d'épilepsie généralisée-dyskinésie *G40.3, G24.8*
- - Tachyarythmie complète *I48.0*
- - Tachycardie *I47*
- - Trouble panique [anxiété épisodique *F41.0*
- - Vertige bénin *H81.1*

Parrot ¬ Pseudo-paralysie de *A50.0†, M90.23**

Parry-Romberg ¬ Syndrome de *G51.8*

Pars flaccida ¬ Perforation de la *H72.1*

Parsonage-Turner ¬ Syndrome de *G54.5*

Partenaire ¬ Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le *Z63*

Participation
- Jeux de hasard ou des paris ¬ *Z72.8*
- Tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire ¬ Autres maladies précisées avec *D76*

Partiel
v. Type de maladie

Parvovirale, siège non précisé ¬ Infection *B34.3*

Parvovirus
- B19 ¬ Infection au *B08.3*
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.6!*
- ¬ Embryopathie à *P35.8*

Pascual-Castroviejo type 2 ¬ Syndrome de *Q28.88*

Pasini et Pierini ¬ Atrophodermie de *L90.3*

Passage
- Sonde ou de bougie ¬ *Z43*
- ¬ Autres formes de *M35.1*

Passarge
v. Schöpf-Schulz-Passarge

Passive
- Agressive ¬ Personnalité: *F60.8*
- Chronique du foie ¬ Congestion *K76.1*
- ¬
- - Congestion pulmonaire (*J81*
- - Trouble de la personnalité: *F60.7*

Pasteurellose ¬ *A28.0*

Patau
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q91.7*
- ¬ Syndrome d'Edwards et syndrome de *Q91*

Patellaire
v.a. génito-patellaire
v.a. ischio-patellaire
- Familiale ¬ Chondromalacie *M22.4*
- Köhler] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: corps *M92.4*
- ¬ Maladies fémoro- *M22.2*

Paterson ¬ Syndrome de: Kelly- *D50.1*

Pathétique
- IV) ¬ Paralysie du nerf *H49.1*
- ¬ Lésion traumatique du nerf *S04.2*

Pathogène ¬
- Klebsiella pneumoniae comme agent *B96.2!*
- Proteus
- - Mirabilis comme agent *B96.2!*
- - Morganii comme agent *B96.2!*

Pathologique
v. Type de maladie

Patient
- Complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un *Y84.9!*
- Itinérant ¬ *F68.1*
- ¬ Vaccination non effectué raison raison indépendant
- - *Z28*

Patient *–suite*
- ¬ Vaccination non effectué raison raison indépendant *–suite*
- - *Z53*

Patterson ¬ Pseudolepréchaunisme de *E34.8*

Patterson-Stevenson ¬ Syndrome de *Q87.0*

Pauci articulaire
- Évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(*M08.3*
- ¬ Arthrite chronique juvénile, forme oligo(*M08.4*

Paucité voie biliaire syndromique
- Monosomie 20p12 ¬ *Q44.7*
- Mutation ponctuelle de JAG1 ¬ *Q44.7*

Paulo [maculeuse brésilienne] ¬ Fièvre (de): Sao *A77.0*

Paume
- Main ¬ *S61.80*
- ¬ *T23*

Paupière
- Appareil lacrymal et de l'orbite ¬ Malformations congénitales des *Q10*
- Cours
- - Impétigo ¬ Atteinte de la *L01.0†*, *H03.8**
- - Leishmaniose ¬ Infection parasitaire de la *B55.1†*, *H03.0**
- - Loase ¬ Infestation des *B74.3†*, *H03.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬
- - - Affections de la *H03**
- - - Atteinte de la *H03.8**
- - - Infection parasitaire de la *H03.0**
- - Maladies infectieuses classées ailleurs ¬ Atteinte de la *H03.1**
- - Onchocercose ¬ Infestation des *B73†*, *H03.0**
- - Phtiriase ¬ Infestation des *B85.3†*, *H03.0**
- - Zona ¬ Atteinte de la *B02.3†*, *H03.1**
- Espèce Demodex ¬ Dermatite des *B88.0†*, *H03.0**
- Gomme ¬ Syphilis tardive de la *A52.7†*, *H03.1**
- Hyperthyroïdie ¬ Chloasma des *E05.9†*, *H03.8**
- Inférieure ¬ Colobome de la *Q10.3*
- Parasites NCA ¬ Infestation des *B89†*, *H03.0**
- Région périoculaire
- - Sans atteinte des voies lacrymales ¬ Plaie ouverte de la *S01.1*
- - ¬
- - - Affections dégénératives des *H02.7*
- - - Brûlure de la *T26.0*
- - - Contusion de la *S00.1*
- - - Corrosion de la *T26.5*
- - - Lésions traumatiques superficielles de la *S00.2*
- - - Plaie ouverte de la *S01.1*
- SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q10.3*

Paupière *–suite*
- Sans précision ¬
- - Affection des *H02.9*
- - Inflammation de la *H01.9*
- Supérieur ¬
- - Colobome de la *Q10.3*
- - Paralysie de la *H02.5*
- Surnuméraire ¬ *Q10.3*
- Virus de l'herpès ¬ Dermite de la *B00.5†*, *H03.1**
- Y compris canthus ¬
- - Carcinoma in situ: Peau de la *D04.1*
- - Mélanome
- - - In situ de la *D03.1*
- - - Malin de la *C43.1*
- - Nævus à mélanocytes de la *D22.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau de la *D23.1*
- - - Maligne: Peau de la *C44.1*
- - ¬
- - Abcès de la *H00.0*
- - Absence ou agénésie de: *Q10.3*
- - Affection
- - - *H02*
- - - Précisées des *H02.8*
- - Anomalie congénitale des *Q10.3*
- - Atrophie de la *H02.5*
- - Chancre des *A51.2†*, *H13.1**
- - Chloasma de la *H02.7*
- - Colobome de la *Q10.3*
- - Dermatoses non infectieuses de la *H01.1*
- - Dermite
- - - Allergique de la *H01.1*
- - - Contact de la *H01.1*
- - - Eczémateuse de la *H01.1*
- - Douleur de la *H02.8*
- - Entropion et trichiasis de la *H02.0*
- - Furoncle de la *H00.0*
- - Herpès
- - - Simplex de la *B00.5†*, *H03.1**
- - - Zoster de la *B02.3†*, *H03.1**
- - Hypertrichose des *H02.8*
- - Infestation parasitaire des *B89†*, *H03.0**
- - Inflammation
- - - *H01*
- - - Précisées de la *H01.8*
- - Lupus
- - - Érythémateux discoïde de la *H01.1*
- - - Vulgaire de *A18.4†*, *H03.1**
- - Madarosis de la *H02.7*
- - Maladie de Basedow avec orbitopathie endocrinienne et rétraction de *E05.0†*, *H06.3**
- - Malformations congénitales des *Q10.3*
- - Molluscum contagiosum de la *B08.1†*, *H03.1**

Paupière *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Nævus d'Ota sur la peau de la *D22.1*
- - Ochronose avec chloasma de la *E70.2†*, *H03.8**
- - Orgelet
- - - *H00.0*
- - - Inflammations profondes de la *H00.0*
- - Ptosis de la *H02.4*
- - Rétention de corps étranger dans la *H02.8*
- - Rétraction congénitale des *Q10.3*
- - Tissu
- - - Conjonctif
- - - - *C49.0*
- - - - *D21.0*
- - - - *D48.1*
- - - Mou: *C79.88*
- - Tuberculose des *A18.4†*, *H03.1**
- - Variole bovine de la *B08.0†*, *H03.1**
- - Vitiligo de la *H02.7*
- - Xanthélasma de la *H02.6*
- - Xérodermie de la *H01.1*

Pauvreté extrême ¬ *Z59*

Pavillon
- Cervical ¬ *Q18.2*
- Congénitale ¬ Fistule (du): *Q18.1*
- Oreille
- - Conduit auditif externe ¬
- - - Abcès *H60.0*
- - - Anthrax *H60.0*
- - - Furoncle *H60.0*
- - ¬
- - - Absence congénitale du *Q16.0*
- - - Affections non infectieuses du *H61.1*
- - - Anomalie congénital
- - - - *Q17.8*
- - - - Position du *Q17.4*
- - - Cellulite phlegmoneuse du: *H60.1*
- - - Déformation acquise: *H61.1*
- - - Hématome non traumatique du *H61.1*
- - - Malformation congénitale du *Q17.3*
- - - Périchondrite: *H61.0*
- - - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.31*
- Surnuméraire ¬ *Q17.0*

Pavimenteux
- Canal cervical ¬ Présence congénitale d'épithélium *Q51.8*
- Muqueuse utérine ¬ Présence congénitale d'épithélium *Q51.8*
- Sans atteinte musculaire ou oculaire ¬ Lissencéphalie *Q04.3*
- ¬ Dégénérescence rétinienne: *H35.4*

PC ¬ *Q84.5*

PCT ¬ *E80.1*

PCU
- Classique ¬ *E70.0*
- ¬ *E70.1*

PDHC ¬ *E74.4*

PEAG [pustulose exanthématique aiguë généralisée] ¬ *L27.0*

Pearson
v.a. Herlitz-Pearson
v.a. McArdle-Schmidt-Pearson
- ¬ Syndrome de *D64.0*

Peau
- Anal ¬
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D03.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- Autologue ¬ Status post greffe de *Z94.5*
- Cours
- - Accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*
- - Trouble métabolique NCA ¬ Maladie de la *E88.9†, L99.8**
- Crapaud ¬ *E50.8†, L86**
- Cuir chevelu cou ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.4*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D23.4*
- - - Maligne: *C44.4*
- Cultivateur ¬ *L57.8*
- Déciduale
- - Acrale ¬ Syndrome de *Q80.8*
- - Généralisée ¬ *Q80.8*
- Derme] et au tissu sous-cutané ¬ Déficit tissulaire limité à la *I70.24*
- Échaudée Syndrome SSS
- - Atteinte 30% surface corporelle
- - - Plus ¬ Syndrome staphylococcique de *L00.1*
- - - ¬ Syndrome staphylococcique de *L00.0*
- - SAP ¬ Syndrome staphylococcique de *L00.0*
- Exposition chronique rayonnement non ionisant
- - Sans précision ¬ Modification de la *L57.9*
- - ¬ Autres modifications de la *L57.8*
- Externe du nez ¬ Plaie ouverte du nez: *S01.21*
- Face, parties autres et non précisées ¬ Tumeur maligne: *C44.3*
- Flasque affaissé
- - Perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ *L98.7*
- - SAI ¬ *L98.7*
- Froide et moite ¬ *R23.1*
- Glabre ¬ Teigne de la *B35.4*

Peau *–suite*
- Goudrons ¬ Cancer de *C44.9*
- Intacte ¬ Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la *L89.0*
- Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la *L87.0*
- Lèvre ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.0*
- - Tumeur bénigne: *D23.0*
- Maladie chronique de rejet greffe-contre-hôte ¬ Atteinte de la *L99.2**
- Marin ¬ *L57.8*
- Médicament ¬ Exanthème toxique dû au contact de la *L24.4*
- Membre
- - Inférieur y compris hanche ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.7*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D23.7*
- - - - Maligne: *C44.7*
- - Supérieur y compris épaule ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.6*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D23.6*
- - - - Maligne: *C44.6*
- - ¬ Plis circulaires bénins multiples de la *Q82.8*
- Muqueux
- - Médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la *T49*
- - ¬ Syphilis secondaire de la *A51.3*
- Non
- - Classé ¬
- - - Ulcérations chroniques de la *L98.4*
- - - Vascularite [angéite] limitée à la *L95*
- - Précisées ¬ Modifications de la *R23.8*
- Ongle ¬
- - Candidose de la *B37.2*
- - Maladie due au VIH avec candidose de la *B20, B37.2*
- Oreille conduit auditif externe ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.2*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D23.2*
- - - Maligne: *C44.2*
- Organe génital
- - Femme ¬
- - - *D28*
- - - *D39.7*
- - Homme ¬
- - - *D29*
- - - *D40.7*
- Parcheminée ¬ Syndrome de la *L98.8*
- Partie face non précis ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.3*

Peau *–suite*
- Partie face non précis ¬ *–suite*
- - Tumeur bénigne: *D23.3*
- Paupière
- - Y compris canthus ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.1*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D23.1*
- - - - Maligne: *C44.1*
- - ¬ Nævus d'Ota sur la *D22.1*
- Périanal ¬
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D03.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- - Herpès de la *A60.1*
- Phanères
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q84.9*
- - ¬ malformation congénital
- - - *Q84*
- - - Précisées de la *Q84.8*
- Pileux bord libre lèvre
- - Inférieure et le sillon mentolabial ¬ *C44.0*
- - Supérieure et le nez ¬ *C44.0*
- Rayons ultraviolet
- - Sans précision ¬ Modification aiguë de la *L56.9*
- - ¬ Modification aigu
- - - *L56*
- - - Précisées de la *L56.8*
- SAI ¬ Parasites de la *B88.9*
- Sans précision ¬
- - Affection
- - - Atrophique de la *L90.9*
- - - Hypertrophique de la *L91.9*
- - Carcinoma in situ: *D04.9*
- - Malformation congénitale de la *Q82.9*
- - Mélanome malin de la *C43.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D23.9*
- - - Maligne de la *C44.9*
- - Vascularite limitée à la *L95.9*
- Scrotum ¬
- - *C63.2*
- - *D29.4*
- Sèche ¬ Dermite avec *L85.3*
- Sein ¬
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*

Peau *–suite*
- Sein ¬ *–suite*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- Sièges ¬ Carcinoma in situ: *D04.8*
- Stade
- - 1 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.05†*, *L99.21**
- - 2 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.06†*, *L99.22**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.07†*, *L99.23**
- Stries ¬ Atrophie
- - Maculaire syphilitique de la *A52.7†*, *L99.8**
- - Syphilitique de la *A52.7†*, *L99.8**
- Tissu
- - Cellulaire sous-cutané
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de la *O99.7*
- - - Cours maladies classées ailleurs ¬ affection
- - - - *L99**
- - - - Précisées de la *L99.8**
- - - Lié irradiation
- - - - Sans précision ¬ Affection de la *L59.9*
- - - - ¬
- - - - - Affections de la *L59*
- - - - - Affections précisées de la *L59.8*
- - - Niveau
- - - - Cou ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.1*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.4*
- - - - - Supérieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.3*
- - - - Tête ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.0*
- - - - Tronc ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.2*
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres affections de la *L98*
- - - Sans précision ¬
- - - - Affection de la *L98.9*
- - - - Infection localisée de la *L08.9*
- - - - Kyste folliculaire de la *L72.9*
- - - - Lésion granulomateuse de la *L92.9*
- - - - Tuméfaction et masses localisées de la *R22.9*
- - - Sièges multiples ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.7*
- - - ¬
- - - - Affections précisées de la *L98.8*
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de maladies de la *Z84.0*
- - - - - Personnels de maladies de la *Z87.2*
- - - - Formes de kyste folliculaire de la *L72.8*
- - - - Infection

Peau *–suite*
- Tissu *–suite*
- - Cellulaire sous-cutané *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Infection *–suite*
- - - - - Localisées de la *L08*
- - - - - Localisées précisées de la *L08.8*
- - - - Kystes folliculaires de la *L72*
- - - - Lésion
- - - - - Granulomateuses de la *L92.8*
- - - - - Infiltrantes de la *L98.6*
- - - - Résultat radiologique anormal de la *R93.8*
- - - - Tuberculose de la *A18.4*
- - - - Tuméfactions et masses localisées de la *R22*
- - Mou) ¬ Sein (*D03.5*
- - Sous-cutané
- - - Excédentaire et flasque ¬ *L98.7*
- - - Membres ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.2*
- - - Non classé
- - - - Avant-bras et poignet ¬ Nécrose de la *R02.02*
- - - - Jambe et genou ¬ Nécrose de la *R02.06*
- - - - Localisation non précisée ¬ Nécrose de la *R02.09*
- - - - Main et doigt ¬ Nécrose de la *R02.03*
- - - - Région
- - - - - Cheville, pied et orteils ¬ Nécrose de la *R02.07*
- - - - - Épaule, bras et coude ¬ Nécrose de la *R02.01*
- - - - - Pelvienne et cuisse ¬ Nécrose de la *R02.05*
- - - - Tête et cou ¬ Nécrose de la *R02.00*
- - - - Tronc ¬ Nécrose de la *R02.04*
- - - - ¬
- - - - - Nécrose de la *R02.0*
- - - - - Nécrose post-traumatique de la *R02*
- - - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.3*
- - - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.0*
- - - Tronc ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.1*
- Tronc ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.5*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D23.5*
- - - Maligne: *C44.5*
- Verge SAI ¬ *C60.9*
- Visage
- - Exception des yeux) ¬ Nævus d'Ota sur la *D22.3*
- - Perte de poids ¬ Affaissement de la *L98.7*
- ¬
- - Accident dû à: Pénétration d'un corps étranger à travers la *W49.9!*

Peau *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Affection
- - - Atrophiques de la *L90.8*
- - - Hypertrophiques de la *L91.8*
- - Anomalie congénitale de la *Q82.9*
- - Antécédents familiaux de tumeur maligne de la *Z80.8*
- - Carcinome in situ de la *D04*
- - Cicatrice: adhérente (*L90.5*
- - Dermite
- - - Allergique contact
- - - - Aliments en contact avec la *L23.6*
- - - - Médicaments en contact avec la *L23.3*
- - - Contact sans précision
- - - - Aliments en contact avec la *L25.4*
- - - - Médicaments en contact avec la *L25.1*
- - - Irritant contact
- - - - Aliments en contact avec la *L24.6*
- - - - Médicaments en contact avec la *L24.4*
- - Desquamation de la *R23.4*
- - Difformité de la cicatrice (*L90.5*
- - Donneur de *Z52.1*
- - Échec et rejet d'une greffe de *T86.5*
- - Exfoliation de la *R23.4*
- - Gelure avec atteinte partielle des couches de la *T33*
- - Gomme de la *A52.7†*, *L99.8**
- - Gonorrhée de la *A54.8†*, *L99.8**
- - Induration de la *R23.4*
- - Infection néonatale de la *P39.4*
- - Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la *C43.8*
- - Maladie due au VIH avec maladie de *B23.8*, *L98.9*
- - Malformation congénital
- - - *Q82*
- - - Précisées de la *Q82.8*
- - Mélanome malin de la *C43*
- - Modifications de la *R23*
- - Nécrose d'une greffe de *T86.51*
- - Rejet/perte d'une greffe de *T86.52*
- - Sarcoïdose de la *D86.3*
- - Sarcome de Kaposi de la *C46.0*
- - Status post greffe de *Z94.5*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†*, *L99.8**
- - Trouble
- - - Circulatoires d'une greffe de *T86.50*
- - - Fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de *T86.59*
- - Tumeur
- - - Bénignes de la *D23*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.5*
- - - Malign
- - - - *C44*

Peau *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Malign *–suite*
- - - - Lésion à localisations contiguës de la *C44.8*
- - - - Secondaire de la *C79.2*
- - Vascularites limitées à la *L95.8*

Pectoraux ¬ Ganglions *C77.3*

Pédiatrique ¬ Sclérose en plaques *G35.9*

Pédicule
- Arc de l'axis ¬ Fracture bilatérale de la *S12.1*
- Ovarien et de la trompe de Fallope ¬ Torsion de l'ovaire, du *N83.5*

Pédiculose
- Acariase et à d'autres infestations ¬ Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.7*
- Pediculus humanus
- - Capitis ¬ *B85.0*
- - Corporis ¬ *B85.1*
- Phtiriase ¬
- - *B85*
- - Infestation mixte, *B85.4*
- Sans précision ¬ *B85.2*

Pediculus humanus
- Capitis ¬ Pédiculose due à *B85.0*
- Corporis ¬ Pédiculose due à *B85.1*

Pédo-carpien ¬ Spasme *R29.0*

Pédophilie ¬ *F65.4*

Pedum ¬ Tinea manuum et *B35.8*

PEG ¬
- Complication mécanique de sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [sonde *T85.51*
- Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [sonde *T85.74*

Peinture
- Teintures, non classées ailleurs ¬ Effet toxique: *T65.6*
- ¬ Intoxication par la *T65.6*

PEJ ¬
- Complication mécanique de sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde *T85.52*
- Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde *T85.74*

Pel ¬ Syndrome de *A52.1†, H58.8**

Pelade
- Généralisée ¬ *L63.1*
- Plaques ¬ *L63*
- Sans précision ¬ *L63.9*
- ¬ Autres formes de *L63.8*

Pelger-Huët ¬ Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: *D72.0*

Péliose hépatique ¬
- *K76.4*
- Maladie toxique du foie avec: *K71.88*

Pelizaeus-Merzbacher ¬
- Leucodystrophie sudanophile de *E75.2*
- Maladie de *E75.2*

Pelizaeus-Merzbacher-like ¬ Maladie de *E75.2*

Pellagre
- Alcoolique) ¬ *E52*
- ¬
- - Carence en acide nicotinique [*E52*
- - Cheilose au cours de *E52†, K93.8**
- - Démence au cours de *E52†, F02.8**
- - Glossite au cours de *E52†, K93.8**
- - Polyneuropathie au cours de *E52†, G63.4**

Pellagreuse ¬
- Encéphalopathie *E52†, G32.8**
- Gingivite *E52†, K93.8**

Pelle ¬ Incisive déformée en forme de *K00.2*

Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du ligament latéral interne du genou [*M76.4*

Pellizzari ¬ Anétodermie de Jadassohn- *L90.2*

Pellucide ¬ Infertilité féminine par défaut de la zone *N97.8*

Pelure de pomme ¬ Syndrome de la *Q41.1*

Pelvi péritonéal
- Actes médicaux ¬ Adhérences *N99.4*
- Femme ¬ Adhérences *N73.6*
- Organes génito-urinaires ¬ Infection à Chlamydia, *A56.1*

Pelvipéritonite
- Aiguë chez la femme ¬ *N73.3*
- Chronique chez la femme ¬ *N73.4*
- Femme, sans précision ¬ *N73.5*
- Gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques ¬ *A54.2*

Pelvis
- Hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ *Q87.8*
- ¬ Tumeur malign
- - *C41.4*
- - *C76.3*
- - Nerfs périphériques du *C47.5*
- - Tissu conjonctif et autres tissus mous du *C49.5*

Pelvi-urétérale ¬
- Jonction *C65*
- Obstruction *N13.5*
- Pyélonéphrite chronique associé
- - Anomalie de jonction *N11.1*
- - Coudure de jonction *N11.1*
- - Obstruction de jonction *N11.1*
- - Rétrécissement de jonction *N11.1*

Pemphigoïde
- Anti-p200 ¬ *L12.8*
- Bulleux ¬ *L12.0*

Pemphigoïde *–suite*
- Cicatriciel ¬ *L12.1*
- Membranes muqueuses ¬ *L12.1*
- Muqueux bénin ¬ *L12.1*
- Oculaire cicatricielle ¬ *L12.1†, H13.3**
- Sans précision ¬ *L12.9*
- ¬ Autres *L12.8*

Pemphigus
- Bénin familial [Hailey-Hailey] ¬ *Q82.8*
- Brésilien [fogo selvagem] ¬ *L10.3*
- Conjunctivae ¬ *L12.1†, H13.3**
- Épidémique du nouveau-né ¬ *L00*
- Érythémateux ¬ *L10.4*
- Foliacé ¬ *L10.2*
- Herpétiforme ¬ *L10.2*
- Médicamenteux ¬ *L10.5*
- Ocularis ¬ *L12.1†, H13.3**
- Sans précision ¬ *L10.9*
- Séborrhéique ¬ *L10.4*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, L99.8**
- Végétant ¬ *L10.1*
- Vulgaire ¬ *L10.0*
- ¬
- - *L10*
- - Formes de *L10.8*

Pénal ¬
- Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou *Z65*
- Poursuites *Z65*

Pendred ¬ Syndrome de *E07.1†, H94.8**

Penduleux (ventre en besace) ¬ Soins maternels pour: abdomen *O34.8*

Pénétrant
- Globe oculaire
- - Corps étranger ¬ Plaie *S05.5*
- - Sans corps étranger ¬ Plaie *S05.6*
- Orbite
- - Sans corps étranger ¬ Plaie *S05.4*
- - ¬ Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie *H05.5*
- Peau [Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et parafolliculaire *L87.0*
- SAI ¬ Plaie: punctiforme avec corps étranger (*T14.1*
- ¬ Hyperkératose folliculaire *L87.0*

Pénétration
- Corps étranger à travers la peau ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- Oculaire SAI ¬ *S05.6*

Pénétré dans un orifice naturel ¬ Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant *T98.0*

Pénible ¬ Rythme de travail *Z56*

Pénicilline
- Oxacilline
- - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae résistant à la *U80.10!*

Pénicilline *–suite*
- Oxacilline *–suite*
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae résistant à la *U80.1!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae résistant
- - - *U80.10!*
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la *U80.11!*
- ¬
- - Allergie à la *T88.7*
- - Antécédents personnels d'allergie à la *Z88.0*
- - Intoxication: *T36.0*

Pénicilliose ¬ *B48.4*

Pénien ¬
- Écoulement *R36*
- Hypospadias *Q54.1*

Pénis
- Latérale) ¬ Courbure du *Q55.6*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q55.6*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Absence et aplasie congénitales du *Q55.5*
- - Agénésie du *Q55.5*
- - Candidose du gland du *B37.4†, N51.2**
- - Fracture du *S39.80*
- - Gomme du *A52.7†, N51.8**
- - Herpès du *A60.0†, N51.8**
- - Hypoplasie du *Q55.6*
- - Lésion de la tunique albuginée du corps caverneux du *S39.80*
- - Malformations congénitales du *Q55.6*
- - Mycose candidosique du gland du *B37.4†, N51.2**
- - Plaie ouverte du *S31.2*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, N51.8**
- - Tuberculose du *A18.1†, N51.8**

Pénitentiaire ¬ inscription dans: établissement *Z02*

Pénoscrotal ¬
- Hypospadias *Q54.2*
- Transposition *Q55.8*

Pensées suicidaires ¬ *R45.8*

Pensionnaires d'établissements de soins ¬ Autres *Z76.4*

Pentalogie de Fallot ¬ *Q21.80*

Pentasomie X ¬ *Q97.1*

Penta-X ¬ *Q97.1*

Pentoses-phosphates ¬ Trouble du métabolisme des *E74.8*

Pentosurie essentielle ¬ *E74.8*

Penttinen ¬ Syndrome de vieillissement prématuré type *E34.8*

PEPCK ¬ Déficit en *E74.4*

Peptides C ¬ Concentration réduite de *R79.8*

Peptique
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens ¬ Ulcère *K27.9, Y57.9!*
- Érosion
- - Anastomotique ¬ ulcère (*K28*
- - Gastro-colique ¬ ulcère (*K28*
- - Gastro-intestinal(e) ¬ ulcère (*K28*
- - Gastro-jéjunal(e) ¬ ulcère (*K28*
- - Jéjunal(e) ¬ ulcère (*K28*
- - Marginal(e) ¬ ulcère (*K28*
- - Stomal(e) ¬ ulcère (*K28*
- Origine médicamenteuse ¬ Ulcère *K27.9, Y57.9!*
- SAI ¬ Ulcère: *K27*
- ¬
- - Œsophagite: *K20*
- - Ulcère de l'œsophage: *K22.1*

Per- et postopératoire ¬ Anémie après hémorragie *D62*

Perçage d'oreilles ¬ *Z41.8*

Perception
- Auditif
- - Anormales ¬ Autres *H93.2*
- - ¬ Trouble de l'élaboration et de la *F80.20*
- Battements cardiaques ¬ *R00.2*
- Général
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux *R44.8*
- - ¬ Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux *R44*
- Non syndromique autosomique
- - Dominante type DFNA ¬ Surdité de *H90.3*
- - Récessive type DFNB ¬ Surdité de *H90.3*
- SAI ¬ Surdité (de): *H90.5*
- Simultanée sans fusion ¬ *H53.3*

Perchloréthylène ¬ *T53.3*

Percreta
- Saignement du post-partum ¬ Placenta *O43.21, O72.0*
- Sans saignement ¬ Placenta *O43.21, O73.0*
- ¬ Placenta increta ou *O43.21*

Percussion anormale thoracique(s) ¬ *R09.8*

Pereira
v. Richieri-Costa-Pereira

Perforant
- Plantaire syphilitique ¬
- - Mal *A52.1†, L99.8**
- - Tabès avec mal *A52.1†, L99.8**
- - Tabo-paralysie avec mal *A52.1†, L99.8**
- Réactionnelle familiale ¬ Collagénose *L87.1*
- Sclérotique ¬ Blessure non *S05.8*
- Serpigineux ¬ Elastome *L87.2*
- Verruciforme ¬ Collagénome *L87.1*
- ¬
- - Granulome annulaire *L92.0*
- - Insuffisance des veines *I87.20*
- - Occlusion et sténose d'une artère *I66.8*

Perforation
v.a. rupture
- Abcès
- - Indication saignement ¬
- - - Diverticulite de l'intestin grêle sans *K57.12*
- - - Diverticulose de l'intestin grêle sans *K57.10*
- - Saignement ¬
- - - Diverticulite
- - - - Côlon
- - - - - *K57.23*
- - - - - Sans *K57.33*
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec *K57.03*
- - - - - Grêle et du côlon avec *K57.43*
- - - - - Grêle et du côlon sans *K57.53*
- - - - - Grêle sans *K57.13*
- - - - - Siège non précisé, avec *K57.83*
- - - - - Siège non précisé, sans *K57.93*
- - - Diverticulose
- - - - Côlon
- - - - - *K57.21*
- - - - - Sans *K57.31*
- - - - Grêle et du colon sans *K57.51*
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec *K57.01*
- - - - - Grêle et du côlon avec *K57.41*
- - - - - Grêle sans *K57.11*
- - - - - Siège non précisé, avec *K57.81*
- - - - - Siège non précisé, sans *K57.91*
- - Sans indication saignement ¬
- - - Diverticulite
- - - - Côlon
- - - - - *K57.22*
- - - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite du côlon sans *K57.32*
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec *K57.02*
- - - - - Grêle et du côlon avec *K57.42*
- - - - - Grêle et du côlon sans *K57.52*
- - - - - Siège non précisé, avec *K57.82*
- - - - - Siège non précisé, sans *K57.92*
- - - Diverticulose
- - - - Côlon
- - - - - *K57.20*
- - - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulose du côlon sans *K57.30*
- - - - Grêle et du colon avec *K57.40*
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec *K57.00*
- - - - - Grêle et du côlon sans *K57.50*
- - - - - Siège non précisé, avec *K57.80*
- - - - - Siège non précisé, sans *K57.90*
- - ¬ Diverticulose
- - - Côlon

Perforation *–suite*
- Abcès *–suite*
- - ¬ Diverticulose *–suite*
- - - Côlon *–suite*
- - - - *K57.2*
- - - - Intestin grêle, sans *K57.5*
- - - - Sans *K57.3*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - *K57.0*
- - - - - Côlon avec *K57.4*
- - - - - Sans *K57.1*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec *K57.8*
- - - - - Non précisé, sans *K57.9*
- Accidentel
- - Nerf
- - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - Organe
- - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - Vaisseau sanguin
- - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- Bulbe sans protrusion ¬ *S05.6*
- Centrale du tympan ¬ *H72.0*
- Cloison nasale SAI ¬ *J34.8*
- Congénitale de la cloison nasale ¬ *Q30.3*
- Déchirure
- - Accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ¬ *T81.2*
- - Lésion origine chimique
- - - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*

Perforation *–suite*
- Déchirure *–suite*
- - Lésion origine chimique *–suite*
- - - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- Drainage ¬ *T81.2*
- Hémorragie due à la négligence ¬ Incision, ponction, *Y69!*
- Intestin (non traumatique) ¬ *K63.1*
- Intestinale périnatale ¬ *P78.0*
- Marginales du tympan ¬ Autres *H72.2*
- Œsophage ¬ *K22.3*
- Pars flaccida ¬ *H72.1*
- Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Rupture ¬ Appendicite aigu péritonite
- - Généralisée (diffuse) après *K35.2*
- - Localisé
- - - *K35.31*
- - - Sans *K35.30*
- S
- - Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire ¬ *T81.5*
- - Multiples du tympan ¬ *H72.8*
- - Totale du tympan ¬ *H72.8*
- Syphilitique
- - Congénitale de la voûte palatine ¬ *A50.5†, K93.8**
- - Luette ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Nez ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Palais ¬ *A52.7†, K93.8**
- Traumatique de la vessie ¬ *S37.22*
- Tympan
- - Partie attique ¬ *H72.1*
- - Post-inflammatoire ¬ *H72*
- - Post-traumatique persistante ¬ *H72*
- - Sans précision ¬ *H72.9*
- - ¬
- - - *H72*
- - - *H72.8*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.2*
- Voies biliaires ¬ *K83.2*

Perforé
- Tardive de la luette ¬ Syphilis *A52.7†, K93.8**
- ¬ Ulcère
- - Cornée: *H16.0*
- - Syphilitique *A52.7†, L99.8**

Performance ¬ Baisse de *R53*

Perfringens
- Clostridium welchii] ¬ Intoxication alimentaire à Clostridium *A05.2*
- Micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium *B96.7!*
- ¬

Perfringens *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Entérite infectieuse à Clostridium *A04.8, B96.7!*
- - Sepsis à Clostridium *A41.4*

Perfusion
- Injection thérapeutique ou transfusion ¬ Choc septique après *T80.2, R57.2*
- Transfusion
- - Sans précision ¬ Complication consécutive à une injection thérapeutique, une *T80.9*
- - ¬
- - - Complication
- - - - Consécutif
- - - - - Injection thérapeutique, une *T80*
- - - - - Injection thérapeutique, une *T80.8*
- - - - Vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une *T80.1*
- - - Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une *T80.0*
- - - Infection consécutif injection thérapeutique
- - - - *T80.2*
- - - Phlébite consécutive à injection thérapeutique, *T80.1*
- - - Réaction
- - - - Facteur Rh à l'occasion d'une *T80.4*
- - - - Incompatibilité de groupes sanguins lors d'une *T80.3*
- - - Septicémie consécutif(ve) à injection thérapeutique, *T80.2*
- - - Thrombo-embolie consécutive à injection thérapeutique, *T80.1*
- - - Thrombophlébite consécutive à injection thérapeutique, *T80.1*
- ¬
- - *T80*
- - Ajustement et entretien d'une pompe à *Z45.1*
- - Sepsis dû à un cathéter spinal de *T85.72*

Périadénite muqueuse nécrotique récidivante ¬ *K12.0*

Péri-ampullaire ¬ Carcinome *C26.9*

Périamygdalien ¬
- Abcès *J36*
- Phlegmon *J36*

Périanal
- Cause non traumatique ¬ Hématome *K64.5*
- Tuberculeux ¬ Abcès *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Abcès *K61.0*
- - Hématome *K64.5*
- - Herpès de la peau *A60.1*
- - Infection herpétique *A60.1*
- - Marisques *K64.4*
- - Peau
- - - *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D03.5*

Périanal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Peau *–suite*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Thrombose veineuse *K64.5*

Périapical
- Fistule ¬ Abcès *K04.6*
- SAI ¬ Abcès: *K04.7*
- Sans
- - Fistule ¬ Abcès *K04.7*
- - Précision ¬ Maladies de la pulpe et des tissus *K04.9*
- ¬
- - Granulome apical ou *K04.5*
- - Kyste: *K04.8*
- - Maladies de la pulpe et des tissus *K04*

Périartérite
- Atteinte pulmonaire ¬ *M30.1*
- Juvénile ¬ *M30.2*
- Noueux
- - Affections apparentées ¬ *M30*
- - ¬
- - - *M30.0*
- - - Affections apparentées à la *M30.8*
- - - Démence au cours de *M30.0†*, *F02.8**
- - - Glomérulonéphrite au cours de *M30.0†*, *N08.5**
- - - Maladie glomérulaire au cours de *M30.0†*, *N08.5**
- - - Myopathie au cours de *M30.0†*, *G73.7**
- - - Polyneuropathie au cours de *M30.0†*, *G63.5**

Périarthrite
- Épaule ¬ *M75.0*
- Gonorrhéique ¬ *A54.4†*, *M73.89**
- Poignet ¬ *M77.2*
- SAI ¬ *M77.9*

Périaxiale ¬ Encéphalite *G37.0*

Péricarde
- Méningocoques ¬ Infection du *A39.5†*, *I32.0**
- Rhumatismale ¬ Adhérence du *I09.2*
- Sans précision ¬ Maladie du *I31.9*
- ¬
- - *C38.0*
- - Adhérence
- - - *I31.0*
- - - Localisées du *I31.8*
- - - Tuberculeuse du *A18.8†*, *I32.0**
- - Anomalie congénital
- - - Complète du *Q24.8*
- - - Partielle du *Q24.8*
- - Calcification du *I31.1*

Péricarde *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Gomme du *A52.0†*, *I32.0**
- - Maladie
- - - *I31*
- - - Précisées du *I31.8*
- - Malformation congénitale du: *Q24.8*
- - Mésothéliome du *C45.2*
- - Rupture du *I21.9*
- - Tuberculose de *A18.8†*, *I32.0**
- - Tumeur maligne secondaire du *C79.83*

Péricardique
- Aigu ¬ épanchement *I30*
- Non inflammatoire) ¬ Epanchement *I31.3*

Péricardite
- Adhésif
- - Chronique ¬ *I31.0*
- - ¬ Médiastino- *I31.0*
- Aigu
- - Sans précision ¬ *I30.9*
- - ¬
- - - *I30*
- - - Formes de *I30.8*
- Aspergillus ¬ *B44.8†*, *I32.1**
- Chronique) SAI ¬ *I31.9*
- Constrictive chronique ¬ *I31.1*
- Cours
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†*, *I32.8**
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *I32.0**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *I32.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *I32.8**
- - Polyarthrite séropositive chronique ¬ *M05.30†*, *I32.8**
- Gonocoques ¬ *A54.8†*, *I32.0**
- Idiopathique aiguë non spécifique ¬ *I30.0*
- Infectieuse ¬ *I30.1*
- Leucémique ¬ *C95.90†*, *I32.8**
- Méningocoques ¬ *A39.5†*, *I32.0**
- Pneumocoques ¬ *I30.1*, *B95.3!*
- Purulente ¬ *I30.1*
- Rhumatismal
- - Aigu ¬
- - - *I01.0*
- - Chronique ¬
- - - *I09.2*
- - - Médiastino- *I09.2*
- Staphylocoques ¬ *I30.1*, *B95.8!*
- Streptocoques ¬ *I30.1*, *B95.5!*
- Syphilitique ¬ *A52.0†*, *I32.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†*, *I32.0**
- Urémique ¬ *N18.89†*, *I32.8**
- Virale ¬ *I30.1*

Péricardite *–suite*
- Virus Coxsackie ¬ *B33.2†*, *I32.1**

Périchondrite
- Auriculaire ¬ *H61.0*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Oreille externe ¬ *H61.0*
- Pavillon de l'oreille ¬ *H61.0*
- Syphilitique tardive du larynx ¬ *A52.7†*, *J99.8**
- ¬ Syphilis du larynx avec *A52.7†*, *J99.8**

Péricoronarite
- Aiguë ¬ *K05.2*
- Chronique ¬ *K05.3*

Péri-endocardite aiguë ou subaiguë ¬ *I33.9*

Périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ Folliculite et *L66.3*

Périhépatite
- Chlamydia ¬ *A74.8†*, *K67.0**
- Gonorrhéique ¬ *A54.8†*, *K67.1**

Péri-implantaire par dispositif d'ostéosynthèse interne ¬ Infection *T84.6*

Périlymphatique ¬ Surdité mixte liée à l'X avec fistule *H90.8*

Périmandibulaire ¬ Abcès *K12.28*

Périménopause
- Sans précision ¬ Trouble de la ménopause et de la *N95.9*
- ¬ trouble
- - Ménopause et autres troubles de la *N95*
- - Précisés de la ménopause et de la *N95.8*

Périnatal
- Accouchement ¬ Infection d'une suture: *O86.0*
- Appareil digestif
- - Sans précision ¬ Affection *P78.9*
- - ¬ Autres affections *P78*
- Fatale ¬
- - Glycogénose
- - - Déficit en enzyme branchante, forme neuromusculaire *E74.0*
- - - Type 4, forme neuromusculaire *E74.0*
- - GSD
- - - Déficit en enzyme branchante, forme neuromusculaire *E74.0*
- - - Type 4, forme neuromusculaire *E74.0*
- Intéressant
- - Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Légère au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Lèvres au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Peau au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Vulve au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- Létale ¬ Maladie de Gaucher *E75.2*

Périnatal *–suite*

- O70
- - 0 intéressant
- - - Muscle
- - - - Périnée au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.1*
- - - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.1*
- - - Plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.1*
- - 1 intéressant
- - - Cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.2*
- - - Sphincter
- - - - Anal au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.2*
- - - - SAI au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.2*
- - 2 intéressant muqueux
- - - Anale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.3*
- - - Rectale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.3*
- Précisées de l'appareil digestif ¬ Autres affections *P78.8*
- Sans précision ¬
- - Affection
- - - Cardio-vasculaire survenant pendant la période *P29.9*
- - - Dont l'origine se situe dans la période *P96.9*
- - - Hématologique de la période *P61.9*
- - Infection spécifique de la période *P39.9*
- Tuberculeuse ¬ Fistule *A18.1†, N37.8**
- ¬
- - Affection
- - - Apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période *P25.8*
- - - Cardio-vasculaire survenant pendant période
- - - - *P29*
- - - - *P29.8*
- - - Dont l'origine se situe dans la période *P96*
- - - Hématologique
- - - - Période *P61*
- - - - Précisées de la période *P61.8*
- - - Précisées dont l'origine se situe dans la période *P96.8*
- - - Respiratoires survenant pendant la période *P28*
- - Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période *Z87.6*
- - Douleur pelvienne et *R10.2*
- - Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période *P27.1*
- - Emphysème interstitiel
- - - Affections apparentées survenant pendant la période *P25*

Périnatal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Emphysème interstitiel *–suite*
- - - Survenant pendant la période *P25.0*
- - Fistule: urétro- *N36.0*
- - Hémorragie
- - - Pulmonaire
- - - - Massive survenant pendant la période *P26.1*
- - - - Non précisée survenant pendant la période *P26.9*
- - - - Survenant
- - - - - Pendant la période *P26*
- - - - - Pendant la période *P26.8*
- - - Trachéo-bronchique survenant pendant la période *P26.0*
- - Hypoxie *P21.9*
- - Infection spécifique
- - - Période *P39*
- - - Précisées de la période *P39.8*
- - Insuffisance *N81.8*
- - Maladie respiratoire chronique
- - - Non précisée survenant pendant la période *P27.9*
- - - Survenant pendant la période *P27.8*
- - Perforation intestinale *P78.0*
- - Pneumomédiastin survenant pendant la période *P25.2*
- - Pneumopéricarde survenant pendant la période *P25.3*
- - Pneumothorax survenant pendant la période *P25.1*

Périnéal ¬ Hypospadias *Q54.3*

Périnée

- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: muscles du: *O70.1*
- Deuxième degré ¬ Déchirure obstétricale du *O70.1*
- Malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du *Q87.8*
- Premier degré ¬ Déchirure obstétricale du *O70.0*
- Quatrième degré ¬ Déchirure obstétricale du *O70.3*
- Rigide ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- Sans précision ¬
- - Affection non inflammatoire de la vulve et du *N90.9*
- - Déchirure obstétricale du *O70.9*
- Troisième degré ¬ Déchirure obstétricale du *O70.2*
- Vagin et de vulve au cours de la grossesse ¬ Varices de *O22.1*
- Vulve ¬ Soins maternels pour: intervention chirurgicale antérieure sur le *O34.7*
- ¬
- - *C49.5*

Périnée *–suite*

- ¬ *–suite*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *S31.0*
- - *T21*
- - Affection non inflammatoire
- - - Précisées de la vulve et du *N90.8*
- - - Vulve et du *N90*
- - Déchirure
- - - Obstétricale du *O70*
- - - Secondaire du *O90.1*
- - Hématome obstétrical de: *O71.7*
- - Rupture suture
- - - Déchirure du *O90.1*
- - - Obstétricale du *O90.1*
- - Soin maternel
- - - Anomalies de la vulve et du *O34.7*
- - - Fibrose du *O34.7*

Périnéo-vaginale ¬ Fistule: *N82.5*

Périnéphrétique tuberculeux ¬ Abcès *A18.1†, N29.1**

Périneuriome

- Extraneural ¬ *D36.1*
- Intraneural ¬ *D36.1*

Périoculaire

- Sans atteinte des voies lacrymales ¬ Plaie ouverte de la paupière et de la région *S01.1*
- ¬
- - Affections dégénératives des paupières et de la région *H02.7*
- - Brûlure de la paupière et de la région *T26.0*
- - Contusion de la paupière et de la région *S00.1*
- - Corrosion de la paupière et de la région *T26.5*
- - Lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région *S00.2*
- - Plaie ouverte de la paupière et de la région *S01.1*

Période

- Attente pour investigation et traitement ¬ Autre *Z75.2*
- Croissance rapide de l'enfance ¬ Examen à la *Z00.2*
- Dilatation] ¬ Prolongation de la première *O63.0*
- Expulsion] ¬ Prolongation de la deuxième *O63.1*
- Néonatale ¬ Autres affections transitoires de la coagulation pendant la *P61.6*
- Périnatal
- - Sans précision ¬
- - - Affection
- - - - Cardio-vasculaire survenant pendant la *P29.9*
- - - - Dont l'origine se situe dans la *P96.9*
- - - - Hématologique de la *P61.9*
- - - Infection spécifique de la *P39.9*

Période *–suite*
- Périnatal *–suite*
- - ¬
- - - Affection
- - - - Apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la *P25.8*
- - - - Cardio-vasculaire
- - - - - Survenant pendant la *P29*
- - - - - Survenant pendant la *P29.8*
- - - - Dont l'origine se situe dans la *P96*
- - - - Hématologique
- - - - - *P61*
- - - - - Précisées de la *P61.8*
- - - - Précisées dont l'origine se situe dans la *P96.8*
- - - - Respiratoires survenant pendant la *P28*
- - - Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la *Z87.6*
- - - Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la *P27.1*
- - - Emphysème interstitiel
- - - - Affections apparentées survenant pendant la *P25*
- - - - Survenant pendant la *P25.0*
- - - Hémorragie
- - - - Pulmonaire
- - - - - Massive survenant pendant la *P26.1*
- - - - - Non précisée survenant pendant la *P26.9*
- - - - - Survenant pendant la *P26*
- - - - - Survenant pendant la *P26.8*
- - - - Trachéo-bronchique survenant pendant la *P26.0*
- - - Infection spécifique
- - - - *P39*
- - - - Précisées de la *P39.8*
- - - Maladie respiratoire chronique
- - - - Non précisée survenant pendant la *P27.9*
- - - - Survenant pendant la *P27.8*
- - - Pneumomédiastin survenant pendant la *P25.2*
- - - Pneumopéricarde survenant pendant la *P25.3*
- - - Pneumothorax survenant pendant la *P25.1*
- Vie ¬ Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes *Z60*
- ¬
- - Eclampsie, sans précision quant à la *O15.9*
- - Hémorragie de la délivrance (troisième *O72.0*

Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS] ¬ *G25.80*

Périodontal
- Latéral ¬ Kyste: *K09.0*
- Localisée ¬ Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection *K08.1*
- Sans précision ¬ Maladie *K05.6*

Périodontal *–suite*
- ¬
- - Abcès: *K05.2*
- - Gingivite et maladies *K05*
- - Kyste: apical (*K04.8*
- - Maladies *K05.5*

Périodontite
- Aiguë ¬ *K05.2*
- Apical
- - Aigu
- - - Origine pulpaire ¬ *K04.4*
- - - SAI ¬ *K04.4*
- - Chronique ¬ *K04.5*
- - SAI ¬ *K04.5*
- Chronique ¬ *K05.3*
- Complexe ¬ *K05.3*
- SAI ¬ *K05.3*
- Simple ¬ *K05.3*

Périodontopathie
v. palmoplantaire-périodontopathie
v. palmoplantaire-périodontopathie-onychogrypose

Périonyxis
- Candida ¬ *B37.2*
- ¬ *L03.0*

Périorale ¬ Dermite *L71.0*

Périoste ¬ Syphilis
- Congénitale du *A50.0†, M90.19**
- Secondaire du *A51.4†, M90.19**
- Tardive du *A52.7†, M90.19**

Périostite
- Cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs ¬ *M90.1**
- Gommeuse du pian (tardif) ¬ Ostéite ou *A66.6*
- Gonorrhéique ¬ *A54.4†, M90.19**
- Hypertrophique) du pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*
- Mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*
- Orbite ¬ *H05.0*
- SAI ¬ *M86.9*
- Syphilitique
- - Congénital
- - - Précoce ¬ *A50.0†, M90.19**
- - - ¬ *A50.0†, M90.19**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, M90.19**
- - Tardive ¬ *A52.7†, M90.19**
- - ¬ *A52.7†, M90.19**
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M90.09**

Péripapillaire
- Hélicoïdale ¬ Dégénérescence choriorétinienne *H31.2*
- ¬ Dystrophie choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée) (*H31.2*

Péripharyngé ¬ Abcès *J39.0*

Périphérique
v. Type de maladie

Périphlébite
- Ombilicale ¬ *I80.88*
- ¬ *I80*

Péri-radiculaire ¬ Kyste *G54.8*

Périrectal
- Tuberculeux ¬
- - Abcès *A18.3†, K93.0**
- - Fistule *A18.3†, K93.0**
- ¬ Abcès *K61.1*

Périrénal ¬ Abcès
- *N15.11*
- Rénal et *N15.1*

Périsplénite ¬ *D73.8*

Péristaltisme apparent ¬ *R19.2*

Péritoine
- Ganglions mésentériques ¬ Tuberculose de l'intestin, du *A18.3*
- Œufs d'helminthes NCA ¬ Granulome du *B83.9†, K67.8**
- Pariétal
- - Pelvien) ¬ *C45.1*
- - ¬ *C48.1*
- Pelvien ¬
- - *C48.1*
- - Endométriose du *N80.3*
- Sans précision ¬
- - Maladie du *K66.9*
- - Tumeur maligne: *C48.2*
- ¬
- - *D17.7*
- - Abcès tuberculeux du *A18.3†, K67.3**
- - Inflammation gonorrhéique du *A54.8†, K67.1**
- - Kyste chyleux du *I89.8†, K67.8**
- - Lésion traumatique: *S36.81*
- - Maladie
- - - *K66*
- - - Précisées du *K66.8*
- - Mésothéliome
- - - *C45.1*
- - - Kystique du *D19.1*
- - Syphilis
- - - *A52.7†, K67.2**
- - - Congénitale du *A50.0†, K67.2**
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - *D20.1*
- - - - Tissu
- - - - - Mésothélial du *D19.1*
- - - - - Mous du rétropéritoine et du *D20*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.4*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du *C48.8*
- - - - Parties précisées du *C48.1*
- - - - Rétropéritoine et du *C48*

Péritoine *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Malign *–suite*
- - - - Secondaire du rétropéritoine et du *C78.6*
- - - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] du *C48.2*

Péritonéal
v.a. rétro-péritonéal
- Actes médicaux ¬ Adhérences pelvi- *N99.4*
- Brides), avec occlusion intestinale ¬ Adhérences *K56.5*
- Cours de maladies infectieuses classées ailleurs ¬ Autres atteintes *K67.8**
- Disséminée ¬ Léiomyomatose *D20.1*
- Femme ¬ Adhérences pelvi- *N73.6*
- Malin ¬ Mésothéliome *C45.1*
- Organes génito-urinaires ¬ Infection à Chlamydia, pelvi- *A56.1*
- Primaire ¬ Carcinome *C48.2*
- Tuberculose bovine contagieuse ¬ Bacillose *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Abcès: *K65.0*
- - Adhérence
- - - *K66.0*
- - - Brides] congénitales: *Q43.3*
- - Appendicite aiguë avec abcès *K35.32*
- - Carcinomatose *C78.6*
- - Dialyse *Z49.2*
- - Epanchement *R18*
- - Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse *T85.71*
- - Pseudomyxome *C78.6*
- - Résultats anormaux de: liquide *R85*
- - Tuberculose
- - - *A18.3†, K93.0**
- - - Ganglions lymphatiques *A18.3†, K93.0**

Péritonite
- Aigu
- - Éosinophiles ¬ *K65.0*
- - Généralisée ¬ *K65.0*
- - Pelvienne, chez l'homme ¬ *K65.0*
- - Septique ¬ *K65.0*
- - Sous-phrénique ¬ *K65.0*
- - ¬ *K65.0*
- Aseptique ¬ *T81.6*
- Bile ¬ *K65.8*
- Candida ¬ *B37.88†, K67.8**
- Candidosique ¬ *B37.88†, K67.8**
- Chimique ¬ *T81.6*
- Chlamydia ¬ *A74.8†, K67.0**
- Diphtérique ¬ *A36.8†, K67.8**
- Éosinophiles ¬ *K65.8*
- Généralisé
- - Diffuse) après perforation ou rupture ¬ Appendicite (aiguë) avec *K35.2*

Péritonite *–suite*
- Généralisé *–suite*
- - ¬ Appendicite aiguë avec *K35.2*
- Gonocoques ¬ *A54.8†, K67.1**
- Localisé
- - Généralisée ¬ Appendicite aiguë, sans mention de *K35.8*
- - Perforation ou rupture ¬ Appendicite aiguë avec *K35.31*
- - Sans perforation ni rupture ¬ Appendicite aiguë avec *K35.30*
- - ¬ Appendicite aiguë avec *K35.3*
- Méconiale ¬ *P78.0*
- Néonatal
- - SAI ¬ *P78.1*
- - ¬ Autres *P78.1*
- Paroxystique bénigne ¬ *E85.0*
- Pelvienne survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Proliférative chronique ¬ *K65.8*
- Puerpérale ¬ *O85*
- Sans précision ¬ *K65.9*
- Syphilitique
- - Congénital
- - - Précoce ¬ *A50.0†, K67.2**
- - - ¬ *A50.0†, K67.2**
- - Tardive ¬ *A52.7†, K67.2**
- - ¬ *A52.7†, K67.2**
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K67.3**
- Urine ¬ *K65.8*
- ¬
- - *K65.8*
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - *K57.2*
- - - - Intestin grêle, avec *K57.4*
- - - Intestin
- - - - Grêle, avec *K57.0*
- - - - SAI, avec *K57.8*

Périurétral
- Atteinte de l'urètre ¬ Déchirure *O71.5*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture des tissus *O70.0*
- Glande annexe ¬ Infection gonococcique partie inférieur appareil génito-urinaire
- - Abcès *A54.1*
- - Sans abcès *A54.0*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): tissu *O08.6*
- Tant que lésion due à l'accouchement chez la mère ¬ Lacération du tissu *O70.0*
- ¬ Abcès (de): *N34.0*

Périvascularite rétinien
- Idiopathique ¬ *H35.0*
- S) ¬ *H35.0*

Périventriculaire
- Acquis du nouveau-né ¬ Kystes *P91.1*
- ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos avec hétérotopie *Q79.6*

Perlèche
- Cours de carence en vitamine B2 ¬ *E53.0†, K93.8**
- ¬ *K13.0*

Perles d'Epstein ¬ *K09.8*

Perlman ¬ Syndrome de *Q87.3*

Permanente ¬
- Difficultés liées à: Besoin d'une surveillance *Z74.3*
- Fibrillation auriculaire
- - *I48.2*
- Myotonie *G71.1*

Perméabilité
- Canal
- - Artériel ¬ *Q25.0*
- - Botal ¬ *Q25.0*
- Persistance
- - Foramen ovale ¬ *Q21.1*
- - Ostium secundum (type II) ¬ *Q21.1*

Perméables ¬ Utérus bicorne bicervical avec col et vagin *Q51.3*

Permis de conduire ¬ inscription dans: obtention du *Z02*

Pernicieuse
- Acquise ¬ Anémie *D51.0*
- Congénital ¬ Anémie
- - *D51.0*
- Glossite ¬ Anémie *D51.0*
- Juvénile ¬ Anémie *D51.0*
- ¬ Polyneuropathie au cours de l'anémie *D51.0†, G63.4**

Pérodactylie-séquence de Robin ¬ Syndrome d'extrasystoles ventriculaires avec syncopes- *Q87.8*

Péroné
- Impliquant
- - Cheville ¬ *S82.6*
- - Malléole ¬ *S82.6*
- Seul
- - Diaphyse ¬ Fracture du *S82.42*
- - Multiple ¬ Fracture du *S82.49*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Fracture du *S82.40*
- - - Proximale ¬ Fracture du *S82.41*
- - ¬ Fracture du *S82.4*
- Tout partie ¬ Fracture
- - Diaphyse du tibia: Avec fracture du *S82.21*
- - Extrémité
- - - Inférieure du tibia: Avec fracture du *S82.31*
- - - Supérieure du tibia: Avec fracture du *S82.11*
- - ¬
- - Extrémité inférieure de: *S93.0*

Péroné *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Incurvation congénitale du tibia et du *Q68.4*
- - Ostéochondrite juvénile du tibia et du *M92.5*
- - Raccourcissement longitudinal du *Q72.6*

Péroné-brachydactylie ¬ Syndrome d'aplasie du *Q73.8*

Péroné-ectrodactylie ¬ Syndrome d'aplasie du *Q73.8*

Péronéo
v. fémoro-péronéo-cubitale

Péronier
- Collatéral
- - Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament externe [Lig. *M23.94*
- - ¬
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament externe [Lig. *M23.54*
- - - Lésions internes du genou: Ligament externe [Lig. *M23.84*
- Ligament latéral ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral *S83.43*
- - Distorsion du ligament latéral *S83.41*
- Neurogénique type Kaeser ¬ Syndrome scapulo- *G12.1*
- Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) *S86.3*
- Type axonal) (type hypertrophique) ¬ Amyotrophie *G60.0*
- ¬
- - Lésion traumatique de l'artère *S85.2*
- - Paralysie du nerf *G57.3*
- - Tendinite *M76.7*

Peroxydase ¬ Déficit en catalase et en *E80.3*

Peroxysomale ¬
- Anomalie de la bêta-oxydation *E71.3*
- Déficit en alanine-glyoxylate aminotransférase *E74.8*
- Syndrome de Zellweger-like sans anomalies *Q87.8*

Perpuéralité ¬ Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la *O26.68*

Perroquets ¬ Fièvre des *A70*

Perruches ¬ Maladie ou poumon des éleveurs de: *J67.2*

Persécution ¬ Cible d'une discrimination ou d'une *Z60*

Persistance
- Arc aortique droit ¬ *Q25.4*
- Canal
- - Artériel
- - - Bicuspidie valvulaire aortique-anomalie des mains ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - - Familiale ¬ *Q25.0*
- - - ¬ *Q25.0*
- - Müller ¬ Syndrome de *Q55.8*

Persistance *–suite*
- Canal *–suite*
- - Omphalo-mésentérique ¬ *Q43.0*
- - Thyréoglosse ¬ *Q89.2*
- - Vitellin ¬ *Q43.0*
- Cinquième arc aortique ¬ *Q25.4*
- Circulation fœtale ¬ *P29.3*
- Cloaque ¬ *Q43.7*
- Convolution de l'arc aortique ¬ *Q25.4*
- Familiale de l'hémoglobine fœtale-bêta-thalassémie ¬ Syndrome de *D56.4*
- Foramen ovale ¬ Perméabilité ou *Q21.1*
- Héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF] ¬ *D56.4*
- Kyste de la poche de Blake ¬ *Q03.1*
- Lanugo ¬ *Q84.2*
- Lobulations spléniques ¬ *Q89.08*
- Ostium
- - Primum (type I) ¬ *Q21.2*
- - Secundum (type II) ¬ Perméabilité ou *Q21.1*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Position occipito
- - Iliaque ¬ Dystocie due à la *O64.0*
- - Postérieure ¬ Dystocie due à la *O64.0*
- - Sacrée ¬ Dystocie due à la *O64.0*
- - Transverse ¬ Dystocie due à la *O64.0*
- Réflexes tendineux ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: *G11.1*
- Tronc artériel ¬ *Q20.0*
- Veine
- - Cardinale postérieure gauche ¬ *Q26.8*
- - Cave supérieur gauche ¬
- - - *Q26.1*
- - - Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec communication interatriale, séquence de Robin et *Q87.8*

Persistant
v. Type de maladie

Personnalité
- Affective ¬ *F34.0*
- Agressive ¬ (Trouble de la) *F60.30*
- Amorale ¬ *F60.2*
- Anankastique ¬ *F60.5*
- Antisociale ¬ *F60.2*
- Anxieuse [évitante] ¬ *F60.6*
- Asociale ¬ *F60.2*
- Captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment ¬ Modification de la *F62.0*
- Comportement
- - A une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision ¬ Trouble organique de la *F07.9*
- - Adulte
- - - Sans précision ¬ Trouble de la *F69*
- - - ¬ trouble
- - - - *F68*
- - - - Précisés de la *F68.8*

Personnalité *–suite*
- Comportement *–suite*
- - Affection lésion dysfonctionnement cérébral ¬ trouble
- - - *F07*
- - - Organiques de la *F07.8*
- Compulsive ¬ (Trouble de la) *F60.5*
- Conduite d'échec ¬ Trouble de la *F60.7*
- Cycloïde ¬ *F34.0*
- Cyclothymique ¬ *F34.0*
- Dépendant
- - Asthénique) ¬ Trouble de la *F60.7*
- - ¬ *F60.7*
- Dépressive ¬ *F34.1*
- Désastres ¬ Modification de la *F62.0*
- Dyssociale ¬ *F60.2*
- Émotionnellement labile
- - Type
- - - Borderline ¬ *F60.31*
- - - Impulsif ¬ *F60.30*
- - ¬ *F60.3*
- Excentrique ¬ *F60.8*
- Expansive-paranoïaque ¬ (Trouble de la) *F60.0*
- Expérience
- - Camp de concentration ¬ Modification de la *F62.0*
- - Catastrophe ¬ Modification durable de la *F62.0*
- Exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la *F62.0*
- Fanatique ¬ (Trouble de la) *F60.0*
- Histrionique ¬ *F60.4*
- Hystérique ¬ (Trouble de la) *F60.4*
- Immature ¬ *F60.8*
- Inadéquate ¬ Trouble de la *F60.7*
- Irritable (explosive) ¬ (Trouble de la) *F60.30*
- Liée à un syndrome algique chronique ¬ Modification durable de la *F62.80*
- Maladie psychiatrique ¬ Modification durable de la *F62.1*
- Multiple ¬ (Trouble de) *F44.81*
- Narcissique ¬ *F60.8*
- Non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales ¬ Modification durable de la *F62*
- Paranoïaque ¬ Trouble
- - *F60.0*
- Passive
- - Agressive ¬ *F60.8*
- - ¬ Trouble de la *F60.7*
- Pathologique SAI ¬ *F60.9*
- Pseudopsychopathique organique ¬ *F07.0*
- Psycho-infantile ¬ (Trouble de la) *F60.4*
- Psycho-névrotique ¬ *F60.8*
- Psychopathique ¬ *F60.2*
- Quérulente ¬ (Trouble de la) *F60.0*

Personnalité *–suite*
- Sans précision ¬
- - Modification durable de la *F62.9*
- - Trouble de la *F60.9*
- Schizoïde ¬ *F60.1*
- Schizotypique ¬ *F21*
- Sensitive paranoïaque ¬ (Trouble de la) *F60.0*
- Sociopathique ¬ *F60.2*
- Torture ¬ Modification de la *F62.0*
- Troubles de la personnalité ¬ Troubles mixtes de la *F61*
- Type «haltlose» ¬ Trouble de la *F60.8*
- ¬
- - Accentuation de certains traits de la *Z73*
- - Modification durable
- - - *F62.8*
- - - *F62.88*
- - Trouble
- - - Mixtes de la personnalité et autres troubles de la *F61*
- - - Organique de la *F07.0*
- - - Spécifiques de la *F60.8*

Personne
- Âgée ¬ Tendance aux chutes chez la *R29.6*
- Atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une *Z29.0*
- Attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté ¬ *Z75.8*
- Bonne santé accompagnant un sujet malade ¬ *Z76.3*
- Consultant pour le compte d'un tiers ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- Dépendante pendant un congé de ses proches ¬ Prise en charge d'une *Z75.8*
- Donne soin
- - Sans précision ¬ Difficulté liée à une dépendance envers la *Z74.9*
- - ¬ difficulté lié dépendance envers
- - - *Z74*
- - - *Z74.8*
- Léser ou de tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre *Y09.9!*
- Vivant seule ¬ *Z60*

Perstans ¬ Infection à Mansonella: *B74.4*

Perte
- Appétit
- - Psychogène ¬ *F50.8*
- - ¬ *R63.0*
- Auditif
- - Bruit ¬ *H83.3*
- - Brutale SAI ¬ *H91.2*
- Audition
- - Conduction SAI ¬ *H90.2*
- - Neurosensorielle SAI ¬ *H90.5*

Perte *–suite*
- Audition *–suite*
- - Ototoxicité ¬ *H91.0*
- - Sans précision ¬ *H91.9*
- - ¬ Autres *H91*
- Connaissance
- - 30 minute
- - - 24 heures lors d'un traumatisme crânio-cérébral ¬ *S06.9, S06.71!*
- - - Lors d'un traumatisme crânio-cérébral ¬ *S06.9, S06.70!*
- - Coma lors traumatisme crânio-cérébral
- - - 30 minute
- - - - 24 heures ¬ *S06.71!*
- - - - ¬ *S06.70!*
- - - Durée non précisée ¬ *S06.79!*
- - - Plus 24 heure
- - - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ *S06.72!*
- - - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ *S06.73!*
- - Lors traumatisme crânio-cérébral ¬
- - - *S06.7!*
- - - *S06.9, S06.79!*
- - Plus 24 heure
- - - Retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un traumatisme crânio-cérébral ¬ *S06.9, S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un traumatisme crânio-cérébral ¬ *S06.9, S06.73!*
- - ¬ *R55*
- Conscience SAI ¬ *R40.2*
- Cutané
- - Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec *L89.1*
- - SAI ¬ Ulcère [escarre] de pression avec *L89.1*
- Dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée ¬ *K08.1*
- Désir sexuel ¬ Absence ou *F52.0*
- Emploi ¬ Menace de *Z56*
- Entérales de protéines ¬ *K92.8*
- Estime de soi pendant l'enfance ¬ Evénements ayant entraîné la *Z61*
- Fonction du labyrinthe ¬ *H83.2*
- Greffe de peau ¬ Rejet/ *T86.52*
- Hydrique ¬ Épuisement dû à la chaleur avec *T67.3*
- Hydrosodées par la chaleur ¬ Syndrome de *T67.8*
- Irréversible de la fonction cérébrale ¬ *G93.88*
- Isolée de magnésium par les reins ¬ *E83.4*
- Membre
- - Intervention chirurgicale ¬ *Z89*
- - Post-traumatique ¬ *Z89*
- Partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique ¬ *Z90*
- Partielle des osselets ¬ *H74.3*

Perte *–suite*
- Poids
- - Anormale ¬ *R63.4*
- - Chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou affaissée: après une *L98.7*
- - ¬
- - - Affaissement de la peau du visage après une *L98.7*
- - - Anorexie mental
- - - - Mesures de *F50.01*
- - - - Sans mesures de *F50.00*
- - - Maladie due au VIH avec *B22, R64*
- Précisées de l'audition ¬ Autres *H91.8*
- Protéines ¬ Entéropathie avec *K90.4*
- Relation affective pendant l'enfance ¬ *Z61*
- Sang
- - Chronique) ¬ Anémie par carence en fer secondaire à une *D50.0*
- - Fœtal
- - - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ *P50.0*
- - - Niveau de la section du cordon d'un jumeau ¬ *P50.5*
- - - Origine placentaire ¬ *P50.2*
- - - Rupture du cordon ¬ *P50.1*
- - - Sans précision ¬ *P50.9*
- - - ¬
- - - - *P50*
- - - - *P50.8*
- - - - Anémie congénitale par *P61.3*
- Sel
- - Eau) ¬ Prostration due à la chaleur avec *T67.4*
- - ¬
- - - Épuisement dû à la chaleur avec *T67.4*
- - - Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase classique avec *E25.00*
- - - Syndrome adrénogénital avec *E25.0*
- Subite de la vision ¬ *H53.1*
- Tissu intra-oculaire ¬ Lacération
- - Oculaire sans protrusion ou *S05.3*
- - Rupture oculaires avec protrusion ou *S05.2*
- Voix ¬ *R49.1*

Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé- *M91.1*

Perthes-Jüngling ¬ Ostéite de *D86.8*

Pertrochantérienne ¬ Fracture du trochanter: *S72.11*

Perturbation
- Activité et de l'attention ¬ *F90.0*
- Iris et du corps ciliaire ¬ Autres adhérences et *H21.5*
- Physiologiques et à des facteurs physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés associés à des *F59*
- Psychologique ¬
- - Hyperphagie associée à d'autres *F50.4*

Perturbation *–suite*
- Psychologique ¬ *–suite*
- - Vomissements associés à d'autres *F50.5*
Pertussis ¬ Coqueluche à Bordetella *A37.0*
Peruana ¬ Verruga *A44.1*
Pes
- Planus] (acquis) ¬ Pied plat [*M21.4*
- Transversus acquis ¬ *M21.63*
Pessaire
- Contraceptif (intra-utérin) ¬ *Z97.8*
- ¬ Ulcère du vagin dû à un *N89.8*
Peste
- Abortive ¬ *A20.8*
- Asymptomatique ¬ *A20.8*
- Bubonique ¬ *A20.0*
- Cutanée ¬ *A20.1*
- Méningée ¬ *A20.3†, G01**
- Mineure ¬ *A20.8*
- Pulmonaire ¬ *A20.2*
- Sans précision ¬ *A20.9*
- Septicémique ¬ *A20.7*
- ¬
- - *A20*
- - Formes de *A20.8*
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.3*
Pesticide
- Sans précision ¬ Effet toxique: *T60.9*
- ¬
- - Effet toxique
- - - *T60*
- - - *T60.8*
- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- - Intoxication par *T60.9*
Pestis
- Yersinia pestis] ¬ infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. *A20*
- ¬ infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. pestis [Yersinia *A20*
Pétéchies
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- ¬ *R23.3*
Peter ¬ Anomalie de *Q13.4*
Peters plus ¬ Syndrome de *Q13.4*
Peters-nanisme ¬ Syndrome d'anomalie de *Q13.4*
Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire] ¬ Poïkilodermie généralisée type *L94.5*
Péthidine ¬ *T40.4*
Pétreux ¬
- Suppuration aiguë de l'os *H70.2*
- Syphilis tardive de l'os *A52.7†, M90.28**
Pétrole
- Lampant] ¬ Kérosène [*T52.0*
- ¬
Pétrole *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Effet toxique: Produits dérivés du *T52.0*
- - Ether de *T52.0*
Pétrosite] ¬ Apexite [*H70.2*
Petty-Laxova-Wiedemann ¬ Syndrome de *E34.8*
Peur
- Dysmorphie corporelle ¬ *F45.2*
- ¬ Réaction de *F41.1*
Peutz-Jeghers ¬ Syndrome de: *Q85.8*
PEX [glaucome pseudo-exfoliatif] ¬ Glaucome *H40.1*
PEX10 ¬ Ataxie autosomique récessive par déficit en *G11.8*
Peyronie ¬ Maladie de La *N48.6*
Pfaundler-Hurler ¬ Syndrome de: *E76.0*
Pfeiffer ¬
- Maladie de *B27*
- Syndrome de *Q87.0*
Pfeiffer-Palm-Teller ¬ Syndrome de *Q87.1*
PGM3 ¬ Anomalie congénitale de la glycosylation associée à *E77.8*
Ph1) positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], chromosome Philadelphie (*C92.1*
PHACE ¬ Syndrome *Q28.88*
Phacoanaphylactique ¬ Uvéite *H20.2*
Phacocèle [hernie du cristallin] ¬ *H27.8*
Phacomatose
- Cesioflammea ¬ *Q85.8*
- Cesiomarmorata ¬ *Q85.8*
- Non classé ¬
- - *Q85*
- - *Q85.8*
- Pigmento-kératosique ¬ *Q85.8*
- Pigmento-vasculaire
- - Type
- - - II ¬ *Q85.8*
- - - III ¬ *Q85.8*
- - - V ¬ *Q85.8*
- - ¬ *Q85.8*
- Sans précision ¬ *Q85.9*
- Spilorosea ¬ *Q85.8*
Phaeohyphomycosique
- Cerveau ¬ Abcès *B43.1*
- Sous-cutanés ¬ Abcès et kyste *B43.2*
- ¬ Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès *B43*
Phagédénique ¬ Pyodermite *L88*
Phagocytes mononucléés ¬ Histiocytoses de *D76.1*
Phakolitique ¬ Glaucome *H40.5*
Phalange
- Distal ¬ Fracture
- - Doigt: *S62.63*
- - Pouce: *S62.52*
Phalange *–suite*
- Knuckle pads] ¬ Coussinet des *M72.1*
- Médiane ¬ Fracture d'un autre doigt: *S62.62*
- Proximal ¬ Fracture
- - Doigt: *S62.61*
- - Pouce: *S62.51*
- SAI ¬ Coalescence des *Q70.9*
- Surnuméraire ¬ *Q74.8*
- ¬
- - Pouce à trois *Q74.0*
- - Syndrome de déficience intellectuelle sévère-épilepsie-anomalies anales-hypoplasie des *Q87.8*
Phalangien
v.a. métatarsophalangien
- Idiopathique ¬ Acroostéolyse *M89.58*
Phanères
- SAI ¬
- - Anomalie SAI des téguments/ *Q84.9*
- - Déformation SAI des téguments/ *Q84.9*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale de la peau et des *Q84.9*
- ¬ malformation congénital
- - Peau et des *Q84*
- - Précisées de la peau et des *Q84.8*
Pharyngé
- Diphtérique ¬ Paralysie *A36.0†, G99.8**
- ¬
- - Diphtérie *A36.0*
- - Poche *Q38.7*
Pharyngien ¬
- Amygdale
- - *C11.1*
- - *D10.6*
- Récessus *C11.2*
- Tumeur
- - Bénigne: Canal cranio- *D35.3*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Canal cranio- *D44.4*
- - Maligne: Tractus cranio- *C75.2*
Pharyngite
- Aigu
- - Gangréneuse ¬ *J02.9*
- - Infectieuse SAI ¬ *J02.9*
- - Micro-organismes précisés ¬ *J02.8*
- - SAI ¬ *J02.9*
- - Sans précision ¬ *J02.9*
- - Suppurée ¬ *J02.9*
- - Ulcéreuse ¬ *J02.9*
- - ¬
- - - *J02*
- - - Laryngo- *J06.0*
- Chronique
- - Atrophique ¬ *J31.2*
- - Granuleuse ¬ *J31.2*
- - Hypertrophique ¬ *J31.2*

Pharyngite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - ¬
- - - *J31.2*
- - - Rhinite, rhinopharyngite et *J31*
- Cytomégalovirus ¬ *J02.8, B97.8!*
- Fusospirochètes ¬ *A69.1*
- Gonococcique ¬ *A54.5*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.1*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: *J10.1*
- Lymphonodulaire à entérovirus ¬ *B08.8*
- Pneumocoques ¬ *J02.8, B95.3!*
- Staphylocoques ¬ *J02.8, B95.8!*
- Streptocoques ¬ *J02.0*
- Syphilitique congénital précoce ¬
- - *A50.0*
- - *A50.0†, J99.8**
- Vésiculaire due à un entérovirus ¬ *B08.5*
- Virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09, U69.21!*
- - Herpès ¬ *B00.2*
- - Influenza
- - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] avec *J10.1*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*

Pharyngo
- Amygdalite due au virus de l'herpès ¬ Gingivo-stomatite et *B00.2*
- Laryngé de l'oropharynx ¬ Carrefour *C10.8*

Pharyngo-cervico-brachial du syndrome de Guillain-Barré ¬ Variant *G61.0*

Pharyngo-conjonctivale épidémique ¬ Fièvre *B30.2†, H13.1**

Pharyngo-conjonctivite
- Viral ¬
- - *B30.2*
- - *B30.2†, H13.1**
- ¬ *B30.2†, H13.1**

Pharynx
- Œsophage cervical
- - Œsophage cervical ¬ Plaie ouverte avec atteinte du *S11.22*
- - Pharynx et de l'œsophage cervical: Pharynx ¬ Plaie ouverte avec atteinte du *S11.21*
- - ¬ Plaie ouverte avec atteinte du *S11.2*
- Rhinopharynx ¬
- - Kyste du *J39.2*
- - Œdème du *J39.2*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q38.8*
- Sans précision ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D10.9*
- - Maligne: *C14.0*

Pharynx *–suite*
- Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du *C14*
- ¬
- - *S10.0*
- - Abcès du *J39.1*
- - Blessure
- - - *S19.88*
- - - *S19.9*
- - Brûlure de la bouche et du *T28.0*
- - Cancer de la paroi postérieure du *C14.0*
- - Carcinoma in situ: Lèvre, cavité buccale et *D00.0*
- - Corps étranger dans le *T17.2*
- - Corrosion de la bouche et du *T28.5*
- - Diverticule du *Q38.7*
- - Gomme du *A52.7†, J99.8**
- - Infection
- - - Chlamydia du *A56.4*
- - - Phlegmoneuse du *J39.1*
- - Maladies du *J39.2*
- - Malformation congénital
- - - *Q38.8*
- - - Langue, de la bouche et du *Q38*
- - Phlegmon du *J39.1*
- - Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: *S11.21*
- - Spasme hystérique du *F45.33*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne de la bouche et du *D10*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et *D37.0*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du *C14.8*

Phase
- 1 ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.11*
- 2 ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.12*
- 3 ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.13*
- 4 ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.14*
- Actif
- - Trachome ¬ *A71.1*
- - Travail ¬ Arrêt de la *O62.1*
- Critique
- - 4 jours
- - - 7 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: *D70.13*
- - - ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: *D70.10*
- - 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: *D70.14*
- - 10 à moins de 20 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie: *D70.11*

Phase *–suite*
- Critique *–suite*
- - 20 jours ou plus ¬ Agranulocytose et neutropénie: *D70.12*
- Immunotolérance ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta: *B18.11*
- Initiale du trachome ¬ *A71.0*
- Latence ¬ Inertie utérine pendant la *O62.0*
- Sommeil ¬ Syndrome de retard des *G47.2*
- Suivi ¬ Lacération due à un avortement, en *O08.6*

PHAVER ¬ Syndrome *Q87.8*

Phénobarbital ¬ Embryopathie au *Q86.88*

Phénol
- Homologues du phénol ¬ Effet toxique: *T54.0*
- ¬ Effet toxique: Phénol et homologues du *T54.0*

Phénomène
- Embrasement thérapeutique (flare phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ *T88.7*
- Marcus Gunn ¬ *Q07.8*
- Ortolani ¬ *R29.4*
- Rappel d'irradiation ¬ *T78.8*
- Secondaire) de Raynaud ¬ *I73.0*

Phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ Phénomène d'embrasement thérapeutique (flare *T88.7*

Phénothiazine ¬ Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la *T43.3*

Phénotype
- Féminin
- - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des chromosomes sexuels, *Q97*
- - Sans précision ¬ Anomalie des chromosomes sexuels, *Q97.9*
- - ¬ Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, *Q97.8*
- Masculin
- - Caryotype 46,XX ¬ Autre *Q98.3*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des chromosomes sexuels, *Q98*
- - Sans précision ¬ Anomalie des chromosomes sexuels, *Q98.9*
- - ¬ Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, *Q98.8*

Phénoxyéthanol ¬ Hypersensibilité au 2- *T78.4*

Phénylalanine hydroxylase ¬ Déficit en *E70.1*

Phénylcétonurie
- Classique ¬ *E70.0*
- Maternelle ¬ *E70.1*
- Modérée ¬ *E70.1*
- Type 2 ¬ *E70.1*
- ¬ *E70.1*

Phénylcétonurique ¬ Embryopathie *E70.1*

Phénylhydantoïne ¬ Embryofœtopathie à la *Q86.1*

Phenylpyruvica ¬ Oligophrenia *E70.0*

Philadelphie (Ph1) positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], chromosome *C92.1*

Phimosis et paraphimosis ¬ Hypertrophie du prépuce, *N47*

PhK ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Phlébectasie

- Congénitale ¬ *Q27.4*
- Diffuse réelle ¬ *Q27.4*
- Membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée ¬ *I83.9*

Phlébite

- Bleue ¬ *I80.28*
- Consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion ¬ *T80.1*
- Gestationnelle SAI ¬ *O22.9*
- Ombilicale ¬ *I80.88*
- Profond
- - Cuisse ¬ *I80.28*
- - Jambe ¬ *I80.28*
- Puerpérale SAI ¬ *O87.9*
- Sein ¬ *I80.88*
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Suppurée ¬ *I80*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I98.8**
- Thrombophlébite
- - Intracrâniennes et intrarachidiennes ¬ *G08*
- - Intrarachidiennes, d'origine non pyogène ¬ *G95.18*
- - Localisation
- - - Non précisée ¬ Thrombose, *I80.9*
- - - ¬ Thrombose, *I80.88*
- - Membres inférieurs, sans précision ¬ Thrombose, *I80.3*
- - Vaisseaux profonds des membres inférieurs ¬ Thrombose, *I80.28*
- - Veine
- - - Axillaire ¬ Thrombose, *I80.81*
- - - Basilaire ¬ Thrombose, *I80.80*
- - - Céphalique ¬ Thrombose, *I80.80*
- - - Fémorale ¬ Thrombose, *I80.1*
- - - Pelviennes ¬ Thrombose, *I80.20*
- - - Profondes des membres supérieurs ¬ Thrombose, *I80.81*
- - - Sous-clavière ¬ Thrombose, *I80.81*
- - - Superficiel membre
- - - - Inférieurs ¬ Thrombose, *I80.0*
- - - - Supérieurs ¬ Thrombose, *I80.80*
- - ¬ Thrombose, *I80*
- Ulcéreuse profonde du membre inférieur ¬ *I80.28*
- Veine
- - Hépatique ¬ *I80.88*
- - Poplitée ¬ *I80.28*
- - Porte ¬ *K75.1*

Phlébopathie

- Gestationnelle SAI ¬ *O22.9*

Phlébopathie *–suite*

- Puerpérale SAI ¬ *O87.9*

Phlébothrombose profond

- Cours
- - Grossesse ¬ *O22.3*
- - Puerpéralité ¬ *O87.1*
- Cuisse ¬ *I80.28*
- Extrémité inférieure ¬ *I80.28*
- Jambe ¬ *I80.28*
- Membre inférieur ¬ *I80.28*

Phlébotome ¬ Fièvre à *A93.1*

Phlegmon

- Abcès
- - Bouche
- - - Sans autre précision ¬ *K12.29*
- - - ¬ *K12.2*
- - Buccal ¬ Autres *K12.28*
- Bouche (plancher) ¬ *K12.20*
- Clostridium ¬ *A48.0*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.2*
- Doigt
- - Orteils ¬ *L03.0*
- - ¬ *L03.01*
- Éosinophiles [Wells] ¬ *L98.3*
- Face ¬ *L03.2*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Localisations ¬ *L03.8*
- Membre s
- - Inférieure(s) ¬ *L03.11*
- - Supérieure(s) ¬ *L03.10*
- Nez et de la cloison nasale ¬ *J34.0*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Orteils ¬ *L03.02*
- Parties d'un membre ¬ *L03.1*
- Pelvien
- - Aigus ¬ Paramétrite et *N73.0*
- - Chroniques ¬ Paramétrite et *N73.1*
- - Femme précisé aigu ¬ *N73.0*
- - Sans précision ¬ Paramétrite et *N73.2*
- Périamygdalien ¬ *J36*
- Pharynx ¬ *J39.1*
- Régions anale et rectale, avec ou sans fistule ¬ *K61*
- Sans précision ¬ *L03.9*
- Tronc ¬ *L03.3*
- ¬ *L03*

Phlegmoneuse

- Aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ Dacryocystite (*H04.3*
- Conduit auditif externe ¬ Cellulite *H60.1*
- Oreille externe ¬ Cellulite *H60.1*
- Pavillon de l'oreille ¬ Cellulite *H60.1*
- Pharynx ¬ Infection *J39.1*

Phlyctène

- Non dues à la chaleur) multiples SAI ¬ *T00.9*
- ¬
- - Formation tuberculeuse de *A18.5†, H19.2**
- - Ulcère [escarre] de pression avec *L89.1*

Phlycténulaire

- Tuberculeuse ¬ Kératoconjonctivite *A18.5†, H19.2**
- ¬ Kératoconjonctivite: *H16.2*

Phobie

- S
- - Animaux ¬ *F40.2*
- - Simple ¬ *F40.2*
- SAI ¬ *F40.9*
- Sociales ¬ *F40.1*
- Spécifiques (isolées) ¬ *F40.2*

Phobique

- Enfance ¬ Trouble anxieux *F93.1*
- SAI ¬ État *F40.9*
- Sans précision ¬ Trouble anxieux *F40.9*
- ¬
- - Réaction *F41.1*
- - Trouble anxieux
- - - *F40*
- - - *F40.8*

Phocomélie

- Membre(s) non précisé(s) ¬ *Q73.1*
- SAI ¬ *Q73.1*

Phonocardiogramme ¬ Anomalies (de): *R94.3*

Phonologique ¬ Trouble: du développement (de): *F80.0*

Phosphatase
v.a. glucose-6-phosphatase

- Acide ¬
- - Anomalies des taux de: *R74.8*
- - Déficit en *E83.38*
- Alcaline ¬ Anomalies des taux de: *R74.8*
- Complexe pyruvate déshydrogénase ¬ Déficit en *E74.4*
- Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme du phosphore et de la *E83.39*
- ¬
- - Anomalie métabolisme phosphore
- - - *E83.3*
- - - *E83.38*
- - Déficit en 3-phosphosérine *E72.8*
- - Rachitisme lors de carence en *E83.38†, M90.89**

Phosphate
v.a. carbamoyl-phosphate
v.a. dolichyl-phosphate
v.a. fructose-1-phosphate
v.a. galactose-1-phosphate
v.a. glucose-6-phosphate
v.a. pentose-phosphate

- Isomérase ¬ Anémie (due à): déficit en: triose- *D55.2*
- Oxydase ¬ Déficit en pyridoxamine 5'- *G40.8*

Phosphate *–suite*
- Pyridoxal ¬ Convulsions sensibles au *G40.8*
- ¬ Hypotonie et ichtyose par déficit en dolichol *E77.8*

Phosphaté ¬
- Diabète *E83.30*
- Tubulopathies avec fuite *N25.0*

Phosphatides ¬ Thésaurismose des *E75.2*

Phosphoénolpyruvate
- Carboxykinase ¬ Déficit en *E74.4*
- ¬ Déficit en: carboxykinase *E74.4*

Phosphoéthanolaminurie ¬ *E83.38*

Phosphofructokinase
- Musculaire ¬
- - Déficit en *E74.0*
- - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- ¬ Déficit en *E74.0*

Phosphoglucomutase
- 1 ¬ Déficit en *E74.0*
- ¬ GSD par déficit en *E74.0*

Phosphoglucose isomérase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.2*

Phosphoglycérate
- Kinase ¬ GSD par déficit en *E74.0*
- Kinase 1 ¬ Maladie glycogénique par déficit en *E74.0*
- Mutase ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0†, G73.6**

Phosphoglycerate déshydrogénase
- Forme infantile/juvénile ¬ Déficit en 3- *E72.8*
- ¬ Déficit en 3- *E72.8*

Phosphoglycéromutase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.2*

Phospholipase A2 ¬ Neurodégénérescence associée à la *G31.88*

Phospholipides ¬ Lithiase biliaire à faible niveau de *K80.80*

Phospholipidose ¬ *E75.5*

Phosphomannomutase 2 ¬ Déficit en *E77.8*

Phosphomannose isomérase ¬ Déficit en *E77.8*

Phosphore
- Composés ¬ Effet toxique: *T57.1*
- Phosphatase
- - Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme du *E83.39*
- - ¬ anomalie métabolisme
- - - *E83.3*
- - - *E83.38*

Phosphorés et carbamates ¬ Effet toxique: Insecticides organo- *T60.0*

Phosphoribosylpyrophosphatase synthétase ¬ Activité accrue de la *E79.8*

Phosphoribosylpyrophosphate
- Synthétase ¬ Déficit en *E79.8*
- Transférase ¬ Déficit en *E79.8*

Phosphoribosyltransférase
- Grade

Phosphoribosyltransférase *–suite*
- Grade *–suite*
- - I ¬ Déficit en hypoxanthine-guanine *E79.8*
- - IV ¬ Déficit en hypoxanthine guanine *E79.1*
- ¬ Déficit
- - Adénosine *E79.8*
- - Partiel en hypoxanthine guanine *E79.8*

Phosphorylase
- Hépatique ¬
- - Déficit en *E74.0*
- - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- Kinase
- - Hépatique et musculaire ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - Musculaire ¬ GSD par déficit en *E74.0*
- - ¬
- - - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - - GSD par déficit en *E74.0*
- Musculaire ¬
- - Déficit en *E74.0*
- - Glycogénose par déficit en glycogène *E74.0*
- PNP] ¬ Déficit en purine nucléoside *D81.5*

Phosphorylation oxydative
- Type
- - 1 ¬ Hépatoencéphalopathie par déficit combiné de la *E88.8, K72.79!*
- - 2 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 4 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 7 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 8 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 9 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 10 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 11 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 13 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 14 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 15 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 16 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 17 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 20 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 21 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 23 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 24 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 25 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 27 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 28 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- ¬
- - Déficit combiné de la *E88.8*
- - Surdité neurosensorielle syndromique due à un déficit combiné de la *G31.81, H90.8*

Phosphosérine
- Aminotransférase ¬ Déficit en *E72.8*
- Phosphatase ¬ Déficit en 3- *E72.8*

Phosphotransférase
v.a. N-acétylglucosamine-1-phosphotransférase

Phosphotransférase *–suite*
- ¬ Déficit en dolichyl-phosphate N-acetylgalactosamine *E77.8*

Photoallergique à un médicament ¬ Réaction *L56.1*

Photocontact [dermite de breloque] ¬ Dermite de *L56.2*

Photokératite ¬ *H16.1*

Photophobie ¬ *H53.1*

Photosensible ¬ Épilepsie *G40.8*

Phototoxique à un médicament ¬ Réaction *L56.0*

Phrénique due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie du nerf *P14.2*

Phrynodermie ¬ *E50.8†, L86**

Phthirus pubis ¬ Infestation par: *B85.3*

Phtiriase
- Infestation par poux du pubis] ¬ *B85.3*
- ¬
- - Infestation
- - - Mixte, pédiculose et *B85.4*
- - - Paupières au cours de *B85.3†, H03.0**
- - Pédiculose et *B85*

Phtisie du globe oculaire ¬ *H44.5*

Phycomycose SAI ¬ *B46.9*

Phyilippinensis ¬ Infection à Capillaria *B81.1*

Phyllode
- Sein ¬ Tumeur *D48.6*
- Tumeur de Brodie] ¬ Cystosarcome *D48.6*

Physiologique
- Attendu ¬ Retard de: stade de développement *R62.0*
- Facteurs physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations *F59*
- Intense) (prolongé) SAI ¬ Ictère *P59.9*
- Psychogène SAI ¬ Dysfonctionnement *F59*
- Sans précision ¬ Retard du développement *R62.9*
- ¬
- - Retard du développement *R62*
- - Retards du développement *R62.8*

Physique
- Chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions *Z64.8*
- Infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de possibles sévices *Z61*
- Malnutrition ¬ Retard de développement *E45*
- Mental, non précisé ¬ Stress *Z73*
- Raisons psychologiques ¬ Majoration de symptômes *F68.0*
- Soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit *F68.1*
- ¬
- - Automutilation et autres blessures *Z91.8*
- - Dépistage prénatal

Physique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dépistage prénatal *–suite*
- - - Malformations par échographie et autres méthodes *Z36.3*
- - - Retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes *Z36.4*
- - Difficultés liées à l'environnement *Z58*
- - Examen périodique (annuel) (*Z00.0*
- - Facteurs psychologiques influençant une affection *F54*
- - Manque d'exercice *Z72.8*
- - Retard (de): *R62.8*
- - Sévices *T74.1*
- - Surmenage *T73.3*
- - Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs *F59*
- - Thérapies *Z50.1!*
- - Trouble mental
- - - Précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection *F06.8*
- - - Sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection *F06.9*
- - Violence *R45.6*

Phytostérolémie
- Homozygote ¬ *E75.5*
- ¬ *E78.0*

PIA] ¬ Pneumonie interstitielle aiguë [*J84.1*

Pian
- Bouba] ¬ *A66*
- Crabe) ¬ Papillomes multiples et pian plantaire humide (*A66.1*
- Cutané, moins de cinq ans après l'infection ¬ *A66.2*
- Latent ¬ *A66.8*
- Lésion
- - Articulaire ¬ *A66.6†, M14.89**
- - Osseuse ¬ *A66.6†, M90.29**
- Mère ¬ *A66.0*
- Plantaire humide (pian-crabe) ¬ Papillomes multiples et *A66.1*
- Précoce tardif ¬
- - Hydarthrose du *A66.6*
- - Nodule du *A66.6*
- - Ostéite du *A66.6*
- - Périostite (hypertrophique) du *A66.6*
- Récent
- - Cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ *A66.2*
- - ¬ Framboeside du *A66.2*
- Sans
- - Précision ¬ *A66.9*
- - Signes cliniques, avec sérologie positive ¬ *A66.8*
- Tardif
- - Nodulaire (ulcéré) ¬ *A66.4*

Pian *–suite*
- Tardif *–suite*
- - ¬
- - - Gomme osseuse du *A66.6*
- - - Ostéite ou périostite gommeuse du *A66.6*
- ¬
- - *A66*
- - Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au *A66.3*
- - Lésion
- - - Cutanées précoces du *A66.2*
- - - Initiales du *A66.0*
- - Manifestations du *A66.7*

Pianides plantaires hyperkératosiques et trichophytoïdes ¬ *A66.3*

Pianique
- Plantaire ou palmaire ¬ Papillome *A66.1*
- ¬
- - Chancre *A66.0*
- - Gommes et ulcères *A66.4*
- - Hyperkératose *A66.3*
- - Lésion
- - - Muqueuses *A66.7*
- - - Ostéo-articulaires *A66.6*
- - Nodules juxta-articulaires *A66.7*

Pianome ¬ *A66.1*

Pica
- Adulte ¬ *F50.8*
- Nourrisson et de l'enfant ¬ *F98.3*

Piccardi
v. Little-Piccardi-Lassueur

Pick
v.a. Niemann-Pick
- ¬
- - Démence de la maladie de *G31.0†, F02.0**
- - Maladie de *G31.0*
- - Splénomégalie de Niemann *E75.2*

Pickwick ¬ Syndrome
- *E66.2*
- *E66.29*

Picotements ¬ *R20.2*

Pics centro-temporaux [Rolando] ¬ Épilepsie bénigne à *G40.08*

Piébaldisme ¬ *E70.3*

Pied
v.a. avant-pied
v.a. main-pied-utérus
- 2ème degré sans précision ¬
- - Brûlure
- - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.20*
- - - Région malléolaire et du *T25.20*
- - Corrosion
- - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.60*
- - - Région malléolaire et du *T25.60*
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.81*

Pied *–suite*
- Affaissé
- - Acquis ¬ *M21.63*
- - Valgus acquis ¬ *M21.63*
- Articulation
- - Médiotarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.32*
- - Tarsométatarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.33*
- Athlète ¬ *B35.3*
- Bifide ¬ *Q72.7*
- Cheville, unilatérale ¬ Absence acquise de *Z89.4*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.84*
- Creux
- - Acquis ¬
- - - *M21.60*
- - Valgus acquis ¬ *M21.63*
- - ¬ *Q66.7*
- Degré
- - 2a ¬
- - - Brûlure
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.20*
- - - - Région malléolaire et du *T25.20*
- - - Corrosion de la région malléolaire et du *T25.60*
- - 2b ¬
- - - Brûlure
- - - - Hanche
- - - - - Jambe, sauf région malléolaire et *T24.21*
- - - - - Jambe, sauf région malléolaire et *T24.61*
- - - - Région malléolaire et du *T25.21*
- - - Corrosion
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.60*
- - - - Région malléolaire et du *T25.61*
- - Non précis ¬
- - - Brûlure
- - - - Cheville et du *T25.0*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.0*
- - - Corrosion
- - - - Cheville et du *T25.4*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.4*
- Équin, acquis ¬ *M21.62*
- Étalé en eventail, acquis ¬ *M21.63*
- Exception orteil lymphangite ¬
- - Infection purulente du *L03.11*
- - Inflammation purulente du *L03.11*
- Fendus-surdité ¬ Syndrome de mains et *Q87.2*
- Flexion dorsale, acquis ¬ *M21.68*

Pied *–suite*

- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.82*
- Immersion ¬ Main et *T69.0*
- Madura
- - Mycosique ¬ *B47.0*
- - SAI ¬ *B47.9*
- Main
- - Bouche ¬ Syndrome *B08.4*
- - ¬ Symbrachydactylie des *Q73.8*
- Membre inférieur [tout niveau, sauf le pied] ¬ Amputation traumatique d'un *T05.4*
- Métatarsien (os), articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.34*
- Metatarsus varus, acquis ¬ *M21.68*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la cheville et du *T34.8*
- Niveau
- - Cheville ¬ Amputation traumatique du *S98.0*
- - Non précisé ¬ Amputation traumatique du *S98.4*
- Orteil
- - S) ¬ Absence congénitale du *Q72.3*
- - ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la cheville, *R02.07*
- Os) carpe, articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.31*
- Partie non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.30*
- Plat
- - Congénital ¬ *Q66.5*
- - Contracté ¬ *Q66.5*
- - Pes planus] (acquis) ¬ *M21.4*
- - Spastique (en valgus) ¬ *Q66.5*
- - Valgus acquis ¬
- - - *M21.61*
- - - *M21.63*
- Présent ¬ Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, *Q72.1*
- Pronation ¬ *M21.68*
- SAI ¬
- - Écrasement du *S97.8*
- - Plaie ouverte
- - - *S91.3*
- - - Malléole et du *S91*
- Sans précision ¬
- - Anomalie morphologique congénitale du *Q66.9*
- - Fracture du *S92.9*
- - Lésion traumatique
- - - Cheville et du *S99.9*
- - - Superficielle de la cheville et du *S90.9*

Pied *–suite*

- Sans précision ¬ *–suite*
- - Polydactylie (main ou *Q69.9*
- SAP ¬ *L03.11*
- Sauf la cheville ¬ Fracture du *S92*
- Scaphoide du tarse] ¬ Fracture :Os naviculaire du *S92.21*
- Seuls] ¬ jambe [toute partie, sauf cheville et *T24*
- Tombant (acquis) ¬ Poignet ou *M21.3*
- Tranchées ¬ *T69.0*
- Valgus ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du *Q66.6*
- Varus ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du *Q66.3*
- ¬
- - Absence congénitale de la jambe et du *Q72.2*
- - Amputation traumatique
- - - Cheville et du *S98*
- - - Deux *T05.3*
- - - Orteil(s) et d'autres parties du *S98.3*
- - - Parties du *S98.3*
- - - Pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le *T05.4*
- - Anomalie
- - - Congénitale du *Q74.2*
- - - Morphologiques congénitales du *Q66.8*
- - Brûlure
- - - Corrosion
- - - - Cheville et du *T25*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24*
- - - Premier degré
- - - - Cheville et du *T25.1*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.1*
- - - Second degré
- - - - Cheville et du *T25.2*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.2*
- - - Troisième degré
- - - - Cheville et du *T25.3*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.3*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: cheville et *T84.16*
- - Contusion de parties autres et non précisées du *S90.3*
- - Cor au *L84*
- - Corrosion
- - - Premier degré
- - - - Cheville et du *T25.5*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.5*
- - - Second degré
- - - - Cheville et du *T25.6*

Pied *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Corrosion *–suite*
- - - Second degré *–suite*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.6*
- - - Troisième degré
- - - - Cheville et du *T25.7*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.7*
- - Déformations acquises de la cheville et du *M21.68*
- - Dermatophytose du *B35.3*
- - Dystocie due à une présentation par les *O64.1*
- - Écrasement
- - - Cheville et du *S97*
- - - Parties de la cheville et du *S97.8*
- - Enthésopathie
- - - *M77.5*
- - - Membre inférieur, sauf le *M76.8*
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S93.6*
- - Fracture
- - - Multiples du *S92.7*
- - - Ouverte du *S92.9, S91.87!*
- - Gelure superficielle de la cheville et du *T33.8*
- - Ischémie traumatique des muscles du *T79.63*
- - Lésion
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S91.84!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S91.87!*
- - - - II
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S91.85!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S91.88!*
- - - - III
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S91.86!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S91.89!*
- - - Traumatique
- - - - Artère
- - - - - Dorsale du *S95.0*
- - - - - Plantaire du *S95.1*
- - - - Multiple
- - - - - Cheville et du *S99.7*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de la cheville et du *S96.7*
- - - - - Nerfs au niveau de la cheville et du *S94.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du *S95.7*
- - - - Muscle

Pied *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Muscle *–suite*
- - - - - Tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du *S96.2*
- - - - - Tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du *S96.1*
- - - - - Tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du *S96.0*
- - - - - Tendon non précisés, au niveau de la cheville et du *S96.9*
- - - - - Tendons au niveau de la cheville et du *S96.8*
- - - - Nerf
- - - - - Cutané sensitif au niveau de la cheville et du *S94.3*
- - - - - Niveau de la cheville et du *S94.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la cheville et du *S94.9*
- - - - - Tibial antérieur au niveau de la cheville et du *S94.2*
- - - - Précisées de la cheville et du *S99.8*
- - - - Superficiel
- - - - - Cheville et du *S90.88*
- - - - - Multiples de la cheville et du *S90.7*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du *S95.9*
- - - - - Sanguins au niveau de la cheville et du *S95.8*
- - - - Veine dorsale du *S95.2*
- - Luxation
- - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du *S93*
- - - Ouverte du *S93.30, S91.87!*
- - - Parties autres et non précisées du *S93.38*
- - Malformation
- - - *M21.68*
- - - Acquise du *M21.68*
- - Oblitération d'une artère du *I74.3*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - Cheville et du *S91*
- - - - Non précisée d'autres parties de la région malléolaire et du *S91.80*
- - - - Partie
- - - - - *S91.3*
- - - - - Malléole et du *S91.8*
- - - Ouvertes multiples de la cheville et du *S91.7*
- - Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du *S93.2*
- - Teigne du *B35.3*
- - Trichophytie du *B35.3*

Pied bot
- Asymétrique ¬ *Q66.8*

Pied bot *–suite*
- E) ou en griffe acquis(e) ¬ Main et *M21.5*
- SAI ¬
- - *Q66.0*
- - *Q66.8*
- Talus
- - Valgus ¬ *Q66.4*
- - Varus ¬ *Q66.1*
- Varus équin ¬ *Q66.0*

Piedra
- Alba] ¬ Piedra blanche [*B36.2*
- Blanche [Piedra alba] ¬ *B36.2*
- Nigra] ¬ Piedra noire [*B36.3*
- Noire [Piedra nigra] ¬ *B36.3*

Piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un *U69.10!*

Pierini ¬ Atrophodermie de Pasini et *L90.3*

Pierre
- Xanthine ¬ *E79.8†, N22.8**
- ¬ Maladie de l'homme de *M61.19*

Pierre Robin
- Anomalie facio-digitale ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Déficience intellectuelle-brachydactylie ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Isolé ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Malformation cardiaque-pied bot ¬ Syndrome
- - *Q87.8*
- - Séquence de *Q87.8*
- Oligodactylie ¬ Syndrome de séquence de *Q87.0*
- ¬ Syndrome (de): *Q87.0*

Pierson] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): symphyse pubienne [*M91.0*

Piéton ¬ Accident de *V99!*

Pigeons ¬ Maladie ou poumon des éleveurs de: *J67.2*

Pigmentaire
- Cristallin ¬ Inclusions *H26.8*
- Déficience intellectuelle-surdité-hypogénitalisme ¬ Syndrome de rétinite *Q87.8*
- Ponctuée albescente) (vitelliforme) ¬ Dystrophie: rétinienne (*H35.5*
- Rétine ¬ Hamartome combiné de l'épithélium *D31.2*
- Rétinien ¬ Décollement de l'épithélium *H35.7*
- ¬
- - Dégénérescence
- - - Iris (*H21.2*
- - - Pallidale *G23.0*
- - Dermatopathie réticulaire *Q82.4*
- - Glaucome (primitif) (résiduel): *H40.1*
- - Lichen plan *L43.8*
- - Nævus: *D22*

Pigmentaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - NARP [Syndrome de neuropathie-ataxie-rétinite *G31.81*
- - Rétinite *H35.5*
- - Syndrome
- - - Ataxie du cordon postérieur-rétinite *G11.1*
- - - Neuropathie-ataxie-rétinite *G31.81*
- - Synovite villonodulaire (*M12.2*

Pigmentation
- Conjonctive ¬ *H11.1*
- Dent
- - Extrinsèque SAI ¬ *K03.6*
- - SAI ¬ *K03.6*
- Dépôts cornéens ¬ *H18.0*
- Ferrique ¬ *L81.8*
- Gaine capillaire
- - Sans précision ¬ Anomalie de la *L67.9*
- - ¬ anomalie
- - - *L67*
- - - *L67.8*
- Intrinsèque des dents SAI ¬ *K00.8*
- Mouchetée ¬ Epidermolyse bulleuse simple avec *Q81.0*
- Rétinienne anormale ¬ Syndrome de microcéphalie-fente palatine- *Q87.8*
- Sans précision ¬ Anomalie de la *L81.9*
- Tatouage ¬ *L81.8*
- ¬
- - Anomalie
- - - *L81*
- - - Précisées de la *L81.8*
- - Syndrome de dysplasie osseuse terminale-défauts de *Q87.2*

Pigmenté
- Fixe ¬ Érythème *L27.1*
- Primaire ¬ Maladie adrénocorticale nodulaire *E24.8*
- ¬
- - Atrophie rétino-choroïdienne paraveineuse *H35.8*
- - Dermatose purpurique *L81.7*
- - Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à sphéroïdes axonaux et cellules gliales *E75.2*
- - Synovite villonodulaire *M12.29*
- - Urticaire *Q82.2*

Pigmenti ¬ Incontinentia *Q82.3*

Pigmento-kératosique ¬ Phacomatose *Q85.8*

Pigmentosum ¬
- Variant du xeroderma *Q82.1*
- Xeroderma *Q82.1*

Pigmento-vasculaire
- Type
- - II ¬ Phacomatose *Q85.8*
- - III ¬ Phacomatose *Q85.8*
- - V ¬ Phacomatose *Q85.8*

Pigmento-vasculaire *–suite*
- ¬ Phacomatose *Q85.8*
Pilaire ¬
- Kyste *L72.1*
- Lichen plano- *L66.1*
- Pityriasis rubra *L44.0*
Pileux
- Bord libre lèvre
- - Inférieure et le sillon mentolabial ¬ Peau *C44.0*
- - Supérieure et le nez ¬ Peau *C44.0*
- Non cicatricielle, sans précision ¬ Raréfaction du système *L65.9*
- ¬
- - Développement excessif du système *L68*
- - Forme non cicatriciel
- - - Précisées de raréfaction du système *L65.8*
- - - Raréfaction du système *L65*
- - Inflammation de la glande du follicule *L73.9*
- - Kyste *L72.1*
- - Nævus: *D22*
- - Tumeurs bénignes de: follicules *D23*
Pili
- Annulati ¬ *Q84.1*
- Bifurcati ¬ *L67.8*
- Multigemini ¬ *L67.8*
- Torti ¬ *Q84.1*
- Trianguli et canaliculi ¬ *Q84.1*
Pilier amygdale
- Antérieur) (postérieur) ¬ Tumeur maligne: *C09.1*
- ¬ *D10.5*
Pilocytique ¬ Astrocytome *C71.9*
Pilomatriciel ¬ Carcinome *C44.9*
Pilon tibial ¬ Fracture du *S82.5*
Pilonidal
- Abcès ¬ Sinus *L05.0*
- E ¬
- - Fistule coccygien(ne) ou *L05*
- - Kyste coccygien(ne) ou *L05*
- SAI ¬ Kyste *L05.9*
- Sans abcès ¬ Sinus *L05.9*
- ¬ Sinus *L05*
Pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs ¬ Renouvellement d'une prescription de *Z30.4*
PIN] ¬ Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la prostate [*N40*
Pince de homard ¬ Main en *Q71.6*
Pinéal
- Différenciation intermédiaire ¬ Tumeur du parenchyme *D44.5*
- Épiphyse] ¬ Dysfonctionnement de la glande *E34.8*
- ¬ Tumeur
- - Bénigne: Épiphyse [glande *D35.4*
Pinéal *–suite*
- ¬ Tumeur *–suite*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Épiphyse [glande *D44.5*
- - Maligne: Épiphyse [glande *C75.3*
- - Papillaire de la région *D44.5*
Pinéoblastome ¬ *C75.3*
Pinéocytome ¬ *D44.5*
Pingelap ¬ Cécité de *H53.5*
Pinkus ¬ Alopécie mucineuse de *L65.2*
Pinta
- Caraté ¬
- - *A67*
- - Chancre (initial) de la *A67.0*
- - Hyperkératose de la *A67.1*
- - Lésion
- - - Cutané
- - - - Achromique
- - - - - *A67.2*
- - - - - Lésions cutanées hyperchromiques de la *A67.3*
- - - - Cicatricielles de la *A67.2*
- - - - Dyschromiques de la *A67.2*
- - - Hyperchromiques de la *A67.1*
- - Papule (initiale) de la *A67.0*
- - Plaques érythémateuses de la *A67.1*
- Sans précision ¬ *A67.9*
- ¬ lésion
- - Initiales de la *A67.0*
- - Intermédiaires de la *A67.1*
- - Mixtes de la *A67.3*
- - Tardives de la *A67.2*
Pintides ¬ *A67.1*
Pipécolinémie ¬ *E72.3*
Pipécolique ¬ Acidémie *E72.3*
Pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association *U81.6!*
Piqueur ¬ Syndrome de: marteau- *T75.2*
Piqûre
- Insecte
- - Non venimeux
- - - Multiples SAI ¬ *T00.9*
- - - ¬
- - - - *W64.9!*
- - - - Lésion
- - - - - Traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé: Morsure ou *T13.03*
- - - - - Traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé: Morsure ou *T11.03*
- - - - - Traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé: Morsure ou *T09.03*
Piqûre *–suite*
- Insecte *–suite*
- - Non venimeux *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - Lésion *–suite*
- - - - - Traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée: Morsure ou *T14.03*
- - - - - Traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou *S90.83*
- - - - - Traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Morsure ou *S70.83*
- - - - - Traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou *S80.83*
- - - - - Traumatiques superficielles de l'avant-bras: Morsure ou *S50.83*
- - - - - Traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Morsure ou *S40.83*
- - - - - Traumatiques superficielles du poignet et de la main: Morsure ou *S60.83*
- - Venimeux ¬ Morsure d'animal ou *X29.9!*
- Morsure d'insecte venimeux ¬ *T63.4*
- ¬ Sensation de *R20.2*
Piriforme ¬
- Récessus *C12*
- Sténose congénitale isolée des orifices *Q30.8*
- Tumeur maligne du sinus *C12*
Piroplasmose ¬ *B60.0*
Piry ¬ Maladie virale de *A93.8*
Piscines ¬ Conjonctivite (des): *B30.1†*
Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.13*
Pitt-Hopkins ¬ Syndrome de *Q87.8*
Pituicytome ¬ *D33.0*
Pituitaire
- Isolé familial ¬ Adénome *D35.2*
- Post-partum) ¬ Nécrose *E23.0*
- SAI ¬ Insuffisance (de): staturale *E23.0*
Pityriasis
- Alba ¬ *L30.5*
- Lichénoïde
- - Chronique ¬ *L41.1*
- - Varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] ¬ *L41.0*
- Nigra ¬ *B36.1*
- Rosé de Gibert ¬ *L42*
- Rubra
- - Hebra) ¬ *L26*
- - Pilaire ¬ *L44.0*
- Streptogène ¬ *L30.5, B95.5!*
- Versicolor ¬ *B36.0*
Piussan-Lenaerts-Mathieu ¬ Syndrome de *Q87.2*
PJS ¬ *Q85.8*
PK] ¬ Anémie (due à): déficit en: pyruvate kinase [*D55.2*
PKAN ¬ *G23.0*

PKI [Pneumatose kystique intestinale] ¬ *K63.8*

PKU

- Maternelle ¬ *E70.1*
- Modérée ¬ *E70.1*

Place

- Ajustement
- - Appareil
- - - Auditif ¬ Mise en *Z46.1*
- - - Dispositifs médicaux ¬ Mise en *Z46*
- - - Orthodontique ¬ Mise en *Z46.4*
- - - Orthopédique ¬ Mise en *Z46.7*
- - - Précisés ¬ Mise en *Z46.8*
- - - Prothèse externe
- - - - Non précisé ¬ Mise en *Z44.9*
- - - - ¬
- - - - - Mise en *Z44*
- - - - - Mise en *Z44.8*
- - - Rapport avec le système nerveux et les organes des sens ¬ Mise en *Z46.2*
- - - Sans précision ¬ Mise en *Z46.9*
- - - Urinaire ¬ Mise en *Z46.6*
- - Bras artificiel (total) (partiel) ¬ Mise en *Z44.0*
- - Iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux ¬ Mise en *Z46.5*
- - Jambe artificielle (totale) (partielle) ¬ Mise en *Z44.1*
- - Lunettes et verres de contact ¬ Mise en *Z46.0*
- - Œil artificiel ¬ Mise en *Z44.2*
- - Prothèse
- - - Dentaire ¬ Mise en *Z46.3*
- - - Externe du sein ¬ Mise en *Z44.3*
- Dispositif contraceptif (intra-utérin) ¬ Mise en *Z30.1*
- Implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en *M96.6*
- Voie chirurgicale ¬ Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en *Z95.81*
- ¬ Racine dentaire laissée en *K08.3*

Placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: attente d'une famille adoptive ou d'un *Z76.2*

Placenta

- Accreta
- - Sans saignement ¬ *O43.20, O73.0*
- - ¬ *O43.20*
- Adhaerens
- - Saignement ¬ *O43.20, O72.0*
- - Sans saignement ¬ *O43.20, O73.0*
- - ¬ *O43.20*
- Amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical ¬ Lésion du *P02.1*
- Anomalie de la coagulation ¬ Décollement prématuré du *O45.0*

Placenta *–suite*

- Anormal SAI ¬ *O43.1*
- Circumvallata ¬ *O43.1*
- Cordon ombilical
- - Membranes ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le *P02*
- - Provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du *P02.3*
- Hématome rétro-placentaire] ¬ Décollement prématuré du *O45*
- Hémorragie actuel ¬
- - Descente du *O44.10*
- - Placenta avec hémorragie actuelle ¬ Placenta praevia et descente du *O44.1*
- Increta
- - Percreta ¬ *O43.21*
- - Sans saignement ¬ *O43.21, O73.0*
- Membrane
- - Sans hémorragie ¬ Rétention
- - - *O73*
- - - Partielle du *O73.1*
- - ¬ Hémorragie associée à la rétention partielle du *O72.2*
- Percreta
- - Saignement du post-partum ¬ *O43.21, O72.0*
- - Sans saignement ¬ *O43.21, O73.0*
- Praevia
- - Descente placenta
- - - Hémorragie actuelle ¬ *O44.1*
- - - Sans
- - - - Hémorragie (actuelle) ¬ *O44.0*
- - - - Précisions ¬ *O44.0*
- - Hémorragie actuelle ¬ *O44.11*
- - Sans hémorragie (actuelle) ¬ *O44.01*
- - ¬
- - - *O44*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par *P02.0*
- SAI ¬ Rétention du *O72.0*
- Sans
- - Hémorragie
- - - Actuel ¬
- - - - Descente du *O44.00*
- - - - Placenta sans hémorragie (actuelle) ¬ Placenta praevia et descente du *O44.0*
- - - ¬ Rétention du *O73.0*
- - Précision ¬
- - - Anomalie du *O43.9*
- - - Décollement prématuré du *O45.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du *P02.2*
- - - Placenta, sans précisions ¬ Placenta praevia et descente du *O44.0*
- Tant que complication de l'accouchement sans saignement ¬ Adhérence du *O43.20, O73.0*

Placenta *–suite*

- ¬
- - Adhérence pathologique du *O43.2*
- - Anomalies du *O43.8*
- - Complication de l'accouchement par une anomalie d'implantation du *O44.00*
- - Décollement prématuré
- - - *O45.8*
- - - *P02.1*
- - Dysfonctionnement du *O43.8*
- - Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du *O72.0*
- - Malformation du *O43.1*
- - Nouveau-né affecté par une malformation du *P02.2*
- - Soins maternels pour cause connue ou présumée de: insuffisance du *O36.5*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D39.2*
- - - Maligne du *C58*

Placentaire
v.a. rétro-placentaire

- Voie vaginale) ¬ Prélèvement *Z36.0*
- ¬
- - Dysfonction *P02.2*
- - Effets non tératogènes de substances transmises par voie *P04*
- - Fœtus nouveau-né affecté
- - - Formes de décollement et d'hémorragie *P02.1*
- - - Syndromes de transfusion *P02.3*
- - Grossesse compliquée par une anomalie d'insertion *O44.00*
- - Infarctus
- - - *O43.8*
- - - *P02.2*
- - Insuffisance *P02.2*
- - Perte de sang fœtal d'origine *P50.2*
- - Polype *O90.8*
- - Syndromes de transfusion *O43.0*

Placentite ¬

- *O41.1*
- *P02.7*

Placoïde persistante ¬ Maculopathie *H35.38*

Plafond du rhinopharynx ¬ *C11.0*

Plagiocéphalie ¬ *Q67.3*

PLAID ¬ *M35.8*

Plaie

- Actes médicaux ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- Cutanées ¬ Myiase des *B87.1*
- Épisiotomie ¬ Infection d'une *O86.0*
- Intraabdominale ¬ Plaie ouverte communicant avec une fracture, une luxation ou *S31*
- Non classée ailleurs ¬ Infection post-traumatique d'une *T79.3*
- Obstétricale ¬ Hématome d'une *O90.2*

Plaie *–suite*

- Opération ¬ Inflammation localisée purulente d'une *T81.4*
- Opératoire
- - Non classée ailleurs ¬ Désunion d'une *T81.3*
- - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une *T81.5*
- - ¬
- - - Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une *T81.5*
- - - Déhiscence d'une *T81.3*
- - - Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une *T81.5*
- - - Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une *T81.5*
- - - Rupture d'une *T81.3*
- Origine obstétricale chirurgicale ¬ Infection d'une *O86.0*
- Ouverte
- - Abdomen
- - - Lombes et du bassin ¬ *S31*
- - - Région lombo-sacrée et du bassin SAI ¬ *S31*
- - Associé fracture luxation
- - - Lésion
- - - - Intracrânienne ¬ *S01*
- - - - Intrathoracique ¬ *S21*
- - - ¬
- - - - *S51*
- - - - *S61*
- - - - *S71*
- - - - *S81*
- - Atteinte
- - - Larynx et de la trachée ¬ *S11.0*
- - - Pharynx œsophage cervical
- - - - Œsophage cervical ¬ *S11.22*
- - - - Pharynx ¬ *S11.21*
- - - - ¬ *S11.2*
- - - Thyroïde ¬ *S11.1*
- - Avant-bras
- - - Partie non précisée ¬ *S51.9*
- - - SAI ¬ *S51*
- - - ¬ *S51*
- - Bras ¬ *S41.1*
- - Cheville
- - - Pied ¬ *S91*
- - - ¬ *S91.0*
- - Communicant fracture luxation
- - - Plaie intraabdominale ¬ *S31*
- - - ¬
- - - - *S11*
- - - - *S41*
- - - - *S91*

Plaie *–suite*

- Ouverte *–suite*
- - Corps étranger (avec ou sans infection) ¬ Complications d'une *T89.01*
- - Cou
- - - Partie non précisée ¬ *S11.9*
- - - SAI ¬ *S11*
- - - Tronc ¬ Séquelles de lésion traumatique superficielle et de *T91.0*
- - - ¬ *S11*
- - Coude ¬ *S51.0*
- - Cuir chevelu ¬ *S01.0*
- - Cuisse ¬ *S71.1*
- - Doigt s
- - - Lésion de l'ongle ¬ *S61.1*
- - - SAI ¬ *S61.0*
- - - Sans lésion de l'ongle ¬ *S61.0*
- - Épaule
- - - Bras
- - - - SAI ¬ *S41*
- - - - ¬ *S41*
- - - ¬ *S41.0*
- - Épiglotte ¬ *S11.01*
- - Genou ¬ *S81.0*
- - Hanche
- - - Cuisse
- - - - SAI ¬ *S71*
- - - - ¬ *S71*
- - - ¬ *S71.0*
- - Infection ¬ Complications d'une *T89.02*
- - Jambe
- - - Partie non précisée ¬ *S81.9*
- - - SAI ¬ *S81*
- - - ¬ *S81*
- - Joue région temporo maxillaire
- - - Joue ¬ *S01.41*
- - - Parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ *S01.49*
- - - Région maxillaire
- - - - Inférieure ¬ *S01.43*
- - - - Supérieure ¬ *S01.42*
- - - ¬ *S01.4*
- - Lèvre cavité buccal
- - - Bouche, partie non précisée ¬ *S01.50*
- - - Gencive (processus alvéolaire) ¬ *S01.53*
- - - Langue et plancher de la bouche ¬ *S01.54*
- - - Lèvre ¬ *S01.51*
- - - Muqueuse de la joue ¬ *S01.52*
- - - Palais ¬ *S01.55*
- - - Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ *S01.59*
- - - ¬ *S01.5*
- - Lombes et du bassin ¬ *S31.0*
- - Malléole et du pied SAI ¬ *S91*
- - Membre

Plaie *–suite*

- Ouverte *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Inférieur
- - - - Niveau non précisé ¬ *T13.1*
- - - - ¬ Séquelles de *T93.0*
- - - Supérieur
- - - - Niveau non précisé ¬ *T11.1*
- - - - ¬ Séquelles de *T92.0*
- - Nez
- - - Orifice nasal ¬ *S01.22*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S01.20*
- - - - Parties ou parties multiples du nez ¬ *S01.29*
- - - Peau externe du nez ¬ *S01.21*
- - - Septum nasal ¬ *S01.23*
- - - ¬ *S01.2*
- - N'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique ¬ *S21.83!*
- - Non précis partie
- - - Avant-bras ¬ *S51.80*
- - - Ceinture du bassin ¬ *S71.80*
- - - Cou ¬ *S11.80*
- - - Jambe ¬ *S81.80*
- - - Non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire ¬ *S41.80*
- - - Poignet et de la main ¬ *S61.80*
- - - Région malléolaire et du pied ¬ *S91.80*
- - - Tête ¬ *S01.80*
- - - Thorax ¬ *S21.80*
- - Œsophage thoracique ¬ *S27.83, S21.83!*
- - Orbite ¬ *S05.9*
- - Oreille appareil auditif
- - - Canal auditif
- - - - Externe ¬ *S01.34*
- - - - ¬ *S01.35*
- - - Oreille interne ¬ *S01.38*
- - - Osselets ¬ *S01.36*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S01.30*
- - - - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif ¬ *S01.39*
- - - Pavillon de l'oreille ¬ *S01.31*
- - - Tragus ¬ *S01.33*
- - - Tympan ¬ *S01.37*
- - - ¬ *S01.3*
- - Organes génitaux externes, autres et non précisés ¬ *S31.5*
- - Orteil s
- - - Lésion de l'ongle ¬ *S91.2*
- - - SAI ¬ *S91.1*
- - - Sans lésion de l'ongle ¬ *S91.1*
- - Paroi
- - - Abdominale ¬ *S31.1*

Plaie *–suite*
- Ouverte *–suite*
- - Paroi *–suite*
- - - Thoracique
- - - - Antérieure ¬ *S21.1*
- - - - Postérieure ¬ *S21.2*
- - Partie
- - - Avant-bras ¬ *S51.8*
- - - Corps non précisée ¬ *T14.1*
- - - Cou ¬ *S11.8*
- - - Jambe ¬ *S81.8*
- - - Malléole et du pied ¬ *S91.8*
- - - Non précis
- - - - Abdomen
- - - - - ¬ *S31.8*
- - - - - ¬ *S31.80*
- - - - Ceinture
- - - - - Pelvienne ¬ *S71.8*
- - - - - Scapulaire ¬ *S41.8*
- - - Pied ¬ *S91.3*
- - - Poignet et de la main ¬ *S61.8*
- - - Tête ¬ *S01.8*
- - - Thorax ¬ *S21.8*
- - Paupière région périoculaire
- - - Sans atteinte des voies lacrymales ¬ *S01.1*
- - - ¬ *S01.1*
- - Pénis ¬ *S31.2*
- - Pied SAI ¬ *S91.3*
- - Poignet main
- - - Partie non précisée ¬ *S61.9*
- - - SAI ¬ *S61*
- - - ¬ *S61*
- - Pouce ¬ *S61.0*
- - Région de la mâchoire ¬ *S01.80*
- - SAI ¬ *T14.1*
- - Sans précision ¬ Complications d'une *T89.00*
- - Scrotum et des testicules ¬ *S31.3*
- - Sein ¬ *S21.0*
- - Tête
- - - Partie non précisée ¬ *S01.9*
- - - SAI ¬ *S01*
- - - ¬
- - - - *S01.9*
- - - - Séquelles de *T90.1*
- - Thorax
- - - Partie non précisée ¬ *S21.9*
- - - ¬ *S21*
- - Tout partie
- - - Abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale ¬ *S31.83!*
- - - Tête) associée à une lésion intracrânienne ¬ *S01.83!*
- - Tronc, niveau non précisé ¬ *T09.1*

Plaie *–suite*
- Ouverte *–suite*
- - Vagin et de la vulve ¬ *S31.4*
- - Zone de l'os alvéolaire ¬ *S01.59*
- - ¬ Complications d'une *T89.03*
- Ouvertes
- - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Plaies ouvertes du thorax avec *T01.1*
- - Associations de parties du corps ¬ *T01.8*
- - Cou ¬ Plaies ouvertes de la tête avec *T01.0*
- - Membre(s) inférieur(s) ¬ Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec *T01.6*
- - Multiple
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S31.7*
- - - Avant-bras ¬ *S51.7*
- - - Cheville et du pied ¬ *S91.7*
- - - Cou ¬ *S11.7*
- - - Épaule et du bras ¬ *S41.7*
- - - Hanche et de la cuisse ¬ *S71.7*
- - - Jambe ¬ *S81.7*
- - - Paroi thoracique ¬ *S21.7*
- - - Poignet et de la main ¬ *S61.7*
- - - Sans précision ¬ *T01.9*
- - - Tête ¬ *S01.7*
- - Plusieurs partie
- - - Corps ¬ *T01*
- - - Membre s
- - - - Inférieur(s) ¬ *T01.3*
- - - - Supérieur
- - - - - S) supérieur(s) ¬ *T01.2*
- - - - - S) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s) ¬ *T01.6*
- - Tête avec plaies ouvertes du cou ¬ *T01.0*
- - Thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ *T01.1*
- Pénétrant
- - Globe oculaire
- - - Corps étranger ¬ *S05.5*
- - - Sans corps étranger ¬ *S05.6*
- - Orbite
- - - Sans corps étranger ¬ *S05.4*
- - - ¬ Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une *H05.5*
- Punctiforme
- - Corps étranger (pénétrant) SAI ¬ *T14.1*
- - Multiples SAI ¬ *T01.9*
- Superficielle du coude ¬ Autre *S50.88*
- Thoracique ouverte sans précision ¬ *S21*
- ¬
- - Cicatrisation secondaire d'une *T89.03*
- - Résultats anormaux de: sécrétions au niveau d'une *R89*

Plaignant rien lesquels aucun diagnostic n est rapporté ¬ Examen
- Général et investigations de sujets ne se *Z00*

Plaignant rien lesquels aucun diagnostic n est rapporté ¬ Examen *–suite*
- Spéciaux et investigations de sujets ne se *Z01*

Plaisir sexuel ¬ Aversion sexuelle et manque de *F52.1*

Plakophiline ¬ Epidermolyse bulleuse simple par déficit en *Q81.0*

Plan
- Annulaire
- - Atrophique ¬ Lichen *L43.8*
- - ¬ Lichen *L43.8*
- Atrophique ¬ Lichen *L43.8*
- Bulleux ¬ Lichen *L43.1*
- Folliculaire ¬ Lichen *L66.1*
- Hypertrophique ¬ Lichen *L43.0*
- Linéaire ¬ Lichen *L43.8*
- Pigmentaire ¬ Lichen *L43.8*
- Sans précision ¬ Lichen *L43.9*
- Subaigu (actif) ¬ Lichen *L43.3*
- Tropical ¬ Lichen *L43.3*
- ¬
- - Comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier *F42.1*
- - Idées ou ruminations obsédantes au premier *F42.0*
- - Lichen *L43*
- - Lichens *L43.8*

Plana ¬
- Cornea *Q13.4*
- Coxa *M91.2*

Plancher
- Antérieur de la bouche ¬ Tumeur maligne: *C04.0*
- Bouche
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C04.9*
- - ¬
- - - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et *S01.54*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D10.2*
- - - - Malign
- - - - - *C04*
- - - - - Lésion à localisations contiguës du *C04.8*
- Buccal ¬ Kyste du *K11.6*
- Latéral de la bouche ¬ Tumeur maligne: *C04.1*
- Orbite ¬ Fracture du *S02.3*
- Pelvien
- - Cicatriciel ¬ Soins maternels pour: *O34.8*
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: *O70.1*
- - Rigide ¬ Soins maternels pour: *O34.8*
- - ¬ Déchirure ancienne des muscles du *N81.8*
- Rhinopharynx ¬ *C11.3*
- ¬ Phlegmon de la bouche (*K12.20*

Planification familiale SAI ¬ *Z30.0*

Plano-pilaire ¬ Lichen *L66.1*

Plantaire

- Acquise ¬ Kératose [kératodermie] palmaire et *L85.1*
- Externe ¬ Lésion traumatique du nerf *S94.0*
- Humide (pian-crabe) ¬ Papillomes multiples et pian *A66.1*
- Hyperkératosiques et trichophytoïdes ¬ Pianides *A66.3*
- Interne ¬ Lésion traumatique du nerf *S94.1*
- Palmaire ¬ Papillome pianique *A66.1*
- Pied ¬ Lésion traumatique de l'artère *S95.1*
- Précoce) (tardive), due au pian ¬ Hyperkératose palmaire ou *A66.3*
- Syphilitique ¬
- - Mal perforant *A52.1†, L99.8**
- - Tabès avec mal perforant *A52.1†, L99.8**
- - Tabo-paralysie avec mal perforant *A52.1†, L99.8**
- ¬
- - Érythème *L53.8*
- - Fasciite *M72.2*
- - Fibromatose de l'aponévrose *M72.2*
- - Kératose ponctuée (palmaire et *L85.2*
- - Lésion du nerf *G57.6*
- - Pustulose palmaire et *L40.3*

Plante

- Ingérées ¬ Effet toxique: Autres (parties de) *T62.2*
- Non venimeuse) ¬ Lésion due à une *W64.9!*
- Produits de naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.6*
- Remèdes populaires ¬ Abus de: préparations à base de *F55*
- Veineux
- - Animaux venimeux ¬ Accident dû au contact avec des *X29.9!*
- - ¬
- - - Consommation d'animaux venimeux ou de *X49.9!*
- - - Contact avec des animaux venimeux ou des *X29!*
- - - Lésion due à des *X29.9!*

Planus] (acquis) ¬ Pied plat [pes *M21.4*

Plaque

- Crânienne ¬ *Z96.7*
- Hollenhorst ¬ *H34.2*
- Muqueuse syphilitique ¬ *A51.3*
- Ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une *M96.6*
- Pleural
- - Asbestose ¬ *J92.0*
- - SAI ¬ *J92.9*
- - Sans asbestose ¬ *J92.9*
- - ¬ *J92*

Plaque *–suite*

- Prothèse interne de fixation ¬ Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une *Z47.0*
- ¬ Enlèvement de: *Z47.0*

Plaques

- Épicardiques ¬ *I31.8*
- Érythémateuses de la pinta [caraté] ¬ *A67.1*
- Kératosiques péri-orificielles ¬ Kératodermie palmoplantaire mutilante avec *Q82.8*
- ¬
- - Atrophie blanche (en *L95.0*
- - Parapsoriasis
- - - Grandes *L41.4*
- - - Petites *L41.3*
- - Pelade en *L63*

Plaquettaire

- Delta ¬ Déficit isolé de stockage des granules *D69.1*
- Québec ¬ Syndrome *D69.1*
- Sans hémorragie ¬ Traitement continu par des antiagrégants *Z92.2*
- ¬
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des antiagrégants *D69.80*
- - Troubles hémorragiques dus à des antiagrégants *D69.80*

Plaquettes

- Géantes] ¬ Syndrome de(s): Bernard-Soulier [*D69.1*
- Grises ¬ Syndrome de(s): *D69.1*
- Normales ¬ Thrombocytopénie héréditaire avec *D69.41*
- Sanguines géantes ¬ Syndrome des *D69.1*
- ¬ Modifications qualitatives des *D69.1*

Plasma

- Liquide extracellulaire ¬ Déplétion du volume du *E86*
- ¬ Succédané du *T45.8*

Plasmablastique ¬ Lymphome diffus à grandes cellules B *C83.3*

Plasmatique

- Anormale ¬ Viscosité *R70.1*
- Non classés ailleurs ¬ Anomalies du métabolisme des protéines *E88.0*
- PTA] ¬ Déficit en précurseur de thromboplastine *D68.1*
- Sans précision ¬ Anomalie des protéines *R77.9*
- ¬
- - Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité *R70*
- - Anomalie
- - - Précisées des protéines *R77.8*
- - - Protéines *R77*
- - Carence en: facteur de la thromboplastine *D67*
- - Modifications précisées des taux de protéines *R77.88*

Plasmatique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Polycythémie: due à: chute du volume *D75.1*

Plasminogène ¬ Déficit congénital en inhibiteur 1 de l'activateur du *D68.8*

Plasmique ¬ Défaut du transporteur de carnitine à travers la membrane *E71.3*

Plasmoblastique ¬ Lymphome *C83.3*

Plasmocytaire

- Rémission complète ¬ Leucémie *C90.11*
- ¬
- - Leucémie *C90.1*
- - Lymphome *C83.0*

Plasmocytes

- Localisée SAI ¬ Tumeur maligne à *C90.3*
- Rémission complète ¬ Myélome à *C90.01*
- ¬
- - Leucémie à *C90.1*
- - Myélome
- - - *C90.0*
- - - Multiple et tumeurs malignes à *C90*

Plasmocytome

- Médullaire
- - Rémission complète ¬ *C90.01*
- - ¬ *C90.0*
- Rémission complet ¬
- - Arthropathie au cours de *C90.01†, M36.1**
- - Maladie
- - - Glomérulaire au cours de *C90.01†, N08.1**
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de *C90.01†, N16.1**
- SAI ¬ *C90.3*
- Solitaire ¬ *C90.3*
- ¬
- - Arthropathie au cours de *C90.00†, M36.1**
- - Glomérulopathie au cours de *C90.00†, N08.1**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *C90.00†, N16.1**

Plasmocytose

- Cutanée primitive ¬ *D47.9*
- ¬ *D72.8*

Plasmodies simiennes ¬ Paludisme à *B53.1*

Plasmodium

- Exception Plasmodium falciparum
- - Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de *B52*
- - ¬ infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de *B51*
- Falciparum
- - Complication cérébral ¬ Paludisme
- - - *B50.0*
- - - *B50.0†, G94.8**

Plasmodium *–suite*

- Falciparum *–suite*
- - Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de *B52*
- - SAI ¬ Paludisme sévère ou compliqué à *B50.8*
- - Sans précision ¬ Paludisme à *B50.9*
- - Toute autre espèce de Plasmodium ¬ Infections mixtes à *B50*
- - ¬
- - - Formes sévères et compliquées de paludisme à *B50.8*
- - - Infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de *B51*
- - - Paludisme
- - - - *B50*
- - - - Congénital à *P37.3*
- Malariae
- - Atteinte rénale ¬ Paludisme à *B52.0†, N08.0**
- - Complications ¬ Paludisme à *B52.8*
- - Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à *B52*
- - SAI ¬ Paludisme à *B52.9*
- - Sans complication ¬ Paludisme à *B52.9*
- - ¬
- - - Glomérulonéphrite à *B52.0†, N08.0**
- - - Paludisme à *B52*
- Ovale ¬ Paludisme à *B53.0*
- Vivax
- - Complications ¬ Paludisme à *B51.8*
- - Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum ¬ infections mixtes à *B51*
- - Rupture de la rate ¬ Paludisme à *B51.0†, D77**
- - SAI ¬ Paludisme à *B51.9*
- - Sans complication ¬ Paludisme à *B51.9*
- - ¬
- - - Infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de *B52*
- - - Paludisme à *B51*
- ¬ Infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre espèce de *B50*

Plastie

- Correction ¬ Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, avec *Z91.70*
- Vasculaire périphérique, SAI ¬ État consécutif à une *Z95.88*

Plastique

- Corps caverneux ¬ Induration *N48.6*
- Correctrice pour cicatrice après traumatisme ¬ chirurgie *Z42*
- Estomac ¬ Linite *C16.9*
- Extrémité

Plastique *–suite*

- Extrémité *–suite*
- - Inférieures ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.4*
- - Supérieures ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.3*
- Motifs cosmétiques ¬ Chirurgie *Z41.1*
- Partie
- - Corps ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.8*
- - Tronc ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.2*
- Sans précision ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.9*
- Sein ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.1*
- Tête et du cou ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.0*
- ¬
- - *L23.5*
- - Soins de contrôle comprenant une opération *Z42*

Plat

- Congénital ¬ Pied *Q66.5*
- Contracté ¬ Pied *Q66.5*
- Pes planus] (acquis) ¬ Pied *M21.4*
- Spastique (en valgus) ¬ Pied *Q66.5*
- Valgus acquis ¬ Pied
- - *M21.61*
- - *M21.63*
- ¬
- - Condylome *A51.3*
- - Syndrome du dos *M40.3*

Plateau tibial ¬

- *S82.1*
- Fracture du *S82.18*

Platine ¬ Réaction allergique

- Contact d'un composé du *T78.4*
- Traitement avec un composé du *T88.7*

Plâtre

- Utilisé à des fins thérapeutiques ¬ Ulcère dû au *L89*
- ¬ Changement, vérification ou enlèvement de: *Z47.8*

Platybasie ¬ *Q75.8*

Platyspondylie sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*

Pléomorphe

- Indifférencié ¬ Sarcome *C49.9*
- Taille petite à moyenne CD4+ ¬ Lymphome T cutané à cellules *C84.4*
- ¬ Xanthoastrocytome *C71.9*

Pleural

- Asbestose ¬ Plaque *J92.0*
- Chronique), SAI ¬ Empyème *J86.9*
- Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.6*
- Cours

Pleural *–suite*

- Cours *–suite*
- - Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Épanchement *J10.1*
- - Maladies classées ailleurs ¬ Epanchement *J91**
- - Tumeur maligne secondaire de la plèvre ¬ Épanchement *C78.2†, J91**
- Fibreux ¬ épaississement *J92*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ Epanchement *J11.1*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: épanchement *J10.1*
- Non classé ailleurs ¬ Epanchement *J90*
- Précisées ¬ Autres affections *J94.8*
- SAI ¬ Plaque *J92.9*
- Sans
- - Asbestose ¬ Plaque *J92.9*
- - Précision ¬ Affection *J94.9*
- Tuberculeux
- - Primaire, confirmé par analyse bactériologique ou histologique ¬ Épanchement *A15.7†, J91**
- - ¬ Épanchement *A16.5†, J91**
- Virus
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [Influenza] avec épanchement *J09, U69.21!*
- - Influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec épanchement *J09*
- ¬
- - Abcès: *J86*
- - Adhérences *J94.8*
- - Affections *J94*
- - Amylose *E85.4†, J99.8**
- - Calcinose *E83.58†, J99.8**
- - Mésothéliome de la plèvre avec épanchement *C45.0†, J91**
- - Plaque *J92*
- - Résultats anormaux de: liquide *R84*

Pleurésie

- Carcinomateuse ¬ *C78.2*
- Épanchement tuberculeux NCA ¬ *A16.5†, J91**
- Tuberculeux
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.6*
- - Primaire avec épanchement, confirmée par analyse bactériologique ou histologique ¬ *A15.7†, J91**
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.5*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.5*

Pleurite avec épanchement ¬ *J90*

Pleurodynie épidémique ¬ *B33.0*

Pleuro-péricardiques ¬ Kystes *Q24.8*

Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO] ¬ *B96.0!*

Pleuropneumonie septique ¬ *J18.8*

Pleurs

- Excessifs du nourrisson ¬ *R68.1*
- Isolée ¬ Asymétrie faciale des *Q18.8*

Plèvre

- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de la *A15.6*
- Épanchement pleural ¬ Mésothéliome de la *C45.0†, J91**
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de la *A16.5*
- ¬
- - Anomalie de la *Q34.0*
- - Épanchement pleural au cours d'une tumeur maligne secondaire de la *C78.2†, J91**
- - Inflammation de la *R09.1*
- - Lésion traumatique de la *S27.6*
- - Mésothéliome de la *C45.0*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: Tissu mésothélial de la *D19.0*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D38.2*
- - - Malign
- - - - *C38.4*
- - - - Cœur, du médiastin et de la *C38*
- - - - Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la *C38.8*
- - - - Secondaire de la *C78.2*

Plexus

- Brachial
- - Déplacement de disque intervertébral ¬ Névrite du *M50.1†, G55.1**
- - Inférieur ¬ paralysie du *P14.1*
- - Supérieur ¬ paralysie du *P14.0*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Autres lésions du *P14.3*
- - ¬
- - - Affections du *G54.0*
- - - Anomalie du *Q07.8*
- - - Lésion traumatique du *S14.3*
- Cardiaque ¬ *S24.4*
- Choroïde ¬
- - Carcinome des *C71.5*
- - Papillome
- - - *D33.0*
- - - Atypique des *C71.5*
- Cœliaque ¬ Ganglion ou *S34.5*
- Hémorroïdaires ¬ Thrombose des *K64.5*
- Hypogastrique ¬ *S34.5*
- Lombo-sacré ¬
- - Affections du *G54.1*
- - Lésion traumatique du *S34.4*
- Mésentérique (inférieur) (supérieur) ¬ *S34.5*

Plexus *–suite*

- Nerveux
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Compression des racines et des *G55.8**
- - Sans précision ¬ Affection des racines et des *G54.9*
- - ¬ affection racine
- - - *G54*
- - - *G54.8*
- Œsophagien ¬ *S24.4*
- Pampiniforme ¬ Thrombose du *I80.88*
- Pulmonaire ¬ *S24.4*
- Rachidien du tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du *T09.4*

Pli

- Anal hypertrophié ¬ *K64.4*
- Circulaires bénins multiples de la peau des membres ¬ *Q82.8*
- Flexion ¬
- - Eczéma (de): *L20.8*
- - Psoriasis des *L40.8*
- Membrane de Descemet ¬ *H18.3*
- Palmaires anormaux ¬ *Q82.8*
- S) glosso-épiglottique(s) ¬ *C10.1*
- ¬ Dermatose réticulée des *L81.8*

Plicaturée ¬ Langue *K14.5*

PLIN1 ¬ Lipodystrophie partielle familiale associée à *E88.1*

PLMS] ¬ Periodic Limb Movements in Sleep [*G25.80*

Plomb

- Composés ¬ Effet toxique: *T56.0*
- ¬
- - Encéphalite due au *T56.0†, G05.8**
- - Intoxication au *T56.0*

Plongeurs ¬ Paralysie des *T70.3*

Plumes ¬ Allergie aux *J30.3*

Plummer-Vinson ¬ Syndrome de: *D50.1*

Pluriendocrinienne ¬ Adénomatose *D44.8*

Pluriglandulaire

- Auto-immun ¬
- - Atrophie *E31.0*
- - Insuffisance *E31.0*
- Sans précision ¬
- - Dysfonctionnement *E31.9*
- - Tumeur maligne: Atteinte *C75.8*
- ¬
- - Dysfonctionnement
- - - *E31*
- - - *E31.8*
- - Hyperfonctionnement *E31.1*
- - Syndrome *D44.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Atteinte *D35.8*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Atteinte *D44.8*

PM ¬ *M33.2*

PMLD ¬ *E75.2*

PMP ¬ *C78.6*

PNCA ¬ Encéphalite otogène disséminée *H66.4†, G05.8**

PNET) du système nerveux central ¬ Tumeur neuroectodermique primitive (*C72.9*

Pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur *P03.3*

Pneumatose kystique intestinale] ¬ PKI [*K63.8*

Pneumoblastome ¬ *C34.9*

Pneumoconiose

- Amiante et à d'autres fibres minérales ¬ *J61*
- Associée à la tuberculose ¬ *J65*
- Mineurs de charbon ¬ *J60*
- Poussière
- - Inorganiques
- - - Précisées ¬ *J63.8*
- - - ¬ *J63*
- - Silice ¬
- - - *J62*
- - - *J62.8*
- - Talc ¬ *J62.0*
- Sans précision ¬ *J64*
- Silicates ¬ *J62.8*

Pneumocoques

- Septicémie ¬ Pneumonie à *J13*
- ¬
- - Amygdalite à *J03.8, B95.3!*
- - Angine aiguë à *J03.8, B95.3!*
- - Arthrite et polyarthrite à *M00.1*
- - Conjonctivite à *H10.8, B95.3!*
- - Endocardite à *I33.0, B95.3!*
- - Méningite à *G00.1*
- - Méningo-encéphalite à *G04.2, B95.3!*
- - Péricardite à *I30.1, B95.3!*
- - Pharyngite à *J02.8, B95.3!*
- - Rhinite à *J00, B95.3!*
- - Septicémie à *A40.3*
- - Trachéite à *J04.1, B95.3!*

Pneumocystis

- Carinii ¬
- - Infection à *B48.5†, J17.2**
- - Maladie due au VIH avec pneumonie à *B20, B48.5*
- - Pneumonie
- - - *B48.5†*
- - - *B48.5†, J17.2**
- Jirovecii ¬ Pneumonie
- - *B48.5†*
- - *B48.5†, J17.2**
- ¬ Pneumonie à *B48.5†, J17.2**

Pneumocystose

- Interstitielle ¬ *B48.5†, J17.2**

Pneumocystose *–suite*
- ¬ *B48.5†, J17.2**

Pneumogastrique [X] ¬ Nerf: *S04.8*

Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale ¬ *P25.2*

Pneumonia alba ¬ *A50.0†, J17.0**

Pneumoniae
- Agent pathogène ¬ Klebsiella *B96.2!*
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptococcus *B95.3!*
- Influenzae ¬ bronchopneumonie due à des bactéries autres que S. *J15*
- M. pneumoniae] ¬ Mycoplasma *B96.0!*
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Klebsiella *U81.01!*
- - 3MRGN ¬ Klebsiella *U81.21!*
- - 4MRGN ¬ Klebsiella *U81.41!*
- Résistant
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus *U80.11!*
- - Pénicilline oxacilline
- - - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus *U80.10!*
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus *U80.1!*
- - - ¬ Streptococcus *U80.10!*
- ¬
- - Bronchite aiguë due à Mycoplasma *J20.0*
- - Bronchopneumonie à S. *J13*
- - Mycoplasma pneumoniae [M. *B96.0!*
- - Pneumonie
- - - Congénitale à Klebsiella *P23.6, B96.2!*
- - - Klebsiella *J15.0*
- - - Mycoplasma *J15.7*
- - - Streptococcus *J13*
- - Septicémie à Streptococcus *A40.3*

Pneumonie
- Acquis hôpital classé
- - Soit présente admission soit survenu 48 heure admission lors hospitalisation connu
- - - 29 jusqu'à 90 jours ¬ *U69.03!*
- - - Jusqu'à 28 jours ¬ *U69.02!*
- - Survenue plus de 48 heures après l'admission ¬ *U69.01!*
- - ¬ *U69.0!*
- Adénovirale ¬ *J12.0*
- Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ Bronchite et *J68.0*
- Aliments et des vomissements ¬ *J69.0*
- Alvéolaires et pariéto-alvéolaires ¬ *J84.0*
- Amibes ¬ *A06.5†, J17.3**
- Ascaris ¬ *B77.8†, J17.3**
- Aspiration
- - Aliments (régurgités) ¬ *J69.0*
- - Anesthésie cours

Pneumonie *–suite*
- Aspiration *–suite*
- - Anesthésie cours *–suite*
- - - Grossesse ¬ *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.0*
- - Lait ¬ *J69.0*
- - SAI ¬ *J69.0*
- - Sécrétions gastriques ¬ *J69.0*
- - Vomissements ¬ *J69.0*
- Bactérie
- - Aérobies) à Gram négatif SAI ¬ *J15.6*
- - Gram négatif ¬ *J15.6*
- Bactérien
- - Non classées ailleurs ¬ *J15*
- - Sans précision ¬ *J15.9*
- - ¬ Autres *J15.8*
- Candida ¬ *B37.1†, J17.2**
- Candidose ¬ *B37.1†, J17.2**
- Candidosique ¬ *B37.1†, J17.2**
- Chimique aspiration anesthésie
- - Cours
- - - Grossesse ¬ *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.0*
- - ¬ *J95.4*
- Chlamydia ¬ *J16.0*
- Congénital
- - Agent
- - - Bactériens ¬ *P23.6*
- - - Viral ¬ *P23.0*
- - Chlamydia ¬ *P23.1*
- - Escherichia coli ¬ *P23.4*
- - Haemophilus influenzae ¬ *P23.6, B96.3!*
- - Klebsiella pneumoniae ¬ *P23.6, B96.2!*
- - Micro-organismes ¬ *P23.8*
- - Mycoplasmes ¬ *P23.6, B96.0!*
- - Pseudomonas ¬ *P23.5*
- - Sans précision ¬ *P23.9*
- - Staphylocoques ¬ *P23.2*
- - Streptocoques, groupe B ¬ *P23.3*
- - Toxoplasmose ¬ *P37.1†, J17.3**
- - Virus respiratoire syncytial [VRS] ¬ *P23.0*
- - ¬ *P23*
- Cours
- - Ascaridose ¬ *B77.8†, J17.3**
- - Coccidioïdomycose
- - - Aiguë ¬ *B38.0†, J17.2**
- - - Chronique ¬ *B38.1†, J17.2**
- - Coqueluche ¬ *A37.9†, J17.0**
- - Fièvre
- - - Q ¬ *A78†, J17.8**
- - - Typhoïde ¬ *A01.0†, J17.0**
- - Gonorrhée ¬ *A54.8†, J17.0**

Pneumonie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.0*
- - Histoplasmose
- - - Aiguë ¬ *B39.0†, J17.2**
- - - Chronique ¬ *B39.1†, J17.2**
- - Infection à spirochètes ¬ *A69.8†, J17.0**
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *J17.0**
- - - Parasitaires ¬ *J17.3**
- - - Virales classées ailleurs ¬ *J17.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *J17.8**
- - Mycoses ¬ *J17.2**
- - Nocardiose ¬ *A43.0†, J17.0**
- - Rougeole ¬ *B05.2†, J17.1**
- - Rubéole ¬ *B06.8†, J17.1**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.3†, J17.3**
- - Tularémie ¬ *A21.2†, J17.0**
- - Varicelle ¬ *B01.2†, J17.1**
- - Ventilation articielle ¬ *J95.88*
- Crète ¬ *A78†, J17.8**
- Cryptocoques ¬ *B45.0†, J17.2**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.0†, J17.1**
- Embolique ¬ *I26.9†, J17.8**
- Éosinophile idiopathique
- - Aiguë ¬ *J82*
- - ¬ *J82*
- Escherichia coli ¬ *J15.5*
- Gonocoques ¬ *A54.8†, J17.0**
- Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- Huiles et des essences ¬ *J69.1*
- Huileuse ¬ *J69.1*
- Hypostatique, sans précision ¬ *J18.2*
- Infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement ¬ *P23*
- Inhalation de sang ¬ *J69.8*
- Interstitiel
- - Aiguë [PIA] ¬ *J84.1*
- - Non spécifique ¬ [NSIP] *J84.1*
- - SAI ¬ *J84.9*
- - Usuelle ¬ *J84.1*
- Klebsiella pneumoniae ¬ *J15.0*
- Lobaire, sans précision ¬ *J18.1*
- Lymphoïde interstitiel ¬
- - *B22*
- - Maladie due au VIH avec *B22, B48.5*
- Metapneumovirus humain ¬ *J12.3*
- Micro-organisme
- - Infectieux
- - - Non classée ailleurs ¬ *J16*
- - - ¬ *J16.8*
- - Non précis ¬
- - - *J18*

Pneumonie *–suite*
- Micro-organisme *–suite*
- - Non précis ¬ *–suite*
- - - *J18.8*
- Miliaire ¬ *J18.8*
- Mycoplasma pneumoniae ¬ *J15.7*
- Nécrosante staphylococcique ¬ *J15.2*
- Néonatale résultant d'une aspiration ¬ *P24*
- Pneumocoques, avec septicémie ¬ *J13*
- Pneumocystis
- - Carinii ¬
- - - *B48.5†*
- - - *B48.5†, J17.2**
- - - Maladie due au VIH avec *B20, B48.5*
- - Jirovecii ¬
- - - *B48.5†*
- - - *B48.5†, J17.2**
- - ¬ *B48.5†, J17.2**
- Post-infectieuse NCA ¬ *B99†, J17.8**
- Post-morbilleuse ¬ *B05.2†*
- Pseudomonas ¬ *J15.1*
- Rickettsies ¬ *A79.9†, J17.0**
- Rubéole congénitale ¬ *P35.0*
- Salmonella
- - Typhi ¬ *A01.0†, J17.0**
- - ¬ *A02.2†, J17.0**
- Sans précision ¬ *J18.9*
- Septique ¬ *J18.9*
- Serratia marcescens ¬ *J15.6*
- Staphylocoques ¬ *J15.2*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *J13*
- Streptocoque
- - Groupe B ¬ *J15.3*
- - ¬ *J15.4*
- Substances solides et liquides ¬ *J69.8*
- Syphilitique congénital précoce ¬
- - *A50.0*
- - *A50.0†, J17.0**
- Toxoplasmes ¬ *B58.3†, J17.3**
- Tuberculeux
- - Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose pulmonaire: *A16.2*
- - Sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*
- Viral
- - Non classées ailleurs ¬ *J12*
- - Sans précision
- - - Virus spécifique non identifié ¬ (Broncho) *J11.0*
- - - ¬ *J12.9*

Pneumonie *–suite*
- Viral *–suite*
- - ¬
- - - *J12.8*
- - - Maladie due au VIH avec *B20, J12.9*
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ *B27.0†, J17.1**
- - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09, U69.21!*
- - Herpès ¬ *B00.8†, J17.1**
- - Influenza
- - - Saisonnier identifié
- - - - Sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Influenza avec *J10.0*
- - - - ¬ Grippe avec *J10.0*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- - Non identifié ¬ Grippe avec *J11.0*
- - Paragrippaux ¬ *J12.2*
- - Respiratoire syncytial [VRS] ¬ *J12.1*
- ¬
- - Abcès
- - - Amibien du poumon avec *A06.5†, J17.3**
- - - Poumon
- - - - *J85.1*
- - - - Sans *J85.2*
- - Actinomycose avec *A42.0†, J17.0**
- - Aspergillose
- - - *B44.1†, J17.2**
- - - Invasive avec *B44.0†, J17.2**
- - Charbon avec *A22.1†, J17.0**
- - Fièvre rhumatismale avec *I00†, J17.8**
- - Infection à Legionella pneumophila sans *A48.2*
- - Maladie
- - - Légionnaires avec *A48.1*
- - - VIH avec *B20, J18.9*
- - Mélioïdose avec *A24.1†, J17.0**
- - Ornithose avec *A70†, J17.8**
- - Psittacose avec *A70†, J17.8**
- - Rhumatisme avec *I00†, J17.8**
- - Varicelle avec *B01.2†, J17.1**

Pneumonique ¬ Bronchiolite oblitérante avec organisation *J84.0*

Pneumopathie
- Allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine ¬ alvéolite et *J67*
- Bagasse ¬ *J67.1*
- Chronique
- - Enfance ¬ *J84.0*
- - Idiopathique à éosinophiles ¬ *J82*
- Cours de l'ascaridose ¬ *B77.8†, J17.3**
- Grippale, virus d'influenza saisonnière identifié ¬ (Broncho) *J10.0*
- Hypersensibilité
- - SAI ¬ *J67.9*

Pneumopathie *–suite*
- Hypersensibilité *–suite*
- - ¬ *J67.9*
- Interstitiel
- - Déficit
- - - ABCA3 ¬ *J84.8*
- - - Protéine C du surfactant ¬ *J84.8*
- - Lymphocytaire ¬ *J84.1*
- - ¬ Bronchiolite respiratoire avec *J68.4*
- Irradiation ¬ *J70.0*
- Néonatale d'aspiration SAI ¬ *P24.9*
- Organisée cryptogénique ¬ *J84.0*
- Toxoplasmose ¬ *B58.3†, J17.3**

Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale ¬ *P25.3*

Pneumophila sans pneumonie ¬ Infection à Legionella *A48.2*

Pneumothorax
- Iatrogène ¬ *J95.80*
- Sans précision ¬ *J93.9*
- Spontané
- - Familial ¬ *J93.1*
- - Pression positive ¬ *J93.0*
- - ¬ Autres *J93.1*
- Survenant pendant la période périnatale ¬ *P25.1*
- Traumatique ¬ *S27.0*
- Tuberculeux
- - Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose pulmonaire: *A16.2*
- - Sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*
- ¬
- - *J93*
- - *J93.8*
- - Blessure ouverte avec *S27.0, S21.83!*

PNP] ¬ Déficit en purine nucléoside phosphorylase [*D81.5*

PNPO ¬ Encéphalopathie épileptique néonatale associée à *G40.8*

Poche
- Blake ¬ Persistance du kyste de la *Q03.1*
- Branchiale ¬ Syndrome de la *D82.1*
- Œsophagien
- - Acquise ¬ *K22.5*
- - ¬ *Q39.6*
- Pharyngée ¬ *Q38.7*
- Pompe ¬ Sérome dû à la *T85.88*
- Rathke ¬ Déficit hypophysaire associé à un kyste de la *E23.6*

Poche-intestin ¬ Fistule *N32.1*

POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] ¬ *G40.01*

POEMS ¬ Syndrome *D47.2*

POIC] ¬ Pseudo-obstruction intestinale chronique [*K59.8*

Poids

- Âge gestationnel ¬ Faible *P05.0*
- Anormal ¬
- - Perte de *R63.4*
- - Prise de *R63.5*
- Chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou affaissée: après une perte de *L98.7*
- Cours de la grossesse ¬ Faible prise de *O26.1*
- Élevé à la naissance ¬ Anomalies liées à une gestation prolongée et un *P08*
- Excessive au cours de la grossesse ¬ Prise de *O26.0*
- Extrêmement faible naissance
- - Poids naissance
- - - 500 à moins de 750 grammes ¬ *P07.01*
- - - 750 à moins de 1000 grammes ¬ *P07.02*
- - - Inférieur à 500 grammes ¬ *P07.00*
- - ¬ *P07.0*
- Faible naissance
- - Poids naissance
- - - 1000 à moins de 1250 grammes ¬ Autres *P07.10*
- - - 1250 à moins de 1500 grammes ¬ Autres *P07.11*
- - - 1500 à moins de 2500 grammes ¬ Autres *P07.12*
- - ¬ Autres *P07.1*
- Insuffisant à la naissance, non classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un *P07*
- Moléculaire ¬ Déficit congénital en kininogène de haut *D68.8*
- Naissance
- - 500 à moins de 750 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: *P07.01*
- - 750 à moins de 1000 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: *P07.02*
- - 1000 à moins de 1250 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: *P07.10*
- - 1250 à moins de 1500 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: *P07.11*
- - 1500 à moins de 2500 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: *P07.12*
- - Inférieur à 500 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: *P07.00*
- ¬
- - Affaissement de la peau du visage après une perte de *L98.7*
- - Anorexie mental
- - - Mesures de perte de *F50.01*
- - - Sans mesures de perte de *F50.00*
- - Maladie due au VIH avec perte de *B22, R64*

Poignet

- Articulation

Poignet *–suite*

- Articulation *–suite*
- - Carpienne ¬ Entorse et foulure du *S63.51*
- - Carpo-métacarpien ¬
- - - Entorse et foulure du *S63.53*
- - - Luxation du *S63.04*
- - Ligament) radiocarpien ¬ Entorse et foulure du *S63.52*
- - Médiocarpienne ¬ Luxation du *S63.03*
- - Radiocarpienne ¬ Luxation du *S63.02*
- - Radio-cubitale ¬ Luxation du *S63.01*
- Carpe ¬ Rupture traumatique de ligament du *S63.3*
- Main
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure
- - - - *T23.20*
- - - - Épaule et du bras, sauf *T22.2*
- - - Corrosion
- - - - *T23.60*
- - - - Épaule et du bras, sauf *T22.6*
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.81*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.84*
- - Degré
- - - 2a ¬
- - - - Brûlure
- - - - - *T23.20*
- - - - - Épaule et du bras, sauf *T22.2*
- - - - Corrosion
- - - - - *T23.60*
- - - - - Épaule et du bras, sauf *T22.6*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure
- - - - - *T23.21*
- - - - - Épaule et du bras, sauf *T22.8*
- - - - Corrosion
- - - - - *T23.61*
- - - - - Épaule et du bras, sauf *T22.9*
- - - Non précis ¬
- - - - Brûlure
- - - - - *T23.0*
- - - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.0*
- - - - Corrosion
- - - - - *T23.4*
- - - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.4*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.82*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.83*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.5*

Poignet *–suite*

- Main *–suite*
- - Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique du *S68.9*
- - Partie non précisée ¬ Plaie ouverte du *S61.9*
- - SAI ¬ Plaie ouverte du *S61*
- - Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S69*
- - - *S69.9*
- - - Superficielle du *S60.9*
- - Seuls] ¬ bras [toute partie, sauf *T22*
- - ¬
- - - Amputation traumatique
- - - - *S68*
- - - - Associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du *S68.3*
- - - - Parties du *S68.8*
- - - Brûlure
- - - - Corrosion
- - - - - *T23*
- - - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22*
- - - - Premier
- - - - - Degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf *T22.1*
- - - - - Degré du *T23.1*
- - - - Second degré du *T23.2*
- - - - Troisième
- - - - - Degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf *T22.3*
- - - - - Degré du *T23.3*
- - - Contusion d'autres parties du *S60.2*
- - - Corrosion
- - - - Premier
- - - - - Degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf *T22.5*
- - - - - Degré du *T23.5*
- - - - Second degré du *T23.6*
- - - - Troisième
- - - - - Degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf *T22.7*
- - - - - Degré du *T23.7*
- - - Écrasement
- - - - *S67*
- - - - Parties autres et non précisées du *S67.8*
- - - Fracture
- - - - Niveau du *S62*
- - - - Parties autres et non précisées du *S62.8*
- - - Gelure superficielle du *T33.5*
- - - Lésion
- - - - Tissu
- - - - - Mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du *S61.84!*
- - - - - Mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du *S61.87!*
- - - - - Mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du *S61.85!*

Poignet *–suite*
- Main *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lésion *–suite*
- - - - Tissu *–suite*
- - - - - Mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du *S61.88!*
- - - - - Mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du *S61.86!*
- - - - - Mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du *S61.89!*
- - - - Traumatique
- - - - - Artère cubitale au niveau du *S65.0*
- - - - - Artère radiale au niveau du *S65.1*
- - - - - Multiples du *S69.7*
- - - - - Multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du *S66.7*
- - - - - Multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du *S66.6*
- - - - - Multiples nerfs au niveau du *S64.7*
- - - - - Multiples vaisseaux sanguins au niveau du *S65.7*
- - - - - Muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du *S66.2*
- - - - - Muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du *S66.3*
- - - - - Muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du *S66.1*
- - - - - Muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du *S66.0*
- - - - - Muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du *S66.9*
- - - - - Muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du *S66.4*
- - - - - Muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du *S66.5*
- - - - - Muscles et tendons au niveau du *S66.8*
- - - - - Nerf cubital au niveau du *S64.0*
- - - - - Nerf médian au niveau du *S64.1*
- - - - - Nerf non précisé, au niveau du *S64.9*
- - - - - Nerf radial au niveau du *S64.2*
- - - - - Nerfs au niveau du *S64.8*
- - - - - Précisées du *S69.8*
- - - - - Superficielles du *S60.88*
- - - - - Superficielles multiples du *S60.7*
- - - - - Vaisseau sanguin non précisé, au niveau du *S65.9*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau du *S65.8*
- - - Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du *S63*
- - - Plaie
- - - - Ouverte
- - - - - *S61*
- - - - - Non précisée d'autres parties du *S61.80*
- - - - - Parties du *S61.8*
- - - - Ouvertes multiples du *S61.7*

Poignet *–suite*
- Main *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Séquelles d'une fracture au niveau du *T92.2*
- Partie
- - Non précis ¬
- - - Entorse et foulure du *S63.50*
- - - Luxation du *S63.00*
- - ¬ Entorse et foulure du *S63.58*
- Pied tombant (acquis) ¬ *M21.3*
- Unilatéral ¬ Absence acquis
- - Main et *Z89.1*
- - Membre supérieur au-dessus du *Z89.2*
- ¬
- - *L03.10*
- - Amputation traumatique
- - - Coude et le *S58.1*
- - - Main au niveau du *S68.4*
- - Articulation du *T84.12*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du *T84.03*
- - Entorse et foulure du *S63.5*
- - Fracture ouverte du *S62.8, S61.87!*
- - Latéral, *S63.3*
- - Luxation du *S63.08*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: avant-bras et *R02.02*
- - Périarthrite du *M77.2*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.63*
- - Ténosynovite sèche de la main et du *M70.0*
- - Tuberculose du *A18.0†, M01.13**

Poïkilocytose ¬ *R71*

Poïkilodermie
- Civatte ¬ *L57.3*
- Généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire] ¬ *L94.5*
- Héréditaire fibrosante-myopathie rétractile-fibrose pulmonaire ¬ Syndrome de *Q82.8*
- Rothmund-Thomson ¬ *Q82.8*
- Sclérosante héréditaire de Weary ¬ *Q82.8*

Poils angora ¬ Nævus à *Q82.5*

Point
- Lacrymal ¬
- - Corps étranger dans le *T15.8*
- - Eversion du *H04.5*
- ¬
- - FIM
- - - Cognitif
- - - - 5-10 *U51.21*
- - - - 11-29 *U51.11*
- - - - 30-35 *U51.01*
- - - Moteur
- - - - 13-30 *U50.51*

Point *–suite*
- ¬ *–suite*
- - FIM *–suite*
- - - Moteur *–suite*
- - - - 31-42 *U50.41*
- - - - 43-58 *U50.31*
- - - - 59-68 *U50.21*
- - - - 69-84 *U50.11*
- - - - 85-91 *U50.01*
- - Index de Barthel
- - - 0-15 *U50.50*
- - - 20-35 *U50.40*
- - - 40-55 *U50.30*
- - - 60-75 *U50.20*
- - - 80-95 *U50.10*
- - - 100 *U50.00*
- - Index de Barthel élargi
- - - 0-15 *U51.20*
- - - 20-65 *U51.10*
- - - 70-90 *U51.00*
- - MMSE
- - - 0-16 *U51.22*
- - - 17-23 *U51.12*
- - - 24-30 *U51.02*

Pointe
- Bords latéraux de la langue ¬ Tumeur maligne: *C02.1*
- Couplage court ¬ Syndrome des torsades de *I47.2*
- Langue ¬ *C02.1*
- Occipitales ¬ Épilepsie à *G40.08*
- Ondes continues pendant le sommeil lent] ¬ POCS (CSWS) [*G40.01*
- Rotule [Sinding Larsen] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.4*

Pointues ¬ Oreilles *Q17.3*

POIS ¬ *F52.3*

Poisson
- Coquillages ¬ Autres intoxications par *T61.2*
- Infection) ¬ Cestodes de *B70.0*
- Scombridés ¬ Intoxication par *T61.1*
- ¬
- - Allergie au *T78.1*
- - Effet toxique d'un contact avec des *T63.5*
- - Hypersensibilité aux protéines de *T78.1*
- - Maladie des yeux de *E78.6*
- - Poumon des: travailleurs de préparations alimentaires à base de *J67.8*
- - Syndrome de l'odeur de *E88.8*

Poitrine
- Angiospastique ¬ Angine de *I20.1*
- Instable ¬ Angine de *I20.0*
- Prinzmetal ¬ Angine de *I20.1*
- SAI ¬ Angine de *I20.9*
- Sans précision ¬ Angine de *I20.9*
- Spasme

Poitrine *–suite*
- Spasme *–suite*
- - Coronaire vérifié ¬ Angine de *I20.1*
- - ¬ Angine de *I20.1*
- Variable ¬ Angine de *I20.1*
- ¬
- - Angine de *I20*
- - Fibroadénomes multiples de la *D24*
- - Formes d'angine de *I20.8*

Polaire
- LL) ¬ Lépromateuse *A30.5*
- Sous-capsulaire (antérieure) (postérieure) ¬ Cataracte sénile: *H25.0*
- TT) ¬ Tuberculoïde *A30.1*

Poland ¬ Syndrome
- *Q79.8*
- Dysplasie cranio-frontonasale-anomalie de *Q87.8*

Pôle
- Postérieur ¬
- - Cicatrice (post-inflammatoire) (post-traumatique) de la macula (*H31.0*
- - Dégénérescence de la macula et du *H35.3*
- - Druses (dégénératives) au *H35.38*
- Rein ¬ Vaisseau accessoire d'un *Q27.8*

Polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCoq + *Z27.3*

Polio-encéphalite
- Bulbaire
- - Myéloïde ¬ *A80.9†, G05.1**
- - ¬ *A80.9†, G05.1**
- Lors grippe Influenza
- - Virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe porcine ¬ *J10.8†, G05.1**
- - ¬ *J11.8†, G05.1**
- Virus grippe aviaire
- - Identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, G05.1**
- ¬ *A80.9†, G05.1**

Polio-encéphalomyélite avec béribéri ¬ *E51.2†, G32.8**

Polio-encéphalopathie
- Supérieure hémorragique ¬ *E51.2†, G32.8**
- Wernicke ¬ *E51.2†, G32.8**

Poliomyélite
- Aigu
- - Non paralytique ¬ *A80.4*
- - Sans précision ¬ *A80.9*
- - ¬ *A80*
- Coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la *Z27.8*
- DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et *Z27.3*

Poliomyélite *–suite*
- Paralytique aigu
- - Associée au virus vaccinal ¬ *A80.0*
- - Sans précision ¬ *A80.3*
- - Virus sauvage
- - - Importé ¬ *A80.1*
- - - Indigène ¬ *A80.2*
- ¬
- - Encéphalite due au virus de la *A80.9†, G05.1**
- - Méningite due au virus de la *A80.9†, G01**
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.0*
- - Ostéopathie consécutive à une *M89.6*
- - Séquelles de *B91*

Poliose
- Circonscrite, acquise ¬ *L67.1*
- SAI ¬ *L67.1*

Pollen ¬
- Allergie SAI due au *J30.1*
- Rhinopathie allergique due au *J30.1*

Pollinose ¬ *J30.1*

Pollution
- Air ¬ *Z58*
- Eau ¬ *Z58*
- Sol ¬ *Z58*

Polyangéite
- Atteinte pulmonaire ¬ Granulomatose avec *M31.3†, J99.1**
- Extensive ¬ Syndrome de *M30.8*
- ¬
- - Glomérulonéphrite au cours de granulomatose avec *M31.3†, N08.5**
- - Glomérulopathie au cours de granulomatose avec *M31.3†, N08.5**
- - Granulomatose éosinophilique avec *M30.1*
- - Maladies respiratoires lors de granulomatose avec *M31.3†, J99.1**

Polyangite
- Atteinte rénale ¬ Granulomatose avec *M31.3†, N08.5**
- Microscopique] ¬ MPA [*M31.7*

Polyartérite
- Atteinte pulmonaire ¬ *M30.1*
- Juvénile ¬ *M30.2*
- Microscopique ¬ *M31.7*
- Noueuse ¬ *M30.0*

Polyarthrite
- Bactéries précisées ¬ Arthrite et *M00.8*
- Chronique
- - Juvénile, type adulte ¬ *M08.0*
- - Manifestation pulmonaire ¬ *M05.10†, J99.0**
- - ¬
- - - Cardite au cours de *M05.30†, I52.8**
- - - Myocardite au cours de *M05.30†, I41.8**
- - - Myopathie au cours de *M05.30†, G73.7**

Polyarthrite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Polyneuropathie au cours de *M05.30†, G63.6**
- Épidémique exanthémateuse ¬ *B33.1*
- Juvénile
- - Chronique ¬ *M08.3*
- - Facteur rhumatoïde ¬ *M08.00*
- - Sans facteur rhumatoïde
- - - Facteurs anti-nucléaires ¬ *M08.3*
- - - ¬ *M08.3*
- Pneumocoques ¬ Arthrite et *M00.1*
- Rhumatoïde
- - Atteinte d'autres organes et appareils ¬ *M05.3†*
- - Précisées ¬ Autres *M06.8*
- - Sans précision ¬ *M06.9*
- - Séronégative ¬ *M06.0*
- - Séropositive
- - - Sans précision ¬ *M05.9*
- - - ¬
- - - - *M05*
- - - - *M05.8*
- - ¬
- - - *M06*
- - - Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (associée à la *C91.7*
- Sans précision ¬ *M13.0*
- Séropositive chronique ¬ Péricardite au cours de *M05.30†, I32.8**
- Staphylocoques ¬ Arthrite et *M00.0*
- Streptocoques ¬ Autres arthrites et *M00.2*

Polyarthropathie
- Chronique avec atteinte cardiaque NCA ¬ *M05.30†, I52.8**
- Inflammatoire ¬ *M06.4*

Polyarthrose
- Post-traumatique ¬ *M15.3*
- Sans précision ¬ *M15.9*
- ¬
- - *M15*
- - *M15.8*

Polyarticulaire
- Extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution *M08.3*
- ¬ Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme *M08.3*

Polychondrite récidivante ¬ *M94.1*

Polyclonale
- Persistante ¬ Lymphocytose B *D72.8*
- SAI ¬ Gammapathie *D89.0*
- ¬ Hypergammaglobulinémie *D89.0*

Polycythaemia rubra vera ¬ *D45*

Polycythémie
- Acquise ¬ *D75.1*
- Altitude ¬ *D75.1*

Polycythémie *–suite*
- Chute du volume plasmatique ¬ *D75.1*
- Émotive ¬ *D75.1*
- Érythropoïétine ¬ *D75.1*
- Hypoxémique ¬ *D75.1*
- Néphrogène ¬ *D75.1*
- Nouveau-né ¬ *P61.1*
- Polyglobulie
- - Bénigne ¬ *D75.0*
- - Familiale ¬ *D75.0*
- Primaire familiale ¬ *D75.0*
- Relative ¬ *D75.1*
- SAI ¬ *D75.1*
- Secondaire ¬ *D75.1*
- Stress ¬ *D75.1*
- Tchouvachie ¬ *D75.1*
- ¬ Ictère néonatal dû à une *P58.3*

Polydactylie
- Central
- - Orteils ¬ *Q69.2*
- - ¬ *Q69.0*
- Index ¬ *Q69.0*
- Main ou pied), sans précision ¬ *Q69.9*
- Miroir
- - Segmentation vertébrale-anomalies des membres ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - ¬ *Q69.9*
- Postaxiale
- - Anomalies dentaires et vertébrales ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - Orteils ¬ *Q69.2*
- - Type
- - - A ¬ *Q69.0*
- - - B ¬ *Q69.0*
- - ¬ Syndrome
- - - Dandy-Walker *Q87.8*
- - - Malformations cérébrales-cardiopathie congénitale- *Q87.8*
- Pouce
- - Biphalangé ¬ *Q69.1*
- - Triphalangé ¬ *Q69.1*
- Préaxiale
- - Colobome-déficience intellectuelle petite taille ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - Orteils ¬ *Q69.2*
- Sans précision ¬ *Q69.9*
- ¬
- - *Q69*
- - Syndrome d'alopécie circonscrite- *Q87.2*

Polydactylie-myopie ¬ Syndrome de *Q87.2*

Polydipsie ¬ *R63.1*

Polydystrophie
- Cérébrale progressive [syndrome d'Alpers] ¬ *G31.88*

Polydystrophie *–suite*
- Sclérosante progressive d'Alpers ¬ *G31.88*
- Type Hurler] ¬ Mucolipidose III [*E77.0*

Polyembryome ¬ *C80.9*

Polyendocrinopathie
- Auto-immun
- - Type
- - - 1 ¬ *E31.0*
- - - II (APS2) ¬ Syndrome de *E31.0*
- - ¬ *E31.0*
- Entéropathie lié à l'X ¬ Syndrome de dérèglement immunitaire- *E31.0*

Polyglandulaire
- Auto-immun
- - Type
- - - 1 ¬ Syndrome *E31.0*
- - - 2 ¬ Syndrome *E31.0*
- - ¬ Insuffisance *E31.0*
- ¬ Syndrome *D44.8*

Polyglobulie
- Bénigne ¬ Polycythémie [*D75.0*
- Essentielle ¬ *D45*
- Familiale ¬ Polycythémie [*D75.0*
- Primitive aiguë et érythroleucose ¬ *C94.0*

Polyglucosane
- Adulte ¬ Maladie des corps de *E74.0*
- Type
- - 1 ¬ Myopathie à corps de *E74.0*
- - 2 ¬ Myopathie à corps de *E74.0†, G73.6**

Polykystique
- Autosomique
- - Dominant ¬ Rein *Q61.2*
- - Récessif ¬ Rein *Q61.1*
- Congénitale du poumon ¬ Maladie: *Q33.0*
- Sans précision ¬ Rein *Q61.3*
- Type
- - Adulte ¬ Rein *Q61.2*
- - Infantile ¬ Rein *Q61.1*
- ¬
- - SOPK [Syndrome ovarien *E28.2*
- - Syndrome ovarien *E28.2*

Polykystose
- Hépatique
- - Autosomique dominante ¬ *Q44.6*
- - Isolée ¬ *Q44.6*
- Rénal Potter type
- - I ¬ *Q61.1*
- - III ¬ *Q61.2*

Poly-L) glycoprotéine ¬ Thrombophilie héréditaire due au déficit congénital en histidine-rich (*D68.5*

Polymastie ¬ *Q83.1*

Polyménorrhée
- Métrorragie ¬ Ménorragie, *N92*
- ¬ *N92.0*

Polymicrogyrie
- Bilatérale ¬ *Q04.3*
- Unilatérale ¬ *Q04.3*
- ¬ Syndrome mégalencéphalie-malformation capillaire- *Q87.3*

Polymorphe
- Bulleux ¬ Érythème *L51.1*
- Catécholaminergique ¬ Tachycardie ventriculaire *I47.2*
- Grossesse ¬ Éruption *O26.88*
- Non bulleux ¬ Érythème *L51.0*
- Sans
- - Précision ¬ Érythème *L51.9*
- - Symptômes schizophréniques ¬ Trouble psychotique aigu *F23.0*
- Symptômes schizophréniques ¬ Trouble psychotique aigu *F23.1*
- ¬
- - Arthropathie au cours d'érythème *L51.9†, M14.89**
- - Dystrophie postérieure *H18.5*
- - Érythème *L51*
- - Formes d'érythème *L51.8*
- - Lucite *L56.4*
- - Réticulose *C86.0*

Polymyalgie rhumatismal ¬
- *M35.3*
- Artérite à cellules géantes avec *M31.5*

Polymyosite
- Atteinte pulmonaire ¬ *M33.2†, J99.1**
- Juvénile ¬ *M33.2*
- ¬ *M33.2*

Polyneuropathie
- Amyloïde
- - Type portugais ¬ *E85.1†, G63.3**
- - ¬ *E85.1†, G63.3**
- Associée à une gammopathie monoclonale IgM ayant une activité anti-MAG ¬ *D47.2†, G63.1**
- Béribéri ¬ *E51.1†, G63.4**
- Cours
- - Amylose familiale ¬ *E85.1†, G63.3**
- - Anémie
- - - Carence alimentaire en vitamine B12 ¬ *D51.3†, G63.4**
- - - Pernicieuse ¬ *D51.0†, G63.4**
- - Avitaminose NCA ¬ *E56.9†, G63.4**
- - Carence vitamine
- - - B ¬ *E53.9†, G63.4**
- - - B12 ¬ *E53.8†, G63.4**
- - - ¬ *E56.9†, G63.4**
- - Collagénose NCA ¬ *M35.9†, G63.5**
- - Diphtérie ¬ *A36.8†, G63.0**
- - Hypoglycémie ¬ *E16.2†, G63.3**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, G63.5**
- - Maladie

Polyneuropathie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Endocrinienne NCA ¬ *E34.9†, G63.3**
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, G63.0**
- - - Métabolique NCA ¬ *E88.9†, G63.3**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, G63.0**
- - Mononucléose infectieuse ¬ *B27.9†, G63.0**
- - Pellagre ¬ *E52†, G63.4**
- - Périartérite noueuse ¬ *M30.0†, G63.5**
- - Polyarthrite chronique ¬ *M05.30†, G63.6**
- - Porphyrie ¬ *E80.2†, G63.3**
- - Tuberculose ¬ *A17.8†, G63.0**
- - Tumeur
- - - Maligne NCA ¬ *C80.9†, G63.1**
- - - ¬ *D48.9†, G63.1**
- - Urémie ¬ *N18.89†, G63.8**
- Déficience intellectuelle-acromicrie-ménopause prématurée ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Diabétique diabète sucré type
- - 1 ¬ *E10.40†, G63.2**
- - 2 ¬ *E11.40†, G63.2**
- Liée à l'alimentation NCA ¬ *E63.9†, G63.4**
- Précisées ¬ Autres *G62.88*
- Réanimation ¬ *G62.80*
- Sérum antitétanique ¬ *G61.1, Y59.9!*
- Syphilitique
- - Congénitale tardive ¬ *A50.4†, G63.0**
- - Tardive ¬ *A52.1†, G63.0**
- ¬
- - Diabète sucré
- - - *E14.40†, G63.2**
- - - Type 1 avec *E10.40†, G63.2**
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, G62.9*
- - Sclérose systémique avec *M34.8†, G63.5**
- - Syndrome d'encéphalite limbique-neuromyotonie-hyperhidrose- *G60.8*

Polynévrite
- Agents toxiques ¬ *G62.2*
- Alcoolique ¬ *G62.1*
- Cours
- - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ *M35.9†, G63.5**
- - Carence en vitamine NCA ¬ *E56.9†, G63.4**
- - Maladie
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *G63.0**
- - - Lyme ¬ *A69.2†, G63.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *G63.8**
- Crânienne ¬ *G52.7*
- Diphtérique ¬ *A36.8†, G63.0**
- Endémique ¬ *E51.1†, G63.4**
- Inflammatoire
- - Sans précision ¬ *G61.9*

Polynévrite *–suite*
- Inflammatoire *–suite*
- - ¬ Autres *G61.8*
- Irradiation ¬ *G62.8*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.30†, G63.6**
- Médicamenteuse ¬ *G62.0*
- Ourlienne ¬ *B26.8†, G63.0**
- Périphérique symétrique ¬ *G61.9*
- Post-herpétique ¬ *B02.2†, G63.0**
- Post-zostérienne ¬ *B02.2†, G63.0**
- Précisées ¬ Autres *G62.8*
- Sans précision ¬ *G62.9*
- Syphilitique congénitale tardive ¬ *A50.4†, G63.0**
- Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G63.0**
- ¬ Autres *G62*

Polynévritique ¬ Hérédopathie ataxique *G60.1*

Polyomavirus ¬ Infection à *B34.4*

Polyorchidie ¬ *Q55.2*

Polyostotique fibreuse [maladie de Jaffe-Lichtenstein] ¬ Dysplasie *Q78.1*

Polyotie ¬ *Q17.0*

Polype
- Adénomateux ¬ *D28*
- Anal ¬ *K62.0*
- Appareil génital femme
- - Sans précision ¬ *N84.9*
- - ¬ *N84*
- Choanes ¬ *J33.0*
- Col
- - Utérus ¬ *N84.1*
- - ¬ Soins maternels pour: *O34.4*
- Côlon ¬ *K63.5*
- Cordes vocales et du larynx ¬ *J38.1*
- Corps utérus ¬
- - *N84.0*
- - Soins maternels pour: *O34.1*
- Endocervical ¬ *N84.1*
- Endomètre ¬ *N84.0*
- Estomac et du duodénum ¬ *K31.7*
- Fosses nasales ¬ *J33.0*
- Hyperplasique ¬
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Inflammatoires du côlon ¬ *K51.4*
- Intestin grêle ¬ *K63.8*
- Intestinal ¬ *K63.8*
- Lèvres ¬ *N84.3*
- Muqueux du col ¬ *N84.1*
- Nasal
- - Sans précision ¬ *J33.9*
- - ¬ *J33*
- Ombilical du nouveau-né ¬ *P83.6*
- Oreille moyenne ¬ *H74.4*

Polype *–suite*
- Parties de l'appareil génital de la femme ¬ *N84.8*
- Placentaire ¬ *O90.8*
- Rectal ¬ *K62.1*
- Rhinopharyngé ¬ *J33.0*
- SAP ¬
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Sinus
- - Ethmoïdal ¬ *J33.8*
- - Face ¬ *J33.8*
- - Maxillaire ¬ *J33.8*
- - Sphénoïdal ¬ *J33.8*
- - ¬ Autres *J33.8*
- Utérus SAI ¬ *N84.0*
- Vagin ¬ *N84.2*
- Vulve ¬ *N84.3*

Polypeptide
- Intestinal vaso-actif ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: *E16.8*
- Pancréatique ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: *E16.8*

Polypeptidome pancréatique] ¬ Ppome [*D37.70*

Polyphagie ¬ *R63.2*

Polyploïdie ¬ Triploïdie et *Q92.7*

Polypoïde ¬ Hyperplasie de l'endomètre: *N85.0*

Polypose
- Adénomateux familial
- - Atténué
- - - Liée à MUTYH ¬ *D12.6*
- - - ¬ *D12.6*
- - ¬ *D12.6*
- Gastro-intestinale juvénile ¬ *D12.6*
- Héréditaire) du côlon ¬ *D12.6*
- Hyperplasique ¬ *D12.6*
- Intestinal
- - Familiale ¬ *D12.6*
- - ¬ *D12.6*
- Juvénile ¬ Syndrome de *D12.6*
- Lymphomateuse maligne ¬ *C83.1*
- Mixte héréditaire ¬ *D12.6*
- Rhino-sinusienne déformante ¬ *J33.1*
- ¬
- - Cap *D12.6*
- - Syphilis gastrique tardive avec *A52.7†, K93.8**

Polyposique [HNPCC] ¬ Cancer du côlon héréditaire non *C18.9, Z80.0*

Polyradiculonévrite
- Aiguë (post-)infectieuse ¬ *G61.0*
- Démyélinisante inflammatoire aiguë ¬ *G61.0*
- Dysimmunitaire subaiguë ¬ *G61.8*

Polyrhinie ¬ *Q30.8*

Polysérite tuberculeuse ¬ *A19*

Polysérosite récurrente bénigne ¬ *E85.0*

Polysorbate 20 ¬ Hypersensibilité au *T78.4*

Polysplénie ¬

- *Q89.08*
- Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou *Q20.6*

Polysyndactylie

- Croisée ¬ *Q70.4*
- Malformation cardiaque ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Pouce triphalangé ¬ Syndrome d'hémimélie tibiale- *Q87.2*
- ¬ *Q70.4*

Polythélie isolée ¬ *Q83.3*

Polytrichie ¬ *L68.3*

Polyurie ¬ *R35*

POMK ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.0*

Pomme ¬ Syndrome de la pelure de *Q41.1*

Pommette ¬ Fracture ouverte de la *S02.4, S01.87!*

Pompe

- Extracorporel ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Adaptation d'une *Z45.02*
- Insuline ¬ *Z96.4*
- Intracorporelle ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Adaptation d'une *Z45.02*
- Médicaments ¬ Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une *Z45.82*
- Paracorporelle ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Adaptation d'une *Z45.02*
- Perfusion ¬ Ajustement et entretien d'une *Z45.1*
- Protons ¬ Eosinophilie œsophagienne répondant aux inhibiteurs de la *K20*
- ¬
- - Maladie de: *E74.0*
- - Sérome dû à la poche d'une *T85.88*

Pompholyx] ¬ Dyshidrose [*L30.1*

Poncet ¬ Maladie de *A18.0†, M01.19**

Ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence ¬ Incision, *Y69!*

Ponctuée

- Albescente
- - Vitelliforme) ¬ Dystrophie: rétinienne (pigmentaire) (*H35.5*
- - ¬ Rétinite *H35.5*
- Brachytéléphalangie ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*
- Dominante liée à l'X ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*
- Liée à X type 2 ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*

Ponctuée *–suite*

- Palmaire et plantaire) ¬ Kératose *L85.2*
- Rhizomélique
- - Type
- - - 1 ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*
- - - 2 ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*
- - - 3 ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*
- - - 5 ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*
- - ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*
- Superficiel
- - Thygeson ¬ Kératite *H16.1*
- - ¬ Kératite: *H16.1*
- Tibiométacarpienne ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*
- Type
- - 1 ¬ Kératodermie palmoplantaire *Q82.8*
- - 2 ¬ Kératodermie palmoplantaire *Q82.8*
- - Toriello ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*
- ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*

Ponctuel complication oculaire diabétique

- Diabète type
- - 1 ¬ Saignement *E10.30†, H58.8**
- - 2 ¬ Saignement *E11.30†, H58.8**
- ¬ Saignement *E14.30†, H58.8**

Pondéral
v.a. staturo-pondéral

- ¬ Retard (de): *R62.8*

Pont de Varole ¬ Lésion syphilitique du *A52.1†, G94.8**

Pontage

- Aorto-coronaire ¬ Présence d'un *Z95.1*
- Coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque ¬ Complication mécanique d'un *T82.2*
- Ventriculaire ¬ Hypotension intracrânienne suite à un *G97.2*
- ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de vaisseaux de *I25.15*

Pontiac] ¬ Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de *A48.2*

Pontique ¬ Dysplasie du tegmentum *Q04.8*

Pontocérébelleuse type

- 1 ¬ Hypoplasie *Q04.3*
- 2 ¬ Hypoplasie *Q04.3*
- 3 ¬ Hypoplasie *Q04.3*
- 4 ¬ Hypoplasie *Q04.3*
- 5 ¬ Hypoplasie *Q04.3*
- 6 ¬ Hypoplasie *Q04.3*
- 7 ¬ Hypoplasie *Q04.3*
- 8 ¬ Hypoplasie *Q04.3*
- 9 ¬ Hypoplasie *Q04.3*
- 10 ¬ Hypoplasie *Q04.3*

Poplité

- Autosomique dominant ¬ Syndrome des ptérygiums *Q87.8*
- Baker] ¬ Kyste synovial *M71.2*
- Externe

Poplité *–suite*

- Externe *–suite*
- - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du nerf sciatique *S84.1*
- - ¬ Lésion du nerf sciatique *G57.3*
- Interne
- - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du nerf sciatique *S84.0*
- - ¬ Lésion du nerf sciatique *G57.4*
- Piégé
- - Popliteal artery entrapment syndrome] ¬ Syndrome de l'artère *I77.1*
- - ¬ Syndrome de l'artère *I77.1*
- ¬
- - Déchirure d'un kyste *M66.0*
- - Lésion traumatique
- - - Artère *S85.0*
- - - Veine *S85.5*
- - Oblitération de l'artère *I74.3*
- - Phlébite de la veine *I80.28*
- - Syndrome des ptérygiums *Q87.8*
- - Thrombophlébite de la veine *I80.28*
- - Thrombose de la veine *I80.28*

Popliteal artery entrapment syndrome ¬

- *I77.1*
- Syndrome de l'artère poplitée piégée [*I77.1*

Populaires ¬ Abus de: préparations à base de plantes ou remèdes *F55*

Population ¬ Examen sanitaire au cours d'enquêtes de *Z00.8*

Porak et Durante ¬ Maladie de *Q78.0*

Porc

- Sanglier ¬ Brucellose du *A23.2*
- ¬
- - Érythème migrant [rouget du *A26.0*
- - Infection par cestodes du *B68.0*
- - Rouget du *A26.0*

Porcine

- Identifié ¬ Grippe
- - Asiatique [influenza], virus de grippe *J09, U69.20!*
- - Influenza] avec myocardite, virus de grippe *J09, U69.20!*
- ¬
- - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou *J10.0*
- - Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe *J10.8†, G05.1**
- - Encéphalopathie lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe *J10.8†, G94.3**
- - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.8*

Porcine *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*

- - Gastroentérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.8*

- - Grippe

- - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*

- - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*

- - - Influenza

- - - - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*

- - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*

- - - - Laryngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*

- - - - Otite, virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe *J10.8†, H67.1**

- - - - Pharyngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*

- - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*

- - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*

- - Infection

- - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*

- - - Virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*

- - Influenza

- - - A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe *U69.20!*

- - - Pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.0*

- - - Virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe *J10.1*

- - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou *J10.8*

- - Myocardite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe *J10.8†, I41.1**

- - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.0*

Porcine *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Polio-encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des virus de la grippe aviaire et de la grippe *J10.8†, G05.1**

Porencéphalie ¬ *Q04.6*

Porencéphalique, acquis ¬ Kyste: *G93.0*

Poretti-Boltshauser ¬ Syndrome de *G11.1*

Porocéphalose ¬ *B88.8*

Porokératose

- Actinique superficielle disséminée ¬ *Q82.8*

- Mibelli ¬ *Q82.8*

- Palmoplantaire et disséminée ¬ *Q82.8*

- ¬ Syndrome de craniosynostose-anomalies anales- *Q87.8*

Porphyrie

- Aiguë intermittente (hépatique) ¬ *E80.2*

- Cutanée tardive ¬ *E80.1*

- Déficit en delta-aminolévulinate déshydratase ¬ *E80.2*

- Doss ¬ *E80.2*

- Érythropoïétique

- - Congénitale ¬ *E80.0*

- - Héréditaire ¬ *E80.0*

- Hépatique aiguë ¬ *E80.2*

- Hépatoérythropoïétique ¬ *E80.2*

- SAI ¬ *E80.2*

- Variegata ¬ *E80.2*

- ¬

- - *E80.2*

- - Polyneuropathie au cours de *E80.2†, G63.3**

Port ¬ Système

- *Z45.20*

- *Z95.81*

Portal

- Anormal ¬ Retour veineux *Q26.5*

- ¬

- - Cirrhose (du foie): *K74.6*

- - Hypertension *K76.6*

Porte

- Artère hépatique (congénitale) ¬ Fistule entre la veine *Q26.6*

- Splénique ¬ Lésion traumatique de la veine *S35.3*

- Syphilis ¬ Thrombose de la veine *A52.0†, I98.0**

- ¬

- - Obstruction de la veine *I81*

- - Phlébite de la veine *K75.1*

- - Syphilis de la veine *A52.0†, I98.0**

- - Thrombose de la veine *I81*

Porteur

- Antigène de surface du virus de l'hépatite B [AgHBs] ¬ *B18.13*

- Blénorragie ¬ Sujet *Z22.4*

- Diphtérie ¬ Sujet *Z22.2*

Porteur *–suite*

- Germes responsables d'une maladie infectieuse ¬ Sujet *Z22*

- Hépatite B ¬ (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet *B17.0*

- Immunoglobulines ¬ Agammaglobulinémie: avec lymphocytes B *D80.1*

- Infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1] ¬ Sujet *Z22.6*

- Maladie

- - Bactérien

- - - Méningocoques ¬ Sujet *Z22.3*

- - - Précisées ¬ Sujet *Z22.3*

- - - Staphylocoques ¬ Sujet *Z22.3*

- - - Streptocoques ¬ Sujet *Z22.3*

- - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel ¬ Sujet *Z22.4*

- - Infectieux

- - - Sans précision ¬ Sujet *Z22.9*

- - - ¬ Sujet *Z22.8*

- - Intestinales infectieuses ¬ Sujet *Z22.1*

- Syphilis ¬ Sujet *Z22.4*

- Typhoïde ¬ Sujet *Z22.0*

- ¬ sujet suspecté *Z22*

Portion

- Cervicotrochantérienne ¬ *S72.05*

- Intracrânienne ¬ Anévrysme de l'artère carotide interne dans sa *I67.10*

- Vaginale du col utérin ¬ Atrésie de la *Q51.8*

Porto-cave ¬ Encéphalopathie *K72.9, K72.79!*

Porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un shunt *Z95.88*

Portugais ¬ Polyneuropathie amyloïde de type *E85.1†, G63.3**

Positif

- Activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, AgHBe *B18.12*

- Causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram *B96.7!*

- Multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres bactéries Gram *U80.8!*

- Non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes anaérobies Gram *B95.91!*

- Précis cause maladie classé chapitre ¬ micro-organisme

- - Aérobies Gram *B95.90!*

- - Gram *B95.9!*

- Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ Micro-organismes Gram *U80!*

- Sans activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta: AgHBe *B18.11*

Positif *–suite*
- Sérum acidifié ¬ Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec test de lyse *D64.4*
- Test
- - Coombs ¬ Résultat *R76.8*
- - Sérologique de la syphilis ¬ Résultats faussement *R76.2*
- Virus Epstein-Barr chez l'enfant ¬ Maladie lymphoproliférative systémique à cellules T *D82.3*
- ¬
- - Carcinome mammaire invasif à récepteurs hormonaux *C50.9*
- - Cultures *R82.7*
- - Décollement de la rétine au cours de rétinite à CMV [cytomégalovirus], VIH *B20†, H32.0*, B25.88*
- - Leucémie myéloïde chronique LMC
- - - BCR/ABL *C92.1*
- - - Chromosome Philadelphie (Ph1) *C92.1*
- - Lymphome
- - - Anaplasique grand cellule
- - - - ALK *C84.6*
- - - - CD30 *C84.6*
- - - B à grandes cellules ALK *C83.3*
- - - Cutané à grandes cellules T, CD30 *C86.6*
- - - Diffus à grandes cellules B CD30 *C83.3*
- - Pian sans signes cliniques, avec sérologie *A66.8*
- - Pneumothorax spontané avec pression *J93.0*
- - Réaction de Wassermann faussement *R76.2*
- - Sérologie syphilitique *A53.0*
- - Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 *C86.6*

Position
- Anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec *K07.3*
- Basse de l'oreille ¬ *Q17.4*
- Couchée ¬ Syndrome hypotensif en *O26.5*
- Instable
- - Avant le travail ¬ *P01.7*
- - ¬ Soins maternels pour *O32.0*
- Occipito
- - Iliaque ¬ Dystocie due à la persistance en *O64.0*
- - Postérieure ¬ Dystocie due à la persistance en *O64.0*
- - Sacrée ¬ Dystocie due à la persistance en *O64.0*
- - Transverse ¬ Dystocie due à la persistance en *O64.0*
- Oreille ¬ Anomalie de *Q17.4*
- Ostia coronaires ¬ Anomalie de *Q24.5*
- Pavillon de l'oreille ¬ Anomalie congénitale de la *Q17.4*
- Présentation anormal
- - Fœtus ¬ Dystocie due à une *O64*

Position *–suite*
- Présentation anormal *–suite*
- - Sans précision ¬ Dystocie due à une *O64.9*
- - ¬ Dystocie due à d'autres *O64.8*
- Rate ¬ Anomalie congénitale de la *Q89.08*
- Sein ¬ Anomalie congénitale de la *Q83.88*
- Transverse
- - Oblique ¬ Soins maternels pour *O32.2*
- - ¬ Arrêt en profondeur en *O64.0*
- Vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et *P03.1*

Possession ¬ Etats de transe et de *F44.3*

Possible
- Distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas *Y34.9!*
- Sévices
- - Physiques infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de *Z61*
- - Sexuels infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de *Z61*
- ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément réductible, réintroduction manuelle *K64.2*

Post-antibiothérapie ¬ Diarrhée *K52.1*

Post-cardiotomie ¬ Syndrome *I97.0*

Post-chirurgical
- Anse borgne ¬ Syndrome *K91.2*
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose consécutive à une malabsorption *M80.3*
- Non classée ailleurs ¬ Malabsorption *K91.2*
- Précisés ¬ Autres états *Z98.8*
- ¬
- - Asplénie *D73.0*
- - États *Z98*
- - Hypoinsulinémie *E89.1*
- - Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption *M83.2*
- - Ostéoporose consécutive à une malabsorption *M81.3*

Post-cholécystectomie ¬ Syndrome *K91.5*

Post-commotionnel ¬ Syndrome *F07.2*

Post-dysentérique ¬ Arthrite *M02.1*

Post-encéphalitique ¬
- Parkinsonisme *G21.3*
- Syndrome
- - *F07.1*
- - Parkinsonien *G21.3*

Post-épileptique de Todd ¬ Paralysie *G83.8*

Postérieur
v. Type de maladie

Postéro-basal ¬ Infarctus
- Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- Transmural (aigu): *I21.2*

Postéro-inférieur ¬ Infarctus
- Répété (aigu) (de): *I22.1*
- Transmural (aigu) (de): *I21.1*

Postéro-latéral ¬ Infarctus
- Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- Transmural (aigu): *I21.2*

Postéro-septal ¬ Infarctus
- Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- Transmural (aigu): *I21.2*

Post-gastrectomie ¬ Syndrome (de): *K91.1*

Post-gonorrhéique ¬
- Spermatocystite *A54.2†, N51.8**
- Vésiculite *A54.2†, N51.8**

Post-hémorragique
- Aiguë ¬ Anémie *D62*
- Chronique) ¬ Anémie *D50.0*
- Nouveau-né ¬ Hydrocéphalie *P91.7*

Post-herpétique
- Ganglion géniculé ¬ Atteinte *B02.2†, G53.0**
- ¬
- - Névralgie trigéminée
- - - *B02.2†, G53.0**
- - - *G53.0**
- - Polynévrite *B02.2†, G63.0**

Posthite
v. Balano-posthite

Post-hypoglycémique ¬ Encéphalopathie *E16.1†, G94.3**

Post-ictale) ¬ Paralysie de Todd (*G83.8*

Post-infectieux
v. Type de maladie

Post-inflammatoire
- Post-traumatique) de la macula (pôle postérieur) ¬ Cicatrice (*H31.0*
- ¬
- - Hyperpigmentation *L81.0*
- - Perforation du tympan: *H72*

Post-laminectomie, non classé ailleurs ¬ Syndrome *M96.1*

Post-leucotomie ¬ Syndrome (des): *F07.0*

Postlinguale ¬ Surdité génétique non syndromique *H90.5*

Postmaturité SAI ¬ *P08.2*

Post-méningococcique ¬ Arthrite *A39.8†, M03.09**

Post-ménopausique
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose *M80.0*
- ¬
- - Ostéoporose *M81.0*
- - Saignements *N95.0*
- - Urétrite: *N34.2*
- - Vaginite atrophique *N95.2*

Post-morbilleuse ¬
- Encéphalite *B05.0†*
- Méningite *B05.1†*
- Otite moyenne *B05.3†*
- Pneumonie *B05.2†*

Post-natal
- Prénatale) ¬ Hypoplasie de l'émail (néonatale) (*K00.4*
- Progressive ¬ Syndrome tétraplégie spastique-corps calleux fin-microcéphalie *Q02*

Post-nécrotique ¬ Cirrhose (du foie): *K74.6*

Post-opératoire
v. Type de maladie

Postorgasmique ¬ Maladie *F52.3*

Post-ostéotomie ¬ Pseudarthrose *M96.0*

Post-partum
v. Type de maladie

Post-phlébitique
- Membres inférieurs ¬ Ulcération *I87.01*
- SAI ¬ Syndrome *I87.00*
- Sans ulcération ¬ Syndrome *I87.00*
- Ulcération ¬ Syndrome *I87.01*
- ¬ Syndrome *I87.0*

Post-poliomyélitique ¬ Syndrome *G14*

Post-pylorique ¬ ulcère: *K26*

Post-radiothérapie ¬
- Encéphalopathie *G93.88*
- Myélopathie: *G95.8*

Post-radique ¬ Encéphalopathie *G93.88, W91.9!*

Post-rhumatismale [Jaccoud] ¬ Arthropathie chronique *M12.0*

Post-schizophrénique ¬ Dépression *F20.4*

Post-thrombotique
- SAI ¬ Syndrome *I87.00*
- Sans ulcération ¬ Syndrome *I87.00*
- Ulcération ¬ Syndrome *I87.01*
- ¬ Ulcère de jambe *I83.0*

Post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux ¬ Défauts de la transformation *E77.0*

Post-tranplantation ¬ Maladie lymphoproliférative *D47.9*

Post-transfusionnelle ¬ Hépatite *B19.9*

Post-transplantation ¬ Hyperlipidémie *E78.5*

Post-traumatique
v. Type de maladie

Post-TVT
- Tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ¬ Rétention urinaire postopératoire *T83.8*
- ¬ Érosion postopératoire *T83.4*

Posturale ¬
- Cyphose *M40.0*
- Hypotension *I95.1*
- Lordose: *M40.4*
- Scoliose congénitale: *Q67.5*

Posturaux ¬ Myopathie liée à l'X avec atrophie des muscles *G71.0*

Posture anormale ¬ *R29.3*

Post-vaccinal ¬
- Arthrite *M02.2*
- Encéphalite *G04.0*

Post-vaccinal ¬ *–suite*
- Encéphalomyélopathie *G04.0*
- Thrombocytopénie *D69.58, Y59.9!*

Post-vaccination ROR ¬ Déficit immunitaire primaire avec infection virale disséminée *D84.8, T88.0*

Post-vagotomie ¬ Syndrome (de): *K91.1*

Post-varicelleuse ¬ Encéphalite *B01.1†*

Post-virale ¬ Syndrome de fatigue *G93.3*

Post-zostérien
- Trijumeau ¬ Névralgie *B02.2†, G53.0**
- ¬ Polynévrite *B02.2†, G63.0**

Potasse] ¬ Hydroxyde de: potassium [*T54.3*

Potassique du nouveau-né ¬ Anomalies de l'équilibre *P74.3*

Potassium
- K ¬
- - Déficit en *E87.6*
- - Excès de *E87.5*
- - Surcharge en *E87.5*
- Potasse] ¬ Hydroxyde de: *T54.3*
- ¬ Déséquilibre du métabolisme du *E87.8*

Potion SAI ¬ Somnifères: *T42.7*

Potocki-Shaffer ¬ Syndrome de *Q93.5*

Pott ¬ Mal
- *A18.0†, M49.09**
- *M49.0**

Pott-Buckel ¬ Syndrome de *A18.0†, M49.09**

Potter
- Fente-cardiopathie ¬ Syndrome de séquence de *Q87.8*
- Type
- - I ¬ Polykystose rénale de *Q61.1*
- - II] ¬ Dysplasie rénale multikystique [*Q61.4*
- - III ¬ Polykystose rénale de *Q61.2*
- ¬ Syndrome de *Q60.6*

Pottique ¬ Gibbosité *A18.0†, M49.09**

Pouce
- Adduction-arthrogrypose, type Dundar ¬ Syndrome des *Q79.6*
- Biphalangé ¬ Polydactylie d'un *Q69.1*
- Complète) (partielle) ¬ Amputation traumatique du *S68.0*
- Long-brachydactylie ¬ Syndrome de *Q87.2*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs et abducteurs du *S56.3*
- - - Fléchisseurs du *S56.0*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs du *S66.2*
- - - Intrinsèques du *S66.4*
- - - Longs fléchisseurs du *S66.0*
- Ongle) ¬ *T23*
- Orteils larges ¬ Ankylose de l'étrier avec *Q87.8*

Pouce *–suite*
- Partie non précisée ¬ Fracture du *S62.50*
- Phalange
- - Distale ¬ Fracture du *S62.52*
- - Proximale ¬ Fracture du *S62.51*
- Quervain] ¬ Ténosynovite chronique sténosante du *M65.4*
- S
- - Doigt(s) ¬ Écrasement du *S67.0*
- - Surnuméraire(s) ¬ *Q69.1*
- Triphalangé
- - Hypospadias-progénie ¬ Syndrome d'hypoplasie du radius- *Q87.2*
- - ¬
- - - Polydactylie d'un *Q69.1*
- - - Syndrome
- - - - Agénésie pulmonaire-anomalie cardiaque- *Q87.8*
- - - - Hémimélie tibiale-polysyndactylie- *Q87.2*
- Trois phalanges ¬ *Q74.0*
- Unilatérale ¬ Absence acquise de doigt(s) [y compris le *Z89.0*
- ¬
- - Absence congénitale du *Q71.3*
- - Fracture du *S62.5*
- - Hypoplasie congénitale du *Q71.8*
- - Lésion traumatique
- - - Nerf collatéral du *S64.3*
- - - Vaisseau(x) sanguin(s) du *S65.4*
- - Plaie ouverte du *S61.0*
- - Succion du *F98.88*

Poulet ¬ Allergie aux protéines de *T78.1*

Pouls
- Faible ¬ *R09.8*
- Non classée ailleurs ¬ Activité électrique sans *R00.3*

Poumon
- Abcès cérébral ¬ Abcès amibien du *A06.6†, G07**
- Acquise) ¬ Maladie (du): kystique du *J98.4*
- Agent chimique
- - Émanations, des fumées et des gaz ¬ Œdème du *J68.1*
- - ¬ Œdème (aigu) du *J68.1*
- Bauxite ¬ Fibrose (du *J63.1*
- Champignonnistes ¬ *J67.5*
- Écorceurs d'érables ¬ *J67.6*
- Éleveurs
- - Perruches ¬ Maladie ou *J67.2*
- - Pigeons ¬ Maladie ou *J67.2*
- Faneurs ¬ *J67.0*
- Fermier ¬ *J67.0*
- Fourreurs ¬ *J67.8*
- Graphite ¬ Fibrose (du *J63.3*
- Irradiation ¬ Fibrose du *J70.1*
- Kystique congénital ¬ *Q33.0*

Poumon *–suite*
- Laveurs de fromage ¬ *J67.8*
- Lobe) ¬ Absence de *Q33.3*
- Malteurs ¬ *J67.4*
- Manipulateurs de liège ¬ Maladie ou *J67.3*
- Médiastin ¬ Abcès du *J85*
- Mineurs de charbon ¬ *J60*
- Moissonneurs ¬ *J67.0*
- Nid d'abeille, congénital ¬ *Q33.0*
- Niveau urgence
- - HU [High Urgency]] ¬ Inscription pour transplantation cœur- *U55.32*
- - U [Urgency] ¬ Inscription pour transplantation cœur- *U55.31*
- Oiseleurs ¬ *J67.2*
- Partie de] ¬ Absence acquise de *Z90.2*
- Petites cellules ¬ Cancer du *C34.9*
- Pneumonie ¬ Abcès
- - *J85.1*
- - Amibien du *A06.5†*, *J17.3**
- SAI ¬
- - Abcès du *J85.2*
- - Maladie (du): *J98.4*
- Sans
- - Niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour transplantation cœur- *U55.30*
- - Pneumonie ¬ Abcès du *J85.2*
- - Précision ¬
- - - Malformation congénitale du *Q33.9*
- - - Tumeur maligne: Bronche ou *C34.9*
- Sarcoïdose des ganglions lymphatiques ¬ Sarcoïdose du *D86.2*
- Stade
- - 1 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.06†*, *J99.21**
- - 2 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.07†*, *J99.22**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.07†*, *J99.23**
- Torréfacteurs de café ¬ *J67.8*
- Travailleurs
- - Liège ¬ Maladie ou *J67.3*
- - Préparations alimentaires à base de poissons ¬ *J67.8*
- Ventilation du nouveau-né ¬ *P27.8*
- ¬
- - *T17.8*
- - Abcès
- - - Amibien
- - - - *A06.5†*, *J99.8**
- - - - Cerveau (et du foie) (et du *A06.6†*
- - - - Foie et du *A06.5†*, *J99.8**
- - - Aspergillaire du *B44.1*
- - Agénésie du *Q33.3*
- - Aluminose (du *J63.0*
- - Amibiase du *A06.5†*, *J99.8**

Poumon *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des *Z80.1*
- - - Personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des *Z85.1*
- - Aspergillose invasive du *B44.0†*, *J99.8**
- - Blastomycose primaire du *B40.0†*, *J99.8**
- - Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les *T27.1*
- - Calcification du *J98.4*
- - Candidose des *B37.1†*, *J99.8**
- - Carcinoma in situ: Bronches et *D02.2*
- - Collapsus du *J98.1*
- - Contusion et hématome du *S27.31*
- - Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les *T27.5*
- - Cryptococcose des *B45.0†*, *J99.8**
- - Déchirure du *S27.32*
- - Donneur de *Z52.80*
- - Échec rejet
- - - Greffe cœur- *T86.3*
- - - Organes et tissus greffés: Greffe de *T86.81*
- - Échinococcose kystique du *B67.1†*, *J99.8**
- - Fibrose silicotique (massive) du *J62*
- - Gangrène et nécrose du *J85.0*
- - Granulome éosinophilique des *C96.6*
- - Hile (du *C34.0*
- - Histoplasmose
- - - Aiguë du *B39.0†*, *J99.8**
- - - Chronique du *B39.1†*, *J99.8**
- - Hypoplasie et dysplasie du *Q33.6*
- - Inscription pour transplantation cœur- *U55.3*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la trachée, des bronches et des *J95.82*
- - Kyste hydatique du *B67.9†*, *J99.8**
- - Lésion traumatique
- - - *S27.3*
- - - Vaisseaux sanguins du *S25.4*
- - Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des *M32.1†*, *J99.1**
- - Maladie
- - - Kystique congénital
- - - - *Q33.0*
- - - Polykystique congénitale du *Q33.0*
- - - VIH avec candidose des *B20, B37.1*
- - Malformation
- - - Adénomatoïde kystique du *Q33.0*
- - - Congénitales du *Q33.8*
- - Microlithiase alvéolaire du *J84.0*
- - Mycose du *B49†*, *J99.8**
- - Nocardiose du *A43.0†*, *J99.8**
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R91*

Poumon *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Sarcoïdose du *D86.0*
- - Status post greffe
- - - *Z94.2*
- - - Cœur et *Z94.3*
- - Syphilis des *A52.7†*, *J99.8**
- - Torulose des *B45.0†*, *J99.8**
- - Toxoplasmose du *B58.3†*, *J17.3**
- - Tumeur
- - - Bénigne: Bronches et *D14.3*
- - - Carcinoïde productrice de mucus des *C34.9*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et *D38.1*
- - - Malign
- - - - Bronches et du *C34*
- - - - Lésion à localisations contiguës des bronches et du *C34.8*
- - - - Lobe
- - - - - Inférieur, bronches ou *C34.3*
- - - - - Moyen, bronches ou *C34.2*
- - - - - Supérieur, bronches ou *C34.1*
- - - - Secondaire du *C78.0*
- - - Neuroendocrine du *C34.9*
- - Zygomycose du *B46.0†*, *J99.8**

Poupée de son" ¬ Syndrome non spécifique du bébé " *P94.2*

Poursuite
- Grossesse
- - Avortement d'un ou plusieurs fœtus ¬ *O31.1*
- - Mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus ¬ *O31.2*
- Pénales ¬ *Z65*

Poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule ¬ Être pressé ou *W64.9!*

Poussée blastique au cours de leucémie myéloïde ¬ *C92.10, C94.8!*

Poussées) ¬ Sclérose en plaques rémittente (évolution par *G35.1*

Poussière
- Coton ¬ Affection des voies aériennes due aux *J66.0*
- Impuretés dans l'air ¬ *Z57*
- Inorganiques
- - Précisées ¬ Pneumoconiose due à d'autres *J63.8*
- - ¬ Pneumoconiose due à d'autres *J63*
- Organique
- - Moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine ¬ alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de *J67*
- - Précisées ¬ Affection des voies aériennes due à d'autres *J66.8*
- - Sans précision ¬ Alvéolite allergique due aux *J67.9*
- - ¬ Alvéolite allergique
- - - *J67*

Poussière *–suite*
- Organique *–suite*
- - ¬ Alvéolite allergique *–suite*
- - - *J67.8*
- Silice ¬ Pneumoconiose
- - *J62*
- - *J62.8*
- Talc ¬ Pneumoconiose due à la *J62.0*

Pouteau-Colles ¬ Fracture de *S52.51*

Poux
- Pubis] ¬ Phtiriase [Infestation par *B85.3*
- Rickettsia prowazekii ¬ Typhus épidémique à *A75.0*
- ¬
- - Fièvre récurrente [borréliose] à *A68.0*
- - Infestation
- - - Chevelure par des *B85.0*
- - - Corps par des *B85.1*
- - Myocardite due au typhus épidémique à *A75.0†, I41.0**
- - Typhus: épidémique (à *A75.0*

Powassan ¬ Maladie virale de *A84.8*

PPA] ¬ Aphasie progressive primaire [*G31.0†, F02.0**

PPARG ¬ Lipodystrophie partielle familiale associée à *E88.1*

PPG ¬ *L40.1*

PPLO] ¬ Pleuro-pneumonia-like-organism [*B96.0!*

Ppome [Polypeptidome pancréatique] ¬ *D37.70*

PR court ¬ Tachyarythmie atriale avec intervalle *I45.6*

Prader-Labhart-Willi ¬ Syndrome de *Q87.1*

Prader-Willi
- Délétion 15q11q13 d'origine paternelle ¬ Syndrome de *Q87.1*
- ¬ Syndrome de: *Q87.1*

Praecox ¬ Lymphoedema *I89.09*

Praevia
- Descente placenta
- - Hémorragie actuelle ¬ Placenta *O44.1*
- - Sans
- - - Hémorragie (actuelle) ¬ Placenta *O44.0*
- - - Précisions ¬ Placenta *O44.0*
- Hémorragie actuelle ¬ Placenta *O44.11*
- Sans hémorragie (actuelle) ¬ Placenta *O44.01*
- ¬
- - Fœtus et nouveau-né affectés par placenta *P02.0*
- - Placenta *O44*

Prasugrel ¬ Hypersensibilité au *T88.7*

Pratique sportive ¬ inscription dans: *Z02*

Praxis ¬ Crises induites par *G40.8*

PRCA
- Pure red cell aplasia] congénitale ¬ *D61.0*
- ¬ *D60.9*

Préauriculaire
- Ophtalmoplégie externe ¬ Syndrome de macrostomie-anomalies *Q87.0*
- ¬
- - Appendice *Q17.0*
- - Fistule et kyste *Q18.1*
- - Syndrome de déficience intellectuelle avec hypoplasie du corps calleux et appendices *Q87.8*

Préaxiale
- Colobome-déficience intellectuelle petite taille ¬ Syndrome de polydactylie *Q87.2*
- Orteils ¬ Polydactylie *Q69.2*
- Temtamy ¬ Syndrome de brachydactylie *Q87.2*

Prébêtalipoprotéinémie ¬ Hyperbêtalipoprotéinémie avec *E78.2*

Précalicielle ¬ Ectasie canaliculaire *Q61.5*

Précautions aseptiques ¬ Mesures insuffisantes de *Y69!*

Précédant accouchement
- Anomalie de la coagulation ¬ Hémorragie *O46.0*
- Associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) *O46.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie (importante) *O46.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie (importante) *O46.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) *O46.0*
- Non classée ailleurs ¬ Hémorragie *O46*
- Sans précision ¬ Hémorragie *O46.9*
- ¬ Autres hémorragies *O46.8*

Précérébral
- Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères *I63.2*
- Multiple bilatéral ¬
- - Accident ischémique transitoire de territoires artériels *G45.2*
- - Occlusion et sténose des artères *I65.3*
- N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères *I65*
- Non précis ¬ Malformation
- - Artérioveineuse congénitale des vaisseaux *Q28.09*
- - Congénitale des vaisseaux *Q28.19*
- SAI ¬ Artère *I65.9*
- Sans précision ¬ Occlusion et sténose d'une artère *I65.9*
- Y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères cérébrales et *I63*
- ¬
- - Anévrisme
- - - Acquis d'artères *I72.5*
- - - Artérioveineux congénital des vaisseaux *Q28.00*
- - - Congénital des vaisseaux *Q28.10*

Précérébral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anévrisme *–suite*
- - - Dissection d'une autre artère *I72.5*
- - Fistule
- - - Artérioveineuse congénitale des vaisseaux *Q28.01*
- - - Congénitale des vaisseaux *Q28.11*
- - Infarctus cérébral
- - - Embolie des artères *I63.1*
- - - Thrombose des artères *I63.0*
- - Malformation
- - - Artérioveineux
- - - - Congénitales des vaisseaux *Q28.08*
- - - - Vaisseaux *Q28.0*
- - - Congénitales des vaisseaux *Q28.18*
- - - Vaisseaux *Q28.1*
- - Occlusion et sténose d'une autre artère *I65.8*
- - Rupture d'anévrysme d'artères *I72.5*

Précipité ¬
- Bredouillement [langage *F98.6*
- Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement *P03.5*

Préclimatérique ¬ Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Précoce
v. Type de maladie

Précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale chez l'homme ¬ *E25*

Précordial ¬
- Douleur *R07.2*
- Frottement *R01.2*

Précurseur
- B ¬ Lymphome
- - *C83.5*
- - Cellules *C83.5*
- T ¬ Lymphome à cellules *C83.5*
- Thromboplastine plasmatique [PTA] ¬ Déficit en *D68.1*

Prédiabète ¬ *R73.0*

Prédisposition
- Cancer du sein et de l'ovaire ¬ Syndrome héréditaire de *C56, C97!, C50.9*
- Cardiomyopathies ¬ Examens liés à une *Z01.81*
- Dysrythmies malignes ¬ Examens liés à une *Z01.80*
- Mendélien infection mycobactérien déficit
- - Complet
- - - IFNgammaR1 ¬ *D84.8*
- - - IFNgammaR2 ¬ *D84.8*
- - - IL12B ¬ *D84.8*
- - - ISG15 ¬ *D84.8*
- - - Récepteur bêta 1 de l'interleukine 12 ¬ *D84.8*
- - Partiel

Prédisposition *–suite*
- Mendélien infection mycobactérien déficit *–suite*
- - Partiel *–suite*
- - - Facteur 8 régulateur de l'interféron ¬ *D84.8*
- - - STAT1 ¬ *D84.8*

Prédominance
- Allergique ¬ Asthme à *J45.0*
- Corticale ¬ Démence à *F01.1*
- Lymphocytaire ¬ Lymphome de Hodgkin nodulaire à *C81.0*

Prédominant
- Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies *D83.1*
- Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies *D83.0*
- Production anticorps
- - Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec déficit *D80.9*
- - ¬ Autres déficits immunitaires avec déficit *D80.8*
- SII-C] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec constipation *K58.2*
- SII-D] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée *K58.1*

Prééclampsie
- Greffée lors d'hypertension ¬ *O11*
- Légère à modérée ¬ *O14.0*
- Sans précision ¬ *O14.9*
- Sévère ¬ *O14.1*
- Surajouté
- - États hypertensifs préexistants ¬ *O11*
- - Hypertension SAI ¬ *O11*
- - ¬
- - - *O11*
- - - Hypertension
- - - - Chronique avec *O11*
- - - - Essentielle préexistante au cours de la grossesse, avec *O11*
- - - - Préexistante avec *O11*
- ¬ *O14*

Pré-excitation ¬ Syndrome de *I45.6*

Pré-excitée ¬ Conduction auriculoventriculaire: *I45.6*

Préexistant
- Affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) ¬ Diabète sucré de la mère (*P70.1*
- Compliquant grossesse accouchement puerpéralité
- - Sans précision ¬ Hypertension *O10.9*
- - ¬
- - - Cardionéphropathie hypertensive *O10.3*
- - - Cardiopathie hypertensive *O10.1*
- - - Hypertension
- - - - *O10*
- - - - Essentielle *O10.0*

Préexistant *–suite*
- Compliquant grossesse accouchement puerpéralité *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hypertension *–suite*
- - - - Secondaire *O10.4*
- - - Néphropathie hypertensive *O10.2*
- Cours de la grossesse, avec prééclampsie surajoutée ¬ Hypertension essentielle *O11*
- Femme enceinte ¬ Présence d'une hypertension rénale *O10.4*
- Gestationnelle ¬ convulsions avec hypertension *O15*
- Lié à la malnutrition ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré *O24.2*
- Néphropathie, chez la femme enceinte ¬ Présence d'une hypertension *O10.4*
- Prééclampsie surajoutée ¬ Hypertension *O11*
- Sans précision ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré *O24.3*
- Type
- - 1 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré *O24.0*
- - 2 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré *O24.1*
- - ¬
- - États mentionnés avec protéinurie *O10*
- - Prééclampsie surajoutée dans: les états hypertensifs *O11*

Préférence sexuel
- Sans précision ¬ Trouble de la *F65.9*
- - ¬ trouble
- - *F65.8*
- - Multiples de la *F65.6*

Préinfarctus ¬ Syndrome (de): *I20.0*

Prékallicréine ¬ Déficit congénital en *D68.8*

Préleucémie (syndrome de) SAI ¬ *D46.9*

Prélèvement
- Effectué sur
- - Appareil
- - - Digestif et la cavité abdominale ¬ Résultats anormaux de *R85*
- - - Respiratoire et le thorax ¬ Résultats anormaux de *R84*
- - Organe
- - - Appareils et tissus ¬ Résultats anormaux de *R89*
- - - Génital
- - - - Femme ¬ Résultats anormaux de *R87*
- - - - Homme ¬ Résultats anormaux de *R86*
- Gorge ¬ Résultats anormaux de: *R84*
- Implantation d'ovules ¬ Admission pour *Z31.2*
- Placentaire (par voie vaginale) ¬ *Z36.0*

Prélinguale ¬ Surdité génétique non syndromique *H90.5*

Prématuré
v. Type de maladie

Prématurité
v.a. ichtyose-prématurité
- SAI ¬ *P07.3*
- ¬
- - Anémie de la *P61.2*
- - Hyperbilirubinémie de la *P59.0*
- - Rétinopathie de la *H35.1*

Préménopause ¬ Saignements abondants de la *N92.4*

Préménopausique ¬ Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Prémenstruelle ¬ Syndrome de tension *N94.3*

Prémolaire-canine ¬ En avant de la jonction *C04.0*

Prénatal
- Amniocentèse ¬ Autres dépistages *Z36.2*
- Anomalies chromosomiques ¬ Dépistage *Z36.0*
- Insuffisants ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins *Z35.3*
- Iso-immunisation ¬ Dépistage *Z36.5*
- Malformations par échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage *Z36.3*
- Retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage *Z36.4*
- Sans précision ¬ Dépistage *Z36.9*
- Systématique mère
- - Sans précision ¬ Résultat anormal constaté au cours de l'examen *O28.9*
- - ¬ résultat
- - - Anormal
- - - - Constatés au cours de l'examen *O28*
- - - - Cours de l'examen *O28.8*
- - - Biochimiques anormaux au cours de l'examen *O28.1*
- - - Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen *O28.5*
- - - Cytologiques anormaux au cours de l'examen *O28.2*
- - - Échographiques anormaux au cours de l'examen *O28.3*
- - - Hématologiques anormaux au cours de l'examen *O28.0*
- - - Radiologiques anormaux au cours de l'examen *O28.4*
- Taux élevé d'alpha-fœtoprotéines ¬ Dépistage *Z36.1*
- ¬
- - Dépistage
- - - *Z36*
- - - *Z36.8*
- - Hypoplasie de l'émail (néonatale) (post-natale) (*K00.4*
- - Kératite gonorrhéique *A54.3†, H19.2**

Préoccupation exagérées pour les événements sources de tension ¬ Inquiétude et *R46.6*

Préparation
- Alimentaires à base de poissons ¬ Poumon des: travailleurs de *J67.8*

Préparation *–suite*
- Base
- - Foie et autres substances anti-anémiantes ¬ *T45.8*
- - Plantes ou remèdes populaires ¬ Abus de: *F55*
- Capillaires ¬ Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et *T49.4*
- Contenant une seule et plusieurs substances ¬ *T38.4*
- Dialyse et traitement ¬ *Z49*
- Ophtalmologiques ¬ Intoxication: Médicaments et *T49.5*
- Utilisés en oto-rhino-laryngologie ¬ Intoxication: Médicaments et *T49.6*

Préparatoires
- Traitement ultérieur, non classés ailleurs ¬ Soins *Z51.4*
- Vue d'une dialyse ¬ Soins *Z49.0*

Prépatellaire ¬ Bursite *M70.4*

Pré-psychotique ¬ Schizophrénie: *F21*

Prépuce
- Adhérent ¬ *N47*
- Clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du *Z91.71*
- Phimosis et paraphimosis ¬ Hypertrophie du *N47*
- Serré ¬ *N47*
- ¬
- - Gonorrhée du *A54.0†, N51.2**
- - Tuberculose du *A18.1†, N51.8**
- - Tumeur maligne: *C60.0*

Prépylore ¬ *C16.4*

Prérénale ¬
- Insuffisance rénale aiguë *N17*
- Urémie *R39.2*

Presbyacousie ¬ *H91.1*

Presbytie ¬ *H52.4*

Prescription
- Moyens contraceptifs ¬ Première *Z30.0*
- Pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs ¬ Renouvellement d'une *Z30.4*

Présénile
- Cours de maladie d'Alzheimer ¬ Démence *G30.0†, F00.0**
- SAI ¬
- - Démence: *F03*
- - Psychose: *F03*
- Type Alzheimer ¬ Démence *F00.0**
- ¬
- - Cataracte infantile, juvénile et *H26.0*
- - Démence
- - - Cours
- - - - Atrophie cérébrale *G31.88†, F02.8**
- - - - Sclérose *G30.0†, F00.0**
- - - Dégénératif primaire type Alzheimer
- - - - Apparition *G30.0†, F00.0**

Présénile *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Démence *–suite*
- - - Dégénératif primaire type Alzheimer *–suite*
- - - - Début *F00.0**
- - Formes sénile et *G30†*
- - Maladie due au VIH avec démence *B22†, F02.4**
- - Syndrome d'hypoplasie fovéale-cataracte *H35.8†, H28.2**

Présent ¬ Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied *Q72.1*

Présentant un risque d'abus ¬ Intoxication: Psychostimulants *T43.6*

Présentation
- Anormal
- - Avant le travail ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.7*
- - Connue ou présumée du fœtus ¬ Soins maternels pour *O32*
- - Fœtus
- - - Sans précision ¬ Soins maternels pour *O32.9*
- - - ¬
- - - - Dystocie due à une position et une *O64*
- - - - Soins maternels pour d'autres *O32.8*
- - Plusieurs fœtus ¬ Soins maternels pour grossesse multiple avec *O32.5*
- - Sans précision ¬ Dystocie due à une position et une *O64.9*
- - ¬ Dystocie due à d'autres positions et *O64.8*
- Complexe ¬
- - Dystocie due à une *O64.5*
- - Soins maternels pour *O32.6*
- Épaule ¬ Dystocie due à une *O64.4*
- Face
- - Avant le travail ¬ *P01.7*
- - Front et du menton ¬ Soins maternels pour *O32.3*
- - ¬ Dystocie due à une *O64.2*
- Front ¬ Dystocie due à une *O64.3*
- Menton ¬ *O64.2*
- Oblique ¬ *O32.2*
- Occipito-postérieure persistante ¬ *P03.1*
- Pieds ¬ Dystocie due à une *O64.1*
- Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P03.1*
- Siège
- - Avant le travail ¬ *P01.7*
- - ¬
- - - Dystocie
- - - - *O64.1*
- - - Soins maternels pour *O32.1*
- Tête ¬ Accouchement spontané avec *O80*
- Transverse

Présentation *–suite*
- Transverse *–suite*
- - Avant le travail ¬ *P01.7*
- - ¬
- - - *O32.2*
- - - *P03.1*

Pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule ¬ Être *W64.9!*

Pression
- Abrasion ¬ Ulcère [escarre] de *L89.1*
- Atmosphérique
- - Ambiant
- - - Eau ¬ Effets sur l'oreille des changements de la *T70.0*
- - - ¬ Effets sur les sinus des changements de la *T70.1*
- - Élevé basse
- - - Changement de pression atmosphérique ¬ Exposition à une *W94!*
- - - Sans relation avec les conditions météorologiques) ¬ Exposition à une *W94.9!*
- - Pression eau
- - - Sans précision ¬ Effet de la *T70.9*
- - - ¬ effet
- - - - *T70*
- - - - *T70.8*
- - ¬
- - - Accident dû à un changement de *W94.9!*
- - - Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de *W94!*
- Cérébrale lors d'une lésion crânio-cérébrale couverte grave ¬ Compression du cerveau, hémorragie et *S06.21, S01.83!*
- Eau
- - Sans précision ¬ Effet de la pression atmosphérique et de la *T70.9*
- - ¬ effet pression atmosphérique
- - - *T70*
- - - *T70.8*
- Explosion, n.c.a. ¬ Blessure par la *T70.8*
- Groupe ¬ Vaccination non effectué raison
- - *Z28*
- - *Z53*
- Industrielle) ¬ Injection traumatique de fluide à haute *T70.4*
- Intracrânienne ¬ Elévation de la *G93.2*
- Normal
- - Idiopathique ¬ Hydrocéphalie à *G91.20*
- - Non précisée ¬ Hydrocéphalie à *G91.29*
- - Secondaire ¬ Hydrocéphalie à *G91.21*
- - ¬ Hydrocéphalie à *G91.2*
- Parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation ¬ *Z62*
- Peau par ailleurs intacte ¬ Zone de pression avec rougeur persistante à la *L89.0*
- Perte cutané

Pression *–suite*
- Perte cutané *–suite*
- - Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de *L89.1*
- - SAI ¬ Ulcère [escarre] de *L89.1*
- Phlyctène ¬ Ulcère [escarre] de *L89.1*
- Positive ¬ Pneumothorax spontané avec *J93.0*
- Rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte ¬ Zone de *L89.0*
- Sans indication de degré ¬ Ulcère [escarre] de *L89.9*
- Télédiastolique ventriculaire gauche ¬ Augmentation pathologique de la *R94.3*
- Veineuse épisclérale élevée ¬ Glaucome secondaire à une *H40.5*
- ¬
- - Effet
- - - Fluides à haute *T70.4*
- - - Onde de *T70.9*
- - Incontinence de *N39.42*
- - Lipoatrophie localisée due à la *E88.1*
- - Neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la *G60.0*
- - Ulcère de décubitus et zone de *L89*

Présyncope ¬ *R42*

Préterminale ¬ Insuffisance rénale *N18.4*

Prétibiale ¬ Epidermolyse bulleuse dystrophique *Q81.2*

Préventives ¬ Méningite due à des mesures *G03.8, Y84.9!*

Prévisible) médicamenteuse ¬ lésion hépatique: toxique (*K71*

Priapisme
- SAP ¬ *N48.39*
- Type
- - High-flow ¬ *N48.31*
- - Low-flow ¬ *N48.30*
- ¬
- - *N48.3*
- - *N48.38*

Primaire
v. Type de maladie

Primigeste
- Âgée ¬ Surveillance d'une *Z35.5*
- Jeune ¬ Surveillance d'une *Z35.6*

Primitif
- Aiguë et érythroleucose ¬ Polyglobulie *C94.0*
- Alvéoles pulmonaires ¬ Collapsus *P28.0*
- Angle
- - Étroit ¬ Glaucome *H40.2*
- - Ouvert ¬ Glaucome *H40.1*
- Cellules T, CD30 positif ¬ Syndrome lymphoprolifératif cutané *C86.6*
- Col de l'utérus ¬ Tumeur neuroectodermique *C53.9*
- Congénital ¬ Méga-uretère *Q62.2*
- Conjonctive ¬ Lymphome *C85.9*

Primitif *–suite*
- Corps de l'utérus ¬ Tumeur neuroectodermique *C54.9*
- Familiale ¬ Hyperparathyroïdie *E21.0*
- Idiopathique) ¬ Macroglobulinémie (*C88.0*
- Inconnu, ainsi précisée ¬ Tumeur maligne, siège *C80.0*
- Indéterminée ¬ Tumeur *C80.0*
- Non
- - Essentiel ¬ Cutis verticis gyrata *Q82.8*
- - Gestationnel ¬ Choriocarcinome ovarien *C56*
- Nouveau-né ¬ Atélectasie *P28.0*
- Œsophage ¬ Achalasie *K22.0*
- Os ¬ Lymphome *C85.7*
- Persistant hyperplasique ¬ Vitré *Q14.0*
- PNET) du système nerveux central ¬ Tumeur neuroectodermique *C72.9*
- Résiduel
- - Aigu ¬ Glaucome à angle fermé (*H40.2*
- - Capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ Glaucome (*H40.1*
- - Chronique
- - - Simple ¬ Glaucome (*H40.1*
- - - ¬ Glaucome à angle fermé (*H40.2*
- - Intermittent ¬ Glaucome à angle fermé (*H40.2*
- - Pigmentaire ¬ Glaucome (*H40.1*
- - Retardé ¬ Glaucome à angle fermé (*H40.2*
- - Tension basse ¬ Glaucome (*H40.1*
- Sans précision ¬ Affection musculaire *G71.9*
- Secondaire) SAI ¬ Myocardiopathie (*I42.9*
- Séreuses ¬ Lymphome *C83.8*
- Sévère néonatale ¬ Hyperparathyroïdie *E21.0*
- Sommeil chez le nouveau-né ¬ Apnée *P28.3*
- Stade Child-Pugh
- - A ¬ Cirrhose biliaire *K74.3, K74.70!*
- - B ¬ Cirrhose biliaire *K74.3, K74.71!*
- - C ¬ Cirrhose biliaire *K74.3, K74.72!*
- Système nerveux central ¬
- - Lymphome *C83.3*
- - Tumeur neuroectodermique *C72.9*
- Systémique) ¬ Hypertension (artérielle) (essentielle) (*I10*
- Type
- - 1 ¬ Hyperoxalurie *E74.8*
- - 2 ¬ Hyperoxalurie *E74.8*
- - 3 ¬ Hyperoxalurie *E74.8*
- ¬
- - Affections musculaires *G71.8*
- - Amylose *E85.9*
- - Cholangite biliaire *K74.3*
- - Cirrhose biliaire *K74.3*
- - Cryoglobulinémie: *D89.1*
- - Dyskinésie ciliaire *Q34.8*
- - Erythrocytose congénitale *D75.0*

Primitif *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Glaucome à angle fermé (*H40.2*
- - Glomérulonéphrite extra membraneuse *N05.2*
- - Goutte *M10.0*
- - Hyperoxalurie *E74.8*
- - Hypertension
- - - Essentielle (*I10*
- - - Pulmonaire *I27.0*
- - Hypotonie utérine *O62.0*
- - Invagination basilaire *Q75.8*
- - Lymphangiectasie intestinale *I89.09*
- - Lymphomes B centrofolliculaire cutané *C82.6*
- - MEAP [méningo-encéphalite amibienne *B60.2†, G05.2**
- - Plasmocytose cutanée *D47.9*
- - Saignement capillaire *D69.88*
- - Sclérose latérale: *G12.2*
- - Syndrome parkinsonien ou maladie de Parkinson: *G20*
- - Tumeur
- - - *C80.9*
- - - Malignes de sièges multiples indépendants (*C97!*

Primo infection tuberculeux appareil respiratoire
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.7*
- SAI ¬ *A16.7*
- Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.7*

Primordial
- Type
- - I ¬ Nanisme microcéphalique ostéodysplasique *Q87.1*
- - II ¬ Nanisme microcéphalique ostéodysplasique *Q87.1*
- - III ¬ Nanisme microcéphalique ostéodysplasique *Q87.1*
- ¬ Kyste: *K09.0*

Primrose ¬ Syndrome de *Q87.8*

Primum
- Type I) ¬ Persistance de l'ostium *Q21.2*
- ¬ CIA type ostium *Q21.2*

Principale
- Accessoires ¬ Glandes salivaires *D37.0*
- Non précisées ¬ Tumeur maligne des glandes salivaires *C08*
- Parathyroïde ¬ Adénome à cellules *D35.1*
- SAI ¬ Glande salivaire (*C08.9*
- Sans précision ¬ Tumeur
- - Bénigne: Glande salivaire *D11.9*
- - Maligne: Glande salivaire *C08.9*
- ¬
- - Glande de Bartholin [glande vestibulaire *C51.0*

Principale *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Autres glandes salivaires *D11.7*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires *C08.8*

Principalement

- Alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents *T44.4*
- Aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux malformatifs atteignant *Q87.0*
- Bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents *T44.5*
- Grossesse ¬ Soins maternels pour d'autres affections liées *O26*
- Membres ¬ Syndromes congénitaux malformatifs impliquant *Q87.2*
- Non médicinale ¬ Taux anormal dans les urines de substances d'origine *R82.6*
- Petite taille ¬ Syndromes congénitaux malformatifs associés *Q87.1*
- Rotatoire ¬ Dystonie cervicale *G24.3*
- Système nerveux central cours
- - Affections classées ailleurs ¬ Affections dégénératives systémiques affectant *G13.8**
- - Maladies tumorales ¬ Autres affections dégénératives systémiques affectant *G13.1**
- Transmises lors des rapports sexuels ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: infections *Z11*

Prinzmetal ¬ Angine de poitrine (de): *I20.1*

Prion

- Familiale Alzheimerlike ¬ Maladie à *A81.9*
- Système nerveux central
- - SAI ¬ Maladie à *A81.9*
- - ¬ maladies à *A81*

Prionopathie de sensibilité variable aux protéases ¬ *A81.8*

Prise

- Charge d'une contraception ¬ Autres *Z30.8*
- Voie interne ¬ Dermite due à d'autres substances *L27.8*

Prison ¬ Difficultés liées à une libération de *Z65*

Pritzker
v. Hashimoto-Pritzker

Privation

- Affective ¬ Psychopathie de *F94.2*
- Eau ¬ *T73.1*
- Liberté ¬ Emprisonnement et autres formes de *Z65*
- Nourriture ¬ *T73.0*
- Sans précision ¬ Effet dû à une *T73.9*
- Sommeil ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- Toxicomanie de la mère ¬ Symptômes néonatals de *P96.1*
- Utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né ¬ Symptômes de *P96.2*
- ¬ effet

Privation *–suite*

- ¬ effet *–suite*
- - *T73*
- - *T73.8*

PRL ¬ Adénome hypophysaire à *D35.2*

Proaccélérine ¬

- Carence en *D68.22*
- Déficit héréditaire en *D68.22*

Problème

- Alimentaire nouveau-né
- - Sans précision ¬ *P92.9*
- - ¬
- - - *P92*
- - - *P92.8*
- Développement psychosexuel ¬ *F66.9*
- Langage ¬ *R47.8*
- Ouïe
- - Syphilitique
- - - Congénitale ¬ *A50.0†, H94.8**
- - - ¬ *A52.1†, H94.8**
- - ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos de type cyphoscoliose avec *Q79.6*
- Psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation ¬ *F66*
- Sexuel relationnel ¬ *F66.2*
- Sociaux ¬ Grossesse à risques liée à des *Z35.8*

Proboscis latéral ¬ *Q30.8*

Procédé biologie moléculaire ¬

- Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*
- Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*
- Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*
- Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*
- Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*

Procédure de garde ou d'entretien d'enfants ¬ *Z65*

Procès

- Civil ou pénal ¬ Condamnation, sans emprisonnement, après *Z65*
- ¬ *Z65*

Processus

- Alvéolaire ¬
- - Fente (du *K08.8*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (*S01.53*
- Condylien de la mandibule ¬ Hyperplasie ou hypoplasie unilatérale du *K10.8*
- Styloïde allongé ¬ Syndrome du *M77.9*
- Xiphoideus ¬ Fracture du sternum: *S22.23*

Proche

- Niveau d'un moignon d'amputation ¬ Contracture (flexion) (de l'articulation la plus *T87.6*
- ¬ Prise en charge d'une personne dépendante pendant un congé de ses *Z75.8*

Procidence

- Bras ¬ *O64.4*
- Cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P02.4*
- Effort spontanément réductible
- - Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec *K64.2*
- - ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec *K64.1*
- Réintroduction manuelle impossible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec *K64.3*
- SAI ¬ *N81.3*
- Vaisseaux du cordon ¬ *P02.6*
- ¬ Hémorroïdes (avec saignement) sans *K64.0*

Proconvertine ¬

- Carence en *D68.23*
- Déficit
- - Constitutionnel en *D68.23*
- - Héréditaire *D68.23*

Procréation ¬

- Conseils et avis généraux en matière de *Z31.6*
- Recherches et tests en vue d'une *Z31.4*

Procréative

- Sans précision ¬ Mesure *Z31.9*
- ¬ Autres mesures *Z31.8*

Procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à *Z35.2*

Proctalgie fugace ¬ *K59.4*

Proctite

- Aiguë amibienne ¬ *A06.8*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Radique ¬ *K62.7*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Virus de l'herpès ¬ *A60.1†, K93.8**

Prodromique ¬ Schizophrénie: *F21*

Production

- Anticorps
- - Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la *D80.9*
- - ¬ Autres déficits immunitaires avec déficit prédominant de la *D80.8*
- Ectopique d'ACTH [hormone adrénocorticotrope] ¬ Syndrome de Cushing dû à la *E24.3*
- IgM
- - Rémission complète ¬ Lymphome lymphoplasmocytaire avec *C88.01*
- - ¬ Lymphome lymphoplasmocytaire avec *C88.0*

Production *–suite*
- Intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ *F68.1*

Productrice mucus
- Appendice ¬ Tumeur carcinoïde *C18.1*
- Poumons ¬ Tumeur carcinoïde *C34.9*

Produit
- Agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique ¬ Intoxication: *T50.3*
- Anormal conception
- - Précisés ¬ Autres *O02.8*
- - Sans précision ¬ *O02.9*
- - ¬ Autres *O02*
- Chimique ¬
- - Dermite
- - - Allergique de contact due à d'autres *L23.5*
- - - Contact, sans précision, due à d'autres *L25.3*
- - - Irritante de contact due à d'autres *L24.5*
- - Sclérose systémique due à des médicaments et des *M34.2*
- - Ulcère de l'œsophage: dû à l'ingestion de: *K22.1*
- Conception
- - Accouchement, sans hémorragie ¬ Rétention de *O73.1*
- - SAI, après l'accouchement ¬ Rétention de *O72.2*
- Conservation du bois ¬ *T60*
- Contenant amphétamine méthamphétamine ¬
- - Consommation non intraveineuse de *U69.34!*
- - Utilisation intraveineuse de *U69.33!*
- Cosmétiques ¬ Allergie aux *L23.2*
- Dérivés du pétrole ¬ Effet toxique: *T52.0*
- Désintoxication alcoolique ¬ *T50.6*
- Exogènes ¬ Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres *E03.2*
- Médicaux
- - Utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques ¬ Incidents dus à des appareils ou à des *Y82!*
- - ¬ Incidents dus à des appareils ou à des *Y82.8!*
- Médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de *Y82.8!*
- Naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Plantes et *F55.6*
- Protection du bois ¬ Intoxication par des *T60.9*
- Sang ¬ Sang entier et *T45.8*
- Stéroïdien dans le sang ¬ Présence d'un *R78.6*
- Système immunitaire ¬ Hémophilie due aux inhibiteurs *D68.38*

Proéminentes ¬ Oreilles *Q17.5*

Professionnel
- Dents ¬ Abrasion: *K03.1*
- Facteurs de risque ¬ Exposition *Z57*
- Non classées ailleurs ¬ Ergothérapie et rééducation *Z50.7!*
- SAI ¬
- - Dermite de contact (*L25.9*
- - Eczéma de contact (*L25.9*
- Y compris crampe de l'écrivain ¬ Névrose: *F48.8*
- ¬
- - Affections des tissus mous d'origine *M70*
- - Érosion des dents: *K03.2*

Profond
v. Type de maladie

Profondeur en position transverse ¬ Arrêt en *O64.0*

Profunda ¬ Trichophytia *B35.8*

Progénie ¬ Syndrome d'hypoplasie du radius-pouces triphalangés-hypospadias- *Q87.2*

Progéria
- Adulte ¬ *E34.8*
- Nestor-Guillermo ¬ *E34.8*
- ¬ *E34.8*

Progéroïde
- Cardio-cutané lié à LMNA ¬ Syndrome *E34.8*
- ¬
- - EDS type *Q79.6*
- - Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Progestatifs ¬ Intoxication: Autres œstrogènes et *T38.5*

Prognathie (mandibulaire) (maxillaire) ¬ *K07.1*

Programme de recherche clinique ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un *Z00.6*

Progrediens ¬ Kératodermie palmoplantaire transgrediens et *Q82.8*

Progressif
v. Type de maladie

Prohormone convertase I ¬ Obésité par déficit en *E66.89*

Prolactine ¬
- Adénome hypophysaire à *D35.2*
- Déficit familial isolé en récepteur de la *E22.1*
- Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*

Prolactinome ¬ *D35.2*

Prolapsus
- Anal ¬ *K62.2*
- Canal anal ¬ *K62.2*
- Col SAI ¬ *N81.2*
- Congénital
- - Méat urinaire ¬ *Q64.7*
- - Urètre ¬ *Q64.7*
- - Vessie (muqueuse) ¬ *Q64.7*
- Cordon ¬ Travail et accouchement compliqués d'un *O69.0*
- Corps vitré ¬ *H43.0*

Prolapsus *–suite*
- Discal ¬ Radiculite
- - *M51.1†, G55.1**
- - Cervicale due à un *M50.1†, G55.1**
- Génital
- - Sans précision ¬ *N81.9*
- - ¬
- - - *N81*
- - - *N81.8*
- Hémorroïdes
- - Externes ¬ *K64.5*
- - Internes ¬ *K64.9*
- Hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope ¬ *N83.4*
- Membranes ¬ Suivi de la mère en cas de *O34.31*
- Mitral] ¬ Syndrome de Barlow [*I34.1*
- Muqueux
- - Rectale ¬ *K62.3*
- - Urétral
- - - Femme ¬ *N81.0*
- - - ¬ *N36.3*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Paroi supérieure du vagin après hystérectomie ¬ *N99.3*
- Prolapsus (de): Prolapsus utérin de 1er ou 2e degré ¬ *N81.2*
- Rectal ¬ *K62.3*
- Urètre
- - Femme ¬ *N81.0*
- - Homme ¬ *N36.3*
- - ¬ *N36.3*
- Utérin
- - 1er ou 2e degré ¬ Prolapsus (de): *N81.2*
- - 3e et 4e degré ¬ *N81.3*
- - SAI ¬ *N81.4*
- Utéro vaginal
- - Complet ¬ *N81.3*
- - Partiel ¬ *N81.2*
- - Sans précision ¬ *N81.4*
- Utérus gravide ¬ Soins maternels pour: *O34.5*
- Vaginal paroi
- - Antérieure) SAI ¬ *N81.1*
- - Postérieure ¬ *N81.6*
- Valve mitrale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypogonadisme- *Q87.8*
- Valvulaire mitral familial ¬ *I34.1*
- Valvule) mitral(e) ¬ *I34.1*

Prolidase ¬ Déficit en *E72.8*

Proliférant
- Décollement de la rétine ¬ Vitréo-rétinopathie *H33.4*
- ¬
- - Rétinopathies *H35.2*
- - Vitréo-rétinopathie *H35.2*

Prolifération
- Blastes en transformation) ¬ Anémie réfractaire avec crise blastique (*C92.0*
- Épithéliale ¬ Mastopathie kystique avec *N60.3*
- Mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux stéroïdes avec *N04.3*
- Tumorale SAI ¬ *D48.9*

Proliférative
v.a. mésangio-proliférative
- Chronique ¬ Péritonite (due à): *K65.8*
- Diffuse au cours de lupus érythémateux disséminé ¬ Glomérulonéphrite *M32.1†, N08.5**
- ¬ Rétinopathie drépanocytaire *D57.8†, H36.8**

Proliferum) ¬ Infection à: Sparganum (S.mansoni) (S. *B70.1*

Proline oxydase ¬ Déficit en *E72.5*

Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact ¬ *R46.7*

Prolongation
- Deuxième période [expulsion] ¬ *O63.1*
- Première période [dilatation] ¬ *O63.0*

Prolongement axillaire du sein ¬ Tumeur maligne: *C50.6*

Prolymphocytaire cellule
- B ¬ Leucémie *C91.3*
- T ¬ Leucémie *C91.6*

Prométaphase ¬
- Délétions vues seulement à la *Q93.6*
- Duplications vues seulement à la *Q92.4*

Promyélocytaire
- Aiguë ¬ Leucémie *C92.4*
- Cellules T ¬ Leucémie *C91.60*

Pronation ¬
- Cheville en *M21.68*
- Pied en *M21.68*

Pro-opiomélanocortine ¬ Obésité par déficit en *E66.89*

Propanétriol ¬ Trinitrate de 1,2,3- *T65.5*

Propanol ¬
- Alcool: propylique [1- *T51.3*
- Effet toxique: 2- *T51.2*

Properdine ¬ Déficit en *D84.1*

Prophylaxie
- Antibiotique de l'endocardite ¬ *Z29.21*
- Avant exposition au VIH ¬ *Z29.22*
- Endocardite ¬ *Z29.21*
- Locale par des antibiotiques ¬ *Z29.20*
- Médicamenteuse systémique ¬ *Z29.21*

Propionibactéries ¬ *B95.91!*

Propionique ¬
- Acidémie: *E71.1*
- Acidurie *E71.1*

Propionyl-CoA carboxylase ¬ Déficit en *E71.1*

Propofol ¬ Dépendance au *F19.2*

Propos
- Consanguinité ¬ Conseil: à *Z71*
- Tabagisme ¬ Conseil: à *Z71*
- VIH [virus de l'immunodéficience humaine] ¬ Conseil: à *Z71*

Propres
- Nourrisson ¬ Symptômes non spécifiques *R68.1*
- Réimplantation et une amputation ¬ Complications *T87*

Propriétaire ¬ Désaccord avec les voisins, les locataires et le *Z59*

Proptose au cours de thyréotoxicose ¬ *E05.9†, H06.2**

Propyle ¬ Allergie au gallate de *T78.4*

Propylique [1-propanol] ¬ Alcool: *T51.3*

Prosaposine ¬ Encéphalopathie par déficit en *E75.2*

Prostaglandines ¬ Echec du déclenchement (du travail) (par): *O61.0*

Prostate
- Annexe, utérus ¬ Région génitale, vessie, *I97.87*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections de la *N51.0**
- IDC-P] ¬ Carcinome intracanalaire de la *C61*
- NIP
- - Haut grade] ¬ Néoplasie intraépithéliale de haut grade de la *D07.5*
- - Stade
- - - I ¬ Néoplasie intra-épithéliale de la *N42.3*
- - - II ¬ Néoplasie intra-épithéliale de la *N42.3*
- PIN] ¬ Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la *N40*
- PSA] ¬ Modification du taux d'antigène spécifique de la *R77.80*
- SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la *Q55.4*
- Sans précision ¬ Affection
- - *N42.9*
- - Inflammatoire de la *N41.9*
- Trichomonas ¬ Infection de la *A59.0†, N51.0**
- ¬
- - Abcès
- - - *N41.2*
- - - Gonorrhéique de la *A54.2†, N51.0**
- - Absence ou aplasie de: *Q55.4*
- - Affection
- - - *N42*
- - - Inflammatoires de la *N41.8*
- - - Précisées de la *N42.8*
- - Atrophie de la *N42.2*
- - Calcul de la *N42.0*
- - Cancer familial de la *C61*
- - Carcinoma in situ: *D07.5*
- - Coccidioïdomycose de la *B38.8†, N51.0**
- - Dysplasie

Prostate *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dysplasie *–suite*
- - - *N42.3*
- - - Bas grade de la *N42.3*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur de la *Z12.5*
- - Gonorrhée de la *A54.2†, N51.0**
- - Hyperplasie
- - - *N40*
- - - Adénomateuse de la *N40*
- - - Bénigne) de la *N40*
- - Hypertrophie (bénigne) de la *N40*
- - Lésion traumatique: *S37.82*
- - Malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la *Q55.4*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, N51.0**
- - Trichomonase de la *A59.0†, N51.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D29.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D40.0*
- - - Maligne de la *C61*

Prostatique
- SAI ¬ Obstruction *N40*
- ¬
- - Barre moyenne [barrière de Mercier] (*N40*
- - Congestion et hémorragie *N42.1*
- - Granulome *N42.8*
- - Lésion traumatique de l'urètre: Partie *S37.33*
- - Lithiase *N42.0*
- - Résultats anormaux de: sécrétions *R86*
- - Tuberculose *A18.1†, N51.0**

Prostatite
- Aiguë ¬ *N41.0*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, N51.0**
- Candida ¬ *B37.4†, N51.0**
- Chronique ¬ *N41.1*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, N51.0**
- Gonocoques ¬ *A54.2†, N51.0**
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.0**
- SAI ¬ *N41.9*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N51.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N51.0**
- Virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N51.0**

Prostato-cystite ¬ *N41.3*

Prostration chaleur
- Perte de sel (et d'eau) ¬ *T67.4*
- SAI ¬ *T67.5*

Protanomalie ¬ *H53.5*

Protanopie ¬ *H53.5*

Protéases ¬
- Prionopathie de sensibilité variable aux *A81.8*

Protéases ¬ *–suite*
- Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de *U85!*

Protecteurs ¬ Intoxication: Emollients, calmants et *T49.3*

Protection du bois ¬ Intoxication par des produits de *T60.9*

Protée ¬ Syndrome de *Q87.3*

Protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour *Z29.0*

Protéinase ¬ Déficit en inhibiteur d'Alpha-1 *E88.0*

Protéine
- Bêta-propeller ¬ Neurodégénérescence associée à une *G23.0*
- Bœuf ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*
- C
- - Activée [mutation du facteur V Leiden] ¬ Résistance à la la *D68.5*
- - Surfactant ¬ Pneumopathie interstitielle par déficit en *J84.8*
- - ¬ Carence en: *D68.5*
- Cacahuètes ¬ Allergie aux *T78.1*
- COASY ¬ Neurodégénérescence associée à la *G23.0*
- Codées par l'ADN mitochondrial ¬ Insuffisance hépatique infantile aiguë par défaut de synthèse des *K72.0*
- C-réactive ¬ Augmentation pathologique du taux de *R77.88*
- Dibasiques avec lysinurie] ¬ LP [Intolérance aux *E72.0*
- E. coli ¬ Hypersensibilité aux *T78.4*
- Liaison du facteur de croissance ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la *R77.88*
- Membrane mitochondriale ¬ Neurodégénérescence associée à la *G23.0*
- Mitochondriales ¬ Maladie mitochondriale par défaut de synthèse des *E88.8*
- Plasmatique
- - Non classés ailleurs ¬ Anomalies du métabolisme des *E88.0*
- - Sans précision ¬ Anomalie des *R77.9*
- - ¬
- - - Anomalie
- - - - *R77*
- - - - Précisées des *R77.8*
- - - Modifications précisées des taux de *R77.88*
- Poisson ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*
- Poulet ¬ Allergie aux *T78.1*
- R ¬ Carence en *E53.8*
- S ¬
- - Carence en: *D68.5*
- - Déficit acquis en *D68.8*
- - Thrombophilie héréditaire sévère due au déficit congénital en *D68.5*

Protéine *–suite*
- Transfert des esters de cholestérol ¬ Déficit en *E78.4*
- ¬
- - Anémie par carence en *D53.0*
- - Entéropathie avec perte de *K90.4*
- - Pertes entérales de *K92.8*
- - Trouble de la N-glycosylation des *E77.8*

Protéino énergétique
- Grave
- - E43
- - - Forme intermédiaire ¬ Malnutrition *E42*
- - - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition *E42*
- - Sans précision ¬ Malnutrition *E43*
- Léger
- - Modérée ¬ Malnutrition *E44*
- - ¬ Malnutrition *E44.1*
- Modérée ¬ Malnutrition *E44.0*
- SAI ¬ Déséquilibre *E46*
- Sans précision ¬ Malnutrition *E46*
- ¬
- - Retard de développement après malnutrition *E45*
- - Séquelles de malnutrition *E64.0*

Protéinose alvéolaire
- Pulmonaire
- - Auto-immune ¬ *J84.0*
- - Congénitale ¬ *J84.0*
- - Idiopathique ¬ *J84.0*
- - Secondaire ¬ *J84.0*
- - Sévère par déficit en MARS à début précoce ¬ *J84.0*
- ¬ *J84.0*

Protéinurie
v.a. cobalamine-protéinurie
- Bence Jones ¬ *R80*
- Gestationnel
- - Liés à la grossesse] sans hypertension ¬ Œdème et *O12*
- - ¬ *O12.1*
- Isolé
- - Lésions morphologiques précisées ¬ *N06*
- - ¬ *R80*
- Orthostatique, sans précision ¬ *N39.2*
- Persistante, sans précision ¬ *N39.1*
- Préexistante ¬ les états mentionnés avec *O10*
- SAI ¬ *R80*
- ¬
- - Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la vitamine B12, avec *D51.1*
- - Œdème gestationnel avec *O12.2*

Proteus
- Mirabilis
- - Agent pathogène ¬ *B96.2!*

Proteus *–suite*
- Mirabilis *–suite*
- - Multirésistant
- - - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.07!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.27!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.47!*
- Morganii comme agent pathogène ¬ *B96.2!*
- ¬ Infection à *A49.8*

Proteus-like ¬ Syndrome *Q87.3*

Prothèse
- Artère coronaire ¬ Présence de *Z95.5*
- Articulaire
- - Interne ¬
- - - Complication mécanique d'une *T84.0*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à une *T84.5*
- - Orthopédiques sans précisions ¬ Présence d'autres *Z96.68*
- - Plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une *M96.6*
- - ¬ Présence d'une *Z96.68*
- Auditif
- - Ancrage osseux [BAHA] ¬ Présence d'une *Z96.2*
- - Implantée ¬ Ajustement et entretien d'une *Z45.3*
- Cardiaque ¬
- - Défaillance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une *I97.1*
- - Insuffisance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une *I97.1*
- Cheville ¬ Présence d'une *Z96.66*
- Cochléaire ¬ *Z45.3*
- Conduction osseuse ¬ *Z45.3*
- Coude ¬ Présence d'une *Z96.61*
- Dentaire
- - Complète)(partielle) ¬ *Z97.8*
- - ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z46.3*
- Disque intervertébral ¬ Présence d'une *Z96.67*
- Épaule ¬ Présence d'une *Z96.60*
- Externe
- - Non précisé ¬ Mise en place et ajustement d'un appareil de *Z44.9*
- - Sein ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z44.3*
- - ¬ Mise place ajustement appareil
- - - *Z44*
- - - *Z44.8*
- Genou ¬ Présence d'une *Z96.65*
- Hanche ¬ Présence d'une *Z96.64*
- Implant
- - Cardiaques et vasculaires ¬ Complication mécanique d'autres *T82.5*
- - Greffe
- - - Appareil
- - - - Génital

Prothèse *–suite*
- Implant *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Appareil *–suite*
- - - - Génital *–suite*
- - - - - ¬ Complication mécanique d'autres *T83.4*
- - - - - ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une *T83.6*
- - - - Génito-urinaire
- - - - - Sans précision ¬ Complication d'une *T83.9*
- - - - - ¬ Autres complications de *T83.8*
- - - - Urinaire ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une *T83.5*
- - - Cardiaque vasculaire
- - - - Sans précision ¬ Complication d'une *T82.9*
- - - - ¬
- - - - - Complications de *T82.8*
- - - - - Douleur due à *T82.8*
- - - - - Embolie due à *T82.8*
- - - - - Fibrose due à *T82.8*
- - - - - Hémorragie due à *T82.8*
- - - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres *T82.7*
- - - - - Sténose due à *T82.8*
- - - - - Thrombose due à *T82.8*
- - - Gastro-intestinaux ¬ Complication mécanique de *T85.5*
- - - Génito-urinaires ¬ Complications de *T83*
- - - Interne
- - - - Non classées ailleurs ¬ Autres complications dues à des *T85.88*
- - - - Partie du tractus gastro-intestinal ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres *T85.76*
- - - - SAI ¬ Complication d'une *T85.9*
- - - - Sans précision ¬ Complication d'une *T85.9*
- - - - Système
- - - - - Hépatobiliaire et le pancréas ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à des *T85.75*
- - - - - Nerveux ¬ Autres complications dues à des *T85.81*
- - - - - Nerveux ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à des *T85.72*
- - - - ¬
- - - - - Complications d'autres *T85*
- - - - - Infection et réaction inflammatoire due à d'autres *T85.78*
- - - Oculaires ¬ Complication mécanique d'autres *T85.3*
- - - Œsophage ¬ Complication mécanique de *T85.50*
- - - Orthopédique interne
- - - - Sans précision ¬ Complication d'une *T84.9*
- - - - ¬
- - - - - Complications de *T84.8*

Prothèse *–suite*
- Implant *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Orthopédique interne *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres *T84.7*
- - - Pancréas ¬ Complication mécanique de *T85.54*
- - - Parties du tractus gastro-intestinal supérieur ¬ Complication mécanique de *T85.51*
- - - Tractus gastro-intestinal inférieur ¬ Complication mécanique de *T85.52*
- - - Voies biliaires ¬ Complication mécanique de *T85.53*
- - Mammaire ¬
- - - Complication
- - - - *T85.83*
- - - - Mécanique d'une *T85.4*
- - - Fibrose capsulaire du sein due à une *T85.82*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à une *T85.73*
- - Urinaires ¬ Complication mécanique d'autres *T83.1*
- Interne
- - Fixation ¬ Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre *Z47.0*
- - Non précisée ¬ Ajustement et entretien d'une *Z45.9*
- - ¬ Ajustement et entretien d'autres *Z45.8*
- Ostéo-articulaire ¬ Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une *M96.88*
- Poignet ¬ Présence d'une *Z96.63*
- Temporo-mandibulaire ¬ Présence d'une *Z96.68*
- Tête radiale ¬ Présence d'une *Z96.62*
- Valvulaire cardiaque ¬
- - Complication mécanique d'une *T82.0*
- - Déplacement dû (due) à une *T82.0*
- - Fuite dû (due) à une *T82.0*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une *T82.6*
- - Malposition dû (due) à une *T82.0*
- - Obstruction mécanique dû (due) à une *T82.0*
- - Perforation dû (due) à une *T82.0*
- - Protrusion dû (due) à une *T82.0*
- - Rupture (mécanique) dû (due) à une *T82.0*
- Valvule cardiaque ¬ Présence de *Z95.2*
- Vasculaire non classée ailleurs ¬ Présence d'une *Z95.88*
- - ¬
- - Hyperplasie par irritation de la crête édentée (due à une *K06.2*
- - Stomatite: due à une *K12.1*

Prothrombine ¬
- Carence en *D68.21*

Prothrombine ¬ *–suite*
- Mutation du gène de *D68.5*

Protides ¬ Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*

Protons ¬ Eosinophilie œsophagienne répondant aux inhibiteurs de la pompe à *K20*

Protoporphyrie
- Dominante liée à l'X ¬ *E80.0*
- Érythropoïétique ¬ *E80.0*

Protoporphyrinogène oxydase ¬ Déficit en *E80.2*

Protozoaires
- Classées ailleurs ¬ Myosite au cours d'infections parasitaires et à *M63.1**
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies à *O98.6*
- Non classées ailleurs ¬ Autres maladies dues à des *B60*
- Sang ¬ Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres *T37.2*
- Sans précision ¬ Maladie
- - *B64*
- - Intestinale à *A07.9*
- - ¬
- - Colite à *A07.9*
- - Diarrhée à *A07.9*
- - Dysenterie à *A07.9*
- - Maladie
- - - Intestinal
- - - - *A07*
- - - - Précisées, à *A07.8*
- - - Précisées dues à des *B60.8*

Protozooses et helminthiases ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: *Z11*

Protrusion
- Acétabulaire ¬ *M24.7*
- Hémorroïdes
- - Externes ¬ *K64.5*
- - Internes ¬ *K64.9*
- Membre inférieur ¬ Dystocie due à une *O64.1*
- Perte tissu intra-oculaire ¬ Lacération
- - Oculaire sans *S05.3*
- - Rupture oculaires avec *S05.2*
- Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- ¬ Perforation du bulbe sans *S05.6*

Protuberans ¬ Dermatofibrosarcoma *C44.9*

Proud ¬ Syndrome de *Q87.8*

Provocation ¬ Trouble oppositionnel avec *F91.3*

Provoquant
- Occlusion sans gangrène ¬ Hernie
- - Crurale (unilatérale): *K41.3*
- - Diaphragmatique: *K44.0*
- - Incisionnelle: *K43.0*
- - Inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - Ombilicale: *K42.0*
- - Parastomale: *K43.3*

Provoquant *–suite*
- Rupture destruction globe oculaire ¬
- - Brûlure *T26.2*
- - Corrosion *T26.7*
- Transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical *P02.3*

Prowazekii ¬ Typhus épidémique à poux dû à Rickettsia *A75.0*

Prower
v. Stuart-Prower

Proximal
- Autosomique dominant
- - Adulte ¬ Amyotrophie spinale *G12.1*
- - Enfance ¬ Amyotrophie spinale *G12.1*
- Cubitus SAI ¬ Partie *S52.00*
- Décollement épiphysaire ¬ Fracture du col du fémur: Épiphyse (*S72.02*
- Dents ¬ Usure: *K03.0*
- Diabète sucré-ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de tubulopathie *Q87.8*
- Diaphyse cubitale avec luxation de la tête du radius ¬ Fracture *S52.21*
- Humérus en tant que traumatisme dû à l'accouchement ¬ Fracture *P13.3*
- Radius SAI ¬ Partie *S52.10*
- Sans précision ¬ Avant-bras *S52.8*
- Tibia
- - Isolé ¬ Partie *S82.18*
- - SAI ¬ Partie *S82.18*
- Type
- - 1 ¬ Amyotrophie spinale *G12.0*
- - 3 ¬ Amyotrophie spinale *G12.1*
- Ulna ¬ Fracture de l'épiphyse *S52.00*
- ¬
- - Acidose tubulaire rénale *N25.8*
- - Amyotrophie spinale *G12.1*
- - Dystrophie myotonique *G71.1*
- - Épiphyse *S42.21*
- - Extrémité *S82.1*
- - Fracture
- - - Doigt: Phalange *S62.61*
- - - Ouverte du radius *S52.10, S51.87!*
- - - Péroné seul: Partie *S82.41*
- - - Pouce: Phalange *S62.51*
- - Humérus *S43.0*
- - Luxation genou Luxation
- - - Antérieure du tibia *S83.11*
- - - Latérale du tibia *S83.14*
- - - Médiane du tibia *S83.13*
- - - Postérieure du tibia *S83.12*
- - Syndrome de microdélétion 16p11.2 *Q93.5*

PRPP synthétase ¬ Hyperactivité de la *E79.8*

Prune belly ¬ Syndrome *Q79.4*

Prurigineuse ¬ Epidermolyse bulleuse dystrophique *Q81.2*

Prurigo
- Actinique ¬ *L56.4*
- Besnier ¬ *L20.0*
- Hebra ¬ *L28.2*
- Mitis ¬ *L28.2*
- Nodulaire de Hyde ¬ *L28.1*
- SAI ¬ *L28.2*
- ¬
- - Formes de *L28.2*
- - Lichen simplex chronique et *L28*

Prurit
- Anal ¬ *L29.0*
- Ano-génital, sans précision ¬ *L29.3*
- Gale ¬ *B86*
- Nageurs ¬ *B65.3*
- Pendant la grossesse ¬ *O26.88*
- Psychogène ¬ *F45.8*
- Sans précision ¬ *L29.9*
- Scrotal ¬ *L29.1*
- Vulvaire ¬ *L29.2*
- ¬
- - *L29*
- - *L29.8*
- - Diabète sucré
- - - *E14.60†, L99.8**
- - - Type
- - - - 1 avec *E10.60†, L99.8**
- - - - 2 avec *E11.60†, L99.8**

PSA] ¬ Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [*R77.80*

Psaume
v. Papillon-Léage-Psaume

PSC ¬ *K83.0*

Pseudallescheria boydii ¬ Infection à *B48.2*

Pseudarthrose
- Congénitale de la clavicule ¬ *Q74.0*
- Fusion ou arthrodèse ¬ *M96.0*
- Post-ostéotomie ¬ *M96.0*
- ¬ Fracture non consolidée [*M84.1*

Pseudoachondroplasie ¬ *Q77.8*

Pseudo-adrénoleucodystrophie
- Néonatale ¬ *E71.3*
- ¬ *E71.3*

Pseudo-ALDN [adrénoleucodystrophie néonatale] ¬ *E71.3*

Pseudoaldostéronisme ¬ *I15.10*

Pseudocamptodactylie
v. trismus-pseudocamptodactylie

Pseudocicatrice
v. facial-pseudocicatrice

Pseudocoxalgie ¬ *M91.3*

Pseudodébilité organique ¬ *F07.0*

Pseudodiastrophique ¬ Dysplasie *Q78.8*

Pseudo-encéphalopathie supérieure hémorragique ¬ *E51.2*

Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, *G31.81*

Pseudo-exfoliatif] ¬ Glaucome PEX [glaucome *H40.1*

Pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ Glaucome (primitif) (résiduel): capsulaire avec *H40.1*

Pseudofolliculite de la barbe ¬ *L73.1*

Pseudoglaucome ¬ Orbitopathie endocrinienne avec *E05.0†, H06.2**

Pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale ¬ Granulome et lésions *K13.4*

Pseudohémophilie
- Bernuth ¬ *D68.09*
- Héréditaire ¬ *D68.00*
- Type
- - A ¬ *D69.88*
- - B ¬ *D68.09*
- Vasculaire ¬ *D69.88*
- ¬ *D68.09*

Pseudo-hermaphrodisme
- Féminin
- - Non classé ailleurs ¬ *Q56.2*
- - SAI ¬ *Q56.2*
- Masculin
- - Déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase type 3 ¬ *E29.1*
- - Non classé ailleurs ¬ *Q56.1*
- - Résistance aux androgènes ¬ *E34.5*
- - SAI ¬ *Q56.1*
- Sans précision ¬ *Q56.3*
- Surrénalien chez la femme ¬ *E25*
- ¬ Non-différenciation sexuelle et *Q56*

Pseudo-hermaphroditisme
- Féminin dû à un trouble corticosurrénal ¬ *E25.8*
- Masculin) ¬ Déficit en 5-alpha-réductase (avec *E29.1*

Pseudo-hyperaldostéronisme type 1 ¬ *I15.10*

Pseudohyperkaliémie familiale ¬ *D58.8*

Pseudohypertrophie musculaire-hypothyroïdie ¬ Syndrome de *E03.1*

Pseudohypoaldostéronisme type
- 1
- - Autosomique
- - - Dominant ¬ *N25.8*
- - - Récessif ¬ *N25.8*
- - Rénal ¬ *N25.8*
- - ¬ *N25.8*
- 2A ¬ *I15.10*
- 2B ¬ *I15.10*
- 2C ¬ *I15.10*
- 2D ¬ *I15.10*
- 2E ¬ *I15.10*

Pseudohypoparathyroïdie ¬ *E20.1*

Pseudo-hypoparathyroïdie ¬ *E20.1*

Pseudo-inflammatoire de Sorsby ¬ Dystrophie *H35.5*
Pseudokyste
- Pancréas ¬ *K86.3*
- Rétine ¬ *H33.1*
Pseudo-Lennox ¬ Syndrome *G40.00*
Pseudolepréchaunisme de Patterson ¬ *E34.8*
Pseudoleucémie infantile ¬ *D64.8*
Pseudolymphome cutané ¬ *L98.8*
Pseudo-maladie de von Willebrand ¬ *D69.1*
Pseudomallei SAI ¬ Infection
- Burkholderia *A24.4*
- Pseudomonas *A24.4*
Pseudoméningocèle
- Actes médicaux ¬ *G97.88*
- Post-traumatique ¬ *G96.1*
Pseudomonas
- Acinetobacter multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.1!*
- - 3MRGN ¬ *U81.3!*
- - 4MRGN ¬ *U81.5!*
- Aeruginosa
- - Multirésistant
- - - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.10!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.30!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.50!*
- - ¬
- - - *B96.5!*
- - - Otite externe à *H60.2, B96.5!*
- Bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.5!*
- Mallei ¬ Infection à *A24.0*
- Pseudomallei SAI ¬ Infection à *A24.4*
- ¬
- - Arthrite à *M00.89, B96.5!*
- - Choc septique à *A41.52, R57.2*
- - Infection
- - - *A49.8*
- - - Voies urinaires à *N39.0, B96.5!*
- - Pneumonie
- - - *J15.1*
- - - Congénitale à *P23.5*
- - Septicémie: *A41.52*
Pseudo-mucineux ovaire ¬
- Adénocarcinome *C56*
- Cystadénocarcinome *C56*
Pseudomyotonie ¬ *G71.1*
Pseudomyxome péritonéal ¬ *C78.6*
Pseudo-névrotique ¬ Schizophrénie: *F21*
Pseudo-obstruction
- Colique aiguë ¬ *K56.0*
- Intestinal
- - Aiguë ¬ *K56.0*
- - Chronique
- - - POIC] ¬ *K59.8*
Pseudo-obstruction *–suite*
- Intestinal *–suite*
- - Chronique *–suite*
- - - ¬ *K59.8*
Pseudo-œdème papillaire ¬ *H47.3*
Pseudo-papillaire et solide du pancréas ¬ Carcinome *C25.9*
Pseudo-paralysie
- Parrot ¬ *A50.0†, M90.23**
- Syphilitique congénitale précoce ¬ *A50.0†, M90.23**
Pseudo-parkinsonien ¬ Syndrome *G21.4*
Pseudo-pelade [de Brocq] ¬ *L66.0*
Pseudophakie ¬ *Z96.1*
Pseudoprogéria ¬ *Q87.8*
Pseudopseudohypoparathyroïdie ¬ *E20.1*
Pseudo-psychopathique ¬ Schizophrénie: *F21*
Pseudopsychopathique organique ¬ Personnalité *F07.0*
Pseudo-ptérygion ¬ *H11.8*
Pseudo-puberté
- Hétérosexuelle précoce chez la femme ¬ *E25*
- Isosexuelle précoce chez l'homme ¬ *E25*
Pseudo-sarcomateuse ¬ Fibromatose *M72.4*
Pseudosclérose
- Spastique avec démence ¬ *A81.0†, F02.1**
- Westphal-von-Strümpell ¬ *E83.0†, G99.8**
Pseudostreptocoques ¬ *B95.91!*
Pseudosyndrome Cushing alcool ¬
- *E24.4*
Pseudo-TORCH ¬ Syndrome *Q87.8*
Pseudo-trisomie 13 ¬ Syndrome *Q87.8*
Pseudotuberculosis subsp. pestis [Yersinia pestis] ¬ infection à Yersinia *A20*
Pseudotyphus de la Californie ¬ *A79.8*
Pseudo-unicorne ¬ Utérus *Q51.4*
Pseudovaccine [nodule des trayeurs] ¬ *B08.0*
Pseudovitamine D ¬ Déficit en *E83.31*
Pseudoxanthome élastique ¬
- *Q82.8*
- Elastolyse dermique papillaire, type *L90.8*
Psilocine ¬
- *T40.9*
- Intoxication à la *T40.9*
Psilocybine ¬
- *T40.9*
- Intoxication à la *T40.9*
PSIS ¬ *E23.6*
Psittaci ¬ Infection à Chlamydia *A70*
Psittacose
- Pneumonie ¬ *A70†, J17.8**
- ¬ *A70*
Psoas ¬
- Abcès du *M60.05*
Psoas ¬ *–suite*
- Tendinite du *M76.1*
Psoriasiforme ¬ Rash fessier *L22*
Psoriasique
- Distale interphalangienne ¬ Arthropathie *L40.5†, M07.09**
- Entéropathiques ¬ Arthrites *M07**
- ¬
- - Arthrite *L40.5†, M07.39**
- - Arthropathie *L40.5†, M07.39**
- - Spondylite *L40.5†, M07.2**
Psoriasis
- Exfoliatif ¬ *L40.8*
- Goutte ¬ *L40.4*
- Guttata modéré à sévère ¬ *L40.4, L40.70!*
- Inversa modéré à sévère ¬ *L40.8, L40.70!*
- Modéré à sévère ¬ *L40.70!*
- Nummulaire ¬ *L40.0*
- Plis de flexion ¬ *L40.8*
- Pustuleux généralisé
- - Forme de von Zumbusch ¬ *L40.1*
- - ¬ *L40.1*
- Sans précision ¬ *L40.9*
- Vulgaris
- - Modéré à sévère ¬ *L40.0, L40.70!*
- - ¬ *L40.0*
- ¬
- - *L40.8*
- - Arthrite juvénile idiopathique associée au *L40.5†, M09.09**
- - Gravité du *L40.7!*
- - Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-épilepsie- *Q87.8*
Psoriatica ¬ Arthritis mutilans *L40.5†, M07.19**
PSP ¬ *G23.1*
Psychalgie ¬ *F45.40*
Psychasthénie ¬ *F48.8*
Psychasthénique ¬ Névrose: *F48.8*
Psychiatrique
- Évident ¬ Mise observation
- - Activité répréhensible en bande sans trouble *Z03.2*
- - Comportement asocial sans trouble *Z03.2*
- - Pyromanie sans trouble *Z03.2*
- - Vol à l'étalage sans trouble *Z03.2*
- Général
- - Demande des autorités ¬ Examen *Z04.8*
- - Non classé ailleurs ¬ Examen *Z00.4*
- ¬ Modification durable de la personnalité après une maladie *F62.1*
Psychique
- Comportement provoqués par ces substances ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles *U69.3!*

Psychique *–suite*
- Troubles du comportement ¬ Maladies *Z13.8*
- ¬
- - Choc *F43.0*
- - Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et *F45.41*
- - Traumatisme *Z91.8*

Psycho
- Actif
- - Troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances *U69.3!*
- - Voie intraveineuse ¬ Consommation d'autres substances *U69.32!*
- - ¬
- - - Antécédents personnels d'abus de substances *Z86.4*
- - - Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances *F05*
- - - Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances *F04*
- - - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances *F19*
- Infantile ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.4*
- Social ¬ difficulté lié
- - Certaines situations *Z64*
- - Situations *Z65*

Psychodysleptiques hallucinogène
- Sans précision ¬ Intoxication: *T40.9*
- ¬ Intoxication par narcotiques et *T40*

Psychogène
v. Type de maladie

Psycholeptiques neuroleptiques
- Dérivés de la phénothiazine ¬ Intoxication: *T43.3*
- Non précisés ¬ Intoxication: *T43.5*

Psychologique
- Comportemental associé
- - Développement sexuel et à son orientation ¬ Problèmes *F66*
- - Maladies ou des troubles classés ailleurs ¬ Facteurs *F54*
- Connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions comportementales et *Z64.8*
- Influençant une affection physique ¬ Facteurs *F54*
- Sans précision ¬ Trouble du développement *F89*
- Trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit *F68.1*
- ¬
- - Hyperphagie associée à d'autres perturbations *F50.4*
- - Majoration de symptômes physiques pour des raisons *F68.0*
- - Sévices *T74.3*

Psychologique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Troubles du développement *F88*
- - Vomissements associés à d'autres perturbations *F50.5*

Psychomoteur
- Déficit en S-adénosylhomocystéine hydrolase ¬ Retard *E72.1*
- ¬ Syndrome
- - Aniridie-agénésie rénale-retard *Q87.8*
- - Ataxie cérébelleuse autosomique récessive-retard *G11.1*

Psychomotrice bénigne [crises de terreur] ¬ Épilepsie *G40.02*

Psycho-névrotique ¬ Personnalité: *F60.8*

Psycho-organique
- Aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ syndrome: *F05*
- ¬ SPO [syndrome *F07.9*

Psychopathie
- Autistique ¬ *F84.5*
- Privation affective ¬ *F94.2*

Psychopathique
v.a. pseudopsychopathique
- ¬ Personnalité: *F60.2*

Psychose
- Affective SAI ¬ *F39*
- Aigu cours trouble
- - Endocrinien ¬ *F05.8*
- - Métabolique ¬ *F05.8*
- Allure schizophrénique au cours d'une épilepsie ¬ *F06.2*
- Cycloïde
- - Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ *F23.0*
- - Symptômes schizophréniques ¬ *F23.1*
- Dépressif
- - Psychogène ¬ épisode
- - - Isolés de: *F32.3*
- - - Récurrents sévères de: *F33.3*
- - Réactionnel ¬ épisode
- - - Isolés de: *F32.3*
- - - Récurrents sévères de: *F33.3*
- Désintégrative ¬ *F84.3*
- Épileptique SAI ¬ *F06.8*
- Hallucinatoire chronique ¬ *F28*
- Hystérique ¬ *F44*
- Infantile atypique ¬ *F84.1*
- Infectieuse aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ *F05*
- Maniaco dépressif
- - Forme dépressif
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- - - Symptômes psychotiques ¬ *F33.3*
- - ¬ *F31*
- Non organique, sans précision ¬ *F29*
- Organique
- - Aigu
- - - Cours d'une maladie infectieuse ¬ *F05.9*

Psychose *–suite*
- Organique *–suite*
- - Aigu *–suite*
- - - Post-traumatique ¬ *F05.8*
- - Maladie de Creutzfeldt-Jakob ¬ *A81.0†, F02.1**
- - SAI ¬ *F09*
- - Subaiguë post-traumatique ¬ *F05.8*
- Paranoïaque
- - Psychogène ¬ *F23.3*
- - ¬ *F22.0*
- Petite enfance ¬ *F84.0*
- Post-partum ¬ *F53.1*
- Présénile SAI ¬ *F03*
- Puerpérale SAI ¬ *F53.1*
- Réactionnel
- - Brève) SAI ¬ *F23.9*
- - ¬ *F23.9*
- SAI
- - Schizophréniforme ¬ *F20.8*
- - ¬ *F29*
- Schizo-affectif
- - SAI ¬ *F25.9*
- - Type
- - - Dépressif ¬ *F25.1*
- - - Maniaque ¬ *F25.0*
- Schizophréniforme
- - Courte durée ¬ *F23.2*
- - Type
- - - Dépressif ¬ *F25.1*
- - - Maniaque ¬ *F25.0*
- Schizophrénique
- - Affective mixte ¬ *F25.2*
- - Type affectif ¬ *F25.9*
- Sénile SAI ¬ *F03*
- Subaigu cours
- - Maladie infectieuse ¬ *F05.9*
- - Trouble endocrinien ¬ *F05.8*
- Symbiotique ¬ *F84.3*
- Symptomatique SAI ¬ *F09*
- Syndrome de Korsakov non alcoolique ¬ *F04*
- Syphilitique NCA au cours de paralysie progressive ¬ *A52.1†, F02.8**
- ¬
- - Sénescence sans mention de *R54*
- - Vieillesse sans mention de *R54*

Psychosexuel
- Sans précision ¬ Trouble du développement *F66.9*
- ¬
- - Problème de développement *F66.9*
- - Troubles du développement *F66.8*

Psychosocial ¬
- Difficultés liées à certaines circonstances *Z64.8*
- Insuffisance staturale: *E34.3*

Psychosomatique
- Indifférencié ¬ Trouble *F45.1*
- Multiple ¬ Trouble *F45.0*
- SAI ¬ Trouble *F45.9*
- ¬ Gastrite *F54, K29.7*

Psychosomatogène ¬ Dermatose *F54, L98.9*

Psychostimulants présentant un risque d'abus ¬ Intoxication: *T43.6*

Psychosyndrome
- Épilepsie du système limbique ¬ *F07.0*
- Organique ¬
- - *F07.9*
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, F07.9*

Psychothérapie
- Non classée ailleurs ¬ *Z50.4!*
- ¬
- - Convalescence après *Z54.3!*
- - Examen de contrôle après *Z09.3*

Psychotique
- Aigu
- - Allure schizophrénique ¬ Trouble *F23.2*
- - Essentiellement délirant ¬ Autre trouble *F23.3*
- - Polymorphe
- - - Sans symptômes schizophréniques ¬ Trouble *F23.0*
- - - Symptômes schizophréniques ¬ Trouble *F23.1*
- - Transitoire
- - - Sans précision ¬ Trouble *F23.9*
- - - ¬ Autres troubles *F23.8*
- Congruents à l'humeur ¬ Manie avec symptômes *F30.2*
- Induit ¬ Trouble: *F24*
- Non
- - Congruents à l'humeur ¬ Manie avec symptômes *F30.2*
- - Organiques ¬ Autres troubles *F28*
- ¬
- - Dépression
- - - Agitée épisode isolé sans symptômes *F32.2*
- - - Endogène
- - - - Sans symptômes *F33.2*
- - - - Symptômes *F33.3*
- - - Majeur
- - - - Épisode isolé sans symptômes *F32.2*
- - - - Récurrente, sans symptômes *F33.2*
- - - Vital
- - - - Épisode isolé sans symptômes *F32.2*
- - - - Récurrente, sans symptômes *F33.2*
- - Épisode
- - - Dépressif sévère
- - - - Sans symptômes *F32.2*
- - - - Symptômes *F32.3*
- - - Isolés dépression
- - - - *F32.3*

Psychotique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Épisode *–suite*
- - - Isolés dépression *–suite*
- - - - Majeure avec symptômes *F32.3*
- - - Récurrent sévère dépression
- - - - *F33.3*
- - - - Majeure, avec symptômes *F33.3*
- - Manie
- - - Sans symptômes *F30.1*
- - - Symptômes *F30.2*
- - Psychose maniaco dépressif forme dépressif
- - - Sans symptômes *F33.2*
- - - Symptômes *F33.3*
- - Syndrome: cérébral post-traumatique, non *F07.2*
- - Trouble
- - - Affectif bipolaire épisode actuel
- - - - Dépression
- - - - - Sévère avec symptômes *F31.5*
- - - - - Sévère sans symptômes *F31.4*
- - - - Maniaque
- - - - - Sans symptômes *F31.1*
- - - - - Symptômes *F31.2*
- - - Dépressif récurrent épisode actuel sévère
- - - - Sans symptômes *F33.2*
- - - - Symptômes *F33.3*

Psychotrope
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres médicaments *T43.8*
- Sang ¬ Présence d'une substance *R78.5*
- Sans précision ¬ Intoxication: Médicament *T43.9*

PTA] ¬ Déficit en précurseur de thromboplastine plasmatique [*D68.1*

Ptérygion
- Congénital de l'œsophage ¬ *Q39.4*
- Larynx
- - Glottique ¬ *Q31.0*
- - SAI ¬ *Q31.0*
- - Sous-glottique ¬ *Q31.0*
- - ¬ *Q31.0*
- Œsophage (acquis) ¬ *K22.2*
- ¬ *H11.0*

Ptérygium
- Antécubital ¬ Syndrome du *Q87.2*
- Multiples-hyperthermie maligne ¬ Syndrome des *Q87.8*
- Poplité
- - Autosomique dominant ¬ Syndrome des *Q87.8*
- - ¬ Syndrome des *Q87.8*

Pterygium colli ¬ *Q18.3*

Ptose
- Gastrique ¬ *K31.8*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, H03.1**

Ptosis
- Congénital ¬ *Q10.0*
- Ésotropie-syndactylie-petite taille ¬ Syndrome de blépharophimosis- *Q87.8*
- Fente labiale ¬ Syndrome de microbrachycéphalie- *Q87.8*
- Paupière ¬ *H02.4*
- Sourcil ¬ *L98.7*

PTT ¬ *M31.1*

Ptyalisme ¬ *K11.7*

Pubarche prématurée ¬ *E30.8*

Puberté
- Hypophysaire précoce ¬ *E22.8*
- Non classées ailleurs ¬ Anomalies de la *E30*
- Précoce
- - Centrale ¬ *E22.8*
- - Dépendante des gonadotropines ¬ *E22.8*
- - ¬ *E30.1*
- Retardée ¬ *E30.0*
- Sans précision ¬ Anomalie de la *E30.9*
- Surrénalienne précoce ¬ *E27.0*
- ¬
- - A la *Z00.3*
- - Anomalies de la *E30.8*
- - Hypertrophie mammaire: massive de la *N62*
- - Ménorragie de la *N92.2*
- - Menstruation trop abondante à la *N92.2*
- - Saignements de la *N92.2*

Pubienne
- Cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ Subluxation de la symphyse (*O26.7*
- Obstétrical e ¬
- - Arrachement du cartilage interne de la symphyse (*O71.6*
- - Écartement traumatique de la symphyse (*O71.6*
- Pierson] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): symphyse *M91.0*
- Van Neck] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): ischio- *M91.0*
- ¬
- - Dysfonctionnement de la symphyse *M25.55*
- - Région *S31.1*
- - Rupture traumatique de la symphyse *S33.4*
- - Tuberculose de la symphyse *A18.0†, M01.15**

Pubis ¬
- Fracture du *S32.5*
- Infestation par: Phthirus *B85.3*
- Phtiriase [Infestation par poux du *B85.3*

Publique ¬ Lésion due à des troubles de l'ordre *Y36.9!*

Puce-chique] ¬ Tungose [infestation par *B88.1*

Puces) ¬ Typhus murin (à *A75.2*

Pudendum femininum ¬ *C51.9*

Pudlak ¬ Syndrome de: Hermansky- *E70.3*

Puerpéral
v. Type de maladie

Puerpéralité

- Lactation ¬ état mentionné cours grossesse
- - *O91*
- - *O92*
- Non classé ¬ trouble mental comportement
- - Associés à la *F53.8*
- - Légers associés à la *F53.0*
- - Sévères associés à la *F53.1*
- Sans précision ¬
- - Complication
- - - Anesthésie au cours de la *O89.9*
- - - Veineuse au cours de la *O87.9*
- - Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.9*
- - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.9*
- - Trouble mental de la *F53.9*
- ¬
- - Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la *O26.6*
- - Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.0*
- - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la *O89.2*
- - Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la *Z87.5*
- - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O89.1*
- - Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.3*
- - Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.1*
- - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la *O89.4*
- - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - Complication
- - - Anesthésie au cours de la *O89.8*
- - - Cardiaques de l'anesthésie au cours de la *O89.1*
- - - Intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la *O89.2*
- - - Mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la *O89*
- - - Pulmonaires de l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la *O89.5*
- - - Veineux
- - - - Cours de la *O87.8*
- - - - Hémorroïdes au cours de la *O87*

Puerpéralité *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Cours
- - - Accouchement et de la *O24*
- - - Travail, de l'accouchement et de la *O87*
- - Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la *O95*
- - Echec ou difficulté d'intubation au cours de la *O89.6*
- - Eclampsie au cours de la *O15.2*
- - Embolie
- - - Grossesse, de l'accouchement ou de la *O88*
- - - Pulmonaire au cours de la *O88.20*
- - Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.2*
- - Hémorroïdes au cours de la *O87.2*
- - Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.4*
- - Hypertension
- - - Essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.0*
- - - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10*
- - - Secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.4*
- - Infection généralisée dans la *O85*
- - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O89.1*
- - Maladie
- - - Affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.8*
- - - Appareil
- - - - Circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.4*
- - - - Digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.6*
- - - - Respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.5*
- - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.3*
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.2*
- - - Infectieux parasitaire mère
- - - - Classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98*
- - - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.8*
- - - Mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99*
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.7*
- - - Protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.6*

Puerpéralité *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.1*
- - - Virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.5*
- - - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.7*
- - Malnutrition au cours de l'accouchement et de la *O25*
- - Myocardiopathie au cours de la *O90.3*
- - Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.2*
- - Phlébothrombose profonde au cours de la *O87.1*
- - Pneumonie
- - - Aspiration dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - - Chimique d'aspiration dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la *O89.3*
- - Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la *O94*
- - Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la *O26.7*
- - Syndrome de Mendelson dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.1*
- - Thrombophlébite superficielle au cours de la *O87.0*
- - Thrombose
- - - Sinus veineux cérébral au cours de la *O87.3*
- - - Veineuse cérébrale au cours de la *O87.3*
- - Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.3*
- - Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.0*
- - Varices des organes génitaux au cours de la *O87.8*

Pugilistique ¬ Démence *F07.2*

Puissance sexuelle ¬ Déficience organique de la *N48.4*

Pulmonaire
v.a. broncho-pulmonaire

- Aberrante ¬ Artère *Q25.7*
- Acquis ¬ Kyste *J98.4*
- Aigu
- - Consécutif intervention chirurgical
- - - Non thoracique ¬ Insuffisance *J95.2*
- - - Thoracique ¬ Insuffisance *J95.1*
- - Histoplasma capsulatum ¬ Histoplasmose *B39.0*
- - Irradiation ¬ Affections *J70.0*

Pulmonaire *–suite*
- Aigu *–suite*
- - Mention de maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque ¬ Œdème *I50.1*
- - SAI ¬ Cœur *I26.0*
- - ¬
- - - Blastomycose *B40.0†, J99.8**
- - - Coccidioïdomycose *B38.0†, J17.2**
- - - Embolie pulmonaire
- - - - Mention de cœur *I26.0*
- - - - Sans mention de cœur *I26.9*
- - - Œdème *J81*
- Anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Complications *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Complications *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Autres complications *O74.1*
- Anomalie cardiaque-pouce triphalangé ¬ Syndrome d'agénésie *Q87.8*
- Anormal
- - Partiel ¬ Retour veineux *Q26.3*
- - Sans précision ¬ Retour veineux *Q26.4*
- - Total ¬ Retour veineux *Q26.2*
- Artérioveineux ¬ Anévrisme *Q25.7*
- Associée à une brièveté de la gestation ¬ Hypoplasie *P28.0*
- Auto-immune ¬ Protéinose alvéolaire *J84.0*
- Bien différencié de type fœtal ¬ Adénocarcinome *C34.9*
- Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.2*
- Bulleux ¬ Emphysème (*J43.9*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte *J99.2**
- Chronique
- - Consécutive à une intervention chirurgicale ¬ Insuffisance *J95.3*
- - Histoplasma capsulatum ¬ Histoplasmose *B39.1*
- - Inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ Fibrose *J68.4*
- - Irradiation ¬ Affections *J70.1*
- - SAI ¬ Cœur *I27.9*
- - ¬
- - - Blastomycose *B40.1†, J99.8**
- - - Coccidioïdomycose *B38.1†, J17.2**
- Compression anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Collapsus *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Collapsus *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Collapsus *O74.1*
- Confirmation
- - Histologique ¬ Tuberculose *A15.2*
- - Moyen autre et non précisé ¬ Tuberculose *A15.3*
- Confirmé

Pulmonaire *–suite*
- Confirmé *–suite*
- - Analyse bactériologique ¬ Tuberculose *A15.0*
- - Culture seulement ¬ Tuberculose *A15.1*
- - Examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ Tuberculose *A15.0*
- Congénital
- - Unilatérale ¬ Hypoplasie *Q33.6*
- - ¬
- - - Anomalie *Q33.9*
- - - Fibrose *P27.8*
- - - Fistule
- - - - Aorte-artère *Q21.4*
- - - - Artérioveineux *Q25.7*
- - - Lymphangiectasie *Q33.8*
- - - Protéinose alvéolaire *J84.0*
- - - Séquestration *Q33.2*
- - - Sténose valvulaire *Q22.1*
- - - Syndrome veinolobaire *Q26.8*
- Cours
- - Amylose ¬ Maladie *E85.4†, J99.8**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la valvule *I39.3**
- - Puerpéralité ¬ Embolie *O88.20*
- Dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie *Q21.3*
- Diffuse ¬ Fibrose *J84.1*
- Echinococcus granulosus ¬ Infection *B67.1†, J99.8**
- Familiale ¬ Hypertension artérielle *I27.0*
- Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.2*
- Fièvre de Pontiac] ¬ Maladie des légionnaires, sans signes *A48.2*
- Fulminante ¬ Embolie *I26.0*
- Goudrons ¬ Cancer *C34.9*
- Hantavirus [SPH] ¬ Syndrome *B33.4†, J17.1**
- Histoplasma capsulatum, sans précision ¬ Histoplasmose *B39.2*
- Idiopathique ¬
- - Fibrose *J84.1*
- - Hémosidérose *E83.1†, J99.8**
- - Hypertension artérielle *I27.0*
- - Protéinose alvéolaire *J84.0*
- Insuffisance ¬ Sténose de la valvule *I37.2*
- Interstitiel
- - Aiguës, médicamenteuses ¬ Affections *J70.2*
- - Chroniques, médicamenteuses ¬ Affections *J70.3*
- - Fibrose ¬ Autres affections *J84.1*
- - Médicamenteuse, sans précision ¬ Affection *J70.4*
- - Précisées ¬ Autres affections *J84.8*

Pulmonaire *–suite*
- Interstitiel *–suite*
- - Sans précision ¬ Affection *J84.9*
- - ¬ Autres affections *J84*
- Intestinale ¬ Mucoviscidose à manifestation *E84.80*
- Invasive ¬ Aspergillose *B44.0*
- Maladies bactériennes ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: tuberculose *Z11*
- Massif
- - Survenant pendant la période périnatale ¬ Hémorragie *P26.1*
- - ¬ Embolie *I26.0*
- Mention de cœur pulmonaire aigu ¬ Embolie *I26.0*
- Mesures médicales ¬ Insuffisance *J95.88*
- Mycobactéries non-tuberculeuses ¬ Infection *A31.0*
- Mycobacterium ¬ Infection *A31.0*
- Naissant
- - Aorte ¬ Artère *Q25.7*
- - Canal artériel ¬ Artère *Q25.7*
- Niveau urgence
- - HU [High Urgency] ¬ Inscription effectuée pour transplantation *U55.22*
- - U [Urgency] ¬ Inscription effectuée pour transplantation *U55.21*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ Eosinophilie *J82*
- - Massive ¬ Embolie *I26.9*
- - Petites cellules ¬ Carcinome *C34.9*
- - Précisée survenant pendant la période périnatale ¬ Hémorragie *P26.9*
- Obstétricale ¬ Embolie *O88.20*
- Obstructif chronique
- - Épisodes aigus, sans précision ¬ Maladie *J44.1*
- - Infection aiguë des voies respiratoires inférieures ¬ Maladie *J44.0*
- - Précisées ¬ Autres maladies *J44.8*
- - SAI ¬ Maladie: *J44.9*
- - Sans précision ¬ Maladie *J44.9*
- - ¬ Autres maladies *J44*
- Origine
- - Anormale ¬ Artère *Q25.7*
- - Médicamenteuse ¬ Antécédents personnels de fibrose *Z87.0*
- Passive) ¬ Congestion *J81*
- Persistante) du nouveau-né ¬ Hypertension *P29.3*
- Petites cellules ¬ Carcinome *C34.9*
- Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.2*
- Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.2*
- Postopératoire ¬ Embolie *I26*

Pulmonaire *–suite*

- Présence d'une thromboembolie chronique ¬ Hypertension *I27.20*
- Primitive ¬ Hypertension *I27.0*
- Rhumatoïde ¬ Maladie *M05.19†, J99.0**
- SAI
- - Cause précis sauf rhumatismal ¬
- - - Insuffisance de la valvule *I37.1*
- - - Régurgitation de la valvule *I37.1*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.2*
- - ¬
- - - Embolie *I26.9*
- - - Emphysème (*J43.9*
- - - Eosinophilie tropicale (*J82*
- - - Hémorragie *R04.8*
- - - Immaturité *P28.0*
- - - Malformation congénitale de la valve *Q22.3*
- - - Masse *R91*
- - - Nodule *R91*
- Sans
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A16.0*
- - Examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique ¬ Tuberculose *A16.1*
- - Mention
- - - Cœur pulmonaire aigu ¬ Embolie *I26.9*
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A16.2*
- - Niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription effectuée pour transplantation *U55.20*
- - Précision ¬
- - - Atteinte de la valvule *I37.9*
- - - Maladie des vaisseaux *I28.9*
- Secondaire
- - Précisées ¬ Autres hypertensions *I27.28*
- - ¬
- - - Hypertensions *I27.2*
- - - Protéinose alvéolaire *J84.0*
- Sévère par déficit en MARS à début précoce ¬ Protéinose alvéolaire *J84.0*
- Spirochètes ¬ Infection *A69.8†, J17.0**
- Sur cicatrice ¬ Carcinome *C34.9*
- Surnuméraire ¬ Lobe *Q33.1*
- Survenant
- - États classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- - Pendant période périnatal ¬ Hémorragie
- - - *P26*
- - - *P26.8*
- Syphilitique ¬ Anévrisme *A52.0†, I79.8**
- Systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air ¬ Maladie *J67.7*

Pulmonaire *–suite*

- Taches café au lait ¬ Syndrome de sténose *Q85.0*
- Tardive ¬ Syphilis *A52.7†, J99.8**
- Thromboembolique chronique ¬ Hypertension *I27.20*
- Tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ Fibrose *A15.0*
- Unilatérale ¬ Hyperclarté *J43.0*
- Valvule tricuspide ¬ Malformations congénitales de la valve *Q22*
- Vésiculaire ¬ Emphysème (*J43.9*
- X ¬ Histiocytose *C96.5*
- ¬
- - Absence d'une artère *Q25.7*
- - Actinomycose *A42.0*
- - Adénome des alvéoles *D14.3*
- - Affections *J98.4*
- - Agénésie
- - - Artère *Q25.7*
- - - Valves *Q22.3*
- - Amylose *E85.4†, J99.8**
- - Anémie hémosidérotique *E83.1†, J99.8**
- - Anévrisme
- - - Artère *I28.1*
- - - Artérioveineux *Q25.7*
- - - Congénital de l'artère *Q25.7*
- - Anomalie
- - - Artère *Q25.7*
- - - Congénital
- - - - Partielle du retour veineux *Q26.3*
- - - - Retour veineux *Q26.4*
- - - - Totale du retour veineux *Q26.2*
- - Arrachement *S27.32*
- - Aspergillose *B44.1†, J99.8**
- - Atrésie
- - - Artère *Q25.5*
- - - Valve *Q22.0*
- - - Veines *Q26.3*
- - Atteintes de la valvule *I37.8*
- - Blastome *C34.9*
- - Blastomycose *B40.2†, J99.8**
- - Bulle d'emphysème *J43.9*
- - Candidose
- - - *B37.1*
- - - *B37.1†, J99.8**
- - Charbon
- - - *A22.1*
- - - *A22.1†, J17.0**
- - Coccidioïdomycose *B38.2†, J17.2**
- - Collapsus
- - - *J98.1*
- - - Primitif des alvéoles *P28.0*
- - Cryoglobulinémie avec atteinte *D89.1†, J99.8**

Pulmonaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Cryptococcose
- - - *B45.0*
- - - *B45.0†, J99.8**
- - Dermatomyosite avec atteinte *M33.9†, J99.1**
- - Dilatation idiopathique de l'artère *I28.8*
- - Distomatose *B66.4†, J99.8**
- - Douve *B66.4*
- - Dysmaturité *P27.0*
- - Dysplasie valvulaire *I37.0*
- - Embolie *I26*
- - Endocardite
- - - Syphilitique de la valve *A52.0†, I39.3**
- - - Tuberculeuse de la valve *A18.8†, I39.3**
- - Fibrose kystique avec manifestations *E84.0*
- - Fistule artérioveineuse des vaisseaux *I28.0*
- - Glycogénose interstitielle *P22.8*
- - Granulomatose avec polyangéite avec atteinte *M31.3†, J99.1**
- - Hémosidérose *E83.1†, J99.8**
- - Histoplasmose *B39.2†, J99.8**
- - Hypogénésie *Q26.8*
- - Hypoplasie artère
- - - *Q25.7*
- - Infarctus (d'une artère) (d'une veine) *I26*
- - Inflammation syphilitique de la valve *A52.0†, I39.3**
- - Inscription pour transplantation *U55.2*
- - Insuffisance
- - - Congénitale de la valve *Q22.2*
- - - Syphilitique de la valve *A52.0†, I39.3**
- - - Valvule *I37.1*
- - Lithiase *J98.4*
- - Lymphangiomatose *Q33.8*
- - Maladie
- - - Précisées des vaisseaux *I28.8*
- - - Rhumatismale de la valvule *I09.8*
- - - Vaisseaux *I28*
- - - Veino-occlusive *I27.0*
- - - Virus Hanta avec manifestations *B33.4†*
- - Malformation congénital
- - - Artère *Q25.7*
- - - Valve *Q22.3*
- - Mélioïdose: *A24.1*
- - Moniliase *B37.1†, J99.8**
- - Mucormycose *B46.0†, J99.8**
- - MVOP [maladie veino-occlusive *I27.0*
- - Mycose *B49†, J99.8**
- - Œdème *J81*
- - Paracoccidioïdomycose *B41.0†, J17.2**
- - Périartérite avec atteinte *M30.1*
- - Peste *A20.2*
- - Plexus: *S24.4*

Pulmonaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Polyartérite avec atteinte *M30.1*
- - Polyarthrite chronique avec manifestation *M05.10†, J99.0**
- - Polymyosite avec atteinte *M33.2†, J99.1**
- - Reflux congénital au niveau de la valve *Q22.2*
- - Régurgitation syphilitique de la valve *A52.0†, I39.3**
- - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.2*
- - Rétrécissement des vaisseaux *I28.8*
- - Rupture des vaisseaux *I28.8*
- - Sclérodermie *M34.8†, J99.1**
- - Sclérose systémique avec atteinte *M34.8†, J99.1**
- - Spondylite ankylosante avec atteinte *M45.09†, J99.8**
- - Sporotrichose *B42.0†, J99.8**
- - Sténose
- - - Congénital
- - - - Artère *Q25.6*
- - - - Valve *Q22.1*
- - - Infundibulum *Q24.3*
- - - Supravalvulaire de l'artère *Q25.6*
- - - Vaisseaux *I28.8*
- - - Valvule *I37.0*
- - Stricture des vaisseaux *I28.8*
- - Syndrome
- - - Gougerot-Sjögren avec atteinte *M35.0†, J99.1**
- - - Microcéphalie-cardiopathie-malsegmentation *Q87.8*
- - - Poïkilodermie héréditaire fibrosante-myopathie rétractile-fibrose *Q82.8*
- - - Sec avec atteinte *M35.0†, J99.1**
- - - Sjögren avec atteinte *M35.0†, J99.1**
- - - Wegener-Klinger-Churg avec atteinte *M31.3†, J99.1**
- - Syphilis des artères *A52.0†, I98.0**
- - Thromboembolie (d'une artère) (d'une veine) *I26*
- - Thrombose (d'une artère) (d'une veine) *I26*
- - Toxoplasmose *B58.3†, J17.3**
- - Tularémie *A21.2*
- - Valvulite syphilitique de la valve *A52.0†, I39.3**
- - VDDI avec communication interventriculaire sous-aortique ou sous-aortique et sous-pulmonaire et sténose *Q20.1*
- - Ventricule droit à double issue avec communication interventriculaire sous-aortique ou sous-aortique et sous-pulmonaire et sténose *Q20.1*

Pulpaire ¬
- Calcifications *K04.2*
- Dégénérescence *K04.2*
- Gangrène *K04.1*

Pulpaire ¬ *–suite*
- Granulome *K03.3*
- Nécrose *K04.1*
- Périodontite apicale aiguë d'origine *K04.4*

Pulpe
- Rouge à petites cellules B ¬ Lymphome splénique diffus de la *C83.0*
- Tissu périapical
- - Sans précision ¬ Maladies de la *K04.9*
- - ¬ Maladies de la *K04*
- ¬
- - Carie avec exposition de la *K02.5*
- - Formation anormale de tissus dentaires durs dans la *K04.3*

Pulpite
- Aiguë ¬ *K04.0*
- Chronique (hyperplasique) (ulcéreuse) ¬ *K04.0*
- Irréversible ¬ *K04.0*
- Réversible ¬ *K04.0*
- SAI ¬ *K04.0*
- ¬ *K04.0*

Pulpolithes ¬ *K04.2*

Pulseurs pour aérosols ¬ *T59*

Pulverulentus ¬ Fundus *H35.5*

Pumphrey
v. Bart-Pumphrey

Punctiforme
- Corps étranger (pénétrant) SAI ¬ Plaie: *T14.1*
- Multiples SAI ¬ Plaies *T01.9*
- ¬ Cataracte sénile: *H25.0*

Pupillaire
- Miotique ¬ Kyste *H21.2*
- ¬
- - Dégénérescence de: rebord *H21.2*
- - Glaucome dû à un blocage *H40.2*
- - Membranes *H21.4*
- - Occlusion *H21.4*
- - Séclusion *H21.4*

Pupille
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies fonctionnelles de la *H58.0**
- Horner ¬ *G90.2*
- ¬
- - Anomale congénitale des la *Q13.2*
- - Anomalies fonctionnelles de la *H57.0*
- - Atrésie de la *Q13.2*

Pure red cell aplasia
- Congénitale ¬ PRCA [*D61.0*
- ¬ *D60.9*

Purine
- Nucléoside phosphorylase [PNP] ¬ Déficit en *D81.5*
- Pyrimidine
- - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme de la *E79.9*
- - ¬ anomalie métabolisme

Purine *–suite*
- Pyrimidine *–suite*
- - ¬ anomalie métabolisme *–suite*
- - - *E79*
- - - *E79.8*

Purple gloves syndrome ¬ *T88.7*

Purpura
- Affections hémorragiques ¬ *D69*
- Allergique ¬ *D69.0*
- Anaphylactoïde ¬ *D69.0*
- Arthritique ¬ *D69.0†, M36.4**
- Cours de scorbut ¬ *E54†, D77**
- Cryoglobulinémique ¬ *D89.1*
- Fibrinolytique ¬ *D65.2*
- Fragilité capillaire idiopathique ¬ *D69.88*
- Fulminans
- - Acquis ¬ *D65.9*
- - ¬ *D65*
- Hypergammaglobulinémique bénin [de Waldenström] ¬ *D89.0*
- Non thrombopénique
- - Hémorragique ¬ *D69.0*
- - Idiopathique ¬ *D69.0*
- - ¬ Autres *D69.2*
- Rhumatoïde
- - Schönlein-Henoch] ¬ *D69.0*
- - ¬ *D69.0*
- SAI ¬ *D69.2*
- Schoenlein-Henoch ¬
- - Arthropathie au cours de *D69.0†, M36.4**
- - Glomérulonéphrite au cours de *D69.0†, N08.2**
- - Maladie glomérulaire au cours de *D69.0†, N08.2**
- Sénile ¬ *D69.2*
- Simple ¬ *D69.2*
- Thrombocytopénique thrombotique ¬ Glomérulopathie au cours de *M31.1†, N08.5**
- Thrombopénique
- - Idiopathique ¬ *D69.3*
- - Thrombotique [Moschcowitz] ¬ *M31.1*
- Thrombotique-thrombocytopénique ¬ Glomérulonéphrite au cours de *M31.1†, N08.5**
- Vasculaire ¬ *D69.0*

Purpurique
- Brésil ¬ Fièvre *A48.4*
- Pigmentée ¬ Dermatose *L81.7*

Purulent
v. Type de maladie

Pustule maligne ¬ *A22.0*

Pustuleux
- Contagieuse ovine] ¬ Orf [dermatite *B08.0*
- Généralisé
- - Forme de von Zumbusch ¬ Psoriasis *L40.1*
- - ¬ Psoriasis *L40.1*

Pustuleux *–suite*
- Sous-cornée ¬ Dermatose *L13.1*
Pustulose
- Exanthématique aigu généralisé ¬
- - *L27.0*
- - *L27.1*
- - PEAG [*L27.0*
- Palmaire et plantaire ¬ *L40.3*
- Sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] ¬ *L13.1*
- Varicelliforme de Kaposi ¬ *B00.0*
PUV ¬ *Q64.2*
PUVA lentigines ¬ *L81.4*
PV ¬ *D45*
PXE ¬ *Q82.8*
Pyélite
- Aiguë ¬ *N10*
- Chronique ¬ *N11*
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N29.1**
- Kystique ¬ *N28.88*
- SAI
- - Chronique ¬ *N11.9*
- - ¬ *N12*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N29.1**
Pyélo
- Urétéral ¬
- - Hydronéphrose avec obstruction de la jonction *N13.0*
- - Occlusion congénitale de: jonction *Q62.1*
- - Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie de jonction *N11.1*
- - - Coudure de jonction *N11.1*
- - - Obstruction de jonction *N11.1*
- - - Rétrécissement de jonction *N11.1*
- Urétérite kystique ¬ *N28.88*
Pyélonéphrite
- Aiguë ¬ *N10*
- Candida ¬ *B37.4†, N16.0**
- Candidosique ¬ *B37.4†, N16.0**
- Chronique
- - Associé
- - - Anomalie
- - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - - Pyélo-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - Uretère ¬ *N11.1*
- - - Coudure
- - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - - Pyélo-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - Uretère ¬ *N11.1*
- - - Obstruction
- - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - - Pyélo-urétérale ¬ *N11.1*
Pyélonéphrite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Associé *–suite*
- - - Obstruction *–suite*
- - - - Uretère ¬ *N11.1*
- - - Reflux (vésico-urétéral) ¬ *N11.0*
- - - Rétrécissement
- - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - - Pyélo-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - Uretère ¬ *N11.1*
- - Non obstructive SAI ¬ *N11.8*
- - ¬ *N11*
- Cours
- - Brucellose ¬ *A23.9†, N16.0**
- - Cryoglobulinémie ¬ *D89.1†, N16.2**
- - Cystinose ¬ *E72.0†, N16.3**
- - Diphtérie ¬ *A36.8†, N16.0**
- - Leucémie NCA ¬ *C95.90†, N16.1**
- - Lymphome NCA ¬ *C85.9†, N16.1**
- - Maladie
- - - Glycogénique ¬ *E74.0†, N16.3**
- - - Wilson ¬ *E83.0†, N16.3**
- - Myélome multiple ¬ *C90.00†, N16.1**
- - Rejet de greffe ¬ *T86.9†, N16.5**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, N16.2**
- - Syphilis ¬ *A52.7†, N16.0**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.8†, N16.0**
- Non obstructive chronique associée à un reflux ¬ *N11.0*
- Obstructive chronique ¬ *N11.1*
- SAI
- - Chronique ¬ *N11.9*
- - ¬ *N12*
- Salmonella ¬ *A02.2†, N16.0**
- Sepsis NCA ¬ *A41.9†, N16.0**
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, N16.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N29.1**
Pyélophlébite ¬ *I80.88*
Pygopages ¬ *Q89.4*
Pyknolepsie] ¬ Épilepsie (avec): absences de l'enfance [*G40.3*
Pyle ¬ Syndrome de *Q78.5*
Pyléphlébite ¬ *K75.1*
Pyléphlébitique ¬ Abcès hépatique: *K75.0*
Pylore
- Non classé ailleurs ¬ Spasme du *K31.3*
- ¬
- - Constriction congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- - Epidermolyse bulleuse simple avec atrésie du *Q81.0*
- - Formes psychogènes de: spasme du *F45.3*
- - Hypertrophie congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
Pylore *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Rétrécissement congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- - Spasme congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- - Sténose
- - - Congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- - - Hypertrophique congénitale du *Q40.0*
- - Tumeur maligne: *C16.4*
Pylori
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Helicobacter pylori [H. *B98.0!*
- Cours ulcère
- - Duodénal ¬ Infection à Helicobacter *K26.9, B98.0!*
- - Estomac ¬ Infection à Helicobacter *K25.9, B98.0!*
- Pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Helicobacter *B98.0!*
- ¬ Gastrite
- - Chronique à Helicobacter *K29.5*
- - Helicobacter *K29.7, B98.0!*
Pylorique
- Hypertrophique de l'adulte ¬ Sténose *K31.1*
- SAI ¬ Sténose *K31.1*
- ¬
- - Canal *C16.4*
- - Tumeur maligne: Antre *C16.3*
- - Ulcère: *K25*
Pyodermia fistulans sinifica ¬ *L73.2*
Pyodermite
- Gangréneuse ¬ *L88*
- Néonatale ¬ *P39.4*
- Phagédénique ¬ *L88*
- ¬ *L08.0*
Pyogène
- Disque intervertébral ¬ Infection (*M46.3*
- Muqueuse buccale ¬ Granulome: *K13.4*
- SAI ¬ Méningite: *G00.9*
- Sans précision ¬ Arthrite à bactéries *M00.9*
- Sinus veineux intracrânien ¬ Thrombose non *I67.6*
- Système veineux intracrânien ¬ Thrombose non *I67.6*
- Veine cérébrale ¬ Thrombose non *I67.6*
- ¬
- - Arthrites à bactéries *M00*
- - Granulome: gingival *K06.8*
- - Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non *I63.6*
- - Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non *G95.18*
- - Thyroïdite: *E06.0*
Pyogénique ¬ Granulome *L98.0*
Pyohémique
- Septique, obstétricale ¬ Embolie *O88.3*
- Staphylocoques ¬ Embolie *A41.2*

Pyohémique *–suite*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*

Pyométrie ¬ *N71*

Pyomyosite tropicale ¬ *M60.0*

Pyonéphrose
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬ *N13.6*

Pyopéricardite ¬ *I30.1*

Pyopneumothorax ¬ *J86*

Pyorrhée-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'alopécie-épilepsie- *Q87.8*

Pyosalpinx
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N74.3**
- ¬ *N70*

Pyothorax
- Fistule ¬ *J86.0*
- Sans fistule ¬ *J86.9*
- ¬ *J86*

Pyo-uretère tuberculeux ¬ *A18.1†, N29.1**

Pyramidal ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.12*

Pyrazolés ¬ Intoxication: Dérivés *T39.2*

Pyrexie
- Cours du travail, non classée ailleurs ¬ *O75.2*
- SAI ¬ *R50.9*

Pyrgocéphalie ¬ *Q75.0*

Pyridoxal ¬ Convulsions sensibles au phosphate de *G40.8*

Pyridoxamine 5'-phosphate oxydase ¬ Déficit en *G40.8*

Pyridoxine ¬
- Anémie sidéroblastique: réagissant à la *D64.3*
- Carence en *E53.1*

Pyridoxino-dépendante ¬ Épilepsie *G40.8*

Pyrimidine
- 5' nucléotidase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.3*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme de la purine et de la *E79.9*
- ¬ anomalie métabolisme purine
- - *E79*
- - *E79.8*

Pyrimidinémie familiale ¬ *E79.8*

Pyromanie
- Sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- ¬ Tendance pathologique à allumer des incendies [*F63.1*

Pyrophosphate de calcium dihydraté ¬ Maladie des dépôts de *M11.19*

Pyrosis ¬ *R12*

Pyrroline-5-carboxylate déshydrogénase ¬ Déficit en 1- *E72.5*

Pyruvate
- Carboxylase ¬ Déficit en: *E74.4*
- Déshydrogénase

Pyruvate *–suite*
- Déshydrogénase *–suite*
- - E1-alpha ¬ Déficit en *E74.4*
- - E2 ¬ Déficit en *E74.4*
- - E3 ¬ Déficit en *E74.4*
- - ¬ Déficit
- - - *E74.4*
- - - Phosphatase du complexe *E74.4*
- Gluconéogenèse ¬ Anomalies du métabolisme du *E74.4*
- Kinase
- - Érythrocytaire ¬ Déficit en *D55.2*
- - Globule rouge ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.2*
- - PK] ¬ Anémie (due à): déficit en: *D55.2*
- ¬ Trouble du métabolisme du *E74.4*

Pyruvoyl-tétrahydroptérine synthase ¬ Hyperphénylalaninémie par déficit en 6- *E70.1*

Qazi-Markouizos ¬ Syndrome de *Q87.8*

QT

- Court familial ¬ Syndrome du *I49.8*
- Long
- - Familial ¬ Syndrome du *I49.8*
- - Type Romano-Ward ¬ Syndrome du *I49.8*
- - ¬ Syndrome du *I49.8*
- Surdité ¬ Syndrome de long *I49.8*
- ¬ Syndrome du *I49.8*

Quadrant

- Inféro-externe du sein ¬ Tumeur maligne: *C50.5*
- Inféro-interne du sein ¬ Tumeur maligne: *C50.3*
- Supéro
- - Externe du sein ¬ Tumeur maligne: *C50.4*
- - Interne du sein ¬ Tumeur maligne: *C50.2*
- ¬ Anopsie d'un *H53.4*

Quadriceps ¬

- Lésion traumatique de muscles et de tendons du *S76.1*
- Myopathie épargnant le *G71.8*

Quadricuspidie valvulaire aortique ¬ *Q23.8*

Quadrilatérale ¬ Fièvre (du): *A78*

Quadriparésie spastique ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-agénésie du corps calleux- *Q87.8*

Quadriplégie

- Chronique ¬ *G82*
- SAI ¬ *G82.5*

Quadriplégique ¬ Paralysie cérébrale spastique *G80.0*

Quadritronculaire ¬ Maladie coronarienne *I25.14*

Quadruplés ¬ *O30.2*

Quantité de l'expectoration ¬ Anomalie de: *R09.3*

Quasi-syndrome de mort subite du nourrisson ¬ *R06.80*

Québec ¬ Syndrome plaquettaire du *D69.1*

Queensland ¬ Fièvre à tiques du *A77.3*

Quérulente ¬

- Paranoïa *F22.8*
- Trouble de la) personnalité: *F60.0*

Quervain ¬

- Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de *M65.4*
- Thyroïdite (à) (de): de *E06.1*

Queue

- Cheval
- - Complet ¬ Syndrome de la *G83.40*
- - Incomplet ¬ Syndrome de la *G83.41*
- - Non précisé ¬ Syndrome de la *G83.49*
- - ¬
- - - Gomme de la *A52.1†, G07**
- - - Lésion
- - - - Non précisée de la *S34.38*
- - - - Traumatique de la *S34.3*

Queue *–suite*

- Cheval *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Malformations congénitales de la *Q06.3*
- - - Syndrome
- - - - *G83.4*
- - - - Traumatique
- - - - - Complet de la *S34.30*
- - - - - Incomplet de la *S34.31*
- - - Tumeur maligne: *C72.1*
- Pancréas ¬ Tumeur maligne: *C25.2*
- ¬ Lésion traumatique du pancréas: *S36.23*

Queyrat

- Lèvres génitales ¬ Maladie de *D07.1*
- SAI ¬ Érythroplasie de *D07.4*
- ¬ Érythroplasie de *D07.4*

Quincke

- Héréditaire ¬ Œdème de *D84.1*
- ¬ Œdème de *T78.3*

Quinolones

- Amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux *U81.6!*
- Streptogramines oxazolidinones
- - Non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux *U80.01!*
- - ¬ Staphylocoque doré résistant oxacilline
- - - Glycopeptides, aux *U80.0!*
- - - Méticilline et le cas échéant aux glycopeptides,aux *U80.00!*

Quinquaud ¬ Folliculite décalvante de *L66.2*

Quintane ¬ Fièvre (de): *A79.0*

Quotidienne NCA ¬ Thérapie concernant les activités de la vie *Z50.8!*

Raas
v. Al Awadi-Raas-Rothschild

Rabson-Mendenhall ¬ Syndrome de *E13.90*

Raccourcis et irréguliers entre les règles ¬ Intervalles *N92.1*

Raccourcissement
- Acquise du métatarse ¬ *M21.68*
- Congénital membre s
- - Inférieur(s) ¬ *Q72.8*
- - Supérieur(s) ¬ *Q71.8*
- Longitudinal
- - Cubitus ¬ *Q71.5*
- - Fémur ¬ *Q72.4*
- - Membre(s) non précisé(s) ¬ *Q73.8*
- - Péroné ¬ *Q72.6*
- - Radius ¬ *Q71.4*
- - Tibia ¬ *Q72.5*
- Membre
- - Inférieur
- - - Sans précision ¬ *Q72.9*
- - - ¬ *Q72*
- - Non précisé ¬ *Q73*
- - S
- - - Inférieur(s) ¬ Autres *Q72.8*
- - - Non précisé(s) ¬ Autres *Q73.8*
- - - Supérieur(s) ¬ Autres *Q71.8*
- - Supérieur
- - - Sans précision ¬ *Q71.9*
- - - ¬ *Q71*
- SAI d'un (des) membre(s) SAI ¬ *Q73.8*

Racémase ¬ Déficit en alpha-méthylacyl-CoA *K76.8*

Rachialgies dorsales ¬ *M54.6*

Rachianesthésie anesthésie épidural cours
- Grossesse ¬
- - Céphalée provoquée par une *O29.4*
- - Complications d'une *O29.5*
- Puerpéralité ¬
- - Céphalée provoquée par une *O89.4*
- - Complications d'une *O89.5*
- Travail accouchement ¬
- - Céphalée provoquée par une *O74.5*
- - Complications d'une *O74.6*

Rachicentèse ¬
- Écoulement de liquide céphalorachidien après *G97.0*
- Réaction secondaire à une *G97.1*

Rachidien
- Cervicales ¬ Lésion traumatique des méninges *S19.80*
- Dorsales ¬ Lésion traumatique des méninges *S29.80*
- Épidurale postopératoire ¬ Hémorragie *G97.82*
- Lésion discale ¬ Rétrécissement du canal *M99.5*

Rachidien *–suite*
- Lombosacrées ¬ Lésion traumatique des méninges *S39.81*
- Muscles striés ¬ Spasticité d'origine *G95.83*
- Non traumatique ¬ Hémorragie *G95.10*
- Sous-arachnoïdienne postopératoire ¬ Hémorragie *G97.84*
- Sous-durale postopératoire ¬ Hémorragie *G97.83*
- Subluxation ¬ Rétrécissement du canal *M99.2*
- Tissu conjonctif ¬ Rétrécissement du canal *M99.4*
- Tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus *T09.4*
- ¬
- - Adhérences méningées (cérébrales) (*G96.1*
- - Claudicatio spinalis cours sténose
- - - Canal *M48.09†, G55.3**
- - - Lombaire du canal *M48.06†, G55.3**
- - Hydroméningocèle (*Q05*
- - Méningocèle (*Q05*
- - Myélopathie au cours de sténose du canal *M48.09†, G99.2**
- - Rétrécissement osseux du canal *M99.3*
- - Trouble des fonctions vésicales du à un choc *G95.82*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Méninges *D32.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Méninges *D42.1*
- - - Maligne: Méninges *C70.1*
- - Vessie réflexe d'origine *G95.80*

Rachis
- Cervical
- - E) ¬ *S12*
- - SAI ¬ Fracture de: *S12.9*
- - ¬
- - - Entorse et foulure du *S13.4*
- - - Lésion traumatique d'une racine nerveuse du *S14.2*
- Dorsal ¬
- - Entorse et foulure du *S23.3*
- - Fracture
- - - Côte(s), du sternum et du *S22*
- - - Multiples du *S22.1*
- - Lésion traumatique d'une racine nerveuse du *S24.2*
- Lombaire
- - Bassin
- - - Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du *S32.82*
- - - Ischion ¬ Fracture de parties autres et non précisées du *S32.81*
- - - ¬
- - - - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S33.7*

Rachis *–suite*
- Lombaire *–suite*
- - Bassin *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Fracture
- - - - - *S32*
- - - - - Multiples du *S32.7*
- - - - - Parties autres et non précisées du *S32.8*
- - - - Luxation
- - - - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments du *S33*
- - - - - Parties autres et non précisées du *S33.3*
- - Sacré ¬ Lésion traumatique de la racine nerveuse du *S34.2*
- - ¬
- - - Entorse et foulure du *S33.5*
- - - Fracture ouverte du *S32.00, S31.87!*
- Moelle épinière traumatisme obstétrical
- - Non précisé ¬ Lésion du *P11.59*
- - Paraplégie
- - - Aiguë ¬ Lésion du *P11.50*
- - - Chronique ¬ Lésion du *P11.51*
- - ¬ Lésion du *P11.5*
- Niveau non précisé ¬ Fracture du *T08*
- Non associées à une scoliose ¬ Autres malformations congénitales du *Q76.4*
- Sans précision
- - Non associée à une scoliose ¬ Malformation du *Q76.4*
- - ¬ Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du *Q77.9*
- Thorax
- - Osseux ¬ Malformations congénitales du *Q76*
- - ¬ Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du *Q67*
- Traumatisme obstétrical ¬ Fracture du *P11.5*
- Tronc, niveau non précisé ¬ Autres lésions traumatiques du *T09*
- ¬
- - Anomalie morphologique congénitale du *Q67.5*
- - Ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du *Q77.8*
- - Séquelles d'une fracture du *T91.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D16.6*
- - - Maligne: *C41.2*

Rachischisis ¬
- *Q05*
- Cranio- *Q00.1*

Rachitisme
- Cours de scorbut ¬ *E54†, M90.89**
- Dépendant de la vitamine D ¬ *E83.31*
- Évolutif ¬ *E55.0*
- Hypophosphatémique

Rachitisme *–suite*
- Hypophosphatémique *–suite*
- - Autosomique
- - - Dominant ¬ *E83.30*
- - - Récessif ¬ *E83.30*
- - Familial ¬ *E83.30*
- Lors de carence en phosphatase ¬ *E83.38†, M90.89**
- Origine tumorale ¬ *E83.38*
- Rénal ¬ *N25.0*
- Résistant à la vitamine D de type II ¬ *E83.30†, M90.89**
- ¬
- - Cyphose en tant que conséquence tardive du *E64.3, M40.19*
- - Dos voûté en tant que conséquence tardive du *E64.3, M40.29*
- - Séquelles de *E64.3*

Racine
- Dentaire
- - Laissée en place ¬ *K08.3*
- - ¬ Présence d'implants maxillaires et sur *Z96.5*
- Fusionnées d'Ackerman ¬ Syndrome de molaires avec *Q87.8*
- Nerveux
- - Cours
- - - Spondylarthrose ¬ Compression des *M47.29†, G55.2**
- - - Tumeur NCA ¬ Compression des *D48.9†, G55.0**
- - Lombaire ¬ Syndrome d'irritation de la *M51.1†, G55.1**
- - Lors atteinte disque intervertébral
- - - Cervicaux avec myélopathie ¬ Compression des *M50.0†, G99.2**
- - - Myélopathie ¬ Compression des *M51.0†, G99.2**
- - - ¬ Compression des *M51.1†, G55.1**
- - Plexus rachidien du tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la *T09.4*
- - Rachis
- - - Cervical ¬ Lésion traumatique d'une *S14.2*
- - - Dorsal ¬ Lésion traumatique d'une *S24.2*
- - - Lombaire et sacré ¬ Lésion traumatique de la *S34.2*
- - ¬ Atteinte des disques intervertébraux cervicaux avec compression des *M50.1†, G55.1**
- Plexus nerveux
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Compression des *G55.8**
- - Sans précision ¬ Affection des *G54.9*
- - ¬ affection
- - - *G54*
- - - *G54.8*

Radial
- Brailsford] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête *M92.1*

Radial *–suite*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique
- - - Artère *S55.1*
- - - Nerf *S54.2*
- - Bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S44.2*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique
- - - Artère *S65.1*
- - - Nerf *S64.2*
- SAI ¬ Nerf *S54.2*
- ¬
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: tête *T84.02*
- - Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral *S53.41*
- - Fracture
- - - Deux diaphyses, cubitale et *S52.4*
- - - Ouverte de la diaphyse *S52.30, S51.87!*
- - Hémimélie *Q71.4*
- - Lésion du nerf *G56.3*
- - Luxation de la tête *S53.0*
- - Main bote *Q71.4*
- - Méromélie longitudinale *Q71.4*
- - Présence d'une prothèse de tête *Z96.62*
- - Syndrome de craniosynostose-aplasie *Q75.0*

Radiation
- Ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie-retard de croissance-sensibilité aux *D81.1*
- Optiques de Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps genouillés et des *H47.5*
- ¬ Accident de *W91.9!*

Radiculaire
- Atteinte des disques intervertébraux ¬ Neuropathie *M51.1†, G55.1**
- Cervicales, non classées ailleurs ¬ Affections *G54.2*
- Lombosacrées, non classées ailleurs ¬ Affections *G54.4*
- Thoraciques, non classées ailleurs ¬ Affections *G54.3*
- ¬
- - Kyste
- - - *K04.8*
- - - Résiduel *K04.8*
- - Stimulateur sacré *Z45.80*

Radiculite
- Atteinte des disques intervertébraux ¬ *M51.1†, G55.1**
- Brachiale SAI ¬ Névrite ou *M54.1*
- Cervical
- - Déplacement de disque intervertébral ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Prolapsus discal ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Rupture discale ¬ *M50.1†, G55.1**
- Dégénérescence discale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Déplacement de disque intervertébral ¬ *M51.1†, G55.1**

Radiculite *–suite*
- Dorsale SAI ¬ Névrite ou *M54.1*
- Lombaire SAI ¬ Névrite ou *M54.1*
- Lombo-sacrée SAI ¬ Névrite ou *M54.1*
- Maladie due au VIH ¬ *B23.8, M54.19*
- Prolapsus discal ¬ *M51.1†, G55.1**
- Rupture discale ¬ *M51.1†, G55.1**
- SAI ¬ *M54.1*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G99.8**

Radiculomyélite toxique à Corynebacterium diphtheriae ¬ *A36.8†, G05.0**

Radiculopathie ¬
- *M54.1*
- Atteinte d'un disque cervical avec *M50.1*
- Dégénérescence disque
- - *M51.1†, G55.1**
- - Intervertébral
- - - Cervicaux avec *M50.1†, G55.1**
- - - Thoraciques avec *M51.1†, G55.1**
- Hernie
- - Cervicale du noyau gélatineux avec *M50.1†, G55.1**
- - Cervico-thoracique du noyau gélatineux avec *M50.1†, G55.1**
- - Lombaire du noyau gélatineux avec *M51.1†, G55.1**
- - Lombosacrée du noyau gélatineux avec *M51.1†, G55.1**
- - Thoracique du noyau gélatineux avec *M51.1†, G55.1**
- - Thoraco-lombaire du noyau gélatineux avec *M51.1†, G55.1**
- Spondylarthrose
- - *M47.2*
- - Cervicale sans myélopathie ou *M47.8*
- - Lombo-sacrée sans myélopathie ou *M47.8*
- - Thoracique sans myélopathie ou *M47.8*

Radio-carpien ¬
- Entorse et foulure du poignet: (Articulation) (Ligament) *S63.52*
- Ligament: *S63.3*
- Luxation du poignet: (Articulation) *S63.02*

Radio-cubital ¬
- Luxation du poignet: (Articulation) *S63.01*
- Synostose *Q74.0*

Radiodermite
- Aiguë ¬ *L58.0*
- Chronique ¬ *L58.1*
- Sans précision ¬ *L58.9*
- ¬
- - *L58*
- - *L59.8*

Radiographique thoracique ¬ Contrôle *Z01.6*

Radio-humérale ¬ Articulation *S53.0*

Radio-isotopes [radionucléides] ¬ résultats anormaux de: épreuves de fixation de *R94*

Radiologie chez la mère ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par la *P00.7*

Radiologique
- Anormal
- - Cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.4*
- - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ Résultat *R93.8*
- Non classé ailleurs ¬ Examen *Z01.6*
- ¬ Spondylarthrite axial non
- - *M45*
- - *M45.09*

Radionucléides] ¬ résultats anormaux de: épreuves de fixation de radio-isotopes [*R94*

Radiothérapie
- Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.1*
- Chimiothérapie
- - Mesures immunosuppressives ¬ Immunocompromission après *D90*
- - Néoplasie maligne ¬ Cure combinée de *Z51.82*
- Médicamenteuse) de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ Ostéonécrose (induite par la *K10.2*
- Tumeur maligne ¬ Examen de contrôle après *Z08.1*
- ¬
- - *Z92.3*
- - Convalescence après *Z54.1!*
- - Envie de vomir sous *R11, Y57.9!*
- - Nausées au cours de *R11, Y57.9!*
- - Phénomène d'embrasement thérapeutique (flare phenomenon) dû à la *T88.7*
- - Séance de *Z51.0*
- - Vomissements au cours de *R11, Y57.9!*

Radioulnaire-thrombocytopénie amégacaryocytique ¬ Syndrome de synostose *Q87.2*

Radius
- Col ¬ Fracture de l'extrémité supérieure du *S52.12*
- Combinée ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du *S52.6*
- Cubitus ¬ Ostéochondrite juvénile du *M92.1*
- Distal ¬ Fracture ouverte du *S52.50, S51.87!*
- Fracture
- - Extension ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S52.51*
- - Flexion ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S52.52*
- Luxation de la tête du cubitus ¬ Fracture distale de la diaphyse du *S52.31*
- Partie
- - Non précis ¬ Fracture
- - - Diaphyse du *S52.30*
- - - Extrémité supérieure du *S52.10*
- - Partie multiple ¬ Fracture extrémité
- - - Inférieure du *S52.59*
- - - Supérieure du *S52.19*
- Pouces triphalangés-hypospadias-progénie ¬ Syndrome d'hypoplasie du *Q87.2*

Radius *–suite*
- Proximal ¬ Fracture ouverte du *S52.10, S51.87!*
- SAI ¬
- - *S52.30*
- - Partie proximale du *S52.10*
- Sans autre précision ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S52.50*
- Tête ¬ Fracture de l'extrémité supérieure du *S52.11*
- ¬
- - Déficit congénital longitudinal du *Q71.4*
- - Fracture
- - - Diaphyse du *S52.3*
- - - Extrémité
- - - - Inférieure du *S52.5*
- - - - Supérieure du *S52.1*
- - - Proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du *S52.21*
- - Raccourcissement longitudinal du *Q71.4*
- - Syndrome de: thrombopénie avec absence de *Q87.2*

RAG1
- 2 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.1*
- ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit partiel en *D81.8*

Rage
- Citadine] ¬ Rage des rues [*A82.1*
- Rues [rage citadine] ¬ *A82.1*
- Sans précision ¬ *A82.9*
- Sylvatique ¬ *A82.0*
- ¬
- - *A82*
- - *A82.9*
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.2*
- - Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.3*

Ragge
v. Bakrania-Ragge

Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with *G31.81*

Raide [rigidité musculaire] ¬ Syndrome de l'homme *G25.88*

Raideur articulaire
- Anomalies osseuses de la face ¬ Syndrome de camptodactylie- *Q87.0*
- Contracture ¬ *M24.5*
- Limitation
- - Complète des mouvements ¬ *M25.69*
- - Partielle des mouvements ¬ *M25.69*
- Non classée ailleurs ¬ *M25.6*

Rakeb
v. Kufor-Rakeb

Ralentie ¬ Miction *R39.1*

Râles ¬ *R09.8*

Rambam-Hasharon ¬ Syndrome de *D84.8*

Ramifié
- Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne *E71*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne *E71.2*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne *E71.1*
- - Cétoacidurie à chaînes *E71.0*
- - Déficit en 2-cétoacide déshydrogénase des chaînes *E71.0*
- - Trouble du métabolisme des acides aminés non *E72.8*

Ramon ¬ Syndrome de *Q87.8*

Ramos-Arroyo ¬ Syndrome de *Q87.8*

Rampante ¬ Myiase
- *B87.0*
- Cutanée *B87.0*

Ramsay-Hunt] ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: myoclonies [*G11.1*

RAPADILINO ¬ Syndrome *Q87.1*

Rapamycine ¬ Hypersensibilité aux dérivés de *T88.7*

Rapide
- Enfance ¬ Examen à la période de croissance *Z00.2*
- ¬
- - Glomérulonéphrite d'évolution *N01*
- - Glomérulopathie d'évolution *N01*
- - Néphrite d'évolution *N01*
- - Rythme cardiaque *R00.0*
- - Syndrome néphritique d'évolution *N01*
- - Travail trop *O62.3*

Rapidité de l'expulsion ¬ *P03.5*

Rapport
- Arcades dentaires ¬ Anomalies de *K07.2*
- Conjoint ou le partenaire ¬ Difficultés dans les *Z63*
- Grossesse actuelle ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans *P00*
- Mâchoires et la base du crâne ¬ Anomalies de *K07.1*
- Parents et les beaux-parents ¬ Difficultés dans les *Z63*
- Sexuels ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: infections principalement transmises lors des *Z11*
- Sommeil ¬ Troubles de l'alimentation en *F51.3*
- Système nerveux et les organes des sens ¬ Mise en place et ajustement d'autres appareils en *Z46.2*

Rare
v. Type de maladie

Raréfaction système pileux
- Non cicatricielle, sans précision ¬ *L65.9*
- ¬ forme non cicatriciel
- - *L65*
- - Précisées de *L65.8*

Rash
- Éruptions cutanées non spécifiques ¬ *R21*
- Fessier psoriasiforme ¬ *L22*

Rasmussen ¬ Encéphalite de *G04.8*

Rat
- Sans précision ¬ Fièvre causée par morsure de *A25.9*
- ¬
- - Fièvre
- - - Causées par morsure de *A25*
- - - Morsures de *A25.9*
- - - Streptobacillaire causée par morsure de *A25.1*
- - Infection (à) (par): cestodes du *B71.0*

Rate
- Accessoire ¬ *Q89.08*
- Amibes ¬ Abcès de la *A06.8†*, *D77**
- Atteinte du parenchyme ¬ Déchirure de la *S36.03*
- Non traumatique ¬ Rupture de la *D73.5*
- Sagou ¬ *E85.4†*, *D77**
- SAI ¬
- - Fibrose de la *D73.8*
- - Lésion de la *S36.00*
- Sans
- - Atteinte plus importante du parenchyme ¬ Déchirure de la capsule de la *S36.02*
- - Précision ¬ Maladie de la *D73.9*
- Surnuméraire ¬ *Q89.08*
- Traumatisme obstétrical ¬ Rupture de la *P15.1*
- ¬
- - *D13.9*
- - Abcès de la *D73.3*
- - Aberration de la *Q89.08*
- - Absence de *Q89.01*
- - Agénésie de la *Q89.01*
- - Anomalie
- - - *Q89.08*
- - - Congénitale de la position de la *Q89.08*
- - Atrophie de la *D73.0*
- - Calcification d'artère de la *I70.8*
- - Déformation congénitale de la *Q89.08*
- - Hypoplasie de la *Q89.08*
- - Infarctus de la *D73.5*
- - Infection purulente aiguë de la *D73.8*
- - Inflammation
- - - Purulente aiguë de la *D73.8*
- - - Syphilitique de la *A52.7†*, *D77**
- - Kyste
- - - *D73.4*
- - - Hydatique de la *B67.9†*, *D77**
- - Lésion
- - - *S36.08*
- - - Traumatique de la *S36.0*
- - Maladie

Rate *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - *D73.8*
- - - Amyloïde de la *E85.4†*, *D77**
- - Malformation congénital
- - - *Q89.08*
- - Paludisme à Plasmodium vivax avec rupture de la *B51.0†*, *D77**
- - Rupture massive du parenchyme de la *S36.04*
- - Syphilis de la *A52.7†*, *D77**
- - Thrombose artérielle de la *D73.5*
- - Torsion de la *D73.5*
- - Traumatisme obstétrical de la *P15.1*
- - Tuberculose de la *A18.8†*, *D77**
- - Tumeur
- - - *D37.78*
- - - Maligne: *C26.1*

Rathbun] ¬ Hypophosphatémie familiale [hypophosphatasie] [syndrome de *E83.38*

Rathke ¬ Déficit hypophysaire associé à un kyste de la poche de *E23.6*

Rautenstrauch
v. Wiedemann-Rautenstrauch

Rauwolfia ¬ *T46.5*

Raynaud
- Troubles moteurs œsophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de *M34.1*
- ¬
- - Gangrène de *I73.0*
- - Maladie de *I73.0*
- - Phénomène (secondaire) de *I73.0*
- - Syndrome de *I73.0*

Rayonnement
- Non ionisant
- - Sans précision ¬ Modification de la peau due à une exposition chronique aux *L57.9*
- - ¬ Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux *L57.8*
- Sans précision ¬ Effets de *T66*
- ¬
- - *Z57*
- - *Z58*
- - Exposition aux *W91!*
- - Mucite (orale) (oropharyngée) induite par des *K12.3*

Rayons
- Ultraviolet
- - Sans précision ¬ Modification aiguë de la peau due aux *L56.9*
- - ¬ Modification aigu
- - - Peau dues aux *L56*
- - - Précisées de la peau dues aux *L56.8*
- X ¬
- - Brûlure par les *T30.0*
- - Exposition à : irradiation aux *W91.9!*

Rayons *–suite*
- ¬ Maladie des *T66*

RB-ILD] ¬ Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease [*J68.4*

RCC ¬ *C64*

Réaction
- Aigu
- - Crise ¬ *F43.0*
- - Facteur de stress ¬ *F43.0*
- - Stress ¬ *F43.0*
- - Substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.6*
- Allergique
- - Contact d'un composé du platine ¬ *T78.4*
- - SAI ¬ *T78.4*
- - Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.7*
- - Traitement avec un composé du platine ¬ *T88.7*
- Anaphylactique
- - Myorelaxants ¬ *T88.6*
- - SAI ¬ *T78.2*
- Anormal
- - Patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de *Y84.9!*
- - Test à la tuberculine ¬ *R76.1*
- Anxieuse ¬ *F41.1*
- Conversion ¬ *F44*
- Dépôts d'iode ¬ Inflammation des glandes salivaires au cours d'une *K11.2*
- Dépressif
- - Courte durée au cours d'un trouble de l'adaptation ¬ *F43.2*
- - F32.0, F32.1, F32.2) ¬ épisodes isolés de: *F32*
- - Prolongée au cours d'un trouble de l'adaptation ¬ *F43.2*
- - ¬ épisodes récurrents de (F33.0 ou F33.1): *F33*
- Deuil ¬ *F43.2*
- Facteur
- - Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion ¬ *T80.4*
- - Stress sévère
- - - Sans précision ¬ *F43.9*
- - - Troubles de l'adaptation ¬ *F43*
- - - ¬ Autres *F43.8*
- Hémolytique à la transfusion ¬ Ictère dû à une *T80.8*
- Hyperkinétique de l'enfance ou de l'adolescence SAI ¬ *F90.9*
- Hypersensibilité
- - Classées ailleurs ¬ Arthropathie au cours de *M36.4**
- - Voies respiratoires supérieures, localisation non précisée ¬ *J39.3*

Réaction *–suite*
- Hypersensibilité *–suite*
- - ¬ Arthrite au cours de *T78.4†, M36.4**
- Incompatibilité
- - ABO ¬ *T80.3*
- - Groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ *T80.3*
- - Rh ¬ *T80.4*
- Inflammatoire
- - Appareil de fixation interne [toute localisation] ¬ Infection et *T84.6*
- - Cathéter de dialyse péritonéale ¬ Infection et *T85.71*
- - Prothèse
- - - Articulaire interne ¬ Infection et *T84.5*
- - - Implant
- - - - Greffe
- - - - - Appareil génital ¬ Infection et *T83.6*
- - - - - Appareil urinaire ¬ Infection et *T83.5*
- - - - - Cardiaques et vasculaires ¬ Infection et *T82.7*
- - - - - Internes ¬ Infection et *T85.78*
- - - - - Internes dans le système hépatobiliaire et le pancréas ¬ Infection et *T85.75*
- - - - - Internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal ¬ Infection et *T85.76*
- - - - - Internes du système nerveux ¬ Infection et *T85.72*
- - - - - Orthopédiques internes ¬ Infection et *T84.7*
- - - - Mammaire ¬ Infection et *T85.73*
- - - Valvulaire cardiaque ¬ Infection et *T82.6*
- - Sonde
- - - Gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG] ¬ Infection et *T85.74*
- - - Jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ] ¬ Infection et *T85.74*
- - ¬ Cholestéatome avec *H71*
- Intolérance alimentaire, non classées ailleurs ¬ Autres *T78.1*
- Intoxication
- - Médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né ¬ *P93*
- - Opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ *P04.0*
- Leucémoïde type
- - Lymphocytaire ¬ *D72.8*
- - Monocytaire ¬ *D72.8*
- - Myélocytaire ¬ *D72.8*
- Lichénoïde médicamenteuse ¬ *L43.2*
- Maniaco-dépressive ¬ *F31*
- Médicament SAI ¬ *T88.7*
- Organique aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ *F05*
- Paranoïaque ¬ *F23.3*
- Peur ¬ *F41.1*
- Phobique ¬ *F41.1*
- Photoallergique à un médicament ¬ *L56.1*

Réaction *–suite*
- Phototoxique à un médicament ¬ *L56.0*
- Schizophrénique
- - Latente ¬ *F21*
- - ¬ *F23.2*
- Secondaire à une rachicentèse ¬ Autre *G97.1*
- Sériques ¬ Autres *T80.6*
- Toxique
- - Anesthésie local cours
- - - Puerpéralité ¬ *O89.3*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.4*
- - Cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse ¬ *O29.3*
- Transfusion SAI ¬ *T80.9*
- Wassermann faussement positive ¬ *R76.2*

Réactionnel
- Attachement de l'enfance ¬ Trouble *F94.1*
- Brève) SAI ¬ Psychose *F23.9*
- Cours maladies classées ailleurs ¬ arthrite
- - *M03.6**
- - Post-infectieuses et *M03**
- Dysfonction des voies respiratoires ¬ Syndrome *J68.3*
- Familiale ¬ Collagénose perforante *L87.1*
- Sans précision ¬ Arthrite *M02.9*
- ¬
- - Arthrite
- - - *M02*
- - - *M02.8*
- - Épisode
- - - Isolés
- - - - Dépression: *F32*
- - - - Psychose dépressive: *F32.3*
- - - Récurrent
- - - - F33.0 ou F33.1): dépression: *F33*
- - - - Sévères de: psychose dépressive: *F33.3*
- - Otite aiguë externe: *H60.5*
- - Psychose *F23.9*

Réactivation immune ¬ Syndrome de *D89.3*

Réactive
- Non
- - Induite par les médicaments ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- - Spécifique ¬ Hépatite *K75.2*
- ¬ Hépatite B *B18.14*

Réactivité ¬ Lenteur et manque de *R46.4*

Réadaptation
v.a. Indice de Barthel de la réadaptation précoce
- ¬ Antécédents de mesures de *Z92.8*

Réagissant à la pyridoxine NCA ¬ Anémie sidéroblastique: *D64.3*

Réanimation
- Sans succès ¬ Arrêt cardiaque, *I46.9*
- ¬
- - Myopathie de *G72.80*

Réanimation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Polyneuropathie de *G62.80*

Réanimé avec succès ¬ Arrêt cardiaque *I46.0*

Reardon ¬ Dysplasie
- Mésomélique type *Q78.8*
- Spondylo-épiphysaire type *Q77.7*

Réarrangement
- Autosomique équilibré chez un sujet anormal ¬ *Q95.2*
- Complexe ¬
- - Délétions avec autres *Q93.7*
- - Duplications avec autres *Q92.5*
- Équilibré marqueur
- - Structuraux, non classés ailleurs ¬ *Q95*
- - Structurel
- - - Sans précision ¬ *Q95.9*
- - - ¬ Autres *Q95.8*
- Sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal ¬ *Q95.3*

Rebord pupillaire ¬ Dégénérescence de: *H21.2*

Récent
- Cartilage articulaire du genou ¬ Déchirure *S83.3*
- Cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian *A66.2*
- Infarctus aigu myocarde ¬
- - Certaines complications *I23*
- - Communication
- - - Interauriculaire comme complication *I23.1*
- - - Interventriculaire comme complication *I23.2*
- - Complications *I23.8*
- - Hémopéricarde comme complication *I23.0*
- - Rupture
- - - Cordages tendineux comme complication *I23.4*
- - - Muscle papillaire comme complication *I23.5*
- - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication *I23.3*
- - Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication *I23.6*
- Ménisque ¬ Déchirure *S83.2*
- ¬ Framboeside du pian *A66.2*

Récepteur
- 1 interféron gamma ¬ MSMD autosomique
- - Dominante par déficit partiel en *D84.8*
- - Récessive par déficit partiel en *D84.8*
- 2 de l'interféron gamma ¬ MSMD autosomique dominante par déficit partiel en *D84.8*
- Alpha et bêta-adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi bien les *T44.9*
- Bêta 1 de l'interleukine 12 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en *D84.8*

Récepteur *–suite*

- Histaminiques H2 ¬ Intoxication: Inhibiteurs des *T47.0*
- Hormonal
- - Périphériques ¬ Anomalies des *E34.5*
- - Positifs ¬ Carcinome mammaire invasif à *C50.9*
- Insuline ¬ Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en *E16.1*
- Leptine ¬ Obésité par déficit en *E66.89*
- Mélanocortine 4 ¬ Obésité par déficit du *E66.89*
- Membrane cellulaire [CR3] ¬ Déficit en complexe *D71*
- P2Y12 ¬ Troubles hémorragiques par anomalie du *D69.88*
- Prolactine ¬ Déficit familial isolé en *E22.1*
- Secrétagogues de l'hormone de croissance ¬ Petite taille par déficit en *E34.3*
- Transcobalamine ¬ Acidurie méthylmalonique par déficit en *E71.1*
- TRH ¬ Hypothyroïdie centrale due à un déficit du *E03.1*
- TSH ¬
- - Hyperthyroïdie familiale par mutation du *E05.8*
- - Hypothyroïdie par mutation du *E03.1*
- Vitamine D [Type II] ¬ Anomalie des *E83.31*

Réceptif

- Auditif congénital ¬ Trouble *F80.2*
- Langage ¬ Autres troubles *F80.28*
- ¬
- - Dysphasie ou aphasie de développement, de type *F80.2*
- - Trouble de l'acquisition du langage, de type *F80.2*

Récessif

- Adulte ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique *G11.2*
- Associé
- - KRT14 ¬ Epidermolyse bulleuse simple autosomique *Q81.0*
- - Spectrine ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique *G11.1*
- - VPS11 ¬ Leucodystrophie hypomyélinisante autosomique *E75.2*
- Atrophie optique-dysarthrie ¬ Syndrome d'ataxie spastique autosomique *G11.4*
- Becker] ¬ Myotonie: congénitale: *G71.1*
- Cécité-surdité ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique *G11.1*
- Centripète ¬ Epidermolyse bulleuse dystrophique *Q81.2*
- Charlevoix-Saguenay ¬ Ataxie spastique autosomique *G11.1*
- Défaut de cytotoxicité spontanée des cellules Natural Killer ¬ Déficit immunitaire primaire autosomique *D84.8*
- Déficit
- - CD27 ¬ Maladie lymphoproliférative autosomique *D47.9*

Récessif *–suite*

- Déficit *–suite*
- - CSF3R ¬ Neutropénie congénitale sévère autosomique *D70.0*
- - CXCR2 ¬ Neutropénie congénitale sévère autosomique *D70.0*
- - G6PC3 ¬ Neutropénie congénitale sévère autosomique *D70.0*
- - JAGN1 ¬ Neutropénie congénitale sévère autosomique *D70.0*
- - Kir6.2 ¬ Hyperinsulinisme autosomique *E16.1*
- - Partiel
- - - IFNgammaR2 ¬ MSMD autosomique *D84.8*
- - - Récepteur 1 de l'interféron gamma ¬ MSMD autosomique *D84.8*
- - PEX10 ¬ Ataxie autosomique *G11.8*
- - SUR1 ¬ Hyperinsulinisme autosomique *E16.1*
- - TYK2 ¬ Syndrome hyper-IgE autosomique *D82.4*
- - Ubiquinone ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique *G11.1*
- Infantile, de type Duchenne ou Becker ¬ Dystrophie musculaire: autosomique *G71.0*
- Leucoencéphalopathie ¬ Ataxie spastique autosomique *G11.4*
- Lié
- - Chromosome X ¬ Ataxie (de): spinocérébelleuse *G11.1*
- - X
- - - Syndromique ¬ Ichtyose *Q80.1*
- - - ¬ Albinisme oculaire *E70.3*
- Membres ¬ Aplasia cutis congenita *Q84.8*
- Retard psychomoteur ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique *G11.1*
- Saccade oculaire ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique *G11.8*
- Type
- - 1 ¬ Cutis laxa autosomique *Q82.8*
- - 1C ¬ Cutis laxa autosomique *Q82.8*
- - 2 ¬
- - - Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.0*
- - - Cutis laxa autosomique *Q82.8*
- - 2A ¬
- - - Cutis laxa autosomique *Q82.8*
- - - Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2B ¬
- - - Cutis laxa autosomique *Q82.8*
- - - Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2C ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2D ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2E ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2F ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*

Récessif *–suite*

- Type *–suite*
- - 2G ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2H ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2I ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2J ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2K ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2L ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2M ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2N ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2O ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2P ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2Q ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2R ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2S ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2U ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2W ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2X ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2Y ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 4 ¬ Ataxie spastique autosomique *G11.4*
- - 5 ¬ Ataxie spastique autosomique *G11.4*
- - 5A ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 6 ¬ Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.0*
- - 7 ¬ Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.1*
- - 10 ¬ Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.2*
- - 11 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 12 ¬ Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.1*
- - 14 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 15 ¬
- - - Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.1*
- - - Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 16 ¬ Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.1*
- - 17 ¬ Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.1*
- - 18 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 19 ¬ Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.1*

Récessif *–suite*
- Type *–suite*
- - 20 ¬
- - - Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.1*
- - - Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 21 ¬
- - - Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.1†, K77.8**
- - - Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 23 ¬
- - - Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.1*
- - - Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 24 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 25 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 26 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 27 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 28 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 32 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 35 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 39 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 43 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 44 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 45 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 46 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 48 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 49 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 53 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 54 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 55 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 56 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 57 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 59 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 60 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 61 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 62 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 63 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 64 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*

Récessif *–suite*
- Type *–suite*
- - 66 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 67 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 68 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 69 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 70 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 71 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 74 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 75 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 76 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 77 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - 78 ¬ Paraplégie spastique autosomique *G11.4*
- - A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire autosomique *G60.0*
- - B ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire autosomique *G60.0*
- - Beauce ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique *G11.2*
- - C ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire autosomique *G60.0*
- - D ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire autosomique *G60.0*
- - DFNB ¬ Surdité de perception non syndromique autosomique *H90.3*
- - Mégarbané ¬ Dysplasie spondylo-métaphysaire autosomique *Q77.8*
- - Suisse) ¬ Agammaglobulinémie: autosomique *D80.0*
- ¬
- - Anémie sidéroblastique autosomique *D64.0*
- - Arthrogrypose multiple congénitale myogénique autosomique *Q74.3*
- - Ataxie (de): Friedreich (autosomique *G11.1*
- - Atrophie optique
- - - Isolée autosomique *H47.2*
- - - Type 3 autosomique *E71.1*
- - Bestrophinopathie autosomique *H35.5*
- - Dysostose spondylo-costale autosomique *Q76.8*
- - Dysplasie des ongles autosomique *Q84.6*
- - Dystonie dopa-sensible autosomique *G24.1*
- - Dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss autosomique *G71.0*
- - HIES [syndrome d'hyperimmunoglobulinémie E] autosomique *D82.4*
- - Hypercalcémie infantile autosomique *E83.58*
- - Ichtyose épidermolytique autosomique *Q80.3*

Récessif *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Myopathie centronucléaire autosomique *G71.2*
- - Neuropathie sensitive héréditaire à transmission: *G60.8*
- - Ophtalmoplégie externe progressive autosomique *H49.4*
- - Ostéopétrose maligne autosomique *Q78.2*
- - Pseudohypoaldostéronisme type 1 autosomique *N25.8*
- - Rachitisme hypophosphatémique autosomique *E83.30*
- - Rein polykystique, autosomique *Q61.1*
- - Syndrome
- - - Ataxie mitochondriale *G11.8*
- - - Choriorétinopathie-microcéphalie autosomique *Q87.8*
- - - Faciodigitogénital autosomique *Q87.0*
- - - Segawa autosomique *G24.1*

Récession de l'angle iridocornéen ¬ *H21.5*

Récessus
- Pharyngien ¬ *C11.2*
- Piriforme ¬ *C12*

Recherche
- Acceptation intervention
- - Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ *Z64.8*
- - Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ *Z64.8*
- Alcool ou de drogue dans le sang ¬ *Z04.8*
- Clinique ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de *Z00.6*
- Hypersensibilité ¬ Tests (de): cutanés à la *Z01.5*
- Maladie bactérienne ¬ Tests (de): cutanés à la *Z01.5*
- Soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ *N88.3*
- Tests en vue d'une procréation ¬ *Z31.4*
- VIH chez les nourrissons ¬ Résultat non concluant du test de *R75*

Rechutes ¬ Pancréatite chronique: à *K86.1*

Récidivant
- Atloïdo-axoïdienne avec myélopathie ¬ Subluxation *M43.3*
- Cartilage du ménisque du genou ¬ Lésion *M23.39*
- Cornée ¬ Érosion *H18.8*
- Gangrène ¬ Hernie crurale
- - *K41.41*
- - Bilatérale *K41.11*
- Genou ¬ Lésion
- - *M23.99*
- - Intra-articulaire *M23.99*
- Mastoïdectomie ¬ Cholestéatome *H95.0*
- Ménisque ¬ Lésion *M23.39*

Récidivant *–suite*
- Occlusion ¬ Hernie crurale
- - *K41.31*
- - Unilatérale *K41.31*
- Périodique ¬ Urticaire: *L50.8*
- Persistante ¬ Hématurie *N02*
- Rotule ¬
- - Luxation *M22.0*
- - Subluxation *M22.1*
- Sans précision sans
- - Angiocholite ni cholécystite ¬ Colique hépatique (*K80.5*
- - Cholécystite ¬ Colique biliaire (*K80.2*
- Weber-Christian] ¬ Panniculite *M35.6*
- ¬
- - Angiocholite: *K83.0*
- - Aphtes buccaux *K12.0*
- - Appendicite: *K36*
- - Cholestase intrahépatique gestationnelle *O26.60*
- - Hémorragie traumatique secondaire et *T79.2*
- - Hernie crurale
- - - *K41.91*
- - - Bilatérale *K41.21*
- - Incontinence *N39.47!*
- - Infarctus
- - - *I22*
- - - Myocarde *I22*
- - Luxation et subluxation articulaires *M24.4*
- - Pancréatite chronique: *K86.1*
- - Périadénite muqueuse nécrotique *K12.0*
- - Polychondrite *M94.1*
- - Rétinite syphilitique centrale *A52.7†, H32.0**
- - Subluxation
- - - Atloïdo-axoïdiennes *M43.4*
- - - Vertébrales *M43.5*
- - Ulcération aphteuse *K12.0*
- - Vaginite candidosique chronique *B37.3†, N77.1**

Récidive de rétinite à CMV [cytomégalovirus] ¬ Maladie due au VIH avec *B20†, H32.0*, B25.88*

Réciproques robertsoniennes et équilibrées ¬ translocations et insertions *Q95*

Recklinghausen
v. von Recklinghausen

Reconstitution immune ¬ Syndrome de *D89.3*

Recours services santé
- Actes médicaux spécifiques, non effectués ¬ Sujets ayant *Z53*
- Circonstances
- - Non précisées ¬ Sujet ayant *Z76.9*
- - Précisées ¬ Sujet ayant *Z76.8*
- - ¬ Sujet ayant *Z76*

Recousus ¬
- Complication de membres *T87.2*
- Infection de membres *T87.2*
- Rejet de membres *T87.2*

Recrutement auditif ¬ *H93.2*

Rectal
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse *O70.3*
- Néonatale ¬ Hémorragie *P54.2*
- Sans fistule ¬
- - Abcès des régions anale et *K61*
- - Phlegmon des régions anale et *K61*
- Tuberculeuse ¬ Fistule *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Abcès
- - - *K61.1*
- - - Ano- *K61.2*
- - - Régions anale et *K61*
- - Ampoule *C20*
- - Ano- *C21.8*
- - Dysfonctionnement du sphincter *K59.9*
- - Fissure et fistule des régions anale et *K60*
- - Fistule
- - - *K60.4*
- - - Ano- *K60.5*
- - - Urétro- *N36.0*
- - - Vésico- *N32.1*
- - Jonction ano- *C21.8*
- - Marisques *K64.4*
- - Polype *K62.1*
- - Prolapsus
- - - *K62.3*
- - - Muqueuse *K62.3*
- - Rétrécissement syphilitique du sphincter *A52.7†, K93.8**
- - Ténesme *R19.88*
- - Varices *I86.82*

Rectite
- Irradiation ¬ *K62.7*
- SAI ¬ *K62.8*
- Ulcéreuse (chronique) ¬ *K51.2*

Rectocèle ¬
- *N81.6*
- Soins maternels pour: *O34.8*

Recto-colite hémorragique
- Colite ulcéreuse] ¬ *K51*
- Psychogène ¬ *F54, K51.9*
- Sans précision ¬ *K51.9*
- ¬
- - *K51.8*
- - Arthrite
- - - Cours de *K51.9†, M07.59**
- - - Juvénile au cours de *K51.9†, M09.29**

Recto-cutanée ¬ Fistule *K60.4*

Recto-sigmoïde ¬
- Colite indéterminée du côlon *K52.32*
- Côlon *C19*

Recto-sigmoïdien ¬
- Carcinoma in situ: Jonction *D01.1*
- Jonction
- - *D37.5*
- - *T18.5*
- Tumeur
- - Bénigne: Jonction *D12.7*
- - Maligne de la jonction *C19*

Recto-sigmoïdite ulcéreuse (chronique) ¬ *K51.3*

Recto-urétrale congénitale ¬ Fistule *Q64.7*

Recto-vaginal
- Congénitale ¬ Fistule *Q52.2*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: cloison *O70.2*
- Tuberculeuse ¬ Fistule *A18.1†, N74.1**
- Vagin ¬ Endométriose du septum *N80.4*
- ¬
- - Fistule *N82.3*
- - Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: cloison *C76.3*
- - Septum *S31.80*

Recto-vésicale ¬ Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: cloison *C76.3*

Rectum
- Abcès ¬ Tuberculose du *A18.3†, K93.0**
- Anus
- - Canal anal ¬ Tumeur
- - - Bénigne du côlon, du *D12*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës du *C21.8*
- - ¬ Fistule congénitale du *Q43.6*
- Fistule ¬
- - Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q42.0*
- - Tuberculose du *A18.3†, K93.0**
- Infection à Chlamydia ¬ Rétrécissement du *A55†, K93.8**
- Lymphogranulome vénérien ¬ Rétrécissement du *A55†, K93.8**
- Remplacement ¬ Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme *N82.80*
- Sans
- - Fistule ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q42.1*
- - Précision ¬ Maladie de l'anus et du *K62.9*
- Virus de l'herpès ¬ Infection de la marge cutanée de l'anus et du *A60.1*
- ¬
- - Carcinoma in situ: *D01.2*
- - Carcinome épidermoïde du *C20*
- - Côlon et *C19*
- - Corps étranger dans l'anus et le *T18.5*
- - Duplication du *Q43.42*

Rectum *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hémorragie de l'anus et du *K62.5*
- - Herpès du *A60.1†, K93.8**
- - Imperforation du *Q42.1*
- - Infection
- - - Chlamydia de l'anus et du *A56.3*
- - - Gonococcique de l'anus et du *A54.6*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: le *K91.83*
- - Invagination de: *K56.1*
- - Lésion traumatique du *S36.6*
- - Maladie
- - - Anus et du *K62*
- - - Crohn [entérite régionale] du: *K50.1*
- - - Précisées de l'anus et du *K62.8*
- - Rétrécissement
- - - Syphilitique du *A52.7†, K93.8**
- - - Tuberculeux du *A18.3†, K93.0**
- - Sténose de l'anus et du *K62.4*
- - Syndrome de l'ulcère solitaire du *K62.6*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, K93.8**
- - Tuberculose du *A18.3†, K93.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.8*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.5*
- - - Malign
- - - - *C20*
- - - - Secondaire du gros intestin et du *C78.5*
- - Ulcère de l'anus et du *K62.6*

Rectus abdominis ¬ Syndrome *G58.0*

Récurrent
v. Type de maladie

Recurvatum congénital ¬ Genu *Q68.2*

Réductase
v.a. NADH-méthémoglobine-réductase
- Pseudo-hermaphroditisme masculin) ¬ Déficit en 5-alpha- *E29.1*
- ¬
- - Anémie hémolytique due à un déficit en glutathion *D55.1*
- - Cardiomyopathie hypertrophique infantile létal déficit
- - - NADH-coenzyme Q *I42.2*
- - - NADH-CoQ *I42.2*
- - Déficit
- - - 7-déhydrocholestérol *Q87.1*
- - - 17-cétostéroïde *E29.1*
- - - Dihydroptéridine *E70.1*
- - - Isolé
- - - - NADH-coenzyme Q *G31.81*
- - - - NADH-ubiquinone *G31.81*
- - - Lysine alpha-cétoglutarate *E72.3*
- - - Méthylène tétrahydrofolate *E72.1*
- - Homocystinurie déficit méthylène tétrahydrofolate
- - - *E72.1*

Réductase *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hyperandrogénie due à un déficit en cortisone *E25.08*

Réducteurs ¬ Myopathie à corps *G71.2*

Réductible
- Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément *K64.2*
- Sans gangrène ¬ Hernie ventrale non *K43.69*
- ¬
- - Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément *K64.1*
- - Hernie
- - - Épigastrique non *K43.60*
- - - Hypogastrique non *K43.68*
- - - Ligne médiane non *K43.68*
- - - Sous-xiphoïdienne non *K43.68*
- - - Spieghel non *K43.68*
- - - Ventrale non *K43.69*

Réduction
- Facteurs de coagulation ¬ *D68.9*
- Luxation congénitale de la hanche ¬ Ostéochondrite juvénile après *M91.8*
- Stomatine ¬ Cryohydrocytose héréditaire avec *D58.8*

Rééducation
- Cardiaques ¬ *Z50.0!*
- Drogués et après abus de médicaments ¬ *Z50.3!*
- Professionnelle, non classées ailleurs ¬ Ergothérapie et *Z50.7!*
- SAI ¬ *Z50.9!*
- Sans précision ¬ Soin impliquant une *Z50.9!*
- Tabagisme ¬ *Z50.8!*
- Voix, de la parole et du langage] ¬ Traitement logopédique [*Z50.5!*
- ¬ soin impliquant
- - *Z50!*
- - Moyens de *Z50.8!*

Réentrée
- Nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par *I47.1*
- ¬
- - Arythmie ventriculaire de *I47.0*
- - Tachycardie de la jonction AV par *I47.1*

Reese
v. Cogan-Reese

Réfection ¬ *Z43*

Réflexe
- Alimentation ¬ Épilepsie *G40.8*
- Anormaux ¬ *R29.2*
- Eau chaude ¬ Épilepsie *G40.8*
- Glabellaire anormal ¬ *R29.2*
- Non classée ailleurs ¬ Vessie neurogène *N31.1*
- Origine rachidienne ¬ Vessie *G95.80*

Réflexe *–suite*
- Tendineux ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: persistance des *G11.1*
- ¬
- - Dystrophie sympathique
- - - *G90.5*
- - - *G90.59*
- - Incontinence *N39.40*

Reflux
- Aortique rhumatismal(e) ¬ *I06.1*
- Biliaire ¬ *K29.6*
- Congénital au niveau de la valve pulmonaire ¬ *Q22.2*
- Gastro-œsophagien
- - Œsophagite ¬ *K21.0*
- - Sans œsophagite ¬ *K21.9*
- - ¬ *K21*
- Mitral(e) rhumatismal(e) ¬ *I05.1*
- Œsophagien
- - Nouveau-né ¬ *P78.8*
- - SAI ¬ *K21.9*
- Sans précision ¬ Uropathie obstructive et par *N13.9*
- Vésico
- - Urétéral
- - - Cicatrice ¬ *N13.7*
- - - SAI ¬ *N13.7*
- - - ¬
- - - - Pyélonéphrite (chronique) associée à un *N11.0*
- - - - Uropathie associée à un *N13.7*
- - Urétéro-rénal congénital ¬ *Q62.7*
- ¬
- - Iléite de *K51.0*
- - Œsophagite par *K21.0*
- - Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un *N11.0*
- - Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance ou *I06.2*
- - Uropathie obstructif
- - - *N13*
- - - *N13.8*

Réfractaire
- Apparition tardive ¬ État de mal épileptique *G41.8*
- Crise blastique
- - Cours de transformation ¬ Anémie *C92.00*
- - Prolifération de blastes en transformation) ¬ Anémie *C92.0*
- Dysplasie multilignées ¬ Anémie *D46.5*
- Excès blastes
- - AREB] ¬ Anémie *D46.2*
- - Transformation ¬ Anémie *D46.2*
- - Type
- - - I [AREB I] ¬ Anémie *D46.2*
- - - II [AREB II] ¬ Anémie *D46.2*
- - ¬ Anémie *D46.2*

Réfractaire *–suite*

- Non
- - Précisée ¬ Anémie *D46.4*
- - Sidéroblastique, ainsi précisée ¬ Anémie *D46.0*
- Sans sidéroblastes ¬ Anémie *D46.0*
- Sidéroblastes en couronne ¬ Anémie *D46.1*
- Traitement
- - Fer ¬ Anémie par déficit en fer *D50.8*
- - Induction
- - - Standard ¬ Leucémie, *C95.8!*
- - - ¬ Leucémie myéloïde aiguë *C92.00*
- Transfusion ¬
- - Thrombocytopénie non précis
- - - Non précisée, non qualifiée de *D69.61*
- - - Qualifiée de *D69.60*
- - Thrombopénie
- - - Primaire
- - - - Non qualifiées de *D69.41*
- - - - Qualifiées de *D69.40*
- - - Secondaire
- - - - Non qualifiées de *D69.58*
- - - - Qualifiées de *D69.57*
- ¬ Sprue *K90.0*

Réfraction

- Sans précision ¬ Vice de *H52.7*
- Troubles de l'accommodation ¬ Vices de *H52*
- ¬ Autres vices de *H52.6*

Refsum

- Infantile ¬ Maladie de *G60.1*
- ¬ Maladie de *G60.1*

Refus de manger en tant qu'anomalie du comportement ¬ *F50.8*

Regard ¬ Paralysie de la conjugaison du *H51.0*

Régénérative du foie ¬ Hyperplasie nodulaire *K76.8*

Régime

- Alimentaire ¬
- - Érosion des dents: due à: *K03.2*
- - Peau flasque ou affaissée: après une perte de poids (chirurgie bariatrique) (*L98.7*
- Habitudes alimentaires inadéquats ¬ *Z72.8*
- ¬ Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un *Z91.1*

Région

- 11p15 ¬ Syndrome
- - Beckwith-Wiedemann dû à un défaut d'empreinte de la *Q87.3*
- - Silver-Russell dû à un défaut d'empreinte de la *Q87.1*
- Anal rectal
- - Sans fistule ¬
- - - Abcès des *K61*
- - - Phlegmon des *K61*
- - ¬

Région *–suite*

- Anal rectal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Abcès des *K61*
- - - Fissure et fistule des *K60*
- Buccal
- - Non
- - - Classés ailleurs ¬ Autres kystes de la *K09.8*
- - - Liés au développement dentaire ¬ Kystes de la *K09.1*
- - Sans précision ¬ Kyste de la *K09.9*
- Cheville, pied et orteils ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.07*
- Costale ¬ *S20.8*
- Épaule, bras et coude ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.01*
- Fessière ¬
- - *L02.3*
- - *T21*
- - Tendinite de la *M76.0*
- Génital
- - Vessie, prostate, annexe, utérus ¬ *I97.87*
- - ¬ Tête cou paroi thoracique
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- Iliaque ¬ *S31.1*
- Inguinale ¬ *S31.1*
- Interscapulaire ¬ *T21*
- Lombo-sacré bassin ¬ Lésion traumatique vaisseau sanguin
- - Épiduraux au niveau de l'abdomen, de la *S35.80*
- - Sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la *S35.82*
- - Sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la *S35.81*
- Lombo-sacrée
- - Bassin
- - - Associée à une lésion intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la *S31.83!*
- - - SAI ¬ Plaie ouverte de l'abdomen, de la *S31*
- - - ¬ Autres lésions précisées de l'abdomen, de la *S39.88*
- - Membre
- - - S), ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Fractures du thorax, de la *T02.7*
- - - Thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la *T04.7*

Région *–suite*

- Lombo-sacrée *–suite*
- - Sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Malformation congénitale (charnière) de la *Q76.4*
- - Thorax bassin ¬
- - - Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la *T04.1*
- - - Luxations, entorses et foulures du thorax et de la *T03.1*
- - ¬ Maladie de la *M53.97*
- Mâchoire ¬ Plaie ouverte dans la *S01.80*
- Malléolaire
- - Pied
- - - 2ème degré sans précision ¬
- - - - Brûlure
- - - - - *T25.20*
- - - - Hanche et de la jambe, sauf *T24.20*
- - - - Corrosion
- - - - - *T25.60*
- - - - Hanche et de la jambe, sauf *T24.60*
- - - Degré
- - - - 2a
- - - - - ¬ Brûlure de la *T25.20*
- - - - - ¬ Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf *T24.20*
- - - - - ¬ Corrosion de la *T25.60*
- - - - 2b
- - - - - ¬ Brûlure de la *T25.21*
- - - - - ¬ Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf *T24.21*
- - - - - ¬ Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf *T24.61*
- - - - - ¬ Corrosion de la *T25.61*
- - - - - ¬ Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf *T24.60*
- - - ¬ Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la *S91.80*
- - ¬ *L03.11*
- Maxillaire
- - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: *S01.43*
- - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: *S01.42*
- Omoplate ¬ *S41.80*
- Orbitaire ¬ *S00.2*
- Pelvien cuisse ¬
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.14*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.05*
- Périoculaire
- - Sans atteinte des voies lacrymales ¬ Plaie ouverte de la paupière et de la *S01.1*
- - ¬
- - - Affections dégénératives des paupières et de la *H02.7*
- - - Brûlure de la paupière et de la *T26.0*
- - - Contusion de la paupière et de la *S00.1*

Région *–suite*
- Périoculaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Corrosion de la paupière et de la *T26.5*
- - - Lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la *S00.2*
- - - Plaie ouverte de la paupière et de la *S01.1*
- Pinéale ¬ Tumeur papillaire de la *D44.5*
- Pubienne ¬ *S31.1*
- Rétro-cricoïdienne ¬ Tumeur maligne: *C13.0*
- Rétromolaire ¬ Tumeur maligne: *C06.2*
- Rhino-pharyngée ¬ Gomme de la *A52.7†, J99.8**
- Sacrée ¬ *S31.0*
- Scapulaire ¬
- - *T22*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.10*
- Supraclaviculaire ¬ *S11.80*
- Temporale ¬ *T20*
- Temporo maxillaire
- - Joue ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.41*
- - Parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.49*
- - Région maxillaire
- - - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.43*
- - - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.42*
- - ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.4*
- Temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la joue et de la *S01.49*
- Thyroïdienne ¬ Entorse et foulure de la *S13.5*
- ¬ Abcès (embolique) (du): cerveau [toute *G06.0*

Règles
- Abondantes SAI ¬ *N92.0*
- Irrégulières SAI ¬ *N92.6*
- ¬
- - Fausses *P54.6*
- - Intervalles raccourcis et irréguliers entre les *N92.1*
- - Saignement régulier entre les *N92.3*

Regorgement ¬ Incontinence par *N39.41*

Régression testiculaire ¬ Syndrome de *Q55.0*

Régressive ¬ Mucinose cutanée spontanément *L98.5*

Régulateur de l'interféron ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit partiel en facteur 8 *D84.8*

Régulation
- Cataméniale ¬ *Z30.3*
- Sécrétion pancréatique interne, sans précision ¬ Anomalie de la *E16.9*
- Thermique nouveau-né

Régulation *–suite*
- Thermique nouveau-né *–suite*
- - Sans précision ¬ Trouble de la *P81.9*
- - ¬ trouble
- - - *P81*
- - - Précisés de la *P81.8*

Régurgitation
- Mérycisme du nouveau-né ¬ *P92.1*
- Syphilitique
- - Aorte ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Valve
- - - Aortique ¬ *A52.0†, I39.1**
- - - Pulmonaire ¬ *A52.0†, I39.3**
- Valvule
- - Aortique SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I35.1*
- - Mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf rhumatismale ¬ *I34.0*
- - Non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- - Pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I37.1*
- - Tricuspide, de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I36.1*
- ¬ Sténose mitrale avec insuffisance ou *I05.2*

Régurgités ¬
- Aspiration néonatale de lait et d'aliments *P24.3*
- Pneumonie par aspiration (de): aliments (*J69.0*
- Suffocation par: aliments (*T17*

Rehder
v. Holzgreve-Wagner-Rehder

Réhydratation orale ¬ Sels de *T50.3*

Reifenstein ¬ Syndrome de *E34.50*

Réimplantation
- Amputation ¬ Complications propres à une *T87*
- Partie
- - Corps ¬ Complications d'une *T87.2*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Complications d'une *T87.1*
- - - Supérieur ¬ Complications d'une *T87.0*

Rein
- Acquis) (multiple) (solitaire) ¬ Kyste du *N28.1*
- Bassinet ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.0*
- Calcul de l'uretère ¬ Calcul du *N20.2*
- Cause inconnu
- - Bilatéral ¬ Petit *N27.1*
- - Sans précision ¬ Petit *N27.9*
- - Unilatéral ¬ Petit *N27.0*
- - ¬ Petit *N27*
- Congénital unique ¬ Kyste
- - *Q61.0*
- Cours de cytomégalie ¬ Maladie des *B25.88†, N29.1**

Rein *–suite*
- Développement) ¬ multikystique: *Q61.4*
- Diabète sucré type
- - 1 ¬ Dégénérescence graisseuse du *E10.20†, N29.8**
- - 2 ¬ Dégénérescence graisseuse du *E11.20†, N29.8**
- Ectopique ¬ *Q63.2*
- Éponge SAI ¬ *Q61.5*
- Exception du bassinet ¬ Tumeur maligne du *C64*
- Fibrokystique ¬ *Q61.8*
- Goldblatt ¬ *I70.1*
- Hyperplasique et géant ¬ *Q63.3*
- Lobulé, soudé et en fer à cheval ¬ *Q63.1*
- Non précisé ¬ Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de *T86.19*
- Polykystique
- - Autosomique
- - - Dominant ¬ *Q61.2*
- - - Récessif ¬ *Q61.1*
- - Sans précision ¬ *Q61.3*
- - Type
- - - Adulte ¬ *Q61.2*
- - - Infantile ¬ *Q61.1*
- S) ¬ absence congénitale de *Q60*
- Sans précision ¬
- - Maladie kystique du *Q61.9*
- - Malformation congénitale du *Q63.9*
- Scléreux
- - Sans précision ¬ *N26*
- - Tuberculeux ¬ *A18.1†, N29.1**
- Surnuméraire ¬ *Q63.0*
- Uretère
- - Cours
- - - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du *N29.8**
- - - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Autres affections du *N29.1**
- - Non classées ailleurs ¬ Autres affections du *N28*
- - Sans précision ¬ Affection du *N28.9*
- - ¬
- - - Affections précisées du *N28.88*
- - - Calcul du *N20*
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ Maladie des *B27.0†, N29.1**
- - Herpès ¬ Maladie des *B00.8†, N29.1**
- ¬
- - Abcès tuberculeux du *A18.1†, N29.1**
- - Absence acquise de *Z90.5*
- - Artériosclérose du *I12*
- - Blessure ouverte du *S37.00, S31.83!*
- - Calcification tuberculeuse du *B90.1†, N29.1**
- - Calcul du *N20.0*

Rein *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Contusion et hématome de *S37.01*
- - Déchirure
- - - *S37.02*
- - - Capsule et du bassinet du *S37.02*
- - Défaut de remplissage de: *R93.4*
- - Dégénérescence
- - - Graisseuse du *E14.20†, N29.8**
- - - Maladie fibrokystique du *Q61.8*
- - Déplacement congénital du *Q63.2*
- - Détérioration fonctionnel
- - - Aiguë d'une greffe de *T86.10*
- - - Chronique d'une greffe de *T86.11*
- - Donneur de *Z52.4*
- - Fibrose rétripéritonéale idiopathique avec infection du *K66.2*
- - Gomme du *A52.7†, N29.0**
- - Gonorrhée du *A54.2†, N29.1**
- - Ischémie et infarctus du *N28.0*
- - Kyste
- - - *N28.1*
- - - Médullaire du *Q61.5*
- - Lésion traumatique
- - - *S37.0*
- - - Vaisseaux sanguins du *S35.4*
- - Maladie
- - - Glycogénique du foie et des *E74.0*
- - - Kystiques du *Q61.8*
- - Malformation congénital
- - - *Q63*
- - - Précisées du *Q63.8*
- - Malrotation du *Q63.2*
- - Perte isolée de magnésium par les *E83.4*
- - Rejet
- - - Aigu d'une greffe de *T86.10*
- - - Chronique d'une greffe de *T86.11*
- - Rétraction tuberculeuse des *A18.1†, N29.1**
- - Rupture de *S37.03*
- - Sarcome à cellules claires du *C64*
- - Status post greffe de *Z94.0*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, N29.0**
- - TBC [Tuberculose] du *A18.1†, N29.1**
- - Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de *T86.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D30.0*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.0*
- - Vaisseau accessoire d'un pôle du *Q27.8*

Réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] ¬ Vérification, *Z30.5*

Reis
v. Thies-Reis

Reis-Bücklers ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*

Reiter ¬
- Arthritis urethritica [syndrome de *M02.39*
- Kératodermie dans le syndrome de *M02.39†, L86**
- Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy- *M02.3*

Rejet
- 29 jours et plus après la transplantation ¬ *T86.41*
- Aigu d'une greffe de rein ¬ *T86.10*
- Appareil digestif greffe-contre-hôte stade
- - 1 ¬ Maladie aiguë de *T86.01†, K93.21**
- - 2 ¬ Maladie aiguë de *T86.02†, K93.22**
- - 3 ¬ Maladie aiguë de *T86.02†, K93.23**
- - 4 ¬ Maladie aiguë de *T86.02†, K93.24**
- Chronique d'une greffe de rein ¬ *T86.11*
- Cutané greffe-contre-hôte stade
- - 1 ¬ Maladie aiguë de *T86.01†, L99.11**
- - 2 ¬ Maladie aiguë de *T86.01†, L99.12**
- - 3 ¬ Maladie aiguë de *T86.01†, L99.13**
- - 4 ¬ Maladie aiguë de *T86.02†, L99.14**
- Greffe
- - Cœur
- - - Poumon ¬ Echec et *T86.3*
- - - ¬ Echec et *T86.2*
- - Foie ¬ Troubles fonctionnels, échec et *T86.4*
- - Intestin ¬ Échec ou *T86.88*
- - Os ¬ Échec ou *T86.88*
- - Peau ¬ Échec et *T86.5*
- - Rein
- - - Non précisé ¬ Trouble fonctionnel, échec et *T86.19*
- - - ¬ Troubles fonctionnels, échec et *T86.1*
- - ¬ Pyélonéphrite au cours d'un *T86.9†, N16.5**
- Greffe-contre-hôte
- - Stade
- - - 1 ¬ Maladie aiguë du foie de *T86.01†, K77.11**
- - - 2 ¬ Maladie aiguë du foie de *T86.02†, K77.12**
- - - 3 ¬ Maladie aiguë du foie de *T86.02†, K77.13**
- - - 4 ¬ Maladie aiguë du foie de *T86.02†, K77.14**
- - ¬ Atteinte
- - - Appareil digestif dans la maladie aiguë de *K93.2**
- - - Foie dans la maladie aiguë de *K77.1**
- - - Peau dans la maladie chronique de *L99.2**
- Greffon après transplantation de cellules souches ¬ *T86.00*
- Membres recousus ¬ *T87.2*
- Non précis greffe
- - Foie ¬ Autre trouble fonctionnel, échec et *T86.49*

Rejet *–suite*
- Non précis greffe *–suite*
- - Peau ¬ Autre trouble fonctionnel, échec et *T86.59*
- Organe tissu greffé
- - Greffe
- - - Cornée de l'œil ¬ Echec et *T86.83*
- - - Pancréas ¬ Echec et *T86.82*
- - - Poumon ¬ Echec et *T86.81*
- - Non précisés ¬ Echec et *T86.9*
- - Organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés ¬ Echec et *T86.88*
- - ¬ Echec et *T86.8*
- Pendant les premiers 28 jours après la transplantation ¬ *T86.40*
- Perte d'une greffe de peau ¬ *T86.52*
- Sociaux ¬ Exclusion ou *Z60*
- ¬ Détérioration fonctionnelle aiguë sans constatation de *T86.10*

Relâchement diaphragmatique ¬ *J98.6*

Relatif
- Absorption d'aliments et de liquides ¬ Autres symptômes et signes *R63.8*
- Appareil
- - Circulatoire respiratoire ¬ symptôme signe
- - - *R09*
- - - Précisés *R09.8*
- - Digestif abdomen ¬ symptôme signe
- - - *R19*
- - - Précisés *R19.8*
- - Urinaire
- - - Non précisés ¬ Symptômes et signes *R39.8*
- - - ¬ Autres symptômes et signes *R39*
- Apparence et au comportement ¬ Autres symptômes et signes *R46.8*
- Attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité ¬ Conseils *Z70*
- Comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité ¬ Conseil *Z70*
- Fonction cognitif conscience
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes *R41.8*
- - ¬ Autres symptômes et signes *R41*
- Humeur ¬ Autres symptômes et signes *R45.8*
- Sensation perception général
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes *R44.8*
- - ¬ Autres symptômes et signes *R44*
- SIDA [ARC] SAI ¬ Complexe *B24*
- Système nerveux ostéo-musculaire
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes *R29.8*
- - ¬ Autres symptômes et signes *R29*
- ¬
- - Polycythémie: *D75.1*
- - Stérilité *N96*

Relation
- Accouchement ¬ Galactorrhée sans *N64.3*
- Affective pendant l'enfance ¬ Perte de *Z61*
- Conditions météorologiques) ¬ Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans *W94.9!*
- Familiales pendant l'enfance ¬ Changements dans le tissu des *Z61*
- Sensitifs ¬ Délire de *F22.0*

Relationnel
- SAI ¬ Trouble: *F68.8*
- ¬ Problème sexuel *F66.2*

Releasing factor" de l'hormone de croissance ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: " *E16.8*

Relevant
- Cause obstétrical
- - Sans précision
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles *O96.9*
- - - ¬ Mort de séquelles *O97.9*
- - ¬ Mort de séquelles *O97*
- Causes externes ¬ Hémoglobinurie due à une hémolyse *D59.6*
- Classification sous C81-C88) ¬ Foyers osseux (médullaires) de lymphomes malins (maladies *C79.5*
- Directement cause obstétrical
- - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles *O96.0*
- - ¬ Mort de séquelles *O97.0*
- Homme ¬ Stérilité de la femme associée à des facteurs *N97.4*
- Indirectement cause obstétrical
- - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles *O96.1*
- - ¬ Mort de séquelles *O97.1*

Releveur de l'anus ¬ Syndrome du muscle *K59.4*

Remèdes populaires ¬ Abus de: préparations à base de plantes ou *F55*

Rémission
- Complet ¬
- - Arthropathie au cours de plasmocytome en *C90.01†, M36.1**
- - Érythrémie chronique en *D45*
- - Érythroblastose chronique type Heilmeyer-Schöner, en *D45*
- - Érythrose chronique en *D45*
- - Leucémie
- - - Monocytaire de Naegeli en *C93.11*
- - - Plasmocytaire en *C90.11*
- - Leucosarcome en *C85.9*
- - Lymphome
- - - Aigu à cellules T de l'adulte en *C91.51*
- - - Lymphoplasmocytaire avec production d'IgM en *C88.01*
- - Maladie
- - - Glomérulaire au cours de plasmocytome en *C90.01†, N08.1**

Rémission *–suite*
- Complet ¬ *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Heilmeyer-Schöner en *D45*
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de plasmocytome en *C90.01†, N16.1**
- - Myélome à plasmocytes en *C90.01*
- - Myélose chronique en *D47.1*
- - Plasmocytome médullaire en *C90.01*
- ¬ Trouble
- - Affectif bipolaire, actuellement en *F31.7*
- - Dépressif récurrent, actuellement en *F33.4*

Rémittente
- Évolution par poussées) ¬ Sclérose en plaques *G35.1*
- Progressive (chronique, secondairement progressive) ¬ Sclérose en plaques *G35.3*

Remplacé
- Anneau ou dicentrique ¬ Chromosome *Q93.2*
- Greffe hétérologue ou homologue ¬ organe ou tissu *Z94*

Remplacement ¬
- Fistule vagin
- - Cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de *N82.80*
- - Vessie de *N82.81*
- Présence d'une autre valvule cardiaque de *Z95.4*

Remplissage
- Rein ¬ Défaut de *R93.4*
- Uretère ¬ Défaut de *R93.4*
- Vessie ¬ Défaut de *R93.4*

Rénal
v. branchio-oto-rénal
v. cérébro-hépato-rénal
v. cranio-facio-cubito-rénal
v. Type de maladie
v. Vésico-rénal

Renalis ¬ Diabetes *E74.8*

Rendu-Osler-Weber ¬ Maladie de *I78.0*

Rénoparenchymateuse ¬ Hypertension *I15.1*

Renouvellement
- Ordonnance
- - Appareil ¬ *Z76.0*
- - Lunettes ¬ *Z76.0*
- - Médicaments ¬ *Z76.0*
- - ¬ *Z76.0*
- Prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs ¬ *Z30.4*

Renpenning ¬ Syndrome de *Q87.5*

Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.5!*

Répandue ¬ Trypanosomiase SAI lieu où
- Maladie de Chagas est *B57.2*
- Trypanosomiase africaine est *B56.9*

Réparation
- ADN ¬ Ataxie cérébelleuse avec défaut de *G11.3*

Réparation *–suite*
- Tissu cicatriciel ¬ opération *Z42*

Reperfusion (retour absent ou lent dans le corps) ¬ Blessure de *T88.8*

Répétition
- Aigu
- - Latéral
- - - Haut ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - - Paroi) SAI ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Latéro
- - - Apical ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - - Basal ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Postérieur (vrai) ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Postéro-basal ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Postéro-latéral ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Postéro-septal ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Septal SAI ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- Localisation
- - Non précisée ¬ Infarctus du myocarde à *I22.9*
- - ¬ Infarctus du myocarde à *I22.8*
- Non classées ailleurs ¬ Chutes à *R29.6*
- Paroi
- - Antérieure ¬ Infarctus du myocarde à *I22.0*
- - Inférieure ¬ Infarctus du myocarde à *I22.1*
- ¬
- - Avortements à *N96*
- - Cyclite aiguë, subaiguë ou à *H20.0*
- - Infarctus du myocarde à *I22*
- - Iritis aiguë, subaiguë ou à *H20.0*
- - Soins au cours de la grossesse pour avortement à *O26.2*
- - Uvéite antérieure aiguë, subaiguë ou à *H20.0*

Repli
- Ary-épiglottique
- - SAI ¬
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Versant
- - - Hypopharyngé ¬
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- - - - Tumeur maligne: *C13.1*
- - - Laryngé ¬
- - - - *C32.1*
- - - - *D02.0*
- - - - *D38.0*
- - Zone marginal ¬
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*

Repli *–suite*
- Ary-épiglottique *–suite*
- - Zone marginal ¬ *–suite*
- - - *D37.0*
- Endocardiques ¬ Malformation des *Q21.2*

Réplication ¬ Hépatite viral chronique B sans agent delta AgHBe
- Négatif
- - Activité inflammatoire, forte *B18.14*
- - Sans agent delta, AgHBe négatif, sans activité inflammatoire, faible *B18.13*
- Positif
- - Activité inflammatoire, forte *B18.12*
- - Sans agent delta: AgHBe positif, sans activité inflammatoire, forte *B18.11*

Réponse
- Génitale ¬ Echec de la *F52.2*
- Héréditaire anormal virus Epstein-Barr ¬ Déficit immunitaire
- - *D82.3*
- Inflammatoire systémique SIRS
- - Non précisé ¬ Syndrome de *R65.9!*
- - Origine
- - - Infectieux
- - - - Complications organiques ¬ Syndrome de *R65.1!*
- - - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de *R65.0!*
- - - Non infectieux
- - - - Complications organiques ¬ Syndrome de *R65.3!*
- - - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de *R65.2!*
- - ¬ Syndrome de *R65!*
- Scotopique supranormale ¬ Dystrophie des cônes avec *H35.5*
- Sexuelle chez la femme ¬ Trouble de: *F52.2*
- Stimulation nerveuse ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Repos
- Loisirs ¬ Manque de *Z73*
- Restless Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) jambes sans *G25.81*
- ¬
- - Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleurs au *I70.23*
- - Insuffisance cardiaque
- - - Droit
- - - - Primaire avec symptôme au *I50.00, I50.05!*
- - - - Symptôme au *I50.01, I50.05!*
- - - Gauche: Avec symptôme au *I50.14*

Répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: activité *Z03.2*

Représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations *F62.0*

Reprise retardée de la fonction de la greffe ¬ *T86.12*

Reptiles ¬ Effet toxique: Venin d'autres *T63.1*

Réseau ¬ Dystrophie de (la): cornée: grillagée en *H18.5*

Résidentiel ¬ inscription dans: établissement *Z02*

Résidents d'établissements institutionnels ¬ Examen général en série de: *Z10*

Résistance
- Androgène
- - Sans précision ¬ Syndrome de *E34.59*
- - ¬
- - - Pseudo-hermaphrodisme masculin avec *E34.5*
- - - Syndrome de *E34.5*
- Inférieure à la normale ¬ les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une *M66*
- Insuline type A ¬ Syndrome de *E13.60*
- Médicament de première ligne ¬ Tuberculose avec *A16.9, U82.0!*
- Multiples hormones ¬ Acrodysostose avec *Q75.4*
- Partielle aux androgènes ¬ Syndrome de *E34.50*
- Périphérique aux hormones thyroïdiennes ¬ Hypothyroïdie due à une *E03.8*
- Protéine C activée [mutation du facteur V Leiden] ¬ *D68.5*
- Totale aux androgènes ¬ Syndrome de *E34.51*

Résistant
- Aminoglycoside
- - Non résistant glycopeptides ¬ Enterococcus
- - - Faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement *U80.21!*
- - - Faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement *U80.31!*
- - ¬ Enterococcus
- - - Faecalis résistant aux glycopeptides et fortement *U80.20!*
- - - Faecium résistant aux glycopeptides et hautement *U80.30!*
- Aminosides ¬ Enterococcus
- - Faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement *U80.2!*
- - Faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement *U80.3!*
- Diazoxide déficit
- - Kir6.2 ¬ Hyperinsulinisme focal *E16.1*
- - SUR1 ¬ Hyperinsulinisme focal *E16.1*
- Glycopeptides
- - Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecalis *U80.20!*
- - Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecium *U80.30!*
- - Oxazolidinones
- - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecalis *U80.2!*
- - - Streptogramines

Résistant *–suite*
- Glycopeptides *–suite*
- - Oxazolidinones *–suite*
- - - Streptogramines *–suite*
- - - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecium *U80.3!*
- - - - ¬
- - - - - Enterococcus faecalis *U80.20!*
- - - - - Enterococcus faecium *U80.30!*
- - Quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré *U80.01!*
- - ¬ Enterococcus
- - - Faecalis
- - - - *U80.20!*
- - - - Résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non *U80.21!*
- - - Faecium
- - - - *U80.30!*
- - - - Résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non *U80.31!*
- Gonadotrophines ¬ Syndrome de l'ovaire *E28.3*
- Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.11!*
- Méthicilline ¬ Staphylocoque doré *U80.0!*
- Oxacilline
- - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré *U80.0!*
- - Méticilline
- - - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré *U80.00!*
- - - MRSA] ¬ Staphylocoque doré *U80.00!*
- - - ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones non *U80.01!*
- Oxazolidinones
- - Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ Enterococcus faecalis *U80.21!*
- - Streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ Enterococcus faecium *U80.31!*
- Pénicilline oxacilline
- - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.1!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- Plusieurs médicaments de première ligne ¬ Mycobacterium tuberculosis *U82.0!*
- Stéroïdes

Résistant *–suite*
- Stéroïdes *–suite*
- - Hyalinose focale et segmentaire ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique *N04.1*
- - Lésions minimales ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique *N04.0*
- - Prolifération mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique *N04.3*
- - Sclérose mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique *N04.8*
- Virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases ¬ Virus de l'immunodéficience humaine *U85!*
- Vitamine D de type II ¬ Rachitisme *E83.30†, M90.89**

Résorption
- Dentaire (externe) ¬ *K03.3*
- Pathologique des dents ¬ *K03.3*
- Sans syndrome de détresse respiratoire ¬ Atélectasie (de): *P28.1*

Respirateur ¬ Dépendance long durée
- *Z99.1*
- Envers un *Z99.1*

Respiration
- Bouche ¬ *R06.5*
- Buccale ¬ Malocclusion due à: *K07.5*
- Douloureuse ¬ *R07.1*
- Non précisées ¬ Anomalies de la *R06.8*
- Périodique ¬ *R06.3*
- ¬
- - Anomalies de la *R06*
- - Insuffisance d'oxygénation systémique due à: gêne mécanique à la *T71*

Respiratoire
- Acte médicaux
- - Sans précision ¬ Trouble *J95.9*
- - ¬ Autres maladies des voies *J95.88*
- Adulte [SDRA] ¬ Syndrome de détresse *J80.0*
- Agent
- - Chimique émanation fumée gaz
- - - Sans précision ¬ Affection *J68.9*
- - - ¬ Autres affections *J68.8*
- - Externe
- - - Précisés ¬ Affections *J70.8*
- - - Sans précision ¬ Affection *J70.9*
- - - ¬ Affections *J70*
- Aigu
- - Adolescent ¬ Syndrome de détresse *J80.09*
- - Adulte ¬ Syndrome de détresse *J80.09*
- - Enfant ¬ Syndrome de détresse *J80.09*
- - Non classée ailleurs ¬ Insuffisance *J96.0*
- - Sévère SRAS
- - - Sans précision ¬ Syndrome *U04.9*
- - - ¬ Syndrome *U04*

Respiratoire *–suite*
- Aigu *–suite*
- - Subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ Autres affections *J68.3*
- - Type
- - - I ¬ Insuffisance *J96.00*
- - - II ¬ Insuffisance *J96.01*
- Chronique
- - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ Affections *J68.4*
- - Non
- - - Classée ailleurs ¬ Insuffisance *J96.1*
- - - Précisée survenant pendant la période périnatale ¬ Maladie *P27.9*
- - SAI ¬ Maladie *J98.9*
- - Survenant pendant la période périnatale ¬ Autres maladies *P27.8*
- - Type
- - - I ¬ Insuffisance *J96.10*
- - - II ¬ Insuffisance *J96.11*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de l'appareil *O99.5*
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique ¬
- - Formes de tuberculose de l'appareil *A15.8*
- - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil *A15.7*
- - Tuberculose de l'appareil *A15*
- Cours
- - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ Troubles *J99.1**
- - Cryoglobulinémie ¬ Troubles *D89.1†, J99.8**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Troubles *J99.8**
- - Spondylarthrite ankylosante ¬ Troubles *M45.09†, J99.8**
- - Sporotrichose ¬ Maladie des voies *B42.0†, J99.8**
- - Syphilis ¬ Maladie des voies *A52.7†, J99.8**
- Créée par la trachéotomie ¬ Obstruction de la voie *J95.0*
- Digestifs ¬ Tumeur maligne secondaire des organes *C78*
- Dysphagie ¬ Syndrome de myopathie à début précoce-aréflexie-détresse *G71.2*
- Enfant et de l'adolescent ¬ Syndrome de détresse *J80*
- Hypoxique ¬ Insuffisance *J96.90*
- Immature du prématuré ¬ Centre *P28.8*
- Infantile ¬ Syndrome de détresse *P22.0*
- Inférieur
- - Aiguë SAI ¬ Infection respiratoire (voies *J22*
- - Sans précision ¬ Infections aiguës des voies *J22*
- - ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies *J44.0*

Respiratoire *–suite*
- Inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ Affections *J68*
- Intrathoracique
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l'oreille moyenne et des organes *D38*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de tumeur maligne des autres organes *Z80.2*
- - - - Personnels de tumeur maligne d'autres organes *Z85.2*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes *C39.8*
- Lors de granulomatose avec polyangéite ¬ Maladies *M31.3†, J99.1**
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et *P00.3*
- Mitochondrial ¬
- - Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en complexe I de la chaîne *I42.2*
- - Déficit isolé complexe
- - - I de la chaîne *G31.81*
- - - IV de la chaîne *G31.81*
- - - V de la chaîne *G31.81*
- Nécrosante ¬ Granulomatose *M31.3*
- Non
- - Classé ¬
- - - Infection des voies *J98.7*
- - - Insuffisance *J96*
- - Précis ¬
- - - Anomalies *R06.88*
- - - Tumeur maligne secondaire des organes *C78.3*
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬
- - - Affection *P28.9*
- - - Détresse *P22.9*
- - ¬
- - - Détresse
- - - - *P22.0*
- - - - *P22.8*
- - - Insuffisance *P28.5*
- Organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de l'appareil *C39*
- Partie non précis ¬
- - Brûlure des voies *T27.3*
- - Corps étranger dans les voies *T17.9*
- - Corrosion des voies *T27.7*
- Pneumopathie interstitielle ¬ Bronchiolite *J68.4*
- Postopératoire ¬ Insuffisance *J95.88*
- Précis
- - Nouveau-né ¬ Autres affections *P28.8*
- - ¬ Autres troubles *J98.8*

Respiratoire *–suite*

- Précoce ¬ Myopathie distale avec atteinte *G71.0*
- Récurrente ¬ Papillomatose *D14.4*
- Respiratory distress syndrome] du nourrisson ¬ Syndrome de détresse *P22.0*
- SAI ¬
- - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil *A16.7*
- - Tuberculose (de): appareil *A16.9*
- - Voies *C39.9*
- Sans
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de l'appareil *A16*
- - Mention confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique ¬
- - - Formes de tuberculose de l'appareil *A16.8*
- - - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil *A16.7*
- - Précision
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique ¬ Tuberculose de l'appareil *A15.9*
- - - Sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de l'appareil *A16.9*
- - - ¬
- - - - Carcinoma in situ: Appareil *D02.4*
- - - - Hémorragie des voies *R04.9*
- - - - Insuffisance *J96.9*
- - - - Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil *T48.7*
- - - - Malformation congénitale de l'appareil *Q34.9*
- - - - Séquelles de tuberculose des voies *B90.9*
- - - - Trouble *J98.9*
- - - - Tumeur
- - - - - Bénigne: Appareil *D14.4*
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Appareil *D38.6*
- SDRA
- - Léger chez l'adulte ¬ Syndrome de détresse *J80.01*
- - Modéré chez l'adulte ¬ Syndrome de détresse *J80.02*
- - Sévère chez l'adulte ¬ Syndrome de détresse *J80.03*
- Supérieur
- - Affection aiguë ¬ Voies *J06.9*
- - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies *J68.2*
- - Infection SAI ¬ Voies *J06.9*
- - Localisation
- - - Multiple
- - - - Non précisées ¬ Infections aiguës des voies *J06*

Respiratoire *–suite*

- Supérieur *–suite*
- - Localisation *–suite*
- - - Multiple *–suite*
- - - - ¬ Autres infections aiguës des voies *J06.8*
- - - Non précisée ¬ Réaction d'hypersensibilité des voies *J39.3*
- - Partie non précisée ¬ Tumeur maligne: Voies *C39.0*
- - Précisées ¬ Autres maladies des voies *J39.8*
- - Sans précision
- - - Virus spécifique non identifié ¬ Infection grippale des voies *J11.1*
- - - ¬
- - - - Infection des voies *J06.9*
- - - - Maladie des voies *J39.9*
- - Streptocoque ¬
- - - Infection des organes *J06.9, B95.5!*
- - - Maladie des organes *J06.9, B95.5!*
- - Virus
- - - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [Influenza] avec infection des voies *J09, U69.21!*
- - - Influenza
- - - - Saisonnière identifié ¬ Grippe: infection aiguë des voies *J10.1*
- - - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec infection *J09*
- - ¬
- - - Fibrose sous-muqueuse des voies *J39.88*
- - - Maladie
- - - - Précisées des voies *J39.88*
- - - - Voies *J39*
- Survenant pendant la période périnatale ¬ Autres affections *P28*
- Syncytial
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Virus *B97.4!*
- - VRS ¬
- - - Bronchiolite aiguë due au virus *J21.0*
- - - Bronchite aiguë due au virus *J20.5*
- - - Pneumonie
- - - - Congénitale à virus *P23.0*
- - - - Virus *J12.1*
- Thorax ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil *R84*
- Type
- - 1 ¬ Amyotrophie spinale avec détresse *G12.2*
- - 2 ¬ Amyotrophie spinale avec détresse *G12.2*
- - I ¬ Insuffisance *J96.90*
- - II ¬ Insuffisance *J96.91*
- Virus
- - Influenza saisonnière identifié ¬ Grippe avec d'autres manifestations *J10.1*
- - Non identifié ¬ Grippe avec d'autres manifestations *J11.1*

Respiratoire *–suite*

- Virus *–suite*
- - ¬ Infection des organes *J98.7, B97.8!*
- Voies respiratoires inférieures) aiguë SAI ¬ Infection *J22*
- ¬
- - Absence congénitale d'organes *Q34.9*
- - Acidose: *E87.2*
- - Alcalose: *E87.3*
- - Anomalie SAI congénitale d'organes *Q34.9*
- - Antécédent
- - - Familiaux de maladies de l'appareil *Z83.6*
- - - Personnels de maladies de l'appareil *Z87.0*
- - Arrêt *R09.2*
- - Arthrite au cours d'affection *J98.9†, M14.89**
- - Atélectasie (de): résorption, sans syndrome de détresse *P28.1*
- - Brûlure
- - - Corrosion des voies *T27*
- - - Parties des voies *T27.2*
- - Carcinoma in situ: Autres parties de l'appareil *D02.3*
- - Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil *D02*
- - Charbon
- - - *A22.1†, J17.0**
- - - Organes *A22.1†, J17.0**
- - Corps étranger
- - - Localisations autres et multiples dans les voies *T17.8*
- - - Voies *T17*
- - Corrosion d'autres parties des voies *T27.6*
- - Diminution de la capacité: *R94.2*
- - Douleur thoracique *R07.1*
- - Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Système *F45.33*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil *Z12.2*
- - Hémorragie
- - - Parties des voies *R04.8*
- - - Voies *R04*
- - Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil *T48*
- - Maladie due au VIH avec anomalie *B23.8, R06.88*
- - Malformation congénital
- - - Appareil *Q34*
- - - Précisées de l'appareil *Q34.8*
- - Symptôme signe
- - - Précisés relatifs aux appareils circulatoire et *R09.8*
- - - Relatifs aux appareils circulatoire et *R09*
- - Syndrome réactionnel de dysfonction des voies *J68.3*
- - Syphilis tardive des voies *A52.7†, J99.8**
- - Troubles *J98*

Respiratoire *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Tumeur

- - - Bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil *D14*

- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D38.5*

- - - Maligne: sièges mal définis de l'appareil *C39.9*

Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease [RB-ILD] ¬ *J68.4*

Respiratory distress syndrome] du nourrisson ¬ Syndrome de détresse respiratoire [*P22.0*

Responsables d'une maladie infectieuse ¬ Sujet porteur de germes *Z22*

Ressort ¬

- Doigt "à *M65.3*

- Genou "à *M23.8*

- Hanche "à *R29.4*

- Mâchoire à *K07.6*

Restauration immunitaire [SIRI] ¬ Syndrome inflammatoire de *D89.3*

Reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause *R96.1*

Restless Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) jambes sans repos [*G25.81*

Restreinte ¬ Difficultés liées à: dépendance due à une mobilité *Z74.0*

Restzustand (schizophrénique) ¬ *F20.5*

Résultant

- Acte visée diagnostique thérapeutique ¬

- - Emphysème (sous-cutané) *T81.8*

- - Hémorragie de toute localisation, *T81.0*

- Amniocentèse ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*

- Aspiration ¬ Pneumonie néonatale *P24*

- Biopsie ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*

- Dispositif intra-utérin ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*

- Examens hématologiques ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*

- Intervention chirurgicale intra-utérine ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*

- Listériose ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.8*

- Maladie virale de la mère ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.3*

- Toxicomanie ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.5*

- Toxoplasmose ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.8*

Résultat

- Accouchement

- - Sans précision ¬ *Z37.9!*

- - ¬ *Z37!*

- Anormal

- - Constaté cours examen prénatal systématique mère

Résultat *–suite*

- Anormal *–suite*

- - Constaté cours examen prénatal systématique mère *–suite*

- - - Sans précision ¬ *O28.9*

- - - ¬ *O28*

- - Cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Autres *O28.8*

- - Écoulement du mamelon ¬ *R89*

- - Épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides] ¬ *R94*

- - Examen

- - - Chimique sang

- - - - Sans précision ¬ *R79.9*

- - - - ¬ Autres *R79*

- - - Cytologique et histologique des urines ¬ *R82.8*

- - - Liquide céphalorachidien ¬ *R83*

- - - Microbiologique des urines ¬ *R82.7*

- - - Urine

- - - - Non précisés ¬ *R82.9*

- - - - ¬ Autres *R82*

- - Expectoration ¬ *R84*

- - Exploration fonctionnel

- - - Cardio-vasculaires ¬ *R94.3*

- - - Endocriniennes ¬ *R94.7*

- - - Hépatiques ¬ *R94.5*

- - - Organes et appareils ¬ *R94.8*

- - - Pulmonaires ¬ *R94.2*

- - - Rénales ¬ *R94.4*

- - - Système nerveux

- - - - Central ¬ *R94.0*

- - - - Périphérique et épreuves sensorielles spéciales ¬ *R94.1*

- - - Thyroïdiennes ¬ *R94.6*

- - - ¬ *R94*

- - Imagerie diagnostique

- - - Appareil urinaire ¬ *R93.4*

- - - Cœur et de la circulation coronaire ¬ *R93.1*

- - - Crâne et de la tête, non classés ailleurs ¬ *R93.0*

- - - Foie et des voies biliaires ¬ *R93.2*

- - - Membres ¬ *R93.6*

- - - Partie

- - - - Abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal ¬ *R93.5*

- - - - Corps

- - - - - Précisées ¬ *R93.8*

- - - - - ¬ *R93*

- - - - Système ostéo-musculaire ¬ *R93.7*

- - - - Voies digestives ¬ *R93.3*

- - - Poumon ¬ *R91*

- - - Sein ¬ *R92*

- - - Système nerveux central ¬ Autres *R90.8*

- - Lavage bronchique ¬ *R84*

- - Liquide

Résultat *–suite*

- Anormal *–suite*

- - Liquide *–suite*

- - - Péritonéal ¬ *R85*

- - - Pleural ¬ *R84*

- - - Synovial ¬ *R89*

- - Précisés des examens chimiques du sang ¬ Autres *R79.8*

- - Prélèvement

- - - Effectué sur

- - - - Appareil

- - - - - Digestif et la cavité abdominale ¬ *R85*

- - - - - Respiratoire et le thorax ¬ *R84*

- - - - Organe

- - - - - Appareils et tissus ¬ *R89*

- - - - - Génitaux de la femme ¬ *R87*

- - - - - Génitaux de l'homme ¬ *R86*

- - - Gorge ¬ *R84*

- - Salive ¬ *R85*

- - Scintigraphie ¬ *R94*

- - Sécrétion

- - - Frottis

- - - - Col de l'utérus ¬ *R87*

- - - - Vagin ¬ *R87*

- - - - Vulve ¬ *R87*

- - - Nasales ¬ *R84*

- - - Niveau d'une plaie ¬ *R89*

- - - Prostatiques ¬ *R86*

- - Sperme, liquide séminal ¬ *R86*

- - Test de Mantoux ¬ *R76.1*

- Biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.1*

- Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.5*

- Cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.2*

- Échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.3*

- Examen ¬ Conseil et surveillance pour: Consultation pour l'explication de *Z71*

- Faussement positifs au test sérologique de la syphilis ¬ *R76.2*

- Fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie ¬ Mauvais *K91.4*

- Hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.0*

- Histologique

- - Stade

- - - 1 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec autres *N17.81*

- - - 2 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec autres *N17.82*

- - - 3 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec autres *N17.83*

- - ¬ Insuffisance rénal aigu

Résultat *–suite*
- Histologique *–suite*
- - ¬ Insuffisance rénal aigu *–suite*
- - - *N17.8*
- - - *N17.89*
- - - Sans *N17.9*
- Immunologiques sérique
- - Sans précision ¬ Anomalie de *R76.9*
- - ¬ anomalie
- - - *R76*
- - - Précisées de *R76.8*
- Non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons ¬ *R75*
- Positif au test de Coombs ¬ *R76.8*
- Radiologique anormal
- - Cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.4*
- - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *R93.8*
- Scolaires ¬ Mauvais *Z55*

Résurgent [maladie de Brill] ¬ Typhus *A75.1*

Resynchronisation cardiaque ¬ Présence
- Défibrillateur de thérapie de *Z95.0*
- Stimulateur de thérapie de *Z95.0*

Retard
- Consolidation d'une fracture ¬ *M84.2*
- Croissance
- - Fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de *Z36.4*
- - Malnutrition du fœtus ¬ *P05*
- - Sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie- *D81.1*
- - ¬ *R62.8*
- Développement
- - Constitutionnel ¬ *E30.0*
- - Déficit
- - - 2-méthylbutyryl-CoA déshydrogénase ¬ *E71.1*
- - - Méthylmalonate semialdéhyde déshydrogénase ¬ *E71.1*
- - Malnutrition protéino-énergétique ¬ *E45*
- - Nourrisson ¬ Maladie due au VIH avec *B22, P05.9*
- - Ostéopénie-anomalies ectodermiques ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Physiologique
- - - Sans précision ¬ *R62.9*
- - - ¬ *R62*
- - Physique dû à la malnutrition ¬ *E45*
- - ¬ Syndrome
- - - Cutis laxa-hyperlaxité ligamentaire- *Q82.8*
- - - Neuropathie viscérale-anomalies cérébrales-dysmorphie- *Q87.8*
- Fermeture des sutures crâniennes ¬ *P96.3*
- Glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme ¬ Ictère dû à un *P59.0*

Retard *–suite*
- Langage
- - Asymétrie faciale-strabisme-incisure du lobe de l'oreille ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - ¬ *R62.0*
- Mental
- - Caractéristiques autistiques ¬ *F84.1*
- - Grave ¬ *F72*
- - Léger ¬ *F70*
- - Mouvements stéréotypés ¬ Hyperactivité associée à un *F84.4*
- - Moyen ¬ *F71*
- - Profond ¬ *F73*
- - Sans précision ¬ *F79*
- - ¬ Autres formes de *F78*
- Phases du sommeil ¬ Syndrome de *G47.2*
- Physique ¬ *R62.8*
- Pondéral ¬ *R62.8*
- Psychomoteur
- - Déficit en S-adénosylhomocystéine hydrolase ¬ *E72.1*
- - ¬ Syndrome
- - - Aniridie-agénésie rénale- *Q87.8*
- - - Ataxie cérébelleuse autosomique récessive- *G11.1*
- Spécifique
- - Lecture ¬ *F81.0*
- - Orthographe (sans trouble de la lecture) ¬ *F81.1*
- Stade de développement physiologique attendu ¬ *R62.0*
- Staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse accélérée-dysmorphie faciale- *Q87.3*

Retardé
- Canal artériel ¬ Obturation *P29.3*
- Deuxième jumeau, triplé, etc. ¬ Accouchement *O63.2*
- Développement physiologique ¬ Autres *R62.8*
- Faisant suite à un traumatisme ¬ Choc (immédiat) (*T79.4*
- Fonction de la greffe ¬ Reprise *T86.12*
- Fusion ou arthrodèse ¬ Guérison osseuse *M96.82*
- Ostéotomie ¬ Guérison osseuse *M96.82*
- Rupture
- - Artificielle des membranes ¬ Accouchement *O75.5*
- - Spontanée ou non précisée des membranes ¬ Accouchement *O75.6*
- SAI ¬ Croissance fœtale *P05.9*
- Sévère
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Hémorragie *O08.1*
- - ¬ échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une hémorragie *O07.1*

Retardé *–suite*
- Sévère *–suite*
- - ¬ échec tentative avortement *–suite*
- - - Sans précision, compliqués d'une hémorragie *O07.6*
- Traitement ¬ Rupture prématurée des membranes, travail *O42.2*
- ¬
- - Développement sexuel *E30.0*
- - Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel): *H40.2*
- - Guérison *T89.03*
- - Maturation *R62.0*
- - Puberté *E30.0*
- - Traitement *T89.03*

Rétention
- Ancien
- - Corps étranger
- - - Magnétique
- - - - Chambre antérieure de l'œil ¬ *H44.6*
- - - - Corps
- - - - - Ciliaire ¬ *H44.6*
- - - - - Vitré ¬ *H44.6*
- - - - Cristallin ¬ *H44.6*
- - - - Iris ¬ *H44.6*
- - - - Paroi postérieure du globe oculaire ¬ *H44.6*
- - - Non magnétique
- - - - Chambre antérieure de l'œil ¬ *H44.7*
- - - - Corps
- - - - - Ciliaire ¬ *H44.7*
- - - - - Vitré ¬ *H44.7*
- - - - Cristallin ¬ *H44.7*
- - - - Iris ¬ *H44.7*
- - - - Paroi postérieure du globe oculaire ¬ *H44.7*
- - - Secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite ¬ *H05.5*
- - Intra-oculaire corps étranger
- - - Magnétique ¬ *H44.6*
- - - Non magnétique ¬ *H44.7*
- Chylomicrons ¬ Maladie de *E78.6*
- Corps étranger dans la paupière ¬ *H02.8*
- Dentaire [dents temporaires persistantes] ¬ *K00.6*
- Fœtus mort in utero ¬ *O02.1*
- Glandes salivaires ¬ Kyste muqueux: de *K11.6*
- Incarcération ou l'adhérence du placenta ¬ Hémorragie associée à la *O72.0*
- Liquidienne SAI ¬ *R60.9*
- Partiel placenta membrane
- - Sans hémorragie ¬ *O73.1*
- - ¬ Hémorragie associée à la *O72.2*
- Placenta
- - Membranes, sans hémorragie ¬ *O73*
- - SAI ¬ *O72.0*

Rétention *–suite*
- Placenta *–suite*
- - Sans hémorragie ¬ *O73.0*
- Produit conception
- - Accouchement, sans hémorragie ¬ *O73.1*
- - SAI, après l'accouchement ¬ *O72.2*
- Stérilet au cours d'une grossesse ¬ *O26.3*
- Urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ¬ *T83.8*
- Urine ¬ *R33*
- ¬ Mort fœtale précoce avec *O02.1*

Rétentionnel de l'ovaire ¬ Kyste *N83.2*

Retenu [siège de la tumeur] ¬ Testicule: *C62.0*

Réticulaire
- Déplétion lymphocytaire ¬ Lymphome de Hodgkin classique de type *C81.3*
- Pigmentaire ¬ Dermatopathie *Q82.4*
- ¬
- - Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie *D81.0*
- - Dégénérescence rétinienne: *H35.4*
- - Dysgénésie *D72.0*
- - Érythrodermie congénitale ichtyosiforme *Q80.3*

Réticulée
- Érythémateuse ¬ Mucinose *L98.5*
- Gougerot-Carteaud] ¬ Papillomatose confluente et *L83*
- Plis ¬ Dermatose *L81.8*
- ¬
- - Folliculite érythémateuse *L66.4*
- - Mucinose érythémateuse *L98.5*

Réticulocytose maligne ¬ *C85.9*

Réticulo-endothéliose leucémique ¬ *C91.4*

Réticulohistiocytaire ¬ Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système *D76*

Réticulohistiocytome (à cellules géantes) ¬ *D76.3*

Réticulohistiocytose multicentrique ¬ *E78.8†, M14.39**

Réticulo-leucémique maligne ¬ Érythrodermie *C84.1*

Réticulosarcome
- Nodulaire ¬ *C96.9*
- ¬ Maladie due au VIH avec *B21, C83.3*

Réticulose
- Hémophagocytaire familiale ¬ *D76.1*
- Lipomélanique ¬ *I89.8*
- Malign ¬
- - *C86.0*
- - Arthrite au cours de *C86.0†, M36.1**
- Médullaire histiocytaire ¬ *C96.8*
- Pagétoïde localisée ¬ *C84.0*
- Polymorphe ¬ *C86.0*
- Sézary ¬ *C84.1*

Rétiforme ¬
- Hémangioendothéliome *D48.1*
- Parapsoriasis *L41.5*

Rétine
- Branche ¬ Occlusion de la veine de la *H34.8*
- Centrale ¬ Occlusion de la veine de la *H34.8*
- Cours de rétinite à CMV [cytomégalovirus], VIH positif ¬ Décollement de la *B20†, H32.0*, B25.88*
- Débutante ¬ Occlusion de la veine de la *H34.8*
- Déchirure rétinienne ¬ Décollement de la *H33.0*
- Partielle ¬ Occlusion de la veine de la *H34.8*
- Rhegmatogène
- - Autosomique dominant ¬ Décollement de la *H33.0*
- - ¬ Décollement de la *H33.0*
- SAI ¬
- - Décollement de la *H33.2*
- - Kyste (de): parasitaire de la *H33.1*
- Sans
- - Déchirure de la rétine ¬ Décollement de la *H33.2*
- - Décollement ¬
- - - Déchirure en fer à cheval de la *H33.3*
- - - Trou rond de la *H33.3*
- Tachetée familiale bénigne ¬ *H35.5*
- VIH ¬ Syndrome de microangiopathie de la *B23.8, H35.0*
- ¬
- - Altérations vasculaires de la *H35.0*
- - Anévrisme congénital de la *Q14.1*
- - Artériosclérose d'un vaisseau de la *I70.8†, H36.8**
- - Décollement
- - - Couches de la *H35.7*
- - - Déchirure de la *H33*
- - - Rétine: sans déchirure de la *H33.2*
- - - Séreux de la *H33.2*
- - - Traction de la *H33.4*
- - Dégénérescence de la partie irienne de la *H21.2*
- - Hamartome combiné de l'épithélium pigmentaire et de la *D31.2*
- - Hyperornithinémie avec atrophie sinueuse de la choroïde et de la *E72.4*
- - Maladie due au VIH avec altération vasculaire de la *B23.8, H35.0*
- - Malformation
- - - Capillaire de la *D18.06*
- - - Congénitale de la *Q14.1*
- - Micro-anévrisme diabétique de la *E14.30†, H36.0**
- - Neurorécidive syphilitique de la *A52.1†, H36.8**
- - Occlusion
- - - Artère
- - - - *H34.2*

Rétine *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Occlusion *–suite*
- - - Artère *–suite*
- - - - Centrale de la *H34.1*
- - - Transitoire de l'artère de la *H34.0*
- - Pseudokyste de la *H33.1*
- - Sclérose de la *I70.8†, H36.8**
- - Syndrome de Batten-Kufs de la *E75.4†, H36.8**
- - Syphilis
- - - Congénitale de la *A50.0†, H32.0**
- - - Secondaire précoce de la *A51.4†, H32.0**
- - - Tardive de la *A52.7†, H32.0**
- - Tortuosité des artères de la *Q14.1*
- - Tuberculose de la *A18.5†, H32.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D31.2*
- - - Maligne: *C69.2*
- - Vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la *H33.4*

Rétinien
v.a. rétine

Rétinite
- Albuminurique ¬ *N18.9†, H32.8**
- Bactérienne ¬ Maladie due au VIH avec *B20†, H32.0*, A49.9*
- Candida ¬ Maladie due au VIH avec *B20†, H32.0*, B37.88*
- CMV cytomégalovirus
- - VIH positif ¬ Décollement de la rétine au cours de *B20†, H32.0*, B25.88*
- - ¬ Maladie VIH
- - - *B20†, H32.0*, B25.88*
- - - Récidive de *B20†, H32.0*, B25.88*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, H32.0**
- Disséminée ¬ *H30.1*
- Foyer ¬ *H30.0*
- Herpétique ¬ *B00.5†, H32.0**
- Mycosique ¬ Maladie due au VIH avec *B20†, H32.0*, B49*
- Pigmentaire
- - Déficience intellectuelle-surdité-hypogénitalisme ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬
- - - *H35.5*
- - - Syndrome d'ataxie du cordon postérieur-*G11.1*
- Ponctuée albescente ¬ *H35.5*
- Rénale ¬ *N18.9†, H32.8**
- SAI ¬ *H30.9*
- Syphilitique
- - Centrale récidivante ¬ *A52.7†, H32.0**
- - Congénitale précoce ¬ *A50.0†, H32.0**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, H32.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, H32.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H32.0**

Rétinite *–suite*

- Virale ¬ Maladie due au VIH avec *B20†, H32.0*, B34.9*
- ¬
- - Diabète sucré type
- - - 1 avec *E10.30†, H36.0**
- - - 2 avec *E11.30†, H36.0**
- - Maladie due au VIH avec *B20, H30.9*

Rétinoblastome ¬ *C69.2*

Rétinocérébelleuse de von Hippel-Lindau ¬ Angiomatose *Q85.8*

Rétino-choroïdienne paraveineuse pigmentée ¬ Atrophie *H35.8*

Rétinochoroïdite

- Disséminée ¬ *H30.1*
- Foyer ¬ *H30.0*
- SAI ¬ *H30.9*

Rétinochoroïdopathie type birdshot ¬ *H30.1*

Rétino-hépato-endocrinologique ¬ Syndrome *Q87.8*

Rétinoïdes ¬ Embryopathie aux *Q86.88*

Rétinopathie

- Altérations vasculaires rétiniennes ¬ Autres *H35.0*
- Athéroscléreuse ¬ *I70.8†, H36.8**
- Coats ¬ *H35.0*
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬
- - - - Décollement tractionnel au cours de *E10.30†, H36.0**
- - - - Glaucome de néovascularisation au cours de *E10.30†, H36.0**
- - - 2 ¬
- - - - Décollement tractionnel au cours de *E11.30†, H36.0**
- - - - Glaucome de néovascularisation au cours de *E11.30†, H36.0**
- - ¬
- - - Décollement tractionnel dans la *E14.30†, H36.0**
- - - Diabète sucré type
- - - - 1 avec *E10.30†, H36.0**
- - - - 2 avec *E11.30†, H36.0**
- - - Glaucome de néovascularisation dans la *E14.30†, H36.0**
- Drépanocytaire proliférative ¬ *D57.8†, H36.8**
- Épilepsie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'ostéogenèse imparfaite- *Q87.8*
- Exsudative ¬ *H35.0*
- Fond de l'œil SAI ¬ *H35.0*
- Hypertensive ¬ *H35.0*
- Prématuré ¬ *H35.1*
- Prématurité ¬ *H35.1*
- Proliférantes ¬ Autres *H35.2*
- SAI ¬ *H35.0*
- Sclérotique ¬ *I70.8†, H36.8**
- Solaire ¬ *H31.0*

Rétinopathie *–suite*

- ¬
- - Diabète sucré avec *E14.30†, H36.0**
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, H35.0*
- - Thalassémie avec *D56.9†, H36.8**

Rétinoschisis

- Juvénile lié à l'X ¬ *Q14.1*
- Kystes rétiniens ¬ *H33.1*

Retour

- Absent ou lent dans le corps) ¬ Blessure de reperfusion (*T88.8*
- Stade connaissance antérieur
- - Lors traumatisme crânio-cérébral ¬ Perte connaissance plus 24 heure
- - - *S06.9, S06.72!*
- - - Sans *S06.9, S06.73!*
- - ¬ Perte connaissance coma lors traumatisme crânio-cérébral Plus 24 heure
- - - *S06.72!*
- - - Sans *S06.73!*
- Veineux
- - Portal anormal ¬ *Q26.5*
- - Pulmonaire
- - - Anormal
- - - - Partiel ¬ *Q26.3*
- - - - Sans précision ¬ *Q26.4*
- - - - Total ¬ *Q26.2*
- - - ¬ Anomalie congénital
- - - - *Q26.4*
- - - - Partielle du *Q26.3*
- - - - Totale du *Q26.2*
- - ¬ Anomalie congénitale du *Q26.8*

Rétractile

- Épaule ¬ Capsulite *M75.0*
- Fibrose pulmonaire ¬ Syndrome de poïkilodermie héréditaire fibrosante-myopathie *Q82.8*
- ¬ Testicule *Q55.2*

Rétraction

- Congénital
- - Mamelons ¬ *Q83.88*
- - Paupières ¬ *Q10.3*
- Duane ¬ Syndrome de *H50.8*
- Gingivale ¬ *K06.0*
- Mamelon ¬ *N64.5*
- Musculaire ischémique] ¬ Syndrome de Volkmann [*T79.60*
- Paupière ¬ Maladie de Basedow avec orbitopathie endocrinienne et *E05.0†, H06.3**
- Tendineuses (gaine) ¬ Autres *M67.1*
- Tuberculeuse des reins ¬ *A18.1†, N29.1**

Retrait gingival (généralisé) (localisé) (post-infectieux) (post-opératoire) ¬ *K06.0*

Rétréci

- SAI entraînant une disproportion ¬ Bassin *O33.1*
- ¬

Rétréci *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Bassin *P03.1*
- - Dystocie due à un bassin généralement *O65.1*
- - Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement *O33.1*

Rétrécissement

- Anus (sphincter) ¬ *K62.4*
- Aortique sous-valvulaire ¬ *Q24.4*
- Artériel congénital(e) ¬ *Q27.8*
- Atrésie du vagin ¬ *N89.5*
- Canal
- - Biliaire, sans calcul ¬ *K83.1*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul ¬ *K82.0*
- - Déférent ¬ *N50.8*
- - Médullaire ¬ *M48.0*
- - Rachidien
- - - Lésion discale ¬ *M99.5*
- - - Subluxation ¬ *M99.2*
- - - Tissu conjonctif ¬ *M99.4*
- - Salivaire ¬ *K11.8*
- Caudal ¬ *M48.0*
- Cavité médiane (bassin) entraînant une disproportion ¬ *O33.3*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.6*
- Conduit auditif externe ¬ *H61.3*
- Congénital
- - Canal lacrymal ¬ Sténose ou *Q10.5*
- - Côlon ¬ occlusion, obstruction et *Q42*
- - Conduit auditif (externe) ¬ Absence, atrésie et *Q16.1*
- - E) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- - Intestin grêle ou de l'intestin SAI ¬ obstruction, occlusion et *Q41*
- - Œsophage ¬ Sténose et *Q39.3*
- - Voies biliaires ¬ Sténose et *Q44.3*
- Cordon spermatique ¬ *N50.8*
- Détroit
- - Inférieur
- - - Bassin) entraînant une disproportion ¬ *O33.3*
- - - Cavité moyenne ¬ Dystocie due à un *O65.3*
- - - ¬ Soins maternels pour disproportion due à un *O33.3*
- - Supérieur
- - - Bassin
- - - - Entraînant une disproportion ¬ *O33.2*
- - - - Maternel ¬ Soins maternels pour disproportion due à un *O33.2*
- - - ¬ Dystocie due à un *O65.2*
- Duodénum ¬ *K31.5*
- Espace intervertébral
- - Ossification et subluxation ¬ *M99.6*
- - Tissu conjonctif et discal ¬ *M99.7*
- Généralisé du champ visuel ¬ *H53.4*

Rétrécissement *–suite*
- Gonorrhéique de la trompe de Fallope ¬ *A54.2†, N74.3**
- Jonction
- - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Méat
- - Auditif osseux ¬ Atrésie ou *Q16.1*
- - Urinaire congénital(e) ¬ *Q64.3*
- Mitral congénital ¬ *Q23.2*
- Œsophage ¬ *K22.2*
- Orifice
- - Vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ *Z91.73*
- - Vésico-urétral congénital(e) ¬ *Q64.3*
- Osseux du canal rachidien ¬ *M99.3*
- Rectum
- - Infection à Chlamydia ¬ *A55†, K93.8**
- - Lymphogranulome vénérien ¬ *A55†, K93.8**
- Rhumatismal valvule
- - Aortique ¬ *I06.0*
- - Mitrale ¬ *I05.0*
- Sténose col
- - Utérus ¬ *N88.2*
- - ¬ Soins maternels pour: *O34.4*
- Syphilitique
- - Artères coronaires NCA ¬ *A52.0†, I52.0**
- - Bronches ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Congénital
- - - Artères coronaires ¬ *A50.5†, I52.0**
- - - Larynx ¬ *A50.5†, J99.8**
- - - Narine ¬ *A50.5†, J99.8**
- - - Œsophage ¬ *A50.5†, K23.8**
- - Larynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Narine ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Œsophage ¬ *A52.7†, K23.8**
- - Rectum ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Rhinopharynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Sphincter rectal ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Trachée ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Urètre ¬ *A52.7†, N37.8**
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.1*
- Tuberculeux
- - Rectum ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Trompe de Fallope ¬ *A18.1†, N74.1**
- Tunique vaginale ¬ *N50.8*
- Urétéral
- - Non classée ailleurs ¬ Hydronéphrose avec *N13.1*
- - Sans hydronéphrose ¬ Coudure et *N13.5*
- - Tuberculeux ¬ *A18.1†, N29.1**

Rétrécissement *–suite*
- Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Urétral
- - Actes médicaux ¬ *N99.1*
- - Post-infectieux, non classé ailleurs ¬ *N35.1*
- - Post-traumatique ¬ *N35.0*
- - Sans précision ¬ *N35.9*
- - Sondage ¬ *N99.1*
- - ¬
- - - *N35*
- - - *N35.8*
- Urètre
- - Congénital(e) ¬ *Q64.3*
- - Séquelle
- - - Accouchement ¬ *N35.0*
- - - Traumatisme ¬ *N35.0*
- Vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- Vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.8*
- Veineux ¬ *I87.1*

Rétripéritonéale idiopathique avec infection du rein ¬ Fibrose *K66.2*

Rétrobulbaire
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Névrite *H48.1**
- - Sclérose en plaques ¬ Névrite *G35.9†, H48.1**
- Méningocoques ¬ Névrite *A39.8†, H48.1**
- SAI ¬ Névrite *H46*
- Syphilitique
- - Tardive ¬ Névrite *A52.1†, H48.1**
- - ¬ Névrite *A52.1†, H48.1**
- ¬ Tissu
- - *C69.6*
- - *D31.6*

Rétro-cæcal ¬ Abcès: *K65.0*

Rétrocochléaire ¬ Surdité *H90.5*

Rétro-cricoïdienne ¬ Tumeur maligne: Région *C13.0*

Rétrocristallinienne ou rétrolentale ¬ Fibroplasie *H35.1*

Rétroflexion de l'utérus ¬ *N85.4*

Rétrognathie (mandibulaire) (maxillaire) ¬ *K07.1*

Rétrograde ¬ Amnésie *R41.2*

Rétrolentale ¬ Fibroplasie rétrocristallinienne ou *H35.1*

Rétromaxillaire fosse canine ¬ Abcès maxillaire
- Indication d'extension *K10.21*
- Sans indication d'extension *K10.20*

Rétromolaire ¬ Tumeur maligne: Région *C06.2*

Rétro-oculaire ¬
- Corps étranger *H05.5*
- Tissu
- - *C69.6*

Rétro-oculaire ¬ *–suite*
- Tissu *–suite*
- - *D31.6*

Rétropéritoine
- Péritoine ¬ Tumeur
- - Bénigne des tissus mous du *D20*
- - Malign
- - - *C48*
- - - Lésion à localisations contiguës du *C48.8*
- - - Secondaire du *C78.6*
- ¬
- - *D17.7*
- - Lésion traumatique: *S36.83*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D20.0*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.3*
- - - Maligne: *C48.0*

Rétropéritonéal
- Ganglions lymphatiques) ¬ Tuberculose (de): *A18.3*
- Idiopathique ¬ Fibrose *K66.2*
- ¬
- - Abcès: *K65.0*
- - Fibrose *K66.2*
- - Hernie: *K45*
- - Métastase ganglionnaire inguinale *C77.8*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace *R93.5*

Rétropharyngé ¬ Abcès parapharyngé et *J39.0*

Rétroplacentaire
- Hémorragie important associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hématome *O45.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hématome *O45.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hématome *O45.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hématome *O45.0*
- SAI ¬ Hématome *O45.9*
- ¬
- - Décollement prématuré du placenta [hématome *O45*
- - Hématome *P02.1*

Retrosa) (non traumatique) ¬ Épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara *M93.0*

Rétroversion utérus
- Gravide ¬ Soins maternels pour: *O34.5*
- ¬ *N85.4*

Rétrovirus
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.3!*
- Non classées ailleurs ¬ Infections à *B33.3*
- SAI ¬ Infection à *B33.3*

Rett ¬ Syndrome de *F84.2*

Réveil ¬ Épilepsie (avec): crises grand mal au *G40.3*

Revenus ¬ Faibles *Z59*

Réversible
- COX ¬ Myopathie mitochondriale avec déficit *G71.3*
- Facteur IIa ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs *D68.35*
- SLEPR) ¬ Syndrome de Leucoencéphalopathie postérieure *G93.6*
- Thrombine ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs *D68.35*
- ¬
- - Pulpite *K04.0*
- - Syndrome
- - - Encéphalopathie postérieure *G93.6*
- - - Vasoconstriction cérébrale *I67.88*

Rêves d'angoisse ¬ *F51.5*

Révolues ¬ Durée grossesse
- 5
- - *O09.0!*
- - 13 semaines *O09.1!*
- 14e semaine à 19 semaines *O09.2!*
- 20e semaine à 25 semaines *O09.3!*
- 26e semaine à 33 semaines *O09.4!*
- 34e semaine à 36 semaines *O09.5!*
- 37e semaine à 41 semaines *O09.6!*
- Plus de 41 semaines *O09.7!*

Reye ¬ Syndrome de *G93.7*

Reynolds ¬ Syndrome de *K74.3, L94.0*

Rh
- Anasarque fœto-placentaire) ¬ Incompatibilité *O36.0*
- Occasion d'une perfusion ou transfusion ¬ Réaction due au facteur *T80.4*
- ¬
- - Anticorps anti-D [*O36.0*
- - Réaction d'incompatibilité *T80.4*
- - Syndrome de déficit *D58.8*

Rhabdomyolyse traumatique ¬ *T79.69*

Rhabdomyosarcome
- Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Vulvo-vaginal ¬ *C57.8*
- ¬ *C49.9*

Rhegmatogène
- Autosomique dominant ¬ Décollement de la rétine *H33.0*
- ¬ Décollement de la rétine *H33.0*

Rhésus du fœtus et du nouveau-né ¬ Iso-immunisation *P55.0*

Rhinite
- Aiguë ¬ *J00*
- Allergique
- - Asthme ¬ *J45.0*
- - Persistante ¬ *J30.3*
- Chronique
- - Atrophique ¬ *J31.0*
- - Granulomateuse ¬ *J31.0*
- - Hypertrophique ¬ *J31.0*

Rhinite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Obstructive ¬ *J31.0*
- - Purulente ¬ *J31.0*
- - SAI ¬ *J31.0*
- - Ulcéreuse ¬ *J31.0*
- - ¬ *J31.0*
- Infectieuse ¬ *J00*
- Pneumocoques ¬ *J00, B95.3!*
- Rhinopharyngite et pharyngite chroniques ¬ *J31*
- Syphilitique
- - Congénitale précoce ¬ *A50.0*
- - Jeune enfant ¬ *A50.0†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**

Rhinocérébrale ¬ Mucormycose *B46.1†, G99.8**

Rhinolithe ¬ *J34.8*

Rhinopathie
- Allergique
- - Pollen ¬ *J30.1*
- - Saisonnières ¬ Autres *J30.2*
- - Sans précision ¬ *J30.4*
- - Vasomotrice ¬ *J30*
- - ¬ Autres *J30.3*
- Vasomotrice ¬ *J30.0*

Rhinopharyngé
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose (de): *A15.8*
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose (de): *A16.8*
- - ¬ Paroi *C11.9*
- Supérieure) (postérieure) du voile du palais ¬ Paroi *C11.3*
- ¬
- - Abcès *J39.1*
- - Diphtérie *A36.1*
- - Myiase *B87.3†, J99.8**
- - Polype (des): *J33.0*

Rhino-pharyngée ¬ Gomme de la région *A52.7†, J99.8**

Rhinopharyngite
- Aiguë [rhume banal] ¬ *J00*
- Chronique ¬ *J31.1*
- Infectieuse SAI ¬ *J00*
- Mutilante ¬ *A66.5*
- Pharyngite chroniques ¬ Rhinite, *J31*
- SAI ¬ *J00*
- Streptocoques ¬ *J00, B95.5!*

Rhinopharynx
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C11.9*
- ¬
- - *T17.2*
- - Atrésie du *Q34.8*

Rhinopharynx *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Kyste du pharynx ou du *J39.2*
- - Œdème du pharynx ou du *J39.2*
- - Plafond du *C11.0*
- - Plancher du *C11.3*
- - Rétrécissement syphilitique du *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D10.6*
- - - Malign
- - - - *C11*
- - - - Lésion à localisations contiguës de *C11.8*
- - - - Paroi
- - - - - Antérieure du *C11.3*
- - - - - Latérale du *C11.2*
- - - - - Postérieure du *C11.1*
- - - - - Supérieure du *C11.0*

Rhinophyma ¬ *L71.1*

Rhinorrhée
- Aiguë ¬ *J00*
- Spasmodique ¬ *J30*

Rhino-sinusienne déformante ¬ Polypose *J33.1*

Rhinosporidose ¬ *B48.1*

Rhinovirus ¬ Bronchite aiguë due à des *J20.6*

Rhizomélique
- Type
- - 1 ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*
- - 2 ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*
- - 3 ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*
- - 5 ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*
- ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*

Rhodesiense ¬
- Infection à Trypanosoma brucei *B56.1*
- Trypanosomiase à Trypanosoma *B56.1*

Rhombencéphalite de Bickerstaff ¬ *G61.0*

Rhombencéphalosynapsis ¬ *Q04.3*

Rhomboidalis ¬ Cutis *L57.2*

Rhumatismal
- Aigu
- - Sans précision ¬ Cardiopathie *I01.9*
- - Subaiguë ¬ Arthrite *I00*
- - ¬
- - - Artérite coronaire *I01.8*
- - - Cardiopathies *I01.8*
- - - Endocardite *I01.1*
- - - Érythème marginé au cours d'une fièvre *I00†, L54.0**
- - - Myocardite *I01.2*
- - - Pancardite *I01.8*
- - - Péricardite
- - - - *I01.0*
- - - Valvulite *I01.1*
- Atteinte cardiaque

Rhumatismal *–suite*
- Atteinte cardiaque *–suite*
- - Tout type classée en I01.- ¬ Chorée: *I02.0*
- - ¬ Chorée *I02.0*
- Chronique ¬
- - Artérite coronaire *I09.8*
- - Médiastino-péricardite *I09.2*
- - Myopéricardite *I09.2*
- - Péricardite *I09.2*
- Congénital ¬
- - Insuffisance valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- - Régurgitation valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- - Sténose valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- - Valvulite (chronique) valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- E ¬ Reflux
- - Aortique *I06.1*
- - Mitral(e) *I05.1*
- Insuffisance
- - Reflux ¬ Sténose aortique *I06.2*
- - ¬ Sténose aortique *I06.2*
- Origine non précisée ¬ Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d'origine *I08.0*
- Pneumonie ¬ Fièvre *I00†, J17.8**
- Précisées ¬ Autres cardiopathies *I09.8*
- SAI ¬
- - Chorée *I02.9*
- - Maladie aortique (valvulaire) *I06.9*
- Sans
- - Atteinte cardiaque ¬ Chorée *I02.9*
- - Précision ¬ Cardiopathie *I09.9*
- Valve
- - Aortique ¬ Sclérose *I06.8*
- - Mitral ¬
- - - Affections non *I34.88*
- - - Sclérose *I05.8*
- Valvule
- - Aortique
- - - Sans précision ¬ Maladie *I06.9*
- - - ¬
- - - - Atteintes non *I35*
- - - - Maladies *I06.8*
- - - - Rétrécissement *I06.0*
- - Mitral
- - - Insuffisance mitrale ¬ Sténose non *I34.80*
- - - Sans précision ¬ Atteinte non *I34.9*
- - - ¬
- - - - Atteinte
- - - - - Non *I34*
- - - - - Non *I34.8*
- - - - Maladies *I05*
- - - - Rétrécissement (*I05.0*
- - - - Sténose non *I34.2*

Rhumatismal *–suite*
- Valvule *–suite*
- - Non précisée ¬ Endocardite *I09.1*
- - Pulmonaire ¬ Maladie *I09.8*
- - Tricuspide
- - - Insuffisance ¬ Sténose non *I36.2*
- - - Sans précision ¬ Atteinte non *I36.9*
- - - ¬
- - - - Atteintes non *I36.8*
- - - - Insuffisance non *I36.1*
- - - - Maladies *I07*
- - - - Sténose non *I36.0*
- ¬
- - Adhérence du péricarde, *I09.2*
- - Artérite à cellules géantes avec polymyalgie *M31.5*
- - Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur *M08.0*
- - Cardiopathies *I09*
- - Cardite
- - - *I09.9*
- - - Aiguë *I01.9*
- - Chorée *I02*
- - Endocardite
- - - Chronique) *I09.1*
- - - Verruqueuse non *M32.1†, I39.8**
- - Insuffisance
- - - Aortique *I06.1*
- - - Cardiaque *I09.9*
- - - Mitrale *I05.1*
- - - Valvule
- - - - Aortique SAI ou de cause précisée, sauf *I35.1*
- - - - Mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf *I34.0*
- - - - Pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf *I37.1*
- - - - Tricuspide
- - - - - *I07.1*
- - - - - Cause précisée, sauf *I36.1*
- - Myocardite *I09.0*
- - Polymyalgie *M35.3*
- - Précis origine
- - - *I07*
- - - *I08*
- - Régurgitation valvule
- - - Aortique SAI ou de cause précisée, sauf *I35.1*
- - - Mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf *I34.0*
- - - Pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf *I37.1*
- - - Tricuspide, de cause précisée, sauf *I36.1*
- - Sténose
- - - Aortique *I06.0*
- - - Valvule) tricuspide (*I07.0*
- - Valvulite (chronique) *I09.1*

Rhumatisme
- Articulaire aigu
- - Atteinte cardiaque ¬ *I01*
- - Sans mention d'atteinte cardiaque ¬ *I00*
- - ¬ Présence d'une insuffisance cardiaque gauche au cours de *I01.8*
- Palindromique ¬ *M12.3*
- Pneumonie ¬ *I00†, J17.8**
- Sans précision ¬ *M79.0*
- Tuberculeux NCA ¬ *A18.0†, M01.19**

Rhumatoïde
- Adéno-splénomégalie et leucopénie ¬ Arthrite *M05.0*
- Atteinte d'autres organes et appareils ¬ Polyarthrite *M05.3†*
- Facteurs anti-nucléaires ¬ Polyarthrite juvénile sans facteur *M08.3*
- Juvénile avec ou sans facteur rhumatismal ¬ Arthrite *M08.0*
- Précisées ¬ Autres polyarthrites *M06.8*
- Sans précision ¬ Polyarthrite *M06.9*
- Schönlein-Henoch] ¬ Purpura: *D69.0*
- Séronégative ¬ Polyarthrite *M06.0*
- Séropositive
- - Chronique ¬
- - - Cardite lors d'arthrite *M05.30†, I52.8**
- - - Endocardite lors d'arthrite *M05.30†, I39.8**
- - - Myocardite lors d'arthrite *M05.30†, I41.8**
- - - Myopathie lors d'arthrite *M05.30†, G73.7**
- - - Polynévrite lors d'arthrite *M05.30†, G63.6**
- - - Vascularite lors d'arthrite *M05.2*
- - Sans précision ¬ Polyarthrite *M05.9*
- - ¬ Polyarthrite
- - - *M05*
- - - *M05.8*
- ¬
- - Arthrite juvénile *M08.99*
- - Atteinte vertébrale au cours de la arthrite *M45*
- - Bursite *M06.2*
- - Cardite *M05.39†, I52.8**
- - Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (associée à la polyarthrite *C91.7*
- - Maladie pulmonaire *M05.19†, J99.0**
- - Myocardite *M05.39†, I41.8**
- - Nodule *M06.3*
- - Polyarthrite
- - - *M06*
- - - Juvénile
- - - - Facteur *M08.00*
- - - - Sans facteur *M08.3*
- - Purpura *D69.0*

Rhume
- Banal ¬
- - Intoxication: Médicaments contre le coryza [*T48.5*

Rhume *–suite*
- Banal ¬ *–suite*
- - Rhinopharyngite aiguë [*J00*
- Foin
- - Asthme ¬ *J45.0*
- - ¬ *J30.1*
- Iodique ¬ *T88.7*

RHYNS ¬ Syndrome *Q87.8*

Riboflavine ¬ Carence en *E53.0*

Ribose-5-phosphate isomérase ¬ Déficit en *E74.8*

Ribosidurie ¬ 5-amino-4-imidazole carboxamide *E79.8*

Ricci
v. Cacchi-Ricci

Rich ¬ Syndrome de Hamman- *J84.1*

Richardson-Olszewski] ¬ Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele- *G23.1*

Riche
- Cellule T
- - Histiocytes ¬ Lymphome à grandes cellules B *C83.3*
- - ¬ Lymphome diffus grand cellule B
- - - *C83.3*
- Lymphocytes ¬ Lymphome Hodgkin
- - Classique) *C81.4*
- - Diffus *C81.4*
- - Nodulaire *C81.4*

Richieri
v. Naguib-Richieri-Costa

Richieri-Costa-da Silva ¬ Syndrome de *Q87.8*

Richieri-Costa-Pereira ¬ Syndrome de *Q87.8*

Richner-Hanhart ¬ Syndrome de *E70.2*

Richter ¬ Syndrome de *C91.1*

Rickettsia
- Akari ¬ Rickettsiose varicelliforme due à *A79.1*
- Australis ¬ Fièvre pourprée due à *A77.3*
- Burnetii [Coxiella burnetii] ¬ Infection à *A78*
- Conorii ¬ Fièvre pourprée à *A77.1*
- Prowazekii ¬ Typhus épidémique à poux dû à *A75.0*
- Rickettsii ¬ Fièvre pourprée à *A77.0*
- Sibirica ¬ Fièvre pourprée due à *A77.2*
- Tsutsugamushi ¬ Typhus à *A75.3*
- Typhi ¬ Typhus à *A75.2*

Rickettsies
- SAI ¬ Infection à *A79.9*
- ¬ Pneumonie à *A79.9†, J17.0**

Rickettsii ¬ Fièvre pourprée à Rickettsia *A77.0*

Rickettsiose
- Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] ¬ *A79.8*
- Sans précision ¬ *A79.9*
- Tiques] ¬ Fièvre pourprée [*A77*
- Varicelliforme due à Rickettsia akari ¬ *A79.1*

Rickettsiose *–suite*
- Vésiculaire [Fièvre de Kew Garden] ¬ *A79.1*
- ¬
- - *A79*
- - Types précisés de *A79.8*

Riedel ¬
- Maladie de *E06.5*
- Thyroïdite (de): *E06.5*

Rieger ¬
- Anomalie de *Q13.8*
- Glaucome lors de syndrome de *Q13.8†, H42.8**
- Syndrome d'Axenfeld- *Q13.8*

Rieger-Axenfeld ¬ Anomalie de *Q13.8*

Rien lesquels aucun diagnostic n est rapporté ¬ Examen
- Général et investigations de sujets ne se plaignant de *Z00*
- Spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de *Z01*

Rifamycines ¬ Intoxication: *T36.6*

Rift ¬ Fièvre de la vallée du *A92.4*

Riggs
v. Hall-Riggs

Rigid spine syndrome ¬ *G71.2*

Rigide ¬ soin maternel
- Périnée *O34.7*
- Plancher pelvien: *O34.8*

Rigidité
- Hymen ¬ *N89.6*
- Musculaire] ¬ Syndrome de l'homme raide [*G25.88*
- Musculature squelettique ¬ *R29.8*

Rigidus ¬ Hallux *M20.2*

Riley
v.a. Bannayan-Riley-Ruvalcaba

Riley-Day] ¬ Dysautonomie familiale [*G90.1*

Rio Bravo ¬ Encéphalite de *A85.8†, G05.1**

Rippling muscle disease ¬ *G71.8*

Risque
- Abus ¬ Intoxication: Psychostimulants présentant un *T43.6*
- Liée à des problèmes sociaux ¬ Grossesse à *Z35.8*
- Non classés ailleurs ¬ Antécédents personnels de facteurs de *Z91*
- Précisés, non classés ailleurs ¬ Antécédents personnels d'autres facteurs de *Z91.8*
- Sans précision ¬ Surveillance de grossesse à haut *Z35.9*
- Tué à tout moment ¬ Modification de la personnalité après: captivité prolongée avec *F62.0*
- Tumeur malign
- - Opération prophylactique
- - - Organes ¬ Opération prophylactique pour facteur de *Z40.08*
- - - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour facteur de *Z40.01*

Risque *–suite*
- Tumeur malign *–suite*
- - Opération prophylactique *–suite*
- - - Sein ¬ Opération prophylactique pour facteur de *Z40.00*
- - ¬ Opération prophylactique pour facteur de *Z40.0*
- Vital chez le nourrisson ¬ Événement aigu constituant un *R06.80*
- ¬
- - Comportement sexuel à *Z72.8*
- - Exposition professionnelle à des facteurs de *Z57*
- - Surveillance grossesse haut
- - - *Z35*
- - - *Z35.8*

Ritscher-Schinzel ¬ Syndrome de *Q87.0*

Ritter von Rittershain] ¬ Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de *L00*

Rittershain
v. Ritter von Rittershain

Rivalité dans la fratrie ¬ *F93.3*

Rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, *D68.35*

River ¬
- Fièvre de la Ross *B33.1*
- Maladie de la Ross *B33.1*

Rivières ¬ Cécité des *B73*

Riziforme intra-articulaire du genou ¬ Corps étranger *M23.4*

Roberts
v.a. Norman-Roberts
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Robertson syphilitique ¬ Signe d'Argyll *A52.1†, H58.0**

Robertsoniennes et équilibrées ¬ translocations et insertions réciproques *Q95*

Robin
v.a. Pierre Robin
- Persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec communication interatriale, séquence de *Q87.8*
- ¬ Syndrome d'extrasystoles ventriculaires avec syncopes-pérodactylie-séquence de *Q87.8*

Robinow
- Silverman-Smith ¬ Syndrome de: *Q87.1*
- ¬ Syndrome de *Q87.1*

Robinson
v. Snyder-Robinson

Rocher (aiguë) (chronique) ¬ Inflammation du *H70.2*

Rocheuses ¬ Fièvre (de): pourprée des Montagnes *A77.0*

Roch-Leri ¬ Lipomatose mésosomatique de *E88.29*

Rocio ¬ Maladie à virus de *A83.6*

Rodenticides ¬ Effet toxique: *T60.4*

Rodríguez ¬ Dysostose acrofaciale type *Q75.4*

Rogers ¬ Syndrome de *Q21.0*

Roifman-Chitayat ¬ Syndrome de *Q87.8*

Rokitansky
v. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Rolandique

- Dyspraxie de la parole ¬ Syndrome d'épilepsie *G40.08, R48.2*
- ¬ Épilepsie *G40.08*

Rolando] ¬ Épilepsie bénigne à pics centro-temporaux [*G40.08*

Rôle

- Sexuel SAI ¬ Trouble du *F64.9*
- Social, non classé ailleurs ¬ Conflit de *Z73*

Rolland-Desbuquois ¬ Dysplasie dyssegmentaire type *Q77.7*

Romano-Ward ¬ Syndrome du QT long type *I49.8*

Romberg
v.a. Parry-Romberg

Rombo ¬ Syndrome de *Q82.8*

Rompu
v. Type de maladie

Rond

- Rétine, sans décollement ¬ Trou *H33.3*
- ¬
- - Ligament de l'utérus (large) (*D28.2*
- - Otosclérose intéressant la: fenêtre *H80.2*
- - Tumeur maligne: Ligament *C57.2*

Ronflement ¬ *R06.5*

ROP ¬ *H35.1*

ROR ¬

- Déficit immunitaire primaire avec infection virale disséminée post-vaccination *D84.8, T88.0*
- Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [*Z27.4*

Rosacée

- Sans précision ¬ Acné *L71.9*
- ¬
- - Acné *L71*
- - Blépharite au cours d'acné *L71.8†, H03.8**
- - Blépharo-conjonctivite au cours d'acné *L71.8†, H13.2**
- - Conjonctivite au cours d'acné *L71.9†, H13.2**
- - Formes d'acné *L71.8*
- - Kératite au cours d'acné *L71.8†, H19.3**

Rosaï
v. Destombes-Rosaï-Dorfman

Rosé de Gibert ¬ Pityriasis *L42*

Rosenmüller ¬ Fossette de *C11.2*

Rosenthal ¬

- Déficit en facteur *D68.1*
- Syndrome
- - *D68.1*
- - Melkersson- *G51.2*

Ross River ¬

- Fièvre de la *B33.1*
- Maladie de la *B33.1*

Rotateurs

- Non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des *M75.1*
- ¬
- - Coiffe des *S43.4*
- - Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des *S46.0*
- - Syndrome de la coiffe des *M75.1*

Rotation

- Absente du cæcum et du côlon ¬ *Q43.3*
- Incomplet
- - Cæcum et du côlon ¬ *Q43.3*
- - Tête du fœtus ¬ Dystocie due à une *O64.0*
- Insuffisante du cæcum et du côlon ¬ *Q43.3*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*

Rotatoire ¬ Dystonie cervicale principalement *G24.3*

Rotavirus ¬ Entérite à *A08.0*

Rothmund-Thomson ¬

- Poïkilodermie de *Q82.8*
- Syndrome de *Q82.8*

Rothschild
v. Al Awadi-Raas-Rothschild

Rotor ¬

- Hyperbilirubinémie type *E80.6*
- Syndrome de: *E80.6*

Rott
v. Schilbach-Rott

Rotule

- Absente ¬ Syndrome d'aniridie- *Q87.8*
- Acromicrie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-calvitie-luxation de la *Q87.8*
- Chondromalacique ¬ *M22.4*
- Rudimentaire ¬ *Q74.1*
- Sans autre précision ¬ Maladie de la *M22.9*
- Sinding Larsen] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: pointe de la *M92.4*
- ¬
- - *S82.0*
- - Absence congénitale de la *Q74.1*
- - Fracture de la *S82.0*
- - Lésion
- - - *M22*
- - - *M22.3*
- - Luxation
- - - *S83.0*
- - - Congénitale de la *Q74.1*
- - - Récidivante de la *M22.0*
- - Maladies de la *M22.8*
- - Ostéochondrite juvénile de la *M92.4*
- - Subluxation récidivante de la *M22.1*

Rotulien

- Maladie de Hoffa] ¬ Hypertrophie du coussinet graisseux (*M79.4*
- ¬
- - Ligament *S76.1*
- - Tendinite *M76.5*

Rouge

- Adulte ¬ Aplasie pure des globules *D60.0*
- Cerise ¬ Syndrome myoclonies-taches *E77.1*
- Déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres *G31.81*
- Inférieur ¬ Syndrome du noyau *I66.8†, G46.3**
- Lèvre ¬ Lèvre
- - Inférieure: zone d'application du *C00.1*
- - Supérieure: zone d'application du *C00.0*
- Petites cellules B ¬ Lymphome splénique diffus de la pulpe *C83.0*
- ¬
- - Albinisme oculo-cutané *E70.3*
- - Anémie hémolytique due à un déficit en pyruvate kinase du globule *D55.2*
- - Anomalies des globules *R71*
- - Miliaire *L74.0*

Rougeole

- Complication
- - Intestinales ¬ *B05.4†, K93.8**
- - ¬ *B05.8*
- Encéphalite ¬ *B05.0†, G05.1**
- Méningite ¬ *B05.1†, G02.0**
- Oreillons-rubéole [ROR] ¬ Nécessité d'une vaccination contre *Z27.4*
- SAI ¬ *B05.9*
- Sans complication ¬ *B05.9*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.4*
- ¬
- - *B05*
- - Encéphalomyélite au cours de *B05.0†, G05.1**
- - Kératite au cours de *B05.8†, H19.2**
- - Kératoconjonctivite
- - - Cours de *B05.8†, H19.2**
- - - Interstitielles au cours de *B05.8†, H19.2**
- - Myélite au cours de *B05.0†, G05.1**
- - Otite moyenne au cours de *B05.3†, H67.1**
- - Pneumonie au cours de *B05.2†, J17.1**

Rouget porc ¬

- *A26.0*
- Érythème migrant [*A26.0*

Rougeur

- Excessive ¬ *R23.2*
- Fesses ¬ *L22*
- Persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte ¬ Zone de pression avec *L89.0*

Rougeur *–suite*
- ¬ *R23.2*
Roulant ¬
- Dépendance de longue durée envers un fauteuil *Z99.3*
- Fauteuil *Z46.8*
Rousseur ¬ Taches de *L81.2*
Roussy-Lévy ¬
- Dystasie aréflexique héréditaire de type *G60.0*
- Syndrome de *G60.0*
Routine
- Cours du post-partum ¬ Contrôle de *Z39.2*
- Enfant ¬ Examen de *Z00.1*
- Entretien de la contraception ¬ Examen de *Z30.4*
- Général) ¬ Examen gynécologique (de *Z01.4*
- Limité à un organe donné ¬ examen de *Z01*
- Sous-population définie ¬ Examen général de *Z10*
- ¬
- - Circoncision rituelle et de *Z41.2*
- - Mammographie de *Z01.6*
Rubéole
- Complication
- - Neurologique ¬
- - - *B06.0†, G99.8**
- - ¬ *B06.8*
- Congénital ¬
- - Pneumonie de la *P35.0*
- - Syndrome de *P35.0*
- ROR] ¬ Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons- *Z27.4*
- SAI ¬ *B06.9*
- Sans complication ¬ *B06.9*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.5*
- ¬
- - *B06*
- - Arthrite au cours de la *B06.8†, M01.49**
- - Arthropathie due à la *B06.8†, M01.49**
- - Encéphalite due à *B06.0†, G05.1**
- - Encéphalomyélite au cours de *B06.0†, G05.1**
- - Méningite au cours de *B06.0†, G02.0**
- - Myélite au cours de *B06.0†, G05.1**
- - Pneumonie au cours de *B06.8†, J17.1**
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par: virus de la *O35.3*
- - Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.4*
Rubéoleuse ¬
- Méningo-encéphalite *B06.0†, G05.1**
- Panencéphalite *B06.0†, G05.1**
Rubéolique ¬ Embryofœtopathie *P35.0*
Rubéose
- Diabétique ¬ *E14.60†, L99.8**
Rubéose *–suite*
- Iris ¬ *H21.1*
Rubeosis diabetica diabète sucré type
- 1 ¬ *E10.60†, L99.8**
- 2 ¬ *E11.60†, L99.8**
Ruber moniliforme ¬ Lichen *L44.3*
Rubinstein-Taybi ¬ Syndrome de: *Q87.2*
Rubra
- Hebra) ¬ Pityriasis *L26*
- Pilaire ¬ Pityriasis *L44.0*
- Vera ¬ Polycythaemia *D45*
Rubro
v. dentato-rubro-pallido-luysienne
Rudimentaire ¬
- Œil *Q11.2*
- Rotule *Q74.1*
Rues [rage citadine] ¬ Rage des *A82.1*
Ruminations obsédantes au premier plan ¬ Avec idées ou *F42.0*
Rupia
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, L99.8**
- Tertiaire ¬ *A52.7†, L99.8**
Rupture
v.a. perforation
- Anévrisme
- - Aorte abdominale descendante ¬ *I71.3*
- - Artères précérébrales ¬ *I72.5*
- - Artérioscléreux
- - - Cérébral ¬ *I60.7*
- - - Cerveau ¬ *I60.7*
- - Syphilitique de l'artère cérébrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- Aorte
- - Abdominale descendante ¬ *I71.3*
- - SAI ¬ *I71.8*
- Artère ¬ *I77.2*
- Artificielle des membranes ¬ Accouchement retardé après *O75.5*
- Bassinet, non traumatique ¬ *N28.80*
- Calice rénal, non traumatique [rupture de fornix] ¬ *N28.80*
- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.2*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.2*
- Choroïde ¬ Hémorragie et *H31.3*
- Complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique ¬ *M75.1*
- Cordages tendineux
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.4*
- - Non classée ailleurs ¬ *I51.1*
- Cordon ¬ Perte de sang fœtal due à une *P50.1*
- Destruction globe oculaire ¬
- - Brûlure provoquant la *T26.2*
- - Corrosion provoquant la *T26.7*
- Discal ¬
Rupture *–suite*
- Discal ¬ *–suite*
- - Névrite due à une *M51.1†, G55.1**
- - Radiculite
- - - *M51.1†, G55.1**
- - - Cervicale due à une *M50.1†, G55.1**
- Estomac ¬ *K31.88*
- Foie due à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.0*
- Fornix] ¬ Rupture d'un calice rénal, non traumatique [*N28.80*
- Frein de la langue ¬ *S01.54*
- Grossesse extra-utérine ¬ *O00*
- Ligaments au niveau de la cheville et du pied ¬ *S93.2*
- Massive du parenchyme de la rate ¬ *S36.04*
- Mécanique) dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Membrane
- - Descemet ¬ *H18.3*
- - ¬ Oligoamnios, sans mention de *O41.0*
- Muscle papillaire
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.5*
- - Non classée ailleurs ¬ *I51.2*
- Néovessie ¬ *N32.4*
- Oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire ¬ Lacération et *S05.2*
- Œsophage ¬ *K22.3*
- Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.3*
- Péricarde ¬ *I21.9*
- Périnatal
- - Intéressant
- - - Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Légère au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Lèvres au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Peau au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Vulve au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - O70
- - - 0 intéressant
- - - - Muscle
- - - - - Périnée au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.1*
- - - - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.1*
- - - - Plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.1*
- - - 1 intéressant
- - - - Cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.2*
- - - - Sphincter

Rupture *–suite*
- Périnatal *–suite*
- - O70 *–suite*
- - - 1 intéressant *–suite*
- - - - Sphincter *–suite*
- - - - - Anal au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.2*
- - - - - SAI au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.2*
- - - 2 intéressant muqueux
- - - - Anale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.3*
- - - - Rectale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.3*
- Plaie opératoire ¬ *T81.3*
- Prématuré membrane
- - Début travail
- - - 1 à 7 jours ¬ *O42.11*
- - - 24 heures ¬ *O42.0*
- - - Delà de 24 heures ¬ *O42.1*
- - - Plus de 7 jours ¬ *O42.12*
- - Sans précision ¬ *O42.9*
- - Traitement tocolytique
- - - Début travail
- - - - 1 à 7 jours ¬ *O42.21*
- - - - 24 heures ¬ *O42.20*
- - - - Plus de 7 jours ¬ *O42.22*
- - - Sans précision du début du travail ¬ *O42.29*
- - Travail retardé par traitement ¬ *O42.2*
- - ¬
- - - *O42*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par la *P01.1*
- Rate
- - Non traumatique ¬ *D73.5*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P15.1*
- - ¬ Paludisme à Plasmodium vivax avec *B51.0†, D77**
- Rein ¬ *S37.03*
- Spontané
- - Ligament s genou
- - - Ligament
- - - - Capsulaire ¬ Autres *M23.67*
- - - - Croisé
- - - - - Antérieur ¬ Autres *M23.61*
- - - - - Postérieur ¬ Autres *M23.62*
- - - - Externe] ¬ Autres *M23.64*
- - - - Interne ¬ Autres *M23.63*
- - - - Non précisé ¬ Autres *M23.69*
- - - Localisations multiples ¬ Autres *M23.60*
- - - ¬ Autres *M23.6*
- - Non précisée des membranes ¬ Accouchement retardé après *O75.6*
- Suture
- - Césarienne ¬ *O90.0*
- - Déchirure du périnée ¬ *O90.1*

Rupture *–suite*
- Suture *–suite*
- - Épisiotomie ¬ *O90.1*
- - Obstétricale du périnée ¬ *O90.1*
- Syphilitique de l'aorte ¬ *A52.0†, I79.0**
- Tissus périurétraux au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- Totale du parenchyme rénal ¬ *S37.03*
- Traumatique
- - Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Complexe fibrocartilagineux triangulaire ¬ *S63.3*
- - Disque intervertébral
- - - Cervical ¬ *S13.0*
- - - Dorsal ¬ *S23.0*
- - - Lombaire ¬ *S33.0*
- - Ligament
- - - Doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ *S63.4*
- - - Latéral
- - - - Externe du coude ¬ *S53.2*
- - - - Interne du coude ¬ *S53.3*
- - - Poignet et du carpe ¬ *S63.3*
- - - SAI ¬ *T14.3*
- - Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- - Symphyse pubienne ¬ *S33.4*
- - TFCC [Complexe fibrocartilagineux triangulaire] ¬ *S63.3*
- - Tympan ¬ *S09.2*
- - Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Trompe Fallope
- - Grossesse ¬ *O00.1*
- - ¬ *N83.8*
- Utérus
- - Avant le début du travail ¬ *O71.0*
- - Non précisée comme survenant avant le début du travail ¬ *O71.1*
- - Pendant le travail ¬ *O71.1*
- Vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.8*
- Varice
- - Œsophagien ¬ Cirrhose
- - - Alcoolique du foie avec hémorragie par *K70.3†, I98.3**
- - - Foie avec hémorragie par *K74.6†, I98.3**
- - - Toxique du foie avec hémorragie par *K71.7†, I98.3**
- - ¬ *I86.1*
- Vessie
- - Non traumatique ¬ *N32.4*
- - ¬ *S37.22*
- - ¬
- - Anévrisme aortique
- - - Abdominal, sans mention de *I71.4*
- - - Localisation non précisée, sans mention de *I71.9*
- - - Thoracique, sans mention de *I71.2*

Rupture *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anévrisme aortique *–suite*
- - - Thoraco-abdominal(e), sans mention de *I71.6*
- - Appendicite aigu péritonite
- - - Généralisée (diffuse) après perforation ou *K35.2*
- - - Localisé
- - - - Perforation ou *K35.31*
- - - - Sans perforation ni *K35.30*
- - Dissection
- - - Aorte
- - - - Abdominal
- - - - - *I71.06*
- - - - - Sans indication de *I71.02*
- - - - Localisation
- - - - - Non précisée, avec *I71.04*
- - - - - Non précisée, sans indication de *I71.00*
- - - - Thoracique
- - - - - *I71.05*
- - - - - Sans indication de *I71.01*
- - - - Thoraco-abdominal
- - - - - *I71.07*
- - - - - Sans indication de *I71.03*
- - - Artère coronarienne avec *I21.9*

Russe ¬
- Encéphalite de la taïga [encéphalite verno-estivale *A84.0*
- Fièvre hémorragique (de): *A98.5*

Russell
v.a. Silver-Russell
- Silver ¬ Syndrome de: *Q87.1*

Russo-asiatique ¬ Fièvre *A77.2*

Rutherfurd ¬ Syndrome oculo-dentaire de *Q87.8*

Ruvalcaba
v. Bannayan-Riley-Ruvalcaba
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Rythme
- Cardiaque
- - Fœtal ¬
- - - Anomalie du *P20*
- - - Irrégularité du *O68.0*
- - Fœtus
- - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du *O68.2*
- - - ¬ Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du *O68.0*
- - Lent ¬ *R00.1*
- - Non précisées ¬ Anomalies du *R00.8*
- - Rapide ¬ *R00.0*
- - ¬ Anomalies du *R00*
- Circadien ¬ Inversion psychogène du *F51.2*
- Différent de 24h ¬ Syndrome du *G47.2*
- Ectopique ¬ Trouble du *I49.8*

Rythme *–suite*

- Nodal ¬ Trouble du *I49.8*
- Nycthéméral ¬ Inversion psychogène du *F51.2*
- Sinus coronaire ¬ Trouble du *I49.8*
- Sommeil ¬ Inversion psychogène du *F51.2*
- Travail pénible ¬ *Z56*
- Veille sommeil
- - Non dû à une cause organique ¬ Trouble du *F51.2*
- - ¬ Irrégularité du *G47.2*

Sablier
- Congénital ¬ Estomac en *Q40.2*
- Estomac ¬ Contraction en *K31.8*
- Sténose de l'estomac ¬ Estomac en *K31.2*
- Utérus ¬ Contractions: en *O62.4*

Sabre ¬
- Déformation syphilitique du tibia en lame de *A50.5†, M90.26**
- Lésions en coup de *L94.1*

Sac
- Amniotique
- - Membranes ¬ Infection du *O41.1*
- - Unique ¬ Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un *O69.2*
- Conjonctival ¬
- - Brûlure de la cornée et du *T26.1*
- - Corps étranger dans le *T15.1*
- - Corrosion de la cornée et du *T26.6*
- Lacrymal
- - Chronique ¬ Mucocèle du *H04.4*
- - Lacrymonasal ¬ Sténose du: *H04.5*
- - ¬
- - - *C69.5*
- - - *D31.5*

Saccade oculaire ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique récessive- *G11.8*

Saccharase-isomaltase ¬ Déficit
- *E74.3*
- Congénital en *E74.3*

Saccharopine déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.3*

Saccharopinurie ¬ *E72.3*

Saccharose ¬ Intolérance au *E74.3*

Saccharose-isomaltose ¬
- Intolérance congénitale au *E74.3*
- Malabsorption de *E74.3*

Sachs
v. Tay-Sachs

Sack-Barabas ¬ Syndrome de *Q79.6*

Sacks
v. Libman-Sacks

Sacré
- Bassin ¬ Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, *S34.5*
- Hydrocéphalie ¬ Spina bifida *Q05.3*
- Radiculaire ¬ Stimulateur *Z45.80*
- Sans hydrocéphalie ¬ Spina bifida *Q05.8*
- ¬
- - Dystocie due à la persistance en position: occipito- *O64.0*
- - Lésion
- - - Traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et *S34.2*
- - - Zone *M53.3*
- - Région *S31.0*
- - Sinus *L05*
- - Syndrome de fente labiopalatine-surdité-lipome *Q87.8*

Sacré *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tuberculose *A18.0†, M49.08**

Sacro-coccygien
- Abcès ¬ Kyste *L05.0*
- Fœtus
- - Entraînant une disproportion ¬ Tératome *O33.7*
- - ¬ Dystocie due à: tératome *O66.3*
- Myélopathie ¬ Spondylarthrose *M47.18†, G99.2**
- Non classées ailleurs ¬ Atteintes *M53.3*
- ¬ Luxation des articulations sacro-iliaque et *S33.2*

Sacro-iliaque
- Congénital ¬
- - Fusion de l'articulation *Q74.2*
- - Malformation de: articulation *Q74.2*
- Sacro-coccygienne ¬ Luxation des articulations *S33.2*
- ¬
- - Articulation *T84.14*
- - Entorse et foulure de l'articulation *S33.6*
- - Tuberculose de l'articulation *A18.0†, M49.08**

Sacro-iliéite, non classée ailleurs ¬ *M46.1*

Sacrum
- Coccyx ¬ Tumeur bénigne: Bassin, *D16.8*
- Lésion de la moelle épinière ¬ Fracture du *S32.1, S34.18*
- Partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne lombaire et *S32.82*
- ¬
- - *C41.4*
- - *D16.8*
- - Carie tuberculeuse du *A18.0†, M49.08**
- - Fracture du *S32.1*
- - Ostéosarcome du *C41.4*
- - Tuberculose du *A18.0†, M49.08**

S-adénosylhomocystéine hydrolase ¬
- Hyperméthioninémie par déficit en *E72.1*
- Retard psychomoteur par déficit en *E72.1*

Sadisme ¬ *F65.5*

Sado-masochisme ¬ *F65.5*

SADS
- Sudden Adult Death Syndrome] ¬ *R96.0*
- Sudden Arrhythmic Death Syndrome] ¬ *I49.9*

Saethre-Chotzen ¬ Syndrome de *Q87.0*

SAG type 3 forme
- Classique ¬ Déficit en 21-hydroxylase [*E25.00*
- Tardive ¬ Déficit en 21-hydroxylase [*E25.01*

Sagie
v. Ahn-Lerman-Sagie

Saginata ¬ Infection
- Cestodes adultes (Taenia *B68.1*
- Taenia *B68.1*

Sagou ¬ Rate *E85.4†, D77**

Saguenay
v.a. Charlevoix-Saguenay

Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬
- Acidose lactique congénitale type *G31.88*
- Syndrome de Leigh type *G31.88*

Saignement
- Abondant
- - Ménarche ¬ *N92.2*
- - Préménopause ¬ *N92.4*
- Anormal
- - Ménopause ¬ *N95.0*
- - Précisés de l'utérus et du vagin ¬ Autres *N93.8*
- - Utérus vagin
- - - Sans précision ¬ *N93.9*
- - - ¬ Autres *N93*
- Capillaire primitif ¬ *D69.88*
- Dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI ¬ *N93.8*
- Hypopharynx ¬ *R04.1*
- Intermenstruels irréguliers ¬ *N92.1*
- Irréguliers SAI ¬ *N92.6*
- Lors d'un avortement septique ¬ *O06.5, O08.1*
- Nez ¬ *R04.0*
- Ovarien ¬ *N83.8*
- Ovulation ¬ *N92.3*
- Ponctuel complication oculaire diabétique
- - Diabète type
- - - 1 ¬ *E10.30†, H58.8**
- - - 2 ¬ *E11.30†, H58.8**
- - ¬ *E14.30†, H58.8**
- Post-coïtaux et de contact ¬ *N93.0*
- Post-ménopausiques ¬ *N95.0*
- Post-partum ¬ Placenta percreta avec *O43.21, O72.0*
- Procidence
- - Effort spontanément réductible
- - - Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec *K64.2*
- - - ¬ Hémorroïdes (avec *K64.1*
- - Réintroduction manuelle impossible ¬ Hémorroïdes (avec *K64.3*
- Prolongée ¬ Durée de *R79.8*
- Puberté ¬ *N92.2*
- Régulier entre les règles ¬ *N92.3*
- SAI ¬ Hémorroïdes (avec *K64.9*
- Sans
- - Indication du degré ¬ Hémorroïdes (avec *K64.9*
- - Procidence ¬ Hémorroïdes (avec *K64.0*
- Utérin ménopausique anormal ¬ *N95.0*
- Varices gastriques ¬ Cirrhose alcoolique du foie avec *K70.3†, I98.3**
- ¬

Saignement *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Adhérence du placenta en tant que complication de l'accouchement sans *O43.20, O73.0*
- - Angiodysplasie
- - - Côlon
- - - - *K55.22*
- - - - Sans indication de *K55.21*
- - - Estomac duodénum
- - - - *K31.82*
- - - - Sans indication de *K31.81*
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation
- - - - - Abcès et *K57.23*
- - - - - Abcès, sans indication de *K57.22*
- - - - Sans
- - - - - Perforation ni abcès, avec *K57.33*
- - - - - Perforation ni abcès, sans indication de *K57.32*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation et abcès sans indication de *K57.42*
- - - - - Côlon avec perforation, abcès et *K57.43*
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, avec *K57.53*
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.52*
- - - - - Perforation et abcès, sans indication de *K57.02*
- - - - - Perforation, abcès et *K57.03*
- - - - - Sans perforation , abcès ou indication de *K57.12*
- - - - - Sans perforation ni abcès, avec *K57.13*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et abcès, sans indication de *K57.82*
- - - - - Non précisé, avec perforation, abcès et *K57.83*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, avec *K57.93*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.92*
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Perforation
- - - - - Abcès et *K57.21*
- - - - - Abcès, sans indication de *K57.20*
- - - - Sans
- - - - - Perforation ni abcès, avec *K57.31*
- - - - - Perforation ni abcès, sans indication de *K57.30*
- - - Grêle côlon
- - - - Perforation et abcès, sans indication de *K57.40*
- - - - Sans perforation ni abcès, avec *K57.51*

Saignement *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Diverticulose *–suite*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation, abcès et *K57.41*
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.50*
- - - - - Perforation et abcès, sans indication de *K57.00*
- - - - - Perforation, abcès et *K57.01*
- - - - - Sans perforation , abcès ou indication de *K57.10*
- - - - - Sans perforation ni abcès, avec *K57.11*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et abcès, sans indication de *K57.80*
- - - - - Non précisé, avec perforation, abcès et *K57.81*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, avec *K57.91*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.90*
- - Ictère néonatal dû à un *P58.1*
- - Placenta
- - - Accreta sans *O43.20, O73.0*
- - - Adhaerens
- - - - *O43.20, O72.0*
- - - - Sans *O43.20, O73.0*
- - - Increta sans *O43.21, O73.0*
- - - Percreta sans *O43.21, O73.0*
- - Thérapie à long terme avec anticoagulants sans *Z92.1*

Saint-Louis ¬ Encéphalite de *A83.3*

Saisonnier

- Identifié
- - Exception virus grippe aviaire grippe porcine ¬
- - - Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe *J10.8†, G05.1**
- - - Encéphalopathie lors de grippe [Influenza], virus de la grippe *J10.8†, G94.3**
- - - Grippe [Influenza] avec otite, virus de la grippe *J10.8†, H67.1**
- - - Influenza, virus de la grippe *J10.1*
- - - Myocardite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe *J10.8†, I41.1**
- - - Polio-encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe *J10.8†, G05.1**
- - Hors virus grippe aviaire porcine ¬
- - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza *J10.0*
- - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza *J10.8*
- - Sauf virus grippe aviaire porcine ¬
- - - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza *J10.8*

Saisonnier *–suite*

- Identifié *–suite*
- - Sauf virus grippe aviaire porcine ¬ *–suite*
- - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza *J10.1*
- - - Gastroentérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza *J10.8*
- - - Grippe
- - - - Asiatique [influenza], virus d'influenza *J10.1*
- - - - Épidémique [influenza], virus d'influenza *J10.1*
- - - - Influenza
- - - - - Hautement fébrile, virus d'influenza *J10.1*
- - - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza *J10.1*
- - - - - Laryngite, virus d'influenza *J10.1*
- - - - - Pharyngite, virus d'influenza *J10.1*
- - - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza], virus d'influenza *J10.1*
- - - - Vraie [influenza], virus d'influenza *J10.1*
- - - Infection
- - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza *J10.1*
- - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la grippe, virus d'influenza *J10.1*
- - - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza *J10.0*
- - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza *J10.0*
- - ¬
- - - Broncho)pneumopathie grippale, virus d'influenza *J10.0*
- - - Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe *J10.8†, G05.1**
- - - Encéphalopathie grippale à virus d'influenza *J10.8*
- - - Gastroentérite grippale à virus d'influenza *J10.8*
- - - Grippe
- - - - Épanchement pleural grippal à virus d'influenza *J10.1*
- - - - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d'influenza *J10.1*
- - - - Laryngite grippale à virus d'influenza *J10.1*
- - - - Manifestation
- - - - - Respiratoires, virus d'influenza *J10.1*
- - - - - Virus d'influenza *J10.8*
- - - - Pharyngite grippale à virus d'influenza *J10.1*
- - - - Pneumonie, virus d'influenza *J10.0*
- - - - Virus d'influenza *J10.1*
- - - Myocardite (aiguë) grippale à virus d'influenza *J10.8*
- ¬
- - Rhinopathies allergiques *J30.2*
- - Trouble dépressif *F33*

Sakati
v. Sanjad-Sakati

Salaam ¬ Tic de *G40.4*

Salamon ¬ Syndrome de *Q82.8*

Salbutamol ¬ *T48.6*

Saldino-Mainzer ¬ Syndrome de *Q87.5*

Saldino-Noonan ¬ Syndrome des côtes courte-spolydactylie type *Q77.2*

Salicylés ¬ Intoxication: *T39.0*

Salih
v. Bosley-Salih-Alorainy

Salins et osmotiques ¬ Intoxication: Laxatifs *T47.3*

Salivaire
- Accessoire
- - SAI ¬ Glandes *D10.3*
- - Siège non précisé ¬ Glande *C06.9*
- Canal excréteur ¬
- - Calcul des glandes *K11.5*
- - Lithiase des glandes *K11.5*
- Cours d'une réaction à des dépôts d'iode ¬ Inflammation des glandes *K11.2*
- Principale
- - Accessoires ¬ Glandes *D37.0*
- - Non précisées ¬ Tumeur maligne des glandes *C08*
- - SAI ¬ Glande *C08.9*
- - Sans précision ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Glande *D11.9*
- - - Maligne: Glande *C08.9*
- - ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Autres glandes *D11.7*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes *C08.8*
- Sans précision ¬ Maladie des glandes *K11.9*
- Surnuméraires ¬ Glandes ou canaux *Q38.4*
- ¬
- - Abcès des glandes *K11.3*
- - Absence de glandes ou de canaux *Q38.4*
- - Atrésie de glandes ou de canaux *Q38.4*
- - Atrophie des glandes *K11.0*
- - Cancer du sein type glande *C50.9*
- - Carcinome de l'œsophage type glande *C15.9*
- - Fistule
- - - Congénitale des glandes *Q38.4*
- - - Glandes *K11.4*
- - Hypertrophie des glandes *K11.1*
- - Kyste muqueux
- - - Épanchement des glandes *K11.6*
- - - Rétention des glandes *K11.6*
- - Lésion lympho-épithéliale bénigne des glandes *K11.8*
- - Maladie
- - - Glandes *K11.8*
- - - VIH avec maladie des glandes *B23.8, K11.9*

Salivaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Malformations congénitales des glandes et des canaux *Q38.4*
- - Mucocèle des glandes *K11.6*
- - Rétrécissement d'un canal *K11.8*
- - Sténose d'un canal *K11.8*
- - Troubles de la sécrétion *K11.7*
- - Tuberculose des glandes *A18.8†, K93.8**
- - Tumeur épithélial
- - - Bénigne des glandes *D11.9*
- - - Maligne des glandes *C07*

Salive ¬ Résultats anormaux de: *R85*

Salla ¬ Maladie de *E77.8*

Salmonella
- Paratyphi SAI ¬ Infection due à *A01.4*
- Sans précision ¬ Infection à *A02.9*
- Sauf S. typhi et S. paratyphi ¬ infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de *A02*
- Typhi ¬
- - Infection due à *A01.0*
- - Pneumonie à *A01.0†, J17.0**
- ¬
- - Arthrite à *A02.2†, M01.39**
- - Entérite à *A02.0*
- - Infection
- - - *A02*
- - - Congénitale à *P37.8†, B96.2**
- - - Localisée à *A02.2*
- - - Précisées à *A02.8*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle à *A02.2†, N16.0**
- - Méningite à *A02.2†, G01**
- - Ostéomyélite à *A02.2†, M90.29**
- - Pneumonie à *A02.2†, J17.0**
- - Pyélonéphrite à *A02.2†, N16.0**
- - Septicémie à *A02.1*

Salmonellose
- Non typhique invasive ¬ *A02.8*
- Typhoïde ¬ *A01.0*

Salpingite
- Chlamydia ¬ *A56.1†, N74.4**
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N74.3**
- Obstruction de la trompe d'Eustache ¬ *H68*
- Ovarite
- - Aiguës ¬ *N70.0*
- - Chroniques ¬ *N70.1*
- - Sans précision ¬ *N70.9*
- - ¬ *N70*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, N74.2**
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N74.1**
- Vénérienne ¬ *A54.2†, N74.3**

Salpingo-oophorite de la mère pendant la grossesse ¬ Nouveau-né affecté par une *P00.8*

Salpingo-ovarienne ¬ *C57.8*

Salpingo-ovarite
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N74.3**
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N74.1**
- Vénérienne ¬ *A54.2†, N74.3**
- ¬ *N70*

SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [lymphome *C88.4*

Sammito
v. Gurrieri-Sammito-Bellussi

Sanders ¬ Syndrome de *B30.0†, H19.2**

Sandhoff ¬ Maladie de: *E75.0*

Sandifer ¬ Syndrome de *G24.8*

Sandrow
v. Laurin-Sandrow

Sanfilippo (type B) (type C) (type D) ¬ Syndrome de: *E76.2*

Sang
- Anomalies du système immunitaire ¬ Glomérulopathie au cours de maladies du *N08.2**
- Chronique) ¬ Anémie par carence en fer secondaire à une perte de *D50.0*
- Entier
- - Produits du sang ¬ *T45.8*
- - ¬ Donneur de *Z52.00*
- Fœtal
- - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ Perte de *P50.0*
- - Niveau de la section du cordon d'un jumeau ¬ Perte de *P50.5*
- - Origine placentaire ¬ Perte de *P50.2*
- - Rupture du cordon ¬ Perte de *P50.1*
- - Sans précision ¬ Perte de *P50.9*
- - ¬
- - - Anémie congénitale par perte de *P61.3*
- - - Perte
- - - - *P50*
- - - - *P50.8*
- Incompatible ¬ Transfusion de *T80.3*
- Maternel ¬
- - Hématémèse et mélæna néonatals dus à une déglutition de *P78.2*
- - Ictère néonatal dû à une déglutition de *P58.5*
- Occulte dans les selles ¬ *R19.5*
- Organe hématopoïétique
- - Certain
- - - Anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du *O99.1*
- - - Trouble système immunitaire ¬
- - - - Antécédent

Sang *–suite*
- Organe hématopoïétique *–suite*
- - Certain *–suite*
- - - Trouble système immunitaire ¬ *–suite*
- - - - Antécédent *–suite*
- - - - - Familiaux de maladies du *Z83.2*
- - - - - Personnels de maladies du *Z86.2*
- - - - Examen spécial de dépistage de maladies du *Z13.0*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres maladies du *D77**
- - Sans précision ¬ Maladie du *D75.9*
- - ¬ maladie
- - - *D75*
- - - Précisées du *D75.8*
- Sans précision ¬
- - Présence d'une substance non trouvée normalement dans le *R78.9*
- - Résultat anormal des examens chimiques du *R79.9*
- Substances susceptibles d'entraîner une dépendance ¬ Présence dans le *R78.4*
- Troubles du système immunitaire ¬ Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du *N16.2**
- ¬
- - 200
- - - 499 lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par microlitre de *U61.2!*
- - - Lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par microlitre de *U61.3!*
- - 500 lymphocytes T auxiliaires (CD4+) et plus par microlitre de *U61.1!*
- - Arthropathie au cours d'une maladie du *D75.9†, M36.3**
- - Aspiration néonatale de *P24.2*
- - Donneur
- - - *Z52.0*
- - - Composants du *Z52.08*
- - Excès de sel dans le *E87.0*
- - Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du *T37.2*
- - Maladie due au VIH avec maladie du *B23.8, D75.9*
- - Pneumonie due à l'inhalation de *J69.8*
- - Présence
- - - Alcool dans le *R78.0*
- - - Cocaïne dans le *R78.2*
- - - Drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le *R78*
- - - Hallucinogène dans le *R78.3*
- - - Opiacé dans le *R78.1*
- - - Produit stéroïdien dans le *R78.6*
- - - Substance
- - - - Précisées non trouvées normalement dans le *R78.8*
- - - - Psychotrope dans le *R78.5*
- - - Taux
- - - - Anormal de lithium dans le *R78.8*

Sang *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Présence *–suite*
- - - Taux *–suite*
- - - - Anormalement élevé de métaux lourds dans le *R78.7*
- - Recherche d'alcool ou de drogue dans le *Z04.8*
- - Résultat anormal
- - - Examens chimiques du *R79*
- - - Précisés des examens chimiques du *R79.8*
- - Sang ¬ Sang entier et produits du *T45.8*
- - Taux anormal
- - - Gaz du *R79.8*
- - - Minéraux dans le *R79.0*

Sanglant
- Séreuse) ¬ Otite moyenne, aiguë et subaiguë: allergique (muqueuse) (*H65.1*
- ¬
- - Expectorations *R04.2*
- - Otite moyenne, aiguë et subaiguë: *H65.1*

Sanglier ¬ Brucellose du porc et du *A23.2*

Sanglot ¬ Spasme du *R06.88*

Sangsues SAI ¬ Infestation par *B88.3*

Sanguin
- Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: vaisseau *T81.2*
- Durablement acquis ¬ Troubles de la coagulation *U69.11!*
- Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: vaisseau *T81.2*
- Épidural niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S35.80*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S15.80*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S25.80*
- Géantes ¬ Syndrome des plaquettes *D69.1*
- Iliaques ¬ Lésion traumatique des vaisseaux *S35.5*
- Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: vaisseau *T81.2*
- Intercostaux ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S25.5*
- Intracrânien ¬ Blessure d'un vaisseau *S06.8*
- Lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ Réaction à une incompatibilité de groupes *T80.3*
- Niveau
- - Abdomen lombes bassin ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S35.7*
- - - Vaisseau
- - - - *S35*
- - - - *S35.88*

Sanguin *–suite*
- Niveau *–suite*
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S55.7*
- - - Vaisseaux *S55.8*
- - Cheville pied ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S95.7*
- - - Vaisseaux *S95.8*
- - Cou ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S15.7*
- - - Vaisseaux *S15.88*
- - Épaule bras ¬ Lésion
- - - Traumatique
- - - - Multiples vaisseaux *S45.7*
- - - - Vaisseaux *S45.8*
- - - Vaisseaux *S45*
- - Hanche cuisse ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S75.7*
- - - Vaisseaux *S75.8*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S85.7*
- - - Vaisseaux *S85.8*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S65.7*
- - - Vaisseaux *S65.8*
- Non précis
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *T13.4*
- - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *T11.4*
- - Niveau
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S35.9*
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S55.9*
- - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S95.9*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S15.9*
- - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S45.9*
- - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S75.9*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S85.9*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S65.9*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S25.9*
- Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques de vaisseaux *T06.3*
- Poumon ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S25.4*
- Rein ¬ Lésion traumatique des vaisseaux *S35.4*
- S
- - Doigt ¬ Lésion traumatique de vaisseau(x) *S65.5*

Sanguin *–suite*

- S *–suite*
- - Partie du corps non précisée ¬ Lésion traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - Pouce ¬ Lésion traumatique de vaisseau(x) *S65.4*
- - SAI ¬
- - - Anévrisme ou fistule (artérioveineux) traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - - Arrachement de vaisseau(x) *T14.5*
- - - Hématome artériel traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - - Lacération de vaisseau(x) *T14.5*
- - - Lésion traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - - Rupture traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - - Section de vaisseau(x) *T14.5*
- Sans mention de diagnostic ¬ Transfusion *Z51.3*
- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: vaisseau *T81.2*
- Sous-arachnoïdien niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S35.82*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S15.82*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S25.82*
- Sous-dural niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S35.81*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S15.81*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S25.81*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): caillot *O08.2*
- Tête, non classée ailleurs ¬ Lésion traumatique des vaisseaux *S09.0*
- Thorax ¬ lésion traumatique
- - Multiples vaisseaux *S25.7*
- - Vaisseaux *S25.88*
- ¬
- - Dermite (due à): Liponyssoides *B88.0*
- - Embolie obstétrical caillot
- - - *O88.2*
- - - *O88.28*
- - Nævus: *Q82.5*
- - Trouble provisoire de la coagulation *U69.12!*
- - Vaisseau
- - - *C49*
- - - *D21*

Sanitaire au cours d'enquêtes de population ¬ Examen *Z00.8*

Sanjad-Sakati ¬ Syndrome de *Q87.1*

Sans abri ¬ *Z59*

Santavuori
v. Hagberg-Santavuori

Sao Paulo [maculeuse brésilienne] ¬ Fièvre (de): *A77.0*

Saphène

- Externe au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de la veine *S85.4*
- Interne
- - Niveau
- - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique de la veine *S75.2*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique de la veine *S85.3*
- - SAI ¬ Veine *S85.3*

SAPHO ¬ Syndrome *M86.39*

Sapin de Noël ¬ Cataracte en *G71.1†, H28.2**

SAPL [syndrome des antiphospholipides] ¬ *D68.6*

Saponification mésentérique ¬ *K65.8*

Sarcocèle syphilitique

- Congénitale ¬ *A50.5†, N51.1**
- ¬ *A52.7†, N51.1**

Sarcocystose ¬ *A07.8*

Sarcoglycane
v. delta-sarcoglycane
v. gamma-sarcoglycane

Sarcoglycanopathie
v. Alpha-sarcoglycanopathie
v. Bêta-sarcoglycanopathie
v. Delta-sarcoglycanopathie
v. Gamma-sarcoglycanopathie

Sarcoïdose

- Ganglion lymphatique ¬
- - *D86.1*
- - Sarcoïdose des ganglions lymphatiques ¬ Sarcoïdose du poumon avec *D86.2*
- Localisations autres et associées ¬ *D86.8*
- Peau ¬ *D86.3*
- Poumon
- - Sarcoïdose des ganglions lymphatiques ¬ *D86.2*
- - ¬ *D86.0*
- Sans précision ¬ *D86.9*
- ¬
- - *D86.9*
- - Arthrite au cours de *D86.8†, M14.89**
- - Arthropathie de la *D86.8†, M14.89**
- - Cardiomyopathie au cours de *D86.8†, I43.8**
- - Granulomes hépatiques au cours de *D86.8†, K77.8**
- - Iridocyclite de la *D86.8†, H22.1**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *D86.9†, N16.2**
- - Myocardite au cours de *D86.8†, I41.8**
- - Myopathie au cours de *D86.8†, G73.7**
- - Myosite au cours de *D86.8†, M63.39**
- - Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de *D86.8†, G53.2**
- - Pyélonéphrite au cours de *D86.8†, N16.2**

Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcome de Kaposi [*C46*

Sarcomatose cutanée idiopathique ¬ *C46.0*

Sarcome

- Alvéolaire des tissus mous ¬ *C49.9*
- Améloblastique de la mandibule ¬ *C41.1*
- Cellule
- - Claires du rein ¬ *C64*
- - Dendritique
- - - Cellules dendritiques (cellules accessoires) ¬ *C96.4*
- - - Folliculaires ¬ *C96.4*
- - - Interdigitées ¬ *C96.4*
- - Kupffer ¬ *C22.3*
- - Langerhans ¬ *C96.4*
- Embryonnaire indifférencié du foie ¬ *C22.4*
- Épithélioïde ¬ *C49.9*
- Ewing
- - Extrasquelettique ¬ *C49.9*
- - ¬ *C41.9*
- Foie ¬ Autres *C22.4*
- Granulocytaire ¬
- - *C92.3*
- - *C92.30*
- Histiocytaire ¬ *C96.8*
- Histiocytaire-lymphocytaire ¬ *C85.9*
- Hodgkin ¬ *C81.3*
- Immunoblastique
- - Diffus ¬ *C83.3*
- - ¬ Maladie par VIH avec *B21, C83.3*
- Kaposi
- - Ganglions lymphatiques ¬ *C46.3*
- - Organes multiples ¬ *C46.8*
- - Palais ¬ *C46.2*
- - Peau ¬ *C46.0*
- - Sans précision ¬ *C46.9*
- - Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ *C46*
- - Sièges ¬ *C46.7*
- - Tissus mous ¬ *C46.1*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B21, C46.9*
- Lymphocytaire ¬ *C85.9*
- Mastocytaire ¬ *C96.2*
- Mastocytes ¬ *C96.2*
- Myéloïde ¬ *C92.3*
- Neurogène ¬ *C47.9*
- Non différencié du foie ¬ *C22.4*
- Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*
- Osseux ¬ *C41.9*
- Ostéogène ¬ *C41.9*
- Pléomorphe indifférencié ¬ *C49.9*
- Rénal à cellules claires ¬ *C64*
- Synovial ¬ *C49.9*
- Tissus mous ¬ *C49.9*
- ¬ Maladie due au VIH avec *B21*

Sarcopénie ¬ *M62.59*

Sarcosine déshydrogénase ¬ Déficit en complexe *E72.5*

Sarcosinémie ¬ *E72.5*

Sarcosporidiose ¬ *A07.8*

SARM ¬

- Infection à *A49.0, U80.00!*
- Septicémie à *A41.0, U80.00!*

Satoyoshi ¬ Syndrome de *Q87.8*

Saturnina ¬ Encephalitis *T56.0†, G05.8**

Saturnine ¬ Goutte *M10.1*

Saturnisme ¬ *T56.0*

Satyriasis ¬ *F52.7*

Saul-Wilson ¬ Dysplasie ostéodysplasique microcéphalique type *Q87.5*

Sauvage

- Importé ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, virus *A80.1*
- Indigène ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, virus *A80.2*

Savarirayan ¬ Dysplasie mésomélique type *Q78.8*

Savon

- Détergents ¬ Effet toxique de *T55*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- ¬ Intoxication au *T55*

Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson ¬ Syndrome de *Q87.8*

Say-Barber-Miller ¬ Syndrome de *Q87.8*

Say-Meyer ¬ Syndrome de *Q87.0*

Sayre ¬ Syndrome de Kearns et *H49.8*

SCA1 ataxie spinocérébelleuse type

- 1 ¬ [*G11.8*
- 3 ¬ [*G11.8*
- 5 ¬ [*G11.8*
- 7 ¬ [*G11.8*
- 11 ¬ [*G11.8*
- 17 ¬ [*G11.8*
- 18 ¬ [*G11.8*
- 25 ¬ [*G11.8*
- 31 ¬ [*G11.8*
- 32 ¬ [*G11.8*
- 35 ¬ [*G11.8*
- 37 ¬ [*G11.8*

SCA21 ¬ *G11.1*

SCA27 ¬ *G11.1*

SCA28 ¬ *G11.1*

SCAD ¬ Déficit en *E71.3*

SCALP ¬ Syndrome *Q84.8*

Scaphocéphalie

- Familiale type McGillivray ¬ *Q75.0*
- Isolée ¬ *Q75.0*

Scaphoïde

- Main ¬ Fracture de l'os *S62.0*
- Tarse] ¬ Fracture :Os naviculaire du pied[*S92.21*

Scaphoïde *–suite*

- Tarsien [Köhler] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.6*

Scapulaire

- Partie non précisée ¬ Fracture de la ceinture *S42.9*
- SAI ¬
- - Entorse et foulure de la ceinture *S43.7*
- - Luxation de la ceinture *S43.3*
- ¬
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Région *T84.10*
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture *S43.7*
- - Epine *S42.12*
- - Luxation
- - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture *S43*
- - - Parties autres et non précisées de la ceinture *S43.3*
- - Malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture *Q74.0*
- - Névrite *G54.5*
- - Plaie ouverte
- - - Non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture *S41.80*
- - - Parties autres et non précisées de la ceinture *S41.8*
- - Région *T22*

Scapulohuméropéronière progressive ¬ Myopathie distale *G71.0*

Scapulo-iliaque ¬ Dysostose *Q87.5*

Scapulo-péronier neurogénique type Kaeser ¬ Syndrome *G12.1*

Scapulo-péronière

- Bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss] ¬ Dystrophie musculaire: *G71.0*
- Liée à l'X ¬ Dystrophie musculaire *G71.0*
- ¬
- - Amyotrophie spinale (de): forme *G12.1*
- - Dystrophie musculaire: *G71.0*

Scarabiase ¬ *B88.2*

SCARF ¬ Syndrome *Q82.8*

Scarlatine

- Staphylocoques ¬ *A38*
- ¬
- - *A38*
- - Myocardite au cours de *A38†, I41.0**
- - Otite moyenne nécrosante aiguë au cours de *A38†, H67.0**

Scarlatineuse ¬

- Cholangite *A38†, K87.0**
- Méningite *A38†, G01**
- Néphrite *A38†, N29.1**
- Otite *A38†, H67.0**

Scedosporium ¬ Infection à *B48.2*

Schaaf
v. Bosch-Boonstra-Schaaf

Schaap-Taylor-Baraitser ¬ Syndrome de *Q87.8*

SCHAD ¬ Déficit en *E71.3*

Scheie ¬ Syndrome

- *E76.0*
- Hurler- *E76.0*

Scheinker
v. Gerstmann-Straussler-Scheinker

Scherer
v. van Bogaert-Scherer-Epstein

Scheuermann

- Familiale ¬ Cyphose juvénile de *M42.09*
- ¬ Maladie de: *M42.0*

Schilbach-Rott ¬ Syndrome de *Q87.8*

Schilder
v.a. Addison-Schilder

- ¬ Maladie de *G37.0*

Schimke ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Schindler

- Type
- - 1 ¬ Maladie de *E77.1*
- - 2 ¬ Maladie de *E77.1*
- - 3 ¬ Maladie de *E77.1*
- ¬ Maladie de *E77.1*

Schinzel
v. Ritscher-Schinzel

Schinzel-Giedion ¬ Syndrome de *Q87.0*

Schistosoma

- Haematobium [schistosomiase urinaire] ¬ Schistosomiase due à *B65.0*
- Intercalatum ¬ Infection à *B65.8*
- Japonicum ¬ Schistosomiase due à *B65.2*
- Mansoni [schistosomiase intestinale] ¬ Schistosomiase due à *B65.1*
- Mattheei ¬ Infection à *B65.8*
- Mekongi ¬ Infection à *B65.8*

Schistosomiase

- Asiatique ¬ *B65.2*
- Bilharziose] ¬ *B65*
- Intestinal ¬
- - *B65.1*
- - Schistosomiase intestinale] ¬ Schistosomiase due à Schistosoma mansoni [*B65.1*
- Sans précision ¬ *B65.9*
- Schistosoma
- - Haematobium [schistosomiase urinaire] ¬ *B65.0*
- - Japonicum ¬ *B65.2*
- - Mansoni [schistosomiase intestinale] ¬ *B65.1*
- Urinaire ¬
- - *B65.0*
- - Schistosomiase urinaire] ¬ Schistosomiase due à Schistosoma haematobium [*B65.0*
- ¬
- - Calcul urinaire au cours de *B65.0†, N22.0**
- - Formes de *B65.8*

Schistosomiase *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Varice gastrique
- - - Cours de *B65.9†, I98.2**
- - - Indication hémorragie cours
- - - - *B65.9†, I98.3**
Schizencéphalie ¬ *Q04.6*
Schizo-affectif
- SAI ¬ Psychose *F25.9*
- Sans précision ¬ Trouble *F25.9*
- Type
- - Dépressif ¬
- - - Psychose: *F25.1*
- - - Trouble *F25.1*
- - Maniaque ¬
- - - Psychose: *F25.0*
- - - Trouble *F25.0*
- - Mixte ¬ Trouble *F25.2*
- ¬ Autres troubles *F25.8*
Schizoïde
- Enfance ¬ Trouble *F84.5*
- ¬ Personnalité *F60.1*
Schizophrénie
- Aiguë (indifférenciée) ¬ *F23.2*
- Atypique ¬ *F20.3*
- Borderline ¬ *F21*
- Catatonique ¬ *F20.2*
- Cénestopathique ¬ *F20.8*
- Chronique indifférenciée ¬ *F20.5*
- Cyclique ¬ *F25.2*
- Désorganisée ¬ *F20.1*
- Hébéphrénique ¬ *F20.1*
- Indifférenciée ¬ *F20.3*
- Latente ¬ *F21*
- Paranoïde ¬ *F20.0*
- Paraphrénique ¬ *F20.0*
- Pré-psychotique ¬ *F21*
- Prodromique ¬ *F21*
- Pseudo-névrotique ¬ *F21*
- Pseudo-psychopathique ¬ *F21*
- Résiduelle ¬ *F20.5*
- Sans précision ¬ *F20.9*
- Simple ¬ *F20.6*
- ¬
- - *F20*
- - Formes de *F20.8*
Schizophréniforme
- Court durée ¬
- - Psychose *F23.2*
- - Trouble *F23.2*
- Type
- - Dépressif ¬ Psychose: *F25.1*
- - Maniaque ¬ Psychose: *F25.0*
- ¬

Schizophréniforme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Psychose SAI *F20.8*
- - Trouble SAI *F20.8*
Schizophrénique
- Affective mixte ¬ Psychose *F25.2*
- Cours d'une épilepsie ¬ Psychose d'allure *F06.2*
- Latente ¬ Réaction *F21*
- Sans précision ¬
- - Bouffée délirante sans symptômes *F23.0*
- - Psychose cycloïde sans symptômes *F23.0*
- Type affectif ¬ Psychose *F25.9*
- ¬
- - Bouffée délirante avec symptômes *F23.1*
- - Catalepsie *F20.2*
- - Catatonie *F20.2*
- - État résiduel *F20.5*
- - Flexibilité cireuse *F20.2*
- - Psychose cycloïde avec symptômes *F23.1*
- - Réaction *F23.2*
- - Restzustand (*F20.5*
- - Trouble
- - - Délirant organique [d'allure *F06.2*
- - - Psychotique aigu
- - - - Allure *F23.2*
- - - - Polymorphe
- - - - - Sans symptômes *F23.0*
- - - - - Symptômes *F23.1*
Schizotypique ¬
- Personnalité *F21*
- Trouble *F21*
Schlatter] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tubercule tibial [Osgood- *M92.5*
Schmid ¬ Chondrodysplasie métaphysaire type *Q78.5*
Schmidt
v.a. McArdle-Schmidt-Pearson
- ¬
- - Dysplasie spondylo-métaphysaire type *Q77.8*
- - Syndrome de *E31.0*
Schmorl ¬ Nodules de *M51.4*
Schnyder ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*
Schoenlein-Henoch ¬
- Arthropathie au cours de purpura de *D69.0†, M36.4**
- Glomérulonéphrite au cours de purpura de *D69.0†, N08.2**
- Maladie glomérulaire au cours de purpura de *D69.0†, N08.2**
Schönberg ¬ Syndrome d'Albers- *Q78.2*
Schöner
v. Heilmeyer-Schöner
Schönlein-Henoch] ¬ Purpura: rhumatoïde [*D69.0*
Schöpf-Schulz-Passarge ¬ Syndrome de *Q82.8*

Schüller
v. Hand-Schüller-Christian
Schultze] ¬ Acroparesthésie: simple [type *I73.8*
Schulz
v. Schöpf-Schulz-Passarge
Schwannomatose ¬ *Q85.0*
Schwannome
- Bénin ¬ *D36.1*
- Malin ¬ *C47.9*
- Vestibulaire ¬ *D33.3*
Schwartz-Jampel-Aberfeld ¬ Syndrome de *Q78.8*
Schweninger-Buzzi ¬ Anétodermie de *L90.1*
Sciatique
- Déplacement de disque intervertébral ¬ Névrite du nerf *M51.1†, G55.1**
- Discopathie intervertébrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique du nerf *S74.0*
- Poplité
- - Externe
- - - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du nerf *S84.1*
- - - ¬ Lésion du nerf *G57.3*
- - Interne
- - - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du nerf *S84.0*
- - - ¬ Lésion du nerf *G57.4*
- ¬
- - *M54.3*
- - Hernie: *K45*
- - Lésion du nerf *G57.0*
- - Lumbago avec *M54.4*
SCID
- Déficit immunitaire combiné sévère] ¬ *D81.9*
- T-B- ¬ *D81.1*
- T-B+ ¬ *D81.2*
Scintigraphie ¬ résultats anormaux de: *R94*
Scintillant ¬ Scotome *H53.1*
Sclère ¬
- Syphilis tardive de la *A52.7†, H19.0**
- Tuberculose de la *A18.5†, H19.0**
Sclérectasie ¬ *H15.8*
Sclérème du nouveau-né ¬ *P83.0*
Scléreux
- Atrophique ¬ Lichen *L90.0*
- Oblitérante [balanitis xerotica obliterans] ¬ Balanite *N48.0*
- Sans précision ¬ Rein *N26*
- Tuberculeux ¬ Rein *A18.1†, N29.1**
Sclérite
- Épisclérite au cours de maladies classées ailleurs ¬ *H19.0**
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, H19.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.0**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H19.0**
- ¬ *H15.0*

Sclérocornée isolée congénitale ¬ *Q13.3*

Sclérodactylie

- Télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de Raynaud-troubles moteurs œsophagiens- *M34.1*
- ¬ *L94.3*

Sclérodermie

- Circonscrite ¬ *L94.0*
- Linéaire ¬ *L94.1*
- Localisée [morphée] ¬ *L94.0*
- Néonatale ¬ *P83.8*
- Pulmonaire ¬ *M34.8†, J99.1**
- Systémique
- - Cutanée diffuse ¬ *M34.0*
- - ¬ *M34.9*
- ¬
- - *M34.9*
- - Myopathie au cours de *M34.8†, G73.7**

Sclérodermoïde généralisé ¬ Myxœdématose lichéniforme papulaire et *L98.5*

Sclérœdème de Buschke ¬ *M34.8*

Sclérokératite tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.2**

Sclérokystique ¬ Syndrome (de): ovarien *E28.2*

Scléromyxœdème ¬ *L98.5*

Sclérosant

- Cordon postérieur ¬ Syphilis *A52.1†, G32.8**
- Diffuse, sans précision ¬ Glomérulonéphrite *N18.9*
- Héréditaire de Weary ¬ Poïkilodermie *Q82.8*
- IgG4 ¬ Cholangite *K83.0*
- Progressive d'Alpers ¬ Polydystrophie *G31.88*
- Subaiguë ¬ Panencéphalite *A81.1*
- Van Bogaert ¬ Leucoencéphalopathie *A81.1*
- ¬
- - Angiocholite: *K83.0*
- - Cholangite *K83.0*
- - Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents *T46.8*
- - Syndrome de kératose linéaireichtyose congénitale-kératodermie *Q82.8*

Sclérose

- Alcooliques du foie ¬ Fibrose et *K70.2*
- Alzheimer ¬ Démence au cours de *G30.9†, F00.9**
- Artère
- - Coronaires ¬ *I25.1*
- - Périphérique ¬ *I70.29*
- Cérébral
- - Diffus
- - - Familiale ¬ *E75.2*
- - - ¬ *G37.0*
- - Infantile ¬ *E75.2*
- - Lobaire atrophique ¬ Démence au cours de *G31.0†, F02.0**
- - Syphilitique ¬ *A52.1†, G94.8**

Sclérose *–suite*

- Choroïde ¬ *H31.1*
- Concentrique [Baló] ¬ *G37.5*
- Endostéale hypoplasie cérébelleuse ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Foie d'origine cardiaque ¬ *K76.1*
- Hépatique ¬
- - *K74.1*
- - Fibrose hépatique, avec *K74.2*
- Latéral
- - Amyotrophique
- - - Type 4 ¬ *G12.2*
- - - ¬
- - - - *G12.2*
- - - - Maladie de Charcot [*G12.2*
- - - - SLA [*G12.2*
- - Primitive ¬ *G12.2*
- Media ¬ *I70.29*
- Mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux stéroïdes avec *N04.8*
- Mönckeberg
- - Media) ¬ *I70.2*
- - ¬ *I70.29*
- Myélinoclastique diffuse ¬ *G37.0*
- Nodulaire ¬ Lymphome de Hodgkin (classique) avec *C81.1*
- Nucléaire ¬ *H25.1*
- Présénile ¬ Démence au cours de *G30.0†, F00.0**
- Rénale SAI ¬ *N26*
- Rétine ¬ *I70.8†, H36.8**
- Rhumatismal valve
- - Aortique ¬ *I06.8*
- - Mitrale ¬ *I05.8*
- Sphincter vésical ¬ *N32.8*
- Spinale postérieure ¬ *A52.1†, G32.8**
- Systémique
- - Atteinte pulmonaire ¬ *M34.8†, J99.1**
- - Cutané
- - - Diffuse ¬ *M34.0*
- - - Limitée ¬ *M34.1*
- - Médicaments et des produits chimiques ¬ *M34.2*
- - Myopathie ¬ *M34.8†, G73.7**
- - Polyneuropathie ¬ *M34.8†, G63.5**
- - Progressive ¬ *M34.0*
- - Sans précision ¬ *M34.9*
- - ¬
- - - *M34*
- - - Formes de *M34.8*
- Tabique du cordon postérieur ¬ *A52.1†, G32.8**
- Tubéreuse ¬ *Q85.1*

Sclérose en plaques

- Aiguë de Marburg ¬ *G35.9*
- Disséminée ¬ *G35*

Sclérose en plaques *–suite*

- Enfant ¬ *G35.9*
- Généralisée ¬ *G35*
- Moelle épinière ¬ *G35*
- Non précisée ¬ *G35.9*
- Pédiatrique ¬ *G35.9*
- Primaire progressive] ¬ SEP-PP [*G35.20*
- Progressive d'emblée (chronique, progressive primaire) ¬ *G35.2*
- Rémittente
- - Évolution par poussées) ¬ *G35.1*
- - Progressive (chronique, secondairement progressive) ¬ *G35.3*
- SAI ¬ *G35*
- Tronc cérébral ¬ *G35*
- ¬
- - *G35*
- - Démence au cours de *G35.9†, F02.8**
- - Névrite rétrobulbaire au cours de *G35.9†, H48.1**
- - Première manifestation d'une *G35.0*

Sclérostéose ¬ *M85.2*

Sclérotique

- Bleu
- - Néphropathie ¬ Syndrome d'hydrocéphalie- *Q87.8*
- - ¬ *Q13.5*
- Cornée au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de la *H19.8**
- Sans précision ¬ Affection de la *H15.9*
- ¬
- - Affection
- - - *H15*
- - - *H15.8*
- - Atrophie de la *H15.8*
- - Blessure non perforante de la *S05.8*
- - Rétinopathie *I70.8†, H36.8**
- - Tumeur maligne de la *C69.4*

Scolaires

- Sans précision ¬ Trouble du développement des acquisitions *F81.9*
- ¬
- - Mauvais résultats *Z55*
- - Trouble
- - - Développement des acquisitions *F81.8*
- - - Mixte des acquisitions *F81.3*
- - - Spécifiques du développement des acquisitions *F81*

Scolarisation inexistante ou inaccessible ¬ *Z55*

Scolarisés ¬ Examen général en série de: enfants *Z10*

Scoliose

- Adolescent ¬ *M41.1*
- Anomalie dorsale ¬ *M41.3*
- Congénital
- - Malformation osseuse congénitale ¬ *Q76.3*

Scoliose *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Posturale ¬ *Q67.5*
- - SAI ¬ *Q67.5*
- Idiopathique
- - Infantile ¬ *M41.0*
- - ¬ Autres *M41.2*
- Irradiation ¬ *M96.5*
- Juvénile idiopathique ¬ *M41.1*
- Neuromusculaire ¬ *M41.4*
- Sans précision ¬ *M41.9*
- Secondaire ¬ Autres formes de *M41.5*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - *M41*
- - Absence congénitale de vertèbres sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Cyphose congénitale sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Formes de *M41.8*
- - Hémivertèbre [hémispondylie] sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Lordose congénitale sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Malformation
- - - Congénital
- - - - Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - - - Rachis, non associées à une *Q76.4*
- - - Rachis sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Ophtalmoplégie externe progressive et *H49.4*
- - Platyspondylie sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Synostose
- - - Hémivertèbres ou défaut de segmentation avec *Q76.3*
- - - Vertébrale congénitale sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Vertèbre surnuméraire sans précision ou non associée à une *Q76.4*

Scombridés ¬ Intoxication par poissons *T61.1*

Scopolamine ¬ Hypersensibilité aux dérivés de *T88.7*

Scorbut ¬
- *E54*
- Arthrite au cours de *E54†, M14.59**
- Inflammation des alvéoles dentaires au cours de *E54†, K93.8**
- Purpura au cours de *E54†, D77**
- Rachitisme au cours de *E54†, M90.89**

Scorbutique ¬
- Anémie *D53.2*
- Gencive *E54†, K93.8**

Scorpion ¬
- Effet toxique: Venin de *T63.2*

Scorpion ¬ *–suite*
- Envenimation suite à la morsure de *T63.2*

SCOT ¬ Déficit en *E71.3*

Scotome
- Annulaire ¬ *H53.4*
- Arciforme ¬ *H53.4*
- Bjerrum ¬ *H53.4*
- Central
- - Syphilitique ¬ *A52.7†, H58.1**
- - ¬ *H53.4*
- Scintillant ¬ *H53.1*

Scotopique supranormale ¬ Dystrophie des cônes avec réponse *H35.5*

Scott
v.a. Aarskog-Scott
v.a. Hecht-Scott
- ¬ Syndrome
- - *D69.88*
- - Cranio-digital de *Q87.0*

SCPH] ¬ Syndrome cardio-pulmonaire à virus Hanta [*B33.4†, J17.1**

Scrofuloderme ¬ *A18.4*

Scrotal ¬
- Fistule urétro- *N50.8*
- Hernie *K40*
- Kyste *L72.9*
- Langue: *K14.5*
- Prurit *L29.1*
- Testicule *C62.1*
- Varices *I86.1*

Scrotum
- SAI ¬ Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du *Q55.2*
- Testicule
- - Sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du *N50.8*
- - - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du *N50.8*
- - - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du *N50.8*
- - - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du *N50.8*
- - ¬ Plaie ouverte du *S31.3*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Abcès tuberculeux du *A18.1†, N51.8**
- - Affections inflammatoires du *N49.2*
- - Agénésie congénitale du *Q55.2*
- - Éléphantiasis du *I89.05†, N51.8**
- - Fistule tuberculeuse du *A18.1†, N51.8**
- - Herpès du *A60.0†, N51.8**
- - Hypoplasie du (des) testicule(s) et du *Q55.1*
- - Kyste de glande sébacée du *L72.1*
- - Lymphangiectasie du *I89.09†, N51.8**

Scrotum *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Malformations congénitales du (des) testicule(s) et du *Q55.2*
- - Peau
- - - *C63.2*
- - - *D29.4*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, N51.8**
- - Tuberculose du *A18.1†, N51.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D29.4*
- - - Maligne: *C63.2*
- - Ulcère tuberculeux du *A18.1†, N51.8**

Scrub typhus ¬ *A75.3*

SCT [Syndrome de choc toxique] ¬ *A48.3*

SDRA
- Léger chez l'adulte ¬ Syndrome de détresse respiratoire [*J80.01*
- Modéré chez l'adulte ¬ Syndrome de détresse respiratoire [*J80.02*
- Sévère chez l'adulte ¬ Syndrome de détresse respiratoire [*J80.03*
- ¬ Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [*J80.0*

Séance
- Chimiothérapie pour tumeur maligne ¬ *Z51.1*
- Radiothérapie ¬ *Z51.0*

Seau
- Ménisque
- - Externe ¬ Déchirure "en anse de *S83.2*
- - Interne ¬ Déchirure "en anse de *S83.2*
- SAI ¬ Déchirure "en anse de *S83.2*
- ¬ Déchirure ancienne "en anse de *M23.2*

Sébacé
- Linéaire ¬ Syndrome du nævus *Q85.8*
- Scrotum ¬ Kyste de glande *L72.1*
- Sein ¬ Kyste d'un canal de glande *N60.8*
- ¬
- - Abcès de glande *L02.9*
- - Kyste *L72.1*
- - Tumeur
- - - Bénignes de: glandes: *D23*
- - - Maligne des glandes: *C44*

Sébocystomatose ¬ *L72.2*

Séborrhée de la tête ¬ *L21.0*

Séborrhéique
- Infantile ¬ Dermite *L21.1*
- Sans précision ¬ Dermite *L21.9*
- ¬
- - Dermite
- - - *L21*
- - - *L21.8*
- - Eczéma *L21*
- - Kératose *L82*
- - Pemphigus *L10.4*

Séborrhéique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Verrue *L82*

Sec
- Atteinte pulmonaire ¬ Syndrome *M35.0†, J99.1**
- Kératoconjonctivite ¬ Syndrome *M35.0†, H19.3**
- Main et du poignet ¬ Ténosynovite *M70.0*
- Sens du syndrome de Sjögren ¬ Conjonctivite *M35.0†, H13.2**
- Stade IVa de Leriche et Fontaine ¬ Gangrène *I70.25*
- ¬
- - Alvéolite *K10.3*
- - Béribéri: *E51.1*
- - Dégénérescence maculaire liée à l'âge, *H35.31*
- - Dermite avec peau *L85.3*
- - Laryngite: atrophique (*J37.0*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de syndrome *M35.0†, N16.4**
- - Myopathie au cours de syndrome *M35.0†, G73.7**
- - Syndrome des yeux *H04.1*

Sécheresse de la bouche, sans précision ¬ *R68.2*

Seckel ¬ Syndrome
- *Q87.1*

Séclusion pupillaire ¬ *H21.4*

Secondaire
v. Type de maladie

Secours insuffisants ¬ Couverture sociale et *Z59*

Secrétagogues de l'hormone de croissance ¬ Petite taille par déficit en récepteur des *E34.3*

Sécrétant ¬ Paragangliome non *D44.7*

Sécrétion
- Anormal
- - Gastrine ¬ *E16.4*
- - Hormone antidiurétique ¬ Syndrome de *E22.2*
- Ectopique ACTH ¬ Syndrome
- - *E24.3*
- - Cushingoïde de *E24.3*
- Frottis
- - Col de l'utérus ¬ Résultats anormaux de *R87*
- - Vagin ¬ Résultats anormaux de *R87*
- - Vulve ¬ Résultats anormaux de *R87*
- Gastrique
- - S SAI anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ Inhalation du contenu ou de *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ Inhalation du contenu ou de *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Inhalation du contenu ou de *O74.0*
- - ¬ Pneumonie par aspiration (de): *J69.0*

Sécrétion *–suite*
- Hormonale ectopique, non classée ailleurs ¬ *E34.2*
- Nasales ¬ Résultats anormaux de: *R84*
- Niveau d'une plaie ¬ Résultats anormaux de: *R89*
- Pancréatique interne
- - Sans précision ¬ Anomalie de la régulation de la *E16.9*
- - ¬ anomalie
- - - *E16*
- - - Précisées de la *E16.8*
- Prostatiques ¬ Résultats anormaux de: *R86*
- Salivaire ¬ Troubles de la *K11.7*
- ¬ Dépendance (de longue durée) envers: appareils de prise en charge des *Z99.0*

Sécrétoire ¬ Otite moyenne
- *H65.9*
- Chronique: *H65.3*

Section
- Cordon d'un jumeau ¬ Perte de sang fœtal au niveau de la *P50.5*
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- Nerf traumatique SAI ¬ *T14.4*
- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*

Secundum
- Type II) ¬ Perméabilité ou persistance de: ostium *Q21.1*
- ¬
- - Anomalie du septum atrial type ostium *Q21.1*
- - ASD type ostium *Q21.1*

SED type spondylo-cheirodysplasique ¬ *Q79.6*

Sédatif
- Cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre *O89*
- Hypnotiques
- - Antiparkinsoniens ¬ Intoxication par anti-épileptiques, *T42*
- - Sans précision ¬ Intoxication: Anti-épileptiques, *T42.7*
- - ¬
- - - Intoxication: Autres anti-épileptiques, *T42.6*
- - - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F13*
- ¬ Trouble persistant dû aux *F13.7*

Sédimentation
- Anomalies de la viscosité plasmatique ¬ Accélération de la vitesse de *R70*
- ¬ Accélération de la vitesse de *R70.0*

Seegmiller
v. Kelley-Seegmiller

Seemanova
- Type 2 ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬
- - Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*
- - Microcéphalie-microcornée type *Q87.8*

Segawa autosomique
- Dominant ¬ Syndrome de *G24.1*
- Récessif ¬ Syndrome de *G24.1*

Segment
- Inférieur de l'utérus ¬ *C54.0*
- ST [NSTEMI] SAI ¬ Infarctus sans élévation du *I21.4*
- ¬ Maladie de Crohn de l'œsophage et du tractus gastro-intestinal sur plusieurs *K50.82*

Segmentaire
- Focale ¬ Syndrome néphrotique idiopathique cortico-sensible avec glomérulosclérose *N04.1*
- Sein ¬ Nécrose adipeuse (*N64.1*
- Somatique ¬ Dysfonctionnement *M99.0*
- ¬
- - Dysplasie odonto-maxillaire *K00.4*
- - Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux stéroïdes avec hyalinose focale et *N04.1*

Segmentation
- Scoliose ¬ Synostose d'hémivertèbres ou défaut de *Q76.3*
- Vertébrale-anomalies des membres ¬ Syndrome de polydactylie en miroir- *Q87.2*

Sein
- Absence de mamelon ¬ Absence congénitale de *Q83.0*
- Associé à l'accouchement ¬ Abcès du *O91.1*
- Difficile chez le nouveau-né ¬ Alimentation au *P92.5*
- Gestationnelle ou puerpérale ¬ Lymphangite du *O91.2*
- Héréditaire ¬ Cancer du *C50.9, Z80.3*
- Lactation) ¬ Subinvolution du *N64.8*
- Non précisées ¬ Lésions traumatiques superficielles du *S20.1*
- Nouveau-né ¬ Engorgement du *P83.4*
- Ovaire ¬ Syndrome héréditaire de prédisposition au cancer du *C56, C97!, C50.9*
- Parties molles ¬ *D24*
- Peau) (tissu mou) ¬ *D03.5*
- Prothèse ou un implant mammaire ¬ Fibrose capsulaire du *T85.82*
- S) ¬ Absence acquise de *Z90.1*
- Sans précision ¬
- - Affection du *N64.9*
- - Carcinome in situ du *D05.9*
- - Malformation congénitale du *Q83.9*
- - Tumeur maligne: *C50.9*
- Surnuméraire ¬ *Q83.1*
- Tissu conjonctif ¬ *D24*
- Tubéreux ¬

Sein *–suite*
- Tubéreux ¬ *–suite*
- - *Q83.80*
- - *Q83.88*
- Type glande salivaire ¬ Cancer du *C50.9*
- ¬
- - *T21*
- - Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de: *N61*
- - Adénofibrome géant du *D24*
- - Adénofibrose du *N60.2*
- - Affection
- - - *N64*
- - - Inflammatoires du *N61*
- - - Précisées du *N64.8*
- - Anomalie congénitale de la position du *Q83.88*
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne du *Z80.3*
- - - Personnels de tumeur maligne du *Z85.3*
- - Carcinome
- - - In situ
- - - - *D05*
- - - - *D05.7*
- - - Métaplasique du *C50.9*
- - Comédocarcinome non invasif du *D05.1*
- - Contusion du *S20.0*
- - Cytostéatonécrose du *N64.1*
- - Ectopie de tissu du *Q83.88*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur du *Z12.3*
- - Fibrosclérose du *N60.3*
- - Furoncle du *N61*
- - Induration du *N64.5*
- - Kyste
- - - *N60.0*
- - - Canal de glande sébacée du *N60.8*
- - - Solitaire du *N60.0*
- - Lipome du *D17.1*
- - Maladie kystique du *N60.1*
- - Malformations congénitales du *Q83.88*
- - Métaplasie des glandes apocrines du *N60.8*
- - Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du *Z44.3*
- - Nécrose adipeuse (segmentaire) du *N64.1*
- - Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du *Z40.00*
- - Peau
- - - *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Phlébite du *I80.88*

Sein *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plaie ouverte du *S21.0*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R92*
- - Signes et symptômes observés au niveau du *N64.5*
- - Soins de contrôle comprenant une opération plastique du *Z42.1*
- - Tissu conjonctif
- - - *C50*
- - - *D48.6*
- - Tumeur
- - - Bénigne du *D24*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.6*
- - - Malign
- - - - *C50*
- - - - Lésion à localisations contiguës du *C50.8*
- - - - Partie centrale du *C50.1*
- - - - Prolongement axillaire du *C50.6*
- - - - Quadrant
- - - - - Inféro-externe du *C50.5*
- - - - - Inféro-interne du *C50.3*
- - - - - Supéro-externe du *C50.4*
- - - - - Supéro-interne du *C50.2*
- - - - Secondaire du *C79.81*
- - - Phyllode du *D48.6*

Seip
v. Berardinelli-Seip

Seitelberger] ¬ Dystrophie neuroaxonale infantile [maladie de *G31.88*

Séjour et éducation en institution ¬ *Z62*

Sel
- Eau) ¬ Prostration due à la chaleur avec perte de *T67.4*
- Réhydratation orale ¬ *T50.3*
- Sang ¬ Excès de *E87.0*
- ¬
- - Effet toxique: Strychnine et ses *T65.1*
- - Épuisement dû à la chaleur avec perte de *T67.4*
- - Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase classique avec perte de *E25.00*
- - Syndrome adrénogénital avec perte de *E25.0*

Selcen ¬ Dystrophie musculaire type *G71.0*

Sélénium ¬ Carence alimentaire en *E59*

Selle
- Attribuable à la syphilis ¬ Nez en *A50.5*
- Fréquentes ¬ *R19.4*
- Turcique vide ¬ Déficit hypophysaire associé au syndrome de la *E23.0*
- Volumineuses ¬ *R19.5*
- ¬
- - Mucus dans les *R19.5*
- - Sang occulte dans les *R19.5*

Selvagem] ¬ Pemphigus brésilien [fogo *L10.3*

Sémantique ¬ Démence *G31.0†, F02.0**

Semblable à) (classique) ¬ Syndrome de: Morquio (- *E76.2*

Semelaigne
v. Kocher-Debré-Semelaigne

Semialdéhyde déshydrogénase ¬ Retard de développement par déficit en méthylmalonate *E71.1*

Semi-circulaire ¬ Syndrome de déhiscence du canal *H83.8*

Semi-coma [coma vigile] ¬ *R40.1*

Semi-lunaire
- Adulte ¬ Ostéochondrite du *M93.1*
- Kienböck] ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): *M92.2*
- ¬
- - Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.11*
- - Nécrose aseptique du *M92.2*
- - Ostéochondrite du *M92.2*

Séminal
- Prostate
- - SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules *Q55.4*
- - ¬ Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules *Q55.4*
- ¬
- - Affections inflammatoires des vésicules *N49.0*
- - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules *N50.8*
- - Gonorrhée
- - - Aiguë de la vésicule *A54.2†, N51.8**
- - - Chronique de la vésicule *A54.2†, N51.8**
- - - Vésicule *A54.2†, N51.8**
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules *N50.8*
- - Lésion traumatique: vésicule *S37.83*
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules *N50.8*
- - Résultats anormaux de: sperme, liquide *R86*
- - Syphilis tardive de la vésicule *A52.7†, N51.8**
- - Trichomonase de la vésicule *A59.0†, N51.8**
- - Tuberculose des vésicules *A18.1†, N51.8**
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules *N50.8*
- - Vésicule
- - - *C63.7*
- - - *D29.7*

Séminomateuse des testicules ¬ Tumeur germinale non *C62.9*

Séminome testiculaire ¬ *C62.9*

Senear-Usher ¬ Syndrome de *L10.4*

Sénescence sans mention de psychose ¬ *R54*

Sengers ¬ Syndrome de *Q87.8*

Sénile
v. Type de maladie

Senilis ¬ Cutis laxa *L57.4*

Sénilité ¬ *R54*

Senior-Loken ¬ Syndrome de *Q61.5†, H36.8**

Sennetsu

- Ehrlichia sennetsu] ¬ Rickettsiose à Neorickettsia *A79.8*
- ¬ Rickettsiose à Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia *A79.8*

Sens

- Migraine ¬
- - Céphalée unilatérale dans le *G43.9*
- - Hémicrânie dans le *G43.9*
- Syndrome de Sjögren ¬ Conjonctivite sèche au *M35.0†, H13.2**
- ¬
- - Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des *Z86.6*
- - Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des *Z46.2*

Sensation

- Étouffement ¬ *R06.88*
- Perception général
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux *R44.8*
- - ¬ Autres symptômes et signes relatifs aux *R44*
- Piqûre ¬ *R20.2*
- Trop-plein ¬ *R19.88*

Sensenbrenner ¬ Syndrome de *Q87.5*

Sensibilisation ¬ Tests cutanés de diagnostic et de *Z01.5*

Sensibilité

- Cutané
- - Non précisés ¬ Troubles de la *R20.8*
- - ¬ Troubles de la *R20*
- Non cœliaque au gluten ¬ *K90.4*
- Radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie-retard de croissance- *D81.1*
- Variable aux protéases ¬ Prionopathie de *A81.8*

Sensible

- Biotine ¬ Maladie des ganglions de la base *G25.88*
- Diazoxide ¬
- - Hyperinsulinisme diffus *E16.1*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique, forme diffuse *E16.1*
- Glucocorticoïdes ¬ Hypertension *E26.0*
- SAI ¬ Abdomen *R10.4*

Sensible *–suite*

- Stéroïdes associée à une thyroïdite auto-immune ¬ Encéphalopathie *G04.8, E06.3*
- Vitamine B12
- - Type
- - - CblA ¬ Acidurie méthylmalonique *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidémie méthylmalonique *E71.1*
- - ¬
- - - Acidémie méthylmalonique *E71.1*
- - - Acidurie méthylmalonique *E71.1*

Sensitif

- Autonomique type
- - 1 ¬ Neuropathie héréditaire *G60.8*
- - 1B ¬ Neuropathie héréditaire *G60.8*
- - 2 ¬ Neuropathie héréditaire *G60.8*
- - 4 ¬ Neuropathie héréditaire *G60.8*
- - 5 ¬ Neuropathie héréditaire *G60.8*
- - 6 ¬ Neuropathie héréditaire *G60.8*
- - 7 ¬ Neuropathie héréditaire *G60.8*
- - 8 ¬ Neuropathie héréditaire *G60.8*
- Cutané au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S54.3*
- Héréditaire transmission
- - Dominante ¬ Neuropathie *G60.8*
- - Récessive ¬ Neuropathie *G60.8*
- Myélinisées de gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec surdité, déficience intellectuelle et absence de fibres *G60.0*
- Niveau
- - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un nerf cutané *S94.3*
- - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf cutané *S44.5*
- - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un nerf cutané *S74.2*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un nerf cutané *S84.2*
- Paranoïaque ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.0*
- Pur ¬ Syndrome lacunaire *I67.9†, G46.6**
- ¬ Délire de relation des *F22.0*

Sensitivo-motrice axonale aiguë ¬ Neuropathie *G61.0*

Sensoriel

- Dysarthrie-ophtalmoplégie ¬ Syndrome d'ataxie neuropathique *G31.81, H49.4*
- SAI ¬ Surdité (de): *H90.5*
- Spéciales ¬ Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves *R94.1*
- Tardive ¬ Albinisme oculaire avec surdité *E70.3*
- Types I-IV ¬ Neuropathie: héréditaire motrice et *G60.0*
- ¬
- - Anesthésie dissociative et atteintes *F44.6*
- - Extinction *R29.5*
- - Négligence *R29.5*
- - Neuropathie héréditaire motrice et *G60.0*

Sensoriel *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Vessie neurogène: atonique (motrice) (*N31.2*

Sensorimotrice héréditaire] ¬ NSMH [neuropathie *G60.0*

Séparation

- Divorce ¬ Dislocation de la famille par *Z63*
- Enfance ¬ Angoisse de *F93.0*

SEP-PP [Sclérose en plaques primaire progressive] ¬ *G35.20*

Sepsis

- Acutissima hyperergica fulminans ¬ *A39.1†, E35.1**
- Bactérien nouveau-né
- - Sans précision ¬ *P36.9*
- - ¬
- - - *P36*
- - - *P36.8*
- Cathéter spinal de perfusion ¬ *T85.72*
- Clostridium
- - Difficile ¬ *A41.4*
- - Perfringens ¬ *A41.4*
- Colibacilles ¬ *A41.51*
- Fulminant à méningocoques ¬ *A39.2*
- Méningocoques ¬
- - *A39.4*
- - Apoplexie des surrénales due à un *A39.1†, E35.1**
- - Hémorragie des surrénales due à un *A39.1†, E35.1**
- - Syndrome hémorragique surrénalien dû à un *A39.1†, E35.1**
- Nouveau-né
- - Anaérobies ¬ *P36.5*
- - Escherichia coli ¬ *P36.4*
- - Staphylocoque
- - - Dorés ¬ *P36.2*
- - - Sans précision ¬ *P36.3*
- - Streptocoque
- - - Groupe B ¬ *P36.0*
- - - Sans précision ¬ *P36.1*
- Shunt ventriculaire intracrânien ¬ *T85.72*
- Streptocoques ¬ Glomérulonéphrite au cours de *A40.9†, N08.0**
- Trachéostome ¬ *J95.0*
- ¬
- - Glomérulonéphrite au cours de *A41.9†, N08.0**
- - Maladie
- - - Glomérulaire au cours de *A41.9†, N08.0**
- - - Rénale tubulo-interstitielle due à un *A41.9†, N16.0**
- - - VIH avec *B20, A41.9*
- - Pyélonéphrite due à un *A41.9†, N16.0**

Septal

- SAI ¬ Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*

Septal *–suite*
- SAI ¬ Infarctus *–suite*
- - Transmural (aigu): *I21.2*
- ¬ Infarctus
- - Répété (aigu): antéro- *I22.0*
- - Transmural (aigu): antéro- *I21.0*

Septicémie
- Actes médicaux ¬ *T81.4*
- Actinomycosique ¬ *A42.7*
- Candida ¬ *B37.7*
- Charbonneuse ¬ *A22.7*
- Congénitale ¬ *P36*
- Consécutif
- - Injection thérapeutique, perfusion et transfusion ¬ *T80.2*
- - Vaccination ¬ *T88.0*
- Cours du travail ¬ *O75.3*
- Erysipelothrix ¬ *A26.7*
- Escherichia coli [E. coli] ¬ *A41.51*
- Gonococcique(s) ¬ *A54.8*
- Haemophilus influenzae ¬ *A41.3*
- Listérienne ¬ *A32.7*
- Micro-organisme
- - Anaérobies ¬ *A41.4*
- - Gram négatif
- - - SAI ¬ *A41.5*
- - - ¬
- - - - *A41.5*
- - - - *A41.58*
- Pneumocoques ¬ *A40.3*
- Précisées ¬ Autres *A41.8*
- Pseudomonas ¬ *A41.52*
- Puerpérale ¬ *O85*
- Salmonella ¬ *A02.1*
- Sans précision ¬ *A41.9*
- SARM ¬ *A41.0, U80.00!*
- Staphylocoque
- - Coagulase-négatifs ¬ *A41.1*
- - Dorés ¬ *A41.0*
- - Non précisés ¬ *A41.2*
- - Précisés ¬ *A41.1*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *A40.3*
- Streptocoque
- - Groupe
- - - A ¬ *A40.0*
- - - D, et entérocoques ¬ *A40.2*
- - Groupe B ¬ *A40.1*
- - Sans précision ¬ *A40.9*
- - ¬
- - - *A40*
- - - *A40.8*
- Virus de l'herpès ¬ *B00.7*
- ¬
- - *A41*
- - Pneumonie à pneumocoques, avec *J13*

Septicémique ¬
- Mélioïdose: *A24.1*
- Peste *A20.7*

Septicopyohémique survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): septique ou *O08.2*

Septique
v. Type de maladie

Septum
- Ancien communication
- - Interatriale [CIA] ¬ Anomalie acquise du *I51.0*
- - Interauriculaire, auricules ¬ Anomalie acquise du *I51.0*
- - Interventriculaire [CIV] ¬ Anomalie acquise du *I51.0*
- Aortique ¬ Malformation du *Q21.4*
- Atrial type ostium secundum ¬ Anomalie du *Q21.1*
- Atrioventriculaire ¬ Défaut complet du *Q21.2*
- Auriculaire ¬ Anomalie du *Q21.1*
- Cardiaque
- - Acquise ¬ Anomalie d'un *I51.0*
- - ¬ Autres malformations congénitales des *Q21.88*
- Interauriculaire ¬ Anévrisme du *Q21.0*
- Interventriculaire ¬ Anévrisme du *Q21.1*
- Nasal ¬
- - *C30.0*
- - Plaie ouverte du nez: *S01.23*
- - Ulcère variqueux du *I86.88*
- Recto-vaginal
- - Vagin ¬ Endométriose du *N80.4*
- - ¬ *S31.80*
- Urorectal ¬ Succession de malformations du *Q87.8*
- Voies optiques ¬ Dysplasie du *Q04.4*

Séquard
v. Brown-Séquard

Séquelle
- Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus ¬ *I69.4*
- Accouchement ¬ Rétrécissement de l'urètre comme *N35.0*
- Affections inflammatoires du système nerveux central ¬ *G09*
- Avitaminose A ¬ *E64.1*
- Avitaminose C ¬ *E64.2*
- Brûlure corrosion
- - Classées selon leur étendue sur la surface du corps ¬ *T95.4*
- - Gelure
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ *T95.3*
- - - - Supérieur ¬ *T95.2*
- - - Précisées ¬ *T95.8*
- - - Sans précision ¬ *T95.9*
- - - Tête ou du cou ¬ *T95.0*

Séquelle *–suite*
- Brûlure corrosion *–suite*
- - Gelure *–suite*
- - - Tronc ¬ *T95.1*
- - - ¬ *T95*
- Carence nutritionnel
- - Non précisée ¬ *E64.9*
- - ¬ *E64.8*
- Cataracte ¬ *H26.4*
- Causes externes, autres et sans précision ¬ *T98*
- Certaines complications précoces d'un traumatisme ¬ *T98.2*
- Complication
- - Grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ *O94*
- - Soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs ¬ *T98.3*
- Écrasement amputation traumatique membre
- - Inférieur ¬ *T93.6*
- - Supérieur ¬ *T92.6*
- Effet
- - Causes externes, autres et sans précision ¬ *T98.1*
- - Corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel ¬ *T98.0*
- - Toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale ¬ *T97*
- Encéphalite virale ¬ *B94.1*
- Excès d'apport ¬ *E68*
- Fracture
- - Bras et de l'avant-bras ¬ *T92.1*
- - Crâne
- - - Blessure intracrânienne ¬ *T90.2*
- - - Os de la face ¬ *T90.2*
- - Fémur ¬ *T93.1*
- - Membre inférieur ¬ *T93.2*
- - Niveau du poignet et de la main ¬ *T92.2*
- - Rachis ¬ *T91.1*
- - Thorax et du bassin ¬ *T91.2*
- Hémorragie
- - Intracérébrale ¬ *I69.1*
- - Intracrâniennes non traumatiques ¬ *I69.2*
- - Sous-arachnoïdienne ¬ *I69.0*
- Hépatite virale ¬ *B94.2*
- Infarctus cérébral ¬ *I69.3*
- Intoxications par médicaments et substances biologiques ¬ *T96*
- Lèpre ¬ *B92*
- Lésion traumatique
- - Cou tronc
- - - Sans précision ¬ *T91.9*
- - - ¬ *T91*
- - Intracrânienne ¬ *T90.5*
- - Membre
- - - Inférieur

Séquelle *–suite*
- Lésion traumatique *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Inférieur *–suite*
- - - - Sans précision ¬ *T93.9*
- - - - ¬ *T93*
- - - Supérieur
- - - - Sans précision ¬ *T92.9*
- - - - ¬ *T92*
- - Moelle épinière ¬ *T91.3*
- - Muscle tendon membre
- - - Inférieur ¬ *T93.5*
- - - Supérieur ¬ *T92.5*
- - Nerf
- - - Crâniens ¬ *T90.3*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ *T93.4*
- - - - Supérieur ¬ *T92.4*
- - Non précisées selon la partie du corps ¬ *T94.1*
- - Œil et de l'orbite ¬ *T90.4*
- - Organe
- - - Intra-abdominaux et pelviens ¬ *T91.5*
- - - Intrathoraciques ¬ *T91.4*
- - Partie
- - - Corps multiples et non précisées ¬ *T94*
- - - Multiples du corps ¬ *T94.0*
- - Précis
- - - Cou et du tronc ¬ *T91.8*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ *T93.8*
- - - - Supérieur ¬ *T92.8*
- - - Tête ¬ *T90.8*
- - Superficiel
- - - Plaie ouverte du cou et du tronc ¬ *T91.0*
- - - Tête ¬ *T90.0*
- - Tête
- - - Sans précision ¬ *T90.9*
- - - ¬ *T90*
- Luxation entorse foulure membre
- - Inférieur ¬ *T93.3*
- - Supérieur ¬ *T92.3*
- Maladie
- - Cérébrovasculaire
- - - Non précisées ¬ *I69.8*
- - - ¬ *I69*
- - Infectieux parasitaire
- - - Non précisées ¬ *B94*
- - - Précisées ¬ *B94.8*
- - - Sans précision ¬ *B94.9*
- Malnutrition
- - Carences nutritionnelles ¬ *E64*
- - Protéino-énergétique ¬ *E64.0*
- Plaie ouverte
- - Membre

Séquelle *–suite*
- Plaie ouverte *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Inférieur ¬ *T93.0*
- - - Supérieur ¬ *T92.0*
- - Tête ¬ *T90.1*
- Poliomyélite ¬ *B91*
- Rachitisme ¬ *E64.3*
- Relevant
- - Cause obstétrical
- - - Sans précision
- - - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de *O96.9*
- - - - ¬ Mort de *O97.9*
- - - ¬ Mort de *O97*
- - Directement cause obstétrical
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de *O96.0*
- - - ¬ Mort de *O97.0*
- - Indirectement cause obstétrical
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de *O96.1*
- - - ¬ Mort de *O97.1*
- Trachome ¬ *B94.0*
- Traumatisme ¬ Rétrécissement de l'urètre comme *N35.0*
- Tuberculose
- - Génito-urinaire ¬ *B90.1*
- - Organes ¬ *B90.8*
- - Os et des articulations ¬ *B90.2*
- - SAI ¬ *B90.9*
- - Système nerveux central ¬ *B90.0*
- - Voies respiratoires et sans précision ¬ *B90.9*
- - ¬ *B90*

Séquence
- Pierre Robin
- - Malformations cardiaques-pieds bots ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Oligodactylie ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Potter-fente-cardiopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Robin
- - Persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec communication interatriale, *Q87.8*
- - ¬ Syndrome d'extrasystoles ventriculaires avec syncopes-pérodactylie- *Q87.8*

Séquestration pulmonaire (congénitale) ¬ *Q33.2*

Séquestre du maxillaire ¬ *K10.2*

Séquoïa ¬ Maladie due au *J67.8*

Séreux
- Aigu ¬
- - Chorioméningite lymphocytaire *A87.2†, G02.0**
- - Otite moyenne *H65.0*
- Centrale ¬ Choriorétinopathie *H35.7*

Séreux *–suite*
- Chronique ¬ Otite moyenne *H65.2*
- Pancréas ¬ Cystadénocarcinome *C25.9*
- Précisées ¬ Autres affections des bourses *M71.8*
- Rétine ¬ Décollement *H33.2*
- Sans précision ¬ Affections des bourses *M71.9*
- ¬
- - Abcès des bourses *M71.0*
- - Affections des bourses *M71*
- - Bourse
- - - *C49*
- - - *D21*
- - Chorio-encéphalite *A87.2†, G05.1**
- - Chorioméningite *A87.2†, G02.0**
- - Dépôts calciques dans une bourse *M71.4*
- - Kystes des bourses *M71.3*
- - Lymphome primitif des *C83.8*
- - Otite moyenne
- - - *H65.9*
- - - Aiguë et subaiguë: allergique (muqueuse) (sanglante) (*H65.1*
- - Tuberculose des bourses *A18.0†, M73.89**

Série
- Enfants scolarisés ¬ Examen général en *Z10*
- Équipes sportives ¬ Examen général en *Z10*
- Étudiants ¬ Examen général en *Z10*
- Membres des forces armées ¬ Examen général en *Z10*
- Résidents d'établissements institutionnels ¬ Examen général en *Z10*

Sérine ¬
- Maladie neurométabolique par déficit en *E72.8*
- Trouble du métabolisme de la *E72.8*

Sérique
- Homologue) ¬ Hépatite sérique (ictère *B19.9*
- Ictère sérique homologue) ¬ Hépatite *B19.9*
- Sans précision ¬ Anomalie
- - Résultats immunologiques *R76.9*
- - Taux d'un enzyme *R74.9*
- ¬
- - Anomalie
- - - Précisées de résultats immunologiques *R76.8*
- - - Résultats immunologiques *R76*
- - - Taux enzyme
- - - - *R74*
- - - - *R74.8*
- - Éruption *T80.6*
- - Intoxication (par): *T80.6*
- - Maladie *T80.6*
- - Neuropathie *G61.1*
- - Réactions *T80.6*
- - Urticaire *T80.6*

SERKAL ¬ Syndrome *Q87.8*

Sérologie
- Positive ¬ Pian sans signes cliniques, avec *A66.8*
- Syphilitique positive ¬ *A53.0*

Sérologique de la syphilis ¬ Résultats faussement positifs au test *R76.2*

Sérome dû à la poche d'une pompe ¬ *T85.88*

Séromuqueuse ¬ Otite moyenne
- *H65.9*
- Aiguë et subaiguë: *H65.1*
- Chronique: *H65.4*

Séronégative
- Forme polyarticulaire ¬ Arthrite chronique juvénile (*M08.3*
- ¬ Polyarthrite rhumatoïde *M06.0*

Séropositive
- Chronique ¬
- - Cardite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.30†, I52.8**
- - Endocardite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.30†, I39.8**
- - Myocardite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.30†, I41.8**
- - Myopathie lors d'arthrite rhumatoïde *M05.30†, G73.7**
- - Péricardite au cours de polyarthrite *M05.30†, I32.8**
- - Polynévrite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.30†, G63.6**
- - Vascularite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.2*
- Sans précision ¬ Polyarthrite rhumatoïde *M05.9*
- ¬ Polyarthrite rhumatoïde
- - *M05*
- - *M05.8*

Seropositivité au VIH SAI ¬ *Z21*

Sérotoninergique ¬ Syndrome *T88.7*

Serovar icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirose à Leptospira interrogans *A27.0*

Serpent
- Marin ¬ Venin de *T63.0*
- ¬
- - Effet toxique: Venin de *T63.0*
- - Envenimation suite à une morsure de *T63.0*

Serpigineux ¬
- Angiome *L81.7*
- Choroïdite *H30.8*
- Elastome perforant *L87.2*

Serrata ¬ Kyste (de): ora *H33.1*

Serratia marcescens
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.06!*
- - 3MRGN ¬ *U81.26!*
- - 4MRGN ¬ *U81.46!*
- ¬ Pneumonie due à: *J15.6*

Serré ¬
- Anneau hyménal *N89.6*

Serré ¬ *–suite*
- Prépuce: *N47*

Sertoli-Leydig de l'ovaire ¬ Tumeur maligne de *C56*

Sérum
- Acidifié ¬ Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec test de lyse positif dans un *D64.4*
- Antitétanique ¬ Polyneuropathie due au *G61.1, Y59.9!*
- Vaccin ¬ Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.7*
- ¬
- - Choc anaphylactique dû au *T80.5*
- - Intolérance au *T88.1*

Serum prothrombin conversion accelerator] ¬ Déficit en SPCA [*D68.23*

Sésame ¬ Allergie à l'huile de *T78.1*

SETD5 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie faciale par haploinsuffisance de *Q87.0*

Seuil auditif ¬ Modification temporaire du *H93.2*

Sever] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: calcanéum [*M92.6*

Sévère
v. Type de maladie

Sévices
- Infligé
- - Adulte SAI ¬ Effets de *T74.9*
- - Enfant SAI ¬ Effets de *T74.9*
- Physique
- - Infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de possibles *Z61*
- - ¬ *T74.1*
- Psychologiques ¬ *T74.3*
- SAI ¬ *Z91.8*
- Sexuel
- - Infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de possibles *Z61*
- - ¬ *T74.2*

Sevrage
- Alcool ¬ *Z50.2!*
- Enfant de mère toxicomane ¬ Syndrome de *P96.1*
- Lors de dépendance médicamenteuse ¬ Syndromes de *F19.3*
- Néonatal ¬ Syndrome de *P96.1*

Sexe
- Indéterminé, sans précision ¬ *Q56.4*
- ¬ Anémie hypochrome sidéroblastique liée au *D64.0*

Sexualité ¬ conseil relatif
- Attitudes, comportement et orientation en matière de *Z70*
- Comportement ou à l'orientation de tiers en matière de *Z70*

Sexuel
- 46
- - XX

Sexuel *–suite*
- 46 *–suite*
- - XX *–suite*
- - - Origine génétique ¬ Anomalie du développement *Q99.1*
- - - ¬ Anomalie
- - - - Développement *Q56.2*
- - - - Testiculaire du développement *Q99.1*
- - XY déficit
- - - 17
- - - - 20-desmolase testiculaire ¬ Anomalie du développement *E29.1*
- - - - Bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase 3 ¬ Anomalie du développement *E29.1*
- - - Isolé en 17,20-lyase ¬ Anomalie du développement *E29.1*
- Adulte ou l'adolescent, type non transsexuel ¬ Trouble de l'identité *F64.1*
- Allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus *Z04.5*
- Anormal
- - Sauf iso (Xq) ¬ Caryotype 46,X avec chromosome *Q96.2*
- - ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome *Q96.4*
- Autosomique équilibré chez un sujet anormal ¬ Réarrangement *Q95.3*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement *O98.3*
- Égodystonique ¬ Orientation *F66.1*
- Enfance ¬ Trouble de l'identité *F64.2*
- Excessive ¬ Activité *F52.7*
- Féminins ¬ Hématome des organes *N94.8*
- Femme ¬ Trouble de: réponse *F52.2*
- Hyperplasie surrénale chez l'homme ¬ précocité *E25*
- Infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de possibles sévices *Z61*
- Localisations ¬ Infection à Chlamydia transmise par voie *A56.8*
- Manque de plaisir sexuel ¬ Aversion *F52.1*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement *A63*
- - Trouble maladie organique
- - - Sans précision ¬ Dysfonctionnement *F52.9*
- - - ¬ Dysfonctionnement
- - - - *F52*
- - - - *F52.8*
- Orientation ¬ Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement *F66*
- Phénotype
- - Féminin
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des chromosomes *Q97*

Sexuel *–suite*
- Phénotype *–suite*
- - Féminin *–suite*
- - - Sans précision ¬ Anomalie des chromosomes *Q97.9*
- - - ¬ Autres anomalies précisées des chromosomes *Q97.8*
- - Masculin
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des chromosomes *Q98*
- - - Sans précision ¬ Anomalie des chromosomes *Q98.9*
- - - ¬ Autres anomalies précisées des chromosomes *Q98.8*
- Pseudo-hermaphrodisme ¬ Non-différenciation *Q56*
- Relationnel ¬ Problème *F66.2*
- Retardé ¬ Développement *E30.0*
- Risques ¬ Comportement *Z72.8*
- SAI ¬
- - Déviation *F65.9*
- - Trouble du rôle *F64.9*
- Sans précision ¬ Trouble
- - Identité *F64.9*
- - Préférence *F65.9*
- Stroma ¬ Tumeur testiculaire des cordons *C62.9*
- Structure anormale ¬ Homme avec chromosomes *Q98.6*
- ¬
- - Absence ou perte de désir *F52.0*
- - Anhédonie *F52.1*
- - Aversion sexuelle et manque de plaisir *F52.1*
- - Baisse du désir *F52.0*
- - Déficience organique de la puissance *N48.4*
- - Homme avec mosaïque des chromosomes *Q98.7*
- - Infection Chlamydia
- - - Trachomatis transmises par voie *A56*
- - - Transmises par voie *A56*
- - Maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement *A63.8*
- - Méthodes spéciales pour l'exploration de: infections principalement transmises lors des rapports *Z11*
- - Sévices *T74.2*
- - Sujet
- - - Contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement *Z20.2*
- - - Porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement *Z22.4*
- - Syndrome de chondrodysplasie-anomalie du développement *Q87.1*
- - Trouble
- - - Identité *F64.8*
- - - Maturation *F66.0*
- - - Multiples de la préférence *F65.6*

Sexuel *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Trouble *–suite*
- - - Préférence *F65.8*

Sexuellement transmise, sans précision ¬ Maladie *A64*

Sézary ¬
- Lymphome de *C84.1*
- Réticulose de *C84.1*

SFAF ¬ *L50.2*

SFTG] ¬ Fièvre sévère avec syndrome de thrombocytopénie [*A93.8*

SGB ¬ *G61.0*

Shaffer
v. Potocki-Shaffer

Shah-Waardenburg ¬ Syndrome de *Q87.8*

Shalash
v. Temtamy-Shalash

Shapiro ¬ Syndrome de *G90.8*

Sharp] ¬ Maladies associées du tissu conjonctif [Syndrome de *M35.1*

Shashi ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Sheehan ¬ Syndrome de: *E23.0*

Sheffield ¬ Chondrodysplasia punctata type *Q77.3*

Sheldon] ¬ Visage de siffleur [syndrome de Freeman- *Q87.0*

Sheldon-Hall ¬ Syndrome de *Q68.8*

Shiga-Kruse] ¬ Infection à Shigella du groupe A [*A03.0*

Shigella
- Boydii ¬ Shigellose à *A03.2*
- Dysenteriae ¬ Shigellose à *A03.0*
- Flexneri ¬ Shigellose à *A03.1*
- Groupe
- - A [Shiga-Kruse] ¬ Infection à *A03.0*
- - C ¬ Infection à *A03.2*
- - D ¬ Infection à *A03.3*
- Groupe B ¬ Infection à *A03.1*
- Sonnei ¬ Shigellose à *A03.3*

Shigellose
- Sans précision ¬ *A03.9*
- Shigella
- - Boydii ¬ *A03.2*
- - Dysenteriae ¬ *A03.0*
- - Flexneri ¬ *A03.1*
- - Sonnei ¬ *A03.3*
- ¬
- - *A03*
- - *A03.8*

Shirodkar avec ou sans mention de béance du col ¬ Soins maternels pour: opération de *O34.3*

SHML ¬ *D76.3*

Shohat ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

SHORT ¬ Syndrome *Q87.1*

Short-bowel-syndrom ¬ *K91.2*

SHOX ¬ Petite taille associée à *Q87.1*

SHP ¬ *E70.3*

Shprintzen
v. Goldberg-Shprintzen

Shprintzen-Goldberg ¬ Syndrome de *Q87.8*

Shrimpton ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Shulman ¬ Syndrome de *M35.4*

Shunt
- Artérioveineux cérébral ¬ *Q28.21*
- Porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un *Z95.88*
- Vasculaire
- - Intrahépatique acquis ¬ *K76.8*
- - ¬
- - - Infection d'un *T82.7*
- - - Inflammation d'un *T82.7*
- Ventriculaire intracrânien
- - Communication) ¬ Complication mécanique d'un *T85.0*
- - ¬ Sepsis dû à un *T85.72*

Shy-Drager] ¬ Hypotension orthostatique neurogène [syndrome de *G23.8*

Sialadénite à IgG4 ¬ Dacryoadénite et *K11.8*

Sialectasie ¬ *K11.8*

Sialidose
- Dysmorphique infantile ¬ *E77.1*
- Mucolipidose I] ¬ *E77.1*
- Normomorphique ¬ *E77.1*
- Type
- - 1 ¬ *E77.1*
- - 2
- - - Congénitale ¬ *E77.1*
- - - Juvénile ¬ *E77.1*
- - - ¬ *E77.1*

Sialique libre ¬ Maladie de surcharge en acide *E77.8*

Sialoadénite
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, K93.8**
- - ¬ *K11.2*

Sialo-adénopathie SAI ¬ *K11.9*

Sialolithiase ¬ *K11.5*

Sialométaplasie nécrosante ¬ *K11.8*

Sialurie type français ¬ *E77.8*

Sibérie ¬ Typhus à tiques de *A77.2*

Sibirica ¬ Fièvre pourprée due à Rickettsia *A77.2*

SIDA
- ARC] SAI ¬ Complexe relatif au *B24*
- Congénital ¬ *B24*
- Maladies définissant le SIDA) ¬ Présente de maladies indicatrices du *U60.3!*
- SAI ¬ Syndrome d'immunodéficience acquise [*B24*
- ¬
- - Méningite à cryptocoques avec *B20†, G02.0*, B45.9*

SIDA *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies définissant le *U60.3!*
- - Toxoplasmose cérébrale avec *B20†, G05.2*, B58.2*

SIDA-démence ¬ Complexe *B22†, F02.4**

Siderius ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Sidéroblaste
- Couronne ¬ Anémie réfractaire à *D46.1*
- ¬ Anémie réfractaire sans *D46.0*

Sidéroblastique
- Ainsi précisée ¬ Anémie réfractaire non *D46.0*
- Associée à GLRX5 ¬ Anémie *D64.0*
- Autosomique récessive ¬ Anémie *D64.0*
- Héréditaire ¬ Anémie *D64.0*
- Idiopathique acquis ¬ Anémie
- - *D46.1*
- - *D64.3*
- Lié
- - Sexe ¬ Anémie hypochrome *D64.0*
- - X avec ataxie ¬ Anémie *D64.0*
- Primaire acquise ¬ Anémie *D64.3*
- Réagissant à la pyridoxine NCA ¬ Anémie *D64.3*
- SAI ¬ Anémie *D64.3*
- Secondaire
- - Maladie ¬ Anémie *D64.1*
- - Médicaments et des toxines ¬ Anémie *D64.2*
- ¬
- - Anémies *D64.3*
- - Myopathie mitochondriale et anémie *G71.3*

Sidéropénique ¬ Dysphagie *D50.1*

Sidérose
- Bantoue ¬ *E83.1*
- Cornée ¬ Anneau de *H18.0, T90.4*
- Œil ¬ *H44.3*
- Superficielle ¬ *I69.0*
- ¬ *J63.4*

SIDS
- Sudden infant death syndrome], après l'âge d'un an ¬ *R96.0*
- ¬ Sudden infant death syndrome [*R95*

Siemens
v.a. Bloch-Siemens
v.a. Christ-Siemens-Touraine
- ¬
- - Kératose folliculaire spinulosa decalvans de *Q82.8*
- - Keratosis palmoplantaris transgrediens de *Q82.8*

Sifflement ¬ *R06.2*

Siffleur
- Syndrome de Freeman-Sheldon] ¬ Visage de *Q87.0*

Siffleur *–suite*
- ¬ Syndrome de la face du *Q87.0*

Sigmoïde
v.a. recto-sigmoïde
- Côlon pelvien] ¬ *C18.7*
- ¬
- - Adénome du *D12.5*
- - Lésion traumatique du côlon: Côlon *S36.54*
- - Mucosite *K92.8*
- - Tuberculose du côlon *A18.3†, K93.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: Côlon *D12.5*
- - - Maligne: Côlon *C18.7*

Sigmoïdien
v. recto-sigmoïdien

Sigmoïdite
v.a. recto-sigmoïdite
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*

Signe
- Alerte ¬ Dengue
- - *A97.1*
- - Hémorragique
- - - *A97.1*
- - - Sans *A97.0*
- - Sans *A97.0*
- Argyll Robertson syphilitique ¬ *A52.1†, H58.0**
- Arthrite inflammatoire et de maladie tophacée ¬ Hyperuricémie sans *E79.0*
- Biochimiques de détresse fœtale ¬ Travail et accouchement compliqués de *O68.3*
- Cliniques, avec sérologie positive ¬ Pian sans *A66.8*
- Détresse fœtal
- - Échographiques ¬ *O68.8*
- - Électrocardiographiques ¬ *O68.8*
- - ¬ Travail et accouchement compliqués d'autres *O68.8*
- Général
- - Précisés ¬ Autres symptômes et *R68.8*
- - ¬ Autres symptômes et *R68*
- Hypoxie fœtale ¬ Soins maternels pour *O36.3*
- Kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: avec *E42*
- Maladie ¬ Décès sans *R96.1*
- Précis relatif appareil
- - Circulatoire et respiratoire ¬ Autres symptômes et *R09.8*
- - Digestif et à l'abdomen ¬ Autres symptômes et *R19.8*
- Pulmonaires [fièvre de Pontiac] ¬ Maladie des légionnaires, sans *A48.2*
- Relatif
- - Absorption d'aliments et de liquides ¬ Autres symptômes et *R63.8*
- - Appareil
- - - Circulatoire et respiratoire ¬ Autres symptômes et *R09*

Signe *–suite*
- Relatif *–suite*
- - Appareil *–suite*
- - - Digestif et à l'abdomen ¬ Autres symptômes et *R19*
- - - Urinaire
- - - - Non précisés ¬ Symptômes et *R39.8*
- - - - ¬ Autres symptômes et *R39*
- - Apparence et au comportement ¬ Autres symptômes et *R46.8*
- - Fonction cognitif conscience
- - - Non précisés ¬ Symptômes et *R41.8*
- - - ¬ Autres symptômes et *R41*
- - Humeur ¬ Autres symptômes et *R45.8*
- - Sensation perception général
- - - Non précisés ¬ Symptômes et *R44.8*
- - - ¬ Autres symptômes et *R44*
- - Système nerveux ostéo-musculaire
- - - Non précisés ¬ Symptômes et *R29.8*
- - - ¬ Autres symptômes et *R29*
- Symptômes observés au niveau du sein ¬ Autres *N64.5*

Signification indéterminée [GMSI] ¬ Gammapathie monoclonale de *D47.2*

SII-C] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec constipation prédominante [*K58.2*

SII-D] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée prédominante [*K58.1*

SII-M] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec troubles du transit changeants (mixtes) [*K58.3*

Silengo
v. Gardner-Silengo-Wachtel

Silicates ¬ Pneumoconiose due aux *J62.8*

Silice ¬ Pneumoconiose poussière
- *J62*
- *J62.8*

Silicose SAI ¬ *J62.8*

Silicotique (massive) du poumon ¬ fibrose *J62*

Sillon
- Glosso-épiglottique ¬ Tumeur maligne: *C10.0*
- Mentolabial ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre inférieure et le *C44.0*
- Vaginal pendant l'accouchement ¬ Déchirure du *O71.4*

Silver ¬ Syndrome de: Russell- *Q87.1*

Silverman-Handmaker ¬ Dysplasie dyssegmentaire type *Q77.7*

Silverman-Smith ¬ Syndrome de: Robinow- *Q87.1*

Silver-Russell dû à un défaut d'empreinte de la région 11p15 ¬ Syndrome de *Q87.1*

Simiae ¬
- Encéphalite à virus Herpes *B00.4†, G05.1**
- Encéphalomyélite à virus Herpes *B00.4†, G05.1**

Simien
- Type 1 (Virus B) ¬ Encéphalomyélite à herpès *B00.4†*
- ¬ Paludisme à plasmodies *B53.1*

Similaire ¬
- Anencéphalie et malformations *Q00*
- Effet toxique
- - Acides corrosifs et substances *T54.2*
- - Alcalis corrosifs et substances *T54.3*
- Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action *T46.0*

Simmonds ¬ Maladie de *E23.0*

Simons
v.a. Barraquer-Simons
- ¬ Syndrome de *E88.1*

Simosa ¬ Syndrome cranio-facial de *Q87.0*

Simple
v. Type de maladie

Simplex
- Chronique
- - Prurigo ¬ Lichen *L28*
- - Vidal] ¬ Lichen *L28.0*
- Face ¬ Herpes *B00.1*
- Hépatite ¬ Herpès *B00.8†, K77.0**
- Lèvre ¬ Herpes *B00.1*
- Œil ¬ Herpès *B00.5†, H58.8**
- Oreille externe ¬ Herpès *B00.1†, H62.1**
- Paupière ¬ Herpès *B00.5†, H03.1**
- SAI ¬ Infection à herpes *B00.9*
- ¬
- - Infection
- - - Ano-génitale par le virus de l'herpès [herpes *A60*
- - - Congénitale au virus de l'herpès *P35.2*
- - - Virale congénitale herpétique [herpes *P35.2*
- - - Virus de l'herpès [herpes *B00*
- - Keratitis
- - - Arborescens à herpès *B00.5†, H19.1**
- - - Dendritica à herpès *B00.5†, H19.1**
- - - Disciformis à herpès *B00.5†, H19.1**
- - - Interstitialis à herpès *B00.5†, H19.1**
- - Maladie due au VIH avec herpès *B20, B00.9*
- - Otite externe au cours de l'infection due au virus de l'herpès [herpes *B00.1†, H62.1**
- - Ulcus dendriticum de la cornée à herpès *B00.5†, H19.1**
- - Verruca: *B07*

Simpson
v. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson

Simpson-Golabi-Behmel ¬ Syndrome de *Q87.3*

Simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou *F68.1*

Simultanée sans fusion ¬ Perception *H53.3*

Sin Nombre ¬ Maladie virus
- *B33.4†*
- *B33.4†, J17.1**

Sinding Larsen] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: pointe de la rotule [*M92.4*

Sinding-Larsen-Johansson ¬ Maladie de *M92.4*

Sinensis ¬
- Distomatose du foie à Chlonorchis *B66.1†, K77.0**
- Infection à Clonorchis *B66.1*

Singe vert ¬ Maladie du *A98.3*

Singleton-Merten ¬ Syndrome de *Q78.8*

Sino-atrial ¬
- Bloc: *I45.5*
- Bradycardie: *R00.1*

Sino-auriculaire
- SAI ¬ Tachycardie: *R00.0*
- ¬ Bloc: *I45.5*

Sino-veineuse cérébrale ¬ Thrombose *I67.6*

Sinueux
- Choroïde et de la rétine ¬ Hyperornithinémie avec atrophie *E72.4*
- ¬ Dystrophie de la cornée avec filaments *H18.5*

Sinus
- Carotidien (syncope) ¬ Syndrome du *G90.00*
- Caverneux ¬ Anévrysme artérioveineux du *Q28.20*
- Changements de la pression atmosphérique ambiante ¬ Effets sur les *T70.1*
- Coronaire ¬
- - Abouchement de la veine cave supérieure gauche dans l'oreillette gauche par le *Q26.1*
- - Anomalie congénitale du *Q21.1*
- - ASD type *Q21.1*
- - Atrésie du *Q21.1*
- - Malformation du *Q21.1*
- - Sténose du *Q21.1*
- - Trouble du rythme (du): *I49.8*
- Épididyme ¬ Tuberculose du *A18.1†, N51.1**
- Ethmoïdal ¬
- - *S02.1*
- - Polypes du *J33.8*
- - Tumeur maligne: *C31.1*
- Face
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose (de): *A15.8*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose (de): *A16.8*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C31.9*
- - ¬
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - - Abcès
- - - - Aigu(ë), d'un *J01*

Sinus *–suite*
- Face *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Abcès *–suite*
- - - - Chronique) d'un *J32*
- - - Anomalie congénitale de la paroi des *Q30.8*
- - - Empyème
- - - - Aigu(ë), d'un *J01*
- - - - Chronique) d'un *J32*
- - - Infection
- - - - Aigu(ë), d'un *J01*
- - - - Chronique) d'un *J32*
- - - Inflammation aigu(ë), d'un *J01*
- - - Polypes du *J33.8*
- - - Suppuration
- - - - Aigu(ë), d'un *J01*
- - - - Chronique) d'un *J32*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et *D14.0*
- - - - Malign
- - - - - *C31*
- - - - - Lésion à localisations contiguës des *C31.8*
- Frontal ¬
- - *S02.1*
- - Tumeur maligne: *C31.2*
- Mais sans pansinusite ¬ Sinusite
- - Aiguë de plus d'un *J01.8*
- - Chronique) de plus d'un *J32.8*
- Maxillaire ¬
- - Polypes du *J33.8*
- - Tumeur maligne: *C31.0*
- Médian(e) de la face et du cou ¬ *Q18.8*
- Nasal ¬ Corps étranger dans un *T17.0*
- Nez ¬
- - Kyste et mucocèle du nez et des *J34.1*
- - Maladie
- - - Nez ¬ Autres maladies du nez et des *J34*
- - - Précisées du nez et des *J34.8*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Paranasaux ¬ Carcinome épidermoïde des fosses nasales et des *C30.0*
- Pilonidal
- - Abcès ¬ *L05.0*
- - Sans abcès ¬ *L05.9*
- - ¬ *L05*
- Piriforme ¬ Tumeur maligne du *C12*
- Sacré ¬ *L05*
- Sphénoïdal ¬
- - Polypes du *J33.8*
- - Tumeur maligne: *C31.3*
- Valsalva (rompu) ¬ Anévrisme du *Q25.4*
- Veineux
- - Cérébral cours

Sinus *–suite*
- Veineux *–suite*
- - Cérébral cours *–suite*
- - - Grossesse ¬ Thrombose du *O22.5*
- - - Puerpéralité ¬ Thrombose du *O87.3*
- - Intracrânien ¬ Thrombose non pyogène de: *I67.6*
- - Veine intracrânien intrarachidien ¬
- - - Embolie septique des *G08*
- - - Endophlébite septique des *G08*
- - - Phlébite septique des *G08*
- - - Thrombophlébite septique des *G08*
- - - Thrombose septique des *G08*
- - ¬ Malformation du *Q21.1*
- Venosus ¬ CIA type *Q21.1*
- ¬
- - Barotraumatisme des *T70.1*
- - Carcinome épidermoïde des *C31.9*
- - Polypes des *J33.8*

Sinusal
- Adénopathie massive ¬ Histiocytose *D76.3*
- Forme familiale ¬ Maladie du nœud *I49.5*
- Maladie du nœud sinusal] ¬ Syndrome de dysfonctionnement *I49.5*
- SAI ¬ Tachycardie: *R00.0*
- ¬
- - Bradycardie: *R00.1*
- - Syndrome dysfonctionnement
- - - *I49.5*
- - - Sinusal [maladie du nœud *I49.5*

Sinusite
- Aigu
- - Plus d'un sinus mais sans pansinusite ¬ *J01.8*
- - Sans précision ¬ *J01.9*
- - ¬ Autres *J01.8*
- Barotraumatique ¬ *T70.1*
- Chronique
- - Plus d'un sinus mais sans pansinusite ¬ *J32.8*
- - SAI ¬ *J32.9*
- - Sans précision ¬ *J32.9*
- - ¬ Autres *J32.8*
- Ethmoïdal
- - Aiguë ¬ *J01.2*
- - Chronique ¬ *J32.2*
- - SAI ¬ *J32.2*
- Frontal
- - Aiguë ¬ *J01.1*
- - Chronique ¬ *J32.1*
- - SAI ¬ *J32.1*
- Maxillaire
- - Aiguë ¬ *J01.0*
- - Chronique ¬ *J32.0*
- - SAI ¬ *J32.0*
- Sphénoïdal

Sinusite *–suite*
- Sphénoïdal *–suite*
- - Aiguë ¬ *J01.3*
- - Chronique ¬ *J32.3*
- - SAI ¬ *J32.3*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, J99.8**

Siphon carotidien ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du *I60.0*

Sirénomélie ¬ Syndrome de: *Q87.2*

SIRI] ¬ Syndrome inflammatoire de restauration immunitaire [*D89.3*

Siris
v. Coffin-Siris

Sirolimus ¬ Hypersensibilité au *T88.7*

Sirop érable ¬ Maladie
- Menkes I [syndrome du *E71.0*
- Urines à odeur de *E71.0*

SIRS
- Non précisé ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.9!*
- Origine
- - Infectieux
- - - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.1!*
- - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.0!*
- - Non infectieux
- - - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.3!*
- - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.2!*
- ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65!*

Site
- Autosomique fragile ¬ Sujet avec *Q95.5*
- Implantation ¬ Tumeur du *D39.2*

Sitostérolémie ¬ Xanthomatose avec *E78.0*

Situation
- Anormale ¬ Testicule en *Q53.0*
- Familiale ¬ Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la *Z63*
- Parentale atypique ¬ *Z60*
- Psycho social ¬ difficulté lié
- - *Z65*
- - Certaines *Z64*
- Représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des *F62.0*
- Socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: *Z76.2*

Situs
- Ambiguus ¬ *Q89.3*
- Inversus
- - Incomplet ¬ *Q89.3*

Situs *–suite*
- Inversus *–suite*
- - Partiel ¬ *Q89.3*
- - Total ¬ *Q89.3*
- - Totalis ¬ *Q89.3*
- - Transversus
- - - Abdominal ¬ *Q89.3*
- - - Thoracique ¬ *Q89.3*
- - ¬
- - - *Q89.3*
- - - Dextrocardie avec *Q89.3*
- - - Disposition auriculaire en miroir avec *Q89.3*
- - - Lévocardie- *Q24.1*
- - - Syndrome d'agnathie-holoprosencéphalie- *Q87.8*

Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer- *C96.0*

Sjögren
v.a. Gougerot-Sjögren
v.a. Marinesco-Sjögren
- Atteinte pulmonaire ¬ Syndrome de *M35.0†, J99.1**
- Kératoconjonctivite ¬ Syndrome de *M35.0†, H19.3**
- Maladie rénale tubulo-interstitielle ¬ Syndrome de *M35.0†, N16.4**
- Néphrite tubulo-interstitielle ¬ Syndrome de *M35.0†, N16.4**
- ¬
- - Conjonctivite sèche au sens du syndrome de *M35.0†, H13.2**
- - Myopathie au cours de syndrome de *M35.0†, G73.7**

Sjögren-Larsson ¬ Syndrome de *Q87.1*

SLA [Sclérose latérale amyotrophique] ¬ *G12.2*

SLC16A1 ¬ Hyperinsulinisme par déficit en *E16.1*

SLEPR) ¬ Syndrome de Leucoencéphalopathie postérieure réversible (*G93.6*

Slim disease) ¬ Émaciation (*B22*

SLOS ¬ *Q87.1*

Sly ¬ Maladie de *E76.2*

SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [*D47.0*

SMARD1 ¬ *G12.2*

SMARD2 ¬ *G12.2*

Smith
v.a. Aase-Smith
v.a. Canale-Smith
v.a. Marshall-Smith
v.a. Marshall-Smith
- Lemli-Opitz ¬ Syndrome de: *Q87.1*
- ¬
- - Fracture de *S52.52*
- - Syndrome de: Robinow-Silverman- *Q87.1*

Smith Strang ¬ Syndrome de *E72.1*

Smith-Fineman-Myers ¬ Syndrome de *Q87.0*

Smith-Magenis ¬ Syndrome de *Q93.5*

Smolandiensis ¬ Dystrophia *H18.5*

Smoldering ¬ Mastocytose systémique type *D47.0*

Snail fever [Bilharziose urinaire] ¬ *B65*

Sneddon

- Wilkinson] ¬ Pustulose sous-cornée [Maladie de *L13.1*
- ¬ Syndrome de *I77.8*

Snyder-Robinson ¬ Syndrome de *Q87.8*

Social

- Apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles du fonctionnement *F94*
- Enfance
- - Sans précision ¬ Trouble du fonctionnement *F94.9*
- - ¬
- - - Anxiété *F93.2*
- - - Troubles du fonctionnement *F94.8*
- Insuffisantes, non classées ailleurs ¬ Aptitudes *Z73*
- Non classé ailleurs ¬ Conflit de rôle *Z73*
- Secours insuffisants ¬ Couverture *Z59*
- ¬
- - Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs *Z64.8*
- - Difficulté lié
- - - Certaines situations psycho- *Z64*
- - - Environnement *Z60*
- - - Situations psycho- *Z65*
- - Exclusion ou rejet *Z60*
- - Grossesse à risques liée à des problèmes *Z35.8*
- - Névrose *F40.1*
- - Phobies *F40.1*

Socialisé ¬ Trouble

- Agressif, type mal *F91.1*
- Conduite type
- - *F91.2*
- - Mal *F91.1*

Socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation *Z76.2*

Sociopathique ¬ Personnalité: *F60.2*

Sodée congénitale ¬ Diarrhée *P78.3*

Sodique du nouveau-né ¬ Anomalies de l'équilibre *P74.2*

Sodium

- Na ¬
- - Déficit en *E87.1*
- - Excès de *E87.0*
- - Surcharge en *E87.0*
- Soude] ¬ Hydroxyde de: *T54.3*

Sodoku ¬ *A25.0*

Soemmering ¬ Anneau de *H26.4*

Soffer
v. Sohval-Soffer

SOH] ¬ Syndrome obésité hypoventilation [*E66.2*

Sohval-Soffer ¬ Syndrome de *Q87.8*

Soif

- Excessive ¬ *R63.1*
- ¬ Effets de la *T73.1*

Soin

- Béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ Recherche et *N88.3*
- Chirurgical médicaux
- - Non classé ¬
- - - Complications de *T88*
- - - Séquelles de complications de *T98.3*
- - Sans précision ¬ Complication de *T88.9*
- Contrôle
- - Chirurgical
- - - Précisés ¬ Autres *Z48.8*
- - - Sans précision ¬ *Z48.9*
- - - ¬ Autres *Z48*
- - Comprenant opération plastique
- - - Extrémité
- - - - Inférieures ¬ *Z42.4*
- - - - Supérieures ¬ *Z42.3*
- - - Partie
- - - - Corps ¬ *Z42.8*
- - - - Tronc ¬ *Z42.2*
- - - Sans précision ¬ *Z42.9*
- - - Sein ¬ *Z42.1*
- - - Tête et du cou ¬ *Z42.0*
- - - ¬ *Z42*
- - Impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation ¬ *Z47.0*
- - Orthopédique
- - - Précisés ¬ Autres *Z47.8*
- - - Sans précision ¬ *Z47.9*
- - - ¬ Autres *Z47*
- Cours de la grossesse pour avortement à répétition ¬ *O26.2*
- Domicile non disponibles ¬ *Z75.8*
- Examen
- - Allaitement maternel ¬ *Z39.1*
- - Immédiatement après l'accouchement ¬ *Z39.0*
- - Post-partum ¬ *Z39*
- Femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses couches ¬ Examen ou *N96*
- Hygiène ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance et de *Z74.1*
- Impliquant
- - Moyens de rééducation ¬ *Z50.8!*
- - Rééducation
- - - Sans précision ¬ *Z50.9!*
- - - ¬ *Z50!*
- Maternel

Soin *–suite*

- Maternel *–suite*
- - Abdomen penduleux (ventre en besace) ¬ *O34.8*
- - Affection
- - - Connues ou présumées du fœtus ¬ *O36*
- - - Fœtus, sans précision ¬ *O36.9*
- - - Liées principalement à la grossesse ¬ *O26*
- - - Précisées du fœtus ¬ *O36.8*
- - Anasarque fœto-placentaire ¬ *O36.2*
- - Anomalie
- - - Chromosomique (présumée) du fœtus ¬ *O35.1*
- - - Col ¬ *O34.4*
- - - Connue ou présumée des organes pelviens ¬ *O34*
- - - Lésion fœtal présumé
- - - - Sans précision ¬ *O35.9*
- - - - ¬ *O35.8*
- - - Organe pelvien
- - - - Sans précision ¬ *O34.9*
- - - - ¬ *O34.8*
- - - Utérus gravide ¬ *O34.5*
- - - Vagin ¬ *O34.6*
- - - Vulve et du périnée ¬ *O34.7*
- - Béance du col ¬ *O34.3*
- - Cause connu présumé
- - - Croissance excessive du Fœtus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ *O36.6*
- - - Fœtus
- - - - Léger pour l'âge gestationnel ¬ *O36.5*
- - - - Petit pour l'âge gestationnel ¬ *O36.5*
- - - Insuffisance du placenta ¬ *O36.5*
- - Cerclage avec ou sans mention de béance du col ¬ *O34.3*
- - Cicatrice
- - - Césarienne antérieure ¬ *O34.2*
- - - Utérine due à une intervention chirurgicale antérieure ¬ *O34.2*
- - Cloisonnement du vagin ¬ *O34.6*
- - Colpocèle ¬ *O34.8*
- - Croissance
- - - Excessive du fœtus ¬ *O36.6*
- - - Insuffisante du fœtus ¬ *O36.5*
- - Disproportion
- - - Anomalies du fœtus ¬ *O33.7*
- - - Bassin maternel généralement rétréci ¬ *O33.1*
- - - Fœto-pelvienne
- - - - Connue ou présumée ¬ *O33*
- - - - Origine mixte, maternelle et fœtale ¬ *O33.4*
- - - Fœtus
- - - - Anormalement gros ¬ *O33.5*
- - - - Hydrocéphale ¬ *O33.6*

Soin *–suite*
- Maternel *–suite*
- - Disproportion *–suite*
- - - Malformation du bassin de la mère ¬ *O33.0*
- - - Origines ¬ *O33.8*
- - - Rétrécissement détroit
- - - - Inférieur ¬ *O33.3*
- - - - Supérieur du bassin maternel ¬ *O33.2*
- - - Sans précision ¬ *O33.9*
- - Fibrome de l'utérus ¬ *O34.1*
- - Fibrose du périnée ¬ *O34.7*
- - Grossesse
- - - Abdominale avec fœtus viable ¬ *O36.7*
- - - Multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus ¬ *O32.5*
- - Incarcération de l'utérus gravide ¬ *O34.5*
- - Intervention chirurgical antérieur sur
- - - Col ¬ *O34.4*
- - - Périnée ou la vulve ¬ *O34.7*
- - - Vagin ¬ *O34.6*
- - Iso-immunisation
- - - Anti-Rh ¬ *O36.0*
- - - ¬ *O36.1*
- - Lésion fœtal présumé
- - - Actes à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *O35.7*
- - - Alcoolisme maternel ¬ *O35.4*
- - - Irradiation ¬ *O35.6*
- - - Médicamenteuses ¬ *O35.5*
- - - Résultant
- - - - Amniocentèse ¬ *O35.7*
- - - - Biopsie ¬ *O35.7*
- - - - Dispositif intra-utérin ¬ *O35.7*
- - - - Examens hématologiques ¬ *O35.7*
- - - - Intervention chirurgicale intra-utérine ¬ *O35.7*
- - - - Listériose ¬ *O35.8*
- - - - Maladie virale de la mère ¬ *O35.3*
- - - - Toxicomanie ¬ *O35.5*
- - - - Toxoplasmose ¬ *O35.8*
- - - Suite infection mère
- - - - Cytomégalovirus ¬ *O35.3*
- - - - Virus de la rubéole ¬ *O35.3*
- - Maladie héréditaire (présumée) du fœtus ¬ *O35.2*
- - Malformation
- - - Congénitale de l'utérus ¬ *O34.0*
- - - Présumée) du système nerveux central du fœtus ¬ *O35.0*
- - Mort intra-utérine du fœtus ¬ *O36.4*
- - Opération de Shirodkar avec ou sans mention de béance du col ¬ *O34.3*
- - Périnée rigide ¬ *O34.7*
- - Plancher pelvien
- - - Cicatriciel ¬ *O34.8*
- - - Rigide ¬ *O34.8*

Soin *–suite*
- Maternel *–suite*
- - Polype
- - - Col ¬ *O34.4*
- - - Corps de l'utérus ¬ *O34.1*
- - Position
- - - Instable ¬ *O32.0*
- - - Transverse et oblique ¬ *O32.2*
- - Présentation
- - - Anormal
- - - - Connue ou présumée du fœtus ¬ *O32*
- - - - Fœtus
- - - - - Sans précision ¬ *O32.9*
- - - - - ¬ *O32.8*
- - - Complexe ¬ *O32.6*
- - - Face, du front et du menton ¬ *O32.3*
- - - Siège ¬ *O32.1*
- - Prolapsus de l'utérus gravide ¬ *O34.5*
- - Rectocèle ¬ *O34.8*
- - Rétrécissement
- - - Sténose du col ¬ *O34.4*
- - - Vagin ¬ *O34.6*
- - Rétroversion de l'utérus gravide ¬ *O34.5*
- - Signes d'hypoxie fœtale ¬ *O36.3*
- - Spina bifida (présumé(e)) du fœtus ¬ *O35.0*
- - Sténose du vagin (acquise) (congénitale) ¬ *O34.6*
- - Tête haute à terme ¬ *O32.4*
- - Tumeur
- - - Col ¬ *O34.4*
- - - Corps de l'utérus ¬ *O34.1*
- - - Vagin ¬ *O34.6*
- - - Vulve ¬ *O34.7*
- - Utérus
- - - Bicorne ¬ *O34.0*
- - - Double ¬ *O34.0*
- Médical, sans précision ¬ *Z51.9*
- Médicaux
- - Chirurgicaux, non classées ailleurs ¬ Autres complications précisées de *T88.8*
- - Enfants trouvés ¬ Surveillance médicale et *Z76.1*
- - Infirmiers surveillance médical enfant bon santé selon circonstances
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ *Z76.2*
- - - Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ *Z76.2*
- - - Maladie de la mère ¬ *Z76.2*
- - - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ *Z76.2*
- - Nourrissons et enfants en bonne santé ¬ Surveillance médicale et *Z76.2*
- - ¬
- - - *Z51*

Soin *–suite*
- Médicaux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Formes précisées de *Z51.8*
- Mise en observation, cas sans complications ¬ *Z39.0*
- Obstétrical
- - Y compris
- - - Césarienne avant début travail ¬ lorsqu y a mise observation hospitalisation
- - - - *O32*
- - - - *O33*
- - - - *O34*
- - - Interruption grossesse ¬ lorsqu y a mise observation hospitalisation
- - - - *O35*
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- - ¬ les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de *O98*
- Palliatifs ¬ *Z51.5*
- Prénatals insuffisants ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de *Z35.3*
- Préparatoires
- - Traitement ultérieur, non classés ailleurs ¬ *Z51.4*
- - Vue d'une dialyse ¬ *Z49.0*
- Sans précision ¬ Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les *Z74.9*
- Santé
- - Sans précision ¬ Difficulté liée aux installations médicales et autres *Z75.9*
- - ¬ Autres difficultés liées aux installations médicales et autres *Z75.8*
- Supplémentaire
- - Fœtus ou du nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de *P08*
- - Nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de *P07*
- ¬
- - Difficulté lié
- - - Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les *Z74.2*
- - - Dépendance envers personne donne
- - - - *Z74*
- - - - *Z74.8*
- - Parent à charge au domicile, nécessitant des *Z63*
- - Pensionnaires d'établissements de *Z76.4*

Sol ¬ Pollution du *Z58*

Solaire ¬
- Dermite *L57.8*
- Kératose: *L57.0*
- Rétinopathie *H31.0*
- Urticaire *L56.3*

Soleil
- Deuxième degré ¬ Coup de *L55.1*
- Premier degré ¬ Coup de *L55.0*
- Sans précision ¬ Coup de *L55.9*
- Troisième degré ¬ Coup de *L55.2*
- ¬
- - Coups de *L55.8*
- - Exposition à: Lumière du *X59.9!*

Solente
v. Touraine-Solente-Gole

Solitaire
- Agressif ¬ Trouble (des): conduites, type *F91.1*
- Bœuf ¬ Ver *B68.1*
- Mâchoire ¬ Kyste osseux *K09.2*
- Os ¬ Kyste *M85.4*
- Rectum ¬ Syndrome de l'ulcère *K62.6*
- Sein ¬ Kyste *N60.0*
- ¬
- - Kyste du rein (acquis) (multiple) (*N28.1*
- - Myélome *C90.3*
- - Plasmocytome *C90.3*
- - Tumeur fibreuse *D21.9*
- - Ulcère: *K62.6*

Solium ¬ Infection
- Larve de Taenia *B69*
- Taenia *B68.0*

Sollicitation excessif
- Articulation ¬ Affections des tissus mous par *M70*
- Non classée ailleurs ¬ Fracture par *M84.3*
- Sans précision ¬ Affection des tissus mous par *M70.9*
- ¬ Autres affections des tissus mous par *M70.8*

Solvant
- Groupe
- - Cétones ¬ *L24.2*
- - Composés chlorés ¬ *L24.2*
- - Cyclohexane ¬ *L24.2*
- - Ester ¬ *L24.2*
- - Glycol ¬ *L24.2*
- - Hydrocarbures ¬ *L24.2*
- Organique
- - Sans précision ¬ Effet toxique: *T52.9*
- - ¬
- - - Allergie aux *L23.5*
- - - Effet toxique
- - - - *T52*
- - - - *T52.8*
- - - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- Volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F18*
- ¬ Dermite irritante de contact due aux *L24.2*

Somatique
- CEBPA ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec mutations *C92.00*
- NPM1 ¬ Leucémie myéloïde aiguë associée à des mutations *C92.00*
- Psychiques ¬ Douleur chronique où interviennent des facteurs *F45.41*
- ¬
- - Dysfonctionnement segmentaire et *M99.0*
- - Troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection *F06*

Somatisation ¬ *F45.0*

Somatoforme
- Appareil
- - Digestif haut ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.31*
- - Uro-génital ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.34*
- Indifférencié ¬ Trouble *F45.1*
- Organe système
- - Non précisé ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.39*
- - ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.38*
- Persistant ¬ Syndrome douloureux *F45.40*
- Plusieurs organes et systèmes ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.37*
- Sans précision ¬ Trouble *F45.9*
- Système
- - Cardio-vasculaire ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.30*
- - Respiratoire ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.33*
- Voies digestives basses ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.32*
- ¬
- - Douleur *F45.40*
- - Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.3*
- - Troubles *F45.8*

Somatomammotropinome ¬ *D35.2*

Somatostatine ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: *E16.8*

Somatotrope ¬ Hypersécrétion de l'hormone *E22.0*

Sommeil
- Afrique
- - Occidentale ¬ Maladie du *B56.0*
- - Orientale ¬ Maladie du *B56.1*
- Anormal ¬ Cycle veille- *Z91.8*
- Central ¬ Syndrome d'apnée du *G47.30*
- Lent ¬
- - ESES [état de mal épileptique électrique pendant le *G40.01*
- - POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le *G40.01*
- Non
- - Cause organique ¬ Trouble du rythme veille- *F51.2*
- - Organique

Sommeil *–suite*
- Non *–suite*
- - Organique *–suite*
- - - Sans précision ¬ Trouble du *F51.9*
- - - ¬ Autres troubles du *F51.8*
- - Précisée ¬ Apnée du *G47.39*
- Nouveau-né
- - Centrale ¬ Apnée du *P28.3*
- - Obstructive ¬ Apnée du *P28.3*
- - SAI ¬ Apnée du *P28.3*
- - ¬ Apnée primitive du *P28.3*
- Obstructif ¬ Syndrome d'apnée du *G47.31*
- SAI ¬
- - Maladie du *B56.9*
- - Trouble émotionnel du *F51.9*
- Sans précision ¬ Trouble du *G47.9*
- Somnolence excessive ¬ Troubles du *G47.1*
- ¬
- - Apnée
- - - *G47.3*
- - - *G47.38*
- - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: privation de *G40.5*
- - État de mal épileptique bioélectrique pendant le *G40.01*
- - Hypoventilation alvéolaire non obstructive idiopathique du *G47.32*
- - Inversion psychogène du rythme (du): *F51.2*
- - Irrégularité du rythme veille- *G47.2*
- - Maladie du *B56*
- - Mouvements périodiques des jambes au cours du *G25.80*
- - Syndrome
- - - Hypoventilation du *G47.32*
- - - Retard des phases du *G47.2*
- - Trouble
- - - *G47.8*
- - - Alimentation en rapport avec le *F51.3*
- - - Cycle veille- *G47.2*
- - - Endormissement et du maintien du *G47.0*

Sommer-Hines ¬ Syndrome de *Q73.8*

Somnambulisme ¬ *F51.3*

Somnifères
- Comprimé SAI ¬ *T42.7*
- Intention suicidaire ¬ Intoxication aux *T42.7*
- Médicament SAI ¬ *T42.7*
- Potion SAI ¬ *T42.7*
- ¬ Intoxication aux *T42.7*

Somnolence
- Excessive ¬ Troubles du sommeil par *G47.1*
- Stupeur et coma ¬ *R40*
- ¬ *R40.0*

Sondage ¬ Rétrécissement urétral après *N99.1*

Sonde
- Bougie ¬ passage de *Z43*
- Cours acte visée diagnostique thérapeutique ¬ Perforation accidentel
- - Nerf par *T81.2*
- - Organe par *T81.2*
- - Vaisseau sanguin par *T81.2*
- Gastrostomie endoscopique percutané sonde PEG ¬
- - Complication mécanique de *T85.51*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une *T85.74*
- Jéjunostomie endoscopique percutané sonde PEJ ¬
- - Complication mécanique de *T85.52*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une *T85.74*
- PEG ¬
- - Complication mécanique de sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [*T85.51*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [*T85.74*
- PEJ ¬
- - Complication mécanique de sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [*T85.52*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [*T85.74*
- Urinaire (à demeure) ¬ Complication mécanique d'une *T83.0*
- Vésicale ¬ Inflammation due à une *T83.5*

Songo ¬ Fièvre *A98.5†, N08.0**

Sonnei ¬ Shigellose à Shigella *A03.3*

Sons ¬ Vertige dû aux infra- *T75.2*

SOPK [Syndrome ovarien polykystique] ¬ *E28.2*

Sorsby ¬ Dystrophie pseudo-inflammatoire de *H35.5*

Sotos ¬ Syndrome de: *Q87.3*

Sottas ¬ Maladie de: Déjerine- *G60.0*

Souche
- Hématopoïétique
- - Immunosuppression actuelle ¬ État consécutif à une transplantation de cellules- *Z94.81*
- - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un transplant de cellules *T86.0*
- - Sans immunosuppression actuelle ¬ État consécutif à une transplantation de cellules- *Z94.80*
- - ¬ Échec d'un transplant de cellules *T86.00*
- Lignée incertaine ¬ Leucémie à cellules *C95.0*
- ¬
- - Carcinome bronchique de bronche *C34.0*
- - Donneur de cellules *Z52.01*
- - Rejet de greffon après transplantation de cellules *T86.00*

Souche *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Status post greffe allogénique de cellules *Z94.80*
- - Tumeur maligne: Bronche *C34.0*

Soudé
- Entraînant une disproportion ¬ Jumeaux *O33.7*
- Fer à cheval ¬ Rein lobulé, *Q63.1*
- ¬
- - Dystocie due à: jumeaux *O66.3*
- - Jumeaux *Q89.4*

Soude] ¬ Hydroxyde de: sodium [*T54.3*

Soudures vertébrales ¬ Autres *M43.2*

Souffle
- Bruits cardiaques ¬ *R01*
- Cardiaque
- - Bénins et anodins ¬ *R01.0*
- - Fonctionnel ¬ *R01.0*
- - Sans précision ¬ *R01.1*
- - Systolique) SAI ¬ *R01.1*
- Explosion ¬ Syndrome dû au *T70.8*

Soufre ¬ Effet toxique: Dioxyde de *T59.1*

Soufrés ¬ Anomalies du métabolisme des acides aminés *E72.1*

Soulier [plaquettes géantes] ¬ Syndrome de(s): Bernard- *D69.1*

Soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ Recherche et soins d'une béance cervicale (*N88.3*

Soupçonneux et évasif ¬ Caractère *R46.5*

Soupirs ¬ *R06.88*

Source
- Affections chez le fœtus et le nouveau-né ¬ Interruption de la grossesse *P96.4*
- Tension ¬ Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements *R46.6*

Sourcil ¬
- *S00.1*
- *S01.0*
- Ptosis du *L98.7*

Souris
- Articulaire du genou ¬ *M23.4*
- Intra-articulaire
- - Genou ¬ *M23.4*
- - ¬ *M24.0*

Sous-alimentation
- Nouveau-né ¬ *P92.3*
- ¬ Gastrite due à une *E63.9†, K93.8**

Sous-arachnoïdien niveau
- Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S35.82*
- Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S15.82*
- Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.82*

Souscapitale ¬ Fracture du col du fémur: *S72.03*

Sous-capsulaire
- Antérieure) (postérieure) ¬ Cataracte sénile: polaire *H25.0*
- Postérieure ¬ Cataracte *H26.8*
- ¬ Opacités glaucomateuses (*H26.2*

Sous-clavière
- Aberrante ¬ Artère *Q27.8*
- ¬
- - Anévrisme syphilitique de l'artère *A52.0†, I79.8**
- - Athérosclérose de l'artère *I70.26*
- - Lésion traumatique
- - - Artère innominée ou *S25.1*
- - - Veine innominée ou *S25.3*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.81*

Sous-cornée
- Maladie de Sneddon-Wilkinson] ¬ Pustulose *L13.1*
- ¬ Dermatose pustuleuse *L13.1*

Sous-cortical
- Bandes ¬ Hétérotopie *Q04.3*
- ¬
- - Démence vasculaire
- - - *F01.2*
- - - Mixte, corticale et *F01.3*
- - Encéphalopathie artérioscléreuse *I67.3*
- - Hémorragie intracérébrale hémisphérique, *I61.0*
- - Leucoencéphalopathie mégalencéphalique avec kystes *E75.2*

Sous-cutané
- Abcès ¬ Chromomycose *B43.2†, L99.8**
- Cellules T de type panniculite ¬ Lymphome *C86.3*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de la peau et du tissu cellulaire *O99.7*
- Cours maladies classées ailleurs ¬ affection
- - Peau et du tissu cellulaire *L99**
- - Précisées de la peau et du tissu cellulaire *L99.8**
- Épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu *E88.21*
- Excédentaire et flasque ¬ Peau et tissu *L98.7*
- Kyste ¬ Chromomycose *B43.2†, L99.8**
- Lié irradiation
- - Sans précision ¬ Affection de la peau et du tissu cellulaire *L59.9*
- - ¬ affection
- - - Peau et du tissu cellulaire *L59*
- - - Précisées de la peau et du tissu cellulaire *L59.8*
- Localisés) (superficiels) ¬ nodules *R22*
- Membres ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu *D17.2*

Sous-cutané *–suite*

- Niveau
- - Cou ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.1*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.4*
- - - Supérieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.3*
- - Tête ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.0*
- - Tronc ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.2*
- Non classé
- - Avant-bras et poignet ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.02*
- - Jambe et genou ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.06*
- - Localisation non précisée ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.09*
- - Main et doigt ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.03*
- - Région
- - - Cheville, pied et orteils ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.07*
- - - Épaule, bras et coude ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.01*
- - - Pelvienne et cuisse ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.05*
- - Tête et cou ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.00*
- - Tronc ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.04*
- - ¬
- - - Affections de la peau et du tissu cellulaire *L98*
- - - Nécrose
- - - - Peau et du tissu *R02.0*
- - - - Post-traumatique de la peau et du tissu *R02*
- Origine traumatique ¬ Emphysème *T79.7*
- Pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et *E88.22*
- Présence d'un corps étranger ¬ Granulome cutané et *L92.3*
- Résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Emphysème (*T81.8*
- Sans précision ¬
- - Affection de la peau et du tissu cellulaire *L98.9*
- - Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire *L08.9*
- - Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire *L72.9*
- - Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire *L92.9*
- - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.9*
- Siège

Sous-cutané *–suite*

- Siège *–suite*
- - Multiples ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.7*
- - Non précisés ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu *D17.3*
- Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu *D17.0*
- Traumatisme obstétrical ¬ Adiponécrose *P15.6*
- Tronc ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu *D17.1*
- Type panniculite ¬ Lymphome T *C86.3*
- Uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée lisse, avec tissu *E88.20*
- ¬
- - Abcès et kyste phaeohyphomycosiques *B43.2*
- - Affections précisées de la peau et du tissu cellulaire *L98.8*
- - Antécédent
- - - Familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire *Z84.0*
- - - Personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire *Z87.2*
- - Déficit tissulaire limité à la peau [derme] et au tissu *I70.24*
- - Formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire *L72.8*
- - Infection localisé
- - - Peau et du tissu cellulaire *L08*
- - - Précisées de la peau et du tissu cellulaire *L08.8*
- - Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire *L72*
- - Lésion
- - - Granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire *L92.8*
- - - Infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire *L98.6*
- - Maladie due au VIH avec maladie du tissu *B23.8, L98.9*
- - Mucormycose *B46.3†, L99.8**
- - Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire *R93.8*
- - Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire *A18.4*
- - Tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22*

Sous-diaphragmatique

- Tuberculeux ¬ Abcès *A18.3†, K93.0**
- ¬ Abcès: *K65.0*

Sous-dural

- Chronique non traumatique ¬
- - Hématome *I62.02*
- - Hémorragie *I62.02*
- Localisé) dû à un traumatisme obstétrical ¬ Hématome *P10.0*
- Niveau

Sous-dural *–suite*

- Niveau *–suite*
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S35.81*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S15.81*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.81*
- Non traumatique ¬ Hémorragie *I62.0*
- Postopératoire ¬ Hémorragie rachidienne *G97.83*
- Sans précision ¬ Abcès extra-dural et *G06.2*
- Traumatique
- - Aiguë ¬ Hémorragie *S06.5*
- - ¬
- - - Conséquences d'une hémorragie *T90.5*
- - - Hémorragie *S06.5*
- Traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie *P10.0*
- ¬ Abcès granulome
- - Intracrânien: *G06.0*
- - Intrarachidien: *G06.1*

Sous-endocardique

- Aigu du myocarde ¬ Infarctus *I21.4*
- SAI ¬ Infarctus *I21.4*

Sous-épendymaire

- Cellules géantes ¬ Astrocytome *D43.2*
- Envahissement intraventriculaire ¬ Hémorragie *P52.1*
- Extension intracérébrale et intraventriculaire ¬ Hémorragie *P52.2*
- Sans envahissement intraventriculaire) ¬ Hémorragie *P52.0*

Sous-épithéliale mucineuse ¬ Dystrophie cornéenne *H18.5*

Sous-galéal

- Traumatisme obstétrical ¬ Hématome *P12.2*
- ¬
- - Contusion *S00.05*
- - Hématome *S00.05*

Sous-gingival ¬ Tartre (dentaire): *K03.6*

Sous-glottique

- Actes médicaux ¬ Sténose *J95.5*
- Congénitale ¬ Sténose *Q31.1*
- Obstructive ¬ Laryngotrachéite *J05.0*
- ¬
- - Amylose *E85.4†, J99.8**
- - Laryngite (aiguë): *J04.0*
- - Œdème (de la): *J38.4*
- - Ptérygion du larynx: *Q31.0*
- - Tumeur maligne: Etage *C32.2*

Sous-hépatique ¬ Abcès: *K65.0*

Sous-mandibulaire

- Indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ Abcès *K12.22*
- Sans indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ Abcès *K12.21*

Sous-mandibulaire *–suite*
- ¬ Tumeur
- - Épithéliale maligne de la glande *C08.0*
- - Maligne: Glande *C08.0*

Sous-maxillaire ¬
- Glande
- - *C08.0*
- - *D11.7*
- Tuberculose *A18.8†, K93.8**

Sous-muqueux
- Bouche ¬ Fibrose *K13.5*
- Langue ¬ Fibrose *K13.5*
- Utérus ¬ Léiomyome *D25.0*
- Voies respiratoires supérieures ¬ Fibrose *J39.88*

Sous-périostique post-traumatique ¬ Ossification *M89.8*

Sous-phrénique
- Actes médicaux ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- ¬
- - Abcès: *K65.0*
- - Péritonite (aiguë): *K65.0*

Sous-population définie ¬ Examen général de routine d'une *Z10*

Sous-pulmonaire
- Non-committed ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec CIV [communication interventriculaire] *Q20.1*
- Sténose pulmonaire ¬
- - VDDI avec communication interventriculaire sous-aortique ou sous-aortique et *Q20.1*
- - Ventricule droit à double issue avec communication interventriculaire sous-aortique ou sous-aortique et *Q20.1*
- ¬
- - Sténose *Q24.3*
- - Ventricule droit à double issue avec communication interventriculaire *Q20.1*

Sous-séreux de l'utérus ¬ Léiomyome *D25.2*

Sous-trochantérienne ¬ Fracture *S72.2*

Sous-type non différencié ¬ Lymphome diffus grand cellule B
- *C83.3*

Sous-valvulaire
- Mitral ¬ Anomalie de l'appareil *Q23.3*
- Tricuspide ¬ Anomalie de l'appareil *Q22.8*
- ¬ Rétrécissement aortique *Q24.4*

Sous-xiphoïdien
- Causant une occlusion ¬ Hernie *K43.68*
- Étranglée ¬ Hernie *K43.68*
- Incarcérée ¬ Hernie *K43.68*
- Non réductible ¬ Hernie *K43.68*
- ¬ Hernie
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*

Soutien
- Appareil
- - Médical ou appareil auxiliaire non précisé ¬ Dépendance de longue durée envers un appareil de *Z99.9*
- - Médicaux appareil auxiliaire
- - - Non classée ailleurs ¬ Dépendance (de longue durée) envers des appareils de *Z99*
- - - ¬ Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de *Z99.8*
- Familial inadéquat ¬ *Z63*

Spahr ¬ Chondrodysplasie métaphysaire type *Q78.5*

Sparganose ¬
- *B70.1*
- Diphyllobothriase et *B70*

Sparganum (S.mansoni) (S. proliferum) ¬ Infection à: *B70.1*

Spasme
- Accommodation ¬ *H52.5*
- Anus ¬ *K59.4*
- Artère cérébrale ¬ *G45.9*
- Artériel ¬ *I73.9*
- Congénital(e) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- Coronaire vérifié ¬ Angine de poitrine avec *I20.1*
- Diffus de l'œsophage ¬ *K22.4*
- Hémifacial clonique ¬ *G51.3*
- Hystérique du pharynx ¬ *F45.33*
- Laryngé ¬ *J38.5*
- Œsophage ¬ *K22.4*
- Pédo-carpien ¬ *R29.0*
- Psychogène des voies digestives ¬ *F45.32*
- Pylore
- - Non classé ailleurs ¬ *K31.3*
- - ¬ Formes psychogènes de: *F45.3*
- Sanglot ¬ *R06.88*
- Sphincter d'Oddi ¬ *K83.4*
- Vasculaire ¬ AVC par *I63.8*
- ¬
- - Angine de poitrine (de): due à un *I20.1*
- - Crampe et *R25.2*

Spasmodique ¬
- Rhinorrhée *J30*
- Torticolis *G24.3*

Spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et *T44.3*

Spasmus nutans ¬ *F98.49*

Spasticité
- Origine rachidienne des muscles striés ¬ *G95.83*
- ¬ Choréoathétose dystonique paroxystique avec ataxie épisodique et *G24.8*

Spastique
v. Type de maladie

Spatiale ¬ Négligence visuo- *R29.5*

Spatz ¬ Maladie de Hallervorden- *G23.0*

SPCA [serum prothrombin conversion accelerator] ¬ Déficit en *D68.23*

Spécial
v. Type de maladie

Spécification d'infections ¬ Codes secondaires pour la *U69.4!*

Spécifique
- Acquisition
- - Arithmétique ¬ Trouble *F81.2*
- - Articulation ¬ Trouble *F80.0*
- - Orthographe ¬ Trouble *F81.1*
- Atoniques ¬ Crises non *G40.3*
- Bébé "poupée de son" ¬ Syndrome non *P94.2*
- Cloniques ¬ Crises non *G40.3*
- Développement
- - Acquisitions scolaires ¬ Troubles *F81*
- - Fonctions motrices, sans précision ¬ Troubles *F82.9*
- - Langage ¬ Trouble *F80.9*
- - Moteur ¬ Trouble *F82*
- - Motricité
- - - Buccale ¬ Troubles *F82.2*
- - - Fine et graphique ¬ Troubles *F82.1*
- - - Globale ¬ Troubles *F82.0*
- - Parole et du langage ¬ Troubles *F80*
- Fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques *G71.2*
- Fœtus nouveau-né
- - Sans précision ¬ Affection des téguments *P83.9*
- - ¬
- - - Affection
- - - - Précisées des téguments *P83.8*
- - - - Téguments *P83*
- - - Anomalies transitoires du métabolisme des glucides *P70*
- - - Œdèmes, autres et sans précision, *P83.3*
- Grossesse multiple ¬ complication
- - *O31*
- - *O31.8*
- Isolées) ¬ Phobies *F40.2*
- Lecture ¬
- - Retard *F81.0*
- - Trouble *F81.0*
- Mixtes du développement ¬ Troubles *F83*
- Myocloniques ¬ Crises non *G40.3*
- Non
- - Classé ¬
- - - Affections articulaires *M24.8*
- - - Arthropathies *M12.8*
- - Effectués ¬ Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux *Z53*
- - Identifié ¬

Spécifique *–suite*
- Non *–suite*
- - Identifié ¬ *–suite*
- - - Broncho)pneumonie virale, sans précision ou virus *J11.0*
- - - Encéphalopathie grippale sans précision ou virus *J11.8*
- - - Epanchement pleural grippal sans précision ou virus *J11.1*
- - - Gastroentérite grippale sans précision ou virus *J11.8*
- - - Infection grippale des voies respiratoires supérieures sans précision ou virus *J11.1*
- - - Laryngite grippale sans précision ou virus *J11.1*
- - - Myocardite (aiguë) grippale sans précision ou virus *J11.8*
- - - Pharyngite grippale sans précision ou virus *J11.1*
- Orthographe (sans trouble de la lecture) ¬ Retard *F81.1*
- Période périnatal
- - Sans précision ¬ Infection *P39.9*
- - ¬ Autres infections *P39*
- Personnalité ¬ Autres troubles *F60.8*
- Précisées de la période périnatale ¬ Autres infections *P39.8*
- Propres au nourrisson ¬ Symptômes non *R68.1*
- Prostate [PSA] ¬ Modification du taux d'antigène *R77.80*
- Sans précision ¬ Lymphadénite non *I88.9*
- Tension artérielle ¬ Constatation d'une baisse non *R03.1*
- Tonico-cloniques ¬ Crises non *G40.3*
- Toniques ¬ Crises non *G40.3*
- ¬
- - Affections articulaires *M24*
- - Antécédents familiaux d'autres maladies *Z83*
- - Arthropathies *M12*
- - Balano-posthite ulcéreuse *A63.8†, N51.2**
- - Bloc ventriculaire non *I45.4*
- - Grippe
- - - Sans mention d'identification d'un virus *J11*
- - - Virale sans mention d'identification d'un virus *J11*
- - Hépatite réactive non *K75.2*
- - Infection bactérienne *A49.9*
- - Lymphadénite
- - - Mésentérique non *I88.0*
- - - Non *I88.8*
- - NSIP] Pneumonie interstitielle non *J84.1*
- - Péricardite idiopathique aiguë non *I30.0*
- - Rash et autres éruptions cutanées non *R21*
- - Urétrite non *N34.1*

Spécifiquement enfance
- Adolescence ¬ Troubles du fonctionnement social apparaissant *F94*

Spécifiquement enfance *–suite*
- ¬ Troubles émotionnels apparaissant *F93*

Spectrine ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique récessive associée à la *G11.1*

Spermatique
- Scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - Atrophie du canal déférent, du cordon *N50.8*
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon *N50.8*
- - Œdème du canal déférent, du cordon *N50.8*
- - Ulcère du canal déférent, du cordon *N50.8*
- Testicule ou de la (tunique) vaginale ¬ hydrocèle du cordon *N43*
- Tunique vaginale du testicule et du canal déférent ¬ Affections inflammatoires du cordon *N49.1*
- ¬
- - Absence ou aplasie de: cordon *Q55.4*
- - Cordon *D29.7*
- - Rétrécissement de: cordon *N50.8*
- - Torsion: canal *N44.0*
- - Tuberculose du cordon *A18.1†, N51.8**
- - Tumeur
- - - Lipomateuse bénigne du cordon *D17.6*
- - - Maligne: Cordon *C63.1*

Spermatocèle ¬
- *N43.4*
- Hydrocèle et *N43*

Spermatocystite
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.8**
- Post-gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N51.8**

Spermatogenèse ¬ Infertilité masculine avec une anomalie de la *N46*

Spermatozoïdes anormaux ¬ *R86*

Sperme
- Liquide séminal ¬ Résultats anormaux de: *R86*
- ¬ Donneur de *Z52.88*

Spermicides ¬ *T49.8*

Spermogramme
- Vasectomie ¬ *Z30.8*
- ¬ *Z31.4*

SPH] ¬ Syndrome pulmonaire à Hantavirus [*B33.4†, J17.1**

Sphénoïdal
- Aiguë ¬ Sinusite *J01.3*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.3*
- SAI ¬ Sinusite *J32.3*
- ¬
- - Polypes du sinus (de): *J33.8*
- - Tumeur maligne: Sinus *C31.3*

Sphénoïde ¬
- *S02.1*
- Os

Sphénoïde ¬ *–suite*
- Os *–suite*
- - *C41.01*
- - *D16.41*

Sphérocytaire
- Héréditaire type
- - I ¬ Anémie (due à): hémolytique non *D55.1*
- - II ¬ Anémie (due à): hémolytique non *D55.2*
- ¬ Ictère: hémolytique congénital (*D58.0*

Sphérocytose héréditaire ¬ *D58.0*

Sphéroïde
- Axonaux et cellules gliales pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à *E75.2*
- ¬ Myopathie à corps *G71.2*

Sphérophakie
- Ectopie du cristallin et mégalocornée ¬ Glaucome secondaire à une *Q15.8*
- ¬ *Q12.4*

Sphincter
- Anal
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: *O70.2*
- - ¬
- - - *C21.1*
- - - *D37.78*
- - - *S31.80*
- Oddi ¬ Spasme du *K83.4*
- Rectal ¬
- - Dysfonctionnement du *K59.9*
- - Rétrécissement syphilitique du *A52.7†, K93.8**
- SAI au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: *O70.2*
- Vésical ¬
- - Sclérose du *N32.8*
- - Ulcère du *N32.8*
- Vessie ¬ Dysfonctionnement neurogène du détrusor/ *N31.88*
- ¬ Rétrécissement de l'anus (*K62.4*

Sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides ¬ Anomalies du métabolisme des *E75*

Sphingolipidose
- Sans précision ¬ *E75.3*
- ¬
- - *E75.2*
- - Dégénérescence cérébrale au cours de *E75.3†, G32.8**

Sphingomyélinose ¬ *E75.3*

Spiegel ¬
- Hernie
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- Syndrome de cryptorchidie-hernie de *K43.68*

Spieghel
- Causant une occlusion ¬ Hernie de *K43.68*
- Étranglée ¬ Hernie de *K43.68*
- Non réductible ¬ Hernie de *K43.68*
- ¬ Hernie incarcérée de *K43.68*

Spielmeyer
v. Stock-Spielmeyer-Vogt
- Vogt ¬ Maladie de: *E75.4*

Spilorosea ¬ Phacomatose *Q85.8*

Spina
- Bifida
- - Aperta
- - - Kystique) ¬ *Q05*
- - - ¬ *Q05.9*
- - Cervical
- - - Hydrocéphalie ¬ *Q05.0*
- - - Sans hydrocéphalie ¬ *Q05.5*
- - Dorsal
- - - Hydrocéphalie ¬ *Q05.1*
- - - SAI ¬ *Q05.6*
- - Dorso lombaire
- - - Hydrocéphalie ¬ *Q05.1*
- - - SAI ¬ *Q05.6*
- - Hydrocéphalie, sans précision ¬ *Q05.4*
- - Kystique ¬ *Q05.9*
- - Lombaire
- - - Hydrocéphalie ¬ *Q05.2*
- - - Sans hydrocéphalie ¬ *Q05.7*
- - Lombo-sacré
- - - Hydrocéphalie ¬ *Q05.2*
- - - SAI ¬ *Q05.7*
- - Occulta ¬ *Q76.0*
- - Présumé(e)) du fœtus ¬ Soins maternels pour: *O35.0*
- - Sacré
- - - Hydrocéphalie ¬ *Q05.3*
- - - Sans hydrocéphalie ¬ *Q05.8*
- - Sans précision ¬ *Q05.9*
- - Thoracique
- - - Hydrocéphalie ¬ *Q05.1*
- - - Sans hydrocéphalie ¬ *Q05.6*
- Ventosa ¬ *A18.0†, M90.09**

Spinal
v. Type de maladie

Spinobulbaire de type Kennedy [Maladie de Kennedy] ¬ Atrophie musculaire *G12.2*

Spinocérébelleuse
- Autosomique récessif type
- - 2 ¬ Ataxie *G11.0*
- - 6 ¬ Ataxie *G11.0*
- - 7 ¬ Ataxie *G11.1*
- - 10 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 12 ¬ Ataxie *G11.1*
- - 15 ¬ Ataxie *G11.1*
- - 16 ¬ Ataxie *G11.1*
- - 17 ¬ Ataxie *G11.1*

Spinocérébelleuse *–suite*
- Autosomique récessif type *–suite*
- - 19 ¬ Ataxie *G11.1*
- - 20 ¬ Ataxie *G11.1*
- - 21 ¬ Ataxie *G11.1†, K77.8**
- - 23 ¬ Ataxie *G11.1*
- Dysmorphie ¬ Syndrome d'ataxie *G11.1*
- Dystrophie cornéenne ¬ Syndrome d'ataxie *G11.8*
- Infantile ¬ Ataxie *G11.1*
- Lié X type
- - 3 ¬ Ataxie *G11.1*
- - 4 ¬ Ataxie *G11.1*
- Neuropathie axonale type 1 ¬ Syndrome d'ataxie *G60.2*
- Récessive liée au chromosome X ¬ Ataxie (de): *G11.1*
- Type
- - 1 ¬ [SCA1] ataxie *G11.8*
- - 2 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 3 ¬ [SCA1] ataxie *G11.8*
- - 4 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 5 ¬ [SCA1] ataxie *G11.8*
- - 6 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 7 ¬ [SCA1] ataxie *G11.8*
- - 8 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 10 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 11 ¬ [SCA1] ataxie *G11.8*
- - 12 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 13 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 14 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 15/16 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 17 ¬ [SCA1] ataxie *G11.8*
- - 18 ¬ [SCA1] ataxie *G11.8*
- - 19/22 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 20 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 23 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 25 ¬ [SCA1] ataxie *G11.8*
- - 26 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 28 ¬ Ataxie *G11.1*
- - 29 ¬ Ataxie *G11.0*
- - 30 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 31 ¬ [SCA1] ataxie *G11.8*
- - 32 ¬ [SCA1] ataxie *G11.8*
- - 34 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 35 ¬ [SCA1] ataxie *G11.8*
- - 36 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 37 ¬ [SCA1] ataxie *G11.8*
- - 38 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 40 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 41 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 42 ¬ Ataxie *G11.8*

Spinulosa
- Decalvans de Siemens ¬ Kératose folliculaire *Q82.8*
- ¬ Trichodysplasie *L85.8*

Spirales cylindriques ¬ Myopathie à *G71.2*

Spirillose ¬ *A25.0*

Spirit ¬ White *T52.0*

Spirochètes
- Précisées ¬ Autres infections à *A69.8*
- Sans précision ¬ Infection à *A69.9*
- ¬
- - Bronchite à *A69.8†, J99.8**
- - Infection
- - - *A69*
- - - *A69.9*
- - - Pulmonaire à *A69.8†, J17.0**
- - Pneumonie au cours d'infection à *A69.8†, J17.0**

Spirochétose ¬ *A69.9*

Spirometra ¬ Infection à: larves de *B70.1*

Spirométrose ¬ *B70.1*

Spitz ¬ Nævus de *D22.9*

SPL ¬ *Q82.8*

Splanchnique ¬ Nerf *S34.5*

Splénique
- Diffus de la pulpe rouge à petites cellules B ¬ Lymphome *C83.0*
- Zone marginale ¬ Lymphome *C83.0*
- ¬
- - Angle: gauche du côlon [*D12.3*
- - Anomalie de: épreuves fonctionnelles (de): *R94.8*
- - Arrachement du hile *S36.04*
- - Artère: *S35.2*
- - Embolie et thrombose de la veine *I82.80*
- - Hématome *S36.01*
- - Lésion traumatique de la veine porte ou *S35.3*
- - Lymphome de la zone marginale *C83.0*
- - Persistance de lobulations *Q89.08*
- - Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [*C18.5*

Splénite
- SAI ¬ *D73.8*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, D77**

Splénogène (primaire) ¬ Neutropénie *D70.6*

Splénogonadique
- Anomalie transversale des membres-micrognathie ¬ Syndrome de fusion *Q87.8*
- Isolée ¬ Fusion *Q89.08*

Splénomégalie
- Congénitale ¬ *Q89.00*
- Congestive chronique ¬ *D73.2*
- Cours de paludisme ¬ *B54†, D77**
- Gaucher
- - Infantile ¬ *E75.2*
- - ¬ *E75.2*
- Leucopénie ¬ Arthrite rhumatoïde avec adéno- *M05.0*
- Myélophtisique ¬ *D47.4*
- Niemann Pick ¬ *E75.2*

Splénomégalie *–suite*
- Non classé ¬
- - *R16.1*
- - Hépatomégalie avec *R16.2*
- SAI ¬ *R16.1*
- Syphilitique congénital
- - Précoce ¬ *A50.0†, D77**
- - ¬ *A50.0†, D77**
- ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R16.1*

SPO [syndrome psycho-organique] ¬ *F07.9*

Spolydactylie
- Type
- - Beemer-Langer ¬ Syndrome des côtes courte- *Q77.2*
- - Majewski ¬ Syndrome des côtes courte- *Q77.2*
- - Saldino-Noonan ¬ Syndrome des côtes courte- *Q77.2*
- - Verma-Naumoff ¬ Syndrome des côtes courte- *Q77.2*
- ¬ Syndrome des côtes courte- *Q77.2*

SPONASTRIME ¬ Dysplasie *Q77.7*

Spondylarthrite
- Ankylosante
- - Juvénile ¬ *M08.1*
- - ¬
- - - Iridocyclite au cours de *M45.09†, H22.1**
- - - Troubles respiratoires au cours de *M45.09†, J99.8**
- Axial non radiologique ¬
- - *M45*
- - *M45.09*

Spondylarthrose
- Cervical
- - Sans myélopathie ou radiculopathie ¬ *M47.8*
- - ¬ Myélopathie au cours de *M47.12†, G99.2**
- Lombaire ¬ Myélopathie au cours de *M47.16†, G99.2**
- Lombosacrée ¬ Myélopathie au cours de *M47.17†, G99.2**
- Lombo-sacrée sans myélopathie ou radiculopathie ¬ *M47.8*
- Myélopathie ¬
- - *M47.1*
- - *M47.99†, G99.2**
- Radiculopathie ¬ Autres *M47.2*
- Sacrale avec myélopathie ¬ *M47.18†, G99.2**
- Sacro-coccygienne avec myélopathie ¬ *M47.18†, G99.2**
- Sans précision ¬ *M47.9*
- Thoracique
- - Sans myélopathie ou radiculopathie ¬ *M47.8*
- - ¬ Myélopathie au cours de *M47.14†, G99.2**
- ¬
- - *M47.8*

Spondylarthrose *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Compression des racines nerveuses au cours de *M47.29†, G55.2**

Spondylite
- Ankylosante
- - Atteinte pulmonaire ¬ *M45.09†, J99.8**
- - ¬ *M45.0*
- Cours
- - Brucellose ¬ *A23.9†, M49.19**
- - Tuberculose ¬ *A18.0†, M49.09**
- Gonocoques ¬ *A54.4†, M49.39**
- Infection intestinale bactérienne ¬ *A04.9†, M49.29**
- Psoriasique ¬ *L40.5†, M07.2**
- Syphilitique ¬ *A52.7†, M49.39**
- Typhique ¬ *A01.0†, M49.29**

Spondylo-camptodactylie ¬ Syndrome *Q77.8*

Spondylo-cheirodysplasique ¬ SED type *Q79.6*

Spondylo-costale
- Atrésie anale-malformation génito-urinaire ¬ Syndrome de dysostose *Q87.8*
- Autosomique récessive ¬ Dysostose *Q76.8*

Spondylodèse congénitaux ¬ Spondylolisthésis et *Q76.2*

Spondylo-enchondrale ¬ Dysplasie *Q77.7*

Spondylo-épimétaphysaire
- Dentition anormale ¬ Syndrome de dysplasie *Q77.7*
- Liée à l'X ¬ Dysplasie *Q77.7*
- Luxations multiples ¬ Dysplasie *Q77.7*
- Type
- - Aggrécane ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Bieganski ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Geneviève ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Handigodu ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Irapa ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Missouri ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Pakistani ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Shohat ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Strudwick ¬ Dysplasie *Q77.7*

Spondylo-épiphysaire
- Arthropathie progressive ¬ Dysplasie *Q77.7*
- Congénitale ¬ Dysplasie *Q77.7*
- Tardive type Kohn ¬ Dysplasie *Q77.7*
- Type
- - Cantu ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Kimberley ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - MacDermot ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Maroteaux ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Nishimura ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Reardon ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Stanescu ¬ Dysplasie *Q77.7*
- ¬ Dysplasie *Q77.7*

Spondylogène
- Moelle épinière ¬ Compression *M47.19†, G99.2**
- ¬ Myélopathie *M47.19†, G99.2**

Spondylolisthésis
- Congénital ¬ *Q76.21*
- Spondylodèse congénitaux ¬ *Q76.2*
- ¬ *M43.1*

Spondylolyse
- Congénitale ¬ *Q76.22*
- ¬ *M43.0*

Spondylo-métaphysaire
- Autosomique récessive type Mégarbané ¬ Dysplasie *Q77.8*
- Dystrophie des cônes et des bâtonnets ¬ Syndrome de dysplasie *Q77.8*
- Type
- - A4 ¬ Dysplasie *Q77.8*
- - Golden ¬ Dysplasie *Q77.8*
- - Kozlowski ¬ Dysplasie *Q77.8*
- - Schmidt ¬ Dysplasie *Q77.8*
- - Sutcliffe ¬ Dysplasie *Q77.8*

Spondylo-métaphysaire-hypotrichose ¬ Syndrome de dysplasie *Q77.7*

Spondylo-oculaire syndrome ¬ *Q87.5*

Spondylopathie
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ *M49.8**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *M49.3**
- Inflammatoire, sans précision ¬ *M46.9*
- Neurologique
- - Cours
- - - Syringobulbie ¬ *G95.0†, M49.49**
- - - Syringomyélie ¬ *G95.0†, M49.49**
- - - Tabès ¬ *A52.1†, M49.49**
- - ¬ *M49.4**
- Sans précision ¬ *M48.9*
- Traumatique ¬ *M48.3*

Spondylopathies
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *M49**
- Infectieuses ¬ Autres *M46.5*
- Inflammatoire
- - Précisées ¬ Autres *M46.8*
- - ¬ Autres *M46*
- Précisées ¬ Autres *M48.8*
- ¬ Autres *M48*

Spongieux
- Muqueuses ¬ Nævus blanc *Q38.6*
- Subaiguë ¬ Encéphalopathie *A81.0*
- ¬
- - Lésion traumatique de l'urètre: Partie *S37.32*
- - Myocarde *I42.88*

Sporotrichose
- Disséminée ¬ *B42.7*

Sporotrichose *–suite*
- Généralisée ¬ *B42.7*
- Lympho-cutanée ¬ *B42.1*
- Pulmonaire ¬ *B42.0†, J99.8**
- Sans précision ¬ *B42.9*
- ¬
- - *B42*
- - Arthrite au cours de *B42.8†, M01.69**
- - Formes de *B42.8*
- - Maladie des voies respiratoires au cours de *B42.0†, J99.8**
- - Méningite au cours de *B42.8†, G02.1**

Sport ¬ Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en *X59.9!*

Sportive ¬
- Examen général en série de: équipes *Z10*
- Inscription dans: pratique *Z02*

Sporulants
- Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies *B96.7!*
- Non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non *B95.91!*

Sprengel ¬
- Malformation de *Q74.0*
- Syndrome d'hydrocéphalie-dysplasie costo-vertébrale-anomalie de *Q87.8*

Sprue
- Non tropicale ¬ *K90.0*
- Réfractaire ¬ *K90.0*
- SAI ¬ *K90.1*
- Tropicale ¬ *K90.1*

SPS ¬ *G25.88*

Squameux
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Lésions papulo- *L45**
- Précisées ¬ Autres lésions papulo- *L44.8*
- Sans précision ¬ Lésion papulo- *L44.9*
- ¬ Autres lésions papulo- *L44*

Squelette
- Traumatisme obstétrical
- - Sans précision ¬ Lésion du *P13.9*
- - ¬ Lésion
- - - *P13*
- - - Parties du *P13.8*
- ¬ Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du *Q87.5*

Squelettique
v.a. facio-cutanéo-squelettique
v.a. microcéphalie-facio-cardio-squelettique
v.a. vélo-facio-squelettique
- Déficience intellectuelle lié a l'X ¬ Syndrome d'anomalies *Q87.5*
- Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de cécité nocturne-anomalies *Q87.8*

Squelettique *–suite*
- Létale type Greenberg ¬ Dysplasie *Q77.3*
- Petite taille ¬ Syndrome de microtie-anomalies *Q87.1*
- Type Greenberg ¬ Dysplasie *Q77.3*
- ¬
- - Rigidité de la musculature *R29.8*
- - Syndrome
- - - Anophtalmie-mégalocornée-cardiopathie-anomalies *Q87.8*
- - - Épilepsie-microcéphalie dysplasie *Q87.8*
- - - Surdité-cataracte-anomalies *Q87.8*
- - Syphilis du système *A52.7†, M90.29**

SRAS
- Sans précision ¬ Syndrome respiratoire aigu sévère [*U04.9*
- ¬ Syndrome respiratoire aigu sévère [*U04*

SSADH ¬ Déficit en *E72.8*

SSS
- Atteinte 30% surface corporelle
- - Plus ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome *L00.1*
- - ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome *L00.0*
- SAP ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome *L00.0*

Stabilisant fibrine ¬
- Carence en facteur *D68.26*
- Déficit héréditaire en facteur *D68.26*

Stabilisée ¬ Carie dentaire *K02.3*

Stable ¬
- Angor *I20.8*
- Carence en facteur *D68.23*
- Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): *E11*

Stafne ¬ Kyste (de): *K10.0*

Stähli ¬ Ligne de *H18.0*

Standard ¬ Leucémie, réfractaire au traitement d'induction *C95.8!*

Stanescu ¬
- Dysostose type *Q78.8*
- Dysplasie spondylo-épiphysaire, type *Q77.7*

Stannose ¬ *J63.5*

Staphylococcique
- Nourrisson
- - Maladie de Ritter von Rittershain] ¬ Dermatite exfoliatrice *L00*
- - ¬ Syndrome d'épidermolyse *L00*
- Peau échaudée Syndrome SSS
- - Atteinte 30% surface corporelle
- - - Plus ¬ Syndrome *L00.1*
- - - ¬ Syndrome *L00.0*
- - SAP ¬ Syndrome *L00.0*
- ¬
- - Pneumonie nécrosante *J15.2*
- - Syndrome de Lyell *L00*

Staphylococcus
- Aureus
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.6!*
- - ¬
- - - Choc septique à *A41.0, R57.2*
- - - Infection cutanée locale à *L08.9, B95.6!*
- Epidermidis ¬ Endoplastite à *T82.7, B95.7!*

Staphylocoque
- Cause maladie classé chapitre ¬
- - *B95.7!*
- - Streptocoques et *B95!*
- Coagulase-négatif ¬
- - Choc septique à *A41.1, R57.2*
- - Septicémie à *A41.1*
- Doré
- - Résistant
- - - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ *U80.01!*
- - - Méthicilline ¬ *U80.0!*
- - - Oxacilline
- - - - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ *U80.0!*
- - - - Méticilline
- - - - - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ *U80.00!*
- - - - - MRSA] ¬ *U80.00!*
- - ¬
- - - Endocardite à *I33.0, B95.6!*
- - - Sepsis du nouveau-né à *P36.2*
- - - Septicémie à *A41.0*
- Langue ¬ Abcès à *K14.0, B95.8!*
- Moelle épinière ¬ Abcès à *G06.1, B95.8!*
- Non précis
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.8!*
- - ¬ Septicémie à *A41.2*
- Précisés ¬ Septicémie à d'autres *A41.1*
- Sans précision ¬ Sepsis du nouveau-né à *P36.3*
- Siège non précisé ¬ Infection à *A49.0*
- ¬
- - Amygdalite à *J03.8, B95.8!*
- - Angine aiguë à *J03.8, B95.8!*
- - Arthrite et polyarthrite à *M00.0*
- - Choc septique à *A41.2, R57.2*
- - Embolie pyohémique à *A41.2*
- - Entérite à *A04.8, B95.8!*
- - Infection
- - - Cutanée locale à *L08.9, B95.8!*
- - - Généralisée à *A41.2*
- - Intoxication alimentaire à *A05.0*
- - Méningite à *G00.3*
- - Méningo-encéphalite à *G04.2, B95.8!*

Staphylocoque *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Péricardite à *I30.1, B95.8!*
- - Pharyngite à *J02.8, B95.8!*
- - Pneumonie
- - - *J15.2*
- - - Congénitale à *P23.2*
- - Scarlatine à *A38*
- - Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des: *Z22.3*

Staphylome
- Cornée ¬ *H18.7*
- Équatorial ¬ *H15.8*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, H19.8**

STAR ¬
- Hyperplasie congénitale lipoïde des surrénales par déficit en *E25.08*
- Syndrome *Q87.8*

Stargardt ¬ Maladie de *H35.5*

Stase SAI ¬ Dermite de *I83.1*

STAT1 ¬
- Déficit en *D84.8*
- Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit partiel en *D84.8*

Stato-acoustique] ¬ Nerf acoustique [N. *S04.6*

Statural
- Constitutionnelle ¬ Insuffisance *E34.3*
- Non classée ailleurs ¬ Insuffisance *E34.3*
- Nutritionnelle ¬ Insuffisance *E45*
- Origine rénale ¬ Insuffisance *N25.0*
- Pituitaire SAI ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- Psychosociale ¬ Insuffisance *E34.3*
- SAI ¬ Insuffisance *E34.3*
- Thanatophore ¬ Insuffisance *Q77.1*
- Type Laron ¬ Insuffisance *E34.3*

Stature constitutionnelle ¬ Haute *E34.4*

Staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse accélérée-dysmorphie faciale-retard *Q87.3*

Status post
- Arthrodèse ¬ *Z98.1*
- Dérivation ou anastomose intestinale ¬ *Z98.0*
- Greffe
- - Allogénique de cellules souches ¬ *Z94.80*
- - Cœur
- - - Poumon ¬ *Z94.3*
- - - ¬ *Z94.1*
- - Cornée ¬ *Z94.7*
- - Foie ¬ *Z94.4*
- - Organe tissu
- - - Sans précision ¬ *Z94.9*
- - - ¬ *Z94.8*
- - Osseuse ¬ *Z94.6*
- - Peau

Status post *–suite*
- Greffe *–suite*
- - Peau *–suite*
- - - Autologue ¬ *Z94.5*
- - - ¬ *Z94.5*
- - Poumon ¬ *Z94.2*
- - Rein ¬ *Z94.0*

Stéatocystome multiple-dents néonatales ¬ Syndrome de *L72.2*

Stéatohépatite
- Alcoolique ¬ *K70.1*
- Non alcoolique [NASH] ¬ *K75.8*
- ¬ *K75.8*

Stéatokystose multiple ¬ *L72.2*

Stéato-nécrose] mésentérique ¬ Nécrose graisseuse [*K65.8*

Stéatorrhée
- Idiopathique ¬ *K90.0*
- Pancréatique ¬ *K90.3*
- Tropicale ¬ *K90.1*

Stéatose hépatique
- Aiguë de la grossesse ¬ *O26.68*
- Non alcoolique ¬ *K76.0*

Steele-Richardson-Olszewski] ¬ Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de *G23.1*

Steinbrinck)-Higashi ¬ Syndrome de: Chediak(- *E70.3*

Steiner
v. Wiedemann-Steiner

Steinert] ¬ Dystrophie myotonique [*G71.1*

Steinfeld ¬ Syndrome de *Q87.8*

Stein-Leventhal ¬ Syndrome (de): *E28.2*

Stellaire ¬
- Ganglion: *S24.4*
- Kératite: *H16.1*
- Nævus: *I78.1*
- Téléangiectasie [angiome *I78.1*

Sténocardie ¬ *I20.8*

Sténopéique] SAI ¬ Méat en trou d'épingle [*N35.9*

Sténosante
- Pouce [de Quervain] ¬ Ténosynovite chronique *M65.4*
- Ulcéreuse multifocale cryptogénétique ¬ Entérite *K63.3*
- ¬ Angiocholite: *K83.0*

Sténose
- Acquis
- - Choanes ¬ *J34.8*
- - Conduit auditif externe ¬ *H61.3*
- Anus et du rectum ¬ *K62.4*
- Aorte (congénitale) ¬ *Q25.3*
- Aortique
- - Congénitale ¬ *Q23.0*
- - Rhumatismal
- - - Insuffisance

Sténose *–suite*
- Aortique *–suite*
- - Rhumatismal *–suite*
- - - Insuffisance *–suite*
- - - - Reflux ¬ *I06.2*
- - - - ¬ *I06.2*
- - - ¬ *I06.0*
- - Supravalvulaire ¬ *Q25.3*
- - Valvulaire congénitale ¬ *Q23.0*
- Aqueduc de Sylvius ¬ *Q03.0*
- Artère
- - Basilaire
- - - Carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus cérébral ¬ *I65*
- - - ¬ Occlusion et *I65.1*
- - Carotide ¬ Occlusion et *I65.2*
- - Cérébelleuses ¬ Occlusion et *I66.3*
- - Cérébral
- - - Antérieure ¬ Occlusion et *I66.1*
- - - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou *I63.5*
- - - Moyenne ¬ Occlusion et *I66.0*
- - - Moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I66*
- - - Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et *I66.4*
- - - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et *I66*
- - - Postérieure ¬ Occlusion et *I66.2*
- - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et *I63*
- - - Sans précision ¬ Occlusion et *I66.9*
- - - ¬
- - - - *I66.9*
- - - - Occlusion et *I66.8*
- - Coronaires ¬ *I25.1*
- - Perforante ¬ Occlusion et *I66.8*
- - Précérébral
- - - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou *I63.2*
- - - Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et *I65.3*
- - - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et *I65*
- - - Sans précision ¬ Occlusion et *I65.9*
- - - ¬ Occlusion et *I65.8*
- - Vertébrale ¬ Occlusion et *I65.0*
- - ¬ *I77.1*
- Atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec *Q21.3*
- Bronches ¬ *J98.0*
- Bronchique congénitale ¬ *Q32.3*
- Canal
- - Biliaire, sans calcul ¬ *K83.1*

Sténose *–suite*
- Canal *–suite*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul ¬ *K82.0*
- - Lacrymal, lacrymonasal ¬ *H04.5*
- - Rachidien ¬
- - - Claudicatio spinalis au cours de *M48.09†, G55.3**
- - - Myélopathie au cours de *M48.09†, G99.2**
- - Salivaire ¬ *K11.8*
- Canalicule lacrymal, lacrymonasal ¬ *H04.5*
- Col
- - Néovessie ¬ *N32.0*
- - Utérus ¬ Rétrécissement et *N88.2*
- - Vessie (acquise) ¬ *N32.0*
- - ¬ Soins maternels pour: rétrécissement ou *O34.4*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.6*
- Congénital
- - Anus
- - - Fistule ¬ Absence, atrésie et *Q42.2*
- - - Sans fistule ¬ Absence, atrésie et *Q42.3*
- - Artère
- - - Pulmonaire ¬ *Q25.6*
- - - Rénale ¬ *Q27.1*
- - Côlon
- - - Sans précision de localisation ¬ Absence, atrésie et *Q42.9*
- - - ¬ Absence, atrésie et *Q42*
- - Duodénum ¬ Absence, atrésie et *Q41.0*
- - E) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- - Iléon ¬ Absence, atrésie et *Q41.2*
- - Intestin
- - - Grêle
- - - - Sans précision de localisation ¬ Absence, atrésie et *Q41.9*
- - - - ¬ Absence, atrésie et *Q41*
- - - SAI ¬ Absence, atrésie et *Q41.9*
- - Isolée des orifices piriformes ¬ *Q30.8*
- - Jéjunum ¬ Absence, atrésie et *Q41.1*
- - Larynx NCA ¬ *Q31.8*
- - Localisation
- - - Côlon ¬ Absence, atrésie et *Q42.8*
- - - Précisées de l'intestin grêle ¬ Absence, atrésie et *Q41.8*
- - Orifice
- - - Nasal (antérieur) (postérieur) ¬ *Q30.0*
- - - Uretère ¬ *Q62.1*
- - Rectum
- - - Fistule ¬ Absence, atrésie et *Q42.0*
- - - Sans fistule ¬ Absence, atrésie et *Q42.1*
- - Trachée ¬ *Q32.1*
- - Urètre et du col de la vessie ¬ Autres formes d'atrésie et de *Q64.3*
- - Valve pulmonaire ¬ *Q22.1*
- - Valvule
- - - Aortique ¬ *Q23.0*

Sténose *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Valvule *–suite*
- - - Tricuspide ¬ *Q22.4*
- - Veine cave
- - - Inférieure) (supérieure) ¬ *Q26.0*
- - - ¬ *Q26.0*
- Duodénum ¬ *K31.5*
- Effet hémodynamique ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sans *I25.10*
- Estomac ¬ Estomac en sablier et *K31.2*
- Hypertrophique congénitale du pylore ¬ *Q40.0*
- Infundibulum pulmonaire ¬ *Q24.3*
- Insuffisance des voies lacrymales ¬ *H04.5*
- Larynx ¬ *J38.6*
- Lombaire du canal rachidien ¬ Claudicatio spinalis au cours de *M48.06†, G55.3**
- Mitral
- - Congénitale ¬ *Q23.2*
- - Insuffisance
- - - Régurgitation ¬ *I05.2*
- - - ¬ *I05.2*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I39.0**
- - ¬ *I05.0*
- Non rhumatismal valvule
- - Mitral
- - - Insuffisance mitrale ¬ *I34.80*
- - - ¬ *I34.2*
- - Tricuspide
- - - Insuffisance ¬ *I36.2*
- - - ¬ *I36.0*
- Œsophage ¬ *K22.2*
- Ostiale coronaire ¬ *Q24.5*
- Ostium urétral ¬ *N35.9*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Pulmonaire
- - Taches café au lait ¬ Syndrome de *Q85.0*
- - ¬
- - - VDDI avec communication interventriculaire sous-aortique ou sous-aortique et sous-pulmonaire et *Q20.1*
- - - Ventricule droit à double issue avec communication interventriculaire sous-aortique ou sous-aortique et sous-pulmonaire et *Q20.1*
- Pylorique
- - Hypertrophique de l'adulte ¬ *K31.1*
- - SAI ¬ *K31.1*
- Rétrécissement congénital
- - Canal lacrymal ¬ *Q10.5*
- - Œsophage ¬ *Q39.3*
- - Voies biliaires ¬ *Q44.3*
- Sac lacrymal, lacrymonasal ¬ *H04.5*
- Sinus coronaire ¬ *Q21.1*
- Sous-aortique congénitale ¬ *Q24.4*

Sténose *–suite*
- Sous-glottique
- - Actes médicaux ¬ *J95.5*
- - Congénitale ¬ *Q31.1*
- Sous-pulmonaire ¬ *Q24.3*
- Stents ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec *I25.16*
- Subaortique
- - Fibromusculaire modérée ¬ *Q24.4*
- - Hypertrophique ¬ *I42.1*
- - Membraneuse modérée ¬ *Q24.4*
- - Tunnel ¬ *Q24.4*
- Supravalvulaire de l'artère pulmonaire ¬ *Q25.6*
- Syphilitique
- - Aorte ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Bronches ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Congénital
- - - Larynx ¬ *A50.5†, J99.8**
- - - Œsophage ¬ *A50.5†, K23.8**
- - Larynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Œsophage ¬ *A52.7†, K23.8**
- - Trachée ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Valve aortique ¬ *A52.0†, I39.1**
- Trachéal
- - Acquis
- - - SAI. ¬ *J39.80*
- - - ¬ *J39.80*
- - Actes médicaux ¬ *J95.81*
- Tricuspidien
- - Insuffisance ¬ *I07.2*
- - ¬ *I07.0*
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.1*
- Tronc
- - Brachio-céphalique ¬ Infarctus cérébral par *I63.2*
- - Commun de l'artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.14*
- Tubaire ¬ *N97.1*
- Uretère ¬ Atrésie et *Q62.1*
- Vagin
- - Acquise) (congénitale) ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- - ¬ *N89.5*
- Vaisseau
- - Pontage ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec *I25.15*
- - Pulmonaires ¬ *I28.8*
- Valvulaire pulmonaire congénitale ¬ *Q22.1*
- Valvule
- - Aortique
- - - Insuffisance ¬ *I35.2*
- - - ¬ *I35.0*
- - Non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- - Pulmonaire
- - - Insuffisance ¬ *I37.2*

Sténose *–suite*
- Valvule *–suite*
- - Pulmonaire *–suite*
- - - ¬ *I37.0*
- - Tricuspide (rhumatismale) ¬ *I07.0*
- Vulve ¬ *N90.5*

Stenotrophomonas
- Non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, *U81.6!*
- ¬ *B96.5!*

Stents ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de *I25.16*

Stercolithe
- Appendice ¬ *K38.1*
- ¬ *K56.4*

Stercoral ¬ Ulcère: *K62.6*

Stéréoscopique ¬ Fusion avec anomalie de la vision *H53.3*

Stéréotypés
- Lésion auto-infligée ¬ Mouvements *F98.41*
- Sans
- - Lésion auto-infligée ¬ Mouvements *F98.40*
- - Précision d'une lésion auto-infligée ¬ Mouvements *F98.49*
- ¬
- - Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements *F84.4*
- - Mouvements *F98.4*

Stéréotypies/comportements répétitifs ¬ *F98.4*

Stérilet
- Cours d'une grossesse ¬ Rétention d'un *O26.3*
- ¬ Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [*Z30.5*

Stérilisation ¬
- *Z30.2*
- Tuboplastie ou vasoplastie après *Z31.0*

Stérilité
- Associée à une anovulation ¬ *N97.0*
- Femme
- - Associée à des facteurs relevant de l'homme ¬ *N97.4*
- - Origines ¬ *N97.8*
- - SAI ¬ *N97*
- - Sans précision ¬ *N97.9*
- - ¬ *N97*
- Homme ¬ *N46*
- Origine
- - Cervicale ¬ *N97.3*
- - Tubaire ¬ *N97.1*
- - Utérine ¬ *N97.2*
- Relative ¬ *N96*
- ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de *Z35.0*

Sternberg) ¬ Syndrome d'Albright(-McCune- *Q78.1*

Sterni ¬ Fracture sternum
- Corpus *S22.22*
- Manubrium *S22.21*

Stern-Lubinsky-Durrie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Sterno mastoïdien
- Congénitale) ¬ Tuméfaction *Q68.0*
- ¬ Torticolis congénital (*Q68.0*

Sterno-claviculaire ¬
- Articulation *T84.10*
- Entorse et foulure de l'articulation *S43.6*
- Luxation de l'articulation *S43.2*
- Tuberculose de l'articulation *A18.0†, M01.11**

Sterno-cléido-mastoïdien
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion *P15.2*
- ¬
- - Anomalie morphologique congénitale des muscles *Q68.0*
- - Contracture du muscle *Q68.0*

Sternum
- Bifide ¬ *Q76.7*
- Bifidum ¬ *Q76.7*
- Clavicule ¬ Tumeur
- - Bénigne: Côtes, *D16.7*
- - Maligne: Côtes, *C41.3*
- Corpus sterni ¬ Fracture du *S22.22*
- Laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique ¬ *M96.80*
- Manubrium sterni ¬ Fracture du *S22.21*
- Processus xiphoideus ¬ Fracture du *S22.23*
- Rachis dorsal ¬ Fracture de côte(s), du *S22*
- ¬
- - *T84.28*
- - Absence congénitale de *Q76.7*
- - Anomalies congénitales du *Q76.7*
- - Entorse et foulure des côtes et du *S23.4*
- - Fracture du *S22.2*
- - Tumeur
- - - Bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.71*
- - - Maligne des os et du cartilage articulaire: *C41.31*

Stéroïdes
- Associée à une thyroïdite auto-immune ¬ Encéphalopathie sensible aux *G04.8, E06.3*
- Déshydrogénase-anomalies dentaires ¬ Syndrome de déficit en *K76.8*
- Hormone ¬
- - Abus de: *F55*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.5*
- Hyalinose focale et segmentaire ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux *N04.1*
- Lésions minimales ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux *N04.0*

Stéroïdes *–suite*
- Prolifération mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux *N04.3*
- Sclérose mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux *N04.8*
- Sulfatase ¬ Déficit en *Q80.1*
- ¬
- - Acné due aux *L70.8*
- - Taux urinaires élevés de: *R82.5*

Stéroïdien
- AINS] ¬ Intoxication: Autres anti-inflammatoires non *T39.3*
- Sang ¬ Présence d'un produit *R78.6*
- ¬ Ulcère
- - Estomac dû aux anti-inflammatoires non *K25.9, Y57.9!*
- - Gastro-duodénal dû aux anti-inflammatoires non *K27.9, Y57.9!*
- - Peptique dû aux anti-inflammatoires non *K27.9, Y57.9!*

Stérol
- 27-hydroxylase ¬ Déficit en *E75.5*
- C5-désaturase ¬ Déficit en *Q87.8*

Stevens-Johnson
- Nécrolyse épidermique toxique ¬ Spectre syndrome de *L51.20*
- ¬
- - Dermatostomatite type *L51.1*
- - Syndrome de *L51.1*

Stevenson
v.a. Beare-Stevenson
v.a. Patterson-Stevenson
- ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Stickler ¬ Syndrome de *Q87.0*

Stieda] ¬ Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini- *M76.4*

Stiff baby ¬ Syndrome *G25.88*

Stiff man" congénital" ¬ Syndrome *G25.88*

Still
- SAI ¬ Maladie de *M08.2*
- Survenant chez l'adulte ¬ Maladie de *M06.1*

Stilling-Türk-Duane ¬ Syndrome de *H50.8*

Stimulant
- Bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques ¬ Médicaments *T44.9*
- Hors caféine ¬
- - Consommation non intraveineuse d'autres *U69.36!*
- - Utilisation intraveineuse d'autres *U69.35!*
- Y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres *F15*
- ¬ Intoxication: Laxatifs *T47.2*

Stimulateur
- Cardiaque
- - Implanté ¬ Adaptation et manipulation d'un *Z45.00*

Stimulateur *–suite*
- Cardiaque *–suite*
- - ¬
- - - Changement
- - - - *Z45.00*
- - - - Générateur d'un *Z45.00*
- - - Contrôle d'un *Z45.00*
- - - Présence de: *Z95.0*
- Diaphragmatique ¬ Adaptation et manipulation d'un *Z45.81*
- Électronique du système nerveux ¬ Complication mécanique de l'implantation d'un *T85.1*
- Sacré radiculaire ¬ *Z45.80*
- Thérapie de resynchronisation cardiaque ¬ Présence de: *Z95.0*

Stimulation
- Excessive par des médicaments déclencheurs de contractions ¬ Hyperactivité de l'utérus due à une *O62.8, Y57.9!*
- Nerveuse ¬ Anomalies (de): réponse à une *R94.1*

STING ¬ Vasculopathie de l'enfant associée à *M35.8*

STK4 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Stocco Dos Santos ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Stockage
- Esters du cholestérol ¬ Maladie de *E75.5*
- Glycogène ¬ Myopathie au cours d'anomalies de *E74.0†, G73.6**
- Graisses ¬ *E75.6*
- Granules plaquettaires delta ¬ Déficit isolé de *D69.1*
- Lipides
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E75.6*
- - ¬
- - - Anomalie
- - - - *E75.5*
- - - - Métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du *E75*
- - - Dystrophie rétinienne au cours de maladie de *E75.6†, H36.8**
- - - Myopathie au cours de maladie de *E75.6†, G73.6**

Stock-Spielmeyer-Vogt ¬ Syndrome de *E75.4*

Stokes ¬
- Dyspnée de Cheyne- *R06.3*
- Maladie d'Adams- *I45.9*

Stoll ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Stoll-Lévy-Francfort ¬ Syndrome de *Q87.2*

Stomal(e) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*

Stomatine
- Normale ¬ Cryohydrocytose héréditaire avec *D58.8*
- ¬ Cryohydrocytose héréditaire avec réduction de *D58.8*

Stomatite
- Affections apparentées ¬ *K12*
- Allergique ¬ *K12.1*
- Angulaire carence vitamine
- - B NCA ¬ *E53.9†, K93.8**
- - B2 ¬ *E53.0†, K93.8**
- Aphteuse (majeure) (mineure) ¬ *K12.0*
- Candida ¬ *B37.0*
- Fusospirochètes ¬ *A69.1*
- Gangréneuse ¬ *A69.0*
- Geotrichum ¬ *B48.3*
- Herpétiforme ¬ *K12.0*
- Pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès ¬ Gingivo- *B00.2*
- Prothèse ¬ *K12.1*
- SAI ¬ *K12.1*
- Ulcéreuse ¬ *K12.1*
- Ulcéro-nécrotique
- - Aiguë) ¬ Gingivo- *A69.1*
- - ¬ *A69.0*
- Vésiculaire
- - Exanthème, due à un entérovirus ¬ *B08.4*
- - Virale [fièvre de l'Indiana] ¬ *A93.8*
- Vésiculeuse ¬ *K12.1*
- ¬ Autres formes de *K12.1*

Stomatocytose ¬ *D58.8*

Stomie
- Appareil
- - Digestif ¬
- - - Présence d'une autre *Z93.4*
- - - Surveillance d'autres *Z43.4*
- - Urinaire ¬
- - - Mauvais fonctionnement de *N99.5*
- - - Présence d'une autre *Z93.6*
- Non précisée ¬ Surveillance d'une *Z43.9*
- Sans précision ¬ Présence d'une *Z93.9*
- Voies urinaires ¬ Surveillance d'autres *Z43.6*
- ¬
- - Existence d'autres *Z93.88*
- - Présence
- - - *Z93*
- - - *Z93.8*
- - Surveillance
- - - *Z43*
- - - *Z43.8*
- - - *Z43.88*

Stormorken ¬ Syndrome de *D69.1*

Stout
v. Gorham-Stout

Stovin
v. Hughes-Stovin

Strabisme
- Adhérences ¬ *H50.6*
- Concomitant SAI ¬ *H50.4*
- Convergent

Strabisme *–suite*
- Convergent *–suite*
- - Concomitant ¬ *H50.0*
- - Intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Ésotropie [*H50.3*
- Divergens] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Exotropie [*H50.3*
- Divergent concomitant ¬ *H50.1*
- Incisure du lobe de l'oreille ¬ Syndrome de retard de langage-asymétrie faciale- *Q87.0*
- Latent ¬ *H50.5*
- Mécanique ¬ *H50.6*
- Paralytique
- - Sans précision ¬ *H49.9*
- - ¬ Autres *H49.8*
- Précisés ¬ Autres *H50.8*
- Sans précision ¬ *H50.9*
- Vertical ¬ *H50.2*
- ¬
- - *H50*
- - Amblyopie: avec *H53.0*

Straddling
- Overriding de la valve tricuspide ¬ *Q22.8*
- Valve mitrale ¬ *Q23.8*

Strangulation
- Intestin due à une hernie avec gangrène ¬ *K46.1*
- ¬
- - Iléus par *K56.2*
- - Suffocation (par *T71*

Strangurie ¬ *R30.0*

Stratakis
v. Carney-Stratakis

Stratton-Garcia-Young ¬ Syndrome de *Q87.8*

Strauss
v. Churg-Strauss

Straussler
v. Gerstmann-Straussler-Scheinker

Streptobacillaire causée par morsure de rat ¬ Fièvre (de): *A25.1*

Streptobacillose ¬ *A25.1*

Streptobacillus moniliformis ¬ Infection à *A25.1*

Streptocerca ¬ Infection à Mansonella: *B74.4*

Streptococcus pneumoniae
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.3!*
- Résistant
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ *U80.11!*
- - Pénicilline oxacilline
- - - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ *U80.10!*
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ *U80.1!*
- - - ¬ *U80.10!*
- ¬

Streptococcus pneumoniae *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Pneumonie due à *J13*
- - Septicémie à *A40.3*

Streptocoque
v.a. Pseudostreptocoque

- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.4!*
- Entérocoques, siège non précisé ¬ Infection à *A49.1*
- Groupe
- - A
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.0!*
- - - ¬ Septicémie à *A40.0*
- - C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.41!*
- - D entérocoques
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.2!*
- - - ¬ Septicémie à *A40.2*
- - G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.42!*
- Groupe B
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.1!*
- - ¬
- - - Pneumonie
- - - - *J15.3*
- - - - Congénitale à *P23.3*
- - - Sepsis du nouveau-né à *P36.0*
- - - Septicémie à *A40.1*
- Moelle épinière ¬ Infection à *G04.8, B95.5!*
- Non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.5!*
- Sans précision ¬
- - Sepsis du nouveau-né à *P36.1*
- - Septicémie à *A40.9*
- Sauf groupe B ¬ *P23.6*
- Spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.48!*
- Staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95!*
- ¬
- - Amygdalite à *J03.0*
- - Angine à *J02.0*
- - Arthrites et polyarthrites à *M00.2*
- - Bronchite aiguë due à des *J20.2*
- - Choc septique à *A40.9, R57.2*
- - Endocardite
- - - *I33.0, B95.5!*
- - - Valvule aortique à *I33.0, B95.5!*
- - Glomérulonéphrite au cours de sepsis à *A40.9†, N08.0**
- - Infection
- - - Congénitale à *P37.8, B95.48!*
- - - Cutanée locale à *L08.9, B95.5!*
- - - Organes respiratoires supérieurs à *J06.9, B95.5!*

Streptocoque *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Laryngite à *J04.0, B95.5!*
- - Laryngotrachéite à *J04.2, B95.5!*
- - Maladie des organes respiratoires supérieurs à *J06.9, B95.5!*
- - Méningite à *G00.2*
- - Méningo-encéphalite à *G04.2, B95.5!*
- - Péricardite à *I30.1, B95.5!*
- - Pharyngite à *J02.0*
- - Pneumonie due à d'autres *J15.4*
- - Rhinopharyngite à *J00, B95.5!*
- - Septicémie
- - - *A40*
- - - *A40.8*
- - Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des: *Z22.3*
- - Trachéite à *J04.1, B95.5!*

Streptogène ¬ Pityriasis *L30.5, B95.5!*

Streptogramines

- Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux *U80.3!*
- Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux *U80.31!*
- Nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux *U80.11!*
- Oxazolidinones
- - Non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux *U80.01!*
- - ¬ Staphylocoque doré résistant oxacilline
- - - Glycopeptides, aux quinolones, aux *U80.0!*
- - - Méticilline et le cas échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux *U80.00!*
- - ¬
- - Enterococcus
- - - Faecalis résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux *U80.20!*
- - - Faecium résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux *U80.30!*
- - Streptococcus pneumoniae résistant pénicilline oxacilline
- - - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux *U80.10!*
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux *U80.1!*

Streptomycine ¬

- *T36.5*
- Hypersensibilité à la *T88.7*

Stress

- Excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au *X59.9!*

Stress *–suite*

- Non classé ailleurs ¬ *Z73*
- Physique ou mental, non précisé ¬ *Z73*
- Post-traumatique ¬ État de *F43.1*
- Sévère
- - Sans précision ¬ Réaction à un facteur de *F43.9*
- - Troubles de l'adaptation ¬ Réaction à un facteur de *F43*
- - ¬ Autres réactions à un facteur de *F43.8*
- ¬
- - Cardiomyopathie de *I42.88*
- - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- - Erythrocytose liée au *D75.1*
- - Fracture vertébrale de *M48.4*
- - Incontinence urinaire d'effort [incontinence de *N39.3*
- - Polycythémie: due à: *D75.1*
- - Réaction aigu
- - - *F43.0*
- - - Facteur de *F43.0*

Stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements *X59.9!*

Striatum syphilitique ¬ Atrophoderma maculatum et *A52.7†, L99.8**

Stricts ¬ Anémie des végétariens *D51.3*

Stricture des vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.8*

Stridor

- Congénital (laryngé) SAI ¬ *P28.8*
- ¬ *R06.1*

Striduleux) ¬ Laryngisme (*J38.5*

Strié

- Appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et *T48*
- Bandes ¬ Kératodermie palmoplantaire *Q82.8*
- Bloquants neuromusculaires] ¬ Intoxication: Myorelaxants (muscles *T48.1*
- ¬
- - Kératite: *H16.1*
- - Langue: *K14.5*
- - Lichen *L44.2*
- - Spasticité d'origine rachidienne des muscles *G95.83*

Stries

- Angioïdes [Angioid streaks] ¬ *H35.38*
- Atrophique
- - Syphilitiques ¬ *A52.7†, L99.8**
- - ¬ *L90.6*
- ¬ Atrophie
- - Maculaire syphilitique de la peau en *A52.7†, L99.8**
- - Syphilitique de la peau en *A52.7†, L99.8**

Striopallidodentée bilatérale ¬ Calcinose *G23.8*

Strohl
v. Guillain-Barré-Strohl

Stroma ¬ Tumeur testiculaire des cordons sexuels et du *C62.9*

Stromale

- Gastro-intestinal
- - TSGI GIST
- - - Côlon ¬ Tumeur *C18.9*
- - - Estomac ¬ Tumeur *C16.9*
- - - Intestin grêle ¬ Tumeur *C17.9*
- - - Œsophage ¬ Tumeur *C15.9*
- - - Péritoine ¬ Tumeur *C48.2*
- - ¬ Tumeur *C26.9*
- ¬
- - Dystrophie cornéenne *H18.5*
- - Kératite *H16.3*

Strongyloïdose

- Cutanée ¬ *B78.1†, L99.8**
- ¬
- - *B78.9*
- - Anguillulose [*B78*
- - Glomérulonéphrite au cours de *B78.9†, N08.0**
- - Maladie
- - - Glomérulaire au cours de *B78.9†, N08.0**
- - - VIH avec *B20, B78.9*

Structure

- Anormale ¬ Homme avec chromosomes sexuels de *Q98.6*
- Dentaire, non classées ailleurs ¬ Anomalies héréditaires de la *K00.5*
- Osseux
- - Sans précision ¬ Anomalie de la densité et de la *M85.9*
- - ¬ anomalie
- - - Densité et de la *M85*
- - - Précisées de la densité et de la *M85.8*

Structurel

- Aide ¬ Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres *Z75.8*
- Apparentées ¬ Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et *C75*
- Intrathoracique précis
- - Canal thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.82*
- - Diaphragme ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.81*
- - Œsophage, partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.83*
- - Organes et structures intrathoraciques précisées ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.88*
- - Thymus ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.84*
- - ¬ Lésion traumatique organe
- - - *S27.8*
- - - Structures intrathoraciques précisés: Autres organes et *S27.88*

Structurel *–suite*

- Noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des *E88.21*
- Œil ¬ les affections de plusieurs *H44*
- Sans précision ¬ Réarrangement équilibré et marqueur *Q95.9*
- ¬
- - Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies *G71.2*
- - Réarrangements équilibrés et marqueurs *Q95.8*

Strudwick ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Strumite lymphomateuse ¬ *E06.3*

Strümpell-Lorrain ¬ Maladie de *G11.4*

Strychnine et ses sels ¬ Effet toxique: *T65.1*

Stuart ¬ Déficit congénital en facteur *D68.24*

Stuart-Bras ¬ Syndrome toxique de *K71.80*

Stuart-Prower ¬

- Carence en facteur *D68.24*
- Déficit en facteur *D68.24*

Stupeur

- Catatonique ¬ *F20.2*
- Coma ¬ Somnolence, *R40*
- Dissociative ¬ *F44.2*
- Maniaque ¬ *F30.2*
- ¬ *R40.1*

Sturge-Weber(-Dimitri) ¬ Syndrome de: *Q85.8*

Sturge-Weber-Krabbe ¬ Angiomatose de *Q85.8*

Stüve-Wiedemann ¬ Syndrome de *Q78.8*

Styloïde

- Allongé ¬ Syndrome du processus *M77.9*
- Cubitus ¬ Apophyse *S52.8*

Subaigu
v. Type de maladie

Subaortique

- Fibromusculaire modérée ¬ Sténose *Q24.4*
- Hypertrophique ¬ Sténose *I42.1*
- Membraneuse modérée ¬ Sténose *Q24.4*
- Tunnel ¬ Sténose *Q24.4*

Subaréolaire gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ Abcès: *O91.1*

Sub-condylienne ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.62*

Subdural cause non traumatique

- Nouveau-né ¬ Hématome *P52.8*
- ¬ Hématome spinal *G95.10*

Sub-épendymome ¬ *D43.2*

Subérose ¬ *J67.3*

Subinvolution

- Sein (après lactation) ¬ *N64.8*
- Utérus ¬ *N85.3*

Subit

- Cause inconnue ¬ Autre mort *R96*
- Décrite ainsi ¬ Mort cardiaque *I46.1*
- Fièvre des trois jours] ¬ Exanthème *B08.2*
- Inexpliquée mort subit nourrisson
- - Âge d'un an ¬ Mort *R96.0*
- - Avant l'âge d'un an ¬ Mort *R95*
- Nourrisson
- - Âge ¬ Mort
- - - *R96.0*
- - - Subite inexpliquée (mort *R96.0*
- - Avant âge ¬ Mort
- - - *R95.9*
- - - Subite inexpliquée (mort *R95*
- - Mention d'autopsie ¬ Syndrome de la mort *R95.0*
- - SAI ¬ Syndrome de la mort *R95.9*
- - Sans mention d'autopsie ¬ Syndrome de la mort *R95.9*
- - ¬
- - - Quasi-syndrome de mort *R06.80*
- - - Syndrome mort
- - - - *R95*
- - - - *R95.9*
- Vision ¬ Perte *H53.1*

Subjectifs de la vision ¬ Troubles *H53.1*

Sublingual ¬

- Glande: *D11.7*
- Tumeur
- - Épithéliale maligne de la glande *C08.1*
- - Maligne: Glande *C08.1*
- Varices *I86.0*

Subluxable ¬ Hanche: *Q65.6*

Subluxation

- Articulaires récidivantes ¬ Luxation et *M24.4*
- Atloïdo-axoïdiennes récidivantes ¬ Autres *M43.4*
- Complexe (vertébrale) ¬ *M99.1*
- Congénital hanche
- - Bilatérale ¬ *Q65.4*
- - Sans précision ¬ *Q65.5*
- - Unilatérale ¬ *Q65.3*
- Pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs ¬ Luxation et *M24.3*
- Récidivant
- - Atloïdo-axoïdienne avec myélopathie ¬ *M43.3*
- - Rotule ¬ *M22.1*
- Symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ *O26.7*
- Traumatique
- - Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Vertébrales récidivantes ¬ Autres *M43.5*
- ¬ Rétrécissement
- - Canal rachidien par *M99.2*

Subluxation *–suite*
- ¬ Rétrécissement *–suite*
- - Espaces intervertébraux par ossification et *M99.6*

Submandibulaire associée à IgG4 ¬ Maladie de la glande *K11.2*

Submersion non mortelle ¬ Noyade et *T75.1*

Submuqueuse ¬ Fente palatine *Q35.9*

Suboccipitale ¬ Malum vertebrale *A18.0†, M49.01**

Substance
- Agissant essentiellement sur
- - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ Intoxication: *T48.7*
- - Muscle
- - - Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par *T48*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: *T48.2*
- - Système cardio-vasculaire
- - - Sans précision ¬ Intoxication: *T46.9*
- - - ¬ Intoxication par *T46*
- - Tractus gastro-intestinal
- - - Sans précision ¬ Intoxication: *T47.9*
- - - ¬ Intoxication: Autres *T47.8*
- Anti-anémiantes ¬ Préparation à base de foie et autres *T45.8*
- Antivariqueuses, y compris les agents sclérosants ¬ Intoxication: *T46.8*
- Appropriée et correctement administrée ¬ Choc anesthésique dû à une *T88.2*
- Biologique
- - Actif
- - - Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres *Y59.9!*
- - - ¬
- - - - Complications dues à des vaccins ou à des *Y59.9!*
- - - - Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres *Y59!*
- - - - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Médicament, drogues et autres *X49.9!*
- - Sans précision ¬
- - - Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une *Z88.9*
- - - Intoxication
- - - - Diurétiques et médicaments et *T50*
- - - - Médicaments et *T50.9*
- - - Néphropathie due à un médicament ou une *N14.2*
- - ¬
- - - Antécédent personel allergie médicament
- - - - *Z88.8*
- - - - *Z91.0*
- - - Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de *R82.5*

Substance *–suite*
- Biologique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Néphropathie due à d'autres médicaments et *N14.1*
- - - Séquelles d'intoxications par médicaments et *T96*
- Blanc
- - SAI ¬ Affection de la *R90.8*
- - ¬ Leucoencéphalopathie avec ataxie cérébelleuse modérée et Œdème de la *E75.2*
- Bouillantes ¬ Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des *X19!*
- Cérébrale ¬ Défaut congénital d'une partie de la *Q04.3*
- Chimique
- - Environnement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des *P04.6*
- - Nutritionnelles ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de *P04.5*
- Contaminées ¬ *Y69!*
- Corrosif
- - Sans précision ¬ Effet toxique: *T54.9*
- - ¬ Effet toxique de *T54*
- Essentiellement systémique hématologique
- - Non classées ailleurs ¬ Intoxication par *T45*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T45.9*
- - ¬ Intoxication: Autres *T45.8*
- Étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Réaction aiguë à une *T81.6*
- Ingérées ¬ Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de *Z03.6*
- Médicamenteux
- - Approprié correctement administré ¬
- - - Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une *T88.6*
- - - Effet indésirable dû (due) à une *T88.7*
- - - Hypersensibilité dû (due) à une *T88.7*
- - - Idiosyncrasie dû (due) à une *T88.7*
- - - Réaction allergique dû (due) à une *T88.7*
- - ¬ métaux de toutes origines, sauf *T56*
- Minérale NCA ¬ Taux anormal de: *R79.0*
- N entraînant dépendance
- - Analgésiques ¬ Usage nocif de *F55.2*
- - Antiacides ¬ Usage nocif de *F55.3*
- - Antidépresseurs ¬ Usage nocif de *F55.0*
- - Laxatifs ¬ Usage nocif de *F55.1*
- - Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage nocif de *F55.6*
- - Stéroïdes et hormones ¬ Usage nocif de *F55.5*
- - Substance
- - - Non précisée ¬ Usage nocif de *F55.9*
- - - ¬ Usage nocif de *F55.8*
- - Vitamines ¬ Usage nocif de *F55.4*

Substance *–suite*
- N entraînant dépendance *–suite*
- - ¬ Usage nocif de *F55*
- Nocif
- - Absorbé biais
- - - Aliment
- - - - Sans précision ¬ Effet toxique: *T62.9*
- - - - ¬ Effet toxique d'autres *T62*
- - - Fruits de mer ¬ Effet toxique de *T61*
- - Précisées absorbées par le biais d'aliments ¬ Effet toxique: Autres *T62.8*
- - ¬ Empoisonnement accidentel par exposition à des *X49!*
- Non
- - Organique
- - - Précisées ¬ Effet toxique: Autres *T57.8*
- - - Sans précision ¬ Effet toxique: *T57.9*
- - - ¬ Effet toxique d'autres *T57*
- - Précis
- - - Prise par voie interne ¬ Dermite due à une *L27.9*
- - - ¬
- - - - Effet toxique de *T65*
- - - - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.9*
- - Trouvé normalement sang
- - - Sans précision ¬ Présence d'une *R78.9*
- - - ¬ Présence de drogues et d'autres *R78*
- Origine
- - Essentiellement non médicinale ¬ Séquelles d'effets toxiques de *T97*
- - Principalement non médicinale ¬ Taux anormal dans les urines de *R82.6*
- Précis
- - Non trouvées normalement dans le sang ¬ Présence d'autres *R78.8*
- - ¬ Effets toxiques d'autres *T65.8*
- Prises par voie interne ¬ Dermite due à d'autres *L27.8*
- Psycho actif
- - Troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.3!*
- - Voie intraveineuse ¬ Consommation d'autres *U69.32!*
- - ¬
- - - Antécédents personnels d'abus de *Z86.4*
- - - Delirium, non induit par l'alcool et d'autres *F05*
- - - Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres *F04*
- - - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres *F19*
- Psychotrope dans le sang ¬ Présence d'une *R78.5*
- Radioactives ¬ Application thérapeutique de *Z51.0*
- Sans précision ¬ Effet toxique d'une *T65.9*

Substance *–suite*

- Similaire ¬ Effet toxique
- - Acides corrosifs et *T54.2*
- - Alcalis corrosifs et *T54.3*
- Solides et liquides ¬ Pneumonie due à d'autres *J69.8*
- Susceptibles d'entraîner une dépendance ¬ Présence dans le sang d'autres *R78.4*
- Toxiques agricoles et industrielles ¬ *Z57*
- Transmises par voie placentaire ¬ effets non tératogènes de *P04*
- Usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par *T49*
- ¬
- - Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces *U69.3!*
- - Préparations contenant une seule et plusieurs *T38.4*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Autres *F55.8*

Substitution

- Méthadone ¬ Traitement de *Z51.83*
- Opiacés ¬ Traitement de *Z51.83*

Substituts synthétiques

- Antagonistes, non classés ailleurs ¬ Intoxication par hormones et leurs *T38*
- Sans précision ¬ Intoxication: Hormones et leurs *T38.8*

Substrat neurologique ¬

- Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans *N31.81*
- Vessie instable sans *N31.82*

Subtélomérique 1p36 ¬ Délétion *Q93.5*

Subtotale ¬ Colite

- Indéterminée *K52.30*
- Ulcéreuse (chronique) *K51.0*

Subvalvulaire ¬ Anomalie de l'appareil mitral *Q23.8*

Succédané du plasma ¬ *T45.8*

Succès ¬ Arrêt cardiaque

- Réanimation sans *I46.9*
- Réanimé avec *I46.0*

Succession de malformations du septum urorectal ¬ *Q87.8*

Succinate
v.a. argino-succinate

Succinate-semi-aldéhyde déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.8*

Succinimide

- Oxazolidine-diones ¬ Intoxication: *T42.2*
- ¬
- - Hypersensibilité aux *T88.7*
- - Intoxication au *T42.2*

Succinyl-CoA

- 3

Succinyl-CoA *–suite*

- 3 *–suite*
- - Cétoacide CoA transférase ¬ Déficit en *E71.3*
- - Oxoacide CoA transférase ¬ Déficit en *E71.3*
- Acétoacétate transférase ¬ Déficit en *E71.3*

Succion du pouce ¬ *F98.88*

Sucrase ¬ Déficit en *E74.3*

Sucré

- Altération vasculaire ¬ Diabète *E14.50†*, *I79.2**
- Angiopathie ¬ Diabète *E14.50†*, *I79.2**
- Ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de tubulopathie proximale-diabète *Q87.8*
- Cataracta diabetica ¬ Diabète *E14.30†*, *H28.0**
- Complication
- - Neurologique ¬ Diabète *E14.40*
- - Rénale ¬ Diabète *E14.30*
- Cours grossesse
- - Diabète sucré préexistant
- - - Lié à la malnutrition ¬ Diabète *O24.2*
- - - Sans précision ¬ Diabète *O24.3*
- - - Type
- - - - 1 ¬ Diabète *O24.0*
- - - - 2 ¬ Diabète *O24.1*
- - Sans précision ¬ Diabète *O24.9*
- - ¬ Diabète *O24*
- Gestationnel SAI ¬ Diabète *O24.4*
- Glomérulosclérose ¬ Diabète *E14.20†*, *N08.3**
- Hépatogène ¬ Diabète *E13.90*
- Instable ¬ diabète (*E10*
- Insulino-dépendant
- - Primaire avec complication vasculaire périphérique ¬ Diabète *E10.50†*, *I79.2**
- - Type
- - - 1 avec complication vasculaire périphérique ¬ Diabète *E10.50†*, *I79.2**
- - - 2 complication
- - - - Neurologique ¬ Diabète *E11.40†*, *G63.2**
- - - - Oculaire ¬ Diabète *E11.30†*, *H58.8**
- - - - Rénale ¬ Diabète *E11.20†*, *N08.3**
- Juvénile ¬ diabète (*E10*
- Maculopathie ¬ Diabète *E14.30†*, *H36.0**
- Maladie oculaire ¬ Diabète *E14.30†*, *H58.8**
- Malnutrition
- - Type
- - - 1 ¬ diabète *E12*
- - - 2 ¬ diabète *E12*
- - ¬ Diabète *E12*
- Mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) ¬ Diabète *P70.1*
- Microangiopathie et macro-angiopathie ¬ Diabète *E14.50†*, *I79.2**

Sucré *–suite*

- MOA [maladie occlusive artérielle] ¬ Diabète *E14.50†*, *I79.2**
- Myatrophie ¬ Diabète *E14.40†*, *G73.0**
- Néonatal ¬ Diabète *P70.2*
- Néphropathie ¬ Diabète *E14.20†*, *N08.3**
- Neuropathie ¬ Diabète *E14.40†*, *G63.2**
- Non
- - Insulino-dépendant
- - - Primaire complication
- - - - Neurologique ¬ Diabète *E11.40†*, *G63.2**
- - - - Oculaire ¬ Diabète *E11.30†*, *H58.8**
- - - Type 2 complication
- - - - Neurologique ¬ Diabète *E11.40†*, *G63.2**
- - - - Oculaire ¬ Diabète *E11.30†*, *H58.8**
- - - - Rénale ¬ Diabète *E11.20†*, *N08.3**
- - Type 1 ou 2 ¬ Diabète *E13.90*
- Obésité sans obésité
- - Adulte ¬ diabète (*E11*
- - Maturité ¬ diabète (*E11*
- - Non
- - - Cétosique ¬ diabète (*E11*
- - - Insulino-dépendant du sujet jeune ¬ diabète (*E11*
- - Stable ¬ diabète (*E11*
- - Type 2 sous insulinothérapie ¬ diabète (*E11*
- Œdème de la macula ¬ Diabète *E14.30†*, *H36.0**
- Pancréatoprive ¬ Diabète
- - *E13*
- - *E13.90*
- Polyneuropathie ¬ Diabète *E14.40†*, *G63.2**
- Préexistant
- - Lié à la malnutrition ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète *O24.2*
- - Sans précision ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète *O24.3*
- - Type
- - - 1 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète *O24.0*
- - - 2 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète *O24.1*
- Prurit ¬ Diabète *E14.60†*, *L99.8**
- Rétinopathie ¬ Diabète *E14.30†*, *H36.0**
- Sans précision ¬ Diabète *E14*
- Sujet à cétose ¬ diabète (*E10*
- Survenant au cours de la grossesse ¬ Diabète *O24.4*
- Trouble circulatoire ¬ Diabète *E14.50†*, *I79.2**
- Type
- - 1
- - - Altération vasculaire ¬ Diabète *E10.50†*, *I79.2**
- - - Angiopathie ¬ Diabète *E10.50†*, *I79.2**
- - - Arthrite de Charcot ¬ Diabète *E10.60†*, *M14.69**

Sucré *–suite*
- Type *–suite*
- - 1 *–suite*
- - - Cataracte ¬ Diabète *E10.30†, H28.0**
- - - Complication
- - - - Neurologique ¬ Diabète *E10.40†, G63.2**
- - - - Rénale ¬ Diabète *E10.20†, N08.3**
- - - - Vasculaire périphérique ¬ Diabète *E10.50†, I79.2**
- - - Maculopathie ¬ Diabète *E10.30†, H36.0**
- - - Maladie oculaire ¬ Diabète *E10.30†, H58.8**
- - - Manifestation ophtalmologique ¬ Diabète *E10.30†, H58.8**
- - - MOA [maladie occlusive artérielle] ¬ Diabète *E10.50†, I79.2**
- - - Myatrophie ¬ Diabète *E10.40†, G73.0**
- - - Névralgie ¬ Diabète *E10.40†, G63.2**
- - - Névrite ¬ Diabète *E10.40†, G63.2**
- - - Polyneuropathie ¬ Diabète *E10.40†, G63.2**
- - - Prurit ¬ Diabète *E10.60†, L99.8**
- - - Rétinite ¬ Diabète *E10.30†, H36.0**
- - - Rétinopathie diabétique ¬ Diabète *E10.30†, H36.0**
- - - Trouble circulatoire ¬ Diabète *E10.50†, I79.2**
- - - ¬
- - - - Décollement tractionnel au cours de rétinopathie diabétique dans le diabète *E10.30†, H36.0**
- - - - Dégénérescence graisseuse du rein dans le diabète *E10.20†, N29.8**
- - - - Diabète *E10*
- - - - Foie diabétique dans le diabète *E10.60†, K77.8**
- - - - Fond d'œil diabétique dans le diabète *E10.30†, H36.0**
- - - - Gastroparésie diabétique dans le diabète *E10.40†, G99.0**
- - - - Glaucome de néovascularisation au cours de rétinopathie diabétique dans le diabète *E10.30†, H36.0**
- - - - Glomérulonéphrite diabétique dans le diabète *E10.20†, N08.3**
- - - - Glomérulosclérose diabétique dans le diabète *E10.20†, N08.3**
- - - - Microangiopathie diabétique dans le diabète *E10.50†, I79.2**
- - - - Nécrobiose lipoïdique diabétique dans le diabète *E10.60†, L99.8**
- - - - Neuropathie diabétique dans le diabète *E10.40†, G63.2**
- - - - Polyneuropathie diabétique dans le diabète *E10.40†, G63.2**
- - - - Rubeosis diabetica dans le diabète *E10.60†, L99.8**
- - - - Syndrome
- - - - - Kimmelstiel et Wilson extracapillaire diabétique dans le diabète *E10.20†, N08.3**
- - - - - Kimmelstiel-Wilson dans le diabète *E10.20†, N08.3**

Sucré *–suite*
- Type *–suite*
- - 1 *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Vulvitis diabetica dans le diabète *E10.60†, N77.8**
- - 2
- - - Altération vasculaire ¬ Diabète *E11.50†, I79.2**
- - - Amyotrophie ¬ Diabète *E11.40†, G73.0**
- - - Angiopathie ¬ Diabète *E11.50†, I79.2**
- - - Arthrite de Charcot ¬ Diabète *E11.60†, M14.69**
- - - Cataracte ¬ Diabète *E11.30†, H28.0**
- - - Complication
- - - - Neurologique ¬ Diabète *E11.40†, G63.2**
- - - - Rénale ¬ Diabète *E11.20†, N08.3**
- - - Maculopathie ¬ Diabète *E11.30†, H36.0**
- - - Maladie oculaire ¬ Diabète *E11.30†, H58.8**
- - - MOA [maladie occlusive artérielle] ¬ Diabète *E11.50†, I79.2**
- - - Myatrophie ¬ Diabète *E11.40†, G73.0**
- - - Néphropathie ¬ Diabète *E11.20†, N08.3**
- - - Neuropathie ¬ Diabète *E11.40†, G63.2**
- - - Névralgie ¬ Diabète *E11.40†, G63.2**
- - - Névrite ¬ Diabète *E11.40†, G63.2**
- - - Prurit ¬ Diabète *E11.60†, L99.8**
- - - Rétinite ¬ Diabète *E11.30†, H36.0**
- - - Rétinopathie diabétique ¬ Diabète *E11.30†, H36.0**
- - - Trouble circulatoire ¬ Diabète *E11.50†, I79.2**
- - - ¬
- - - - Décollement tractionnel au cours de rétinopathie diabétique dans le diabète *E11.30†, H36.0**
- - - - Dégénérescence graisseuse du rein dans le diabète *E11.20†, N29.8**
- - - - Diabète *E11*
- - - - Foie diabétique dans le diabète *E11.60†, K77.8**
- - - - Fond d'œil diabétique dans le diabète *E11.30†, H36.0**
- - - - Gastroparésie diabétique dans le diabète *E11.40†, G99.0**
- - - - Glaucome de néovascularisation au cours de rétinopathie diabétique dans le diabète *E11.30†, H36.0**
- - - - Glomérulonéphrite diabétique dans le diabète *E11.20†, N08.3**
- - - - Glomérulosclérose diabétique dans le diabète *E11.20†, N08.3**
- - - - Microangiopathie diabétique dans le diabète *E11.50†, I79.2**
- - - - Nécrobiose lipoïdique diabétique dans le diabète *E11.60†, L99.8**
- - - - Polyneuropathie diabétique dans le diabète *E11.40†, G63.2**
- - - - Rubeosis diabetica dans le diabète *E11.60†, L99.8**

Sucré *–suite*
- Type *–suite*
- - 2 *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Syndrome
- - - - - Kimmelstiel et Wilson extracapillaire diabétique dans le diabète *E11.20†, N08.3**
- - - - - Kimmelstiel-Wilson dans le diabète *E11.20†, N08.3**
- - - - Vulvitis diabetica dans le diabète *E11.60†, N77.8**
- ¬
- - Antécédents familiaux de diabète *Z83.3*
- - Arthropathie neuropathique dans le diabète *E14.60†, M14.69**
- - Examen spécial de dépistage de diabète *Z13.1*
- - Neuropathie des nerfs périphériques autonomes dans le diabète *E14.40†, G99.0**
- - Syndrome myasthénique dans le diabète *E14.40†, G73.0**
- - Trouble circulatoire dans le diabète *E14.50†, I79.2**

Sucrose ¬ Intolérance au *E74.3*

Sudanophile
- Pelizaeus-Merzbacher ¬ Leucodystrophie *E75.2*
- ¬ Leucodystrophie *E75.2*

Sudden Adult Death Syndrome] ¬ SADS [*R96.0*

Sudden Arrhythmic Death Syndrome] ¬ SADS [*I49.9*

Sudden infant death syndrome
- Âge d'un an ¬ SIDS [*R96.0*
- Avant l'âge d'un an ¬ *R95.9*
- SIDS] ¬ *R95*

Sudeck-Leriche ¬ Atrophie osseuse de *G90.5*

Sudoripares
- Apocrine
- - Sans précision ¬ Affection des glandes *L75.9*
- - ¬ Autres affections des glandes *L75.8*
- Exocrines
- - Sans précision ¬ Affection des glandes *L74.9*
- - ¬ Autres affections des glandes *L74.8*
- SAI ¬ Affection des glandes *L74.9*
- ¬ tumeur
- - Bénignes de: glandes: *D23*
- - Maligne des glandes: *C44*

Sueurs nocturnes ¬ *R61.9*

Suffocation
- Aliments (régurgités) ¬ *T17*
- Mucus ¬ *T17*
- Strangulation) ¬ *T71*
- ¬ Gasping syndrome (syndrome de *T51.9*

Suffodiens [Hoffmann] ¬ Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et *L66.3*

Suicidaire ¬
- Idées [tendances] *R45.8*
- Intoxication aux somnifères avec intention *T42.7*
- Pensées *R45.8*

Suicide
- Moyens non précisés ¬ Effets non précisés de: lésion auto-infligée délibérée (*T76*
- Tentative) ¬ *X84.9!*
- ¬ Tentative de *Z91.8*

Suis ¬ Brucellose à Brucella *A23.2*

Suisse) ¬ Agammaglobulinémie: autosomique récessive (type *D80.0*

Sulfamidase ¬ Déficit en héparane *E76.2*

Sulfamides
- Utilisés comme un médicament approprié à l'indication et correctement administrés ¬ Anurie due aux *R34, Y57.9!*
- ¬
- - Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.2*
- - Intoxication: *T37.0*

Sulfatase
v.a. N-acétyl-6-sulfatase
- ¬
- - Carence en N-acétylgalactosamine 4- *E76.2*
- - Déficit
- - - *E75.2*
- - - Iduronate 2- *E76.1*
- - - Multiple en *E75.2*
- - - Stéroïde *Q80.1*

Sulfatidose
- Juvénile type Austin ¬ *E75.2*
- ¬ Lipidose *E75.2*

Sulfhémoglobinémie) ¬ Méthémoglobinémie: acquise (avec *D74.8*

Sulfite oxydase
- Déficit cofacteurs molybdène
- - Type A ¬ Déficit en *E72.1*
- - ¬ Déficit en *E72.1*
- Xanthine déshydrogénase et aldéhyde oxydase type A ¬ Déficit combiné en *E72.1*
- ¬
- - Déficit
- - - *E72.1*
- - - Isolé en *E72.1*
- - Encéphalopathie par déficit en *E72.1*

Sulfocystinurie ¬ *E72.1*

Sulfure
- Carbone ¬ Effet toxique: *T65.4*
- Hydrogène ¬ Effet toxique: *T59.6*

Sulfurique ¬ Acide: *T54.2*

Sulzberger
v. Bloch-Sulzberger

Summitt ¬ Syndrome de *Q75.1*

Superficiel
v. Type de maladie

Supérieur
v. Type de maladie

Supéro
- Externe du sein ¬ Tumeur maligne: Quadrant *C50.4*
- Interne du sein ¬ Tumeur maligne: Quadrant *C50.2*

Supplémentaire
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins *P08*
- Nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins *P07*
- ¬
- - Chromosomes marqueurs *Q92.6*
- - Dents *K00.1*

Supposé) d'un membre de la famille ¬ Disparition ou décès (*Z63*

Suppression de la lactation ¬ *O92.5*

Suppression-bursts"" ¬ Encéphalopathie myoclonique précoce avec *G40.4*

Suppuration
- Aigu
- - Os pétreux ¬ *H70.2*
- - Sinus de la face ¬ *J01*
- Chronique) d'un sinus (de la face) ¬ *J32*

Suppuré
v. Type de maladie

Supra
- Alvéolie (antérieure) (postérieure) ¬ *K07.2*
- Gingival ¬ Tartre (dentaire): *K03.6*

Supraclaviculaire ¬ Région *S11.80*

Supracondylaire ¬ Fracture extrémité inférieur
- Fémur: *S72.43*
- Humérus: *S42.41*

Supranucléaire
- Progressif
- - Maladie de Steele-Richardson-Olszewski] ¬ Ophtalmoplégie *G23.1*
- - ¬ Paralysie *G23.1*
- UMNL] ¬ Paralysie vésicale en cas de lésion *G95.80*

Supratentoriel
- SAI ¬ *C71.0*
- ¬ Tumeur
- - Bénigne: Encéphale, *D33.0*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, *D43.0*

Supravalvulaire
- Artère pulmonaire ¬ Sténose *Q25.6*
- Mitral ¬ Anneau *Q23.2*
- ¬ Sténose aortique *Q25.3*

Supraventriculaire ¬
- Extrasystoles *I49.4*
- Tachycardie *I47.1*

Supravésicale ¬ Obstruction *N13.5*

SUR1 ¬ Hyperinsulinisme
- Autosomique
- - Dominant par déficit en *E16.1*
- - Récessif par déficit en *E16.1*
- Focal résistant au diazoxide par déficit en *E16.1*

Suractivité ¬ *R46.3*

Suraiguë
- Lyell
- - Atteinte 30%
- - - Plus de la surface corporelle ¬ Epidermolyse nécrosante *L51.21*
- - - Surface corporelle SAI ¬ Epidermolyse nécrosante *L51.20*
- - ¬ Epidermolyse nécrosante *L51.2*
- Syndrome de Lyell) SAI ¬ Epidermolyse nécrosante *L51.20*

Surajouté
- Démence
- - Ainsi décrit ¬ Delirium non *F05.0*
- - ¬ Delirium *F05.1*
- États hypertensifs préexistants ¬ Prééclampsie *O11*
- Hypertension SAI ¬ Prééclampsie *O11*
- ¬
- - Hypertension
- - - Chronique avec prééclampsie *O11*
- - - Essentielle préexistante au cours de la grossesse, avec prééclampsie *O11*
- - - Préexistante avec prééclampsie *O11*
- - Prééclampsie *O11*

Suralimentation
- Nouveau-né ¬ *P92.4*
- SAI ¬ *R63.2*

Surcharge
- Acide sialique libre ¬ Maladie de *E77.8*
- Actine ¬ Myopathie avec *G71.2*
- Cérébrale en fer type 1 ¬ Neurodégénérescence avec *G23.0*
- Desmine et inclusions de corps de Mallory ¬ Myopathie avec *G71.8*
- Graisseuse ¬ Syndrome de *T80.8*
- Liquidienne ¬ *E87.7*
- Potassium [K] ¬ *E87.5*
- Sodium [Na] ¬ *E87.0*
- Triglycéride
- - Ichtyose ¬ Lipidose avec *E75.5*
- - ¬ Lipidose avec *E75.5*

Surdi-mutité
- Non classée ailleurs ¬ *H91.3*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, H94.8**

Surdité
v.a. cataracte-ataxie-surdité
v.a. néphropathie-surdité-hyperparathyroïdie
- Anomalies génitales-synostoses métacarpiennes et métatarsiennes ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Aplasie du labyrinthe, microtie et microdontie ¬ *Q16.5*

Surdité *–suite*

- Atrophie optique-létalité ¬ Syndrome d'ataxie- *E79.8*
- Bilatéral
- - Mixte de transmission et neurosensorielle ¬ *H90.6*
- - Transmission ¬ *H90.0*
- Brusque idiopathique ¬ *H91.2*
- Cardiopathie-dysmorphie cranio-faciale ¬ Syndrome d'atrésie des choanes- *Q87.8*
- Cataracte-anomalies squelettiques ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Centrale SAI ¬ *H90.5*
- Congénital
- - SAI ¬ *H90.5*
- - ¬ *H90*
- Déficience intellectuel
- - Absence de fibres sensitives myélinisées de gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec *G60.0*
- - Lié à l'X ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ Syndrome
- - - Dentinogenèse imparfaite-petite taille- *Q87.8*
- - - Microcéphalie- *Q87.8*
- Génétique non syndromique
- - Postlinguale ¬ *H90.5*
- - Prélinguale ¬ *H90.5*
- Hypogénitalisme ¬ Syndrome de rétinite pigmentaire-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Ischémique transitoire ¬ *H93.0*
- Liée à l'X type 2 ¬ *H90.8*
- Lipome sacré ¬ Syndrome de fente labiopalatine- *Q87.8*
- Mixte
- - Liée à l'X avec fistule périlymphatique ¬ *H90.8*
- - Transmission neurosensoriel
- - - Lié X ¬
- - - - *H90.3*
- - - - *H90.8*
- - - Sans précision ¬ *H90.8*
- Narcolepsie ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante- *G11.2*
- Nerveuse SAI ¬ *H90.5*
- Neurosensoriel
- - Bilatérale ¬ *H90.3*
- - Congénitale ¬ Albinisme oculaire avec *E70.3*
- - Non syndromique mitochondriale ¬ *H90.5*
- - Sans précision ¬ *H90.5*
- - Syndromique due à un déficit combiné de la phosphorylation oxydative ¬ *G31.81, H90.8*
- - Unilatérale sans altération de l'audition de l'autre oreille ¬ *H90.4*
- - ¬ Syndrome de myopie forte- *H90.5*
- Obésité ¬ Choroïdérémie avec *Q87.8*

Surdité *–suite*

- Oreille anormale-paralysie faciale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Partiel total
- - Fréquences
- - - Basses ¬ *H91.9*
- - - Hautes ¬ *H91.9*
- - SAI ¬ *H91.9*
- Perception
- - Non syndromique autosomique
- - - Dominante type DFNA ¬ *H90.3*
- - - Récessive type DFNB ¬ *H90.3*
- - SAI ¬ *H90.5*
- Psychogène ¬ *F44.6*
- Rétrocochléaire ¬ *H90.5*
- Sensoriel
- - SAI ¬ *H90.5*
- - Tardive ¬ Albinisme oculaire avec *E70.3*
- Syndrome cranio-facial ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.0†, H94.8**
- - ¬ *A52.1†, H94.8**
- Transmission
- - Neurosensorielle ¬ *H90*
- - Sans précision ¬ *H90.2*
- Unilatéral
- - Mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l'audition de l'autre oreille ¬ *H90.7*
- - Transmission sans altération de l'audition de l'autre oreille ¬ *H90.1*
- Variable ¬ Syndrome de paralysie faciale congénitale héréditaire- *Q87.0*
- Verbale ¬ *F80.2*
- ¬ Syndrome
- - Ataxie cérébelleuse autosomique récessive-cécité- *G11.1*
- - Fibromatose gingivale- *H90.3*
- - Kératodermie palmoplantaire- *Q82.8*
- - Long QT- *I49.8*
- - Mains et pieds fendus- *Q87.2*
- - Myoclonie-ataxie cérébelleuse- *G11.1*

Surdité-néphropathie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Surélévation de l'omoplate ¬ *Q74.0*

Surface

- Corporelle
- - Plus ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la *L00.1*
- - SAI ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la *L51.20*
- - ¬
- - - Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la *L51.21*
- - - Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la *L00.0*

Surface *–suite*

- Corps
- - Atteinte ¬
- - - Brûlures classées selon l'étendue de la *T31!*
- - - Corrosions classées selon l'étendue de la *T32!*
- - ¬
- - - Brûlure couvrant
- - - - 10 et 19% de la *T31.1!*
- - - - 10% de la *T31.0!*
- - - - 20 et 29% de la *T31.2!*
- - - - 30 et 39% de la *T31.3!*
- - - - 40 et 49% de la *T31.4!*
- - - - 50 et 59% de la *T31.5!*
- - - - 60 et 69% de la *T31.6!*
- - - - 70 et 79% de la *T31.7!*
- - - - 80 et 89% de la *T31.8!*
- - - - 90 % ou plus de la *T31.9!*
- - - Corrosion couvrant
- - - - 10 et 19% de la *T32.1!*
- - - - 10% de la *T32.0!*
- - - - 20 et 29% de la *T32.2!*
- - - - 30 et 39% de la *T32.3!*
- - - - 40 et 49% de la *T32.4!*
- - - - 50 et 59% de la *T32.5!*
- - - - 60 et 69% de la *T32.6!*
- - - - 70 et 79% de la *T32.7!*
- - - - 80 et 89% de la *T32.8!*
- - - Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la *T32.9!*
- - - Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la *T95.4*
- Cutané
- - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec *E88.21*
- - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec *E88.20*
- Virus de l'hépatite B [AgHBs] ¬ Porteur de l'antigène de *B18.13*

Surfactant ¬ Pneumopathie interstitielle par déficit en protéine C du *J84.8*

Surinfecté ¬ Eczéma *L30.3*

Surmenage

- Burn-out] ¬ *Z73*
- Physique ¬ *T73.3*

Surnombre de la trompe de Fallope ou du ligament large ¬ Présence en *Q50.6*

Surnuméraire

- Causant un rapprochement des dents ¬ Dent *K07.3*
- Cervicale ¬ Côte *Q76.5*
- S ¬
- - Doigt(s) *Q69.0*

Surnuméraire *–suite*
- S ¬ *–suite*
- - Orteil(s) *Q69.2*
- - Pouce(s) *Q69.1*
- Sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Vertèbre *Q76.4*
- ¬
- - Canal hépatique *Q44.5*
- - Côte *Q76.6*
- - Dents *K00.1*
- - Foie *Q44.7*
- - Glandes ou canaux salivaires *Q38.4*
- - Gros orteil *Q69.2*
- - Lobe pulmonaire *Q33.1*
- - Lobule *Q17.0*
- - Mamelon *Q83.3*
- - Muscle
- - - *Q79.8*
- - - Oculaire *Q10.3*
- - Nez *Q30.8*
- - Oreille *Q17.0*
- - Os du carpe *Q74.0*
- - Ovaire *Q50.3*
- - Pancréas *Q45.3*
- - Paupière *Q10.3*
- - Pavillon *Q17.0*
- - Phalange *Q74.8*
- - Rate *Q89.08*
- - Rein *Q63.0*
- - Sein *Q83.1*
- - Torsion (de): trompe *N83.5*
- - Uretère: *Q62.5*
- - Urètre *Q64.7*
- - Vessie *Q64.7*

Surocclusion
- Horizontale ¬ *K07.2*
- Profonde ¬ *K07.2*
- Verticale ¬ *K07.2*

Surplomb ¬ *K07.2*

Surproduction d'adénosine désaminase ¬ Anémie hémolytique due à une *D55.3*

Surprotection parentale ¬ *Z62*

Surrénale
- Aiguë ¬ Insuffisance *E27.2*
- Congénitale ¬ Hyperplasie *E25.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies de la glande *E35.1**
- Déficit
- - 3-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.08*
- - 11-bêta-hydroxylase ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.08*
- - 17-alphahydroxylase ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.08*
- - 21 hydroxylase classique
- - - Perte de sel ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.00*

Surrénale *–suite*
- Déficit *–suite*
- - 21 hydroxylase classique *–suite*
- - - ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.00*
- - Cytochrome P450 oxydoréductase ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.08*
- - STAR ¬ Hyperplasie congénitale lipoïde des *E25.08*
- Homme ¬ précocité sexuelle avec hyperplasie *E25*
- Hypofonctionnement cortical ¬ Syphilis des *A52.7†, E35.1**
- Sans précision ¬
- - Maladie de la glande *E27.9*
- - Tumeur maligne: *C74.9*
- Sepsis méningocoques ¬
- - Apoplexie des *A39.1†, E35.1**
- - Hémorragie des *A39.1†, E35.1**
- ¬
- - Atrophie des *E27.8*
- - Calcification tuberculeuse de la glande *B90.8†, E35.1**
- - Crise d'insuffisance *E27.2*
- - Hémorragie de la *E27.4*
- - Infarctus de la *E27.4*
- - Lésion traumatique: *S37.81*
- - Maladie
- - - Glande *E27*
- - - Précisées de la glande *E27.8*
- - Malformations congénitales des *Q89.1*
- - Syndrome de Cushing dû à une hyperplasie macronodulaire des *E24.8*
- - Syphilis des *A52.7†, E35.1**
- - Thrombose d'une veine *I82.88*
- - Tuberculose
- - - *A18.7†, E35.1**
- - - Glande *A18.7†, E35.1**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D35.0*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.1*
- - - Malign
- - - - *C74*
- - - - Cortex de la *C74.0*
- - - - Secondaire de la glande *C79.7*

Surrénalien
- Aiguë ¬ Insuffisance *E27.2*
- Bilatéral) ¬ Hyperaldostéronisme primaire dû à un adénome *E26.0*
- Congénitale cytomégalique ¬ Hypoplasie *E27.1*
- Femme ¬ pseudo-hermaphrodisme *E25*
- Héréditaire isolée par déficit partiel en CYP11A1 ¬ Insuffisance *E27.1*
- Néonatale ¬ Hémorragie *P54.4*
- Précoce ¬ Puberté *E27.0*
- Sepsis à méningocoques ¬ Syndrome hémorragique *A39.1†, E35.1**
- ¬ Syndrome méningococcique *A39.1†*

Surrénalisme tuberculeux ¬ *A18.7†, E35.1**

Surrénalite
- Auto-immune ¬ *E27.1*
- Hémorragique méningocoques ¬
- - *A39.1†*
- - *A39.1†, E35.1**

Sursaut ¬ Maladie familiale du *G25.88*

Surveillance
- Abus de médicaments ou toxicomanie ¬ Conseil et *Z71*
- Alcoolisme ¬ Conseil et *Z71*
- Allaitement ¬ *Z39.1*
- Colostomie ¬ *Z43.3*
- Conseil
- - Médical, sans précisions ¬ Conseil et *Z71*
- - Surveillance diététiques ¬ Conseil et *Z71*
- Consultation pour l'explication de résultats d'examen ¬ Conseil et *Z71*
- Contraceptifs ¬ *Z30.4*
- Contrôle inadéquats de la part des parents ¬ *Z62*
- Croissance du nourrisson ou de l'enfant ¬ *Z00.1*
- Cystostomie ¬ *Z43.5*
- Dialyse ¬ *Z49*
- Diététiques ¬ Conseil et surveillance pour: Conseil et *Z71*
- Dispositif contraceptif (intra-utérin) ¬ *Z30.5*
- Électronique continue ¬ Lésion du cuir chevelu liée à une *P12.4*
- Gastrostomie ¬ *Z43.1*
- Grossesse
- - Antécédent
- - - Avortement ¬ *Z35.1*
- - - Môle
- - - - Hydatiforme ¬ *Z35.1*
- - - - Vésiculaire ¬ *Z35.1*
- - - Mort
- - - - Néonatales ¬ *Z35.2*
- - - - Nés ¬ *Z35.2*
- - - Obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer ¬ *Z35.2*
- - - Soins prénatals insuffisants ¬ *Z35.3*
- - - Stérilité ¬ *Z35.0*
- - Haut risque
- - - Sans précision ¬ *Z35.9*
- - - ¬
- - - - *Z35*
- - - - *Z35.8*
- - Multiparité élevée ¬ *Z35.4*
- - Normale ¬ *Z34*
- Iléostomie ¬ *Z43.2*
- Médical
- - Enfant bon santé selon circonstances
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou *Z76.2*

Surveillance *–suite*
- Médical *–suite*
- - Enfant bon santé selon circonstances *–suite*
- - - Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou *Z76.2*
- - - Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou *Z76.2*
- - - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou *Z76.2*
- - Soin médicaux
- - - Enfants trouvés ¬ *Z76.1*
- - - Nourrissons et enfants en bonne santé ¬ *Z76.2*
- - Traitement ¬
- - - *Z08*
- - - *Z09*
- Pendant la prise de nourriture ¬ Dysphagie nécessitant une *R13.0*
- Permanente ¬ Difficultés liées à: Besoin d'une *Z74.3*
- Personne consultant pour le compte d'un tiers ¬ Conseil et *Z71*
- Primigeste
- - Âgée ¬ *Z35.5*
- - Jeune ¬ *Z35.6*
- Stomie
- - Appareil digestif ¬ *Z43.4*
- - Non précisée ¬ *Z43.9*
- - Voies urinaires ¬ *Z43.6*
- - ¬
- - - *Z43*
- - - *Z43.8*
- - - *Z43.88*
- Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) ¬ Conseil et *Z71*
- Sutures et pansements chirurgicaux ¬ *Z48.0*
- Thoracostomie ¬ *Z43.80*
- Trachéostomie ¬ *Z43.0*
- Vagin artificiel ¬ *Z43.7*

Susac ¬ Syndrome de *I67.7*

Susceptibilité infection opportuniste ¬
- HIGM avec *D80.5*
- Syndrome hyper-IgM
- - *D80.5*
- - Sans *D80.5*

Susceptibles d'entraîner une dépendance ¬ Présence dans le sang d'autres substances *R78.4*

Sus-claviculaire ¬
- Ganglions *C77.0*
- Métastase ganglionnaire *C77.0*

Sus-épineux
- Coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou incomplète) du *M75.1*

Sus-épineux *–suite*
- ¬ Syndrome *M75.1*

Sus-glottique ¬
- Œdème (de la): *J38.4*
- Tumeur maligne: Etage *C32.1*

Sus-hyoïdien
- SAI ¬ Epiglotte (partie *C32.1*
- ¬ épiglotte partie
- - *D02.0*
- - *D14.1*
- - *D38.0*

Sus-ombilicale ¬ Syndrome d'hémangiomes faciaux-pseudocicatrice *D18.01*

Suspecté
- Conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, *U69.10!*
- Porteur ¬ sujet *Z22*

Suspicion
- Affection
- - Cardio-vasculaires ¬ Mise en observation pour *Z03.5*
- - Système nerveux ¬ Mise en observation pour *Z03.3*
- Effet
- - Indésirable d'un médicament ¬ Mise en observation pour *Z03.6*
- - Toxique de substances ingérées ¬ Mise en observation pour *Z03.6*
- Exclue ¬ Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, *Z03*
- Infarctus du myocarde ¬ Mise en observation pour *Z03.4*
- Intoxication ¬ Mise en observation pour *Z03.6*
- Maladie
- - Sans précision ¬ Mise en observation pour *Z03.9*
- - Suspicion exclue ¬ Mise en observation et examen médical pour *Z03*
- - ¬ Mise en observation pour *Z03.8*
- Troubles mentaux et du comportement ¬ Mise en observation pour *Z03.2*
- Tuberculose ¬ Mise en observation pour *Z03.0*
- Tumeur maligne ¬ Mise en observation pour *Z03.1*

Sutcliffe ¬ Dysplasie spondylo-métaphysaire type *Q77.8*

Suture
- Actes médicaux ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- Césarienne ¬
- - Infection d'une *O86.0*
- - Rupture d'une *O90.0*
- Crâniennes ¬ Retard de fermeture des *P96.3*
- Déchirure du périnée ¬ Rupture d'une *O90.1*
- Épisiotomie ¬ Rupture d'une *O90.1*
- Obstétricale du périnée ¬ Rupture d'une *O90.1*

Suture *–suite*
- Opération
- - Anus ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Estomac ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Intestin ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Œsophage ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Organes du système digestif ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Pancréas ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.82*
- - Rectum ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Trachée, des bronches et des poumons ¬ Insuffisances d'anastomoses et *J95.82*
- - Vésicule et des voies biliaires ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.81*
- Os du crâne ¬ Anomalie de *Q75.0*
- Pansements chirurgicaux ¬ Surveillance des *Z48.0*
- Périnéale après accouchement ¬ Infection d'une *O86.0*
- ¬ Ablation de *Z48.0*

Sweet] ¬ Dermatose neutrophile fébrile [*L98.2*

Swyer ¬ Syndrome de *Q99.1*

Sycosis
- Barbe ¬ *L73.8*
- Parasitaire
- - Barbe ¬ *B35.0*
- - ¬ *B35.0*
- Trichophytique ¬ *B35.0*
- ¬ Dermatophytose avec *B35.0*

Sydenham ¬ chorée de *I02*

Sylvatique ¬
- Fièvre jaune *A95.0*
- Rage *A82.0*

Sylvius ¬
- Anomalie de l'aqueduc de *Q03.0*
- Malformations de l'aqueduc de *Q03.0*
- Obstruction congénitale de l'aqueduc de *Q03.0*
- Sténose de l'aqueduc de *Q03.0*

Symbiotique ¬ Psychose: *F84.3*

Symblépharon ¬ *H11.2*

Symbolique non
- Classés ailleurs ¬ Dyslexie et autres troubles de la fonction *R48*
- Précisés ¬ Troubles de la fonction *R48.8*

Symbrachydactylie des pieds et des mains ¬ *Q73.8*

Sympathique
- Cervical
- - Postérieur ¬ Syndrome *M53.0*
- - ¬ Lésion traumatique des nerfs *S14.5*
- Lombaires, sacrés et du bassin ¬ Lésion traumatique des nerfs *S34.5*

Sympathique *–suite*
- Parasympathiques ¬ nerfs et ganglions *C47*
- Réflexe ¬ Dystrophie
- - *G90.5*
- - *G90.59*
- Thoracique ¬ Ganglion: *S24.4*
- Thorax ¬ Lésion traumatique de nerfs *S24.4*
- ¬
- - Ophtalmie *H44.1*
- - Uvéite *H44.1*

Sympathomimétique non classé ¬ Intoxication agent principalement
- Alpha- *T44.4*
- Bêta- *T44.5*

Symphysaire ¬ Grossesse avec dysfonctionnement *O26.7*

Symphyse
- Maxillaire ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.66*
- Pubienne
- - Cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ Subluxation de la *O26.7*
- - Obstétrical e ¬
- - - Arrachement du cartilage interne de la *O71.6*
- - - Écartement traumatique de la *O71.6*
- - Pierson] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*
- - ¬
- - - Dysfonctionnement de la *M25.55*
- - - Rupture traumatique de la *S33.4*
- - - Tuberculose de la *A18.0†, M01.15**

Symptomatique
- Défini localisation focal partiel crise partiel
- - Complexes ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques *G40.2*
- - Simples ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques *G40.1*
- Leucoderme ¬ Syphilis tardive *A52.7†, L99.8**
- SAI ¬ Psychose: *F09*
- Sans précision ¬ Trouble mental organique ou *F09*
- VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C ¬ Maladie *U60.2!*
- ¬
- - Anémie hémolytique type
- - - Chaud (secondaire) (*D59.1*
- - - Froid (secondaire) (*D59.1*
- - Encéphalopathie myoclonique précoce (*G40.4*
- - Forme tardif syphilis
- - - *A52.7*
- - - Congénitale, *A50.5*
- - Lymphocytose (*D72.8*
- - Monocytose (*D72.8*
- - Myotonie: *G71.1*

Symptomatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension orthostatique *G23.8*
- - Syphilis
- - - Congénitale précoce, *A50.0*
- - - Nerveuse *A52.1*

Symptôme
- Affectifs ¬ Épilepsie partielle bénigne à *G40.02*
- Bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ *N95.1*
- Effort
- - Important ¬ Insuffisance cardiaque
- - - Droit
- - - - *I50.01, I50.03!*
- - - - Primaire avec *I50.00, I50.03!*
- - - Gauche: Avec *I50.12*
- - Léger ¬ Insuffisance cardiaque
- - - Droit
- - - - *I50.01, I50.04!*
- - - - Primaire avec *I50.00, I50.04!*
- - - Gauche: Avec *I50.13*
- Hémorroïdaires ¬ *K64.9*
- Incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de *F68.1*
- Néonatals de privation dus à la toxicomanie de la mère ¬ *P96.1*
- Non spécifiques propres au nourrisson ¬ *R68.1*
- Observés au niveau du sein ¬ Autres signes et *N64.5*
- Physiques pour des raisons psychologiques ¬ Majoration de *F68.0*
- Précis du système digestif et de l'abdomen ¬ Autres *R19.88*
- Privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né ¬ *P96.2*
- Psychotique
- - Congruents à l'humeur ¬ Manie avec *F30.2*
- - Non congruents à l'humeur ¬ Manie avec *F30.2*
- - ¬
- - - Dépression
- - - - Agitée épisode isolé sans *F32.2*
- - - - Endogène
- - - - - *F33.3*
- - - - - Sans *F33.2*
- - - - Majeur
- - - - - Épisode isolé sans *F32.2*
- - - - - Récurrente, sans *F33.2*
- - - - Vital
- - - - - Épisode isolé sans *F32.2*
- - - - - Récurrente, sans *F33.2*
- - - Épisode
- - - - Dépressif
- - - - - Sévère avec *F32.3*

Symptôme *–suite*
- Psychotique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Épisode *–suite*
- - - - Dépressif *–suite*
- - - - - Sévère sans *F32.2*
- - - - Isolés de: dépression: majeure avec *F32.3*
- - - - Récurrents sévères de: dépression: majeure, avec *F33.3*
- - - Manie
- - - - *F30.2*
- - - - Sans *F30.1*
- - - Psychose maniaco dépressif forme dépressif
- - - - *F33.3*
- - - - Sans *F33.2*
- - - Trouble
- - - - Affectif
- - - - - Bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec *F31.5*
- - - - - Bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans *F31.4*
- - - - - Bipolaire, épisode actuel maniaque avec *F31.2*
- - - - - Bipolaire, épisode actuel maniaque sans *F31.1*
- - - - Dépressif
- - - - - Récurrent, épisode actuel sévère avec *F33.3*
- - - - - Récurrent, épisode actuel sévère sans *F33.2*
- Repos ¬ Insuffisance cardiaque
- - Droit
- - - *I50.01, I50.05!*
- - - Primaire avec *I50.00, I50.05!*
- - Gauche: Avec *I50.14*
- Sans autre explication ¬ Décès survenant moins de 24 heures après le début des *R96.1*
- Schizophrénique
- - Sans précision ¬
- - - Bouffée délirante sans *F23.0*
- - - Psychose cycloïde sans *F23.0*
- - ¬
- - - Bouffée délirante avec *F23.1*
- - - Psychose cycloïde avec *F23.1*
- - - Trouble psychotique aigu polymorphe
- - - - *F23.1*
- - - - Sans *F23.0*
- Signe
- - Général
- - - Précisés ¬ Autres *R68.8*
- - - ¬ Autres *R68*
- - Précis relatif appareil
- - - Circulatoire et respiratoire ¬ Autres *R09.8*
- - - Digestif et à l'abdomen ¬ Autres *R19.8*
- - Relatif

Symptôme *–suite*
- Signe *–suite*
- - Relatif *–suite*
- - - Absorption d'aliments et de liquides ¬ Autres *R63.8*
- - - Appareil
- - - - Circulatoire et respiratoire ¬ Autres *R09*
- - - - Digestif et à l'abdomen ¬ Autres *R19*
- - - - Urinaire
- - - - - Non précisés ¬ *R39.8*
- - - - - ¬ Autres *R39*
- - - Apparence et au comportement ¬ Autres *R46.8*
- - - Fonction cognitif conscience
- - - - Non précisés ¬ *R41.8*
- - - - ¬ Autres *R41*
- - - Humeur ¬ Autres *R45.8*
- - - Sensation perception général
- - - - Non précisés ¬ *R44.8*
- - - - ¬ Autres *R44*
- - - Système nerveux ostéo-musculaire
- - - - Non précisés ¬ *R29.8*
- - - - ¬ Autres *R29*
- ¬ Insuffisance cardiaque
- - Droit
- - - Primaire sans *I50.00*, *I50.02!*
- - - Sans *I50.01*, *I50.02!*
- - Gauche: Sans *I50.11*

Syncope
- Chaleur ¬ *T67.1*
- Collapsus ¬ *R55*
- Mictionnelle ¬ *R55*
- Pérodactylie-séquence de Robin ¬ Syndrome d'extrasystoles ventriculaires avec *Q87.8*
- Psychogène ¬ *F48.8*
- ¬ Syndrome du sinus carotidien (*G90.00*

Syncytial
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Virus respiratoire *B97.4!*
- VRS ¬
- - Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire *J21.0*
- - Bronchite aiguë due au virus respiratoire *J20.5*
- - Pneumonie
- - - Congénitale à virus respiratoire *P23.0*
- - - Virus respiratoire *J12.1*

Syndactylie
v.a. aphalangie-syndactylie-microcéphalie
v.a. cryptophtalmie-syndactylie
- Complexe
- - Doigts avec synostose ¬ *Q70.0*
- - Orteils avec synostose ¬ *Q70.2*
- Doigts sans synostose ¬ Simple *Q70.1*
- Dysplasie ectodermique
- - 1 ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - 2 ¬ Syndrome de *Q82.8*

Syndactylie *–suite*
- Orteils sans synostose ¬ Simple *Q70.3*
- Petite taille ¬ Syndrome de blépharophimosis-ptosis-ésotropie- *Q87.8*
- Sans précision ¬ *Q70.9*
- Type
- - 1 ¬ *Q70.4*
- - 2 ¬ *Q70.4*
- - 3 ¬ *Q70.1*
- - 4 ¬ *Q70.4*
- - 5 ¬ *Q70.4*
- - 6 ¬ *Q70.4*
- - 8 ¬ *Q70.0*
- ¬ *Q70*

Syndrome
v. Nom propre
v. Pseudosyndrome

Syndrome 5q- ¬ *D46.6*

Synéchie
- Iris
- - Antérieures ¬ *H21.5*
- - Postérieures ¬ *H21.5*
- - SAI ¬ *H21.5*
- Latérales ¬ Syndrome de fente palatine- *Q87.8*
- Utérine ¬ *N85.6*

Syngamose ¬ *B83.3*

Syngnathie congénitale isolée ¬ *Q67.4*

Synostose
- Cervicale ¬ *Q76.1*
- Hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose ¬ *Q76.3*
- Huméro-radiale ¬ *Q74.0*
- Huméro-radio-ulnaire ¬ *Q74.0*
- Huméro-ulnaire ¬ *Q74.0*
- Métacarpiennes et métatarsiennes ¬ Syndrome de surdité-anomalies génitales- *Q87.8*
- Multiples ¬ Syndrome des *Q78.8*
- Radio-cubitale ¬ *Q74.0*
- Radioulnaire-thrombocytopénie amégacaryocytique ¬ Syndrome de *Q87.2*
- Tibio-fibulaire ¬ *Q74.2*
- Vertébrale congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- ¬
- - Simple syndactylie
- - - Doigts sans *Q70.1*
- - - Orteils sans *Q70.3*
- - Syndactylie complexe
- - - Doigts avec *Q70.0*
- - - Orteils avec *Q70.2*

Synovial
v.a. oculo-urétro-synovial
- Non classée ailleurs ¬ Hypertrophie *M67.2*
- Poplité [Baker] ¬ Kyste *M71.2*
- SAI ¬ Kyste *M71.3*
- Tendon

Synovial *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres atteintes de la *M68.8**
- - Sans précision ¬ Atteinte de la *M67.9*
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - *M67*
- - - - Précisées de la *M67.8*
- - - Déchirure spontanée de la *M66*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Déchirure
- - - *M66.1*
- - - Kyste de la *M66.1*
- - Ostéochondromatose *D48.1*
- - Résultats anormaux de: liquide *R89*
- - Sarcome *C49.9*
- - Syphilis de la membrane *A52.7†*, *M68.09**

Synovite
- Articulaire tuberculeuse ¬ *A18.0†*, *M01.19**
- Cours syphilis
- - Tardive ¬ *A52.7†*, *M68.09**
- - ¬ *A52.7†*, *M68.09**
- Gonocoques ¬ *A54.4†*, *M68.09**
- Gonorrhéique ¬ *A54.4†*, *M68.09**
- Infectieuses ¬ Autres (téno) *M65.1*
- Ténosynovite
- - Cours de maladies bactériennes classées ailleurs ¬ *M68.0**
- - Sans précision ¬ *M65.9*
- - ¬
- - - *M65*
- - - *M65.8*
- Toxique ¬ *M67.3*
- Transitoire ¬ *M67.3*
- Tuberculeux
- - Colonne vertébrale ¬ *A18.0†*, *M49.09**
- - ¬ *A18.0†*, *M68.09**
- Villonodulaire
- - Pigmentaire) ¬ *M12.2*
- - Pigmentée ¬ *M12.29*

Synthase
- Hépatique ¬
- - Déficit en glycogène *E74.0*
- - GSD par déficit en glycogène *E74.0*
- Non lié à CYP11B2 ¬ Déficit en aldostérone *E27.4*
- Type cblG ¬ Déficit fonctionnel en méthionine *E72.1*
- ¬
- - Déficit
- - - Aldostérone *E27.4*
- - - Bêta-alanine *E79.8*
- - - Fonctionnel en méthionine *E72.1*

Synthase *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Déficit *–suite*
- - - N-acétylglutamate *E72.2*
- - - Uridine monophosphate *E79.8*
- - Hyperammoniémie par déficit en N-acétylglutamate *E72.2*
- - Hyperphénylalaninémie par déficit en 6-pyruvoyl-tétrahydroptérine *E70.1*

Synthèse
- Acide biliaire
- - Cholestase et malabsorption ¬ Défaut de *K76.8*
- - ¬
- - - Déficit congénital de *K76.8*
- - - Malabsorption idiopathique par défaut de *K90.8*
- Protéine
- - Codées par l'ADN mitochondrial ¬ Insuffisance hépatique infantile aiguë par défaut de *K72.0*
- - Mitochondriales ¬ Maladie mitochondriale par défaut de *E88.8*
- Thromboxane ¬ Troubles hémorragiques par déficit de *D69.88*
- Vitamine D [Type I] ¬ Anomalie de la *E83.31*

Synthétase
- I ¬ Déficit en carbamoyl-phosphate *E72.2*
- ¬
- - Activité accrue de la phosphoribosylpyrophosphatase *E79.8*
- - Déficit
- - - 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA *E71.3*
- - - Carbamoyl-phosphate *E72.2*
- - - Héréditaire en glutamine *E72.8*
- - - Phosphoribosylpyrophosphate *E79.8*
- - Dysgénésie cérébrale congénitale par déficit en glutamine *E72.8*
- - Hyperactivité de la PRPP *E79.8*

Synthétiques
- Antagonistes, non classés ailleurs ¬ Intoxication par hormones et leurs substituts *T38*
- Sans précision ¬ Intoxication: Hormones et leurs substituts *T38.8*
- ¬ Intoxication
- - Glucocorticoïdes et analogues *T38.0*
- - Narcotiques *T40.4*

Syphilis
- Acquise) SAI ¬ *A53.9*
- Adhésive de l'arachnoïde ¬ *A52.1†, G01**
- Aiguë des méninges ¬ *A51.4†, G01**
- Alopécie ¬ *A51.3†, L99.8**
- Amygdales ¬ *A52.7†, J99.8**
- Anale primaire ¬ *A51.1*
- Anévrisme du système nerveux central ¬ *A52.0†, I68.8**
- Anus ¬ *A52.7†, K93.8**
- Aorte

Syphilis *–suite*
- Aorte *–suite*
- - Abdominale ¬ *A52.0†, I79.1**
- - Thoracique ¬ *A52.0†, I79.1**
- - ¬ *A52.0†, I79.1**
- Artère
- - Hépatiques ¬ *A52.0†, I79.8**
- - Pulmonaires ¬ *A52.0†, I98.0**
- Articulaire de Charcot ¬ *A52.1†, M14.69**
- Bronchique
- - Tardive ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- Canal auditif ¬ *A52.7†, H94.8**
- Cardio-vasculaire
- - Tardive ¬ *A52.0†, I98.0**
- - Tertiaire ¬ *A52.0†, I98.0**
- - ¬
- - - *A52.0†*
- - - *A52.0†, I98.0**
- - - *I98.0**
- Cérébral
- - Arachnoïde ¬ *A52.1†, G01**
- - ¬ *A52.1†, G94.8**
- Cérébrovasculaire ¬ *A52.0†, I68.8**
- Cloison nasale ¬ *A52.7†, J99.8**
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.1*
- Congénital
- - Cœur ¬ *A50.5†, I52.0**
- - Nerveuse tardive [neurosyphilis juvénile] ¬ *A50.4*
- - Périoste ¬ *A50.0†, M90.19**
- - Péritoine ¬ *A50.0†, K67.2**
- - Précoce
- - - Cutanée ¬ *A50.0*
- - - Cutanéo-muqueuse ¬ *A50.0*
- - - Latente ¬ *A50.1*
- - - Oculopathie ¬ *A50.0†, H58.8**
- - - Sans précision ¬ *A50.2*
- - - Symptomatique ¬ *A50.0*
- - - Viscérale ¬ *A50.0*
- - Rétine ¬ *A50.0†, H32.0**
- - Sans précision ¬ *A50.9*
- - Symptomatique ¬ Autres formes tardives de *A50.5*
- - Tardif
- - - Cardiovasculaire ¬ *A50.5†, I98.0**
- - - Latente ¬ *A50.6*
- - - SAI ¬ *A50.7*
- - - Sans précision ¬ *A50.7*
- - ¬
- - - *A50.9*
- - - Arthrite au cours de *A50.5†, M03.19**
- - - Encéphalite au cours de *A50.4†, G05.0**
- - - Encéphalomyélite au cours de *A50.4†, G05.0**

Syphilis *–suite*
- Congénital *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Gomme due à la *A50.5*
- - - Kératite au cours de *A50.3†, H19.2**
- - - Kératoconjonctivite au cours de *A50.3†, H19.2**
- - - Méningite au cours de *A50.4†, G01**
- - - Myélite au cours de *A50.4†, G05.0**
- Cornée ¬ *A52.7†, H19.2**
- Cristallin ¬ *A52.7†, H28.8**
- Crosse de l'aorte ¬ *A52.0†, I79.1**
- Cutanée congénitale précoce ¬ *A50.0†, L99.8**
- Dure-mère ¬ *A52.1†, G01**
- Endémique ¬ *A65*
- Épididyme ¬ *A52.7†, N51.1**
- Estomac ¬ *A52.7†, K93.8**
- Foie ¬ *A52.7†, K77.0**
- Gastrique tardive avec polypose ¬ *A52.7†, K93.8**
- Génitale primaire ¬ *A51.0*
- Glandes lacrymales ¬ *A52.7†, H06.0**
- Hypophyse ¬ *A52.7†, E35.8**
- I ¬ *A51.0*
- II ¬ *A51.4*
- Intestin grêle ¬ *A52.7†, K93.8**
- Intestinale tardive ¬ *A52.7†, K93.8**
- Larynx
- - Périchondrite ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- Latent
- - Non précisée précoce ou tardive ¬ *A53.0*
- - SAI ¬ *A53.0*
- Leucoderme ¬ *A51.3†, L99.8**
- Membrane synoviale ¬ *A52.7†, M68.09**
- Méninges ¬ *A52.1†, G01**
- Méningo-vasculaire
- - Cérébrale ¬ *A52.1†, G01**
- - Congénitale ¬ *A50.4†, G01**
- Muscle ¬ *A52.7†, M63.09**
- Myocarde ¬ *A52.0†, I41.0**
- Nerf
- - Acoustique ¬ *A52.1†, H94.0**
- - Auditif ¬ *A52.1†, H94.0**
- - Crânien
- - - Paralysies multiples ¬ *A52.1†, G53.1**
- - - ¬ *A52.1†, G53.8**
- - Facial ¬ *A52.1†, G53.8**
- - Optique ¬ *A52.1†, H48.0**
- - Périphérique ¬ *A52.7†, G59.8**
- - Vestibulocochléaire ¬ *A52.1†, H94.0**
- Nerveux
- - Asymptomatique ¬ *A52.2*
- - Sans précision ¬ *A52.3*

Syphilis *–suite*
- Nerveux *–suite*
- - Symptomatique ¬ *A52.1*
- - Tabétique juvénile ¬ *A50.4*
- Nez ¬ *A52.7†, J99.8**
- Non vénérienne ¬ *A65*
- Nouveau-né NCA ¬ *A50.9*
- Oreille
- - Interne
- - - Neurorécidive ¬ *A52.1†, H94.0**
- - - ¬ *A52.7†, H94.8**
- - Moyenne ¬ *A52.7†, H75.8**
- - ¬ *A52.7†, H94.8**
- Os ¬ *A52.7†, M90.29**
- Osseuse tardive ¬ *A52.7†, M90.29**
- Perforée tardive de la luette ¬ *A52.7†, K93.8**
- Péritoine ¬ *A52.7†, K67.2**
- Poumons ¬ *A52.7†, J99.8**
- Précoce
- - Latente ¬ *A51.5*
- - Sans précision ¬ *A51.9*
- - ¬ *A51*
- Primaire d'autres localisations ¬ *A51.2*
- Pulmonaire tardive ¬ *A52.7†, J99.8**
- Rate ¬ *A52.7†, D77**
- Sans précision ¬
- - *A53*
- - *A53.9*
- Sclérosante du cordon postérieur ¬ *A52.1†, G32.8**
- Secondaire
- - Choroïde ¬ *A51.4†, H32.0**
- - Corps ciliaire ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Foie ¬ *A51.4†, K77.0**
- - Iris ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Muscle ¬ *A51.4†, M63.09**
- - Orbite ¬ *A51.4†, H06.3**
- - Os ¬ *A51.4†, M90.29**
- - Peau et des muqueuses ¬ *A51.3*
- - Périoste ¬ *A51.4†, M90.19**
- - Précoce
- - - Ganglion lymphatique ¬ *A51.4*
- - - Rétine ¬ *A51.4†, H32.0**
- - - ¬ Oculopathie au cours de *A51.4†, H58.8**
- - Tractus uvéal ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Viscères ¬ *A51.4†, K93.8**
- - Vulve ¬ *A51.3†*
- - ¬
- - - *A51.4*
- - - Formes de *A51.4*
- Spinale de l'arachnoïde ¬ *A52.1†, G01**
- Surrénale
- - Hypofonctionnement cortical ¬ *A52.7†, E35.1**
- - ¬ *A52.7†, E35.1**

Syphilis *–suite*
- Symptomatique ¬ Autres formes tardives de *A52.7*
- Système squelettique ¬ *A52.7†, M90.29**
- Tardif
- - Amygdales linguales ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Appareil lacrymal ¬ *A52.7†, H06.0**
- - Bouche ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Bourse ¬ *A52.7†, M73.19**
- - Canal déférent ¬ *A52.7†, N51.8**
- - Col de l'utérus ¬ *A52.7†, N74.2**
- - Côlon ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Cornée ¬ *A52.7†, H19.2**
- - Corps
- - - Ciliaire ¬ *A52.7†, H22.0**
- - - Vitré ¬ *A52.7†, H45.8**
- - Épididyme ¬ *A52.7†, N51.1**
- - Épiglotte ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Ganglion lymphatique ¬ *A52.7†, I98.8**
- - Glande thyroïde ¬ *A52.7†, E35.0**
- - Hémorragie du corps vitré ¬ *A52.7†, H45.0**
- - Intestin ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Langue ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Larynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Latente ¬ *A52.8*
- - Lèvre ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Lymphadénite ¬ *A52.7†, I98.8**
- - Médiastin ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Nez ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Œil ¬ *A52.7†, H58.8**
- - Œsophage ¬ *A52.7†, K23.8**
- - Orbites ¬ *A52.7†, H06.3**
- - Os pétreux ¬ *A52.7†, M90.28**
- - Ovaire ¬ *A52.7†, N74.2**
- - Palais ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Pancréas ¬ *A52.7†, K87.1**
- - Paupière avec gomme ¬ *A52.7†, H03.1**
- - Peau ¬ *A52.7†, L99.8**
- - Pénis ¬ *A52.7†, N51.8**
- - Périoste ¬ *A52.7†, M90.19**
- - Pharynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Plèvre ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Prostate ¬ *A52.7†, N51.0**
- - Rectum ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Rein ¬ *A52.7†, N29.0**
- - Rétine ¬ *A52.7†, H32.0**
- - Sans précision ¬ *A52.9*
- - Sclère ¬ *A52.7†, H19.0**
- - Scrotum ¬ *A52.7†, N51.8**
- - Symptomatique avec leucoderme ¬ *A52.7†, L99.8**
- - Système nerveux central SAI ¬ *A52.3*
- - Tendon ¬ *A52.7†, M68.09**
- - Thymus ¬ *A52.7†, E35.8**

Syphilis *–suite*
- Tardif *–suite*
- - Trachée ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Tractus uvéal ¬ *A52.7†, H22.0**
- - Trompe de Fallope ¬ *A52.7†, N74.2**
- - Tubéreuse ¬ *A52.7†, L99.8**
- - Tunique vaginale ¬ *A52.7†, N51.8**
- - Urètre ¬ *A52.7†, N37.0**
- - Utérus ¬ *A52.7†, N74.2**
- - Vagin ¬ *A52.7†, N77.1**
- - Vésicule
- - - Biliaire ¬ *A52.7†, K87.0**
- - - Séminale ¬ *A52.7†, N51.8**
- - Vessie urinaire ¬ *A52.7†, N33.8**
- - Voies respiratoires ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Vulve ¬ *A52.7†, N77.1**
- - ¬
- - - *A52*
- - - Arthropathie au cours de *A52.7†, M03.19**
- - - Choriorétinite au cours de *A52.7†, H32.0**
- - - Encéphalite au cours de *A52.1†, G05.0**
- - - Encéphalomyélite au cours de *A52.1†, G05.0**
- - - Myélite au cours de *A52.1†, G05.0**
- - - Oculopathie au cours de *A52.7†, H58.8**
- - - Synovite au cours de *A52.7†, M68.09**
- - - Ténosynovite au cours de *A52.7†, M68.09**
- Tertiaire ¬ Aphasie au cours de *A52.1†, G94.8**
- Testicule ¬ *A52.7†, N51.1**
- Trachée ¬ *A52.7†, J99.8**
- Trompe d'Eustache ¬ *A52.7†, J99.8**
- Urètre ¬ *A52.7†, N37.0**
- Vasculaire
- - Cerveau ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Système nerveux central ¬ *A52.0†, I68.8**
- - ¬ *A52.0†, I98.0**
- Veine porte ¬ *A52.0†, I98.0**
- Veineuse ¬ *A52.0†, I98.0**
- Viscérale secondaire NCA ¬ *A51.4*
- ¬
- - Arthrite neuropathique au cours de *A52.1†, M14.69**
- - Arthropathie de Charcot au cours de *A52.1†, M14.69**
- - Crise gastrique au cours de *A52.7†, K93.8**
- - Démence paralysante au cours de *A52.1†, F02.8**
- - Hémorragie cérébrale due à la *A52.0†, I68.8**
- - Kératoconjonctivite interstitielles au cours de *A50.3†, H19.2**
- - Maladie
- - - Endocarde au cours de *A52.0†, I39.8**
- - - Glomérulaire au cours de *A52.7†, N08.0**

Syphilis *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Voies respiratoires au cours de *A52.7†*, *J99.8**
- - Méningite au cours de *A52.1†*, *G01**
- - Myosite secondaire au cours de *A51.4†*, *M63.09**
- - Névrite acoustique au cours de la *A52.1†*, *H94.0**
- - Nez en selle attribuable à la *A50.5*
- - Nodule juxta-articulaire au cours de *A52.7†*, *M14.89**
- - Pyélonéphrite au cours de *A52.7†*, *N16.0**
- - Résultats faussement positifs au test sérologique de la *R76.2*
- - Sujet porteur de: *Z22.4*
- - Synovite au cours de *A52.7†*, *M68.09**
- - Ténosynovite au cours de *A52.7†*, *M68.09**
- - Thrombose
- - - Cardiaque due à la *A52.0†*, *I52.0**
- - - Cérébrale due à la *A52.0†*, *I68.8**
- - - Coronaire due à la *A52.0†*, *I52.0**
- - - Murale due à la *A52.0†*, *I52.0**
- - - Veine porte due à la *A52.0†*, *I98.0**

Syphilitica ¬ Keratitis punctata *A50.3†*, *H19.2**

Syphilitique
v. Type de maladie

Syphilitique tardif
v. Type de maladie

Syphilome
- Cardiovasculaire ¬ *A52.0†*, *I98.0**
- Système
- - Circulatoire ¬ *A52.0†*, *I98.0**
- - Nerveux central SAI ¬ *A52.3*

Syringobulbie ¬
- Spondylopathie neurologique au cours de *G95.0†*, *M49.49**
- Syringomyélie et *G95.0*

Syringomyélie
- Syringobulbie ¬ *G95.0*
- ¬
- - Arthropathie au cours de *G95.0†*, *M14.69**
- - Spondylopathie neurologique au cours de *G95.0†*, *M49.49**

Syringomyélique de Charcot ¬ Arthropathie *G95.0†*, *M49.49**

Syringomyélocèle ¬ *Q05*

Systématique mère
- Sans précision ¬ Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal *O28.9*
- ¬ résultat
- - Anormal
- - - Constatés au cours de l'examen prénatal *O28*
- - - Cours de l'examen prénatal *O28.8*
- - Biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal *O28.1*

Systématique mère *–suite*
- ¬ résultat *–suite*
- - Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal *O28.5*
- - Cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal *O28.2*
- - Échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal *O28.3*
- - Hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal *O28.0*
- - Radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal *O28.4*

Systémique
v. Type de maladie

Systolique) SAI ¬ Souffle cardiaque (*R01.1*

TAB ¬ Nécessité vaccination contre
- Choléra et la typhoïde-parathyphoïde [choléra + *Z27.0*
- Diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + *Z27.2*
- Typhoïde-paratyphoïde seule [*Z23.1*

Tabac
- Médicaments ou de drogues ¬ Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de *Z72.0*
- Nicotine ¬ Effet toxique: *T65.2*
- ¬
- - Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F17*

Tabagisme
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par le *P04.2*
- ¬
- - Conseil: à propos du *Z71*
- - Rééducation après *Z50.8!*

Tabardillo] ¬ Typhus murin [typhus mexicain, typhus endémique, *A75.9*

Tabatznik ¬ Syndrome de *Q87.2*

Tabès
- Juvénile ¬ *A50.4*
- Mal perforant plantaire syphilitique ¬ *A52.1†, L99.8**
- Osseux ¬ *A52.1†, M90.29**
- ¬
- - *A52.1*
- - Spondylopathie neurologique au cours de *A52.1†, M49.49**

Tabes mesenterica ¬ *A18.3†, K93.0**

Tabétique
- Juvénile ¬ Syphilis nerveuse *A50.4*
- ¬ Arthropathie *A52.1†, M14.69**

Tabique
- Charcot ¬ Arthropathie *A52.1†, M14.69**
- Cordon postérieur ¬ Sclérose *A52.1†, G32.8**
- Neurogène ¬ Atrophie osseuse *A52.1†, M90.29**
- ¬
- - Arthrite *A52.1†, M03.19**
- - Arthropathie neuropathique *A52.1†, M14.69**

Tabo-paralysie
- Articulation de Charcot ¬ *A52.1†, M14.69**
- Mal perforant plantaire syphilitique ¬ *A52.1†, L99.8**

TAC
- Tachyarythmie complète] ¬ *I48.9*
- ¬ *Q20.0*

TACH ¬ Syndrome *E75.2*

Tache
- Aveugle ¬ Elargissement de la *H53.4*
- Bitot
- - Jeune enfant ¬ *E50.1*

Tache *–suite*
- Bitot *–suite*
- - Xérosis conjonctival ¬ Avitaminose A avec *E50.1†, H13.8**
- Blanches [caries initiales] ¬ *K02.0*
- Café lait ¬
- - *L81.3*
- - Syndrome de sténose pulmonaire- *Q85.0*
- Émail non associées à la fluorose ¬ *K00.3*
- Rouge cerise ¬ Syndrome myoclonies- *E77.1*
- Rousseur ¬ *L81.2*
- Séniles ¬ *L81.8*
- Vin
- - Multiples familiaux ¬ Nævus en *Q82.5*
- - ¬ Nævus: en *Q82.5*

Tacheté
- Familiale bénigne ¬ Rétine *H35.5*
- ¬
- - Dents *K00.3*
- - Dysplasie diaphysaire *Q77.3*
- - Émail *K00.3*

Tachyarythmie
- Atrial
- - Intervalle PR court ¬ *I45.6*
- - Trouble de conduction cardiaque infra-Hisienne familiales ¬ *I45.8*
- Complet
- - Paroxystique
- - - Cours
- - - - Fibrillation auriculaire ¬ *I48.0*
- - - - Flutter auriculaire ¬ *I48.9*
- - - ¬ *I48.0*
- - ¬
- - - *I48.9*
- - - TAC [*I48.9*
- Cours d'une fibrillation auriculaire ¬ *I48.9*
- ¬ *I49.8*

Tachycardie
- Atrial
- - Chaotique ¬ *I47.1*
- - Multifocale ¬ *I47.1*
- Bradycardie ¬ Syndrome de *I49.5*
- Fœtale ¬ *O68.0*
- Hisienne ¬ *I47.1*
- Jonction AV par réentrée ¬ *I47.1*
- Jonctionnelle ectopique ¬ *I47.1*
- Paroxystique
- - Atriale ¬ *I47.1*
- - Atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ *I47.1*
- - Auriculoventriculaire [AV] SAI ¬ *I47.1*
- - Jonctionnelle ¬ *I47.1*
- - Nodale ¬ *I47.1*
- - Sans précision ¬ *I47.9*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**

Tachycardie *–suite*
- Paroxystique *–suite*
- - ¬ *I47*
- Sans précision ¬ *R00.0*
- Sinoauriculaire SAI ¬ *R00.0*
- Sinusale SAI ¬ *R00.0*
- Supraventriculaire ¬ *I47.1*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- Ventriculaire
- - Incessante du nouveau-né ¬ *I47.2*
- - Paroxystique maligne ¬ *I47.2*
- - Polymorphe catécholaminergique ¬ *I47.2*
- - ¬ *I47.2*

Tachypnée transitoire du nouveau-né ¬ *P22.1*

Taenia
- Saginata ¬ Infection
- - *B68.1*
- - Cestodes adultes (*B68.1*
- Sans précision ¬ Infection à *B68.9*
- Solium ¬ Infection
- - *B68.0*
- - Larve de *B69*
- Téniase] ¬ Infection à *B68*

Taïga [encéphalite verno-estivale russe] ¬ Encéphalite de la *A84.0*

Taille
- Âge gestationnel ¬ Petite *P05.1*
- Associée à SHOX ¬ Petite *Q87.1*
- Déficit
- - GHR ¬ Petite *E34.3*
- - Récepteur des secrétagogues de l'hormone de croissance ¬ Petite *E34.3*
- Hyperlaxité ¬ Syndrome d'hydrocéphalie-grande *Q87.8*
- Hypertélorisme ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-petite *Q87.8*
- Petite à moyenne CD4+ ¬ Lymphome T cutané à cellules pléomorphes de *C84.4*
- Surdité-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de dentinogenèse imparfaite-petite *Q87.8*
- Troubles du comportement-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-petite *Q87.8*
- ¬ Syndrome
- - Blépharophimosis-ptosis-ésotropie-syndactylie-petite *Q87.8*
- - Congénitaux malformatifs associés principalement à une petite *Q87.1*
- - Déficience intellectuelle liée à l'X-hypogonadisme-ichtyose-obésité-petite *Q87.8*
- - Goniodysgénésie-déficience intellectuelle-petite *Q87.8*
- - Microtie-anomalies squelettiques-petite *Q87.1*
- - Polydactylie préaxiale-colobome-déficience intellectuelle petite *Q87.2*

Takagi
v. Furukawa-Takagi-Nakao

Takahara] ¬ Acatalasie [*E80.3*

Takayasu ¬

- Artérite de *M31.4*
- Syndrome de la crosse aortique [*M31.4*

Tako-Tsubo ¬ Cardiomyopathie *I42.88*

Talc ¬ Pneumoconiose due à la poussière du *J62.0*

Talipes equinovarus avec communication interatriale, séquence de Robin et persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome TARP (*Q87.8*

Talo-crurale ¬ Syndrome d'empiètement de l'articulation *M24.87*

Talon ¬

- *S91.3*
- Malformation acquise du *M21.68*
- Os du *S92.0*

Talus

- Valgus ¬ Pied bot *Q66.4*
- Varus ¬ Pied bot *Q66.1*

Tamoxifène ¬ *T38.6*

Tampon ¬ Syndrome du choc toxique avec utilisation de *A48.3*

Tamponnade cardiaque ¬ *I31.9*

Tanapox ¬ Syndrome du virus de *B08.8*

Tangier ¬ Maladie de *E78.6*

Tapétochoroïdienne ¬ Dystrophie *H31.2*

Tapéto-rétinien ¬

- Dystrophie: *H35.5*
- Syndrome d'hypoplasie cérébelleuse-dégénérescence *Q04.3*

Tardif

- Amygdales linguales ¬ Syphilis *A52.7†, J99.8**
- Appareil lacrymal ¬ Syphilis *A52.7†, H06.0**
- Associée à l'alpha-B cristalline ¬ Myopathie distale *G71.0*
- Autosomique dominante ¬ Dégénérescence rétinienne d'apparition *H35.5*
- Bassin féminin ¬ Inflammation syphilitique *A52.7†, N74.2**
- Bouche ¬ Syphilis *A52.7†, K93.8**
- Bourse ¬ Syphilis *A52.7†, M73.19**
- Canal déférent ¬ Syphilis *A52.7†, N51.8**
- Cardiovasculaire ¬ Syphilis congénitale *A50.5†, I98.0**
- Col de l'utérus ¬ Syphilis *A52.7†, N74.2**
- Côlon ¬ Syphilis *A52.7†, K93.8**
- Cornée ¬ Syphilis *A52.7†, H19.2**
- Corps
- - Ciliaire ¬ Syphilis *A52.7†, H22.0**
- - Vitré ¬ Syphilis *A52.7†, H45.8**
- Épididyme ¬ Syphilis *A52.7†, N51.1**
- Épiglotte ¬ Syphilis *A52.7†, J99.8**
- Forme d'étoile ¬ Hyalose syphilitique *A52.7†, H45.8**
- Ganglion lymphatique ¬ Syphilis *A52.7†, I98.8**
- Glande thyroïde ¬ Syphilis *A52.7†, E35.0**

Tardif *–suite*

- Grossesse ¬ Vomissements *O21.2*
- Hémorragie du corps vitré ¬ Syphilis *A52.7†, H45.0**
- Idiotie amaurotique ¬ Forme *E75.4*
- Intestin ¬ Syphilis *A52.7†, K93.8**
- Langue ¬ Syphilis *A52.7†, K93.8**
- Larynx ¬
- - Périchondrite syphilitique *A52.7†, J99.8**
- - Syphilis *A52.7†, J99.8**
- Latent ¬ Syphilis
- - *A52.8*
- - Congénitale *A50.6*
- Late-onset] ¬ Insuffisance hépatique à début *K72.0*
- Lèvre ¬ Syphilis *A52.7†, K93.8**
- Liée à l'X ¬ Hypothyroïdie congénitale centrale avec macroorchidie *E03.1*
- Luette ¬ Syphilis perforée *A52.7†, K93.8**
- Lymphadénite ¬ Syphilis *A52.7†, I98.8**
- Médiastin ¬ Syphilis *A52.7†, J99.8**
- Nerf vestibulocochléaire ¬ Névrite syphilitique *A52.1†, H94.0**
- Neurosyphilis juvénile] ¬ Syphilis congénitale nerveuse *A50.4*
- Nez ¬
- - Déformation syphilitique *A52.7†, J99.8**
- - Syphilis *A52.7†, J99.8**
- Nodulaire (ulcéré) ¬ Pian *A66.4*
- Non héréditaire ¬ Lymphœdème primaire *I89.09*
- Nouveau-né ¬ Acidose métabolique *P74.0*
- Œil ¬ Syphilis *A52.7†, H58.8**
- Œsophage ¬ Syphilis *A52.7†, K23.8**
- Orbites ¬ Syphilis *A52.7†, H06.3**
- Os pétreux ¬ Syphilis *A52.7†, M90.28**
- Ovaire ¬ Syphilis *A52.7†, N74.2**
- Palais ¬ Syphilis *A52.7†, K93.8**
- Pancréas ¬ Syphilis *A52.7†, K87.1**
- Paupière avec gomme ¬ Syphilis *A52.7†, H03.1**
- Peau ¬ Syphilis *A52.7†, L99.8**
- Pénis ¬ Syphilis *A52.7†, N51.8**
- Périoste ¬ Syphilis *A52.7†, M90.19**
- Pharynx ¬ Syphilis *A52.7†, J99.8**
- Pian ¬ Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (*A66.3*
- Pinta ¬ Lésions *A67.2*
- Plèvre ¬ Syphilis *A52.7†, J99.8**
- Polypose ¬ Syphilis gastrique *A52.7†, K93.8**
- Prostate ¬ Syphilis *A52.7†, N51.0**
- Rachitisme ¬
- - Cyphose en tant que conséquence *E64.3, M40.19*
- - Dos voûté en tant que conséquence *E64.3, M40.29*
- Rectum ¬ Syphilis *A52.7†, K93.8**
- Rein ¬ Syphilis *A52.7†, N29.0**

Tardif *–suite*

- Rétine ¬ Syphilis *A52.7†, H32.0**
- SAI ¬ Syphilis congénitale *A50.7*
- Sans précision ¬ Syphilis
- - *A52.9*
- - Congénitale *A50.7*
- Sclère ¬ Syphilis *A52.7†, H19.0**
- Scrotum ¬ Syphilis *A52.7†, N51.8**
- Secondaire ¬ Hémorragie du post-partum, *O72.2*
- Symptomatique avec leucoderme ¬ Syphilis *A52.7†, L99.8**
- Syphilis
- - Congénitale, symptomatique ¬ Autres formes *A50.5*
- - Symptomatique ¬ Autres formes *A52.7*
- Système nerveux central SAI ¬ Syphilis (*A52.3*
- Tendon ¬ Syphilis *A52.7†, M68.09**
- Thymus ¬ Syphilis *A52.7†, E35.8**
- Trachée ¬ Syphilis *A52.7†, J99.8**
- Tractus uvéal ¬ Syphilis *A52.7†, H22.0**
- Trompe de Fallope ¬ Syphilis *A52.7†, N74.2**
- Tubéreuse ¬ Syphilis *A52.7†, L99.8**
- Tunique vaginale ¬ Syphilis *A52.7†, N51.8**
- Type
- - 1) ¬ Démence de la maladie d'Alzheimer, à début *G30.1†, F00.1**
- - Kohn ¬ Dysplasie spondylo-épiphysaire *Q77.7*
- - Markesbery-Griggs ¬ Myopathie distale *G71.0*
- Urètre ¬ Syphilis *A52.7†, N37.0**
- Utérus ¬ Syphilis *A52.7†, N74.2**
- Vagin ¬ Syphilis *A52.7†, N77.1**
- Vésicule
- - Biliaire ¬ Syphilis *A52.7†, K87.0**
- - Séminale ¬ Syphilis *A52.7†, N51.8**
- Vessie urinaire ¬ Syphilis *A52.7†, N33.8**
- Voies respiratoires ¬ Syphilis *A52.7†, J99.8**
- Vulve ¬ Syphilis *A52.7†, N77.1**
- ¬
- - Albinisme oculaire avec surdité sensorielle *E70.3*
- - Anémie syphilitique *A52.7†, D63.8**
- - Arachnoïdite syphilitique *A52.1†, G01**
- - Arthrite syphilitique *A52.1†, M03.19**
- - Arthropathie
- - - Cours de syphilis *A52.7†, M03.19**
- - - Syphilitique congénitale *A50.5†, M03.19**
- - Asthme *J45.9*
- - Ataxie cérébelleuse *G11.2*
- - Atrophie optique syphilitique *A52.1†, H48.0**
- - Bursite syphilitique *A52.7†, M73.19**
- - Céroïde-lipofuscinose neuronale infantile *E75.4*
- - Cervicite syphilitique *A52.7†, N74.2**

Tardif *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Chorioïdite syphilitique
- - - *A52.7†, H32.0**
- - - Congénitale *A50.3†, H32.0**
- - Chorioretinite
- - - Cours de syphilis *A52.7†, H32.0**
- - - Syphilitique
- - - - *A52.7†, H32.0**
- - - - Congénitale *A50.3†, H32.0**
- - Conjonctivite syphilitique *A52.7†, H13.1**
- - Cystite syphilitique *A52.7†, N33.8**
- - Dacryocystite syphilitique *A52.7†, H06.0**
- - Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme *E25.01*
- - Démence de la maladie d'Alzheimer, à début *G30.1†, F00.1**
- - Dyskinésie *G24.0*
- - Encéphalite
- - - Cours de syphilis *A52.1†, G05.0**
- - - Syphilitique
- - - - *A52.1†, G05.0**
- - - - Congénitale *A50.4†, G05.0**
- - Encéphalomyélite au cours de syphilis *A52.1†, G05.0**
- - Épididymite syphilitique *A52.7†, N51.1**
- - Épisclérite syphilitique *A52.7†, H19.0**
- - État de mal épileptique réfractaire d'apparition *G41.8*
- - Gomme osseuse du pian (*A66.6*
- - Hépatite syphilitique
- - - *A52.7†, K77.0**
- - - Congénital
- - - - *A50.5†, K77.0**
- - - - Stade *A50.5†, K77.0**
- - Hyalite syphilitique *A52.7†, H45.8**
- - Hydarthrose
- - - Pian (précoce) (*A66.6*
- - - Syphilitique *A52.7†, M14.89**
- - Insuffisance hépatique *K72.0*
- - Iridocyclite syphilitique congénitale *A50.3†, H22.0**
- - Irite syphilitique
- - - *A52.7†, H22.0**
- - - Congénitale *A50.3†, H22.0**
- - Kératite interstitielle syphilitique congénitale *A50.3†, H19.2**
- - Laryngite syphilitique *A52.7†, J99.8**
- - Laryngotrachéite syphilitique *A52.7†, J99.8**
- - Leucoderme syphilitique *A52.7†, L99.8**
- - Lymphœdème primaire *I89.09*
- - Marche *R62.0*
- - Médiastinite syphilitique *A52.7†, J99.8**
- - Méningite syphilitique
- - - *A52.1†, G01**
- - - Congénitale *A50.4†, G01**

Tardif *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Myélite au cours de syphilis *A52.1†, G05.0**
- - Myosite syphilitique *A52.7†, M63.09**
- - Néphrite syphilitique *A52.7†, N08.0**
- - Néphrose syphilitique *A52.7†, N08.0**
- - Névrite rétrobulbaire syphilitique *A52.1†, H48.1**
- - Nodule du pian (précoce) (*A66.6*
- - Oculopathie
- - - Cours de syphilis *A52.7†, H58.8**
- - - Syphilitique
- - - - *A52.7†, H58.8**
- - - - Congénital
- - - - - *A50.3*
- - - - - *A50.3†, H58.8**
- - Ostéite
- - - Périostite gommeuse du pian (*A66.6*
- - - Pian (précoce) (*A66.6*
- - - Syphilitique *A52.7†, M90.29**
- - Ostéochondropathie syphilitique congénitale *A50.5†, M90.29**
- - Paraphrénie (*F22.0*
- - Périostite
- - - Hypertrophique) du pian (précoce) (*A66.6*
- - - Syphilitique *A52.7†, M90.19**
- - Péritonite syphilitique *A52.7†, K67.2**
- - Polyneuropathie syphilitique
- - - *A52.1†, G63.0**
- - - Congénitale *A50.4†, G63.0**
- - Polynévrite syphilitique congénitale *A50.4†, G63.0**
- - Porphyrie cutanée *E80.1*
- - Pyélonéphrite syphilitique *A52.7†, N16.0**
- - Rétinite syphilitique *A52.7†, H32.0**
- - Sclérite syphilitique *A52.7†, H19.0**
- - Sinusite syphilitique *A52.7†, J99.8**
- - Syndrome de Marie-Pierre II d'apparition *G11.2*
- - Synovite au cours de syphilis *A52.7†, M68.09**
- - Syphilis
- - - *A52*
- - - Bronchique *A52.7†, J99.8**
- - - Cardiovasculaire *A52.0†, I98.0**
- - - Intestinale *A52.7†, K93.8**
- - - Latente, non précisée précoce ou *A53.0*
- - - Osseuse *A52.7†, M90.29**
- - - Pulmonaire *A52.7†, J99.8**
- - Ténosynovite au cours de syphilis *A52.7†, M68.09**
- - Trachéite syphilitique *A52.7†, J99.8**
- - Ulcère syphilitique *A52.7†, L99.8**
- - Uvéite syphilitique *A52.7†, H22.0**
- - Vaginite syphilitique *A52.7†, N77.1**
- - Vulvite syphilitique *A52.7†, N77.1**

TARP (Talipes equinovarus avec communication interatriale, séquence de Robin et persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome *Q87.8*

Tarsale
- Oligodontie ¬ Syndrome de fente palatine-anomalies carpo- *Q87.8*
- ¬ Coalescence *Q66.8*

Tarse
- Sans précision ¬ Fracture: Un ou plusieurs autres os du *S92.20*
- ¬
- - Fracture Os
- - - *S92.28*
- - - Naviculaire du pied[scaphoide du *S92.21*
- - Ostéochondrite juvénile du *M92.6*

Tarsien
v.a. cranio-carpo-tarsien
v.a. médiotarsien
- Köhler] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: scaphoïde *M92.6*
- ¬
- - Abcès des glandes *H00.0*
- - Ligament: *S93.6*
- - Os naviculaire carpien ou *S62.0*
- - Syndrome du canal *G57.5*

Tarsite
- Syphilitique ¬ *A52.7†, H03.1**
- Tuberculeuse ¬ *A18.4†, H03.1**

Tarsocarpienne ¬ Syndrome de coalition *Q74.8*

Tarso-métatarsien ¬
- Ligament: *S93.6*
- Luxation de parties autres et non précisées du pied: (Articulation) *S93.33*

Tartre dentaire
- Sous-gingival ¬ *K03.6*
- Supra-gingival ¬ *K03.6*

Tarui ¬ Maladie de: *E74.0*

Tassement vertébral
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *M49.5**
- Non classé ailleurs ¬ *M48.5*
- SAI ¬ *M48.5*
- Vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques ¬ *M80*

Tateyama ¬ Myopathie distale type *G71.0*

Tatouage
- Piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un *U69.10!*
- ¬ Pigmentation: par *L81.8*

Tatton-Brown-Rahman ¬ Syndrome de *Q87.3*

Taurodontisme ¬ *K00.2*

Taussig-Bing ¬ Syndrome de *Q20.1*

Taux
- Accru
- - Ammoniaque ¬ *R79.8*

Taux *–suite*
- Accru *–suite*
- - Ostéocalcine ¬ *R79.8*
- Amylase ¬ Anomalies des *R74.8*
- Anormal
- - Alanine aminotransférase ¬ *R74.8*
- - Aspartate aminotransférase ¬ *R74.8*
- - Cobalt ¬ *R79.0*
- - Cuivre ¬ *R79.0*
- - Fer ¬ *R79.0*
- - Gaz du sang ¬ *R79.8*
- - Lithium dans le sang ¬ Présence d'un *R78.8*
- - Magnésium ¬ *R79.0*
- - Métaux lourds dans les urines ¬ *R82.6*
- - Minéraux dans le sang ¬ *R79.0*
- - Substance minérale NCA ¬ *R79.0*
- - Urines de substances d'origine principalement non médicinale ¬ *R82.6*
- - Zinc ¬ *R79.0*
- Anormalement élevé de métaux lourds dans le sang ¬ Présence d'un *R78.7*
- Anticorps ¬ Augmentation du *R76.0*
- Antigène spécifique de la prostate [PSA] ¬ Modification du *R77.80*
- Élevé d'alpha-fœtoprotéines ¬ Dépistage prénatal d'un *Z36.1*
- Enzyme sérique
- - Sans précision ¬ Anomalie du *R74.9*
- - ¬ anomalie
- - - *R74*
- - - *R74.8*
- Immunoglobulines SAI ¬ Augmentation du *R76.8*
- Lipase [triacylglycerol lipase] ¬ Anomalies des *R74.8*
- Médicaments et de substances biologiques ¬ Augmentation dans les urines du *R82.5*
- Phosphatase
- - Acide ¬ Anomalies des *R74.8*
- - Alcaline ¬ Anomalies des *R74.8*
- Protéine
- - C-réactive ¬ Augmentation pathologique du *R77.88*
- - Plasmatiques ¬ Autres modifications précisées des *R77.88*
- Réduit
- - Glutathion ¬ *R79.8*
- - Protéine de liaison du facteur de croissance ressemblant à l'insuline ¬ *R77.88*
- Transaminase et d'acide lactique déshydrogénase ¬ Augmentation des *R74.0*
- Urinaire élevé
- - 17-cétostéroïdes ¬ *R82.5*
- - Acide indol-acétique ¬ *R82.5*
- - Catécholamines ¬ *R82.5*
- - Stéroïdes ¬ *R82.5*

Taybi ¬ Syndrome de: Rubinstein- *Q87.2*

Taylor
v. Schaap-Taylor-Baraitser

Tay-Sachs ¬ Maladie
- *E75.0*

Tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/ *U81.6!*

T-B- ¬
- Déficit immunitaire combiné sévère *D81.1*
- SCID *D81.1*

T-B+
- Déficit en JAK3 ¬ Déficit immunitaire combiné sévère *D81.2*
- Lié à l'X ¬ Déficit immunitaire combiné sévère *D81.2*
- ¬
- - Immunodéficience combinée sévère *D81.2*
- - SCID *D81.2*

TBC tuberculose
- Articulaire ¬ *A18.0†, M01.19**
- Articulation du genou ¬ *A18.0†, M01.16**
- Cerveau ¬ *A17.8†, G07**
- Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- Hanche ¬ *A18.0†, M01.15**
- Intestin ¬ *A18.3†, K93.0**
- Méninges ¬ *A17.0†, G01**
- Os ¬ *A18.0†, M90.09**
- Rein ¬ *A18.1†, N29.1**

Tchouvachie ¬ Polycythémie de *D75.1*

TD ¬ *Q77.1*

TDAH [trouble du déficit de l'attention / hyperactivité] ¬ *F90.0*

Teebi
v. Kennedy-Teebi
- ¬ Hypertélorisme de *Q87.0*

Teebi-Kaurah ¬ Syndrome de *Q87.8*

Teevan ¬ Fracture crânienne de *S02.0*

Tegmentale ¬ Paralysie
- *G83.8*
- Mésencéphalique/ *G83.8*

Tegmentum pontique ¬ Dysplasie du *Q04.8*

Tégument
- Phanères SAI ¬
- - Anomalie SAI des *Q84.9*
- - Déformation SAI des *Q84.9*
- Spécifique fœtus nouveau-né
- - Sans précision ¬ Affection des *P83.9*
- - ¬ affection
- - - *P83*
- - - Précisées des *P83.8*

Teigne
- Barbe et du cuir chevelu ¬ *B35.0*
- Crurale] ¬ Teigne inguinale [*B35.6*
- Imbriquée ¬ *B35.5*
- Inguinale [teigne crurale] ¬ *B35.6*

Teigne *–suite*
- Main ¬ *B35.2*
- Ongle ¬ *B35.1*
- Peau glabre ¬ *B35.4*
- Pied ¬ *B35.3*
- SAI ¬ *B35.9*
- Tondante ¬ *B35.0*
- Tous types, sauf ceux classés en B36.- ¬ *B35*
- ¬ *B35.0*

Teinte des tissus dentaires durs après l'éruption ¬ Modification de la *K03.7*

Teintures
- Non classées ailleurs ¬ Effet toxique: Peintures et *T65.6*
- ¬
- - *L24.8*
- - Dermite
- - - Allergique de contact due aux *L23.4*
- - - Contact, sans précision, due aux *L25.2*

Télangiectasie
- Essentielle ¬ *L81.7*
- Hémorragique héréditaire ¬ *I78.0*
- Maculaire ¬ *H35.0*
- Parafovéale ¬ *H35.0*
- Rétinien
- - Congénitale ¬ *H35.0*
- - ¬ *H35.0*
- ¬ Syndrome de calcinose-maladie de Raynaud-troubles moteurs œsophagiens-sclérodactylie- *M34.1*

Télangiectasique
- Foie ¬ Hyperplasie nodulaire focale *D13.4*
- Louis-Bar] ¬ Ataxie *G11.3*
- Muqueuse buccale ¬ Granulome *K13.4*
- Périphériques ¬ Masses *D31.2*
- ¬ Adénome hépatocellulaire *D13.4*

Telangiectatica congenita ¬
- Cutis marmorata *Q27.8*
- Syndrome
- - Macrocéphalie-cutis marmorata *Q87.3*
- - Mégalencéphalie-cutis marmorata *Q87.3*

Téléangiectasie [angiome stellaire] ¬ *I78.1*

Télédiastolique ventriculaire gauche ¬ Augmentation pathologique de la pression *R94.3*

Teller
v. Pfeiffer-Palm-Teller

Télogène ¬ *L65.0*

TEMF ¬ *I42.3*

Témoin ¬ Décès sans *R98*

Température
- Ambiante ¬ Hypothermie, non associée à une baisse de la *R68.0*
- Extrême ¬ *Z57*
- Sans précision ¬ Effet d'une baisse de la *T69.9*
- ¬ effet

Température *–suite*
- ¬ effet *–suite*
- - Baisse de la *T69*
- - Précisés d'une baisse de la *T69.8*

Temple
v. Houlston-Ironton-Temple

Temporaire
- Persistantes] ¬ Rétention dentaire [dents *K00.6*
- Seuil auditif ¬ Modification *H93.2*
- ¬ Chute prématurée des dents *K00.6*

Temporal
- Droite ¬ Démence fronto-temporale, variante d'atrophie *G31.0†, F02.0**
- Écaille temporale ¬ Os: *S02.0*
- Exclusion de l'écaille temporale ¬ *S02.1*
- Familiale ¬ Épilepsie *G40.2*
- FTD] ¬ Démence fronto- *G31.0†, F02.0**
- Juvénile ¬ Artérite *L95.8*
- Mésiale familial
- - Bénigne ¬ Épilepsie *G40.2*
- - Convulsions fébriles ¬ Épilepsie *G40.2*
- Papille optique ¬ Pâleur *H47.2*
- Variante
- - Atrophie temporale à droite ¬ Démence fronto- *G31.0†, F02.0**
- - Comportementale ¬ Démence fronto- *G31.0†, F02.0**
- ¬
- - Artérite *M31.6*
- - Lobe
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Os
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - - Temporal, écaille *S02.0*
- - Région *T20*
- - Temporal, à l'exclusion de l'écaille *S02.1*
- - Tumeur maligne: Lobe *C71.2*

Temporo-mandibulaire
- Ligament) ¬ Articulation *S03.4*
- ¬
- - Ankylose congénitale *K07.6*
- - Articulation
- - - *S03.0*
- - - *T84.08*
- - Dysfonctionnement de l'articulation *K07.6*
- - Lésions de l'articulation *K07.6*
- - Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la joue et de la région *S01.49*
- - Présence d'une prothèse *Z96.68*
- - Syndrome de dysfonctionnement douloureux de l'articulation *K07.6*

Temps
- Coagulation prolongé ¬ *R79.8*
- Thromboplastine prolongé ¬ *R79.8*

Temtamy ¬ Syndrome de brachydactylie préaxiale de *Q87.2*

Temtamy-Shalash ¬ Syndrome de *Q87.8*

Tendance
- Chute
- - Affections peu claires ¬ *R29.6*
- - Personne âgée ¬ *R29.6*
- Pathologique
- - Allumer des incendies [pyromanie] ¬ *F63.1*
- - Commettre des vols [kleptomanie] ¬ *F63.2*
- Suicidaires ¬ Idées [*R45.8*

Tendineux
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture des cordages *I23.4*
- Gaine) ¬ Autres rétractions *M67.1*
- Nodulaire ¬ Lésion *M65.3*
- Non classée ailleurs ¬ Rupture des cordages *I51.1*
- ¬
- - Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: persistance des réflexes *G11.1*
- - Présence d'autres implants osseux et *Z96.7*

Tendinite
- Calcifiante
- - Épaule ¬ *M75.3*
- - ¬ *M65.2*
- Gonorrhéique ¬ *A54.4†, M68.09**
- Insertion ¬ *M77.9*
- Muscle biceps brachial ¬ *M75.2*
- Péronière ¬ *M76.7*
- Psoas ¬ *M76.1*
- Région fessière ¬ *M76.0*
- Rotulienne ¬ *M76.5*
- SAI ¬ *M77.9*
- Tendon d'Achille ¬ *M76.6*
- Tibiale postérieure ¬ *M76.8*
- Trochantérienne ¬ *M70.6*

Tendon
- Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S39.0*
- Achille
- - Acquise) ¬ Brièveté du *M67.0*
- - ¬
- - - Bursite du *M76.6*
- - - Lésion traumatique du *S86.0*
- - - Tendinite du *M76.6*
- Adducteurs de la cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.2*
- Chef long du biceps brachial ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S46.1*
- Coiffe des rotateurs ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S46.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres atteintes de la synoviale et du *M68.8**

Tendon *–suite*
- Extenseur
- - Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S56.3*
- - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S66.3*
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre *S56.5*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et *S66.7*
- - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S66.2*
- - S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S56.4*
- - ¬ Déchirure spontanée des *M66.2*
- Fléchisseur
- - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S66.1*
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre *S56.2*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et *S66.6*
- - Pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S56.0*
- - S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S56.1*
- - ¬ Déchirure spontanée des *M66.3*
- Gaine ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Kyste articulaire ou du *M67.4*
- Hanche ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.0*
- Intrinsèque
- - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S66.5*
- - Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S96.2*
- - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S66.4*
- Long
- - Extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S96.1*
- - Fléchisseur
- - - Orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S96.0*
- - - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S66.0*
- Membre
- - Inférieur ¬ Séquelles de lésion traumatique de muscles et de *T93.5*
- - Supérieur ¬ Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de *T92.5*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique

Tendon *–suite*
- Niveau *–suite*
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique *–suite*
- - - Multiples muscles et *S56.7*
- - - Muscles et de *S56*
- - Cheville pied ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et *S96.7*
- - - Muscles et *S96.8*
- - Cou ¬ Lésion traumatique des muscles et des *S16*
- - Épaule bras ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et *S46.7*
- - - Muscles et *S46.8*
- - Hanche cuisse ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et *S76.7*
- - - Muscles et de *S76*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et *S86.7*
- - - Muscles et *S86.8*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'autres muscles et *S66.8*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique des muscles et des *S29.0*
- Non précis
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *T13.5*
- - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *T11.5*
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S56.8*
- - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S96.9*
- - - Cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.4*
- - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique de muscle et de *S46.9*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S86.9*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S66.9*
- - Tronc ¬ Lésion traumatique de muscle et de *T09.5*
- Partie
- - Biceps brachial ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S46.2*
- - Corps non précisée ¬ Lésion traumatique de muscles et de *T14.6*
- Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques de muscles et de *T06.4*
- Postérieurs au niveau de la cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.3*
- Quadriceps ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.1*
- S
- - Antérieurs au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de muscle(s) et de *S86.2*
- - Péroniers au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de muscle(s) et de *S86.3*

Tendon *–suite*
- S *–suite*
- - Postérieurs au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et *S86.1*
- - SAI ¬
- - - Arrachement de muscle(s) et de *T14.6*
- - - Déchirures de muscle(s) et de *T14.6*
- - - Entorses/foulures de muscle(s) et de *T14.6*
- - - Lacération de muscle(s) et de *T14.6*
- - - Lésion traumatique de muscle(s) et de *T14.6*
- - - Rupture traumatique de muscle(s) et de *T14.6*
- - - Section de muscle(s) et de *T14.6*
- Sans précision ¬
- - Atteinte de la synoviale et du *M67.9*
- - Déchirure spontanée d'un *M66.5*
- Tête ¬ Lésion traumatique des muscles et des *S09.1*
- Triceps ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S46.3*
- ¬
- - Abcès de la gaine du *M65.0*
- - Absence de: *Q79.8*
- - Atteinte
- - - Précisées de la synoviale et du *M67.8*
- - - Synoviale et du *M67*
- - Brièveté congénitale d'un *Q79.8*
- - Déchirure spontané
- - - *M66.4*
- - - Synoviale et du *M66*
- - Syphilis tardive d'un *A52.7†, M68.09**

Ténesme
- Rectal ¬ *R19.88*
- Vésical ¬ *R30.1*
- ¬ *R19.88*

Teneur en oxygène de l'air ambiant ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible *T71*

Téniase] ¬ Infection à Taenia [*B68*

Tennis elbow ¬ *M77.1*

Téno)synovites infectieuses ¬ Autres (*M65.1*

Ténonite ¬ *H05.0*

Ténosynovite
- Chronique sténosante du pouce [de Quervain] ¬ *M65.4*
- Cours
- - Maladies bactériennes classées ailleurs ¬ Synovite et *M68.0**
- - Syphilis
- - - Tardive ¬ *A52.7†, M68.09**
- - - ¬ *A52.7†, M68.09**
- Gonocoques ¬ *A54.4†, M68.09**
- Gonorrhéique ¬ *A54.4†, M68.09**
- Sans précision ¬ Synovite et *M65.9*
- Sèche de la main et du poignet ¬ *M70.0*

Ténosynovite *–suite*
- Tuberculeux
- - Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - ¬ *A18.0†, M68.09**
- ¬ Synovite
- - *M65*
- - *M65.8*

Tension
- Artériel
- - Élevée ¬ *I10*
- - Sans diagnostic
- - - Hypertension ¬ Constatation d'une élévation de la *R03.0*
- - - ¬ Constatation d'une anomalie de la *R03*
- - ¬
- - - Constatation d'une baisse non spécifique de la *R03.1*
- - - Mesure de la *Z01.3*
- Basse ¬ Glaucome (primitif) (résiduel): à *H40.1*
- Épisodique ¬ Céphalée (de): *G44.2*
- Nerveuse ¬ *R45.0*
- Prémenstruelle ¬ Syndrome de *N94.3*
- SAI ¬ Céphalée (de): *G44.2*
- Sans précision ¬ État de choc émotionnel et *R45.7*
- ¬
- - Céphalée
- - - Chronique dite de *G44.2*
- - - Dite de *G44.2*
- - Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de *R46.6*
- - Rétention urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans *T83.8*

Tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ¬ Rétention urinaire postopératoire post-TVT [*T83.8*

Tentative
- Avortement
- - Médical
- - - Complications autres et non précisées ¬ Echec d'une *O07.3*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ Echec d'une *O07.2*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Echec d'une *O07.1*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Echec d'une *O07.0*
- - - SAI ¬ Echec d'une *O07.4*
- - - Sans complication ¬ Echec d'une *O07.4*
- - SAI ¬ Echec d'une *O07.9*
- - Sans précision
- - - Complications autres et non précisées ¬ Echecs d'une *O07.8*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ Echecs d'une *O07.7*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Echecs d'une *O07.6*

Tentative *–suite*
- Avortement *–suite*
- - Sans précision *–suite*
- - - Compliqué *–suite*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Echecs d'une *O07.5*
- - - Sans précision, sans complication ¬ Echecs d'une *O07.9*
- - ¬ Echec d'une *O07*
- Implantation
- - Embryon en cas de transfert d'embryon ¬ Complications de *N98.3*
- - Œuf fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de *N98.2*
- Suicide ¬ *Z91.8*
- ¬ Suicide (*X84.9!*

Tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical ¬ Déchirure de la *P10.4*

Ter Haar
v. Frank-Ter Haar

Tératogènes de substances transmises par voie placentaire ¬ effets non *P04*

Tératome
- Épignathe ¬ *Q89.4*
- Extragonadique ¬ *D48.9*
- Malin de l'ovaire ¬ *C56*
- Sacro-coccygien fœtus
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- - ¬ Dystocie due à: *O66.3*

Terme
- Antiagrégants plaquettaires ¬ Hémorragie sous utilisation à long *D69.80*
- Anticoagulant
- - Sans saignement ¬ Thérapie à long *Z92.1*
- - ¬
- - - Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long *Z92.1*
- - - Hémorragie sous utilisation à long *D68.35*
- Césarienne ¬ Travail prématuré spontané avec accouchement à *O60.2*
- Coumarines (antagonistes de la vitamine K) ¬ Hémorragie sous utilisation à long *D68.33*
- Héparines ¬ Hémorragie sous utilisation à long *D68.34*
- Médicaments ¬ Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long *Z92.2*
- N'est pas gros pour l'âge gestationnel ¬ Enfant né après *P08.2*
- ¬
- - Enfants nés avant *P07.3*
- - Ictère
- - - Néonatal associé à un accouchement avant *P59.0*
- - - Retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant *P59.0*
- - Incapacité de mener une grossesse à *N97*
- - Naissance après *O48*
- - Soins maternels pour tête haute à *O32.4*

Terme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Travail prématuré avec accouchement à *O60.2*

Terminale
- Défauts de pigmentation ¬ Syndrome de dysplasie osseuse *Q87.2*
- Externe du nerf tibial antérieur ¬ Branche *S94.2*
- ¬
- - Atrophie rénale (*N26*
- - Iléite: *K50.0*
- - Insuffisance rénale *N18.5*

Ternidens
- Deminutus ¬ Infestation par: *B81.8*
- Diminutus [ternidensiase] ¬ Infection par: *B81.8*

Ternidensiase] ¬ Infection par: Ternidens diminutus [*B81.8*

Terreur
- Nocturnes ¬ *F51.4*
- ¬ Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de *G40.02*

Terrifiante pendant l'enfance ¬ Expérience personnelle *Z61*

Territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux ¬ Accident ischémique transitoire de *G45.2*

Terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du *F62.0*

Terroristes ou de tortures ¬ Victime d'un crime, d'actes *Z65*

Tertiaire ¬
- Aphasie
- - Cours de syphilis *A52.1†, G94.8**
- - Syphilitique *A52.1†, G94.8**
- Hyperparathyroïdie *E21.2*
- Rupia *A52.7†, L99.8**
- Syphilis cardiovasculaire *A52.0†, I98.0**

Tessier ¬ Fente facial
- 4 de *Q18.8*
- 5 de *Q18.8*
- 6 de *Q18.8*

Test
- Allergie ¬ *Z01.5*
- Coombs ¬ Résultat positif au *R76.8*
- Cutané
- - Diagnostic et de sensibilisation ¬ *Z01.5*
- - Recherche
- - - Hypersensibilité ¬ *Z01.5*
- - - Maladie bactérienne ¬ *Z01.5*
- Grossesse ¬ Examen et *Z32*
- Lyse positif dans un sérum acidifié ¬ Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec *D64.4*
- Mantoux ¬ Résultats anormaux au *R76.1*
- Recherche du VIH chez les nourrissons ¬ Résultat non concluant du *R75*

Test *–suite*
- Sérologique de la syphilis ¬ Résultats faussement positifs au *R76.2*
- Tuberculine ¬ Réaction anormale au *R76.1*
- Vue d'une procréation ¬ Recherches et *Z31.4*

Testiculaire
- Actes médicaux ¬ Hypofonctionnement *E89.5*
- Cause non traumatique ¬ Lésion *E29.9*
- Cordons sexuels et du stroma ¬ Tumeur *C62.9*
- Développement sexuel 46,XX ¬ Anomalie *Q99.1*
- SAI ¬
- - Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène *E29.1*
- - Hypogonadisme *E29.1*
- Sans précision ¬ Dysfonction *E29.9*
- Syndrome) ¬ Féminisation *E34.51*
- Unilatérale ou bilatérale ¬ Ectopie *Q53.0*
- ¬
- - Anomalie du développement sexuel 46,XY par déficit en 17,20-desmolase *E29.1*
- - Dysfonctions *E29.8*
- - Hyperfonction *E29.0*
- - Hypersécrétion d'hormones *E29.0*
- - Hypofonction *E29.1*
- - Séminome *C62.9*
- - Syndrome de régression *Q55.0*

Testicule
- Canal déférent ¬ Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du *N49.1*
- Descendu ¬ Tumeur maligne: *C62.1*
- Ectopique [siège de la tumeur] ¬ *C62.0*
- Épididyme au cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections du *N51.1**
- Retenu [siège de la tumeur] ¬ *C62.0*
- Rétractile ¬ *Q55.2*
- S scrotum
- - SAI ¬ Malformation congénitale du (des) *Q55.2*
- - ¬
- - - Hypoplasie du (des) *Q55.1*
- - - Malformations congénitales du (des) *Q55.2*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C62.9*
- Sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du *N50.8*
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du *N50.8*
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du *N50.8*
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du *N50.8*
- Scrotal ¬ *C62.1*
- Situation anormale ¬ *Q53.0*

Testicule *–suite*
- Torsion hydatide ¬ Torsion du *N44*
- Tunique) vaginale ¬ hydrocèle du cordon spermatique, du *N43*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Abcès
- - - Épididyme ou du *N45.0*
- - - Tuberculeux du *A18.1†, N51.1**
- - Absence et aplasie du *Q55.0*
- - Atrophie du *N50.0*
- - Éléphantiasis du *I89.05*
- - Fibrose syphilitique chronique du *A52.7†, N51.1**
- - Fongus bénin du *A18.1†, N51.8**
- - Fusion des *Q55.1*
- - Migration du *Q55.2*
- - Plaie ouverte du scrotum et des *S31.3*
- - Syphilis du *A52.7†, N51.1**
- - Torsion
- - - *N44.0*
- - Tuberculose des *A18.1†, N51.1**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D29.2*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D40.1*
- - - Germinale non séminomateuse des *C62.9*
- - - Maligne du *C62*

Tétanie
- Néonatal
- - SAI ¬ *P71.3*
- - Sans carence en calcium ou magnésium ¬ *P71.3*
- Parathyréoprive ¬ *E89.2*
- Parathyroïdienne ¬ *E20.9*
- ¬
- - *R29.0*
- - Syndrome axial de *R29.0*

Tétaniques ¬ Contractions: *O62.4*

Tétanos
- Coqueluche
- - DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie- *Z27.1*
- - Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie- *Z27.3*
- - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie- *Z27.2*
- Néonatal ¬ *A33*
- Obstétrical ¬ *A34*
- Poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le *Z27.8*
- SAI ¬ *A35*
- Seul ¬ Nécessité d'une vaccination contre le *Z23.5*
- ¬ Autres formes de *A35*

Tête
- Associée à une lésion intracrânienne ¬ Plaie ouverte (toute partie de la *S01.83!*
- Cou
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure de la *T20.20*
- - - Corrosion de la *T20.60*
- - Degré
- - - 2a ¬
- - - - Brûlure de la *T20.20*
- - - - Corrosion de la *T20.60*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure de la *T20.21*
- - - - Corrosion de la *T20.61*
- - - Non précis ¬
- - - - Brûlure de la *T20.0*
- - - - Corrosion de la *T20.4*
- - Paroi thoracique région génital ¬
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - Sans précision ¬ Gelure de la *T35.2*
- - ¬
- - - Absence acquise d'une partie de la *Z90.0*
- - - Brûlure
- - - - Corrosion de la *T20*
- - - - Premier degré de la *T20.1*
- - - - Second degré de la *T20.2*
- - - - Troisième degré de la *T20.3*
- - - Corrosion
- - - - Premier degré de la *T20.5*
- - - - Second degré de la *T20.6*
- - - - Troisième degré de la *T20.7*
- - - Dislocations multiples au niveau de la *T03.0*
- - - Lymphadénite aiguë de la face, de la *L04.0*
- - - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.00*
- - - Œil avec d'autres parties de la face, de la *T20*
- - - Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la *T95.0*
- - - Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la *Z42.0*
- Cubitus ¬
- - *S52.8*
- - Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la *S52.31*
- Écrasement du cou ¬ Écrasement de la *T04.0*
- Face
- - Cou ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la *D21.0*

Tête *–suite*
- Face *–suite*
- - Cou ¬ Tumeur *–suite*
- - - Lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la *D17.0*
- - - Malign
- - - - *C76.0*
- - - - Ganglions lymphatiques de la *C77.0*
- - - - Nerfs périphériques de la *C47.0*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous de la *C49.0*
- - Rachis et du thorax ¬ Anomalies morphologiques congénitales de la *Q67*
- Fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) ¬ Épiphysiolyse de la *M93.0*
- Fémur
- - Legg-Calvé-Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la *M91.1*
- - SAI ¬ *S72.08*
- - Type Meyer ¬ Dysplasie de la *Q78.8*
- Fœtus ¬ Dystocie due à une rotation incomplète de la *O64.0*
- Fractures du cou ¬ Fractures de la *T02.0*
- Haute à terme ¬ Soins maternels pour *O32.4*
- Histamine ¬ Maux de *G44.0*
- Humérale ¬ Fracture de deux à quatre fragments de la *S42.21*
- Humérus [Haas] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.0*
- Lésions traumatiques superficielles du cou ¬ Lésions traumatiques superficielles de la *T00.0*
- Luxations, entorses et foulures du cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la *T03.0*
- Métacarpiennes [Mauclaire] ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): *M92.2*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.0*
- Non
- - Classé ¬
- - - Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la *S09.0*
- - - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la *R93.0*
- - Précisée ¬ Amputation traumatique d'une partie de la *S08.9*
- Oiseau type Montréal ¬ Nanisme à *Q87.1*
- Pancréas ¬ Tumeur maligne: *C25.0*
- Partie non précis ¬
- - Blessure superficielle de la *S00.9*
- - Écrasement de la *S07.9*
- - Plaie ouverte de la *S01.9*
- Plaies ouvertes du cou ¬ Plaies ouvertes de la *T01.0*
- Radial
- - Brailsford] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.1*
- - ¬
- - - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.02*
- - - Luxation de la *S53.0*

Tête *–suite*
- Radial *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Présence d'une prothèse de *Z96.62*
- Radius ¬ Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la *S52.21*
- SAI ¬ Plaie ouverte de la *S01*
- Sans précision ¬
- - Lésion traumatique de la *S09.9*
- - Séquelles de lésion traumatique de la *T90.9*
- Tout partie face ¬
- - *L02.8*
- - *L03.8*
- ¬
- - *S82.1*
- - *S82.41*
- - Accouchement spontané avec présentation en *O80*
- - Amputation traumatique partie
- - - *S08*
- - - *S08.8*
- - Blessure superficiel
- - - Multiples de la *S00.7*
- - - Parties de la *S00.8*
- - Déformations acquises de la *M95.2*
- - Écrasement
- - - *S07*
- - - Parties de la *S07.8*
- - Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la *S03.5*
- - Fracture
- - - Extrémité supérieur
- - - - Humérus: *S42.21*
- - - - Radius: *S52.11*
- - - Os du métacarpe: *S62.34*
- - - Premier métacarpien: *S62.24*
- - Gelure superficielle de la *T33.0*
- - Lésion
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de la *S01.84!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de la *S01.87!*
- - - - II
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de la *S01.85!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de la *S01.88!*
- - - - III
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de la *S01.86!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de la *S01.89!*
- - - Traumatique
- - - - Multiples de la *S09.7*

Tête *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Muscles et des tendons de la *S09.1*
- - - - Pancréas: *S36.21*
- - - - Précisées de la *S09.8*
- - - - Superficielle de la *S00*
- - Luxation
- - - Entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la *S03*
- - - Parties autres et non précisées de la *S03.3*
- - Mouvements anormaux de la *R25.0*
- - Non-engagement de la *O32.4*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - *S01.9*
- - - - Non précisée d'autres parties de la *S01.80*
- - - - Parties de la *S01.8*
- - - Ouvertes multiples de la *S01.7*
- - Séborrhée de la *L21.0*
- - Séquelle
- - - Lésion traumatique
- - - - *T90*
- - - - Précisées de la *T90.8*
- - - - Superficielle de la *T90.0*
- - - Plaie ouverte de la *T90.1*
- - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la *R22.0*

Tétra X ¬ *Q97.1*

Tétra-amélie ¬ *Q73.0*

Tétrachloréthylène ¬ Effet toxique: *T53.3*

Tétrachloroéthène ¬ *T53.3*

Tétrachlorométhane ¬ *T53.0*

Tétrachlorure de carbone ¬ Effet toxique: *T53.0*

Tétracyclines ¬ Intoxication: *T36.4*

Tétracycliques ¬
- Hypersensibilité aux antidépresseurs *T88.7*
- Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et *T43.0*

Tétrahydrobioptérine ¬
- Déficit en *E88.8*
- Hyperphénylalaninémie par déficit en *E70.1*

Tétrahydrofolate réductase ¬
- Déficit en méthylène *E72.1*
- Homocystinurie déficit méthylène
- - *E72.1*

Tétralogie de Fallot ¬ *Q21.3*

Tétraparésie tétraplégie
- Flasque ¬ *G82.3*
- Sans précision ¬ *G82.5*
- Spastique ¬ *G82.4*
- ¬ Paraparésie et paraplégie, *G82*

Tétraplégie
- Chronique ¬ *G82*
- Cours de paralysie cérébrale spastique ¬ *G80.0*
- Embolique en tant qu'événement en cours ¬ *I63.4, G82.52*
- Flasque ¬ Tétraparésie et *G82.3*
- Paraplégie ¬ Myosite ossifiante liée à une *M61.2*
- Sans précision ¬ Tétraparésie et *G82.5*
- Spastique
- - Corps calleux fin-microcéphalie post-natale progressive ¬ Syndrome *Q02*
- - ¬ Tétraparésie et *G82.4*
- Thrombotique en tant qu'événement en cours ¬ *I63.3, G82.52*
- ¬
- - Paraparésie et paraplégie, tétraparésie et *G82*
- - Syndrome d'ichtyose congénitale-microcéphalie- *Q87.8*

Tétraplégique congénitale (cérébrale) ¬ Paralysie spastique *G80.0*

Tétraploïdie ¬ *Q92.7*

Tétrasomie
- 9p ¬ *Q99.8*
- 12p ¬ *Q99.8*
- 18p ¬ *Q99.8*
- X ¬ *Q97.1*

Texas ¬ Maladie hémorragique de l'est du *D68.28*

TFCC
- Complexe fibrocartilagineux triangulaire] ¬ Rupture traumatique du *S63.3*
- ¬ Complexe fibrocartilagineux triangulaire [*S63.3*

TFG ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 due à une mutation de *G60.0*

TFR2 ¬ Hémochromatose liée à *E83.1*

TFRC ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

T-gamma ¬ Maladie lymphoproliférative de type *D47.9*

TGV
- Coarctation ¬ *Q20.3*
- ¬ *Q20.3*

Thakker-Donnai ¬ Syndrome de *Q87.8*

Thalassémie
- Bêta) mineure ¬ *D56.3*
- Déficience intellectuelle liée à l'X ¬ Alpha- *D56.0*
- Grave ¬ Bêta- *D56.1*
- Intermédiaire moyenne ¬ *D56.1*
- Majeure ¬ *D56.1*
- Mineure ¬ Bêta *D56.3*
- Mixte) (avec autre hémoglobinopathie) (sans précision) ¬ *D56.9*
- Rétinopathie ¬ *D56.9†, H36.8**
- Sans précision ¬ *D56.9*

Thalassémie *–suite*
- Syndrome myélodysplasique ¬ Syndrome d'alpha- *D56.0, D46.9*
- ¬
- - *D56.8*
- - Alpha- *D56.0*
- - Arthrite au cours de *D56.9†, M36.3**
- - Bêta- *D56.1*
- - Delta-bêta- *D56.2*
- - Hémoglobine Lepore-bêta- *D56.8*
- - HPFH - bêta- *D56.4*
- - Syndrome de persistance familiale de l'hémoglobine fœtale-bêta- *D56.4*

Thalassemie à hématies falciformes ¬ Béta- *D57.2*

Thalassémique ¬ Trait *D56.3*

Thalidomide ¬ Embryopathie due à la *Q86.80*

Thallium ¬ *T56.8*

Thanatophore ¬
- Insuffisance staturale *Q77.1*
- Nanisme *Q77.1*

Thélarche prématurée ¬ *E30.8*

Thélaziose ¬ *B83.8*

Thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes *J67.7*

Thermoplégie ¬ *T67.0*

Thésaurismose
- Cystinique
- - Maladie de Lignac) ¬ *E72.0*
- - ¬ *E72.0†, N29.8**
- Gangliosides ¬ *E75.1*
- Glycogénique ¬ *E74.0*
- Phosphatides ¬ *E75.2*

Thiamine
- Sans précision ¬ Carence en *E51.9*
- ¬
- - Carence en *E51*
- - Manifestations de la carence en *E51.8*

Thiel-Behnke ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*

Thies-Reis ¬ Syndrome de *H74.3*

Thiobarbituriques ¬
- *T41.1*
- Intoxication aux *T41.1*

Thiolase
- Mitochondriale ¬ Déficit en acétoacétyl-CoA *E71.1*
- ¬
- - Carence en 3-oxo *E71.1*
- - Déficit en alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA *E71.1*

Thiopurine méthyltransférase) ¬ Déficit congénital en TPMT (*E88.8*

Thiourée ¬ Hypersensibilité à la *T78.4*

Thioxanthène ¬ Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et *T43.4*

Thomas ¬ Syndrome de *Q87.8*

Thomsen] ¬ Myotonie: congénitale: dominante [*G71.1*

Thomson
v. Rothmund-Thomson

Thoracique
- Antérieur
- - SAI ¬ Douleur de la paroi *R07.3*
- - ¬
- - - Lésions traumatiques superficielles de la paroi *S20.3*
- - - Plaie ouverte de la paroi *S21.1*
- Asphyxiante Jeune ¬
- - Dysplasie *Q77.2*
- - Dystrophie *Q77.2*
- Hydrocéphalie ¬
- - Spina bifida *Q05.1*
- - Syndrome de dysplasie *Q87.8*
- Ischémique ¬ Douleur *I20.9*
- Larynx ¬ Trachée *S11.01*
- Lésion de la moelle épinière ¬ Fracture des vertèbres *S22.00, S24.10*
- Musculosquelettiques ¬ Douleurs *R07.3*
- Non classées ailleurs ¬ Affections radiculaires *G54.3*
- Noyau gélatineux avec radiculopathie ¬ Hernie *M51.1†, G55.1**
- Ouverte sans précision ¬ Plaie *S21*
- Postérieur ¬
- - Lésions traumatiques superficielles de la paroi *S20.4*
- - Plaie ouverte de la paroi *S21.2*
- Radiculopathie ¬ Dégénérescence des disques intervertébraux *M51.1†, G55.1**
- Région génital ¬ Tête cou paroi
- - *I89.03*
- - *I89.04*
- - *I89.05*
- - *Q82.03*
- - *Q82.04*
- - *Q82.05*
- Respiratoire ¬ Douleur *R07.1*
- Rompu ¬ Anévrisme aortique *I71.1*
- Rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.05*
- S ¬
- - Frottements *R09.8*
- - Percussion anormale *R09.8*
- - Tympanisme *R09.8*
- SAI ¬
- - *C76.1*
- - Anomalie morphologique congénitale de la paroi *Q67.8*
- - Paroi
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- Sans

Thoracique *–suite*
- Sans *–suite*
- - Hydrocéphalie ¬ Spina bifida *Q05.6*
- - Indication de rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.01*
- - Mention de rupture ¬ Anévrisme aortique *I71.2*
- - Myélopathie ou radiculopathie ¬ Spondylarthrose: *M47.8*
- - Précision ¬ Douleur *R07.4*
- Trachée cervicale, partie cervicale ¬ Trachée *S11.02*
- ¬
- - Abcès: *J86*
- - Anévrisme syphilitique de l'aorte *A52.0†, I79.0**
- - Cavité *T27.2*
- - Contrôle radiographique *Z01.6*
- - Douleurs *R07.3*
- - Endométriose *N80.8*
- - Ganglion: sympathique *S24.4*
- - Insuffisance pulmonaire aigu consécutif intervention chirurgical
- - - *J95.1*
- - - Non *J95.2*
- - Lésion traumatique
- - - Aorte *S25.0*
- - - Organe structurel intrathoracique précis
- - - - Canal *S27.82*
- - - - Œsophage, partie *S27.83*
- - - Trachée *S27.5*
- - Myélopathie au cours de spondylarthrose *M47.14†, G99.2**
- - Paroi
- - - *I97.88*
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - Plaie
- - - Ouverte de l'œsophage *S27.83, S21.83!*
- - - Ouvertes multiples de la paroi *S21.7*
- - Situs inversus ou transversus: *Q89.3*
- - Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale *M96.80*
- - Syphilis de l'aorte *A52.0†, I79.1**
- - Thorax instable après intervention chirurgicale *M96.81*
- - Transposition des viscères: *Q89.3*
- - Traumatisme *S29.9*
- - Tumeur maligne: Œsophage *C15.1*

Thoraco-abdominal
- Rompu ¬ Anévrisme aortique *I71.5*
- Rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.07*
- Sans
- - Indication de rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.03*

Thoraco-abdominal *–suite*
- Sans *–suite*
- - Mention de rupture ¬ Anévrisme aortique *I71.6*

Thoracobrachiale ¬ Syndrome de traversée *G54.0*

Thoraco-lombaire du noyau gélatineux avec radiculopathie ¬ Hernie *M51.1†, G55.1**

Thoracopages ¬ *Q89.4*

Thoracostomie ¬
- Existence d'une *Z93.80*
- Surveillance d'une *Z43.80*

Thorax
- Abdomen
- - Lombes bassin
- - - Sans précision ¬ Gelure du *T35.3*
- - - ¬ Lésions traumatiques superficielles du *T00.1*
- - Membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du *T04.7*
- - Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ Écrasement du *T04.1*
- Amputation traumatique d'une partie du thorax ¬ Écrasement du *S28*
- Bassin
- - Membre s ¬
- - - Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du *T04.7*
- - - Fractures du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membre(s), ou du *T02.7*
- - ¬
- - - Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du *T04.1*
- - - Luxations, entorses et foulures du thorax et de la région lombo-sacrée ou du *T03.1*
- - - Séquelles d'autres fractures du *T91.2*
- Bréchet congénital ¬ *Q67.7*
- Carène congénital ¬ *Q67.7*
- Communiquant avec une lésion intrathoracique ¬ Plaie ouverte (n'importe quelle partie du *S21.83!*
- Côtes ¬ Déformation acquise du *M95.4*
- Entonnoir congénital ¬ *Q67.6*
- Fractures des lombes et du bassin ¬ Fractures du *T02.1*
- Instable après intervention chirurgicale thoracique ¬ *M96.81*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.2*
- Osseux
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale du *Q76.9*
- - ¬ malformation congénital
- - - *Q76.8*
- - - Rachis et du *Q76*
- Partie non précis ¬
- - Fracture des os du *S22.9*

Thorax *–suite*
- Partie non précis ¬ *–suite*
- - Plaie ouverte du *S21.9*
- Plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Plaies ouvertes du *T01.1*
- Région lombo-sacrée
- - Membre
- - - S), ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Fractures du *T02.7*
- - - Thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du *T04.7*
- - Thorax bassin ¬
- - - Écrasement du thorax et de l'abdomen, du *T04.1*
- - - Luxations, entorses et foulures du *T03.1*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique du *S29.9*
- ¬
- - Amputation traumatique d'une partie du *S28.1*
- - Anomalie morphologique congénital
- - - *Q67.8*
- - - Tête, de la face, du rachis et du *Q67*
- - Contusion du *S20.2*
- - Dissection transversale de: *T05.8*
- - Douleur au niveau de la gorge et du *R07*
- - Écrasement
- - - *S28.0*
- - - Thorax et amputation traumatique d'une partie du *S28*
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S23.5*
- - Fracture
- - - Ouverte du *S22.9, S21.87!*
- - - Parties des os du *S22.8*
- - Gelure superficielle du *T33.2*
- - Lésion
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S21.84!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S21.87!*
- - - - II
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S21.85!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S21.88!*
- - - - III
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S21.86!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S21.89!*
- - - Traumatique
- - - - Multiple
- - - - - *S29.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins du *S25.7*
- - - - Muscles et des tendons au niveau du *S29.0*

Thorax *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Nerf
- - - - - *S24.5*
- - - - - Moelle épinière au niveau du *S24*
- - - - - Non précisé du *S24.6*
- - - - - Périphériques du *S24.3*
- - - - - Sympathiques du *S24.4*
- - - - Précisées du *S29.88*
- - - - Superficiel
- - - - - *S20*
- - - - - Multiples du *S20.7*
- - - - - Parties autres et non précisées du *S20.8*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé du *S25.9*
- - - - - Sanguins du *S25.88*
- - - - - Sanguins épiduraux au niveau du *S25.80*
- - - - - Sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du *S25.82*
- - - - - Sanguins sous-duraux au niveau du *S25.81*
- - Luxation
- - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments du *S23*
- - - Parties autres et non précisées du *S23.2*
- - Plaie ouverte
- - - *S21*
- - - Non précisée d'une autre partie du *S21.80*
- - - Parties du *S21.8*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le *R84*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du *D21.3*
- - - Malign
- - - - *C76.1*
- - - - Nerfs périphériques du *C47.3*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du *C49.3*

Thréonine ¬ Trouble du métabolisme de la *E72.8*

Thrombasthénie (hémorragique) (héréditaire) ¬ *D69.1*

Thrombine
- Facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la *D68.35*
- ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs réversibles de la *D68.35*

Thrombo-angéite oblitérante [Buerger] ¬ *I73.1*

Thrombocytaire hémorragipare ¬ Dystrophie *D69.1*

Thrombocytémie
- Essentielle (hémorragique) ¬ *D47.3*
- Hémorragique idiopathique ¬ *D47.3*

Thrombocytes ¬ *Z52.08*

Thrombocytopénie
v.a. hémangiome-thrombocytopénie
- Amégacaryocytique ¬ Syndrome de synostose radioulnaire- *Q87.2*
- Eczéma ¬ Déficit immunitaire avec *D82.0*
- Héparino-induite ¬ *D69.52*
- Héréditaire avec plaquettes normales ¬ *D69.41*
- Maternelle idiopathique ¬ Thrombopénie néonatale due à: *P61.0*
- Non précis
- - Non précisée, non qualifiée de réfractaire aux transfusions ¬ *D69.61*
- - Qualifiée de réfractaire aux transfusions ¬ *D69.60*
- Post-vaccinale ¬ *D69.58, Y59.9!*
- Sévère à Haemaphysalis longicornis ¬ Syndrome de fièvre avec *A93.8*
- SFTG] ¬ Fièvre sévère avec syndrome de *A93.8*
- Syndromique liée à MYH9 ¬ *D69.41*

Thrombocytopénique
v. thrombotique-thrombocytopénique
- Thrombotique ¬ Glomérulopathie au cours de purpura *M31.1†, N08.5**

Thrombocytose essentielle ¬ *D47.3*

Thromboembolie
- Artère) (d'une veine) pulmonaire ¬ *I26*
- Chronique ¬ Hypertension pulmonaire en présence d'une *I27.20*
- Consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion ¬ *T80.1*
- Coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*
- ¬ Antécédents personnels de *Z86.7*

Thromboembolique chronique ¬ Hypertension pulmonaire *I27.20*

Thrombomoduline ¬ Maladie hémorragique liée à la *D68.5*

Thrombopathie
- Constitutionnelle ¬ *D68.00*
- Von Willebrand ¬ *D68.09*
- ¬ *D69.1*

Thrombopénie
- Absence de radius ¬ Syndrome de: *Q87.2*
- Induit héparine type
- - I ¬ *D69.52*
- - II ¬ *D69.53*
- Materno-fœtale et néonatale allo-immune ¬ *P61.0*
- May-Hegglin ¬ *D72.0*
- Néonatal
- - Exsanguino-transfusion ¬ *P61.0*
- - Iso-immunisation ¬ *P61.0*
- - Thrombocytopénie maternelle idiopathique ¬ *P61.0*

Thrombopénie *–suite*
- Néonatal *–suite*
- - Transitoire ¬ *P61.0*
- Primaire
- - Non qualifiées de réfractaires aux transfusions ¬ Autres *D69.41*
- - Qualifiées de réfractaires aux transfusions ¬ Autres *D69.40*
- - ¬ Autres *D69.4*
- Sans précision ¬ *D69.6*
- Secondaire
- - Non qualifiées de réfractaires aux transfusions ¬ Autres *D69.58*
- - Qualifiées de réfractaires aux transfusions ¬ Autres *D69.57*
- - Sans précision ¬ *D69.59*
- - ¬
- - - *D69.5*
- - - Maladie due au VIH avec *B23.8, D69.58*
- ¬
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, D69.61*
- - Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une *O14.2*

Thrombopénique
- Hémorragique ¬ Purpura: non *D69.0*
- Idiopathique ¬ Purpura
- - *D69.3*
- - Non *D69.0*
- Thrombotique [Moschcowitz] ¬ Purpura *M31.1*
- ¬ Autres purpuras non *D69.2*

Thrombophilie
- Héréditaire
- - Déficit congénital
- - - Antithrombine ¬ *D68.5*
- - - Histidine-rich (poly-L) glycoprotéine ¬ *D68.5*
- - Sévère due au déficit congénital en protéine S ¬ *D68.5*
- Primaire ¬ *D68.5*
- ¬ Autres *D68.6*

Thrombophlébite
- Consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion ¬ *T80.1*
- Intracrâniennes et intrarachidiennes ¬ Phlébite et *G08*
- Intrarachidiennes, d'origine non pyogène ¬ Phlébite et *G95.18*
- Localisation
- - Non précisée ¬ Thrombose, phlébite et *I80.9*
- - ¬ Thrombose, phlébite et *I80.88*
- Membre inférieur
- - Cours de la grossesse ¬ *O22.2*
- - Sans précision ¬ Thrombose, phlébite et *I80.3*
- Migratrice ¬ *I82.1*
- Pelvienne post-partum ¬ *O87.1*

Thrombophlébite *–suite*
- Profond
- - Cuisse ¬ *I80.28*
- - Jambe ¬ *I80.28*
- - Membre inférieur ¬ *I80.28*
- Rénale ¬ *I80.88*
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Superficiel cours
- - Grossesse ¬ *O22.2*
- - Puerpéralité ¬ *O87.0*
- Vaisseaux profonds des membres inférieurs ¬ Thrombose, phlébite et *I80.28*
- Veine
- - Axillaire ¬ Thrombose, phlébite et *I80.81*
- - Basilaire ¬ Thrombose, phlébite et *I80.80*
- - Céphalique ¬ Thrombose, phlébite et *I80.80*
- - Fémorale ¬ Thrombose, phlébite et *I80.1*
- - Hépatique ¬ *I80.88*
- - Pelvien
- - - Avant l'accouchement ¬ *O22.3*
- - - ¬ Thrombose, phlébite et *I80.20*
- - Poplitée ¬ *I80.28*
- - Profondes des membres supérieurs ¬ Thrombose, phlébite et *I80.81*
- - Sous-clavière ¬ Thrombose, phlébite et *I80.81*
- - Superficiel membre
- - - Inférieurs ¬ Thrombose, phlébite et *I80.0*
- - - Supérieurs ¬ Thrombose, phlébite et *I80.80*
- ¬ Thrombose, phlébite et *I80*

Thromboplastine
- Plasmatique
- - PTA] ¬ Déficit en précurseur de *D68.1*
- - ¬ Carence en: facteur de la *D67*
- Prolongé ¬ Temps de *R79.8*

Thrombose
- Ancien
- - Apicale ¬ *I51.3*
- - Auriculaire ¬ *I51.3*
- - Auricule ¬ *I51.3*
- - Ventriculaire ¬ *I51.3*
- Aorte abdominale ¬ Embolie et *I74.0*
- Artère
- - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus cérébral ¬ *I65*
- - Cérébral
- - - Moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I66*
- - - ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.3*
- - Distales, sans précision ¬ Embolie et *I74.4*
- - Iliaque ¬ Embolie et *I74.5*
- - Membre
- - - Inférieurs ¬ Embolie et *I74.3*

Thrombose *–suite*
- Artère *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieurs ¬ Embolie et *I74.2*
- - Mésentérique supérieure ¬ *K55.0*
- - Non précisées ¬ Embolie et *I74.9*
- - Précérébrales ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.0*
- - Rénale ¬ *N28.0*
- - Veine) pulmonaire ¬ *I26*
- - ¬ Embolie et *I74.8*
- Artériel
- - Moelle épinière ¬ *G95.18*
- - Rate ¬ *D73.5*
- - ¬ Embolie et *I74*
- Bulbe de la veine jugulaire ¬ *I82.81*
- Cardiaque due à la syphilis ¬ *A52.0†, I52.0**
- Cérébral
- - Syphilis ¬ *A52.0†, I68.8**
- - ¬ Neurosyphilis avec *A52.0†, I68.8**
- Conjonctivale ¬ *H11.4*
- Coronaire
- - N'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*
- - Syphilis ¬ *A52.0†, I52.0**
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.8*
- Gestationnelle SAI ¬ *O22.9*
- Hémorroïdaire stade III ¬ *K64.2*
- Hémorroïdes
- - Externes ¬ *K64.5*
- - Internes ¬ *K64.8*
- Intracardiaque, non classée ailleurs ¬ *I51.3*
- Membre inférieur SAI ¬ Embolie ou *I80.3*
- Mésentérique (artère) (veine) ¬ *K55.0*
- Murale due à la syphilis ¬ *A52.0†, I52.0**
- Non pyogène
- - Sinus veineux intracrânien ¬ *I67.6*
- - Système veineux intracrânien ¬ *I67.6*
- - Veine cérébrale ¬ *I67.6*
- Oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.6*
- Organe génital
- - Féminins ¬ *N94.8*
- - Homme ¬ *N50.1*
- Parties de l'aorte, autres et non précisées ¬ Embolie et *I74.1*
- Phlébite thrombophlébite
- - Localisation
- - - Non précisée ¬ *I80.9*
- - - ¬ *I80.88*
- - Membres inférieurs, sans précision ¬ *I80.3*
- - Vaisseaux profonds des membres inférieurs ¬ *I80.28*
- - Veine
- - - Axillaire ¬ *I80.81*

Thrombose *–suite*
- Phlébite thrombophlébite *–suite*
- - Veine *–suite*
- - - Basilaire ¬ *I80.80*
- - - Céphalique ¬ *I80.80*
- - - Fémorale ¬ *I80.1*
- - - Pelviennes ¬ *I80.20*
- - - Profondes des membres supérieurs ¬ *I80.81*
- - - Sous-clavière ¬ *I80.81*
- - - Superficiel membre
- - - - Inférieurs ¬ *I80.0*
- - - - Supérieurs ¬ *I80.80*
- - ¬ *I80*
- Plexus
- - Hémorroïdaires ¬ *K64.5*
- - Pampiniforme ¬ *I80.88*
- Profond
- - Cuisse ¬ *I80.28*
- - Extrémité inférieure ¬ *I80.28*
- - Jambe ¬ *I80.28*
- - Membre inférieur ¬ *I80.28*
- - ¬ *I80.28*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Puerpérale SAI ¬ *O87.9*
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Sino-veineuse cérébrale ¬ *I67.6*
- Sinus veineux cérébral cours
- - Grossesse ¬ *O22.5*
- - Puerpéralité ¬ *O87.3*
- Syphilitique artère
- - Coronaires ¬ *A52.0†, I52.0**
- - Moelle épinière ¬ *A52.0†, I79.8**
- Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus cérébral par *I63.0*
- Vaisseaux ombilicaux ¬ *O69.5*
- Veine
- - Abdominale ¬ *I82.88*
- - Anales ¬ *K64.5*
- - Cave ¬ Embolie et *I82.2*
- - Iliaque ¬ *I80.20*
- - Jugulaire ¬
- - - *I82.81*
- - - Embolie et *I82.81*
- - Méninges ¬ *I67.6*
- - Non précisée ¬ Embolie et *I82.9*
- - Pelvienne ¬ *I80.20*
- - Poplitée ¬ *I80.28*
- - Porte
- - - Syphilis ¬ *A52.0†, I98.0**
- - - ¬ *I81*
- - Précisées ¬ Embolie et *I82.88*
- - Rénal
- - - Fœtus ¬ *P29.8*

Thrombose *–suite*
- Veine *–suite*
- - Rénal *–suite*
- - - Nouveau-né ¬ *P29.8*
- - - ¬ Embolie et *I82.3*
- - Splénique ¬ Embolie et *I82.80*
- - Surrénale ¬ *I82.88*
- Veineux
- - Bras ¬ *I80.88*
- - Cérébral
- - - Cours
- - - - Grossesse ¬ *O22.5*
- - - - Puerpéralité ¬ *O87.3*
- - - Non pyogène ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.6*
- - Périanale ¬ *K64.5*
- - Profond
- - - Avant l'accouchement ¬ *O22.3*
- - - Post-partum ¬ *O87.1*
- - - SAI ¬ *I80.28*
- - SAI ¬ *I82.9*
- - ¬ Autres embolies et *I82*
- ¬
- - Paquet hémorroïdaire avec *K64.8*
- - Syndrome de l'intestin court dû à une *K91.2, K55.0*

Thrombotique
- Moschcowitz] ¬ Purpura thrombopénique *M31.1*
- Tant événement cours ¬
- - Hémiplégie *I63.3, G81.9*
- - Monoplégie *I63.3, G83.3*
- - Tétraplégie *I63.3, G82.52*
- Veineuse profonde de l'extrémité inférieure ¬ Inflammation *I80.28*
- ¬
- - Glomérulopathie au cours de purpura thrombocytopénique *M31.1†, N08.5**
- - Infarctus: *I74*
- - Microangiopathie *M31.1*
- - Occlusion: *I74*

Thrombotique-thrombocytopénique ¬ Glomérulonéphrite au cours de purpura *M31.1†, N08.5**

Thromboxane ¬ Troubles hémorragiques par déficit de synthèse de la *D69.88*

Thygeson ¬ Kératite ponctuée superficielle de *H16.1*

Thymique
- Déficit immunitaire ¬ Aplasie ou hypoplasie *D82.1*
- Grand cellule B ¬ Lymphome médiastinal
- - *C85.2*
- ¬
- - Alymphoplasie *D82.1*
- - Carcinome *C37*
- - Tumeur *D38.4*

Thymome
- Malin ¬ *C37*
- ¬
- - *D15.0*
- - Érythroblastopénie (acquise) (adulte) (avec *D60*

Thymus
- Sans précision ¬ Maladie du *E32.9*
- ¬
- - Abcès du *E32.1*
- - Dysfonction du *E32.9*
- - Hyperfonction du *E32.8*
- - Hyperplasie persistante du *E32.0*
- - Hypertrophie du *E32.0*
- - Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.84*
- - Maladies du *E32.8*
- - Syphilis tardive du *A52.7†*, *E35.8**
- - Tuberculose du *A18.8†*, *E35.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D15.0*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D38.4*
- - - Maligne du *C37*

Thyréoglosse ¬
- Kyste *Q89.2*
- Persistance du canal *Q89.2*

Thyréotoxicose
- Factice ¬ *E05.4*
- Goitre
- - Diffus ¬ *E05.0*
- - Multinodulaire toxique ¬ *E05.2*
- - Uninodulaire toxique ¬ *E05.1*
- Hyperthyroïdie] ¬ *E05*
- Maladie cardiaque ¬ *E05.9†*, *I43.8**
- Néonatale ¬ *P72.1*
- Nodule thyroïdien
- - Ectopiques ¬ *E05.3*
- - Simple ¬ *E05.1*
- Sans précision ¬ *E05.9*
- Transitoire ¬ Thyroïdite chronique avec *E06.2*
- ¬
- - *E05.8*
- - Arthropathie au cours de *E05.9†*, *M14.59**
- - Exophtalmie au cours de *E05.0†*, *H06.2**
- - Myopathie au cours de *E05.9†*, *G73.5**
- - Proptose au cours de *E05.9†*, *H06.2**
- - Syndrome myasthénique au cours de *E05.9†*, *G73.0**

Thyréotoxique
- Aiguë ¬ Crise *E05.5*
- ¬
- - Cardiopathie *E05.9†*, *I43.8**
- - Insuffisance cardiaque *E05.9†*, *I43.8**
- - Maladie

Thyréotoxique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Cardiaque *E05.9†*, *I43.8**
- - - Oculaire *E05.9†*, *H58.8**
- - Myopathie *E05.9†*, *G73.5**

Thyréotrope ¬
- Adénome *D35.2*
- Exophtalmie *E05.0†*, *H06.2**

Thyréotropine ¬ Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*

Thyrocalcitonine ¬ Hypersécrétion de *E07.0*

Thyroglobuline ¬ Anomalie de la *E07.8*

Thyroïde
- Acquise) ¬ Atrophie de la *E03.4*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies de la glande *E35.0**
- Echinococcus granulosus ¬ Infection de la *B67.3†*, *E35.0**
- Glandes endocrines ¬ Carcinoma in situ: *D09.3*
- Myxœdème) ¬ Aplasie de la *E03.1*
- Sans précision ¬ Affection de la *E07.9*
- ¬
- - Abcès de la *E06.0*
- - Affection
- - - *E07*
- - - Précisées de la *E07.8*
- - Atrophie congénitale de la *E03.1*
- - Blessure de la *S19.9*
- - Cancer
- - - Anaplasique de la *C73*
- - - Folliculaire de la *C73*
- - - Médullaire de la *C73*
- - - Papillaire de la *C73*
- - Carcinome
- - - *C73*
- - - Papillaire ou folliculaire familial de la *C73*
- - Cartilage
- - - *S12.8*
- - - *S13.5*
- - Hémiagénésie de la *E03.1*
- - Hémorragie de la *E07.8*
- - Hyperplasie des cellules C de la *E07.0*
- - Hypoplasie de la *E03.1*
- - Infarctus de la *E07.8*
- - Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou *Q89.2*
- - Plaie ouverte avec atteinte de la *S11.1*
- - Syphilis tardive de la glande *A52.7†*, *E35.0**
- - Tuberculose de la *A18.8†*, *E35.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne de la *D34*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.0*
- - - Maligne de la *C73*

Thyroïdien
- Apparentées liées à une carence en iode ¬ Autres affections *E01.8*
- Congénital
- - Sans précision ¬ Syndrome d'insuffisance *E00.9*
- - Type
- - - Mixte ¬ Syndrome d'insuffisance *E00.2*
- - - Myxœdémateux ¬ Syndrome d'insuffisance *E00.1*
- - - Neurologique ¬ Syndrome d'insuffisance *E00.0*
- Dérivés ¬ Intoxication: Hormones *T38.1*
- Ectopiques ¬ Thyréotoxicose due à des nodules *E05.3*
- Exophtalmie ¬ Trouble de la fonction *E05.0†*, *H06.2**
- Kystique) SAI ¬ Nodule: *E04.1*
- Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies néonatales de la fonction *P72.2*
- Normale ¬ Goitre congénital transitoire avec fonction *P72.0*
- Simple
- - Non toxique ¬ Nodule *E04.1*
- - ¬ Thyréotoxicose avec nodule *E05.1*
- ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage *Q31.8*
- - Articulation (ligament): crico- *S13.5*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage *Q31.8*
- - Dyshormonosynthèse *E03.0*
- - Ectopie *E03.1*
- - Entorse et foulure de la région *S13.5*
- - Fissure (de): cartilage *Q31.8*
- - Hypothyroïdie due à une résistance périphérique aux hormones *E03.8*
- - Intoxication: Anti- *T38.2*
- - Lymphome *C85.9*
- - Nodule: colloïde (kystique) (*E04.1*
- - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.6*

Thyroïdite
- Aiguë ¬ *E06.0*
- Aspergillus ¬ *B44.8†*, *E35.0**
- Auto-immun ¬
- - *E06.3*
- - Encéphalopathie sensible aux stéroïdes associée à une *G04.8*, *E06.3*
- Cellules géantes ¬ *E06.1*
- Chronique
- - Fibreuse ¬ *E06.5*
- - SAI ¬ *E06.5*
- - Thyréotoxicose transitoire ¬ *E06.2*
- - ¬ Autres *E06.5*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†*, *E35.0**

Thyroïdite *–suite*
- Granulomateuse ¬ *E06.1*
- Hashimoto ¬ *E06.3*
- Ligneuse ¬ *E06.5*
- Lymphocytaire ¬ *E06.3*
- Médicamenteuse ¬ *E06.4*
- Non suppurée ¬ *E06.1*
- Post-partum ¬ *O90.5*
- Pyogène ¬ *E06.0*
- Quervain ¬ *E06.1*
- Riedel ¬ *E06.5*
- Sans précision ¬ *E06.9*
- Subaiguë ¬ *E06.1*
- Suppurée ¬ *E06.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, E35.0**
- ¬ *E06*

Thyrotoxique ¬ Paralysie périodique *G72.3*

Thyrotrophine ¬ Hyperproduction de *E05.8*

Tibia
- Aplastique-ectrodactylie ¬ Syndrome de *Q73.8*
- Blount] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse supérieure du *M92.5*
- Fracture péroné tout partie ¬ Fracture
- - Diaphyse du *S82.21*
- - Extrémité
- - - Inférieure du *S82.31*
- - - Supérieure du *S82.11*
- Impliquant
- - Cheville ¬ *S82.5*
- - Malléole ¬ *S82.5*
- Isolé ¬
- - Diaphyse du *S82.28*
- - Fracture distale du *S82.38*
- - Partie proximale du *S82.18*
- Lame de sabre ¬ Déformation syphilitique du *A50.5†, M90.26**
- Péroné ¬
- - Incurvation congénitale du *Q68.4*
- - Ostéochondrite juvénile du *M92.5*
- Proximal ¬ Luxation genou Luxation
- - Antérieure du *S83.11*
- - Latérale du *S83.14*
- - Médiane du *S83.13*
- - Postérieure du *S83.12*
- SAI ¬
- - *S82.28*
- - Diaphyse du *S82.28*
- - Fracture distale du *S82.38*
- - Partie proximale du *S82.18*
- Vara ¬ *M92.5*
- ¬
- - Condyles latéral ou médial du *S82.1*
- - Extrémité inférieure de: *S93.0*
- - Fracture

Tibia *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fracture *–suite*
- - - Diaphyse du *S82.28*
- - - Extrémité
- - - - Inférieure du *S82.38*
- - - - Supérieure du *S82.18*
- - Ostéochondrose déformante du *M92.5*
- - Raccourcissement longitudinal du *Q72.5*

Tibial
- Antérieur
- - Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique du nerf *S94.2*
- - Piégée ¬ Syndrome de l'artère *T79.62*
- - Postérieure) ¬ Lésion traumatique de l'artère *S85.1*
- - ¬
- - - Branche terminale externe du nerf *S94.2*
- - - Myopathie distale du muscle *G71.0*
- - - Syndrome de la loge *M76.8*
- Collatéral
- - Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [Lig. *M23.93*
- - ¬
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament interne [Lig. *M23.53*
- - - Lésions internes du genou: ligament interne [Lig. *M23.83*
- Externe [Haglund] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: apophyse *M92.6*
- Ligament médian ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral *S83.44*
- - Distorsion du ligament latéral *S83.42*
- Osgood-Schlatter] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tubercule *M92.5*
- Polysyndactylie-pouce triphalangé ¬ Syndrome d'hémimélie *Q87.2*
- Postérieure ¬ Tendinite *M76.8*
- ¬
- - Dystrophie musculaire *G71.0*
- - Fracture
- - - Pilon *S82.5*
- - - Plateau *S82.18*
- - Hémimélie *Q72.5*
- - Plateau *S82.1*

Tibio-fibulaire ¬ Synostose *Q74.2*

Tibiométacarpienne ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*

Tibio-péronier
- Antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et foulure de la cheville: Ligament *S93.43*
- Supérieure et ses ligaments ¬ Articulation *S83.6*
- ¬ Articulation *S83.1*

Tic
- Douloureux de la face [Trousseau] ¬ *G50.0*

Tic *–suite*
- Médicamenteux et autres tics d'origine organique ¬ *G25.6*
- Moteur
- - Syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et *F95.2*
- - Vocal chronique ¬ *F95.1*
- Origine organique ¬ Tics médicamenteux et autres *G25.6*
- Psychogène ¬ *F95.9*
- Salaam ¬ *G40.4*
- Sans précision ¬ *F95.9*
- Transitoire ¬ *F95.0*
- Vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant *F95.2*
- ¬ Autres *F95.8*

Ticlopidine ¬ Hypersensibilité à la *T88.7*

Tierce bénigne ¬ Anémie due à la fièvre *B54†, D63.8**

Tiers
- Antérieur langue
- - Face
- - - Inférieure ¬ Deux *C02.2*
- - - Supérieure ¬ Deux *C02.0*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: Deux *C02.3*
- Inférieur de l'œsophage ¬ Tumeur maligne: *C15.5*
- Latéral ¬ Fracture de la clavicule: *S42.03*
- Matière de sexualité ¬ Conseil relatif au comportement ou à l'orientation de *Z70*
- Médian ¬ Fracture de la clavicule: *S42.01*
- Moyen
- - Langue SAI ¬ *C02.3*
- - Œsophage ¬ Tumeur maligne: *C15.4*
- - Vagin pendant l'accouchement ¬ Déchirure du *O71.4*
- - ¬ Fracture de la clavicule: *S42.02*
- Postérieur de la langue ¬ *C01*
- Supérieur
- - Œsophage ¬ Tumeur maligne: *C15.3*
- - Vagin pendant l'accouchement ¬ Déchirure du *O71.4*
- ¬ Conseil et surveillance pour: Personne consultant pour le compte d'un *Z71*

Tietze] ¬ Syndrome des articulations chondro-costales [*M94.0*

Tige
- Hypophysaire ¬ Syndrome d'interruption de la *E23.6*
- ¬ Enlèvement de: *Z47.0*

Timbre SAI ¬ Changement de *R49.8*

Timori ¬ Filariose à Brugia *B74.2*

Tinea
- Axillaris ¬ *B35.8*
- Blanca ¬ *B36.2*
- Capillitii ¬ *B35.0*
- Faciei ¬ *B35.0*
- Flava ¬ *B36.0*

Tinea *–suite*
- Genitalis ¬ *B35.8*
- Manuum et pedum ¬ *B35.8*
- Nigra ¬ *B36.1*
- Tonsurans ¬ *B35.0*
- Versicolor ¬ *B36.0*
- ¬ Dermatophytose [*B35*

Tinschert
v. Braun-Tinschert

TIPS] ¬ Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [*Z95.88*

Tiques
- Colorado ¬ Fièvre à *A93.2*
- Haemaphysalis longicornis ¬ Fièvre à *A93.8*
- Kenya ¬ Fièvre (à) (de): *A77.1*
- Queensland ¬ Fièvre à *A77.3*
- SAI ¬ Typhus à *A77.9*
- Sans précision ¬ Encéphalite virale transmise par des *A84.9*
- Sibérie ¬ Typhus à *A77.2*
- ¬
- - Encéphalite
- - - *A84.9*
- - - Europe centrale transmise par des *A84.1*
- - - Viral transmis
- - - - *A84*
- - - - *A84.8*
- - Fièvre
- - - Indienne à *A77.1*
- - - Pourprée [rickettsioses à *A77*
- - - Récurrente [borréliose] à *A68.1*
- - Lésions dues aux *B88.8*
- - Méningo-encéphalite virale transmise par des *A84*
- - Typhus africain à *A77.1*

Tire-bouchon ¬ Œsophage en *K22.4*

Tissu
- Accessoire tricuspide ¬ *Q22.8*
- Adénoïde ¬ *C11.1*
- Adipeux ¬
- - *C49*
- - *D21*
- Cellulaire sous-cutané
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de la peau et du *O99.7*
- - Cours maladies classées ailleurs ¬ affection
- - - Peau et du *L99**
- - - Précisées de la peau et du *L99.8**
- - Lié irradiation
- - - Sans précision ¬ Affection de la peau et du *L59.9*
- - - ¬ affection
- - - - Peau et du *L59*
- - - - Précisées de la peau et du *L59.8*

Tissu *–suite*
- Cellulaire sous-cutané *–suite*
- - Niveau
- - - Cou ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.1*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.4*
- - - - Supérieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.3*
- - - Tête ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.0*
- - - Tronc ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.2*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres affections de la peau et du *L98*
- - Sans précision ¬
- - - Affection de la peau et du *L98.9*
- - - Infection localisée de la peau et du *L08.9*
- - - Kyste folliculaire de la peau et du *L72.9*
- - - Lésion granulomateuse de la peau et du *L92.9*
- - - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.9*
- - Sièges multiples ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.7*
- - ¬
- - - Affections précisées de la peau et du *L98.8*
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de maladies de la peau et du *Z84.0*
- - - - Personnels de maladies de la peau et du *Z87.2*
- - - Formes de kyste folliculaire de la peau et du *L72.8*
- - - Infection localisé
- - - - Peau et du *L08*
- - - - Précisées de la peau et du *L08.8*
- - - Kystes folliculaires de la peau et du *L72*
- - - Lésion
- - - - Granulomateuses de la peau et du *L92.8*
- - - - Infiltrantes de la peau et du *L98.6*
- - - Résultat radiologique anormal de la peau et du *R93.8*
- - - Tuberculose de la peau et du *A18.4*
- - - Tuméfactions et masses localisées de la peau et du *R22*
- Cérébral
- - SAI ¬ Atteinte limitée ou circonscrite du *S06.30*
- - ¬
- - - Atteinte limitée ou circonscrite du *S06.3*
- - - Grosse atteinte du *S06.2*
- Cicatriciel
- - Réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par *Z91.73*

Tissu *–suite*
- Cicatriciel *–suite*
- - ¬ opération réparation d'un *Z42*
- Conjonctif
- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte du *M36.5**
- - Cours
- - - Hypogammaglobulinémie ¬
- - - - Affection systémique du *D80.9†*, *M36.8**
- - - - Maladie systémique du *D80.1†*, *M36.8**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ Atteintes systémiques du *M36.8**
- - - Ochronose ¬ Affection systémique du *E70.2†*, *M36.8**
- - Discal ¬ Rétrécissement des espaces intervertébraux par *M99.7*
- - Orbite ¬
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - Oreille ¬
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Paupière ¬
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Sans précision ¬
- - - Affection localisée du *L94.9*
- - - Atteinte systémique du *M35.9*
- - - Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du *M95.9*
- - Sein ¬
- - - *C50*
- - - *D48.6*
- - Stade
- - - 1 ¬ Maladie GVH chronique du *T86.05†*, *M36.51**
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique du *T86.06†*, *M36.52**
- - - 3 ¬ Maladie GVH chronique du *T86.07†*, *M36.53**
- - Syndrome de Sharp] ¬ Maladies associées du *M35.1*
- - Tissu mous
- - - Abdomen ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: *D21.4*
- - - - Maligne: *C49.4*
- - - Bassin ¬ Tumeur bénigne: *D21.5*
- - - Cou ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.85*
- - - Membre
- - - - Inférieur
- - - - - Y compris la hanche ¬ Tumeur bénigne: *D21.2*
- - - - - Y compris la hanche ¬ Tumeur maligne: *C49.2*
- - - - Supérieur

Tissu *–suite*
- Conjonctif *–suite*
- - Tissu mous *–suite*
- - - Membre *–suite*
- - - - Supérieur *–suite*
- - - - - Y compris l'épaule ¬ Tumeur bénigne: *D21.1*
- - - - - Y compris l'épaule ¬ Tumeur maligne: *C49.1*
- - - - ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.86*
- - - Pelvis ¬ Tumeur maligne: *C49.5*
- - - Sans précision ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: *D21.9*
- - - - Maligne: *C49.9*
- - - Sièges précisés ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.88*
- - - Tête face cou ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: *D21.0*
- - - - Maligne: *C49.0*
- - - Thorax ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: *D21.3*
- - - - Maligne: *C49.3*
- - - Tronc sans précision ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: *D21.6*
- - - - Maligne: *C49.6*
- - - ¬ Tumeur
- - - - Bénignes du *D21*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.1*
- - - - Malign
- - - - - *C49*
- - - - - Lésion à localisations contiguës du *C49.8*
- - ¬
- - - Affection localisé
- - - - *L94*
- - - - Précisées du *L94.8*
- - - Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du *Z87.3*
- - - Atteinte systémique
- - - - *M35*
- - - - Précisées du *M35.8*
- - - Déformation acquis
- - - - Précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du *M95.8*
- - - - Système ostéo-articulaire, des muscles et du *M95*
- - - Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du *N08.5**
- - - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du *N16.4**
- - - Métastase sur *C79.88*
- - - Polynévrite au cours d'affections disséminées du *M35.9†, G63.5**
- - - Rétrécissement du canal rachidien par *M99.4*
- - - Sein: *D24*

Tissu *–suite*
- Conjonctif *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du *J99.1**
- - - Tuberculose systémique du *A18.8†, M36.8**
- Cutané
- - Lymphome SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux *C88.4*
- - Sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du *E88.22*
- - ¬ Modifications du *R23.4*
- Dentaire durs
- - Éruption ¬ Modification de la teinte des *K03.7*
- - Pulpe ¬ Formation anormale de *K04.3*
- - Sans précision ¬ Maladie des *K03.9*
- - ¬ maladie
- - - *K03*
- - - Précisées des *K03.8*
- Ectopique intrapulmonaire (congénital) ¬ *Q33.5*
- Greffé
- - Greffe
- - - Cornée de l'œil ¬ Echec et rejet d'autres organes et *T86.83*
- - - Pancréas ¬ Echec et rejet d'autres organes et *T86.82*
- - - Poumon ¬ Echec et rejet d'autres organes et *T86.81*
- - Non précisés ¬ Echec et rejet d'un organe et d'un *T86.9*
- - Organes ou tissus greffés ¬ Echec et rejet d'autres organes et *T86.88*
- - ¬ échec rejet organe
- - - *T86.8*
- - - Tissus greffés: Autres organes ou *T86.88*
- Hématopoïétique NCA ¬ Maladie due au VIH avec tumeur maligne du *B21, C96.9*
- Intra-oculaire ¬ Lacération
- - Oculaire sans protrusion ou perte de *S05.3*
- - Rupture oculaires avec protrusion ou perte de *S05.2*
- Lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite néoplasique lors de tumeur des *C79.3*
- Lymphoïde
- - Associé
- - - Bronches [lymphome BALT] ¬ Lymphome des *C88.4*
- - - Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des *C88.4*
- - - Tissus cutanés [lymphome SALT] ¬ Lymphome des *C88.4*
- - Hématopoïétique apparent
- - - Évolution imprévisible inconnu

Tissu *–suite*
- Lymphoïde *–suite*
- - Hématopoïétique apparent *–suite*
- - - Évolution imprévisible inconnu *–suite*
- - - - Sans précision ¬ Tumeur des *D47.9*
- - - - ¬
- - - - - Tumeurs des *D47*
- - - - - Tumeurs précisées des *D47.7*
- - - Non précisées ¬ Tumeurs malignes des *C96*
- - - Sans précision ¬ Tumeur maligne des *C96.9*
- - - ¬
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux d'autres tumeurs des *Z80.7*
- - - - - Personnels d'autres tumeurs malignes des *Z85.7*
- - - - Tumeurs malignes précisées des *C96.7*
- Lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire ¬ Autres maladies précisées avec participation des *D76*
- Membre inférieur SAI ¬ Gelure avec nécrose des *T34.9*
- Mésothélial
- - Péritoine ¬ Tumeur bénigne: *D19.1*
- - Plèvre ¬ Tumeur bénigne: *D19.0*
- - Sans précision ¬ Tumeur bénigne: *D19.9*
- - Sièges ¬ Tumeur bénigne: *D19.7*
- - ¬ Tumeur bénigne du *D19*
- Mou
- - Épaule ¬ *C79.86*
- - Hanche ¬ *C79.86*
- - Oreille ¬ *C79.88*
- - Paupière ¬ *C79.88*
- - Présence d'un corps étranger non classé ailleurs ¬ Granulome d'un *M60.2*
- - ¬
- - - Corps étranger résiduel dans un *M79.5*
- - - Sein (peau) (*D03.5*
- Mous
- - Abdomen ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.4*
- - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.4*
- - Bassin ¬ Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.5*
- - Cou ¬ Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres *C79.85*
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Autres affections des *M73.8**
- - Maternels ¬ Anomalies des *P03.8*
- - Membre
- - - Inférieur y compris hanche ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.2*
- - - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.2*
- - - Supérieur y compris épaule ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.1*

Tissu *–suite*
- Mous *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur y compris épaule ¬ Tumeur *–suite*
- - - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.1*
- - - ¬ Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres *C79.86*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres affections des *M79*
- - Origine professionnelle ¬ affections des *M70*
- - Pelvis ¬ Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.5*
- - Rétropéritoine et du péritoine ¬ Tumeur bénigne des *D20*
- - Sans précision ¬
- - - Affection des *M79.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.9*
- - - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.9*
- - Sièges précisés ¬ Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres *C79.88*
- - Sollicitation excessif
- - - Articulation ¬ Affections des *M70*
- - - Sans précision ¬ Affection des *M70.9*
- - - ¬ Autres affections des *M70.8*
- - Stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermé
- - - - - Luxation de la hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.84!*
- - - - - Luxation de la jambe ¬ Lésion des *S81.84!*
- - - - - Luxation de la tête ¬ Lésion des *S01.84!*
- - - - - Luxation de l'avant-bras ¬ Lésion des *S51.84!*
- - - - - Luxation du bras ¬ Lésion des *S41.84!*
- - - - - Luxation du cou ¬ Lésion des *S11.84!*
- - - - - Luxation du pied ¬ Lésion des *S91.84!*
- - - - - Luxation du poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.84!*
- - - - - Luxation du thorax ¬ Lésion des *S21.84!*
- - - - Luxation
- - - - - Fermée de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.84!*
- - - - - Ouverte de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.87!*
- - - - Ouverte
- - - - - Luxation de la hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.87!*
- - - - - Luxation de la jambe ¬ Lésion des *S81.87!*
- - - - - Luxation de la tête ¬ Lésion des *S01.87!*

Tissu *–suite*
- Mous *–suite*
- - Stade *–suite*
- - - I lors fracture *–suite*
- - - - Ouverte *–suite*
- - - - - Luxation de l'avant-bras ¬ Lésion des *S51.87!*
- - - - - Luxation du bras ¬ Lésion des *S41.87!*
- - - - - Luxation du cou ¬ Lésion des *S11.87!*
- - - - - Luxation du pied ¬ Lésion des *S91.87!*
- - - - - Luxation du poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.87!*
- - - - - Luxation du thorax ¬ Lésion des *S21.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermé
- - - - - Luxation de la hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.85!*
- - - - - Luxation de la jambe ¬ Lésion des *S81.85!*
- - - - - Luxation de la tête ¬ Lésion des *S01.85!*
- - - - - Luxation de l'avant-bras ¬ Lésion des *S51.85!*
- - - - - Luxation du bras ¬ Lésion des *S41.85!*
- - - - - Luxation du cou ¬ Lésion des *S11.85!*
- - - - - Luxation du pied ¬ Lésion des *S91.85!*
- - - - - Luxation du poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.85!*
- - - - - Luxation du thorax ¬ Lésion des *S21.85!*
- - - - Luxation
- - - - - Fermée de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.85!*
- - - - - Ouverte de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.88!*
- - - - Ouverte
- - - - - Luxation de la hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.88!*
- - - - - Luxation de la jambe ¬ Lésion des *S81.88!*
- - - - - Luxation de la tête ¬ Lésion des *S01.88!*
- - - - - Luxation de l'avant-bras ¬ Lésion des *S51.88!*
- - - - - Luxation du bras ¬ Lésion des *S41.88!*
- - - - - Luxation du cou ¬ Lésion des *S11.88!*
- - - - - Luxation du pied ¬ Lésion des *S91.88!*
- - - - - Luxation du poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.88!*
- - - - - Luxation du thorax ¬ Lésion des *S21.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermé
- - - - - Luxation de la hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.86!*
- - - - - Luxation de la jambe ¬ Lésion des *S81.86!*
- - - - - Luxation de la tête ¬ Lésion des *S01.86!*

Tissu *–suite*
- Mous *–suite*
- - Stade *–suite*
- - - III lors fracture *–suite*
- - - - Fermé *–suite*
- - - - - Luxation de l'avant-bras ¬ Lésion des *S51.86!*
- - - - - Luxation du bras ¬ Lésion des *S41.86!*
- - - - - Luxation du cou ¬ Lésion des *S11.86!*
- - - - - Luxation du pied ¬ Lésion des *S91.86!*
- - - - - Luxation du poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.86!*
- - - - - Luxation du thorax ¬ Lésion des *S21.86!*
- - - - Luxation
- - - - - Fermée de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.86!*
- - - - - Ouverte de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.89!*
- - - - Ouverte
- - - - - Luxation de la hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.89!*
- - - - - Luxation de la jambe ¬ Lésion des *S81.89!*
- - - - - Luxation de la tête ¬ Lésion des *S01.89!*
- - - - - Luxation de l'avant-bras ¬ Lésion des *S51.89!*
- - - - - Luxation du bras ¬ Lésion des *S41.89!*
- - - - - Luxation du cou ¬ Lésion des *S11.89!*
- - - - - Luxation du pied ¬ Lésion des *S91.89!*
- - - - - Luxation du poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.89!*
- - - - - Luxation du thorax ¬ Lésion des *S21.89!*
- - Tête face cou ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.0*
- - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.0*
- - Thorax ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.3*
- - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.3*
- - Tronc sans précision ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.6*
- - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.6*
- - ¬
- - - Affections précisées des *M79.8*
- - - Sarcome
- - - - *C49.9*
- - - - Alvéolaire des *C49.9*
- - - - Kaposi des *C46.1*
- - - Tumeur
- - - - Bénignes du tissu conjonctif et des autres *D21*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres *D48.1*
- - - - Malign
- - - - - Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres *C49.8*
- - - - - Tissu conjonctif et des autres *C49*

Tissu *–suite*

- Non précisés ¬ Donneur d'organe ou de *Z52.9*
- Orbite ¬ Contusion du globe oculaire et des *S05.1*
- Ovarien résiduel ¬ Syndrome dû à la présence de *N99.8*
- Pelvien
- - Consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Lésions des organes et *O08.6*
- - Lors
- - - Accouchement ¬ Anomalie du *O34.9*
- - - Grossesse ¬ Anomalie du *O34.9*
- Périapical
- - Sans précision ¬ Maladies de la pulpe et des *K04.9*
- - ¬ Maladies de la pulpe et des *K04*
- Périurétral
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture des *O70.0*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- - Tant que lésion due à l'accouchement chez la mère ¬ Lacération du *O70.0*
- Relations familiales pendant l'enfance ¬ Changements dans le *Z61*
- Remplacé par greffe hétérologue ou homologue ¬ organe ou *Z94*
- Rétrobulbaire ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Rétro-oculaire ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- SAI ¬ Gelure
- - Multiples, avec nécrose des *T35.1*
- - Nécrose des *T34.9*
- Sans précision ¬ Status post greffe d'organe ou de *Z94.9*
- Sein ¬ Ectopie de *Q83.88*
- Sous-cutané
- - Épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le *E88.21*
- - Excédentaire et flasque ¬ Peau et *L98.7*
- - Membres ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.2*
- - Non classé
- - - Avant-bras et poignet ¬ Nécrose de la peau et du *R02.02*
- - - Jambe et genou ¬ Nécrose de la peau et du *R02.06*
- - - Localisation non précisée ¬ Nécrose de la peau et du *R02.09*
- - - Main et doigt ¬ Nécrose de la peau et du *R02.03*
- - - Région

Tissu *–suite*

- Sous-cutané *–suite*
- - Non classé *–suite*
- - - Région *–suite*
- - - - Cheville, pied et orteils ¬ Nécrose de la peau et du *R02.07*
- - - - Épaule, bras et coude ¬ Nécrose de la peau et du *R02.01*
- - - - Pelvienne et cuisse ¬ Nécrose de la peau et du *R02.05*
- - - Tête et cou ¬ Nécrose de la peau et du *R02.00*
- - - Tronc ¬ Nécrose de la peau et du *R02.04*
- - - ¬ Nécrose
- - - - Peau et du *R02.0*
- - - - Post-traumatique de la peau et du *R02*
- - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.3*
- - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.0*
- - Tronc ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.1*
- - Uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée lisse, avec *E88.20*
- - ¬
- - - Déficit tissulaire limité à la peau [derme] et au *I70.24*
- - - Maladie due au VIH avec maladie du *B23.8, L98.9*
- Tronc SAI ¬ Gelure avec nécrose des *T34.9*
- Valvulaire mitral accessoire ¬ *Q23.8*
- ¬
- - Donneur d'autres organes et *Z52.88*
- - État consécutif à la transplantation d'autres organes ou *Z94.88*
- - Examen d'un donneur éventuel d'organe et de *Z00.5*
- - Gelure
- - - Bras et de l'avant-bras, avec nécrose des *T34.4*
- - - Cheville et du pied, avec nécrose des *T34.8*
- - - Cou, avec nécrose des *T34.1*
- - - Genou et de la jambe, avec nécrose des *T34.7*
- - - Hanche et de la cuisse, avec nécrose des *T34.6*
- - - Localisations autres et non précisées, avec nécrose des *T34.9*
- - - Nécrose des *T34*
- - - Paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des *T34.3*
- - - Parties multiples du corps, avec nécrose des *T35.1*
- - - Poignet et de la main, avec nécrose des *T34.5*
- - - Tête, avec nécrose des *T34.0*
- - - Thorax, avec nécrose des *T34.2*

Tissu *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et *R89*
- - Status post d'autre greffe d'organe ou de *Z94.8*

Tissulaire

- Infiltrante ¬ Malformation lymphatique microkystique *D18.19*
- Limité à la peau [derme] et au tissu sous-cutané ¬ Déficit *I70.24*
- ¬ Maladie systémique due aux mastocytes *D47.0*

Titre prophylactique ¬ Admission pour ablation d'un organe à *Z40.0*

T-lymphotrope humain de type I ¬ Dermatite infectieuse associée au virus *L30.3*

Tocolytique

- Début travail
- - 1 à 7 jours ¬ Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.21*
- - 24 heures ¬ Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.20*
- - Plus de 7 jours ¬ Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.22*
- Sans précision du début du travail ¬ Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.29*

Todd

- Post-ictale) ¬ Paralysie de *G83.8*
- ¬ Paralysie post-épileptique de *G83.8*

Toit

- Orbite ¬ *S02.1*
- Oreillette gauche ¬ Abouchement de la veine cave supérieure gauche dans le *Q26.1*

Tokelau ¬ *B35.5*

Tolérance

- Altérée au glucose ¬ *R73.0*
- Glucose ¬ Anomalie de l'épreuve de *R73.0*

Tolosa-Hunt ¬ Syndrome de *H49.0*

Toluène

- Méthylbenzène] ¬ *T52.2*
- ¬ Embryopathie au *Q86.88*

Tombant

- Acquis) ¬ Poignet ou pied *M21.3*
- ¬ Accident dû à: Objet (jeté) (*W49.9!*

Toms River ¬ Hémoglobinopathie *D58.2*

Tondante ¬ Teigne *B35.0*

Tonico clonique ¬

- Crises non spécifiques: *G40.3*
- État de mal épileptique *G41.0*

Toni-Debré-Fanconi ¬ Syndrome de: de *E72.0*

Toniques ¬ Crises non spécifiques: *G40.3*

Tonsilles ¬ Infection purulente chronique des *J35.0*

Tonsurans ¬

- Herpes *B35.0*
- Tinea *B35.0*

Tonus musculaire
- Accru ¬ *R29.8*
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬ Anomalie du *P94.9*
- - ¬ Autres anomalies du *P94.8*
- ¬ Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du *T42.8*

Tooth
v. Charcot-Marie-Tooth

Tophacée ¬ Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie *E79.0*

Tophus goutteux du cœur ¬ *M10.09†, I43.8**

Topique
- Agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage *T49*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage *T49.0*
- Sans précision ¬ Intoxication: *T49.9*
- ¬
- - Glucocorticoïdes à usage *T49*
- - Intoxication
- - - *T49.8*
- - - Médicaments dentaires à usage *T49.7*

Tor ¬
- A Vibrio cholerae 01, biovar El *A00.1*
- Choléra El *A00.1*

Toriello
v.a. Kapur-Toriello
- ¬ Chondrodysplasie ponctuée type *Q77.3*

Toriello-Carey ¬ Syndrome de *Q87.8*

Torréfacteurs de café ¬ Poumon des: *J67.8*

Torsades de pointes à couplage court ¬ Syndrome des *I47.2*

Torsion
- Canal spermatique ¬ *N44.0*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.2*
- Congénitale de l'ovaire ¬ *Q50.2*
- Cordon ombilical ¬ *P02.5*
- Début précoce ¬ Dystonie de *G24.1*
- Épididyme ¬ *N44.0*
- Hydatide
- - Morgagni ¬ *N83.5*
- - ¬
- - - *N44.1*
- - - Torsion hydatide ¬ Torsion du testicule et *N44*
- Ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope ¬ *N83.5*
- Rate ¬ *D73.5*
- Testicule
- - Torsion hydatide ¬ *N44*
- - ¬
- - - *N44.0*
- Trompe surnuméraire ¬ *N83.5*

Torti ¬ Pili *Q84.1*

Torticolis
- Congénital (sterno-mastoïdien) ¬ *Q68.0*
- Paroxystique bénin de l'enfant ¬ *G24.3*
- Psychogène ¬ *F45.8*
- Spasmodique ¬ *G24.3*
- ¬ *M43.6*

Tortuosité
- Artères de la rétine ¬ *Q14.1*
- Artérielle ¬ Syndrome de *I77.1*

Torture ¬
- Modification de la personnalité après: *F62.0*
- Victime d'un crime, d'actes terroristes ou de *Z65*

Torula histolytica ¬
- Méningo-encéphalomyélite à *B45.1†, G05.2**
- Méningomyélite à *B45.1†, G05.2**

Torulose
- Poumons ¬ *B45.0†, J99.8**
- ¬
- - Encéphalite au cours de *B45.1†, G05.2**
- - Méningite due à une *B45.1†, G02.1**

Torus
- Mandibulaire ¬ *K10.0*
- Palatin ¬ *K10.0*

TOS ¬ *G54.0*

Touffes ¬ Angiome en *D18.01*

Touraine
v. Christ-Siemens-Touraine

Touraine-Solente-Gole ¬ Syndrome de *M89.49*

Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la *F95.2*

Toux
- Hémorragie ¬ *R04.2*
- ¬
- - *R05*
- - Dépendance (de longue durée) envers: insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la *Z99.0*
- - Formes psychogènes de: *F45.3*

Townes-Brocks ¬ Syndrome de *Q87.8*

Toxémie gravidique ¬ *O14.9*

Toxicité ¬ Dépression médullaire due à une *D61.9*

Toxicomane ¬ Syndrome de sevrage chez un enfant de mère *P96.1*

Toxicomanie
- Mère ¬
- - Fœtus et nouveau-né affectés par *P04.4*
- - Symptômes néonatals de privation dus à la *P96.1*
- ¬
- - Conseil et surveillance pour: abus de médicaments ou *Z71*
- - Insuffisance hépatique par *K71.1, Y57.9!*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de *O35.5*

Toxines
- Transmis par la mère ou administrés au nouveau-né ¬ Ictère néonatal dû à des médicaments ou des *P58.4*
- ¬ Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des *D64.2*

Toxique
v. Type de maladie

Toxocarose ¬
- *B83.0*
- Endophtalmie au cours de *B83.0†, H45.1**

Toxoplasma
- Gondii ¬
- - Infection à *B58*
- - Maladie due au VIH avec infection à *B20, B58.9*
- ¬
- - Choriorétinite à *B58.0†, H32.0**
- - Hépatite à *B58.1†, K77.0**
- - Méningo-encéphalite à *B58.2†, G05.2**
- - Myocardite à *B58.8†, I41.2**
- - Myosite à *B58.8†, M63.19**
- - Oculopathie à *B58.0†*

Toxoplasme ¬
- Affection des yeux due à des *B58.0†, H58.8**
- Hypophysite à *B58.2†, G05.2**
- Pneumonie à *B58.3†, J17.3**
- Vasculite à *B58.8†, I98.1**

Toxoplasmose
- Atteinte d'autres organes ¬ *B58.8*
- Cérébral
- - SIDA ¬ *B20†, G05.2*, B58.2*
- - ¬ *B58.2†, G05.2**
- Congénital ¬
- - *P37.1*
- - Hydrocéphalie due à une *P37.1*
- Hépatique ¬ *B58.1†, K77.0**
- Poumon ¬ *B58.3†, J17.3**
- Pulmonaire ¬ *B58.3†, J17.3**
- Sans précision ¬ *B58.9*
- ¬
- - *B58*
- - Choriorétinite congénitale à *P37.1†, H32.0**
- - Encéphalite congénitale à *P37.1†, G05.2**
- - Encéphalomyélite au cours de *B58.2†, G05.2**
- - Hépatite
- - - Acquise à *B58.1†, K77.0**
- - - Congénitale à *P37.1†, K77.0**
- - Maladie
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de *B58.8†, N16.0**
- - - VIH avec *B20, B58.9*
- - Méningo-encéphalite
- - - Acquise au cours de *B58.2†, G05.2**
- - - Congénitale à *P37.1†, G05.2**
- - Méningo-encéphalomyélite

Toxoplasmose *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Méningo-encéphalomyélite *–suite*
- - - Acquise au cours de *B58.2†, G05.2**
- - - Congénitale à *P37.1†, G05.2**
- - Myélite au cours de *B58.2†, G05.2**
- - Myocardite au cours de *B58.8†, I41.2**
- - Myosite au cours de *B58.8†, M63.19**
- - Pancréatite due à la *B58.8†, K87.1**
- - Pneumonie
- - - Congénitale à *P37.1†, J17.3**
- - - Cours de *B58.3†, J17.3**
- - Pneumopathie due à la *B58.3†, J17.3**
- - Pyélonéphrite au cours de *B58.8†, N16.0**
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.8*
- - Uvéite
- - - Acquise au cours de *B58.0†, H22.0**
- - - Congénitale à *P37.1†, H22.0**

TPMT (thiopurine méthyltransférase) ¬ Déficit congénital en *E88.8*

Traboulsi ¬ Syndrome de *Q87.0*

Trachéal
- Acquis
- - SAI. ¬ Sténose *J39.80*
- - ¬ Sténose *J39.80*
- Actes médicaux ¬ Sténose *J95.81*
- Partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule *R13.1*
- ¬
- - Adaptation et manipulation d'un extenseur *Z45.85*
- - Anomalie du cartilage *Q32.1*
- - Présence d'un extenseur *Z96.81*

Trachéamycose ¬ *B49†, J99.8**

Trachée
- Bronche
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du larynx, de la *A15.5*
- - Poumon ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de tumeur maligne de la *Z80.1*
- - - - Personnels de tumeur maligne de la *Z85.1*
- - - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la *J95.82*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D38.1*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du larynx, de la *A16.4*
- - ¬ Malformations congénitales de la *Q32*
- Cervicale, partie cervicale ¬ Trachée thoracique: *S11.02*

Trachée *–suite*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de: *A15.5*
- Poumon ¬
- - Brûlure comprenant le larynx et la *T27.1*
- - Corrosion comprenant le larynx et la *T27.5*
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- - ¬ *S11.02*
- Thoracique
- - Larynx ¬ *S11.01*
- - Trachée cervicale, partie cervicale ¬ *S11.02*
- - ¬ Lésion traumatique de la *S27.5*
- ¬
- - *S10.0*
- - *S12.8*
- - Atrésie de la *Q32.1*
- - Blessure de la partie cervicale de la *S19.9*
- - Brûlure du larynx et de la *T27.0*
- - Carcinoma in situ: *D02.1*
- - Corps étranger dans la *T17.4*
- - Corrosion du larynx et de la *T27.4*
- - Dilatation congénitale de la *Q32.1*
- - Écrasement du larynx et de la *S17.0*
- - Fracture des anneaux cartilagineux de la *S12.8*
- - Gomme de la *A52.7†, J99.8**
- - Kyste de la *J39.88*
- - Malformation congénital
- - - *Q32.1*
- - Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la *S11.0*
- - Rétrécissement syphilitique de la *A52.7†, J99.8**
- - Sténose
- - - Congénitale de la *Q32.1*
- - - Syphilitique de la *A52.7†, J99.8**
- - Syphilis
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Tardive de la *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D14.2*
- - - Maligne de la *C33*

Trachéite
- Aigu
- - Catarrhale ¬ *J04.1*
- - Laryngite (aiguë) ¬ *J04.2*
- - SAI ¬ *J04.1*
- - ¬
- - - *J04.1*
- - - Laryngite et *J04*
- - - Laryngo- *J04.2*
- Candida ¬ *B37.88*
- Candidose ¬ *B37.88*

Trachéite *–suite*
- Chronique
- - Laryngite ¬ *J37.1*
- - ¬
- - - *J42*
- - - Laryngite
- - - - Chronique) ¬ Laryngite chronique avec *J37.1*
- - - - Laryngo- *J37*
- - - Laryngo- *J37.1*
- Diphtérique ¬ Laryngo- *A36.2*
- Pneumocoques ¬ *J04.1, B95.3!*
- SAI ¬
- - Bronchite: avec *J40*
- - Laryngo- *J04.2*
- Streptocoques ¬ *J04.1, B95.5!*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, J99.8**
- Virale ¬ *J04.1, B97.8!*
- ¬ bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*

Trachéo-bronchique
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A15.4*
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A16.3*
- Survenant pendant la période périnatale ¬ Hémorragie *P26.0*
- ¬
- - Collapsus *J98.0*
- - Dyskinésie *J98.0*
- - Lymphadénopathie *R59.0*

Trachéo-bronchite
- Aiguë ¬ *J20*
- Aspergillus ¬ *B44.1†, J99.8**
- Chronique ¬ *J42*
- Congestion ¬ *J42*
- Obstructive chronique ¬ *J44*
- SAI ¬ *J40*

Trachéo-bronchopathie chondro-ostéoplastique ¬ *J98.0*

Trachéocèle congénitale ¬ *Q32.1*

Trachéomalacie congénitale ¬ *Q32.0*

Trachéo-œsophagien
- Congénital
- - SAI ¬ Fistule *Q39.2*
- - Sans atrésie ¬ Fistule *Q39.2*
- Consécutive à une trachéotomie ¬ Fistule *J95.0*
- Isolée ¬ Fistule *Q39.2*
- ¬
- - Atrésie de l'œsophage avec fistule *Q39.1*
- - Fistule *J86.0*

Trachéostome ¬
- Fonctionnement défectueux d'un *J95.0*
- Hémorragie par le *J95.0*

Trachéostome ¬ *–suite*
- Sepsis du *J95.0*

Trachéostomie
- Nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur *R13.1*
- ¬
- - Présence d'une *Z93.0*
- - Surveillance de *Z43.0*

Trachéotomie ¬
- Fistule trachéo-œsophagienne consécutive à une *J95.0*
- Obstruction de la voie respiratoire créée par la *J95.0*

Trachoma dubium ¬ *A71.0*

Trachomateux ¬
- Conjonctivite
- - Folliculaire *A71.1*
- - Granuleuse (*A71.1*
- Pannus *A71.1*

Trachomatis transmises par voie sexuelle ¬ infections à Chlamydia *A56*

Trachome
- Sans précision ¬ *A71.9*
- ¬
- - *A71*
- - Phase
- - - Active du *A71.1*
- - - Initiale du *A71.0*
- - Séquelles du *B94.0*

Traction
- Normale et traduisant une résistance inférieure à la normale ¬ les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en *M66*
- Rétine ¬ Décollement par *H33.4*
- Vitréo-maculaire ¬ *H35.38*
- ¬ Changement, vérification ou enlèvement de: appareils externes de fixation ou de *Z47.8*

Tractionnel
- Cours rétinopathie diabétique diabète sucré type
- - 1 ¬ Décollement *E10.30†, H36.0**
- - 2 ¬ Décollement *E11.30†, H36.0**
- Rétinopathie diabétique ¬ Décollement *E14.30†, H36.0**

Tractus
- Cranio-pharyngien ¬ Tumeur maligne: *C75.2*
- Gastro-intestinal
- - Inférieur ¬ Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le *T85.52*
- - SAI ¬ *C26.9*
- - Sans précision ¬ Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le *T47.9*
- - Supérieur ¬ Complication mécanique de prothèses, implants et greffes dans d'autres parties du *T85.51*

Tractus *–suite*
- Gastro-intestinal *–suite*
- - Sur plusieurs segments ¬ Maladie de Crohn de l'œsophage et du *K50.82*
- - ¬
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du *T85.76*
- - - Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le *T47.8*
- Intestinal, partie non précisée ¬ Tumeur maligne: *C26.0*
- Uvéal ¬ Syphilis
- - Secondaire du *A51.4†, H22.0**
- - Tardive du *A52.7†, H22.0**

Tragus
- Accessoire ¬ *Q17.0*
- ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.33*

Train ¬ Accident de *V99!*

Trait
- Hb-S ¬ *D57.3*
- Maladie des hématies falciformes [drépanocytaire] ¬ *D57.3*
- Personnalité ¬ Accentuation de certains *Z73*
- Thalassémique ¬ *D56.3*

Traitement
- Affection
- - Sans précision ¬ Examen de contrôle après *Z09.9*
- - Tumeurs malignes ¬ Examen de contrôle après *Z09*
- - ¬ Examen de contrôle après d'autres *Z09.8*
- Anticoagulant ¬ Hématurie sous *D68.35*
- Chirurgical
- - Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.0*
- - Décollement ¬ Cicatrices choriorétiniennes après *H59.8*
- - Tumeur maligne ¬ Examen de contrôle après *Z08.0*
- Combiné
- - Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.7*
- - Tumeur maligne ¬ Examen de contrôle après *Z08.7*
- - ¬ Convalescence après *Z54.7!*
- Composé du platine ¬ Réaction allergique au *T88.7*
- Continu
- - Antiagrégants plaquettaires, sans hémorragie ¬ *Z92.2*
- - Coumariniques, sans hémorragie ¬ *Z92.1*
- - Héparines, sans hémorragie ¬ *Z92.1*
- Cytostatique
- - Maladies non malignes ¬ *Z51.2*
- - Néoplasie) ¬ Lyse (spontanée) des tumeurs (après *E88.3*
- - ¬

Traitement *–suite*
- Cytostatique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un *D61.10*
- - - Leucopénie après un *D70.19*
- Falithrom ¬ Hémorragie sous *D68.33*
- Fer ¬ Anémie par déficit en fer réfractaire au *D50.8*
- Fracture ¬
- - Convalescence après *Z54.4!*
- - Examen de contrôle après *Z09.4*
- Héparine ¬ Hémorragie sous *D68.34*
- Induction
- - Standard ¬ Leucémie, réfractaire au *C95.8!*
- - ¬ Leucémie myéloïde aiguë réfractaire à un *C92.00*
- Inhalation ¬ Complication d'un *T81.8*
- Logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage] ¬ *Z50.5!*
- Maladies ¬ Examen de suivi après autre *Z09.88*
- Marcoumar ¬ Hémorragie sous *D68.33*
- Médical
- - Régime ¬ Antécédents personnels de non-observance d'un *Z91.1*
- - Sans précision ¬ Antécédents personnels de *Z92.9*
- - ¬ Antécédents personnels de *Z92*
- Médicamenteuse) ¬ Akathisie (induite par le *G25.88*
- Médicaux
- - Précisés ¬ Autres *Z51.88*
- - ¬ Antécédents personnels d'autres *Z92.8*
- Non précisé ¬ Convalescence après un *Z54.9!*
- Retardé ¬ *T89.03*
- Sans précision ¬ Syndrome dû à de mauvais *T74.9*
- Substitution
- - Méthadone ¬ *Z51.83*
- - Opiacés ¬ *Z51.83*
- Tocolytique
- - Début travail
- - - 1 à 7 jours ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.21*
- - - 24 heures ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.20*
- - - Plus de 7 jours ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.22*
- - Sans précision du début du travail ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.29*
- Tumeur malign
- - Sans précision ¬ Examen de contrôle après *Z08.9*
- - ¬ Examen de contrôle après d'autres *Z08.8*
- Ultérieur, non classés ailleurs ¬ Soins préparatoires pour *Z51.4*

Traitement *–suite*
- Vitamine B12 ou l'acide folique ¬ anémie mégaloblastique ne répondant pas au *D53*
- ¬
- - Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.1*
- - Arrêt prématuré du *Y69!*
- - Convalescence après un autre *Z54.8!*
- - Mauvais *Y09.9!*
- - Période d'attente pour investigation et *Z75.2*
- - Préparation d'une dialyse et *Z49*
- - Rupture prématurée des membranes, travail retardé par *O42.2*
- - Surveillance médical
- - - *Z08*
- - - *Z09*
- - Syndrome
- - - Mauvais *T74.8*
- - - Myélodysplasique induit par un *D46.9*

Tram ¬ Accident de *V99!*

Tranchées ¬
- Fièvre des *A79.0*
- Pied des *T69.0*

Tranebjaerg
v. Mohr-Tranebjaerg

Tranquillisants
- Administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et intoxications dues à des opiacés et *P04.0*
- ¬ Intoxication par *T43.5*

Transaldolase ¬ Déficit en *E74.8*

Transaminase
- Acide
- - Gamma-aminobutyrique ¬ Déficit en *E72.8*
- - Lactique déshydrogénase ¬ Augmentation des taux de *R74.0*
- ¬ Déficit en GABA *E72.8*

Transcarbamylase ¬ Déficit en ornithine *E72.4*

Transcervicale
- Ouverte du col du fémur ¬ Fracture *S72.04, S71.87!*
- SAI ¬ *S72.04*

Transcobalamine
- II ¬ Carence en *D51.2*
- ¬ Acidurie méthylmalonique par déficit en récepteur de la *E71.1*

Transcondylaire (en T ou en Y) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.45*

Transcortine ¬
- Anomalie de la *E27.8*
- Déficit en *E27.8*

Transe et de possession ¬ Etats de *F44.3*

Transépidermique
- Sans précision ¬ Anomalie de l'élimination *L87.9*
- ¬ anomalie élimination
- - *L87*

Transépidermique *–suite*
- ¬ anomalie élimination *–suite*
- - *L87.8*

Transférase ¬ Déficit
- Phosphoribosylpyrophosphate *E79.8*
- Succinyl-CoA
- - 3
- - - Cétoacide CoA *E71.3*
- - - Oxoacide CoA *E71.3*
- - Acétoacétate *E71.3*

Transfert
- Cytosolique du groupement méthyle ¬ Anomalie du *E72.1*
- Embryon ¬ Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de *N98.3*
- Esters de cholestérol ¬ Déficit en protéine de *E78.4*

Transformation
- Maligne ¬ Tumeur ovarienne dermoïde avec *C56*
- Post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux ¬ Défauts de la *E77.0*
- ¬ Anémie réfractaire
- - Crise blastique
- - - Cours de *C92.00*
- - - Prolifération de blastes en *C92.0*
- - Excès de blastes en *D46.2*

Transformé en bouc émissaire ¬ Hostilité envers un enfant *Z62*

Transfusion
- Fœto-maternelle ¬ *O43.0*
- Jumeau
- - Jumeau à jumeau ¬ *O43.0*
- - Transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une *P02.3*
- Materno-fœtale ¬ *O43.0*
- Placentaire ¬
- - Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de *P02.3*
- - Syndromes de *O43.0*
- SAI ¬ Réaction à une *T80.9*
- Sang incompatible ¬ *T80.3*
- Sanguine, sans mention de diagnostic ¬ *Z51.3*
- Sans précision ¬ Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une *T80.9*
- Transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre *P02.3*
- ¬
- - Choc septique après perfusion, injection thérapeutique ou *T80.2, R57.2*
- - Complication
- - - Consécutif injection thérapeutique perfusion
- - - - *T80*
- - - - *T80.8*

Transfusion *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Complication *–suite*
- - - Vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une *T80.1*
- - Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une *T80.0*
- - Ictère
- - - *T80.8*
- - - Réaction hémolytique à la *T80.8*
- - Infection consécutif injection thérapeutique perfusion
- - - *T80.2*
- - Phlébite consécutive à injection thérapeutique, perfusion et *T80.1*
- - Réaction
- - - Facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou *T80.4*
- - - Incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une *T80.3*
- - Septicémie consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et *T80.2*
- - Thrombocytopénie non précis
- - - Non précisée, non qualifiée de réfractaire aux *D69.61*
- - - Qualifiée de réfractaire aux *D69.60*
- - Thrombo-embolie consécutive à injection thérapeutique, perfusion et *T80.1*
- - Thrombopénie
- - - Néonatale due à: exsanguino- *P61.0*
- - - Primaire
- - - - Non qualifiées de réfractaires aux *D69.41*
- - - - Qualifiées de réfractaires aux *D69.40*
- - - Secondaire
- - - - Non qualifiées de réfractaires aux *D69.58*
- - - - Qualifiées de réfractaires aux *D69.57*
- - Thrombophlébite consécutive à injection thérapeutique, perfusion et *T80.1*

Transit
- Changeants (mixtes) [SII-M] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec troubles du *K58.3*
- Colique ¬ Constipation lors d'un trouble du *K59.00*
- Intestinal ¬ Modification du *R19.4*
- Lent ¬ Constipation à *K59.00*

Transitions entre les différentes périodes de vie ¬ Difficultés d'ajustement aux *Z60*

Transitoire
v. Type de maladie

Transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par voie *Z95.88*

Translocase ¬ Déficit
- Carnitine-acylcarnitine *E71.3*
- G6P *E74.0*

Translocation
- Insertion
- - Équilibrée chez un sujet normal ¬ *Q95.0*

Translocation *–suite*
- Insertion *–suite*
- - Non équilibrées ¬ *Q92*
- - Réciproques robertsoniennes et équilibrées ¬ *Q95*
- T 8
- - 16)(p11;p13) ¬ Leucémie myéloblastique aiguë associée à une *C92.00*
- - 21)(q22;q22) ¬ Leucémie myéloblastique aiguë type associée à une *C92.00*
- ¬ Trisomie
- - 13, *Q91.6*
- - 18, *Q91.2*
- - 21, *Q90.2*

Translucidité de l'iris ¬ *H21.2*

Transmissible
- Non précisée ¬ Sujets en contact avec et exposés à une maladie *Z20.9*
- ¬ Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies *Z20.8*

Transmission
- Dominante ¬ Neuropathie sensitive héréditaire à *G60.8*
- Est essentiellement sexuel
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies dont le mode de *O98.3*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres maladies dont le mode de *A63*
- - ¬
- - - Maladies précisées dont le mode de *A63.8*
- - - Sujet
- - - - Contact avec et exposés à des infections dont le mode de *Z20.2*
- - - - Porteur de maladies dont le mode de *Z22.4*
- Maternel ¬
- - CPEO de *H49.4*
- - Maladie de Leigh de *G31.88*
- - Ophtalmoplégie externe progressive chronique de *H49.4*
- - Paraplégie spastique de *G11.4*
- Neurosensoriel
- - Lié X ¬ Surdité mixte
- - - *H90.3*
- - - *H90.8*
- - Sans
- - - Altération de l'audition de l'autre oreille ¬ Surdité unilatérale mixte de *H90.7*
- - - Précision ¬ Surdité mixte de *H90.8*
- - ¬ Surdité
- - - *H90*
- - - Bilatérale mixte de *H90.6*
- Récessive ¬ Neuropathie sensitive héréditaire à *G60.8*
- Sans
- - Altération de l'audition de l'autre oreille ¬ Surdité unilatérale de *H90.1*
- - Précision ¬ Surdité de *H90.2*

Transmission *–suite*
- ¬ Surdité bilatérale de *H90.0*

Transmural
- Aigu
- - Antérieur SAI ¬ Infarctus *I21.0*
- - Antéro
- - - Apical ¬ Infarctus *I21.0*
- - - Latéral ¬ Infarctus *I21.0*
- - - Septal ¬ Infarctus *I21.0*
- - Inférieur (paroi) SAI ¬ Infarctus *I21.1*
- - Inféro-latéral ¬ Infarctus *I21.1*
- - Latéral
- - - Haut ¬ Infarctus *I21.2*
- - - SAI ¬ Infarctus *I21.2*
- - Latéro
- - - Apical ¬ Infarctus *I21.2*
- - - Basal ¬ Infarctus *I21.2*
- - Myocarde
- - - Localisation
- - - - Non précisée ¬ Infarctus *I21.3*
- - - - ¬ Infarctus *I21.2*
- - - Paroi
- - - - Antérieure ¬ Infarctus *I21.0*
- - - - Inférieure ¬ Infarctus *I21.1*
- - Paroi
- - - Antérieure SAI ¬ Infarctus *I21.0*
- - - Diaphragmatique ¬ Infarctus *I21.1*
- - - Latéral SAI ¬ Infarctus *I21.2*
- - Postérieur
- - - Paroi postérieur] SAI ¬ Infarctus *I21.1*
- - - Vrai) ¬ Infarctus *I21.2*
- - Postéro-basal ¬ Infarctus *I21.2*
- - Postéro-inférieur ¬ Infarctus *I21.1*
- - Postéro-latéral ¬ Infarctus *I21.2*
- - Postéro-septal ¬ Infarctus *I21.2*
- - Septal SAI ¬ Infarctus *I21.2*
- Myocarde SAI ¬ Infarctus *I21.3*
- SAI ¬ Infarctus du myocarde non *I21.4*

Transpeptidase ¬ Déficit en gamma-glutamyl *E72.8*

Transpiration ¬ Dysréflexie autonome manifestée par des crises de *G90.41*

Transplacentaire
- Lait maternel ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie *P04*
- ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion *P02.3*

Transplant
- Cardiaques ou vasculaires ¬ Présence d'autres implants ou *Z95.88*
- Cellule souche hématopoïétique
- - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un *T86.0*
- - ¬ Échec d'un *T86.00*

Transplantation
- Capillaire ¬ *Z41.8*
- Cardiaque
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency] ¬ Inscription pour *U55.12*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription pour *U55.11*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour *U55.10*
- - ¬ Inscription pour *U55.1*
- Cellule souche
- - Hématopoïétique
- - - Immunosuppression actuelle ¬ État consécutif à une *Z94.81*
- - - Sans immunosuppression actuelle ¬ État consécutif à une *Z94.80*
- - ¬ Rejet de greffon après *T86.00*
- Cœur poumon
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency]] ¬ Inscription pour *U55.32*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription pour *U55.31*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour *U55.30*
- - ¬ Inscription pour *U55.3*
- Organe
- - Niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ Inscription effectuée pour *Z75.7*
- - Sans niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ Inscription effectuée pour *Z75.6*
- - Tissus ¬ État consécutif à la *Z94.88*
- - ¬
- - - Examen de suivi après *Z09.80*
- - - Inscription effectuée pour *U55*
- Pulmonaire
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency] ¬ Inscription effectuée pour *U55.22*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription effectuée pour *U55.21*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription effectuée pour *U55.20*
- - ¬ Inscription pour *U55.2*
- ¬
- - Détérioration fonctionnel
- - - 29 jours et plus après la *T86.41*
- - - Pendant les premiers 28 jours après la *T86.40*
- - Encéphalite limbique aiguë après *T85.78†, G05.1**
- - Rejet
- - - 29 jours et plus après la *T86.41*
- - - Pendant les premiers 28 jours après la *T86.40*

Transport
- Acide aminés ¬
- - Anomalies du *E72.0*
- - Trouble de l'absorption et du *E72.0*

Transport *–suite*
- Aérien ¬ Accident de *V99!*
- Cérébral des folates ¬ Syndrome neurodégénératif dû au déficit de *G31.88*
- Électrons carence
- - Flavoprotéine ¬ Trouble du *E71.3*
- - Flavoprotéine-ubiquinone oxydoréductase ¬ Trouble du *E71.3*
- Glucose ¬ Anomalie du *E74.8*
- Glutamate-aspartate ¬ Défaut de *E72.0*
- ¬
- - Accident de *V99!*
- - Examen et mise en observation après un accident de *Z04.1*
- - Mal des *T75.3*

Transporteur
- ATP-binding cassette A1 ¬ Déficit du *E78.6*
- Carnitine à travers la membrane plasmique ¬ Défaut du *E71.3*

Transposition
- Appendice ¬ *Q43.8*
- Côlon ¬ *Q43.8*
- Complète des grosses artères ¬ *Q20.3*
- Congénitalement
- - Corrigée des gros vaisseaux ¬ *Q20.5*
- - Non corrigée gros vaisseau
- - - Coarctation ¬ *Q20.3*
- - - ¬ *Q20.3*
- Corrigée ¬ *Q20.5*
- Gauche ¬ *Q20.5*
- Gros vaisseau
- - Complète) ¬ *Q20.3*
- - ¬ *Q20.3*
- Intestin ¬ *Q43.8*
- Isolé congénitalement non corrigée gros
- - Artères ¬ *Q20.3*
- - Vaisseaux ¬ *Q20.3*
- Pénoscrotale ¬ *Q55.8*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*
- Viscères
- - Abdominale ¬ *Q89.3*
- - Thoracique ¬ *Q89.3*

Transsexualisme ¬ *F64.0*

Transsexuel ¬ Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l'adolescent, type non *F64.1*

Transsudative ¬ Otite moyenne
- *H65.9*
- Chronique: *H65.3*

Transthyrétine
- Héréditaire] ¬ h-ATTR [Amylose à *E85.2*
- ¬ Cardiopathie amyloïde de la *E85.4†, I43.1**

Transtrochantérienne ¬ *S72.10*

Transuraniens de métaux lourds ¬ Intoxication par des nucléides *T66*

Transversale
- Abdomen ¬ Dissection *T05.8*

Transversale *–suite*
- Complet moelle
- - Cervicale ¬ Lésion *S14.11*
- - Dorsale ¬ Lésion *S24.11*
- - Lombaire ¬ Lésion *S34.10*
- Incomplet
- - Moelle
- - - Cervicale ¬ Autres lésions *S14.13*
- - - Dorsale SAI ¬ Lésions *S24.12*
- - - Lombaire ¬ Lésion *S34.11*
- - ¬ Lésion central moelle
- - - Cervicale (lésion *S14.12*
- - - Dorsale (lésion *S24.12*
- Membres-micrognathie ¬ Syndrome de fusion splénogonadique-anomalie *Q87.8*
- Thorax ¬ Dissection *T05.8*

Transverse
- Aigu
- - Cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central ¬ Myélite *G37.3*
- - SAI ¬ Myélite *G37.3*
- Avant le travail ¬ Présentation (de): *P01.7*
- Cervical(e) ¬ apophyse: *S12*
- Dorsal(e) ¬ apophyse: *S22*
- Lombo-sacré(e) ¬ apophyse: *S32*
- Oblique ¬ Soins maternels pour position *O32.2*
- Syphilitique ¬ Myélite *A52.1†, G05.0**
- ¬
- - Arrêt en profondeur en position *O64.0*
- - Dystocie due à la persistance en position: occipito- *O64.0*
- - Lésion traumatique du côlon: Côlon *S36.52*
- - Présentation
- - - *O32.2*
- - - *P03.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Côlon *D12.3*
- - - Maligne: Côlon *C18.4*

Transversus
- Abdominal ¬ Situs inversus ou *Q89.3*
- Acquis ¬ Pes *M21.63*
- Thoracique ¬ Situs inversus ou *Q89.3*

Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.14*

Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.15*

Trauma chronique ¬ Encéphalite par *F07.2*

Traumatique
v. Type de maladie

Traumatisme
- Accouchement ¬ Fracture proximale de l'humérus en tant que *P13.3*
- Acoustique ¬ *H83.3*
- Ancien
- - Corne
- - - Antérieur ménisque

Traumatisme *–suite*
- Ancien *–suite*
- - Corne *–suite*
- - - Antérieur ménisque *–suite*
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.24*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.21*
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.25*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.22*
- - Localisations multiples ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.20*
- - Ménisque SAI ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.29*
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.26*
- - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.23*
- - ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.2*
- Antérieur ¬ Ostéonécrose due à un *M87.2*
- Canal lacrymal ¬ *S05.8*
- Cérébral SAI ¬ *S06.9*
- Crânio-cérébral
- - 1er degré ¬ *S06.0*
- - 30 minute
- - - 24 heures ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.71!*
- - - ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.70!*
- - Durée non précisée ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.79!*
- - Non ouvert ¬ *S06.9*
- - Plus 24 heure
- - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.73!*
- - ¬
- - - Antécédents personnels de *Z87.8*
- - - Perte connaissance
- - - - 30
- - - - - Minutes à 24 heures lors d'un *S06.9, S06.71!*
- - - - - Minutes lors d'un *S06.9, S06.70!*
- - - - Lors
- - - - - *S06.7!*
- - - - - *S06.9, S06.79!*
- - - - Plus
- - - - - 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un *S06.9, S06.72!*
- - - - - 24 heures, sans retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un *S06.9, S06.73!*

Traumatisme *–suite*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P00.5*
- Non classées ailleurs ¬ Certaines complications précoces des *T79*
- Obstétrical
- - Foie ¬ *P15.0*
- - Nerf crânien VII] ¬ Lésion du nerf facial due à un *P11.3*
- - Non précisé ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un *P11.59*
- - Paraplégie
- - - Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un *P11.50*
- - - Chronique ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un *P11.51*
- - Précis ¬
- - - *O71.8*
- - - *P15.8*
- - Rate ¬ *P15.1*
- - Sans précision ¬
- - - *O71.9*
- - - *P15.9*
- - - Lésion
- - - - Cuir chevelu due à un *P12.9*
- - - - Squelette due à un *P13.9*
- - - - Système
- - - - - Nerveux central due à un *P11.9*
- - - - - Nerveux périphérique due à un *P14.9*
- - ¬
- - - *O71*
- - - *P15*
- - - Adiponécrose sous-cutanée due à un *P15.6*
- - - Céphalhématome dû à un *P12.0*
- - - Congestion faciale due à un *P15.4*
- - - Déchirure
- - - - Hémorragie
- - - - - Intracrâniennes dues à un *P10*
- - - - - Intracrâniennes dues à un *P10.8*
- - - - - Intracrâniennes non précisées, dues à un *P10.9*
- - - - Tente du cervelet due à un *P10.4*
- - - Fracture
- - - - Clavicule due à un *P13.4*
- - - - Crâne due à un *P13.0*
- - - - Rachis due à un *P11.5*
- - - Glaucome traumatique dû (due) à un *P15.3*
- - - Hématome
- - - - Chignon dû à un *P12.1*
- - - - Sous-dural (localisé) dû à un *P10.0*
- - - - Sous-galéal dû à un *P12.2*
- - - Hémorragie
- - - - Cérébrale due à un *P10.1*
- - - - Épicrânienne sous-aponévrotique due à un *P12.2*
- - - - Intraventriculaire due à un *P10.2*

Traumatisme *–suite*
- Obstétrical *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hémorragie *–suite*
- - - - Sous
- - - - - Arachnoïdienne due à un *P10.3*
- - - - - Conjonctivale dû (due) à un *P15.3*
- - - - Sous-durale due à un *P10.0*
- - - Lésion
- - - - Cérébral
- - - - - Non précisée, due à un *P11.2*
- - - - - Précisées, dues à un *P11.1*
- - - - Crâne dues à un *P13.1*
- - - - Cuir chevelu dues à un *P12.8*
- - - - Faciale due à un *P15.4*
- - - - Fémur due à un *P13.2*
- - - - Nerfs crâniens due à un *P11.4*
- - - - Œil due à un *P15.3*
- - - - Organes génitaux externes due à un *P15.5*
- - - - Os longs due à un *P13.3*
- - - - Partie
- - - - - Squelette dues à un *P13.8*
- - - - - Système nerveux périphérique dues à un *P14.8*
- - - - Plexus brachial dues à un *P14.3*
- - - - Rachis et de la moelle épinière due à un *P11.5*
- - - - Squelette due à un *P13*
- - - - Sterno-cléido-mastoïdienne due à un *P15.2*
- - - - Système
- - - - - Nerveux central dues à un *P11*
- - - - - Nerveux périphérique due à un *P14*
- - - Meurtrissure du cuir chevelu due à un *P12.3*
- - - Œdème cérébral dû à un *P11.0*
- - - Paralysie
- - - - Dejerine-Klumpke due à un *P14.1*
- - - - Duchenne-Erb due à un *P14.0*
- - - - Faciale due à un *P11.3*
- - - - Nerf phrénique due à un *P14.2*
- - - Rupture
- - - - Foie due à un *P15.0*
- - - - Rate due à un *P15.1*
- Oculaire ¬ Glaucome secondaire à un *H40.3*
- Psychique ¬ *Z91.8*
- Sans précision ¬ Complication précoce d'un *T79.9*
- Thoracique ¬ *S29.9*
- ¬
- - Chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après *Z42*
- - Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un *T79.4*
- - Complication
- - - Précisées d'un *T89*

Traumatisme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Complication *–suite*
- - - Précoces d'un *T79.8*
- - Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, associées à un *K06.2*
- - Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de: *N35.0*
- - Séquelles de certaines complications précoces d'un *T98.2*

Travail
- 1 7 jours ¬ Rupture prématuré membrane
- - Début du *O42.11*
- - Traitement tocolytique, début du *O42.21*
- 24 heure ¬ Rupture prématuré membrane
- - Début du *O42.0*
- - Traitement tocolytique, début du *O42.20*
- 37ème semaine entière de gestation ¬ Faux *O47.1*
- Accouchement
- - Administration de médicaments ¬ détresse fœtale au cours du *O68*
- - Compliqué
- - - Anomalie
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical ¬ *O69*
- - - - - Ombilical ¬ *O69.8*
- - - - - Ombilical, sans précision ¬ *O69.9*
- - - - Rythme
- - - - - Cardiaque du fœtus ¬ *O68.0*
- - - - - Cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ *O68.2*
- - - Brièveté du cordon ¬ *O69.3*
- - - Circulaire du cordon, avec compression ¬ *O69.1*
- - - Détresse fœtal
- - - - Sans précision ¬ *O68.9*
- - - - ¬ *O68*
- - - Forme d'enchevêtrement du cordon ¬ *O69.2*
- - - Hémorragie, non classée ailleurs ¬ *O67*
- - - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ *O69.4*
- - - Lésions vasculaires du cordon ¬ *O69.5*
- - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ *O68.1*
- - - Prolapsus du cordon ¬ *O69.0*
- - - Signe
- - - - Biochimiques de détresse fœtale ¬ *O68.3*
- - - - Détresse fœtale ¬ *O68.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres complications du *O75*
- - Puerpéralité ¬
- - - Cours du *O87*
- - - Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du *O95*

Travail *–suite*
- Accouchement *–suite*
- - Sans précision ¬
- - - Complication
- - - - *O75.9*
- - - - Anesthésie au cours du *O74.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du *P03.9*
- - ¬
- - - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du *O74.3*
- - - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.2*
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du *O74.5*
- - - Choc pendant ou après le *O75.1*
- - - Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du *O74.1*
- - - Complication
- - - - Anesthésie au cours du *O74.8*
- - - - Cardiaques de l'anesthésie au cours du *O74.2*
- - - - Intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du *O74.3*
- - - - Précisées du *O75.8*
- - - - Pulmonaires de l'anesthésie au cours du *O74.1*
- - - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du *O74.6*
- - - Echec ou difficulté d'intubation au cours du *O74.7*
- - - Épuisement maternel au cours du *O75.0*
- - - Fœtus nouveau-né affecté
- - - - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du *P04.0*
- - - - Complication
- - - - - *P03*
- - - - - Précisées du *P03.8*
- - - - Présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du *P03.1*
- - - Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le *P20.1*
- - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.0*
- - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.2*
- - - Pneumonie
- - - - Aspiration due à une anesthésie au cours du *O74.0*
- - - - Chimique d'aspiration dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.0*
- - - Réaction
- - - - Intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le *P04.0*
- - - - Toxique à une anesthésie locale au cours du *O74.4*
- - - Syndrome

Travail *–suite*
- Accouchement *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Syndrome *–suite*
- - - - Hépato-rénal consécutif au *O90.4*
- - - - Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.0*
- Avant 37 semaines entières de gestation ¬ Faux *O47.0*
- Chirurgie ¬ Echec du déclenchement (du *O61.1*
- Delà de 24 heures ¬ Rupture prématurée des membranes, avec début du *O42.1*
- Difficiles ¬ Conditions de *Z56*
- Équipe ¬ *Z56*
- Hypertonique ¬ *P03.6*
- Incoordonné ¬ *O62.4*
- Irrégulier ¬ *O62.2*
- Moyens mécaniques ¬ Echec du déclenchement (du *O61.1*
- Non classée ailleurs ¬ Pyrexie au cours du *O75.2*
- Ocytocique ¬ Echec du déclenchement (du *O61.0*
- Pénible ¬ Rythme de *Z56*
- Plus 7 jours ¬ Rupture prématuré membrane
- - Début du *O42.12*
- - Traitement tocolytique, début du *O42.22*
- Prématuré
- - Accouchement
- - - SAI ¬ *O60.1*
- - - Terme ¬ *O60.2*
- - - ¬ *O60*
- - Induit ¬ *O60.0*
- - Sans accouchement ¬ *O60.0*
- - Spontané
- - - Accouchement
- - - - Prématuré
- - - - - Césarienne ¬ *O60.1*
- - - - - ¬ *O60.1*
- - - - Terme par césarienne ¬ *O60.2*
- - - ¬ *O60.0*
- Prolongé
- - Sans précision ¬ *O63.9*
- - ¬ *O63*
- Prostaglandines ¬ Echec du déclenchement (du *O61.0*
- Provoqué ¬ *P03.8*
- Retardé par traitement ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.2*
- SAI ¬ Lenteur du *O63.9*
- Sans précision ¬
- - Anomalie des forces en jeu au cours du *O62.9*
- - Échec
- - - Déclenchement du *O61.9*
- - - Épreuve de *O66.4*
- - Faux *O47.9*

Travail *–suite*
- Spontané ¬ Accouchement prématuré
- - Césarienne, sans *O60.3*
- - Sans *O60.3*
- Suivi d'une césarienne ¬ Echec de l'épreuve de *O66.4*
- Trop rapide ¬ *O62.3*
- ¬
- - Anomalies des forces en jeu au cours du *O62.8*
- - Arrêt de la phase active du *O62.1*
- - Échec déclenchement
- - - *O61.8*
- - - Instrumental du *O61.1*
- - - Médical du *O61.0*
- - Eclampsie au cours du *O15.1*
- - Examen
- - - Médecine du *Z10*
- - - Mise en observation après un accident du *Z04.2*
- - Faux *O47*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le *P01.7*
- - Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du *P20.0*
- - Infections au cours du *O75.3*
- - Lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris césarienne avant début
- - - *O32*
- - - *O33*
- - - *O34*
- - Mauvaise adaptation au *Z56*
- - Position instable avant le *P01.7*
- - Présentation
- - - Face avant le *P01.7*
- - - Siège avant le *P01.7*
- - - Transverse avant le *P01.7*
- - Rupture
- - - Prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du *O42.29*
- - - Utérus
- - - - Avant le début du *O71.0*
- - - - Non précisée comme survenant avant le début du *O71.1*
- - - - Pendant le *O71.1*
- - Septicémie au cours du *O75.3*
- - Version externe avant le *P01.7*

Travailleurs
- Liège ¬ Maladie ou poumon des: *J67.3*
- Préparations alimentaires à base de poissons ¬ Poumon des: *J67.8*
- Sociaux ¬ Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les *Z64.8*

Travers
- Hiatus œsophagien ¬ Glissement du cardia à *Q40.1*

Travers *–suite*
- Membrane plasmique ¬ Défaut du transporteur de carnitine à *E71.3*
- Peau ¬ Accident dû à: Pénétration d'un corps étranger à *W49.9!*

Traversée thoracobrachiale ¬ Syndrome de *G54.0*

Travestisme
- Bivalent ¬ *F64.1*
- Fétichiste ¬ *F65.1*
- ¬ Fétichisme avec *F65.1*

Trayeurs] ¬ Pseudovaccine [nodule des *B08.0*

Treacher Collins] ¬ Syndrome de Franceschetti [Syndrome de *Q75.4*

Trèfle
- Anomalies congénitales multiples ¬ Syndrome de crâne en *Q87.8*
- Isolé ¬ Crâne en *Q75.0*

Tréhalase ¬ Diarrhée et vomissements dus à un déficit en *E74.3*

Trélat ¬ Maladie de Leser- *L82*

Tremblement
- Essentiel ¬
- - *G25.0*
- - Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: *G11.1*
- Familial ¬ *G25.0*
- Intentionnel ¬ *G25.2*
- Médicaments ¬ *G25.1*
- Sans précision ¬ *R25.1*
- ¬ Autres formes précisées de *G25.2*

Trénaunay
v. Klippel-Trénaunay
v. Klippel-Trénaunay-Weber

Treponema pallidum SAI ¬ Infection due à *A53.9*

TRH ¬ Hypothyroïdie centrale due à un déficit du récepteur de la *E03.1*

Triacylglycerol lipase] ¬ Anomalies des taux de: lipase [*R74.8*

Triade
- Acnéique ¬ *L73.2*
- Horner ¬ *G90.2*
- Hutchinson ¬ *A50.5*

Trianguli et canaliculi ¬ Pili *Q84.1*

Triatrial
- Droit ¬ Cœur *Q24.2*
- Gauche ¬ Cœur *Q24.2*
- ¬ Cœur *Q24.2*

Triazole ¬ Allergie aux dérivés du *T88.7*

Triceps ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon du *S46.3*

Trichiasis de la paupière ¬ Entropion et *H02.0*

Trichilemmal proliférant ¬ Kyste *L72.1*

Trichinella ¬ Infection à *B75*

Trichinellose ¬
- *B75*

Trichinellose ¬ *–suite*
- Myosite au cours de *B75†, M63.19**

Trichinose ¬
- *B75*
- Encéphalite au cours de *B75†, G05.2**

Trichiuria ¬ Infection à Trichuris *B79*

Trichloréthylène ¬ Effet toxique: *T53.2*

Trichloroéthène ¬ *T53.2*

Trichlorométhane ¬ *T53.1*

Trichocéphale (infection) (maladie) ¬ *B79*

Trichocéphalose ¬ *B79*

Tricho-dentaire ¬ Syndrome *Q82.8*

Tricho-dento-osseux ¬ Syndrome *Q82.8*

Trichodysplasie spinulosa ¬ *L85.8*

Trichofolliculome ¬ *D23.9*

Tricholeucocytes
- Variante ¬ Leucémie à *C91.40*
- ¬ Leucémie à *C91.4*

Tricholeucoplasie ¬ *K13.3*

Trichomonas
- Vaginalis ¬
- - Fluor à *A59.0†, N77.1**
- - Leucorrhée (vaginale) à *A59.0*
- ¬
- - Balanite à *A59.0†, N51.2**
- - Cervicite à *A59.0†, N74.8**
- - Cystite à *A59.0†, N33.8**
- - Infection
- - - Col de l'utérus à *A59.0†, N74.8**
- - - Prostate à *A59.0†, N51.0**
- - - Urètre à *A59.0†, N37.0**
- - - Vaginale à *A59.0†, N77.1**
- - - Vulve à *A59.0†, N77.1**
- - Leucorrhée à *A59.0†, N77.1**
- - Prostatite à *A59.0†, N51.0**
- - Urétrite à *A59.0†, N37.0**
- - Vaginite à *A59.0†, N77.1**
- - Vésiculite à *A59.0†, N51.8**
- - Vulvite à *A59.0†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite à *A59.0†, N77.1**

Trichomonase
- Intestinale ¬ *A07.8*
- Prostate ¬ *A59.0†, N51.0**
- Sans précision ¬ *A59.9*
- Urètre ¬ *A59.0†, N37.0**
- Uro-génitale ¬ *A59.0*
- Vagin ¬ *A59.0†, N77.1**
- Vésicule séminale ¬ *A59.0†, N51.8**
- Vessie ¬ *A59.0†, N33.8**
- Vulve ¬ *A59.0†, N77.1**
- ¬
- - *A59*
- - Localisations de *A59.8*

Tricho-odonto-onychiale ¬ Dysplasie *Q82.8*

Trichoodonto-onychiale ¬ Dysplasie ectodermique *Q82.8*

Trichophytia
- Capitis ¬ *B35.0*
- Profunda ¬ *B35.8*

Trichophytie
- Main ¬ *B35.2*
- Parties découvertes du corps ¬ *B35.4*
- Pied ¬ *B35.3*

Trichophytique ¬ Sycosis *B35.0*

Trichophytoïdes ¬ Pianides plantaires hyperkératosiques et *A66.3*

Trichophyton ¬ infections causées par les espèces appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et *B35*

Trichophytosis unguium ¬ *B35.1*

Trichopoliodystrophie ¬ *E83.0*

Trichorrhexie noueuse ¬ *L67.0*

Trichostrongylose ¬ *B81.2*

Trichothiodystrophie ¬ Ichtyose avec *L67.8*

Trichotillomanie ¬ *F63.3*

Trichuris trichiuria ¬ Infection à *B79*

Tricuspide
- Cause précis sauf rhumatismal ¬
- - Insuffisance (de la valvule) *I36.1*
- - Régurgitation (de la valvule) *I36.1*
- Combiné ¬ atteinte valve
- - Aortique et *I08.2*
- - Mitral
- - - *I08.1*
- - - Aortique et *I08.3*
- Congénitale ¬ Malformation *Q22.9*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la valvule *I39.2**
- Insuffisance ¬ Sténose non rhumatismale (de la valvule) *I36.2*
- Parachute ¬ Valve *Q22.8*
- Rhumatismal ¬
- - Insuffisance (de la valvule) *I07.1*
- - Sténose (de la valvule) *I07.0*
- SAI ¬ Atteinte de la valvule *I07.9*
- Sans précision ¬
- - Atteinte non rhumatismale de la valvule *I36.9*
- - Maladie de la valvule *I07.9*
- - Malformation congénitale de la valvule *Q22.9*
- ¬
- - Agénésie des valves *Q22.4*
- - Anomalie
- - - Appareil sous-valvulaire *Q22.8*
- - - Ebstein de la valve *Q22.5*
- - Atrésie de la valvule *Q22.4*
- - Atteintes non rhumatismales de la valvule *I36.8*
- - Dysplasie congénitale de la valve *Q22.8*
- - Endocardite tuberculeuse de la valve *A18.8†, I39.2**

Tricuspide *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Inflammation syphilitique de la valve *A52.0†, I39.2**
- - Insertion anormale des cordages de la *Q22.8*
- - Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) *I36.1*
- - Maladie
- - - Rhumatismales de la valvule *I07*
- - - Valvule *I07.8*
- - Malformation congénital
- - - Valve pulmonaire et de la valvule *Q22*
- - - Valvule *Q22.8*
- - Sténose
- - - Congénitale de la valvule *Q22.4*
- - - Non rhumatismale (de la valvule) *I36.0*
- - Straddling ou overriding de la valve *Q22.8*
- - Tissu accessoire *Q22.8*
- - Valvulite syphilitique de la valve *A52.0†, I39.2**

Tricuspidien
- Insuffisance ¬ Sténose *I07.2*
- ¬
- - Insuffisance *I07.1*
- - Sténose *I07.0*

Tricycliques et tétracycliques ¬ Intoxication: Antidépresseurs *T43.0*

Trieurs de laine] ¬ Maladie des chiffonniers [maladie des *A22.1*

Trifasciculaire ¬ Bloc *I45.3*

Trigémellaire ¬ Grossesse: *P01.5*

Trigéminale après herpès zoster ¬ Ganglionite *B02.3†, H58.8**

Trigéminée post-herpétique ¬ Névralgie
- *B02.2†, G53.0**
- *G53.0**

Triglycéride
- Ichtyose ¬ Lipidose avec surcharge en *E75.5*
- Lipase pancréatique ¬ Déficit en *K90.3*
- ¬ Lipidose avec surcharge en *E75.5*

Trigone de la vessie ¬ Tumeur maligne: *C67.0*

Trigonite ¬
- *N30.3*
- Urétro- *N30.3*

Trigonocéphalie
v.a. Opitz-trigonocéphalie
- Nez bifide-anomalies des extrémités ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬ *Q75.0*

Trijumeau
- Nerf crânien V] ¬ Affections du nerf *G50*
- Sans précision ¬ Affection du nerf *G50.9*
- ¬
- - Affections du nerf *G50.8*
- - Lésion traumatique du nerf *S04.3*
- - Névralgie

Trijumeau *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Névralgie *–suite*
- - - *G50.0*
- - - Post-zostérienne du *B02.2†, G53.0**

Triloculaire biauriculaire ¬ Cœur *Q20.4*

Trimalléolaire ¬ Fracture *S82.82*

Triméthadione ¬ Embryopathie à la *Q86.88*

Triméthylaminurie
- Sévère primaire ¬ *E88.8*
- ¬ *E88.8*

Trinitrate de 1,2,3-propanétriol ¬ *T65.5*

Trinitrotoluène ¬ *T65.3*

Triose-phosphate isomérase ¬ Anémie (due à): déficit en: *D55.2*

Triphalangé
- Hypospadias-progénie ¬ Syndrome d'hypoplasie du radius-pouces *Q87.2*
- ¬
- - Polydactylie d'un pouce *Q69.1*
- - Syndrome
- - - Agénésie pulmonaire-anomalie cardiaque-pouce *Q87.8*
- - - Hémimélie tibiale-polysyndactylie-pouce *Q87.2*

Triplé ¬
- *O30.1*
- Accouchement retardé du deuxième jumeau, *O63.2*

Triple H ¬ Syndrome *E72.4*

Triplégie ¬ *G83.8*

Triploïdie et polyploïdie ¬ *Q92.7*

Trismus-pseudocamptodactylie ¬ Syndrome de *Q68.8*

Trisomie
- 1 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 2 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 3 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 4 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 4p ¬ *Q92.2*
- 5 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 5p ¬ *Q92.3*
- 7 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 8 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 9 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 9p partielle ¬ *Q92.2*
- 10 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 10p ¬ *Q92.2*
- 12 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 12p ¬ *Q92.3*
- 13
- - Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ¬ *Q91.5*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q91.4*
- - Partielle ¬ *Q91.7*
- - Translocation ¬ *Q91.6*
- - ¬ *Q91.7*

Trisomie *–suite*
- 14 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 15 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 16 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 17 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 18
- - Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ¬ *Q91.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q91.0*
- - Partielle ¬ *Q91.3*
- - Translocation ¬ *Q91.2*
- - ¬ *Q91.3*
- 18p ¬ *Q92.2*
- 20
- - Mosaïque ¬ *Q92.1*
- - P) (q) ¬ *Q92.8*
- 20p ¬ *Q92.2*
- 21
- - Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ¬ *Q90.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q90.0*
- - Partielle ¬ *Q90.9*
- - SAI ¬ *Q90.9*
- - Translocation ¬ *Q90.2*
- 22 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- Chromosome entier
- - Mosaïque chromosomique non-disjonction mitotique ¬
- - - *Q92.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q92.0*
- Distale 10q ¬ *Q92.3*
- Partiel
- - Autosomes
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres trisomies et *Q92*
- - - Sans précision ¬ Trisomie et *Q92.9*
- - Majeure ¬ *Q92.2*
- - Mineure ¬ *Q92.3*
- - Précisées des autosomes ¬ Autres trisomies et *Q92.8*
- Trisomie partiel
- - Autosomes
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres *Q92*
- - - Sans précision ¬ *Q92.9*
- - Précisées des autosomes ¬ Autres *Q92.8*
- X ¬ *Q97.0*

Tristesse ¬ *R45.2*

Tritanomalie ¬ *H53.5*

Tritanopie
- Congénitale ¬ *H53.5*
- ¬ *H53.5*

Tritronculaire ¬
- Cardiopathie artérioscléreuse: Implication *I25.13*
- Maladie
- - Athéroscléreuse *I25.13*

Tritronculaire ¬ *–suite*
- Maladie *–suite*
- - Coronarienne bitronculaire à *I25.13*

TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [*I47.1*

Trochanter
- Pertrochantérienne ¬ Fracture du *S72.11*
- Sans précision ¬ Fracture du trochanter: *S72.10*
- Trochanter: Trochanter sans précision ¬ Fracture du *S72.10*
- ¬
- - Fracture du *S72.1*
- - Grand *S72.10*
- - Petit *S72.10*

Trochantérienne ¬
- Bursite *M70.6*
- Tendinite *M70.6*

Trochléaire ¬ Paralysie congénital
- Familiale du nerf *H49.1*
- Nerf *H49.1*

Trochlée
- Humérus ¬ Aplasie de la *Q74.0*
- ¬ *S42.49*

Trombiculose ¬ *B88.0*

Trompe
- Eustache
- - Sans précision ¬ Affection de la *H69.9*
- - ¬
- - - *C30.1*
- - - *Z96.2*
- - - Absence de *Q16.2*
- - - Affection
- - - - *H69*
- - - - Précisées de la *H69.8*
- - - Compression de la *H68.1*
- - - Distension de la *H69.0*
- - - Obstruction de la *H68.1*
- - - Orifice de la *C11.2*
- - - Rétrécissement de la *H68.1*
- - - Salpingite
- - - - *H68.0*
- - - - Obstruction de la *H68*
- - - Sténose de la *H68.1*
- - - Syphilis de la *A52.7†, J99.8**
- - - Tuberculose de la *A18.6†, H75.0**
- Fallope
- - Grossesse ¬ Rupture de la *O00.1*
- - Ligament large
- - - SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q50.6*
- - - ¬
- - - - Absence de la *Q50.6*
- - - - Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la *N83.8*

Trompe *–suite*
- Fallope *–suite*
- - Ligament large *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Atrésie de la *Q50.6*
- - - - Malformation
- - - - - Congénitales des *Q50.6*
- - - - - Congénitales des ovaires, des *Q50*
- - - - Présence en surnombre de la *Q50.6*
- - Vasectomie ¬ Admission pour ligature des *Z30.2*
- - ¬
- - - *D28.2*
- - - Abcès (de): *N70*
- - - Atrophie acquise de l'ovaire et de la *N83.3*
- - - Endométriose de la *N80.2*
- - - Gonorrhée de la *A54.2†, N74.3**
- - - Grossesse dans une *O00.1*
- - - Kyste embryonnaire de la *Q50.4*
- - - Lésion traumatique de la *S37.5*
- - - Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la *N83.4*
- - - Rétrécissement
- - - - Gonorrhéique de la *A54.2†, N74.3**
- - - - Tuberculeux de la *A18.1†, N74.1**
- - - Rupture de la *N83.8*
- - - Syphilis tardive de la *A52.7†, N74.2**
- - - Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la *N83.5*
- - - Tuberculose
- - - - Aiguë de la *A18.1†, N74.1**
- - - - Chronique de la *A18.1†, N74.1**
- - - Tumeur maligne: *C57.0*
- Ligaments de l'utérus ¬ Tumeur bénigne: *D28.2*
- Surnuméraire ¬ Torsion (de): *N83.5*
- Utérus ¬ *C57.0*
- ¬
- - Associée à une anomalie congénitale des *N97.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne des *D28.2*
- - - Maligne des *C57.0*

Tronc
- 2ème degré sans précision ¬
- - Brûlure du *T21.2*
- - Corrosion du *T21.6*
- Artériel
- - Commun ¬ *Q20.0*
- - ¬ Persistance du *Q20.0*
- Brachio-céphalique
- - Entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (y compris *I63*
- - ¬
- - - Anévrisme syphilitique du *A52.0†, I79.8**
- - - Infarctus cérébral

Tronc *–suite*
- Brachio-céphalique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Infarctus cérébral *–suite*
- - - - Embolie du *I63.1*
- - - - Occlusion du *I63.2*
- - - - Sténose du *I63.2*
- - - - Thrombose du *I63.0*
- Cérébral
- - Moelle épinière-élévation des lactates ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie avec atteinte du *G31.81*
- - SAI ¬ Lésion du *S06.9*
- - Type Athabascan ¬ Dysgénésie du *Q87.8*
- - ¬
- - - *D33.1*
- - - *D43.1*
- - - Compression du cerveau (*G93.5*
- - - Gliome infiltrant du *C71.7*
- - - Hémorragie intracérébrale du *I61.3*
- - - Hernie du cerveau (*G93.5*
- - - Sclérose en plaques (de): *G35*
- - - Syndromes vasculaires du *I67.9†, G46.3**
- - - Tumeur
- - - - *D43.1*
- - - - Maligne: *C71.7*
- Commun de l'artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du *I25.14*
- Degré
- - 2a ¬
- - - Brûlure du *T21.2*
- - - Corrosion du *T21.6*
- - 2b ¬
- - - Brûlure du *T21.8*
- - - Corrosion du *T21.9*
- - Non précis ¬
- - - Brûlure du *T21.0*
- - - Corrosion du *T21.4*
- Niveau non précis
- - Abrasion ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.01*
- - Contusion ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.05*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.04*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.02*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.03*
- - Type de lésion non précisée ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.00*
- - ¬
- - - Amputation traumatique du *T09.6*
- - - Lésion traumatique
- - - - Non précisé ¬ Lésion traumatique non précisée du *T09.9*

Tronc *–suite*
- Niveau non précis *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lésion traumatique *–suite*
- - - - Précisées du *T09.8*
- - - - Rachis et du *T09*
- - - - Superficiel
- - - - - *T09.0*
- - - - - *T09.08*
- - - Plaie ouverte du *T09.1*
- Non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du *T09.4*
- SAI ¬
- - Écrasement de: *T04.1*
- - Gelure
- - - *T35.3*
- - - Nécrose des tissus (de): *T34.9*
- - - Superficielle (de): *T33.9*
- Sans précision ¬
- - Séquelles de lésion traumatique du cou et du *T91.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du *D21.6*
- - - Malign
- - - - Nerfs périphériques du *C47.6*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du *C49.6*
- ¬
- - Abcès cutané, furoncle et anthrax du *L02.2*
- - Anévrisme et dissection de l'artère basilaire (*I72.5*
- - Brûlure
- - - Corrosion du *T21*
- - - Premier degré du *T21.1*
- - - Troisième degré du *T21.3*
- - Carcinoma in situ: Peau du *D04.5*
- - Corrosion
- - - Premier degré du *T21.5*
- - - Troisième degré du *T21.7*
- - Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du *T09.5*
- - Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du *T09.2*
- - Lymphadénite aiguë du *L04.1*
- - Mélanome
- - - In situ du *D03.5*
- - - Malin du *C43.5*
- - Nævus à mélanocytes du *D22.5*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.04*
- - Phlegmon du *L03.3*
- - Séquelle
- - - Brûlure, corrosion et gelure du *T95.1*
- - - Lésion traumatique
- - - - Cou et du *T91*

Tronc *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Séquelle *–suite*
- - - Lésion traumatique *–suite*
- - - - Précisées du cou et du *T91.8*
- - - - Superficielle et de plaie ouverte du cou et du *T91.0*
- - Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du *Z42.2*
- - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du *R22.2*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau du *D23.5*
- - - Lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du *D17.1*
- - - Maligne: Peau du *C44.5*

Trophique du col de l'utérus ¬ Ulcère *N86*

Trophoblastique
- Épithélioïde ¬ Tumeur *D39.2*
- SAI ¬ Maladie *O01.9*
- ¬ Antécédents personnels de maladie *Z87.5*

Tropica avec complication cérébrale ¬ Malaria *B50.0†, G94.8**

Tropical
- Pulmonaire) SAI ¬ Eosinophilie *J82*
- SAI ¬ Ulcère: *L98.4*
- ¬
- - Acné *L70.3*
- - Bubon climatique ou *A55*
- - Fibrose endomyocardique (*I42.3*
- - Lichen plan *L43.3*
- - Miliaire *L74.2*
- - Myosite
- - - *M60.09*
- - - Purulente *M60.09*
- - Pancréatite *K86.1*
- - Paraplégie spastique *G04.1*
- - Pyomyosite *M60.0*
- - Sprue
- - - *K90.1*
- - - Non *K90.0*
- - Stéatorrhée *K90.1*

Trou
- Épingle [sténopéique] SAI ¬ Méat en *N35.9*
- Foramen) macula ¬ *H35.38*
- Rond de la rétine, sans décollement ¬ *H33.3*

Trouble
- Accommodation ¬
- - *H52.5*
- - Vices de réfraction et *H52*
- Adaptation ¬
- - *F43.2*
- - Réaction à un facteur de stress sévère, et *F43*

Trouble *–suite*
- Affectant la fonction palpébrale ¬ Autres *H02.5*
- Affectifs bipolaires ¬ Autres *F31.8*
- Alimentation
- - Rapport avec le sommeil ¬ *F51.3*
- - ¬
- - - *F50*
- - - *F50.8*
- Anxieux
- - Mixtes ¬ Autres *F41.3*
- - Phobique ¬
- - - *F40*
- - - *F40.8*
- - Précisés ¬ Autres *F41.8*
- - ¬ Autres *F41*
- Appareil circulatoire
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ Autres *I97.89*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *I98**
- Apparentés ¬ Flatulence et *R14*
- Associés de l'odorat et du goût ¬ *R43.8*
- Cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *I98.1**
- Cérébraux précisés chez le nouveau-né ¬ Autres *P91.88*
- Cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *I68.8**
- Circulatoire
- - Greffe de peau ¬ *T86.50*
- - Selon Fontaine ¬ *I70.29*
- Classés ailleurs ¬ Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des *F54*
- Coagulation sanguine durablement acquis ¬ *U69.11!*
- Comportement
- - Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-petite taille- *Q87.8*
- - Troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence ¬ Autres *F98*
- - ¬ Maladies psychiques et *Z13.8*
- Conduction cardiaque ¬ Autres *I45*
- Conduite
- - Dépression ¬ *F92.0*
- - F91 associé trouble
- - - Émotionnel en F93.- ¬ *F92.8*
- - - Névrotique en F40-F48 ¬ *F92.8*
- - Type "en groupe" ¬ *F91.2*
- - ¬ Autres *F91.8*
- Conversion] ¬ Autres troubles de dissociation [*F44.88*
- Coordination
- - Non précisés ¬ *R27.8*
- - ¬ Autres *R27*

Trouble *–suite*

- Cours d'une ménopause artificielle ¬ *N95.3*
- Croissance et du développement osseux ¬ Autres *M89.2*
- Cycle veille-sommeil ¬ *G47.2*
- Déglutition, SAI ¬ *R13.9*
- Délirants persistants ¬ Autres *F22.8*
- Dépressifs récurrents ¬ Autres *F33.8*
- Développement
- - Acquisitions scolaires ¬ Autres *F81.8*
- - Dents SAI ¬ *K00.9*
- - Enfance ¬ Examen spécial de dépistage de certains *Z13.4*
- - Parole et du langage ¬ Autres *F80.8*
- - Psychologique ¬ Autres *F88*
- - Psychosexuel ¬ Autres *F66.8*
- Dissociatif conversion
- - Transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ *F44.82*
- - ¬ Autres *F44.8*
- Dissociation [troubles de conversion] ¬ Autres *F44.88*
- Dyspeptiques ¬ *R10.1*
- Émotionnel
- - Apparaissant
- - - Habituellement enfance adolescence ¬ trouble
- - - - Comportement et *F98*
- - - - Précisés du comportement et *F98.88*
- - - Spécifiquement dans l'enfance ¬ *F93*
- - Enfance ¬ Autres *F93.8*
- - Sans précision ¬ Trouble mixte des conduites et *F92.9*
- - ¬ Autres troubles mixtes des conduites et *F92.8*
- Endocrinien
- - Précisés ¬ Autres *E34.8*
- - ¬ Autres *E34*
- Endormissement et du maintien du sommeil ¬ *G47.0*
- Envahissants du développement ¬ Autres *F84.8*
- Éruption dentaire ¬ *K00.6*
- Facteurs de coagulation, n.c.a. ¬ *D68.28*
- Fonction
- - Labyrinthiques ¬ *H83.2*
- - Symbolique non
- - - Classés ailleurs ¬ Dyslexie et autres *R48*
- - - Précisés ¬ *R48.8*
- Fonctionnel
- - Chirurgie cardiaque ¬ Autres *I97.1*
- - Échec rejet greffe
- - - Foie ¬ *T86.4*
- - - Rein ¬ *T86.1*
- - Estomac ¬ *K31*
- - Intestin ¬ Autres *K59*
- - Précisés de l'intestin ¬ Autres *K59.8*

Trouble *–suite*

- Fonctionnement social
- - Apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence ¬ *F94*
- - Enfance ¬ Autres *F94.8*
- Formation des dents ¬ *K00.4*
- Habitudes et des impulsions ¬ Autres *F63.8*
- Hémorragique
- - Anomalie du récepteur P2Y12 ¬ *D69.88*
- - Antiagrégants plaquettaires ¬ *D69.80*
- - Anticoagulant
- - - Anticorps circulants ¬ *D68.3*
- - - Circulants ¬ *D68.35*
- - - ¬ *D68.35*
- - Augmentation anticorps
- - - Anti-facteur VIII ¬ *D68.31*
- - - Dirigés contre d'autres facteurs de coagulation ¬ *D68.32*
- - - Non précisés ¬ Autres *D68.38*
- - Coumarines (antagonistes de la vitamine K) ¬ *D68.33*
- - Déficit de synthèse de la thromboxane ¬ *D69.88*
- - Héparines ¬ *D68.34*
- - Hirudine ¬ *D68.35*
- - Inhibiteur
- - - Réversible
- - - - Facteur IIa ¬ *D68.35*
- - - - Thrombine ¬ *D68.35*
- - - Sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ *D68.35*
- Héréditaires ¬ Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres *M14.0**
- Humeur affectif
- - Isolés ¬ Autres *F38.0*
- - Persistants ¬ Autres *F34.8*
- - Précisés ¬ Autres *F38.8*
- - Récurrents ¬ Autres *F38.1*
- - ¬ Autres *F38*
- Hyperkinétiques ¬ Autres *F90.8*
- Hypertensifs de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P00.0*
- Identité sexuelle ¬ Autres *F64.8*
- Jet urinaire ¬ *R39.1*
- Langage non
- - Classés ailleurs ¬ *R47*
- - Précisés ¬ *R47.8*
- Liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et *F19*
- Ménopause
- - Climatère féminin ¬ *N95.1*
- - Troubles de la périménopause ¬ *N95*
- Mental
- - Comportement

Trouble *–suite*

- Mental *–suite*
- - Comportement *–suite*
- - - Associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Autres *F53.8*
- - - Légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ *F53.0*
- - - Lié utilisation
- - - - Alcool ¬ *F10*
- - - - Cocaïne ¬ *F14*
- - - - Dérivés du cannabis ¬ *F12*
- - - - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ *F19*
- - - - Hallucinogènes ¬ *F16*
- - - - Opiacés ¬ *F11*
- - - - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ *F13*
- - - - Solvants volatils ¬ *F18*
- - - - Stimulants, y compris la caféine ¬ *F15*
- - - - Tabac ¬ *F17*
- - - Sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ *F53.1*
- - - ¬
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de *Z81*
- - - - - Personnels d'autres *Z86.5*
- - - - Mise en observation pour suspicion de *Z03.2*
- - Lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique ¬ Autres *F06*
- - Maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O99.3*
- - Précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique ¬ Autres *F06.8*
- Métabolique
- - Classés ailleurs ¬ Arthropathie à microcristaux au cours d'autres *M14.1**
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec *O21.1*
- - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec *O21.1*
- - ¬ Hyperémèse gravidique avec *O21.1*
- Métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.5*
- Miction ¬ Autres *R39.1*
- Mixte
- - Conduites et troubles émotionnels ¬ Autres *F92.8*
- - Personnalité et autres troubles de la personnalité ¬ *F61*
- Moteur
- - Dissociatifs ¬ *F44.4*

Trouble *–suite*

- Moteur *–suite*
- - Œsophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de Raynaud- *M34.1*
- Motricité
- - Cours d'affections classées ailleurs ¬ Syndromes extrapyramidaux et *G26**
- - ¬ Syndrome
- - - Extrapyramidaux et *G25*
- - - Précisés extrapyramidaux et *G25.88*
- Multiples de la préférence sexuelle ¬ *F65.6*
- Névrotique
- - Précisés ¬ Autres *F48.8*
- - ¬ Autres *F48*
- Non précisés de l'appareil circulatoire ¬ *I99*
- Nutrition ¬ Examen spécial de dépistage des *Z13.2*
- Nutritionnels de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P00.4*
- Obsessionnels-compulsifs ¬ Autres *F42.8*
- Oculaires psychogènes ¬ *F45.8*
- Odontogénèse
- - Sans précision ¬ *K00.9*
- - ¬ Autres *K00.8*
- Odorat goût
- - Non précisés ¬ *R43.8*
- - ¬ *R43*
- Ordre publique ¬ Lésion due à des *Y36.9!*
- Organique
- - Humeur [affectifs] ¬ *F06.3*
- - Personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux ¬ Autres *F07.8*
- Périménopause ¬ Troubles de la ménopause et autres *N95*
- Personnalité
- - Comportement
- - - Adulte ¬ Autres *F68*
- - - Affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux ¬ *F07*
- - ¬ Troubles mixtes de la personnalité et autres *F61*
- Précis
- - Appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *I98.8**
- - Comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence ¬ Autres *F98.88*
- - Conduction ¬ Autres *I45.8*
- - Ménopause et de la périménopause ¬ Autres *N95.8*
- - Personnalité et du comportement chez l'adulte ¬ Autres *F68.8*
- - Régulation thermique du nouveau-né ¬ Autres *P81.8*
- Préférence sexuelle ¬ Autres *F65.8*

Trouble *–suite*

- Psychiques et du comportement provoqués par ces substances ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de *U69.3!*
- Psychotique
- - Aigus et transitoires ¬ Autres *F23.8*
- - Non organiques ¬ Autres *F28*
- Réceptifs du langage ¬ Autres *F80.28*
- Régulation thermique du nouveau-né ¬ Autres *P81*
- Respiratoire
- - Cours
- - - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ *J99.1**
- - - Cryoglobulinémie ¬ *D89.1†, J99.8**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *J99.8**
- - - Spondylarthrite ankylosante ¬ *M45.09†, J99.8**
- - Précisés ¬ Autres *J98.8*
- - ¬ Autres *J98*
- Schizo-affectifs ¬ Autres *F25.8*
- Sécrétion salivaire ¬ *K11.7*
- Sensibilité cutané
- - Non précisés ¬ *R20.8*
- - ¬ *R20*
- Somatoformes ¬ Autres *F45.8*
- Sommeil
- - Non organiques ¬ Autres *F51.8*
- - Somnolence excessive ¬ *G47.1*
- - ¬ Autres *G47.8*
- Spécifique
- - Développement
- - - Acquisitions scolaires ¬ *F81*
- - - Fonctions motrices, sans précision ¬ *F82.9*
- - - Motricité
- - - - Buccale ¬ *F82.2*
- - - - Fine et graphique ¬ *F82.1*
- - - - Globale ¬ *F82.0*
- - - Parole et du langage ¬ *F80*
- - Mixtes du développement ¬ *F83*
- - Personnalité ¬ Autres *F60.8*
- Subjectifs de la vision ¬ *H53.1*
- Système immunitaire ¬
- - Antécédent
- - - Familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains *Z83.2*
- - - Personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains *Z86.2*
- - Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains *Z13.0*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des *N16.2**
- Transit changeants (mixtes) [SII-M] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec *K58.3*

Trouble *–suite*

- Vasculaire
- - Aigus de l'intestin ¬ *K55.0*
- - Chroniques de l'intestin ¬ *K55.1*
- - Intestin ¬ Autres *K55.8*
- - Kystes de la conjonctive ¬ Autres *H11.4*
- Vision
- - Binoculaire ¬ Autres *H53.3*
- - Couleurs ¬ *H53.5*
- - ¬ Autres *H53.8*
- Voix
- - Non précisés ¬ *R49.8*
- - ¬ *R49*
- Vue
- - Audition ¬ Antécédents familiaux de *Z83.5*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *H58.1**

Trousseau] ¬ Tic douloureux de la face [*G50.0*

Trypanosoma

- Brucei
- - Gambiense ¬ Infection à *B56.0*
- - Rhodesiense ¬ Infection à *B56.1*
- Cruzi ¬ infection à *B57*
- Gambiense ¬ Trypanosomiase à *B56.0*
- Rhodesiense ¬ Trypanosomiase à *B56.1*

Trypanosomiase

- Africain
- - Est répandue ¬ Trypanosomiase SAI, en des lieux où la *B56.9*
- - Sans précision ¬ *B56.9*
- - ¬
- - - *B56*
- - - *B56.9*
- - - Démence au cours de *B56.9†, F02.8**
- Américaine
- - Atteinte cardiaque ¬ *B57.2†, I41.2**
- - SAI ¬ *B57.2*
- - ¬ *B57*
- SAI lieu où
- - Maladie de Chagas est répandue ¬ *B57.2*
- - Trypanosomiase africaine est répandue ¬ *B56.9*
- Trypanosoma
- - Gambiense ¬ *B56.0*
- - Rhodesiense ¬ *B56.1*

Tryptophane ¬

- Anomalies du métabolisme de: *E70.8*
- Carence en: acide nicotinique (*E52*

TSGI GIST

- Côlon ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C18.9*
- Estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C16.9*
- Intestin grêle ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C17.9*

TSGI GIST *–suite*

- Œsophage ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C15.9*
- Péritoine ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C48.2*

TSH ¬

- Hyperthyroïdie familiale par mutation du récepteur de la *E05.8*
- Hypothyroïdie par mutation du récepteur de la *E03.1*

Tsubo
v. Tako-Tsubo

Tsutsugamushi ¬ Typhus à Rickettsia *A75.3*

TT) ¬ Tuberculoïde polaire (*A30.1*

TUBA1 ¬ Lissencéphalie due à une mutation de *Q04.3*

Tubaire ¬

- Avortement *O00.1*
- Grossesse *O00.1*
- Imperméabilité *N97.1*
- Insufflation *Z31.4*
- Occlusion *N97.1*
- Sténose *N97.1*
- Stérilité d'origine *N97.1*

Tube

- Appareil digestif SAI ¬ *C26.9*
- Digestif ¬ Infection fongique du *B49†, K93.8**
- Neural ¬ Anomalie du *Q05.9*
- S) de myringotomie [diabolo] ¬ *Z96.2*

Tubercolare ¬ Méningite *A17.0†, G01**

Tubercule

- Paramolaire ¬ *K00.2*
- Tibial [Osgood-Schlatter] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.5*
- ¬
- - Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Grand *S42.24*
- - Petit *S42.29*

Tuberculeux
v. Type de maladie

Tuberculine ¬ Réaction anormale au test à la *R76.1*

Tuberculoïde

- BT) ¬ Borderline *A30.2*
- Forme tuberculoïde (T)] ¬ Lèpre *A30.1*
- Polaire (TT) ¬ *A30.1*
- T)] ¬ Lèpre tuberculoïde [Forme *A30.1*
- Type intermédiaire atypique ¬ Lèpre *A30.2*

Tuberculome

- Cerveau ¬ *A17.8†, G07**
- Méninges
- - Cérébrales ¬ *A17.1†, G07**
- - Spinales ¬ *A17.1†, G07**
- - ¬ *A17.1†, G07**
- Moelle épinière ¬ *A17.8†, G07**

Tuberculosa

- Ischiophthisis] ¬ Coxitis *A18.0†, M01.15**

Tuberculosa *–suite*

- ¬ Ostitis *A18.0†, M90.09**

Tuberculose

- Aiguë de la trompe de Fallope ¬ *A18.1†, N74.1**
- Annexes ¬ *A18.1†, N74.1**
- Anus ¬ *A18.3†, K93.0**
- Appareil
- - Génito-urinaire ¬ *A18.1*
- - Respiratoire
- - - Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique ¬
- - - - *A15*
- - - - Formes de *A15.8*
- - - SAI ¬ *A16.9*
- - - Sans
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16*
- - - - Mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Autres formes de *A16.8*
- - - - Précision
- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique ¬ *A15.9*
- - - - - Sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.9*
- Appendice ¬ *A18.3†, K93.0**
- Arachnoïde ¬ *A17.0†, G01**
- Artère
- - Cérébrale ¬ *A18.8†, I68.1**
- - ¬ *A18.8†, I79.8**
- Articulaire ¬ TBC [*A18.0†, M01.19**
- Articulation
- - Épaule ¬ *A18.0†, M01.11**
- - Genou ¬ TBC [*A18.0†, M01.16**
- - Hanche ¬ *A18.0†, M01.15**
- - Sacro-iliaque ¬ *A18.0†, M49.08**
- - Sternoclaviculaire ¬ *A18.0†, M01.11**
- Bassin
- - Féminin ¬ *A18.1†, N74.1**
- - ¬ *A18.0†, M90.05**
- BCG] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.2*
- Bouche ¬ *A18.8†, K93.8**
- Bourses séreuses ¬ *A18.0†, M73.89**
- Bovine contagieuse ¬ Bacillose péritonéale par *A18.3†, K93.0**
- Bronche
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.4*
- Cæcum ¬ *A18.3†, K93.0**
- Canal déférent ¬ *A18.1†, N51.8**

Tuberculose *–suite*

- Cartilage
- - Intervertébral ¬ *A18.0†, M49.09**
- - ¬ *A18.0†, M01.19**
- Cérébrale ¬ *A17.8†, G07**
- Cérébrospinale ¬ *A17.8†, G07**
- Cerveau ¬
- - *A17.8†, G07**
- - TBC [*A17.8†, G07**
- Cervelet ¬ *A17.8†, G07**
- Cheville ¬ *A18.0†, M01.17**
- Choroïde ¬ *A18.5†, H32.0**
- Chronique de la trompe de Fallope ¬ *A18.1†, N74.1**
- Cœur ¬ *A18.8†, I43.0**
- Col de l'utérus ¬ *A18.1†, N74.0**
- Côlon sigmoïde ¬ *A18.3†, K93.0**
- Colonne
- - Iliaque supérieure ¬ *A18.0†, M90.05**
- - Vertébral ¬
- - - *A18.0†, M49.09**
- - - TBC [*A18.0†, M49.09**
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.0*
- Congénitale ¬ *P37.0*
- Cordon spermatique ¬ *A18.1†, N51.8**
- Cornée ¬ *A18.5†, H19.2**
- Corps ciliaire ¬ *A18.5†, H22.0**
- Coude ¬ *A18.0†, M01.12**
- Cul-de-sac de Douglas ¬ *A18.1†, N74.1**
- Disque intervertébral ¬ *A18.0†, M49.09**
- Disséminée ¬ *A19*
- Dure-mère
- - Crânienne ¬ *A17.0†, G01**
- - Spinale ¬ *A17.0†, G01**
- Encéphale ¬ *A17.8†, G07**
- Endocarde ¬ *A18.8†, I39.8**
- Endomètre ¬ *A18.1†, N74.1**
- Épididyme ¬ *A18.1†, N51.1**
- Estomac ¬ *A18.8†, K93.8**
- Fascia ¬ *A18.8†, M73.89**
- Foie ¬ *A18.8†, K77.0**
- Ganglion
- - Intrathoracique
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.4*
- - - Sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.3*
- - Lymphatiques péritonéaux ¬ *A18.3†, K93.0**
- Ganglionnaire
- - Hilaire
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.4*

Tuberculose *–suite*
- Ganglionnaire *–suite*
- - Hilaire *–suite*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.3*
- - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.3*
- - Médiastinal
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.4*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.3*
- - Trachéo-bronchique
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.4*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.3*
- - ¬ *A18.0†, M68.09**
- Gastro-intestinale ¬ *A18.3†, K93.0**
- Généralisée ¬ *A19*
- Génito-urinaire ¬ Séquelles de *B90.1*
- Glande
- - Bulbo-urétrales ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Cowper ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Endocrines NCA ¬ *A18.8†, E35.8**
- - Mésentériques ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Parathyroïde ¬ *A18.8†, E35.8**
- - Parotide ¬ *A18.8†, K93.8**
- - Salivaires ¬ *A18.8†, K93.8**
- - Surrénale ¬ *A18.7†, E35.1**
- Glotte
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.4*
- Hanche ¬ TBC [*A18.0†, M01.15**
- Hypophyse ¬ *A18.8†, E35.8**
- Iléo-cæcale hyperplasique ¬ *A18.3†, K93.0**
- Iléon ¬ *A18.3†, K93.0**
- Intestin
- - Péritoine et des ganglions mésentériques ¬ *A18.3*
- - ¬ TBC [*A18.3†, K93.0**
- Iris ¬ *A18.5†, H22.0**
- Ischio-rectale ¬ *A18.3†, K93.0**
- Jéjunum ¬ *A18.3†, K93.0**
- Langue ¬ *A18.8†, K93.8**
- Larynx
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.4*
- - Trachée bronche

Tuberculose *–suite*
- Larynx *–suite*
- - Trachée bronche *–suite*
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.4*
- Latente ¬ *Z22.7*
- Leptoméninges ¬ *A17.0†, G01**
- Lèvres ¬ *A18.8†, K93.8**
- Ligament large ¬ *A18.1†, N74.1**
- Luette ¬ *A18.8†, K93.8**
- Mâchoire ¬ *A18.0†, M90.08**
- Médiastinal
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.8*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.8*
- Médullaire ¬ *A17.8†, G07**
- Méningée (cérébrale) (médullaire) ¬ *A17.0†*
- Méninges ¬ TBC [*A17.0†, G01**
- Mésentérique des ganglions lymphatiques ¬ *A18.3†, K93.0**
- Miliaire
- - Aigu
- - - Localisation unique et précisée ¬ *A19.0*
- - - Sans précision ¬ *A19.2*
- - - Sièges multiples ¬ *A19.1*
- - Sans précision ¬ *A19.9*
- - Viscères NCA ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ Autres *A19.8*
- Moelle épinière ¬ *A17.8†, G07**
- Multirésistante [MDR-TB] ¬ *U82.1!*
- Muscle ¬ *A18.8†, M63.09**
- Myocarde ¬ *A18.8†, I41.0**
- Nasal
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.8*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.8*
- Nerf optique ¬ *A18.5†, H48.8**
- Nerveuse ¬ *A17.8†, G59.8**
- Oculaire ¬ *A18.5*
- Œil ¬ *A18.5*
- Œsophage ¬ *A18.8†, K23.0**
- Orbites ¬ *A18.5*
- Oreille
- - Interne ¬ *A18.6*
- - Moyenne ¬ *A18.6†, H67.0**
- - ¬ *A18.6*
- Organe
- - Digestifs ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Génital
- - - Masculins ¬ *A18.1†, N51.8**
- - - ¬ *A18.1*

Tuberculose *–suite*
- Organe *–suite*
- - Précisés ¬ *A18.8*
- - ¬
- - - *A18*
- - - Séquelles de *B90.8*
- Os
- - Articulation ¬
- - - *A18.0†*
- - - Séquelles de *B90.2*
- - ¬ TBC [*A18.0†, M90.09**
- Ovaire ¬ *A18.1†, N74.1**
- Palais mou ¬ *A18.8†, K93.8**
- Pancréas ¬ *A18.8†, K87.1**
- Paupières ¬ *A18.4†, H03.1**
- Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *A18.4*
- Pénis ¬ *A18.1†, N51.8**
- Péricarde ¬ *A18.8†, I32.0**
- Péritonéale NCA ¬ *A18.3†, K93.0**
- Plèvre
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.6*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.5*
- Poignet ¬ *A18.0†, M01.13**
- Prépuce ¬ *A18.1†, N51.8**
- Prostatique ¬ *A18.1†, N51.0**
- Pulmonaire
- - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.2*
- - Confirmation
- - - Histologique ¬ *A15.2*
- - - Moyen autre et non précisé ¬ *A15.3*
- - Confirmé
- - - Analyse bactériologique ¬ *A15.0*
- - - Culture seulement ¬ *A15.1*
- - - Examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.2*
- - Maladies bactériennes ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: *Z11*
- - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.2*
- - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.2*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.2*
- - Sans

Tuberculose *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Sans *–suite*
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*
- - - Examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique ¬ *A16.1*
- - - Mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.2*
- Rate ¬ *A18.8†, D77**
- Rectum
- - Abcès ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Fistule ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *A18.3†, K93.0**
- Rein ¬ TBC [*A18.1†, N29.1**
- Résistance au médicament de première ligne ¬ *A16.9, U82.0!*
- Rétine ¬ *A18.5†, H32.0**
- Rétropéritonéale (ganglions lymphatiques) ¬ *A18.3*
- Rhinopharyngé
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.8*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.8*
- Sacrée ¬ *A18.0†, M49.08**
- Sacrum ¬ *A18.0†, M49.08**
- SAI ¬
- - *A16.9*
- - Séquelles de *B90.9*
- Sclère ¬ *A18.5†, H19.0**
- Scrotum ¬ *A18.1†, N51.8**
- Sinus
- - Épididyme ¬ *A18.1†, N51.1**
- - Face
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.8*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.8*
- Sous-maxillaire ¬ *A18.8†, K93.8**
- Surrénales ¬ *A18.7†, E35.1**
- Symphyse pubienne ¬ *A18.0†, M01.15**
- Système nerveux
- - Central ¬
- - - *A17.9†, G99.8**
- - - Séquelles de *B90.0*
- - ¬
- - - *A17.9†, G99.8**
- - - *A17†*
- - - Formes de *A17.8†*
- Systémique du tissu conjonctif ¬ *A18.8†, M36.8**
- Testicules ¬ *A18.1†, N51.1**
- Thymus ¬ *A18.8†, E35.8**
- Thyroïde ¬ *A18.8†, E35.0**
- Trachée

Tuberculose *–suite*
- Trachée *–suite*
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.4*
- Trompe d'Eustache ¬ *A18.6†, H75.0**
- Tunique vaginale ¬ *A18.1†, N51.8**
- Uretère ¬ *A18.1†, N29.1**
- Urètre ¬ *A18.1†, N37.0**
- Utérus ¬ *A18.1†, N74.1**
- Uvée ¬ *A18.5†, H22.0**
- Uvule ¬ *A18.8†, K93.8**
- Vagin ¬ *A18.1†, N77.1**
- Vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- Vésicule
- - Biliaire ¬ *A18.8†, K87.0**
- - Séminales ¬ *A18.1†, N51.8**
- Vessie ¬ *A18.1†, N33.0**
- Voies respiratoires et sans précision ¬ Séquelles de *B90.9*
- Vulve ¬ *A18.1†, N77.1**
- ¬
- - Déformation de la colonne vertébrale due à la *A18.0†, M49.09**
- - Encéphalite au cours de *A17.8†, G05.0**
- - Maladie due au VIH avec *B20, A16.9*
- - Mise en observation pour suspicion de *Z03.0*
- - Pneumoconiose associée à la *J65*
- - Polyneuropathie au cours de *A17.8†, G63.0**
- - Séquelles de *B90*
- - Spondylite au cours de *A18.0†, M49.09**
- - Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.1*
- - Ulcère de la vulve au cours de *A18.1†, N77.0**

Tuberculosis
v.a. Pseudotuberculosis
- Résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ Mycobacterium *U82.0!*

Tubéreux
v. Type de maladie

Tubéro-éruptif ¬ Xanthome: *E78.2*

Tubérosité antérieure ¬ *S82.1*

Tubes collecteurs ¬ Carcinome des *C64*

Tubo-ovarien ¬
- Abcès (de): *N70*
- Affection inflammatoire *N70*

Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation ¬ *Z31.0*

Tubo-tympanique
- Chronique ¬ Catarrhe *H65.2*
- ¬
- - Maladie chronique *H66.1*
- - Otite moyenne suppurée chronique *H66.1*

Tubulaire
- Aigu
- - Stade
- - - 1 ¬ Nécrose *N17.01*
- - - 2 ¬ Nécrose *N17.02*
- - - 3 ¬ Nécrose *N17.03*
- - ¬ Nécrose *N17.0*
- Médicaments et des métaux lourds ¬ Atteintes tubulo-interstitielles et *N14*
- Rénal
- - Distale ¬ Acidose *N25.8*
- - Proximale ¬ Acidose *N25.8*
- - Stade
- - - 1 ¬ Nécrose *N17.01*
- - - 2 ¬ Nécrose *N17.02*
- - - 3 ¬ Nécrose *N17.03*
- - Type 2 ¬ Acidose *N25.8*
- - ¬
- - - Dysgénésie *Q63.8*
- - - Nécrose *N17.0*
- SAI ¬
- - Acidose *N25.8*
- - Nécrose *N17.0*
- Stade
- - 1 ¬
- - - Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.01*
- - - Nécrose *N17.01*
- - 2 ¬
- - - Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.02*
- - - Nécrose *N17.02*
- - 3 ¬
- - - Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.03*
- - - Nécrose *N17.03*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Nécrose *O08.4*
- Type I[Syndrome de Lightwood-Albright] ¬ Acidose *N25.8*
- ¬
- - Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.0*
- - Myopathie avec agrégats *G71.2*
- - Syndrome d'encéphalopathie-cardiomyopathie hypertrophique-néphropathie *E88.8*

Tubulinopathie ¬ Dysgyrie associée à une *Q04.3*

Tubulo-interstitiel
- Aiguë ¬ Néphrite *N10*
- Chronique
- - Sans précision ¬ Néphrite *N11.9*
- - ¬ Néphrite
- - - *N11*
- - - *N11.8*
- Cours

Tubulo-interstitiel *–suite*
- Cours *–suite*
- - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ Maladie rénale *N16.4**
- - Brucellose ¬ Maladie rénale *A23.9†, N16.0**
- - Cryoglobulinémie mixte ¬ Maladie rénale *D89.1†, N16.2**
- - Cystinose ¬ Maladie rénale *E72.0†, N16.3**
- - Diphtérie ¬ Maladie rénale *A36.8†, N16.0**
- - Leucémie ¬
- - - Maladie rénale *C95.90†, N16.1**
- - - Trouble *C95.90†, N16.1**
- - Lymphome NCA ¬ Maladie rénale *C85.9†, N16.1**
- - Maladie
- - - Glycogénique ¬ Maladie rénale *E74.0†, N16.3**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Maladie rénale *N16.0**
- - - Métaboliques ¬ Maladie rénale *N16.3**
- - - Sang et des troubles du système immunitaire ¬ Maladie rénale *N16.2**
- - - Tumorales ¬ Maladie rénale *N16.1**
- - - Wilson ¬ Maladie rénale *E83.0†, N16.3**
- - Maladies classées ailleurs ¬ maladie rénal
- - - *N16**
- - - *N16.8**
- - Myélome multiple ¬ Maladie rénale *C90.00†, N16.1**
- - Plasmocytome
- - - Rémission complète ¬ Maladie rénale *C90.01†, N16.1**
- - - ¬ Maladie rénale *C90.00†, N16.1**
- - Sarcoïdose ¬ Maladie rénale *D86.9†, N16.2**
- - Syndrome sec ¬ Maladie rénale *M35.0†, N16.4**
- - Toxoplasmose ¬ Maladie rénale *B58.8†, N16.0**
- Cytomégalovirus ¬ Maladie rénale *B25.88†, N16.0**
- Non précisée comme aiguë ou chronique ¬ Néphrite *N12*
- Précisées ¬ Autres maladies rénales *N15.8*
- Salmonella ¬ Maladie rénale *A02.2†, N16.0**
- Sans précision ¬ Maladie rénale *N15.9*
- Sepsis ¬ Maladie rénale *A41.9†, N16.0**
- Tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds ¬ Atteintes *N14*
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ Maladie rénale *B27.0†, N16.0**
- - Herpès ¬ Maladie rénale *B00.8†, N16.0**
- ¬
- - Lupus érythémateux disséminé avec atteinte rénale *M32.1†, N16.4**
- - Maladies rénales *N15*
- - Syndrome Sjögren
- - - Maladie rénale *M35.0†, N16.4**
- - - Néphrite *M35.0†, N16.4**

Tubulokystique ¬ Carcinome rénal *C64*

Tubulo-mucineux à cellules fusiformes ¬ Carcinome rénal *C64*

Tubulopathie
- Fuite phosphatée ¬ *N25.0*
- Mutation de l'ADN mitochondrial ¬ Cardiomyopathie hypertrophique et *I42.2*
- Proximale-diabète sucré-ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Rénale ¬ Déplétion de l'ADN mitochondrial, forme encéphalomyopathique avec *G31.81†, N16.8**
- Sans précision ¬ Affection due à une *N25.9*
- ¬ affection
- - *N25*
- - *N25.8*

Tué à tout moment ¬ Modification de la personnalité après: captivité prolongée avec risque d'être *F62.0*

Tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de *Y09.9!*

Tularémie
- Abdominale ¬ *A21.3*
- Gastro-intestinale ¬ *A21.3*
- Généralisée ¬ *A21.7*
- Oculo-glandulaire ¬ *A21.1*
- Pulmonaire ¬ *A21.2*
- Sans précision ¬ *A21.9*
- Ulcéro-glandulaire ¬ *A21.0*
- ¬
- - *A21*
- - Conjonctivite due à une *A21.1†, H13.1**
- - Formes de *A21.8*
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.4*
- - Pneumonie au cours de *A21.2†, J17.0**

Tularensis
- Francisella tularensis] ¬ infection à Francisella tularensis subsp. *A21*
- Subsp. tularensis [Francisella tularensis] ¬ infection à Francisella *A21*
- ¬ infection à Francisella tularensis subsp. tularensis [Francisella *A21*

Tuméfaction
- Diffus généralisé
- - Intra-abdominale SAI ¬ *R19.0*
- - Ombilicale ¬ *R19.0*
- - Pelvienne SAI ¬ *R19.0*
- Ganglionnaire ¬ *R59*
- Mammaire, sans précision ¬ *N63*
- Masse
- - Intra-abdominales et pelviennes ¬ *R19.0*
- - Localisé peau tissu cellulaire sous-cutané
- - - Niveau
- - - - Cou ¬ *R22.1*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *R22.4*
- - - - - Supérieur ¬ *R22.3*

Tuméfaction *–suite*
- Masse *–suite*
- - Localisé peau tissu cellulaire sous-cutané *–suite*
- - - Niveau *–suite*
- - - - Tête ¬ *R22.0*
- - - - Tronc ¬ *R22.2*
- - - Sans précision ¬ *R22.9*
- - - Sièges multiples ¬ *R22.7*
- - - ¬ Autres *R22*
- Sterno-mastoïdienne (congénitale) ¬ *Q68.0*

Tumeur
- Alvéolaires primaires ¬ Multiples *C34.9, C97!*
- Anale ¬ *D37.78*
- Appareil respiratoire ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.2*
- Bénin
- - Amygdale ¬ *D10.4*
- - Anus et canal anal ¬ *D12.9*
- - Appareil respiratoire, sans précision ¬ *D14.4*
- - Appendice ¬ *D12.1*
- - Atteinte pluriglandulaire ¬ *D35.8*
- - Bassin, sacrum et coccyx ¬ *D16.8*
- - Bassinet rénal ¬ *D30.1*
- - Bouche et du pharynx ¬ *D10*
- - Bronches et poumon ¬ *D14.3*
- - Cæcum ¬ *D12.0*
- - Canal cranio-pharyngien ¬ *D35.3*
- - Caronculaire de l'œil ¬ *D31.0*
- - Choroïde ¬ *D31.3*
- - Cœur ¬ *D15.1*
- - Col de l'utérus ¬ *D26.0*
- - Côlon
- - - Ascendant ¬ *D12.2*
- - - Descendant ¬ *D12.4*
- - - Rectum, de l'anus et du canal anal ¬ *D12*
- - - Sans précision ¬ *D12.6*
- - - Sigmoïde ¬ *D12.5*
- - - Transverse ¬ *D12.3*
- - Conjonctive ¬ *D31.0*
- - Cornée ¬ *D31.1*
- - Corps
- - - Ciliaire ¬ *D31.4*
- - - Utérus ¬ *D26.1*
- - Corpuscule carotidien ¬ *D35.5*
- - Côtes, sternum et clavicule ¬ *D16.7*
- - Duodénum ¬ *D13.2*
- - Encéphale
- - - Infratentoriel ¬ *D33.1*
- - - Parties du système nerveux central ¬ *D33*
- - - Sans précision ¬ *D33.2*
- - - Supratentoriel ¬ *D33.0*
- - Épididyme ¬ *D29.3*
- - Épiphyse [glande pinéale] ¬ *D35.4*

Tumeur *–suite*
- Bénin *–suite*
- - Estomac ¬ *D13.1*
- - Foie ¬ *D13.4*
- - Follicules pileux ¬ *D23*
- - Ganglions lymphatiques ¬ *D36.0*
- - Glande
- - - Endocrine
- - - - Non précisées ¬ *D35*
- - - - Précisées ¬ *D35.7*
- - - - Sans précision ¬ *D35.9*
- - - Lacrymale et canal lacrymal ¬ *D31.5*
- - - Parotide ¬ *D11.0*
- - - Salivaire principale
- - - - Sans précision ¬ *D11.9*
- - - - ¬ *D11.7*
- - - Sébacées ¬ *D23*
- - - Sudoripares ¬ *D23*
- - Glomus aortique et autres paraganglions ¬ *D35.6*
- - Hypopharynx ¬ *D10.7*
- - Hypophyse ¬ *D35.2*
- - Jonction recto-sigmoïdienne ¬ *D12.7*
- - Kraniofazial ¬ *D16.41*
- - Langue ¬ *D10.1*
- - Larynx ¬ *D14.1*
- - Lèvre ¬ *D10.0*
- - Maxillaire inférieur ¬ *D16.5*
- - Maxillofazial ¬ *D16.42*
- - Médiastin ¬ *D15.2*
- - Méninges
- - - Cérébrales ¬ *D32.0*
- - - Rachidiennes ¬ *D32.1*
- - - Sans précision ¬ *D32.9*
- - - ¬ *D32*
- - Moelle épinière ¬ *D33.4*
- - Nerf
- - - Crâniens ¬ *D33.3*
- - - Périphériques et du système nerveux autonome ¬ *D36.1*
- - Œil
- - - Annexes ¬ *D31*
- - - Sans précision ¬ *D31.9*
- - Œsophage ¬ *D13.0*
- - Omoplate et os longs du membre supérieur ¬ *D16.0*
- - Orbite, sans précision ¬ *D31.6*
- - Oreille moyenne
- - - Appareil respiratoire ¬ *D14*
- - - Fosses nasales et sinus de la face ¬ *D14.0*
- - Organe
- - - Génital
- - - - Femme
- - - - - Non précisés ¬ *D28*
- - - - - Précisés ¬ *D28.7*

Tumeur *–suite*
- Bénin *–suite*
- - Organe *–suite*
- - - Génital *–suite*
- - - - Femme *–suite*
- - - - - Sans précision ¬ *D28.9*
- - - - Homme
- - - - - Sans précision ¬ *D29.9*
- - - - - ¬ *D29.7*
- - - Intrathoracique
- - - - Non précisés ¬ *D15*
- - - - Précisés ¬ *D15.7*
- - - - Sans précision ¬ *D15.9*
- - - Urinaire
- - - - Sans précision ¬ *D30.9*
- - - - ¬ *D30.7*
- - Os
- - - Cartilage articulaire
- - - - Clavicule ¬ *D16.72*
- - - - Côtes ¬ *D16.70*
- - - - Sans précision ¬ *D16.9*
- - - - Sternum ¬ *D16.71*
- - - - ¬ *D16*
- - - Court membre
- - - - Inférieur ¬ *D16.3*
- - - - Supérieur ¬ *D16.1*
- - - Crâne et de la face ¬ *D16.4*
- - - Longs du membre inférieur ¬ *D16.2*
- - Ovaire ¬ *D27*
- - Pancréas
- - - Endocrine ¬ *D13.7*
- - - ¬ *D13.6*
- - Parathyroïde ¬ *D35.1*
- - Partie
- - - Bouche, autres et non précisées ¬ *D10.3*
- - - Intestin grêle, autres et non précisées ¬ *D13.3*
- - - Mal définies de l'appareil digestif ¬ *D13*
- - - Oropharynx ¬ *D10.5*
- - - Précisées du système nerveux central ¬ *D33.7*
- - - Utérus ¬ *D26.7*
- - Peau
- - - Cuir chevelu et du cou ¬ *D23.4*
- - - Lèvre ¬ *D23.0*
- - - Membre
- - - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D23.7*
- - - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D23.6*
- - - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D23.2*
- - - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D23.3*
- - - Paupière, y compris le canthus ¬ *D23.1*
- - - Sans précision ¬ *D23.9*
- - - Tronc ¬ *D23.5*
- - - ¬ Autres *D23*

Tumeur *–suite*
- Bénin *–suite*
- - Péritoine ¬ *D20.1*
- - Pharynx, sans précision ¬ *D10.9*
- - Plancher de la bouche ¬ *D10.2*
- - Prostate ¬ *D29.1*
- - Rachis ¬ *D16.6*
- - Rectum ¬ *D12.8*
- - Rein ¬ *D30.0*
- - Rétine ¬ *D31.2*
- - Rétropéritoine ¬ *D20.0*
- - Rhinopharynx ¬ *D10.6*
- - Scrotum ¬ *D29.4*
- - Sein ¬ *D24*
- - Siège
- - - Mal définis de l'appareil digestif ¬ *D13.9*
- - - Non précisé ¬ *D36.9*
- - - Précisés ¬ *D36.7*
- - Surrénale ¬ *D35.0*
- - Système nerveux central, sans précision ¬ *D33.9*
- - Testicule ¬ *D29.2*
- - Thymus ¬ *D15.0*
- - Thyroïde ¬ *D34*
- - Tissu
- - - Conjonctif tissu mous
- - - - Abdomen ¬ *D21.4*
- - - - Bassin ¬ *D21.5*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D21.2*
- - - - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D21.1*
- - - - Sans précision ¬ *D21.9*
- - - - Tête, de la face et du cou ¬ *D21.0*
- - - - Thorax ¬ *D21.3*
- - - - Tronc, sans précision ¬ *D21.6*
- - - - ¬ Autres *D21*
- - - Mésothélial
- - - - Péritoine ¬ *D19.1*
- - - - Plèvre ¬ *D19.0*
- - - - Sans précision ¬ *D19.9*
- - - - Sièges ¬ *D19.7*
- - - - ¬ *D19*
- - - Mous du rétropéritoine et du péritoine ¬ *D20*
- - Trachée ¬ *D14.2*
- - Trompe
- - - Ligaments de l'utérus ¬ *D28.2*
- - - ¬ *D28.2*
- - Uretère ¬ *D30.2*
- - Urètre ¬ *D30.4*
- - Utérus
- - - Sans précision ¬ *D26.9*
- - - ¬ Autres *D26*
- - Vagin ¬ *D28.1*
- - Verge ¬ *D29.0*

Tumeur *–suite*
- Bénin *–suite*
- - Vessie ¬ *D30.3*
- - Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire ¬ *D13.5*
- - Vulve ¬ *D28.0*
- Brenner maligne ¬ *C56*
- Brodie] ¬ Cystosarcome phyllode [*D48.6*
- Burkitt ¬ Maladie due au VIH avec *B21, C83.7*
- Calcifiée de Malherbe ¬ *D23.9*
- Canal anal ¬ *D37.78*
- Carcinoïde productrice mucus
- - Appendice ¬ *C18.1*
- - Poumons ¬ *C34.9*
- Castleman ¬ *D47.7*
- Cavité buccal organe digestif évolution imprévisible inconnu
- - Organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs ¬ *D37.78*
- - Pancréas ¬ *D37.70*
- - ¬ *D37*
- Cellule
- - G ¬ *D37.70*
- - Îlots pancréatiques ¬ *D37.70*
- - Insulaires ¬ *D13.7*
- Cérébrale syphilitique ¬ *A52.1†, G94.8**
- Col
- - Utérus ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.4*
- - ¬ Soins maternels pour: *O34.4*
- Corps de l'utérus ¬ Soins maternels pour *O34.1*
- Desmoïde ¬ *D48.1*
- Encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D43*
- Épithélial
- - Bénigne des glandes salivaires ¬ *D11.9*
- - Malign glande
- - - Salivaires ¬ *C07*
- - - Sous-mandibulaire ¬ *C08.0*
- - - Sublinguale ¬ *C08.1*
- - Ovaire, à la limite de la malignité ¬ *C56*
- Estomac ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.0*
- Évolution imprévisible inconnu
- - Appareil
- - - Digestif, sans précision ¬ *D37.9*
- - - Respiratoire, sans précision ¬ *D38.6*
- - Appendice ¬ *D37.3*
- - Atteinte pluriglandulaire ¬ *D44.8*
- - Bassinet ¬ *D41.1*
- - Canal cranio-pharyngien ¬ *D44.4*
- - Côlon ¬ *D37.4*
- - Corpuscule carotidien ¬ *D44.6*
- - Encéphale

Tumeur *–suite*
- Évolution imprévisible inconnu *–suite*
- - Encéphale *–suite*
- - - Infratentoriel ¬ *D43.1*
- - - Sans précision ¬ *D43.2*
- - - Supratentoriel ¬ *D43.0*
- - Épiphyse [glande pinéale] ¬ *D44.5*
- - Estomac ¬ *D37.1*
- - Foie, vésicule et voies biliaires ¬ *D37.6*
- - Glande endocrine, sans précision ¬ *D44.9*
- - Glomus aortique et autres paraganglions ¬ *D44.7*
- - Hypophyse ¬ *D44.3*
- - Intestin grêle ¬ *D37.2*
- - Larynx ¬ *D38.0*
- - Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ *D37.0*
- - Médiastin ¬ *D38.3*
- - Méninges
- - - Cérébrales ¬ *D42.0*
- - - Rachidiennes ¬ *D42.1*
- - - Sans précision ¬ *D42.9*
- - Moelle épinière ¬ *D43.4*
- - Nerf
- - - Crâniens ¬ *D43.3*
- - - Périphériques et du système nerveux autonome ¬ *D48.2*
- - Organe
- - - Digestifs ¬ *D37.7*
- - - Génital
- - - - Femme
- - - - - Sans précision ¬ *D39.9*
- - - - - ¬ *D39.7*
- - - - Homme
- - - - - Sans précision ¬ *D40.9*
- - - - - ¬ *D40.7*
- - - Respiratoires ¬ *D38.5*
- - - Urinaire
- - - - Sans précision ¬ *D41.9*
- - - - ¬ *D41.7*
- - Os et cartilage articulaire ¬ *D48.0*
- - Ovaire ¬ *D39.1*
- - Parathyroïde ¬ *D44.2*
- - Parties du système nerveux central ¬ *D43.7*
- - Peau ¬ *D48.5*
- - Péritoine ¬ *D48.4*
- - Placenta ¬ *D39.2*
- - Plèvre ¬ *D38.2*
- - Prostate ¬ *D40.0*
- - Rectum ¬ *D37.5*
- - Rein ¬ *D41.0*
- - Rétropéritoine ¬ *D48.3*
- - Sans précision ¬ *D48.9*
- - Sein ¬ *D48.6*
- - Sièges précisés ¬ *D48.7*
- - Surrénale ¬ *D44.1*

Tumeur *–suite*
- Évolution imprévisible inconnu *–suite*
- - Système nerveux central, sans précision ¬ *D43.9*
- - Testicule ¬ *D40.1*
- - Thymus ¬ *D38.4*
- - Thyroïde ¬ *D44.0*
- - Tissu conjonctif et autres tissus mous ¬ *D48.1*
- - Trachée, bronches et poumon ¬ *D38.1*
- - Uretère ¬ *D41.2*
- - Urètre ¬ *D41.3*
- - Utérus ¬ *D39.0*
- - Vessie ¬ *D41.4*
- Fibreuse solitaire ¬ *D21.9*
- Fœtus
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- - ¬ Dystocie due à: *O66.3*
- Gastro-intestinale neuroendocrine ¬ *C26.9*
- Germinale
- - Dysgerminomateuse maligne de l'ovaire ¬ *C56*
- - Malign
- - - Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- - - Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- - - Mixte ¬ *C80.9*
- - - Non dysgerminomateuse de l'ovaire ¬ *C56*
- - - Vagin ¬ *C52*
- - Non séminomateuse des testicules ¬ *C62.9*
- Glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D44*
- Glioneuronale papillaire ¬ *D43.2*
- Glomus ¬ *D18.00*
- Histiocytaires à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D47.7*
- Histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue ¬ *D47.0*
- Intestin ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.1*
- Intestinale ¬ *D37.78*
- Intracrânienne incertaine ¬ Démence au cours d'une *D43.2†, F02.8**
- Klatskin ¬ *C24.0*
- Lipomateuse bénin
- - Cordon spermatique ¬ *D17.6*
- - Organe
- - - Intra-abdominaux ¬ *D17.5*
- - - Intrathoraciques ¬ *D17.4*
- - Peau tissu sous-cutané
- - - Membres ¬ *D17.2*
- - - Sièges autres et non précisés ¬ *D17.3*
- - - Tête, de la face et du cou ¬ *D17.0*
- - - Tronc ¬ *D17.1*
- - Sans précision ¬ *D17.9*
- - Sièges ¬ *D17.7*
- - ¬ *D17*

Tumeur *–suite*
- Localisations ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.8*
- Malign
- - Abdomen ¬ *C76.2*
- - Affectant à la fois les canaux biliaires intra- et extra-hépatiques ¬ *C24.8*
- - Ampoule de Vater ¬ *C24.1*
- - Amygdale
- - - Linguale ¬ *C02.4*
- - - Sans précision ¬ *C09.9*
- - - ¬ *C09*
- - Angle
- - - Droit du côlon [hepatica] ¬ *C18.3*
- - - Gauche du côlon [splénique] ¬ *C18.5*
- - Anneau de Waldeyer ¬ *C14.2*
- - Annexes de l'utérus, sans précision ¬ *C57.4*
- - Antre pylorique ¬ *C16.3*
- - Anus
- - - Canal anal ¬ *C21*
- - - Sans précision ¬ *C21.0*
- - Appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis ¬ *C39*
- - Appendice ¬ *C18.1*
- - Atteinte pluriglandulaire, sans précision ¬ *C75.8*
- - Base de la langue ¬ *C01*
- - Bassinet ¬ *C65*
- - Bouche
- - - Parties autres et non précisées ¬ *C06*
- - - Sans précision ¬ *C06.9*
- - Bronche
- - - Poumon
- - - - Sans précision ¬ *C34.9*
- - - - ¬ *C34*
- - - Souche ¬ *C34.0*
- - Cæcum ¬ *C18.0*
- - Canal
- - - Anal ¬ *C21.1*
- - - Biliaire extra-hépatique ¬ *C24.0*
- - - Pancréatique ¬ *C25.3*
- - Cardia ¬ *C16.0*
- - Caronculaire de l'œil ¬ *C69.0*
- - Cartilage laryngé ¬ *C32.3*
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Choroïde ¬ *C69.3*
- - Clitoris ¬ *C51.2*
- - Cœur
- - - Médiastin et de la plèvre ¬ *C38*
- - - ¬ *C38.0*
- - Col
- - - Utérus
- - - - Sans précision ¬ *C53.9*
- - - - ¬ *C53*
- - - Vésical ¬ *C67.5*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Côlon
- - - Ascendant ¬ *C18.2*
- - - Descendant ¬ *C18.6*
- - - Sans précision ¬ *C18.9*
- - - Sigmoïde ¬ *C18.7*
- - - Transverse ¬ *C18.4*
- - - ¬ *C18*
- - Commissure des lèvres ¬ *C00.6*
- - Conjonctive ¬ *C69.0*
- - Cordon spermatique ¬ *C63.1*
- - Cornée ¬ *C69.1*
- - Corps
- - - Ciliaire ¬ *C69.4*
- - - Estomac ¬ *C16.2*
- - - Pancréas ¬ *C25.1*
- - - Utérus
- - - - Sans précision ¬ *C54.9*
- - - - ¬ *C54*
- - - Verge ¬ *C60.2*
- - Corpuscule carotidien ¬ *C75.4*
- - Cortex de la surrénale ¬ *C74.0*
- - Côtes, sternum et clavicule ¬ *C41.3*
- - Cryptorchidie ¬ *C62.0*
- - Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision ¬ *C02.3*
- - Diverticule de Meckel ¬ *C17.3*
- - Dôme de la vessie ¬ *C67.1*
- - Duodénum ¬ *C17.0*
- - Encéphale
- - - Sans précision ¬ *C71.9*
- - - Sauf lobes et ventricules ¬ *C71.0*
- - - ¬ *C71*
- - Endocol ¬ *C53.0*
- - Endomètre ¬ *C54.1*
- - Envahissement de la moelle osseuse ¬ *C79.5*
- - Épididyme ¬ *C63.0*
- - Épiphyse [glande pinéale] ¬ *C75.3*
- - Estomac
- - - Sans précision ¬ *C16.9*
- - - ¬ *C16*
- - Etage
- - - Sous-glottique ¬ *C32.2*
- - - Sus-glottique ¬ *C32.1*
- - Exocol ¬ *C53.1*
- - Face
- - - Antérieure de l'épiglotte ¬ *C10.1*
- - - Cutanée de la lèvre ¬ *C44.0*
- - - Dorsale de la langue ¬ *C02.0*
- - - Inférieure de la langue ¬ *C02.2*
- - Fente branchiale ¬ *C10.4*
- - Foie
- - - Sans précision ¬ *C22.9*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Foie *–suite*
- - - Voies biliaires intrahépatiques ¬ *C22*
- - Fond de l'utérus ¬ *C54.3*
- - Fosse
- - - Amygdalienne ¬ *C09.0*
- - - Nasal
- - - - Oreille moyenne ¬ *C30*
- - - - ¬ *C30.0*
- - Fundus ¬ *C16.1*
- - Gaines des nerfs périphériques ¬ *C47.9*
- - Ganglion
- - - Base ¬ *C71.0*
- - - Lymphatique
- - - - Aisselle et du membre supérieur ¬ *C77.3*
- - - - Inguinaux et du membre inférieur ¬ *C77.4*
- - - - Intra-abdominaux ¬ *C77.2*
- - - - Intrapelviens ¬ *C77.5*
- - - - Intrathoraciques ¬ *C77.1*
- - - - Sans précision ¬ *C77.9*
- - - - Secondaire et non précisée ¬ *C77*
- - - - Sièges multiples ¬ *C77.8*
- - - - Tête, de la face et du cou ¬ *C77.0*
- - Gencive
- - - Inférieure ¬ *C03.1*
- - - Sans précision ¬ *C03.9*
- - - Supérieure ¬ *C03.0*
- - - ¬ *C03*
- - Gland ¬ *C60.1*
- - Glande
- - - Endocrine
- - - - Sans précision ¬ *C75.9*
- - - - Structures apparentées ¬ *C75*
- - - Lacrymale et canal lacrymal ¬ *C69.5*
- - - Parotide ¬ *C07*
- - - Salivaire principale
- - - - Non précisées ¬ *C08*
- - - - Sans précision ¬ *C08.9*
- - - Sébacées ¬ *C44*
- - - Sous-mandibulaire ¬ *C08.0*
- - - Sublinguale ¬ *C08.1*
- - - Sudoripares ¬ *C44*
- - - Urétrale ¬ *C68.1*
- - Glomus aortique et autres paraganglions ¬ *C75.5*
- - Glotte ¬ *C32.0*
- - Grand
- - - Courbure de l'estomac, sans précision ¬ *C16.6*
- - - Lèvre ¬ *C51.0*
- - Hypopharynx
- - - Sans précision ¬ *C13.9*
- - - ¬ *C13*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Hypophyse ¬ *C75.1*
- - Iléon ¬ *C17.2*
- - Intestin grêle
- - - Sans précision ¬ *C17.9*
- - - ¬ *C17*
- - Isthme de l'utérus ¬ *C54.0*
- - Jéjunum ¬ *C17.1*
- - Jonction recto-sigmoïdienne ¬ *C19*
- - Kraniofazial ¬ *C41.01*
- - Langue
- - - Parties autres et non précisées ¬ *C02*
- - - Sans précision ¬ *C02.9*
- - Larynx
- - - Sans précision ¬ *C32.9*
- - - ¬ *C32*
- - Lésion localisation contigu
- - - Amygdale ¬ *C09.8*
- - - Appareil digestif ¬ *C26.8*
- - - Bouche, parties autres et non précisées ¬ *C06.8*
- - - Bronches et du poumon ¬ *C34.8*
- - - Cœur, du médiastin et de la plèvre ¬ *C38.8*
- - - Col de l'utérus ¬ *C53.8*
- - - Côlon ¬ *C18.8*
- - - Corps de l'utérus ¬ *C54.8*
- - - Encéphale
- - - - Parties du système nerveux central ¬ *C72.8*
- - - - ¬ *C71.8*
- - - Estomac ¬ *C16.8*
- - - Glandes salivaires principales ¬ *C08.8*
- - - Hypopharynx ¬ *C13.8*
- - - Intestin grêle ¬ *C17.8*
- - - Langue ¬ *C02.8*
- - - Larynx ¬ *C32.8*
- - - Lèvre
- - - - Cavité buccale et du pharynx ¬ *C14.8*
- - - - ¬ *C00.8*
- - - Nerfs périphériques et du système nerveux autonome ¬ *C47.8*
- - - Œil et de ses annexes ¬ *C69.8*
- - - Œsophage ¬ *C15.8*
- - - Organe
- - - - Génital
- - - - - Femme ¬ *C57.8*
- - - - - Homme ¬ *C63.8*
- - - - Respiratoires et intrathoraciques ¬ *C39.8*
- - - - Urinaires ¬ *C68.8*
- - - Oropharynx ¬ *C10.8*
- - - Os cartilage articulaire
- - - - Membres ¬ *C40.8*
- - - - ¬ *C41.8*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Lésion localisation contigu *–suite*
- - - Palais ¬ *C05.8*
- - - Pancréas ¬ *C25.8*
- - - Peau ¬ *C44.8*
- - - Plancher de la bouche ¬ *C04.8*
- - - Rectum, de l'anus et du canal anal ¬ *C21.8*
- - - Rétropéritoine et du péritoine ¬ *C48.8*
- - - Rhinopharynx ¬ *C11.8*
- - - Sein ¬ *C50.8*
- - - Sièges autres et mal définis ¬ *C76.8*
- - - Sinus de la face ¬ *C31.8*
- - - Tissu conjonctif et des autres tissus mous ¬ *C49.8*
- - - Verge ¬ *C60.8*
- - - Vessie ¬ *C67.8*
- - - Voies biliaires ¬ *C24.8*
- - - Vulve ¬ *C51.8*
- - Lèvre
- - - Cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis ¬ *C14*
- - - Inférieur
- - - - Bord libre ¬ *C00.1*
- - - - Face interne ¬ *C00.4*
- - - Sans précision
- - - - Bord libre ¬ *C00.2*
- - - - Face interne ¬ *C00.5*
- - - - ¬ *C00.9*
- - - Supérieur
- - - - Bord libre ¬ *C00.0*
- - - - Face interne ¬ *C00.3*
- - - ¬ *C00*
- - Ligament
- - - Large ¬ *C57.1*
- - - Rond ¬ *C57.2*
- - Lobe
- - - Frontal ¬ *C71.1*
- - - Inférieur, bronches ou poumon ¬ *C34.3*
- - - Moyen, bronches ou poumon ¬ *C34.2*
- - - Occipital ¬ *C71.4*
- - - Pariétal ¬ *C71.3*
- - - Supérieur, bronches ou poumon ¬ *C34.1*
- - - Temporal ¬ *C71.2*
- - Luette ¬ *C05.2*
- - Mamelon et aréole ¬ *C50.0*
- - Mandibule ¬ *C41.1*
- - Mastocytes ¬ *C96.2*
- - Maxillofazial ¬ *C41.02*
- - Médiastin
- - - Antérieur ¬ *C38.1*
- - - Partie non précisée ¬ *C38.3*
- - - Postérieur ¬ *C38.2*
- - Médullosurrénale ¬ *C74.1*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *C76.5*
- - - Supérieur ¬ *C76.4*
- - Méninges
- - - Cérébrales ¬ *C70.0*
- - - Rachidiennes ¬ *C70.1*
- - - Sans précision ¬ *C70.9*
- - - ¬ *C70*
- - Mixte müllérienne de l'ovaire ¬ *C56*
- - Moelle épinière
- - - Nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central ¬ *C72*
- - - ¬ *C72.0*
- - Muqueuse de la joue ¬ *C06.0*
- - Myomètre ¬ *C54.2*
- - Nerf
- - - Auditif [Nerf crânien VIII] ¬ *C72.4*
- - - Crâniens, autres et non précisés ¬ *C72.5*
- - - Olfactif [Nerf crânien I] ¬ *C72.2*
- - - Optique [Nerf crânien II] ¬ *C72.3*
- - - Périphériques
- - - - Abdomen ¬ *C47.4*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *C47.2*
- - - - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *C47.1*
- - - - Pelvis ¬ *C47.5*
- - - - Système
- - - - - Nerveux autonome ¬ *C47*
- - - - - Nerveux autonome, sans précision ¬ *C47.9*
- - - - Tête, de la face et du cou ¬ *C47.0*
- - - - Thorax ¬ *C47.3*
- - - - Tronc, sans précision ¬ *C47.6*
- - Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*
- - Œil
- - - Annexes ¬ *C69*
- - - Sans précision ¬ *C69.9*
- - Œsophage
- - - Abdominal ¬ *C15.2*
- - - Cervical ¬ *C15.0*
- - - Sans précision ¬ *C15.9*
- - - Thoracique ¬ *C15.1*
- - - ¬ *C15*
- - Omoplate et os longs du membre supérieur ¬ *C40.0*
- - Opération prophylactique
- - - Organes ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de *Z40.08*
- - - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de *Z40.01*
- - - Sein ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de *Z40.00*
- - Orbite ¬ *C69.6*
- - Oreille moyenne ¬ *C30.1*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Organe
- - - Digestif
- - - - Sièges autres et mal définis ¬ *C26*
- - - - ¬
- - - - - Antécédents familiaux de *Z80.0*
- - - - - Antécédents personnels de *Z85.0*
- - - Génital
- - - - Femme
- - - - - Non précisés ¬ *C57*
- - - - - Précisés ¬ *C57.7*
- - - - - Sans précision ¬ *C57.9*
- - - - Homme
- - - - - Non précisés ¬ *C63*
- - - - - Précisés ¬ *C63.7*
- - - - - Sans précision ¬ *C63.9*
- - - - ¬
- - - - - Antécédents familiaux de *Z80.4*
- - - - - Antécédents personnels de *Z85.4*
- - - Respiratoire intrathoracique ¬ antécédent
- - - - Familiaux de *Z80.2*
- - - - Personnels de *Z85.2*
- - - Systèmes ¬ Antécédents personnels de *Z85.8*
- - - Urinaire
- - - - Non précisés ¬ *C68*
- - - - Sans précision ¬ *C68.9*
- - Orifice urétéral ¬ *C67.6*
- - Oropharynx
- - - Sans précision ¬ *C10.9*
- - - ¬ *C10*
- - Os
- - - Cartilage articulaire
- - - - Clavicule ¬ *C41.32*
- - - - Côtes ¬ *C41.30*
- - - - Membre
- - - - - Sans précision ¬ *C40.9*
- - - - - ¬ *C40*
- - - - Sans précision ¬ *C41.9*
- - - - Sièges autres et non précisés ¬ *C41*
- - - - Sternum ¬ *C41.31*
- - - Court membre
- - - - Inférieur ¬ *C40.3*
- - - - Supérieur ¬ *C40.1*
- - - Crâne et de la face ¬ *C41.0*
- - - Face ¬ *C41.02*
- - - Longs du membre inférieur ¬ *C40.2*
- - - ¬ Osteodystrophia deformans au cours de *C41.9†, M90.69**
- - Ouraque ¬ *C67.7*
- - Ovaire ¬ *C56*
- - Palais
- - - Sans précision ¬ *C05.9*
- - - ¬ *C05*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Pancréas
- - - Endocrine ¬ *C25.4*
- - - Sans précision ¬ *C25.9*
- - - ¬ *C25*
- - Paramètre ¬ *C57.3*
- - Parathyroïde ¬ *C75.0*
- - Paroi
- - - Antérieur
- - - - Rhinopharynx ¬ *C11.3*
- - - - Vessie ¬ *C67.3*
- - - Latéral
- - - - Oropharynx ¬ *C10.2*
- - - - Rhinopharynx ¬ *C11.2*
- - - - Vessie ¬ *C67.2*
- - - Postérieur
- - - - Hypopharynx ¬ *C13.2*
- - - - Oropharynx ¬ *C10.3*
- - - - Rhinopharynx ¬ *C11.1*
- - - - Vessie ¬ *C67.4*
- - - Supérieure du rhinopharynx ¬ *C11.0*
- - Partie
- - - Centrale du sein ¬ *C50.1*
- - - Pancréas ¬ *C25.7*
- - - Précisées du péritoine ¬ *C48.1*
- - Peau
- - - Cuir chevelu et du cou ¬ *C44.4*
- - - Face, parties autres et non précisées ¬ *C44.3*
- - - Membre
- - - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *C44.7*
- - - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *C44.6*
- - - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *C44.2*
- - - Paupière, y compris le canthus ¬ *C44.1*
- - - Sans précision ¬ *C44.9*
- - - Tronc ¬ *C44.5*
- - - ¬
- - - - *C44*
- - - - Antécédents familiaux de *Z80.8*
- - Pelvienne ¬ *C76.3*
- - Pelvis ¬
- - - *C41.4*
- - - *C76.3*
- - Péritoine, sans précision ¬ *C48.2*
- - Petit
- - - Courbure de l'estomac, sans précision ¬ *C16.5*
- - - Lèvre ¬ *C51.1*
- - Pharynx, sans précision ¬ *C14.0*
- - Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) ¬ *C09.1*
- - Placenta ¬ *C58*
- - Plancher
- - - Antérieur de la bouche ¬ *C04.0*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Plancher *–suite*
- - - Bouche
- - - - Sans précision ¬ *C04.9*
- - - - ¬ *C04*
- - - Latéral de la bouche ¬ *C04.1*
- - Plasmocytes
- - - Localisée SAI ¬ *C90.3*
- - - ¬ Myélome multiple et *C90*
- - Plèvre ¬ *C38.4*
- - Pointe et bords latéraux de la langue ¬ *C02.1*
- - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ¬ Autres *C96.7*
- - Prépuce ¬ *C60.0*
- - Prolongement axillaire du sein ¬ *C50.6*
- - Prostate ¬ *C61*
- - Pylore ¬ *C16.4*
- - Quadrant
- - - Inféro-externe du sein ¬ *C50.5*
- - - Inféro-interne du sein ¬ *C50.3*
- - - Supéro
- - - - Externe du sein ¬ *C50.4*
- - - - Interne du sein ¬ *C50.2*
- - Queue
- - - Cheval ¬ *C72.1*
- - - Pancréas ¬ *C25.2*
- - Rachis ¬ *C41.2*
- - Rate ¬ *C26.1*
- - Rectum ¬ *C20*
- - Région
- - - Rétro-cricoïdienne ¬ *C13.0*
- - - Rétromolaire ¬ *C06.2*
- - Rein, à l'exception du bassinet ¬ *C64*
- - Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé ¬ *C13.1*
- - Rétine ¬ *C69.2*
- - Rétropéritoine
- - - Péritoine ¬ *C48*
- - - ¬ *C48.0*
- - Rhinopharynx
- - - Sans précision ¬ *C11.9*
- - - ¬ *C11*
- - SAI ¬
- - - *C80.9*
- - - Généralisé (secondaire): *C79.9*
- - Sans précision ¬
- - - *C80.9*
- - - Antécédent
- - - - Familial de *Z80.9*
- - - - Personnels de *Z85.9*
- - - Examen de contrôle après traitement pour *Z08.9*
- - Sclérotique ¬ *C69.4*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Scrotum ¬ *C63.2*
- - Secondaire
- - - Cerveau et des méninges cérébrales ¬ *C79.3*
- - - Cœur ¬ Autres *C79.84*
- - - Foie et des voies biliaires intrahépatiques ¬ *C78.7*
- - - Glande surrénale ¬ *C79.7*
- - - Gros intestin et du rectum ¬ *C78.5*
- - - Intestin grêle ¬ *C78.4*
- - - Médiastin ¬ *C78.1*
- - - Organe
- - - - Digestifs, autres et non précisés ¬ *C78.8*
- - - - Génitaux ¬ *C79.82*
- - - - Respiratoire
- - - - - Digestifs ¬ *C78*
- - - - - Non précisés ¬ *C78.3*
- - - Os et de la moelle osseuse ¬ *C79.5*
- - - Ovaire ¬ *C79.6*
- - - Parties du système nerveux, autres et non précisées ¬ *C79.4*
- - - Peau ¬ *C79.2*
- - - Péricarde ¬ *C79.83*
- - - Plèvre ¬
- - - - *C78.2*
- - - - Épanchement pleural au cours d'une *C78.2†, J91**
- - - Poumon ¬ *C78.0*
- - - Rein et du bassinet ¬ *C79.0*
- - - Rétropéritoine et du péritoine ¬ *C78.6*
- - - Sein ¬ *C79.81*
- - - Siège
- - - - Non
- - - - - Précisé ¬ *C79.9*
- - - - - Précisés ¬ *C79*
- - - - Précisés ¬ *C79.8*
- - - Tissu conjonctif tissu mous
- - - - Cou ¬ *C79.85*
- - - - Membres ¬ *C79.86*
- - - - Sièges précisés ¬ *C79.88*
- - - Vessie et des organes urinaires, autres et non précisés ¬ *C79.1*
- - Sein
- - - Sans précision ¬ *C50.9*
- - - ¬
- - - - *C50*
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de *Z80.3*
- - - - - Personnels de *Z85.3*
- - Sertoli-Leydig de l'ovaire ¬ *C56*
- - Siège
- - - Mal défini
- - - - Appareil
- - - - - Digestif ¬ *C26.9*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Siège *–suite*
- - - Mal défini *–suite*
- - - - Appareil *–suite*
- - - - - Respiratoire ¬ *C39.9*
- - - - ¬ *C76.7*
- - - Multiples indépendants (primitifs) ¬ *C97!*
- - - Non précisé ¬ *C80*
- - - Primitif inconnu, ainsi précisée ¬ *C80.0*
- - Sillon glosso-épiglottique ¬ *C10.0*
- - Sinus
- - - Ethmoïdal ¬ *C31.1*
- - - Face
- - - - Sans précision ¬ *C31.9*
- - - - ¬ *C31*
- - - Frontal ¬ *C31.2*
- - - Maxillaire ¬ *C31.0*
- - - Piriforme ¬ *C12*
- - - Sphénoïdal ¬ *C31.3*
- - Surrénale
- - - Sans précision ¬ *C74.9*
- - - ¬ *C74*
- - Système
- - - Nerveux central, sans précision ¬ *C72.9*
- - - Organes ¬ Antécédents familiaux de *Z80.8*
- - Testicule
- - - Descendu ¬ *C62.1*
- - - Sans précision ¬ *C62.9*
- - - ¬ *C62*
- - Tête
- - - Face et cou ¬ *C76.0*
- - - Pancréas ¬ *C25.0*
- - Thorax ¬ *C76.1*
- - Thymus ¬ *C37*
- - Thyroïde ¬ *C73*
- - Tiers
- - - Inférieur de l'œsophage ¬ *C15.5*
- - - Moyen de l'œsophage ¬ *C15.4*
- - - Supérieur de l'œsophage ¬ *C15.3*
- - Tissu
- - - Conjonctif tissu mous
- - - - Abdomen ¬ *C49.4*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *C49.2*
- - - - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *C49.1*
- - - - Pelvis ¬ *C49.5*
- - - - Sans précision ¬ *C49.9*
- - - - Tête, de la face et du cou ¬ *C49.0*
- - - - Thorax ¬ *C49.3*
- - - - Tronc, sans précision ¬ *C49.6*
- - - - ¬ *C49*
- - - Hématopoïétique NCA ¬ Maladie due au VIH avec *B21, C96.9*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Tissu *–suite*
- - - Lymphoïde hématopoïétique apparent
- - - - Non précisées ¬ *C96*
- - - - Sans précision ¬ *C96.9*
- - - - ¬ Antécédents personnels d'autres *Z85.7*
- - Trachée
- - - Bronche poumon ¬ antécédent
- - - - Familiaux de *Z80.1*
- - - - Personnels de *Z85.1*
- - - ¬ *C33*
- - Tractus
- - - Cranio-pharyngien ¬ *C75.2*
- - - Intestinal, partie non précisée ¬ *C26.0*
- - Trigone de la vessie ¬ *C67.0*
- - Trompe
- - - Fallope ¬ *C57.0*
- - - ¬ *C57.0*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Uretère ¬ *C66*
- - Urètre ¬ *C68.0*
- - Utérus, partie non précisée ¬ *C55*
- - Vagin ¬ *C52*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - Verge
- - - Sans précision ¬ *C60.9*
- - - ¬ *C60*
- - Vésicule biliaire ¬ *C23*
- - Vessie
- - - Sans précision ¬ *C67.9*
- - - ¬ *C67*
- - Vestibule de la bouche ¬ *C06.1*
- - Voie
- - - Biliaires, sans précision ¬ *C24.9*
- - - Respiratoires supérieures, partie non précisée ¬ *C39.0*
- - - Urinaire ¬ antécédent
- - - - Familiaux de *Z80.5*
- - - - Personnels de *Z85.5*
- - Voile du palais ¬ *C05.1*
- - Voûte palatine ¬ *C05.0*
- - Vulve
- - - Sans précision ¬ *C51.9*
- - - ¬ *C51*
- - Zone cloacale ¬ *C21.2*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de *Z80*
- - - - Personel
- - - - - *Z85*
- - - - - Chimiothérapie pour *Z92.6*
- - - Examen contrôle
- - - - Chimiothérapie pour *Z08.2*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Examen contrôle *–suite*
- - - - Radiothérapie pour *Z08.1*
- - - - Traitement
- - - - - *Z08.8*
- - - - - Affections autres que les *Z09*
- - - - - Chirurgical d'une *Z08.0*
- - - - - Combinés pour *Z08.7*
- - - Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de *B21*
- - - Maladie due au VIH avec *B21*, *C80.9*
- - - Mise en observation pour suspicion de *Z03.1*
- - - Myopathie au cours d'une *C80.9†*, *M63.89**
- - - Opération prophylactique pour facteur de risque de *Z40.0*
- - - Polyneuropathie au cours d'une *C80.9†*, *G63.1**
- - - Séance de chimiothérapie pour *Z51.1*
- - - Syndrome myasthénique au cours d'une *C80.9†*, *G73.2**
- Mastocytes SAI ¬ *D47.0*
- Méninges à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D42*
- Mucineuse de l'ovaire à faible potentiel de malignité ¬ *C56*
- Myéloïde extramédullaire ¬ *C92.30*
- Myofibroblastique inflammatoire ¬ *D48.9*
- Neuroectodermique primitif
- - Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- - Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- - PNET) du système nerveux central ¬ *C72.9*
- - Système nerveux central ¬ *C72.9*
- Neuroendocrine
- - Côlon ¬ *C18.9*
- - Estomac ¬
- - - *C16.9*
- - - *D13.1*
- - Faible grade du corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- - Iléon ¬
- - - *C17.2*
- - - *D13.3*
- - Incertain
- - - Côlon ¬ *D37.4*
- - - Iléon ¬ *D37.2*
- - - Jéjunum ¬ *D37.2*
- - Jéjunum ¬
- - - *C17.1*
- - - *D13.3*
- - Métastatique ¬ *C80.9*
- - Non fonctionnel pancréas ¬
- - - *C25.9*
- - - *D13.7*
- - Pancréas ¬ *C25.9*

Tumeur *–suite*
- Neuroendocrine *–suite*
- - Poumon ¬ *C34.9*
- - Vésicule biliaire ¬ *C23*
- Neuroépithéliale dysembryoplasique ¬ *D33.2*
- Odontogène kératokystique
- - Mandibule ¬ *D16.5*
- - Maxillaire ¬ *D16.42*
- Oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D38*
- Organe
- - Génital
- - - Femme à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D39*
- - - Homme à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D40*
- - Urinaires à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D41*
- Ovarienne dermoïde avec transformation maligne ¬ *C56*
- Pancréatico-duodénale ¬ *D37.70*
- Pancréatique ¬ *D37.70*
- Papillaire
- - Kystique ¬ *D37.78*
- - Mucineuse de l'ovaire à faible potentiel de malignité ¬ *C56*
- - Région pinéale ¬ *D44.5*
- Parenchyme pinéal à différenciation intermédiaire ¬ *D44.5*
- Phyllode du sein ¬ *D48.6*
- Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue ¬ Autres *D47.7*
- Primaire inconnue) ¬ Anémie tumorale (*D48.9†*, *D63.0**
- Primitif
- - Indéterminée ¬ *C80.0*
- - ¬ *C80.9*
- Prostate ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.5*
- Rare gastro-œsophagienne ¬ *D37.1*
- Rate ¬ *D37.78*
- SAI ¬ *D48.9*
- Sans précision ¬ Examen spécial de dépistage d'une *Z12.9*
- Secondaires malignes d'autres localisations précisées ¬ Autres *C79.88*
- Sein ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.3*
- Sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D48*
- Site d'implantation ¬ *D39.2*
- Stromale gastro-intestinal
- - TSGI GIST
- - - Côlon ¬ *C18.9*
- - - Estomac ¬ *C16.9*
- - - Intestin grêle ¬ *C17.9*
- - - Œsophage ¬ *C15.9*
- - - Péritoine ¬ *C48.2*

Tumeur *–suite*
- Stromale gastro-intestinal *–suite*
- - ¬ *C26.9*
- Testiculaire des cordons sexuels et du stroma ¬ *C62.9*
- Thymique ¬ *D38.4*
- Tissu
- - Lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite néoplasique lors de *C79.3*
- - Lymphoïde hématopoïétique apparent
- - - Évolution imprévisible inconnu
- - - - Sans précision ¬ *D47.9*
- - - - ¬ Autres *D47*
- - - ¬ Antécédents familiaux d'autres *Z80.7*
- Traitement cytostatique d'une néoplasie) ¬ Lyse (spontanée) des *E88.3*
- Tronc cérébral ¬ *D43.1*
- Trophoblastique épithélioïde ¬ *D39.2*
- Vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- Vessie ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.6*
- Vulve ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- Wilms ¬
- - *C64*
- - Syndrome de néphroblastomatose-ascite fœtale-macrosome- *Q87.3*
- ¬
- - Anémie au cours d'une *D48.9†*, *D63.0**
- - Antécédents personnels d'autres *Z86.0*
- - Arthropathie au cours d'une *D48.0†*, *M36.1**
- - Ataxie cérébelleuse au cours de *D48.9†*, *G13.1**
- - Atrophie systémique du système nerveux central au cours de *D48.9†*, *G13.1**
- - Compression des racines nerveuses au cours de *D48.9†*, *G55.0**
- - Dégénérescence cérébrale au cours de *D48.9†*, *G32.8**
- - Dermatomyosite au cours de *D48.9†*, *M36.0**
- - Dermato-polymyosite au cours de *D48.9†*, *M36.0**
- - Encéphalopathie au cours de *D48.9†*, *G13.1**
- - Examen spécial de dépistage des *Z12*
- - Fracture pathologique au cours d'une *D48.0†*, *M90.79**
- - Hydrocéphalie au cours de *D48.9†*, *G94.1**
- - Kyste branchial [siège de la *C10.4*
- - Myélopathie au cours de *D48.9†*, *G99.2**
- - Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de *D48.9†*, *G53.3**
- - Polyneuropathie au cours de *D48.9†*, *G63.1**
- - Syndrome myasthénique au cours de *D48.9†*, *G73.2**
- - Testicule
- - - Ectopique [siège de la *C62.0*

Tumeur *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Testicule *–suite*
- - - Retenu [siège de la *C62.0*

Tumidus ¬ Lupus *L93.2*

Tungose [infestation par puce-chique] ¬ *B88.1*

Tunique
- Albuginée du corps caverneux du pénis ¬ Lésion de la *S39.80*
- Intermédiaire artérielle ¬ Dégénérescence de la *I70.29*
- Vaginal
- - Non filarienne) SAI ¬ Chylocèle de la *N50.8*
- - Testicule et du canal déférent ¬ Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la *N49.1*
- - Vésicule séminal ¬
- - - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la *N50.8*
- - - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la *N50.8*
- - - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la *N50.8*
- - - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la *N50.8*
- - ¬
- - - *C63.7*
- - - *D29.7*
- - - Hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (*N43*
- - - Rétrécissement de: *N50.8*
- - - Syphilis tardive de la *A52.7†, N51.8**
- - - Tuberculose de la *A18.1†, N51.8**

Tunnel
- Aorto-ventriculaire
- - Droit ¬ *Q20.8*
- - Gauche ¬ *Q20.8*
- - ¬ *Q20.8*
- ¬ Sténose subaortique en *Q24.4*

Turcique vide ¬ Déficit hypophysaire associé au syndrome de la selle *E23.0*

Türk-Duane ¬ Syndrome de Stilling- *H50.8*

Turner
v.a. Wilson-Turner
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q96.9*
- ¬
- - Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*
- - Dent hypoplasique de *K00.4*
- - Formes du syndrome de *Q96.8*
- - Syndrome
- - - *Q96*
- - - Parsonage- *G54.5*

Turner-Kieser ¬ Syndrome de *Q87.2*

Turricéphalie ¬ *Q75.0*

TYK2 ¬ Syndrome hyper-IgE autosomique récessif par déficit en *D82.4*

Tylose ¬ Hyperostose vertébrale ankylosante avec *M48.19*

Tympan
- Partie attique ¬ Perforation du *H72.1*
- Post-inflammatoire ¬ perforation du *H72*
- Post-traumatique persistante ¬ perforation du *H72*
- Sans précision ¬
- - Affection du *H73.9*
- - Perforation du *H72.9*
- ¬
- - Affection
- - - *H73*
- - - Précisées du *H73.8*
- - Cholestéatome du *H71*
- - Défaut du *H72.9*
- - Perforation
- - - *H72*
- - - *H72.8*
- - - Centrale du *H72.0*
- - - Marginales du *H72.2*
- - - S
- - - - Multiples du *H72.8*
- - - - Totale du *H72.8*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.37*
- - Rupture traumatique du *S09.2*

Tympanisme thoracique(s) ¬ *R09.8*

Tympanite
- Aiguë ¬ *H73.0*
- Chronique ¬ *H73.1*

Tympanosclérose ¬ *H74.0*

Typhi
- S. paratyphi ¬ infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de Salmonella, sauf S. *A02*
- ¬
- - Infection due à Salmonella *A01.0*
- - Pneumonie à Salmonella *A01.0†, J17.0**
- - Typhus à Rickettsia *A75.2*

Typhique
- Invasive ¬ Salmonellose non *A02.8*
- ¬
- - Ostéomyélite *A01.0†, M90.29**
- - Spondylite *A01.0†, M49.29**

Typhlite tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**

Typhoïde
- Parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la *Z27.0*
- Paratyphoïde
- - DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et *Z27.2*
- - Seule [TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.1*

Typhoïde *–suite*
- Paratyphoïde *–suite*
- - ¬ Fièvres *A01*
- ¬
- - Arthrite au cours de fièvre *A01.0†, M01.39**
- - Endocardite *A01.0†, I39.8**
- - Fièvre *A01.0*
- - Méningite *A01.0†, G01**
- - Myocardite *A01.0†, I41.0**
- - Myosite *A01.0†, M63.09**
- - Pneumonie au cours de fièvre *A01.0†, J17.0**
- - Salmonellose *A01.0*
- - Sujet porteur de *Z22.0*

Typhus
- Abdominale ¬ *A01.0*
- Africain à tiques ¬ *A77.1*
- Broussailles ¬ *A75.3*
- Cérébral ¬ *A75.9†, G94.8**
- Classique ¬ *A75.0*
- Endémique
- - Tabardillo] ¬ Typhus murin [typhus mexicain, *A75.9*
- - ¬ *A75.0*
- Épidémique poux
- - Rickettsia prowazekii ¬ *A75.0*
- - ¬
- - - *A75.0*
- - - Myocardite due au *A75.0†, I41.0**
- Mexicain, typhus endémique, tabardillo] ¬ Typhus murin [*A75.9*
- Murin
- - Puces) ¬ *A75.2*
- - Typhus mexicain, typhus endémique, tabardillo] ¬ *A75.9*
- Récurrent ¬ *A68*
- Résurgent [maladie de Brill] ¬ *A75.1*
- Rickettsia
- - Tsutsugamushi ¬ *A75.3*
- - Typhi ¬ *A75.2*
- SAI ¬ *A75.9*
- Sans précision ¬ *A75.9*
- Tiques
- - SAI ¬ *A77.9*
- - Sibérie ¬ *A77.2*
- ¬
- - *A75*
- - Méningite cérébrospinale due au *A75.9†, G01**
- - Myocardite au cours de *A75.9†, I41.0**
- - Scrub *A75.3*

Tyrosine
- Aminotransférase ¬ Tyrosinémie par déficit en *E70.2*
- Hydroxylase ¬
- - Déficit en *G24.1*

Tyrosine *–suite*
- Hydroxylase ¬ *–suite*
- - Dystonie dopa-sensible par déficit en *G24.1*
- ¬ Anomalies du métabolisme de la *E70.2*

Tyrosinémie
- Déficit
- - 4-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase ¬ *E70.2*
- - Tyrosine aminotransférase ¬ *E70.2*
- Hépato-rénale ¬ *E70.2*
- Oculo-cutanée ¬ *E70.2*
- Transitoire du nouveau-né ¬ *P74.5*
- Type
- - 1 ¬ *E70.2*
- - 2 ¬ *E70.2*
- - 3 ¬ *E70.2*
- ¬ *E70.2*

Tyrosinose ¬ *E70.2*

Tyrosinurie ¬ *E70.2*

Ubiquinone ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique récessive par déficit en *G11.1*

UCP2 ¬

- Hyperinsulinisme par déficit en *E16.1*
- Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en *E16.1*

Uhl ¬ Syndrome de *Q24.8*

UIP [Usual interstitial pneumonia] ¬ *J84.1*

Ulbright-Hodes ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Ulcerans [Ulcère de Buruli] ¬ Infection par Mycobacterium: *A31.1*

Ulcération

- Aphteuse récidivante ¬ *K12.0*
- Artérielle ¬ *I77.8*
- Chroniques de la peau, non classées ailleurs ¬ *L98.4*
- Cornée ¬ Avitaminose A avec xérosis et *E50.3†, H19.8**
- Inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *N77.8**
- Larynx ¬ *J38.7*
- Nez et de la cloison nasale ¬ *J34.0*
- Post-phlébitique des membres inférieurs ¬ *I87.01*
- Traumatique) de la langue ¬ *K14.0*
- Vagin ¬ *N76.5*
- Vulve
- - Cours maladie
- - - Behçet ¬ *M35.2†, N77.8**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *N77.0**
- - ¬ *N76.6*
- Vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ *N77.2**
- ¬
- - Athérosclérose artère distal Type bassin-jambe
- - - *I70.24*
- - - Stade IV selon Fontaine avec *I70.24*
- - Insuffisance veineux
- - - Chronique périphérique
- - - - *I87.21*
- - - - Sans *I87.20*
- - - Membres inférieurs, avec *I87.21*
- - Stade IV de Leriche et Fontaine, avec *I70.24*
- - Syndrome
- - - Post-phlébitique
- - - - *I87.01*
- - - - Sans *I87.00*
- - - Post-thrombotique
- - - - *I87.01*
- - - - Sans *I87.00*

Ulcérative ¬ Gingivite (chronique): *K05.1*

Ulcère

- Amygdalien ¬ *J35.8*
- Anus et du rectum ¬ *K62.6*

Ulcère *–suite*

- Artériel de jambe ¬ *I70.24*
- Bronches ¬ *J98.0*
- Buruli] ¬ Infection par Mycobacterium: ulcerans [*A31.1*
- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- - Déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Chronique cutané SAI ¬ *L98.4*
- Cornée
- - Annulaire ¬ *H16.0*
- - Central ¬ *H16.0*
- - Hypopyon ¬ *H16.0*
- - Marginal ¬ *H16.0*
- - Perforé ¬ *H16.0*
- - SAI ¬ *H16.0*
- - ¬ *H16.0*
- Cornet nasal ¬ *J34.0*
- Cutané SAI ¬ *L98.4*
- Décubitus
- - 1er degré ¬ *L89.0*
- - 2e degré ¬ *L89.1*
- - 3e degré ¬ *L89.2*
- - 4e degré ¬ *L89.3*
- - Zone de pression ¬ *L89*
- Digestif, de siège non précisé ¬ *K27*
- Duodénal
- - Origine médicamenteuse ¬ *K26.9, Y57.9!*
- - ¬
- - - *K26*
- - - Infection à Helicobacter pylori au cours d' *K26.9, B98.0!*
- Duodénum ¬ *K26*
- Escarre pression
- - Abrasion ¬ *L89.1*
- - Perte cutané
- - - Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ *L89.1*
- - - SAI ¬ *L89.1*
- - Phlyctène ¬ *L89.1*
- - Sans indication de degré ¬ *L89.9*
- Estomac
- - Anti-inflammatoires non stéroïdiens ¬ *K25.9, Y57.9!*
- - Origine médicamenteuse ¬ *K25.9, Y57.9!*
- - ¬
- - - *K25*
- - - Infection à Helicobacter pylori au cours d' *K25.9, B98.0!*
- Framboesial initial ¬ *A66.0*
- Gastrique
- - Psychogène ¬ *F54, K25.9*
- - ¬ *K25*

Ulcère *–suite*

- Gastro-duodénal
- - Anti-inflammatoires non stéroïdiens ¬ *K27.9, Y57.9!*
- - Nouveau-né ¬ *P78.8*
- - Origine médicamenteuse ¬ *K27.9, Y57.9!*
- - SAI ¬ *K27*
- Gastro-jéjunal
- - Aigu ¬ *K28.3*
- - ¬ *K28*
- Hémorroïdes
- - Externes ¬ *K64.5*
- - Internes ¬ *K64.8*
- Infectieux de jambe ¬ *L97*
- Inflammation ¬ Varice membre inférieur
- - *I83.2*
- - Sans *I83.9*
- Intestin ¬ *K63.3*
- Intestinal tuberculeux ¬ *A18.3†, K93.0**
- Jambe
- - Insuffisance veineuse ¬ *I87.21*
- - Mixte de type bassin-jambe ¬ *I70.24*
- - Non variqueux ¬ *I87.21*
- - Post-thrombotique ¬ *I83.0*
- Malin para-urétral ¬ *C76.3*
- Membre inférieur, non classé ailleurs ¬ *L97*
- Mooren ¬ *H16.0*
- Muqueuse buccale ¬ *K12.1*
- Œsophage
- - Fongique ¬ *K22.1*
- - Ingestion
- - - Médicaments ¬ *K22.1*
- - - Produits chimiques ¬ *K22.1*
- - Peptique ¬ *K22.1*
- - SAI ¬ *K22.1*
- - ¬ *K22.1*
- Palais ¬ *K12.1*
- Peptique
- - Anti-inflammatoires non stéroïdiens ¬ *K27.9, Y57.9!*
- - Érosion
- - - Anastomotique ¬ *K28*
- - - Gastro-colique ¬ *K28*
- - - Gastro-intestinal(e) ¬ *K28*
- - - Gastro-jéjunal(e) ¬ *K28*
- - - Jéjunal(e) ¬ *K28*
- - - Marginal(e) ¬ *K28*
- - - Stomal(e) ¬ *K28*
- - Origine médicamenteuse ¬ *K27.9, Y57.9!*
- - SAI ¬ *K27*
- Plâtre utilisé à des fins thérapeutiques ¬ *L89*
- Post-pylorique ¬ *K26*
- Primaire de l'intestin grêle ¬ *K63.3*
- Pylorique ¬ *K25*
- Solitaire

Ulcère *–suite*
- Solitaire *–suite*
- - Rectum ¬ Syndrome de l' *K62.6*
- - ¬ *K62.6*
- Sphincter vésical ¬ *N32.8*
- Stercoral ¬ *K62.6*
- Syphilitique
- - Perforé ¬ *A52.7†, L99.8**
- - Tardif ¬ *A52.7†, L99.8**
- Trophique du col de l'utérus ¬ *N86*
- Tropical SAI ¬ *L98.4*
- Tuberculeux
- - Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Cornée ¬ *A18.5†, H19.2**
- - Intestin ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Scrotum ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Vessie ¬ *A18.1†, N33.0**
- Urètre (méat) ¬ *N34.2*
- Vagin dû à un pessaire ¬ *N89.8*
- Variqueux
- - Anus ¬ *K64.8*
- - Externe de l'anus ¬ *K64.5*
- - Interne de l'anus ¬ *K64.8*
- - Membres inférieurs, toute localisation) ¬ *I83.0*
- - Septum nasal ¬ *I86.88*
- Vasculaire mixte de type épaule-bras ¬ *I70.26*
- Veineux de la jambe sans varices ¬ *I87.21*
- Verge ¬ *N48.5*
- Vésical ¬ *N32.8*
- Vulve
- - Cours de tuberculose ¬ *A18.1†, N77.0**
- - Virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N77.0**

Ulcéré
- Aigus de l'estomac et du duodénum ¬ *K27.3*
- Membres inférieurs ¬ Varices *I83.0*
- Pianiques ¬ Gommes et *A66.4*
- ¬ Pian tardif nodulaire (*A66.4*

Ulcéreuse
- Chronique
- - Subtotale ¬ Colite *K51.0*
- - ¬
- - - Pancolite *K51.0*
- - - Rectite *K51.2*
- - - Recto-sigmoïdite *K51.3*
- Multifocale cryptogénétique ¬ Entérite sténosante *K63.3*
- Profonde du membre inférieur ¬ Phlébite *I80.28*
- Spécifique ¬ Balano-posthite *A63.8†, N51.2**
- ¬
- - Amygdalite (aiguë): *J03.9*
- - Colite tuberculeuse *A18.3†, K93.0**
- - CU [colite *K51.9*
- - Endocardite (aiguë) (subaiguë): *I33.0*

Ulcéreuse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Laryngite (aiguë): *J04.0*
- - Mucosite orale (*K12.3*
- - Œsophagite *K22.1*
- - Pharyngite (aiguë): *J02.9*
- - Pulpite chronique (hyperplasique) (*K04.0*
- - Recto-colite hémorragique [colite *K51*
- - Rhinite (chronique): *J31.0*
- - Stomatite: *K12.1*

Ulcéro-glandulaire ¬ Tularémie *A21.0*

Ulcéro-nécrotique
- Aigu ¬
- - Gingivite *A69.1*
- - Gingivo-stomatite *A69.1*
- - GUNA [gingivite *A69.1*
- ¬ Stomatite *A69.0*

Ulcus dendriticum de la cornée à herpès simplex ¬ *B00.5†, H19.1**

Ulérythème ophryogène ¬ *L66.4*

Ullrich
v.a. Morquio-Ullrich-Brailsford
- ¬ Dystrophie musculaire congénitale d' *G71.2*

Ulmer
v. Bindewald-Ulmer-Müller

Ulna ¬ Fracture de l'épiphyse proximale de l' *S52.00*

Ulnaire ¬ Hémimélie *Q71.5*

Ultérieur
- Non classés ailleurs ¬ Soins préparatoires pour traitement *Z51.4*
- Sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication *Y84.9!*

UMNL] ¬ Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [*G95.80*

Uncinariose ¬ *B76*

Unguéal congénital(e) ¬ Hippocratisme *Q84.6*

Unguis incarnatus ¬ *L60.0*

Unguium ¬ Trichophytosis *B35.1*

Unicervical ¬ Utérus bicorne *Q51.3*

Unicorne ¬ Utérus *Q51.4*

Unifocale
- Cellules de Langerhans ¬ Histiocytose *C96.6*
- ¬ Histiocytose X *C96.6*

Unilatéral
v. Type de maladie

Uninodulaire
- Non toxique ¬ Goitre *E04.1*
- Toxique ¬ Thyréotoxicose avec goitre *E05.1*

Uniparentale
- Maternel chromosome
- - 2 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 6 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 16 ¬ Disomie *Q99.8*

Uniparentale *–suite*
- Origine paternelle du chromosome 11 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une disomie *Q87.3*
- Paternelle du chromosome 6 ¬ Disomie *Q99.8*

Unipolaire SAI ¬ Dépression *F33.9*

Unique
- Césarienne ¬ Accouchement *O82*
- Enfant
- - Mort-né ¬ Naissance *Z37.1!*
- - Vivant ¬ Naissance *Z37.0!*
- Forceps et ventouse ¬ Accouchement *O81*
- Lieu de naissance non précisé ¬ Enfant *Z38.2*
- Né
- - Hôpital ¬ Enfant *Z38.0*
- - Hors d'un hôpital ¬ Enfant *Z38.1*
- Précis ¬
- - Nécessité vaccination contre maladie
- - - Infectieuses *Z26.8*
- - - Virales *Z25.8*
- - Tuberculose miliaire aiguë, localisation *A19.0*
- SAI ¬ Naissance: *Z37.9!*
- Spontané ¬ Accouchement *O80*
- ¬
- - Artère ombilicale *Q27.0*
- - Cœur univentriculaire à valve auriculoventriculaire *Q20.4*
- - Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique *O69.2*
- - Kyste rein congénital
- - - *Q61.0*
- - Naissance spontanée par voie vaginale d'un enfant *O80*
- - Nécessité vaccination contre
- - - Certaines maladies virales *Z24*
- - - Maladie
- - - - Bactériennes *Z23.8*
- - - - Infectieuses *Z26*
- - - - Virales *Z25*
- - Ventricule: *Q20.4*

Unisystémique ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et *C96.5*

Univentriculaire
- Valve auriculoventriculaire unique ¬ Cœur *Q20.4*
- ¬ Cœur *Q20.4*

Universalis ¬ Leukopathia *E70.3*

Universel ¬
- Dyschromatose héréditaire *L81.8*
- Mésentère *Q43.3*

Unna ¬ Hypotrichose type Marie *Q84.0*

Unverricht-Lundborg ¬ Maladie de *G40.3*

Urate ¬ Néphropathie d' *M10.99†, N29.8**

Urbach
v. Oppenheim-Urbach

Urbach-Wiethe ¬ Maladie de *E78.8*

Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Mycoplasma et *B96.0!*

Uréidopropionase
v. bêta-uréidopropionase

Urémie
- Chronique, sans précision ¬ *N18.9*
- Extrarénale ¬ *R39.2*
- Nouveau-né ¬ *P96.0*
- Prérénale ¬ *R39.2*
- SAI ¬ *N19*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- ¬ Polyneuropathie au cours d' *N18.89†, G63.8**

Urémique
- Atypique ¬ Syndrome hémolytique et *D58.8*
- Diarrhée ¬ Syndrome hémolytique et *D59.3*
- ¬
- - Apoplexie *N18.89†, I68.8**
- - Démence *N18.89†, F02.8**
- - Encéphalopathie *N18.89†, G94.3**
- - Glomérulonéphrite au cours de syndrome hémolytique *D59.3†, N08.2**
- - Maladie glomérulaire au cours de syndrome hémolytique *D59.3†, N08.2**
- - Neuropathie *N18.89†, G63.8**
- - Paralysie *N18.89†, G99.8**
- - Péricardite *N18.89†, I32.8**
- - Syndrome hémolytique *D59.3*

Uréogenèse ¬ Anomalies du cycle de l' *E72.2*

Urétéral
v.a. pelvi-urétérale
- Cicatrice ¬ Reflux vésico- *N13.7*
- Non classée ailleurs ¬ Hydronéphrose avec rétrécissement *N13.1*
- SAI ¬ Reflux vésico- *N13.7*
- Sans hydronéphrose ¬ Coudure et rétrécissement *N13.5*
- Tuberculeux ¬ Rétrécissement *A18.1†, N29.1**
- ¬
- - Calcul *N20.1*
- - Déplacement de l'uretère ou de l'orifice *Q62.6*
- - Déviation de l'uretère ou de l'orifice *Q62.6*
- - Ectopie de l'uretère ou de l'orifice *Q62.6*
- - Fistule: utéro- *N82.1*
- - Hydronéphrose obstruction
- - - Calculeuse rénale et *N13.2*
- - - Jonction pyélo- *N13.0*
- - Implantation anormale de l'uretère ou de l'orifice *Q62.6*
- - Occlusion congénital
- - - Jonction pyélo- *Q62.1*
- - - Orifice vésico- *Q62.1*
- - Orifice de la vessie: *D30.3*
- - Pyélonéphrite chronique associé

Urétéral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pyélonéphrite chronique associé *–suite*
- - - Anomalie de jonction pyélo- *N11.1*
- - - Coudure de jonction pyélo- *N11.1*
- - - Obstruction de jonction pyélo- *N11.1*
- - - Reflux (vésico- *N11.0*
- - - Rétrécissement de jonction pyélo- *N11.1*
- - Tumeur maligne: Orifice *C67.6*
- - Uropathie associée à un reflux vésico- *N13.7*

Uretère
v. mégavessie-méga-uretère
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du rein et de l' *N29.8**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Autres affections du rein et de l' *N29.1**
- Double ¬ *Q62.5*
- Non classées ailleurs ¬ Autres affections du rein et de l' *N28*
- Orifice urétéral ¬
- - Déplacement de l' *Q62.6*
- - Déviation de l' *Q62.6*
- - Ectopie de l' *Q62.6*
- - Implantation anormale de l' *Q62.6*
- SAI ¬ Anomalie de l' *Q62.8*
- Sans précision ¬ Affection du rein et de l' *N28.9*
- Surnuméraire ¬ *Q62.5*
- ¬
- - Absence d' *Q62.4*
- - Affections précisées du rein et de l' *N28.88*
- - Agénésie de l' *Q62.4*
- - Anomalie
- - - Congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l' *Q62*
- - - Obstructives du bassinet et de l' *Q62.3*
- - Antécédents familiaux de maladies rénales et de l' *Z84.1*
- - Atrésie et sténose de l' *Q62.1*
- - Calcul
- - - *N20.1*
- - - Rein
- - - - *N20*
- - - - Calcul de l' *N20.2*
- - Défaut de remplissage de: *R93.4*
- - Dilatation congénitale de l' *Q62.2*
- - Duplication de l' *Q62.5*
- - Gomme de l' *A52.7†, N29.1**
- - Hydro- *N13.4*
- - Imperméabilité de l' *Q62.1*
- - Lésion traumatique de l' *S37.1*
- - Malformations congénitales de l' *Q62.8*
- - Malposition de l' *Q62.6*
- - Occlusion congénitale de: *Q62.1*

Uretère *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie de *N11.1*
- - - Coudure de *N11.1*
- - - Obstruction de *N11.1*
- - - Rétrécissement de *N11.1*
- - Sténose congénitale de l'orifice de l' *Q62.1*
- - Tuberculose de l' *A18.1†, N29.1**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D30.2*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.2*
- - - Maligne de l' *C66*

Urétérite
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N29.1**
- Kystique ¬
- - *N28.88*
- - Pyélo- *N28.88*

Urétéro
- Rénal congénital ¬ Reflux vésico- *Q62.7*
- Vaginale ¬ Fistule: *N82.1*

Urétérocèle congénitale ¬ *Q62.3*

Urétérostomie ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Urethritica [syndrome de Reiter] ¬ Arthritis *M02.39*

Urethritis candidomycetica ¬ *B37.4†, N37.0**

Urétral
v.a. recto-urétral
- Actes médicaux ¬ Rétrécissement *N99.1*
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement de: orifice vésico- *Q64.3*
- Cours de la grossesse ¬ Infections *O23.2*
- Femme ¬ Prolapsus de muqueuse *N81.0*
- Glande urétrale) ¬ Abcès (de): *N34.0*
- Interne ¬ Orifice *C67.5*
- Postérieures congénitales ¬ Valvules *Q64.2*
- Post-infectieux, non classé ailleurs ¬ Rétrécissement *N35.1*
- Post-traumatique ¬ Rétrécissement *N35.0*
- Sans précision ¬
- - Rétrécissement *N35.9*
- - Syndrome *N34.3*
- Sondage ¬ Rétrécissement *N99.1*
- ¬
- - Abcès
- - - *N34.0*
- - - Urétral (glande *N34.0*
- - Caroncule *N36.2*
- - Diverticule *N36.1*
- - Écoulement *R36*
- - Fausse voie *N36.0*
- - Fistule *N36.0*
- - Méatite *N34.2*
- - Orifice de la vessie: *D30.3*

Urétral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Prolapsus de la muqueuse *N36.3*
- - Rétrécissement
- - - *N35*
- - - *N35.8*
- - Sténose de l'ostium *N35.9*
- - Tumeur maligne: Glande *C68.1*
- - Urétrite et syndrome *N34*

Urètre
- Antérieur ¬ Valve de l' *Q64.7*
- Col de la vessie ¬ Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l' *Q64.3*
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement de: *Q64.3*
- Cours
- - Cytomégalie ¬ Maladie de l' *B25.88†, N29.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de l' *N37.8**
- Double ¬ *Q64.7*
- Femme ¬ Prolapsus de l' *N81.0*
- Homme ¬ Prolapsus de l' *N36.3*
- Méat) ¬ Ulcère de l' *N34.2*
- Partie
- - Membraneuse ¬ Lésion traumatique de l' *S37.31*
- - Prostatique ¬ Lésion traumatique de l' *S37.33*
- - Spongieuse ¬ Lésion traumatique de l' *S37.32*
- - ¬ Lésion traumatique de l' *S37.38*
- SAI ¬ Malformation congénitale de la vessie ou de l' *Q64.7*
- Sans précision ¬
- - Affection de l' *N36.9*
- - Lésion traumatique de l' *S37.30*
- Séquelle
- - Accouchement ¬ Rétrécissement de l' *N35.0*
- - Traumatisme ¬ Rétrécissement de l' *N35.0*
- Surnuméraire ¬ *Q64.7*
- Trichomonas ¬ Infection de l' *A59.0†, N37.0**
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ Maladie de l' *B27.0†, N29.1**
- - Herpès ¬ Maladie de l' *B00.8†, N29.1**
- ¬
- - Absence congénitale de la vessie et de l' *Q64.5*
- - Affection
- - - *N36*
- - - Précisées de l' *N36.8*
- - Blessure ouverte de l' *S37.1, S31.83!*
- - Calcul de l' *N21.1*
- - Corps étranger dans l' *T19.0*
- - Déchirure périurétrale avec atteinte de l' *O71.5*
- - Fistule tuberculeuse de l' *A18.1†, N37.8**
- - Imperméabilité de l' *Q64.3*

Urètre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion
- - - Obstétricale de: *O71.5*
- - - Traumatique de l' *S37.3*
- - Malformations congénitales de la vessie et de l' *Q64.7*
- - Mycose de l' *B49†, N37.0**
- - Prolapsus
- - - *N36.3*
- - - Congénital de: *Q64.7*
- - Rétrécissement syphilitique de l' *A52.7†, N37.8**
- - Syphilis
- - - *A52.7†, N37.0**
- - - Tardive de l' *A52.7†, N37.0**
- - Trichomonase de l' *A59.0†, N37.0**
- - Tuberculose de l' *A18.1†, N37.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D30.4*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.3*
- - - Maligne: *C68.0*
- - Valve postérieure de l' *Q64.2*

Urétrite
- Candida ¬ *B37.4†, N37.0**
- Candidose ¬ *B37.4†, N37.0**
- Chlamydia ¬ *A56.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *N37.0**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, N37.0**
- Gonococcique SAI ¬ *A54.0*
- Non
- - Gonococcique ¬ *N34.1*
- - Spécifique ¬ *N34.1*
- - Vénérienne ¬ *N34.1*
- Post-ménopausique ¬ *N34.2*
- SAI ¬ *N34.2*
- Syndrome urétral ¬ *N34*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N37.0**
- Vénérienne NCA ¬ *A64†, N37.0**
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ *B27.0†, N37.0**
- - Herpès ¬ *B00.8†, N37.0**
- ¬
- - *N34.2*
- - Cystite et *N21*

Urétro
v.a. oculo-urétro-synovial
- Périnéale ¬ Fistule: *N36.0*
- Rectale ¬ Fistule: *N36.0*
- Scrotale ¬ Fistule *N50.8*
- Trigonite ¬ *N30.3*
- Vaginale ¬ Fistule: *N82.1*

Urétrocèle
- Congénitale ¬ *Q64.7*
- Femme ¬ *N81.0*

Urétrocèle *–suite*
- Homme ¬ *N36.3*
- ¬ Cystocèle avec *N81.1*

Urétrorrhée ¬ *R36*

Urétrostomie ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Urgence
- HU High Urgency ¬ Inscription
- - Effectué transplantation
- - - Organe
- - - - Niveau d' *Z75.7*
- - - - Sans niveau d' *Z75.6*
- - - Pulmonaire: Avec niveau d' *U55.22*
- - Transplantation
- - - Cardiaque : Avec niveau d' *U55.12*
- - - Cœur-poumons : Avec niveau d' *U55.32*
- U Urgency
- - HU High Urgency ¬ Inscription
- - - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d' *U55.20*
- - - Transplantation
- - - - Cardiaque : Sans niveau d' *U55.10*
- - - - Cœur-poumons: Sans niveau d' *U55.30*
- - ¬ Inscription
- - - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d' *U55.21*
- - - Transplantation
- - - - Cardiaque : Avec niveau d' *U55.11*
- - - - Cœur-poumons : Avec niveau d' *U55.31*

Urgency
- HU High Urgency ¬ Inscription
- - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [*U55.20*
- - Transplantation
- - - Cardiaque : Sans niveau d'urgence U [*U55.10*
- - - Cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [*U55.30*
- ¬
- - *N31.82*
- - Inscription
- - - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [*U55.21*
- - - Transplantation
- - - - Cardiaque : Avec niveau d'urgence U [*U55.11*
- - - - Cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [*U55.31*

Uricostatiques ¬ *T50.4*

Uricosuriques ¬ *T50.4*

Uridine
- Diphosphate-galactose-4-épimérase ¬ Déficit en *E74.2*
- Monophosphate synthase ¬ Déficit en *E79.8*

Uridine-diphosphate glucuronosyltransférase
- Type
- - 1 ¬ Déficit en bilirubine *E80.5*
- - 2 ¬ Déficit en bilirubine *E80.5*
- ¬ Déficit en bilirubine *E80.5*

Uridyltransférase ¬ Déficit en galactose-1-phosphate *E74.2*

Urinaire
- Accouchement ¬ Infection des voies *O86.2*
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement de: méat *Q64.3*
- Cours
- - Bilharziose ¬ Calcul *B65.0†, N22.0**
- - Grossesse ¬ infection
- - - Non précisée de l'appareil *O23.4*
- - - Parties de l'appareil *O23.3*
- - Maladies classées ailleurs ¬ Calcul des voies *N22.8**
- - Schistosomiase ¬ Calcul *B65.0†, N22.0**
- Demeure) ¬ Complication mécanique d'une sonde *T83.0*
- Double ¬ Méat *Q64.7*
- Effort [incontinence de stress] ¬ Incontinence *N39.3*
- Élevé
- - 17-cétostéroïdes ¬ Taux *R82.5*
- - Acide indol-acétique ¬ Taux *R82.5*
- - Catécholamines ¬ Taux *R82.5*
- - Stéroïdes ¬ Taux *R82.5*
- Entérocoques ¬ Infection des voies *N39.0, B95.2!*
- Escherichia coli ¬ Infection des voies *N39.0, B96.2!*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes *D41*
- Extraurétrale ¬ Incontinence *N39.43*
- Génital ¬
- - Abcès tuberculeux des organes *A18.1*
- - Infection à Chlamydia des organes *A56.2†, N29.1**
- Inférieur
- - Sans précision ¬ Calcul des voies *N21.9*
- - ¬ Autres calculs des voies *N21.8*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies *P00.1*
- Non précis ¬
- - Carcinoma in situ: Organes *D09.1*
- - Lésion traumatique d'un organe pelvien ou *S37.9*
- - Symptômes et signes relatifs à l'appareil *R39.8*
- - Tumeur malign
- - - Organes *C68*
- - - Secondaire de la vessie et des organes *C79.1*
- Origine non organique ¬ Incontinence *F98.0*
- Postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ¬ Rétention *T83.8*

Urinaire *–suite*
- Précis ¬
- - Formes d'incontinence *N39.4*
- - Incontinence *N39.48*
- Pseudomonas ¬ Infection des voies *N39.0, B96.5!*
- SAI ¬
- - Appareil
- - - *C68.9*
- - - *D30.9*
- - Congénital
- - - Anomalie de l'appareil *Q64.9*
- - - Déformation de l'appareil *Q64.9*
- - Fistule: *N36.0*
- - Obstruction *N13.9*
- Sans précision ¬
- - Affection de l'appareil *N39.9*
- - Calcul *N20.9*
- - Incontinence *R32*
- - Malformation congénitale de l'appareil *Q64.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Organe *D30.9*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe *D41.9*
- - - Maligne: Organe *C68.9*
- Siège non précisé ¬ Infection des voies *N39.0*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Infection des voies *O08.8*
- ¬
- - Absence acquise d'autres organes des voies *Z90.6*
- - Affection
- - - Appareil *N39*
- - - Précis
- - - - Appareil *N39.8*
- - - - Système *N39.88*
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne des voies *Z80.5*
- - - Personnels de tumeur maligne des voies *Z85.5*
- - Complication mécanique
- - - Greffe d'organe *T83.2*
- - - Prothèses et implants *T83.1*
- - Fistule congénitale utéro-digestive et utéro- *Q51.7*
- - Infection
- - - Néonatale des voies *P39.3*
- - - Réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil *T83.5*
- - - Tuberculeuse des organes *A18.1*
- - Lésion traumatique
- - - Multiples organes pelviens et *S37.7*
- - - Organes pelviens et *S37.8*
- - Malformation congénital

Urinaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Malformation congénital *–suite*
- - - Appareil *Q64*
- - - Précisées de l'appareil *Q64.8*
- - Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil *N99.5*
- - Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.6*
- - Présence d'une autre stomie de l'appareil *Z93.6*
- - Prolapsus congénital de: méat *Q64.7*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil *R93.4*
- - Schistosomiase
- - - *B65.0*
- - - Schistosoma haematobium [schistosomiase *B65.0*
- - Snail fever [Bilharziose *B65*
- - Surveillance d'autres stomies des voies *Z43.6*
- - Symptômes et signes relatifs à l'appareil *R39*
- - Syphilis tardive de la vessie *A52.7†, N33.8**
- - Troubles du jet *R39.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Autres organes *D30.7*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D41.7*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes *C68.8*

Urine
- Non précisés ¬ Résultats anormaux de l'examen des *R82.9*
- Odeur de sirop d'érable ¬ Maladie des *E71.0*
- Substances d'origine principalement non médicinale ¬ Taux anormal dans les *R82.6*
- Taux de médicaments et de substances biologiques ¬ Augmentation dans les *R82.5*
- ¬
- - Cellules et cylindres dans les *R82.9*
- - Extravasation d' *R39.0*
- - Péritonite (due à): *K65.8*
- - Résultat anormal examen
- - - *R82*
- - - Cytologique et histologique des *R82.8*
- - - Microbiologique des *R82.7*
- - Rétention d' *R33*
- - Taux anormal de métaux lourds dans les *R82.6*

Urique ¬
- Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide *T50.4*
- Néphrolithiase avec calcul d'acide *M10.09†, N22.8**

Urocanase ¬ Encéphalopathie par déficit en *E70.8*

Uro-génital
- Mycoplasmes ¬ Infection *N39.0, B96.0!*

Uro-génital *–suite*

- Tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur l'appareil *I97.87*
- ¬
- - Candidose d'autres localisations *B37.4*
- - Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil *F45.34*
- - Présence d'implants *Z96.0*
- - Trichomonase *A59.0*

Uro-génitointestinale ¬ Syndrome d'aphalangie-hémivertèbre-dysgénésie *Q87.8*

Uropathie

- Associée à un reflux vésico-urétéral ¬ *N13.7*
- Obstructif
- - Infection ¬ *N13.6*
- - Reflux
- - - Sans précision ¬ *N13.9*
- - - ¬
- - - - *N13*
- - - - *N13.8*
- ¬ Syndrome de cataracte-déficience intellectuelle-atrésie anale- *Q87.8*

Urorectal ¬ Succession de malformations du septum *Q87.8*

Urticaire

- Allergique ¬ *L50.0*
- Cholinergique ¬ *L50.5*
- Chronique ¬ *L50.8*
- Contact ¬ *L50.6*
- Géante ¬ *T78.3*
- Idiopathique ¬ *L50.1*
- Nouveau-né ¬ *P83.8*
- Œdème angioneurotique héréditaire ¬ *D84.1*
- Papuleuse ¬ *L28.2*
- Pigmentée ¬ *Q82.2*
- Provoqué
- - Froid et la chaleur ¬ *L50.2*
- - Vibration ¬ *L50.4*
- Psychogène ¬ *F54, L50.9*
- Récidivante périodique ¬ *L50.8*
- Sans précision ¬ *L50.9*
- Sérique ¬ *T80.6*
- Solaire ¬ *L56.3*
- Vibratoire ¬ *L50.4*
- ¬
- - *L50*
- - Formes d' *L50.8*

Urticarien

- Hypocomplémentémique ¬ Vascularite *M31.8*
- ¬ Dermographisme *L50.3*

Usher ¬ Syndrome

- *Q87.8*
- Senear- *L10.4*

Usual interstitial pneumonia] ¬ UIP [*J84.1*

Usuelle ¬ Pneumonie interstitielle *J84.1*

Usure

- Occlusale des dents ¬ *K03.0*
- Proximale des dents ¬ *K03.0*

Utérin

- 1er ou 2e degré ¬ Prolapsus (de): Prolapsus *N81.2*
- 3e et 4e degré ¬ Prolapsus *N81.3*
- Dilatation du col ¬ Anomalies de la contraction *O62*
- Hypertoniques, non coordonnées et prolongées ¬ Contractions *O62.4*
- Intervention chirurgicale antérieure ¬ Soins maternels pour cicatrice *O34.2*
- Ménopausique anormal ¬ Saignement *N95.0*
- Non précisé ¬ Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico- *O34.39*
- Pendant la phase de latence ¬ Inertie *O62.0*
- Post-partum ¬ Hypotonie *O72.1*
- Primitive ¬ Hypotonie *O62.0*
- Rectum de remplacement ¬ Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto- *N82.80*
- SAI ¬
- - Hémorragie (du): post-partum (atonie *O72.1*
- - Hypotonie *O62.2*
- - Inertie *O62.2*
- - Prolapsus *N81.4*
- Secondaire ¬
- - Hypotonie *O62.1*
- - Inertie *O62.1*
- Tant complication accouchement ¬
- - Amputation du col *O65.5*
- - Atrésie du col *O65.5*
- - Cicatrice au col *O65.5*
- ¬
- - Abcès
- - - *N71*
- - - Non puerpéral du col *N72*
- - Accouchement en présence d'un léiomyome *O34.1*
- - Artère ou veine: *S35.88*
- - Atrésie
- - - Orifice du col *Q51.8*
- - - Portion vaginale du col *Q51.8*
- - Colique *N94.8*
- - Douleurs *N94.8*
- - Formes d'inertie *O62.2*
- - Hypertonie *O62.4*
- - Inertie *P03.6*
- - Kyste du col *N88.8*
- - Mélanome in situ du col *D03.8*
- - Présence congénitale d'épithélium pavimenteux dans la muqueuse *Q51.8*
- - Stérilité d'origine *N97.2*
- - Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico- *O34.38*
- - Synéchie *N85.6*

Utero

- Pendant l'accouchement ¬ Pneumonie infectieuse acquise in *P23*
- ¬ Rétention d'un fœtus mort in *O02.1*

Utéro

- Digestive et utéro-urinaire ¬ Fistule congénitale *Q51.7*
- Ovarienne ¬ *C57.8*
- Pariétale ¬ Fistule: *N82.5*
- Urétérale ¬ Fistule: *N82.1*
- Urinaire ¬ Fistule congénitale utéro-digestive et *Q51.7*
- Vaginal
- - Complet ¬ Prolapsus *N81.3*
- - Partiel ¬ Prolapsus *N81.2*
- - Sans précision ¬ Prolapsus *N81.4*
- Vésicale ¬ Fistule: *N82.1*

Utérus
v.a. main-pied-utérus

- Avant début
- - Contractions ¬ Déchirure de l' *O71.0*
- - Travail ¬ Rupture de l' *O71.0*
- Bicorne
- - Bicervical
- - - Col et vagin perméables ¬ *Q51.3*
- - - Hémivagin borgne ¬ *Q51.3*
- - Unicervical ¬ *Q51.3*
- - ¬
- - - *Q51.3*
- - - Soins maternels pour *O34.0*
- Cloisonné total ¬ *Q51.2*
- Col utérus
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de l' *Q51.9*
- - ¬
- - - Hypoplasie de l' *Q51.8*
- - - Malformation congénital
- - - - *Q51*
- - - - *Q51.8*
- Didelphe ¬ *Q51.2*
- Double
- - Duplication du col et du vagin ¬ *Q51.1*
- - SAI ¬ *Q51.2*
- - ¬ Soins maternels pour *O34.0*
- Exclusion col ¬ affection inflammatoire
- - *N71*
- - Aiguë de l' *N71.0*
- - Chronique de l' *N71.1*
- Gravide ¬ soin maternel
- - Anomalies de l' *O34.5*
- - Incarcération de l' *O34.5*
- - Prolapsus de l' *O34.5*
- - Rétroversion de l' *O34.5*
- Incision lors d'une intervention chirurgicale ¬ Blessure de l' *T81.2*

Utérus *–suite*

- Inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l' *O34.30*
- Large) (rond) ¬ Ligament de l' *D28.2*
- NIC stade
- - I ¬ Néoplasie intraépithéliale du col de l' *N87.0*
- - II ¬ Néoplasie intraépithéliale du col de l' *N87.1*
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ néoplasie intraépithéliale du col de l' *D06*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ Dysplasie sévère du col de l' *N87.2*
- - Précisée comme survenant avant le début du travail ¬ Rupture de l' *O71.1*
- Partie non précisée ¬ Tumeur maligne de l' *C55*
- Pendant
- - Accouchement ¬ Déchirure de l' *O71.1*
- - Travail ¬ Rupture de l' *O71.1*
- Pseudo-unicorne ¬ *Q51.4*
- SAI ¬
- - Affection de l' *N85.9*
- - Dysplasie sévère du col de l' *N87.2*
- - Dystocie (de) (par): *O62.4*
- - Fibrose de l' *N85.8*
- - Ligament de l' *C57.3*
- - Polype de: *N84.0*
- Sans précision
- - Exclusion du col ¬ Affection inflammatoire de l' *N71.9*
- - ¬
- - - Affection non inflammatoire
- - - - *N85.9*
- - - - Col de l' *N88.9*
- - - Carcinoma in situ: Col de l' *D06.9*
- - - Dysplasie du col de l' *N87.9*
- - - Léiomyome de l' *D25.9*
- - - Malformation congénitale de l'utérus et du col de l' *Q51.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D26.9*
- - - - Malign
- - - - - Annexes de l' *C57.4*
- - - - - Col de l' *C53.9*
- - - - - Corps de l' *C54.9*
- Sauf le col ¬ Autres affections non inflammatoires de l' *N85*
- Stimulation excessive par des médicaments déclencheurs de contractions ¬ Hyperactivité de l' *O62.8, Y57.9!*
- Survenant état classé O00 O07 ¬ Lacération perforation déchirure lésion origine chimique
- - *O08.6*
- - Col de l' *O08.6*
- Tant complication accouchement ¬

Utérus *–suite*

- Tant complication accouchement ¬ *–suite*
- - Contraction hypotonique de l' *O62.2*
- - Hypotonie de l' *O62.2*
- Toute partie] ¬ Corps étranger dans l' *T19.3*
- Trichomonas ¬ Infection du col de l' *A59.0†, N74.8**
- Unicorne ¬ *Q51.4*
- Vagin
- - SAI ¬ Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l' *N93.8*
- - Sans précision ¬ Saignement anormal de l' *N93.9*
- - ¬ Saignement anormal
- - - *N93*
- - - Précisés de l' *N93.8*
- ¬
- - Absence congénital
- - - *Q51.0*
- - - Col de l' *Q51.5*
- - Adénocarcinome du col de l' *C53.9*
- - Adénosarcome
- - - Col de l' *C53.9*
- - - Corps de l' *C54.9*
- - Adhérence
- - - Col de l' *N88.1*
- - - Paroi extérieure de l' *N73.6*
- - Affection
- - - Inflammatoires du col de l' *N72*
- - - Non inflammatoire
- - - - Col de l' *N88*
- - - - Précis
- - - - - *N85.8*
- - - - - Col de l' *N88.8*
- - Agénésie aplasie
- - - *Q51.0*
- - - Col de l' *Q51.5*
- - Allongement hypertrophique du col de l' *N88.4*
- - Antéversion de l' *N85.4*
- - Associée à une anomalie congénitale de l' *N97.2*
- - Atrophie acquise de l' *N85.8*
- - Béance du col de l' *N88.3*
- - Carcinofibrome du corps de l' *C54.9*
- - Carcinoma in situ: Autres parties du col de l' *D06.7*
- - Carcinome
- - - Adénoïde
- - - - Basal du col de l' *C53.9*
- - - - Kystique du col de l' *C53.9*
- - - Cellule
- - - - Transitionnelles du corps de l' *C54.1*
- - - - Vitreuses du col de l' *C53.9*
- - - Épidermoïde du corps de l' *C54.9*
- - - In situ du col de l' *D06*

Utérus *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Carcinome *–suite*
- - - Neuroendocrine de haut grade du col de l' *C53.9*
- - - Papillaire
- - - - Col de l' *C53.9*
- - - - Corps de l' *C54.9*
- - Carcinosarcome
- - - Col de l' *C53.9*
- - - Corps de l' *C54.9*
- - Contractions
- - - Non coordonnées de l' *O62.4*
- - - Sablier de l' *O62.4*
- - Déchirure
- - - Ancienne du col de l' *N88.1*
- - - Obstétricale du col de l' *O71.3*
- - Décollement annulaire du col de l' *O71.3*
- - Duplications de l' *Q51.2*
- - Dysplasie
- - - Col de l' *N87*
- - - Légère du col de l' *N87.0*
- - - Moyenne du col de l' *N87.1*
- - Endométriose de l' *N80.0*
- - Érosion et ectropion du col de l' *N86*
- - Eversion du col de l' *N86*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l' *Z12.4*
- - Fibromyome de l' *D25*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l' *P03.6*
- - Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l' *Z01.4*
- - Gonorrhée de l' *A54.2†, N74.3**
- - Gros *N85.2*
- - Hypertrophie de l' *N85.2*
- - Hypoplasie de l'utérus et du col de l' *Q51.8*
- - Inflammation purulente de l' *N71.9*
- - Inversion
- - - *N85.5*
- - - Post-partum de l' *O71.2*
- - Kyste embryonnaire du col de l' *Q51.6*
- - Léiomyome
- - - *D25*
- - - Intramural de l' *D25.1*
- - - Sous-muqueux de l' *D25.0*
- - - Sous-séreux de l' *D25.2*
- - Léiomyosarcome
- - - Col de l' *C53.9*
- - - Corps de l' *C54.9*
- - Lésion traumatique de l' *S37.6*
- - Leucoplasie du col de l' *N88.0*
- - Ligament sauf
- - - *C49*
- - - *D21*
- - Malformation congénital utérus col

Utérus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Malformation congénital utérus col *–suite*
- - - *Q51*
- - - *Q51.8*
- - Malposition de l' *N85.4*
- - Polype
- - - Col de l' *N84.1*
- - - Corps de l' *N84.0*
- - Région génitale, vessie, prostate, annexe, *I97.87*
- - Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: col de l' *R87*
- - Rétrécissement et sténose du col de l' *N88.2*
- - Rétroflexion de l' *N85.4*
- - Rétroversion de l' *N85.4*
- - Rhabdomyosarcome
- - - Col de l' *C53.9*
- - - Corps de l' *C54.9*
- - Segment inférieur de l' *C54.0*
- - Soin maternel
- - - Fibrome de l' *O34.1*
- - - Malformation congénitale de l' *O34.0*
- - - Polype du corps de l' *O34.1*
- - - Tumeur du corps de l' *O34.1*
- - Subinvolution de l' *N85.3*
- - Syphilis tardif
- - - *A52.7†, N74.2**
- - - Col de l' *A52.7†, N74.2**
- - Trompe de l' *C57.0*
- - Tuberculose
- - - *A18.1†, N74.1**
- - - Col de l' *A18.1†, N74.0**
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - *D26*
- - - - Col de l' *D26.0*
- - - - Corps de l' *D26.1*
- - - - Parties de l' *D26.7*
- - - - Trompe et ligaments de l' *D28.2*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D39.0*
- - - Germinale malign
- - - - Col de l' *C53.9*
- - - - Corps de l' *C54.9*
- - - Malign
- - - - Col de l' *C53*
- - - - Corps de l' *C54*
- - - - Fond de l' *C54.3*
- - - - Isthme de l' *C54.0*
- - - - Lésion
- - - - - Localisations contiguës du col de l' *C53.8*
- - - - - Localisations contiguës du corps de l' *C54.8*
- - - Neuroectodermique primitif

Utérus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Neuroectodermique primitif *–suite*
- - - - Col de l' *C53.9*
- - - - Corps de l' *C54.9*
- - - Neuroendocrine de faible grade du corps de l' *C54.9*
- - Ulcère trophique du col de l' *N86*

Utilisation
- Actuel long terme
- - Anticoagulants ¬ Antécédents personnels d' *Z92.1*
- - Médicaments ¬ Antécédents personnels d' *Z92.2*
- Alcool ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F10*
- Cocaïne ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F14*
- Dérivés du cannabis ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F12*
- Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F19*
- Hallucinogènes ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F16*
- Hypnotiques ¬ Agitation après *F13.8*
- Inadéquate de drogues SAI ¬ *F19*
- Intraveineux
- - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ *U69.33!*
- - Stimulants hors caféine ¬ *U69.35!*
- Long terme
- - Antiagrégants plaquettaires ¬ Hémorragie sous *D69.80*
- - Anticoagulants ¬ Hémorragie sous *D68.35*
- - Coumarines (antagonistes de la vitamine K) ¬ Hémorragie sous *D68.33*
- - Héparines ¬ Hémorragie sous *D68.34*
- Mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P04.5*
- Opiacés ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F11*
- Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F13*
- Solvants volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F18*
- Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F15*
- Substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l' *F19*
- Tabac ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F17*
- Tampon ¬ Syndrome du choc toxique avec *A48.3*
- Thérapeutique
- - Médicament
- - - Nouveau-né ¬ Symptômes de privation d'une *P96.2*

Utilisation *–suite*
- Thérapeutique *–suite*
- - Médicament *–suite*
- - - ¬ Effets secondaires indésirables d'une *Y57!*
- - Vaccins ou autres substances biologiques actives ¬ Effets secondaires indésirables d'une *Y59!*
- ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur *Y82.8!*

Uvéal
- Congénital ¬ Ectropion *Q10.1*
- Idiopathique ¬ Syndrome d'effusion *H33.2*
- ¬ Syphilis
- - Secondaire du tractus *A51.4†, H22.0**
- - Tardive du tractus *A52.7†, H22.0**

Uvée ¬ Tuberculose de l' *A18.5†, H22.0**

Uvéite
- Acquise au cours de toxoplasmose ¬ *B58.0†, H22.0**
- Antérieur
- - Aiguë, subaiguë ou à répétition ¬ *H20.0*
- - Infectieuse ¬ *H20.9*
- - ¬ *H20.9*
- Congénitale à toxoplasmose ¬ *P37.1†, H22.0**
- Intermédiaire ¬ *H30.2*
- Phacoanaphylactique ¬ *H20.2*
- Postérieur
- - Maladie de Whipple ¬ *K90.8†, M14.89**
- - ¬ *H30.9*
- Sympathique ¬ *H44.1*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.0†, H22.0**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, H22.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H22.0**
- Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H22.0**
- ¬ *H20.9*

Uvéo-parotidienne [Heerfordt] ¬ Fièvre *D86.8*

Uvule ¬ Tuberculose de l' *A18.8†, K93.8**

Vacances ¬ inscription dans: colonie de *Z02*

Vaccin

- Substance biologique actif
- - Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des *Y59.9!*
- - ¬
- - - Complications dues à des *Y59.9!*
- - - Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de *Y59!*
- ¬
- - Antécédents personnels d'allergie aux sérum et *Z88.7*
- - Infection par le virus de la *B08.0*
- - Intolérance aux *T88.1*
- - Intoxication par *T50.9*

Vaccinal ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, associée au virus *A80.0*

Vaccination

- Associé contre
- - Diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq] ¬ Nécessité d'une *Z27.1*
- - Plusieurs maladie infectieux
- - - Sans précision ¬ Nécessité d'une *Z27.9*
- - - ¬ Nécessité d'une *Z27*
- Contre
- - Associations de maladies infectieuses ¬ Nécessité d'une *Z27.8*
- - Certaines maladies virales uniques ¬ Nécessité d'une *Z24*
- - Choléra
- - - Seul ¬ Nécessité d'une *Z23.0*
- - - Typhoïde-parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une *Z27.0*
- - Coqueluche seule ¬ Nécessité d'une *Z23.7*
- - Diphtérie
- - - Seule ¬ Nécessité d'une *Z23.6*
- - - Tétanos
- - - - Coqueluche
- - - - - Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une *Z27.3*
- - - - - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une *Z27.2*
- - - - Poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ *Z27.8*
- - Encéphalite virale transmise par les arthropodes ¬ Nécessité d'une *Z24.1*
- - Fièvre jaune ¬ Nécessité d'une *Z24.3*
- - Grippe ¬ Nécessité d'une *Z25.1*
- - Hépatite virale ¬ Nécessité d'une *Z24.6*
- - Leishmaniose ¬ Nécessité d'une *Z26.0*
- - Maladie
- - - Bactériennes uniques ¬ Nécessité d'une *Z23.8*
- - - Infectieux
- - - - Sans précision ¬ Nécessité d'une *Z26.9*
- - - - Unique
- - - - - Précisées ¬ Nécessité d'une *Z26.8*

Vaccination *–suite*

- Contre *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Infectieux *–suite*
- - - - Unique *–suite*
- - - - - ¬ Nécessité d'une *Z26*
- - - Viral unique
- - - - Précisées ¬ Nécessité d'une *Z25.8*
- - - - ¬ Nécessité d'une *Z25*
- - Oreillons seuls ¬ Nécessité d'une *Z25.0*
- - Papillomavirus humain ¬ *Z25.8*
- - Peste ¬ Nécessité d'une *Z23.3*
- - Poliomyélite ¬ Nécessité d'une *Z24.0*
- - Rage ¬ Nécessité d'une *Z24.2*
- - Rougeole
- - - Oreillons-rubéole [ROR] ¬ Nécessité d'une *Z27.4*
- - - Seule ¬ Nécessité d'une *Z24.4*
- - Rubéole seule ¬ Nécessité d'une *Z24.5*
- - Seule maladie bactérienne ¬ Nécessité d'une *Z23*
- - Tétanos seul ¬ Nécessité d'une *Z23.5*
- - Tuberculose [BCG] ¬ Nécessité d'une *Z23.2*
- - Tularémie ¬ Nécessité d'une *Z23.4*
- - Typhoïde-paratyphoïde seule [TAB] ¬ Nécessité d'une *Z23.1*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Autres complications consécutives à *T88.1*
- - Effectué raison
- - - Contre-indication ¬
- - - - *Z28*
- - - - *Z53*
- - - Croyances ¬
- - - - *Z28*
- - - - *Z53*
- - - Pression groupe ¬
- - - - *Z28*
- - - - *Z53*
- - - Raison indépendant patient ¬
- - - - *Z28*
- - - - *Z53*
- - Faite ¬ *Z28*
- SAI ¬ Nécessité d'une *Z26.9*
- ¬
- - Éruption consécutive à *T88.1*
- - Infection consécutive à *T88.0*
- - Maladie ressemblant aux oreillons après une *T88.1*
- - Méningite due à la *G03.8, Y59.9!*
- - Septicémie consécutive à *T88.0*

Vaccine
v.a. Pseudovaccine

Vaccinia ¬ *B08.0*

Vacciniforme ¬

- Hydroa *L56.4*

Vacciniforme ¬ *–suite*

- Lymphome à type d'hydroa *C84.5*

Vache ¬

- Allergie au lait de *L27.2*
- Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de *P71.0*
- Variole de la *B08.0*

VACTERL ¬ Association *Q87.2*

VACTERL-hydrocéphalie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Vacuoles bordées ¬ Myopathie distale à *G71.8*

Vagal

- Nerf crânien X] ¬ Affections du nerf *G52.2*
- ¬ Bradycardie: *R00.1*

Vagin

- Acquise) (congénitale) ¬ Soins maternels pour: sténose du *O34.6*
- Artificiel ¬ Surveillance de *Z43.7*
- Cloisonné ¬ *Q52.1*
- Côlon ¬ Fistule du *N82.3*
- Cours accouchement ¬ Déchirure rupture périnatal
- - Intéressant): *O70.0*
- - O70.0, intéressant aussi: muscles du: *O70.1*
- Cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement ¬ Fistule entre le *N82.80*
- Hystérectomie ¬ Prolapsus de la paroi supérieure du *N99.3*
- Intestin grêle ¬ Fistule du *N82.2*
- NIVA stade
- - I ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N89.0*
- - II ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N89.1*
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale du *D07.2*
- Non classée ailleurs ¬ Dysplasie sévère du *N89.2*
- Pendant accouchement ¬ Déchirure tiers
- - Moyen du *O71.4*
- - Supérieur du *O71.4*
- Perméables ¬ Utérus bicorne bicervical avec col et *Q51.3*
- Pessaire ¬ Ulcère du *N89.8*
- SAI ¬
- - Dysplasie sévère du *N89.2*
- - Malformation congénitale du *Q52.4*
- - Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du *N93.8*
- Sans précision ¬
- - Affection non inflammatoire du *N89.9*
- - Dysplasie du *N89.3*
- - Saignement anormal de l'utérus et du *N93.9*
- Vessie de remplacement ¬ Fistule entre *N82.81*
- Vulve
- - Cours de la grossesse ¬ Varices de périnée, de *O22.1*

Vagin *–suite*
- Vulve *–suite*
- - ¬
- - - Inflammation
- - - - *N76*
- - - - Précisées du *N76.8*
- - - Maladie inflammatoire précisée du *N76.88*
- - - Plaie ouverte du *S31.4*
- ¬
- - Absence congénital
- - - *Q52.0*
- - Adhérences du *N89.5*
- - Affection non inflammatoire
- - - *N89*
- - - Précisées du *N89.8*
- - Brûlure
- - - 1er degré du *T28.3*
- - - 2e degré du *T28.3*
- - - 3e degré du *T28.3*
- - - Chimique
- - - - 1er degré du *T28.8*
- - - - 2e degré du *T28.8*
- - - - 3e degré du *T28.8*
- - Candidose de la vulve et du *B37.3†, N77.1**
- - Carcinoma in situ: *D07.2*
- - Corps étranger dans la vulve et le *T19.2*
- - Déchirure ancienne du *N89.8*
- - Dédoublement du *Q52.1*
- - Dysplasie
- - - Légère du *N89.0*
- - - Moyenne du *N89.1*
- - Endométriose du septum recto-vaginal et du *N80.4*
- - Hématome obstétrical de: *O71.7*
- - Leucoplasie du *N89.4*
- - Malformations congénitales du *Q52.4*
- - Mycose candidosique du *B37.3†, N77.1**
- - Polype du *N84.2*
- - Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: *R87*
- - Rétrécissement et atrésie du *N89.5*
- - Saignement anormal
- - - Précisés de l'utérus et du *N93.8*
- - - Utérus et du *N93*
- - Soin maternel
- - - Anomalies du *O34.6*
- - - Cloisonnement du *O34.6*
- - - Intervention chirurgicale antérieure sur le *O34.6*
- - - Rétrécissement du *O34.6*
- - - Tumeur du *O34.6*
- - Sténose du *N89.5*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, N77.1**
- - Trichomonase du *A59.0†, N77.1**
- - Tuberculose du *A18.1†, N77.1**

Vagin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D28.1*
- - - Germinale maligne du *C52*
- - - Maligne du *C52*
- - Ulcération du *N76.5*
- - Utérus double avec duplication du col et du *Q51.1*

Vaginal
v.a. recto-vaginal
- Césarienne ¬ Accouchement par voie *O75.7*
- Col utérin ¬ Atrésie de la portion *Q51.8*
- Communicante congénitale ¬ Hydrocèle *P83.5*
- Complet ¬ Prolapsus utéro- *N81.3*
- Création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice *Z91.73*
- Degré
- - 2a ¬ Brûlure
- - - *T28.3*
- - - Chimique *T28.8*
- - 2b ¬ Brûlure
- - - *T28.3*
- - - Chimique *T28.8*
- Enfant unique ¬ Naissance spontanée par voie *O80*
- Haute isolée ¬ Déchirure obstétricale *O71.4*
- Isolée partielle ¬ Agénésie *Q52.0*
- Néonatale ¬ Hémorragie *P54.6*
- Non filarienne) SAI ¬ Chylocèle de la tunique *N50.8*
- Paroi
- - Antérieure) SAI ¬ Prolapsus *N81.1*
- - Postérieure ¬ Prolapsus *N81.6*
- Partiel ¬ Prolapsus utéro- *N81.2*
- Pendant l'accouchement ¬ Déchirure du sillon *O71.4*
- Post-opératoires ¬ Adhérences *N99.2*
- Sans
- - Précision ¬ Prolapsus utéro- *N81.4*
- - Tension] ¬ Rétention urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette *T83.8*
- Tant que complication de l'accouchement ¬ Lacération *O70.0*
- Testicule et du canal déférent ¬ Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique *N49.1*
- Trichomonas
- - Vaginalis) ¬ Leucorrhée (*A59.0*
- - ¬ Infection *A59.0†, N77.1**
- Vésicule séminal ¬
- - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique *N50.8*

Vaginal *–suite*
- Vésicule séminal ¬ *–suite*
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique *N50.8*
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique *N50.8*
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique *N50.8*
- ¬
- - Candidose *B37.3†, N77.1**
- - Diphtérie *A36.8†, N77.1**
- - Entérocèle *N81.5*
- - Érosion de l'épithélium *N89.8*
- - Fistule
- - - Périnéo- *N82.5*
- - - Urétéro- *N82.1*
- - - Urétro- *N82.1*
- - Hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) *N43*
- - Kyste (du): embryonnaire *Q52.4*
- - Muguet *B37.3†*
- - Mycose *B37.3†, N77.1**
- - Prélèvement placentaire (par voie *Z36.0*
- - Rétrécissement de: tunique *N50.8*
- - Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie *O34.30*
- - Syphilis tardive de la tunique *A52.7†, N51.8**
- - Tuberculose de la tunique *A18.1†, N51.8**
- - Tunique
- - - *C63.7*
- - - *D29.7*

Vaginalis ¬
- Fluor à Trichomonas *A59.0†, N77.1**
- Leucorrhée (vaginale) à Trichomonas (*A59.0*

Vaginisme
- Non organique ¬ *F52.5*
- Psychogène ¬ *F52.5*
- ¬ *N94.2*

Vaginite
v.a. Cervico-vaginite
- Accouchement ¬ *O86.1*
- Aiguë ¬ *N76.0*
- Atrophique post-ménopausique ¬ *N95.2*
- Blennorhéique ¬ *A54.0†, N77.1**
- Candida ¬ *B37.3†, N77.1**
- Candidose ¬ *B37.3†, N77.1**
- Candidosique
- - Chronique récidivante ¬ *B37.3†, N77.1**
- - ¬ *B37.3†, N77.1**
- Cours de l'infection par des oxyures ¬ *B80†, N77.1**
- Gonorrhéique

Vaginite *–suite*
- Gonorrhéique *–suite*
- - Abcès ¬ *A54.1†, N77.1**
- - ¬ *A54.0†, N77.1**
- Monilia ¬ *B37.3†, N77.1**
- Mycosique ¬ *B37.3†, N77.1**
- SAI ¬ *N76.0*
- Sénile (atrophique) ¬ *N95.2*
- Subaiguë et chronique ¬ *N76.1*
- Syphilitique
- - Précoce ¬ *A51.0*
- - Tardive ¬ *A52.7†, N77.1**
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N77.1**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N77.1**
- Vénérienne NCA ¬ *A64†, N77.1**
- Virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N77.1**
- Vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *N77.1**

Vaginitis candidomycetica ¬ *B37.3†, N77.1**

Vaisseau
- Accessoire d'un pôle du rein ¬ *Q27.8*
- Cérébral
- - Cours de maladies cérébrovasculaires NCA ¬ Syndrome des *I67.9†, G46.8**
- - Non précis ¬ Malformation
- - - Artérioveineuse congénitale des *Q28.29*
- - - Congénitale des *Q28.39*
- - ¬
- - - Anévrisme
- - - - Artérioveineux congénital des *Q28.20*
- - - - Congénital des *Q28.30*
- - - Dégénérescence cérébrale au cours de maladies des *I67.9†, G32.8**
- - - Endartérite syphilitique oblitérante d'un *A52.0†, I68.1**
- - - Fistule
- - - - Artérioveineuse congénitale des *Q28.21*
- - - - Congénitale des *Q28.31*
- - - Malformation
- - - - *Q28.3*
- - - - Artérioveineux
- - - - - *Q28.2*
- - - - - Congénitales des *Q28.28*
- - - - Congénitales des *Q28.38*
- Coarctation ¬ Transposition congénitalement non corrigée des gros *Q20.3*
- Complète) ¬ Transposition des gros *Q20.3*
- Cordon ¬ Procidence des *P02.6*
- Coronaires ¬ Malformation des *Q24.5*
- Cutanés ¬ Vascularite des petits *M31.0*
- Ganglion lymphatique
- - Sans précision ¬ Atteinte non infectieuse des *I89.9*
- - ¬ atteinte non infectieux
- - - *I89*

Vaisseau *–suite*
- Ganglion lymphatique *–suite*
- - ¬ atteinte non infectieux *–suite*
- - - Précisées des *I89.8*
- Lymphatique
- - SAI ¬ Maladie des *I89.9*
- - Suite à mastectomie ¬ Oblitération des *I97.2*
- - ¬
- - - *C49*
- - - *D21*
- Ombilicaux ¬ Thrombose des *O69.5*
- Pontage ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de *I25.15*
- Précérébral
- - Non précis ¬ Malformation
- - - Artérioveineuse congénitale des *Q28.09*
- - - Congénitale des *Q28.19*
- - ¬
- - - Anévrisme
- - - - Artérioveineux congénital des *Q28.00*
- - - - Congénital des *Q28.10*
- - - Fistule
- - - - Artérioveineuse congénitale des *Q28.01*
- - - - Congénitale des *Q28.11*
- - - Malformation
- - - - *Q28.1*
- - - - Artérioveineux
- - - - - *Q28.0*
- - - - - Congénitales des *Q28.08*
- - - - Congénitales des *Q28.18*
- Profonds des membres inférieurs ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres *I80.28*
- Pulmonaire
- - Sans précision ¬ Maladie des *I28.9*
- - ¬
- - - Fistule artérioveineuse des *I28.0*
- - - Maladie
- - - - *I28*
- - - - Précisées des *I28.8*
- - - Rétrécissement des *I28.8*
- - - Rupture des *I28.8*
- - - Sténose des *I28.8*
- - - Stricture des *I28.8*
- Rénal aberrant ¬ *Q27.8*
- Rétine ¬ Artériosclérose d'un *I70.8†, H36.8**
- Sanguin
- - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- - Épidural niveau
- - - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S35.80*

Vaisseau *–suite*
- Sanguin *–suite*
- - Épidural niveau *–suite*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique de *S15.80*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique de *S25.80*
- - Iliaques ¬ Lésion traumatique des *S35.5*
- - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- - Intercostaux ¬ Lésion traumatique de *S25.5*
- - Intracrânien ¬ Blessure d'un *S06.8*
- - Niveau
- - - Abdomen lombes bassin ¬ Lésion traumatique
- - - - *S35*
- - - - *S35.88*
- - - - Multiples *S35.7*
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique
- - - - *S55.8*
- - - - Multiples *S55.7*
- - - Cheville pied ¬ Lésion traumatique
- - - - *S95.8*
- - - - Multiples *S95.7*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique
- - - - *S15.88*
- - - - Multiples *S15.7*
- - - Épaule bras ¬ Lésion
- - - - *S45*
- - - - Traumatique
- - - - - *S45.8*
- - - - - Multiples *S45.7*
- - - Hanche cuisse ¬ Lésion traumatique
- - - - *S75.8*
- - - - Multiples *S75.7*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique
- - - - *S85.8*
- - - - Multiples *S85.7*
- - - Poignet main ¬ Lésion traumatique
- - - - *S65.8*
- - - - Multiples *S65.7*
- - Non précis
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T13.4*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T11.4*
- - - Niveau
- - - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S35.9*
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un *S55.9*
- - - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S95.9*
- - - - Cou ¬ Lésion traumatique de *S15.9*
- - - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un *S45.9*

Vaisseau *–suite*
- Sanguin *–suite*
- - Non précis *–suite*
- - - Niveau *–suite*
- - - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un *S75.9*
- - - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un *S85.9*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un *S65.9*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique d'un *S25.9*
- - Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques de *T06.3*
- - Poumon ¬ Lésion traumatique de *S25.4*
- - Rein ¬ Lésion traumatique des *S35.4*
- - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- - Sous-arachnoïdien niveau
- - - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S35.82*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique de *S15.82*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique de *S25.82*
- - Sous-dural niveau
- - - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S35.81*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique de *S15.81*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique de *S25.81*
- - Tête, non classée ailleurs ¬ Lésion traumatique des *S09.0*
- - Thorax ¬ lésion traumatique
- - - *S25.88*
- - - Multiples *S25.7*
- - ¬
- - - *C49*
- - - *D21*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale des gros *Q25.9*
- X sanguin s
- - Doigt ¬ Lésion traumatique de *S65.5*
- - Partie du corps non précisée ¬ Lésion traumatique de *T14.5*
- - Pouce ¬ Lésion traumatique de *S65.4*
- - SAI ¬
- - - Anévrisme ou fistule (artérioveineux) traumatique de *T14.5*
- - - Arrachement de *T14.5*
- - - Hématome artériel traumatique de *T14.5*
- - - Lacération de *T14.5*
- - - Lésion traumatique de *T14.5*
- - - Rupture traumatique de *T14.5*
- - - Section de *T14.5*
- ¬
- - Gros
- - - *C49.3*
- - - *D21.3*
- - L-transposition des gros *Q20.5*
- - Malformations congénitales des gros *Q25.8*

Vaisseau *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Transposition
- - - Congénitalement
- - - - Corrigée des gros *Q20.5*
- - - - Non corrigée des gros *Q20.3*
- - - Gros *Q20.3*
- - - Isolée congénitalement non corrigée des gros *Q20.3*

Valga congénitale ¬ Coxa: *Q65.8*

Valgum congénital ¬ Genu *Q74.1*

Valgus
- Acquis ¬
- - Hallux *M20.1*
- - Pied
- - - Affaissé *M21.63*
- - - Creux *M21.63*
- - - Plat
- - - - *M21.61*
- - - - *M21.63*
- Dysmorphie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-cubitus *Q87.8*
- Non classée ailleurs ¬ Déformation en *M21.0*
- ¬
- - Anomalies morphologiques congénitales du pied en *Q66.6*
- - Metatarsus *Q66.6*
- - Pied bot talus *Q66.4*
- - Pied plat: spastique (en *Q66.5*

Valine ¬ Trouble du métabolisme de la *E71.1*

Vallée du Rift ¬ Fièvre de la *A92.4*

Valley ¬ Encéphalite de la Murray *A83.4*

Valproate ¬ Embryopathie au *Q86.88*

Valproïque ¬
- Acide *T42.6*
- Intoxication à l'acide *T42.6*

Valsalva (rompu) ¬ Anévrisme du sinus de *Q25.4*

Valve
- Aortique
- - Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des *I08.2*
- - ¬
- - - Anomalie congénital
- - - - *Q23.9*
- - - - Feuillets de la *Q23.9*
- - - Endocardite
- - - - Syphilitique de la *A52.0†*, *I39.1**
- - - - Tuberculeuse de la *A18.8†*, *I39.1**
- - - Inflammation syphilitique de la *A52.0†*, *I39.1**
- - - Régurgitation syphilitique de la *A52.0†*, *I39.1**
- - - Sclérose rhumatismale de la *I06.8*
- - - Sténose syphilitique de la *A52.0†*, *I39.1**
- - - Valvulite syphilitique de la *A52.0†*, *I39.1**

Valve *–suite*
- Auriculoventriculaire unique ¬ Cœur univentriculaire à *Q20.4*
- Cardiaque ¬ Inflammation syphilitique de la *A52.0†*, *I39.8**
- Eustache persistante ¬ *Q26.8*
- Mitral
- - Aortique
- - - Combinées ¬ Atteintes des *I08.0*
- - - Précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée ¬ Lésions des *I08.0*
- - - Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des *I08.3*
- - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypogonadisme-prolapsus de la *Q87.8*
- - Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des *I08.1*
- - ¬
- - - Affection
- - - - *I05.8*
- - - - Non rhumatismales des *I34.88*
- - - Double orifice de la *Q23.8*
- - - Endocardite tuberculeuse de la *A18.8†*, *I39.0**
- - - Inflammation syphilitique de la *A52.0†*, *I39.0**
- - - Overriding de la *Q23.8*
- - - Sclérose rhumatismale de la *I05.8*
- - - Straddling de la *Q23.8*
- - - Valvulite syphilitique de la *A52.0†*, *I39.0**
- Postérieure de l'urètre ¬ *Q64.2*
- Pulmonaire
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q22.3*
- - Valvule tricuspide ¬ Malformations congénitales de la *Q22*
- - ¬
- - - Agénésie des *Q22.3*
- - - Atrésie de la *Q22.0*
- - - Endocardite
- - - - Syphilitique de la *A52.0†*, *I39.3**
- - - - Tuberculeuse de la *A18.8†*, *I39.3**
- - - Inflammation syphilitique de la *A52.0†*, *I39.3**
- - - Insuffisance
- - - - Congénitale de la *Q22.2*
- - - - Syphilitique de la *A52.0†*, *I39.3**
- - - Malformations congénitales de la *Q22.3*
- - - Reflux congénital au niveau de la *Q22.2*
- - - Régurgitation syphilitique de la *A52.0†*, *I39.3**
- - - Sténose congénitale de la *Q22.1*
- - - Valvulite syphilitique de la *A52.0†*, *I39.3**
- Tricuspide
- - Parachute ¬ *Q22.8*
- - ¬
- - - Agénésie des *Q22.4*
- - - Anomalie d'Ebstein de la *Q22.5*

Valve *–suite*
- Tricuspide *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Dysplasie congénitale de la *Q22.8*
- - - Endocardite tuberculeuse de la *A18.8†*, *I39.2**
- - - Inflammation syphilitique de la *A52.0†*, *I39.2**
- - - Straddling ou overriding de la *Q22.8*
- - - Valvulite syphilitique de la *A52.0†*, *I39.2**
- Urètre antérieur ¬ *Q64.7*

Valvulaire
- Aortique
- - Anomalie des mains ¬ Syndrome de persistance du canal artériel-bicuspidie *Q87.2*
- - Congénitale ¬ Dysplasie *Q23.9*
- - ¬
- - - Atrésie *Q23.0*
- - - Quadricuspidie *Q23.8*
- Cardiaque
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Endocardite et atteintes *I39**
- - ¬
- - - Complication mécanique
- - - - Pontage coronarien et d'une greffe *T82.2*
- - - - Prothèse *T82.0*
- - - Déplacement dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - - Fuite dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse *T82.6*
- - - Malposition dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - - Obstruction mécanique dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - - Perforation dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - - Protrusion dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - - Rupture (mécanique) dû (due) à une prothèse *T82.0*
- Congénital ¬
- - Dysplasie *Q24.8*
- - Sténose aortique *Q23.0*
- Mitral
- - Accessoire ¬ Tissu *Q23.8*
- - Chronique) SAI ¬ Atteinte (*I05.9*
- - Familial ¬ Prolapsus *I34.1*
- Multiple
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes *I39.4**
- - ¬ Autres maladies *I08.8*
- Pulmonaire
- - Congénitale ¬ Sténose *Q22.1*
- - ¬ Dysplasie *I37.0*
- Rhumatismale SAI ¬ Maladie aortique (*I06.9*
- ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type cardiaque *Q79.6*

Valvule
- Aortique
- - Bicuspide ¬ *Q23.1*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *I39.1**
- - Insuffisance ¬ Sténose (de la *I35.2*
- - Mitral
- - - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q23.9*
- - - ¬ Autres malformations congénitales des *Q23.8*
- - SAI cause précis sauf rhumatismal ¬
- - - Insuffisance (de la *I35.1*
- - - Régurgitation (de la *I35.1*
- - Sans précision ¬
- - - Atteinte de la *I35.9*
- - - Maladie rhumatismale de la *I06.9*
- - Streptocoques ¬ Endocardite de la *I33.0*, *B95.5!*
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - *I35.8*
- - - - Non rhumatismales de la *I35*
- - - Insuffisance
- - - - *I35.1*
- - - - Congénitale de la *Q23.1*
- - - Maladies rhumatismales de la *I06.8*
- - - Rétrécissement rhumatismal (de la *I06.0*
- - - Sténose
- - - - *I35.0*
- - - - Congénitale de la *Q23.0*
- Cardiaque
- - Remplacement ¬ Présence d'une autre *Z95.4*
- - Xénogénique ¬ Présence d'une *Z95.3*
- - ¬ Présence de prothèse d'une *Z95.2*
- Iléo-cæcal ¬
- - *C18.0*
- - *D12.0*
- Mitral
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *I39.0**
- - E
- - - SAI cause précis sauf rhumatismal ¬
- - - - Insuffisance (de la *I34.0*
- - - - Régurgitation (de la *I34.0*
- - - ¬ Prolapsus (de la *I34.1*
- - Insuffisance mitrale ¬ Sténose non rhumatismale de la *I34.80*
- - Sans précision ¬
- - - Atteinte non rhumatismale de la *I34.9*
- - - Maladie de la *I05.9*
- - ¬
- - - Atteinte non rhumatismal
- - - - *I34*
- - - - *I34.8*
- - - Insuffisance (de la *I34.0*

Valvule *–suite*
- Mitral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Maladie
- - - - *I05.8*
- - - - Rhumatismales de la *I05*
- - - Rétrécissement (rhumatismal) de la *I05.0*
- - - Sténose non rhumatismale (de la *I34.2*
- Non précis
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Endocardite, *I39.8**
- - SAI cause précis sauf rhumatismal congénital ¬
- - - Insuffisance *I38*
- - - Régurgitation *I38*
- - - Sténose *I38*
- - - Valvulite (chronique) *I38*
- - ¬ Endocardite
- - - *I38*
- - - Rhumatismale, *I09.1*
- Pulmonaire
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *I39.3**
- - Insuffisance ¬ Sténose de la *I37.2*
- - SAI cause précis sauf rhumatismal ¬
- - - Insuffisance de la *I37.1*
- - - Régurgitation de la *I37.1*
- - Sans précision ¬ Atteinte de la *I37.9*
- - ¬
- - - Atteintes de la *I37.8*
- - - Insuffisance de la *I37.1*
- - - Maladie rhumatismale de la *I09.8*
- - - Sténose de la *I37.0*
- Sans précision ¬ Maladie de plusieurs *I08.9*
- Tricuspide
- - Cause précis sauf rhumatismal ¬
- - - Insuffisance (de la *I36.1*
- - - Régurgitation (de la *I36.1*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *I39.2**
- - Insuffisance ¬ Sténose non rhumatismale (de la *I36.2*
- - Rhumatismal ¬
- - - Insuffisance (de la *I07.1*
- - - Sténose (de la *I07.0*
- - SAI ¬ Atteinte de la *I07.9*
- - Sans précision ¬
- - - Atteinte non rhumatismale de la *I36.9*
- - - Maladie de la *I07.9*
- - - Malformation congénitale de la *Q22.9*
- - ¬
- - - Atrésie de la *Q22.4*
- - - Atteintes non rhumatismales de la *I36.8*
- - - Insuffisance non rhumatismale (de la *I36.1*
- - - Maladie

Valvule *–suite*
- Tricuspide *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Maladie *–suite*
- - - - *I07.8*
- - - - Rhumatismales de la *I07*
- - - Malformation congénital
- - - - *Q22.8*
- - - - Valve pulmonaire et de la *Q22*
- - - Sténose
- - - - Congénitale de la *Q22.4*
- - - - Non rhumatismale (de la *I36.0*
- Urétrales postérieures congénitales ¬ *Q64.2*
- ¬ Maladies de plusieurs *I08*

Valvulite
- Chronique
- - Rhumatismale ¬ *I09.1*
- - Valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- Rhumatismale aiguë ¬ *I01.1*
- Syphilitique
- - Valve
- - - Aortique ¬ *A52.0†, I39.1**
- - - Mitrale ¬ *A52.0†, I39.0**
- - - Pulmonaire ¬ *A52.0†, I39.3**
- - - Tricuspide ¬ *A52.0†, I39.2**
- - ¬ *A52.0†, I39.8**

Valvulopathie mitrale ¬ *I05.8*

Vampire ¬ Main de *A66.3*

Van Bogaert ¬ Leucoencéphalopathie sclérosante de *A81.1*

Van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ Cholestérose cérébro-tendineuse [*E75.5*

Van Creveld
v. Ellis-van Creveld

Van Creveld von Gierke ¬ Maladie *E74.0*

Van den Ende-Gupta ¬ Syndrome de *Q74.3*

Van der Woude ¬ Syndrome de *Q38.0*

Van Esch ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Van Horick
v. Verloove-Van Horick-Brubakk

Van Maldergem ¬ Syndrome de *Q87.0*

Van Neck] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): ischio-pubienne [*M91.0*

Vanadium ¬ Carence en *E61.6*

Vandellia cirrhosa ¬ Ichtyoparasitose à *B88.8*

Vanishing-Bone-Disease ¬ *M89.59*

Vapeur
- Brûlante ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Métaux ¬ fumées et *T56*

Vaquez
v. Osler-Vaquez

Vara
- Congénitale ¬ Coxa: *Q65.8*

Vara *–suite*
- Retrosa) (non traumatique) ¬ Épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa *M93.0*
- ¬ Tibia *M92.5*

Variante
- Aleucémique de la leucémie à mastocytes ¬ *C94.30*
- Atrophie temporale à droite ¬ Démence fronto-temporale, *G31.0†, F02.0**
- Comportementale ¬ Démence fronto-temporale, *G31.0†, F02.0**
- Épilepsie nordique ¬ Céroïde-lipofuscinose neuronale, *E75.4*
- Non leucémique de la LLC-B ¬ *C83.0*
- ¬
- - Aiguë *C91.5*
- - Amylose ABeta2M *E85.1*
- - Chronique *C91.5*
- - Latente *C91.5*
- - Leucémie à tricholeucocytes *C91.40*
- - LMA avec t(15;17) et *C92.4*
- - Lymphomateuse *C91.5*

Varice
- Coliques ¬ *I86.81*
- Congénital(e) ¬ *Q27.8*
- Gastrique
- - Cours de schistosomiase ¬ *B65.9†, I98.2**
- - Indication hémorragie cours schistosomiase ¬
- - - *B65.9†, I98.3**
- - ¬
- - - *I86.4*
- - - Cirrhose alcoolique foie
- - - - *K70.3†, I98.2**
- - - - Saignement de *K70.3†, I98.3**
- Grêliques ¬ *I86.80*
- Hémorroïdaires ¬ *K64.9*
- Localisation
- - Précis ¬
- - - *I86.8*
- - - *I86.88*
- - ¬ *I86*
- Membre inférieur
- - Cours de la grossesse ¬ *O22.0*
- - Inflammation ¬ *I83.1*
- - Sans ulcère ou inflammation ¬ *I83.9*
- - Toute localisation] ou de localisation non précisée ¬ *I83.9*
- - Ulcère et inflammation ¬ *I83.2*
- - ¬ *I83*
- Œsophagien
- - Gastrique cours maladie classé chapitre
- - - Mention d'hémorragie ¬ *I98.3**
- - - Sans indication d'hémorragie ¬ *I98.2**
- - Hémorragiques ¬ *I85.0*
- - Non hémorragiques ¬ *I85.9*
- - SAI ¬ *I85.9*

Varice *–suite*
- Œsophagien *–suite*
- - ¬
- - - *I85*
- - - Cirrhose
- - - - Alcoolique
- - - - - Foie avec *K70.3†, I98.2**
- - - - - Foie avec hémorragie par rupture des *K70.3†, I98.3**
- - - - Foie
- - - - - *K74.6†, I98.2**
- - - - - Hémorragie par rupture des *K74.6†, I98.3**
- - - - Toxique
- - - - - Foie avec *K71.7†, I98.2**
- - - - - Foie avec hémorragie par rupture des *K71.7†, I98.3**
- Organe génital cours
- - Grossesse ¬ *O22.1*
- - Puerpéralité ¬ *O87.8*
- Pelviennes ¬ *I86.2*
- Périnée, de vagin et de vulve au cours de la grossesse ¬ *O22.1*
- Rectales ¬ *I86.82*
- Rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- SAI au cours de la grossesse ¬ *O22.0*
- Scrotales ¬ *I86.1*
- Sublinguales ¬ *I86.0*
- Ulcérées des membres inférieurs ¬ *I83.0*
- Vulvaires ¬ *I86.3*
- ¬
- - Rupture de *I86.1*
- - Ulcère veineux de la jambe sans *I87.21*

Varicelle
- Complications ¬ *B01.8*
- Congénital ¬
- - *P35.8*
- - Syndrome de *P35.8*
- Pneumonie ¬ *B01.2†, J17.1**
- SAI ¬ *B01.9*
- Sans complication ¬ *B01.9*
- Zona ¬
- - Antécédents personnels d'infection à VZV [virus de la *Z86.1*
- - Paralysie faciale liée à l'infection par le virus *B02.2†, G53.0**
- ¬
- - *B01*
- - Keratitis disciformis au cours de *B01.8†, H19.2**
- - Méningite au cours de *B01.0†, G02.0**
- - Pneumonie au cours de *B01.2†, J17.1**

Varicelleuse
- Cornée et de la conjonctive ¬ Infection *B01.8†, H19.2**
- ¬
- - Encéphalite *B01.1†, G05.1**

Varicelleuse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Encéphalomyélite
- - - *B01.1†*
- - - *B01.1†, G05.1**
- - Méningite *B01.0†, G02.0**
- - Myélite *B01.1†, G05.1**

Varicelliforme
- Kaposi ¬ Pustulose *B00.0*
- Rickettsia akari ¬ Rickettsiose *A79.1*

Varicocèle ¬ *I86.1*

Variole
- Bovine
- - Paupière ¬ *B08.0†, H03.1**
- - ¬ *B08.0*
- Vache ¬ *B08.0*
- ¬ *B03*

Varioliforme
- Aigu [Maladie de Mucha-Habermann] ¬ Pityriasis lichénoïde et *L41.0*
- ¬ Acné *L70.2*

Variqueux
- Anus ¬ Ulcère *K64.8*
- Externe de l'anus ¬ Ulcère *K64.5*
- Interne de l'anus ¬ Ulcère *K64.8*
- Membre inférieur tout localisation
- - Localisation] ou de localisation non précisée ¬ Veines *I83.9*
- - ¬ Ulcère *I83.0*
- Septum nasal ¬ Ulcère *I86.88*
- ¬
- - Anévrisme: *I77.0*
- - Ulcère de jambe non *I87.21*

Varole ¬ Lésion syphilitique du pont de *A52.1†, G94.8**

Varum congénital ¬ Genu *Q74.1*

Varus
- Acquis ¬ Pied en metatarsus *M21.68*
- Congénital ¬ Hallux *Q66.3*
- Équin ¬ Pied bot *Q66.0*
- Non classée ailleurs ¬ Déformation en *M21.1*
- ¬
- - Anomalies morphologiques congénitales du pied en *Q66.3*
- - Hallux *M20.3*
- - Metatarsus *Q66.2*
- - Pied bot talus *Q66.1*

Vasculaire
v. pigmento-vasculaire
v. Type de maladie

Vascularite
- Angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs ¬ *L95*
- Associée aux ANCA ¬ *I77.6*
- Cryoglobulinémique ¬ Angéite [*D89.1*
- Déficit en ADA2 ¬ *M30.8*

Vascularite *–suite*
- IgA ¬ *D69.0*
- Induite par les médicaments ¬ *D69.0*
- Limité peau
- - Sans précision ¬ *L95.9*
- - ¬ Autres *L95.8*
- Livédoïde ¬ *L95.0*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.2*
- Petits vaisseaux cutanés ¬ *M31.0*
- Post-infectieuse ¬ *I77.6*
- Rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- Systémique ¬ *I77.6*
- Urticarienne hypocomplémentémique ¬ *M31.8*
- ¬ Neuropathie non systémique due à une *G61.8*

Vasculite
- Allergique ¬ *D69.0*
- Cours d'arthrite juvénile ¬ *M08.7*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88*
- Toxoplasmes ¬ *B58.8†, I98.1**

Vasculopathie
- Enfant associée à STING ¬ *M35.8*
- Nécrosante
- - Précisées ¬ Autres *M31.8*
- - Sans précision ¬ *M31.9*
- - ¬ Autres *M31*

Vasculo-rénale ¬ Hypertension *I15.0*

Vasectomie ¬
- Admission pour ligature des trompes de Fallope ou *Z30.2*
- Spermogramme après *Z30.8*

Vaso-actif ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: polypeptide: intestinal *E16.8*

Vasoconstriction cérébrale réversible ¬ Syndrome de *I67.88*

Vasodilatateur
- Coronariens, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T46.3*
- Périphériques ¬ Intoxication: *T46.7*

Vasomotrice
- Type Nothnagel] ¬ Acroparesthésie: *I73.8*
- ¬ Rhinopathie
- - *J30.0*
- - Allergique et *J30*

Vasoplastie après stérilisation ¬ Tuboplastie ou *Z31.0*

Vasospasme
- Artères coronaires ¬ *I20.1*
- Cours d'hémorragie sous-arachnoïdienne ¬ *I67.80!*
- Psychogène ¬ *F45.30*
- Traumatique ¬ Syndrome de: *T75.2*

Vasovagal psychogène ¬
- Malaise *F45.30*
- Syndrome *F45.30*

Vater ¬
- Ampoule
- - *D01.5*
- - *D37.6*
- Carcinome de l'ampoule de *C24.1*
- Syndrome de: *Q87.2*
- Tumeur maligne: Ampoule de *C24.1*

VCP ¬ Myopathie distale de l'adulte due à des mutations de *G71.0*

VDDI avec communication interventriculaire sous-aortique ou sous-aortique et sous-pulmonaire et sténose pulmonaire ¬ *Q20.1*

Vectocardiogramme ¬ Anomalies (de): *R94.3*

Vegetans ¬ Keratosis *Q82.8*

Végétant ¬ Pemphigus *L10.1*

Végétariens stricts ¬ Anémie des *D51.3*

Végétatif du à l'alcool ¬ Dysfonctionnement du système nerveux *G31.2*

Végétation adénoïde
- SAI ¬ Maladie (chronique) des amygdales et des *J35.9*
- Sans précision ¬ Maladie chronique des amygdales et des *J35.9*
- ¬
- - Hyperplasie des *J35.2*
- - Hypertrophie
- - - *J35.2*
- - - Amygdales et des *J35.3*
- - Maladies chroniques des amygdales et des *J35.8*

Végétaux sauf aliment ¬ Dermite
- Allergique de contact due aux *L23.7*
- Contact, sans précision, due aux *L25.5*
- Irritante de contact due aux *L24.7*

Véhicule
- Aquatique ¬ Accident dû à un *V99!*
- Attelé à un animal ¬ Accident d'équitation ou accident de *V99!*
- Livraison ¬ Accident de *V99!*
- Moteur causé délibérément ¬ Accident de *Y09.9!*
- Spécialisé ¬ Accident dû à un *V99!*

Veille sommeil
- Anormal ¬ Cycle *Z91.8*
- Non dû à une cause organique ¬ Trouble du rythme *F51.2*
- ¬
- - Irrégularité du rythme *G47.2*
- - Troubles du cycle *G47.2*

Veine
- Abdominale ¬ Thrombose d'une *I82.88*
- Anales ¬ Thrombose des *K64.5*
- Axillaire
- - Brachiale ¬ Lésion traumatique de la *S45.2*
- - ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: *I80.81*
- Azygos ¬
- - *S25.88*

Veine *–suite*
- Azygos ¬ *–suite*
- - Continuation de la veine cave inférieure dans la *Q26.8*
- Basilaire ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: *I80.80*
- Brachio-céphalique sous-aortique ¬ *Q26.8*
- Cardinale postérieure gauche ¬ Persistance de la *Q26.8*
- Cave
- - Inférieur
- - - Oreillette gauche ¬ Drainage anormal de la *Q26.8*
- - - Supérieur
- - - - SAI ¬ Anomalie de la *Q26.9*
- - - - ¬
- - - - - Absence de *Q26.8*
- - - - - Sténose congénitale de la *Q26.0*
- - - - - Syndrome de la *I87.1*
- - - Veine azygos ¬ Continuation de la *Q26.8*
- - - ¬
- - - - Interruption de la *Q26.8*
- - - - Lésion traumatique de la *S35.1*
- - SAI ¬ *S25.2*
- - Supérieur
- - - Droite dans l'oreillette gauche ¬ Abouchement de la *Q26.8*
- - - Gauche
- - - - Oreillette gauche par le sinus coronaire ¬ Abouchement de la *Q26.1*
- - - - Toit de l'oreillette gauche ¬ Abouchement de la *Q26.1*
- - - - ¬
- - - - - Persistance de la *Q26.1*
- - - - - Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec communication interatriale, séquence de Robin et persistance de la *Q87.8*
- - - ¬
- - - - Agénésie de la *Q26.8*
- - - - Lésion traumatique de la *S25.2*
- - ¬
- - - Embolie et thrombose de la *I82.2*
- - - Sténose congénitale de la *Q26.0*
- Céphalique ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: *I80.80*
- Cérébrale ¬ Thrombose non pyogène de: *I67.6*
- Cou ¬ Oblitération d'une *I82.88*
- Dorsale du pied ¬ Lésion traumatique de la *S95.2*
- Fémoral
- - Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique de la *S75.1*
- - ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la *I80.1*
- Galien ¬
- - Anévrisme de la *Q28.20*
- - Malformation atério-veineuse de la *Q28.28*

Veine *–suite*
- Hépatique ¬
- - *S35.1*
- - Phlébite d'une *I80.88*
- - Thrombophlébite d'une *I80.88*
- Hypogastrique ¬ Artère ou *S35.88*
- Iliaque ¬
- - Artère ou *S35.5*
- - Thrombose de la *I80.20*
- Innominée
- - Sous-clavière ¬ Lésion traumatique de la *S25.3*
- - ¬ Absence de *Q26.8*
- Intracrânien intrarachidien ¬
- - Embolie septique des sinus veineux et *G08*
- - Endophlébite septique des sinus veineux et *G08*
- - Phlébite septique des sinus veineux et *G08*
- - Thrombophlébite septique des sinus veineux et *G08*
- - Thrombose septique des sinus veineux et *G08*
- Jugulaire
- - Externe ¬ Lésion traumatique de la *S15.2*
- - Interne ¬ Lésion traumatique de la *S15.3*
- - ¬
- - - Embolie et thrombose de la *I82.81*
- - - Thrombose
- - - - *I82.81*
- - - - Bulbe de la *I82.81*
- Mammaire ¬ Artère ou *S25.88*
- Méninges ¬ Thrombose d'une *I67.6*
- Mésentérique (inférieure) (supérieure) ¬ *S35.3*
- N entraînant infarctus myocarde ¬
- - Embolie coronaire (artère) (*I24.0*
- - Occlusion coronaire (artère) (*I24.0*
- - Thrombo-embolie coronaire (artère) (*I24.0*
- Niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'une *S55.2*
- Non précisée ¬ Embolie et thrombose d'une *I82.9*
- Ovarienne ¬ Artère ou *S35.88*
- Pelvien
- - Avant l'accouchement ¬ Thrombophlébite des *O22.3*
- - ¬ Thrombose
- - - *I80.20*
- - - Phlébite et thrombophlébite des *I80.20*
- Perforantes ¬ Insuffisance des *I87.20*
- Poplité ¬
- - Lésion traumatique de la *S85.5*
- - Phlébite de la *I80.28*
- - Thrombophlébite de la *I80.28*
- - Thrombose de la *I80.28*
- Porte

Veine *–suite*
- Porte *–suite*
- - Artère hépatique (congénitale) ¬ Fistule entre la *Q26.6*
- - Splénique ¬ Lésion traumatique de la *S35.3*
- - Syphilis ¬ Thrombose de la *A52.0†, I98.0**
- - ¬
- - - Obstruction de la *I81*
- - - Phlébite de la *K75.1*
- - - Syphilis de la *A52.0†, I98.0**
- - - Thrombose de la *I81*
- Précisées ¬ Embolie et thrombose d'autres *I82.88*
- Profond membre
- - Inférieur ¬ Insuffisance des *I87.20*
- - Supérieurs ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite des *I80.81*
- Pulmonaire ¬
- - Atrésie des *Q26.3*
- - Infarctus (d'une artère) (d'une *I26*
- - Thromboembolie (d'une artère) (d'une *I26*
- - Thrombose (d'une artère) (d'une *I26*
- Rénal
- - Fœtus ¬ Thrombose de la *P29.8*
- - Nouveau-né ¬ Thrombose de la *P29.8*
- - ¬
- - - Artère ou *S35.4*
- - - Embolie et thrombose de la *I82.3*
- Rétine
- - Branche ¬ Occlusion de la *H34.8*
- - Centrale ¬ Occlusion de la *H34.8*
- - Débutante ¬ Occlusion de la *H34.8*
- - Partielle ¬ Occlusion de la *H34.8*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale d'une grande *Q26.9*
- Saphène
- - Externe au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de la *S85.4*
- - Interne
- - - Niveau
- - - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique de la *S75.2*
- - - - Jambe ¬ Lésion traumatique de la *S85.3*
- - - SAI ¬ *S85.3*
- Sous-clavière ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: *I80.81*
- Splénique ¬ Embolie et thrombose de la *I82.80*
- Superficiel
- - Membre
- - - Inférieurs ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite des *I80.0*
- - - Supérieurs ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite des *I80.80*
- - Niveau de l'épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'une *S45.3*
- Surrénale ¬ Thrombose d'une *I82.88*
- Sus-hépatiques ¬ Anomalies des *Q26.8*

Veine *–suite*
- Utérine ¬ Artère ou *S35.88*
- Variqueuses des membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée ¬ *I83.9*
- ¬
- - Absence d'une artère ou d'une *Q27.8*
- - Atrésie d'une artère ou d'une *Q27.8*
- - Embolie mésentérique (artère) (*K55.0*
- - Infarctus mésentérique (artère) (*K55.0*
- - Malformations congénitales des grandes *Q26.8*
- - Thrombose mésentérique (artère) (*K55.0*

Veinectasie anale ¬ *K64.9*

Veineux
- Animaux venimeux ¬ Accident dû au contact avec des plantes *X29.9!*
- Bras ¬ Thrombose *I80.88*
- Cérébral
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Thrombose
- - - - *O22.5*
- - - - Sinus *O22.5*
- - - Puerpéralité ¬ Thrombose
- - - - *O87.3*
- - - - Sinus *O87.3*
- - Non pyogène ¬ Infarctus cérébral dû à une thrombose *I63.6*
- Chronique
- - Membre inférieur ¬ Insuffisance *I87.20*
- - Périphérique
- - - SAI ¬ Insuffisance *I87.20*
- - - Sans ulcération ¬ Insuffisance *I87.20*
- - - Ulcération ¬ Insuffisance *I87.21*
- - - ¬ Insuffisance *I87.2*
- Consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Autres complications *O08.7*
- Cours puerpéralité
- - Sans précision ¬ Complication *O87.9*
- - ¬ Autres complications *O87.8*
- Cutanéomuqueuse ¬ Malformation *Q27.8*
- Épisclérale élevée ¬ Glaucome secondaire à une pression *H40.5*
- Grossesse
- - Sans précision ¬ Complication *O22.9*
- - ¬ Autres complications *O22.8*
- Hémorroïdes cours
- - Grossesse ¬ Complications *O22*
- - Puerpéralité ¬ Complications *O87*
- Intracrânien ¬ Thrombose non pyogène
- - Sinus *I67.6*
- - Système *I67.6*
- Jambe sans varices ¬ Ulcère *I87.21*
- Membres inférieurs, avec ulcération ¬ Insuffisance *I87.21*
- Osseux

Veineux *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Primaire ¬ Malformation *D18.08*
- - ¬ Malformation *D18.08*
- Périanale ¬ Thrombose *K64.5*
- Portal anormal ¬ Retour *Q26.5*
- Précisées ¬ Autres atteintes *I87.8*
- Profond
- - Avant l'accouchement ¬ Thrombose *O22.3*
- - Extrémité inférieure ¬ Inflammation thrombotique *I80.28*
- - Post-partum ¬ Thrombose *O87.1*
- - SAI ¬ Thrombose *I80.28*
- Pulmonaire
- - Anormal
- - - Partiel ¬ Retour *Q26.3*
- - - Sans précision ¬ Retour *Q26.4*
- - - Total ¬ Retour *Q26.2*
- - ¬ Anomalie congénital
- - - Partielle du retour *Q26.3*
- - - Retour *Q26.4*
- - - Totale du retour *Q26.2*
- SAI ¬
- - Anomalie artérielle ou *Q27.9*
- - Embolie *I82.9*
- - Thrombose (*I82.9*
- Sans précision ¬ Atteinte *I87.9*
- Veine intracrânien intrarachidien ¬
- - Embolie septique des sinus *G08*
- - Endophlébite septique des sinus *G08*
- - Phlébite septique des sinus *G08*
- - Thrombophlébite septique des sinus *G08*
- - Thrombose septique des sinus *G08*
- ¬
- - Anomalie congénitale du retour *Q26.8*
- - Atteintes *I87*
- - Compression *I87.1*
- - Consommation d'animaux venimeux ou de plantes *X49.9!*
- - Contact avec des animaux venimeux ou des plantes *X29!*
- - Embolies et thromboses *I82*
- - Inflammation *I80*
- - Lésion due à des plantes *X29.9!*
- - Malformation du sinus: *Q21.1*
- - Rétrécissement *I87.1*
- - Syphilis *A52.0†, I98.0**
- - Trouble circulatoire *I87.20*
- - Ulcère de jambe dû à une insuffisance *I87.21*

Veinolobaire pulmonaire congénital ¬ Syndrome *Q26.8*

Veino-occlusif
- Foie ¬ Maladie
- - *K76.5*
- - Toxique *K71.80*

Veino-occlusif *–suite*
- Hépatique-déficit immunitaire ¬ Syndrome de maladie *D82.8, K76.5*
- Pulmonaire ¬
- - Maladie *I27.0*
- - MVOP [maladie *I27.0*

Vélaire ¬ Fente *Q35.3*

Vélamenteuse cordon ¬
- Hémorragie due à une insertion *O69.4*
- Perte de sang fœtal due à une insertion *P50.0*
- Travail et accouchement compliqués par une insertion *O69.4*

Vélo-facio-squelettique ¬ Syndrome *Q87.0*

Vénérien
- Chlamydia ¬ Lymphogranulomatose *A55*
- SAI ¬ Maladie *A64*
- ¬
- - Arthrite *M02.39*
- - Balanite *A64†, N51.2**
- - Condylomes ano-génitaux (*A63.0*
- - Rétrécissement du rectum dû à un lymphogranulome *A55†, K93.8**
- - Salpingite *A54.2†, N74.3**
- - Salpingo-ovarite *A54.2†, N74.3**
- - Syphilis non *A65*
- - Urétrite
- - - *A64†, N37.0**
- - - Non *N34.1*
- - Vaginite *A64†, N77.1**

Vénézuélienne ¬ Fièvre
- Équine *A92.2*
- Hémorragique *A96.8*

Venimeux
- Multiples SAI ¬ Piqûres d'insecte (non *T00.9*
- Plante veineux ¬
- - Consommation d'animaux *X49.9!*
- - Contact avec des animaux *X29!*
- Sans précision ¬ Effet toxique d'un contact avec un animal *T63.9*
- ¬
- - Accident dû au contact avec des plantes vénéneuses ou des animaux *X29.9!*
- - Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux *T63.8*
- - Lésion
- - - Plante (non *W64.9!*
- - - Traumatique superficiel
- - - - Avant-bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S50.83*
- - - - Cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S90.83*
- - - - Épaule et du bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S40.83*
- - - - Hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S70.83*
- - - - Jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S80.83*

Venimeux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique superficiel *–suite*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non *T13.03*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non *T11.03*
- - - - Partie du corps non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non *T14.03*
- - - - Poignet et de la main: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S60.83*
- - - - Tronc, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non *T09.03*
- - Morsure animal
- - - Non *W64.9!*
- - - Piqûre d'insecte *X29.9!*
- - Piqûre
- - - Insecte, non *W64.9!*
- - - Morsure d'insecte *T63.4*

Venin
- Amphibien ¬ *T63.8*
- Araignée ¬ Effet toxique: *T63.3*
- Arthropodes ¬ Effet toxique: *T63.4*
- Lézard ¬ *T63.1*
- Reptiles ¬ Effet toxique: *T63.1*
- Scorpion ¬ Effet toxique: *T63.2*
- Serpent
- - Marin ¬ *T63.0*
- - ¬ Effet toxique: *T63.0*

Venosus ¬ CIA type sinus *Q21.1*

Ventilation
- Articielle ¬ Pneumonie au cours de la *J95.88*
- Climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de *J67.7*
- Nouveau-né ¬ Poumon de *P27.8*

Ventilatoire obstructif ¬ Bronchiolite oblitérante avec trouble *J44.89*

Ventosa ¬ Spina *A18.0†, M90.09**

Ventouse
- Forceps
- - Sans précision ¬ Echec de l'application d'une *O66.5*
- - Suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne ¬ Application d'une *O66.5*
- ¬
- - Accouchement unique par forceps et *O81*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [*P03.3*

Ventre
- Besace) ¬ Soins maternels pour: abdomen penduleux (*O34.8*
- ¬ Absence congénitale de la musculature du *Q79.4*

Ventriculaire
v.a. atrio-ventriculaire
v.a. auriculo-ventriculaire
- Ballon ¬ Syndrome de l'apex *I42.88*
- Droit
- - Arythmogène
- - - CVDA] ¬ Cardiomyopathie *I42.80*
- - - Familiale isolée ¬ Dysplasie *I42.80*
- - - ¬ Dysplasie *I42.80*
- - Isolée ¬ Hypoplasie *Q22.6*
- Gauche
- - Non précisée ¬ Insuffisance *I50.19*
- - ¬
- - - Augmentation pathologique de la pression télédiastolique *R94.3*
- - - Hypertrabéculation *I42.88*
- - - Non-compaction *I42.88*
- Idiopathique type Brugada ¬ Fibrillation *I49.8*
- Incessante du nouveau-né ¬ Tachycardie *I47.2*
- Intracrânien
- - Communication) ¬ Complication mécanique d'un shunt *T85.0*
- - ¬ Sepsis dû à un shunt *T85.72*
- Non spécifique ¬ Bloc *I45.4*
- Paroxystique maligne ¬ Tachycardie *I47.2*
- Polymorphe catécholaminergique ¬ Tachycardie *I47.2*
- Prématurée ¬ Dépolarisation *I49.3*
- Réentrée ¬ Arythmie *I47.0*
- Syncopes-pérodactylie-séquence de Robin ¬ Syndrome d'extrasystoles *Q87.8*
- ¬
- - Anévrisme: *I25.3*
- - Bandes *C32.1*
- - Canal atrioventriculaire complet - hypoplasie *Q21.2*
- - Dilatation *I51.7*
- - Fibrillation et flutter *I49.0*
- - Hyperkinésie *R93.1*
- - Hypotension intracrânienne suite à un pontage *G97.2*
- - Inversion *Q20.5*
- - Tachycardie *I47.2*
- - Thrombose (ancienne): *I51.3*

Ventricule
- Cérébral ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumeur maligne: *C71.5*
- Commun ¬ *Q20.4*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du *I23.6*
- Croisés ¬ *Q24.8*
- Double issue [Double inlet ventricle] ¬ *Q20.4*
- Droit
- - Double issue

Ventricule *–suite*
- Droit *–suite*
- - Double issue *–suite*
- - - Communication interventriculaire
- - - - Sous-aortique
- - - - - Sous-aortique ou sous-aortique et sous-pulmonaire et sténose pulmonaire ¬ *Q20.1*
- - - - - ¬ *Q20.1*
- - - - Sous-pulmonaire ¬ *Q20.1*
- - - Double outlet right ventricle
- - - - CIV [communication interventriculaire] sous-pulmonaire non-committed ¬ *Q20.1*
- - - - Communication interventriculaire sous-aortique ¬ *Q20.1*
- - - - ¬ *Q20.1*
- - ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du *Q21.3*
- Gauche
- - Double issue [Double outlet left ventricle] ¬ *Q20.2*
- - ¬
- - - Cardiopathie coronarienne avec insuffisance fonctionnelle du *I25.19*
- - - Diverticule congénital du *Q24.8*
- Unique ¬ *Q20.4*
- ¬
- - Quatrième
- - - *C71.7*
- - - *D33.1*
- - - *D43.1*
- - Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et *C71.0*

Ventriculite (cérébrale) SAI ¬ *G04.9*

Ventriculo-artériel
- Concordance atrio-ventriculaire ¬ Discordance *Q20.3*
- Isolée ¬ Discordance *Q20.3*

Ventriculo-auriculaire discordante ¬ Communication *Q20.3*

Ver
- Guinée ¬ Infection [dracontiase] (à): *B72*
- Solitaire du bœuf ¬ *B68.1*

Verbale ¬ Surdité *F80.2*

Verge
- SAI ¬ Peau de la *C60.9*
- Sans précision ¬
- - Affection de la *N48.9*
- - Tumeur maligne: *C60.9*
- ¬
- - Abcès des corps caverneux et de la *N48.2*
- - Adénocarcinome de la *C60.9*
- - Affection
- - - *N48*
- - - Inflammatoires de la *N48.2*
- - - Précisées de la *N48.8*

Verge *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anthrax des corps caverneux et de la *N48.2*
- - Atrophie des corps caverneux et de la *N48.8*
- - Carcinoma in situ: *D07.4*
- - Carcinome épidermoïde de la *C60.9*
- - Cavernite (de la *N48.2*
- - Furoncle des corps caverneux et de la *N48.2*
- - Hypertrophie des corps caverneux et de la *N48.8*
- - Kraurosis de la *N48.0*
- - Leucoplasie de la *N48.0*
- - Phlegmon des corps caverneux et de la *N48.2*
- - Thrombose des corps caverneux et de la *N48.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D29.0*
- - - Malign
- - - - *C60*
- - - - Corps de la *C60.2*
- - - - Lésion à localisations contiguës de la *C60.8*
- - Ulcère de la *N48.5*

Vergetures ¬ *L90.6*

Vérification
- Dispositif cardiaque (électronique) ¬ Contrôle et *Z45.0*
- Enlèvement
- - Appareils externes de fixation ou de traction ¬ Changement, *Z47.8*
- - Plâtre ¬ Changement, *Z47.8*
- Réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] ¬ *Z30.5*

Vérifié ¬ Angine de poitrine avec spasme coronaire *I20.1*

Verloove-Van Horick-Brubakk ¬ Syndrome de *Q87.8*

Verma-Naumoff ¬ Syndrome des côtes courte-spolydactylie type *Q77.2*

Vermiculaire ¬ Adhérences de l'appendice *K66.0*

Vermiforme ¬ Atrophoderma *L66.4*

Vermis cérébelleux ¬ Hypoplasie isolée du *Q04.3*

Vernale ¬ Kératoconjonctivite *H16.2*

Verno estival
- Europe centrale (FSME) ¬ Encéphalite *A84.1*
- Russe] ¬ Encéphalite de la taïga [encéphalite *A84.0*

Verre
- Ostéogenèse imparfaite] ¬ Maladie des os de *Q78.0*
- ¬ Maladie des os de *Q78.0*

Verres de contact ¬ Mise en place et ajustement de lunettes et *Z46.0*

Verruca
- Simplex ¬ *B07*
- Vulgaris ¬ *B07*

Verruciforme
- Hopf ¬ Acrokératose *Q82.8*
- ¬
- - Collagénome perforant *L87.1*
- - Epidermodysplasie *B07*

Verrue
- Origine virale ¬ *B07*
- Séborrhéique ¬ *L82*

Verrues-hypogammaglobulinémie-infections-myélokathexis ¬ Syndrome des *D81.8*

Verruga peruana ¬ *A44.1*

Verruqueux
- Atypique ¬ Endocardite *M32.1†, I39.8**
- Hypertrophique ¬ Lupus érythémateux *L93.2*
- Löffler ¬ Endocardite *I42.3*
- Muqueuse buccale ¬ Xanthome *K13.4*
- Non rhumatismale ¬ Endocardite *M32.1†, I39.8**
- ¬
- - Dermatite *B43.0*
- - Dyskératome *D23.9*
- - Hémangiome *D18.00*
- - Nævus: *Q82.5*

Versant
- Hypopharyngé ¬
- - Repli ary-épiglottique
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, *C13.1*
- Laryngé ¬ Repli ary-épiglottique
- - *C32.1*
- - *D02.0*
- - *D38.0*

Versicolor ¬
- Pityriasis *B36.0*
- Tinea: *B36.0*

Version externe avant le travail ¬ *P01.7*

Vertébral
v.a. oculo-auriculo-vertébral
- Adulte ¬ Ostéochondrite *M42.1*
- Ankylosante avec tylose ¬ Hyperostose *M48.19*
- Anomalies des membres ¬ Syndrome de polydactylie en miroir-segmentation *Q87.2*
- Cervical(e) ¬ arc: *S12*
- Congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Synostose *Q76.4*
- Cours
- - Arthrite rhumatoïde ¬ Atteinte *M45*
- - Maladies classées ailleurs ¬ Tassement *M49.5**
- Dorsal(e) ¬ arc: *S22*

Vertébral *–suite*
- Fatigue ¬ Fracture *M48.4*
- Juvénile ¬ Ostéochondrite *M42.0*
- Lésion de la moelle épinière ¬ Fracture de la colonne *T08.0, T09.3*
- Lombo-sacré(e) ¬ arc: *S32*
- Métastase ¬ Fracture *C79.5†, M49.59**
- Moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie ¬ Lésion de la colonne *P11.59*
- N entraînant infarctus cérébral ¬
- - Embolie des artères basilaires, carotides et *I65*
- - Obstruction (complète) (partielle) des artères basilaires, carotides et *I65*
- - Sténose des artères basilaires, carotides et *I65*
- - Thrombose des artères basilaires, carotides et *I65*
- Non classé ailleurs ¬ Tassement *M48.5*
- Récidivantes ¬ Autres subluxations *M43.5*
- SAI ¬
- - Incurvation *M43.9*
- - Tassement *M48.5*
- Sans précision ¬ Ostéochondrite *M42.9*
- Stress ¬ Fracture *M48.4*
- Tuberculeux ¬ Bloc *A18.0†, M49.09**
- Tuberculose ¬ Déformation de la colonne *A18.0†, M49.09**
- Vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques ¬ tassement *M80*
- ¬
- - Abcès tuberculeux de la colonne *A18.0†, M49.09**
- - Anévrisme et dissection de l'artère *I72.6*
- - Ankylose d'articulation *M43.2*
- - Artère basilaire carotide
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- - Artériosclérose de l'artère *I65.0*
- - Arthrite tuberculeuse de la colonne *A18.0†, M49.09**
- - Arthrose ou ostéoarthrite *M47*
- - Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne *M46.0*
- - Carie tuberculeuse de la colonne *A18.0†, M49.09**
- - Céphalée d'origine *M54.2*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: Colonne *T84.20*
- - Granulome tuberculeux de la colonne *A18.0†, M49.09**
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.5*
- - Instabilités *M53.2*
- - Lésion traumatique de l'artère *S15.1*
- - Nécrose tuberculeuse de la colonne *A18.0†, M49.09**
- - Occlusion et sténose de l'artère *I65.0*

Vertébral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ostéochondrite *M42*
- - Ostéomyélite *M46.2*
- - Soudures *M43.2*
- - Subluxation complexe (*M99.1*
- - Syndrome
- - - Compression de l'artère *M47.09†, G99.2**
- - - Polydactylie postaxiale-anomalies dentaires et *Q87.2*
- - Synovite tuberculeuse de la colonne *A18.0†, M49.09**
- - TBC [Tuberculose] de la colonne *A18.0†, M49.09**
- - Ténosynovite tuberculeuse de la colonne *A18.0†, M49.09**
- - Tuberculose
- - - *A18.0†, M49.09**
- - - Colonne *A18.0†, M49.09**
- - Ulcère tuberculeux de la colonne *A18.0†, M49.09**

Vertebrale suboccipitale ¬ Malum *A18.0†, M49.01**

Vertèbre
- Cervical
- - C1/C2 ¬ Luxation d'une *S13.11*
- - C2/C3 ¬ Luxation d'une *S13.12*
- - C3/C4 ¬ Luxation d'une *S13.13*
- - C4/C5 ¬ Luxation d'une *S13.14*
- - C5/C6 ¬ Luxation d'une *S13.15*
- - C6/C7 ¬ Luxation d'une *S13.16*
- - C7/D1 ¬ Luxation d'une *S13.17*
- - E) ¬ *S12*
- - Lésion de la moelle épinière ¬ Fracture des *S12.9, S14.10*
- - Niveau SAI ¬ Luxation d'une *S13.10*
- - Précisées ¬ Fracture d'autres *S12.2*
- - SAI ¬ Fracture de: *S12.9*
- - ¬
- - - Fracture
- - - - *S12.9*
- - - - 3ème *S12.21*
- - - - 4ème *S12.22*
- - - - 5ème *S12.23*
- - - - 6ème *S12.24*
- - - - 7ème *S12.25*
- - - - Deuxième *S12.1*
- - - - Multiples des *S12.7*
- - - - Première *S12.0*
- - - Luxation d'une *S13.18*
- - - Syndrome de microcéphalie-fusions des *Q87.8*
- Cunéiforme
- - Ostéoporotiques ¬ tassement vertébral et *M80*
- - SAI ¬ *M48.5*
- Dorsal

Vertèbre *–suite*
- Dorsal *–suite*
- - D1 D2
- - - D2 et D2/D3 ¬ Luxation d'une *S23.11*
- - - ¬ Fracture d'une *S22.01*
- - D11 D12 ¬
- - - Fracture d'une *S22.06*
- - - Luxation d'une *S23.16*
- - D12/L1 ¬ Luxation d'une *S23.17*
- - D3 D4
- - - D4 et D4/D5 ¬ Luxation d'une *S23.12*
- - - ¬ Fracture d'une *S22.02*
- - D5 D6
- - - D6 et D6/D7 ¬ Luxation d'une *S23.13*
- - - ¬ Fracture d'une *S22.03*
- - D7 D8
- - - D8 et D8/D9 ¬ Luxation d'une *S23.14*
- - - ¬ Fracture d'une *S22.04*
- - D9 D10
- - - D10 et D10/D11 ¬ Luxation d'une *S23.15*
- - - ¬ Fracture d'une *S22.05*
- - E) ¬ *S22*
- - Niveau non précis ¬
- - - Fracture d'une *S22.00*
- - - Luxation d'une *S23.10*
- - Non précisée ¬ *S23.10*
- - ¬
- - - Fracture d'une *S22.0*
- - - Luxation d'une *S23.1*
- Lombaire
- - L1
- - - L2 ¬ Luxation d'une *S33.11*
- - - ¬ Fracture d'une *S32.01*
- - L2
- - - L3 ¬ Luxation d'une *S33.12*
- - - ¬ Fracture d'une *S32.02*
- - L3
- - - L4 ¬ Luxation d'une *S33.13*
- - - ¬ Fracture d'une *S32.03*
- - L4
- - - L5 ¬ Luxation d'une *S33.14*
- - - ¬ Fracture d'une *S32.04*
- - L5
- - - S1 ¬ Luxation d'une *S33.15*
- - - ¬ Fracture d'une *S32.05*
- - Lésion de la moelle épinière ¬ Fracture des *S32.00, S34.18*
- - Niveau non précis ¬
- - - Fracture d'une *S32.00*
- - - Luxation d'une *S33.10*
- - SAI ¬ Luxation de *S33.10*
- - ¬
- - - Fracture d'une *S32.0*
- - - Luxation d'une *S33.1*
- Lombo-sacré(e) ¬ *S32*

Vertèbre *–suite*
- Progressive non infectieuse ¬ Fusion des *Q87.5*
- Sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Absence congénitale de *Q76.4*
- Surnuméraire sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Thoraciques avec lésion de la moelle épinière ¬ Fracture des *S22.00, S24.10*

Vertébro-basilaire ¬ Syndrome *G45.0*

Vertical
- Vertical shear fracture] ¬ Fracture de cisaillement *S32.7*
- ¬
- - Astragale *Q66.8*
- - Strabisme *H50.2*
- - Surocclusion: *K07.2*

Vertical shear fracture] ¬ Fracture de cisaillement verticale [*S32.7*

Verticis gyrata primitif non essentiel ¬ Cutis *Q82.8*

Vertige
- Auriculaire ¬ *H81.3*
- Bénin paroxystique ¬ *H81.1*
- Épidémique ¬ *A88.1†, H82**
- Infra-sons ¬ *T75.2*
- Ménière ¬ Syndrome ou *H81.0*
- Origine centrale ¬ *H81.4*
- Otogène ¬ *H81.3*
- Périphérique
- - Atteinte du labyrinthe ¬ *H81.3*
- - SAI ¬ *H81.3*
- Périphériques ¬ Autres *H81.3*
- SAI ¬ *R42*

Vertigineux
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Syndromes *H82**
- SAI ¬ Syndrome *H81.9*

Vésical
v.a. recto-vésical
- Choc rachidien ¬ Trouble des fonctions *G95.82*
- Cours de la grossesse ¬ Infections *O23.1*
- Instabilité du détrusor due à une neuropathie autonome ¬ Trouble fonctionnel *N31.1*
- Lésion
- - Périphérique [LMNL] ¬ Paralysie *G95.81*
- - Supranucléaire [UMNL] ¬ Paralysie *G95.80*
- Néovessie ¬ Calcul *N21.0*
- Non classée ailleurs ¬ Fistule *N32.2*
- Origine neuromusculaire ¬ Autre dysfonction *N31.88*
- Sans substrat neurologique ¬ Hypo- et acontractilité du muscle *N31.81*
- ¬
- - Aréflexie *G95.81*
- - Atonie *G95.81*
- - Calcul
- - - *N21.0*

Vésical *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Calcul *–suite*
- - - Diverticule *N21.0*
- - Dyssynergie du détrusor du col *N32.0*
- - Ectopie *Q64.1*
- - Exstrophie *Q64.1*
- - Fistule
- - - Cervico- *N82.1*
- - - Utéro- *N82.1*
- - Inflammation due à une sonde *T83.5*
- - Sclérose du sphincter *N32.8*
- - Ténesme *R30.1*
- - Tumeur maligne: Col *C67.5*
- - Ulcère
- - - *N32.8*
- - - Sphincter *N32.8*

Vésico
- Intestinale ¬ Fistule *N32.1*
- Rectale ¬ Fistule *N32.1*
- Urétéral
- - Cicatrice ¬ Reflux *N13.7*
- - SAI ¬ Reflux *N13.7*
- - ¬
- - - Occlusion congénitale de: orifice *Q62.1*
- - - Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (*N11.0*
- - - Uropathie associée à un reflux *N13.7*
- Urétéro-rénal congénital ¬ Reflux *Q62.7*
- Urétral congénital(e) ¬ Rétrécissement de: orifice *Q64.3*

Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies *Q87.8*

Vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière ¬ Dyssynergie *G95.84*

Vésico-vaginal ¬
- Carcinome *C57.9*
- Fistule *N82.0*

Vésiculaire
- Congénitale ¬ Dermatose érosive et *P83.8*
- Entérovirus ¬ Pharyngite *B08.5*
- Exanthème, due à un entérovirus ¬ Stomatite *B08.4*
- Fièvre de Kew Garden] ¬ Rickettsiose *A79.1*
- Lèvre due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite *B00.1*
- Oreille due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite *B00.1*
- SAI ¬ Môle *O01.9*
- Virale [fièvre de l'Indiana] ¬ Stomatite *A93.8*
- Virus de l'herpès ¬ Dermite *B00.1*
- ¬
- - Emphysème (pulmonaire): *J43.9*
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle: *Z35.1*

Vésicule
- Biliaire
- - Cholécystite aiguë ¬ Calcul de la *K80.0*
- - Exclue ¬ *R93.2*
- - Forme de cholécystite ¬ Calcul de la *K80.1*
- - Intrahépatique ¬ *Q44.1*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q44.1*
- - Sans
- - - Calcul ¬
- - - - Abcès de la *K81.0*
- - - - Empyème de la *K81.0*
- - - - Gangrène de la *K81.0*
- - - - Occlusion du canal cystique ou de la *K82.0*
- - - - Rétrécissement du canal cystique ou de la *K82.0*
- - - - Sténose du canal cystique ou de la *K82.0*
- - - Cholécystite ¬ Calcul de la *K80.2*
- - - Précision
- - - - Sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: *K80.2*
- - - - ¬ Maladie de la *K82.9*
- - Voie biliaire
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la *K87.0**
- - - Foie ¬ Malformations congénitales de la *Q44*
- - - Pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *K87**
- - ¬
- - - Absence congénitale de la *Q44.0*
- - - Adénocarcinome de la *C23*
- - - Adhérences du canal cystique ou de la *K82.8*
- - - Agénésie, aplasie et hypoplasie de la *Q44.0*
- - - Atrophie du canal cystique ou de la *K82.8*
- - - Cholestérolose de la *K82.4*
- - - Dyskinésie du canal cystique ou de la *K82.8*
- - - Exclusion du canal cystique ou de la *K82.8*
- - - Fistule de la *K82.3*
- - - Hypertrophie du canal cystique ou de la *K82.8*
- - - Infection purulente aiguë de la *K81.0*
- - - Kyste du canal cystique ou de la *K82.8*
- - - Lésion traumatique
- - - - *S36.17*
- - - - Foie et de la *S36.1*
- - - Maladie
- - - - *K82*
- - - - Précisées de la *K82.8*
- - - Malformations congénitales de la *Q44.1*
- - - Mucocèle de la *K82.1*
- - - Occlusion de la *K82.0*
- - - Perforation de la *K82.2*

Vésicule *–suite*
- Biliaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Rupture du canal cystique ou de la *K82.2*
- - - Syphilis tardive de la *A52.7†, K87.0**
- - - Tuberculose de la *A18.8†, K87.0**
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et *D13.5*
- - - - Maligne de la *C23*
- - - - Neuroendocrine de la *C23*
- - - Ulcère du canal cystique ou de la *K82.8*
- Fraise ¬ *K82.4*
- Non thermique ¬ lésion traumatique superficiel
- - Avant-bras: Formation de *S50.82*
- - Cheville et du pied: Formation de *S90.82*
- - Épaule et du bras: Formation de *S40.82*
- - Hanche et de la cuisse: Formation de *S70.82*
- - Jambe: Formation de *S80.82*
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé: Formation de *T13.02*
- - - Supérieur, niveau non précisé: Formation de *T11.02*
- - Partie du corps non précisée: Formation de *T14.02*
- - Poignet et de la main: Formation de *S60.82*
- - Tronc, niveau non précisé: Formation de *T09.02*
- Séminal
- - Prostate
- - - SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des *Q55.4*
- - - ¬ Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des *Q55.4*
- - ¬
- - - *C63.7*
- - - *D29.7*
- - - Affections inflammatoires des *N49.0*
- - - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des *N50.8*
- - - Gonorrhée
- - - - *A54.2†, N51.8**
- - - - Aiguë de la *A54.2†, N51.8**
- - - - Chronique de la *A54.2†, N51.8**
- - - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des *N50.8*
- - - Lésion traumatique: *S37.83*
- - - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des *N50.8*
- - - Syphilis tardive de la *A52.7†, N51.8**
- - - Trichomonase de la *A59.0†, N51.8**

Vésicule *–suite*
- Séminal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Tuberculose des *A18.1†, N51.8**
- - - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des *N50.8*
- Voie biliaire ¬
- - Carcinoma in situ: Foie, *D01.5*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la *K91.81*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, *D37.6*

Vésiculeuse ¬ Stomatite: *K12.1*

Vésiculite
- Amibes ¬ *A06.8†, N51.8**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, N51.8**
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.8**
- Post-gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.8**
- SAI ¬ *N49.0*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N51.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N51.8**

Vessie
- Acquise) ¬ Sténose du col de la *N32.0*
- Automatique SAI ¬ *G95.8*
- Congénital(e) ¬ Occlusion du col de la *Q64.3*
- Cours
- - Cytomégalie ¬ Maladie de la *B25.88†, N33.8**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Affections de la *N33.8**
- Désinhibée d'origine centrale ¬ *N31.0*
- Douloureuse ¬ Syndrome de la *N30.1*
- Faible compliance, fixée organiquement ¬ *N31.80*
- Goudrons ¬ Cancer de la *C67.9*
- Hyperactive ¬ *N32.8*
- Instable sans substrat neurologique ¬ *N31.82*
- Muqueuse) ¬ Prolapsus congénital de: *Q64.7*
- Neurogène
- - Atonique (motrice) (sensorielle) ¬ *N31.2*
- - Autonome ¬ *N31.2*
- - Dénervation afférente chirurgicale ¬ *N31.2*
- - Flasque (périphérique), non classée ailleurs ¬ *N31.2*
- - Neuropathie autonome ¬ *N31.2*
- - Non inhibée, non classée ailleurs ¬ *N31.0*
- - Non-réflexe ¬ *N31.2*
- - Réflexe, non classée ailleurs ¬ *N31.1*
- - SAI ¬ Dysfonctionnement de la *N31.9*
- - Syndrome du cortex frontal ¬ *N31.2*
- Non
- - Précisée ¬ Lésion de la *S37.20*
- - Traumatique ¬ Rupture de la *N32.4*
- Organes urinaires, autres et non précisés ¬ Tumeur maligne secondaire de la *C79.1*

Vessie *–suite*
- Paresseuse ¬ *N31.81*
- Prostate, annexe, utérus ¬ Région génitale, *I97.87*
- Réflexe d'origine rachidienne ¬ *G95.80*
- Remplacement ¬ Fistule entre vagin et *N82.81*
- Sans précision ¬
- - Affection de la *N32.9*
- - Dysfonctionnement neuromusculaire de la *N31.9*
- - Tumeur maligne: *C67.9*
- Spastique ¬
- - *G95.80*
- - *N32.8*
- Surnuméraire ¬ *Q64.7*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- Urétéral ¬ Orifice de la *D30.3*
- Urétral ¬ Orifice de la *D30.3*
- Urètre
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q64.7*
- - ¬
- - - Absence congénitale de la *Q64.5*
- - - Malformations congénitales de la *Q64.7*
- Urinaire ¬ Syphilis tardive de la *A52.7†, N33.8**
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ Maladie de la *B27.0†, N33.8**
- - Herpès ¬ Maladie de la *B00.8†, N33.8**
- ¬
- - Abcès de la *N30.8*
- - Affections précisées de la *N32.8*
- - Anomalie de: épreuves fonctionnelles (de): *R94.8*
- - Blessure ouverte de la *S37.20, S31.83!*
- - Calcification de la *N32.8*
- - Calcul de la *N21.0*
- - Carcinoma in situ: *D09.0*
- - Contusion de la *S37.21*
- - Corps étranger dans la *T19.1*
- - Défaut de remplissage de: *R93.4*
- - Diverticule
- - - *N32.3*
- - - Congénital de la *Q64.6*
- - Dysfonctionnement
- - - Neurogène du détrusor/sphincter de la *N31.88*
- - - Neuromusculaires de la *N31.8*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur de la *Z12.6*
- - Extroversion de la *Q64.1*
- - Formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col de la *Q64.3*
- - Hernie congénitale de la *Q64.7*

Vessie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lacération de la *S37.22*
- - Lésion
- - - *S37.28*
- - - Obstétricale de: *O71.5*
- - - Traumatique de la *S37.2*
- - Obstruction du col de la *N32.0*
- - Perforation traumatique de la *S37.22*
- - Rupture de la *S37.22*
- - Trichomonase de la *A59.0†, N33.8**
- - Tuberculose de la *A18.1†, N33.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D30.3*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.4*
- - - Malign
- - - - *C67*
- - - - Dôme de la *C67.1*
- - - - Lésion à localisations contiguës de la *C67.8*
- - - - Paroi
- - - - - Antérieure de la *C67.3*
- - - - - Latérale de la *C67.2*
- - - - - Postérieure de la *C67.4*
- - - - Trigone de la *C67.0*
- - Ulcère tuberculeux de la *A18.1†, N33.0**

Vestibulaire
- Central ¬ Syndrome *H81.4*
- Principale] ¬ Glande de Bartholin [glande *C51.0*
- Sans précision ¬ Atteinte des fonctions *H81.9*
- ¬
- - Atteintes des fonctions *H81.8*
- - Neuronite *H81.2*
- - Schwannome *D33.3*

Vestibule
- Bouche ¬ Tumeur maligne: *C06.1*
- Fosses nasales ¬ *C30.0*

Vestibulocochléaire
- Cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, *H94.0**
- ¬
- - Névrite syphilitique
- - - Nerf *A52.1†, H94.0**
- - - Tardive du nerf *A52.1†, H94.0**
- - Syphilis du nerf *A52.1†, H94.0**

Vestibulo-cochléaire cours maladie
- Infectieuse NCA ¬ Névrite du nerf *B99†, H94.0**
- Parasitaire NCA ¬ Névrite du nerf *B89†, H94.0**

Vestibulopathie bilatérale idiopathique ¬ *H81.8*

Vestiges branchiaux ¬ *Q18.0*

VHL ¬ *Q85.8*

Viable ¬ Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus *O36.7*

Vibration ¬

- *Z57*
- Effets des *T75.2*
- Exposition à : *W49.9!*
- Urticaire provoquée par *L50.4*

Vibratoire ¬ Urticaire *L50.4*

Vibrio

- Cholerae 01 biovar
- - Cholerae 01, biovar cholerae ¬ A *A00.0*
- - El Tor ¬ A *A00.1*
- Parahaemolyticus ¬ Intoxication alimentaire à *A05.3*
- Vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B98.1!*

Vice réfraction

- Sans précision ¬ *H52.7*
- Troubles de l'accommodation ¬ *H52*
- ¬ Autres *H52.6*

Vici ¬ Syndrome de *Q87.8*

Vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions *P03.1*

Victime

- Coupable
- - Blessures dues à une agression ¬ Examen de la *Z04.5*
- - Viol ou un abus sexuel allégué ¬ Examen de la *Z04.5*
- Crime, d'actes terroristes ou de tortures ¬ *Z65*
- Terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être *F62.0*

Vidal] ¬ Lichen simplex chronique [*L28.0*

Vide ¬ Déficit hypophysaire associé au syndrome de la selle turcique *E23.0*

Vie

- Institution ¬ Difficulté liée à la *Z59*
- Quotidienne NCA ¬ Thérapie concernant les activités de la *Z50.8!*
- Sans précision ¬ Difficulté liée au mode de *Z72.9*
- ¬ difficulté
- - Ajustement aux transitions entre les différentes périodes de *Z60*
- - Lié
- - - Mode
- - - - *Z72*
- - - - *Z72.8*
- - - Orientation de son mode de *Z73*

Vieillesse sans mention de psychose ¬ *R54*

Vieillissement prématuré type Penttinen ¬ Syndrome de *E34.8*

Vigile] ¬ Semi-coma [coma *R40.1*

VIH

- Abattement ¬ Maladie due au *B23.8, R53*
- Adénopathie ¬ Maladie due au *B23.8, R59.9*
- Affection du système nerveux central ¬ Maladie due au *B22†, G94.8**
- Agranulocytose ¬ Maladie due au *B23.8, D70.3*
- Altération vasculaire de la rétine ¬ Maladie due au *B23.8, H35.0*
- Anémie
- - Carence ¬ Maladie due au *B23.8, D53.9*
- - Hémolytique acquise ¬ Maladie due au *B23.8, D59.9*
- - ¬ Maladie due au *B23.8, D64.9*
- Anomalie respiratoire ¬ Maladie due au *B23.8, R06.88*
- Arthrite
- - Infectieuse ¬ Maladie due au *B20, M00.99*
- - Purulente ¬ Maladie due au *B20, M00.99*
- Cachexie ¬ Maladie due au *B22, R64*
- Candidose
- - Bouche ¬ Maladie due au *B20, B37.0*
- - Disséminée ¬ Maladie due au *B20, B37.88*
- - Peau et des ongles ¬ Maladie due au *B20, B37.2*
- - Poumons ¬ Maladie due au *B20, B37.1*
- - ¬ Maladie due au *B20, B37.9*
- Catégorie
- - 1 ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au *U61.1!*
- - 2 ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au *U61.2!*
- - 3 ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au *U61.3!*
- - A ¬ Catégories cliniques de l'infection par le *U60.1!*
- - B ¬ Catégories cliniques de l'infection par le *U60.2!*
- - C ¬ Catégories cliniques de l'infection par le *U60.3!*
- Cécité ¬ Maladie due au *B23.8, H54.0*
- Coccidioïdomycose ¬ Maladie due au *B20, B38.9*
- Coccidiose ¬ Maladie due au *B20, A07.3*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [*O98.7*
- Cryptococcose ¬ Maladie due au *B20, B45.9*
- Cytomégalie ¬ Maladie due au *B20, B25.9*
- Démence
- - Présénile ¬ Maladie due au *B22†, F02.4**
- - ¬ Maladie due au *B22†, F02.4**
- Démyélinisation ¬ Maladie due au *B22†, G94.8**
- Dermatomycose ¬ Maladie due au *B20, B36.9*
- Dermatophytose [dermatophytie] ¬ Maladie due au *B20, B35.9*
- Diarrhée
- - Infectieuse ¬ Maladie due au *B20, A09.0*

VIH *–suite*

- Diarrhée *–suite*
- - ¬ Maladie due au *B23.8, K52.9*
- Dyspnée ¬ Maladie due au *B23.8, R06.0*
- Encéphalite ¬ Maladie due au *B22†, G05.1**
- Encéphalomyélite ¬ Maladie due au *B22†, G05.1**
- Encéphalopathie ¬ Maladie due au *B22†, G94.3**
- Éruption cutanée ¬ Maladie due au *B23.8, R21*
- Faible vision ¬ Maladie due au *B23.8, H54.0*
- Fièvre ¬ Maladie due au *B23.8, R50.9*
- Gastroentérite
- - Infectieuse ¬ Maladie due au *B20, A09.0*
- - Non infectieuse ¬ Maladie par *B23.8, K52.9*
- Gonflement des glandes ¬ Maladie due au *B23.8, R59.9*
- Hépatomégalie ¬ Maladie due au *B23.8, R16.0*
- Herpès simplex ¬ Maladie due au *B20, B00.9*
- Histoplasmose ¬ Maladie due au *B20, B39.9*
- Hyperhidrose ¬ Maladie due au *B23.8, R61.9*
- Hypersplénisme ¬ Maladie due au *B23.8, D73.1*
- Hypovolémie ¬ Maladie due au *B23.8, E86*
- Infection
- - Bactérienne NCA ¬ Maladie due au *B20, A49.9*
- - Candida ¬ Maladie due au *B20, B37.9*
- - Cryptosporidium ¬ Maladie due au *B20, A07.2*
- - Fongique ¬ Maladie due au *B20, B49*
- - Isospora ¬ Maladie due au *B20, A07.3*
- - Mycobactérienne ¬ Maladie due au *B20, A31.9*
- - Mycobacterium avium intracellulaire ¬ Maladie due au *B20, A31.0*
- - Parasitaire ¬ Maladie due au *B20, B89*
- - Toxoplasma gondii ¬ Maladie due au *B20, B58.9*
- - Tuberculeuse ¬ Maladie due au *B20, A16.9*
- - Virale ¬ Maladie due au *B20, B34.9*
- - Virus lent ¬ Maladie due au *B20, A81.9*
- Leucoencéphalite multifocale ¬ Maladie due au *B22†, G05.1**
- Leucoplasie de la muqueuse buccale ¬ Maladie due au *B23.8, K13.2*
- Lymphadénite aiguë ¬ Maladie due au *B23.8, L04.9*
- Lymphadénopathie généralisé
- - Persistante) [LPG] ¬ Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au *U60.1!*
- - ¬ Maladie due au *B23.8, R59.1*
- Lymphome
- - Burkitt ¬ Maladie due au *B21, C83.7*
- - Non hodgkinien ¬ Maladie due au *B21, C85.9*

VIH *–suite*
- Lymphome *–suite*
- - Primaire du cerveau ¬ Maladie due au *B21, C85.9*
- - ¬ Maladie due au *B21, C85.9*
- Malabsorption intestinale ¬ Maladie due au *B23.8, K90.9*
- Maladie
- - Carence nutritionnelle ¬ Maladie due au *B22, E63.9*
- - Glandes salivaires ¬ Maladie due au *B23.8, K11.9*
- - Infectieuse ¬ Maladie due au *B20, B99*
- - Organes hématopoïétiques ¬ Maladie due au *B23.8, D75.9*
- - Parasitaire NCA ¬ Maladie due au *B20, B99*
- - Peau ¬ Maladie due au *B23.8, L98.9*
- - Sang ¬ Maladie due au *B23.8, D75.9*
- - Tissu sous-cutané ¬ Maladie due au *B23.8, L98.9*
- Méningite aseptique ¬ Maladie due au *B20, G03.0*
- Mycose ¬ Maladie due au *B20, B49*
- Myélite ¬ Maladie due au *B23.8, G04.9*
- Myélopathie ¬ Maladie due au *B23.8, G95.9*
- N'entrant pas dans la catégorie A ou C ¬ Maladie symptomatique due au *U60.2!*
- Névralgie ¬ Maladie due au *B23.8, M79.29*
- Névrite ¬ Maladie due au *B23.8, M79.29*
- Non précisée ¬ Catégorie clinique de la maladie due au *U60.9!*
- Nourrissons ¬ Résultat non concluant du test de recherche du *R75*
- Origine
- - Affections précisées ¬ Immunodéficience humaine virale [*B22*
- - États précisés ¬ Maladie par *B23.8*
- - Maladie
- - - Infectieuses et parasitaires ¬ Immunodéficience humaine virale [*B20*
- - - ¬ Immunodéficience humaine virale [*B23*
- - Tumeurs malignes ¬ Immunodéficience humaine virale [*B21*
- Perte de poids ¬ Maladie due au *B22, R64*
- Pneumonie
- - Lymphoïde interstitielle ¬ Maladie due au *B22, B48.5*
- - Pneumocystis carinii ¬ Maladie due au *B20, B48.5*
- - Virale ¬ Maladie due au *B20, J12.9*
- - ¬ Maladie due au *B20, J18.9*
- Polyneuropathie ¬ Maladie due au *B23.8, G62.9*
- Positif ¬ Décollement de la rétine au cours de rétinite à CMV [cytomégalovirus], *B20†, H32.0*, B25.88*
- Psychosyndrome organique ¬ Maladie due au *B23.8, F07.9*
- Récidive de rétinite à CMV [cytomégalovirus] ¬ Maladie due au *B20†, H32.0*, B25.88*

VIH *–suite*
- Retard de développement chez le nourrisson ¬ Maladie due au *B22, P05.9*
- Réticulosarcome ¬ Maladie due au *B21, C83.3*
- Rétinite
- - Bactérienne ¬ Maladie due au *B20†, H32.0*, A49.9*
- - Candida ¬ Maladie due au *B20†, H32.0*, B37.88*
- - CMV [cytomégalovirus] ¬ Maladie due au *B20†, H32.0*, B25.88*
- - Mycosique ¬ Maladie due au *B20†, H32.0*, B49*
- - Virale ¬ Maladie due au *B20†, H32.0*, B34.9*
- - ¬ Maladie due au *B20, H30.9*
- Rétinopathie ¬ Maladie due au *B23.8, H35.0*
- SAI ¬ Seropositivité au *Z21*
- Sans précision ¬ Immunodéficience humaine virale [*B24*
- Sarcome
- - Immunoblastique ¬ Maladie par *B21, C83.3*
- - Kaposi ¬ Maladie due au *B21, C46.9*
- - ¬ Maladie due au *B21*
- Sepsis ¬ Maladie due au *B20, A41.9*
- Splénomégalie ¬ Maladie due au *B23.8, R16.1*
- Strongyloïdose ¬ Maladie due au *B20, B78.9*
- Thrombopénie
- - Secondaire ¬ Maladie due au *B23.8, D69.58*
- - ¬ Maladie due au *B23.8, D69.61*
- Toxoplasmose ¬ Maladie due au *B20, B58.9*
- Trouble
- - Hématologique ¬ Maladie par *B23.8*
- - Immunitaire ¬ Maladie par *B23.8*
- Tuberculose ¬ Maladie due au *B20, A16.9*
- Tumeur
- - Burkitt ¬ Maladie due au *B21, C83.7*
- - Malign
- - - Tissu hématopoïétique NCA ¬ Maladie due au *B21, C96.9*
- - - ¬ Maladie due au *B21, C80.9*
- Virus immunodéficience humain
- - Maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: *Z11*
- - ¬ Conseil: à propos du *Z71*
- ¬
- - Catégories cliniques de l'infection par le *U60!*
- - Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [*Z21*
- - Maladie due au *B20, A07.2*
- - Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [*R75*
- - Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au *U61!*
- - Prophylaxie avant exposition au *Z29.22*

VIH *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Radiculite par maladie due au *B23.8, M54.19*
- - Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [*Z20.6*
- - Syndrome
- - - Infection aiguë par *B23.0*
- - - Microangiopathie
- - - - Conjonctive dû au *B23.8, M31.1*
- - - - Rétine dû au *B23.8, H35.0*

Viljoen
v. Winship-Viljoen-Leary

Villeuse ¬ Langue noir
- *K14.3*

Villonodulaire
- Pigmentaire) ¬ Synovite *M12.2*
- Pigmentée ¬ Synovite *M12.29*

Vin
- Multiples familiaux ¬ Nævus en tache de *Q82.5*
- ¬ Nævus: en tache de *Q82.5*

Vinca-alcaloïdes ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*

Vincent ¬
- Angine de *A69.1*
- Gingivite de *A69.1*
- Infections dites de *A69.1*

Vingt ongles ¬ Dystrophie des *L60.3*

Vinson ¬ Syndrome de: Plummer- *D50.1*

Viol
- Abus sexuel allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un *Z04.5*
- ¬ *Y09.9!*

Violence
- Conjugale SAI ¬ *T74.1*
- N'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de *Y34.9!*
- Physique ¬ *R45.6*

Violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une mort *R96.1*

VIPome ¬ *D48.9*

Viral
- Aigu
- - Précisées ¬ Autres hépatites *B17.8*
- - Sans précision ¬ Hépatite *B17.9*
- - ¬ Autres hépatites *B17*
- Caractérisé lésion cutanéo muqueux
- - Non classées ailleurs ¬ Autres infections *B08*
- - Sans précision ¬ Infection *B09*
- Chronique
- - B
- - - Agent delta ¬ Hépatite *B18.0*
- - - Sans agent delta

Viral *–suite*
- Chronique *–suite*
- - B *–suite*
- - - Sans agent delta *–suite*
- - - - AgHBe
- - - - - Négatif, avec activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite *B18.14*
- - - - - Négatif, sans activité inflammatoire, faible réplication ¬ Hépatite *B18.13*
- - - - - Positif, avec activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite *B18.12*
- - - - - Positif, sans activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite *B18.11*
- - - - Phase
- - - - - 1 ¬ Hépatite *B18.11*
- - - - - 2 ¬ Hépatite *B18.12*
- - - - - 3 ¬ Hépatite *B18.13*
- - - - - 4 ¬ Hépatite *B18.14*
- - - - - Immunotolérance ¬ Hépatite *B18.11*
- - - - ¬ Hépatite *B18.1*
- - C ¬ Hépatite *B18.2*
- - D ¬ Hépatite *B18.0*
- - E ¬ Hépatite *B18.8*
- - Sans précision ¬ Hépatite *B18.9*
- - ¬ Hépatite
- - - *B18*
- - - *B18.8*
- Classé ¬
- - Arthrite au cours d'autres maladies *M01.5**
- - Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections *G05.1**
- - Méningite au cours d'infections *G02.0**
- - Myocardite au cours de maladies *I41.1**
- - Otite
- - - Externe au cours de maladies *H62.1**
- - - Moyenne au cours de maladies *H67.1**
- - Pneumonie au cours de maladies *J17.1**
- Coma hépatique ¬ Hépatite *B19.0, K72.74!*
- Compliquant grossesse accouchement puerpéralité ¬
- - Hépatite *O98.4*
- - Maladies *O98.5*
- Congénital
- - Herpétique [herpes simplex] ¬ Infection *P35.2*
- - Sans précision ¬ Maladie *P35.9*
- - ¬
- - - Hépatite *P35.3*
- - - Maladies *P35.8*
- Disséminée post-vaccination ROR ¬ Déficit immunitaire primaire avec infection *D84.8, T88.0*
- Épidémique ¬ Conjonctivite *B30.9†, H13.1**
- Fièvre de l'Indiana] ¬ Stomatite vésiculaire *A93.8*
- Infectieuse) aiguë SAI ¬ Hépatite *B17.9*
- Intestinales et autres infections intestinales précisées ¬ Infections *A08*

Viral *–suite*
- Kunjin ¬ Maladie *A83.4*
- Mère ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie *O35.3*
- Non classé ¬
- - Encéphalites *A85*
- - Fièvres hémorragiques *A98*
- - Pneumonie *J12*
- Nouveau-né ¬ Myocardite *B33.2†, I41.1**
- Œil ¬ Maladie *B33.8†, H58.8**
- Piry ¬ Maladie *A93.8*
- Powassan ¬ Maladie *A84.8*
- Précis
- - Caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses ¬ Autres infections *B08.8*
- - Système nerveux central ¬ Autres infections *A88.8*
- - Transmis
- - - Arthropodes ¬ Autres fièvres *A93.8*
- - - Moustiques ¬ Autres fièvres *A92.8*
- - ¬
- - - Encéphalites *A85.8*
- - - Fièvres hémorragiques *A98.8*
- SAI ¬
- - Enanthème *B09*
- - Entérite *A08.4*
- - Exanthème *B09*
- - Gastroentérite *A08.4*
- - Hépatite
- - - *B19.9*
- - - A (aiguë) (*B15.9*
- - - B aiguë (*B16.9*
- Sans
- - Mention d'identification d'un virus spécifique ¬ Grippe *J11*
- - Précision
- - - Coma hépatique ¬ Hépatite *B19.0*
- - - Sans précision, sans coma hépatique ¬ Hépatite *B19.9*
- - - Virus spécifique non identifié ¬ (Broncho)pneumonie *J11.0*
- - - ¬
- - - - Conjonctivite *B30.9*
- - - - Encéphalite *A86*
- - - - Fièvre hémorragique *A99*
- - - - Hépatite *B19*
- - - - Infection
- - - - - *B34.9*
- - - - - Intestinales *A08.4*
- - - - Pneumonie *J12.9*
- Siège non précis ¬ Infection
- - *B34*
- - *B34.8*
- Système nerveux central
- - Non classées ailleurs ¬ Autres infections *A88*
- - Sans précision ¬ Infection *A89*

Viral *–suite*
- Transmis
- - Arthropodes
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres fièvres *A93*
- - - Sans précision ¬
- - - - Encéphalite *A85.2*
- - - - Fièvre *A94*
- - - ¬ Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite *Z24.1*
- - Moustiques
- - - Sans précision ¬
- - - - Encéphalite *A83.9*
- - - - Fièvre *A92.9*
- - - ¬
- - - - Encéphalite
- - - - - *A83*
- - - - - *A83.8*
- - - - Fièvres *A92*
- - Tiques
- - - Sans précision ¬ Encéphalite *A84.9*
- - - ¬
- - - - Encéphalite
- - - - - *A84*
- - - - - *A84.8*
- - - - Méningo-encéphalite *A84*
- Unique
- - Précisées ¬ Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies *Z25.8*
- - ¬ Nécessité vaccination contre
- - - Certaines maladies *Z24*
- - - Maladies *Z25*
- VIH
- - Origine
- - - Affections précisées ¬ Immunodéficience humaine *B22*
- - - Maladie
- - - - Infectieuses et parasitaires ¬ Immunodéficience humaine *B20*
- - - - ¬ Immunodéficience humaine *B23*
- - - Tumeurs malignes ¬ Immunodéficience humaine *B21*
- - Sans précision ¬ Immunodéficience humaine *B24*
- - ¬
- - Arthrite au cours de maladie *B34.9†, M01.59**
- - Arthropathie post-infectieuse au cours d'hépatite *B19.9†, M03.29**
- - Bronchite *J20.9*
- - Cardite
- - - *B33.2*
- - - *B33.2†, I52.1**
- - Conjonctivite *B30*
- - Encéphalomyélite précisée *A85*
- - Entérites *A08.3*
- - Hépatite

Viral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Hépatite *–suite*
- - - Aiguë non *K72.0*
- - - Non
- - - - *K75.9*
- - - - A non B (aiguë) (*B17.8*
- - - Subaiguë non *K72.0*
- - Maladie
- - - Conjonctivale *B30.9†, H13.1**
- - - VIH
- - - - Infection *B20, B34.9*
- - - - Pneumonie *B20, J12.9*
- - - - Rétinite *B20†, H32.0*, B34.9*
- - Méningite
- - - *A87.8*
- - - *A87.9*
- - - Cours de maladie *A87.9*
- - Méningo-encéphalite précisée *A85*
- - Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies *Z11*
- - Mucite (orale) (oropharyngée) *K12.3*
- - Myocardiopathie *B33.2†, I43.0**
- - Myosite *M60.09*
- - Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite *Z24.6*
- - Otite
- - - Externe au cours de maladie *B34.9†, H62.1**
- - - Moyenne au cours de maladie *B34.9†, H67.1**
- - Péricardite: *I30.1*
- - Pharyngo-conjonctivite
- - - *B30.2*
- - - *B30.2†, H13.1**
- - Pneumonie
- - - *J12.8*
- - - Congénitale due à un agent *P23.0*
- - Séquelle
- - - Encéphalite *B94.1*
- - - Hépatite *B94.2*
- - Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite *Z20.5*
- - Trachéite *J04.1, B97.8!*
- - Verrues d'origine *B07*

Virémie SAI ¬ *B34.9*

Virilisme (chez la femme) ¬ *E25*

Virostatiques

- Inhibiteurs de protéases ¬ Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux *U85!*
- ¬ Virus de l'Herpès résistants aux *U84!*

Virus

- B) ¬ Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (*B00.4†*
- BK ¬ Infection à *B34.4*

Virus *–suite*

- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B97.8!*
- Coxsackie
- - 24 ¬ Conjonctivite (due à): *B30.3†*
- - A24 ¬ Conjonctivite à *B30.3†, H13.1**
- - ¬
- - - *B97.1!*
- - - Bronchite aiguë due au *J20.3*
- - - Cardite à *B33.2†, I52.1**
- - - Endocardite à *B33.2†, I39.8**
- - - Hépatite à *B33.8†, K77.0**
- - - Infection SAI à *B34.1*
- - - Méningite à *A87.0†, G02.0**
- - - Myocardite à *B33.2†, I41.1**
- - - Péricardite à *B33.2†, I32.1**
- Dengue ¬ Maladie à *A97.9*
- Ebola ¬
- - Fièvre hémorragique à *A98.4*
- - Maladie à *A98.4*
- ECHO ¬
- - *B97.1!*
- - Bronchite aiguë due à des *J20.7*
- - Infection SAI à *B34.1*
- - Méningite à *A87.0†, G02.0**
- Epstein-Barr
- - Enfant ¬ Maladie lymphoproliférative systémique à cellules T positive au *D82.3*
- - ¬
- - - Carcinome gastrique associé au *C16.9*
- - - Colite à *B27.0†, K93.8**
- - - Déficit immunitaire réponse héréditaire anormal
- - - - *D82.3*
- - - Duodénite à *B27.0†, K93.8**
- - - Gastrite à *B27.0†, K93.8**
- - - Iléite à *B27.0†, K93.8**
- - - Infection congénitale au *P35.8*
- - - Maladie
- - - - Glomérulaire à *B27.0†, N08.0**
- - - - Reins à *B27.0†, N29.1**
- - - - Rénale tubulo-interstitielle à *B27.0†, N16.0**
- - - - Urètre à *B27.0†, N29.1**
- - - - Vessie à *B27.0†, N33.8**
- - - Mononucléose due au *B27.0*
- - - Œsophagite à *B27.0†, K23.8**
- - - Pneumonie à *B27.0†, J17.1**
- - - Syndrome d'infection chronique au *B27.0*
- - - Urétrite à *B27.0†, N37.0**
- Gamma ¬ Mononucléose due à herpès *B27.0*
- Grippaux ¬ bronchopneumonie due à des virus autres que des *J12*
- Grippe
- - Aviaire

Virus *–suite*

- Grippe *–suite*
- - Aviaire *–suite*
- - - Grippe porcine ¬
- - - - Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des *J10.8†, G05.1**
- - - - Encéphalopathie lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des *J10.8†, G94.3**
- - - - Grippe [Influenza] avec otite, virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des *J10.8†, H67.1**
- - - - Influenza, virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des *J10.1*
- - - - Myocardite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des *J10.8†, I41.1**
- - - - Polio-encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié, à l'exception des *J10.8†, G05.1**
- - - Identifié ¬
- - - - Grippe
- - - - - Asiatique [influenza], *J09, U69.21!*
- - - - - Influenza] avec encéphalite, *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - - Influenza] avec entérite, *J09, U69.21!*
- - - - - Influenza] avec épanchement pleural, *J09, U69.21!*
- - - - - Influenza] avec Gastroentérite, *J09, U69.21!*
- - - - - Influenza] avec infection des voies respiratoires supérieures, *J09, U69.21!*
- - - - - Influenza] avec laryngite, *J09, U69.21!*
- - - - - Influenza] avec méningisme, *J09, U69.21!*
- - - - - Influenza] avec otite moyenne, *J09†, H67.1*, U69.21!*
- - - - - Influenza] avec pharyngite, *J09, U69.21!*
- - - - - Influenza] avec pneumonie, *J09, U69.21!*
- - - - - Influenza] avec polio-encéphalite, *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - - Influenza] par *J09, U69.21!*
- - - - Myocardite grippale par *J09, U69.21!*
- - - Porcine ¬
- - - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors *J10.0*
- - - - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.8*
- - - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - Gastroentérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.8*
- - - - Grippe
- - - - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*

Virus *–suite*

- Grippe *–suite*
- - Aviaire *–suite*
- - - Porcine ¬ *–suite*
- - - - Grippe *–suite*
- - - - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Influenza] avec infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Influenza] avec laryngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Influenza] avec pharyngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Influenza] hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - Infection
- - - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.0*
- - - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors *J10.8*
- - - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.0*
- - - Zoonotique pandémique identifié ¬ Grippe Influenza
- - - - Encéphalite, *J09†, G05.1**
- - - - Encéphalopathie, *J09†, G94.3**
- - - - Myocardite, *J09†, I41.1**
- - - - Otite moyenne, *J09†, H67.1**
- - - - Polio-encéphalite, *J09†, G05.1**
- - Porcine identifié ¬ Grippe
- - - Asiatique [influenza], *J09, U69.20!*
- - - Influenza] avec myocardite, *J09, U69.20!*
- - Saisonnier identifié
- - - Exception virus grippe aviaire grippe porcine ¬
- - - - Encéphalite lors de grippe [Influenza], *J10.8†, G05.1**
- - - - Encéphalopathie lors de grippe [Influenza], *J10.8†, G94.3**
- - - - Grippe [Influenza] avec otite, *J10.8†, H67.1**
- - - - Influenza, *J10.1*
- - - - Myocardite lors de grippe [Influenza], *J10.8†, I41.1**
- - - - Polio-encéphalite lors de grippe [Influenza], *J10.8†, G05.1**

Virus *–suite*

- Grippe *–suite*
- - Saisonnier identifié *–suite*
- - - ¬ Encéphalite lors de grippe [Influenza], *J10.8†, G05.1**
- - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le *J10.1*
- Han ¬ Syndrome cardio-pulmonaire à *B33.4†, J17.1**
- Hanta
- - Hantavirus] avec manifestations rénales ¬ Maladie à *A98.5†, N08.0**
- - Manifestations pulmonaires ¬ Maladie à *B33.4†*
- - SCPH] ¬ Syndrome cardio-pulmonaire à *B33.4†, J17.1**
- Hendra ¬ Infection
- - *A85.8*
- - *B33.8*
- Hépatite
- - B [AgHBs] ¬ Porteur de l'antigène de surface du *B18.13*
- - D ¬ *B17.8*
- - ¬ Infection par le *B19.9*
- Herpes
- - Simiae ¬
- - - Encéphalite à *B00.4†, G05.1**
- - - Encéphalomyélite à *B00.4†, G05.1**
- - ¬ Hépatite due au *B00.8†, K77.0**
- Herpès
- - Gamma ¬
- - - Hépatite au cours de mononucléose à *B27.0†, K77.0**
- - - Hépatomégalie au cours de mononucléose à *B27.0†, K77.0**
- - Herpes simplex ¬
- - - Infection
- - - - *B00*
- - - - Ano-génitale par le *A60*
- - - Otite externe au cours de l'infection due au *B00.1†, H62.1**
- - Résistants aux virostatiques ¬ *U84!*
- - Sans précision ¬ Infection
- - - *B00.9*
- - - Ano-génitale par le *A60.9*
- - Simplex ¬ Infection congénitale au *P35.2*
- - ¬
- - - Affections oculaires dues au *B00.5†, H58.8**
- - - Balanite due au *A60.0†, N51.2**
- - - Cervicite due au *A60.0†, N74.8**
- - - Colite à *B00.8†, K93.8**
- - - Conjonctivite due au *B00.5†, H13.1**
- - - Dermite
- - - - Paupière due au *B00.5†, H03.1**
- - - - Vésiculaire due au *B00.1*
- - - Duodénite à *B00.8†, K93.8**

Virus *–suite*

- Herpès *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Encéphalite due au *B00.4†, G05.1**
- - - Épididymite due au *A60.0†, N51.1**
- - - Formes d'infection due au *B00.8*
- - - Gastrite à *B00.8†, K93.8**
- - - Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au *B00.2*
- - - Iléite à *B00.8†, K93.8**
- - - Infection
- - - - Appareil génital de l'homme par le *A60.0†, N51.8**
- - - - Marge cutanée de l'anus et du rectum, par le *A60.1*
- - - - Organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le *A60.0*
- - - Iridocyclite due au *B00.5†, H22.0**
- - - Iritis due au *B00.5†, H22.0**
- - - Kératite due au *B00.5†, H19.1**
- - - Kératoconjonctivite due au *B00.5†, H19.1**
- - - Maladie
- - - - Disséminée due au *B00.7*
- - - - Glomérulaire à *B00.8†, N08.0**
- - - - Reins à *B00.8†, N29.1**
- - - - Rénale tubulo-interstitielle à *B00.8†, N16.0**
- - - - Urètre à *B00.8†, N29.1**
- - - - Vessie à *B00.8†, N33.8**
- - - Méningite due au *B00.3†, G02.0**
- - - Méningo-encéphalite à *B00.4†, G05.1**
- - - Myélite à *B00.4†, G05.1**
- - - Orchite due au *A60.0†, N51.1**
- - - Pharyngite due au *B00.2*
- - - Pneumonie à *B00.8†, J17.1**
- - - Proctite due au *A60.1†, K93.8**
- - - Prostatite due au *A60.0†, N51.0**
- - - Septicémie due au *B00.7*
- - - Ulcère de la vulve dû au *A60.0†, N77.0**
- - - Urétrite à *B00.8†, N37.0**
- - - Uvéite due au *B00.5†, H22.0**
- - - Vaginite due au *A60.0†, N77.1**
- - - Vulvite due au *A60.0†, N77.1**
- - - Vulvo-vaginite due au *A60.0†, N77.1**
- Herpétique humain de type 5 ¬ Infection par le *B25.9*
- Humain type 2 alpha HSV-2 ¬ Dermite vésiculaire
- - Lèvre due au *B00.1*
- - Oreille due au *B00.1*
- Immunodéficience humain
- - Maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [*Z11*
- - Résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases ¬ *U85!*
- - VIH

Virus *–suite*

- Immunodéficience humain *–suite*
- - VIH *–suite*
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladie due au *O98.7*
- - - ¬
- - - - Infection asymptomatique par le *Z21*
- - - - Mise en évidence par des examens de laboratoire du *R75*
- - - - Sujets en contact avec et exposés au *Z20.6*
- - ¬ Conseil: à propos du VIH [*Z71*
- Influenza
- - B C identifié ¬ Grippe
- - - *J10*
- - - Influenza B ou C identifié ¬ Grippe [influenza], *J10.8*
- - Saisonnier identifié
- - - Hors virus grippe aviaire porcine ¬
- - - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], *J10.0*
- - - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], *J10.8*
- - - Sauf virus grippe aviaire porcine ¬
- - - - Entérite au cours de la grippe [influenza], *J10.8*
- - - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], *J10.1*
- - - - Gastroentérite au cours de la grippe [influenza], *J10.8*
- - - - Grippe
- - - - - Asiatique [influenza], *J10.1*
- - - - - Épidémique [influenza], *J10.1*
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] avec infection des voies aériennes supérieures , *J10.1*
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] avec laryngite, *J10.1*
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] avec pharyngite, *J10.1*
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] hautement fébrile, *J10.1*
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza], *J10.1*
- - - - - Vraie [influenza], *J10.1*
- - - - Infection
- - - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, *J10.1*
- - - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la grippe, *J10.1*
- - - - Influenza avec pneumonie, *J10.0*
- - - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], *J10.0*
- - - ¬

Virus *–suite*

- Influenza *–suite*
- - Saisonnier identifié *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Broncho)pneumopathie grippale, *J10.0*
- - - - Encéphalopathie grippale à *J10.8*
- - - - Gastroentérite grippale à *J10.8*
- - - - Grippe
- - - - - *J10.1*
- - - - - Épanchement pleural grippal à *J10.1*
- - - - - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à *J10.1*
- - - - - Laryngite grippale à *J10.1*
- - - - - Manifestations respiratoires, *J10.1*
- - - - - Manifestations, *J10.8*
- - - - - Pharyngite grippale à *J10.1*
- - - - - Pneumonie, *J10.0*
- - - - Myocardite (aiguë) grippale à *J10.8*
- - Zoonotique pandémique identifié ¬ Grippe
- - - *J09*
- - - Influenza
- - - - Entérite, *J09*
- - - - Épanchement pleural, *J09*
- - - - Gastroentérite, *J09*
- - - - Infection respiratoire supérieure, *J09*
- - - - Laryngite, *J09*
- - - - Méningisme, *J09*
- - - - Pharyngite, *J09*
- - - - Pneumonie, *J09*
- Lent ¬ Maladie due au VIH avec infection à *B20, A81.9*
- Lymphotrope lymphocytes T humain
- - Type 1 HTLV-1 ¬
- - - Myélopathie due à une infection à *G04.1*
- - - Sujet porteur d'une infection à *Z22.6*
- - ¬ Myélopathie associée à un *G04.1*
- Maladie de Newcastle ¬ Conjonctivite à *B30.8†, H13.1**
- Mengo ¬ Encéphalite à *A85.8†, G05.1**
- Nipah ¬ Maladie à *A85.8*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Autres maladies à *B33*
- - Identifié ¬ Grippe
- - - *J11*
- - - Manifestation
- - - - *J11.8*
- - - - Respiratoires, *J11.1*
- - - Pneumonie, *J11.0*
- O'nyong-nyong ¬ Fièvre due au *A92.1*
- Paragrippaux ¬
- - Bronchite aiguë due aux *J20.4*
- - Pneumonie due aux *J12.2*
- Poliomyélite ¬
- - Encéphalite due au *A80.9†, G05.1**
- - Méningite due au *A80.9†, G01**

Virus *–suite*

- Précisées ¬ Autres maladies à *B33.8*
- Respiratoire syncytial
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.4!*
- - VRS ¬
- - - Bronchiolite aiguë due au *J21.0*
- - - Bronchite aiguë due au *J20.5*
- - - Pneumonie
- - - - *J12.1*
- - - - Congénitale à *P23.0*
- Rocio ¬ Maladie à *A83.6*
- Rubéole ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par: *O35.3*
- SAI ¬
- - Encéphalomyélite à *A86*
- - Méningo-encéphalite à *A86*
- Sauvage
- - Importé ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, *A80.1*
- - Indigène ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, *A80.2*
- Sin Nombre ¬ Maladie
- - *B33.4†*
- - *B33.4†, J17.1**
- Spécifique
- - Non identifié ¬
- - - Broncho)pneumonie virale, sans précision ou *J11.0*
- - - Encéphalopathie grippale sans précision ou *J11.8*
- - - Epanchement pleural grippal sans précision ou *J11.1*
- - - Gastroentérite grippale sans précision ou *J11.8*
- - - Infection grippale des voies respiratoires supérieures sans précision ou *J11.1*
- - - Laryngite grippale sans précision ou *J11.1*
- - - Myocardite (aiguë) grippale sans précision ou *J11.8*
- - - Pharyngite grippale sans précision ou *J11.1*
- - ¬ Grippe
- - - Sans mention d'identification d'un *J11*
- - - Virale sans mention d'identification d'un *J11*
- Système nerveux central
- - Sans précision ¬ Infection atypiques à *A81.9*
- - ¬ Autres infections atypiques à *A81.8*
- Tanapox ¬ Syndrome du *B08.8*
- T-lymphotrope humain de type I ¬ Dermatite infectieuse associée au *L30.3*
- Transmise par des moustiques ¬ méningo-encéphalite à *A83*
- Vaccinal ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, associée au *A80.0*
- Vaccine ¬ Infection par le *B08.0*

Virus *–suite*
- Varicelle zona ¬
- - Antécédents personnels d'infection à VZV [*Z86.1*
- - Paralysie faciale liée à l'infection par le *B02.2†, G53.0**
- Virus grippaux ¬ bronchopneumonie due à des *J12*
- West-Nile ¬ Fièvre due au *A92.3*
- Zika
- - Contracté mère ¬
- - - Fœtus affecté par la maladie à *P00.2*
- - - Nouveau-né affecté par la maladie à *P00.2*
- - ¬
- - - Fièvre à *A92.5*
- - - Infection à *A92.5*
- - - Maladie
- - - - *A92.5*
- - - - Congénitale à *P35.4*
- - - Microcéphalie due à la maladie congénitale à *P35.4*
- ¬
- - Grippe aviaire avec identification du *J09, U69.21!*
- - Infection des organes respiratoire par des *J98.7, B97.8!*

Vis ¬ Enlèvement de: *Z47.0*

Visage
- Exception des yeux) ¬ Nævus d'Ota sur la peau du *D22.3*
- Perte de poids ¬ Affaissement de la peau du *L98.7*
- SAI ¬
- - *S01.80*
- - *S02.9*
- Siffleur [syndrome de Freeman-Sheldon] ¬ *Q87.0*
- ¬ Paralysie idiopathique du *G51.0*

Viscéral
- Anomalies cérébrales-dysmorphie-retard du développement ¬ Syndrome de neuropathie *Q87.8*
- Secondaire NCA ¬ Syphilis *A51.4*
- ¬
- - Herpès *B00.8†, K93.8**
- - Larva migrans *B83.0*
- - Leishmaniose *B55.0*
- - Syphilis congénitale précoce: *A50.0*

Viscères
- Abdominale ¬ Transposition des *Q89.3*
- Thoracique ¬ Transposition des *Q89.3*
- ¬
- - Syphilis secondaire des *A51.4†, K93.8**
- - Tuberculose miliaire des *A18.3†, K93.0**

Viscosité plasmatique
- Anormale ¬ *R70.1*
- ¬ Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la *R70*

Visible
- Clitoris
- - Lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement *Z91.72*
- - Prépuce clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement *Z91.71*
- ¬ Exposition à : lumière artificielle *W91.9!*

Vision
- Binoculaire
- - Non précisée ¬ Atteinte de la *H54.9*
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - Légère de la *H54.3*
- - - - Modérée de la *H54.2*
- - - - Sévère de la *H54.1*
- - - Cécité et forte baisse de la *H54.0*
- - - Disparition de la *H53.3*
- - - Troubles de la *H53.3*
- Couleur ¬
- - Incapacité acquise de la *H53.5*
- - Troubles de la *H53.5*
- Double ¬ *H53.2*
- Floue au cours d'hystérie ¬ *F44.6†, H58.1**
- Monoculaire ¬
- - Atteinte
- - - Moyennement sévère de la *H54.6*
- - - Sévère de la *H54.5*
- - Cécité et forte baisse de la *H54.4*
- Orthoptique] ¬ Education de la *Z50.6!*
- Sans précision ¬ Trouble de la *H53.9*
- Stéréoscopique ¬ Fusion avec anomalie de la *H53.3*
- ¬
- - Cécité et baisse de la *H54*
- - Examen des yeux et de la *Z01.0*
- - Maladie due au VIH avec faible *B23.8, H54.0*
- - Perte subite de la *H53.1*
- - Trouble
- - - *H53.8*
- - - Subjectifs de la *H53.1*

Visuel ¬
- Affections du cortex *H47.6*
- Anomalies du champ *H53.4*
- Cortex *S04.0*
- Hallucinations *R44.1*
- Halos *H53.1*
- Rétrécissement généralisé du champ *H53.4*

Visuellement ¬ Anomalies (de): potentiels évoqués *R94.1*

Visuo-spatiale ¬ Négligence *R29.5*

Vital
- Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F32.2*

Vital *–suite*
- Fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un danger *F62.0*
- Nourrisson ¬ Événement aigu constituant un risque *R06.80*
- Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F33.2*
- ¬ Diminution de la capacité: *R94.2*

Vitamine
v.a. Pseudovitamine
- A
- - Cicatrice
- - - Cornée ¬ Carence en *E50.6†, H19.8**
- - - Xérophtalmique de la cornée ¬ Carence en *E50.6†, H19.8**
- - Kératite xérotique ¬ Carence en *E50.4†, H19.3**
- - Kératose ¬ Carence en *E50.8†, L86**
- - Xérophtalmie ¬ Carence en *E50.7†, H19.8**
- B ¬
- - Encéphalopathie au cours de carence en *E53.9†, G32.8**
- - Glossite de Möller Hunter due à une carence en *E53.9†, K93.8**
- - Polyneuropathie au cours de carence en *E53.9†, G63.4**
- - Stomatite angulaire due à une carence en *E53.9†, K93.8**
- B12
- - Acide folique ¬ anémie mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la *D53*
- - Carence en facteur intrinsèque ¬ Anémie par carence en *D51.0*
- - Malabsorption sélective de la vitamine B12, avec protéinurie ¬ Anémie par carence en *D51.1*
- - Protéinurie ¬ Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la *D51.1*
- - Sans précision ¬ Anémie par carence en *D51.9*
- - Type
- - - CblA ¬ Acidurie méthylmalonique sensible à la *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidémie méthylmalonique sensible à la *E71.1*
- - ¬
- - - Acidémie méthylmalonique
- - - - Résistante à la *E71.1*
- - - - Sensible à la *E71.1*
- - - Acidurie méthylmalonique
- - - - Résistante à la *E71.1*
- - - - Sensible à la *E71.1*
- - - Anémie carence
- - - - *D51*
- - - - *D51.8*
- - - - Alimentaire en *D51.3*
- - - Dégénérescence
- - - - Cérébrale au cours de carence en *E53.8†, G32.8**

Vitamine *–suite*
- B12 *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Dégénérescence *–suite*
- - - - Combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de carence en *E53.8†, G32.0**
- - - Démence au cours de carence en *E53.8†, F02.8**
- - - Myélopathie au cours de carence en *E53.8†, G32.0**
- - - Neuropathie au cours de carence en *E53.8†, G63.4**
- - - Polyneuropathie cours
- - - - Anémie par carence alimentaire en *D51.3†, G63.4**
- - - - Carence en *E53.8†, G63.4**
- B2 ¬
- - Cheilose au cours de carence en *E53.0†, K93.8**
- - Perlèche au cours de carence en *E53.0†, K93.8**
- - Stomatite angulaire due à une carence en *E53.0†, K93.8**
- B6-dépendante ¬ Épilepsie *G40.8*
- C ¬ Carence en *E54*
- D
- - Sans précision ¬ Carence en *E55.9*
- - Type
- - - I] ¬ Anomalie de la synthèse de la *E83.31*
- - - II ¬
- - - - Anomalie des récepteurs de la *E83.31*
- - - - Rachitisme résistant à la *E83.30†, M90.89**
- - ¬
- - - Carence en *E55*
- - - Ostéomalacie résistante à la *E83.30†, M90.89**
- - - Rachitisme dépendant de la *E83.31*
- E ¬
- - Ataxie par déficit en *G11.1*
- - Carence en *E56.0*
- K
- - Coagulants ¬ Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, *T45.7*
- - ¬
- - - Carence
- - - - *E56.1*
- - - - Nouveau-né en *P53*
- - - Déficit héréditaire combiné en facteurs de la coagulation dépendants de la *D68.28*
- - - Hémorragie sous utilisation à long terme des coumarines (antagonistes de la *D68.33*
- - - Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la *D68.33*
- Non classées ailleurs ¬ Intoxication: *T45.2*
- ¬
- - Abus de: *F55*

Vitamine *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Atrophie optique au cours de carence en *E56.9†, H48.0**
- - Carence en autres *E56.8*
- - Encéphalopathie au cours de carence en *E56.9†, G32.8**
- - Polyneuropathie au cours de carence en *E56.9†, G63.4**
- - Polynévrite au cours de carence en *E56.9†, G63.4**
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.4*

Vitelliforme
- Adulte ¬ Dégénérescence maculaire *H35.5*
- ¬ Dystrophie: rétinienne (pigmentaire) (ponctuée albescente) (*H35.5*

Vitellin ¬ Persistance du canal: *Q43.0*

Vitesse sédimentation
- Anomalies de la viscosité plasmatique ¬ Accélération de la *R70*
- ¬ Accélération de la *R70.0*

Vitiligo
- Paupière ¬ *H02.7*
- ¬ *L80*

Vitré
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Hémorragie du corps *H45.0**
- Globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du corps *H45.8**
- Primitif persistant hyperplasique ¬ *Q14.0*
- Sans précision ¬ Affection du corps *H43.9*
- ¬
- - Abcès du corps *H44.0*
- - Affection corps
- - - *H43*
- - - *H43.8*
- - Décollement du corps *H43.8*
- - Dégénérescence du corps *H43.8*
- - Hémorragie du corps *H43.1*
- - Hernie du corps *H43.0*
- - Malformation congénitale du corps *Q14.0*
- - Opacité
- - - Congénitale du corps *Q14.0*
- - - Corps *H43.3*
- - - Cristallines du corps *H43.2*
- - Prolapsus du corps *H43.0*
- - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: corps: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: corps: *H44.7*
- - Syndrome du corps *H59.0*
- - Syphilis tardif
- - - Corps *A52.7†, H45.8**
- - - Hémorragie du corps *A52.7†, H45.0**

Vitréo-maculaire ¬ Traction *H35.38*

Vitréo-rétinien
- Flocons de neige ¬ Dégénérescence *H35.5*

Vitréo-rétinien *–suite*
- Wagner ¬ Dégénérescence *H35.5*
- ¬ Dystrophie: *H35.5*

Vitréo-rétino-choroïdopathie autosomique dominante ¬ *H35.5*

Vitréo-rétinopathie
- Inflammatoire néovasculaire autosomique dominante ¬ *H35.2*
- Proliférant
- - Décollement de la rétine ¬ *H33.4*
- - ¬ *H35.2*

Vitreuses du col de l'utérus ¬ Carcinome à cellules *C53.9*

Vivant
- Mort-né ¬ Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né *Z37.3!*
- SAI ¬ Enfant né *Z38.2*
- Selon le lieu de naissance ¬ Enfants nés *Z38*
- Seule ¬ Personne *Z60*
- ¬ Naissance
- - Gémellaire, jumeaux nés *Z37.2!*
- - Multiple
- - - Certains enfants nés *Z37.6!*
- - - Tous nés *Z37.5!*
- - Unique, enfant *Z37.0!*

Vivax
- Complications ¬ Paludisme à Plasmodium *B51.8*
- Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum ¬ infections mixtes à Plasmodium *B51*
- Rupture de la rate ¬ Paludisme à Plasmodium *B51.0†, D77**
- SAI ¬ Paludisme à Plasmodium *B51.9*
- Sans complication ¬ Paludisme à Plasmodium *B51.9*
- ¬
- - Infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium *B52*
- - Paludisme à Plasmodium *B51*

Viverrini) ¬ Infection par: Opisthorchis (felineus) (*B66.0*

VLCADD ¬ *E71.3*

VLDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de très basse densité [*E78.1*

Vocal
- Chronique ¬ Tic moteur ou *F95.1*
- Tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics *F95.2*

Voerner ¬ Kératodermie palmoplantaire érythrodermique diffuse type *Q82.8*

Vogt
v. Stock-Spielmeyer-Vogt
- ¬ Maladie de: Spielmeyer- *E75.4*

Vohwinkel ¬ Syndrome de *Q82.8*

Voie
- Aérien
- - Poussière

Voie *–suite*
- Aérien *–suite*
- - Poussière *–suite*
- - - Coton ¬ Affection des *J66.0*
- - - Organiques précisées ¬ Affection des *J66.8*
- - SAI ¬ Maladie: chronique obstructive des *J44.9*
- - Supérieur virus influenza saisonnier identifié sauf virus grippe aviaire porcine ¬
- - - Grippe [influenza] avec infection des *J10.1*
- - - Infection aiguë des *J10.1*
- Biliaire
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la vésicule biliaire et des *K87.0**
- - Extra-hépatique
- - - Vésicule biliaire ¬ Tumeur bénigne: *D13.5*
- - - ¬
- - - - Adénocarcinome des *C24.0*
- - - - Carcinome épidermoïde des *C24.0*
- - Foie ¬ Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des *Q44*
- - Intracrânien ¬
- - - Carcinome
- - - - Épidermoïde du foie et des *C22.0, C22.1*
- - - - Indifférencié du foie et des *C22.9, C22.1*
- - - Cystadénome des *D13.4*
- - - Tumeur malign
- - - - Foie et des *C22*
- - - - Secondaire du foie et des *C78.7*
- - Intra-hépatiques ¬ *D13.4*
- - Isolée ¬ Atrésie des *Q44.2*
- - Pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la vésicule biliaire, des *K87**
- - SAI ¬ Malformation congénitale des *Q44.5*
- - Sans précision ¬
- - - Maladie des *K83.9*
- - - Tumeur maligne: *C24.9*
- - Syndromique
- - - Monosomie 20p12 ¬ Paucité des *Q44.7*
- - - Mutation ponctuelle de JAG1 ¬ Paucité des *Q44.7*
- - ¬
- - - Atrésie des *Q44.2*
- - - Carcinoma in situ: Foie, vésicule et *D01.5*
- - - Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les *T85.53*
- - - Distomiase des *B66.3†, K87.0**
- - - Fistule des *K83.3*
- - - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la vésicule et des *K91.81*
- - - Maladie
- - - - *K83*
- - - - Précisées des *K83.8*
- - - Malformations congénitales des *Q44.5*

Voie *–suite*
- Biliaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Obstruction des *K83.1*
- - - Perforation des *K83.2*
- - - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des *R93.2*
- - - Sténose et rétrécissement congénitaux des *Q44.3*
- - - Tumeur
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et *D37.6*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C24.8*
- Chirurgicale ¬ Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par *Z95.81*
- Digestif
- - Basses ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: *F45.32*
- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte des *K93.3**
- - Inférieures, n.c.a. ¬ Anomalie congénitale des *Q43.9*
- - Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les *T18.9*
- - SAI ¬ Absence (complète) (partielle) des *Q45.8*
- - Stade
- - - 1 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.05†, K93.31**
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.06†, K93.32**
- - - 3 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.07†, K93.33**
- - Supérieur
- - - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q40.9*
- - - ¬
- - - - Anomalie
- - - - - Congénitale des *Q40.9*
- - - - - Congénitale SAI des *Q40.9*
- - - - Malformation
- - - - - Congénitales des *Q40*
- - - - - Congénitales précisées des *Q40.8*
- - - ¬
- - - Brûlure d'autres parties des *T28.2*
- - - Corps étranger
- - - - *T18*
- - - - Localisations autres et multiples dans les *T18.8*
- - - Corrosion d'autres parties des *T28.7*
- - - Insuffisance d'une anastomose dans les *K91.83*
- - - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des *R93.3*
- - - Spasme psychogène des *F45.32*
- Fait agression
- - Agent chimique ¬ *Y09.9!*
- - Armes ¬ *Y09.9!*

Voie *–suite*
- Fait agression *–suite*
- - Médicament ¬ *Y09.9!*
- - ¬ *Y09.9!*
- Générale ¬ Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par *T36.7*
- Génitales, après accouchement ¬ Autres infections des *O86.1*
- Génito-urinaire
- - Accouchement ¬ Autres infections des *O86.3*
- - Femme SAI ¬ *C57.9*
- - Homme SAI ¬ *C63.9*
- - Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les *T19.9*
- - SAI ¬ Infection puerpérale des *O86.3*
- - ¬ Corps étranger
- - - *T19*
- - - Localisations autres et multiples dans les *T19.8*
- Hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté G6PD, de la *D55.1*
- Interne ¬ Dermite substance
- - Non précisée prise par *L27.9*
- - Prises par *L27.8*
- Intraveineux ¬ Consommation
- - Héroïne par *U69.30!*
- - Substances psycho-actives par *U69.32!*
- Lacrymal ¬
- - Inflammation
- - - Aiguë et sans précision des *H04.3*
- - - Chronique des *H04.4*
- - Lésions des *H04.6*
- - Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire avec ou sans atteinte des *S01.1*
- - Sténose et insuffisance des *H04.5*
- Non intraveineuse ¬ Consommation d'héroïne par *U69.31!*
- Optique
- - Corps genouillés et des radiations optiques de Gratiolet ¬ Affections des *H47.5*
- - Cours maladies classées ailleurs ¬ affection nerf
- - - *H48.8**
- - - II] et des *H48**
- - Sans précision ¬ Affection des *H47.7*
- - ¬
- - - Affection
- - - - *H47.5*
- - - - Nerf [II] et des *H47*
- - - Dysplasie du septum et des *Q04.4*
- - - Gliome des *D33.3*
- - - Lésion traumatique du nerf et des *S04.0*
- Placentaire ¬ effets non tératogènes de substances transmises par *P04*
- Respiratoire

Voie *–suite*
- Respiratoire *–suite*
- - Actes médicaux ¬ Autres maladies des *J95.88*
- - Cours
- - - Sporotrichose ¬ Maladie des *B42.0†, J99.8**
- - - Syphilis ¬ Maladie des *A52.7†, J99.8**
- - Créée par la trachéotomie ¬ Obstruction de la *J95.0*
- - Inférieur
- - - Aiguë SAI ¬ Infection respiratoire (*J22*
- - - Sans précision ¬ Infections aiguës des *J22*
- - - ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des *J44.0*
- - Non classée ailleurs ¬ Infection des *J98.7*
- - Partie non précis ¬
- - - Brûlure des *T27.3*
- - - Corps étranger dans les *T17.9*
- - - Corrosion des *T27.7*
- - SAI ¬ *C39.9*
- - Sans précision ¬
- - - Hémorragie des *R04.9*
- - - Séquelles de tuberculose des *B90.9*
- - Supérieur
- - - Affection aiguë ¬ *J06.9*
- - - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs ¬ Inflammation des *J68.2*
- - - Infection SAI ¬ *J06.9*
- - - Localisation
- - - - Multiple
- - - - - Non précisées ¬ Infections aiguës des *J06*
- - - - - ¬ Autres infections aiguës des *J06.8*
- - - - Non précisée ¬ Réaction d'hypersensibilité des *J39.3*
- - - Partie non précisée ¬ Tumeur maligne: *C39.0*
- - - Précisées ¬ Autres maladies des *J39.8*
- - - Sans précision
- - - - Virus spécifique non identifié ¬ Infection grippale des *J11.1*
- - - - ¬
- - - - - Infection des *J06.9*
- - - - - Maladie des *J39.9*
- - - Virus
- - - - Grippe aviaire identifié ¬ Grippe [Influenza] avec infection des *J09, U69.21!*
- - - - Influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: infection aiguë des *J10.1*
- - - ¬
- - - - Fibrose sous-muqueuse des *J39.88*
- - - - Maladie
- - - - - *J39*
- - - - - Précisées des *J39.88*
- - ¬

Voie *–suite*
- Respiratoire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Brûlure
- - - - Corrosion des *T27*
- - - - Parties des *T27.2*
- - - Corps étranger
- - - - *T17*
- - - - Localisations autres et multiples dans les *T17.8*
- - - Corrosion d'autres parties des *T27.6*
- - - Hémorragie
- - - - *R04*
- - - - Parties des *R04.8*
- - - Syndrome réactionnel de dysfonction des *J68.3*
- - - Syphilis tardive des *A52.7†, J99.8**
- Sexuel
- - Localisations ¬ Infection à Chlamydia transmise par *A56.8*
- - ¬ infection Chlamydia
- - - Trachomatis transmises par *A56*
- - - Transmises par *A56*
- Transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par *Z95.88*
- Transplacentaire ou par le lait maternel ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par *P04*
- Urétrale ¬ Fausse *N36.0*
- Urinaire
- - Accouchement ¬ Infection des *O86.2*
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Calcul des *N22.8**
- - Entérocoques ¬ Infection des *N39.0, B95.2!*
- - Escherichia coli ¬ Infection des *N39.0, B96.2!*
- - Inférieur
- - - Sans précision ¬ Calcul des *N21.9*
- - - ¬ Autres calculs des *N21.8*
- - Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des *P00.1*
- - Pseudomonas ¬ Infection des *N39.0, B96.5!*
- - Siège non précisé ¬ Infection des *N39.0*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Infection des *O08.8*
- - ¬
- - - Absence acquise d'autres organes des *Z90.6*
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de tumeur maligne des *Z80.5*
- - - - Personnels de tumeur maligne des *Z85.5*
- - - Infection néonatale des *P39.3*
- - - Surveillance d'autres stomies des *Z43.6*
- Vaginal
- - Césarienne ¬ Accouchement par *O75.7*
- - Enfant unique ¬ Naissance spontanée par *O80*

Voie *–suite*
- Vaginal *–suite*
- - ¬ Prélèvement placentaire (par *Z36.0*

Voile palais
- Fente labial
- - Bilatéral ¬ Fente
- - - *Q37.2*
- - - Voûte et du *Q37.4*
- - SAI ¬ Fente
- - - *Q37.3*
- - - Voûte et du *Q37.5*
- - Unilatéral ¬ Fente
- - - *Q37.3*
- - - Voûte et du *Q37.5*
- ¬
- - Fente
- - - *Q35.3*
- - - Voûte et du *Q35.5*
- - Gomme du *A52.7†, K93.8**
- - Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du *C11.3*
- - Tumeur maligne: *C05.1*

Voisins, les locataires et le propriétaire ¬ Désaccord avec les *Z59*

Voiture ¬ Accident de *V99!*

Voix
- Non précisés ¬ Troubles de la *R49.8*
- Parole et du langage] ¬ Traitement logopédique [rééducation de la *Z50.5!*
- ¬
- - Perte de la *R49.1*
- - Troubles de la *R49*

Vol
- Étalage sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- Groupe ¬ *F91.2*
- Kleptomanie] ¬ Tendance pathologique à commettre des *F63.2*

Volaire ¬ Ligament *S63.4*

Volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants *F18*

Volet costal ¬ *S22.5*

Volhynie ¬ Fièvre (de): *A79.0*

Volkmann
- Rétraction musculaire ischémique] ¬ Syndrome de *T79.60*
- Tant que complication de blessure ¬ Paralysie ischémique de *T79.60*
- ¬ Paralysie de *T79.60*

Volume
- Forme des dents ¬ Anomalies de *K00.2*
- Parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du *E88.22*
- Plasma ou du liquide extracellulaire ¬ Déplétion du *E86*

Volume *–suite*
- Plasmatique ¬ Polycythémie: due à: chute du *D75.1*
- SAI ¬ Anomalie des hématies (de): *R71*

Volumineuses ¬ Selles *R19.5*

Volvulus
- Nouveau-né ¬ *P76.8*
- ¬
- - *K56.2*
- - Infection à Onchocerca *B73*
- - Syndrome de l'intestin court dû à un *K91.2, K56.2*

Vomer ¬
- *C41.02*
- *D16.42*

Vomissements
- Associés à d'autres perturbations psychologiques ¬ *F50.5*
- Compliquant la grossesse ¬ Autres *O21.8*
- Consécutifs à une intervention gastro-intestinale ¬ *K91.0*
- Cours
- - Chimiothérapie ¬ *R11, Y57.9!*
- - Radiothérapie ¬ *R11, Y57.9!*
- Déficit en tréhalase ¬ Diarrhée et *E74.3*
- Exsiccose ¬ Diarrhée
- - *A09.9, E86*
- Grossesse, sans précision ¬ *O21.9*
- Importants commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ *O21.2*
- Incoercibles au cours de la grossesse ¬ *O21*
- Maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse ¬ *O21.8*
- Nouveau-né ¬ *P92.0*
- Persistants ¬ Érosion des dents: due à: *K03.2*
- Psychogènes ¬ *F50.5*
- SAI ¬ inhalation de liquides ou de *T17*
- Tardifs de la grossesse ¬ *O21.2*
- ¬
- - Nausées et *R11*
- - Pneumonie
- - - Aliments et des *J69.0*
- - - Aspiration (de): *J69.0*

Von Economo-Cruchet ¬ Maladie de *A85.8†, G05.1**

Von Gierke ¬ Maladie de: *E74.0*

Von Hippel-Lindau ¬
- Angiomatose rétinocérébelleuse de *Q85.8*
- Syndrome de: *Q85.8*

Von Recklinghausen ¬
- Maladie de *Q85.0*
- Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de *E21.0†, M90.89**

Von Voss-Cherstvoy ¬ Syndrome de *Q87.8*

Von Willebrand
- Acquis ¬

Von Willebrand *–suite*
- Acquis ¬ *–suite*
- - Maladie de *D68.01*
- - Syndrome de *D68.01*
- Héréditaire ¬ Maladie de *D68.00*
- Sans précision ¬ Maladie de *D68.09*
- Type
- - 1 ¬ Maladie de *D68.00*
- - 2 ¬ Maladie de *D68.00*
- - 2A ¬ Maladie de *D68.00*
- - 2B ¬ Maladie de *D68.00*
- - 2M ¬ Maladie de *D68.00*
- - 2N ¬ Maladie de *D68.00*
- - 3 ¬ Maladie de *D68.00*
- ¬
- - Augmentation des anticorps dirigés contre le facteur *D68.32*
- - Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le facteur de *D68.32*
- - Maladie de *D68.0*
- - Pseudo-maladie de *D69.1*
- - Thrombopathie de *D68.09*

Von Zumbusch ¬ Psoriasis pustuleux généralisé, forme de *L40.1*

Von-Graefe ¬ Maladie de *H49.4*

Von-Strümpell
v. Westphal-von-Strümpell

Voriconazole ¬ Candida résistants au fluconazole ou au *U83!*

Vorticellé primaire
- Essentielle du cuir chevelu ¬ Pachydermie *Q82.8*
- ¬ Pachydermie *Q82.8*

Voss
v. Von Voss-Cherstvoy

Voûte
- Crâne ¬ Fracture de la *S02.0*
- Crânienne liée à l'X ¬ Hyperostose de la *M85.2*
- Palais
- - Fente labial
- - - Bilatérale ¬ Fente de la *Q37.0*
- - - SAI ¬ Fente de la *Q37.1*
- - - Unilatérale ¬ Fente de la *Q37.1*
- - ¬ Fente de la *Q35.1*
- Palatin ¬
- - Perforation syphilitique congénitale de la *A50.5†, K93.8**
- - Tumeur maligne: *C05.0*
- Voile palais
- - Fente labial
- - - Bilatérale ¬ Fente de la *Q37.4*
- - - SAI ¬ Fente de la *Q37.5*
- - - Unilatérale ¬ Fente de la *Q37.5*
- - ¬ Fente de la *Q35.5*

Voûté en tant que conséquence tardive du rachitisme ¬ Dos *E64.3, M40.29*

Voyeurisme ¬ *F65.3*

VPS11 ¬ Leucodystrophie hypomyélinisante autosomique récessive associée à *E75.2*

Vrai
- 46,XX ¬ Hermaphrodite *Q99.1*
- Épaule ¬ Luxation congénitale *Q68.8*
- Influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe *J10.1*
- SAI ¬ Corde vocale (*C32.0*
- ¬
- - Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite *Q99.0*
- - Infarctus
- - - Myocarde, à répétition (aigu): postérieur (*I22.8*
- - - Transmural (aigu): postérieur (*I21.2*
- - Lymphome histiocytaire *C96.8*

VRS ¬
- Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [*J21.0*
- Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [*J20.5*
- Pneumonie
- - Congénitale à virus respiratoire syncytial [*P23.0*
- - Virus respiratoire syncytial [*J12.1*

Vulgaire
- Paupière ¬ Lupus *A18.4†, H03.1**
- SAI ¬ Lupus: *A18.4*
- ¬
- - Acné *L70.0*
- - Ichtyose *Q80.0*
- - Pemphigus *L10.0*

Vulgaris
- Modéré à sévère ¬ Psoriasis *L40.0, L40.70!*
- ¬
- - Psoriasis *L40.0*
- - Verruca: *B07*

Vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Vibrio *B98.1!*

Vulvaire ¬
- Prurit *L29.2*
- Varices *I86.3*

Vulve
- Cours
- - Accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*
- - Grossesse ¬ Varices de périnée, de vagin et de *O22.1*
- - Maladie
- - - Behçet ¬ Ulcération de la *M35.2†, N77.8**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Ulcération de la *N77.0**
- - Tuberculose ¬ Ulcère de la *A18.1†, N77.0**
- Grande) (petite) ¬ lèvre de la *T21*
- NIV stade
- - I ¬ Néoplasie intraépithéliale de la *N90.0*
- - II ¬ Néoplasie intraépithéliale de la *N90.1*

Vulve *–suite*
- NIV stade *–suite*
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale de la *D07.1*
- Non classée ailleurs ¬ Dysplasie sévère de la *N90.2*
- Périnée
- - Sans précision ¬ Affection non inflammatoire de la *N90.9*
- - ¬
- - - Affection non inflammatoire
- - - - *N90*
- - - - Précisées de la *N90.8*
- - - Soins maternels pour anomalies de la *O34.7*
- SAI ¬ Dysplasie sévère de la *N90.2*
- Sans précision ¬
- - Dysplasie de la *N90.3*
- - Tumeur maligne: *C51.9*
- Trichomonas ¬ Infection de la *A59.0†*, *N77.1**
- Vagin ¬
- - Candidose de la *B37.3†*, *N77.1**
- - Corps étranger dans la *T19.2*
- Virus de l'herpès ¬ Ulcère de la *A60.0†*, *N77.0**
- ¬
- - *S31.5*
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Abcès de la *N76.4*
- - Absence congénital(e) de la *Q52.7*
- - Adénocarcinome de la *C51.9*
- - Adhérences de la *N90.8*
- - Atrophie de la *N90.5*
- - Carcinoma in situ: *D07.1*
- - Carcinome
- - - Basocellulaire de la *C51.9*
- - - Épidermoïde de la *C51.9*
- - Dysplasie
- - - Légère de la *N90.0*
- - - Moyenne de la *N90.1*
- - Dystrophie de la *N90.4*
- - Furoncle de la *N76.4*
- - Fusion de la *Q52.5*
- - Hématome obstétrical de: *O71.7*
- - Herpès de la *A60.0†*, *N77.1**
- - Hypertrophie de la *N90.6*
- - Inflammation
- - - Précisées du vagin et de la *N76.8*
- - - Vagin et de la *N76*
- - Kraurosis de la *N90.4*
- - Kyste
- - - *N90.7*
- - - Congénital(e) de la *Q52.7*
- - Leucoplasie de la *N90.4*

Vulve *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie inflammatoire précisée du vagin et de la *N76.88*
- - Malformation
- - - Congénitales de la *Q52.7*
- - - SAI congénital(e) de la *Q52.7*
- - Mycose de la *B37.3†*, *N77.1**
- - Néoplasie intraépithéliale de la *N90.3*
- - Plaie ouverte du vagin et de la *S31.4*
- - Polype de la *N84.3*
- - Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: *R87*
- - Soin maternel
- - - Intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la *O34.7*
- - - Tumeur de la *O34.7*
- - Sténose de la *N90.5*
- - Syphilis
- - - Secondaire de la *A51.3†*
- - - Tardive de la *A52.7†*, *N77.1**
- - Trichomonase de la *A59.0†*, *N77.1**
- - Tuberculose de la *A18.1†*, *N77.1**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D28.0*
- - - Malign
- - - - *C51*
- - - - Lésion à localisations contiguës de la *C51.8*
- - Ulcération de la *N76.6*

Vulvite
- Aiguë ¬ *N76.2*
- Blennorragique ¬ *A54.0†*, *N77.1**
- Candida ¬ *B37.3†*, *N77.1**
- Candidose ¬ *B37.3†*, *N77.1**
- Candidosique ¬ *B37.3†*, *N77.1**
- Cours de l'infection par des oxyures ¬ *B80†*, *N77.1**
- Diabétique ¬ *E14.60†*, *N77.8**
- Gonorrhéique
- - Abcès ¬ *A54.1†*, *N77.1**
- - ¬ *A54.0†*, *N77.1**
- Moniliase ¬ *B37.3†*, *N77.1**
- SAI ¬ *N76.2*
- Subaiguë et chronique ¬ *N76.3*
- Syphilitique
- - Précoce ¬ *A51.0*
- - Tardive ¬ *A52.7†*, *N77.1**
- Trichomonas ¬ *A59.0†*, *N77.1**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†*, *N77.1**
- Virus de l'herpès ¬ *A60.0†*, *N77.1**
- Vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Vaginite, *N77.1**

Vulvitis
- Diabetica diabète sucré type
- - 1 ¬ *E10.60†*, *N77.8**

Vulvitis *–suite*
- Diabetica diabète sucré type *–suite*
- - 2 ¬ *E11.60†*, *N77.8**
- Mycotica ¬ *B37.3†*, *N77.1**

Vulvo-vaginal
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Ulcérations *N77.2**
- Chronique stade
- - 1 ¬ Maladie GVH *T86.05†*, *N77.21**
- - 2 ¬ Maladie GVH *T86.06†*, *N77.22**
- - 3 ¬ Maladie GVH *T86.07†*, *N77.23**
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Ulcération et inflammation *N77.8**
- ¬
- - Candidomycose *B37.3†*, *N77.1**
- - Mycose *B37.3†*, *N77.1**
- - Rhabdomyosarcome *C57.8*

Vulvo-vaginal-gingival ¬ Syndrome *L43.8*

Vulvo-vaginite
- Aiguë ¬ *N76.0*
- Amibes ¬ *A06.8†*, *N77.1**
- Candida ¬
- - *B37.3†*
- - *B37.3†*, *N77.1**
- Candidomycétique ¬ *B37.3†*
- Candidose ¬ *B37.3†*, *N77.1**
- Candidosique ¬ *B37.3†*, *N77.1**
- Chlamydia ¬ *A56.0*
- Chronique ¬ *N76.1*
- Cours
- - Infection par des oxyures ¬ *B80†*, *N77.1**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Vaginite, vulvite et *N77.1**
- Gonococcique SAI ¬ *A54.0*
- Gonocoques
- - Abcès ¬ *A54.1†*, *N77.1**
- - ¬ *A54.0†*, *N77.1**
- Gonorrhéique ¬ *A54.0†*, *N77.1**
- Herpétique ¬ *A60.0†*, *N77.0**
- Moniliase ¬ *B37.3†*, *N77.1**
- Mycosique ¬ *B37.3†*, *N77.1**
- SAI ¬ *N76.0*
- Subaiguë ¬ *N76.1*
- Trichomonas ¬ *A59.0†*, *N77.1**
- Virus de l'herpès ¬ *A60.0†*, *N77.1**

Vulvovaginitis candidomycetica ¬ *B37.3†*, *N77.1**

VZV [virus de la varicelle et du zona] ¬ Antécédents personnels d'infection à *Z86.1*

Waardenburg
v.a. Klein-Waardenburg
v.a. Shah-Waardenburg
- Anomalies des membres ¬ Syndrome de *E70.3*
- Type
- - 1 ¬ Syndrome de *E70.3*
- - 3 ¬ Syndrome de *E70.3*
- ¬ Syndrome
- - *E70.3*
- - Anophtalmie de *Q87.2*

Waardenburg-Jonker ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*

Wachtel
v. Gardner-Silengo-Wachtel

Wagner
v.a. Holzgreve-Wagner-Rehder
- ¬ Dégénérescence vitréo-rétinienne de *H35.5*

Wagner-Parnas [Forme hépatique de la glycogénose] ¬ Syndrome de *E74.0*

WAGR ¬ Syndrome *Q87.8*

Waldenström ¬
- Glomérulonéphrite au cours de macroglobulinémie de *C88.00†*, *N08.1**
- Glomérulopathie au cours de macroglobulinémie de *C88.00†*, *N08.1**
- Macroglobulinémie de *C88.0*
- Purpura hypergammaglobulinémique bénin [de *D89.0*

Waldeyer ¬ Tumeur maligne: Anneau de *C14.2*

Waldmann ¬ Maladie de *I89.09*

Walker
v. Marden-Walker
v.a. Dandy-Walker

Walker-Dyson ¬ Syndrome de *Q13.1*

Walker-Warburg ¬ Syndrome de *Q04.3*

Wallenberg ¬ Syndrome de *I66.3†*, *G46.3**

Warburg
v. Walker-Warburg

Ward
v. Romano-Ward

Warfarine ¬ Dysmorphisme dû à la *Q86.2*

WAS ¬ *D82.0*

Wassermann faussement positive ¬ Réaction de *R76.2*

Watanabe] ¬ Épilepsie bénigne du nourrisson [*G40.08*

Water clefts (fentes) ¬ *H25.0*

Waterhouse-Friderichsen ¬ Syndrome de *A39.1†*, *E35.1**

Waters-West ¬ Syndrome de *D58.8*

Watson ¬ Syndrome de *Q85.0*

Watsoniase ¬ *B66.8*

Watsons
v. Alagille-Watsons

Waziri
v. Carpenter-Waziri

Weary ¬ Poïkilodermie sclérosante héréditaire de *Q82.8*

Weaver ¬ Syndrome de: *Q87.3*

Weaver-Williams ¬ Syndrome de *Q87.8*

Weber
v. Klippel-Trénaunay-Weber
v.a. Rendu-Osler-Weber
v.a. Sturge-Weber-Dimitri
v.a. Sturge-Weber-Krabbe
- ¬ Syndrome
- - *I67.88†*, *G46.3**
- - Parkes *Q87.2*

Weber-Christian] ¬ Panniculite récidivante [*M35.6*

Wegener ¬
- Glomérulonéphrite au cours de granulomatose de *M31.3†*, *N08.5**
- Glomérulopathie au cours de granulomatose de *M31.3†*, *N08.5**
- Granulomatose de *M31.3*
- Maladie de *A50.0†*, *M90.29**

Wegener-Klinger-Churg avec atteinte pulmonaire ¬ Syndrome de *M31.3†*, *J99.1**

Weil] ¬ Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de *A27.0*

Weill
v. Léri-Weill

Weill-Marchesani ¬ Syndrome de *Q87.1*

Weiss
v. Jackson-Weiss
- ¬ Syndrome de Mallory- *K22.6*

Weissenbacher-Zweymuller ¬ Syndrome de *Q77.7*

Welander ¬
- Amyotrophie spinale (de): forme juvénile, type III [Kugelberg- *G12.1*
- Myopathie distale type *G71.0*

Welchii] ¬ Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium *A05.2*

Wellesley-Carman-French ¬ Syndrome de *Q87.8*

Wells
v.a. Hay-Wells
v.a. Muckle-Wells
- ¬ Phlegmon à éosinophiles [*L98.3*

Wenckebach ¬ Bloc (de) (du): *I44.1*

Werdnig-Hoffman] ¬ Amyotrophie spinale infantile, type I [*G12.0*

Werlhof ¬ Maladie de *D69.3*

Wermer ¬ Syndrome de *D44.8*

Werner
- Atypique ¬ Syndrome de *E34.8*
- ¬ Syndrome de *E34.8*

Wernicke ¬
- Aphasie de développement, de type *F80.2*
- Encéphalopathie de *E51.2†*, *G32.8**
- Polio-encéphalopathie de *E51.2†*, *G32.8**

West
v.a. Waters-West
- Nile ¬ Fièvre due au virus *A92.3*
- ¬ Syndrome de: *G40.4*

Westphal-von-Strümpell ¬ Pseudosclérose de *E83.0†*, *G99.8**

Weyers ¬ Dysostose acrofaciale type *Q75.4*

Wharton ¬ Kyste du canal de *K11.6*

WHIM ¬ Syndrome *D81.8*

Whipple ¬
- Arthrite au cours de maladie de *K90.8†*, *M14.89**
- Maladie de *K90.8†*, *M14.89**
- Uvéite postérieure dans la maladie de *K90.8†*, *M14.89**

White
v. Darier-White
- Spirit ¬ *T52.0*
- ¬ Syndrome de: Wolff-Parkinson- *I45.6*

Whitmore ¬ Maladie de *A24.4*

Wieacker-Wolff ¬ Syndrome de *G71.8*

Wiedemann
v. Beckwith-Wiedemann
v. Petty-Laxova-Wiedemann
v. Stüve-Wiedemann

Wiedemann-Rautenstrauch ¬ Syndrome de *E34.8*

Wiedemann-Steiner ¬ Syndrome de *Q87.1*

Wiethe
v. Urbach-Wiethe

Wilbrandt
v. Grayson-Wilbrandt

Wildervanck ¬ Syndrome de *Q75.4*

Wilkinson] ¬ Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon- *L13.1*

Willi
v. Prader-Labhart-Willi
v. Prader-Willi

Williams
v. Weaver-Williams

Williams-Beuren ¬ Syndrome de *Q93.5*

Williams-Campbell ¬ Syndrome de *Q32.2*

Wilms ¬
- Syndrome de néphroblastomatose-ascite fœtale-macrosome-tumeur de *Q87.3*
- Tumeur de *C64*

Wilson
v.a. Kimmelstiel-Wilson
v.a. Mowat-Wilson
v.a. Saul-Wilson
- Extracapillaire diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ Syndrome de Kimmelstiel et *E10.20†*, *N08.3**
- - - 2 ¬ Syndrome de Kimmelstiel et *E11.20†*, *N08.3**
- - ¬ Syndrome de Kimmelstiel et *E14.20†*, *N08.3**
- Mikity ¬ Syndrome de *P27.0*
- ¬
- - Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*
- - Démence au cours de maladie de *E83.0†*, *F02.8**
- - Maladie
- - - *E83.0*
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de maladie de *E83.0†*, *N16.3**

Wilson *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Pyélonéphrite au cours de maladie de *E83.0†, N16.3**

Wilson-Turner ¬ Syndrome de *Q87.8*

Winged" ¬ Déficit en hélice " *D82.8*

Winship-Viljoen-Leary ¬ Syndrome de *Q87.8*

Winter
v. Baraitser-Winter
v. Ellis-Yale-Winter
v. MacDermot-Winter

Wiskott-Aldrich ¬ Syndrome de *D82.0*

Witkop ¬ Syndrome de *Q82.8*

Woakes ¬ Syndrome ou ethmoïdite de *J33.1*

Wolff
v.a. Wieacker-Wolff

- Femme ¬ Adénome du canal de *D28.7*

- Hirschorn ¬ Syndrome de *Q93.3*

- Parkinson-White ¬ Syndrome de: *I45.6*

- ¬ Corps ou canal de *C57.7*

Wolff-Zimmermann ¬ Syndrome de *Q87.0*

Wolfram ¬ Syndrome de *E13.72*

Wolman ¬ Maladie de *E75.5*

Woltman
v. Moersch-Woltman

Wood
v. Lowry-Wood
v. Matthew-Wood

Worster-Drought ¬ Syndrome de *G80.8*

Worth ¬ Ostéosclérose autosomique dominante type *Q78.2*

Woude
v. Van der Woude

WS3 ¬ *E70.3*

Wuchereria bancrofti ¬ Filariose à *B74.0*

WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante-épilepsie-déficience intellectuelle par déficit de *G11.1*

X-ALD ¬ *E71.3*

Xanthélasma de la paupière ¬ *H02.6*

Xanthine

- Aldéhyde oxydase ¬ Déficit combiné en xanthine déshydrogénase et *E79.8*
- Déshydrogénase
- - Aldéhyde oxydase type A ¬ Déficit combiné en sulfite oxydase, *E72.1*
- - Xanthine aldéhyde oxydase ¬ Déficit combiné en *E79.8*
- - ¬ Déficit en *E79.8*
- Oxydase ¬ Déficit en *E79.8*
- Oxydoréductase ¬ Déficit en *E79.8*
- ¬ Pierre de *E79.8†, N22.8**

Xanthinurie

- Héréditaire ¬ *E79.8*
- Type
- - I ¬ *E79.8*
- - II ¬ *E79.8*

Xanthoastrocytome pléomorphe ¬ *C71.9*

Xanthogranulome

- Juvénile ¬ *D76.3*
- Nécrobiotique ¬ *D76.3*
- ¬ *D76.3*

Xanthomatose

- Cours d'hypercholestérolémie ¬ *E78.0*
- Sitostérolémie ¬ *E78.0*

Xanthome

- Conjonctival ¬ *E75.5†, H13.8**
- Ligamentaire ¬ *E75.5*
- Tubéreux ¬ *E78.2*
- Tubéro-éruptif ¬ *E78.2*
- Verruqueux de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*

Xanthopsie ¬ *H53.5*

Xanthurénique ¬ Acidurie *E70.8*

Xénogénique ¬ Présence d'une valvule cardiaque *Z95.3*

Xenopi ¬ Infection à Mycobacterium *A31.88*

Xérocytose héréditaire ¬ *D58.8*

Xeroderma pigmentosum ¬

- *Q82.1*
- Variant du *Q82.1*

Xérodermie

- Avitaminose A ¬ *E50.8†, L86**
- Paupière ¬ *H01.1*

Xérophtalmie ¬

- *E50.7†, H19.8**
- Carence en vitamine A avec *E50.7†, H19.8**

Xérophtalmique cornée ¬

- Avitaminose A avec cicatrices *E50.6†, H19.8**
- Carence en vitamine A avec cicatrice *E50.6†, H19.8**

Xérosis

- Conjonctival ¬ Avitaminose A
- - *E50.0†, H13.8**

Xérosis *–suite*

- Conjonctival ¬ Avitaminose A *–suite*
- - Taches de Bitot et *E50.1†, H13.8**
- Cornéen ¬ Avitaminose A avec *E50.2†, H19.8**
- Cutané ¬ *L85.3*
- SAI de la conjonctive ¬ *H11.1*
- Ulcération de la cornée ¬ Avitaminose A avec *E50.3†, H19.8**

Xérostomie ¬ *K11.7*

Xerotica obliterans] ¬ Balanite scléreuse oblitérante [balanitis *N48.0*

Xérotique ¬ Carence en vitamine A avec kératite *E50.4†, H19.3**

Xia-Gibbs ¬ Syndrome de *Q87.8*

Xiphoideus ¬ Fracture du sternum: Processus *S22.23*

XLF
v. cernunnos-XLF

XLSA ¬ *D64.0*

XP ¬ *Q82.1*

Xp22.3 ¬ Syndrome de microdélétion *Q99.8*

XPV ¬ *Q82.1*

Xq ¬ Caryotype 46 X

- Chromosome sexuel anormal, sauf iso (*Q96.2*
- Iso (*Q96.1*

XX

- 46 XY
- - Hermaphrodite vrai ¬ Chimère 46, *Q99.0*
- - ¬ Chimère 46, *Q99.0*
- Origine génétique ¬ Anomalie du développement sexuel 46, *Q99.1*
- Ovaire en bandelettes ¬ 46, *Q99.1*
- XY ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/46, *Q96.3*
- ¬
- - Anomalie
- - - Développement sexuel 46, *Q56.2*
- - - Testiculaire du développement sexuel 46, *Q99.1*
- - Hermaphrodite vrai 46, *Q99.1*
- - Phénotype masculin avec caryotype 46, *Q98.3*
- - Syndrome
- - - 45,X/46, *Q96.3*
- - - Klinefelter, homme avec caryotype 46, *Q98.2*

XXX ¬

- Caryotype 47, *Q97.0*
- Syndrome 47, *Q97.0*

XXXX ¬ Syndrome 48, *Q97.1*

XXXXX ¬ Syndrome 49, *Q97.1*

XXXXY ¬ Syndrome 49, *Q98.1*

XXXY ¬ Syndrome 48, *Q98.1*

XXY ¬ Syndrome de Klinefelter, caryotype 47, *Q98.0*

XXYY ¬ Syndrome 48, *Q98.8*

XY

- Déficit
- - 17
- - - 20-desmolase testiculaire ¬ Anomalie du développement sexuel 46, *E29.1*
- - - Bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase 3 ¬ Anomalie du développement sexuel 46, *E29.1*
- - Isolé en 17,20-lyase ¬ Anomalie du développement sexuel 46, *E29.1*
- Hermaphrodite vrai ¬ Chimère 46,XX/46, *Q99.0*
- Ovaire en bandelettes ¬ 46, *Q99.1*
- ¬
- - Chimère 46,XX/46, *Q99.0*
- - Dysgénésie gonadique
- - - Complète 46, *Q99.1*
- - - Partielle 46, *Q56.1*
- - Femme avec un caryotype 46, *Q97.3*
- - Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou *Q96.3*

Xylène [diméthylbenzène] ¬ *T52.2*

Xylitol déshydrogénase ¬ Déficit en *E74.8*

XYY ¬ Caryotype 47, *Q98.5*

XYYY ¬ Syndrome 48, *Q98.8*

XYYYY ¬ Syndrome 49, *Q98.8*

Yaba ¬ Fièvre (de): *B08.8*

Yahr ¬ stade

- 0 à moins de 3 selon Hoehn et *G20.0*
- 3 à 4 selon Hoehn et *G20.1*
- 5 selon Hoehn et *G20.2*

Yale
v. Ellis-Yale-Winter

Yaws ¬ *A66*

Yersinia

- Enterocolitica ¬
- - Arthrite post-infectieuse au cours d'une entérite à *A04.6†, M03.29**
- - Arthropathie post-infectieuse au cours d'une entérite à *A04.6†, M03.29**
- - Entérite à *A04.6*
- Pestis] ¬ infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. pestis [*A20*
- Pseudotuberculosis subsp. pestis [Yersinia pestis] ¬ infection à *A20*

Yersiniose extra-intestinale ¬ *A28.2*

Yeux
v. œil

YF ¬ *A95.9*

Young
v. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson
v. Stratton-Garcia-Young

Yq ¬ Isochromosomie *Q98.6*

ZAP70 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Zébrés ¬ Myopathie à corps *G71.2*

Zellweger ¬ Syndrome de: *Q87.8*

Zellweger-like sans anomalies peroxysomales ¬ Syndrome de *Q87.8*

Zézaiement ¬ *F80.8*

Zika

- Contracté mère ¬
- - Fœtus affecté par la maladie à virus *P00.2*
- - Nouveau-né affecté par la maladie à virus *P00.2*
- ¬
- - Fièvre à virus *A92.5*
- - Infection à virus *A92.5*
- - Maladie
- - - Congénitale à virus *P35.4*
- - - Virus *A92.5*
- - Microcéphalie due à la maladie congénitale à virus *P35.4*

Zimmermann
v. Wolff-Zimmermann

Zimmermann-Laband ¬ Syndrome de *Q87.8*

Zinc

- Composés ¬ Effet toxique: *T56.5*
- ¬
- - Anémie associée à carence en: *D53.8*
- - Anomalies du métabolisme du *E83.2*
- - Carence alimentaire en *E60*
- - Taux anormal de: *R79.0*

Zinsser ¬ Maladie de Brill- *A75.1*

Ziter
v. Carey-Fineman-Ziter

Zollinger-Ellison ¬ Syndrome de *E16.4*

Zona

- Accompagné d'autres manifestations neurologiques ¬ *B02.2†*
- Complications ¬ *B02.8*
- Disséminé ¬ *B02.7*
- Herpes zoster] ¬ *B02*
- Ophtalmique ¬ *B02.3*
- SAI ¬ *B02.9*
- Sans complication ¬ *B02.9*
- ¬
- - *B02*
- - Antécédents personnels d'infection à VZV [virus de la varicelle et du *Z86.1*
- - Atteinte de la Paupière au cours de *B02.3†, H03.1**
- - Encéphalomyélite due à *B02.0†, G05.1**
- - Kératite interstitielle au cours de *B02.3†, H19.2**
- - Kératoconjonctivite interstitielle au cours de *B02.3†, H19.2**
- - Myélite due à *B02.0†, G05.1**
- - Otite externe au cours de *B02.8†, H62.1**
- - Paralysie faciale liée à l'infection par le virus varicelle *B02.2†, G53.0**

Zone

- Application rouge lèvre ¬ Lèvre
- - Inférieure: *C00.1*
- - Supérieure: *C00.0*
- Cloacale ¬ Tumeur maligne: *C21.2*
- Diffuses ¬ lymphome folliculaire non hodgkinien avec ou sans *C82*
- Marginal
- - Cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la *C88.4*
- - Splénique ¬ Lymphome de la *C83.0*
- - ¬
- - - Lymphome
- - - - B cutané de la *C83.0*
- - - - Nodal de la *C83.0*
- - - - Nodulaire à cellules B de la *C83.0*
- - - - Splénique de la *C83.0*
- - - Repli ary-épiglottique
- - - - *C13.1*
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- Os alvéolaire ¬ Plaie ouverte dans la *S01.59*
- Pellucide ¬ Infertilité féminine par défaut de la *N97.8*
- Postérieure ¬ Inflammation de la *H30.2*
- Pression
- - Rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte ¬ *L89.0*
- - ¬ Ulcère de décubitus et *L89*
- Sacrée ¬ Lésion de la *M53.3*
- T ¬ Lymphome de la *C84.4*

Zoonotique pandémique identifié ¬ Grippe

- Influenza
- - Encéphalite, virus de la grippe aviaire *J09†, G05.1**
- - Encéphalopathie, virus de la grippe aviaire *J09†, G94.3**
- - Entérite, virus d'influenza *J09*
- - Épanchement pleural, virus d'influenza *J09*
- - Gastroentérite, virus d'influenza *J09*
- - Infection respiratoire supérieure, virus d'influenza *J09*
- - Laryngite, virus d'influenza *J09*
- - Méningisme, virus d'influenza *J09*
- - Myocardite, virus de la grippe aviaire *J09†, I41.1**
- - Otite moyenne, virus de la grippe aviaire *J09†, H67.1**
- - Pharyngite, virus d'influenza *J09*
- - Pneumonie, virus d'influenza *J09*
- - Polio-encéphalite, virus de la grippe aviaire *J09†, G05.1**
- Virus d'influenza *J09*

Zoster

- Auricularis ¬ Herpès *B02.2†, H94.0**
- Ischiadicus ¬ *B02.2†, G59.8**

Zoster *–suite*

- Nerf facial ¬ Herpès *B02.2†, G53.0**
- Névralgie ¬ Herpès *B02.2†, G53.0**
- Ophthalmicus NCA ¬ Herpes *B02.3†, H58.8**
- Oticus ¬ Herpès *B02.2†, H94.0**
- Paupière ¬ Herpès *B02.3†, H03.1**
- ¬
- - Conjonctivite au cours d'herpès *B02.3†, H13.1**
- - Encéphalite au cours d'herpès *B02.0†, G05.1**
- - Ganglionite
- - - Cours d'herpès *B02.2†, G53.0**
- - - Trigéminale après herpès *B02.3†, H58.8**
- - Herpes *B02*
- - Iridocyclite au cours d'herpès *B02.3†, H22.0**
- - Méningite à herpès *B02.1†, G02.0**
- - Névralgie crânienne après herpès *B02.2†, G53.0**
- - Névrite *B02.2†, G53.0**
- - Zona [herpes *B02*

Zostérien ¬

- Blépharite *B02.3†, H03.1**
- Conjonctivite *B02.3†, H13.1**
- Douleurs *B02.9*
- Encéphalite *B02.0†, G05.1**
- Ganglionite géniculée *B02.2†, G53.0**
- Iritis *B02.3†, H22.0**
- Kératite *B02.3†, H19.2**
- Kératoconjonctivite *B02.3†, H19.2**
- Méningite *B02.1†, G02.0**
- Méningo-encéphalite *B02.0†, G05.1**
- Névrite du ganglion géniculé *B02.2†, G53.0**
- Sclérite *B02.3†, H19.0**

Zumbusch
v. von Zumbusch

Zunich ¬ Syndrome neuroectodermique type *Q87.8*

Zunich-Kaye ¬ Syndrome de *Q87.8*

Zweymuller
v. Weissenbacher-Zweymuller

Zygoma ¬ *S02.4*

Zygomaticum ¬ Os: *D16.42*

Zygomatique ¬ Os: *C41.02*

Zygomycose

- Poumon ¬ *B46.0†, J99.8**
- Sans précision ¬ *B46.9*
- ¬
- - *B46*
- - *B46.8*

Annexe

Tableau des tumeurs

Notes:

1. La liste ci-après indique les numéros de la classification topographique des tumeurs. Pour chaque siège anatomique, cinq codes sont possibles:
   - Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives
   - Tumeur maligne, secondaire ou présumées secondaire
   - Tumeur in situ
   - Tumeur bénigne
   - Tumeur d'évolution imprévisible ou inconnue

La description de la lésion indique souvent quelle colonne utiliser, per exemple: «mélanome malin de la peau», «carcinome in situ du col utérin», «fibro-adénome bénin du sein».

2. Les sièges marqués du signe # (par exemple: face NCA #) seront classés comme tumeur maligne de la peau desdits sièges si la tumeur en question est un carcinome spinocellulaire ou un carcinome épidermoïde, et à tumeur bénigne de la peau, desdits sièges s'il s'agit d'un papillome (quel qu'en soit le type).

3. Sauf s'ils sont intra-osseux ou odontogènes, les carcinomes et adénocarcinomes de sièges marqués du signe ◊ (par exemple ischion ◊) seront considérés comme métastases, siège primitif non précisé; classer à C79.5.

4. Pour les tumeurs du tissu conjonctif (vaisseaux sanguins bourse séreuse, fascia, ligaments, muscles, nerfs périphériques, nerfs parasympathiques et sympathiques, tendons, synoviale, etc.) ou les tumeurs dont le type morphologique indique une participation du tissu conjonctif, coder selon la liste d'après le terme «Tumeur, tissu conjonctif». Pour les sièges qui ne figurent pas dans la liste, choisir le code de la tumeur correspondant à ce siège; par exemple:
   - Fibrosarcome, pancréas C25.9
   - Léiomyosarcome, estomac C16.9.

Les types morphologiques traduisant la participation du tissu conjonctif apparaissent, à la place qui leur revient dans l'index alphabétique, avec la mention «v. tumeur, tissu conjonctif».

5. Pour les néoplasies de la peau, ou lors d'indications morphologiques (histologiques) se rapportant à la peau, coder selon la liste ci-après; pour des localisations qui ne figurent pas dans la liste, coder la néoplasie selon sa localisation, p. ex.
   - Carcinome basocellulaire du palais – codé C05.9

Les indications morphologiques (histologiques) se rapportant à la peau figurent à l'endroit approprié dans l'index alphabétique avec la mention «v. tumeur, peau».

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
tumeur	C80.9	C79.9	D09.9	D36.9	D48.9
– abdomen, abdominal	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– abdominal	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organe	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– – paroi	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – trou	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – viscères	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– abdomino-pelvien	C76.8	C79.88		D36.7	D48.7
– acromion ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– aile du nez (externe)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– aine NCA #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– aisselle – v. tumeur, creux des aisselles					

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– alvéolaire					
– – muqueuse	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – procès ou rebord	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – poumon – v. tumeur, poumons					
– – – carcinome	C03.9	C79.88			
– – – – maxillaire	C03.0	C79.88			
– – – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88			
– – – maxillaire	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – maxillaire inférieur	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – muqueuse	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alvéole (dent)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – maxillaire inférieur	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alvéole dentaire NCA	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alvéole pulmonaire – v. tumeur, poumons					
– ampoule de Vater (hépato-pancréatique)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– amygdale pharyngienne	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– amygdales	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – fosse	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – gorge	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – linguale	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – luette	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – pharyngée	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piliers des amygdales (postérieurs) (antérieurs)	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– angle colique					
– – droit	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – gauche	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – hépatique	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – splénique	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– angle ponto-cérébelleux	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– anneau lymphoïde de Waldeyer	C14.2	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– anneau lymphatique NCA – v.a. tumeur, oropharynx	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – amygdale palatine	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – piliers des amydales	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– annexe (utérus)	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– ano-rectale (transition)	C21.8	C78.5	D01.4	D12.9	D37.78
– anus, anal	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – canal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – marge	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – peau	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sphincter	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– aorte (thoracique)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – abdominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– aponévrose – v.a. tumeur, tissu conjonctif					
– – palmaire	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – plantaire	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– appendice cérébrale	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– appendiculaire	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– arachnoïde	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cérébrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– arc palato-glosse	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– arc palato-pharyngien	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– aréole	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– artère – v.a. tumeur, tissu conjonctif					
– – carotide	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– articulation NCA ◊ (v.a. tumeur, os)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acromio-claviculaire ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – bourse séreuse ou synovial de la peau – v. tumeur, tissu conjonctif					
– – costo-vertébrale ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – sterno-costale ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – temporo-mandibulaire ◊	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– arycartilage (cartilages arytaénoïdes)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– Atlas ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– atrium du coeur	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– auditif					
– – conduit (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – interne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nerf	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– avant-bras NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– biliaires	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – canaux ou voies (canal commun) (canal cystique) (extra-hépatique)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – inter-lobulaire	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intra-lobulaire	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – intrahépatique	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – – – avec extra-hépatique	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– bourse séreuse – v. tumeur, tissu conjonctif					
– branchial	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– bronchiole	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchique	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carène	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe inférieur	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe moyen	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe supérieur	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – principal	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchique (poumons)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– buccal (cavité)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – muqueuse	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – sillon (inférieur) (supérieur)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– buccale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – angle	C00.6		D00.0	D10.3	D37.0
– – muqueuse NCA	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – plafond	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – plancher	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – partie antérieure	C04.0	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – partie latérale	C04.1	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – plus près concernant une partie NCA	C06.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – vestibule	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– bulbe olfactif	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– caecum	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– canal					
– – anal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – auriculaire (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cholédoque	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – conduit auditif (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cranio-pharyngé	C75.2	C79.88	D09.3	D35.3	D44.4
– – cystique	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – déférent	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – éjaculateur	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – hépatique	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – lacrymo-nasal	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – pancréatique accessoire (de Santorini)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – parotidien	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sublingual	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – submandibulaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – thoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – thyréoglosse, thyroglosse	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– canal cystique	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– canal de Müller					
– – organes génitaux féminins	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – organes génitaux masculins	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– canal de Santorini	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– canal de Stensen (canal de Sténon)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– canal de Wharton	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– canal de Wirsung	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– canal de Wolff (corps)					
– – femme	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – homme	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– canal déférent	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– capillaire – v. tumeur, tissu conjonctif					
– capsule interne	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cardia	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– carène trachéale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– cartilage (articulation) NCA (v.a. tumeur, os)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – anneau	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – ary - (cartilages aryténoïdes)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – aryténoïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – bronche	C34.0	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– – cricoïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cône	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – costal ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – côtes ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – épiglotte	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – laryngé	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nez, nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – oreille (externe)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – paupière	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – semin-lunaire (genou)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – thyroïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – trachée	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– cavité					
– – abdominal	C48.2	C78.6		D20.1	D48.7
– – buccale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – tympanique	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cavité oculaire – v. tumeur, orbite					
– cavité tympanique	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cellules insulaires (pancréas)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– central					
– – substance blanche du cerveau	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – système nerveux – v. tumeur, système nerveux					
– cérébral – v. tumeur, cerveau					
– cerveau NCA	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – frontal	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – infratentoriel	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lobe occipital	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobe pariétal	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobe temporal	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – méninge	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – nerf crânien – v. tumeur, nerf					
– – supratentoriel	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – tronc cérébral	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – ventricule cérébral – v. tumeur, ventricule cérébral					
– cervelet	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– cheville NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– chiasma optique	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– choane	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– choroïde	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
– clavicule ◊	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– clitoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– clivus	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cloaque	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– coccyx ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – glomus coccygien	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – vertèbre ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– coeur (ventricule) (oreillette)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – sac	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– coin de l'oeil (externe) (interne)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– col (col de l'utérus)	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – canal	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – jonction vers le vagin	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – moignon	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– col de l'utérus interne	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– col de l'utérus – v. tumeur, col					

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– côlon (v.a. tumeur, intestin, gros, côlon)	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – avec rectum	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– côlon transverse	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– columelle nasale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– commissure					
– – labiale	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – laryngée	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– conduit auditif externe	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– conduits					
– – biliaires	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – intra-hépatiques	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– cône médullaire	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
– cône terminal	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
– conjonctive	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
– cordes vocales (vraies)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – fausses	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cordon spermatique	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– cornée (limbes)	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– corps					
– – calleux	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– – caverneux	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – ciliaire	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– – pancréatique	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – pinéal	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – strié	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – utérus	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – – isthme	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – ventriculaire	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– corpuscule carotidien	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– cortex					
– – cérébral	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerveau	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – glande surénale	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– côtes ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– cou NCA #	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– coude NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– crâne ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– crânienne (chaque fosse)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– creux des aisselles	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – pli cutané	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– crico-pharynx	C 13.0	C 79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– cryptes de Morgagni	C 21.8	C 78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– cubitus (chaque partie) ◊	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– cuir chevelu	C 44.4	C 79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– cuisse NCA #	C 76.5	C 79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– cul-de-sac					
– – pharyngien	C 11.3	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – cul-de-sac recto-utérin	C 48.1	C 78.6		D20.1	D48.4
– – vaginal	C 52	C 79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– cutanée – v. tumeur, peau					
– diaphragme	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– diencéphale	C 71.7	C 79.3		D33.2	D43.1
– disque intervertébral ◊	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– disséminée					
– – sans précision	C 80.9	C 79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C 80.0	C 79.9			
– diverticule de Meckel	C 17.3	C 78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– doigts NCA #	C 76.4	C 79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– dos NCA #	C 76.7	C 79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– duodénum	C 17.0	C 78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– dure-mère	C 70.9	C 79.4		D32.9	D42.9
– – crânial	C 70.0	C 79.3		D32.0	D42.0
– – encéphale	C 70.0	C 79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C 70.1	C 79.4		D32.1	D42.1
– endocarde	C 38.0	C 79.84		D15.1	D48.7
– endocervicale (glandes) (canal)	C 53.0	C 79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endomètre (glande) (Stroma)	C 54.1	C 79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– entérique – v. tumeur, intestin					
– épaule NCA #	C 76.4	C 79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– épendyme (cerveau)	C 71.5	C 79.3		D33.0	D43.0
– épicarde	C 38.0	C 79.84		D15.1	D48.7
– épididyme	C 63.0	C 79.82	D07.6	D29.3	D40.7
– épidural	C 72.9	C 79.4		D33.9	D43.9
– épiglotte	C 32.1	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – bord libre	C 10.1	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – cartilage	C 32.1	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – face antérieure	C 10.1	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – supra-hyoïdien	C 32.1	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – surfaces postérieures	C 32.1	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– épipharynx – v. tumeur, rhinopharynx					

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– épiphyse (glande pinéale)	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– estomac	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antre	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cardia	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – corps	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – entrée	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – fundus	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – grande courbure NCA	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – paroi NCA	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – antérieur NCA	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – postérieur NCA	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – petite courbure NCA	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – prépylore	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – pylore	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – sortie	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– exocol	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– externe					
– – conduit auditif	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – orifice du col	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– extra-dural	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– extra-rectal	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– faux (du cervelet) (du cerveau)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– fémur (chaque partie) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– fente branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fente de Rathke	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– fesses NCA #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– flanc NCA #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– foie	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – localisation primaire	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– follicule pileux	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– fosse					
– – crânienne (antérieure) (moyenne) (postérieure)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – glosso-pharyngienne	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – glosso-palatine	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – ischio-rectale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – pituitaire	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – ptérygoïde NCA	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – nerfs périphériques	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – système nerveux autonome	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – tissu conjonctif	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – – tissus moux	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – Rosenmüller	C 11.2	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsillaire	C09.0	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fosse de Rosenmüller	C 11.2	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– fosse poplitée #	C 76.5	C 79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– fosse postérieure	C 71.9	C 79.3		D33.2	D43.2
– fosse supra-claviculaire	C 76.0	C 79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– frein					
– – antérieur des lèvres	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – labial – v. tumeur, lèvre intérieure					
– – lingual	C02.2	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– frontal	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lobe	C 71.1	C 79.3		D33.0	D43.0
– – lobe frontal cérébral	C 71.1	C 79.3		D33.0	D43.0
– – os <>	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – sinus	C 31.2	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– fundus					
– – gastrique	C 16.1	C 78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – utérus	C 54.3	C 79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– ganglion (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C 47.9	C 79.88		D36.1	D48.2
– – basal	C 71.0	C 79.88		D33.0	D43.0
– gastro-intestinal (tractus) NCA	C 26.9	C 78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– gencive (alvéolaire) (marginale)	C03.9	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibule	C03.1	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – maxillaire	C03.0	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– gencive – v. tumeur, gencive					
– généralisée					
– – sans précision	C 80.9	C 79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C 80.0	C 79.9			
– genou NCA #	C 76.5	C 79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– gland	C 60.1	C 79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– glande					
– – lacrymale	C 69.5	C 79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – parathyroïde	C 75.0	C 79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– – pinéale	C 75.3	C 79.88		D35.4	D44.5
– – pituitaire	C 75.1	C 79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – sous-maxilaire	C08.0	C 79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sous-maxillaire	C08.0	C 79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C 79.88	D00.0	D11.7	D37.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – surrénale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – vestibulaire majeure	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– glande de Bartholin	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– glande de Meibom	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– glande de Virchow	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
– glande mammaire (masculine) (féminine) (tissu glandulaire) (parties molles)	C50.9	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – corps glandulaire central	C50.1	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – externes	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – inférieure	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – interne	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – ligne médio-claviculaire	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – mamelon, aréole	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – peau	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – prolongement axillaire	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant inféro-externe	C50.5	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant inféro-interne	C50.3	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant supéro-externe	C50.4	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant supéro-interne	C50.2	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – récessus axillaire	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – siège ectopique	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – supérieure	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– glande parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– glande pinéale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– glande salivaire, glandes salivaires (canal) (principal)	C08.9	C79.88	D00.0	D11.9	D37.0
– – accessoire NCA	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – oreille	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sous-maxillaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– glande(s), (lymphe) (système) v.a. tumeur, lymphatique					
– – endocrinienne NCA	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – para-urétral	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– – salive, tumeur de la glande salivaire					
– glandes bulbo-urétrales	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– glandes de Cowper	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– glandes de Skene..	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– glandes endocrines NCA	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – pluriglandulaire	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– glandes sébacées – v. tumeur, peau					
– glandes sous-linguales	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– glandes sudoripares (sécrétrices), localisation non proche concernant	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– glandes vulvo-vaginales	C 51.0	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– globe oculaire	C 69.9	C 79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– Globus pallidus	C 71.0	C 79.3		D33.0	D43.0
– glomus					
– – carotidien	C 75.4	C 79.88		D35.5	D44.6
– – coccygien	C 75.5	C 79.88		D35.6	D44.7
– – jugulaire, typanicum	C 75.5	C 79.88		D35.6	D44.7
– glotte	C 32.0	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– grand hémisphère cérébral	C 71.0	C 79.3		D33.0	D43.0
– grands vaisseaux NCA	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– hanches NCA #	C 76.5	C 79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– hélix	C 44.2	C 79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– hémisphères cérébraux, cérébral (hémisphère) (substance blanche)	C 71.0	C 79.3		D33.0	D43.0
– – méninges	C 70.0	C 79.3		D32.0	D42.0
– – pédoncule	C 71.7	C 79.3		D33.1	D43.1
– – ventricule (troisième) (latéral)	C 71.5	C 79.3		D33.0	D43.0
– – – quatrième	C 71.7	C 79.3		D33.1	D43.1
– hépatique	C 22.9	C 78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – angle (côlon)	C 18.3	C 78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – localisation primaire	C 22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– – voies (biliaires)	C 24.0	C 78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– hile du poumon	C 34.0	C 78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– hippocampe	C 71.2	C 79.3		D33.0	D43.0
– humérus (chaque partie) ◊	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– hymen	C 52	C 79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– hypopharynx, hypopharyngien NCA	C 13.9	C 79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – paroi postérieur	C 13.2	C 79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – rétro-cricoïdienne	C 13.0	C 79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– hypophyse (voie) (infundibulum)	C 75.1	C 79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– hypothalamus	C 71.0	C 79.3		D33.0	D43.0
– île de Reil	C 71.0	C 79.3		D33.0	D43.0
– iléo-caecum, iléo-caecal (valve)	C 18.0	C 78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– iléon	C 17.2	C 78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– iliaque ◊	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– ilion ◊	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– îlots de Langerhans	C 25.4	C 78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– immunproliférative NCA	C 88.90				D47.9
– infraclaviculaire (région) #	C 76.1	C 79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– infratentoriel	C 71.7	C 79.3		D33.1	D43.1
– insula (de Reil)	C 71.0	C 79.3		D33.0	D43.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– intestin	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
– – grêle	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – duodénum	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– – – Iléon	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – jéjunum	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gros	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– – – caecum	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – côlon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – – angle					
– – – – – droit	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – gauche	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – hépatique	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – – splénique	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – ascendant	C18.2	C78.5	D01.0	D12.1	D37.4
– – – – avec rectum	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – – – caecum	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – – descendant	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – droit	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
– – – – gauche	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – pelvien	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – transverse	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – iliéo-caecal	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – tractus NCA	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
– intestin NCA	C76.7	C79.88		D36.7	D48.7
– intra-abdominale	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– intra-crânienne NCA	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– intra-oculaire	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– intra-orbitaire	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– intra-throracique (cavité) (organe NCA)	C76.1	C79.88		D36.7	D48.7
– intrasellaire	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– iris	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– ischion ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ischio-rectale (fosse)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– isthme utérin	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– jéjunum	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– jonction (entre)					
– – ano-rectale	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – bassinet rénal et uretère	C 65	C 79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – cardio-oesophagien	C 16.0	C 78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – col utérin ou vagin	C 53.8	C 79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – duodéno-jéjunal	C 17.8	C 78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gastro-oesophagien	C 16.0	C 78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – iléocaecal	C 18.0	C 78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – palais dur et mou	C05.8	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pelvi-rectale	C 19	C 78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – recto-sigmoïdienne	C 19	C 78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– jonction pelvi-rectale	C 19	C 78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– joue	C 76.0	C 79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – extérieure	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – intérieure	C06.0	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – muqueuse	C06.0	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pli (supérieur) (inférieur)	C06.1	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– labial (peau)	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – grandes lèvres	C 51.0	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – petites lèvres	C 51.1	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– labiale (v.a. tumeur, lèvre)	C00.9	C 79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – gouttière (supérieur) (inférieur)	C06.1	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lacrymale					
– – canal	C 69.5	C 79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – canal nasal	C 69.5	C 79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – glande	C 69.5	C 79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – point	C 69.5	C 79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – sac	C 69.5	C 79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– langue	C02.9	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – amygdale	C02.4	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – antérieure (deuxième tiers) NCA	C02.3	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – surface dorsale	C02.0	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – surface ventrale	C02.2	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – base (surface dorsale)	C01	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – bords (latéraux)	C02.1	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – dos	C02.0	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – frein	C02.2	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – ligne intermédiaire NCA	C02.0	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – partie immobile	C01	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – partie mobile NCA	C02.3	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – pointe	C02.1	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – postérieure	C01	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – racine (surface dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – surface (dorsale)	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – racine de la langue	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – tiers postérieur	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – zone de jonction	C02.8	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– laryngé – v. tumeur, larynx					
– laryngo-pharynx	C13.9	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– larynx NCA	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilage (ary-) (bassin de Giess) (Kegel) (anneau) (bouclier) (aryténoïde) (Wrisberg)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – commissure (postérieure) (antérieure)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – externe NCA	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – dans la signification d'hypopharynx	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – interne	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – repli ventriculaire laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– lentille	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– lèvre de la vulve – v. tumeur, labiale					
– lèvre	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – Bändchen – v. tumeur, lèvre intérieure					
– – commissure	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – domaine du rouge à lèvre	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieur	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieur	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – extérieur de la lèvre	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieur	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieur	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – extérieure	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieure	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieure	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – inférieures	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – intérieures	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – intérieures	C00.5	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieures	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieures	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – muqueuse – v. tumeur, lèvre, intérieure					
– – peau (commissure) (supérieure) (inférieure)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – région buccale – v. tumeur, lèvre, intérieure					
– – supérieures	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – intérieures	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – trou de la bouche latéral – v. tumeur, lèvre interne					
– ligament (v.a. tumeur, tissu conjonctif)	C 49.9	C 79.88		D21.9	D48.1
– – large de l'utérus	C 57.1	C 79.82		D28.2	D39.7
– – ligament rond de l'utérus	C 57.2	C 79.82		D28.2	D39.7
– – non-utérin – v. tumeur, tissu conjonctif					
– – propre de l'ovaire	C 57.1	C 79.82		D28.2	D39.7
– – rond	C 57.2	C 79.82		D28.2	D39.7
– – sacro-utérin	C 57.3	C 79.82		D28.2	D39.7
– – utéro-sacré	C 57.3	C 79.82		D28.2	D39.7
– – utérus	C 57.3	C 79.82		D28.2	D39.7
– – vestibulaire	C 32.1	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – vocale	C 32.0	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– ligament utéro-sacré	C 57.3	C 79.82		D28.2	D39.7
– limbe cornéen	C 69.1	C 79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– linguale NCA (v.a. tumeur, langue)	C02.9	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– lingula pulmonaire gauche	C 34.1	C 78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– lobe					
– – frontal	C 71.1	C 79.3		D33.0	D43.0
– – frontal du cerveau	C 71.1	C 79.3		D33.0	D43.0
– – inférieur du poumon	C 34.3	C 78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – moyen du poumon	C 34.2	C 78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – occipital	C 71.4	C 79.3		D33.0	D43.0
– – occipital du cerveau	C 71.4	C 79.3		D33.0	D43.0
– – pariétal du cerveau	C 71.3	C 79.3		D33.0	D43.0
– – supérieur du poumon	C 34.1	C 78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – temporal du cerveau	C 71.2	C 79.3		D33.0	D43.0
– – veine azygos	C 34.1	C 78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– lobe occipital	C 71.4	C 79.3		D33.0	D43.0
– lobe pariétal	C 71.3	C 79.3		D33.0	D43.0
– luette	C05.2	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lymphatique					
– – faisceaux NCA (v.a. tumeur, tissu conjonctif)	C 49.9	C 79.88		D21.9	D48.1
– – ganglion (localisation secondaire)		C 77.9		D36.0	D48.7
– – – abdominale		C 77.2		D36.0	D48.7
– – – anneau crural		C 77.4		D36.0	D48.7
– – – aortique		C 77.2		D36.0	D48.7
– – – auriculaire (antérieur) (postérieur)		C 77.0		D36.0	D48.7
– – – axillaire		C 77.3		D36.0	D48.7
– – – brachial		C 77.3		D36.0	D48.7
– – – bronchique		C 77.1		D36.0	D48.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – broncho-pulmonaire		C77.1		D36.0	D48.7
– – – cervicale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cervico-faciale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – Cloquet		C77.4		D36.0	D48.7
– – – coeliaque		C77.2		D36.0	D48.7
– – – côlon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cou		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cubital		C77.3		D36.0	D48.7
– – – diaphragme		C77.1		D36.0	D48.7
– – – épigastrique, inférieur		C77.5		D36.0	D48.7
– – – épitrochléaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – fémorale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – foie		C77.2		D36.0	D48.7
– – – gastriques		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hépatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hile (poumons)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – – splénique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hile du poumon		C77.1		D36.0	D48.7
– – – hile hépatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hypogastrique		C77.5		D36.0	D48.7
– – – iléon et côlon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – iliaque		C77.5		D36.0	D48.7
– – – infra-claviculaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – inguinale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – intercostal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – intestinale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intra-abdominale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intrathoracique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – jugulaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – localisations multiples dans C77.0 - C77.5		C77.8		D36.0	D48.7
– – – lombaire		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mandibulaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – médiastinal (antérieur) (postérieur)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – membre inférieur		C77.4		D36.0	D48.7
– – – membre supérieur		C77.3		D36.0	D48.7
– – – membres					
– – – – inférieurs		C77.4		D36.0	D48.7
– – – – supérieurs		C77.3		D36.0	D48.7
– – – membres inférieurs		C77.4		D36.0	D48.7
– – – membres supérieurs		C77.3		D36.0	D48.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – mésentérique (inférieur) (supérieur)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mésocôlon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – nucal		C77.0		D36.0	D48.7
– – – nuque		C77.0		D36.0	D48.7
– – – occipital		C77.0		D36.0	D48.7
– – – oesophagien		C77.1		D36.0	D48.7
– – – pancréatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – para-aortique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – para-utérin		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paracervical (col de l'utérus)		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paramètre		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parasternal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – paravaginal		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parotidienne		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pectoral		C77.3		D36.0	D48.7
– – – pelvien		C77.5		D36.0	D48.7
– – – pelvienne		C77.5		D36.0	D48.7
– – – péri-aortique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – péri-pancréatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pli inguinal		C77.4		D36.0	D48.7
– – – poplitée		C77.4		D36.0	D48.7
– – – portale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pré-auriculaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pré-symphyséale		C77.5		D36.0	D48.7
– – – prélaryngien		C77.0		D36.0	D48.7
– – – prétrachéale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – primaire – code d'après un type morphologique, comportement et localisation					
– – – pylore		C77.2		D36.0	D48.7
– – – rate (hile)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – rétro-auriculaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – rétro-sternal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – rétropéritonéale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – rétropharyngé		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sacral		C77.5		D36.0	D48.7
– – – scalène		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sous-capsulaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sous-claviculaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sous-mandibulaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sous-maxillaire		C77.0		D36.0	D48.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – sous-mentonnière		C77.0		D36.0	D48.7
– – – subinguinale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – sublinguale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – supra-claviculaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – tête		C77.0		D36.0	D48.7
– – – thoracique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tibial		C77.4		D36.0	D48.7
– – – trachéal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – trachéo-bronchique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – trou obturateur		C77.5		D36.0	D48.7
– – – veine porte		C77.2		D36.0	D48.7
– – – Virchow		C77.0		D36.0	D48.7
– – – visage		C77.0		D36.0	D48.7
– – – voies biliaires		C77.2		D36.0	D48.7
– – glande – v. tumeur, ganglions lymphatique					
– – vaisseaux (v.a. tumeur, tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– mâchoire	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – carcicome (chaque type) (supérieur) (inférieur)	C76.0	C79.88			
– – os	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – inférieur	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – supérieur	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parties molles	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – – inférieur	C03.1	C79.88		D10.3	D37.0
– – – supérieur	C03.0	C79.88		D10.3	D37.0
– – peau	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – trou	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– main NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– maladie généralisée					
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– mamelon	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– mammaire – v. tumeur, glande mammaire					
– mastoïde (Antre) (trou) (cellules)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os (processus mastoïde) ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– maxillaire	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – alvéolaire					
– – – appendice ou peigne	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – carcinome (muqueuse)	C03.0	C79.88			
– – – muqueuse	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – carcinome	C03.0	C79.88			

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – sinus	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – sinus du nez	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – trou	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– maxillaire inférieur	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – alvéolaire					
– – – appendice ou crête	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – carcinome (muqueuse)	C03.1	C79.88			
– – – muqueuse	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – glandes salivaires	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– médiastin, médiastinal	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
– – antérieur	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– – postérieur	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
– médullaire					
– – bulbe rachidien	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – glande surrénale	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– membre inférieur NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– membre supérieur NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– membres #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inférieures #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – inférieurs	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – supérieures #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– – supérieurs	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– méninges	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cérébrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – cerveau	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – crânienne	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – intra-crânien	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – moëlle épinière	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– méninges rachidiennes	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– méninges – v. tumeur, méninges					
– ménisque, articulation du genou (externe) (interne) (latéral) (médial) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– menton	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– mésentère	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mésentère, mésentérique	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– méso-appendice	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mésocôlon	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mésopharynx – v. tumeur, oropharynx					
– mésosalpinx	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– mésovarium	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– métacarpe (chaque os) ◊	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– métastatique					
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– métatarse (chaque os) ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– moëlle épinière (lombaire) (sacrale) (thoracique) (cervicale)	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– moignon cervical	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– mollet #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– Mont					
– – Vénus, de	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– multiple, maligne (localisations primaires indépendantes l'une de l'autre)	C97!				
– muqueuse					
– – alvéolaire (appendice) (crête)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – bouche NCA	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – joues	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – lèvres – v. tumeur, lèvre intérieure					
– – nez	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– muscles (v. a. tumeur, tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – extra-oculaire	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– muscles extra-oculaires	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– myocarde	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– myomètre	C54.2	C79.82		D26.1	D39.0
– narines	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasal – v. tumeur, nasale					
– nasopharynx (v.a. tumeur, rhinopharynx)	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– nerf optique, chiasme ou tractus	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– nerf, nerfs (ganglion)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – abducens	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – accessoire (spinal)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – auditif	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – autonome NCA (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cochléaire	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – crânien NCA	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – cubital	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – facial	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – fémoral	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – ganglion NCA (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – glosso-pharyngien	C 72.5	C 79.4		D33.3	D43.3
– – hypoglosse	C 72.5	C 79.4		D33.3	D43.3
– – intercostal	C 47.3	C 79.88		D36.1	D48.2
– – lombaires	C 47.6	C 79.88		D36.1	D48.2
– – médian	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – moteur oculaire commun	C 72.5	C 79.4		D33.3	D43.3
– – obturateur	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – olfactif (bulbe olfactif)	C 72.2	C 79.4		D33.3	D43.3
– – optique	C 72.3	C 79.4		D33.3	D43.3
– – para-sympathique (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C 47.9	C 79.88		D36.1	D48.2
– – périphérique NCA	C 47.9	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – abdominale ou abdomen	C 47.4	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – abdomino-pelvien	C 47.8	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – auriculaire (oreille)	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – avant-bras	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – cou	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – creux des aisselles	C 47.3	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – cuir chevelu	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – doigts	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – dos	C 47.6	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – épaule	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – extra-rectal	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – fémur, supérieur	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – fesses	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – fosse ischio-rectale	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – fosse ptérygoïde	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – front	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – genou	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – hanches	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – inguinal (région) (canal)	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – intra-thoracique	C 47.3	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – joue	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – main	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – malléole	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – membres	C 47.9	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – – inférieurs	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – – supérieurs	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – membres NCA	C 47.9	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – – inférieurs	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – – supérieurs	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – menton	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – mollet	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – muscle glutéal	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – nuque	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – ombilicale	C 47.4	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – orbite	C 69.6	C 79.4		D31.6	D48.7
– – – oreille (externe)	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – orteil	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – para-rectal	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – paraurétral	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – paravaginal	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – paroi abdominale	C 47.4	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – paupière	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – périnée	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – périrectal (tissu)	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – périurétral (tissu)	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – pied	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – plancher pelvien	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – pli du coude, coude	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – poignet	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – pouce	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – présacral	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – recto-vésicale	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – région de l'omoplate	C 47.3	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – région de l'os temporal	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – région du canal inguinal	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – région du flanc	C 47.6	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – région du sacrum et du coccyx	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – région infra-claviculaire	C 47.3	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – région sus-claviculaire	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – sein, paroi thoracique	C 47.3	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – septum recto-vaginal	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – submental	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – talon	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – tempe	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – tête	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – thorax, aine	C 47.3	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – tronc	C 47.6	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – vésico-rectale	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – visage	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – radial	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – sacré	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – sciatique	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – spinal NCA	C 47.9	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – accessoire	C 72.5	C 79.4		D33.3	D43.3
– – sympathique NCA (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C 47.9	C 79.88		D36.1	D48.2
– – trijumeau	C 72.5	C 79.4		D33.3	D43.3
– – trochléaire	C 72.5	C 79.4		D33.3	D43.3
– – vague	C 72.5	C 79.4		D33.3	D43.3
– – vestibulo-cochléaire	C 72.4	C 79.4		D33.3	D43.3
– nerfs autonomes ou système nerveux autonome – v. tumeur, nerf périphérique					
– nerfs crâniens NCA	C 72.5	C 79.4		D33.3	D43.3
– nerfs périphériques NCA	C 47.9	C 79.88		D36.1	D48.2
– nez, nasal	C 76.0	C 79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– – aile (externe)	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – cartilage	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cavité	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – choane	C 11.3	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – cornet (muqueuse)	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – os ◊	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – externe (peau)	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fosse	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – interne	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – muqueuse	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os ◊	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – os du nez ◊	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – peau	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – septum	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – anneau postérieur	C 11.3	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – trou, trous	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – vestibule	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nodule du coccyx – v. tumeur, glomus coccygien					
– Noyaux gris centraux	C 71.0	C 79.3		D33.0	D43.0
– nucleus pulposus ◊	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– odontogènes – v. tumeur, mâchoire, os					
– oeil NCA	C 69.9	C 79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– oesophage	C 15.9	C 78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – partie abdominal	C 15.2	C 78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – partie cervicale	C 15.0	C 78.8	D00.1	D13.0	D37.78

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – partie thoracique	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers distal	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers inférieur	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers moyen	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers proximal	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers supérieur	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– oeufs de Naboth	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– Oliva (cerveau)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ombilicale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– omentum	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– omoplate (chaque partie) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– operculum (cerveau)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– orbite	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– – nerfs autonomes	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – nerfs périphériques	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parties molles	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– oreille moyenne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– oreille, sens auditif (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – canal	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – conduit (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – interne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – lobule	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – moyenne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – muscle	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – peau	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– organe de Zuckerkandl	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– organes génitaux					
– – féminins NCA	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – – plus près concernant la localisation NCA	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – masculins NCA	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – plus près concernant la localisation NCA	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– organes génito-urinaires ou voies urinaires NCA	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
– – vessie – v. tumeur, vessie					
– orifice					
– – cardiaque	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – urétéral	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– orifice de l'estomac	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– orifice du col					
– – externe	C 53.1	C 79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – interne	C 53.0	C 79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– oropharynx	C 10.9	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – paroi latéral	C 10.2	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – paroi postérieur	C 10.3	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – région de transition	C 10.8	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– orteil NCA #	C 76.5	C 79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– os ethmoïdal (trou)	C 31.1	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os ou cellules ◊	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– os iliaque ◊	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– os mastoïde ◊	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– os sphénoïde	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – os ◊	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – trou (trou de Highmore)	C 31.3	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– os, périoste ◊	C 41.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – acetabulum	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – acromion (processus)	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – astragale	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – Atlas	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– – avant-bras	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – axis	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– – boîte cranienne, vertex	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – calcanéum	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – calvaria	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – carpe (chaque)	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – cartilage NCA	C 41.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – clavicule	C 41.32	C 79.5		D16.72	D48.0
– – clivus	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – coccyx	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – côtes, cartilage des côtes	C 41.30	C 79.5		D16.70	D48.0
– – coude	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – courts	C 40.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – – membres inférieurs	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – – membres supérieurs	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – crânien	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – cubitus (chaque partie)	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – disque intervertébral	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– – doigt	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – dos NCA	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – épaule	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – fémur (chaque partie)	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – front	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – genou	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – hanches	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – humérus (chaque partie)	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – iliaque	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – ischion	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – longs	C 40.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – – membres inférieurs NCA	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – – membres supérieurs NCA	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – mâchoire (maxillaire)	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – – inférieure (mandibule)	C 41.1	C 79.5		D16.5	D48.0
– – main	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – malléole	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – mandibule	C 41.1	C 79.5		D16.5	D48.0
– – membre inférieur NCA	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – membre supérieur NCA	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – membres NCA	C 40.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – – inférieurs (os longs)	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – – – os courts	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – – supérieurs (os longs)	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – – – os courts	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – métacarpe	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – métatarse	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – moëlle NCA	C 96.9	C 79.5			D47.9
– – nez, nasal	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – occipital	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – omoplate (chaque partie)	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – orbite	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – orteil	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – os de la cheville	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – os ethmoïde (cellules)	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – os hyoïde	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – os iliaque	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – os pariétal	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – os sphénoïde	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – os tarsien	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – os temporal	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – os zygomatique	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – pelvienne	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – péroné (chaque partie)	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – phalange	C 40.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – – main	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – – pied	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – pied	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – pouce	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – processus xiphoïde	C 41.31	C 79.5		D16.71	D48.0
– – pubis	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – radius (chaque partie)	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – rotule	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – sacrum	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – selle turcique	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – squelette NCA	C 41.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – sternum	C 41.31	C 79.5		D16.71	D48.0
– – talon, os du talon	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – tibia (chaque partie)	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – vertèbre, colonne vertébrale	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– – – coccyx	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – – sacrum	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – visage	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – vomer	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– ouraque	C 67.7	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– ovaire	C 56	C 79.6	D07.3	D27	D39.1
– oviducte	C 57.0	C 79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– palais	C05.9	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – arc	C09.1	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – dur	C05.0	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mou	C05.1	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – bout	C 11.3	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – surface antérieur au naso-pharynx	C 11.3	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – surfaces postérieures	C 11.3	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsille	C09.9	C 79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – transition entre palais dur et mou	C05.8	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– palpébrale	C 44.1	C 79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– pancréas	C 25.9	C 78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – canal (de Santorini) (pancréatique)	C 25.3	C 78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – col……	C 25.7	C 78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – corps	C 25.1	C 78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – insulaire	C 25.4	C 78.8	D01.7	D13.7	D37.70

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – queue	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – tête	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– papille de Vater	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– para-ovarienne	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– para-rectal	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– para-thyroïde	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paraganglion NCA	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – aorte abdominale	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– paramètre	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– paranéphritique	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– parasellaire	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– parathyroïdien	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paraurétral	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – glande	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– paravaginal	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parenchyme, rénal	C64	C79.0	C09.1	D30.0	D41.0
– parodontale NCA	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– parotide (glande) (canal)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parties molles – v. tumeur, tissu conjonctif					
– paupière (peau) (supérieure) (inférieure)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– paupière (supérieure) (inférieure) (glande)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– peau (de type non-mélanome)	**C44.9**	**C79.2**	**D04.9**	**D23.9**	**D48.5**
– – abdominal, paroi abdominale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – aile du nez	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – aine, région de l'aine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – aisselle, pli de l'aisselle	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – anus	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – avant-bras	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – clitoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – coin de l'œil (externe) (interne)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – columelle nasale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – conduit auditif (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cuir chevelu	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – doigts	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – dos	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – épaule	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – fémur, supérieur	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – fesses	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – flanc	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – fosse supra-claviculaire	C 44.4	C 79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – front	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – genou	C 44.7	C 79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – glutéale (musculature) (région)	C 44.5	C 79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – hanches	C 44.7	C 79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – hélix	C 44.2	C 79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – joue	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lèvre (supérieure) (inférieure)	C 44.0	C 79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – lèvres	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – grandes lèvres	C 51.0	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – petites lèvres	C 51.1	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – mâchoire	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – main, paume	C 44.6	C 79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – malléole	C 44.7	C 79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – membre inférieur	C 44.7	C 79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – membre supérieur	C 44.6	C 79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – membres NCA	C 44.9	C 79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – – inférieurs	C 44.7	C 79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – – supérieurs	C 44.6	C 79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – menton	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – mollet	C 44.7	C 79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – nez (externe)	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – ombilicale	C 44.5	C 79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – oreille (externe)	C 44.2	C 79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – organes génitaux féminins	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – clitoris	C 51.2	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – lèvres féminines	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – lèvres NCA	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – grandes lèvres	C 51.0	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – petites lèvres	C 51.1	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – vulve	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – organes génitaux masculins	C 63.9	C 79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – pénis NCA	C 60.9	C 79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – prépuce	C 60.0	C 79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – scrotum	C 63.2	C 79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – orteil, orteilles	C 44.7	C 79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – palpébrale	C 44.1	C 79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – paupière	C 44.1	C 79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – paupière (supérieure) (inférieure)	C 44.1	C 79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – pavillon de l'oreille	C 44.2	C 79.2	D04.2	D23.2	D48.5

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – pénis NCA	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – périanale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – périnée	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – pied, plante du pied	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – plantaire	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – pli du coude, coude	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – pli sous-mammaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – pouce	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – prépuce	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – région claviculaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région de la nuque	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – région du cou	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – région du sacrum et du coccyx	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région inguinale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région pubienne	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région scapulaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scrotum	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – sein, paroi thoracique	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sourcil	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – subclaviculaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – talon	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – tempe	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – tête NCA	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – thorax, aine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – Tragus	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – tronc	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – type mélanome – v. mélanome					
– – visage NCA	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – vulve	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– peau synoviale – v. tumeur, tissu conjonctif					
– pédoncule cérébral	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pelvien(ne)	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organe	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – os ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – paroi	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – péritonéal	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – plancher	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – rénal	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– pénis	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – corps caverneux	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – gland	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – peau NCA	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– péri-ampullaire (ampoule de Vater)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– péri-pancréatique	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– péri-rectal (tissu)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– péri-rénal (tissu)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– péri-rénale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– périanal (peau)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– péricarde	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– périnée	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– périnéphrique	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– périoste – v. tumeur des os					
– péritoine – voir tumeur, péritonéal					
– péritonéal	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– – pariétale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – pelvien	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – plus près concernant une partie NCA	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – viscérale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– péroné (chaque partie) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– phalanges ◊	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – main	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – pied	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– pharynx	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– pharynx buccal – v. tumeur, oropharynx					
– pharynx, pharyngé	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – amygdales	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – cul-de-sac	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – paroi (postérieur) (latéral)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – récessus	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – région	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– pie-mère	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cérébrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – crânienne	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– pied NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– placenta	C58	C79.82	D07.3	D26.7	D39.2
– plèvre	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plèvre (trou) (pariétale) (pulmonaire) (viscérale)	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plexus (nerveux)					
– – brachial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – cervicale	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – choroïde (troisième ventricule) (ventricule latérale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quatrième ventricule	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lumbosacré	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacral	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– plexus brachial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– plexus lombosacré	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– pli ary-épiglottique	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – côté laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – face hypo-pharyngée	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – zone marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– pli nasolabial	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– pluriglandulaire	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– plus près concernant la localisation NCA	C76.7	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– poche recto-utérine	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– poignet NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– pouce NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– poumons	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – bronches principales	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carène trachéale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – hile	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe inférieur	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe lingual du poumon	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe moyen	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe supérieur	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe veine azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– prépuce	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– prépylore	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– présacrale (région)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– processus xiphoïde ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– prostatique	C61	C79.82	D07.5	D29.1	D40.0
– protubérance annulaire	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pubis ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– pudendum feminin	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– pulmonaire (v.a. tumeur, poumons)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– Putamen	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– pylore, pylorique	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antre	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – canal	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– pyramidal (cerveau)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– queue de cheval	C72.1	C79.3		D33.4	D43.4
– radius (chaque partie) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– rate NCA	C26.1	C78.8		D13.9	D37.78
– récessus					
– – pharyngien (Rosenmüller)	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– recto-sigmoïde (côlon) (transition)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rectum (ampoule)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
– – avec côlon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– région					
– – postcricoïde	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – scapulaire #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région cervicale	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– région de l'aine #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région de l'omoplate #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région glutéale #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région rétro-molaire	C06.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– rénal (v.a. tumeur, rénale)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– rénale (parenchym)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– – calice	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – hile	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvien	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– repli					
– – aryépiglottique	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – côté hypopharyngien	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – côté laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – zone marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – glosso-épiglottique	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – vestibulaire	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– respiratoire					
– – organe ou système NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – tractus NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – supérieur	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– rétinienne	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
– rétro-caecale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– rétro-oculaire	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– rétro-péritoine	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– rétro-vésical	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– rétrobulbaire	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– rétropéritonéal (tissu)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– rétropharyngé	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– rhinencéphale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– rhinopharynx	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – paroi	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – antérieur	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – latéral	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – postérieur	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – supérieur	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – plafond	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – plancher	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– rotule ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– sacrum (vertèbre) ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sacrum et coccyx ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – région	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– salpinx	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– sclérotique	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– scrotum	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– sein, paroi thoracique NCA	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– selle turcique, os ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– septum					
– – nez	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – bord postérieur	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – recto-vaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – recto-vésicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – urétro-vaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – vésico-vaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– septum ou paroi recto-vaginal	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– septum recto-vésical	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– sillon glosso-pharyngien	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– sinus (de Highmore) (maxillaire)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – pylorique	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – tympanal	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– sinus (des sinus)	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – ethmoïdal	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – frontal	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – maxillaire	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nasales, paranasales NCA	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – sphénoïdal	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– sinus – v. tumeur, sinus					
– souffle, respiration					
– – organe ou système NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – voies NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – supérieurs	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– sourcil	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– sous-cutanée (tissus) (nodule) NCA – v. tumeur, tissu conjonctif					
– sous-dural	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– sous-glottique	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– sous-pleural	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– sous-sternal	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– sphincter					
– – anal	C21.1	C78.5	D01.3	D21.9	D37.78
– – Oddi	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– squelette NCA ◊	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– sternum ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– Stroma de l'endomètre	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– sublinguale	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– submental	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– substance blanche du cerveau (central) (cérébral)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– supra-glottique	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– suprasellaire (région)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– supratentoriel (cerveau) NCA	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– surrénale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – capsule	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – cortex	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – glande	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – médullaire	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– sympathique, nerf ou système nerveux NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– symphyse pubienne	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– système digestif, système, voie NCA	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– système nerveux (central) NCA	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– – autonome – v. tumeur, nerf périphérique					
– – para-sympathique – v. tumeur, nerf périphérique					
– – sympathique – v. tumeur, nerf périphérique					
– talon NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– tapetum cérébral	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– tarse (chaque os) ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– tempe (peau)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– temporale					
– – lobe	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – région	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– tendon, gaine tendineuse – v. tumeur, tissu conjonctif					
– tentorium cerebral	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– testicule – v. tumeur, testicules					
– testicules	C62.9	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – descandantes	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ectopiques	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – non-descandantes	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – retenues	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – scrotal	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– tête NCA #	C76.0	C79.88	D04.4	D36.7	D48.7
– thalamus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– thorax (trou) (organe NCA) (paroi NCA)	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– thymus	C37	C79.88	D09.3	D15.0	D38.4
– thyroïdien	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– thyroïdienne	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– tibia (chaque partie) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– tissu adénoïde	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tissu adipeux – v. tumeur, tissu conjonctif					
– tissu conjonctif NCA	**C49.9**	**C79.88**		**D21.9**	**D48.1**
– – abdominale ou abdomen	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – abdomino-pelvien	C49.8	C79.88		D21.9	D48.1
– – aisselle	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – auriculaire (oreille)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – avant-bras	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – canal lymphatique thoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – cou	C49.0	C79.85		D21.0	D48.1
– – cuisse	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – diaphragme	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – doigts	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – dos	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – épaule	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – extra-rectal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – extrémités	C49.9	C79.86		D21.9	D48.1
– – – inférieurs	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – – supérieurs	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – fesses	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – fosse ischio-rectale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – fosse ptérygoïde	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – front	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – genou, jarret	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – grands vaisseaux NCA	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – hanches	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – hypocondre	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – inguinal (région) (canal)	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – intrathoracique	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – joue	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – mâchoire	C03.9	C 79.88		D10.3	D37.0
– – main	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – malléole	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – membre inférieur	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – membre supérieur	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – membres NCA	C 49.9	C 79.86		D21.9	D48.1
– – – inférieurs	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – – supérieurs	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – menton	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – mollet	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – muscle ilio-psoas	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – muscle psoas	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – muscule glutéal	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – nuque – v. tumeur, tissu conjonctif, cou					
– – ombilicale	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – orbite	C 69.6	C 79.4		D31.6	D48.7
– – oreille (externe)	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – orteil	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – para-rectal	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – para-urétral	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – paravaginal	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – paroi abdominale	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – paroi thoracique	C 49.6	C 79.88		D21.6	D48.1
– – paupière	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – périnée	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – périrectal (tissu)	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – périurétral (tissu)	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – pied	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – plancher pelvien	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – pli du coude, coude	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – poignet	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – pouce	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – présacral	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – recto-vésicale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – région de l'omoplate	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – région du canal inguinal	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – région du sacrum et du coccyx	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – région infra-claviculaire	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – région sus-claviculaire	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – rétropéritonéal	C 48.0	C 78.6		D20.0	D48.3
– – sein, paroi thoracique	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – septum recto-vaginal	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – submental	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – talon	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – tempe	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – tête, cuir chevelu	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – thorax (paroi)	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – tronc	C 49.6	C 79.88		D21.6	D48.1
– – vésico-rectal	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – visage	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– tissu hématopoétique NCA	C 96.9				D47.9
– tissu péri-urétral	C 76.3	C 79.88		D36.7	D48.7
– tissu périodontal NCA	C03.9	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– tissu vésico-cervical	C 57.9	C 79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– trachée	C 33	C 78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachée (cartilage) (muqueuse)	C 33	C 78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachéo-bronchique	C 34.8	C 78.0	D02.2	D14.2	D38.1
– tractus urogénital					
– – féminin	C 57.9	C 79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – masculin	C 63.9	C 79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– tractus uvéal	C 69.4	C 79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– Tragus (oreille)	C 44.2	C 79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– transistion cardio-oesophagienne	C 16.0	C 78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– transition gastro-oesophagienne	C 16.0	C 78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– trigone de la vessie	C 67.0	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– trompe					
– – auditive	C 30.1	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – orifice pharyngé	C 11.2	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – trompe de Fallope	C 57.0	C 79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– trompe d'Eustache	C 30.1	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– tronc cérébral	C 71.7	C 79.3		D33.1	D43.1

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– tronc NCA #	C 76.7	C 79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– trou péritonéal	C 48.2	C 78.6		D20.1	D48.4
– tubaire	C 57.0	C 79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tubo-ovarienne	C 57.8	C 79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– tunique vaginale	C 63.7	C 79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– uncus	C 71.2	C 79.3		D33.0	D43.0
– union – v. tumeur, transition					
– urétéral – v. tumeur, uretère					
– uretère	C 66	C 79.1	D09.1	D30.2	D41.2
– – orifice	C 67.6	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– urétral – v. tumeur, urètre					
– urètre, uréthal (glande)	C 68.0	C 79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– – orifice interne	C 67.5	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– urétro-vaginal (septum)	C 57.9	C 79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– utéro-ovarien	C 57.8	C 79.82		D28.7	D39.7
– – ligament	C 57.1	C 79.82		D28.2	D39.7
– utérus	C 55	C 79.82	D07.3	D26.9	D39.0
– – annexe	C 57.4	C 79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – col (col de l'utérus)	C 53.9	C 79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – col de l'utérus externe	C 53.1	C 79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – col de l'utérus interne	C 53.0	C 79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – corps	C 54.9	C 79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – endocol (canal) (glande)	C 53.0	C 79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – exocol	C 53.1	C 79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – fond	C 54.3	C 79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – isthme	C 54.0	C 79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – jonction entre le col (col de l'utérus) et le vagin	C 53.8	C 79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – ligament	C 57.3	C 79.82		D28.2	D39.7
– – – large de l'utérus	C 57.1	C 79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– – – rond	C 57.2	C 79.82		D28.2	D39.7
– – ligament – voir tumeur de l'utérus ligamenteux					
– – segment inférieur	C 54.0	C 79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – trompes	C 57.0	C 79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– utricule prostatique	C 68.0	C 79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– vagin (arc) (massif)	C 52	C 79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– vagin (arc) (paroi)	C 52	C 79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– vagino-vésicale	C 57.9	C 79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – septum	C 57.9	C 79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vaisseau sanguin – v. tumeur, tissu conjonctif					
– vaisseaux (sanguin) – v.a. tumeur, tissu conjonctif					

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – grands	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– vallécule épiglottique	C 10.0	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– valvule iléo-caecale	C 18.0	C 78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– vasculaire – v. tumeur, tissu conjonctif					
– veine cave (abdominale) (inférieure)	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – supérieure	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– veine, veineux – v. tumeur, tissu conjonctif					
– ventricule	C 71.5	C 79.3		D33.0	D43.0
– – cerveau (plancher) (troisième) (latéral)	C 71.5	C 79.3		D33.0	D43.0
– – – quatrième	C 71.7	C 79.3		D33.1	D43.1
– – coeur (gauche) (droit)	C 38.0	C 79.84		D15.1	D48.7
– ventricule cérébral (plancher) (droit) (cervelet) (latéral) (quatrième)	C 71.5				
– ventricule laryngé	C 32.0	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– vermis (cérébral)	C 71.6	C 79.3		D33.1	D43.1
– vermis cérébelleux	C 71.6	C 79.3		D33.1	D43.1
– vertèbre, colonne vertébrale ◊	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– – bulbe rachidien	C 71.7	C 79.3		D33.1	D43.1
– – coccyx ◊	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – dure-mère	C 70.1	C 79.4		D32.1	D42.1
– – méninges	C 70.1	C 79.4		D32.1	D42.1
– – méninges rachidiens	C 70.1	C 79.4		D32.1	D42.1
– – moëlle épinière	C 72.0	C 79.4		D33.4	D43.4
– – nerf, racine du nerf	C 47.9	C 79.88		D36.1	D48.2
– – pie-mère	C 70.1	C 79.4		D32.1	D42.1
– – sacro-lombaire ◊	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– – sacrum ◊	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– vertex ◊	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– vésical – v. tumeur, vessie					
– vésico-rectale	C 76.3	C 79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– vésico-vaginale	C 57.9	C 79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – septum	C 57.9	C 79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vésicule biliaire	C 23	C 78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– vésicule séminale	C 63.7	C 79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vessie	C 67.9	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – col	C 67.5	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – orifice	C 67.9	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – urétéral	C 67.6	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – urétral interne	C 67.5	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – ouraque	C 67.7	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – ouverture	C 67.9	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – paroi	C 67.9	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – antérieur	C 67.3	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – latéral	C 67.2	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – postérieure	C 67.4	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – sphincter	C 67.8	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – trigone de la vessie	C 67.0	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – vertex (dôme de la vessie)	C 67.1	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– vessie et organes génitaux					
– – féminins	C 57.9	C 79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – masculins	C 63.9	C 79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– vestibule					
– – bouche	C06.1	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – laryngé	C 32.1	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nasal	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– visage NCA #	C 76.0	C 79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– voies biliaires (extra-hépatiques)	C 24.0	C 78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – intra-hépatique	C 22.1	C 78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– voies de Gärtner	C 52	C 79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– voies optiques	C 72.3	C 79.4		D33.3	D43.3
– voies respiratoires supérieures	C 39.0	C 78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– Vomer ◊	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– vulve	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– zone hémorrhoïdale	C 21.1	C 78.5	D01.3	D12.9	D37.78

Programme des publications de l'OFS

En tant que service statistique central de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public. Il utilise plusieurs moyens et canaux pour diffuser ses informations statistiques par thème.

Les domaines statistiques

00 Bases statistiques et généralités
01 Population
02 Espace et environnement
03 Travail et rémunération
04 Économie nationale
05 Prix
06 Industrie et services
07 Agriculture et sylviculture
08 Énergie
09 Construction et logement
10 Tourisme
11 Mobilité et transports
12 Monnaie, banques, assurances
13 Sécurité sociale
14 Santé
15 Éducation et science
16 Culture, médias, société de l'information, sport
17 Politique
18 Administration et finances publiques
19 Criminalité et droit pénal
20 Situation économique et sociale de la population
21 Développement durable, disparités régionales et internationales

Les principales publications générales

L'Annuaire statistique de la Suisse

L'Annuaire statistique de la Suisse de l'OFS constitue depuis 1891 l'ouvrage de référence de la statistique suisse. Il englobe les principaux résultats statistiques concernant la population, la société, l'État, l'économie et l'environnement de la Suisse.

Le Mémento statistique de la Suisse

Le mémento statistique résume de manière concise et attrayante les principaux chiffres de l'année. Cette publication gratuite de 52 pages au format A6/5 est disponible en cinq langues (français, allemand, italien, romanche et anglais).

Le site Internet de l'OFS: www.statistique.ch

Le portail «Statistique suisse» est un outil moderne et attrayant vous permettant d'accéder aux informations statistiques actuelles. Nous attirons ci-après votre attention sur les offres les plus prisées.

La banque de données des publications pour des informations détaillées
Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, vous pouvez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).
www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Catalogues et banques de données → Publications

Vous souhaitez être parmi les premiers informés?

Abonnez-vous à un Newsmail et vous recevrez par e-mail des informations sur les résultats les plus récents et les activités actuelles concernant le thème de votre choix.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB: la banque de données statistiques interactive

La banque de données statistiques interactive vous permet d'accéder simplement aux résultats statistiques dont vous avez besoin et de les télécharger dans différents formats.
www.stattab.bfs.admin.ch

Statatlas Suisse: la banque de données régionale avec ses cartes interactives

L'atlas statistique de la Suisse, qui compte plus de 4500 cartes, est un outil moderne donnant une vue d'ensemble des thématiques régionales traitées en Suisse dans les différents domaines de la statistique publique.
www.statatlas-suisse.admin.ch

Pour plus d'informations

Centre d'information statistique
058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales : la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le domaine du codage médical et des classifications médicales de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et soutient les personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur l'index systématique CIM-10-GM 2020 paru le 30.10.2020. Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2021.

En ligne
www.statistique.ch

Imprimés
www.statistique.ch
Office fédéral de la statistique CH-2010 Neuchâtel
order@bfs.admin.ch
tél. 058 463 60 60

Numéro OFS
1188-2034

ISBN
978-3-303-14331-5

La statistique compte pour vous. www.la-statistique-compte.ch