

14

Santé

1182-1000

Le cancer en Suisse



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

nicer




Swiss Childhood Cancer Registry (SCCR)
Schweizer Kinderkrebsregister (SKKR)
Registre Suisse du Cancer de l'Enfant (RSCE)
Registro Svizzero dei Tumori Pediatrici (RSTP)

Neuchâtel, 2011


Le cancer en Suisse: nombre de cas et décès

Part des principales causes de décès selon le groupe d'âge, en 2007

Hommes



Femmes



La surface des cercles est proportionnelle au nombre absolu de décès par groupe d'âge.

Source: OFS: CD

© OFS

L'incidence¹ des cancers invasifs est estimée² à environ 19'000 chaque année chez les hommes et 16'000 chez les femmes.


Chaque année, le nombre de décès dus au cancer est d'environ 8600 chez les hommes et 6900 chez les femmes. Cela correspond à 30% des décès chez les hommes et 23% chez les femmes. Le cancer est la principale cause de décès entre 45 et 84 ans chez les hommes, et entre 45 et 64 ans chez les femmes.

¹ Nombre des nouveaux cas de la maladie dans une population définie durant une période donnée

² Incidence estimée à partir des données des registres du cancer (cf. carte)

Incidence¹, mortalité, APVP² – Femmes

Incidence¹, mortalité et années potentielles de vie perdues² (APVP) chez les femmes, par localisation, 2003–2007



Source: OFS: CD, NICER, RCT

© OFS

Chez la femme, les cancers du sein, du côlon-rectum et du poumon représentent 51% des nouveaux cas. Aucune autre localisation ne représente plus de 6% des cancers. Le mélanome de la peau est le 4^e cancer le plus fréquent.

Les décès par cancer sont le plus souvent dus au cancer du sein, du poumon, puis au cancer colorectal.


La proportion des années potentielles de vie perdues² (APVP) par des décès prématurés dus au cancer est estimée à 45%. Le cancer du sein est responsable du plus grand nombre des APVP par cancer.

¹ Incidence estimée à partir des données des registres du cancer (cf. carte)

² Indicateur de la mortalité précoce (avant 70 ans) prenant en compte l'âge du décès

Incidence¹, mortalité, APVP² – Hommes

Incidence¹, mortalité et années potentielles de vie perdues² (APVP) chez les hommes, par localisation, 2003–2007



Source: OFS: CD, NICER, RCT

© OFS

Chez l'homme, les cancers de la prostate, du poumon et du côlon-rectum représentent 53% des nouveaux cas. Aucune des autres localisations ne représente plus de 6% des cancers et le mélanome occupe la 4^e place.

Les décès par cancer sont d'abord dus au cancer du poumon puis au cancer de la prostate. Le cancer colorectal est la 3^e cause de décès par cancer.


La proportion des années potentielles de vie perdues² par des décès prématurés dus au cancer s'élève à 29%. Le cancer du poumon est responsable du plus grand nombre des APVP par cancer.

¹ Incidence estimée à partir des données des registres du cancer (cf. carte)

² Indicateur de la mortalité précoce (avant 70 ans) prenant en compte l'âge du décès

Incidence¹ et mortalité selon l'âge

Tous les cancers malins², 2003–2007



Source: OFS: CD, NICER, RCT

© OFS

Le cancer peut apparaître à tout âge et le risque croît avec l'âge: 13% des cancers apparaissent avant 50 ans, et 54% avant 70 ans. Le risque d'être atteint d'un cancer avant l'âge de 70 ans est d'environ 25% pour les hommes et de 20% pour les femmes.


¹ Incidence estimée à partir des données des registres du cancer (cf. carte)

² Sauf les cancers non mélaniques de la peau pour l'incidence

Incidence¹ et mortalité, évolution temporelle

Tous les cancers malins²: évolution de l'incidence¹ et de la mortalité

Taux pour 100'000 habitants, standard européen



Source: OFS: CD, NICER, RCT

© OFS

Ces 15 dernières années, le nombre de nouveaux cas a augmenté pour les cancers du poumon chez la femme, de la thyroïde (surtout chez la femme), de la prostate, et le mélanome de la peau. A l'inverse, il a diminué pour les cancers du col de l'utérus, de l'estomac, et du poumon chez l'homme.

La mortalité, quant à elle, a baissé pour la plupart des localisations cancéreuses (particulièrement pour le col de l'utérus, l'estomac, le poumon chez l'homme, le côlon-rectum, le sein, la prostate et la maladie de Hodgkin). La principale exception est la forte augmentation de la mortalité par cancer du poumon observée chez les femmes.

¹ Incidence estimée à partir des données des registres du cancer (cf. carte)

² Sauf les cancers non mélaniques de la peau pour l'incidence

Incidence¹ et mortalité, taux par localisation, 2003–2007 – Femmes

Pour 100'000 habitantes, standard européen

		Incidence ¹	Mortalité
Tous cancers²		324,3	117,1
Organes buccaux et digestifs	Cavité buccale et pharynx	6,4	1,7
	Œsophage	2,3	1,6
	Estomac	5,6	3,3
	Côlon et rectum	31,5	11,1
	Foie ³	2,8	2,9
	Vésicule et voies biliaires	3,0	1,9
	Pancréas	8,7	7,8
Organes respiratoires	Larynx	0,7	0,2
	Poumon, bronches, trachée	25,2	17,3
	Plèvre	0,4	0,3
Os, articulations, cartilage		0,8	0,3
Mélanome de la peau		20,8	2,0
Organes reproductifs	Sein	110,5	23,9
	Col de l'utérus	5,1	1,7
	Corps de l'utérus	17,6	3,2
	Ovaire	11,5	7,8
Organes urinaires	Rein	4,9	1,9
	Vessie	4,6	2,1
Cerveau et système nerveux central		5,0	4,0
Thyroïde		8,1	0,6
Sang et lymphes	Maladie de Hodgkin	2,4	0,2
	Lymphome non hodgkinien	12,7	3,6
	Myélome multiple	3,7	2,3
	Leucémie	7,5	3,7

¹ Incidence estimée à partir des données des registres du cancer (cf. carte)

² Sauf les cancers non mélaniques de la peau pour l'incidence

³ Sous-estimation probable de l'incidence en raison de la couverture incomplète (cf. carte)

Source: OFS: CD, NICER, RCT

Incidence¹ et mortalité, taux par localisation, 2003–2007 – Hommes

Pour 100'000 habitants, standard européen

		Incidence ¹	Mortalité
Tous cancers²		453,9	191,6
Organes buccaux et digestifs	Cavité buccale et pharynx	17,8	6,4
	Œsophage	8,7	7,0
	Estomac	10,7	6,9
	Côlon et rectum	50,2	19,1
	Foie	10,9	8,9
	Vésicule et voies biliaires	3,1	1,5
	Pancréas	10,7	10,1
Organes respiratoires	Larynx	5,9	1,7
	Poumon, bronches, trachée	56,5	45,3
	Plèvre	3,2	2,1
Os, articulations, cartilage		1,0	0,5
Mélanome de la peau		22,3	3,7
Organes reproductifs	Prostate	133,7	26,5
	Testicule	10,6	0,3
Organes urinaires	Rein	11,6	4,3
	Vessie	19,7	6,6
Cerveau et système nerveux central		7,3	6,0
Thyroïde		3,3	0,5
Sang et lymphes	Maladie de Hodgkin	3,4	0,3
	Lymphome non hodgkinien	16,5	5,9
	Myélome multiple	5,8	3,5
	Leucémie	12,4	6,4


¹ Incidence estimée à partir des données des registres du cancer (cf. carte)

² Sauf les cancers non mélaniques de la peau pour l'incidence

Source: OFS: CD, NICER, RCT

Le cancer chez les enfants

Le cancer chez les enfants: diagnostics par classe d'âge, 1988-2007



Source: RSCE

© OFS

Chez l'enfant, les cancers sont rares. Environ 168 nouveaux cas et 37 décès sont dénombrés chaque année.


Depuis le début des années 1990, le nombre des nouveaux cas de cancer par an est resté relativement constant et la mortalité a légèrement diminué. Les chances de guérison se sont nettement améliorées ces 60 dernières années et se montent actuellement à 80%. Les cancers représentent cependant la deuxième cause de mortalité dans l'enfance.

Les plus fréquents sont les leucémies (33%), les tumeurs du système nerveux central (21%) et les lymphomes (13%).

¹ Classification internationale des cancers de l'enfant, 3^e révision

Informations complémentaires

Cantons couverts par un registre des tumeurs, en 2010



Source: NICER, RCT

© OFS, ThemaKart, Neuchâtel 2011

Sources des données:

- Statistique des causes de décès (CD)
- 10 Registres cantonaux des tumeurs (RCT) (cf. carte)
- Registre suisse du cancer de l'enfant (RSCE)

Impressum

Editeur: Office fédéral de la statistique (OFS), CH-2010 Neuchâtel,
tél.: 032 713 60 60, fax: 032 713 60 61, e-mail: order@bfs.admin.ch

Conception, rédaction: Section Santé de la population, Epidémiologie du cancer (OFS)

Langues: Disponible en français, allemand et italien

Traduction: Services linguistiques de l'OFS

Layout et graphiques: Service Prepress/Print, OFS

Photo de couverture: OFS; Concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne;
photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Renseignements: tél.: 032 713 67 00, e-mail: gesundheit@bfs.admin.ch

Publication en format PDF: www.cancer.bfs.admin.ch

Commandes: Numéro de commande: 1182-1000

Rapport complet: «Le cancer en Suisse», Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, 2011