14

Santé

1188-1403

CIM-10-GM 2014

Index alphabétique – Version française
Volume 1 (A–L)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Neuchâtel, 2014

La série «Statistique de la Suisse»
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
couvre les domaines suivants:

0 Bases statistiques et généralités

1 Population

2 Espace et environnement

3 Travail et rémunération

4 Economie nationale

5 Prix

6 Industrie et services

7 Agriculture et sylviculture

8 Energie

9 Construction et logement

10 Tourisme

11 Mobilité et transports

12 Monnaie, banques, assurances

13 Protection sociale

14 Santé

15 Education et science

16 Culture, médias, société de l'information, sport

17 Politique

18 Administration et finances publiques

19 Criminalité et droit pénal

20 Situation économique et sociale de la population

21 Développement durable et disparités régionales et internationales

Statistique Suisse

CIM-10-GM 2014

Index alphabétique – Version française
Volume 1 (A – L)

Rédaction Team Nomenclatures médicales

Editeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2014

Editeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Complément d'information: Secrétariat au codage
e-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Auteurs: Office fédéral de la statistique (OFS)
Traduction basée sur:
CIM-10 GM 2012 de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)

Réalisation: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel

Diffusion: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel
tél. 058 463 60 60 / fax 058 463 60 61/ e-mail: order@bfs.admin.ch

Numéro de commande: 1188-1403

Prix: 33 francs (TVA excl.)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: Allemand (document en partie déjà traduit en français par SwissDRG AG)

Traduction: Services linguistiques de l'OFS

Page de couverture: OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Graphisme/Layout: Section DIAM, Prepress / Print

Copyright: Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel 2014 – Version basée sur la CIM-10 de l'OMS et la CIM-10-GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.

ISBN: 978-3-303-14224-0

TABLE DES MATIÈRES

Introduction V

Index alphabétique

A 3
B 73
C 89
D 159
E 201
F 233
G 259
H 283
I 315
J 349
K 353
L 359

Introduction

Contexte

La première version française de l'index alphabétique de la CIM-10-GM fut réalisée en 2008, sous la responsabilité de SwissDRG SA, qui publia également par la suite un index alphabétique CIM-10-GM 2010 retravaillé. Dès la version CIM-10-GM 2012, l'OFS a repris la production de l'index alphabétique. Pour chaque nouvelle version les modifications apportées à l'index systématique sont introduites à l'index alphabétique existant. Ceci implique la permutation des nouveaux libellés ou des libellés modifiés, ainsi que la suppression des entrées liées à des codes supprimés. Les textes de ce différentiel se basent sur la version française de l'index systématique de la CIM-10-GM 2014, publié le 31 octobre 2014. La traduction française se fondant sur l'index systématique de référence, l'ICD-10-GM 2014 publié par l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI).

Validité

La présente version de l'index alphabétique CIM-10-GM 2014, publiée en novembre 2014, entre en vigueur dès le 1er janvier 2015.

Langues, formats, accès

L'index alphabétique CIM-10-GM 2014 est publié en français et en italien par l'OFS. L'édition papier et les documents PDF paraissent en 2 volumes par langue. Dès la version CIM-10-GM 2014 un fichier Excel de l'index alphabétique est également mis à disposition. Les versions PDF et Excel peuvent être téléchargées directement sur le site Internet de l'OFS. De plus amples informations pour la commande d'une version imprimée sont disponibles à la fin du présent document (voir dernière page).

Pour la version allemande, veuillez vous référer aux publications du DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information).

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne sert dans un premier temps qu'à trouver un code. Ce code doit ensuite impérativement être vérifié dans l'index systématique.

Les entrées principales de l'index apparaissent en gras. Les autres termes du libellé sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique sous le terme principal. Il convient de remarquer que l'effacement des mots vides et la permutation des mots rendent les textes moins lisibles.

Incidences sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. Ainsi, en cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. À l'avenir, nous aimerions intégrer d'autres terminologies médicales. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinerons volontiers toute suggestion et toute proposition d'amélioration dans la perspective des prochaines éditions. La prochaine publication est prévue en 2016.

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à cette publication par la signalisation d'erreurs ou l'apport de suggestions. Nous remercions tout particulièrement Monsieur A. Assimacopoulos (Advimed), qui a à nouveau supervisé le processus d'élaboration du répertoire.

LISTE ALPHABÉTIQUE

AAC - *voir* articulation acromio-claviculaire

Aarskog, syndrome d' *Q87.1*

AB0 incompatibilité
- réaction à une perfusion *T80.3*
- réaction à une transfusion *T80.3*

AB0 iso-immunisation
- avec
- - érythroblastose foetale *P55.1*
- - ictère foetal *P55.1*
- entraînant prise en charge maternelle *O36.1*
- foetus/nouveau-né *P55.1*

AB0 surveillance immunologique durant la *O36.1*

AB0, maladie hémolitique du foetus/nouve *P55.1*

Abaissement de la filtration glomérulair *N05.9*

Abaissement du taux d'hémoglobine *D64.9*

Abandon *T74.0*
- émotionel, pendant l'enfance *Z62*
- enfant *T74.0*
- - avec malnutrition *T74.0*
- famille *Z63*
- hémiplégie *R29.5*
- nouveau né *T74.0*
- soins corporels *R46.0*

Abandonisme *F68.8*

Abasie *F44.4*
- *R26.8*
- fonctionnelle *F44.4*
- hystérique *F44.4*

Abattement *R53*
- et fatigue, généralisés *R53*

Abcédant(e)
- inflammation, sinus pilonidal *L05.0*
- pneumonie *J85.1*
- pyélonéphrite *N12*
- sinus pilonidal *L05.0*

Abcès *L02.9*
- abdominal *K65.0*
- abdomino-pelvien *K65.0*
- aisselle *L02.4*
- alvéolaire
- - lors d'abcès
- - - dentaire *K04.6*
- - - dento-alvéolaire *K04.6*
- alvéolaire (dentaire)
- - apical *K04.6*
- amygdale *J36*
- amygdalien *J36*
- ano-rectal *K61.2*
- antrite de Highmore, chronique *J32.0*
- anus *K61.0*
- apical *K04.7*
- apocrine *L74.8*
- apophyse mastoïde *H70.0*
- après fièvre typhoïde *A01.0*
- aréolaire, après accouchement *O91.10*
- aréole *N61*
- - aigu *N61*
- - chronique *N61*
- - non puerpéral *N61*
- - sein *N61*
- - - post-partum *O91.00*
- articulation *M00.99*

Abcès –*suite*
- articulation –*suite*
- - tuberculeuse NCA *A18.0+, M01.19**
- articulation du genou *M00.96*
- articulation intervertébrale, non tuberculeux *M46.59*
- avant-bras *L02.4*
- axillaire, ganglion lymphatique aiguë *L04.2*
- bassin *L02.2*
- - chez la femme *N73.9*
- - - tuberculeux *A18.1+, N74.1**
- - péritonéal. chez l'homme *K65.0*
- - petit *K65.0*
- bas-ventre *K65.0*
- bourse *M71.09*
- - pharyngé *J39.1*
- bourse séreuse *M71.09*
- bras *L02.4*
- bras supérieur *L02.4*
- Brodie (de-) *M86.89*
- bronchique *J98.0*
- buccal périmandibulaire *K12.28*
- canal
- - déférent *N49.1*
- - spermatique *N49.1*
- canal déférent *N49.1*
- canal spinal *G06.1*
- canaux de Skene *N34.0*
- canthus *H10.5*
- capsule rénale *N15.10*
- caroncules lacrymales *H04.3*
- cartilage *M94.89*
- cavité abdominale *K65.0*
- cavité buccale *K12.29*
- cérébelleux *G06.0*
- cérébral *G06.0*
- - amibien *A06.6+, G07**
- - ariétal *G06.0*
- - chromomycotique *B43.1+, G07**
- - embolique *G06.0*
- - épidural *G06.0*
- - extra-dural *G06.0*
- - frontal *G06.0*
- - gonococcique *A54.8+, G07**
- - kystique *G06.0*
- - lors d'abcès
- - - hépatique, par amibes *A06.6+, G07**
- - - pulmonaire, par amibes *A06.6+, G07**
- - otogène *G06.0*
- - sous-arachnoïdien *G06.0*
- cerveau, temporal *G06.0*
- cervelet *G06.0*
- cheville *M00.97*
- choroïde *H30.0*
- cloison nasale *J34.0*
- coccygien *L02.3*
- coeur *I51.8*
- col de l'utérus *N72*
- - puerpéral *O86.1*
- col utérin *N72*
- colonne cervicale *M46.22*
- colonne vertébrale
- - non tuberculeux *M46.29*
- - tuberculeux *A18.0+, M49.09**
- commissure palpébrale, canthus *H10.5*
- conduit auditif *H60.0*

Abcès –*suite*
- conjonctive, oeil *H10.0*
- corde vocale *J38.3*
- cordon spermatique *N49.1*
- cornée *H16.3*
- corps
- - caverneux *N48.2*
- - jaune *N70.9*
- corps calleux *G06.0*
- corps ciliaire *H20.8*
- corps vertébral *M46.29*
- corps vitré *H44.0*
- cortex rénal *N15.10*
- cou *L02.1*
- coude *L02.4*
- cristallin *H27.8*
- cuir chevelu *L02.8*
- cuisse *L02.4*
- cutané de la joue *L02.0*
- cutané dorsal *L02.2*
- dentaire *K04.7*
- - avec
- - - abcès, alvéole dentaire *K04.6*
- - - fistule *K04.6*
- - avec conduit fistulaire *K04.6*
- dentaire avec fistule *K04.6*
- dentoalvéolaire *K04.7*
- - avec
- - - abcès, dentaire *K04.6*
- - - fistule *K04.6*
- dento-alvéolaire *K04.7*
- - avec
- - - abscès, alvéole *K04.6*
- - - fistule *K04.6*
- diaphragmatique *K65.0*
- doigt *L02.4*
- doigt/orteil *L02.4*
- Douglas (cul de sac de-) *N73.5*
- - chronique *N73.5*
- dure-mère, tuberculeux *A17.8+, G01**
- embolique *L02.9*
- endomètre *N71.9*
- épididyme *N45.0*
- épidural *G06.2*
- - tuberculeux *A17.8+, G07**
- épiglotte *J38.7*
- épiploon *K65.0*
- érysipélateux *A46*
- espace abdominal *K65.0*
- et saignement, lors de
- - diverticulite, intestin grêle, côlon *K57.43*
- - diverticulose, intestin grêle, côlon *K57.41*
- externe *L02.9*
- extra-dural *G06.2*
- extra-péritonéal *K65.0*
- extrémité
- - inférieure *L02.4*
- - supérieure *L02.4*
- face *L02.0*
- fascia *M72.89*
- fémoral *L02.4*
- fesses *L02.3*
- fièvre typhoide, suite à la *A01.0*
- filet abdominal *K65.0*
- fistulisé *L02.9*
- fosse

Abcès –*suite*
- fosse –*suite*
- - canine *K04.7*
- - ischio-anale *K61.3*
- - ischio-rectale *K61.3*
- - supraclaviculaire *L02.4*
- front *L02.0*
- gaine du tendon *M65.09*
- ganglion lymphatique *L04.9*
- - aigu *L04.9*
- - cervical *L04.0*
- - inguinal *L04.1*
- - mésentérique *I88.0*
- - non mésentérique, aigu *L04.9*
- ganglion lymphatique inguinal, aigu *L04.3*
- genou *L02.4*
- - tuberculeux *A18.0+, M01.16**
- gingival, aigu *K05.2*
- glande
- - sous-maxillaire *K11.3*
- - sublinguale *K11.3*
- - vulvo-vaginale *N75.1*
- - - puerpérale *O86.1*
- glande de Bartholin *N75.1*
- - après accouchement *O86.1*
- - par gonocoques *A54.1*
- glande de Cooper *N34.0*
- - tuberculeux *A18.1+, N51.8**
- glande de Littré *N34.0*
- glande de Meibom *H00.0*
- glande sudoripare *L74.8*
- glande urétrale *N34.0*
- glandes
- - col utérin *N72*
- - urétrales, par gonocoques *A54.1*
- glandes lacrymales *H04.0*
- glandes salivaires *K11.3*
- glandes sudoripares *L75.8*
- glutéal *L02.3*
- gonorrhéique NCA *A54.1*
- gorge *J39.1*
- hanche *L02.4*
- - tuberculeux *A18.0+, M01.15**
- hépatique *K75.0*
- - angiocholique *K75.0*
- - - avec perforation *K75.0*
- - dysenterie, au cours de *A06.4*
- - hématogène *K75.0*
- - lors d'abcès pulmonaire par amibes *A06.5+, J99.8**
- - lymphogène *K75.0*
- - par amibes *A06.4*
- - - avec abcès cérébral *A06.6+, G07**
- hypophyse *E23.6*
- iatrogène *T81.4*
- iliaque *L02.2*
- ilio-psoas, non tuberculeux *M60.05*
- infectieux *L02.9*
- infraclaviculaire *L02.4*
- inguinal *L02.2*
- intestin *K63.0*
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- intestinal NCA *K63.0*
- intestinal, tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- intraabdominal *K65.0*
- - après un acte médical *T81.4*
- intracrânien *G06.0*

Abcès –*suite*
- intracrânien –*suite*
- - épidural *G06.0*
- - extra-dural *G06.0*
- - séquelles *G09*
- intrahépatique *K75.0*
- intramédullaire *G06.1*
- - épidural *G06.1*
- - extradural *G06.1*
- - séquelles *G09*
- - sous-dural *G06.1*
- intraorbitaire *H05.0*
- intrapéritonéal *K65.0*
- intrasphinctérien, anus *K61.4*
- iridien (de l'iris) *H20.8*
- iris *H20.8*
- ischio-rectal *K61.3*
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- jambe *L02.4*
- joue *K12.23*
- labial (vulve) *N76.4*
- larynx *J38.7*
- l'épaule *L02.4*
- lèvre *K13.0*
- lèvres
- - grandes *N76.4*
- - - après accouchement *O86.1*
- - - cours de grossesse *O23.5*
- - - puerpéral *O86.1*
- - petites *N76.4*
- - - cours de grossesse *O23.5*
- - - post-partal *O86.1*
- - - puerpéral *O86.1*
- ligament utérin *N73.2*
- ligament utérin large *N73.2*
- - aigu *N73.0*
- - chronique *N73.1*
- lingual *K14.0*
- - staphylocoques *K14.0, B95.8!*
- lobe frontal *G06.0*
- lobe temporal *G06.0*
- lobe temporal du cerveau *G06.0*
- localisé NCA *L02.8*
- lombaire *L02.2*
- - non tuberculeux *L02.2*
- - tuberculeux *A18.0+, M49.06**
- lors de
- - chromomycose sous-cutanée *B43.2+, L99.8**
- - colostomie *K91.4*
- - diabète sucré *E14.60*
- - diabète sucré type 1 *E10.60*
- - diabète sucré type 2 *E11.60*
- - diverticulite
- - - côlon *K57.22*
- - - - avec
- - - - - perforation, *K57.22*
- - - - - hémorragie, *K57.23*
- - - intestin *K57.82*
- - - - avec hémorragie *K57.83*
- - - intestin grêle *K57.02*
- - - - avec hémorragie *K57.03*
- - - - et côlon *K57.42*
- - diverticulose
- - - côlon *K57.20*
- - - - avec
- - - - - perforation, *K57.20*
- - - - - hémorragie, *K57.21*

Abcès –*suite*
- lors de –*suite*
- - diverticulose –*suite*
- - - intestin *K57.80*
- - - - avec hémorragie *K57.81*
- - - intestin grêle *K57.00*
- - - - avec hémorragie *K57.01*
- - - - et côlon *K57.40*
- - entérostomie *K91.4*
- - épididymite *N45.0*
- - épididymo-orchite *N45.0*
- - fistule
- - - coccyx *L05.0*
- - - sinus pilonidal *L05.0*
- - fistule pilonidale *L05.0*
- - gonorrhée
- - - glande de Bartholin *A54.1*
- - - glande de Cooper *A54.1*
- - iléostomie *K91.4*
- - infection, sinus pilonidal *L05.0*
- - inflammation, trompe, aiguë *N70.0*
- - kyste dermoïde coccygien *L05.0*
- - maladie de Crohn *K50.9*
- - - intestin grêle et gros intestin *K50.8*
- - orchite *N45.0*
- - para-urétrite, gonococcique *A54.1*
- - péritonite *K65.0*
- - sinus
- - - coccygien *L05.0*
- - - pilonidal *L05.0*
- - tuberculose du rectum *A18.3+, K93.0**
- - urétrite
- - - gonorrhéique *A54.1*
- - - par diplocoques *A54.1*
- - vaginite, gonorrhéique *A54.1*
- - vulvite, gonorrhéique *A54.1*
- - vulvo-vaginite, par gonocoques *A54.1*
- mâchoire *K10.28*
- mâchoire inférieure *K10.28*
- main *L02.4*
- malléole *L02.4*
- malléole externe *L02.4*
- mamelon *N61*
- - associé à l'accouchement *O91.00*
- - post-natal *O91.00*
- mandibulaire *K12.28*
- mastoïdite de Bezold *H70.0*
- maxillaire *K10.20*
- maxillo-massétérin *K12.28*
- médiastin *J85.3*
- médiastinal *J85.3*
- méninges *G06.2*
- - tuberculeux *A17.0+, G01**
- menton *L02.0*
- mésentérique *K65.0*
- mésosalpinx *N70.9*
- métastatique *L02.9*
- miliaire, pulmonaire, putride *J85.2*
- moëlle épinière *G06.1*
- - embolique *G06.1*
- - épidural *G06.1*
- - extradural *G06.1*
- - par staphylocoques *G06.1, B95.8!*
- - sous-arachnoïdien *G06.1*
- - tuberculeux *A17.8+, G07**
- mollet *L02.4*
- mont de Vénus (pubien) *L02.2*

Abcès –*suite*

- multiples *L02.9*
- - organes génitaux masculins *N49.88*
- muqueuse buccale *K12.29*
- muqueuse buccale de la joue *K12.23*
- muscle ilio-psoas *M60.05*
- musculaire *M60.09*
- - tuberculeux *A18.8+, M63.09**
- myocarde *I40.0*
- nasal *J34.0*
- - externe *J34.0*
- nuque *L02.1*
- oeil *H44.0*
- oesophagien *K20*
- oeufs de Naboth *N72*
- ombilical *L02.2*
- - chez le nouveau-né *P38*
- ongle d'orteil *L03.02*
- ongle du pouce *L03.01*
- ongle, doigt *L03.01*
- orbital *H05.0*
- oreille
- - externe *H60.0*
- - interne *H83.0*
- oreille moyenne *H66.4*
- - aigu *H66.0*
- organes génitaux
- - après
- - - avortement *O08.0*
- - - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - - grossesse môlaire *O08.0*
- - après accouchement *O86.1*
- - externes, chez la femme *N76.4*
- - l'homme *N49.9*
- - post-natal, chez la femme *O85*
- - puerpéral, chez la femme *O85*
- - tuberculeuse NCA *A18.1*
- organes uro-génitaux, tuberculeux *A18.1*
- orteil *L02.4*
- os
- - canal médullaire *A18.0+, M49.09**
- - - non tuberculeux *M46.29*
- - chronique *M86.69*
- - sous-périosté *M86.89*
- - tuberculeux *A18.0+, M90.09**
- os pariétal *L02.8*
- ovarien *N70.9*
- - aigu *N70.0*
- - chronique *N70.1*
- palais *K12.28*
- - dur *K10.28*
- palpébral *H00.0*
- pancréatique *K85.91*
- par
- - amibes *A06.4*
- - aspergillus pulmonaire *B44.1*
- - candida *B37.88*
- paradontal *K05.2*
- paramètre *N73.2*
- - aigu *N73.0*
- - chronique *N73.1*
- parapharyngé *J39.0*
- pararectal *K61.1*
- para-rectal *K61.1*
- pararotulien *L02.4*
- paraurétral *N34.0*
- parautérin *N73.2*

Abcès –*suite*

- parautérin –*suite*
- - chronique *N73.1*
- paravaginal *N76.0*
- parodontal *K05.2*
- paroi abdominale *L02.2*
- paroi artérielle *I77.8*
- paroi du côlon *K63.0*
- paroi intestinale *K63.0*
- paroi thoracique *L02.2*
- parotidien *K11.3*
- paupière *H00.0*
- peau *L02.9*
- - face *L02.0*
- - par amibes *A06.7*
- - région des fesses *L02.2*
- - tuberculeux *A18.4*
- pectoral *L02.2*
- périamygdalien *J36*
- péri-amygdalien *J36*
- périanal *K61.0*
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- périapical *K04.7*
- - avec fistule *K04.6*
- - sans fistule *K04.7*
- péricardique *I30.1*
- périmandibulaire *K12.28*
- périnéal *L02.2*
- périnée *L02.2*
- périnéphrétique *N15.11*
- - tuberculeux *A18.1+, N29.1**
- périostal *M86.99*
- périostal, avec ostéomyélite *M86.89*
- - aigu *M86.19*
- - chronique *M86.69*
- péripharyngé *J39.0*
- périprostatique *N41.2*
- périrectal *K61.1*
- péri-rectal *K61.1*
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- périrénal *N15.11*
- - tuberculose *A18.1+, N29.1**
- péritonéal *K65.0*
- - après
- - - avortement *O08.0*
- - - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - - grossesse molaire *O08.0*
- - pelvien, chez la femme *N73.5*
- - perforé *K65.0*
- - post-opératoire *T81.4*
- - post-partal *O85*
- - tuberculeux *A18.3+, K67.3**
- péri-urétéral *N28.8*
- périurétral *N34.0*
- périutérin *N73.2*
- - chronique *N73.1*
- périvésical *N30.8*
- phagédénique NCA *L02.9*
- phagédénique, lors d'un chancre mou *A57*
- pharyngé *J39.1*
- pharyngo-amygdalien *J36*
- pied *L02.4*
- pilonidal *L05.0*
- plaie *L02.9*
- - après un acte médical *T81.4*
- plaie opératoire *T81.4*
- plancher buccal *K12.28*

Abcès –*suite*

- pleural *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*
- plèvre *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*
- pli cubital *L02.4*
- pli inguinal *L02.2*
- poignet *L02.4*
- poplité *L02.4*
- post-opératoire *T81.4*
- pouce *L02.4*
- processus mastoïde *H70.0*
- prostatique *N41.2*
- - gonorrhéique *A54.2+, N51.0**
- psoas, non tuberculeux *M60.05*
- ptérygo-mandibulaire *K12.28*
- pulmonaire *J85.2*
- - avec pneumonie *J85.1*
- - par amibes *A06.5+, J99.8**
- - - avec
- - - - abcès
- - - - - hépatique, *A06.5+, J99.8**
- - - - - cérébral, *A06.6+, G07**
- - - - pneumonie *A06.5+, J17.0**
- - tuberculeux
- - - froid *A16.2*
- - - primaire *A16.7*
- - - - confirmé par bactériologie ou histologie *A15.7*
- pulpaire *K04.0*
- purulent *L02.9*
- rectal *K61.1*
- recto-vaginal *N76.0*
- - port-partum *O86.1*
- recto-vésical *N30.8*
- région temporale *L02.0*
- rénal *N15.10*
- - avec
- - - calcul *N20.0*
- - - hydronéphrose, avec calcul *N13.6*
- - chez la mère, avec lésion du foetus/nouveau-né *P00.1*
- - cours de grossesse *O23.0*
- - post-partal *O86.2*
- - tuberculeux *A18.1+, N29.1**
- rétinien *H30.0*
- rétroamygdalien *J36*
- rétrobulbaire *H05.0*
- retrocaecal *K65.0*
- rétrolaryngé *J38.7*
- rétromaxillaire *K10.21*
- rétronasal *J34.0*
- rétropérinéal *L02.2*
- rétropéritonéal *K65.0*
- rétropharyngé *J39.0*
- - tuberculeux *A16.8*
- - - avec confirmation bactériologique et histologique *A15.8*
- rétro-utérin *N73.2*
- rétro-vésical *N30.8*
- rhinopharyngé *J39.1*
- rocher *H70.2*
- sacrum
- - non tuberculeux *M46.28*
- - tuberculeux *A18.0+, M49.08**
- scapulaire *M86.81*
- scléral *H15.0*
- sclérotique *H15.0*
- scrofuleux *A18.2*

Abcès –*suite*

- scrotal *N49.2*
- - tuberculeux *A18.1+, N51.8**
- sein *N61*
- - aigu *N61*
- - - non puerpéral *N61*
- - associé à la grossesse *O91.10*
- - associé à l'accouchement, avec difficulté à a mise au sein *O91.11*
- - chronique *N61*
- - - non puerpéral *N61*
- - non puerpéral *N61*
- - puerpéral *O91.10*
- - tuberculeux *A18.8*
- sigmoïdien *K63.0*
- sinus veineux accessoire, intracrânien *G06.0*
- sinus éthmoïdal *J32.2*
- - aigu *J01.2*
- - chronique *J32.2*
- sinus frontal *J32.1*
- - aigu *J01.1*
- - chronique *J32.1*
- - tuberculeux *A16.8*
- - - avec confirmation bactériologique et histologique *A15.8*
- sinus maxillaire *J32.0*
- - aigu *J01.0*
- - chronique *J32.0*
- sinus nasal *J32.9*
- - aigu *J01.9*
- - tous *J32.4*
- - - aigu *J01.4*
- sinus sphénoïdal *J32.3*
- - aigu *J01.3*
- - chronique *J32.3*
- sous-arachnoïdien *G06.2*
- sous-aréolaire *N61*
- - associé à la grossesse *O91.10*
- - puerpérale *O91.10*
- sous-cutané *L02.9*
- sous-diaphragmatique *K65.0*
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- sous-dural *G06.2*
- - intracrânien *G06.0*
- sous-hépatique *K65.0*
- sous-mandibulaire *K12.21*
- - avec extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale *K12.22*
- sous-maxillaire *L02.0*
- sous-mentonnier *L02.0*
- sous-phrénique *K65.0*
- - après un acte médical *T81.4*
- sous-urétral *N34.0*
- sphéno-temporal *G06.0*
- sphincter anal *K61.4*
- splénique *D73.3*
- - par amibes *A06.8*
- sublingual *K12.28*
- superficiel *L02.9*
- supra-claviculaire *L02.4*
- sur suture *T81.4*
- - après un acte médical *T81.4*
- surrénalien *E27.8*
- sus-pubien *L02.2*
- talon *L02.4*
- tempe *L02.0*
- temporal, sphénoïde *G06.0*
- tendon *M65.09*

Abcès –*suite*

- testicule *N45.0*
- - tuberculeux *A18.1+, N51.1**
- thoracique *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*
- thymus *E32.1*
- thyroïdien *E06.0*
- tissu conjonctif NCA *L02.9*
- trachée *J39.88*
- trochantérien *M86.95*
- trompe (Fallope) *N70.9*
- - chronique *N70.1*
- trompe utérine *N70.9*
- - avec rupture *N70.9*
- tronc *L02.2*
- tronc cérébral *G06.0*
- tuberculeux froid *A16.9*
- tuberculeux NCA *A16.9*
- tubo-ovarien *N70.9*
- - aigu *N70.0*
- - chronique *N70.1*
- tunique vaginale du testicule *N49.1*
- urétéral *N28.8*
- urétral *N34.0*
- - périnéal *N34.0*
- urinaire *N39.0*
- uro-génital (système), tuberculeux *A18.1*
- utérus *N71.9*
- - aigu *N71.0*
- - chronique *N71.1*
- - post-partum *O86.1*
- - tuberculeux *A18.1+, N74.1**
- vaginal *N76.0*
- - post-partum *O86.1*
- verge *N48.2*
- - gonorrhéique NCA *A54.1*
- vertébral. tuberculeux *A18.0+, M49.09**
- vésicule biliaire *K81.0*
- - sans lithiase *K81.0*
- vésicule séminale *N49.0*
- vessie *N30.8*
- - cours de grossesse *O23.1*
- voies lacrymales *H04.3*
- voies respiratoire supérieures *J39.88*
- voies urinaires, en post-partum NCA *O86.2*
- vulvaire *N76.4*
- - cours de la grossesse *O23.5*
- - post-partum *O86.1*
- - puerpéral *O86.1*

Abdomen

- abcès *K65.0*
- adhérence *K66.0*
- aigu *R10.0*
- amputation traumatique partielle *S38.3*
- angiome *D18.08*
- anomalies dans le diagnostique par imagerie NCA *R93.5*
- avec liquide *R18*
- carcinome *C76.2*
- colique *R10.4*
- contracture *R19.3*
- contusion *S30.1*
- crampe *R10.4*
- difformité congénitale *Q89.9*
- douleur *R10.4*
- - chronique *R10.4*

Abdomen –*suite*

- douleur –*suite*
- - intense *R10.0*
- - - avec contracture de la paroi abdominale *R10.0*
- - psychogène *F45.39*
- - sans maladie *R10.4*
- douleur pesistante *R10.4*
- écrasement *S38.1*
- épanchement *R18*
- et
- - bassin, région sacro-lombaire
- - - lésions multiples *S39.7*
- - - plaies ouvertes multiples *S31.7*
- - membre
- - - inférieur
- - - - lésion superficielle *T00.8*
- - - - plaies ouvertes diverses *T01.8*
- - - supérieur
- - - - lésion superficielle *T00.8*
- - - - plaies ouvertes diverses *T01.8*
- - thorax
- - - écrasements multiples *T04.1*
- - - plaies ouvertes diverses *T01.1*
- fistule *K63.2*
- flatulent *R14*
- gonflement *R19.0*
- granulome *K66.8*
- hémorragie *R58*
- inférieur
- - douleurs aigues *R10.3*
- - féminin, troubles *N94.9*
- - malignome *C76.2*
- lésion *S39.9*
- - avec lésion d'organe du bassin *S39.6*
- - bassin *S34.8*
- - musculaire *S39.0*
- - nerveuse *S34.8*
- - région sacro-lombaire *S34.8*
- - superficielle *S30.90*
- - tendineuse *S39.0*
- - vaisseau sangin *S35.9*
- - - séquelles *T91.8*
- lésions superficielles multiples du bassin et de la région sacro-lombaire *S30.7*
- métastase *C79.88*
- métastase des gangliuons lymphatiques *C77.2*
- non précisé *R10.4*
- pendant
- - avec lésion sur le foetus/ le nouveau-né *P03.8*
- - durant la grossesse *O34.8*
- plaie ouverte *S31.80*
- résultat
- - CT (tomographie computerisée) anormale *R93.5*
- - ultrason anormal *R93.5*
- rigidité avec douleur abdominale intense *R10.0*
- rupture traumatique de l'aorte *S35.0*
- sarcome des tissus mous *C49.4*
- sarcome du tissu conjonctif *C49.4*
- syphilis *A52.7*
- traumatisme *S39.9*
- - moignon *S39.9*
- tuberculose des ganglions lymphatiques *A18.3*
- tuméfaction *R19.0*

Abdomen –*suite*

- tumeur *R19.0*
- tympanisme *R14*
- typhus *A01.0*
- volumineux *R19.8*

abdominal
- antérieur
- - avec
- - - gangrène Autre Hernie de la paroi *K43.78*
- - - occlusion sans gangrène , Autre Hernie de la paroi *K43.68*
- - non précisées
- - - avec occlusion sans gangrène , Autre Hernie de la paroi *K43.6*
- - - - occlusion, sans gangrène , Hernie de la paroi *K43.69*
- - - - gangrène , Autre Hernie de la paroi *K43.7*
- - - - gangrène , Hernie de la paroi *K43.79*
- - - sans occlusion ni gangrène , Hernie de la paroi *K43.99*
- - SAI Hernie de la paroi *K43.99*
- - sans occlusion gangrène , Autre Hernie de la paroi *K43.98*
- rompu Anévrisme aortique thoraco - *I71.5*
- sans mention rupture Anévrisme aortique thoraco - *I71.6*
- Typhus *A01.0*

Abdominal(e)
- actinomycose *A42.1*
- adaptation de l'appareil *Z46.5*
- adhérence *K66.0*
- crise *R10.4*
- desmoïde *D48.1*
- douleurs
- - diffuses *R10.4*
- - viscérales dans la partie supérieure de l'abdomen *R10.1*
- douloureux *R10.4*
- épilepsie *G40.8*
- équivalent convulsif *G40.8*
- fibromatose *D48.1*
- grossesse *O00.0*
- hernie *K46.9*
- - avec
- - - étranglement, avec gangrène *K46.1*
- - - étranglement, sans gangrène *K46.0*
- hernie hiatale *K44.9*
- lymphome *C85.9*
- métastase *C79.88*
- migraine *G43.8*
- paratyphoïde *A01.4*
- rigidité *R19.3*
- spasme *R10.4*
- testicule *Q53.9*
- tuberculose *A18.3*
- tularémie *A21.3*
- tuméfaction *R19.0*

Abdominopathie *R10.4*

Abducens (VIe nerf cranien) parésie *H49.2*

Aberration
- artérielle NCA *Q27.8*
- canal hépatique *Q44.5*
- chromosomique *Q99.9*
- glande endocrine NAC *Q89.2*

Aberration –*suite*

- glande sébacée, bucale, congénitale *Q38.6*
- glande thyroïde *Q89.2*
- hypophysaire *Q89.2*
- mammaire *Q83.8*
- muqueuse buccale, congénitale *Q38.6*
- pancréatique *Q45.3*
- parathyroïdienne *Q89.2*
- rate *Q89.0*
- surrénalienne *Q89.1*
- thymus *Q89.2*
- veine NCA *Q27.8*

Abiotrophie *R68.8*

Ablation
- corps vitré *H43.8*
- couche pigmentaire, rétine *H35.7*
- ménisque *M23.39*
- - suite
- - - blessure, ancienne *M23.29*
- - - déchirure, ancienne *M23.29*
- utérus *Z90.7*

Ablépharie *Q10.3*

Abortif
- peste *A20.8*
- poliomyélite *A80.4*

Abortus *voir aussi* avortement *O06.9*
- ampullaire *O00.1*
- Bang (maladie de-), infection *A23.1*
- commençant, débutant *O05.9*
- complet *O06.9*
- habituel *O03.9*
- imminent *O20.0*
- - avec lésion du foetus *P01.8*
- incomplet *O06.4*

Abouchement veine pulmonaire anormal *Q26.4*

Aboulie *R68.8*

Aboyante, toux *R05*

Abrasion
- cornée *S05.0*
- dents *K03.1*
- - habituelle *K03.1*
- - par dentifrice *K03.1*
- - professionnelle *K03.1*
- - traditionnelle *K03.1*
- lésion, cornée *S05.0*

Abrasion dent *K03.1*

Abrikossoff (tumeur d') *D21.9*

Absence (s)
- acquise
- - bilatérale
- - - main et poignet *Z89.3*
- - - malléole et pied *Z89.7*
- - glande, endocrine NCA *E89.9*
- albumine dans le sang *E88.0*
- anus
- - avec fistule *Q42.2*
- - congénitale *Q42.3*
- aorte, congénitale *Q25.4*
- appareil lacrymal *Q10.4*
- - congénitale *Q10.4*
- appareil lacrymal, congénitale *Q10.4*
- appendice, congénitale *Q42.8*
- arc aortique, congénitale *Q25.4*
- artère coronaire *Q24.5*

Absence (s) –*suite*

- artère ombilicale, congénitale *Q27.0*
- artère périphérique, congénitale *Q27.8*
- artère pulmonaire, congénitale *Q25.7*
- artère rénale, congénitale *Q27.2*
- artérielle NCA *Q27.8*
- articulation, congénitale NCA *Q74.8*
- atonique *G40.3*
- avant-bras
- - et main, congénitale *Q71.2*
- - unilatérale, acquise *Z89.2*
- avant-bras, et bras, congénitale, main présente *Q71.1*
- bras
- - acquise *Z89.2*
- - bilatérale, acquise *Z89.3*
- - congénitale *Q71.9*
- bronches, congénitale *Q32.4*
- bruits intestinaux *R19.1*
- canal
- - déférent, congénitale *Q55.4*
- - spermatique, congénitale *Q55.4*
- canal déférent
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q55.4*
- canal déférent, congénitale *Q55.4*
- canal lacrymal *Q10.4*
- canaux salivaires *Q38.4*
- cartilage thyroïdien, congénitale *Q31.8*
- cartillage cricoide *Q31.8*
- cerveau *Q00.0*
- cervelet *Q04.3*
- cheville
- - acquise *Z89.4*
- - et pied, congénitale *Q72.3*
- chromosomes sexuels, en cas de
- - phénotype féminin *Q97.8*
- - phénotype masculin *Q98.8*
- cils
- - acquise *H02.7*
- - congénitale *Q10.3*
- cils palpébraux *Q10.3*
- clitoris, congénitale *Q52.6*
- cloison aorto-pulmonaire *Q21.4*
- cloison interauriculaire, congénitale *Q21.1*
- cloison ventriculaire, congénitale *Q20.4*
- coccyx, congénitale *Q76.4*
- col utérin
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q51.5*
- complète des membres supérieurs, congénitale *Q71.0*
- conduit auditif, externe, congénitale *Q16.1*
- cordon spermatique *Q55.4*
- - congénitale *Q55.4*
- corps calleux *Q04.0*
- côtes
- - acquise *Z90.8*
- - congénitale *Q76.6*
- cristallin
- - acquise *H27.0*
- - congénitale *Q12.3*
- cristallin - *voir aussi* aphakie *H27.0*
- cuisse et jambe, pied présent *Q72.1*
- dent
- - acquise, avec occlusion *K07.3*
- - congénitale *K00.0*

Absence (s) *–suite*

- développement physiologique normal *R62.9*
- diaphragme *Q79.1*
- - congénitale *Q79.1*
- doigts
- - acquise *Z89.0*
- - congénitale *Q71.3*
- - multiples, bilatérale, acquise *Z89.3*
- duodénum
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q41.0*
- enclume
- - acquise *H74.3*
- - congénitale *Q16.3*
- épididyme
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q55.4*
- épiglotte, congénitale *Q31.8*
- épileptique NCA *G40.7*
- épileptique, atonique *G40.3*
- estomac
- - acquise *Z90.3*
- - congénitale *Q40.2*
- - partielle, acquise *Z90.3*
- fémur inférieur, et pied, congénitale *Q72.2*
- fémur, congénitale *Q72.4*
- foie, congénitale *Q44.7*
- gammaglobuline
- - dans le sang *D80.1*
- - sang, héréditaire *D80.0*
- glande thyroide
- - acquise *E89.0*
- - congénitale *E03.1*
- glandes salivaires, congénitale *Q38.4*
- glandes, endocrines, congénitale NCA *Q89.2*
- globe oculaire
- - acquise *Z90.0*
- - congénitale *Q11.1*
- glotte, congénitale *Q31.8*
- gros intestin
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q42.9*
- hymen, congénitale *Q52.4*
- hypophyse
- - acquise *E89.3*
- - congénitale *Q89.2*
- iléon
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q41.2*
- intestin grêle, congénitale *Z90.4*
- intestin, congénitale *Q41.9*
- iris, congénitale *Q13.1*
- jambe
- - acquise *Z89.6*
- - au-dessus, genou, acquise *Z89.6*
- - bilatérale, acquise *Z89.7*
- - congénitale *Q72.8*
- - en-dessous, genou, acquise *Z89.5*
- - et bras
- - - acquise *Z89.8*
- - - bilatérale *Z89.8*
- jéjunum
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q41.1*
- lactation *O92.30*
- lactation partielle *O92.40*

Absence (s) *–suite*

- langue, congénitale *Q38.3*
- larynx
- - acquise *Z90.0*
- - congénitale *Q31.8*
- ligament utérin large *Q50.6*
- lors d'épilepsie *G40.7*
- - dans l'enfance *G40.3*
- - juvénile *G40.3*
- luette *Q38.5*
- - congénitale *Q38.5*
- luette, congénitale *Q38.5*
- main
- - acquise *Z89.1*
- - congénitale *Q71.3*
- - et membres inférieurs, acquise *Z89.8*
- mamelon, congénitale *Q83.2*
- - cas d'amastie *Q83.0*
- mammaire
- - acquise *Z90.1*
- - congénitale *Q83.8*
- - - avec absence, mamelon *Q83.0*
- maturation pulmonaire *P28.0*
- maturation pulmonaire ou atélectasie *P28.0*
- - nouveau-né *P28.0*
- Membre de la famille *Z63*
- membre inférieur *Q72.0*
- membre supérieur *Q71.0*
- membres
- - acquise *Z89.9*
- - congénitale *Q73.0*
- - inférieurs, bilatérale, et membres supérieurs *Z89.8*
- - supérieurs
- - - et membre inférieur *Z89.8*
- - - unilatérale, acquise *Z89.2*
- menstruation *N91.2*
- menton, congénitale *Q18.8*
- mouvements du foetus *O36.8*
- muscle *Q79.8*
- - congénitale *Q79.8*
- muscle oculaire *Q10.3*
- myocloniques, lors d'épilepsie *G40.4*
- neutropénie *D70.7*
- nez
- - acquise *Z90.0*
- - congénitale *Q30.1*
- oeil
- - acquise *Z90.0*
- - congénitale *Q11.1*
- oesophage
- - acquise *Z90.4*
- - congénital *Q39.8*
- oreille
- - acquise *Z90.0*
- - congénitale *Q16.9*
- oreille interne, congénitale *Q16.5*
- organe de Corti, congénitale *Q16.5*
- organes
- - acquise *Z90.8*
- - congénitale *Q89.8*
- organes digestifs
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q45.8*
- organes génitaux
- - acquise *Z90.7*
- - féminins, congénitale *Q52.8*

Absence (s) *–suite*

- organes génitaux féminins externes, congénitale *Q52.7*
- organes génito-urinaires
- - féminins, congénitale *Q52.8*
- - masculins, congénitale *Q55.8*
- organes respiratoires *Q34.8*
- - congénitale *Q34.9*
- orteils
- - acquise *Z89.4*
- - congénitale *Q72.3*
- os du crâne
- - avec hydrocéphalie, avec spina bifida *Q05.4*
- - congénitale *Q75.8*
- - - avec
- - - - Anencéphalie *Q00.0*
- - - - encéphalocèle *Q01.9*
- - - - hydrocéphalie *Q03.9*
- - - - microcéphalie *Q02*
- osselets, congénitale *Q17.8*
- ouverture du col de l'utérus en cas de contractions *O62.0*
- ovaire
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q50.0*
- ovulation *N97.0*
- pancréas
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q45.0*
- parathyroïdienne
- - acquise *E89.2*
- - congénitale *Q89.2*
- partie de la tête, acquise *Z90.0*
- partie de l'encéphale *Q04.3*
- patella, congénitale *Q74.1*
- paupière *Q10.3*
- - acquise *Z90.0*
- paupière, manquante, congénitale *Q10.3*
- pavillon, oreille, congénitale *Q16.0*
- pénis
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q55.5*
- péricarde, congénitale *Q24.8*
- pied
- - acquise *Z89.4*
- - et membres supérieurs, acquise *Z89.8*
- poignet, acquise *Z89.1*
- pouce
- - acquise *Z89.0*
- - bilatérale, acquise *Z89.3*
- - congénitale *Q71.3*
- poumons
- - acquise *Z90.2*
- - congénitale *Q33.3*
- prostate *Q55.4*
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q55.4*
- rachis, congénitale *Q76.4*
- radius, congénitale *Q71.4*
- rate
- - acquise *D73.0*
- - congénitale *Q89.0*
- rectum
- - acquise *Z90.4*
- - cas de fistule *Q42.0*
- - - rectale *Q42.0*
- - - recto-cutanée *Q42.0*

Absence (s) *–suite*
- rectum *–suite*
- - congénitale *Q42.1*
- rein
- - acquise *Z90.5*
- - congénitale *Q60.2*
- - - bilatérale *Q60.1*
- - - unilatérale *Q60.0*
- rotation
- - caecum *Q43.3*
- - côlon *Q43.3*
- sacrum, congénitale *Q76.4*
- scrotum, congénitale *Q55.2*
- sensibilité au chaud *R20.8*
- sensibilité au froid *R20.8*
- stéréoscopie *H53.3*
- sternum, congénitale *Q76.7*
- surrénalienne
- - acquise *E89.6*
- - congénitale *Q89.1*
- tendon *Q79.8*
- - congénitale *Q79.8*
- testicules
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q55.0*
- thyroïde *E03.1*
- trachée, congénitale *Q32.1*
- tronc, acquise *Z90.1*
- tubaire
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q50.6*
- tube digestif
- - complète *Q45.8*
- - partielle *Q45.8*
- tube digestif, supérieur, congénitale *Q40.8*
- tube, conduit
- - auditif, congénitale *Q16.2*
- - Fallope *Q50.6*
- - - acquise *Z90.7*
- - - congénitale *Q50.6*
- unilatérale, membre inférieur, au-dessus du genou, acquise *Z89.6*
- uretère *Q62.4*
- - acquise *Z90.6*
- - congénitale *Q62.4*
- urètre, congénitale *Q64.5*
- utérus
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q51.0*
- vagin, congénitale *Q52.0*
- vaisseaux cérébraux, congénitale *Q28.38*
- veine
- - cave
- - - inférieure *Q26.8*
- - - supérieure *Q26.8*
- - porte, congénitale *Q26.5*
- veine cérébrale, congénitale *Q28.38*
- veine NCA *Q27.8*
- veine périphérique, congénitale *Q27.8*
- vermis cérébelleux *Q04.3*
- vertèbre, congénitale *Q76.4*
- - sans scoliose *Q76.4*
- vésicule biliaire
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q44.0*
- vésicule séminale
- - acquise *Z90.7*

Absence (s) *–suite*
- vésicule séminale *–suite*
- - congénitale *Q55.4*
- vessie, congénitale *Q64.5*
- vigilance *R41.8*
- visage *Q18.8*
- voie biliaire, congénitale *Q44.5*
- vulve, congénitale *Q52.7*

Absent(e)
- dent
- - à
- - - accident *K08.1*
- - - extraction *K08.1*
- - - parodontose *K08.1*
- - avec morsure, défectueuse *K07.3*
- développement, segments pulmonaires terminaux, chez le nouveau-né *P28.0*
- immunité contre hépatite virale *Z24.6*
- immunité contre la rubéole *Z24.5*
- lien social, en cas de trouble, comportement social *F91.1*
- mouvements de l'enfant *O36.8*
- ovulation *N97.0*
- - avec stérilité *N97.0*
- perception acoustique congénitale *F80.28*
- présentation de la tête, dans le détroit supérieur du bassin, obstacle, naissance *O64.8*
- présentation de la tête, soins, femme enceinte *O32.4*
- socialisation, en cas d'agressivité *F91.1*
- stéréopsie *H53.3*

Absentéisme (école buissonnière) *F91.2*
- durant l'enfance
- - avec socialisation *F91.2*
- - sans socialisation *F91.1*

Absidia (zygomycète), infection *B46.5*

Absinthe, dépendance *F10.2*

Absinthisme *F19.2*

Absolu
- agraphie *R48.8*
- arythmie *I48.19*
- - intermittente *I48.19*
- - lors de fibrillation auriculaire *I48.19*
- bradyarythmie *I48.19*
- glaucome *H44.5*
- tachyarythmie *I48.19*

Absorptiométrie radiographique *Z01.88*

Absorption
- amidon, troubles *K90.4*
- calcium, troubles *E58*
- drogues, par voie placentaire *P04.1*
- graisse, troubles *K90.4*
- - pancréatique *K90.3*
- hydrates de carbone, troubles *K90.4*
- médicaments, par voie placentaire *P04.1*
- protéines, troubles *K90.4*
- substance, chimique *T65.9*
- - par voie placentaire *P04.8*
- substances de l'environnement, chimiques, avec lésion, foetus/nouveau -né *P04.6*
- trouble(s) *K90.9*
- vitamines, troubles *E56.9*

Absorption des glucides

Absorption des glucides *–suite*
- intestin, troubles, post-opératoires *K91.2*
- intestinal, troubles NCA *E74.3*

Absorption deux photons *Z01.88*

Abstrusio auriculae *Q17.9*

Abt Letterer Siwe Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminé) [Maladie d ' *C96.0*

Abt-Letterer-Siwe (maladie de -) *C96.0*

Abus
- alcool *F10.1*
- - avec sevrage *F10.3*
- - chronique *F10.2*
- - dans
- - - antécédents familiaux *Z81*
- - - l'anamnèse *Z86.4*
- amphétamine *F15.1*
- analgésique *F55.2*
- analgésiques *F55.2*
- anamnèse *Z91.8*
- antacides *F55.3*
- antiacides *F55.3*
- antidépresseurs *F55.0*
- anxiolytiques *F13.1*
- avec lésion, chez l'adulte *T74.9*
- barbituriques *F13.1*
- benzodiazépine *F13.1*
- caféine *F15.1*
- cannabis *F12.1*
- cannabis, sans dépendance *F12.1*
- cocaïne *F14.1*
- comprimés *F19.1*
- corporel *T74.1*
- diazépam *F13.1*
- drogues *F19.1*
- gouttes nasales *F55.8*
- hallucinogènes *F16.1*
- haschisch, sans dépendance *F12.1*
- héroïne *F11.1*
- hormone *F55.5*
- hypnotiques *F13.1*
- laxatifs *F55.1*
- LSD, sans dépendance *F16.1*
- médicamenteux *F19.1*
- médicaments *F19.1*
- Médication *F19.1*
- - et drogues
- - - anamnèse *Z86.4*
- - - antécédents familiaux NCA *Z81*
- minéralocorticoïde *E27.0*
- morphine *F11.1*
- nicotine *F17.1*
- - chronique *F17.1*
- opiacés *F11.1*
- opioïdes *F11.1*
- personnes, forme mixte *T74.8*
- phénylcyclidine (ou substances comparables) *F19.1*
- phenylcyclidine, ou de substances comparables *F19.1*
- plantes *F55.6*
- plantes et remèdes naturels *F55.6*
- psychique *T74.3*
- remèdes naturels *F55.6*
- sédatifs *F13.1*
- sexuel *T74.2*

Abus –*suite*
- sexuel –*suite*
- - prétendue, clarification *Z04.5*
- solvants *F18.1*
- solvants volatils *F18.1*
- spray nasal *F55.8*
- stéroïdes *F55.5*
- stimulants NCA *F15.1*
- substance *F19.1*
- - conseil *Z71*
- - psychoactif *F19.1*
- - psychotrope, antécédents familiaux NCA *Z81*
- substance psycho-active *F19.1*
- tabac *F17.1*
- - dans
- - - anamnèse *Z86.4*
- - - antécédents familiaux *Z81*
- tranquilisants *F13.1*
- vitamine *F55.4*

Abusif(ve)
- alcool *F10.1*
- divergence des yeux *H51.8*
- masturbation *F98.8*
- myoclonie fragmentaire *G25.3*
- onanisme *F98.8*
- somnolence *G47.1*
- succion du pouce, chez l'enfant *F98.8*
- tabac *F17.1*
- - cigarettes *F17.1*

Acalculie *R48.8*
- cours du développement (Dyscalculie) (développementale) *F81.2*

Acanthamibes
- kératite *B60.1+, H19.2**
- kératoconjonctivite (interstitielle) *B60.1+, H19.2**

Acanthamibiase (Amibiase à Acanthamoeba) *B60.1*
- avec kératite *B60.1+, H19.2**

Acanthamoebiose *B60.1*
- conjonctivite *B60.1+, H13.1**

Acanthocéphaliase *B83.8*

Acanthocéphalose *B83.8*

Acanthocytose *E78.6*

Acantholytique
- acantholyse *L11.9*
- dermatose *L11.9*
- - transitoire *L11.1*

Acanthome - *voir aussi* sous néoplasie b *D36.9*

Acanthome *voir aussi* Tumeur, selon local *D36.9*
- adéno- *C54.1*
- bénin *voir aussi* Tumeur bénigne *D36.9*
- cellules basales *D23.9*
- - visage *D23.3*
- kérato- *L85.8*
- - paupière *L85.8*
- malin *C80*
- mélano- *D23.9*

Acanthose *L83*
- acquise *L83*
- bénigne *Q82.8*
- congénital *Q82.8*
- langue *K14.3*

Acanthose –*suite*
- nigricans *L83*
- séborrhéique *L82*

Acare, affection *B86*

Acariase *B88.0*

Acariases, infestation *B88.0*

Acarien, sujet en contact avec (exposé à *Z20.7*

Acariens
- allergie *J30.3*
- dermite *B88.0+, L99.8**
- diarrhée *B88.0*
- fièvre *A75.3*
- infestation *B88.9*
- sputum *B88.0*

Acariens de Sumatra, fièvre *A75.3*

Acariose *B88.0*

Acarophobie *F40.2*

Acarus siro, acariase à *B88.0*

Acatalasémie (Déficit en catalase) *E80.3*

Acathésie induite par les neuroleptiques *G25.8*

ACC [arrêt cardiocirculatoire] *I46.9*

Accélération
- conduction, auriculo-ventriculaire *I45.6*
- croissance, pendant l'enfance *Z00.2*
- fréquence cardiaque *R00.0*
- respiration *R06.4*
- vitesse de sédimentation *R70.0*

Accélérée (maligne), hypertension *I10.90*

Accélérine, carence
- acquise *D68.4*

Accentuation, traits de personnalité *Z73*
- type A *Z73*

Accès *R56.8*
- atonique *G40.3*
- bronchique *J98.0*
- délirant *F23.0*
- fébrile *R56.0*
- goutte *M10.99*
- thoracique antérieur douloureux *R07.3*
- vasculaire, manipulation *Z45.29*

Accessoire *voir* sous maladie concernée

Accessoire, nerf crânien
- affection, NCA *G52.8*
- parésie, NCA *G52.8*

Accessoire, Shunt *Z49.0*

Accident *I64*
- anamnèse, surveillance de la grossesse *Z35.8*
- angiospastique *I64*
- - cérébral *I64*
- apoplectique *I64*
- - artère cérébrale
- - - moyenne *I64*
- - - postérieure *I64*
- - sur le territoire d'une artère cérébrale *I64*
- autre non précisé *X59.9!*
- avec
- - hypothermie *T68*
- - perte, dent *K08.1*
- cardiaque *I21.9*
- cardio-vasculaire *I21.9*
- cérébral *I64*

Accident –*suite*
- cérébral –*suite*
- - ancien *Z86.7*
- - apoplectique *I64*
- - ischémique *I63.9*
- cérébro-vasculaire *I64*
- - ancien *Z86.7*
- coronarien *I21.9*
- dû à
- - chaleur artificielle *W92.9!*
- - changement de pression athmosphérique *W94.9!*
- - contact avec des plantes ou animaux vénéneux *X29.9!*
- - courant électrique *W87.9!*
- - explosion à des forces mécanique d'objets animés *W64.9!*
- - explosion à des forces mécanique d'objets inanimés *W49.9!*
- - froid artificiel *W93.9!*
- - radiation *W91.9!*
- éléctrique *T75.4*
- encéphalomalacique *I63.9*
- hémorragique *R58*
- ingestion *T62.9*
- ischémique *I63.9*
- - apoplectique *I63.9*
- noyade *T75.1*
- surrénalien *E27.4*
- tronc cérébral *I64*
- vasculaire cérébral *I64*
- - ancien, ineffectif *Z86.7*
- - dans les antécédents familiaux *Z82*
- - paralytique *I64*
- - séquelles NCA *I69.4*
- - suites de couches *O99.4*
- - via
- - - embolie de l'artère
- - - - cérébrale *I63.4*
- - - - précérébrale *I63.1*
- - - saignement *I61.9*
- - - - cortical, dans l'hémisphère cérébral *I61.1*
- - - - dans
- - - - - tronc cérébral, *I61.3*
- - - - - cervelet, *I61.4*
- - - - intraventriculaire, intracérébral *I61.5*
- - - - sous-cortical, dans l'hémisphère cérébral *I61.0*
- - - thrombose
- - - - artère
- - - - - précérébrale, *I63.0*
- - - - - cérébrale, *I63.3*
- - - - non-purulente *I63.6*

Accidentel
- hémorragie
- - complication d'avortement *O08.1*
- - complication de grossesse, foetus, nouveau-né affecté par *P02.1*
- - précédant l'accouchement (antepartum) NCA *O46.9*
- souffle cardiaque *R01.0*
- - bénin (anodin) *R01.0*
- souffle systolique *R01.0*

Accidentellement
- déchirement, lors d'une intervention médicale, avec complication *T81.2*
- lacération, lorsque complication de l'opération *T81.2*

Accidentellement –*suite*
- ponction, lors d'une intervention médicale, avec complication *T81.2*
- ponction, lorsque complication de l'opération *T81.2*

Accolement
- paupière *H11.2*
- - congénital *Q10.3*
- péricarde, chronique, rhumatismale *I09.2*
- plèvre *J94.8*
- prépuce *N47*

Accommodati-f, -ve (lié à l'accommodatio
- asthénopie *H52.5*
- Strabisme convergent *H50.3*

Accommodation
- crampe (spasme) de *H52.5*
- insuffisance de *H52.5*
- - liée à l'âge *H52.4*
- paralysie de *H52.5*
- - hystérique *F44.88*
- parésie de *H52.5*
- trouble de *H52.5*
- - d'origine médicamenteuse (secondaire à médicament) *H52.5*
- - d'origine toxique *H52.5*

Accouchement *O80*
- anormal, affectant le foetus/nouveau né *P03.9*
- après terme *P08.2*
- - foetus/nouveau-né *P08.2*
- arrêt *O75.9*
- - cas de position transverse *O64.0*
- artificiel, avec lésion foetus/nouveau-né *P03.8*
- avant terme *P07.3*
- avant terme NCA *O60.1*
- avec
- - acidose, foetale *O68.3*
- - albuminurie *O12.1*
- - anoxie *P21.9*
- - antéversion, utérus *O34.5*
- - arythmie, foetale *O68.0*
- - Asphyxie *P21.9*
- - - grave *P21.0*
- - - légère *P21.1*
- - - modérée *P21.1*
- - aspiration suite à l'anésthésie *O74.0*
- - choc, foetus/nouveau-né NCA *P96.8*
- - cicatrice, utérus *O34.2*
- - collapsus, pulmonaire, suite à l'anésthésie *O74.1*
- - compression du foetus/nouveau-né *P15.9*
- - cystocèle *O34.8*
- - décélération, foetale *O68.0*
- - déchirure
- - - col utérin *O71.3*
- - - périnée *O70.9*
- - - - centrale *O70.9*
- - - - premier degré *O70.0*
- - - - quatrième degré *O70.3*
- - - - second degré *O70.1*
- - - - troisième degré *O70.2*
- - - périnée, légère *O70.0*
- - - tissu, péri-urétral *O71.5*
- - - urètre *O71.5*
- - - vagin, haute *O71.4*
- - - - sans déchirure, périnée *O71.4*

Accouchement –*suite*
- avec –*suite*
- - déchirure, symphyse pubienne *O71.6*
- - Décollement annulaire du col de l'utérus *O71.3*
- - détresse
- - - foetal, due à médication *O68.9*
- - - maternelle *O75.0*
- - diabète sucré *O24.9*
- - disjonction de la symphyse pubienne *O71.6*
- - douleurs, tête, après une rachianesthésie et une anesthésie péridurale *O74.5*
- - éclampsie *O15.1*
- - embolie *O88.2*
- - - cerveau *O88.2*
- - - septique *O88.3*
- - embolie gazeuse *O88.0*
- - embolie graisseuse *O88.8*
- - embolie par caillot sanguin *O88.2*
- - embolie, poumons *O88.2*
- - fibroïde *O34.1*
- - fibromyome, utérus *O34.1*
- - fièvre *O75.2*
- - forceps NCA *O81*
- - - avec rotation, par voie utérine *O81*
- - - échec d'une tentative *O66.5*
- - - par
- - - - voie basse *O81*
- - - - voie utérine *O81*
- - fracture, coccyx *O71.6*
- - hématome
- - - bassin *O71.7*
- - - périnée *O71.7*
- - - vagin *O71.7*
- - - vaginal *O71.7*
- - - vulve *O71.7*
- - hépatite virale *O98.4*
- - hypoxie *P21.9*
- - infection NCA *O75.3*
- - inversion de l'utérus *O71.2*
- - kyste
- - - bassin, féminin *O34.8*
- - - ovaire *O34.8*
- - lacération
- - - cérébrale *P10.8*
- - - cerveau *P10.8*
- - - organes pelviens *O71.5*
- - lésion
- - - bassin *O71.6*
- - - bassin, articulation *O71.6*
- - - coccyx *O71.6*
- - - conjonctive, de la *P15.3*
- - - cornée *P15.3*
- - - cuir chevelu *P12.8*
- - - foetus ou nouveau-né *P15.9*
- - - foetus ou nouveau-né, due à
- - - - rectocèle *P03.8*
- - - - tumeur
- - - - - bassin, *P03.8*
- - - - - col utérin, *P03.8*
- - - - - périnée, *P03.8*
- - - - - utérus, *P03.8*
- - - - - vagin, *P03.8*
- - - - - vulve, *P03.8*
- - - foetus, due à une sténose, vagin *P03.8*
- - - mère *O71.9*

Accouchement –*suite*
- avec –*suite*
- - lésion –*suite*
- - - nerf optique *P15.3*
- - - nerf phrénique *P14.2*
- - - orbite *P15.3*
- - - organes pelviens NCA *O71.5*
- - - paupière *P15.3*
- - - périnée *O71.8*
- - - - avec implication
- - - - - commissure postérieure des petites lèvres, *O70.0*
- - - - - lèvres, *O70.0*
- - - - - peau, *O70.0*
- - - - - vaginale, *O70.0*
- - - - - vulve, *O70.0*
- - - - légère *O70.0*
- - - rétinienne *P15.3*
- - - vessie *O71.5*
- - - visage *P15.4*
- - - vulve *O71.8*
- - lésion, symphyse, traumatique *O71.6*
- - luxation du globe oculaire *P15.3*
- - luxation, symphyse pubienne *O71.6*
- - maladie veineuse *O87.9*
- - maladie, infectieuse *O98.9*
- - malformation, organes pelviens NCA *O34.8*
- - malnutrition *O25*
- - mort
- - - due à une anesthésie *O74.8*
- - - subite, cause, inconnue *O95*
- - paralysie, nerf phrénique *P14.2*
- - période de dilatation prolongée *O63.0*
- - période d'expulsion prolongée *O63.1*
- - période d'expulsion, abrégée *O62.3*
- - position du foetus, anormale *O64.9*
- - position occipito-antérieure *O64.0*
- - position transverse, en profondeur *O64.0*
- - présentation de l'épaule *O64.4*
- - protéinurie *O12.1*
- - rétrécissement, col utérin *O34.4*
- - rétroversion de l'utérus *O34.5*
- - rigidité, plancher pelvien *O34.8*
- - rupture
- - - organes pelviens *O71.5*
- - - symphyse pubienne *O71.6*
- - - utérus *O71.1*
- - rupture, symphyse *O71.6*
- - rupture, symphyse pubienne, traumatique *O71.6*
- - septicémie *O75.3*
- - signes, détresse, foetale, décelés par
- - - électrocardiogramme *O68.8*
- - - ultrason *O68.8*
- - subinvolution utérine *O90.8*
- - syndrome de Mendelson *O74.0*
- - tétanos *A34*
- - thrombose
- - - cerveau *O99.4*
- - - veine du bassin *O87.1*
- - tumeur, ovaire, stromale *O34.8*
- - utérus, double *O34.0*
- césarienne *O82*
- - accouchement
- - - avec hystérectomie *O82*
- - - cas de danger pour la mère et l'enfant *O82*

Accouchement –*suite*
- césarienne –*suite*
- - avec lésion, foetus ou nouveau-né *P03.4*
- - avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.4*
- - cas de
- - - anomalie de position *O32.9*
- - - - foetus *O32.9*
- - - - organes pelviens NCA *O34.8*
- - - - utérus NCA *O34.5*
- - - anomalie, postion, foetus, NCA *O32.9*
- - - Antéversion de l'utérus *O34.5*
- - - atonie, utérus *O62.2*
- - - bassin, bouche, rétrécis *O33.2*
- - - - *O33.3*
- - - bassin, rétrécissement généralisé *O33.1*
- - - cardiopathie de la mère NCA *O99.4*
- - - cerclage *O34.39*
- - - cicatrice
- - - - col de l'utérus *O34.4*
- - - - utérus *O34.2*
- - - col utérin
- - - - anormal *O34.4*
- - - - rigide *O34.4*
- - - contractions utérus non coordonnées *O62.4*
- - - cystocèle *O34.8*
- - - décollement placentaire *O45.9*
- - - détresse
- - - - foetale *O36.3*
- - - - maternelle *O75.0*
- - - diabète sucré, maternel *O24.9*
- - - difformité
- - - - bassin NCA *O33.0*
- - - - organes pelviens NCA *O34.8*
- - - disproportion, foeto-pelvienne *O33.9*
- - - echec, accouchement NCA *O66.4*
- - - éclampsie *O15.0*
- - - faible, contractions *O62.2*
- - - - primaire *O62.0*
- - - - secondaire *O62.1*
- - - foetus, anormalement grand *O33.5*
- - - formation, sac, utérus, gravide *O34.5*
- - - grossesse multiple, avec anomalie de position *O32.5*
- - - hydrocéphalie, foetus *O33.6*
- - - incarcération, utérus *O34.5*
- - - insuffisance placentaire *O36.5*
- - - latéroversion, utérus *O34.5*
- - - malposition, utérus NCA *O34.5*
- - - méconium, dans le liquide amniotique *O36.3*
- - - naissance prolongée *O63.9*
- - - non-engagement, tête, à terme *O32.4*
- - - ouverture, absente, col utérin *O62.0*
- - - périnée, rigide *O34.7*
- - - - *O34.8*
- - - placenta praevia
- - - - avec hémorragie *O44.11*
- - - - sans hémorragie *O44.01*
- - - polype, col utérin *O34.4*
- - - position de l'enfant, anormal NCA *O32.9*
- - - position oblique *O32.2*
- - - prééclampsie *O14.9*

Accouchement –*suite*
- césarienne –*suite*
- - cas de –*suite*
- - - prématuré, foetal *O60.3*
- - - présentation du front *O32.3*
- - - présentation du menton *O32.3*
- - - présentation du siège *O32.1*
- - - présentation par l'épaule *O32.2*
- - - présentation transversale *O32.2*
- - - prolapsus
- - - - cordon ombilical *O69.0*
- - - - main *O32.2*
- - - - utérus *O34.5*
- - - prolapsus, bras *O32.2*
- - - rectocèle *O34.8*
- - - saignement
- - - - foeto-maternelle *O43.0*
- - - - intrapartum *O67.9*
- - - - prepartum *O46.9*
- - - siège *O32.1*
- - - sténose, col utérin *O34.4*
- - - suture de Shirodkar *O34.39*
- - - tumeur
- - - - col de l'utérus *O34.4*
- - - - organes pelviens NCA *O34.8*
- - - - tissu, bassin NCA *O34.8*
- - - utérus
- - - - anomalie congénitale *O34.0*
- - - - rétroversion *O34.5*
- - - vagin
- - - - anormal *O34.6*
- - - - rigide *O34.6*
- - - visage, position *O32.3*
- - - vulve
- - - - anormale *O34.7*
- - - - rigide *O34.7*
- - élective, accouchement *O82*
- - naissance
- - - avec hystérectomie *O82*
- - - cas de danger pour la mère et l'enfant *O82*
- - post mortem, avec lésion, foetus/nouveau-né *P01.6*
- - pour
- - - cerclage *O34.39*
- - - cystocèle *O34.8*
- - - méconium, dans le liquide amniotique *O36.3*
- - - non-engagement, tête, à terme *O32.4*
- - - placenta praevia, avec hémorragie *O44.11*
- - - sacculation, utérus gravide *O34.5*
- - - Shirodkar suture *O34.39*
- - - sténose, col utérin *O34.4*
- - précédent, avec cicatrice, avec prise en charge de la mère *O34.2*
- - précoce *O34.2*
- chirurgical avec lésion du fœtus/nouveau-né *P03.8*
- complication *O75.9*
- - accouchement, retardé *O63.9*
- - activité utérine, incoordonnée *O62.4*
- - adhérence, placenta *O72.0*
- - - sans hémorragie *O73.0*
- - altération, cordon ombilical *O69.9*
- - amputation, col utérin *O34.4*
- - anneau de contraction *O62.4*
- - anneau de rétraction, utérus, pathologique *O62.4*

Accouchement –*suite*
- complication –*suite*
- - anomalie de présentation
- - - col utérin *O65.5*
- - - placenta, sans hémorragie *O44.00*
- - - utérus *O65.5*
- - anomalie, placenta NCA *O43.1*
- - anomalie, rythme cardial, foetal *O68.0*
- - antéversion utérus sacciforme gravide *O34.5*
- - apoplexie, cérébrale *O99.4*
- - après
- - - accouchement par césarienne, antérieure *O75.7*
- - - intervention, chirurgicale, gynécologique, antérieure NCA *O34.8*
- - atonie, utérus *O62.2*
- - atrésie, col utérin *O34.4*
- - avec
- - - déchirure, périnée
- - - - muscles vaginaux *O70.1*
- - - - vagin *O70.0*
- - - déchirure, sphincter anal, avec
- - - - muqueuse anale *O70.3*
- - - - muqueuse rectale *O70.3*
- - - intervention, chirgurgicale
- - - - col utérin, antérieure *O34.4*
- - - - périnée, antérieure *O34.7*
- - - - utérus, antérieure *O34.2*
- - - - vagin, antérieure *O34.6*
- - - - vulve, antérieure *O34.7*
- - - rétention, placenta avec hémorragie *O72.0*
- - cicatrice, col utérin *O34.4*
- - compression, cordon ombilical *O69.2*
- - contraction en sablier, utérus *O62.4*
- - contraction, utérus *O62.4*
- - contractions, anormales *O62.9*
- - contracture, utérine, anormale *O62.9*
- - contusion, cordon ombilical *O69.5*
- - cordon ombilical, court *O69.3*
- - déchirure
- - - anus *O70.2*
- - - col utérin *O71.3*
- - - intestin *O71.5*
- - - péritoine *O71.5*
- - - plancher pelvien *O70.1*
- - - urètre *O71.5*
- - - utérus *O71.1*
- - - vessie *O71.5*
- - déchirure, périnée *O70.0*
- - décollement placentaire NCA *O45.8*
- - décollement, placenta *O45.9*
- - déformation, foetale *O66.3*
- - détresse, foetale *O68.9*
- - diastasis
- - - muscles grands droits (de l'abdomen) *O71.8*
- - - pubis *O71.6*
- - - symphyse *O71.6*
- - diastasis des grands droits *O71.8*
- - due à
- - - anomalie, rythme cardiaque, foetal, avec méconium dans le liquide amniotique *O68.2*
- - - déchirure, muqueuse anale *O70.3*
- - - détresse foetale, signes biochimiques *O68.3*
- - - dilatation, vessie *O66.8*

Accouchement –*suite*
- complication –*suite*
- - due à –*suite*
- - - dysfonction, utérus hypotonique
- - - - primitive *O62.0*
- - - - secondaire *O62.1*
- - - fréquence cardiaque, foetale, anormale, avec méconium, dans le liquide amniotique *O68.2*
- - - hémorragie, due à
- - - - afibrinogénémie *O67.0*
- - - - défaut de coagulation *O67.0*
- - - - hyperfibrinolyse *O67.0*
- - - - hypofibrinogénémie *O67.0*
- - - hypotonie, travail
- - - - primitive *O62.0*
- - - - secondaire *O62.1*
- - - léiomyome, utérus, avec hémorragie *O67.8*
- - - méconium, dans le liquide amniotique *O68.1*
- - - placenta
- - - - décollement prématuré *O45.9*
- - - - implantation basse, avec hémorragie *O44.10*
- - - - position anormale *O44.10*
- - - - praevia, avec hémorragie *O44.11*
- - - traumatisme, avec hémorragie *O67.8*
- - dysfonction
- - - utérus NCA *O62.9*
- - - - hypertonique NCA *O62.4*
- - - - hypotonique NCA *O62.2*
- - dystocie, cervicale *O62.0*
- - éclampsie *O15.1*
- - embolie *O88.2*
- - - amniotique *O88.1*
- - enroulement, cordon ombilical *O69.2*
- - hématome
- - - cordon ombilical *O69.5*
- - - épine ischiatique *O71.7*
- - hémorragie *O67.9*
- - - cerveau *O99.4*
- - - cordon ombilical *O69.5*
- - - intracérébrale *O99.4*
- - - placenta NCA *O67.8*
- - hypertension *O16*
- - hypertonie utérine *O62.4*
- - hypotonie, travail *O62.2*
- - inertie utérine *O62.2*
- - - primitive *O62.0*
- - - secondaire *O62.1*
- - insertion vélamenteuse, cordon ombilical *O69.8*
- - insuffisance cardiaque *O75.4*
- - lacération
- - - anus *O70.2*
- - - - avec déchirure
- - - - - muqueuse anale, *O70.3*
- - - - - muqueuse rectale, *O70.3*
- - - commissure postérieure des petites lèvres *O70.0*
- - - lèvres *O70.0*
- - - périnée, centrale *O70.9*
- - - recto-vaginale *O71.4*
- - - vagin *O71.4*
- - - vulve *O70.0*
- - lésion
- - - bassin *O70.1*
- - - coccyx *O71.6*

Accouchement –*suite*
- complication –*suite*
- - lésion –*suite*
- - - obstétricale *O71.9*
- - - organes pelviens *O71.5*
- - - tissu, péri-urétral *O71.5*
- - - vaisseau, cordon ombilical *O69.5*
- - maladie
- - - cérébrovasculaire *O99.4*
- - - placenta *O43.9*
- - malformation
- - - cordon ombilical NCA *O69.8*
- - - placenta NCA *O43.1*
- - membrane retenue, avec hémorragie *O72.2*
- - mort, due à une anesthésie *O74.8*
- - noeud, cordon ombilical *O69.2*
- - organes génitaux, infantiles *O34.8*
- - pénétration, instrument, utérus, gravide *O71.1*
- - placenta
- - - accreta *O72.0*
- - - - sans hémorragie *O73.0*
- - - adhérent *O72.0*
- - - - sans hémorragie *O73.0*
- - - increta *O72.0*
- - - - sans hémorragie *O73.0*
- - - percreta *O72.0*
- - - - sans hémorragie *O73.0*
- - placenta, implantation basse, sans hémorragie *O44.00*
- - présentation de la face *O64.2*
- - présentation du front *O64.3*
- - présentation du siège *O64.1*
- - prolapsus
- - - bras *O32.2*
- - - jambe *O32.1*
- - - main *O32.2*
- - - pied *O32.1*
- - - utérus *O34.5*
- - prolapsus, cordon ombilical *O69.0*
- - prolongation, travail *O63.9*
- - rétention
- - - chorion *O72.2*
- - - délivrance
- - - - partielle *O72.2*
- - - - - sans hémorragie, *O73.1*
- - - - sans hémorragie *O73.0*
- - - placenta *O72.2*
- - - - avec hémorragie *O72.0*
- - - - sans hémorragie *O73.0*
- - rétrécissement, col utérin *O65.5*
- - rupture
- - - col utérin *O71.3*
- - - cordon ombilical *O69.8*
- - - organes pelviens *O71.5*
- - - sphincter anal *O70.2*
- - - urètre *O71.5*
- - - utérus *O71.1*
- - - vagin *O71.4*
- - - vessie *O71.5*
- - rupture de la poche des eaux, prématurée *O42.9*
- - siège *O64.1*
- - spasme, col utérin *O62.4*
- - sténose, col utérin *O65.5*
- - thrombose
- - - cordon ombilical *O69.5*
- - - veine ombilicale *O69.5*

Accouchement –*suite*
- complication –*suite*
- - torsion, cordon ombilical *O69.8*
- - traumatisme NCA *O71.9*
- - traumatisme obstétrical, mère *O71.9*
- - tumeur
- - - organes pelviens NCA *O65.5*
- - - tissu conjonctif pelvien NCA *O65.5*
- - utérus de Couvelaire *O45.8*
- - utérus, infantile *O34.5*
- - vasa praevia *O69.4*
- complications
- - anesthésie, de l' *O74.9*
- - cardiaques, suite à l'anesthésie *O74.2*
- - dans les antécédents personnels *Z87.5*
- - pulmonaire, suite à l'anesthésie *O74.1*
- - système nerveux central, suite à l'anesthésie *O74.3*
- compliqué *O66.9*
- - avec lésion foetus/nouveau-né *P03.1*
- - immunodéficience humaine *O98.7*
- - par
- - - anomalie
- - - - bassin de la mère *O65.9*
- - - - foetus *O66.3*
- - - - organes pelviens maternels *O65.5*
- - - - utérus *O65.5*
- - - antéversion
- - - - col utérin *O65.5*
- - - - utérus *O65.5*
- - - bassin
- - - - androïde avec disproportion foeto-pelvienne *O65.3*
- - - - généralement rétréci *O65.1*
- - - - pithécoïde, avec disproportion foeto-pelvienne *O65.0*
- - - - plat, avec disproportion foeto-pelvienne *O65.0*
- - - bassin en entonnoir, avec diproportion foeto-pelvienne *O65.3*
- - - cicatrice
- - - - col utérin *O34.4*
- - - - - *O65.5*
- - - contracture du bassin, avec disproportion foeto-pelvienne *O65.1*
- - - cystocèle *O65.5*
- - - déformation
- - - - bassin *O65.0*
- - - - foetus *O66.3*
- - - déformation du bassin, avec disproportion dystocique *O65.0*
- - - disproportion céphalo-pelvienne *O65.4*
- - - dystocie des épaules *O66.0*
- - - fibrome, utérus *O65.5*
- - - fibromyome, utérus *O65.5*
- - - fibrose, périnée *O65.5*
- - - foetus
- - - - anormalement gros *O66.2*
- - - - exceptionnellement grand *O66.2*
- - - hydrocéphalie, foetus *O66.3*
- - - incarcération, utérus gravide *O65.5*
- - - jumeaux
- - - - accrochage *O66.1*
- - - - blocage *O66.1*
- - - kyste
- - - - bassin *O65.5*
- - - - ovaire *O65.5*
- - - latéroversion
- - - - col utérin *O65.5*

Accouchement –*suite*
- compliqué –*suite*
- - par –*suite*
- - - latéroversion –*suite*
- - - - utérus *O65.5*
- - - malformation
- - - - périnée *O65.5*
- - - - vaginale *O65.5*
- - - - vulve *O65.5*
- - - malformation, organes pelviens, avec lésions du foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - malformation, rachis lombaire, avec disproportion foeto-pelvienne *O65.0*
- - - malposition, utérus NCA *O65.5*
- - - myéloméningocèle du foetus *O66.3*
- - - polype
- - - - col utérin *O65.5*
- - - - utérus *O65.5*
- - - position anormale *O64.9*
- - - - complexe *O64.5*
- - - position des pieds *O64.8*
- - - position du foetus
- - - - occipito-illiaque, persistante *O64.0*
- - - - occipito-transverse, persistante *O64.0*
- - - - sacro-occipitale, persistante *O64.0*
- - - position transverse persistante *O64.0*
- - - posture anormale *O64.9*
- - - présentation anormale *O64.9*
- - - présentation du front *O64.3*
- - - présentation du menton *O64.2*
- - - présentation du siège *O64.1*
- - - présentation foetale de l'épaule *O64.4*
- - - présentation oblique *O64.4*
- - - présentation par la tête *O64.8*
- - - présentation par le siège
- - - - arrière, persistante *O64.0*
- - - - avant, persistante *O64.0*
- - - présentation transverse *O64.4*
- - - prolapsus
- - - - bras *O64.4*
- - - - jambe *O64.8*
- - - - main *O64.4*
- - - - utérus *O65.5*
- - - prolapsus, jambe *O64.8*
- - - rectocèle *O65.5*
- - - rétrécissement
- - - - bassin détroit inférieur et moyen *O65.3*
- - - - détroit supérieur du bassin *O65.2*
- - - rétroversion
- - - - col utérin *O65.5*
- - - - utérus *O65.5*
- - - rétroversion de l'utérus *O65.5*
- - - rigidité
- - - - col utérin *O65.5*
- - - - périnée *O65.5*
- - - - plancher pelvien *O65.5*
- - - - vagin *O65.5*
- - - - vulve *O65.5*
- - - siège, présentation par le *O64.1*
- - - - *O64.8*
- - - spondylolyse, sacro-lombaire *O65.8*
- - - spondylose, avec disproportion foeto -pelvienne *O65.0*
- - - sténose *O65.5*
- - - - col utérin *O65.5*

Accouchement –*suite*
- compliqué –*suite*
- - par –*suite*
- - - sténose –*suite*
- - - - vaginale *O65.5*
- - - tératome sacro-coccygien du foetus *O66.3*
- - - tête non engagée *O64.8*
- - - torsion, vertèbres lombaires, avec disproportion foeto-pelvienne *O65.0*
- - - tumeur
- - - - bassin NCA *O65.5*
- - - - col utérin *O65.5*
- - - - foetus *O66.3*
- - - - périnée *O65.5*
- - - - utérus, survenant au cours de la grossesse *O65.5*
- - - - vaginale, survenant au cours de la grossesse *O65.5*
- - - - vulvaire, survenant au cours de la grossesse *O65.5*
- - - utérus
- - - - bicorne *O65.5*
- - - - duplex *O65.5*
- - - vagin, rigide *O65.5*
- - - visage, position du *O64.2*
- - - vulve rigide *O65.5*
- - VIH *O98.7*
- déclenchement
- - avec lésion du foetus/nouveau-né *P03.8*
- - chirurgical, échoué *O61.1*
- - échoué *O61.9*
- - - par
- - - - ocytocine *O61.0*
- - - - prostaglandines *O61.0*
- - instrument, échoué *O61.1*
- - mécanique, échoué *O61.1*
- - médicamenteux, échoué *O61.0*
- difficile, anamnèse influençant le déroulement de la grossesse *Z35.2*
- domicile *Z38.1*
- échec d'une tentative *O66.4*
- et travail, avec
- - choc *O75.1*
- - collapsus, circulation *O75.1*
- - complication *O75.9*
- - - due à sédation *O74.9*
- - hypotension *O75.8*
- - trouble du métabolisme *O75.8*
- forcé avec lésion foetus/nouveau-né *P03.8*
- forceps *O81*
- - avec lésion foetus/nouveau-né *P03.2*
- hémorragie antérieure *O46.9*
- hors mariage *Z64.0*
- instrumentale,nécessitant manoeuvre, avec lésion foetus/nouveau-né *P03.8*
- Jumeaux prématurés *P07.3*
- jumeaux, bloqués *O66.1*
- mort NCA *P95*
- multiples
- - hors de l'hopital *Z38.7*
- - l'hôpital *Z38.6*
- multiples, avec lésion foetus/nouveau-né *P01.5*
- non souhaitée *Z64.0*
- normal *O80*
- nouveau-né
- - hors d'un hôpital *Z38.1*

Accouchement –*suite*
- nouveau-né –*suite*
- - l'hôpital *Z38.0*
- obstruction *O66.9*
- - due à
- - - anomalie du bassin *O65.9*
- - - tissus mous du bassin *O65.5*
- par
- - césarienne *O82*
- - - avec hystérectomie *O82*
- - - cas de danger pour la mère et l'enfant *O82*
- - - élective *O82*
- - forceps *O81*
- - - avec antécédent, dans l'anamnèse, ayant une influence sur le déroulement de la grossesse *Z35.2*
- - - avec lésion sur le foetus/nouveau-né *P03.2*
- - Forceps NCA *O81*
- - - avec rotation, par voie utérine *O81*
- - - échec d'une tentative *O66.5*
- - - par
- - - - voie basse *O81*
- - - - voie utérine *O81*
- - Ventouse *O81*
- - ventouse et forceps, extraction combninée par *O81*
- - ventouse NCA *O81*
- - ventouse obstétricale NCA *O81*
- précipité *O62.3*
- - affectant le foetus/nouveau né *P03.5*
- - avec contractions *O62.3*
- prématuré *O60.0*
- - *O60.1*
- prématuré NCA *O60.1*
- - avec antécédents
- - - affectant la surveillance d'une grossesse *Z35.2*
- - - affectant le déroulement de la grossesse *Z35.2*
- - avec ictère, néonatal *P59.0*
- - sans travail *O60.3*
- prématuré, avec ictère chez les nouveaux-nés *P59.0*
- prolongation *O63.9*
- - deuxième période *O63.1*
- - première période *O63.0*
- prolongation du travail, avec césarienne *O63.9*
- prolongé NCA *O63.9*
- - compliqué *O63.9*
- - deuxième jumeau *O63.2*
- - suite à
- - - rupture artificielle de la poche des eaux *O75.5*
- - - Rupture des membranes *O75.6*
- retard NCA *O63.9*
- - avec lésion foetus/nouveau-né *P03.9*
- - deuxième jumeau *O63.2*
- retardé NCA *O63.9*
- - après
- - - rupture artificielle de la poche des eaux *O75.5*
- - - rupture de la poche des eaux *O75.6*
- - cas d'épanchement, liquide amniotique *O75.6*
- sans complication *O80*
- siège, avec lésions, foetus ou nouveau-né *P03.0*
- spontané *O80*

Accouchement *–suite*
- spontané *–suite*
- - avec
- - - présentation céphalique *O80*
- - - présentation du siège *O80*
- - présentation du sommet *O80*
- - unique *O80*
- spontané, avant la fin de la 37ème semaine de grossesse *O60.1*
- tentative, échec, suivi d'une césarienne NCA *O66.4*
- unique *O80*
- vaginal, après accouchement par opération césarienne, antérieure *O75.7*
- vaginale (par voie), unique, spontanée *O80*

Accouchement associé à
- abcès, mammaire, avec difficulté à la mise au sein *O91.11*
- crevasse, mamelon, avec difficulté à la mise au sein *O92.11*
- décès
- - an ou plus après l'accouchement *O97*
- - entre 42 jours et un an après l'accouchement *O96*
- diabète sucré *O24.4*
- - avec lésion, foetus/nouveau né *P70.0*
- fistule
- - mammaire, due à une mastite *O91.10*
- - sein, due à une mastite *O91.10*
- galactophorite *O91.20*
- hémorragie, mère, avec lésion, foetus *P02.1*
- infection mammaire *O91.10*
- infection, mamelon, avec difficulté lors de la mise au sein *O91.01*
- inflammation
- - mamelon *O91.00*
- - mammaire *O91.20*
- invagination, mamelon *O92.00*
- lymphadénite
- - mammaire *O91.20*
- - purulent, mammaire *O91.10*
- lymphangite mammaire *O91.20*
- Mastite *O91.20*
- - interstitielle *O91.20*
- - non purulente, avec difficulté à la mise au sein *O91.21*
- - parenchymateuse *O91.20*
- oedème avec protéinurie *O12.2*
- Thélite *O91.00*

Accoutumance aux laxatifs *F55.1*

Accretio
- cordis *I31.0*
- pericardii *I31.0*

Accumulation
- air, pneumothorax *J93.9*
- eau
- - articulation *M25.49*
- - cavité abdominale *R18*
- - cavité thoracique *J94.8*
- fer, avec anémie, hypochrome *D64.3*
- graisse *E75.6*
- hémosidérine *E83.1*
- mélanine *L81.4*

Accumulation de phosphate *E83.38*

Acéphalie *Q00.0*

Acéphalobrachie *Q89.8*

Acéphalochirie *Q89.8*

Acéphalogastrie *Q89.8*

Acéphalostomie *Q89.8*

Acéphalothorax *Q89.8*

Acétazolamide, intoxication *T50.2*

Acétone, dermite de contact, allergique *L24.2*

Acétonémie *R79.8*
- associée à
- - diabète sucré *E14.11*
- - diabète sucré de type I *E10.11*
- - diabète sucré de type II *E11.11*

Acétonémique(s), vomissements *R11*

Acétonurie *R82.4*

AC-globuline Carence en *D68.22*

AC-globuline, carence
- acquise *D68.4*

Achalasie *K22.0*
- cardia *K22.0*
- congénitale *Q39.5*
- l'oesophage *K22.0*
- l'uretère *N28.8*
- pylore *Q40.0*

Achillodynie *M76.6*

Achlorhydrie *K31.88*
- neurogène *K31.88*
- psychogène *F45.31*
- secondaire, suite à une vagotomie *K91.1*

Achlorhydrique
- anémie *D50.8*
- diarrhée *K31.88*

Achloroblepsie *H53.5*

Acholie *K83.1*

Acholurique, ictère
- acquis *D59.8*
- familial *D58.0*

Achondrogenèse *Q77.0*

Achondroplasie *Q77.4*

Achondroplasie [chondrogenèse imparfaite *Q77.4*

Achrestique, anémie *D53.1*

Achromatique
- mélanome *C43.9*
- naevus *D22.9*

Achromatopsie *H53.5*
- acquise *H53.5*
- congénitale *H53.5*

Achromatopsie rouge-vert *H53.5*

Achromie *E70.3*

Achromiques et hyperchromiques, lésions *A67.3*

Achylie *K31.88*
- gastrique *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- - réfractaire *K31.88*
- pancréatique *K86.8*

Achylique, anémie chlorotique *D50.8*

Aciclovir (DCI)
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Acide
- corrosion *T30.4*
- - cornée, yeux *T26.6*

Acide *–suite*
- dermite de contact, toxique *L24.5*
- intoxication *T41.5*
- manque *R09.0*
- - grande quantité *T70.2*
- - systémique *T71*
- - - due à handicap, respiration, mécanique *T71*

Acide aminé
- anomalie du transport *E72.0*
- - aromatique, anomalie(s) du métabolisme *E70.9*
- anomalie(s) du métabolisme *E72.1*
- - *E72.9*
- - avec anémie *D53.0*
- - carence *E72.9*
- - - avec anémie *D53.0*
- - chaîne ramifiée
- - - anomalie(s) du métabolisme *E71.2*
- - congénital *E72.9*
- - néonatal, transitoire *P74.8*
- - - trouble(s) d'élimination *E71.1*
- anomalies de transport *E72.0*
- - avec néphrosclérose *E72.0+, N29.8**
- - non ramifié, métabolisme, anomalie(s) *E72.8*

Acide aminé métabolisme, trouble *E72.8*

Acide amino-salycilique
- hypothyroïdie *E03.2*
- Hypothyroïdisme *E03.2*

Acide ascorbique, carence *E54*

Acide basique, équilibre, trouble, mixte *E87.4*

Acide basique, foetus, trouble, lors de *O68.3*

Acide chlorydrique, effet, toxique *T54.2*

Acide citrique
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Acide D-lysergique, diéthylamide [LSD], *F16.2*

Acide gras
- essentiel, carence *E63.0*
- trouble du métabolisme *E71.3*

Acide lactique déshydrogénase, augmentat *R74.0*

Acide lysergique, dépendance *F16.2*

Acide nicotinique
- carence *E52*
- intoxication *T46.7*

Acide nicotinique, carence *E52*

Acide silicique
- granulome cutané *L92.3*
- pneumoconiose NCA *J62.8*

Acide sorbique
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Acide sulfurique, effet toxique *T54.2*

Acide tropique
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Acide urique
- augmentation *E79.0*
- cristallisation *R82.9*
- diathèse *M10.99*
- intoxication médicamenteuse *T50.4*

Acide, indigestion *K30*

Acidémie *E87.2*
- argino-succinique *E72.2*
- foetale, prise en charge de la future mère *O36.3*
- pipécolique *E72.3*

Acidémie arginino-succinique *E72.2*

Acidémie isovalérique *E71.1*

Acidémie méthylmalonique *E71.1*

Acidémie pipécolique *E72.3*

Acidémie propionique *E71.1*

Acidité gastrique, affection *K31.88*
- psychogène *F45.31*

Acidité psychogène *F45.31*

Acido-basophile
- adénome *D35.2*
- carcinome, mixte *C75.1*

Acido-basophile, carcinome mixte *C75.1*

Acidocétose NCA *E87.2*
- alcoolique *E87.2*
- associée à
- - diabète sucré *E14.11*
- - - insulinodépendant primaire *E10.11*
- - - non insulinodépendant primaire *E11.11*
- - diabète sucré de type 1 *E10.11*
- - - insulinodépendant *E10.11*
- - diabète sucré de type 2 *E11.11*
- - - insulinodépendant *E11.11*
- - - non insulinodépendant *E11.11*

Acidophile
- adénocarcinome *C75.1*
- adénome *D35.2*
- carcinome *C75.1*

Acidose *E87.2*
- associée à
- - diabète sucré *E14.11*
- - diabète sucré de type I *E10.11*
- - diabète sucré de type II *E11.11*
- foetale *P20.9*
- - lors de l'accouchement *O68.3*
- intra-utérine *P20.9*
- lactique *E87.2*
- métabolique NCA *E87.2*
- provoquée par l'alcool *E87.2*
- rénale *N25.8*
- respiratoire *E87.2*
- tardive, métabolique, chez le nouveau-né *P74.0*
- tubulaire
- - distale *N25.8*
- - rénale *N25.8*
- - - type I *N25.8*

Acidurie 4-hydroxybutyrique *E88.8*

Acidurie arginino-succinique *E72.2*

Acidurie argino-succinique *E72.2*

Acidurie glutarique *E72.2*

Acinetobacter
- agent *B96.5!*
- infection *A49.8*

Acineuses, cellules
- adénocarcinome *C80*
- adénome *D36.9*

Acné *L70.9*
- androgène *L70.8*
- androgénétique *L70.8*

Acné –*suite*
- artificielle *L70.8*
- atrophique *L70.2*
- bromique *L70.8*
- cachecticorum *L70.8*
- chéloïde *L73.0*
- chez le nouveau-né *L70.4*
- chlorique *L70.8*
- comédons *L70.0*
- conglobata *L70.1*
- décalvante *L66.2*
- excoriée *L70.5*
- - jeunes filles *L70.5*
- goudron *L70.8*
- huile *L70.8*
- huileuse *L70.8*
- indurée *L70.0*
- infantile *L70.4*
- iodique *L70.8*
- juvénile *L70.0*
- kystique *L70.0*
- nécrotique *L70.2*
- - miliaire *L70.2*
- nodulaire *L70.0*
- nouveau né *L70.4*
- papuleuse *L70.0*
- papulo-pustuleuse *L70.0*
- picealis *L70.8*
- professionnelle *L70.8*
- pustuleuse *L70.0*
- rosacée *L71.9*
- stéroïde *L70.8*
- stéroïdes, des *L70.8*
- tropicale *L70.3*
- varioliforme *L70.2*
- vulgaire *L70.0*
- - conglobata *L70.1*
- - infantile *L70.4*

acnéiforme Érythème *L66.4*

Acnéiforme, dermatite *L30.8*

Acnitis *A18.4*
- primaire *A18.4*

Acontractile, vessie *N31.81*

Acontractilité, muscle de la vessie, non *N31.81*

Acouphènes *H93.1*

Acoustique, nerf, neurilemmome *voir* neur *D33.3*
- malin *C72.4*

Acoustique, nerf, neurinome *D33.3*

acquis
- auriculaire Déformation *H61.1*
- pavillon oreille Déformation *H61.1*
- pur
- - chronique Aplasie médullaire [anémie aplastique] *D60.0*
- - sans précision Aplasie médullaire [anémie aplastique] *D60.9*
- - transitoire Aplasie médullaire [anémie aplastique] *D60.1*
- trouble coagulation sanguin durablement *U69.11!*

Acquis(e) - *voir* sous type de maladie

Acrânie *Q00.0*

Acridine (dérivés d -)
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Acrocéphale *Q75.0*

Acrocéphalopolysyndactylie, syndrome *Q87.0*
- syndrome de Carpenter *Q87.0*

Acrocéphalosyndactylie, syndrome *Q87.0*
- syndrome d'Apert *Q87.0*

Acrochordon *Q82.8*
- anus *K64.4*

Acrochordon congénital *Q82.8*

Acrocyanose *I73.8*
- chez le nouveau-né *P28.2*
- chronique *I73.8*

Acrodermatite *L30.8*
- chronique atrophiante *L90.4*
- - Herxheimer (Pick-Herxheimer) *L90.4*
- continue
- - purulente (suppurative) *L40.2*
- - pustuleuse *L40.2*
- entéropathique *E83.2*
- Hallopeau *L40.2*
- papuleuse (érythémato-) infantile *L44.4*
- perstans *L40.2*

Acrodynie *T56.1*
- consécutive à intoxication au mercure (infantile) *T56.1*

Acrodynie ou maladie rose *T56.1*

Acrokératose verruciforme *Q82.8*

Acrolentigineux (acral), mélanome, malin *C43.9*

Acromégalie *E22.0*
- avec
- - arthrite *E22.0+, M14.5**
- - arthropathie *E22.0+, M14.5**
- par hypersécrétion du lobe antérieur de l'hypophyse *E22.0*

Acromélalgie *I73.8*

Acromicrie *Q79.8*

Acromio-claviculaire
- infection *M00.91*
- luxation *S43.1*

Acromion, fracture *S42.12*

Acroparesthésie *I73.8*
- simple, type Schultze *I73.8*
- vasomotrice *I73.8*
- vasomotrice, type Nothnagel *I73.8*

Acrophobie *F40.2*

Acrosarcome *C46.9*

Acrosclérose *M34.8*

Acte obsessionnel *F42.1*
- prépondérant *F42.1*

Actes obsessionnels prépondérants *F42.1*

ACTH (hormone adrénocorticotrope)
- allergie *T88.7*
- hypersécrétion
- - hypophyse *E24.0*
- - non liée à la maladie de Cushing *E27.0*
- hypersensibilité *T88.7*
- hyposécrétion *E23.0*
- sécrétion ectopique par tumeur, avec syndrome de Cushing *E24.3*
- surproduction *E27.0*
- syndrome de sécrétion extrahypophysaire *E24.3*

Actif, active *voir* sous la maladie conce

Actinique
- chéilite *L56.8*

Actinique –*suite*
- chéilite –*suite*
- - liée à
- - - autre que rayons solaires *L59.8*
- - - rayons solaires *L56.8*
- dermatite, liée à
- - autre que rayons solaires *L59.8*
- - rayons solaires *L57.8*
- élastose, NCA *L57.4*
- élastose, sénile *L57.4*
- granulome *L57.5*
- kératite *H16.1*
- kératose *L57.0*
- otite externe, aiguë *H60.5*
- précancérose *D04.9*
- réticulose *L57.1*

Actinobacillose *A28.8*

Actinobacillus actinomycetum comitans, i *A28.8*

Actinomyces israelii, infection *A42.9*

Actinomycètes, alvéolite allergique (A.t *J67.7*

Actinomycétome *B47.1*

Actinomycose *A42.9*
- avec
- - canaliculite *A42.8+, H06.0**
- - encéphalite *A42.8+, G05.0**
- - méningite *A42.8+, G01**
- - méningoencéphalomyélite *A42.8+, G05.0**
- - pneumonie *A42.0+, J17.0**
- - septicémie *A42.7*
- cervico-faciale *A42.2*
- cutanée *A42.8*
- gastro-intestinale *A42.1*
- pulmonaire *A42.0*

Actinomycotique (actinomycosique)
- ganglion *A42.9*
- nodule *A42.9*
- septicémie *A42.7*

active voie intraveineuse Consommation d ' Autre substance psycho - *U69.32!*

Activité
- catatonie *F06.1*
- fonctionnelle diminuée *R68.8*
- hypersplénisme *D73.1*

Activité cardiaque irrégulière *I49.9*

Activité et attention, trouble de *F90.0*
- avec hyperkinésie *F90.0*

Acuité auditive
- baisse, due à
- - anomalie de l'oreille *Q16.9*
- - dégénérescence congénitale du labyrinthe *Q16.5*
- - hypoplasie du conduit auditif *Q16.9*
- - malposition (de)
- - - conduit auditif, congénitale *Q16.9*
- - - oreille, congénitale *Q16.9*
- examen *Z01.1*
- perte *H91.9*
- - acquise *H91.9*
- - congénitale *H91.9*
- problème *H91.9*

Acyanopsie *H53.5*

Acyanotique, cardiopathie *Q24.9*
- congénitale *Q24.9*

Acyclique, menstruations *N92.6*

Acystie *Q64.5*

ADA - Déficit en adénosine-désaminase *D81.3*

Adactylie
- doigt *Q71.3*
- d'orteil *Q72.3*

Adamantinoblastome *D16.5*

Adamantinome *D16.5*
- malin *C41.1*
- maxillaire *D16.42*
- - malin *C41.02*
- maxillaire inférieur *D16.5*
- - malin *C41.1*
- os de la mâchoire inférieure *D16.5*
- os long *C40.9*
- tibia *C40.2*

Adam-Stokes, crise d' *I45.9*
- Morgagni *I45.9*

Adaptation manipulation
- Autre dispositif cardiaque (électroniques) , *Z45.08*
- défibrillateur cardiaque implanté , *Z45.01*
- stimulateur cardiaque implanté , *Z45.00*
- système assistance cardiaque , *Z45.02*

Adaptation à l'obscurité, pathologique *H53.6*

Addison(-Biermer), anémie d' *D51.0*

Addison, anémie d' *D51.0*
- Biermer-Ehrlich *D51.0*
- Hunter *D51.0*

Addison, chéloïde d' *L94.0*

Addison, crise d' *E27.2*

Addison, maladie d' *E27.1*
- avec myopathie *E27.1+, G73.5**
- tuberculeuse *A18.7+, E35.1**

Addison-Schilder, maladie d' *E71.3*

Additif alimentaire, hypersensibilité *T78.1*

Additifs alimentaires, hypersensibilité *T78.1*

Adducteurs
- claquage, cuisse *S76.2*
- contracture *M24.59*

Adénine-phosphoribosyl-transférase, manq *E79.8*

Adénite *I88.9*
- aiguë *L04.9*
- axillaire *I88.9*
- - aiguë *L04.2*
- - chronique *I88.1*
- - subaiguë *I88.1*
- Bartholin (glandes de) *N75.8*
- bulbo-urétrale, glande *N34.2*
- cervicale *I88.9*
- - aiguë *L04.0*
- - chronique *I88.1*
- - subaiguë *I88.1*
- chancrelleuse, par bacille de Ducrey (haemophilus ducreyi) *A57*
- chronique *I88.1*
- Cowper glande de *N34.2*
- épidémique, aiguë *B27.0*
- gangrenée *L04.9*
- glande
- - sous-mandibulaire, purulente *K11.2*
- - sublinguale, purulente *K11.2*

Adénite –*suite*
- glande salivaire *K11.2*
- glande urétrale *N34.2*
- gonorrhéique, NCA *A54.8*
- inguinale *I88.9*
- - aiguë *L04.1*
- - chronique *I88.1*
- - subaiguë *I88.1*
- inoculation *A28.1*
- lacrymale *H04.0*
- mésentérique
- - aiguë *I88.0*
- - chronique *I88.0*
- - non spécifique *I88.0*
- par inoculation *A28.1*
- parotide, purulente *K11.2*
- Skene, conduits de la glande de *N34.2*
- subaiguë *I88.1*
- tuberculeuse *A18.2*
- - scrofuleux *A18.2*

Adéno-acanthome du sein *C54.1*

Adéno-améloblastome *D16.5*
- mâchoire supérieure *D16.42*
- mandibule ou maxillaire inférieur *D16.5*

Adénocarcinoïde - *voir* tumeur maligne *C80*

Adénocarcinome *C80*
- abdomen inférieur *C76.2*
- acidophile *C75.1*
- acineux *C80*
- alvéolaire *C34.9*
- angle colique gauche *C18.5*
- apocrine *C44.9*
- basophile *C75.1*
- bifurcation du canal hépatique (tumeur de Klatskin) *C22.1*
- bronchio-alvéolaire *C34.9*
- bronchiolaire *C34.9*
- caecum *C18.0*
- canalaire *C50.9*
- - infiltrant *C50.9*
- cardia *C16.0*
- cellules acineuses *C80*
- cellules basales *C08.9*
- cellules claires *C80*
- cellules de Hürthle *C73*
- cellules eau de roche *C75.0*
- cellules en bague à chaton *C80*
- cellules granuleuses *C80*
- cellules granulomateuses-éosinophiles *C80*
- cellules mixtes *C80*
- cellules mucoïdes *C75.1*
- cérumineux *C44.2*
- chromophobe *C75.1*
- col de l'utérus *C53.9*
- colloïde *C80*
- côlon *C18.9*
- - ascendant *C18.2*
- - transverse *C18.4*
- côlon transverse *C18.4*
- corps de l'utérus *C54.9*
- cortex surrénalien *C74.0*
- cylindromateux *C80*
- diffus *C16.9*
- disséminé en surface *C80*
- embryonnaire *C80*
- endométrioïde

Adénocarcinome –*suite*
- endométrioïde –*suite*
- - chez la femme *C56*
- - chez l'homme *C61*
- enflammé *C50.9*
- éosinophile *C75.1*
- folliculaire
- - bien différencié *C73*
- - moyennement différencié *C73*
- - thyroïde *C73*
- - type trabéculaire *C73*
- glande sébacée *C44.9*
- glande sudoripare *C44.9*
- grandes cellules éosinophiles *C80*
- in situ *D09.9*
- - papillaire *D09.9*
- - sein *D05.9*
- insulaire *C25.4*
- intracanalaire *D05.1*
- intrakystique, papillaire *C80*
- kyste
- - endométrioide
- - - chez la femme *C56*
- - - chez l'homme *C61*
- - mucineux *C56*
- - pancréas *C25.9*
- - papillaire *C56*
- - pseudo-mucineux *C56*
- - séreux *C56*
- - voies biliaires *C22.1*
- kystique *C80*
- kystique des voies biliaires *C22.1*
- l'exocol utérin *C53.1*
- lobulaire *C50.9*
- lors de
- - polypose du côlon *C18.9*
- - siège primitif de la tumeur non précisé *C80*
- médullaire *C80*
- mésonéphrique *C80*
- mixte, papillaire et folliculaire *C73*
- mucine, produisant de la *C80*
- mucineux *C80*
- mucipare *C80*
- mucoïde *C80*
- muqueux *C80*
- oncocytaire *C80*
- oxyphile *C80*
- pancréas *C25.9*
- papillaire *C80*
- - variante folliculaire *C73*
- papillokystique *C56*
- petit bassin *C76.3*
- prolifèrant superficiel *C80*
- prostatique *C61*
- pseudomucineux *C56*
- pulmoniaire *C34.9*
- rectum *C20*
- rein *C64*
- rénal *C64*
- sclérosant, non encapsulé, de la thyroïde *C73*
- sécrétant de la mucine *C80*
- sein *C50.9*
- - intracanalaire *D05.1*
- - - non infiltrant *D05.1*
- - - papillaire *D05.1*
- séreux *C80*

Adénocarcinome –*suite*
- siège primitif inconnu *C80*
- squameux *C80*
- squirrheux *C80*
- trabéculaire *C80*
- trigone vésical *C67.0*
- tubulaire *C80*
- type canaux biliaires *C22.1*
- type, intestinal *C16.9*
- villeux *C80*

Adénofibrome *D27*
- cellules claires *D27*
- endométroïde *D27*
- - limite de la malignité *D39.1*
- - malin *C56*
- kyste
- - endométroïde *D27*
- - - avec malignité, borderline *D39.1*
- - - malin *C56*
- - mucineux *D27*
- - muqueux *D27*
- - séreux *D27*
- mucineux *D27*
- ovaire *D27*
- papillaire *D27*
- prostate *N40*
- séreux *D27*

Adéno-fibrome géant *D24*

Adénofibrose du sein *N60.2*
- chronique *N60.2*
- diffuse *N60.2*
- kystique *N60.2*
- périodique *N60.2*
- segmentaire *N60.2*

Adénoïde
- cicatrice *J35.8*
- kyste contaminé *J35.8*
- lésion *S09.9*
- prolifération *J35.2*
- tissu
- - avec hyperplasie des amygdales *J35.3*
- - polypeux *J33.0*
- - tuberculeux *A16.8*
- - - confirmé par bactériologie ou histologie *A15.8*
- végétations *J35.2*

Adénoïdite *J03.9*
- aiguë *J03.9*
- chronique *J35.0*

Adénolipomatose *E88.8*
- Lanois-Bensaude, maladie de *E88.8*

Adénolymphome *D11.9*

Adénolymphome, kyste, parotide *D11.0*

adénomateux prostate Hyperplasie *N40*

Adénomateux, adénomateuse
- goitre *E04.9*
- - endémique *E01.1*
- - sporadique *E04.9*
- hyperplasie de l'endomètre *N85.1*
- pneumonie à foyers multiples *C34.9*
- polype *D36.9*
- - génital, chez la femme *D28.9*
- - muqueuse, multiple *D36.9*
- polypose
- - colon, avec adénocarcinome *C18.9*
- - intestinale *D12.6*

Adénomateux, adénomateuse –*suite*
- polypose –*suite*
- - multiple *D36.9*
- thyroïde
- - avec hyperthyroïdie *E05.2*
- - non toxique *E04.9*
- - toxique *E05.2*
- thyroïde, kystique *E04.2*
- - endémique *E01.1*
- - sporadique *E04.2*
- tumeur, génitale chez la femme *D28.9*

Adénomatoïde, tumeur (mésothéliome bénin *D19.9*
- maxillaire (supérieur), odontogène *D16.41*
- odontogène *D16.5*

Adénomatose *D12.6*
- colon *D12.6*
- endocrinienne *D44.8*
- endocrinienne multiple *D44.8*
- érosive du mamelon *D24*
- pulmonaire *D38.1*
- rein *D30.0*

Adénome *D36.9*
- acineux *D36.9*
- alvéolaire *D14.3*
- ampoule de Vater *D13.2*
- annexes de la peau *D23.9*
- apocrine *D23.9*
- basocellulaire *D11.9*
- basocellulaire éosinophile *D36.9*
- basophile *D35.2*
- bronchique *D38.1*
- caecum *D12.0*
- - tubulovilleux *D12.0*
- canalaire *D36.9*
- canalaire du sein *D24*
- cellues claires *D36.9*
- cellules acido- et basophiles *D35.2*
- cellules acidophiles *D35.2*
- cellules acineuses *D36.9*
- cellules alpha *D13.7*
- cellules bêta *D13.7*
- cellules claires *D36.9*
- cellules de Hürthle *D34*
- cellules de Sertoli
- - chez la femme *D27*
- - chez l'homme *D29.2*
- cellules eau de roche *D35.1*
- cellules insulaires *D13.7*
- cellules mixtes *D36.9*
- cellules mucoïdes *D35.2*
- cellules polymorphes *D36.9*
- cellules principales *D35.1*
- cérumineux *D23.2*
- cholédoque *D13.5*
- chorionique (chorioadénome) *D39.2*
- - destruens *C58*
- chromophobe *D35.2*
- col de la vessie *N40*
- col vésical *N40*
- colloïde *D34*
- côlon *D12.6*
- colon descendant *D12.4*
- corps de l'utérus *D26.1*
- duodénum *D13.2*
- embryonnaire *D36.9*
- endométrioïde *D36.9*

Adénome –*suite*

- eosinophile *D35.2*
- - *D36.9*
- foetal *D34*
- folliculaire *D34*
- glande lacrymale, pléomorphe *D31.5*
- glande salivaire *D11.9*
- glande sébacée *D23.9*
- glande sudoripare, *voir aussi* néoplasie cutanée bénigne *D23.9*
- grandes cellules éosinophiles *D36.9*
- hépatocellulaire *D13.4*
- hypophyse *D35.2*
- - chromophobe *D35.2*
- - compression du chiasma optique *D35.2*
- - eosinophile *D35.2*
- intestin *D13.9*
- intrakystique, papillaire *D36.9*
- kyste *D36.9*
- - colloïde *C56*
- - mucineux *C56*
- - muqueux *C56*
- - ovaire
- - - mucineux, avec malignité, borderline *C56*
- - - papillaire, avec malignité, borderline *C56*
- - - pseudo-mucineux, avec malignité, borderline *C56*
- - - séreux, avec malignité, borderline *C56*
- - pseudo-mucineux *D27*
- - séreux *D27*
- - voies biliaires *D13.4*
- kyste, syringome *D23.9*
- - papillaire *D23.9*
- kystique *D36.9*
- larynx *D14.1*
- lymphomateux *C85.9*
- - *D11.9*
- - angioimmunoblastique *C84.4*
- macrofolliculaire *D34*
- macrovésiculaire *D34*
- malin *C80*
- mamelon *D24*
- mésonéphrique *D36.9*
- microfolliculaire *D34*
- microkystique *D13.7*
- monomorphe *D36.9*
- monomorphique *D36.9*
- mucineux *D36.9*
- muqueuse de l'estomac *D13.1*
- muqueux *D36.9*
- myxoïde *D37.0*
- nasal *D36.7*
- noir *D35.0*
- oesophagien *D13.0*
- ombilical *D23.5*
- oncocytaire *D36.9*
- ovarien, folliculoïde *D27*
- pancréatique *D13.6*
- - gastrinosécrétant *D13.6*
- - microkystique *D13.7*
- papillaire *D36.9*
- - eccrine *D23.9*
- papillotubulaire *D36.9*
- parathyroïdien *D35.1*
- paraurétral *D30.4*

Adénome –*suite*

- parotidien *D11.0*
- - pléomorphe *D11.0*
- pléomorphe *D36.9*
- polypoïde *D36.9*
- poumon *D38.1*
- - alvéolaire *C34.9*
- prostate *N40*
- prostatique *N40*
- - avec résidu urinaire *N40*
- - obstructif *N40*
- - stade
- - - I *N40*
- prostatique avec obstruction *N40*
- rectal *D12.8*
- - tubulovilleux *D12.8*
- - villeux *D37.5*
- rénal *D30.0*
- sébacé (maladie de Pringle) *Q85.1*
- sein *D24*
- sigmoïde *D13.9*
- sudoripare *D23.9*
- surrénalien *D35.0*
- - cellules claires *D35.0*
- - cellules compactes *D35.0*
- - cellules glomérulaires *D35.0*
- - cellules mixtes *D35.0*
- - variante à cellules très pigmentées *D35.0*
- - zone glomérulée *D35.0*
- testiculaire
- - chez la femme *D27*
- - chez l'homme *D29.2*
- thyroïde *D34*
- - autonome *D34*
- - - compensé *D34*
- - - décompensé *D34*
- trabéculaire *D36.9*
- trachée *D14.2*
- tubulaire *D36.9*
- tubulaire de Pick
- - chez la femme *D27*
- - chez l'homme *D29.2*
- tubulovilleux *D36.9*
- - caecum *D12.0*
- - côlon
- - - ascendant *D12.2*
- - - sigmoïde *D12.5*
- - - sigmoïdien *D12.5*
- - rectum *D12.8*
- vessie *D30.3*
- villeux *D36.9*
- - *D48.9*
- - colon
- - - ascendant *D37.4*
- - - sigmoïdien *D37.4*
- villoglandulaire *D36.9*
- voie *D36.9*
- voies bilaires *D13.5*
- - extra-hépatiques *D13.5*
- - intrahépatique *D13.4*
- Wolff, canal de *D36.9*
- zona glomerulosa, surrénal *D35.0*

Adénomyome de la prostate *N40*

Adénomyose *N80.0*
- l'utérus *N80.0*

Adénomyosmatose *N80.0*
- prostate *D40.0*

Adénomyosmatose –*suite*

- vésicule biliaire *D13.5*

Adénopathie *R59.9*
- généralisée *R59.1*
- inguinale *R59.0*
- localisée *R59.0*
- lymphatique, localisée *R59.0*
- médiastinale *R59.0*
- mésentérique *R59.0*
- syphilitique, secondaire *A51.4*
- trachéo-bronchique *R59.0*
- - tuberculeuse *A16.3*
- - - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.4*
- - - primaire *A16.7*
- - - - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.7*
- tuberculeuse *A18.2*

Adénorhabdomyosarcome embryonnaire du re *C64*

Adénosarcome *C80*
- embryonnaire du rein (tumeur de Wilms) *C64*
- organes génitaux
- - chez la femme *C57.9*
- - chez l'homme *C63.9*

Adénosarcome rénal de l'enfant *C64*

Adénosclérose *I88.8*

Adénose du sein, sclérosante *N60.2*

Adénosine-désaminase, déficit *D81.3*

Adénosquameux, carcinome *C80*

Adénotonsillaire, hyperplasie *J35.3*

Adénovirus
- cause de maladies classées ailleurs *B97.0!*
- conjonctivite *B30.1+, H13.1**
- conjonctivite folliculaire aiguë *B30.1+, H13.1**
- diarrhée *A08.2*
- encéphalite *A85.1+, G05.1**
- encéphalomyélite *A85.1+, G05.1**
- entérite *A08.2*
- infection *B34.0*
- kératite *B30.0+, H19.2**
- kératoconjonctivite *B30.0+, H19.2**
- méningite *A87.1+, G02.0**
- méningo-encéphalite *A85.1+, G05.1**
- myélite *A85.1+, G05.1**
- pneumonie *J12.0*

ADH (hormone antidiurétique / HAD), hyp *E22.2*

Adhérence *K66.0*
- abdominale *K66.0*
- ancienne, post-partum, de la vulve *N90.8*
- anomalie lors de
- - anomalie de l'intestin *Q43.3*
- - position congénitale de l'intestin *Q43.3*
- anse sigmoïde *K66.0*
- appendice *K38.8*
- articulaire *M24.89*
- articulation de l'épaule *M75.0*
- articulation du genou *M23.89*
- avec
- - amnios au foetus *O41.8*
- - strabisme *H50.6*

Adhérence –*suite*

- bassin *K66.0*
- - post-infectieuse
- - - chez la femme *N73.6*
- - - chez l'homme *K66.0*
- - - post-partum *N73.6*
- - tuberculeuse *A18.1+, N74.1**
- bassin, féminin *N73.6*
- caecum *K66.0*
- canal
- - cholédoque *K83.8*
- - cystique, post-infectieuse *K82.8*
- - déférent
- - - acquise *N50.8*
- - - congénitale *Q55.4*
- - déférent, post-infectieuse *N50.8*
- - lacrymal, post-infectieuse *H04.5*
- - nasolacrymal, post-infectieuse *H04.5*
- - spinal *G96.1*
- cervico-vaginale *N88.1*
- - congénitale *Q52.8*
- - postpartum *O90.8*
- - - ancienne *N88.1*
- - puerpérale (post partum) *O90.8*
- - - ancienne *N88.1*
- cicatrice *L90.5*
- clitoris *N90.8*
- coeur *I31.0*
- - rhumatismale *I09.2*
- col de l'utérus *N88.1*
- colon *K66.0*
- conjonctive
- - acquise *H11.2*
- - congénitale *Q15.8*
- cornée *H17.9*
- corps ciliaire NCA *H21.5*
- corps étranger laissé accidentellement dans une plaie opératoire *T81.5*
- corps vitré *H43.8*
- dents *K00.2*
- diaphragme *K66.0*
- doigt congénitale *Q70.0*
- doigts *Q70.0*
- endocardiques *I31.0*
- épaule avec ténosynovite *M75.0*
- épicarde *I31.0*
- épididyme *N50.8*
- épiglotte *J38.7*
- épiploon *K66.0*
- - anomalie congénitale *Q43.3*
- estomac *K66.0*
- foie *K66.0*
- globe oculaire *H44.8*
- iléocaecale *K66.0*
- intestin *K66.0*
- - partir d'une anomalie congénitale *Q43.3*
- - post-infectieuse, avec occlusion *K56.5*
- intestin grêle *K66.0*
- intestinale *K66.0*
- - avec occlusion *K56.5*
- - iléus *K56.5*
- intra-abdominale *K66.0*
- iris NCA *H21.5*
- iris, post-infectieuse après une greffe de cornée NCA *T85.88*
- langue, congénitale *Q38.3*
- - avec les gencives *Q38.3*
- lèvres

Adhérence –*suite*

- lèvres –*suite*

- - grandes, congénitale *Q52.5*
- - petites, congénitale *Q52.5*
- lèvres et vulve congénitale *Q52.5*
- lors de
- - occlusion de l'intestin *K56.5*
- - péritonite pelvienne chronique, chez la femme *N73.6*
- - pleurite *R09.1*
- médiastin *J98.5*
- méninges *G96.1*
- - cérébrale *G96.1*
- - congénitale *Q07.8*
- - spinale *G96.1*
- - tuberculeuse *A17.0+, G01**
- mésentère *K66.0*
- muscle oculaire *H50.6*
- nerf sciatique *G57.0*
- nez (cornet et cloison) *J34.8*
- orteil, congénitale *Q70.2*
- orteils *Q70.2*
- ovaire *N73.6*
- - acquis *Q50.3*
- paroi abdominale *K66.0*
- paupière *H02.5*
- pelvi-péritonéale chez la femme *N73.6*
- péri-appendiculaire *K66.0*
- péricarde *I31.0*
- - localisée *I31.8*
- - - post-infectieuse *I31.8*
- - rhumatismale *I09.2*
- - rhumatismales *I09.2*
- - tuberculeuse *A18.8+, I32.0**
- péricarde, chroniques, rhumatismales *I09.2*
- périgastrique *K66.0*
- périovarienne *N73.6*
- péri-ovarienne *N73.6*
- périprostatique *N42.8*
- périrénale *N28.8*
- péritonéale *K66.0*
- - avec occlusion *K56.5*
- - avec occlusion de l'intestin *K56.5*
- - avec occlusion intestinale *K56.5*
- - bassin chez la femme *N73.6*
- - congénitale *Q43.3*
- - pelvienne
- - - chez la femme, après un acte médical *N99.4*
- - - post-opératoire *N99.4*
- - postopératoires *K66.0*
- péritubaire *N73.6*
- - avec stérilité chez la femme *N97.1*
- péri-urétérale *N28.8*
- péri-utérine *N73.6*
- périvésicale *N32.8*
- périvésicale de vésicule séminale *N50.8*
- placenta, complication lors de la délivrance (troisième période) *O72.0*
- - sans hémorragie *O73.0*
- pleuropéricardique *J94.8*
- plèvre (Brustfell) *J94.8*
- - tuberculeuse NCA *A16.5*
- plèvre (Rippenfell) *J98.4*
- - tuberculeuse NCA *A16.5*
- post-infectieuse *K66.0*
- post-infectieuse de l'amnios affectant le foetus/nouveau-né *P02.8*

Adhérence –*suite*

- post-opératoire
- - avec occlusion de l'intestin *K91.3*
- - par corps étranger laissé accidentellement dans la plaie opératoire *T81.5*
- poumon *J98.4*
- prépuce *N47*
- pulmonaire *J98.4*
- pylore *K66.0*
- scrotum et pénis congénitale *Q55.8*
- sous-scapulaire *M75.0*
- testicule *N50.8*
- tissu adipeux *E88.2*
- trachée *J39.80*
- tubo-ovarienne *N73.6*
- tunique vaginale du testicule *N50.8*
- utérus *N85.6*
- - intra-utérine, post-infectieuse *N85.6*
- - paroi abdominale, post-infectieuse *N73.6*
- vagin *N89.5*
- - post-opératoire *N99.2*
- ventre *K66.0*
- - péritonéales *K66.0*
- vésicule biliaire *K82.8*
- vésicule séminale *N50.8*
- vessie *N32.8*
- viscères *K66.0*
- voies biliaires *K82.8*
- - *K83.8*
- vulve *N90.8*

Adhérentiel

- arachnoïdite *G03.9*
- - syphilitique *A52.1+, G01**
- boursite *M71.59*
- bride *K66.0*
- - intestin *K66.0*
- - péritonéal *K66.0*
- capsulite *M77.9*
- enthésiopathie, épaule *M75.0*
- inflammation
- - capsule *M77.9*
- - capsule articulaire de l'épaule *M75.0*
- maladie, oreille moyenne *H74.1*
- neurosyphylis, méninges *A52.1+, G01**
- otite *H74.1*
- - moyenne *H74.1*
- pachyméningite *G03.9*
- péricapsulite *M75.0*
- péricardite
- - chronique *I31.0*
- - rhumatismale *I09.2*
- péricardite du médiastin *I31.0*
- péritendinite, épaule *M75.0*
- péritonite *K65.9*
- pleurésie *R09.1*
- syphilis, arachnoïde *A52.1+, G01**
- tendinite *M65.89*
- - épaule *M75.0*
- ténosynovite *M65.89*
- vulvite, congénitale *Q52.7*

Adiaspiromycose *B48.8*

Adie, syndome d' *H57.0*

Adiponécrose

- épiploïque *K65.8*
- mésentérique *K65.8*
- péritonéale *K65.8*

Adiponécrose *–suite*
- sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical *P15.6*

Adiponécrose sous-cutanée du nouveau-né, *P15.6*

Adiposité *E65*

Adiposo-génital, syndrome *E23.6*

Administration de fluor, prophylaxie con *Z29.8*

Admission, examen
- pour
- - établissement résidentiel *Z02*
- - forces armées *Z02*
- - institution éducative *Z02*
- - maison de retraite *Z02*

Admission, pour ablation d'un organe à t *Z40.08*

Adolescents
- albuminurie *N39.2*
- crise *Z60*
- cyphose *M42.09*
- rachitisme *E55.0*
- scoliose *M41.19*

Adrénaline, hypersécrétion *E27.5*

Adrénalite auto-immune *E27.1*

Adrénarche, précoce *E27.0*

Adréno-génital
- syndrome *E25.9*
- - acquis, avec
- - - féminisation *E25.8*
- - - virilisation *E25.8*
- - congénital *E25.09*
- syndrome de déplétion saline *E25.09*
- trouble *E25.9*
- - iatrogène *E25.8*
- - idiopathique *E25.8*
- - induit par médicaments *E25.8*
- yndrome *E25.9*

Adrénoleucodystrophie *E71.3*

Adriblastine (Doxorubicine), lésion par *T88.5*

Adulte
- lymphome à cellules T *C91.50*
- - leucémique *C91.50*
- maladie de Gaucher *E75.2*
- ostéochondrose NCA *M93.8*
- ostéochondrose, os lunaire, main *M93.1*
- rhabdomyome *D21.9*
- syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) *J80*
- tératome
- - foie, mature, bénin *D13.4*
- - kystique *D36.9*
- - testiculaire, mature, bénin *D29.2*

Adynamie *R53*

Adynamie épisodique héréditaire *G72.3*

Adynamique, obtruction, intestin *K56.0*

Aerobacter aerogenes
- diarrhée *A04.8*
- entérite, infectieuse *A04.8*

Aéroembolisme *T70.3*

Aerola
- abcès, en couche *O91.10*
- avec tumeur maligne sein *C50.0*

Aéro-otite *T70.0*
- moyenne *T70.0*

Aérophagie *F45.31*

Aéro-sinusite *T70.1*

Aérosol, effet toxique des gaz propulseu *T59.8*

Afébrile
- douleurs, membres *M79.69*
- rhume *J00*

Affaiblissement, *voir aussi* cachexie *R64*
- après ablation, fonction, ovaire *E89.4*
- énergie *R68.8*
- focntions cognitives due à l'âge *R41.8*
- libido *F52.0*
- mémoire *R41.8*
- poids
- - anormal *R63.4*
- - - avec dystrophie *R63.4*
- - consécutif au HIV [Immunodéficience Humaine Virale] *B22, R64*
- primaire, fonction, ovaire *E28.3*
- sénile *R54*
- - avec
- - - altération mentale NCA *F03*
- - - désorientation aiguë *F05.1*
- - - psychose *F03*
- - physique *R54*
- tolérance au glucose *R73.0*
- tuberculeuse NCA *A16.9*

Affaissement
- chambre antérieure de l'oeil *H44.4*
- hanche *M91.2*
- tête fémorale *M89.85*
- thoracique, congénital *Q67.8*
- voûte plantaire
- - acquis *M21.4*
- - congénital *Q66.5*
- - rachitique *E64.3*
- - spastique, congénital *Q66.5*

Affaissement (de)
- rachis *T08.0*
- voûte plantaire *M21.4*

affectant foetus nouveau-né avec hypoglycémie) , Diabète sucré de la mère (préexistant), *P70.1*

Affectif(ve)
- épisode, mixte *F38.0*
- psychopathie *F34.0*
- psychose, bipolaire *F31.9*
- symptômes, dans l'épilepsie partielle, bénins *G40.02*
- trouble *F39*
- - bipolaire *F31.9*
- - - épisode actuel
- - - - dépressif
- - - - - grave,
- - - - - léger, *F31.3*
- - - - - moyen, *F31.3*
- - - - - grave, asymptomatique, psychotique, *F31.4*
- - - - - grave, symptomatique, psychotique, *F31.5*
- - - - hypomaniaque *F31.0*
- - - - maniaque
- - - - - asymptomatique, psychotique, *F31.1*
- - - - - symptomatique, psychotique, *F31.2*
- - - - mixte *F31.6*

Affectif(ve) *–suite*
- trouble *–suite*
- - bipolaire *–suite*
- - - rémission (actuellement) *F31.7*
- - dépressif *F32.9*
- - isolé NCA *F38.0*
- - organique *F06.3*
- - - hémisphère droit *F07.8*
- - persistant *F34.9*
- - personnalité *F34.0*
- - récidivant NCA *F38.1*
- - sénile NCA *F03*

Affection
- aiguë des voies respiratoires supérieures *J06.9*
- amygdales *J35.9*
- - chronique *J35.9*
- annexes oculaires *H57.9*
- appareil circulatoire *I99*
- appareil lacrymal *H04.9*
- appareil masticateur avec douleurs au visage *K07.6*
- appareil urinaire *N39.9*
- articulaire *M25.99*
- articulaire dégénérative *M19.99*
- articulation hanche *M24.85*
- articulation sacro-iliaque NCA *M53.3*
- articulation temporo-mandibulaire *K07.6*
- auto-immune, dans l'anamnèse personnelle *Z86.2*
- bandelettes optiques *H47.5*
- biliaire *K82.9*
- bourses séreuses *M71.99*
- bulbaire *H44.9*
- cardiaque rhumatismale *I09.9*
- cartilage articulaire *M24.19*
- cellules des ganglions de la corne antérieure *G12.2*
- centre cortical de la vision *H47.6*
- cérébrale *G93.9*
- - organique avec psychose *F09*
- cérébro-vasculaire *I67.9*
- cérébro-ventriculaire *G93.88*
- chiasma *H47.4*
- - inflammatoire *H47.4*
- - ischémique *H47.4*
- - optique *H47.4*
- choroïde *H31.9*
- choroïdienne *H31.9*
- col de l'utérus, avec stérilité féminine *N97.3*
- conjonctive *H11.9*
- cornée, oeil *H18.9*
- coronarienne *I25.19*
- coronarienne bi- ou tri- tronculaire *I25.13*
- coronarienne bi-tronculaire *I25.12*
- coronarienne touchant plusieurs vaisseaux *I25.19*
- corps ciliaire *H21.9*
- corps géniculé latéral *H47.5*
- corps vitré *H43.9*
- cortex visuel *H47.6*
- cristallin *H27.9*
- - avec
- - - glaucome NCA *H40.5*
- - - glaucome obstructif *H40.5*
- cutanée *L98.9*

Affection –*suite*

- dégénérative
- - cerveau *G31.9*
- - conjonctive *H11.8*
- - gencives *K06.0*
- - - généralisée *K06.0*
- - - localisée *K06.0*
- - - post-infectieuse *K06.0*
- - - post-opératoire *K06.0*
- - poumon *J84.1*
- - vessie *N32.8*
- dégénérative de la colonne vertébrale *M47.99*
- dégénérative péri-oculaire *H02.7*
- démyélinisante, système nerveux central *G37.9*
- dent *K08.88*
- diaphragme *J98.6*
- duodénum *K31.9*
- endocarde
- - cas de syphilis *A52.0+, I39.8**
- - due à des gonocoques *A54.8+, I39.8**
- endocrinienne, avec arthrite NCA *E34.9+, M14.5**
- épaule *M75.0*
- épaule, région *M75.9*
- érythémateuse *L53.9*
- estomac *K31.88*
- - *K31.9*
- extrapyramidale indéterminée, avec anomalie, mobilité
- - anormale *G25.9*
- - - spastique *G25.9*
- folliculaire, os *L73.9*
- - impetiginosa *L73.9*
- fonctionnelle de la pupille *H57.0*
- frein de la langue *K14.9*
- gastro-entérologique aiguë *K92.9*
- gastro-intestinale, avec arthrite NCA *K63.9+, M03.69**
- génitale, primaire, due à la syphilis *A51.0*
- glande lacrymale *H04.1*
- glande mammaire, après accouchement *O92.20*
- glande parathyroïde, avec ostéodystrophie *E21.0*
- glande sudoripare *L74.9*
- glande surrénale *E27.9*
- globe oculaire *H44.9*
- gynécologique *N94.9*
- - psychosomatique *F45.9*
- hépatique
- - au cours de la grossesse *O26.6*
- - niveau
- - - l'anamnèse familiale *Z83.7*
- - - l'anamnèse personnelle *Z87.1*
- immunologique *D89.9*
- inflammatoire du bas-ventre *N73.9*
- intestinale infectieuse, sur un sujet porteur de germes *Z22.1*
- intra-cérébrale *G93.9*
- iris et corps ciliaire *H21.9*
- labyrinthe *H83.9*
- mâchoire, inflammatoire *K10.29*
- maligne *C80*
- - système lymphatique *C96.9*
- médullaire *G95.9*
- mentale *F99*
- métabolique *E88.9*

Affection –*suite*

- métabolique –*suite*
- - avec
- - - arthrite NCA *E88.9+, M14.5**
- - - arthropathie NCA *E88.9+, M14.5**
- - - cataracte NCA *E88.9+, H28.1**
- - - glaucome NCA *E88.9+, H42.0**
- - - myopathie NCA *E88.9+, G73.6**
- - - polyneuropathie NCA *E88.9+, G63.3**
- - fer *E83.1*
- - lors de la grossesse *O99.2*
- moelle épinière *G95.9*
- mono-tronculaire, coronarienne *I25.11*
- mouvements oculaires *H51.9*
- musculaire *M62.99*
- musculaire de l'oeil *H50.9*
- musculaire héréditaire, dans l'anamnèse familiale *Z82*
- musculaire, héréditaire, antécédants personnels *Z87.3*
- myocardique *I51.5*
- myocardique ischémique *I25.5*
- nerveuse
- - nerf accessoire (XIe paire) *G52.8*
- - nerf auditif (VIIIe paire) *H93.3*
- - nerf crânien, (Xe paire nerf pneumogastrique) *G52.2*
- - nerf facial (VIIe paire) *G51.9*
- - nerf grand hypoglosse (XIIe paire) *G52.3*
- - nerf olfactif (Ie paire) *G52.0*
- - nerf optique (IIe paire) NCA *H47.0*
- - nerf pneumogastrique (Xe paire) *G52.2*
- - nerf trijumeau (Ve paire) *G50.9*
- nerveuse indéterminée *G58.9*
- nervus accessorius *G52.8*
- neuro-dégénérative *G31.9*
- neurologique
- - avec arthrite NCA *G98+, M14.6**
- - dépistage *Z13.8*
- neuromusculaire *G70.9*
- - toxique *G70.1*
- nez *J34.8*
- non obstétricale, antécédents, influant sur le déroulement de la grossesse *Z35.8*
- oculo-cornéenne *H18.9*
- oeil *H57.9*
- - après un acte diagnostique ou thérapeutique *H59.9*
- - avec
- - - cataracte secondaire *H26.2*
- - - glaucome NCA *H40.5*
- - taxoplasmose *B58.0+, H58.8**
- ongles *L60.9*
- orbite *H05.9*
- oreille *H93.9*
- - externe *H61.9*
- - vasculaire, dégénérative *H93.0*
- oreille moyenne *H65.3*
- organes génitaux de la femme *N94.9*
- organes génitaux masculins *N50.9*
- os de verre *Q78.2*
- osseuse
- - Boeck *D86.9*
- - dégénérative *M89.89*
- paupière *H02.9*
- - dégénérative *H02.7*

Affection –*suite*

- paupière –*suite*
- - en cas de zona *B02.3+, H03.1**
- peau *L98.9*
- - dépistage *Z13.8*
- - tissu cellulaire sous-cutané *L98.9*
- pelvis
- - chez la femme *N94.8*
- - chez l'homme *K66.8*
- pénis *N48.9*
- périnée, non inflammatoire *N90.9*
- phacome, oeil *H35.8*
- placenta *O43.9*
- plexus (nerveux) *G54.9*
- pôle rénal *N28.9*
- primaire
- - anale, en cas de syphilis *A51.1*
- - cas de syphilis *A51.0*
- prostate *N42.9*
- - chronique *N42.8*
- - maligne *C61*
- - neurovégétative *F45.8*
- - psychovégétative *F45.8*
- - suspecte *N42.9*
- - urétro- *N40*
- psoriasiforme *L40.9*
- psychiatrique *F99*
- psychique *F99*
- psychosomatique *F45.9*
- pulmonaire *J98.4*
- - chronique obstructive *J44.99*
- - - avec exacerbation aiguë *J44.19*
- - congénitale *Q33.0*
- - obstructive, avec exacerbation infectieuse *J44.19*
- pulmonaire interstitelle *J84.9*
- pulmonaire obstructive *J44.99*
- racines nerveuses *G54.9*
- rénale *N28.9*
- - kystique *Q61.9*
- réno-vasculaire *I73.9*
- respiratoire NCA *J98.9*
- - aiguë, provoquée par
- - - fumées *J68.3*
- - - gaz *J68.3*
- - - irradiation *J70.0*
- - - vapeurs *J68.3*
- - avec arthrite NCA *J98.9+, M14.8**
- - chronique, provoquée par
- - - fumées *J68.4*
- - - irradiation *J70.1*
- - dépistage NCA *Z13.8*
- - provoquée par
- - - agents externes *J70.9*
- - - fumées *J68.9*
- - - gaz *J68.9*
- - - vapeurs *J68.9*
- rétinienne *H35.9*
- rhumatismale *M79.09*
- rotule *M22.9*
- sclérotique *H15.9*
- sein *N64.9*
- sinus du nez *J34.8*
- système hypophyse-mésencéphale, avec stérilité, chez la femme *E23.0*
- système nerveux *G98*
- - associée à une maladie par VIH *B22+, G94.8**
- - autonome *G90.9*

Affection –*suite*

- tendon *M67.99*
- thyroïdienne *E07.9*
- toxique de la macula *H35.3*
- tractus optique *H47.5*
- tri-tronculaire
- - artérioscléreuse *I25.13*
- - coronarienne *I25.13*
- trompe d'Eustache *H69.9*
- tronc cérébral *G93.9*
- trouble anxieux *F41.9*
- tympan *H73.9*
- uretère *N28.9*
- urétrale *N36.9*
- utérinne inflammatoire *N71.9*
- utérus *N85.9*
- - avec stérilité *N97.2*
- vagin, avec stérilité féminine *N97.3*
- vasculaire
- - coronarienne *I25.9*
- - quadri, coronaire *I25.14*
- - rétinienne *H35.0*
- - tritronculaire, athérosclérose *I25.13*
- vasculaire cérébrale, compliquant les suites de couches *O99.4*
- vasculaire du corps ciliaire *H21.1*
- vasculaire, collagène *M35.9*
- - avec polyneuropathie NCA *M35.9+, G63.5**
- vasculaire, screening, NCA *Z13.6*
- veineuse douloureuse *I87.9*
- vésicale *N32.9*
- vésicule biliaire *K82.9*
- vessie *N32.9*
- vessie incontinence *N32.8*
- - ménopause *N32.8*
- - neuro-hormonale *N31.1*
- - végétative *N32.8*
- voies biliaires *K83.9*
- voies optiques *H47.7*
- vulve, non inflammatoire *N90.9*

Afibrinogénémie *D68.8*
- acquise *D65.0*
- après échec d'une tentative d'avortement médical *O07.1*
- avec
- - hémorragie
- - - compliquant l'accouchement *O67.0*
- - - renforcée
- - - - lors du décollement du placenta *O45.0*
- - - - pendant l'accouchement *O67.0*
- - - - précédant l'accouchement *O46.0*
- - hémorragie précédant l'accouchement *O46.0*
- compliquant l'échec d'un avortement provoqué *O07.6*
- congénital *D68.20*
- cours du post-partum *O72.3*

AFP [alpha-foetoprotéine], taux
- pathologique
- - abaissé *R77.2*
- - élevé *R77.2*

Africain(e)
- anémie *D57.1*
- trypanosomiase *B56.9*
- - avec démence *B56.9+, F02.8**

Agalactie *O92.30*

Agalactie –*suite*
- avec difficultés à la mise au sein *O92.31*
- élective *O92.50*
- pendant les suites de couches *O92.30*
- primitive *O92.30*
- secondaire *O92.50*
- thérapeutique *O92.50*

Agammaglobulinémie *D80.1*
- acquise *D80.1*
- autosomique récessive *D80.0*
- avec
- - lymphocytes B, immunoglobulines positives *D80.1*
- - lymphopénie *D81.9*
- Bruton, type *D80.0*
- commune variable *D80.1*
- héréditaire *D80.0*
- liée au chromosome X *D80.0*
- - avec carence en hormone de croissance *D80.0*
- lymphopénique *D81.9*
- non familiale *D80.1*
- suisse, type *D80.0*
- type suisse *D80.0*

Agammaglobulinémique syndrome de carence *D80.0*

Aganglionose (maladie de Hirschsprung) *Q43.1*
- côlon *Q43.1*

Agastrique, syndrome - *K91.1*

Age, affaiblissement des fonctions cogni *R41.8*

Age, lié(e) à l'
- baisse de l'acuité visuelle (presbytie) *H52.4*
- diabète sucré *E11.90*
- insuffisance d'accommodation (presbytie) *H52.4*
- perte d'audition (presbyacousie) *H91.1*
- trouble circulatoire *I99*

Agénésie
- annexes de l'oeil *Q15.8*
- anus, avec fistule *Q42.2*
- aorte *Q25.4*
- appareil circulatoire NCA *Q28.9*
- appareil lacrymal *Q10.4*
- appareil urinaire NCA *Q64.8*
- appendice *Q42.8*
- artère cérébrale *Q28.38*
- artère coronaire *Q24.5*
- artère ombilicale *Q27.0*
- artère périphérique *Q27.8*
- artère pulmonaire *Q25.7*
- bras (totale) *Q71.0*
- bronche *Q32.4*
- caecum *Q42.8*
- canal
- - déférent *Q55.4*
- - éjaculateur *Q55.4*
- - spermatique *Q55.4*
- canal anal *Q42.3*
- canal déférent *Q55.4*
- canal lacrymal *Q10.4*
- carpe *Q71.3*
- cartilage *Q79.8*
- cartilage cricoïde et larynx *Q31.8*
- cartilage thyroïdien *Q31.8*
- ceinture pelvienne *Q74.2*

Agénésie –*suite*
- ceinture scapulaire *Q74.0*
- cerveau *Q00.0*
- cerveau, partie du *Q04.3*
- cervelet *Q04.3*
- cheveux *Q84.0*
- cils *Q10.3*
- cils palpébraux *Q10.3*
- clavicule *Q74.0*
- clitoris *Q52.6*
- cloison aorto-pulmonaire *Q21.4*
- cloison interauriculaire *Q21.1*
- cloison interventriculaire *Q20.4*
- coccyx *Q76.4*
- coeur *Q24.8*
- col de l'utérus *Q51.5*
- côlon *Q42.9*
- colonne vertébrale *Q76.4*
- conduit auditif *Q16.1*
- cordon spermatique *Q55.4*
- corps calleux *Q04.0*
- côte *Q76.6*
- cou, partie *Q18.8*
- cristallin *Q12.3*
- cubitus *Q71.5*
- diaphragme, avec hernie *Q79.1*
- doigt *Q71.3*
- duodénum *Q41.0*
- enclume *Q16.3*
- épaule *Q74.0*
- épididyme *Q55.4*
- épiglotte *Q31.8*
- estomac *Q40.2*
- fémur *Q72.4*
- foie *Q44.7*
- glande endocrine NCA *Q89.2*
- glande salivaire *Q38.4*
- glande sous-maxillaire *Q38.4*
- glotte *Q31.8*
- gros intestin *Q42.9*
- humérus *Q71.8*
- hymen *Q52.4*
- hypophyse *Q89.2*
- iléon *Q41.2*
- intestin *Q41.9*
- intestin grêle *Q41.9*
- iris *Q13.1*
- iris (fibres dilatatrices) *Q13.2*
- jambe *Q72.8*
- - avec pied *Q72.2*
- jéjunum *Q41.1*
- labyrinthe membraneux *Q16.5*
- langue *Q38.3*
- larynx *Q31.8*
- lèvre (buccale) *Q38.0*
- lèvres
- - grandes *Q52.7*
- - petites *Q52.7*
- ligament rond *Q52.8*
- lobe de l'oreille *Q17.8*
- luette *Q38.5*
- mâchoire *K07.0*
- mâchoire supérieure *K07.0*
- main *Q71.3*
- mamelon *Q83.2*
- mandibule *K07.0*
- membre inférieur (totale) *Q72.0*
- membres

Agénésie –*suite*
- membres –*suite*
- - inférieures *Q72.0*
- - supérieurs *Q71.0*
- - - main présente *Q71.1*
- - totale *Q73.0*
- menton *Q18.8*
- métacarpe *Q71.3*
- métatarse *Q72.3*
- moëlle épinière *Q06.0*
- muscle oculaire *Q15.8*
- nerf *Q07.8*
- nez *Q30.1*
- oeil *Q11.1*
- oesophage *Q39.8*
- omoplate *Q74.0*
- ongle *Q84.3*
- oreille *Q16.9*
- organe de Corti *Q16.5*
- organe génital
- - féminin *Q52.8*
- - - externe *Q52.7*
- - masculin *Q55.8*
- organes digestifs NCA *Q45.8*
- - partielle NCA *Q45.8*
- - supérieurs *Q40.8*
- - totale NCA *Q45.8*
- organes respiratoires NCA *Q34.8*
- orteil *Q72.3*
- os de la face NCA *Q75.8*
- os du crâne *Q75.8*
- - avec hydrocéphalie et spina bifida *Q05.4*
- os NCA *Q79.8*
- ovaire *Q50.0*
- pancréas *Q45.0*
- parathyroïde (glande) *Q89.2*
- parotide (glande) *Q38.4*
- paupière *Q10.3*
- pavillon de l'oreille *Q16.0*
- pénis *Q55.5*
- péricarde *Q24.8*
- péroné *Q72.6*
- pied *Q72.3*
- plafond de l'orbite *Q75.8*
- pli palpébral *Q10.3*
- point lacrymal *Q10.4*
- points lacrymaux, congénitale *Q10.4*
- poumon *Q33.3*
- prostate *Q55.4*
- radio-cubitale *Q71.8*
- radius *Q71.4*
- rate *Q89.0*
- rectum *Q42.1*
- - avec fistule *Q42.0*
- rein *Q60.2*
- - bilatérale *Q60.1*
- - unilatérale *Q60.0*
- rénale congénitale *Q60.0*
- rotule *Q74.1*
- sacrum *Q76.4*
- scrotum *Q55.2*
- sein
- - avec absence de mamelon *Q83.0*
- - avec présence du mamelon *Q83.8*
- sternum *Q76.7*
- surrénale (glande) *Q89.1*
- système nerveux, NCA *Q07.8*

Agénésie –*suite*
- système nerveux, partie NCA *Q07.8*
- système ostéo-articulaire et des muscles NCA *Q79.8*
- tarse *Q72.3*
- tendon *Q79.8*
- testicule *Q55.0*
- thymus *Q89.2*
- thyroïde *E03.1*
- tibia *Q72.5*
- tibio-péronière *Q72.8*
- trachée *Q32.1*
- trompe de Fallope *Q50.6*
- trompe d'Eustache *Q16.2*
- trompe utérine *Q50.6*
- uretère *Q62.4*
- urètre *Q64.5*
- utérus *Q51.0*
- vagin *Q52.0*
- valve cardiaque NCA *Q24.8*
- veine
- - grande NCA *Q26.8*
- - périphérique *Q27.8*
- veine cave *Q26.8*
- - inférieure *Q26.8*
- - supérieure *Q26.8*
- veine cérébrale *Q28.38*
- veine porte *Q26.5*
- vermis cérébelleux *Q04.3*
- vertèbre *Q76.4*
- vésicule *Q44.0*
- vessie *Q64.5*
- voies biliaires *Q44.5*
- vulve *Q52.7*

Agent de conservation
- dermatite de contact, allergique *L23.5*
- dermatite, toxique NCA *L24.5*

Agent pathogène, avec arthrite NCA *M00.89*

Agents
- externes, anémie aplastique NCA *D61.2*
- toxiques, polyneuropathie NCA *G62.2*

Agents de diagnostic, intoxication *T50.8*

Agglutinines froides, maladie des *D59.1*
- chronique *D59.1*

Agitation *R45.1*
- catatonique *F20.2*
- interne *R45.0*
- maniaque *F30.9*
- motrice *R45.1*
- nocturne *F51.8*
- psychogène *F30.8*
- psychomotrice *R45.1*
- psychovégétatif *R45.1*
- réactive, due à
- - stress, émotionnel *F30.8*
- - trauma, psychique *F30.8*

Agité
- anxieux, dépression *F32.2*
- dépression *F32.2*
- - épisode isolé *F32.2*
- - ménopausale, épisode, isolé *F32.2*

Aglossie *Q38.3*
- congénitale *Q38.3*

Aglossie-adactylie (syndrome d'Hanhart) *Q87.0*

Agnosie *R48.1*

Agnosie –*suite*
- auditive *R48.1*
- autotopo - *R48.1*
- autres sens *R48.1*
- développement *F88*
- pragmato- *R48.1*
- représentation corporelle *R48.1*
- stéréo- *R48.1*
- tactile *R48.1*
- verbale *R48.1*
- - liée au développement *F80.28*
- visuelle *R48.1*

Agoraphobie *F40.00*
- avec trouble panique *F40.01*
- sans trouble panique *F40.00*

Agrammatisme *R48.8*

Agranulocytose *D70.3*
- aiguë *D70.3*
- aplasique *D70.3*
- avec angine *D70.3*
- - nécrosante *D70.3*
- chronique *D70.3*
- cyclique *D70.5*
- due à un médicament *D70.19*
- essentielle *D70.3*
- et neutropénie, dues à un médicament *D70.19*
- - avec
- - - phase critique de
- - - - 10 à moins de 20 jours *D70.11*
- - - - 20 jours ou plus *D70.12*
- - - - moins de 10 jours *D70.10*
- - sous traitement cytostatique *D70.19*
- génétique *D70.0*
- hyperplasique *D70.3*
- infantile *D70.0*
- infantile héréditaire *D70.0*
- lors de
- - leucopénie *D70.3*
- - maladie, par VIH *B23.8, D70.3*
- mucosite nécrotique *D70.3*
- périodique *D70.5*
- pernicieuse *D70.3*
- phase critique de x jours *D70.1*
- sous chimiothérapie *D70.19*

Agraphie *R48.8*
- absolue *R48.8*
- cours du développement *F81.8*

agressif Mastocytose systémique *C96.2*

Agressif / agressive
- comportement *F91.1*
- - durant l'enfance et l'adolescence *F91.1*
- - persistant, lors de troubles du comportement en société *F91.2*
- fibromatose *D48.1*
- hépatite chronique *K73.2*
- ostéoblastome *D48.0*
- personnalité *F60.30*
- trouble, asocial *F91.1*

Agression, voie de fait *Y09.9!*

Agressive, personnalité *F60.30*

Agressivité *F91.1*
- avec socialisation manquante *F91.1*
- groupe *F91.2*

Agressivité de groupe *F91.2*

Agriculture, maladie *J67.0*

Agrypnie *G47.0*

Agueusie *R43.2*
- hystérique *F44.6*

Agyrie *Q04.3*

Ahlbäck, maladie de [ostéonécrose asepti *M87.05*

Aicardi, syndrome d' *Q87.8*

Aichmophobie *F40.2*

AIDS(SIDA)-virus, sujet en contact avec, *Z20.6*

Aigu, aiguë *voir aussi* maladie concernée
- abdomen *R10.0*
- leucémie NCA *C95.00*
- - lymphatique *C91.00*
- - - rémission complète *C91.01*
- - lymphoblastique *C91.00*
- - - rémission complète *C91.01*
- - lymphocytaire *C91.00*
- - - rémission complète *C91.01*
- - monocytaire *C93.00*
- - - rémission complète *C93.01*
- - myéloïde *C92.00*
- - - rémission complète *C92.01*
- - myélomonocytaire *C92.50*
- - - rémission complète *C92.51*
- - promyélocytaire *C92.40*
- - - rémission complète *C92.41*
- - rémission complète *C95.01*

Aiguille, laissée dans une plaie opérato *T81.5*

Aiguille, peur de *F40.2*

Aile du nez
- mélanome, in situ *D03.3*
- mélanome, malin *C43.3*
- naevus *D22.3*

Aile du nez, hypertrophie *J34.8*

Aine
- abcès *L02.2*
- anévrysme *I72.3*
- - rompue *I72.3*
- brulure *T21.09*
- - 1er degré *T21.13*
- - 3ème degré *T21.33*
- - degré
- - - 2a *T21.23*
- - - 2b *T21.83*
- - second degré *T21.23*
- carcinome *C76.3*
- contusion *S30.1*
- corrosion *T21.43*
- - 1er degré *T21.53*
- - 3ème degré *T21.73*
- - degré
- - - 2a *T21.63*
- - - 2b *T21.93*
- - second degré *T21.63*
- dermatophytose *B35.6*
- douleurs *R10.3*
- gonflement *R22.2*
- hernie *K40.90*
- - avec
- - - gangrène *K40.40*
- - - incarcération *K40.30*
- - - obstruction *K40.30*
- - - strangulation *K40.30*
- - bilatérale

Aine *–suite*
- hernie *–suite*
- - bilatérale *–suite*
- - - récidivante, sans occlusion *K40.21*
- - - sans occlusion *K40.20*
- - directe *K40.90*
- - - récidivante *K40.91*
- - incarcérée *K40.30*
- - - récidivante *K40.31*
- - incomplète *K40.90*
- - indirecte *K40.90*
- - - récidivante *K40.91*
- - indirecte, récidivante *K40.91*
- - récidivante *K40.91*
- - - avec
- - - - gangrène *K40.41*
- - - - obstruction *K40.31*
- - - - occlusion *K40.31*
- - - - strangulation *K40.31*
- - récidive *K40.91*
- - unilatérale
- - - récidivante, sans occlusion *K40.91*
- - - sans occlusion *K40.90*
- infection, due à un champignon *B35.6*
- mou *K40.90*
- - récidivante *K40.91*
- mycose *B35.6*
- noeuds lymphatiques, infection *L04.1*
- Troubles *R10.3*

Aïnhum *L94.6*

Ainhum (Dactylolyse essentielle) (D. spo *L94.6*

Ainhum [dactylolyse spontanée] *L94.6*

Air
- accumulation, pneumothorax *J93.9*
- injection *T70.4*

Air comprimé
- affection *T70.3*
- paralysie *T70.3*

Air comprimé, maladie *T75.2*

Aisselle
- abcès *L02.4*
- - glandes sudoripares *L74.8*
- adénopathie *R59.0*
- anthrax *L02.4*
- brûlure *T22.03*
- - 1er degré *T22.13*
- - 2ème degré *T22.23*
- - 3ème degré *T22.33*
- - degré
- - - 2a *T22.23*
- - - 2b *T22.83*
- carcinome basocellulaire *C44.5*
- contusion *S40.0*
- corrosion *T22.43*
- - 1er degré *T22.53*
- - 2ème degré *T22.63*
- - 3ème degré *T22.73*
- - degré
- - - 2a *T22.63*
- - - 2b *T22.93*
- écrasement *S47*
- eczéma *L30.9*
- furoncle *L02.4*
- hidradénite *L73.2*
- lésion *S49.9*
- - superficielle *S40.9*

Aisselle *–suite*
- lésion d'un vaisseau sanguin *S45.9*
- lymphadénite aiguë *L04.2*
- lymphangiome *D18.11*
- lymphome *C85.9*
- mélanome in situ *D03.5*
- mélanome malin *C43.5*
- naevus *D22.5*
- peau, carcinome *C44.5*
- phlegmon *L03.10*
- plaie, ouverte *S41.80*
- tuberculose *A18.2*

AIT accident ischémique transitoire ou I *G45.92*

Aite *G20.90*
- induit par un traitement NCA *G21.1*

Aitken, classification selon *- voir* sous

Ajustement
- appareil auditif *Z46.1*
- appareil orthopédique *Z46.7*
- armature orthopédique *Z46.7*
- bandage orthopédique *Z46.7*
- bras artificiel *Z44.0*
- ceinture de colostomie *Z46.5*
- chaussures orthopédiques *Z46.7*
- colostomie *Z46.5*
- corset orthopédique *Z46.7*
- dent articificielle *Z46.3*
- difficultés scolaires *Z55*
- dispositif
- - abdominal *Z46.5*
- - auditif *Z46.2*
- - orthodondique *Z46.4*
- - voies urinaires *Z46.6*
- dispositif intestinal, NCA *Z46.5*
- dispositif NCA *Z46.9*
- - optique *Z46.2*
- - orthopédique *Z46.7*
- extenseur bronchique *Z45.84*
- extenseur trachéal *Z45.85*
- fauteuil roulant *Z46.8*
- iléostomie *Z46.5*
- lentilles de contact *Z46.0*
- lunettes *Z46.0*
- lunettes de lecture *Z46.0*
- neurostimulateur *Z45.80*
- platre orthopédique *Z46.7*
- prothèse *Z44.9*
- prothèse de jambe *Z44.1*
- prothèse de l'oeil *Z44.2*
- prothèse dentaire *Z46.3*
- prothèse du sein *Z44.3*
- prothèse externe *Z44.9*
- sein artificiel *Z44.3*
- stimulateur cardiaque *Z45.0*
- stimulateur sacré radiculaire *Z45.80*
- système d'assistance cardiaque *Z45.83*

Akathisie induit traitement médicamenteuse) , *G25.88*

Akathisie (Acathisie)
- secondaire à traitement *G25.8*
- secondaire aux neuroleptiques *G25.8*

Akinésie *R29.8*
- foetale, autosomale récessive *Q87.8*
- hémi- *R29.5*

Akinétique
- crise *G20.90*

Akinétique –*suite*
- épilepsie *G40.3*
- mutisme *R41.8*
- syndrome, hypotone (hypotonique) *R29.8*

Akureyri, maladie d' *G93.3*

Akureyri, syndrome *G93.3*

Alagille, syndrome d' *Q44.7*

Alajouanine, Foix-, syndrome de *G37.4*

Alalie *R47.0*
- liée au développement *F80.0*

Alanine amino transférase (ALAT), augmen *R74.0*

Alanine-aminotransférase (ALAT), augment *R74.0*

alba Piedra blanc Piedra *B36.2*

Albers-Schönberg (maladie de) *Q78.2*

Albinisme *E70.3*
- cutané *E70.3*
- généralisé *E70.3*
- isolé *E70.3*
- oculaire *E70.3*
- oculo-cutané *E70.3*
- partiel *E70.3*

Albright, syndrome de *Q78.1*
- Forbes- *E22.1*
- Lightwood *N25.8*
- McCune *Q78.1*

Albumine
- absence dans le sang *E88.0*
- anormale *R77.0*
- manque *E46*
- perte *R80*

Albuminurie *R80*
- adolescents *N39.2*
- aiguë *R80*
- Bence-Jones - NCA *R80*
- chronique *R80*
- cours de
- - Accouchement *O12.1*
- - grossesse *O12.1*
- - - avec oedème *O12.2*
- - - lors d'hypertension *O14.9*
- - - - gestationnelle *O14.9*
- - - - préexistante *O11*
- - scarlatine *A38*
- juvénile *N39.2*
- lordotique *N39.2*
- micro- *R80*
- orthostatique *N39.2*
- posturale *N39.2*
- prééclamptique *O14.9*
- - affectant le foetus/nouveau-né *P00.0*
- - sévère *O14.1*
- puerpérale *O12.1*
- - avec oedème *O12.2*
- sévère, lors de grossesse, avec hypertension *O14.1*
- subaiguë *R80*

Alcalémie *E87.3*

Alcalose *E87.3*
- avec tétanie *E87.3*
- métabolique *E87.3*
- respiratoire *E87.3*

Alcanilisant, médicament, intoxication *T50.9*

Alcaptonurie *E70.2*
- avec arthrose *E70.2+, M36.8**

Alcool
- abus *F10.1*
- - chronique *F10.2*
- - mentionné dans l'
- - - anamnèse *Z86.4*
- - - anamnèse familiale *Z81*
- affection du nerf optique *H47.0*
- allergie *T78.4*
- amylique, effet, toxique *T51.3*
- boire, démesurément NCA *F10.1*
- butylique, effet toxique *T51.3*
- cétylique
- - allergie *T78.4*
- - hypersensibilité *T78.4*
- consommation NCA *Z72.0*
- consommationde la mère avec lésion du foetus/nouveau-né *P04.3*
- convulsions sous sevrage *F10.3*
- crise épileptique *G40.5*
- dans le sang, recherche *R78.0*
- délirium tremens *F10.4*
- démence *F10.7*
- dépendance *F10.2*
- - *F19.2*
- - avec ivresse aiguë *F10.0*
- - avec psychose organique *F10.5*
- - cours de grossesse *O99.3*
- dermite de contact, toxique *L24.2*
- détermination du taux dans le sang *Z04.8*
- dysfonction du système nerveux autonome *G31.2*
- embryopathie *Q86.0*
- - avec dysmorphie *Q86.0*
- gastrite *K29.2*
- hallucinose *F10.5*
- intoxication *T51.9*
- - aiguë, au sens d'ivresse *F10.0*
- - avec intoxication, par comprimés *T51.9*
- - lors de dépendance *F10.0*
- isopropylique
- - allergie *T78.4*
- - effet toxique *T51.2*
- - hypersensibilité *T78.4*
- ivresse *F10.0*
- - aiguë *F10.0*
- - avec délire *F10.0*
- - lors de dépendance *F10.2*
- - pathologique *F10.0*
- lésion du foetus/nouveau-né *P04.3*
- maladie *F10.2*
- méthylique
- - dépendance *F10.2*
- - effet, toxique *T51.1*
- myopathie *G72.1*
- paranoïa *F10.5*
- polyneuropathie *G62.1*
- propylique, effet toxique *T51.3*
- psychose *F10.5*
- - avec
- - - confabulation, amnésique *F10.6*
- - - delirium tremens *F10.4*
- - - démence *F10.7*
- - - hallucinose *F10.5*
- - - jalousie *F10.5*
- - - polynévrite *F10.6*
- - paranoïaque *F10.5*

Alcool –*suite*
- stéarylique
- - allergie *T78.4*
- - hypersensibilité *T78.4*
- Syndrome de sevrage *F10.3*
- syndrome de sevrage avec delirium *F10.4*
- trouble
- - amnésique, persistant *F10.6*
- - persistant *F10.7*

Alcoolémie (Alcotest) *Z04.8*

Alcoolique
- acidocétose *E87.2*
- acidose *E87.2*
- anémie *D53.8*
- ataxie cérébelleuse *G31.2*
- atrophie, cerveau *G31.2*
- atteinte
- - organe *F10.1*
- - pancréas *K86.0*
- atteinte, moëlle osseuse *D75.9*
- cardioangiopathie *I42.6*
- cardiomyopathie *I42.6*
- cardiomyopathie dilatée *I42.6*
- cirrhose *K70.3*
- - foie *K70.3*
- - - avec varices, oesophage *K70.3+*
- - - - avec hémorragie *K70.3+*
- - foie stéatosique *K70.3*
- - macronodulaire *K70.3*
- - micronodulaire *K70.3*
- - nutritionnelle *K70.3*
- - portale *K70.3*
- - post-nécrotique *K70.3*
- coma hépatique *K70.4*
- comitialité *G40.5*
- décompensation, foie *K70.4*
- - aiguë *K70.4*
- - chronique *K70.4*
- - subaiguë *K70.4*
- dégénérescence
- - cérébelleuse *G31.2*
- - cérébrale *G31.2*
- - cerveau *G31.2*
- - corticale *G31.2*
- - foie graisseuse *K70.0*
- - système nerveux *G31.2*
- délire de jalousie *F10.5*
- delirium tremens *F10.4*
- dysfonction du coeur *I51.8*
- encéphalopathie *G31.2*
- fibrose hépatique *K70.2*
- folie *F10.5*
- hépatite *K70.1*
- - aiguë *K70.1*
- - chronique *K70.1*
- hépatomégalie *K70.9*
- hépatopathie *K70.9*
- intoxication aiguë avec psychose organique *F10.5*
- ivresse pathologique aiguë NCA *F10.0*
- Laennec (cirrhose de-), foie *K70.3*
- lésion, foie *K70.9*
- maladie, foie *K70.9*
- - avec psychose organique *F10.5*
- manie *F10.5*
- - aiguë *F10.5*
- - chronique *F10.5*

Alcoolique –*suite*

- myocardiopathie *I42.6*
- myocardite *I40.8*
- myopathie *G72.1*
- paranoïa *F10.5*
- pellagre *E52*
- polyneuropathie *G62.1*
- prédélire *F10.4*
- pseudo-paralysie *F10.8*
- psychose *F10.5*
- - paranoïaque *F10.5*
- sclérose du foie *K70.2*
- stéatose du foie *K70.0*
- stéatose hépatique *K70.0*
- syndrome psychotique *F10.7*
- - chronique, organique *F10.7*
- thrombocytopénie *D69.58*
- trouble(s) du comportement *F10.9*

Alcoolisation du foie *K70.9*

Alcoolisme *F10.2*
- avec
- - affectant foetus ou nouveau-né *P04.3*
- - démence *F10.7*
- - gastrite *K29.2*
- - psychose *F10.5*
- chronique *F10.2*
- dans la famille, avec problème *Z63*
- dépistage *Z13.8*
- Korsakoff *F10.6*

Alder-Reilly, anomalie d' *D72.0*

Alder-Reilly, anomalie de *D72.0*

Aldolase, carence héréditaire en *E74.1*

Aldostérone, hypersécretion *E26.9*

Aldostéronisme *E26.9*
- primaire *E26.0*
- - à une hyperplasie corticosurrénale *E26.0*

Aleucémie *C95.70*
- rémission complète *C95.71*

Aleucémique
- leucémie
- - granulocytaire *C92.70*
- - lymphoïde *C91.70*
- - lympthatique *C91.70*
- - monocytaire *C93.70*
- - myélique *C92.70*
- - myélogène *C92.70*
- réticulose *C96.0*

Aleukia haemorrhagica *D61.9*

Alexander, syndrome d' *E75.2*

Alexie *R48.0*
- développement *F81.0*

Algie vasculaire de la face *G44.0*
- chronique *G44.0*
- épisodique *G44.0*

Algie vasculaire de la face [syndrome de *G44.0*

Algie, non précisée *R52.9*

Algodystrophie *M89.09*

Algogène, syndrome psychique *F07.9*

Algolagnie *F65.5*
- active *F65.5*
- passive *F65.5*

Algoménorrhée *N94.6*

Algoneurodystrophie *M89.09*

Algopareunie
- chez la femme *N94.1*
- chez l'homme *N48.8*

Alibert-Bazin, syndrome d' *C84.0*

Alibidinie *F52.0*

Aliénation *Z63*

Aliment
- allergie *T78.1*
- - avec
- - - colite *K52.2*
- - - conseil diététique *Z71*
- - - diarrhée *K52.2*
- - - entérite *K52.2*
- - - gastro-entérite *K52.2*
- - - surveillance diététique *Z71*
- asphyxie *T17.9*
- aspiration *T17.9*
- carence *T73.0*
- choc, anaphylactique NCA *T78.0*
- dermite *L27.2*
- dermite de contact *L25.4*
- - toxique *L24.6*
- Eczéma professionnel *L24.6*
- infection *A05.9*
- ingéré
- - allergie cutanée *L27.2*
- - avec dermite *L27.2*
- - eczéma *L27.2*
- - exanthème *L27.2*
- intolérance *K90.4*
- - *T78.1*
- - avec
- - - conseil diététique *Z71*
- - - diète, surveillance *Z71*
- - avec choc *T78.0*
- intoxication *T62.9*
- - bactérienne *A05.9*
- malabsorption *K90.9*
- pneumonie par aspiration *J69.0*
- réaction
- - allergique NCA *T78.1*
- - gastro-intestinale, allergique *K52.2*
- régurgitation *R11*
- - chez le nouveau-né *P92.1*
- suffocation *T17.9*
- toxique, effet *T62.9*
- urticaire *L50.0*

Aliment régurgité
- étouffement *T17.9*
- pneumonie par aspiration *J69.0*

Alimentaire
- anémie *D53.9*
- - avec absorption de fer faible *D50.8*
- - macrocytaire *D52.0*
- - mégaloblastique *D52.0*
- - par carence en acide folique *D52.0*
- cardiomyopathie *E63.9+, I43.2**
- carence *E63.9*
- - avec arthropathie *E63.9+, M14.5**
- - calcium *E58*
- - conséquences *E64.9*
- - molybdène *E61.5*
- - par deséquilibre alimentaire *E63.1*
- - sélénium *E59*
- - vitamine B12, avec anémie *D51.3*
- - zinc *E60*
- dystrophie *E45*

Alimentaire –*suite*

- marasme *E41*
- obésité *E66.09*
- retard de croissance *E45*
- retard de développement *E45*
- syndrome de dumping après gastrectomie *K91.1*
- tendance aux syncopes après gastrectomie *K91.1*
- trouble(s) *E63.9*
- - ongle *L60.3*

Alimentation
- adéquate, carence NCA *Z59*
- boisson, difficultés chez les nouveaux-nés *P92.2*
- carence *T73.0*
- - avec
- - - anémie *D53.9*
- - - - avec hypoabsorption du fer *D50.8*
- - - stomatite angularis *E53.0*
- - faim *T73.0*
- composition, déséquilibrée *E63.9*
- - avec carence alimentaire *E63.1*
- excessive *R63.2*
- inhalation, avec pneumonie *J69.0*
- inspiration *T17.9*
- réduite *E46*
- refus *F50.9*
- - comportemental *F50.9*
- - dans la petite enfance *F98.2*
- régurgitée
- - étouffement *T17.9*
- - pneumonie par aspiration *J69.0*
- surveillance *Z71*
- trouble, pendant l'enfance *F98.2*

ALK
- négatif Lymphome anaplasique à grand cellules, *C84.7*
- positif Lymphome anaplasique à grand cellules, *C84.6*

Allaitement *O92.50*
- absence partielle *O92.40*
- atrophie *O92.60*
- au sein difficile chez le nouveau-né *P92.5*
- avec mastite NCA *O91.20*
- bouchon *O92.70*
- diminué *O92.50*
- excessif *O92.60*
- insuffisance *O92.30*
- - partielle, en couche *O92.40*
- non puerpéral *N64.3*
- primaire *O92.50*
- psychose *F53.1*
- retard *O92.50*
- - avec difficultés à la mise au sein *O92.51*
- secondaire *O92.50*
- surveillance *Z39.1*
- trouble NCA *O92.70*
- - compliquant la naissance, en couche NCA *O99.8*
- - couche *O92.70*

Allen-Masters, syndrome d' *N83.8*

Allergène
- désensibilisation *Z51.6*
- poussière, excepté pollen *J30.3*
- test *Z01.5*

Allergène respiratoire, avec rhinite, al *J30.3*

Allergie *T78.4*
- acariens de la poussière, avec asthme bronchique *J45.0*
- aliments, due à
- - colite *K52.2*
- - conseil diététique *Z71*
- - diarrhée *K52.2*
- - entérite *K52.2*
- - gastro-entérite *K52.2*
- - surveillance diététique *Z71*
- antécédent familial *Z84.8*
- avec dermatose *L23.9*
- avec eczéma *L23.9*
- conjonctivite *H10.1*
- contact *L23.9*
- due à
- - aciclovir *T88.7*
- - acide benzoïque *T78.4*
- - acide benzosulfonique *T78.4*
- - acide citrique *T78.4*
- - acide de Bernstein *T78.4*
- - acide sorbique *T78.4*
- - acide tropique *T78.4*
- - acide valproïque, dérivés de *T88.7*
- - acridine, dérivés de l' *T88.7*
- - adrénergique produit *T88.7*
- - agent antiinfectieux, antécédent personnel NCA *Z88.3*
- - alcool *T78.4*
- - alcool benzylique *T78.4*
- - alcool cétylique *T78.4*
- - alcool isopropylique *T78.4*
- - alcool stéarylique *T78.4*
- - aliment *T78.1*
- - amantadine *T88.7*
- - amarante (E123) *T78.4*
- - amide anesthésique local *T88.7*
- - amidine *T88.7*
- - aminoglycoside *T88.7*
- - aminoquinoline *T88.7*
- - amoxicilline *T88.7*
- - amphotéricine B *T88.7*
- - analgésique, antécédent personnel *Z88.6*
- - anesthésique, antécédent personnel NCA *Z88.4*
- - annatto *T78.4*
- - antagoniste des récepteurs adrénergiques alpha *T88.7*
- - antagoniste du calcium *T88.7*
- - antagoniste récepteurs adrénergiques bêta *T88.7*
- - antagonistes de sérotonine (5HT3) *T88.7*
- - anthracène, dérivés de *T88.7*
- - anthracycline *T88.7*
- - antibiotique, antécédent personnel *Z88.1*
- - anticholinergique *T88.7*
- - anticorps monoclonal *T88.7*
- - antidépresseur tricyclique *T88.7*
- - antihistaminique *T88.7*
- - atropine *T88.7*
- - azorubine (E122) *T78.4*
- - barbiturique *T88.7*
- - baume du Pérou *T88.7*
- - benzamide *T88.7*
- - benzimidazole, dérivés de *T88.7*
- - benzodiazépine *T88.7*

Allergie *–suite*
- due à *–suite*
- - bêtabloquant *T88.7*
- - bêta-lactame antibiotique *T88.7*
- - bisphosphonate *T88.7*
- - brun (E155) *T78.4*
- - butylhydroxyanisol *T78.4*
- - butylhydroxytoluène *T78.4*
- - butyrophénone, dérivés de *T88.7*
- - caféine *T88.7*
- - cannelle *T78.1*
- - carbamate *T88.7*
- - carbamazépine *T88.7*
- - carbapénème *T88.7*
- - carmins (E120) *T78.4*
- - caroube, farine de (E140) *T78.4*
- - carraghénane (E407) *T78.4*
- - céfotaxime *T88.7*
- - céphalosporine *T88.7*
- - chlorocresol *T78.4*
- - chlorure de benzalkonium *T78.4*
- - chrysanthème *T78.4*
- - citrate de triéthyle *T78.4*
- - clindamycine *T88.7*
- - composé nitré *T78.4*
- - composite, plante *T78.4*
- - contraste, produit de *T88.7*
- - - iodé *T88.7*
- - corticostéroïde *T88.7*
- - curcumine (E100) *T78.4*
- - dacarbazine *T88.7*
- - darbépoétine-alfa *T88.7*
- - désirudine *T88.7*
- - dihydropyridine *T88.7*
- - dioxyde de soufre *T78.4*
- - diphenylbutylpiperidine *T88.7*
- - ergot de seigle, alcaloïde de l' *T88.7*
- - érythromycine *T88.7*
- - érythrosine (E127) *T78.4*
- - ester, anesthésique local *T88.7*
- - estradiol *T88.7*
- - éthanol *T78.4*
- - fentanyl *T88.7*
- - filgastrim *T88.7*
- - fluorouracile *T88.7*
- - formaldéhyde *T78.4*
- - gadodiamide *T88.7*
- - gallate *T78.4*
- - glycopeptide antibiotique *T88.7*
- - glycoside cardiaque *T88.7*
- - gonadotrophine releasing hormone, analogue *T88.7*
- - guar, farine de (E412) *T78.4*
- - hamster protéine de *T78.4*
- - héparine *T88.7*
- - histamine antagoniste des récepteurs H2 *T88.7*
- - hormone corticotrope (ACTH) *T88.7*
- - huile d'arachide *T78.1*
- - hydantoïne, dérivés de *T88.7*
- - hydralazine *T88.7*
- - hydrocarbure halogéné *T88.7*
- - imidazole, dérivés de *T88.7*
- - immunoglobuline *T88.7*
- - - humaine normale *T88.7*
- - indométacine *T88.7*
- - inhalation d'anesthésiques *T88.7*
- - inhibiteur bêta-lactamase *T88.7*

Allergie *–suite*
- due à *–suite*
- - inhibiteurs d'enzyme de conversion (ECA) *T88.7*
- - iode *T78.4*
- - jaune de quinoléine (E104) *T78.4*
- - jaune orangé S (E110) *T78.4*
- - Karaya (E416) *T78.4*
- - lacosamide *T88.7*
- - lidocaïne *T88.7*
- - lincomycine *T88.7*
- - lisinopril *T88.7*
- - lutéine-releasing hormone *T88.7*
- - lysozyme *T78.4*
- - macrogol *T88.7*
- - macrogol ricinoléate de glycérol *T78.4*
- - macrolide *T88.7*
- - macrolide, antibiotique *T88.7*
- - médicament *T88.7*
- - mercaptopurine *T88.7*
- - mercure *T88.7*
- - métoprolol *T88.7*
- - myorelaxant *T88.7*
- - nadroparine *T88.7*
- - narcotique, antécédent personnel NCA *Z88.5*
- - natamycine *T88.7*
- - néomycine *T88.7*
- - neuroleptique *T88.7*
- - nitrate *T88.7*
- - nitrofurane *T88.7*
- - nitroimidazole, dérivés de *T88.7*
- - nitroso-urée *T88.7*
- - noir brillant (E151) *T78.4*
- - norfluran *T78.4*
- - ombellifères *T78.4*
- - opiacé *T88.7*
- - oxicam *T88.7*
- - parabène *T78.4*
- - para-hydroxybenzoate de méthyle *T78.4*
- - pénicilline *T88.7*
- - perchlorate *T88.7*
- - phénothiazine *T88.7*
- - phénytoïne *T88.7*
- - pipérazine, dérivés de la *T88.7*
- - pipéridine, dévivés de la *T88.7*
- - podophyllotoxine *T88.7*
- - polymyxine B *T88.7*
- - ponceau (E124) *T78.4*
- - pravastatine *T88.7*
- - probénécide *T88.7*
- - propacétamol *T88.7*
- - propylène glycol *T78.4*
- - prostaglandine *T88.7*
- - protéine de soja *T78.1*
- - protéine d'oeuf *T78.1*
- - protéines plasmatiques *T88.7*
- - pyrazolone *T88.7*
- - pyréthrine *T88.7*
- - pyrrolidone *T78.4*
- - quinazoline *T78.4*
- - quinoline *T88.7*
- - quinoline méthanol *T88.7*
- - quinolone *T88.7*
- - racine de valériane *T88.7*
- - rifamycine *T88.7*
- - rouge (E128) *T78.4*
- - rouge allura (E129) *T78.4*

Allergie –*suite*
- due à –*suite*
- - rouge cochenille (E124) *T78.4*
- - rouge de phénol *T78.4*
- - rubine, pigments (E180) *T78.4*
- - salicylates *T88.7*
- - sérum *T80.6*
- - - antécédent personnel *Z88.7*
- - sodium, benzoate de *T78.4*
- - sodium, bisulfate de *T78.4*
- - sodium, édétate de *T78.4*
- - soja *T78.1*
- - sorbitol *T78.1*
- - souris protéine de *T78.4*
- - sulfamidés *T88.7*
- - sulfamidés, antécédent personnel *Z88.2*
- - sulfasalazine *T88.7*
- - sulfite *T78.4*
- - sulfonylurée *T88.7*
- - sympathomimétique *T88.7*
- - tacrolimus *T88.7*
- - tartrazine (E102) *T78.4*
- - terbutaline *T88.7*
- - tétracycline *T88.7*
- - tétracycline, dérivés de *T88.7*
- - thiamine *T88.7*
- - thiazide *T88.7*
- - thionamide, dérivés de *T78.4*
- - thioxanthène *T88.7*
- - thyréotropine-releasing-hormone *T88.7*
- - tolycaïne *T88.7*
- - traganthe (E413) *T78.4*
- - triammonium citrate de *T78.4*
- - triarylméthane *T78.4*
- - triméthoprime *T88.7*
- - triphénylméthane, colorant *T78.4*
- - urée *T88.7*
- - vaccin, antécédent personnel *Z88.7*
- - valaciclovir *T88.7*
- - vitamine D *T88.7*
- - xanthine *T88.7*
- examen *Z01.5*
- gastro-intestinale *K52.2*
- herbe, avec asthme *J45.0*
- lapin *T78.4*
- multiple *T78.4*
- par
- - acarien *J30.3*
- - agent conservateur *L23.5*
- - ambroisie *J30.1*
- - - avec asthme *J45.0*
- - caoutchouc *L23.5*
- - chrome *L23.0*
- - ciment *L23.5*
- - contact avec des aliments *L23.6*
- - cosmétique *L23.2*
- - détergent *L23.5*
- - farine, avec asthme *J45.0*
- - foin *J30.1*
- - gluten *K90.0*
- - graisse *L23.5*
- - inhalation *J30.3*
- - insecticide *L23.5*
- - irradiation *L59.8*
- - lait de vache *L27.2*
- - lapin *T78.4*

Allergie –*suite*
- par –*suite*
- - lesive *L23.5*
- - moisissures *J30.3*
- - nickel *L23.0*
- - pancement *L23.5*
- - pellicules *J30.3*
- - pénicilline, antécédent personnel *Z88.0*
- - plante *L23.7*
- - plante à floraison précoce *J30.1*
- - plastique *L23.5*
- - plume *J30.3*
- - poil de chat *J30.3*
- - poils d'animaux *J30.3*
- - pollen *J30.1*
- - - avec asthme *J45.0*
- - pollen de bouleau *J30.1*
- - pollen de l'herbe *J30.1*
- - pollen de roses *J30.1*
- - pollen de séneçon de Jacob *J30.1*
- - pollen d'herbes *J30.1*
- - poussière domestique *J30.3*
- - - avec asthme *J45.0*
- - produit chimique *L23.5*
- - rayon solaire *L56.4*
- - savon *L23.5*
- - seigle *J30.1*
- - solvant organique *L23.5*
- paupière *H01.1*
- peau *L23.9*
- - origine indéterminée *L50.9*
- - provoquée par
- - - aliment ingéré *L27.2*
- - - chaleur *L50.2*
- - - contact *L23.9*
- - - froid *L50.2*
- - - médicament *L27.0*
- photo-, avec dermatose *L56.8*
- pollen de bouleau *J30.1*
- poussière *J30.3*
- rhinite *J30.4*
- sans précision *T78.4*
- solaire *L56.4*
- soleil *L56.4*
- voies respiratoires *J98.8*
- - supérieures *J30.4*

allergique Vasculite *D69.0*

Allergique - *voir* Type de maladie

Allescheria boydii, infection (à) *B48.2*

Alleschériose *B48.2*

Allochirie *R20.8*

Allo-immunisation des thrombocytes, avec *D69.58*
- *D69.58*

Allongement
- coagulation *D68.9*
- coma, en cas de lésion intra-crânienne *S06.9, S06.79!*
- contracture, utérus, pendant le travail *O62.4*
- grossesse *O48*
- ictère psychologique, chez le nouveau-né *P59.9*
- miction *R39.1*
- naissance, avec césarienne *O63.9*
- temps de coagulation *D68.9*
- travail *O63.9*

Allongement –*suite*
- travail –*suite*
- - avec lésion foetus/nouveau-né *P03.8*
- - deuxième période *O63.1*
- - première période *O63.0*

Allorythmie *I49.9*

Allura, rouge
- allergie [E 129] *T78.4*
- hypersensibilité [E 129] *T78.4*

Alopécie *L65.9*
- androgénique *L64.9*
- - provoquée par un médicament *L64.0*
- cicatricielle *L65.8*
- - *L66.9*
- circonscrite *L63.9*
- congénitale *Q84.0*
- consécutive à une infection NCA *L65.8*
- corps entier *L63.1*
- diffuse *L65.9*
- héréditaire *L65.9*
- maligne *L65.8*
- marginale *L65.8*
- mucineuse *L65.2*
- parvimaculata *L65.8*
- pelade *L63.9*
- post-infectieuse NCA *L65.8*
- post-ménopausique *L64.9*
- post-partum *L65.0*
- prématurée *L64.8*
- provoquée par
- - médicament cytotoxique NCA *L65.8*
- - rayons X *L58.1*
- pseudo-pelade *L66.0*
- séborrhéique *L65.9*
- sénile *L65.9*
- syphilitique *A51.3+, L99.8**
- totale *L63.0*
- toxique *L65.8*
- type androgénique *L64.9*
- universelle *L63.1*

Alpers, maladie d' *G31.88*

alpha bêta gamma delta Contient des cellules de type *C86.1*

Alpha et bêta-adrénergiques, médicaments *T44.9*

Alpha, cellules
- adénome *D13.7*
- tumeur *D13.7*
- - maligne du pancréas *C25.4*

Alpha, maladie des chaînes lourdes alpha *C88.10*
- rémission complète *C88.11*

Alpha-1-antitrypsine, carence *E88.0*

Alpha-adrénergiques, antagonistes
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Alpha-foetoprotéine
- abaissée *R77.2*
- anomalie *R77.2*
- anormale *R77.2*
- élevée *R77.2*
- taux élevé dans le liquide amniotique *Z36.1*

Alpha-réductase 5 alphareductase, carenc *E29.1*
- avec pseudohermaphrodisme masculin *E29.1*

Alpha-thalassémie *D56.0*

Alport, syndrome d' *Q87.8*
- autre oeil, avec amaurose, unilatérale *H54.1*
- bilatérale *H54.2*
- presbytie *H52.4*
- unilatérale *H54.5*

altération gène MLL Leucémie myéloïde aigu avec *C92.6*

Altération des fonctions locomotrices *R26.8*

Altération du lien familial *Z63*
- due à un divorce *Z63*

Altération psychologique sénile *F03*

Altération vasculaire de la rétine *H35.0*

Altération, son cardiaque foetal, prise *O36.3*

Alternant(e)
- ésotropie *H50.0*
- - intermittente *H50.3*
- - sauf intermittente *H50.0*
- exotropie *H50.1*
- - intermittente *H50.3*
- - sauf intermittente *H50.1*
- hyperphorie *H50.5*
- paralysie *G83.88*
- - moyenne *G83.88*
- - nerf oculomoteur *G83.88*
- strabisme *H50.9*
- - convergent intermittent *H50.3*
- - divergent intermittent *H50.3*
- strabisme convergent *H50.0*
- trouble de la personnalité *F44.88*

Alternaria, infection (à) *B48.7*

Altitude
- effets NCA *T70.2*
- - oreille *T70.0*
- - sinus paranasaux *T70.1*
- oedème pulmonaire *T70.2*

Altitude, pression, maladie *T70.2*

Aluminium
- maladie *M83.49*
- ostéomalacie *M83.49*
- ostéopathie *M83.49*
- pneumoconiose *J63.0*

Aluminose *J63.0*
- associée à la tuberculose, organes respiratoires *J65*
- associée à une fibrose, pulmonaire *J63.0*

Aluminose pulmonaire *J63.0*

alvéolaire
-
-
- adénocarcinome *C34.9*
- adénome *D14.3*
- - pulmonaire *C34.9*
- anomalie NCA *J84.0*
- carcinome *C34.9*
- échinococcose *B67.7*
- - hépatique *B67.5+, K77.0**
- gangrène *K10.3*
- hyperplasie de la muqueuse *K06.2*
- hypoventilation *R06.88*
- - associée à l'obésité *E66.29*
- - - avec
- - - - indice de masse corporelle (IMC) de

alvéolaire *–suite*
- hypoventilation *–suite*
- - associée à l'obésité *–suite*
- - - avec *–suite*
- - - - indice de masse corporelle (IMC) de *–suite*
- - - - - 30 à moins de 35, *E66.20*
- - - - - 35 à moins de 40, *E66.21*
- - - - - 40 et plus, *E66.22*
- - - chez les enfants et les adolescents *E66.29*
- - non obstructive du sommeil, idiopathique *G47.32*
- - syndrome *E66.29*
- Kyste naso - labial [naso - *K09.1*
- lésion *J84.0*
- microlithiase, pulmonaire *J84.0*
- ostéite *K10.3*
- pariéto alvéolaire Pneumonies *J84.0*
- périostite *K10.3*
- pneumonie, granulocytaire *J18.8*
- Pneumonies alvéolaire pariéto - *J84.0*
- protéinose *J84.0*
- pyorrhée *K05.3*
- rhabdomyosarcome *C49.9*
- sarcome, parties molles *C49.9*

Alvéole dentaire
- abcès
- - apical *K04.6*
- - cas d'abcès
- - - dentaire *K04.6*
- - - dento alvéolaire *K04.6*
- hémorragie, après extraction *T81.0*
- infection *K10.3*
- inflammation *K10.3*
- - cas de scorbut *E54+, K93.8**
- maladie *K08.9*
- sèche *K10.3*

Alvéolite
- allergique *J67.9*
- - liée à une obstruction, voies respiratoires *J67.9*
- - provoquée par
- - - actinomycètes thermophiles *J67.7*
- - - moisissures *J67.7*
- - - organismes provenant de systèmes de conditionnement d'air *J67.7*
- - - poussières organiques inhalées *J67.8*
- avec fibrose *J84.1*
- broncho- *J18.0*
- cryptogénique, fibreuse *J84.1*
- extrinsèque *J67.9*
- fibreuse *J84.1*
- mâchoire *K10.3*
- provoquée par
- - Aspergillus clavatus *J67.4*
- - Cryptostroma corticale *J67.6*

Alvéolocapillaire, obstruction *J84.1*

Alvéolodentaire, périostite *K10.3*

Alymphocytose *D72.8*
- thymique *D82.1*

Alymphoplasie thymique *D82.1*

Alzheimer *G30.9*
- avec
- - début précoce, avec démence (type 2) *G30.0+, F00.0**
- - début tardif, avec démence (type 1) *G30.1+, F00.1**

Alzheimer *–suite*
- avec démence *G30.9+, F00.9**
- forme présénile *G30.0+, F00.0**
- forme sénile *G30.1+, F00.1**
- précoce *G30.0+, F00.0**
- tardive *G30.1+, F00.1**

Amagnétique, *voir* type de maladie

Amaigrissement *E41*
- extrême *E41*
- malnutrition *E41*

Amalgame, intoxication *T49.7*

Amantadine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*
- intoxication *T42.8*

Amarante
- allergie (E 123) *T78.4*
- hypersensibilité (E 123) *T78.4*

Amastie - agénésie de sein *Q83.8*
- avec
- - absence congénitale du mamelon *Q83.0*
- - présence du mamelon *Q83.8*

Amaurose *H54.0*
- acquise *H54.0*
- bilatérale *H54.0*
- congénitale *H54.0*
- fugace *G45.39*
- hystérique *F44.6*
- Leber (de-) *H35.5*
- - congénitale *H35.5*
- - tapéto-rétinienne *H35.5*
- traumatique *H54.0*
- unilatérale *H54.4*
- - avec
- - - baisse de vision de l'autre oeil *H54.1*
- - - vision normale de l'autre oeil *H54.4*

Amaurotique
- idiotie *E75.4*
- - familiale *E75.4*
- - forme tardive *E75.4*
- - infantile *E75.4*
- - juvénile *E75.4*
- Tay-Sachs (maladie de-), familiale *E75.0*

Ambivalent, problème, partenariat *Z63*

Amblyopie *H53.0*
- acquise *H53.0*
- avec strabisme *H53.0*
- congénitale *H53.0*
- crépusculaire *H53.6*
- hystérique *F44.6*
- lors de / par
- - héméralopie (cécité nocturne) *H53.6*
- - nicotine *H53.8*
- lors de/par
- - amétropie *H53.0*
- - anisométropie *H53.0*
- - défaut d'usage *H53.0*
- - ptose *H53.0*
- - strabisme *H53.0*
- partielle *H53.0*
- sur vice de réfraction *H52.7*
- toxique NCA *H53.8*

Amblyopie crépusculaire *H53.6*

Amblyopie par anopsie *H53.0*

Amblyopie réfractaire *H52.7*

Ambrosie
- allergie *J30.1*
- - avec asthme *J45.0*
- dermite de contact, allergique *L23.7*

Amélanotique
- mélanome *C43.9*
- - malin *C43.9*
- naevus *D22.9*

Amélie *Q73.0*
- extrémité
- - inférieure *Q72.0*
- - supérieure *Q71.0*

Améloblastique
- carcinome *C41.1*
- - mâchoire supérieure (os) *C41.02*
- fibrome *D16.5*
- - mâchoire supérieure *D16.42*
- fibro-odontome *D16.5*
- - mâchoire supérieure (os) *D16.42*
- fibrosarcome *C41.1*
- - mâchoire supérieure (os) *C41.02*
- odontome *D16.5*
- - mâchoire supérieure (os) *D16.41*
- odontosarcome *C41.1*
- - mâchoire supérieure (os) *C41.02*

Améloblastome *D16.5*
- mâchoire inférieure (os) *D16.5*
- malin *C41.1*
- - mâchoire supérieure (os) *C41.02*
- mandibule, malin *C41.1*
- mélanotique *D16.9*
- odonto- *D16.5*
- os longs *C40.9*
- tibia *C40.2*

Amélogenèse (amelogenesis) *K00.5*
- Imparfaite (imperfecta) *K00.5*
- - non hereditaria segmentalis *K00.4*

Aménorrhée *N91.2*
- centrale *N91.1*
- econdaire *N91.1*
- état de détresse *N91.1*
- fonctionnelle *N91.1*
- hormonale *N91.1*
- hyperhormonale *E28.8*
- hypogonadotrope *N91.1*
- hypothalamique *N91.1*
- post-natal *N91.1*
- primaire *N91.0*
- pseudo- *N91.1*
- psychogène *N91.1*
- rgence *N91.1*
- secondaire *N91.1*
- sous prise d'inhibiteurs de l'ovulation *N91.1*
- stress *N91.1*
- sur atrésie *N91.0*
- traumatique *N91.1*
- ue au stress *N91.1*

Aménorrhée post-pilule *N91.1*

Aménorrhée-galaktorrhée syndrome *E22.1*

Amentia *F03*
- Meynert *F10.6*

Amentia (syndrome) *F79.9*

Americaine, trypanosomiase, avec atteint *B57.2+, I41.2**

Amétropie *H52.7*
- avec amblyopie *H53.0*

Amiante
- dépistage, par plaques, plèvre *J92.0*
- fixation dans les poumons *J61*
- pneumoconiose *J61*

Amibes
- abcès *A06.4*
- - cerveau *A06.6+, G07**
- - foie *A06.4*
- - - avec abcès cérébral *A06.6+, G07**
- - peau *A06.7*
- - poumon *A06.5+, J99.8**
- - - avec
- - - - abcès
- - - - - hépatique, *A06.5+, J99.8**
- - - - - cérébral, *A06.6+, G07**
- - - - pneumonie *A06.5+, J17.0**
- - rate *A06.8*
- appendicite *A06.8*
- avec
- - cystite *A06.8+, N33.8**
- - diarrhée, non dysentérique *A06.2*
- - entérite
- - - aiguë *A06.0*
- - - chronique *A06.1*
- - - non dysentérique *A06.2*
- balanite *A06.8+, N51.2**
- colite *A06.0*
- - non dysentérique *A06.2*
- dermite *A06.7*
- diarrhée *A06.0*
- - aiguë *A06.0*
- - chronique *A06.1*
- dysenterie *A06.0*
- - aiguë *A06.0*
- - chronique *A06.1*
- - porteur (sujet -) *Z22.1*
- entérite *A06.0*
- hépatite *A06.4*
- infection *A06.9*
- méningo-encéphalite primaire *B60.2+, G05.2**
- pneumonie *A06.5+, J17.3**
- proctite, aiguë *A06.0*
- ulcère
- - intestin *A06.1*
- - peau *A06.7*
- vésiculite (séminale) *A06.8*
- vulvovaginite *A06.8+, N77.1**

Amibiase *A06.9*
- aiguë *A06.0*
- cutanée *A06.7*
- hépatique *A06.4*
- intestinale *A06.0*
- intestinale chronique *A06.1*
- porteur *Z22.1*
- pulmonaire *A06.5+, J99.8**

Amibien(ne)
- cystite *A06.8+, N33.8**
- entérite
- - aiguë *A06.0*
- - chronique *A06.1*

Amides, anesthésiques locaux de type-
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Amidine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Amidon

Amidon *–suite*
- absorption, trouble *K90.4*
- intolérance NCA *K90.4*
- intolérance, avec malabsorption *K90.4*
- malabsorption *K90.4*

Amimie *R48.8*

Aminoacidopathie *E72.9*

Aminoacidurie *E72.9*

Amino-acidurie *E72.9*

Aminoglycoside
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

aminoglycosides non résistant glycopeptides Enterococcus faecalis résistant au oxazolidinones ou hautement résistant au *U80.21!*
- Enterococcus faecium résistant au oxazolidinones ou au streptogramines ou hautement résistant au *U80.31!*

Aminoquinoline
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Ammoniac, anomalie(s) du métabolisme *E72.2*

Amnésie *R41.3*
- antérograde *R41.1*
- auditive *R48.8*
- dissociative *F44.0*
- hystérique *F44.0*
- postcritique chez les épileptiques *G40.9*
- psychogène *F44.0*
- rétrograde *R41.2*
- transitoire, globale *G45.49*

Amnésie antérograde *R41.1*

Amnésique
- aphasie *R47.0*
- complexe symptomatique *F10.6*
- confabulation, lors de psychose alccolique *F10.6*
- épisode *G45.49*
- état *F04*
- syndrome *F10.6*
- - après usage de
- - - alcool *F10.6*
- - - cocaïne *F14.6*
- - - dérivés du cannabis *F12.6*
- - - hallucinogènes *F16.6*
- - - opioïdes *F11.6*
- - - sédatifs et hypnotiques *F13.6*
- - - solvants volatils *F18.6*
- - organique, non dû à l'alcool *F04*
- trouble persitant, dû à
- - alcool *F10.6*
- - sédatifs *F13.6*

Amniographie *Z36.3*

Amnios (sac amniotique)
- adhérence postinfectieuse, avec lésion du foetus/nouveau-né *P02.8*
- anomalie *O41.9*
- - avec lésion, foetus ou nouveau-né *P02.9*
- avec adhérence, foetus *O41.8*
- embolie amniotique *O88.1*
- fibrose *O41.8*
- hydramnios *O40*
- kyste *O41.8*
- syndrome infectieux *O41.1*

Amnios (sac amniotique) *–suite*
- syndrome infectieux *–suite*
- - chez le nouveau-né *P02.7*

Amnioscopie *Z36.3*

Amniotique
- bride *Q79.8*
- kyste, placenta *O43.1*

Amniotite *O41.1*
- avec lésion, foetus ou nouveau-né *P02.7*

Amœbome *A06.3*
- intestinal *A06.3*

Amoral(ité), trouble de la personnalité *F60.2*

Amoxicilline
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Amphétamine
- abus *F15.1*
- dépendance *F15.2*

Amphotéricine B
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Ampoule
- hépatopancréatique, carcinome in situ *D01.5*
- oesophagienne inférieure *K22.8*
- phrénique *K22.8*
- Vater (de), carcinome in situ *D01.5*

Ampoule phrénique *K22.8*

Amputation
- col de l'utérus, complication
- - accouchement *O34.4*
- - grossesse *O34.4*
- crânienne *S18*
- doigt *S68.1*
- extrémités des deux membres supérieurs, traumatique *T05.2*
- foetus, pour faciliter l'accouchement *P03.8*
- jambe, état consécutif à une *Z89.5*
- main et poignet, traumatique *S68.9*
- neurome *T87.3*
- partie du crâne, traumatique, séquelles *T90.8*
- séquelles postopératoires NCA *T98.3*
- traumatique *T14.7*
- - articulation de la hanche *S78.0*
- - articulation de l'épaule *S48.0*
- - avant-bras *S58.9*
- - bassin, parties NCA *S38.3*
- - bras *S48.9*
- - cuisse *S78.9*
- - doigts
- - - deux, et autres parties de la main *S68.3*
- - - doigt et autres parties de la main *S68.3*
- - - plusieurs *S68.2*
- - - seul *S68.1*
- - entre
- - - coude et poignet *S58.1*
- - - épaule et coude *S48.1*
- - - genou et cheville *S88.1*
- - - hanche et genou *S78.1*
- - extrémité *T14.7*
- - - membre inférieur

Amputation *–suite*
- traumatique *–suite*
- - extrémité *–suite*
- - - membre inférieur *–suite*
- - - - sauf orteils *T13.6*
- - - - séquelles *T93.6*
- - - membre supérieur *T11.6*
- - - - séquelles *T92.6*
- - jambe *S88.9*
- - - deux *T05.5*
- - lèvres
- - - grandes lèvres *S38.2*
- - - petites lèvres *S38.2*
- - main *S68.9*
- - - deux *T05.0*
- - - et autres parties du membre supérieur *T05.1*
- - - niveau du poignet *S68.4*
- - membre inférieur *T13.6*
- - - deux *T05.5*
- - membre supérieur *T11.6*
- - - es deux *T05.2*
- - - et membre inférieur, toute combinaison *T05.6*
- - multiple *T05.9*
- - nez *S08.8*
- - niveau de
- - - genou *S88.0*
- - niveau du
- - - coude *S58.0*
- - niveau du cou *S18*
- - oreille *S08.1*
- - organes génitaux externes *S38.2*
- - orteil
- - - deux ou plus et parties du pied *S98.3*
- - - plusieurs *S98.2*
- - - seul *S98.1*
- - - - et parties du pied *S98.3*
- - parties de l'abdomen *S38.3*
- - pénis *S38.2*
- - pied *S98.4*
- - - deux *T05.3*
- - - et
- - - - autres parties de la jambe *T05.4*
- - - - autres parties du membre inférieur *T05.4*
- - - niveau de la cheville *S98.0*
- - pouce *S68.0*
- - région lombosacrée, parties *S38.3*
- - scrotum *S38.2*
- - séquelles *T94.1*
- - testicule *S38.2*
- - thorax, partie *S28.1*
- - tronc NCA *T09.6*
- - vulve *S38.2*
- tronc, traumatique, séquelles *T91.8*
- visage, traumatique, séquelles *T90.8*

Amputé(e) *Z89.9*
- deux côtés *Z89.9*

Amusie *R48.8*
- développement *F80.8*

Amyélencéphalie *Q00.0*

Amyélie *Q06.0*

Amygdale
- abcès *J36*
- adénome pléomorphe ou tumeur mixte *D37.0*

Amygdale *–suite*
- affection *J35.9*
- - chronique *J35.9*
- angiosarcome *C09.9*
- aspergillose *B44.2+, J99.8**
- brûlure *T28.0*
- calcul *J35.8*
- cicatrice *J35.8*
- concrétion *J35.8*
- corrosion *T28.5*
- diphtérie *A36.0*
- et tissus, adénoïdes, hyperplasie *J35.3*
- gomme *A52.7+, J99.8**
- hémorragie ou saignement *J35.8*
- hyperplasie *J35.1*
- hypertrophie *J35.1*
- infection *J03.9*
- - aiguë *J03.9*
- - chronique *J35.0*
- - subaiguë *J03.9*
- inflammation *J03.9*
- inflammation, tonsillite *J03.9*
- - aiguë *J03.9*
- - chronique *J35.0*
- kératose *J35.8*
- kyste *J35.8*
- lésion *S09.9*
- lipome *D17.7*
- lymphangiome *D18.18*
- maladie, chronique *J35.9*
- nécrose *J35.8*
- palatine
- - cicatrice *J35.8*
- - et amygdale pharyngienne, hyperplasie *J35.3*
- - hyperplasie *J35.1*
- - maladie chronique *J35.9*
- - tuberculose *A16.8*
- papillome *D10.4*
- pharyngienne
- - carcinome *C11.1*
- - cicatrice *J35.8*
- - et amygdale linguale, hyperplasie *J35.3*
- - hyperplasie *J35.2*
- - inflammation *J03.9*
- - maladie, chronique *J35.9*
- - prolifération *J35.2*
- rupture *J35.8*
- septicémie, chronique *J35.0*
- suppuration *J03.9*
- - chronique *J35.0*
- syphilis *A52.7+, J99.8**
- - stade primaire *A51.2*
- - stade secondaire *A51.3*
- tératome *D37.0*
- tonsille ou amygdale linguale *A52.7+, J99.8**
- toxicose focale *J35.8*
- tuberculopse *A16.8*
- - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.8*
- tuberculose *A16.8*
- ulcère *J35.8*
- - diphtérique *A36.0*
- vestige *J35.8*
- - infecté *J35.0*

Amygdalite *J03.9*
- aiguë *J03.9*

Amygdalite –*suite*

- angine de Plaut-Vincent *A69.1*
- base de la langue *J03.9*
- cas de
- - candidose *B37.88*
- - grippe [Influenza] *J11.1*
- catarrhale *J03.9*
- chronique *J35.0*
- - exacerbation *J35.0*
- cryptique *J03.9*
- diphtérique *A36.0*
- due à la présence de
- - Aspergillus *B44.2+, J99.8**
- - Candida *B37.88*
- - pneumocoques *J03.8, B95.3!*
- - staphylocoques *J03.8, B95.8!*
- - streptocoques *J02.0*
- - virus NCA *J03.8*
- fébrile *J03.9*
- folliculaire *J03.9*
- gangréneuse *J03.9*
- - aiguë *J03.9*
- hypertrophique *J35.0*
- infectieuse *J03.9*
- - aiguë *J03.9*
- lacunaire *J03.9*
- linguale *J03.9*
- palatine *J03.9*
- para- *J36*
- parenchymateuse *J03.9*
- péri- *J36*
- pharyngée *J06.8*
- - due à herpès *B00.2*
- pharyngo-(amygdalite) *J06.8*
- phlegmoneuse *J03.9*
- Plaut-Vincent *A69.1*
- purulente *J03.9*
- récidivante *J03.9*
- septique *J03.9*
- subaiguë *J03.9*
- tuberculeuse *A16.8*
- - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.8*
- ulcéreuse *J03.9*
- - aiguë *J03.9*
- ulcéro-membraneuse *A69.1*

Amygdalolithe *J35.8*

Amylase, taux sérique anormal *R74.8*

Amyloïde
- angiopathie cérébrale *E85.4+, I68.0**
- dégénérescence *E85.9*
- - artères cérébrales *E85.4+, I68.0**
- - capillaire *E85.8+, I79.8**
- - cœur *E85.4+, I43.1**
- - hépatique NCA *E85.4+, K77.8**
- - intestin *E85.4+, K93.8**
- - moelle épinière *E85.4+, G32.8**
- - peau *E85.4+, L99.0**
- - rate *E85.4+, D77**
- - rein *E85.4+, N29.8**
- - système nerveux *E85.4+, G99.8**
- dépôt *E85.9*
- infiltration généralisée *E85.9*
- infiltration localisée *E85.4*
- néphrite *E85.4+, N08.4**
- néphropathie *E85.4+, N08.4**
- - héréditaire *E85.0+, N08.4**
- néphrose *E85.4+, N08.4**

Amyloïde –*suite*

- neuropathie autonome *E85.9+, G99.0**
- névrite *E85.4+, G63.3**
- polyneuropathie *E85.1+, G63.3**
- - portugais(e), type *E85.1+, G63.3**

Amyloïdose *E85.9*
- artère pulmonaire *E85.4*
- associée *E85.9*
- associée à l'hémodialyse *E85.3*
- avec
- - arthrite *E85.4+, M14.4**
- - arthropathie *E85.9+, M14.4**
- - cardiomyopathie *E85.4+, I43.1**
- - dépôt, conjonctive *E85.4+, H13.8**
- - glaucome *E85.9+, H42.0**
- - glomérulonéphrite *E85.9+, N08.4**
- - myopathie *E85.4+, G73.6**
- - néphrose *E85.4+, N08.4**
- - neuropathie, nerfs périphériques autonomes *E85.4+, G99.0**
- - pneumopathie *E85.4+, J99.8**
- circonscrite à l'organe *E85.4*
- cœur *E85.4+, I43.1**
- conjonctive *E85.4+, H13.8**
- cornée, primitive, héréditaire *E85.4*
- estomac *E85.4+, K93.8**
- familiale *E85.2*
- - avec polyneuropathie *E85.1+, G63.3**
- foie *E85.4+, K77.8**
- généralisée *E85.9*
- génétique *E85.2*
- hérédo-familiale *E85.2*
- - neuropathique *E85.1*
- - non neuropathique *E85.0*
- hypophyse *E85.4*
- intestin *E85.4+, K93.8**
- intestin grêle *E85.4+, K93.8**
- larynx *E85.4+, J99.8**
- localisée *E85.4*
- maculaire *E85.9+, L99.0**
- myocarde *E85.4+, I43.1**
- parathyroïde *E85.4*
- paroi vasculaire *E85.4*
- paupière *E85.4*
- peau *E85.4+, L99.0**
- personne âgée *E85.8*
- plèvre *E85.4+, J99.8**
- portugais(e), type *E85.1*
- poumon *E85.4+, J99.8**
- primitive *E85.9*
- pulmonaire *E85.4+, J99.8**
- pulpe de la rate *E85.4*
- rein *E85.4+, N29.8**
- secondaire *E85.3*
- - généralisée *E85.3*
- sous-glottique *E85.4+, J99.8**
- surrénale *E85.4*
- thymus *E85.4*
- thyroïde *E85.4*

Amylopectinose *E74.0*

Amylose *E85.9*
- hépatique *E85.4+, K77.8**
- limitée à un ou plusieurs organes *E85.4*
- rénale *E85.4+, N29.8**
- splénique *E85.4+, D77**
- sujet âgé *E85.8*

Amyoplasie congénitale *Q79.8*

Amyostatique, syndrome *E83.0*

Amyotonie *M62.89*
- congénitale *G70.2*

Amyotrophie *G71.8*
- associée au diabète sucré de type 2 *E11.40+, G73.0**
- congénitale *Q79.8*
- diabétique *E14.40+, G73.0**
- névralgique *G54.5*
- progressive, spinale *G12.2*

Amyotrophique
- paralysie *G12.2*
- sclérose latérale *G12.2*

Amytal, dépendance *F13.2*

Anacidité *K31.88*
- estomac *K31.88*
- psychogène *F45.31*

Anaérobie, phlegmon *A48.0*

Anaérobies (bactéries -)
- bactériémie *A49.9*
- infection *A49.9*
- inflammation, tissu cellulaire *A48.0*
- septicémie *A41.4*
- - chez le nouveau-né *P36.5*

Anagène effluve (anageneffluvium) *L65.1*

Anal - *voir* type de maladie

Anal, fibrose du sphincter *K62.8*

Anal, sténose du sphincter *K62.4*

Analbuminémie *E88.0*

Analgésie *R20.0*
- mére, avec lésion, foetus/nouveau-né *P04.0*

Analgésiques
- abus *F55.2*
- addiction NCA *F55.2*
- administration, avec complication, mère
- - couches *O89.9*
- - pendant l'accouchement *O74.9*
- allergie, dans les antécédents personnels *Z88.6*
- asthme *J45.1*
- intolérance *T88.7*
- néphropathie due au *N14.0*
- rein atrophié *N14.0*

Analphabétisme *Z55*

Analphalipoprotéinémie *E78.6*
- familiale *E78.6*

Analyse
- chromosomes, prénatale *Z36.0*
- sang foetal *Z36.8*

Anancastique
- dépression *F42.9*
- névrose *F42.9*
- trouble, personnalité *F60.5*

Anankasmus *F42.9*

Anaphrodisie *F52.1*

Anaphylactique
- choc *T78.2*
- - dans les antécédents personnels *Z87.8*
- - par
- - - immunisation *T80.5*
- - - produits alimentaires NCA *T78.0*
- - - sérum *T80.5*
- purpura *D69.0*

Anaplasie, col utérin *N87.9*

anaplasique
- -
- astrocytome *C71.9*
- carcinome
- - petites cellules *C80*
- - thyroïdien *C73*
- cytome *C80*
- ependymome *C71.9*
- grand cellules
- - ALK
- - - négatif , Lymphome *C84.7*
- - - positif , Lymphome *C84.6*
- - CD30 positif , Lymphome *C84.6*
- - Lymphome cutané *C86.6*
- Lymphome diffus grand cellules B , *C83.3*
- oligodendrogliome *C71.9*
- papillome, plexus choroïde *C71.5*
- séminome *C62.9*

Anarthria syllabaris *F98.5*

Anarthrie *R47.1*

Anasarque *R60.1*
- cardiaque *I50.01*
- chez le nouveau-né *P83.2*

Anasarque due à malnutrition *E43*

Anaspadias *Q64.0*

Anastomose
- avec
- - complication NCA *T85.9*
- - complication, mécanique *T82.3*
- congénitale des vaisseaux choroïdiens et rétiniens *Q14.8*
- érosion, peptique *K28.9*
- infection *T82.7*
- inflammation *T82.7*
- insuffisance, tractus gastro-intestinal *K91.88*
- intestinale *K63.8*
- organes urinaires, avec complication *N99.8*
- - intestinale *N99.8*
- ulcère *K28.9*
- - peptique *K28.9*
- vasculaire, avec complication *T82.9*

anastomoses suture après opération
- anus , Insuffisance d ' *K91.83*
- Autre organe du système digestif , Insuffisance d ' *K91.83*
- pancréas , Insuffisance d ' *K91.82*
- trachée , des bronche et des poumon , Insuffisance d ' *J95.82*
- vésicule et des voie biliaire , Insuffisance d ' *K91.81*

Anastomosite *T81.4*

ANCA associé, vasculite *I77.6*

Ancien infarctus du myocarde *I25.29*

Ancienne - *voir* Type de maladie

Andersen (maladie d'), Fabry- *E75.2*
- avec affection, glomérulaire *E75.2+, N08.4**

Andersen (syndrome d')(glycogénose) *E74.0*

Andersen (syndrome d'), Fanconi- (mucovi *E84.9*

Andersen-Fabry (maladie d'), avec dégére *E75.2+, G32.8**

Andes (maladie des) *T70.2*

Andrews (syndrome d') *L40.3*

Androblastome
- bénin
- - chez la femme *D27*
- - chez l'homme *D29.2*
- chez la femme *D39.1*
- chez l'homme *D40.1*
- malin
- - chez la femme *C56*
- - chez l'homme *C62.9*
- tubulaire
- - chez la femme *D27*
- - chez l'homme *D29.2*

Androgènes
- anomalie des récepteurs périphériques aux *E34.59*
- déficit *E29.1*
- déprivation *E29.1*
- effet secondaire *T88.7*
- excédent *E28.1*
- hypersécrétion
- - ovarienne *E28.1*
- - surrénalienne *E27.0*
- - tesiculaire *E29.0*
- insensibilité *E34.59*
- - complète (CAIS - complete androgen insensitivity syndrome) *E34.51*
- - partielle (PAIS) *E34.50*
- résistance *E34.59*
- - lors d'un pseudohermaphrodisme masculin *E34.59*
- surproduction
- - adrénalienne *E27.0*
- - ovarienne *E28.1*
- - testiculaire *E29.0*
- testiculaires, biosynthèse, trouble *E29.1*

Androgénique
- acné *L70.8*
- alopécie *L64.9*

Androgénique, perte, cheveu *L64.9*

Androgénisation *E28.1*

Androginie *E25.9*
- congénitale *E25.09*

Androgynie *Q56.1*

Androïde, bassin *Q74.2*
- avec disproportion foeto-pelvienne *O33.0*
- - avec
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.1*
- - - obstruction, accouchement *O65.3*

Andropause *N50.8*

anémie
- *D64.9*
- à corps de Heinz, congénitale *D58.2*
- achlorhydrique *D50.8*
- achlorhydrique, achylique *D50.8*
- achrestique *D53.1*
- Addison (Bierner-Ehrlich-), d' *D51.0*
- Addison (Hunter-), d' *D51.0*
- Addison(-Biermer) (d') *D51.0*
- africaine *D57.1*
- alimentaire *D53.9*
- - avec hypo-absorption du fer *D50.8*
- - macrocytaire *D52.0*
- - par carence en acide folique *D52.0*
- anacide *D50.8*
- aplasique *D61.9*
- - acquise *D60.9*

anémie –*suite*
- aplasique –*suite*
- - congénitale *D61.0*
- - constitutionnelle *D61.0*
- - idiopathique *D61.3*
- - isolée *D60.9*
- - - acquise *D60.9*
- - - - chronique *D60.0*
- - - - transitoire *D60.1*
- - - associée à un thymome *D60.9*
- - - dans l'enfance *D61.0*
- - provoquée par
- - - agents externes NCA *D61.2*
- - - cytostatiques *D61.10*
- - - infection *D61.2*
- - - irradiation *D61.2*
- - - médicaments *D61.19*
- - toxique *D61.2*
- aplastique
- - acquis pur
- - - chronique , Aplasie médullaire [*D60.0*
- - - sans précision , Aplasie médullaire [*D60.9*
- - - transitoire , Aplasie médullaire [*D60.1*
- - médicamenteuse
- - - due traitement cytostatique , Aplasie médullaire [*D61.10*
- - - sans précision , Aplasie médullaire [*D61.19*
- aplastiques
- - constitutionnel *D61.0*
- - précisé Autre *D61.8*
- après hémorragie normocytaire *D50.0*
- associée à
- - carence
- - - vitamine B12 *D51.9*
- - - - alimentaire *D51.3*
- - - - - avec polyneuropathie, *D51.3+, G63.4**
- - - - chez les végétariens *D51.3*
- - - - provoquée par malabsorption sélective de la vitamine B12, avec protéinurie *D51.1*
- - - vitamine B6 *D64.3*
- - favisme *D55.0*
- - grossesse *O99.0*
- - infection *D64.9*
- - maladie par VIH *B23.8, D64.9*
- - néoplasme NCA *D48.9+, D63.0**
- - prématurité *P61.2*
- - pseudoleucémie *D64.8*
- - scorbut *D53.2*
- - tumeur (tumeur primitive inconnue) *D48.9+, D63.0**
- autoimmune, hémolytique
- - acquise NCA *D59.1*
- - symptomatique *D59.1*
- avec
- - dégénérescence de la moelle épinière, combinée, NCA *D51.0+, G32.0**
- - myélose funiculaire NCA *D51.0+, G32.0**
- avec splénomégalie *D64.8*
- Biermer-Ehrlich-Addison *D51.0*
- Blackfan-Diamond *D61.0*
- Blackfan-Diamond, de *D61.0*
- carence en fer *D50.9*
- cellules cibles *D64.8*

anémie –*suite*

- cellules cibles, à *D64.8*
- - hémorragique *D50.0*
- - - aiguë *D62*
- cellules-cibles *D64.8*
- - hémorragique *D50.0*
- - - aiguë *D62*
- chlorotique, achylique *D50.8*
- chronique due à saignement *D50.0*
- congénitale *P61.4*
- - provoquée par
- - - isoimmunisation NCA *P55.9*
- - - perte de sang foetal *P61.3*
- Cooley, de *D56.1*
- corps de Heinz (à), congénitale *D58.2*
- dans
- - anamnèse familiale *Z83.2*
- - enfance *D64.9*
- dans hémosidérose pulmonaire *E83.1+, J99.8**
- dans la syphilis tardive *A52.7+, D63.8**
- déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD], avec ictère, néonatale *D55.0*
- dépistage *Z13.0*
- dimorphe *D53.1*
- diphasique *D53.1*
- diphtérique *A36.8*
- drépanocytaire *D57.1*
- - avec crises *D57.0*
- - sans crises *D57.1*
- Dyke-Young, syndrome de [anémie hémolytique avec macrocytose] *D59.1*
- dysérythropoïétique congénitale *D64.4*
- dyshématopoïétique *D64.4*
- - congénitale *D64.4*
- elliptocytaire *D58.1*
- érythroblastique
- - chez
- - - enfant *D56.1*
- - - fœtus et nouveau-né *P55.9*
- érythroblastique familiale *D56.1*
- érythrocytaire
- - aplasique
- - - congénitale *D61.0*
- - - transitoire *D60.1*
- - isolée *D60.9*
- essentielle *D64.9*
- Fanconi, de *D61.0*
- ferriprive *D50.9*
- fœtus et nouveau-né, par perte de sang fœtal *P61.3*
- Heinz, à corps de, congénitale *D58.2*
- hémolytique *D58.9*
- - *D59.1*
- - acquise *D59.9*
- - - associée à une maladie par VIH *B23.8, D59.9*
- - - avec hémoglobinurie NCA *D59.6*
- - aiguë *D59.9*
- - - chez le fœtus et le nouveau-né *P55.9*
- - auto-immune *D59.1*
- - - provoquée par un médicament *D59.0*
- - chronique *D58.9*
- - congénitale *D58.0*
- - constitutionnelle *D58.0*
- - familiale *D58.9*
- - héréditaire *D58.9*

anémie –*suite*

- hémolytique –*suite*
- - héréditaire –*suite*

- - - avec ictère, néonatale *P58.8*
- - - provoquée par un déficit enzymatique *D55.9*
- - idiopathique chronique *D59.9*
- - mécanique *D59.4*
- - - provoquée par
- - - - prothèse, implant ou transplant *D59.4*
- - - - shunt *D59.4*
- - microangiopathique *D59.4*
- - non auto-immune *D59.4*
- - non sphérocytaire
- - - congénitale NCA *D55.8*
- - - congénitale, due à une carence
- - - - glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] *D55.0*
- - - - pyruvate kinase *D55.2*
- - - héréditaire NCA *D55.8*
- - provoquée par
- - - auto-anticorps chauds *D59.1*
- - - auto-anticorps froids *D59.1*
- - - déficit enzymatique *D55.9*
- - - - à un médicament *D59.2*
- - - hémoglobine instable *D58.2*
- - - médicaments *D59.2*
- - secondaire *D59.4*
- - Stransky-Regala, type *D58.2*
- - symptomatique *D59.4*
- - toxique *D59.4*
- hémolytique à agglutinines chaudes *D59.1*
- hémolytique à agglutinines froides *D59.1*
- hémolytique autoimmune *D59.1*
- hémolytique auto-immune *D59.1*
- hémolytique immunoallergique, médicamenteuse *D59.2*
- hémolytique non sphérocytaire *D55.8*
- - type
- - - I *D55.1*
- - - II *D55.2*
- hémolytique, type froid *D59.1*
- hémorragie *D50.0*
- - aiguë *D62*
- hémorragique chronique *D50.0*
- Herrick *D57.1*
- Herrick, de *D57.1*
- Heuck-Assmann, de *D64.8*
- hyperchrome *D64.8*
- hypochrome *D50.9*
- - avec accumulation de fer *D64.3*
- - microcytaire *D50.8*
- - normoblaste *D50.8*
- hypochrome normoblastique *D50.8*
- hypoplasique *D61.9*
- - congénitale *D61.0*
- - familiale *D61.0*
- idiopathique *D64.9*
- induite par un médicament
- - hémolytique autoimmune *D59.0*
- - hémolytique non autoimmune *D59.2*
- - provoquée par une carence
- - - acide folique *D52.1*
- - - enzyme *D59.2*
- induite par une chimiothérapie *D61.10*
- infectieuse *D64.8*

anémie –*suite*

- infectieuse –*suite*

- - hémolytique, acquise *D59.4*
- Jaksch, Hayem (et Luzet), de [anémie due au lait de chèvre] *D52.0*
- lait *D52.0*
- latente *D64.9*
- Lederer, de, hémolytique *D59.1*
- leuco-érythroblastique *D64.8*
- liée à l'alcool *D53.8*
- macrocytaire *D52.9*
- - compliquant la grossesse *O99.0*
- - tropicale *D52.8*
- maligne *D51.0*
- méditerranéenne *D56.9*
- - avec hémoglobinopathie *D56.9*
- mégaloblastique *D53.1*
- - alimentaire *D52.0*
- - héréditaire *D51.1*
- - nourrisson *D53.1*
- - par orotacidurie *D53.0*
- - réfractaire *D53.1*
- - résistante à
- - - traitement par la vitamine B12 *D53.1*
- - - traitement par l'acide folique *D53.1*
- mégalocytaire *D53.1*
- microcytaire *D50.8*
- - due à perte de sang *D50.0*
- - - aiguë *D62*
- - familiale *D56.8*
- microelliptopoïkilocytaire [maladie de Rietti-Greppi-Micheli] *D56.9*
- myélodysplasique *D46.9*
- myélofibrose, associée à *D47.1+, D63.0**
- myélogène *D64.8*
- myéloprolifération *D47.1*
- non-spérocytaire hémolytique
- - congénital NCA *D55.8*
- - congénitale due à une carence
- - - pyruvate kinase *D55.2*
- - congénitale, due à une carence
- - - glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] *D55.0*
- - héréditaire NCA *D55.8*
- - type
- - - I *D55.1*
- - - II *D55.2*
- normochrome *D64.9*
- normocytaire *D64.9*
- - associée à la myélophtisie *D61.9*
- - cas de myélophtise *D61.9*
- - due à une perte de sang aigue *D62*
- - posthémorragique aiguë *D62*
- nouveau-né *P61.4*
- - post-hémorragique *P61.3*
- nutritionnelle *D53.9*
- - avec trouble de l'absorption du fer *D50.8*
- nutritionnelle ou carentielle *D53.9*
- - cas de maladie induite par le VIH *B23.8, D53.9*
- ostéosclérotique *D64.8*
- paludique *B54+, D63.8**
- palustre *B54+, D63.8**
- paranéoplasique *C80+, D63.0**
- pendant les suites de couches *O99.0*
- permicieuse *D51.0*

anémie –*suite*

- pernicieuse *D51.0*
- - avec
- - - glossite *D51.0*
- - - glossite de Moeller(-Hunter) *D51.0*
- - - polyneuropathie *D51.0+, G63.4**
- - congénitale *D51.0*
- pernicieuse hémoglobinurique *B50.8*
- pléiochrome *D64.8*
- - cas de sprue *D52.8*
- - dans la sprue *D52.8*
- post-hémorragique *D50.0*
- - aiguë *D62*
- - chez le nouveau-né *P61.3*
- - chronique *D50.0*
- - progressive *D50.0*
- primitive *D64.9*
- printemps de Bagdad *D55.0*
- printemps de Bagdad, du *D55.0*
- progressive *D64.9*
- provoquée par
- - accès palustre *B54+, D63.8**
- - anémie falciforme *D57.1*
- - anomalie
- - - glycolyse anaérobie *D55.2*
- - - métabolisme des nucléotides *D55.3*
- - anomalie du métabolisme des pentoses phosphates *D55.1*
- - Balantidium coli *A07.0*
- - Bothriocephalus *B70.0+, D63.8**
- - carence *D53.9*
- - - 2,3-diphosphoglycérate-mutase [2,3 -DPG] *D55.2*
- - - 6-phosphogluconate déshydrogénase [6-GPD] *D55.1*
- - - acide aminé *D53.0*
- - - acide folique *D52.9*
- - - cuivre *D53.8*
- - - enzyme *D55.9*
- - - - associée à la voie de l'hexose monophosphate (HMP) NCA *D55.1*
- - - - glycolytique *D55.2*
- - - - métabolisme des nucléotides *D55.3*
- - - fer *D50.9*
- - - - après perte de sang *D50.0*
- - - - lors de la grossesse *O99.0*
- - - - par hyporésorption du fer *D50.8*
- - - GGS-R [glutathion réductase] *D55.1*
- - - glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] *D55.0*
- - - glutathion érythrocytaire *D55.1*
- - - glutathion réductase *D55.1*
- - - glycéraldéhyde-phosphate déshydrogénase *D55.2*
- - - GSH [glutathion] *D55.1*
- - - hémoglobine *D64.9*
- - - hexokinase *D55.2*
- - - molybdène *D53.8*
- - - nutritionnelle *D53.9*
- - - - avec hypoabsorption du fer *D50.8*
- - - phosphofructoaldolase *D55.2*
- - - phosphoglycérate kinase *D55.2*
- - - protéine *D53.0*
- - - pyridoxine *D64.3*
- - - pyruvate kinase *D55.2*
- - - transcobalamine II *D51.2*
- - - triose-phosphate isomérase *D55.2*

anémie –*suite*

- provoquée par –*suite*
- - carence –*suite*
- - - vitamine B12, par carence, facteur intrinsèque *D51.0*
- - - zinc *D53.8*
- - déficit
- - - enzyme *D55.9*
- - - hexokinase *D55.2*
- - Diphyllobothrium *B70.0+, D63.8**
- - hémorragie *D50.0*
- - - aiguë *D62*
- - hypoplasie érythrocytaire *D61.9*
- - inactivité de la glucose-6-phosphate déshydrogénase [inactivité de la G6PD] *D55.0*
- - lait de chèvre *D52.0*
- - malaria *B54+, D63.8**
- - malnutrition *D53.9*
- - myxoedème *E03.9+, D63.8**
- - orotacidurie *D53.0*
- - plomb *D64.2*
- - trouble(s) du métabolisme
- - - acide aminé *D53.0*
- - - glutathion *D55.1*
- pseudo-Biermer chez le nourrisson *D53.1*
- pseudo-hémorragique *E83.1*
- pseudo-pernicieuse, chez le nourrisson *D53.1*
- puerpérale *O99.0*
- - due à hémorragie *O99.0*
- réfractaire
- - *D46.4*
- - associée à hémochromatose *D46.1*
- - avec
- - -
- - - dysplasie multilignées , *D46.5*
- - - excès blastes , type I [AREB I] , *D46.2*
- - - sidéroblastes en anneau *D46.1*
- - hypoprolifération *D61.9*
- - sans sidéroblastes *D46.0*
- - sidéroblastes couronne *D46.1*
- rénale *N18.9+, D63.8**
- Rietti Greppi Micheli *D56.9*
- Rietti-Greppi-Micheli, maladie de *D56.9*
- secondaire *D64.9*
- semiplastique *D61.8*
- sensible à la pyridoxine *D64.3*
- sensible à la vitamine B6 *D64.3*
- septique *D64.8*
- sidéro-achrestique *D64.3*
- - héréditaire *D64.0*
- - hypochrome, liée au chromosome X *D64.0*
- - secondaire *D64.1*
- - - due à un médicament *D64.2*
- - sensible à la pyridoxine *D64.3*
- sidéroblastique *D64.3*
- sidéropénique *D50.9*
- - réfractaire *D50.8*
- simple *D64.9*
- - chronique *D53.9*
- sphérocytaire *D58.0*
- sphérocytaire héréditaire *D58.0*
- thalassémie *D56.9*
- thrombocytopénique *D69.61*
- - réfractaire aux transfusions *D69.60*

anémie –*suite*

- toxique *D61.2*
- - hémolytique, acquise *D59.4*
- tuberculeuse *A18.8+, D63.8**
- tumeur primitive inconnue *D48.9+, D63.0**
- végétariens stricts *D51.3*
- Witt *D50.8*
- Witt, de *D50.8*

Anémones de mer

- contact avec effet toxique *T63.6*
- morsure, avec empoisonnement *T63.6*
- piqûre, avec intoxication *T63.6*

Anencéphale

- associé à
- - anomalie, os du crâne *Q00.0*
- - hypoplasie, os du crâne *Q00.0*
- - suture incomplète, crâne *Q00.0*
- foetal, prise en charge de la future mère *O35.0*

Anencéphalie *Q00.0*

- associée à
- - absence d'os du crâne congénitale *Q00.0*
- - déformation du crâne congénitale *Q00.0*
- foetale, prise en charge de la mère *O35.0*
- hémi- *Q00.0*
- hydr- *Q04.3*

Anérythropsie *H53.5*

Anesthésiant(e), substance, addiction N *F55.8*

Anesthésie *R20.0*

- avec
- - anoxie cérébrale
- - - pendant
- - - - grossesse *O29.2*
- - - - l'accouchement *O74.3*
- - arrêt, coeur
- - - pendant
- - - - grossesse *O29.1*
- - - - l'accouchement *O74.2*
- - aspiration
- - - contenu gastrique
- - - - après l'accouchement *O89.0*
- - - - cours du post-partum *O89.0*
- - - - pendant
- - - - - grossesse, *O29.0*
- - - - - l'accouchement, *O74.0*
- - - - puerpérale *O89.0*
- - - lors de la naissance *O74.0*
- - choc *T88.2*
- - collapsus
- - - poumon *T88.2*
- - - pulmonaire, lors de l'accouchement *O74.1*
- - complication NCA *T88.5*
- - - cardiaque, durant la grossesse *O29.1*
- - - cours du post-partum *O89.9*
- - - lors de la naissance
- - - - cardiaque *O74.2*
- - - - pulmonaire *O74.1*
- - - - système nerveux central *O74.3*
- - - pulmonaire, au cours du post-partum *O89.0*
- - - système nerveux central
- - - - cours du post-partum *O89.2*

Anesthésie *–suite*
- avec *–suite*
- - complication NCA *–suite*
- - - système nerveux central *–suite*
- - - - durant la grossesse *O29.2*
- - effet secondaire NCA *T88.5*
- - hyperthermie, maligne *T88.3*
- - mort, complication, accouchement *O74.8*
- - pneumonie
- - - pendant
- - - - grossesse *O29.0*
- - - - l'accouchement *O74.0*
- - pneumonie par aspiration
- - - cours du post-partum *O89.0*
- - - pendant la grossesse *O29.0*
- - pneumothorax *T88.2*
- - - cours du post-partum *O89.0*
- - - pendant la grosesse *O29.0*
- - syndrome de Mendelson
- - - cours du post-partum *O89.0*
- - - pendant
- - - - grossesse *O29.0*
- - - - l'accouchement *O74.0*
- avec complication, mère
- - couche *O89.9*
- - lors de l'accouchement *O74.9*
- cornée *H18.8*
- effet, anormal *T88.5*
- fonctionnelle, dissociative *F44.6*
- hémi- *R20.0*
- hystérique *F44.6*
- mère, avec lésion, du foetus/nouveau-né *P04.0*
- peau *R20.0*
- péridurale, avec effet secondaire *T88.5*
- rachidienne *T88.5*

Anesthésique général, administration ave *O74.9*

Anesthésique local
- administration, avec complication, mère
- - couche *O89.9*
- - pendant l'accouchement *O74.9*
- intolérance *T88.7*
- intoxication *T41.3*

Anesthésiques
- allergie, dans les antécédents personnels NCA *Z88.4*
- intraveineux, intoxication *T41.1*

Anesthésiques locaux de type ester
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Anésthésiques, dépendance NCA *F55.8*

Anesthétiques intraveineux, intoxication *T41.1*

Anétodermie *L90.8*
- Jadassohn-Pellizzari (maladie de) *L90.2*
- Schweninger-Buzzi, (maladie de) *L90.1*

Anétodermie maculeuse *L90.8*

Anévrismal(e)
- hémorragie sous-arachnoïdienne, dans l'anamnèse du patient *Z86.7*
- kyste
- - mâchoire *K09.2*
- - os *M85.59*
- malformation, artérioveineuse *Q27.3*
- tumeur *I72.9*

Anévrisme
- *I72.9*
- anastomotique *I72.9*
- aorte *I71.9*
- - abdominale *I71.4*
- - - descendante *I71.4*
- - - rompu *I71.3*
- - artérioscléreux NCA *I71.9*
- - artérioscléreux, rompu *I71.8*
- - ascendante *I71.2*
- - - rompu *I71.1*
- - calcification *I70.0*
- - congénital *Q25.4*
- - descendante *I71.9*
- - - abdominale, rompu *I71.3*
- - - rompu *I71.8*
- - - thoracique, rompu *I71.1*
- - disséquant *I71.00*
- - rompu *I71.8*
- - sous-rénal *I71.4*
- - - rompu *I71.3*
- - syphilitique *A52.0+, I79.0**
- - - congénital *A50.5+, I79.0**
- - thoracique *I71.2*
- - - descendante *I71.2*
- - - non syphilitique *I71.2*
- - - rompu *I71.1*
- - - syphilitique *A52.0+, I79.0**
- aorte abdominale *I71.4*
- - perforé *I71.3*
- - perforé sans rupture *I71.3*
- aorte thoracique *I71.2*
- - rompu *I71.1*
- aorte thoracique, rompu *I71.1*
- aortique thoraco abdominal
- - rompu , *I71.5*
- - sans mention de rupture , *I71.6*
- artère *I72.9*
- - basilaire *I67.10*
- - carotide *I72.0*
- - - interne *I72.0*
- - - intracrânienne, syphilitique *A52.0+, I68.8**
- - - rompu *I72.0*
- - cérébrale
- - - antérieure *I67.10*
- - - moyenne *I67.10*
- - communicante
- - - antérieure *I67.10*
- - - postérieure *I67.10*
- - fémorale *I72.4*
- - iliaque *I72.3*
- - - commune *I72.3*
- - - interne *I72.3*
- - - rompu *I72.3*
- - membre
- - - inférieur *I72.4*
- - - - rompu *I72.4*
- - - supérieur *I72.1*
- - - - rompu *I72.1*
- - poplitée *I72.4*
- - pulmonaire *I28.1*
- - - congénital *Q25.7*
- - rénale *I72.2*
- - - rompu *I72.2*
- - sous-clavière *I72.8*
- - - rompu *I72.8*
- - - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- - splénique *I72.8*

Anévrisme *–suite*
- artère *–suite*
- - vertébrale *I72.8*
- artère basilaire *I67.10*
- artère cérébrale *I67.10*
- - rupture *I60.7*
- - syphilitique, rupture *A52.0+, I68.8**
- artère coronaire *I25.4*
- - artérioscléreux *I25.4*
- - congénital *Q24.5*
- artère hépatique *I72.8*
- - rompu *I72.8*
- artère iliaque *I72.3*
- - rompu *I72.3*
- artère précérébrale
- - autre *I72.5*
- artère pulmonaire *I28.1*
- - congénital *Q25.7*
- artère rénale *I72.2*
- - rompu *I72.2*
- artérioscléreux *I72.9*
- artério-veineux
- - acquis *I77.0*
- - cérébral, rompu *I60.8*
- - congénital *Q27.3*
- - non rompu *Q28.00*
- - pulmonaire *Q25.7*
- - traumatique *T14.5*
- - vaisseaux précérébraux, extra-crâniens *Q28.00*
- autres *I72*
- avec compression, chiasma *I67.10+, H48.8**
- carotide *I72.0*
- - rompu dans le cerveau *I60.0*
- - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- - - intracrânien *A52.0+, I68.8**
- cercle artériel
- - cerveau *I67.10*
- - - congénital *Q28.30*
- - - rompu *I60.6*
- - congénital, rompu *I60.6*
- - Willis, (polygone de) *I67.10*
- cérébral *I67.10*
- - ampullaire
- - - non rompu *I67.10*
- - - rompu *I60.9*
- - artérioscléreux *I67.10*
- - - rompu *I60.9*
- - artérioveineux *Q28.20*
- - - acquis *I67.10*
- - - - rompu *I60.8*
- - - congénital *Q28.20*
- - - rompu *I60.8*
- - congénital *Q28.30*
- - - rompu *I60.9*
- - mycosique *I72.9*
- - - rompu *I60.9*
- - neurosyphilitique *A52.0+, I68.8**
- - non rompu *I67.10*
- - rompu *I60.9*
- - - artère cérébrale *I60.7*
- - - artère communicante *I60.7*
- - - artère intracrânienne, multiple *I60.6*
- - - avec hémorragie sous-arachnoïdienne *I60.9*
- - - congénital *I60.9*
- - - sacculaire *I60.9*
- - - - congénital *I60.9*

Anévrisme –*suite*
- cérébral –*suite*
- - syphilitique *A52.0+, I68.8**
- cerveau forme de baie
- - non rompu *I67.10*
- - rompu *I60.9*
- cirsoïde *I72.9*
- cœur *I25.3*
- cône artériel *I25.3*
- congénital NCA *Q28.80*
- conjonctive *H11.4*
- coronaire
- - rompu *I21.9*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- crosse aortique *I71.2*
- - rompu *I71.1*
- cylindrique de l'aorte *I71.9*
- - rompu *I71.8*
- diffus *I72.9*
- dissection artère
- - basilaire tronc) , *I72.5*
- - vertébral *I72.6*
- disséquant *I72.9*
- - aorte
- - - abdominale *I71.02*
- - - ascendante *I71.01*
- - aortes *I71.00*
- - - rompu *I71.04*
- - - type
- - - - A
- - - - - thoracique, *I71.01*
- - - - - thoracoabdominal, *I71.03*
- - - - B
- - - - - thoracique, *I71.01*
- - - - - thoracoabdominal, *I71.03*
- FAUX *I72.9*
- - artère fémorale profonde *I72.4*
- fusiforme *I72.9*
- hémorragie *I72.9*
- infectieux *I72.9*
- intrathoracique *I71.2*
- - syphilitique *A52.0+, I79.0**
- iris *H21.1*
- médiastinal *I72.8*
- - rompu *I72.8*
- - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- méninges, cerveau *I67.10*
- - rompu *I60.8*
- miliaire *I67.10*
- - rompu *I60.9*
- moëlle épinière *I72.8*
- - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- multiple *I72.9*
- mural *I25.3*
- mycosique *I72.9*
- myocarde *I25.3*
- non rompu, vaisseaux précérébraux, extra-crânien, congénital *Q28.10*
- paroi antérieure *I25.3*
- paroi cardiaque *I25.3*
- - aigu *I21.9*
- - complication aiguë après infarctus du myocarde aigu *I23.3*
- - durant depuis 4 semaines ou moins *I21.9*
- paroi vasculaire *I72.9*
- perforation *I72.9*
- périphérique NCA *I72.8*
- - congénital *Q27.8*

Anévrisme –*suite*
- périphérique NCA –*suite*
- - rompu NCA *I72.8*
- pseudo- *I72.9*
- pulmonaire *I28.1*
- - artérioveineux acquis *I28.0*
- - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- racémeux
- - congénital *Q27.8*
- - périphérique *I72.9*
- racine aortique *I71.2*
- Rasmussen NCA *A16.2*
- rétine *H35.0*
- - acquis *H35.0*
- - congénital *Q14.1*
- - diabétique *E14.30+, H36.0**
- rupture *I72.9*
- sacculaire *I72.9*
- septum
- - inter-auriculaire *I25.3*
- - inter-ventriculaire *I25.3*
- sinus
- - aorte, congénital *Q25.4*
- - caverneux *I67.10*
- - - artérioveineux *Q28.30*
- - - - rompu *I60.8*
- - Valsalva, de *Q25.4*
- - - rompu *Q25.4*
- sinus veineux cérébral *I67.10*
- spinal *I72.8*
- - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- splénique, vaisseau *I72.8*
- - rompu *I72.8*
- spongieux *D18.00*
- syphilitique congénital *A50.5+, I79.0**
- système nerveux central, syphilitique *A52.0+, I68.8**
- thoracique, rompu *I71.1*
- tronc basilaire *I67.10*
- tronc brachiocéphalique
- - non syphilitique *I72.8*
- - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- vaisseau cérébral
- - artérioveineux, non rompu, congénital *Q28.20*
- - non rompu, congénital *Q28.30*
- valvule aortique *I35.8*
- valvule mitrale *I34.88*
- valvule pulmonaire *I37.8*
- valvule tricuspide *I07.8*
- valvule, rhumatismale *I09.1*
- variqueux *Q27.3*
- variqueux, rompu *I77.0*
- vasculaire
- - membre supérieur *I72.1*
- - précérébral, extra-crânien, congénital *Q28.10*
- vasculaire, artérioveineux, traumatique *T14.5*
- veine coronaire *I25.8*
- veine jugulaire *I86.8*
- veineux *I86.8*
- - congénital *Q27.8*
- ventricule *I25.3*
- - associé à une maladie du cœur, des coronaires *I25.3*

Anévrysme splénique *I72.8*
- rompue *I72.8*

Angéite *I77.6*

Angéite –*suite*
- allergique *M31.0*
- - granulomateuse *M30.1*
- hypersensibilité, d' *M31.0*
- nécrosante *M31.9*
- provoquée par
- - cytomégalovirus *B25.88*
- - hypersensibilité *M31.0*
- - Toxoplasma *B58.8*

Angelman, syndrome d' *Q93.5*

Angiectasie *I99*

Angine *J03.9*
- abdominale *K55.1*
- agranulocytaire *D70.3*
- aiguë *J03.8*
- - provoquée par
- - - pneumocoques *J03.8, B95.3!*
- - - staphylocoques *J03.8, B95.8!*
- - - virus *J03.8*
- aphteuse *B08.5*
- associée à
- - agranulocytose *D70.3*
- - effort *I20.8*
- - grippe *J11.1*
- - scarlatine *A38*
- catarrhale *J03.9*
- chronique *J35.0*
- croupeuse *J03.9*
- décubitus *I20.0*
- diphtérique *A36.0*
- effort *I20.8*
- fièvreuse aiguë *J03.8*
- folliculaire *J03.9*
- herpétique *B08.5*
- hypertrophique *J35.0*
- infectieuse aiguë *J03.9*
- lacunaire *J03.9*
- - folliculaire *J03.9*
- latérale *J02.9*
- - aiguë *J02.9*
- - associée à la grippe *J11.1*
- - chronique *J31.2*
- - purulente *J02.9*
- linguale *J03.9*
- Ludwig, de *K12.20*
- membraneuse *J31.2*
- - diphtérique *A36.0*
- nécrosante en cas d'agranulocytose *D70.3*
- nécrotique *A69.1*
- phlegmoneuse *J03.9*
- plancher de la bouche *J03.9*
- Plaut-Vincent *A69.1*
- - fusospirillaire *A69.1*
- - nécrotique *A69.1*
- poitrine *I20.9*
- - accélérée *I20.0*
- - angiospastique *I20.1*
- - associée à
- - - effort, de novo *I20.0*
- - - sténose de stent *I97.1*
- - avant un infactus *I20.0*
- - avec
- - - spasme coronaire vérifié *I20.1*
- - - tolérance à l'effort réduite *I20.0*
- - cardiaque *I20.9*
- - d'effort *I20.8*
- - induite par spasme *I20.1*

Angine –*suite*
- poitrine –*suite*
- - instable *I20.0*
- - novo *I20.0*
- - post-infarctus *I20.8*
- - pré-infarctus *I20.0*
- - Prinzmetal *I20.1*
- - repos *I20.8*
- - stable *I20.9*
- - variable *I20.1*
- - vasomotrice *I20.1*
- - vasospastique *I20.1*
- provoquée par
- - lymphocytes mononucléaires *B27.9*
- - streptocoques *J02.0*
- pseudomembraneuse *A69.1*
- pseudomembraneuse diphtérique *A36.0*
- purulente *J03.9*
- rétronasale *J03.9*
- septique *J03.9*
- - streptocoques *J02.0*
- simple, aiguë *J03.9*
- subaiguë *J03.9*
- tonsillaire *J03.9*
- - avec mise en évidence de streptocoques *J02.0*
- - chronique *J35.0*
- - fébrile *J03.9*
- - purulente *J03.9*
- toxique aiguë *J03.9*
- ulcéreuse *A69.1*
- ulcéro-membraneuse *A69.1*
- vésiculaire aiguë *J03.9*
- Vincent, de *A69.1*
- - fusospirillaire *A69.1*
- - nécrotique *A69.1*

Angineux(se)
- douleurs *I20.9*
- maladie du coeur *I20.9*

angio immunoblastique
- avec dysprotéinémie LAID] , Lymphadénopathie *C86.5*
- cellules T Lymphome *C86.5*

Angioblaste, sarcome *C49.9*

Angioblastique, méningiome *D32.9*

Angioblastome *D48.1*

Angiocenrique
- lésion immunproliférative *D47.7*
- Lymphome à cellules T *C85.7*

Angio-cérébrale, insuffisance *I67.88*

Angiocholécystite *K81.0*
- alithiasique *K81.0*

Angiocholite, duodénum *K83.0*

Angiodysplasie
- côlon *K55.21*
- - avec hémorragie *K55.22*
- duodénum *K31.81*
- - avec hémorragie *K31.82*
- estomac *K31.81*
- - avec hémorragie *K31.82*
- gastro-intestinale *K55.8*
- intestin *K55.8*
- intestin grêle *K55.8*
- - avec saignement *K55.82*
- - sans saignement *K55.81*
- jéjunum *K55.8*

Angioendothéliomatose *C85.7*

Angio-endothéliome
- bénin *D18.00*
- lymphatique malin *C49.9*
- malin de l'os *C41.9*
- os *C41.9*
- système nerveux, bénin *D18.08*

Angioendothéliome cutané *C46.9*

Angio-endothéliome d'Ewing *C41.9*

Angiofibrome juvénile *D10.6*

Angiohémophilie *D68.0*
- A *D68.0*
- B *D68.0*

Angioïde, strie *H35.3*
- choroïde *H35.3*
- macula *H35.3*
- rétine *H35.3*

Angio-immunoblastique
- lymphadénome *C84.4*
- lymphadénopathie *D47.7*
- lymphome [LAID] *C84.4*
- lymphome à cellules T *C84.4*
- lymphome non hodgkinien *C84.4*

Angioimmunoblastome *C84.4*

Angiokératome *D23.9*

Angiokératome corporel
- circonscrit *D18.01*
- diffus *E75.2*

Angioléiomyolipome *D17.9*

Angioléiomyome *D21.9*

Angio-léiomyosarcome *C49.9*

Angiolipome *D17.9*
- rein *D17.7*

Angiolithe *I99*

Angiomateux
- meningiome *D32.9*
- naevus *D18.00*

Angiomatose *Q82.8*
- cérébro-rétinal *Q85.8*
- encéphalo-cutanée *Q85.8*
- encéphalo-trigéminé *Q85.8*
- foie *K76.4*
- hémorragique (multiple) *C46.9*
- Kaposi *C46.9*
- lors de chondrodysplasie *Q78.4*
- réticulo- *C46.9*
- rétino-cérébelleux *Q85.8*

Angiomatose de Sturge-Weber-Krabbe *Q85.8*

Angiome *D18.00*
- angiolipome *D17.9*
- artère basilaire *D18.02*
- avec hémorragie intracérébrale *D18.02*
- cavité abdominale *D18.08*
- chorionique (chorioadénome) *O02.8*
- conjonctive *D18.08*
- glomique *D18.00*
- hémolymph- *D18.19*
- lymph- *D18.19*
- - capillaire *D18.19*
- - caverneux *D18.19*
- - kystique *D18.19*
- malin *C49.9*
- méninges *D32.9*
- placenta *O43.1*
- plexiforme *D18.00*

Angiome –*suite*
- racémeux *D18.00*
- rein *D18.08*
- sarcomateux *C49.9*
- sénile *I78.1*
- serpigineux *L81.7*
- stellaire *I78.1*
- uvée *D18.05*

Angiomyoblastome *D48.1*

Angiomyolipome *D17.9*
- rein *D17.7*

Angiomyome *D21.9*

Angiomyoneurome *D18.00*

Angiomyosarcome *C49.9*

Angionécrose *N28.0*

Angioneuropathie *F45.30*

Angioneurose *F45.30*

Angioneurotique
- crise stato-acoustique *H81.0*
- oedème *T78.3*
- - avec urticaire *T78.3*
- - dans l'anamnèse personnelle *Z88.9*
- - héréditaire *D84.1*
- - - dans les cas d'urticaire *D84.1*

Angioorganopathie *I99*

Angiopathie *I99*
- cas de
- - diabète sucré *E14.50+, I79.2**
- - diabète type I *E10.50+, I79.2**
- - diabète type II *E11.50+, I79.2**
- cérébral *I67.9*
- - amyloïde *E85.4+, I68.0**
- Cerveau *I67.9*
- labyrinthique *H81.0*
- périphérique *I73.9*
- rétinienne *H35.0*
- rétinienne syphilitique *A52.0+, H36.8**

Angiopathie, sclérose *I70.9*

Angioréticulomatose [sarcome de Kaposi] *C46.9*

Angioréticulomatose de kaposi *C46.9*

Angio-réticulomatose, Kazal-Ronchese-Ker *C46.9*

Angio-réticulo-sarcome *C49.9*

Angiosarcome *C49.9*
- amygdale *C09.9*
- cuir chevelu *C44.4*
- foie *C22.3*
- glande thyroïde *C73*
- rate *C26.1*
- rein *C64*
- sein *C50.9*

Angiosarcome épithélioide *C49.9*

Angiosclérose *I70.9*
- cérébrale *I67.2*

Angiospasme *I73.9*
- cérébral *G45.99*
- traumatique
- - Jambe *I73.9*
- - pied *I73.9*

Angiospastique
- angine de poitrine *I20.1*
- attaque cérébrale *I64*
- maladie *I73.9*

Angiospastique *–suite*
- maladie *–suite*
- - cérébral *G45.99*
- - veine *I87.8*
- oedème *I73.9*

Angiostrongylose
- intestinale *B81.3*
- par
- - angyostrongylus
- - - cantonensis *B83.2*
- - - costaricensis *B81.3*
- - parastrongylose
- - - cantonensis *B83.2*
- - - costaricensis *B81.3*

Angiostrongylus
- cantonensis, Angiostrongyloïdose *B83.2*
- costaricensis, angiostrongyloïdose *B81.3*

Angle
-
- droit côlon hepatica Tumeur malign : *C18.3*
- gauche côlon splénique Tumeur malign : *C18.5*
- gauche du côlon, cancer *C18.5*
- sigmoïdien
- - anomalie *Q43.9*
- - volvulus *K56.2*

Angle de la chambre antérieure de l'oeil *H40.0*

Angle de la paupière
- abcès *H10.5*
- mélanome, malin *C43.1*
- ulcère *H01.0*

Angle de l'oeil
- affection *H02.9*
- basaliome *C44.1*
- blessure, ouverte *S01.1*
- - avec déchirement, angle de l'oeil *S01.1*
- contusion *S00.1*
- corps étranger *T15.1*
- kyste *H11.4*
- lésion *S09.9*
- - superficielle *S00.20*
- mélanome, malin *C43.1*

Angle iridocornéen
- atrésie *Q15.0*
- large *H40.0*
- malformation *H21.5*

Angle iridocornéen, récessus *H21.5*

Angle sigmoïdien
- spasme *K58.9*
- - psychogène *F45.32*
- sténose grave *K56.6*

Angor au repos *I20.8*

Angor crescendo *I20.0*

Anguillule stercoralis, infestation *B78.9*

Anguillulose *B78.9*
- avec diarrhée *B78.0*

Anguillulose intestinale *B78.0*

Anguillulose, infection *B78.9*

Angulation du bassin *Q74.2*

Anhédonie *F52.1*
- sexuelle *F52.1*

Anhédonie sexuelle, psychogène *F52.1*

Anhidrose (anidrose) *L74.4*

Anhidrotique, dysplasie, ectodermique *Q82.4*

Anhydration *E86*

Anhydrémie *E86*
- avec épuisement, dû à la chaleur *T67.3*

Anidrose hypotrichosique *Q82.8*

Aniline (aminobenzène), effet, toxique *T65.3*

Aniline, effet toxique *T65.3*

Animal domestique, rage *A82.1*

Aniridie *Q13.1*
- avec glaucome *Q13.1+, H42.8**
- congénitale *Q13.1*

Anisakiase *B81.0*

Anisakis marina, infestation *B81.0*

Aniséiconie *H52.3*

Anisocorie *H57.0*
- congénitale *Q13.2*
- physiologique *H57.0*

Anisocytose *R71*

Anisométropie *H52.3*
- avec amblyopie *H53.0*
- congénitale *H52.3*

Anitis *K62.8*

Ankuloblépharon *H02.5*
- acquis *H02.5*
- congénital *Q10.3*
- filiforme
- - adnatum *Q10.3*
- - congénital *Q10.3*

Ankyloglossie syndrome supérieur *Q38.1*

Ankylosante
- arthrite, colonne vertébrale *M45.09*
- arthrose *M19.98*
- coxarthrose *M16.9*
- hyperostose, colonne vertébrale *M48.19*

Ankylose *M24.69*
- après
- - fusion chirurgicale *Z98.1*
- - mesures chirurgicales *M24.69*
- articulation *M24.69*
- - plusieurs *M24.60*
- articulation crico-aryténoïdienne *J38.7*
- articulation du genou *M24.66*
- articulation ilio-sacrale *M43.27*
- articulation vertébrale *M43.29*
- bras *M24.69*
- cheville *M24.67*
- coude *M24.62*
- dent *K03.5*
- dentaire *K03.5*
- doigts *M24.64*
- enclume-étrier, infectieux *H74.3*
- épaule *M24.61*
- Etrier (stapès) *H74.3*
- fibrose *M24.69*
- hanche *M24.65*
- main *M24.64*
- osselet *H74.3*
- osseux *M24.69*
- poignet *M24.63*
- sacro-lombaire *M43.27*

Ankylose de l'enclume et de l'étrier, in *H74.3*

Ankylose infectieuse étrier, enclume *H74.3*

Ankylostomiase *B76.9*

Ankylostomose *B76.0*

Annatto
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Anneau
- contraction *O62.4*
- contractions, utérus, pathologiques *O62.4*
- Schatzky, oesophage, inférieur, acquis *K22.2*

Anneau cornéen de Kayser-Fleischer, NCA *H18.0*

anneau de contraction
- avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.6*
- Bandl *O62.4*
- complications, accouchement *O62.4*

Anneau de Kayser-Fleischer *H18.0*

Anneau de Kayser-Fleischer NCA *H18.0*

Anneau de Schatzki, oesophage, partie in *K22.2*

Anneau hyménal *N89.6*

Anneau pelvien
- fracture *S32.89*
- relâchement, au cours de la grossesse *O26.7*

Anneau vasculaire
- aorte *Q25.4*
- - anomalie *Q25.4*
- congénital *Q25.8*

Anneau, en forme de
- chromosome *Q93.2*
- contracture, complication, accouchement *O62.4*
- scotom *H53.4*
- séparation, col de l'utérus, lors de l'accouchement *O71.3*
- ulcère, cornée *H16.0*

Anneau, en forme de, éruption *R23.8*

Anneur de Soemmering *H26.4*

Annexalgies *N94.8*

Annexe
- épaississement *N83.9*
- gonflement *N83.9*
- inflammation *N70.9*
- irritation *N83.9*
- torsion *N83.5*
- tuberculose *A18.1+, N74.1**
- tumeur *D39.7*

Annexite *N70.9*
- aiguë *N70.0*
- chez l'homme *N49.9*
- chronique *N70.1*
- gonorrhéique *A54.2+, N74.3**
- puerpérale *O86.1*
- purulente *N70.9*
- - chronique *N70.1*
- subaiguë *N70.0*

Anodin(e)
- Goître *E04.9*
- thrombose NCA *I82.9*

Anodontie *K00.0*
- acquise *K08.1*

Anodontie –*suite*

- due à
- - accident *K08.1*
- - extraction *K08.1*
- - parodontose, locale *K08.1*
- partielle *K00.0*
- totale *K00.0*

Ano-génital
- candidose *B37.4*
- condylome *A63.0*
- démangeaison *L29.3*
- eczéma *L30.9*
- herpès *A60.9*
- mycose *B37.4*
- verrue *A63.0*

Anomalie *H53.4*
- Alder Reilly *D72.0*
- alpha-fœtoprotéine *R77.2*
- Amnios *O41.9*
- - préjudice pour le foetus/nouveau-né *P02.9*
- anémie, Glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), avec ictère néonatale *D55.0*
- anneau vasculaire aortique *Q25.4*
- anus *Q43.9*
- aorte NCA *Q25.4*
- appareil digestif NCA *Q45.9*
- - inférieur NCA *Q43.9*
- - supérieur *Q40.9*
- appareil lacrymal *Q10.6*
- appendice *Q43.8*
- approvisionnement rénal *Q27.2*
- aqueduc de Sylvius *Q03.0*
- - avec spina bifida *Q05.4*
- arc vertébral *Q76.4*
- arcade dentaire *K07.2*
- artère *Q27.9*
- - basilaire NCA *Q28.19*
- - cérébrale *Q28.39*
- - coronaire (cardiaque) *Q24.5*
- - grande *Q25.9*
- - ombilicale *Q27.0*
- - ophtalmique *Q15.8*
- - périphérique *Q27.9*
- - pulmonaire *Q25.7*
- - pulmonaire, congénital *Q25.7*
- - rénale *Q27.2*
- - rétinienne *Q14.1*
- - sous-clavière *Q27.8*
- - vertébrale NCA *Q28.19*
- articulation de l'épaule *Q74.0*
- articulation lombo-sacrale *Q76.4*
- articulation NCA *Q74.9*
- articulation sacro-iliaque NCA *Q74.2*
- atrium *Q20.8*
- auricule *Q20.8*
- autosome NCA *Q99.9*
- avant-bras *Q74.0*
- Axenfeld *Q15.0*
- bandelette du coeur *Q24.8*
- bandes ou replis méningés *Q07.9*
- bassin *Q74.2*
- bouche *Q38.6*
- bourse séreuse *Q79.9*
- bras *Q74.0*
- bronchique *Q32.4*
- caecum *Q43.9*

Anomalie –*suite*

- calcium *E83.58*
- canal *R26.8*
- - cholédoque *Q44.5*
- - cystique *Q44.5*
- - déférent *Q55.4*
- - éjaculatoire *Q55.4*
- - Gartner *Q50.6*
- - glande salivaire *Q38.4*
- - hépatique *Q44.5*
- - hystérique *F44.4*
- - Nuck *Q52.4*
- - para-urétral *Q64.7*
- - parotidien *Q38.4*
- - sublingual majeur *Q38.4*
- canthus *Q10.3*
- capillaire *Q27.9*
- caractère *F68.8*
- cardiaque *Q24.9*
- cardiovasculaire *Q28.88*
- caroncule lacrymale *Q10.6*
- cartilage cricoïde *Q31.8*
- cartilage de la trachée *Q32.1*
- cartilage du nez *Q30.9*
- cartilage thyroïde *Q31.8*
- cavités cardiaques *Q20.9*
- cérébrale *Q04.9*
- cerveau
- - congénital *Q04.9*
- - multiples *Q04.9*
- chambre de l'oeil
- - antérieur *Q13.9*
- - postérieur *Q14.9*
- champ visuel *H53.4*
- Chediak-Steinbrinck-Higashi *E70.3*
- cheveu, congénitale *Q84.1*
- cheveux *L67.9*
- cheveux, congénitale *Q84.2*
- cheville *Q74.2*
- Chilaiditi *Q43.3*
- chorion *O41.9*
- - préjudice pour le foetus/nouveau-né *P02.9*
- choroïde *Q14.3*
- chromosomique *Q99.9*
- - dans
- - - antécédents familiaux *Z82*
- - - l'anamnèse *Z87.7*
- - dépistage, liquide amniotique *Z36.0*
- - foetus, soins, femme enceinte *O35.1*
- chromosomique NCA *Q99.9*
- cils *Q10.3*
- clavicule *Q74.0*
- clitoris *Q52.6*
- cloison interauriculaire *Q21.1*
- cloison interventriculaire *Q21.0*
- coagulation *D68.9*
- - consommation *D65.1*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P60*
- - - intra partum *O67.0*
- - - intrapartum, avec lésion foetus/nouveau-né *P02.1*
- - - postpartum *O72.3*
- - - prénatale *O46.0*
- - - suite à
- - - - avortement *O08.1*
- - - - grossesse extra-utérine *O08.1*
- - - - grossesse molaire *O08.1*

Anomalie –*suite*
- coagulation –*suite*

- - couche *O72.3*
- - due au facteur V, mutation génétique *D68.8*
- coarctation, aorte *Q25.1*
- coccyx *Q76.4*
- coeur *Q24.9*
- col utérin *Q51.9*
- - avec stérilité, féminine *N97.3*
- - lors de la grossesse *O34.4*
- - soins, femme enceinte *O34.4*
- col utérin, lors de la grossesse NCA *O34.4*
- côlon *Q43.9*
- comportement *F69*
- - *R46.8*
- - sexuel *F65.9*
- conduction atrio-venticulaire (excitation) *I45.6*
- conduit auditif *Q16.1*
- congénital *Q89.9*
- - examen analytique *Z13.7*
- congénitale *Q89.9*
- - artère
- - - pulmonaire *Q25.7*
- - - rénale *Q27.2*
- - - sous-clavière *Q25.8*
- - tronc brachiocéphalique *Q25.8*
- conque de l'oreille *Q17.3*
- cordage tendineux *Q24.8*
- cordon ombilical, lors d'une grossesse *O69.9*
- cordon spermatique *Q55.4*
- cornet nasal *Q30.9*
- corps vitré *Q14.0*
- correspondance rétinienne *H53.3*
- côte cervicale *Q76.5*
- côtes *Q76.6*
- cou, gorge *Q18.9*
- coude *Q74.0*
- couleur des cheveux *L67.1*
- couleur, cheveux *L67.9*
- crâne *Q75.9*
- cristallin *Q12.9*
- cubitus *Q74.0*
- cycle menstruel *N92.6*
- - chronique *N92.6*
- cytogénétique *Q99.9*
- Dandy-Walker *Q03.1*
- dégradation des glycoprotéines *E77.1*
- dentaire *K00.2*
- dentition *K07.3*
- dento-faciale *K07.9*
- - fonctionnelle *K07.5*
- dents *K00.9*
- dermatoglyphe *Q82.8*
- dermatoglyphes *Q82.8*
- disque intervertébral *Q76.4*
- doigt, acquise *M20.0*
- doigts *Q74.0*
- duodénum *Q43.9*
- dure *Q04.9*
- - mère
- - - crânienne *Q04.9*
- - - spinale *Q06.9*
- Ebstein *Q22.5*
- - coeur *Q22.5*
- ectodermique *Q82.9*

Anomalie –*suite*

- empreintes digitales, palmaires *Q82.8*
- endocrinienne *E34.9*
- épididyme *Q55.4*
- épiglotte *Q31.8*
- éruption, dent *K00.6*
- estomac *Q40.3*
- excrétion de la bilirubine *E80.6*
- extrémité de la valve aortique NCA *Q23.9*
- extrémité, congénitale *Q74.9*
- face *Q18.8*
- - *Q18.9*
- fascia *Q79.9*
- fémorale NCA *Q74.2*
- fémur NCA *Q74.2*
- fixation, intestin *Q43.3*
- flexure sigmoïde *Q43.9*
- foetale *Q89.9*
- - avec dystocie *O66.3*
- foetus, soin, femme enceinte *O35.9*
- foie *Q44.7*
- fonctionnelle de la pupille *H57.0*
- forme, cornée *Q13.4*
- forme, dent *K00.2*
- fovéa centralis, rétine *Q14.1*
- front *Q75.8*
- frontal *Q75.9*
- gaine capillaire *L67.9*
- gencive *Q38.6*
- genou *Q74.1*
- gland *Q55.6*
- glande endocrine NAC *Q89.2*
- glande parathyroïde *Q89.2*
- glande sébacée *Q82.9*
- glande sousmaxillaire *Q38.4*
- globuline, transcortine *E27.8*
- glotte *Q31.8*
- gonosomes *Q99.8*
- - avec caryotype 46, X, excepté iso (Xq) *Q96.2*
- - avec mosaïque, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) NCA *Q96.4*
- - lors de
- - - phénotype féminin *Q97.9*
- - - phénotype masculin *Q98.9*
- granulocytes, génétiques *D72.0*
- hanches NCA *Q74.2*
- Hegglin *D72.0*
- hématocrite *R79.8*
- hiatus diaphragmatique, congénital *Q79.1*
- humérus *Q74.0*
- hymen *Q52.4*
- hypophyse *Q89.2*
- Iléon (iléum) *Q43.9*
- immunitaire *D84.9*
- intestinale *Q43.9*
- - avec
- - - adhésion, anormale *Q43.3*
- - - malrotation *Q43.3*
- iris *Q13.2*
- jambe NCA *Q74.2*
- jéjunum *Q43.8*
- joue *Q18.9*
- kératome palmaire *Q82.8*
- Klinefelter, gonosomes *Q98.4*
- labyrinthe, membraneux *Q16.5*
- lentille *Q12.9*

Anomalie –*suite*

- leucocytes, génétiques *D72.0*
- lèvre (buccale) *Q38.0*
- lèvres
- - grandes lèvres *Q52.7*
- - petites lèvres *Q52.7*
- ligament *Q79.9*
- - large de l'utérus *Q50.6*
- - rond *Q52.8*
- ligament de l'utérus
- - ligament rond de l'utérus *Q52.8*
- linguale *Q38.3*
- liquide céphalo-rachidien *R83.9*
- lors d'imagerie diagnostique
- - abdomen NCA *R93.5*
- - appareil musculo-squelettique NCA *R93.7*
- - appareil urinaire *R93.4*
- - circulation coronaire *R93.1*
- - cœur *R93.1*
- - déficit de l'appareil digestif *R93.3*
- - extémité *R93.6*
- - foie *R93.2*
- - mammaire *R92*
- - organe intra-thoracique NCA *R93.8*
- - poumon *R91*
- - rétropéritoine *R93.5*
- - système biliaire *R93.2*
- - système nerveux central NCA *R90.8*
- - tête *R93.0*
- - tissu sous-cutané *R93.8*
- - tissus cutané *R93.8*
- - tractus digestif NCA *R93.3*
- - tractus gastro-intestinal *R93.3*
- - tractus urogénital *R93.8*
- luette *Q38.5*
- mâchoire *K07.9*
- main *Q68.1*
- - *Q74.0*
- - congénitale *Q68.1*
- mammaire *Q83.8*
- May-Hegglin *D72.0*
- méat urinaire NCA *Q64.7*
- membrane fœtale *O41.9*
- - préjudice pour le foetus *P02.9*
- membres *Q74.9*
- - inférieurs *Q74.2*
- - supérieurs *Q74.0*
- méninges *Q07.9*
- méninges rachidiennes *Q06.9*
- menstruelle *N94.9*
- menton *Q18.9*
- mésentère *Q45.9*
- métabolique *E88.9*
- métabolisme *E70.8*
- métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine *E72.3*
- métabolisme des protéines *E88.0*
- métacarpe *Q74.0*
- métatarse NCA *Q74.2*
- miction *R39.1*
- mictionnelle NCA *R39.1*
- moëlle épinière *Q06.9*
- morsure *K07.4*
- multiple NCA *Q89.7*
- muscle laryngé *Q31.9*
- muscle papillaire *Q24.8*
- myocarde *Q24.8*

Anomalie –*suite*

- nerf
- - auditif VIII *Q07.8*
- - optique II *Q07.8*
- nombre de leucocytes *R72*
- nombre de thrombocytes *D69.61*
- noyau de Pelger-Huët *D72.0*
- œil *Q15.9*
- oesophagienne *Q39.9*
- omoplate *Q74.0*
- ongle *L60.3*
- - congénitale *Q84.6*
- ongles *Q84.6*
- orbite *Q10.7*
- oreille *Q17.9*
- - avec atteinte de l'ouïe *Q16.9*
- oreille interne *Q16.5*
- oreille moyenne *Q16.4*
- organe de Corti *Q16.5*
- organes digestifs NCA *Q45.9*
- organes du bassin, avec préjudice pour le foetus/nouveau-né *P03.8*
- organes génitaux
- - féminins *Q52.9*
- - féminins, externes *Q52.7*
- - masculins *Q55.9*
- organes pelviens
- - maternelle, dystocie *O65.5*
- - soins, femme enceinte *O34.9*
- organes respiratoires *Q34.9*
- organes urinaires *Q64.9*
- orifice urétral NCA *Q64.7*
- orteil *Q74.2*
- orteil, acquise *M20.5*
- os
- - carpe *Q74.0*
- - crâne
- - - avec
- - - - anencéphalie *Q00.0*
- - - - encéphalocèle *Q01.9*
- - - - hydrocéphalie *Q03.9*
- - - - - avec spina bifida, *Q05.4*
- - - - microcéphalie *Q02*
- - - congénital *Q67.4*
- - crâne, de la face, congénital *Q75.9*
- - du bassin, lors de la grossesse *O33.0*
- - iliaque NCA *Q74.2*
- - ischion NCA *Q74.2*
- - nez *Q30.9*
- - os NCA *Q79.9*
- - pelvien NCA *Q74.2*
- - tarsien NCA *Q74.2*
- osselet, acquise NCA *H74.3*
- osselets de l'oreille *Q16.3*
- ouraque *Q64.4*
- ouverture du diaphragme NCA *Q79.1*
- ovaire NCA *Q50.3*
- palais
- - dur NCA *Q38.5*
- - mou NCA *Q38.5*
- pancréas *Q45.3*
- papille *H47.3*
- papilles du nerf optique *Q14.2*
- parathyroïdienne *Q89.2*
- paroi abdominale NCA *Q79.5*
- paroi thoracique *Q67.8*
- - osseux *Q76.9*
- parotidienne *Q38.4*

Anomalie –*suite*

- paupière *Q10.3*
- paupière, congénitale *Q10.3*
- pavillon de l'oreille *Q17.8*
- peau *Q82.9*
- Pelger-Huët *D72.0*
- pelvienne NCA *Q74.2*
- - lors de la grossesse *O33.0*
- - maternelle, avec dystocie *O65.9*
- pelvi-urétérale, lors d'une pyélonéphrite chronique *N11.1*
- péricarde *Q24.8*
- périnée
- - lors de la grossesse *O34.7*
- - soins, femme enceinte *O34.7*
- périnée, avec obstacle, la naissance *O65.5*
- péroné NCA *Q74.2*
- Peters *Q13.4*
- pharynx *Q38.8*
- pied bot (pied en varus) *Q66.3*
- pied en varus *Q66.3*
- pied NCA *Q74.2*
- pièvre *Q34.0*
- pigmentation *L81.9*
- pigmentation de la cornée (granulation) *H18.0*
- pigmentation NCA *L81.9*
- placenta NCA *O43.1*
- - avec
- - - foetus/du nouveau-né affecté *P02.2*
- - - hémorragie *O46.8*
- - soins, femme enceinte *O43.1*
- plèvre *Q34.0*
- plexus choroïdes *Q07.8*
- pli ary-épiglottique *Q31.8*
- Poland *Q79.8*
- position
- - canine, incluse *K07.3*
- - dent de sagesse, incluse *K07.3*
- - germes dentaires *K01.0*
- position de la dent *K07.3*
- position de la langue, congénitale *Q38.3*
- position des dents *K07.3*
- position mâchoire-crâne *K07.1*
- positions, rein *Q63.2*
- postopératoire *T81.8*
- posturale *R29.3*
- - cyphose, chez l'adolescent *M40.09*
- - rachis NCA *M43.99*
- - scoliose *M41.99*
- pouce *Q74.0*
- poumon *Q33.9*
- prélèvement
- - col utérin *R87.9*
- - vaginal *R87.9*
- - vulvaire *R87.9*
- prépuce *Q55.6*
- prostate *R86.9*
- prostatique *Q55.4*
- pulmonaire *Q33.9*
- pupille *H57.0*
- - *Q13.2*
- pyélo-urétérale, associée à une pyélonéphrite chronique *N11.1*
- pylore *Q40.3*
- queue de cheval (syndrome) *Q06.3*
- rachis *Q76.4*

Anomalie –*suite*

- racine nerveuse spinale *Q07.8*
- radius *Q74.0*
- rapport entre les mâchoires et la base du crâne *K07.1*
- rectum *Q43.9*
- réflex pupillaire *H57.0*
- réfraction *H52.7*
- réfraction (vice de) *H52.7*
- réfractions NCA *H52.7*
- rénale *Q63.9*
- replis des méninges *Q07.9*
- respiratoire *R06.88*
- - lors d'une maladie, due au VIH *B23.8, R06.88*
- respiratoire NCA *R06.88*
- retour veineux *Q26.8*
- retour veineux pulmonaire *Q26.4*
- - partiel *Q26.3*
- - total *Q26.2*
- retour veineux, pulmonaire
- - partiel *Q26.3*
- - total *Q26.2*
- Rieger *Q13.8*
- rotations
- - fémorales *Q65.8*
- - hanches *Q65.8*
- rotule *Q74.1*
- rythme cardiaque, fétal, soins, femme enceinte *O36.3*
- s métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée *E71.1*
- s métabolisme des acides aminés aromatiques *E70.9*
- sacrum NCA *Q76.4*
- Scimitar (syndrome) *Q26.8*
- scrotum *Q55.2*
- sécrétion hormonale antidiurétique *E22.2*
- septale auriculo-ventriculaire *Q21.2*
- septum auriculaire *Q21.1*
- septum cardiaque *Q21.9*
- septum ventriculaire *Q21.0*
- sexuelle *F65.9*
- sigmoïdienne *Q43.9*
- sinus de Valsalva *Q25.4*
- sinus nasal *Q30.8*
- sinus veineux *Q21.1*
- spermatique *R86.9*
- splénique *Q89.0*
- squelette, généralisé NCA *Q78.9*
- sternum NCA *Q76.7*
- stockage des lipides *E75.6*
- - avec
- - - dystrophie, rétine *E75.6+, H36.8**
- - - myopathie *E75.6+, G73.6**
- structurelle
- - chromosomes sexuels, chez le phénotype masculin *Q98.6*
- - gonosomes, chez le phénotype masculin *Q98.6*
- - région cervicale *M43.12*
- - région lombaire *M43.16*
- surrénalienne *Q89.1*
- synchondrose *Q78.8*
- système circulatoire central, congénital *Q28.9*
- système musculosquelettique NCA *Q79.9*
- système nerveux *Q07.9*

Anomalie –*suite*

- système nerveux central NCA *Q07.9*
- système nerveux NCA *Q07.8*
- système uro-génital
- - chez la femme NCA *Q52.9*
- - chez l'homme NCA *Q55.9*
- système vasculaire, périphérique *Q27.9*
- taille de la mâchoire *K07.0*
- talon NCA *Q74.2*
- tarse NCA *Q74.2*
- taux de glycémie *E16.2*
- taux d'hémoglobine *R79.8*
- tégument *Q84.9*
- tendon *Q79.9*
- testicules *Q55.2*
- tête *Q75.9*
- thorax *Q67.8*
- - osseux *Q76.9*
- thymus *Q89.2*
- thyroglobuline *E07.8*
- thyroïdienne *Q89.2*
- tibia NCA *Q74.2*
- tissus mous maternels, foetus.nouveau-né affecté *P03.8*
- tissus pelviens mous, lors de la grossesse *O34.9*
- tolérance au glucose *R73.0*
- trachée *Q32.1*
- transcortine *E27.8*
- transport de l'urine *R39.1*
- trompe de Fallope *Q50.6*
- - avec stérilité *N97.1*
- - congénitales, avec stérilité, tubaire *N97.1*
- trompe d'Eustache *Q17.8*
- Turner, gonosomes *Q96.9*
- Uhl *Q24.8*
- uretère *Q62.8*
- - lors d'une pyélonéphrite chronique *N11.1*
- - obstructive NCA *Q62.3*
- Uretère NCA *Q64.7*
- - congénitale *Q64.7*
- - obstructive NCA *Q64.3*
- urètre *Q64.7*
- utérus *Q51.9*
- - avec
- - - affection du foetus ou du nouveau-né *P03.8*
- - - obstruction, naissance *O65.5*
- - - seule une corne fonctionnelle *Q51.8*
- - - stérilité *N97.2*
- - congénitales, avec stérilité, tubaire *N97.2*
- - soins, femme enceinte *O34.5*
- vaginale *Q52.4*
- - avec obstruction, naissance *O65.5*
- - avec stérilité, féminine *N97.8*
- - lors de la gorssesse *O34.6*
- vaisseau cérébral *Q28.39*
- vaisseau rénal *Q27.2*
- - *Q27.8*
- valeur d'INR *R79.8*
- vallécule épiglottique *Q31.8*
- valve cardiaque NCA *Q24.8*
- valve iléo-caecale *Q43.9*
- valve pulmonaire, congénitale *Q22.3*
- valve tricuspide, congénitale *Q22.9*

Anomalie –*suite*
- valve, veine cave inférieure, péricardiaque *Q24.8*
- valvule cardiaque *Q24.8*
- valvule du sinus coronaire *Q24.5*
- valvule iléo-caecale *Q43.9*
- valvule mitrale *Q23.9*
- valvules aortique, congénitale *Q23.9*
- vasculaire
- - extracrânienne, relié au cerveau *Q28.19*
- - optico-ciliaire *Q13.2*
- - paupière *H02.8*
- vasculaire rénale *Q27.2*
- veine *Q27.9*
- - grande *Q26.9*
- - périphérique *Q27.9*
- veine cave
- - inférieure *Q26.9*
- - supérieure *Q26.9*
- veine porte *Q26.5*
- veine rénale *Q26.8*
- ventricule cardiaque *Q20.8*
- vertébrale *Q76.4*
- vésicule biliaire *Q44.1*
- vésicule séminale *Q55.4*
- vessie *Q64.7*
- vision des couleurs *H53.5*
- voies biliaires *Q44.5*
- volume, dent *K00.2*
- vulve *Q52.7*
- - soins, femme enceinte *O34.7*
- vulve avec obstruction, naissance *O65.5*

Anomie *R48.8*

Anonychie *Q84.3*
- acquise *L60.8*
- congénitale *Q84.3*

Anophtalmie *Q11.1*
- acquise *Z90.0*
- congénitale *Q11.1*

Anopsie *H53.4*
- d'un quadrant *H53.4*
- - champ visuel *H53.4*

Anopsie d'un quadrant *H53.4*
- champ visuel *H53.4*

Anorchidie *Q55.0*

Anorchie *Q55.0*

Anorectal
- abcès *K61.2*
- fistule *K60.5*
- hémorragie *K62.5*
- lésion *K62.9*
- phlegmon *K61.2*
- prolapsus, femme *N81.6*
- ulcère *K62.6*

Anorexie *R63.0*
- endogène *F50.0*
- hystérique *F44.88*
- pendant la puberté *F50.0*
- psychogène *F50.0*

Anorexie mentale *F50.0*
- atypique *F50.1*

Anorexie mentale NCA *F50.0*

Anorexie, syndrome *R63.0*

Anorexigènes, intoxication *T50.5*

Anorgasmie *F52.3*
- psychogène *F52.3*

Anormal
- comportement social, sans trouble psychiatrique manifeste *Z03.2*
- formule leucocytaire *R72*
- résultat
- - cardiotocographie (CTG) *O28.8*
- - colposcopie *R93.5*

Anormal - s. Nature de la maladie

Anormal *voir* maladie

Anosmie *R43.0*
- hystérique *F44.6*

Anosognosie *R41.8*

Anotie *Q17.8*

Anovulation *N97.0*
- cycle *N97.0*
- stérilité *N97.0*

Anoxémie *R09.0*
- chez le nouveau-né *P21.9*

Anoxie *R09.0*
- avant le début du travail *P20.0*
- avec
- - hémorragie intracrânienne du foetus/nouveau-né *P52.9*
- - lésion cérébrale suite à une intervention chirurgicale *T88.5*
- cérébrale *G93.1*
- - après
- - - actes médicaux *G97.88*
- - - césarienne *O75.4*
- - - mesure obstétricale (comprenant l'accouchement) *O75.4*
- - due à anesthésie
- - - cours de la puerpéralité *O89.2*
- - - pendant
- - - - accouchement *O74.3*
- - - - grossesse *O29.2*
- - pendant un acte médical *G97.88*
- due à haute altitude *T70.2*
- due à noyade *T75.1*
- intra-utérine *P20.9*
- pathologique *R09.0*

Anoxique
- encéphalopathie *G93.1*
- lésion cérébrale *G93.1*
- - après des actes médicaux *G97.88*
- - pendant un acte médical *G97.88*
- néphrose *N17.0*
- - tubulaire *N17.0*

Anoxo-ischémique
- encéphalopathie, chez le nouveau-né *P91.6*
- lésion cérébrale *G93.1*

Anse afférente, syndrome *K91.88*

Anse borgne, syndrome de *K90.2*
- après intervention chirurgicale *K91.2*
- congénital *Q43.8*

Anse iliaque
- abcès *K63.0*
- adhérence *K66.0*
- anomalie *Q43.9*
- constriction *K56.6*
- diverticule *K57.30*
- - congénitale *Q43.8*
- - perforation *K57.20*
- diverticulite *K57.32*

Anse iliaque –*suite*
- diverticulite –*suite*
- - avec perforation *K57.22*
- - congénitale *Q43.8*
- diverticulose *K57.30*
- - congénitale *Q43.8*
- élongation *Q43.8*
- fistule *K63.2*
- flexion
- - anomalie *Q43.9*
- - axe de rotation *K56.2*
- hypertrophie *K59.3*
- lésions *K63.9*
- malformation
- - acquise *K63.8*
- - congénitale *Q43.9*
- malposition *Q43.8*
- néoplasie *D37.4*
- perforation *K63.1*
- - chez le foetus/nouveau-né *P78.0*
- - traumatique *S36.59*
- - traumatisme obstétrical de la mère *O71.5*
- polype *K63.5*
- rupture
- - chez le foetus/nouveau-né *P78.0*
- - non-traumatique *K63.1*
- - traumatique *S36.59*
- spasmes *K58.9*
- - psychogènes *F45.32*
- sténose *K56.6*
- tumeur *D37.4*
- volvulus *K56.2*

Antécédent VIH *B24*

Antécédents de carcinome, familiaux *Z80.9*

Antécédents familiaux et risque de throm *Z82*
- artérielle *Z82*
- veineuse *Z82*

Antéflexion (antéversion) de l'utérus (a *N85.4*

Anté-hypophyse
- hormone, insuffisance NCA *E23.0*
- hyperfonction *E22.9*
- - avec acromégalie *E22.0*
- infarctus *E23.6*
- insuffisance aiguë, post-partum *E23.0*

Antepartum
- carence en facteur de coagulation affectant le foetus et le nouveau-né *P02.1*
- fibrinolyse *O46.0*
- hémorragie *O46.9*
- - due à une anomalie de la coagulation *O46.0*
- - placentaire *O46.8*
- - traumatique *O46.8*
- surveillance *Z34*
- thrombophlébite
- - mère, affectant le foetus/le nouveau-né *P00.3*
- - profonde *O22.3*

antérieur
-
- anomalie de position, prise en charge, grossesse *Z34*
- avec

antérieur *–suite*
- avec *–suite*
- - gangrène Autre Hernie de la paroi abdominal *K43.78*
- - occlusion sans gangrène , Autre Hernie de la paroi abdominal *K43.68*
- chambre antérieure de l'oeil
- - affection *H21.9*
- - corps étranger *S05.5*
- - - rétention *H44.7*
- - hémorragie *H21.0*
- - hypopyon *H20.0*
- - kyste *H21.3*
- - lésion *S05.8*
- - oblitération *H44.4*
- - tassement *H44.4*
- chambre antérieure, anomalie *Q13.9*
- chambre de l'oeil, rétrecissement *H40.0*
- crâne, fracture *S02.1*
- douleurs thorasciques *R07.3*
- humeur acqueuse, affection *H21.9*
- ligament croisé
- - déchirure
- - - complète *S83.53*
- - - partielle *S83.53*
- - insuffisance *M23.81*
- - rupture, articulation du genou, ancienne *M23.51*
- membrane, dystrophie, cornée *H18.5*
- narine
- - atrésie *Q30.0*
- - sténose *J34.8*
- - - congénitale *Q30.0*
- non précisées
- - avec
- - - gangrène , Autre Hernie de la paroi abdominal *K43.7*
- - - - , Hernie de la paroi abdominal *K43.79*
- - - occlusion sans gangrène , Autre Hernie de la paroi abdominal *K43.6*
- - - - , sans gangrène , Hernie de la paroi abdominal *K43.69*
- - sans occlusion ni gangrène , Hernie de la paroi abdominal *K43.99*
- occlusion, dents *K07.2*
- SAI Hernie paroi abdominal *K43.99*
- sans occlusion gangrène Autre Hernie de la paroi abdominal *K43.98*
- syndrome spinal antérieur *G95.1*
- synéchie *H21.5*
- - oeil *H21.5*
- - post-traumatique, avec glaucome secondaire *H40.3*
- thorax, douleurs *R07.3*
- urétré, sténose *N35.9*
- vagin, prolaps *N81.1*

Antérieur - *voir* type de maladie

Antérieur gauche
- bloc fasciculaire *I44.4*
- hémibloc *I44.4*

Antéro-apical - *voir* type de maladie

Antérolatéral - *voir* type de maladie

Antéroseptal - *voir* type de maladie

Antétorsion augmentée du col du fémur *Q65.8*
- congénitale *Q65.8*

Antéversion
- col de l'utérus *N88.8*

Antéversion *–suite*
- col de l'utérus *–suite*
- - avec obstacle à la naissance *O65.5*
- utérus *N85.4*
- - avec
- - - foetus/du nouveau-né affecté *P03.8*
- - - obstacle à la naissance *O65.5*
- - avec césarienne *O34.5*
- - congénitale *Q51.8*
- - lors de
- - - accouchement *O34.5*
- - - grossesse *O34.5*
- utérus gravide, sacciforme, compliquant l'accouchement *O34.5*

Anthracose *J60*
- avec
- - lymphadénite *J60*
- - tuberculose, organes respiratoires *J65*
- cas de fibrose pulmonaire *J60*
- pulmonaire *J60*

Anthraco-silicose *J60*

Anthracosilicose pulmonaire *J60*

Anthracosilicose, en cas de fibrose pulm *J60*

Anthracycline
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Anthrax - *voir aussi* maladie du charbon *L02.9*
- aine *L02.2*
- aisselle *L02.4*
- anus *L02.3*
- avant bras *L02.4*
- bras *L02.4*
- canal
- - déférent *N49.1*
- - spermatique *N49.1*
- canal déférent *N49.1*
- cas de charbon *A22.0*
- charbon *A22.9*
- - contagieux *A22.0*
- conduit auditif *H60.0*
- cordon spermatique *N49.1*
- corps caverneux *N48.2*
- cou *L02.1*
- creux axillaire *L02.4*
- cuir chevelu *L02.8*
- cuisse *L02.4*
- doigt *L02.4*
- dos *L02.2*
- épaule *L02.4*
- face *L02.0*
- fesses *L02.3*
- fessier *L02.3*
- genou *L02.4*
- glande lacrymale *H04.0*
- hanche *L02.4*
- jambe *L02.4*
- lèvre *L02.0*
- lèvres
- - vulvaires, grandes *N76.4*
- - vulvaires, petites *N76.4*
- lèvres vulvaires *N76.4*
- localisations multiples *L02.9*
- lombes *L02.2*
- main *L02.4*
- malléole *L02.4*

Anthrax - *voir aussi* maladie du charbon *–suite*
- nez *J34.0*
- nombril *L02.2*
- nuque *L02.1*
- orbite *H05.0*
- oreille *H60.0*
- organes génitaux masculins *N49.9*
- orteils *L02.4*
- paroi abdominale *L02.2*
- paroi thoracique *L02.2*
- partie inférieure de la jambe *L02.4*
- partie supérieure du bras *L02.4*
- paupière *H00.0*
- pavillon de l'oreille *H60.0*
- peau NCA *L02.9*
- pénis *N48.2*
- périnée *L02.2*
- pied *L02.4*
- poignet *L02.4*
- pouce *L02.4*
- rectum *K61.1*
- région fessière *L02.2*
- rein *N15.10*
- scrotum *N49.2*
- sein *N61*
- talon *L02.4*
- tempe *L02.0*
- testicule *N45.0*
- tête *L02.8*
- tronc *L02.2*
- urètre *N34.0*
- vésicule séminale *N49.0*
- voies lacrymales *H04.3*
- vulve *N76.4*

Anthropoïde, bassin *Q74.2*
- avec disproportion foeto-pelvienne *O33.0*

Antiaggrégant plaquettaire, thérapie (pa *Z92.2*

Antiallergique, intoxication *T45.0*

Anti-androgène, effet indésirable *T88.7*

Antianémique, intoxication *T45.8*

Antibiogramme *Z01.7*

Antibiotique
- Antécédents personnels d'allergie *Z88.1*
- antinéoplasique, intoxication *T45.1*
- incompatibilité *T88.7*
- prophylaxie *Z29.2*

Anticholinergique, syndrome *T44.3*

Anticholinergiques
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Anticholinestérasiques, intoxication *T44.0*

Anticoagulants
- avec thérapie de longue durée, dans les antécédents *Z92.1*
- circulatoire, trouble, hémorragique *D68.3*
- Diathèse, hémorragique *D68.3*
- intoxication *T45.5*
- Thérapie *Z92.1*
- - avec hématurie *D68.3*
- Thérapie de longue durée, avec hémorragie *D68.3*
- troubles hémorragiques *D68.30*

Anticorps

Anticorps –*suite*

- Anti-D
- - Mère, chez le foetus/nouveau-né *P55.0*
- - soins maternels *O36.0*
- antinucléaire (ANA), augmentation *R76.0*
- contre les facteurs de coagulation, diathèse, hémorragique, après accouchement *O72.3*
- déficit *D80.1*
- - avec/en cas de
- - - déficit immunitaire *D80.9*
- - - gammaglobulinémie normale *D80.6*
- - - hypergammanoglobulinémie *D80.6*
- déficit humoral *D80.8*
- déficit immunitaire *D80.9*
- Examen de dépistage *Z01.7*
- Groupes sanguins, mère *O36.1*
- mère *O36.1*
- monoclonal
- - allergie *T88.7*
- - hypersensibilité *T88.7*
- Rh
- - Mère, chez le foetus/nouveau-né *P55.0*
- - soins maternels *O36.0*

Anticorps anti D
- mère, chez le foetus/nouveau-né *P55.0*
- soins maternels *O36.0*

Anticorps anti-GBM, néphrite, en cas de *M31.0+, N08.5**

Anticorps de groupe sanguin, mère *O36.1*

Antidépresseur
- abus *F55.0*
- inhibiteur de la mono-amine-oxydase, intoxication *T43.1*
- tétracyclique, intoxication *T43.0*
- tricyclique
- - allergie *T88.7*
- - hypersensibilité *T88.7*
- - intoxication *T43.0*

Antidiabétique, effet indésirable *T88.7*

Antidiarrhéique, intoxication *T47.6*

Antidiurétique (hormone)
- hypersécrétion *E22.2*
- hyposécrétion *E23.2*
- sécrétion, inappropriée, syndrome *E22.2*

Anti-E titre, positif, au cours de la gr *O36.0*

Antiémétiques, intoxication *T45.0*

Antiépileptiques, syndrome de malformati *Q86.1*

antigène spécifique prostate PSA Modification du taux d ' *R77.80*

Antigène australien, avec hépatite *B16.9*

Antigène de surface de l'hépatite B [HBs *Z22.5*

Antigène-associé, hépatite *B16.9*

Anti-glomérulaire, anticorps membrane ba *M31.0+, N08.5**

Antihémophile, globuline, carence NCA *D66*

Antihistaminiques
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Anti-infectieux pour les yeux, Intoxicat *T49.5*

Anti-infectieux, yeux, intoxication *T49.5*

Antinéoplasique, antibiotiques, intoxica *T45.1*

Anti-oestrogène, effet indésirable *T88.7*

Anti-péristaltique *R19.2*

Antiprurigineux, intoxication *T49.1*

Antisocial
- psychopathie *F60.2*
- trouble de la personnalité *F60.2*

Antithrombine, augmentation, avec diathè *D68.3*

Antithrombinémie *D68.3*
- après accouchement *O72.3*

Antithromboplastinémie *D68.3*
- après accouchement *O72.3*

Antithromboplastinogénémie *D68.3*
- après accouchement *O72.3*

Antitubulaire, néphrite de la membrane b *N12*

Antitussifs, intoxication *T48.3*

Anton-Babinski, syndrome *R48.1*

Antre
- empyème, chronique *J32.0*
- érosion *K25.9*
- fistule *J32.0*
- Gastrite *K29.5*
- - chronique *K29.5*
- Highmore (sinus maxillaire)
- - Abcès, chronique *J32.0*
- - corps étranger *T17.0*
- - kyste *J34.1*
- - polype *J33.8*
- inflammation, chronique *J32.0*
- mastoïde, inflammation *H70.9*
- Nécrose *J32.0*
- polype *K31.7*
- pylore, polype *K31.7*

Antre de l'estomac, carcinome *C16.3*
- cellules en bague à chaton *C16.3*

Antrite *H70.9*

Antropophobie *F40.1*

Anurie *R34*
- après
- - Actes médicaux *N99.0*
- - Avortement *O08.4*
- - grossesse extra-utérine *O08.4*
- - grossesse môlaire *O08.4*
- chez le nouveau-né *P96.0*
- provoquée par
- - calcul *N20.9*
- - sulfamides, médication adéquate et administration selon la prescription *R34*
- - surdosage, sulfamides *T37.0*
- traumatique *T79.5*

Anurie traumatique *T79.5*

Anurique, atteinte rénale *N19*

anus
-
- abcès *K61.0*
- absence
- - avec fistule *Q42.2*
- - congénitale *Q42.3*
- accessoire *Q43.42*

anus –*suite*

- Acrochordon de l ' *K64.4*
- agénésie *Q42.3*
- - avec fistule *Q42.2*
- anomalie *Q43.9*
- anthrax *L02.3*
- artificiel
- - prolapsus *K91.4*
- - sténose *K91.4*
- - transverse, prolapsus *K91.4*
- atrésie, avec fistule *Q42.2*
- brûlure *T21.04*
- - degré
- - - 2a *T21.24*
- - - 2b *T21.84*
- - deuxième degré *T21.24*
- - premier degré *T21.14*
- - troisième degré *T21.34*
- cancer baso-cellulaire *C44.5*
- carcinome *C21.0*
- carcinome in situ *D01.3*
- carcinome pagetoïde *C21.0*
- cicatrice *K62.8*
- corps étranger *T18.5*
- corrosion *T21.44*
- - degré
- - - 2a *T21.64*
- - - 2b *T21.94*
- - deuxième degré *T21.64*
- - premier degré *T21.54*
- - troisième degré *T21.74*
- cryptopapillite *K62.8*
- déchirure, complication, accouchement *O70.2*
- déformation, acquise *K62.8*
- dilatation *K59.8*
- douleurs *K62.8*
- duplication *Q43.42*
- ectopie *Q43.5*
- fibrome *D21.5*
- fibrose *K62.8*
- fissure *K60.2*
- - *S31.80*
- fistule, tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- furoncle *L02.3*
- gonorrhée *A54.6*
- hémorragie *K62.5*
- hypoplasie *Q42.3*
- - avec fistule *Q42.2*
- imperforation *Q42.3*
- imperforation, avec fistule *Q42.2*
- infection *K62.8*
- - chlamydies *A56.3*
- inflammation *K62.8*
- Insuffisance anastomoses suture après opération de : l ' *K91.83*
- insuffisance de *K62.8*
- irritation *K62.8*
- kyste *K62.8*
- lacération
- - avec déchirure
- - - muqueuse anale, complication, accouchement *O70.3*
- - - muqueuse rectale, complication, accouchement *O70.3*
- - complication, accouchement *O70.2*
- - non-puerpérale, non-traumatique *K60.2*
- lésion *S39.9*

anus –*suite*
- lésion –*suite*
- - superficielle *S30.80*
- leucoplasie *K62.8*
- maladie *K62.9*
- maladie de Paget, extramammaire *C21.0*
- mélanome *C43.5*
- - malin *C21.0*
- mélanome malin *C21.0*
- naevus *D22.5*
- oblitération *Q42.3*
- - avec fistule *Q42.2*
- occlusion *K62.4*
- - congénitale *Q42.3*
- - - avec fistule *Q42.2*
- papillite *K62.8*
- papillome *D12.9*
- paralysie *K62.8*
- plaie, ouverte *S31.80*
- prolapsus *K62.2*
- rhagade *K60.2*
- septum *Q42.3*
- sphincter, crampe *K59.4*
- sphincter, incontinence *R15*
- sténose *K62.4*
- - avec sténose du rectum *K62.4*
- - congénitale *Q42.3*
- - - avec fistule *Q42.2*
- sténose grave
- - chez le nourrisson *Q42.3*
- - congénitale, avec fistule *Q42.2*
- syphilis *A52.7+, K93.8**
- - secondaire *A51.3*
- - stade primaire *A51.1*
- tumeur *D37.78*
- ulcère *K62.6*
- varices au cours de la grossse *O22.4*

Anxiété *F41.9*
- avant
- - grossesse *F45.2*
- - injection *F40.2*
- avortement *F45.2*
- calme *O92.70*
- cancer *F45.2*
- cas de trouble, émotionnelle, spécifique, dans l'enfance *F93.8*
- chez l'enfant *F93.8*
- Coeur *F45.2*
- épisodique, paroxystique *F41.0*
- et réaction, dépressif, combiné *F41.2*
- examen *F40.2*
- Examens *F40.2*
- généralisée *F41.1*
- hauteur *F40.2*
- librement flottante *F41.1*
- lieu *F40.00*
- malformation *F45.2*
- nuit *F51.4*
- pathologique *F40.9*
- rechute *F45.2*
- séparation *F43.2*
- - dans l'enfance *F93.0*
- - - cas de trouble, émotionnel *F93.0*
- sociale, de l'enfance *F93.2*
- - lors de troubles *F93.2*
- - - émotionnels *F93.2*
- thromboembolie *F45.2*

Anxiété, trouble, personnalité *F60.6*

Anxieux
- agité, dépression *F32.2*
- dépressif, syndrome *F41.2*
- dépression *F41.2*
- - légère *F41.2*
- - persistante *F34.1*
- - transitoire *F41.2*
- trouble de la personnalité *F60.6*

Anxiolytique, abus *F13.1*

Anxiolytiques, trouble, persistant *F13.7*

AOPC [Atrophie olivo-ponto-cérébelleuse] *G23.8*

Aorte
- abdominale
- - Anévrisme *I71.4*
- - - disséquant *I71.02*
- - - perforé *I71.3*
- - - perforé sans rupture *I71.3*
- - - rompue *I71.3*
- - - sous-rénal *I71.4*
- - athérosclérose *I70.0*
- - descendant, anévrisme *I71.4*
- - dissection *I71.02*
- - - rompue *I71.06*
- - embolie *I74.0*
- - lésion *S35.0*
- - occlusion *I74.0*
- - rupture *I71.3*
- - - traumatique *S35.0*
- - syphilis *A52.0+, I79.1**
- - thrombose *I74.0*
- absence, congénitale *Q25.4*
- Agénésie *Q25.4*
- anévrisme *I71.9*
- - artérioscléreux NCA *I71.9*
- - artérioscléreux, rompu *I71.8*
- - calcification *I70.0*
- - congénitale *Q25.4*
- - cylindrique *I71.9*
- - - rompu *I71.8*
- - disséquant *I71.00*
- - rompue *I71.8*
- - sous-rénal (infrarénal) *I71.4*
- - - rompue *I71.3*
- - syphilitique *A52.0+, I79.0**
- - - congénital *A50.5+, I79.0**
- - thoracique
- - - rompue *I71.1*
- - - syphilitique *A52.0+, I79.0**
- - thoraco-abdominal *I71.6*
- anneau vasculaire *Q25.4*
- - anomalie *Q25.4*
- anneau, atrésie *Q25.2*
- anomalie de position congénitale *Q25.4*
- anomalie NCA *Q25.4*
- aplasie *Q25.4*
- appareil de contrepulsion (ballonnet), avec complication *T82.9*
- artériosclérose *I70.0*
- artérite, non syphilitique *I77.6*
- ascendante
- - anévrisme *I71.2*
- - - disséquant *I71.01*
- - - rompue *I71.1*
- - hypoplasie, syndrome du ventricule gauche, hypoplasique *Q23.4*
- - rétrécissement, congénital *Q25.3*
- - rupture *I71.1*

Aorte –*suite*
- ascendante –*suite*
- - sténose, congénitale *Q25.3*
- athéromatose *I70.0*
- athérosclérose *I70.0*
- atrésie *Q25.2*
- - cas d'hypoplasie du coeur gauche *Q23.4*
- - congénitale *Q23.0*
- - - avec hypoplasie de l'aorte ascendante et développement défectueux du ventricule gauche *Q23.4*
- base, et artère pulmonaire, communication *Q21.4*
- brachiocéphalique, artérite *M31.4*
- calcification *I70.0*
- carrefour
- - embolie *I74.0*
- - thrombose *I74.0*
- carrefour, thrombose *I74.0*
- cheval *Q25.4*
- coarctation *Q25.1*
- - post-ductale *Q25.1*
- - pré-ductale *Q25.1*
- crosse
- - absence, congénitale *Q25.4*
- - accessoire *Q25.4*
- - anévrisme *I71.2*
- - - rompu *I71.1*
- - artérite *M31.4*
- - atrésie *Q25.2*
- - déformation
- - - acquise *I77.8*
- - - congénitale *Q25.4*
- - double *Q25.4*
- - - persistante *Q25.4*
- - droite, persistance *Q25.4*
- - embolie *I74.0*
- - rupture *I71.1*
- - syphilis *A52.0+, I79.1**
- déformation
- - acquise *I77.8*
- - congénitale *Q25.4*
- dégénérescence *I70.0*
- - graisseuse *I77.8*
- déplacement *Q25.4*
- descendante
- - abdominale
- - - anévrisme, rompu *I71.3*
- - - rupture *I71.3*
- - anévrisme *I71.9*
- - - rompu *I71.8*
- - rupture *I71.8*
- - thoracique
- - - anévrisme, rompu *I71.1*
- - - rupture *I71.1*
- dextrotransposition *Q20.3*
- dilatation *I71.9*
- - congénitale *Q25.4*
- - rompue *I71.8*
- - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- Dissection thoraco-abdominale, avec rupture *I71.07*
- dissection *voir* anévrisme disséquant de l'aorte *I71.00*
- - avec rupture *I71.04*
- ectasie *I71.9*
- - rompue *I71.8*

Aorte –*suite*
- embolie *I74.1*
- embolie en selle *I74.0*
- hématome, disséquant *I71.00*
- hypoplasie *Q25.4*
- insuffisance
- - congénitale *Q23.1*
- - rhumatismale *I06.1*
- - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- isthme, sténose *Q25.1*
- - congénitale *Q25.1*
- - post-ductale *Q25.1*
- - pré-ductale *Q25.1*
- lésion *I35.9*
- - *S25.0*
- lipoïdose *E75.6*
- maladie, non syphilitique *I77.9*
- nécrose
- - hyaline *I71.9*
- - rompue *I71.8*
- nécrose de la media, kystique *I71.00*
- occlusion *Q25.3*
- paroi, rupture *I71.8*
- racine
- - anévrisme *I71.2*
- - gauche persistante, avec crosse aortique à droite *Q25.4*
- régurgitation, syphilitique *A52.0+, I39.1**
- rupture *I71.8*
- - syphilitique *A52.0+, I79.0**
- - traumatique *S25.0*
- - - abdominale ou abdomen *S35.0*
- sclérose *I70.0*
- sténose
- - artériosclérotique *I70.0*
- - congénitale *Q25.3*
- - rhumatismale *I06.0*
- - - avec
- - - - insuffisance *I06.2*
- - - - régurgitation *I06.2*
- - sclérosée *I70.0*
- - subvalvulaire, congénitale *Q24.4*
- - supravalvulaire *Q25.3*
- - supraventriculaire *Q25.3*
- - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- - valvulaire, congénitale *Q23.0*
- syphilitique *A52.0+, I79.1**
- thoracique
- - anévrisme *I71.2*
- - - rompu *I71.1*
- - anévrismes *I71.2*
- - - non syphilitique *I71.2*
- - descendant, anévrisme *I71.2*
- - dissection *I71.01*
- - - rompue *I71.05*
- - embolie *I74.1*
- - lésion *S25.0*
- - rupture *I71.1*
- - syphilitique *A52.0+, I79.1**
- - thrombose *I74.1*
- thoracique, anévrisme *I71.2*
- - rompu *I71.1*
- thoracique, anévrisme rompu *I71.1*
- thrombose *I74.1*
- torsion, congénitale *Q25.4*
- transposition *Q20.3*
- volet de valvule

Aorte –*suite*
- volet de valvule –*suite*
- - accessoire *Q23.8*
- - anomalie NCA *Q23.9*

aortique thoraco abdominal
- rompu Anévrisme *I71.5*
- sans mention de rupture , Anévrisme *I71.6*

Aortique, valvule
- anévrisme *I35.8*
- anomalie *I35.8*
- - cardiaque rhumatismale *I06.8*
- - combinée *I35.2*
- - rhumatismale chronique *I06.8*
- anomalie NCA *Q23.9*
- athérome *I35.8*
- atrésie *Q23.0*
- atteinte *I35.9*
- - associée à
- - - endocardite
- - - - valvule mitrale aiguë, avec chorée, *I02.0*
- - - - - évolutif, avec chorée, *I02.0*
- - - - - *I08.0*
- - - - valvule tricuspide *I08.2*
- - - insuffisance
- - - - valvule mitrale *I08.0*
- - - - - rhumatismale, *I08.0*
- - - - - et atteinte valvule tricuspide, *I08.3*
- - - - valvule tricuspide *I08.2*
- - - sténose
- - - - valvule mitrale *I08.0*
- - - - valvule tricuspide avec,
- - - - - *I08.2*
- - - - - avec, insuffisance, *I08.2*
- - - - - avec, régurgitation, *I08.2*
- - avec
- - - insuffisance valvule tricuspide, avec atteinte valvule mitrale *I08.3*
- - - sténose valvule tricuspide, avec atteinte valvule mitrale *I08.3*
- - chronique artérioscléreuse *I35.9*
- - non rhumatismale *I35.9*
- - rhumatismale *I06.9*
- bicuspide *Q23.1*
- bruit *I35.8*
- calcification *I35.8*
- défaut *I35.8*
- - non rhumatismal *I35.8*
- - rhumatismal chronique *I06.8*
- déformation congénitale *Q23.8*
- dégénérescence *I35.8*
- endocardite
- - active, avec affection de la valvule mitrale, avec chorée *I02.0*
- - aiguë, avec affection de la valvule mitrale, avec chorée *I02.0*
- - artérioscléreuse *I35.8*
- - avec
- - - affection
- - - - valvule mitrale *I08.0*
- - - - - et atteinte de la valvule tricuspide, *I08.3*
- - - fièvre, rhumatismale, inactive *I06.9*
- - - maladie
- - - - valvule tricuspide *I08.2*
- - non rhumatismale *I35.8*
- - rhumatismale *I06.9*

Aortique, valvule –*suite*
- endocardite –*suite*
- - rhumatismale –*suite*
- - - aiguë *I01.1*
- - - - avec
- - - - - atteinte de la valvule mitrale, *I01.1*
- - - - - atteinte de la valvule mitrale, avec chorée, *I02.0*
- - - - - chorée, *I02.0*
- - - avec atteinte de la valvule mitrale et de la valvule tricuspide *I08.3*
- - - évolutive *I01.1*
- - - - avec
- - - - - atteinte de la valvule mitrale, *I01.1*
- - - - - atteinte de la valvule mitrale, avec chorée, *I02.0*
- - - - - chorée, *I02.0*
- - streptocoques *I33.0, B95.5!*
- - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- - tuberculeuse *A18.8+, I39.1**
- et
- - valvule mitrale
- - - anomalie *I08.0*
- - - - chronique, rhumatismale *I08.0*
- - - inflammation *I08.0*
- - - - chronique, rhumatismale *I08.0*
- - - insuffisance *I08.0*
- - - - chronique, rhumatismale *I08.0*
- - - sclérose *I08.0*
- - - - chronique, rhumatismale *I08.0*
- - - sténose *I08.0*
- - - - chronique, rhumatismale *I08.0*
- - - valvule tricuspide, atteinte combinée *I08.3*
- - valvule tricuspide, atteinte combinée *I08.2*
- hypoplasie *Q23.1*
- - dans le syndrome d'hypoplasie ventriculaire gauche *Q23.4*
- implant de remplacement, état consécutif à la pose d'un *Z95.4*
- inflammation *I35.8*
- insuffisance *I35.1*
- - avec atteinte
- - - valvule mitrale *I08.0*
- - - - et atteinte valvule tricuspide *I08.3*
- - - valvule tricuspide *I08.2*
- - congénitale *Q23.1*
- - non rhumatismale *I35.1*
- - rhumatismale *I06.1*
- - - avec atteinte
- - - - valvule mitrale *I08.0*
- - - - - et atteinte valvule tricuspide, *I08.3*
- - - - valvule tricuspide *I08.2*
- lésion *I35.9*
- malformation *Q23.9*
- malformation congénitale *Q23.8*
- obstruction *I35.0*
- - rhumatismale *I06.0*
- quadricuspide *Q23.8*
- régurgitation *I35.1*
- - non rhumatismale *I35.1*
- - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- rupture *I35.8*
- sclérose *I35.8*
- sténose *I35.0*
- - avec insuffisance *I35.2*

Aortique, valvule –*suite*
- sténose –*suite*
- - congénitale *Q23.0*
- - rhumatismale *I06.0*
- - - avec
- - - - affection
- - - - - valvule tricuspide, *I08.2*
- - - - atteinte
- - - - - valvule mitrale, *I08.0*
- - - - - valvule mitrale, et atteinte valvule tricuspide, *I08.3*
- - - - insuffisance *I06.2*
- - - - régurgitation *I06.2*
- - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- valvulite syphilitique *A52.0+, I39.1**

Aortite *I77.6*
- artérioscléreuse *I70.0*
- aspergillaire *B44.8+, I79.1**
- calcifiée *I77.6*
- non syphilitique *I77.6*
- rhumatismale *I01.1*
- syphilitique *A52.0+, I79.1**
- - congénitale *A50.5+, I79.1**

Aorto-coronaire, pontage [PAC] *Z95.1*

Aorto-duodénale, fistule *I77.2*

Aorto-iliaque, athérome *I70.0*

Aorto-pulmonaire, défaut septal *Q21.4*

Aoûtats, dermatite *B88.0+, L99.8**

AP [angine de poitrine] - *voir* sous Angi *I20.9*

Apallique
- syndrome *G93.80*
- - chez le nouveau-né *P91.80*
- syndrome apallique *G93.80*

Apathie *R45.3*

Apatite, cristaux, arthropathie par *M11.09*

Apatitique, rhumatisme *M11.09*

APC, résistance [résistance à la protéin *D68.8*

Apepsie *K31.88*
- *R68.8*
- psychogène *F45.31*

Apert et Cushing, syndrome d' *E24.9*

Apert, syndrome d' [forme du syndrome d' *Q87.0*

Apert-Gallais (-Crooke), syndrome d' *E24.9*

Apesanteur, effets *T75.8*

Apex pulmonaire, tuberculose *A16.2*

Apgar, score d'
- 0-3 à 1 minute après la naissance, en cas d'asphyxie *P21.0*
- 4-7 à 1 minute après la naissance, en cas d'asphyxie *P21.1*

Aphagie *R63.0*
- psychogène *F50.0*

Aphakie *H27.0*
- acquise *H27.0*
- - bilatérale *H27.0*
- - unilatérale *H27.0*
- congénitale *Q12.3*
- pseudo-, avec décollement rétinien *H33.5*
- sans IIO [implant intraoculaire] *H27.0*

Aphasie *R47.0*

Aphasie –*suite*
- acquise, avec épilepsie *F80.3*
- amnésique *R47.0*
- associée à la syphilis tertiaire *A52.1+, G94.8**
- Broca, de *R47.0*
- développement, de *F80.28*
- - auditive *F80.28*
- - type
- - - expressif *F80.1*
- - - réceptif *F80.28*
- globale *R47.0*
- motrice *R47.0*
- progressive isolée *G31.0*
- progressive primitive [PPA] *G31.0+, F02.0**
- sémantique *R47.0*
- syntaxique *R47.0*
- syphilitique, tertiaire *A52.1+, G94.8**
- urémique *N19*
- Wernicke, de développement de *F80.28*

Aphémie *R47.0*

Aphérèse *Z51.81*

Aphonie *R49.1*
- organique *R49.1*
- psychogène *F44.4*

Aphtes *K12.0*
- Bednar, de *K12.0*
- Behçet, de *M35.2*
- buccaux *K12.0*
- - récidivants *K12.0*

Aphtes de Bednar *K12.0*

Aphteux(se)
- candidose *B37.0*
- fièvre *B08.8*
- ulcération
- - buccale *K12.0*
- - organes génitaux
- - - féminins *N76.6*
- - - masculins *N50.8*
- ulcère, récidivant *K12.0*
- vulvite *N76.2*

Apical(e)
- abcès *K04.7*
- - alvéole (dentaire) *K04.6*
- granulome *K04.5*
- kyste *K04.8*
- ostéite *K10.3*
- parodontite *K04.5*
- - aiguë *K04.4*
- - chronique *K04.5*
- périodontite *K04.5*
- - aiguë *K04.4*
- tuberculose *A16.2*

Apico-latéral, infarctus du myocarde
- aigu, transmural *I21.2*
- récidivant *I22.8*

Apituitarisme *E23.0*

Aplanissement de la cornée *Q13.4*

Aplasie
- aorte *Q25.4*
- axiale extracorticale (Pelizaeus-Merzbacher) *E75.2*
- bord alvéolaire
- - acquise *K08.88*
- - congénitale *Q38.6*

Aplasie –*suite*
- bronchique *Q32.4*
- canal déférent *Q55.4*
- cément *K00.4*
- cervelet *Q04.3*
- col utérin *Q51.5*
- cordon spermatique *Q55.4*
- corne antérieure, moelle épinière *Q06.1*
- corps calleux *Q04.0*
- doigt(s) *Q71.3*
- ectodermique congénitale *Q84.8*
- encéphale *Q00.0*
- encéphale, partielle *Q04.3*
- érythrocytaire isolée
- - associée à un thymome *D60.9*
- - chronique *D60.0*
- - congénitale *D61.0*
- - infantile *D61.0*
- - primitive *D61.0*
- - transitoire *D60.1*
- érythrocytaire pure *D60.9*
- fovéa *Q14.1*
- glandes parathyroïdes et thymus *D82.1*
- iris *Q13.1*
- labyrinthe membraneux *Q16.5*
- ligament rond de l'utérus *Q52.8*
- médullaire anémie aplastique
- - acquis pur, chronique , *D60.0*
- - - pur, transitoire , *D60.1*
- - - pur, sans précision , *D60.9*
- - médicamenteuse due à un traitement cytostatique , *D61.10*
- - - , sans précision , *D61.19*
- membres
- - congénitale *Q73.0*
- - inférieurs *Q72.0*
- - supérieurs *Q71.0*
- Merzbacher-Pelizaeus *E75.2*
- moëlle épinière *Q06.0*
- moelle osseuse *D61.9*
- - induite par une chimiothérapie *D61.10*
- - myéloïde *D61.9*
- nerf(s) *Q07.8*
- œil *Q11.1*
- orteil *Q72.3*
- ovaire(s) *Q50.0*
- pancréas *Q45.0*
- partielle, système nerveux, NCA *Q07.8*
- Pelizaeus-Merzbacher *E75.2*
- pénis *Q55.5*
- pouce *Q71.3*
- poumon *Q33.8*
- prostate *Q55.4*
- radius *Q71.4*
- - associée à une thrombopénie [TAR] *Q87.2*
- rein(s) *Q60.2*
- scrotum *Q55.2*
- sinus paranasal *J34.8*
- système nerveux, partielle, NCA *Q07.8*
- testicule *Q55.0*
- thymus *D82.1*
- - avec immunodéficience *D82.1*
- thyroïde *E03.1*
- - avec myxoedème *E03.1*
- uretère *Q62.4*
- urètre *Q64.5*
- utérus *Q51.0*

Aplasie –*suite*
- vagin *Q52.0*
- vésicule biliaire *Q44.0*
- vésicule séminale *Q55.4*
- vessie *Q64.5*
- voies biliaires *Q44.5*
- vulve *Q52.7*

Aplasique
- agranulocytose *D70.3*
- anémie *D61.9*
- - acquise *D60.9*
- - congénitale *D61.0*
- - constitutionnelle *D61.0*
- - érythrocytaire
- - - congénitale *D61.0*
- - - transitoire *D60.1*
- - idiopathique *D61.3*
- - isolée *D60.9*
- - - acquise *D60.9*
- - - - chronique *D60.0*
- - - - transitoire *D60.1*
- - - associée à un thymome *D60.9*
- - - chez l'adulte *D60.9*
- - - chez l'enfant *D61.0*
- - - congénitale *D61.0*
- - - primitive *D61.0*
- - provoquée par
- - - agents externes NCA *D61.2*
- - - cytostatiques *D61.10*
- - - infection *D61.2*
- - - irradiation *D61.2*
- - - médicaments *D61.19*
- - toxique *D61.2*

aplastique
- acquis pur
- - chronique Aplasie médullaire [anémie *D60.0*
- - sans précision , Aplasie médullaire [anémie *D60.9*
- - transitoire Aplasie médullaire [anémie *D60.1*
- médicamenteuse
- - due traitement cytostatique , Aplasie médullaire [anémie *D61.10*
- - sans précision Aplasie médullaire [anémie *D61.19*

aplastiques
- constitutionnel anémie *D61.0*
- précisé Autre anémie *D61.8*

Aplatissement
- bassin
- - acquis *M95.5*
- - avec disproportion fœtopelvienne *O33.0*
- - - avec obstacle à l'accouchement *O65.0*
- - congénital *Q74.2*
- compression, visage *Q67.1*
- cotyle *M24.85*
- crâne *Q67.4*
- dos, congénital *Q76.4*
- mamelon *N64.5*
- scoliose *M41.99*
- - dorsale *M41.94*
- - - convexe à droite *M41.94*
- - - convexe à gauche *M41.94*
- - - et lombaire
- - - - convexe à droite *M41.95*
- - - - convexe à gauche *M41.95*

Aplatissement –*suite*
- scoliose –*suite*
- - lombaire
- - - convexe à droite *M41.96*
- - - convexe à gauche *M41.96*
- thorax *Q76.8*

Apnée
- *R06.88*
- chez l'enfant *R06.88*
- crise *R06.88*
- hystérique *F45.33*
- nouveau-né NCA *P28.4*
- prématuré *P28.4*
- psychogène *F45.33*
- sommeil *G47.39*
- - centrale *G47.30*
- - chez nouveau-né SAI central , *P28.3*
- - - obstructive , *P28.3*
- - obstructive *G47.31*
- - primitive chez le nouveau-né *P28.3*
- transitoire *R06.88*
- - chez le nouveau-né *P22.1*

Apneumatose par compression *J98.1*

Apocrine
- abcès *L74.8*
- adénocarcinome *C44.9*
- adénome *D23.9*
- carcinome *C44.9*
- carcinome in situ du sein *D05.7*
- glande mammaire, métaplasie *N60.8*
- glandes sudoripares, affection *L75.9*
- miliaire *L75.2*

Aponévrose
- enthésopathie *M77.9*
- palmaire
- - contracture *M72.0*
- - fibromatose *M72.0*
- - rétraction *M72.0*
- plantaire
- - contracture *M72.2*
- - enthésopathie *M77.5*
- - fibromatose *M72.2*

Aponévrosite plantaire *M72.2*

Apophyse coronoïde de la mandibule, frac *S02.63*

Apophyse épineuse
- cervicale, fracture *S12.9*
- Décubitus *L89.92*
- dorsale, fracture *S22.00*
- lombosacrée, fracture *S32.00*

Apophysite *M93.9*
- calcanéenne *M92.8*
- juvénile *M92.9*
- tibiale de croissance *M92.5*

Apoplectiforme(s), convulsions, dans l'i *I67.88*

Apoplectique *I64*
- accident *I64*
- - artère cérébrale
- - - moyenne *I64*
- - - postérieure *I64*
- - cérébral *I64*
- - ischémique *I63.9*
- - sur le territoire d'une artère cérébrale *I64*
- accident ischémique, récidive *I63.9*
- Coma *I64*

Apoplectique –*suite*
- hémorragie *I61.9*
- paralysie *I64*

Apoplexie *I64*
- ancienne *Z86.7*
- antécédent familial *Z82*
- auriculaire *I21.9*
- basilaire *I64*
- bulbaire *I64*
- capillaire *I64*
- cardiaque *I21.9*
- cérébrale *I64*
- - artère cérébrale moyenne *I64*
- - compliquant l'accouchement *O99.4*
- - séquelles *I69.4*
- embolique *I63.4*
- - artère
- - - intracrânienne *I63.4*
- - - précérébrale, extracrânienne *I63.1*
- hémorragique *I61.9*
- - méninges *I60.9*
- hépatique *K76.3*
- médullaire *G95.1*
- pré- *G45.99*
- progressive *I64*
- puerpérale *O99.4*
- récidivante *I64*
- séquelles *I69.4*
- surrénalienne *E27.4*
- - provoquée par septicémie à méningocoques *A39.1+, E35.1**
- thrombotique *I63.3*
- - artère
- - - intracrânienne *I63.3*
- - - précérébrale, extracrânienne *I63.0*
- urémique *N18.89+, I68.8**
- utéro-placentaire *O45.8*

Apoplexie, avant apparition *G45.99*

Appareil
- abdominal, adaptation *Z46.5*
- adaptation NCA *Z46.9*
- auditif
- - ajustement *Z46.1*
- - Mise en place *Z46.1*
- contre-pulsion aortique, avec complication *T82.9*
- dentaire, affection *K08.9*
- fixation, changement *Z47.8*
- lacrymal
- - agénésie *Q10.4*
- - atrésie *Q10.4*
- - brûlure *T26.3*
- - contusion *S05.8*
- - corps étranger *T15.8*
- - corrosion *T26.8*
- - lésion, superficielle *S05.8*
- - maladie NCA *H04.9*
- - malformation, congénitale *Q10.6*
- - malposition, congénitale *Q10.6*
- - mucocèle, chronique *H04.4*
- - suppuration *H04.3*
- - syphillis tardive *A52.7+, H06.0**
- masticatoire, maladie, avec douleurs, visage *K07.6*
- orthodontique
- - adaptation *Z46.4*
- - fourniture *Z46.4*
- orthopédique

Appareil *–suite*
- orthopédique *–suite*
- - ajustement *Z46.7*
- - soins avec *Z46.7*
- orthopédique, ajustement *Z46.7*
- soutien de la dent
- - abcès NCA *K05.2*
- - maladie *K08.9*
- urinaire
- - anomalie *Q64.9*
- - maladie *N39.9*
- - - dans les antécédents personnels *Z87.4*
- - malformation, congénitale *Q64.9*
- vocal, tuberculose *A16.4*
- voies urinaires
- - adaptation *Z46.6*
- - dysfonctionnement NCA *T83.1*
- - fourniture *Z46.6*

Apparence
- altération vasculaire rétinienne *H35.0*
- extérieure, personnelle bizarre *R46.1*

Apparent
- mouvement, intestin *R19.2*
- péristaltisme *R19.2*

Appauvrissement *Z59*
- affectif *R45.8*
- extrême *Z59*
- potassium *E87.6*
- sel *E87.1*
- sodium *E87.1*

Appelt-Gerken-Lenz, syndrome d' *Q89.7*

Appendice
- absence, congénitale *Q42.8*
- accessoire *Q43.41*
- adhérence *K38.8*
- agénésie *Q42.8*
- anomalie *Q43.8*
- atrophie *K38.8*
- calcul *K38.1*
- carcinoïde *D37.3*
- carcinome *C18.1*
- colique *K38.8*
- concrétions *K38.1*
- coprolithe *K38.1*
- coprostase *K38.1*
- corps étranger *T18.4*
- déformation *Q43.8*
- diverticule *K38.2*
- double *Q43.41*
- épididymite *Q55.4*
- étranglement *K38.8*
- fistule *K38.3*
- frange épiploïque, intestin *Q43.8*
- - avec
- - - péritonite
- hyperplasie *K38.0*
- - lymphoïde *K38.0*
- inflammation *K37*
- inflammation, *voir* appendicite *K37*
- - chronique *K36*
- - récidivante *K36*
- intussusception *K38.8*
- invagination *K38.8*
- kyste *K38.8*
- lumière, oblitération *K38.8*
- maladie *K38.9*

Appendice *–suite*
- malposition congénitale *Q43.8*
- méga- *Q43.8*
- mucocèle *K38.8*
- préauriculaire *Q17.0*
- - surnuméraire *Q17.0*
- rétrocaecal *Q43.8*
- testicule *Q55.2*
- transposition *Q43.8*
- transposition rétrocaecale congénitale *Q43.8*
- tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- tumeur *D37.3*

Appendicite *K37*
- aiguë
- - avec abcès péritonéal *K35.32*
- - avec péritonite
- - - généralisée *K35.2*
- - - localisée *K35.3*
- chronique *K36*
- compliquant la grossesse *O99.6*
- crises répétées *K36*
- obstructive *K36*
- péri- *K37*
- phlegmoneuse *K35.9*
- provoquée par
- - infection amibienne *A06.8*
- - pneumocoques *K37*
- pseudo- *I88.0*
- purulente *K35.9*
- récidivante *K36*
- rétrocaecale *K37*
- subaiguë *K36*
- tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- ulcéreuse *K35.9*

Appendicopathia oxyurica *B80*

Appétit
- excessif *R63.2*
- manque, psychogène (anorexie mentale) *F50.0*
- perte *R63.0*
- - d'origine non organique *F50.8*
- - hystérique *F50.8*
- - psychogène *F50.8*
- perverti *F50.8*
- sexuel
- - augmentation *F52.7*
- - baisse de désir sexuel *F52.0*
- - perte du désir sexuel *F52.0*
- trouble *R63.0*
- - psychogène *F50.8*

Application
- analgésique, avec complications, mère
- - couche *O89.9*
- - pendant l'accouchement *O74.9*
- anésthésiques locaux, avec complications, mère
- - couche *O89.9*
- - pendant l'accouchement *O74.9*
- anésthésiques, généraux, avec complications, mère, pendant l'accouchement *O74.9*
- prophylactique, gammaglobuline *Z29.1*
- thérapeutique de substance radioactive *Z51.0*

Apport
- carotène, excès *E67.1*
- vitamine A, excès *E67.0*

Apport *–suite*
- vitamine D, excès *E67.3*
- vitamines, excès NCA *E67.8*

Apport énergétique, substance, carence *E46*

Appréhendé, état, non prouvé *Z71*

Appréhension *F41.9*

Apprentissage du langage, retard *R62.0*

Apprentissage scolaire, trouble
- combiné *F81.3*
- développement *F81.9*

Apprêteurs du lin, maladie des *J66.1*

Approvisionnement en eau potable, insuff *Z58*

Apraxie *R48.2*
- classique *R48.2*
- idéokinétique *R48.2*
- idéomotrice *R48.2*
- motrice *R48.2*
- oculomotrice, congénitale *H51.8*
- trouble d'instrumentation *R48.8*
- verbale *R48.2*

Aprosopie *Q18.8*

Aptitudes sociales insuffisantes NCA *Z73*

Aptyalisme *K11.7*

Apudome *D44.9*

Aqueduc
- cérébral
- - anomalie *Q03.0*
- - - avec spina bifida *Q05.4*
- - atrésie *Q03.0*
- - - avec spina bifida *Q05.4*
- - cloison *Q03.0*
- - - avec spina bifida *Q05.4*
- - obstruction *G91.1*
- - obturation
- - - acquise *G91.1*
- - - congénitale *Q03.0*
- - - - avec spina bifida *Q05.4*
- - rétrécissement
- - - acquis *G91.1*
- - - congénitale *Q03.0*
- - sténose *Q03.0*
- - - acquise *G91.1*
- - - avec spina bifida *Q05.4*
- sylvius
- - anomalie *Q03.0*
- - atrésie *Q03.0*
- - cloison *Q03.0*
- - obturation, hydrocéphalie *Q03.0*

Arachnidisme *T63.3*

Arachnodactylie *Q87.4*

Arachnoïde
- neurosyphilis *A52.1+, G01**
- tuberculose *A17.0+, G01**

Arachnoïdien(ne)
- hématome traumatique, sous- *S06.6*
- hémorragie, sous- *I60.9*
- kyste *G93.0*
- - cérébral congénital *Q04.6*
- sarcome cérébelleux circonscrit *C71.6*

Arachnoïdite *G03.9*
- adhérente *G03.9*
- - syphilitique *A52.1+, G01**
- aiguë *G03.9*

Arachnoïdite –*suite*

- bactérienne *G00.9*
- basilaire *G03.9*
- cérbrospinale *G03.9*
- cérébrale syphilitique *A52.1+, G01**
- chimique *G03.8*
- méningocoques, à *A39.0+, G01**
- spinale *G03.9*
- - syphilitique *A52.1+, G01**
- syphilitique tardive *A52.1+, G01**
- tuberculeuse *A17.0+, G01**

Aran(-Duchenne), syndrome d' *G12.2*

Aran, cancer (vert) d' [chlorome] *C92.30*
- rémission complète *C92.31*

Arborisation, bloc *I45.5*

Arbovirus
- encéphalite NCA *A85.2*
- fièvre *A94*
- - hémorragique *A94*
- infection *A94*
- méningite *A87.8+, G02.0**

Arbre bronchique, développement incomple *Q32.4*

Arc
- brachial
- - persistant *Q18.0*
- - quatrième syndrome *D82.1*
- lipoïde *H18.4*
- - cornée *H18.4*
- - juvénile *Q13.4*
- palmaire
- - profond, lésion traumatique, vaisseau *S65.3*
- - superficiel, lésion traumatique *S65.2*
- - - vaisseau *S65.2*
- sénile *H18.4*
- - cornée *H18.4*
- syndrome du premier *Q87.0*
- vertébral
- - anomalie *Q76.4*
- - cervical, fracture *S12.9*
- - fracture *T08.0*
- - sacro-lombaire, fracture *S32.00*
- - thoracique, fracture *S22.00*

ARC [complexe (de syndromes) associé au *B24*

Arcade dentaire, anomalie *K07.2*

Arcades dentaires, anomalie, machoire in *K07.2*

ARDS [syndrome de détresse respiratoire *J80*

AREB I Anémie réfractaire avec excès de blastes, type I [*D46.2*

Aréflexie, vessie *G95.81*

Arénavirus, fièvre hémorragique (à) *A96.9*

Aréolaire
- dystrophie
- - centrale, épithélium pigmentaire, choroïde *H31.2*
- - choroïde centrale *H31.2*
- tissu, inflammation NCA *L08.9*

Aréole
- abcès *N61*
- - aigu *N61*
- - chronique *N61*
- - non puerpéral *N61*

Aréole –*suite*

- mammaire
- - abcès *N61*
- - - post-partum *O91.00*
- - - puerpéral *O91.00*
- - hypoplasie, congénitale *Q83.8*
- - inflammation *N61*

Aréolite *N61*

Argent
- intoxication *T56.8*
- pigmentation de la dent *K03.7*

Argentaffine, carcinoïde *D48.9*

Argentaffinome malin *C80*

Arginine
- hyperamino-acidurie *E72.2*
- métabolisme, anomalie *E72.2*

Argininémie *E72.2*

Arginino-succinique, acide, anomalie du *E72.2*

Argonz-del Castillo, syndrome d' *N64.3*

Argyll-Roberston, syndrome de
- atypique *H57.0*
- non syphilitique *H57.0*
- syphilitique *A52.1+, H58.0**

Argyll-Robertson, syndrome d'
- atypique *H57.0*
- non syphilitique *H57.0*
- syphilitique *A52.1+, H58.0**

Argyrose conjonctivale *H11.1*

Argyrose NCA *T56.8*

Arhinencéphalie *Q04.1*

Ariboflavinose *E53.0*

Arizona, entérite *A02.0*

Arlequin, foetus *Q80.4*

Arnold-Chiari, syndrome d' *Q07.0*

Arrachage de cheveux, lors de troubles, *F98.4*

Arrachage des cheveux, pathologique *F63.3*

Arrachement hile splénique *S36.04*

Arrachement, déchirure *T14.7*
- articulation *T14.3*
- bulbe *S05.7*
- cartilage *T14.3*
- - genou, traumatique, récent *S83.2*
- cartilage de la symphyse lors de l'accouchement *O71.6*
- corps ciliaire *H21.5*
- cuir chevelu *S08.0*
- dent *S03.2*
- frenulum, frein de la langue *S01.54*
- iris *H21.5*
- ligament *T14.3*
- ménisque *S83.2*
- - genou *M23.39*
- mésentérial *S36.82*
- muscle *T14.6*
- oculaire, avec plaie, ouverte *S05.7*
- oeil *S05.7*
- ongle *T14.1*
- osseux
- - ligament *T14.3*
- - ligament latéral cubital des pouces *S63.4*
- pédicule rénal *S37.02*

Arrachement, déchirure –*suite*

- rocher *S02.1*
- tendon *T14.6*
- tendon rotulien *S76.1*
- tête, complet *S18*
- traumatique *T14.7*
- uretère *S37.1*
- urètre *S37.30*
- vaisseau sangin *T14.5*

Arrêt cardiaque *I46.1*

Arrêt respiratoire
- accouchement *O75.9*
- - cas de position transverse *O64.0*
- auriculaire *I45.5*
- cardio-respiratoire *I46.9*
- cardio-vasculaire *I46.9*
- coeur *I46.9*
- - avec réanimation réussie *I46.0*
- - chez le nouveau-né *P29.1*
- - complication, lors de l'échec d'un avortement *O07.8*
- - lors de
- - - échec de tentative d'avortement médical *O07.3*
- - - intervention chirurgicale *T81.8*
- - par
- - - anesthésie
- - - - pendant
- - - - - période de grossesse, *O29.1*
- - - - - l'accouchement, *O74.2*
- - - - suites de couches *O89.1*
- - postopératoire *I97.8*
- - - effet à long terme après chirurgie cardiaque *I97.1*
- - vers
- - - césarienne *O75.4*
- - - mesure obstétricale (comprenant l'accouchement) *O75.4*
- croissance
- - enfant *R62.8*
- - épiphyse *M89.19*
- - fœtus *P05.9*
- - fœtus, soins maternels *O36.5*
- - osseux *M89.29*
- développement *R62.8*
- - à la malnutrition *E45*
- - anneau trachéal *Q32.1*
- - enfant *R62.8*
- - fœtus *P05.9*
- - fœtus, soins maternels *O36.5*
- - osseux *M89.29*
- phase active des contractions *O62.1*
- - avec lésion sur le foetus/nouveau-né *P03.6*
- respiration *R09.2*
- - chez le nouveau-né *P28.8*
- - origine centrale *R09.2*
- sino-auriculaire *I45.5*
- sinu-atrial *I45.5*
- ventriculaire *I46.9*

Arrhénoblastome
- bénin
- - chez la femme *D27*
- - chez l'homme *D29.2*
- malin
- - chez la femme *C56*
- - chez l'homme *C62.9*

Arrhythmie *I48.19*

Arrhythmie –*suite*
- cas de palpitations *I48.19*
- ventriculaire *I49.0*

Arriération mentale *F79.9*

Arsenic
- dermatite *L27.8*
- intoxication *T57.0*
- kératose *L85.8*
- mélanose *L81.8*
- pigmentation *L81.8*
- polyneuropathie *G62.2*

Artéfact *L98.1*
- peau *L98.1*

artère
-
- aberrante NCA *Q27.8*
- absence NCA *Q27.8*
- alimentant le cerveau, extracrânien
- - Apoplexie
- - - embolique *I63.1*
- - - thrombotique *I63.0*
- - embolie *I65.9*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.1*
- - occlusion *I65.9*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - bilatérale *I65.3*
- - - multiples *I65.3*
- - sténose *I65.9*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - sténose, multiple *I65.3*
- - thrombose *I65.9*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.0*
- anévrisme *I72.9*
- - iliaque *I72.3*
- - membres
- - - inférieurs *I72.4*
- - - - rompue *I72.4*
- - - supérieurs *I72.1*
- - - - rompue *I72.1*
- Anomalie *Q27.9*
- anomalie, congénitale *Q27.8*
- athérome *I70.9*
- atrésie NCA *Q27.8*
- auditive interne
- - embolie *I65.8*
- - occlusion *I65.8*
- - rétrécissement *I65.8*
- - thrombose *I65.8*
- axillaire
- - embolie *I74.2*
- - lésion *S45.0*
- basilaire
- - anévrisme *I67.10*
- - angiome *D18.02*
- - anomalie NCA *Q28.19*
- - artériosclérose *I67.2*
- - embolie *I65.1*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.1*
- - hémorragie, sous-arachnoïdal *I60.4*
- - insuffisance *G45.09*
- - obstruction *I65.1*
- - - complet *I65.1*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - partiel *I65.1*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - occlusion *I65.1*
- - thrombose *I65.1*

artère –*suite*
- basilaire –*suite*
- - thrombose –*suite*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.0*
- - tronc Anévrisme et dissection de l ' *I72.5*
- brachial
- - embolie *I74.2*
- - lésion *S45.1*
- - occlusion *I74.2*
- bruit *R09.8*
- caillot *I74.9*
- calcification *I70.9*
- carotide
- - anévrisme *I72.0*
- - - intracrânien, syphilitique *A52.0+, I68.8**
- - - rompu *I72.0*
- - artériosclérose *I67.2*
- - commune
- - - lésion *S15.01*
- - - thrombose *I65.2*
- - embolie *I65.2*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.1*
- - externe, lésion *S15.02*
- - insuffisance *G45.19*
- - interne
- - - anévrisme *I72.0*
- - - lésion *S15.03*
- - - occlusion *I65.2*
- - - sténose *I65.2*
- - - thrombose *I65.2*
- - lésion *S15.00*
- - obstruction *I65.2*
- - - complet *I65.2*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - partielle *I65.2*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - occlusion *I65.2*
- - - bilatérale *I65.3*
- - rétrécissement, bilatéral *I65.3*
- - sténose bilatérale *I65.3*
- - thrombose *I65.2*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.0*
- centrale, occlusion (rétine) *H34.1*
- cérébelleuse
- - embolie *I66.3*
- - obstruction *I66.3*
- - - complète *I66.3*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - partielle *I66.3*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - thrombose *I66.3*
- cérébrale
- - agénésie *Q28.38*
- - anévrisme *I67.10*
- - - cérébral, rompu *I60.7*
- - - rupture *I60.7*
- - - syphilitique, rupture *A52.0+, I68.8**
- - anomalie *Q28.39*
- - antérieur
- - - anévrisme *I67.10*
- - - embolie *I66.1*
- - - infarctus *I63.5*
- - - obstruction
- - - - complète avec infarctus, cerveau, *I63.5*
- - - - - *I66.1*

artère –*suite*
- cérébrale –*suite*
- - antérieur –*suite*
- - - obstruction –*suite*
- - - - partielle avec infarctus, cerveau, *I63.5*
- - - - - *I66.1*
- - - occlusion *I66.1*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - thrombose *I66.1*
- - artériosclérose *I67.2*
- - athéromatose *I67.2*
- - atrésie NCA *Q28.38*
- - embolie *I66.9*
- - gomme syphilitique *A52.0+, I68.8**
- - hémorragie sous-arachnoïdienne *I60.7*
- - hypoplasie *Q28.38*
- - maladie *I67.9*
- - moyenne
- - - anévrisme *I67.10*
- - - apoplexie cérébrale *I64*
- - - attaque, apoplectique *I64*
- - - embolie *I66.0*
- - - hémorragie, sous-arachnoïdienne *I60.1*
- - - infarctus *I63.5*
- - - obstruction
- - - - complète avec infarctus, cerveau, *I63.5*
- - - - - *I66.0*
- - - - partielle avec infarctus, cerveau, *I63.5*
- - - - - *I66.0*
- - - occlusion *I66.0*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - thrombose *I66.0*
- - occlusion *I66.9*
- - - bilatérale *I66.4*
- - - multiples *I66.4*
- - postérieure
- - - attaque, apoplectique *I64*
- - - embolie *I63.5*
- - - - *I66.2*
- - - obstruction
- - - - complète avec infarctus, cerveau, *I63.5*
- - - - - *I66.2*
- - - - partielle avec infarctus, cerveau, *I63.5*
- - - - - *I66.2*
- - - occlusion *I66.2*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - thrombose *I66.2*
- - rétrécissement, congénital *Q28.38*
- - spasme *G45.99*
- - thrombose *I66.9*
- - tuberculose *A18.8+, I68.1**
- cervelet
- - embolie, avec infarctus, cerveau *I63.4*
- - occlusion *I66.3*
- - thrombose, avec infarctus, cerveau *I63.3*
- choroïde
- - embolie *I66.8*
- - occlusion *I66.8*
- - rétrécissement *I66.8*
- - thrombose *I66.8*
- cilio-rétinienne, occlusion *H34.2*
- cilio-rétinienne, presistance *Q14.8*

artère –*suite*

- cœliaque
- - lésion *S35.2*
- - syndrome de compression *I77.4*
- coeliaque, compression, syndrome de *I77.4*
- communiquante
- - anévrisme, cérébral, rompu *I60.7*
- - antérieure
- - - anévrisme *I67.10*
- - - hémorragie, sous-arachnoïdienne *I60.2*
- - hémorragie, sous-arachnoïdienne *I60.7*
- - postérieure
- - - anévrisme *I67.10*
- - - embolie *I66.8*
- - - hémorragie, sous-arachnoïdienne *I60.3*
- - - occlusion *I66.8*
- - - rétrécissement *I66.8*
- - - thrombose *I66.8*
- compression *I77.1*
- cordon ombilical
- - Agénésie *Q27.0*
- - hypoplasie *Q27.0*
- coronaire
- - Accident thromboembolique *I21.9*
- - Agénésie *Q24.5*
- - anévrysme *I25.4*
- - - artériosclérotique *I25.4*
- - - artérioveineux, acquise *I77.0*
- - - congénitale *Q24.5*
- - anomalie *Q24.5*
- - Anomalie de positionnement, congénitale *Q24.5*
- - artériosclérose *I25.19*
- - athérome *I25.19*
- - atrésie NCA *Q24.5*
- - calcification *I25.19*
- - difformité
- - - acquise *I25.8*
- - - congénitale *Q24.5*
- - dissection *I25.4*
- - Dysfonctionnement, pontage *T82.2*
- - embolie *I21.9*
- - - n'entraînant pas d'infarctus du myocarde *I24.0*
- - hypoplasie *Q24.5*
- - infarctus *I21.9*
- - inflammatoire *I25.8*
- - insuffisance *I24.8*
- - lésions *I25.9*
- - Maladie *I25.19*
- - - congénitale *Q24.5*
- - manquante *Q24.5*
- - obstruction *I25.19*
- - occlusion *I21.9*
- - - n'entraînant pas d'infarctus du myocarde *I24.0*
- - ossification *I25.19*
- - rétrécissement *I25.19*
- - - syphilitique NCA *A52.0+, I52.0**
- - - syphilitique, congénital *A50.5+, I52.0**
- - rupture *I21.9*
- - sclérose *I25.19*
- - - moyenne *I25.19*
- - - sténosante *I25.19*
- - - syphilitique *A52.0+, I52.0**

artère –*suite*

- coronaire –*suite*
- - Spasme *I20.1*
- - spasmes *I20.1*
- - sténose *I25.19*
- - Sténose du tronc commun, gauche *I25.14*
- - stricture *I25.19*
- - - congénitale *Q24.5*
- - surnuméraire *Q24.5*
- - thrombose *I21.9*
- - - n'entraînant pas d'infarctus du myocarde *I24.0*
- - - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- coronaire, anomalie *Q24.5*
- coronaire, thrombose *I21.9*
- Coudure *I77.1*
- déformation
- - cérébrale, congénitale *Q28.39*
- - périphérique, acquise, nca *I77.8*
- dégénérescence
- - athéromateuse *I70.9*
- - calcifiée *I70.9*
- - cérébrale, amyloïde *E85.4+, I68.0**
- - médiale *I70.20*
- digitales, lésion *S65.5*
- dilatation, *voir* à anévrisme *I72.9*
- dissection, cérébrale, rompue *I60.7*
- distales
- - artériosclérose *I70.20*
- - athérosclérose
- - - type bassin-jambe, avec
- - - - claudication intermittente *I70.21*
- - - - douleurs au repos *I70.22*
- - - - ulcération *I70.23*
- - - type épaule-bras, tous stades *I70.25*
- - embolie *I74.4*
- - - et thrombose *I74.4*
- - thrombose *I74.4*
- dorsale (pédieuse), lésion *S95.0*
- dysplasie, fibromusculaire *I77.3*
- ectasie *I72.9*
- embolie
- - extrémité
- - - inférieure *I74.3*
- - - supérieure *I74.2*
- - précérébrale *I65.9*
- érosion *I77.8*
- fémorale
- - anévrisme *I72.4*
- - athérosclérose *I70.20*
- - commune, embolie *I74.3*
- - embolie *I74.3*
- - lésion *S75.0*
- - occlusion *I74.3*
- - sténose *I77.1*
- - thrombose *I74.3*
- fémorale profonde, faux anévrisme *I72.4*
- fémorale, thrombose *I74.3*
- fistule *I77.2*
- ganglions de la base
- - occlusion *I66.8*
- - sténose *I66.8*
- gastrique, lésion *S35.2*
- gastroduodénale, lésion *S35.2*
- gomme *A52.0+, I79.8**
- gros
- - Anomalie *Q25.9*

artère –*suite*

- gros –*suite*
- - malformation, congénitale *Q25.9*
- - transposition *Q20.3*
- hémorragie *R58*
- hépatique
- - anévrysme *I72.8*
- - - rompue *I72.8*
- - lésion *S35.2*
- - syphilis *A52.0+, I79.8**
- - thrombose *I74.8*
- - veine porte, fistule *Q26.6*
- - veine porte, fistule congénitale *Q26.6*
- hyalinose *I70.9*
- hyaloïde, persistante *Q14.0*
- hyperplasie, fibromusculaire *I77.3*
- hypertrophie *I77.8*
- - congénitale NCA *Q27.8*
- hypogastrique, lésion *S35.5*
- hypophysaire
- - embolie *I66.8*
- - rétrécissement *I66.8*
- - thrombose *I66.8*
- iliaque
- - anévrisme *I72.3*
- - - *I72.3*
- - - rompu *I72.3*
- - - - *I72.3*
- - commune, anévrisme *I72.3*
- - embolie *I74.5*
- - - et thrombose *I74.5*
- - externe, embolie artérielle *I74.5*
- - interne, anévrisme *I72.3*
- - lésion *S35.5*
- - occlusion *I73.9*
- - sténose *I77.1*
- - thrombose *I74.5*
- infection *I77.9*
- inflammation *I77.6*
- innominée, lésion du tronc brachiocéphalique *S25.1*
- intercostales, lésion *S25.5*
- interventriculaire antérieure, sténose *I25.11*
- intestinale
- - artériosclérose *K55.1*
- - embolie, avec gangrène *K55.0*
- - thrombose *K55.0*
- intracrânienne
- - apoplexie
- - - embolique *I63.4*
- - - thrombotique *I63.3*
- - dissection, non rompue *I67.0*
- - occlusion, avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - plusieurs
- - - anévrisme, cérébral, rompu *I60.6*
- - - hémorragie, sous-arachnoïdienne *I60.6*
- - sténose, avec infarctus, cerveau *I63.5*
- labyrinthique
- - embolie *I65.8*
- - occlusion *I65.8*
- - rétrécissement *I65.8*
- - thrombose *I65.8*
- lenticulo-striées, hémorragie *I61.0*
- lésion traumatique *T14.5*
- - cérébrale *S06.8*
- mammaire, lésion *S25.8*

artère –*suite*

- méningée, thrombose *I66.8*
- mésentérique
- - embolie *K55.0*
- - - avec gangrène *K55.0*
- - inférieure, lésion *S35.2*
- - insuffisance *K55.1*
- - lésion *S35.2*
- - obstruction *K55.0*
- - occlusion *K55.0*
- - supérieure
- - - embolie *K55.0*
- - - lésion *S35.2*
- - thrombose *K55.0*
- - - avec gangrène *K55.0*
- mésentérique, syndrome *K55.1*
- nécrose *I77.5*
- obstruction, précérébrale *I65.9*
- occlusion *I77.9*
- - extrémité *I74.4*
- - périphérique *I77.9*
- ombilicale
- - absence, congénitale *Q27.0*
- - agénésie *Q27.0*
- - anomalie *Q27.0*
- - atrésie NCA *Q27.0*
- - hypoplasie *Q27.0*
- - rétrécissement, congénital *Q27.0*
- - unique *Q27.0*
- ophtalmique
- - anomalie *Q15.8*
- - atrésie NCA *Q15.8*
- - embolie *H34.2*
- - thrombose *H34.2*
- oreille interne, thrombose *I65.8*
- ovarienne, lésion *S35.8*
- perforante
- - embolie, avec infarctus, cerveau *I63.4*
- - occlusion *I66.8*
- - thrombose, avec infarctus, cerveau *I63.3*
- périphérique
- - absence, congénitale *Q27.8*
- - Agénésie *Q27.8*
- - Anomalie *Q27.9*
- - artériosclérose *I70.20*
- - embolie NCA *I74.4*
- - hypoplasie *Q27.8*
- - occlusion
- - - embolique *I74.4*
- - - thrombotique *I74.4*
- - sclérose *I70.20*
- - thrombose *I74.4*
- peronière, lésion *S85.2*
- plantaire, lésion *S95.1*
- plicature *I77.1*
- pontine
- - embolie *I66.8*
- - occlusion *I66.8*
- - rétrécissement *I66.8*
- - thrombose *I66.8*
- poplitée
- - anévrisme *I72.4*
- - embolie *I74.3*
- - lésion *S85.0*
- - obstruction *I74.3*
- - occlusion *I73.9*
- précérébrale

artère –*suite*

- précérébrale –*suite*

- - Occlusion *I65.9*
- - - bilatérale *I65.3*
- - - multiples *I65.3*
- - rétrécissement
- - - bilatérale *I65.3*
- - - multiples *I65.3*
- - sténose *I65.9*
- - - bilatérale *I65.3*
- - syndrome
- - - bilatérale *G45.29*
- - - multiples *G45.29*
- pulmonaire
- - aberrante *Q25.7*
- - absence, congénitale *Q25.7*
- - agénésie *Q25.7*
- - amylose *E85.4*
- - anévrisme *I28.1*
- - - congénital *Q25.7*
- - anévrysme *I28.1*
- - - congénital *Q25.7*
- - anomalie *Q25.7*
- - anomalie congénitale *Q25.7*
- - anomalie de position, congénitale *Q25.7*
- - anomalie, congénitale *Q25.7*
- - artériosclérose *I27.0*
- - atrésie *Q25.5*
- - avec communication aortique *Q21.4*
- - dilatation *I28.8*
- - ectasie *I28.8*
- - embolie *I26.9*
- - Erosion *I28.8*
- - et veine pulmonaire, communication, congénitale *Q25.7*
- - hypoplasie, congénital *Q25.7*
- - lésion *S25.4*
- - maladie *I28.9*
- - rétrécissement *Q25.6*
- - - acquis *I28.8*
- - rupture *I28.8*
- - sclérose *I27.0*
- - sténose *Q25.6*
- - - acquise *I28.8*
- - - infundibulaire *Q24.3*
- - - supravalvulaire de l ' *Q25.6*
- - - tétralogie de Fallot *Q21.3*
- - sténose grave *Q25.6*
- - - acquise *I28.8*
- - syphilis *A52.0+, I98.0**
- - Thromboembolie *I26.9*
- - thrombose *I26.9*
- radiale
- - embolie, artériel *I74.2*
- - lésion
- - - hauteur
- - - - avant-bras *S55.1*
- - - - main *S65.1*
- rate
- - calcification *I70.8*
- - embolie *I74.8*
- - lésion *S35.2*
- - thrombose *I74.8*
- rénale
- - anévrisme *I72.2*
- - - rompu *I72.2*
- - Anomalie *Q27.2*

artère –*suite*

- rénale –*suite*

- - anomalie de débit *Q27.2*
- - artériosclérose *I70.1*
- - dysplasie *Q27.2*
- - embolie *N28.0*
- - hyperplasie *I77.8*
- - lésion *S35.4*
- - obstruction *N28.0*
- - occlusion *N28.0*
- - sclérose *I70.1*
- - sténose *I70.1*
- - - artériosclérotique *I70.1*
- - - fibromusculaire *I77.3*
- - - primitive *I70.1*
- - thrombose *N28.0*
- rénale principale, dyplasie *Q27.2*
- rénale, occlusion *N28.0*
- rénales
- - absence, congénital *Q27.2*
- - anévrysme *I72.2*
- - - rompu *I72.2*
- - anomalie *Q27.2*
- - artériosclérose *I70.1*
- - athérosclérose *I70.1*
- - calcification *I70.1*
- - contrainte, athérosclérotique *I70.1*
- - double *Q27.2*
- - dysplasie *Q27.2*
- - embolie *N28.0*
- - hyperplasie *I77.8*
- - malformation *Q27.2*
- - - acquise *I77.8*
- - multiple *Q27.2*
- - obstruction *N28.0*
- - occlusion *N28.0*
- - sclérose *I70.1*
- - sténose *I70.1*
- - - athérosclérotique *I70.1*
- - - fibromusculaire *I77.3*
- - - naissance *Q27.1*
- - stricture
- - - athérosclérotique *I70.1*
- - - fibromusculaire *I77.3*
- - - naissance *Q27.1*
- - surnuméraires *Q27.2*
- - thrombose *N28.0*
- rétine centrale
- - artériosclérose *I70.8*
- - occlusion *H34.1*
- rétinienne, occlusion *H34.2*
- rétinienne, spasme *H34.2*
- rétrécissement *I77.1*
- - cérébelleux *I66.3*
- - cérébrale *I66.9*
- - congénitale *Q27.8*
- - précébral *I65.9*
- - précébrale *I65.9*
- rupture *I77.2*
- - cardiaque *I21.9*
- - cérébrale *I61.9*
- - traumatique *T14.5*
- sclérose *I70.9*
- sous-clavière
- - aberrante *Q27.8*
- - anévrisme *I72.8*
- - - rompu *I72.8*
- - - syphilitique *A52.0+, I79.8**

artère –*suite*
- sous-clavière –*suite*
- - anomalie de débit *Q25.8*
- - athérosclérose *I70.25*
- - lésion *S25.1*
- spasme NCA *I73.9*
- spinale
- - antérieure, syndrome de compression *M47.09+, G99.2**
- - postérieure, syndrome *G95.1*
- - thrombose *G95.1*
- - thrombose, syphilitique *A52.0+, I79.8**
- splénique
- - anévrisme, romput *I72.8*
- - lésion *S35.2*
- stapédienne persistente *Q16.3*
- sténose *I77.1*
- - rénale *I70.1*
- thrombose *I74.9*
- - extrémité
- - - inférieure *I74.3*
- - - supérieurs *I74.2*
- - précébrale *I65.9*
- tibial, lésion *S85.1*
- tortuosités *I77.1*
- tuberculose *A18.8+, I79.8**
- tunique musculaire, hypertrophie *I77.8*
- ulcération *I77.8*
- ulnaire, lésion
- - hauteur
- - - avant-bras *S55.0*
- - - main *S65.0*
- utérine, lésion *S35.5*
- vertébral Anévrisme dissection de l ' *I72.6*
- vertébrale
- - anévrisme *I72.8*
- - anomalie NCA *Q28.19*
- - artériosclérose *I67.2*
- - embolie *I65.0*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.1*
- - hémorragie, sous-arachnoïdal *I60.5*
- - insuffisance *G45.09*
- - lésion *S15.1*
- - obstruction *I65.0*
- - - complète *I65.0*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - partielle *I65.0*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - occlusion *I65.0*
- - - bilatérale *I65.3*
- - rétrécissement, bilatéral *I65.3*
- - syndrome de compression *M47.09+, G99.2**
- - thrombose *I65.0*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.0*
- vertèbre, compression *M47.09+, G99.2**

Artériel
- anévrismes *I72.9*
- athérome *I70.9*
- dégénérescence *I70.9*
- - médiale *I70.20*
- embolie *I74.9*
- - artère
- - - illiaque externe *I74.5*
- - - radiale *I74.2*
- - avant-bras *I74.2*

Artériel –*suite*
- embolie –*suite*
- - bras *I74.2*
- - cuisse *I74.3*
- - jambe *I74.3*
- - jambe (partie inférieure) *I74.3*
- - périphérique *I74.4*
- - pied *I74.3*
- - pulmonaire *I26.9*
- hématome, par traumatisme *T14.5*
- hémorragie due à l'érosion *I77.8*
- hypertension *I10.90*
- - essentielle *I10.90*
- - pulmonaire *I27.28*
- - type Goldblatt *I70.1*
- hypotonie *I95.9*
- infarctus *I77.9*
- - mésentérique *K55.0*
- insuffisance *I77.1*
- - précérébrale *G45.29*
- lésion vasculaire *I77.9*
- maladie
- - cardiaque *I25.19*
- - cérébral *I67.9*
- - vasculaire *I77.9*
- maladie occlusive *I73.9*
- - jambe *I70.20*
- - périphérique *I73.9*
- - - cas de diabète sucré *E14.50+, I79.2**
- - - stade IIb (Fontaine) *I73.9*
- - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- - type fémorale *I70.20*
- - type iliaque *I73.9*
- - type iliaque et fémorale *I70.20*
- - type jambe (partie supérieure) *I70.20*
- maladie vasculaire périphérique (PVD) (MVP) *I73.9*
- occlusion *I77.9*
- - aiguë, jambe *I74.3*
- - avec douleurs ischémiques *I73.9*
- - jambe *I73.9*
- - jambe (partie inférieure) *I73.9*
- - pied *I73.9*
- - vasculaire
- - - jambe (partie inférieure) *I73.9*
- - - membre inférieur *I73.9*
- - - rétinienne *H34.2*
- - - - transitoire *H34.0*
- risque de thrombose, antécédents familiaux *Z82*
- rupture *I77.2*
- sclérose, cérébrale *I67.2*
- syndrome d'occlusion *I73.9*
- Thromboembolie *I74.9*
- - jambe *I74.3*
- thrombose
- - intracrânienne *I66.9*
- - jambe *I74.3*
- - méninges *I66.8*
- - moëlle épinière *G95.1*
- Tiraillement *I77.8*
- trouble vasculaire *I73.9*
- - cérébral *I67.88*
- - intestin grêle *K55.9*
- - intestinale *K55.9*
- - mésentérique *K55.1*
- - périphérique *I73.9*
- trouble, rénal, avec hypertension *I15.00*

Artériel –*suite*
- vasospasme, cérébral *G45.99*

Artériolaire
- cirrhose du rein
- - hyaline *I12.90*
- - hyperplasique *I12.90*
- néphrite *I12.90*
- Néphrosclérose *I12.90*

Artériole
- maladie *I77.9*
- - oblitérante, généralisée *I77.9*
- nécrose *I77.5*
- sclérose *I70.9*
- thrombose *I74.9*

Artériopathie *I77.9*

Artériopathie dégénérative *I70.9*

Artériopathie oblitérante *I73.9*
- associée à
- - diabète sucré *E14.50+, I79.2**
- - diabète sucré de type I *E10.50+, I79.2**
- - diabète sucré de type II *E11.50+, I79.2**
- bassin et fémur, type *I70.20*
- bassin, type *I73.9*
- cuisse, type *I70.20*
- membre inférieur *I70.20*

Artériosclérose *I70.9*
- aorte *I70.0*
- artère
- - basilaire *I67.2*
- - carotide *I67.2*
- - cérébrale *I67.2*
- - périphérique *I70.20*
- - pulmonaire *I27.0*
- - rénale *I70.1*
- - rétine centrale *I70.8*
- - vertébrale *I67.2*
- artère coronaire *I25.19*
- Artère du cou *I70.8*
- artère intestinale *K55.1*
- artère rénale *I70.1*
- artères distales *I70.20*
- avec
- - dégénérescence corticale, diffuse *I67.2*
- - parkinsonisme, secondaire *G21.8*
- - psychose, organique *F01.9*
- cardio-rénale *I13.90*
- cardio-vasculaire *I25.0*
- cas de myocardite *I51.4*
- central *I70.9*
- cérébrale *I67.2*
- cérébro-spinale *I67.2*
- cérébro-vasculaire *I67.2*
- diffuse *I70.9*
- érébrale *I67.2*
- généralisée *I70.9*
- médiale *I70.20*
- membre inférieur *I70.20*
- mésentérique *K55.1*
- moëlle épinière *G95.1*
- Mönckerberg *I70.20*
- oblitérante *I70.9*
- occlusive *I70.8+, H36.8**
- pulmonaire *I27.0*
- rénale *I12.90*
- rénales *I12.90*

Artériosclérose *–suite*
- rénales *–suite*
- - avec insuffisance rénale *I12.00*
- sénile *I70.9*
- spinale *I67.2*
- système nerveux central *I67.2*
- type iliaque *I70.20*
- Vaisseau du coeur *I25.11*
- vaisseau rétinien *I70.8*
- vasculaire *I70.9*

Artériosclérotique - *voir* nature de la m

Artério-vasculaire, dégénérescence *I70.9*

Artérioveineuse
- anévrismes
- - acquise *I77.0*
- - cérébrale *Q28.20*
- - - acquis *I67.10*
- - - rompue *I60.8*
- - cerveau
- - - acquise *I67.10*
- - - - rompue *I60.8*
- - - congénitale *Q28.20*
- - - rompue *I60.8*
- - congénitale *Q27.3*
- - non rompu, vaisseau, précérébral, extracrânien, congénital *Q28.00*
- - pulmonaire *Q25.7*
- - - acquis *I28.0*
- - sinus caverneux *Q28.30*
- - - rompue *I60.8*
- - traumatique *T14.5*
- - vaisseau cérébral, non rompu, congénitale *Q28.20*
- - vaisseaux précérébraux, extra-crâniens *Q28.00*
- fistule *I77.0*
- - acquis *I77.0*
- - congénitale *Q27.3*
- - congénitale, vaisseau
- - - cérébrale *Q28.21*
- - - précérébrale *Q28.01*
- - coronaire, acquise *I25.4*
- - crâne *I67.11*
- - - congénitale, rompue *I60.8*
- - - rupture *I60.8*
- - créée chirurgicalement
- - - avec complications *T82.9*
- - - - mécanique *T82.5*
- - - infection *T82.7*
- - - inflammation *T82.7*
- - orbite *H05.8*
- - pulmonaire, congénitale *Q25.7*
- - traumatique *T14.5*
- - vaisseaux pulmonaires *I28.0*
- hémangiome *D18.00*
- hématome, vaisseau sanguin, traumatique *T14.5*
- insuffisance *I99*
- malformation *Q28.88*
- - anévrismatique *Q27.3*
- - cérébrale, rupture *I60.8*
- - crâne *Q28.29*
- - intracérébrale *Q28.29*
- - vasculaire
- - - périphérique *Q27.3*
- - - précérébrale, extracrânienne *Q28.09*
- shunt

Artérioveineuse *–suite*
- shunt *–suite*
- - créée chirurgicalement, avec complications *T82.9*
- - pulmonaire, congénitale *Q25.7*
- - pulmonaire, NCA *I28.0*
- trouble vasculaire *I99*

Artérite *I77.6*
- allergique *M31.0*
- cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale *M31.5*
- cellules géantes NCA *M31.6*
- - avec myopathie *M31.6+, G73.7**
- - avec polymyalgie rhumatismale *M31.5*
- cérébrale *I67.7*
- - avec
- - - lupus erythémateux, systémique, disséminé *M32.1+, I68.2**
- - - neurosyphilis *A52.0+, I68.1**
- - causée par une listériose *A32.8+, I68.1**
- - syphilitique *A52.0+, I68.1**
- - tuberculeuse *A18.8+, I68.1**
- coronaire *I25.8*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- crânienne *M31.6*
- crosse aortique *M31.4*
- déformante *I70.9*
- fumeur *I73.1*
- granulomateuse à cellules géantes *M31.3*
- granulome à cellules géantes *M31.3*
- hyperergique *M30.1*
- nécrosante *M31.9*
- nodulaire *M30.0*
- non syphilitique, aorte *I77.6*
- oblitérante *I77.6*
- purulente *I77.2*
- sénile *I70.9*
- spinale, syphilitique *A52.0+, I79.8**
- syphilitique *A52.0+, I79.8**
- syphilitique, généralisée *A52.0+, I79.8**
- sytème nerveux central *I77.6*
- temporale *M31.6*
- tronc brachiocéphalique *M31.4*
- tuberculeuse *A18.8+, I79.8**

Arthériopathie oblitérante *I70.9*

Arthralgie *M25.59*
- allergique *M25.59*
- articulation du genou *M25.56*
- articulation temporo-mandibulaire *K07.6*
- articulation tibio-tarsienne *M25.57*
- associée à la grippe *J11.8*
- poignet *M25.53*
- psychogènes *F45.4*

Arthrite
- *M13.99*
- aiguë *M13.99*
- - cas de fièvre, rhumatismale *I00*
- allergique *M13.89*
- articulation coxo-fémorale *M13.15*
- articulation des doigts *M13.14*
- articulation du coude *M13.92*
- Articulation du genou *M13.16*
- articulation sacro-iliaque *M13.15*
- articulation scapulaire *M13.11*
- articulation temporo-mandibulaire *K07.6*

Arthrite *–suite*
- articulation tibio-tarsienne *M13.17*
- - selon sollicitation *M13.17*
- - supérieure *M13.17*
- atrophique *M19.99*
- bactérienne, dysentérique *A03.9+, M01.39**
- blennoragique *A54.4+, M01.39**
- cas de
- - Acromégalie *E22.0+, M14.5**
- - Affection
- - - endocrinienne NCA *E34.9+, M14.5**
- - - gastro-intestinale NCA *K63.9+, M03.69**
- - - métabolique NCA *E88.9+, M14.5**
- - - neurologique NCA *G98+, M14.6**
- - - respiratoire NCA *J98.9+, M14.8**
- - amyloïdose *E85.4+, M14.4**
- - colite ulcéreuse *K51.9+, M07.59**
- - endocardite, infectieuse *I33.0+, M03.69**
- - entérite, NCA *A09+, M01.89**
- - entérite, régionale *K50.9+, M07.49**
- - érythème
- - - exsudatif multiforme *L51.9+, M14.8**
- - - noueux *L52+, M14.8**
- - fièvre méditerannéenne, familiale *E85.0+, M14.4**
- - gonorrhée *A54.4+, M01.39**
- - goutte *M10.09*
- - Helminthiase NCA *B83.9+, M01.89**
- - hématopathie NCA *D75.9+, M36.3**
- - hémochromatose *E83.1+, M14.5**
- - hémoglobinopathie NCA *D58.2+, M36.3**
- - hémophilie NCA *D66+, M36.2**
- - hyperparathyroïdie, NCA *E21.3+, M14.1**
- - Hypogammaglobulinémie *D80.1+, M14.8**
- - hypothyroïdie, NCA *E03.9+, M14.5**
- - leucémie NCA *C95.90+, M36.1**
- - maladie
- - - bactérienne, NCA *A49.9+, M01.39**
- - - hématologique NCA *D75.9+, M36.3**
- - - infectieuse NCA *B99+, M01.89**
- - - parasitaire NCA *B89+, M01.89**
- - - sérique *M02.29*
- - - virus NCA *B34.9+, M01.59**
- - maladie de Crohn *K50.9+, M07.49**
- - maladie de Lyme *A69.2+, M01.29**
- - Maladie de Whipple *K90.8+, M14.8**
- - maladie des caissons *T70.3+, M14.8**
- - myélomatose *C90.00+, M36.1**
- - myélome, multiple *C90.00+, M36.1**
- - ochronose *E70.2+, M14.5**
- - oreillons *B26.8+, M01.59**
- - paratyphoïde *A01.4+, M01.39**
- - psoriasis *L40.5+, M07.39**
- - Purpura de Schönlein-Henoch *D69.0+, M36.4**
- - Réaction d'hypersensibilité NCA *T78.4+, M36.4**
- - réticulose, maligne *C85.7+, M14.8**
- - rubéole *B06.8+, M01.49**
- - sarcoïdose *D86.8+, M14.8**
- - scorbut *E54+, M14.5**
- - sporotrichose *B42.8+, M01.69**

Arthrite –*suite*
- cas de –*suite*
- - Syndrome de Behçet *M35.2*
- - syringomyélie *G95.0+, M49.49**
- - thalassémie NCA *D56.9+, M36.3**
- - trouble du métabolisme NCA *E88.9+, M14.5**
- - typhus *A01.0+, M01.39**
- - - abdominale *A01.0+, M01.39**
- cervicale *M47.82*
- Charcot *A52.1+, M14.6**
- - avec
- - - diabète type I *E10.60*
- - - diabète type II *E11.60*
- - diabétique *E14.60+, M14.6**
- - non-syphilitique NCA *G98+, M14.6**
- - syringomyélique *G95.0+, M49.49**
- chronique *M13.99*
- climatérique NCA *M13.89*
- colonne vertébrale *M46.99*
- - ankylosante *M45.09*
- - infectieuse *M46.59*
- - primaire, progressive *M45.09*
- - pyogène *M46.59*
- - rhumatoïde *M45.09*
- - traumatique *M48.39*
- - tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- complication post-vaccinale *M02.29*
- contraintes répétées
- - cheville *M13.17*
- - poignet *M13.13*
- coxo- *M13.15*
- dans les
- - antécédents *Z87.3*
- - antécédents familiaux *Z82*
- déformante *M19.99*
- - syphilitique *A52.1+, M14.6**
- dos - *voir* spondylite *M46.99*
- due à des microcristaux *M11.99*
- dysenterie, au cours de *A09+, M01.89**
- dysentérique (syndrome de Reiter) *M02.39*
- hypertrophique *M19.99*
- infectieuse *M00.99*
- - cas de maladie due au VIH *B20, M00.99*
- infectieuse (arthrite réactionnelle) *M02.99*
- infectieuse [Arthropathie réactionnelle] *M02.99*
- jambe *M13.99*
- juvénile *M08.99*
- - avec
- - - colite ulcéreuse *K51.9+, M09.29**
- - - entérite régionale *K50.9+, M09.19**
- - - maladie de Crohn *K50.9+, M09.19**
- - - psoriasis *L40.5+, M09.09**
- - avec vasculite *M08.79*
- - chronique
- - - forme débutante oligoarticulaire *M08.49*
- - - - & en cours, polyarticulaire (oligoarthrite étendue) *M08.3*
- - - forme systémique débutante *M08.29*
- - forme débutante polyarticulaire *M08.3*
- main *M13.94*

Arthrite –*suite*
- Marie von Strümpel (spondylite ankylosante), colonne vertébrale *M45.09*
- ménopausale NCA *M13.89*
- mycosique NCA *B49+, M01.69**
- neuropathique *A52.1+, M14.6**
- - diabétique *E14.60+, M14.6**
- - non-syphilitique NCA *G98+, M14.6**
- - syringomyélitique *G95.0+, M49.49**
- non purulente NCA *M13.99*
- ochronotique *E70.2+, M14.5**
- ostéo- *M19.99*
- ourlien *B26.8†, M01.5-**
- par
- - agent pathogène NCA *M00.89*
- - Escherichia coli *M00.89, B96.2!*
- - Haemophilus influenzae *M00.89, B96.3!*
- - méningocoques *A39.8+, M01.09**
- - pneumocoques *M00.19*
- - pseudomonas *M00.89, B96.5!*
- - salmonelles *A02.2+, M01.39**
- - sérum *M02.29*
- - staphylocoques *M00.09*
- - streptocoques *M00.29*
- pied *M13.97*
- poignet *M13.13*
- - fonction de la sollicitation *M13.13*
- polyarticulaire *M13.0*
- post-dysentérique *M02.19*
- post-entérique *M02.19*
- post-infectieuse
- - entérite, à Yersinia enterocolitica *A04.6+, M03.29**
- - hépatite virale *B19.9+, M03.29**
- post-rhumatismale, chronique (arthrite de Jaccoud) *M12.09*
- primaire, progressive *M13.89*
- psoriasique mutilante *L40.5+, M07.19**
- purulente *M00.99*
- - cas de maladie due au VIH *B20, M00.99*
- - chronique *M00.92*
- réactionnelle *M02.99*
- rhumatoïde *M06.99*
- - aiguë *I00*
- - - avec
- - - - cardiopathie multiple, *I01.8*
- - - - - *I01.9*
- - - - endocardite *I01.1*
- - - - myocardite *I01.2*
- - - - péricardite *I01.0*
- - - - Valvulite *I01.1*
- - subaiguë *I00*
- - - avec
- - - - cardiopathie multiple, *I01.8*
- - - - - *I01.9*
- - - - endocardite *I01.1*
- - - - myocardite *I01.2*
- - - - péricardite *I01.0*
- - - - Valvulite *I01.1*
- rhumatoide de Jaccoud *M12.09*
- rubéoleuse *B06.8†, M01.4-**
- sénile *M19.99*
- septique *M00.99*
- subaiguë *M13.99*
- - cas de fièvre, rhumatismale *I00*
- suite à

Arthrite –*suite*
- suite à –*suite*
- - dérivation intestinale *M02.09*
- - infection à méningocoques *A39.8+, M03.09**
- - vaccination *M02.29*
- superficielle *M12.89*
- syndrome oculo-uréthro-synovial (syndrome de Reiter) *M02.39*
- syphilitique congénitale *A50.5+, M03.19**
- syphilitique déformante *A52.1+, M14.6**
- syphilitique tardive *A52.1+, M01.39**
- tabès *A52.1+, M14.6**
- temporo-mandibulaire *K07.6*
- toxique, ménopause *M13.89*
- transitoire *M12.89*
- traumatique, chronique *M12.59*
- tuberculeuse *A18.0+, M01.19**
- - chronique *A18.0+, M01.19**
- urique *M10.09*
- villeuse *M12.89*

Arthritique
- érythème, épidémique *A25.1*
- purpura *D69.0*

arthrodèse Guérison retardé genou après fusion ou *M96.82*

Arthrodèse, selon état *Z98.1*

Arthrodynie *M25.59*
- psychogène *F45.4*

Arthrofibrose *M24.69*

Arthrogrypose *Q68.8*
- congénitale *Q68.8*
- congénitale multiple *Q74.3*

Arthrolithe *M24.09*

Arthromyodysplasie congénitale *Q74.3*

Arthropathie *M25.99*
- affection *M25.99*
- articulation crico-aryténoïdienne *J38.7*
- avec nodosités d'Heberden *M15.1*
- Charcot *A52.1+, M14.6**
- - diabétique *E14.60+, M14.6**
- - non syphilitique NCA *G98+, M14.6**
- - syphilitique *A52.1+, M14.6**
- - syringomyélique *G95.0+, M49.49**
- - tabétique *A52.1+, M14.6**
- congénitale, syphilis tardive *A50.5+, M03.19**
- cours de/avec
- - acromégalie *E22.0+, M14.5**
- - amyloïdose *E85.9+, M14.4**
- - anomalie métabolique *E88.9+, M14.5**
- - carence, alimentaire *E63.9+, M14.5**
- - chondrocalcinose *M11.29*
- - endocardite, infectieuse *I33.0+, M03.69**
- - entérité régionale *K50.9+, M07.49**
- - érythème
- - - exsudatif multiforme *L51.9+, M14.8**
- - - noueux *L52+, M14.8**
- - goutte *M10.09*
- - hémochromatose *E83.1+, M14.5**
- - hémoglobinopathie *D58.2+, M36.3**
- - hémophilie NCA *D66+, M36.2**
- - histiocytose, maligne *C96.1+, M36.1**

Arthropathie –*suite*
- cours de/avec –*suite*
- - hyperthyroïdie *E05.9+, M14.5**
- - hypothyroïdie *E03.9+, M14.5**
- - leucémie *C95.90+, M36.1**
- - maladie
- - - endocrine *E34.9+, M14.5**
- - - sanguine NCA *D75.9+, M36.3**
- - maladie de Crohn *K50.9+, M07.49**
- - maladie de Henoch-Schönlein *D69.0+, M36.4**
- - myélome, multiple *C90.00+, M36.1**
- - néoformation *D48.0+, M36.1**
- - Nodosités de Bouchard *M15.2*
- - plasmocytome *C90.00+, M36.1**
- - - rémission complète *C90.01+, M36.1**
- - psoriasis *L40.5+, M07.39**
- - rubéole *B06.8+, M01.49**
- - sarcoïdose *D86.8+, M14.8**
- - syphilis tardive *A52.7+, M01.39**
- - syringomyélie *G95.0+, M49.49**
- - thyréotoxicose *E05.9+, M14.5**
- déformante *M19.99*
- dégénérative *M19.99*
- diabétique *E14.60+, M14.2**
- due à des microcristaux *M11.99*
- - avec hyperparathyroïdie *E21.3+, M14.1**
- - de
- - - phosphate de calcium *M11.89*
- - - pyrophosphate *M11.89*
- genou *M25.96*
- hypertrophique *M19.99*
- inflammatoire *M13.99*
- microcristaux *M11.99*
- - cas d'hyperparathyroïdie *E21.3+, M14.1**
- - due à
- - - phosphate de calcium *M11.89*
- - - pyrophosphate *M11.89*
- neuropathique tabétique *A52.1+, M14.6**
- neuropathique, avec diabète sucré *E14.90+, M14.6**
- non-syphilitique neurogène NCA *G98+, M14.6**
- ostéopulmonaire *M89.49*
- par/à
- - goutte
- - - affection à hématites falciformes *D57.8+, M14.0**
- - - syndrome de Lesch-Nyhan *E79.1+, M14.0**
- - hydroxyapatite *M11.09*
- post-entérique *M02.19*
- post-infectieuse NCA *B99+, M03.29**
- post-infectieuse, au cours de
- - entérite à Yersinia enterocolitica *A04.6+, M03.29**
- - hépatite, par virus NCA *B19.9+, M03.29**
- post-rhumatisale, chronique (arthropathie de Jaccoud) *M12.09*
- post-vaccinale *M02.29*
- psoriasique NCA *L40.5+, M07.39**
- psoriasis, distale, interphalangienne *L40.5+, M07.09**
- pyrophosphate de calcium *M11.19*
- réactive *M02.99*

Arthropathie –*suite*
- réactive –*suite*
- - avec endocardite, infectieuse *I33.0+, M03.69**
- rhumatisme de Jaccoud *M12.09*
- syphilitique déformante *A52.1+, M14.6**
- syringomyélique, neurogène *G95.0+, M14.6**
- tabétique *A52.1+, M14.6**
- transitoire *M12.89*
- traumatique *M12.59*

Arthropatie post-vaccinale *M02.29*

Arthrophyte *M25.79*

Arthropodes
- affection, par virus *A94*
- encéphalite NCA *A85.2*
- encéphalite, par virus *A85.2*
- fièvre, hémorragie *A94*
- infestation *B88.2*
- morsure, avec intoxication NCA *T63.4*
- piqûre, avec intoxication NCA *T63.4*

Arthrose *M19.99*
- activée *M19.89*
- ankylosante *M19.98*
- apophyse xiphoïde *M84.18*
- articulation acromio-claviculaire *M19.91*
- articulation basale du gros orteil *M19.97*
- articulation basale du pouce *M18.9*
- articulation de Chopart *M19.97*
- articulation des doigts *M19.94*
- articulation interphalangienne, doigt
- - distale *M15.1*
- - proximale *M15.2*
- articulation sacro-iliaque *M19.95*
- articulation tibio-tarsienne *M19.97*
- - supérieure *M19.97*
- articulation unco-vertébrale *M47.89*
- articulation vertébrale *M47.99*
- avec alcaptonurie *E70.2+, M36.8**
- axis *M47.81*
- Bouchard *M15.2*
- - articulation interphalangienne *M15.2*
- - et arthrose d'Heberden *M15.8*
- carpe *M19.94*
- cheville, importante *M15.9*
- colonne cervicale *M47.82*
- colonne lombaire *M47.86*
- coude *M19.92*
- deformans endemica *M12.19*
- déformante *M19.99*
- - articulation, importante *M15.9*
- - genou *M17.9*
- érosive *M15.4*
- facettes
- - colonne cervicale *M47.82*
- - lombo-sacrée *M47.87*
- - région cervicale *M47.82*
- - sacro-lombaires *M47.87*
- fémoro-patellaire *M17.9*
- - avec gonarthrose *M17.9*
- généralisée *M15.9*
- genou *M17.9*
- - médiale *M17.9*
- hanche *M16.9*
- Heberden *M15.1*

Arthrose –*suite*
- Heberden –*suite*
- - doigts *M15.1*
- - et arthrose de Bouchard *M15.8*
- hypertrophique *M19.99*
- intervertébrale *M47.89*
- localisation multiple *M15.9*
- localisée *M19.99*
- mâchoire *K07.6*
- ostéo-, déformante *M12.19*
- - alcaptonurie *E70.2+, M36.8**
- pied *M19.97*
- pneumarthrose *M12.89*
- poignet *M19.93*
- polyarticulaire *M15.9*
- post-traumatique NCA *M19.19*
- première articulation carpo-métacarpienne *M18.9*
- primaire NCA *M19.09*
- primaire, généralisée *M15.0*
- pseud- *M84.19*
- radio-ulnaire *M19.93*
- rétro-patellaire *M17.9*
- - et gonarthrose *M17.9*
- rhiz- *M18.9*
- secondaire *M19.29*
- secondaire, multiple *M15.3*
- singes précurseurs
- - cheville, supérieure *M19.97*
- - hanches *M16.9*
- spondylathrose *M47.99*
- tarse *M19.97*

Arthrosynovite *M65.99*

articulaire
- Déplacement dû dû) à une prothèse *T84.0*
- Fuite dû dû) à une prothèse *T84.0*

Articulaire, rigidité, multiple, congéni *Q68.8*

Articulation
- abcès *M00.99*
- - tuberculeux NCA *A18.0+, M01.19**
- acromio-claviculaire
- - arthrose *M19.91*
- - blocage *M99.87*
- - foulure, entorse *S43.5*
- - luxation *S43.1*
- - rupture *S43.1*
- adhérence *M24.89*
- affection *M24.99*
- - non traumatique *M25.99*
- - récente *T14.3*
- agénésie NCA *Q74.8*
- altération dégénérative *M19.99*
- ankylose *M24.69*
- anomalie de position congénitale NCA *Q68.8*
- anomalie NCA *Q74.9*
- artificielle *M84.19*
- atteinte interne *M24.99*
- blessure NCA *T14.9*
- - ancienne *M25.89*
- - résiduelle *M25.89*
- blocage *M24.89*
- - osseux *M24.69*
- blocage, traitable par chirothérapie *M99.89*
- calcification *M25.89*

Articulation –*suite*

- capsule
- - déchirure *T14.3*
- - foulure *T14.3*
- - hémarthrose, traumatique *T14.3*
- - rupture, traumatique *T14.3*
- - subluxation, traumatique *T14.3*
- capsulite *M77.9*
- carcinome *C79.5*
- carpo-métacarpienne, arthrose *M18.9*
- cartilage, libre *M24.09*
- cartillage
- - chondrosarcome *C41.9*
- - déchirure, ancienne *M24.19*
- - dégénérescence NCA *M24.19*
- - - articulation de l'épaule NCA *M24.11*
- - - articulation du coude NCA *M24.12*
- - - articulation du genou *M23.39*
- - érosion *M94.89*
- - lésion récidivante *M24.49*
- - maladie *M24.19*
- - rupture récente *T14.3*
- Charcot *A52.1+, M14.6**
- - cas de taboparalysie *A52.1+, M14.6**
- - diabétique *E14.60+, M14.6**
- cheville
- - abcès *M00.97*
- - ankylose *M24.67*
- - anomalie *Q74.2*
- - arthralgie *M25.57*
- - arthrite *M13.17*
- - - selon la sollicitation *M13.17*
- - arthrose *M19.97*
- - déformation, acquise NCA *M21.67*
- - dommages, cartilage *M24.17*
- - douleurs *M25.57*
- - entorse ligament capsulaire *S93.40*
- - état inflammatoire *M24.87*
- - foulure *S93.40*
- - fracture *S82.88*
- - - bimalléolaire *S82.81*
- - - trimalléolaire *S82.82*
- - fracture luxation *S82.88*
- - instabilité chronique *M25.37*
- - luxation *S93.0*
- - malformation, congénitale *Q74.2*
- - phlégnome *L03.11*
- - raideur *M25.67*
- - rupture, ligament externe *S93.2*
- - supérieure
- - - arthrite *M13.17*
- - - arthrose *M19.97*
- - - blocage *M99.86*
- - - contusion *S90.0*
- - - écrasement *S97.0*
- - - - avec implication, pied *S97.8*
- - - épanchement *M25.47*
- - - état inflammatoire *M24.87*
- - - extension, ligament *S93.40*
- - - foulure *S93.40*
- - - fracture *S82.88*
- - - fracture A selon la classification de Weber *S82.6*
- - - fracture B selon la classification de Weber *S82.6*
- - - fracture C selon la classification de Weber *S82.6*
- - - implication, lors de la fracture
- - - - péroné *S82.6*

Articulation –*suite*

- cheville –*suite*
- - supérieure –*suite*
- - - implication, lors de la fracture –*suite*
- - - - tibia *S82.5*
- - - irritation capsulaire *M24.87*
- - - lésion ligament capsulaire *S93.40*
- - - lésion, ligament externe *S93.40*
- - - ligament interne, foulure *S93.41*
- - - luxation *S93.0*
- - - préarthrose *M19.97*
- - - rupture
- - - - ligament externe *S93.2*
- - - - ligament, traumatique *S93.2*
- - - synovite *M65.97*
- - - tendinite *M77.5*
- chondromatose *M24.09*
- claquage *T14.3*
- contracture en flexion *M24.59*
- contrature *M24.59*
- - cas de raccourcissement du tendon *M24.59*
- - - congénital *Q66.8*
- - paralytique *M24.59*
- costo-vertébrale, blocage *M99.88*
- crépitation *M24.89*
- crico-aryténoïdienne
- - ankylose *J38.7*
- - arthropathique *J38.7*
- - foulure *S13.5*
- - luxation *S13.2*
- crico-thyroidienne, entorse *S13.5*
- de l'épaule
- - adhérence *M75.0*
- - amputation traumatique *S48.0*
- - anomalie *Q74.0*
- - arthrite *M13.11*
- - arthrose *M19.91*
- - dégénérescence, cartilage articulaire, NCA *M24.11*
- - empyème *M00.91*
- - foulure *S43.4*
- - inflammation *M13.11*
- - lésion de la coiffe des rotateurs *M75.1*
- - lésion interne *M24.91*
- - luxation *S43.00*
- - - congénitale *Q68.8*
- - luxation ou dislocation *S43.00*
- - - chronique *M24.41*
- - - congénitale *Q68.8*
- - - récidivante *M24.41*
- - raideur *M25.61*
- - subluxation, congénitale *Q68.8*
- - tuberculose *A18.0+, M01.11**
- déchirure *T14.3*
- déformation
- - acquise, NCA *M21.99*
- - congénitale *Q68.8*
- déformation de rotation acquise *M21.89*
- dégénérescence *M19.99*
- destruction *M24.89*
- doigt
- - arthrite *M13.14*
- - arthrose *M19.94*
- - contracture *M24.54*
- - polyarthrose *M15.9*
- - raideur *M25.64*
- douleurs *M25.59*

Articulation –*suite*

- douleurs –*suite*
- - aiguës *M25.59*
- - psychogènes *F45.4*
- dysfonction
- - psychogène *F45.8*
- - temporo-mandibulaire *K07.6*
- dysplasie congénitale *Q74.8*
- empyème *M00.99*
- entorse *T14.3*
- épanchement *M25.49*
- - sanguinolent *M25.09*
- épaule, fracture *S42.14*
- état d'irritation *M24.89*
- extrémités, blocage *M99.89*
- fistule *M25.19*
- flexion anormale NCA *Q74.9*
- formes tardives de la syphilis *A52.7+, M14.8**
- fracture *T14.20*
- fusion
- - acquise *M24.69*
- - congénitale *Q74.8*
- ganglion *M67.49*
- genou - *voir aussi* genou
- - abscès *M00.96*
- - adhésion *M23.89*
- - ankylose *M24.66*
- - arthralgie *M25.56*
- - arthrite *M13.16*
- - arthrose *M17.9*
- - - médiale *M17.9*
- - blessures dues à une surcharge *M25.86*
- - contracture en flexion *M24.56*
- - crépitation *M23.89*
- - déchirure du ligament latéral *S83.40*
- - déformation en varus *M21.16*
- - - congénitale *Q74.1*
- - dégénérescence du cartilage articulaire *M23.39*
- - destruction *M23.89*
- - douleurs *M25.56*
- - empyème *M00.96*
- - entorse *S83.6*
- - épanchement *M25.46*
- - épanchement articulaire *M25.46*
- - gonflement *M25.46*
- - hémarthrose *M25.06*
- - infection *M00.96*
- - inflammation *M13.16*
- - - tuberculeuse *A18.0+, M01.16**
- - instabilité chronique *M23.59*
- - insuffisance du ligament latéral interne *M23.83*
- - irritation capsulaire *M23.99*
- - lésion du cartilage *M23.99*
- - lésion du ménisque externe *M23.36*
- - lésion interne *M23.99*
- - - récidivante *M24.46*
- - luxation *S83.10*
- - - ancienne *M23.89*
- - - congénitale *Q68.2*
- - luxation récidivante *M24.46*
- - malformation *Q68.2*
- - obstruction *M23.89*
- - ostéochondrite disséquante *M93.2*
- - raideur *M25.66*
- - rupture

Articulation –*suite*
- genou - *voir aussi* genou –*suite*
- - rupture –*suite*
- - - ligament croisé *S83.50*
- - - - antérieur, ancienne *M23.51*
- - - ligament latéral interne *S83.44*
- - - ligament, ancienne *M23.59*
- - saignement non-traumatique *M25.06*
- - syndrome de la plica *M67.86*
- - synovite *M65.96*
- - tuberculose *A18.0+, M01.16**
- gléno-humérale, luxation *S43.00*
- gonflement *M25.49*
- - tuberculeux *A18.0+, M01.19**
- gonorrhée *A54.4+, M01.39**
- grains riziformes *M24.09*
- grande
- - arthrose *M15.9*
- - arthrose déformante *M15.9*
- grinçante *M24.89*
- hémarthrose traumatique *T14.3*
- hémorragie *M25.09*
- huméroradiale, luxation *S53.0*
- huméro-ulnaire, luxation *S53.10*
- hydrops *M25.49*
- infection *M00.99*
- Inflammation NCA *M13.99*
- - aiguë *M13.99*
- - capsule *M77.9*
- - gonorrhéique *A54.4+, M01.39**
- - goutte *M10.09*
- instabilité
- - après ablation, prothèse articulaire *M96.88*
- - iliosacrée, post-traumatique *M53.28*
- - post-traumatique *M25.39*
- interphalangienne, arthrose de Bouchard *M15.2*
- kyste NCA *M25.89*
- lésion *M25.99*
- - cas de pian *A66.6+, M14.8**
- - interne, récidivante *M24.49*
- lombo-sacrale
- - anomalie *Q76.4*
- - instabilité congénitale *Q76.4*
- - malformation *Q76.4*
- - malformation, de naissance *Q76.4*
- - - sans scoliose *Q76.4*
- - relaxation *M53.27*
- luxation *T14.3*
- luxation récidivante *M24.49*
- machoire *K07.6*
- maladie *M25.99*
- - dégénérative *M19.99*
- - suppurée *M00.99*
- membres
- - inférieurs, subluxaton congénitale, sauf hanche *Q68.8*
- - supérieurs, subluxation congénitale *Q68.8*
- métacarpe, entorse *S63.7*
- métacarpophalangienne, entorse, foulure *S63.61*
- métatarsophalangienne du gros orteil
- multiple (à siège). ankylose *M24.60*
- œdème *M25.49*
- pelvienne, blessure, à la naissance *O71.6*
- périarthrite *M77.9*

Articulation –*suite*
- péronéo tibiale
- - blocage *M99.86*
- - déchirure, proximale *S83.6*
- - inférieure
- - - entorse *S93.43*
- - - luxation *S93.0*
- - supérieure
- - - entorse *S83.6*
- - - luxation *S83.10*
- pouce
- proche de
- - nodules syphilitiques *A52.7+, M14.8**
- - pian, avec nodules *A66.7*
- psoriasis *L40.5+, M07.39**
- radiocarpienne
- - entorse *S63.52*
- - foulure *S63.52*
- - luxation *S63.02*
- radiocubitale, luxation
- - distale *S63.01*
- - proximale *S53.10*
- radio-humérale, luxation *S53.0*
- raideur *M25.69*
- - après fusion chirurgicale *Z98.1*
- - fibreuse *M25.69*
- - osseuse *M25.69*
- relaxation
- - congénitale NCA *Q74.8*
- - paralytique *M25.29*
- résultats anormaux d'un liquide de l' *R89.9*
- rhumatisme *M79.09*
- - aigu *M79.09*
- - - avec atteinte cardiaque *I01.9*
- - subaigu *M79.09*
- rigidité, multiple, congénitale *Q68.8*
- sacro-iliaque
- - ankylose *M43.27*
- - anomalie NCA *Q74.2*
- - arthrite *M13.15*
- - arthrose *M19.95*
- - assouplissement *M53.28*
- - atteinte *M53.3*
- - - non traumatique *M53.3*
- - atteinte NCA *M53.3*
- - blocage *M99.84*
- - - cas de syndrome lombaire, aigu *M54.16*
- - déformation *Q74.2*
- - déformation, de naissance *Q74.2*
- - déplacement
- - - ancien *M53.28*
- - - congénital *Q74.2*
- - - naissance *M53.28*
- - - récent *S33.2*
- - douleurs *M54.5*
- - fusion, de naissance *Q74.2*
- - glissement *M53.28*
- - inflammation *M46.1*
- - instabilité *M25.35*
- - irritation, avec lombalgie *M54.5*
- - luxation *S33.2*
- - - congénitale *Q74.2*
- - raideur *M53.3*
- - relaxation *M53.28*
- - restriction, mouvement *M53.3*
- - tuberculose *A18.0+, M49.08**

Articulation –*suite*
- sacro-iliaque, entorse *S33.6*
- sacro-iliaque, luxation *S33.2*
- - congénitale *Q74.2*
- - récidivante *M53.28*
- sacrum
- - contusion *S30.0*
- - plaie, ouverte *S31.0*
- - spondylarthrose *M47.88*
- sans corpuscule *M24.09*
- sarcome *C41.9*
- septicémie *M00.99*
- sterno-claviculaire
- - dislocation *S43.2*
- - entorse *S43.6*
- - luxation *S43.2*
- - tubeuculose *A18.0+, M01.11**
- subluxation traumatique *T14.3*
- supérieure de la cheville
- suppuration *M00.99*
- synovite tuberculeuse *A18.0+, M01.19**
- syphilis de Charcot *A52.1+, M14.6**
- temporo-mandibulaire
- - dysfonctionnement *K07.6*
- - Luxation *S03.0*
- tibio-fibulaire, luxation *S83.10*
- trouble langage *F80.0*
- - développement, du *F80.0*
- - fonctionnel *F80.0*
- tuberculose *A18.0+, M01.19**
- xanthome *E75.5*

Artificiel
- avortement *O04.9*
- climatérique *N95.3*
- coeur
- - avec complication, mécanique *T82.5*
- - existance *Z95.80*
- - infection *T82.7*
- - inflammation *T82.7*
- cristallin *Z44.2*
- dent, mise en place *Z46.3*
- Dépendance long durée envers un coeur *Z99.4*
- fécondation *Z31.1*
- - avec
- - - complications *N98.9*
- - - hyperstimulation, ovaires *N98.1*
- - - infection *N98.0*
- insémination *Z31.1*
- - avec
- - - hyperstimulation, ovaires *N98.1*
- - - infection *N98.0*
- - par
- - - donneur, avec complication *N98.8*
- - - semence, partenaire, avec complication *N98.8*
- larynx, existance *Z96.3*
- malaria *B53.8*
- membres, existance *Z97.1*
- ménopause *N95.3*
- - avec hémorragie *N95.3*
- naissance provoquée avec lésion foetus/nouveau-né *P03.8*
- oeil
- - existance *Z97.8*
- - mise en place *Z44.2*
- rayons, avec lésion gencives *K03.8*
- stomie

Artificiel *–suite*
- stomie *–suite*
- - fermeture *Z43.9*
- - obstruction *Z43.9*
- - ré-ouverture *Z43.9*
- - soins *Z43.9*
- syndrome de Cushing *E24.2*
- trouble *F68.1*
- vagin, existance *Z93.8*
- valvule cardiaque *Z95.2*

Arythmie *I49.9*
- absolu *I48.19*
- - fibrillation auriculaire *I48.19*
- - intermittente *I48.19*
- brachy- *I49.8*
- brady- *I49.8*
- cardiaque *I49.9*
- chez les nouveaux-nés *P29.1*
- extrasystolique *I49.4*
- fibrillation *I48.19*
- - auriculaire *I48.19*
- fœtale, en cas d'accouchement *O68.0*
- hypsarythmie *G40.4*
- nodale *I49.8*
- - auriculoventriculaire *I49.8*
- psychogène *F45.30*
- respiratoire *I49.9*
- sinusale *I49.8*
- tachy- *I48.19*
- ventriculaire *I49.8*
- - réentrée *I47.0*

Asbestose *J61*
- avec tuberculose, organes respiratoires *J65*
- par fibrose, poumons *J61*
- poumons *J61*

Ascaridiase, ascaridose *B77.9*

Ascaridiase, *voir aussi* ascaridiose *B77.9*

Ascaridose *B77.9*
- avec
- - complications *B77.8*
- - complications, intestinales *B77.0+, K93.8**
- - pneumonie *B77.8+, J17.3**

Ascaris
- infection *B77.9*
- pneumonie *B77.8+, J17.3**

Ascaris du chat, atteinte *B83.0*

Ascaris lumbricoides, infection *B77.9*

Ascendant
- angiocholite *K83.0*
- chaleur *N95.1*
- hémiplégie NCA *G81.9*
- hémiplégie, spinale *G95.88*
- infection, voies urinaires *N39.0*
- myélite *G04.9*
- - aigue *G04.9*
- néphrite *N12*
- neuromyélite *G61.0*
- paralysie, spinale, aigue *G61.0*
- poliomyélite, progressive *A80.3*
- sclérose multiple *G35.9*

Aschoff, nodule de *I09.0*

Ascite *I89.8*
- chyleuse *I89.8*
- gélatineuse péritonéale *C78.6*

Ascite *–suite*
- liquide dans la cavité péritonéale *R18*
- - avec tumeurs malignes *C78.6*
- - cardiaque *I50.01*
- - chyleuse, non filarienne *I89.8*
- - foetale
- - - avec dystocie *O66.3*
- - - soins, mère *O33.7*
- - hémorragique *R18*
- - induite par néoformation, maligne *R18*
- - lymphe *I89.8*
- - maligne *R18*
- - syphilitique *A52.7*
- - tuberculeuse *A18.3*

Aseptique
- choc *R57.8*
- méningite *G03.0*
- - aiguë NCA *G03.0*
- - cas d'affection, par VIH *B20, G03.0*
- - par leptospirose *A27.9+, G01**
- myocardite, chez les nouveaux nés *B33.2+, I41.1**
- nécrose *R02*
- - hanche *M87.95*
- - lunatum *M92.2*
- - os *M87.99*
- - - idiopathique *M87.09*
- - os naviculaire du pied *M92.6*
- - pancréas *K86.8*
- - sphincter, vessie *N32.8*
- neurosyphilis, leptoméninges *A52.1+, G01**
- ostéonécrose, condyles fémoraux *M87.05*
- péritonite *T81.6*

Asherman, syndrome *N85.6*

Asialie *K11.7*

Asiatique, grippe (Influenza) *J11.1*
- virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.1*

Askin, tumeur (formation de tissu conjon *C49.3*

Asomatognosie *R29.5*

Aspartate amino transférase (ASAT), augm *R74.0*

Aspartate aminotransférase (ASAT), augme *R74.0*

Aspartylglucosaminurie *E77.1*

Asperger, syndrome *F84.5*

Aspergillome *B44.9*

Aspergillose *B44.9*
- allergique, broncho-pulmonaire (ABPA) *B44.1+, J99.8**
- amygdalienne *B44.2+, J99.8**
- avec
- - otite externe *B44.8+, H62.2**
- - otomycose *B44.8+, H62.2**
- - pneumonie *B44.1+, J17.2**
- broncho-pulmonaire *B44.1*
- cérébrale *B44.8*
- généralisée *B44.7*
- invasive *B44.9*
- - avec pneumonie *B44.0+, J17.2**
- poumons NCA *B44.1+, J99.8**
- poumons, invasive *B44.0+, J99.8**
- SNC système nerveux central *B44.8*

Aspergillus
- abcès, poumons *B44.1*
- amygdalien *B44.2+, J99.8**
- Aortite *B44.8+, I79.1**
- bronchiolite *B44.1+, J99.8**
- bronchite *B44.1+, J99.8**
- bronchopneumonie *B44.1+, J17.2**
- clavatus, alvéolite *J67.4*
- duodénite *B44.8+, K93.8**
- endocardite *B44.8+, I39.8**
- entérite *B44.8+, K93.8**
- flavus, infection *B44.9*
- fumigatus, infection *B44.9*
- gastrite *B44.8+, K93.8**
- glossite *B44.8*
- granulome *B44.8*
- iléite *B44.8+, K93.8**
- infection *B44.9*
- jéjunite *B44.8+, K93.8**
- méningite *B44.8+, G02.1**
- myocardite *B44.8+, I41.2**
- néphrite *B44.8+, N08.0**
- oesophagite *B44.8+, K23.8**
- péricardite *B44.8+, I32.1**
- pleurésie *B44.8*
- pneumonie *B44.1+, J17.2**
- prostatite *B44.8+, N51.0**
- sepsie *B44.7*
- septicémie *B44.7*
- splénite *B44.8*
- terreus, infection *B44.9*
- thyroidite *B44.8+, E35.0**
- trachéite *B44.8*
- trachéo-bronchite *B44.1+, J99.8**
- vascularite *B44.8*

Aspermatogénèse *N46*

Aspermie *N46*

Asphyxiant
- dysostose, thorax *Q77.2*
- dysplasie, thorax *Q77.2*
- dystrophie, thorax *Q77.2*

Asphyxie *R09.0*
- avec score d'Apgar
- - 0-3 pour 1 minute postnatale *P21.0*
- - 4-7 pour 1 minute postnatale *P21.1*
- blanche *P21.0*
- bleu *P21.1*
- bleue *P21.1*
- chez les nouveaux nés *P21.9*
- due à
- - aliment, régurgité *T17.9*
- - constriction *T71*
- - corps étranger *T17.9*
- - éboulement *T71*
- - écharpe (porte-bébé) *T71*
- - étranglement *T71*
- - gaz NCA *T59.9*
- - inhalation, huile *T17.9*
- - literie *T71*
- - mucus NCA *T17.9*
- - nourriture *T17.9*
- - noyade *T75.1*
- - pendaison *T71*
- - pression *T71*
- - sac en plastique *T71*
- - strangulation *T71*
- - vomissement NCA *T17.9*
- foetale *P20.9*

Asphyxie –*suite*

- hors naissance *R09.0*
- intra-utérine *P20.9*
- locale *I73.0*
- lors de la naissance *P21.9*
- - grave *P21.0*
- - légère *P21.1*
- - modérée *P21.1*
- mécanique *T71*
- par
- - alimentaire *T17.9*
- - compression *T71*
- - corps étranger *T17.9*
- - - bronche *T17.5*
- - - bronchioles *T17.8*
- - - chez les nouveaux nés *P24.3*
- - - larynx *T17.3*
- - - nez *T17.1*
- - - poumons *T17.8*
- - - rhinopharynx *T17.2*
- - - sinus nasal *T17.0*
- - - trachée *T17.4*
- - - voies respiratoires *T17.9*
- - éboulement *T71*
- - - avec écrasement *S28.0*
- - écrasement *S28.0*
- - fumée *T59.9*
- - fumées *T59.9*
- - gaz NCA *T59.9*
- - immersion *T75.1*
- - monoxyde de carbone *T58*
- - mucus *T17.9*
- - - bronche *T17.5*
- - - bronchioles *T17.8*
- - - chez les nouveaux nés *P24.1*
- - - gorge *T17.2*
- - - larynx *T17.3*
- - - nasopharynx *T17.2*
- - - nez *T17.1*
- - - poumons *T17.8*
- - - sinus nasal *T17.0*
- - - trachée *T17.4*
- - - voies respiratoires *T17.9*
- - noyade *T75.1*
- - pendaison *T71*
- - sommeil *T71*
- - strangulation *T71*
- - vomissements *T17.9*
- pathologique *R09.0*
- relative à la gravitation *T71*
- traumatique NCA *T71*
- traumatique, par écrasement, thorax NCA *S28.0*

Aspiration
- aliments *T17.9*
- aliments, avec pneumonie *J69.0*
- bouchon de mucus, par les nouveaux nés *P24.1*
- broncho-pneumonie *J69.0*
- contenu gastrique *T17.9*
- - lors anésthésie
- - - nouveau né *O89.0*
- - - pendant
- - - - accouchement *O74.0*
- - - - grossesse *O29.0*
- - - postpartum *O89.0*
- - - puerpérale *O89.0*
- corps étranger *T17.9*

Aspiration –*suite*

- digestive *T17.9*
- fluidité *T17.9*
- huiles, avec pneumonie *J69.1*
- lait *P24.3*
- lipidique avec pneumonie *J69.1*
- liquide amniotique *P24.1*
- - avec pneumonie *P24.1*
- liquor amnii *P24.1*
- méconium *P24.0*
- mucus *T17.9*
- - bronche *T17.5*
- - bronchioles *T17.8*
- - gorge *T17.2*
- - nez *T17.1*
- - par les nouveaux nés *P24.1*
- - poumons *T17.8*
- - sinus nasal *T17.0*
- - trachée *T17.4*
- - voies respiratoires *T17.9*
- nourriture *T17.9*
- par anésthésie, lors de la naissance *O74.0*
- pneumonie *J69.0*
- - chez les nouveaux-nés *P24.9*
- - due à
- - - aliments *J69.0*
- - - anésthésie
- - - - couche *O89.0*
- - - - pendant
- - - - - grossesse, *O29.0*
- - - - - accouchement, *O74.0*
- - - - - travail, *O74.0*
- - - essence *J69.1*
- - - huile *J69.1*
- - - lait *J69.0*
- - - matière
- - - - liquide, NCA *J69.8*
- - - - solide, NCA *J69.8*
- - - sang *J69.8*
- - - sécrétion gastrique *J69.0*
- - - vomissements *J69.0*
- - par anésthésie *J95.4*
- poumons *J69.0*
- sang
- - avec pneumonie *J69.8*
- - chez les nouveaux nés *P24.2*
- sperme, épididymaire *Z31.3*
- syndrome, chez les nouveaux-nés *P24.9*
- vernix caseosa *P24.8*
- vomissement *T17.9*
- - avec pneumonie *J69.0*

Aspirine, thérapie longue durée, anamnès *Z92.2*

Asplénie *Q89.0*
- après splénéctomie *D73.0*
- congénitale *Q89.0*
- isomérisme *Q20.6*

Assemblé
- ganglion *M67.49*
- odontome *D16.5*
- - sinus maxilaires *D16.41*

Assimilation du fer, dysfonctionnement *E83.1*

Assimilation, dysfonctionnement, aliment *K90.9*

assistance cardiaque Adaptation manipulation d ' un système d ' *Z45.02*

Assman, anémie, Heuck *D64.8*

Assman-Herd, avec symptômes NCA *A16.2*

Association
- VACTEL (anomalies vertébrales, atrésie anale, défauts cardiaques, fistule trachéo-œsophagienne, atrésie œsophagienne, anomalies rénales, anomalies des membres) *Q87.2*
- VACTER (anomalies vertébrales, atrésie anale, défauts cardiaques, fistule trachéo-œsophagienne, atrésie œsophagienne, anomalies rénales, anomalies des membres) *Q87.2*

associé
- bronche lymphome BALT Lymphome des tissu lymphoïde *C88.4*
- entéropathie Lymphome cellules T *C86.2*
- hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] , Mastocytose systémique *D47.0*
- muqueuse lymphome MALT Lymphome extranodal de la zone marginal à cellules B, lymphome des tissu lymphoïde *C88.4*
- tissu conjonctif Syndrome Sharp] , maladie *M35.1*

Associé au mucus, lymphome *C88.30*
- rémission complète *C88.31*

Associé aux antibiotiques
- colite *A04.7*
- - dans les antécédents personnels *Z86.1*
- entérite *A04.7*
- entérocolite *A04.7*

Astasie *F44.4*
- fonctionnelle *F44.4*
- hystérique *F44.4*

Astéatose *L85.3*
- cutanée *L85.3*

Astéracées, plantes
- allergie (due à) *T78.4*

Astéréognosie *R41.3*

Astéroïde, hyalite *H43.2*

Asthénie *R53*
- cardiaque *I50.9*
- - psychogène *F45.30*
- cardio-vasculaire *I50.9*
- - psychogène *F45.30*
- hystérique *F44.4*
- myocardique *I50.9*
- - psychogène *F45.30*
- nerveuse *F48.0*
- neuro-circulatoire *F45.30*
- - *F45.37*
- névrotique *F48.0*
- psychique *F48.8*
- psychique, suite à une
- - épuisement *F48.8*
- - névrose *F48.8*
- psychogène *F48.0*
- psychonévrotique *F48.0*
- sans mention psychose *R54*

Asthénique
- neurose *F48.0*
- réaction *F48.0*
- trouble
- - organique *F06.6*
- - personnalité *F60.7*
- - psychogène *F48.0*

Asthénopie *H53.1*
- accomodative *H52.5*
- hystérique *F44.6*
- psychogène *F44.6*

Asthénospermie *R86.9*

Asthmatiforme
- bronchite *J45.9*
- spasme *J45.9*

Asthmatique
- bronchite *J45.9*
- - chronique *J44.89*
- - - avec
- - - - exacerbation, aigue *J44.19*
- - - - infection, voies respiratoires inférieures, aigue *J44.09*
- - endogène *J45.9*
- - obstructive *J45.9*
- dyspnée *J45.9*
- - avec bronchite *J45.9*
- - - chronique *J44.89*
- Etat *J45.9*

Asthme *J45.9*
- allergique *J45.0*
- allergique, en majorité *J45.0*
- atopique *J45.0*
- avec
- - infection, aiguë *J45.1*
- - rhinite, allergique *J45.0*
- - rhume des foins *J45.0*
- boulanger *J45.0*
- bronchique *J45.9*
- - allergique *J45.0*
- - - avec exacerbation due à une infection *J45.8*
- - - avec exacerbation, due à une infection *J45.8*
- - analgésiques, induit par *J45.1*
- - atopique *J45.0*
- - attaque *J45.9*
- - avec bronchite *J45.9*
- - cas d'allergie à la poussière domestique *J45.0*
- - cas de
- - - infiltration, poumons, éosinophile *J82*
- - - rhinopathie, allergique *J45.0*
- - - rhume des foins *J45.0*
- - dans les antécédants familiaux *Z82*
- - due à une infection *J45.1*
- - effort *J45.1*
- - effort, due à *J45.1*
- - extrinsèque *J45.0*
- - forme mixte *J45.8*
- - infectieux *J45.1*
- - infection, relatif à *J45.1*
- - intrinsèque *J45.1*
- - intrinsèque et extrinsèque *J45.8*
- - intrinsèque, d'origine, extrinsèque *J45.8*
- - non-allergique *J45.1*
- - - endogène *J45.1*
- - - médication, induit par *J45.1*
- - psychogène *F54, J45.9*
- bronchique du à un effort *J45.1*
- cardiaque *I50.19*
- cardio-bronchique *I50.19*
- cas de
- - allergie
- - - ambroisie *J45.0*
- - - pollen *J45.0*

Asthme *–suite*
- cas de *–suite*
- - allergie *–suite*
- - - poussière domestique *J45.0*
- - idiosyncrasie *J45.1*
- - obstruction, voies respiratoires NCA *J45.9*
- - rhume des foins *J45.0*
- chronique *J45.9*
- croup *J45.9*
- effort *J45.1*
- effort, induit par *J45.1*
- emphysème *J43.9*
- - cas de bronchite *J44.89*
- endogène *J45.1*
- enfance *J45.0*
- exacerbé *J45.0*
- exogène, allergique *J45.0*
- extrinsèque *J45.0*
- grave, aigue *J46*
- induit par
- - allergie, farine *J45.0*
- - analgétiques *J45.1*
- - détergents *J69.8*
- - foin *J45.0*
- - platine *J45.0*
- - pollen *J45.0*
- induit par l'exercice *J45.1*
- infantile *J45.0*
- intrinsèque *J45.1*
- - non-allergique *J45.1*
- jet de sable *J62.8*
- médication, causé par, non-allergique *J45.1*
- mineurs *J60*
- mixte *J45.8*
- montanum *J62.8*
- nerveuse *J45.1*
- platine *J45.0*
- polisseur de métaux *J62.8*
- potier *J62.8*
- poumons *J45.9*
- professionnel, céramique (asthme du potier) *J62.8*
- sableur *J62.8*
- Schleifer *J62.8*
- spasmodique *J45.9*
- tailleur de pierre *J62.8*
- tardif *J45.9*
- thymus *E32.8*
- tuberculeux *A16.2*

Astigmatisme *H52.2*
- congénital *H52.2*

Astragale
- fracture *S92.1*
- Luxation, entorse *S93.0*
- ostéochondrite, juvénile *M92.6*
- ostéochondrose, juvénile *M92.6*

Astroblastome *C71.9*

Astrocytome *C71.9*
- anaplasique *C71.9*
- bulbe rachidien (medulla oblongata) *C71.7*
- cellulaire *C71.9*
- cérébelleux *C71.6*
- cortex pariétal *C71.3*
- fibreux *C71.9*
- fibrillaire *C71.9*

Astrocytome *–suite*
- frontal *C71.1*
- gémistocytique *C71.9*
- gigantocellulaire *C71.9*
- juvénile *C71.9*
- kystique *C71.9*
- lobe pariétal *C71.3*
- lobe temporal *C71.2*
- malin *C71.9*
- oligo *C71.9*
- pilocytique *C71.9*
- piloide *C71.9*
- protoplasmique *C71.9*
- rétine *C69.2*
- sous-épendymaire *D43.2*
- temporal, second stade *C71.2*
- thalamique *C71.0*
- tronc cérébral *C71.7*
- xantho-astrocytome *C71.9*

Astrogangliocytome *C71.9*

Astrogliome *C71.9*

Asymbolie *R48.8*

Asymétrie
- bassin, avec anomalie pelvienne *O33.0*
- crâne, nourrisson *Q67.4*
- face *Q67.0*
- mâchoire *K07.1*
- mammaire *Q83.8*
- pied *Q66.8*

Asymétrique
- pied bot *Q66.8*
- vertébral, anomalie, sacro-lombaire *Q76.4*

Asymptomatique
- bactériurie *N39.0*
- - Examen de dépistage *Z13.8*
- - lors de la grossesse *O23.4*
- - postpartum *O86.2*
- - puerpérale *O86.2*
- hyperuricémie *E79.0*
- infection
- - VIH, causée par *Z21*
- - voies urinaires, en couche *O86.2*
- neurosyphilis *A52.2*
- peste *A20.8*
- uricémie *E79.0*

Asynergie *R27.8*

Asynergie détrusor-sphincter *R27.8*

Asystolie *I46.9*

Ataxie *R27.0*
- aiguë *R27.8*
- cas de syphilis, système nerveux central *A52.1*
- cérébelleuse *G11.9*
- - avec défaut de réparation de l'ADN *G11.3*
- - cas de
- - - myxoedème *E03.9+, G13.2**
- - - néoplasme NCA *D48.9+, G13.1**
- - - neurosyphilis *A52.1+, G99.8**
- - début précoce *G11.1*
- - - avec
- - - - myoclonie *G11.1*
- - - - persistance des réflexes tendineux *G11.1*
- - - - tremblement essentiel *G11.1*
- - héréditaire *G11.9*

Ataxie *–suite*
- cérébelleuse *–suite*
- - liée à l'alcool *G31.2*
- - tardive *G11.2*
- cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN *G11.3*
- cérébrale *G11.9*
- congénitale, non progressive *G11.0*
- démarche *R26.0*
- Duchenne, syphilitique *A52.1*
- Friedreich *G11.1*
- - autosomique-récessive *G11.1*
- - héréditaire
- - - familiale *G11.1*
- - - spinale *G11.1*
- générale *R27.8*
- héréditaire NCA *G11.9*
- héréditaire, en cas de neuropathie *G60.2*
- hérédo-, cérébelleuse *G11.9*
- hystérique *F44.4*
- locomotrice, en cas de neurosyphilis *A52.1*
- muscle détrusor-col de la vessie *R27.8*
- muscle détrusor-plancher pelvien *R27.8*
- oculaire *H55*
- origine non organique *F44.4*
- Pierre-Marie *G11.2*
- plancher pelvien, -muscle détrusor *R27.8*
- progressive *A52.1*
- progressive, en cas de tabès *A52.1*
- psychogène *F44.4*
- Ramsay-Hunt *G11.1*
- Roussy-Lévy *G60.0*
- Sanger-Brown *G11.2*
- spastique
- - cas de neurosyphilis *A52.1*
- - héréditaire NCA *G11.4*
- spinale
- - cas de neurosyphilis *A52.1*
- - héréditaire *G11.1*
- spino-cérébelleuse, récessive liée au chromosome X *G11.1*
- spinocérébrale *G11.9*
- spino-cérébrale *G11.9*
- tabétique *A52.1*
- télangiectasique *G11.3*
- vésico-pelvienne *R27.8*
- vésico-sphinctérienne *R27.8*

Ataxique
- Démarche *R26.0*
- paralysie
- - cas de paralysie, progressive *A52.1*
- - cérébrale *G80.4*
- - héréditaire *G11.9*
- paralysie infantile, cérébrale *G80.4*
- paralysie, cérébrale *G80.4*
- parésie, cérébrale *G80.4*
- - infantile *G80.4*

Ataxo-adynamie *R27.8*

Atélectasie *J98.1*
- affaissement *J98.1*
- bande *J98.1*
- cas d'épituberculose *A16.7*
- chez le nouveau-né *P28.1*
- chez le nouveau-né, sans syndrome de détresse respiratoire *P28.1*
- compression *J98.1*

Atélectasie *–suite*
- compression *–suite*
- - acquise *J98.1*
- lobe inférieur *J98.1*
- lobe moyen *J98.1*
- massive *J98.1*
- orientée *J98.1*
- par compression *J98.1*
- - acquise *J98.1*
- partielle *J98.1*
- - chez le nouveau-né *P28.1*
- plaques *J98.1*
- pression *J98.1*
- primitive du nouveau-né *P28.0*
- primitive, chez le nouveau-né *P28.0*
- pulmonaire *J98.1*
- résorption *J98.1*
- - chez le nouveau-né, sans syndrome de détresse respiratoire *P28.1*
- secondaire, chez le nouveau-né *P28.1*
- totale *J98.1*
- tuberculeuse *A16.2*

Atélocardie *Q24.9*

Atélomyélie *Q06.1*

Athélie *Q83.2*

Athériosclérose, rein *I70.1*

Athéromatose *I70.9*
- aorte *I70.0*
- artère cérébrale *I67.2*
- cérébrale *I67.2*
- coeur *I25.19*
- coronaire *I25.19*
- vaisseau *I70.9*

Athérome *L72.1*
- aorte *I70.0*
- aorto-iliaque *I70.0*
- artère *I70.9*
- - basilaire *I67.2*
- - carotide *I67.2*
- - cérébrale *I67.2*
- - vertébrale *I67.2*
- artère coronaire *I25.19*
- coccyx *L05.9*
- coeur *I25.19*
- enflammé *L72.1*
- infecté *L72.1*
- myocarde *I25.19*
- paupière *H02.8*
- peau *L72.1*
- scrotum *L72.1*
- valvule aortique *I35.8*
- valvule mitrale *I34.88*
- valvule pulmonaire *I37.8*
- valvule tricuspide *I36.8*

Athéroscléreux (euse)
- encéphalopathie *I67.2*
- gangrène *I70.24*
- maladie cardiovasculaire *I25.0*
- maladie tritronculaire *I25.13*
- maladie, cardiaque *I25.19*
- - avec
- - - sténose de vaisseaux de pontage *I25.15*
- - - sténose sur stent *I25.16*
- - sans sténose, ayant un effet hémodynamique *I25.10*
- rétinopathie *I70.8+, H36.8**

Athérosclérose
- démence *F01.9*
- ujet âgé *I70.9*

Athérosclérose - *voir* Artériosclérose ou *I70.9*
- aorte abdominale *I70.0*
- artère
- - fémorale *I70.20*
- - sous-clavière *I70.25*
- artère rénale *I70.1*
- artères distales, des
- - type extrémités inférieures, avec
- - - boiterie, intermittente *I70.21*
- - - douleurs au repos *I70.22*
- - - ulcération *I70.23*
- artères périphériques, des
- - type épaule-bras, tous stades *I70.25*
- membre inférieur *I70.20*
- membres *I70.20*
- - inférieurs *I70.20*
- périphérique *I70.20*
- sénile *I70.9*
- tronc coeliaque *K55.1*
- vaisseau coronaire *I25.19*
- vaisseaux, périphériques *I70.20*

Athéro-thrombose *I74.9*

Athétose *R25.8*
- acquise *R25.8*
- cas de paralysie cérébrale dyskinétique *G80.3*
- congénitale, bilatérale *G80.3*
- double *G80.3*
- hémi- *R25.8*
- unilatérale *R25.8*

Athétosique
- paralysie cérébrale *G80.3*
- paralysie cérébrale dyskinétique *G80.3*
- parésie cérébrale *G80.3*

Athyréose *E03.1*
- acquise *E03.9*
- congénitale *E03.1*

Atlanto-axial
- articulation
- - entorse *S13.4*
- - foulure *S13.4*
- - luxation *S13.11*
- entorse *S13.4*
- luxation de l'articulation *S13.11*
- subluxation récidivante avec myélopathie *M43.3*

Atlanto-occipital
- blocage *M99.80*
- e articulation
- - entorse *S13.4*
- - foulure *S13.4*
- entorse *S13.4*
- luxation *S13.11*

Atlas
- blocage *M99.80*
- entorse *S13.4*
- fracture *S12.0*
- luxation *S13.11*

Atmosphérique
- pression
- - effet de la pression augmentée *T70.3*
- - effet de la pression provoquée par une explosion *T70.8*

Atonie

Atonie *–suite*
- caecum *K59.8*
- - psychogène *F45.32*
- côlon *K59.8*
- congénitale *P94.2*
- détrusor de la vessie *N31.2*
- estomac *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- intestin *K59.0*
- - *K59.8*
- - psychogène *F45.32*
- intestin grêle *K59.8*
- musculaire *M62.89*
- - congénitale *P94.2*
- oesophage *K22.8*
- uretère *N28.8*
- utérus *O62.2*
- - avec
- - - césarienne *O62.2*
- - - foetus et nouveau-né affectés au cours du travail *P03.6*
- - compliquant l'accouchement *O62.2*
- vaisseau capillaire *I78.8*
- vessie *N31.2*
- - neurogène *G83.49*
- - psychogène *F45.34*

Atonique
- absences *G40.3*
- - épileptiques *G40.3*
- accouchement compliqué par hémorragie *O72.1*
- constipation *K59.0*
- crise *G40.3*
- - épileptique, non spécifique *G40.3*
- dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie *N31.2*
- dyspepsie *K30*
- iléus *K56.0*
- métrorragie post partum, NCA *O72.1*
- pseudoparalysie congénitale *P94.2*

Atopie *T78.4*

Atopique
- asthme *J45.0*
- chéilite *K13.0*
- conjonctivite aïgue *H10.1*
- eczéma
- - cuir chevelu *L20.8*
- - main *L20.8*
- - pied *L20.8*
- - visage *L20.8*
- endogène
- - dermatite *L20.9*
- - dermatose *L20.9*
- - eczéma *L20.9*
- - - généralisé *L20.9*
- - - impétiginisé *L20.9*
- rhinite *J30.4*

Atransferrinémie *E88.0*
- congénitale *E88.0*

Atrésie
- anale *Q42.3*
- angle irido-cornéen *Q15.0*
- anus, avec fistule *Q42.2*
- aorte *Q25.2*
- - congénitale *Q23.0*

Atrésie *–suite*
- aorte *–suite*
- - congénitale *–suite*
- - - avec hypoplasie de l'aorte ascendante et développement défectueux du ventricule gauche *Q23.4*
- - lors d'hypoplasie du coeur gauche *Q23.4*
- appareil lacrymal *Q10.4*
- appareil urinaire NCA *Q64.8*
- aqueduc de Sylvius *Q03.0*
- - avec spina bifida *Q05.4*
- artère NCA *Q27.8*
- - cérébrale, NCA *Q28.38*
- - coronaire NCA *Q24.5*
- - oeil, NCA *Q15.8*
- - ombilicale NCA *Q27.0*
- - pulmonaire *Q25.5*
- - pulmonaire NCA *Q25.5*
- bronche *Q32.4*
- caecum *Q42.8*
- canal
- - biliaire *Q44.2*
- - - acquise *K83.1*
- - cholédoque *Q44.2*
- - cystique *Q44.2*
- - - acquise *K82.0*
- - déférent *Q55.3*
- - éjaculateur *Q55.4*
- - hépatique *Q44.2*
- - parotidien *Q38.4*
- - - acquise *K11.8*
- - pharyngo-tympanique *Q17.8*
- - salivaire *Q38.4*
- - - acquise *K11.8*
- - sublingual *Q38.4*
- - - acquise *K11.8*
- - submandibulaire *Q38.4*
- - - acquise *K11.8*
- - utérin *Q50.6*
- - - acquise *N97.1*
- cartilage cricoïde *Q31.8*
- cartilage thyroïde *Q31.8*
- choanale *Q30.0*
- col de l'utérus *Q51.5*
- col utérin
- - acquise *N88.2*
- - compliquant la grossesse *O34.4*
- - compliquant l'accouchement *O34.4*
- - congénitale *Q51.8*
- col vésical *Q64.3*
- côlon *Q42.9*
- conduit
- - auditif *Q16.1*
- - urinaire *Q64.3*
- conduit auditif *Q16.1*
- - osseux *Q16.1*
- congénitale multiple, syndrome *Q89.8*
- crosse aortique *Q25.2*
- duodénum *Q41.0*
- épiglotte *Q31.8*
- fentes de Luschka *Q03.1*
- foramen
- - Luschka, avec spina bifida *Q05.4*
- - Magendie *Q03.1*
- - - avec spina bifida *Q05.4*
- fosses nasales *Q30.8*
- glande salivaire *Q38.4*

Atrésie *–suite*
- glotte *Q31.8*
- grosse veine *Q26.8*
- hymen acquise *N89.6*
- hyménale *Q52.3*
- iléon *Q41.2*
- intestin *Q41.9*
- - congénitale *Q41.9*
- intestin grêle *Q41.9*
- iris *Q15.0*
- jéjunale *Q41.1*
- jéjunum *Q41.1*
- - héréditaire *Q41.1*
- larynx *Q31.8*
- ligament utérin large *Q50.6*
- mitrale congénitale *Q23.2*
- narine
- - antérieure *Q30.0*
- - postérieure *Q30.0*
- nasopharynx *Q34.8*
- nez, acquise *J34.8*
- oesophage *Q39.0*
- - avec fistule trachéo-oesophagienne *Q39.1*
- - sans fistule *Q39.0*
- oesophage, avec fistule, oesobronchique *Q39.1*
- organes digestifs NCA *Q45.8*
- organes digestifs NCA, partie supérieure *Q40.8*
- organes génitaux
- - femme *Q52.8*
- - - externes *Q52.7*
- - homme
- - - externes *Q55.8*
- - - internes *Q55.8*
- orifice
- - col *Q51.5*
- - latéral *Q03.1*
- - - quatrième ventricule *Q03.1*
- - - - avec spina bifida *Q05.4*
- - médian *Q03.1*
- - - quatrième ventricule *Q03.1*
- - - - avec spina bifida *Q05.4*
- - vésico-urétéral *Q62.1*
- ostium de l'uretère *Q62.1*
- ostium de l'urètre *Q64.3*
- ovaire *Q50.0*
- pupille *Q13.2*
- pylore *Q40.8*
- rectum *Q42.1*
- - avec fistule *Q42.0*
- - - rectale *Q42.0*
- - - recto-cutanée *Q42.0*
- sinus paranasal *J34.8*
- spastique, syndrome *G80.1*
- trachée *Q32.1*
- trompe de Fallope *Q50.6*
- - acquise *N97.1*
- trompe d'Eustache *Q17.8*
- uretère *Q62.1*
- uretère, congénitale *Q62.1*
- urètre *Q64.3*
- utérus *Q51.8*
- - acquise *N85.8*
- vagin
- - acquise *N89.5*
- - congénitale *Q52.4*
- vaisseau cérébral, NCA *Q28.38*

Atrésie –*suite*

- vaisseau NCA *Q27.8*
- valve
- - aortique *Q23.0*
- - cardiaque NCA *Q24.8*
- - mitrale *Q23.2*
- - - lors d'hypoplasie du coeur gauche *Q23.4*
- - pulmonaire *Q22.0*
- - tricuspide *Q22.4*
- veine NCA *Q27.8*
- - cave
- - - inférieure *Q26.8*
- - - supérieure *Q26.8*
- - porte *Q26.5*
- - pulmonaire *Q26.3*
- vésicule biliaire *Q44.1*
- vessie *Q64.5*
- vulve *Q52.7*
- - acquise *N90.5*

Atrésique
- aménorrhée *N91.0*
- kyste folliculaire *N83.0*

atrial réentrée nodal AVNRT] [AVRT] , Tachycardie (paroxystique) : *I47.1*

Atrichie *L65.9*
- congénitale universelle *Q84.0*

Atrichie congénitale *Q84.0*

Atrichose *L65.9*

atrio ventriculaire complet Bloc : *I44.2*

Atriomégalie *I51.7*

Atrophie
- anale *K62.8*
- appendice *K38.8*
- blanche *L95.0*
- bord pupillaire *H21.2*
- brune *I51.5*
- canal
- - cystique *K82.8*
- - déférent *N50.8*
- - pancréatique *K86.8*
- - spermatique *N50.8*
- canal cholédoque *K83.8*
- canal déférent *N50.8*
- cardiaque *I51.5*
- cardiaque liée à l'âge *R54*
- cartilage *M94.89*
- cavité buccale *K13.7*
- cérébelleuse *G31.9*
- cérébrale *G31.9*
- - alcoolique *G31.2*
- - avec démence *F03*
- - circonscrite *G31.0*
- - - avec démence *G31.0+, F02.0**
- - présénile, avec démence *G31.88+, F02.8**
- - sénile *G31.1*
- cérébrale frontale *G31.0*
- cervelet *G31.9*
- Charcot-Marie-Tooth(-Hoffmann), de *G60.0*
- cheveux *L67.8*
- choroïde *H31.1*
- col utérin *N88.8*
- - ménauposique *N95.8*
- congestive foie *K76.1*
- conjonctive, sénile *H11.8*

Atrophie –*suite*

- cordon spermatique *N50.8*
- cornets *J34.8*
- corps caverneux *N48.8*
- corps ciliaire *H21.2*
- cortex cérébral *G31.9*
- cortex rénal *N26*
- cortex surrénalien *E27.4*
- - primaire *E27.1*
- corticale *G31.9*
- crête alvéolaire *K08.2*
- crête alvéolaire édentée *K06.8*
- cutanée *L90.9*
- - due à l'exposition à un rayonnement *L57.8*
- - idiopathique progressive *L90.4*
- - maculeuse
- - - striée, syphilitique *A52.7+, L99.8**
- - - syphilitique *A51.3+, L99.8**
- - sénile *L90.8*
- - sénile, due à l'exposition à un rayonnement *L57.8*
- défaut d'usage NCA *M62.59*
- Déjerine-Thomas, de *G23.8*
- endomètre, sénile *N85.8*
- épididyme *N50.8*
- fascio-scapulo-humérale (de Landouzy-Déjerine) *G71.0*
- foie *K72.9*
- - avec ictère aigu, au cours de la grossesse *O26.6*
- - jaune *K72.9*
- - - aiguë *K72.0*
- - - - mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P00.8*
- - - chronique *K72.1*
- - - subaiguë *K72.0*
- foie cirrhotique *K74.6*
- gastrique *C16.9*
- gastro-intestinale *K63.8*
- gencive *K06.0*
- génitale *N95.2*
- glande
- - sublinguale *K11.0*
- - submandibulaire *K11.0*
- glandes lacrymales *H04.1*
- glandes salivaires *K11.0*
- globe oculaire *H44.5*
- globus pallidus, pigmentaire *G23.0*
- granulaire, rein *N26*
- gyrée *H31.2*
- - choroïde *H31.2*
- hémifaciale congénitale *Q67.4*
- hémisphère *G31.9*
- hémoglobine *D58.2*
- hypophyse *G31.9*
- inanition, par *E46*
- intestinale *K63.8*
- iris *H21.2*
- - essentielle *H21.2*
- - - progressive *H21.2*
- - progressive *H21.2*
- lactation *O92.60*
- Landouzy-Déjerine, de *G71.0*
- langue *K14.8*
- - sénile *K14.8*
- larynx *J38.7*
- lèvre (buccale) *K13.0*
- lobe frontal *G31.0*

Atrophie –*suite*

- malnutrition, par *E46*
- mamelon *N64.2*
- mammaire *N64.2*
- - déficit après allaitement *N64.8*
- - puerpérale *O92.20*
- multi-systématisée *G90.3*
- - cas d'hypotonie, orthostatique, neurogène - *voir aussi* syndrome de Shy-Drager *G90.3*
- multi-systémique *G90.3*
- - associée à une hypotension orthostatique neurogène - *voir* syndrome de Shy-Drager *G90.3*
- muqueuse *L90.9*
- - buccale *K13.7*
- - gastrique *K29.4*
- muscle NCA *M62.59*
- muscle spinal *G12.9*
- musculaire *M62.59*
- - Charcot Marie *G60.0*
- - diffuse *M62.50*
- - Duchenne Aran *G12.2*
- - généralisée *M62.50*
- - idiopathique *M62.59*
- - membres *M62.50*
- - neuropathique *G60.0*
- - neuropathique de Marie-Charcot-Tooth *G60.0*
- - névritique *G58.9+, M63.89**
- - péronière *G60.0*
- - - forme hypertrophique *G60.0*
- - - type axonal *G60.0*
- - primitive *M62.59*
- - progressive *G12.2*
- - pseudohypertrophique *G71.0*
- - spinale *G12.9*
- - - chez l'adulte *G12.1*
- - - forme
- - - - distale *G12.1*
- - - - juvénile (type III) *G12.1*
- - - - scapulo-péronière *G12.1*
- - - héréditaire NCA *G12.1*
- - - infantile, type I *G12.0*
- - - infantile, type II *G12.1*
- - - progressive *G12.2*
- - syphilitique *A52.7+, M63.89**
- - type I (Werdnig-Hoffmann) *G12.0*
- musculaire Charcot-Marie-Tooth, neuropathique *G60.0*
- musculaire neuropathique de Charcot-Marie-Tooth (Hoffmann) *G60.0*
- musculaire, Werdnig-Hoffmann, de (amyotrophie spinale) *G12.0*
- museau de tanche (col utérin) *N88.8*
- myocarde *I51.5*
- - brune *I51.5*
- myomètre *N85.8*
- - cervical *N88.8*
- - sénile *N85.8*
- nerf
- - optique (II) *H47.2*
- - - syphilitique *A52.1+, H48.0**
- - - - congénitale *A50.4+, H48.0**
- nerf facial (VIIe paire) *G51.8*
- nerf optique (II) *H47.2*
- - dans la neurosyphilis *A52.1+, H48.0**
- nerf(s)
- - auditif (VIII) *H93.3*
- - facial (VII) *G51.8*

Atrophie –*suite*
- nerf(s) –*suite*
- - moteur oculaire commun (III) *H49.0*
- - moteur oculaire externe (VI) *H49.2*
- - trochléaire (IV) *H49.1*
- - vestibulo-cochléaire (VIII) *H93.3*
- nerf(s) crânien(s) *G52.9*
- - II *H47.2*
- - III *H49.0*
- - IV *H49.1*
- - VI *H49.2*
- - VIII *H93.3*
- nerf(s) périphérique(s) *G58.9*
- olivo-ponto-cérébelleuse *G23.8*
- ongles *L60.3*
- - congénitale *Q84.6*
- optique, nerf (IIe paire) *H47.2*
- - associée à
- - - carence en vitamine *H47.2*
- - - leucodystrophie *E75.2+, H48.0**
- - - maladie, foie *H47.2*
- - - neurosyphilis *A52.1+, H48.0**
- - post-traumatique *H47.2*
- - syphilitique tardive *A52.1+, H48.0**
- - vasculaire *H47.2*
- orbite *H05.3*
- oreille *H93.8*
- organes génitaux masculins *N50.8*
- os
- - neurogène
- - - post-traumatique *M89.09*
- - - tabétique *A52.1+, M90.29**
- - par défaut d'usage NCA *M81.29*
- - post-traumatique NCA *M81.89*
- - sénile NCA *M89.89*
- osseuse *M81.99*
- osseuse de Sudeck *M89.09*
- ovaire(s) *N83.3*
- ovaire, déficit, avec kyste ovarien NCA *N83.2*
- pancréas *K86.8*
- papille *H47.2*
- papille optique *H47.2*
- - temporale *H47.2*
- papilles linguales *K14.4*
- parenchyme hépatique *K72.9*
- parodontose *K05.4*
- parotide *K11.0*
- peau du visage *L90.9*
- peau, maculaire, syphilitique *A52.7+, L99.8**
- pénis *N48.8*
- performance cérébrale *G93.88*
- pharynx *J39.2*
- pluriglandulaire *E31.8*
- - auto-immune *E31.0*
- processus alvéolaire
- - édenté *K08.2*
- - mandibule ou maxillaire inférieur *K08.2*
- - maxillaire *K08.2*
- prostate *N42.2*
- rate *D73.0*
- rein *N26*
- - amyloïde *E85.4+, N29.8**
- - artériosclérotique *I12.90*
- - avec
- - - hypertonie *I12.90*
- - - - avec insuffisance rénale *I12.00*

Atrophie –*suite*
- rein –*suite*
- - avec –*suite*
- - - maladie cardiaque hypertensive *I13.90*
- - avec hypertension *I12.90*
- - bilatérale
- - - congénitale *Q60.4*
- - - infantile *Q60.4*
- - cas de
- - - hypertonie *I12.90*
- - - pyélite *N11.9*
- - - pyélonéphrite *N11.9*
- - congénitale *Q60.5*
- - due à
- - - analgésique *N14.0*
- - - présence de plomb *N26*
- - - présence d'oxalate *E74.8*
- - granuleuse *N26*
- - hydronéphrotique *N13.3*
- - - avec infection *N13.6*
- - hyperplastique, artériolaire *I12.90*
- - infantile *Q60.5*
- - pyélonéphritique *N11.9*
- - secondaire *N26*
- - substance hyaline, artériolaire *I12.90*
- - terminale *N26*
- - tuberculeuse *A18.1+, N29.1**
- - unilatérale
- - - congénitale *Q60.3*
- - - infantile *Q60.3*
- - vasculaire *I12.90*
- reins *N26*
- rénale *N26*
- rétine *H35.8*
- - postinfectieuse *H35.8*
- rétinienne *H31.1*
- rhinopharynx *J31.1*
- Romberg, de, hémifaciale *G51.8*
- scrotum *N50.8*
- sénile *R54*
- - paupière *H02.7*
- sénile des organes génitaux *N95.2*
- sous-cutanée *L90.9*
- spinale *G95.88*
- - avec paralysie *G12.2*
- - - infantile, aiguë *A80.3*
- striée *L90.6*
- - peau, syphilitique *A52.7+, L99.8**
- Sudeck, de *M89.09*
- surrénale *E27.4*
- système nerveux central, systémique, associée à
- - myxoedème *E03.9+, G13.2**
- - néoplasme NCA *D48.9+, G13.1**
- tardive *K90.0*
- tarse palpébrale, congénitale *Q10.3*
- testicules *N50.0*
- thymus *E32.8*
- thyroïde *E03.4*
- - acquise *E03.4*
- - avec goître *E03.1*
- - congénitale *E03.1*
- tissu adipeux de l'orbite *H05.8*
- trachée *J39.88*
- trompes de Fallope *N83.3*
- tubules rénaux *N26*
- tunique vaginale *N50.8*

Atrophie –*suite*
- tympan *H73.8*
- utérus *N85.8*
- - acquise *N85.8*
- - due à l'exposition à un rayonnement *N99.8*
- - - (effet souhaité) *N85.8*
- - retard en couche *O90.8*
- - troubles, en couche *O90.8*
- vagin *N95.2*
- - sénile *N95.2*
- vasculaire *I99*
- vertébrale *M48.89*
- vertèbre *M48.89*
- vésicule biliaire *K82.8*
- vésicule séminale *N50.8*
- vessie *N32.8*
- - congénitale *Q64.7*
- - neurogène *N31.88*
- villositaire *K90.0*
- voies biliaires *K82.8*
- voies respiratoire supérieures *J39.88*
- vulve *N90.5*

Atrophique, *voir* type de maladie

Atrophodermia vermiforme *L66.4*

Atrophodermie *L90.9*
- idiopathique, de type Pasini Pierini *L90.3*
- maculée *L90.8*
- névritique (neuriticum) *L90.8*
- pigmentosum *Q82.1*
- reticulata symmetricum faciei *L66.4*
- vermiculée *L66.4*

Atrophodermie (Atrophoderma) *L90.9*
- maculée (maculatum)
- - et striée (stratium), syphilitique *A52.7+, L99.8**
- - syphilitique *A51.3+, L99.8**

Atrophodermie idiopathique de Pasini Pie *L90.3*

Atrophodermie, sénile *L90.8*
- due à un rayonnement *L57.8*

Atropine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*
- intoxication *T44.3*

Attachement, peau *L91.8*
- hypertrophié *L91.8*
- infecté *L91.8*

Attaque cérébrale *I64*
- mortelle, par courant électrique *T75.4*
- par courant électrique *T75.4*

Attaque de Schwindel *R42*

Atteinte
- anale *K62.9*
- biliaire *K82.9*
- calcul urinaire *N20.9*
- dos *M53.99*
- - déformante *M43.99*
- macula *H35.9*
- mentale *F99*
- organes génitaux féminins *N94.9*
- poumons *J98.4*
- rachis, dégénérative *M47.99*
- rétine *H35.9*
- veine *I87.9*

Atteinte du coccyx *M53.3*

Atteinte liée à la pression atmosphériqu *T70.9*
- oreille *T70.0*
- sinus paranasal *T70.1*

Atteinte veineuse *I87.9*

Atteinte, ménisque externe *M23.36*

Atteinte, tolérance au glucose *R73.0*

Attention
- déficit *F98.8*
- - cas de trouble avec hyperactivité *F90.0*
- trouble *F98.8*
- - chez l'enfant *F90.0*
- - et perturbation de l'activité *F90.0*
- - - cas d'hyperkinésie *F90.0*
- - sans hyperactivité *F98.8*

Atténuation, coeur *R01.2*

Attrition
- dent *K03.0*
- structure de la dent *K03.0*

Atypique
- anorexie mentale *F50.1*
- Argyll-Robertson, syndrome d' *H57.0*
- autisme *F84.1*
- boulimie *F50.3*
- carcinoïde *C80*
- carcinome, épithélium épidermoïde *C80*
- démence, de type Alzheimer *G30.8+, F00.2**
- dépression *F32.8*
- douleurs, faciales *G50.1*
- ectropion, portion, avec saignement *N86*
- endomètre *N85.9*
- épilepsie, bégnine *G40.00*
- érosion, une partie *N86*
- fibroxanthome *D48.1*
- Flutter auriculaire , *I48.4*
- hyperplasie
- - endomètre *N85.1*
- - mélanocytes *D22.9*
- hypertrophie, endomètre *N85.1*
- infection
- - due à un virus *A81.9*
- - mycobacterium *A31.9*
- leucémie, myéloïde *C92.10*
- méningiome *D32.9*
- mycobactéries
- - avec
- - - infection, pumons, tuberculeuse *A16.2*
- - - résistance, à un ou plusieurs médicaments de première ligne *U82.2!*
- - infection
- - - cutanée *A31.1*
- - - pulmonaire *A31.0*
- mycobactéries, disséminées *A31.80*
- Névralgie faciale *G50.1*
- pneumonie *J18.9*
- psychose, pendant l'enfance *F84.1*
- schizophrénie *F20.3*
- situation, familiale *Z60*
- tic douloureux *G50.1*
- tumeur rhabdoïde, tératoïde *C80*
- vaisseau, portion *N86*

Audiogène, trouble, développement langag *F80.28*

auditif
-
- agnosie *R48.1*
- altération du pouvoir de discrimination *H93.2*
- amnésie *R48.8*
- aphasie, développement, induit par *F80.28*
- épilepsie *G40.8*
- externe Abcès pavillon de l ' oreille ou conduit *H60.0*
- hallucination *R44.0*
- Nerf crânien VIII Tumeur malign : Nerf *C72.4*
- perception, déficit congénital *F80.28*
- recrutement *H93.2*
- sensation anormale NCA *H93.2*
- traumatisme *H83.3*
- trouble, réceptif, de l'acquisition *F80.20*

Audition
- blessure induisant surdité *S04.6*
- diminution *H91.9*
- faiblesse - *voir aussi* surdité partielle ou voir aussi diminution de l'audition *H91.9*
- perte due au bruit *H83.3*
- sensibilité au bruit *H93.2*

Auditive, amnésie *R48.8*

Augmentation
- activité sexuel *F52.7*
- activité, rate *D73.1*
- alpha-foetoprotéine *R77.2*
- androgène
- - ovarienne *E28.1*
- - surrénale *E27.0*
- - testiculaire *E29.0*
- antéversion, col du fémur *Q65.8*
- - congénitale *Q65.8*
- anticoagulant, avec diathèse hémorragique *D68.3*
- anti-IXa, avec diathèse hémorragique *D68.3*
- anti-VIIIa, avec diathèse hémorragique *D68.3*
- anti-Xa, avec diathèse hémorragique *D68.3*
- anti-XIa, avec diathèse hémorragique *D68.3*
- cholestérol *R79.8*
- congénitale (malformation de la ceinture scapulaire) *Q74.0*
- crachats *R09.3*
- déchets, ballonements *R14*
- densité osseuse *M85.89*
- - avec apparition de taches *M85.89*
- - généralisée *M85.89*
- enzymes hépatiques (transaminases) *R74.0*
- fonction
- - hypophyse *E22.9*
- - médullosurrénale *E27.5*
- fréquence des mictions *R35*
- glucose sanguin *R73.9*
- hémolyse avec
- - ictère néonatal *P58.9*
- - ictère, néonatal NCA *P58.9*
- hyperlipidémie *E78.5*
- hypertrichose *L68.9*
- immunoglobulines *R76.8*
- inexpliquée de la vitesse de sédimentation *R70.0*

Augmentation –*suite*

- inexpliquée des transaminases *R74.0*
- lacrymale *H04.9*
- Libido *F52.7*
- l'ingestion d'aliments (avec obésité) *E66.09*
- lipidémie *E78.5*
- métabolisme basal *R94.8*
- miction *R35*
- mictions (formes psychogènes de mictions fréquentes) *F45.34*
- nombre d'anticorps *R76.0*
- nombre de leucocytes *R72*
- pathologique du taux sanguin de prolactine *E22.1*
- paupière, peau *H02.3*
- - congénitale *Q10.3*
- perméabilité des capillaires *I78.8*
- perméabilité des vaisseaux capillaires *I78.8*
- plis, peau *L98.8*
- poids *R63.5*
- polyurie *R35*
- potassium *E87.5*
- pression
- - artérielle *R03.0*
- - artérielle RR [Riva-Rocci] *R03.0*
- - intracrânienne *G93.2*
- - - bénigne *G93.2*
- - - due à un traumatisme obstétrical *P11.0*
- - intra-oculaire *H40.0*
- - veineuse *I87.8*
- - - épisclérale, avec glaucome secondaire *H40.8*
- Réflexes nauséeux *J39.2*
- résidu de la miction *R39.1*
- risque de malformation chez le phoetus *O35.9*
- risque génétique, chez le phoetus *O35.9*
- salive *K11.7*
- sécrétion
- - gastrine *E16.4*
- - glucagon *E16.3*
- - pancréas, endocrine *E16.9*
- - polypeptide
- - - intestinal vaso-actif du pancréas *E16.8*
- - - pancréatique *E16.8*
- - somatostatine du pancréas *E16.8*
- sécretion de liquide amniotique *O40*
- sécrétion, aldostéronisme *E26.9*
- sécrétions (de)
- - aldostérone *E26.9*
- - gastrine *E16.4*
- - glucagon *E16.3*
- sensibilité à la douleur *R20.8*
- sodium *E87.0*
- soif *R63.1*
- sphéricité cristallinienne *Q12.4*
- taux
- - acide urique *E79.0*
- - alanine amino-transférase [ALAT] *R74.0*
- - anticorps antinucléaires *R76.0*
- - aspartate amino-transférase [ASAT] *R74.0*
- - azote non-protéique [NPN] *R79.8*
- - dans les urines de

Augmentation *–suite*
- taux *–suite*
- - dans les urines de *–suite*
- - - 17-cétostéroïdes *R82.5*
- - - acide indol-acétique *R82.5*
- - - catécholamines *R82.5*
- - - stéroïdes *R82.5*
- - glutamate-oxaloacétate-transaminase [GOT] *R74.0*
- - glutamate-pyruvate-transaminase [GPT] *R74.0*
- - glycémie *R73.9*
- - immunoglobuline *R76.8*
- - lactate déshydrogénase [LDH] *R74.0*
- - lipides dans le sang *E78.5*
- - parathormone *R79.8*
- - sanguin, glycérol, anormale *R79.8*
- température corporelle, due à une fièvre d'étiologie inconnue *R50.80*
- tonus sphinctérien anal *K59.4*
- transpiration *R61.9*
- trouble du sommeil *G47.1*
- urémie, extra-rénale *R39.2*
- vitesse de sédimentation (VS) *R70.0*
- volume des selles *R19.5*

Aujeszky, maladie d' *B33.8*

Aura
- avec migraine *G43.1*
- - sans mal de tête *G43.1*
- épileptique NCA *G40.9*
- installation aïgue, avec migraine *G43.1*
- Jackson, de *G40.1*
- prolongée, avec migraine *G43.1*

Aurantiase, cutanée *E67.1*

auriculaire
-
- arrêt *I45.5*
- atypique Flutter *I48.4*
- Crise de tachycardie paroxystique, *voir aussi* syndrome de Hoffmann Bouveret *I47.9*
- Déformation acquis : *H61.1*
- fistule *H61.1*
- - congénitale *Q18.1*
- ossification *H61.1*
- othématome *H61.1*
- - non traumatique *H61.1*
- permanente Fibrillation *I48.2*
- sans autre précision Fibrillation et flutter *I48.9*
- tachycardie *I47.1*
- type
- - I Flutter *I48.3*
- - II Flutter *I48.4*
- typique Flutter *I48.3*

Auriculaire (atrial)
- défaut, septum *Q21.1*
- extrasystoles *I49.1*
- fibrillation *I48.19*
- tachycardie ectopique *I47.1*

Auricule
- déformation
- - acquise *H61.1*
- - oreille, congénitale *Q17.3*
- hématome *S00.48*

Auriculo-ventriculaire
- anomalie septale *Q21.2*
- bloc *I44.3*

Auriculo-ventriculaire *–suite*
- bloc *–suite*
- - 1er degré *I44.0*
- - 2e degré *I44.1*
- - - type
- - - - I *I44.1*
- - - - II *I44.1*
- - 3e degré *I44.2*
- - complet *I44.2*
- communication discordante *Q20.5*
- conduction
- - accélérée *I45.6*
- - accessoire *I45.6*
- - prématurée *I45.6*
- dissociation *I45.8*
- propagation de l'influx anormale *I45.6*
- rythme nodal *I49.8*
- tachycardie, paroxysmique *I47.1*

Australien
- encéphalite *A83.4*
- fièvre Q *A78*

Autisme *F84.0*
- atypique *F84.1*
- infantile *F84.0*

Auto-anticorps
- chaud, avec anémie hémolytique *D59.1*
- froid, avec anémie hémolytique *D59.1*

Autoanticorps froids, avec anémie hémoly *D59.1*

Autodigestion *R68.8*

Auto-immune
- anémie hémolytique *D59.1*
- - provoquée par un médicament *D59.0*
- anémie, hémolytique *D59.1*
- - acquise, NCA *D59.1*
- - due à des médicaments *D59.0*
- - symptomatique *D59.1*
- atrophie pluriglandulaire *E31.0*
- cirrhose du foie *K74.6*
- granulocytopénie *D70.6*
- hémolyse *D59.1*
- Hémorragie parathyroïdienne *E21.4*
- hépatite *K75.4*
- Hypoparathyroïdie *E20.0*
- insuffisance pluriglandulaire *E31.0*
- maladie *M35.9*
- - systémique NCA *M35.9*
- maladie dans les antécédents personnels *Z86.2*
- maladie, diabète sucré latent associé à *E10.90*
- maladie, hyperthyroïdie provoquée par *E05.8*
- sensibilisation au froid *D59.1*
- surrénalite *E27.1*
- syndrome pluriglandulaire *E31.0*
- thrombopénie *D69.58*
- thyroïdite *E06.3*
- thyropathie *E06.3*
- vascularite *D69.0*

Auto-intoxication *R68.8*
- tentative, anamnèse *Z91.8*

Autolyse *R68.8*

Automatismes *G93.88*
- épileptiques *G40.2*
- paroxystiques idiopathiques *G40.2*

Automnal, catarrhe [rhinite allergique] *J30.1*

Automnale, fièvre [leptospirose] *J30.1*

Automne, fièvre, japonaise *A27.8*

Automne, foie *K76.1*

Automutilation
- comportement *Z72.8*
- - antécédents familiaux *Z81*
- trouble, personnalité *F60.7*

Automutilation, antécédents personnels *Z91.8*

Automutilation, type de lésion codé ou i

Autonome
- adénome thyroïdien *D34*
- - compensé *D34*
- - décompensé *D34*
- dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie *N31.2*
- dysfonctionnement somatoforme *F45.39*
- dysréflexie *G90.49*
- - se manifestant par
- - - crise de transpiration *G90.41*
- - - crise hypertonique *G90.40*
- facio-céphalalgie *G90.08*
- nerf, périphérique, neuropathie *G90.9*
- - associée à
- - - amyloïdose *E85.4+, G99.0**
- - - diabète sucré *E14.40+, G99.0**
- - - goutte *M10.09+, G63.6**
- - - hyperthyroïdie *E05.9+, G99.0**
- - - maladie
- - - - endocrinienne NCA *E34.9+, G99.0**
- - - - métabolique NCA *E88.9+, G99.0**
- neuropathie *G90.9*
- - amyloïdenne *E85.9+, G99.0**
- - avec vessie neurogène *N31.2*
- - cardiaque *G90.9*
- neuropathie, idiopathique *G90.08*
- système nerveux
- - affection *G90.9*
- - dégénérescence *G90.9*
- - dysfonctionnement provoqué par l'alcool *G31.2*
- - périphérique
- - - compression *G90.8*
- - - dégénérescence *G90.9*
- - - irritation *G90.8*
- - - paralysie *G90.8*
- trouble de l'équilibre sympathique *G90.8*
- vessie, neurogène *N31.2*

Autonomie
- multifocale, associée à un goître, avec euthyroïdie *E04.2*
- thyroïdienne, associée à un goître *E04.9*
- - avec hyperthyroïdie *E05.2*
- unifocale, associée à un goître, avec
- - euthyroïdie *E04.1*
- - hyperthyroïdie *E05.1*

autopsie Syndrome mort subit du nourrisson avec mention d' *R95.0*
- du nourrisson sans mention d ' *R95.9*

Autosensibilisation
- cutanée *L30.2*
- érythrocytaire *D69.2*
- - avec hémorragie
- - - cutanée *D69.2*

Autosensibilisation *–suite*
- érythrocytaire *–suite*
- - avec hémorragie *–suite*
- - - pétéchiale *D69.2*

Autosensibilisation cutanée *L30.2*

Autosomes
- accessoires NCA *Q92.9*
- anomalie NCA *Q99.9*
- délétion *Q93.9*
- et gonosomes, réarrangement équilibré, chez sujet anormal *Q95.3*
- réarrangement, équilibré, chez sujet anormal *Q95.2*
- translocation équilibrée *Q95.9*
- - chez sujet normal *Q95.0*
- trisomie NCA *Q92.9*

Autosomique dominant(e)
- Best, maladie de, dégénérescence maculaire vitelliforme *H35.5*
- dégénérescence maculaire vitelliforme *H35.5*
- rein polykystique *Q61.2*
- rein polykystique, type adulte *Q61.2*
- vitréo-rétinopathie *H43.8*

Autosomique récessif(ve)
- agammaglobulinémie *D80.0*
- akinésie foetale *Q87.8*
- Friedreich, ataxie de *G11.1*
- rein polykystique *Q61.1*
- rein polykystique, type infantile *Q61.1*

Autosomique, site fragile, chez le sujet *Q95.5*

Autotopoagnosie *R48.1*

Autotoxémie *R68.8*

Autotransplantation, rejet *T86.9*

AV [auriculo-ventriculaire], bloc *I44.3*
- complet *I44.2*
- incomplet *I44.3*

AV [auriculo-ventriculaire], canal *Q21.2*

AV [auriculo-ventriculaire], dissociatio *I45.8*

AV, jonction
- extrasystoles *I49.2*
- tachycardie
- - auriculaire *I47.1*
- - paroxystique *I47.1*
- - psychogène *F45.30*
- - supraventriculaire *I47.1*
- - ventriculaire *I47.2*

Avant-bras
- abcès *L02.4*
- absence, unilatérale, acquise *Z89.2*
- amputation, traumatique *S48.9*
- - *S58.9*
- Anomalie *Q74.0*
- avec coude, lésion, multiples *S59.7*
- basaliome *C44.6*
- brûlures
- - 1er degré *T22.11*
- - 3ème degré *T22.31*
- - degré
- - - 2a *T22.21*
- - - 2b *T22.81*
- - second degré *T22.21*
- carcinome *C76.4*
- contusion *S40.0*
- - *S50.1*

Avant-bras *–suite*
- corrosion *T22.42*
- - 1er degré *T22.51*
- - 3ème degré *T22.71*
- - avec atteinte du poignet et de la main *T29.4*
- - degré
- - - 2a *T22.61*
- - - 2b *T22.91*
- - second degré *T22.61*
- courbure *M21.83*
- décollement *S51.9*
- difformité
- - acquise *M21.93*
- - congénitale *Q68.8*
- écrasement *S47*
- - *S57.9*
- embolie, artérielle *I74.2*
- et
- - avant-bras, absence congénitale *Q71.1*
- - bras, absence congénitale, avec main pré-existante *Q71.1*
- - épaule
- - - contusion, multiple *S40.7*
- - - lésions, multiples *S49.7*
- - - plaie ouverte, multiples *S41.7*
- - main, absence, congénitale *Q71.2*
- foulure *S46.9*
- - *S56.8*
- - musculaire *S46.9*
- fracture *S42.3*
- - *S52.9*
- - complète *S52.7*
- - distale *S42.40*
- - - *S52.8*
- - - bicondylaire *S42.44*
- - multiples *S42.7*
- - multiples NCA *S52.7*
- - ouverte *S42.3*
- - - *S52.9*
- - proximale *S42.20*
- - - *S52.8*
- furoncle *L02.4*
- Gelure superficiel bras et de l ' *T33.4*
- hématome *S40.0*
- lésion *S49.9*
- - *S59.9*
- - multiples *S59.7*
- - musculaire *S46.9*
- - - *S56.8*
- - superficielle *S40.9*
- - - *S50.9*
- - - multiples *S50.7*
- lésion vasculaire *S45.9*
- luxation *T11.2*
- luxation, ouverte *S42.3*
- - *S52.9*
- lymphoedème, suite à une mastectomie *I97.2*
- mélanome, in situ *D03.6*
- mélanome, malin *C43.6*
- naevus *D22.6*
- nerf, lésion traumatique *S44.9*
- phlégnome *L03.10*
- plaie, ouverte *S41.1*
- - *S51.9*
- - multiples *S51.7*
- sarcome *C40.0*

Avant-bras *–suite*
- sollicitation excessive *M70.9*
- tendinite *M77.8*
- ténosynovite *M65.93*
- ténovaginite *M65.93*

Avant-douleurs *O47.9*

Avant-pied
- contusion *S90.3*
- gangrène *R02*
- - diabétique *E14.50*
- malformation *M21.67*
- mélanome, malin *C43.7*

Avant-pied, névralgie de Morton *G57.6*

Avasculaire, nécrose
- hanche *M87.95*
- os *M87.99*
- - idiopathique *M86.09*

Avec transfusion plasmatique
- choc *T80.8*
- complications *T80.9*
- hémolyse *T80.8*

Avec trouble binoculaire
- Anomalie de la correspondance rétinienne *H53.3*
- fusion, avec réduction de la vision stéréoscopique *H53.3*
- Vision simultanée, sans fusion *H53.3*

Aversion sexuelle *F52.1*

Aversive, thérapie NCA *Z50.4!*

Aveugle
- bronches, fin *Q32.4*
- macula, élargissement *H53.4*
- macula, grossissement *H53.4*
- - champ visuel *H53.4*

aviaire Influenza A H5N1 , épidémie de 2009 [grippe *U69.21!*

Aviaire, grippe, avec mise en évidence d *J09*

Avitaminose *E56.9*
- A *E50.9*
- avec polyneuropathie NCA *E56.9+, G63.4**
- B *E53.9*
- B2 *E53.0*
- C *E54*
- D *E55.9*
- K *E56.1*
- multiple NCA *E56.9*
- neurologique *E56.9+, G99.8**

Avitaminose E, tocophérol *E56.0*

AVNRT AVRT Tachycardie paroxystique) : atrial de réentrée (nodal) [*I47.1*

Avoir des nausées *R11*

Avortement *O06.9*
- après menace de fausse couche *O03.9*
- artificiel *O04.9*
- avec
- - choc, septique *O08.3*
- - hémorrage *O06.6*
- - - accidentelle *O08.1*
- - - tardif *O06.6*
- - infection, voies urinaires *O08.8*
- - tétanos *A34*
- causes immunologiques *O05.9*
- comnplet *O06.9*
- complet *O06.9*

Avortement –*suite*
- complet –*suite*
- - avec complication *O06.8*
- - avec complications *O06.8*
- criminel *O05.9*
- décollement
- - avortement *O04.9*
- - - demande d' *Z30.0*
- - - indication
- - - - médicale *O04.9*
- - - - sociale *O04.9*
- - - médical *O04.9*
- - placenta *O45.9*
- - - avec
- - - - césarienne *O45.9*
- - - - hémorragie, renforcée par
- - - - - afibrinogénémie, *O45.0*
- - - - - coagulation intravasculaire disséminée, *O45.0*
- - - - - hyperfibrinogénémie, *O45.0*
- - - - - hyperfibrinolyse, *O45.0*
- - - - lésion, foetus *P02.1*
- - - complications, accouchement NCA *O45.8*
- - - lors de trouble, coagulation *O45.0*
- deux temps *O06.9*
- - avec complications *O06.8*
- échoué *O07.9*
- - avec complications, par
- - - arrêt, coeur *O07.8*
- - - cautérisation, chimique, organes pelviens *O07.8*
- - - choc, septique *O07.5*
- - - coagulation, intravasculaire *O07.6*
- - - collapsus, circulation *O07.8*
- - - déchirure, organes pelviens *O07.8*
- - - défaillance, rénale *O07.8*
- - - infection
- - - - appareil génital *O07.5*
- - - - bassin *O07.5*
- - - - voies urinaires *O07.8*
- - - nécrose, tubulaire rénale *O07.8*
- - - perforation, organes pelviens *O07.8*
- - - salpingite *O07.5*
- - - salpingo-oophorite *O07.5*
- - - syndrome de défibrination *O07.6*
- - - trouble, électrolytique *O07.8*
- fausse couche *O06.9*
- gémellaire *O06.9*
- grossesse gémellaire *O06.9*
- illégal *O05.9*
- imminent *O20.0*
- incomplet *O06.4*
- - avec complications *O06.3*
- indication
- - légale *O04.9*
- - psychiatrique *O04.9*
- induction
- - échouée, avec complications *O07.8*
- - - par
- - - - afibrinogénémie *O07.6*
- - - - choc *O07.8*
- - - - embolie *O07.7*
- - - - endométrite *O07.5*
- - - - hémorragie, amplifiée *O07.6*
- - - - infection *O07.5*
- - - - oligurie *O07.8*
- - - - oophorite *O07.5*
- - - - paramétrite *O07.5*

Avortement –*suite*
- induction –*suite*
- - échouée, avec complications –*suite*
- - - par –*suite*
- - - - pelvi-péritonite *O07.5*
- - médicale échouée *O07.4*
- infecté *O06.5*
- infectieux *O08.0*
- jumeaux *O06.9*
- légal *O04.9*
- lors de lacération, durée de traitement consécutif *O08.6*
- médical
- - échoué *O07.4*
- - - par
- - - - afibrinogénémie *O07.1*
- - - - arrêt, coeur *O07.3*
- - - - cautérisation, organes pelviens *O07.3*
- - - - choc septique, *O07.0*
- - - - - *O07.3*
- - - - coagulation, intravasculaire *O07.1*
- - - - collapsus, circulation *O07.3*
- - - - déchirure, organes pelviens *O07.3*
- - - - défaillance, rénale *O07.3*
- - - - embolie *O07.2*
- - - - endométrite *O07.0*
- - - - hémorragie *O07.1*
- - - - infection
- - - - - bassin, *O07.0*
- - - - - organes génitaux, *O07.0*
- - - - - voies urinaires, *O07.3*
- - - - nécrose, tubulaire rénale *O07.3*
- - - - oligurie *O07.3*
- - - - oophorite *O07.0*
- - - - paramétrite *O07.0*
- - - - pelvi-péritonite *O07.0*
- - - - perforation, organes pelviens *O07.3*
- - - - salpingite *O07.0*
- - - - salpingo-oophorite *O07.0*
- - - - sepsis *O07.0*
- - - - septicémie *O07.0*
- - - - syndrome de défibrination *O07.1*
- - - - trouble, électrolytique *O07.3*
- - induit *O04.9*
- menaçant *O20.0*
- - avec
- - - hémorragie *O20.0*
- - - lésion, foetus *P01.8*
- par savon *O05.8*
- phobie *F45.2*
- précoce *O06.9*
- psychose *F53.1*
- punissable *O05.9*
- récidive *O06.9*
- - avec complications *O06.8*
- répétition *O03.9*
- - tendance *N96*
- - - avec surveillance, sans grossesse *N96*
- retardé *O06.8*
- rétention *O02.1*
- savon *O05.8*
- septique *O08.0*
- - avec hémorragie *O08.8*
- spontané *O03.9*
- - avec hémorragie *O03.6*
- - complet *O03.9*

Avortement –*suite*
- spontané –*suite*
- - complet –*suite*
- - - avec complications *O03.8*
- - foetus *P01.8*
- - incomplet *O03.4*
- - - avec complications *O03.3*
- - infecté *O03.5*
- - menaçant *O20.0*
- - répétition *O03.9*
- - septique *O03.5*
- tardif *O06.9*
- temps *O06.9*
- - avec complications *O06.8*
- tendance, habituelle, lors de grossesse *O26.2*
- toxique *O08.0*
- trérapeutique *O04.9*
- tubaire *O00.1*

AVRT Tachycardie paroxystique atrial de réentrée (nodal) [AVNRT] [*I47.1*

Avulsion, paupière *S01.1*

Axe crânio-facial, malformation *Q75.0*

Axenfeld(-Rieger), anomalie d' *Q15.0*

Axenfeld, conjonctivite de (Morax-) *H10.2*

Axenfeld, dégénérescence, calcifiante *Q13.4*

Axenfeld-Schürenberg, syndrome *H49.0*

Axial(e), hernie hiatale *K44.9*

Axillaire
- adénite *I88.9*
- - aiguë *L04.2*
- - chronique *I88.1*
- - subaiguë *I88.1*
- carcinome, ganglions lymphatiques *C77.3*
- ganglion lymphatique
- - infection *L04.2*
- - tuberculose *A18.2*
- paralysie *G54.0*
- sein surnuméraire *Q83.1*
- tissu mammaire accessoire *Q83.1*

Axillaire, nerf, lésion *G56.8*

Axillaire, veine, thrombose *I82.8*

Axis
- arthrose *M47.81*
- fracture *S12.1*
- luxation *S13.11*

Axonal, amyotrophie péronière de type *G60.0*

Ayerza, maladie (syndrome) d' *I27.0*

Azoospermie *N46*
- oligo- *N46*

Azorubine
- allergie [E 122] *T78.4*
- hypersensibilité [E 122] *T78.4*

Azote résiduel, augmentation, extrarénal *R39.2*

Azote, rétention extrarénale *R39.2*

Azotémie *R79.8*

Azotémique, ostéodystrophie *N25.0*

Aztèque, oreille d' *Q17.3*

Azygos, continuation de la veine cave in *Q26.8*

Baader, syndrome de *L51.1*

Baastrup, syndrome de *M48.29*

Babésiose *B60.0*

Babinski-Fröhlich, syndrome de *E23.6*

Babinski-Nageotte, syndrome de *G93.5*

Bacillaire
- entérite, NCA *A03.9*
- pneumonie *J15.9*

Bacille de Welch-Fraenkel, infection NCA *A48.0*

Bacilles
- anthracis anthrax
- - infection - *voir* Anthrax ou Charbon *A22.9*
- - septicémie *A22.7*
- botulinus, intoxication *A05.1*
- cereus, intoxication alimentaire *A05.4*
- cholerae-suis, intoxication *A02.9*
- dans les urines *N39.0*
- Ducrey
- - balanite *A57+, N51.2**
- - infection *A57*
- gangrène clostridium perfringens *A48.0*
- gangrène gazeuse, bactériémie *A48.0*
- Gram négatif, infection NCA *A49.9*
- infection NCA *A49.9*

Bacillocoque, endémique [Brucellose] *A23.9*

Bacillose, actino- *A28.8*

Bacillurie *N39.0*

Backer-Rosenbach, érysipéloïde de *A26.9*

Bactéride *L40.3*
- Andrews, d' *L40.3*
- pustuleuse *L40.3*

Bactérie(s)
- autosensibilisation cutanée *L30.2*
- avec
- - pneumonie congénitale NCA *P23.6*
- - résistance multiple aux antibiotiques *U81!*
- dysenterie *A03.9*
- entérite *A04.9*
- Gram négatif
- - bactériémie *A49.9*
- - méningite *G00.9*
- Shigella sonnei, dysenterie à *A03.3*
- urine, dans *N39.0*

Bactériémie *A49.9*
- aiguë à méningocoques *A39.2*
- chronique à méningocoques *A39.3*
- gonococcique *A54.9*
- provoquée par
- - bactéries à Gram négatif *A49.9*
- - Clostridium *A48.0*
- - germes anaérobies *A49.9*
- - méningocoques *A39.4*

Bactérienne - *voir* Type de maladie

Bactéries acétiques, infection *A49.8*

Bactéries Coli, diarrhée *A04.4*

Bactéries intestinales, infection, sujet *Z20.0*

Bactéries, coques
- méningite gram négative NCA *G00.9*
- méningite gram positif NCA *G00.9*
- vaginite *N76.0*
- - chronique *N76.1*

Bactériologique
- avec confirmation
- - épituberculose *A15.7*
- - foyer de Ghon *A15.7*
- et histologique, non étudié du point de vue, tuberculose pulmonaire *A16.1*

Bactériurie *N39.0*
- asymptomatique *N39.0*
- - après accouchement *O86.2*
- - cours de la grossesse *O23.4*
- - dépistage *Z13.8*
- - puerpérale *O86.2*

Bacteroides
- fragilis, agent pathogène *B96.6!*
- infection NCA *A49.8*

Baelz, maladie de *K13.0*

Bagassose *J67.1*
- associée à une fibrose pulmonaire *J67.1*

Baies
- avariées, empoisonnement *T62.1*
- toxiques, empoisonnement *T62.1*

Baillement *R06.88*
- psychogène *F45.33*

Baisse
- activité cérébrale du nouveau-né *P91.4*
- pathologique, élémination de l'hydroxiproline, urine *R82.9*
- presssion artérielle *I95.9*
- - sur choc après blessure *T79.4*

Baker, kyste de *M71.2*
- rupture *M66.0*
- tuberculeux *A18.0+, M01.16**

Balancements mécaniques, exposition prof *Z57*

Balanite *N48.1*
- Candida *B37.4+, N51.2**
- candidomycetica *B37.4+, N51.2**
- Chlamydia *A56.0*
- circinée *N48.1*
- érosive *N48.1*
- gangréneuse *N48.1*
- gonococcique *A54.0+, N51.2**
- infectieuse *N48.1*
- mycotique *B37.4+, N51.2**
- non gonococcique *N48.1*
- phagédénique *N48.1*
- provoquée par
- - amibes *A06.8+, N51.2**
- - bacille de Ducrey *A57+, N51.2**
- - candida *B37.4+, N51.2**
- - champignon *B37.4+, N51.2**
- - herpès *A60.0+, N51.2**
- - Trichomonas *A59.0+, N51.2**
- psoriasique *N48.1*
- scléreuse *N48.0*
- - oblitérante *N48.0*
- sclérosante *N48.1*
- simple *N48.1*
- ulcéreuse *N48.1*
- vénérienne NCA *A64+, N51.2**
- vulgaire *N48.1*

Balano-posthite *N48.1*
- Candida *B37.4+, N51.2**
- chronique *N48.1*
- gonococcique *A54.0+, N51.2**
- psoriasique *N48.1*
- ulcéreuse spécifique *A63.8+, N51.2**

Balanorrhagie - *voir* Balanite

Balantidienne, dysenterie *A07.0*

Balantidiose *A07.0*

Balantidium coli
- anémie *A07.0*
- colite *A07.0*
- diarrhée *A07.0*
- dysenterie *A07.0*
- infection *A07.0*

Balkans, néphropathie endémique des *N15.0*

Ballantyne-Runge, syndrome de *P08.2*

Baller-Gerold, syndrome de [syndrome de *Q75.0*

Ballisme, syndrome *G25.8*

Ballonnement *R14*

Ballonnement, abdomen *R14*

Ballonnet, appareil à
- gastro-intestinal, avec complication *T85.9*
- - mécanique *T85.5*
- vasculaire, avec complication *T82.9*
- - mécanique *T82.5*

Baló, maladie de *G37.5*

BALT Lymphome tissu lymphoïde associé au bronche [lymphome *C88.4*

Bälz, syndrome de *K13.0*

Bande latérale
- déchirure, articulation genou *S83.40*
- entorse, genou *S83.40*
- fibulaire, genou
- - entorse *S83.41*
- - fissure
- - - complète *S83.43*
- - - partielle *S83.43*
- latérale, entorse, genou *S83.41*
- lésion, en cas de lésion
- - Ménisque interne *S83.7*
- - ménisque, externe *S83.7*
- médiale, entorse, genou *S83.42*
- tibiale
- - entorse, genou *S83.42*
- - genou, déchirure
- - - complète *S83.44*
- - - partielle *S83.44*
- ulnaire, rupture, osseuse, pouces *S63.4*

bandelettes
- dégénérescence, cornée *H18.4*
- kératopathie *H18.4*

Bandl, anneau de *O62.4*
- avec lésion, foetus/nouveau né *P03.6*

Bankart, lésion de *S43.01*

Bannayan-Riley-Ruvalcaba, syndrome de *Q89.8*

Bannayan-Zonana, syndrome de *Q89.8*

Bannister, maladie de *T78.3*
- héréditaire *D84.1*

Banti, syndrome de (maladie de) *K76.6*

Barbe
- dermatophytose *B35.0*
- infection fongique *B35.0*
- mycose *B35.0*
- poils incarnés *L73.1*
- teigne *B35.0*

Barber-Say, syndrome de *L40.3*

Barbital, dépendance *F13.2*

Barbituriques
- abus *F13.1*
- allergie *T88.7*
- dépendance *F13.2*
- hypersensibilité *T88.7*

Barbituriques, dépendance *F13.2*

Barcoo, maladie de *L98.4*

Bardet-Biedl-Laurence-Moon, syndrome de *Q87.8*

Bärensprung, maladie de [érythrasma] *L08.1*

Barlow, maladie de *E54*

Barlow, syndrome de *I34.1*

Barmah, Forêt de, maladie *A92.8*

Barodontalgie *T70.2*

Barosinusite *J34.8*

Barotraumatisme *T70.2*
- avec
- - odontalgie *T70.2*
- - sinusite *T70.1*
- oreille *T70.0*
- sinus frontal *T70.1*
- sinus maxillaire *T70.1*
- sinus paranasal *T70.1*

Barraquer-Simons, maladie de *E88.1*

Barre prostatique
- col vésical *N40*
- - fibreuse *N40*
- hypertrophique, vessie *N40*

Barré, syndrome de
- Guillain- *G61.0*
- Landry-Guillain- *G61.0*

Barré-Liéou, syndrome de *M53.0*

Barré-Masson, syndrome de *D18.01*

Barres latérales, prostate
- congestion *N42.1*
- induration *N42.8*

Barres moyennes, prostate
- congestion *N42.1*
- induration *N42.8*

Barres, prostate, adénome *N40*

Barrett, carcinome sur oesophage de *C15.9*

Barrett, oesophage de *K22.7*

Barrett, syndrome de *K22.7*

Barrett, ulcère de l'œsophage de *K22.1*

Bársony-Polgár, syndrome de *M85.35*

Barthel, indice de
- 0-15 points *U50.50*
- 100 points *U50.00*
- 20-35 points *U50.40*
- 40-55 points *U50.30*
- 60-75 points *U50.20*
- 80-95 points *U50.10*
- élargi
- - 0-15 points *U51.20*
- - 20-65 points *U51.10*
- - 70-90 points *U51.00*

Barthlin, pseudo-abcès de la glande de *N75.1*

Bartholin, adénite de la glande de *N75.8*

Bartholin, glande de
- abcès *N75.1*

Bartholin, glande de *–suite*
- abcès *–suite*
- - puerpéral *O86.1*
- fistule *N82.9*
- gonorrhée
- - avec abcès *A54.1*
- - chronique *A54.0*
- - purulente *A54.0*
- hypertrophie *N75.8*
- infection *N75.8*
- inflammation *N75.8*

Bartholin, kyste de la glande de *N75.0*

Bartholin, tumeur de la glande de *D39.7*

Bartholinite *N75.8*
- gonococcique *A54.1*
- - aiguë *A54.1*
- - chronique *A54.1*
- purulente *N75.8*

Barton, fracture de *S52.52*

Bartonellose *A44.9*
- cutanéo-muqueuse *A44.1*
- généralisée *A44.0*

Bartter, syndrome de *E26.8*
- Schwartz- *E22.2*

Baryum, péritonite provoquée par *T81.6*

Bas
- hémoglobine NCA *D64.9*
- métabolisme fondamental *R94.8*
- température, dermatite *L30.8*
- tension artérielle *I95.9*
- - sans
- - - diagnostic d'hypotonie, résultat secondaire *R03.1*
- - - trouble de la régulation hypotonique *R03.1*
- - - - constatation d'une élévation de la tension artérielle *R03.1*
- - suite à un choc, une blessure *T79.4*
- valeur tension artérielle Riva Rucci *R03.1*

Base du cerveau, anévrisme *I67.10*

Base du crâne
- fibrome *D21.0*
- fissure *S02.1*
- fracture *S02.1*
- - multiple *S02.1*
- fracture en anneau *S02.1*
- fracture tranverse *S02.1*

Basedow, maladie de *E05.0*

Basedow, syndrome de *E05.0*
- avec exophtalmie *E05.0+, H06.2**

Basidiobolus, infection *B46.8*

basilaire
-
- anévrisme *I67.10*
- apoplexie *I64*
- arachnoïdite *G03.9*
- fibrome *D21.0*
- hémorragie *I61.0*
- impression *Q75.8*
- insuffisance artérielle *G45.09*
- méningite *G03.9*
- - tuberculeuse *A17.0+, G01**
- migraine *G43.1*
- pachyméningite *G03.9*
- pleurésie *R09.1*

basilaire *–suite*
- pneumonie *J18.1*
- tête de l'artère, anévrisme *I67.10*
- thrombose *I65.1*
- - phlébite thrombophlébite de : veine *I80.80*
- tronc Anévrisme dissection de l ' artère *I72.5*
- trouble vasculaire *G45.09*

Basocellulaire
- acanthome *D23.9*
- - visage *D23.3*
- adénocarcinome *C08.9*
- adénome *D11.9*
- carcinome *C44.9*
- - joue *C44.3*
- - lèvre (buccale) *C44.0*
- - maxillaire *C44.3*
- - peau *C44.9*
- - pigmenté *C44.9*
- épithélioma *C44.9*
- hyperfonctionnement, col de l'utérus *N87.9*
- - psychogène *F45.34*
- papillome *D23.9*
- - pigmenté *D23.9*
- tumeur *C44.9*
- - *D48.5*

Basocellulaire et spinocellulaire, carci *C44.9*

Basocytose *D75.8*

Baso-éosinophile
- adénome *D36.9*
- carcinome *C75.1*

Basolatéral, infarctus du myocarde
- aigu, transmural *I21.2*
- récidive *I22.8*

Basophile
- adénocarcinome *C75.1*
- adénome *D35.2*
- carcinome *C75.1*
- hyperpituitarisme *E24.9*
- leucémie *C94.30*
- - rémission complète *C94.31*

Basophiles, prolifération *D75.8*

Basophilie *D75.8*

Basophilisme *E24.0*
- adrénocortical *E24.0*
- hypophysaire *E24.0*
- hypophysaire (Cushing) *E24.0*
- thymique *E24.0*

Bassen-Kornzweig, syndrome de *E78.6*

Bassen-Kornzweig, Syndrome, abétalipopro *E78.6*

Bassin
- abcès *L02.2*
- - péritonéal, chez l'homme *K65.0*
- adhérence *K66.0*
- - post-infectieux
- - - chez la femme *N73.6*
- - - chez l'homme *K66.0*
- - post-natal, post-infectieux *N73.6*
- - tuberculose *A18.1+, N74.1**
- androïde *Q74.2*
- - avec disproportion, foeto-pelvienne *O33.0*
- - - avec

Bassin –*suite*
- androïde –*suite*
- - avec disproportion, foeto-pelvienne –*suite*
- - - avec –*suite*
- - - - lésion, foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - - obstacle, accouchement *O65.3*
- anomalie NCA *Q74.2*
- anomalie, lors de la grossesse *O33.0*
- anthropoïde *Q74.2*
- - avec disproportion foeto-pelvienne *O33.0*
- asymétrie, avec disproportion foeto-pelvienne *O33.0*
- blessure *S39.9*
- - abdomen *S34.8*
- - ancienne *N81.8*
- - complication, accouchement *O70.1*
- - musculaire *S39.0*
- - superficielle *S30.90*
- - vaisseau sanguin, séquelles *T91.8*
- brûlure *T21.09*
- carcinome *C76.3*
- chondrosarcome *C41.4*
- contracture
- - acquise *M95.5*
- - avec disproportion, foeto-pelvienne, avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.1*
- - obstacle, accouchement, avec disproportion, foeto-pelvienne *O65.1*
- contusion *S30.0*
- corrosion *T21.43*
- difformité
- - acquise *M95.5*
- - avec
- - - césarienne NCA *O33.0*
- - - disproportion, foeto-pelvienne *O33.0*
- - - - avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.1*
- - comme séquelle, rachitisme *E64.3*
- - congénitale *Q74.2*
- - lors de la grossesse *O33.0*
- - obstacle, accouchement *O65.0*
- dislocation *S33.3*
- - séquelles *T91.8*
- distorsion NCA *S33.7*
- distorsion, jonction pubienne NCA *S33.7*
- douleurs *R10.2*
- - aiguës *R10.2*
- - chroniques *R10.2*
- dysplasie *Q74.2*
- écrasement *S38.1*
- endométriose *N80.3*
- entonnoir
- - acquis *M95.5*
- - avec disproportion, foeto-pelvienne *O33.3*
- - - avec
- - - - lésion, foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.1*
- - - - obstacle, accouchement *O65.3*
- - - - obstruction, naissance *O65.3*
- - congénital *Q74.2*
- et
- - colonne vertébrale, fracture, multiple *S32.7*
- - extrémité

Bassin –*suite*
- et –*suite*
- - extrémité –*suite*
- - - inférieure
- - - - blessure, superficielle *T00.8*
- - - - plaie, ouverte, plusieurs *T01.8*
- - - supérieure
- - - - blessure, superficielle *T00.8*
- - - - plaie, ouverte, plusieurs *T01.8*
- - thorax
- - - écrasement, multiple *T04.1*
- - - extrémité
- - - - inférieure, fracture, multiple *T02.70*
- - - - supérieure, fracture, multiple *T02.70*
- - - fracture, multiple *T02.10*
- - - plaie, ouverte, plusieurs *T01.1*
- et foetus, disproportion, due à difformité foetale *O33.7*
- étroit
- - acquis *M95.5*
- - avec disproportion, foeto-pelvienne *O33.1*
- étroit, acquis *M95.5*
- étroit, avec disproportion, foeto-pelvienne *O33.1*
- féminin
- - abcès *N73.9*
- - - tuberculeux *A18.1+, N74.1**
- - adhérence *N73.6*
- - adhérence douloureuse *N73.6*
- - adhérence, péritonéale *N73.6*
- - examen de routine *Z01.4*
- - infection *N73.9*
- - inflammation *N73.9*
- - - par
- - - - Chlamydia *A56.1+, N74.4**
- - - - gonocoques *A54.2+, N74.3**
- - - syphilitique tardive *A52.7+, N74.2**
- - - tissu conjonctif *N73.2*
- - - - chronique *N73.1*
- - kyste *N94.8*
- - - lors de
- - - - grossesse *O34.8*
- - - - l'accouchement *O34.8*
- - maladie NCA *N94.9*
- - - inflammatoire *N73.9*
- - - péritoine NCA *N94.8*
- - péritonite *N73.5*
- - - aiguë *N73.3*
- - suppuration *N73.9*
- - tissu conjonctif, inflammation, aiguë *N73.0*
- - tuberculose *A18.1+, N74.1**
- fracture *S32.83*
- - complexe *S32.89*
- - ouverte *S32.83, S31.87!*
- - séquelles *T91.2*
- fracture de cisaillement verticale *S32.89*
- fracture de l'aile iliaque *S32.89*
- fracture par compression *S32.89*
- gelure *T35.3*
- - avec nécrose des tissus *T34.3*
- - superficielle *T33.3*
- gonorrhée *A54.2*
- hématome
- - lors de l'accouchement *O71.7*
- - traumatique

Bassin –*suite*
- hématome –*suite*
- - traumatique –*suite*
- - - organes pelviens *S37.9*
- - - superficiel *S30.0*
- horizontal acquis *M95.5*
- hypoplasie *Q74.2*
- inclinaison
- - acquise *M95.5*
- - lors du raccourcissement, jambe *M21.79*
- infantile, acquis *M95.5*
- infection
- - lors d'un avortement, médical, échoué *O07.0*
- - par les gonocoques *A54.2*
- inflammation, chez la femme *N73.9*
- kyste, avec obstacle, accouchement *O65.5*
- luxation, ouverte *S33.3*
- maladie variqueuse *I86.2*
- maladie, inflammatoire
- - aiguë *N73.0*
- - après
- - - avortement *O08.0*
- - - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - - grossesse molaire *O08.0*
- - chronique *N73.1*
- - lors de la grossesse *O23.5*
- - mère, avec lésion, foetus/nouveau-né *P00.8*
- masculin
- - péritonite, aiguë *K65.0*
- - suppuration *K65.0*
- masse
- - diffuse *R19.0*
- - généralisée *R19.0*
- métastase, ganglion lymphatique *C77.5*
- Naegele
- - acquis *M95.5*
- - avec disproportion, foeto-pelvienne *O33.0*
- - congénital *Q74.2*
- nodule *R19.0*
- ostéochondrite, juvénile *M91.0*
- ostéomalacie *M83.85*
- Otto-Chroback [Protrusio acetabuli] *M24.7*
- parties molles, tumeur maligne *C49.5*
- parties, amputation, traumatique NCA *S38.3*
- péritonite
- - après avortement *O08.0*
- - chronique, avec adhérence, chez la femme *N73.6*
- - couches *O85*
- petit
- - abcès *K65.0*
- - adénocarcinome *C76.3*
- phlébite
- - couches *O87.1*
- - post-natale *O87.1*
- phlegmon *L03.3*
- pithécoïde *Q74.2*
- - avec disproportion, foeto-pelvienne *O33.0*
- - - avec
- - - - affection du foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - - entrave lors de la naissance *O65.0*

Bassin *–suite*
- pithécoïde *–suite*
- - avec disproportion, foeto-pelvienne *–suite*
- - - avec *–suite*
- - - - lésion, foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - - obstacle, accouchement *O65.0*
- plaie ouverte *S31.0*
- plat
- - acquis *M95.5*
- - avec disproportion, foeto-pelvienne *O33.0*
- - - avec obstacle, accouchement *O65.0*
- - congénital *Q74.2*
- position foetale acquise *M95.5*
- position profonde acquise *M95.5*
- rachitique, comme séquelles *E64.3*
- région abdominale et région lombosacrale, blessure, superficielle, multiple *S30.7*
- région lombosacrée et abdomen
- - lésion, multiple *S39.7*
- - plaie, ouverte, multiple *S31.7*
- résultat, sonographie, anormal *R93.5*
- rétrécissement
- - mère, avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.1*
- - suivi de la mère *O33.1*
- rétrécissement général
- - avec césarienne *O33.1*
- - obstacle, accouchement *O65.1*
- - suivi, femme enceinte *O33.1*
- rétrécissement longitudinal
- - acquis *M95.5*
- - congénital *Q74.2*
- rétrécissement transversal *Q74.2*
- Robert *Q74.2*
- - avec disproportion, foeto-pelvienne *O33.0*
- scoliose, avec disproportion foeto-pelvienne, avec
- - lésion, foetus/nouveau-né *P03.1*
- - obstacle, accouchement *O65.0*
- septicémie, en couches *O85*
- thrombophlébite, en couches *O87.1*
- tissu conjonctif
- - inflammation *N73.2*
- - - aiguë *N73.0*
- - - chronique *N73.1*
- - sarcome *C49.5*
- tuberculose *A18.0+, M90.05**
- tumeur *D48.7*
- - avec
- - - césarienne NCA *O34.8*
- - - lésion, foetus/nouveau-né
- - - - lors de l'accouchement *P03.8*
- - - - pendant la grossesse *P03.8*
- - - obstacle, accouchement NCA *O65.5*
- - lors de la grossesse *O34.8*
- ulcère de décubitus *L89.93*
- vaisseau sanguin, lésion *S35.9*
- varices *I86.2*

Bassinet calices rénaux
- dilatation *N28.8*
- ectasie *N28.8*

Bassinet rénal
- calcul *N20.0*
- - encapsulé *N20.0*
- - solitaire *N20.0*

Bassinet rénal *–suite*
- calcul ramifié *N20.0*
- calcul uratique *N20.0*
- carcinome à cellules transitionnelles *C65*
- cellules transitionnelles, papillome *D41.1*
- déficience *Q63.8*
- - obstructive *Q62.3*
- dilatation *N28.8*
- diverticule, avec calcul *N20.0*
- diverticulite, avec calcul *N20.0*
- diverticulose, avec calcul *N20.0*
- double *Q63.8*
- - avec urétère, double *Q62.5*
- ectasie *N28.8*
- ectopie *Q63.2*
- et urètre, infection, kystique *N28.8*
- Fibrolipome *D17.7*
- fistule *N28.8*
- hémorragie *N28.8*
- infection, aiguë *N10*
- infiltration *C79.0*
- inflammation *N12*
- - gangréneuse *N12*
- - kystique *N12*
- - purulente *N12*
- kyste *N13.3*
- lésion, en cas de déchirure, rein *S37.02*
- leucoplasie *N28.8*
- lipomatose *E88.2*
- malacoplasie *N28.8*
- maladie, fonctionnelle *N28.9*
- malformation, de naissance *Q63.9*
- métaplasie *N28.8*
- métastatase *C79.0*
- mofification, kystique *N13.3*
- néphrolithiase *N20.0*
- obstruction, de naissance *Q62.3*
- papillome *D41.1*
- - bénin *D30.1*
- - malin *C65*
- Papillome à cellules transitionnelles *D41.1*
- polype *D30.1*
- rupture *S37.02*
- scission *Q63.8*
- surnuméraire, avec urètre, double *Q62.5*
- trouble de l'écoulement *N13.0*
- tumeur *D41.1*
- - malin *C65*

Bathophobie *F40.2*

Battements cardiaque prématuré SAI *I49.4*

Batten-Mayou, syndrome de *E75.4*

Battey, maladie de *A31.0*

Baume du Pérou
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Baumgarten-Cruveilhier, maladie (syndrom *K74.6*

Bauxite
- fibrose *J63.1*
- - avec tuberculose, organes respiratoires *J65*
- - poumon *J63.1*
- pneumoconiose *J63.1*

BAV bloc atrio ventriculaire, type Wenck

BAV bloc atrio ventriculaire, type Wenck *–suite*
- type
- - I *I44.1*
- - II *I44.1*

BCO [bronchite chronique obstructive] *J44.89*

Bébé
- bleu, syndrome *Q24.9*
- bronzé *P83.8*
- collodion *Q80.2*
- hypotrophique, suivi, femme enceinte *O36.5*
- insuffisance staturo-pondérale par rapport à l'âge gestationnel *P05.1*
- petit pour l'âge gestationnel *P05.1*

Bec de lièvre *Q37.1*
- complet *Q36.9*
- incomplet *Q36.9*
- labio-palatine *Q37.1*
- lèvres *Q37.1*

Bechterew, syndrome de *M45.09*

Beckwith-Wiedemann, syndrome de *Q87.3*

Bégaiement *F98.5*
- développement *F98.5*
- discret *F98.5*
- psychogène *F98.5*

Behçet, maladie de, avec ulcère, vulve *M35.2+, N77.8**

Behçet, syndrome de, avec arthrite *M35.2*

Behçet-Aphthen, syndrome de *M35.2*

Behr, syndrome de *H35.5*

Beigel, maladie de *B36.8*

Bell, maladie (manie) de *F30.8*

Bell, paralysie de *G51.0*

Bell, spasme de *G51.3*

Bell, syndrome (paralysie) de *G51.0*

Bence-Jones, albuminurie de, NCA *R80*

Bence-Jones, protéinurie, NCA *R80*

Benedikt, syndrome de *I67.9+, G46.3**

Bénigne - *voir* Type de maladie

bénin Waldenström Purpura hypergammaglobulinémique *D89.0*

Bennett, fracture de [base du premier mé *S62.21*

Bensaude (Launois-), adénolipomatose *E88.8*

Benson, maladie de *H43.2*

Benzalkonium, chlorure
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Benzamide
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Benzédrine, dépendance *F15.2*

Benzène, effet toxique *T52.1*

Benzène, homologues, effet toxique *T52.2*

Benzimidazole, dérivés de
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Benzodiazépine
- abus *F13.1*
- allergie *T88.7*

Benzodiazépine –*suite*
- dépendance *F13.2*
- hypersensibilité *T88.7*

Benzoïque, acide
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Benzosulfonique, acide
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Benzylique, alcool
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Berger, paresthésie de *R20.2*

Bergmeister, papille de *Q14.0*

Béribéri *E51.1*
- avec
- - dégénérescence cérébrale *E51.1+, G32.8**
- - névrite *E51.1+, G63.4**
- - polyencéphalomyélite *E51.2+, G32.8**
- - polyneuropathie *E51.1+, G63.4**
- dans l'avitaminose B *E51.1*
- humide *E51.1*
- - avec
- - - atteinte du système cardio-vasculaire *E51.1+, I98.8**
- - - polyneuropathie *E51.1+, G63.4**
- sec *E51.1*

Berlin, oedème de *S05.8*
- après contusion rétinienne *S05.1*
- traumatique *S05.8*

Bernard-Horner, syndrome de Claude *G90.2*

Bernard-Soulier, thrombopathie *D69.1*

Bernhard Roth, maladie de *G57.1*

Bernhardt(-Roth), maladie (paresthésie) *G57.1*

Bernheim, syndrome de *I50.01*

Bernuth, pseudohémophilie de *D68.0*

Bernuth, syndrome de *D68.0*

Bertiella, infection par *B71.8*

Bérylliose *J63.2*
- avec
- - granulome, foie *J63.2+, K77.8**
- - tuberculose, organes respiratoires *J65*
- cas de fibrose des poumons *J63.2*
- poumons *J63.2*

Béryllium
- granulomatose *J63.2*
- pneumoconiose *J63.2*
- pneumonie *J63.2*
- - *J68.0*
- poumons, poussière *J63.2*

Besnier Tennession, syndrome de *D86.9*

Besnier, syndrome de *L20.0*

Besnier-Boeck-Schaumann, syndrome de *D86.9*

Besnier-Tennesson, syndrome de *D86.9*

Besoin de sommeil accru, pathologique *G47.1*

Besoin d'uriner *R35*
- douloureux *R30.0*
- fréquent *R35*
- impérieux *R32*
- impétueux *R32*

Best, dégénérescence maculaire, vitellif *H35.5*

Best, syndrome de *H35.5*

bêta
- gamma delta Contient des cellules de type alpha - *C86.1*
- lipoprotéinémie A - *E78.6*

Bêta, cellules
- Adénome *D13.7*
- hyperplasie *E16.1*
- - Langerhans, îlots de *E16.1*
- tumeur *D13.7*
- - maligne, pancréas *C25.4*

Bêta-adrénorécepteurs, antagonistes
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Bêtabloquant
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Bêta-glucoronidiase, carence *E76.2*

Béta-hydrostéroïde déshydrogénase, caren *E25.08*

Bétaïne, dépendance *F13.2*

Bêta-lactamases, inhibiteurs des
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Bêta-lactame, antibiotique
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Bêtalipoprotéinémie *E78.2*
- flottante *E78.2*
- large *E78.2*

Bêtalipoprotéinémie flottante (large) *E78.2*

Bêtalipoprotéinémie large (flottante) *E78.2*

Bêta-thalassémie *D56.1*
- drépanocytose *D57.2*
- grave *D56.1*

Betathalassémie de falciformation *D57.2*

Beurmann, maladie de *B42.1*

Bézoard *T18.9*
- estomac *T18.2*
- intestinale *T18.3*
- tricho- *T18.9*
- trichophyto *T18.9*

Bezold, maladie de *H70.0*

Biceps
- tendinite *M75.2*
- ténosynovite *M75.2*

Bichromate
- dermatite toxique *L24.5*
- dermite de contact, allergique *L23.0*

Bifidité
- col de l'utérus, acquise *N88.8*
- Gland du pénis *Q55.6*
- petites lèvres, congénitale *Q52.7*
- utérus, externe, orifice double, frenulum *Q51.8*
- veineuse *I87.8*

Bifurcation aortique, embolie *I74.0*

Bigéminisme *R00.8*

Bilan de santé *Z00.0*
- médecine du travail *Z10*
- petit enfant *Z00.1*

Bilan électrolytique
- altération *E87.8*
- - cas de
- - - échec d'une tentative d'avortement médical *O07.3*
- - - hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation *O21.1*
- - complication en cas d'échec d'une interruption médicale de grossesse *O07.8*
- anormal *E87.8*
- déséquilibre, perturbé *E87.8*
- et bilan hydrique, anomalie chez le nouveau-né *P74.4*

Bilan protéino énergétique, déficience *E46*

Bilatéral, *voir* type de maladie
- athétose, congénitale *G80.3*
- coxarthrose, dysplasique *M16.2*
- embolie rénale, massive *N28.0*
- empyème *J86.9*
- gonarthrose, secondaire *M17.4*
- hernie
- - fémorale *K41.2*
- - - avec
- - - - gangrène *K41.1*
- - - - occlusion, sans gangrène *K41.0*
- - inguinale *K40.20*
- - - avec
- - - - gangrène *K40.10*
- - - - occlusion, sans gangrène *K40.00*
- - - récidivante *K40.21*
- - - - avec
- - - - - occlusion, sans gangrène, *K40.01*
- - - - - gangrène, *K40.11*
- - - - sans occlusion *K40.21*
- - - sans occlusion *K40.20*
- hydrothorax *J94.8*
- nécrose
- - cortex rénal *N17.1*
- - rénales *N28.0*
- obstruction, trompe de Fallope *N97.1*
- occlusion
- - artère
- - - cérébrale *I66.4*
- - - précérébrale *I65.3*
- - artères
- - - carotide *I65.3*
- - - vertébrale *I65.3*
- paralysie, nerf moteur oculaire commun, externe *H49.0*
- pleuro-pneumonie *J18.8*
- pneumonie *J18.9*
- pyélonéphrite, aiguË *N10*
- rétrécissement
- - artères
- - - carotide *I65.3*
- - - vertébrale *I65.3*
- rhizarthrose
- - post-traumatique *M18.2*
- - primaire *M18.0*
- - secondaire *M18.4*
- sténose
- - artère précérébrale *I65.3*
- - supravésicale *N13.5*
- syndrome d'adénopathie hilaire (syndrome de Löfgren) *D86.8*
- syndrome, artère, précérébrale *G45.29*

Bile épaisse, syndrome *P59.1*
- avec ictère, néonatal *P59.1*

Bile épaisse, syndrome *–suite*
- nouveau-né *P59.1*

Bilharziose *B65.9*
- avec affection glomérulaire *B65.0+, N08.0**

Biliaire
- cirrhose *K74.5*
- - primitive *K74.3*
- - secondaire *K74.4*
- Insuffisance anastomoses suture après opération de la vésicule et des voie *K91.81*
- kyste *K83.5*
- obstruction *K83.1*
- pancréatite
- - aiguës *K85.10*
- - - avec complication organique *K85.11*
- - Tête du pancréas *K85.10*
- péritonite *K65.8*
- septicémie *A41.9*
- Vomissements, cause inconnue *R11*

Biliburine, hépatose, en cas d'ictère no *E80.6*

Bilieux
- Dyspepsie *K30*
- fièvre, avec hémoglobinurie *B50.8*
- péritonite *K65.8*
- vomissements, cause inconnue *R11*

Bilirubine
- encéphalopathie due à *P57.9*
- lésion cérébrale *P57.9*
- trouble(s) du métabolisme *E80.7*

Bilirubinémie, familiale, non hémolytiqu *E80.4*

Bilirubinurie *R82.2*

Binoculaire
- diplopie *H53.2*
- Mouvement oculaire, anomalie *H51.9*

Biphasique
- méningo-encéphalite *A84.1*
- mésothéliome
- - Epiploon, bénin *D19.1*
- - malin *C45.9*
- - mésentérique, bénin *D19.1*
- - mésocôlon, bénin *D19.1*
- - péritoine, bénin *D19.1*
- - plèvre, bénin *D19.0*
- sarcome, synovial *C49.9*

Biphosphonate
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Bipolaire
- psychose *F31.9*
- - affective *F31.9*
- troubles *F31.9*
- - affectifs *F31.9*
- - - actuellement en rémission *F31.7*
- - - avec épisode
- - - - dépressif
- - - - - grave,
- - - - - léger, *F31.3*
- - - - - moyen, *F31.3*
- - - - - grave, sans symptôme psychotique, *F31.4*
- - - - - grave, avec symptôme psychotique, *F31.5*
- - - - hypomaniaque *F31.0*

Bipolaire *–suite*
- troubles *–suite*
- - affectifs *–suite*
- - - avec épisode *–suite*
- - - - maniaque
- - - - - sans symptôme psychotique, *F31.1*
- - - - - avec symptôme psychotique, *F31.2*
- - - - mixte *F31.6*
- - organique *F06.3*

Bisalbuminémie *E88.0*

Bismuth, intoxication *T65.8*

Bitemporale
- Hémianopsie *H53.4*

Biventriculaire
- décompensation
- - cardiaque *I51.9*
- - myocarde *I51.9*
- hypertrophie cardiaque *I51.7*
- Insuffisance cardiaque *I50.01*
- insuffisance de
- - coeur *I50.01*
- - myocarde *I50.01*
- insuffisance, cardiaque *I50.01*

BK-Mole syndrome *D22.9*

blanc
- Hernie ligne *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- Piedra alba Piedra *B36.2*

Blanc, blanche
- dégénérescence, sans pression *H35.4*
- globule
- - anormaux NCA *R72*
- - maladie NCA *D72.9*
- naevus de la muqueuses buccales *Q38.6*
- substance, affection *R90.8*
- taches (lichen scléreux et atrophique) *L90.0*
- taches, lésion dentaire *K02.0*

Blanche Asphyxie *P21.0*

Bland-White-Garland, syndrome de (anomal *Q24.5*

Bland-White-Garland, syndrome de [anomal *Q24.5*

blastes type I AREB I] , Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*

blastique
- cellules NK Lymphome *C86.4*
- cours leucémie myéloïde chronique [LMC] , Crise *C94.8!*

Blastique, leucémie aiguë *C95.00*
- rémission complète *C95.01*

Blastique, leucémie, granulocytaire *C92.00*

Blastome *C71.9*
- Adamantino-, adamanto- *D16.5*
- adéno-amélo- *D16.5*
- - mandibule *D16.5*
- - maxillaire *D16.42*
- amélo- *D16.5*
- - malin *C41.1*
- angio- *D48.1*
- astro- *C71.9*
- cémento- *D16.5*

Blastome *–suite*
- chondro- *D16.9*
- chorio- *C58*
- épendymo- *C71.9*
- esthésioneuro- *C30.0*
- germino- *C83.2*
- - diffus *C83.2*
- hémangio- *D48.1*
- leiomyo- *D21.9*
- lemmo- *D36.1*
- lipo- *D17.9*
- médullo-, desmoplasique *C71.6*
- médullomyo- *C71.6*
- mélanoamélo- *D16.9*
- myo- *D21.9*
- - cellules granuleuses *D21.9*
- myxo- *D21.9*
- néphro- *C64*
- - embryonnaire *C64*
- nésidio-, bénin *D13.7*
- neuro- *C74.9*
- neurofibro- *D36.1*
- odonto- *D16.5*
- odonto-amélo- *D16.5*
- oligodendro- *C71.9*
- orchio- *C62.9*
- ostéo- *D16.9*
- pancréato- *C25.9*
- phéochromo- *C74.1*
- pinéalo- *C75.3*
- pinéo- *C75.3*
- pneumo- *C34.9*
- pulmonaire *C34.9*
- rétino- *C69.2*
- - avec amas cellulaires en rosette *C69.2*
- - différencié *C69.2*
- - indifférencié *C69.2*
- - sans amas cellulaires en rosette *C69.2*
- rhabdomyo- *D21.9*
- sympathico-, sympatho- *C74.9*
- testicules *C62.9*
- thymo- *D15.0*

Blastomycose *B40.9*
- avec méningo-encéphalite NCA *B40.8+, G05.2**
- chéloïdienne *B48.0*
- dermatidis, infection *B40.9*
- disséminée *B40.7*
- européenne *B45.9*
- généralisée *B40.7*
- infection *B40.9*
- nord-américaine *B40.9*
- peau *B40.3+, L99.8**
- pulmonaire *B40.2+, J99.8**
- - aiguë *B40.0+, J99.8**
- - chronique *B40.1+, J99.8**
- - primitive *B40.0+, J99.8**

Blennorragie *A54.9*
- aiguë *A54.9*
- chez le nouveau-né *A54.3+, H13.1**
- chronique *A54.9*
- gonococcique *A54.0+, N51.2**
- inclusions *A74.0+, H13.1**
- infection oculaire *A54.3+, H13.1**
- rhinite gonococcique *J31.0*

Blennorrhée ophtalmique *A54.3+, H13.1**

Bléomycine, toxicité pulmonaire *T45.1*

Blépharadénite *H01.0*

Blépharite *H01.0*
- allergique *H01.0*
- angulaire *H01.0*
- bactérienne *H01.0*
- chronique *H01.0*
- ciliaire *H01.0*
- due à
- - herpès *B00.5+, H03.1**
- - rosacée *L71.8+, H03.8**
- - zona (herpès zoster) *B02.3+, H03.1**
- granulomateuse *H01.0*
- marginale *H01.0*
- non ulcéreuse *H01.0*
- palpébrale *H01.0*
- séborrhéique *H01.0*
- squameuse *H01.0*
- ulcéreuse *H01.0*

Blépharochalasis *H02.3*
- congénitale *Q10.0*

Blépharo-conjonctivite *H10.5*
- allergique *H10.5*
- chronique *H10.5*
- - purulente *H10.5*
- due à des staphylocoques, avec infiltration, cornée, immunogène *H16.2*
- purulente *H10.5*
- rosacée *L71.8+, H13.2**

Blépharophimosis *H02.5*
- congénital *Q10.3*
- paupière *H02.5*

Blépharophimosis, syndrome *Q10.3*

Blépharoptose *H02.4*
- congénitale *Q10.0*

Blépharospasme *G24.5*
- primaire *G24.5*
- secondaire *G24.5*

Blépharosténose *H02.5*

Blessig-Ivanoff, kyste de *H33.1*

Blessure crânio-cérébral
- avec démence *T90.9+, F02.8**
- fermé, majeure *S06.20, S01.83!*
- - avec compression cérébrale, hémorragie, hypertension intra-crânienne *S06.21, S01.83!*
- fermée, majeure *S06.20, S01.83!*
- ouvert *S06.20, S01.83!*

Blessure de scalpel, du nouveau-né, due *P15.8*

Blessure par morsure *T14.1*
- chien *T14.1*

Blessure perforante *T14.1*

Bleu(e)
- asphyxie *P21.1*
- naevus *D22.9*
- naevus, de Jadassohn *D22.9*
- nouveau-né *Q24.9*
- péri-oculaire *S00.1*
- sclérotique *Q13.5*

Blindage tumoral
- hypogastre *R19.0*
- intestin grêle *R19.0*

Bloc
- arborisations *I45.5*
- ariculoventriculaire *I44.3*
- atrio ventriculaire complet *I44.2*
- atrioventriculaire *I44.3*

Bloc *–suite*
- atrioventriculaire *–suite*
- - complet *I44.2*
- - degré 1 *I44.0*
- - degré 2 *I44.1*
- - - type
- - - - I *I44.1*
- - - - II *I44.1*
- - degré 3 *I44.2*
- auriculoventriculaire *I44.3*
- bifasciculaire *I45.2*
- branche *I45.5*
- branche droit *I45.1*
- - complet *I45.1*
- - incomplet *I45.1*
- branche gauche *I44.7*
- - complet *I44.7*
- - d'un côté *I44.6*
- - Hémibloc *I44.6*
- - incomplet *I44.6*
- - intermittent *I44.7*
- branche sans précision *I45.4*
- cardiaque *I45.9*
- - complet *I44.2*
- - congénital *Q24.6*
- - degré 1 *I44.0*
- - degré 2 *I44.1*
- - - type
- - - - I *I44.1*
- - - - II *I44.1*
- - degré 3 *I44.2*
- fasciculaire *I44.6*
- - antérieur *I44.4*
- - antérieur gauche *I44.4*
- - droit *I45.0*
- - gauche *I44.6*
- - postérieur *I44.5*
- - postérieur gauche *I44.5*
- fasciculaire droit *I45.0*
- hémi- *I44.6*
- - antérieur gauche *I44.4*
- - gauche NCA *I44.6*
- - postérieur gauche *I44.5*
- intraventriculaire, non spécifique *I45.4*
- Möbitz *I44.1*
- - type
- - - I *I44.1*
- - - II *I44.1*
- myocardique *I45.9*
- nodal *I45.5*
- sino-atrial *I45.5*
- sino-auriculaire *I45.5*
- trifasciculaire *I45.3*
- Trou de Magendie, avec hydrocéphalie, acquise *G91.1*
- Wenckebach
- - type
- - - I *I44.1*
- - - II *I44.1*
- Wilson *I45.1*

Blocage
- à thérapie chiropractique *M99.99*
- alvéolocapillaire *J84.1*
- anus *Q42.3*
- - avec fistule *Q42.2*
- articulation *M24.89*
- - acromio-claviculaire *M99.87*
- - atlanto-occipital *M99.80*

Blocage *–suite*
- articulation *–suite*
- - costo-vertébrale *M99.88*
- - osseux *M24.69*
- - sacro-iliaque *M99.84*
- - - cas de syndrome lombaire, aigu *M54.16*
- - tête *M99.80*
- - tibio-fibulaire *M99.86*
- - traitement par chiropratique *M99.89*
- Atlas *M99.80*
- avec
- - dorsalgie *M54.99*
- - douleurs cervico-brachiale *M53.1*
- - douleurs cervico-céphalique *M53.0*
- - hernie *K46.0*
- - - avec gangrène *K46.1*
- - - diaphragmatique *K44.0*
- - - fémorale
- - - - bilatérale, sans grangrène *K41.0*
- - - - unilatérale *K41.3*
- - - - - avec gangrène, *K41.4*
- - - inguinale *K40.30*
- - - - bilatérale
- - - - - sans gangrène, *K40.00*
- - - - - récurrent, sans gangrène, *K40.01*
- - - - récurrent *K40.31*
- - - - unilatérale *K40.30*
- - - paroi abdominale *K43.0*
- - - umbilicale *K42.0*
- - hernie hiatale *K44.0*
- - lombalgie, aiguë *M54.5*
- avec insuffisance cardiaque
- - chez le nouveau-né *P29.0*
- - hypertensive *I11.00*
- bile *K83.1*
- biliaire *K83.1*
- bronchique *J98.0*
- Calcul biliaire *K80.20*
- - canal
- - - cholédoque *K80.50*
- - - cystique *K80.20*
- - - hépatique *K80.50*
- - voie biliaire *K80.50*
- cardiaque *I50.01*
- cardiopulmonaire *I50.19*
- carpe *M99.87*
- cas de
- - cervical, syndrome *M54.2*
- - colonne cervicale, hernie discale, syndrome *M54.13*
- - élongation, nuque *S13.4*
- - lombosciatique *M54.4*
- - myogélose, épaule, nuque, muscles *M62.81*
- - raideur anormale, cervicale *M53.82*
- - spondylarthrose, lombosacrée *M47.27*
- cas de calcul, uretère, haut *N20.1*
- cas de nystagmus *H55*
- - congénital *H55*
- cerveau *G93.88*
- cervical *M99.81*
- cervico-thoracique *M99.81*
- colonne vertébrale *M99.89*
- - multiple *M99.89*
- côtes *M99.88*
- - première *M99.88*
- dent *K01.1*

Blocage *–suite*
- disque intervertébral, cervicodorsal *M99.81*
- en flexion
- - L5/S1 *M99.83*
- - rachis dorsal *M99.82*
- - rachis lombaire *M99.83*
- épaule, affectés, foetus/nouveaux nés *P03.1*
- extrémité (articulaire) *M99.89*
- fibula, tête *M99.86*
- flexion, région dorsale *M99.82*
- foie *K76.1*
- - passive, chronique *K76.1*
- Foramen de Magendie
- - acquis *G91.1*
- - congénital *Q03.1*
- - - avec
- - - - hydrocéphalie *Q03.1*
- - - - spina bifida *Q05.4*
- genou *M23.89*
- gros intestin *K56.4*
- - *Q42.9*
- hépatique *K76.1*
- intercostal *M99.88*
- intestin *K56.4*
- - *Q41.9*
- - par calcul biliaire *K56.3*
- intestin grêle *Q41.9*
- intracrânien *I67.88*
- iris, post-opératoire *H59.8*
- L4/L5, avec pseudo-spondylolisthésis *M43.16*
- L5/S1 *M99.83*
- labyrinthe *H83.8*
- lait, en couche *O92.70*
- Lochial- *O90.8*
- lombaire *M99.83*
- lombo-sacrée *M99.83*
- Lymphe *I89.8*
- matière fécale *K56.4*
- méconium *E84.1+, P75**
- nasal *J34.8*
- oesophage *Q39.0*
- - avec fistule, oesotrachéale *Q39.1*
- os du tarse *M99.86*
- pancréas *K86.8*
- par l'épaule *O66.0*
- plèvre *J94.8*
- poignet *M99.87*
- poumons *J81*
- - aigu *J81*
- - cas d'insuffisance cardiaque *I50.19*
- - hypostatique *J81*
- - passive *J81*
- prostate, chronique *N42.1*
- rachis, L5/S1 *M99.83*
- rectum *Q42.1*
- - avec fistule *Q42.0*
- région cervicale *M99.81*
- - aigue *M99.81*
- - avec cervicobrachialgie *M53.1*
- - et région thoracique *M99.81*
- Région thoracique *M99.82*
- - aigu *M99.82*
- - et région cervicale *M99.81*
- rein *N13.3*
- - *N19*
- - suite à

Blocage *–suite*
- rein *–suite*
- - suite à *–suite*
- - - acte médical *N99.0*
- - - avortement *O08.4*
- - - cystoscopie *N99.0*
- - - grossesse extra-utérine *O08.4*
- - - grossesse môlaire *O08.4*
- reins *N13.3*
- rétine *H35.8*
- retour veineux
- - supérieur *I87.1*
- - - et inférieur *I87.1*
- rotation, région cervicale *M99.81*
- sacro-iliaque, articulation *M99.84*
- salive *K11.7*
- tarse, supérieur *M99.86*
- tête (région occipito-cervicale) *M99.80*
- tête du radius *M99.87*
- - cas d'épicondylite *M77.1*
- thoracique *M99.82*
- thoracique, en cas de syndrome cervical, aigu *M54.2*
- trompe de Fallope *N97.1*
- tronc cérébral *G93.5*
- tubaire *N97.1*
- uretère *N13.5*
- uretère, congénitale *Q62.1*
- varices *I83.9*
- vasculaire NCA *I99*
- vasculaire, cérébral *I67.88*
- veine *I87.8*
- - rétine *H34.8*
- - ulcéreuses *I83.0*
- - - avec inflammation *I83.2*
- veine hépatique *I82.0*
- veine NCA *I82.9*
- veine porte *I81*
- - *K76.1*
- veineux, lors de la grossesse *O22.9*
- vertèbre
- - acquis NCA *M43.29*
- - après intervention chirurgicale *Z98.1*
- - congénital *Q76.4*
- vessie *N13.9*
- voie biliaire, congénitale *Q44.2*

Bloch-Sulzberger, syndrome de *Q82.3*

Bloom Machacek Torre, syndrome de *Q82.8*

Bloquant, neuromusculaire, intoxication *T48.1*

Blount Barber, maladie de *M92.5*

Blount, maladie de *M92.5*

Boire
- alcool, excessif NCA *F10.1*
- constant *F10.2*
- par habitude *F10.2*

Bois vert, fracture en *T14.20*
- avant-bras *S52.9*
- radius *S52.30*

Boîte crânienne
- néoplasme malin *C41.01*
- viscérocrâne, os, néoplasme malin *C41.01*

Bonnevie-Ullrich, syndrome de *Q87.1*

Bord de la paupière
- croûtes *H01.8*

Bord de la paupière *–suite*
- eczéma *H01.1*
- exanthème, allergique *H01.1*
- folliculite *H01.0*
- irritation *H02.9*
- kyste *H02.8*
- kyste de rétention *H02.8*
- ulcère *H01.0*

Bord du bassin, fracture *S32.89*

Bord pupillaire
- atrophie *H21.2*
- dégénérescence *H21.2*
- kyste *H21.3*

Bordetella
- Coqueluche bronchiseptica *A37.8*
- infection *A37.9*
- infection, parapertussis *A37.1*
- infection, pertussis *A37.0*
- Trachéobronchite, bronchiseptica *A37.8*

Börjeson-Forssmann-Lehmann, syndrome de *Q87.8*

Bornholm, maladie de *B33.0*

Borrelia
- Infection buccale *A69.1*
- Infection par - burgdorferi *A69.2*
- Infection par B.vincenti (bacille fusiforme de Vincent) *A69.1*

Borrélies, érythème chronique migrateur *A69.2*

Borréliose
- fièvre récurrente *A68.9*
- - par morsure de tique *A68.1*
- Lyme *A69.2*
- - par morsure de tique *A69.2*
- - stade
- - - I *A69.2*
- - - II *A69.2*
- - - III *A69.2*
- neurologique *A69.2+, G05.0**

Bosselure
- prostate *N42.8*

Bothriocéphalose *B70.0*
- Dibothriocephalus latum *B70.0*
- larve, à Dibothriocephalus (latum) *B70.1*

Bothriocephalus
- anémie due au *B70.0+, D63.8**
- latus
- - infestation *B70.0*
- - larves, infestation *B70.1*

Botulisme *A05.1*

Bouc émissaire, enfant *Z62*

Bouche
- abcès *K12.29*
- angulus infectiosus *K13.0*
- anomalie *Q38.6*
- brûlure *A69.0*
- candidose *B37.0*
- candidose, en cas de maladie, due au VIH *B20, B37.0*
- carcinome *C06.9*
- cicatrice *K13.7*
- coin de
- - chéilite *K13.0*
- - fissure *K13.0*
- - perlèche *K13.0*

Bouche –*suite*
- coin de –*suite*
- - rhagade *K13.0*
- corps étranger *T18.0*
- corrosion *T28.5*
- déformation, acquise *K13.7*
- douleurs *K13.7*
- érythroplasie *K13.2*
- et gorge
- - brûlure *T28.0*
- - corrosion *T28.5*
- fistule *K12.28*
- gangrène *A69.0*
- glande sébacée, aberration, congénitale *Q38.6*
- granulome, purulent *K13.4*
- infection *K13.7*
- inflammation *K12.1*
- kyste *K09.9*
- - lympho-épithélial *K09.8*
- kyste dermoïde *K09.8*
- kyste épidermoïde *K09.8*
- lésion *S09.9*
- leuco-oedème *K13.2*
- leucoplasie *K13.2*
- maladie, parasitaire NCA *B37.0*
- malformation, congénitale *Q38.6*
- mycose *B37.0*
- - due à une Candida *B37.0*
- néoplasie *D37.0*
- noma *A69.0*
- phlegmon *K12.20*
- plaie
- - ouverte *S01.50*
- - superficielle *S00.50*
- saignement *K13.7*
- syphilis tardive *A52.7+, K93.8**
- syphilis, secondaire *A51.3*
- tissu mou, kyste lymphoépithélial *K09.8*
- trouble de kératinisation *K13.2*
- tuberculose *A18.8+, K93.8**
- tumeur *D37.0*
- ulcère *K13.7*
- vésicule *K12.1*

Bouchon
- allaitement *O92.70*
- méconium dans mucoviscidose [Au cours de fibrose kystique] : occlusion intestinal due à un *E84.1†, P75**
- uretère *N13.4*

Bouchon de cérumen *H61.2*

Bouffée de chaleur *N95.1*

Bouffée délirante *F23.0*
- avec symptôme, schizophrénie *F23.1*
- sans symptôme, schizophrénie *F23.0*

Bouffées d'air *F45.31*
- psychogène *F45.31*

Bouffées de chaleur *N95.1*
- chaleur *N95.1*
- ménopause *N95.1*

Boulimie *F50.2*
- atypique *F50.3*
- avec poids normal *F50.3*
- bulimia nervosa *F50.2*
- psychogène *F50.4*
- syndrome d'hypersomnie et *G47.8*

Bourdonnements d'oreilles *H93.1*

Bourgeonnante, utérus, myomatose *D25.9*

Bourrelet adipeux *E65*
- genou, hypertrophie *M79.46*
- localisé *E65*
- rétropatellaire, décrit *M79.46*

Bourrelet cicatriciel *L91.0*

Bourse
- abcès *M71.09*
- affection *M71.99*
- calcification NCA *M71.49*
- gonorrhée *A54.4+, M73.09**
- pharyngée
- - abcès *J39.1*
- - kyste *J39.2*
- synoviale, kyste NCA *M71.39*
- syphilis tertiaire *A52.7+, M73.19**
- tuberculose *A18.0+, M73.89**

Bourse séreuse
- abcès *M71.09*
- anomalie *Q79.9*
- inflammation *M71.99*
- - gonorrhéique *A54.4+, M73.09**
- - région de l'épaule *M75.5*
- kyste *M71.39*

Bout du nez, entaille, congénitale *Q30.2*

Bouton de fièvre *B00.1*

Bouton purulent *L08.9*

Brachial
- neuropathie radiculaire *M54.14*
- névrite *M54.12*

Brachialgie *M79.69*
- avec syndrome HWS, chronique *M54.2*
- cervico *M53.1*
- - aiguë *M53.1*
- - avec blocage *M53.1*
- - - NCB *M53.1*
- - chronique *M53.1*
- cervico-céphalo *M53.1*
- chiro *R29.8*

Brachy-arythmie *I49.8*

Brachycéphalie *Q75.0*

Brachydactylie *Q73.8*
- doigt *Q71.8*
- orteil *Q72.8*

Brachygénie *K07.0*

Brachygnathie *K07.0*

Brachyœsophage *K22.8*

Brachyolmie *Q76.4*

Bradyarythmie *I49.8*
- absolue *I48.19*

Bradyarythmie absolue *I48.19*

Bradycardie *O68.0*
- *R00.1*
- foetale *P20.9*
- - lors de l'accouchement *O68.0*
- - suivi, femme enceinte *O36.3*
- intra-utérine *P20.9*
- par syncope *R00.1*
- sinoatriale *R00.1*
- sinusale *R00.1*
- vagale *R00.1*

Bradycardie sinusale *R00.1*

Bradypnée *R06.88*

Branche
- fracture *S02.64*

Branche –*suite*
- inférieure, os pubis, fracture *S32.5*
- mandibulaire, fracture *S02.64*
- supérieure, os pubis, fracture *S32.5*

Branchiogène
- carcinome *C10.4*
- fente *Q18.2*
- fistule *Q18.0*
- kyste *Q18.0*
- - infectieux *Q18.0*
- - néoplasie, maligne *C10.4*
- malformation *Q18.2*
- sinus *Q18.0*
- Vestiges branchiaux *Q18.0*

Bras
-
- abcès *L02.4*
- absence
- - acquise *Z89.2*
- - bilatérale, acquise *Z89.3*
- - congénitale *Q71.9*
- agénésie totale *Q71.0*
- amputation, traumatique *T11.6*
- ankylose *M24.69*
- anomalie *Q74.0*
- anthrax *L02.4*
- apophysite interne du coude *M77.0*
- atteinte dans
- - brûlure, main *T29.0*
- - corrosion, main *T29.4*
- avant-bras Gelure superficiel du *T33.4*
- brûlure *T22.02*
- - degré
- - - 2a *T22.22*
- - - 2b *T22.82*
- - deuxième degré *T22.22*
- - premier degré *T22.12*
- - troisième degré *T22.32*
- carcinome *C76.4*
- chondrosarcome *C40.0*
- contusion *T11.05*
- corrosion *T22.42*
- - avec atteinte du poignet et de la main *T29.4*
- - degré
- - - 2a *T22.62*
- - - 2b *T22.92*
- - deuxième degré *T22.62*
- - premier degré *T22.52*
- - troisième degré *T22.72*
- court chromosome 5 Syndrome de délétion du *D46.6*
- Décubitus *L89.91*
- déformation
- - acquise *M21.99*
- - congénitale *Q68.8*
- déformation NCA *Q68.8*
- deux
- - amputation, traumatique *T05.2*
- - paralysie *G83.0*
- diplégie *G83.0*
- douleurs *M79.69*
- écrasement *T04.2*
- embolie *I74.2*
- - artérielle *I74.2*
- entorse *T11.2*
- et jambe
- - absence

Bras –*suite*
- et jambe –*suite*
- - absence –*suite*
- - - acquise *Z89.8*
- - - bilatérale *Z89.8*
- - amputation traumatique, toute combinaison (tout niveau) *T05.6*
- fourmillements *R20.2*
- fracture *S42.3*
- - fermée *T10.0*
- - ouverte *T10.1*
- - séquelles *T92.1*
- furoncle *L02.4*
- gelure
- - avec nécrose des tissus *T34.4*
- gonflement *M79.82*
- hypoplasie, congénitale *Q71.9*
- lésion d'un vaisseau sanguin *T11.4*
- lésion traumatique *T11.9*
- - vaisseaux sanguins, multiples *T06.3*
- lymphœdème *I89.0*
- Maladie
- - toxique foie avec : maladie veino - occlusion du foie [syndrome de Stuart - *K71.8*
- - veino occlusion du foie [syndrome de Stuart - *K76.5*
- mélanome in situ *D03.6*
- mélanome malin *C43.6*
- monoplégie *G83.2*
- muscle(s), lésion traumatique *T11.5*
- naevus *D22.6*
- nerf
- - lésion traumatique *T11.3*
- - périphérique, lésion *G56.9*
- ostéochondrite juvénile *M92.3*
- paralysie *G83.2*
- - hystérique *F44.4*
- - psychogène *F45.8*
- - transitoire *R29.8*
- - - traumatique NCA *T11.3*
- parties molles, lésions traumatiques étendues *T11.1*
- - impliquant les tendons *T11.8*
- phlegmon *L03.10*
- procidence, complication de l'accouchement *O32.2*
- prolapsus
- - avec césarienne *O32.2*
- - foetus *P03.1*
- - foetus, avec prise en charge de la mère *O32.2*
- - obstruction, naissance *O64.4*
- prothèse, ajustement *Z44.0*
- pseudo-paralysie *R29.8*
- Raccourcissement
- - acquis *M21.79*
- - congénital *Q71.8*
- rudimentaire *Q71.9*
- septicémie, avec lymphangite *L03.10*

Bras chromosomique
- duplication complète *Q92.2*
- duplication partielle (incomplète) *Q92.3*

Bras court
- chromosome
- - 4, délétion *Q93.3*
- - 5, délétion *Q93.4*

Bras, perte des deux *Z89.3*

Brau

Brau –*suite*
- allergie (E 155) *T78.4*
- hypersensibilité (E 155) *T78.4*
- Induration pulmonaire primaire *E83.1+, J99.8**

Bredouillement *F98.6*

Breloque, dermite de *L56.2*

Bride *K66.0*
- avec occlusion intestinale *K56.5*
- fibreuse *K66.0*
- intestin grêle *K66.0*

Bride de tissu
- adhérente *K66.0*
- coeur
- - anormale *Q24.8*
- - congénitale *Q24.8*
- col de l'utérus *N88.1*
- congénitale, affectant la vésicule biliaire *Q44.1*
- épiploon
- - anormale *Q43.3*
- - congénitale *Q43.3*
- intestinale
- - adhérente *K66.0*
- - obstructive *K56.5*
- périappendiculaire, congénitale *Q43.3*
- péritonéale, adhérente *K66.0*
- péritonéale, obstructive *K56.5*
- utérine *N73.6*
- vaginale *N89.5*

Brides amniotiques *Q79.8*

Brides cutanées, anomalie *Q82.8*

Bright, mal (maladie) de *N05.9*
- artérioscléreux *I12.90*

Brill, maladie de, provoquée par
- poux *A75.1*
- puces *A75.2*

Brill-Symmers, maladie de *C82.9*

Brill-Zinsser, maladie de *A75.1*

Broca, aphasie de *R47.0*

Brock, syndrome de *J98.1*

Brocq, dermite polymorphe de *L13.0*

Brocq, maladie de *L41.9*

Brocq-Dühring, maladie de *L13.0*

Brodie, abcès de *M86.89*

Bromhidrose *L75.0*

Bromisme chronique *F13.2*

Bromisme, dépendance *F13.2*

Bromure d'éthyle, dépendance *F13.2*

Bromure, dépendance NCA *F13.2*

bronche
- lymphome BALT Lymphome des tissu lymphoïde associé au *C88.4*
- poumon Insuffisance anastomoses et suture après opération de la trachée, des *J95.82*

Bronchectasie *J47*
- cas d'obstruction des voies respiratoires *J47*
- congénitale *Q33.4*
- cylindrique *J47*
- diffuse *J47*
- fusiforme *J47*
- localisée *J47*
- postinfectieuse *J47*

Bronchectasie –*suite*
- sacciforme *J47*
- tuberculeuse NCA *A16.2*
- - bactériologie et histologie non
- - - confirmées *A16.0*
- - - étudiées *A16.1*
- - confirmée par l'examen microscopique de l'expectoration et la mise en culture *A15.0*

Bronches
- abcès *J98.0*
- absence, congénitale *Q32.4*
- adénome *D38.1*
- affection NCA *J98.0*
- agénésie *Q32.4*
- allergie *J45.0*
- anomalie *Q32.4*
- aplasie *Q32.4*
- aspiration, mucus *T17.5*
- atrésie *Q32.4*
- calcification *J98.0*
- carcinoïde *C34.9*
- carcinome *C34.9*
- - épidermoïde *C34.9*
- - - petites cellules *C34.9*
- carcinome in situ *D02.2*
- cécité *Q32.4*
- compression *J98.0*
- constriction *J98.0*
- contracture *J98.0*
- corps étranger, asphyxie *T17.5*
- déformation
- - acquise NCA *J98.0*
- - congénitale *Q32.4*
- dilatation *J47*
- diverticule
- - acquise *J98.0*
- - congénitale *Q32.4*
- diverticulite, acquise *J98.0*
- diverticulose, acquise *J98.0*
- éctasie *J47*
- érosion *J98.0*
- et poumons
- - néoformation, maligne, à plusieurs localisations contiguës *C34.8*
- - tumeur maligne *C34.9*
- fistule *J86.0*
- - tuberculeuse, primaire *A16.7*
- - - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.7*
- formation de poches *Q32.4*
- hémorragie *R04.8*
- hypoplasie *Q32.4*
- infection *J40*
- - aigue *J20.9*
- infection à spirochètes, Castellani *A69.8*
- lacération *J98.0*
- lésion *S27.4*
- mucus *T17.8*
- mucus, asphyxie *T17.5*
- nécrose *J98.0*
- néoformation, maligne, dans les
- - antécédents familiaux *Z80.1*
- - antécédents personnels *Z85.1*
- obstruction *J98.0*
- ossification *J98.0*
- paralysie *J98.0*
- perforation *J98.0*
- périchondrite *J98.0*

Bronches –*suite*
- polype *J98.0*
- position, anomalie, congénitale *Q32.4*
- principales
- - corps étranger *T17.5*
- - occlusion *J98.0*
- - saignement *R04.8*
- rupture *J98.0*
- stase *J98.0*
- sténose *J98.0*
- - congénitale *Q32.3*
- - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- syndrome obstructif chronique *J44.89*
- syphilis tardive *A52.7+, J99.8**
- tuberculose *A16.4*
- tumeur *D38.1*
- tumeur mixte *D38.1*
- ulcère *J98.0*

Bronchiolaire
- adénocarcinome *C34.9*
- carcinome *C34.9*

Bronchiolectasie *J47*

Bronchioles
- aspiration, mucus *T17.8*
- corps étranger *T17.8*
- - asphyxie *T17.8*
- dilatation *J47*

Bronchiolite *J21.9*
- aiguë *J21.9*
- - avec bronchospasme *J21.9*
- - due au virus respiratoire syncytial [VRS] *J21.0*
- associée à
- - candidose *B37.1*
- - grippe *J11.1*
- avec
- - bronchospasme *J21.9*
- - obstruction *J21.9*
- chronique *J44.89*
- chronique due à agent chimique *J68.4*
- fibreuse oblitérante *J44.89*
- inclusions cytomégaliques, à *J20.8*
- infectieuse *J21.9*
- oblitérante
- - chronique *J44.89*
- - - par inhalation de substances chimiques *J68.4*
- - par inhalation de substances chimiques *J68.4*
- - subaiguë par inhalation de substances chimiques *J68.4*
- oblitérante, avec pneumonie organisée [BOOP] *J84.0*
- provoquée par
- - Aspergillus *B44.1+, J99.8**
- - Candida *B37.1*
- - cytomégalovirus *J20.8*
- purulente *J21.9*
- subaiguë *J21.9*

Bronchiolo-alvéolaire
- adénocarcinome *C34.9*
- carcinome *C34.9*

Bronchique
- adénome *D38.1*
- calcul *J98.0*
- carcinome *C34.9*
- - lobe inférieur *C34.3*
- - lobe supérieur *C34.1*

Bronchique –*suite*
- carcinome –*suite*
- - non à petites cellules *C34.9*
- - petites cellules *C34.9*
- catarrhe *J40*
- - chronique *J42*
- corps étranger *T17.5*
- croup *J20.9*
- fistule *J86.0*
- - tuberculeuse *A16.4*
- grippe *J11.1*
- hémorragie *R04.8*
- - dans la tuberculose *A16.4*
- - tuberculeuse, confirmée par la bactériologie ou l'histologie *A15.5*
- hyperréactivité *R94.2*
- hypersécrétion *R09.3*
- inflammation *J40*
- kyste *J98.4*
- - congénital *Q33.0*
- métastase *C78.0*
- néoplasme *D38.1*
- sarcome *C34.9*
- sténose *J98.0*
- syphilis *A52.7+, J99.8**
- système
- - hémorragie *R04.8*
- - hyperréactivité *R94.2*
- - - allergique *J45.0*
- toux *R05*
- tuberculose, confirmée par la bactériologie ou l'histologie *A15.5*

Bronchite *J42*
- Castellani *A69.8*
- chronique du fumeur *J42*
- chronique spastique *J44.89*
- emphysémateuse *J44.89*
- - avec exacerbation infectieuse *J44.19*
- - bulleuse *J44.89*
- - chronique *J44.89*
- - - avec
- - - - exacerbation aiguë *J44.19*
- - - - infection aiguë des voies respiratoires inférieures *J44.09*
- - exacerbée *J44.19*
- - obstructive *J44.89*
- - - avec exacerbation *J44.19*
- - obstructive chronique *J44.89*
- - spastique *J44.89*
- rhinosinusienne *J40*
- - purulente *J41.1*
- sécrétante *J40*

Broncho-alvéolaire
- adénocarcinome *C34.9*
- tumeur, intravasculaire *D38.1*

Broncho-alvéolite *J18.0*

Broncho-cutanée, fistule *J86.0*
- tuberculeuse *A16.4*

Broncholithiase *J98.0*

Bronchomalacie *J98.0*
- congénitale *Q32.2*

Broncho-médiastinale, fistule *J86.0*
- tuberculeuse *A16.4*

Broncho-oesophagienne, fistule *J86.0*

Broncho-pharyngite *J40*
- aiguë *J20.9*
- - provoquée par

Broncho-pharyngite –*suite*
- aiguë –*suite*
- - provoquée par –*suite*
- - - agent chimique *J68.0*
- - - Haemophilus influenzae *J20.1*
- - - irradiation *J70.0*
- - - Mycoplasma pneumoniae *J20.0*
- - - pneumocoques *J20.2*
- - - rhinovirus *J20.6*
- - - streptocoques *J20.2*
- - - virus Coxsackie *J20.3*
- - - virus ECHO *J20.7*
- - - virus paragrippal *J20.4*
- - - virus respiratoire syncytial [VRS] *J20.5*
- allergique *J45.0*
- alvéolaire *J21.9*
- associée à
- - candidose *B37.88+, J99.8**
- - dyspnée, asthmatique *J45.9*
- - grippe *J11.1*
- - maladie pulmonaire obstructive chronique *J44.89*
- - trachéite
- - - aiguë *J20.9*
- - - chronique *J42*
- - - subaiguë *J20.9*
- asthmatiforme *J45.9*
- asthmatique *J45.9*
- - chronique *J44.89*
- - - avec
- - - - exacerbation aiguë *J44.19*
- - - - infection aiguë, voies respiratoires inférieures *J44.09*
- - endogène *J45.9*
- - obstructive *J45.9*
- avec
- - asthme bronchique *J45.9*
- - bronchospasme aigu *J20.9*
- - emphysème asthmatique *J44.89*
- - emphysème chez la personne âgée *J44.89*
- - emphysème pulmonaire *J44.89*
- - évolution lente non chronique *J40*
- - obstruction *J44.89*
- - trachéite *J40*
- avec rhinosinusite *J40*
- - purulente *J41.1*
- avec rhinotrachéite *J40*
- avec sinusite *J40*
- - aiguë *J20.9*
- - chez
- - - adolescent *J40*
- - - adulte *J40*
- - - enfant *J20.9*
- - chronique *J42*
- - fébrile *J20.9*
- - purulente *J41.1*
- bactérienne *J40*
- capillaire *J21.9*
- Castellani, de *A69.8*
- catarrhale *J40*
- - aiguë *J20.9*
- - chez l'enfant de moins de 15 ans *J20.9*
- - chronique *J41.0*
- chez
- - adolescent *J40*
- - adulte *J40*

Broncho-pharyngite –*suite*
- chez –*suite*
- - enfant *J20.9*
- chimique
- - aiguë *J68.0*
- - chronique *J68.4*
- - subaiguë *J68.0*
- chronique *J42*
- - associée à dyspnée, asthmatique *J44.89*
- - dépistage *Z13.8*
- - provoquée par
- - - agent chimique *J68.4*
- - - fumées *J68.4*
- - - gaz *J68.4*
- - - irradiation *J70.1*
- - - vapeurs *J68.4*
- chronique des fumeurs *J42*
- chronique sénile *J42*
- chronique simple *J41.0*
- coquelucheuse *J20.9*
- croupeuse *J20.9*
- diffuse *J40*
- emphysémateuse *J44.89*
- - avec exacerbation infectieuse *J44.19*
- - bulleuse *J44.89*
- - chronique *J44.89*
- - - avec
- - - - exacerbation aiguë *J44.19*
- - - - infection aiguë des voies respiratoires inférieures *J44.09*
- - exacerbée *J44.19*
- - obstructive *J44.89*
- - - avec exacerbation *J44.19*
- - obstructive chronique *J44.89*
- - spastique *J44.89*
- emphysémateuse, dans pneumopathie obstructive *J44.89*
- endo- *J40*
- exacerbée *J40*
- exsudative *J20.9*
- fébrile *J20.9*
- - aiguë *J20.9*
- fétide *J41.1*
- fibrineuse *J40*
- - aiguë *J20.9*
- - subaiguë *J20.9*
- hypostatique *J40*
- infectieuse *J40*
- laryngo-trachéo *J40*
- - aiguë *J20.9*
- - chez
- - - adolescent *J40*
- - - adulte *J40*
- - - enfant *J20.9*
- - chronique *J42*
- membraneuse *J40*
- - aiguë *J20.9*
- - subaiguë *J20.9*
- mixte simple et mucopurulente *J41.8*
- mucopurulente
- - aiguë *J20.9*
- - chronique *J41.1*
- - subaiguë *J20.9*
- mucopurulente chronique *J41.1*
- obstructive *J44.89*
- - aiguë *J20.9*
- - chez l'enfant *J20.9*
- - exacerbée *J44.19*

Broncho-pharyngite –*suite*
- obstructive –*suite*
- - récidivante *J44.89*
- obstructive chronique *J44.89*
- - avec
- - - exacerbation aiguë *J44.19*
- - - infection aiguë des voies respiratoires inférieures *J44.09*
- péri- *J42*
- - tuberculeuse *A16.4*
- pharyngolaryngotrachéo- *J40*
- plastique *J20.9*
- provoquée par
- - agent chimique *J68.0*
- - Aspergillus *B44.1+, J99.8**
- - Candida *B37.1*
- - cytomégalovirus *J20.8*
- - fumées *J68.0*
- - lésion traumatique, prolongée *J40*
- - spirochètes NCA *A69.8+, J99.8**
- - virus *J40*
- pseudomembraneuse *J20.9*
- purulente *J41.1*
- - aiguë *J20.9*
- - chronique *J41.1*
- - obstructive *J44.89*
- - subaiguë *J20.9*
- putride chronique *J41.1*
- récidivante *J42*
- rhino- *J40*
- - aiguë *J20.9*
- - purulente *J41.1*
- secondaire *J40*
- septique
- - aiguë *J20.9*
- - subaiguë *J20.9*
- spastique *J40*
- - aiguë *J20.9*
- - chez
- - - adolescent *J40*
- - - adulte *J40*
- - - enfant *J20.9*
- - surinfectée *J40*
- spastique chronique *J44.89*
- stase *J42*
- subaiguë *J20.9*
- - avec bronchospasme *J20.9*
- - provoquée par irradiation *J70.0*
- trachéo- *J40*
- - à
- - - enfants de moins de 15 ans *J20.9*
- - - inclusions cytomégaliques *J20.8*
- - - patients de 15 ans ou plus *J40*
- - aiguë *J20.9*
- - catarrhale *J40*
- - fébrile aiguë *J20.9*
- - obstructive chronique, avec
- - - exacerbation *J44.19*
- - - infection aiguë, voies respiratoires inférieures *J44.09*
- - provoquée par
- - - Bordetella bronchiseptica *A37.8*
- - - cytomégalovirus *J20.8*
- - - Francisella tularensis *A21.8*
- - purulente *J41.1*
- - subaiguë *J20.9*
- tuberculeuse *A16.4*
- - associée à trachéite NCA *A16.4*

Broncho-pharyngite –*suite*
- tuberculeuse –*suite*
- - caséeuse *A16.4*
- - démontrée par la bactériologie ou l'histologie *A15.5*
- virale
- - aiguë NCA *J20.8*
- - subaiguë NCA *J20.8*

Broncho-pleurale
- fistule *J86.0*
- - tuberculeuse *A16.4*
- tuberculose *A16.5*

Broncho-pleuro-médiastinale, fistule *J86.0*

Bronchopleuropneumonie *J18.0*

Bronchopleuropneumopathie *J18.0*

Bronchopneumonie *J18.0*
- allergique *J82*
- bactérienne *J15.9*
- chronique *J84.1*
- due à/à
- - candida *B37.1+, J17.2**
- - grippe [Influenza] *J11.0*
- - - sans virus identifié *J11.0*
- - - virus Influenza identifié, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.0*
- hémorragique *J18.0*
- hypostatique *J18.2*
- interstitielle *J84.9*
- laryngo-trachéo *J18.0*
- lobe inférieur *J18.0*
- lobe supérieur *J18.0*
- par/à
- - agent d'Eaton *J15.7*
- - aspergillose *B44.1+, J17.2**
- - aspiration *J69.0*
- - bacille de Friedländer *J15.0*
- - candida *B37.1+, J17.2**
- - champignon *B49+, J17.2**
- - Escherichia coli *J15.5*
- - fumée *J68.0*
- - fumées *J68.0*
- - gaz *J68.0*
- - Haemophilus influenzae *J14*
- - inhalation *J69.0*
- - - essence *J69.1*
- - - huile *J69.1*
- - klebsiella pneumoniae *J15.0*
- - lipide, endogène *J84.8*
- - lipidique *J69.1*
- - Mycoplasma pneumoniae *J15.7*
- - organisme similaire à la pleuropneumonie (PPLO) *J15.7*
- - pneumocoques *J13*
- - proteus *J15.6*
- - pseudomonas *J15.1*
- - staphylocoque doré *J15.2*
- - staphylocoques *J15.2*
- - Streptococcus pneumoniae *J13*
- - streptocoques NCA *J15.4*
- - streptocoques, groupe B *J15.3*
- - virus *J12.9*
- pleuro *J18.0*
- purulente *J18.0*
- spasmodique *J18.0*
- trachéo *J18.0*
- tuberculeuse *A16.2*

Broncho-pulmonaire

Broncho-pulmonaire –*suite*

- affection *J98.4*
- aspergillose *B44.1*
- - *B44.1+, J99.8**
- - allergique *B44.1+, J99.8**
- candidose *B37.88+, J99.8**
- décompensation *J98.8*
- dysplasie *P27.1*
- - d'origine périnatale *P27.1*
- fistule *J86.0*
- infection *J22*
- moniliase *B37.1+, J99.8**
- mycose NCA *B49+, J99.8**

Bronchorragie *R04.8*
- tuberculeuse *A16.4*
- - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.5*

Bronchorrhée *J98.0*
- infectieuse, chronique *J42*

Bronchorrhée chronique *J41.0*

Bronchospasme *J98.0*
- avec
- - bronchiolite *J21.9*
- - - aigue *J21.9*
- - bronchite
- - - aigue *J20.9*
- - - subaiguë *J20.9*

Bronchoviscérale, fistule *J86.0*

Bronzée, maladie *E27.1*
- tuberculeuse *A18.7+, E35.1**

Brooke, syndrome de *D23.9*

Broviac® Cathéter de *Z95.81*

Broviak® Cathéter de *Z45.20*

Brown, phénomène de *H50.6*

Brown, syndrome de *H50.6*
- Horton Magath *M31.6*

Brown-Kelly-Paterson, syndrome de *D50.1*

Brown-Séquard, syndrome *G83.88*

Brown-Séquard, syndrome de *G83.88*

Brucella
- abortus, infection *A23.1*
- canis, infection *A23.3*
- infection *A23.9*
- melitensis, infection *A23.0*
- sepsie *A23.9*
- suis, infection *A23.2*

Brucellose *A23.9*
- à
- - brucella
- - - abortus *A23.1*
- - - canis *A23.3*
- - - melitensis *A23.0*
- - - suis *A23.2*
- avec
- - maladie, rénale, tubulo-interstitielle *A23.9+, N16.0**
- - pyélonéphrite *A23.9+, N16.0**
- - spondylite *A23.9+, M49.19**
- examen de dépistage *Z11*
- forme mixte *A23.8*
- porcine *A23.2*
- septique *A23.9*

Bruch, dégénérescence de la membrane de *H31.1*

Bruck De Lange, maladie de *Q87.1*

Bruck-de-Lange, maladie de *Q87.1*

Brugada, syndrome de *I45.8*

Brugia
- malayi, filariose à *B74.1*
- timori
- - avec éléphantiasis *B74.2*
- - filariose *B74.2*

Brugsch, syndrome de *Q82.8*

Bruit
- artère *R09.8*
- Austin-Flint (souffle d') *I35.1*
- cardiaque *R01.1*
- - accidentel *R01.0*
- - - bénin *R01.0*
- - anormal NCA *R01.2*
- - assourdi *R01.2*
- - fonctionnel *R01.0*
- - non organique *R01.0*
- conséquences sur l'oreille interne *H83.3*
- crécelle, pulmonaire *R09.8*
- dû au
- - hypoacousie *H83.3*
- - surdité *H83.3*
- exposition aux *Z58*
- Flint, de (souffle de) *I35.1*
- Graham-Steel (souffle de) *I37.1*
- intestinal
- - absence *R19.1*
- - anormal *R19.1*
- - excessif *R19.1*
- oreille *H93.1*
- percussion, thorax, anormal *R09.8*
- perte de l'audition *H83.3*
- provoqué(e) par
- - perte auditive *H83.3*
- - surdité *H83.3*
- râpe précordiale *R01.2*
- - division *R01.2*
- - foetal, altération, surveillance de la grossesse *O36.3*
- respiratoire, striduleux *R06.1*
- Steel (souffle de) *I37.1*
- valvule
- - aortique *I35.8*
- - pulmonaire *I37.8*
- - tricuspide *I07.9*

Brûlure *T30.0*
- 1er degré *T30.1*
- 3ème degré *T30.3*
- aisselles *T22.03*
- - 1er degré *T22.13*
- - 3ème degré *T22.33*
- - degré
- - - 2a *T22.23*
- - - 2b *T22.83*
- - second degré *T22.23*
- anus *T21.04*
- - 1er degré *T21.14*
- - 3ème degré *T21.34*
- - degré
- - - 2a *T21.24*
- - - 2b *T21.84*
- - second degré *T21.24*
- articulation de la main *T23.0*
- - 1er degré *T23.1*
- - 3ème degré *T23.3*
- - avec implication du bras *T29.0*

Brûlure –*suite*
- articulation de la main –*suite*

- - degré
- - - 2a *T23.20*
- - - 2b *T23.21*
- - second degré *T23.20*
- avant-bras
- - 1er degré *T22.11*
- - 3ème degré *T22.31*
- - degré
- - - 2a *T22.21*
- - - 2b *T22.81*
- - second degré *T22.21*
- avec
- - calcification, muscle *M61.39*
- - myositis ossificans *M61.39*
- bouche et gorge *T28.0*
- bras *T22.02*
- - 1er degré *T22.12*
- - 3ème degré *T22.32*
- - degré
- - - 2a *T22.22*
- - - 2b *T22.82*
- - second degré *T22.22*
- brûlure *X19,*
- bulbus, avec rupture *T26.2*
- canal lacrymal *T26.3*
- cheville *T25.0*
- - 1er degré *T25.1*
- - 3ème degré *T25.3*
- - degré
- - - 2a *T25.20*
- - - 2b *T25.21*
- - second degré *T25.20*
- choc *T95.9*
- clitoris *T21.05*
- col utérin *T28.3*
- colon *T28.2*
- conduit auditif *T20.0*
- conjonctive *T26.1*
- cornée *T26.1*
- cornée, yeux *T26.1*
- corps entier *T29.0*
- cou *T20.0*
- - 1er degré *T20.1*
- - 3ème degré *T20.3*
- - degré
- - - 2a *T20.20*
- - - 2b *T20.21*
- - second degré *T20.20*
- - séquelles *T95.0*
- coude
- - 1er degré *T22.11*
- - 3ème degré *T22.31*
- - degré
- - - 2a *T22.21*
- - - 2b *T22.81*
- - second degré *T22.21*
- cuir chevelu *T20.0*
- cutanée *R20.2*
- degré
- - 2a *T30.20*
- - 2b *T30.21*
- doigts *T23.0*
- dos *T21.04*
- - 1er degré *T21.14*
- - 3ème degré *T21.34*
- - degré

Brûlure –*suite*
- dos –*suite*
- - degré –*suite*
- - - 2a *T21.24*
- - - 2b *T21.84*
- - second degré *T21.24*
- dues à
- - chaud, -de
- - - gaz *T30.0*
- - - Liquide / Epanchement liquidien *T30.0*
- - - objet *T30.0*
- - effet des rayonnements *T30.0*
- - éléctricité *T30.0*
- - flamme *T30.0*
- - inhalation NCA *T27.3*
- - rayonnements *T66*
- - vapeurs *T30.0*
- échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes *X19.9!*
- épaule *T22.02*
- - 1er degré *T22.12*
- - 3ème degré *T22.32*
- - degré
- - - 2a *T22.22*
- - - 2b *T22.82*
- - second degré *T22.22*
- épididyme *T21.09*
- Epigastrium *T21.03*
- fémur, supérieur *T24.0*
- fesses *T21.04*
- - 1er degré *T21.14*
- - 3ème degré *T21.34*
- - degré
- - - 2a *T21.24*
- - - 2b *T21.84*
- - second degré *T21.24*
- Flanc *T21.03*
- - 1er degré *T21.13*
- - 3ème degré *T21.33*
- - degré
- - - 2a *T21.23*
- - - 2b *T21.83*
- - second degré *T21.23*
- genou *T24.0*
- gorge *T28.0*
- hanches *T24.0*
- - 1er degré *T24.1*
- - 3ème degré *T24.3*
- - degré
- - - 2a *T24.20*
- - - 2b *T24.21*
- - second degré *T24.20*
- inguinale *T21.09*
- - 1er degré *T21.13*
- - 3ème degré *T21.33*
- - degré
- - - 2a *T21.23*
- - - 2b *T21.83*
- - second degré *T21.23*
- jambe *T24.0*
- - 1er degré *T24.1*
- - 3ème degré *T24.3*
- - degré
- - - 2a, sauf cheville et pied *T24.20*
- - - 2b, sauf cheville et pied *T24.21*
- - sauf cheville et pied *T24.0*
- - second degré, sauf cheville et pied *T24.20*

Brûlure –*suite*
- langue *T28.0*
- larynx *T27.0*
- - et trachée, avec implication des poumons *T27.1*
- lèvres *T20.0*
- - 1er degré *T21.15*
- - 3ème degré *T21.35*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - grandes lèvres *T21.05*
- - - 1er degré *T21.15*
- - - 3ème degré *T21.35*
- - - degré
- - - - 2a *T21.25*
- - - - 2b *T21.85*
- - - second degré *T21.25*
- - petites lèvres *T21.05*
- - - 1er degré *T21.15*
- - - 3ème degré *T21.35*
- - - degré
- - - - 2a *T21.25*
- - - - 2b *T21.85*
- - - second degré *T21.25*
- - second degré *T21.25*
- lèvres vulvaires
- - grandes *T21.05*
- - petites *T21.05*
- main *T23.0*
- - 1er degré *T23.1*
- - 3ème degré *T23.3*
- - avec implication du bras *T29.0*
- - degré
- - - 2a *T23.20*
- - - 2b *T23.21*
- - second degré *T23.20*
- mammaire *T21.01*
- - 1er degré *T21.11*
- - 3ème degré *T21.31*
- - degré
- - - 2a *T21.21*
- - - 2b *T21.81*
- - second degré *T21.21*
- membres
- - inférieurs *T24.0*
- - - séquelles *T95.3*
- - supérieurs *T22.00*
- - - séquelles *T95.2*
- miction *R30.9*
- multiples *T29.0*
- nez *T20.0*
- oculaire *H57.1*
- oeil *T26.4*
- - avec
- - - brûlure
- - - - partielle de la tête *T20.0*
- - - - partielle du cou *T20.0*
- - - - partielle du visage, autres *T20.0*
- - - rupture, destruction, globe oculaire *T26.2*
- - séquelles *T95.8*
- Oeil et ses annexes *T26.4*
- oesophage *T28.1*
- oreille *T20.0*
- - externe *T20.0*
- organes
- - interne, génito-urinaire *T28.3*

Brûlure –*suite*
- organes –*suite*
- - internes NCA *T28.4*
- organes génito-urinaires
- - externes *T21.05*
- - internes *T28.3*
- orteils *T25.0*
- partie de la tête, en cas de brulure des yeux *T20.0*
- partie du cou, en cas de brulure des yeux *T20.0*
- partie du visage, autres, en cas de brulure des yeux *T20.0*
- paumes de la main *T23.0*
- paupière, région péri-oculaire *T26.0*
- peau NCA *T30.0*
- pelvienne *T21.09*
- pénis *T21.05*
- - 1er degré *T21.15*
- - 3ème degré *T21.35*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - second degré *T21.25*
- périnée *T21.05*
- - 1er degré *T21.15*
- - 3ème degré *T21.35*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - second degré *T21.25*
- péri-oculaires *T26.0*
- pharynx *T28.0*
- pied *T25.0*
- - 1er degré *T25.1*
- - 3ème degré *T25.3*
- - avec atteinte jambe *T29.0*
- - degré
- - - 2a *T25.20*
- - - 2b *T25.21*
- - second degré *T25.20*
- pouce *T23.0*
- prépuce *T21.05*
- rectum *T28.2*
- région costale *T21.02*
- région de la cheville, et pied, avec implication jambe *T29.0*
- région du corps, multiples *T29.0*
- - 1er degré *T29.1*
- - 3ème degré *T29.3*
- - degré
- - - 2a *T29.20*
- - - 2b *T29.21*
- - second degré *T29.20*
- - séquelles *T95.8*
- région du tronc *T21.05*
- Région iliaque *T21.03*
- région interscapulaire *T21.04*
- - 1er degré *T21.14*
- - 3ème degré *T21.34*
- - degré
- - - 2a *T21.24*
- - - 2b *T21.84*
- - second degré *T21.24*
- région pelvienne *T21.04*
- région pubienne *T21.05*
- région sacro-lombaire *T21.04*
- région scapulaire *T22.02*
- - 1er degré *T22.12*

Brûlure –*suite*
- région scapulaire –*suite*
- - 3ème degré *T22.32*
- - degré
- - - 2a *T22.22*
- - - 2b *T22.82*
- - second degré *T22.22*
- sclère *T26.3*
- scrotum *T21.05*
- - 1er degré *T21.15*
- - 3ème degré *T21.35*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - second degré *T21.25*
- second degré *T30.20*
- septum nasal *T20.0*
- séquelles *T95.9*
- sous-inguinales
- - doigts *T23.0*
- - orteils *T25.0*
- surface du corps atteinte *T31!*
- - entre 10% et moins de 20% de la surface du corps *T31.1!*
- - entre 20% et moins de 30% de la surface du corps *T31.2!*
- - entre 30% et moins de 40% de la surface du corps *T31.3!*
- - entre 40% et moins de 50% de la surface du corps *T31.4!*
- - entre 50% et moins de 60% de la surface du corps *T31.5!*
- - entre 60% et moins de 70% de la surface du corps *T31.6!*
- - entre 70% et moins de 80% de la surface du corps *T31.7!*
- - entre 80% et moins de 90% de la surface du corps *T31.8!*
- - entre 90% ou plus de la surface du corps *T31.9!*
- - moins de 10% de la surface du corps *T31.0!*
- tempe *T20.0*
- testicules *T21.05*
- - 1er degré *T21.15*
- - 3ème degré *T21.35*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - second degré *T21.25*
- testis, degré 2b *T21.85*
- tête *T20.0*
- - 1er degré *T20.1*
- - 3ème degré *T20.3*
- - degré
- - - 2a *T20.20*
- - - 2b *T20.21*
- - second degré *T20.20*
- - séquelles *T95.0*
- thorax *T21.02*
- Thorax, paroi *T21.02*
- - 1er degré *T21.12*
- - 3ème degré *T21.32*
- - degré
- - - 2a *T21.22*
- - - 2b *T21.82*
- - second degré *T21.22*
- Thorax, trous *T27.2*
- tonsille *T28.0*
- trachée *T27.0*

Brûlure –*suite*
- trachée –*suite*
- - avec troubles, poumons *T27.1*
- tronc *T21.00*
- - *T21.03*
- - *T21.04*
- - 1er degré *T21.10*
- - - *T21.13*
- - 3ème degré *T21.30*
- - - *T21.33*
- - degré
- - -
- - - 2a *T21.20*
- - - - *T21.23*
- - - 2b *T21.80*
- - - - *T21.83*
- - second degré *T21.20*
- - - *T21.23*
- - séquelles *T95.1*
- tube digestif NCA *T28.2*
- tunique vaginale *T21.09*
- tympan *T20.0*
- utérus *T28.3*
- vaginales *T28.3*
- - 1er degré *T21.15*
- - 3ème degré *T21.35*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - second degré *T21.25*
- visage *T20.0*
- - séquelles *T95.0*
- voies digestives NCA *T28.2*
- voies respiratoires *T27.3*
- vulve *T21.05*
- - 1er degré *T21.15*
- - 3ème degré *T21.35*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - second degré *T21.25*

Bruton, type
- agammaglobulinémie *D80.0*
- syndrome de défaut en anti-corps *D80.0*

Bruxisme *F45.8*
- psychogène *F45.8*
- sommeil *F45.8*

Bubon *I88.8*
- chancrelleux *A57*
- - virulent *A57*
- climatique *A55*
- inguinal *I88.8*
- inguinal, provoqué par Haemophilus ducreyi *A57*
- provoqué par
- - chancre mou *A57*
- - gonocoques *A54.8*
- - Haemophilus ducreyi *A57*
- purulent *L04.9*
- syphilitique *A51.0*
- - congénital *A50.0*
- - primaire *A51.0*
- tropical *A55*
- tuberculeux, scrofuleux *A18.2*
- vénérien *A64*

buccal organe digestif évolution imprévisible ou inconnu : Pancréas , Tumeur de la cavité *D37.70*
- ou inconnu : Autre organe digestif , Tumeur de la cavité *D37.78*

Buccal(e)(s), lésion *K13.7*

Bucco-facial, -le
- dysfonctionnement *G24.4*
- dyskinésie *G24.4*
- dystonie, idiopatique *G24.4*
- syndrome *Q87.0*

Buchmann, maladie (ostéochondrite) de *M91.0*

Budd-Chiari, syndrome de [syndrome d'occ *I82.0*

Bulbaire
- absence de septum ventriculaire *Q21.0*
- accident *I64*
- hémorragie *I61.5*
- - puerpérale *O99.4*
- paralysie *G12.2*
- - chronique *G12.2*
- - infantile *A80.3*
- - l'enfant *G12.1*
- - myasthénique *G70.0*
- - par Poliomyélite *A80.3*
- - poliomyélitique aiguë *A80.3*
- - progressive *G12.2*
- - - juvénile *G12.1*
- - spastique *G12.2*
- - spinale *G12.2*
- - supranucléaire *G12.2*
- - syphilitique *A52.1*
- polio-encéphalite *A80.9*
- - myéloïde *A80.9*
- poliomyélite, paralytique *A80.3*
- rétrécissement urétral *N35.9*
- sclérose en plaques *G35.9*
- sclérose progressive *G35.9*
- sténose de l'urètre *N35.9*

Bulbaire, syndrome *G12.2*

Bulbe
- affection *H44.9*
- artériel, persistance, dans ventricule gauche *Q21.88*
- brûlure, avec rupture *T26.2*
- contusion
- - avec contusion des tissus de l'orbite *S05.1*
- - oeil *S05.1*
- corrosion, avec rupture *T26.7*
- dégénérescence *H44.5*
- duodénal, malformation *K31.88*
- lésion traumatique *S05.9*
- - superficielle *S05.8*
- luxation traumatique *S05.8*
- perforation *S05.3*
- - avec
- - - corps étranger *S05.5*
- - - prolapsus *S05.2*
- - sans
- - - corps étranger *S05.6*
- - - prolapsus *S05.3*
- rupture
- - avec prolapsus du vitré *S05.2*
- - sans prolapsus *S05.3*
- veine jugulaire, thrombose *I82.8*

Bulbite
- duodénum *K29.8*

Bulbite –*suite*
- urétrale, gonococcique *A54.0*
- urètre *N34.2*
- verge *N48.2*

Bulbo-urétrale, glande
- adénite *N34.2*
- kyste *N36.8*
- tuberculose *A18.1+, N51.8**

Bulle *R23.8*
- acantholytique *Q81.8*
- hémorragique *R23.8*

Bulle, cloque *R23.8*
- ulcérante *L01.0*

Bulles d'emphysème *J43.9*

Bulleuse chronique
- dermatose, chez l'enfant *L12.2*
- maladie, chez l'enfant *L12.2*

Bulleux(se)
- bronchite emphysémateuse *J44.89*
- cystite *N30.8*
- dermatite *L13.9*
- dermatose *L13.9*
- dermite estivale *L30.8*
- emphysème *J43.9*
- - pulmonaire *J43.9*
- éruption *R23.8*
- érythème exsudatif multiforme *L51.1*
- érythème, ichtyosiforme, congénital *Q80.3*
- érythrodermie, ichtyosiforme, congénital *Q80.3*
- kératopathie *H18.1*
- - après chirurgie de la cataracte *H59.0*
- - par un glaucome *H18.1*
- kyste géant, poumon *J43.9*
- myringite (tympanite) *H73.0*
- pemphigoïde *L12.0*

Buphtalmie congénitale *Q15.0*

Bürger, artérite de *I73.1*

Bürger-Grütz, maladie de *E78.3*

Burkholderia
- agent pathogène *B96.5!*
- résistant à
- - amikacine *U80.7!*
- - ceftazidime *U80.7!*
- - co-trimoxazole *U80.7!*
- - piperacilline/tazobactam *U80.7!*
- - quinolone *U80.7!*

Burkitt LLA-B cellules matures de type *C91.8*

Burkitt, leucémie *C91.00*

Burkitt, lymphome de *C83.7*
- causé par le VIH [immunodéficience humaine virale] *B21, C83.7*
- petites cellules non encochées, type *C83.7*

Burkitt-like Lymphome *C83.7*

Burnet, maladie de Derrick- *A78*

Burnett, syndrome de *E83.58*

Burns, maladie (ostéochondrite) de *M92.1*

Bursite *M71.99*
- achilléenne *M76.6*
- adhérente *M71.59*
- aiguë *M71.99*
- apophyse épineuse *M71.49*

Bursite –*suite*
- apophyse épineuse –*suite*
- - épaule *M75.3*
- - sus-épineux *M75.3*
- articulation du coude *M70.2*
- associée à
- - gonorrhée *A54.4+, M73.09**
- - goutte *M10.09*
- - polyarthrite, chronique *M06.20*
- calcanéenne *M77.5*
- calcanéum *M77.5*
- coude NCA *M70.3*
- doigts *M70.8*
- Duplay, de *M75.0*
- épaule *M75.5*
- genou NCA *M70.5*
- gonococcique *A54.4+, M73.09**
- gros orteil *M20.1*
- hallux valgus *M77.5*
- hanche NCA *M70.7*
- infectieuse NCA *M71.19*
- ischiale *M70.7*
- ligament latéral interne *M76.4*
- main *M70.1*
- malléole *M76.8*
- olécrânienne *M70.2*
- orteil *M77.5*
- orteil, de *M77.5*
- pharyngée, de *J39.1*
- pied *M77.5*
- poignet *M70.1*
- poplitée, de *M70.5*
- pré-rotulienne *M70.4*
- professionnelle NCA *M70.9*
- provoquée par
- - gonocoques *A54.4+, M73.09**
- - pression *M70.9*
- - sollicitation excessive *M70.9*
- radiohumérale *M77.8*
- rhumatoïde *M06.29*
- scapulohumérale *M75.5*
- semi-membraneux *M70.5*
- sous acromiale *M75.5*
- sous-achilléenne *M76.6*
- sous-acromiale *M75.5*
- sous-coracoïdienne *M75.5*
- sous-deltoïdienne *M75.5*
- sous-rotulienne *M70.5*
- syphilitique *A52.7+, M73.19**
- syphilitique tardive *A52.7+, M73.19**
- Tornwaldt *J39.2*
- trochantérienne *M70.6*
- tuberculeuse *A18.0+, M73.89**

Buruli, ulcère de [UB] *A31.1*

Bury, maladie de *L95.1*

Buschke, maladie de *B45.3+, M90.29**

Buschke-Ollendorff, syndrome de *Q89.8*

Butanol, effet toxique 1-butanol *T51.3*

Butylhydroxyanisol
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Butylhydroxytoluène
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Butyrophénone, dérivés de
- allergie *T88.7*

Butyrophénone, dérivés de –*suite*
- hypersensibilité *T88.7*

Byler, maladie de *K74.5*

Byssinose *J66.0*
- associée à fibrose pulmonaire *J66.0*

Bywaters, syndrome de *T79.5*

C1-estérase, inhibiteur, déficit *D84.1*

C1-INH, déficit *D84.1*

Cacchi-Ricci, maladie de *Q61.5*

Cachectique, diarrhée NCA *K52.8*

Cachectique, syndrome (wasting-syndrome) *B22*

Cachexie *R64*
- associée à
- - maladie due au VIH *B22, R64*
- - paludisme *B54*
- - troubles alimentaires *E41*
- - tumeur *R64*
- due
- - plomb *T56.0*
- - tumeur maligne *R64*
- hypophysaire *E23.0*
- hypophysaire [maladie de Simmonds] *E23.0*
- hypopituitaire *E23.0*
- maligne *R64*
- nerveuse *F48.0*
- paludéenne *B54*
- pituitaire *E23.0*
- rein *N28.9*
- saturnine *T56.0*
- sénile *R54*
- splénique *D73.0*
- thyréoprive *E03.4*
- tuberculeuse NCA *A16.9*
- wasting disease NCA *R64*

Cachexie, v.aussi marasme *E41*

Cacosmie *R43.1*

Cadavre retrouvé *R98*
- cause du décés, inconnue *R98*

Cadavre, découverte *R98*
- cause du décés, inconnue *R98*

Cadmium pneumonie *J68.0*

Caecostomie
- avec complications *K91.4*
- prolapsus *K91.4*

Caecum
- abcès *K65.0*
- adénocarcinome *C18.0*
- adénome *D12.0*
- - tubulovilleux *D12.0*
- adhérence *K66.0*
- agénésie *Q42.8*
- anomalie *Q43.9*
- appendice *Q43.8*
- appendicite *K37*
- atonie *K59.8*
- - psychogène *F45.32*
- atrésie *Q42.8*
- corps étranger *T18.4*
- difformité
- - acquise *K63.8*
- - congénitale *Q43.9*
- dilatation *K59.3*
- - psychogène *F45.32*
- diverticulite *K57.30*
- - congénitale *Q43.8*
- diverticulose *K57.30*
- - avec perforation *K57.20*
- - congénitale *Q43.8*
- douleurs *R10.3*
- duplication *Q43.41*
- fistule *K63.2*

Caecum *–suite*
- hémorragie *K92.2*
- hypertrophie *K59.3*
- hypoplasie *Q42.8*
- infection *K37*
- inflammation *K37*
- lésion *S36.59*
- lésions *K63.9*
- maladie *K63.9*
- maldescensus *Q43.3*
- malformation, appendice, congénitale *Q43.8*
- malposition congénitale *Q43.8*
- malrotation *Q43.3*
- mobile *Q43.3*
- néoplasie *D37.4*
- obstruction *K56.6*
- occlusion *K56.7*
- - mécanique *K56.6*
- - paralytique *K56.0*
- palpable *K63.8*
- perforation *K63.1*
- prolapsus *K63.4*
- ptose *K63.4*
- rotation
- - absente *Q43.3*
- - incomplète *Q43.3*
- spasmes *K58.9*
- - avec diarrhée *K58.0*
- - psychogènes *F45.32*
- stase *K59.8*
- sténose grave *K56.6*
- surnuméraire *Q43.41*
- tuberculose *A18.3+, K93.0**
- ulcus *K63.3*
- volvulus *K56.2*

Caféine
- abus *F15.1*
- allergie *T88.7*
- dépendance vis-à-vis *F15.2*
- hypersensibilité *T88.7*
- intoxication aigue *F15.0*
- syndrome de sevrage *F15.3*

Caffey-Silvermann, hyperostose corticale *M89.89*

Cage thoracique *- voir* Thorax

Caillot
- artère *I74.9*
- cerveau *I66.9*
- circulation *I74.9*
- coronaire *I21.9*
- veine *I82.9*

Caisse du tympan
- inflammation *H66.9*
- - aiguë *H66.9*
- polype *H74.4*

Caissons, maladie des *T70.3*
- avec
- - arthrite *T70.3+, M14.8**
- - ostéonécrose *T70.3+, M90.39**

Cal *L84*
- infecté *L84*

Calcaire, infiltration NCA *R89.7*

Calcanéum
- apophysite *M92.8*
- bursite *M77.5*
- douleurs *M79.67*

Calcanéum *–suite*
- fracture *S92.0*
- fracture comminutive *S92.0*
- ostéochondrite juvénile *M92.6*
- ostéochondrose
- - chez l'adulte *M93.1*
- - juvénile *M92.6*

Calciférol, carence *E55.9*
- avec
- - ostéomalacie *M83.89*
- - rachitisme *E55.0*

Calcifiant
- dégénérescence NCA *R89.7*
- dégénérescence, artère *I70.9*
- kyste
- - maxillaire, odontogène *D16.42*
- - odontogène *D16.5*
- pancréatite *K86.1*
- prostatite *N41.8*

Calcification
- anévrisme, aorte *I70.0*
- aorte *I70.0*
- aponévrose *M62.89*
- artère *I70.9*
- artère coronaire *I25.19*
- artère rénale *I70.1*
- artère splénique *I70.8*
- artères *I70.9*
- articulation *M25.89*
- bourse séreuse NCA *M71.49*
- bronches *J98.0*
- cardiaque *I31.1*
- cartilage, postinfectieuse *M94.89*
- cas de tendinite *M65.29*
- cérébrale *G93.88*
- cœur *I51.5*
- col de l'utérus *N88.8*
- col vésical *N32.8*
- conjonctive *H11.1*
- corps caverneux *N48.8*
- corps vitré *H43.2*
- cortex surrénalien *E27.4*
- cristallin *H26.8*
- disque intervertébral, postinfectieuse *M51.8*
- épiphyse *E34.8*
- faux du cerveau *G96.1*
- foyer
- - endomètre *N85.8*
- - ovaire *N83.8*
- - sein *R92*
- - utérus *N85.8*
- gaine tendineuse *M65.89*
- ganglion lymphatique *I89.8*
- - postinfectieuse *I89.8*
- - tuberculeuse *B90.8*
- généralisée *E83.58*
- glande surrénale *E27.8*
- - tuberculeuse *B90.8+, E35.1**
- intrarénale *N28.8*
- larynx, sénile *J38.7*
- ligament *M24.29*
- - genou *M23.83*
- ligament latéral interne *M23.83*
- méninges
- - cérébrales *G96.1*
- - rachidiennes *G96.1*
- ménisque *M23.89*

Calcification *–suite*
- métastatique *E83.58*
- muscle *M61.99*
- - associée à
- - - brûlure *M61.39*
- - - paralysie *M61.29*
- - paralytique *M61.29*
- myocarde *I51.5*
- noyaux gris centraux *G23.8*
- oreille externe *H61.1*
- ovaire *N83.8*
- pancréas *K86.8*
- papille dentaire *K00.4*
- papille rénale *N26*
- parenchyme rénal *N28.8*
- paroi vasculaire *I70.9*
- périarticulaire *M25.89*
- péricarde *I31.1*
- plèvre *J94.8*
- - postinfectieuse *J94.8*
- - tuberculeuse NCA *B90.9*
- - tuberculeuse, avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.6*
- plexus choroïdien *G93.88*
- pôle rénal *N28.8*
- poumon *J98.4*
- - postinfectieuse *J98.4*
- - tuberculeuse *B90.9*
- prostate *N42.8*
- pulpe *K04.2*
- - dentaire *K04.2*
- pulpe dentaire *K04.2*
- rate *D73.8*
- rein *N28.8*
- - tuberculeuse *B90.1+, N29.1**
- sclérotique *H15.8*
- sous-cutanée *L94.2*
- sphincter vésical *N32.8*
- tendon *M65.89*
- trachée *J39.88*
- uretère *N28.8*
- utérus *N85.8*
- vaisseau *I70.9*
- valvule aortique *I35.8*
- valvule mitrale *I34.88*
- verge *N48.8*
- vésicule biliaire *K82.8*
- vésicule séminale *N50.8*
- vessie *N32.8*

Calcifié
- aorte *I77.6*
- dégénérescence cornée *Q13.4*
- épithéliome, de Malherbe *D23.9*
- tumeur épithéliale, odontogène *D16.5*

Calcifiée, vessie *N32.8*

Calcinose *E83.58*
- associée à fibrose pulmonaire *J62.8*
- circonscrite *L94.2*
- cutanée *L94.2*
- - phénomène de Raynaud, dysfonction oesophagienne, sclérodactylie, télangiectasie, dans sclérodermie systémique [syndrome CREST] *M34.1*
- généralisée *E83.58*
- interstitielle *E83.58*
- néphro- *E83.58+, N29.8**
- plèvre *E83.58+, J99.8**
- tumorale *E83.58*

Calciphylaxie *E83.50*

Calciprive, hémophilie *D68.4*

Calcitonine, hypersécrétion *E07.0*

Calcium
- anomalie transitoire du métabolisme, nouveau né *P71.9*
- antagonistes
- - allergie *T88.7*
- - hypersensibilité *T88.7*
- - intoxication *T46.1*
- carence *E58*
- - alimentaire *E58*
- - séquelles *E64.8*
- carence, chronique *E58*
- corrosion *T30.4*
- - œil *T26.9*
- dépôt, en cas de périarthrite scapulohumérale *M75.0*
- malabsorption *K90.8*
- néphrolithiase *N20.0*
- perte *E83.58*
- savon, corps vitré *H43.2*
- sel
- - corps vitré *H43.2*
- - infiltration *R89.7*
- trouble de l'absorption *E58*
- trouble du métabolisme *E83.59*
- urolithiase *N20.9*

Calciurie *R82.9*

Calcul *N20.0*
- acide urique *M10.09*
- - avec néphrolithiase *M10.09+, N22.8**
- - diathèse *M10.99*
- ampoule de Vater *K80.50*
- amygdale *J35.8*
- annexes du testicule *N50.8*
- appendice *K38.1*
- appendiculaire *K38.1*
- avec
- - anurie *N20.9*
- - cholécystite *K80.10*
- - colique
- - - rein *N20.0*
- - - uretère *N20.1*
- - - urètre *N21.1*
- - cystite *N21.0*
- - cystopyélite *N20.9*
- - néphrite *N20.9*
- - obstruction de l'uretère *N20.1*
- - pyélite *N20.9*
- - pyélocystite *N20.9*
- - pyélonéphrose *N20.9*
- - uretérite *N20.1*
- - urétrite *N21.1*
- bassinet *N20.0*
- - encapsulé *N20.0*
- - solitaire *N20.0*
- biliaire *K80.20*
- - avec
- - - obstruction intestinale *K56.3*
- - - occlusion intestinale *K56.3*
- - blocage *K80.20*
- - - intestin *K56.3*
- - - voie biliaire *K80.50*
- - bloqué
- - - conduit
- - - - cholédoque avec,
- - - - - avec, cholangite, *K80.30*

Calcul *–suite*
- biliaire *–suite*
- - bloqué *–suite*
- - - conduit *–suite*
- - - - cholédoque avec, *–suite*
- - - - - avec, cholangite, avec obstruction de la voie biliaire, *K80.31*
- - - - - avec, cholécystite, *K80.40*
- - - - - avec, cholécystite, avec obstruction de la voie biliaire, *K80.41*
- - - - - *K80.50*
- - - - - avec, obstruction de la voie biliaire, *K80.51*
- - - - cystique avec,
- - - - - avec, cholécystite,
- - - - - avec, cholécystite, aiguë, *K80.00*
- - - - - avec, cholécystite, aiguë, avec obstruction de la voie biliaire, *K80.01*
- - - - - avec, cholécystite, chronique, *K80.10*
- - - - - avec, cholécystite, chronique, avec obstruction de la voie biliaire, *K80.11*
- - - - - *K80.20*
- - - - - avec, obstruction de la voie biliaire, *K80.21*
- - - - hepatique avec,
- - - - - avec, cholangite, *K80.30*
- - - - - avec, cholangite, avec obstruction de la voie biliaire, *K80.31*
- - - - - avec, cholécystite, *K80.40*
- - - - - avec, cholécystite, avec obstruction de la voie biliaire, *K80.41*
- - - - - *K80.50*
- - - - - avec, obstruction de la voie biliaire, *K80.51*
- - - vésicule biliaire *K80.20*
- - - - avec
- - - - - cholécystite,
- - - - - cholécystite, aiguë, *K80.00*
- - - - - cholécystite, aiguë, avec obstruction de la voie biliaire, *K80.01*
- - - - - cholécystite, chronique, *K80.10*
- - - - - cholécystite, chronique, avec obstruction de la voie biliaire, *K80.11*
- - - - - obstruction de la voie biliaire, *K80.21*
- - - voie biliaire *K80.50*
- - - - avec
- - - - - cholangite, *K80.30*
- - - - - cholangite, avec obstruction de la voie biliaire, *K80.31*
- - - - - cholécystite, *K80.40*
- - - - - cholécystite, avec obstruction de la voie biliaire, *K80.41*
- - - - - obstruction de la voie biliaire, *K80.51*
- - colique *K80.20*
- - conduit
- - - cholédoque *K80.50*
- - - - blocage *K80.50*
- - - cystique *K80.20*
- - - - blocage *K80.20*
- - - hépatique *K80.50*
- - - - blocage *K80.50*
- - fistule, vésicule bilaire *K80.20*

Calcul –*suite*
- biliaire –*suite*
- - formation *K80.20*
- - Ileus *K56.3*
- - maladie *K80.20*
- - multiple *K80.20*
- - pancréatite *K85.10*
- - vésicule biliaire *K80.20*
- biliaire, multiple *K80.20*
- bronchique *J98.0*
- calice *N20.0*
- calice rénal *N20.0*
- canal
- - cholédoque *K80.50*
- - cystique *K80.20*
- - hépatique *K80.50*
- - pancréatique *K86.8*
- - sublingual *K11.5*
- - - congénital *Q38.4*
- - submandibulaire *K11.5*
- canal biliaire *K80.50*
- canal de Wharton *K11.5*
- canal hépatique *K80.50*
- canal pancréatique *K86.8*
- canal Sténon *K11.5*
- cholestérolique *K80.20*
- colique *R10.4*
- conjonctive *H11.1*
- coralliforme *N20.0*
- dent *K03.6*
- encapsulé, reins *N20.0*
- enclavé, avec cholélithiase *K80.20*
- estomac *K31.88*
- foie, enclavé *K80.50*
- glande salivaire *K11.5*
- glande sublinguale *K11.5*
- intestin *K56.4*
- massif du bassinet *N20.0*
- nez *J34.8*
- oxalique
- - évacuation *N20.9*
- - voies urinaires *N20.9*
- pancréas *K86.8*
- par
- - abcès, rein *N20.0*
- - - avec hydronéphrose *N13.6*
- - cholangite *K80.30*
- - diverticule
- - - bassinet *N20.0*
- - - vessie *N21.0*
- - diverticulite, bassinet *N20.0*
- - diverticulose, bassinet *N20.0*
- - fistule, voies biliaires *K80.50*
- - hydronéphrose, avec infection *N13.6*
- - maladie des voies biliaires *K80.50*
- - obstruction des voies biliaires *K80.51*
- parenchyme rénal *N20.0*
- parotide *K11.5*
- plèvre *J94.8*
- poumon *J98.4*
- prostate *N42.0*
- pulpe *K04.2*
- pyélite, chronique *N20.9*
- pyélonéphrite *N20.9*
- - chronique *N20.9*
- rein *N20.0*
- rein, antécédent personnel *Z87.4*
- rénal *N20.0*

Calcul –*suite*
- rénal –*suite*
- - avec
- - - néphrite *N20.9*
- - - obstruction, avec hydronéphrose *N13.2*
- - avec calcul urétéral, concomitant *N20.2*
- - avec urétérite, non-spécifique *N20.2*
- - colique *N20.0*
- - évacuation *N20.0*
- - groupe de calices, supérieur *N20.0*
- - naissance *Q63.8*
- - supérieur *N20.0*
- sous-maxillaire *K11.5*
- tunique vaginale *N50.8*
- urates, bassinet *N20.0*
- uretère *N20.1*
- - avec hydronéphrose *N13.2*
- - bloqué *N20.1*
- - haut *N20.1*
- - - avec congestion *N20.1*
- - - sans congestion *N20.1*
- - prévésical *N20.1*
- urétérocèle *N20.1*
- urètre *N21.1*
- - bloqué *N21.1*
- urinaire *N20.9*
- - diathèse *N20.9*
- - évacuation *N20.9*
- - maladie *N20.9*
- - voies urinaires basses *N21.9*
- urinaire, voies basses *N21.9*
- vagin *N89.8*
- vasculaire *I99*
- veine *I87.8*
- vésical d'acide urique *M10.09*
- vésicule biliaire *K80.20*
- vésicule séminale *N50.8*
- vessie *N21.0*
- - avec
- - - cystite *N21.0*
- - - urétrite *N21.0*
- - évacuation *N21.0*
- voies
- - biliaires *K80.50*
- - - avec
- - - - cholangite *K80.30*
- - - - cholécystite *K80.40*
- - lacrymales *H04.5*
- - urinaires *N20.9*
- - vésicule biliaire *K80.20*
- - - avec cholécystite, aiguë *K80.00*
- - - sans cholécystite *K80.20*
- xanthinique *E79.8+, N22.8**

Calice
- calcul *N20.0*
- concrétion *N20.0*
- hydronéphrose *N13.3*
- infection *N12*
- lithiase urinaire *N20.0*
- modification, inflammatoire *N12*
- rénal
- - calcul *N20.0*
- - concrétion *N20.0*
- - déformation *N28.8*
- - dilatation *N13.3*
- - diverticule *N28.8*

Calice –*suite*
- rénal –*suite*
- - élongation *Q63.8*
- - formation de caillot *N28.8*
- - hydronéphrose *N13.3*
- - infection *N12*
- - inférieur, calcul *N20.0*
- - kyste *N13.3*
- - sténose *N13.3*
- - supérieur, calcul *N20.0*

Callosité *L84*
- cornée *L84*
- coupole pleurale *J94.1*
- infarctus, myocarde *I25.29*
- infectée *L84*
- Melker *L84*
- peau *L84*
- péricarde *I31.8*
- plèvre *J94.1*
- professionnel *L84*
- professionnelle *L84*
- pulmonaire *J84.1*
- s surfeur *T14.08*
- surfer *T14.08*
- trayeur *L84*

Calories, malnutrition *E46*

Calorique, nystagmus, résultat de test a *R94.1*

Calosité cornée
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Calotte (crânienne)
- fracture *S02.0*
- fracture comminutive *S02.0*

Calotte crânienne
- contusion *S00.05*
- fracture *S02.0*

Calvé, maladie de Legg-Perthes- *M42.09*

Calvitie *L64.9*

Camptocormie *F44.4*
- hystérique *F44.4*

Campylobacter
- diarrhée *A04.5*
- entérite *A04.5*
- infection *A49.8*

Canabis, dérivé, empoisonnement *T40.7*

Canal
- anal
- - agénésie *Q42.3*
- - carcinoma in situ *D01.3*
- - hémorragie *K62.5*
- - hypoplasie *Q42.3*
- - - avec fistule *Q42.2*
- - inflammation *K62.8*
- - maladie *K62.9*
- - polype *K62.0*
- - prolapsus *K62.2*
- - sténose *K62.4*
- - tumeur *D37.78*
- - ulcère *K62.6*
- artériel
- - Botal, ouvert *Q25.0*
- - déformation *Q25.0*
- - occlusion
- - - déficiente, congénitale *Q25.0*
- - - ralentie *P29.3*

Canal –*suite*
- artériel –*suite*
- - ouvert *Q25.0*
- - persistant (Botal) *Q25.0*
- auditif
- - externe, sténose, acquise *H61.3*
- - occlusion *H61.3*
- auriculoventriculaire *Q21.2*
- - défaut *Q21.2*
- - persistant *Q21.2*
- auriculo-ventriculaire *Q21.2*
- - anomalie *Q21.2*
- - persistant *Q21.2*
- carpien, syndrome du *G56.0*
- - lors de la grossesse *O26.82*
- cholédoque
- - adénome *D13.5*
- - adhérence *K83.8*
- - affection *K83.9*
- - allongement *Q44.5*
- - anomalie *Q44.5*
- - atrésie *Q44.2*
- - calcul *K80.50*
- - calcul bilaire *K80.50*
- - - blocage *K80.50*
- - - obstruction *K80.50*
- - - - avec
- - - - - angiocholite, *K80.30*
- - - - - angiocholite, avec obtruction de la voie biliaire, *K80.31*
- - - - - cholécystite, *K80.40*
- - - - - cholécystite, avec obtruction de la voie biliaire, *K80.41*
- - - - - obstruction de la voie biliaire, *K80.51*
- - carcinome *C24.0*
- - cholélithiase *K80.50*
- - cicatrice *K83.8*
- - colique *K80.50*
- - contracture *K83.8*
- - dilatation *K83.8*
- - - congénitale *Q44.5*
- - double *Q44.5*
- - fistule *K83.3*
- - hypertrophie *K83.8*
- - infection *K83.0*
- - inflammation *K83.0*
- - kyste *K83.5*
- - - *Q44.4*
- - - congénital *Q44.4*
- - - - *Q44.4*
- - lésion *S36.18*
- - obstruction, non causée par calculs *K83.1*
- - occlusion *K83.1*
- - perforation *K83.2*
- - raccourcissement, congénital *Q44.5*
- - rupture *K83.2*
- - spasme *K83.8*
- - spasmes *K83.8*
- - sténose *K83.1*
- - - acquise *K83.1*
- - - congénitale *Q44.3*
- - sténose grave *K83.1*
- - torsion *K83.8*
- - ulcus *K83.8*
- Cloquet persistance *Q14.0*
- cranio-pharyngien, tumeur *D44.4*
- cystique

Canal –*suite*
- cystique –*suite*
- - accessoire *Q44.5*
- - adhérence, post-infectieuse *K82.8*
- - allongement *Q44.5*
- - anomalie *Q44.5*
- - atrésie *Q44.2*
- - - acquise *K82.0*
- - atrophie *K82.8*
- - caculs *K80.20*
- - - blocage *K80.20*
- - - - avec
- - - - - cholécystite,
- - - - - cholécystite, aigue, *K80.00*
- - - - - cholécystite, aigue, avec obtruction de la voie biliaire, *K80.01*
- - - - - cholécystite, chronique, *K80.10*
- - - - - cholécystite, chronique, avec obtruction de la voie biliaire, *K80.11*
- - - - - obstruction de la voie biliaire, *K80.21*
- - calcul *K80.20*
- - cholélithiase *K80.20*
- - colique *K80.20*
- - contracture *K82.8*
- - déformation
- - - acquise *K82.8*
- - - congénitale *Q44.5*
- - dilatation *K82.8*
- - - congénitale *Q44.5*
- - double *Q44.5*
- - dysfonctionnement *K82.8*
- - dyskinésie *K82.8*
- - fistule *K82.3*
- - - congénitale *Q44.5*
- - hypertrophie *K82.8*
- - infection *K81.9*
- - kyste *K82.8*
- - lésion *S36.18*
- - malformation *Q44.5*
- - obstruction *K82.0*
- - occlusion *K82.0*
- - occlusion, sans calcul *K82.0*
- - perforation *K82.2*
- - réduction, congénitale *Q44.5*
- - rupture *K82.2*
- - sténose *K82.0*
- - - sans calcul *K82.0*
- - sténose grave *K82.0*
- - - sans calcul *K82.0*
- - torsion *K82.8*
- - ulcus *K82.8*
- déférent
- - abcès *N49.1*
- - abscès *N49.1*
- - absence
- - - acquise *Z90.7*
- - - congénitale *Q55.4*
- - absence, congénitale *Q55.4*
- - adhérence, post-infectieuse *N50.8*
- - affection *N50.9*
- - agénésie *Q55.4*
- - anomalie *Q55.4*
- - anthrax *N49.1*
- - atrésie *Q55.3*
- - atrophie *N50.8*
- - déformation

Canal –*suite*
- déférent –*suite*
- - déformation –*suite*
- - - acquise *N50.8*
- - - congénitale *Q55.4*
- - fibrose *N50.8*
- - furoncle *N49.1*
- - gangrène *N49.1*
- - - non-infectieuse *N50.8*
- - gonorrhée *A54.2+, N51.8**
- - gonorrhée, aiguë *A54.2+, N51.8**
- - hématome *N50.1*
- - - non traumatique *N50.1*
- - - traumatique *S37.84*
- - hémorragie *N50.1*
- - hypertrophie *N50.8*
- - infection NCA *N49.1*
- - inflammation *N49.1*
- - interruption *Z30.2*
- - kyste *N50.8*
- - lésion *S37.84*
- - malformation
- - - acquise *N50.8*
- - - congénitale *Q55.4*
- - manque, congénital *Q55.4*
- - oedème *N50.8*
- - - *N50.8*
- - phlegmon *N49.1*
- - phlegmone *N49.1*
- - rétrecissement *N50.8*
- - saignement *N50.1*
- - sténose grave *N50.8*
- - - congénitale *Q55.4*
- - stricture *N50.8*
- - syphilis tardive *A52.7+, N51.8**
- - thrombose *N50.1*
- - torsion *N44.0*
- - tuberculose *A18.1+, N51.8**
- - ulcère *N50.8*
- - ulcus *N50.8*
- déférent, obstruction *N50.8*
- éjaculateur
- - agénésie *Q55.4*
- - anomalie *Q55.4*
- - atrésie *Q55.4*
- - déformation
- - - acquise *N50.8*
- - - congénitale *Q55.4*
- - fibrose *N50.8*
- - obstruction *N50.8*
- - sténose grave *N50.8*
- - - congénitale *Q55.4*
- - sténose NCA *N50.8*
- épendymaire
- - Affection *G12.2*
- - maladie *G12.2*
- galactophore
- - dilatation *N60.4*
- - ectasie *N60.4*
- - occlusion *N64.8*
- galactophore, dilatation *N60.4*
- gastro intestinal
- - malformation
- - - acquise NCA *K63.8*
- - - congénitale NCA *Q45.9*
- - résultats anormaux d'imagerie diagnostique *R93.3*
- - tuberculose *A18.3+, K93.0**

Canal –*suite*

- glandes lacrymales, formation de calculs *H04.5*
- glandes salivaires
- - absence *Q38.4*
- - accessoire *Q38.4*
- - anomalie *Q38.4*
- - atrésie *Q38.4*
- - - acquise *K11.8*
- - blessure *S09.9*
- - calcul salivaire *K11.5*
- - déformation
- - - acquise *K11.8*
- - - congénitale *Q38.4*
- - double *Q38.4*
- - fistule *K11.4*
- - infection *K11.2*
- - kyste *K11.6*
- - maladie *K11.9*
- - - corps d'inclusion *B25.9*
- - - due à un virus *B25.9*
- - obstruction *K11.8*
- - rétrécissement *K11.8*
- - sténose *K11.8*
- - suppuration *K11.2*
- hépatique
- - aberration *Q44.5*
- - acc *Q44.5*
- - affection *K83.9*
- - anomalie *Q44.5*
- - atrésie *Q44.2*
- - bifurcation, adénocarcinome (Klatskin, tumeur de) *C22.1*
- - calcul *K80.50*
- - calcul biliaire *K80.50*
- - - blocage *K80.50*
- - - bloqué *K80.50*
- - - - avec
- - - - - angiocholite, *K80.30*
- - - - - angiocholite, avec obtruction de la voie biliaire, *K80.31*
- - - - - cholécystite, *K80.40*
- - - - - cholécystite, avec obtruction de la voie biliaire, *K80.41*
- - - - - obstruction de la voie biliaire, *K80.51*
- - cholélithiase *K80.50*
- - cicatrice *K83.8*
- - colique *K80.50*
- - commun *C24.0*
- - contracture *K83.8*
- - difformité congénitale *Q44.5*
- - fistule *K83.3*
- - hypertrophie *K83.8*
- - infection *K83.0*
- - inflammation *K83.0*
- - kyste *K83.5*
- - lésion *S36.18*
- - lithiase *K80.50*
- - lithiase, cholédoque *K80.50*
- - malformation *Q44.5*
- - obstruction, non causée par calculs *K83.1*
- - perforation *K83.2*
- - position, anomalie, congénitale *Q44.5*
- - rupture *K83.2*
- - sténose *K83.1*
- - - congénitale *Q44.3*
- - sténose grave *K83.1*

Canal –*suite*

- hépatique –*suite*
- - surnuméraire *Q44.5*
- - torsion *K83.8*
- - ulcus *K83.8*
- incisif, kyste *K09.1*
- inguinal, syndrome du *G57.1*
- lacrymal
- - absence *Q10.4*
- - absence, congénitale *Q10.4*
- - adhérence, post-infectieuse *H04.5*
- - agénésie *Q10.4*
- - anomalie *Q10.6*
- - brûlure *T26.3*
- - corps étranger *T15.8*
- - corrosion *T26.8*
- - dilatation *H04.6*
- - fistule *H04.6*
- - granulome *H04.6*
- - inflammation *H04.3*
- - lésion *S05.8*
- - malformation
- - - acquise *H04.6*
- - - acquise NCA *H04.6*
- - - congénitale *Q10.6*
- - - congénitale NCA *Q10.6*
- - malformation, acquise *H04.6*
- - malposition congénitale *Q10.6*
- - occlusion *H04.5*
- - plaie, ouverte *S01.1*
- - - *S05.8*
- - - avec plaie de la paupière *S01.1*
- - - avec plaie, paupière *S01.1*
- - rétrécissement, congénital *Q10.5*
- - sténose *H04.5*
- - - congénitale *Q10.5*
- - sténose grave *H04.5*
- - - congénitale *Q10.5*
- lacrymal, sténose congénitale *Q10.5*
- lacrymo nasal, fistule *H04.6*
- lacrymonasal
- - occlusion *H04.5*
- - sténose *H04.5*
- - - congénitale *Q10.5*
- nasolacrymal
- - adhérence, post-infectieuse *H04.5*
- - fistule *H04.6*
- - lésion *S05.8*
- - obstruction *H04.5*
- - - congénitale *Q10.5*
- - occlusion *H04.5*
- - - congénitale *Q10.5*
- - position, anomalie, congénitale *Q10.6*
- - sténose *H04.5*
- - sténose grave *H04.5*
- - - congénitale *Q10.5*
- Nuck
- - anomalie *Q52.4*
- - difformité *Q52.4*
- - hydrocèle *N94.8*
- - kyste *N94.8*
- - - congénital *Q52.4*
- - ouvert *Q52.4*
- omphalo-mésentérique
- - occlusion, déficient, congénital *Q43.0*
- - ouvert *Q43.0*
- - persistant *Q43.0*
- pancréatique

Canal –*suite*

- pancréatique –*suite*
- - anomalie *Q45.3*
- - atrophie *K86.8*
- - calcul *K86.8*
- - dilatation *K86.8*
- - malformation, congénitale *Q45.3*
- - obstruction *K86.8*
- para-uréthrale, anomalie *Q64.7*
- parotidien
- - anomalie *Q38.4*
- - atrésie *Q38.4*
- - - acquise *K11.8*
- - kyste *K11.6*
- salivaire, surnuméraire *Q38.4*
- salivaire, *voir aussi* canal parotidien
- - kyste *K11.6*
- sous-maxillaire, kyste *K11.6*
- spermatique
- - abcès *N49.1*
- - absence, congénitale *Q55.4*
- - agénésie *Q55.4*
- - anthrax *N49.1*
- - atrophie *N50.8*
- - fibrose *N50.8*
- - hématome *N50.1*
- - hémorragie *N50.1*
- - hypertrophie *N50.8*
- - kyste *N50.8*
- - oedème *N50.8*
- - phlegmon *N49.1*
- - sténose grave *N50.8*
- - thrombose *N50.1*
- - ulcus *N50.8*
- spinal
- - abcès *G06.1*
- - adhérence *G96.1*
- - sténose *M48.09*
- - - cervicale *M48.02*
- - - dégénérative *M48.09*
- - - lombaire *M48.06*
- - - osseuse *M99.39*
- - - par lésion discale *M99.59*
- - - par tissu conjonctif *M99.49*
- - sténose par subluxation *M99.29*
- Stensen
- - kyste *K11.6*
- - lithiase *K11.5*
- - occlusion *K11.8*
- Stenson *voir* canal parotidien
- sublingual
- - atrésie *Q38.4*
- - - acquise *K11.8*
- - calcul *K11.5*
- - - congénitale *Q38.4*
- - et canal submandibulaire, fusion *Q38.4*
- - majeur, anomalie *Q38.4*
- - sténose *K11.8*
- - - congénitale *Q38.4*
- submandibulaire
- - atrésie *Q38.4*
- - - acquise *K11.8*
- - avec canal sublingual, fusion *Q38.4*
- - calcul *K11.5*
- - inflammation *K11.2*
- - kyste *K11.6*
- thoracique

Canal –*suite*
- thoracique –*suite*
- - fistule *I89.8*
- - lésion *S27.82*
- - obstruction *I89.0*
- - occlusion *I89.0*
- - rupture *I89.8*
- thyréoglosse
- - fistule *Q89.2*
- - infection *K14.8*
- - kyste *Q89.2*
- - persistant *Q89.2*
- - reste *Q89.2*
- vitellin
- - occlusion, déficient, congénital *Q43.0*
- - ouvert *Q43.0*
- - persistant *Q43.0*

Canalaire
- adénocarcinome *C50.9*
- - infiltrant *C50.9*
- adénome *D36.9*
- carcinome, mammaire, infiltrant *C50.9*

Canaliculite *H04.3*
- aiguë *H04.3*
- cas d'actinomycose *A42.8+, H06.0**
- chronique *H04.4*
- lacrymale *H04.3*
- subaiguë *H04.3*

Canavan, maladie de *E75.2*

Cancer
- multiple SAI *C80.9*
- secondaire multiple SAI *C79.9*

Cancer, *voir aussi* tumeur maligne *C80*
- Aran *C92.30*
- - rémission complète *C92.31*
- goudron *C44.9*
- - cuirasse *C50.8*
- - stomatite ulcéro-nécrotique *A69.0*
- - xanthosus [chlorome] *C92.30*
- - - rémission complète *C92.31*
- placenta *C58*
- scrotum des ramoneurs *C63.2*

Cancéreuse, *voir aussi* tumeur maligne *C80*
- appendice *D37.3*
- atypiques *C80*
- avec tumeur, ovaire *D39.1*
- bronchique *C34.9*
- cellule *C18.1*
- cellule mixte *C80*
- entéro-endocrines *D48.9*
- iléum *C17.2*
- intestin grêle *C17.9*
- - métastasée *C17.9*
- maligne *C80*
- mucoide, maligne *C18.1*
- poumons *C34.9*
- tumeur
- - avec sécrétion, hormone *E34.0*
- - mucoide *C18.1*
- type; adénome bronchique *C34.9*

Cancérophobie *F45.2*

Cancérose *C80*

Cancroïde *C80*

Candida
- abcès *B37.88*

Candida –*suite*
- albicans, tropical, infection *B37.9*
- amygdalite *B37.88*
- autosensibilisation cutanée *L30.2*
- avec résistance à
- - fluconazole *U83!*
- - voriconazole *U83!*
- balanite *B37.4+, N51.2**
- bronchiolite *B37.1*
- bronchite *B37.1*
- bronchomycose *B37.88+, J99.8**
- bronchopneumonie *B37.1+, J17.2**
- chéilite *B37.88*
- cholécystite *B37.88*
- colite *B37.88*
- cystite *B37.4+, N33.8**
- duodénite *B37.88*
- dysenterie *B37.88*
- eczéma *B37.2*
- endocardite *B37.6+, I39.8**
- entérite *B37.88*
- entérocolite *B37.88*
- gastro-entérite *B37.88*
- glossite *B37.0*
- granulome cutané *B37.2*
- hépatite *B37.88*
- infection *B37.9*
- - associée à maladie causée par VIH *B20, B37.9*
- - chez le nouveau-né *P37.5*
- - congénitale *P37.5*
- - invasive *B37.9*
- lymphadénite *B37.88*
- méningite *B37.5+, G02.1**
- mycose *B37.9*
- - buccale *B37.0*
- - gastro-intestinale *B37.88*
- - pharyngée *B37.88*
- myocardite *B37.88+, I41.2**
- myosite *B37.88*
- néphrite *B37.4+, N08.0**
- oesophagite *B37.81*
- onychomycose *B37.2*
- ostéomyélite *B37.88*
- paronychie *B37.2*
- péritonite *B37.88+, K67.8**
- pharyngite *B37.88*
- pleurite *B37.1*
- pneumonie *B37.1+, J17.2**
- prostatite *B37.4+, N51.0**
- pyélonéphrite *B37.4+, N16.0**
- rétinite, associée au VIH *B20+, H32.0**
- septicémie *B37.7*
- splénite *B37.88*
- stomatite *B37.0*
- trachéite *B37.1*
- urétrite *B37.4+, N37.0**
- vaginite *B37.3+, N77.1**
- vascularite *B37.88*
- vulvite *B37.3+, N77.1**
- vulvo-vaginite *B37.3+, N77.1**

Candidide *L30.2*

Candidose *B37.9*
- anale *B37.88*
- anogénitale *B37.4*
- aphteuse *B37.0*
- appreil urogénital NCA *B37.4*
- associée à

Candidose –*suite*
- associée à –*suite*
- - grossesse *O98.8*
- - maladie due au VIH *B20, B37.9*
- avec
- - balanite *B37.4+, N51.2**
- - balanoposthite *B37.4+, N51.2**
- - endocardite *B37.6+, I39.8**
- - méningite *B37.5+, G02.1**
- - onychie *B37.2*
- - otite externe *B37.2+, H62.2**
- - otomycose *B37.88+, H62.2**
- - paronychie *B37.2*
- - périonychie *B37.2*
- - pneumonie *B37.1+, J17.2**
- - septicémie *B37.7*
- - urétrite *B37.4+, N37.0**
- - vaginite *B37.3+, N77.1**
- - vulvite *B37.3+, N77.1**
- - vulvovaginite *B37.3+, N77.1**
- avec dermite *B37.2*
- balanite *B37.4+, N51.2**
- bouche *B37.0*
- bronchiolite *B37.1*
- bronchite *B37.88+, J99.8**
- bronchopneumonie *B37.1+, J17.2**
- buccale *B37.0*
- buccale, associée à maladie causée par le VIH *B20, B37.0*
- colite *B37.88*
- colpite *B37.3+, N77.1**
- - chronique, récidivante *B37.3+, N77.1**
- congénitale *P37.5*
- dermite *B37.2*
- disséminée *B37.88*
- disséminée, associée au VIH *B20, B37.88*
- duodénite *B37.88*
- eczéma *B37.2*
- entérite *B37.88*
- fessière *B37.2*
- gastrite *B37.88*
- gastro-entérite *B37.88*
- génitale *B37.4*
- gland *B37.4+, N51.2**
- glossite *B37.0*
- intertrigineuse *B37.2*
- intertrigo *B37.2*
- intestinale *B37.88*
- laryngite *B37.88*
- méningite *B37.5+, G02.1**
- muqueuse buccale *B37.0*
- niveau fessier *B37.2*
- nouveau-né *P37.5*
- oesophagite *B37.81*
- ongles *B37.2*
- orale *B37.0*
- Organes génitaux
- - féminins *B37.3+, N77.1**
- - masculins *B37.4+, N51.8**
- peau *B37.2*
- - et ongles, associée à maladie due au VIH *B20, B37.2*
- périanale *B37.88*
- péritonite *B37.88+, K67.8**
- perlèche *B37.88*
- pharyngite *B37.88*
- pharynx *B37.88*

Candidose –*suite*
- pneumonie *B37.1+, J17.2**
- post-antibiotique *B37.9*
- poumons *B37.1+, J99.8**
- pulmonaire *B37.1+, J99.8**
- - associée à maladie due au VIH *B20, B37.1*
- pyélonévrite *B37.4+, N16.0**
- sepsie *B37.7*
- sous-mammaire *B37.2*
- stomatite *B37.0*
- systémique *B37.88*
- tonsillite *B37.88*
- trachéite *B37.1*
- urogénitale *B37.4*
- vagin *B37.3+, N77.1**
- vaginite *B37.3+, N77.1**
- vulve *B37.3+, N77.1**
- - et vagin *B37.3+, N77.1**
- vulvite *B37.3+, N77.1**
- vulvovaginale *B37.3+, N77.1**
- vulvovaginite *B37.3+, N77.1**

Candiru, infestation *B88.8*

Canelle
- allergie *T78.1*
- hypersensibilité *T78.1*

Canicola, fièvre à *A27.8*

Canine incluse, ectopique *K07.3*

Canitie *L67.1*
- congénitale *Q84.2*
- prématurée *L67.1*

Cannabinoïde
- consommation
- - avec syndrome de dépendance *F12.2*
- - nuisible *F12.1*
- empoisonnement
- - aiguë, dans le sens de l'intoxication *F12.0*
- - dans un contexte de dépendance *F12.0*
- Intoxication, aiguë *F12.0*

Cannabinose *J66.2*

Cannabis
- abus *F12.1*
- dépendance *F12.2*
- Empoisonnement *T40.7*
- indica, dépendance *F12.2*
- sativa, dépendance *F12.2*
- trouble persistant *F12.7*

Cannabisme *F12.2*

Canthus
- abcès *H10.5*
- anomalie *Q10.3*
- carcinome in situ *D04.1*
- et paupière, tumeur maligne *C44.1*
- kyste *H11.4*
- lésion *H02.9*
- malformation
- - acquise *H02.8*
- - congénitale *Q10.3*
- mélanome in situ *D03.1*
- mélanome malin *C43.1*
- nævus *D22.1*

Cantrell (et Crittenden), syndrome de *Q87.8*

Caoutchouc

Caoutchouc –*suite*
- allergie *L23.5*
- dermite de contact allergique *L23.5*

Capacité respiratoire, diminuée *R94.2*

Capacité, apprentissage, problème lié au *F81.9*

Capacité, lecture, trouble, développemen *F81.0*

Capacité, lire écrire
- avec problème *Z55*
- niveau faible *Z55*

Capacité, lire, écrire, niveau, bas *Z55*

Capgras, syndrome de [Délire d'illusion *F22.0*

Capillaire
- anomalie *Q27.9*
- apoplexie *I64*
- augmentation de la perméabilité *I78.8*
- dégénérescence
- - amyloïde *E85.8+, I79.8**
- - graisseuse *I78.8*
- dilatation *I78.8*
- embolie *I78.8*
- fragilité *D69.8*
- - héréditaire *D69.8*
- - idiopathique, avec purpura *D69.8*
- fragilité congénitale *D69.8*
- hémangiome *D18.00*
- - orbite *D18.08*
- - rétine *D18.08*
- hémorragie *I78.8*
- - primaire *D69.8*
- - puerpérale *O72.2*
- hyperperméabilité *I78.8*
- lymphangiome *D18.19*
- malformation acquise *I78.8*
- nævus *D18.00*
- pneumonie *J18.9*
- rupture *D69.9*
- - *I78.8*
- thrombose *I78.8*
- toxicose hémorragique *D69.0*
- vaisseau
- - atonie *I78.8*
- - ectasie *I78.8*
- - maladie *I78.9*
- - perméabilité accrue *I78.8*

Capillarectasie rétinienne *H35.0*

Capillaria
- hepatica, infection *B83.8*
- infection, intestinale *B81.1*
- infection, philippinensis *B81.1*

Capillariose *B81.1*
- hépatique *B83.8*
- intestinale *B81.1*

Capillarite *I78.8*

Caplan(-Colinet), syndrome de *M05.19+, J99.0**

Capsulaire, blessure du ligament (articu *S93.40*

Capsulaire, élongation du ligament (arti *S93.40*

Capsulaire, glaucome
- avec pseudo-exfoliation cristallinienne *H40.1*
- primaire

Capsulaire, glaucome –*suite*
- primaire –*suite*
- - avec pseudo-exfoliation cristallinienne *H40.1*
- - état résiduel, avec pseudo-exfoliation cristallinienne *H40.1*

Capsulaires, vestiges opaques *Q14.8*

Capsule
- coiffe des rotateurs (partie de la capsule)
- - élongation *S43.4*
- - foulure *S43.4*
- cristallin
- - postérieure, membrane *Q13.8*
- - pseudoexfoliation *H26.8*
- fibrose, due à un implant mammaire *T85.82*
- hépatique
- - déchirure *S36.13*
- - fibrose *K74.6*
- - hémorragie *K76.8*
- - inflammation *K65.8*
- inflammation *M77.9*
- - adhésive *M77.9*
- - articulation *M77.9*
- - épaule *M75.0*
- interne
- - hémorragie *I61.0*
- - infarctus *I63.5*
- irritation
- - articulation du genou *M23.99*
- - articulation supérieure de la cheville *M24.87*
- - épaule *M75.8*
- médiane du genou, tendinite *M76.8*
- otosclérose *H80.2*
- prostatique, infection *N41.9*
- rate, déchirure sans rupture majeure du parenchyme *S36.02*
- rénale
- - abcès *N15.10*
- - déchirure *S37.02*
- - hémorragie *N28.8*
- - lésion, en cas de déchirure, rein *S37.02*
- - œdème *N04.9*
- rupture, implant mammaire *T85.4*
- splénique
- - hyalinose *D73.0*
- - inflammation
- - - aigue *D73.8*
- - - chronique *D73.8*

Capsulite *M77.9*
- adhésive *M77.9*
- articulaire *M77.9*
- biceps *M75.0*
- trouble *M77.9*

Caractère héréditaire
- drépanocytes, dépistage *Z13.0*
- hémoglobine
- - C, avec elliptocytose *D58.1*
- - pathologique, avec thalassémie *D56.3*
- pour
- - hématies falciformes (drépanocytes) *D57.3*
- - - avec
- - - - elliptocytose *D57.8*
- - - - sphérocytose *D57.8*
- - hémoglobine

Caractère héréditaire *–suite*
- pour *–suite*
- - hémoglobine *–suite*
- - - C *D58.2*
- - - pathologique NCA *D58.2*
- - hémoglobine AS *D57.3*
- - hémoglobine S *D57.3*
- - thalassémie *D56.3*

Carbamate
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Carbamate d'éthyle, dépendance *F19.2*

Carbamazépine
- allergie *T88.7*
- empoisonnement *T42.1*
- hypersensibilité *T88.7*

Carbapénème
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Carbonisation *T29.0*
- corps entier *T29.0*
- due à la foudre *T75.0*

Carboxyhémoglobine *T58*

Carboxylase pyruvate, carence *E74.4*

Carboxylase, déficit, biotine-dépendante *D81.8*

Carcinoïde *E34.0*

Carcinoïde à cellules caliciformes *C18.1*

Carcinoïde, syndrome *E34.0*

Carcinomateux
- infiltration, paroi vésicale *C79.1*
- kyste *C80*
- neuropathie *C80+, G13.0**

Carcinomatose *C80*

Carcinome *voir aussi* tumeur maligne *C80*
- adéno- *C80*
- alvéolaire *C34.9*
- basocellulaire *C44.9*
- - aisselle *C44.5*
- - anus *C44.5*
- - arcade zygomatique interne *C44.3*
- - avant-bras *C44.6*
- - avec différenciation épidermoïde *C44.9*
- - bras *C44.6*
- - canthus *C44.1*
- - cou *C44.4*
- - cuir chevelu *C44.4*
- - dos *C44.5*
- - épaule *C44.6*
- - exulcératif *C44.9*
- - fesses *C44.5*
- - fibro-épithélial *C44.9*
- - front *C44.3*
- - hanches *C44.7*
- - joue *C44.3*
- - lèvre (buccale) *C44.0*
- - malin *C44.9*
- - membres
- - - inférieurs *C44.7*
- - - supérieurs *C44.6*
- - multifocal *C44.9*
- - nez *C44.3*
- - oesophage *C15.9*
- - oreille *C44.2*

Carcinome *voir aussi* tumeur maligne *–suite*
- basocellulaire *–suite*
- - paroi abdominale *C44.5*
- - paupière *C44.1*
- - pavillon de l'oreille *C44.2*
- - peau *C44.9*
- - peau du visage *C44.3*
- - périnée *C44.5*
- - pigmenté *C44.9*
- - sclérodermiforme *C44.9*
- - scrotum *C63.2*
- - sein *C44.5*
- - sourcil *C44.3*
- - tempe *C44.3*
- - térébrant *C44.9*
- - ulcérant *C44.9*
- Bowen *C44.9*
- branchial *C10.4*
- bronches supérieures *C34.1*
- bronchique non petites cellules *C34.9*
- cellules claires *C34.9*
- cellules de transition (transitionnelles), bassinet *C65*
- cellules rénales *C64*
- cellules transitionnelles
- - rénale *C65*
- - vessie *C67.9*
- colo-rectal *C19*
- corion *C44.9*
- corps de l'estomac *C16.2*
- évolution imprévisible *D48.9*
- - adéno-, prostate *D40.0*
- - lèvres vulvaires *D39.7*
- - œil *D48.7*
- - pénis *D40.7*
- - urètre *D41.3*
- - vulve *D39.7*
- glande sébacée *C44.9*
- hépatocellulaire *C22.0*
- - fibrolamellaire *C22.0*
- hépato-cholangiocellulaire *C22.0*
- in situ *D09.9*
- - ampoule
- - - hépatopancréatique *D01.5*
- - - Vater *D01.5*
- - ano-périnéal *D04.5*
- - anus *D01.3*
- - appareil respiratoire *D02.4*
- - bord libre de la lèvre *D00.0*
- - bronchique *D02.2*
- - canalaire du sein *D05.1*
- - canthus *D04.1*
- - cavité buccale *D00.0*
- - cellules de transition *D09.9*
- - col utérin *D06.9*
- - côlon *D01.0*
- - cuir chevelu *D04.4*
- - endomètre *D07.0*
- - épiderme *D04.9*
- - épidermoïde *D09.9*
- - - avec envahissement stromal discutable, col de l'utérus *D06.9*
- - épiglotte *D02.0*
- - - partie, sus-hyoïdienne *D02.0*
- - épithélium jonctionnel *D09.9*
- - estomac *D00.2*
- - foie *D01.5*
- - fosse nasale *D02.3*

Carcinome *voir aussi* tumeur maligne *–suite*
- in situ *–suite*
- - glande endocrine *D09.3*
- - gorge *D00.0*
- - hypopharynx *D00.0*
- - intestinal *D01.4*
- - intracanalaire *D05.1*
- - jonction recto-sigmoïdienne *D01.1*
- - larynx *D02.0*
- - lèvre *D00.0*
- - mammaire *D05.9*
- - - apocrine *D05.7*
- - - lobulaire *D05.0*
- - - - canalaire invasif *C50.9*
- - - - intracanalaire *D05.7*
- - marge anale *D04.5*
- - marge anale, peau *D04.5*
- - museau de tanche *D06.9*
- - nez *D09.7*
- - oeil *D09.2*
- - oesophage *D00.1*
- - oreille moyenne *D02.3*
- - organes urinaires *D09.1*
- - oropharynx *D00.0*
- - pancréas *D01.7*
- - papillaire *D09.9*
- - peau *D04.9*
- - - aine *D04.5*
- - - aisselle *D04.5*
- - - cou *D04.4*
- - - dos *D04.5*
- - - épaule *D04.6*
- - - fesses *D04.5*
- - - hanche *D04.7*
- - - mammaire *D04.5*
- - - ombilic *D04.5*
- - - oreille, externe *D04.2*
- - - paroi abdominale *D04.5*
- - - tronc *D04.5*
- - peau de la lèvre *D04.0*
- - peau de la paupière *D04.1*
- - peau du nez *D04.3*
- - peau périanale *D04.5*
- - pharynx *D00.0*
- - pli ary-épiglottique *D00.0*
- - - paroi latérale
- - - - hypopharyngé *D00.0*
- - - - laryngé *D02.0*
- - - zone marginale *D00.0*
- - polype *D09.9*
- - poumon *D02.2*
- - prostate *D07.5*
- - rectum *D01.2*
- - rein *D09.1*
- - sinus paranasal *D02.3*
- - trachée *D02.1*
- - uretère *D09.1*
- - urètre *D09.1*
- - utérus *D07.3*
- - vagin *D07.2*
- - verge *D07.4*
- - vessie *D09.0*
- - voies biliaires *D01.5*
- - vulve *D07.1*
- in situ, avec envahissement stromal discutable du col de l'utérus
- - épidermoïde *D06.9*

Carcinome *voir aussi* tumeur maligne *–suite*
- in situ, avec envahissement stromal discutable du col de l'utérus *–suite*
- - plaques épithéliales *D06.9*
- ovaire *C56*
- pilomatrix *C44.9*
- planocellulaire *C80*
- précoce, estomac *C16.9*
- pulmonaire à petites cellules *C34.9*
- spino-basocellulaire *C44.9*
- spino-cellulaire *C80*
- thyroïde *C73*
- tumeur maligne *C80*
- - acido-basophile, mixte *C75.1*
- - acidophile *C75.1*
- - améloblastome *C41.1*
- - annexes de la peau *C44.9*
- - apocrines *C44.9*
- - basocellulaire éosinophile *C75.1*
- - basophile *C75.1*
- - baso-spinocellulaire, mixte *C44.9*
- - cas de polyposis coli *C18.9*
- - cellules bague, estomac *C16.9*
- - cellules basales *C44.9*
- - - pigmenté *C44.9*
- - cellules claires *C34.9*
- - - *C56*
- - cellules de Hürthle *C73*
- - cellules de Sertoli *C62.9*
- - - chez la femme *C56*
- - - chez l'homme *C62.9*
- - cellules eau de roche *C75.0*
- - cellules mucoïdes *C75.1*
- - cérumineux *C44.2*
- - Chimiothérapie *Z51.1*
- - cholangio-, et carcinome, hépato-cellulaire combiné *C22.0*
- - chromophobe *C75.1*
- - comédon *C50.9*
- - - mammaire, non invasif *D05.7*
- - diffuses *C16.9*
- - ductal, invasif *C50.9*
- - embryonnaire *C80*
- - éosinophile *C75.1*
- - folliculaire
- - - thyroïde *C73*
- - - type différencié *C73*
- - - type moyennement différencié *C73*
- - - type trabéculaire *C73*
- - hépatocellulaire *C22.0*
- - - avec cholangiosarcome, combiné *C22.0*
- - inflammatoire *C50.9*
- - intracanalaire *D05.1*
- - intradermique *D04.9*
- - intra-osseux *C41.1*
- - lobulaire, invasif *C50.9*
- - lymphocytes C *C73*
- - mammaire
- - - avec sécrétion *C50.9*
- - - juvénile *C50.9*
- - métatypique *C44.9*
- - mixte, papillaire et folliculaire *C73*
- - neuroendocrinienne *C75.9*
- - os machoire supérieure
- - - améloblastome *C41.02*
- - - intra-osseux *C41.02*
- - - odontogène *C41.02*

Carcinome *voir aussi* tumeur maligne *–suite*
- tumeur maligne *–suite*
- - Paget *C50.0*
- - - mamelon *C50.0*
- - papillaire *C80*
- - - folliculaire, variante *C73*
- - papillaire kystique *C56*
- - parafolliculaire, thyroide *C73*
- - petites cellules *C34.9*
- - Pilomatrix *C44.9*
- - plaques épithéliales *C80*
- - polype *C80*
- - riche en glycogène *C50.9*
- - riche en lipides *C50.9*
- - Schmincke *C11.9*
- - Schneider *C30.0*
- - secondaire *C80*
- - spinocellulaire *C80*
- - urothélium *C68.9*

Carcinose *C80*
- épicarde *C79.84*
- méninges *C70.9*
- moelle osseuse *C96.9*
- péricarde *C79.83*
- péritonéal *C78.6*
- péritonéale *C78.6*
- pleurale *C78.2*
- plèvre *C78.2*
- primitive *C80*
- secondaire *C80*

Card - *voir aussi* Kard-

Cardia
- achalasie *K22.0*
- adénocarcinome *C16.0*
- carcinome *C16.0*
- carcinome gastrique *C16.0*
- diverticule *K22.5*
- glissement, à travers le hiatus œsophagien *Q40.1*
- insuffisance *K22.8*
- lésion *K22.9*
- néoplasie *D37.1*
- obstruction *K22.2*
- obstruction NCA *K22.2*
- rétrécissement *K22.2*
- spasme *K22.0*
- sténose *K22.2*
- tumeur *D37.1*
- - maligne *C16.0*
- ulcère *K22.1*
- varices *I86.4*
- - avec hémorragie *I86.4*

Cardial(e) - *voir* nature de la maladie

Cardialgie, estomac *K22.0*

cardiaque
-
- Adaptation manipulation système d ' assistance *Z45.02*
- congénital Eisenmenger Malformation *Q21.88*
- électronique Présence dispositif *Z95.0*
- électroniques Adaptation manipulation d ' Autre dispositif *Z45.08*
- implanté Adaptation manipulation d ' un stimulateur *Z45.00*
- - d ' un défibrillateur *Z45.01*
- prématuré SAI Battements *I49.4*

cardiaque *–suite*
- Présence défibrillateur *Z95.0*
- Tamponnade *I31.9*

Cardinale, persistance de la veine posté *Q26.8*

Cardio-angiopathie *I25.9*
- provoquée par l'alcool *I42.6*

Cardiochalasie *K21.9*

Cardio-circulatoire, arrêt *I46.9*

Cardio-circulatoire, collapsus *I50.9*

Cardiogénique, choc *R57.0*

Cardio-glycoside
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Cardiomalacie *I51.5*

Cardiomégalie *I51.7*
- congénitale *Q24.8*
- glycogénique diffuse *E74.0+, I43.1**
- idiopathique *I51.7*

Cardiomyopathie *I42.9*
- alcoolique *I42.6*
- artérioscléreuse *I25.5*
- arythmogène du ventricule droit *I42.80*
- arythmogène, ventricule droit *I42.80*
- avec dilatation *I42.0*
- Becker *I42.88*
- Béribéri *E51.1+, I43.2**
- cas de
- - diphtérie *A36.8+, I43.0**
- - grossesse *O99.4*
- - maladie, due à une carence alimentaire *E63.9+, I43.2**
- - sarcoïdose *D86.8+, I43.8**
- congénitale *I42.4*
- congestive *I42.0*
- constrictive *I42.9*
- cours de la puerpéralité *O90.3*
- dilatée *I42.0*
- - provoquée par l'alcool *I42.6*
- due à
- - amyloïdose *E85.4+, I43.1**
- - médicaments *I42.7*
- - substance exogène NCA *I42.7*
- héréditaire *I42.9*
- hypertensive *I11.90*
- hypertrophique
- - non obstructive *I42.2*
- - obstructive *I42.1*
- - - congénitale *Q24.8*
- idiopathique *I42.9*
- ischémique *I25.5*
- métabolique *E88.9+, I43.8**
- nutritionnelle *E63.9+, I43.2**
- oblitérante *I42.5*
- obstructive *I42.1*
- primitive *I42.9*
- psycho- *F45.30*
- restrictive NCA *I42.5*
- rhumatismale *I09.0*
- secondaire *I42.9*
- thyréotoxique *E05.9+, I43.8**
- toxique *I42.7*
- tuberculeuse *A18.8+, I43.0**
- virale *B33.2+, I43.0**

Cardioneurose *F45.30*

Cardio-œsophagien(ne)

Cardio-œsophagien(ne) –*suite*

- relaxation *K21.9*
- ulcère peptique *K22.1*

Cardiopathie *I31.1*
- *I51.8*
- *I51.9*
- aigue *I51.8*
- artérioscléreuse *I25.19*
- cas de
- - fièvre, rhumatismale, inactive *I09.9*
- - polyarthrite
- - - chronique *M05.30+, I52.8**
- - - séropositive, chronique *M05.30+, I52.8**
- cas de mucopolysaccharidose *E76.3+, I52.8**
- chronique *I51.8*
- due à
- - méningocoques *A39.5+, I52.0**
- - virus *B33.2+, I52.1**
- - virus Coxsackie *B33.2+, I52.1**
- épi- *I31.9*
- idiopathique *I42.9*
- ischémique *I25.9*
- péri- *I31.9*
- polymorphe *I51.9*
- rhumatoïde *I09.9*
- - *M05.39+, I52.8**
- - aigue *I01.9*
- - chronique *I09.9*
- - inactive *I09.9*
- subaiguë *I51.8*
- virale *B33.2+, I52.1**

Cardiopathie artérioscléreuse *I25.19*
- angio- *I25.19*

Cardiopathie coronarienne *I25.9*
- dans les antécédents familiaux *Z82*

Cardiopathie ischémique (ischémie myocar *I25.9*

Cardiopathie ischémique chronique *I25.9*
- décompensée *I25.9*

Cardiopathie noire *I27.0*

Cardiopathie rhumatismale *I09.9*

Cardio-pulmonaire
- blocage *I50.19*
- décompensation *R09.2*
- insuffisance *R09.2*
- - cardiaque *I27.9*
- maladie
- - cardiaque *I27.9*
- - chronique *I27.9*
- syndrome, en cas d'obésité *E66.29*

Cardio-pulmonaire, syndrome, à virus Han *B33.4+, J17.1**

Cardio-rénal
- artériosclérose *I13.90*
- collapsus *I13.20*
- complications *I13.20*
- décompensation *I13.20*
- dégénérescence *I13.90*
- hypertonie *I13.90*
- - avec insuffisance, rein *I13.10*
- - bégnine *I13.90*
- - maligne *I13.90*
- insuffisance, hypertensive *I13.20*
- lésion vasculaire *I13.90*
- maladie, hypertensive *I13.90*

Cardio-rénal –*suite*
- sclérose *I13.90*

Cardio-respiratoire
- arrêt *I46.9*
- collapsus *R57.0*
- décompensation *R09.2*
- défaillance *R09.2*
- insuffisance *R09.2*
- syndrome de détresse, idiopathique, chez les nouveaux-nés *P22.0*

Cardiotocogramme (CTG), pathologique, lo *O28.8*

Cardiotocogramme, pathologique *O28.8*
- lors de la grossesse *O28.8*

Cardiotonique, dilatation, oesophage *K22.0*

Cardiovasculaire
- Anomalie *Q28.88*
- artériosclérose *I25.0*
- Asthénie *I50.9*
- - psychogène *F45.30*
- attaque *I21.9*
- choc *R57.0*
- collagéneux *I42.88*
- collapsus *R57.9*
- - chez les nouveaux-nés *P29.8*
- - postopératoire *T81.1*
- décompensation *I51.6*
- dégénérescence *I51.6*
- - rénale *I13.90*
- hypertonie *I11.90*
- - rénale *I13.90*
- - - avec insuffisance, rein *I13.10*
- insuffisance *I50.9*
- - rénale *I13.20*
- insuffisance, chronique *I50.9*
- maladie *I51.6*
- - antécédents familiaux *Z82*
- - artérioscléreuse *I25.0*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P29.9*
- - congénitale *Q28.9*
- - rénale *I13.90*
- névrose *F45.30*
- oedème, en cas d'insuffisance cardiaque *I50.01*
- sclérose *I51.6*
- - rénale *I13.90*
- sténose *I51.6*
- Symptôme *R09.8*
- syphilis *A52.0+, I98.0**
- - tertiaire *A52.0+, I98.0**
- syphilis tertiaire *A52.0+, I98.0**
- - congénitale *A50.5+, I98.0**
- système, difformité, congénitale *Q28.9*
- troubles *I51.6*
- - fonctionnels *I51.6*
- - psychogènes *F45.30*
- xanthomatose *E75.5*

Cardio-vasculaire
- insuffisance *I50.9*
- maladie *I51.6*
- - athéroscléreuse *I25.0*
- - congénitale, pendant la grossesse *O99.8*
- système
- - dysfonctionnement neuro-végétatif *F45.30*
- - gomme syphilitique *A52.0+, I98.0**

Cardio-vasculaire –*suite*
- système –*suite*
- - malformation congénitale *Q28.9*
- troubles *I51.6*
- - fonctionnels *I51.6*
- - nerveux *F45.30*

Carence
- 11-Hydroxylase *E25.08*
- 2,3-Diphosphoglycérate-mutase [2,3-DPG], avec anémie *D55.2*
- 21-Hydroxylase
- - forme classique *E25.00*
- - forme tardive *E25.01*
- 25-hydroxyvitamine D1-a-hydroxylase *E83.31*
- 3-beta-hydroxystéroide-déshydrogénase *E25.08*
- 5-alpha-réductase *E29.1*
- - avec pseudohermaphrodisme masculin *E29.1*
- 6-phosphogluconate déshydrogénase [6-PGD], avec anémie *D55.1*
- ac-globuline
- - acquise *D68.4*
- acide *R09.0*
- - grande quantité *T70.2*
- - systémique *T71*
- - - due à handicap, respiration, mécanique *T71*
- acide aminée *E72.9*
- - avec anémie *D53.0*
- acide ascorbique *E54*
- acide bilaire *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- acide folique *E53.8*
- - avec anémie *D52.9*
- - - alimentaire *D52.0*
- - - médication, induite par *D52.1*
- - lors de la grossesse *O26.88*
- acide nicotinique *E52*
- acides gras, essentiels *E63.0*
- acides pantothéniques *E53.8*
- activités *Z73*
- adénosine désaminase (ADA) *D81.3*
- adénosine phosphoribosyltransférase *E79.8*
- affection *E63.9*
- affective, syndrome de *Z61*
- albumine *E46*
- aldolase, héréditaire *E74.1*
- alimentaire *E63.9*
- alimentation *R63.0*
- - d'origine non-organique *F50.8*
- - psychogène *F50.0*
- alpha 1-antitrypsine *E88.0*
- amnésie *R41.3*
- androgène *E29.1*
- aneurine *E51.9*
- anticorps *D80.1*
- - cas
- - - déficit immunitaire *D80.9*
- - - gammaglobulinémie normale *D80.6*
- - - hypergammaglobulinémie *D80.6*
- - humoral *D80.8*
- anti-Müller, hormone *E29.1*
- antithrombine III *D68.4*
- - congénitale *D68.8*
- antithrombine-III *D68.4*
- - congénital *D68.8*

Carence –*suite*

- antitrypsine, familaire *E88.0*
- antitrypsine, familiale *E88.0*
- assistance pour les soins *Z74.2*
- bêta-glucoronidase *E76.2*
- biens matériels *Z59*
- biotine *E53.8*
- C1 estérase, inhibiteur *D84.1*
- C1 INH *D84.1*
- calaories, grave *E43*
- - avec marasme *E41*
- calciférol *E55.9*
- calciférol, avec
- - ostéomalacie *M83.89*
- - rachitisme *E55.0*
- calcium *E58*
- - alimentaire *E58*
- - séquelles *E64.8*
- calcium, chronique *E58*
- calories *Z59*
- carboxykinase phosphoénol pyruvate *E74.4*
- carboxylase pyruvate *E74.4*
- carboxylase, biotine-dépendante *D81.8*
- carboxylase, dépendant à la biotine *D81.8*
- carnitine *E56.8*
- carnitine palmitoyltransferase *E71.3*
- carnitine palmityltransférase musculaire *E71.3*
- carotène *E50.9*
- céruléoplasmine *E83.0*
- choline *E53.8*
- chrome *E61.4*
- cobalamine *E53.8*
- complexe majeur d'histo-compatibilité
- - classe
- - - I *D81.6*
- - - II *D81.7*
- couleur, congénital *E70.3*
- cuivre *E61.0*
- - alimentation, induite par *E61.0*
- - avec anémie *D53.8*
- cyanocobalamine *E53.8*
- décarboxylase *E71.0*
- déconcentration *Z73*
- désir sexuel *F52.0*
- diaphorase *D74.0*
- disaccharidase *E73.9*
- éducation, pendant l'enfance *Z62*
- électrolytique *E87.8*
- élément nutritionnel *E61.9*
- - plusieurs *E61.7*
- éléments nutritionnels *E61.9*
- enzyme *E88.9*
- - avec anémie *D55.9*
- - - médication, induite par *D59.2*
- - - relation avec les voies de pentoses phosphates NCA *D55.1*
- - circulante NCA *E88.0*
- - glycolytique, avec anémie *D55.2*
- - nucléotides, modification, avec anémie *D55.3*
- enzyme branchante *E74.0*
- ergostérine, avec ostéomalacie *M83.89*
- ergostérol *E55.9*
- - cas de rachitisme *E55.0*
- érythrocyte, avec anémie *D55.1*
- facteur

Carence –*suite*

- facteur –*suite*

- - fibrine, stabilisant
- - - acquise *D68.4*
- - IX *D67*
- - - avec troubles, fonction *D67*
- - - héréditaire *D67*
- - labile
- - - acquis *D68.4*
- - multiple *D68.8*
- - VIII *D66*
- - - avec
- - - - disfonctionnement, vasculaire *D68.0*
- - - - troubles fonctionnels *D66*
- - - - - endothélium vasculaire, *D68.0*
- - - héréditaire *D66*
- - XI *D68.1*
- - - héréditaire *D68.1*
- facteur de coagulation
- - acquise *D68.4*
- - antépartum, avec lésion, foetus/nouveau-né *P02.1*
- - due à
- - - affection, foie *D68.4*
- - - carence, vitamine K *D68.4*
- - postpartum *O72.3*
- - prénatale *O46.0*
- facteur intrinsèque
- - avec anémie, due à une carence en vitamine B12 *D51.0*
- - congénitale *D51.0*
- facteur PP *E52*
- facteur, proconvertine
- - acquise *D68.4*
- fer *E61.1*
- - avec anémie *D50.9*
- - - due à la résorption du fer, diminution *D50.8*
- - - lors de la grossesse *O99.0*
- - - suite à une perte de sang *D50.0*
- fibrinogène acquise *D65.9*
- fluor *E61.8*
- folate *E53.8*
- fonction, selon
- - colostomie *K91.4*
- - entérostomie *K91.4*
- fructose *E74.1*
- fructose, 16-diphosphate *E74.1*
- galactose *E74.2*
- galactose-1-phosphate-uridyl-transférase *E74.2*
- gammaglobuline, sang *D80.1*
- - héréditaire *D80.0*
- glande thyroide *E03.9*
- globuline, anti-hémophile NCA *D66*
- glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] *E74.0*
- - antécédents familiaux *Z83.2*
- - avec anémie *D55.0*
- - - hémolytique, non sphérocytaire, congénitale *D55.0*
- glutathion réductase (GR), avec anémie *D55.1*
- glutathion réductase, avec anémie *D55.1*
- glutathion, anémie *D55.1*
- glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase, avec anémie *D55.2*
- glycogénose *E74.0*

Carence –*suite*

- glycoronyl-transférase *E80.5*
- gonadotrophine, isolée *E23.0*
- hémoglobine *D64.9*
- - anémie *D64.9*
- hépatophosphorylase *E74.0*
- hexokinase, avec anémie *D55.2*
- hormone *E34.9*
- - anté-hypophyse NCA *E23.0*
- - avec
- - - colpite *N95.2*
- - - urétrite *N34.2*
- - testiculaire *E29.1*
- hormone corticotrope, adrénocorticotrophine (ACTH), isolée *E23.0*
- hormone de croissance *E23.0*
- - cas d'agammaglobulinémie, liée au chromosome X *D80.0*
- - idiopathique *E23.0*
- - isolée *E23.0*
- hormone hypophyse, isolée *E23.0*
- hormone parathyroide *E20.9*
- hydrochloride de thiamine *E51.9*
- hydrogénase pyruvate *E74.4*
- immunité *D84.9*
- - cellulaire *D84.8*
- - combinée *D81.9*
- - humorale *D80.9*
- immunoglobuline
- - A *D80.2*
- - G *D80.3*
- - M *D80.4*
- inositol *E53.8*
- insuline, post-opératoire *E89.1*
- iode *E61.8*
- - avec
- - - goitre
- - - - cystique *E01.1*
- - - - diffus *E01.0*
- - - - endémique *E01.2*
- - - - multinodulaire *E01.1*
- - - - nodulaire *E01.1*
- - - - uninodulaire *E01.1*
- - - hypothyréose *E01.8*
- - - - acquise *E01.8*
- - - - congénitale *E00.9*
- - - - subclinique *E02*
- - - hypothyroidie
- - - - acquise, NCA *E01.8*
- - - - congénitale *E00.9*
- jeu, enfance *Z62*
- Kappa, chaines légères *D80.8*
- kinase pyruvate, avec anémie *D55.2*
- - hémolytique, non sphérocytaire, congénitale *D55.2*
- lactose
- - congénitale *E73.0*
- - génétique, induite par *E73.0*
- - secondaire *E73.1*
- lait, en couche *O92.40*
- larmes *H04.1*
- - acquise *H04.1*
- - congénitale *Q10.6*
- lécithine, cholestérol, acyltransférase *E78.6*
- - avec affection, glomérulaire *E78.6+, N08.4**

Carence –*suite*
- lécithine, cholestérol, acyltransférase –*suite*
- - familiaire, avec trouble, glomérulaire *E78.6+, N08.4**
- libido *F52.0*
- lipocaique *K86.8*
- lipoprotéine *E78.6*
- - familier *E78.6*
- lipoprotéine haute densité HDL *E78.6*
- logement *Z59*
- magnésium *E61.2*
- - alimentaire *E61.2*
- manganèse *E61.3*
- mentale *F79.9*
- molybdène *E61.5*
- - alimentaire *E61.5*
- - avec anémie *D53.8*
- morale *F60.2*
- mouvement, corporel *Z72.8*
- moyens financiers *Z59*
- myophosphorylase *E74.0*
- NADH diaphorase, congénitale *D74.0*
- NADH méthémoglobine-réductase *D74.0*
- - congénitale *D74.0*
- NADH-réductase, congénitale *D74.0*
- natrium *E87.1*
- niacien, acide *E52*
- niacine *E52*
- - avec démence *E52+, F02.8**
- - séquelles *E64.8*
- nicotinamide *E52*
- nourriture *T73.0*
- - adéquate NCA *Z59*
- - avec
- - - anémie *D53.9*
- - - - avec hypoabsorption du fer *D50.8*
- - - stomatite angularis *E53.0*
- - faim *T73.0*
- nutritionnelle *E63.9*
- - avec déséquilibre alimentaire *E63.1*
- - cas de carence alimentaire *E63.1*
- - cours de la grossesse *O25*
- - maladie *E63.9*
- - - avec cardiomyopathie *E63.9+, I43.2**
- - - cas de
- - - - grossesse NCA *O99.2*
- - - - maladie, par VIH *B22, E63.9*
- oedème, malnutrition, degré 3 *E43*
- oestrogènes *E28.3*
- - avec
- - - colpite *N95.2*
- - - vulvite *N95.2*
- ornithine transcarbamylase *E72.4*
- ovarienne *E28.8*
- pellagre *E52*
- phénylalanine hydroxylase *E70.1*
- phosphatase acide *E83.38*
- phosphatase, en cas de rachitisme *E83.38+, M90.89**
- phospho-fructo-aldolase, avec anémie *D55.2*
- phosphofructokinase *E74.0*
- phospho-glycérate-kinase, avec anémie *D55.2*
- plaquettes *D69.61*
- - réfractaire aux transfusions *D69.60*

Carence –*suite*
- plasma thromboplastin antécédent *D68.1*
- plasma thromboplastin composant *D67*
- pluriglandulaire *E31.9*
- - auto-immune *E31.0*
- possibilité de logement
- - continue *Z59*
- - passagère *Z59*
- possibilité soins à domicile pour les malades *Z74.2*
- potassium *E87.6*
- proaccélérine
- - acquise *D68.4*
- prolactine, isolée *E23.0*
- protéine *E46*
- - avec anémie *D53.0*
- protéine NCA *E46*
- protéine, avec anémie *D53.0*
- protéique *E46*
- prothrombine acquise *D68.4*
- provitamine D *E55.9*
- pseudocholinestérase *E88.0*
- pseudovitamine D *E83.31*
- purine nucléoside phosphorylase PNP *D81.5*
- pyridoxamine *E53.1*
- pyridoxine *E53.1*
- - avec anémie *D64.3*
- pyridoxine, dérivé *E53.1*
- pyrimidine *E79.8*
- riboflavine *E53.0*
- saccharose *E74.3*
- salive *K11.7*
- sécrétion
- - glandes salivaires *K11.7*
- - ovaire *E28.3*
- - urine *R34*
- sel *E87.1*
- sélénium *E59*
- - alimentaire *E59*
- - séquelles *E64.8*
- sels minéraux, NCA *E61.8*
- soins, enfant *T74.0*
- somatotropine
- - idiopathique *E23.0*
- - isolée *E23.0*
- substance énergétique *E46*
- succinate semialdehyde dehydrogenase *E88.8*
- sulfate *E75.2*
- sulfitoxidase *E72.1*
- téstostérone *E29.1*
- thiamine *E51.9*
- - séquelles *E64.8*
- thyréotropine, isolée *E23.0*
- tocophérol *E56.0*
- transcobalamine II, avec anémie *D51.2*
- triose phosphate isomérase, avec anémie *D55.2*
- tryptophane *E52*
- vanadium *E61.6*
- vitamine *E56.9*
- - avec
- - - atrophie, optique *H47.2*
- - - encéphalopathie *E56.9+, G32.8**
- - - polyneuropathie NCA *E56.9+, G63.4**
- - - polynévrite NCA *E56.9+, G63.4**

Carence –*suite*
- vitamine –*suite*
- - multiple *E56.9*
- - séquelles NCA *E64.8*
- vitamine A *E50.9*
- - avec
- - - aveuglement nocturne *E50.5+, H58.1**
- - - cicatrice, cornée *E50.6+, H19.8**
- - - - xérophtalmiques *E50.6+, H19.8**
- - - héméralopie *E50.5+, H58.1**
- - - hyperkératose *E50.8+, L86**
- - - kératite, xérotique *E50.4+, H19.8**
- - - kératomalacie *E50.4+, H19.8**
- - - kératose *E50.8+, L86**
- - - nyctalopie *E50.5+, H58.1**
- - - phrynodermie *E50.8+, L86**
- - - ulcus, cornée, avec xérosis corneae *E50.3+, H19.8**
- - - xeroderma *E50.8+, L86**
- - - xerophtalmie *E50.7+, H19.8**
- - - xerosis
- - - - conjonctival *E50.0+, H13.8**
- - - - - et tâches de Bitot, *E50.1+, H13.8**
- - - - cornée *E50.2+, H19.8**
- - oeil *E50.7*
- - séquelles *E64.1*
- vitamine B *E53.9*
- - avec
- - - Béribéri *E51.1*
- - - encéphalopathie NCA *E53.9+, G32.8**
- - - glossite de Moeller(-Hunter) *E53.9+, K93.8**
- - - ostéomalacie, chez l'adulte *M83.89*
- - - pellagre *E52*
- - - polyneuropathie *E53.9+, G63.4**
- - - stomatite angularis NCA *E53.9+, K93.8**
- - séquelles *E64.8*
- vitamine B1 *E51.9*
- vitamine B12 *E53.8*
- - alimentaire, avec anémie *D51.3*
- - - avec polyneuropathie *D51.3+, G63.4**
- - avec
- - - anémie *D51.9*
- - - - chez les végétariens *D51.3*
- - - - due à une carence, facteur intrinsèque *D51.0*
- - - dégénérescence
- - - - cerveau *E53.8+, G32.8**
- - - - moelle épinière, combinée, subaigue *E53.8+, G32.0**
- - - démence *E53.8+, F02.8**
- - - myélopathie *E53.8+, G32.0**
- - - neuropathie *E53.8+, G63.4**
- - - polyneuropathie *E53.8+, G63.4**
- vitamine B2 *E53.0*
- - avec
- - - perlèche *E53.0+, K93.8**
- - - stomatite angularis *E53.0+, K93.8**
- vitamine B2 en riboflavine *E53.0*
- vitamine B6 *E53.1*
- - avec anémie *D64.3*
- vitamine C *E54*
- - séquelles *E64.2*
- vitamine D *E55.9*
- - avec rachitisme *E55.0*

Carence –*suite*

- vitamine D2 *E55.9*
- vitamine E *E56.0*
- vitamine H *E53.8*
- vitamine K *E56.1*
- - avec
- - - carence
- - - - facteur de coagulation *D68.4*
- - - défaut, coagulation *D68.4*
- - - saignement *D68.4*
- - chez les nouveaux-nés *P53*
- vitamine P *E56.8*
- volumes *E86*
- zinc *E60*
- - alimentaire *E60*
- - avec anémie *D53.8*

Carie avec exposition pulpe *K02.5*

Carie dentaire *K02.9*

Carie stabilisée *K02.3*

Carié, cariée
- dent *K02.9*
- lésion *K02.9*

Caries *K02.9*
- cément *K02.2*
- dent *K02.9*
- Dentine *K02.1*
- émail des dents *K02.0*
- initiale *K02.0*
- irradiées *K03.8*
- limité à l'émail *K02.0*
- mesure prophylactique, fluor *Z29.8*
- osseuses *A18.0+, M90.09**
- - apophyse mastoïde, tuberculeux *A18.0+, H75.0**
- - genou *A18.0+, M01.16**
- - hanches, tuberculeuses *A18.0+, M01.15**
- - membres, tuberculeux NCA *A18.0+, M90.09**
- - nez, tuberculeux *A18.0+, M90.08**
- - orbite, tuberculeux *A18.0+, M90.08**
- - rachis, tuberculeux *A18.0+, M49.09**
- - sacrum, tuberculeux *A18.0+, M49.08**
- - syphilitique *A52.7+, M90.29**
- - vertébrale, tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- tuberculeuse *A18.0+, M90.09**

Carmins (E120)
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Carninome, ulcus *C80*

Carnitine, carence *E56.8*

Caro luxurians *L92.9*

Caroncule
- lacrymal *H04.3*
- - anomalie *Q10.6*
- - malformation
- - - acquise *H04.6*
- - - congénitale *Q10.6*
- tumeur*
- - bégnine *D31.0*
- - maligne *C69.0*
- urétrale, bénigne *N36.2*
- urètre *N36.2*
- vaginale *N89.8*

Carotène
- alimentation, excessive *E67.1*
- carence *E50.9*
- excès *E67.1*

Caroténémie *E67.1*
- origine diabétique *E67.1*

Carotide
- anévrysme *I72.0*
- - rompue *I72.0*
- - - dans le cerveau *I60.0*
- - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- - - intracrânienne *A52.0+, I68.8**
- sclérose *I67.2*
- sténose *I65.2*
- thrombose *I65.2*

Carotidynie *G90.08*

Carpe
- agénésie *Q71.3*
- anomalie *Q74.0*
- arthrose *M19.94*
- articulation, entorse *S63.51*
- blocage *M99.87*
- enthésopathie NCA *M77.8*
- fracture *S62.10*
- hypoplasie congénitale *Q71.8*
- lésion traumatique *S69.9*
- - avec atteinte des tendons *S69.7*
- luxation *S63.03*
- os du
- - fracture NCA *S62.10*
- - Luxation *S63.00*
- pyramidal, fracture *S62.12*
- semi-lunaire, ostéochondrite juvénile *M92.2*

Carraghénane
- allergie (E 407) *T78.4*
- Hypersensibilité (E 407) *T78.4*

Cartilage
- abcès *M94.89*
- absence, congénitale *Q31.8*
- agénésie *Q79.8*
- agénésie, larynx *Q31.8*
- anomalie *Q31.8*
- articulation *M24.09*
- aryténoïde, kyste *J38.7*
- atrésie *Q31.8*
- atrophie *M94.89*
- branchial *Q18.2*
- - congénital *Q18.2*
- branchiale *Q18.2*
- calcification post-infectieuse *M94.89*
- carcinome *C79.5*
- - avec atteinte osseuse *C79.5*
- cricoïde
- - anomalie *Q31.8*
- - fracture *S12.8*
- - malformation
- - - acquise *J38.7*
- - - congénitale *Q31.8*
- déchirure *T14.3*
- - genou, traumatique, récent *S83.2*
- dégénérescence *M24.19*
- difformité
- - acquise *J38.7*
- - congénitale *Q31.8*
- ectopique, intrapulmonaire *Q33.5*
- fente, arrière *Q31.8*

Cartilage –*suite*

- fermeture, défectueuse *Q31.8*
- fracture *S12.8*
- genou, déchirure aiguë *S83.3*
- hypertrophie *M94.89*
- hypoplasie *Q31.2*
- infection *M94.89*
- inflammation *M94.89*
- maladie *M94.99*
- nasal
- - anomalie *Q30.9*
- - hypertrophie *J34.8*
- nécrose *M94.29*
- ossification, sénile *M94.89*
- ramollissement *M94.89*
- - epiglotte *Q31.8*
- rupture, genou *S83.3*
- sarcome *C41.9*
- semilunaire-, ménisque *S83.2*
- septum nasal, luxation *S03.1*
- séquelles *M94.99*
- - articulation du genou *M23.99*
- - cheville *M24.17*
- sténose *J38.6*
- sternal
- - dislocation *S23.2*
- - entorse *S23.4*
- symphysaire, arrachement, lors de l'accouchement *O71.6*
- thyroïde
- - agénésie *Q31.8*
- - atrésie *Q31.8*
- - entorse *S13.5*
- - fente *Q31.8*
- - - congénitale *Q31.8*
- - frature *S12.8*
- - hypoplasie *Q31.2*
- - malformation
- - - acquise *J38.7*
- - - congénitale *Q31.8*
- - manque, congénital *Q31.8*
- - perforation *S13.2*
- - position, anomalie, congénitale *Q31.8*
- trachée
- - anomalie *Q32.1*
- - fracture *S12.8*
- - malformation *Q32.1*
- - manque, congénital *Q32.1*
- trachée, fracture *S12.8*
- troubles *M94.99*
- tubeuculose *A18.0+, M01.19**
- - intervertébrale *A18.0+, M49.09**

Cartilagineux, -neuse
- enchondromatose *Q78.4*
- exostose *D16.9*
- - gros orteil *D16.3*
- - multiple *Q78.6*

Cartilagineux, -se
- fosses nasales, congénital *Q30.8*
- septum nasal, luxation *S03.1*

Cartillage, semi-lunaire
- déchirure longitudinale du ménisque *S83.2*
- entorse, avec déchirure, frais *S83.2*
- genou, entorse *S83.6*
- rupture *S83.2*

Carvernome capillaire *D18.01*

Caryotype
- 45, X *Q96.0*
- 46, X
- - avec anomalie, gonosomes, sauf iso (Xq) *Q96.2*
- - iso (Xq) *Q96.1*
- 46, XX, avec ovaires en bandelettes *Q99.1*
- 46, XX, en cas de
- - hermaphrodisme *Q99.1*
- - Syndrome de Klinefelter, phénotype masculin *Q98.2*
- 46, XY, en cas de phénotype féminin *Q97.3*
- 46,XY, avec ovaires en bandelettes *Q99.1*
- 47, XX, Syndrome de Klinefelter *Q98.0*
- 47, XXX *Q97.0*
- - cas de phénotype féminin *Q97.0*
- 47, XYY *Q98.5*
- - cas de phénotype masculin *Q98.5*
- anormal *R89.8*

Caséeux(se)
- bronchite, tuberculeuse *A16.4*
- épididymite *A18.1+, N51.1**
- méningite *A17.0+, G01**
- péricardite *A18.8+, I32.0**
- péritonite *A18.3+, K67.3**
- pneumonie *A16.2*

Cassée, dent *S02.5*

Castration, traumatique, chez l'homme *S38.2*

Catalase, déficit *E80.3*

Catalepsie *F44.2*
- catatonique, aiguë *F20.2*
- hystérique *F44.2*
- schizophrénique *F20.2*

Cataleptique
- crise *F44.2*
- schizophrénie *F20.2*

Cataplexie *G47.4*
- idiopathique *G47.4*

Cataracte *H26.9*
- anneau, Soemmering *H26.4*
- antérieure, sous-capsulaire, sénile *H25.0*
- avec
- - glaucome *H40.5*
- - iridocyclite, chronique *H26.2*
- - opacités glaucomateuses, sous-capsulaires *H26.2*
- bleue *Q12.0*
- bleue, congénitale *Q12.0*
- brunescente *H25.1*
- cas de
- - diabète sucré *E14.30+, H28.0**
- - diabète sucré de type 1 *E10.30+, H28.0**
- - diabète sucré de type 2 *E11.30+, H28.0**
- - hétérochromie *H26.2*
- - hypoparathyroïdie *E20.9+, H28.1**
- - maladie métabolique NCA *E88.9+, H28.1**
- - maladie, endocrinienne NCA *E34.9+, H28.1**
- - myxoedème *E03.9+, H28.1**
- - trouble, alimentation NCA *E63.9+, H28.1**
- centrale *Q12.0*

Cataracte *–suite*
- compliquée *H26.2*
- congénitale *Q12.0*
- - polaire
- - - antérieure *Q12.0*
- - - postérieure *Q12.0*
- - totale *Q12.0*
- contusion *H26.1*
- coralliforme *Q12.0*
- coronaire *Q12.0*
- corticale *H26.9*
- corticale débutante *H25.0*
- cortico-nucléaire *H26.8*
- - capsulaire postérieure *H26.8*
- - évoluée *H26.8*
- - subcapsulaire postérieure *H26.8*
- cristallin *Q12.0*
- dépistage *Z13.5*
- diabétique *E14.30+, H28.0**
- - avec
- - - diabète de type 1 *E10.30+, H28.0**
- - - diabète de type II *E11.30+, H28.0**
- due à
- - cristallin dur *H26.8*
- - irradiation *H26.8*
- - malnutrition et déshydratation *E46+, H28.1**
- - rayonnement thermique *H26.8*
- due à une maladie, oeil *H26.2*
- électrique *H26.8*
- embryonnaire *Q12.0*
- évoluée *H26.9*
- hétérochrome *H26.2*
- hypermature, avec glaucome *H40.5*
- immature *H26.9*
- incipiente *H26.9*
- induite par des médicaments *H26.3*
- infantile *H26.0*
- infrarouge *H26.8*
- intumescente *H26.9*
- juvénile *H26.0*
- mature *H26.9*
- médicamenteuse *H26.3*
- membraneuse congénitale *Q12.0*
- myotonique *G71.1+, H28.2**
- nucléaire *H26.9*
- - avec sclérose *H25.1*
- - embryonnaire *Q12.0*
- - sénile *H25.1*
- périnucléaire *Q12.0*
- polaire
- - antérieure *Q12.0*
- - postérieure *Q12.0*
- ponctuée *Q12.0*
- postérieure, sous-capsulaire, sénile *H25.0*
- prématurée *H26.9*
- présénile *H26.0*
- primitive *H26.0*
- - membraneuse *H26.0*
- pulvérulente *Q12.0*
- - congénitale *Q12.0*
- pyramidale *Q12.0*
- sapin de Noël *G71.1+, H28.2**
- sclérose nucléaire *H25.1*
- secondaire *H26.4*
- - avec affection, oeil *H26.2*
- - cas d'affection, oeil *H26.2*

Cataracte *–suite*
- secondaire *–suite*
- - membraneuse *H26.4*
- sénile *H25.9*
- - brunescente *H25.1*
- - coronaire *H25.0*
- - corticale *H25.0*
- - évoluée *H25.8*
- - grise *H25.9*
- - hypermûre *H25.2*
- - intumescente *H25.8*
- - mixte *H25.8*
- - mûre *H25.9*
- - nucléaire *H25.1*
- - punctiforme *H25.0*
- - subcapsulaire
- - - antérieure *H25.0*
- - - évoluée *H25.8*
- - - postérieure *H25.0*
- - type Morgagni *H25.2*
- sénile débutante *H25.0*
- souffleurs de verre *H26.8*
- sous-capsulaire, sénile *H25.0*
- toxique *H26.3*
- traumatique *H26.1*
- type Morgagni *H25.2*
- verriers *H26.8*
- zonulaire *Q12.0*

Catarrhal(e)
- angine *J03.9*
- appendicite *K35.9*
- bronchite *J40*
- - aiguë *J20.9*
- - chez les enfants de moins de 15 ans *J20.9*
- - chronique *J41.0*
- colite *K52.9*
- croup *J05.0*
- dysenterie *A09*
- hépatite
- - aiguë *B15.9*
- - avec coma hépatique *B15.0, K72.74!*
- inflammation, trompe d'Eustache *H68.0*
- laryngite *J37.0*
- laryngotrachéite, chronique *J37.1*
- métrite *N71.9*
- néphrite, aiguë *N00.9*
- ophtalmie *H10.2*
- otite moyenne *H65.9*
- - aiguë *H65.1*
- - chronique *H65.2*
- - subaiguë *H65.1*
- pharyngite *J02.9*
- pneumonie *J18.0*
- rhinite *J31.0*
- sinusite *J32.9*
- staphylite *K12.28*
- trachéite *J04.1*
- - aiguë *J04.1*
- trachéobronchite *J40*
- tubotympanite *H65.2*
- - chronique *H65.2*
- uvulite *K12.28*

Catarrhe *J00*
- aigu *J00*
- automnal *J30.1*
- bronchique *J40*
- - chronique *J42*

Catarrhe –*suite*

- chronique *J31.0*
- col de l'utérus *N72*
- conduit de l'oreille moyenne *H65.9*
- - chronique *H65.2*
- conjonctive *H10.9*
- duodénum *K29.8*
- estival *J30.1*
- estivale *J30.1*
- estomac *K29.7*
- folliculaire *H10.8*
- gastro-intestinal *K52.9*
- - aigu *A09*
- gland *N48.1*
- glande lymphatique *R59.9*
- gorge *J02.9*
- - aigu *J02.9*
- - chez le fumeur *J31.2*
- - chronique *J31.2*
- infectieux *J00*
- inflammatoire *J00*
- intestin *K52.9*
- - aigu *A09*
- larynx, chronique *J37.0*
- lèvres vulvaires *N76.2*
- nez *J31.0*
- - aigu *J00*
- - chronique *J31.0*
- oeil, aigu *H10.2*
- oreille *H93.8*
- oreille moyenne *H65.9*
- - chronique *H65.2*
- - - ulcére *H65.2*
- printanier, oeil *H10.1*
- région rhinopharyngée *J31.1*
- - aigu *J00*
- - chronique *J31.1*
- rhinobronchique chronique *J31.1*
- rhino-bronchique, chronique *J31.1*
- rhinopharyngé
- - aigu *J00*
- - chronique *J31.1*
- rhino-pharyngé
- - aigu *J00*
- - chronique *J31.1*
- rhino-trachéal *J04.1*
- sinus frontal *J32.1*
- sinus maxillaire *J32.0*
- sinus nasal *J32.9*
- sinus nasal, aigu *J01.9*
- syphilitique, congénital *A50.0+, J99.8**
- trachée *J04.1*
- trompe *H68.0*
- - aigu *H68.0*
- - chronique *H68.0*
- - exsudatif *H68.0*
- - oreille *H68.0*
- trompe d'Eustache *H68.0*
- tubo-tympanique *H65.9*
- - aigu *H65.0*
- - chronique *H65.2*
- urètre *N34.2*
- vessie *N30.9*
- voies respiratoires
- - aigu *J22*
- - - combiné *J06.9*
- - supérieures, aigu *J06.9*

Catatonie *F20.2*

Catatonie –*suite*

- aiguë *F20.2*

Catatonique
- agitation *F20.2*
- catalepsie, aiguë *F20.2*
- démence *F20.2*
- état de tension *F20.2*
- état d'excitation *F20.2*
- schizophrénie *F20.2*
- stupeur *F20.2*
- symptôme
- - avec activité, psychomotrice *F06.1*
- - cas de stupeur *F06.1*
- trouble, organique *F06.1*

Catécholamine
- hypersécrétion *E27.5*
- taux urinaire, élevé *R82.5*

Catégorie
- A, clinique, maladie VIH *U60.1!*
- B, clinique, maladie VIH *U60.2!*
- C, clinique, maladie VIH *U60.3!*

Cathéter
-
- avec
- - complication NCA *T85.9*
- - complication, mécanique NCA *T85.6*
- - embolie NCA *T85.88*
- - fibrose NCA *T85.88*
- - hémorragie NCA *T85.88*
- - maladie NCA *T85.88*
- - thrombose NCA *T85.88*
- Broviac® *Z95.81*
- Broviak® *Z45.20*
- défaillance NCA *T85.6*
- déplacement NCA *T85.6*
- dialyse
- - avec
- - - complication *T82.9*
- - - - mécanique *T82.4*
- - - embolie *T82.8*
- - - fibrose *T82.8*
- - - sténose *T82.8*
- - - thrombose *T82.8*
- - déplacement *T82.4*
- - dysfonction *T82.4*
- - fuite *T82.4*
- - infection *T82.7*
- - inflammation *T82.7*
- - obstruction *T82.4*
- - perforation *T82.4*
- dialyse péritonéale
- - avec complication *T85.9*
- - - mécanique *T85.6*
- - déplacement *T85.6*
- - dysfonctionnement *T85.6*
- - embolie *T85.88*
- - fuite *T85.6*
- - infection *T85.71*
- - inflammation *T85.71*
- - obstruction *T85.6*
- - septicémie *T85.71*
- - sténose *T85.88*
- - thrombose *T85.88*
- dysfonctionnement NCA *T85.6*
- fuite NCA *T85.6*
- malposition NCA *T85.6*
- obstruction NCA *T85.6*

Cathéter –*suite*

- occlusion, en cas de cathéter de fistule sus-pubien *T83.0*
- perfusion
- - avec
- - - complication mécanique *T82.5*
- - - embolie NCA *T82.8*
- - - fibrose NCA *T82.8*
- - - sténose NCA *T82.8*
- - - thrombose *T82.8*
- - défaut de positionnement NCA *T82.5*
- - déplacement NCA *T82.5*
- - dysfonctionnement NCA *T82.5*
- - fuite NCA *T82.5*
- - inflammation *T82.7*
- - rachidienne
- - - déplacement *T85.6*
- - - fuite *T85.6*
- - - obstruction *T85.6*
- permanent
- - changement *Z46.6*
- - transurétral, existant *Z97.8*
- spinal, avec
- - complication, mécanique *T85.6*
- - embolie *T85.81*
- vasculaire, infection *T82.7*

Cauchemar *F51.5*

Caudal, déplacement
- cervelet, congénital *Q04.8*
- tronc cérébral, congénital *Q04.8*

Causalgie *G56.4*

Cause du décés
- imprécise *R99*
- inconnue *R99*

Causes de mortalité non précisées *R99*

CAV (canal atrio-ventriculaire) - *voir* au *Q21.1*

Caverne
- papilles du nerf optique *Q14.2*
- poumons *A16.2*
- - non tuberculeux *J98.4*
- prostate *N42.8*

Caverneux, -euse
- hémangiome *D18.00*
- - orbite *D18.08*
- - rétine *D18.08*
- lymphangiome *D18.19*
- naevus *D18.00*

Cavernite *N48.2*
- verge *N48.2*

Cavernome *D18.01*

cavité buccal organe digestif évolution imprévisible ou inconnu : Pancréas , Tumeur de la *D37.70*
- imprévisible ou inconnu : Autre organe digestif , Tumeur de la *D37.78*

Cavité abdominale
- abcès *K65.0*
- grossesse *O00.0*
- hydrops *R18*
- syphilis tardive *A52.7*

Cavité amniotique
- infection *O41.1*
- trouble(s) *O41.9*

Cavité buccale
- abcès *K12.29*

Cavité buccale –*suite*

- atrophie *K13.7*
- carcinome *C06.9*
- carcinome in situ *D00.0*
- corps étranger *T18.0*
- fistule *K12.28*
- hémorragie *K13.7*
- inflammation *K12.1*
- kyste de la fente *K09.1*
- lésion, superficielle *S00.50*
- leucoplasie *K13.2*
- lymphangiome *D18.18*
- mucocèle *K13.7*
- papillome *D10.3*
- plaie, ouverte *S01.50*
- syphilis *A51.3*
- tumeur *D37.0*
- tumeur mixte *D37.0*

Cavité cardiaque
- anomalie *Q20.8*
- anomalie congénitale *Q20.9*
- apoplexie *I21.9*
- fibrillation *I49.0*
- thrombose *I51.3*
- - ancienne *I51.3*
- - complication aiguë après infarctus aigu du myocarde *I23.6*

Cavité crânienne
- lésion *S06.8*
- tératome *D48.0*

Cavité de l'oeil, *voir* orbite

Cavité glénoïde
- luxation *S43.00*
- scapula, fracture *S42.14*

Cavité mastoïde
- cholestéatome récidivant, après mastoïdectomie *H95.0*
- complication, après mastoïdectomie NCA *H95.1*
- inflammation chronique, après mastoïdectomie *H95.1*
- kyste
- - après mastoïdectomie *H95.1*
- - muqueux, après mastoïdectomie *H95.1*
- tissu de granulation, après mastoïdectomie *H95.1*

Cavité médiane
- accouchement par forceps *O81*
- - avec rotation *O81*
- contracture, avec disproportion, foetopelvienne *O33.3*
- et détroit inférieur du bassin, rétrécissement, encombrement, naissance *O65.3*
- rétrécissement, soins, mère *O33.3*

Cavité médullaire, sténose lombaire *M48.06*

Cavité péritonéale, avec liquide *R18*

Cavité péritonéale, libre, hémorragie *R58*

Cavum
- cholestéatome, tympan *H71*
- septi pellucidi, dilaté *Q06.8*
- synéchie utérine *N85.6*

Cavus du pied *Q66.8*
- acquis *M21.57*

CC [complication cardiaque] *voir* Cardiop *I51.9*

CD30 positif
-
- Lymphome
- - anaplasique à grand cellules, *C84.6*
- - cutané à grand cellules T, *C86.6*
- - diffus grand cellules B , *C83.3*
- Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, *C86.6*

Cécité *H54.0*
- acquise *H54.0*
- affection, induite par le VIH *B23.8, H54.0*
- Agnosie (visuelle) *R48.1*
- complète *H54.0*
- congénitale *H54.0*
- corticale *H53.8*
- couleurs *H53.5*
- couleurs (rouge, vert) *H53.5*
- dans les antécédants familiaux *Z82*
- deux yeux *H54.0*
- dissociative *F44.6*
- diurne *H53.1*
- due à
- - commotion *S05.8*
- - lésion *S05.9*
- - souffle d'explosion *S05.8*
- d'un oeil *H54.4*
- émotionnelle *F44.6*
- hémianopsie *H53.4*
- - bitemporale *H53.4*
- - hétéronyme *H53.4*
- - homonyme *H53.4*
- - nasale *H53.4*
- - périphérique *H53.4*
- hystérique *F44.6*
- nocturne *H53.6*
- - amblyopie *H53.6*
- - Avitaminose A *E50.5+, H58.1**
- nocturne, carence vitamine A *E50.5+, H58.1**
- suite à une lésion *T90.4*
- transitoire *H53.1*
- traumatique *S05.9*
- unilatérale, avec faculté visuelle, faible, autre oeil *H54.1*
- urémique *N19*

Ceelen-Gellerstedt, syndrome de *E83.1+, J99.8**

Céfotaxime
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Ceinture limbique, Vogt *H18.4*

Ceinture pelvienne
- Agénésie *Q74.2*
- anomalie NCA *Q74.2*
- dystrophie musculaire *G71.0*
- hypoplasie *Q74.2*
- malformation congénitale *Q74.2*
- myopathie *G71.0*
- nerf, blessure *S74.9*
- plaie, ouverte NCA *S71.80*

Ceinture scapulaire ou région de l'omopl *S41.80*

Cellulaire
- fibro-adénome, intracanaliculaire *D24*
- léiomyome *D21.9*
- malformation immunitaire *D84.8*
- transition
- - carcinome in situ *D09.9*

Cellulaire –*suite*
- transition –*suite*

- - méningeome *D32.9*

cellularité mixte Lymphome Hodgkin (classique) à *C81.2*

cellules
-
- ALK
- - négatif Lymphome anaplasique à grand *C84.7*
- - positif Lymphome anaplasique à grand *C84.6*
- B
- -
- - anaplasique Lymphome diffus à grand *C83.3*
- - CD30 positif Lymphome diffus à grand *C83.3*
- - Lymphome
- - - diffus à grand *C83.3*
- - - médiastinal (thymique) à grand *C85.2*
- - - petit *C83.0*
- - - tissu lymphoïde associé au muqueuse [lymphome MALT] , Lymphome extranodal de la zone marginal à *C88.4*
- B (lymphocytes)
- - hyperplasie *E16.1*
- - immunocytome *C83.0*
- - leucémie *C91.70*
- - - rémission complète *C91.71*
- - lymphome NCA *C85.1*
- - - cérébral *C85.1*
- - - monocytoïde *C85.7*
- - lymphome non hodgkinien *C85.1*
- - tumeur *D13.7*
- bague à chaton
- - adénocarcinome *C80*
- - carcinome
- - - antre de l'estomac *C16.3*
- - - l'estomac *C16.9*
- ballonnisées, mélanome à *C43.9*
- ballons, mélanome *C43.9*
- ballons, naevus *D22.9*
- CD30 positif Lymphome anaplasique à grand *C84.6*
- claires
- - adénocarcinome *C80*
- - adénofibrome *D27*
- - adénome *D36.9*
- - - surrénalienne *D35.0*
- - hidradénome *D23.9*
- - sarcome *C49.9*
- - - rénale *C64*
- claires, à
- - adénocarcinome *C80*
- - adénofibrome *D27*
- - adénome *D36.9*
- dans l'urine *R82.9*
- dendritique cellules foeto-pelvienne Sarcome à *C96.4*
- épithélioïdes, à
- - granulomatose *D86.9*
- - mélanome *C43.9*
- - mélanosarcome *C43.9*
- - mésothéliome *C45.9*
- - - mésentérique, bénin *D19.1*
- - - mésocôlon, bénin *D19.1*
- - - omentum (épiploon), bénin *D19.1*

cellules –*suite*
- épithélioïdes, à –*suite*
- - mésothéliome –*suite*
- - - péritoine, bénin *D19.1*
- - - plèvre, bénin *D19.0*
- - naevus *D22.9*
- - réticuloendothéliose *D86.9*
- - sarcome *C49.9*
- - - synovial *C49.9*
- ethmoïdales
- - carcinome *C31.1*
- - infection, chronique *J32.2*
- - inflammation *J32.2*
- foeto-pelvienne Sarcome cellules dendritique (*C96.4*
- fusiformes
- - lipome *D17.9*
- - mélanome, malin, de
- - - type
- - - - A *C69.4*
- - - - B *C69.4*
- - naevus *D22.9*
- - sarcome *C49.9*
- - - synovial *C49.9*
- géantes
- - cémentome *D16.5*
- - - mâchoire supérieure *D16.42*
- - fibro-adénome intracanaliculaire *D24*
- - sarcome (à l'exception des os) *C49.9*
- - tumeur
- - - chondromateuse *D16.9*
- - - os *D48.0*
- granuleuses, à
- - myoblastome *D21.9*
- - - langue *D10.1*
- - - malin *C49.9*
- - tumeur *D21.9*
- hépatiques
- - carcinome *C22.0*
- - - avec carcinome, voies biliaires, combiné *C22.0*
- - dégénérescence *K72.9*
- - lésions, en cas de cholestase *K71.0*
- - séquelles *K76.9*
- - - avec ictère, néonatale *P59.2*
- hilaires, tumeur *D27*
- Langerhans
- -
- - Histiocytose unifocale à *C96.6*
- - multifocale
- - - multisystémique disséminé) [Maladie d ' Abt - Letterer - Siwe] , Histiocytose à *C96.0*
- - - unisystémique Histiocytose à *C96.5*
- - Sarcome à *C96.4*
- Lymphome cutané anaplasique à grand *C86.6*
- manteau Lymphome à *C83.1*
- mastocytes
- - leucémie *C94.30*
- - - rémission comlpète *C94.31*
- - maladie systémique *C96.2*
- - sarcome *C96.2*
- - tumeur *D47.0*
- - - maligne *C96.2*
- matures
- - liposarcome *C49.9*
- - tératome
- - - foie, adulte, bénin *D13.4*

cellules –*suite*
- matures –*suite*
- - tératome –*suite*
- - - testicules, adulte, bénin *D29.2*
- - type Burkitt LLA-B à *C91.8*
- mixtes
- - adénocarcinome *C80*
- - astrocytome *C71.9*
- - lymphome
- - - folliculaire *C82.1*
- - - lymphocytaire-histiocytaire *C83.2*
- - - - nodulaire *C82.1*
- - maladie d'Hodgkin, nodulaire sclérosante *C81.1*
- - meningiome *D32.9*
- mucoïdes
- - adénocarcinome *C75.1*
- - adénome *D35.2*
- - carcinome *C75.1*
- myocardiques, nécrose *I21.9*
- NK Lymphome blastique à *C86.4*
- plasmatiques
- - leucémie *C90.10*
- - - rémission complète *C90.11*
- - myléome
- - - monostotique *C90.00*
- - - multiples *C90.00*
- - - - rémission complète *C90.01*
- - sarcome *C90.20*
- pléomorphes, sarcome, réticulocelullaire *C83.3*
- précurseur B Lymphome à *C83.5*
- principales, adénome *D35.1*
- rondes *C71.9*
- - liposarcome *C49.9*
- - sarcome *C49.9*
- rondes, sarcome, indifférent, os *C41.9*
- souches, donneur *Z52.01*
- T
- -
- -
- - associé entéropathie Lymphome à *C86.2*
- - CD30 positif Lymphome cutané à grand *C86.6*
- - - Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à *C86.6*
- - leucémie *C91.50*
- - - chez l'adulte *C91.50*
- - - - rémission complète *C91.51*
- - - prolymphocytaire à *C91.6*
- - Lymphome
- - - angio #NAME? *C86.5*
- - - hépatosplénique à *C86.1*
- - lymphome non hodgkinien *C84.4*
- - non spécifié Lymphome périphérique à *C84.4*
- - sans précision Lymphome cutané à *C84.8*
- - type panniculite Lymphome sous - cutané à *C86.3*
- T par microlitre de sang
- - 200 à 499, en cas de maladie due au VIH *U61.2!*
- - 500 et plus, en cas de maladie due au VIH *U61.1!*
- - moins de 200, en cas de maladie due au VIH *U61.3!*
- T/NK
- - matures

cellules –*suite*
- T/NK –*suite*
- - matures –*suite*
- - - Autre Lymphome à *C84.5*
- - - sans précision , Lymphome à *C84.9*
- - spécifiés Autre Lymphome à *C86*
- - type nasal Lymphome extranodal à *C86.0*
- transition (transitionnelles)
- - bassinet, papillome *D41.1*
- - tumeur *D48.9*
- - uretère, papillome *D41.2*
- - vessie
- - - carcinome *C67.9*
- - - papillome *D41.4*
- type alpha bêta gamma - delta , Contient des *C86.1*

Cellulite *L03.9*
- après vaccination *T88.0*
- éosinophile *L98.3*
- péri- *L03.9*
- sein *N61*

Cément
- allergie *L23.5*
- aplasie *K00.4*
- caries *K02.2*
- dermatite, toxique *L24.5*
- dermite par contact *L25.3*
- - allergique *L23.5*
- hyperplasie *K03.4*
- hypoplasie *K00.4*

Cémentoblastome *D16.5*
- os maxillaire supérieur, bénin *D16.42*

Cémento-fibrome *D16.9*

Cémentome *D16.42*
- cellules géantes *D16.5*
- - sinus maxilaires *D16.42*
- fibro- *D16.9*
- géant *D16.5*
- - mâchoire supérieure *D16.42*
- os maxillaire supérieur *D16.42*

Cémentose *K03.4*

Central
- aménorrhée *N91.1*
- apnée du sommeil *G47.30*
- artériosclérose *I70.9*
- artérite *I77.6*
- choriorétinopathie, séreuse *H35.7*
- déchirement du périnée, lors de l'accouchement *O70.9*
- démyélinisation du corps calleux *G37.1*
- dystrophie
- - choroïde aréolaire *H31.2*
- - choroïde aréolaire généralisée *H31.2*
- - cornée, cristallin *H18.5*
- - épithélium pigmentaire, aréolaire, choroïde *H31.2*
- granulome à cellules géantes *K10.1*
- granulome, mâchoire inférieure *K10.1*
- hématomyélie *G95.1*
- îlot *H53.4*
- lacération intestinale, complication pendant l'accouchement *O70.9*
- myélinolyse, pontine *G37.2*
- myopathie des fibrilles *G71.2*
- nécrose du foie, hémorragique *K76.2*
- nystagmus de position *H81.4*
- opacité de la cornée NCA *H17.1*

Central –*suite*
- origine des vertiges *H81.4*
- paralysie faciale *G51.0*
- perforation de la membrane du tympan *H72.0*
- perte de l'audition *H90.5*
- pneumonie *J18.1*
- puberté précoce, déclenchée *E22.8*
- relatif aux troubles respiratoires *R06.88*
- rétinite, syphilitique, récidivente *A52.7+, H32.0**
- rétinopathie, séreuse *H35.7*
- scotom *H53.4*
- - champ visuel *H53.4*
- - syphilitique *A52.7+, H58.1**
- surdité *H90.5*
- syndrome de la moelle épinière *S24.12*
- système nerveux
- - affection due à maladie induite par le VIH *B22+, G94.8**
- - anévrisme syphilitique *A52.0+, I68.8**
- - anomalie NCA *Q07.9*
- - artériosclérose *I67.2*
- - atrophie systémique, en cas de
- - - myxoedème *E03.9+, G13.2**
- - - tumeur ou néoformation NCA *D48.9+, G13.1**
- - atteinte rhumatismale en cas de fièvre *I02.9*
- - complication
- - - due à l'anesthésie
- - - - durant la grossesse *O29.2*
- - - - durant les suites de couches *O89.2*
- - - due à l'anesthésie lors de l'accouchement *O74.3*
- - cysticercose *B69.0+, G99.8**
- - déchéance avec psychose *F09*
- - déficience *G96.8*
- - dégénérescence myélinique *G37.9*
- - démyélinisation *G37.9*
- - gomme *A52.3+, G07**
- - - syphilitique *A52.3+, G07**
- - gomme (syphilitique) *A52.3+, G07**
- - infection à virus lent *A81.9*
- - infection due à
- - - entérovirus NCA *A88.8*
- - - virus *A89*
- - - virus Coxsackie NCA *A88.8*
- - lésion des vaisseaux sanguins *I67.9*
- - lésion due à un traumatisme obstétrical *P11.9*
- - maladie *G96.9*
- - - démyélinisante *G37.9*
- - - - avec myélite aiguë transverse *G37.3*
- - - induite par des prions *A81.9*
- - maladie démyélinisante *G37.9*
- - myélosclérose disséminée *G35.9*
- - nécrose ischémique NCA *I67.88*
- - perte de l'audition neurosensorielle *H90.5*
- - processus
- - - inflammatoire *G04.9*
- - - inflammatoire chronique *G04.9*
- - résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.0*
- - résultats anormaux d'imagerie diagnostique *R90.8*
- - soins maternels pour difformité du foetus *O35.0*

Central –*suite*
- système nerveux –*suite*
- - soins maternels pour malformation du système nerveux central du fœtus *O35.0*
- - syphilis *A52.3*
- - - avec
- - - - ataxie *A52.1*
- - - - paralysie
- - - - - progressive, juvénile, *A50.4*
- - - - - progressive, *A52.1*
- - - - parésie *A52.1*
- - - - Tabes dorsal (ou dégénérescence des cordons postérieurs de la moelle épinière) *A52.1*
- - - - tabo-paralysie juvénile, *A50.4*
- - - - - *A52.1*
- - - cas de tabès *A52.1*
- - - congénitale *A50.4*
- - - floride *A52.1*
- - - juvénile *A50.4*
- - - latente *A52.2*
- - - tertiaire *A52.3*
- - - vasculaire *A52.0+, I68.8**
- - syphilis tardive *A52.3*
- - syphilome *A52.3*
- - tuberculose NCA *A17.9+, G99.8**
- - - état suivant *B90.0*
- - - séquelles tardives *B90.0*
- troubles
- - coordination *R27.8*
- - mouvement *G25.9*
- ulcère de la cornée *H16.0*
- uvéite postérieure *H30.0*
- vertiges *H81.4*

Centre respiratoire
- dépression *G93.88*
- paralysie NCA *G93.88*

Centre-africain, lymphome (de Burkitt) *C83.7*

Centres vitaux, altération chez le nouve *P91.88*

Centres vitaux, défaillance, chez le nou *P91.88*

Centroblastique
- lymphome
- - diffus *C83.8*
- - folliculaire *C82.7*

Centroblastome *C83.8*

centrocytaire Lymphome *C83.1*

Centro-cytique, lymphome *C83.8*

Centrocyto-centroblastique, lymphome *C83.8*
- diffus *C83.8*
- folliculaire *C82.7*

Centro-cytome *C83.8*

centrofolliculaire
- cutané Lymphome *C82.6*
- diffus Lymphome *C82.5*

Centro-lobulaire, emphysème *J43.2*

Centrolobulaire, sclérose familiale *E75.2*

Centronucléaire, myopathie *G71.2*

Centro-nucléaire, myopathie *G71.2*
- myotubulaire *G71.2*

Cénurose *B71.8*

Céphalalgie *R51*

Céphalalgie –*suite*
- d'origine non organique *F45.4*

Céphalée *R51*
- cluster *G44.0*
- de tension *G44.2*
- - chronique *G44.2*
- - épisodique *G44.2*
- - épisodiques *G44.2*
- - migraineuse *G44.2*
- - nerveuse *G44.2*
- - par contraction musculaire *G44.2*
- grappe *G44.0*
- - chronique *G44.0*
- - épisodique *G44.0*
- Horton, de *G44.0*
- médicamenteuse *G44.4*
- nerveuse *F45.4*
- vasomotrice *G44.1*

Céphalhématome, due à une lésion congéni *P12.0*

Céphalie, cycles *Q04.9*

Céphalique
- algie, céphalée *R51*
- - cervico-céphalique *M53.0*
- - - aiguë *M53.0*
- - - cas de blocage *M53.0*
- - - chronique *M53.0*
- - migraineuse *G43.9*
- - vasomotrice *G44.1*
- hématocèle
- - chez le nouveau-né *P52.8*
- - due à un traumatisme obstétrical chez le foetus/nouveau-né *P10.8*
- - traumatique *S09.8*
- hématome traumatique *S09.8*
- hypoplasie *Q02*
- syndrome cervico-céphalique *M53.0*

Céphalocèle *Q01.9*

Céphalo-pelvienne, disproportion dystoci *O65.4*

céphalorachidien
- après rachicentèse Ecoulement de liquide *G97.0*
- Ecoulement liquide *G96.0*

Céphalosporine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Céphalo-thoracopages *Q89.4*

Cercarienne, dermite *B65.3*

Cerclage
- avec accouchement par césarienne *O34.39*
- avec complication *T85.9*
- cas d'insuffisance cervico-utérine, pendant la grossesse *O34.39*
- soins
- - femme enceinte *O34.39*
- - mère *O34.39*

Cercomoniase *A07.8*

Cérébelleux(se)
- abcès *G06.0*
- astrocytome *C71.6*
- ataxie *G11.9*
- - alcoolique *G31.2*
- - avec *G11.1*
- - avec défaut de réparation de l'ADN *G11.3*

Cérébelleux(se) –*suite*
- ataxie –*suite*
- - début précoce *G11.1*
- - - avec
- - - - myoclonie *G11.1*
- - - - réflexes tendineux conservés *G11.1*
- - - - tremblement essentiel *G11.1*
- - entraînant
- - - myxoedème *E03.9+, G13.2**
- - - neurosyphilis *A52.1+, G99.8**
- - - tumeur ou néoformation NCA *D48.9+, G13.1**
- - héréditaire *G11.9*
- - tardive *G11.2*
- atrophie *G31.9*
- cholestéatome *D33.1*
- dégénérescence *G31.9*
- - alcoolique *G31.2*
- - héréditaire *G11.9*
- encéphalomalacie *G93.88*
- hémiatrophie *G31.9*
- hémorragie *S06.30*
- - chez le foetus/nouveau-né *P52.6*
- - non-traumatique *I61.4*
- - traumatique *S06.34*
- hérédo-ataxie *G11.9*
- maladie héréditaire *G11.9*
- métastase *C79.3*
- sarcome *C71.6*
- - arachnoïdien circonscrit *C71.6*
- sclérose héréditaire *G11.9*
- sténose atérielle *I66.3*
- syndrome héréditaire *G11.9*
- télangiectasie *G11.3*
- trouble de l'irrigation sanguine *I67.88*

Cerebellum - *voir aussi* Cervelet

Cérébral - *voir* également le type de la
- anévrisme du sinus veineux *I67.10*
- organique, syndrome *F06.9*
- traumatisme crânio- *S06.9*
- - ouvert *S06.9*

Cérébro
- hépato-rénal, syndrome *Q87.8*
- lipofuscinose neuronale *E75.4*
- maculaire, dystrophie *E75.4*
- malacie *G93.88*
- méningée, hémorragie *I61.8*
- oculo-facio-squelettique, syndrome *Q87.8*
- oculo-rénale, dystrophie *E72.0*
- organique
- - arrêt *G93.88*
- - attaque *R56.8*
- - psychose *F06.8*
- - syndrome *F06.9*
- - - avec délirium
- - - - aigu *F05.9*
- - - - subaigu *F05.9*
- - syndrome psychotique *F06.9*
- - vertige *H81.4*
- pathie psychique d'origine toxémique *F10.6*
- rétinien(ne)
- - angiomatose *Q85.8*
- - lipidose *E75.4*
- side, lipidose *E75.2*
- sidose *E75.2*

Cérébro –*suite*
- spinal(e)
- - arachnoïdite *G03.9*
- - artério-sclérose *I67.2*
- - endartérite *I67.7*
- - épanchement *G03.9*
- - fistule *G96.0*
- - hémorragie *I61.9*
- - infection, due à la présence de méningocoques *A39.0+, G01**
- - maladie *G96.9*
- - méningite *A39.0+, G01**
- - - due au typhus *A75.9+, G01**
- - - tuberculeuse *A17.0+, G01**
- - méningite tuberculeuse *A17.0+, G01**
- - otorrhée (écoulement purulent qui s'effectue par l'oreille) *G96.0*
- - sclérose
- - - disséminée *G35.9*
- - - multiple ou sclérose en plaques *G35.9*
- - syphilis *A52.1*
- - - tabique *A52.1*
- - tuberculose *A17.8+, G07**
- tendineuse, xanthomatose *E75.5*
- vasculaire(s)
- - affection *I67.9*
- - affection en période post-partum *O99.4*
- - artério-sclérose *I67.2*
- - attaque (ou apoplexie) *I64*
- - - ancienne *Z86.7*
- - dégénérescence *I67.9*
- - démence *F01.9*
- - dépression *F32.9*
- - dysfonctionnement *I67.9*
- - - période puerpérale (états selon I60-I69) *O99.4*
- - hémorragie *I61.9*
- - infarctus *I63.9*
- - insiffisance *I67.88*
- - - 1er degré *I67.88*
- - - aiguë *I67.88*
- - ischémie *I67.88*
- - - organique, avec psychose *F01.9*
- - maladie *I67.9*
- - - aiguë *I67.88*
- - - artério-sclérosante *I67.2*
- - - complication(s) lors de l'accouchement *O99.4*
- - - cours de grossesse *O99.4*
- - - ischémique *I67.88*
- - - occlusive *I66.9*
- - - par embolie *I66.9*
- - - période puerpérale *O99.4*
- - - séquelles NCA *I69.8*
- - - thrombotique *I66.9*
- - - - aiguë *I63.3*
- - maladie dégénérative *I67.9*
- - occlusion *I66.9*
- - - avec infarctus cérébral *I63.5*
- - - diffuse *I66.9*
- - réinfarctus *I63.9*
- - sclérose *I67.2*
- - syphilis *A52.0+, I68.8**
- - trouble de la régulation *I67.9*
- - trouble de l'irrigation sanguine *I67.88*
- - - chronique *I67.88*
- vasculaire, insuffisance *I67.88*

Cérébro –*suite*
- veineux, thrombose du sinus
- - cours de la grossesse *O22.5*
- - période puerpérale *O87.3*
- ventriculaire, affection *G93.88*

Certificat
- fins administratives, consultation *Z02*
- médical, délivrance *Z02*
- - de
- - - aptitude *Z02*
- - - cause du décés *Z02*
- - - inaptitude *Z02*
- - - invalidité *Z02*

Certificat, délivrance *Z02*

Céruléoplasmine, carence *E83.0*

Cérumen *H61.2*
- blocage *H61.2*
- bouchon de *H61.2*
- enclavée *H61.2*
- obstructif *H61.2*
- solide *H61.2*

Cérumineux
- adénocarcinome *C44.2*
- adénome *D23.2*
- carcinome *C44.2*

Cerveau
- abcès *G06.0*
- - chromomycotique *B43.1+, G07**
- - embolique *G06.0*
- - épidural *G06.0*
- - extradural *G06.0*
- - hépatique, par amibes *A06.6+, G07**
- - kystique *G06.0*
- - otogène *G06.0*
- - par
- - - amibes *A06.6+, G07**
- - - gonocoques *A54.8+, G07**
- - pariétal *G06.0*
- - pulmonaire, par amibes *A06.6+, G07**
- - sous-arachnoïdien *G06.0*
- - temporal *G06.0*
- - tuberculeux *A17.8+, G07**
- absence *Q00.0*
- affection, organique, avec psychose *F09*
- agénésie *Q00.0*
- alimentant le cerveau
- - artère, extra-crânienne
- - - apoplexie
- - - - embolique *I63.1*
- - - - thrombotique *I63.0*
- - - embolie *I65.9*
- - - obstruction *I65.9*
- - - occlusion *I65.9*
- - - - avec infarctus cérébral *I63.2*
- - - - bilatérale *I65.3*
- - - - multiple *I65.3*
- - - rétrécissement *I65.9*
- - - rétrécissement, multiple *I65.3*
- - - sténose *I65.9*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - thrombose *I65.9*
- - vaisseau
- - - extra-crânien
- - - - anévrisme
- - - - - artério-veineux, *Q28.00*
- - - - - congénital, *Q28.10*
- - - - malformation

Cerveau –*suite*
- alimentant le cerveau –*suite*
- - vaisseau –*suite*
- - - extra-crânien –*suite*
- - - - malformation –*suite*
- - - - - artério-veineuse, *Q28.09*
- - - - - congénitale, *Q28.19*
- - - sténose *I66.9*
- anévrisme *I67.10*
- - artériosclérotique *I67.10*
- - - rompu *I60.9*
- - artério-veineux
- - - acquis *I67.10*
- - - - rompu *I60.8*
- - - congénital *Q28.20*
- - - rompu *I60.8*
- - congénital *Q28.30*
- - - rompu *I60.9*
- - forme de grappes de raisin
- - - non rompu *I67.10*
- - - rompu *I60.9*
- - mycosique *I72.9*
- - - rompu *I60.9*
- - rompu *I60.9*
- - syphilitique *A52.0+, I68.8**
- angiopathie *I67.9*
- anomalie
- - congénitale *Q04.9*
- - multiple *Q04.9*
- aplasie *Q00.0*
- apoplexie *I64*
- artériosclérose *I67.2*
- artérite *I67.7*
- athérosclérose *I67.2*
- atrophie *G31.9*
- - alcoolique *G31.2*
- - avec démence *F03*
- - circonscrite *G31.0*
- - - avec démence *G31.0+, F02.0**
- - pré-sénil, avec démence *G31.88+, F02.8**
- - sénile *G31.1*
- atrophie, congénitale *Q04.3*
- attaque *I64*
- attaque cérébrale *I63.5*
- atteinte
- - nouveau-né, avec syndrome résiduel, cérébral *P91.9*
- - périnatale *P96.8*
- blocage *G93.88*
- caillot *I66.9*
- carcinome *C71.9*
- cervelet atteints de déchirure(s) *S06.38*
- - multiples *S06.28*
- cicatrice *G93.88*
- commotion *S06.0*
- - aigue *S06.0*
- - avec lésions, légères *S06.0*
- - isolée *S06.0*
- compression *G93.5*
- - due à
- - - contusion *S06.28*
- - - - circonscrite *S06.30*
- - - lésion NCA *S06.28*
- contusion *S06.21*
- - circonscrite *S06.31*
- - diffuse *S06.21*
- cryptococcose *B45.1+, G05.2**

Cerveau –*suite*
- cysticercose *B69.0+, G94.8**
- déchirure, due à lésion lors de la naissance *P10.1*
- déformation *Q04.9*
- - acquise *G93.88*
- dégénérescence *G31.9*
- - alcoolique *G31.2*
- - artériosclérotique *I67.2*
- - cas de
- - - affection, vaisseaux sanguins cérébraux *I67.9+, G32.8**
- - - Anderson Fabry, maladie de *E75.2+, G32.8**
- - - Béribéri *E51.1+, G32.8**
- - - carence, vitamine B12 *E53.8+, G32.8**
- - - Gaucher, syndrome de *E75.2+, G32.8**
- - - Hunter, syndrome de *E76.1+, G32.8**
- - - lipidose
- - - - cérébrale *E75.4+, G32.8**
- - - - généralisée *E75.6+, G32.8**
- - - mucopolysaccharidose *E76.3+, G32.8**
- - - myxoedème *E03.9+, G32.8**
- - - néoformation, NCA *D48.9+, G32.8**
- - - Niemann Pick, maladie de *E75.2+, G32.8**
- - - sphingolipidose *E75.3+, G32.8**
- - chez l'enfant *G31.9*
- - congénitale, en cas d'hydroencéphalie *Q03.9*
- - corticale, progressive *G31.9*
- - kystique *G31.88*
- - - congénitale *Q04.6*
- - sénile NCA *G31.1*
- dommage *G93.9*
- - à
- - - anoxie, post-opératoire *T88.5*
- - - bilirubine *P57.9*
- - - lésion à la naissance *P11.2*
- - anoxique *G93.1*
- - - pendant un acte médical *G97.88*
- - - suite à un acte médical *G97.88*
- - congénital *Q04.9*
- - hypoxique *G93.1*
- - - après un acte médical *G97.88*
- - - pendant un acte médical *G97.88*
- - non traumatique *G93.9*
- - nouveau-né *P91.9*
- - pendant l'enfance NCA *G80.9*
- dysplasie *Q04.9*
- ecchymose *G93.5*
- ectopie *Q04.8*
- embolie *I66.9*
- - couche *O88.2*
- - lors de
- - - grossesse *O88.2*
- - - l'accouchement *O88.2*
- empyème *G06.0*
- endartérite *I67.7*
- - syphilitique *A52.0+, I68.1**
- enflure *G93.6*
- épanchement, sérique *G93.6*
- épendymome *C71.9*
- fièvre *G04.9*
- fistule *G96.0*
- - artério-veineuse *I67.11*

Cerveau –*suite*
- fistule –*suite*
- - artério-veineuse –*suite*
- - - congénitale, rompue *I60.8*
- - - rupture *I60.8*
- frontal
- - abscès *G06.0*
- - astrocytome *C71.1*
- - atrophie *G31.0*
- - infarctus *I63.9*
- - tumeur* *D43.0*
- glioblastome *C71.9*
- gliome *C71.9*
- - malin *C71.9*
- gomme *A52.3*
- granulome *G06.0*
- grippe [Influenza] *J11.8+, G05.1**
- hémangiome *D18.02*
- hématome
- - à des lésions lors de l'accouchement *P10.1*
- - avec
- - - contusion, cérébrale *S06.28*
- - - déchirure, cérébrale *S06.28*
- - chez le foetus/nouveau-né NCA *P52.4*
- - non traumatique *I61.9*
- - traumatique *S06.8*
- hémorragie *I61.9*
- - chez le fœtus et le nouveau-né *P52.4*
- - complication, accouchement *O99.4*
- - corticale *I61.1*
- - couche *O99.4*
- - infratentorielle, traumatique *S06.8*
- - intra-ventriculaire *I61.5*
- - miliaire, non-traumatique *I61.9*
- - non-traumatique, chez le foetus/nouveau-né *P52.4*
- - par
- - - lésion à la naissance *P10.1*
- - - syphilis *A52.0+, I68.8**
- - subcorticale *I61.0*
- - supratentorielle, traumatique *S06.8*
- - traumatique *S06.8*
- hernie *Q01.9*
- - congénitale *Q01.9*
- hypertrophie *G93.88*
- hypoplasie *Q02*
- induration *G93.88*
- infarctus *I63.9*
- - à
- - - embolie
- - - - artère
- - - - - basilaire, *I63.1*
- - - - - carotide, *I63.1*
- - - - - extracrânienne, *I63.1*
- - - - - vertébrale, *I63.1*
- - - - - cérébrale, *I63.4*
- - - - - intracrânienne, *I63.4*
- - - - artère perforante *I63.4*
- - - obstruction
- - - - artère
- - - - - basilaire,
- - - - - carotide,
- - - - - cérébrale,
- - - - - vertébrale,
- - - - - basilaire, complète, *I63.2*
- - - - - basilaire, partielle, *I63.2*
- - - - - carotide, complète, *I63.2*

Cerveau –*suite*
- infarctus –*suite*
- - à –*suite*
- - - obstruction –*suite*
- - - - artère –*suite*
- - - - - carotide, partielle, *I63.2*
- - - - - vertébrale, complète, *I63.2*
- - - - - vertébrale, partielle, *I63.2*
- - - - - cérébrale, antérieure, *I63.5*
- - - - - cérébrale, antérieure, complète, *I63.5*
- - - - - cérébrale, antérieure, partielle, *I63.5*
- - - - - cérébrale, médiane, *I63.5*
- - - - - cérébrale, médiane, complète, *I63.5*
- - - - - cérébrale, médiane, partielle, *I63.5*
- - - - - cérébrale, postérieure, *I63.5*
- - - - - cérébrale, postérieure, complète, *I63.5*
- - - - - cérébrale, postérieure, partielle, *I63.5*
- - - - artère cérébrale
- - - - - complète, *I63.5*
- - - - - partielle, *I63.5*
- - - occlusion
- - - - artère
- - - - - cérébrale,
- - - - - basilaire, *I63.2*
- - - - - carotide, *I63.2*
- - - - - extracrânienne, *I63.2*
- - - - - vertébrale, *I63.2*
- - - - - cérébrale, antérieure, *I63.5*
- - - - - cérébrale, médiane, *I63.5*
- - - - - cérébrale, postérieure, *I63.5*
- - - - - intracrânienne, *I63.5*
- - - - artères
- - - - - cérébrales, *I63.5*
- - - - - perforantes, *I63.5*
- - - - cérébrovasculaire *I63.5*
- - - - tronc cérébral *I63.5*
- - - sténose
- - - - artère
- - - - - extracrânienne, *I63.2*
- - - - - intracrânienne, *I63.5*
- - - - artère cérébrale
- - - - - antérieure, *I63.5*
- - - - - médiane, *I63.5*
- - - - - postérieure, *I63.5*
- - - - atrère cérébelleuse *I63.5*
- - - - tronc *I63.5*
- - - thrombose
- - - - artère
- - - - - basilaire, *I63.0*
- - - - - carotide, *I63.0*
- - - - - extracrânienne, *I63.0*
- - - - - vertébrale, *I63.0*
- - - - - cérébrale, *I63.3*
- - - - - intracrânienne, *I63.3*
- - - - Arteriae perforantes *I63.3*
- - - - non purulente
- - - - - sinus, veineux, intracrânien, *I63.6*
- - - - - veine cérébrale, *I63.6*
- - conséquences *I69.3*
- - embolique *I63.4*
- - ischémique *I63.9*
- infection *G04.9*
- - avec psychose, organique

Cerveau –*suite*
- infection –*suite*
- - avec psychose, organique –*suite*
- - - aigue *F05.8*
- - - subaiguë *F05.8*
- - due à des méningocoques *A39.8+, G05.0**
- - septique *G06.0*
- inflammation *G04.9*
- ischémie *I67.88*
- Krabbe, maladie de *E75.2*
- kyste *G93.0*
- - à hydatides *B67.9+, G94.8**
- - arachnoidien, congénital *Q04.6*
- - congénital *Q04.6*
- kyste, ramolissement *G93.0*
- lacération
- - circonscrite *S06.30*
- - diffuse *S06.20*
- - lésion à la naissance, avec hémorragie *P10.1*
- - lors de la naissance *P10.8*
- lésion *S06.9*
- - circonscrite *S06.30*
- - conséquences *T90.5*
- - diffuse *S06.20*
- - due à la pression *S06.0*
- - nerf crânien *S09.7*
- lésion à la naissance *P11.2*
- lésion moelle épinière *T06.0*
- lymphome primaire, lors d'une affection, dû au VIH *B21, C85.9*
- maladie *G93.9*
- - artérielle *I67.9*
- - artériosclérotique *I67.2*
- - congénitale *Q04.9*
- - dégénérative *G31.9*
- - organique *G93.9*
- - - avec psychose *F06.8*
- - parasitaire NCA *B71.9+, G94.8**
- - sénile NCA *G31.1*
- malformation *Q04.9*
- - artério-veineuse *Q28.29*
- - congénitale *Q04.9*
- méninges
- - anévrisme *I67.10*
- - - rompu *I60.8*
- - déformation
- - - acquise *G96.1*
- - - congénitale *Q04.8*
- - hémorragie *I60.8*
- - malformation *Q04.8*
- métastase *C79.3*
- - cas de tumeur primaire, inconnue *C79.3*
- nécrose, ischémique *I67.88*
- oedème *G93.6*
- - à des lésions lors de l'accouchement *P11.0*
- - chez le fœtus et le nouveau-né *P52.4*
- - hypertonique *G93.6*
- - traumatique *S06.1*
- oligodendrogliome *C71.0*
- panartérite noueuse *I67.7*
- processus d'évacuation *G31.9*
- prolapsus *Q01.9*
- purpura *D69.0*
- ramolissement *G93.88*

Cerveau –*suite*
- région tissu, grande, lésion, diffuse *S06.20*
- résultat d'examens fonctionnels, anormal *R94.0*
- rupture
- - artère *I61.9*
- - vaisseau sanguin *I61.9*
- sclérose *G37.9*
- - atrophique, lobaire *G31.0*
- - - avec démence *G31.0+, F02.0**
- - diffuse *G37.0*
- - - familiale *E75.2*
- - - infantile *E75.2*
- - disséminée *G35.9*
- - infantile *E75.2*
- - insulaire *G35.9*
- - miliaire *G35.9*
- - multiple *G35.9*
- - Pelizaeus-Merzbacher *E75.2*
- - présénile *G30.0*
- - progressive, familiale *E75.2*
- - sénile (artériosclérotique) *I67.2*
- - tubéreuse *Q85.1*
- sous-développement, congénital *Q02*
- sténose *G93.88*
- suppuration *G06.0*
- syphilis *A52.3*
- - vasculaire *A52.0+, I68.8**
- tassement *G31.9*
- thrombose *I66.9*
- - couche *O99.4*
- - due à la syphilis *A52.0+, I68.8**
- - lors de
- - - accouchement *O99.4*
- - - grossesse *O99.4*
- toxoplasmose *B58.2+, G05.2**
- trauma, avec psychose, organique *F06.8*
- - aigu *F05.8*
- trouble vasculaire *I67.88*
- trouble, organique, avec trouble du comportement *F07.0*
- troubles fonctionnels *G93.4*
- tuberculose *A17.8+, G07**
- tuberculose, forme de *A17.8+, G07**
- tumeur *D43.2*
- - avec psychose *F06.8*
- - bénigne *D33.2*
- - syphilitique *A52.1+, G94.8**
- typhus *A01.0*

Cervelet
- abcès *G06.0*
- absence de ver *Q04.3*
- agénésie *Q04.3*
- aplasie *Q04.3*
- atrophie *G31.9*
- cerveau, déchirure *S06.38*
- - multiples *S06.28*
- cholestéatome *D33.1*
- chordome *D43.1*
- - bénin *D33.1*
- - malin *C71.6*
- contusion *S06.22*
- - *S06.8*
- - circonscrite *S06.32*
- déplacement caudal congénital *Q04.8*
- gliome, malin *C71.6*
- hématome traumatique *S06.8*

Cervelet –*suite*
- hypoplasie *Q04.3*
- infractus *I63.9*
- - embolique *I63.4*
- kyste *G93.0*
- lacération *S06.28*
- lésion *S06.8*
- manque *Q04.3*
- métastatase *C79.3*
- nécrose, ischémique *I67.88*
- saignement *I61.4*
- - intracérébral *I61.4*
- - non-traumatique *I61.4*
- - - foetus/nouveau-né *P52.6*
- - suites de couches *O99.4*
- - traumatique *S06.8*
- sarcome, circonscrit *C71.6*
- syndrome
- - angle ponto-cérébelleux *E24.8*
- - cérébelleux *I67.9+, G46.4**
- - cérébelleux apoplexique *I67.9+, G46.4**
- traumatisme obstétrical *P11.1*
- tubeuculeux *A17.8+, G07**
- tumeur* *D43.1*

Cervical
- canal
- - sténose *N88.2*
- - sténose grave *N88.2*
- corps vertébral
- - fracture du pédicule *S12.9*
- - spondylodiscite *M46.42*
- nerf sympathique, lésion traumatique *S14.5*
- rachis
- - abcès *M46.22*
- - aplatissement de la courbure *M53.82*
- - - avec
- - - - arthrose *M47.82*
- - - - blocage *M53.82*
- - arthrose *M47.82*
- - arthrose des facettes *M47.82*
- - blocage *M99.81*
- - - avec douleur cervico-brachiale *M53.1*
- - blocage aigu *M99.81*
- - chondrosarcome *C41.2*
- - coup du lapin *S13.4*
- - cyphose *M40.22*
- - dégénérescence *M47.82*
- - dorsal (et), blocage *M99.81*
- - douleurs *M54.2*
- - élongation *S13.4*
- - entorse *S13.4*
- - et
- - - D [rachis dorsal]
- - - - blocage *M99.81*
- - - - dégénérescence, avec cervico-dorsalgie *M47.23*
- - - - spondylose *M47.83*
- - - L [rachis lombaire], spondylose *M47.80*
- - foulure *S13.4*
- - fracture *S12.9*
- - fracture(s) *S12.9*
- - - multiples *S12.7*
- - fusion congénitale *Q76.1*
- - inférieur, ostéochondrite *M42.92*
- - lésion dégénérative *M47.82*

Cervical –*suite*
- rachis –*suite*
- - lésion traumatique
- - - moelle épinière *S14.10*
- - - racines nerveuses *S14.2*
- - lésions d'un disque vertébral *M50.9*
- - luxation *S13.10*
- - luxation(s) *S13.10*
- - - multiples *S13.3*
- - myogélose *M62.88*
- - ostéochondrite *M42.92*
- - ostéochondrose *M42.92*
- - rachis dorsal, rachis lombaire, spondylose *M47.80*
- - scoliose
- - - convexe à droite *M41.92*
- - - convexe à gauche *M41.92*
- - spondylarthrite *M47.82*
- - spondylarthrose *M47.82*
- - - avec uncarthrose *M47.82*
- - spondylite déformante *M47.82*
- - spondylose *M47.82*
- - syndrome des facettes *M47.22*
- syndrome *M54.2*
- - aigu *M54.2*
- - - avec blocage du rachis dorsal *M54.2*
- - avec blocage *M54.2*
- - C6 sensoriel *M54.2*
- - C6-C8 sensoriel *M54.2*
- - C7 *M54.2*
- - C8 *M54.2*
- - chronique *M54.2*
- - - avec brachialgie *M54.2*
- - dégénératif *M47.22*
- - musculo-tendineux *M54.2*
- - musculaire *M54.2*

Cervicale
- artère, artériosclérose *I70.8*
- côte *Q76.5*
- - anomalie *Q76.5*
- - malformation congénitale *Q76.5*
- - surnuméraire *Q76.5*
- glande, gonflement *R59.0*
- moelle, lésion(s) traumatique(s) *S14.10*
- - centrale *S14.12*
- - multiples *S19.7*
- région, troubles NCA *M53.82*
- veine, caillot *I82.8*
- vertèbre
- - C1, fracture *S12.0*
- - C2
- - - fracture *S12.1*
- - - fracture de la dent *S12.1*
- - C3, fracture *S12.21*
- - C4, fracture *S12.22*
- - C5, fracture *S12.23*
- - C6, fracture *S12.24*
- - C7, fracture *S12.25*
- - fracture *S12.9*
- - - avec lésion de la moëlle épinière *S12.9, S14.10*
- - lésion traumatique *S13.4*
- - luxation
- - - C2/C3 *S13.12*
- - - C3/C4 *S13.13*
- - - C4/C5 *S13.14*
- - - C5/C6 *S13.15*
- - - C6/C7 *S13.16*

Cervicale –*suite*
- vertèbre –*suite*
- - luxation –*suite*
- - - C7/D1 *S13.17*
- - luxations multiples *S13.3*
- - soudure *M43.22*

Cervicalgie *M54.2*
- aigue *M54.2*
- chronique *M54.2*
- psychogène *F45.4*

Cervicaux, ganglions lymphatiques
- gonflement *R59.0*
- hyperplasie *R59.0*
- tuberculose *A18.2*

Cervicite *N72*
- aigue *N72*
- avec
- - ectropion *N72*
- - érosion *N72*
- - ulcération *N72*
- cas de
- - eversion, col de l'utérus *N72*
- - grossesse *O23.5*
- - ulcère, col utérin *N72*
- chronique *N72*
- couche *O86.1*
- due à
- - Chlamydias *A56.0*
- - gonocoques *A54.0*
- - herpès *A60.0+, N74.8**
- - Trichomonase *A59.0+, N74.8**
- érosive *N72*
- gonococcique *A54.0*
- hyperplasique *N72*
- mère, avec lésion foetus/nouveau-né *P00.8*
- non vénérienne *N72*
- puerpérale *O86.1*
- sénile, atrophique *N72*
- subaigue *N72*
- suite à l'accouchement *O86.1*
- syphilitique *A52.7+, N74.2**
- syphilitique, tardive *A52.7+, N74.2**
- tuberculose *A18.1+, N74.0**

Cervico
- brachiale, douleurs *M53.1*
- brachiale, névralgie *M53.1*
- brachialgie *M53.1*
- céphalique, douleurs *M53.0*
- - aigue *M53.0*
- - cas de blocage *M53.0*
- - chronique *M53.0*
- céphalique, syndrome *M53.0*
- dorsal
- - blocage mécanique *M99.81*
- - entorse *S13.4*
- - syndrome
- - - avec blocage *M54.13*
- - - chronique, avec lésions dégénératives de la colonne vertébrale *M47.23*
- dorsalgie, en cas de dégénérescence, cervicale et dorsale *M47.23*
- dorso-lombaire, syndrome *M54.10*
- - chronique *M54.10*
- faciale, actinomycose *A42.2*
- lombaire, syndrome *M54.10*
- - dégénératif *M47.20*

Cervico *–suite*

- scapulaire, douleurs *M54.12*
- sigmoïdal, fistule *N82.4*
- thoracique
- - blocage *M99.81*
- - dégénérescence, disque, NCA *M50.3*
- - dommages, disque *M50.9*
- - entorse *S13.4*
- - hernie, nucleus pulposus *M50.2*
- - rachis, entorse *T03.8*
- thoracique, syndrome *M54.13*
- trochantérienne, fracture *S72.05*
- vertébral, syndrome *M54.2*

Cervicogène
- maux, tête *M54.2*
- vertiges *R42*

Cervico-vaginite emphysémateuse (cervico *N72*

Césarienne *O82*
- antérieure, prise en charge, femme enceinte *O34.2*
- primitive *O82*
- secondaire *O82*

Césarienne, plaie
- complications NCA *O90.8*
- Déchirure *O90.0*
- déhiscence *O90.0*
- déhiscence, suture *O90.0*
- hématome *O90.2*
- infection *O86.0*
- infection, puerpérale *O86.0*

Cestan-Chenais, syndrome de *I63.0+, G46.3**

Cestode
- Diphyllobothrium
- - infestation *B70.0*
- - larves, infestation *B70.1*
- infection *B71.9*

Cestodes, infection à *B71.9*

Cétone
- dermite de contact, toxique *L24.2*
- effet toxique *T52.4*

Cétonurie *R82.4*

Cétose *E88.8*
- associée à
- - diabète sucré *E14.11*
- - diabète sucré de type 1 *E10.11*
- - diabète sucré de type 2 *E11.11*

Cétose, prédisposition, dans le diabète *E14.11*

Cétostéroïde, taux urinaire élevé de 17- *R82.5*

Cevico-brachial, syndrome douloureux *M53.1*

CFC [chlorofluorocarbures], effet toxiqu *T53.5*

Chagas, maladie de
- dépistage *Z11*
- forme aiguë, avec atteinte cardiaque *B57.0+, I98.1**
- forme chronique, avec atteinte
- - coeur *B57.2+, I98.1**
- - l'appareil digestif *B57.3+, K93.8**
- - système nerveux *B57.4+, G05.2**
- sans atteinte organique *B57.1*

Chaîne des osselets

Chaîne des osselets *–suite*
- dislocation *H74.2*
- dissociation *H74.2*

Chaînes légères kappa
- anomalie *D80.8*
- déficit *D80.8*

Chaînes lourdes, maladie des *C88.10*

Chalasie
- blépharo- *H02.3*
- dermato- *Q82.8*

Chalazion *H00.1*
- paupière inférieure *H00.1*

Chalcose *H44.3*
- cornée *H18.0*
- cristallin *H26.8*
- globe oculaire *H44.3*
- rétine *H35.8*

Chaleur
- allergie cutanée *L50.2*
- avec épuisement par perte hydrique *T67.3*
- bouffées *N95.1*
- chaleur artificielle excessive
- collapsus *T67.1*
- crampes *T67.2*
- dermite *L59.0*
- eczéma *L59.0*
- effet *T67.9*
- effets *T67.9*
- effets nocifs *T67.9*
- épuisement *T67.5*
- - provoqué par
- - - perte de sel *T67.4*
- - - perte hydrique *T67.3*
- éruption *L74.0*
- évanouissement *T67.1*
- exposition à *W92*
- fatigue *T67.6*
- - transitoire *T67.6*
- fièvre *T67.0*
- lésions chroniques *L59.0*
- oedème *T67.7*
- syncope *T67.1*
- tétanie *T67.2*
- urticaire *L50.2*

Chalicose *J62.8*
- associée à une fibrose pulmonaire *J62.8*

Chalicose pulmonaire *J62.8*

Chambre antérieure
- corps étranger
- - magnétique, intraoculaire, ancien *H44.6*
- - non-magnétique, intraoculaire, ancien *H44.7*
- hémorragie, causée par acte chirurgical *H59.8*
- kyste
- - exsudatif *H21.3*
- - parasitaire *H21.3*
- kyste, dû à implant *H21.3*
- lentille, corps étranger *S05.5*
- oeil
- - aplatissement *H44.4*
- - corps étranger *S05.5*
- - - rétention *H44.7*
- - hémorragie *H21.0*
- - hypopyon *H20.0*

Chambre antérieure *–suite*
- oeil *–suite*

- - kyste *H21.3*
- - lésion *S05.8*
- - maladie *H21.9*
- - oblitération *H44.4*

Chambre de l'oeil
- chambre antérieure, Anomalie *Q13.9*
- Chambre postérieure, Anomalie *Q14.9*

Champ visuel
- anomalie *H53.4*
- - avec suspicion de glaucome *H40.0*
- - subjectif *H53.1*
- anomalies *H53.4*
- constriction
- - fonctionnelle *H53.4*
- - périphérique *H53.4*
- contraction *H53.4*
- Elargissement de la tache aveugle *H53.4*
- image résiduelle, temporel *H53.4*
- quadrant, anopsie *H53.4*
- scotome annulaire *H53.4*
- scotome central *H53.4*
- scotum, arciforme *H53.4*
- spirale de Goldmann *H53.4*
- sténose *H53.4*
- - concentrique *H53.4*

Champ visuel, central *H53.4*

Champignon(s)
- alvéolite, allergique *J67.7*
- avec maladie
- - cutanée *B36.9*
- - génitale *B49*
- - tractus urinaire *B49*
- balanite *B37.4+, N51.2**
- bouche *B37.0*
- bronchopneumopathie bactérienne mycosique *B49+, J17.2**
- infection NCA *B49*
- - barbe *B35.0*
- - cas de maladie induite par le VIH *B20, B49*
- - corporelle *B35.4*
- - cutanée *B36.9*
- - de(s) ongle(s) *B35.1*
- - expectorations *B48.8*
- - interdigitale *B35.9*
- - - main *B35.2*
- - - pied *B35.3*
- - l'aine *B35.6*
- - l'oreille *B49*
- - main *B35.2*
- - ongles des pieds *B35.1*
- - périanale *B35.6*
- - pied *B35.3*
- - superficielle *B36.9*
- - tête *B35.0*
- - tractus digestif *B49+, K93.8**
- - vaginale *B37.3+, N77.1**
- infestation
- - corporelle *B35.4*
- - de(s) ongle(s) *B35.1*
- - langue *B37.0*
- ingérés, effet toxique *T62.0*
- l'ongle/ des ongles *B35.1*
- maladie, en cas de maladie induite par le VIH *B20, B49*

Champignon(s) *–suite*

- méningite NCA *B49+, G02.1**
- opportuniste(s) pathogène(s), mycose(s) *B48.7*
- pneumonie *J16.8*
- septicémie *B49*
- ulcère de l'oesophage *K22.1*
- vénéneu(x), empoisonnement *T62.0*

Champignons imparfaits, infection causée *B43.8*

Chance, jeux de
- obsessionnelle *F63.0*
- pathologique *F63.0*

Chancre mou ou chancrelle ou chancre de *A57*

Chancreux
- adénite, due à l'Haemophilus ducreyi *A57*
- bubon *A57*
- - virulent *A57*
- lymphadénite, congénitale *A57*
- lymphangite *A57*
- phimosis *A57*
- ulcère *A57*

Chandler, syndrome de *H21.8*

Changement
- enfant
- - avec lésion, foetus/nouveau-né, avant les contractions *P01.7*
- - prise en charge, grossesse *O32.0*
- position, foetus *O32.0*

Changement de couleur pendant la formati *K00.8*

Chanvre indien, dépendance *F12.2*

Chanvre, dépendance *F12.2*

Charcot
- arthrite de *A52.1+, M14.6**
- - associée à
- - - diabète sucré de type I *E10.60*
- - - diabète sucré de type II *E11.60*
- - diabétique *E14.60+, M14.6**
- - non syphilitique NCA *G98+, M14.6**
- - syringomyélique *G95.0+, M49.49**
- cirrhose de *K74.3*
- maladie de
- - associée à une syringomyélie *G95.0+, M49.89**
- - diabétique *E14.60+, M14.6**
- - héréditaire *G11.4*
- maladie de [sclérose latérale amyotrophique] *G12.2+, M14.6**
- Marie-Tooth(-Hoffmann), amyotrophie de *G60.0*
- Weiss-Baker, syndrome de *G90.00*

Charcuterie
- intoxication *T62.9*
- trichinose, intoxication *B75*

Charentes, fièvre des [leptospirose] *A27.8*

Charge cardiaque gauche *I50.19*

CHARGE, association [complexe malformati *Q87.8*

Chargée, langue *K14.3*

Chassaignac, pronation douloureuse de [s *S53.0*

Chauffard, syndrome de
- Hanot- *E83.1*
- Troisier-Hanot- *E83.1*

Chauffard-Still, maladie de *M08.29*

Chaussures orthopédiques
- ajustement *Z46.7*
- soins et équipement (mise en place) *Z46.7*

Cheadle, maladie de [scorbut infantile] *E54*

Chediak-Steinbrick-Higashi, syndrome de *E70.3*

Chéilite *K13.0*
- actinique *L56.8*
- - provoquée par
- - - rayonnements autres que solaires *L59.8*
- - - rayons solaires *L56.8*
- angulaire *K13.0*
- atopique *K13.0*
- coin de la bouche *K13.0*
- commissurale *K13.0*
- due à un Candida *B37.88*
- exfoliatrice *K13.0*
- glandulaire *K13.0*

Chéilodynie *K13.0*

Cheilognathopalatoschisis [bec-de-lièvre *Q37.5*

Cheilognathoschisis [fente labiale unila *Q37.1*

Cheiloschisis [bec-de-lièvre incomplet] *Q36.9*

Cheilose *K13.0*
- associée à
- - carence en vitamine B2 *E53.0+, K93.8**
- - pellagre *E52+, K93.8**
- coins de la bouche *K13.0*

Chéiropompholyx *L30.1*

Chéloïde *L91.0*
- Addison, de *L94.0*
- cicatrice *L91.0*
- cornée *H17.8*
- cutanée *L91.0*
- spontanée *L91.0*

Chéloïde cicatricielle *L91.0*
- après épisiotomie *L91.0*

Chémodectome *D44.7*

Chémosis conjonctival *H11.4*

Chenais, syndrome de Cestan- *I63.0+, G46.3**

Chérubisme *K10.8*

Cheveu étrangleur
- nourrisson *T13.8*
- nouveau-né *T13.8*

Cheveux
- agénésie *Q84.0*
- anomalie *L67.9*
- anomalie congénitale *Q84.2*
- arrachage pathologique *F63.3*
- atrophie *L67.8*
- blanchissement *L67.1*
- - congénital *Q84.2*
- - précoce *L67.1*
- couleur
- - anomalie *L67.9*
- - changement *L67.1*
- dystrophie *L67.8*
- fragilité *L67.8*
- hétérochromie *L67.1*

Cheveux *–suite*

- hypoplasie *Q84.2*
- leucoplasie *K13.3*
- maladie *L73.9*
- malformation congénitale *Q84.2*
- monilethrix *Q84.1*
- - congénitale *Q84.1*
- moniliformes *Q84.1*
- - congénital *Q84.1*
- moniliformes, congénitaux *Q84.1*
- noeuds *L67.8*
- perte *L65.9*
- - androgénique *L64.9*
- - diffuse *L65.9*
- - localisée *L63.9*
- - non cicatricielle *L65.9*
- - partielle *L63.9*
- - totale *L63.0*
- tordus, congénitaux *Q84.1*
- transplantation *Z41.8*
- transplantation cosmétique *Z41.1*
- trouble de la croissance *L73.9*

Cheville
- ankylose *M24.67*
- élongation *S93.6*
- entorse *S93.6*
- tuméfaction *M25.47*

Cheville, ostéite tuberculeuse *A18.0+, M01.17**

Cheyne, syndrome de *F45.2*

Cheyne-Stokes, apnée de *R06.3*

Cheyne-Stokes, respiration de *R06.3*

Chez un non diabétique, coma insulinique *E15*

Chiari, syndrome de
- Arnold- *Q07.0*
- Budd- [syndrome d'occlusion des veines hépatiques] *I82.0*

Chiari-Frommel, syndrome de *O92.60*

Chiasma
- affection *H47.4*
- - inflammatoire *H47.4*
- - ischémique *H47.4*
- compression *H47.4*
- - par
- - - adénome hypophysaire *D35.2*
- - - anévrisme *I67.10+, H48.8**
- optique
- - kyste NCA *H47.4*
- - lésion *H47.4*
- - lésion traumatique *S04.0*

Chiasmatique, syndrome *H47.4*

Chignon, hématome en *B36.8*
- chez le nouveau-né *P12.1*

Chikungunya *A92.0*

Chilaïditi, syndrome de *Q43.3*

Chilomastigiase *A07.8*

Chilomastix
- diarrhée *A07.8*
- dysenterie *A07.8*
- entérite *A07.8*
- infection intestinale *A07.8*

Chimère 46,XX/46,XY *Q99.0*
- hermaphrodite vrai *Q99.0*

Chimie sanguine anormale *R79.9*

Chimioprophylaxie *Z29.2*

Chimiothérapie *Z51.2*
- agranulocytose *D70.19*
- cas de tumeur *Z51.1*
- cytostatique pour tumeur maligne, dans l'anamnèse du sujet *Z92.6*
- d'entretien *Z51.2*
- - cas de tumeur *Z51.1*
- dose d'entretien en cas de tumeur NCA *Z51.1*
- dose d'entretien NCA *Z51.2*
- effet secondaire *T88.7*
- induit(e) par
- - anémie *D61.10*
- - aplasie médullaire *D61.10*
- - leucémie *C95.90*
- - neutropénie *D70.19*
- - pancytopénie *D61.10*
- prophylactique
- - *Z29.2*
- - Autre Mesure de *Z29.28*
- - local *Z29.20*
- - systémique *Z29.21*
- prophylactique NCA *Z29.2*

Chimique
- agent
- - absorbé, dermite NCA *L27.8*
- - allergie *L23.5*
- - bronchite *J68.0*
- - - aiguë *J68.0*
- - - chronique *J68.4*
- - dermite de contact *L25.3*
- - eczéma *L25.3*
- - eczéma professionnel *L24.5*
- - emphysème *J68.4*
- - érythème de contact *L25.3*
- - érythème NCA *L53.0*
- - ingestion, avec ulcère, oesophage *K22.1*
- - intoxication *T65.9*
- - - dépistage *Z13.8*
- - oedème pulmonaire *J68.1*
- - - aigu *J68.1*
- - - chronique *J68.4*
- - oesophagite *K20*
- arachnoïdite *G03.8*
- bronchiolite chronique *J68.4*
- bronchite
- - aiguë *J68.0*
- - chronique *J68.4*
- - subaiguë *J68.0*
- conjonctivite, non médicamenteuse *H10.8*
- corrosion *T30.4*
- péritonite *T81.6*
- produit, avec
- - dermite allergique *L23.5*
- - dermite de contact, allergique *L23.5*
- substance
- - absorption *T65.9*
- - - par voie placentaire *P04.8*
- - avec otite aiguë externe *H60.5*
- - effet toxique NCA *T65.9*
- - inhalation, avec
- - - bronchiolite oblitérante *J68.4*
- - - - chronique *J68.4*
- - - - subaiguë *J68.4*
- - - emphysème *J68.4*
- - - - chronique *J68.4*
- - - - diffus *J68.4*

Chimique *–suite*
- substance *–suite*
- - inhalation, avec *–suite*
- - - fibrose pulmonaire *J68.4*
- - - - chronique *J68.4*
- - péritonite *T81.6*
- - sclérose systémique NCA *M34.2*

Chiragre *M10.99*

Chirobrachialgie *R29.8*

Chiromégalie *M79.84*

Chiropratique
- répondant à, blocage *M99.99*
- traitable par, blocage articulaire *M99.89*

Chirospasme *F48.8*

Chirurgical(e)
- fusion
- - lombo-sacrée *Z98.1*
- - sacro-iliaque *Z98.1*
- intervention
- - antérieure, col utérin, avec
- - - complication de l'accouchement *O34.4*
- - - prise en charge de la mère *O34.4*
- - importante NCA, anamnèse *Z92.4*
- - périnée, antérieure
- - - avec complication, accouchement *O34.7*
- - - prise en charge de la mère *O34.7*
- - utérus, antérieure, avec complication, accouchement *O34.2*
- - vagin, antérieure
- - - avec complication, accouchement *O34.6*
- - - prise en charge de la mère *O34.6*
- - vulve, antérieure
- - - avec complication, accouchement *O34.7*
- - - prise en charge de la mère *O34.7*
- intervention, dentaire *K08.9*
- ménopause artificielle *N95.3*
- moignon d'amputation
- - avec complications *T87.6*
- - hématome *T87.6*
- - infection *T87.4*
- - oedème *T87.6*
- perforation
- - nerf, accidentelle *T81.2*
- - organe, accidentelle *T81.2*
- - vaisseau sanguin, accidentelle *T81.2*
- soin de plaie ouverte, petite *T14.1*
- suture, soin *Z48.0*

Chirurgie de reprise avec désinsertion, *T84.0*

Chirurgie plastique, abdomen, cosmétique *Z41.1*

Chlamydia
- cervicite *A56.0*
- conjonctivite *A74.0+, H13.1**
- - chez le nouveau-né *P39.1*
- cystite *A56.0*
- endométrite *A56.1+, N74.4**
- épididymite *A56.1+, N51.1**
- infection *A74.9*
- - anus *A56.3*
- - appareil génital, partie inférieure *A56.0*
- - appareil génito-urinaire *A56.2*
- - génitale *A56.2*

Chlamydia *–suite*
- infection *–suite*
- - petit bassin *A56.1*
- - pharynx *A56.4*
- - rectum *A56.3*
- - sténose grave du rectum *A55*
- - transmise par voie sexuelle NCA *A56.8*
- inflammation des organes pelviens de la femme *A56.1+, N74.4**
- lymphogranulomatose vénérienne *A55*
- lymphogranulome *A55*
- orchite *A56.1+, N51.1**
- péritonite *A74.8+, K67.0**
- pharyngite *A56.4*
- pneumonie *J16.0*
- - congénitale *P23.1*
- proctite *A56.3*
- salpingite *A56.1+, N74.4**
- syndrome de Curtis-Fitz-Hugh *A74.8+, K67.0**
- urétrite *A56.0*
- vaginite *A56.0*
- vulvite *A56.0*
- vulvo-vaginite *A56.0*

Chlamydia psittaci, infection *A70*

Chloasma *L81.1*
- cachecticorum *L81.1*
- gravidique *O26.88*
- hormonal *L81.1*
- idiopathique *L81.1*
- médicamenteux *L81.1*
- paupière *H02.7*
- - cas d'ochronose *E70.2+, H03.8**
- - par hyperthyroïdie *E05.9+, H03.8**
- symptomatique *L81.1*
- virginium periorale *L81.1*

Chlolangiohépatome *C22.0*

Chlonorchis sinensis, distomatose à, foi *B66.1+, K77.0**

Chloramphénicol, syndrome gris, chez le *P93*

Chlordiazépoxide, dépendance *F13.2*

Chlore gazeux, effet toxique *T59.4*

Chlormadinone acétate, effet secondaire *T88.7*

Chlorocrésol
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Chlorofluorocarbures, effet toxique *T53.5*

Chlorome *C92.30*
- rémission complète *C92.31*

Chloropénie *E87.8*

Chlorose *D50.9*

Chlorotique, anémie *D50.8*

Chlorure de méthylène, effet toxique *T53.4*

Chlorure d'éthyle, dépendance *F19.2*

Chlourie *R82.2*

Choc *R57.9*
- allergique, dû à une transfusion *T80.5*
- anaphylactique *T78.2*
- - à
- - - alimentation NCA *T78.0*
- - - immunisation *T80.5*
- - - sérum *T80.5*
- - antécédents personnels *Z87.8*

Choc –*suite*
- anaphylactique dû au sérum *T80.5*
- aseptique *R57.8*
- avec résidu, pression sanguine, après lésion *T79.4*
- cardiaque *R57.0*
- cardiogène *R57.0*
- cardiovasculaire *R57.0*
- cas de
- - avortement, médical, échoué *O07.3*
- - contractions et accouchement *O75.1*
- compliquant l'échec d'un avortement provoqué *O07.8*
- culturel *F43.2*
- culturel non traumatique *F43.2*
- éléctrochoc *T75.4*
- émotionnel *R45.7*
- foetus/nouveau-né, dû à la naissance NCA *P96.8*
- hématologique *R57.8*
- hémorragique *R57.1*
- hypoglycémique *E15*
- - cas de
- - - diabète sucré *E14.61*
- - - diabète type I *E10.61*
- - - diabète type II *E11.61*
- - non diabétique *E15*
- hypovolémique *R57.1*
- - après intervention *T81.1*
- - traumatique *T79.4*
- naissance *O75.1*
- obstétrical *O75.1*
- pendant ou suite à une intervention *T81.1*
- postopératoire *T81.1*
- - avec hypovolémie *T81.1*
- psychique *F43.0*
- rachis *T09.3*
- septique *A41.9*
- - *R57.2*
- - à Escherichia coli *A41.51*
- - avec avortement *O08.3*
- - cas d'avortement, médical, échoué *O07.0*
- - complication, lors de l'avortement, échoué *O07.5*
- - post-opératoire *T81.1*
- - suite à
- - - acte médical *T81.1*
- - - Avortement *O08.0*
- - - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - - grossesse môlaire *O08.0*
- - - transfusion, injection thérapeutique ou transfusion *T80.2*
- spinal, dysfonctionnement vésical *G95.82*
- suite
- - accident thérapeutique NCA *T81.1*
- - anesthésie *T88.2*
- - brûlures *T95.9*
- - endotoxine *R57.8*
- - - après intervention *T81.1*
- - foudre *T75.0*
- - intolérance alimentaire *T78.0*
- - Médication *T78.2*
- - réaction à un vaccin *T80.6*
- - saignement *R57.1*
- - transfusion de plasma *T80.8*
- - transfusion lymphocytes *T80.8*
- - transfusion sanguine *T80.8*

Choc –*suite*
- suite à
- - Avortement *O08.3*
- - fausse couche *O08.3*
- - grossesse extra-utérine *O08.3*
- - grossesse môlaire *O08.3*
- - intervention chirurgicale *T81.1*
- - lésion *T79.4*
- - - avec
- - - - pouls, rapide *T79.4*
- - - - respiration faible *T79.4*
- toxique, syndrome du *A48.3*
- - utilisation de tampon *A48.3*
- traumatique *T79.4*
- - avec
- - - hypovolémie *T79.4*
- - - Réduction
- - - - pression sanguine *T79.4*
- - - - respiratoire *T79.4*

Cholangiectasie *K83.8*

Cholangio carcinome *C22.1*
- et carcinome, hépatocellulaire, mixte *C22.0*
- foie *C22.1*
- hépatique *C22.0*

Cholangio hépatite *K76.8*

Cholangiocellulaire
- carcinome *C22.1*
- néoplasie *D37.6*

Cholangiolite *K83.0*
- aiguë *K83.0*
- chronique *K83.0*
- extra-hépatique *K83.0*
- gangréneuse *K83.0*
- intra-hépatique *K83.0*

Cholangiolithiase *K80.30*

Cholangiolitique
- cirrhose primaire *K74.3*
- hépatite *K75.8*

Cholangiome *D13.4*
- hépatique *D13.4*
- maligne *C22.1*

Cholangiopathie *K83.9*

Cholangite *K83.0*
- ascendante *K83.0*
- avec
- - calcul *K80.30*
- - obstruction des voies biliaires, en cas de
- - - calcul des voies biliaires, bloqué
- - - - canal
- - - - - cholédoque, *K80.31*
- - - - - hépatique, *K80.31*
- - - - voies biliaires *K80.31*
- - - cholédocholithiase *K80.31*
- - - cholélithiase intra-hépatique *K80.31*
- - - colique hépatique récidivante *K80.31*
- bactérienne *K83.0*
- cas de
- - calcul biliaire, bloqué
- - - canal
- - - - cholédoque *K80.30*
- - - - hépatique *K80.30*
- - - voies biliaires *K80.30*
- - calcul, voies biliaires *K80.30*
- - cholédocholithiase *K80.30*

Cholangite –*suite*
- cas de –*suite*
- - cholélithiase intra-hépatique *K80.30*
- - colique hépatique récidivante *K80.30*
- - scarlatine *A38+, K87.0**
- duodénoangiocholite *K83.0*
- hépatique *K75.8*
- non purulente, destructive, chronique *K74.3*
- par cytomégalovirus *B25.88+, K93.8**
- primaire *K83.0*
- purulente *K83.0*
- récidivante *K83.0*
- sclérosante *K83.0*
- secondaire *K83.0*
- sténosante *K83.0*

Cholangitique
- abcès du foie *K75.0*
- - avec perforation *K75.0*
- cirrhose primitive *K74.3*

Choléastome *H71*

Cholécystectasie *K82.8*

Cholécystite *K81.9*
- aiguë *K81.0*
- - avec obstruction des voies biliaires, causée par
- - - calcul biliaire, bloqué
- - - - canal cystique *K80.01*
- - - - vésicule biliaire *K80.01*
- - - colique récidivante de la vésicule biliaire *K80.01*
- - cas de
- - - calcul de la vésicule biliaire *K80.00*
- - - calcul de la vésicule, bloqué
- - - - canal cystique *K80.00*
- - - - vésicule biliaire *K80.00*
- - - cholécystolithiase *K80.00*
- - - - avec obtruction des voies biliaires *K80.01*
- - - cholédocholithiase *K80.40*
- - - cholélithiase *K80.00*
- - - - avec obtruction des voies biliaires *K80.01*
- - - colique récidivante de la vésicule biliaire *K80.00*
- angio- *K81.0*
- - sans calcul *K81.0*
- avec
- - lithiase *K80.10*
- - obstruction des voies biliaires, causée par
- - - calcul de la vésicule, bloqué
- - - - canal
- - - - - cholédoque, *K80.41*
- - - - - hépatique, *K80.41*
- - - - voies biliaires *K80.41*
- - - cholélithiase intra-hépatique *K80.41*
- - - colique hépatique récidivante *K80.41*
- candida *B37.88*
- cas de
- - calcul de la vésicule, bloqué
- - - canal
- - - - cholédoque *K80.40*
- - - - hépatique *K80.40*
- - - voies biliaires *K80.40*
- - cholédocholithiase *K80.40*
- - - avec obtruction des voies biliaires *K80.41*

Cholécystite –*suite*
- cas de –*suite*
- - cholélithiase *K80.10*
- - - intra-hépatique *K80.40*
- - colique hépatique récidivante *K80.40*
- causée par
- - calcul des voies biliaires *K80.40*
- chronique *K81.1*
- - avec obstruction des voies biliaires, causée par
- - - calcul biliaire, bloqué
- - - - canal cystique *K80.11*
- - - - vésicule biliaire *K80.11*
- - - colique récidivante de la vésicule biliaire *K80.11*
- - causée par
- - - calcul biliaire, bloqué
- - - - canal cystique *K80.10*
- - - - vésicule biliaire *K80.10*
- - - cholécystolithiase *K80.10*
- - - - avec obtruction des voies biliaires *K80.11*
- - - cholélithiase *K80.10*
- - - - avec obtruction des voies biliaires *K80.11*
- - - colique récidivante de la vésicule biliaire *K80.10*
- emphysémateuse, aiguë *K81.0*
- - sans lithiase *K81.0*
- gangréneuse *K81.0*
- - sans lithiase *K81.0*
- péri- *K81.0*
- scléro-atrophique *K82.8*
- suppurative *K81.0*
- suppurée *K81.0*
- - sans lithiase *K81.0*

Cholécysto-duodénale, fistule *K82.3*

Cholécystopathie *K82.9*
- fonctionnelle *K82.8*

Cholédocho-duodénale, fistule *K83.3*

Cholédocho-jéjunale, fistule *K83.3*

Cholédocholithiase *K80.50*
- avec
- - cholangite *K80.30*
- - - avec obstruction des voies biliaires *K80.31*
- - cholécystite *K80.40*
- - - aiguë *K80.40*
- - - avec obtruction des voies biliaires *K80.41*
- - obstruction des voies biliaires *K80.51*
- avec cholécystite *K80.80*
- canal hépatique *K80.50*
- kystique *K80.20*

Cholédocite *K83.0*
- suppurée *K83.0*

Cholélithiase *K80.20*
- avec
- - calcul bloqué *K80.20*
- - cholécystite *K80.10*
- - - aiguë *K80.00*
- - - - avec obtruction des voies biliaires *K80.01*
- - - chronique *K80.10*
- - - - avec obtruction des voies biliaires *K80.11*
- - fistule *K80.20*
- - hydrops *K80.20*

Cholélithiase –*suite*
- avec –*suite*
- - obstruction des voies biliaires *K80.21*
- canal
- - cholédoque *K80.50*
- - cystique *K80.20*
- - hépatique *K80.50*
- intra-hépatique *K80.50*
- - avec
- - - cholangite *K80.30*
- - - - avec obtruction des voies biliaires *K80.31*
- - - cholécystite *K80.40*
- - - - avec obtruction des voies biliaires *K80.41*
- - - obstruction des voies biliaires *K80.51*
- multiples *K80.20*
- vésicule biliaire *K80.20*
- voies biliaires *K80.50*

Cholémie *R17*
- congénitale *E80.4*
- familiale *E80.4*

Cholépéritoine *K65.8*

Cholépéritonite *K65.8*

Choléra *A00.9*
- antimonial *T56.8*
- avec
- - contact *Z20.0*
- - typhoïde-paratyphoïde [choléra+TAB], vaccination contre *Z27.0*
- examen de dépistage *Z11*
- nécessité de vaccination *Z23.0*
- - contre la typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB] *Z27.0*
- par
- - vibrio
- - - cholerae O:1, biovar cholerae *A00.0*
- - - cholerae O:1, biovar El Tor *A00.1*
- porteurs de germes *Z22.1*

Choléra stibié *T56.8*

Cholestase *K83.1*

Cholestase NCA *K83.1*
- avec lésion des hépatocytes *K71.0*
- cas de maladie toxique du foie *K71.0*
- extra-hépatique NCA *K83.1*
- intra-hépatique NCA *K71.0*
- isolée NCA *K71.0*
- pure *K71.0*

Cholestatique
- cirrhose
- - primitive *K74.3*
- - secondaire *K74.4*
- hépatite *K75.8*
- hépatose *K76.8*

Cholestéatome *H71*
- apophyse mastoïde *H71*
- avec réaction *H71*
- caisse du tympan *H71*
- cavité mastoïdienne, récidivant, après mastoïdectomie *H95.0*
- cérébelleux *D33.1*
- cervelet *D33.1*
- conduit auditif *H60.4*
- inflammation de l'oreille *H71*
- oreille *H71*
- - externe *H60.4*
- oreille moyenne *H71*

Cholestéatome –*suite*
- primitif *H71*
- - juvénile *H71*
- pseudo- *H71*
- - oreille externe *H60.4*
- - oreille moyenne *H71*
- sinus paranasal *J34.8*

Cholestérol
- augmentation du *R79.8*
- dépôt
- - corps vitré *H43.2*
- - rétine *H35.8*
- - vésicule billiaire *K80.20*
- embolie *T79.1*
- lipidose *E75.5*
- maladie de stockage *E75.5*
- pneumonie *J84.8*
- pneumopathie *J84.8*
- trouble du métabolisme *E78.9*

Cholestérolémie *E78.0*
- essentielle *E78.0*
- familiale *E78.0*
- héréditaire *E78.0*

Cholestérolose *K82.4*
- vésicule biliaire *K82.4*

Cholestérolose de la vésicule biliaire *K82.4*

Choline, carence en *E53.8*

Cholinergique, urticaire *L50.5*

Chologène, diarrhée *K90.8*

Chondrite *M94.89*
- costale *M94.0*
- costale [maladie de Tietze] *M94.0*
- ostéo- *M93.9*
- purulente *M94.89*
- tuberculeuse NCA *A18.0+, M01.19**
- vertébral, tuberculose *A18.0+, M49.09**

Chondroblastique
- ostéosarcome *C41.9*
- sarcome *C41.9*

Chondroblastique, sarcome *C41.9*

Chondroblastome *D16.9*
- malin *C41.9*

Chondrocalcinose *M11.29*
- articulaire *M11.29*
- avec arthropathie *M11.29*
- familiale *M11.19*

Chondrocostale, entorse *S23.4*

Chondrodermite
- nodulaire
- - chronique de l'hélix *H61.0*
- - l'hélix *H61.0*
- pavillon de l'oreille *H61.0*

Chondrodysplasie *Q78.9*
- avec
- - angiomatose *Q78.4*
- - hémangiome *Q78.4*
- calcifiante congénitale *Q77.3*
- foetale *Q77.4*
- maladie d'Ollier *Q78.4*
- ostéo- *Q78.9*
- - avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis *Q77.9*
- ponctuée *Q77.3*

Chondrodysplasie d'Ollier *Q78.4*

Chondrodystrophie *Q78.9*
- calcifiante congénitale *Q77.3*
- congénitale *Q78.9*
- foetale *Q78.9*
- hypoplasique *Q78.9*
- myotonie *G71.1*
- myotonique *Q78.8*
- nanisme *Q77.4*
- petite taille *Q77.4*
- ponctuée *Q77.3*

Chondro-ectodermique, dysplasique *Q77.6*

Chondroïde
- chordome
- - coccyx *C41.4*
- - rachis *C41.2*
- syringome *D23.9*

Chondrolyse *M94.39*

Chondromalacie *M94.29*
- épiglotte *Q31.8*
- genou, 2ème degré *M22.4*
- larynx *Q31.8*
- rétropatellaire *M22.4*
- systémique *M94.29*

Chondromatose *D48.0*
- articulaire *M24.09*
- ostéo- *D48.0*
- - synoviale *M24.09*

Chondrome *D16.9*
- angio-fibro- *D16.9*
- fibromyxoïde *D16.9*
- juxta cortical *D16.9*
- larynx *D14.1*
- ostéo- *D16.9*
- périosté *D16.9*
- poumon *D14.3*
- trachée *D14.2*

Chondrome myxoïde *D16.9*

Chondromyxofibrome *D16.9*

Chondromyxome *D16.9*

Chondromyxosarcome *C41.9*

Chondro-ostéodystrophie *E76.2*
- type Morquio *E76.2*

Chondropathie *M94.99*
- genou *M23.89*
- rotule *M22.4*

Chondropathie tubéreuse *M94.0*

Chondrosarcome *C41.9*
- bassin *C41.4*
- bras *C40.0*
- cartilage articulaire *C41.9*
- cotyle *C41.4*
- épaule *C40.0*
- fémur *C40.2*
- juxta-cortical *C41.9*
- mésenchymateux *C49.9*
- myxoïde *C41.9*
- omoplate *C40.0*
- os du bassin *C41.4*
- rachis cervical *C41.2*
- vertèbre thoracique *C41.2*

Chondrose *M94.89*
- lombo-sacrée *M94.88*

Chondrose intervertébrale *M51.3*
- cervicale [chondrose cervicale] *M50.3*

Chondrosternale, entorse *S23.4*

Chopart, articulation de
- arthrose *M19.97*
- entorse *S93.6*
- luxation *S93.34*

Chordée
- verge *N48.8*
- - antérieure congénitale *Q54.4*
- - entraînant une blennorragie *A54.0*
- - latérale *Q55.6*
- - non vénérienne *N48.8*

Chordome *C80*
- angle ponto-cérébelleux *D43.1*
- - bénin *D33.1*
- - malin *C71.6*
- chondroïde
- - coccyx *C41.4*
- - rachis *C41.2*
- rachis lombaire *C41.2*
- sacrum *C41.4*

Chorée *G25.5*
- associée à
- - affection de la valvule mitrale, dans endocardite rhumatismale valvule aortique
- - - active *I02.0*
- - - aiguë *I02.0*
- - endocardite
- - - rhumatismale
- - - - active *I02.0*
- - - - aiguë *I02.0*
- - - - subaiguë *I02.0*
- - - valve aortique
- - - - active, avec atteinte de la valvule mitrale *I02.0*
- - - - aiguë, avec atteinte de la valvule mitrale *I02.0*
- - - - rhumatismale
- - - - - active, *I02.0*
- - - - - aiguë, *I02.0*
- - - valvule mitrale
- - - - active *I02.0*
- - - - - avec atteinte de la valvule aortique, *I02.0*
- - - - aiguë *I02.0*
- - - - - avec atteinte de la valvule aortique, *I02.0*
- - - valvule pulmonaire, rhumatismale
- - - - aiguë *I02.0*
- - - - subaiguë *I02.0*
- - - valvule tricuspide
- - - - active *I02.0*
- - - - aiguë *I02.0*
- - insuffisance cardiaque (ventricule gauche), rhumatismale
- - - active *I02.0*
- - - aiguë *I02.0*
- - insuffisance de la valvule mitrale, rhumatismale
- - - active *I02.0*
- - - aiguë *I02.0*
- - myocardite, rhumatismale, active *I02.0*
- - péricardite aiguë *I02.0*
- - valvulite, rhumatismale, chronique *I09.1*
- avec
- - atteinte cardiaque *I02.0*
- - tics *G25.6*
- avec participation, coeur *I02.0*
- chronique *G25.5*

Chorée *–suite*
- dégénérative *G10*
- grave *G25.5*
- hémi- *G25.5*
- héréditaire *G10*
- Huntington *G10*
- - antécédents familiaux *Z82*
- - avec
- - - démence *G10+, F02.2**
- - - psychose, organique *F06.8*
- infectieuse *I02.9*
- juvénile *I02.9*
- médicamenteuse *G25.4*
- mineure *I02.9*
- - avec atteinte cardiaque *I02.0*
- post-hémiplégique *G25.5*
- progressive *G25.5*
- progressive héréditaire *G10*
- rhumatismale *I02.9*
- - avec
- - - endocardite *I02.0*
- - - myocardite *I02.0*
- - - péricardite *I02.0*
- - - valvulite *I02.0*
- - sans atteinte cardiaque *I02.9*
- sénile *G25.5*
- simple *I02.9*
- spastique *G25.5*
- Sydenham, de *I02.9*
- - avec atteinte cardiaque *I02.0*

Choréiformes, mouvements *R25.8*

Choréique, hypokinésie réflexe *G25.5*

Choréo-athétose *G25.5*
- paroxystique *G25.5*

Chorio
- adénome *D39.2*
- - destruens *D39.2*
- amniotite *O41.1*
- angiome (CA) *O02.8*
- blastome *C58*
- encéphalite *A87.2+, G05.1**
- - aiguë *A87.2+, G05.1**
- - lymphocytaire *A87.2+, G05.1**
- - - séreuse, aiguë *A87.2+, G05.1**
- - séreuse *A87.2+, G05.1**
- épithéliome
- - métastase de *C80*
- - testiculaire *C62.9*
- épithéliose (Chorionepitheliosis interna) *D39.2*
- méningite *A87.2+, G02.0**
- - aiguë *A87.2+, G02.0**
- - lymphocytaire *A87.2+, G02.0**
- - - séreuse, aiguë *A87.2+, G02.0**
- - séreuse *A87.2+, G02.0**
- rétinienne
- - cicatrice *H31.0*
- - - après intervention chirurgicale pour décollement de la rétine *H59.8*
- - - non maculaire *H31.0*
- - - post-opératoire *H59.8*
- - dégénérescence *H31.1*
- - - héréditaire *H31.2*
- rétinite *H30.9*
- - congénitale
- - - syphilitique, tardive *A50.3+, H32.0**
- - - toxoplasmique *P37.1+, H32.0**
- - disséminée *H30.1*

Chorio –*suite*
- rétinite –*suite*
- - disséminée, au cours de neurosyphilis *A52.1+, H32.0**
- - focalisée *H30.0*
- - foyer (foyers) *H30.0*
- - juxta-papillaire *H30.0*
- - lors
- - - syphillis *A52.7+, H32.0**
- - - toxoplasmose *B58.0+, H32.0**
- - myopique progressive *H44.2*
- - neuro- *H30.9*
- - séreuse centrale *H30.0*
- - syphilitique
- - - congénitale *A50.0+, H32.0**
- - - disséminée *A52.7+, H32.0**
- - - syphilis secondaire *A51.4+, H32.0**
- - tuberculeuse *A18.5+, H32.0**
- rétinite avec myopie progressive *H44.2*
- rétinite en foyer *H30.9*
- - disséminée *H30.1*
- - focale *H30.0*
- - foyer *H30.0*
- - juxta-papillaire *H30.0*
- rétinopathie
- - séreuse centrale *H35.7*
- - type Birdshot (en taches de bougie) *H35.7*

Chorion (chorio-placenta) (chorioamnion)
- adénome (chorio-adénome) *D39.2*
- - destruens *C58*
- amnionite *O41.1*
- - avec complication pour le foetus *P02.7*
- angiome *O02.8*
- anomalie *O41.9*
- - complication-s sur le foetus/nouveau-né (répercussions pathologiques sur) *P02.9*
- carcinome *C58*
- - chez la femme *C58*
- - chez l'homme *C62.9*
- épithéliome *C58*
- épithéliose *D39.2*
- fibrose *O41.8*
- kyste *O41.8*
- tumeur *O01.9*

Choroïde
- abcès *H30.0*
- affection *H31.9*
- affection de la couche pigmentaire, placoïde, multifocale, aiguë *H31.8*
- anomalie *Q14.3*
- atrophie *H31.1*
- Atrophie gyrée *H31.2*
- cicatrice *H31.0*
- colobome *Q14.3*
- décollement *H31.4*
- dégénérescence *H31.1*
- - héréditaire *H31.2*
- dystrophie *H31.2*
- - aréolaire centrale *H31.2*
- - couche pigmentaire, aréolaire centrale *H31.2*
- - généralisée *H31.2*
- - généralisée, aréolaire, centrale *H31.2*
- - héréditaire *H31.2*
- - péripapillaire *H31.2*
- et rétine, inflammation *H30.9*
- hémangiome *D18.08*

Choroïde –*suite*
- hématome *H31.3*
- hémorragie *H31.3*
- - expulsive *H31.3*
- - sous-rétinienne *H31.3*
- infarctus *H34.2*
- inflammation *H30.9*
- inflammation, sympathique *H44.1*
- lésion traumatique *S05.8*
- lymphome *C85.9*
- maladie *H31.9*
- malformation
- - acquise *H31.8*
- - congénitale *Q14.3*
- mélanome *C69.3*
- - malin *C69.3*
- mélanome, in situ *D03.8*
- mélanome, malin *C69.3*
- métastase *C79.88*
- myopie progressive *H44.2*
- naevus *D31.3*
- rupture *H31.3*
- sclérose *H31.1*
- Séparation *H31.4*
- stries angioïdes *H35.3*
- syphilis secondaire *A51.4+, H32.0**
- trouble vasculaire *H34.2*
- trouble(s) (de) pigmentation *Q14.3*
- tuberculose *A18.5+, H32.0**
- tumeur *D48.7*
- - bénigne *D31.3*
- - maligne *C69.3*

Choroïdérémie *H31.2*

Choroïdite *H30.9*
- avec rétinite (choriorétinite) *H30.9*
- congénitale *H30.9*
- dégénérative *H31.1*
- disséminée *H30.1*
- focalisée *H30.0*
- foyer (foyers) *H30.0*
- héréditaire *H31.2*
- serpigineuse (choroïdopathie géographique hélicoïdale péripapillaire) *H31.8*
- syphilitique
- - congénitale précoce *A50.0+, H32.0**
- - secondaire *A51.4+, H32.0**
- syphilitique congénitale tardive *A50.3+, H32.0**
- syphilitique tardive *A52.7+, H32.0**
- tuberculeuse *A18.5+, H32.0**

Choroïdose (choroïdopathie) *H31.9*
- dégénérative *H31.1*
- héréditaire *H31.2*

Chrirurgicalement
- créé(e)
- - fistule artério-veineuse
- - - avec complication *T82.9*
- - - infection *T82.7*
- - - inflammation *T82.7*
- - shunt artério-veineux, avec complication *T82.9*

Christian, syndrome de
- Pfeifer-Weber- *M35.6*
- - avec granulome lipidique *M35.6*

Christ-Siemens-Touraine, syndrome de *Q82.8*

Chroback-Otto, bassin de (protrusion acé *M24.7*

Chromaffinome, malin *C80*

Chromatopsie *H53.1*

Chrome
- allergie à *L23.0*
- carence (déficit) *E61.4*
- dermatite allergique de contact *L23.0*
- dermatite toxique *L24.8*
- intoxication *T56.2*

Chromhydrose *L75.1*
- pseudo- *L67.8*

Chromomycose *B43.9*
- cutanée *B43.0+, L99.8**
- sous-cutanée avec
- - abcès *B43.2+, L99.8**
- - kyste *B43.2+, L99.8**

Chromomycotique, abcès cérébral *B43.1+, G07**

Chromophobe
- Adénocarcinome *C75.1*
- adénome *D35.2*
- - hypophysaire *D35.2*
- carcinome *C75.1*

Chromophytose *B36.0*

Chromoprotéinurie (néphrose hémoglobinur *N04.9*

Chromosome
- 18, délétion du bras long *Q93.5*
- - avec réarrangements complexes NCA *Q93.7*
- 4, délétion du bras court *Q93.3*
- 5
- - del 5q Syndrome myélodysplasique avec délétion isolé du *D46.6*
- - Syndrome délétion du bras court du *D46.6*
- 5, délétion du bras court *Q93.4*
- aberration (aberration chromosomique) *Q99.9*
- accessoire avec
- - réarrangement complexe NCA *Q92.5*
- - réarrangement complexe visible seulement en prométaphase *Q92.4*
- accessoire NCA *Q92.9*
- anneau *Q93.2*
- anneau (circulaire) *Q93.2*
- anomalie *Q99.9*
- - dépistage par amniocentèse *Z36.0*
- - foetale, avec nécessité de soins à la mère pendant la grossesse *O35.1*
- - lors de
- - - anamnèse *Z87.7*
- - - anamnèse familiale *Z82*
- anomalie congénitale *Q99.8*
- délétion, avec réarrangements complexes NCA *Q93.7*
- diagnostic prénatal (screening prénatal) *Z36.0*
- dicentrique *Q93.2*
- double
- - avec réarrangements complexes NCA *Q92.5*
- - visible seulement en prométaphase, NCA *Q92.4*
- double (duplication)
- - visible seulement en prométaphase, NCA *Q92.4*
- duplication en prométaphase *Q92.4*
- inversion, sujet normal *Q95.1*

Chromosome *–suite*
- marqueur supplémentaire *Q92.6*
- réarrangement équilibré *Q95.9*
- - chez sujet anormal *Q95.2*
- résultat d'analyse
- - anormal *R89.8*
- - anormal, lors d'examen systématique en cours de grossesse *O28.5*
- sexuel
- - absence, dans
- - - phénotype féminin *Q97.8*
- - - phénotype masculin *Q98.8*
- - accessoires
- - - dans
- - - - phénotype féminin *Q97.8*
- - - - phénotype masculin *Q98.8*
- - anomalie *Q99.8*
- - - avec caryotype 46, X, excepté iso (Xq) *Q96.2*
- - - avec mosaïque, 45,X/lignées cellulaires NCA *Q96.4*
- - - dans
- - - - phénotype féminin *Q97.9*
- - - - phénotype masculin *Q98.9*
- - anomalie structurale, dans phénotype masculin *Q98.6*
- - autosomes (et), réarrangement équilibré chez un sujet anormal *Q95.3*
- - Klinefelter, syndrome de *Q98.4*
- - mosaïque, chez la femme NCA *Q97.8*
- - mosaïque, chez l'homme NCA *Q98.7*
- - syndrome malformatif congénital, dans phénotype masculin *Q98.9*
- - Turner, syndrome de *Q96.9*
- translocation équilibrée (balancée) *Q95.9*
- translocation NCA *Q99.8*
- trisomie complète *Q92.9*
- X
- - fragile *Q99.2*
- - lié
- - - Agammaglobulinémie *D80.0*
- - - - avec carence en hormone de croissance *D80.0*
- - - anémie, sidéroblastique hypochrome *D64.0*
- - - lymphoprolifération *D82.3*
- - plus de
- - - deux, en cas de syndrome de Klinefelter, phénotype masculin *Q98.1*
- - - trois, en cas de phénotype féminin *Q97.1*
- - Rétinoschisis *Q14.1*
- - triple, avec phénotype féminin *Q97.0*

Chronique *voir* nature de la maladie
- leucémie
- - granulocytaire *C92.10*
- - - rémission complète *C92.11*
- - lymphocytaire *C91.10*
- - - rémission complète *C91.11*
- - lympthatique *C91.10*
- - - rémission complète *C91.11*
- - monocytaire *C93.10*
- - - rémission complète *C93.11*
- - myéloïde *C92.10*
- - - rémission complète *C92.11*
- récidivante
- - gastrite *K29.5*
- - lombalgie *M54.5*

Chronique *voir* nature de la maladie *–suite*
- récidivante *–suite*
- - syndrome lombaire *M54.16*
- - urticaire *L50.8*
- syndrome de fatigue *G93.3*
- syndrome douloureux régional complexe (de douleur régionale complexe) (SDRC)
- - type
- - - I *M89.09*
- - - II, extrémité membre
- - - - inférieur *G57.8*
- - - - supérieur *G56.4*

Chrysanthème
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Chrysops, fièvre du au *A21.9*

Churg syndrome Granulomatose de Wegener- *M31.3*
- avec atteinte plumonaire *M31.3+, J99.1**

Churg-Strauss syndrome de (angéite granu *M30.1*

Chute, mère, affectant le foetus/nouveau *P00.5*

Chylectasie (chylangiectasie) (kyste chy *I89.8*

Chyleux, -se
- ascite, non filarienne *I89.8*
- épanchement *J94.0*
- - pleural *J94.0*
- hydrothorax, non filarienne *I89.8*
- kyste
- - mésentérique *I89.8+, K67.8**
- - péritonéal *I89.8+, K67.8**

Chylocèle (kyste chyleux) *I89.8*
- non d'origine filarienne *I89.8*
- tunique vaginale testiculaire *N50.8*
- - non d'origine filarienne *N50.8*

Chylopéricarde *I31.3*

Chylothorax *I89.8*
- non d'origine filarienne *I89.8*

Chylurie *R82.0*
- non d'origine filarienne *R82.0*

Chypre, fièvre de *A23.0*

cicatrice
- *L90.5*
- abdominale, hernie *K43.9*
- adénoïde *J35.8*
- adhérence *L90.5*
- amygale *J35.8*
- amygdale palatine *J35.8*
- amygdale pharyngienne *J35.8*
- anus *K62.8*
- atrophique *L90.5*
- avec
- - altération *L90.5*
- - strabisme *H50.6*
- bouche *K13.7*
- canal
- - cholédoque *K83.8*
- - hépatique *K83.8*
- cerveau *G93.88*
- césarienne, antérieure, avec prise en charge de la mère *O34.2*
- chéloïde *L91.0*
- choriorétinienne *H31.0*

cicatrice *–suite*
- choriorétinienne *–suite*
- - non maculaire *H31.0*
- - postopératoire *H59.8*
- - suite à une intervention chirurgicale *H59.8*
- choroïde *H31.0*
- col de l'utérus
- - avec
- - - césarienne *O34.4*
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.8*
- - complications
- - - accouchement *O34.4*
- - - grossesse *O34.4*
- - postopératoire *N88.1*
- - post-partum *N88.1*
- col de l'utérus, avec obstruction à la naissance *O65.5*
- conjonctive *H11.2*
- contracture *L90.5*
- corde vocale *J38.3*
- cornée *H17.9*
- - cas d'avitaminose A *E50.6+, H19.8**
- - tuberculeuse *A18.5+, H19.8**
- - xérophtalmique en cas d'avitaminose A *E50.6+, H19.8**
- - xérophtalmiques *H17.8*
- cutanée *L90.5*
- - douloureuse *L90.5*
- - endométriose *N80.6*
- - fibrose *L90.5*
- - infectieuse *L08.8*
- - postinfectieuse *L90.5*
- - tuberculeuse *B90.8*
- difformité *L90.5*
- douleurs *L90.5*
- duodénum, obstructive *K31.5*
- ectropion *H02.1*
- emphysème *L90.5*
- endométriose *N80.6*
- entropion *H02.0*
- épisiotomie *L90.5*
- excédentaire *L91.0*
- fibrose *L90.5*
- - épidurale, après discectomie *M96.1*
- gorge *J39.2*
- granulome *L90.5*
- hémorroïdaires cutané résiduel *K64.4*
- hernie *K43.9*
- - incarcérée *K43.0*
- - paroi abdominale *K43.9*
- hypertrophie *L91.0*
- hypertrophique *L91.0*
- hypopharynx *J39.2*
- infarctus, myocarde *I25.29*
- inflammation *L90.5*
- irritation *L90.5*
- langue *K14.8*
- larynx *J38.7*
- lèvres
- - grandes lèvres *N90.8*
- - petites lèvres *N90.8*
- macula *H31.0*
- - due à l'exposition au soleil *H31.0*
- - post-inflammatoire *H31.0*
- - post-traumatique *H31.0*
- macula lutea, pôle inférieur *H31.0*
- - post-traumatique *H31.0*

cicatrice –*suite*
- macula lutea, pôle inférieur –*suite*
- - suite à une inflammation *H31.0*
- maligne *C44.9*
- muscle *M62.89*
- - avec contracture *M62.49*
- myocarde *I25.29*
- neurome *T87.3*
- oreille moyenne *H74.8*
- os *M89.89*
- paupière *H02.5*
- pavillon de l'oreille *H61.1*
- pénis *N48.8*
- pharynx *J39.2*
- pôle oculaire, inférieur *H31.0*
- post inflammatoire post traumatique) de la macula (pôle postérieur) , *H31.0*
- poumons *J84.1*
- problème *L90.5*
- Processus alvéolaire *K08.88*
- prostate *N42.8*
- rectum *K62.8*
- rétine *H31.0*
- rhinopharynx *J39.2*
- surrénalienne *E27.8*
- tissus conjonctifs *L90.5*
- trachée *J39.88*
- troubles *L90.5*
- tuberculeuse NCA *B90.9*
- tympan *H73.8*
- urètre *N36.8*
- utérus *N85.8*
- - avec
- - - césarienne *O34.2*
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.8*
- - cas de
- - - accouchement *O34.2*
- - - grossesse *O34.2*
- vagin *N89.8*
- - postopératoire *N99.2*
- vésicule séminale *N50.8*
- vessie (cystite) *N32.8*
- voies biliaires *K83.8*
- voies lacrymales *H04.5*
- voile palatal *K13.7*
- - molle *K13.7*
- vulve *N90.8*
- - ancienne *N90.8*

Cicatriciel(le)/cicatrice
- alopécie *L66.9*
- enroulement de la paupière vers l'intérieur *H02.0*
- entropion *H02.0*
- induite par
- - déformation de la paupière *H02.5*
- - lagophtalmie *H02.2*
- modification, pôle rénal *N28.8*
- pemphigoïde *L12.1*

Cicatrisation
- avec reflux vésico-urétéral *N13.7*
- fracture
- - avec défaut de positionnement *M84.09*
- - retardée *M84.29*
- larynx *J38.7*
- myocarde *I25.29*
- pemphigoïde *L12.1*

Cicatrisation –*suite*
- plèvre *J94.1*
- reins *N28.8*
- retardée *T79.9*
- secondaire *T79.9*
- secondaire, fissure périnéale *O90.1*
- troubles *T79.9*
- - genou *T79.9*
- - postopératoires *T81.8*
- - - infectieux *T81.4*

Cigarettes
- consommation excessive *F17.1*
- ingestion *T65.2*

Ciguatera ichtyosarcotoxisme *T61.0*

Ciguatera intoxication par poisson *T61.0*

Cilaire

Ciliaire
- dyskinésie, primaire *Q34.8*
- staphylome *H15.8*

Cilio-rétinien
- artère, persistance *Q14.8*
- veine, persistance *Q14.8*

Cils
- absence *Q10.3*
- - acquise *H02.7*
- - congénitale *Q10.3*
- agénésie *Q10.3*
- croissance anormale *H02.8*
- difformité
- - acquise *H02.8*
- - congénitale *Q10.3*
- Folliculite *H00.0*
- inversés *H02.8*
- poliose *L67.1*
- trichiasis *H02.0*

Cils, syndrome, dyskinésie *Q34.8*

CIN *voir* sous Néoplasie intra-épithélial *N87.9*
- grade I *N87.0*
- grade II *N87.1*
- grade III *D06.9*

Cinq foetus, grossesse *O30.8*

Cinq jours, fièvre de *A79.0*

Cinquième maladie (erythème infectieux a *B08.3*

Cipriani maladie de *D55.0*

Circadien, rythme
- inversion *G47.2*
- inversion, psychogène *F51.2*

Circoncision *Z41.2*
- rituelle *Z41.2*
- routine *Z41.2*
- sans indication médicale *Z41.2*

Circonscrit
- ménigite *G03.9*
- oedème, aigu *T78.3*
- sclérodermie *L94.0*

Circonscrit, -te

Circonvolution cérébrale, hypoplasie *Q04.3*

Circonvolutions, malformation *Q04.8*

Circulaire
- cyclothymie *F34.0*
- membrane *H21.4*

Circulant
- anticoagulants, troubles, hémorragiques *D68.3*
- complexe immun, avec néphrite NCA *N05.8*
- enzyme, carence NCA *E88.0*

Circulation
- blocage NCA *I99*
- caillot *I74.9*
- choc *R57.9*
- - cas de
- - - avortement, médical, échoué *O07.3*
- - - contractions, et accouchement *O75.1*
- - chez le nouveau-né *P29.8*
- - complication, lors de l'échec d'un avortement *O07.8*
- - suite à
- - - avortement *O08.3*
- - - grossesse extra-utérine *O08.3*
- - - grossesse molaire *O08.3*
- collatérale *I99*
- - chez le foetus/nouveau-né *P96.8*
- complications *I99*
- - suite à
- - - actes médicaux *I97.9*
- - - intervention chirurgicale *I97.9*
- coronaire, anomalie, lors du diagnostic par imagerie *R93.1*
- déficit *I99*
- - chez le nouveau-né *Q28.9*
- - congénital *Q28.9*
- dérégulation *I99*
- - hypotonique *I95.9*
- doigt *L03.01*
- - avec lymphangite *L03.01*
- dysfonctionnement, lors de la grossesse *O99.4*
- extracorporelle, avec complications *T80.9*
- foetale, persistance *P29.3*
- insuffisance *R57.9*
- - aigue, périphérique *R57.9*
- - chez le foetus/nouveau-né *P96.8*
- - périphérique *R57.9*
- insuffisance NCA *I99*
- - aigue *R57.9*
- - chez le foetus/nouveau-né *P29.8*
- Labilité *I99*
- - lors de la grossesse *O99.4*
- maladie NCA *I99*
- - syphilitique NCA *A52.0+, I98.0**
- - syphilitique, congénitale *A50.5+, I98.0**
- matrice de l'ongle
- - doigt *L03.01*
- - orteils *L03.02*
- orteils *L03.02*
- sang, extracorporelle, avec thrombocytopénie *D69.58*
- Troubles *I99*
- - cas d'hypotension *I95.9*
- - congénital *Q28.9*
- - hypotonique *I95.9*
- - neurovégétatif *F45.30*
- - orthostatique *I95.1*
- - périphérique, en cas de
- - - diabète sucré *E14.50*
- - - type 1 *E10.50*
- - - type 2 *E11.50*
- - psychogènes *F45.30*

Circulation *–suite*
- Troubles *–suite*
- - sénil *I99*
- - végétatives *I99*

Circulus arteriosus
- anévrysme congénital rompu NCA *I60.6*
- anévrysme du polygone de Willis *I67.10*
- cerebri (Polygone de Willis)
- - anévrysme *I67.10*
- - - congénital *Q28.30*
- - - rompu *I60.6*
- - rupture *I60.6*

Cirrhose *K74.6*
- alcoolique *K70.3*
- - macronodulaire *K70.3*
- - micronodulaire *K70.3*
- - nutritionnelle *K70.3*
- - portale *K70.3*
- - post-nécrotique *K70.3*
- angiocholite, primaire *K74.3*
- biliaire *K74.5*
- - primitive *K74.3*
- - secondaire *K74.4*
- blocage, foie *K76.1*
- Charcot *K74.3*
- cholostatique
- - primitive *K74.3*
- - secondaire *K74.4*
- Cruveilhier-von-Baumgarten *K74.6*
- diabètique *K74.6*
- et fibrose, foie, en cas de maladie hépatique toxique *K71.7*
- foie *K74.6*
- - alcoolique *K70.3*
- - toxique *K71.7*
- Hanot de, hépatique *K74.3*
- hépatique *K74.6*
- - alcoolique *K70.3*
- - - avec varices, oesophage *K70.3+*
- - - - avec saignement *K70.3+*
- - auto-immune *K74.6*
- - avec varices, oesophage *K74.6+*
- - - avec saignement *K74.6+*
- - cardiale *K76.1*
- - cas de glycogénose *E74.0*
- - congénitale *P78.8*
- - cryptogène *K74.6*
- - décompensée *K74.6*
- - macronodulaire *K74.6*
- - médicamenteuse, toxique *K71.7*
- - micronodulaire *K74.6*
- - non alcoolique *K74.6*
- - portale *K74.6*
- - post-nécrotique *K74.6*
- - pseudo-péricardique *I31.1*
- - suite à une hépatite *K74.6*
- - syphilitique *A52.7+, K77.0**
- - toxique *K71.7*
- - - avec varices, oesophage *K71.7+*
- - - - avec saignement *K71.7+*
- hépatique, décompensée *K74.6*
- hépatoliénale *K74.6*
- hypertrophique *K74.3*
- Laënnec *K70.3*
- - hépatique
- - - alcoolique *K70.3*
- - - non alcoolique *K74.6*

Cirrhose *–suite*
- mixte *K74.6*
- monolobulaire *K74.3*
- néphro- *N26*
- nutritionnelle *K74.6*
- pancréatique *K86.8*
- périportale *K74.6*
- pigment-, foie *E83.1*
- post-hépatite *K74.6*
- pulmonaire *J84.1*
- - chronique *J84.1*
- rein *N26*
- rénale *N26*
- Tood, de *K74.3*
- trabecula *K74.6*

Cirrhose biliaire primitive [maladie de *K74.3*

Cirrhose cardiaque *K76.1*

Cirrhose de Laennec, foie
- alcoolique *K70.3*
- non-alcoolique *K74.6*

Cirrhose de Todd *K74.3*

Cirrhose du foie *K76.1*

Cirrhose monolobulaire *K74.3*

Cirrhose suite à une nécrose
- alccolique *K70.3*
- hépatique *K74.6*

Cirrhotique
- hypertrophie, clitoris *N90.8*
- néphrite *N26*
- pneumonie chronique *J84.1*

Cisaillement, cornée *H18.4*

Citrate de triéthyle
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Citrobacter, résistant à
- amikacine *U80.5!*
- carbapénèmes *U80.5!*
- quinolones *U80.5!*

Citrulline, anomalie du métabolisme *E72.2*

Citrullinémie *E72.2*

Citrullinurie *E72.2*

Civatte, poïkilodermie de *L57.3*

CIVD [coagulation intravasculaire dissém *D65.1*

CL - *voir* colonne vertébrale

Cladosporiose *B36.1*

Cladosporium
- castellani, infection *B36.1*
- werneckii, infection *B36.1*

Clarke-Hadfield, syndrome de [mucoviscid *E84.9*

classique
- avec sclérose nodulaire Lymphome de Hodgkin (*C81.1*
- cellularité mixte Lymphome de Hodgkin (*C81.2*
- déplétion lymphocytaire Lymphome de Hodgkin (*C81.3*
- riche lymphocytes Lymphome de Hodgkin (*C81.4*
- type non précisé Lymphome de Hodgkin *C81.7*

Claude Bernard-Horner syndrome de *G90.2*

Claude Bernard-Horner syndrome de *–suite*
- traumatique *S14.5*

Claude Bernard-Horner, syndrome de *G90.2*
- traumatique *S14.5*

Claude, syndrome de *I66.8+, G46.3**

Claudication
- intermittente *I73.9*
- - artérioscléreuse, médullaire *G95.1*
- - cérébrale *G45.99*
- - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- - veineuse *I87.8*
- spinale *G95.1*

Claudication, intermittente *I73.9*
- cas d'athérosclérose, artères distales, type jambe-bassin *I70.21*
- syphilitique *A52.0+, I79.8**

Claustrophobie *F40.2*

Clavelée ou poxvirose *B08.0*

Clavicule
- agénésie *Q74.0*
- anomalie *Q74.0*
- anomalie de position, congénitale *Q74.0*
- carcinome *C79.5*
- fracture *S42.00*
- - dans
- - - tiers latéral *S42.03*
- - - tiers médial *S42.01*
- - - tiers moyen *S42.02*
- - lors d'une fracture de l'humérus *S42.7*
- - par des lésions liées à la naissance *P13.4*
- - périnatale *P13.4*
- fracture de l'omoplate, humérus, multiples *S42.7*
- hypoplastie, congénitale *Q74.0*
- malformation *Q74.0*
- - acquise *M21.81*
- - congénitale *Q68.8*
- perforation *S43.1*
- pseudo-arthrose, acquise *Q74.0*
- sarcome *C41.3*

Cléidotomie du foetus *P03.8*

Cléptomanie *F63.2*

Clifford, syndrome de *P08.2*

Climatère
- masculin, avec syndrome psychique *N50.8*
- précoce *E28.3*
- tardif *N95.1*

Clindamycine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Clinique
- catégorie
- - A, VIH *U60.1!*
- - B, HIV *U60.2!*
- - C, VIH *U60.3!*
- diagnostique, malaria, sans confirmation parasitologique *B54*
- résultats anormaux NCA *R68.8*

Clitoris
- absence, congénitale *Q52.6*
- adhérence *N90.8*
- Agénésie *Q52.6*

Clitoris –*suite*

- Anomalie *Q52.6*
- brûlures *T21.05*
- contusion *S30.2*
- déchirure *S31.4*
- difformité
- - acquise *N90.8*
- - congénitale *Q52.6*
- Epispadias *Q64.0*
- fente *Q52.6*
- hyperplasie, congénitale *Q52.6*
- hypertrophie *N90.8*
- - cirrhotique *N90.8*
- - congénitale *Q52.6*
- kyste *N90.7*
- lésion *S39.9*
- - superficielle *S30.80*
- malformation *Q52.6*
- mélanome, malin *C51.2*
- plaie, ouverte *S31.4*
- Prépuce, malformation *Q52.6*
- rétention, smegma *N90.8*
- tumeur* *D39.7*

Clivus, méningeome *D32.0*

Cloaque
- carcinome *C21.2*
- exstrophie *Q43.8*
- persistant *Q43.7*

Cloaque, persistance du *Q43.7*

Cloision, sinus paranasal
- anomalie *Q30.8*
- difformité congénitale *Q30.8*

Cloison nasal
- abcès *J34.0*
- brulure *T20.0*
- corrosion *T20.4*
- courbure *J34.2*
- - acquise *J34.2*
- - congénitale *Q67.4*
- Déviation *J34.2*
- - acquise *J34.2*
- - congénitale *Q67.4*
- luxation *J34.2*
- perforation, syphilitique *A52.7+, J99.8**

Cloison nasale, déviation *J34.2*
- acquise *J34.2*
- congénitale *Q67.4*

Clomifène, test au *Z31.4*

clonale non mastocytaire SM-AHNMD Mastocytose systémique associé à une hémopathie *D47.0*

Clone *R25.8*

Clonidine, intoxication *T46.5*

Clonique
- contraction, utérus *O62.4*
- épilepsie *G40.3*
- spasme hémifacial *G51.3*

Clonorchiase *B66.1*
- foie *B66.1+, K77.0**

Clonorchis sinensis, infection *B66.1*
- foie *B66.1*

Clostridium
- bifermentans, infection *A48.0*
- botulinum
- - infection *A05.1*
- - intoxication alimentaire *A05.1*

Clostridium –*suite*

- cellulite *A48.0*
- difficile
- - entérocolite *A04.7*
- - intoxication alimentaire *A04.7*
- - septicémie *A41.4*
- entérite *A04.7*
- entérocolite *A04.7*
- histolyticum, infection *A48.0*
- infection NCA *A48.0*
- infection, congénitale *P39.8*
- myosite *A48.0*
- nécrose musculaire *A48.0*
- novyi, infection, agent de la gangrène gazeuse *A48.0*
- oedematiens, infection *A48.0*
- perfringens
- - agents pathogènes *B96.7!*
- - diarrhée *A04.8*
- - entérite
- - - infectieuse *A04.8*
- - - nécrosante *A05.2*
- - gangrène *A48.0*
- - intoxication alimentaire *A05.2*
- - septicémie *A41.4*
- phlegmon *A48.0*
- septicum, infection, agent de la gangrène gazeuse *A48.0*
- sordelli, infection, agent de la gangrène gazeuse *A48.0*
- welchii, intoxication alimentaire *A05.2*

Clostridium, bactériémie à *A48.0*

Clouston, syndrome de *Q82.8*

cluster Céphalée *G44.0*

Clutton, hydarthrose de *A50.5+, M03.19**

CMV [cytomégalovirus]
- infection, associée à maladie causée par le VIH *B20, B25.9*
- maladie, avec décollement de rétine exsudatif *B25.9*
- rétinite
- - associée à maladie causée par le VIH *B20+, H32.0**
- - avec décollement de rétine, VIH positif *B20+, H32.0**

coagulation
-
- Carence héréditaire Autre facteur de *D68.28*
- défaut *D68.9*
- - acquis *D68.4*
- - avec
- - - décollement prématuré du placenta, avec hémorragie *O45.0*
- - - hémorragie
- - - - avant l'accouchement *O46.0*
- - - - complication pendant l'accouchement *O67.0*
- - pendant l'accouchement *O67.0*
- - postpartum *O72.3*
- - provoqué par
- - - carence en vitamine K *D68.4*
- - - hyperprothrombinémie *D68.4*
- - - maladie du foie *D68.4*
- - transitoire néonatal *P61.6*
- intravasculaire *D65.1*
- - complication lors d'un échec d'avortement *O07.6*
- - diffuse *D65.1*

coagulation –*suite*
- intravasculaire –*suite*

- - disséminée *D65.1*
- - - avec
- - - - glomérulonéphrite *D65.1+, N08.2**
- - - - glomérulopathie *D65.1+, N08.2**
- - - - hémorragie précédant l'accouchement *O46.0*
- - - - saignements importants pendant l'accouchement *O67.0*
- - - chez le fœtus/nouveau-né *P60*
- - disséminée avec saignement
- - - important
- - - - cas de décollement du placenta *O45.0*
- - - - précédant l'accouchement *O46.0*
- - lors de l'échec d'un avortement médical *O07.1*
- prolongée *D68.9*
- sanguin
- - durablement acquis trouble de la *U69.11!*
- - trouble provisoires de la *U69.12!*
- troubles *D68.9*
- - adulte *D68.9*
- - avec
- - - hémorragie précédant l'accouchement *O46.0*
- - - saignement
- - - - pendant l'accouchement *O67.0*
- - - - précédant l'accouchement *O46.0*
- - cas de décollement prématuré du placenta *O45.0*
- - postpartum *O72.3*
- - transitoires chez le nouveau-né *P61.6*

Coagulation sanguine
- anomalie *D68.9*
- - transitoire, néonatale *P74.4*
- déficiente *D68.9*

Coagulation, facteurs, allongée *D68.9*

Coagulopathie de consommation *D65.1*
- avec purpura, gangréneux *D65.1*
- chez le fœtus/nouveau-né *P60*
- intrapartum *O67.0*
- intrapartum, avec lésion foetus/nouveau-né *P02.1*
- postpartum *O72.3*
- prénatale *O46.0*
- suite à
- - Avortement *O08.1*
- - grossesse extra-utérine *O08.1*
- - grossesse môlaire *O08.1*

Coarctation de l'aorte *Q25.1*
- post-ductal *Q25.1*
- pré-ductal *Q25.1*

Coarctation de l'isthme aortique *Q25.1*

Coarctation, aorte *Q25.1*
- post-ductale *Q25.1*
- pré-ductale *Q25.1*

Coats, rétinite de *H35.0*

Cobalamine, carence *E53.8*

Cobalt, concentration anormale dans le s *R79.0*

Cocaïne
- abus *F14.1*
- dépendance *F14.2*
- Inhaler *F14.2*

Cocaïne *–suite*
- intoxication *T40.5*
- - aiguë, dans le sens de l'intoxication *F14.0*
- - cas de dépendance *F14.0*
- intoxication aigue *F14.0*
- présence dans le sang *R78.2*
- Utilisation
- - avec syndrome de dépendance *F14.2*
- - nuisible *F14.1*

Cocaïne, dérivé, dépendance *F14.2*

Cocaïnomanie *F14.2*

Coccidioïdomycose *B38.9*
- aiguë, avec pneumonie *B38.0+, J17.2**
- chronique, avec pneumonie *B38.1+, J17.2**
- cutanée *B38.3+, L99.8**
- disséminée *B38.7*
- lors d'une maladie, due au VIH *B20, B38.9*
- méninges *B38.4+, G02.1**
- prostate *B38.8+, N51.0**
- pulmonaire *B38.2+, J99.8**
- - aigue *B38.0+, J99.8**
- - chronique *B38.1+, J99.8**

Coccidiose *A07.3*
- colite *A07.3*
- diarrhée *A07.3*
- dysenterie *A07.3*
- entérite *A07.3*
- infection *A07.3*
- intestinale *A07.3*
- lors d'une maladie, due au VIH *B20, A07.3*

Coccydynie *M53.3*

Coccygien-, -enne
- kyste *M85.65*
- Kyste dermoïde *L05.9*
- - avec abcès *L05.0*
- sinus *L05.9*
- - avec abcès *L05.0*
- spondylose *M47.88*

Coccygodynie *M53.3*

Coccyx
- abcès *L02.3*
- absence, congénitale *Q76.4*
- agénésie *Q76.4*
- anomalie *Q76.4*
- athérome *L05.9*
- atteinte, NCA *M53.3*
- blessure *S39.9*
- - obstétricale *O71.6*
- chordome, chondroïde *C41.4*
- contusion *S30.0*
- décubitus *L89.94*
- déformation
- - acquise *M43.88*
- - congénitale, NCA *Q76.4*
- déformation, acquise *M43.88*
- dermoïde *L05.9*
- dislocation *S33.2*
- distortion *S33.7*
- douleurs *M53.3*
- fistule *L05.9*
- - avec abcès *L05.0*
- fracture *S32.2*
- - obstétricale *O71.6*

Coccyx *–suite*
- hypermobilité *M53.28*
- hypoplasie *Q76.4*
- kyste *L05.9*
- - infecté *L05.9*
- - malin *C44.5*
- lésion obstétricale *O71.6*
- malformation *Q76.4*
- phlegmon *L03.3*
- sarcome *C41.4*

Coccyx, décubitus dans la région du *L89.94*

Coccyx, fracture *S32.2*

Coccyx, tératome *D48.0*
- foetal, soins maternels *O33.7*

Cochenille, rouge
- allergie [E 124] *T78.4*
- hypersensibilité [E 124] *T78.4*

Cochlée
- hémorragie *H83.8*
- plaie, ouverte *S01.38*

Cochlée, dégénérescence *H83.8*

Cochlée, surdité *H90.5*

Cochrane, syndrome de *E71.1*

Cockayne, syndrome de *Q87.1*
- Weber- *Q81.8*

Codéine, dépendance *F11.2*

Codéine, intoxication *T40.2*

Codman, tumeur de *D16.9*

Coeliaque *K90.0*
- avec rachitisme *K90.0*
- chez
- - enfant *K90.0*
- - l'adulte *K90.0*

Coeur
- abcès *I51.8*
- accessoire *Q24.8*
- activité irrégulière *I49.9*
- adhérence *I31.0*
- - rhumatismale *I09.2*
- adipeux *I51.5*
- affection rhumatismale *I09.9*
- agénésie *Q24.8*
- anévrisme *I25.3*
- angine *I20.9*
- anomalie *Q24.9*
- - congénitale *Q24.9*
- anomalie de position congénitale NCA *Q24.8*
- anomalie, lors du diagnostic par imagerie *R93.1*
- apoplexie *I21.9*
- appareil
- - avec hémorragie NCA *T82.8*
- - électronique
- - - avec fibrose *T82.8*
- - - malposition *T82.1*
- arrêt *I46.9*
- - *I50.9*
- - à
- - -
- - - anesthésie
- - - - pendant
- - - - - grossesse, *O29.1*
- - - - - accouchement, *O74.2*
- - - - suites de couches *O89.1*

Coeur *–suite*
- arrêt *–suite*
- - à *–suite*
- - - anésthésie
- - - - pendant l'accouchement *O74.2*
- - - - suite de couches, au cours des *O89.1*
- - - obstruction *I50.01*
- - - prothèse cardiaque *I97.1*
- - après
- - - accouchement par césarienne *O75.4*
- - - mesure obstétricale (comprenant l'accouchement) *O75.4*
- - avec réanimation réussie *I46.0*
- - biventriculaire *I50.01*
- - brusque *I50.9*
- - chez le nouveau-né *P29.0*
- - - *P29.1*
- - complication, lors de l'avortement, échec *O07.8*
- - congénital *P29.0*
- - congestif *I50.01*
- - cours de
- - - avortement, médical, échec *O07.3*
- - - intervention chirurgicale *T81.8*
- - hypertensif *I11.00*
- - lors de l'opération *T81.8*
- - mécanique dû à une prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- - post-opératoire *I97.8*
- - - *I97.8*
- - - conséquence non-immédiate de la chirurgie cardiaque *I97.1*
- - rhumatismal *I09.9*
- - sénile *I50.9*
- - suite à
- - - accouchement par césarienne *O75.4*
- - - intervention chirurgicale *I97.8*
- - - mesure obstétricale (comprenant l'accouchement) *O75.4*
- - thyréotoxique *E05.9+, I43.8**
- artériosclérose *I25.19*
- artificiel
- - avec complication *T82.9*
- - - mécanique *T82.5*
- - Dépendance long durée envers un *Z99.4*
- - infection *T82.7*
- - inflammation *T82.7*
- - présence *Z95.80*
- asthénie *I50.9*
- - psychogène *F45.30*
- asthme *I50.19*
- athéromatose *I25.19*
- athérome *I25.19*
- battement *I49.8*
- bessure perforante traumatique *S26.88*
- - avec hémopéricarde *S26.0*
- biloculaire *Q20.8*
- bloc *I45.9*
- - complet *I44.2*
- - congénital *Q24.6*
- - deuxième degré *I44.1*
- - - type
- - - - I *I44.1*
- - - - II *I44.1*
- - premier degré *I44.0*
- - troisième degré *I44.2*
- boeuf *I51.7*

Coeur –*suite*

- bruit *R01.1*
- - accidentel *R01.0*
- - - bénin *R01.0*
- - anormal NCA *R01.2*
- - fonctionnel *R01.0*
- - non-organique *R01.0*
- calcification *I51.5*
- callosité de la paroi postérieure *I25.29*
- collapsus *I50.9*
- complication *I51.9*
- compresssion *I51.8*
- congestion *I50.01*
- contusion *S26.81*
- cordon tissulaire
- - anormal *Q24.8*
- - congénital *Q24.8*
- crise *I50.9*
- d'athlète *I51.7*
- déchirure *S26.88*
- - avec ouverture d'une cavité cardiaque *S26.83*
- - sans ouverture d'une cavité cardiaque *S26.82*
- décompensation *I51.9*
- - biventriculaire *I51.9*
- - lors d'hypertension *I11.00*
- défaillance due à une prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- défaut *I38*
- - acquis *I38*
- - congénital *Q24.9*
- - rhumatismal *I09.1*
- dégénérescence *I51.5*
- - amyloïde *E85.4+, I43.1**
- - athéromateuse *I25.19*
- - graisseuse *I51.5*
- - sénile *I51.5*
- dégénérescence graisseuse *I51.5*
- déplacement
- - acquis *I51.8*
- - congénital *Q24.8*
- - due à une prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- développement défectueux congénital *Q24.9*
- dilatation *I51.7*
- - aiguë *I51.7*
- - chronique *I51.7*
- - congénitale *Q24.8*
- diverticule congénital *Q24.8*
- donneur *Z52.7*
- douleurs *R07.2*
- - psychogènes *F45.4*
- dysfonctionnement *I51.8*
- - provoqué par l'alcool *I51.8*
- Ebstein, anomalie d' *Q22.5*
- ectopie *Q24.8*
- embolie *I21.9*
- embolie graisseuse *I21.9*
- épuisement *I50.9*
- et rein
- - insuffisance, lors d'hypertonie
- - - cardio-rénale *I13.20*
- - - cardiovasculaire *I13.20*
- - - rénale *I13.20*
- - maladie hypertensive *I13.90*
- - - avec insuffisance
- - - - coeur *I13.00*

Coeur –*suite*

- et rein –*suite*
- - maladie hypertensive –*suite*
- - - avec insuffisance –*suite*
- - - - coeur –*suite*
- - - - - avec crise hypertensive, *I13.01*
- - - - - et rein, *I13.20*
- - - - rein *I13.10*
- - - - - avec crise hypertensive, *I13.11*
- faiblesse *I50.9*
- fibrillation *I49.0*
- fibroïde *I51.4*
- fibrose *I51.4*
- fonction ventriculaire gauche restreinte *I50.19*
- gibbeux *I27.1*
- glycogénose *E74.0+, I43.1**
- gomme *A52.0+, I52.0**
- gonorrhée *A54.8+, I52.0**
- hémorragie *I51.8*
- hydropisie *I50.01*
- hyperkinésie *I51.8*
- hypertensif *I11.90*
- hypertrophie *I51.7*
- - avec fièvre, rhumatismale, inactive *I09.8*
- - biventriculaire *I51.7*
- - chronique *I51.7*
- - congénitale NCA *Q24.8*
- - graisseuse *I51.5*
- - hypertensive *I11.90*
- - rhumatismale *I09.8*
- - - aiguë *I01.8*
- - - évolutive *I01.8*
- hypochondrie *F45.2*
- hypoplasie *Q24.8*
- IDM postérieur aigu *I21.1*
- infantilisme *Q24.9*
- infarctus, *voir aussi* infarctus du myocarde ou infarctus du muscle cardiaque *I21.9*
- - aigu *I21.9*
- - ancien *I25.29*
- - callosité *I25.29*
- - imminent *I20.0*
- - paroi antérieure *I21.0*
- infection *I51.8*
- infiltration glycogénique *E74.0+, I43.1**
- infiltration graisseuse *I51.5*
- inflammation *I51.8*
- insuffisance *I50.9*
- - aiguë *I50.9*
- - artérioscléreux *I50.9*
- - avec
- - - congestion pulmonaire *I50.19*
- - - défaillance antérieure et postérieure *I50.9*
- - - oedème *I50.01*
- - - poumon, aigu *I50.14*
- - biventriculaire *I50.01*
- - cardio-pulmonaire *I27.9*
- - chez le nouveau-né *P29.0*
- - chronique *I50.9*
- - compensée *I50.9*
- - complication de l'accouchement *O75.4*
- - congénitale *Q24.8*
- - congestive *I50.01*
- - coronaire *I24.8*

Coeur –*suite*

- insuffisance –*suite*
- - décompensée *I50.9*
- - dégénérative *I51.5*
- - diastolique *I50.19*
- - due à une protèse cardiaque *I97.1*
- - globale *I50.01*
- - hypertensive
- - - avec
- - - - insuffisance rénale *I13.20*
- - - - maladie rénale *I13.00*
- - - due à une congestion *I11.00*
- - ischémique *I25.9*
- - lors de
- - - fièvre, rhumatismale, inactive *I09.8*
- - - hypertonie *I11.00*
- - - - rénale *I13.00*
- - - intervention chirurgicale *T81.8*
- - - maladie cardiaque
- - - - et rénale, hypertensive *I13.00*
- - - - hypertensive *I11.00*
- - - sollicitation *I50.9*
- - musculaire *I50.9*
- - post-opératoire *I97.8*
- - rhumatismale *I09.9*
- - - aiguë *I01.2*
- - - évolutive *I01.2*
- - - subaiguë *I01.2*
- - sénile *I50.9*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- - thyréotoxique *E05.9+, I43.8**
- insuffisance congestive *I50.01*
- - hypertensive avec maladie rénale *I13.00*
- irrégulier *I49.9*
- irritabilité *F45.30*
- ischémie chronique *I25.9*
- lacération *S26.88*
- - avec hémopéricarde *S26.0*
- lésion *S26.9*
- - avec hémopéricarde *S26.0*
- lésions *I51.9*
- maladie *I51.9*
- - acyanosée *Q24.9*
- - - congénitale *Q24.9*
- - artérielle *I25.19*
- - athéroscléreuse *I25.19*
- - - avec
- - - - stent sténosé *I25.16*
- - - - vaisseaux de pontage sténosés *I25.15*
- - - sans sténose ayant un effet hémodynamique *I25.10*
- - avec
- - - hypertonie
- - - - bénigne *I11.90*
- - - - lors de la grossesse, pré-existante *O10.1*
- - - oedème pulmonaire aigu *I50.14*
- - cardio-pulmonaire *I27.9*
- - congénitale *Q24.9*
- - congénitale, mère, avec lésion, foetus/nouveau-né (états décrits en Q20-Q24) *P00.3*
- - congestive *I50.01*
- - coronaire *I25.9*
- - - aiguë *I24.9*
- - - avec
- - - - anévrisme ventriculaire *I25.3*

Coeur –*suite*
- maladie –*suite*
- - coronaire –*suite*
- - - avec –*suite*
- - - - fonction ventriculaire gauche restreinte *I25.9*
- - - chronique *I25.9*
- - cyanotique *I24.9*
- - - congénitale *Q24.9*
- - cyphoscoliotique *I27.1*
- - cyphosique *I27.1*
- - dilatée *I51.7*
- - due à méningocoques *A39.5+, I52.0**
- - examen de dépistage NCA *Z13.6*
- - fibroïde *I51.4*
- - fonctionnelle *I51.8*
- - - psychogène *F45.30*
- - hyperkynétique *I51.8*
- - hypertensive *I11.90*
- - - avec insuffisance cardiaque *I11.00*
- - - - avec crise hypertensive *I11.01*
- - - bénigne *I11.90*
- - - lors d'une cirrhose rénale *I13.90*
- - - maligne *I11.90*
- - - sans insuffisance cardiaque avec crise hypertensive *I11.91*
- - hyperthyroïdie *E05.9+, I43.8**
- - hypertonique avec défaillance rénale *I13.10*
- - hypostatique *I51.8*
- - ischémique *I25.9*
- - - aiguë *I24.9*
- - - antécédents familiaux *Z82*
- - - chronique *I25.9*
- - - - hypertonique *I25.9*
- - lors de
- - - fièvre, rhumatismale, non évolutive NCA *I09.8*
- - - thyréotoxicose *E05.9+, I43.8**
- - maternelle, avec accouchement par césarienne NCA *O99.4*
- - polyvalvulaire *I08.9*
- - poumons *I27.9*
- - - aigu *I26.0*
- - - chronique *I27.9*
- - psychogène *F45.30*
- - rhumatismale
- - - aiguë *I01.9*
- - - chronique *I09.9*
- - - mère, avec atteinte du foetus/nouveau-né (classés en I05-I09) *P00.3*
- - sclérotique *I25.19*
- - scoliotique *I27.1*
- - sénile *I51.4*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- - thyréotoxique *E05.9+, I43.8**
- - valvulaire *I38*
- maladie bleue *I38*
- maladie quadrivalvulaire *I08.9*
- malformation congénitale *Q24.8*
- - *Q24.9*
- malposition *Q24.8*
- malposition due à une prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- matité
- - augmentée *R01.2*
- - diminuée *R01.2*
- myome *D15.1*
- nerveux *F45.30*

Coeur –*suite*
- névrose *F45.30*
- nodosité goutteuse *M10.09+, I43.8**
- obstruction mécanique due à une protèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- oedème *I50.01*
- ossification *I51.5*
- palpitations *R00.2*
- paralysie *I50.9*
- paroi
- - anévrismes *I25.3*
- - - aigus *I21.9*
- - - complication aiguë après infarctus du myocarde aigu *I23.3*
- - - d'une durée de 4 semaines ou moins *I21.9*
- - rupture
- - - avec hémopéricarde, après infarctus du myocarde, aigu *I23.0*
- - - sans hémopéricarde, complications, aigu, après infarctus du myocarde, aigu *I23.3*
- paroi latérale, infarctus *I21.2*
- paroi postérieure, infarctus de la *I21.1*
- participation
- - lors de
- - - arthrite rhumatismale
- - - - aiguë *I01.9*
- - - - subaiguë *I01.9*
- - - Chagas, maladie de
- - - - aiguë *B57.0+, I98.1**
- - - - chronique *B57.2+, I98.1**
- - - chorée *I02.0*
- - - - mineure *I02.0*
- - - - rhumatismale *I02.0*
- - - - Sydenham, de *I02.0*
- - - chorée de Huntington *I02.0*
- - - fièvre rhumatismale *I01.9*
- - - hypertonie *I11.90*
- - - - avec néphrosclérose *I13.10*
- - - - maligne *I11.90*
- - - néphrosclérose *I13.10*
- - - polyarthrite chronique NCA *M05.39+, I52.8**
- - - polyarthropathie chronique NCA *M05.39+, I52.8**
- - - rhumatisme, articulation, aigu *I01.9*
- - - Sydenham, syndrome de *I02.0*
- - - trypanosomiase américaine *B57.2+, I41.2**
- - répétée, lors de
- - - arthrite rhumatismale
- - - - aiguë *I01.8*
- - - - subaiguë *I01.8*
- - - chorée rhumatismale *I02.0*
- perforation due à une prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- protrusion due à une prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- pulmonaire *I27.9*
- - aigu *I26.0*
- - - associé à embolie pulmonaire *I26.0*
- - associé à
- - - thromboembolie
- - - - artère pulmonaire *I26.0*
- - - - veine pulmonaire *I26.0*
- - - thrombose
- - - - artère pulmonaire *I26.0*
- - - - veine pulmonaire *I26.0*
- - chronique *I27.9*

Coeur –*suite*
- ramolissement *I51.5*
- rapide *R00.0*
- rétrécissement *I51.9*
- rhumatisme *I09.9*
- rupture *I21.9*
- - artère *I21.9*
- - traumatique *S26.88*
- - vaisseau sanguin *I21.9*
- sclérose *I25.19*
- sénile *R54*
- - avec
- - - hypertension *I11.90*
- - - insuffisance *I50.9*
- septum
- - atrioventriculaire défectueux NCA *Q21.0*
- - interatrial défectueux NCA *Q21.1*
- - interventriculaire défectueux NCA *Q21.0*
- sous-développement *Q24.8*
- spasme *I20.1*
- stéatose *I51.5*
- syncope *R55*
- syphilis congénitale *A50.5+, I52.0**
- tamponnade *I31.9*
- thrombose, après infarctus du myocarde, aigu *I23.6*
- tophus *M10.09+, I43.8**
- transplantation, état après *Z94.1*
- transposition *Q24.0*
- - avec inversion, viscères, complète *Q89.3*
- triatrial *Q24.2*
- triloculaire *Q20.8*
- - biauriculaire *Q20.4*
- - biventriculaire *Q21.1*
- trouble
- - conduction *I45.9*
- - psychogène *F45.30*
- - rythme ventriculaire *I49.8*
- Troubles *I51.9*
- - angine de poitrine *I20.9*
- - angineux *I20.9*
- - fonctionnels *I51.8*
- - nerveux *F45.30*
- - psychosomatiques *F45.30*
- - végétatifs *F45.30*
- tuberculose *A18.8+, I43.0**
- univentriculaire *Q20.4*

Coeur-poumons, transplantation
- échec *T86.3*
- rejet *T86.3*

Coffin(-Lowry), syndrome de *Q89.8*

COFS, syndrome [syndrome cérébro-oculo -f *Q87.8*

Cogan I, syndrome *H16.3*

Cogan II, syndrome *H51.8*

Cogan, dystrophie de [dystrophie microky *H18.5*

Cogan-Reese, syndrome de *H21.8*

Cognitif, -ve
- FIM
- - 11-29 points *U51.11*
- - 30-35 points *U51.01*
- - 5-10 points *U51.21*
- fonction, lié à l'âge *R41.8*
- troubles

Cognitif, -ve –*suite*
- troubles –*suite*

- - léger *F06.7*
- - persistant, dû à
- - - alcool *F10.7*
- - - sédatifs *F13.7*
- - - substance hallucinogène *F16.7*

Coiffe des rotateurs
- capsule
- - élongation *S43.4*
- - foulure *S43.4*
- entorse *S46.0*
- lésion *M75.1*
- - *S46.0*
- rupture *M75.1*
- - complète, non traumatique *M75.1*
- - épaule *M75.1*
- - - traumatique *S46.0*
- - incomplète, non traumatique *M75.1*
- syndrome *M75.1*

Coïlonychie - *voir* Koïlonychie *L60.3*

Coït
- douleurs, psychogènes *F52.6*
- douloureux *N94.1*
- - chez la femme *N94.1*
- - chez l'homme *N48.8*

Coït douloureux *N94.1*

Coït, saignements *N93.0*

Coït, troubles *F52.9*

Coït, troubles, masculins *N48.8*

Col
- fémur
- - antétorsion, augmentée *Q65.8*
- - - congénitale *Q65.8*
- - fracture *S72.00*
- fémur, fracture *S72.00*
- - cervicotrochantérienne *S72.05*
- - latérale *S72.08*
- - médiale *S72.01*
- - niveau de la tête du fémur *S72.08*
- - pathologique *M84.45*
- - souscapitale *S72.03*
- - transverticale *S72.04*
- - - ouverte *S72.04, S71.87!*
- radius, fracture *S52.12*
- utérin non dilaté *O62.0*
- utérus
- - abcès *N72*
- - adénocarcinome vaginal *C53.1*
- - atrésie *Q51.5*
- - atrophie *N88.8*
- - carcinome *C53.9*
- - carcinome in situ *D06.9*
- - catarrhe *N72*
- - cicatrice *N88.1*
- - cicatrice, obstruction, accouchement *O65.5*
- - déchirure ancienne *N88.1*
- - dysplasie *N87.9*
- - ectopie *N86*
- - - chronique *N86*
- - - congénitale *Q51.8*
- - - hémorragie, atypique *N86*
- - endométriose *N80.0*
- - érosion, chronique *N86*
- - Erythroplasie *R93.8*
- - fibrose *N88.8*

Col –*suite*
- utérus –*suite*

- - hypertrophie
- - - avec allongement *N88.4*
- - - congénitale *Q51.8*
- - inflammation *N72*
- - - chronique *N72*
- - kyste *N88.8*
- - malformation congénitale *Q51.8*
- - Mosaïque *R93.8*
- - néoplasie *D39.0*
- - polype *N84.1*
- - prolapsus *N81.2*
- - rétrécissement *N88.2*
- - saignement *N88.8*
- - tumeur maligne *C53.9*
- - ulcère *N85.8*
- - ulcus *N86*
- - utérus
- - - érosion *N86*
- - - leucoplasie *N88.0*
- - - malignome *C53.9*
- - zone de transformation *N86*
- - - chronique *N86*
- - zone de transformation, atypique *N86*
- utérus, anomalie *N88.4*
- vésical
- - adénome *N40*
- - adénome (prostate) *N40*
- - ataxie du détrusor *R27.8*
- - atrésie *Q64.3*
- - congestion *N32.8*
- - déformation *N32.8*
- - dilatation *N32.8*
- - diverticule *N32.3*
- - fibrose *N32.8*
- - hypertrophie *N32.8*
- - insuffisance *R32*
- - métaplasie *N32.8*
- - obstruction *N32.0*
- - oedème *N32.0*
- - polype *D41.4*
- - sclérose *N32.8*
- - sténose *N32.0*
- - sténose grave *N32.0*

Colère *R45.4*

Coli, entérite *A04.4*
- chez le nourrisson *A04.4*

Colibacille, sepsis à *A41.51*

Colibacillose *A49.8*

Colibacillose, généralisée NCA *A41.51*

Colibacillurie *N39.0*

Colicystite *N30.8, B96.2!*

Colique *R10.4*
- 3 mois *R10.4*
- abdomen supérieur, aigue *R10.1*
- abdominale *R10.4*
- appendice *K38.8*
- biliaire *K80.20*
- biliaire (hépatique) *R10.4*
- canal
- - cholédoque *K80.50*
- - cystique *K80.20*
- - hépatique *K80.50*
- cas de lithiase urètre *N21.1*
- due à

Colique –*suite*
- due à –*suite*

- - calcul de la vésicule biliaire *K80.20*
- - calcul rénal *N20.0*
- - lithiase *R10.4*
- - lithiase urinaire *N20.9*
- - plomb *T56.0*
- estomac *R10.4*
- flatulente *R14*
- foie, récidivante *K80.50*
- - avec
- - - cholangite *K80.30*
- - - - avec obstruction, voie biliaire *K80.31*
- - - cholécystite *K80.40*
- - - - avec obstruction, voie biliaire *K80.41*
- - - obstruction des voies biliaires *K80.51*
- hépatique *K80.50*
- hystérique *F45.39*
- ictére *R10.4*
- infantile *R10.4*
- intestinale *R10.4*
- muco-membraneuse *K58.9*
- muqueuse *K58.9*
- néphrétique *N23*
- nourrisson *R10.4*
- ombilicale *R10.4*
- petit enfant *R10.4*
- psychogène *F45.39*
- récidivante *R10.4*
- reins *N23*
- - due à un calcul *N20.0*
- saturnine NCA *T56.0*
- spastique *R10.4*
- trimenon- *R10.4*
- uretère *N23*
- - due à un calcul *N20.1*
- urètre *N36.8*
- - due à un calcul *N21.1*
- utérus NCA *N94.8*
- utérus, lors de la menstruation *N94.6*
- vermineuse *B83.9*
- vessie *N32.8*
- voies biliaires *K80.50*
- voies urinaires *K80.20*
- - récidivante *K80.20*
- - - avec
- - - - cholécystite
- - - - - aigue, *K80.00*
- - - - - aigue, avec obstruction, voie biliaire, *K80.01*
- - - - - chronique, *K80.10*
- - - - - chronique, avec obstruction, voie biliaire, *K80.11*
- - - - obstruction des voies biliaires *K80.21*

Colite *K52.9*
- aigue *A09*
- allergique *K52.2*
- avec Clostridium *A04.7*
- bactérienne *A04.9*
- cas de
- - cytomégalie *B25.80+, K93.8**
- - soor *B37.88*
- catarrhale *K52.9*
- chronique *K52.9*
- chronique purulente *K51.9*
- collagène *K52.8*

Colite –*suite*
- dans les antécédents personnels *Z87.1*
- diabètique *K52.2*
- diversion *K52.8*
- due à
- - allergie, alimentaire *K52.2*
- - amibiens *A06.0*
- - - non dysentérique *A06.2*
- - Balantidium coli *A07.0*
- - candida *B37.88*
- - coccidiose *A07.3*
- - cytomégalovirus *B25.80+, K93.8**
- - giardia lamblia *A07.1*
- - isospora
- - - belli *A07.3*
- - - hominis *A07.3*
- - Lamblia intestinalis *A07.1*
- - maladie du charbon *A22.2*
- - protozoaires *A07.9*
- - rayons *K52.0*
- - Trichomonas *A07.8*
- entéro- *K52.9*
- - aigue *A09*
- - cas de cytomégalie *B25.80+, K93.8**
- - chronique *K52.9*
- - pseudomembraneuse
- - - prenant la forme de
- - - - colite post-antibiothérapie *A04.7*
- - - - colon irritable *K58.9*
- - spastique *K52.9*
- Gastro- *K52.9*
- gastroentéro- *K52.9*
- granulomateuse *K50.1*
- - régionale *K50.1*
- grave régionale *K50.1*
- hémorragique *K52.9*
- iléo-
- - chronique *K52.9*
- - régionale *K50.9*
- - tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- indéterminée *K52.3*
- - du côlon rectosigmoïde *K52.32*
- - latérale gauche *K52.31*
- infectieuse *A09*
- ischémique *K55.9*
- - aigue *K55.0*
- - chronique *K55.1*
- - subaiguë *K55.0*
- kystique superficielle *K52.8*
- lympocytaire *K52.8*
- médicamenteux Gastroentérite et *K52.1*
- muco-membraneuse, psychogène *F54, K58.9*
- muqueuse
- - membraneuse *K58.9*
- - psychogène *F54, K58.9*
- non-infectieuse *K52.9*
- péri- *K52.9*
- polypose *K51.4*
- post-antibiothérapie *A04.7*
- - antécédents personnels *Z86.1*
- présumée
- - infectieuse *A09*
- - non-infectieuse *K52.9*
- procto- *K51.5*
- - idiopathique *K51.5*
- pseudo-membraneuse *A04.7*
- - due à Clostridium difficile *A04.7*

Colite –*suite*
- pseudo-membraneuse –*suite*
- - prenant la forme de
- - - colite post-antibiothérapie *A04.7*
- - - colon irritable *K58.9*
- pseudomembraneuse à Clostridium difficile *A04.7*
- recto- *K51.5*
- régionale *K50.1*
- septique *A09*
- spastique *K58.9*
- - avec diarrhée *K58.0*
- suite à un traitement *A04.7*
- toxique *K52.1*
- tuberculeuse *A18.3*
- - ulcéreuse *A18.3+, K93.0**
- ulcéreuse *K51.9*
- - avec arthrite *K51.9+, M07.59**
- - - juvénile *K51.9+, M09.29**
- - chronique *K51.9*
- - psychogène *F54, K51.9*

Collagène, colite *K52.8*

Collagénose *M35.9*
- avec polynévrite NCA *M35.9+, G63.5**
- cardio-vasculaire *I42.88*
- mixte *M35.1*
- non vasculaire *M35.9*
- réactive, perforante *L87.1*
- vasculaire *M35.9*

Collapsus *R55*
- à la chaleur *T67.1*
- cardio-rénal *I13.20*
- cardio-respiratoire *R57.0*
- cardio-vasculaire *R57.9*
- - chez le nouveau né *P29.8*
- - post-opératoire *T81.1*
- cérébral *I64*
- circulatoire *R57.9*
- - cas de
- - - contractions et accouchement *O75.1*
- - - échec d'une tentative d'avortement médical *O07.3*
- - chez le nouveau né *P29.8*
- - complication, en cas d'échec d'une tentative d'avortement *O07.8*
- - suite à
- - - avortement *O08.3*
- - - grossesse extra-utérine *O08.3*
- - - grossesse molaire *O08.3*
- cœur *I50.9*
- conduit auditif externe *H61.3*
- cours d'une intervention chirurgicale *T81.1*
- généralisé *R55*
- hystérique *F44.88*
- labyrinthe membraneux, congénital *Q16.5*
- nerveux *F48.8*
- neuro-circulatoire *F45.30*
- orthostatique *I95.1*
- poumon *J98.1*
- - par anesthésie *T88.2*
- - post-partum *O89.0*
- - puerpéral *O89.0*
- - suite à un avortement *O08.3*
- pulmonaire *J98.1*
- - par anesthésie, lors de la naissance *O74.1*

Collapsus –*suite*
- suite à une intervention chirurgicale *T81.1*
- surrénalien *E27.2*
- thorax *J93.9*
- trachée *J39.80*
- trachéo-bronchique *J98.0*
- vasculaire
- - chez le nouveau-né *P29.8*
- - périphérique *R57.9*
- vertébral NCA *M48.59*
- - à une métastase *C79.5+, M49.59**
- - cas d'ostéoporose *M80.99*

Collatérale
- rupture traumatique de ligament *S63.4*
- rupture traumatique de ligament du doigt *S63.4*

Colle
- dermatite de contact, allergique *L23.1*
- dermatite toxique *L24.5*
- neuropathie de reniflement *G62.2*

Colle pour avion
- dépendance *F18.2*
- inhalation *F18.1*

Collet préputial *N47*

Collet-Sicard, syndrome de *G52.7*

Colliculus seminalis
- hypertrophie *N36.8*
- polype *N50.8*

Colloïde
- adénocarcinome *C80*
- adénome *D34*
- cystadénome *C56*
- dégénérescence cutanée *L98.8*
- goitre *E04.9*
- - endémique *E01.0*

Colloïde, milium *L57.8*

Colobome *Q13.0*
- choroïde *Q14.3*
- cristallin *Q12.2*
- fond de l'oeil *Q14.8*
- - *Q14.8*
- Fuchs, congénital *Q14.3*
- iris *Q13.0*
- - congénital *Q13.0*
- papille optique *Q14.2*
- paupière *Q10.3*
- - congénital *Q10.3*

Colobome uvéal, syndrome *Q13.0*

Colo-gastrique, fistule *K31.6*

côlon
-
- abcès de la paroi *K63.0*
- adéno-carcinome *C18.9*
- adénomatose *D12.6*
- adénome *D12.6*
- adhérence *K66.0*
- affection *K63.9*
- aganglionose *Q43.1*
- agénésie *Q42.9*
- allongement *Q43.8*
- angio-dysplasie *K55.21*
- - avec hémorragie *K55.22*
- anomalie *Q43.9*
- anomalie congénitale de position *Q43.8*
- ascendant

côlon –*suite*
- ascendant –*suite*
- - adénocarcinome *C18.2*
- - adénome
- - - tubulovilleux *D12.2*
- - - villeux *D37.4*
- - ischémie *K55.9*
- - lésion traumatique *S36.51*
- - perforation *K63.1*
- atonie *K59.8*
- atrésie *Q42.9*
- brûlure *T28.2*
- carcinome
- - flexure gauche *C18.5*
- - héréditaire sans polypose [HNPCC] *C18.9, Z80.0*
- carcinome in situ *D01.0*
- corps étranger *T18.4*
- corrosion *T28.7*
- descendant
- - adénome *D12.4*
- - lésion traumatique *S36.53*
- - tumeur *D37.4*
- dilatation *K59.3*
- - congénitale *Q43.2*
- - psychogène *F45.32*
- diverticule *K57.30*
- - avec dégénérescence *C18.9*
- diverticulite *K57.32*
- - avec
- - - hémorragie *K57.33*
- - - péritonite *K57.22*
- - - - avec hémorragie *K57.23*
- - congénitale *Q43.8*
- diverticulose *K57.30*
- - avec
- - - hémorragie *K57.31*
- - - péritonite *K57.20*
- - - - avec hémorragie *K57.21*
- dolichocôlon *Q43.8*
- douleurs *R10.4*
- dysfonctionnement *K59.9*
- - psychogène *F45.32*
- entérite *K50.1*
- - régionale *K50.1*
- et intestin grêle, entérite *K50.8*
- étranglement *K56.2*
- faiblesse *K63.9*
- fistule *K63.2*
- gangrène *K55.0*
- granulome *K63.8*
- hémorragie *K92.2*
- hepatica Tumeur malign : Angle droit du *C18.3*
- hypermobilité, psychogène *F45.32*
- hypersensibilité, psychogène *F45.32*
- hypertrophie *K59.3*
- - congénitale *Q43.2*
- hypoplasie *Q42.9*
- iléus *K56.7*
- impaction *K56.4*
- infarctus *K55.0*
- infection *A09*
- intussusception *K56.1*
- invagination *K56.1*
- irritabilité *K58.9*
- - avec diarrhée *K58.0*
- - psychogène *F45.32*

côlon –*suite*
- irritable *K58.9*
- - avec diarrhée *K58.0*
- - psychogène *F45.32*
- - sans diarrhée *K58.9*
- irritable, avec diarrhée *K58.0*
- ischémie *K55.9*
- kyste *K63.8*
- lésion traumatique *S36.50*
- leucoplasie *K63.8*
- maladie *K63.9*
- - due à des protozoaires *A07.9*
- - fonctionnelle *K59.9*
- - - congénitale *Q43.2*
- - - psychogène *F45.32*
- maladie de Crohn *K50.1*
- malformation *Q43.8*
- - *Q43.9*
- - acquise *K63.8*
- - congénitale *Q43.8*
- - - *Q43.9*
- malformation, congénital *Q43.3*
- malrotation *Q43.3*
- mégacôlon congénital *Q43.1*
- mélanose *K63.8*
- métastase *C78.5*
- microcôlon *Q43.8*
- - congénital *Q43.8*
- nécrose *K55.0*
- névrose *F45.32*
- non descendu *Q43.3*
- obstruction *K56.6*
- occlusion *K56.6*
- - *K56.7*
- - mécanique *K56.6*
- - paralytique *K56.0*
- paralysie NCA *K56.0*
- parésie *K56.0*
- perforation *K63.1*
- - chez le foetus/nouveau-né *P78.0*
- - tant que traumatisme obstétrical de la mère *O71.5*
- - traumatique *S36.50*
- polype *K63.5*
- polypose adénomateuse *D12.6*
- prolapsus, pédiculé *K63.4*
- rétrécissement *K56.6*
- - congénital *Q42.9*
- rotation
- - absente *Q43.3*
- - incomplète *Q43.3*
- - mal- *Q43.3*
- rupture
- - chez le foetus/nouveau-né *P78.0*
- - non traumatique *K63.1*
- - traumatique *S36.50*
- sigmoïde
- - adénome
- - - tubulovilleux *D12.5*
- - - villeux *D37.4*
- - carcinome *C18.7*
- - lésion *K63.9*
- - lésion traumatique *S36.54*
- - tumeur *D37.4*
- - varices *I86.8*
- spasme *K58.9*
- - avec diarrhée *K58.0*
- - psychogène *F45.32*

côlon –*suite*
- splénique Tumeur malign : Angle gauche du *C18.5*
- stase *K59.8*
- sténose *K56.6*
- - congénitale *Q42.9*
- syphillis tardive *A52.7+, K93.8**
- torsion *K56.2*
- transposition *Q43.8*
- transverse
- - adénocarcinome *C18.4*
- - lésion traumatique *S36.52*
- - tumeur *D37.4*
- transverse, adénocarcinome *C18.4*
- trouble *K63.9*
- - fonctionnel *K59.9*
- - - congénital *Q43.2*
- trouble fonctionnel *K59.9*
- tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne *C19*
- ulcère *K63.3*
- ulcère, tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- valvule, congénitale *Q43.8*
- varices *I86.8*
- volvulus *K56.2*

Colonisation
- métastatique *C80*
- poumon, tumeur *C78.0*

Colonisation anormale, intestin grêle *K63.8*

Colonne vertébrale
- abcès
- - non tuberculeux *M46.29*
- - tuberculeux *A18.0+, M49.09**
- absence congénitale *Q76.4*
- agénésie *Q76.4*
- ankylose *M43.29*
- anomalie *Q76.4*
- anomalie au niveau des insertions *M46.09*
- arthrite *M46.99*
- - ankylosante *M45.09*
- - infectieuse *M46.59*
- - primaire, progressive *M45.09*
- - pyogène *M46.59*
- - rhumatoïde *M45.09*
- - traumatique *M48.39*
- - tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- arthrite de Marie-Strümpell *M45.09*
- arthrose *M47.99*
- assouplissement *M53.29*
- blocage *M99.89*
- - multiples endroits *M99.89*
- blocage du Segment L5/S1 *M99.83*
- carcinome *C79.5*
- caries tuberculeuses *A18.0+, M49.09**
- chordome chondroïde *C41.2*
- contracture *M43.99*
- contusion *T09.05*
- - région lombaire *S30.0*
- - tronc *T09.05*
- défaut de fermeture (spina-bifida) *Q05.9*
- - congénital, avec hydrocéphalie *Q05.4*
- défaut de la statique *M43.99*
- défaut de segmentation, avec scoliose *Q76.3*
- déformation *M43.99*
- - *Q76.4*

Colonne vertébrale –*suite*
- déformation –*suite*
- - acquise NCA *M43.89*
- - congénitale *Q67.5*
- - rachitique *E64.3*
- dégénérescence *M47.99*
- dégénérescence des surfaces articulaires *M47.99*
- déviation *M43.99*
- - acquise *M43.99*
- - comme séquelle tardive de rachitisme *E64.3*
- - congénitale *Q67.5*
- - due à
- - - ostéite
- - - - déformante *M88.88*
- - - - fibro-kystique *E21.0+, M49.89**
- - - tuberculose *A18.0+, M49.09**
- - tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- dislocation *T09.2*
- - cervicale *S13.10*
- - lombaire *S33.10*
- - pathologique NCA *M53.29*
- - thoracique *S23.10*
- dislocation cervico-thoracique *T03.8*
- douleur *M54.99*
- - colonne vertébrale cervicale *M54.2*
- - colonne vertébrale thoracique (ou dorsale) *M54.6*
- - dégénérative *M47.99*
- - psychogène *F45.4*
- - statique *M43.99*
- enthésopathie *M46.09*
- entière, irritation des facettes entraînant une radiculopathie *M47.20*
- fissure
- - avec hydrocéphalie *Q05.4*
- - congénitale *Q05.9*
- foulure *T09.2*
- fracture *T08.0*
- - avec lésion de la moelle épinière *T08.0, T09.3*
- - due à un traumatisme obstétrical *P11.59*
- - multiples endroits *T02.10*
- - séquelles *T91.1*
- fracture cervicale *S12.9*
- fusion
- - acquise NCA *M43.29*
- - congénitale *Q76.4*
- - - sans scoliose *Q76.4*
- gangrène *R02*
- granulome
- - syphilitique *A52.1+, G07**
- - tuberculeux *A18.0+, M49.09**
- hyperostose ankylosante *M48.19*
- hypoplasie *Q76.4*
- inflammation *M46.99*
- instabilité *M53.29*
- - région lombaire *M53.26*
- lésion des sites d'insertion musculaires *M46.09*
- lombaire
- - arthrose *M47.86*
- - blocage *M99.83*
- - chordome *C41.2*
- - contusion *S30.0*
- - Dorsopathie *M53.86*
- - entorse *S33.50*

Colonne vertébrale –*suite*
- lombaire –*suite*
- - entorse –*suite*
- - - avec
- - - - disproportion
- - - - - foeto-pelvienne,
- - - - - entre le foetus et le bassin, *O33.8*
- - - - - foeto-pelvienne, obstruction, naissance, *O65.0*
- - - - - foeto-pelvienne, lésions du foetus/du nouveau-né, *P03.1*
- - et fractures multiples du bassin *S32.7*
- - fracture *S32.00*
- - - avec fracture du sacrum *S32.82*
- - - ouverte *S32.00*
- - hyperlordose *M40.46*
- - luxation *S33.10*
- - - ouverte *S32.00*
- - malformation *Q76.4*
- - - avec
- - - - disproportion
- - - - - foeto-pelvienne,
- - - - - entre le foetus et le bassin, *O33.8*
- - - - - foeto-pelvienne, obstruction, naissance, *O65.0*
- - - - - foeto-pelvienne, lésions du foetus/du nouveau-né, *P03.1*
- - ostéochondrite *M42.96*
- - ostéoporose *M81.98*
- - spondylarthrite *M47.86*
- - spondylite déformante *M47.86*
- - spondylose *M47.86*
- lombaire, syndrome *M54.16*
- - à un prolapsus, disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- - lors de la grossesse *O99.8*
- maladie *M53.99*
- maladie dégénérative *M47.99*
- malformation *Q76.4*
- - sans scoliose *Q76.4*
- mauvaise posture *M43.99*
- métastase *C79.5*
- modification dégénérative *M47.99*
- - avec syndrome chronique de la colonne dorsale et cervicale *M47.23*
- myogélose *M62.88*
- nécrose *M87.98*
- - tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- ostéo-arthrose *M47.99*
- Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis *Q77.9*
- ostéochondropathie *M93.8*
- ostéochondrose *M42.99*
- - chez les adultes *M42.19*
- - juvénile *M42.09*
- - prononcée, avec un rétrécissement de foramen *M42.99*
- ostéoporose *M81.98*
- polyarthrite chronique *M45.00*
- posture incorrecte NCA *M43.99*
- région (de la)
- - déséquilibre musculaire *M62.98*
- - myogélose *M62.88*
- rigidité *M53.89*
- sarcome *C41.2*
- scoliose *M41.99*

Colonne vertébrale –*suite*
- séquelles de lésion trauamatique spinale *T91.8*
- sites d'insertion ligamentaires *M46.09*
- subluxation *M99.19*
- syndrome *M53.99*
- - chronique *M53.99*
- - dégénératif *M47.99*
- synovite tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- tendo-synovite tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- ténosynovite *M65.98*
- traumatisme obstétrical *P11.59*
- - avec paraplégie
- - - aiguë *P11.50*
- - - chronique *P11.51*
- troubles liés à la segmentation *M53.99*
- tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- tuberculose *A18.0+, M49.09**
- ulcère tuberculeux *A18.0+, M49.09**
- usure importante *M53.99*

Coloptose *K63.4*

Colorado, fièvre à tiques du *A93.2*

Colorant
- carence congénitale *E70.3*
- dermite de contact *L25.2*
- - allergique *L23.4*
- - toxique *L24.8*
- intolérance alimentaire *T78.1*

Coloration anormale des dents après érup *K03.7*

Coloration des dents, dépôt *K03.6*

Colorectum, carcinome *C19*

Colostomie
- ajustement *Z46.5*
- ajustement de la ceinture *Z46.5*
- avec
- - abcès *K91.4*
- - complication *K91.4*
- dysfonctionnement *K91.4*
- existence *Z93.3*
- fistule *K91.4*
- mauvais fonctionnement *K91.4*
- prolapsus *K91.4*
- sténose *K91.4*
- surveillance *Z43.3*

Colo-vésicale, fistule *N32.1*

Colpite *N72*

Colpocèle *N81.1*

Colpo-cystite *N76.0*

Colporrhexis *S31.4*

Colposcopie constatée, visible *R93.5*

Coma *R40.2*
- acidocétosique, dans
- - diabète sucré *E14.01*
- - diabète sucré de type I *E10.01*
- - diabète sucré de type II *E11.01*
- apoplectique *I64*
- apoplectique (accident) *I64*
- cardiaque *R40.2*
- cérébral *R40.2*
- cérébrale *R40.2*
- diabétique *E14.01*
- - avec respiration de Kussmaul *E14.01*
- - - lors de diabète type II *E11.01*

Coma *–suite*
- diabétique *–suite*
- - dans
- - - diabète sucré de type I *E10.01*
- - - diabète sucré de type II *E11.01*
- - hyperosmolaire *E14.01*
- - lors de
- - - diabète type I *E10.01*
- - - diabète type II *E11.01*
- diabétique avec hyperglycémie *E14.01*
- - dans
- - - diabète sucré de type I *E10.01*
- - - diabète sucré de type II *E11.01*
- échec de foie *K72.9*
- éclamptique *O15.9*
- - *R56.8*
- épileptique *G40.8*
- foie *K72.9, K72.74!*
- - alcoolique *K70.4*
- hépatique *K72.9*
- - *K72.9, K72.74!*
- - avec infection concomitante par agent delta, avec hépatite B virale aiguë *B16.0, K72.74!*
- - dans
- - - hépatite
- - - - A, virale *B15.0, K72.74!*
- - - - catarrhale *B15.0, K72.74!*
- - - - épidémique *B15.0, K72.74!*
- - - - infectieuse *B15.0, K72.74!*
- - - - virale *B19.0, K72.74!*
- - - ictère
- - - - épidémique *B15.0, K72.74!*
- - - - fébrile *B15.0, K72.74!*
- - - ictère catarrhal *B15.0, K72.74!*
- hypercapnique *R40.2*
- hyperglycémique *E14.01*
- hypoglycémique *E15*
- - avec encéphalopathie *E16.1+, G94.8**
- - lors de
- - - diabète sucré *E14.61*
- - - diabète type I *E10.61*
- - - diabète type II *E11.61*
- - - hyperinsulisme *E15*
- - non diabétique *E15*
- insuline *E15*
- - lors de
- - - diabète sucré *E14.01*
- - - diabète type I *E10.01*
- - - diabète type II *E11.01*
- - non diabétique *E15*
- - non diabétique, provoquée par un médicament *E15*
- insulinique *E15*
- - chez sujet non diabétique, provoqué par un médicament *E15*
- - dans
- - - diabète sucré *E14.01*
- - - diabète sucré de type 1 *E10.01*
- - - diabète sucré de type 2 *E11.01*
- - non diabétique *E15*
- Kussmaul *E14.01*
- - lors de
- - - diabète type I *E10.01*
- - - diabète type II *E11.01*
- lors de
- - diabète type I *E10.01*
- - - insulino-dépendant *E10.01*
- - diabète type II *E11.01*

Coma *–suite*
- lors de *–suite*
- - diabète type II *–suite*
- - - insulino-dépendant *E11.01*
- - - non insulino-dépendant *E11.01*
- - hyperinsulisme *E15*
- - hypoglycémie *E15*
- - - iatrogène *E15*
- - - par insuline *E15*
- - - provoquée par un médicament *E15*
- non diabétique, lors d'une réaction hypoglycémqiue par insuline *E15*
- nouveau-né *P91.5*
- prolongé *R40.2*
- prolongé, lors de lésion intra-crânienne *S06.9, S06.79!*
- urémique *N19*
- urique *N19*
- via
- - hyperthyroïdie *E05.5*
- - myxoedème *E03.5*
- vigile *G93.80*

Combinaison de naevus *D22.9*

Combinaison des maux de tête *R51*

Combinaison des vaccinations s.a. inscri *Z27.9*

Combiner - s. type de maladie

Comédo *L70.0*
- prononcé *L70.0*

Comédocarcinome *C50.9*
- sein non invasif *D05.7*

Comédomastite *N61*

Comédon *L70.0*

Commotio

Commotion
- cérébrale *S06.0*
- - aiguë *S06.0*
- - avec lésions, légères *S06.0*
- - isolée *S06.0*
- cône médullaire *S34.38*
- moelle épinière *T09.3*
- - cervicale *S14.0*
- - lombaire *S34.0*
- - thoracique *S24.0*
- queue de cheval *S34.38*
- rachidienne *T09.3*
- rénale *S37.01*
- rétinienne *S05.8*

commun Canal hépatique *C24.0*

Commun(e) variable
- agammaglobulinémie *D80.1*
- déficit immunitaire *D83.9*

Commun, -ne
- délit *F91.2*
- ventricule *Q20.4*

Communication
- Déplacement dû shunt ventriculaire intracrânien (*T85.0*
- familiaire, insuffisant *Z63*
- problème, conditionné par le développement *F80.9*

Communication interventriculaire *Q21.0*

Communiquer, shunt, ventricule cérébral *Z98.2*

Compenser

Compenser *–suite*
- adénome, glande thyroïde autonome *D34*
- insuffisance
- - coeur *I50.9*

complet Bloc atrio ventriculaire *I44.2*

Complet - s. type de maladie

Complète, type de maladie

Complexe
- anurie *R34*
- attaque, focal, avec développement vers une attaque secondaire généralisée *G40.2*
- Costen *K07.6*
- démence de Parkinson, de Guam *G21.8+, F02.8**
- démence du SIDA *B22+, F02.4**
- démence Parkinson de l'île de Guam *G21.8+, F02.8**
- De-Toni-Debré-Fanconi *E72.0*
- Eisenmenger *I27.8*
- fémur-péroné-cubitus *Q72.4*
- focal, attaque épileptique *G40.2*
- focal, attaque lors d'un état de mal épileptique *G41.2*
- fracture du bassin *S32.89*
- immun, circulant, avec néphrite NCA *N05.8*
- Lutembacher *Q21.1*
- majeur d'histo-compatibilité
- - classe
- - - I
- - - - carence *D81.6*
- - - - déficit *D81.6*
- - - II
- - - - carence *D81.7*
- - - - déficit *D81.7*
- majeur d'histocompatibilité, classe 1 *D81.6*
- majeur d'histocompatibilité, classe 2 *D81.7*
- naevus *D22.9*
- odontome *D16.5*
- - sinus maxilaires *D16.41*
- primaire, tuberculeux *A16.7*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- Schilder-Addison *E71.3*
- symptomatique
- - amnésique *F10.6*
- - atonique-astatique *G80.1*
- - chronique veineux *I87.9*
- - délirant *F05.9*
- - gastrocardiaque *F45.37*
- - Goldenhar, de [dysplasie oculo-auriculo-vertébrale] *Q87.0*
- - Horner, de *G90.2*
- - Ménière, de *H81.0*
- - Opitz, d' *D73.2*
- - psychosomatique *F45.9*
- - Roemheld, de *F45.37*
- - variqueux *I83.9*
- - veineux *I87.9*
- syndactylie
- - doigts *Q70.0*
- - orteil *Q70.2*
- - osseux avec synostose *Q70.9*
- syndrome de malformation *Q89.7*
- Taussig-Bing *Q20.1*

Complexe –*suite*

- Thomson *Q75.4*

complication
-
- accouchement *O75.9*
- - adhérence, placenta *O72.0*
- - - sans hémorragie *O73.0*
- - amputation, col utérin *O34.4*
- - décollement placentaire NCA *O45.8*
- - lacération
- - - anus *O70.2*
- - - - avec déchirure
- - - - - muqueuse anale, *O70.3*
- - - - - muqueuse rectale, *O70.3*
- - - commissure postérieure des petites lèvres *O70.0*
- - - lèvres *O70.0*
- - - périnée, centrale *O70.9*
- - - recto-vaginale *O71.4*
- - - vaginale *O71.4*
- - - vulve *O70.0*
- - rupture
- - - col utérin *O71.3*
- - - cordon ombilical *O69.8*
- - - organes pelviens *O71.5*
- - - sphincter anal *O70.2*
- - - urètre *O71.5*
- - - utérus *O71.1*
- - - vaginale *O71.4*
- - - vessie *O71.5*
- - via
- - - anomalie, rythme cardiaque, foetal, avec méconium dans le liquide amniotique *O68.2*
- - - déchirure, muqueuse anale *O70.3*
- - - détresse foetale, signes biochimiques *O68.3*
- - - dilatation, vessie *O66.8*
- - - dysfonction, utérus hypotonique
- - - - primitive *O62.0*
- - - - secondaire *O62.1*
- - - fréquence cardiaque, foetale, anormale, avec méconium, dans le liquide amniotique *O68.2*
- - - hémorragie, due à
- - - - afibrinogénémie *O67.0*
- - - - défaut, coagulation *O67.0*
- - - - hyperfibrinolyse *O67.0*
- - - - hypofibrinogénémie *O67.0*
- - - hypotonie, travail
- - - - primitive *O62.0*
- - - - secondaire *O62.1*
- - - léiomyome, utérus, avec hémorragie *O67.8*
- - - méconium, dans le liquide amniotique *O68.1*
- - - placenta
- - - - décollement prématuré *O45.9*
- - - - implantation basse, avec hémorragie *O44.10*
- - - - position anormale *O44.10*
- - - - praevia, avec hémorragie *O44.11*
- - - traumatisme, avec hémorragie *O67.8*
- après
- - avortement *O08.9*
- - fécondation in-vitro *N98.3*
- - fertilisation in-vitro *N98.2*
- - grossesse extra-utérine *O08.9*
- - grossesse môlaire *O08.9*

complication –*suite*
- après –*suite*

- - insémination artificielle *N98.9*
- - intervention chirurgicale *T81.9*
- - intervention intra-utérine *P96.5*
- - perfusion, injection thérapeutique, transfusion *T80.1*
- - plombage, bloc opératoire *T85.88*
- - pyélogramme *N99.8*
- - suture permanente obstréticale NCA *O90.8*
- blessure pendant la césarienne NCA *O90.8*
- cardiale *I51.9*
- - après
- - - infarctus de myocarde aigu NCA *I23.8*
- - - intervention chirurgicale *I97.9*
- - via
- - - anésthésie
- - - - pendant la grossesse *O29.1*
- - - - pendant le travail *O89.1*
- cardio-rénale *I13.20*
- cérébrale
- - malaria
- - - falciparum *B50.0+, G94.8**
- - - tropicale *B50.0+, G94.8**
- circulation *I99*
- - après
- - - examens médicaux *I97.9*
- - - intervention chirurgicale *I97.9*
- coeur *I51.9*
- corps vitré après extraction de la cataracte *H59.0*
- défaut aigu, après crise cardiaque aiguë
- - septum auriculaire *I23.1*
- - septum ventriculaire *I23.2*
- diabète sucré tardif *E14.80*
- diabétique *E14.80*
- difficulté
- - alphabétisation *Z55*
- - appareil circulatoire, végétatif *I99*
- - appareil urinaire *N39.9*
- - avec
- - - alcoolisme dans la famille *Z63*
- - - alphabétisation *Z55*
- - - audition *H91.9*
- - - camarades de classe *Z55*
- - - chômage *Z56*
- - - collègues *Z56*
- - - communication *F80.9*
- - - conseillers *Z64.8*
- - - contraintes juridiques *Z59*
- - - créanciers *Z59*
- - - échec aux examens *Z55*
- - - éducation des enfants NCA *Z62*
- - - éducation inadéquate *Z55*
- - - éducation secondaire *Z55*
- - - environnement *Z58*
- - - environnement communal *Z58*
- - - études *Z55*
- - - implant *T85.9*
- - - influence sur l'état de santé NCA *Z91.8*
- - - le, la
- - - - environnement social *Z60*
- - - - logement *Z59*
- - - les
- - - - conditions de travail NCA *Z56*

complication –*suite*
- difficulté –*suite*
- - avec –*suite*
- - - les –*suite*

- - - - modes de vie *Z59*
- - - logement *Z59*
- - - Parents *Z63*
- - - partenaire, couple *Z63*
- - - peine de prison ou privation de liberté *Z65*
- - - personne en charge, pendant l'enfance *F93.8*
- - - professeurs *Z55*
- - - santé, prise en charge *Z75.9*
- - - supérieurs *Z56*
- - - travail social *Z64.8*
- - cas de
- - - déglutition *R13.9*
- - - port de lunettes *T88.9*
- - cathéter, mécanique, NCA *T85.6*
- - cause de
- - - abandon *Z63*
- - - chomage *Z56*
- - - décès d'un membre de la famille *Z63*
- - - discrimination *Z60*
- - - environnement social *Z60*
- - - faillite *Z59*
- - - grossesse non désirée *Z64.0*
- - - incarcération *Z65*
- - - jugement *Z65*
- - - libération de prison *Z65*
- - - menace de chomage *Z56*
- - - multiparité *Z64.1*
- - - pension *Z60*
- - - rejet *Z60*
- - - séparation *Z63*
- - - situation familiale atypique *Z60*
- - - surprotection des parents *Z62*
- - changement d'emploi *Z56*
- - comportement, adulte *F69*
- - connaissances *F81.9*
- - démarche *R26.1*
- - développement, apprentissage *F81.9*
- - digestives *K92.9*
- - due à l'éducation *Z55*
- - dues à
- - - appareil, implant ou transplantation *T85.6*
- - - cicatrice *L90.5*
- - - droits de garde de l'enfant *Z65*
- - - enfance malheureuse *Z61*
- - - enfant adopté *Z63*
- - - enfant, soins *Z63*
- - - expériences négatives durant l'enfance *Z61*
- - - intubation, en cas d'anésthésie *T88.4*
- - - pression *Z62*
- - - vie en institution *Z59*
- - dues à l'éducation *Z55*
- - école *Z55*
- - enfant
- - - avec nouveau membre dans la famille *Z61*
- - - cause de
- - - - mauvais traitement *Z61*
- - - - naissance, frère ou soeur *Z61*
- - éonomiques *Z59*
- - équilibre *R63.8*

complication –*suite*
- difficulté –*suite*
- - familiales *Z63*
- - financières *Z59*
- - foetales, prise en charge de la mère *O36.9*
- - Goût *R43.8*
- - hygiène, personnelle *Z91.8*
- - implant mammaire, mécanique *T85.4*
- - intestin, fonctionnel *K59.9*
- - intestinales *K59.9*
- - lacrymales *H04.9*
- - lactation *O92.70*
- - - chez les nouveaux-nés *P92.5*
- - mastication *K08.88*
- - mécaniques
- - - avec implant *T85.6*
- - - cas de prothèse à l'oeil *T85.3*
- - - fixation, interne, orthopédique NCA *T84.2*
- - - shunt, ventriculaire, intracrânien *T85.0*
- - mode de vie *Z72.9*
- - neurologique NCA *R29.8*
- - nutritionnelle *R63.3*
- - - chez les nouveaux-nés *P92.9*
- - - non-organique *F50.8*
- - Odorat *R43.8*
- - oeil *H57.9*
- - oreille *H93.9*
- - organes génitaux
- - - féminins *N94.9*
- - - masculins *N50.9*
- - orientation du mode de vie *Z73*
- - parents-enfants *Z61*
- - parole *F80.9*
- - parole NCA *R47.8*
- - partenaire *Z63*
- - - ambivalent *Z63*
- - personnalité *F61*
- - personne vivant seule *Z60*
- - pontage artériel NCA *T82.3*
- - professionnelles *Z56*
- - prothèse, articulation, mécanique *T84.0*
- - psychiatrique *F99*
- - psychique NCA *F99*
- - psychosocial *Z65*
- - santé, dans la famille *Z63*
- - sexuelles *F52.9*
- - si résultat normal prouvé *Z71*
- - trouble de préférence sexuelle *F66.9*
- - verbales *R47.8*
- - verbales, liées au développement *F80.9*
- - voix *R49.8*
- dues prothèse implant mammaire , Autre *T85.83*
- endocrine *E34.9*
- - après un acte médical *E89.9*
- - post-opératoire *E89.9*
- foetale, prise en charge de la future mère *O36.9*
- gastro-intestinale *K92.9*
- - consécutif à une intervention chirurgicale *K91.9*
- grossesse NCA *O26.9*
- - amputation, col utérin *O34.4*
- - anémie, macrocitaire *O99.0*
- - cicatrice, col utérin *O34.4*

complication –*suite*
- grossesse NCA –*suite*
- - mère, avec lésion, foetus/nouveau-né NCA *P01.9*
- - rupture du foie spontanée *O26.6*
- - via
- - - amniotite *O41.1*
- - - dysfonctionnement de la glande thyroïde *O99.2*
- - - dysplasie, col utérin *O34.4*
- - - môle hydatiforme *O01.9*
- - - parchemin *O31.0*
- - - phlébite superficielle *O22.2*
- - - phlegmasie alba dolens *O22.3*
- intestinale
- - lors de
- - - Ascaridose *B77.0+, K93.8**
- - - rougeole *B05.4+, K93.8**
- - via anastomose, organes urinaires *N99.8*
- l'accouchement *O75.9*
- - accouchement, retardé *O63.9*
- - activité utérine, incoordonnée *O62.4*
- - altération, cordon ombilical *O69.9*
- - anneau de contraction *O62.4*
- - anneau de rétraction, utérus, pathologique *O62.4*
- - anomalie, placenta NCA *O43.1*
- - anomalie, rythme cardial, foetal *O68.0*
- - antéversion utérus sacciforme gravide *O34.5*
- - apoplexie, cérébrale *O99.4*
- - après
- - - accouchement par césarienne, antérieure *O75.7*
- - - intervention, chirurgicale, gynécologique, antérieure NCA *O34.8*
- - atonie, utérus *O62.2*
- - atrésie, col utérin *O34.4*
- - avec
- - - déchirure, périnée
- - - - muscles vaginaux *O70.1*
- - - - vaginale *O70.0*
- - - déchirure, sphincter anal, avec
- - - - muqueuse anale *O70.3*
- - - - muqueuse rectale *O70.3*
- - cicatrice, col utérin *O34.4*
- - compression, cordon ombilical *O69.2*
- - contraction en sablier, utérus *O62.4*
- - contraction, utérus *O62.4*
- - contractions, anormales *O62.9*
- - contracture
- - - annulaire *O62.4*
- - - utérin, anormal *O62.9*
- - contusion, cordon ombilical *O69.5*
- - cordon ombilical, court *O69.3*
- - déchirure
- - - anus *O70.2*
- - - col utérin *O71.3*
- - - intestinale *O71.5*
- - - péritonéal *O71.5*
- - - plancher pelvien *O70.1*
- - - urètre *O71.5*
- - - utérus *O71.1*
- - - vessie *O71.5*
- - déchirure, périnée *O70.0*
- - décollement, placenta *O45.9*
- - déformation, foetale *O66.3*
- - diastasis

complication –*suite*
- l'accouchement –*suite*
- - diastasis –*suite*
- - - muscles grands droits (de l'abdomen) *O71.8*
- - - pubis *O71.6*
- - - symphyse *O71.6*
- - diastasis des grands droits *O71.8*
- - dystocie, cervicale *O62.0*
- - éclampsie *O15.1*
- - embolie *O88.2*
- - - amniotique *O88.1*
- - enroulement, cordon ombilical *O69.2*
- - hématome
- - - cordon ombilical *O69.5*
- - - épine ischiatique *O71.7*
- - hypertension *O16*
- - hypertonie utérine *O62.4*
- - hypotonie, travail *O62.2*
- - inertie utérine *O62.2*
- - - primitive *O62.0*
- - - secondaire *O62.1*
- - insertion vélamenteuse, cordon ombilical *O69.8*
- - insuffisance cardiaque *O75.4*
- - lésion
- - - coccyx *O71.6*
- - - organes pelviens *O71.5*
- - - vaisseau, cordon ombilical *O69.5*
- - lésion traumatique
- - - obstétricale *O71.9*
- - - pelvienne *O70.1*
- - - tissu, péri-urétral *O71.5*
- - lors de
- - - intervention, chirgurgicale
- - - - col utérin, antérieure *O34.4*
- - - - perineum, antérieure *O34.7*
- - - - utérus, antérieure *O34.2*
- - - - vagin, antérieure *O34.6*
- - - - vulve, antérieure *O34.7*
- - - rétention, placenta avec hémorragie *O72.0*
- - maladie
- - - cérébrovasculaire *O99.4*
- - - placenta *O43.9*
- - malformation
- - - cordon ombilical NCA *O69.8*
- - - placenta NCA *O43.1*
- - membrane retenue, avec hémorragie *O72.2*
- - mort, due à anesthésie *O74.8*
- - noeud, cordon ombilical *O69.2*
- - organes génitaux, infantiles *O34.8*
- - pénétration, instrument, utérus, gravide *O71.1*
- - placenta
- - - accreta *O72.0*
- - - - sans hémorragie *O73.0*
- - - adhérent *O72.0*
- - - - sans hémorragie *O73.0*
- - - increta *O72.0*
- - - - sans hémorragie *O73.0*
- - - percreta *O72.0*
- - - - sans hémorragie *O73.0*
- - placenta, implantation basse, sans hémorragie *O44.00*
- - présentation anormale
- - - col utérin *O65.5*
- - - placenta, sans hémorragie *O44.00*

complication –*suite*
- l'accouchement –*suite*
- - présentation anormale –*suite*
- - - utérus *O65.5*
- - présentation de la face *O64.2*
- - présentation du front *O64.3*
- - présentation du siège *O64.1*
- - prolapsus
- - - main *O32.2*
- - - membre inférieur *O32.1*
- - - membre supérieur *O32.2*
- - - pied *O32.1*
- - - utérus *O34.5*
- - prolapsus, cordon ombilical *O69.0*
- - prolongation, travail *O63.9*
- - rétention
- - - chorion *O72.2*
- - - délivrance
- - - - partielle *O72.2*
- - - - - sans hémorragie, *O73.1*
- - - - sans hémorragie *O73.0*
- - - placenta *O72.2*
- - - - avec hémorragie *O72.0*
- - - - sans hémorragie *O73.0*
- - rétrécissement, col utérin *O65.5*
- - rupture de la poche des eaux, prématurée *O42.9*
- - saignement *O67.9*
- - - cerveau *O99.4*
- - - cordon ombilical *O69.5*
- - - intracérébrale *O99.4*
- - - placenta NCA *O67.8*
- - siège *O64.1*
- - souffrance, foetale *O68.9*
- - spasme, col utérin *O62.4*
- - sténose, col utérin *O65.5*
- - thrombose
- - - cordon ombilical *O69.5*
- - - veine ombilicale *O69.5*
- - torsion, cordon ombilical *O69.8*
- - traumatisme NCA *O71.9*
- - traumatisme obstétrical, mère *O71.9*
- - troubles fonctionnels
- - - utérus NCA *O62.9*
- - - - hypertonique NCA *O62.4*
- - - - hypotonique NCA *O62.2*
- - tumeur
- - - organes pelviens NCA *O65.5*
- - - tissu conjonctif pelvien NCA *O65.5*
- - utérus de Couvelaire *O45.8*
- - utérus, infantile *O34.5*
- - vasa praevia *O69.4*
- lors de
- - anestésie NCA *T88.5*
- - anesthésie spinale et péridurale
- - - lors de contractions et accouchement NCA *O74.6*
- - - pendant l'accouchement NCA *O89.5*
- - angine rouge *A38*
- - ascaridiase NCA *B77.8*
- - avortement
- - - deux temps *O06.8*
- - - incomplet *O06.3*
- - - spontané
- - - - complet *O03.8*
- - - - incomplet *O03.3*
- - circulation sanguine extra corporelle *T80.9*

complication –*suite*
- lors de –*suite*
- - contractions et accouchement *O75.9*
- - diabète thype I *E10.80*
- - diabète type II *E11.80*
- - diabète type IIb *E11.80*
- - dialyse NCA *T80.9*
- - fausse couche
- - - complète *O06.8*
- - - incomplète *O06.3*
- - grossesse NCA *O26.9*
- - herpès *B00.8*
- - induction de l'avortement, échec *O07.8*
- - interruption incomplète *O04.3*
- - malaria
- - - falciparum NCA *B50.8*
- - - tropicale *B50.8*
- - - vivax NCA *B51.8*
- - naissance
- - - cardiale via anesthésie *O74.2*
- - - dans les antécédents personnels *Z87.5*
- - - pulmonaire via anesthésie *O74.1*
- - - système nerveux central via anesthésie *O74.3*
- - - via narcose *O74.9*
- - oreillons NCA *B26.8*
- - photothérapie *T88.9*
- - rougeole NCA *B05.8*
- - rubéole NCA *B06.8*
- - tentative
- - - implantation d'un embryon lors d'un transfert embryonnaire *N98.3*
- - - insertion d'une cellule germinale fécondée par fécondation in vitro *N98.2*
- - thérapie d'inhalation NCA *T81.8*
- - thérapie électrochocs NCA *T88.9*
- - thérapie par ultrasons NCA *T88.9*
- - thérapie respiratoire artificielle NCA *T81.8*
- - thérapie respiratoire NCA *T81.8*
- - via insémination artificielle
- - - sperme du partenaire *N98.8*
- - - sperme étranger *N98.8*
- mécanique
- - appareil fixation interne d ' os d ' un membre , *T84.1*
- - - d ' Autre os , *T84.2*
- - Autre appareil implant et greffe des os , *T84.3*
- - - et greffe orthopédique interne , *T84.4*
- - lentille intra oculaire , *T85.2*
- méchanique via fixation osseuse interne membre *T84.1*
- méchanique, via
- - anastomose *T82.3*
- - appareil vésical *T83.1*
- - artères coronaires *T82.2*
- - Bombonne
- - - gastro-intestinale *T85.5*
- - - vasculaires *T82.5*
- - cathéter de dialyse *T82.4*
- - cathéter de perfusion *T82.5*
- - cathéter des voies urinaires *T83.0*
- - cathéter NCA *T85.6*
- - cathéter spinal *T85.6*
- - cathéter, de dialyse péritonéale *T85.6*

complication –*suite*
- méchanique, via –*suite*
- - coeur artificiel *T82.5*
- - dispositif anti-reflux oesophagien *T85.5*
- - fistule, artério-veineuse, créée chirurgicalement *T82.5*
- - fixation orthopédique interne *T84.2*
- - génioplastie *T85.6*
- - greffon artériel *T82.3*
- - greffon de cornée *T85.3*
- - implant du canal biliaire *T85.5*
- - implant mammaire *T85.4*
- - implant oculaire *T85.3*
- - implant pour le canal déférent *T83.4*
- - implantation NCA *T85.6*
- - prothèse articulaire *T84.0*
- - prothèse de valves cardiaques *T82.0*
- - prothèse du pénis *T83.4*
- - Schrittmacher *T82.1*
- - seringue *T80.9*
- - shunt *T82.5*
- - - intra-crânien, ventriculaire *T85.0*
- - stérilet *T83.3*
- - stimulateur de vessie électronique *T83.1*
- - stimulateur des nerfs crâniens *T85.1*
- - stimulateur musculaire électronique *T84.4*
- - stimulateur osseux *T84.3*
- - - électonique *T84.3*
- - stimulateur, système nerveux, électronique *T85.1*
- - suture permanente *T85.6*
- - transplant des artères coronaires *T82.2*
- - transplant d'organes urinaires *T83.2*
- - transplant du tendon *T84.4*
- - transplant du tractus génital *T83.4*
- - transplant NCA *T85.6*
- - transplantation de l'appareil génital *T83.4*
- - transplantation musculaire *T84.4*
- - transplantation nerveuse *T85.6*
- - transplantation, os *T84.3*
- médicaments ou des drogues *Y57.9!*
- membre réimplanté *T87.2*
- mère, via
- - application
- - - analgétiques
- - - - pendant l'accouchement *O74.9*
- - - - pendant le travail *O89.9*
- - - anesthésique local
- - - - pendant l'accouchement *O74.9*
- - - - pendant le travail *O89.9*
- - - anesthésiques généraux, pendant l'accouchement *O74.9*
- - mesure de soulagement
- - - pendant l'accouchement *O74.9*
- - - pendant le travail *O89.9*
- métabolisme après un acte médical *E89.9*
- multiples de (lésions multiples consécutives à)
- - diabète de type I *E10.70*
- - diabète de type II *E11.70*
- multiples, lors de
- - diabète sucré *E14.70*
- - - non insulino-dépendant *E11.70*
- - diabète type I *E10.70*
- - - insulino-dépendant *E10.70*

complication –*suite*
- multiples, lors de –*suite*
- - diabète type II *E11.70*
- - - insulino-dépendant *E11.70*
- - - non insulino-dépendant *E11.70*
- - diabète type IIb *E11.70*
- neurologique lors de
- - diabète sucré *E14.40*
- - - insulino-dépendant primaire *E10.40+, G63.2**
- - - non insulino-dépendant *E11.40+, G63.2**
- - diabète type I *E10.40+, G63.2**
- - - insulino-dépendant *E10.40+, G63.2**
- - diabète type II *E11.40+, G63.2**
- - - insulino-dépendant *E11.40+, G63.2**
- - - non insulino-dépendant *E11.40+, G63.2**
- - diphtérie *A36.8*
- - rubéole *B06.0+, G99.8**
- oeil *H57.9*
- - diabétique, saignement ponctuel *E14.30+, H58.8**
- - - lors de
- - - - diabète type I *E10.30+, H58.8**
- - - - diabète type II *E11.30+, H58.8**
- - lors de
- - - diabète sucré *E14.30*
- - - - insulo-dépendant primaire *E10.30+, H58.8**
- - - - non insulino-dépendant *E11.30+, H58.8**
- - - diabète type I *E10.30+, H58.8**
- - - - insulo-dépendant *E10.30+, H58.8**
- - - diabète type II *E11.30+, H58.8**
- - - - insulo-dépendant *E11.30+, H58.8**
- - - - non insulino-dépendant *E11.30+, H58.8**
- - post-opératoire *H59.9*
- opératoire en raison de
- - déchirure accidentelle *T81.2*
- - ponction accidentelle *T81.2*
- oreille *H93.9*
- - après un acte médical *H95.9*
- organe urinaire, après intervention médicale *N99.9*
- organes génitaux masculins *N50.9*
- - après un acte médical *N99.9*
- pendant le travail *O90.9*
- - lors d'une anesthésie *O89.9*
- périphérique vasculaire, lors de
- - diabète sucré
- - - insulino-dépendant primaire *E10.50+, I79.2**
- - - non insulino-dépendant *E11.50*
- - diabète type I *E10.50+, I79.2**
- - - insulino-dépendant *E10.50+, I79.2**
- - diabète type II *E11.50*
- - - insulino-dépendant *E11.50*
- - - non insulino-dépendant *E11.50*
- post-mastoïdectomie NCA *H95.1*
- post-opératoire *T81.9*
- précoce, trauma *T79.9*
- processus mastoïde, après un acte médical *H95.9*
- pulmonaire via anesthésie
- - pendant la grossesse *O29.0*
- - pendant le travail *O89.0*

complication –*suite*
- rénale *N28.9*
- - lors de
- - - diabète type I *E10.20+, N08.3**
- - - diabète type II *E11.20+, N08.3**
- - - - insulino-dépendant *E11.20+, N08.3**
- - - - non insulino-dépendant *E11.20+, N08.3**
- respiratoire *J98.9*
- - après intervention chirurgicale *J95.9*
- syphilitique, lors de
- - accouchement ou pendant le travail *O98.1*
- - grossesse *O98.1*
- système musculo-squelettique après un acte médical *M96.9*
- système nerveux *G98*
- - après intervention chirurgicale *G97.9*
- système nerveux central via anesthésie
- - pendant la grossesse *O29.2*
- - suites de couches *O89.2*
- système urogénital après un acte médical *N99.9*
- traumatisme antérieur *T79.9*
- trou mastoïdien, après mastoïdectomie NCA *H95.1*
- vasculaire
- - après
- - - examens médicaux *I97.8*
- - - intervention chirurgicale *T81.7*
- - cas de diabète sucré *E14.50*
- - lors de
- - - diabète sucré *E14.50*
- - - diabète type II *E11.50*
- vasculaires
- - périphérique, lors de diabète sucré *E14.50+, I79.2**
- veineux, pendant le travail *O87.9*
- via
- - actes médicaux *T88.9*
- - afibrinogénémie, lors de l'induction de l'avortement, échec *O07.6*
- - anastomose NCA *T85.9*
- - - vasculaires *T82.9*
- - - voies urinaires *N99.8*
- - anesthésie spinale et péridurale, lors de la grossesse NCA *O29.5*
- - anomalie du placenta, lors de la grossesse *O44.10*
- - appareil de contre-pulsion aortique *T82.9*
- - appareil de fixation orthopédique interne *T84.9*
- - appareil respiratoire *T85.9*
- - appareil vésical *T83.9*
- - application
- - - analgétique lors de la grossesse *O29.9*
- - - anesthésiques généraux, lors de la grossesse *O29.9*
- - - anesthésiques locaux lors de la grossesse *O29.9*
- - apport de contraception intra-utérin *T83.9*
- - arrêt cardiaque, lors d'un avortement, échec *O07.8*
- - artères coronaires *T82.9*
- - Bombonne
- - - gastro-intestinale *T85.9*
- - - vasculaires *T82.9*

complication –*suite*
- via –*suite*
- - brûlure chimique, organe pelvien, lors d'un avortement, échec *O07.8*
- - caecostomie *K91.4*
- - cathéter de dialyse *T82.9*
- - cathéter NCA *T85.9*
- - cathéter urétral *T83.9*
- - cathéter, de dialyse péritonéale *T85.9*
- - choc
- - - lors d'une iinduction de l'avortement, échec *O07.8*
- - - septique, lors d'un avortement, échec *O07.5*
- - coagulation intravasculaire, lors d'avortement, échec *O07.6*
- - coeur artificiel *T82.9*
- - collapsus, circulation sanguine, lors d'un avortement, échec *O07.8*
- - colostomie *K91.4*
- - court-circuit NCA *T85.9*
- - cystostomie *N99.5*
- - déchirement de l'organe pelvien, lors d'un avortement, échec *O07.8*
- - déchirement visible, lors d'un acte médical *T81.2*
- - dispositif anti-reflux oesophagien *T85.9*
- - échec rénal, lors d'un avortement, échec *O07.8*
- - embolie, lors de l'induction de l'avortement, échec *O07.7*
- - endométrite, lors de l'induction de l'avortement, échec *O07.5*
- - endoprothèse othopédique *T84.9*
- - entérostomie *K91.4*
- - fécondation artificielle *N98.9*
- - filtre veine cave *T82.9*
- - fistule arterio veineuse, opératoire inhérent *T82.9*
- - gastronomie *K91.88*
- - génioplastie *T85.9*
- - greffon de cornée *T85.9*
- - greffon de peau *T86.59*
- - iléostomie *K91.4*
- - implant *T85.9*
- - - interne *T85.9*
- - - respiratoire *T85.9*
- - implant cardiaque *T82.8*
- - implant du canal biliaire *T85.9*
- - implant du tractus génital *T83.9*
- - implant du tractus urinaire *T83.9*
- - implant mammaire *T85.9*
- - implant oculaire *T85.9*
- - implant pour le canal déférent *T83.9*
- - infection
- - - lors d'une induction de l'avortement, échec *O07.5*
- - - pelvien, lors d'avortement, échec *O07.5*
- - - tractus génital, lors d'un avortement, échec *O07.5*
- - - voies urinaires, lors d'un avortement, échec *O07.8*
- - infusion NCA *T80.9*
- - injection *T80.9*
- - inoculation *T80.9*
- - jéjunostomie *K91.4*
- - matériel pour sutures permanentes, non résorbables NCA *T85.9*
- - mesures de soulagement pendant la grossesse *O29.9*

complication –*suite*
- via –*suite*
- - moignon d'amputation chirurgical *T87.6*
- - nécrose, tubul rénal, lors d'avortement, échec *O07.8*
- - néphrostomie *N99.5*
- - neurostimulateur *T85.9*
- - oligurie, lors d'une induction de l'avortement, échec *O07.8*
- - oophorite, lors d'une induction de l'avortement, échec *O07.5*
- - paramétrite, lors d'une induction de l'avortement, échec *O07.5*
- - pelvipéritonite, lors d'une induction de l'avortement, échec *O07.5*
- - perforation, organe pelvien, lors d'un avortement, échec *O07.8*
- - perfusion NCA *T80.9*
- - piqûre accidentelle, pendant un acte médical *T81.2*
- - ponction lombaire *G97.1*
- - ponction spinale *G97.1*
- - prothèse *T85.9*
- - - interne *T85.9*
- - prothèse articulaire *T84.9*
- - - internes *T84.9*
- - prothèse cardiale, implant ou transplant *T82.9*
- - prothèse cardiaque *T82.8*
- - prothèse de pénis, implanter *T83.9*
- - prothèse de valves cardiaques *T82.9*
- - prothèse du cristallin intra-oculaire *T85.9*
- - prothèse mammaire *T85.88*
- - prothèse oculaire *T85.9*
- - prothèse tractus gastro-intestinal *T85.9*
- - prothèse vasculaire *T82.9*
- - radiothérapie NCA *T66*
- - rayonnement *T66*
- - ré-implantation NCA *T85.9*
- - saignement renforcé avec l'induction de l'avortement, échec *O07.6*
- - salpingite, lors d'un avortement, échec *O07.5*
- - salpingo-oophorite, lors d'un avortement, échec *O07.5*
- - Schrittmacher cardial *T82.9*
- - sédation, lors du travail et accouchement *O74.9*
- - shunt *T85.9*
- - - arterio-veineuse, opératoire inhérent *T82.9*
- - stérilet *T83.9*
- - stimulateur cardiaque *T82.9*
- - stimulateur cardiaque électronique *T82.9*
- - stimulateur des nerfs crâniens *T85.9*
- - stimulateur musculaire *T84.9*
- - stimulateur osseux *T84.9*
- - stimulateur vésical électronique *T83.9*
- - stoma *K91.4*
- - suture permanente *T85.9*
- - syndrome de défibrination, lors d'un avortement, échec *O07.6*
- - trachéostomie *J95.0*
- - transfusion de plasma *T80.9*
- - transfusion lymphocytes *T80.9*
- - transfusion sanguine *T80.9*
- - transplant des valves cardiaques *T82.9*
- - transplant du tractus génital *T83.9*

complication –*suite*
- via –*suite*
- - transplant du tractus urinaire *T83.9*
- - transplant mammaire *T85.9*
- - transplant NCA *T85.9*
- - - interne *T85.9*
- - - respiratoire *T85.9*
- - transplant oculaire *T85.9*
- - transplant osseux *T84.9*
- - transplant tractus gastro-intestinal *T85.9*
- - transplantation articulaire *T84.9*
- - transplantation cardiaque *T82.8*
- - transplantation vasculaire *T82.9*
- - trouble, équilibre électrolytique, lors d'un avortement, échec *O07.8*
- - vaccination *T88.1*
- voies urinaires, après opération *N99.9*

Comportement
- agressif *F91.1*
- - durable, en cas de troubles sociaux *F91.2*
- - pendant l'enfance et l'adolescence *F91.1*
- alimentaire
- - modifié *R63.0*
- - trouble *F50.9*
- Anomalie *F69*
- - *R46.8*
- - sexuelle *F65.9*
- asocial
- - durable, en cas de troubles sociaux *F91.2*
- - sans troubles psychiques manifestes *Z03.2*
- asocial, chez l'enfant ou l'adulte *Z72.8*
- asocial, perturbation, personnalité *F60.2*
- auto-mutilante *Z72.8*
- - antécédents familaux *Z81*
- avortement *O02.1*
- changement *F60.9*
- - organique *F07.0*
- criminel *F60.2*
- destructeur *F91.8*
- évasif *R46.5*
- fausse couche *O02.1*
- hyperactif *R46.3*
- inadapté névrotique *F48.9*
- inexplicable *R46.2*
- lenteur *R46.4*
- mentruation *N91.2*
- opposition, en cas de troubles sociaux *F91.3*
- problème, chez l'adulte *F69*
- sexuel
- - facteur de risque *Z72.8*
- - risques *Z72.8*
- social
- - et émotionnel, troubles combinés *F92.9*
- - sans trouble psychiatrique manifeste *Z03.2*
- - troubles *F91.9*
- - - avec
- - - - caractère obsessionel *F63.8*
- - - - comportement
- - - - - agressif, persistant, *F91.2*
- - - - - asocial, persistant, *F91.2*
- - - - - contestataire, oppositionnel, *F91.3*

Comportement –*suite*
- social –*suite*
- - troubles –*suite*
- - - avec –*suite*
- - - - dépression *F92.0*
- - - - liaison sociale absente, *F91.1*
- - - - - *F91.2*
- - - - socialisation *F91.2*
- - - - syndrome, hyperkinétique, pendant l'enfance *F90.1*
- - - - troubles
- - - - - dépressifs, *F92.0*
- - - - - émotionnels, *F92.8*
- - - - - émotionnels, pendant l'enfance, *F92.8*
- - - - - névrotiques, *F92.8*
- - - dans les groupes *F91.2*
- - - graves, puerpérales NCA *F53.1*
- - - légers, en couche NCA *F53.0*
- - - lié à la famille *F91.0*
- - - pendant l'enfance *F91.9*
- - - sans socialisation *F91.1*
- - - type, agressif *F91.1*
- - troubles de l'adaptation *F43.2*
- social troublé *F91.9*
- - avec
- - - comportement
- - - - agressif, persistant *F91.2*
- - - - asocial, persistant *F91.2*
- - - - contestataire, oppositionnel *F91.3*
- - - relation sociale *F91.2*
- - - - manquante *F91.1*
- - - trouble, émotionnel, pendant l'enfance *F92.8*
- social, trouble limité au milieu familial *F91.0*
- soupçonneux *R46.5*
- suicidaire *R45.8*
- Trouble *R46.2*
- troubles *F69*
- - à l'alcool *F10.9*
- - antécédents familaux *Z81*
- - avéré
- - - débilité mentale *F79.1*
- - - nécessitant un traitement, en cas de retard mental
- - - - grave *F72.1*
- - - - profond *F73.1*
- - cas de
- - - retard mental *F79.8*
- - - - grave *F72.8*
- - - - léger *F70.8*
- - - - moyen *F71.8*
- - - - profond *F73.8*
- - - troubles
- - - - cerveau, organique *F07.0*
- - - - corporels *F59*
- - couche *F53.8*
- - émotionnel, pendant l'enfance et l'adolescence *F98.9*
- - et trouble, personnalité *F69*
- - pendant l'enfance *F91.9*
- - psychogènes *F69*
- - sexuels *F65.9*
- type A *Z73*

Comportment associal, chez l'enfant ou l *Z72.8*

Composant alimentaire
- carence *E61.9*

Composant alimentaire –*suite*
- plusieurs, carence *E61.7*

Composées, plante
- hypersensibilité *T78.4*

Composés du fer, intoxication *T45.4*

Composés nitrés
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Compresse, laissé par négligence dans un *T81.5*

Compression
- artère *I77.1*
- artère rénale
- - artériosclérose *I70.1*
- - fibromusculaire *I77.3*
- avec neuropathie *G58.9*
- bronches *J98.0*
- cardiaque *I51.8*
- cérébrale *G93.5*
- - hémorragie, pression intracrânienne, associée à une lésion traumatique crânio-cérébrale fermée, grave *S06.21, S01.83!*
- cerveau *G93.5*
- - due à
- - - blessure NCA *S06.28*
- - - contusion *S06.28*
- - - - diffuse *S06.30*
- chiasma *H47.4*
- - due à
- - - adénome hypophysaire *D35.2*
- - - anévrysme *I67.10+, H48.8**
- cordon ombilical
- - affectant le foetus *P02.5*
- - compliquant l'accouchement *O69.2*
- - cordon ombilical enroulé autour du cou *O69.1*
- corps vertébral NCA *M48.59*
- corps vertébral, ostéoporotique *M80.98*
- corps vitré *H43.3*
- foetus/nouveau né, pendant l'accouchement *P15.9*
- imagerie du sein, anormale *R92*
- intestin *K56.6*
- mammaire *N63*
- mammographique, anormale *R92*
- moelle épinière *G95.2*
- - due à atteinte
- - - disque intervertébral NCA *M51.0+, G99.2**
- - - disque intervertébral, cervical *M50.0+, G99.2**
- - spondylogène *M47.19+, G99.2**
- nerf *G58.9*
- - cubital, avec neuropathie *G56.2*
- - fémoro-cutané, avec neuropathie *G57.1*
- - laryngé récurrent *J38.7*
- - médian *G56.0*
- - médian, avec neuropathie *G56.0*
- - optique *H47.0*
- - périphérique *G58.9*
- - péronier, avec neuropathie *G57.3*
- - sciatique *G57.0*
- - sympathique NCA *G90.8*
- - tibial postérieur *G57.5*
- - tibial postérieur, avec neuropathie *G57.5*
- - ulnaire *G56.2*

Compression –*suite*
- œsophage *K22.2*
- osseuse
- - disséminée *M85.89*
- - généralisée *M85.89*
- - tachée *M85.89*
- plexus brachial *G54.0*
- plexus lombosacré *G54.1*
- plexus nerveux NCA *G54.9*
- poumon *J98.4*
- poumons, nodale *J98.4*
- queue de cheval *G83.49*
- - complète *G83.40*
- - incomplète *G83.41*
- racine, sacrée *M54.18*
- racines nerveuses NCA *G54.9*
- racines nerveuses, avec
- - séquelles
- - - disque intervertébral NCA *M51.1+, G55.1**
- - - - avec myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - - cervical avec myélopathie, *M50.0+, G99.2**
- - - - - *M50.1+, G55.1**
- - spondylose *M47.29+, G55.2**
- - tumeur NCA *D48.9+, G55.0**
- système nerveux, autonome, périphérique *G90.8*
- thermographie du sein, anormale *R92*
- trachée *J39.80*
- trompe d'Eustache *H68.1*
- tronc cérébral *G93.5*
- uretère *N28.8*
- vaisseau lymphatique *I89.0*
- veine *I87.1*
- veine cave
- - inférieure *I87.1*
- - supérieure *I87.1*

Comprimés
- abus *F19.1*
- dépendance *F19.2*
- ingestion *T50.9*
- intoxication *T50.9*
- - avec intoxication, alcool *T51.9*

Compromission immunitaire
- avec inflammation des muqueuses, généralisée *K91.80*
- suite à
- - chimiothérapie *D90*
- - rayonnement *D90*

Comptage de spermatozoïdes *Z31.4*
- après vasectomie *Z30.8*

Compulsive, réaction, psychonévrotique *F42.1*

Concentration
- acide phosphatase, anormale *R74.8*
- anormale
- - amylase *R74.8*
- - Lipase *R74.8*
- - triacylglycérol lipase *R74.8*
- CPK, anormale *R74.8*
- créatinine, anormale *R79.8*
- enzyme pancréatique, anormale *R74.8*
- faiblesse, ménopause *N95.1*
- phosphatase alcaline, anormale *R74.8*
- triglycérides, élevée *R79.8*
- trouble, ménopause *N95.1*

Concentration, faculté, réduite *F98.8*

Concentrique
- dystrophie, macula, bégnine *H31.2*
- hypertrophie, ventricule gauche *I51.7*
- limitation, champ visuel *H53.4*
- sclérose *G37.5*

Conception *Z32*

Conception, prévention *Z30.9*

Conception, produit
- anormale *O02.9*
- rétention, après accouchement *O72.2*
- - sans hémorragie *O73.1*

Conclusion d'un planning familial *Z30.9*

Condamnation, avec peine d'emprisonnemen *Z65*

Conditions de travail difficiles *Z56*

Condrite costale, maladie de Tietze *M94.0*

Conduction
- auriculo-ventriculaire
- - accélérée *I45.6*
- - accessoire *I45.6*
- - prématurée *I45.6*
- auriculo-ventriculaire accessoire *I45.6*
- cardiaque, retardée *I45.8*
- défaut (trouble) de *I45.9*
- intraventriculaire, anormale *I45.6*
- stérilisation *I45.9*
- trouble, cœur *I45.9*
- troubles *I45.9*

Conduction, surdité *H90.2*

conduit auditif externe Abcès pavillon de l ' oreille ou *H60.0*

Conduit auditif
- abcès *H60.0*
- agénésie *Q16.1*
- anomalie *Q16.1*
- anomalie de position congénitale *Q17.8*
- - avec atteinte de l'audition *Q16.9*
- anthrax *H60.0*
- atrésie *Q16.1*
- blessure *S09.9*
- - superficielle *S00.40*
- brûlures *T20.0*
- catarrhe *H68.0*
- cholestéatome *H60.4*
- constriction *H61.3*
- corps étranger *T16*
- corrosion *T20.4*
- double *Q17.8*
- eczéma *H60.5*
- exostose *H61.8*
- externe
- - absence congénitale *Q16.1*
- - avec oreille, mélanome malin *C43.2*
- - blessure *S09.9*
- - collapsus *H61.3*
- - exostose *H61.8*
- - furoncle *H60.0*
- - infection diffuse *H60.3*
- - inflammation *H60.9*
- - malformation congénitale *Q17.8*
- - mélanome in situ *D03.2*
- - mélanome malin *C43.2*
- - naevus *D22.2*
- - périchondrite *H61.0*
- - plaie ouverte *S01.34*
- - rétrécissement *H61.3*
- - rétrécissement congénital *Q16.1*

Conduit auditif –*suite*
- externe –*suite*
- - suppuration NCA *H60.3*
- fistule *H61.8*
- furoncle *H60.0*
- fusion *Q16.1*
- granulation *H60.4*
- hypoplasie *Q17.8*
- - avec atteinte de l'audition *Q16.9*
- inflammation *H60.9*
- irritation *H61.9*
- kératose obturante *H60.4*
- maladie NCA *H61.9*
- malformation acquise *H61.8*
- mycose *B36.9+, H62.2**
- osseux
- - atrésie *Q16.1*
- - fracture *S02.1*
- - hypoplasie *Q17.8*
- - rétrécissement congénital *Q16.1*
- phlegmon *H60.1*
- polype *H74.4*
- prurit *L29.8*
- rétrécissement *H61.3*
- rétrécissement acquis *H61.3*
- saignement *H92.2*
- sténose *H61.3*
- - *H68.1*
- - acquise *H61.3*
- - congénitale *Q16.1*
- suppuration *H60.3*
- surnuméraire *Q17.8*
- syphilis *A52.7+, H94.8**

Condyle
- externe du tibia, fracture, avec fracture du péroné *S82.11*
- fémoral
- - fracture *S72.41*
- - médial, ostéonécrose, aseptique *M87.05*
- fémoral, nécrose *M87.05*
- huméral, fracture *S42.44*
- interne du tibia
- - fracture, avec fracture du péroné *S82.11*
- - ostéochondrite, juvénile *M92.5*
- tibial, fracture *S82.18*

Condylome *A63.0*
- acuminé *A63.0*
- - gonorrhéique *A54.0*
- acuminés *A63.0*
- - gonococciques *A54.0*
- anal *A63.0*
- anaux *A63.0*
- anogénital *A63.0*
- géant *A51.3*
- gonorrhéique *A54.0*
- plat *A51.3*
- - dans la syphilis congénitale *A50.0*
- - syphilitique *A51.3*
- - syphilitique, congénital *A50.0*
- syphilitique *A51.3*
- vénérien *A51.3*
- vulvaires *A63.0*
- vulve *A63.0*

Cône *Q14.8*
- artériel, anévrisme *I25.3*
- congénital *Q14.8*

Cône –*suite*
- médullaire
- - commotion *S34.38*
- - moelle épinière, contusion *S34.38*
- myopie *H44.2*
- papille *H47.3*

Cône médullaire, syndrome du *G95.88*

Confabulation, amnésique, avec psychose, *F10.6*

Configuration d'iris plateau, avec glauc *H40.2*
- *H40.2*

Confirmation, grossesse *Z32*

Confirmé par examen parasitologique, pal *B53.8*

Conflit
- pendant la puberté *Z60*
- postménopausique *N95.9*
- pré opératoire *F43.0*
- rôles sociaux NCA *Z73*
- sexuel *F66.2*
- - chronique *F66.2*
- social *Z65*
- stérilité, chez la femme *N97.9*

Conflit conjugal *Z63*

Confusion *R41.0*
- aigue, avec démence, sénile *F05.1*
- cas de sclérose, cérébrale *F01.9*
- épileptique *F05.8*
- psychogène *F44.88*
- réactive, due à une charge émotionnelle *F44.88*
- schizophrénie *F20.8*
- subaiguë *F05.9*
- vieillesse *F03*

Confusion, état de
- aigu *F05.9*
- - à la vieillesse *F05.1*
- cas de psychose
- - réactive *F23.0*
- - schizophréniforme *F23.1*
- non induite par l'alcool
- - aigue *F05.9*
- - subaiguë *F05.9*
- réactive, psychotique *F23.9*

congénital
- Afibrinogénémie *D68.20*
- Eisenmenger Malformation cardiaque *Q21.88*
- Maladie Eulenburg Paramyotonie *G71.1*
- malformatifs dû cause exogène connues , Autre syndrome *Q86.88*
- sein Autre malformation *Q83.88*

Congénital - *voir* type de la maladie

Congénitale - *voir* Type de maladie

Congénitale, pneumonie, infection *P23.9*

Congestif
- cardiomyopathie *I42.0*
- dysménorrhée *N94.6*
- insuffisance, cardiaque *I50.01*
- insuffisance, coeur *I50.01*
- maladie, coeur *I50.01*
- prostatite *N41.9*

Congestion
- col vésical *N32.8*
- prostate *N42.1*

Congestion –*suite*
- rétine *H35.8*
- vésicule séminale *N50.8*

Congestion faciale, due à un traumatisme *P15.4*

Congestion pulmonaire *J81*

Conidiobolus, infection *B46.8*

Conique
- col de l'utérus *N88.4*
- cornée *H18.6*
- dents *K00.2*

Conjoint, sévices physiques *T74.1*

conjonctif Syndrome Sharp maladie associé du tissu *M35.1*

Conjonctive
- abcès *H10.0*
- acanthamoebiose *B60.1+, H13.1**
- adhérence
- - acquise *H11.2*
- - congénitale *Q15.8*
- affection *H11.9*
- - vaisseau *H11.4*
- - virale *B30.9+, H13.1**
- allergie *H10.1*
- amylose *E85.4+, H13.8**
- anévrysme *H11.4*
- angiome *D18.08*
- argyrose *H11.1*
- atrophie *H11.8*
- atrophie, sénile *H11.8*
- brûlure *T26.1*
- calcification *H11.1*
- calcul *H11.1*
- carcinome, cellules épithéliales *C69.0*
- catarrhe *H10.9*
- chancre *A51.2+, H13.1**
- chémosis *H11.4*
- cicatrice *H11.2*
- contusion *S05.0*
- - avec corps étranger, sac conjonctival *T15.1*
- contusion, avec corps étranger *T15.1*
- corps étranger *T15.1*
- - profond *T15.1*
- - sous tarsal *T15.1*
- - superficiel *T15.1*
- corrosion *T26.6*
- cyanose *H11.4*
- déformation, congénitale *Q15.8*
- dégénérescence *H11.1*
- déhiscence, suture *T81.3*
- dépôt *H11.1*
- - lors d'amyloïdose *E85.4+, H13.8**
- dermoïde *D31.0*
- ecchymose *H11.3*
- emphysème *H11.8*
- érythème multiforme *L51.1+, H13.8**
- érythroplasie *D09.2*
- fibrome *D31.0*
- granulome *H10.4*
- granulome corps étranger *H10.4*
- hémangiome *D18.08*
- hémorragie *H11.3*
- - chez le nouveau né *P54.8*
- HIV, microangiopathie, syndrome de *B23.8, M31.1*
- hyperémie *H11.4*

Conjonctive –*suite*

- hypertrophie, lymphoïde *H11.8*
- hyposphagme *H11.3*
- ictère *R17*
- induration *H11.1*
- infiltration, réactive, lymphoïde *H11.8*
- inflammation *H10.9*
- - aiguë *H10.3*
- - allergique *H10.1*
- - bactérienne *H10.8*
- - chronique *H10.4*
- - due à un virus *B30.9+, H13.1**
- - gonorrhéique *A54.3+, H13.1**
- - suppurée *H10.0*
- irritation *H11.9*
- kyste *H11.4*
- kyste de rétention *H11.4*
- lésion *H11.9*
- - pendant l'accouchement *P15.3*
- - superficielle *S05.0*
- - - avec corps étranger *T15.1*
- Lyell, syndrome de *L51.20*
- lymphangiectasie *H11.8*
- lymphome *C85.9*
- mélanome in situ *D03.8*
- mélanome, malin *C69.0*
- mélanose *H11.1*
- - congénitale *Q13.8*
- nævus *D31.0*
- naevus d'ota *D31.0*
- neurofibrome *D31.6*
- œdème *H11.4*
- papillome *D31.0*
- pigmentation *H11.1*
- plaie *S05.0*
- ptérygion *H11.0*
- sarcome de Kaposi *C46.7*
- stockage *H11.1*
- traumatisme, et traumatisme, cornée *S05.0*
- trouble, vasculaire *H11.4*
- tuberculose *A18.5+, H13.1**
- tumeur
- - bénigne *D31.0*
- - évolution, inconnue *D48.7*
- - maligne *C69.0*
- ulcère *H10.8*
- xanthome *E75.5*
- xérose *H11.1*

Conjonctive (s)

Conjonctivite *H10.9*

- aiguë *H10.3*
- allergique *H10.1*
- - aiguë *H10.1*
- - chronique *H10.4*
- Apollo *B30.3+, H13.1**
- atopique, aiguë *H10.1*
- avec kératite, superficielle *H16.2*
- bactérienne *H10.8*
- blépharo-, avec rosacée *L71.8+, H13.2**
- chez le nouveau né *P39.1*
- chimique, non médicamenteuse *H10.8*
- Chlamydia *A74.0+, H13.1**
- chronique *H10.4*
- - poussée aiguë *H10.4*
- diphtérique *A36.8+, H13.1**
- due à

Conjonctivite –*suite*

- due à –*suite*

- - Acanthamoeba *B60.1+, H13.1**
- - adénovirus *B30.1+, H13.1**
- - Chlamydia *A74.0+, H13.1**
- - - chez le nouveau né *P39.1*
- - corps étranger *T15.1*
- - entérovirus type 70 *B30.3+, H13.1**
- - gonocoques *A54.3+, H13.1**
- - herpès zostérien *B02.3+, H13.1**
- - inclusion *A74.0+, H13.1**
- - influences, physico chimiques *H10.2*
- - kératite photoélectrique *H16.2*
- - kératite superficielle *H16.2*
- - maladie, parasitaire NCA *B89+, H13.1**
- - méningocoques *A39.8+, H13.1**
- - pneumocoques *H10.8, B95.3!*
- - poussière *H10.2*
- - Reiter, syndrome de *M02.39*
- - rhume des foins *H10.1*
- - rosacée *L71.9+, H13.2**
- - staphylocoque doré, chronique *H10.4*
- - tularémie *A21.1+, H13.1**
- - virus *B30.9+, H13.1**
- - virus Coxsackie 24 *B30.3+, H13.1**
- - virus de la maladie de Newcastle *B30.8+, H13.1**
- - virus de l'herpès simplex *B00.5+, H13.1**
- épidémique *B30.9+, H13.1**
- estivale *H10.3*
- folliculaire *H10.4+, H13.1**
- - aiguë *H10.2+, H13.1**
- - - due à un adénovirus *B30.1+, H13.1**
- - chronique *H10.4*
- gigantopapillaire *H10.8*
- gonococcique *A54.3+, H13.1**
- gonococcique du nouveau-né *A54.3+, H13.1**
- gonorrhéique du nouveau né *A54.3+, H13.1**
- hémorragique *B30.3+, H13.1**
- - aiguë *B30.3+, H13.1**
- - due à l'entérovirus type 70 *B30.3+, H13.1**
- - épidémique *B30.3+, H13.1**
- hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) *B30.3+, H13.1**
- herpétique *B02.3+, H13.1**
- hyperergique *H10.1*
- inclusion *A74.0+, H13.1**
- infectieuse *H10.8*
- kérato- *H16.2*
- - cas de rougeole *B05.8+, H19.2**
- Koch Weeks *H10.0*
- mécanique *H10.8*
- médicamenteuse *H10.8*
- Morax Axenfeld *H10.2*
- mucopurulente *H10.0*
- néonatale *P39.1*
- Newcastle *B30.8+, H13.1**
- nodulaire *H10.2*
- - aiguë *H10.2*
- - chronique *H10.4*
- papillaire géante *H10.8*
- Parinaud *H10.8*
- pétrifiante *H10.4*
- pharyngo-, virale *B30.2+, H13.1**

Conjonctivite –*suite*

- phlycténulaire *H10.4*
- piscines *B30.1+, H13.1**
- printanière *H10.1*
- - *H10.4*
- pyogène *H10.8*
- récidivante *H10.4*
- rhino-, saisonnière *H10.8*
- scléro- *H15.0*
- sèche
- - sous la forme du
- - - syndrome de l'oeil sec *H04.1*
- - - syndrome de Sjögren *M35.0+, H13.2**
- séreuse *H10.8*
- simple *H10.9*
- suppurée *H10.0*
- syphilitique tardive *A52.7+, H13.1**
- tuberculeuse *A18.5+, H13.1**
- virale, épidémique *B30.9+, H13.1**

Conjugaison, retardée, avec ictère

- chez le nouveau né, dû à un accouchement avant terme *P59.0*
- néonatal *P59.8*

Conjugué

- paralysie
- - regard *H51.0*
- - yeux *H51.0*
- - - corticale *H51.0*
- spasme *H51.8*

Conn, syndorme de *E26.0*

Connexion, abbouchement

- congénital, entre utérus et
- - appareil urinaire *Q51.7*
- - intestin *Q51.7*
- - rectum *Q51.7*
- - tube digestif *Q51.7*
- - vessie *Q51.7*
- congénitale, entre
- - artère pulmonaire et veine pulmonaire *Q25.7*
- - sac péricardique et sac pleural *Q34.8*
- discordant
- - auriculoventriculaire *Q20.5*
- - ventriculo-artérielle *Q20.3*
- entre aorte et artère pulmonaire *Q21.4*
- veine pulmonaire, anomalie *Q26.4*
- - partielle *Q26.3*
- - totale *Q26.2*
- ventricule, gauche, avec oreillette droite *Q20.5*

connues Autre syndrome congénital malformatifs dû à des cause exogène *Q86.88*

Conque de l'oreille

- anomalie *Q17.3*
- malformation congénitale *Q17.3*

Conradi-Hänermann, syndrome de *Q77.3*

Consanguinité

- conseil *Z71*
- dans l'anamnèse familiale *Z84.3*
- dans les antécédents familiaux *Z84.3*

Conscience

- opacité *R40.0*
- - avec épilepsie *G40.8*
- - paroxystique *G40.8*
- Perte, de courte durée *R55*

Conscience –*suite*

- troubles *R41.8*
- - avec crise d'épilepsie *G40.2*
- - avec réaction post-traumatique aiguë *F43.0*
- - par épilepsie partielle *G40.2*

Consécutif
- ésotropie *H50.0*
- exotropie *H50.1*

Conseil *Z71*
- alimentation du nourrisson *Z00.1*
- attitudes vis-à-vis de la sexualité *Z70*
- cas de
- - abus de médicaments ou de stupéfiants *Z71*
- - abus de médicaments ou stupéfiants *Z71*
- - consanguinité *Z71*
- - parenté *Z71*
- diététique *Z71*
- - pour
- - - allergie alimentaire *Z71*
- - - diabète sucré *Z71*
- - - intolérance alimentaire *Z71*
- diététique, en cas de
- - colite *Z71*
- - gastrite *Z71*
- - hypercholestérolémie *Z71*
- - hypoglycémie *Z71*
- en matière d'alimentation *Z71*
- en matière de sexualité *Z70*
- - nom d'un tiers *Z70*
- - portant sur des problèmes combinés *Z70*
- explication de résultats d'examens *Z71*
- génétique en relation avec procréation assistée *Z31.5*
- médical *Z71*
- - les résidents d'une institution *Z59*
- - personne vivant seule *Z60*
- nutritionnel *Z71*
- - cas de
- - - allergie alimentaire *Z71*
- - - diabète sucré *Z71*
- - - intolérance alimentaire *Z71*
- pour
- - abus de médicaments *Z71*
- - alcoolisme *Z71*
- - contraception *Z30.0*
- - dépendance tabagique *Z71*
- - éthylisme *Z71*
- - insémination artificielle *Z31.1*
- - interruption de grossesse *Z30.0*
- - obésité *Z71*
- - procréation assistée *Z31.6*
- - régulation des naissances *Z30.0*
- - stérilisation *Z30.2*
- - stérilité *Z31.6*
- - tabagisme *Z71*
- - toxicomanie *Z71*
- relation avec VIH *Z71*
- selon le paragraphe 218 *Z30.0*
- sexualité
- - nom d'un tiers *Z70*
- - portant sur problèmes combinés *Z70*
- tiers absent *Z71*
- vaccination *Z26.9*

Conservateurs

Conservateurs –*suite*

- allergie *L23.5*
- hypersensibilité *T78.1*

Consommation
-
- alcool NCA *Z72.0*
- alcool, par la mère, endommageant le foetus/nouveau né *P04.3*
- Autre substance psycho active par voie intraveineuse , *U69.32!*
- héroïne voie
- - intraveineuse *U69.30!*
- - non intraveineuse , *U69.31!*
- nicotine NCA *Z72.0*
- tabac NCA *Z72.0*

Constipation *K59.0*
- atonique *K59.0*
- chronique *K59.0*
- neurogène *K59.0*
- psychogène *F45.32*
- spastique *K59.0*

Constitutionnel
- anémie
- - aplastique *D61.0*
- - aplastiques *D61.0*
- - hémolytique *D58.0*
- dysfonctionnement hépatique *K76.8*
- haute stature *E34.4*
- hyperbilirubinémie *E80.6*
- hypotonie *I95.9*
- ictère
- - hémolytique *D58.0*
- - non hémolytique, avec hépatose, lipochrome *E80.6*
- insuffisance staturale *E34.3*
- lymphadénopathie *R59.1*
- obésité *E66.89*
- pancytopénie *D61.0*
- panmyélopathie *D61.0*
- panmyélophtisie *D61.0*
- précocité, sexuelle *E30.1*
- psychopathie *F60.9*
- retard, puberté *E30.0*
- thrombopathie *D68.0*
- thrombopénie *D69.41*

Constrictif
- cardiomyopathie *I42.9*
- péricardite, chronique *I31.1*

Constriction
- asphyxie *T71*
- avec étouffement *T71*
- bronchique *J98.0*
- champ visuel
- - fonctionnel *H53.4*
- - périphérique *H53.4*
- conduit auditif *H61.3*
- duodénum *K31.5*
- intestin *K56.6*
- larynx *J38.6*
- - congénital *Q31.8*
- - sous glottique, congénitale *Q31.1*
- méninges, anormale *Q07.8*
- œsophage *K22.2*
- prépuce, acquise *N47*
- pylore
- - congénitale *Q40.0*
- - infantile *Q40.0*
- uretère *N13.5*

Constriction –*suite*
- uretère –*suite*

- - avec infection *N13.6*
- urètre, spastique *N39.88*
- utérus, complication, accouchement *O62.4*
- vésicule biliaire *K82.0*

Consultation
- l'explication des résultats d'examen *Z71*
- sans certificat, à des fins administratives *Z02*
- sans plainte *Z71*

Contact
- anémone de mer, effet toxique *T63.6*
- avec
- - acariase *Z20.7*
- - bactéries intestinales, infectieuses *Z20.0*
- - choléra *Z20.0*
- - gonocoques *Z20.2*
- - gonorrhée *Z20.2*
- - hépatite virale *Z20.5*
- - maladie
- - - intestinale, infectieuse *Z20.0*
- - - parasitaire *Z20.7*
- - - transmissible *Z20.9*
- - maladie sexuellement transmissible *Z20.2*
- - maladie virale NCA *Z20.8*
- - poliomyélite *Z20.8*
- - rage *Z20.3*
- - rougeole *Z20.8*
- - rubéole *Z20.4*
- - syphilis *Z20.2*
- - varicelle *Z20.8*
- - variole *Z20.8*
- - VIH *Z20.6*
- - virus du SIDA *Z20.6*
- crustacé, effet toxique *T63.6*
- étoile de mer, effet toxique *T63.6*
- méduse, effet toxique *T63.6*
- produit chimique, érythème *L25.3*
- trouble, chez l'enfant *F93.2*
- urticaire *L50.6*

Contact cutané
- avec
- - allergie, due à un aliment *L23.6*
- - dermite de contact
- - - allergique, due à un aliment *L23.6*
- - - toxique, due à un médicament *L24.4*
- - exanthème toxique provoqué par un médicament *L24.4*
- médicament, avec exanthème *L25.1*

Contamination, dépistage NCA *Z13.8*

Contenu gastrique
- aspiration *T17.9*
- - due à l'anésthésie
- - - pendant
- - - - accouchement *O74.0*
- - - - grossesse *O29.0*
- - - post partum *O89.0*
- - - puerpérale *O89.0*
- - - suites de couches *O89.0*
- régurgitation *R11*

Contient cellules type alpha bêta et gamma - delta , *C86.1*

Continu, affection de l'estomac *K31.88*

Continuation de la veine cave inférieure *Q26.8*

Continuité osseuse
- modification *M84.99*
- trouble *M84.99*

Contraceptif
- aménorrhée *N91.1*
- effets secondaires *T88.7*
- indication, examen de contrôle *Z30.4*
- intolérance *T88.7*
- oral, intoxication *T38.4*
- ordonnance *Z30.0*
- première prescription *Z30.0*
- réinstallation *Z30.5*
- renouvellement d'ordonnance *Z30.4*

Contraception *Z30.9*
- alternative *Z30.8*
- antécédents personnels *Z92.8*
- avec mise en place, stérilet, intra-utérin *Z30.1*
- conseil *Z30.0*
- hormonale *Z30.4*
- orale *Z30.4*

Contraception, dispositif, intra-utérin
- avec complications *T83.9*
- perforation, utérus *T83.3*

Contraception, prise en charge *Z30.9*

Contractée, vessie *N32.8*

Contractions *O26.88*
- anormales NCA *O62.9*
- anormales, avec lésion foetus/nouveau-né *P03.6*
- applatissement, pied *Q66.5*
- attaque *O62.8*
- avec
- - défaillance, reins, aigu *O75.8*
- - détresse, foetale, due à la prise de médicaments *O68.9*
- - fièvre *O75.2*
- - infection, générale *O75.3*
- - preuve, détresse foetale
- - - électrocardiogramme *O68.8*
- - - ultrason *O68.8*
- - sepsie *O75.3*
- Braxton-Hick *O47.9*
- cas de
- - naissance, trop rapide *O62.3*
- - position anormale *O64.0*
- champ visuel *H53.4*
- continu *O62.4*
- contractions faibles *O62.2*
- crampe *O62.4*
- dangereuses *O47.9*
- - avec lésion, foetus *P01.8*
- douleurs *O47.9*
- en sablier
- - stomacale
- - - congénitale *Q40.2*
- - - psychogène *F45.31*
- - utérus, avec lésion sur le foetus/nouveau-né *P03.6*
- - vésicule biliaire, congénitale *Q44.1*
- - vessie, congénitale *Q64.7*
- en sablier, utérus *O62.4*
- - complication, pendant l'accouchement *O62.4*
- estomac, en sablier *K31.88*
- et accouchement, avec
- - choc *O75.1*

Contractions *–suite*
- et accouchement, avec *–suite*
- - collapsus, circulation *O75.1*
- - complications *O75.9*
- - - due à sédation *O74.9*
- - hypotonie *O75.8*
- - troubles du métabolisme *O75.8*
- faiblesse *O62.2*
- - avec
- - - césarienne *O62.2*
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.6*
- - compliquant l'accouchement *O62.2*
- - primitive *O62.0*
- - - avec
- - - - césarienne *O62.0*
- - - - compliquant l'accouchement *O62.0*
- - secondaire *O62.1*
- - - avec
- - - - césarienne *O62.1*
- - - - compliquant l'accouchement *O62.1*
- FAUX *O47.9*
- - avant 37 semaines entières de gestation *O47.0*
- - avec douleurs *O47.9*
- - ou après la 37ème semaine entière de gestation *O47.1*
- faux travail *O47.9*
- habilité
- - anormal NCA *O62.9*
- - anormale, avec lésion foetus/ nouveau -né *P03.6*
- - avec maladie veineuse *O87.9*
- - non coordonnées *O62.4*
- - prématurées *O60.0*
- - restreintes *O62.2*
- hypertonie, avec lésion foetus/nouveau -né *P03.6*
- hypertoniques *O62.4*
- hystérique *F44.4*
- induction, échouée
- - ocytocine *O61.0*
- - prostaglandines *O61.0*
- irrégulières *O62.2*
- - avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.6*
- médicament, effets indésirables *T88.7*
- muscle de l'oeil, paralytique *H49.9*
- muscle, psychogène, réaction de conversion *F44.4*
- non coordonnées *O62.4*
- - affectant le fœtus/nouveau-né *P03.6*
- - avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.6*
- non nécessaires *O47.9*
- - avant la 37ème semaine de grossesse *O47.0*
- - partir de la 37ème semaine de grossesse *O47.1*
- obstructive *O66.9*
- phase, active
- - arrêt *O62.1*
- - - avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.6*
- - interrompue *O62.1*
- pied plat *Q66.5*
- prématurées *O60.0*
- - avec accouchement *O60.1*
- - - prématuré *O60.1*
- - - terme *O60.2*

Contractions *–suite*
- prématurées *–suite*
- - sans accouchement *O60.0*
- prolongation, complications, accouchement *O63.9*
- prolongées *O63.9*
- - avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.8*
- - deuxième période *O63.1*
- - première période *O63.0*
- résistantes aux thérapies *O62.4*
- sablier, utérus *O62.4*
- - complication, accouchement *O62.4*
- troubles *O26.88*
- troubles, hypertoniques *O62.4*
- utérines *O80*
- utérines hypertoniques *O62.4*
- utérines non coordonnées *O62.4*
- utérus
- - anormale *O62.9*
- - clonique *O62.4*
- - hypertonique *O62.4*
- - hypotonique NCA *O62.2*
- - tétanique *O62.4*
- utérus, anormal *O62.9*
- vaines, fausses *O47.9*

Contracture
- (de) Dupuytren *M72.0*
- abdominale *R19.3*
- adducteurs *M24.59*
- anneau, en forme de, complications, accouchement *O62.4*
- aponévrose palmaire *M72.0*
- articulation *M24.59*
- - cas de raccourcissement, tendon *M24.59*
- - - congénitale *Q66.8*
- - paralytique *M24.59*
- articulation, hanches, congénitale *Q65.8*
- bassin
- - acquise *M95.5*
- - avec disproportion, foeto-pelvienne, avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.1*
- - obstacle, accouchement, avec disproportion, foeto-pelvienne *O65.1*
- bassin ou pelvis *G24.1*
- bassin, centre, avec disproportion, foeto -pelvien *O33.3*
- bassin, disproportion foeto-pelvienne de l''ouverture inférieure *O33.3*
- bassin, disproportion foeto-pelvienne de l''ouverture supérieure *O33.2*
- bronchique *J98.0*
- canal
- - cholédoque *K83.8*
- - cystique *K82.8*
- - hépatique *K83.8*
- cas de cicatrice, muscle *M62.49*
- cervicale ou torticolis *M43.6*
- - aigu(e)s *M43.6*
- - cas de polyarthrite, chronique *M06.88*
- - congénitale(s) *Q68.0*
- - due à un traumatisme obstétrical *P15.2*
- - hystériques *F44.4*
- - intermittentes *M43.6*
- - musculaires *M43.6*
- - - congénitales *Q68.0*
- - musculaires *M43.6*
- - psychogènes *F45.8*

Contracture –*suite*
- cervicale ou torticolis –*suite*
- - rhumatoïdes *M06.88*
- - spasmodiques *G24.3*
- - traumatiques, récentes NCA *S13.4*
- cicatrice *L90.5*
- col utérin *N88.2*
- doigt NCA *M20.0*
- doigt, articulation *M24.54*
- doigt, congénitale *Q68.1*
- Dupuytren *M72.0*
- en flexion
- - articulation *M24.59*
- - moignon d'amputation *T87.6*
- estomac *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- fascia *M62.89*
- fascia lata *M62.85*
- fascia palmaire *M72.0*
- fascia plantaire *M72.2*
- fléchisseurs
- - Articulation coxo-fémorale *M24.55*
- - articulation du genou *M24.56*
- flexion
- - genou, articulation *M24.56*
- - hanche, articulation *M24.55*
- flexion, moignon, amputation *T87.6*
- gorge, psychogène *F45.8*
- hanches *M24.55*
- intestinale *K56.6*
- ischémique de Volkmann *T79.6*
- - ischémique, complication, lésion *T79.6*
- Ledderhose *M72.2*
- ligament *M24.29*
- - congénitale *Q79.8*
- moignon d'amputation *T87.6*
- muscle oculaire *H50.8*
- muscle sterno-cléido-mastoidien *Q68.0*
- muscles paravertébraux *M62.88*
- musculaire *M62.49*
- - ischémique *T79.6*
- - paralytique *M62.49*
- - post-infectieuse NCA *M62.49*
- - posturale NCA *M62.49*
- musculaire, posture NCA *M62.49*
- orifice du col *N88.2*
- - interne *N88.2*
- orteils *M20.5*
- ostium ureteris
- - avec infection *N13.6*
- - post-infectieuse *N13.5*
- ouverture, urétro-vésicale, post-infectieuse *N13.5*
- paupière *H02.5*
- plantaire *M72.2*
- prostate *N42.8*
- pylore NCA *K31.3*
- rachis *M43.99*
- rein
- - congénitale *Q63.8*
- - granulaire *N26*
- - hyperdronéphrose *N13.3*
- - - avec infection *N13.6*
- - pyélonéphritique *N11.9*
- - secondaire *N26*
- - tuberculeuse *A18.1+, N29.1**
- sablier
- - estomac

Contracture –*suite*
- sablier –*suite*
- - estomac –*suite*
- - - congénitale *Q40.2*
- - - psychogène *F45.31*
- - utérus, avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.6*
- - vésicule biliaire, congénitale *Q44.1*
- - vessie, congénitale *Q64.7*
- sterno-cléido-mastoidien, congénitale *Q68.0*
- tendon *M67.19*
- tendon d'Achille *M67.0*
- - congénitale *Q66.8*
- urètre *N35.9*
- utérus *N85.8*
- - insuffisante
- - - primaire *O62.0*
- - - secondaire *O62.1*
- - prolongée, pendant les contractions *O62.4*
- utérus, anormal, complications, accouchement *O62.9*
- vaginale *N89.5*
- vésicule biliaire *K82.8*
- vessie *N32.8*
- voies biliaires *K83.8*
- Volkmann *T79.6*

Contraire, développement sexuel *F66.9*

Contraste, produit de
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*
- iodé, allergie *T88.7*

Contrôle
- appareil de fixation
- - externe *Z47.8*
- - interne *Z47.0*
- attelle, externe *Z47.8*
- bandage *Z47.8*
- batterie, pace-maker *Z45.0*
- croissance
- - croissance rapide chez l'enfant *Z00.2*
- - enfant *Z00.1*
- - petit enfant *Z00.1*
- diététique *Z71*
- Kirschner, fil de *Z47.0*
- ne nécessitant pas de prise en charge médicale *Z04.9*
- pace-maker *Z45.0*
- pansement, et suture, après intervention chirurgicale *Z48.0*
- postopératoire *Z09.0*
- stérilet *Z30.5*
- stimulateur *Z45.0*
- suspicion de maladie *Z03.9*

Contrôle, tissu cicatriciel *Z42.9*
- membres
- - inférieurs *Z42.4*
- - supérieurs *Z42.3*
- tête et cou *Z42.0*
- tronc *Z42.2*

Contusion *T14.05*
- abdomen *S30.1*
- abdominale *S39.9*
- aine *S30.1*
- aisselle *S40.0*
- annexes oculaires NCA *S05.8*
- appareil lacrymal *S05.8*

Contusion –*suite*
- articulation de la main *S60.2*
- avant-pied *S90.3*
- avec compression, cerveau *S06.28*
- avec ictère, du nouveau-né *P58.0*
- bassin *S30.0*
- bras *T11.05*
- bras, inférieur *S50.1*
- buste *S20.2*
- calotte cranienne *S00.05*
- cardiaque *S26.81*
- cataracte *H26.1*
- cérébrale *S06.21*
- - cas d'hématome, cerveau *S06.28*
- - circonscrite *S06.31*
- - diffuse *S06.21*
- cerveau *S06.21*
- - circonscrite *S06.31*
- - diffuse *S06.21*
- cervelet *S06.22*
- - *S06.8*
- - circonscrite *S06.32*
- chez le nouveau-né *P54.5*
- circonscrite, avec compression, cerveau *S06.30*
- clitoris *S30.2*
- coccyx *S30.0*
- coeur *S26.81*
- coin de l'oeil *S00.1*
- colonne vertébrale, thorax *S20.2*
- conjonctivite *S05.0*
- - avec corps étranger, sac conjonctival *T15.1*
- corde vocale *S10.0*
- cornée *S05.1*
- - due à un corps étranger *T15.0*
- corps caverneux *S30.2*
- cortex *S06.31*
- cortex cérébral *S06.31*
- - circonscrite *S06.31*
- - diffuse *S06.21*
- côtes *S20.2*
- cou *S10.95*
- - séquelles *T91.0*
- coude *S50.0*
- crane *S00.95*
- cuir chevelu *S00.05*
- - lésion congénitale *P12.3*
- - par des lésions lors de la naissance *P12.3*
- déchirure *T14.1*
- doigts *S60.0*
- - avec lésion, ongle *S60.1*
- dos *T09.05*
- épaule *S40.0*
- épididyme *S30.2*
- extrémité
- - inférieure *T13.05*
- - - séquelles *T93.8*
- - supérieure *T11.05*
- - - séquelles *T92.8*
- fémur, supérieur *S70.1*
- fesses *S30.0*
- flanc *S30.1*
- foie *S36.11*
- fosse supra-claviculaire *S10.85*
- front *S00.85*
- genou *S80.0*
- glandes lacrymales *S05.8*

Contusion *–suite*

- globe
- - avec contusion du tissu orbitaire *S05.1*
- - oeil *S05.1*
- globe oculaire *S05.1*
- - avec glaucome *H40.3*
- gorge *S10.0*
- hanches *S70.0*
- huméral *S40.0*
- illion *S30.1*
- intracrânienne *S06.8*
- iris *S05.1*
- jambe *T13.05*
- larynx *S10.0*
- lentille *S05.1*
- lèvre
- - grandes lèvres *S30.2*
- - petites lèvres *S30.2*
- main *S60.2*
- malléole *S90.0*
- mammaire *S20.0*
- membre inférieur *S80.1*
- - multiple *S80.7*
- méninges *S06.8*
- moelle épinière, lombaire, avec oedème *S34.0*
- multiple *T00.9*
- - cheviille et pied *S90.7*
- - épaule et bras *S40.7*
- multiples *T00.9*
- muscle *T14.6*
- muscle quadriceps, fémur *S70.1*
- nez *S00.35*
- oeil NCA *S05.8*
- oesophage
- - partie cervicale *S10.0*
- - thoracique *S27.83*
- ongle, doigt *S60.1*
- ongle, orteil *S90.2*
- orbite *S05.1*
- - tissu conjonctif *S05.1*
- orbite, tissu, avec contusion, bulbus *S05.1*
- organes génitaux, externes *S30.2*
- orteils *S90.1*
- - avec lésion, ongle *S90.2*
- os NCA *T14.05*
- osseuse *T14.20*
- paroi abdominale *S30.1*
- paroi abdominale, avec hématome, musculaire *S30.1*
- paupière *S00.1*
- peau NCA *T14.05*
- pénis *S30.2*
- périnée *S30.2*
- petit orteil *S90.1*
- pharynx *S10.0*
- pied *S90.3*
- pouce *S60.0*
- - avec lésion, ongle *S60.1*
- poumon *S27.31*
- prépuce *S30.2*
- rachidienne *T09.3*
- rachis *T09.05*
- - cervical *S14.0*
- - cône médullaire *S34.38*
- - lombaire *S34.0*
- - queue de cheval *S34.38*
- - région lombaire *S30.0*

Contusion *–suite*

- rachis *–suite*
- - thoracique *S24.0*
- - tronc *T09.05*
- région
- - costale *S20.2*
- - épigastrique *S30.1*
- - iliaque *S30.1*
- - inguinale *S30.1*
- - interscapulaire *S20.2*
- - lombaire *S30.0*
- - multiples, séquelles *T94.0*
- - occipitale *S00.05*
- - pariétale *S00.05*
- - pelvienne *S30.0*
- - péri-oculaire *S00.1*
- - pubienne *S30.1*
- - sacrée *S30.0*
- - sacro-lombaire *S30.0*
- - scapulaire *S40.0*
- - - multiple *S40.7*
- - sternale *S20.2*
- reins *S30.1*
- - *S37.01*
- rétinienne avec oedème de Berlin *S05.1*
- sac lacrymal *S05.8*
- saignement, cérébral *S06.8*
- sans lésion cutanée *T14.05*
- sclérotique *S05.1*
- scrotum *S30.2*
- séquelles *T94.1*
- Sourcil *S00.1*
- sous périostale NCA *T14.05*
- sous-conjonctivale *S05.0*
- sous-cutané NCA *T14.05*
- sternum *S20.2*
- supra-orbitaire *S00.85*
- talon *S90.3*
- tarse, supérieur *S90.0*
- tempe *S00.85*
- testicules *S30.2*
- tête *S00.95*
- - séquelles *T90.0*
- thoracique *S20.2*
- thorax *S20.2*
- tissus de l'orbite *S05.1*
- trachée *S10.0*
- - partie
- - - cervicale *S10.0*
- - - thoracique *S27.5*
- tronc *T09.05*
- - séquelles *T91.0*
- tunique vaginale *S30.2*
- vaginale *S37.88*
- vessie *S37.21*
- visage *S00.85*
- - séquelles *T90.0*
- vulve *S30.2*

Convalescence *Z54.9!*

- retardée *Z54.9!*
- suite à
- - Chimiothérapie *Z54.2!*
- - intervention chirurgicale NCA *Z54.0!*
- - psychothérapie *Z54.3!*
- - radiothérapie *Z54.1!*
- - Traitement *Z54.9!*
- - traitement d'une fracture *Z54.4!*

Convergence, excès *H51.1*

Convergence, excès *–suite*

- cas de
- - esotropie *H50.0*
- - exotropie *H50.1*
- non accomodante *H50.0*

Convergence, excessive, avec esophorie *H51.1*

Convergence, insuffisance *H51.1*

- oeil *H51.1*

Convergence, paralysie *H51.1*

Convergence, trouble *H51.1*

- supranucléaire *H51.1*

Conversion, trouble *F44.9*

- avec
- - hystérie *F44.9*
- - névrose *F44.9*
- mixte *F44.7*
- réactive *F44.9*

Convexe

- scoliose *M41.99*
- - région cervicale *M41.92*
- - région dorsale *M41.94*
- - - et région dorso-lombaire *M41.95*
- - - - sans relief *M41.95*
- - - sans relief *M41.94*
- - région lombaire *M41.96*
- - - sans relief *M41.96*
- - thoracique *M41.94*

Convexe gauche

- cyphoscoliose *M41.99*
- scoliose *M41.99*
- - colonne dorsale *M41.94*
- - - et colonne vertébrale *M41.95*
- - - - plate *M41.95*
- - - plate *M41.94*
- - colonne vertébrale *M41.96*
- - - plate *M41.96*
- - colonne vertébrale cervicale *M41.92*

Convulsif-idiopathique, statut *G41.0*

Convulsions *R56.8*

- abdomen *R10.4*
- accomodation *H52.5*
- affect *R56.8*
- - respiratoire *R06.88*
- apoplectiforme, en cas d'ischémie, cérébrale *I67.88*
- artère coronaire *I20.1*
- avec psychose *F06.8*
- bégnines, congénitales *G40.3*
- cardia *K22.0*
- cas de
- - éclampsie *O15.9*
- - épilepsie, généralisée *G40.3*
- - fièvre *R56.0*
- - grossesse *O15.0*
- - tétanos *A35*
- cérébrale *R56.8*
- chez le
- - nageur *T75.1*
- - nouveau-né *P90*
- chez les nouveaux nés *P90*
- due à
- - chaleur *T67.2*
- - perte, sel *E87.1*
- éclair *G40.4*
- - spastique *G40.4*
- écrivains *F48.8*

Convulsions –*suite*
- écrivains –*suite*

- - organique *G25.8*
- épileptiforme *R56.8*
- épileptique *G40.9*
- épileptiques *G40.9*
- estomac *R10.4*
- fibules *R56.0*
- généralisée *R56.8*
- glotte *J38.5*
- hystériques *F44.5*
- idiopathiques *R56.8*
- infantiles *R56.8*
- intestin *R10.4*
- - psychogène *F45.32*
- Jackson, de *G40.1*
- jambe *R25.2*
- larmes *F48.8*
- membres
- - inférieurs NCA *R25.2*
- - supérieurs NCA *R25.2*
- mollet *R25.2*
- - nocturne *R25.2*
- muscle *R25.2*
- - psychogène *F45.8*
- muscle masticateur *R25.2*
- myocloniques *G40.3*
- néonatales bénignes *G40.3*
- Nick *G40.4*
- - non épileptique *R25.8*
- nouveau-né, bénigne *G40.3*
- - familiale *G40.3*
- occupation, main *F48.8*
- oesophage *K22.4*
- parétiques, en cas de syphilis *A52.1*
- paupière *G24.5*
- psychomotrices *G40.2*
- pylore *K31.3*
- réflexe *R25.8*
- réflexes *R25.8*
- région mésogastrique *R10.4*
- respiratoires *R06.88*
- Salaam *G40.4*
- - non épileptique *R25.8*
- sevrage, alcool *F10.3*
- sphincter, anus *K59.4*
- tétanie *R29.0*
- urémique *N19*
- uriques *N19*
- utérus *N94.8*
- - induit par les menstruations *N94.6*
- vasculaire, périphérique *I73.9*
- vessie *R30.1*
- visage *R25.2*
- vision *H51.8*

Convulsive
- épilepsie majeur *G40.3*
- équivalent, abdominal *G40.8*

Cooley, anémie de *D56.1*

Cooper, maladie de *N60.1*

Coordination
- moteur, trouble, développement *F82.9*
- troubles *R27.8*
- - centrale *R27.8*
- - dûs au développement *F82.9*
- - labyrinthe *H83.2*
- - muscle oculaire NCA *H50.9*

Coordination –*suite*
- troubles –*suite*

- - posture corporelle *R29.3*

Coprolagnie *F65.8*

Coprolithe *K56.4*
- appendice *K38.1*
- étranglé *K56.4*

Coproporphyrie, héréditaire *E80.2*

Coprostase *K56.4*
- appendice *K38.1*

Coqueluche *A37.9*
- avec pneumonie *A37.9+, J17.0**
- dépistage *Z11*
- due à
- - bordetella
- - - parapertussis *A37.1*
- - - pertussis *A37.0*
- incubation *Z20.8*
- provoquée par
- - Bordetella
- - - bronchoseptica *A37.8*
- - - parapertussis *A37.1*
- - - pertussis *A37.0*
- vaccin [Pa] [aP] *Z23.7*
- vaccination [Pa] [aP] *Z23.7*

Coqueluchoïde, bronchite *J20.9*

Coquillages et crustacés
- avariés, intoxication *T61.2*
- contact avec effet toxique *T63.6*
- empoisonnement, bactérien *A05.9*
- ichtyosisme NCA *T61.2*
- morsure, avec empoisonnement *T63.6*

Cor *L84*

Cordage tendineux
- anomalie *Q24.8*
- déchirure NCA *I51.1*
- déchirure, comme complication d'un infarctus aigu du myocarde *I23.4*
- rupture NCA *I51.1*
- rupture, comme complication d'un infarctus aigu du myocarde *I23.4*

Corde
- tympan, lésion *G51.8*
- verge [chordée], congénitale *Q54.4*
- vocal Phlegmon des *J38.3*

Corde vocale
- abcès *J38.3*
- accessoire *Q31.8*
- carcinome *C32.0*
- cicatrice *J38.3*
- contusion *S10.0*
- fixation *J38.3*
- granulome *J38.3*
- hématome *S10.0*
- hyperkératose *J38.3*
- hypertrophie *J38.3*
- incoordination névrotique *F45.33*
- inflammation *J38.2*
- kératose *J38.3*
- kyste *J38.3*
- léiomyome *D14.1*
- Leucokératose *J38.3*
- leucoplasie *J38.3*
- maladie *J38.3*
- myome *D14.1*
- œdème *J38.4*

Corde vocale –*suite*

- oedèmes de Reinke *J38.4*
- papillome *D14.1*
- parakératose *J38.3*
- paralysie *J38.00*
- - complète, unilatérale *J38.02*
- - partielle
- - - deux côtés *J38.03*
- - - unilatérale *J38.01*
- parésie *J38.00*
- plaie superficielle *S10.10*
- polype *J38.1*
- tubercule *J38.2*
- varices *I86.8*

Cordite *J38.2*
- fibrineuse *J38.2*
- nodulaire *J38.2*
- tubéreuse *J38.2*

Cordon cicatriciel, vagin *N89.8*

Cordon ombilical
- anomalie, comme complication, accouchement *O69.9*
- anomalie, lors de la grossesse *O69.9*
- changement
- - avec lésion, foetus *P02.6*
- - complication, accouchement *O69.9*
- compression
- - avec lésion, foetus *P02.5*
- - complication, accouchement *O69.2*
- - par enroulement, cordon ombilical, cou *O69.1*
- comprimant la gorge, avec lésion du foetus/nouveau-né *P02.5*
- court *O69.3*
- - avec lésion, foetus/nouveau-né *P02.6*
- court, complication, accouchement *O69.3*
- déchirure, avec lésion, foetus/nouveau-né *P50.1*
- écrasement *O69.5*
- - avec lésion, foetus/nouveau-né *P02.6*
- - comme complication, accouchement *O69.5*
- enchevêtrement, avec lésion, foetus *P02.5*
- enroulement
- - avec lésion, foetus *P02.5*
- - complication, accouchement *O69.2*
- étranglement, avec lésion, foetus *P02.5*
- hématome *O69.5*
- - comme complication, accouchement *O69.5*
- hernie *Q79.2*
- insertion vélamenteuse, complication, accouchement *O69.8*
- lésion, vaisseau sanguin, comme complication, accouchement *O69.5*
- ligature inadéquate *P51.8*
- - avec hémorragie *P51.8*
- ligature, déplacement *P51.8*
- malformation, complication, accouchement NCA *O69.8*
- nécrose, avec lésion, foetus *P02.6*
- noeud
- - avec lésion, foetus *P02.5*
- - chez des jumeaux, monoamniotique *O69.2*
- - complication, accouchement *O69.2*
- - VRAI *O69.2*
- phlegmon *P38*

Cordon ombilical –*suite*

- prolapsus
- - chez le foetus *P02.4*
- - complication, accouchement *O69.0*
- prolapsus, avec accouchement par césarienne *O69.0*
- rompu, avec perte de sang, foetale *P50.1*
- rupture, complication, accouchement *O69.8*
- saignement, comme complication, accouchement *O69.5*
- septicémie, du nouveau-né *P36.9*
- serré autours du cou, avec atteinte, foetus/nouveau-né *P02.5*
- thrombose
- - complication de l'accouchement, avec lésion, foetus/nouveau-né *P02.6*
- - complication, accouchement *O69.5*
- torsion
- - avec lésion, foetus *P02.5*
- - complication, accouchement *O69.8*
- torsion, avec lésion, foetus *P02.5*
- trop court, avec lésion, foetus/nouveau -né *P02.6*
- varices, avec lésion, foetus *P02.6*

Cordon postérieur
- dégénérescence *G95.88*
- sclérose *A52.1*
- - tabétique *A52.1*
- syphilis, sclérosante *A52.1*

Cordon spermatique
- abcès *N49.1*
- absence *Q55.4*
- - congénitale *Q55.4*
- adhérence
- - acquise *N50.8*
- - congénitale *Q55.4*
- agénésie *Q55.4*
- anomalie *Q55.4*
- aplasie *Q55.4*
- atrophie *N50.8*
- douleurs *N50.8*
- fibrose *N50.8*
- furoncle *N49.1*
- hématome, non traumatique *N50.1*
- hydrocèle *N43.3*
- hydrops *N43.3*
- hypertrophie *N50.8*
- inflammation *N49.1*
- kyste *N50.8*
- lipome *D17.6*
- malformation
- - acquise *N50.8*
- - congénitale *Q55.4*
- manque, congénital *Q55.4*
- névralgie *G58.8*
- oedème *N50.8*
- phlegmon *N49.1*
- phlegmone *N49.1*
- saignement *N50.1*
- sclérose *N50.8*
- scrotal
- - lésion *S39.9*
- - plaie ouverte *S31.3*
- sectionné *Z30.2*
- stricture *N50.8*
- torsion *N44.0*
- tuberculose *A18.1+, N51.8**

Cordon spermatique –*suite*

- tumeur *D40.7*
- ulcère *N50.8*
- ulcus *N50.8*
- varicocèle, ulcéreuse *I86.1*

Cori, maladie de *E74.0*

Corne
- antérieure, dégénérescence progressive *G12.2*
- cutanée *L85.8*
- - paupière *L85.8*

Corne antérieure du ménisque interne, lé *M23.31*

Corne antérieure, syndrome *S24.12*

Corne cutanée *L85.8*

Corne postérieure du ménisque interne
- déchirure *S83.2*
- déchirure transversale *S83.2*
- lésion *M23.32*

Corne postérieure, syndrome de la *S24.12*

Cornea - *voir* Cornée
- guttata *H18.5*
- - dégénérative *H18.4*
- plana *Q13.4*
- verticillata *H18.5*

Cornée
- abcès *H16.3*
- adhérence *H17.9*
- amylose primitive héréditaire *E85.4*
- anesthésie *H18.8*
- anneau de sidérose *H18.0, T90.4*
- anomalie, forme *Q13.4*
- Arc sénile *H18.4*
- brûlures *T26.1*
- callosité *L84*
- Chalcose *H18.0*
- chéloïde *H17.8*
- cicatrice *H17.9*
- - cas d'avitaminose A *E50.6+, H19.8**
- - tuberculeuse *A18.5+, H19.8**
- - xérophtalmique en cas d'avitaminose A *E50.6+, H19.8**
- Cicatrice d'ulcération cornéenne, facette *H18.4*
- cicatriciel *H17.9*
- - tuberculeuse *A18.5+, H19.8**
- - xérophtalmiques *H17.8*
- - - cas d'avitaminose A *E50.6+, H19.8**
- cisaillement *H18.4*
- conique *H18.6*
- contour irrégulier *H18.7*
- contusion *S05.1*
- - par un corps étranger *T15.0*
- corps étranger *T15.0*
- - perforant *S05.5*
- - profond, sans perforation *T15.0*
- - superficiel
- - - avec présence de rouille *T15.0*
- - - sans présence de rouille *T15.0*
- corrosion *T26.6*
- décompensation, avec kératopathie bulleuse *H18.1*
- déformation *H18.7*
- dégénérescence *H18.4*
- - crocodile-chagrin *H18.4*
- - héréditaire *H18.5*
- - hyaline *H18.4*

Cornée –*suite*
- dégénérescence –*suite*
- - Salzmann, de *H18.4*
- - séniles *H18.4*
- - sphéroïde *H18.4*
- - striée *H18.4*
- dégénérescence primaire héréditaire *H18.4*
- déhiscence de suture *T81.3*
- Dépôt *H18.0*
- dépôts, avec pigmentation cornéenne *H18.0*
- difformité
- - acquise *H18.7*
- - congénitale *Q13.4*
- donneur *Z52.5*
- dystrophie
- - avec kératopathie bulleuse *H18.1*
- - carte géographique et empreintes digitales *H18.5*
- - Cogan, de, microkystique *H18.5*
- - cristalline centrale *H18.5*
- - cristalline marginale *H18.5*
- - endothéliale *H18.5*
- - Fuchs, de *H18.5*
- - gélatineuse en goutte *H18.5*
- - granuleuse *H18.5*
- - grillagée *H18.5*
- - héréditaire *H18.5*
- - maculaire *H18.5*
- - Meesmann, de, juvénile *H18.5*
- - membrane antérieure *H18.5*
- - mouchetée *H18.5*
- - pré-Descemet *H18.5*
- - sous-épithéliale *H18.5*
- - Thiel-Benhke, de *H18.5*
- dystrophie, de Thiel-Behnke *H18.5*
- ectasie *H18.7*
- épithélium, dystrophie *H18.5*
- érosion *H16.0*
- - non-traumatique *H16.0*
- - récidivante *H18.8*
- - récurrente (récidivante) *H18.8*
- - traumatique *S05.0*
- gangréneuse *H18.8*
- Gérontoxon *H18.4*
- globuleuse *H18.7*
- - congénitale *Q15.8*
- - congénitale, avec glaucome *Q15.0*
- greffe *Z94.7*
- - adhérence, iris, post-infectieuse NCA *T85.88*
- - avec
- - - complications *T85.9*
- - - - mécaniques *T85.3*
- - - douleurs NCA *T85.88*
- - - embolie NCA *T85.88*
- - - hémorragie NCA *T85.81*
- - - sténose NCA *T85.88*
- - - thrombose NCA *T85.88*
- - décompensation *T86.83*
- - défaillance NCA *T85.3*
- - déplacement NCA *T85.3*
- - fissure NCA *T85.3*
- - malposition NCA *T85.3*
- - rejet
- - - aigu *T86.83*
- - - chronique *T86.83*
- - troubles *T86.83*

Cornée –*suite*
- herpès *B00.5+, H19.1**
- Hudson-Stähli, ligne de *H18.0*
- hypesthésie *H18.8*
- hypoesthésie *H18.8*
- incrustation par un corps étranger *T15.0*
- infiltration *H18.2*
- infiltration immunogène *H18.2*
- - provoquée par
- - - blépharoconjonctivite à staphylocoques *H16.2*
- - - staphylocoques *H16.2*
- inflammation *H16.9*
- - chronique *H16.8*
- inflammatoire *H16.9*
- kératite ponctuée *H16.1*
- kyste *H18.8*
- Lésion *S05.8*
- - par abrasion *S05.0*
- - superficielle *S05.0*
- - - avec corps étranger *T15.0*
- lésion traumatique
- - lamellaire *S05.0*
- - lors de la naissance *P15.3*
- - profonde *S05.0*
- Lésion traumatique, et traumatisme, conjonctive *S05.0*
- ligne de Hudson Stähli *H18.0*
- Ligne pigmentée de Stähli *H18.0*
- Maladie *H18.9*
- malformation *H18.7*
- - *Q13.4*
- - congénitale *Q13.4*
- malformation congénitale *Q13.4*
- mégalo- *Q15.8*
- - avec glaucome *Q15.0*
- mélanose
- - congénitale *Q13.4*
- - prénatale *Q13.4*
- - présénile *H18.0*
- - sénile *H18.0*
- nébuleuse *H17.8*
- nécrose *H18.4*
- néovascularisation *H16.4*
- - due à lentilles de contact souples *H16.4*
- - stromale *H16.4*
- - totale *H16.4*
- oblitération vasculaire *H16.4*
- oedème *H18.2*
- oedème épithélial *H18.2*
- oedème NCA *H18.2*
- oeil
- - affection *H18.9*
- - Bowen, maladie de *D09.2*
- - brûlure *T26.1*
- - corrosion *T26.6*
- - - provoquée par
- - - - acide *T26.6*
- - - - base *T26.6*
- - dégénérescence *H18.4*
- - dépôt *H18.0*
- - fossette *H18.7*
- - infiltration *H18.2*
- - maladie *H18.9*
- - mosaïque, dystrophie de Vogt *H18.4*
- - plaie pénétrante *S05.6*
- - ramollissement *H18.4*

Cornée –*suite*
- oeil –*suite*
- - remaniement *H18.9*
- - tuberculose *A18.5+, H19.2**
- - ulcération *H16.0*
- opacité *H17.9*
- - centrale NCA *H17.1*
- - congénitale *Q13.3*
- - dégénérative *H18.4*
- - héréditaire *H18.5*
- - périphérique *H17.8*
- - totale *H17.8*
- Pannus *H16.4*
- perforation
- - avec prolapsus de l'iris *S05.2*
- - par un ulcère *H16.0*
- - sans prolapsus de l'iris *S05.3*
- Perforation, par ulcération *H16.0*
- phlyctène, formation *H16.2*
- pigmentation *H18.0*
- pigmentation, due à un dépôt cornéen *H18.0*
- plaie, ouverte *S05.8*
- plaies par éclats *T15.0*
- protrusion
- - à perforation de la sclérotique *S05.2*
- - cas de désunion de plaie opératoire *T81.3*
- remaniement de la membrane *H18.3*
- rupture, sans prolapsus de l'iris *S05.3*
- sclérose *H17.8*
- staphylome *H18.7*
- - congénital *Q13.3*
- stroma, dystrophie *H18.5*
- syphilis *A52.7+, H19.2**
- syphillis tardive *A52.7+, H19.2**
- taches de sang *H18.0*
- Terrien, dégénérescence de *H18.4*
- tuberculose *A18.5+, H19.2**
- tumeur
- - bénigne *D31.1*
- - évolution inconnue *D48.7*
- - maligne *C69.1*
- ulcération
- - avec xérosis cornéen, en cas d'avitaminose A *E50.3+, H19.8**
- - marginale *H16.0*
- ulcère annulaire rhumatoïde *H16.0*
- Ulcère de Sämisch *H16.0*
- ulcère, avec xérosis cornéen, en cas d'avitaminose A *E50.3+, H19.8**
- ulcère, tuberculeux *A18.5+, H19.2**
- vaisseaux fantômes *H16.4*
- xérosis
- - avec ulcération cornéenne, en cas d'avitaminose A *E50.3+, H19.8**
- - cas d'avitaminose A *E50.2+, H19.8**

Cornelia de Lange I, syndrome de *Q87.1*

Cornelia de Lange II, syndrome de *Q87.1*

Cornet nasal
- atrophie *J34.8*
- dégénérescence *J34.8*
- déviation *J34.2*
- et septum, adhérence *J34.8*
- gonflement *J34.3*
- hyperplasie *J34.3*
- hypertrophie *J34.3*
- kyste *J34.1*

Cornet nasal –*suite*
- mucocèle *J34.1*
- occlusion *J34.8*
- polype *J33.8*
- pyocèle *J32.9*
- sarcome *C41.02*
- ulcère *J34.8*

Coronaire
- Affection *I25.19*
- - vasculaire *I25.9*
- Affection cardiaque *I25.9*
- - aiguë *I24.9*
- - avec
- - - anévrisme, ventricule *I25.3*
- - - fonction, ventriculaire gauche, restreinte *I25.9*
- - chronique *I25.9*
- Affection coronarienne aiguë *I24.9*
- anévrysme
- - rompue *I21.9*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- artérite *I25.8*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- athéromatose *I25.19*
- athérosclérose *I25.19*
- attaque cérébrale *I21.9*
- Atteinte pluri vasculaire *I25.19*
- Atteinte plurivasculaire *I25.14*
- Caillot *I21.9*
- fistule *I25.4*
- - artérioveineux, acquise *I25.4*
- infarctus *I21.9*
- insuffisance *I24.8*
- - aiguë *I24.8*
- - cardiaque *I24.8*
- - chronique *I25.8*
- ischémie *I25.9*
- Ischémie ou diminution de la vascularisation artérielle *I24.8*
- Maladie bi ou tritronculaire *I25.13*
- Maladie bitronculaire *I25.12*
- maladie monotronculaire *I25.11*
- maladie tritronculaire *I25.13*
- troubles vasculaires *I25.9*

Coronaire, tronc
- athéro-sclérose *I25.19*
- sclérose *I25.19*

Coronaires, artères, athéro-sclérose *I25.19*

coronarien flux lent Coronary slow flow syndrome) , Syndrome *I20.8*

Coronarite *I25.8*

Coronaropathie monotronculaire *I25.11*

Coronary slow flow syndrome Syndrome coronarien à flux lent (*I20.8*

Coronavirus
- agent pathogène *B97.2!*
- infection NCA *B34.2*

Corporel, -elle
- abus *T74.1*
- dégradation *R68.8*
- - généralisée *R53*
- fatigue *R53*
- manque de mouvement *Z72.8*
- mauvais traitement dû à
- - amis *T74.1*
- - conjoint *T74.1*
- - connaissances *T74.1*

Corporel, -elle –*suite*
- mauvais traitement dû à –*suite*
- - Parents *T74.1*
- - partenaire *T74.1*
- processus d'évacuation *R53*
- psychose *F09*
- retard *R62.8*
- - à la malnutrition *E45*
- - chez l'enfant *R62.8*
- retard du développement
- - à la malnutrition chez l'enfant *E45*
- - fœtus *P05.9*
- troubles du comportement *F59*
- troubles fonctionnels psychogènes *F59*
- violence *R45.6*

Corps
- albicans, kyste *N83.2*
- amylacés, prostate *N42.8*
- calleux
- - abcès *G06.0*
- - agénésie *Q04.0*
- - aplasie *Q04.0*
- - démyélinisation centrale *G37.1*
- - encéphalopathie démyélinisante *G37.1*
- - gliome *C71.0*
- - hypoplasie *Q04.0*
- - malformation congénitale *Q04.0*
- caverneux
- - abcès *N48.2*
- - affection *N48.9*
- - anthrax *N48.2*
- - atrophie *N48.8*
- - calcification *N48.8*
- - contusion *S30.2*
- - fibrosclérose *N48.6*
- - furoncle *N48.2*
- - gangrène *N48.2*
- - - non infectieuse *N48.8*
- - hématome non traumatique *N48.8*
- - hypertrophie *N48.8*
- - inflammation *N48.2*
- - pénis
- - - induration *N48.6*
- - - ulcère chronique *N48.5*
- - phlegmon *N48.2*
- - sclérose
- - - chez la femme *N90.8*
- - - chez l'homme *N48.6*
- - thrombose *N48.8*
- - ulcère chronique *N48.5*
- caverneux du pénis, tunique albuginée, lésion *S39.80*
- cilaire, vaisseau
- - affection, NCA *H21.1*
- - maladie NCA *H21.1*
- - néoformation *H21.1*
- ciliaire
- - abcès *H20.8*
- - adhérence NCA *H21.5*
- - affection, NCA *H21.9*
- - atrophie *H21.2*
- - corps étranger *S05.5*
- - - intraoculaire, ancien
- - - - amagnétique *H44.7*
- - - - magnétique *H44.6*
- - déchirure *H21.5*
- - - *S05.3*

Corps –*suite*
- ciliaire –*suite*
- - dégénérescence *H21.2*
- - et iris, affection *H21.9*
- - gumma *A52.7+, H22.8**
- - hémorragie *H21.0*
- - hernie, traumatique *S05.2*
- - inflammatoire *H20.9*
- - kyste *H21.3*
- - - exsudatif *H21.3*
- - - parasitaire *H21.3*
- - kyste, dû à implant *H21.3*
- - lésion *S05.8*
- - maladie *H21.9*
- - mélanocytome *D31.4*
- - mélanome, malin *C69.4*
- - néovascularisation *H21.1*
- - prolapsus, traumatique *S05.2*
- - rupture NCA *H21.5*
- - syphilis secondaire *A51.4+, H22.0**
- - syphillis tertiaire *A52.7+, H22.0**
- - tuberculose *A18.5+, H22.0**
- - tumeur maligne *C69.4*
- ciliaire, corps étranger retenu *H44.7*
- dermatomycose *B35.4*
- dermatophytose *B35.4*
- d'inclusion
- - conjonctivite *A74.0+, H13.1**
- - encéphalite *A81.1*
- - maladie *B25.9*
- - - cytomégalovirus *B25.9*
- - - glandes salivaires *B25.9*
- - - glandes salivaires, canal *B25.9*
- érectile
- - fibrose *N48.8*
- - inflammation *N48.2*
- étranger
- - ancien, suite à une plaie pénétrante de l'orbite *H05.5*
- - antre de Highmore *T17.0*
- - anus *T18.5*
- - appendice *T18.4*
- - asphyxie *T17.9*
- - - chez le nouveau-né *P24.3*
- - aspiration *T17.9*
- - bronche, asphyxie *T17.5*
- - bronches principales *T17.5*
- - bronchioles *T17.8*
- - - asphyxie *T17.8*
- - caecum *T18.4*
- - canal lacrymal *T15.8*
- - cavité buccale *T18.0*
- - chambre antérieure (oeil) *S05.5*
- - coin de l'oeil *T15.1*
- - col de l'utérus *T19.3*
- - côlon *T18.4*
- - conduit auditif *T16*
- - conjonctival
- - - profond *T15.1*
- - - sous tarsal *T15.1*
- - - superficiel *T15.1*
- - cornée *T15.0*
- - - perforée *S05.5*
- - - profonde, sans perforation *T15.0*
- - - superficielle
- - - - avec présence de rouille *T15.0*
- - - - sans présence de rouille *T15.0*
- - corps ciliaire *S05.5*

Corps –*suite*
- étranger –*suite*
- - corps vitré
- - - non magnétique, rétention *H44.7*
- - - sans décollement de la rétine *S05.5*
- - crête alvéolaire *T18.0*
- - dans la plaie opératoire, granulome *T81.5*
- - duodénum *T18.3*
- - estomac *T18.2*
- - étouffement *T17.9*
- - gencive *T18.0*
- - glande lacrymale *T15.8*
- - globe oculaire *T15.8*
- - - avec plaie, pénétrante *S05.5*
- - hypopharynx *T17.2*
- - iléon *T18.3*
- - ingestion, chez l'enfant *T18.9*
- - inhalation *T17.9*
- - inspiration *T17.9*
- - intestin *T18.3*
- - intestin grêle *T18.3*
- - intra-oculaire *S05.5*
- - - magnétique *S05.5*
- - - non magnétique *S05.5*
- - iris *S05.5*
- - - non magnétique, rétention *H44.7*
- - langue *T18.0*
- - larynx *T17.3*
- - - asphyxie *T17.3*
- - lentille *S05.5*
- - - chambre antérieure (oeil) *S05.5*
- - - non magnétique, rétention *H44.7*
- - magnétique, intra-oculaire, ancien
- - - chambre antérieure (oeil) *H44.6*
- - - corps ciliaire *H44.6*
- - - corps vitré *H44.6*
- - - globe oculaire *H44.6*
- - - iris *H44.6*
- - - lentille *H44.6*
- - - paroi postérieure du globe oculaire *H44.6*
- - muscle oculaire *S05.4*
- - narine *T17.1*
- - nez *T17.1*
- - - asphyxie *T17.1*
- - non magnétique, ancien, intraoculaire
- - - chambre antérieure de l'oeil *H44.7*
- - - corps ciliaire *H44.7*
- - - corps vitré *H44.7*
- - - iris *H44.7*
- - - lentille *H44.7*
- - - paroi postérieure du bulbe *H44.7*
- - non magnétique, métallique, rétention, avec hétérochromie *H44.7*
- - œil *T15.9*
- - - externe NCA *T15.9*
- - œsophage *T18.1*
- - ongle *S60.84*
- - orbite *S05.4*
- - oreille *T16*
- - organes digestifs NCA *T18.9*
- - palais *T18.0*
- - par erreur
- - - laissé dans la cavité du corps, avec
- - - - obstruction *T81.5*
- - - - perforation *T81.5*
- - - laissé dans la plaie opératoire *T81.5*
- - - laissé dans une plaie opératoire, avec

Corps *–suite*
- étranger *–suite*
- - par erreur *–suite*
- - - laissé dans une plaie opératoire, avec *–suite*
- - - - adhésion *T81.5*
- - - - - post-opératoire, *T81.5*
- - - - obstruction *T81.5*
- - - - perforation *T81.5*
- - paupière *H02.8*
- - - *T15.8*
- - - ancien *H02.8*
- - pavillon de l'oreille *T16*
- - peau *T14.04*
- - - et tissu sous cutané *T14.04*
- - pénétrant
- - - cas d'entaille *T14.1*
- - - plaie, ouverte *T14.1*
- - pharynx *T17.2*
- - point lacrymal *T15.8*
- - poumon *T17.8*
- - - asphyxie *T17.8*
- - recto-sigmoïde *T18.5*
- - rectum *T18.5*
- - résiduel, granulome, os *M86.89*
- - rétention
- - - chambre de l'oeil, antérieure *H44.7*
- - - corps ciliaire *H44.7*
- - - globe oculaire *H44.7*
- - - muscle *M79.59*
- - - muscle oculaire, ancien *H05.5*
- - - orbite, ancien *H05.5*
- - - paroi postérieure du globe oculaire *H44.7*
- - - tissu mou *M79.59*
- - rétention, paupière *H02.8*
- - rétine *S05.5*
- - rétrobulbaire *H05.5*
- - - rétention *H05.5*
- - - suite à lésion, perforante *H05.5*
- - rhinopharynx *T17.2*
- - rhinopharynx, asphyxie *T17.2*
- - sac conjonctival *T15.1*
- - - avec contusion, conjonctive *T15.1*
- - sclère *T15.1*
- - sinus frontal *T17.0*
- - sinus maxillaire *T17.0*
- - sinus paranasal *T17.0*
- - - asphyxie *T17.0*
- - sinus piriforme *T17.2*
- - suite à
- - - lésion
- - - - conjonctive, superficielle *T15.1*
- - - - cornée, superficielle *T15.0*
- - - plaie
- - - - orbite, pénétrante *S05.4*
- - - - pénétrante du globe oculaire *S05.5*
- - superficiel, sans plaie ouverte *T14.04*
- - surfragmentation, conjonctive *T15.1*
- - tissu mou *M79.59*
- - tonsillaire *T17.2*
- - trachée *T17.4*
- - - asphyxie *T17.4*
- - tractus gastro-intestinal *T18.9*
- - tractus urogénital *T19.9*
- - tube digestif *T18.9*
- - uretère *T19.8*
- - urètre *T19.0*

Corps *–suite*
- étranger *–suite*
- - utérus *T19.3*
- - vagin *T19.2*
- - verge *T19.8*
- - vessie *T19.1*
- - voie gastro-intestinale *T18.9*
- - voie lacrymale *T15.8*
- - voies respiratoires *T17.9*
- - - asphyxie *T17.9*
- - vulve *T19.2*
- étranger, granulome
- - conjonctivite *H10.4*
- - orbite *H05.1*
- - paupière *H01.8*
- - peau *L92.3*
- - tissu sous-cutané *L92.3*
- - tissus ^mou NCA *M60.29*
- étranger, sensation
- - gorge *F45.8*
- - œil *H57.1*
- fatigue *R53*
- flottants dans le vitré *H43.3*
- genouillé, affection *H47.5*
- graisseux (rotulien), hypertrophie *M79.46*
- gras dans les selles *R19.5*
- infection fongique *B35.4*
- infestation pour un champignon *B35.4*
- jaune
- - abcès *N70.9*
- - infection *N70.9*
- - insuffisance *E28.8*
- - kyste *N83.1*
- - - hémorragique *N83.1*
- - - rupture *N83.1*
- - persistance *E28.8*
- - rupture *N83.1*
- jaune, kyste *N83.1*
- - hémorragique *N83.1*
- Luys, de, hémorragie *I61.0*
- mycose *B35.4*
- omoplate, fracture *S42.11*
- para-aortiques, tumeur *D44.7*
- pinéal
- - dysfonctionnement *E34.8*
- - kyste *E34.8*
- quadrijumeaux, kyste *G93.0*
- rétine, cytoïde *H34.2*
- retrouvé *R98*
- - cause du décès inconnue *R98*
- utérus
- - adénocarcinome *C54.9*
- - adénome *D26.1*
- - fibromyome *D25.9*
- - kyste récidivant *N85.8*
- - léiomyofibrome *D25.9*
- - léiomyosarcome *C54.9*
- - néoplasie *D39.0*
- - polype *N84.0*
- - - prise en charge de la mère *O34.1*
- - sarcome *C54.9*
- - tumeur, prise en charge, femme enceinte *O34.1*
- vitré
- - affecté par *H43.9*
- - - abcès *H44.0*
- - - adhérence *H43.8*

Corps *–suite*
- vitré *–suite*
- - affecté par *–suite*
- - - anomalie *Q14.0*
- - - calcification *H43.2*
- - - complication après chirurgie de la cataracte *H59.0*
- - - corps étranger
- - - - magnétique ancien de l'oeil *H44.6*
- - - - non magnétique ancien de l'oeil *H44.7*
- - - - sans décollement de la rétine *S05.5*
- - - corps flottants *H43.3*
- - - décollement *H43.8*
- - - dépôt
- - - - cholestérol *H43.2*
- - - - cristallin *H43.2*
- - - dépôt d'oxalate de calcium *H43.2*
- - - hémorragie *H43.1*
- - - - avec trou rétinien *H43.1*
- - - - dans la syphilis tertiaire *A52.7+, H45.0**
- - - - peropératoire *H59.8*
- - - - postopératoire *H59.8*
- - - - traumatique *H43.1*
- - - hernie *H43.3*
- - - - dans la chambre antérieure de l'oeil *H43.0*
- - - hyperplasie primaire persistante *Q14.0*
- - - infiltration *H43.8*
- - - - inflammatoire *H43.8*
- - - inflammation *H43.8*
- - - kyste *H43.8*
- - - malformation
- - - - acquise *H43.8*
- - - - congénitale *Q14.0*
- - - prolapsus *H43.0*
- - - - après contusion du globe oculaire *S05.2*
- - - - cas de rupture du globe oculaire *S05.2*
- - - synchysis *H43.8*
- - - syphilis tertiaire *A52.7+, H45.8**
- - - turbidité *H43.3*
- - - - après hémorragie vitréenne *H43.3*
- - - - congénitale *Q14.0*
- - - - dans la syphilis tertiaire *A52.7+, H45.8**
- - - - due à une inflammation intraoculaire *H43.3*
- - anomalie *Q14.0*
- - atteint de condensation *H43.3*
- - atteint de fuite, chirurgie de la cataracte *H59.0*
- - atteint de lésion traumatique *S05.8*
- - atteint de liquéfaction *H43.8*
- - atteint d'opacité congénitale *Q14.0*
- - atteint d'opacité NCA *H43.3*
- - décollement *H43.8*
- - - hémorragique *H43.1*
- - dégénérescent *H43.8*
- - étoilé *H43.8*
- - hernie *S05.2*
- - - dans la chambre antérieure de l'oeil *H43.0*
- - malformation
- - - acquise *H43.8*
- - - congénitale *Q14.0*
- vitré, anomalie *Q14.0*

Corpulence *E66.99*
Corpuscule
- carotidien, tumeur *D44.6*
Corpuscules *M24.09*
- intra-articulaire *M24.09*
Corpuscules amyloïdes, prostate *N42.8*
Correspondance
- rétine, anormale, avec trouble de la vision binoculaire *H53.3*
- rétinienne, anomalie *H53.3*
Correspondants, points rétiniens, anomal *H53.3*
Corrosion *T30.4*
- 1er degré *T30.5*
- 3ème degré *T30.7*
- aisselle *T22.43*
- - 1er degré *T22.53*
- - 3ème degré *T22.73*
- - degré
- - - 2a *T22.63*
- - - 2b *T22.93*
- - second degré *T22.63*
- anus *T21.44*
- - 1er degré *T21.54*
- - 3ème degré *T21.74*
- - degré
- - - 2a *T21.64*
- - - 2b *T21.94*
- - second degré *T21.64*
- appareil lacrymal *T26.8*
- avec sténose grave du rectum *T28.2*
- bassin *T21.43*
- bouche *T28.5*
- - et gorge *T28.5*
- bras *T22.42*
- - 1er degré *T22.52*
- - 3ème degré *T22.72*
- - avec atteinte du poignet et de la main *T29.4*
- - degré
- - - 2a *T22.62*
- - - 2b *T22.92*
- - second degré *T22.62*
- bras, inférieur
- - 1er degré *T22.51*
- - 3ème degré *T22.71*
- - degré
- - - 2a *T22.61*
- - - 2b *T22.91*
- - second degré *T22.61*
- bulbus, avec rupture *T26.7*
- chimique *T30.4*
- - organes pelviens, complications, en cas d'avortement échoué *O07.8*
- col utérin *T28.8*
- colon *T28.7*
- conduit auditif *T20.4*
- conjonctive *T26.6*
- cornée *T26.6*
- cornée, yeux *T26.6*
- - due à
- - - acide *T26.6*
- - - base chimique *T26.6*
- cou *T20.4*
- - 1er degré *T20.5*
- - 3ème degré *T20.7*
- - degré
- - - 2a *T20.60*
- - - 2b *T20.61*

Corrosion *–suite*
- cou *–suite*
- - second degré *T20.60*
- - séquelles *T95.0*
- coude
- - 1er degré *T22.51*
- - 3ème degré *T22.71*
- - degré
- - - 2a *T22.61*
- - - 2b *T22.91*
- - second degré *T22.61*
- degré
- - 2a *T30.60*
- - 2b *T30.61*
- doigts *T23.4*
- dos *T21.44*
- - 1er degré *T21.54*
- - 3ème degré *T21.74*
- - degré
- - - 2a *T21.64*
- - - 2b *T21.94*
- - second degré *T21.64*
- due à
- - acide *T30.4*
- - calcaire *T30.4*
- - inhalation *T27.7*
- épaule *T22.42*
- - 1er degré *T22.52*
- - 3ème degré *T22.72*
- - degré
- - - 2a *T22.62*
- - - 2b *T22.92*
- - second degré *T22.62*
- estomac *T28.7*
- externe *T30.4*
- fémur *T24.4*
- fesses *T21.44*
- - 1er degré *T21.54*
- - 3ème degré *T21.74*
- - degré
- - - 2a *T21.64*
- - - 2b *T21.94*
- - second degré *T21.64*
- flanc *T21.43*
- - 1er degré *T21.53*
- - 3ème degré *T21.73*
- - degré
- - - 2a *T21.63*
- - - 2b *T21.93*
- - second degré *T21.63*
- genou *T24.4*
- hanches *T24.4*
- - 1er degré *T24.5*
- - 3ème degré *T24.7*
- - degré
- - - 2a *T24.60*
- - - 2b *T24.61*
- - second degré *T24.60*
- humérale *T22.42*
- - avec atteinte du poignet et de la main *T29.4*
- inguinale *T21.43*
- - 1er degré *T21.53*
- - 3ème degré *T21.73*
- - degré
- - - 2a *T21.63*
- - - 2b *T21.93*
- - second degré *T21.63*

Corrosion *–suite*
- interne *T30.4*
- intestinale *T28.7*
- jambe *T24.4*
- - 1er degré, sauf cheville et pied *T24.5*
- - 3ème degré, sauf cheville et pied *T24.7*
- - avec atteinte cheville et pied *T29.4*
- - degré
- - - 2a, sauf maléolle et pied *T24.60*
- - - 2b, sauf maléolle et pied *T24.61*
- - sauf cheville et pied *T24.4*
- - second degré, sauf cheville et pied *T24.60*
- langue *T28.5*
- larynx *T27.4*
- - avec implication des poumons *T27.5*
- - et trachée, avec implication des poumons *T27.5*
- lésion *T30.4*
- lèvres *T20.4*
- - 1er degré *T21.55*
- - 3ème degré *T21.75*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - grandes lèvres *T21.45*
- - - degré
- - - - 2a *T21.65*
- - - - 2b *T21.95*
- - petites lèvres *T21.45*
- - - degré
- - - - 2a *T21.65*
- - - - 2b *T21.95*
- - second degré *T21.65*
- main *T23.4*
- - 1er degré *T23.5*
- - 3ème degré *T23.7*
- - avec implication du bras *T29.4*
- - degré
- - - 2a *T23.60*
- - - 2b *T23.61*
- - et du poignet *T23.4*
- - second degré *T23.60*
- malléole
- - 1er degré *T25.5*
- - 3ème degré *T25.7*
- - degré
- - - 2a *T25.60*
- - - 2b *T25.61*
- - second degré *T25.60*
- malléole, région de *T25.4*
- - avec atteinte jambe *T29.4*
- mammaire *T21.41*
- - 1er degré *T21.51*
- - 3ème degré *T21.71*
- - degré
- - - 2a *T21.61*
- - - 2b *T21.91*
- - second degré *T21.61*
- membre inférieur *T24.4*
- - avec implication cheville et pied *T29.4*
- membres
- - inférieurs *T24.4*
- - - séquelles *T95.3*
- - supérieurs *T22.40*
- - - séquelles *T95.2*
- multiples *T29.4*
- nez *T20.4*

Corrosion –*suite*

- nez, paroi *T20.4*
- oeil *T26.9*
- - avec
- - - corrosion
- - - - partielle de la tête *T20.4*
- - - - partielle du cou *T20.4*
- - - - partielle du visage, autres *T20.4*
- - - rupture, et destruction, globe oculaire *T26.7*
- - due à
- - - calcaire *T26.9*
- - - mortier *T26.9*
- - séquelles *T95.8*
- Oeil et ses annexes *T26.9*
- oesophage *T28.6*
- oreille *T20.4*
- - externe *T20.4*
- organe
- - interne NCA *T28.9*
- - interne, génito-urinaire *T28.8*
- organes génito-urinaires
- - externes *T21.45*
- - internes *T28.8*
- organes pelviens, en cas d'avortement médical échoué *O07.3*
- orteils *T25.4*
- paroi thoracique *T21.42*
- - 1er degré *T21.52*
- - 3ème degré *T21.72*
- - degré
- - - 2a *T21.62*
- - - 2b *T21.92*
- - externe *T21.42*
- - interne *T28.9*
- - second degré *T21.62*
- partie du corps, multiples *T29.4*
- - 1er degré *T29.5*
- - 3ème degré *T29.7*
- - degré
- - - 2a *T29.60*
- - - 2b *T29.61*
- - second degré *T29.60*
- - séquelles *T95.8*
- partie du cou, en cas de corrosion de l'oeil *T20.4*
- partie du visage, autres, en cas de corrosion de l'oeil *T20.4*
- paupière *T26.5*
- peau NCA *T30.4*
- peau, tête, cheveu *T20.4*
- pénis *T21.45*
- - 1er degré *T21.55*
- - 3ème degré *T21.75*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - second degré *T21.65*
- périnée *T21.45*
- - 1er degré *T21.55*
- - 3ème degré *T21.75*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - second degré *T21.65*
- phalanges
- - main *T23.4*
- - pied *T25.4*
- phalanges, doigts *T23.4*

Corrosion –*suite*

- pharynx *T28.5*
- pied *T25.4*
- - 1er degré *T25.5*
- - 3ème degré *T25.7*
- - avec atteinte jambe *T29.4*
- - degré
- - - 2a *T25.60*
- - - 2b *T25.61*
- - et cheville *T25.4*
- - second degré *T25.60*
- poignet
- - 1er degré *T23.5*
- - 3ème degré *T23.7*
- - degré
- - - 2a *T23.60*
- - - 2b *T23.61*
- - second degré *T23.60*
- pouce *T23.4*
- rectum *T28.7*
- région interscapulaire *T21.44*
- - 1er degré *T21.54*
- - 3ème degré *T21.74*
- - degré
- - - 2a *T21.64*
- - - 2b *T21.94*
- - second degré *T21.64*
- région péri-oculaire *T26.5*
- région sacro-lombaire *T21.44*
- scapula, région de *T22.42*
- - 1er degré *T22.52*
- - 3ème degré *T22.72*
- - degré
- - - 2a *T22.62*
- - - 2b *T22.92*
- - second degré *T22.62*
- sclérotique *T26.8*
- scrotum *T21.45*
- - 1er degré *T21.55*
- - 3ème degré *T21.75*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - second degré *T21.65*
- second degré *T30.60*
- séquelles *T95.9*
- suite à un avortement *O08.6*
- surface du corps atteinte *T32!*
- - entre 10% et moins de 20% de la surface du corps *T32.1!*
- - entre 20% et moins de 30% de la surface du corps *T32.2!*
- - entre 30% et moins de 40% de la surface du corps *T32.3!*
- - entre 40% et moins de 50% de la surface du corps *T32.4!*
- - entre 50% et moins de 60% de la surface du corps *T32.5!*
- - entre 60% et moins de 70% de la surface du corps *T32.6!*
- - entre 70% et moins de 80% de la surface du corps *T32.7!*
- - entre 80% et moins de 90% de la surface du corps *T32.8!*
- - entre 90% ou plus de la surface du corps *T32.9!*
- - moins de 10% de la surface du corps *T32.0!*
- tempe *T20.4*
- testicules *T21.45*

Corrosion –*suite*

- testicules –*suite*

- - 1er degré *T21.55*
- - 3ème degré *T21.75*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - second degré *T21.65*
- tête *T20.4*
- - 1er degré *T20.5*
- - 3ème degré *T20.7*
- - degré
- - - 2a *T20.60*
- - - 2b *T20.61*
- - second degré *T20.60*
- - séquelles *T95.0*
- tête, partie, en cas de corrosion de l'oeil *T20.4*
- tonsille *T28.5*
- trachée *T27.4*
- - avec implication des poumons *T27.5*
- tronc *T21.40*
- - *T21.43*
- - 1er degré *T21.50*
- - - *T21.53*
- - 3ème degré *T21.70*
- - - *T21.73*
- - degré
- - -
- - - 2a *T21.60*
- - - - *T21.63*
- - - 2b *T21.90*
- - - - *T21.93*
- - second degré *T21.60*
- - - *T21.63*
- - séquelles *T95.1*
- tympan *T20.4*
- utérus *T28.8*
- vaginale *T28.8*
- - 1er degré *T21.55*
- - 3ème degré *T21.75*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - second degré *T21.65*
- visage *T20.4*
- - séquelles *T95.0*
- voies digestives NCA *T28.7*
- voies respiratoires *T27.7*
- vulve *T21.45*
- - 1er degré *T21.55*
- - 3ème degré *T21.75*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - second degré *T21.65*

Cors *L84*

Corset, orthopédique

- ajustement *Z46.7*
- soins de *Z46.7*

Cortex

- cérébral
- - anomalie *Q04.8*
- - atrophie *G31.9*
- - contusion *S06.31*
- - - circonscrite *S06.31*
- - - diffuse *S06.21*
- - hémorragie *I61.9*

Cortex –*suite*
- cérébral –*suite*
- - lacération *S06.28*
- - lésion *S06.8*
- cérébral atteint d'atrophie *G31.9*
- rénal
- - abcès *N15.10*
- - adiposité *N04.9*
- - atrophie *N26*
- - déchirure *S37.03*
- - déficience *N28.8*
- - hémorragie *N28.8*
- - infection, hématogène *N15.9*
- - infractus *N28.0*
- - lipoïdose *E75.6*
- - lipome *D17.7*
- - nécrose *N17.1*
- - - aiguë *N17.1*
- - - bilatérale *N17.1*
- - - cas d'insuffisance rénale, aigue *N17.1*
- - - mère, avec atteinte, foetus/nouveau né *P00.1*
- - papillome *D30.0*
- surrénalien
- - aberration *Q89.1*
- - adénocarcinome *C74.0*
- - apoplexie *E27.4*
- - atrophie *E27.4*
- - - primaire *E27.1*
- - calcification *E27.4*
- - cicatrice *E27.8*
- - crise *E27.2*
- - dystrophie *E27.8*
- - et hyperfonctionnement glande surrénalienne, medulla, après acte médical *E89.6*
- - hyalinose *E27.8*
- - hyperfonctionnement *E27.0*
- - - avec la puberté, prématuré *E25.9*
- - - congénital, avec la puberté, prématuré *E25.09*
- - hyperplasie *E27.8*
- - - avec
- - - - aldostéronisme, primaire *E26.0*
- - - - développement sexuel prématuré *E25.9*
- - - - précocité sexuelle, chez les garçons *E25.9*
- - - - virilité féminine *E25.9*
- - - congénitale *E25.09*
- - hypertrophie *E27.8*
- - hypofonction *E27.4*
- - - induit par la médication *E27.3*
- - - primaire *E27.1*
- - hypoplasie *E27.8*
- - infarctus *E27.4*
- - insuffisance *E27.4*
- - - aigue *E27.2*
- - - primaire *E27.1*
- - métastase *C79.7*
- - nécrose *E27.4*
- - saignement *E27.4*
- - troubles *E27.9*
- - - cas de
- - - - pseudohermaphrodisme
- - - - - féminin, *E25.8*
- - - - - masculin, *E25.8*
- - - congénital

Cortex –*suite*
- surrénalien –*suite*
- - troubles –*suite*
- - - congénital –*suite*
- - - - pseudohermaphrodisme
- - - - - féminin, *E25.09*
- - - - - masculin, *E25.09*
- - tumeur* *D44.1*
- - - maligne *C74.0*
- visuel
- - affection *H47.6*
- - hémorragie *H47.6*
- - inflammation *H47.6*
- - ischémie *H47.6*
- - lésion *S04.0*
- - tumeur *H47.6*
- visuel, troubles *H47.6*

Corti, organe de
- absence, congénitale *Q16.5*
- agénésie *Q16.5*
- anomalie *Q16.5*
- déformation *Q16.5*
- hypoplasie *Q16.5*
- malformation congénitale *Q16.5*

Cortical(e)
- atrophie *G31.9*
- cécité *H53.8*
- centre visuel, trouble *H47.6*
- crise, focale *G40.1*
- dégénérescence *G31.88*
- - alcoolique *G31.2*
- - cérébrale, progressive *G31.9*
- - diffuse, due à une artériosclérose *I67.2*
- démence, prépodérante *F01.1*
- épilepsie *G40.1*
- hémorragie
- - cerveau *I61.1*
- - couches *O99.4*
- - hémisphère du cerveau, intracérébral *I61.1*
- hyperostose, infantile *M89.89*
- nécrose
- - cas de
- - - néphrite *N05.8*
- - - néphropathie *N05.8*
- - rein *N17.1*
- - - aiguë *N17.1*
- - - mère, atteinte, foetus/nouveau-né *P00.1*
- paralysie, muscle de l'oeil, conjuguée *H51.0*
- thrombose *I66.9*

Corticobasale, dégénérescence [DCB] *G31.0+, F02.0**

Corticoïde - *voir* Corticostéroïde

Corticostéroïde
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Corticostriatospinale, dégénérescence *A81.0*

Corticosurrénal(e)
- hypersécrétion *E24.9*
- insuffisance *E27.4*
- sous-fonction NCA *E27.4*

Cortico-surrénalienne, insuffisance *E27.4*
- iatrogène *E27.3*
- induite par médicaments *E27.3*

Cortico-surrénalienne, insuffisance –*suite*
- primaire *E27.1*

Cortisol, hypersécrétion *E24.9*

Cortisone, glaucome *H40.6*

Corynebacterium diphtheriae, radiculomyé *A36.8+, G05.0**

Coryza *J00*
- aigu *J00*
- cas de grippe [influenza] *J11.1*
- syphilitique, congénital *A50.0+, J99.8**

Cosmétique
- greffe, cheveux *Z41.1*
- lifting du visage *Z41.1*
- opération, plastique *Z41.1*
- reconstitution, poitrine *Z41.1*
- réduction, poitrine *Z41.1*

Cosmétiques
- allergie *L23.2*
- dermatite de contact *L25.0*
- - allergique *L23.2*
- - toxique *L24.3*

Cossio, syndrome de *Q21.1*

Costale, lésion NCA *S29.9*

Costen, syndrome (complexe) de *K07.6*

Costo-chondrale, lésion NCA *S29.9*

Costochondrite *M94.0*

Costochondrose *M94.0*

Côte
- absence
- - acquise *Z90.8*
- - congénitale *Q76.6*
- accessoire *Q76.6*
- agénésie *Q76.6*
- anomalie *Q76.6*
- anomalie, position, congénitale *Q76.6*
- blocage *M99.88*
- - première *M99.88*
- carcinome *C79.5*
- cartilage
- - dystrophie *M94.0*
- - entorse *S23.4*
- - fracture *S22.32*
- - luxation *S23.2*
- cervicale *Q76.5*
- chondrite *M94.0*
- chondrite, Tietze *M94.0*
- contusion *S20.2*
- cou *Q76.5*
- déplacement *M89.88*
- difformité
- - acquise *M95.4*
- - congénitale *Q76.6*
- dislocation *S23.2*
- douleurs *R07.3*
- élevée *Q76.6*
- entorse *S23.4*
- fente *Q76.6*
- flottante *Q76.6*
- fracture *S22.32*
- - avec thorax instable *S22.5*
- - multiples *S22.40*
- - - avec première fracture des côtes *S22.41*
- fractures multiples *S22.40*
- - avec
- - - participation de

Côte –*suite*
- fractures multiples –*suite*
- - avec –*suite*
- - - participation de –*suite*
- - - - deux côtes *S22.42*
- - - - quatre et plusieurs côtes *S22.44*
- - - - trois côtes *S22.43*
- fusion *Q76.6*
- gastrique
- - érosion, peptique *K28.9*
- - ulcère, peptique *K28.9*
- gauche
- - bloc fasciculaire *I44.6*
- - hémibloc NCA *I44.6*
- - négligence *R29.5*
- glissante *M89.88*
- haute *Q76.6*
- hypoplasie *Q76.6*
- malformation congénitale *Q76.6*
- mélanome, in situ *D03.5*
- naevus *D22.5*
- première, fracture *S22.31*
- - cas de fractures multiples, côtes *S22.41*
- région
- - brûlure *T21.02*
- - derrière
- - - lésion, superficielle *S20.40*
- - - plaie, ouverte *S21.2*
- - devant
- - - lésion, superficielle *S20.30*
- - - plaie, ouverte *S21.1*
- - lésions multiples superficielles *S20.7*
- - plaie, ouverte *S21.9*
- sarcome *C41.3*
- slipping rib *M89.88*
- surnuméraire, région cervicale *Q76.5*

Cotyle
- fracture *S32.4*
- luxation *S73.00*

Cotyle (acétabulum)
- chondrosarcome *C41.4*
- dysplasie congénitale *Q65.8*
- entorse NCA *S73.18*
- fracture *S32.4*
- ostéochondrite, juvénile *M91.0*
- plat *M24.85*

Cou *F45.8*
- abcès *L02.1*
- adipeux de Madelung *E88.8*
- agénésie partielle *Q18.8*
- anomalie *Q18.9*
- anthrax *L02.1*
- appendice cutané *Q18.2*
- basaliome *C44.4*
- brûlures *T20.0*
- - 1er degré *T20.1*
- - 2e degré *T20.20*
- - 3e degré *T20.3*
- - degré
- - - 2a *T20.20*
- - - 2b *T20.21*
- - séquelles *T95.0*
- cancer des tissus conjonctifs et tissus mous *C49.0*
- contusion *S10.95*
- - séquelles *T91.0*
- corps vertébraux, fusion *Q76.1*

Cou –*suite*
- corrosion *T20.4*
- - 1er degré *T20.5*
- - 2e degré *T20.60*
- - 3e degré *T20.7*
- - degré
- - - 2a *T20.60*
- - - 2b *T20.61*
- - séquelles *T95.0*
- court *Q76.4*
- difformité *M20.0*
- douleurs *R07.0*
- - non spécifiques *R07.0*
- écrasement *S17.9*
- - séquelles *T91.8*
- élongation, séquelles *T91.8*
- entorse *S13.6*
- entorse, séquelles *T91.8*
- et tête
- - cicatrices, correction *Z42.0*
- - écrasement *T04.0*
- - entorse *T03.0*
- - fractures multiples *T02.00*
- - luxation *T03.0*
- - opération plastique *Z42.0*
- - plaies ouvertes multiples *T01.0*
- fibrome *D21.0*
- fissure branchiale (persistante) *Q18.0*
- fistule
- - latérale *Q18.1*
- - médiane *Q18.8*
- fracture *S12.8*
- fracture(s) *S12.9*
- - multiples *S12.7*
- - ouverte *S12.9*
- furoncle *L02.1*
- ganglions lymphatiques
- - abcès *L04.0*
- - métastase *C77.0*
- - - primaire non connu *C77.0*
- gelure *T35.2*
- - avec nécrose tissulaire *T34.1*
- - séquelles *T95.0*
- - superficielle *T33.1*
- infection *J02.9*
- inflammation *J02.9*
- - aiguë *J02.9*
- - chronique *J31.2*
- - diphtérique *A36.0*
- - provoquée par streptocoques *J02.0*
- - septique, provoquée par streptocoques *J02.0*
- - ulcéreuse *J02.9*
- kyste
- - latéral *Q18.1*
- - médian *Q18.8*
- lésion NCA *S19.8*
- lésion(s) traumatique(s) *S19.9*
- - multiples *S19.7*
- - musculaire, séquelles *T91.8*
- - nerf
- - - périphérique *S14.4*
- - - séquelles *T91.8*
- - séquelles *T91.9*
- - superficielle(s) *S10.90*
- - - multiples *S10.7*
- - - séquelles *T91.0*
- - tendon, séquelles *T91.8*

Cou –*suite*
- lésion(s) traumatique(s) –*suite*
- - vaisseau sanguin, séquelles *T91.8*
- lipome *D17.0*
- luxation(s) *S13.10*
- - *S13.2*
- - multiples *S13.3*
- - - *S13.3*
- - séquelles *T91.8*
- malformation
- - acquise *M95.3*
- - congénitale *Q18.9*
- mélanome in situ *D03.4*
- mélanome malin *C43.4*
- nævus *D22.4*
- nerf
- - lésion traumatique *S14.6*
- - sympathique, lésion traumatique *S14.5*
- oppression *F45.8*
- palmé *Q18.3*
- - dans le syndrome de Noonan *Q87.1*
- partie
- - brûlure, en cas de brûlure d'un oeil *T20.0*
- - corrosion, en cas de corrosion d'un oeil *T20.4*
- phlegmon *L03.8*
- plaie(s) ouverte(s) *S11.9*
- - multiples *S11.7*
- - séquelles *T91.0*
- sensation de boule dans la gorge *F45.8*
- sensation de corps étranger *F45.8*
- tuméfaction localisée de la peau *R22.1*

Cou gras de Madelung *E88.8*

Couche bleue, syndrome *E70.8*

Couche de fibres nerveuse, défaut, rétin *H40.0*

Couche de la rétine
- Décollement *H35.7*
- Solution *H35.7*

Couche pigmentaire
- affection dégénérative de l'iris *H21.2*
- décollement de la rétine *H35.7*

Couches bleues, syndrome des *E70.8*

Couches, candidose *B37.2*

Couches, dermatose *L22*

Couches, dermite *L22*
- associée à candidose *B37.2*
- psoriasiforme *L22*

Couches, érythème *L22*

Coude
- abcès *L02.4*
- ankylose *M24.62*
- Anomalie *Q74.0*
- articulation
- - arthrite *M13.92*
- - arthrose *M19.92*
- - bursite *M70.2*
- - déformation, acquise *M21.92*
- - dégénérescence, cartilage articulaire, NCA *M24.12*
- - empyème *M00.92*
- - lésion interne *M24.92*
- - luxation *S53.10*
- - raideur *M25.62*
- - ulcère de décubitus *L89.91*

Coude –*suite*

- brûlure
- - 1er degré *T22.11*
- - 3ème degré *T22.31*
- - degré
- - - 2a *T22.21*
- - - 2b *T22.81*
- - second degré *T22.21*
- bursite NCA *M70.3*
- contusion *S50.0*
- corrosion
- - 1er degré *T22.51*
- - 3ème degré *T22.71*
- - degré
- - - 2a *T22.61*
- - - 2b *T22.91*
- - second degré *T22.61*
- déformation, congénitale *Q68.8*
- douleurs, non dues à une opération *M79.62*
- écrasement *S57.0*
- élongation *S53.40*
- entorse *S53.40*
- épicondylite *M77.8*
- et avant bras, lésion, multiple *S59.7*
- foulure *S53.40*
- fracture *S52.00*
- - supracondylaire *S42.41*
- interne, lésion *M24.92*
- joueurs de golf *M77.0*
- joueurs de tennis *M77.1*
- lésion *S59.9*
- - récidivante *M24.42*
- - superficielle *S50.9*
- - - multiples *S50.7*
- ligament latéral, rupture, ulna *S53.3*
- luxation *S53.10*
- - congénitale *Q68.8*
- - habituelle *M24.42*
- mélanome, malin *C43.6*
- plaie, ouverte *S51.0*
- pli, abcès *L02.4*
- région, enthésiopathie *M77.8*
- rupture, ménisque, ancienne *M24.12*
- ténosynovite *M65.92*
- tuberculose *A18.0+, M01.12**

Cou-de-pied, plaie ouverte *S91.3*

Coudure
- iléon *K56.6*
- intestin *K56.6*
- jonction pyélo-urétérale associée à une pyélonéphrite chronique *N11.1*
- uretère *N13.5*
- uretère associée à une pyélonéphrite chronique *N11.1*
- utérus *N85.4*

Couleur
- capillaire
- - anomalie *L67.9*
- - modification *L67.1*
- expectoration anormale *R09.3*
- selles anormales *R19.5*

Coumarine, empoisonnement *T45.5*

Coup de chaleur *T67.0*
- avec fièvre *T67.0*
- insolation *T67.0*

Coup de soleil *L55.9*

Coup de soleil –*suite*

- 1er degré *L55.0*
- 3ème degré *L55.2*
- dermite de chaleur *L59.0*
- second degré *L55.1*

Coup du lapin *S13.4*
- rachis cervical *S13.4*

Couple, problème *Z63*
- ambivalent *Z63*

Couple, trouble *Z63*

Coupure *T14.1*
- due à un couteau *T14.1*
- externe *T14.1*
- intestin *S61.0*
- multiples *T01.9*
- muscle *T14.6*
- pied *S91.3*
- tendon *T14.6*
- utérus *S37.6*
- vagin *S31.4*
- Vaisseau sanguin *T14.5*

Courant
- accident *T75.4*
- brûlure *T30.0*
- électrique
- - choc *T75.4*
- - décharge *T75.4*

Courant électrique
- avec
- - effet non mortel *T75.4*
- - lésion non mortelle *T75.4*
- lésion *T75.4*

Courbe de croissance de Harris *M89.19*

Courbure
- avant-bras *M21.83*
- exposition à *W87*
- fémur *M21.85*
- - congénitale *Q68.3*
- fibula *M21.86*
- - congénitale *Q68.4*
- os de la jambe, long, congénitale *Q68.5*
- pénis, dorsale *Q55.6*
- rachis *M43.99*
- radius *M21.83*
- septum nasal *J34.2*
- - acquise *J34.2*
- - congénitale *Q67.4*
- tibia *M21.86*
- - et fibula, congénitale *Q68.4*

couronne Anémie réfractaire sidéroblastes en *D46.1*

Court
- carcinome de la lèvre *C51.1*
- chromosome 5 Syndrome de délétion du bras *D46.6*
- écorchure, dos de la main *S60.81*
- orifice vaginal *N89.6*
- ovaire, congénitale *Q50.3*
- plaie ouverte, soignée chirurgiquement *T14.1*
- Plaie par rupture *T14.1*
- rénal *N27.9*
- - deux côtés *N27.1*
- - unilatéral *N27.0*
- utérus *N85.8*

Court, -te

Court, -te –*suite*

- cordon ombilical, complications, accouchement *O69.3*
- durée de grossesse, avec hypoplasie pulmonaire *P28.0*
- psychose
- - réactive *F23.9*
- - schizophréniforme *F23.2*
- troubles schizophréniformes *F23.2*

Courte durée
- épisode schizophrène NCA *F23.2*
- réaction, dépression *F43.2*

Coussinet phalange Knuckle pads *M72.1*

Coussinet de phalange *M72.1*

Coussinet graisseux rotulien, hypertroph *M79.46*

Coussinets endocardiques, défaut *Q21.2*

Couvade, syndrome de la *F60.9*

Couvelaire, syndrome de *O45.8*

Couvert
- lésion cérébrale, grave *S06.20, S01.83!*
- rompu
- - anévrisme aortique abdominal *I71.3*

Couverture sociale, insuffisante *Z59*

Cowden, syndrome de *Q89.8*

Cowper, glande de
- abcès *N34.0*
- - tuberculeux *A18.1+, N51.8**
- adénite *N34.2*
- affection *N34.2*
- gonorrhée, avec abcès *A54.1*
- inflammation *N34.2*
- kyste *N36.8*
- tuberculose *A18.1+, N51.8**

Cowperite *N34.2*

Cowpox *B08.0*
- paupière *B08.0+, H03.1**
- pseudo- *B08.0*

Coxa
- antetorta *M21.85*
- plana *M91.2*
- saltans *M24.85*
- valga *M21.05*
- - antetorta *M21.05*
- - congénitale *Q65.8*
- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*
- vara *M21.15*
- - congénitale *Q65.8*
- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*

Coxalgie *M25.55*
- non tuberculeuse *M25.55*
- pseudo- *M91.3*
- tuberculeuse *A18.0+, M01.15**

Coxarthrite *M13.15*

Coxarthrose *M16.9*
- 1er stade *M16.9*
- 1er-2e stades *M16.9*
- 2e stade *M16.9*
- 3e stade *M16.9*
- activée *M16.9*
- ankylosante *M16.9*
- bilatérale *M16.9*
- dysplasique *M16.3*
- - bilatérale *M16.2*
- - unilatérale *M16.3*

Coxarthrose –*suite*

- grave *M16.9*
- initiale *M16.9*
- légère *M16.9*
- post-traumatique *M16.5*
- - bilatérale *M16.4*
- - unilatérale *M16.5*
- primitive *M16.1*
- - bilatérale *M16.0*
- - unilatérale *M16.1*
- protrusions *M16.7*
- protusion *M16.7*
- secondaire *M16.7*
- - bilatérale *M16.6*
- - unilatérale *M16.7*
- unilatérale *M16.9*

Coxiella burnetii, infection *A78*

Coxite *M13.15*
- fugace *M12.85*
- pseudo- *M91.3*
- tuberculeuse *A18.0+, M01.15**
- tuberculeuse [ischiophtisie] *A18.0+, M01.15**

Coxite tuberculeuse *A18.0+, M01.15**

Coxsackie, virus
- A24, conjonctivite *B30.3+, H13.1**
- agent pathogène *B97.1!*
- bronchite aiguë *J20.3*
- cardite *B33.2+, I52.1**
- endocardite *B33.2+, I39.8**
- entérite *A08.3*
- hépatite *B33.8+, K77.0**
- herpangine *B08.5*
- infection *B34.1*
- - pharynx *B08.5*
- - système nerveux central NCA *A88.8*
- méningite *A87.0+, G02.0**
- myocardite *B33.2+, I41.1**
- péricardite *B33.2+, I32.1**
- pharyngite *B08.5*
- pleurodynie *B33.0*

Crachats
- excessifs *R09.3*
- sang *R04.2*

Crainte *F40.9*
- chez l'enfant *F93.8*

Crainte de l'allaitement *O92.70*

Crampe *R25.2*
- écrivains *F48.8*
- - organique *G25.8*
- fasciculations, syndrome *R25.2*
- musculaire *R25.2*
- nageurs *T75.1*
- professionnelle, main *F48.8*
- s menstruation *N94.8*
- syndrome de sevrage d'alcool *F10.3*
- utérus, induite par la menstruation *N94.6*

Crâne
- à rebord *Q75.8*
- anomalie *Q75.0*
- - *Q75.8*
- - *Q75.9*
- - avec hydrocéphalie, avec spina bifida *Q05.4*
- - congénitale *Q75.8*
- anomalie, diagnostic par imagerie *R93.0*

Crâne –*suite*

- asymétrie, nourrisson *Q67.4*
- bifide *Q75.8*
- blessure par projectile *S09.7*
- contusion *S00.95*
- cranioclasie, chez le foetus *P03.8*
- déformation
- - acquise *M95.2*
- - congénitale *Q75.8*
- - - avec
- - - - anencéphalie *Q00.0*
- - - - encéphalocèle *Q01.9*
- - - - hydrocéphalie *Q03.9*
- - - - - avec spina bifida, *Q05.4*
- - - - microcéphalie *Q02*
- difformité
- - acquise *M95.2*
- - naissance *Q75.8*
- dysfonctionnement
- - électif, après
- - - craniectomie décompressive *M96.88*
- - - intervention neurochirurgicale *M96.88*
- - post-opératoire, en tant que complication *T88.8*
- écrasement *S07.1*
- enfoncement *Q67.4*
- fermeture, défectueuse *Q75.0*
- - avec
- - - anencéphalie *Q00.0*
- - - encéphalocèle *Q01.9*
- - - hydrocéphalie *Q03.9*
- - - microcéphalie *Q02*
- fracture *S02.9*
- - cas de traumatisme, séquelles intracrâniennes *T90.2*
- - due à un traumatisme obstétrical *P13.0*
- - multiple *S02.7*
- - séquelles *T90.2*
- fracture multifragmentaire *S02.7*
- fracture-éclatement *S02.9*
- hyperostose *M85.2*
- - congénitale *Q75.8*
- lacunaire *Q75.8*
- lésion NCA *S09.9*
- lésion, due à un traumatisme obstétrical NCA *P13.1*
- mou *M83.88*
- ostéite déformante *M88.0*
- plaie, ouverte *S01.80*
- pus *M86.88*
- scaphocéphale *Q75.0*
- tératome *D48.0*

Crânial
- artérite *M31.6*
- hémorragie *I62.9*
- hydro-encéphalocèle *Q01.9*
- névralgie, après herpès zoster *B02.2+, G53.0**
- processus vasculaire *I67.9*

Crâniectomie, fétale *P03.8*

crânien VIII Tumeur malign : Nerf auditif [Nerf *C72.4*

Crânio
- cervicale, fracture
- - disque *T08.0*
- - machoire *S02.4*
- clasie, fétale *P03.8*

Crânio –*suite*

- cléido-dysostose *Q74.0*
- facial, axe, déficient *Q75.0*
- pages *Q89.4*
- pharyngiome *D44.4*
- rachischisis *Q00.1*
- - total *Q00.1*
- schisis *Q75.8*
- sténose *Q75.0*
- synostose *Q75.0*
- tabès *M83.88*
- - chez le nouveau-né *P96.3*
- - lors de syphilis *A50.5*
- - origine inconnue *M83.88*
- - rachitique *E64.3*

Craquant, grinçant
- articulation *M24.89*
- genou *M23.89*

Créatinine clearance, diminution *R94.4*

Créatinine phospho kinase (CPK), taux él *R74.8*

Créatinine, taux élevé *R79.8*

Crépitation
- articulation *M24.89*
- articulation du genou *M23.89*

Crépusculaire, état
- épileptique *F05.8*
- hystérique *F44.88*
- psychogène *F44.88*

CREST, syndrome [forme particulière de s *M34.1*

Crête alvéolaire *K06.8*
- atrophie *K06.8*
- - *K08.2*
- édentée
- - affection *K06.9*
- - hyperplasie par irritation *K06.2*
- - occlusion traumatique *K06.2*
- hypertrophie *K08.88*

Crête iliaque
- éperon *M76.2*
- ostéochondrite, juvénile *M91.0*

Crête iliaque, décubitus *L89.93*

Crétinisme *E00.9*
- avec myopathie *E00.9+, G73.5**
- cas d'atrophie, thyroïde *E03.1*
- congénital *E00.9*
- endémique *E00.9*
- - hypothyroïdien *E00.1*
- - type mixte *E00.2*
- - type myxoedémateux *E00.1*
- - type neurologique *E00.0*
- hypophysaire *E23.0*
- sans goitre *E00.9*
- sporadique *E00.9*

Creutzfeldt-Jakob, maladie de *A81.0*
- avec
- - démence *A81.0+, F02.1**
- - psychose organique *A81.0+, F02.1**
- - psychose, organique *A81.0+, F02.1**
- forme atypique associée à l'ESB [encéphalopathie spongiforme bovine] *A81.8*

Cri du chat, syndrome (maladie) du *Q93.4*

Crico-thyroïdien, ligament, entorse *S13.5*

Crico-thyroïdienne, articulation

Crico-thyroïdienne, articulation *–suite*
- entorse *S13.5*
- foulure *S13.5*
- luxation *S13.2*

Crigler et Najjar, maladie de *E80.5*
- avec ictère, néonatale *E80.5*

Crigler-Najjar, syndrome de *E80.5*
- avec ictère, néonatal *E80.5*

Criminel, -elle
- avortement *O05.9*
- comportement *F60.2*

Crise
- *R56.8*
- abdominale *R10.4*
- acinétique *G20.90*
- Adams-Stokes(-Morgagni) *I45.9*
- Adams-Stokes(-Morgagni), crise comitiale dans syndrome d' *I45.9*
- Addison, de *E27.2*
- Adolescents *Z60*
- agressivité, d' *F91.1*
- akinétique *G40.3*
- angoisse *F41.2*
- apnée *R06.88*
- apoplectique (accident) *I64*
- asthme *J45.9*
- asthme bronchique *J45.9*
- blastique cours leucémie myéloïde chronique [LMC] , *C94.8!*
- blastique de la
- - leucémie
- - - lymphatique *C91.10*
- - - myéloïde *C92.10*
- - myélodysplasie *D46.9*
- boulimie *R63.2*
- - d'origine non organique *F50.4*
- - psychogènes *F50.4*
- cardiaque *I21.9*
- - *I50.9*
- - *I51.6*
- catalepsie, de *F44.2*
- cérébrale *R56.8*
- - transitoire *G45.99*
- convulsions *R56.8*
- - cérébrale *R56.8*
- - dissociative *F44.5*
- convulsive
- - cérébrale *R56.8*
- - dissociative *F44.5*
- cyclite glaucomateuse *H40.4*
- drépanocytose *D57.0*
- éclair *G40.4*
- - spasmodique *G40.4*
- émotionnelle *F43.2*
- - cas de
- - - réaction aiguë à un facteur de stress *F43.0*
- - - Trouble de l'adaptation *F43.2*
- - spécifique
- - - pendant l'adolescence *F93.8*
- - - pendant l'enfance *F93.8*
- épileptiforme *R56.8*
- - dans la cysticercose *B69.0+, G94.8**
- - focale *G40.1*
- épileptique *G40.9*
- - atonique non spécifique *G40.3*
- - avec trouble de la conscience *G40.2*
- - clonique *G40.3*

Crise *–suite*
- épileptique *–suite*
- - dû facteur suivants : médicament et drogue , *G40.5*
- - focale complexe *G40.2*
- - focale simple *G40.1*
- - initialement focale *G40.08*
- - myoclonique *G40.3*
- - non spécifique *G40.9*
- - provoquée par
- - - alcool *G40.5*
- - - médicaments *G40.5*
- - - modification hormonale *G40.5*
- - - privation de sommeil *G40.5*
- - - stress *G40.5*
- - - stupéfiants *G40.5*
- - sans trouble de la conscience *G40.1*
- - tonico-clonique *G40.3*
- - tonique *G40.3*
- épileptoïde *R56.8*
- état de *F43.0*
- focale
- - complexe, évoluant en crise secondairement généralisée *G40.2*
- - corticale *G40.1*
- focale complexe, associée à
- - épilepsie du nourrisson, bénigne *G40.08*
- - état de mal comitial *G41.2*
- gastrique, en cas de syphilis *A52.7+, K93.8**
- glaucome iridio-cyclite *H40.4*
- goutte *M10.99*
- grand mal *G40.6*
- - dans le petit mal *G40.6*
- - réveil *G40.3*
- hypercalcémique *E83.58*
- hypertensive *I10.91*
- - avec
- - - hypertension, due à une maladie endocrinienne *I15.21*
- - - maladie
- - - - cardiaque
- - - - - et rénale, hypertensive, avec insuffisance,
- - - - - hypertensive,
- - - - - hypertensive, avec insuffisance cardiaque, *I11.01*
- - - - - hypertensive, sans insuffisance cardiaque, *I11.91*
- - - - - et rénale, hypertensive, avec insuffisance, cardiaque, *I13.01*
- - - - - et rénale, hypertensive, avec insuffisance, rénale, *I13.11*
- - - - rénale hypertensive
- - - - - avec insuffisance rénale, *I12.01*
- - - - - sans insuffisance rénale, *I12.91*
- - cas d'hypotension
- - - bégnine, essentielle *I10.01*
- - - maligne *I10.11*
- - - vasculo-rénale *I15.01*
- hystérie, d' *F44.5*
- identitaire *F68.8*
- larmes *F48.8*
- ménopause *N95.1*
- migraineuse *G43.9*
- myasthénique *G70.9*
- myoclono-astatique, dans l'épilepsie *G40.4*
- nitritoïde

Crise *–suite*
- nitritoïde *–suite*
- - cas de
- - - administration prescrite *I95.2*
- - - médication adéquate *I95.2*
- - - Surdosage *T37.8*
- - cause d'une substance administrée par erreur *T37.8*
- - due à une erreur médicamenteuse *T37.8*
- nocturne *F51.4*
- oculogyre *H51.8*
- - psychogène *F45.8*
- organique cérébrale *R56.8*
- panique *F41.0*
- paroxystique *R56.8*
- Pel *A52.1+, H58.8**
- pendant la puberté *Z60*
- petit mal *G40.7*
- pseudo- *F44.5*
- psychogène *F44.88*
- psychomotrice *G40.2*
- psychosocial *F43.0*
- réaction aigue *F43.0*
- rénale *N28.8*
- Salaam, de type *G40.4*
- schizophréniforme *F20.8*
- - aiguë *F23.2*
- sensitivomotrice *R56.8*
- simple, focale, évoluant vers une crise généralisée secondaire *G40.1*
- surrénalienne *E27.2*
- sympathovagale *R55*
- syncope *R55*
- syncope, de *R55*
- - dissociative *F44.88*
- - vagale *R55*
- tabique *A52.1*
- tension artérielle *I10.91*
- terreurs nocturnes *F51.4*
- thyréotoxique aigu *E05.5*
- thyroïde *E05.5*
- tonico-clonique, dans l'état de grand mal épileptique *G41.0*
- uncus, syndrome *G40.2*
- vasomotrice *R57.9*
- vaso-vagale *R55*
- - psychogène *F45.39*
- viscérale, en cas de Tabes *A52.1*

Cristallin
- abcès *H27.8*
- absence
- - acquise *H27.0*
- - congénitale *Q12.3*
- affection *H27.9*
- - avec
- - - glaucome NCA *H40.5*
- - - glaucome obstructif *H40.5*
- agénésie *Q12.3*
- anomalie *Q12.9*
- artificiel *Z44.2*
- calcification *H26.8*
- cataracte *Q12.0*
- cataracte, congénitale *Q12.0*
- chalcose *H26.8*
- colobome *Q12.2*
- contusion *H26.1*
- - *S05.1*
- corps étranger *S05.5*

Cristallin *–suite*
- corps étranger *–suite*
- - chambre antérieure de l'oeil *S05.5*
- - magnétique, intraoculaire, ancien *H44.6*
- - non magnétique, intraoculaire, ancien *H44.7*
- - rétention, non magnétique *H44.7*
- déformation, acquise *H27.8*
- dégénération *H27.8*
- déplacement *H27.1*
- - congénital *Q12.1*
- dépôt, corps vitré *H43.2*
- dépôt, métallique *H26.8*
- dislocation *H27.1*
- - avec glaucome *H40.5*
- - congénitale *Q12.1*
- - traumatique *S05.8*
- dystrophie, cornée
- - centrale *H18.5*
- - marginale *H18.5*
- ectopie *Q12.1*
- incarcération, dans une plaie *S05.2*
- induration, avec iridocyclite *H20.2*
- intraoculaire
- - avec complication, mécanique *T85.2*
- - défaillance mécanique *T85.2*
- - déplacement *T85.2*
- - obstruction, mécanique *T85.2*
- - perforation *T85.2*
- - perte de poids *T85.2*
- - position anormale *T85.2*
- - protrusion *T85.2*
- intumescence *H26.9*
- kyste *H27.8*
- - congénital *Q12.8*
- lésion *S05.8*
- luxation *H27.1*
- - congénitale *Q12.1*
- malformation *Q12.8*
- - congénitale *Q12.8*
- malformation congénitale *Q12.9*
- opacité *H26.9*
- positionnement anormal *H27.8*
- - congénital *Q12.1*
- prolapsus *H27.8*
- - congénital *Q12.1*
- - traumatique *S05.1*
- Pseudoexfoliation, avec
- - glaucome *H40.1*
- - - capsulaire *H40.1*
- - - - primaire *H40.1*
- - glaucome primitif résiduel capsulaire *H40.1*
- sphérophakie, élevée *Q12.4*
- subluxation *H27.1*
- syphilis *A52.7+, H28.8**

Cristallisation, acide urique *R82.9*

Cristallurie *R82.9*

Cristaux
- arthrite *M11.99*
- synovite *M11.99*
- ténosynovite *M11.99*

Cristaux cholestéroliques, embolie *I74.9*
- après intervention *T81.7*

Cristaux urinaires *N20.9*

Crohn, maladie de *K50.9*

Crohn, maladie de *–suite*
- avec
- - abcès *K50.9*
- - arthrite *K50.9+, M07.49**
- - - juvénile *K50.9+, M09.19**
- - arthropathie *K50.9+, M07.49**
- côlon *K50.1*
- de l'oesophage *K50.81*
- duodénum *K50.0*
- gastrique *K50.80*
- gros intestin *K50.1*
- iléum *K50.0*
- intestin grêle *K50.0*
- - et gros intestin *K50.8*
- - - avec abcès *K50.8*
- jéjunale *K50.0*
- rectum *K50.1*

Croissance - *voir aussi* néoformation, in
- accélérée pendant l'enfance *Z00.2*
- arrêt
- - enfant *R62.8*
- - epiphyse *M89.19*
- - foetal, prise en charge de la mère *O36.5*
- - foetus *P05.9*
- - osseuse *M89.29*
- - trachée *Q32.1*
- enchondrale osseuse retardée *M89.29*
- foetale
- - excessive *P08.1*
- - insuffisante *P05.9*
- foetus
- - excessive, avec soins maternels *O36.6*
- - insuffisante, avec soins maternels *O36.5*
- fongique
- néoplasique (à évolution imprévisible ou inconnue) *D48.9*
- retard *R62.8*
- - foetal NCA *P05.9*
- - foetale, prise en charge de la mère *O36.5*
- retardée, nouveau-né *P05.9*
- secondaire *C80*
- troubles *R62.8*
- - cas de trouble, croissance osseuse NCA *M89.29*
- - cheveux *L73.9*
- - ongles *L60.8*
- - os tubulaire, et colonne vertébrale, en cas d'ostéochondrodysplasie *Q77.9*

Croissants, formation diffuse, avec glom
- hématurie
- - persistante *N02.7*
- - récidivante *N02.7*
- protéinurie isolée *N06.7*
- syndrome
- - néphritique
- - - aigu *N00.7*
- - - d'évolution rapide *N01.7*
- - néphrotique *N04.7*

Crosse aortique, syndrome [Takayasu] *M31.4*

Cross-McKusick-Breen, syndrome de *E70.3*

Croup - *voir* Laryngite obstructive aiguë *J05.0*
- catarrhal *J05.0*
- infectieux *J05.0*

Croup - *voir* Laryngite obstructive aiguë *–suite*
- inflammatoire *J05.0*
- non diphtérique *J05.0*
- pseudo- *J38.5*

Croup, non diphtérique *J05.0*

Croup, *voir aussi* laryngite obstructive *J05.0*
- bronchique *J20.9*
- catarrhale *J05.0*
- diphtérique *A36.2*
- FAUX *J38.5*
- infectieux *J05.0*
- inflammatoire *J05.0*
- non diphtérique *J05.0*
- pseudo- *J38.5*
- spastique *J38.5*

Croupal
- angine *J03.9*
- asthme *J45.9*
- bronchite *J20.9*
- pneumonie *J18.1*
- Stridor *J38.5*
- - diphtérique *A36.2*

Croûte de lait
- chez l'enfant *L21.1*
- endogène *L20.8*
- séborrhéique *L21.0*
- séborrhéiques *L21.0*

Croûte, nécrose
- aigue, en cas d'insuffisance rénale aigue *N17.1*
- rénale *N17.1*

Croûte, peau *R23.4*

Crouzon, maladie de *Q75.1*

Cruauté, psychique *T74.3*

crurale unilatéral incarcérée sans gangrène , Hernie *K41.3*

Crush syndrome *T79.5*

Cruveilhier, maladie (paralysie) de *G12.8*

Cryoglobulinémie *D89.1*
- avec
- - atteinte, poumon *D89.1+, J99.8**
- - glomérulonéphrite *D89.1+, N08.2**
- - purpura *D89.1*
- - pyélonévrite *D89.1+, N16.2**
- - Vasculite *D89.1*
- essentielle *D89.1*
- idiopathique *D89.1*
- mixte *D89.1*
- - avec affection rénale, tubulo-interstitielle *D89.1+, N16.2**
- primitive *D89.1*
- secondaire *D89.1*

Cryptite *K62.8*

Cryptitis *K62.8*
- anale *K62.8*
- rectale *K62.8*

Cryptococcose *B45.9*
- avec encéphalite *B45.1+, G05.2**
- cas de VIH *B20, B45.9*
- cérébrale *B45.1+, G05.2**
- cerveau *B45.1+, G05.2**
- disséminée *B45.7*
- due à Cryptococcus neoformans *B45.9*
- généralisée *B45.7*

Cryptococcose –*suite*

- méninges *B45.1+, G02.1**
- méningo-cérébrale *B45.1+, G02.1**
- neuro-méningée
- - infection *B45.9*
- - méningoencéphalomyélite *B45.1+, G05.2**
- - méningomyélite *B45.1+, G05.2**
- osseuse *B45.3+, M90.29**
- peau *B45.2+, L99.8**
- pulmonaire *B45.0+, J99.8**

Cryptococcus neoformans, infection *B45.9*

Cryptocoques
- adrénalite *B45.8*
- encéphalite *B45.1+, G05.2**
- infection *B45.9*
- lymphadénite *B45.8*
- méningite *B45.1+, G02.1**
- Méningomyélite *B45.1+, G05.2**
- myocardite *B45.8*
- néphrite *B45.8*
- Parathyroïdie *B45.8*
- pneumonie *B45.0+, J17.2**
- Sialadénite *B45.8*
- thyroïdie *B45.8*

Cryptogène
- alvéolite, fibrosante *J84.1*
- cirrhose du foie *K74.6*
- Epilepsie *G40.9*
- pneumonie *J84.0*
- précocité, sexuelle *E30.1*

Cryptoménorrhée *N89.7*

Cryptopapillite *K62.8*
- anus *K62.8*

Cryptophtalmie *Q11.2*

Cryptophtalmie, syndrome *Q87.0*

Cryptorchidie *Q53.9*
- bilatérale *Q53.2*
- unilatérale *Q53.1*

Cryptorchisme *Q53.9*
- bilatéral *Q53.2*
- unilatéral *Q53.1*

Cryptosporidiose *A07.2*
- cas de VIH *B20, A07.2*

Cryptosporidiose, infection *A07.2*
- associé à maladie causée par le VIH *B20, A07.2*

Cryptosporidium
- diarrhée *A07.2*
- entérite *A07.2*
- gastro-entérite *A07.2*

Cryptostroma corticale, alvéolite à *J67.6*

CSGC [complexe symptomatique gastrocardi *F45.37*

CTG [cardiotocogramme], résultat anormal *O28.8*

C-trigonocéphalie syndrome *Q89.8*

Cubitus
- et radius, fracture *S52.4*
- fracture *S52.20*
- valgus *M21.02*
- - congénital *Q68.8*
- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*
- varus *M21.12*
- - congénital *Q68.8*

Cubitus –*suite*
- varus –*suite*

- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*

Cuir chevelu
- affecté par un abcès *L02.8*
- angiosarcome *C44.4*
- basaliome *C44.4*
- carcinome in situ *D04.4*
- chevelu
- - brûlures *T20.0*
- - carcinome *C44.4*
- - compression *S07.8*
- - Contusion *S00.05*
- - - due à lésions obstétricales *P12.3*
- - corrosion *T20.4*
- - déchirure *S08.0*
- - lésion *S09.9*
- - - foetus/nouveau-né *P12.9*
- - mélanome, in situ *D03.4*
- - mélanome, malin *C43.4*
- - plaie contuse due à lésion obstétricale *P12.3*
- - Plaie dans la région occipitale *S09.9*
- - traumatisme obstétrical *P12.9*
- - - à
- - - - agrafe (suture) du cuir chevelu *P12.4*
- - - - électrodes *P12.4*
- - - - incision pour prise d'échantillons *P12.4*
- dermatophytose [dermatophytie] *B35.0*
- eczéma atopique *L20.8*
- furoncle *L02.8*
- Furoncle, anthrax *L02.8*
- Hémorragie *S00.05*
- infection fongique *B35.0*
- lésion due à un traumatisme obstétrical *P12.8*
- Masse *R22.0*
- - circonscrite *R22.0*
- mélanome, malin *C43.4*
- nævus *D22.4*
- phlegmon *L03.8*
- Psoriasis (de) *L40.8*
- spinaliome *C44.4*
- teigne *B35.0*

Cuisse ou fémur
- abcès *L02.4*
- hernie *K41.9*
- - avec
- - - étranglement *K41.3*
- - - gangrène *K41.4*
- - incarcérée *K41.3*
- - irréductible *K41.3*
- mélanome in situ *D03.7*
- naevus *D22.7*
- phlegmon *L03.11*

Cuivre
- carence *E61.0*
- - alimentaire *E61.0*
- - avec anémie *D53.8*
- décoloration des dents *K03.7*
- taux anormal, dans le sang *R79.0*
- troubles du métabolisme *E83.0*

Cuivre, maladie *T56.8*

Cul-de-sac de Douglas
- abcès *N73.5*
- tuberculose *A18.1+, N74.1**

Culicosis bullosa *L13.8*

Culture
- bactérienne, avec test de résistance *Z01.7*
- positive
- - cas d'examen d'urine *R82.7*
- - de
- - - crachats *R84.5*
- - - gorge *R84.5*
- - - plaie *R89.5*
- - - sécrétion nasale *R84.5*

Cunninghamella, infection *B46.5*

Curcumin
- allergie (E100) *T78.4*
- hypersensibilité (E100) *T78.4*

Currarino, syndrome (triade) de *Q42.9*

Curschmann-Batten-Steinert, syndrome de *G71.1*

Curtis-Fitz-Hugh syndrome de
- Chlamydia *A74.8+, K67.0**
- gonorrhée *A54.8+, K67.1**

Curtis-Fitz-Hugh, syndrome de *A54.8+, K67.1**

Cushing, syndrome de *E24.9*
- Apert- *E24.9*
- artificiel *E24.2*
- avec myopathie *E24.9+, G73.5**
- basophilisme hypophysaire *E24.0*
- hypophysaire *E24.0*
- iatrogène *E24.2*
- idiopathique *E24.8*
- médicamenteux *E24.2*
- provoqué par une tumeur sécrétant de l'ACTH [hormone adrénocorticotrope], ectopique *E24.3*
- pseudo-, dû à l'alcool *E24.4*

Cuspide dentaire *K00.2*

cutané
-
- Albinisme *E70.3*
- anaplasique grand cellules Lymphome *C86.6*
- Bartonellose *A44.1*
- Blastomycose *B40.3+, L99.8**
- cellules T
- - sans précision , Lymphome *C84.8*
- - type panniculite , Lymphome sous - *C86.3*
- cryptococcose *B45.2+, L99.8**
- fistule *L98.8*
- - génito-, chez la femme *N82.5*
- - recto- *K60.4*
- - urétéro- *N28.8*
- - urétro- *N36.0*
- - vagino- *N82.5*
- - vésico- *N32.2*
- gangrène *R02*
- grand cellules T CD30 positif , Lymphome *C86.6*
- hémorragie *R23.3*
- - due à une auto-sensibilisation érythrocytaire *D69.2*
- leishmaniose *B55.1*
- listériose *A32.0*
- lymphome *C84.5*
- - centrofolliculaire *C82.6*
- lymphome à cellules T *C84.5*
- mucinose *L98.5*
- mucormycose *B46.3+, L99.8**

cutané –*suite*
- nocardiose *A43.1*
- nodules *R22.9*
- primitif cellules T CD30 positif , Syndrome lymphoprolifératif *C86.6*
- résiduel cicatrice hémorroïdaires *K64.4*
- stockage *R23.8*
- strongyloïdose *B78.1+, L99.8**
- syphilis précoce, congénitale *A50.0+, L99.8**
- troubles psychogènes *F45.8*
- Vésicules cutanées *R23.8*

Cutis marmorata ou peau marbrée *R23.8*

Cutis, cutanée
- hyperélastique *Q82.8*
- - acquise *L57.4*
- laxa
- - congénitale [cutis laxa (héréditaire)] *Q82.8*
- - hyperélastique *Q82.8*
- - sénile *L57.4*
- marmorata *R23.8*
- - telangiectatica congenita [CMTC] *Q27.8*
- ostéose *L94.2*
- rhomboidalis [nuque rhomboïdale] *L57.2*
- vagantium *B85.1*
- verticis gyrata (CVG) *Q82.8*
- - acquise *L91.8*

Cyano-

Cyanocobalamine, carence *E53.8*

Cyanose *R23.0*
- acrocyanose *I73.8*
- cas d'hypertonie *I11.90*
- conjonctive *H11.4*
- doigt, paroxysme *I73.0*
- entérogène [méthémoglobinémie acquise] *D74.8*
- lèvres *R23.0*
- rétine *H35.8*

Cyanose, crise, chez le nouveau-né *P28.2*

Cyanotique, affection, coeur *I24.9*
- congénitale *Q24.9*

Cyanure, effet, toxique *T65.0*

Cycle
- anovulatoire *N97.0*
- gamma-glutamyl, trouble *E72.8*
- menstruel irrégulier *N92.6*
- monophase *N97.0*
- uréogenèse, trouble *E72.2*

Cycle, anomalie *N92.6*
- chronique *N92.6*

Cycle, labilité, ménopause *N95.0*

Cyclique
- agranulocytose *D70.5*
- migraine *N94.3*
- neutropénie *D70.5*
- schizophrénie *F25.2*
- stupeur *F31.9*
- vomissements *R11*
- - psychogènes *F50.5*

Cyclite *H20.9*
- aigue *H20.0*
- chronique *H20.1*
- hétérochrome *H20.8*
- hétérochromique de Fuchs *H20.8*

Cyclite –*suite*
- postérieure *H30.2*
- récidivante *H20.0*
- subaiguë *H20.0*

Cyclocéphalie *Q87.0*

Cyclohexane, dermite de contact, toxique *L24.2*

Cycloide
- cyclothymie *F34.0*
- psychose *F23.0*
- - avec symptome, schizophrénie *F23.1*
- - sans symptome, schizophrénie *F23.0*

Cyclophorie *H50.5*
- décompensée *H50.5*

Cyclophorie alternante *H50.5*

Cyclopie *Q87.0*

Cyclopie (synophtalmie) *Q87.0*

Cycloplégie *H52.5*

Cyclospasme *H52.5*

Cyclothymie *F34.0*
- avec
- - dépression *F31.3*
- - manie *F31.1*
- dépression *F34.0*
- phase dépressive *F34.0*
- psychose *F28*
- tempérament *F34.0*
- trouble de la personnalité *F34.0*

Cyclotropie *H50.4*

Cylindre, carcinome, poumon *C34.9*

Cylindre, dans l'urine *R82.9*

Cylindre, épithélium
- col de l'utérus, déplacement *N87.9*
- déplacement, orifice du col de l'utérus *Q51.8*

Cylindrique, bronchectasie *J47*

Cylindromatose
- adénocarcinome *C80*
- syringadénome *D23.9*

Cylindrome
- derme *D23.9*
- peau *D23.9*

Cylindrome cutané, cuir chevelu *D23.4*

Cylindrurie *R82.9*

Cyphoscoliose *M41.99*
- acquise *M41.99*
- comme séquelle de rachitisme *E64.3*
- congénitale *Q67.5*
- droite, convexe *M41.99*
- gauche, convexe *M41.99*
- tuberculeuse *A18.0+, M49.09**

Cyphoscoliose, cardiopathie *I27.1*

Cyphose *M40.25*
- acquise *M40.29*
- Adolescents *M42.09*
- cardiopathie *I27.1*
- comme séquelle de rachitisme *E64.3, M40.29*
- congénitale *Q76.4*
- - sans scoliose *Q76.4*
- déformation, région cervicale *M40.22*
- hyper-, région dorsale *M40.24*
- posturale *M40.09*
- - adolescent *M40.09*

Cyphose –*suite*
- posturale –*suite*
- - chez l'adolescent *M40.09*
- posturale, chez les adolescents *M40.09*
- région cervicale *M40.22*
- région dorsale *M40.24*
- rein *Q63.8*
- rhino- *Q67.4*
- secondaire NCA *M40.19*
- suite à
- - laminectomie *M96.3*
- - rayonnement *M96.2*
- sur mal de Pott *A18.0+, M49.09**
- syphilitique, congénitale *A50.5+, M49.39**
- thoracique *M40.24*
- tuberculeuse *A18.0+, M49.09**

Cyprotérone, acétate, effet secondaire *T88.7*

Cyriax, syndrome de *M89.88*

Cyrrhose
- adénocarcinome *C80*
- carcinome, estomac, avec limitis plastica *C16.9*

Cystadénome *D36.9*

Cystalgie *R39.8*

Cystathionine, anomalie du métabolisme *E72.1*

Cystathioninémie *E72.1*

Cystathioninurie *E72.1*

Cysticercose *B69.9*
- avec
- - attaque épileptiforme *B69.0+, G94.8**
- - endophtalmie *B69.1+, H45.1**
- - épilepsie *B69.0+, G94.8**
- - kyste *B69.9*
- - myosite *B69.8+, M63.19**
- cérébrale *B69.0+, G94.8**
- cerveau *B69.0+, G94.8**
- neuro-cysticercose *B69.0+, G99.8**
- oculaire *B69.1+, H45.1**
- œil *B69.1+, H45.1**

Cysticercus cellulosae, infection *B69.9*

Cystine, calcul *E72.0+, N22.8**

Cystine, hyperaminoacidurie *E72.0*

Cystinose *E72.0*
- avec
- - maladie rénale tubulo-interstitielle *E72.0+, N16.3**
- - polynévrite *E72.0+, N16.3**
- maligne *E72.0*

Cystinurie *E72.0*
- *E72.8*

Cystique, hématurie *R31*

Cystite *N30.9*
- à
- - amibes *A06.8+, N33.8**
- - calcul *N21.0*
- - Candida *B37.4+, N33.8**
- - Chlamydia *A56.0*
- - gonocoques *A54.0*
- - rayons *N30.4*
- - trichomonas *A59.0+, N33.8**
- aiguë *N30.0*
- - hémorragique *N30.0*
- allergique *N30.8*

Cystite –*suite*
- amibienne *A06.8+, N33.8**
- atrophique *N30.2*
- bactérienne *N30.8*
- blennorragique *A54.0*
- bulleuse *N30.8*
- cas de
- - calcul de vessie *N21.0*
- - grossesse *O23.1*
- - hypertrophie prostatique *N41.3*
- - prostatite *N41.3*
- chronique *N30.2*
- - interstitielle *N30.1*
- cicatricielle *N30.8*
- colpocystite *N76.0*
- cours de la grossesse *O23.1*
- diffuse *N30.8*
- diphtérique *A36.8+, N33.8**
- E Coli *N30.8, B96.2!*
- E. coli *N30.8, B96.2!*
- éosinophile *N30.8*
- exsudative *N30.9*
- fibrineuse *N30.9*
- gangréneuse *N30.8*
- gonococcique *A54.0*
- gonorrhéique *A54.0*
- granulomateuse *N30.8*
- hémorragique *N30.9*
- hyperplastique *N30.9*
- interstitielle *N30.1*
- intra-murale *N30.8*
- intramurals *N30.8*
- kystique *N30.8*
- - granulomateuse *N30.8*
- kystique granulomateuse *N30.8*
- mère avec répercussion sur le fœtus/nouveau-né *P00.1*
- parenchymateuse *N30.8*
- péricystite *N30.9*
- péri-spermatocystite *N49.9*
- plancher vésical *N30.9*
- post-partum *O86.2*
- prostato-cystite *N41.3*
- pseudo-membraneuse *N30.9*
- puerpérale *O86.2*
- purulente *N30.9*
- pyélocystite *N12*
- radique *N30.4*
- récidivante *N30.2*
- septique *N30.9*
- sous-muqueuse *N30.1*
- spermatocystite *N49.0*
- - post gonorrhéique *A54.2+, N51.8**
- subaiguë *N30.0*
- suppurative *N30.9*
- syphilitique tardive *A52.7+, N33.8**
- trigonite *N30.3*
- tuberculeuse *A18.1+, N33.0**
- ulcéreuse *N30.8*
- urétérale *N30.8*
- urétrale *N34.2*
- urétro-trigonite *N30.3*

Cysto
- entérocèle *N81.1*
- pyélonéphrite *N12*
- rectocèle, chez la femme *N81.1*
- urétrite *N34.2*
- urétrocèle *N81.1*

Cysto –*suite*
- urétrocèle –*suite*
- - chez la femme *N81.1*
- - chez l'homme *N32.8*

Cystocèle *N81.1*
- avec
- - césarienne *O34.8*
- - urétrocèle, chez la femme *N81.1*
- chez l'homme *N32.8*
- chez/au cours de
- - femme *N81.1*
- - grossesse *O34.8*
- - l'accouchement *O34.8*
- deuxième degré, chez la femme *N81.1*
- féminine *N81.1*
- méningo-cystocèle *Q05.9*
- mère avec répercussion sur le fœtus/nouveau-né *P03.8*
- myélocystocèle *Q05.9*
- obstruction à la naissance *O65.5*
- premier degré, chez la femme *N81.1*
- troisième degré, chez la femme *N81.1*

Cystoïde, œdème maculaire *H35.8*
- héréditaire dominant *H35.8*
- post-opératoire *H59.8*

Cystolithiase *N21.0*

Cystome
- mucineux *D27*
- ovaire *D27*
- séreux *D27*

Cystoplégie *N31.2*

Cystoptose *N32.8*

Cystopyélite *N12*
- aiguë *N10*
- avec calcul *N20.9*
- chronique *N11.9*
- cours de la grossesse *O23.3*
- post-partum *O86.2*

Cystorragie *N32.8*

Cystosarcome *D48.6*

Cystosarcome phyllode [tumeur de Brodie] *D48.6*
- bénin *D24*
- malin *C50.9*

Cystostome
- existence *Z93.5*
- soins *Z43.5*

cystostomie
- Déplacement sonde (de) : *T83.0*
- Fuite sonde (de) : *T83.0*

Cystostomie, avec complication *N99.5*

Cystostomie, infection du Cathéter *T83.5*

Cytarabine, intoxication *T45.1*

Cytodiagnostic exfoliatif *Z01.7*

Cytogénétique, anomalie *Q99.9*

Cytoïde, corps (rétine) *H34.2*

Cytologique
- dysgénésie, lymphoblastique héréditaire *D82.1*
- résultats
- - anormaux *R89.6*
- - - durant
- - - - dépistage prénatal *O28.2*
- - - - l'examen prénatal systématique de la mère *O28.2*

Cytologique –*suite*
- résultats –*suite*
- - anormaux –*suite*
- - - urine *R82.8*
- - suspects, prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme *R87.6*

Cytolyse *D75.8*

Cytome
- anaplasique *C80*
- épendymocytome *C71.9*
- esthesioneurocytome *C30.0*
- gangliocytome *D36.1*
- histiocytome *D23.9*
- immunocytome *C83.0*
- pinéalocytome *D44.5*
- spermatocytome *C62.9*

Cytomégaliques, maladie des inclusions *B25.9*

Cytomégalovirus (voir cytomégalie)

Cytomegalovirus, infection à *B25.9*
- adrénalite *B25.88+, E35.1**
- angéite *B25.88*
- bronchiolite *J20.8*
- bronchite *J20.8*
- cas de maladie due au VIH *B20, B25.9*
- cholangite *B25.88+, K93.8**
- colite *B25.80+, K93.8**
- congénitale *P35.1*
- dermite *B25.88+, L99.8**
- duodénite *B25.80+, K93.8**
- encéphalite *B25.88+, G05.1**
- encéphalomyélite *B25.88+, G05.1**
- entérite *B25.80+, K93.8**
- entérocolite *B25.80+, K93.8**
- Ependymite *B25.88+, G05.1**
- gastrite *B25.80+, K93.8**
- glomérulonéphrite *B25.88+, N08.0**
- glossite *B25.88+, K93.8**
- hépatite *B25.1+, K77.0**
- Hypophysite *B25.88+, G05.1**
- iléite *B25.80*
- jéjunite *B25.80+, K93.8**
- mononucléose *B27.1*
- myélite *B25.88+, G05.1**
- myosite *B25.88+, M63.29**
- œsophagite *B25.80+, K23.8**
- pancréatite *B25.2+, K87.1**
- parathyroïdite *B25.88+, E35.8**
- pharyngite *J02.8, B97.8!*
- pneumonie *B25.0+, J17.1**
- proctite *B25.80+, K93.8**
- prostatite *B25.88+, N51.0**
- rétinite *B25.88+, H32.0**
- sialadénite *B25.88+, K93.8**
- thyroïdite *B25.88+, E35.0**
- trachéite *J04.1*
- trachéo-bronchite *J20.8*
- vasculite *B25.88*
- vésiculite *B25.88+, N51.8**

Cytopathie mitochondriale *G31.81*

Cytopénie *D61.9*
- acquise *D61.9*
- avec malformation *D61.0*
- congénitale *D61.0*
- due à une chimiothérapie *D61.10*
- splénogène, primaire *D73.1*

Cytostatique
- Aplasie médullaire anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement *D61.10*
- chimiothérapie pour tumeur maligne dans les antécédents personnels *Z92.6*
- thérapie, en cas de maladie non maligne *Z51.2*

Cytostatiques, effets secondaires *T45.1*

Cytotoxiques, médicaments absorbés par l *P04.1*

Da Costa, syndrome [syndrome d'hypervent *F45.37*
Dacarbazine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*
Dacryoadénite *H04.0*
- aiguë *H04.0*
- chronique *H04.0*
Dacryocystite *H04.3*
- aiguë *H04.3*
- - néonatale *P39.1*
- chronique *H04.4*
- néonatale *P39.1*
- phlegmoneuse *H04.3*
- - aiguë *H04.3*
- - subaiguë *H04.3*
- subaiguë *H04.3*
- syphilitique *A52.7+, H06.0**
- - congénitale *A50.0+, H06.0**
- syphilitique tardive *A52.7+, H06.0**
Dacryocystoblennorrhée *H04.4*
Dacryocystocèle *H04.6*
Dacryolithe *H04.5*
- rhino- *H04.5*
Dacryolithiase *H04.5*
Dacryome *H04.6*
Dacryopéricystite *H04.3*
- aiguë *H04.3*
- chronique *H04.4*
- subaiguë *H04.3*
Dacryops *H04.1*
Dacryopsialadénopathie atrophique *M35.0*
Dacryosialadénopathie atrophique *M35.0*
Dactylite *L08.9*
- avec atteinte osseuse *M86.99*
- syphilitique *A52.7+, M90.19**
- tuberculeuse *A18.0+, M90.09**
Dactylolyse
- spontanée *L94.6*
- spontanée [aïnhum] *L94.6*
Dagga (cannabis), dépendance *F12.2*
Daltonisme *H53.5*
Dana (syndrome de-) *D51.3+, G32.0**
Danbolt (syndrome de-) (Acrodermatite en *E83.2*
Dandy-Walker (syndrome de -) *Q03.1*
Dandy-Walker, malformation de *Q03.1*
Dandy-Walker, syndrome de *Q03.1*
Danger, en état de
- foetus *P20.9*
- intra-utérin *P20.9*
Danger, suicide, diagnostic codé *R45.8*
Danlos (syndrome d'Ehlers -) *Q79.6*
Darbépoétine alpha
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*
Darier (syndrome de Bowen -) *D04.9*
Darier I, syndrome de *Q82.8*
Darier Roussy, sarcoïde de *D86.3*
Darier, maladie de
- dyskératose folliculaire *Q82.8*
- - végétante *Q82.8*
Darier, maladie de [érythème annulaire c *L53.1*
Darier-Roussy, sarcoïde de *D86.3*
Dartre *B36.9*
- barbe *L73.8*
- cuir chevelu (barbe) *B35.0*
- dermatophytose *B35.9*
- dermite vésiculaire *B00.1*
- - fébrile *B00.1*
- imbriquée *B35.5*
- impétigo *L01.0*
- lichen plan *L43.9*
- membre inférieur *B35.6*
- périorale *B35.0*
- pied *B35.3*
- - mycosique *B35.3*
- pityriasis versicolor *B36.0*
- psoriasis *L40.9*
- sèche *B36.9*
Dawson, encéphalite de *A81.1*
death syndrome SIDS Sudden infant *R95*
Débilité *F70.9*
Débit urinaire, anomalie *N13.9*
- fonctionnelle *N31.9*
- mécanique *N13.9*
Débranchement, enzyme de, carence *E74.0*
Debray Looser Milkman, syndrome de *M83.89*
Debré, Fanconi, De Toni, syndrome de *E72.0*
Debré, syndrome de *A28.1*
Début
- aigu, avec démence, vasculaire *F01.0*
- miction, trouble *R39.1*
Débutant
- cataracte *H26.9*
- gonarthrose *M17.9*
Décalage de la ligne médiane maxillaire *K07.2*
Décalage machoire *K07.2*
Décalcification
- dents *K03.8*
- os *M81.99*
Décapitation *S18*
- foetus, pour faciliter l'accouchement *P03.8*
Décarboxylase, carence *E71.0*
Décérébration, syndrome *G93.80*
Décès *R99*
- pendant la période de gestation *O95*
Décès de vieillesse *R54*
Décès sans témoin *R98*
Déchirure
- anale *S31.80*
- - non traumatique *K60.2*
- ancienne
- - avec
- - - ablation, ménisque *M23.29*
- - - lésion, ménisque *M23.29*
- - col de l'utérus *N88.1*
- - col utérin *N88.1*
- anus, complications, accouchement *O70.2*
- aorte *I71.8*
- artère *I77.2*

Déchirure –*suite*
- articulation *T14.3*
- bassin, organes
- - cas d'avortement, médical, échoué *O07.3*
- - complication, lors de l'avortement, échoué *O07.8*
- - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.5*
- capsule
- - articulaire *T14.3*
- - articulation du doigt, avec entorse *S63.60*
- - articulation, traumatique *T14.3*
- - foie *S36.13*
- - rénale *S37.02*
- cartilage
- - articulaire du genou, aigue *S83.3*
- - articulation, ancienne *M24.19*
- - semi-lunaire *S83.2*
- cérébrale, avec hématome, cerveau *S06.28*
- cerveau, cervelet *S06.38*
- cerveau, lésion congénitale *P10.1*
- choroïde *H31.3*
- cicatrice, césarienne *O90.0*
- clitoris *S31.4*
- coeur *S26.88*
- - avec ouverture, caverne cardiaque *S26.83*
- - sans ouverture, caverne cardiaque *S26.82*
- coin de l'oeil, en cas de plaie ouverte *S01.1*
- col utérin
- - ancienne *N88.1*
- - complications, accouchement *O71.3*
- - lors de la naissance *O71.3*
- - non-puerpérale, non-traumatique *N88.1*
- - traumatique *S37.6*
- cordon ombilical
- - avec lésion, foetus/nouveau né *P50.1*
- - complications, accouchement *O69.8*
- corps ciliaire *S05.3*
- décollement de la rétine *H33.0*
- ectropion du col de l'utérus *N86*
- examen *O71.3*
- existante, lors d'actes médicaux, avec complications *T81.2*
- fer à cheval *H33.3*
- - avec décollement de la rétine *H33.0*
- - rétinienne *H33.3*
- foie *S36.12*
- - grave *S36.15*
- - moyennement grave *S36.14*
- géante (sans déchirure de l'ora), en cas de décollement de la rétine *H33.0*
- intestin, complications, accouchement *O71.5*
- intestinale *K63.1*
- iris *S05.3*
- lacération *T14.1*
- - ancienne
- - - col de l'utérus *N88.1*
- - - intestin *N81.8*
- - - plancher pelvien *N81.8*
- - - rectovaginal *N89.8*
- - - vagin *N89.8*
- - annexes oculaires NCA *S01.1*

Déchirure –*suite*
- lacération –*suite*
- - anus
- - - avec lacération
- - - - muqueuse anale, complication, accouchement *O70.3*
- - - - muqueuse retcum, complication, accouchement *O70.3*
- - - complication, accouchement *O70.2*
- - - non puerpérale, non-traumatique *K60.2*
- - avec avortement, période de soins consécutifs *O08.6*
- - cérébrale
- - - diffuse *S06.20*
- - - limitée *S06.30*
- - - lors de la naissance *P10.8*
- - - suite à un traumatisme obstétrical, avec hémorragie *P10.1*
- - cervelet *S06.28*
- - coeur *S26.88*
- - - avec hémopéricarde *S26.0*
- - col de l'utérus
- - - lors d'un accouchement compliqué, blessure de la mère *O71.3*
- - - non puerpérale, non-traumatique *N88.1*
- - - traumatique *S37.6*
- - cordage
- - - tendineux NCA *I51.1*
- - - tendineux, après infarctus duu myocarde, aigu *I23.4*
- - cortex, cérébral *S06.28*
- - globe oculaire
- - - avec
- - - - incident, tissus intraoculaires *S05.2*
- - - - perte, tissus intraoculaires *S05.2*
- - - plaie pénétrante *S05.6*
- - - sans prolapsus *S05.3*
- - intestin, lésion chez la mère suite à un accouchement compliqué *O71.5*
- - intracrânienne NCA *S06.28*
- - intracrânienne, suite à un traumatisme obstétrical *P10.9*
- - lèvres, complication, accouchement *O70.0*
- - ligament *T14.3*
- - Ligamentum latum uteri ou ligament large de l'utérus, traumatisme obstétrical chez la mère *O71.6*
- - méninges *S06.28*
- - ménisque *S83.2*
- - - traumatisme ancien *M23.29*
- - moëlle épinière *T09.3*
- - - chez le nouveau-né *P11.59*
- - multiples endroits *T01.9*
- - organes pelviens, lors de la naissance *O71.5*
- - paupière *S01.1*
- - périnéale au niveau de la fourchette ou Frenulum labiorum pudendi, complication, accouchement *O70.0*
- - périnée *S31.0*
- - - ancienne *N81.8*
- - - centrale, complication, accouchement *O70.9*
- - péritoine, traumatisme obstétrical chez la mère *O71.5*
- - plancher pelvien *S31.0*
- - - complication, accouchement *O70.1*
- - - ne concernant pas la période puerpérale *S31.0*

Déchirure –*suite*
- lacération –*suite*
- - post-partum, col de l'utérus *N88.1*
- - prévisible, comme complication opératoire *T81.2*
- - rectovaginale
- - - avec participation, périnée, lors de la naissance *O70.2*
- - - complication, accouchement *O71.4*
- - septum rectovaginal *S31.80*
- - sphincter anal *S31.80*
- - tendon *T14.6*
- - tente du cervelet tentorium cerebelli *S06.28*
- - tissu cérébral
- - - diffuse *S06.28*
- - - durant la naissance *P10.8*
- - - limitée *S06.30*
- - tissu, péri-urétral *S37.88*
- - - comme traumatisme obstétrical chez la mère *O71.5*
- - urétrale, traumatisme obstétrical chez la mère *O71.5*
- - utérus *N85.8*
- - - ancienne *N85.8*
- - - comme traumatisme obstétrical chez la mère NCA *O71.1*
- - - non puerpérale, non traumatique *N85.8*
- - vagin *S31.4*
- - - avec participation, périnée, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - complication, accouchement *O71.4*
- - - non puerpérale, non traumatique *N89.8*
- - vessie *S37.28*
- - - comme traumatisme obstétrical chez la mère *O71.5*
- - vulve *S31.4*
- - - ancienne *N90.8*
- - - complication, accouchement *O70.0*
- - - non puerpérale, non traumatique *N90.8*
- lèvres *S31.4*
- ligament *T14.3*
- - collatéral
- - - articulation du genou *S83.40*
- - - fibulaire, genou
- - - - complète *S83.43*
- - - - partielle *S83.43*
- - - tibia, genou
- - - - complète *S83.44*
- - - - partielle *S83.44*
- - croisé *S83.50*
- - - arrière
- - - - complète *S83.54*
- - - - partielle *S83.54*
- - - avant
- - - - complète *S83.53*
- - - - partielle *S83.53*
- - externe, genou
- - - complète *S83.43*
- - - partielle *S83.43*
- - genou
- - - ancienne *M23.59*
- - - spontanée *M23.59*
- - interne, genou
- - - complète *S83.44*
- - - partielle *S83.44*
- - large de l'utérus *N83.8*

Déchirure –*suite*
- ligament –*suite*
- - large de l'utérus –*suite*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.6*
- - latéral coude, ulnaire *S53.3*
- - traumatique *T14.3*
- longitudinale du ménisque *S83.2*
- - aigu *S83.2*
- - Cartilage, semi-lunaire *S83.2*
- - - externe *S83.2*
- - - - aigu *S83.2*
- méninges *S06.8*
- ménisque *S83.2*
- - aigue *S83.2*
- - - ancienne *M23.29*
- - - genou *S83.2*
- - - interne *S83.2*
- - - - aigu *S83.2*
- - interne *S83.2*
- - - genou *S83.2*
- - interne en anse de seau *S83.2*
- - latérale, genou *S83.2*
- mésentérique *S36.82*
- multiples, cerveau, cervelet *S06.28*
- muqueuse anale, avec complications à l'accouchement *O70.3*
- muqueuse gastrique *K22.6*
- muscle *T14.6*
- - ancienne *M62.19*
- - - Plancher pelvien *N81.8*
- - fémur, supérieur *S76.4*
- - mollet *S86.9*
- - non traumatique *M62.19*
- - vaginal, complications accouchement *O70.1*
- musculaire *T14.6*
- - fémur, supérieur *S76.4*
- - mollet *S86.9*
- oculaire, avec rupture oculaire *S05.3*
- oeil *S05.3*
- - avec prolapsus, et perte de tissu intra-oculaire *S05.2*
- - sans prolapsus, sans perte de tissu intra-oculaire *S05.3*
- parenchyme rénal *S37.03*
- paupière *S01.1*
- périnéale, secondaire, en couche *O90.1*
- périnée *S31.0*
- - ancienne, post partum *N81.8*
- - avec
- - - déchirure
- - - - muscles vaginaux, compliquant l'accouchement *O70.1*
- - - - vagin, compliquant l'accouchement *O70.0*
- - - particîpation
- - - - cloison rectovaginale, lors de l'accouchement *O70.2*
- - - - fourchette vulvaire, lors de la naissance *O70.0*
- - - - hymen, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - - lèvres, lors de la naissance *O70.0*
- - - - lèvres, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - - muqueuse anale, lors de l'accouchement *O70.3*
- - - - muqueuse rectale, lors de l'accouchement *O70.3*

Déchirure –*suite*
- périnée –*suite*
- - avec –*suite*
- - - particîpation –*suite*
- - - - musculature périnéale, lors de l'accouchement *O70.1*
- - - - musculature vaginale, lors de l'accouchement *O70.1*
- - - - plancher pelvien, lors de l'accouchement *O70.1*
- - - - sphincter, lors de l'accouchement *O70.2*
- - - - vagin, lors de la naissance *O70.0*
- - - - vulve, lors de la naissance *O70.0*
- - avec implication
- - - fourchette vulvaire, lors de la naissance *O70.0*
- - - lèvres, lors de la naissance *O70.0*
- - - peau, lors de la naissance *O70.0*
- - - vagin, lors de la naissance *O70.0*
- - - vulve, lors de la naissance *O70.0*
- - bégnine, lors de la naissance *O70.0*
- - cas de
- - - accouchement *O70.9*
- - - naissance
- - - - 1er degré *O70.0*
- - - - 3ème degré *O70.2*
- - - - 4ème degré *O70.3*
- - - - second degré *O70.1*
- - centrale, lors de l'accouchement *O70.9*
- - chez l'homme *S31.0*
- - cicatrisation, secondaire *O90.1*
- - complications, accouchement *O70.0*
- - - *O70.1*
- - déhiscence *O90.1*
- - hématome, en couche *O90.2*
- - non associée à un accouchement *S31.0*
- - postpartum *O90.1*
- - secondaire *O90.1*
- - suite à une épisiotomie *O70.9*
- périnéo-vaginale *S31.4*
- péritoneum, complications, accouchement *O71.5*
- plaie *T14.1*
- - multiples *T01.9*
- plaie opératoire NCA *T81.3*
- poumons *S27.32*
- rate *S36.08*
- - avec implication parenchyme *S36.03*
- - capsule, sans atteinte plus importante du parenchyme *S36.02*
- récente, en cas d'entorse, ménisque *S83.2*
- reins *S37.03*
- - avec lésion
- - - bassinet *S37.02*
- - - capsule rénale *S37.02*
- rétinienne
- - avec décollement, rétine *H33.0*
- - fer à cheval, sans décollement *H33.3*
- - sans décollement de la rétine *H33.3*
- rupture, ménisque *S83.2*
- - aigue *S83.2*
- - Cartillage, semi-lunaire *S83.2*
- - ménisque interne *S83.2*
- - - aigue *S83.2*
- - Ménisque, externe *S83.2*
- - - aigue *S83.2*

Déchirure –*suite*
- rupture, ménisque –*suite*
- - ménisque, genou *S83.2*
- sphincter anal *S31.80*
- - muqueuse anale, complication, accouchement *O70.3*
- - rectum, muqueuse, complications, accouchement *O70.3*
- tendon *T14.6*
- tendon d'Achille *S86.0*
- tente du cervelet, due à une lésion congénitale *P10.4*
- tissu, péri-urétral, lors de la naissance *O71.5*
- urètre, complications, accouchement *O71.5*
- urètre, congénitale *O71.5*
- utérus *S37.6*
- - avant les contractions *O71.0*
- - compliquant l'accouchement *O71.1*
- vagin *S31.4*
- - avec déchirure périnée, complications, accouchement *O70.0*
- - haute lors de l'accouchement *O71.4*
- - - sans déchirure périnée, *O71.4*
- vaginale *S31.4*
- - ancienne *N89.8*
- - et périnéale *S31.4*
- - - lors de l'accouchement
- - - - 1er degré *O70.0*
- - - - 2ème degré *O70.1*
- - - - 3ème degré *O70.2*
- - - - 4ème degré *O70.3*
- Vaisseau sanguin *T14.5*
- vessie *N32.4*
- - complications, accouchement *O71.5*
- - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.5*
- - traumatique *S37.22*
- vulve
- - ancienne *N90.8*
- - complications, accouchement *O70.0*

Déciduome *C58*

Deciduome malin *C58*

Déclenchement, menstruation (pour la con *Z30.3*

Déclin dégradation
- corporel *R68.8*
- - généralisé *R53*
- dent *K02.9*
- - due à des causes systémiques *K08.0*
- forces *R53*

Déclin musculaire, syndrome *T79.5*

Décollée, oreille *Q17.5*

Décollement
- choroïde *H31.4*
- col utérin, annulaire, lors d'accouchement *O71.3*
- corps vitré *H43.8*
- - hémorragique *H43.1*
- couche de la rétine *H35.7*
- oreille *Q17.5*
- placentaire, complication de l'accouchement *O45.9*
- pubis, lors d'accouchement *O71.6*
- rétine *H33.2*
- - *H33.5*
- - avec déchirure *H33.0*
- - couche pigmentaire *H35.7*

Décollement –*suite*
- rétine –*suite*
- - épithelium pigmentaire *H35.7*
- - rhegmatogène *H33.0*
- - sans déchirure, rétine *H33.2*
- - séreux *H33.2*
- - - sans déchirure, rétine *H33.2*
- - suite à
- - - rupture, rétine, traumatique *H33.0*
- - - trou, rétine *H33.0*
- - - vitréo-rétinopathie proliférante *H33.4*
- symphyse, lors d'accouchement *O71.6*
- traction, par
- - avec
- - - décollement de la rétine, ancien *H33.4*
- - - rétinopathie diabétique *E14.30+, H36.0**
- - - - cas de
- - - - - diabète de type 1, *E10.30+, H36.0**
- - - - - diabète de type 2, *E11.30+, H36.0**
- - rétine *H33.4*

Décoloration
- dent *K03.7*
- - due à
- - - Dépôt *K03.6*
- - - métaux *K03.7*
- - - saignement, pulpaire *K03.7*
- - extrinsèque *K03.6*
- - intrinsèque NCA *K00.8*
- ongle NCA *L60.8*
- précoce des cheveux *L67.1*
- système pileux (Canitie) *L67.1*
- - cheveux *L67.1*
- - - congénitale *Q84.2*
- - - précoce *L67.1*
- urine *R82.9*

Décompensation
- bronchopulmonaire *J98.8*
- cardiaque *I51.9*
- - aiguë *I51.9*
- - chez la personne âgée *I51.9*
- - chronique *I51.9*
- - gauche *I50.19*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- cardiopulmonaire *R09.2*
- cardiorénale *I13.20*
- cardiorespiratoire *R09.2*
- cardiovasculaire *I51.6*
- coeur
- - avec hypertension *I11.00*
- - biventriculaire *I51.9*
- coeur sénile *I51.9*
- cornée, avec kératopathie bulleuse *H18.1*
- détrusor, vessie *N31.2*
- globale, avec insuffisance cardiaque *I50.01*
- greffe de cornée *T86.83*
- hépatique *K72.9*
- myocarde, biventriculaire *I51.9*
- myocardique *I51.9*
- organes respiratoires *J98.8*
- péricardite (dans la) *I31.9*
- psychique *F43.9*
- - aiguë *F43.0*

Décompensation –*suite*
- psychovégétative *F45.9*
- rénale *N19*
- respiratoire *J98.8*
- ventricule gauche *I50.19*
- vésicale *N32.9*

Décompensé(e)
- adénome thyroïdien *D34*
- - autonome *D34*
- akinésie, myocarde *I50.9*
- cardiopathie ischémique chronique *I25.9*
- cirrhose du foie *K74.6*
- cyclophorie *H50.5*
- ésophorie *H50.5*
- exophorie *H50.5*
- hyperphorie *H50.5*
- hypophorie *H50.5*
- insuffisance
- - cardiaque *I50.9*
- - myocardique *I50.9*
- insuffisance congestive *I50.01*
- insuffisance ventriculaire droite *I50.01*
- insuffisance ventriculaire gauche *I50.19*
- métabolisme *E88.9*

Décompression, maladie de la *T70.3*

Décontraction, manque de *Z73*

Découragement *R45.3*

Décubitus *L89.99*
- de 1er degré *L89.0*
- infection *L89.99*
- nécrose *L89.99*
- ulcère *L89.99*
- - bassin *L89.93*
- - col de l'utérus *N86*
- - coude *L89.91*
- - cuisse *L89.98*
- - hanche *L89.93*
- - jambe *L89.98*
- - mollet *L89.98*
- - pied *L89.98*
- - présacré *L89.94*
- - région anale *L89.99*
- - sacré *L89.94*
- - sacrum *L89.94*
- - talon *L89.97*

Décubitus, présacré *L89.94*

Dédoublement vésicule biliaire *Q44.1*

Défaillance
- amnésie *F04*
- cardiaque *I50.9*
- - aigue *I50.9*
- - biventriculaire *I50.01*
- - chez le nouveau-né *P29.0*
- - congénitale *P29.0*
- - congestive *I50.01*
- - due à
- - - anésthésie
- - - - couche *O89.1*
- - - - pendant
- - - - - grossesse, *O29.1*
- - - - - accouchement, *O74.2*
- - - blocage *I50.01*
- - - prothèse cardiaque *I97.1*
- - hypertensive *I11.00*
- - lors d'une opération *T81.8*

Défaillance –*suite*
- cardiaque –*suite*
- - mécanique, due à une prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- - post-opératoire *I97.8*
- - rhumatisme *I09.9*
- - sénile *I50.9*
- - suite à
- - - accouchement par césarienne *O75.4*
- - - acte chirurgical *I97.8*
- - - actes pour provoquer l'accouchement *O75.4*
- - thyréotoxique *E05.9+, I43.8**
- cardio-pulmonaire *R09.2*
- cardio-rénale, avec hypertonie *I13.20*
- cardio-respiratoire *R09.2*
- cardio-vasculaire, chronique *I50.9*
- cathéter NCA *T85.6*
- centre respiratoire *G93.88*
- circulation *R57.9*
- - chez le fœtus et le nouveau-né *P96.8*
- - périphérique *R57.9*
- circulation sanguine *I50.9*
- dysmnésie *F04*
- fixation, interne, orthopédique NCA *T84.2*
- fonction ventriculaire, en cas d'insuffisance cardiaque *I50.9*
- fonction, testiculaire, endocrine *E29.1*
- greffe de foie *T86.49*
- greffon de peau *T86.59*
- hallucinatoire
- - non alcoolique, organique *F06.0*
- - organique *F06.0*
- hépatique *K72.9*
- - aigue *K72.0*
- - alcoolique *K70.4*
- - - aigue *K70.4*
- - - chronique *K70.4*
- - - subaiguë *K70.4*
- - après un acte médical *K91.88*
- - cas de
- - - hépatite
- - - - aigue *K72.9*
- - - - fulminante *K72.9*
- - - - maligne, NCA *K72.9*
- - - nécrose, cellules hépatiques *K72.9*
- - chronique *K72.1*
- - due à
- - - drogues *K71.1*
- - - médication *K71.1*
- hépato-rénal *K76.7*
- intubation, pendant anésthésie *T88.4*
- lactation *O92.30*
- - partie, en couche *O92.40*
- lentille, intra-oculaire, mécanique *T85.2*
- mécanique
- - implant, gastro-intestinal *T85.5*
- - transplantation, gastro-intestinale *T85.5*
- muscle cardiaque *I50.9*
- myocarde *I50.9*
- - avec blocage *I50.01*
- - chronique *I50.9*
- organes, plusieurs *R68.8*
- - cas de sépticémie *A41.9, R65.1*
- organique, paranoïa *F22.8*
- ovarienne
- - après un acte médical *E89.4*

Défaillance –*suite*
- ovarienne –*suite*
- - primitive *E28.3*
- ovulation, avec stérilité *N97.0*
- paranoïa
- - organique *F06.2*
- - sénile *F03*
- paranoïa, hallucinations, organique *F06.2*
- pluriglandulaire, auto-immune *E31.0*
- polyviscérale *R68.8*
- - cas de septicémie *A41.9, R65.1*
- pompage
- - biventriculaire *I50.01*
- - myocarde *I50.9*
- poumon *J96.9*
- - aigue *J96.0*
- - après un acte médical *J95.88*
- - chronique *J96.1*
- prothèse
- - articulaire *T84.0*
- - mammaire *T85.4*
- - orbitaire NCA *T85.3*
- pulmonaire *J96.9*
- reins *N19*
- - acide urique *N19*
- - aigue *N17.9*
- - - avec
- - - - autres résultats, histologie *N17.8*
- - - - nécrose
- - - - - tubulaire, *N17.0*
- - - - - croute, aigue, *N17.1*
- - - - - médullaire, *N17.2*
- - - - - papille, *N17.2*
- - - - - papille, aigue, *N17.2*
- - - pendant le travail *O75.8*
- - - post-partum *O90.4*
- - - post-rénale *N17.8*
- - - pré-rénale *N17.8*
- - - sans résultat, histologie *N17.9*
- - avec nécrose, tubulaire *N17.0*
- - cas de
- - - affection, coeur, hypertension *I13.10*
- - - avortement, médical, échoué *O07.3*
- - - écrasement *T79.5*
- - - hypertension *I12.00*
- - - nécrose, foie, en couche *O90.4*
- - chronique *N18.9*
- - complication, lors de l'avortement, échoué *O07.8*
- - congénitale *P96.0*
- - couche *O90.4*
- - dialyse, assujettie *N19*
- - extra-rénale *N19*
- - hypertension *I12.00*
- - mère, avec lésion, foetus/nouveau-né *P00.1*
- - post-rénale *N19*
- - pré-rénale *N19*
- - suite à
- - - acte médical *N99.0*
- - - avortement *O08.4*
- - - chimiothérapie *N99.0*
- - - examen par contraste *N99.0*
- - - grossesse extra-utérine *O08.4*
- - - grossesse môlaire *O08.4*
- - - hypertonique *I12.00*
- réponse, génitale *F52.2*
- respiration *G93.88*

Défaillance –*suite*

- respiration, chez le nouveau-né *P28.5*
- respiratoire *R09.2*
- respiratoire, chez le nouveau-né *P28.5*
- ségmentation
- - coccyx *Q76.4*
- - doigts *Q70.0*
- - orteil *Q70.2*
- sénile, générale *R54*
- shunt, ventriculaire, intracrânien *T85.0*
- transplant de cellules de la moëlle osseuse *T86.00*
- transplant mammaire *T86.88*
- transplantation *T86.9*
- - artérielle NCA *T82.3*
- - avec rejet *T86.9*
- - cardiaque *T86.2*
- - coeur-poumons *T86.3*
- - cornée NCA *T85.3*
- - intestinale *T86.88*
- - os *T86.88*
- - pancréas *T86.82*
- - post-transplantation
- - - hépatique *T86.49*
- - - rénale *T86.19*
- - poumons *T86.81*
- - reins *T86.19*
- vasculaire, mécanique, due à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- ventriculaire *I50.9*
- - droit *I50.01*
- - - suite à une insuffisance cardiaque *I50.01*
- - gauche *I50.19*
- - - hypertensive *I11.00*
- - gauche, droit *I50.01*
- vitale, chez le nouveau-né *P91.88*

Défaillant, -te, faible, troubles

- éducation *Z55*
- menstruation *N91.5*
- miction *R39.1*
- nouveau-né *P96.8*
- pouls *R09.8*
- respiration, due à un choc suite à une lésion *T79.4*

Défaut

- cardiaque *I38*
- - acquis *I38*
- - congénital *Q24.9*
- - rhumatismal *I09.1*
- déficit, anomalie
- - 21-Hydroxylase
- - - forme classique *E25.00*
- - - forme tardive *E25.01*
- - asociale *F60.2*
- - bassinet *Q63.8*
- - - obstruction *Q62.3*
- - biosynthèse, androgène, testiculaire *E29.1*
- - Canal auriculo-ventriculaire *Q21.2*
- - catalase *E80.3*
- - cerveau, substance *Q04.3*
- - chaine légère kappa *D80.8*
- - champ visuel *H53.4*
- - chromosomique *Q99.9*
- - circulation *I99*
- - - chez le nouveaux-né *Q28.9*
- - - congénital *Q28.9*
- - coagulation *D68.9*

Défaut –*suite*

- déficit, anomalie –*suite*
- - coagulation –*suite*
- - - à
- - - - carence, vitamine K *D68.4*
- - - - hypoprothrombinémie *D68.4*
- - - - maladie hépatique *D68.4*
- - - acquise *D68.4*
- - - avec
- - - - perte, placenta, prématurée, avec hémorragie *O45.0*
- - - - saignement
- - - - - antepartum, *O46.0*
- - - - - complications, accouchement, *O67.0*
- - - intrapartum *O67.0*
- - - postpartum *O72.3*
- - - transitoire, chez le nouveaux-né *P61.6*
- - complément *D84.1*
- - complexe majeur d'histocompatibilité
- - - classe
- - - - I *D81.6*
- - - - II *D81.7*
- - complexe récepteur de la membrane cellulaire *D71*
- - conduction *I45.9*
- - cortex *Q04.8*
- - cortex rénal *N28.8*
- - couche des fibres nerveuses rétiniennes, avec suspicion de glaucome *H40.0*
- - crâne
- - - électif, après
- - - - craniectomie décompressive *M96.88*
- - - - intervention neurochirurgicale *M96.88*
- - - post-opératoire, en tant que complication *T88.8*
- - décollement de la rétine *H33.0*
- - d'Eisenmenger *Q21.88*
- - dent, cunéiforme *K03.1*
- - diaphragme, congénital, avec éventration *Q79.0*
- - ectodermique, congénital *Q82.9*
- - enzymatique
- - - avec
- - - - anémie *D55.9*
- - - - - hémolytique, *D55.9*
- - - - - hémolytique, héréditaire, *D55.9*
- - - - goitre *E07.1*
- - - induit par la médication, avec anémie, hémolytique *D59.2*
- - - lors de l'hormonosynthèse, avec goitre *E07.1*
- - fonction lymphocytaire antigène 1 (LFA-1) *D84.0*
- - foramen ovale *Q21.1*
- - hexokinase, avec anémie *D55.2*
- - immunitaire, cellulaire *D84.8*
- - iris, acquis *H21.5*
- - iris, pigmentation *H21.2*
- - langage NCA *R47.8*
- - langue, dû au développement NCA *F80.9*
- - membrane de Descemet, congénital *Q13.8*
- - mental *F79.9*
- - métabolisme de la billirubine NCA *E80.6*

Défaut –*suite*

- déficit, anomalie –*suite*
- - modification, post-traductionnelle, enzyme, lysosomale *E77.0*
- - moral *F60.2*
- - - cas de trouble de la personnalité *F60.2*
- - muqueuse gastrique *K25.9*
- - myocarde *I51.9*
- - oesophage, congénital *Q39.9*
- - organes respiratoires, congénital *Q34.9*
- - os, lors d'une fracture, machoire inférieure, ouverte *S02.60, S01.87!*
- - ostium
- - - primum *Q21.2*
- - - secundum *Q21.1*
- - paroi
- - - abdominale
- - - - antérieure, avec ectopie, viscères *Q79.5*
- - - - congénitale *Q79.5*
- - - estomac *K25.9*
- - - intra-ventriculaire *Q21.0*
- - paupière, après excision *H59.8*
- - peau *L98.9*
- - peroxydase *E80.3*
- - pigmentation, iris, post-opératoire *H59.8*
- - queue de cheval, due au développement *Q06.3*
- - réduction
- - - extrémité
- - - - inférieure *Q72.9*
- - - - supérieure *Q71.9*
- - - longitudinale
- - - - fémur *Q72.4*
- - - - fibula *Q72.6*
- - - - radius *Q71.4*
- - - - tibia *Q72.5*
- - - - ulna *Q71.5*
- - réparation de l'ADN, en cas d'ataxie cérébelleuse *G11.3*
- - replis, endocardiques *Q21.2*
- - Rétinaculum des extenseurs *M62.84*
- - rétine *H33.3*
- - - cas de décollement de la rétine *H33.0*
- - schizophrène *F20.5*
- - septum
- - - aorto-pulmonaire *Q21.4*
- - - atrio-ventriculaire, coeur NCA *Q21.0*
- - - atrium *Q21.1*
- - - entre aorte et artère pulmonaire NCA *Q21.4*
- - - interauriculaire, coeur NCA *Q21.1*
- - - interventriculaire, coeur NCA *Q21.0*
- - septum atrial *Q21.1*
- - - septum secundum, type *Q21.1*
- - septum auriculaire *Q21.1*
- - - acquis, ancien *I51.0*
- - - complication aiguë après infarctus du myocarde aigu *I23.1*
- - - congénital *Q21.1*
- - - et
- - - - septum ventriculaire *Q21.2*
- - septum cardiaque *Q21.9*
- - - acquise *I51.0*
- - - - atrium *I51.0*
- - - - chambre *I51.0*

Défaut –*suite*
- déficit, anomalie –*suite*
- - septum cardiaque –*suite*
- - - acquise –*suite*
- - - - oreillette *I51.0*
- - septum ventriculaire *Q21.0*
- - - *Q21.1*
- - - acquis *I51.0*
- - - acquis, ancien *I51.0*
- - - avec
- - - - atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte, hypertrophie, ventricule, droit *Q21.3*
- - - - sténose artério-pulmonaire, dextroposition, hypertrophie, ventricule, droit *Q21.3*
- - - bulbaire *Q21.0*
- - - cas de tétralogie de Fallot *Q21.3*
- - - complication aiguë après infarctus du myocarde aigu *I23.2*
- - - congénital *Q21.0*
- - - infundibulaire *Q21.0*
- - septum, atrio-ventriculaire *Q21.2*
- - sinus
- - - caverneux *I67.88*
- - - coronaire *Q21.1*
- - - veineux *Q21.1*
- - sinus coronaire *Q21.1*
- - thrombocytes *D69.1*
- - - qualitatif *D69.1*
- - tissus mous, prétibial, non traumatique *M79.96*
- - tube neural *Q05.9*
- - tympan *H73.8*
- - vasculaire
- - - congénital *Q27.9*
- - - local *I99*
- - voix *R49.8*
- fermeture, paupière *H02.2*
- parole NCA *R47.8*
- segmentation de la colonne vertébrale, avec scoliose *Q76.3*
- système de complément *D84.1*
- transformation, posttraductionnelle, enzymes lysosomiaux *E77.0*
- valvule
- - aortique *I35.8*
- - - et valvule mitrale *I08.0*
- - - non rhumatismal *I35.8*
- - - rhumatismal, chronique *I06.8*
- - mitrale *I05.8*
- - - et valvule aortique, chronique, rhumatismal *I08.0*
- - - non rhumatismal *I34.88*
- - - rhumatismal, chronique *I05.8*
- - pulmonaire *I37.8*
- - - rhumatismal *I09.8*
- - tricuspide *I07.8*
- - - rhumatismal *I07.8*

Défécation, douloureuse *R19.8*

Déférentite *N49.1*
- gonorrhéique *A54.2+, N51.8**
- - aiguë *A54.2+, N51.8**
- - chronique *A54.2+, N51.8**
- nodosa *N49.1*
- tuberculeuse *A18.1+, N51.8**

défibrillateur cardiaque
- implanté Adaptation et manipulation d ' un *Z45.01*

défibrillateur cardiaque –*suite*
- Présence de : *Z95.0*

Défibrillateur, implant

Déficit
- attention *F98.8*
- - cas de trouble avec hyperactivité *F90.0*
- auditif *H91.9*
- calorique sévère *E43*
- - avec marasme *E41*
- développement, valvule cardiaque, congénital *Q24.8*
- hormonal, syndrome, ménopause *N95.9*
- hormone Anti-Müller *E29.1*
- immunitaire *D84.9*
- - avec
- - - déficience, anticorps *D80.9*
- - - micromélie, disproportionnée *D82.2*
- - - réaction, déficit héréditaire, au virus d'Epstein-Barr *D82.3*
- - - thrombocytopénie, et eczéma *D82.0*
- - cas de
- - - aplasie, thymus *D82.1*
- - - dysplasie, thymus *D82.1*
- - - hypoplasie, thymus *D82.1*
- - - immunoglobuline M, élevée *D80.5*
- - cellulaire *D84.8*
- - combiné *D81.9*
- - - sévère, avec
- - - - dysgénésie, réticulaire *D81.0*
- - - - nombre de cellules B, faible *D81.2*
- - - - nombre de cellules T et B, faible *D81.1*
- - humorale *D80.9*
- - - avec
- - - - gammaglobulinémie normale *D80.6*
- - - - hypergammanoglobulinémie *D80.6*
- - sous traitement par cortisone *D84.8*
- - variable *D83.9*
- - - avec
- - - - anomalie des cellules T, surtout immunorégulatrices *D83.1*
- - - - auto-anticorps anti-
- - - - - cellules B, *D83.2*
- - - - - cellules T, *D83.2*
- - - - déviation prédominante, nombre et fonction des cellules B *D83.0*
- immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T *D81.1*
- immunitaire variable *D83.9*
- - avec
- - - anomalie prédominante en lymphocytes T immunorégulateurs *D83.1*
- - - anomalie prédominante en nombre et fonction des lymphocytes B *D83.0*
- - - autoanticorps anti-
- - - - lymphocyte T *D83.2*
- - - - lymphocytes B *D83.2*
- lactase, congénital *E73.0*
- - congénital *E73.0*
- mental *F79.9*
- morsure *K07.4*
- - due à
- - - déglutition anormale *K07.5*
- - - dent manquante *K07.3*

Déficit –*suite*
- morsure –*suite*
- - due à –*suite*
- - - respiration buccale *K07.5*
- neurologie ischémique réversible prolongé *I63.9*
- neurologique, prolongé, réversible, ischémique *I63.9*
- occlusion de la rangée de dents, due à
- - déglutition anormale *K07.5*
- - habitudes de succion digitale *K07.5*
- - habitudes de succion labiale *K07.5*
- - habitudes de succion linguale *K07.5*
- - respiration buccale *K07.5*
- phosphofructokinase musculaire *E74.0*
- postural
- - cyphotique, colonne vertébrale cervicale *M40.02*
- - scoliotique *M41.99*
- - thoraco-lombaire *M43.95*
- psychomotrice *F44.4*
- purine nucléoside phosphorylase [PNP] *D81.5*
- réfraction, lunettes *T88.9*
- rotation du côlon *Q43.3*
- statique
- - colonne vertébrale *M43.99*
- - pied *R29.8*
- système nerveux central *G96.8*
- visuel *H53.9*

Défiguration, due à cicatrice *L90.5*

Déflexion
- nasal *J34.2*
- radius *M21.83*
- septum nasal, acquise *J34.2*

Defluvium
- capillorum *L65.9*
- ciliorum *H02.7*
- unguium *L60.8*

Déformation *Q89.9*
- abdomen, congénitale *Q89.9*
- acquis
- - auriculaire *H61.1*
- - pavillon oreille *H61.1*
- acquise
- - orteil *M20.5*
- - orteil NCA *M20.6*
- angle irido-cornéen *H21.5*
- anneau trachéal, acquise *J39.88*
- anse iléo-caecale, congénitale *Q43.9*
- anus, congénitale *K62.8*
- aorte
- - acquise *I77.8*
- - congénitale *Q25.4*
- appareil digestif
- - congénitale *Q45.9*
- - supérieur, congénitale *Q40.9*
- appendice *Q43.8*
- artère
- - cérébral, congénitale *Q28.39*
- - coronaire
- - - acquise *I25.8*
- - - congénitale *Q24.5*
- - périphérique
- - - acquise, NCA *I77.8*
- - - congénitale, NCA *Q27.9*
- - rénale *Q27.2*
- - - acquise *I77.8*

Déformation –*suite*
- artère –*suite*
- - rétinienne, congénitale *Q14.1*
- articulation
- - acquise, NCA *M21.99*
- - congénitale *Q68.8*
- - coude, acquis *M21.92*
- - genou *Q68.2*
- - iléo-sacrale, congénitale *Q74.2*
- - lombo-sacrale *Q76.4*
- - main *Q68.1*
- - main, congénitale *Q68.1*
- - sacro-lombaire, congénitale *Q76.4*
- attaque *G45.02*
- auricules
- - acquise *H61.1*
- - oreille, congénitale *Q17.3*
- avant-bras
- - acquise *M21.93*
- - congénitale *Q68.8*
- avant-pied *M21.67*
- bassinet rénal, congénitale *Q63.9*
- bouche, acquise *K13.7*
- boutonnière *M20.0*
- bras NCA *Q68.8*
- - acquise *M21.99*
- - congénitale *Q68.8*
- bronchique
- - acquise, NCA *J98.0*
- - congénitale *Q32.4*
- bulbe duodénal *K31.88*
- caecum
- - acquise *K63.8*
- - congénitale *Q43.9*
- calice du rein *N28.8*
- canal
- - artériel *Q25.0*
- - cystique *Q44.5*
- - - acquise *K82.8*
- - - congénitale *Q44.5*
- - déférent
- - - acquise *N50.8*
- - - congénitale *Q55.4*
- - éjaculateur
- - - acquise *N50.8*
- - - congénitale *Q55.4*
- - gastro-intestinal
- - - acquise, NCA *K63.8*
- - - congénitale, NCA *Q45.9*
- - glandes salivaires
- - - acquise *K11.8*
- - - congénitale *Q38.4*
- - hépatique *Q44.5*
- - hépatique, congénitale *Q44.5*
- - lacrymal
- - - acquise *H04.6*
- - - congénitale *Q10.6*
- - Nuck *Q52.4*
- canthus
- - acquise *H02.8*
- - congénitale *Q10.3*
- capillaire, acquise *I78.8*
- caroncule lacrymale
- - acquise *H04.6*
- - congénitale *Q10.6*
- cartilage cricoïde
- - acquise *J38.7*
- - congénitale *Q31.8*

Déformation –*suite*
- cartilage de la trachée *Q32.1*
- cartilage thyroïde
- - acquise *J38.7*
- - congénitale *Q31.8*
- ceinture scapulaire *Q74.0*
- cérébrale, acquise *G93.88*
- cerveau *Q04.9*
- - acquis *G93.88*
- champ visuel *H53.4*
- cheville, acquise NCA *M21.67*
- choroïde
- - acquise *H31.8*
- - congénitale *Q14.3*
- cils
- - acquise *H02.8*
- - congénitale *Q10.3*
- clavicule *Q74.0*
- - acquise *M21.81*
- - congénitale *Q68.8*
- clitoris *Q52.6*
- - acquise *N90.8*
- - congénitale *Q52.6*
- cloison nasale *J34.2*
- - congénitale *Q30.8*
- coccyx *Q76.4*
- coccyx, acquise *M43.88*
- coeur, congénitale *Q24.8*
- - *Q24.9*
- col utérin *Q51.9*
- - acquise, NCA *N88.8*
- - congénitale *Q51.9*
- col vésical *N32.8*
- col-de-cygne *M20.0*
- côlon
- - acquise *K63.8*
- - congénitale *Q43.9*
- conduit auditif
- - acquise *H61.8*
- - extérieur, congénitale *Q17.8*
- congénitale *Q89.9*
- conque auriculaire *Q17.3*
- conque, oreille, acquise *H61.1*
- cordon spermatique
- - acquise *N50.8*
- - congénital *Q55.4*
- cornée *H18.7*
- - acquise *H18.7*
- - congénitale *Q13.4*
- corps vitré
- - acquise *H43.8*
- - congénitale *Q14.0*
- Corti, organes de *Q16.5*
- côte cervicale, congénitale *Q76.5*
- côtes
- - acquise *M95.4*
- - congénitale *Q76.6*
- cou, gorge
- - acquise *M95.3*
- - congénitale *Q18.9*
- coude, congénitale *Q68.8*
- crâne
- - acquise *M95.2*
- - congénitale *Q75.8*
- - - avec
- - - - anencéphalie *Q00.0*
- - - - encéphalocèle *Q01.9*
- - - - hydrocéphalie *Q03.9*

Déformation –*suite*
- crâne –*suite*
- - congénitale –*suite*
- - - avec –*suite*
- - - - hydrocéphalie –*suite*
- - - - - avec spina bifida, *Q05.4*
- - - - microcéphalie *Q02*
- cristallin, acquise *H27.8*
- cristallin, congénitale *Q12.9*
- crosse aortique
- - acquise *I77.8*
- - congénitale *Q25.4*
- cubitus
- - acquise *M21.93*
- - congénitale, NCA *Q68.8*
- dents *K00.2*
- diaphragme
- - acquise *J98.6*
- - congénitale *Q79.1*
- disque intervertébral, acquise *M51.8*
- doigt
- - acquise *M20.0*
- - congénital *Q68.1*
- dos *M43.99*
- douleur dorsale *M43.99*
- duodénum
- - acquise *K31.88*
- - congénitale *Q43.9*
- ectodermique, congénitale *Q82.9*
- épaule
- - acquise *M21.91*
- - congénitale *Q74.0*
- épididyme
- - acquise *N50.8*
- - congénitale *Q55.4*
- épiglotte
- - acquise *J38.7*
- - congénitale *Q31.8*
- extémité
- - acquise *M21.99*
- - congénitale, excepté l'anomalie réductionnelle *Q68.8*
- - inférieure, congénitale *Q74.2*
- fémur NCA *Q68.8*
- fémur, supérieur
- - acquise *M21.95*
- - congénitale, NCA *Q68.8*
- feuillet de la plèvre, congénitale *Q34.0*
- fibula NCA *Q68.8*
- flexion *M21.29*
- - articulation de la hanche, congénitale *Q65.8*
- - congénitale NCA *Q68.8*
- - congénitale, NCA *Q68.8*
- - cuisse, acquise *M21.25*
- - fémoral, acquise *M21.25*
- - hanche, acquise *M21.25*
- foetus *Q89.9*
- - avec
- - - disparité pelvienne et foetus *O33.7*
- - - obstruction, naissance *O66.3*
- - compliquant l'accouchement *O66.3*
- - soin maternel, NCA *O33.7*
- foie *Q44.7*
- - acquise *K76.8*
- - congénitale *Q44.7*
- frontal
- - acquise *M95.2*

Déformation –*suite*
- frontal –*suite*
- - congénitale *Q75.8*
- gastriques
- - acquise *K31.88*
- - congénitale *Q40.3*
- gencives, acquis NCA *K06.8*
- genou, congénitale NCA *Q68.2*
- glande
- - endocrine NCA *Q89.2*
- - salivaire
- - - acquise *K11.8*
- - - congénitale *Q38.4*
- - sous-maxillaire, congénitale *Q38.4*
- - thyroïde, congénitale *Q89.2*
- globe oculaire
- - acquise *H44.8*
- - congénitale *Q15.8*
- gros intestin
- - acquise *K63.8*
- - congénitale NCA *Q43.9*
- gros orteil, acquise NCA *M20.3*
- gyrus *Q04.8*
- hanches
- - congénitale *Q65.9*
- - via une précédente ostéochondrite juvénile *M91.2*
- humérus
- - acquise *M21.82*
- - congénitale *Q74.0*
- humérus, NCA *Q68.8*
- hymen *Q52.4*
- hymen, congénitale *Q52.4*
- hypophyse, congénitale *Q89.2*
- iléo-caecal, acquise *K63.8*
- iléon, congénitale *Q43.9*
- iléo-sacral, acquise *M43.88*
- intestin grêle
- - acquise *K63.8*
- - congénitale, NCA *Q43.9*
- intestinale
- - acquise *K63.8*
- - congénitale, NCA *Q43.9*
- intrinsèque, main *M21.84*
- iris
- - acquise *H21.5*
- - congénitale *Q13.2*
- jambe
- - acquise *M21.96*
- - congénitale *Q68.8*
- jambe NCA *Q68.8*
- joue
- - acquise *M95.2*
- - congénitale *Q18.9*
- Klippel Feil *Q76.1*
- lame de sabre, tibia syphilitique *A50.5+, M90.26**
- langue *Q38.3*
- larynx
- - acquise *J38.7*
- - congénitale *Q31.8*
- lentille *Q12.8*
- lèvre (buccale)
- - acquise, NCA *K13.0*
- - congénitale, NCA *Q38.0*
- lèvres
- - grandes lèvres *Q52.7*
- - - acquise *N90.8*

Déformation –*suite*
- lèvres –*suite*
- - grandes lèvres –*suite*
- - - congénitale *Q52.7*
- - petites lèvres *Q52.7*
- - - acquise *N90.8*
- - - congénitale *Q52.7*
- ligament
- - acquise *M24.29*
- - congénitale *Q79.9*
- ligament, acquise *M24.29*
- lingual
- - acquise *K14.8*
- - congénitale *Q38.3*
- luette, congénitale *Q38.5*
- mâchoire *K07.9*
- - acquise *K07.9*
- - congénitale *K07.9*
- Madelung *Q74.0*
- main *M21.33*
- - congénitale *Q68.1*
- - intrinsèque majeure *M21.84*
- - intrinsèque mineure *M21.84*
- malléole
- - acquise, NCA *M21.67*
- - congénitale, NCA *Q68.8*
- mamelon
- - acquis *N64.8*
- - acquise *N64.8*
- mandibule ou maxillaire inférieur *K07.9*
- maxillaire *K07.9*
- membre inférieur
- - acquise *M21.99*
- - congénitale *Q68.8*
- méninges
- - cerveau
- - - acquise *G96.1*
- - - congénitale *Q04.8*
- - congénitale *Q07.9*
- méninges rachidiennes
- - acquise *G96.1*
- - congénitale *Q06.9*
- menton
- - acquise *M95.2*
- - congénitale *Q18.9*
- mésentère, congénitale *Q45.9*
- métacarpe
- - acquise *M21.94*
- - congénitale *Q74.0*
- moëlle épinière *Q06.9*
- - acquise *G95.88*
- - congénitale *Q06.9*
- multiple, congénitale NCA *Q89.7*
- muqueuse nasale *J34.8*
- muscle oculaire
- - acquise *H50.6*
- - congénitale *Q10.3*
- muscle sterno-cléido-mastoïdien, congénital *Q68.0*
- muscle, acquise *M62.89*
- nasale nez ensellé ou concave acquise *M95.0*
- nerfs *Q07.8*
- nez *Q30.8*
- - acquise *M95.0*
- - cartilage nasal, congénitale *Q30.8*
- - congénitale *Q30.9*
- - post-traumatique *M95.0*

Déformation –*suite*
- nez –*suite*
- - syphilitique congénitale *A50.5*
- - syphilitique tardive *A52.7+, J99.8**
- nez ensellé *M95.0*
- oeil *Q15.8*
- oeil, congénitale *Q15.9*
- oesophagien
- - acquise *K22.8*
- - congénitale *Q39.9*
- omoplate
- - acquise *M21.81*
- - congénitale *Q68.8*
- ongles
- - acquise *L60.8*
- - congénitale *Q84.6*
- orbite
- - acquise *H05.3*
- - congénitale *Q10.7*
- oreille
- - acquise *H61.1*
- - congénitale *Q17.9*
- - externe *Q17.3*
- - interne *Q16.5*
- - moyenne *Q16.4*
- - - congénitale *Q16.4*
- - tombante *Q17.3*
- organe de Corti, congénitale *Q16.5*
- organe pelvien, avec accouchement d'urgence NCA *O34.8*
- organes génitaux
- - féminins
- - - congénitale, NCA *Q52.9*
- - - extérieurs, congénitale *Q52.7*
- - - intérieurs, congénitale NCA *Q52.8*
- - masculins
- - - acquise *N50.8*
- - - congénitale, NCA *Q55.9*
- orteil *Q66.9*
- orteil, congénitale *Q66.9*
- os
- - crâne NCA *Q75.8*
- - crâne, avec
- - - encéphalocèle *Q01.9*
- - - hydrocéphalie *Q03.9*
- - - microcéphalie *Q02*
- - face NCA *Q75.8*
- - frontal *M95.2*
- - iliaque
- - - acquise *M95.5*
- - - congénitale *Q74.2*
- - ischion
- - - acquise *M95.5*
- - - congénitale *Q74.2*
- - main *Q68.1*
- - nez acquise *M95.0*
- osselets, congénitale *Q16.3*
- osseux, acquise *M95.9*
- ostium urétral interne
- - acquise *N32.8*
- - congénitale, NCA *Q64.7*
- ouraque, congénitale *Q64.4*
- ouverture de la vessie, congénitale NCA *Q64.7*
- ouverture de l'urètre, congénitale NCA *Q64.7*
- ovaire
- - acquise *N83.8*
- - congénitale *Q50.3*

Déformation –*suite*

- palais
- - acquise *K10.8*
- - congénitale *Q38.5*
- pancréatique *Q45.3*
- - acquise *K86.8*
- - congénitale *Q45.3*
- parathyroïdien *Q89.2*
- paroi abdominale
- - acquise *M95.8*
- - congénitale *Q79.5*
- paroi des sinus de la face, congénitale *Q30.8*
- paroi thoracique *Q67.8*
- paroi vésicale *N32.8*
- parotidien
- - acquise *K11.8*
- - congénitale *Q38.4*
- patellaire *Q68.2*
- paupière
- - acquise *H02.8*
- - congénitale *Q10.3*
- paupière, acquise *H02.8*
- pavillon de l'oreille *H61.1*
- - acquise *H61.1*
- - congénitale *Q17.3*
- pavillon de l'oreille, acquise *H61.1*
- peau, congénitale *Q82.9*
- pelvienne
- - acquise *M95.5*
- - avec
- - - accouchement par césarienne NCA *O33.0*
- - - disproportion, foeto-pelvienne *O33.0*
- - - - avec lésion, foetus/nouveau né *P03.1*
- - comme séquelle de rachitisme *E64.3*
- - congénitale *Q74.2*
- - lors de la grossesse *O33.0*
- - obstruction, naissance *O65.0*
- péricarde, congénitale *Q24.8*
- pharynx
- - acquise *J39.2*
- - congénitale *Q38.8*
- pied *M21.37*
- - *M21.67*
- - *Q66.9*
- - congénitale *Q66.9*
- Pierre-Robin, congénitale *Q87.0*
- plexus choroïde *Q07.8*
- pli palpébral
- - acquise *H02.8*
- - congénitale *Q10.3*
- pouce
- - acquise *M20.0*
- - congénitale, NCA *Q68.1*
- prépuce
- - acquise *N48.8*
- - congénitale *Q55.6*
- prostatique
- - acquise *N42.8*
- - congénitale *Q55.4*
- pulmonaire
- - acquise *J98.4*
- - congénitale *Q33.9*
- pupille
- - acquise *H21.5*
- - congénitale *Q13.2*

Déformation –*suite*

- pylore
- - acquise *K31.88*
- - congénitale *Q40.3*
- rachis *M43.99*
- - *Q06.8*
- - *Q76.4*
- - acquise, NCA *M43.89*
- - congénitale *Q67.5*
- - rachitique *E64.3*
- rachitique
- - acquise, NCA *H04.6*
- - congénitale, NCA *Q10.6*
- rachitique, vieux *E64.3*
- racine nerveuse spinale, congénitale *Q07.8*
- radius
- - acquis *M21.93*
- - congénitale *Q68.8*
- radius NCA *Q68.8*
- rate *Q89.0*
- rectum
- - acquise *K62.8*
- - congénitale *Q43.9*
- réductions
- - cérébral congénitale *Q04.3*
- - membres
- - - inférieurs *Q72.9*
- - - longitudinale *Q73.8*
- - - supérieure *Q71.9*
- région lombaire *Q76.4*
- - avec
- - - disproportion
- - - - entre le foetus et le bassin *O33.8*
- - - - foeto-pelvienne, avec
- - - - - obstruction, naissance, *O65.0*
- - - - - lésions du foetus/du nouveau-né, *P03.1*
- région sacro-lombaire *Q76.4*
- rénale *Q63.9*
- - acquise *N28.8*
- - congénitale *Q63.9*
- rotations
- - articulation de la hanche, congénitale *Q65.8*
- - articulation, acquise *M21.89*
- - congénitale *Q74.9*
- - hanches, acquise *M21.85*
- rotule
- - acquise *M22.8*
- - congénitale *Q68.2*
- sacro-iliaque *Q74.2*
- sacro-lombaire, acquise *M43.87*
- sacrum *Q76.4*
- - acquise *M43.88*
- - congénitale *Q76.4*
- scapulaire *Q74.0*
- - acquise *M21.81*
- - congénitale *Q68.8*
- scrotum
- - acquise *N50.8*
- - congénitale *Q55.2*
- selle, dos *M40.59*
- septum cardiaque, congénitale *Q21.9*
- sigmoïdien
- - acquise *K63.8*
- - congénitale *Q43.9*
- sinus de Valsalva *Q25.4*
- splénique

Déformation –*suite*

- splénique –*suite*
- - acquise *D73.8*
- - congénitale *Q89.0*
- spondylarthrose *M47.99*
- Sprengel *Q74.0*
- - congénitale *Q74.0*
- sternum
- - acquise *M95.4*
- - congénitale, NCA *Q76.7*
- sternum NCA *Q76.7*
- système
- - cardio-vasculaire, congénitale *Q28.9*
- - circulatoire central, congénital *Q28.9*
- - lymphatique, congénital *Q89.9*
- - musculo-squelettique
- - - acquise *M95.9*
- - - congénitale *Q79.9*
- - nerveux *Q07.9*
- - sanguin cardiaque, congénitale *Q28.9*
- - urinaire, congénitale *Q64.9*
- talon
- - acquise *M21.67*
- - congénitale *Q66.9*
- tarse
- - acquise *M21.67*
- - congénitale *Q66.8*
- tégument, congénitale *Q84.9*
- testicules
- - acquise *N50.8*
- - congénitale *Q55.2*
- tête
- - acquise *M95.2*
- - congénitale *Q75.8*
- tête, enfant, pendant la naissance *P13.1*
- thorax
- - acquise *M95.4*
- - comme séquelle de rachitisme *E64.3*
- - congénitale *Q67.8*
- tibia
- - acquise *M21.86*
- - congénitale, NCA *Q68.8*
- tibia NCA *Q68.8*
- tissu organique, Thymus, congénitale *Q89.2*
- trachée
- - acquise *J39.88*
- - congénitale *Q32.1*
- tractus gastro-intestinal
- - acquise *K63.8*
- - congénitale *Q45.9*
- trompe de Fallope,acquise *N83.8*
- trompe d'Eustache *Q17.8*
- trompe d'Eustache, congénitale NCA *Q17.8*
- trompes de Fallope *Q50.6*
- trompes de Fallope, acquise *N83.8*
- tronc
- - acquise *M95.8*
- - congénitale *Q89.9*
- tubaire *Q50.6*
- ulna NCA *Q68.8*
- uretère *Q62.8*
- - acquise *N28.8*
- - congénitale *Q62.8*
- urètre *Q64.7*
- - acquise *N36.8*
- - congénitale *Q64.7*

Déformation –*suite*
- urètre –*suite*
- - obstructive *Q64.3*
- utérus *Q51.9*
- - acquise *N85.8*
- - congénitale *Q51.9*
- vaginale *Q52.4*
- - acquise *N89.8*
- - congénitale *Q52.4*
- valgus *M21.09*
- - pied NCA *M21.07*
- - pied, congénitale NCA *Q66.6*
- valvule
- - aortique, congénitale *Q23.8*
- - aortiques, congénitale *Q23.8*
- - cardiaque, congénitale *Q24.8*
- - iléo-caecale, congénitale *Q43.9*
- - mitrale *I05.8*
- - tricuspide *I07.8*
- - tricuspide d'Elbstein *Q22.5*
- varus *M21.19*
- - articulation du genou *M21.16*
- - - congénitale *Q74.1*
- - pied NCA *M21.17*
- - pied, congénitale NCA *Q66.3*
- vasculaire
- - congénitale NCA *Q27.9*
- - optico-ciliaire, congénitale *Q13.2*
- - papille du nerf optique, congénitale *Q14.2*
- veine
- - cave
- - - inférieure, congénitale *Q26.9*
- - - supérieure, congénitale *Q26.9*
- - congénitale *Q27.9*
- - grande, congénitale *Q26.9*
- - porte, congénitale *Q26.5*
- verge
- - acquise *N48.8*
- - congénitale *Q55.6*
- vertèbre *Q76.4*
- vésicule biliaire
- - acquise *K82.8*
- - congénitale *Q44.1*
- vésicule séminale
- - acquise *N50.8*
- - congénitale *Q55.4*
- vessie *Q64.7*
- - acquise *N32.8*
- - congénitale *Q64.7*
- vessie, meat en trou de golf *N28.8*
- visage
- - acquise *M95.2*
- - congénitale *Q18.9*
- voies biliaires *Q44.5*
- - acquise *K83.8*
- - congénitale *Q44.5*
- voies lacrymales
- - acquise, NCA *H04.6*
- - congénitale, NCA *Q10.6*
- vulve *Q52.7*
- - acquise *N90.8*
- - congénitale *Q52.7*

Déformé
- doigt *Q70.0*
- orteil *Q70.2*

Défribillateur, implanté
- batterie épuisée *T82.1*

Défribillateur, implanté –*suite*
- dysfonctionnement *T82.1*
- infection *T82.7*

Dégénérative - *voir* Type de la maladie

Dégénérescence
- adénomatoïde-kystique du poumon *D14.3*
- amyloïde *E85.9*
- amyloïde de la rate *E85.4+, D77**
- aorte *I70.0*
- - graisseuse *I77.8*
- artère
- - athéromateuse *I70.9*
- - calcifiante *I70.9*
- - cérébrale, amyloïde *E85.4+, I68.0**
- - médiane *I70.20*
- articulaire *M19.99*
- avec nystagmus *H55*
- Axenfeld, calcifiante *Q13.4*
- bord pupillaire *H21.2*
- calcifiante NCA *R89.7*
- capillaire
- - amyloïde *E85.8+, I79.8**
- - graisseuse *I78.8*
- cardiaque *I51.5*
- - amyloïde *E85.4+, I43.1**
- - athéromateuse *I25.19*
- - graisseuse *I51.5*
- - sénile *I51.5*
- cardiorénale *I13.90*
- cardiovasculaire *I51.6*
- - rénale *I13.90*
- cartilage articulaire NCA *M24.19*
- - coude NCA *M24.12*
- - épaule NCA *M24.11*
- - genou *M23.39*
- cartilagineuse *M24.19*
- cérébelleuse *G31.9*
- - alcoolique *G31.2*
- - héréditaire *G11.9*
- cérébrale *G31.9*
- - alcoolique *G31.2*
- - artérioscléreuse *I67.2*
- - associée à
- - - affection vasculaire cérébrale *I67.9+, G32.8**
- - - Anderson-Fabry, maladie de *E75.2+, G32.8**
- - - béribéri *E51.1+, G32.8**
- - - carence en vitamine B12 *E53.8+, G32.8**
- - - Gaucher, syndrome de *E75.2+, G32.8**
- - - Hunter, syndrome de *E76.1+, G32.8**
- - - lipidose
- - - - cérébrale *E75.4+, G32.8**
- - - - généralisée *E75.6+, G32.8**
- - - mucopolysaccharidose *E76.3+, G32.8**
- - - myxoedème *E03.9+, G32.8**
- - - néoplasie NCA *D48.9+, G32.8**
- - - Niemann-Pick, maladie de *E75.2+, G32.8**
- - - sphingolipidose *E75.3+, G32.8**
- - congénitale, en cas d'hydrocéphalie *Q03.9*
- - corticale progressive *G31.9*
- - enfant, chez l' *G31.9*

Dégénérescence –*suite*
- cérébrale –*suite*
- - kystique *G31.88*
- - - congénitale *Q04.6*
- - sénile *G31.1*
- - sénile NCA *G31.1*
- cérébrale, substance grise *G31.88*
- cerveau *G31.9*
- choriorétinienne *H31.1*
- - héréditaire *H31.2*
- choroïdienne *H31.1*
- - héréditaire *H31.2*
- cochléaire *H83.8*
- col de l'utérus *N88.8*
- - provoquée par une irradiation *N88.8*
- conjonctive *H11.1*
- cordon postérieur *G95.88*
- corne antérieure, progressive *G12.2*
- cornée *H18.4*
- - chagrin de crocodile *H18.4*
- - oeil *H18.4*
- - Salzmann, de *H18.4*
- - sphéroïde *H18.4*
- - striée *H18.4*
- cornée, Salzmann *H18.4*
- cornéenne *H18.4*
- - familiale *H18.5*
- - hyaline *H18.4*
- - sénile *H18.4*
- cornets *J34.8*
- corps ciliaire *H21.2*
- corticale *G31.88*
- - alcoolique *G31.2*
- - diffuse, due à une artériosclérose *I67.2*
- corticobasale [DCB] *G31.0+, F02.0**
- cortico-striato-spinale *A81.0*
- cristallin *H27.8*
- cutanée *L98.8*
- - amyloïde *E85.4+, L99.0**
- - colloïde *L98.8*
- disque invertébral NCA *M51.3*
- - avec
- - - myélopathie NCA *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - cervical NCA *M50.3*
- - cervical, avec
- - - myélopathie *M50.0+, G99.2**
- - - névrite *M50.1+, G55.1**
- - - radiculite *M50.1+, G55.1**
- - - radiculopathie *M50.1+, G55.1**
- - cervicodorsal NCA *M50.3*
- - dorsal NCA *M51.3*
- - dorsal, avec
- - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - - sciatique *M51.1+, G55.1**
- - dorsolombaire NCA *M51.3*
- - lombaire NCA *M51.3*
- - lombaire, avec
- - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculopathie *M51.2+, G55.2**
- - - sciatique *M51.3+, G55.3**

Dégénérescence –*suite*
- disque invertébral NCA –*suite*
- - lombosacré NCA *M51.3*
- en stries, cornée, primitive, héréditaire *H18.4*
- épiphyse *E34.8*
- équatoriale
- - bave d'escargot *H35.4*
- - blanche sans pression *H35.4*
- - microcystoïde *H35.4*
- - ponctuée *H35.4*
- - quadrillage (avec) *H35.4*
- équatoriale ponctuée *H35.4*
- estomac *K31.88*
- extrapyramidale *G25.9*
- facial, nerf *G51.8*
- foie *K76.0*
- foie, pigmentaire *K76.8*
- fond de l'oeil *H35.0*
- ganglions de la base NCA *G23.9*
- générale *R53*
- - physique et psychique *R53*
- - psychique *R53*
- globe oculaire *H44.5*
- graisseuse
- - coeur *I51.5*
- - endocarde *I51.5*
- - épithélium tubulaire *E75.6*
- - foie NCA *K76.0*
- - - alcoolique *K70.0*
- - - cirrhose alcoolique *K70.3*
- - - dégénérative *K76.0*
- - - hépatite *K76.0*
- - - non alcoolique *K76.0*
- - myocarde *I51.5*
- - reins *E75.6*
- - reins capsule *N04.9*
- - réno-parenchymateuse *E75.6*
- hépatique *K76.8*
- - amyloïde NCA *E85.4+, K77.8**
- - diffuse NCA *K76.8*
- - graisseuse NCA *K76.0*
- - graisseuse, alcoolique *K70.0*
- - hypertrophique NCA *K76.8*
- - kystique NCA *K76.8*
- - kystique, congénitale *Q44.6*
- - parenchymateuse
- - - aiguë NCA *K72.0*
- - - subaiguë NCA *K72.0*
- - pigmentaire NCA *K76.8*
- - toxique NCA *K71.9*
- hépatocytes *K72.9*
- hépatolenticulaire *E83.0*
- - avec démence *E83.0+, F02.8**
- hépatorénale *K76.7*
- hyaline, ganglions lymphatiques *I89.8*
- hypophyse *E23.6*
- intestinale, amyloïde *E85.4+, K93.8**
- iris *H21.2*
- - pigmentée *H21.2*
- Junius-Kuhnt, de *H35.3*
- - rétinienne *H35.3*
- labyrinthe *H83.8*
- - congénitale, avec atteinte de l'ouïe *Q16.5*
- - osseux *H83.8*
- lenticulaire progressive *E83.0*
- limbique en ceinture de Vogt *H18.4*

Dégénérescence –*suite*
- macula *H35.3*
- macula, non exsudative *H35.3*
- maculaire *H35.3*
- - *H35.5*
- - atrophique *H35.3*
- - congénitale *H35.5*
- - exsudative *H35.3*
- - héréditaire *H35.5*
- - humide *H35.3*
- - - sénile *H35.3*
- - non exsudative *H35.3*
- - pôle postérieur (et du) *H35.3*
- - sèche *H35.3*
- - - sénile *H35.3*
- - sénile *H35.3*
- - - atrophique *H35.3*
- - - exsudative *H35.3*
- - vitelliforme, autosomique dominante *H35.5*
- maculaire héréditaire *H35.5*
- mamelon *N64.8*
- membrane de Bruch *H31.1*
- membrane synoviale *M67.89*
- ménisque *M23.39*
- microkystoïde *H35.4*
- moelle épinière *G31.88*
- - amyloïde *E85.4+, G32.8**
- - combinée
- - - associée à anémie NCA *D51.0+, G32.0**
- - - subaiguë, en cas de carence en vitamine B12 *E53.8+, G32.0**
- - familiale NCA *G31.88*
- - graisseuse *G31.88*
- - syphilitique *A52.1*
- - tuberculeuse *A17.8+, G07**
- Mönckeberg, de *I70.20*
- mosaïque, Vogt, cornée, oeil *H18.4*
- multisystématisée *G90.3*
- multisystémique *G90.3*
- murale *I51.5*
- musculaire
- - fibreuse *M62.89*
- - graisseuse *M62.89*
- - hyaline *M62.89*
- - progressive *M62.89*
- myéline, système nerveux central *G37.9*
- myocarde *I51.5*
- - cas de fièvre rhumatoïde inactive *I09.0*
- - fébrile, rhumatoïde *I09.0*
- - graisseuse *I51.5*
- - hypertensive *I11.90*
- - sénile *I51.5*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- nerf
- - auditif (VIII) *H93.3*
- - facial (VII) *G51.8*
- - optique (II) *H47.0*
- nerf crânien *G52.9*
- - III *H49.0*
- - IV *H49.1*
- - VI *H49.2*
- nucléaire du cristallin, progressive *E83.0*
- olivo-ponto-cérébelleuse
- - familiale *G23.8*
- - héréditaire *G23.8*
- optique, nerf *H47.2*
- optique, nerf (II) *H47.2*

Dégénérescence –*suite*
- osseuse NCA *M89.89*
- ovarienne *N83.8*
- - kystique *N83.2*
- - microkystique *N83.2*
- palissade, équatoriale *H35.4*
- pancréatique *K86.8*
- paupière *H02.7*
- pavimenteuse
- - équatoriale *H35.4*
- - rétine *H35.4*
- physique *R53*
- pigmentaire
- - globus pallidus *G23.0*
- - iris *H21.2*
- - l'iris *H21.2*
- - pallidale *G23.0*
- - rétine *H35.5*
- - rétinienne *H35.5*
- placentaire *O43.8*
- pulmonaire *J98.4*
- - adénomatoide kystique *D14.3*
- - congénitale *Q33.8*
- pulpaire *K04.2*
- rachis *M47.99*
- rachis cervical *M47.82*
- rachis cervical et dorsal, avec cervicodorsalgie *M47.23*
- rate *D73.0*
- - amyloïde *E85.4+, D77**
- rénale *N28.8*
- - amyloïde *E85.4+, N29.8**
- - fibrokystique *Q61.8*
- - graisseuse *N28.8*
- - kystique *Q61.9*
- - - congénitale *Q61.9*
- - polykystique *Q61.3*
- - - adulte *Q61.2*
- - - infantile *Q61.1*
- rétine, équatoriale *H35.4*
- rétinienne *H35.4*
- - entrecroisée *H35.4*
- - équatoriale *H35.4*
- - héréditaire *H35.5*
- - maculeuse *H35.3*
- - pavimenteuse *H35.4*
- - périphérique *H35.4*
- - pigmentée *H35.5*
- - pôle postérieur de l'oeil *H35.3*
- - quadrillée *H35.4*
- - réticulaire *H35.4*
- - sans déchirure *H35.4*
- sacculaire congénitale *Q16.5*
- sclérotique, hyaline *H15.8*
- sein *N64.8*
- sénile *R54*
- sinus *J32.9*
- - kystique *J32.9*
- - polypoïde *J33.1*
- Stargardt (de), maculaire *H35.5*
- striatonigrique *G23.2*
- substance grise *G95.88*
- surface articulaire, rachis *M47.99*
- surrénalienne *E27.8*
- synoviale *M67.89*
- système nerveux *G31.9*
- - alcoolique *G31.2*
- - amyloïde *E85.4+, G99.8**

Dégénérescence *–suite*
- système nerveux *–suite*
- - autonome *G90.9*
- - - périphérique *G90.9*
- - graisseuse *G31.88*
- système nerveux central, avec psychose *F09*
- tapétorétinienne *H35.5*
- Terrien (de), cornéenne marginale *H18.4*
- testicule, postinfectieuse *N50.8*
- thymus *E32.8*
- - graisseuse *E32.8*
- thyroïdienne *E07.8*
- tuberculeuse NCA *A16.9*
- utérus *N85.8*
- valvule
- - aortique *I35.8*
- - cardiaque, rhumatismale *I09.1*
- - pulmonaire *I37.8*
- - tricuspide *I07.9*
- vasculaire *I70.9*
- - artérielle *I70.9*
- - cérébrale *I67.9*
- verge *N48.8*
- vitré *H43.8*
- Wilson (de), cristallin *E83.0*

Déglutition
- anormale, avec occlusion, rangée de dents manquante *K07.5*
- anormale, fermeture maxilaire manquante *K07.5*
- paralysie *R13.9*
- paralysie, hystérique *F44.4*
- pneumonie *J69.0*
- troubles *R13.9*

Degos, syndrome de *I77.8*

Degos-Delort-Tricot, syndrome de *I77.8*

Dégradation *R45.8*

Degré moyen
- dépression, réactive, épisode unique *F32.1*
- dysplasie
- - col utérin *N87.1*
- - vagin *N89.1*
- - vulve *N90.1*
- épisode
- - cas de troubles dépressifs *F32.1*
- - - récidivants *F33.1*
- - dépressif *F32.1*
- - - avec trouble, affectif, bipolaire *F31.3*
- oligophrénie *F71.9*
- retard mental *F71.9*
- - avec trouble du comportement *F71.8*
- sclérose, artère coronaire *I25.19*

Déhiscence
- déchirure, périnée *O90.1*
- plaie *T81.3*
- - avec éventration *T81.3*
- - cicatrice périnéale *O90.1*
- - périnéale, postpartum *O90.1*
- - périnée, obstétricale *O90.1*
- plaie de césarienne *O90.0*
- plaie opératoire NCA *T81.3*
- suture *T81.3*
- - césarienne *O90.0*
- - conjonctive *T81.3*
- - cornée *T81.3*

Déhiscence *–suite*
- suture *–suite*
- - infectée *T81.4*
- - périnée, obstétricale *O90.1*
- - post-partum *O90.1*
- suture d'épisiotomie *O90.1*
- symphyse pubienne, au cours de la grossesse *O26.7*

Déhydroépiandrostérone, sulfate de, (SDH *T88.7*

Déjerine Roussy, syndrome de *G93.88*

Déjerine Thomas, atrophie de *G23.8*

Déjerine-Klumpke, syndrome de *P14.1*

Déjerine-Roussy, syndrome de *G93.88*

Déjerine-Sottas, neuropathie *G60.0*
- hypertrophique *G60.0*

Déjerine-Sottas, neuropathie de *G60.0*
- hypertrophique *G60.0*

Déjerine-Thomas, syndrome de *G23.8*

del 5q Syndrome myélodysplasique avec délétion isolé du chromosome 5 [*D46.6*

Délaissement *T74.0*

délétion
-
- autosomes *Q93.9*
- bras court chromosome 5 , Syndrome de *D46.6*
- bras long chromosome 18 *Q93.5*
- chromosome
- - 18, bras long *Q93.5*
- - - avec réarrangements complexes NCA *Q93.7*
- - 4, bras court *Q93.3*
- - 5, bras court *Q93.4*
- - avec réarrangements complexes NCA *Q93.7*
- chromosomique partielle *Q93.5*
- isolé chromosome 5 del (5q)] , Syndrome myélodysplasique avec *D46.6*
- partielle d'un chromosome *Q93.5*
- prométaphase *Q93.6*
- syndrome de *Q93.9*

Délinquance *F91.8*
- adolescent *F91.8*
- névrotique *F92.8*

Délinquance de groupe *F91.2*

Délinquance de groupe, examen, sans trou *Z03.2*

Délirant, syndrome *F05.9*

Délirant, -te
- Dysmorphophobie *F22.8*
- troubles *F22.0*
- - induits *F24*
- - organiques *F06.2*
- - persistants *F22.9*

Délire relation sensitif *F22.0*

Délire *voir aussi* delirium *F22.0*
- asthénique *F43.0*
- delirium *F05.9*
- dermatozoen *F06.0*
- epizoonose *F06.0*
- hypocondriaque *F45.2*
- jalousie *F22.0*
- - alccolique *F10.5*
- - alcoolique *F10.5*

Délire *voir aussi* delirium *–suite*
- maladie *F45.2*
- mégalomaniaque *F22.0*
- paranoïa *F22.0*
- persécution *F22.0*
- poursuite *F22.0*
- quérulent *F22.8*
- relationnel *F22.0*
- - sensitif *F22.0*
- revendication *F22.8*
- systématisé *F22.0*

Delirium *F05.9*
- à l'alcool *F10.4*
- aigu *F05.9*
- - avec syndrome
- - - organique cérébral *F05.9*
- - - psycho-organique *F05.9*
- - réaction exogène (à type de) *F05.9*
- alcoolique *F10.4*
- - aigu *F10.4*
- - chronique *F10.6*
- avant apparition *F05.9*
- - alccolique *F10.4*
- avec
- - démence *F05.1*
- - éclampsie *O15.9*
- - ivresse due à l'alcool *F10.0*
- - syndrome de sevrage
- - - après usage de
- - - - alcool *F10.4*
- - - - cannabinoïdes *F12.4*
- - - - cocaïne *F14.4*
- - - - hallucinogènes *F16.4*
- - - - opiacés *F11.4*
- - - - sédatifs et hypnotiques *F13.4*
- - - - solvants volatils *F18.4*
- - - stimulants *F15.4*
- - - stupéfiants *F19.4*
- épuisement, d' *F43.0*
- étiologie mixte *F05.8*
- hystérique *F44.88*
- non alcoolique *F05.9*
- non dû à l'alcool *F05.9*
- non dû aux drogues *F05.9*
- non induit par une drogue *F05.9*
- non surajouté à une démence *F05.0*
- post-partum NCA *F05.8*
- provoqué par un hyperthyroïdisme *E05.5*
- puerpéral *F05.8*
- sevrage, de *F19.4*
- - alcoolique *F10.4*
- subaigu *F05.9*
- - associé à un syndrome
- - - organique cérébral *F05.9*
- - - psycho-organique *F05.9*
- - réaction exogène (à type de) *F05.9*
- syndrome de sevrage *F19.4*
- - alcool *F10.4*
- tremens *F10.4*
- - cas de psychose due à l'alcool *F10.4*
- - lié à l'alcool *F10.4*
- urémique *N19*

Délits, commis en bande *F91.2*

Délivrance, rétention
- cas de complication, accouchement, saignement *O72.0*

Délivrance, rétention *–suite*
- complication, accouchement, sans saignement *O73.0*
- partielle, complication, accouchement *O72.2*
- - sans saignement *O73.1*

delta Contient cellules type alpha - bêta et gamma - *C86.1*

Delta, virus
- avec infection aiguë, chez sujet porteur du virus de l'hépatite B *B17.0*
- hépatite B virale chronique *B18.0*

Delta-bêta-thalassémie *D56.2*

Demande d'
- interruption, grossesse *Z30.0*

Demande de
- stérilisation
- - chez la femme *Z30.2*
- - chez l'homme *Z30.2*

Demande d'expertise *Z04.8*

Démarche
- anomalie *R26.8*
- - hystérique *F44.4*
- ataxique *R26.0*
- chancelante *R26.0*
- ébrieuse *R26.0*
- para urétrale *Q64.7*
- - infection *N34.2*
- paralytique *R26.1*
- pointe des pieds, sur *R26.8*
- rotation externe, en *R26.8*
- rotation interne, en *R26.8*
- spasmodique *R26.1*

Démarche vacillante *R26.0*

Démence *F03*
- à corps de Lewy *G31.82+*
- alcoolique *F10.7*
- Alzheimer *G30.9+, F00.9**
- après atteinte du cerveau *T90.9+, F02.8**
- artériosclérotique *F01.9*
- - cérébrale *F01.9*
- associée à
- - alcool *F10.7*
- - hypnotique *F13.7*
- - sédatifs *F13.7*
- - solvants volatils *F18.7*
- - substance inhalée *F18.7*
- associée au SIDA (syndrome cognitif et moteur associé au VIH-1) *B22+, F02.4**
- athéroscléreuse *F01.9*
- atypique, type Alzheimer *G30.8+, F00.2**
- avec delirium *F05.1*
- Binswanger *I67.3*
- catatonique *F20.2*
- cause inconnue *F03*
- cérébrale *F03*
- cérébrovasculaire *F01.9*
- complexe
- - Guam-Parkinson *G21.8+, F02.8**
- - SIDA *B22+, F02.4**
- congénitale *F79.9*
- corps de Lewy *G31.82+*
- corticale, prédominante *F01.1*
- cours de
- - alcoolisme *F10.7*
- - Alzheimer, maladie d'

Démence *–suite*
- cours de *–suite*
- - Alzheimer, maladie d' *–suite*
- - - début précoce (Type 2) *G30.0+, F00.0**
- - - début tardif (Type 1) *G30.1+, F00.1**
- - Alzheimer, sclérose d' *G30.9+, F00.9**
- - atrophie, cerveau *F03*
- - - circonscrite *G31.0+, F02.0**
- - - présénile *G31.88+, F02.8**
- - carence
- - - niacine *E52+, F02.8**
- - - vitamine B12 *E53.8+, F02.8**
- - chorée de Huntington *G10+, F02.2**
- - Creutzfeldt-Jakob, maladie de *A81.0+, F02.1**
- - dégénérescence hépatolenticulaire *E83.0+, F02.8**
- - encéphalopathie *G93.4+, F02.8**
- - épilepsie *G40.9+, F02.8**
- - Huntington, maladie de *G10+, F02.2**
- - hypercalcémie *E83.58+, F02.8**
- - hypothyroïdie, acquise *E03.9+, F02.8**
- - - due à carence en iode *E01.8+, F02.8**
- - intoxication *T65.9+, F02.8**
- - - monoxyde de carbone *T58+, F02.8**
- - lupus erythémateux, systémique *M32.1+, F02.8**
- - maladie
- - - Alzheimer *G30.9+, F00.9**
- - - Wilson *E83.0+, F02.8**
- - maladie, par VIH *B22+, F02.4**
- - neurosyphilis *A52.1+, F02.8**
- - panartérite noueuse *M30.0+, F02.8**
- - paralysie agitante *G20.90+, F02.3**
- - paralysie, psychique, progressive *A52.1+, F02.8**
- - parkinson, syndrome, primaire *G20.90+, F02.3**
- - pellagre *E52+, F02.8**
- - Pick, maladie de *G31.0+, F02.0**
- - pseudosclérose, spastique *A81.0+, F02.1**
- - psychose, due à l'alcool *F10.7*
- - sclérose
- - - cérébrale, atrophique, lobaire *G31.0+, F02.0**
- - - présénile *G30.0+, F00.0**
- - sclérose en plaques *G35.9+, F02.8**
- - trouble métabolique, lipide, cérébrale *E75.6+, F02.8**
- - trouble, vasculaire, cérébral *F01.9*
- - trypanosomiase, africaine *B56.9+, F02.8**
- - tumeur, expansive, intracrânienne *D43.2+, F02.8**
- dégénérative primitive *F03*
- - type Alzheimer *G30.9+, F00.9**
- dégénérative, primaire, type Alzheimer, avec
- - début précoce *G30.0+, F00.0**
- - début tardif *G30.1+, F00.1**
- encéphalitique *G04.9*
- épileptique *G40.9+, F02.8**
- frontotemporale *G31.0+, F02.0**
- hébéphrénique *F20.1*
- infantile *F84.3*
- infarctus multiples *F01.1*
- par infarctus multiples *F01.1*

Démence *–suite*
- paralytique *A52.1+, F02.8**
- - congénitale *A50.4*
- - juvénile *A50.4+, F02.8**
- - - syphilitique *A50.4+, F02.8**
- - progressive syphilitique *A52.1+, F02.8**
- - syphilitique *A52.1+, F02.8**
- - tabétique (forme) *A52.1*
- paralytique, par Syphilis *A52.1*
- paranoïde *F03*
- paranoïde fantastique *F22.9*
- parétique *A52.1+, F02.8**
- persistante *F03*
- Pick *G31.0+, F02.0**
- précoce *F20.9*
- - hébéphrénique *F20.1*
- - paranoïde *F20.9*
- présénile *F03*
- - avec
- - - maladie d'Alzheimer *G30.0+, F00.0**
- - - maladie, par VIH *B22+, F02.4**
- - avec psychose, organique *F03*
- puerpérale *F53.1*
- schizophrénie *F20.9*
- sclérotique, cérébrale *F01.9*
- sémantique *G31.0+, F02.0**
- sénile *F03*
- - avec
- - - état confusionnel, aigu *F05.1*
- - - psychose, organique *F03*
- - dépressif *F03*
- - forme simple *F03*
- - maladie d'Alzheimer *G30.1+, F00.1**
- - paranoïde *F03*
- syphilitique, progressive *A52.1+, F02.8**
- type Alzheimer, avec
- - début tardif *G30.1+, F00.1**
- - forme atypique *G30.8+, F00.2**
- - forme mixte *G30.8+, F00.2**
- urémique *N18.89+, F02.8**
- vasculaire *F01.9*
- - corticale et sous-corticale, mixte *F01.3*
- - début aigu *F01.0*
- - subcorticale *F01.2*

Démentielle, psychose *F03*

Demi-, hémi-
- hémibloc de branche gauche *I44.6*
- hémicrânie (migraine) *G43.9*
- héminégligence *R29.5*

Déminéralisation
- ongle *L60.8*
- - congénitale *Q84.6*
- os *M81.99*

Démodécie *B88.0*

Demodex folliculorum, infestation *B88.0*

Demodex-Arten, dermatite *B88.0+, L99.8**
- paupière *B88.0+, H03.0**

Demons-Meigs, syndrome de *D27*

Démyélinisant
- encéphalopathie, coprs calleux *G37.1*
- maladie, système nerveux central *G37.9*
- - avec myélite transverse aïguë *G37.3*
- polyneuropathie, inflammatoire, chronique *G61.8*

Démyélinisation *G37.9*
- corps calleux, centrale *G37.1*
- cours de
- - maladie, par VIH *B22+, G94.8**
- - névrite optique *G36.0*
- disséminée, aiguë *G36.9*
- encéphalomyélite, aiguë (ADEM) *G37.8*
- système nerveux central *G37.9*

dendritique cellules foeto-pelvienne Sarcome à cellules *C96.4*

Dengue, fièvre *A90*
- dépistage *Z11*
- hémorragique *A91*

Denrées alimentaires
- entièrement gâtées, indigestion NCA *A05.9*
- infection *A05.9*

Densité et structure osseuse *M85.89*

Densité osseuse
- élevée *M85.89*
- - généralisée *M85.89*
- - tachetée *M85.89*
- trouble *M85.99*

Dent
- abcès *K04.7*
- - avec
- - - abcès dento-alvéolaire *K04.6*
- - - fistule *K04.6*
- - avec conduit fistulaire *K04.6*
- abrasion *K03.1*
- - habituelle *K03.1*
- - par dentifrice *K03.1*
- - professionnelle *K03.1*
- - traditionnelle *K03.1*
- absence
- - acquise, avec occlusion, défectueuse *K07.3*
- - congénitale *K00.0*
- accessoire *K00.1*
- - encombrante *K07.3*
- allongement *K00.2*
- ankylose *K03.5*
- anomalie *K00.9*
- anomalie, forme *K00.2*
- arrachement *S03.2*
- artificielle, ajustement *Z46.3*
- attrition *K03.0*
- blessure *S09.9*
- - superficielle *S00.50*
- branlante *K08.88*
- carie *K02.9*
- cassée *S02.5*
- changement, prématuré *K00.6*
- chevauchement *K07.3*
- coalescence *K00.2*
- conique *K00.2*
- décalcification *K03.8*
- décoloration *K03.7*
- - due à
- - - dépôt *K03.6*
- - - hémorragie pulpaire *K03.7*
- - - métaux *K03.7*
- - extrinsèque *K03.6*
- - intrinsèque NCA *K00.8*
- déformation *K00.2*
- dégradation *K02.9*
- - due à des causes générales *K08.0*
- déplacement *K07.3*
- dépôt *K03.6*

Dent –*suite*
- dépôt –*suite*
- - au
- - - bétel *K03.6*
- - - tabac *K03.6*
- - materia alba *K03.6*
- - noir *K03.6*
- - orange *K03.6*
- - vert *K03.6*
- détérioration *K03.2*
- dévitalisée *K04.9*
- diastème *K07.3*
- dichotomie *K00.2*
- dilacération *K00.4*
- dislocation *S03.2*
- douleurs *K08.88*
- emboliforme *K00.2*
- enclavée *K01.1*
- - avec position anormale *K07.3*
- - - dent, adjacente *K07.3*
- érosion *K03.2*
- - due aux
- - - aliments *K03.2*
- - - drogues *K03.2*
- - - médicaments *K03.2*
- - - vomissements, persistants *K03.2*
- - idiopathique *K03.2*
- - professionnelle *K03.2*
- éruption
- - anomalie *K00.6*
- - compliquée *K00.7*
- - prématurée *K00.6*
- - trouble, avec position anormale des dents *K07.3*
- espacement anormal *K07.3*
- examen *Z01.2*
- exfoliation *K08.0*
- - due à des causes générales *K08.0*
- exfoliation, due à des causes générales *K08.0*
- fistule *K04.6*
- fluorose *K00.3*
- - chronique *K00.3*
- forme de pelle *K00.2*
- forme, anormalité *K00.2*
- foyer *K04.9*
- frature *S02.5*
- - pathologique *K08.81*
- frontal, sagittal *K07.2*
- fusion *K00.2*
- gémination *K00.2*
- granulome *K04.5*
- - chronique *K04.5*
- Hutchinson (de), consécutive à une syphilis congénitale *A50.5*
- hypercémentose *K03.4*
- hypoplasique *K00.2*
- incluse *K01.0*
- - avec position anormale *K07.3*
- - complète *K01.0*
- - déplacée *K07.3*
- - partielle *K01.0*
- inclusion *K01.1*
- infection *K04.7*
- - *K04.9*
- - focale *K04.7*
- kyste
- - à un trouble du développement des dents *K09.0*

Dent –*suite*
- kyste –*suite*
- - éruptif *K09.0*
- - maxillaire inférieur *K09.0*
- - maxillaire supérieur *K09.0*
- - péri odontal, latéral *K09.0*
- - primordial *K09.0*
- - radiculaire *K04.8*
- - résiduel *K04.8*
- kyste d'éruption *K09.0*
- kyste d'origine *K09.0*
- lait
- - éruption, précoce *K00.6*
- - rétention *K00.6*
- lésion *K08.9*
- luxation *S03.2*
- maladie *K08.9*
- - examen de dépistage *Z13.8*
- malformation, cunéiforme *K03.1*
- malposition *K07.3*
- manquante
- - avec occlusion, défectueuse *K07.3*
- - due à
- - - accident *K08.1*
- - - extraction *K08.1*
- - - parodontose *K08.1*
- manquante, formation anormale *K07.3*
- modification de la couleur
- - après l'éruption *K03.7*
- - tissus durs *K03.7*
- natales *K00.6*
- néonatale *K00.6*
- nombre, insuffisant *K00.0*
- non conservée *K08.88*
- non préservée *K08.88*
- périoste, purulant *K10.3*
- perte, consécutive à un accident *K08.1*
- polype *K04.0*
- position anormale, en cas de trouble, éruption dentaire *K07.3*
- purulente *K04.7*
- résorption *K03.3*
- - externe *K03.3*
- - pathologique *K03.3*
- rétention, avec position anormale des dents adjacentes *K07.3*
- rotation *K07.3*
- sagesse, rétention, malposition *K07.3*
- sans racine *K00.5*
- séquestre *K10.28*
- supplémentaire *K00.1*
- surnuméraire *K00.1*
- - encombrante *K07.3*
- - entraînant un encombrement *K07.3*
- T *K00.2*
- tache, opaque *K02.0*
- taille, anormale *K00.2*
- temporaire, persistante *K00.6*
- tissus durs, maladie *K03.9*
- toxicose focale *K04.9*
- transposition *K07.3*
- trouble, développement *K00.9*
- Turner (de) *K00.4*
- ulcère *K04.6*
- usure
- - excessive *K03.0*
- - occlusale *K03.0*
- - proximale *K03.0*

Denticule *K04.2*

Dentine
- carie *K02.1*
- irrégulière *K04.3*
- secondaire *K04.3*
- sensible *K03.8*

Dentinogenesis imperfecta *K00.5*

Dentinome *D16.5*
- mâchoire supérieure *D16.42*

Dentition
- anomalie *K07.3*
- ayant besoin de soins *K08.9*
- - chirurgicaux *K08.9*
- difficile *K00.7*
- précoce *K00.6*
- retardée *K00.6*
- troubles *K00.6*

Dentition, maladie de la *K00.7*

Dentogène
- abcès *K04.7*
- kyste *K04.8*

Dénutrition *R64*

Départ de la maison pendant l'enfance *Z61*
- mise en foyer *Z61*

Dépassement de terme
- foetus ou nouveau-né *P08.2*
- grossesse (grossesse prolongée) *O48*

Dépassement de terme (grossesse prolongé *O48*

Dépendance long durée envers coeur artificiel , *Z99.4*

Dépendance, à, au
- absinthe *F10.2*
- - *F19.2*
- acide lysergique *F16.2*
- acide methyllysergique *F16.2*
- alcool *F10.2*
- - avec fumée aiguë *F10.0*
- - lors de la grossesse *O99.3*
- alcool méthylique *F10.2*
- amobarbital *F13.2*
- amphétamine *F15.2*
- amytal *F13.2*
- analgésiques NCA *F55.2*
- appareil médical *Z99.9*
- avec intoxication par
- - alcool *F10.0*
- - cannabinoïde *F12.0*
- - cocaïne *F14.0*
- - hallucinogènes *F16.0*
- - héroïne *F11.0*
- - opioïdes *F11.0*
- - sédatifs, et hypnotiques *F13.0*
- - solvants volatils *F18.0*
- - tabac *F17.0*
- barbiturate *F13.2*
- barbiturique *F13.2*
- benzedrine *F15.2*
- benzodiazepine *F13.2*
- bétaïne *F13.2*
- bromide NCA *F13.2*
- caféine *F15.2*
- cannabis *F12.2*
- - indica *F12.2*
- - sativa *F12.2*
- chaise roulante *Z99.3*

Dépendance, à, au *–suite*
- chaise roulante nécessaire aux soins *Z74.0*
- chanvre *F12.2*
- chanvre indien *F12.2*
- chlordiazépoxide *F13.2*
- chlorhydrate *F13.2*
- cocaïne *F14.2*
- codéïne *F11.2*
- dagga *F12.2*
- démérol *F11.2*
- dérivé
- - cannabis *F12.2*
- - cocaïne *F14.2*
- - feuilles de coca *F14.2*
- - LSD (Acide lysergique diéthylamide) *F16.2*
- - opium *F11.2*
- dexamphétamine *F15.2*
- dexedrine *F15.2*
- dextromethorphane *F11.2*
- dextromoramide *F11.2*
- dextro-nor-pseudoéphédrine *F15.2*
- dextrorphane *F11.2*
- dialyse rénale *Z99.2*
- diazepam *F13.2*
- dilaudide *F11.2*
- drogues NCA *F19.2*
- - affectant foetus/nouveau-né *P96.1*
- - avec perte de conscience profonde NCA *F13.2*
- - combinaison NCA *F19.2*
- - pendant la grossesse *O99.3*
- - synthétiques à effets morphinique *F11.2*
- éthanol *F10.2*
- éthylbromide *F13.2*
- éthylcarbamate *F19.2*
- éthylchloride *F19.2*
- éthylmorphine *F11.2*
- feuilles de coca *F14.2*
- ganja *F12.2*
- glutéthimide *F13.2*
- hallucinogènes *F16.2*
- haschisch *F12.2*
- héroïne *F11.2*
- hypnotiques NCA *F13.2*
- inhalation *Z99.0*
- jeu *F63.0*
- khat *F15.2*
- kiff *F12.2*
- laudanum *F11.2*
- luminal *F13.2*
- maconha *F12.2*
- marijuana *F12.2*
- médicaments, NCA *F19.2*
- - affectant le foetus/nouveau-né *P96.1*
- - combinaison NCA *F19.2*
- - hallucinogènes *F16.2*
- - lors de la grossesse *O99.3*
- - mère, avec préjudice pour le foetus/nouveau-né *P04.4*
- - perte de conscience profonde NCA *F13.2*
- méprobamate *F13.2*
- mescaline *F16.2*
- méthadone *F11.2*
- méthamphétamine *F15.2*
- méthaqualone *F13.2*

Dépendance, à, au *–suite*
- méthyl bromide *F13.2*
- méthylmorphine *F11.2*
- méthylphénidate *F15.2*
- méthylsulfonal *F13.2*
- monoxyde azote *F19.2*
- moyens anesthésiques NCA *F55.8*
- narcotique *F19.2*
- narcotiques NCA *F19.2*
- Nembutal *F13.2*
- Neraval *F13.2*
- Neravan *F13.2*
- neurobarb *F13.2*
- nicotine *F17.2*
- non barbiturique avec effet barbiturique *F13.2*
- nourriture *F50.8*
- opiacés *F11.2*
- opium *F11.2*
- oxide d'azote *F19.2*
- paraldéhyde *F13.2*
- parégorique USP *F11.2*
- pentothal *F13.2*
- peyotl *F16.2*
- phenmétrazine *F15.2*
- phénobarbital *F13.2*
- psilocine *F16.2*
- psilocybe *F16.2*
- psilocybine *F16.2*
- psychostimulant NCA *F15.2*
- respirateur *Z99.1*
- sécobarbital *F13.2*
- Seconal *F13.2*
- sédatif non barbiturique *F13.2*
- sédatifs NCA *F13.2*
- sniff de benzine *F18.2*
- soignant *Z74.9*
- soins *Z74.9*
- - mobilité restreinte *Z74.0*
- solvants volatils *F18.2*
- somnifères *F13.2*
- stimulants *F15.2*
- stupéfiants *F19.2*
- substances addictives NCA *F19.2*
- substances morphinomimétiques *F11.2*
- teinture d'opium benzoïque *F11.2*
- tranquillisants NCA *F13.2*
- type sulfate de morphine *F11.2*
- type sulfite de morphine *F11.2*

Dépendant(e)
- personnalité passive *F60.7*
- trouble, personnalité *F60.7*

Déperdition
- cathéter de dialyse *T82.4*
- cathéter de transfusion spinal *T85.6*
- cathéter de transfusion, NCA *T82.5*
- cathéter NCA *T85.6*
- cathéter pour voies urinaires *T83.0*
- cathéter, en cas de dialyse péritonéale *T85.6*
- coeur, due à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- due à une lentille intra-oculaire *T85.2*
- implant mammaire *T85.4*
- implant, gastro-intestinal *T85.5*
- intestinale *K63.1*
- prothèse mammaire *T85.4*
- prothèse orbitaire NCA *T85.3*

Déperdition –*suite*
- shunt, ventriculaire, intracrânien *T85.0*
- transplant des artères coronaires *T82.2*
- transplantation de la cornée NCA *T85.3*
- transplantation NCA *T82.3*
- transplantation, organe urinaire *T83.2*
- vasculaire, en raison d'une prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*

Dépistage
- amniocentèse *Z36.2*
- anténatal *Z36.9*
- cancer *Z12.9*
- caryotype *Z36.0*
- de
- - affection *Z13.9*
- - - cardiovasculaire NCA *Z13.6*
- - - neurologique *Z13.8*
- - - organes urinaires et de l'appareil génital NCA *Z13.8*
- - - peau *Z13.8*
- - - respiratoire NCA *Z13.8*
- - alcoolisme *Z13.8*
- - anémie *Z13.0*
- - anomalie chromosomique *Z13.7*
- - - chez un athlète *Z10*
- - anomalie congénitale *Z13.7*
- - bactériurie, asymptomatique *Z13.8*
- - bronchite chronique *Z13.8*
- - brucellose *Z11*
- - cataracte *Z13.5*
- - choléra *Z11*
- - consommation
- - - stimulants *Z04.8*
- - - stupéfiants *Z04.8*
- - contamination NCA *Z13.8*
- - coqueluche *Z11*
- - dépression *Z13.8*
- - diabète sucré *Z13.1*
- - diphtérie *Z11*
- - emphysème pulmonaire *Z13.8*
- - encéphalite, par virus *Z11*
- - exception, substance radioactive *Z13.8*
- - fibrose, cystique *Z13.8*
- - fièvre de Dengue *Z11*
- - fièvre jaune *Z11*
- - fièvre, hémorragique *Z11*
- - filariose *Z11*
- - framboisie *Z11*
- - galactosémie *Z13.8*
- - glaucome *Z13.5*
- - goutte *Z13.8*
- - handicap lié au développement *Z13.8*
- - helminthose intestinale *Z11*
- - hémoglobinopathie *Z36.8*
- - hémoglobulinopathie NCA *Z13.0*
- - HIV *Z11*
- - hypertension *Z13.6*
- - hypertonie *Z13.6*
- - immuno-pathie *Z13.0*
- - infection
- - - candida *Z11*
- - - chlamydia *Z11*
- - - fongique *Z11*
- - - mycosiques *Z11*
- - infestation parasitaire *Z11*
- - ingestion de substances radioactives *Z13.8*
- - intoxication *Z13.8*

Dépistage –*suite*
- de –*suite*
- - intoxication –*suite*
- - - via
- - - - métals lourds *Z13.8*
- - - - produit chimique *Z13.8*
- - leishmaniose *Z11*
- - lèpre *Z11*
- - leptospirose *Z11*
- - lésion, via les rayons *Z13.8*
- - leucémie *Z12.8*
- - luxation de l'articulation de la hanche, congénitale *Z13.7*
- - lymphome *Z12.8*
- - maladie
- - - bactérienne, NCA *Z11*
- - - coeur NCA *Z13.6*
- - - dent *Z13.8*
- - - drépanocytose *Z13.0*
- - - gastro-intestinale NCA *Z13.8*
- - - oeil, congénital *Z13.5*
- - - organe, hématopoïétique *Z13.0*
- - - organes urinaires et de l'appareil génital NCA *Z13.8*
- - - ou troubles *Z13.9*
- - - protozoaire *Z11*
- - - relatif aux vaisseaux NCA *Z13.6*
- - - relative au virus NCA *Z11*
- - - rénale *Z13.8*
- - - rheumatique NCA *Z13.8*
- - - sanguine *Z13.0*
- - - thyroïdienne *Z13.8*
- - - vénérienne *Z11*
- - - voies respiratoires NCA *Z13.8*
- - maladie de Chagas *Z11*
- - maladie de Hodgkin *Z12.8*
- - maladie de Rickettsien *Z11*
- - maladie du sommeil *Z11*
- - maladie infectieuse *Z11*
- - maladie sexuellement transmissible *Z11*
- - malaria *Z11*
- - malnutrition *Z13.2*
- - mucoviscidose *Z13.8*
- - néoplasie de la vessie *Z12.6*
- - néoplasie du col de l'utérus *Z12.4*
- - néoplasme de la vessie *Z12.6*
- - néphropathie *Z13.8*
- - obésité *Z13.8*
- - ofection à spirochètes *Z11*
- - peste *Z11*
- - phénylcétonurie *Z13.8*
- - poliomyélite *Z11*
- - polyarthrite, chronique *Z13.8*
- - prédisposition à la drépanocytose *Z13.0*
- - retardement, mental *Z13.8*
- - rougeole *Z11*
- - rubéole *Z11*
- - schistosomiase *Z11*
- - tétanos *Z11*
- - trachome *Z11*
- - trouble du métabolisme, congénital *Z13.8*
- - troubles endocriniens *Z13.8*
- - trypanosomiase *Z11*
- - tumeur *Z12.9*
- - tumeur de l'intestin *Z12.1*
- - tumeur du sein *Z12.3*

Dépistage –*suite*
- de –*suite*
- - tumeur, maligne
- - - noeuds lymphatiques *Z12.8*
- - - sanguine *Z12.8*
- - - système hématopoétique *Z12.8*
- - vers intestinaux *Z11*
- échelonné *Z13.9*
- grossesse, avec résultat de l'examen
- - anormal *O28.9*
- - - biochimique *O28.1*
- - - cytologique *O28.2*
- - - génétique *O28.5*
- - - hématologique *O28.0*
- - - radiologique *O28.4*
- - chromosomique, anormal *O28.5*
- - ultrason, anormal *O28.3*
- liquide amniotique *Z36.2*
- mammographie *Z12.3*
- postnatal, sur anomalie chromosomique *Z13.7*
- prénatal *Z36.9*
- - moyen d'une amniosynthèse *Z36.2*
- - sur
- - - anomalie chromosomique *Z36.0*
- - - croissance retardée du foetus *Z36.4*
- - - hémoglobinopathie *Z36.8*
- - - iso-immunisation *Z36.5*
- - - malformation *Z36.3*
- - - - moyen d'ultrasons *Z36.3*
- - - taux élevé d'alpha-foetoprotéines *Z36.1*
- spécial *Z13.9*
- - de
- - - anomalie chromosomique *Z13.7*
- - - diabète sucré *Z13.1*
- - - HIV *Z11*
- - - maladie cardiovasculaire *Z13.6*
- - - maladie des oreilles *Z13.5*
- - - maladie des yeux *Z13.5*
- - - maladie intestinale infectieuse *Z11*
- - - maladie psychique *Z13.8*
- - - malformation *Z13.7*
- - - malformation congénitale *Z13.7*
- - - troubles de l'alimentation *Z13.2*
- - - troubles du comportement *Z13.8*
- - - troubles du développement déterminées, dans l'enfance *Z13.4*
- - - tuberculose pulmonaire *Z11*
- - - tumeur
- - - - col utérin *Z12.4*
- - - - estomac *Z12.0*
- - - - organes respiratoires *Z12.2*
- - - - prostate *Z12.5*
- - - - sein *Z12.3*
- - - - tractus intestinal *Z12.1*
- - - - vessie *Z12.6*
- test *Z11*
- - positif *A53.0*
- via amniocentèse *Z36.2*

Déplacé(e), Complication
- dispositif intra-utérin *T83.3*
- fracture *T14.20*
- - fémur, sous-trochantérienne *S72.2*
- tampon hygiénique *T19.2*

Déplacement
-
- arcade dentaire, ligne médiane *K07.2*

Déplacement –*suite*

- articulation ilio-sacrale
- - congénital *M53.28*
- - récente *S33.2*
- audition, enflure, temporaire *H93.2*
- autre environnement social *Z60*
- côtes *M89.88*
- de l'axe médian dentaire *K07.2*
- difficulté *R26.2*
- disque intervertébral *M51.2*
- dû
- - dû prothèse articulaire , *T84.0*
- - shunt ventriculaire intracrânien (communication) , *T85.0*
- électrolytique *E87.8*
- épiphyse *M93.9*
- - traumatique *M93.9*
- épiphyse, fémur, supérieur *M93.0*
- épithèlium, rétine *H35.4*
- handicap *R26.8*
- lentille intra-oculaire *T85.2*
- ligature, cordon ombilical *P51.8*
- ligne médiane de l'arcade dentaire *K07.2*
- machoire, ligne médiane *K07.2*
- nerf ulnaire, non-traumatique *G56.2*
- pigmentaire, macula *H35.3*
- problème *R26.1*
- sonde cystostomie *T83.0*
- temporaire du seuil auditif *H93.2*
- tendon *M67.89*

Déplétion
- liquide extracellulaire *E86*
- lymphocytaire Lymphome Hodgkin (classique) à *C81.3*
- volume du plasma *E86*

Déplétion lymphocytaire, maladie d'Hodgk *C81.3*
- fibrose diffuse *C81.3*
- réticulaire *C81.3*
- sclérose nodulaire *C81.1*

Dépôt
- amyloïde *E85.9*
- calcium, périarthrite scapulo-humérale *M75.0*
- cholestérol
- - corps vitré *H43.2*
- - rétine *H35.8*
- - vésicule biliaire *K80.20*
- conjonctive *H11.1*
- - lors d'amyloïdose *E85.4+, H13.8**
- contraception, intra-utérine, perforation, utérus *T83.3*
- cornée *H18.0*
- cornée, avec pigmentation de la cornée *H18.0*
- cornée, yeux *H18.0*
- cristallin, corps vitré *H43.2*
- dent *K03.6*
- - materia alba, plaque *K03.6*
- - noir *K03.6*
- - orange *K03.6*
- - provoqué par
- - - bétel *K03.6*
- - - tabac *K03.6*
- - vert *K03.6*
- excessif de graisse *E66.99*
- - localisé *E65*
- hémosidérine *E83.1*

Dépôt –*suite*

- lipide *E75.6*
- mélanine *L81.4*
- métal, gencive *K06.8*
- métalique, cristalin *H26.8*
- para-amyloïde *E85.8*
- peau *R23.8*
- plèvre *R09.1*
- sidérose *J63.4*
- - avec pigmentation *L81.8*
- - pulmoniaire *J63.4*
- stérilet *Z30.1*
- tissu adipeux *E88.2*
- urate, rein *N20.0*

Dépôt dense, maladie à
- hématurie récidivante *N02.6*
- protéinurie, isolée *N06.6*
- syndrome
- - néphritique
- - - aigu *N00.6*
- - - chronique *N03.6*
- - - évolution rapide *N01.6*
- - néphrotique *N04.6*

Dépôt, dent *K03.6*
- materia alba *K03.6*

Dépression *F32.8*
- agitée *F32.2*
- - épisode léger *F32.2*
- - ménopause, épisode, isolé *F32.2*
- aiguë *F32.9*
- anancastique *F42.9*
- angoisse *F41.2*
- anxieuse *F41.2*
- - agitée *F32.2*
- - légère *F41.2*
- - non persistante *F41.2*
- - persistante *F34.1*
- après maladie infectieuse *F06.3*
- asthénique *F32.9*
- atypique *F32.8*
- avec
- - complication de la grossesse *O99.3*
- - cyclothymie *F31.3*
- - réaction maniaco-dépressive *F33.2*
- - trouble des conduites *F92.0*
- centre respiratoire *G93.88*
- cérébrale *F32.9*
- cérébrovasculaire *F32.9*
- chronicisée *F32.9*
- cyclothymique *F34.0*
- dépistage *Z13.8*
- endogène *F33.2*
- - avec symptômes psychotiques *F33.3*
- - récidivante, sans symptôme psychotique *F33.2*
- - sans symptôme psychotique *F33.2*
- endogène réactionnelle, sans symptômes, psychotique *F33.2*
- endoréactive, sans symptôme psychotique *F33.2*
- épisode, unique, sans symptôme psychotique *F32.2*
- épuisement *F32.9*
- exogène *F06.3*
- hypochondriaque *F45.2*
- hystérique *F44.88*
- involution *F32.8*
- larvée *F32.8*

Dépression –*suite*
- larvée –*suite*
- - épisode unique *F32.8*
- légère *F32.0*
- majeure
- - épisode
- - - grave, récidivant, avec symptômes psychotiques *F33.3*
- - - unique
- - - - avec symptômes psychotiques *F32.3*
- - - - sans symptôme psychotique *F32.2*
- - récidivante, sans symptôme psychotique *F33.2*
- maniaque *F31.9*
- médullaire *G93.88*
- ménopause *F32.8*
- moelle osseuse *D75.8*
- - toxique *D75.8*
- monopolaire *F33.9*
- nerveuse *F34.1*
- névrotique *F34.1*
- - sans symptôme psychotique *F34.1*
- organique *F32.9*
- paranoïde *F32.3*
- périodique *F33.9*
- personne âgée *F32.9*
- plaintive *F32.8*
- postnatale *F53.0*
- post-opératoire *F32.9*
- postpartum *F53.0*
- post-schizophrénique *F20.4*
- psychogène *F32.9*
- - avec épisode
- - - léger, récidivant *F33.0*
- - - moyen, récidivant *F33.1*
- - épisode récidivant *F33.8*
- - épisode simple *F32.9*
- psychonévrotique *F34.1*
- psychosomatique *F32.9*
- psychotique
- - épisode simple *F32.3*
- - épisodique
- - - grave, récidivant *F33.3*
- - - récidivant *F33.3*
- - ménopause épisode unique *F32.3*
- puerpérale *F53.0*
- réactionnelle *F32.9*
- - aiguë *F32.9*
- - avec épisode
- - - léger, récidivant *F33.0*
- - - moyen, récidivant *F33.1*
- - chronique *F33.9*
- - endogène, sans symptôme psychotique *F33.2*
- - épisode récidivant *F33.8*
- - épisode simple *F32.8*
- - - léger *F32.0*
- - - moyen *F32.1*
- - grave *F32.2*
- - - épisode, unique, sans symptôme psychotique *F32.2*
- - psychotique *F32.3*
- récidivante *F33.9*
- récidivante, sans symptôme psychotique *F33.2*
- secondaire *F32.9*
- sénile *F32.9*
- somatisante *F32.8*

Dépression –*suite*
- suites de couches *F53.0*
- vitale
- - épisode, unique, sans symptôme psychotique *F32.2*
- - récidivante, sans symptôme psychotique *F33.2*

Dépressive - *voir* Type de maladie

Déprime radioactive, conséquences nocive *T66*

Déprivation
- androgènes *E29.1*
- avec nystagmus *H55*
- lors d'amblyopie *H53.0*

Dérangement interne *M23.99*

Dercum, maladie de *E88.2*

Déréalisation *F48.1*
- névrotique *F48.1*

Dérégulation psycho-neurovégétative *F45.9*

Dérivation
- liquide céphalorachidien in situ *Z98.2*
- ventricule céréblal *Z98.2*

Dérivé de
- acide nicotinique, intoxication *T46.7*
- anthracène
- - allergie *T88.7*
- - hypersensibilité *T88.7*
- hormone parathyroide, intoxication *T50.9*
- imidazol
- - allergie *T88.7*
- - hypersensibilité *T88.7*
- opium, dépendance *F11.2*
- pipérazine
- - allergie *T88.7*
- - hypersensibilité *T88.7*
- pipéridine
- - allergie *T88.7*
- - hypersensibilité *T88.7*
- pyrazolés, intoxication *T39.2*
- pyridoxine, carence *E53.1*

Dermanyssus gallinae, infestation *B88.0*

Dermatite
- allergique *L23.9*
- contact *L25.9*
- - allergique *L23.9*
- - - due à
- - - - acétone *L24.2*
- - - - ambrosie *L23.7*
- - - - bichromate *L23.0*
- - - - caoutchouc *L23.5*
- - - - chrome *L23.0*
- - - - ciment *L23.5*
- - - - colle *L23.1*
- - - - conservateurs *L23.5*
- - - - contact cutané avec des aliments *L23.6*
- - - - cosmétiques *L23.2*
- - - - eau de Cologne *L23.2*
- - - - emplâtre de cantharides *L23.1*
- - - - emplâtre vésicant *L23.1*
- - - - farine *L23.6*
- - - - fourrure *L23.8*
- - - - fruit *L23.6*
- - - - graminées *L23.7*
- - - - insecticide *L23.5*

Dermatite –*suite*
- contact –*suite*
- - allergique –*suite*
- - - due à –*suite*
- - - - lait *L23.6*
- - - - légume *L23.6*
- - - - médicaments *L23.3*
- - - - métaux *L23.0*
- - - - nickel *L23.0*
- - - - nylon *L23.5*
- - - - orties *L23.7*
- - - - plastique *L23.5*
- - - - poison-chêne *L23.7*
- - - - poisson *L23.6*
- - - - primevère *L23.7*
- - - - produit chimique *L23.5*
- - - - séneçon de Jacob *L23.7*
- - - - sparadrap *L23.1*
- - - - sumac vénéneux *L23.7*
- - - - teinture *L23.4*
- - - - viande *L23.6*
- - due à
- - - aliment *L25.4*
- - - ciment *L25.3*
- - - cosmétiques *L25.0*
- - - détergents *L24.0*
- - - farine *L25.4*
- - - fruit *L25.4*
- - - graisse *L24.1*
- - - huile NCA *L24.1*
- - - insecticide *L25.3*
- - - lait *L25.4*
- - - légume *L25.4*
- - - lubrifiant NCA *L24.1*
- - - médicaments *L25.1*
- - - poisson *L25.4*
- - - produit chimique *L25.3*
- - - produit de rinçage *L24.0*
- - - rayonnement *L59.8*
- - - solvant organique *L24.2*
- - - substance irritante *L24.9*
- - - teinture *L25.2*
- - - teinture capillaire *L25.0*
- - - térébenthine *L25.3*
- - - végétaux *L25.5*
- - - viande *L25.4*
- - non allergique *L24.9*
- - paupière *H01.1*
- - phototoxique *L56.2*
- - professionnelle *L25.9*
- - toxique *L24.9*
- - - due à
- - - - acides *L24.5*
- - - - alcool *L24.2*
- - - - aliment *L24.6*
- - - - cétone *L24.2*
- - - - composé chloré *L24.2*
- - - - contact cutané, du à un médicament *L24.4*
- - - - cosmétiques *L24.3*
- - - - cyclohexane *L24.2*
- - - - essence *L24.2*
- - - - ester *L24.2*
- - - - fruit *L24.6*
- - - - glycol *L24.2*
- - - - hydrocarbure *L24.2*
- - - - insecticide *L24.5*
- - - - lait *L24.6*

Dermatite –*suite*
- contact –*suite*
- - toxique –*suite*
- - - due à –*suite*
- - - - légume *L24.6*
- - - - lessive *L24.5*
- - - - poisson *L24.6*
- - - - produit corrosif *L24.5*
- - - - produit pétrolier *L24.2*
- - - - produits alcalins *L24.5*
- - - - solvants *L24.2*
- - - - sulfure de carbone *L24.2*
- - - - teinture *L24.8*
- - - - tétrachloréthylène *L24.2*
- - - - toluène *L24.2*
- - - - viande *L24.6*
- - - professionnelle *L24.9*
- poils de chenille *L24.8*
- sèche *L30.8*
- - surinfectée *L30.3*
- vaseline *L57.0*

Dermato-arthrite lipoïde *E78.8+, M14.3**

Dermatocèle, cornée *H18.7*

Dermatochalasis *Q82.8*
- paupière *H02.3*

Dermatofibrome - *voir* Tumeur bénigne, pe *D23.9*
- lenticulaire - *voir* Tumeur bénigne, peau *D23.9*
- progressif récidivant *C44.9*

Dermatofibrosarcome *C44.9*

Dermatofibrosarcome protubérant *C44.9*

Dermatofibrose *L90.5*

Dermatoglyphes, anomalie *Q82.8*

Dermatologique, maladie *L98.9*

Dermatolyse *Q82.8*
- acquise *L57.4*
- congénitale *Q82.8*
- exfoliatrice *Q82.8*
- paupière *H02.3*
- sénile *L57.4*

Dermatomucomyosite *M33.1*

Dermatomycose *B36.9*
- corps *B35.4*
- favus *B35.9*
- furfuracea *B36.0*

Dermatomyosite *M33.1*
- aiguë *M33.1*
- associée à tumeur NCA *D48.9+, M36.0**
- avec troubles pulmonaires *M33.9+, J99.1**
- chronique *M33.1*
- juvénile *M33.0*
- poïkilo- *M33.1*

Dermatomyosite, tache blanche *M33.1*

Dermato-neurose, trophique *T56.1*

Dermatophilose *A48.8*

Dermatophyte *L30.2*
- infection, pied *B35.3*
- onychose *B35.1*

Dermatophytie inguinale *B35.6*

Dermatophytose *B35.9*
- aine *B35.6*
- amiantacea *L44.8*

Dermatophytose –*suite*

- asbestina *L44.8*
- associée à maladie causée par le VIH *B20, B35.9*
- avec sycose *B35.0*
- axillaris *B35.8*
- barbe *B35.0*
- blanca *B36.2*
- circinée *B35.4*
- corps *B35.4*
- - superficielle *B35.4*
- cuir chevelu *B35.0*
- disséminée *B35.8*
- due à
- - microsporum *B35.9*
- - trichophyton *B35.9*
- enracinée *B35.8*
- favique *B35.9*
- flava *B36.0*
- génitale *B35.8*
- granulomateuse *B35.8*
- imbriquée *B35.5*
- infectieuse *B35.9*
- inguinalis *B35.6*
- interdigitale *B35.9*
- - main *B35.2*
- - pied *B35.3*
- intersecta *B35.9*
- intertrigineuse *B35.9*
- - pied *B35.3*
- main *B35.2*
- - eczémateuse *B35.2*
- - et pied *B35.8*
- membre inférieur *B35.6*
- nigra *B36.1*
- noueuse *B36.8*
- ongle *B35.1*
- périanale *B35.6*
- pied *B35.3*
- plantaire *B35.3*
- provoquée par
- - Epidermophyton *B35.9*
- - Microsporum *B35.9*
- - Trichophyton *B35.9*
- surinfectée *B35.8*
- tête *B35.0*
- tonsurans *B35.0*
- tropicale *B35.4*
- unguium *B35.1*
- versicolor *B36.0*
- visage *B35.0*

Dermatophytose [dermatophytie] *B35.9*
- inguinale *B35.6*

Dermatophytose ou dermatophytie *B35.9*

Dermatopolymyosite *M33.9*
- associée à tumeur NCA *D48.9+, M36.0**

Dermatopolynévrite *T56.1*

Dermatorrhexie *Q82.8*
- acquis *L57.4*

Dermatosclérose *M34.9*
- chronique *M34.9*
- localisée *L94.0*

Dermatose *L98.9*
- acantholytique *L11.9*
- acantholytique transitoire [Grover] *L11.1*

Dermatose –*suite*

- aiguë, fébrile, neutrophile [syndrome de Sweet] *L98.2*
- associée à
- - allergie *L23.9*
- - grossesse *O99.7*
- - photoallergie *L56.8*
- Atopique endogène *L20.9*
- Bowen *D04.9*
- bulleuse *L13.9*
- bulleuse chronique, chez l'enfant *L12.2*
- exfoliatrice *L26*
- factice *L98.1*
- fessière du nourrisson *L22*
- gonococcique *A54.8+, L99.8**
- herpétiforme *L13.0*
- IgA linéaire *L13.8*
- impétiginisation, secondaire *L01.1*
- irritation, par *L98.8*
- lucite *L56.4*
- - polymorphe *L56.4*
- menstruelle NCA *L98.8*
- pachy- *L85.9*
- papuleuse noire *L82*
- papuleuse, pendant la grossesse *O99.7*
- paupière, non infectieuse *H01.1*
- photo- *L56.4*
- phytophoto- *L56.2*
- pigmentaire *L81.9*
- - progressive *L81.7*
- - Schamberg, de *L81.7*
- pigmentaire progressive *L81.9*
- plantaire juvénile *L30.1*
- professionnelle *L25.9*
- prurigo *L28.2*
- psychogène *F54, L98.9*
- psychosomatique *F54, L98.9*
- psycho-somatogène *F54, L98.9*
- purpurique pigmentée *L81.7*
- - chronique *L81.7*
- pustulose sous-cornée *L13.1*
- sèche *L85.3*
- sénile *L98.8*
- stase *I83.1*
- - associée à
- - - varices *I83.1*
- - - - avec ulcère *I83.2*
- - - varices des membres inférieurs, sans ulcère ou inflammation *I83.9*
- - surinfectée *I83.1*
- Sweet, de *L98.2*

Dermique
- cylindrome exocrine *D23.9*
- naevus *D22.9*

Dermite *L30.9*
- acarienne *B88.0+, L99.8**
- acariens *B88.0+, L99.8**
- acnéiforme *L30.8*
- acro- *L30.8*
- actinique, provoquée par
- - rayonnements autres que solaires *L59.8*
- - rayons solaires *L57.8*
- aiguë *L30.9*
- - provoquée par
- - - lumière *L56.8*
- - - rayons radioactifs *L58.0*
- - - rayons ultraviolets *L56.8*

Dermite –*suite*
- aiguë –*suite*
- - provoquée par –*suite*

- - - rayons X *L58.0*
- allergique *L23.9*
- - inflammatoire *L23.9*
- - provoquée par
- - - irritant externe NCA *L23.8*
- - - produit chimique *L23.5*
- - - teinture capillaire *L23.2*
- - - térébenthine *L23.5*
- ammoniacale *L22*
- anogénitale *L22*
- artificielle *L98.1*
- associée à
- - candidose *B37.2*
- - exsiccation *L30.8*
- Atopique
- - endogène *L20.9*
- - infantile *L20.8*
- - intertrigineuse *L20.8*
- atrophiante *L90.8*
- - maculeuse *L90.8*
- berloque, de *L56.2*
- boulangers *L25.4*
- bulleuse *L13.9*
- chondro-, pavillon de l'oreille *H61.0*
- chronique *L30.9*
- - provoquée par
- - - rayons radioactifs *L58.1*
- - - rayons X *L58.1*
- contact *L25.9*
- - alcali toxique *L24.5*
- - allergique *L23.9*
- - - provoquée par
- - - - acétone *L24.2*
- - - - adhésifs *L23.1*
- - - - agent de conservation *L23.5*
- - - - ambrosiacées *L23.7*
- - - - bichromate *L23.0*
- - - - caoutchouc *L23.5*
- - - - chêne vénéneux *L23.7*
- - - - chrome *L23.0*
- - - - ciment *L23.5*
- - - - colle *L23.1*
- - - - contact cutané avec des aliments *L23.6*
- - - - cosmétiques *L23.2*
- - - - eau de Cologne *L23.2*
- - - - emplâtre de cantharides *L23.1*
- - - - emplâtre révulsif *L23.1*
- - - - farine *L23.6*
- - - - fourrure *L23.8*
- - - - fruits *L23.6*
- - - - graminées *L23.7*
- - - - insecticide *L23.5*
- - - - lait *L23.6*
- - - - légume *L23.6*
- - - - matière synthétique *L23.5*
- - - - médicament *L23.3*
- - - - médicaments *L23.3*
- - - - métaux *L23.0*
- - - - nickel *L23.0*
- - - - nylon *L23.5*
- - - - orties *L23.7*
- - - - pansement adhésif *L23.1*
- - - - plastique *L23.5*
- - - - poisson *L23.6*

Dermite –*suite*
- contact –*suite*
- - allergique –*suite*
- - - provoquée par –*suite*
- - - - primevère (coucou) *L23.7*
- - - - primulacées *L23.7*
- - - - produit chimique *L23.5*
- - - - séneçon de Jacob *L23.7*
- - - - sumac grimpant *L23.7*
- - - - sumac vénéneux *L23.7*
- - - - teinture *L23.4*
- - - - viande *L23.6*
- - non allergique *L24.9*
- - ortie, allergique *L23.7*
- - paupière *H01.1*
- - phototoxique *L56.2*
- - provoquée par
- - - aliment *L25.4*
- - - ciment *L25.3*
- - - colorant *L25.2*
- - - cosmétiques *L25.0*
- - - détergents *L24.0*
- - - farine *L25.4*
- - - fruits *L25.4*
- - - graisse *L24.1*
- - - huile NCA *L24.1*
- - - insecticide *L25.3*
- - - irradiation *L59.8*
- - - irritant *L24.9*
- - - lait *L25.4*
- - - légume *L25.4*
- - - lubrifiant NCA *L24.1*
- - - médicament *L25.1*
- - - plantes *L25.5*
- - - poisson *L25.4*
- - - produit chimique *L25.3*
- - - produit de lavage *L24.0*
- - - produit de rinçage *L24.0*
- - - solvant organique *L24.2*
- - - teinture capillaire *L25.0*
- - - térébenthine *L25.3*
- - - viande *L25.4*
- - térébenthine *L25.3*
- - toxique *L24.9*
- - - professionnelle *L24.9*
- - - provoquée par
- - - - acide *L24.5*
- - - - agent corrosif *L24.5*
- - - - alcalins (solution alcaline), lessive *L24.5*
- - - - alcool *L24.2*
- - - - aliment *L24.6*
- - - - cétone *L24.2*
- - - - colorant *L24.8*
- - - - composé chloré *L24.2*
- - - - contact cutané avec un médicament *L24.4*
- - - - cosmétiques *L24.3*
- - - - cyclohexane *L24.2*
- - - - essence *L24.2*
- - - - ester *L24.2*
- - - - fruits *L24.6*
- - - - glycol *L24.2*
- - - - hydrocarbure *L24.2*
- - - - insecticide *L24.5*
- - - - lait *L24.6*
- - - - légume *L24.6*
- - - - poisson *L24.6*

Dermite –*suite*
- contact –*suite*
- - toxique –*suite*
- - - provoquée par –*suite*
- - - - produit pétrolier *L24.2*
- - - - produits alcalins *L24.5*
- - - - solvants *L24.2*
- - - - sulfure de carbone *L24.2*
- - - - tétrachloréthylène *L24.2*
- - - - toluène *L24.2*
- - - - viande *L24.6*
- - végétaux *L23.7*
- contusiforme *L52*
- des prés *L23.7*
- diabétique *E14.60+, L99.8**
- diphtérique *A36.3*
- dysménorrhéique symétrique *N94.6*
- eczémateuse NCA *L30.9*
- eczémateuse, avec rhagade *L30.8*
- eczématoïde *L30.3*
- engelures *T69.1*
- érysipéloïde *L30.8*
- estivale
- - aigue *L55.9*
- - bulleuse *L30.8*
- - chronique *L57.8*
- exfoliative *L26*
- - généralisée *L26*
- - infantile *L00.0*
- - nouveau-né *L00.0*
- exfoliatrice de Wilson-Brocq *L26*
- exsiccation *L30.8*
- - surinfectée *L30.3*
- factice *L98.1*
- fessière du nourrisson *L22*
- - lors d'une candidose *B37.2*
- - psoriasiforme *L22*
- folliculaire *L30.8*
- fongique *B36.9*
- gangréneuse *L88*
- - *L08.0*
- - infantile *R02*
- graminées des prés *L23.7*
- herpétiforme
- - Duhring *L13.0*
- - juvénile *L12.2*
- - sénile *L12.0*
- hivernale *L30.8*
- hypostatique *I83.1*
- hypostatique, lors d'ulcère variqueux de la jambe *I83.2*
- infantile *L20.8*
- infectieuse *L30.3*
- - eczémateuse *L21.9*
- - sous-mammaire *L30.3*
- infrarouge (feu) *L59.0*
- ingestion, produit chimique *L27.8*
- Jaquet, de *L22*
- kérato-, congénitale *Q82.8*
- lichénifiée NCA *L28.0*
- lichénoïde chronique *L28.1*
- multiforme *L13.0*
- mycosique NCA *B36.9*
- - associée à maladie causée par le VIH *B20, B36.9*
- - corps *B35.4*
- - fessière du nourrisson *B36.8*
- nummulaire *L30.0*

Dermite –*suite*
- papillaire de la nuque (acné chéloïde) *L73.0*
- paupière
- - eczémateuse *H01.1*
- - lors de zona *B02.3+, H03.1**
- - provoquée par
- - - Demodex, espèces de *B88.0+, H03.0**
- - - virus de l'herpès *B00.5+, H03.1**
- paupière, allergique *H01.1*
- pavillon de l'oreille *H60.5*
- pellagreuse *E52*
- périorale *L71.0*
- périorbitaire *H01.1*
- photo- *L56.8*
- - chronique *L57.8*
- - provoquée par
- - - rayonnement autre que solaire *L59.8*
- - - rayons solaires *L56.8*
- - provoquée par médicaments *L56.8*
- photosensible *L56.2*
- phototoxique *L56.2*
- plantaire sèche *L30.1*
- plis de flexion NCA *L20.8*
- poils de chenille *L24.8*
- polymorphe douloureuse [de Brocq] *L13.0*
- précancéreuse de Bowen *D04.9*
- provoquée par
- - acariens *B88.0+, L99.8**
- - aliment *L27.2*
- - - ingéré *L27.2*
- - amibes *A06.7*
- - aoûtat *B88.0+, L99.8**
- - arsenic *L27.8*
- - basse température *L30.8*
- - cercaires *B65.3*
- - chaleur *L59.0*
- - cytomégalovirus *B25.88+, L99.8**
- - Demodex, espèces de *B88.0+, L99.8**
- - Dermanyssus gallinae *B88.0+, L99.8**
- - détergents *L24.0*
- - froid *L30.8*
- - frottement *L30.4*
- - fruit, ingéré *L27.2*
- - gel *L30.8*
- - graisse *L24.1*
- - irradiation *L59.8*
- - irritant externe NCA *L24.9*
- - lait, bu *L27.2*
- - légume, ingéré *L27.2*
- - Liponyssoides sanguineus *B88.0+, L99.8**
- - lumière NCA *L57.8*
- - médicament *L27.0*
- - - absorbé par voie orale *L27.0*
- - - généralisée, due à la prise de médicamens par voie orale *L27.0*
- - - localisée, due à la prise de médicaments par voie orale *L27.1*
- - plantes *L25.5*
- - poisson, ingéré *L27.2*
- - produit chimique absorbé NCA *L27.8*
- - produit de lavage *L24.0*
- - radium *L58.9*
- - rayons *L59.8*
- - - aiguë *L58.0*
- - - chronique *L58.1*

Dermite *–suite*
- provoquée par *–suite*
- - rayons *–suite*
- - - non ionisant *L57.8*
- - rayons infrarouges *L59.8*
- - rayons solaires *L57.8*
- - rayons ultraviolets *L57.8*
- - savon *L24.0*
- - sensibilisation NCA *L23.9*
- - sérum NCA *T80.6*
- - solvant organique *L24.2*
- - substance
- - - ingérée *L27.9*
- - - radioactive *L58.9*
- - vaccin *L27.0*
- - vaccination *L27.0*
- - viande, ingéré *L27.2*
- - virus *B09*
- prurigineuse *L13.0*
- purulente *L08.0*
- pustuleuse
- - contagieuse *B08.0*
- - sous-cornéenne *L13.1*
- pyogène *L08.0*
- radio- *L58.9*
- - aiguë *L58.0*
- - chronique *L58.1*
- rayons X *L58.9*
- rhus sumac *L23.7*
- rhus, sumac *L23.7*
- Schamberg, de *L81.7*
- séborrhéique *L21.9*
- - chez
- - - adolescent *L21.1*
- - - enfant *L21.1*
- septique *L08.0*
- serpigineuse *L40.2*
- solaire *L30.4*
- - *L55.9*
- - *L57.8*
- - aiguë *L55.9*
- - - deuxième degré *L55.1*
- - - premier degré *L55.0*
- - - troisième degré *L55.2*
- - chronique *L57.8*
- - exposition chronique *L57.8*
- sous-mammaire *L30.9*
- stase *I83.1*
- - liée à un ulcère variqueux de la jambe *I83.2*
- suppurative *L08.0*
- thermique *L59.0*
- - provoquée par
- - - coup de soleil *L59.0*
- - - froid *L30.8*
- toxique, par *L24.9*
- - agent conservateur NCA *L24.5*
- - bichromate *L24.5*
- - chrome *L24.8*
- - ciment *L24.5*
- - colle *L24.5*
- - eau de Cologne *L24.3*
- - fourrure *L24.8*
- - irritant externe NCA *L24.8*
- - métaux *L24.8*
- - nickel *L24.8*
- - nylon *L24.5*
- - pansement *L24.5*

Dermite *–suite*
- toxique, par *–suite*
- - plantes *L24.7*
- - plastique *L24.5*
- - teinture capillaire *L24.3*
- - térébenthine *L24.2*
- traumatique NCA *L30.4*
- trophoneurotique *L13.0*
- ulcéreuse *L88*
- variqueuse *I83.1*
- - cas de Ulcus cruris varicosum *I83.2*
- végétale *L23.7*
- végétante *L10.1*
- vénéneuse *L23.7*
- vésiculaire *B00.1*
- - due à due au virus de l'herpès *B00.1*
- - fiévreuse *B00.1*
- - lèvre, due au virus de l'herpès alpha, type 2, humain *B00.1*
- - oreille, due au virus de l'herpès alpha, type 2, humain *B00.1*

Dermoépidermite *L30.8*

Dermographique, urticaire *L50.3*

Dermographisme *L50.3*
- urticaire *L50.3*

Dermoïde *D36.9*
- coccyx *L05.9*
- conjonctive *D31.0*
- due à une exposition aux rayonnements non ionisants *L57.8*
- paupière *D21.0*

Dermoïde, tumeur, à transformation malig *C56*

Derrick-Burnet, maladie de *A78*

Descemet, membrane de
- changement *H18.3*
- défaut congénital *Q13.8*
- pli *H18.3*
- rupture *H18.3*

Descemétocèle *H18.7*

Descendante, paralysie, spinale NCA *G12.2*

Descendu, testicule, embryome *C62.1*

Descente
- absence de, testicule *Q53.9*
- - bilatérale *Q53.2*
- - unilatérale *Q53.1*
- utérus *N81.4*
- - deuxième degré *N81.2*
- - durant la grossesse *O34.5*
- - et vagin *N81.4*
- - - partielle *N81.2*
- - - totale *N81.3*
- - premier degré *N81.2*
- - troisième degré *N81.3*
- vagin *N81.1*
- - antérieure *N81.1*
- - et vessie *N81.1*
- ventricule *K31.88*
- vessie, féminin *N81.1*

Désensibilisation aux allergènes *Z51.6*

Déséquilibre
- acido-cétose *E87.2*
- alimentaire *E63.1*
- - avec arthropathie *E63.9+, M14.5**
- - due à une composition de l'alimentation non équilibrée *E63.1*

Déséquilibre *–suite*
- alimentaire *–suite*
- - séquelles *E64.9*
- cas de diabète sucré *E14.91*
- électrolytique *E87.8*
- émotionnel *F60.30*
- hydrique, avec perturbation de l'équilibre électrolytique *E87.8*
- musculaire *M62.99*
- - niveau rachidien *M62.98*
- postural *R29.3*
- - rachis NCA *M43.99*
- psychovégétatif *R45.8*
- sel *E87.8*
- syndrome de, sous dialyse *E87.1*
- température *R50.9*

Déséquilibré, -ée
- Insertion *Q92.8*
- translocation *Q92.8*

Déshydratation *E86*
- hyperémèse gravidique *O21.1*
- hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation *O21.1*
- hypotonique *E86*
- nouveau-né *P74.1*

Déshydroépiandrostérone [DHEA], sulfate, *T88.7*

Deshydrogénase pyruvate, carence *E74.4*

Desidurine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Désinhibition *R45.8*
- attachement de l'enfance *F94.2*

Désintégratif(ve)
- psychose *F84.3*
- schizophrénie *F20.1*
- trouble infantile NCA *F84.3*

Désir de stérilisation *Z30.2*

Désir d'enfants *Z31.6*

Désir sexuel, absence *F52.0*

Desmoïde - *voir* Tumeur à évolution impré *D48.1*
- abdominale *D48.1*
- extra-abdominale - *voir* Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, tissu conjonctif *D48.1*

Desmoplastique
- fibrome *D48.1*
- médulloblastome *C71.6*
- mélanome, malin *C43.9*

Desogestrel, effet indésirable *T88.7*

Désorganisée, schizophrénie [hébéphréniq *F20.1*

Désorientation *R41.0*

Désorientation sénile *F03*

Desquamation de la peau *R23.4*

Desquamation, peau *R23.4*

Destructeur(trice)
- apophyse osseuse *M89.89*
- chorioadénome *C58*
- môle hydatiforme *D39.2*

Destructif(ve)
- angiocholite chronique, non suppurée *K74.3*
- comportement *F91.8*

Destructif(ve) –*suite*
- labyrinthite *H83.0*

Destruction
- articulaire *M24.89*
- avec rupture du globe oculaire, en cas de brûlure caustique de l'oeil *T26.7*
- corps vitré *H43.8*
- crâne, foetus *P03.8*
- genou, articulation *M23.89*
- os *M89.89*
- rupture, globe oculaire, en cas de brulure des yeux *T26.2*
- septum nasal *J34.8*
- sphincter rectal *K62.8*

Désunion, points de suture *T81.3*

Détenus, examen médical *Z10*

Détergent
- allergie *L23.5*
- asthme *J69.8*
- dermite *L24.0*
- dermite de contact *L24.0*
- eczéma *L24.0*
- eczéma professionnel *L24.0*
- effet toxique *T55*

Détérioration fonctionnelle
- greffe de foie
- - 29 jours ou plus après la transplantation *T86.41*
- - pendant les 28 premiers jours après la transplantation *T86.40*
- greffe de rein
- - aiguë *T86.10*
- - chronique *T86.11*

Détérioration, vision *H53.9*

De-Toni-Debré-Fanconi, syndrome *E72.0*

Détresse
- fœtale *P20.9*
- - accouchement compliqué de *O68.9*
- - confirmation, au cours de l'accouchement, par
- - - échographie *O68.8*
- - - électrocardiogramme *O68.8*
- - cours de l'accouchement, liée à médication *O68.9*
- - détectée pour la première fois
- - - avant le début du travail *P20.0*
- - - cours du travail ou de l'accouchement *P20.1*
- - situation de
- - - césarienne *O36.3*
- - - complication d'accouchement biochimiquement confirmée *O68.3*
- - soins maternels pour *O36.3*
- gastro-intestinale, fonctionnelle *K30*
- intestinale, fonctionnelle NCA *K59.9*
- intra-utérine *P20.9*
- maternelle
- - avec césarienne *O75.0*
- - cours de l'accouchement *O75.0*
- respiratoire *R06.0*
- - chez le nouveau né *P22.9*

Détroit inférieur du bassin
- accouchement par forceps *O81*
- contracture, avec disproportion foeto-pelvienne *O33.3*
- et milieu du du bassin, rétrécissement, encombrement, accouchement *O65.3*

Détroit inférieur du bassin –*suite*
- rétréci, avec accouchement par césarienne *O33.3*

Détroit supérieur du bassin
- contracture, avec disproportion, feotopelvienne *O33.2*
- rétréci, avec accouchement par césarienne *O33.2*
- rétrécississement, encombrement, naissance *O65.2*

Détrusor
- atonie, vessie *N31.2*
- décompensation, vessie *N31.2*
- hyperactivité *N32.8*
- hyperréflexie, vessie *N31.1*
- hypoactivité, vessie *N31.2*
- instabilité
- - avec trouble fonctionnel, vessie, dans un contexte de neuropathie autonome *N31.1*
- - d'origine centrale *N31.0*
- insuffisance *R32*
- myasthénie *R32*

Deutéranomalie *H53.5*

Deutéranopie *H53.5*
- complète *H53.5*
- incomplète *H53.5*

Deux, bras, perte *Z89.3*

deuxième degré Hémorroïdes du *K64.1*

Développement
- acalculie *F81.2*
- anormal, névrotique *F48.9*
- anormal, queue de cheval *Q06.3*
- appareil respiratoire, incomplet *Q34.8*
- arbre bronchique, incomplet *Q32.4*
- arrêt de *R62.8*
- - à la malnutrition *E45*
- - enfant *R62.8*
- - fœtus *P05.9*
- - fœtus, soins maternels *O36.5*
- - osseux *M89.29*
- - trachée *Q32.1*
- cardiaque, incomplet, congénital *Q24.9*
- épisode dépressif *F32.9*
- état de
- - enfant, examen *Z00.1*
- - examen à la période de croissance rapide de l'enfance *Z00.2*
- - nourrisson, examen de routine *Z00.1*
- foetus, incomplet *P05.9*
- insuffisant, organes génitaux, féminin
- - externe, congénitale *Q52.7*
- - interne, congénital *Q52.8*
- langage
- - retard *F80.9*
- - trouble *F80.9*
- - - audiogène *F80.28*
- maturation pulmonaire, absent, chez le nouveau-né *P28.0*
- névrotique *F48.9*
- organes génitaux
- - féminin, absence complète ou partielle, congénitale *Q52.8*
- - masculin, absence complète ou partielle, congénitale *Q55.8*
- parole, trouble *F80.9*
- physiologique, normal *R62.9*
- prématuré *E30.8*
- pulmonaire

Développement –*suite*
- pulmonaire –*suite*
- - incomplet, congénital (non relié à une naissance prématurée) *Q33.6*
- - insuffisant, durée de grossesse, courte *P28.0*
- queue de cheval, congénitale absent *Q06.3*
- retard de *F89*
- - *R62.8*
- - avec acalculie *F81.2*
- - chez le nourrission en cas de maladie due au VIH *B22, P05.9*
- - corporel
- - - après malnutrition chez l'enfant *E45*
- - - fœtus *P05.9*
- - enfant *R62.8*
- - fœtus *P05.9*
- - fonctions motrices *F82.9*
- - généralisé *F89*
- - malnutrition *E45*
- - malnutrition protéinée *E45*
- - mental *F79.9*
- - mixte *F83*
- - moteur *F82.9*
- - syndrome avec hyperactivité *F90.0*
- sein, excessif, unilatéral *N64.8*
- sexuel, précoce *E30.1*
- - cas d'hyperplasie surrénalienne *E25.9*
- stade de
- - Agnosie *F88*
- - - langage *F80.28*
- - agraphie *F81.8*
- - Alalie *F80.0*
- - Alexie *F81.0*
- - Amusie *F80.8*
- - aphasie *F80.28*
- - - auditive *F80.28*
- - - type
- - - - expressif *F80.1*
- - - - réceptif *F80.28*
- - Dyslalie *F80.0*
- - Dyslexie *F81.0*
- - dysphasie de type
- - - expressif *F80.1*
- - - réceptif *F80.28*
- - encéphalie *Q04.6*
- - handicap, dépistage *Z13.8*
- - kyste
- - - odontogène *K09.0*
- - - ovaire *Q50.1*
- - - région buccale *K09.1*
- - maladie, mâchoire *K10.0*
- - myasthénie *G70.2*
- - oreille, ischémique *H93.0*
- - problème
- - - communication *F80.9*
- - - langage *F80.9*
- - queue de cheval, anomalie *Q06.3*
- - surdité ischémique transitoire *H93.0*
- - syndrome de Gerstmann *F81.2*
- - trouble
- - - articulation *F80.0*
- - - coordination *F82.9*
- - - expression écrite *F81.8*
- - - langage, mixtes *F80.28*
- - - lecture *F81.0*
- - - mâchoire *K10.0*
- - Wernicke, aphasie de *F80.28*

Développement –*suite*

- symptôme physique pour des raisons psychologiques *F68.0*
- tardif *E30.0*
- tolérance, induite par les médicaments *T88.7*
- trouble *F89*
- - apprentissage *F81.9*
- - articulation *F80.0*
- - calcul *F81.2*
- - dents *K00.9*
- - écriture *F81.0*
- - envahissant *F84.9*
- - fonctions moteurs *F82.9*
- - langage
- - - expressif *F80.1*
- - - réceptif *F80.28*
- - lecture *F81.0*
- - mental *F79.9*
- - mixte *F83*
- - mixtes *F83*
- - motricité buccale, circonscrit *F82.2*
- - motricité fine et graphique, circonscrite *F82.1*
- - motricité globale, circonscrit *F82.0*
- - psychosexuel *F66.9*
- - scolaire *F81.9*
- trouble, apprentissage *F81.9*
- valve pulmonaire, insuffisance congénitale *Q22.2*
- valvule cardiaque, absente, congénitale *Q24.8*
- ventricule gauche, absence congénitale *Q24.8*
- - cas d'hypoplasie du coeur gauche *Q23.4*

Devergie, maladie de *L44.0*

Déviation

- abouchement de l'uretère *Q62.6*
- cloison nasale *J34.2*
- - acquise *J34.2*
- - congénitale *Q67.4*
- coccyx
- - acquise *M43.88*
- - congénitale NCA *Q76.4*
- conjuguée *H51.8*
- cornée *H18.7*
- cubitus *M21.83*
- fémur
- - acquise *M21.85*
- - congénitale *Q74.2*
- nez acquise *M95.0*
- nez, paroi *J34.2*
- oeil, asymétrique *H51.8*
- oesophage, acquise *K22.8*
- pénis *Q55.6*
- penis courbure ventrale congénitale *Q54.4*
- poignet
- - acquise *M21.84*
- - congénitale *Q74.0*
- radius, progressive, idiopatique, congénitale *Q74.0*
- sacrum
- - acquise *M43.88*
- - congénitale NCA *Q76.4*
- septum nasal *J34.2*
- - acquise *J34.2*
- - congénitale *Q67.4*

Déviation –*suite*

- sexuelle *F65.9*
- spinale *M43.99*
- - acquise *M43.99*
- - congénital *Q67.5*
- - due à
- - - ostéite
- - - - déformante *M88.88*
- - - - fibro-kystique *E21.0+, M49.89**
- - - tubeuculose *A18.0+, M49.09**
- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*
- - tuberculose *A18.0+, M49.09**
- tibia
- - acquise *M21.86*
- - congénitale *Q74.2*
- trachée *J39.88*
- uretère, congénitale *Q62.6*
- verticale, non paralytique
- - latente *H50.2*
- - manifeste *H50.2*

Devic, maladie de *G36.0*

Dévitalisation, dent *K04.9*

Dévitalisé, dent *K04.9*

Dexamphetamine, dépendance *F15.2*

Dexedrine, dépendance *F15.2*

Dextrinose *E74.0*

Dextrinose limite *E74.0*

Dextrinose, limite *E74.0*

Dextrocardie *Q24.0*

- cas de situs inversus *Q89.3*

Dextro-éphédrine, pseudo-éphédrine, dépe *F15.2*

Dextrométhorphane, dépendance *F11.2*

Dextromoramide, dépendance *F11.2*

Dextroposition

- antéversion, utérus *N85.4*
- dextrocardie *Q24.0*

Dextrorphane, dépendance *F11.2*

Dextrotransposition, aorte *Q20.3*

Dhat, syndrome de *F48.8*

Dhobi démangent *B35.6*

Dhobie itch *B35.6*

Di George, syndrome de *D82.1*

Di Guglielmo, affection *C94.00*

- rémission complète *C94.01*

Diabète

- acide aminé *E72.0*
- âge mûr *E11.90*
- - avec obésité *E11.90*
- bronzé *E83.1*
- corticoïdes (stéroïdes), surdosage en *T38.0*
- foie diabétique *E14.60+, K77.8**
- - lors de
- - - diabète sucré type I *E10.60+, K77.8**
- - - diabète sucré type II *E11.60+, K77.8**
- galactosémique *E74.2*
- glycosurie rénale, syndrome de *E74.8*
- insipide (spurius) *E23.2*
- - hypophysaire *E23.2*
- - rénal (néphrogène) *N25.1*
- - vasopressine, résistance à *N25.1*
- instable (labile) *E10.90*

Diabète –*suite*

- MODY Maturity Onset Diabetes of the Young *E11.90*
- phosphaté *E83.30*
- pré- (latent) (infra-clinique) *R73.0*
- stéatose (dégénérescence graisseuse) rein *E14.20+, N29.8**
- - lors de
- - - diabète sucré type I *E10.20+, N29.8**
- - - diabète sucré type II *E11.20+, N29.8**
- stéroïdien, par surdosage *T38.0*
- sucré mère préexistant affectant le foetus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) , *P70.1*
- sucré (mellitus) - coder le plus possible selon les types I et II et la présence éventuelle de complications *E14.90*
- - adulte, de l' *E11.90*
- - antécédents familiaux *Z83.3*
- - auto-immun, adulte (LADA) (latent [or late onset] autoimmune diabetes of adulthood) *E10.90*
- - avec (compliqué de)
- - - abcès *E14.60*
- - - acétonémie *E14.11*
- - - acidocétose *E14.11*
- - - acidose *E14.11*
- - - altération
- - - - rétinienne *E14.30+, H36.0**
- - - - vasculaire *E14.50+, I79.2**
- - - angiopathie *E14.50+, I79.2**
- - - artériopathie obstructive périphérique *E14.50+, I79.2**
- - - atrophie musculaire *E14.40+, G73.0**
- - - atteinte oculaire *E14.30+, H58.8**
- - - carence nutritionnelle ou malnutrition *E12.90*
- - - cataracta diabetica *E14.30+, H28.0**
- - - cataracte *E14.30+, H28.0**
- - - cétose *E14.11*
- - - choc hypoglycémique *E14.61*
- - - coma acidoticum (acidosique) *E14.01*
- - - coma hypoglycémique *E14.61*
- - - coma insulinique *E14.01*
- - - complication *E14.80*
- - - - multiples *E14.70*
- - - - neurologique *E14.40*
- - - - oculaire *E14.30*
- - - - tardive *E14.80*
- - - - vasculaire *E14.50*
- - - - - périphérique, *E14.50+, I79.2**
- - - conseil diététique *Z71*
- - - décompensation *E14.91*
- - - gangrène *E14.50*
- - - glomérulosclérose (Kimmerstiel-Wilson) *E14.20+, N08.3**
- - - hypoglycémie *E14.60*
- - - - due à insuline *E14.60*
- - - infarctus multiples, syndrome *E14.90*
- - - infection *E14.60*
- - - maladie artérielle obstructive *E14.50+, I79.2**
- - - manifestation neurologique *E14.40+, G63.2**
- - - manifestation ophtalmologique *E14.30+, H58.8**
- - - manifestation rénale *E14.20+, N08.3**

Diabète –*suite*
- sucré (mellitus) - coder le plus possible selon les types I et II et la présence éventuelle de complications –*suite*
- - avec (compliqué de) –*suite*
- - - microangiopathie et macroangiopathie *E14.50+, I79.2**
- - - néphrite *E14.20+, N08.3**
- - - néphropathie *E14.20+, N08.3**
- - - néphrosclérose *E14.20*
- - - néphrose *E14.20+, N08.3**
- - - neuro-arthropathie (de Charcot) (arthropathie neurogène) *E14.90+, M14.6**
- - - neuropathie *E14.40*
- - - neuropathie, système nerveux autonome périphérique *E14.40+, G99.0**
- - - névralgie *E14.40+, G59.0**
- - - névrite *E14.40+, G59.0**
- - - polyneuropathie *E14.40+, G63.2**
- - - pré-coma *E14.01*
- - - prurit cutané *E14.60+, L99.8**
- - - rétinite *E14.30+, H36.0**
- - - retinopathia diabetica
- - - - proliferans (prolifération) *E14.30+, H36.0**
- - - - simplex *E14.30+, H36.0**
- - - rétinopathie *E14.30+, H36.0**
- - - rétinopathie maculaire (maculopathie) *E14.30+, H36.0**
- - - syndrome myasthénique *E14.40+, G73.0**
- - - syndrome tardif *E14.70*
- - - trouble circulation périphérique *E14.50*
- - - trouble flux sanguin périphérique *E14.50+, I79.2**
- - - ulcère *E14.50*
- - - ulcus *E14.50*
- - chez
- - - adulte *E14.90*
- - - nouveau-né *P70.2*
- - congénital *E10.90*
- - dysrégulatif, de type *E14.80*
- - familial *E14.90*
- - gestation, provoqué par *O24.4*
- - - avec complications chez foetus/nouveau né *P70.0*
- - gestationnel *O24.4*
- - glycosurie rénale, syndrome de *E74.8*
- - grossesse, déclaré au cours de (gestationnel) *O24.4*
- - grossesse, pré-existant à celle-ci, lié à carence ou malnutrition *O24.2*
- - insulino-requérant *E14.90*
- - juvénile *E10.90*
- - labile (instable) (mal équilibré) *E10.90*
- - latent *R73.0*
- - - associé à auto-immunité *E10.90*
- - - lors de grossesse *O24.9*
- - lors de
- - - grossesse *O24.9*
- - - - apparition (déclaration) en cours de grossesse *O24.4*
- - - - pré-existant *O24.3*
- - - naissance *O24.9*
- - maternel, césarienne *O24.9*
- - néonatal transitoire *P70.2*
- - non insulino-dépendant (DMNID) (NIDDM) *E11.90*

Diabète –*suite*
- sucré (mellitus) - coder le plus possible selon les types I et II et la présence éventuelle de complications –*suite*
- - non primairement insulino-dépendant *E11.90*
- - - avec
- - - - acidocétose *E11.11*
- - - - complication
- - - - - rénale, *E11.20+, N08.3**
- - - - - oculaire, *E11.30+, H58.8**
- - - - - neurologique, *E11.40+, G63.2**
- - - - - vasculaire, périphérique, *E11.50*
- - - - - multiple, *E11.70*
- - - - complication-s
- - - - - rénale-s, *E11.20+, N08.3**
- - - - - oculaire-s, *E11.30+, H58.8**
- - - - - neurologique-s, *E11.40+, G63.2**
- - - - - vasculaire-s périphérique-s, *E11.50*
- - - - - multiples, *E11.70*
- - - type 1 ou 2 *E13.90*
- - non-insulino-dépendant, chez adulte jeune *E11.90*
- - pancréatoprive *E13.90*
- - post-partum (puerpéral) (suites de couches) *O24.9*
- - primaire
- - - insulino-dépendant *E10.90*
- - - - avec
- - - - - complication,
- - - - - acidocétose, *E10.11*
- - - - - complication, oculaire, rénale, *E10.20+, N08.3**
- - - - - complication, oculaire, *E10.30+, H58.8**
- - - - - complication, neurologique, *E10.40+, G63.2**
- - - - - complication, oculaire, vasculaire périphérique, *E10.50+, I79.2**
- - - - - sans complication, *E10.90*
- - sans
- - - cétose, propension à *E14.90*
- - - complication *E14.90*
- - secondaire *E13.90*
- - - insulino-requérant *E11.90*
- - stable *E11.90*
- - sub-clinique (infra-clinique) *R73.0*
- - type
- - - 1a *E10.90*
- - - 1b *E10.90*
- - - 2a *E11.90*
- - - 2b *E11.90*
- - type 1 *E10.90*
- - - avec
- - - - abcès *E10.60*
- - - - acétonémie *E10.11*
- - - - acidocétose *E10.11*
- - - - acidose *E10.11*
- - - - altération-s
- - - - - rétinienne, *E10.30+, H36.0**
- - - - - vasculaire, *E10.50+, I79.2**
- - - - atrophie musculaire *E10.40+, G73.0**
- - - - cataracta diabetica *E10.30+, H28.0**
- - - - cataracte *E10.30+, H28.0**
- - - - cétose *E10.11*
- - - - Charcot, arthropathie de *E10.60*
- - - - choc hypoglycémique *E10.61*

Diabète –*suite*
- sucré (mellitus) - coder le plus possible selon les types I et II et la présence éventuelle de complications –*suite*
- - type 1 –*suite*
- - - avec –*suite*
- - - - coma
- - - - - acidosique, *E10.01*
- - - - - hyperglycaemicum diabeticum, *E10.01*
- - - - coma avec respiration de Kussmaul *E10.01*
- - - - complication-s rénale-s, *E10.20+, N08.3**
- - - - - oculaire-s, *E10.30+, H58.8**
- - - - - neurologique-s, *E10.40+, G63.2**
- - - - - vasculaire-s périphérique-s, *E10.50+, I79.2**
- - - - - multiples, *E10.70*
- - - - - *E10.80*
- - - - complications multiples *E10.70*
- - - - déchirure rétinienne par traction, rétinopathie diabétique *E10.30+, H36.0**
- - - - foie diabétique *E10.60+, K77.8**
- - - - fundus diabeticus *E10.30+, H36.0**
- - - - - proliferans, *E10.30+, H36.0**
- - - - - simplex, *E10.30+, H36.0**
- - - - gangrène
- - - - - diabétique, *E10.50*
- - - - - pied diabétique, *E10.50*
- - - - gastroparésie diabétique *E10.40+, G99.0**
- - - - glaucome néo-vasculaire lors de rétinopathie diabétique *E10.30+, H36.0**
- - - - glomérulonéphrite diabétique *E10.20+, N08.3**
- - - - glomérulosclérose
- - - - - diabétique, *E10.20+, N08.3**
- - - - - extracapillaire diabétique, *E10.20+, N08.3**
- - - - hémorragie punctiforme, complication oculaire diabétique *E10.30+, H58.8**
- - - - hyalinose glomérulaire extra-capillaire diabétique *E10.20+, N08.3**
- - - - hypoglycémie *E10.60*
- - - - - due à insuline, *E10.60*
- - - - infection *E10.60*
- - - - Kimmelstiel-Wilson, syndrome de *E10.20+, N08.3**
- - - - maculopathie *E10.30+, H36.0**
- - - - maladie artérielle obstructive périphérique *E10.50+, I79.2**
- - - - microangiopathie diabétique *E10.50+, I79.2**
- - - - nécrobiose lipoïdique diabétique *E10.60+, L99.8**
- - - - néphrose *E10.20+, N08.3**
- - - - neuropathie diabétique *E10.40+, G63.2**
- - - - névralgie *E10.40+, G53.8**
- - - - névrite *E10.40+, G59.0**
- - - - pied diabétique *E10.70*
- - - - polyneuropathie diabétique *E10.40+, G63.2**
- - - - pré-coma *E10.01*
- - - - prurit *E10.60+, L99.8**
- - - - prurit cutané *E10.60+, L99.8**
- - - - rétinite *E10.30+, H36.0**
- - - - rubeosis diabetica *E10.60+, L99.8**

Diabète –*suite*
- sucré (mellitus) - coder le plus possible selon les types I et II et la présence éventuelle de complications –*suite*
  - type 1 –*suite*
    - avec –*suite*
      - stéatose (dégénérescence graisseuse) rein *E10.20+, N29.8**
      - syndrome tardif *E10.70*
      - trouble circulatoire périphérique *E10.50*
      - trouble flux sanguin *E10.50+, I79.2**
      - trouble sexuel *E10.40*
      - ulcère *E10.50*
      - ulcus
        - cruris diabeticum, *E10.50*
        - diabeticum, *E10.50*
      - vulvite diabétique *E10.60+, N77.8**
    - chez adulte *E10.90*
    - dysrégulation, de *E10.80*
    - insulino-dépendant *E10.90*
      - avec
        - complication-s,
        - coma, *E10.01*
        - acidocétose, *E10.11*
        - complication-s, oculaire-s, *E10.30+, H58.8**
        - complication-s, neurologique-s, *E10.40+, G63.2**
        - complication-s, vasculaire-s périphérique-s, *E10.50+, I79.2**
        - complication-s, multiples, *E10.70*
    - sans complication *E10.90*
    - traité par insuline, sans complication *E10.90*
  - type 2 *E11.90*
    - arthropathie de Charcot, avec *E11.60*
    - avec
      - abcès *E11.60*
      - acétonémie *E11.11*
      - acidocétose *E11.11*
      - acidose *E11.11*
      - altération-s
        - rétinienne, *E11.30+, H36.0**
        - vasculaire, *E11.50+, I79.2**
      - amyotrophie *E11.40+, G73.0**
      - arthropathie de Charcot *E11.60*
      - atrophie musculaire *E11.40+, G73.0**
      - cataracta diabetica *E11.30+, H28.0**
      - cataracte *E11.30+, H28.0**
      - cétose *E11.11*
      - choc hypoglycémique *E11.61*
      - coma *E11.01*
        - acidosique, *E11.01*
        - hyperglycémie diabétique, *E11.01*
      - coma avec respiration de Kussmaul *E11.01*
      - coma insulinique *E11.01*
      - complication-s rénale-s, *E11.20+, N08.3**
        - oculaire-s, *E11.30+, H58.8**
        - neurologique-s, *E11.40+, G63.2**
        - vasculaire-s périphérique-s, *E11.50*
        - vasculaire-s, *E11.50*

Diabète –*suite*
- sucré (mellitus) - coder le plus possible selon les types I et II et la présence éventuelle de complications –*suite*
  - type 2 –*suite*
    - avec –*suite*
      - complication-s rénale-s, –*suite*
        - multiples, *E11.70*
        - *E11.80*
      - complications multiples *E11.70*
      - déchirure par traction rétine, rétinopathie diabétique *E11.30+, H36.0**
      - foie diabétique *E11.60+, K77.8**
      - fundus diabeticus *E11.30+, H36.0**
        - proliferans, *E11.30+, H36.0**
        - simplex, *E11.30+, H36.0**
      - gangrène
        - diabétique, *E11.50*
        - pied diabétique, *E11.50*
      - gastroparésie diabétique *E11.40+, G99.0**
      - glaucome néo-vasculaire, lors de rétinopathie diabétique *E11.30+, H36.0**
      - glomérulonéphrite diabétique *E11.20+, N08.3**
      - glomérulosclérose
        - diabétique, *E11.20+, N08.3**
        - extracapillaire diabétique, *E11.20+, N08.3**
      - hémorragie punctiforme, complication oculaire diabétique *E11.30+, H58.8**
      - hyalinose glomérulaire extracapillaire diabétique *E11.20+, N08.3**
      - hypoglycémie *E11.60*
        - due à insuline, *E11.60*
      - infection *E11.60*
      - Kimmelstiel-Wilson, syndrome de *E11.20+, N08.3**
      - maculopathie *E11.30+, H36.0**
      - maladie artérielle obstructive *E11.50+, I79.2**
      - micro-angiopathie diabétique *E11.50+, I79.2**
      - nécrobiose lipoïdique diabétique *E11.60+, L99.8**
      - néphropathie *E11.20+, N08.3**
      - néphrose *E11.20+, N08.3**
      - neuropathie *E11.40*
        - diabétique, *E11.40+, G63.2**
      - névralgie *E11.40+, G53.8**
      - névrite *E11.40+, G59.0**
      - pied diabétique *E11.70*
      - polyneuropathie *E11.40+, G63.2**
      - pré-coma *E11.01*
      - prurit *E11.60+, L99.8**
      - prurit cutané *E11.60+, L99.8**
      - rétinite *E11.30+, H36.0**
      - rubeosis diabetica *E11.60+, L99.8**
      - stéatose (dégénérescence graisseuse) rein *E11.20+, N29.8**
      - syndrome tardif *E11.70*
      - trouble circulation périphérique *E11.50*
      - trouble flux sanguin *E11.50*
      - trouble sexuel *E11.40*
      - ulcère *E11.50*
      - ulcus
        - cruris diabeticum, *E11.50*

Diabète –*suite*
- sucré (mellitus) - coder le plus possible selon les types I et II et la présence éventuelle de complications –*suite*
  - type 2 –*suite*
    - avec –*suite*
      - ulcus –*suite*
        - diabeticum, *E11.50*
      - vulvite diabétique *E11.60+, N77.8**
    - chez adulte *E11.90*
    - dysrégulation, de *E11.80*
    - insulino-dépendant *E11.90*
      - avec
        - complication-s,
        - coma, *E11.01*
        - acidocétose, *E11.11*
        - complication-s, rénale-s, *E11.20+, N08.3**
        - complication-s, oculaire-s, *E11.30+, H58.8**
        - complication-s, neurologique-s, *E11.40+, G63.2**
        - complication-s, vasculaire-s périphérique-s, *E11.50*
        - complication-s, multiples, *E11.70*
    - lors de
      - obésité *E11.90*
    - non insulino-dépendant *E11.90*
      - avec
        - complication-s,
        - coma, *E11.01*
        - acidocétose, *E11.11*
        - complication-s, rénale-s, *E11.20+, N08.3**
        - complication-s, oculaire-s, *E11.30+, H58.8**
        - complication-s, neurologique-s, *E11.40+, G63.2**
        - complication-s, vasculaire-s périphérique-s, *E11.50*
        - complication-s, multiples, *E11.70*
    - sans
      - complication *E11.90*
      - obésité *E11.90*
    - traité par médication per os *E11.90*
      - sans complication *E11.90*
    - traité par régime *E11.90*
      - sans complication *E11.90*
  - type 2b avec
    - complication *E11.80*
    - complications multiples *E11.70*
    - néphrose *E11.20*

Diabète gluco-aminophosphaté *E72.0*

diabétique Syndrome enfant mère *P70.1*

Diabétique - *voir* Type de maladie

Diagnostic
- chromosomique, prénatal *Z36.0*
- liquide amniotique *Z36.9*

diagnostique thérapeutique Autre maladie du système nerveux après un acte à visée *G97.88*

Dialyse
- avec complication NCA *T80.9*
- cas d'insuffisance rénale *Z49.1*
- dépendance
  - insuffisance rénale *N19*
- extra-corporelle *Z49.1*
- longue durée, en cas d'insuffisance rénale *Z99.2*

Dialyse –*suite*
- péritonéale *Z49.2*
- préparation *Z49.0*
- rénale *Z49.1*

Diamond, anémie de Blackfan- *D61.0*

Diamond, syndrome de Gardner- *D69.2*

Diaphorase, déficit *D74.0*

Diaphragmatique, infarctus, myocarde
- aigu, transmural *I21.1*
- répétition *I22.1*

Diaphragmatique, péritonite *K65.0*

Diaphragmatite *J98.6*

Diaphragme
- abcès *K65.0*
- adhérence *K66.0*
- affection *J98.6*
- agénésie, avec hernie *Q79.1*
- coupoles, congénitales *Q79.1*
- déchirure, lésion *S27.81*
- défaut, congénital, avec éventration *Q79.0*
- difformité *K66.0*
- - acquise *J98.6*
- - congénitale *Q79.1*
- hernie *K44.9*
- - avec
- - - gangrène *K44.1*
- - - occlusion *K44.0*
- - irrépétible *K44.0*
- inflammation *J98.6*
- lésion traumatique *S27.81*
- malformation
- - acquise *J98.6*
- - congénitale *Q79.1*
- manque *Q79.1*
- - congénitale *Q79.1*
- ossification *J98.6*
- ouverture
- - anomalie NCA *Q79.1*
- - hypertrophie, congénitale *Q79.1*
- ouverture anormale NCA *Q79.1*
- paralysie *J98.6*
- - inerte *J98.6*
- - par (ré)section accidentelle du nerf phrénique lors d'un traitement médical *T81.2*
- relâchement *J98.6*
- relaxation *J98.6*
- spasme
- - psychogène *F45.38*
- - réflexe *R06.6*
- stimulateur, examen, paramètres fonctionnels *Z45.81*

Diaphyse du tibia, fracture *S82.28*
- avec fracture, péroné *S82.21*
- isolée *S82.28*

Diaphyse, inflammation *M86.89*

Diaphysite *M86.89*

Diarrhée *K52.9*
- achlorhydrique *K31.88*
- aiguë *A09*
- - avec exsiccose *A09, E86*
- - due à une amibiase *A06.0*
- alimentaire *K52.2*
- allergique *K52.2*
- Amibiase non dysentérique *A06.2*

Diarrhée –*suite*
- après opération gastro-intestinale *K91.88*
- aspécifique *K52.9*
- associée à
- - anguillulose *B78.0*
- - colite spastique *K58.0*
- - côlon irritable *K58.0*
- - dyspepsie *K52.9*
- - gastro-entérite d'origine présumée infectieuse *A09*
- - irritabilité intestinale *K58.0*
- - Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés *B23.8, K52.9*
- - spasme
- - - caecum *K58.0*
- - - côlon *K58.0*
- - syndrome de l'intestin irritable *K58.0*
- avec
- - exsiccose *K52.9, E86*
- - vomissement *K52.9*
- - - avec exsiccose *K52.9, E86*
- bactérienne NCA *A04.9*
- cachectique NCA *K52.8*
- chez
- - nourrisson *A09*
- - - avec exsiccose *A09, E86*
- - nouveau-né *P78.3*
- chologène *K90.8*
- chronique *K52.9*
- - provoquée par une amibiase *A06.1*
- Cochinchine, de *B78.0*
- d'origine présumée infectieuse *A09*
- - avec exsiccose *A09, E86*
- d'une semaine *K52.9*
- dysentérique *A09*
- endémique *A09*
- épidémique *A09*
- estivale *K52.9*
- Flexner, (dysenterie) de *A03.1*
- fonctionnelle *K59.1*
- - après une opération gastro-intestinale *K91.88*
- infantile *A09*
- infectieuse *A09*
- - associée à une maladie provoquée par le VIH *B20, A09*
- - avec exsiccose *A09, E86*
- - et gastro-entérite *A09*
- inflammatoire *A09*
- isolée *K52.9*
- mycotique NCA *B49+, K93.8**
- nerveuse *F45.32*
- non infectieuse *K52.9*
- - néonatale *P78.3*
- post-antibiotique *K52.8*
- provoquée par
- - acariens *B88.0*
- - adénovirus *A08.2*
- - Aerobacter aerogenes *A04.8*
- - agent pathogène du groupe Arizona *A02.0*
- - allergie alimentaire *K52.2*
- - amibes *A06.0*
- - Balantidium coli *A07.0*
- - Campylobacter *A04.5*
- - Chilomastix *A07.8*
- - Clostridium perfringens *A04.8*
- - Coccidium *A07.3*

Diarrhée –*suite*
- provoquée par –*suite*
- - Colibactérie, Escherichia coli *A04.4*
- - Cryptosporidium *A07.2*
- - Dientamoeba *A07.8*
- - entérovirus *A08.3*
- - Escherichia coli *A04.4*
- - - entéro-agrégative *A04.4*
- - - entéro-hémorragique *A04.3*
- - - entéro-invasive *A04.2*
- - - entéro-pathogène *A04.0*
- - - entéro-toxigène *A04.1*
- - flagellés *A07.9*
- - Giardiase [lambliase]
- - - intestinale *A07.1*
- - - lamblia *A07.1*
- - Isospora
- - - belli *A07.3*
- - - hominis *A07.3*
- - Lamblia intestinalis *A07.1*
- - protozoaires *A07.9*
- - staphylocoques *A04.8*
- - Trichomonas *A07.8*
- - virus *A08.4*
- - Yersinia enterocolitica *A04.6*
- psychogène *F45.32*
- - fonctionnelle *F45.32*
- sanglante *K52.9*
- septique *A09*
- toxique *K52.1*
- tropicale *K90.1*
- tuberculose *A18.3+, K93.0**
- voyage *A09*

Diarrhéique
- entérite *A09*
- maladie infectieuse NCA *A09*

Diastasis
- abdominale *M62.08*
- - avec ventre distendu *M62.08*
- - complications à l'accouchement *O71.8*
- - congénital *Q79.5*
- muscle droit de l'abdomen, compliquant l'accouchement *O71.8*
- musculaire *M62.09*
- - congénital *Q79.8*
- os du crâne *M84.88*
- - congénital NCA *Q75.8*
- os pubien, compliquant l'accouchement *O71.6*
- symphyse, compliquant l'accouchement *O71.6*

Diastématoglossie *Q38.3*

Diastématognathie *Q37.1*

Diastématomyélie *Q06.2*

Diastème, dent *K07.3*

Diastolique, insuffisance, coeur *I50.19*

Diastrophique, dysplasie *Q77.5*

Diathèse
- acide urique *M10.99*
- allergique *T78.4*
- calcul urinaire *N20.9*
- cystinique *E72.8*
- goutte *M10.99*
- hémorragique *D69.9*
- - dus à des
- - - anticoagulants *D68.3*
- - - anticorps

Diathèse *–suite*
- hémorragique *–suite*
- - dus à des *–suite*
- - - anticorps *–suite*
- - - - contre
- - - - - facteur de coagulation, *D68.3*
- - - - - facteurs de coagulation, post-partum, *O72.3*
- - - multiplication
- - - - anti-IXa *D68.3*
- - - - antithrombine *D68.3*
- - - - anti-VIIIa *D68.3*
- - - - anti-Xa *D68.3*
- - - - anti-XIa *D68.3*
- - familiale *D69.9*
- lithiase urique *M10.99*

Diatomite, pneumoconiose *J62.8*

Diaz, ostéochondrite ou maladie de *M92.6*

Diazépam
- abus *F13.1*
- dépendance *F13.2*

Dicentrique, chromosome *Q93.2*

Dicéphales *Q89.4*

Dichlorométhane, effet toxique *T53.4*

Dichoriale et diamniotique, grossesse gé *O30.0*

Dichotomie, dent *K00.2*

Dichromasie *H53.5*
- congénitale *H53.5*

Dichromatopsie *H53.5*
- congénitale *H53.5*

Dicrocœliase *B66.2*

Dicrocoelium dendriticum, infection *B66.2*

Dieker, syndrome de Miller- *Q93.5*

Diencéphalique, syndrome *E23.6*

Dientamoeba
- diarrhée *A07.8*
- fragilis, dysenterie *A07.8*

Diététique
- carence en cuivre *E61.0*
- cirrhose *K74.6*
- colite *K52.2*
- conseil, pour
- - colite *Z71*
- - gastrite *Z71*
- - hypercholestérolémie *Z71*
- - hypoglycémie *Z71*
- diarrhée *K52.2*
- entérite *K52.2*
- gastro-entérite *K52.2*
- hémosidérose *E83.1*
- hydrops *E43*
- hypercalcémie *E83.58*
- hypercaroténémie *E67.1*
- hypervitaminose *E67.8*
- hypocalcémie *E58*
- insuffisance *E63.9*
- origine, hypercaroténémie *E67.1*
- polyneuropathie NCA *E63.9+, G63.4**
- retard de développement *E45*
- surveillance, pour
- - colite *Z71*
- - diabète sucré *Z71*
- - gastrite *Z71*
- - hypercholestérolémie *Z71*

Diététique *–suite*
- traités, diabète sucré de type II *E11.90*
- - sans complication *E11.90*

Dieulafoy, ulcère de *K25.0*

Différence de longueur des membres *M21.79*

Différencié(e)
- histiocytose, progressive, aiguë *C96.0*
- liposarcome *C49.9*
- rétinoblastome *C69.2*
- tératome *D36.9*

Difficile
- conditions de travail *Z56*
- intubation *T88.4*
- naissance, dans l'anamnèse, qui influence le déroulement de la grossesse *Z35.2*

Difficulté à, liée à
- acquérir des connaissances *F81.9*
- apprentissage *F81.9*
- boire, chez le nouveau-né *P92.2*
- couple *Z63*
- d'ajustement
- - due à
- - - changement d'emploi *Z56*
- - - exclusion sociale *Z60*
- - - isolement *Z60*
- - retraite *Z60*
- décés, membre de la famille *Z63*
- éducation *Z55*
- lecture *F81.0*
- logement *Z59*
- lors de
- - allaitement, chez le nouveau-né *P92.5*
- - intubation
- - - lors de l'accouchement *O74.7*
- - - pendant la grossesse *O29.6*
- - - suites de couches *O89.6*
- matérielle *Z59*
- mécaniques, lors de gastro-duodénostomie *K91.88*
- mode de vie *Z72.9*
- nutritionnelle *R63.3*
- - non organiques, durant l'enfance *F98.2*
- nutritionnelles *R63.3*
- - non organiques, dans l'enfance précoce *F98.2*
- orgasme *F52.3*
- orthographique, circonscrite *F81.0*
- pécuniaires, qui influencent sur l'alimentation NCA *Z59*
- relations, chez l'enfant *F93.2*
- relatives au lieu de travail *Z56*
- respiratoires *R06.0*
- scolaires *Z55*
- se chauffer *Z59*
- se projetter *Z73*
- sociale, culturelle tranmatisante *Z60*
- travail en équipe *Z56*

Difformité en siège, dos *M40.59*

Difformité vasculaire, persistante, dans *Q25.4*

diffus
-
- glomérulonéphrite sclérosant *N18*
- grand cellules B anaplasique Lymphome *C83.3*

diffus *–suite*
- grand cellules B anaplasique Lymphome *–suite*
- - CD30 positif Lymphome *C83.3*
- - Lymphome *C83.3*
- Lymphome centrofolliculaire *C82.5*

Diffuse - *voir* Type de maladie

digestif
-
-
- évolution imprévisible inconnu
- - Autre organe digestif , Tumeur de la cavité buccal et des organe *D37.78*
- - Pancréas , Tumeur de la cavité buccal et des organe *D37.70*
- Insuffisance anastomoses suture après opération d ' Autre organe du système *K91.83*
- organe
- - absence
- - - acquise *Z90.4*
- - - congénitale *Q45.8*
- - accessoire NCA *Q45.8*
- - agénésie NCA *Q45.8*
- - - complète NCA *Q45.8*
- - - partielle NCA *Q45.8*
- - anomalie NCA *Q45.9*
- - anomalie, position, congénitale NCA *Q45.8*
- - atrésie NCA *Q45.8*
- - carcinome *C26.9*
- - corps étranger NCA *T18.9*
- - duplication *Q45.8*
- - hypoplasie, congénitale NCA *Q45.8*
- - inférieurs, anomalie, position, congénitale *Q43.8*
- - malposition, congénitale *Q45.8*
- - manifestation, en cas de grippe (influenza) *J11.8*
- - néoformation, maligne, dans
- - - antécédents familiaux *Z80.0*
- - - antécédents personnels *Z85.0*
- - supérieurs
- - - agénésie *Q40.8*
- - - anomalie, position, congénitale *Q40.8*
- - - atrésie NCA *Q40.8*
- - - hypoplasie *Q40.8*
- - tuberculose *A18.3+, K93.0**
- système
- - anomalie, congénitale *Q45.9*
- - carcinome *C26.9*
- - corps étranger *T18.9*
- - difformité, congénitale *Q45.9*
- - implication, en cas de maladie de Chagas, chronique *B57.3+, K93.8**
- - maladie
- - - antécédents familiaux *Z83.7*
- - - antécédents personnels *Z87.1*
- - trouble *K92.9*
- - - après acte médical *K91.9*
- - - chez les nouveaux nés *P78.9*
- - - fonctionnel, après un acte médical NCA *K91.88*
- - - psychogène *F45.39*
- tube
- - absence
- - - complète *Q45.8*
- - - partielle *Q45.8*

digestif –*suite*
- tube –*suite*
- - avec persistance, tissu, pancréatique *Q43.8*
- - brûlures ANC *T28.2*
- - corps étranger *T18.9*
- - difformité, congénitale *Q45.9*
- - et utérus, communication, congénitale *Q51.7*
- - greffon contre l'hôte, maladie de, aigue
- - - stade
- - - - *T86.01+, K93.21**
- - infection fongique *B49+, K93.8**
- - infection NCA *A09*
- - inférieur, anomalie NCA *Q43.9*
- - maladie *K63.9*
- - résultat, ultrason, pathologique *R93.3*
- - résultats anormaux, imagerie diagnostic NCA *R93.3*
- - spasme, psychique *F45.32*
- - supérieur
- - - absence, congénitale *Q40.8*
- - - anomalie *Q40.9*
- - - difformité, congénitale *Q40.9*
- Tumeur
- - cavité buccal et des organe digestif à évolution imprévisible ou inconnu : Autre organe *D37.78*
- - évolution imprévisible ou inconnu : Autre organe *D37.7*

Digestion
- insuffisance *K30*
- problème *K92.9*
- troubles *K30*
- - fonctionnels *K59.9*
- - psychogènes *F45.39*

Digestion faiblesse *K30*

Digitaline, intoxication *T46.0*

Dihydropyridine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Dilacération ou déchirure *T14.1*
- tendon d'Achille *S86.0*

Dilacération, dent *K00.4*

Dilatation
- anus *K59.8*
- aorte *I71.9*
- - congénitale *Q25.4*
- - rompue *I71.8*
- - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- artère - *voir* Anévrisme *I72.9*
- artère pulmonaire *I28.8*
- bassinet et calices rénaux *N28.8*
- bassinet rénal *N28.8*
- bronchioles *J47*
- bronchique *J47*
- caecum *K59.3*
- - psychogène *F45.32*
- calices rénaux *N13.3*
- canal
- - biliaire *K82.8*
- - - congénitale *Q44.5*
- - cholédoque *K83.8*
- - - congénitale *Q44.5*
- - galactophore *N60.4*
- - pancréatique *K86.8*
- capillaires *I78.8*

Dilatation –*suite*
- cavum septi pellucidi *Q06.8*
- coeur
- - aiguë *I51.7*
- - chronique *I51.7*
- - congénitale *Q24.8*
- - droit *I51.7*
- col de l'utérus, absente, pendant le travail *O62.0*
- col utérin *N88.3*
- - avec lésion du foetus/nouveau-né *P01.0*
- - compliquant la grossesse *O34.39*
- - incomplète
- - - avec lésion du foetus/nouveau-né *P03.6*
- - - compliquant l'accouchement *O62.0*
- - tardive, complication, accouchement *O62.0*
- côlon *K59.3*
- - congénitale *Q43.2*
- - psychogène *F45.32*
- congénitale de l'oesophage *Q39.5*
- duodénum *K59.8*
- estomac *K31.88*
- - aiguë *K31.0*
- - congénitale *Q40.2*
- - psychogène *F45.31*
- fente palpébrale *H02.2*
- iléum *K59.8*
- - psychogène *F45.32*
- insuffisante, du col utérin, césarienne *O62.0*
- jéjunum *K59.8*
- - psychogène *F45.32*
- larynx, congénitale *Q31.3*
- méat urinaire *N32.8*
- oesophage *K22.8*
- - cardiotonique *K22.0*
- - congénitale *Q39.5*
- oreillette *I51.7*
- ostium urétral interne *N32.8*
- pharynx *J39.2*
- plexus pampiniforme *I78.8*
- prostate *N42.8*
- pupille *H57.0*
- rectum *K59.3*
- rénale *N28.8*
- saccule, congénitale *Q16.5*
- sphincter anal *K62.8*
- trompe d'eustache *H69.0*
- - congénitale *Q17.8*
- uretère *N28.8*
- - congénitale *Q62.2*
- urètre, acquise *N36.8*
- vaisseau lymphatique *I89.0*
- vaisseau sanguin *I99*
- vaso- *I73.9*
- vasomotrice *I73.9*
- veineuse *I86.8*
- veinules NCA *I86.8*
- ventricule *I51.7*
- ventricules cérébraux, congénitale *Q04.8*
- vésicale *N32.8*
- vésicule biliaire *K82.8*
- vessie *N32.8*
- - avec complication, accouchement *O66.8*

Dilatation –*suite*
- vessie –*suite*
- - congénitale *Q64.7*
- voies biliaires
- - acquise *K82.8*
- - - *K83.8*
- - congénitale *Q44.5*
- voies lacrymales *H04.6*

Dilaté(e)
- cardiomyopathie *I42.0*
- - alcoolique *I42.6*
- maladie cardiaque *I51.7*

Dilaudide, dépendance *F11.2*

Dilution, sang, avec thrombocytopénie *D69.58*

DIM dérangement intervertébral mineur *M99.81*

Diméthylbenzène, effet toxique *T52.2*

Diminution
- amnésie *R41.3*
- audition *H91.9*
- - acquise *H91.9*
- - congénitale *H91.9*
- capacité de réaction, et ralentissement *R46.4*
- fluidité, extracellulaire *E86*
- libido *F52.0*
- plasma *E86*
- pression, intracrânienne, suite à un shunt ventriculaire *G97.2*
- retard mental *F79.9*
- - avec
- - - autisme *F84.1*
- - - trouble(s) du comportement *F79.8*
- - et stéréotypies motrices, dans
- - - hyperkinésie *F84.4*
- - - trouble hyperactif *F84.4*
- - grave *F72.9*
- - - avec trouble(s) du comportement *F72.8*
- - - - nécessitant manifestement un traitement *F72.1*
- - léger *F70.9*
- - - avec trouble(s) du comportement *F70.8*
- - moyen *F71.9*
- - - avec trouble(s) du comportement *F71.8*
- - profond *F73.9*
- - - avec trouble du comportement *F73.8*
- - - - nécessitant un traitement *F73.1*
- - sans trouble du comportement *F79.0*
- sang *E86*
- vision stéréoscopique, avec trouble de la vision binoculaire lors de la fusion *H53.3*

Diminution des volumes plasmatiques *E86*

Diminution du jet urinaire *R39.1*

Diminution fréquence cardiaque
- foetal, lors de l'accouchement *O68.0*
- précoce *O68.0*
- tradive *O68.0*

Diminution, tassement
- estomac *K31.88*
- intestin *K63.4*
- reins *N28.8*
- utérus *N81.4*

Diminution, tassement –*suite*
- vagin *N81.1*
- vessie, féminine *N81.1*
- viscères *K63.4*

Dimmer, syndrome de Haab- *H18.5*

Dimorphe, anémie *D53.1*

Dioctophyme renale, infestation *B83.8*

Dioxyde d'azote pneumonie *J68.0*

Dioxyde de carbone
- effet, toxique *T59.7*
- intoxication *T41.5*

Dioxyde de carbone, intoxication *T59.8*

Dioxyde de soufre
- allergie *T78.4*
- effet, toxique *T59.1*
- hypersensibilité *T78.4*

Dip
- aucune décélération au cours de l'accouchement *O68.0*
- décélération au cours de l'accouchement *O68.0*
- deux décélérations au cours de l'accouchement *O68.0*

Diphallus *Q55.6*

Diphasique, anémie *D53.1*

Diphenylbutylpipéridine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Diphosphoglycérate-mutase, déficit avec *D55.2*

Diphtérie *A36.9*
- amygdales *A36.0*
- avec
- - atteinte rénale tubulo-interstitielle *A36.8+, N16.0**
- - cardiomyopathie *A36.8+, I43.0**
- - complication neurologique *A36.8*
- - lymphadénite *A36.8*
- - paralysie
- - - iris *A36.8+, H22.8**
- - - larynx *A36.2*
- - polyneuropathie *A36.8+, G63.0**
- - pyélonévrite *A36.8+, N16.0**
- cutanée *A36.3*
- dépistage *Z11*
- gangréneuse *A36.9*
- hémorragique *A36.9*
- laryngite *A36.2*
- nasale *A36.8*
- nécessité de vaccination *Z23.6*
- ombilicale *A36.3*
- oreille moyenne *A36.8*
- pharyngée *A36.0*
- plaie *A36.3*
- rhino- *A36.8*
- rhinopharyngée *A36.1*
- sujet porteur *Z22.2*
- trachée *A36.8*
- vaginale *A36.8*
- vecteur *Z22.2*

Diphtérie rhino-pharyngée ou nasale *A36.8*

Diphtérie-coqueluche-tétanos-Haemophilus
- B [DTP-Hib], nécessité de la vaccination *Z27.8*

Diphtérie-coqueluche-tétanos-Haemophilus –*suite*
- B, vaccination, avec poliomyélite [DTP-IPV-HiB] *Z27.8*

Diphtérie-tétanos [DT], vaccination *Z27.8*

Diphtérie-tétanos-Haemophilus influenzae *Z27.8*

Diphtérie-tétanos-polio [DTP], nécessité *Z27.1*

Diphtérie-tétanos-polio, avec typhus-par *Z27.2*

Diphtérique
- amygdalite *A36.0*
- anémie *A36.8*
- angine *A36.0*
- - membraneuse *A36.0*
- conjonctivite *A36.8+, H13.1**
- croup *A36.2*
- cystite *A36.8+, N33.8**
- dermite *A36.3*
- infection de plaie *A36.3*
- inflammation
- - larynx *A36.2*
- - pharynx *A36.0*
- laryngisme *A36.2*
- laryngo-trachéite *A36.2*
- myocardite *A36.8+, I41.0**
- ophtalmie *A36.8+, H13.1**
- paralysie du pharynx *A36.0*
- péritonite *A36.8+, K67.8**
- pharyngite *A36.0*
- polynévrite *A36.8+, G63.0**
- stomatite *A36.8*
- stridor croupeux *A36.2*
- trachéite *A36.8*
- ulcère
- - amygdales *A36.0*
- - larynx *A36.2*
- - pharynx *A36.0*

Diphyllobothriase *B70.0*
- intestinale *B70.0*
- larvaire *B70.1*

Diphyllobothrium
- anémie *B70.0+, D63.8**
- forme adulte, infestation *B70.0*
- infestation *B70.0*
- larves, infestation *B70.1*
- latum, forme adulte, infestation *B70.0*
- pacificum, forme adulte, infestation *B70.0*

Diphyllobothrium latum
- infestation *B70.0*
- infestation due à ses larves *B70.1*
- larves
- - dibothriocéphalus, infestation par *B70.1*
- - infestation *B70.1*

Diplacousie *H93.2*

Diplégie *G83.0*
- congénitale *G80.8*
- dans la paralysie cérébrale spastique infantile *G80.1*
- faciale *G51.0*
- inférieure *G82.22*
- membres
- - inférieurs *G82.22*
- - supérieurs *G83.0*
- membres supérieurs *G83.0*

Diplégie –*suite*
- spastique *G80.1*
- - infantile *G80.1*
- supérieure *G83.0*
- syndrome de
- - faciale congénitale *Q87.0*
- - oculofaciale congénitale *Q87.0*

Diplégique
- infirmité motrice cérébrale spastique *G80.1*
- paralysie cérébrale infantile *G80.8*
- paralysie cérébrale spastique *G80.1*

Diplocoques
- méningite *A39.0+, G01**
- urétrite *A54.0*
- - avec abcès *A54.1*

Diplogonoporus grandis, infestation *B71.8*

Diplomyélie *Q06.8*

Diplopie *H53.2*
- binoculaire *H53.2*
- monoculaire *H53.2*
- paroxystique *H53.2*

Diprosopie *Q18.8*

Dipsomanie *F10.2*
- avec psychose *F10.5*

Dipylidiose *B71.1*
- intestinale *B71.1*

Dipylidium caninum, infection *B71.1*

Dipyridamole, intoxication *T46.3*

directement cause obstétrical Mort de Séquelle relevant *O96.0*
- de Séquelle relevant *O97.0*

Direction du regard, nystagmus *H55*

Dirofilariose *B74.8*

Disaccharidase, carence *E73.9*

Disaccharide, intolérance héréditaire *E73.0*

Disaccharide, malabsorption *E73.9*

Discite *M46.49*
- pyogène *M46.39*

Discomycose *A42.9*

Discontinuité, osselets *H74.2*

Discopathie *M51.9*
- lombaire *M51.9*
- lombosacrée *M51.9*

Discordante, communication
- auriculo-ventriculaire *Q20.5*
- ventriculo-artérielle *Q20.3*

Discret, bégaiement *F98.5*

Discrimination *Z60*
- ethnique *Z60*
- politique *Z60*
- raciale *Z60*
- religieuse *Z60*
- sexuelle *Z60*

Discrimination auditive, anomalie *H93.2*

Discrimination, religieuse *Z60*

Disparition d'un membre de la famille *Z63*

dispositif cardiaque
- électronique Présence d ' un *Z95.0*
- électroniques Adaptation et manipulation d ' Autre *Z45.08*

Dispositif, ajustement, tractus intestin *Z46.5*

Dispositif, appareil d'aide
- adaptation NCA *Z46.9*
- orthopédique
- - adaptation *Z46.7*
- - avec assistance *Z46.7*

Disposition
- avortement, répétition *N96*
- - avec surveillance, sans grossesse *N96*
- - lors de la grossesse *O26.2*
- chute NCA *R29.6*
- paranoïde *F60.0*
- saignement *D68.9*
- - acquise *D68.9*
- - postpartum *O72.3*
- suicide *R45.8*
- suicide, diagnostic codé *R45.8*

Disposition auriculaire en miroir, avec *Q89.3*

Disproportion
- bassin et embryon, difformité foetale *O33.7*
- cas de causes maternelles et foetales combinées *O33.4*
- cause foetale, en cas de foetus normal *O33.5*
- céphalopelvienne *O33.9*
- céphalopelvienne, obstacle, accouchement *O65.4*
- due à
- - foetus, grand *O33.5*
- - hydrocéphale, foetal *O33.6*
- entre
- - foetus et bassin *O33.9*
- - tête et bassin *O33.9*
- fibres musculaires *G71.2*
- foetale, soins, femme enceinte *O33.5*
- foeto-pelvienne *O33.9*
- - avec
- - - césarienne *O33.9*
- - - obstruction, naissance, due à une contracture du bassin *O65.1*
- - cas de
- - - bassin
- - - - androïde avec,
- - - - - *O33.0*
- - - - - avec, obstruction, naissance, *O65.3*
- - - - - avec, lésions du foetus/du nouveau-né, *P03.1*
- - - - étroit *O33.1*
- - - - flasque *O33.0*
- - - - - avec obstruction, naissance, *O65.0*
- - - - simiesque avec,
- - - - - *O33.0*
- - - - - avec, obstruction, naissance, *O65.0*
- - - - - avec, lésions du foetus/du nouveau-né, *P03.1*
- - - bassin en entonnoir *O33.3*
- - - - avec
- - - - - obstruction, naissance, *O65.3*
- - - - - lésions du foetus/du nouveau-né, *P03.1*
- - - contracture
- - - - bassin, détroit inférieur *O33.3*
- - - - bassin, détroit supérieur *O33.2*
- - - - bassin, et lésion, foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - - voie vaginale *O33.3*

Disproportion *–suite*
- foeto-pelvienne *–suite*
- - cas de *–suite*
- - - difformité, bassin, avec lésion, foetus/nouveu-né *P03.1*
- - - distorsion, rachis lombaire, avec
- - - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.1*
- - - - obstruction, naissance *O65.0*
- - - malformation, rachis lombaire, avec
- - - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.1*
- - - - obstruction, naissance *O65.0*
- - - Naegele, bassin de *O33.0*
- - - Robert, bassin de *O33.0*
- - - scoliose, bassin, avec
- - - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.1*
- - - - obstruction, naissance *O65.0*
- - - spondylolisthésis *O33.3*
- - - spondylose *O33.3*
- - - - avec
- - - - - obstruction, naissance, *O65.0*
- - - - - lésions du foetus/du nouveau-né, *P03.1*
- - due à
- - - hydrocéphalie, foetus *O33.6*
- - - jumeaux, élevés ensemble *O33.7*
- né, nanisme, avec déficit immunitaire *D82.2*
- types de fibres *G71.2*

Disque
- hernie *M51.2*
- prolapsus *M51.2*
- - avec lombo-sciatique chronique *M51.2*
- - cervical *M50.2*
- - dorsal *M51.2*
- - dorso-lombaire *M51.2*
- - intraspongieu *M51.4*
- - lombaire *M51.2*

Disque intervertébral *voir* Disque ou Nuc
- anomalie *Q76.4*
- calcification post-infectieuse *M51.8*
- déchirure *M51.8*
- déformation, acquise *M51.8*
- dégénérescence NCA *M51.3*
- - avec
- - - myélopathie NCA *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - cervical NCA *M50.3*
- - cervical, avec
- - - myélopathie *M50.0+, G99.2**
- - - névrite *M50.1+, G55.1**
- - - radiculite *M50.1+, G55.1**
- - - radiculopathie *M50.1+, G55.1**
- - cervico-thoracique NCA *M50.3*
- - lombaire NCA *M51.3*
- - lombaire, avec
- - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculopathie *M51.2+, G55.2**
- - - sciatique *M51.3+, G55.3**
- - lombosacré NCA *M51.3*
- - thoracique NCA *M51.3*
- - thoracique, avec
- - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - - sciatique *M51.1+, G55.1**
- - thoraco-lombaire NCA *M51.3*
- déplacement *M51.2*
- - avec
- - - lumbago *M51.2*
- - - myélopathie NCA *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - nerf sciatique *M51.1+, G55.1**
- - - plexus brachial *M50.1+, G55.1**
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - cervical, avec radiculite *M50.1+, G55.1**
- - extraforaminal *M51.2*
- - lombaire, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - lombo-sacré, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - thoracique, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - thoraco-lombaire, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- hernie *M51.2*
- infection *M46.39*
- - pyogène *M46.39*
- infection, pyogène *M46.39*
- lésion *M51.9*
- - *T09.9*
- - associée à neuropathie, radiculaire *M51.1+, G55.1**
- - avec
- - - compression
- - - - racine(s) nerveuse(s), avec myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - - racines nerveuses NCA *M51.1+, G55.1**
- - - lombosciatique *M51.1+, G55.1**
- - - lumbago, avec sciatique *M51.1+, G55.1**
- - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - cervical *M50.1+, G55.1**
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - - sciatique *M51.1+, G55.1**
- - cervical *M50.9*
- - - avec
- - - - compression de racine(s) nerveuse(s) avec myélopathie, *M50.0+, G99.2**
- - - - - *M50.1+, G55.1**
- - - - myélopathie *M50.0+, G99.2**
- - - - névralgie cervicale *M50.8*
- - - - radiculopathie *M50.1+, G55.1**
- - cervico-thoracique *M50.9*
- - lombaire *M51.9*
- - - avec radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - lombo-sacré *M51.9*
- - thoracique *M51.9*
- - thoraco-lombaire *M51.9*
- prolapsus *M51.2*
- - avec
- - - compression, moelle épinière NCA *M51.0+, G99.2**

Disque intervertébral *voir* Disque ou Nuc *–suite*
- prolapsus *–suite*
- - avec *–suite*
- - - lumbago *M51.2*
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - sciatique *M51.1+, G55.1**
- - - syndrome cervical *M50.1+, G55.1**
- - - syndrome rachidien lombaire *M51.1+, G55.1**
- - cervical *M50.2*
- - - avec radiculite *M50.1+, G55.1**
- - cervical, avec
- - - compression, moelle épinière *M50.0+, G99.2**
- - - myélopathie *M50.0+, G99.2**
- - lombaire *M51.2*
- - - avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - lombo-sacré *M51.2*
- - - avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - thoracique *M51.2*
- - thoracique, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - thoraco-lombaire, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- protrusion *M51.2*
- - cervical *M50.2*
- - lombaire *M51.2*
- - lombo-sacré *M51.2*
- rupture
- - avec
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - cervical, avec radiculite *M50.1+, G55.1**
- - lombaire, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - lombo-sacré, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - thoracique, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - thoraco-lombaire, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - traumatique *T09.2*
- - - cervical *S13.0*
- - - lombaire *S33.0*
- - - thoracique *S23.0*
- tuberculose *A18.0+, M49.09**

Dissection
- aorte *- voir* Anévrisme disséquant de l'aorte *I71.00*
- - abdominale *I71.02*
- - - rompue *I71.06*
- - avec rupture *I71.04*
- - thoracique *I71.01*
- - - rompue *I71.05*
- - thoracoabdominale, rompue *I71.07*
- artère
- -
- - basilaire tronc Anévrisme et *I72.5*
- - cérébrale, rompue *I60.7*
- - intracrânienne, non rompue *I67.0*
- - vertébral Anévrisme et *I72.6*
- artère coronaire *I25.4*
- autres *I72*
- vaisseau *I99*

Dissémination de pus, généralisée *A41.9*

Disséminé
- dermatophytose [dermatophytie] *B35.8*

Disséminé *–suite*
- Maladie Abt Letterer - Siwe] , Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (*C96.0*
- placenta *O44.00*
- - endommageant le foetus/nouveau né *P03.1*
- rein *N28.8*

Disséminé(e) *- voir* Type de maladie

Disséquant, anévrisme *I72.9*
- aorte *I71.00*

Dissociatif(ve)(s)
- amnésie *F44.0*
- anesthésie, fonctionnelle *F44.6*
- cécité *F44.6*
- convulsions *F44.5*
- fugue *F44.1*
- perte de connaissance *F44.88*
- stupeur *F44.2*
- trouble *F44.9*
- - mixte *F44.7*
- - moteur *F44.4*
- - organique *F06.5*
- - perception sensorielle *F44.6*
- - psychomoteur *F44.4*
- - sensibilité *F44.6*
- - sensoriel *F44.6*
- - transitoire, survenant dans l'enfance et l'adolescence *F44.82*

Dissociation
- auriculo-ventriculaire *I45.8*
- d'interférence *I45.8*
- interférente *I45.8*
- osselets *H74.2*

Dissocié(e)
- intelligence *F74.9*
- mort cérébrale *G93.80*
- nystagmus *H55*
- strabisme vertical *H50.2*

Distal(e)
- acidose, tubulaire *N25.8*
- articulation interphalangienne, doigt, arthrose *M15.1*
- carcinome, oesophage *C15.5*
- dystrophie musculaire *G71.0*
- épiphyse cubitale, ostéochondrite, juvénile *M92.1*
- fémur (extrémité du -), ostéochondrite *M92.8*
- fémur, luxation, postérieure *S83.11*
- fracture
- - avant-bras *S52.8*
- - bras, bicondylaire *S42.44*
- - cubitus *S52.8*
- - fémur *S72.40*
- - humérus *S42.40*
- - jambe *S82.38*
- - radius *S52.50*
- - - avec fracture du cubitus *S52.6*
- - - ouverte *S52.50, S51.87!*
- - tibia *S82.38*
- - - avec fracture du péroné (fibula) *S82.31*
- - - isolée *S82.38*
- fracture comminutive, radius *S52.50*
- humérus, épiphyse, fracture *S42.44*
- interphalangienne, arthropathie, psoriasique *L40.5+, M07.09**
- ligament tibio-péronier, entorse *S93.43*

Distal(e) *–suite*
- luxation
- - cubitus *S63.08*
- - fémur *S83.10*
- - jambe *S93.0*
- - métacarpien(s) *S63.11*
- - péroné *S93.0*
- - radiocubitale (articulation -) *S63.01*
- - radius *S63.02*
- - tibia *S93.0*
- myopathie *G71.0*
- sténose
- - méat *N35.9*
- - urètre *N35.9*

Distendue, Trompe d'Eustache *H69.0*

Distension *- voir aussi* dilatation
- estomac *K31.88*
- - aiguë *K31.0*
- pupille, acquise *H21.5*
- vésicale (vessie géante) *N32.8*
- vésicule séminale *N50.8*
- vessie *N32.8*

Distichiasis *Q10.3*

Distoma hepaticum, infestation *B66.3*

Distomatose *B66.9*
- foie, due à
- - Chlonorchis sinensis *B66.1+, K77.0**
- - douve du foie du chat *B66.0+, K77.0**
- - Fasciola hepatica *B66.3+, K77.0**
- - Opistorchis felineus *B66.0+, K77.0**
- pulmonaire *B66.4+, J99.8**

Distomiatose *B66.9*
- hépatique *B66.3+, K77.0**
- intestinale *B66.5*
- pulmonaire *B66.4+, J99.8**
- voie biliaire *B66.3+, K87.0**

Distomolaire [quatrième molaire] *K00.1*

Districhiasis *L68.8*

DIU [dispositif intra-utérin], perforati *T83.3*

Diurèse
- augmentée *R35*
- hydrique *R35*
- osmotique *R35*

Diurèse accrue *R35*

Diurétique de l'anse, toxication *T50.1*

Diurétiques de l'anse, intoxication *T50.1*

Divergence
- excessive avec exophorie *H51.8*
- oculaire excessive *H51.8*
- paralysie nucléaire *H51.8*
- verticale *H50.2*
- - dissociée *H50.2*
- - négative *H50.2*
- - positive *H50.2*

Divergence, insuffisance de *H51.8*

Diverticule *K57.90*
- appendice *K38.2*
- bassinet, avec calcul *N20.0*
- bronche
- - acquis *J98.0*
- - congénital *Q32.4*
- caecum *K57.30*
- - avec perforation *K57.20*
- - congénital *Q43.8*

Diverticule –*suite*

- calice rénal *N28.8*
- canal de Nuck *Q52.4*
- cardia *K22.5*
- cœur, congénital *Q24.8*
- col vésical *N32.3*
- côlon *K57.30*
- - avec dégénérescence *C18.9*
- côlon sigmoïde *K57.30*
- - congénital *Q43.8*
- - perforation *K57.20*
- duodénum *K57.10*
- - congénital *Q43.8*
- estomac *K31.4*
- - congénital *Q40.2*
- hypopharynx *Q38.7*
- iléal *Q43.0*
- iléon *K57.10*
- inflammation *K57.92*
- intestin *K57.90*
- - congénital *Q43.8*
- - rupture *K57.80*
- intestin grêle *K57.10*
- jéjunal *K57.10*
- jonction pharyngo-oesophagienne *Q38.7*
- Meckel *Q43.0*
- - hypertrophie congénitale *Q43.0*
- - intestin grêle *Q43.0*
- - persistant *Q43.0*
- - torsion congénitale *Q43.0*
- - ulcère *Q43.0*
- multiple *K57.92*
- Nuck *Q52.4*
- œsophage *Q39.6*
- - acquis *K22.5*
- - congénital *Q39.6*
- - épiphrénique *K22.5*
- oro-pharynx *Q38.7*
- ostium urétéral *N28.8*
- ouraque *Q64.4*
- perforation *K57.80*
- - gros intestin *K57.20*
- péricarde, congénital *Q24.8*
- pharyngo-œsophagien
- - acquis *K22.5*
- - congénital *Q39.6*
- pharynx *Q38.7*
- - congénital *Q38.7*
- pseudo-, urètre *N36.1*
- pulsion, oesophage *K22.5*
- - *K22.5*
- recto-sigmoïdien *K57.30*
- - congénital *Q43.8*
- rectum *K57.30*
- rein *N28.8*
- trachée *Q32.1*
- traction, oesophage *K22.5*
- trompe
- - auditive (d'Eustache) *H69.8*
- - utérine (salpynx) (de Fallope) *N83.8*
- trompe d'Eustache *H69.8*
- uretère *N28.8*
- - congénital *Q62.8*
- urètre *N36.1*
- - avec calcul *N21.1*
- - congénital *Q64.7*
- ventricule gauche, congénital *Q24.8*

Diverticule –*suite*

- vésicule séminale *N50.8*
- vessie *N32.3*
- - avec calcul *N21.0*
- - congénital *Q64.6*
- Zenker *K22.5*
- - œsophage *K22.5*

Diverticulite *K57.92*

- aiguë *K57.92*
- bassinet, avec calcul *N20.0*
- bronche, acquise *J98.0*
- caecum *K57.30*
- - congénitale *Q43.8*
- côlon *K57.32*
- - avec
- - - hémorragie *K57.33*
- - - péritonite *K57.22*
- - - - avec hémorragie *K57.23*
- - congénitale *Q43.8*
- duodénum *K57.12*
- - congénitale *Q43.8*
- gros intestin *K57.32*
- - avec
- - - abcès *K57.22*
- - - - avec hémorragie *K57.23*
- - - hémorragie *K57.33*
- - - perforation *K57.22*
- - - - avec
- - - - - abcès, *K57.22*
- - - - - hémorragie, *K57.23*
- iléon *K57.12*
- intestin *K57.92*
- - avec
- - - abcès *K57.82*
- - - - avec hémorragie *K57.83*
- - - hémorragie *K57.93*
- - - perforation *K57.82*
- - - - avec hémorragie *K57.83*
- - - péritonite *K57.82*
- - - - avec hémorragie *K57.83*
- intestin grêle *K57.12*
- - avec
- - - abcès *K57.02*
- - - - avec hémorragie *K57.03*
- - - hémorragie *K57.13*
- - - perforation *K57.02*
- - - - avec hémorragie *K57.03*
- - - péritonite *K57.02*
- - - - avec hémorragie *K57.03*
- - et gros intestin *K57.52*
- - - avec
- - - - abcès *K57.42*
- - - - - et hémorragie, *K57.43*
- - - - hémorragie *K57.53*
- - - - perforation *K57.42*
- - - - - et hémorragie, *K57.43*
- - - - péritonite *K57.42*
- - - - - et hémorragie, *K57.43*
- jéjunum *K57.12*
- multiple *K57.92*
- péri- *K57.92*
- - intestin *K57.92*
- pharyngo-oesophagienne, acquise *K22.5*
- recto-sigmoïdienne, congénitale *Q43.8*
- rectum *K57.32*
- sigmoïdienne *K57.32*
- - avec perforation *K57.22*

Diverticulite –*suite*

- sigmoïdienne –*suite*
- - congénitale *Q43.8*
- uretère, congénitale *Q62.8*
- urètre *N36.1*
- - congénitale *Q64.7*
- vessie, congénitale *Q64.6*

Diverticulose *K57.90*

- avec perforation *K57.80*
- - avec hémorragie *K57.81*
- bassinet, avec calcul *N20.0*
- bronche, acquise *J98.0*
- caecum *K57.30*
- - congénitale *Q43.8*
- côlon *K57.30*
- - avec
- - - hémorragie *K57.31*
- - - péritonite *K57.20*
- - - - avec hémorragie *K57.21*
- duodénum *K57.10*
- - congénitale *Q43.8*
- gros intestin *K57.30*
- - avec
- - - abcès *K57.20*
- - - - avec hémorragie *K57.21*
- - - hémorragie *K57.31*
- - - perforation *K57.20*
- - - - avec
- - - - - abcès, *K57.20*
- - - - - hémorragie, *K57.21*
- - sans perforation ni abcès *K57.30*
- iléon *K57.10*
- intestin *K57.90*
- - avec
- - - abcès *K57.80*
- - - - avec hémorragie *K57.81*
- - - hémorragie *K57.91*
- - - perforation *K57.80*
- - - - avec hémorragie *K57.81*
- - - péritonite *K57.80*
- - - - avec hémorragie *K57.81*
- - sans perforation *K57.90*
- intestin grêle *K57.10*
- - avec
- - - abcès *K57.00*
- - - - avec hémmoragie *K57.01*
- - - hémorragie *K57.11*
- - - perforation *K57.00*
- - - - avec hémorragie *K57.01*
- - - péritonite *K57.00*
- - - - avec saignement *K57.01*
- - et gros intestin *K57.50*
- - - avec
- - - - abcès *K57.40*
- - - - - et hémorragie, *K57.41*
- - - - hémorragie *K57.51*
- - - - perforation *K57.40*
- - - - - et hémorragie, *K57.41*
- - - - péritonite *K57.40*
- - - - - et hémorragie, *K57.41*
- jéjunum *K57.10*
- multiple *K57.92*
- pharyngo-oesophagienne, acquise *K22.5*
- recto-sigmoïdienne, congénitale *Q43.8*
- rectum *K57.30*
- sigmoïdienne *K57.30*
- - congénitale *Q43.8*

Diverticulose –*suite*
- uretère, congénitale *Q62.8*
- urètre *N36.1*
- - congénitale *Q64.7*
- vessie, congénitale *Q64.6*

Divorce *Z63*

DMLA *H35.3*

Doigt *R68.3*
- abcès *L02.4*
- absence
- - acquise *Z89.0*
- - congénitale *Q71.3*
- accessoire *Q69.9*
- adactylie *Q71.3*
- agénésie *Q71.3*
- amputation *S68.1*
- - traumatique
- - - plusieurs *S68.2*
- - - unique *S68.1*
- ankylose *M24.64*
- anomalie *Q74.0*
- - *R68.3*
- anthrax *L02.4*
- aplasie *Q71.3*
- articulation interphalangienne
- - distale, arthrose *M15.1*
- - proximale, arthrose *M15.2*
- bordure de l'ongle, infection *L03.01*
- brachydactylie *Q71.8*
- brûlure *T23.0*
- bursite *M70.8*
- capsule articulaire, déchirure, lors d'une entorse *S63.60*
- chevauchant, déformation acquise *M20.0*
- coalescence congénitale *Q70.0*
- congénital *Q68.1*
- contracture NCA *M20.0*
- contracture, congénitale *Q68.1*
- contusion *S60.0*
- - avec lésion, ongle *S60.1*
- corrosion *T23.4*
- cyanose paroxystique *I73.0*
- déformation *Q68.1*
- deux, amputation traumatique et autres parties de la main *S68.3*
- difformité *M20.0*
- douleurs *M79.64*
- écrasement *S67.0*
- - avec atteinte de la main *S67.8*
- ectrodactylie *Q71.8*
- eczéma, dyshidrosique *L30.1*
- élongation *S63.60*
- entorse *S63.60*
- - interphalangienne *S63.62*
- envie(s) *L03.01*
- - avec lymphangite *L03.01*
- formation, palmure *Q70.1*
- foulure *S63.60*
- fracture *S62.60*
- - et fracture, métacarpe(s) *T02.20*
- - multiple *S62.7*
- - séquelles *T92.2*
- furoncle *L02.4*
- fusion *Q70.0*
- fusionnés *Q70.0*
- gelure *T35.4*
- - avec nécrose, tissu(s) *T34.5*

Doigt –*suite*
- gelure –*suite*
- - superficielle *T33.5*
- gonflement *M79.84*
- Heberden, arthrose d' *M15.1*
- hypoplastie congénitale *Q71.8*
- infection cutanée *L08.9*
- lésion traumatique *S69.9*
- - avec atteinte des tendons *S69.7*
- - sous-unguéale *S69.9*
- - - superficielle *S60.9*
- - superficielle *S60.88*
- lit unguéal
- - inflammation *L03.01*
- - panaris *L03.01*
- - ulcère *L03.01*
- luxation *S63.10*
- - multiple *S63.2*
- - phalange *S63.10*
- maillet, traumatique *S63.10*
- malformation
- - acquise *M20.0*
- - congénitale *Q68.1*
- malposition *Q74.0*
- malposition, congénitale *Q68.1*
- marteau *M20.4*
- mégalodactylie *Q74.0*
- mélanome in situ *D03.6*
- mélanome, malin *C43.6*
- mort *I73.0*
- mycose *B35.2*
- naevus *D22.6*
- nerf, lésion traumatique *S64.4*
- onychie *L03.01*
- - avec lymphangite *L03.01*
- onychomycose *B35.1*
- panaris *L03.01*
- - avec lymphangite *L03.01*
- - périunguéal *L03.01*
- - sous-unguéal *L03.01*
- paronychie *L03.01*
- - aiguë *L03.01*
- - chronique *L03.01*
- périonychie *L03.01*
- pérodactylie *Q71.9*
- phlegmon *L03.01*
- plaie, ouverte *S61.0*
- - avec lésion, ongle *S61.1*
- - sans lésion, ongle *S61.0*
- plusieurs, absence(s), bilatérale, acquise *Z89.3*
- polyarthrose *M15.9*
- ressort *M65.3*
- - congénital *Q74.0*
- rétraction *M20.0*
- rhagade *R23.4*
- segmentation, absence *Q70.0*
- septicémie, avec lymphangite *L03.01*
- supraductus
- - main *M20.0*
- - pied *M20.5*
- surnuméraire(s) *Q69.0*
- - *Q69.9*
- syndactylie
- - avec synostose *Q70.0*
- - complexe *Q70.0*
- - cutanée *Q70.1*
- - - sans synostose *Q70.1*

Doigt –*suite*
- syndactylie –*suite*
- - osseuse *Q70.0*
- syphilis, primaire *A51.2*
- ténosynovite *M65.94*
- un
- - amputation, traumatique, et autres parties de la main *S68.3*
- - ou plusieurs, perte, bilatérale *Z89.3*
- vaisseau sanguin, lésion *S65.5*
- vésicules cutanées *R23.8*

Dolichocéphalie *Q67.2*

Dolichogastrie *K31.88*

Dolichosténomélie *Q74.0*

Dolicocôlon *Q43.8*

Dollinger, syndrome de Bielschowsky *E75.4*

Domicile, à
- possiiblités de soins insuffisants pour les malades *Z74.2*
- prise en charge du malade dans sa famille *Z63*

Dominant
- druse, héréditaire [dégénérescence maculaire de Doyne] *H35.5*
- héréditaire, neuropathie sensitive *G60.8*
- myotonie congénitale *G71.1*
- oedème, macula, héréditaire, cystoïde *H35.8*

Donneur
- *Z52.9*
- Autre organe tissu *Z52.88*
- de
- - cellules souches *Z52.01*
- - coeur *Z52.7*
- - cornée *Z52.5*
- - foie *Z52.6*
- - lymphocytes *Z52.08*
- - moelle osseuse *Z52.3*
- - organe *Z52.9*
- - os *Z52.2*
- - peau *Z52.1*
- - rein *Z52.4*
- - reins *Z52.4*
- - sang *Z52.00*
- - sperme *Z52.88*
- - thrombocytes *Z52.08*
- - tissu *Z52.9*
- poumon *Z52.80*

Donovanose *A58*

doré résistant
- glycopeptides quinolones streptogramines ou au oxazolidinoneset non résistant à l ' oxacilline ou à la méticilline , Staphylocoque *U80.01!*
- oxacilline méticilline [MRSA] , Staphylocoque *U80.00!*
- - [MRSA] , Staphylocoque *U80.00!*

Dorfman-Rosai, syndrome (de) (maladie (d *D76.3*

Dorsal, e
- corps vertébral
- - chondrosarcome *C41.2*
- - métastase *C79.5*
- - spondylodiscite *M46.44*
- courbure du pénis *Q55.6*
- douleur *M54.99*
- fracture, vertèbre *S22.00*

Dorsal, e –*suite*
- fracture, vertèbre –*suite*
- - multiple *S22.1*
- kyste *M70.8*
- lésion, moelle épinière *S24.10*
- moelle épinière, lésion, racine nerveuse *S24.2*
- rachis
- - aplatissement des courbures *M53.84*
- - blocage *M99.82*
- - - aigu *M99.82*
- - contusion *S20.2*
- - cyphose *M40.24*
- - douleurs *M54.6*
- - entorse *S23.3*
- - et
- - - rachis cervical, blocage *M99.81*
- - - rachis lombaire, scoliose en torsion *M41.85*
- - fractures multiples *S22.1*
- - hypercyphose *M40.24*
- - lésion traumatique de racine(s) nerveuse(s) *S24.2*
- - luxation *S23.10*
- - métastase *C79.5*
- - ostéochondrite *M42.94*
- - remaniement dégénératif *M47.84*
- - scoliose en torsion *M41.84*
- - spondylarthrite *M47.84*
- - spondylite *M47.84*
- - spondylite déformante *M47.84*
- - tumeur *D48.0*
- région
- - blocage *M99.82*
- - blocage en flexion *M99.82*
- spina bifida *Q05.6*
- - avec hydrocéphalie *Q05.1*
- - lors d'hydrocéphalie congénitale *Q05.1*
- syndrome rachidien *M54.14*
- - aigu *M54.14*
- - cervico-, avec blocage *M54.13*
- - chronique *M54.14*
- - dans la spondylarthrose déformante, avec pincement *M47.84*
- - dégénératif *M47.24*
- vertèbre
- - blocage *M99.82*
- - - dans syndrome cervico-vertébral aigu *M54.2*
- - cervical, lombaire, spondylose *M47.80*
- - cervicale
- - - blocage *M99.81*
- - - dégénérescence, avec cervicodorsalgie *M47.23*
- - - spondylite *M47.83*
- - cyphose *M40.24*
- - douleurs, rachis *M54.6*
- - entorse *S23.3*
- - foulure *S23.3*
- - irritation des facettes *M47.24*
- - lombaire
- - - scoliose *M41.95*
- - - - convexe à droite *M41.95*
- - - - - effacée, *M41.95*
- - - - convexe à gauche *M41.95*
- - - - - effacée, *M41.95*
- - - scoliose, torsion *M41.85*
- - - spondylite *M47.85*

Dorsal, e –*suite*
- vertèbre –*suite*
- - myogélose *M62.88*
- - ostéochondrite *M42.94*
- - remaniement dégénératif *M47.84*
- - scoliose *M41.94*
- - - avec remaniement dégénératif *M41.94*
- - - convexe à droite *M41.94*
- - - - effacée *M41.94*
- - - convexe à gauche *M41.94*
- - - - effacée *M41.94*
- - - effacée *M41.94*
- - scoliose, torsion *M41.84*
- - spondylarthroses *M47.84*
- - spondylite déformante *M47.84*
- - spondylose *M47.84*

Dorsalgie *M54.99*
- aiguë *M54.99*
- - récidivante *M54.99*
- cervico-, lors de dégénération, vertèbres cervicales et dorsales *M47.23*
- chronique *M54.99*
- lors de blocage *M54.99*
- psychogène *F45.4*
- récidivante *M54.99*

Dorsalgie posturale *M54.99*

Dorso-lombaire, syndrome rachidien *M54.15*
- cervico- *M54.10*
- - chronique *M54.10*
- dégénératif *M47.25*

Dorso-lombalgie *M54.5*
- aiguë *M54.5*
- chronique *M54.5*
- réactive *M54.5*
- récidivante *M54.5*

Dorsopathie *M53.99*

Dorsopathie de la charnière lombo-sacrée *M53.97*

Dos
- appareil ligamentaire, relaxation *M53.29*
- arthrite (voir spondylite) *M46.99*
- basaliome *C44.5*
- brûlure *T21.04*
- - degré
- - - 2a *T21.24*
- - - 2b *T21.84*
- - premier degré *T21.14*
- - second degré *T21.24*
- - troisième degré *T21.34*
- concave *M40.25*
- contusion *T09.05*
- corrosion *T21.44*
- - degré
- - - 2a *T21.64*
- - - 2b *T21.94*
- - premier degré *T21.54*
- - second degré *T21.64*
- - troisième degré *T21.74*
- décubitus *L89.99*
- déformation *M43.99*
- dislocation *T09.2*
- distorsion *T09.2*
- douleur *M54.99*
- - chronique *M54.99*
- - lombaire *M54.5*

Dos –*suite*
- douleur –*suite*
- - postural *M54.99*
- - psychogène *F45.4*
- douleur, myalgique *M54.99*
- furoncle *L02.2*
- inférieur
- - écrasement *S38.1*
- - lésion traumatique, superficielle *S30.80*
- lésion traumatique *S39.9*
- lordose *M40.59*
- maladie *M53.99*
- mélanome in situ *D03.5*
- mélanome, malin *C43.5*
- nævus *D22.5*
- névralgie *M54.89*
- phlegmon *L03.3*
- pied
- - contusion *S90.3*
- - coupure *S91.3*
- - lésion traumatique d'une veine *S95.2*
- - oedème *R60.0*
- plaie, ouverte *S21.2*
- plat *M40.39*
- - congénital *Q76.4*
- rond *M40.29*
- - avec vertébre anormale *M40.29*
- - fixé *M40.29*
- - posture, lésion *M40.09*
- - rigide *M40.29*
- - tant que séquelle tardive, rachitisme *E64.3, M40.29*
- souffrance, déformation *M43.99*
- tissu conjonctif, sarcome *C49.6*

Dos, brûlure *T21.04*

Dose d'entretien (pour une)
- chimiothérapie NCA *Z51.2*
- chimiothérapie, en cas de néoformation NCA *Z51.1*

Double
-
- anus *Q43.42*
- appendice *Q43.41*
- artère rénale *Q27.2*
- atrium *Q20.8*
- bassinet *Q63.8*
- - avec double uretère *Q62.5*
- caecum *Q43.41*
- canal
- - cholédoque *Q44.5*
- - cystique *Q44.5*
- canal salivaire *Q38.4*
- col de l'utérus, externe *Q51.8*
- col utérin *Q51.8*
- - avec utérus double *Q51.1*
- conduit auditif *Q17.8*
- crosse aortique *Q25.4*
- - persistante *Q25.4*
- drépanocytose hétérozygote *D57.2*
- entrée
- - ventricule gauche (à) *Q20.4*
- estomac *Q40.2*
- foie *Q44.7*
- fracture ouverte du maxillaire inférieur *S02.69, S01.87!*
- gros intestin *Q43.41*

Double –*suite*

- inlet ventricle Ventricule à double issue [*Q20.4*
- intestin *Q43.49*
- intestin grêle *Q43.40*
- issue
- - Double
- - - inlet ventricle] , Ventricule à *Q20.4*
- - - outlet
- - - - left ventricle] , Ventricule gauche à *Q20.2*
- - - - right ventricle] , Ventricule droit à *Q20.1*
- - ventricule (à) *Q20.9*
- langue *Q38.3*
- méat urinaire *Q64.7*
- moelle épinière, incomplète *Q06.8*
- oesophage *Q39.8*
- oreillette *Q20.8*
- organes digestifs NCA *Q45.8*
- organes respiratoires NCA *Q34.8*
- outlet
- - left ventricle Ventricule gauche à double issue [*Q20.2*
- - right ventricle Ventricule droit à double issue [*Q20.1*
- pancréas *Q45.3*
- pénis *Q55.6*
- placenta *O43.1*
- uretère *Q62.5*
- - bassinet, annexes *Q62.5*
- urètre *Q64.7*
- utérus *Q51.2*
- - lésion du foetus et nouveau-né durant la grossesse *P03.8*
- - lors (de) (d')
- - - accouchement *O34.0*
- - - grossesse *O34.0*
- vagin *Q52.1*
- vessie *Q64.7*
- voies biliaires *Q44.5*
- vulve *Q52.7*

Doublement
- incomplète, bras de chromosomes *Q92.3*
- majeure, bras de chromosomes *Q92.2*
- meatus urinarius *Q64.7*
- nez *Q18.8*
- rachis *Q06.8*
- urètre *Q64.7*
- vésicule biliaire *Q44.1*

Douleur due prothèse implant greffe de l ' appareil génito - urinaire , *T83.8*

Douleur, s *R52.9*
- abdomen *R10.4*
- - aigues *R10.0*
- - - avec contracture de la paroi abdominale *R10.0*
- - - cas de rigidité, abdomen *R10.0*
- - chroniques *R10.4*
- - inférieur *R10.3*
- - - aigues *R10.3*
- - non précisées *R10.4*
- - psychogène *F45.39*
- - sans maladie *R10.4*
- - supérieur *R10.1*
- - - abdomen, viscéral *R10.1*
- - - aigues *R10.1*
- - - non précisées *R10.1*

Douleur, s –*suite*
- abdominale *R10.4*
- abdominales diffuses *R10.4*
- adhérence, bassin, féminin *N73.6*
- adhérences pelvi-péritonéales chez la femme *N73.6*
- aigues NCA *R52.0*
- anus *K62.8*
- articulation *M25.59*
- - aigues *M25.59*
- - genou *M25.56*
- - hanche *M25.55*
- - machoire *K07.6*
- - main *M25.53*
- - psychogènes *F45.4*
- bassin *R10.2*
- - aiguës *R10.2*
- - chroniques *R10.2*
- bras *M79.69*
- buccales *K13.7*
- caecum *R10.3*
- calcanéenne *M79.67*
- calcanéum *M79.67*
- cardiaques *R07.2*
- - psychogènes *F45.4*
- cas de
- - atteinte veineuse *I87.9*
- - carcinome *R52.1*
- - miction *R30.9*
- - spasme, intestin *R10.4*
- cervicales *M54.2*
- - psychogènes *F45.4*
- cervico-brachiale *M53.1*
- - aigue *M53.1*
- - cas de blocage *M53.1*
- - - région cervicale *M53.1*
- - chronique *M53.1*
- cervico-brachiales *M53.1*
- cheville *M25.57*
- chronique
- - somatique et psychique *F45.41*
- chroniques irréductibles *R52.1*
- chroniques NCA *R52.2*
- cicatrice *L90.5*
- coccyx *M53.3*
- coit, psychogènes *F52.6*
- côlon *R10.4*
- contractions *O47.9*
- cordon spermatique *N50.8*
- côtes *R07.3*
- cou NCA *M54.2*
- cou, psychogènes *F45.4*
- coude, non induites par une intervention *M79.62*
- croissance *R29.8*
- dent *K08.88*
- dentaire *K00.7*
- dentition *K00.7*
- désafférentiation, en cas de lésion moelle épinière *G95.85*
- diffuses NCA *R52.9*
- doigts *M79.64*
- dos *M54.99*
- - chroniques *M54.99*
- - dues à la posture *M54.99*
- - lombaires *M54.5*
- - psychogènes *F45.4*
- dues à
- - cathéter de perfusion, spinal *T85.81*

Douleur, s –*suite*
- dues à –*suite*
- - cathéter NCA *T85.88*
- - fixation orthopédique interne NCA *T84.8*
- - implant cardiaque *T82.8*
- - implant, thorax *T85.88*
- - prothèse articulaire *T84.8*
- - prothèse orbitaire NCA *T85.88*
- - prothèse vasculaire *T82.8*
- - shunt intracrânien ventriculaire *T85.88*
- - transfusion *T85.88*
- - transplantation cardiaque *T82.8*
- - transplantation de la cornée NCA *T85.88*
- - transplantation NCA *T82.8*
- - zona *B02.2+, G53.0**
- éjaculation, psychogènes *F52.6*
- épaule *M75.8*
- épididyme *N50.8*
- épigastrium *R10.1*
- estomac *R10.1*
- - psychogènes *F45.4*
- fantôme *G54.6*
- fémur, supérieur, névralgie *G57.1*
- flanc *R10.4*
- gastriques *R10.1*
- - psychogènes *F45.4*
- généralisées *R52.9*
- gorge *R07.0*
- - non précisées *R07.0*
- hypersensibilité *R20.8*
- iléum, articulation *M54.5*
- iliaques *M53.3*
- intermenstruelles *N94.0*
- intermittentes *R52.2*
- ischémie, en cas de blocage artériel *I73.9*
- ischémiques, en cas d'occlusion artérielle *I73.9*
- jambe *M79.69*
- - non précisées *M79.69*
- langue *K14.6*
- lombaires *M54.5*
- lombaires, aigues *M54.5*
- machoires *K10.8*
- main *M79.63*
- mammaires *N64.4*
- - psychogènes *F45.4*
- mastoïde *H92.0*
- maxillaire *K10.8*
- membre *M79.69*
- - fébriles *M79.69*
- membres *M79.69*
- ménopause *N50.8*
- menstruelles *N94.6*
- mentruation *N94.6*
- - psychogènes *F45.8*
- moignon, suite à une amputation
- - bras, traumatique *T92.6*
- - jambe, traumatique *T93.6*
- mollet *R29.8*
- Mouvement oculaire *H57.1*
- musculaires *M79.19*
- nasopharynx *J39.2*
- nerf, visage *G50.0*
- nerfs NCA *M79.29*
- neuromusculaires *M79.29*
- nez *J34.8*

Douleur, s –*suite*

- non précisées *R52.9*
- oculaire *H57.1*
- oeil *H57.1*
- - avec nausées *H57.1*
- ophtalmiques *H57.1*
- orbite *H57.1*
- oreille *H92.0*
- organes génitaux
- - féminins NCA *N94.8*
- - masculins *N50.8*
- organes génitaux, psychogènes *F45.4*
- orteils *M79.67*
- osseuses *M89.89*
- ovariennes *N94.8*
- ovulation *N94.0*
- paroi antérieure *R07.3*
- paroi thoracique *R07.3*
- paroi thoracique, antérieure *R07.3*
- patient, chronique *R52.2*
- peau, psychogènes *F45.8*
- pectangineuses *I20.9*
- pelviennes, aigues *R10.2*
- pénis *N48.8*
- - psychogènes *F45.4*
- péri-anales, et douleurs périnéales *K62.9*
- péricardique *R07.2*
- périnéales *R10.2*
- - aigues *R10.2*
- - et douleurs péri-anales *K62.9*
- périnée *R10.2*
- - aiguës *R10.2*
- phalange, métacarpe *M25.54*
- phalange, métatarse *M25.57*
- pharynx *J39.2*
- pied *M79.67*
- - statiques *M79.67*
- plèvre *R07.3*
- - non induites par une tumeur *R07.3*
- précordiales *R07.2*
- - psychogènes *F45.4*
- prémenstruelles *N94.3*
- prostatiques *N42.9*
- psychogènes, persistantes *F45.4*
- rachis *M54.6*
- - *M54.99*
- - cervicales *M54.2*
- - dorsales *M54.6*
- - psychogènes *F45.4*
- racine, spinal *M54.19*
- radiculaires, spinales *M54.19*
- rectales *K62.8*
- - spastiques *K59.4*
- - - psychogènes *F45.4*
- rectum *K62.8*
- région lombaire *M54.5*
- reins *N23*
- relatives à la croissance *R29.8*
- résistantes aux thérapies *R52.1*
- rétro-sternales *R07.3*
- rhumatoïdes *M79.09*
- sciatiques *M54.3*
- scrotum *N50.8*
- - psychogènes *F45.4*
- somatoforme *F45.40*
- suite à un traumatisme au thorax *S29.8*
- syndrome

Douleur, s –*suite*

- syndrome –*suite*
- - céphalo-brachiale *M53.1*
- - cervicale *M54.2*
- - chronique *R52.2*
- - fémoro-patellaire *M22.2*
- - lombaire, vertébrale, localisée *M54.5*
- - musculo-squelettique *M79.19*
- - myofascial *M79.19*
- - polymyalgique *M35.3*
- - thalamique *R52.1*
- - thoracique *R07.4*
- - vertébrale *M54.89*
- - visage, paroxysme *G50.0*
- système gastro-intestinal, psychogènes *F45.4*
- système sympathique *G90.8*
- talon *M79.67*
- testicules *N50.8*
- - psychogènes *F45.4*
- tête *R51*
- - allergiques NCA *G44.8*
- - cas d'insuffisance cérébro-vasculaire *I67.88*
- - cervicales *M54.2*
- - chroniques *R51*
- - combinaison *R51*
- - d'origine non organiques *F45.4*
- - dues à
- - - effet, médicament *G44.4*
- - - histamine *G44.0*
- - émotionnelles *F45.4*
- - genèse, non spécifiée *R51*
- - hémiplégiques (migraine) *G43.9*
- - ménopause *N95.1*
- - migraine *G43.9*
- - nerveuses *F45.4*
- - non spécifiques *R51*
- - post-traumatiques *G44.3*
- - - chroniques *G44.3*
- - psychogènes *F45.4*
- - suite à
- - - anésthésie spinale
- - - - et
- - - - - anesthésie épidurale, *T88.5*
- - - - - anésthésie, péridurale, *T88.5*
- - - - ou anésthésie, péridurale
- - - - - pendant la grossesse, *O29.4*
- - - - - lors de l'accouchement, *O74.5*
- - - - - couche, *O89.4*
- - - ponction lombaire *G97.1*
- - vasculaires *G44.1*
- - vasomotrices *G44.1*
- - vertébrales *M54.12*
- thoraciques gauches *R07.2*
- thorax *R07.4*
- - ischémiques *I20.9*
- - lors de la respiration *R07.1*
- tibia *M89.86*
- trijumeau *G50.0*
- tumeur* *R52.1*
- uretère *N23*
- utérus NCA *N94.8*
- utérus, psychogènes *F45.4*
- veineuses *I87.9*
- ventre *R10.4*
- vertébrales *M54.89*
- vésicales *R39.8*

Douleur, s –*suite*

- vésicule séminale *N50.8*
- vessie *R39.8*
- visage *R51*
- - atypiques *G50.1*
- - cas de maladie, mandibule *K07.6*
- - chroniques *R52.2*
- xiphoide *M89.88*

Douloureux, -euse

- cicatrice, peau *L90.5*
- coite *N94.1*
- - chez la femme *N94.1*
- - chez l'homme *N48.8*
- défécation *R19.8*
- dysfonctionnement, articulation de la machoire *K07.6*
- éjaculation *N48.8*
- - psychogène *F52.6*
- érection *N48.39*
- érection chronique *N48.39*
- flatulence *R14*
- gonflement, lèvres *K13.0*
- menstruation
- - primaire *N94.4*
- - psychogène *F45.8*
- - secondaire *N94.5*
- miction *R30.9*
- - psychogène *F45.34*
- pied plat *M21.4*
- raideur de l'épaule, aigue *M25.61*
- respiration *R07.1*
- rougeur, lèvres *K13.0*
- trouble, somatoforme, persistant *F45.4*
- urie *R30.0*

Doute

- avec observation *Z03.9*
- clarification *Z03.9*
- Exclusion *Z03.9*

Doute, suspicion de

- glaucome *H40.0*
- - cas de
- - - défaillance, champ visuel *H40.0*
- - - défaut, couche des fibres nerveuses de la rétine *H40.0*
- - - résultat, papille *H40.0*
- grossesse *Z32*
- insuffisance, col de l'utérus, avec prise en charge, non enceinte *N88.3*

Douve intestinal *B66.5*

Douve du foie

- chat
- - avec distomatose hépatique *B66.0+, K77.0**
- - avec distomatose, foie *B66.0+, K77.0**
- - infection *B66.0*
- chinoise, infestation *B66.1*
- d'Asie orientale, infestation *B66.1*
- grande, infestation *B66.3*
- infection due à la larve de Cysticercus tenuicollis *B66.0*
- infection due au parasite Opisthorsis veverrini *B66.0*
- infestation *B66.3*
- orientale, infestation *B66.1*
- sibérique, avec distomatose hépatique *B66.0+, K77.0**

Down, syndrome de *Q90.9*

- foetal, soins, femme enceinte *O35.1*

Down, syndrome de –*suite*

- kératocône *Q90.9+, H19.8**
- Langdon- *Q90.9*
- translocation *Q90.2*

Dracunculose *B72*

Drainage
- liquide céphalo-rachidien *Z98.2*
- perforation *T81.8*

Drépanocytose *D57.1*
- anémie *D57.1*
- - avec crises *D57.0*
- - sans crises *D57.1*
- avec
- - anémie *D57.1*
- - arthropathie, due à la goutte *D57.8+, M14.0**
- - elliptocytose *D57.8*
- - glomérulonéphrite *D57.8+, N08.2**
- - maladie, glomérulaire *D57.8+, N08.2**
- - néphropathie *D57.1+, N08.2**
- - sphérocytose *D57.8*
- crise *D57.0*
- double hétérozygote *D57.2*
- hémoglobinopathie *D57.1*
- - avec thalassémie *D56.8*
- héréditaire *D57.3*
- - avec
- - - elliptocytose *D57.8*
- - - sphérocytose *D57.8*
- - dépistage *Z13.0*
- hétérozygote *D57.3*
- hétérozygotes *D57.3*
- rétinopathie, proliférante *D57.8+, H36.8**

Dreschlera hawaiiensis, infection *B43.8*

Dressler II Syndrome de *I24.1*

drogue Crise épileptique dû au facteur suivants : médicament et *G40.5*

Drogues
- absorption, par le placenta *P04.1*
- abus *F19.1*
- appropriée
- - effet secondaire, non souhaité, par administration, correcte *T88.7*
- - hypersensibilité, lors d'administration correcte *T88.7*
- - idiosyncrasie, par administration, correcte *T88.7*
- - réaction, allergique, lors de l'administration, correcte *T88.7*
- combinaison, dépendance NCA *F19.2*
- dépendance *F16.2*
- - *F19.2*
- dépendance NCA *F19.2*
- - avec perte de conscience, profonde NCA *F13.2*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P96.1*
- - pendant grossesse *O99.3*
- détermination du taux dans le sang *Z04.8*
- effet NCA *T88.7*
- hallucinose *F19.5*
- induit par, paranoia *F19.5*
- - et hallucinations *F19.5*
- ingestion, avec ulcère, oesophage *K22.1*
- insuffisance, foie *K71.1*
- intoxication *T50.9*
- - avec psychose *F19.5*

Drogues –*suite*

- polyneuropathie due aux *G62.0*
- psychose *F19.5*
- - hallucinatoire *F19.5*
- - paranoïde *F19.5*
- - paranoïde hallucinatoire *F19.5*
- psychotrope, dans le sang, mise en évidence de *R78.5*
- sevrage, thérapie *Z50.3!*
- substitution (aux) *Z51.83*
- syndrome de sevrage NCA *F19.3*
- - avec delirium *F19.4*
- - chez le nouveau-né *P96.1*
- - - chez la mère, dépendante *P96.1*
- synthèse à effets morphiniques, dépendance *F11.2*
- usage, dépistage *Z04.8*
- vertige, pathologique *F19.0*

Droit
- bloc fasciculaire *I45.0*
- branche, bloc *I45.1*
- - complet *I45.1*
- - incomplet *I45.1*
- coeur, syndrome de, hypoplasie *Q22.6*
- crosse aortique, persistance *Q25.4*
- gauche, insuffisance cardiaque *I50.01*
- hémisphère, trouble, organique, affectif *F07.8*
- ventricule
- - dilatation *I51.7*
- - hypertrophie *I51.7*
- - insuffisance *I50.01*
- - - conséquence d'une insuffisance du ventricule gauche *I50.01*
- - - décompensée *I50.01*
- - - primitive *I50.00*
- - - secondaire, suite à une insuffisance du ventricule gauche *I50.01*
- ventricule, cardiomyopathie, arythmogène *I42.80*

Drug fever Fièvre due à des médicament [*R50.2*

Duane, syndrome de *H50.8*
- Stilling-Türk *H50.8*

Dubin Johnson, ictère *E80.6*

Dubin-Johnson, syndrome de *E80.6*

Dubin-Sprinz, ictère de *E80.6*

Dubowitz, syndrome de *Q87.1*

Duchenne
- Aran, syndrome de *G12.2*
- ataxie, syphilitique *A52.1*
- dystrophie de *G71.0*
- dystrophie musculaire de *G71.0*
- dystrophie, muscle, progressive, héréditaire *G71.0*
- Erb, syndrome de *P14.0*
- Griesinger, maladie de *G71.0*
- paralysie de *G12.2*
- - cas de
- - - affection motoneurale *G12.2*
- - - dystrophie musculaire *G71.0*
- - par des lésions lors de la naissance *P14.0*

Ducrey, bacille de
- balanite *A57+, N51.2**
- infection *A57*

Ducrey, chancre *A57*

Ductus

Ductus –*suite*

- Coarctation de l'aorte *Q25.1*
- sténose, isthme aortique *Q25.1*

due
- Autre micro organisme infectieux , Pneumonie *J16.8*
- bouchon méconium dans mucoviscidose , [Au cours de fibrose kystique] : occlusion intestinal *E84.1†, P75**
- médicament Drug fever Fièvre *R50.2*
- prothèse implant greffe de l ' appareil génito - urinaire , Douleur *T83.8*
- - de l ' appareil génito - urinaire , Embolie *T83.8*
- thalidomide Embryopathie *Q86.80*
- traitement cytostatique Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse *D61.10*

dues prothèse implant
- greffe interne du système nerveux , Infection et réaction inflammatoire *T85.72*
- mammaire Infection et réaction inflammatoire *T85.73*
- - Autre complication *T85.83*

Dühring-Brocq, maladie de *L13.0*

Dukes-Filatov, maladie de *A55*

Dukes-Filatov, syndrome de *A55*

Dumping syndrome, après gastrectomie *K91.1*

Dumping, syndrome de *K91.1*
- consécutif à une intervention gastrique *K91.1*

Duodénal - *voir* Duodénum
- ulcère
- - avec perforation *K26.5*
- - perforé *K26.5*

Duodénite *K29.8*
- associée à candidose *B37.88*
- gastro- *K29.9*
- - virale *A08.4*
- peptique *K29.8*
- péri- *K29.8*
- provoquée par
- - Aspergillose *B44.8+, K93.8**
- - candida *B37.88*
- - cytomégalovirus *B25.80+, K93.8**
- superficielle *K29.8*

Duodénite, surface *K29.8*

Duodénum
- absence
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q41.0*
- adénome *D13.2*
- adhérence *K66.0*
- agénésie *Q41.0*
- angiodysplasie *K31.81*
- - avec hémorragie *K31.82*
- anomalie *Q43.9*
- atrésie *Q41.0*
- avec estomac, maladie *K31.9*
- bulbite *K29.8*
- catarrhe *K29.8*
- cicatrice obstructive *K31.5*
- constriction *K31.5*
- corps étranger *T18.3*
- dilatation *K59.8*

Duodénum –*suite*
- diverticule *K57.10*
- - congénital *Q43.8*
- diverticulite *K57.12*
- - congénitale *Q43.8*
- diverticulose *K57.10*
- - congénitale *Q43.8*
- entérite régionale *K50.0*
- érosion *K26.9*
- - post-pylorique *K26.9*
- fistule *K31.6*
- hémorragie *K92.2*
- hyperémie *K31.88*
- hypertrophie *K31.88*
- iléus chronique *K31.5*
- inflammation *K29.8*
- irritabilité *K59.8*
- lésion *K31.9*
- lésion traumatique *S36.41*
- maladie *K31.9*
- maladie de Crohn *K50.0*
- malformation
- - acquise *K31.88*
- - congénitale *Q43.9*
- méga- *Q43.8*
- métastase *C78.4*
- obstruction *K31.5*
- perforation *K26.5*
- - chez la mère, compliquant l'accouchement *O71.5*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - traumatique *S36.41*
- polype *K31.7*
- - hyperplasique *K31.7*
- rupture
- - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - traumatique *S36.41*
- septum *Q43.8*
- spasme *K59.8*
- sténose *K31.5*
- - congénitale *Q41.0*
- sténose grave *K31.5*
- - congénitale *Q41.0*
- torsion *K56.2*
- tuberculose *A18.3+, K93.0**
- tumeur *D37.2*
- ulcère *K26.9*
- - avec hémorragie *K26.4*
- ulcère peptique *K26.9*

Duplay, bursite de *M75.0*

Duplay, péri-arthrite ou maladie de *M75.0*

Duplication
- appareil digestif *Q45.8*
- cholédoque *Q44.5*
- chromosome, prométaphase *Q92.4*
- estomac *Q40.2*
- intestin *Q43.49*
- méat urinaire *Q64.7*
- œsophage *Q39.8*
- rectum *Q43.42*
- rénale *Q63.1*
- système des cavités rénales *Q62.3*
- uretère *Q62.5*
- urètre *Q64.7*
- utérus *Q51.2*
- voies biliaires *Q44.5*
- voies urinaires *Q64.8*

Dupuytren, fracture de *S82.81*
- cheville *S82.81*
- ouverte *S82.81*
- péroné *S82.81*

Dur
- chancre *A51.0*
- fibrome *D21.9*
- palais
- - abcès *K10.28*
- - et palais, mou, fente *Q35.5*
- - - avec fente, lèvres *Q37.5*
- - - - bilatérale *Q37.4*
- - - - unilatérale *Q37.5*
- - - unilatérale *Q35.5*
- - fente *Q35.1*
- - - avec fente, lèvres *Q37.1*
- - - - bilatérale *Q37.0*
- - - - unilatérale *Q37.1*
- - - unilatérale *Q35.1*
- - hypertrophie *K10.8*
- - lésion *S09.9*

durablement acquis trouble coagulation sanguin *U69.11!*

Durcissement de la plèvre *J94.1*

Dure, substance
- dent
- - couleur, modification *K03.7*
- - maladie *K03.9*
- - formation, irrégulière, pulpe *K04.3*

Dure-mère
- anomalie *Q04.9*
- dure-mère
- - abcès tuberculeux *A17.8+, G01**
- - encéphalique
- - - kyste *G93.0*
- - - malformation *Q04.9*
- - - tuberculose *A17.0+, G01**
- - malformation *Q04.9*
- - neurosyphilis *A52.1+, G01**
- - spinale
- - - kyste *G96.1*
- - - malformation *Q06.9*
- - - tuberculose *A17.0+, G01**
- hémorragie *I62.09*
- métastase *C79.3*

Dureté musculaire *M62.89*
- iliaque *M62.85*
- psoas *M62.85*

Duroziez, maladie de *Q23.2*

Dyalise rénale, dépendance *Z99.2*

Dyke-Young, anémie de *D59.1*

Dysacousie *H93.2*

Dysarthrie *R47.1*

Dysautonomie *G90.1*
- familiale *G90.1*

Dysbarisme *T70.3*

Dysbasie *R26.2*
- angioscléreuse intermittente *I73.9*
- hystérique *F44.4*
- intermittente *I73.9*
- lordotique progressive *G24.1*
- - symptomatique *G24.2*
- non organique *F44.4*
- psychogène *F44.4*

Dysbiose intestinale [déséquilibre de la *K63.8*

Dyscalculie *R48.8*

Dyscardie *I51.8*
- fonctionnelle *F45.30*

Dyschésie *K59.0*

Dyscholie *K83.8*

Dyschondroplasie *Q78.4*
- avec hémangiome *Q78.4*

Dyschondrostéose familiale *Q77.8*

Dyschromatopsie *H53.5*

Dyschromie *L81.9*
- cutanée *L81.9*

Dyschromie cutanée *L81.9*

Dyscorticisme *E24.9*

Dyscranio-pygophalangie *Q87.0*

Dyscrasie
- lymphoplasmocytaire, en cas de gammapathie *D47.2*
- lymphoplasmocytique, en cas de gammapathie *D47.2*
- polyglandulaire *E31.9*
- sanguine *D75.9*
- - avec
- - - hémorragie précédant l'accouchement *O46.0*
- - - hémorragie, intrapartum *O67.0*
- - dans les antécédents personnels *Z86.2*
- - lors de l'accouchement *O72.3*
- - post-partum *O72.3*
- sanguine, chez le foetus ou le nouveau-né *P61.9*

Dyscrinie *E34.9*

Dysdiadococinésie *R27.8*

Dysembryome
- néphrogène *C64*
- rénal *C64*

Dysembryome rénal, de Manon *C64*

Dysencéphalie splanchnokystique *Q61.9*

Dysenterie *A09*
- aiguë, amibienne *A06.0*
- bacille de Hiss-Russel *A03.1*
- bacille de Schmitz-Stutzer *A03.0*
- bacille de Shiga-Kruse *A03.0*
- bactérienne *A03.9*
- - due à
- - - Shigella
- - - - boydii *A03.2*
- - - - flexneri *A03.1*
- - - - sonnei *A03.3*
- Boyd *A03.2*
- Boyd, de *A03.2*
- catarrhale *A09*
- chronique, amibienne *A06.1*
- diabète sucré *E14.90*
- due à
- - amibes *A06.0*
- - - aiguës *A06.0*
- - - porteur *Z22.1*
- - bactéries Shiga Kruse *A03.0*
- - balantidiose *A07.0*
- épidémique *A09*
- Flexner *A03.1*
- Flexner, de *A03.1*
- hémorragique *A09*
- insipide *E23.2*
- provoquée par
- - amibes *A06.0*
- - bactérie de Sonne *A03.3*

Dysenterie –*suite*
- provoquée par –*suite*
- - Balantidium coli *A07.0*
- - candida *B37.88*
- - Chilomastix *A07.8*
- - Coccidium *A07.3*
- - Dientamoeba fragilis *A07.8*
- - Embadomonas *A07.8*
- - Giardia
- - - intestinalis *A07.1*
- - - lamblia *A07.1*
- - Isospora
- - - belli *A07.3*
- - - hominis *A07.3*
- - Lamblia intestinalis *A07.1*
- - Monilia *B37.88*
- - protozoaires *A07.9*
- - salmonelles *A02.0*
- - Shigella
- - - boydii *A03.2*
- - - dysenteriae *A03.0*
- - - flexneri *A03.1*
- - - groupe
- - - - A *A03.0*
- - - - B *A03.1*
- - - - C *A03.2*
- - - - D *A03.3*
- - - paradysenteriae *A03.1*
- - - sonnei *A03.3*
- - Shigella NCA *A03.9*
- - Trichomonas *A07.8*
- - virus *A08.4*
- rhumatisme *M02.39*
- Schmitz (-Stutzer) *A03.0*
- Shiga Kruse *A03.0*
- Shiga Kruse, maladie de *A03.0*
- Shigella sonnei *A03.3*
- Sonne *A03.3*
- sporadique *A09*
- tropicale *A09*
- tuberculeuse *A18.3+, K93.0**

Dysentérique
- abcès, foie *A06.4*
- arthrite *A09+, M01.89**
- - bactérienne *A03.9+, M01.39**
- diarrhée *A09*
- strongyloïdose *B78.0*
- ulcère NCA *A09*

Dysérythropoïétique, anémie, congénitale *D64.4*

Dysesthésie *R20.8*
- psychogène *F44.6*

Dysfonction oesophagienne, sclérodactyli *M34.1*

Dysfonctionnement
- anastomose NCA *T82.3*
- appareil dans voies urinaires NCA *T83.1*
- après
- - colostomie *K91.4*
- - cystostomie *N99.5*
- - entérostomie *K91.4*
- - gastronomie *K91.88*
- - iléostomie *K91.4*
- - jéjunostomie *K91.4*
- articulation temporomandibulaire *K07.6*
- - douloureux *K07.6*
- biomécanique *M99.99*

Dysfonctionnement –*suite*
- buccofacial *G24.4*
- canal cystique *K82.8*
- cardiaque *I51.8*
- - alcoolique *I51.8*
- cathéter de cystostomie *T83.0*
- cathéter de dialyse *T82.4*
- cathéter de dialyse péritonéale *T85.6*
- cathéter de perfusion NCA *T82.5*
- cathéter NCA *T85.6*
- cérébral *G93.88*
- - minimal *G93.88*
- circulatoire compliquant la grossesse *O99.4*
- côlon *K59.9*
- - psychogène *F45.32*
- colostomie *K91.4*
- cordes vocales *J38.7*
- corticosurrénalien *E27.9*
- DCI [défibrillateur cardioverseur implanté] *T82.1*
- défibrillateur-cardioverseur implanté *T82.1*
- éjaculation *F52.8*
- endocrinien NCA *E34.9*
- endomètre *N85.8*
- épiphyse *E34.8*
- érectile *F52.2*
- - non organique *F52.2*
- - organique *N48.8*
- gastrique *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- glande pinéale Épiphyse *E34.8*
- glande NCA *E34.9*
- greffon vasculaire NCA *T82.3*
- hépatique *K76.8*
- - constitutionnel *K76.8*
- hormonal *E34.9*
- - hypophyse *E23.7*
- hypophyse *E23.3*
- hypothalamus *E23.3*
- labyrinthe *H83.2*
- ménopause *N95.9*
- muscles papillaires *I51.8*
- neuromusculaire, vessie *N31.9*
- neurovégétatif *F45.9*
- neurovégétatif somatoforme *F45.39*
- ovarien *E28.9*
- - avec excès
- - - androgènes *E28.1*
- - - oestrogènes *E28.0*
- - hormonal *E28.9*
- pacemaker *T82.1*
- placentaire *O43.8*
- pluriglandulaire *E31.9*
- pontage coronarien *T82.2*
- rectum *K59.9*
- - psychogène *F45.32*
- rénal *N28.9*
- segmentaire *M99.09*
- sénile *R54*
- sexuel *F52.9*
- sexuel, psychogène *F52.9*
- shunt ventriculaire *T85.0*
- shunt ventriculaire intracrânien *T85.0*
- somatique *M99.09*
- sonde urinaire NCA *T83.0*
- sphincter d'Oddi *K83.4*
- sphincter rectal *R19.8*

Dysfonctionnement –*suite*
- stimulateur cardiaque implanté *T82.1*
- surrénalien *E27.9*
- symbolique NCA *R48.8*
- système nerveux autonome, provoqué par l'alcool *G31.2*
- testicule *E29.9*
- thyroïde *E07.9*
- thyroïdien *E07.9*
- - complication, grossesse *O99.2*
- trachéotomie *J95.0*
- trompe d'Eustache *H69.9*
- utérin
- - hypertonique *O62.4*
- - hypotonique *O62.2*
- - - initial *O62.0*
- - - secondaire *O62.1*
- utérus, avec lésion du foetus/nouveau-né, compliquant l'accouchement *P03.6*
- vasculaire, en cas de carence en facteur VIII *D68.0*
- vasomoteur *I73.9*
- ventriculaire gauche *I50.19*
- - asymptomatique *I50.11*
- ventriculaire gauche, asymptomatique *I50.11*
- vésicule biliaire *K82.8*
- vessie *N31.9*
- - neurogène *N31.9*
- - neuromusculaire
- - - atone *N31.2*
- - - atonique *N31.2*
- - - autonome *N31.2*
- - - non inhibée *N31.0*
- - - non réflexe *N31.2*

Dysgénésie *Q13.8*
- gonadique *Q96.9*
- - pure *Q99.1*
- gonadique, en cas de
- - caryotype
- - - 46,XX *Q99.1*
- - - 46,XY *Q99.1*
- - hermaphrodite
- - - 46, XX *Q99.1*
- - - 46, XY *Q99.1*
- lymphoblastique, cytologique, héréditaire *D82.1*
- mésostromale *Q13.8*
- ovarienne *Q50.3*
- rénale *Q60.5*
- - bilatérale *Q60.4*
- - unilatérale *Q60.3*
- réticulaire *D72.0*
- - cas d'immunodéficience combinée sévère [DICS] *D81.0*

Dysgerminome
- l'ovaire *C56*
- masculin *C62.9*

Dysgnathie *K07.2*

Dysgrammatisme *R48.8*

Dysgraphie *R27.8*

Dysgueusie *R43.2*

Dyshidrose [pompholyx] *L30.1*
- lamellosa sicca *L30.1*
- manuum *L30.1*

Dyshormonal
- goitre *E07.1*
- - familial *E07.1*

Dyshormonal –*suite*

- goitre familial *E07.1*

Dyskératose *L85.8*
- col de l'utérus *N87.9*
- congénitale *Q82.8*
- folliculaire
- - Darier, maladie de *Q82.8*
- - végétante, maladie de Darier *Q82.8*
- utérus NCA *N85.8*

Dyskinésie *G24.9*
- canal cystique *K82.8*
- ciliaire primitive [DCP] [dyskinésie ciliaire bronchique congénitale] *Q34.8*
- hystérique *F44.4*
- intestinale *K59.8*
- neuroleptiques *G24.0*
- œsophage *K22.4*
- origine non organique *F44.4*
- oro-faciale *G24.4*
- psychogène *F44.4*
- tardive *G24.0*
- trachée *J39.88*
- trachéo-bronchique *J98.0*
- uretère *N28.8*
- vésicule biliaire *K82.8*

Dyskinésique
- paralysie cérébrale *G80.3*
- paralysie infantile, cérébrale *G80.3*
- paralysie, cérébrale *G80.3*
- parésie, cérébrale *G80.3*
- - infantile *G80.3*
- syndrome *G24.9*
- syndrome ciliaire *Q34.8*

Dyslalie *F80.0*
- développement *F80.0*
- partielle *F80.0*

Dyslexie *F81.0*
- *R48.0*
- développement *F81.0*
- secondaire, due à des lésions organiques *R48.8*

Dyslipidémie *E78.9*

Dysmaturité *P07.3*
- pulmonaire *P27.0*

Dysmélie *Q73.8*

Dysménorrhée *N94.6*

Dysménorrhée membraneuse *N94.6*
- acquise *N94.6*
- congestion *N94.6*
- essentielle *N94.6*
- exfoliante *N94.6*
- intermenstruelle *N94.6*
- primaire *N94.4*
- psychogène *F45.8*
- secondaire *N94.5*
- statique *N94.6*

Dysmétrie *R27.8*

Dysmnésie *F04*

Dysmorphie
- due
- - alcool *Q86.0*
- - cause exogène NCA *Q86.8*
- - hydantoïne *Q86.1*
- - warfarine *Q86.2*
- face *Q18.9*
- rein *Q63.8*

Dysmorphie –*suite*

- syndrome d'alcoolisme fœtal *Q86.0*

Dysmorphophobie *F22.8*
- délirante *F22.8*
- non délirante *F45.2*

Dysmorphophobie non-paranoïde *F45.2*

Dysnomie *R48.8*

Dysomnie *G47.9*

Dysorexie *R63.0*
- hystérique *F50.8*

Dysorgasmie *F52.3*

Dysostose
- cléido-crânienne *Q74.0*
- cléio-crânienne héréditaire *Q74.0*
- crânio-faciale *Q75.1*
- - héréditaire *Q75.1*
- enchondrale *E76.0*
- héréditaire, cléidocrânienne *Q74.0*
- idiotie [syndrome de Hurler] *E76.0*
- mandibulo-faciale *Q75.4*
- multiple *E76.0*
- oculo-mandibulo-facial *Q75.5*
- ostéo onycho- *Q87.2*
- thoracique asphyxiante *Q77.2*

Dyspareunie *N94.1*
- chronique *N94.1*
- femme *N94.1*
- homme *N48.8*
- non organique *F52.6*
- psychogène *F52.6*
- secondaire *N94.1*

Dyspepsie *K30*
- allergique *K30*
- atonique *K30*
- avec diarrhée *K52.9*
- chronique *K30*
- congénitale *K30*
- digestive *K30*
- fermentation *K30*
- fermentative *K30*
- fonctionnelle *K30*
- gastro-intestinale *K30*
- intestinale *K30*
- neurotique *F45.31*
- professionnelle *K30*
- psychogène *F45.31*
- putréfaction *K30*
- réflexe *K30*
- SAI *R10.1*

Dysphagie *R13.9*
- avec
- - dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale obstruée *R13.1*
- - nécessïté de surveillance pendant la prise de nourriture *R13.0*
- fonctionnelle *F45.8*
- hystérique *F45.8*
- psychogène *F45.8*
- sidéropénique *D50.1*

Dysphagocytose *D71*
- congénitale *D71*

Dysphasie *R47.0*
- développement, type
- - expressif *F80.1*
- - réceptif *F80.28*

Dysphonie *R49.0*
- fonctionnelle *F44.4*
- hyperfonctionnelle *R49.0*
- hypofonctionnelle *R49.0*
- hystérique *F44.4*
- psychogène *F44.4*
- sénile *R49.0*
- spastique *J38.3*

Dysphorie *F32.9*

Dyspituitarisme *E23.3*

dysplasie
-
- acétabulaire, congénitale *Q65.8*
- angio-, du colon *K55.21*
- - avec saignement *K55.22*
- artère rénale *Q27.2*
- artérielle, fibromusculaire *I77.3*
- articulation de la hanche *Q65.8*
- articulation, congénitale *Q74.8*
- basse
- - col utérin *N87.0*
- - vaginale *N89.0*
- - vulve *N90.0*
- broncho-pulmonaire *P27.1*
- - période périnatale *P27.1*
- cémento-osseuse périapicale *D16.5*
- cérébrale *Q04.9*
- chondro- *Q78.9*
- chondro-ectodermique *Q77.6*
- col de l'utérus *N87.9*
- - complication, grossesse *O34.4*
- - légère *N87.0*
- - modérée *N87.1*
- - sévère *N87.2*
- dentine *K00.5*
- diaphysaire progressive *Q78.3*
- diastrophique *Q77.5*
- ectodermique *Q82.4*
- - anhidrotique *Q82.4*
- - hidrotique *Q82.8*
- ectodermique hidrotique *Q82.8*
- épididyme *Q55.4*
- épiphysaire *Q77.3*
- - *Q78.8*
- - multiple *Q77.3*
- - ponctuée *Q77.3*
- épithéliale, col de l'utérus *N87.9*
- fibreuse *M85.09*
- - mâchoire *K10.8*
- - monostotique *M85.09*
- fibreuse des os, NCA *M85.09*
- hanche *Q65.8*
- - légère *Q65.8*
- jambe *Q74.2*
- mâchoire supérieure
- - floride *D16.42*
- - périapical *D16.42*
- mammaire *N60.9*
- - bénigne *N60.9*
- - kystique *N60.1*
- métaphysaire *Q78.5*
- moelle épinière *Q06.1*
- - rachis *Q06.1*
- multilignées Anémie réfractaire avec *D46.5*
- multilinéaire Leucémie myéloïde aigu avec *C92.8*
- muscle *Q79.8*
- myélo- *D46.9*

dysplasie –*suite*
- myélo- –*suite*
- - avec poussée blastique *D46.9*
- myéloradiculo- *Q06.1*
- - moelle épinière *Q06.1*
- naevus naevocellulaire *D22.9*
- oculo-auriculo-vertébrale *Q87.0*
- oculodentodigitale *Q87.0*
- oeil *Q11.2*
- - congénitale *Q11.2*
- ostéochondro- *Q78.9*
- - avec trouble de la croissance des os longs et du rachis *Q77.9*
- pavillon de l'oreille *Q17.8*
- peau, congénitale *Q82.4*
- pelvienne *Q74.2*
- périapicale, cément osseux *D16.5*
- périostale *M89.89*
- polyostotique, fibreuse *Q78.1*
- poumon *Q33.6*
- prostate *N42.3*
- - congénitale *Q33.6*
- rénale *Q61.4*
- réno-faciale, congénitale *Q60.6*
- rétine, congénitale *Q14.1*
- rotule *Q74.1*
- sacrum *Q78.8*
- septum *Q04.4*
- sévère, en cas de néoplasie
- - intra-épithéaliale de la vulve, stade III *D07.1*
- - intra-épithéliale du col de l'utérus, stade III *D06.9*
- - intra-épithéliale du vagin, stade III *D07.2*
- spondylo-épiphysaire *Q77.7*
- spondylo-thoracique *Q67.5*
- système nerveux NCA *Q07.9*
- testicule *Q55.2*
- thanatophore *Q77.1*
- thoracique asphyxiante *Q77.2*
- thymique *D82.1*
- - avec immunodéficience *D82.1*
- uretère *N13.8*
- urothéliale *N39.88*
- vaginale *N89.3*
- - légère *N89.0*
- - modérée *N89.1*
- - sévère *N89.2*
- vaisseau lymphatique *Q89.8*
- voie biliaire *Q44.5*
- vulve *N90.3*
- - légère *N90.0*
- - modérée *N90.1*
- - sévère *N90.2*

Dysplasique
- coxarthrose *M16.3*
- - bilatérale *M16.2*
- - unilatérale *M16.3*
- naevus *D22.9*

Dyspnée *R06.0*
- asthmatique *J45.9*
- - avec bronchite *J45.9*
- - - chronique *J44.89*
- cardiaque *I50.19*
- cas de
- - effort *R06.0*
- - maladie, par VIH *B23.8, R06.0*

Dyspnée –*suite*
- chez le nouveau né *P22.8*
- fonctionnelle *F45.33*
- hyperventilation *R06.0*
- hystérique *F45.33*
- nocturne *R06.0*
- paroxystique *R06.0*
- psychogène *F45.33*
- repos *R06.0*
- respiratoire *J96.9*
- - aiguë *J96.0*
- urémique *N19*

Dyspnée d'effort *R06.0*

Dyspondérose *F50.9*

Dyspraxie *F82.9*
- *R27.8*
- développement *F82.9*

Dysprotéinémie *E88.0*
- LAID Lymphadénopathie angio #NAME? *C86.5*

Dysraphie *Q07.9*

Dysraphie spinale occulte *Q76.0*

Dysréflexie autonome *G90.49*
- manifestée par
- - crise de transpiration *G90.41*
- - crise hypertonique *G90.40*

Dysrégulation
- cérébrovasculaire *I67.9*
- circulatoire *I99*
- - hypotonique *I95.9*
- diabète de type I *E10.80*
- diabète de type II *E11.80*
- diabète sucré *E14.80*
- glande surrénale, hormonale *E27.9*
- hypotonique *I95.9*
- neurovégétative *F45.9*
- orthostatique
- - dans les antécédents personnels *Z86.7*
- - pendant la grossesse *O99.4*
- psycho-neurovégétatif *F45.9*
- psychosomatique *F45.9*
- psycho-végétatif *F45.9*
- végétatif *F45.9*

Dysrythmie, cardiaque *I49.9*
- fœtus *P20.9*
- post-opératoire *I97.8*
- - effet à long terme après chirurgie cardiaque *I97.1*

Dyssocial
- comportement
- - examens, sans trouble psychique manifeste *Z03.2*
- - prolongé, en cas de trouble du comportement social *F91.2*
- trouble, personnalité *F60.2*

Dyssynergie
- cérébelleuse myoclonique *G11.1*
- détrusor col vésical *R27.8*
- détrusor sphinctère *N31.88*
- - liée à une lésion de la moelle épinière *G95.84*
- plancher pelvier, -muscle detrusor *R27.8*
- sphincter, détrusor *N31.88*
- - len cas d'atteinte, moelle épinière *G95.84*
- vésico-pelvien *R27.8*

Dyssynergie –*suite*
- vésico-pelvienne *R27.8*
- vésico-sphinctérienne *N31.88*
- - *R27.8*
- - liée à une lésion de la moelle épinière *G95.84*
- voies biliaires *K83.8*

Dystélectasie *J98.1*

Dysthymie *F34.1*

Dysthyroïdie *E07.9*

Dystocie *O66.9*
- affectant le foetus/nouveau né *P03.1*
- cervicale, compliquant l'accouchement *O62.0*
- col de l'utérus *O62.2*
- - primitive *O62.0*
- - secondaire *O62.1*
- contractions *O62.4*
- due à
- - anomalie fœtus *O66.3*
- - ascite fœtale *O66.3*
- - double malformation *O66.3*
- - fœtus *O66.9*
- - fœtus, anormalement gros *O66.2*
- - hydrocéphalie, foetus *O66.3*
- - hydropisie du foetus *O66.3*
- - jumeaux, soudés *O66.3*
- - méningomyélocèle du foetus *O66.3*
- - origines maternelles *O66.9*
- - position anormale *O64.9*
- - posture anormale *O64.9*
- - présentation anormale *O64.9*
- - tératome, coccyx, foetal *O66.3*
- - tumeur foetale *O66.3*
- épaule négligée, compliquant l'accouchement *O66.0*
- épaules, obstacle à l'accouchement *O66.0*
- gémellaire, avec obstruction à la naissance *O66.1*
- travail *O62.4*
- utérine NCA *O62.4*

Dystonie *G24.9*
- bucco linguo faciale *G24.4*
- idiopathique *G24.1*
- - familiale *G24.1*
- - non familiale *G24.2*
- - orofaciale *G24.4*
- lenticulaire *G24.8*
- médicamenteuse *G24.0*
- mouvement *R25.8*
- musculaire déformante *G24.1*
- neurovégétative *F45.9*
- paralysie, cérébrale *G80.3*
- - dyskinétique *G80.3*
- parésie, cérébrale *G80.3*
- psychovégétative *F45.9*
- Spasme (de) torsion (dystonia deformans) progerssive *G24.1*
- torsion *G24.1*
- - symptomatique *G24.2*
- végétative *F45.9*

Dystopie
- foie *Q44.7*
- poumon *Q33.1*
- rein *Q63.2*

Dystrophie
- adiposo-génitale *E23.6*

Dystrophie *–suite*
- adiposo-génitale *–suite*
- - avec hypoplasie, organes génitaux *E23.6*
- adréno-leuco- *E71.3*
- Albright, ostéo, héréditaire *E83.58*
- algo- *M89.09*
- alimentaire *E45*
- antérieure en mosaïque de Vogt, cornée, oeil *H18.4*
- aréolaire, centrale de l'épithélium pigmentaire et de la choroïde *H31.2*
- bâtonnets cônes *H35.5*
- Becker *G71.0*
- cartilage costal *M94.0*
- cérébro-maculaire *E75.4*
- cheveux *L67.8*
- chez le nourrisson *R64*
- chondro- *Q78.9*
- chondro-ostéo- *E76.2*
- - type Morquio *E76.2*
- choroïde *H31.2*
- - aréolaire centrale *H31.2*
- - généralisée *H31.2*
- - généralisée, aréolaire, centrale *H31.2*
- - héréditaire *H31.2*
- - péripapillaire *H31.2*
- choroïdienne péripapillaire *H31.2*
- cônes *H35.5*
- - bacille *H35.5*
- cônes et bâtonnets *H35.5*
- cornée *H18.5*
- - avec kératopathie bulleuse *H18.1*
- - cristalline, centrale *H18.5*
- - entrecroisée *H18.5*
- - épithéliale grillagée maculée *H18.5*
- - gélatineuse *H18.5*
- - gélatineuse en goutte *H18.5*
- - granulaire *H18.5*
- - héréditaire *H18.5*
- - maculaire *H18.5*
- - marginale, cristalline *H18.5*
- - membrane, avant *H18.5*
- - sous-épithéliale *H18.5*
- cornéenne
- - de Cogan (membrane basale) *H18.5*
- - de la membrane basale *H18.5*
- - endothéliale *H18.5*
- - endothélium *H18.5*
- cortex de la glande surrénale *E27.8*
- due à
- - malnutrition *E45*
- - perte de poids anormale *R63.4*
- émail (dents) *K00.3*
- endothéliale, héréditaire, congénitale *Q13.4*
- fœtale *P05.2*
- foie *K72.9*
- - aiguë *K72.0*
- - chronique *K72.1*
- grillagée de la cornée *H18.5*
- hypophyse *E23.6*
- inanition, par *E46*
- intra-utérine *P05.9*
- irido-cornéo-endothélial [syndrome ICE] *H21.8*
- - avec glaucome secondaire *H40.5*
- Landouzy-Déjerine, de *G71.0*
- Leyden-Moebius *G71.0*

Dystrophie *–suite*
- Leyden-Moebius, de *G71.0*
- lipo- *E88.1*
- lipochondro- *E76.0*
- maculaire concentrique bénigne *H31.2*
- maculaire de Sorsby, pseudo-inflammatoire *H35.5*
- maculaire pseudo-inflammatoire de Sorsby *H35.5*
- malnutrition *E46*
- malnutrition, due à *E46*
- musculaire *G71.0*
- - bénigne (type Becker) *G71.0*
- - ceinture pelvienne *G71.0*
- - ceinture scapulaire *G71.0*
- - ceinture thoracique *G71.0*
- - congénitale *G71.2*
- - de Gowers *G71.0*
- - distale *G71.0*
- - Duchenne *G71.0*
- - Duchenne, progressive, héréditaire *G71.0*
- - Emery-Dreifuss *G71.0*
- - Erb *G71.0*
- - facio-scapulo-humérale (FSH) *G71.0*
- - héréditaire *G71.0*
- - héréditaire, congénitale *G71.2*
- - Landouzy *G71.0*
- - maligne (Type Duchenne) *G71.0*
- - myotonique *G71.1*
- - oculaire *G71.0*
- - oculo-pharyngée *G71.0*
- - progressive, de type Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - progressive, héréditaire *G71.0*
- - pseudo-hypertrophique *G71.0*
- - scapulo-péronière *G71.0*
- - - bénigne, avec contractures (Type Emery-Dreifuss) *G71.0*
- myocarde *I51.5*
- myotonique *G71.1*
- neuro- *M89.09*
- neuroaxonale infantile *G31.88*
- nutritionnelle *E45*
- oculaire *G71.0*
- oculo-cérébro-rénal *E72.0*
- oculopharyngée *G71.0*
- ongle *L60.3*
- - congénitale *Q84.6*
- onycho- *L60.3*
- ostéo- *Q78.9*
- - azotémique *N25.0*
- - congénitale *Q78.9*
- - parathyroïdie, secondaire *E21.1*
- - rénale *N25.0*
- - - avec osthéopathie *N25.0+, M90.89**
- ostéo-chondro- *E78.9*
- - familiale *E76.2*
- ovaire *N83.8*
- peau NCA *L98.8*
- pluriglandulaire *E31.8*
- réflexe *M89.09*
- - sympathique *M89.09*
- rétine *H35.5*
- - cours de
- - - anomalie du stockage des lipides *E75.6+, H36.8**
- - - lipidose systémique *E75.6+, H36.8**
- - héréditaire *H35.5*

Dystrophie *–suite*
- rétine *–suite*
- - pigmentaire *H35.5*
- - pigmentaire, ponctuée albescente, vitelliforme *H35.5*
- - tapétorétinienne *H35.5*
- - vitelliforme *H35.5*
- - vitréo-rétinienne *H35.5*
- rétinienne ponctuée albescente, vitelliforme *H35.5*
- Salzmann *H18.4*
- scapulo-péronière *G71.0*
- syndrome de Klippel Feil *Q76.4*
- tapétorétinienne *H35.5*
- - héréditaire *H35.5*
- testicule *N50.8*
- thoracique asphyxiante *Q77.2*
- thrombocytopathie *D69.1*
- vitréo-rétinienne *H35.5*
- vulve *N90.4*

Dysurie *R30.0*
- psychogène *F45.34*

Eagle-Barrett, syndrome d' *M79.28*

Eales, maladie d' *H35.0*

Eau
- accumulation
- - articulation *M25.49*
- - cavité abdominale *R18*
- - cavité thoracique *J94.8*
- cellules, claires
- - adénocarcinome *C75.0*
- - adénome *D35.1*
- - carcinome *C75.0*
- Cologne
- - dermatite, toxique *L24.3*
- - dermite de contact, allergique *L23.2*
- foyer
- - et troubles électrolytiques, chez les nouveaux nés *P74.4*
- - troubles *E87.8*
- gonflement *M67.49*
- injection *T70.4*
- intoxication *E87.7*
- manque *T73.1*
- - avec soif *T73.1*
- - lésion *T73.1*
- pression
- - échange, avec dommages, oreille *T70.0*
- - effet NCA *T70.9*
- rétention *R60.9*
- sevrage, en cas d'hyperémèse gravidique *O21.1*

Eberthella typhosa, infection *A01.0*

Eblouissement *H53.1*

Eblouissement, sensibilité pathologique *H53.1*

Eboulement *T79.5*
- avec
- - asphyxie *T71*
- - écrasement
- - - asphyxie *S28.0*
- - - sévère *T14.7*
- - étouffement *T71*

Ebstein, anomalie d', valvule tricuspide *Q22.5*

Ebstein, maladie d', non associé à une t *G70.8*

Ecartement des orteils, mycose *B35.3*

Ecchondrome *D16.9*

Ecchondrose *D48.0*

Ecchymose *R58*
- chez le nouveau né *P54.5*
- conjonctive *H11.3*
- oeil, traumatique *S05.1*
- paupière, traumatique *S00.1*
- spontanée *R23.3*

Eccrine
- adénome, papillaire *D23.9*
- cylindrome dermique *D23.9*
- maladie, glandes sudoripares *L74.9*
- spiradénome, *voir* tumeur bénigne, peau *D23.9*

ECG
- durée PQ, raccourcie *I45.6*
- période de transition, raccourcie *I45.6*

Echancrure nasale congénitale *Q30.2*

Echange
- aggrégat, stimulateur cardiaque *Z45.0*

Echange *–suite*
- attelle, externe *Z47.8*
- bandage *Z47.8*
- cathéter *Z46.6*
- dent, précoce *K00.6*
- eau, pression, avec lésions, oreille *T70.0*
- fixation *Z47.8*
- fixation, dispositif *Z47.8*
- - externe *Z47.8*
- - interne *Z47.0*
- Kirschner, fil de *Z47.0*
- pansement *Z48.0*
- stérilet *Z30.5*
- stimulateur *Z45.0*
- suture *Z48.0*

Echantillon de tissus placentaires, prél *Z36.0*

Echarde *T14.04*

échaudage
- substances bouillantes *X19*

échéant macrolides oxazolidinones streptogramines Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l ' oxacilline et le cas *U80.10!*

Echec
- accouchement *O66.4*
- accouchement par forceps *O66.5*
- extraction par ventouse obstétricale, avec
- - subséquent
- - - accouchement par césarienne NCA *O66.5*
- - - accouchement par forceps NCA *O66.5*
- tentative d'accouchement, suivie d'un accouchement par césarienne NCA *O66.4*
- tentative d'avortement *O07.9*
- utilisation de forceps, suivi d'un accouchement par césarienne NCA *O66.5*

Echinococcose *B67.9*
- alvéolaire *B67.7*
- hépatique NCA *B67.8+, K77.0**
- - alvéolaire *B67.5+, K77.0**
- - kystique *B67.0+, K77.0**
- infestation de l'orbite *B67.9+, H06.1**
- kystique
- - *B67.4*
- - Infection hépatique à Echinococcus granulosus [*B67.0*
- - sans précision Infection à Echinococcus granulosus [*B67.4*
- orbitaire *B67.9+, H06.1**
- osseuse kystique *B67.2+, M90.29**
- ostéomyélite *B67.2+, M90.29**
- pulmonaire kystique *B67.1+, J99.8**

Echinococcus granulosus echinococcose kystique
- Infection hépatique à *B67.0*
- sans précision , Infection à *B67.4*

Echinocoque
- alvéolaris, infection *B67.7*
- cysticus, infection *B67.4*
- granulosus
- - infection *B67.4*
- - - foie *B67.0+, K77.0**
- - - os *B67.2+, M90.29**
- - - poumon *B67.1+, J99.8**

Echinocoque *–suite*
- granulosus *–suite*
- - infection *–suite*
- - - thyroïde *B67.3+, E35.0**
- - kyste hydatique du foie *B67.0*
- infection sans précision *B67.9*
- - hépatique *B67.8+, K77.0**
- - kystique *B67.4*
- infestation *B67.4*
- - *B67.9*
- kyste *B67.9*
- maladie NCA *B67.4*
- multilocularis
- - infection *B67.7*
- - - hépatique *B67.5+, K77.0**
- - kyste hydatique du foie *B67.5*

Echinorhynchidae *B81.8*

Echinostoma ilocanum, infestation *B66.8*

Echinostomose *B66.8*

Echocardiogramme anormal *R93.1*

Echoencéphalogramme anormal *R90.8*

Echolalie *R48.8*

Echoué
- avortement *O07.9*
- - avec complications, par
- - - arrêt, coeur *O07.8*
- - - cautérisation, chimique, organes pelviens *O07.8*
- - - choc septique *O07.5*
- - - coagulation, intravasculaire *O07.6*
- - - collapsus, circulation *O07.8*
- - - déchirure, organes pelviens *O07.8*
- - - infection
- - - - bassin *O07.5*
- - - - organes génitaux *O07.5*
- - - - voies urinaires *O07.8*
- - - insuffisance rénale *O07.8*
- - - nécrose, tubulaire rénale *O07.8*
- - - perforation, organes pelviens *O07.8*
- - - salpingite *O07.5*
- - - Salpingo-Oophoritis *O07.5*
- - - syndrome de défibrination *O07.6*
- - - trouble, électrolytique *O07.8*
- - mort in utéro *O02.1*
- contractions, dû à
- - ocytocine *O61.0*
- - prostaglandines *O61.0*
- Introduction
- - avortement
- - - avec complications *O07.8*
- - - - dues à
- - - - - endométrite, *O07.5*
- - - - - infection, *O07.5*
- - - - - oophorite, *O07.5*
- - - - - paramétrite, *O07.5*
- - - - - pelvi-péritonite, *O07.5*
- - - - - afibrinogénémie, *O07.6*
- - - - - saignement fort, *O07.6*
- - - - - embolie, *O07.7*
- - - - - choc, *O07.8*
- - - - - oligurie, *O07.8*
- - - médical *O07.4*
- - naissance *O61.9*
- - - due à
- - - - oxytocine *O61.0*
- - - - prostaglandines *O61.0*
- - - instrumentale *O61.1*

Echoué –*suite*
- Introduction –*suite*
- - naissance –*suite*
- - - mécanique *O61.1*
- - - médicamenteuse *O61.0*
- - - opératoire *O61.1*
- intubation *T88.4*
- - couche *O89.6*
- - lors de l'accouchement *O74.7*
- - pendant la grossesse *O29.6*
- travail *O36.4*

Eckbom, syndrome de Wittmaack- *G25.8*

Eclampsie *O15.9*
- avec
- - césarienne *O15.0*
- - convulsions *O15.9*
- - délire *O15.9*
- - hypertension
- - - induite par la grossesse, NCA *O15.9*
- - - préexistante, NCA *O15.9*
- compliquant l'accouchement *O15.1*
- lors de
- - grossesse *O15.0*
- - naissance *O15.1*
- mère, avec préjudice sur foetus/nouveau né *P00.0*
- postpartum *O15.2*
- prériode néonatale *A33*
- suites de couches *O15.2*
- urémique *O15.0*

Eclamptique
- coma *O15.9*
- hypertension déjà préexistante à la grossesse *O11*
- toxicose *O15.9*
- urémie, lors de la grossesse *O15.0*

Eclatement, veinule(s) *D69.9*

Ecole
- difficultés scolaires *Z55*
- trouble du développement *F81.9*

Economique, problème *Z59*

Economo, maladie d' *A85.8+, G05.1**

Ecorceur d'érable (maladie de) (poumon d *J67.6*

Ecorchure, éraflure *T14.01*
- cuisse *S70.81*
- de multiples endroits *T00.9*
- dos de la main, petite *S60.81*
- tête *S00.91*

Ecoulement
- lacrymal, troubles *H04.5*
- liquide céphalorachidien
- - *G96.0*
- - après rachicentèse , *G97.0*
- liquide amniotique *O42.9*
- - avec accouchement retardé *O75.6*
- liquide céphalorachidien *G96.0*
- - après
- - - ponction lombaire *G97.0*
- - - ponction spinale *G97.0*
- - après ponction lombaire *G97.0*
- lymphatique, trouble *I89.8*
- oreille *H92.1*
- urétral *R36*

Ecrasement *T14.7*
- abdomen *S38.1*

Ecrasement –*suite*
- avant-bras *S57.9*
- avec
- - asphyxie *S28.0*
- - défaillance rénale *T79.5*
- avec ictère, néonatale *P58.0*
- bas de la jambe *S87.8*
- bassin *S38.1*
- bras *T04.2*
- cerveau *G93.5*
- cordon ombilical *O69.5*
- - avec lésion foetus/nouveau-né *P02.6*
- - comme complication, accouchement *O69.5*
- cou *S17.9*
- - séquellaire *T91.8*
- coude *S57.0*
- crâne *S07.1*
- creux axillaire *S47*
- cuir chevelu *S07.8*
- cuisse *S77.1*
- - avec écrasement de la hanche *S77.2*
- doigt *S67.0*
- - avec atteinte de la main *S67.8*
- épaule *S47*
- extrémité
- - inférieure *T04.3*
- - - multiples blessures *T04.3*
- - - séquellaire *T93.6*
- - supérieure *T04.2*
- - - multiples blessures *T04.2*
- - - séquellaire *T92.6*
- forme de crush *T14.7*
- genou *S87.0*
- gorge, et tête *T04.0*
- grave *T14.7*
- grave, lors d'un ensevelissement *T14.7*
- hanche *S77.0*
- - avec écrasement de la cuisse *S77.2*
- jambe *T04.3*
- joue *S07.0*
- larynx *S17.0*
- lésion superficielle *T14.05*
- lèvre (faciale) *S07.0*
- lèvre (génitale)
- - grande *S38.0*
- - petite *S38.0*
- main *S67.8*
- massif fessier *S38.1*
- multiples endroits (de) *T04.9*
- - extrémité
- - - inférieure du thorax et de
- - - - abdomen *T04.7*
- - - - bassin *T04.7*
- - - - région lombo-sacrée *T04.7*
- - - supérieure et extrémité inférieure *T04.4*
- - thorax et de
- - - abdomen *T04.1*
- - - bassin *T04.1*
- - - région lombo-sacrée *T04.1*
- nez *S07.0*
- oreille *S07.0*
- organes génitaux externes *S38.0*
- organes internes *T14.7*
- organes sexuels (ou génitaux)
- - féminins externes *S38.0*
- - masculins externes *S38.0*

Ecrasement –*suite*
- orteil(s) *S97.1*
- partie inférieure du dos *S38.1*
- partie supérieure de la cheville *S97.0*
- - avec atteinte du pied *S97.8*
- partie supérieure du bras *S47*
- paupière *S00.1*
- pénis *S30.2*
- pharynx *S17.8*
- pied *S97.8*
- poignet *S67.8*
- pouce *S67.0*
- - avec atteinte de la main *S67.8*
- région lombo-sacrée *S38.1*
- région scapulaire *S47*
- régions corporelles multiples et séquellaires *T94.0*
- reins *S37.01*
- scrotum *S30.2*
- séquellaire *T94.1*
- talon *S97.8*
- testicules *S30.2*
- tête *S07.9*
- - séquellaire *T90.8*
- thorax *S20.2*
- - *S28.0*
- - avec asphyxie traumatique NCA *S28.0*
- trachée *S17.0*
- tronc *T04.1*
- - avec localisations multiples *T04.1*
- - et des membres *T04.7*
- - séquellaire *T91.8*
- visage *S07.0*
- - séquellaire *T90.8*
- vulve *S30.2*

Ecriture
- capacité
- - retard, circonscrit *F81.1*
- - - sans trouble de la lecture *F81.1*
- - trouble, développement *F81.0*
- problème, dû à une éducation inadéquate *Z55*
- trouble
- - cas de trouble de la lecture *F81.0*
- - isolé *F81.1*

Ectasie
- aorte *I71.9*
- - rompue *I71.8*
- artère *I72.9*
- artère pulmonaire *I28.8*
- bassinet *N28.8*
- bronch-, congénitale *Q33.4*
- bronche *J47*
- canal galactophore *N60.4*
- canaliculaire précalicielle *Q61.5*
- canaux galactophores *N60.4*
- capillaire, rétine *H35.0*
- chyl- *I89.8*
- cornée *H18.7*
- - congénitale *Q13.4*
- estomac *K31.88*
- kérat- *H18.7*
- lymphangi- *I89.0*
- - postinfectieuse *I89.0*
- - pulmonaire, kystique, congénitale *Q33.8*
- - scrotum *I89.0+, N51.8**
- oesophage *K22.8*

Ectasie –*suite*

- phléb-, congénitale *Q27.4*
- plexus pampiniforme *I78.8*
- rein *N28.8*
- sclérotique *H15.8*
- tubulaire, précalicielle *Q61.5*
- uretère *N28.8*
- vaisseau capillaire *I78.8*
- vasculaire *I99*
- veineuse *I83.9*

Ecthyma *L08.0*
- contagiosum *B08.0*
- gangraenosum *L88*
- infectiosum *B08.0*
- simplex *L08.0*
- vulgaris *L08.0*

Ectocardie *Q24.8*

Ectodermique
- anomalie *Q82.9*
- dysplasie *Q82.4*
- - anhidrotique *Q82.4*
- - hidrotique *Q82.8*
- malformation, congénitale *Q82.9*
- syndrome, NCA *Q82.8*

Ectodermose érosive multi orificielle *L51.1*

Ectopie
- anus *Q43.5*
- cardiaque *Q24.8*
- cérébrale *Q04.8*
- col de l'utérus *N86*
- - avec hémorragie, atypique *N86*
- - chronique *N86*
- - congénitale *Q51.8*
- cristallin *Q12.1*
- cristalline
- - congénitale *Q12.1*
- - familiale *Q12.1*
- endomètre *N80.9*
- muqueuse gastrique *Q40.2*
- orifice urétéral *Q62.6*
- pancréas *Q45.3*
- pupillaire *Q13.2*
- pupille *Q13.2*
- - congénitale *Q13.2*
- pupille, acquise *H21.5*
- rein *Q63.2*
- rénale *Q63.2*
- rénale pelvienne *Q63.2*
- - congénitale *Q63.2*
- testicule *Q53.0*
- - bilatérale *Q53.0*
- - unilatérale *Q53.0*
- tissu mammaire *Q83.8*
- uretère *Q62.6*
- vésicale *Q64.1*
- vessie *Q64.1*
- viscérale *Q45.8*
- viscères abdominaux *Q45.8*
- - due à une anomalie de la paroi abdominale antérieure *Q79.5*

Ectopique
- cartilage intrapulmonaire *Q33.5*
- grossesse *O00.9*
- - avec rupture *O00.9*
- grossesse abdominale *O00.0*
- hyperinsulinisme *E16.1*
- kyste de l'endomètre *N80.9*

Ectopique –*suite*

- rythme *I49.8*
- sécrétion hormonale NCA *E34.2*
- systoles *I49.4*
- tachycardie atriale *I47.1*
- tissu glandulaire, avec sécrétion hormonale NCA *E34.2*
- tissu intrapulmonaire *Q33.5*
- tissu pulmonaire, congénital *Q33.5*
- tissu thyroïdien, avec hyperthyroïdie *E05.3*
- tumeur avec syndrôme de Cushing produisant de l'ACTH (adenocorticotrope hormone) *E24.3*

Ectrodactylie *Q73.8*
- doigts *Q71.8*
- orteil *Q72.8*

Ectromélie *Q73.8*
- membre *Q73.8*
- - inférieure *Q72.9*
- - supérieure *Q71.9*

Ectropion *H02.1*
- anal *K62.2*
- avec
- - cervicite *N72*
- - endocervicite *N72*
- - exocervicite *N72*
- cicatrice *H02.1*
- col de l'utérus *N86*
- congénital *Q10.1*
- érosion du col de l'utérus *N86*
- iris *H21.8*
- lèvre
- - acquise *K13.0*
- - congénitale *Q38.0*
- mécanique *H02.1*
- paralytique *H02.1*
- paupière *H02.1*
- sénile *H02.1*
- spastique *H02.1*
- suite à traumatisme *H02.1*
- urètre *N36.3*
- - *N36.8*
- uvée *H21.8*

Eczéma *L30.9*
- abrasion *L30.8*
- aigu *L30.9*
- - aux rayons ultraviolets *L56.8*
- aisselle *L30.9*
- allergique *L23.9*
- - infantile *L20.8*
- - intrinsèque *L20.8*
- anal *L30.9*
- anogénital *L30.9*
- assèchement *L30.8*
- associé à
- - candidose *B37.2*
- - goutte *M10.99+, L99.8**
- atopique
- - cuir chevelu *L20.8*
- - endogène *L20.9*
- - - généralisé *L20.9*
- - - impétiginisé *L20.9*
- - main *L20.8*
- - pied *L20.8*
- - visage *L20.8*
- avec allergie *L23.9*
- bactérien *L30.9*

Eczéma –*suite*

- boulanger *L25.4*
- - allergique *L23.6*
- - toxique *L24.6*
- boulangers *L25.4*
- - allergique *L23.6*
- - toxique *L24.6*
- champignons *B36.9*
- chez l'enfant
- - aigu *L20.8*
- - chronique *L20.8*
- chronique *L30.9*
- chronique récidivant *L30.9*
- conduit auditif *H60.5*
- contact
- - provoqué par
- - - aliment *L25.4*
- - - graisse *L24.1*
- - - huile *L24.1*
- - - médicament *L25.1*
- - - produit chimique *L25.3*
- - - végétaux *L25.5*
- - toxique *L24.9*
- contact, du aux solvants, organiques *L24.2*
- craquelé *L30.8*
- crevassé *L30.9*
- cruraie *L30.9*
- dégénératif *L30.8*
- dermite avec rhagade *L30.8*
- déshydratation *L30.8*
- dessiccation *L30.8*
- dishydrosique *L30.1*
- - *L30.9*
- dyshidrosiforme *L30.1*
- - main *L30.1*
- - - et pied *L30.1*
- - pied *L30.1*
- dyshidrosiforme, pied *L30.1*
- dysidrosique, doigt *L30.1*
- endogène *L20.9*
- - impétiginisé *L20.9*
- - infantile *L20.8*
- érythémateux *L30.9*
- étendu *L30.9*
- exsudatif *L30.8*
- frottement *L30.8*
- gale *B86*
- généralisé *L30.9*
- génital *L30.9*
- herpétique *B00.0*
- - Kaposi *B00.0*
- humidité *L30.9*
- hyperkeratique *L30.3*
- - rhagadiforme *L30.3*
- hyperkératosique *L30.8*
- hypostatique *I83.1*
- ichtyosiforme *L30.8*
- impétigo *L01.0*
- infantile *L20.8*
- inflammatoire *L30.9*
- intertrigineux infantile *L21.1*
- intertrigineux NCA *L30.4*
- intertrigo *L30.4*
- - infectieux *L30.4*
- intrinsèque *L20.8*
- irritation *L30.8*
- jambe *L30.9*

Eczéma –*suite*

- joue *L30.9*
- lichénifié NCA *L28.0*
- main *L30.9*
- - dyshidrosiforme *L30.1*
- - et pied, dyshidrosiforme *L30.1*
- marginé *B35.6*
- marginé de Hebra *B35.6*
- microbien *L30.3*
- mycosique *B36.9*
- narine *L30.9*
- niveau des plis de flexion NCA *L20.8*
- nummulaire *L30.0*
- ombilical *L20.8*
- - chez l'enfant *L20.8*
- oreille *H60.5*
- - externe *H60.5*
- palpébral *H01.1*
- papuleux *L30.8*
- paupière *H01.1*
- pavillon de l'oreille *H60.5*
- peau *L30.9*
- périanal *L30.9*
- périoral *L71.0*
- - surinfecté *L30.3*
- perlèche *L30.9*
- photoallergique *L56.8*
- plantaire *L30.9*
- plis de flexion infantile *L20.8*
- post-scabieux, due à gale sarcoptique *B86*
- professionnel *L25.9*
- - provoqué par
- - - aliment *L24.6*
- - - détergent *L24.0*
- - - détergents *L24.0*
- - - graisse *L24.1*
- - - médicament *L24.4*
- - - médicaments *L24.4*
- - - plante *L24.7*
- - - produit alimentaire *L24.6*
- - - produit chimique *L24.5*
- - - solvant organique *L24.2*
- - - végétaux *L24.7*
- provoqué par
- - aliment ingéré *L27.2*
- - candida *B37.2*
- - chaleur *L59.0*
- - contact *L25.9*
- - détergents *L24.0*
- - graisse *L24.1*
- - lessive *L24.0*
- - médicament *L27.0*
- - produit chimique *L25.3*
- - radiothérapie *L59.8*
- - rayon infrarouge *L59.8*
- - savon *L24.0*
- - solvant organique *L24.2*
- - sparadrap *L23.1*
- - végétaux *L25.5*
- prurigineux *L30.8*
- pustuleux *L30.3*
- récidivant *L30.9*
- rubrum *L30.9*
- scabieux *B86*
- scrotum *L30.9*
- séborrhéique *L21.9*
- - chez l'enfant *L21.1*

Eczéma –*suite*

- sébostatique *L30.8*
- sec *L30.8*
- solaire, dû à une exposition au soleil *L56.4*
- squameux *L30.9*
- stase *I83.1*
- surinfecté *L30.3*
- tête *L30.9*
- - séborrhoïde *L21.0*
- thrombocytopénie, et déficit immunitaire *D82.0*
- toxique *L24.9*
- traumatique *L30.4*
- tylosique *L30.3*
- - rhagadiforme *L30.3*
- vaccination *T88.1*
- vagin *L30.9*
- variqueux *I83.1*
- - cas de
- - - varices *I83.1*
- - - - avec ulcère *I83.2*
- - - varices des membres inférieurs, sans ulcère ou inflammation *I83.9*
- - surinfectée *I83.1*
- vésiculeux *L30.8*
- visage *L30.9*
- vulve *N76.88*
- - pustuleux *N76.88*

Eczémateux
- dermite NCA *L30.9*
- - infectieuse *L21.9*
- - paupière *H01.1*
- otite externe *H60.8*
- - aiguë *H60.5*
- teigne de la main *B35.2*
- trouble psychogène *F45.8*

Eczématide *L30.2*

Eczématisé
- gale *B86*
- mycose *B36.9*
- psoriasis *L40.8*

Eczématoïde *L30.2*
- dermite *L30.3*
- dessiccation *L30.3*
- séborrhéique *L21.9*

Eczématoide(s) craquelé(e)(s) *L30.3*

Edenté, édentée
- bord alvéolaire, atrophie *K08.2*
- crête alvéolaire
- - hyperplasie, irritation *K06.2*
- - maladie *K06.9*
- - occlusion, traumatique *K06.2*

Education
- avec problème *Z62*
- difficultés d' *Z63*
- institution (en -) *Z62*
- insuffisante *Z55*
- sexuelle *Z70*

Edwards, syndrome d' *Q91.3*

Effet
- anormal *T75.8*
- anormal d'un médicament NCA *T88.7*
- anormal d'une anesthésie *T88.5*
- apesanteur *T75.8*
- chaleur *T67.9*

Effet –*suite*

- chaleur (conditions météorologiques) *T67.9*
- courant électrique *T75.4*
- drogues NCA *T88.7*
- d'un gaz toxique *T59.9*
- d'une émanation de fumée toxique *T59.9*
- faim *T73.0*
- fluides à haute pression *T70.4*
- forces de gravitation anormales *T75.8*
- foudre *T75.0*
- froid *T69.9*
- indésirable (de)
- - cobalt radioactif *T66*
- - fluoroscopie NCA *T66*
- - isotope radioactif NCA *T66*
- - mésothorium NCA *T66*
- - polonium NCA *T66*
- - radioactivité NCA *T66*
- - radiothérapie NCA *T66*
- - rayons infra-rouges NCA *T66*
- - rayons ultra-violets NCA *T66*
- - télé-roentgenthérapie NCA *T66*
- - thérapie par rayonnement NCA *T66*
- - uranium NCA *T66*
- indésirable de mouvements (mal des transports) *T75.3*
- indésirable d'une force de pesanteur exceptionnellement forte *T75.8*
- l'altitude
- - haute altitude NCA *T70.2*
- - - oreille (barotraumatisme) *T70.0*
- - - sinus (barotraumatisme) *T70.1*
- l'apesanteur *T75.8*
- lieux trop chauds *T67.9*
- nocif de la soif *T73.1*
- non mortels, dus au courant électrique *T75.4*
- nuisible
- - radium NCA *T66*
- - rayonnments NCA *T66*
- - retombées radioactives NCA *T66*
- - substances radioctives NCA *T66*
- - télé-roentgenthérapie NCA *T66*
- pression atmosphérique *T70.9*
- - élevée *T70.3*
- - raison d'une explosion *T70.8*
- pression de l'eau NCA *T70.9*
- psycho-social, lié à l'emploi *Z56*
- rayonnements nocifs NCA *T66*
- secondaire NCA *T78.9*
- - androgène *T88.7*
- - anti-androgène *T88.7*
- - antidiabétique *T88.7*
- - anti-ovulation *T88.7*
- - antithyroidie *T88.7*
- - ant-oestrogène *T88.7*
- - cas de
- - - anestésie NCA *T88.5*
- - - anésthésie, péridurale *T88.5*
- - - anesthésie, spinale *T88.5*
- - Chimiothérapie *T88.7*
- - Chlormadinone *T88.7*
- - contraceptif oral *T88.7*
- - cyprotérone *T88.7*
- - déhydroépiandrostérone *T88.7*
- - desogestrel *T88.7*
- - estradiol *T88.7*

Effet *–suite*
- secondaire NCA *–suite*
- - estrone *T88.7*
- - ethinyl-estradiol *T88.7*
- - glucocorticoïde *T88.7*
- - insuline *T88.7*
- - médicamenteux, avec trouble du rythme cardiaque *T46.9*
- - nocif *T78.9*
- - non souhaité *T78.9*
- - - à
- - - - drogues, conforme aux indications, en cas de mauvaise administration *T88.7*
- - - - médication, conforme aux indications, en cas de mauvaise administration *T88.7*
- - - médicament, clarification *Z03.6*
- - nortestostérone *T88.7*
- - ocytocine *T88.7*
- - oestrogène *T88.7*
- - oxytocique *T88.7*
- - progestagène *T88.7*
- - progestérone *T88.7*
- - sulfate de déhydroépiandrostérone *T88.7*
- - tamoxifène *T88.7*
- toxique (de)
- - 1-butanol *T51.3*
- - 1-propanétriol (glycérine) *T65.5*
- - 1-propanol *T51.3*
- - 2-propanétriol *T65.5*
- - 2-propanol *T51.2*
- - 3-propanétriol *T65.5*
- - acide chlorhydrique *T54.2*
- - acide cyanhydrique *T57.3*
- - acide sulfurique *T54.2*
- - alccol *T51.9*
- - alcool amylique *T51.3*
- - alcool butylique *T51.3*
- - alcool isopropylique *T51.2*
- - alcool méthylique *T51.1*
- - alcool propylique *T51.3*
- - aminobenzène *T65.3*
- - aniline *T65.3*
- - baies ingérées *T62.1*
- - benzène *T52.1*
- - cétones *T52.4*
- - champignons ingérés *T62.0*
- - chlore gazeux *T59.4*
- - chlorofluorocarbures *T53.5*
- - chloroforme *T53.1*
- - chlorure de méthylène *T53.4*
- - contact
- - - avec des anémones de mer *T63.6*
- - - avec des crustacés *T63.6*
- - - avec des étoiles de mer *T63.6*
- - - avec des méduses *T63.6*
- - cyanure *T65.0*
- - détergents *T55*
- - dichlorométhane *T53.4*
- - diméthylbenzène *T52.2*
- - dioxyde de carbone *T59.7*
- - dioxyde de soufre *T59.1*
- - essence *T52.0*
- - éthanol *T51.0*
- - éther de pétrole *T52.0*
- - fluor à l'état gazeux *T59.5*
- - fluorure d'hydrogène *T59.5*

Effet *–suite*
- toxique (de) *–suite*
- - fongicides *T60.3*
- - formaldéhyde *T59.2*
- - gaz lacrymogène *T59.3*
- - gaz propulseurs des bombes aérosol *T59.8*
- - glycols *T52.3*
- - herbicides *T60.3*
- - homologues du benzène *T52.2*
- - homologues du phénol *T54.0*
- - huile de fusel *T51.3*
- - huile de paraffine *T52.0*
- - hydroxide de potassium *T54.3*
- - hydroxyde de sodium *T54.3*
- - insecticides halogénés *T60.1*
- - kérosène *T52.0*
- - métaux *T56.9*
- - méthanol *T51.1*
- - méthylbenzène *T52.2*
- - monoxyde de carbone *T58*
- - morsures d'insectes venimeux *T63.4*
- - nicotine *T65.2*
- - nitrobenzène *T65.3*
- - oxydes d'azote *T59.0*
- - paraffine *T52.0*
- - perchloréthylène *T53.3*
- - phénol *T54.0*
- - piqûres d'insectes venimeux *T63.4*
- - plantes nocives *T62.2*
- - produits dérivés du pétrole *T52.0*
- - produits protecteurs du bois *T60.9*
- - rodenticides *T60.4*
- - savons *T55*
- - sels de strychnine *T65.1*
- - strychnine *T65.1*
- - substances
- - - chimiques NCA *T65.9*
- - - corrosives *T54.9*
- - - ingérées, mise en observation pour clarification *Z03.6*
- - sulfure de carbone *T65.4*
- - sulfure d'hydrogène *T59.6*
- - tabac *T65.2*
- - tétrachloréthylène *T53.3*
- - tétrachloroéthène *T53.3*
- - tétrachlorométhane *T53.0*
- - tétrachlorure de carbone *T53.0*
- - thallium *T60.4*
- - toluène *T52.2*
- - trichloréthylène *T53.2*
- - trichloroéthène *T53.2*
- - trichlorométhane *T53.1*
- - trinitrate *T65.5*
- - trinitrotoluène *T65.3*
- - vapeurs métalliques *T56.8*
- - venin d'amphibien *T63.8*
- - venin d'araignée *T63.3*
- - venin de lézard *T63.1*
- - venin de scorpion *T63.2*
- - venin de serpent *T63.0*
- - venin de serpent marin *T63.0*
- - xylène *T52.2*
- toxique de la fumée *T59.9*
- toxique dû à l'ingestion d'aliments, empoisonnement *T62.9*
- vibrations *T75.2*

Efflorescence
- cutanée *R21*
- herpès *B00.0*
- non spécifique *R21*

Efflorescence *–suite*

Efflorescence acnéique *L70.9*

Effluvium *L65.9*
- anagène *L65.1*
- capitis *L65.9*
- diffus *L65.9*
- post- partum *L65.0*
- télogène *L65.0*

Effort
- excessif *T73.3*
- - avec épuisement *T73.3*
- - lésions *T73.3*
- - oculaire NCA *H53.1*
- - périostose *M77.9*
- excessif avec épuisement *T73.3*
- spontanément réductible
- - Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l ' *K64.1*
- - réintroduction manuelle possible , Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l ' *K64.2*
- syndrome d' *F45.37*

Effusion uvéale, syndrome *H33.2*

Egouttement urinaire, constant *R32*

Ehler-Danlos, maladie d' *Q79.6*

Ehrlichiose granulocytaire humaine [EGH] *A28.8*

Eisenmenger Malformation cardiaque congénital d ' *Q21.88*

Eisenmenger, complexe d' *I27.8*

Ejaculation
- déficiente *N50.8*
- douleureuse, psychogène *F52.6*
- douloureuse *N48.8*
- précoce *F52.4*
- retardée *F52.3*
- rétrograde *F52.8*
- troubles *F52.8*

Elastofibrome *D21.9*

Elastoïdose
- cutanée *L57.4*
- sénile *L57.4*

Elastome *Q82.8*
- juvénile *Q82.8*
- Lutz-Miescher *L87.2*
- perforant *L87.2*

Elastomyofibrose *I42.4*

Elastose
- actinique NCA *L57.4*
- actinique sénile *L57.4*
- atrophiante sénile *L57.4*
- par le rayonnement solaire NCA *L57.8*
- perforante serpigineuse *L87.2*
- sénile *L57.4*

Electif
- agalactie *O92.50*
- césarienne, accouchement *O82*
- mutisme *F94.0*
- - avec réaction d'adaptation *F94.0*
- opération *Z41.9*

Electricité
- choc *T75.4*
- secousse *T75.4*

Electrocardiogramme [ECG], anormal *R94.3*

Electrocardiogramme ECG, anormal *R94.3*

Electrochoc *T75.4*

Electrocution *T75.4*

Electroencéphalogramme [EEG], anormal *R94.0*

Electrolyte
- altération *E87.8*
- - avec trouble hydrique *E87.8*
- - dans l'hyperémèse gravidique *O21.1*
- - transitoire chez le nouveau-né *P74.4*
- carence *E87.8*
- déséquilibre *E87.8*
- trouble métabolique *E87.8*

Electromyogramme [EMG] anormal *R94.1*

Electronique
- stimulateur cardiaque, complication *T82.9*
- stimulateur urinaire, complication *T83.9*
- stimulateur vésical
- - infection *T83.5*
- - inflammation *T83.5*

électronique Présence dispositif cardiaque *Z95.0*

électroniques Adaptation manipulation Autre dispositif cardiaque (*Z45.08*

Electro-oculogramme [EOG] anormal *R94.1*

Electrophysiologique, exploration intrac *R94.3*

Electrorétinogramme [ERG] anormal *R94.1*

Electrosensibilité *Z58*

Eléments nutritionnels
- apport, excessif NCA *E67.8*
- carence *E61.9*

Elephantiasis *I89.0*
- congénitale héréditaire *Q82.0*
- consécutive à
- - intervention chirurgicale *I97.8*
- - mastectomie *I97.2*
- glandulaire *I89.0*
- héréditaire congénitale *Q82.0*
- italica *E52*
- lymphangiectasique *I89.0*
- non filarien *I89.0*
- paupière *H02.8*
- pavillon de l'oreille *Q17.8*
- pénis *I89.0*
- provoquée par
- - Brugia timori *B74.2*
- - Wuchereria malayi *B74.1*
- scrotum *I89.0+, N51.8**
- télangiectasique *I89.0*
- testicule *I89.0*
- vulve *N90.8*

Elévation ST, infarctus sans *I21.4*

Elève en internat *Z59*

Elevé(e)
- tension artérielle *I10.90*
- - essentielle primitive *I10.90*
- - mesure unique, sans hypertension *R03.0*
- - sans diagnostic d'hypertension, observation annexe *R03.0*
- - secondaire *I15.90*

Elimination

Elimination *–suite*
- artère
- - pulmonaire anormale *Q25.7*
- - rénale, anormale *Q27.2*
- - sous-clavière, anormale *Q25.8*
- artère coronaire, anormale *Q24.5*
- calcul rénal *N20.0*
- calcul urinaire *N20.9*
- calcul vésical *N21.0*
- calculs d'oxalate de calcium *N20.9*
- gaz intestinaux, surplus *R14*
- méconium intra-utérin *P20.9*
- microlithiase rénale *N20.0*
- microlithiase urinaire *N20.9*
- selles *R15*
- transépidermique, anormale *L87.9*
- tronc brachiocéphalique, anormal *Q25.8*

Elliptocytes, anémie *D58.1*

Elliptocytose *D58.1*
- congénitale *D58.1*
- due à une infection des cellules falciformes *D57.8*
- hémoglobine *D58.1*
- héréditaire *D58.1*
- - cellules falciformes *D57.8*
- - hémoglobine C *D58.1*

Ellis-van-Creveld, syndrome de *Q77.6*

Elongation
- calice rénal *Q63.8*
- cas d'hypertrophie
- - col utérin *N88.4*
- col de l'utérus *N88.4*
- ligament *T14.3*
- - articulation tibiotarsienne *S93.40*
- ligament croisé *M23.89*
- sigmoïdienne *Q43.8*
- symphyse pubienne, au cours de la grossesse *O26.7*

Elschnig, syndrome de *Q10.3*

Elucidation
- constatation médicale *Z71*
- ordonnance *Z71*
- résultat de l'examen médical *Z71*

Email
- caries *K02.0*
- dystrophie *K00.3*
- hypoplasie *K00.4*
- - postnatale *K00.4*
- - prénatale *K00.4*
- lésion, via rayons artificiels *K03.8*
- opacité *K00.3*
- - due au fluor *K00.3*
- - non due au fluor *K00.3*
- perle *K00.2*
- taches *K00.3*

Emancipation, conflit *Z73*

Embadomonas
- entérite *A07.8*
- infestation *A07.8*

Embarrure crânienne *S02.9*

Embolie
- *I74.9*
- amniotique *O88.1*
- aorte *I74.1*
- - abdominale *I74.0*

Embolie *–suite*
- aorte *–suite*
- - thoracique *I74.1*
- aorte abdominale *I74.0*
- artère
- - auditive interne *I65.8*
- - axillaire *I74.2*
- - basiliaire *I65.1*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.1*
- - brachiales *I74.2*
- - carotide *I65.2*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.1*
- - cérébelleuse *I66.3*
- - cérébrale *I66.9*
- - - antérieures *I66.1*
- - - moyenne *I66.0*
- - - postérieure *I66.2*
- - cérébrale, avec infarctus, cerveau *I63.4*
- - choroidienne *I66.8*
- - communicante postérieure *I66.8*
- - coronaire *I21.9*
- - - sans infartcus du myocarde *I24.0*
- - distales *I74.4*
- - extracrânienne, relié au cerveau *I65.9*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.1*
- - fémorale *I74.3*
- - - commune *I74.3*
- - hypophysaire *I66.8*
- - iliaque *I74.5*
- - - externe, artérielle *I74.5*
- - intestin, avec gangrène *K55.0*
- - intracrânienne, avec infarctus, cérébral *I63.4*
- - jambe *I74.3*
- - labyrinthique *I65.8*
- - membres
- - - inférieurs *I74.3*
- - - supérieurs *I74.2*
- - mésentérique *K55.0*
- - - avec gangrène *K55.0*
- - - supérieure *K55.0*
- - ophtalmique *H34.2*
- - perforante, avec infarctus cérébral *I63.4*
- - périphérique NCA *I74.4*
- - pontine *I66.8*
- - poplitée *I74.3*
- - précérébrale *I65.9*
- - pulmonaire *I26.9*
- - radiales, artérielle *I74.2*
- - rénale *N28.0*
- - rétinienne *H34.2*
- - splénique *I74.8*
- - vertébrale *I65.0*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.1*
- artérielle *I74.9*
- athéromateuse *T79.1*
- athérome *T79.1*
- avant bras, artérielle *I74.2*
- bras *I74.2*
- - artérielle *I74.2*
- caillot sanguin
- - accouchement *O88.2*
- - grossesse *O88.2*
- capillaire *I78.8*
- cardiaque *I21.9*
- - sans infartcus du myocarde *I24.0*
- cas de

Embolie –*suite*
- cas de –*suite*
- - accouchement *O88.2*
- - avortement, médical, échoué *O07.2*
- - tumeur *C80*
- cerveau *I66.9*
- - cas de
- - - accouchement *O88.2*
- - - grossesse *O88.2*
- - couche *O88.2*
- complication, en cas d'avortement échoué *O07.7*
- complications, naissance *O88.2*
- couche *O88.2*
- crosse aortique *I74.0*
- due prothèse implant greffe de l ' appareil génito - urinaire , *T83.8*
- due à
- - air *T79.0*
- - - cas de
- - - - accouchement *O88.0*
- - - - grossesse *O88.0*
- - - couche *O88.0*
- - - pendant la gestation *O88.0*
- - - suite à
- - - - injection thérapeutique *T80.0*
- - - - transfusion *T80.0*
- - - traumatique *T79.0*
- - appareil
- - - éléctronique, dans les voies urinaires *T83.8*
- - - implant ou greffe
- - - - gastro-intestinale *T85.88*
- - - - orthopédique NCA *T84.8*
- - - système nerveux, stimulateur électronique *T85.81*
- - cathéter de dialyse *T82.8*
- - cathéter de perfusion NCA *T82.8*
- - cathéter NCA *T85.88*
- - cathéter spinal *T85.81*
- - cathéter urinaire *T83.8*
- - cathéter, de dialyse péritonéale *T85.88*
- - cholestérine *T79.1*
- - cristaux de cholestérine *I74.9*
- - - après intervention *T81.7*
- - fixation orthopédique interne NCA *T84.8*
- - gaz *T79.0*
- - implant cardiaque *T82.8*
- - implant mammaire *T85.88*
- - liquide amniotique *O88.1*
- - - complications, naissance *O88.1*
- - - couche *O88.1*
- - prothèse articulaire *T84.8*
- - prothèse cardiaque *T82.8*
- - prothèse orbitaire NCA *T85.88*
- - Prothèse vasculaire *T82.8*
- - shunt intracrânien ventriculaire *T85.88*
- - transplantation cardiaque *T82.8*
- - transplantation de la cornée NCA *T85.88*
- en selle
- - aorte *I74.0*
- - bifurcation de l'aorte *I74.0*
- et thrombose
- - artère illiaque *I74.5*
- - artères distales *I74.4*
- - jambe *I80.3*

Embolie –*suite*
- et thrombose –*suite*
- - veine cave *I82.2*
- fémorale *I74.3*
- fémur inférieur *I80.3*
- - artérielle *I74.3*
- - bilatérale *I80.3*
- fémur supérieur, artérielle *I74.3*
- fourche aortique *I74.0*
- gazeuse *T79.0*
- - couche *O88.0*
- - lors de
- - - accouchement *O88.0*
- - - grossesse *O88.0*
- - suite à
- - - injection thérapeutique *T80.0*
- - - intervention *T81.7*
- - - transfusion *T80.0*
- - traumatique *T79.0*
- graisseuse
- - coeur *I21.9*
- - couche *O88.8*
- - lors de l'accouchement *O88.8*
- - pendant la grossesse *O88.8*
- - pendant les suites de couches *O88.8*
- - rein *N28.0*
- - traumatique *T79.1*
- hypophyse *E23.6*
- intracrânienne *I66.9*
- jambe *I80.3*
- - artérielle *I74.3*
- membres *I74.4*
- - inférieurs *I80.3*
- - supérieurs *I74.2*
- méninges *I66.8*
- mésentérique *K55.0*
- micro- *I82.9*
- - cérébrale *I63.4*
- - rétinienne *H34.2*
- moelle osseuse *T79.8*
- multiple NCA *I74.9*
- oeil *H34.2*
- ophtalmique *H34.2*
- paradoxe NCA *I74.9*
- pendant la grossesse *O88.2*
- pénis *N48.8*
- périphérique, artérielle *I74.4*
- pied, artérielle *I74.3*
- poumons *I26.9*
- - artérielle *I26.9*
- - avec mention de coeur pulmonaire, aiguë *I26.0*
- - cas de
- - - grossesse *O88.2*
- - - naissance *O88.2*
- - couche *O88.2*
- - fulminante *I26.0*
- - massive *I26.0*
- - non massive *I26.9*
- - postopératoire *I26.9*
- - sans mention de coeur pulmonaire, aiguë *I26.9*
- pulmonaire
- - obstétricale *O88.20*
- pyohémique *A41.9*
- - couche *O88.3*
- - due à
- - - pneumocoques *A40.3*

Embolie –*suite*
- pyohémique –*suite*
- - due à –*suite*
- - - pneumocoques –*suite*
- - - - avec pneumonie *J13*
- - - staphylocoques *A41.2*
- - - streptocoques *A40.9*
- - lors de la grossesse *O88.3*
- - pendant la gestation *O88.3*
- - suite à
- - - avortement *O08.2*
- - - grossesse extra-utérine *O08.2*
- - - grossesse môlaire *O08.2*
- rachis *G95.1*
- - purulente *G06.1*
- rénale *N28.0*
- - bilatérale massive *N28.0*
- rétine *H34.2*
- selle
- - aorte *I74.0*
- - bifurcation de l'aorte *I74.0*
- septique *I74.9*
- - cas de
- - - accouchement *O88.3*
- - - grossesse *O88.3*
- - couche *O88.3*
- sinus veineux
- - intracrânien *G08*
- - - non purulente *I67.6*
- - intrarachidienne *G08*
- - - non purulente *G95.1*
- - septique
- - - intracranienne *G08*
- - - intrarachidienne *G08*
- sous contraceptif *I74.9*
- suite à
- - avortement *O08.2*
- - grossesse extra-utérine *O08.2*
- thrombo- *I74.9*
- - artère *I74.9*
- - couche *O88.2*
- - pendant la gestation *O88.2*
- - suite à une injection thérapeutique ou à une transfusion *T80.1*
- thrombose
- - Autre veine précisé , *I82.88*
- - veine splénique *I82.80*
- vaisseau cérébral *I66.9*
- veine *I82.9*
- - cave *I82.2*
- - cérébrale *I67.6*
- - coronaire *I21.9*
- - - sans infartcus du myocarde *I24.0*
- - fémorale *I80.1*
- - hépatique *I82.0*
- - intestin, avec gangrène *K55.0*
- - intraspinale, non purulente *G95.1*
- - membre, inférieur *I80.3*
- - mésentérique *K55.0*
- - - avec gangrène *K55.0*
- - porte *I81*
- - rénale *I82.3*
- - septique
- - - intracrânienne *G08*
- - - intrarachidienne *G08*

Embolique
- abcès *L02.9*
- - cérébral *G06.0*

Embolique –*suite*
- abcès –*suite*
- - cerveau *G06.0*
- - moelle épinière *G06.1*
- apoplexie *I63.4*
- - artère
- - - cérébrale extracrânienne *I63.1*
- - - intracrânienne *I63.4*
- encéphalite focale *G04.2*
- encéphalomalacie *I63.4*
- endartérite *I74.9*
- hémiplégie, en cours (de survenue actuelle) (en tant qu'événement d'apparition actuelle) *I63.4, G81.9*
- infarctus *I74.9*
- - cérébelleux *I63.4*
- - cérébral *I63.4*
- - médullaire aigu *G95.1*
- - pulmonaire *I26.9*
- - splénique *I74.8*
- monoplégie, en cours (de survenue actuelle) (en tant qu'événement d'apparition actuelle) *I63.4, G83.3*
- occlusion *I74.9*
- - artère périphérique *I74.4*
- paralysie *I63.4*
- pneumonie *I26.9+, J17.8**
- tétraplégie, en cours (de survenue actuelle) (en tant qu'événement d'apparition actuelle) *I63.4, G82.52*
- trouble cérébro-vasculaire *I66.9*

Embouchure, anomalie
- veine porte *Q26.5*
- veine pulmonaire
- - partielle *Q26.3*
- - totale *Q26.2*

Embryo-fœtopathie due à l'hydantoïne *Q86.1*

Embryome (de)
- foie *C22.0*
- rein *C64*
- testicule *C62.9*
- - descendu *C62.1*
- - non descendu *C62.0*

Embryonnaire
- adénocarcinome *C80*
- adénome *D36.9*
- adénorhabdomyosarcome rénal *C64*
- adénosarcome rénal [tumeur de Wilms] *C64*
- carcinome *C80*
- - foie *C22.7*
- cataracte *Q12.0*
- cataracte nucléaire *Q12.0*
- hépatome *C22.0*
- kyste
- - col utérin *Q51.6*
- - hymen *Q52.4*
- - ligament large de l'utérus *Q50.5*
- - trompe de Fallope *Q50.4*
- - utérus *Q51.8*
- - vaginal *Q52.4*
- liposarcome *C49.9*
- néphroblastome *C64*
- rhabdomyosarcome *C49.9*
- sarcome *C49.9*
- tératome *C80*
- - foie *C22.7*
- - ovaire, malin à cellules immatures *C56*

Embryonnaire –*suite*
- tumeur *D48.9*
- - cellules germinales, à *C80*
- - foie *C22.7*
- tumeur mixte, foie, maligne *C22.0*

Embryopathie *Q86.8*
- due thalidomide *Q86.80*
- provoquée par
- - alcool *Q86.0*
- - - avec dysmorphie *Q86.0*
- - antiépileptiques *Q86.1*
- - cause exogène NCA *Q86.8*
- - rubéole *P35.0*
- - virus *P35.9*
- - warfarine *Q86.2*

Embryopathie rubéoleuse *P35.0*

Embryotoxon *Q13.4*
- postérieur *Q13.4*

Emétiques, intoxication *T47.7*

Emotion, psychopathie *F94.2*
- pendant l'enfance *F94.2*

Emotionnel-le (affectif-ve)
- attention
- - perte dans la petite enfance *T74.3*
- - perte NCA *Z65*
- cécité *F44.6*
- choc *R45.7*
- crise *F43.2*
- - lors de
- - - réaction aiguë à facteur de stress *F43.0*
- - - trouble de l'adaptation *F43.2*
- - spécifique
- - - adolescence *F93.8*
- - - enfance *F93.8*
- facteur, trouble du sommeil dû à *F51.9*
- labilité *R45.8*
- labilité (instabilité) exagérée *F60.30*
- labilité, trouble organique *F06.6*
- malentendance *F44.6*
- maltraitance, enfant *T74.9*
- maux de tête *F45.4*
- négligence dans l'enfance *Z62*
- personnalité instable *F60.30*
- perturbation, avec trouble de l'adaptation en société *F43.2*
- polyglobulie *D75.1*
- stress *R45.7*
- - excitation réactionnelle, avec *F30.8*
- stress, avec confusion réactionnelle *F44.88*
- surdité *F44.6*
- symptomatique (symptômes)
- - trouble de l'adaptation, lors de *F43.2*
- - trouble du comportement social, lors de *F92.8*
- trouble (perturbation) *F39*
- - avec trouble du comportement, chez l'enfant et l'adolescent *F98.9*
- - chez l'adolescent *F98.9*
- - l'identité avec hyperanxiété, chez l'enfant *F93.8*
- - lors de
- - - angoisse de séparation chez l'enfant *F93.0*
- - - anxiété sociale chez l'enfant *F93.2*
- - - réaction aiguë à un facteur de stress *F43.0*

Emotionnel-le (affectif-ve) –*suite*
- trouble (perturbation) –*suite*
- - lors de –*suite*
- - - trouble du comportement social *F92.8*
- - - - chez l'enfant *F92.8*
- - persistant *F34.9*
- - personnalité, labile, type impulsif *F60.30*
- - spécifique chez l'enfant *F93.9*
- - - avec
- - - - anxiété *F93.8*
- - - - rivalité dans la fratrie *F93.3*

Emotivité pathologique *F60.30*

Emphysémateux-se
- bronchite chronique *J44.89*
- - avec
- - - exacerbation aiguë *J44.19*
- - - infection aiguë des voies respiratoires inférieures *J44.09*
- cholécystite aiguë *K81.0*
- - sans lithiase *K81.0*

Emphysème *J43.9*
- après intervention chirurgicale *T81.8*
- asthmatique *J43.9*
- asthmatique, entraînant une bronchite *J44.89*
- atrophique *J43.9*
- bulleux *J43.9*
- centrolobulaire *J43.2*
- chez la personne âgée *J43.9*
- chronique *J43.9*
- - inhalation de substance chimique *J68.4*
- cicatriciel *L90.5*
- compensatoire *J98.3*
- conjonctive *H11.8*
- déficit en alpha-1-antitrypsine *E88.0*
- diffus, dû à inhalation de substance chimique *J68.4*
- entraînant une obstruction des voies respiratoires *J43.9*
- interlobulaire *J43.9*
- interstitiel *J98.2*
- - chez le nouveau-né *P25.0*
- - congénital *P25.0*
- médiastinal *J98.2*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P25.2*
- obstructif *J43.9*
- orbital *H05.8*
- panacinaire *J43.1*
- panlobulaire *J43.1*
- paupière *H02.8*
- - après intervention chirurgicale *T81.8*
- - d'origine traumatique *T79.7*
- personne âgée *J43.9*
- - associé à une bronchite *J44.89*
- provoqué par
- - fumée *J68.4*
- - gaz *J68.4*
- - inhalation de substance chimique *J68.4*
- - produit chimique *J68.4*
- pulmonaire *J43.9*
- - bulleux *J43.9*
- - chronique *J43.9*
- - dépistage *Z13.8*
- - entraînant une bronchite *J44.89*
- - non obstructif *J43.9*

Emphysème –*suite*
- pulmonaire, chez le foetus/nouveau-né *P25.8*
- sénile *J43.9*
- - entraînant une bronchite *J44.89*
- souffleurs de verre *J43.9*
- sous-cutané
- - après intervention chirurgicale *T81.8*
- - d'origine traumatique *T79.7*
- sous-cutané d'origine traumatique *T79.7*
- sous-cutané, après intervention chirurgicale *T81.8*
- thoracique *J43.9*
- tissu conjonctif
- - après intervention chirurgicale *T81.8*
- - d'origine traumatique *T79.7*
- tuberculeux *A16.2*
- unilatéral *J43.0*
- vésiculaire *J43.9*

Empiétement, syndrome, épaule *M75.4*

Emplâtre de catharides, dermatite de con *L23.1*

Empoisonnement
- accidentel *X49.9!*
- au rauwolfia alcaloïdes *T46.5*

Emprisonnement, suite à une condamnation *Z65*

Empyème *J86.9*
- apophyse mastoïde *H70.0*
- - aigu *H70.0*
- articulaire *M00.99*
- articulation métatarsophalangienne du gros orteil *M00.97*
- bilatéral *J86.9*
- cérébral *G06.0*
- chronique du sinus maxillaire *J32.0*
- coude *M00.92*
- épaule *M00.91*
- épigastre *K65.0*
- extra-dural *G06.2*
- genou *M00.96*
- pleural *J86.9*
- plèvre *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*
- - tuberculeux *A16.5*
- sinus ethmoïdal *J32.2*
- - aigu *J01.2*
- - chronique *J32.2*
- sinus frontal *J32.1*
- - aigu *J01.1*
- - chronique *J32.1*
- sinus maxillaire *J32.0*
- - aigu *J01.0*
- - chronique *J32.0*
- sinus paranasal *J32.9*
- - aigu *J01.9*
- - chronique *J32.9*
- - complet, aigu *J01.4*
- sinus sphénoïdal *J32.3*
- - aigu *J01.3*
- - chronique *J32.3*
- sous-arachnoïdien *G06.2*
- sous-diaphragmatique *J86.9*
- sous-dural *G06.2*
- thoracique *J86.9*
- tuberculeux *A16.5*

Empyème –*suite*
- tuberculeux –*suite*
- - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.6*
- uretère *N28.8*
- ventriculaire *G06.0*
- vésicule biliaire *K81.0*
- - sans lithiase *K81.0*
- vésicule séminale *N49.0*

Enanthème viral *B09*

Encéphale (voir cerveau)

Encéphale, anomalie *Q04.3*

Encéphale, gliome *C71.9*

Encéphalie
- cycl- *Q04.9*
- liss- *Q04.3*
- mégal- *Q04.5*
- por- *Q04.6*

Encéphalite *G04.9*
- aiguë, disséminée *G04.0*
- après
- - immunisation *G04.0*
- - infection varicelleuse *B01.1+, G05.1**
- - vaccination contre la variole *G04.0*
- australienne *A83.4*
- avec parkinsonisme secondaire *G21.3*
- Californie *A83.5*
- chorio- *A87.2+, G05.1**
- - aiguë *A87.2+, G05.1**
- - lympocytaire *A87.2+, G05.1**
- - - séreuse aiguë *A87.2+, G05.1**
- - séreuse *A87.2+, G05.1**
- chronique *G04.9*
- complication de vaccination *G04.0*
- congénitale toxoplasmique *P37.1+, G05.2**
- Dawson *A81.1*
- démyélinisante *G37.9*
- démyélinisante disséminée *G35.9*
- disséminée *G04.0*
- due à
- - adénovirus *A85.1+, G05.1**
- - arbovirus NCA *A85.2*
- - arthropodes NCA *A85.2*
- - cryptocoques *B45.1+, G05.2**
- - entérovirus *A85.0+, G05.1**
- - Herpes-simiae virus (virus herpès simien) *B00.4+, G05.1**
- - méningocoques *A39.8+, G05.0**
- - plomb *T56.0*
- - poliovirus *A80.9+, G05.1**
- - tiques *A84.9*
- - virus *A86*
- - - aiguë *A86*
- - - dépistage *Z11*
- - - séquelle *B94.1*
- - - transmis par
- - - - arthropodes *A85.2*
- - - - - nécesssité de vaccination contre, *Z24.1*
- - - - moustiques *A83.9*
- - - - tiques *A84.9*
- - virus de Rocio *A83.6*
- - virus Ilhéus *A83.8*
- - virus Langat *A84.8*
- - virus Mengo *A85.8*
- - virus Negishi *A85.2*
- Economo von *A85.8+, G05.1**

Encéphalite –*suite*
- endémique *A86*
- épidémique NCA *A86*
- équine
- - occidentale *A83.1*
- - orientale *A83.2*
- équine occidentale *A83.1*
- équine orientale *A83.2*
- estivale *A84.1*
- Europe centrale *A84.1*
- Extrême-Orient, transmise par la tique *A84.0*
- fausse *G04.9*
- focale *G04.2*
- - disséminée *G04.2*
- - embolique *G04.2*
- hémorragique *G04.9*
- herpétique *B00.4+, G05.1**
- idiopathique *G04.9*
- inclusions *A81.1*
- japonaise *A83.0*
- léthargique (von Economo-Cruchet) (épidémique) *A85.8+, G05.1**
- leuco- *G04.8*
- - hémorragique aiguë post-immunisation *G04.0*
- - post-infectieuse *G04.8*
- - sclérosante subaiguë (panencéphalite sclérosante subaiguë) *A81.1*
- lors de
- - actinomycose *A42.8+, G05.0**
- - cryptococcose *B45.1+, G05.2**
- - cytomégalie *B25.88+, G05.1**
- - grippe [Influenza] *J11.8+, G05.1**
- - - virus de la grippe aviaire identifié *J09*
- - - virus Influenza identifié, à l'exclusion du virus de la grippe aviaire *J10.8+, G05.1**
- - herpes zoster *B02.0+, G05.1**
- - listériose *A32.1+, G05.0**
- - lupus erythémateux systémique *M32.1+, G05.8**
- - maladie
- - - due au VIH *B22+, G05.1**
- - - parasitaire NCA *B89+, G05.2**
- - oreillons *B26.2+, G05.1**
- - rougeole *B05.0+, G05.1**
- - rubéole *B06.0+, G05.1**
- - syphilis congénitale *A50.4+, G05.0**
- - syphilis tardive *A52.1+, G05.0**
- - torulose *B45.1+, G05.2**
- - toxoplasmose *B58.2+, G05.2**
- - trichinose *B75+, G05.2**
- - tuberculose *A17.8+, G05.0**
- - varicelle *B01.1+, G05.1**
- Louping ill *A84.8*
- lympocytaire *A87.2+, G05.1**
- méningo- *G04.9*
- - à
- - - adénovirus *A85.1+, G05.1**
- - - Haemophilus influenza *G04.2, B96.3!*
- - - herpesvirus *B00.4+, G05.1**
- - - Listeria *A32.1+, G05.0**
- - - Listeria monocytogenes *A32.1+, G05.0**
- - - parastrongylus cantonensis, angiostrongylus *B83.2+, G05.2**
- - - pneumocoque *G04.2, B95.3!*
- - - staphylocoque *G04.2, B95.8!*

Encéphalite –*suite*
- méningo- –*suite*
- - à –*suite*
- - - streptocoque *G04.2, B95.5!*
- - - toxoplasme *B58.2+, G05.2**
- - - virus *A86*
- - aiguë NCA *A86*
- - bactérienne NCA *G04.2*
- - biphasique *A84.1*
- - éosinophiles *B83.2+, G05.2**
- - épidémique *A39.8+, G05.0**
- - infectieuse *A86*
- - lors de
- - - herpès *B00.4+, G05.1**
- - - oreillons *B26.2+, G05.1**
- - lymphocytaire *A87.2+, G05.1**
- - parasitaire NCA *B89+, G05.2**
- - syphilitique *A52.1+, G05.0**
- - toxique NCA *G92*
- - tuberculeuse *A17.8+, G05.0**
- - verno-estivale *A84.1*
- - virale *A86*
- méningo-, verno-estivale
- - Europe Centrale *A84.1*
- - russe *A84.0*
- myélo- *G04.9*
- non épidémique *G04.9*
- otogène NCA *H66.4+, G05.8**
- pan- *A81.1*
- périaxiale *G37.0*
- - concentrique *G37.5*
- - diffuse *G37.0*
- polio- *A80.9*
- - bulbaire *A80.9*
- - myélite, bulbaire *A80.9*
- post-infectieuse NCA *G04.8*
- post-traumatique *G04.9*
- post-vaccinale *G04.0*
- post-virale NCA *A86*
- Powassan *A84.8*
- purulente *G04.8*
- Rio Bravo *A85.8*
- russe verno-estivale *A84.0*
- Saint Louis *A83.3*
- Saint-Louis *A83.3*
- saturnine *T56.0*
- séquelle tardive *G09*
- séquelles *G09*
- subaiguë *G04.9*
- syphilitique *A52.1+, G05.0**
- syphilitique congénitale tardive *A50.4+, G05.0**
- syphilitique tardive *A52.1+, G05.0**
- taïga transmise par des tiques *A84.0*
- tchécoslovaque *A84.1*
- toxique NCA *G92*
- type C *A83.3*
- type viennois *A85.8*
- verno-estivale (estivo-printannière) (d'Europe Centrale) transmise par la tique *A84.1*
- virale
- - aiguë *A86*
- - infectieuse NCA *A86*
- virus lent *A81.9*
- Wiener, type *A85.8*

Encéphalitique, démence *G04.9*

Encéphalocèle *Q01.9*

Encéphalocèle –*suite*
- frontale *Q01.0*
- hydro- *Q01.9*
- - congénitale *Q01.9*
- lors de
- - absence congénitale, os du crâne *Q01.9*
- - anomalie, os du crâne *Q01.9*
- - déformation, os du crâne *Q01.9*
- - fermeture incomplète, os du crâne *Q01.9*
- - hypoplasie, os du crâne *Q01.9*
- - malformation crânienne congénitale *Q01.9*
- méningo-, syphilitique *A52.1+, G94.8**
- naso-frontale *Q01.1*
- occipitale *Q01.2*

Encéphalo-cutanée, angiomatose *Q85.8*

Encéphalomalacie *G93.88*
- artérioscléreuse *I63.8*
- blanche *I63.9*
- cérébelleuse *G93.88*
- cérébrale *G93.88*
- congénitale *Q04.8*
- embolique *I63.4*
- hémorragique *I61.9*
- nécrotique *G93.88*
- occlusive *I63.5*
- progressive *G93.88*
- thrombotique *I63.3*

Encéphalo-méningite *G04.9*

Encéphalo-méningocèle *Q01.9*
- hydro- *Q01.9*
- - congénitale *Q01.9*

Encéphalo-méningo-myélite *G04.9*

Encéphalo-méningopathie *G96.9*

Encéphalomyélite *G04.9*
- à
- - adénovirus *A85.1+, G05.1**
- - entérovirus *A85.0+, G05.1**
- - herpès zoster *B02.0+, G05.1**
- - herpesvirus simien *B00.4+, G05.1**
- - varicelle *B01.1+, G05.1**
- aiguë *G04.0*
- complication de vaccination *G04.0*
- démyélinisante aiguë [ADEM] *G37.8*
- démyélinisante disséminée *G35.9*
- disséminée *G35.9*
- disséminée aiguë *G04.0*
- disséminée aiguë post-infectieuse *G04.0*
- lors de
- - infection à cytomégalovirus *B25.88+, G05.1**
- - infection à Naegleria *B60.2+, G05.2**
- - maladie due au VIH *B22+, G05.1**
- - oreillons (ourlienne) *B26.2+, G05.1**
- - rougeole (morbilleuse) *B05.0+, G05.1**
- - rubéole *B06.0+, G05.1**
- - syphilis congénitale *A50.4+, G05.0**
- - syphilis tardive *A52.1+, G05.0**
- - toxoplasmose *B58.2+, G05.2**
- louping ill *A84.8*
- méningo-
- - à
- - - Cryptococcus neoformans (Torula histolytica) *B45.1+, G05.2**

Encéphalomyélite –*suite*
- méningo- –*suite*
- - à –*suite*
- - - Haemophilus influenza *G04.2, B96.3!*
- - aiguë NCA *A86*
- - estivale *A84.1*
- - lors d'actinomycose *A42.8+, G05.0**
- - proto-estivale (du début de l'été) *A84.1*
- - virale NCA *A86*
- myalgique *G93.3*
- - épidémique *G93.3*
- - postinfectieuse *G93.3*
- myalgique bénigne *G93.3*
- myxobolus cerebralis *A84.8*
- - ovine *A84.8*
- périaxiale sclérotique disséminée *G35.9*
- polio- *A80.9*
- post-immunisation *G04.0*
- post-infectieuse NCA *G04.8*
- post-vaccinale *G04.0*
- séquelle tardive *G09*
- séquelles *G09*
- syphilitique *A52.1+, G05.0**
- virale *A86*
- - infectieuse *A86*

Encéphalomyélocèle *Q01.9*

Encéphalo-myéloneuropathie *G96.9*

Encéphalo-myélopathie *G96.9*
- nécrosante *G31.88*
- - subaiguë [Morbus Leigh] *G31.88*

Encéphalo-myéloradiculite *G61.0*
- aiguë *G61.0*

Encéphalo-myéloradiculopathie *G96.9*

Encéphalopathie *G93.4*
- aiguë *G93.4*
- alcoolique *G31.2*
- anoxique *G93.1*
- après coma hypoglycémique *E16.1+, G94.8**
- athéroscléreuse *I67.2*
- avec démence *G93.4+, F02.8**
- bilirubinémique *P57.9*
- Binswanger *I67.3*
- démyélinisante du corps calleux *G37.1*
- due à
- - coma hypoglycémique *E16.1+, G94.8**
- - hyperinsulisme *E16.1+, G94.8**
- - plomb *T56.0*
- - toxoplasme *B58.2+, G05.2**
- - traumatisme obstétrical *P11.1*
- - vaccination préventive (prophylactique) *T80.6*
- hépatique *K72.9, K72.79!*
- hépato- *K72.9, K72.79!*
- hyperbilirubinémique
- - chez le nouveau-né *P57.9*
- - - iso-immunisation *P57.0*
- - iso-immunisation *P57.0*
- hypertensive *I67.4*
- hypoglycémique *E16.1+, G94.8**
- hypoxique *G93.1*
- hypoxique ischémique, chez les nouveaux-nés *P91.6*
- hypoxique-ischémique chez le nouveau -né *P91.6*

Encéphalopathie –*suite*
- infarctus multiples *I63.9*
- leuco-
- - après immunisation *G04.0*
- - métachromatique *E75.2*
- limbique paranéoplasique *D48.9+, G13.1**
- lors de
- - carence
- - - vitamine *E56.9+, G32.8**
- - - vitamine B NCA *E53.9+, G32.8**
- - grippe [Influenza] *J11.8+, G94.8**
- - - virus Influenza démontré, à l'exclusion du virus de la grippe aviaire *J10.8*
- - lupus érythémateux *M32.1+, G05.8**
- - maladie VIH *B22+, G94.8**
- - néoformation NCA *D48.9+, G13.1**
- mésencéphale NCA *G93.88*
- myoclonique précoce *G40.4*
- naso-frontale *Q01.1*
- nécrosante subaiguë *G31.88*
- par infarctus multiples *I63.9*
- pellagreuse *E52+, G32.8**
- porto-cave *K72.9, K72.79!*
- post-contusionnelle *F07.2*
- - aiguë *S06.20*
- post-radique *G93.88*
- saturnine *T56.0*
- spongiforme subaiguë *A81.0*
- syphilitique *A52.1+, G94.8**
- toxique *G92*
- traumatique *F07.2*
- - aiguë *S06.0*
- traumatique des boxeurs *F07.2*
- urémique *N18.89+, G94.8**
- vasculaire *I67.9*
- - sous-corticale progressive *I67.3*
- Wernicke *E51.2+, G32.8**
- - chez l'enfant *E51.2+, G32.8**

Encéphalotrigéminée, angiomatose *Q85.8*

Enchevêtrement, cordon ombilical
- avec lésion, foetus *P02.5*
- compliquant l'accouchement *O69.2*

Enchondral-e (endochondral)
- croissance osseuse, retard de *M89.29*
- dysostose *E76.0*

Enchondromatose *Q78.4*
- cartilagineuse *Q78.4*
- multiple *Q78.4*

Enchondrome malin *C41.9*

Enchondromes multiples congénitaux *Q78.4*

Enclume
- absence
- - acquise *H74.3*
- - congénitale *Q16.3*
- agénésie *Q16.3*
- fracture *S02.1*

Encoché
- et non encoché, lymphome, à grandes cellules *C83.3*
- langue *K14.8*
- lymphome
- - diffus *C83.1*
- - folliculaire *C82.0*
- - - grandes cellules, à *C82.2*

Encoché –*suite*
- lymphome –*suite*
- - folliculaire –*suite*
- - - mixte à petites et grandes cellules *C82.1*
- - - petites cellules *C82.0*
- - grandes cellules, à *C83.3*
- - petites cellules *C83.1*
- lymphome non hodgkinien
- - folliculaire
- - - mixte à petites et grandes cellules *C82.1*
- - - petites cellules *C82.0*

Encoprésie *R15*
- fonctionnelle *F98.1*
- non organique *F98.1*
- psychogène *F98.1*

Endartérite *I77.6*
- bactérienne *I77.6*
- cérébrale *I67.7*
- - syphilitique *A52.0+, I68.1**
- cérébrospinale *I67.7*
- déformante *I70.9*
- embolique *I74.9*
- infectieuse *I77.6*
- oblitérante *I70.9*
- - pulmonaire *I28.8*
- - vasculaire, syphilitique *A52.0+, I68.1**
- rétinienne *H35.0*
- sénile *I70.9*
- septique *I77.6*
- subaiguë *I77.6*
- syphilitique *A52.0+, I79.8**
- - congénitale *A50.5+, I79.8**
- tuberculeuse *A18.8+, I79.8**
- type Buerger *I73.1*

Endémique
- agrandissement, thyroïde *E01.2*
- brucellose *A23.9*
- crétinisme *E00.9*
- - hypothyroïdien *E00.1*
- - type mixte *E00.2*
- - type myxoedémateux *E00.1*
- - type neurologique *E00.0*
- diarrhée *A09*
- encéphalite *A86*
- érythème *E52*
- funiculite *N49.1*
- - tuberculeuse *A18.1+, N51.8**
- goître *E01.2*
- - adénomateux *E01.1*
- - colloïde *E01.0*
- - diffus *E01.0*
- - hyperplasique *E01.2*
- - kystique *E01.1*
- - lié à carence iode *E01.2*
- - multinodulaire *E01.1*
- - nodulaire *E01.1*
- - nodulaire simple *E01.1*
- - parenchymateux *E01.2*
- - simple *E01.2*
- goître multinodulaire non toxique *E01.1*
- néphropathie chronique *N15.0*
- néphropathie des Balkans *N15.0*
- névrite *E51.1+, G63.4**
- poliomyélite *A80.9*
- polynévrite *E51.1+, G63.4**
- thyroïde adénomateuse kystique *E01.1*

Endémique –*suite*
- typhus *A75.0*

Endobronchite *J40*

Endocardique (endocarde)
- adhérence *I31.0*
- affection (atteinte) (maladie)
- - chronique *I38*
- - rhumatismale *I09.1*
- atteinte, au cours de syphilis *A52.0+, I39.8**
- fibroélastose *I42.4*
- fibrose *I38*
- gonorrhée *A54.8+, I39.8**
- hémorragie *I51.8*
- infection à méningocoque *A39.5+, I39.8**
- lipoïdose *E75.6*
- stéatose *I51.5*
- thrombose *I21.9*
- - sans infarctus myocardique consécutif *I24.0*
- tuberculose *A18.8+, I39.8**

Endocardite *I38*
- aiguë *I33.9*
- aortique
- - active, avec affection de la valvule mitrale, avec chorée *I02.0*
- - aiguë, avec affection de la valvule mitrale, avec chorée *I02.0*
- - artérioscléreuse *I35.8*
- - avec
- - - atteinte (de)
- - - - valvule mitrale *I08.0*
- - - - - et atteinte de la valvule tricuspide, *I08.3*
- - - - valvule tricuspide *I08.2*
- - - fièvre rhumatismale inactive *I06.9*
- - non rhumatismale *I35.8*
- - rhumatismale *I06.9*
- - - active *I01.1*
- - - - avec
- - - - - atteinte de la valvule mitrale, *I01.1*
- - - - - atteinte de la valvule mitrale, avec chorée, *I02.0*
- - - - - chorée, *I02.0*
- - - aiguë *I01.1*
- - - - avec
- - - - - atteinte de la valvule mitrale, *I01.1*
- - - - - atteinte de la valvule mitrale, avec chorée, *I02.0*
- - - - - chorée, *I02.0*
- - - avec atteinte de la valvule mitrale et de la valvule tricuspide *I08.3*
- - streptocoques *I33.0, B95.5!*
- - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- - tuberculeuse *A18.8+, I39.1**
- artérioscléreuse *I38*
- atteinte de plusieurs valvules *I08.9*
- bactérienne *I33.0*
- - aiguë *I33.0*
- - subaiguë *I33.0*
- - - avec
- - - - atteinte glomérulaire *I33.0+, N08.8**
- - - - glomérulonéphrite *I33.0+, N08.0**
- cardiaque *I38*
- chronique *I38*
- congénitale *I42.4*

Endocardite –*suite*

- entraînant
- - candidose *B37.6+, I39.8**
- - chorée rhumatismale *I02.0*
- - fièvre Q *A78+, I39.8**
- - fièvre rhumatismale *I01.1*
- - - inactive *I09.1*
- - lupus érythémateux *M32.1+, I39.8**
- - polyarthrite rhumatoïde
- - - aiguë *I01.1*
- - - subaiguë *I01.1*
- - polyarthrite séropositive, chronique *M05.30+, I39.8**
- - typhus *A01.0+, I39.8**
- foetale *I42.4*
- infectieuse *I33.0*
- - aiguë *I33.0*
- - avec
- - - arthrite *I33.0+, M03.69**
- - - arthropathie *I33.0+, M03.69**
- - - - réactionnelle *I33.0+, M03.69**
- - subaiguë *I33.0*
- lente *I33.0*
- - aiguë *I33.0*
- - subaiguë *I33.0*
- Loeffler *I42.3*
- maladie de Libman-Sacks *M32.1+, I39.8**
- maligne *I33.0*
- - aiguë *I33.0*
- - subaiguë *I33.0*
- mitrale *I05.9*
- - active, avec
- - - atteinte de la valvule aortique, avec chorée *I02.0*
- - - chorée *I02.0*
- - aiguë *I01.1*
- - - avec
- - - - atteinte de la valvule aortique, avec chorée *I02.0*
- - - - chorée *I02.0*
- - artérioscléreuse *I34.88*
- - avec
- - - atteinte (de)
- - - - valvule aortique *I08.0*
- - - - valvule tricuspide *I08.1*
- - - fièvre rhumatismale, inactive *I05.9*
- - bactérienne *I33.0*
- - non rhumatismale *I34.88*
- - tuberculeuse *A18.8+, I39.0**
- mycosique *I33.0*
- myo- *I38*
- - aiguë *I33.9*
- - subaiguë *I33.9*
- non bactérienne *I38*
- pariétale fibroplasique de Löffler *I42.3*
- - avec hyperéosinophilie *I42.3*
- péri-
- - aiguë *I33.9*
- - subaiguë *I33.9*
- prophylaxie (de) *Z29.2*
- - antibiotique *Z29.2*
- provoquée par
- - Aspergillus *B44.8+, I39.8**
- - Candida *B37.6+, I39.8**
- - Coxiella burnetii *A78+, I39.8**
- - gonocoques *A54.8+, I39.8**
- - Listeria *A32.8+, I39.8**
- - méningocoques *A39.5+, I39.8**

Endocardite –*suite*

- provoquée par –*suite*
- - pneumocoques *I33.0, B95.3!*
- - prothèse valvulaire *T82.6*
- - streptocoques *I33.0, B95.5!*
- - valve aortique artificielle *T82.6*
- - virus Coxsackie *B33.2+, I39.8**
- pulmonaire
- - artérioscléreuse *I37.8*
- - avec fièvre rhumatismale, inactive *I09.8*
- - chronique *I37.8*
- - non rhumatismale
- - - active *I33.9*
- - - aiguë *I33.9*
- - rhumatismale *I09.8*
- - - active *I01.1*
- - - aiguë *I01.1*
- - - - avec chorée *I02.0*
- - - subaiguë *I01.1*
- - - - avec chorée *I02.0*
- - syphilitique *A52.0+, I39.3**
- - tuberculeuse *A18.8+, I39.3**
- purulente *I33.0*
- rhumatismale *I09.1*
- - active, avec chorée *I02.0*
- - aiguë *I01.1*
- - - avec chorée *I02.0*
- - chronique *I09.1*
- - subaiguë, avec chorée *I02.0*
- septique *I33.0*
- - aiguë *I33.0*
- - subaiguë *I33.0*
- subaiguë *I33.9*
- syphilitique NCA *A52.0+, I39.8**
- thrombotique *I38*
- toxique *I33.9*
- tricuspide *I07.8*
- - active, avec chorée *I02.0*
- - aiguë *I01.1*
- - - avec chorée *I02.0*
- - artérioscléreuse *I36.8*
- - avec
- - - atteinte (de)
- - - - valvule aortique *I08.2*
- - - - valvule mitrale *I08.1*
- - - fièvre rhumatismale, inactive *I07.8*
- - non rhumatismale *I36.8*
- - - aiguë *I33.9*
- - - subaiguë *I33.9*
- - tuberculeuse *A18.8+, I39.2**
- tuberculeuse *A18.8+, I39.8**
- ulcérative *I33.0*
- ulcéreuse *I33.0*
- - aiguë *I33.0*
- - subaiguë *I33.0*
- ulcéropolypoïde *I33.0*
- valvulaire *I38*
- végétative *I33.0*
- verruqueuse
- - atypique *M32.1+, I39.8**
- - non rhumatismale *M32.1+, I39.8**

Endocervicite *N72*

- aiguë *N72*
- avec
- - ectropion *N72*
- - érosion *N72*
- chronique *N72*

Endocervicite –*suite*

- due à dispositif intra-utérin [DIU] *T83.6*
- hyperplasique *N72*

Endocol

- cancer *C53.0*
- infection *N72*

Endocrinienne - *voir* Type de maladie

Endogène

- anorexie *F50.0*
- asthme *J45.1*
- - bronchique non allergique *J45.1*
- bronchite asthmatique *J45.9*
- bronchopneumopathie lipidique *J84.8*
- croûte de lait *L20.8*
- dépression *F33.2*
- - réactionnelle sans symptôme psychotique *F33.2*
- - récidivante sans symptôme psychotique *F33.2*
- - sans symptôme psychotique *F33.2*
- eczéma *L20.9*
- - impétiginé *L20.9*
- - infantile *L20.8*
- hyperglycidémie lors d'hypercholestérolémie *E78.2*
- hypertriglycéridémie *E78.1*
- - hypercholestérolémie, lors de *E78.2*
- iridocyclite *H20.0*
- manie unipolaire *F30.9*
- obésité *E66.89*
- ochronose *E70.2*
- pneumonie lipidique *J84.8*
- psychose *F29*

Endolymphatique

- hydrops *H81.0*
- myose stromale *D39.0*

Endomètre

- abcès *N71.9*
- atrophie sénile *N85.8*
- atypique *N85.9*
- calcification *N85.8*
- carcinome in situ *D07.0*
- dysfonctionnement *N85.8*
- ectopique *N80.9*
- hyperplasie *N85.0*
- - adénomateuse *N85.1*
- - atypique *N85.1*
- - col utérin *N87.9*
- - dans les antécédents personnels *Z87.4*
- - glandulaire *N85.0*
- - glandulo-kystique *N85.0*
- - kystique *N85.0*
- - polypoïde *N85.0*
- hypertrophie
- - atypique *N85.1*
- - glandulaire *N85.0*
- hypoplasie *N85.8*
- inflammatoire *N71.9*
- kyste *N85.8*
- - ectopique *N80.9*
- polype *N84.0*
- - *O34.1*
- post-ménopausique *N95.8*
- - atrophe *N95.8*
- - purulent *N71.9*
- rétention, saignement *O72.2*
- synéchie *N85.6*
- tuberculose *A18.1+, N74.1**

Endomètre, diagnostic suspect *N85.9*
Endométrial
- nodule *D26.1*
- nodule de stroma *D26.1*
- sarcome, isthme de l'utérus *C54.0*
- stromatose *D39.0*

Endométrioïde
- adénocarcinome
- - chez la femme *C56*
- - chez l'homme *C61*
- adénofibrome *D27*
- - limite de la malignité *D39.1*
- - malin *C56*
- adénome *D36.9*
- cystadénocarcinome
- - chez la femme *C56*
- - chez l'homme *C61*
- cystadénofibrome *D27*
- - limite de la malignité *D39.1*
- - malin *C56*

Endométriose *N80.9*
- après avortement *O08.8*
- cicatrice *N80.6*
- cutanée *N80.6*
- - cicatrice *N80.6*
- Douglas (cul-de-sac de) *N80.3*
- génitale *N80.8*
- - externe *N80.8*
- - interne *N80.8*
- intestinale *N80.5*
- museau de tanche *N80.0*
- ombilicale *N80.8*
- ovarienne *N80.1*
- pelvienne *N80.3*
- péritoine pelvien *N80.3*
- rectale *N80.8*
- septum recto-vaginal *N80.4*
- stromale *D39.0*
- trompe de Fallope *N80.2*
- utérine *N80.0*
- - externe *N80.0*
- - interne *N80.0*
- utérus *N80.0*
- vaginale *N80.4*
- vessie *N80.8*

Endométriosique, kyste *N85.8*

Endométrite *N71.9*
- aiguë *N71.0*
- associée à
- - échec d'avortement médical *O07.0*
- - grossesse *O23.5*
- atrophique sénile *N71.9*
- chez la mère, avec affection sur foetus/nouveau-né *P00.8*
- Chlamydia *A56.1+, N74.4**
- chronique *N71.1*
- col utérin *N72*
- compliquant l'échec d'un avortement provoqué *O07.5*
- consécutive à
- - avortement *O08.0*
- - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - grossesse môlaire *O08.0*
- déciduale, lors de la grossesse *O41.1*
- gonococcique *A54.2+, N74.3**
- - aiguë *A54.2+, N74.3**
- - chronique *A54.2+, N74.3**
- hyperplasique *N85.0*
- non puerpérale *N71.9*

Endométrite *–suite*
- post-partum *O85*
- puerpérale *O85*
- purulente *N71.9*
- septique *N71.9*
- subaiguë *N71.0*
- tuberculeuse *A18.1+, N74.1**
- - avec stérilité d'origine utérine *N97.2*

Endométrium
- affection *N93.8*
- - hémorragique *N93.8*
- inflammation *N71.9*
- - aigue *N71.0*
- - catarrhale *N71.9*
- - cervicale *N72*
- - chronique *N71.1*
- - hémorragique *N71.9*
- - septique *N71.9*
- post-ménopause *N95.8*
- - atrophique *N95.8*
- - purulent *N71.9*

Endomyocardique
- fibroélastose *I42.4*
- fibrose *I42.3*
- - tropicale *I42.3*
- maladie, éosinophilique *I42.3*

Endomyocardite *I38*

Endomyofibrose *I42.3*

Endomyométrite *N71.9*
- aiguë *N71.0*
- chronique *N71.1*

Endo-nasal, -le
- abcès *J34.0*
- saignements *R04.0*

Endo-ostéophyte *M25.79*

Endopéricardite *I38*

Endopérinévrite *G58.9*

Endophlébite *I80.9*
- porte *K75.1*
- septique
- - intracrânienne *G08*
- - intrarachidienne *G08*
- sinus veineux
- - intracrânienne *G08*
- - septique
- - - intracrânienne *G08*
- - - intrarachidienne *G08*

Endophtalmie *H44.0*

Endophtalmite *H44.1*
- aiguë *H44.1*
- associée à
- - cysticercose *B69.1+, H45.1**
- - parasitose à Toxocara *B83.0+, H45.1**
- bactérienne *H44.0*
- gonococcique *A54.3+, H45.1**
- infectieuse *H44.1*
- métastatique *H44.1*
- mycosique *H44.1*
- parasitaire NCA *H44.1*
- purulente *H44.0*
- septique *H44.0*
- stérile *H44.1*
- subaiguë *H44.1*
- sympathique *H44.1*
- virale *H44.1*
- virus lentogène *H44.1*

Endoprothèse
- hernie *T84.0*
- orthopédique, avec complication *T84.9*
- totale, articulation coxo-fémorale, désinsertion des cotyles [EPT-hanche] *T84.0*
- totale, articulation de la hanche *T84.0*
- totale, avec complications *T84.9*

Endosalpingiome *D28.2*

Endosalpingite *N70.9*
- aiguë *N70.0*
- chronique *N70.1*

Endothélial(e)
- dystrophie
- - héréditaire congénitale *Q13.4*
- - irido-cornéo-endothélial [syndrome ICE] *H21.8*
- - - avec glaucome secondaire *H40.5*
- myélome *C41.9*

Endothéliomateux, méningiome *D32.9*

Endothéliome *C49.9*
- angio-
- - bénin *D18.00*
- - osseux *C41.9*
- - système nerveux, bénin *D18.08*
- diffus [sarcome d'Ewing] *C41.9*
- hémangio- *D48.1*
- - bénin *D18.00*
- - diffus, osseux *C41.9*
- - malin *C49.9*
- - système nerveux, bénin *D18.00*
- lymphangio- *D18.19*
- - malin *C49.9*
- lympho- *D18.19*
- réticulo- *C83.3*
- vasculaire, bénin *D18.00*

Endothéliose *D69.8*
- hémorragique infectieuse *D69.8*
- réticulo-
- - leucémique *C91.40*
- - - rémission complète *C91.41*

Endothélium, dysfonctionnement, par care *D68.0*

Endotoxique, choc *R57.8*
- post-opératoire *T81.1*

Endovasculite oblitérante du placenta *O43.8*

Energie, diminution *R68.8*

Energie, malnutrition *E46*

Enfant
- mère diabétique Syndrome de l ' *P70.1*
- myxoedème *E03.9*
- psychose atypique *F84.1*
- Réaction de peu, anormale *F93.1*
- schizophrénie *F84.5*
- tête
- - malformation, pendant la naissance *P13.1*
- - non engagée, obstruction à la naissance *O64.8*
- Troubles de l'humeur *F91.8*

Enfant battu, syndrome *T74.1*

Enfant mort né, syndrome *P95*

Enfant né après terme *P08.2*

Enfant trouvé *Z76.1*
- prise en charge *Z76.1*

Enfant v. maladie courante

Engelures *T69.1*

Engman, maladie d' *L30.3*

Engman, syndrome de Zinsser-Cole- *Q82.8*

Engorgement du sein chez le nouveau-né *P83.4*

Enophtalmie *H05.4*
- pseudo- *H05.4*

Enostose *M84.89*

Enregistrement
- greffe
- - cardiaque
- - - avec
- - - - niveau d'urgence
- - - - - U, *U55.11*
- - - - - HU, *U55.12*
- - - sans niveau d'urgence U ni HU *U55.10*
- - coeur, poumons
- - - avec
- - - - niveau d'urgence
- - - - - U, *U55.31*
- - - - - HU, *U55.32*
- - - sans niveau d'urgence U ni HU *U55.30*
- - foie, avec
- - - niveau d'urgence
- - intestin grêle
- - - niveau d'urgence HU *Z75.76*
- - - sans niveau d'urgence HU *Z75.66*
- - pancréas
- - - niveau d'urgence HU *Z75.75*
- - - sans niveau d'urgence HU *Z75.65*
- - poumons
- - - avec
- - - - niveau d'urgence
- - - - - U, *U55.21*
- - - - - HU, *U55.22*
- - - sans niveau d'urgence U ni HU *U55.20*
- - reins
- - - niveau d'urgence HU *Z75.70*
- - - sans niveau d'urgence HU *Z75.60*
- - reins, pancréas
- - - niveau d'urgence HU *Z75.74*
- - - sans niveau d'urgence HU *Z75.64*

Enrouement *R49.0*
- entraînant une laryngite *J04.0*

Enroulement, cordon ombilical
- avec lésion foetus *P02.5*
- complications, accouchement *O69.2*
- gorge, avec compression du cordon ombilical *O69.1*

Entaille *T14.1*
- avec corps étranger, pénétrant *T14.1*
- cardiaque, traumatique *S26.88*
- - avec hémopéricarde *S26.0*
- multiples *T01.9*

Entamibiase (Entamoeba histolytica)
- abcès, foie *A06.4*
- hépatite *A06.4*
- infection - *voir aussi* amibiase ou voir aussi maladie due aux amibes *A06.9*

Entérique, hyperémie *K59.8*

Entérite *K52.9*
- aiguë *A09*
- - avec exsiccose *A09, E86*
- - par les amibes *A06.0*

Entérite *–suite*
- amibienne
- - aiguë *A06.0*
- - chronique *A06.1*
- amibienne non dysentérique *A06.2*
- associée à
- - candidose *B37.88*
- - cytomégalovirus *B25.80+, K93.8**
- - gangrène gazeuse *A48.0*
- - grippe *J11.8*
- - - virus de la grippe aviaire identifié *J09*
- - - virus grippal identifié, sauf celui de la grippe aviaire *J10.8*
- avec arthrite NCA *A09+, M01.89**
- bacillaire NCA *A03.9*
- bactérienne NCA *A04.9*
- chez le nourrisson *A09*
- - avec exsiccose *A09, E86*
- chronique *K52.9*
- - amibienne *A06.1*
- colon *K50.1*
- diarrhéique *A09*
- diététique *K52.2*
- épidémique *A09*
- Escherichia coli *A04.4*
- - chez le nourrisson *A04.4*
- gangréneuse *A09*
- gastro- *K52.9*
- - aiguë *A09*
- - - avec exsiccose *A09, E86*
- - - l'agent de Norwalk *A08.1*
- - allergique *K52.2*
- - associée à
- - - candidose *B37.88*
- - - grippe *J11.8*
- - - - virus grippal identifié, sauf le virus de la grippe aviaire *J10.8*
- - - maladie par VIH *B23.8, K52.9*
- - - paratyphoïde *A01.4*
- - avec exsiccose *K52.9, E86*
- - chez le nourrisson *A09*
- - - avec exsiccose *A09, E86*
- - chronique *K52.9*
- - diététique *K52.2*
- - d'origine présumée infectieuse *A09*
- - - avec
- - - - diarrhée *A09*
- - - - exsiccose *A09, E86*
- - éosinophile *K52.8*
- - épidémique *A09*
- - hémorragique *K52.9*
- - infectieuse *A09*
- - - associée à maladie par VIH *B20, A09*
- - - avec exsiccose *A09, E86*
- - non bactérienne chez le nourrisson *A08.5*
- - non infectieuse *K52.9*
- - provoquée par
- - - allergie alimentaire *K52.2*
- - - candida *B37.88*
- - - Cryptosporidiose *A07.2*
- - - intoxication alimentaire *A05.9*
- - - irradiation *K52.0*
- - - rotavirus *A08.0*
- - - salmonelle *A02.0*
- - - virus *A08.4*
- - septique *A09*
- - toxique *K52.1*
- - - virale *A08.4*

Entérite *–suite*
- gastro- *–suite*
- - tuberculose *A18.3+, K93.0**
- - virale *A08.4*
- - - épidémique *A08.1*
- - - grave chez le nourrisson *A08.3*
- granulomateuse *K50.9*
- hémorragique *K52.9*
- infectieuse NCA *A09*
- infectieuse, provoquée par
- - Aerobacter aerogenes *A04.8*
- - Clostridium perfringens *A04.8*
- - Enterobacter aerogenes *A04.8*
- - entérovirus *A08.3*
- - Lamblia intestinalis *A07.1*
- - Trichomonas *A07.8*
- intestin grêle
- - et colique *K50.8*
- - régionale *K50.0*
- ischémique *K55.9*
- - aiguë *K55.0*
- - chronique *K55.1*
- membraneuse *K58.9*
- nécrosante *A05.2*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P77*
- - Clostridium perfringens [Clostridium welchii] *A05.2*
- non infectieuse *K52.9*
- parasitaire NCA *B82.9*
- paratyphoïde *A01.4*
- post-antibiothérapie *A04.7*
- présumée
- - d'origine infectieuse *A09*
- - - avec exsiccose *A09, E86*
- - non infectieuse *K52.9*
- provoquée par
- - adénovirus *A08.2*
- - allergie alimentaire *K52.2*
- - amibe *A06.0*
- - Aspergillus *B44.8+, K93.8**
- - bactérie *A04.9*
- - Campylobacter *A04.5*
- - candida *B37.88*
- - Chilomastix *A07.8*
- - Clostridium *A04.7*
- - Coccidie *A07.3*
- - Cryptosporidium *A07.2*
- - cytomégalovirus *B25.80+, K93.8**
- - Embadomonas *A07.8*
- - Escherichia coli *A04.4*
- - - entéroagrégative *A04.4*
- - - entéro-hémorragique *A04.3*
- - - entéro-invasive *A04.2*
- - - entérotoxigène *A04.1*
- - Escherichia coli entéropathogène *A04.0*
- - Giardia lamblia *A07.1*
- - protozoaire *A07.9*
- - radiothérapie *K52.0*
- - rotavirus *A08.0*
- - Salmonella arizona *A02.0*
- - salmonelle *A02.0*
- - shigellose *A03.9*
- - staphylocoque *A04.8*
- - Trichomonas *A07.8*
- - virus *A08.4*
- - virus Coxsackie *A08.3*
- - Yersinia *A04.6*

Entérite –*suite*
- provoquée par –*suite*
- - Yersinia enterocolitica *A04.6*
- - - avec
- - - - arthrite post-infectieuse *A04.6+, M03.29**
- - - - arthropathie post-infectieuse *A04.6+, M03.29**
- régionale *K50.9*
- - avec
- - - arthrite juvénile *K50.9+, M09.19**
- - - arthropathie *K50.9+, M07.49**
- - colon *K50.1*
- - duodénum *K50.0*
- - gros intestin *K50.1*
- - iléale *K50.0*
- - intestin grêle et gros intestin *K50.8*
- - jéjunale *K50.0*
- - rectum *K50.1*
- sans vomissements *K52.9*
- septique *A09*
- toxique *K52.1*
- tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- typhoïde *A01.0*
- typhoidique *A01.0*
- ulcéreuse *K51.9*
- - chronique *K51.9*
- virale *A08.4*
- - due à l'agent de Norwalk *A08.1*

Entéritique, fièvre *A01.0*

Entérobactérie
- aérogène, entérite, infectieuse *A04.8*
- agent pathogène *B96.2!*
- pneumonie *J15.6*
- résistant à
- - amikacine *U80.5!*
- - carbapénème *U80.5!*
- - quinolone *U80.5!*
- septicémie *A41.58*
- spondylite à *A04.9+, M49.29**

Entérobiase *B80*

Enterobius vermicularis, infection *B80*

Entérocèle *K46.9*
- *N81.5*
- avec gangrène *K46.1*
- causant une occlusion, sans gangrène *K46.0*
- cysto- *N81.1*
- étranglé, sans gangrène *K46.0*
- étranglée, sans gangrène *K46.0*
- irrépétible, sans gangrène *K46.0*
- vaginale *N81.5*
- - acquise, NCA *N81.5*
- - congénitale NCA *N81.5*

Entérochromaffine, tumeur *C80*

Enterococcus
-
- faecalis résistant
- - glycopeptides
- - - *U80.20!*
- - - oxazolidinones ou au streptogramines , *U80.20!*
- - oxazolidinones hautement résistant au aminoglycosides et non résistant au glycopeptides , *U80.21!*
- faecalis, avec
- - résistance à
- faecium résistant

Enterococcus –*suite*
- faecium résistant –*suite*
- - glycopeptides
- - - *U80.30!*
- - - oxazolidinones ou au streptogramines , *U80.30!*
- - oxazolidinones streptogramines ou hautement résistant au aminoglycosides et non résistant au glycopeptides , *U80.31!*
- faecium, avec
- - résistance à

Entérocolique, fistule *K63.2*

Entérocolite *K52.9*
- aiguë *A09*
- chronique *K52.9*
- cytomégalovirus *B25.80+, K93.8**
- gastro- *K52.9*
- ischémique *K55.9*
- - aiguë *K55.0*
- - chronique *K55.1*
- - fulminante *K55.0*
- nécrosante (NEC), chez le foetus/nouveau né *P77*
- post-antibiothérapie *A04.7*
- provoquée par
- - candida *B37.88*
- - Clostridium *A04.7*
- - - difficile *A04.7*
- - cytomégalovirus *B25.80+, K93.8**
- - pseudotuberculose *A04.8*
- - salmonelle *A02.0*
- pseudomembraneuse
- - Clostridium difficile *A04.7*
- - prenant la forme de
- - - colite post-antibiothérapie *A04.7*
- - - colon irritable *K58.9*
- spastique *K52.9*
- tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- ulcéreuse *K51.0*

Entérocoque
- agent pathogène *B95.2!*
- infection des voies urinaires *N39.0, B95.2!*
- prostate *N41.9*
- septicémie *A40.2*

Entéro-cutanée, fistule *K63.2*

Entérocytome *Q43.8*

Entérogène, cyanose [méthémoglobinémie a *D74.8*

Entérolithiase *K56.4*

Entéromyiase *B87.8+, K93.8**

Entéro-névrose *F45.32*

Entéropathie *K63.9*
- due à perte protéique *K90.4*
- gastro-, aiguë à l'agent de Norwalk *A08.1*
- intolérance au gluten *K90.0*
- Lymphome cellules T associé à des *C86.2*

Entéropathogène à Escherichia coli, avec *A04.0*

Entéroptose *K63.4*

Entéroptose ou Maladie de Glénard *K63.4*

Entérorragie *K92.2*

Entérorrhée *K52.9*

Entérospasme *K58.9*

Entérospasme –*suite*
- psychogène *F45.32*

Entérosténose *K56.6*

Entérostomie
- avec
- - abcès *K91.4*
- - complication *K91.4*
- sténose *K91.4*

Entérotoxine, intoxication alimentaire *A05.0*

Entéro-utérine (intestino-utérine), fist *N82.4*

Entéro-vaginal (-e)
- fistule NCA *N82.4*
- - gros intestin NCA *N82.3*
- - intestin grêle NCA *N82.2*

Entérovaginale, fistule *N82.4*
- congénitale *Q52.2*
- gros intestin *N82.3*
- intestin grêle *N82.2*

Entérovirus
- diarrhée *A08.3*
- encéphalite *A85.0+, G05.1**
- encéphalomyélite *A85.0+, G05.1**
- entérite, infectieuse *A08.3*
- fièvre, avec exanthème *A88.0*
- infection NCA *B34.1*
- infection, système nerveux central NCA *A88.8*
- méningite *A87.0+, G02.0**
- myélite *A85.0+, G05.1**
- pharyngite
- - lymphonodulaire *B08.8*
- - vésiculaire *B08.5*
- source primaire *B97.1!*
- stomatite, vésiculaire, avec exanthème *B08.4*
- type 70, conjonctivite *B30.3+, H13.1**
- - hémorragique *B30.3+, H13.1**

Enthésopathie *M77.9*
- articulation de la main NCA *M77.8*
- cheville *M77.5*
- diffuse, avec tendinopathie *M77.8*
- genou *M76.8*
- hanches *M76.8*
- ligament ilio-lombaire *M77.8*
- membre, inférieur *M76.9*
- périphérique NCA *M77.9*
- pied NCA *M77.5*
- plantaire *M77.5*
- région de l'épaule *M75.9*
- - adhésive *M75.0*
- région du coude *M77.8*
- spinale *M46.09*
- tarse *M77.5*
- tendon de la main NCA *M77.8*

Enthésopathie spinale *M46.09*

Entomophthora
- infection *B46.8*
- mycose *B46.8*

Entorse *T14.3*
- articulation *T14.3*
- articulation atlanto-axiale *S13.4*
- articulation atlanto-occipitale *S13.4*
- articulation crico-aryténoïdienne *S13.5*
- articulation cricothyroïdienne *S13.5*
- articulation de la mâchoire *S03.4*

Entorse –*suite*
- articulation du genou *S83.6*
- articulation du pied *S93.6*
- articulation interphalangienne *S93.5*
- articulation métatarso-phalangienne *S93.5*
- articulation radiocarpienne *S63.52*
- articulation talo-crurale *S93.40*
- articulation tibio-fibulaire proximale *S83.6*
- avant-bras *S56.8*
- bras *S46.9*
- capsule articulaire *T14.3*
- cartilage thyroide *S13.5*
- ceinture scapulaire *S43.7*
- cheville *S93.40*
- - *S93.6*
- coraco-claviculaire *S43.7*
- coraco-humérale *S43.4*
- côte *S23.4*
- cou. séquelles *T91.8*
- coude *S53.40*
- doigts *S63.60*
- foulure de l'articulation acromio-claviculaire (ligament) *S43.5*
- hanche *S73.10*
- hanche pubo-fémorale *S73.18*
- ligament *T14.3*
- - acromio-claviculaire *S43.5*
- - cervical longitudinal antérieur *S13.4*
- - coracohuméral *S43.4*
- - maxillaire *S03.4*
- - tarsien *S93.6*
- - tarso-métatarsien *S93.6*
- - tibio-fibulaire proximal *S83.6*
- mâchoire, séquelles *T90.8*
- membre
- - inférieur, séquelles *T93.3*
- - supérieur, séquelles *T92.3*
- musculaire *T14.6*
- - cheville *S96.9*
- - jambe *S86.9*
- - pied *S96.9*
- orteil *S93.5*
- partie capsulaire, coiffe des rotateurs *S43.4*
- poignet *S63.50*
- rachis cervical *S13.4*
- rachis dorsal *S23.3*
- rachis lombaire *S33.50*
- régions du corps multiples, séquelles *T94.0*
- séquelles *T94.1*
- skieur *S63.61*
- sternum *S23.4*
- tendon *T14.6*
- - cheville *S96.9*
- - jambe *S86.9*
- - pied *S96.9*
- tronc, séquelles *T91.8*
- vertébrale *T09.2*

Entrée
- retard, menstraution *N91.0*
- tête, manquant, à l'entrée du pelvis, complication, naissance *O64.8*

Entrelacement
- cordon ombilical
- - avec lésions, foetus *P02.5*

Entrelacement –*suite*
- cordon ombilical –*suite*
- - chez des jumeaux, monoamniotique *O69.2*
- intestin *K56.2*

Entretien, résultat *Z71*

Entropion *H02.0*
- cicatrice *H02.0*
- cils retournés *H02.8*
- congénital *Q10.2*
- paralytique *H02.0*
- paupière *H02.0*
- - cicatricel *H02.0*
- - congénital *Q10.2*
- - paralytique *H02.0*
- - sénile *H02.0*
- - spasmodique *H02.0*
- sénil *H02.0*
- spasmodique *H02.0*

Enucléation
- oeil *S05.7*
- - traumatique aiguë *S05.7*
- traumatique *S05.7*

Enucléation, oeil *S05.7*

Enurésie *R32*
- diurne *R32*
- fonctionnelle *F98.0*
- nocturne *R32*
- - névrotique *F98.0*
- - non organique *F98.0*
- - persistante *R32*
- - secondaire *R32*
- non organique *F98.0*
- - primaire *F98.0*
- - secondaire *F98.0*
- psychogène *F98.0*

Enveloppe nerveuse, myxome *D36.1*

Enveloppe plastique, asphyxie *T71*

Envie (tache de vin) *Q82.5*

Environnement
- insuffisant NCA *Z59*
- insuffisant, travail NCA *Z56*

Environnement culturel, perte *Z60*

Enzyme
- anomalie
- - avec
- - - anémie *D55.9*
- - - - hémolytique *D55.9*
- - - - - héréditaire, *D55.9*
- - - goitre *E07.1*
- - avec anémie hémolytique médicamenteuse *D59.2*
- - dans la synthèse de l'hormone thyroïdienne, avec goitre *E07.1*
- branchement (branchante), déficit *E74.0*
- circulante, déficit NCA *E88.0*
- débranchante (de débranchement), déficit *E74.0*
- déficit *E88.9*
- - avec anémie *D55.9*
- - - induite par des substances médicamenteuses *D59.2*
- - - relation avec la voie (le cycle) (le shunt) des pentoses phosphates NCA *D55.1*
- - métabolisme des nucléotides, avec anémie *D55.3*

Enzyme –*suite*
- foie, augmentation *R74.0*
- glycolytique
- - déficit, avec anémie *D55.2*
- - dysfonctionnement *E74.8*
- hépatique, taux anormal *R74.8*
- lysosomale, défect de la transformation post-traductionnelle *E77.0*
- sérique, anormal *R74.9*

Enzymopathie congénitale *E88.9*

Enzymopathique, méthémoglobinémie congén *D74.0*

EOCA (early onset cerebellar ataxia)[ata *G11.1*

EOG [électro-oculogramme] pathologique *R94.1*

Eosinopénie *D72.8*

Eosinophile
- adénocarcinome *C75.1*
- adénome *D35.2*
- - hypophyse *D35.2*
- carcinome *C75.1*
- cellulite *L98.3*
- cystite *N30.8*
- fasciite *M35.4*
- - diffuse *M35.4*
- gastrite *K52.8*
- gastro-entérite *K52.8*
- granulome
- - muqueuse buccale *K13.4*
- - peau *L92.2*
- infiltrat pulmonaire *J82*
- - avec asthme bronchique *J82*
- leucémie *C92.70*
- maladie endomyocardique *I42.3*
- méningite *B83.2+, G02.8**
- méningo-encéphalite *B83.2+, G05.2**
- pneumonie *J82*
- pneumonite *J82*
- réaction leucémoïde *D72.1*

éosinophile
- Granulome *C96.6*
- syndrome hyperéosinophilique Leucémie chronique à *D47.5*

Eosinophilie *D72.1*
- allergique *D72.1*
- héréditaire *D72.1*
- pulmonaire NCA *J82*
- pulmonaire tropicale *J82*
- tropicale *J82*

Epaississemnt, gonflement
- épiderme *L85.9*
- gencive *K06.1*
- hymen *N89.6*
- langue *K14.8*
- larynx *J38.7*
- lèvres, congénital *Q18.6*
- ongles *L60.2*
- - congénitale *Q84.5*
- os *M89.39*
- peau *N83.9*
- - *R23.4*
- périostale *M89.39*
- plèvre *J92.9*
- - avec dépistage, asbeste *J92.0*
- reins *E27.8*
- - nodulaire *E27.8*

Epaississemnt, gonflement –*suite*

- sous-épiglotte *J38.7*
- utérus *N85.2*

Epanchement
- apparence chyleuse *J94.0*
- - plèvre *J94.0*
- articulaire *M25.49*
- - hémorragique *M25.09*
- articulation de la cheville (tibio-astragalienne) *M25.47*
- articulation du genou *M25.46*
- cas de
- - mono-arthropathie *M25.49*
- - otite moyenne *H65.9*
- - - aiguë *H65.1*
- - - chronique *H65.4*
- - - subaiguë *H65.1*
- - péricardite *I31.9*
- - péritonite *K65.9*
- - pleurésie
- - - bactérienne *J90*
- - - tuberculeuse
- - - - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.6*
- - - - primaire avec confirmation bactériologique ou histologique, *A15.7*
- - - - - *A16.7*
- cérébral (oedème) *G93.6*
- cérébral, séreux *G93.6*
- cérébro-spinal *G03.9*
- chyleux *J94.0*
- dans la caisse du tympan *H65.9*
- - non purulent *H65.4*
- intracrânien *G93.6*
- liquide pleural *J90*
- médullaire *G03.9*
- niveau de l'articulation du genou *M25.46*
- niveau de l'oreille moyenne *H65.9*
- niveau des méninges *G03.9*
- non purulent, en cas d'otite moyenne *H65.9*
- - chronique *H65.4*
- péricardique *I31.3*
- - aigu *I30.9*
- - malin *I31.3*
- - non-inflammatoire *I31.3*
- - rhumatismal *I09.2*
- pleural *J90*
- - cas de
- - - grippe [influenza] *J11.1*
- - - - avec virus de la grippe aviaire identifié *J09*
- - - - avec virus de l'influenza identifié, à l'exception du virus de la grippe aviaire *J10.1*
- - - mésothéliome de la plèvre *C45.0+, J91**
- - - néoformation maligne de la plèvre secondaire *C78.2+, J91**
- - chez le phoetus/nouveau-né *P28.8*
- - chyleux *J94.0*
- - tuberculeux NCA *A16.5*
- - tuberculeux primaire, avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.7*
- poumon *J81*
- séreux, en cas de péricadrdite bactérienne aiguë *I30.1*

Epanchement –*suite*

- séro-purulent, en cas de péricardite bactérienne aiguë *I30.1*
- tuberculeux, en cas de pleurésie NCA *A16.5*
- tympanique muqueux *H65.3*
- - séro- *H65.4*
- tympanique séromuqueux *H65.4*

Epaule *voir aussi* aisselle
- abcès *L02.4*
- adhérences *M75.0*
- - avec ténosynovite *M75.0*
- agénésie *Q74.0*
- ankylose *M24.61*
- anomalie *Q74.0*
- anthrax *L02.4*
- articulation, capsule
- - inflammation, adhésive *M75.0*
- - irritation *M24.81*
- brûlure *T22.02*
- - 1er degré *T22.12*
- - 2ème degré *T22.22*
- - 3ème degré *T22.32*
- - dégré
- - - 2a *T22.22*
- - - 2b *T22.82*
- cancer spinocellulaire *C44.6*
- capsulite rétractile, inflammation *M75.0*
- cavité glénoïde ou cavité cotyloïde, fracture *S42.14*
- ceinture de
- - anomalie *Q74.0*
- - blocage *S43.7*
- - dystrophie musculaire *G71.0*
- - entorse NCA *S43.7*
- - foulure *S43.7*
- - fracture *S42.9*
- - - séquelles *T92.1*
- - hypoplasie *Q74.0*
- - luxation *S43.3*
- - malformation *Q74.0*
- - myopathie *G71.0*
- - névrite *G54.5*
- - plaie, ouverte *S41.80*
- - posture anormale *R29.3*
- - syndrome *G54.5*
- - syndrome de compression *G54.0*
- - Tendomyopathie *M75.8*
- - tendomyose *M75.8*
- chondrosarcome *C40.0*
- contusion *S40.0*
- corrosion *T22.42*
- - 1er degré *T22.52*
- - 2ème degré *T22.62*
- - 3ème degré *T22.72*
- - degré
- - - 2a *T22.62*
- - - 2b *T22.92*
- difformité
- - acquise *M21.91*
- - congénitale *Q74.0*
- douleurs *M75.8*
- dystocie, avec complication lors de l'accouchement *O66.0*
- écrasement *S47*
- encastrée, avec complication lors de l'accouchement *O66.0*
- enclavement, avec lésions du phoetus/nouveau-né *P03.1*

Epaule *voir aussi* aisselle –*suite*

- entorse, foulure *S43.7*
- épithélioma ou basaliome *C44.6*
- et partie supérieure du bras
- - contusions multiples *S40.7*
- - lésions multiples *S49.7*
- - plaies, ouvertes, multiples *S41.7*
- foulure, entorse *S43.7*
- fracture *S42.9*
- - séquelles *T92.1*
- fracture-luxation *S42.9*
- furoncle *L02.4*
- instabilité articulaire *M25.31*
- irritation, capsule *M75.8*
- lésion *M75.9*
- - musculaire *S46.9*
- - non-traumatiques *M75.9*
- - récentes *S43.00*
- - superficielle *S40.9*
- - - de multiples endroits *S40.7*
- - traumatique d'un nerf *S44.9*
- - traumatique d'un vaisseau sanguin *S45.9*
- luxation *S43.00*
- - compliquée *S43.00*
- - congénitale *Q68.8*
- - récidivante *M24.41*
- lymphadénite aiguë *L04.2*
- main, syndrome *M89.09*
- maladie *M89.81*
- malformation ou anomalie congénitale *Q74.0*
- mélanome in situ *D03.6*
- mélanome malin *C43.6*
- naevus *D22.6*
- périarthrite *M75.0*
- péricapsulite adhérente *M75.0*
- péritendinite adhérente *M75.0*
- phlegmon *L03.10*
- plaie, ouverte *S41.0*
- position haute, congénitale *Q74.0*
- raideur *M25.61*
- - douloureuse, aigue *M25.61*
- raideur partielle *M25.61*
- région de
- - affection *M75.9*
- - Enthésopathie *M75.9*
- - - adhésive *M75.0*
- - troubles, tendons *M75.8*
- rupture de la coiffe des rotateurs *M75.1*
- - traumatique *S46.0*
- rupture ménisque, ancienne *M24.11*
- sarcome, tissu conjonctif *C49.1*
- syndrome d'empiètement de l'épaule *M75.4*
- synovite *M65.91*
- tendinite avec adhérence *M75.0*
- tendinite calcifiante *M75.3*
- ténosynovite *M75.8*
- traumatisme d'effort *S43.7*
- travers, soins maternels *O32.8*

Ependymaire, glioblastome *C71.9*

Ependymite *G04.9*
- aiguë *G04.9*
- cérébrale *G04.9*
- chronique *G04.9*
- Cytomégalovirus *B25.88+, G05.1**
- granuleuse *G04.9*

Ependymoblastome *C71.9*

Ependymocytome *C71.9*

Ependymo-épithéliome *C71.9*

Ependymogliome *C71.9*

Ependymome *C71.9*
- anaplasique *C71.9*
- cerveau *C71.9*
- épithélial *C71.9*
- glio- *C71.9*
- malin *C71.9*
- myxopapillaire *D43.2*
- papillaire *D43.2*

Ependymopathie *G93.88*

Eperon
- calcanéen *M77.3*
- os *M77.9*
- osseux *M77.9*
- - crête iliaque *M76.2*
- septum nasal *J34.8*
- vomer *J34.8*

Ephelides *L81.2*

Epiblépharon *Q10.3*
- congénital *Q10.3*

Epicanthus *Q10.3*
- congénital *Q10.3*

Epicarde
- adhérence *I31.0*
- carcinose *C79.84*

Epicardique
- lipomatose *E88.2*
- plaques *I31.8*

Epicardite *I31.9*

Epicondyle
- latéral de l'humérus, fracture *S42.42*
- médial de l'humérus (épitrochlée), fracture *S42.43*

Epicondyle du fémur, fracture *S72.41*

Epicondylite *M77.1*
- avec blocage, tête du radius *M77.1*
- coude *M77.8*
- humérus *M77.8*
- - cubitale (ulnaire) (interne) (épitrochléite) *M77.0*
- - radiale (externe) *M77.1*
- - - chronique *M77.1*
- latérale (externe) *M77.8*
- - chronique *M77.8*
- médiale (interne) *M77.8*
- radiale *M77.1*
- - chronique *M77.1*
- ulnaire (cubitale) *M77.0*

Epicondylopathie *M77.8*
- radiale *M77.1*
- ulnaire (cubitale) *M77.0*

Epicondylopathie humérale *M77.8*
- radiale (externe) *M77.1*

Epicystite (cystite) *N30.9*

Epidémie
- aphteuse *B08.8*
- Klauen *B08.8*
- Maul et Klauen *B08.8*
- Stuttgart *A27.8*

épidémie 2009 grippe aviaire Influenza A / H5N1, *U69.21!*

Epidémique *voir* la maladie concernée

Epiderme
- carcinome in situ *D04.9*
- épaississement *L85.9*
- kyste *L72.0*

Epidermique
- kyste *L72.0*
- mycose *B36.9*
- naevus *D22.9*
- nécrolyse toxique *L51.20*
- - avec
- - - atteinte
- - - - muqueuse *L51.21*
- - - - supérieure ou égale à 30% de la surface corporelle *L51.21*

Epidermisation, col de l'utérus *N87.9*

Epidermisation, oesophage *K22.8*

Epidermite, dermo- *L30.8*

Epidermo-dermique
- jonction, naevus de la *D22.9*

Epidermo-dermique, naevus *D22.9*

Epidermodysplasie verruciforme *B07*

Epidermoïde, carcinome in situ *D09.9*
- col de l'utérus avec invasion stromale incertaine *D06.9*

Epidermoïde, kyste *L72.0*
- bouche *K09.8*
- orbite *D31.6*
- peau *L72.0*
- ventricule cérébral, troisième *G93.0*

Epidermolyse
- aiguë toxique *L51.20*
- bulleuse *Q81.9*
- - acquise *L12.3*
- - atrophicans gravis (de type Herlitz) (EBJ-H) *Q81.1*
- - dystrophique *Q81.2*
- - létale *Q81.1*
- - simple *Q81.0*
- nécrosante suraiguë (necroticans combustiformis) (syndrome de Lyell) *L51.20*

Epidermomycose *B36.9*

Epidermophyton, dermatophytose [dermatop *B35.9*

Epididymaires, aspiration de spermatozoï *Z31.3*

Epididyme
- abcès *N45.0*
- absence
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q55.4*
- adhérence *N50.8*
- Agénésie *Q55.4*
- anomalie *Q55.4*
- atrophie *N50.8*
- brulure *T21.09*
- calcul *N50.8*
- contusion *S30.2*
- difformité
- - acquise *N50.8*
- - congénitale *Q55.4*
- douleurs *N50.8*
- dysplasie *Q55.4*
- fibrome *D29.3*
- fibrose *N50.8*
- Fistule *N50.8*
- - tuberculeuse *A18.1+, N51.1**
- gangrène *N45.9*

Epididyme *–suite*
- gonflement *N50.8*
- gonorrhée *A54.2+, N51.1**
- hématome, non traumatique *N50.1*
- hypertrophie *N50.8*
- hypoplasie, congénitale *Q55.4*
- infection *N45.9*
- inflammation *N45.9*
- - gonorrhéique *A54.2+, N51.1**
- kyste *N50.8*
- lésion *S39.9*
- - superficielle *S30.80*
- maladie *N50.9*
- mésothéliome *C63.0*
- modifications, nodulaire *D40.7*
- noeuds *D40.7*
- orchite *N45.9*
- plaie, ouverte *S31.3*
- saignements *N50.1*
- syphilis *A52.7+, N51.1**
- syphillis tertiaire *A52.7+, N51.1**
- testicules, inflammation *N45.9*
- torsion *N44.0*
- tuberculose *A18.1+, N51.1**
- ulcère *D40.7*

Epididymite *N45.9*
- aiguë *N45.9*
- avec abcès *N45.0*
- caséeuse *A18.1+, N51.1**
- chronique *N45.9*
- due à
- - Chlamydias *A56.1+, N51.1**
- - gonocoques *A54.2+, N51.1**
- - herpesvirus *A60.0+, N51.1**
- gonococcique *A54.2+, N51.1**
- non vénérienne *N45.9*
- orchi- *N45.9*
- péri- *N45.9*
- purulente *N45.0*
- récurrente *N45.9*
- résiduelle *N45.9*
- syphilitique *A52.7+, N51.1**
- syphilitique tardive *A52.7+, N51.1**
- tuberculeuse *A18.1+, N51.1**

Epididymo-orchite *N45.9*
- avec abcès *N45.0*
- sans abcès *N45.9*

Epidural
- abcès *G06.2*
- - étage médullaire (intra-rachidien) (intra-spinal) *G06.1*
- - intra-crânien *G06.0*
- - intra-rachidien *G06.1*
- - tuberculeux *A17.8+, G07**
- fibrose, cicatrice, après discectomie *M96.1*
- granulome
- - intracrânien *G06.0*
- - intra-rachidien (intra-spinal) *G06.1*
- hématome *S06.4*
- - non traumatique *I62.1*
- - traumatique *S06.4*
- hématome (hémorragie) *S06.4*
- - non traumatique *I62.1*
- - traumatique *S06.4*
- lipomatose *E88.2*

Epigastralgie *R10.1*

Epigastrique
- ténesme *R10.4*
- tumeur *D48.7*

épigastrique
- avec
- - gangrène Hernie *K43.70*
- - occlusion sans gangrène , Hernie *K43.60*
- sans occlusion gangrène Hernie *K43.90*

Epigastrique, hernie *K43.9*
- partiellement incarcérée *K43.0*

Epigastrium (épigastre)
- blessure (lésion) *S39.9*
- - superficielle *S30.80*
- brûlure *T21.03*
- contusion *S30.1*
- douleurs *R10.1*
- plaie ouverte *S31.1*

Epiglotte
- abcès *J38.7*
- absence congénitale *Q31.8*
- adhérence *J38.7*
- agénésie *Q31.8*
- allongement pointe inférieure *Q31.8*
- atrésie *Q31.8*
- carcinome in situ *D02.0*
- chondromalacie *Q31.8*
- déformation
- - acquise *J38.7*
- - congénitale *Q31.8*
- fissure congénitale *Q31.8*
- hypoplasie *Q31.2*
- inflammation
- - aiguë *J05.1*
- - chronique *J37.0*
- kyste *J38.7*
- - congénital *Q31.8*
- lésion NCA *S19.8*
- lésion superficielle *S10.80*
- malformation (anomalie) congénitale *Q31.8*
- oedème *J38.4*
- partie sus-hyoïdenne, carcinome in situ *D02.0*
- phlegmon *J05.1*
- plaie ouverte *S11.80*
- position (situation) anormale congénitale *Q31.8*
- ramollissement, cartilage *Q31.8*
- syphilis tardive *A52.7+, J99.8**
- tuberculose *A16.4*
- - documentée bactériologiquement ou histologiquement *A15.5*
- ulcère *J38.7*
- ulcus *J38.7*

Epiglottite *J05.1*
- aiguë *J05.1*
- chronique *J37.0*

Epignathes *Q89.4*

Epilepsia
- major *G40.3*
- - convulsive *G40.3*
- minor *G40.3*
- nutans *F98.4*
- partialis continua *G40.5*

Epilepsie *G40.8*
- abdominale *G40.8*
- acoustique *G40.8*
- akinétique *G40.3*

Epilepsie *–suite*
- alcoolique *G40.5*
- atypique bénigne *G40.00*
- avec
- - absences *G40.7*
- - - juvéniles *G40.3*
- - - myocloniques *G40.4*
- - altération de l'état de conscience *G40.8*
- - amnésie *G40.9*
- - aphasie acquise *F80.3*
- - crise myoclonique-astatique *G40.4*
- - démence *G40.9+, F02.8**
- - fugue *G40.9*
- - psychose
- - - organique NCA *F05.8*
- - - schizophréniforme *F06.2*
- bénigne de l'enfance à pointes (-ondes) centro-temporales à l'EEG *G40.08*
- bénigne du nourrisson (Watanabe) *G40.08*
- bénigne du nourrisson avec crises partielles complexes *G40.08*
- Blitz-Nick-Salaam (BNS) *G40.4*
- Bravais-Jackson *G40.1*
- cérébrale *G40.9*
- climatérique *G40.8*
- clonique *G40.3*
- corticale *G40.1, G40.9*
- crises grand mal au réveil *G40.3*
- cryptogène *G40.9*
- dans
- - antécédents familiaux *Z82*
- - antécédents personnels *Z86.6*
- focale *G40.1*
- généralisée *G40.3*
- - avec convulsion *G40.3*
- - idiopathique *G40.3*
- - symptomatique d'une autre pathologie cérébrale *G40.3*
- Grand-Mal *G40.6*
- hystéro- *F44.5*
- idiopathique *G40.9, G40.09*
- Jackson (Bravais-) *G40.1*
- - focale *G40.1*
- Kojewnikow *G40.5*
- l'enfance avec paroxysmes EEG occipitaux *G40.08*
- lésion temporale *G41.2*
- limbique avec altération de la personnalité *F07.0*
- lobe temporal *G40.2*
- motrice partielle *G40.1*
- musicogène (déclenchée par une musique) *G40.8*
- myoclonique *G40.3*
- - bégnine, enfance *G40.3*
- - juvénile *G40.3*
- - progressive *G40.3*
- myoclonique progressive *G40.3*
- myoclonique, progressive *G40.3*
- non précisée comme partielle ou généralisée *G40.8*
- parasitaire NCA *B71.9+, G94.8**
- partielle *G40.1*
- - avec altération d'état de conscience *G40.2*
- - sans altération de l'état de conscience *G40.1*
- - secondairement généralisée *G40.1*

Epilepsie *–suite*
- partielle (focale) *G40.1*
- - *G40.8*
- - idiopathique *G40.09*
- partielle, bégnine, avec symptômes affectifs *G40.02*
- personne âgée *G40.9*
- petit mal *G40.3*
- Petit- Mal *G40.3*
- - infantile *G40.3*
- post-traumatique *T90.5*
- présence de cysticercose cérébrale *B69.0+, G94.8**
- psychomotrice *G40.2*
- - bégnine *G40.02*
- psychosensorielle *G40.2*
- réflexe *G40.8*
- secondaire *G40.8*
- sénile *G40.8*
- somatomotrice *G40.1*
- somatosensorielle *G40.1*
- sujet âgé *G40.9*
- symptome *G40.9*
- système limbique *G40.2*
- tonico-clonique *G40.3*
- type mixte *G40.3*
- Unverricht-Lundborg *G40.3*
- viscérale *G40.8*
- visuelle *G40.8*

Epileptiforme
- Convulsions *R56.8*
- crise *R56.8*
- - focale *G40.1*
- - lors de cysticercose *B69.0+, G94.8**

Epileptique
- absences atoniques *G40.3*
- altération de l'état de conscience *G40.8*
- aura *G40.9*
- automatismes *G40.2*
- coma *G40.8*
- confusion mentale *F05.8*
- convulsions *G40.9*
- crise *G40.9*
- - atonique non spécifique *G40.3*
- - ave altération de l'état de conscience *G40.2*
- - début partiel (à début focal) *G40.08*
- - lien avec
- - - alcool *G40.5*
- - - changement hormonal *G40.5*
- - - drogues *G40.5*
- - - médicament *G40.5*
- - - privation de sommeil *G40.5*
- - - stress *G40.5*
- - partielle (focale) complexe *G40.2*
- - partielle (focale) simple *G40.1*
- - sans altération de l'état de conscience *G40.1*
- - tonique *G40.3*
- équivalent *G40.2*
- état confusionnel (delirium) *F05.8*
- état de mal type Petit-Mal (état de mal type absences) *G41.1*
- migraine *G40.8*
- psychose *F06.8*
- réaction *G40.9*
- spasme *G40.9*
- syndrome *G40.9*
- - généralisé *G40.4*

Epileptique *–suite*
- syndrome *–suite*
- - non précisé comme focal ou généralisé *G40.8*
- - particulier *G40.5*

épileptique dû facteur suivants médicament et drogue , Crise *G40.5*

Epiloïa (Epilepsy-low intelligence-adeno *Q85.1*

Epiménorrhée *N92.0*

Epine dorsale
- synovite, tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- tendosynovite, tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- tuberculose *A18.0+, M49.09**

Epine sciatique, hématome, complication, *O71.7*

Epinéphrite *N15.9*

Epinéphrome (surrénalome) *C64*

Epines accolées *M48.29*

Epineurite *M79.29*

Epipharyngite (rhinopharyngite) *J00*

Epipharynx (rhinopharynx)
- carcinome *C11.9*
- saignement *R04.0*
- tumeur *D37.0*

Epiphora *H04.2*
- subjective *H04.2*

Epiphrénique, diverticule oesophagien (d *K22.5*

Epiphyse
- arrêt de croissance *M89.19*
- claviculaire, sternale, ostéochondrose juvénile *M92.3*
- déplacement *M93.9*
- - traumatique *M93.9*
- dysfonctionnement *E34.8*
- épiphysiolyse *M93.9*
- - non traumatique *M93.9*
- - tête fémorale *M93.0*
- glande pinéale Tumeur malign : *C75.3*
- - à évolution imprévisible ou inconnu : *D44.5*
- glissement (épiphysiolyse) *M93.9*
- - traumatique *M93.9*
- humérale
- - inférieure, fracture *S42.44*
- - supérieure, fracture *S42.21*
- nécrose *M93.9*
- proximale huméale, fracture *S42.21*
- radius
- - inférieure, fracture *S52.50*
- - supérieur, fracture *S52.10*
- tératome *C40.9*
- tibia
- - extrémité inférieure, fracture *S82.38*
- - extrémité supérieure, fracture *S82.18*
- ulna
- - distale, ostéochondrose juvénile *M92.1*
- - inférieure, fracture *S52.8*
- - supérieur, fracture *S52.09*

Épiphyse Dysfonctionnement glande pinéale [*E34.8*

Epiphysite *M93.9*
- juvénile *M92.9*

Epiphysite *–suite*
- syphilitique congénitale *A50.0+, M90.29**
- vertébrale *M42.09*

Epiplocèle *K46.9*
- avec gangrène *K46.1*
- avec occlusion, sans gangrène *K46.0*
- étranglée, sans gangrène *K46.0*
- incarcérée, sans gangrène *K46.0*
- non réductible, sans gangrène *K46.0*

Epiploïte *K65.9*

Epiplon, abcès *K65.0*

Epiploon, métastase *C78.6*

Episclérale, hypertension veineuse avec *H40.8*

Episclérite *H15.1*
- lors de goutte *M10.99+, H19.0**
- purulente *H15.1*
- syphilitique tardive *A52.7+, H19.0**
- tuberculeuse *A18.5+, H19.0**

Episcleritis periodica fugax *H15.1*

Episiotomie
- cicatrice *L90.5*
- cicatrice chéloïde *L91.0*
- infection puerpérale après *O86.0*
- plaie
- - hématome *O90.2*
- - infection *O90.1*
- - saignement *O90.2*
- suture
- - déhiscence *O90.1*
- - infection de plaie *O86.0*

Episode
- affectif mixte *F38.0*
- amnésique *G45.49*
- dépressif *F32.9*
- - léger *F32.0*
- - - présence (dans le cadre) d'un trouble affectif bipolaire *F31.3*
- - majeur *F32.9*
- - moyen *F32.1*
- - - présence (dans le cadre) d'un trouble affectif bipolaire *F31.3*
- - récurrent (récidivant) bref *F38.1*
- - sévère
- - - isolé *F32.2*
- - - présence de
- - - - symptôme psychotique *F32.3*
- - - - trouble affectif bipolaire
- - - - - sans symptôme psychotique, *F31.4*
- - - - - avec symtôme psychotique, *F31.5*
- - - sans symptôme psychotique *F32.2*
- dépressif isolé
- - agité *F32.2*
- - - ménopausal *F32.2*
- - majeur
- - - avec symtôme psychotique *F32.3*
- - - sans symptôme psychotique *F32.2*
- - réactif sévère sans symptôme psychotique *F32.2*
- - vital sans symptôme psychotique *F32.2*
- grave en présence (dans le cadre) d'un trouble dépressif
- - récurrent (récidivant) avec symptôme psychotique *F33.3*

Episode *–suite*
- grave en présence (dans le cadre) d'un trouble dépressif *–suite*
- - sans symptôme psychotique *F32.2*
- hypomane *F30.0*
- - présence (dans le cadre) d'un trouble affectif bipolaire *F31.0*
- isolé
- - dépression
- - - larvaire *F32.8*
- - - psychogène *F32.9*
- - - psychotique *F32.3*
- - - - ménopause *F32.3*
- - - réactif *F32.8*
- - - - léger *F32.0*
- - - - moyen *F32.1*
- - psychose, dépression
- - - psychogène *F32.3*
- - - réactive *F32.3*
- - réaction, dépression *F32.9*
- léger en présence (dans le cadre) d'un trouble dépressif *F32.0*
- - récurrent (récidivant) *F33.0*
- maniaque *F30.9*
- - alcoolique *F10.5*
- - - aigu *F10.5*
- - - chronique *F10.5*
- - avec symptôme psychotique *F30.2*
- - - parathymique *F30.2*
- - - synthimique *F30.2*
- - cas de cyclothymie *F31.1*
- - chronique *F31.8*
- - endogène, monoplaire *F30.9*
- - hystérique *F44.88*
- - isolé
- - - avec symtôme psychotique *F30.2*
- - - d'un (dans le cadre d'un) trouble bipolaire *F30.9*
- - manie ou maladie de Bell *F30.8*
- - monopolaire *F30.9*
- - nosomanie *F45.2*
- - période puerpérale *F30.8*
- - présence (dans le cadre) d'un trouble affectif bipolaire
- - - avec symtôme psychotique *F31.2*
- - - sans symptôme psychotique *F31.1*
- - récurrent (récidivant) *F31.8*
- - sans symptome psychotique *F30.1*
- mixte en présence (dans le cadre) d'untrouble affectif bipolaire *F31.6*
- moyen en présence (dans le cadre) d'un trouble dépressif *F32.1*
- - récurrent (récidivant) *F33.1*
- psychotique *F23.9*
- - organique *F06.8*
- récurrent (récidivant)
- - dépression
- - - psychogène *F33.8*
- - - réactive *F33.8*
- - léger d'une (dans le cadre d'une) réaction dépressive *F33.0*
- - psychose, dépressive, psychogène *F33.8*
- - trouble dépressif saisonnier *F33.8*
- schizophréniforme *F23.2*
- - brève durée NCA *F23.2*

Episodique
- anxiété paroxystique *F41.0*
- céphalées tensionnelles *G44.2*

Episodique *–suite*
- cluster headache (céphalées en grappe) *G44.0*

Epispadias *Q64.0*
- chez la femme *Q64.0*
- chez l'homme *Q64.0*
- clitoris *Q64.0*

Episplénite *D73.8*

Epistaxis *R04.0*
- multiple (à répétition) (récidivante) *R04.0*

Epithelia animaux, rhinite allergique au *J30.3*

Epithélial
- dysplasie, col utérin *N87.9*
- dystrophie, cornée *H18.5*
- épendymome *C71.9*
- kyste, peau *L72.0*
- Molluscum contagiosum *B08.1*
- néphrite aiguë *N00.8*
- néphroblastome *C64*
- prolifération, en cas de
- - kyste mammaire *N60.3*
- - mastite
- - - chronique *N60.3*
- - - kystique *N60.3*
- - mastopathie kystique diffuse *N60.3*
- tumeur
- - calcifiante odontogène *D16.5*
- - maxillaire odontogène *D16.41*
- vaginale, hyperplasie *N89.3*

Epithélialisation (ré-épithélialisation) *K22.8*

Epithélioïde
- hémangiome *D18.00*
- léiomyome *D21.9*
- léiomyosarcome *C49.9*

Epithelioma
- adenoides cysticum de Brooke *D23.9*
- calcifiant de Malherbe *D23.9*
- papillaire *D36.9*
- séminifère *C62.9*
- spermatogonique Masson *C62.9*

Epithéliome (voir aussi tumeur maligne) *C80*
- bénin *D36.9*
- Bowen *D04.9*
- calcifiant de Malherbe *D23.9*
- cellules basales *C44.9*
- chorio- *C58*
- chorio-, trompe utérine *C57.0*
- épendymo- *C71.9*
- épithélium pavimenteux *C80*
- ésthésioneuro- *C30.0*
- fibro- *D21.9*
- glande sébacée *D23.9*
- intra-épidermique, type Borst-Jadassohn *D23.9*
- intra-épithélial *D04.9*
- - type Borst-Jadassohn *D23.9*
- Jadassohn, intra-épidermique *D23.9*
- malin (voir aussi tumeur maligne) *C80*
- médullo-, tératoïde *C80*
- neuro- *C71.9*
- thymus *D15.0*
- tricho- *D23.9*
- uvée *C69.4*

Epithéliopathie multifocale placoïde pig *H31.8*

Epithéliose, chorion *D39.2*

Epithélium *C57.0*
- bouche, hyperplasie *K13.2*
- buccal, trouble *K13.2*
- col utérin, hyperfonctionnement *N87.9*
- de la cavité buccale
- - et langue, érythroplasie *K13.2*
- - leuco-oedème *K13.2*
- hyperplasie *L85.9*
- - buccal, focalisée *K13.2*
- kyste *L72.0*
- pigmentaire
- - dystrophie choroïdienne aréolaire centrale *H31.2*
- - rétine
- - - ablation *H35.7*
- - - glissement *H35.4*
- transition, carcinome in situ *D09.9*
- tubulaire, accumulation anormale de lipides *E75.6*

Epituberculose *A16.7*
- allergique *A16.7*
- avec atélectasie *A16.7*
- confirmée bactériologiquement *A15.7*
- confirmée histologiquement *A15.7*

Epitympanique
- maladie chronique *H66.2*
- otite moyenne chronique *H66.2*
- - avec myringite *H66.2*

Epizoonose *L98.8*

Epizoonose, délire *F06.0*

Epizootie *B88.9*

Epizootique, stomatite *B08.8*

Epoophore, kyste *Q50.5*

Epstein, néphrose *N04.9*

Epstein, syndrome *N04.9*
- van Bogaert-Scherer- *E75.5*

Epstein-Barr, virus (EBV)
- infection *B27.0*
- mononucléose *B27.0*
- pneumonie *J12.8*

Epuisement *R53*
- à
- - chaleur *T67.5*
- - effort excessif *T73.3*
- - exposition aux éléments *T73.2*
- - froid *T69.8*
- - grossesse *O26.88*
- - intempéries *T73.2*
- à la chaleur, par le biais de
- - perte d'eau *T67.3*
- - perte, sel *T67.4*
- chez le nouveau-né *P96.8*
- cœur *I50.9*
- dépressif *F48.0*
- épuisement *Z73*
- intempéries *T73.2*
- maladie au VIH *B23.8, R53*
- myocarde *I50.9*
- nerveux *F48.0*
- - aigu *F43.0*
- neurasthénie *F48.0*
- perte hydrique, dû à la chaleur *T67.3*
- physique *R53*
- pile

Epuisement *–suite*
- pile *–suite*
- - cardioverseur-défibrillateur implanté *T82.1*
- - CDI [cardioverseur-défibrillateur implanté] *T82.1*
- - stimulateur cardiaque implanté *T82.1*
- psychasthénique *F48.8*
- psychogène *F48.0*
- psychose *F43.0*
- psycho-végétatif *F48.0*
- total NCA *Z73*

Epulis *K06.8*
- cellules géantes *K06.8*
- fibreuse *K06.8*
- gencive *K06.8*

Epulis à cellules géantes *K06.8*

Equilibre
- Trouble (de)
- - lié à l'alimentation *E63.1*
- Trouble de
- Trouble de l'
- - endocrinien *E34.9*
- - équilibre électrolytique *E87.8*
- - hormone *E34.9*
- troubles *R42*
- - autonome *G90.8*
- - avec
- - - vertige de rotation *H81.8*
- - - vertiges constants *H81.9*
- - et vertige *R42*
- - flore intestinale [dysbiose] *K63.8*
- - potassium, chez le nouveau-né *P74.3*
- - sympathique *G90.8*

Equilibre en sodium, troubles, chez les *P74.2*

Equilibré(e)(s)
- insertion, réciproque *Q95.8*
- réarrangement
- - autosomes, chez sujet anormal *Q95.2*
- - chromosome *Q95.9*
- - - chez sujet anormal *Q95.2*
- - gonosomes et autosomes, chez sujet anormal *Q95.3*
- translocation
- - autosomes *Q95.9*
- - - chez sujet normal *Q95.0*
- - chromosome *Q95.9*
- - chromosomes, chez sujet normal *Q95.0*
- - réciproque *Q95.8*

Equinovarus (varus équin) (pied bot), ac *M21.57*

Equivalent
- convulsif, abdomial *G40.8*
- épileptique *G40.2*
- migraine *G43.1*

Equivalents migraineux *G43.1*

Eraflure /excoriation *T14.01*
- peau *T14.01*
- - névrotique *L98.1*

Eraflures
- angioïde *H35.3*
- - choroïde *H35.3*
- - macula *H35.3*
- - rétine *H35.3*
- grossesse *O26.88*

Eraflures –*suite*

- longitudinales, ongle *L60.8*
- - congénitale *Q84.6*
- macula *H35.3*
- ovaire *Q50.3*

Erb
- dystrophie musculaire *G71.0*
- paralysie, due à traumatisme obstétrical *P14.0*
- paralysie, plexus *P14.0*
- syndrome *G71.0*
- - Duchenne- *P14.0*

Erb-Charcot, maladie *G11.4*

Erb-Oppenheim-Goldflam, syndrome *G70.0*

Erdheim, tumeur d' *D44.4*

Erectile
- dysfonction *F52.2*
- - non organique *F52.2*
- - organique *N48.8*
- impuissance *F52.2*
- - psychogène *F52.2*
- instabilité (insuffisance) *F52.2*

Erection
- défectueuse *N48.8*
- douloureuse *N48.39*
- faiblesse *F52.2*
- incomplète *N48.4*
- trouble de *F52.2*
- - non organique chez l'homme *F52.2*
- - origine organique chez l'homme *N48.8*

Erection chronique *N48.39*
- douloureuse *N48.39*

Eréthisme *F90.8*

ERG [électrorétinogramme], anomalie path *R94.1*

Ergostérine, carence (avec ostéomalacie) *M83.89*

Ergostérol, carence *E55.9*
- cas de rachitisme *E55.0*

Ergotisme *T62.2*

Erosif
- arthrose *M15.4*
- balanite *N48.1*
- cervicite *N72*
- gastrite *K29.1*
- - aiguë, avec hémorragie *K29.0*
- - chronique *K29.6*
- - hémorragique *K29.0*
- ostéoarthrose *M15.4*
- ulcère *R02*
- - œsophagite *K22.1*
- - reflux œsophagien *K21.0*
- vulvite *N76.2*

Erosion
- anastomose, peptique *K28.9*
- artère *I77.8*
- artère pulmonaire *I28.8*
- avec
- - cervicite *N72*
- - endocervicite *N72*
- - exocervicite *N72*
- - kératopathie *H18.8*
- bronche *J98.0*

Erosion –*suite*

- candidose de la peau (interdigitale) *B37.2*
- cartilage articulaire *M94.89*
- col
- - chronique *N86*
- - utérus *N86*
- col de l'utérus *N86*
- - ectropion *N86*
- cornée *H16.0*
- - non traumatique *H16.0*
- - récidivante *H18.8*
- - traumatique *S05.0*
- côté estomac, peptique *K28.9*
- dent *K03.2*
- - due à
- - - drogue *K03.2*
- - - médicament *K03.2*
- - - régime alimentaire *K03.2*
- - - vomissements, persistants *K03.2*
- - idiopathique *K03.2*
- - professionnelle *K03.2*
- dentaire *K03.2*
- duodénum *K26.9*
- - post-pylorique *K26.9*
- estomac *K25.9*
- gastro-colique, peptique *K28.9*
- gastro-intestinal, peptique *K28.9*
- gastro-jéjunal, peptique *K28.9*
- gland *N48.1*
- intestin *K63.3*
- jéjunal, peptique *K28.9*
- marginale, peptique *K28.9*
- œsophage *K22.1*
- os *M85.89*
- peau *L98.8*
- sinus *K25.9*
- urètre *N39.88*
- utérus *N85.8*
- utérus, follicules *N85.8*
- utérus, papillaire *N85.8*
- vaisseau lymphatique *I89.8*
- vera
- - utérus *N85.8*
- - vagin *N89.8*

Erotomanie *F52.7*

Eructation *R14*
- acide *R14*
- exsufflation nerveuse *F45.31*
- nerveuse *F45.39*
- psychogène *F45.31*
- - *F45.39*

Eruptif, kyste, dent *K09.0*

Eruption *R21*
- annelée *R23.8*
- bulleuse *R23.8*
- cutanée *R21*
- - cas de maladie par VIH *B23.8, R21*
- - et éruption cutanée, non spécifique *R21*
- - lichénoïde *L28.0*
- - scarlatine, ressemblant à *R21*
- - toxique NCA *L53.0*
- dent
- - anomalie *K00.6*
- - difficile *K00.7*
- - prématurée *K00.6*

Eruption –*suite*
- dent –*suite*

- - trouble, avec malposition des dents *K07.3*
- due à
- - chaleur *L74.0*
- - sérum NCA *T80.6*
- due à des médicaments *L27.0*
- érythémateuse, chez le nouveau né *P83.8*
- érythème fessier du nourisson *L22*
- Kaposi, varicelliforme de *B00.0*
- localisée, due à
- - médicaments *L27.1*
- - vaccination *L27.1*
- non spécifique *R21*
- papule urticarienne *L50.9*
- peau *L30.9*
- - non spécifique, et éruption cutanée *R21*
- polymorphe à la lumière, due aux rayons du soleil *L56.4*
- pus *L01.0*
- teigne *L01.0*
- vésiculaire *R23.8*

Eruption cutanée maculo-papuleuse *R21*

Eruption dentaire, aggravée *K00.7*

Eruption dentaire, trouble *K00.7*

Eruption vésiculaire cutanée *R23.8*

Erysipélateux(euse)
- abcès *A46*
- fièvre *A46*
- inflammation, tissu cellulaire *A46*

Erysipèle *A46*
- avec
- - otite externe *A46+, H62.0**
- - toxicose *A46*
- chez le nouveau né *A46*
- gangréneux *A46*
- infantile *A46*
- jambe *A46*
- larynx *A46*
- oreille *A46*
- - externe *A46+, H62.0**
- pénis *A46*
- phlegmoneux *A46*
- post-partum *O86.8*
- pseudo- *A26.9*
- puerpéral *O86.8*
- suppuré *A46*
- tête *A46*
- visage *A46*

Erysipéloïde *A26.0*
- *A26.9*
- avec septicémie *A26.7*
- disséminée *A26.8*
- peau *A26.0*
- Rosenbach, de *A26.0*

Erysipelothrix
- insidiosa rhusiopathiae, infection *A26.9*
- septicémie *A26.7*

érythémateux réticulée Mucinose *L98.5*

Erythémateux(euse)
- affection *L53.9*
- eczéma *L30.9*
- éruption, chez le nouveau-né *P83.8*
- inflammation NCA *L53.9*

Erythémateux(euse) –*suite*

- maladie *L53.9*

Erythème *L53.9*
- à
- - contact, produit chimique *L25.3*
- - médicaments *L27.0*
- - produit chimique NCA *L53.0*
- - rayons *L59.8*
- allergique *L23.9*
- annulaire centrifuge *L53.1*
- arthritique épidémique *A25.1*
- au feu *L59.0*
- au froid (engelure) *T69.1*
- chronique migrateur *A69.2*
- - à
- - - Borrelia *A69.2*
- - - Borrelia burgdorferi *A69.2*
- - - - après piqûre de tique *A69.2*
- elevatum et diutinum *L95.1*
- endémique *E52*
- exsudatif polymorphe *L51.9*
- - avec
- - - arthrite *L51.9+, M14.8**
- - - arthropathie *L51.9+, M14.8**
- - - herpès, iris *L51.1*
- - bulleux *L51.1*
- - dans les antécédents personnels *Z87.2*
- - majeur *L51.1*
- - non bullleux *L51.0*
- fessier *L22*
- figuré persistant *L53.3*
- froid, dû au *T69.1*
- glutéal *L22*
- ichtyosiforme, congénital, bulleux *Q80.3*
- induré
- - non tuberculeux *L52*
- - tuberculeux *A18.4*
- induré de Bazin *A18.4*
- infectieux *B08.3*
- - aigu *B08.3*
- - phobie *F45.2*
- intertrigineux *L30.4*
- iris *L51.1+, H22.8**
- localisé, dû à des médicaments *L27.1*
- marginé *L53.2*
- - lors de fièvre, rhumatismal, aigu *I00+, L54.0**
- mégal- *B08.3*
- migrant *A26.0*
- - langue *K14.1*
- noueux *L52*
- - avec
- - - arthrite *L52+, M14.8**
- - - arthropathie *L52+, M14.8**
- - non tuberculeux *L52*
- nouveau né (du-) *P83.8*
- palmaire *L53.8*
- paume de la main *L53.8*
- pernio *T69.1*
- polymorphe *L51.9*
- - conjonctive *L51.1+, H13.8**
- - pemphigoïde *L12.0*
- rhumatismal *L53.2*
- scarlatiniforme *L53.8*
- solaire *L55.0*
- streptococcique *L53.2*
- subit *B08.2*

Erythème –*suite*

- toxique du nouveau-né *P83.1*
- toxique NCA *L53.0*
- tuberculeux, primaire *A18.4*

Érythème acnéiforme *L66.4*

Erythrasma *L08.1*
- intertrigineux *L08.1*

Erythrémie (polyglobulie) *C94.00*
- aiguë *C94.00*
- - rémission complète *C94.01*
- chronique *C94.10*
- - rémission complète *C94.11*
- rémission complète *C94.01*
- secondaire *D75.1*

Erythroblastes, anémie
- chez
- - enfant *D56.1*
- - foetus/nouveau-né *P55.9*

Erythroblastique, anémie, familiale *D56.1*

Erythroblastopénie *D60.9*

Erythroblastose
- foetale *P55.9*
- - due à isoimmunisation ABO *P55.1*
- Heilmeyer-Schöner (de-) *C94.10*
- - rémission complète *C94.11*
- Rh [Rhésus], foetale *P55.0*

Erythrocyanose *I73.8*
- crurale *I73.8*
- - jeune fille (de la -) *I73.8*

Erythrocytaire
- autosensibilisation *D69.2*
- - avec hémorragie
- - - cutanée *D69.2*
- - - pétéchiale *D69.2*
- hypoplasie, congénitale *D61.0*

Erythrocytémie (polyglobulie) *C94.00*
- rémission complète *C94.01*

Erythrocytes
- anémie
- - aplastique
- - - congénitale *D61.0*
- - - transitoire *D60.1*
- - isolée *D60.9*
- anormales *R71*
- aplasie, isolée
- - avec thymome *D60.9*
- - chronique *D60.0*
- - congénitale *D61.0*
- - infantile *D61.0*
- - primaire *D61.0*
- - transitoire *D60.1*
- hypoplasie, avec anémie *D61.9*
- morphologie, modifiée *R71*
- volume, modifié *R71*

Erythrocytes-Glutathion, carence, avec a *D55.1*

Erythrocytopénie *D64.9*

Erythrocytose (polyglobulie) *D75.1*
- familiale *D75.0*
- ovale, héréditaire *D58.1*

Erythrocyturie d'effort *N02.9*

Erythrodermie *L53.9*
- desquamative de Leiner (du nourrisson) *L21.1*

Erythrodermie –*suite*

- ichtyosiforme congénitale bulleuse *Q80.3*
- maligne, réticulo-leucémique (réticulose de Sézary) *C84.1*
- nouveau-né (du-) *P83.8*
- psoriasique *L40.8*
- secondaire *L53.9*

Erythroedème (acrodynie) *T56.1*
- polyneuropathique *T56.1*

Erythrogenesis imperfecta *D61.0*

Erythroïde, hyperplasie *D75.8*

Erythroleucémie *C94.00*
- aiguë *C94.00*
- - rémission complète *C94.01*
- rémission complète *C94.01*

Erythro-leucoblastose *C94.00*
- rémission complète *C94.01*

Erythroleucose *C94.00*

Erythromélalgie *I73.8*
- primaire *I73.8*

Erythromélie *L90.4*

Erythromycine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Erythrophagocytose *D75.9*

Erythrophobie *F40.2*

Erythroplasie *D07.4*
- bouche *K13.2*
- bouche, épithélium buccal, et langue *K13.2*
- col utérin (museau de tanche) *R93.8*
- conjonctive *D09.2*
- langue *K13.2*
- pénis *D07.4*
- Queyrat, de *D07.4*
- - pénis *D07.4*

Erythropoïétine, polyglobulie *D75.1*

Erythropoïétique
- porphyrie, congénitale *E80.0*
- protoporphyrie *E80.0*

Erythrose
- aiguë *C94.00*
- - rémission complète *C94.01*
- chronique *C94.10*
- - rémission complète *C94.11*

Erythrosine
- allergie [E127] *T78.4*
- hypersensibilité [E 127] *T78.4*

Escarre *L89.99*
- 1er degré *L89.19*
- - apophyse épineuse *L89.12*
- - coccyx *L89.14*
- - crâne *L89.10*
- - crête iliaque *L89.13*
- - ischion *L89.15*
- - membre supérieur *L89.11*
- - sacrum *L89.14*
- - talon *L89.17*
- - trochanter *L89.16*
- 2e degré *L89.29*
- - apophyse épineuse *L89.22*
- - coccyx *L89.24*
- - crâne *L89.20*
- - crête iliaque *L89.23*

Escarre *–suite*
- 2e degré *–suite*
- - ischion *L89.25*
- - membre supérieur *L89.21*
- - sacrum *L89.24*
- - talon *L89.27*
- - trochanter *L89.26*
- 3e degré *L89.39*
- - apophyse épineuse *L89.32*
- - coccyx *L89.34*
- - crâne *L89.30*
- - crête iliaque *L89.33*
- - ischion *L89.35*
- - membre supérieur *L89.31*
- - sacrum *L89.34*
- - talon *L89.37*
- - trochanter *L89.36*
- apophyse épineuse *L89.92*
- avec gangrène *L89.99*
- bras *L89.91*
- coccyx *L89.94*
- crâne *L89.90*
- crête iliaque *L89.93*
- dos *L89.99*
- ischion *L89.95*
- jambe *L89.98*
- localisation *L89.99*
- malléole externe *L89.98*
- membre supérieur *L89.91*
- mollet *L89.98*
- orteil *L89.98*
- pied *L89.98*
- région anale *L89.99*
- région du coccyx *L89.94*
- sacrum *L89.94*
- talon *L89.97*
- trochanter *L89.96*

Escherichia
- avec résistance
- - à
- - - amikacine *U80.4!*
- - - carbapénèmes *U80.4!*
- - - quinolones *U80.4!*
- - prouvée, contre les bêtalactamines [résistance aux ESBL] *U80.4!*
- coli
- - agent pathogène *B96.2!*
- - arthrite *M00.89, B96.2!*
- - bronchopneumonie *J15.5*
- - choc septique à *A41.51*
- - diarrhée *A04.4*
- - entérite *A04.4*
- - entérohémorragique
- - - diarrhée *A04.3*
- - - entérite *A04.3*
- - entéroinvasive
- - - diarrhée *A04.2*
- - - entérite *A04.2*
- - entéropathogène, avec diarrhée *A04.0*
- - entérotoxigène
- - - diarrhée *A04.1*
- - - entérite *A04.1*
- - infection NCA *A49.8*
- - - congénitale NCA *P39.8*
- - - généralisée *A41.51*
- - - voies urinaires *N39.0, B96.2!*
- - méningite *G00.8, B96.2!*
- - pneumonie *J15.5*

Escherichia *–suite*
- coli *–suite*
- - pneumonie *–suite*
- - - congénitale *P23.4*
- - - lobaire *J15.5*
- - septicémie *A41.51*
- - - chez le nouveau-né *P36.4*
- - - congénitale *P36.4*

ESES [état de mal épileptique électrique *G40.01*

Esodéviation *H50.0*

Esophorie *H50.5*
- décompensée *H50.5*
- lors de
- - convergence excessive *H51.1*
- - insuffisance de divergence *H51.8*

Esotropie *H50.0*
- alternante *H50.0*
- - intermittente *H50.3*
- - non intermittente *H50.0*
- alternante convergence oblique supérieure et parésie oblique inférieure *H50.0*
- avec
- - excès de convergence *H50.0*
- - orbitopathie endocrine en cas de maladie de Basedow *E05.0+, H06.3**
- consécutive *H50.0*
- hyperfonctionnement du muscle oblique supérieur et parésie du muscle oblique inférieur *H50.0*
- infantile *H50.0*
- intermittente *H50.3*
- monoculaire *H50.0*
- paralysie de divergence, Stangler-Zuschrott *H51.8*
- residuelle *H50.0*
- - intermittente *H50.3*
- secondaire *H50.0*
- unilatérale *H50.0*
- V, en cas de parésie du muscle oblique supérieur et hyperfonctionnement du muscle oblique inférieur *H50.0*
- variable *H50.0*

Espace interdigital plantaire

Espacement insuffisant, dents *K07.3*

Essence
- dermite de contact, toxique *L24.2*
- effet toxique *T52.0*
- inhalation, avec
- - bronchopneumonie *J69.1*
- pneumonie d'aspiration d' *J69.1*

essentiel Polyglobulie *D45*

Essentiel(-le)
- acide gras, carence *E63.0*
- agranulocytose *D70.3*
- anémie *D64.9*
- atrophie, iris *H21.2*
- - progressive *H21.2*
- cryoglobulinémie *D89.1*
- dysménorrhée *N94.6*
- fructosémie *E74.1*
- fructosurie *E74.1*
- hématurie *R31*
- histiocytose lipoïdique *E75.2*
- hypercholestérolémie *E78.0*
- - familiale *E78.0*
- hyperlipidémie *E78.4*

Essentiel(-le) *–suite*
- hypertension *I10.90*
- - artérielle *I10.90*
- - bénigne préexistante en cas de grossesse *O10.0*
- - bénine, avec crise, hypertensive *I10.01*
- - cas de grossesse, préexistante, avec protéinurie, surajoutée *O11*
- - primitive *I10.90*
- hypertension, primitive *I10.90*
- hypertriglycéridémie *E78.1*
- induration brune, du poumon *E83.1+, J99.8**
- myoclonie *G25.3*
- oedème, aigu *T78.3*
- pentosurie *E74.8*
- télangiectasie *L81.7*
- - familiale *L81.7*
- tension artérielle *I10.90*
- thrombocytémie *D47.3*
- tremblement *G25.0*
- - cas d'ataxie cérébelleuse à début précoce *G11.1*
- xanthomatose *E75.5*

Essoufflement *R06.88*

ESSV [extrasystole supraventriculaire] *I49.4*

Ester, dermatite de contact, toxique *L24.2*

Esthésioneuroblastome *C30.0*

Esthésioneurocytome *C30.0*

Esthésioneuroépithéliome *C30.0*

Esthiomène *A55*

Estivo-automnale, fièvre *B50.9*

Estomac
- absence
- - acquise *Z90.3*
- - congénitale *Q40.2*
- - partielle, acquise *Z90.3*
- accessoire *Q40.2*
- acidité *K31.88*
- adhérence *K66.0*
- affection *K31.9*
- - fonctionnelle *K31.88*
- - - psychogène *F45.31*
- affection maligne *C16.9*
- agénésie *Q40.2*
- amyloïdose *E85.4+, K93.8**
- anacidité *K31.88*
- angiodysplasie *K31.81*
- - avec hémorragie *K31.82*
- anomalie *Q40.3*
- atonie *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- bézoard *T18.2*
- calcul *K31.88*
- cancer du corps *C16.2*
- cancer précoce *C16.9*
- carcinome
- - cardia *C16.0*
- - cellules en bague à chaton *C16.9*
- - squirrheux, avec linite plastique *C16.9*
- carcinome in situ *D00.2*
- cardia, carcinome *C16.0*
- cardialgie *K22.0*
- cardiospasme *K22.0*
- cascade *K31.2*
- catarrhe *K29.7*

Estomac –*suite*

- colique *R10.4*
- contraction *K31.88*
- - en sablier
- - - congénitale *Q40.2*
- - - psychogène *F45.31*
- - psychogène *F45.31*
- contraction, en sablier *K31.88*
- corps étranger *T18.2*
- corrosion *T28.7*
- crampe *R10.4*
- crochet *K31.88*
- dédoublement *Q40.2*
- dégénérescence *K31.88*
- déplacement, congénital *Q40.2*
- descente *K31.88*
- digestion *K31.88*
- dilatation *K31.88*
- - aiguë *K31.0*
- - congénitale *Q40.2*
- - psychogène *F45.31*
- distension *K31.88*
- - aiguë *K31.0*
- diverticule *K31.4*
- - congénital *Q40.2*
- douleurs *R10.1*
- - psychogènes *F45.4*
- duplication *Q40.2*
- dysfonctionnement *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- ectasie *K31.88*
- érosion *K25.9*
- et duodénum, maladie *K31.9*
- étranglement, en cas d'hernie *K46.0*
- - gangréneuse *K46.1*
- fistule *K31.6*
- fomation de poche *K31.4*
- grippe [influenza] *J11.8*
- hémorragie *K92.2*
- - chez le nouveau né *P54.3*
- - dans les antécédents personnels *Z87.1*
- hyperacidité *K31.88*
- hyperactivité *K31.88*
- hyperémie *K31.88*
- hypermobilité *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- hypersensibilité *K52.2*
- - psychogène *F45.31*
- hypertonie *K31.88*
- hypertrophie *K31.88*
- hypoacidité *K31.88*
- hypochlorhydrie *K31.88*
- hypomotilité *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- inertie *K31.88*
- inflammation *K29.7*
- intrathoracique *K44.9*
- irritabilité *K31.88*
- - *K31.9*
- - psychogène *F45.31*
- irritabilité, psychogène *F45.31*
- irritable *K30*
- - psychogène *F45.31*
- léiomyosarcome *C16.9*
- lésion *S36.3*
- lipome *D17.5*
- lymphangiome *D18.18*
- lymphome *C85.9*

Estomac –*suite*

- lymphome –*suite*
- - primaire *C85.9*
- malformation
- - acquise *K31.88*
- - congénitale *Q40.3*
- MALT [lymphomes du tissu lymphoïde associé aux muqueuses] *C85.1*
- nécrose *K31.88*
- nerveux *F45.31*
- névrose *F45.31*
- obstruction NCA *K31.88*
- - congénitale *Q40.2*
- - due à un pylorospasme *K31.3*
- paralysie *K31.88*
- perforation *K25.5*
- - sans ulcère *K31.88*
- phlegmon *K29.6*
- phytobézoard *T18.2*
- polype *K31.7*
- - hyperplasique *K31.7*
- position anormale *K31.88*
- pression *K31.9*
- prolapsus *K31.88*
- psychogène *F45.31*
- ptose *K31.88*
- pylorique *K31.9*
- ramollissement *K31.88*
- rétrécissement *K31.88*
- - congénital *Q40.2*
- rétrécissement en sablier *K31.2*
- rupture *K25.5*
- - spontanée, non traumatique *K31.88*
- - traumatique *S36.3*
- sablier *K31.2*
- - congénital *Q40.2*
- - psychogène *F45.31*
- sac en cuir *C16.9*
- sclérose *K31.88*
- spasme *K31.88*
- - névrotique *F45.31*
- sténose *K31.88*
- syphilis *A52.7+, K93.8**
- transposition *Q40.2*
- - avec inversion, viscères, complète *Q89.3*
- trichobézoard *T18.2*
- trichophytobézoard *T18.2*
- trouble de la motricité *K31.88*
- trouble, sécrétion *K31.9*
- troubles *K31.9*
- - fonctionnels *K31.9*
- - nerveux *F45.31*
- troubles fonctionnels psychogènes *F45.31*
- tuberculose *A18.8+, K93.8**
- tumeur *D37.1*
- ulcère *K25.9*
- - aigu *K25.3*
- - - avec
- - - - hémorragie *K25.0*
- - - - perforation *K25.1*
- - avec hémorragie *K25.4*
- - avec perforation *K25.5*
- - chronique *K25.7*
- - dans les antécédents personnels *Z87.1*
- - hémorragie *K25.4*
- - psychogène *F54, K25.9*
- ulcère de stress *K25.3*

Estomac –*suite*

- varices *I86.4*
- volvulus, dû à l'absence de ligament gastrocolique *K31.88*

Estradiol

- allergie *T88.7*
- effet secondaire *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Estrogène

- effet secondaire *T88.7*
- excédent *E28.0*
- - cas de dysfonction, ovaire *E28.0*
- - iatrogène *E28.0*
- - induit par un médicament *E28.0*
- hypersécrétion *E28.0*
- manque *E28.3*
- - avec
- - - colpite *N95.2*
- - - vulvite *N95.2*
- réduction *E28.3*

Etablissement

- certificat médical *Z02*
- - pour
- - - aptitude *Z02*
- - - cause de décès *Z02*
- - - invalidité *Z02*
- renouvellement d'ordonnance *Z76.0*

Etat

- absences, épileptique *G41.1*
- agitation *R45.1*
- - à une psychose, réactif *F30.8*
- - psycho-végétatif *R45.1*
- angine *I20.0*
- anxiété *F41.1*
- - épisode dépressif *F41.2*
- - - nevrotique *F41.2*
- - réactive *F41.1*
- anxieux *F41.1*
- - dépressif *F41.2*
- - - névrotique *F41.2*
- - et état de tension aigu *F41.3*
- - névrotique *F41.1*
- - psycho-neurotique *F41.1*
- - réactive *F41.1*
- asthmatique *J46*
- asymptomatique, VIH *Z21*
- burn out *Z73*
- confusionnel *R41.-*
- confusionnel (psychogéne) *F44.8*
- confusionnel aigu *F05.9*
- convulsif idiopathique *G41.0*
- crises *F43.0*
- dégénératif, globe oculaire *H44.5*
- dépressif *F32.9*
- dyskinésie *G80.3*
- épileptique *G41.9*
- - avec attaque focale complexe *G41.2*
- - bioéléctrique, pendant le sommeil *G40.01*
- - cas de
- - - grand mal *G41.0*
- - - petit mal *G41.1*
- - focal, moteur *G41.8*
- - partiel *G41.8*
- - psychomoteur *G41.2*
- - tonico-clonique *G41.0*
- épuisement total *Z73*
- esprit, déprimé, pessimiste *F32.9*

Etat –*suite*
- exception
- - psychique *F43.9*
- - psychogène, non précisée *F43.9*
- excitation *R45.1*
- - psychovégétative *R45.1*
- fébrile *R50.88*
- général, mauvais *R53*
- grabataire *Z74.0*
- - nécessitant des soins médicaux *Z74.0*
- grand mal (épileptique) *G41.0*
- - avec crise tonico-clonique *G41.0*
- hallucinatoire organique *F06.0*
- lobes temporaux *G41.2*
- lymphatique, constitutionnel *R59.1*
- mal épilectique, Bioélectrique, pendant le sommeil *G40.01*
- maniaque *F30.9*
- ménopause *N95.1*
- migraineux *G43.2*
- névrotique *F48.9*
- - avec
- - - phase dépressive *F34.1*
- - - phases de dépersonnalisation *F48.1*
- obsessionnel *F42.0*
- panique *F41.0*
- paranoïa *F22.0*
- pathologique, placenta *O43.9*
- persistant *F19.7*
- phobique *F40.9*
- possession (hystérique) *F44.3*
- post-commotion cérébrale *F07.2*
- progressif, carcinome *C80*
- pseudo-comateux *R40.1*
- psychose, schizophrène *F23.1*
- psychotique, aigü *F23.9*
- résiduel
- - glaucome à angle étroit
- - - aigu *H40.2*
- - - chronique *H40.2*
- - - intermittent *H40.2*
- - - primitif
- - - - aigu *H40.2*
- - - - chronique *H40.2*
- - - - intermittent *H40.2*
- - - - retardé *H40.2*
- - glaucome pigmentaire *H40.1*
- - - primitif *H40.1*
- - glaucome, primitif, capsulaire, avec pseudo-exfoliation, cristallin *H40.1*
- - schizophrénique *F20.5*
- résiduel, schizophrénique *F20.5*
- stress *F43.9*
- stress post-traumatique *F43.1*
- suite à
- - ablation kyste de la vessie *Z90.6*
- - ablation larynx *Z90.0*
- - ablation pancréas *Z90.4*
- - ablation sein *Z90.1*
- - ablation vessie *Z90.4*
- - amputation, membre inférieur *Z89.5*
- - Apoplexie *I69.4*
- - arthrodèse *Z98.1*
- - athyroïdie, avec hypothyréose *E89.0*
- - cellules souches, transplantation, hématopoiétique
- - - avec immunosuppression *Z94.81*
- - - sans immunosuppression *Z94.80*
- - hystérectomie *Z90.7*

Etat –*suite*
- suite à –*suite*
- - infarctus, coeur *I25.29*
- - mastectomie unilatérale ou bilatérale *Z90.1*
- - méningite *G09*
- - partielle ou complète
- - - ablation *Z90.7*
- - - ablation colon *Z90.4*
- - - ablation estomac *Z90.3*
- - - ablation poumon *Z90.2*
- - - ablation prostate *Z90.7*
- - - ablation rein *Z90.5*
- - - hystérectomie *Z90.7*
- - pontage aorto-coronaire *Z95.1*
- - substitut
- - - valvule aortique *Z95.4*
- - - valvule mitrale *Z95.4*
- - trachéostomie *Z93.0*
- - transplantation *Z94.9*
- - - cardiaque *Z94.1*
- - - peau *Z94.5*
- - - rénale *Z94.0*
- tension *F43.9*
- - catatonique *F20.2*
- - et état d'angoisse aigu *F41.3*
- - nerveuse *R45.0*
- thymus, lymphatique *E32.8*
- typhoïde *A01.0*
- urgence
- - psychique *F43.9*
- - réactif, avec dysfonctionnement psychomoteur principalement *F43.0*
- varices
- - bilatérales *I83.9*
- - jambe *I83.9*

étendue Maladie chronique greffon contre l ' hôte, forme *T86.04*

Eternuement *R06.7*
- inapaisables *R06.7*

Ethanol
- allergie *T78.4*
- dépendance *F10.2*
- hypersensibilité *T78.4*
- intoxication *T51.0*

Ethanolaminurie *E72.8*

Ethmoïdal, fistule *J32.2*

Ethmoïdite *J32.2*
- aiguë *J01.2*
- cas de grippe [influenza] *J11.1*
- chronique *J32.2*
- non purulente *J32.2*
- polypeuse *J32.2*
- purulente *J32.2*
- Woakes *J33.1*

Ethnique, discrimination *Z60*

Ethylique, cirrhose hépatique *K70.3*

Ethylisme *F10.2*
- chronique *F10.2*

Ethylmorphine, dépendance *F11.2*

Ethynil-oestradiol, effet secondaire *T88.7*

Etoiles de mer
- contact avec effet toxique *T63.6*
- morsure, avec empoisonnement *T63.6*
- piqûre, avec intoxication *T63.6*

Etourdissement *R40.0*

étranglée sans gangrène
- Hernie parastomale : *K43.3*
- tout hernie mentionné en K43 . 6 - : *K43.6*

Etranglement
- colon *K56.2*
- corde, asphyxie *T71*
- herniaire *K46.0*

Être en observation *Z03.9*

Etrier
- ankylose *H74.3*
- fixation *H74.3*

Etroit
- anneau hyménal *N89.6*
- bassin, avec
- - disproportion fœto-pelvienne *O33.1*
- - grossesse *O33.1*
- conditions de logement *Z59*
- détroit inférieur, en cas de césarienne *O33.3*
- détroit supérieur, bassin, en cas de césarienne *O33.2*
- rétrecissement
- - artère coronaire *I25.19*
- - - syphilitique, congénitale *A50.5+, I52.0**
- - artère pulmonaire *Q25.6*
- - artère rétinienne *H35.0*
- - artères
- - - auditive interne *I65.8*
- - - basiliaire *I65.1*
- - - carotide *I65.2*
- - - - bilatérale *I65.3*
- - - choroidienne *I66.8*
- - - communicante postérieure *I66.8*
- - - hypophysaire *I66.8*
- - - labyrinthique *I65.8*
- - - pontine *I66.8*
- - - vertébrales *I65.0*
- - - - bilatérale *I65.3*
- - artérielle NCA *I77.1*
- - - cérébelleux *I66.3*
- - - cérébraux *I66.9*
- - - précérébrale *I65.9*
- - - - bilatérale *I65.3*
- - - - multiples *I65.3*
- - - précérébrale, extracrânienne *I65.9*
- - - - multiples *I65.3*
- - bassin
- - - avec disproportion, foeto-pelvienne *O33.1*
- - - mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - prise en charge, mère *O33.1*
- - bassin, médian, prise en charge, mère *O33.3*
- - chambre de l'oeil, antérieure *H40.0*
- - col utérin *N88.2*
- - conduit auditif *H61.3*
- - - externe *H61.3*
- - Détroit supérieur du bassin
- - - obstruction, naissance *O65.2*
- - - prise en charge, mère *O33.2*
- - fente palpébrale *H02.5*
- - introitus vaginae *N89.6*
- - larynx *J38.6*
- - multiple, artère, extracrânienne *I65.3*
- - paupière *H02.5*
- - prépuce *N47*

Etroit –*suite*
- rétrecissement –*suite*
- - sous-glottique, oedèmateuse, chronique *J38.4*
- - syphilitique, artère coronaire NCA *A52.0+, I52.0**
- - trompe d'Eustache *H68.1*
- - uretère *N13.5*
- - - avec infection *N13.6*
- - urètre *N35.9*
- - voie basse
- - - et médiane, obstacle, naissance *O65.3*
- - - prise en charge, mère *O33.3*
- - voies lacrymales *H04.5*

Etroitesse
- col vésical *N32.0*
- méat, distal *N35.9*
- prépuce *N47*
- sous-glottique, œdème, chronique *J38.4*
- uretèral *N13.5*
- uretère *N13.5*
- uretères *N13.5*
- urètre *N35.9*
- - bulbaire *N35.9*

Eulenburg Paramyotonie congénital Maladie d ' *G71.1*

Eumycétome *B47.0*

Eunuchoïdisme *E29.1*
- fertile *E23.0*
- hypogonadotrope *E23.0*

Europe centrale
- encéphalite *A84.1*
- méningo-encéphalite verno-estivale *A84.1*
- - vaccination *Z24.1*

Européenne, blastomycose *B45.9*

Euthyréose, en cas de
- goitre
- - avec autonomie
- - - multinodulaire *E04.2*
- - - uninodulaire *E04.1*
- - nodulaire *E04.9*

Euthyroïdien, goitre *E04.9*
- diffus *E04.0*

Eutrophique, prématuré *P07.3*

Evacuation
- artères rénales, sténose *I70.1*
- bassinet, sténose *N13.5*
- voies urinaires
- - spasme *R39.8*
- - trouble fonctionnel *N39.9*

Evanouissement *R55*
- à la chaleur *T67.1*

Evénement (incident)
- humiliant dans l'enfance *Z61*
- malaise grave inopiné du nourrisson (MGIN) (syndrome ALTE apparent life threatening event) *R06.80*
- sans autre précision, circonstances indéterminées *Y34.9!*

Evénement aigu constituant un risque vit *R06.80*

Eventration *K43.9*
- cas de malformation, diaphragme, congénitale *Q79.0*

Eversion
- col de l'utérus *N86*
- - avec cervicite *N72*
- pied NCA *M21.07*
- pied, congénitale NCA *Q66.6*
- uretère *N28.8*
- urètre *N36.3*
- utérus *N81.4*
- vessie *N32.8*

Eversion du point lacrymal *H04.5*

Eversion utérus atypique *N86*

Eviscération
- due à une lésion obstétricale *P15.8*
- oeil, traumatique *S05.7*
- post-opératoire *T81.3*
- traumatique NCA *T06.5*

évolution imprévisible inconnu
- Autre organe digestif , tumeur à *D37.7*
- - digestif , Tumeur de la cavité buccal et des organe digestif à *D37.78*
- Epiphyse glande pinéale] , tumeur à *D44.5*
- Pancréas Tumeur de la cavité buccal et des organe digestif à *D37.70*
- tumeur histiocytaire à *D47.7*

Evolution pulmonaire *J84.1*

Exacerbation
- aiguë, en cas de
- - bronchite
- - - asthmatique chronique *J44.19*
- - - chronique obstructive *J44.19*
- - - emphysémateuse chronique *J44.19*
- - maladie pulmonaire obstructive chronique *J44.19*
- amygdalite chronique *J35.0*
- cas de
- - BPCO [bronchopneumopathie chronique obstructive] *J44.19*
- - bronchite emphysémateuse obstructive *J44.19*
- - maladie pulmonaire obstructive *J44.19*
- - trachéobronchite chronique obstructive *J44.19*
- infection, en cas de
- - bronchite emphysémateuse *J44.19*
- - maladie pulmonaire obstructive *J44.19*
- origine infectueuse
- - bronchite emphysémateuse *J44.19*
- - maladie pulmonaire, obstructive *J44.19*
- relative à une infection, en cas d'asthme bronchique allergique *J45.8*
- rhinosinusite chronique *J32.8*

Exacerbé(e)
- asthme *J45.0*
- bronchite *J40*
- - obstructive *J44.19*
- bronchite emphysémateuse *J44.19*

Examen
- bilan
- - à
- - - admission
- - - - colonie de vacances *Z02*
- - - - prison *Z02*
- - - adoption *Z02*
- - - développement, pendant l'adolescence *Z00.3*
- - - immigration *Z02*
- - - mariage *Z02*
- - - naturalisation *Z02*

Examen –*suite*
- bilan –*suite*
- - à –*suite*
- - - période de croissance pendant l'enfance *Z00.2*
- - - puberté *Z00.3*
- - admission
- - - pour
- - - - établissement résidentiel *Z02*
- - - - forces armées *Z02*
- - - - institution éducative *Z02*
- - - - maison de retraite *Z02*
- - allergie *Z01.5*
- - après soins
- - - carcinome
- - - - chimiothérapie *Z08.2*
- - - - radiothérapie *Z08.1*
- - - - traitement chirurgical *Z08.0*
- - - routine *Z09.9*
- - - suite à
- - - - intervention chirurgicale NCA *Z09.0*
- - - - néoplasme, malin *Z08.9*
- - audition *Z01.1*
- - bassin, féminin, de routine *Z01.4*
- - dentaire *Z01.2*
- - donneur d'organe ou de tissu potentiel *Z00.5*
- - éléctrophysiologique, cardiaque, anormal *R94.3*
- - embauche *Z02*
- - enfant *Z00.1*
- - enfant, sain *Z00.1*
- - état de santé, auprès d'un échantillon de la population *Z00.8*
- - femme non enceinte
- - - avortement à répétition *N96*
- - - suspicion, insuffisance, col de l'utérus *N88.3*
- - général, médical *Z00.0*
- - génétique *Z01.88*
- - génétique en relation avec procréation assistée *Z31.5*
- - gynécologique *Z01.4*
- - - cause de
- - - - dispositif de contraception *Z30.5*
- - - - entretien de la contraception *Z30.4*
- - - généralisé *Z01.4*
- - hypersensibilité *Z01.5*
- - laboratoire *Z01.7*
- - l'assurance *Z02*
- - liquide amniotique *Z36.2*
- - - prénatal NCA *Z36.2*
- - médecine du travail *Z10*
- - médical
- - - athlètes *Z10*
- - - d'une population *Z10*
- - - et contrôle des personnes dans le cadre d'un programme de recherche clinique *Z00.6*
- - - prisonniers *Z10*
- - - prostitution *Z10*
- - - raison de
- - - - admission scolaire *Z02*
- - - - enquête de la population *Z00.8*
- - - - fins administratives *Z02*
- - - - permis de conduire *Z02*
- - - réfugiés *Z10*
- - mère
- - - allaitement *Z39.1*

Examen *–suite*
- bilan *–suite*
- - mère *–suite*
- - - immédiatement après accouchement *Z39.0*
- - - postpartum *Z39.2*
- - observation
- - - accident de transport *Z04.1*
- - - accident de travail *Z04.2*
- - oreille, examen auditif *Z01.1*
- - peau *Z01.5*
- - - hypersensibilité *Z01.5*
- - périodique *Z00.0*
- - permis de conduire *Z02*
- - petit enfant *Z00.1*
- - postpartum, de routine *Z39.2*
- - pour
- - - activité sportive *Z02*
- - - admission à l'école *Z02*
- - prise de contact *Z02*
- - prophylactique, cancer *Z12.9*
- - psychiatrique NCA *Z00.4*
- - psychiatrique, général, administratif *Z04.8*
- - radiologique NCA *Z01.6*
- - raisons médico-légales *Z04.8*
- - rayons X *Z01.6*
- - routine *Z00.0*
- - santé, chez l'enfant *Z00.1*
- - spécial *Z01.9*
- - suite à
- - - accident de voiture *Z04.1*
- - - accident NCA *Z04.3*
- - - traitement *Z09.9*
- - tension artérielle *Z01.3*
- - urinaire, avec culture positive *R82.7*
- - victime ou coupable suite à des violences sexuelles *Z04.5*
- - vision *Z01.0*
- cas de
- - anastomose *Z98.0*
- - bypass
- - - aorto-coronaire *Z95.1*
- - - intestinal *Z98.0*
- - implant vasculaire, coronaire *Z95.5*
- - shunt, ventricule *Z98.2*
- - stomie, artificielle *Z93.9*
- contrôle *Z09.9*
- - après
- - - chimiothérapie *Z09.2*
- - - - néoplasme malin *Z08.2*
- - - chirurgie *Z09.0*
- - - intervention chirurgicale, pour tumeur maligne *Z08.0*
- - - psychothérapie *Z09.3*
- - - radiothérapie *Z09.1*
- - - - tumeur maligne *Z08.1*
- - - traitement d'une fracture *Z09.4*
- - - traitements combinés, pour tumeur maligne *Z08.7*
- - - transplantation d'organe *Z09.80*
- - contraception *Z30.9*
- - - médicamenteuse *Z30.4*
- - mère, de routine, post-partum *Z39.2*
- - usage, contraceptif *Z30.4*
- contrôle, peau, après radiothérapie *Z09.1*
- cytologiques, Papanicolaou, test de *R87.6*

Examen *–suite*
- dentaire *Z01.2*
- dépistage d'anomalie chromosomique *Z13.7*
- - chez un athlète *Z10*
- développement, état de
- - enfant *Z00.1*
- - nourrisson *Z00.1*
- échantillon *Z02*
- général
- - de
- - - écoliers *Z10*
- - - équipes sportives *Z10*
- - - étudiants *Z10*
- - - forces armées *Z10*
- - - résidents d'établissements institutionnels *Z10*
- - médecine du travail *Z10*
- laboratoire, anticorps *Z01.7*
- laboratoire, VIH *R75*
- matériel
- - col de l'utérus, anormal *R87.9*
- - vulve, anormal *R87.9*
- médecine du travail *Z10*
- médical de contrôle
- - carcinome, suite à
- - - chimiothérapie *Z08.2*
- - - radiothérapie *Z08.1*
- - - traitement chirurgical *Z08.0*
- - routine *Z09.9*
- - suite à
- - - intervention chirurgicale NCA *Z09.0*
- - - tumeur, maligne *Z08.9*
- médical préventif NCA *Z00.0*
- - adolescent *Z00.0*
- - cancer *Z12.9*
- - gynécologique NCA *Z01.4*
- - prénatal, lors d'une grossesse avec un déroulement normal *Z34*
- - sanitaire, chez l'enfant (U1, U2, U3, etc.) *Z00.1*
- médical préventif pour les adolescents *Z00.0*
- médical, prise de contact *Z02*
- nystagmus, calorique, anormal *R94.1*
- oreilles et de l'audition *Z01.1*
- permis de conduire *Z02*
- postpartum NCA *Z39.2*
- pour pratique sportive *Z02*
- prénatal, avec résultats
- - biochimiques anormaux *O28.1*
- - chromosomiques, anormaux *O28.5*
- - génétiques anormaux *O28.5*
- - radiologiques anormaux *O28.4*
- radiographique *Z01.6*
- - routine NCA *Z01.6*
- - thorax *Z12.3*
- - thorax, de routine *Z01.6*
- résultat *Z71*
- résultats
- - vagin, anormal *R87.9*
- routine *Z00.0*
- - gynécologique *Z01.4*
- santé, de l'enfant (U1, U2, U3, etc) *Z00.1*
- spécial de dépistage des maladies de type rickettsioses *Z11*
- suite à
- - angioplastie, périphérique NCA *Z95.88*

Examen *–suite*
- suite à *–suite*
- - arthrodèse *Z98.1*
- - colostomie *Z93.3*
- - cystostomie *Z93.5*
- - dérivation, ventricule *Z98.2*
- - dialyse *Z99.2*
- - gastrostomie *Z93.1*
- - iléostomie *Z93.2*
- - néphrostomie *Z93.6*
- - urethrostomie *Z93.6*
- - urétrostomie *Z93.6*
- test de grossesse *Z32*
- urine anormal NCA *R82.9*
- vision *Z01.0*
- - examen, yeux *Z01.0*

Exanthème *R21*
- à
- - ingestion d'aliment *L27.2*
- - médiacament d'usage externe *L25.1*
- - médicament *L27.0*
- - - généralisé *L27.0*
- - médicament en contact avec la peau *L25.1*
- - sérothérapie *T80.6*
- - virus *B09*
- allergique *L23.9*
- bord de la paupière, allergique *H01.1*
- Boston *A88.0*
- cas de
- - polyarthropathie, épidémique *B33.1*
- - rougeole *B05.9*
- - stomatite, vésiculaire, due à un entérovirus *B08.4*
- - varicelle *B01.8*
- chronique migrateur *A69.2*
- contact, allergique, du à un médicament *L23.3*
- cutané *R21*
- - infecté *L08.9*
- épidémique *B33.1*
- - avec méningite *A88.0+, G02.0**
- fièvre, dû à un entérovirus *A88.0*
- main, pied, bouche *B08.4*
- main-pied-bouche *B08.4*
- morbilliforme *R21*
- paupière *H01.1*
- pustuleux *L08.0*
- scarlatineux *A38*
- scarlatiniforme *A38*
- séborrhoïde *L21.9*
- subit *B08.2*
- toxique, dû au contact avec la peau, dû à un médicament *L24.4*
- urticarien *L50.9*
- vésiculaire *R21*
- viral *B09*

Excavation, papille *H47.2*

Excentrique, trouble de la personnalité *F60.8*

Excès
- androgènes *E28.1*
- - ovariens *E28.1*
- - surrénaux *E27.0*
- - testiculaires *E29.0*
- blastes type I AREB I] , Anémie réfractaire avec *D46.2*
- corticoïdes, minéralo- *E27.0*

Excès –*suite*
- liquidien *E87.7*
- oestrogènes *E28.0*
- - cas de dysfonction ovarienne *E28.0*
- - iatrogène *E28.0*
- - induit médicamenteusement *E28.0*
- potassium (kaliémique) *E87.5*
- sodium (natrémique) *E87.0*

Excessif, -ve
- abrasion (attrition) dentaire *K03.0*
- appétit *R63.2*
- apport
- - carotène *E67.1*
- - oligo-éléments NCA *E67.8*
- - vitamine A *E67.0*
- - vitamine D *E67.3*
- apport calorique, obésité consécutive *E66.09*
- - avec
- - - indice de masse corporelle (IMC) (BMI)
- - - - 30 à inférieur à 35 *E66.00*
- - - - 35 à inférieur à 40 *E66.01*
- - - - 40 et au-dessus *E66.02*
- - chez l'enfant et l'adolescent (en-dessous de 18 ans) *E66.09*
- boisson alcoolisée NCA *F10.1*
- boisson NCA *F10.1*
- bruits abdominaux *R19.1*
- convergence avec ésophorie *H51.1*
- croissance foetale *P08.1*
- dépôt, graisse *E66.99*
- - localisé *E65*
- développement du sein, unilatéral *N64.8*
- divergence, avec exophorie *H51.8*
- effort, avec épuisement *T73.3*
- instabilité émotionnelle *F60.30*
- lactation *O92.60*
- menstruations abondantes
- - lla puberté *N92.2*
- - lors d'un cycle menstruel
- - - irrégulier *N92.1*
- - - régulier *N92.0*
- nourriture (alimentation) *R63.2*
- obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire *E66.29*
- pleurs, nourrisson *R68.1*
- prise alimentaire (alimentation) *R63.2*
- prise de poids au cours de la grossesse *O26.0*
- rougeur *R23.2*
- saignement, à la puberté (ménorragie à la puberté) *N92.2*
- salivation *K11.7*
- - cours de grossesse *O26.88*
- sécrétion
- - bronchique *R09.3*
- - lactée (galactorrhée) *O92.60*
- - urine *R35*
- soif *R63.1*
- sudation *R61.9*
- - localisée *R61.0*
- - nocturne *R61.9*
- surocclusion *K07.2*
- tissu de granulation *L92.9*
- ventilation *R06.4*
- vomissements au cours de la grossesse *O21.0*

Excessif, -ve –*suite*
- vomissements au cours de la grossesse –*suite*
- - début après 20 semaines entières de gestation *O21.2*

Exclusion
- grossesse *Z32*
- résultats suspects *Z03.9*
- sociale *Z60*
- suspicion de maladie *Z03.9*

Excoriation *T14.01*
- neurotique *L98.1*
- traumatique *T14.01*

Excoriation chronique de la langue *K14.1*

Excrétion
- bilirubine, anomalie *E80.6*
- cristallurie *R82.9*
- glycosurie *R81*
- protéinurie *R80*
- urine, insuffisante *R34*

Excrétoire, insuffisance pancréatique *K86.8*

Exencéphalie *Q01.9*

Exercice
- d'habileté dans les activités quotidiennes NCA *Z50.8!*
- gymnastique respiratoire *Z50.1!*
- gymnastique thérapeutique *Z50.1!*
- orthoptique *Z50.6!*
- respiratoires *Z50.1!*
- thérapeutique NCA *Z50.1!*
- thérapeutiques *Z50.1!*

Exfoliatif(-ive)
- chéilite *K13.0*
- dermatite *L26*
- dermatolyse *Q82.8*
- dermatose *L26*
- dysménorrhée *N94.6*

Exfoliation
- aires de la langue *K14.1*
- cristallin *H27.8*
- dentaire *K08.0*
- - d'origine systémique *K08.0*

Exhibitionnisme *F65.2*

Exigence, système de santé publique *Z76.9*

Exigences scolaires, adaptation, diffici *Z55*

Existant
- mamelon, avec amastie *Q83.8*
- pessaire intra-utérin *Z97.8*

Exitus
- dans les 24 heures après le début des symptômes *R96.1*
- soudain *R96.0*

Exmane, phobie *F40.2*

Exocervicite *N72*
- avec
- - ectropion *N72*
- - érosion *N72*

Exocrine
- insuffisance pancréatique *K86.8*
- troubles de la fonction du pancréas *K86.8*

Exogène
- asthme allergique *J45.0*

Exogène –*suite*
- connues Autre syndrome congénital malformatifs dû à des cause *Q86.88*
- dépression *F06.3*
- obésité *E66.09*
- paralysie spinale spastique *T62.2*
- substance
- - cardiomyopathie NCA *I42.7*
- - hypothyroïdie NCA *E03.2*
- type de réaction aiguë *F05.9*

Exomphale *Q79.2*

Exophorie *H50.5*
- décompensée *H50.5*
- par excès de divergence *H51.8*
- près *H50.5*

Exophtalmie *H05.2*
- avec
- - cyclocéphalie *Q87.0*
- - maladie de Basedow *E05.0+, H06.2**
- - thyréotoxicose *E05.0+, H06.2**
- - trouble fonctionnel thyroïdien *E05.0+, H06.2**
- congénitale *Q15.8*
- due à hématome orbitaire *H05.2*
- intermittente NCA *H05.2*
- myxoedème, ostéoarthropathie hypertrophique [OAH] (avec hyperthyroïdie) *E05.0*
- pseudo- *H05.2*
- pulsatile *H05.2*

Exophtalmique, goître *E05.0*

Exostose *M77*
- calcanéenne *M77.3*
- - plantaire *M77.3*
- cartilagineuse *D16.9*
- - multiple *Q78.6*
- cartilagineuse du gros orteil *D16.3*
- conduit auditif *H61.8*
- - externe *H61.8*
- congénitale multiple *Q78.6*
- gonorrhéique *A54.4+, M90.29**
- mâchoire *K10.8*
- olécranienne *M89.92*
- orbite *H05.3*
- ostéo-cartilagineuse *D16.9*
- syphilitique *A52.7+, M90.29**
- trochantérienne massive *M89.95*

Exotropie *H50.1*
- A, en cas d'hyperfonctionnement du muscle oblique supérieur et paralysie du muscle oblique inférieur *H50.1*
- alternante *H50.1*
- - intermittente *H50.3*
- - non intermittente *H50.1*
- alternante divergence oblique supérieure et parésie oblique inérieure *H50.1*
- avec excès de convergence *H50.1*
- consécutive *H50.1*
- intermittente *H50.3*
- monoculaire *H50.1*
- résiduelle, intermittente *H50.3*
- secondaire *H50.1*
- unilatérale *H50.1*
- V, en cas de paralysie du muscle oblique supérieur et hyperfonctionnement du muscle oblique inférieur *H50.1*

Expansive paranoïaque, trouble de la per *F60.0*

Expectorants, intoxication *T48.4*

Expectoration *R09.3*
- anormale *R09.3*
- avec acariens *B88.0*
- couleur, anormale *R09.3*
- infection, due à des champignons *B48.8*
- odeur, anormale *R09.3*
- quantité, anormale *R09.3*
- sanglante *R04.2*

Expérience ludique, manque, pendant l'en *Z62*

Explosive, trouble de la personnalité *F60.30*

Exposition *T75.8*
- à
- - bruit *Z58*
- - contamination de l'air NCA *Z58*
- - désagréments climatiques *T75.8*
- - discrimination *Z60*
- - froid *T69.9*
- - impuretés du sol *Z58*
- - irradiation NCA *Z58*
- - nuisance du sol *Z58*
- - nuisances NCA *Z58*
- - persécution *Z60*
- - pollution de l'eau *Z58*
- - poussière NCA *Z58*
- - rage *Z20.3*
- - rubéole *Z20.4*
- - substance industrielle toxique *Z57*
- - terrorisme *Z65*
- - torture *Z65*
- - vibrations mécaniques *Z58*
- - VIH *Z20.6*
- chronique (avec dermatite solaire) *L57.8*
- épuisement, dû à *T73.2*
- non professionnelle
- - à
- - - substance agricole toxique *Z58*
- - - substance industrielle toxique *Z58*
- - - températures extrêmes *Z58*
- professionnelle
- - à
- - - bruit *Z57*
- - - facteurs de risque *Z57*
- - - impuretés du sol *Z57*
- - - nuisances *Z57*
- - - pollution de l'air *Z57*
- - - poussière *Z57*
- - - rayonnement *Z57*
- - - substance agricole toxique *Z57*
- - - températures extrêmes *Z57*
- - - vibrations *Z57*
- - - vibrations mécaniques *Z57*
- pulpe Carie avec *K02.5*

Exposition chronique au soleil, avec der *L57.8*

Expressif, trouble
- expression écrite, lié au développement *F81.8*
- langage *F80.1*

Expulsive, hémorragie
- après chirurgie de la cataracte *T81.0*
- choroïdienne *H31.3*
- rétinienne *H31.3*

Exsanguino-transfusion, avec thrombopéni *P61.0*

Exsiccose *E86*
- cas de
- - diarrhée *K52.9, E86*
- - - aiguë *A09, E86*
- - - avec vomissement *K52.9, E86*
- - - chez le nourrisson *A09, E86*
- - - d'origine présumée infectieuse *A09, E86*
- - - infectieuse *A09, E86*
- - entérite
- - - aiguë *A09, E86*
- - - chez le nourrisson *A09, E86*
- - - d'origine présumée infectieuse *A09, E86*
- - gastro-entérite *K52.9, E86*
- - - aiguë *A09, E86*
- - - chez le nourrisson *A09, E86*
- - - d'origine présumée infectieuse *A09, E86*
- - - infectieuse *A09, E86*

Exstrophie
- cloaque *Q43.8*
- contenu abdominal *Q45.8*
- utérus, après la naissance *N81.4*
- vessie *Q64.1*

Exstrophie splanchnique *Q43.8*

Exsudat
- cotonneux *H35.0*
- rétinien blanc *H35.0*

Exsudatif(ve)
- bronchite *J20.9*
- catarrhe tubaire *H68.0*
- cystite *N30.9*
- dégénérescence maculaire *H35.3*
- - sénile *H35.3*
- kyste
- - chambre antérieure de l'oeil *H21.3*
- - corps ciliaire *H21.3*
- - iris *H21.3*
- néphrite
- - aiguë *N00.9*
- - chronique *N03.8*
- otite moyenne *H65.9*
- - aiguë *H65.1*
- - chronique *H65.4*
- - subaiguë *H65.1*
- pleurite *J90*
- rétinopathie *H35.0*
- vitréo-rétinopathie héréditaire *H43.8*

Exsudation rétinienne *H35.0*

Extenseurs dorsaux, myogélose *M62.88*

Externe
- abcès *L02.9*
- corrosion *T30.4*
- orgelet *H00.0*
- résorption dentaire *K03.3*

Externe - *voir* Type de maladie

Extinction sensorielle *R29.5*

Extra-abdominal, desmoïde (voir aussi - D48.1

Extra-articulaire, rhumatisme *M79.09*

Extra-capillaire
- glomérulopathie diabétique *E14.20+, N08.3**
- - cas de
- - - diabète de type 1 *E10.20+, N08.3**
- - - diabète de type 2 *E11.20+, N08.3**
- glomérulosclérose diabétique *E14.20+, N08.3**
- - cas de
- - - diabète de type 1 *E10.20+, N08.3**
- - - diabète de type 2 *E11.20+, N08.3**

Extra-capillaire *–suite*
- glomérulopathie diabétique *–suite*
- - cas de *–suite*

Extra-capillaire, glomérulonéphrite prol *N05.8*

Extracellulaire, liquide
- déplétion *E86*
- diminution *E86*

Extra-corporel(le)
- circulation, avec complication *T80.9*
- circulation, avec thrombocytopénie *D69.58*
- dialyse *Z49.1*
- fécondation *Z31.2*
- insémination *Z31.2*

Extra-crânien(ne)
- artère précérébrale
- - apoplexie
- - - embolique *I63.1*
- - - thrombotique *I63.0*
- - embolie *I65.9*
- - occlusion *I65.9*
- - - avec infarctus cérébral *I63.2*
- - - bilatérale *I65.3*
- - - multiple *I65.3*
- - rétrécissements multiples *I65.3*
- - sténose *I65.9*
- - - avec infarctus cérébral *I63.2*
- - stricture *I65.9*
- - thrombose *I65.9*
- vaisseau précérébral
- - anévrysme
- - - artério-veineux *Q28.00*
- - - congénital *Q28.10*
- - anomalie *Q28.19*
- - malformation artério-veineuse *Q28.09*

Extraction
- accès vasculaire *Z45.29*
- appareil de fixation externe *Z47.8*
- appareil de fixation interne *Z47.0*
- appareil d'extension externe *Z47.8*
- attelle, externe *Z47.8*
- bandage plâtré *Z47.8*
- barre *Z47.0*
- cataméniale *Z30.3*
- cathéter permanent *Z46.6*
- cathéter urinaire *Z46.6*
- catracte, avec syndrome du corps vitré *H59.0*
- clou *Z47.0*
- DIU [dispositif intra-utérin] *Z30.5*
- foetale avec crochet *P03.8*
- Kirschner, fil de *Z47.0*
- organe, prophylactique, pour traitement de néoplasie *Z40.08*
- pansement *Z48.0*
- par le siège endommageant le foetus/nouveau-né *P03.0*
- plaque *Z47.0*
- soins post-opératoires *Z48.8*
- stérilet *Z30.5*
- stimulateur cardiaque *Z45.0*

Extraction –*suite*
- suture *Z48.0*
- ventouse et forceps, combination, accouchement *O81*
- ventouse, échec
- - suivie d'
- - - accouchement par césarienne NCA *O66.5*
- - - accouchement par forceps NCA *O66.5*
- vis *Z47.0*

Extradural(e)
- abcès *G06.2*
- - cérébral *G06.0*
- - intra-crânien *G06.0*
- - intra-rachidien *G06.1*
- - moelle épinière *G06.1*
- empyème *G06.2*
- granulome
- - intra-crânien *G06.0*
- - intra-rachidien *G06.1*
- hématome *S06.4*
- hémorragie
- - chez le fœtus/nouveau-né *P52.8*
- - dans les suites de couches *O99.4*
- - due à traumastisme obstétrical *P10.8*

Extra-génital(e)
- chancre *A51.2*
- ulcus durum *A51.2*

Extra-hépatique
- adénome de voie biliaire *D13.5*
- cholangiolite *K83.0*
- cholestase NCA *K83.1*

Extra-hypophysaire, syndrome ACTH [hormo *E24.3*

Extra-intestinale, yersiniose *A28.2*
- septicémie *A28.2*

Extrait d'huile, aspiration, avec pneumo *J69.1*

Extrait hépatique, intoxication *T45.8*

Extra-mammaire, maladie de Paget (anus) *C21.0*

Extra-médullaire, plasmocytome *C90.20*
- rémission complète *C90.21*

extranodal
- cellules T/NK type nasal , Lymphome *C86.0*
- zone marginal cellules B , lymphome des tissu lymphoïde associé au muqueuse [lymphome MALT] , Lymphome *C88.4*

Extra-oculaire, plaie ouverte du muscle *S05.4*

Extra-ovarien, carcinome *C56*

Extra-péritonéal(e)
- abcès *K65.0*
- rupture de la vessie *S37.22*

Extra-pulmonaire, infection mycobactérie *A31.80*

Extra-pyramidal(e)
- affection, avec confusion et troubles des mouvements
- - anormale *G25.9*
- - - spastique *G25.9*
- dégénérescence *G25.9*
- maladie *G25.9*
- sclérose *G25.9*
- tic *G25.6*

Extrapyramidal, syndrome (SEP) *G25.9*

Extrarénal(e)
- insuffisance rénale *N19*
- rétention, azote *R39.2*
- urémie *R39.2*

Extra-surrénalien, paraganglione *D44.7*

Extrasystoles *I49.4*
- auriculaires *I49.1*
- d'effort *I49.4*
- effort, d' *I49.4*
- jonctionnelles *I49.2*
- supraventriculaires *I49.4*
- ventriculaires *I49.3*

Extrasystolie ventriculaire *I49.3*

Extraurétrale, incontinence urinaire *N39.43*

Extrautérine, grossesse
- avec
- - hématocèle *O00.9*
- - infection, organes génitaux *O08.0*
- - tétanos *A34*
- - thrombophlébite, veine pelvienne *O08.0*
- cervicale *O00.8*
- corne utérine, dans *O00.8*
- rompue *O00.9*

Extravasation
- lymphatique, dans le mésentère *I89.8*
- sanguine *R58*
- urinaire *R39.0*

Extravasation d'urine *R39.0*

Extravasation sanguine *R58*

Extrême
- amaigrissement *E41*
- prématurité *P07.2*
- prématurité, nouveau-né *P07.2*

Extrinsèque
- alvéolite *J67.9*
- asthme bronchique *J45.0*
- origine, avec asthme bronchique intrinsèque *J45.8*
- pigmentation dentaire *K03.6*

Extroversion
- utérus *N81.4*
- vessie *Q64.1*

Extroversion vésicale *Q64.1*

Extrusion d'implant oculaire *T85.3*

Exulcéré(e)
- carcinome baso-cellulaire *C44.9*
- métastase *C80*

Exulcéré, carcinome *C80*

Faber, syndrome de *D50.9*

Fabry-Anderson, maladie de *E75.2*
- avec affection glomérulaire *E75.2+, N08.4**

Fabry-Anderson, maladie de (avec dégénér *E75.2+, G32.8**

Face
- anomalie, congénitale *Q18.8*
- névralgie, paroxystique *G50.0*
- os
- - agénésie NCA *Q75.8*
- - carcinome *C79.5*
- - et os du crâne, anormalie congénitale *Q67.4*
- - fracture *S02.9*
- - - avec fracture, os du crâne *S02.7*
- - - - multiple *S02.7*
- - - multiple *S02.7*
- - - séquelles *T90.9*
- - hypoplasie NCA *Q75.8*
- - lésion *S09.9*
- - malformation, NCA *Q75.8*
- - néoplasme, malin *C41.01*
- - os du crâne, néoformation maligne *C41.01*
- - sarcome *C41.02*
- - surnuméraire *Q75.8*
- os anomalie, congénitale *Q75.9*
- présentation de la
- - avec
- - - affectation du foetus/ nouveau-né *P01.7*
- - - césarienne *O32.3*
- - complication, accouchement *O64.2*
- - foetus NCA *O32.3*
- - soins maternels *O32.3*

Facette cornéen *H18.4*

Facial
- diplégie (syndrome de), congénital *Q87.0*
- fibrome *D21.9*
- fibrosarcome *C49.9*
- fracture *S02.7*
- hémihypertrophie *Q67.4*
- myokymie *G51.4*
- nerf
- - affection *G51.9*
- - atrophie *G51.8*
- - dégénérescence *G51.8*
- - inflammation *G51.8*
- - névralgie *G51.8*
- - névrite *G51.8*
- - paralysie *G51.0*
- - - avec lagophtalmie *H02.2*
- - - Bell, de *G51.0*
- - - centrale *G51.0*
- - - obstétricale *P11.3*
- - - périphérique *G51.0*
- - spasme *G51.3*
- syndrome de malformation *Q87.0*

Faciès de Potter *Q60.6*

Facio-bucco-linguale, dystonie *G24.4*

Facio-céphalalgie *G90.08*
- autonome *G90.08*

facteur
-
- Carence héréditaire en *D68.24*
- coagulation
- - carence

facteur *–suite*
- coagulation *–suite*
- - carence *–suite*

- - - acquise *D68.4*
- - - antépartum, avec lésion, foetus/nouveau-né *P02.1*
- - - due à
- - - - carence, vitamine K *D68.4*
- - - - maladie, foie *D68.4*
- - - héréditaire *D68.2*
- - - - d ' Autre *D68.28*
- - - postpartum *O72.3*
- - - prénatale *O46.0*
- - déficit
- - - acquis *D68.4*
- - - provoqué par
- - - - carence en vitamine K *D68.4*
- - - - maladie du foie *D68.4*
- Hageman Carence en *D68.25*
- I Carence héréditaire en *D68.20*
- II Carence héréditaire en *D68.21*
- IX, carence *D67*
- - avec troubles fonctionnels *D67*
- - héréditaire *D67*
- labile, carence
- - acquise *D68.4*
- multiple, carence *D68.8*
- psychologiques influençant les affections physiques *F54*
- stabilisant fibrine Carence en *D68.26*
- stabilisant de la fibrine, carence
- - acquise *D68.4*
- stable Carence en *D68.23*
- Stuart Prower Carence en *D68.24*
- suivants médicament drogue Crise épileptique dû au *G40.5*
- V
- - Carence héréditaire en *D68.22*
- - mutation de gènes, dans les antécédents familiaux *Z83.2*
- VII Carence héréditaire en *D68.23*
- VIII, carence *D66*
- - avec
- - - anomalie fonctionnelle *D66*
- - - - hémophilie vasculaire *D68.0*
- - - anomalie vasculaire *D68.0*
- - héréditaire *D66*
- XI, carence *D68.1*
- - héréditaire *D68.1*
- XII Carence héréditaire en *D68.25*
- XIII Carence héréditaire en *D68.26*

faecalis résistant
- glycopeptides
- - Enterococcus *U80.20!*
- - oxazolidinones streptogramines , Enterococcus *U80.20!*
- oxazolidinones hautement résistant au aminoglycosides et non résistant au glycopeptides , Enterococcus *U80.21!*

faecium résistant
- glycopeptides
- - Enterococcus *U80.30!*
- - oxazolidinones streptogramines , Enterococcus *U80.30!*
- oxazolidinones streptogramines hautement résistant au aminoglycosides et non résistant au glycopeptides , Enterococcus *U80.31!*

Fahr, maladie de *G93.88*

Faible
- aine *K40.90*
- - récidive *K40.91*
- chancre *A57*
- - palais *A51.2*
- contraction *O62.2*
- fibrome *D17.9*
- lentilles de contact, avec vascularisation, cornée *H16.4*
- niveau de lecture et d'écriture *Z55*
- palais
- - cicatrice *K13.7*
- - et palais, dur, fente *Q35.5*
- - - avec fente, lèvres *Q37.5*
- - - - bilatérale *Q37.4*
- - - - unilatérale *Q37.5*
- - - unilatérale *Q35.5*
- - fente *Q35.3*
- - - avec fente, lèvres *Q37.3*
- - - - bilatérale *Q37.2*
- - - - unilatérale *Q37.3*
- - - unilatérale *Q35.3*
- - gumma *A52.7+, K93.8**
- - hypertrophie *K13.7*
- - lésion *S09.9*
- - malformation, de naissance *Q38.5*
- - paralysie *K13.7*
- - perforation *Q35.3*
- - tuberculose *A18.8*
- - ulcus *K12.1*
- prise de poids pendant la grossesse *O26.1*
- revenu(s) *Z59*
- vision
- - associée à une maladie due au VIH *B23.8, H54.0*
- - deux yeux *H54.2*
- - d'un oeil *H54.5*
- - oeil opposé, avec cécité unilatérale *H54.1*

Faiblesse *R53*
- divergence avec ésophorie *H51.8*
- fatigue *R53*
- - alimentation, nouveau-né *P92.2*
- - apprentissage *F81.9*
- - auditive, *voir* surdité *H91.9*
- - cardiaque *I50.9*
- - - aigue *I50.9*
- - chronique *R53*
- - circulatoire *I99*
- - - cas d'hypotension *I95.9*
- - colon *K63.9*
- - concentration, ménopause *N95.1*
- - congénitale NCA *P96.9*
- - continence *R32*
- - - Vessie *R32*
- - contractions *O62.2*
- - - avec
- - - - césarienne *O62.2*
- - - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.6*
- - - complication, accouchement *O62.2*
- - - primaires *O62.0*
- - - - avec
- - - - - césarienne, *O62.0*
- - - - - complication, accouchement, *O62.0*
- - - secondaires *O62.1*
- - - - avec
- - - - - césarienne, *O62.1*

Faiblesse –*suite*
- fatigue –*suite*
- - contractions –*suite*
- - - secondaires –*suite*
- - - - avec –*suite*
- - - - - complication, accouchement, *O62.1*
- - corporelle *R53*
- - dépression *F32.9*
- - détrusor *R32*
- - éducation *F81.2*
- - érection *F52.2*
- - filtration *N19*
- - fusions *H53.3*
- - généralisée *R53*
- - hormonale *E28.8*
- - immunitaire *D84.9*
- - - sous traitement par cortisone *D84.8*
- - lecture et écriture *F81.0*
- - ligament *M24.29*
- - - familière *M35.7*
- - - genou *M23.89*
- - maladie *R53*
- - mental, léger *F70.9*
- - mentale *F79.9*
- - - grave *F72.9*
- - - légère *F70.9*
- - motricité globale *F82.0*
- - musculaire *M62.89*
- - - pathologique *G70.9*
- - myocarde *I50.9*
- - - avec oedème *I50.01*
- - - décompensé *I50.9*
- - - pendant la vieillesse *I50.9*
- - nerveuse *F48.0*
- - - *R53*
- - paroi abdominale *M79.88*
- - pendant la vieillesse *R54*
- - - avec
- - - - démence NCA *F03*
- - - - désorientation aiguë *F05.1*
- - - - psychose *F03*
- - - corporelle *R54*
- - Plancher pelvien *N81.8*
- - Posture *R29.3*
- - pouls *R09.8*
- - puissance *F52.2*
- - - érectile *F52.2*
- - - psychogène *F52.2*
- - respiratoire *R06.0*
- - - chez le nouveau-né *P28.8*
- - séniles *R54*
- - sexuelle, psychogène *F52.9*
- - sphincter *N31.2*
- - tissus conjonctifs *M79.89*
- - - généralisée *M79.89*
- - vasculaire *I99*
- - vessie *N31.9*
- - Vessie, paroi *N31.2*
- - vision des couleurs *H53.5*
- symptome général de *R68.8*
- - sénile *R54*

Faim *T73.0*
- avec
- - affaiblissement *T73.0*
- - anémie *D53.9*
- effets *T73.0*
- effets nocifs *T73.0*

Faim –*suite*
- inanition *T73.0*
- provoquée par
- - malnutrition *E46*
- - sous-alimentation *T73.0*
- psychogène *F45.31*
- sensation *R06.0*
- volontaire NCA *F50.0*

Falithrom, hémorragie due à l'utilisatio *D68.3*

Fallot, pentalogie de [communication int *Q21.80*

Fallot, tétralogie de *Q21.3*
- avec
- - anomalie du septum inter-ventriculaire *Q21.3*
- - fermeture défectueuse de la cloison interventriculaire *Q21.3*
- - hypertrophie ventriculaire *Q21.3*
- - sténose artérielle pulmonaire *Q21.3*

Fallot, trilogie de [sténose des artères *Q21.88*

Faltulence vaginale *N89.8*

Familial - *voir* type de maladie

Familiale, migraine hémiplégique *G43.1*

Famille
- désaccord *Z63*
- isolement *Z63*
- mise à l'écart *Z63*
- perte, pendant l'enfance *Z61*

Famine atrophie *E46*

Fanatique, trouble de la personnalité *F60.0*

Fanconi Andersen, syndrome de [mucovisci *E84.9*

Fanconi Hegglin, syndrome de *J18.0*

Fanconi, syndrome de *D61.0*
- cas de syndrome de Lowe *E72.0*
- secondaire *E83.38*
- Toni-Debré-Fanconi, syndrome de *E72.0*

Farber, maladie de *E75.2*

Farine
- allergie, avec asthme *J45.0*
- dermite par contact *L25.4*
- - allergique *L23.6*
- graines de caroubes
- - allergie [E 410] *T78.4*
- - hypersensibilité [E 410] *T78.4*
- poisson, pneumopathie chez les travailleurs causée par *J67.8*

Fascia
- abcès *M72.89*
- anomalie *Q79.9*
- calcification *M62.89*
- contracture *M62.89*
- hernie *M62.89*
- inflammation *M72.99*
- lata, contracture *M62.85*
- maladie *M62.99*
- - inflammatoire *M72.99*
- ossification *M62.89*
- palmaire, fibromatose *M72.0*
- plantaire, fibromatose *M72.2*
- rupture *T14.3*
- tarso orbitaire, atrophie congénitale *Q10.3*

Fascia –*suite*
- tarso-orbitaire, insuffisance congénitale *Q10.3*
- tuberculose *A18.8+, M73.89**

Fasciculaire, contraction *R25.3*

Fasciculation *R25.3*

Fascicule longitudinal inférieur, lésion *S06.8*

Fasciculitis optica *H46*

Fascie, insuffisance, congénitale *Q10.3*

Fasciite *M72.99*
- éosinophile *M35.4*
- - diffuse *M35.4*
- nécrosante *M72.69*
- nodulaire *M72.49*
- périrénale, avec
- - infection *N13.6*
- - obstruction, uretère *N13.5*
- plantaire *M72.2*
- traumatique *M72.89*

Fasciola
- gigantica, infection *B66.3*
- hepatica
- - avec distomatose du foie *B66.3+, K77.0**
- - infection *B66.3*
- indica, infection *B66.3*

Fasciolopsis buski
- infection *B66.5*
- infestation intestinale *B66.5*

Fascio-scapulo-huméral(e)
- atrophie *G71.0*
- dystrophie musculaire *G71.0*
- myopathie *G71.0*

Fatal(e)(s)
- insomnie, familiale *A81.8*
- syncope *R96.0*

Fatigabilité musculaire (maladive) *G70.9*

Fatigue *R53*
- due à
- - chaleur *T67.6*
- - - transitoire *T67.6*
- - grossesse *O26.88*
- due à la chaleur *T67.6*
- due à la faim *T73.0*
- et lassitude, générale *R53*
- et malaise *R53*
- myocardique (akinésie) *I50.9*
- oculaire *H53.9*
- psychogène généralisée *F48.0*
- sénile *R54*
- vocale *R49.8*

Fatigué, oeil *H53.9*

Fatigue, syndrome de *F48.0*
- chronique *G93.3*
- post-virale *G93.3*

Fausse
- articulation *M84.19*
- contractions *O47.9*
- - avant la 37ème semaine de grossesse *O47.0*
- - partir de la 37ème semaine de grossesse *O47.1*
- contractions, dites de Braxton-Hick *O47.9*
- couche - *voir aussi* avortement *O06.9*

Fausse –*suite*
- couche - *voir aussi* avortement –*suite*
- - avec
- - - lésion des organes pelviens *O08.6*
- - - rupture
- - - - urètre *O08.6*
- - - - vessie *O08.6*
- - avec antécédent figurant dans l'anamnèse, ayant une influence sur le déroulement de la grossesse *Z35.1*
- - complète *O06.9*
- - - avec complications *O06.8*
- - compliquée *O08.9*
- - incomplète *O06.4*
- - - avec complications *O06.3*
- - menace de *O20.0*
- - - avec atteinte, foetus *P01.8*
- - sans expulsion *O02.1*
- - spontanée *O03.9*
- voie urétrale *N36.0*

Faussement positif
- réaction de Wassermann *R76.2*
- test VDRL [veneral disease research laboratories] *R76.2*

Fauteuil roulant, dépendance, nécessite *Z74.0*

Faux
- abouchement
- - veine porte *Q26.5*
- - veine pulmonaire *Q26.4*
- alimentation *R63.3*
- anévrisme *I72.9*
- contraction *O47.9*
- - avant la 37ème semaine de grossesse *O47.0*
- - avec douleurs *O47.9*
- - partir de la 37ème semaine de grossesse *O47.1*
- contraction, n'agissant pas sur le col de l'utérus *O47.9*
- croup *J38.5*
- encéphalite *G04.9*
- travail, en vain *O47.9*
- travail, frustant *O47.9*
- travail, vain *O47.9*

Faux du cervelet
- calcification *G96.1*
- ossification *G96.1*

Favisme *D55.0*
- avec anémie *D55.0*

Favre, syndrome de
- Durand-Nicolas- *A55*
- Goldmann- *H43.8*

Favus *B35.9*
- capitis *B35.0*

Fazio-Londe, syndrome de *G12.1*

FC - *voir* Fibrose kystique ou Mucoviscid *E84.9*

Fébrile *voir* Type de maladie *R53*
- dermatose, aiguë, neutrophile [syndrome de Sweet] *L98.2*
- et fatigue *R53*
- fièvre *R50.9*

Fécale, obstruction *K56.4*

Fécaloïdes, vomissements *R11*

Fécalurie *R82.9*

Fécondation

Fécondation –*suite*
- artificielle *Z31.1*
- - avec
- - - complications *N98.9*
- - - hyperstimulation, ovaires *N98.1*
- - - infection *N98.0*
- assistée NCA *Z31.3*
- conseil *Z31.6*
- extra-corporelle *Z31.2*
- in vitro *Z31.2*
- intra-tubaire *Z31.2*

Fécondé, oeuf, non-implantation *N97.2*

Feer, maladie de *T56.1*
- avec polynévrite *T56.1*
- Selter-Swift- *T56.1*

Feichtinger, syndrome de, -Ullrich *Q87.0*

Feil-Klippel, syndrome de *Q76.1*

Feinmesser-Zelig, syndrome de *Q82.8*

Felty, syndrome de [polyarthrite, spléno *M05.00*

Féminin, type de maladie

féminines type
- 1 Mutilations génital *N90.81*
- 2 Mutilations génital *N90.82*
- 3 Mutilations génital *N90.83*
- 4 Mutilations génital *N90.84*
- non précisé Mutilations génital *N90.80*

femininum Pudendum *C51.9*

Féminisation *E29.1*
- cas de syndrome, génito-surrénal, acquis *E25.8*
- testiculaire *E34.51*
- - cas de pseudohermaphrodisme masculin *E34.59*

Femme enceinte, prise en charge, en cas
- acidémie, foetale *O36.3*
- altération, rythme cardiaque, foetal *O36.3*
- anencéphalie, foetale *O35.0*
- anomalie
- - chromosomique, foetus *O35.1*
- - col de l'utérus *O34.4*
- - équilibre acides-bases, foetal *O36.3*
- - fœtus *O35.9*
- - organes pelviens *O34.9*
- - périnée *O34.7*
- - placentaire *O43.1*
- - rythme cardiaque, foetus *O36.3*
- - utérus *O34.5*
- - vaginale *O34.6*
- - vulve *O34.7*
- bassin, rétrécissement généralisé *O33.1*
- bébé gros pour l'âge *O36.6*
- bébé maigre pour l'âge *O36.5*
- bébé petit pour l'âge *O36.5*
- bradycardie, foetale *O36.3*
- cerclage *O34.39*
- césarienne, antérieure *O34.2*
- complication foetale *O36.9*
- croissance foetale
- - excéssive *O36.6*
- - insuffisante *O36.5*
- détresse foetale *O36.3*
- difformité, foetus *O33.7*
- disproportion céphalo-pelvienne *O33.9*
- disproportion foetale *O33.5*
- Down, syndrome de, foetal *O35.1*

Femme enceinte, prise en charge, en cas –*suite*
- hématome, rétro-placentaire *O43.8*
- herpes gestationis *O26.4*
- hydrocéphale, foetal *O35.0*
- hydrops foetal *O36.2*
- Hygroma colli, foetal *O35.8*
- hypertrophie foetale *O36.6*
- hypotonie *O26.5*
- hypoxie foetale *O36.3*
- incompatibilité, groupe sanguin *O36.1*
- insuffisance
- - col de l'utérus *O34.39*
- - foeto-placentaire *O36.5*
- - placentaire *O36.5*
- iso-immunisation *O36.1*
- lésions, foetus *O35.9*
- - dues à
- - - alcool *O35.4*
- - - amniocentèse *O35.7*
- - - biopsie *O35.7*
- - - stérilet intra-utérin *O35.7*
- - - toxoplasmose *O35.8*
- lésions, foetus, due à une maladie héréditaire *O35.2*
- maladie hépatique *O26.6*
- Malformation
- - placentaire *O43.1*
- - système nerveux central, foetus *O35.0*
- - utérus *O34.0*
- malformation, système nerveux central, foetal *O35.0*
- mort, in utero *O36.4*
- - intra-utérine *O36.4*
- non-engagement, tête, à terme *O32.4*
- position anormale, foetus *O32.9*
- position, enfant, instable *O32.0*
- position, transverse
- - épaule *O32.8*
- - profonde *O32.8*
- présentation anormale, foetus *O32.9*
- présentation du front *O32.3*
- - *O32.8*
- présentation du menton *O32.3*
- présentation du siège *O32.1*
- présentation oblique *O32.2*
- présentation par la face *O32.3*
- présentation par le siège
- - postérieure *O32.8*
- - - *Z34*
- présentation par l'épaule *O32.2*
- présentation transverse *O32.2*
- présentation, os pariétal *O32.1*
- retard, croissance, foetale *O36.5*
- rétroversion, col de l'utérus *O34.5*
- rupture, symphyse *O26.7*
- siège *O32.1*
- siège, présentation par le *O32.1*
- - *O32.6*
- sous stérilet, intra-utérin *O26.3*
- spina bifida, foetale *O35.0*
- Station foetale
- - haute *O32.8*
- - profonde *O32.8*
- suture de Shirodkar *O34.39*
- tête, engagement, échec *O32.4*
- tumeur, corps de l'utérus *O34.1*
- utérus
- - bicorne *O34.0*

Femme enceinte, prise en charge, en cas *–suite*
- utérus *–suite*
- - duplex *O34.0*
- veine cave, syndrome *O26.5*

Fémoral
- abcès *L02.4*
- embolie *I74.3*
- - veine *I80.1*
- épiphyse
- - inférieure, fracture *S72.42*
- - supérieure
- - - fracture *S72.02*
- - - glissement *M93.0*
- hernie *K41.9*
- - avec
- - - étranglement *K41.3*
- - - gangrène *K41.4*
- - irréductible *K41.3*
- - unilatérale *K41.9*
- lésion *G57.2*
- névralgie *G57.2*
- névrite *G57.2*
- phlébite *I80.1*
- veine, thrombose *I80.1*

Fémoro-inguinale, hernie *K40.90*
- récidivante *K40.91*

Fémoro-patellaire
- arthrose *M17.9*
- - avec gonarthrose en varus *M17.9*
- compression, syndrome de *M22.2*
- douleur, syndrome de *M22.2*
- gonarthrose *M17.9*

Fémur
- absent, congénital *Q72.4*
- agénésie *Q72.4*
- anomalie NCA *Q74.2*
- carcinome *C79.5*
- chondrosarcome *C40.2*
- corrosion *T24.4*
- déformation NCA *Q68.8*
- déviation
- - acquise *M21.85*
- - congénitale *Q74.2*
- distal, luxation postérieure *S83.11*
- extrémité distale du, fracture *M92.8*
- fracture *S72.3*
- - *S72.9*
- - distal *S72.40*
- - - intercondylaire *S72.44*
- - - supracondylaire *S72.43*
- - intertrochantérienne *S72.11*
- - intratrochantérienne *S72.10*
- - multiple *S72.7*
- - pertrochantérienne *S72.10*
- - séquelles *T93.1*
- - sous-trochantérienne *S72.2*
- - - disloquée *S72.2*
- - transcervicale *S72.08*
- - transtrochantérienne *S72.10*
- - traumatisme obstétrical *P13.2*
- hypoplasie congénitale *Q72.8*
- incurvation congénitale *Q68.3*
- inférieur
- - abcès *L02.4*
- - agénésie *Q72.8*
- - amputation

Fémur *–suite*
- inférieur *–suite*
- - amputation *–suite*
- - - état suite à *Z89.5*
- - - traumatique *S88.9*
- - bilatéral
- - - amputation, traumatique *T05.5*
- - - embolie *I80.3*
- - carcinome *C76.5*
- - contusion *S80.1*
- - - multiples *S80.7*
- - corrosion *T24.4*
- - - avec implication, maléole et pied *T29.4*
- - décubitus *L89.98*
- - difformité
- - - acquise *M21.96*
- - - congénitale *Q68.8*
- - écrasement *S87.8*
- - eczéma *L30.9*
- - embolie *I80.3*
- - - artérielle *I74.3*
- - erysipèle *A46*
- - et
- - - fémur supérieur, absence congénitale *Q72.1*
- - - genou
- - - - lésion
- - - - - superficielle, multiples, *S80.7*
- - - - - multiples, *S89.7*
- - - - plaies, ouvertes, multiples *S81.7*
- - - pied, absence congénitale *Q72.2*
- - foulure
- - - musculaire *S86.9*
- - - tendons *S86.9*
- - fracture *S82.9*
- - - complète *S82.7*
- - - distale *S82.38*
- - - multiples *S82.7*
- - - ouverte *S82.9, S81.87!*
- - fracture de Maisonneuve *S82.7*
- - furoncle *L02.4*
- - gangréne *R02*
- - gelure
- - - avec nécrose, tissu *T34.7*
- - - superficielle *T33.7*
- - inflammation, tissu cellulaire *L03.11*
- - lésion *S89.9*
- - - multiples* *S89.7*
- - - musculaire *S86.9*
- - - superficielle *S80.9*
- - - - multiples* *S80.7*
- - luxation
- - - distale *S93.0*
- - - proximale *S83.10*
- - mélanome, malin *C43.7*
- - - superficiel *C43.7*
- - mycose *B35.3*
- - nécrose *R02*
- - nerf, lésion traumatique *S84.9*
- - obstruction
- - - artérielle *I73.9*
- - - vasculaire, artérielle *I73.9*
- - oedème *R60.0*
- - phlébite *I80.3*
- - - superficielle *I80.0*
- - phlégnome *L03.11*
- - plaie, ouverte *S81.9*

Fémur *–suite*
- inférieur *–suite*
- - plaie, ouverte *–suite*
- - - multiples* *S81.7*
- - thrombophlébite *I80.3*
- - - superficielle *I80.0*
- - thrombose *I80.3*
- - - superficielle *I80.0*
- - - veineuse *I80.3*
- - trauma *S89.9*
- - ulcère *L97*
- - - cas de varices *I83.0*
- - ulcus, décubitus *L89.98*
- - vaisseau sanguin, lésion *S85.9*
- - varices *I83.9*
- - - hémorragie *I83.9*
- luxation
- - distale *S83.10*
- - proximale *S73.00*
- ossification paracondylaire post-traumatique *M76.4*
- ostéochondrite juvénile *M91.1*
- ostéomyélite *M86.95*
- raccourcissement
- - acquis *M21.75*
- - congénital *Q72.4*
- raccourcissement longitudinal *Q72.4*
- sarcome *C40.2*
- supérieur
- - abcès *L02.4*
- - amputation, traumatique *S78.9*
- - anomalie NCA *Q74.2*
- - brulure *T24.0*
- - contusion *S70.1*
- - déchirure, muscles *S76.4*
- - déformation en flexion acquise *M21.25*
- - difformité
- - - acquise *M21.95*
- - - congénitale NCA *Q68.8*
- - douleurs névralgiques *G57.1*
- - écrasement *S77.1*
- - - avec écrasement de la hanche *S77.2*
- - embolie, artérielle *I74.3*
- - et
- - - hanches, plaies ouvertes multiples *S71.7*
- - - membres inférieurs, absence congénitale *Q72.1*
- - flexion anormale *Q65.8*
- - foulure *S76.4*
- - - Adducteurs *S76.2*
- - - musculaires *S76.4*
- - fracture *S72.9*
- - - distale *S72.40*
- - - ouverte *S72.9, S71.87!*
- - - pertrochantérienne *S72.10*
- - - subtrochantérienne *S72.2*
- - fracture multifragmentaire *S72.9*
- - furoncle *L02.4*
- - gelure *T35.5*
- - - avec nécrose, tissu *T34.6*
- - - superficielle *T33.6*
- - hanches, lésions multiples *S79.7*
- - hématome traumatique, sous- *S70.1*
- - infection, peau *L08.9*
- - lésion *S79.9*
- - - musculaire NCA *S76.4*
- - - nerveuse *S74.9*

Fémur –*suite*
- supérieur –*suite*
- - lésion –*suite*
- - - superficielle *S70.9*
- - - - multiples *S70.7*
- - liposarcome *C49.2*
- - Luxation
- - - distale *S83.10*
- - - proximale *S73.00*
- - mélanome, malin *C43.7*
- - phlébite *I80.3*
- - - superficielle *I80.0*
- - phlégnome *L03.11*
- - plaie *S70.81*
- - plaie ouverte *S71.1*
- - Raccourcissement
- - - acquis *M21.75*
- - - congénital *Q72.4*
- - Rotation, anomalie *Q65.8*
- - thrombophlébite *I80.3*
- - - superficielle *I80.0*
- - thrombose *I80.3*
- - - superficielle *I80.0*
- - thrombose veineuse *I80.3*
- - - superficielle *I80.0*
- - ulcère, décubitus *L89.98*
- - vaisseau sanguin, lésion *S75.9*
- traumatisme obstétrical *P13.2*

Fémur-fibula-ulna, complexe *Q72.4*

Fenestration
- valvule cardiaque NCA *Q24.8*
- valvule pulmonaire *Q22.2*

Fenêtre
- aorto-pulmonaire *Q21.4*
- cochléaire, impliquée par otosclérose *H80.2*
- ovale
- - non oblitérante, avec otosclérose *H80.0*
- - oblitérante, avec ostosclérose *H80.1*
- ovale, impliquée par otosclérose
- - non oblitérante *H80.0*
- - oblitérante *H80.1*
- valvulaire cardiaque NCA *Q24.8*

Fenêtre du labyrinthe *H83.0*

Fentanyl
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Fente
- branchiale *Q18.2*
- - obturateur défectueux *Q18.0*
- - sinus *Q18.0*
- cartilage cricoïde *Q31.8*
- cartilage thyroïdien *Q31.8*
- - congénitale *Q31.8*
- labiale *Q36.9*
- labiale unilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais *Q37.5*
- - lèvres *Q37.5*
- labio-maxillaire *Q37.1*
- - bilatérale *Q37.0*
- - unilatérale *Q37.1*
- labio-maxillo-palatine *Q37.5*
- - bilatérale *Q37.4*
- - unilatérale *Q37.5*
- labio-palatine *Q37.9*
- larynx, trachée *Q31.8*

Fente –*suite*
- larynx, trachée –*suite*
- - partielle *Q31.8*
- - totale *Q31.8*
- lèvre inférieure *Q36.9*
- lèvres *Q36.9*
- - avec fente, palais *Q37.9*
- - - voile et voûte *Q37.5*
- - bilatérale *Q36.0*
- - - avec fente, palais
- - - - molle *Q37.2*
- - - - voûte *Q37.0*
- - - - - et voile, *Q37.4*
- - cas de fente, palais
- - - voile *Q37.3*
- - - voûte *Q37.1*
- - médiane *Q36.1*
- - unilatérale *Q36.9*
- - - avec fente, palais
- - - - voile *Q37.3*
- - - - voûte *Q37.1*
- - - - - et voile, *Q37.5*
- lèvres supérieures *Q36.9*
- lèvres, mâchoire *Q37.1*
- - bilatérale *Q37.0*
- - unilatérale *Q37.1*
- lèvres, machoire, palais *Q37.5*
- - bilatérale *Q37.4*
- - unilatérale *Q37.5*
- lèvres-palais *Q37.9*
- luette *Q35.7*
- machoire-palais *Q37.5*
- maxillaire *Q37.1*
- nasale *Q30.2*
- naso-labiale
- - mélanome, malin *C43.3*
- - nævus *D22.3*
- palais *Q35.9*
- - avec fente labiale *Q37.9*
- - - bilatérale *Q37.8*
- - congénitale *Q35.9*
- - et voile du palais, médian *Q35.5*
- - voile *Q35.3*
- - - avec fente labiale *Q37.3*
- - - - bilatérale *Q37.2*
- - - - unilatérale *Q37.3*
- - - unilatérale *Q35.3*
- - voûte *Q35.1*
- - - avec fente, lèvres *Q37.1*
- - - - bilatérale *Q37.0*
- - - - unilatérale *Q37.1*
- - - et voile *Q35.5*
- - - - avec fente labiale bilatérale, *Q37.4*
- - - - - *Q37.5*
- - - - - unilatérale, *Q37.5*
- - - - unilatérale *Q35.5*
- - - unilatérale *Q35.1*
- palpébrale
- - dilatation *H02.2*
- - rétrécissement *H02.5*
- penis *Q55.6*
- processus alvéolaire *K08.88*
- scrotum, en cas de pseudo-hermaphrodisme masculin *Q56.1*
- sternum *Q76.7*
- urètre *Q64.0*
- - congénitale *Q64.0*
- - inférieure *Q54.9*

Fente –*suite*
- visage *Q18.8*
- voile *Q35.3*
- voile du palais *Q35.3*
- - médiane *Q35.3*

Fer
- anomalie, pigmentation *L81.8*
- carence *E61.1*
- - avec anémie *D50.9*
- - - par hyporésorption du fer *D50.8*
- - - pendant la grossesse *O99.0*
- - - perte de sang *D50.0*
- dépôt *J63.4*
- - avec pigmentation *L81.8*
- - poumon *J63.4*
- intoxication *T45.4*
- métabolisme, anomalie *E83.1*
- métabolisme, avec anémie, hypochrome *D64.3*
- pneumoconiose *J63.4*
- taux anormal, dans le sang *R79.0*
- trouble métabolique *E83.1*

Fermé
- fracture *T14.20*
- - bras *T10.0*
- - jambe *T12.0*
- - maxillaire inférieur *S02.60*
- - os nasal *S02.2*
- lésion traumatique *T14.00*
- - rein *S37.00*
- - vessie *S37.20*

Fermentation iléale *K56.6*

Fermeture
- incapacité, en cas de sténose
- - valve aortique, rhumatismale *I06.2*
- - valvule tricuspide *I07.2*
- - - avec atteinte de la valvule aortique *I08.2*
- machoire, anormale *K07.5*
- muscle
- - incontinence *R15*
- - urètre, incontinence *R32*
- paupière trouble *H02.5*

Fertile, eunuchoïdisme *E23.0*

Fertilité
- perte
- - chez la femme *N97.9*
- - chez l'homme *N46*
- troubles
- - chez la femme *N97.9*
- - chez l'homme *N46*

Fesse
- abcès *L02.3*
- anthrax *L02.3*
- brûlure *T21.04*
- - 1er degré *T21.14*
- - 2e degré *T21.24*
- - 3e degré *T21.34*
- - degré
- - - 2a *T21.24*
- - - 2b *T21.84*
- candidose *B37.2*
- carcinome basocellulaire *C44.5*
- contusion *S30.0*
- corrosion *T21.44*
- - 1er degré *T21.54*
- - 2e degré *T21.64*

Fesse –*suite*
- corrosion –*suite*
- - 3e degré *T21.74*
- - degré
- - - 2a *T21.64*
- - - 2b *T21.94*
- écrasement *S38.1*
- érythème *L22*
- furoncle *L02.3*
- hématome *S30.0*
- lésion traumatique *S39.9*
- - superficielle *S30.80*
- mélanome in situ *D03.5*
- mélanome malin *C43.5*
- naevus *D22.5*
- peau
- - cancer *C44.5*
- - carcinome in situ *D04.5*
- - infection *L08.9*
- phlegmon *L03.3*
- plaie ouverte *S31.0*
- région
- - furoncle *L02.2*
- - peau, abcès *L02.2*
- tendinite *M76.0*
- ténosynovite *M65.95*

Fessier
- furoncle *L02.3*
- paralysie *G54.1*
- phlégmon *L03.3*
- tendinite *M76.0*

Fétichisme *F65.0*
- travestisme *F65.1*

Fétide
- bronchite *J41.1*
- sueur *L75.0*

Feto-foetal(e)
- hémorragie *P50.3*
- transfusion *O43.0*
- - affectant le foetus/nouveau-né *P02.3*

Feuilles de coca, dépendance *F14.2*

Feuilles de coca, dérivé, dépendance *F14.2*

Feuillet cardiaque, anomalie *Q24.8*

fever Fièvre due médicament [Drug *R50.2*

Fibres du corps vitré *H43.3*

Fibres minérales, pneumonie NCA *J61*

Fibres myocardiques, nécrose *I21.9*

Fibreuse, barre, col vésical *N40*

Fibreux(se)
- ankylose *M24.69*
- astrocytome *C71.9*
- bride *K66.0*
- dégénérescence musculaire *M62.89*
- dysplasie *M85.09*
- - mâchoire *K10.8*
- - monostotique *M85.09*
- - os NCA *M85.09*
- - polyostotique *Q78.1*
- histiocytome *D23.9*
- induration
- - pulmonaire chronique *J84.1*
- - sein, après l'accouchement *O92.20*
- mastopathie kystique *N60.1*
- méningiome *D32.9*
- mésothéliome *C45.9*

Fibreux(se) –*suite*
- mésothéliome –*suite*
- - bénin, épiploon *D19.1*
- - bénin, mésentère *D19.1*
- - bénin, mésocôlon *D19.1*
- - bénin, péritoine *D19.1*
- - bénin, plèvre *D19.0*
- myocardite *I51.4*
- naevus, nez *D22.3*
- ostéite, kystique, généralisée *E21.0*
- pachyméningite *G03.9*
- pancréatite, chronique *K86.1*
- péricardite *I31.0*
- pneumonie chronique *J84.1*
- prostatite *N41.1*
- raideur articulaire *M25.69*
- thyroïdite chronique *E06.5*
- tumeur - *voir* Tumeur bénigne, tissu conjonctif *D21.9*

Fibrillaire
- astrocytome *C71.9*
- contraction, muscles *M62.89*

Fibrillation
-
- auriculaire *I48.19*
- - avec
- - - arythmie absolue *I48.19*
- - - tachy-arythmie *I48.19*
- - chronique *I48.11*
- - intermittente *I48.10*
- - paroxystique *I47.9*
- - - *I48.10*
- - permanente *I48.2*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- cardiaque *I49.0*
- flutter auriculaire sans autre précision , *I48.9*
- ventriculaire *I49.0*

fibrine Carence facteur stabilisant de la *D68.26*

Fibrine, déficit en facteur stabilisateu
- acquis *D68.4*

Fibrineux(se)
- bronchite *J40*
- - aiguë *J20.9*
- - subaiguë *J20.9*
- cordite *J38.2*
- cystite *N30.9*
- iritis *H20.0*
- péricardite *I30.8*
- - purulente *I30.1*
- péritonite *K65.9*
- pleurite *R09.1*
- pneumonie *J18.1*
- rhinite *J31.0*

Fibrinogène, déficit acquis *D65.9*

Fibrinolyse *D65.2*
- acquise *D65.2*
- après
- - avortement *O08.1*
- - grossesse extra-utérine *O08.1*
- - grossesse môlaire *O08.1*
- avant l'accouchement *O46.0*
- pendant l'accouchement *O67.0*
- post-partum *O72.3*

Fibrinolytique
- hémorragie, acquise *D65.2*

Fibrinolytique –*suite*
- purpura *D65.2*

Fibrinopénie acquise *D68.4*

Fibrinopurulent(e)
- méningite *G00.9*
- pleurite *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*

Fibrinorrhée plastique *N94.6*
- maxillaire *D16.42*

Fibroadénomatose de l'utérus *N80.0*

Fibroadénome *D24*
- cellules géantes *D24*
- intracanalaire *D24*
- intracanaliculaire *D24*
- - cellulaire *D24*
- - cellules géantes *D24*
- juvénile *D24*
- péricanaliculaire *D24*
- phyllode *D24*
- prostate *N40*
- sein *D24*

Fibroadénome cellulaire intracanaliculai *D24*

Fibroaméloblastique, odontome *D16.5*
- maxillaire *D16.41*

Fibroangiochondrome *D16.9*

Fibroangiome juvénile *D10.6*

Fibroblastes, anomalie *M72.99*

Fibroblastique
- méningiome *D32.9*
- ostéosarcome *C41.9*

Fibroblastome
- neural *D36.1*
- périneural *D36.1*

Fibrocémentome *D16.9*

Fibrochondrosarcome *C41.9*

Fibroélastose *I42.4*
- cardiaque *I42.4*
- endocardique *I42.4*
- endomyocardique *I42.4*

Fibroélastose endocardique *I42.4*

Fibroépithélial(e)
- basaliome *C44.9*
- tumeur *D21.9*

Fibroépithéliome *D21.9*

Fibroépithéliome bénin de l'ovaire *D27*

Fibroïde - *voir* Tumeur bénigne, tissu co *D21.9*
- associée à
- - accouchement *O34.1*
- - grossesse *O34.1*
- induration pulmonaire chronique *J84.1*
- maladie cardiaque *I51.4*
- pneumonie chronique *J84.1*
- tumeur *D21.9*
- utérus *D25.9*

Fibrokystique
- Maladie *E84.9*
- - foie *Q44.6*
- - - congénitale *Q44.6*
- - pancréas *E84.1+, K87.1**
- - poumon *E84.0*
- - rein *Q61.8*
- - sein *N60.1*

Fibrokystique –*suite*

- Mastopathie *N60.1*

Fibrolamellaire, carcinome hépatocellula *C22.0*

Fibrolipome *D17.9*
- bassinet rénal *D17.7*
- rein *D17.7*

Fibroliposarcome *C49.9*

Fibromateux
- méningiome *D32.9*
- naevus naevocellulaire *D22.9*

Fibromatose *D48.1*
- *M72.99*
- abdominale *D48.1*
- agressive *D48.1*
- aponévrose palmaire *M72.0*
- aponévrose plantaire *M72.2*
- généralisée congénitale *D48.1*
- gingivale *K06.1*
- myo- *D48.1*
- neuro-
- - bénigne *Q85.0*
- - maligne *C47.9*
- pseudosarcomateuse *M72.49*
- rétropéritonéale *D48.3*
- sein *D48.6*

Fibrome *D21.9*
- adéno- *D27*
- - prostate *N40*
- améloblastique, maxillaire *D16.42*
- anus *D21.5*
- aponévrotique *D21.9*
- base du crâne *D21.0*
- basilaire *D21.0*
- cémentoblastique *D16.9*
- chondromyxo- *D16.9*
- chondromyxoïde *D16.9*
- conjonctive *D31.0*
- cou *D21.0*
- dermato- - *voir* Tumeur bénigne, peau *D23.9*
- - lenticulaire - *voir* Tumeur bénigne, peau *D23.9*
- desmoïde - *voir* Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, tissu conjonctif *D48.1*
- desmoïde - *voir* Tumeur bénigne, peau *D48.1*
- desmoplasique *D48.1*
- d'irritation *D21.9*
- dur *D21.9*
- élasto- *D21.9*
- gland *D29.0*
- intracanaliculaire *D24*
- invasif *D48.1*
- langue *D21.0*
- leiomyo- *D21.9*
- lipo- *D17.9*
- maxillaire, odontogène *D16.41*
- mou *D17.9*
- mucineux *D21.9*
- myo- *D21.9*
- myxo- *D21.9*
- myxochondro- *D16.9*
- myxoïde *D21.9*
- - maxillaire (mâchoire), odontogène *D16.41*
- - odontogène *D16.5*

Fibrome –*suite*

- nasopharyngé *D10.6*
- naso-pharyngé *D10.6*
- nasopharyngien *D10.6*
- neuro- *D36.1*
- nez *D21.0*
- odontogène *D16.5*
- - périphérique *D16.5*
- orbite *D31.6*
- os, non ossifiant *M89.89*
- ossifiant *D16.9*
- ostéo- *D16.9*
- ovaire *D27*
- paupière *D21.0*
- pendulaire *D17.9*
- périosté *D16.9*
- plèvre *D21.3*
- prostate *N40*
- rein *D21.4*
- sarcomateux *C49.9*
- sein *D24*
- simple d'Unna *D21.9*
- tête de l'épididyme *D29.3*
- thécal *D27*
- thécal, xanthomateux *D27*
- trachée *D14.2*
- utérus *D26.9*
- - avec obstacle à l'accouchement *O65.5*
- - pendant la grossesse *O34.1*
- vagin *D28.1*
- verge *D29.0*
- xantho- *D21.9*

Fibromusculaire
- dysplasie, artère *I77.3*
- hyperplasie, artère *I77.3*
- sténose grave, artère rénale *I77.3*
- sténose, artère rénale *I77.3*

Fibromyalgie *M79.29*
- *M79.70*
- huméro-scapulaire *M75.8*
- juvénile *M79.70*

Fibromyome *D21.9*
- corps utérin *D25.9*
- nez *D21.0*
- utérus *D25.9*
- - avec
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.8*
- - - obstacle à l'accouchement *O65.5*
- - lors de
- - - accouchement *O34.1*
- - - grossesse *O34.1*

Fibromyosarcome *C49.9*

Fibromyosite *M79.70*
- scapulohumérale *M75.8*

Fibromyxoïde, chondrome *D16.9*

Fibromyxolipome *D17.9*

Fibromyxome *D21.9*

Fibromyxosarcome *C49.9*

Fibro-odontome améloblastique *D16.5*
- maxillaire *D16.42*

Fibro-ostéoclasie *D48.0*

Fibroplasie rétrocristallinienne *H35.1*

Fibroplasique
- péritonite *K65.8*
- sarcome *C49.9*

Fibropurulent(e)
- péritonite *K65.0*
- pleurite *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*

Fibrosante diffuse, maladie de Hodgkin, *C81.3*

Fibrosante, alvéolite *J84.1*
- cryptogénique *J84.1*

Fibrosarcome *C49.9*
- améloblastique *C41.1*
- aponévrotique *C49.9*
- congénital *C49.9*
- dermato- *C44.9*
- infantile *C49.9*
- maxillaire
- - améloblastique *C41.02*
- - odontogène *C41.02*
- myxomateux *C49.9*
- neuro- *C47.9*
- odontogène *C41.1*
- périosté *C41.9*
- rate, de la *C26.1*

Fibrosclérose
- corps caverneux *N48.6*
- multiple *M35.5*
- pénis *N48.6*
- sein *N60.3*

fibrose
- *M62.89*
- anus, de l' *K62.8*
- associée à l'alvéolite dentaire *J84.1*
- canal déférent *N50.8*
- canal, du
- - déférent *N50.8*
- - éjaculateur *N50.8*
- - spermatique *N50.8*
- capillaires pulmonaires *J84.1*
- capsulaire, due à une prothèse mammaire *T85.82*
- capsule hépatique *K74.6*
- cardiaque *I51.4*
- chorion, du *O41.8*
- cicatrice *L90.5*
- - cutanée *L90.5*
- - épidurale, après discectomie *M96.1*
- col utérin, du *N88.8*
- col vésical *N32.8*
- cordon spermatique *N50.8*
- corps caverneux *N48.8*
- côtes *J94.1*
- cutanée NCA *L90.5*
- dermato- *L90.5*
- élasto- *I42.4*
- endo- *I42.3*
- endocardique *I38*
- endomyocardique *I42.3*
- - tropicale *I42.3*
- épididyme *N50.8*
- et cirrhose hépatique, dans affection hépatique d'origine toxique *K71.7*
- ganglions lymphatiques *I89.8*
- hépatique *K74.0*
- - alcoolique *K70.2*
- - avec sclérose hépatique *K74.2*
- hépatoliénale, avec hypertension portale *K76.6*
- huméro-scapulaire *M75.8*
- intestinale *K63.8*
- kystique *E84.9*

fibrose –*suite*
- kystique –*suite*
- - avec manifestation
- - - digestive *E84.1*
- - - intestinale *E84.1*
- - - pulmonaire *E84.0*
- - - - et digestive *E84.80*
- - avec manifestations
- - - multiples *E84.87*
- - congénitale familiale *E84.9*
- - dépistage *Z13.8*
- - occlusion intestinal due à un bouchon de méconium dans la mucoviscidose , [Au cours de *E84.1†, P75**
- langue, sous-muqueuse *K13.5*
- leptoméningée *G96.1*
- liée au vieillissement *R54*
- médiastinale *J98.5*
- médullaire *D47.1*
- membrane amniotique, de la *O41.8*
- méninges *G96.1*
- moelle osseuse *D75.8*
- muscle oculaire, du *H50.6*
- museau de tanche *N88.8*
- myélo- *D47.1*
- - avec métaplasie myéloïde *D47.1*
- myocarde *I51.4*
- nodulaire sous-épidermique *D23.9*
- organes génitaux masculins, des *N50.8*
- ostéo- *Q78.2*
- ostéomyélo- *D75.8*
- pancréas *K86.8*
- - kystique *E84.1+, K87.1**
- paroi vésicale *N32.8*
- pénis NCA *N48.6*
- péribronchique *J84.1*
- péricarde *I31.8*
- périnée
- - avec obstacle à l'accouchement *O65.5*
- - lors de la grossesse *O34.7*
- placenta *O43.8*
- pleurale *J94.1*
- plèvre *J94.1*
- - avec dépistage, asbeste *J92.0*
- poumon *J84.1*
- prostate, chronique *N40*
- provoquée par
- - appareil
- - - électrique placé dans l'os *T84.8*
- - - électronique cardiaque *T82.8*
- - - électronique dans les voies urinaires *T83.8*
- - - électronique placé dans le système nerveux *T85.81*
- - bauxite *J63.1*
- - - avec tuberculose, organes respiratoires *J65*
- - cathéter de dialyse *T82.8*
- - cathéter de perfusion NCA *T82.8*
- - cathéter NCA *T85.88*
- - cathéter urinaire *T83.8*
- - fixation orthopédique interne NCA *T84.8*
- - graphite *J63.3*
- - - avec tuberculose, organes respiratoires *J65*
- - greffe de cornée NCA *T85.3*
- - greffon artériel NCA *T82.8*
- - implant cardiaque *T82.8*

fibrose –*suite*
- provoquée par –*suite*
- - implant mammaire *T85.82*
- - irradiation *L59.8*
- - prothèse articulaire *T84.8*
- - prothèse vasculaire *T82.8*
- - shunt ventriculaire intracrânien *T85.88*
- - Thorotrast *T96*
- - transplant cardiaque *T82.8*
- provoquée par un médicament, dans les antécédents du sujet *Z87.3*
- pulmonaire *J84.1*
- - atrophique *J84.1*
- - avec
- - - aluminose *J63.0*
- - - anthracose *J60*
- - - anthraco-silicose *J60*
- - - asbestose *J61*
- - - bagassose *J67.1*
- - - bérylliose *J63.2*
- - - byssinose *J66.0*
- - - chalicose *J62.8*
- - - pneumoconiose NCA *J64*
- - - pneumosidérose *J63.4*
- - - Poumon de fermier *J67.0*
- - - sidérose *J63.4*
- - - silicose *J62.8*
- - - stannose *J63.5*
- - chronique *J84.1*
- - - par inhalation de substances chimiques *J68.4*
- - congénitale *P27.8*
- - diffuse *J84.1*
- - idiopathique *J84.1*
- - interstitielle
- - - idiopathique *J84.1*
- - - provoquée par un médicament *J70.4*
- - post-inflammatoire *J84.1*
- - post-pneumonie *J84.1*
- - provoquée par
- - - bauxite *J63.1*
- - - graphite *J63.3*
- - - inhalation de substances chimiques *J68.4*
- - - irradiation *J70.1*
- - provoquée par un médicament *J70.4*
- - silicotique, due à
- - - poussière de quartz *J62.8*
- - - poussière du talc *J62.0*
- - tuberculeuse *A16.2*
- - - bactériologiquement et histologiquement
- - - - étudiée *A16.1*
- - - - prouvée *A16.0*
- - - confirmée par l'examen microscopique de l'expectoration et la mise en culture *A15.0*
- rate *D73.8*
- rein *N26*
- rétropéritonéale *N13.5*
- - idiopathique *N13.5*
- - - avec infection *N13.6*
- rétropéritonéale [maladie d'Ormond] *N13.5*
- scrotum *N50.8*
- sein *N60.3*
- sénile *R54*
- sous-muqueuse de la bouche, langue *K13.5*
- sphincter anal *K62.8*

fibrose –*suite*
- surrénalienne *E27.8*
- testicules *N50.8*
- - chronique, syphilitique *A52.7+, N51.1**
- thymus *E32.8*
- trompe (de Fallope) *N83.8*
- trompes de Fallope *N83.8*
- tunique vaginale *N50.8*
- utérus *N85.8*
- vaginale *N89.8*
- valvule cardiaque *I38*
- veine *I87.8*
- veineuse *I87.8*
- vésicule séminale *N50.8*
- vessie *N32.8*

Fibrosite *M79.70*
- myo- *M79.70*
- périarticulaire *M79.70*
- rhumatismale *M79.70*

Fibrosplénome *D13.9*

Fibrosysplasie ossifiante progressive [m *M61.19*

Fibrothorax *J94.1*

Fibroxanthome *D21.9*
- atypique *D48.1*
- malin *C49.9*

Fibroxanthosarcome *C49.9*

Fibula, ligament, entorse *S93.48*

Fiedler, myocardite de *I40.1*

Fiessinger-Leroy-Reiter, maladie de *M02.39*

Fiessinger-Leroy-Reiter, maladie de [syn *M02.39*

Fièvre *R50.9*
- abattoirs [fièvre Q] *A78*
- Afrique de l'Ouest *B50.8*
- aphteuse *B08.8*
- après accouchement *O86.4*
- aspécifique *R50.9*
- associée à
- - accouchement *O75.2*
- - charbon *A22.9*
- - maladie par le VIH *B23.8, R50.9*
- - paratyphoïde *A01.4*
- - - A *A01.1*
- - - B *A01.2*
- - - C *A01.3*
- - rhume *J00*
- - scarlatine *A38*
- - travail *O75.2*
- automnale *J30.1*
- automnale du Japon *A27.8*
- avec
- - convulsion *R56.0*
- - exanthème, à entérovirus [exanthème de Boston] *A88.0*
- - frissons *R50.88*
- - - zone palustre *B54*
- - inanition *R50.9*
- avec frissons NCA *R50.88*
- Balkans *A78*
- - avec
- - - endocardite *A78+, I39.8**
- - - pneumonie *A78+, J17.8**
- - sud est *A78*
- bilieuse *B50.8*

Fièvre –*suite*

- bilieuse hématurique *B50.8*
- - cas de malaria *B50.8*
- bilieuse hémoglobinurique *B50.8*
- - dans le paludisme *B50.8*
- Brucella abortus (à) *A23.1*
- Brucella melitensis (à) *A23.0*
- cachectique *R50.9*
- Cameroun *B54*
- canicola *A27.8*
- cérébrale *G04.9*
- cérébro-spinale, due à des méningocoques *A39.0+, G01**
- charbon *A22.9*
- Charentes *A27.8*
- Chypre [mélitococcie] *A23.0*
- cinq jours *A79.0*
- convulsion fébrile *R56.0*
- Corse *B54*
- dengue *A90*
- - dépistage *Z11*
- - hémorragique *A91*
- dentaire *K00.7*
- due médicament Drug fever] , *R50.2*
- due à l'environnement, de nouveau-né *P81.0*
- d'un jour *R50.9*
- entéritique *A01.0*
- éphémère *R50.9*
- équine vénézuélienne *A92.2*
- éruption dentaire *K00.7*
- érysipélateuse *A46*
- estivo-automnale *B50.9*
- étiologie inconnue *R50.80*
- Eubée [typhus murin] *A78*
- fluctuante *B54*
- fluviale du Japon *A75.3*
- fondeurs *T56.5*
- forêt de Barmah *A92.8*
- Fort Bragg, de *A27.8*
- gastrique [typhoïde] *A01.0*
- gastro-entérite *A01.0*
- Gibraltar [mélitococcie] *A23.0*
- griffes du chat *A28.1*
- Haverill *A25.1*
- helminthiase *B83.9*
- hémoglobinurique *B50.8*
- hémorragique de Crimée [du Congo] *A98.0*
- hémorragique d'Omsk *A98.1*
- hémorragique NCA *A94*
- - avec syndrome rénal *A98.5+, N08.0**
- - dépistage *Z11*
- - provoquée par
- - - arbovirus *A94*
- - - arénavirus *A96.9*
- - - arthropode *A94*
- - - virus *A99*
- - - virus Junin *A96.0*
- - - virus Machupo *A96.1*
- - sud américaine *A96.8*
- infectieuse NCA *B99*
- intermittente
- - d'étiologie inconnue *R50.80*
- - paludéenne *B54*
- - pernicieuse *B50.9*
- intermittente, lors de paludisme *B54*
- intestinale, au cours de paludéenne *B54*
- jaune *A95.9*

Fièvre –*suite*

- jaune –*suite*
- - brousse *A95.0*
- - citadine *A95.1*
- - dépistage *Z11*
- jaune de brousse *A95.0*
- jaune, citadine *A95.1*
- Kedani *A75.3*
- Lassa *A96.2*
- leptospirose *A27.9*
- lièvre *A21.9*
- lièvres *A21.9*
- Malte *A23.0*
- mastite *O86.8*
- méditerranéenne *A23.0*
- - familiale *E85.0*
- - - avec arthrite *E85.0+, M14.4**
- - périodique *E85.0*
- morsure de rat
- - spirille mineure *A25.0*
- - spirochètes morsus muris *A25.0*
- - streptobacillose moniliforme *A25.1*
- mouche du daim *A21.9*
- Naples [mélitococcie] *A23.0*
- napolitaine *A23.0*
- néonatale *P81.9*
- Nil occidental *A92.3*
- nourrisson *O85*
- - avec septicémie *O85*
- nouveau-né, due à l'environnement *P81.0*
- ondulante *A23.9*
- - Bang (maladie de) *A23.1*
- - bovine *A23.1*
- - Brucella melitensis (à) *A23.0*
- ondulante - *voir* Brucellose *A23.9*
- paludéenne *B54*
- paludéenne Panama *B50.9*
- paludisme *B54*
- palustre *B54*
- - provoquée par leptospire *A27.9*
- Panama [paludisme] *B50.9*
- pappataci *A93.1*
- par morsure de rat *A25.9*
- - provoquée par
- - - Spirillum minus *A25.0*
- - - Spirochaeta morsus muris *A25.0*
- - - streptobacille *A25.1*
- - - Streptobacillus moniliformis *A25.1*
- persistante *R50.88*
- pétéchiale (typhus) *A75.9*
- pharyngoconjonctivale *B30.2+, H13.1**
- - épidémique *B30.2+, H13.1**
- - virale *B30.2+, H13.1**
- piqûre de tique, provoquée par
- - rickettsia
- - - conori *A77.1*
- - - rickettsii *A77.0*
- - - sibirica *A77.2*
- Pontiac [légionellose] *A48.2*
- post-pératoire, d'étiologie infectieuse *T81.4*
- prétibiale *A27.8*
- provoquée par
- - arbovirus *A94*
- - leptospirose *A27.9*
- - Plasmodium ovale *B53.0*
- - spirillose *A25.0*

Fièvre –*suite*

- provoquée par –*suite*
- - streptobacilles *A25.1*
- - trombiculidé *A75.3*
- - vapeur de métal *T56.8*
- - vapeur de polyester *T59.8*
- puerpérale *O85*
- purpurique du Brésil *A48.4*
- Q *A78*
- - australienne *A78*
- - avec pneumonie *A78+, J17.8**
- quarte (paludéenne) *B52.9*
- quatre jours *B52.9*
- quintane *A79.0*
- quotidienne (paludéenne) *B50.9*
- récurrente *A68.9*
- - à
- - - poux *A68.0*
- - - tiques *A68.1*
- - Novy, transmise
- - - par les poux *A68.0*
- - - par les tiques *A68.1*
- - provoquée par
- - - poux *A68.0*
- - - tiques *A68.1*
- récurrente de Novy
- - poux *A68.0*
- - tiques *A68.1*
- récurrente Novy due aux
- - poux *A68.0*
- - tiques *A68.1*
- rémittente, dans le paludisme *B54*
- rhumatismale *I00*
- - aiguë *I00*
- - - avec
- - - - érythème marginé *I00+, L54.0**
- - - - myocardite *I01.2*
- - associée à
- - - dégénérescence du myocarde *I09.0*
- - - insuffisance cardiaque *I09.9*
- - - insuffisance ventriculaire gauche, active *I01.8*
- - - myocardite *I09.0*
- - - péricardite active *I01.0*
- - avec
- - - arthrite
- - - - aiguë *I00*
- - - - subaiguë *I00*
- - - atteinte
- - - - cardiaque *I01.9*
- - - - système nerveux central *I02.9*
- - - endocardite *I01.1*
- - - péricardite *I01.0*
- - - pneumonie *I00+, J17.8**
- - inactive
- - - avec
- - - - cardite *I09.9*
- - - - dégénérescence du myocarde *I09.0*
- - - - endocardite *I09.1*
- - - - - valvule pulmonaire, *I09.8*
- - - - hypertrophie cardiaque *I09.8*
- - - - insuffisance cardiaque *I09.8*
- - - - insuffisance ventriculaire gauche *I09.8*
- - - - maladie cardiaque NCA *I09.8*
- - - - myocardite *I09.0*
- - - - pancardite *I09.9*
- - - - péricardite *I09.2*

Fièvre –*suite*
- rhumatismale –*suite*
- - inactive –*suite*
- - - dans l'endocardite
- - - - valvule aortique *I06.9*
- - - - valvule mitrale *I05.9*
- - - - valvule tricuspide *I07.8*
- - subaiguë *I00*
- rhume des foins
- - avec rhinite *J30.1*
- - provoqué par allergène, sauf pollen *J30.3*
- Ross River *B33.1*
- scarlatine *A38*
- sept jours *A27.8*
- - japonaise *A27.8*
- septique *A41.9*
- Songo *A98.5+, N08.0**
- tabardillo *A75.0*
- - provoquée par
- - - poux *A75.0*
- - - puces *A75.2*
- thyphoïde *A01.0*
- tierce (paludéenne) *B51.9*
- tierce maligne *B50.9*
- tique NCA *A77.9*
- - Colorado *A93.2*
- - Queensland *A77.3*
- - rickettsie
- - - conori *A77.1*
- - - rickettsii *A77.0*
- - - sibirica *A77.2*
- tiques
- - Colorado *A93.2*
- - Queensland *A77.3*
- tiques du Quennsland *A77.3*
- tranchées *A79.0*
- tranchées des *A79.0*
- transitoire *R50.9*
- transmise par rongeur *A21.9*
- trois jours [exanthème subit] *B08.2*
- tsutsugamushi *A75.3*
- typhoïde *A01.0*
- typhoide gastrique *A01.0*
- typhus *A75.9*
- - cérébral *A75.9+, G94.8**
- - classique *A75.0*
- - endémique *A75.0*
- - épidémique *A75.0*
- - fluviale du Japon *A75.3*
- - murin *A75.2*
- - provoquée par
- - - acarien *A75.3*
- - - poux *A75.0*
- - - - épidémique *A75.0*
- - - - - avec myocardite, *A75.0+, I41.0**
- - - puce *A75.2*
- - - rickettsia
- - - - australis *A77.3*
- - - - conorii *A77.1*
- - - - mooseri *A75.2*
- - - - orientale *A75.3*
- - - - rickettsii *A77.0*
- - - - sibirica *A77.2*
- - - - tsutsugamushi *A75.3*
- - - - typhi *A75.2*
- - récidive tardive *A75.1*
- - résurgent *A75.1*

Fièvre –*suite*
- typhus –*suite*
- - tropical *A75.3*
- - varicelliforme *A79.1*
- urémique *N19*
- urticaire *L50.9*
- uvéo-parotidienne [syndrome de Heerfordt] *D86.8*
- uvéo-parotidienne subchronique *D86.8*
- vallée du Rift *A92.4*
- vers parasites *B83.9*
- virale, transmise par des moustiques *A92.9*
- virus O'nyong-nyong *A92.1*
- virus Tahyna *B33.8*
- virus Yaba *B08.8*
- Volhynie [fièvre des tranchées] *A79.0*
- Whitmore *A24.4*

Figuré, érythème, chronique NCA *L53.3*

Fil de Kirschner
- remplacement *Z47.0*
- vérification *Z47.0*

Filariose *B74.9*
- dépistage *Z11*
- lymphatique *B74.0*
- provoquée par
- - Brugia
- - - malayi *B74.1*
- - - timori *B74.2*
- - Wuchereria bancrofti *B74.0*

Filatov, maladie de *B27.0*

Filet abdominal
- abscès *K65.0*
- hernie *K46.9*

Filgastrim
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Filiforme, verrue *B07*

Film lacrymal, insuffisance *H04.1*

Filtration, glomérulaire, réduite *N05.9*

Filtration, insuffisance *N19*

FIM [mesure de l'indépendance fonctionne
- cognitive
- - 11-29 points *U51.11*
- - 30-35 points *U51.01*
- - 5-10 points *U51.21*
- moteur
- - 13-30 points *U50.51*
- - 31-42 points *U50.41*
- - 43-58 points *U50.31*
- - 59-68 points *U50.21*
- - 69-84 points *U50.11*
- - 85-91 points *U50.01*

Financier, moyens, insuffisance *Z59*

Fischer, syndrome de *Q82.8*

Fisher, syndrome de *H49.0*
- Miller- *G61.0*

Fissure
- anale *K60.2*
- - aiguë *K60.0*
- - chronique *K60.1*
- - congénitale *Q43.8*
- base du crâne *S02.1*
- commissure des lèvres *K13.0*
- Emmet *O71.3*

Fissure –*suite*
- épiglotte, congénitale *Q31.8*
- labiale *K13.0*
- labio-maxillaire *Q37.1*
- - deux côtés *Q37.0*
- - unilatérale *Q37.1*
- langue
- - acquise *K14.5*
- - congénitale *Q38.3*
- larynx *J38.7*
- - congénitale *Q31.8*
- lésion du pouce *S60.81*
- lèvre *K13.0*
- - congénitale *Q36.9*
- lobe de l'oreille, congénitale *Q17.8*
- mamelon *N64.0*
- - liée à la grossesse *O92.10*
- - puerpérale *O92.10*
- nez *Q30.2*
- palais *Q35.9*
- - congénitale *Q35.9*
- peau *R23.4*
- périnéale *R23.4*
- rachis
- - avec hydrocéphalie *Q05.4*
- - congénitale *Q05.9*
- rectum *K60.2*
- rocher, suppuration, aiguë *H70.2*

Fistule *L98.8*
- abdomen *K63.2*
- abdomino (paroi)-vésicale *N32.2*
- abdomino-thoracique *J86.0*
- abdomino-utérine *N82.5*
- alvéolaire du sinus maxillaire *J32.0*
- anale *K60.3*
- - congénitale *Q43.6*
- - tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- ano-rectale *K60.5*
- antre *J32.0*
- anus, tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- aorto-duodénale *I77.2*
- apophyse mastoïde *H70.1*
- appendice *K38.3*
- après
- - intervention chirurgicale *T81.8*
- - trachéotomie *J95.0*
- artère *I77.2*
- artère hépatique, veine porte *Q26.6*
- artère hépatique, veine porte, congénitale *Q26.6*
- artério-veineuse *I77.0*
- - acquise *I77.0*
- - cérébrale, acquise *I67.11*
- - cerveau, rupture *I60.8*
- - congénitale *Q27.3*
- - congénitale, vaisseau
- - - cérébral *Q28.21*
- - - précérébral *Q28.01*
- - créée chirurgicalement
- - - avec complication *T82.9*
- - - infection *T82.7*
- - - inflammation *T82.7*
- - pulmonaire, congénitale *Q25.7*
- - traumatique *T14.5*
- articulation *M25.19*
- auriculaire *H61.1*
- - congénitale *Q18.1*
- avec

Fistule –*suite*
- avec –*suite*
- - abcès
- - - dentaire *K04.6*
- - - dento-alvéolaire *K04.6*
- - - périapical *K04.6*
- - - plèvre *J86.0*
- - - thorax *J86.0*
- - absence de l'anus *Q42.2*
- - absence de rectum *Q42.0*
- - agénésie
- - - anus *Q42.2*
- - - rectum *Q42.0*
- - anus obstrué *Q42.2*
- - atrésie de l'anus *Q42.2*
- - atrésie du rectum *Q42.0*
- - cholélithiase *K80.20*
- - cloison anale *Q42.2*
- - empyème pleural *J86.0*
- - fermeture de l'anus congénitale *Q42.2*
- - hypoplasie
- - - anus *Q42.2*
- - - canal anal *Q42.2*
- - - rectum *Q42.0*
- - imperforation
- - - anus *Q42.2*
- - - rectum *Q42.0*
- - membrane anale persistante *Q42.2*
- - pleurite
- - - fibrino-purulente *J86.0*
- - - septique *J86.0*
- - - séro-purulente *J86.0*
- - pyopneumothorax *J86.0*
- - rectum obstrué *Q42.0*
- - rétrécissement
- - - anus, congénital *Q42.2*
- - - rectum, congénital *Q42.0*
- - sténose de l'anus, congénitale *Q42.2*
- - tuberculose, rectum *A18.3+, K93.0**
- bassinet *N28.8*
- biliaire *K82.3*
- bilio-digestive *K82.3*
- bilio-pancréatique *K86.8*
- bouche *K12.28*
- branchiogène *Q18.0*
- bronche, tuberculeuse, primaire *A16.7*
- - confirmé par bactériologie ou histologie *A15.7*
- bronchique *J86.0*
- - tuberculeuse *A16.4*
- broncho-cutanée *J86.0*
- - tuberculeuse *A16.4*
- broncho-intestinale *J86.0*
- broncho-médiastinale *J86.0*
- - tuberculeuse *A16.4*
- broncho-oesophagienne *J86.0*
- broncho-pleurale *J86.0*
- - tuberculeuse *A16.4*
- broncho-pleuro-médiastinale *J86.0*
- broncho-pulmonaire *J86.0*
- broncho-viscérale *J86.0*
- buccale *K12.28*
- buccale, sinus maxillaires *J32.0*
- bucco-sinusienne *J32.0*
- caecale *K63.2*
- caeco-sigmoïdienne *K63.2*
- caecum *K63.2*
- canal

Fistule –*suite*
- canal –*suite*
- - cholédoque *K83.3*
- - cystique *K82.3*
- - - congénitale *Q44.5*
- - hépatique *K83.3*
- - nasolacrymal *H04.6*
- - thoracique *I89.8*
- - thyréoglosse *Q89.2*
- canal biliaire *K83.3*
- canal semi-circulaire *H83.1*
- carotido-caverneuse *I67.11*
- cavité buccale *K12.28*
- cérébro-spinale *G96.0*
- cerveau *G96.0*
- - artério-veineuse *I67.11*
- - - congénitale, rompue *I60.8*
- cervico-auriculaire *Q18.1*
- cervico-sigmoïdienne *N82.4*
- cholécysto-colique *K82.3*
- cholécysto-duodénale *K82.3*
- cholécysto-entérique *K82.3*
- cholécysto-gastrique *K82.3*
- cholécysto-intestinale *K82.3*
- cholédocho-duodénale *K83.3*
- cholédocho-jéjunale *K83.3*
- coccyx *L05.9*
- - avec abcès *L05.0*
- col utérin *N82.9*
- colo-gastrique *K31.6*
- côlon *K63.2*
- côlon, entéro-vaginale *N82.3*
- colostomie *K91.4*
- colo-vaginale *N82.3*
- combinée *L08.9*
- conduit auditif *H61.8*
- congénitale, vaisseau
- - cérébral *Q28.31*
- - précérébral *Q28.11*
- coronaire *I25.4*
- - artérioveineuse, acquise *I25.4*
- cou
- - latérale *Q18.1*
- - médiane *Q18.8*
- cutanée *L98.8*
- dent *K04.6*
- Douglas-vaginale *N82.8*
- duodénum *K31.6*
- entéro-colique *K63.2*
- entéro-cutanée *K63.2*
- entéro-utérine *N82.4*
- - congénitale *Q51.7*
- entéro-vaginale *N82.4*
- - congénitale *Q52.2*
- entérovésicale *N32.1*
- entéro-vésicale *N32.1*
- épididyme *N50.8*
- - tuberculeuse *A18.1+, N51.1**
- estomac *K31.6*
- ethmoïdale *J32.2*
- fécale *K63.2*
- - congénitale *Q43.6*
- Fistule
- - abdominale *N32.2*
- - abdominale, utérus *N82.5*
- - re *J32.0*
- follicule pileux
- - avec abcès *L05.0*

Fistule –*suite*
- follicule pileux –*suite*
- - infection *L05.9*
- gastrique *K31.6*
- - côlon *K31.6*
- - vésicule biliaire *K82.3*
- gastro-colique *K31.6*
- - congénitale *Q40.2*
- - tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- gastro-duodénale *K31.6*
- gastro-entérocolique *K31.6*
- gastro-jéjunale *K31.6*
- gastro-jéjuno-colique *K31.6*
- génito-cutanée, chez la femme *N82.5*
- génito-intestinale, chez la femme NCA *N82.4*
- glande de Bartholin *N82.9*
- glande lacrymale *H04.6*
- glande sous-maxillaire *K11.4*
- - congénitale *Q38.4*
- glande sublinguale *K11.4*
- - congénitale *Q38.4*
- glandes salivaires *K11.4*
- globe oculaire *H44.4*
- hanche *M25.15*
- hépatopleurale *J86.0*
- hépato-pleurale *J86.0*
- hépatopulmonaire *J86.0*
- hépato-pulmonaire *J86.0*
- hypopharynx *J39.2*
- iléon *K63.2*
- iléo-rectale *K63.2*
- iléo-sigmoïdienne *K63.2*
- iléo-vaginale *N82.2*
- iléo-vésicale *N32.1*
- intestin *K63.2*
- intestin grêle *K63.2*
- intestin NCA *K63.2*
- intestinale *K63.2*
- - congénitale *Q43.6*
- - intestino-génitale, chez la femme NCA *N82.4*
- - intestino-urétérale *N28.8*
- - vesico- *N32.1*
- intestino-génitale, chez la femme NCA *N82.4*
- intestino-vaginale (intestin grêle) *N82.2*
- intestino-vésicale *N32.1*
- ischio-rectale *K61.3*
- jéjunum *K63.2*
- labyrinthe *H83.1*
- lacrymale *H04.6*
- laryngo-trachéale congénitale *Q34.8*
- larynx *J38.7*
- lèvre (buccale) *K13.0*
- - congénitale *Q38.0*
- lèvres
- - grandes *N82.9*
- - petites *N82.9*
- liquide céphalorachidien, postopératoire *G97.80*
- liquide, postopératoire *G97.80*
- lymphatique *I89.8*
- lymphatique, pavillon *H61.1*
- mamelon *N64.0*
- - postpartum, due à une mastite *O91.10*
- - puerpérale, due à une mastite *O91.10*
- mammaire (glande) *N61*

Fistule –*suite*

- mammaire, puerpérale *O91.10*
- mastoïde *H70.1*
- maxillo-alvéolaire *J32.0*
- médiane de la face et du cou *Q18.8*
- médiastinale *J86.0*
- médiastino-bronchique *J86.0*
- médiastino-cutanée *J86.0*
- naso-pharyngée *J39.2*
- nez *J34.8*
- oesophage *K22.8*
- - congénitale *Q39.2*
- oesophago-bronchique *J86.0*
- - avec atrésie de l'œsophage *Q39.1*
- - congénitale *Q39.2*
- oesophago-cutanée *K22.8*
- œsophago-pleuro-cutanée *J86.0*
- oesophago-trachéale *J86.0*
- - après trachéotomie *J95.0*
- - avec
- - - atrésie de l'oesophage *Q39.1*
- - - imperforation de l'oesophage *Q39.1*
- - congénitale *Q39.2*
- - - sans atrésie *Q39.2*
- ombilicale *Q82.8*
- ombilicale, urinaire *Q64.8*
- ombilico-urinaire *Q64.8*
- orbite *H05.8*
- - artério-veineuse *H05.8*
- oreille *H61.8*
- oreille interne *H83.1*
- oreille moyenne *H74.8*
- organes génitaux féminins *N82.9*
- oronasale *Q35.9*
- os *M89.89*
- - cas d'ostéomyélite chronique *M86.49*
- ouraque *Q64.4*
- - congénitale *Q64.4*
- pancréas *K86.8*
- pancréatico-duodénale *K86.8*
- paroi abdominale *K63.2*
- paroi thoracique *J86.0*
- parotide *K11.4*
- paupière *H01.8*
- pavillon de l'oreille *H61.1*
- peau *L98.8*
- pénis *N48.8*
- péri-anale *K60.3*
- périlymphatique, pavillon de l'oreille *H61.1*
- périnéale NCA *N36.0*
- - avec atteinte de l'urètre *N36.0*
- - tuberculeuse *A18.1+, N37.8**
- périnée, tuberculeuse *A18.8*
- périnéo-rectale *K60.4*
- périrectale *K60.4*
- - tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- péritoine *K65.9*
- pharynx *J39.2*
- - *Q18.0*
- pharynx- sillon branchial *Q18.0*
- pilonidale *L05.9*
- - avec abcès *L05.0*
- plancher buccal *K12.28*
- pleuro-cutanée *J86.0*
- - tuberculeuse NCA *A16.5*
- pleuro-péritonéale *J86.0*
- - tuberculeuse NCA *A16.5*

Fistule –*suite*

- plèvre *J86.0*
- - tuberculeuse NCA *A16.5*
- postauriculaire *H70.1*
- postopératoire, persistante *T81.8*
- poumon *J86.0*
- - tuberculeuse *A16.2*
- préauriculaire *Q18.1*
- processus mastoïde *H70.1*
- prostate *N42.8*
- pulmono-péritonéale *J86.0*
- rectale *K60.4*
- - avec
- - - atrésie rectale *Q42.0*
- - - sténose rectale *Q42.0*
- - tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- - urètrale *N36.0*
- - vesicale *N32.1*
- recto-cutanée *K60.4*
- - avec
- - - atrésie rectale *Q42.0*
- - - sténose rectale *Q42.0*
- - tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- recto-labiale *N82.4*
- recto-sigmoïdienne *K63.2*
- recto-urétérale *N28.8*
- recto-urétrale *N36.0*
- - congénitale *Q64.7*
- recto-utérine *N82.4*
- - congénitale *Q51.7*
- recto-vaginale *N82.3*
- - congénitale *Q52.2*
- - tuberculeuse *A18.1+, N74.1**
- recto-vésicale *N32.1*
- - congénitale *Q64.7*
- recto-vésico-vaginale *N82.3*
- recto-vulvaire *N82.4*
- - congénitale *Q52.7*
- rectum *K60.4*
- - avec tuberculose *A18.3+, K93.0**
- - congénitale *Q43.6*
- région costale *J86.0*
- rein *N28.8*
- rétro-auriculaire *H70.1*
- sac lacrymal *H04.6*
- sclère *H15.8*
- scrotum *N50.8*
- - tuberculeuse *A18.1+, N51.8**
- sein *N61*
- - due à une mastite, puerpérale *O91.10*
- - postpartum *O91.10*
- - due à une mastite *O91.10*
- sein, puerpérale *O91.10*
- sigmoïde *K63.2*
- sigmoïdienne *K63.2*
- sigmoïdo-vaginale *N82.3*
- sillon branchial *Q18.0*
- sinus caverneux
- - non traumatique *I67.11*
- - traumatique *S06.8*
- sinus frontal *J32.1*
- sinus maxillaire *J32.0*
- sinus maxillaire-alvéole *J32.0*
- sinus maxillaire-bouche *J32.0*
- sinus maxillaire-joue *J32.0*
- sinus paranasal *J32.9*
- spléno-colique *D73.8*
- stercorale *K63.2*

Fistule –*suite*

- suture *T81.8*
- thoracique *J86.0*
- thoracique, paroi *J86.0*
- thoraco-abdominale *J86.0*
- thoraco-gastrique *J86.0*
- thoraco-intestinale *J86.0*
- thyréoglosse *Q89.2*
- thyroïde *E07.8*
- trachée *Q32.1*
- - congénitale *Q32.1*
- trachéo-oesophagienne *J86.0*
- - après trachéotomie *J95.0*
- - congénitale *Q39.2*
- tractus thyréoglosse *Q89.2*
- trompe de Fallope, externe *N82.5*
- tuberculeuse, lombaire *A18.0+, M49.06**
- typhoïdique *A01.0*
- uretère *N28.8*
- - périnéale *N28.8*
- - persistante *N28.8*
- urétéro-abdominale (paroi) *N28.8*
- urétéro-cutanée *N28.8*
- urétéro-intestinale *N28.8*
- urétéro-rectale *N28.8*
- urétéro-sacrée *N28.8*
- urétéro-sigmoïdo-abdominale *N28.8*
- urétéro-utérine *N82.1*
- urétéro-vaginale *N82.1*
- urétéro-vésicale *N32.2*
- urètre *N36.0*
- - congénitale *Q64.7*
- - tuberculeuse *A18.1+, N37.8**
- urétro-cutanée *N36.0*
- urétro-périnéale *N36.0*
- urétro-périnéo-vésicale *N32.2*
- urétro-rectale *N36.0*
- - congénitale *Q64.7*
- urétro-scrotale *N50.8*
- urétro-vaginale *N82.1*
- urétro-vésicale *N32.2*
- utéro- abdominale *N82.5*
- utéro-abdominale *N82.5*
- - congénitale *Q51.7*
- utéro-abdominale (paroi) *N82.5*
- utéro-intestinale *N82.4*
- - congénitale *Q51.7*
- utéro-rectale *N82.4*
- - congénitale *Q51.7*
- utéro-urétérale *N82.1*
- utéro-urétrale, congénitale *Q51.7*
- utéro-vaginale *N82.8*
- utéro-vaginale (Douglas) *N82.8*
- utéro-vésicale *N82.1*
- - congénitale *Q51.7*
- utérus *N82.9*
- - externe *N82.5*
- vagin *N82.9*
- vaginale
- - Douglas *N82.8*
- - entéro-(vaginale) intestin grêle *N82.2*
- - intestin grêle *N82.2*
- - jusqu'au rectum *N82.3*
- - recto-(vaginale) *N82.3*
- - sigmoïde *N82.3*
- - sigmoïdo-(vaginale) *N82.3*
- - urétéro-(vaginale) *N82.1*

Fistule –*suite*
- vaginale –*suite*
- - vésico-(vaginale) *N82.0*
- - vésico-rectale *N82.8*
- vaginocutanée *N82.5*
- vagino-cutanée *N82.5*
- vagino-perinéale *N82.5*
- vagino-sigmoïdienne *N82.3*
- vagino-vésicale *N82.0*
- vaisseaux pulmonaires, artério-veineuse *I28.0*
- vésicale (Douglas) *N32.2*
- vésicale NCA *N32.2*
- vésico- sigmoïdo-vaginale *N82.3*
- vésico- urétéro-vaginale *N82.1*
- vésico- urétro-rectale *N32.1*
- vésico-cervicale *N82.1*
- vésico-cervico-vaginale *N82.1*
- vésico-colique *N32.1*
- vésico-cutanée *N32.2*
- vésico-Douglas *N32.2*
- vésico-entérale *N32.1*
- vésico-iléale *N32.1*
- vésico-intestinale *N32.1*
- vésico-ombilicale *Q64.8*
- vésico-périnéale *N32.2*
- vésico-rectale *N32.1*
- - congénitale *Q64.7*
- vésico-recto-vaginale *N82.8*
- vésico-sigmoïdienne *N32.1*
- vésico-urétérale *N32.2*
- vésico-urétéro-vaginale *N82.1*
- vésico-urétrale *N32.2*
- vésico-urétro-rectale *N32.1*
- vésico-utérine *N82.1*
- - congénitale *Q51.7*
- vésico-vaginale *N82.0*
- vésicule biliaire *K82.3*
- - avec calcul biliaire *K80.20*
- vessie *N32.2*
- vessie NCA *N32.2*
- voies biliaires *K83.3*
- - avec calcul *K80.50*
- voies lacrymales *H04.6*
- voies urinaires *N36.0*
- - persistante *N36.0*
- vulve *N82.8*
- vulvo-rectale *N82.4*
- - congénitale *Q52.7*

Fistulisé, abcès *L02.9*

Fitz-Hugh-Curtis syndrome de
- Chlamydia *A74.8+, K67.0**
- gonorrhée *A54.8+, K67.1**

Fitz-Hugh-Curtis, syndrome de *A54.8+, K67.1**

Fixateur
- changement *Z47.8*
- externe
- - changement *Z47.8*
- - contrôle *Z47.8*
- interne
- - ablation *Z47.0*
- - changement *Z47.0*
- - contrôle *Z47.0*

Fixateur interne orthopédique, avec comp *T84.9*

Fixation

Fixation –*suite*
- alcool dans le sang *Z04.8*
- anormale, en cas de malposition, intestinale, congénitale *Q43.3*
- cerclage, changement *Z47.8*
- corde vocale *J38.3*
- drogues dans le sang *Z04.8*
- étrier *H74.3*
- groupe sanguin *Z01.7*
- interne
- - Autre os Complication mécanique d ' un appareil de *T84.2*
- - os membre Complication mécanique d ' un appareil de *T84.1*
- interne orthopédique
- - défaillance NCA *T84.2*
- - déplacement NCA *T84.2*
- - infection NCA *T84.6*
- - inflammation NCA *T84.6*
- - malposition *T84.2*
- intestinale, anomalie *Q43.3*
- larynx *J38.7*
- orthopédique, interne, avec complication mécanique *T84.2*
- osseuse interne
- - membre
- - - avec complication mécanique *T84.1*
- - - position anormale *T84.1*

Fixé(e)
- cyphose *M40.29*
- pied plat *M21.4*

Fixe(s)
- calcul
- - avec cholélithiase *K80.20*
- - foie *K80.50*
- - rénal *N20.0*
- calcul de la vésicule biliaire *K80.20*
- cérumen *H61.2*
- jumeaux
- - accouchement *O66.1*
- - compliquant l'accouchement *O66.1*

Flagellé
- diarrhée *A07.9*
- infection intestinale *A07.9*

Flatau-Schilder, maladie de *G37.0*

Flatulence *R14*
- douloureuse *R14*
- intestinale *R14*
- psychogène *F45.32*
- pulmonaire *J43.9*
- - cas de bronchite *J44.89*

Flatulences *R14*

Flexibilité cireuse schizophrénique cata *F20.2*

Flexion
- articulation, anormale NCA *Q74.9*
- cuisse, anormale *Q65.8*
- hanche, anormale *Q65.8*
- utérus *N85.4*

Flexner, dysenterie de *A03.1*

Flexure colique
- droit, carcinome *C18.3*
- gauche
- - adéno-carcinome *C18.5*
- - carcinome *C18.5*

Flint, roulement de *I35.1*
- Austin- *I35.1*

Flore
- bactérienne, mélange, infection NCA *A49.8*
- vagin, perturbée *N89.9*

Flore intestinale, trouble, équilibre (d *K63.8*

Floride
- dysplasie cémento-osseuse *D16.42*
- formes tardives de syphilis, avec leucoderme *A52.7+, L99.8**
- rachitisme (maladie de Glisson) *E55.0*
- syphilis
- - congénitale, formes tardives *A50.5*
- - système nerveux central *A52.1*
- syphilis précoce, congénitale *A50.0*

Flottant, rein *N28.8*

flow syndrome Syndrome coronarien à flux lent (Coronary slow *I20.8*

Fluctuant, troublé
- canal *R26.0*
- esotropie *H50.0*
- Tension artérielle *I99*

Fluide vaginal, résultat, anormal *R87.9*

Fluides sous haute pression
- effets *T70.4*
- lésions *T70.4*

Fluidification, corps vitré *H43.8*

Fluor
- carence *E61.8*
- opacité de l'émail dentaire *K00.3*

Fluor (gaz), effet toxique *T59.5*

Fluorocarbonés polymères pneumonie *J68.0*

Fluorose
- dentaire *K00.3*
- - chronique *K00.3*
- squelette *M85.19*

Fluorose dentaire *K00.3*

Fluorouracile
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Fluorure d'hydrogène, effet toxique *T59.5*

Flush *R23.2*

Flutter
- auriculaire
- - *I48.09*
- - atypique *I48.4*
- - chronique *I48.01*
- - paroxystique *I48.00*
- - sans autre précision , Fibrillation et *I48.9*
- - type
- - - I *I48.3*
- - - II *I48.4*
- - typique *I48.3*
- cardiaque *I49.8*
- ventriculaire *I49.0*

Flutter ventriculaire *I49.0*

Fluviale, fièvre, du Japon *A75.3*

flux lent Coronary slow flow syndrome) , Syndrome coronarien à *I20.8*

Focal
- adhérence, péricarde *I31.8*
- - post-infectieuse *I31.8*
- choriorétinite *H30.0*
- choriorétinite en foyer *H30.0*

Focal *–suite*

- choroïdite *H30.0*
- crise
- - complexe, évoluant vers des crises secondairement généralisées *G40.2*
- - corticale *G40.1*
- - simple, évoluant vers des crises secondairement généralisées *G40.1*
- débutante, crise épileptique *G40.08*
- épilepsie *G40.1*
- glomérulonéphrite
- - proliférative *N05.1*
- - sclérosante *N05.1*
- glomérulosclérose *N05.1*
- hémorragie intracérébrale traumatique *S06.30*
- hyperplasie
- - épithélium buccal *K13.2*
- - foie, nodulaire *K76.8*
- infection dentaire *K04.7*
- Jackson, épilepsie de *G40.1*
- lésion glomérulaire, en cas de
- - hématurie
- - - persistante *N02.1*
- - - récidivante *N02.1*
- - protéinurie isolée *N06.1*
- - syndrome
- - - néphritique, d'évolution rapide *N01.1*
- - - néphrotique *N04.1*
- lupus, discoïde *L93.0*
- moteur, état de mal épileptique *G41.8*
- mucinose *L98.5*
- - buccale *K13.7*
- néphrite
- - aiguë *N00.1*
- - chronique *N03.1*
- rétinite *H30.0*
- toxicose
- - amygdales *J35.8*
- - dent *K04.9*
- uvéite postérieure *H30.0*

Foetal - *voir* type de la maladie

Foeto-maternelle
- hémorragie, avec césarienne *O43.0*
- transfusion *O43.0*
- - affectant le foetus/nouveau-né *P02.3*

Foetopathie diabétique *P70.1*

foeto-pelvienne Sarcome cellules dendritique (cellules *C96.4*

Foeto-pelvienne, disproportion *O33.9*
- avec
- - césarienne *O33.9*
- - dystocie due à bassin rétréci *O65.1*
- due à
- - bassin
- - - androïde *O33.0*
- - - - avec
- - - - - dystocie, *O65.3*
- - - - - affection du foetus/nouveau-né, *P03.1*
- - - pithécoïde, avec
- - - - affection du foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - - dystocie *O65.0*
- - - plat *O33.0*
- - - - avec dystocie *O65.0*
- - - rétréci *O33.1*

Foeto-pelvienne, disproportion *–suite*
- due à *–suite*
- - bassin de Naegele *O33.0*
- - bassin de Robert *O33.0*
- - bassin en entonnoir *O33.3*
- - - avec
- - - - affection du foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - - dystocie *O65.3*
- - contracture (de)
- - - bassin affectant le foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - cavité médiane du bassin *O33.3*
- - - détroit inférieur du bassin *O33.3*
- - - détroit supérieur du bassin *O33.2*
- - déformation du bassin affectant le foetus/nouveau né *P03.1*
- - entorse du rachis lombaire, avec
- - - affection du foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - dystocie *O65.0*
- - hydrocéphalie foetale *O33.6*
- - jumeaux soudés *O33.7*
- - malformation du rachis lombaire, avec
- - - affection du foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - dystocie *O65.0*
- - scoliose ou bassin oblique, avec
- - - dystocie *O65.0*
- - - foetus/nouveau-né affectés *P03.1*
- - spondylolisthésis *O33.3*
- - spondylose *O33.3*
- - - avec
- - - - affection du foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - - dystocie *O65.0*
- dystocie NCA *O65.4*

Foeto-placentaire, insuffisance entraina *O36.5*

foetus nouveau-né avec hypoglycémie Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le *P70.1*

Foetus - *voir aussi* Foetus ou nouveau-né
- adhérence, avec amnios *O41.8*
- amputation, pour faciliter l'accouchement *P03.8*
- anémie, par perte de sang, foetale *P61.3*
- anencéphalie, soins maternels *O35.0*
- anomalie
- - chromosome, femme enceinte, soins *O35.1*
- - soins, femme enceinte *O35.9*
- anomalie de position NCA *O32.9*
- - avec accouchement césarienne *O32.9*
- - cours de la grossesse *O32.9*
- - soins, femme enceinte *O32.9*
- anomalie de position sans précision *O32.9*
- anomalie de présentation NCA *O32.9*
- - avec accouchement césarienne NCA *O32.9*
- - soins, femme enceinte *O32.9*
- arlequin *Q80.4*
- arrêt (de) (du)
- - croissance *P05.9*
- - développement *P05.9*
- avortement, spontané *P01.8*
- céphalhématocèle, due à traumatisme obstétrical *P10.8*

Foetus - *voir aussi* Foetus ou nouveau-né *–suite*
- compressus, soins maternels *O31.0*
- croissance
- - excessive, avec soins maternels *O36.6*
- - insuffisante, avec soins maternels *O36.5*
- cuire chevelu, lésion *P12.9*
- dépassement terme *P08.2*
- développement
- - incomplet *P05.9*
- - insuffisant *P05.9*
- difformité, soins maternels NCA *O33.7*
- dysmature *P05.9*
- exceptionnellement grand
- - avec accouchement césarienne *O33.5*
- - dystocie *O66.2*
- - obstruction, naissance *O66.2*
- - soins maternels *O33.5*
- excessivement grand, obstruction à la naissance *O66.2*
- extraction, avec crochet *P03.8*
- foeto-pelvienne, disproportion *O33.9*
- grand pour l'âge gestationnel NCA *P08.1*
- grand, avec disproportion *O33.5*
- grande taille *P08.1*
- gros pour l'âge gestationnel *P08.1*
- gros pour l'âge gestationnel NCA *P08.1*
- hémorragie *P50.9*
- hydrocéphale, avec
- - accouchement césarienne *O33.6*
- - disproportion, foeto-pelvienne *O33.6*
- - dystocie *O66.3*
- - obstruction, naissance *O66.3*
- hypermaturité *P08.2*
- hypotrophique *P05.0*
- incompatibilité Rh [Rhésus] *P55.0*
- infection *P39.9*
- infection, intra-amniotique *P39.2*
- léger pour l'âge gestationnel *P05.0*
- lésion
- - cours de
- - - accouchement, dû à
- - - - rectocèle *P03.8*
- - - - tumeur
- - - - - bassin, *P03.8*
- - - - - col utérin, *P03.8*
- - - - - périnée, *P03.8*
- - - - - utérus, *P03.8*
- - - - - vagin, *P03.8*
- - - - - vulve, *P03.8*
- - - accouchement, due à une sténose, vagin *P03.8*
- - - craintes, par l'absorption de substances chimiques par le placenta, soins maternels *O35.8*
- - - grippe [influenza], mère *P00.2*
- - - jumeaux *P01.5*
- - - malformation, organes pelvien, avec obstruction, naissance *P03.1*
- - - naissance, multiple *P01.5*
- - - quadruplés *P01.5*
- - - quintuplés *P01.5*
- - - sextuplés *P01.5*
- - - triplés *P01.5*
- - cours de la grossesse, due à
- - - rectocèle *P03.8*
- - - salpingo-oophorite *P00.8*
- - - tumeur

Foetus - *voir aussi* Foetus ou nouveau-né *–suite*
- lésion *–suite*
- - cours de la grossesse, due à *–suite*
- - - tumeur *–suite*
- - - - bassin *P03.8*
- - - - col utérin *P03.8*
- - - - périnée *P03.8*
- - - - utérus *P03.8*
- - - - vagin *P03.8*
- - - - vulve *P03.8*
- - - utérus, double *P03.8*
- - due à
- - - absorption, médicament, entraînant une dépendance, par le placenta *P04.4*
- - - absorption, substances, chimiques, absorbées par l'alimentation de la mère *P04.5*
- - - actes radiologiques chez la mère *P00.7*
- - - albuminurie, prééclamptique *P00.0*
- - - alcool, avec soins maternels *O35.4*
- - - alcoolisme *P04.3*
- - - altération, cordon ombilical *P02.6*
- - - amniocentèse, soins maternels *O35.7*
- - - amniotite, chorion *P02.7*
- - - anneau de Bandl *P03.6*
- - - anneau de contraction *P03.6*
- - - anomalie
- - - - amnios *P02.9*
- - - - chorion *P02.9*
- - - anomalie, chorion *P02.9*
- - - avortement, menace de *P01.8*
- - - bassin
- - - - androïde, avec disproportion, foeto -pelvienne *P03.1*
- - - - pithécoïde, avec disproportion, foeto-pelvienne *P03.1*
- - - bassin en entonnoir, avec diproportion foeto-pelvienne *P03.1*
- - - biopsie, soins, femme enceinte *O35.7*
- - - carence, facteur de coagulation, antepartum *P02.1*
- - - cervicite, mère *P00.8*
- - - chimiothérapie, pour cancer, mère *P04.1*
- - - coagulopathie de consommation, intrapartum *P02.1*
- - - complication
- - - - chorion *P02.9*
- - - - liquide amniotique *P02.9*
- - - compression, cordon ombilical *P02.5*
- - - contraction utérine *P03.6*
- - - contraction utérine, menace de *P01.8*
- - - contracture en sablier, utérus *P03.6*
- - - contracture, bassin, avec disproportion foeto-pelvienne *P03.1*
- - - contusion, cordon ombilical *P02.6*
- - - cordon ombilical, serré autour de cou *P02.5*
- - - cytocèle, mère *P03.8*
- - - cytomégalovirus, maternel, avec soins maternels *O35.3*
- - - déchirure, cordon ombilical *P50.1*
- - - déclenchement provoqué, naissance *P03.8*
- - - décollement placentaire *P02.1*

Foetus - *voir aussi* Foetus ou nouveau-né *–suite*
- lésion *–suite*
- - due à *–suite*
- - - déformation, vertèbres lombaires, avec disproportion foeto-pelvienne *P03.1*
- - - dépendance à la drogue, avec soins maternels *O35.5*
- - - difformité, bassin, avec disproportion, foeto-pelvienne *P03.1*
- - - dilatation, col utérin, incomplète *P03.6*
- - - dispositif intra-utérin, soins, femme enceinte *O35.7*
- - - dysfonction, utérus, complication, accouchement *P03.6*
- - - dystocie *P03.1*
- - - effets de radiation, avec soins maternels *O35.6*
- - - enchevêtrement, cordon ombilical *P02.5*
- - - enroulement, cordon ombilical *P02.5*
- - - examen, hématologique, avec soins maternels *O35.7*
- - - hémorragie
- - - - accidentelle, mère *P02.1*
- - - - gestationnelle, mère *P02.1*
- - - - placenta *P02.1*
- - - - vasa praevia *P50.0*
- - - hémorragie, mère *P02.1*
- - - hystérotomie *P03.8*
- - - infection, maternelle *P00.8*
- - - infection, organes génitaux, mère *P00.8*
- - - inflammation, chorion *P02.7*
- - - liquide amniotique, anormal *P02.9*
- - - listériose, maternelle, avec soins maternels *O35.8*
- - - lupus érythémateux, systémique, mère *P00.8*
- - - maladie
- - - - infectieuse, mère (classée à A00-B99 et J09-J11) *P00.2*
- - - - parasitaire, mère (classée à A00-B99 et J09-J11) *P00.2*
- - - maladie virale, maternelle, avec soins maternels *O35.3*
- - - malformation, placenta *P02.6*
- - - malnutrition, mère *P00.4*
- - - médicament, cytotoxique, mère *P04.1*
- - - nécrose, cordon ombilical *P02.6*
- - - noeud, cordon ombilical *P02.5*
- - - obstruction, naissance *P03.1*
- - - oligohydramnios *P01.2*
- - - opération obstétricale *P03.8*
- - - opération, intra-utérine, avec soins maternels *O35.7*
- - - période d'expulsion, précipitée *P03.5*
- - - pharmacodépendance, avec soins maternels *O35.5*
- - - placentite *P02.7*
- - - position transversale *P03.1*
- - - - avant le travail *P01.7*
- - - prééclampsie *P00.0*
- - - présentation du menton, instable, avant le travail *P01.7*
- - - présentation du siège, avant le travail *P01.7*
- - - présentation par l'épaule *P03.1*
- - - procidence, cordon ombilical *P02.4*

Foetus - *voir aussi* Foetus ou nouveau-né *–suite*
- lésion *–suite*
- - due à *–suite*
- - - prolapsus, utérus, gravide *P03.8*
- - - protéinurie, prééclamptique *P00.0*
- - - rétrécissement, cordon ombilical *P02.6*
- - - rotation manuelle *P03.8*
- - - rubéole, maternelle, avec soins maternels *O35.3*
- - - scoliose, bassin, avec disproportion foeto-pelvienne *P03.1*
- - - spondylose, avec disproportion, foeto-pelvienne *P03.1*
- - - torsion, vertèbres lombaires, avec disproportion foeto-pelvienne *P03.1*
- - - toxoplasmose, avec soins maternels *O35.8*
- - - transfusion, foeto-maternelle *P02.3*
- - - traumatisme, mère, au cours de la grosseses *P00.5*
- - - utérus
- - - - bicorne *P03.8*
- - - - double *P03.8*
- - - varices, cordon ombilical *P02.6*
- - - vasa praevia *P02.6*
- - - version, externe, avant le travail *P01.7*
- - soins, femme enceinte *O35.9*
- - suspicion de, due à
- - - acte, médical, avec soins maternels *O35.7*
- - - contraceptifs, intra-utérin, avec soins maternels *O35.7*
- - - cytomégalovirus, maternel, avec soins maternels *O35.3*
- - - dépendance à la drogue, avec soins maternels *O35.5*
- - - examen, hématologique, avec soins maternels *O35.7*
- - - listériose, maternelle, avec soins maternels *O35.8*
- - - opération, intra-utérine, avec soins maternels *O35.7*
- - - pharmacodépendance, avec soins maternels *O35.5*
- - - rubéole, maternelle, avec soins maternels *O35.3*
- macération *P95*
- - sans indication de cause *P95*
- maladie, avec soins maternels NCA *O35.8*
- malformation, système nerveux central, soins, femme enceinte *O35.0*
- mort, retenu, soins maternels *O36.4*
- mort-né NCA *P95*
- naissance après terme *P08.2*
- normal, avec disproportion, cause foetale *O33.5*
- nouveau-né affecté par complications lors d'un accouchement dirigé *P03.8*
- nouveau-né mort-né NCA *P95*
- opération, destructrice *P03.8*
- papyracé
- - cours de la grossesse *O31.0*
- - grossesse multiple *O31.0*
- - soins maternels *O31.0*
- petit et léger pour l'âge gestationnel *P05.1*
- petit pour l'âge gestationnel *P05.1*
- - prise en charge de la mère *O36.5*
- petite taille à la naissance *P05.1*

Foetus - *voir aussi* Foetus ou nouveau-né *–suite*

- position
- - anormale *O32.9*
- - instable *O32.0*
- - - avant le travail *P01.7*
- position transversale *O32.2*
- présentation
- - anormale *O32.9*
- - tête, haute *O32.8*
- présentation de la face et du front *O32.3*
- présentation de la face sans précision *O32.3*
- présentation du menton NCA *O32.3*
- présentation du siège *O32.1*
- - avec version *O32.1*
- présentation transversale NCA *O32.2*
- prolapsus
- - bras, avec soins maternels *O32.2*
- - main, avec soins maternels *O32.2*
- retard
- - croissance *P05.9*
- - développement *P05.9*
- retard de développement, corporel *P05.9*
- sous-développement *P05.9*
- traumatisme, au cours de l'accouchement *P15.9*
- trop léger pour l'âge gestationnel *P05.0*
- tumeur, avec obstruction, naissance *O66.3*
- viable, en cas de Graviditas abdominalis (grossesse abdominale) *O36.7*
- viable, en cas de grossesse abdominale *O36.7*

foie
- *Q44.7*
- abcès *K75.0*
- - cas d'abcès pulmonaire amibien *A06.5+, J99.8**
- - cholangitique *K75.0*
- - - avec perforation *K75.0*
- - dysentérique *A06.4*
- - hématogène *K75.0*
- - lymphogène *K75.0*
- - par des amibes *A06.4*
- - - avec abcès du cerveau *A06.6+, G07**
- absence, congénitale *Q44.7*
- accessoire *Q44.7*
- adénome *D13.4*
- adhérences *K66.0*
- affection hépatique au cours de la grossesse *O26.6*
- agénésie *Q44.7*
- amaurose *H35.5*
- - congénitale *H35.5*
- - tapéto-rétinienne *H35.5*
- amibiase *A06.4*
- amyloïdose *E85.4+, K77.8**
- angiomatose *K76.4*
- angiosarcome *C22.3*
- anomalie *Q44.7*
- anomalie de position, congénitale *Q44.7*
- apoplexie *K76.3*
- atrophie *K72.9*
- - avec ictère, aigu, en cours de grossessse *O26.6*

foie *–suite*
- atrophie *–suite*
- - jaune *K72.9*
- - - aiguë *K72.0*
- - - - mère, avec lésion, foetus/nouveau-né *P00.8*
- - - chronique *K72.1*
- - - subaiguë *K72.0*
- atteinte, toxique *K71.9*
- avec maladie veino occlusion du foie [syndrome de Stuart - Bras] , Maladie toxique du *K71.8*
- blessure par déchirure
- - modérée *S36.14*
- blessure par rupture
- - majeure *S36.15*
- calcul, restant bloqué *K80.50*
- capillariose *B83.8*
- Carcinoma in situ *D01.5*
- carcinome
- - embryonnaire *C22.7*
- - neuroendocrinien *C22.7*
- chirurgie de greffage , état consécutif, avec défaillance, greffe *T86.49*
- cholangiocarcinome *C22.1*
- cicatriciel *K74.0*
- cirrhose *K74.6*
- - *K76.1*
- - alcoolique *K70.3*
- - - avec varices oesophagiennes *K70.3+*
- - - - avec hémorragie *K70.3+*
- - auto-immune *K74.6*
- - avec varices oesophagiennes *K74.6+*
- - - avec hémorragie *K74.6+*
- - cardiaque *K76.1*
- - cas de glycogénose *E74.0*
- - congénitale *P78.8*
- - cryptogénique *K74.6*
- - décompensée *K74.6*
- - macronodulaire *K74.6*
- - médicamenteuse - toxique *K71.7*
- - micronodulaire *K74.6*
- - non liée à la consommation d'alcool *K74.6*
- - portale *K74.6*
- - post-nécrotique *K74.6*
- - pseudo-péricardique *I31.1*
- - suite à une hépatite *K74.6*
- - syphilitique *A52.7+, K77.0**
- - toxique *K71.7*
- - - avec varices oesophagiennes *K71.7+*
- - - - avec hémorragie *K71.7+*
- cirrhose de Laënnec
- - alcoolique *K70.3*
- - non-alcoolique *K74.6*
- cirrhose ou maladie de Hanot *K74.3*
- cirrhose pigmentaire *E83.1*
- cirrhose puis induration *K76.1*
- clonorchiase *B66.1+, K77.0**
- colique, récidivante *K80.50*
- - avec
- - - avec obstruction des canaux biliaires *K80.51*
- - - cholangite *K80.30*
- - - - avec obstruction, canaux biliaires *K80.31*
- - - cholécystite *K80.40*
- - - - avec obstruction des canaux biliaires *K80.41*
- coma *K72.9, K72.74!*

foie *–suite*
- coma *–suite*
- - alcoolique *K70.4*
- congestion *K76.1*
- - passive, chronique *K76.1*
- congestion puis induration *K76.1*
- constatation, sonographie, pathologique *R93.2*
- contusion *S36.11*
- côté *Q44.7*
- déchirure *S36.12*
- dédoublement *Q44.7*
- défaillance *K72.9*
- - aiguë *K72.0*
- - alcoolique *K70.4*
- - - aiguë *K70.4*
- - - chronique *K70.4*
- - - subaiguë *K70.4*
- - après un acte à visée thérapeutique *K91.88*
- - cas d'hépatite
- - - aiguë *K72.9*
- - - maligne NCA *K72.9*
- - chronique *K72.1*
- - due à
- - - médicaments *K71.1*
- - par
- - provoquée par
- - - drogues *K71.1*
- dégénérescence *K76.8*
- - amyloïdose NCA *E85.4+, K77.8**
- - diffuse NCA *K76.8*
- - graisseuse NCA *K76.0*
- - graisseuse, alcoolique *K70.0*
- - hypertrophique NCA *K76.8*
- - kystique NCA *K76.8*
- - kystique, congénitale *Q44.6*
- - parenchymateuse
- - - aiguë NCA *K72.0*
- - - subaiguë NCA *K72.0*
- - pigmentaire NCA *K76.8*
- - toxique NCA *K71.9*
- dégénérescence graisseuse *K76.0*
- destiné à une transplantation, enregistrement, avec
- - stade de gravité
- difformité
- - acquise *K76.8*
- - congénitale *Q44.7*
- distomatose, par
- - Chlonorchis sinensis (clonorchiase) *B66.1+, K77.0**
- - douve du foie du chat (Opisthorchis felineus) *B66.0+, K77.0**
- - douve du foie, sibirique *B66.0+, K77.0**
- - Fasciola hepatica (fasciolase) *B66.3+, K77.0**
- - Opisthorchis felineus (douve du foie du chat) *B66.0+, K77.0**
- dommages *K76.9*
- - chroniques *K76.9*
- - dus à l'alcool *K70.9*
- - non traumatiques *K76.9*
- donneur *Z52.6*
- durcissement *K76.8*
- dysfonctionnement *K76.8*
- - constitutionnel *K76.8*
- - fonctionnel *K76.8*
- dystopie *Q44.7*

foie –*suite*

- dystrophie *K72.9*
- - aiguë *K72.0*
- - chronique *K72.1*
- échinococcose NCA *B67.8+, K77.0**
- - alvéolaire *B67.5+, K77.0**
- - kystique *B67.0+, K77.0**
- embryon *C22.0*
- et
- - rein(s), glycogénose *E74.0*
- - système biliaire, carcinome *C22.9*
- fibrose *K74.0*
- - alcoolique *K70.2*
- - avec sclérose, foie *K74.2*
- - et cirrhose, en cas de maladie, foie, toxique *K71.7*
- filiae (évolution métastatique) *C78.7*
- formation des lobules hépatiques, anormale *Q44.7*
- gomme *A52.7+, K77.0**
- granulome NCA *K75.3*
- granulome, en cas de
- - béryllose *J63.2+, K77.8**
- - sarcoïdose *D86.8+, K77.8**
- greffe *Z94.4*
- grossissement *R16.0*
- - congénital *Q44.7*
- hémangiome *D18.03*
- hématome *S36.11*
- - consécutif à un traumatisme lors de l'accouchement *P15.0*
- - non traumatique *K76.8*
- - sous-capsulaire, non traumatique *K76.8*
- hémochromatose *E83.1+, K77.8**
- hémorragie *K76.8*
- hépatite *K75.8*
- hyperémie, active *K76.8*
- hyperplasie
- - congénitale *Q44.7*
- - nodulaire, focale *K76.8*
- hypertrophie *R16.0*
- - aiguë *K76.8*
- - innée *Q44.7*
- hypoplasie *Q44.7*
- induartion *K76.8*
- infarctus *K76.3*
- infection à
- - Clonorchis sinensis (clonorchiase) *B66.1*
- - échinocoques ou Echinococcus *B67.8+, K77.0**
- - - granulosus *B67.0+, K77.0**
- - - multilocularis *B67.5+, K77.0**
- infiltration *K76.8*
- infiltration glycogénique *E74.0+, K77.8**
- inflammation *K75.9*
- - chronique *K73.9*
- - purulente *K75.0*
- insuffisance *K72.9*
- kyste *K76.8*
- - congénital *Q44.7*
- - hydatique NCA *B67.8+, K77.0**
- kyste hydatique, par présence de
- - d'échinocoques ou Echinococcus
- - - granulosus *B67.0*
- - - multilocularis *B67.5*
- kystes, congénitaux *Q44.6*

foie –*suite*

- lésion *S36.10*
- maladie *K76.9*
- - alcoolique *K70.9*
- - - avec psychose, organique *F10.5*
- - avec
- - - atrophie optique *H47.2*
- - - - héréditaire *H47.2*
- - - atrophie, optique *H47.2*
- - - carence, facteurde coagulation *D68.4*
- - - troubles, coagulation *D68.4*
- - chronique *K76.9*
- - fibrokystique *Q44.6*
- - - congénitale *Q44.6*
- - idiosyncrasique, imprévisible, médicamenteuse *K71.9*
- - kystique *Q44.6*
- - organique *K76.9*
- - polykystique *Q44.6*
- - - congénitale *Q44.6*
- - syphilitique *A52.7+, K77.0**
- - toxique *K71.9*
- - - avec
- - - - cholestase *K71.0*
- - - - granulome, foie *K71.8*
- - - - hépatite NCA aiguë, *K71.2*
- - - - - chronique-persistante, *K71.3*
- - - - - lobulaire, chronique, *K71.4*
- - - - - chronique-active, *K71.5*
- - - - - lupoïde, *K71.5*
- - - - - *K71.6*
- - - - hyperplasie, nodulaire, focale *K71.8*
- - - - nécrose, hépatique *K71.1*
- - - - Peliosis hepatis ou péliose hépatique *K71.8*
- - - prévisible, médicamenteuse *K71.9*
- maladie de Graft-versus-host, aiguë
- - stade
- - - *T86.01+, K77.11**
- maladie/affection
- - assistance médicale, femmes enceintes *O26.6*
- - dans
- - - l'anamnèse familiale *Z83.7*
- - - l'anamnèse personnelle *Z87.1*
- malformation *Q44.7*
- malformation, congénitale *Q44.7*
- mélanome *C22.9*
- mélanose *K76.8*
- mésothéliome *C45.7*
- métastase *C78.7*
- - cas de tumeur primaire, non connue *C78.7*
- muscade *K76.1*
- nécrose *K72.9*
- - avec défaillance
- - - foie *K72.9*
- - - rénale, en période puerpérale *O90.4*
- - chez la mère, avec lésion, foetus/nouveu-né *P00.8*
- - cours de la grossesse *O26.6*
- - hémorragique, centrale *K76.2*
- - période puerpérale (conditions décrites sous K72.0) *O90.8*
- prolapsus *K76.8*
- ptôsis *K76.8*
- résultats anormaux d'imagerie diagnostique *R93.2*

foie –*suite*

- résultats d'explorations fonctionnelles hépatiques, anormaux *R94.5*
- rupture *S36.12*
- - due à un traumatisme obstétrical *P15.0*
- - traumatique *O26.6*
- - - *S36.12*
- sarcome *C22.9*
- sclérose *K74.1*
- - alcoolique *K70.2*
- - cardiaque *K76.1*
- - cas de fibrose du foie *K74.2*
- stéatose NCA *K76.0*
- syndrome Stuart Bras Maladie toxique du foie avec : maladie veino - occlusion du *K71.8*
- - Maladie veino - occlusion du *K76.5*
- syphilis *A52.7+, K77.0**
- - secondaire *A51.4+, K77.0**
- tératocarcinome *C22.7*
- tératome *C22.7*
- - embryonnaire *C22.7*
- - mature, adulte, bénin *D13.4*
- Thorotrast *T96*
- thrombose *I82.0*
- toxoplasmose *B58.1+, K77.0**
- traumatisme obstétrical *P15.0*
- trouble fonctionnel, dans l'anamnèse familiale *Z83.7*
- tuberculeux *A18.8+, K77.0**
- tumeur *D37.6*
- - embryonnaire *C22.7*
- - mésodermique, mixte *C22.4*
- - neuroendocrinienne *D37.6*
- tumeur mixte, embryonnaire, maligne *C22.0*
- tumeur, maligne, primaire *C22.9*
- typhus *A01.0*

Foix-Alajouanine, syndrome de *G37.4*

Foix-Heubner, syndrome de, -Schilder *G37.0*

Folates (acide folique), carence *E53.8*
- avec anémie *D52.9*
- - alimentaire *D52.0*
- - induite médicamenteusement *D52.1*
- pendant la grossesse *O26.88*

Folie *F29*
- alcoolique *F10.5*
- puerpérale *F53.1*

Folie à deux *F24*

Folie, avec méconnaissance des personnes *F22.0*

Folliculaire
- adénocarcinome
- - glande thyroïde *C73*
- - type bien différencié *C73*
- - type moyennement différencié *C73*
- - type trabéculaire *C73*
- adénome *D34*
- carcinome
- - glande thyroïde *C73*
- - type bien différencié *C73*
- - type moyennement différencié *C73*
- - type trabéculaire *C73*
- catarrhe *H10.8*
- dermite *L30.8*
- germinoblastome *C82.1*

Folliculaire –*suite*

- grade
- - I Lymphome *C82.0*
- - II Lymphome *C82.1*
- - III sans précision , Lymphome *C82.2*
- - IIIa Lymphome *C82.3*
- - IIIb Lymphome *C82.4*
- inflammation, pharynx *J31.2*
- kyste
- - atrésique *N83.0*
- - odontogène *K09.0*
- - ovaire *N83.0*
- - peau *L72.9*
- lymphome *C82.9*
- - avec prolifération cellulaire diffuse *C82.9*
- - cellularité mixte *C82.1*
- - cellules encochées (clivées) (cleaved-cells) *C82.0*
- - - mixte petites et grandes cellules *C82.1*
- - - petites cellules *C82.0*
- - cellules non-encochées (non-clivées) (non-cleaved-cells) *C82.2*
- - centroblastique (à centroblastes) *C82.7*
- - centrocytaire-centroblastique *C82.7*
- - grandes cellules *C82.2*
- - - encochées (clivées) (cleaved-cells) *C82.2*
- - histiocytaire *C82.2*
- - sans prolifération cellulaire diffuse *C82.9*
- lymphome non-hodgkinien
- - cellules encochées (clivées) (cleaved-cells)
- - - mixte petites et grandes cellules *C82.1*
- - - petites cellules *C82.0*
- - grandes cellules *C82.2*
- lymphosarcome *C82.9*
- - type cellularité mixte *C82.1*
- mycose *B35.9*
- pharyngite chronique *J31.2*
- réticulolymphosarcome *C82.1*
- stomatite *K12.1*

Follicule
- Graaf, kyste *N83.0*
- Naboth *N88.8*
- - kyste rompu *N88.8*
- persistance *N94.8*

Follicule de Naboth *N88.8*
- kyste, rupture *N88.8*

Follicule pileux
- fistule
- - avec abcès *L05.0*
- - infection *L05.9*
- inflammation *L73.9*
- kyste *L05.9*
- - infection *L05.9*
- maladie *L73.9*

Folliculite *L73.9*
- abscedens et suffodiens *L66.3*
- barbae *L73.8*
- capitis *L73.8*
- chéloïde *L73.0*
- chéloïdienne *L73.0*
- ciliaire (orgelet) *H00.0*
- decalvans *L66.2*

Folliculite –*suite*

- et Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens (Hoffmann) *L66.3*
- gonorrhéique *A54.8*
- - aiguë *A54.8*
- - chronique *A54.8*
- narine *L73.8*
- parasitaire *L73.8*
- profonde *L73.8*
- - parasitaire *B35.0*
- pustuleuse *L01.0*
- rebord palpébral *H01.0*
- sclerotisans nuchae *L73.0*
- simplex *L73.8*
- staphylogenes superficialis *L73.8*
- superficielle *L01.0*
- ulerythematosa reticulata *L66.4*
- vulvaire *N76.4*

Folliculoïde, adénome, ovaire *D27*

Folliculoma lipidique
- chez la femme *D27*
- chez l'homme *D29.2*

Folliculome *D23.9*
- *D39.1*
- malin *C56*
- tricho- *D23.9*

Fölling, maladie de *E70.0*

Fonction
- acquisitives de la mémoire
- - altération *R41.3*
- - - trouble léger, après un traumatisme crânien *F06.7*
- - déficit *R41.3*
- - perte *R41.3*
- cardiaque limitée, ventriculaire gauche *I50.19*
- cardiaque, trouble *I51.8*
- - post-opératoire *I97.8*
- - provoqué par prothèse cardiaque *I97.1*
- cognitive en déclin, associé à l'âge *R41.8*
- complications dues à
- - colostomie *K91.4*
- - entérostomie *K91.4*
- diminuée du parenchyme pancréatique *K86.8*
- estomac, troubles *K31.9*
- glande thyroïde, trouble avec exophtalmie *E05.0+, H06.2**
- hypophysaire
- - augmentée *E22.9*
- - diminuée *E23.0*
- intellectuelle borderline *R41.8*
- labyrinthique, perte *H83.2*
- limitée du ventriculaire gauche, en cas de maladie cardiaque coronaire *I25.9*
- lipasique diminuée *K90.3*
- lymphocytaire antigène 1 (LFA 1), anomalie *D84.0*
- médullosurrénale augmentée *E27.5*
- motrice, trouble du développement *F82.9*
- ovarienne
- - affaiblissement
- - - après ablation *E89.4*
- - - primaire *E28.3*
- - diminuée en cas d'hypopituitarisme *E23.0*

Fonction –*suite*

- ovarienne, limitée *E28.9*
- pulmonaire
- - anormale, chez le nouveau-né *P28.8*
- - insuffisante *R06.88*
- - - chez le nouveau-né *P28.5*
- pupillaire
- - affection *H57.0*
- - anomalie *H57.0*
- rénale, troule, avec goutte *M10.39*
- sexuelle, trouble psychogène *F52.9*
- testiculaire endocrinienne, défaillance *E29.1*
- tubulaire rénale, altérée *N25.9*
- tubulaire rénale, trouble *N25.9*

Fonctionnel - *voir* type de la maladie

Fonctionnement des trompes d'Eustache, a *Q17.8*

fond oeil SAI Rétinopathie (avec) (de) : *H35.0*

Fond de l'estomac, carcinome *C16.1*

Fond de l'oeil
- colobome *Q14.8*
- hémorragie *H35.6*
- modification *H35.0*

Fongémie NCA *B49*

Fongicide, effet toxique *T60.3*

Fongoïde
- croissance - *voir aussi* néoformation incertaine
- ulcère de l'oesophage *K22.1*

Fongus
- bénin du testicule *A18.1+, N51.8**
- blanc, *voir* naevus, muqueuse de la bouche *Q38.6*
- laissé dans une cavité opératoire *T81.5*
- ombilical *L92.8*
- sang *D18.00*

Fontanelle
- ossification prématurée *Q75.0*
- rupture *P13.1*

Foramen
- brèche (déchirure) rétinienne *H33.3*
- - lors de décollement de la rétine *H33.0*
- brèches rétiniennes multiples lors de décollement de la rétine *H33.0*
- déchirure en fer à cheval *H33.3*
- - rétinienne *H33.3*
- hémorragie du corps vitré sur brèche (déchirure) rétiniennne *H43.1*
- jugulaire, syndrome du *G52.7*
- Luschka, atrésie avec spina bifida *Q05.4*
- Magendie
- - atrésie *Q03.1*
- - - avec spina bifida *Q05.4*
- - blocage
- - - acquis *G91.1*
- - - congénital *Q03.1*
- - - - avec spina bifida *Q05.4*
- magnum, hernie *G93.5*
- - congénitale *Q01.8*
- Monro (interventriculaire), obstruction
- - avec spina bifida *Q05.4*
- - congénitale *Q03.8*
- ovale
- - anomalie (défect) *Q21.1*
- - fermeture

Foramen –*suite*
- ovale –*suite*
- - fermeture –*suite*
- - - partielle (incomplète) *Q21.1*
- - - prématurée *Q21.88*
- - perméable (ouvert) *Q21.1*
- - persistant *Q21.1*
- tissulaire, en cas de rétinoschisis *H33.1*
- trou maculaire *H35.3*
- trou rond rétinien *H33.3*

Foramina
- intervertébraux
- - sténose (rétrécissement)
- - - disque intervertébral, par *M99.79*
- - - ossification, par *M99.69*
- - - tissu fibreux (conjonctif), par *M99.79*
- - sténose (rétrécissement) par subluxation *M99.69*
- Luschka, atrésie *Q03.1*
- parietalia *Q75.8*
- rétrécissement
- - étage cervical *M47.82*
- - prononcé, lors d'ostéochondrose vertébrale *M42.99*

Forbes, syndrome de *E74.0*

Forbes-Albright, syndrome de *E22.1*

Forbes-Hers, syndrome de *E74.0*

forces mécaniques
- exposition à
- - objets animés *W64*
- - objets inanimés *W49*

Fordyce, maladie de *Q38.6*
- Fox- *L75.2*

Forestier-Ott, maladie de *M48.19*

Formaldéhyde
- allergie *T78.4*
- effet toxique *T59.2*
- hypersensibilité *T78.4*

Formation
- adénome de la prostate, urine restante *N40*
- anodontie, anormale *K07.3*
- calcul biliaire *K80.20*
- dent
- - avec modification de la couleur *K00.8*
- - trouble *K00.4*
- diminution, mélanine, avec trouble, pigmentation *L81.6*
- Gibbosit *M40.19*
- glycogène, déficit *E74.0*
- membrane interdigitale
- - doigts *Q70.1*
- - orteils *Q70.3*
- palmure
- - doigts *Q70.1*
- - orteils *Q70.3*
- partielle
- - handicap *Z55*
- - problème *Z55*
- - Trouble de l'adaptation *Z55*
- phlyctène *H16.2*
- - cornée *H16.2*
- - non tuberculeux *H16.2*
- - tuberculeux *A18.5+, H19.2**
- plis multiples de la peau *L98.8*
- substance dure, anormale, pulpe *K04.3*

Formation –*suite*
- vaisseau, cornée *H16.4*

forme
- étendue Maladie chronique du greffon contre l ' hôte, *T86.04*
- limité Maladie chronique du greffon contre l ' hôte, *T86.03*

Forme (de forme)
- auriculaire, tachycardie paroxystique *voir aussi* Maladie de Bouveret (Syndrome de Bouveret-Hoffmann) *I47.9*
- combinée, cataracte *H25.8*
- cornée, anomalie *Q13.4*
- dentaire, anomalie *K00.2*
- hypomane, réaction maniaco-dépressive *F31.8*
- maniaque, réaction maniaco-dépressive *F31.8*

Forme de cataracte, combinée *H25.8*

Forme de cellules mixte, maladie d'Hodgk *C81.2*

forme de sablier, contraction de l'estom *K31.88*

forme d'étoile
- corps vitré *H43.8*
- hyalite *H43.2*
- hyalose *H43.2*
- - syphilitique tardive *A52.7+, H45.8**

Formule leucocytaire différentielle
- anormale *R72*
- suspecte *R72*

Formule sanguine
- Taux anormal de phosphatase alcaline *R74.8*

Fornix vaginae, sténose *N89.5*

Forssell, syndrome de *D75.1*

Forssmann-Lehmann-Börjeson, syndrome de *Q87.8*

Fort poids pour l'âge gestationnel *P08.1*

Fort, -te
- douleurs abdominales *R10.0*
- - avec contracture de la paroi abdominale *R10.0*
- - cas de rigidité, abdomen *R10.0*
- menstruation *N92.0*
- oncarthrose, région scapulaire *M47.84*
- variante pigmentée, adénome, surrénal *D35.0*

Fort-Bragg, fièvre de *A27.8*

Fortement fébrile - *voir* Type de maladie

Fosse
- canine, abcès *K04.7*
- cérébrale (crânienne)
- - antérieure, fracture *S02.1*
- - moyenne, fracture *S02.1*
- - postérieure
- - - fracture *S02.1*
- - - hémorragie
- - - - chez le fœtus/nouveau-né *P52.6*
- - - - non traumatique *I61.8*
- crânienne
- - antérieure, fracture *S02.1*
- - moyenne, fracture *S02.1*
- - postérieure
- - - fracture *S02.1*
- - - kyste, sous-arachnoïdien *G93.0*

Fosse –*suite*
- ischio-anale (ischio-rectale), abcès *K61.3*
- ischio-rectale (ischio-anale), abcès *K61.3*
- nasale
- - atrésie *Q30.8*
- - blessure *S09.9*
- - carcinome in situ *D02.3*
- - polype *J33.0*
- - polype de Killian *J33.0*
- - suppuration chronique *J32.9*
- - synéchie *J34.8*
- nasales, polype de Killian *J33.0*
- supra-claviculaire (creux sus-claviculaire)
- - abcès *L02.4*
- - lésion NCA *S19.9*
- - lésion superficielle *S10.80*
- supraclaviculaire, fosse *S10.85*

Fossette papillaire congénitale *Q14.2*

Fossettes, cornée, oeil *H18.7*

Fossettes, formation de *R60.9*
- cas d'oedème *R60.9*
- lèvres *R60.0*

Fossulae tonsillares (orifices des crypt *J35.9*

Fothergill, syndrome de (névralgie du tr *G50.0*

Foudre *T75.0*
- carbonisation *T75.0*
- choc *T75.0*
- effets *T75.0*

Foudre, effet *T75.0*

Fouet, infection du vers à fouet *B79*

Fouet, syndrome du coup de fouet *S13.4*

Foulure *T14.3*
- adducteurs, fémur supérieur *S76.2*
- articulation *T14.3*
- articulation crico-aryténoïdienne *S13.5*
- articulation cricothyroïdienne *S13.5*
- articulation interphalangienne *S93.5*
- articulation tibio-fibulaire proximale *S83.6*
- Atlanto-axiale, articulation *S13.4*
- Atlanto-occipitale, articulation *S13.4*
- avant-bras *S46.9*
- bras, inférieur *S56.8*
- capsule articulaire *T14.3*
- capsule, ligament *S93.40*
- cheville *S93.6*
- côtes *S23.4*
- coude *S53.40*
- doigts *S63.60*
- épaule *S43.7*
- fémur, supérieur *S76.4*
- genou, articulation *S83.6*
- ligament *T14.3*
- ligament de l'utérus
- - acromio-claviculaire *S43.5*
- - collatéral
- - - radial *S53.41*
- - - ulnaire *S53.42*
- - coracohuméral *S43.4*
- - longitudinal antérieur cervical *S13.4*
- ligament maxillaire *S03.4*
- ligament tarsien *S93.6*

Foulure –*suite*

- ligament tarso-métatarsien *S93.6*
- ligament tibio-fibulaire proximal *S83.6*
- maxilaire *S03.4*
- membres
- - inférieure, séquelles *T93.3*
- - supérieure, séquelles *T92.3*
- métatarso-phalangienne (articulation) *S93.5*
- mollet *S86.9*
- musculaires *T14.6*
- - ancienne *M62.69*
- - avant-bras *S46.9*
- - fémur, supérieur *S76.4*
- - membre inférieur *S86.9*
- - région cervicale *S16*
- - région du genou *S83.6*
- - région lombaire *S39.0*
- nuque, avec blocage *S13.4*
- orteils *S93.5*
- partie capsulaire, manchette de rotateur *S43.4*
- pied *S93.6*
- poignet *S63.50*
- région cervicale *S13.4*
- région dorsale *S23.3*
- région lombaire *S33.50*
- régions, multiples, séquelles *T94.0*
- séquelles *T94.1*
- séquelles de la mâchoire *T90.8*
- séquelles du cou *T91.8*
- séquelles du tronc *T91.8*
- tendon *T14.6*
- - membre inférieur *S86.9*
- tibio-tarsienne (articulation) *S93.40*

Foulure cervicale *S13.4*

Foulure, appendice xyphoïde *S23.4*

Fourmillement *R20.2*
- cutanés *R20.2*
- main *R20.2*
- peau *R20.2*

Fournier, gangrène de
- chez la femme *N76.80*
- chez l'homme *N49.80*

Fovea centralis retinae (fovea)
- anomalie *Q14.1*
- aplasie *Q14.1*

Fovéale, dystrophie pseudo-inflammatoire *H35.5*

Foville, syndrome de *I67.88+, G46.3**

Fox-Fordyce, maladie de *L75.2*

Foyer
- choriodite *H30.0*
- choriorétinite *H30.0*
- dent *K04.9*
- d'extension choroïdien, avec myopie *H44.2*
- paralysie, Lissauer de *A52.1*
- prostatique, inflammation *N41.9*
- rétinite *H30.0*

Fractionnement de la miction *R39.1*

Fracture *T14.20*
- 1ère côte, fracture multiple de côtes *S22.41*
- 5ème métacarpien *S62.30*
- abduction *T14.20*
- acétabulum (cotyle) *S32.4*

Fracture –*suite*

- acromion *S42.12*
- adduction *T14.20*
- angle mandibulaire *S02.65*
- anneau pelvien *S32.89*
- anneau pelvien, fracture de Malgaigne *S32.89*
- anneau, en, base du crâne *S02.1*
- antécédents personnels *Z87.8*
- apophyse
- - coronoïde mandibulaire *S02.63*
- - coronoïde, cubitus *S52.02*
- - épineuse
- - - cervicale *S12.9*
- - - lombo-sacrée *S32.00*
- - - thoracique *S22.00*
- - odontoïde deuxième vertèbre cervicale *S12.1*
- - styloïde du cubitus *S52.8*
- - transverse
- - - cervicale *S12.9*
- - - lombo-sacrée *S32.00*
- - - thoracique *S22.00*
- arc vertébral *T08.0*
- - cervical *S12.9*
- - lombo-sacré *S32.00*
- - thoracique *S22.00*
- arcade zygomatique *S02.4*
- arrachement *T14.20*
- articulation *T14.20*
- articulation temporo-mandibulaire *S02.63*
- astragale *S92.1*
- atlas *S12.0*
- avant-bras *S52.9*
- - complète *S52.7*
- - distale *S52.8*
- - multiples NCA *S52.7*
- - ouverte *S52.9*
- - proximale *S52.8*
- avec impression (dépression) osseuse
- - malaire, os *S02.4*
- - plateau vertébral supérieur *T08.0*
- avulsion (fracture-arrachement) *T14.20*
- axis *S12.1*
- Barton, de *S52.52*
- base du crâne *S02.1*
- - multiples *S02.1*
- base du premier métacarpien *S62.21*
- bassin (pelvienne) *S32.83*
- - complexe *S32.89*
- - et colonne lombaire, multiples *S32.7*
- - ouverte *S32.83, S31.87!*
- - séquelles *T91.2*
- Bennett, de *S62.21*
- bicondylaire, humérus, distale *S42.44*
- bimalléolaire *S82.81*
- - Articulation tibio-tarsienne *S82.81*
- blow-out (par) (par enfoncement) *S02.3*
- - avec trouble mécanique de la motilité oculaire *H50.6*
- bois vert *T14.20*
- - avant-bras *S52.9*
- - radius *S52.30*
- branche (ramus) *S02.64*
- - inférieur, os pubis *S32.5*
- - mandibulae (mandibulaire) *S02.64*
- - supérieur, os pubis *S32.5*

Fracture –*suite*

- bras *S42.3*
- - distale, bicondylienne *S42.44*
- - fermée *T10.0*
- - multiples *S42.7*
- - ouverte *S42.3*
- - - *T10.1*
- - proximale *S42.20*
- - séquelles *T92.1*
- burst- (bursting), crâne *S02.9*
- calcanéum *S92.0*
- calotte crânienne *S02.0*
- calotte crânienne (voûte du crâne) *S02.0*
- Caput (tête)
- - femoris (fémur) *S72.08*
- - ulnae (cubitus) *S52.8*
- carpe, os du NCA *S62.10*
- cartilage
- - costal *S22.32*
- - cricoïde *S12.8*
- - thyroïde *S12.8*
- - trachée *S12.8*
- cavitas glenoidalis scapulae (cavité glénoïde de l'omoplate) *S42.14*
- cervicale *S12.9*
- - multiples *S12.7*
- - ouverte *S12.9*
- charnière (occipito-cervicale), base du crâne *S02.1*
- cheville *S82.88*
- - bimalléolaire *S82.81*
- - supérieure *S82.88*
- - trimalléolaire *S82.82*
- cisaillement vertical (vertical shear fracture) *S32.89*
- cisaillement verticale, pelvienne *S32.89*
- cisaillement, verticale (Vertical shear fracture) *S32.89*
- clavicule *S42.00*
- - du
- - - tiers distal (latéral) (externe) *S42.03*
- - - tiers moyen *S42.02*
- - - tiers proximal (interne) (médial) *S42.01*
- - lors de fracture de l'humérus *S42.7*
- - omoplate, humérus, multiples *S42.7*
- coccyx *S32.2*
- - complication d'accouchement *O71.6*
- col
- - anatomique, humérus *S42.23*
- - chirurgical, humérus *S42.22*
- - condyle mandibulaire *S02.61*
- - fémur *S72.00*
- - - atteignant la tête du fémur *S72.08*
- - - cervico-trochantérienne *S72.05*
- - - latéral (externe) *S72.08*
- - - médial (interne) *S72.01*
- - - pathologique *M84.45*
- - - sous-capitale *S72.03*
- - - transcervicale *S72.04*
- - - - ouverte *S72.04, S71.87!*
- - péroné *S82.41*
- - radius *S52.12*
- colonne
- - cervicale *S12.9*
- - cervicale (vertébrale), multiples *S12.7*
- - vertébrale (rachis) *T08.0*

Fracture –*suite*
- colonne –*suite*
- - vertébrale (rachis) –*suite*
- - - avec atteinte médullaire (lésion-s moëlle épinière) *T08.0, T09.3*
- - - cervicale *S12.9*
- - - multiples *T02.10*
- - - séquelle-s de *T91.1*
- - vertébrale thoracique, multiples *S22.1*
- comminutive *T14.20*
- - calcanéum *S92.0*
- - calotte crânienne *S02.0*
- - crâne *S02.7*
- - cuisse (fémur) *S72.9*
- - face, étage moyen *S02.7*
- - main *S62.8*
- - radius distal *S52.50*
- complexe naso-ethmoïdal, du *S02.7*
- compression *T14.20*
- - bassin, latérale *S32.89*
- - corps vertébral *T08.0*
- - vertèbre lombaire *S32.00*
- conduit auditif osseux *S02.1*
- condyle
- - fémoral *S72.41*
- - huméral *S42.44*
- - lateralis tibiae (tibial latéral) (externe) avec fracture du péroné (de la fibula) *S82.11*
- - medialis tibiae (tibial interne) (médial) avec fracture du péroné (de la fibula) *S82.11*
- consolidation
- - position vicieuse (en mauvaise position) (cal vicieux) *M84.09*
- - retard *M84.29*
- côte *S22.32*
- - avec instabilité thoracique *S22.5*
- - étagées (multiples) *S22.40*
- - - avec
- - - - participation de
- - - - - deux côtes, *S22.42*
- - - - - trois côtes, *S22.43*
- - - - - quatre et plus côtes, *S22.44*
- - multiples *S22.40*
- - - avec fracture première côte *S22.41*
- - première *S22.31*
- - - lors de fractures multiples de côtes *S22.41*
- coude *S52.00*
- - supracondylienne *S42.41*
- crâne *S02.9*
- - multiples *S02.7*
- - par traumatisme obstétrical *P13.0*
- - séquelle-s de *T90.2*
- - séquelle-s de, en cas de blessure intracrânienne *T90.2*
- crâne, multiples, lors de fracture os de la face *S02.7*
- cubitus *S52.20*
- - diaphyse *S52.20*
- - épiphyse
- - - inférieure *S52.8*
- - - supérieure *S52.09*
- - tête (caput ulnae) *S52.8*
- cuboïde, os *S92.22*
- décalée
- - fermée *T14.20*
- - ouverte *T14.21*

Fracture –*suite*
- dens (apophyse odontoïde) de C2 *S12.1*
- dent *S02.5*
- - pathologique *K08.81*
- dent, racine *S02.5*
- déplacée *T14.20*
- déplacée (avec déplacement) *T14.20*
- Deutschländer, de *S92.3*
- diaphyse
- - fémorale *S72.3*
- - humérale *S42.3*
- - isolée du péroné *S82.42*
- - jambe *S82.28*
- doigt *S62.60*
- - et fracture métacarpe *T02.20*
- - multiples *S62.7*
- - séquelle-s *T92.2*
- Dupuytren, de *S82.81*
- - malléole *S82.81*
- - ouverte *S82.81*
- - péroné (fibula) *S82.81*
- éminence intercondylaire du tibia *S82.18*
- en cheveu - fracture en codage après localisation
- enclume *S02.1*
- épaule *S42.9*
- - séquelle-s de *T92.1*
- épaule, cavité glénoïde de l'omoplate *S42.14*
- épicondyle
- - lateralis humeri (latéral de l'humérus) *S42.42*
- - medialis humeri (médial de l'humérus) *S42.43*
- épiphyse humérale
- - distale *S42.44*
- - proximale *S42.21*
- ethmoïde (os ethmoïdal) *S02.1*
- extrémité-s *T14.20*
- - inférieure-s *T12.0*
- - - deux *T02.50*
- - supérieure-s *T10.0*
- - - deux *T02.40*
- - - multiples NCA *T02.20*
- face (massif facial), étage (tiers) moyen *S02.7*
- - multiples *S02.7*
- fatigue (de stress) *M84.39*
- - vertèbre *M48.49*
- fémur *S72.9*
- - distal *S72.40*
- - - intercondylienne *S72.44*
- - - supracondylienne *S72.43*
- - intertrochantérienne *S72.11*
- - intratrochantérienne *S72.10*
- - multiples *S72.7*
- - ouverte *S72.9, S71.87!*
- - par traumatisme obstétrical *P13.2*
- - pertrochantérienne *S72.10*
- - séquelles de *T93.1*
- - soustrochantérienne *S72.2*
- - - déplacée *S72.2*
- - transcervicale *S72.08*
- - transtrochantérienne *S72.10*
- fémur, corps (diaphyse) *S72.3*
- fémur, épicondyle *S72.41*
- fémur, épiphyse

Fracture –*suite*
- fémur, épiphyse –*suite*
- - inférieure *S72.42*
- - supérieure *S72.02*
- fémur, tête *S72.08*
- fémur, tête épiphysaire *S72.02*
- fermée *T14.20*
- - déplacée *T14.20*
- Fort I *S02.4*
- - maxillaire *S02.4*
- Fort II *S02.4*
- - maxillaire *S02.4*
- Fort III *S02.4*
- - maxillaire *S02.4*
- fosse cérébrale
- - antérieure *S02.1*
- - moyenne *S02.1*
- - postérieure *S02.1*
- fosse crânienne (cérébrale)
- - antérieure *S02.1*
- - moyenne *S02.1*
- - postérieure *S02.1*
- frontal, os *S02.0*
- Galeazzi *S52.31*
- gros orteil *S92.4*
- hanche *S72.08*
- - acétabulum (cotyle) (cavité acétabulaire) (cavité cotyloïdienne) *S32.4*
- - ouverte *S72.00*
- - plancher acétabulaire (plancher du cotyle) *S32.4*
- - toit du cotyle *S32.4*
- humérus *S42.3*
- - avec fracture
- - - clavicule *S42.7*
- - - omoplate *S42.7*
- - diaphyse *S42.3*
- - - multiples *S42.3*
- - distal *S42.40*
- - épiphyse proximale *S42.21*
- - extrémité distale *S42.40*
- - extrémité proximale *S42.20*
- - lésion obstétricale *P13.3*
- - massif articulaire distal *S42.40*
- - sous-capitale *S42.20*
- - supracondylaire *S42.41*
- - tête *S42.21*
- - - pluri-fragmentaire de 2 à 4 fragments *S42.21*
- hyoïde, os *S12.8*
- ilium (ilion) *S32.3*
- ischion *S32.81*
- jambe *S82.9*
- - complète *S82.7*
- - distale *S82.38*
- - multiples *S82.7*
- - ouverte *S82.9, S81.87!*
- labyrinthe osseux *S02.1*
- larynx *S12.8*
- Le Fort I *S02.4*
- - maxillaire *S02.4*
- Le Fort II *S02.4*
- - mâchoire supérieure *S02.4*
- Le Fort III *S02.4*
- - mâchoire supérieure *S02.4*
- lors de
- - néoplasie NCA *D48.0+, M90.79**
- - ostéoporose *M80.99*

Fracture –*suite*

- luxation
- - articulation de la cheville *S82.88*
- - cheville *S82.88*
- - épaule *S42.9*
- - Monteggia *S52.21*
- luxation de Monteggia *S52.21*
- mâchoire inférieure (mandibule) *S02.60*
- main NCA *S62.8*
- - multiples NCA *S62.8*
- - ouverte *S62.8*
- maisonneuve, jambe *S82.7*
- malaire, os *S02.4*
- - et fracture os maxillaire *S02.4*
- - ouverte *S02.4, S01.87!*
- Malgaigne, de, anneau pelvien *S32.89*
- malléolaire *S82.88*
- - latérale (externe) (du péroné) *S82.6*
- - médiale (interne) (du tibia) *S82.5*
- malléole *S82.88*
- - externe *S82.6*
- - interne *S82.5*
- manubrium sterni *S22.2*
- marche (de fatigue) *S92.3*
- maxillaire
- - angle *S02.65*
- - inférieur (mandibulaire) *S02.60*
- - - col du condyle mandibulaire (processus condylaris mandibularis) *S02.61*
- - - fermée *S02.60*
- - - ouverte *S02.60, S01.87!*
- - - - avec défect osseux *S02.60, S01.87!*
- - - - double *S02.69, S01.87!*
- - - - multiple *S02.69, S01.87!*
- - - pars alveolaris (os alvéolaire) *S02.67*
- - - sous-condylienne *S02.62*
- - inférieur, corps, ouverte *S02.68, S01.87!*
- - os *S02.4*
- - - et fracture os malaire *S02.4*
- - - ouverte *S02.4, S01.87!*
- membre inférieur
- - fermée *T12.0*
- - ouverte *T12.1*
- métacarpe *S62.30*
- - multiples *S62.4*
- - premier *S62.20*
- - - collum (col) *S62.23*
- - - diaphyse *S62.22*
- - - tête *S62.24*
- métacarpe et fracture doigt *T02.20*
- métacarpien, os *S62.30*
- - multiples *S62.4*
- - premier *S62.20*
- métatarse *S92.3*
- métatarsienne *S92.3*
- - ouverte *S92.3, S91.87!*
- multangulum, os
- - minus (trapézoïde) *S62.15*
- - trapèze (trapezium) *S62.14*
- multifragmentaire *T14.20*
- - calcanéum *S92.0*
- - crâne *S02.0*
- - - *S02.7*
- - fémur, supérieur *S72.9*
- - hémifaciale *S02.7*
- - main *S62.8*

Fracture –*suite*

- multifragmentaire –*suite*
- - radius distal *S52.50*
- multiples
- - cou et tête *T02.00*
- - extrémité
- - - inférieure et
- - - - bassin *T02.70*
- - - - région lombosacrée *T02.70*
- - - inférieure NCA *T02.30*
- - - supérieure
- - - - et extrémité inférieure *T02.60*
- - - - thorax et
- - - - - bassin, *T02.70*
- - - - - région lombosacrée, *T02.70*
- - thorax et
- - - bassin *T02.10*
- - - région lombosacrée *T02.10*
- multiples des côtes *S22.40*
- - avec
- - - implication de
- - - - deux côtes *S22.42*
- - - - quatre et plusieurs côtes *S22.44*
- - - - trois côtes *S22.43*
- multiples régions du corps, séquelles de *T94.0*
- naso-ethmoïdale *S02.7*
- naviculaire, os
- - main *S62.0*
- - pied *S92.21*
- nez *S02.2*
- non consolidée *M84.19*
- olécrâne *S52.01*
- - ouverte *S52.01, S51.87!*
- omoplate (scapula) *S42.10*
- orbite *S02.8*
- orteil *S92.5*
- os
- - bassin, multiples *S32.89*
- - calcanéum (calcis) *S92.0*
- - carpe NCA *S62.10*
- - coccyx (coccygis) *S32.2*
- - crochu (hamatum) *S62.17*
- - cunéiforme du tarse *S92.23*
- - cunéiforme, crâne (sphénoïde) *S02.1*
- - - carpe (pyramidal) *S62.12*
- - - pied (cunéiforme) *S92.23*
- - face *S02.9*
- - - avec fracture-s os du crâne *S02.7*
- - - - multiples *S02.7*
- - - multiples *S02.7*
- - - séquelles *T90.9*
- - frontal *S02.0*
- - grand os du carpe (capitatum) *S62.16*
- - iliaque (ilium) *S32.3*
- - ischion (ischii) *S32.81*
- - métatarse *S92.3*
- - naviculare (scaphoïde) *S62.0*
- - - tarsien *S92.21*
- - nez *S02.2*
- - - fermée *S02.2*
- - - ouverte *S02.2, S01.87!*
- - occipital *S02.1*
- - parietal *S02.0*
- - pisiforme *S62.13*
- - pubis *S32.5*
- - pyramidal (triquetrum) *S62.12*
- - sacrum *S32.1*

Fracture –*suite*

- os –*suite*
- - scaphoïde (naviculaire) (scaphoideum) *S92.21*
- - - main *S62.0*
- - - pied *S92.0*
- - semi-lunaire (lunatum) *S62.11*
- - sésamoïde
- - - main *S62.13*
- - - pied *S92.4*
- - sphenoidale (os sphénoïde) *S02.1*
- - tarse *S92.20*
- - temporal *S02.1*
- - - excepté pars squamosa (excepté écaille temporale) *S02.1*
- - - pars squamosa (écaille) *S02.0*
- - trapèze (trapezium) *S62.14*
- - trapézoïde (trapezoideum) *S62.15*
- - zygomatique (os malaire) *S02.4*
- osseuse *T14.20*
- - après insertion (mise en place)
- - - implant orthopédique *M96.6*
- - - matériel d'ostéosynthèse *M96.6*
- - - prothèse articulaire *M96.6*
- - liée à lésion obstétricale *P13.9*
- - lors de tumeur NCA *D48.0+, M90.79**
- - pathologique *M84.49*
- ouverte *T14.21*
- - déplacée *T14.21*
- palais *S02.8*
- panfaciales *S02.7*
- patella (rotule) *S82.0*
- pathologique *M84.49*
- - lors de
- - - ostéoporose *M80.99*
- - - - idiopathique *M80.59*
- - - - liée à
- - - - - inactivité, *M80.29*
- - - - - malabsorption post-chirurgicale, *M80.39*
- - - - médicamenteuse *M80.49*
- - - - post-ménopausique *M80.09*
- - - - post-ovariectomie *M80.19*
- - - - post-traumatique *M80.89*
- - - - sénile *M80.89*
- - - tumeur NCA *D48.0+, M90.79**
- pédicule de l'arc vertébral, rachis cervical *S12.9*
- pédicule vertébral, vertébre cervicale *S12.9*
- pénis *S39.80*
- péroné (fibula) *S82.40*
- - avec
- - - fracture de
- - - - cheville haute (articulation talo-crurale) (articulation tibio-astragalienne) (tibio-tarsienne) *S82.6*
- - - - malléole *S82.6*
- - - fracture du tibia *S82.21*
- - lors d'une fracture
- - - condyle
- - - - lateralis tibiae *S82.11*
- - - - medialis tibiae *S82.11*
- - - tibia
- - - - distal *S82.31*
- - - - proximal *S82.11*
- - - tibia, diaphyse *S82.21*
- - - tuberositas tibiae (tibia, tubérosité antérieure) *S82.11*

Fracture –*suite*
- péroné (fibula) –*suite*
- - multiples *S82.49*
- - seul, diaphyse *S82.42*
- pertrochantérienne *S72.10*
- phalange *S62.60*
- - main *S62.60*
- - pied *S92.5*
- phalange distale, majeur (médius) *S62.63*
- phalanges *S92.5*
- pied *S92.9*
- - multiples *S92.7*
- - ouverte *S92.9*
- pilon tibial *S82.5*
- Pipkin, de *S72.08*
- plancher de l'orbite, dite Blow-out *S02.3*
- - avec dysfonctionnement, motilité, mécanique, oeil *H50.6*
- plancher orbitaire *S02.3*
- poignet NCA *S62.8*
- poignet, ouverte *S62.8*
- pommette (os maxillaire supérieur et malaire/zygomatique) *S02.4*
- position, mauvaise *M84.09*
- pouce *S62.50*
- - phalange
- - - distale *S62.52*
- - - proximale *S62.51*
- - séquelle-s *T92.2*
- Pouteau-Colles, de *S52.51*
- premier métacarpien *S62.21*
- processus (apophyse)
- - condylaris mandibulae (articulaire mandibulaire) (condyle mandibulaire) *S02.61*
- - coracoideus (coracoïde) *S42.13*
- - coronoideus (coronoïde)
- - - mandibulae (mandibulaire) *S02.63*
- - - ulnae (cubitus) *S52.02*
- - styloideus ulnae (styloïde cubitale) *S52.8*
- - xiphoideus (xiphoïde) *S22.2*
- processus alvéolaire *S02.8*
- pubis *S32.5*
- radius *S52.30*
- - avec fracture du cubitus *S52.7*
- - distale *S52.50*
- - - avec fracture du cubitus *S52.6*
- - - ouverte *S52.50, S51.87!*
- - et cubitus, lésions obstétricales *P13.3*
- - intra-articulaire *S52.59*
- - loco typico *S52.51*
- - multiples NCA *S52.7*
- - proximale *S52.10*
- - - ouverte *S52.10, S51.87!*
- - typique *S52.50*
- radius, col *S52.12*
- radius, diaphyse *S52.30*
- - et diaphyse cubitale *S52.4*
- - ouverte *S52.30, S51.87!*
- radius, épiphyse
- - inférieure *S52.50*
- - supérieure *S52.10*
- radius, tête *S52.11*
- région lombaire
- - avec fracture du sacrum *S32.82*
- - ouverte *S32.00*

Fracture –*suite*
- rocher *S02.1*
- - longitudinale *S02.1*
- - transversale *S02.1*
- sacrum *S32.1*
- - avec lésion de la moëlle épinière *S32.1, S34.18*
- - lors de fracture de la colonne lombaire *S32.82*
- scapula (omoplate) *S42.10*
- - corps *S42.11*
- - lors de fracture de l'humérus *S42.7*
- - multiples *S42.19*
- secondaire sur métastase *C79.5+, M90.79**
- séquelles de *T94.1*
- - hauteur de
- - - main *T92.2*
- - - poignet *T92.2*
- sinus
- - ethmoïdal *S02.1*
- - frontal *S02.1*
- - frontal partie haute *S02.0*
- - sphénoïdal *S02.1*
- Smith, de *S52.52*
- solicitation excessive *M84.39*
- - vertébrale *M48.49*
- sous-trochantérienne *S72.2*
- spina scapulae (épine de l'omoplate) *S42.12*
- spontanée *M84.49*
- sternum *S22.2*
- - instabilité thoracique, avec *S22.5*
- stress *M84.39*
- - vertèbre *M48.49*
- sur ostéoporose d'inacivité *M80.29*
- symphysis (symphyse)
- - mandibulae (mandibulaire) *S02.66*
- - pubica (pubienne) *S32.5*
- syphilitique *A52.7+, M90.29**
- talus (astragale) *S92.1*
- tarse *S92.9*
- tarsus (tarse) *S92.20*
- tête
- - fémur *S72.08*
- - humérus *S42.21*
- - multiples *S02.7*
- - - avec fractures d'autres régions du corps *T02.80*
- - péroné *S82.41*
- thorax
- - avec participation d'extrémité-s *T02.70*
- - multiples *S22.8*
- - osseux *S22.9*
- - ouverte *S22.9*
- - séquelle-s de *T91.2*
- tibia *S82.28*
- - avec
- - - fracture fibula (péroné) *S82.21*
- - - participation
- - - - cheville haute *S82.5*
- - - - malléole *S82.5*
- - condyle *S82.18*
- - diaphyse *S82.28*
- - - avec fracture fibula (péroné) *S82.21*
- - - isolée *S82.28*
- - distale *S82.38*

Fracture –*suite*
- tibia –*suite*
- - distale –*suite*
- - - avec fracture du péroné (fibula) *S82.31*
- - - isolée *S82.38*
- - épiphyse
- - - inférieure *S82.38*
- - - supérieure *S82.18*
- - et péroné, traumatisme obstétrical *P13.3*
- - proximale *S82.18*
- - - avec fracture fibula (péroné) *S82.11*
- - - isolée *S82.18*
- - tête *S82.18*
- - - latérale *S82.18*
- toit orbitaire *S02.1*
- trachée *S12.8*
- transtrochantérienne *S72.10*
- trimalléolaire *S82.82*
- trochanter
- - major (grand) *S72.10*
- - mineur (petit) *S72.10*
- trochlée humérale (trochlea humeri) *S42.49*
- tronc
- - avec fracture des membres *T02.70*
- - multiples *T02.10*
- tubérosité (tuberculum)
- - grande (majus), humérus *S42.24*
- - petite (minus), humérus *S42.29*
- tubérosité tibiale (tuberositas tibiae) *S82.18*
- - avec fracture fibula (péroné) *S82.11*
- ulna (cubitus) *S52.20*
- - avec fracture du radius *S52.7*
- - - distale *S52.6*
- - distale *S52.8*
- - multiples NCA *S52.7*
- - proximale *S52.00*
- ulna processus styloïde *S52.8*
- vertébrale, métastatique *C79.5+, M49.59**
- vertèbre *T08.0*
- - dorsale *S22.00*
- - - multiples *S22.1*
- - liée-s à
- - - métastase *C79.5+, M49.59**
- - - traumatisme obstétrical *P11.59*
- - lors d'ostéoporose *M80.98*
- - multiples *T02.10*
- - nouveau-né *P11.59*
- vertèbre cervicale *S12.9*
- - 1ère *S12.0*
- - 2ème *S12.1*
- - 3ème *S12.21*
- - 4ème *S12.22*
- - 5ème *S12.23*
- - 6ème *S12.24*
- - 7ème *S12.25*
- - avec lésion de la moëlle épinière *S12.9, S14.10*
- vertèbre lombaire *S32.00*
- - avec lésion de la moëlle épinière *S32.00, S34.18*
- - L1 *S32.01*
- - L2 *S32.02*
- - L3 *S32.03*
- - L4 *S32.04*

Fracture *–suite*
- vertèbre lombaire *–suite*
- - L5 *S32.05*
- - multiples *S32.7*
- vertèbre lombosacrée SAI *S32.00*
- vertèbre thoracique *S22.00*
- - avec lésion médullaire *S22.00, S24.10*
- - T1 *S22.01*
- - T10 *S22.05*
- - T11 *S22.06*
- - T12 *S22.06*
- - T2 *S22.01*
- - T3 *S22.02*
- - T4 *S22.02*
- - T5 *S22.03*
- - T6 *S22.03*
- - T7 *S22.04*
- - T8 *S22.04*
- - T9 *S22.05*
- vertèbre thoracique (vertèbre dorsale) *S22.00*
- vertex *S02.0*
- vomer *S02.2*
- voûte crânienne *S02.0*
- Weber A, cheville supérieure *S82.6*
- Weber B, cheville supérieure *S82.6*
- Weber C, cheville supérieure *S82.6*
- Winterstein [métacarpien I transversale extra-articulaire] *S62.21*

Fragilitas
- crinium *L67.8*
- ossium *Q78.0*
- - héréditaire *Q78.0*

Fragilité
- capillaire *D69.8*
- - héréditaire *D69.8*
- - idiopathique, avec purpura *D69.8*
- cheveux *L67.8*
- ongles *L60.3*
- osseuse congénitale *Q78.0*

Fragilité capillaire congénitale *D69.8*

Fragment rétinien, sans décollement de r *H33.3*

Franceschetti-Klein, syndrome de [dysost *Q75.4*

Franceschetti-Zwahlen, syndrome de *Q75.4*

Francisella tularensis
- infection *A21.9*
- trachéo-bronchite *A21.8*

Franges (trompe), kyste *Q50.4*

Fredrickson
- hyperlipoprotéinémie, de type
- - I *E78.3*
- - IIa *E78.0*
- - IIb *E78.2*
- - III *E78.2*
- - IV *E78.1*
- - V *E78.3*

Freeman-Sheldon, syndrome de *Q87.0*

Frein
- court *N48.8*
- - prépuce *N47*
- déchirure *S01.54*
- langue
- - affection *K14.9*
- - brièveté, congénital *Q38.1*

Frein *–suite*
- langue *–suite*
- - ulcère *K14.0*
- langue, hypertrophie *K14.8*
- prépuce, allongement *Q55.6*
- pudendi de labiorum
- - lacération, complication, accouchement *O70.0*
- - participation, en cas de
- - - déchirure, périnée, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - lésion, périnée, lors de l'accouchement *O70.0*
- raccourcissement *Q38.1*
- rupture *S01.54*

Fréquence
- cardiaque
- - accélérée *R00.0*
- - anormale NCA *R00.8*
- - fœtale
- - - anormale *P20.9*
- - - - avec méconium dans le liquide amniotique, avec complication de l'accouchement *O68.2*
- - - irrégulière *O68.0*
- - ralentissement *R00.1*
- hautes, hypoacousie *H91.9*
- - oreille interne, bilatérale *H90.3*
- hautes, surdité *H91.9*

Fréquent(e)(s)
- mentruations *N92.0*
- mictions *R35*
- - nocturnes *R35*
- - psychogènes *F45.8*

Frey, syndrome de *G50.8*

Friedländer
- bacilles de
- - bronchopneumonie *J15.0*
- - infection *A49.8*
- méningite *G00.8*
- pneumonie *J15.0*
- sepsis *A41.58*

Friedmann, syndrome de *G40.3*

Friedreich, ataxie de *G11.1*
- autosomique-récessive *G11.1*
- héréditaire
- - familière *G11.1*
- - spinale *G11.1*

Friedrich, syndrome de *M92.3*

Frigide *F52.0*

Frisson *R68.8*

Frissons *R68.8*
- cas de fièvre *R50.88*
- - dans une zone touchée par la Malaria ou le paludisme *B54*
- dans une région touchée par la Malaria ou le paludisme *B54*

Fröhlich, syndrome
- Babinski *E23.6*
- pseudo- *E30.8*

Froid
- abcès pulmonaire tuberculeux *A16.2*
- allergie cutanée *L50.2*
- artificiel excessif
- - exposition à *W93*
- dermite *L30.8*
- - thermique *L30.8*

Froid *–suite*
- épuisement *T69.8*
- pied *R23.1*
- séquelles *T69.9*
- traumatisme *T69.9*
- - nouveau-né *P80.0*
- urticaire *L50.2*

Froid et eau, lésions dues à *T75.1*
- main *T69.0*
- pied *T69.0*

Froide et humide, peau *R23.1*

Froid-humidité, lésions
- main *T69.0*
- pied *T69.0*

Froin, syndrome de *G95.88*

Frommel-Chiari, syndrome de *O92.60*

Front
- abcès *L02.0*
- anomalie *Q75.8*
- basaliome *C44.3*
- blessure *S09.9*
- - superficielle *S00.80*
- contusion *S00.85*
- mélanome in situ *D03.3*
- mélanome, malin *C43.3*
- naevus *D22.3*
- phlegmone *L03.2*
- plaie, ouverte *S01.80*

Fronto-temporal, syndrome *F07.0*
- avec vessie, neurogène *N31.2*

Fronto-temporale, démence *G31.0+, F02.0**

Frotteurisme *F65.8*

Frottis
- col utérin
- - avec des noyaux atypiques *R87.6*
- - selon Papanicolaou *Z12.4*
- Papanicolaou, col utérin, de routine *Z01.4*

Fructokinase, carence *E74.1*

Fructose
- intolérance *E74.1*
- - héréditaire *E74.1*
- troubles du métabolisme *E74.1*

Fructose 16 diphosphatase, carence *E74.1*

Fructosémie *E74.1*
- bégnine *E74.1*
- essentielle *E74.1*

Fructosurie *E74.1*
- essentielle *E74.1*

Fruit, dermite de contact *L25.4*
- allergique *L23.6*
- toxique *L24.6*

FSH (follicular stimulating hormon), tes *Z31.4*

Fuchs I, syndrome de *L51.1*

Fuchs II, syndrome de *H18.5*

Fuchs III, syndrome de, cyclite hétéroch *H20.8*

Fuchs, colobome, congénital *Q14.3*

Fuchs, cyclite hétérochromique *H20.8*
- avec glaucome secondaire *H40.4*

Fuchs, dystrophie de la cornée *H18.5*

Fuchs, taches *H44.2*

Fucosidose *E77.1*

Fugue *R68.8*
- dissociative *F44.1*
- due à l'épilépsie *G40.9*
- hystérique *F44.1*
- réaction à une charge extraordinaire *F43.0*

Fuite
- dû dû prothèse articulaire , *T84.0*
- sonde cystostomie *T83.0*

Fumée
- affection des organes respiratoires
- - aiguë *J68.3*
- - chronique *J68.4*
- affection respiratoire *J68.9*
- - aiguë *J68.3*
- - chronique *J68.4*
- asphyxie *T59.9*
- bronchite *J68.0*
- - chronique *J68.4*
- bronchopneumonie *J68.0*
- effet toxique *T59.9*
- emphysème *J68.4*
- inflammation des voies respiratoires supérieures *J68.2*
- inhalation NCA *T59.9*
- inhalation, avec
- - emphysème *J68.4*
- - - chronique *J68.4*
- - - diffus *J68.4*
- - fibrose pulmonaire *J68.4*
- - - chronique *J68.4*
- intoxication *T59.9*
- pneumoconiose *J68.8*
- pneumonie *J68.0*
- - *J68.0*

Fumeur, avec rhume chronique, pharynx *J31.2*

Fundus
- albipunctatus *H35.5*
- artériosclérose *I70.8+, H36.8**
- dégénérescence *H35.0*
- diabétique *E14.30+, H36.0**
- - cas de
- - - diabète type I *E10.30+, H36.0**
- - - diabète type II *E11.30+, H36.0**
- flavimaculatus, isolé *H35.5*
- gastrite chronique *K29.5*
- hypertonique *H35.0*
- modification *H35.0*
- myome *D25.9*
- myopie *H44.2*
- myopique *H52.1*
- oculaire
- - colobome *Q14.8*
- - saignement *H35.6*
- varices *I86.4*
- - avec saignement *I86.4*

Funiculaire, myélose avec anémie NCA *D51.0+, G32.0**

Funiculite *N49.1*
- aiguë *N49.1*
- chronique *N49.1*
- endémique *N49.1*
- gonococcique *A54.2+, N51.8**
- - aiguë *A54.2+, N51.8**
- - chronique *A54.2+, N51.8**
- tuberculeuse
- - aiguë *A18.1+, N51.8**

Funiculite *–suite*
- tuberculeuse *–suite*

- - chronique *A18.1+, N51.8**
- - endémique *A18.1+, N51.8**

Funiculus latéral *G12.2*

Fureur *F30.9*

Furoncle *L02.9*
- aisselle *L02.4*
- anal *L02.3*
- avant bras *L02.4*
- brachial *L02.4*
- conduit auditif *H60.0*
- - externe *H60.0*
- corps caverneux *N48.2*
- cou *L02.1*
- creux axillaire *L02.4*
- cuir chevelu *L02.8*
- cutané NCA *L02.9*
- doigts *L02.4*
- dos *L02.2*
- épaule *L02.4*
- facial *L02.0*
- fémoral *L02.4*
- fesses *L02.3*
- genou *L02.4*
- glande lacrymale *H04.0*
- hanches *L02.4*
- jambe *L02.4*
- lèvres *L02.0*
- - grandes lèvres *N76.4*
- - petites lèvres *N76.4*
- lèvres vulvaires *N76.4*
- localisation multiple NCA *L02.9*
- main *L02.4*
- malléole *L02.4*
- membre
- - inférieur *L02.4*
- - supérieur *L02.4*
- membre inférieur *L02.4*
- nasal *J34.0*
- nuque *L02.1*
- ombilic *L02.2*
- orbite *H05.0*
- oreille *H60.0*
- - externe *H60.0*
- organes génitaux masculins *N49.9*
- orteil *L02.4*
- palpébral *H00.0*
- paroi abdominale *L02.2*
- paroi thoracique *L02.2*
- pénis *N48.2*
- périnéal *L02.2*
- pied *L02.4*
- pli inguinal *L02.2*
- poignet *L02.4*
- pouce *L02.4*
- rectum *K61.1*
- région fessière *L02.2*
- région glutéale *L02.3*
- rénal *L02.2*
- scrotum *N49.2*
- talon *L02.4*
- tempe *L02.0*
- testicules *N45.0*
- thoracique *L02.2*
- tronc *L02.2*
- vésicule séminale *N49.0*

Furoncle *–suite*

- voies lacrymales *H04.3*
- vulve *N76.4*

Furonculose *L02.9*
- chronique *L02.9*

Fusarium, infection *B48.7*

Fuseau, de Krukenberg-Axenfeld *H18.0*

Fusiforme
- anévrisme *I72.9*
- bronchectasie *J47*

Fusion
- arthrodèse Guérison retardé du genou après *M96.82*
- articulation
- - acquise *M24.69*
- - congénitale *Q74.8*
- articulation sacroiliaque, congénitale *Q74.2*
- avec anomalie de la vision stéréoscopique, vision binoculaire réduite *H53.3*
- canal sublingual et du canal sousmaxillaire *Q38.4*
- choanale *Q30.0*
- conduit auditif *Q16.1*
- congénitale, des os *Q79.9*
- congénitale, des osselets *Q16.3*
- congénitale, des vertèbres cervicales *Q76.1*
- corps vertébraux, cou *Q76.1*
- côtes *Q76.6*
- côtes, congénitale *Q76.6*
- dents *K00.2*
- doigts *Q70.0*
- hémivertèbre associée à une scoliose, congénitale *Q76.3*
- hymen *Q52.3*
- imparfaite, des os du crâne *Q75.0*
- jumeaux *Q89.4*
- larynx et trachée *Q34.8*
- lèvres *Q52.5*
- - grandes (lèvres), congénitale *Q52.5*
- - petites (lèvres), congénitale *Q52.5*
- lobes pulmonaires *Q33.8*
- membre
- - congénitale *Q74.8*
- - inférieur, congénitale *Q74.2*
- - supérieur, congénitale *Q74.0*
- noyau d'ossification, tarsal *Q66.8*
- orifice nasal *Q30.0*
- orteil *Q70.2*
- os calcaneum et os naviculaire *Q66.8*
- os crânien, incomplète *Q75.0*
- osselets, congénitale *Q16.3*
- rachis
- - acquise NCA *M43.29*
- - congénitale *Q76.4*
- - - sans scoliose *Q76.4*
- sacro-iliaque
- - acquise *M43.27*
- - chirurgicale *Z98.1*
- - congénitale *Q74.2*
- sacro-lombaire
- - acquise *M43.27*
- - chirurgicale *Z98.1*
- - congénitale *Q76.4*
- talus naviculaire *Q74.2*
- tarses, noyau d'ossification *Q66.8*

Fusion –*suite*

- testicules *Q55.1*
- trachée et oesophage *Q39.8*
- vagin *Q52.4*
- valvule cardiaque NCA *Q24.8*
- valvule pulmonaire *Q22.1*
- valvules mitrales *Q23.2*
- vulve *Q52.5*

Fusion calcanéoscapoïdienne *Q66.8*

Fusion choanale *Q30.0*

Fusion défaut *H53.3*

Fusion rénale *Q63.1*

Fusion, anomalie avec perte de zones du *H53.4*

Fusospirochètes
- gangrène *A69.0*
- pharyngite *A69.1*

Fusospirochétose *A69.1*

G, tumeur à cellules *D37.78*
- maligne, pancréas *C25.4*

Gadodiamide
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Gaine optique, hématome *H47.0*

Gaine, orthopédique, mise en place *Z46.7*

Galactocèle *N64.8*
- puerpéral *O92.70*
- sein *N64.8*

Galactographie *Z01.6*

Galactokinase, déficit *E74.2*

Galactophorite *N61*
- pendant la grossesse *O91.20*
- postpartum *O91.20*

Galactorrhée *O92.60*
- avec difficultés à la mise au sein *O92.61*
- pendant la grossesse *O92.60*
- postpartum *O92.60*
- sans relation avec la grossesse *N64.3*

Galactorrhée-amenorrhée, syndrome *E22.1*

Galactose
- intolérance *E74.2*
- intolérance congénitale *E74.2*
- malabsorption *E74.2*
- trouble du métabolisme *E74.2*

Galactose-1-phosphate-uridyl-transférase *E74.2*

Galactosémie *E74.2*
- avec ictère, néonatale *E74.2*
- congénitale *E74.2*
- dépistage *Z13.8*

Galactostase *O92.70*

Galactosurie *E74.2*

Galacturie *R82.0*

Gale *B86*
- acariens *B88.9*
- avec eczéma, sarcoptique *B86*
- aviculteurs *B88.0*
- blanchisseurs *B35.6*
- blé *B88.0*
- boulangers *L25.4*
- céréales *B88.0*
- ciment *L25.3*
- cimentiers *L25.3*
- épiciers *B88.0*
- infestation *B86*
- l'huile *L24.1*
- - contact *L24.1*
- - toxique *L24.1*
- moissoneurs *B88.0*
- moissonneurs *B88.0*
- norvégienne *B86*
- paille *B88.0*
- sarcopte *B86*

Galéa aponévrotique, hémorragie *S00.05*

Gallate
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Galop, bruit de *R00.8*

Gamètes, transfert de *Z31.2*
- intrapéritonéal *Z31.2*
- intratubaire, transabdominal *Z31.2*
- transcervical, transutérin *Z31.2*

Gamètes, tumeur embryonnaire *C80*

Gamétopathie *Q89.8*

gamma delta Contient cellules de type alpha - bêta et *C86.1*

Gamma glutamyl transferase [GGT], anomal *R74.8*

Gamma glutamyl transpeptidase (GGT), ano *R74.8*

Gamma, chaînes lourdes, maladie des *C88.20*
- rémission complète *C88.21*

Gamma, herpèsvirus, mononucléose *B27.0*
- avec
- - hépatite *B27.0+, K77.0**
- - hépatomégalie *B27.0+, K77.0**

Gammaglobuline
- absence dans le sang *D80.1*
- administration prophylactique *Z29.1*
- carence dans le sang *D80.1*
- sanguine
- - absence, héréditaire *D80.0*
- - carence, héréditaire *D80.0*

Gammaglobulinémie normale
- avec carence en anticorps *D80.6*
- cas d'immunodéficience humorale *D80.6*

Gamma-glutamyl, cycle, anomalie *E72.8*

Gamma-hydroxybutyrique, acidurie *E88.8*

Gammapathie
- associée à une dyscrasie lymphoplasmocytaire *D47.2*
- monoclonale *D47.2*
- - signification indéterminé GMSI] , *D47.2*
- polyclonale *D89.0*

Gamna, maladie de *D73.1*

Gandy-Nanta, maladie de *D73.1*

Gangliocytaire, paragangliome *D13.2*

Gangliocytome *D36.1*
- malin *C47.9*
- - *C49.9*
- mélanokystique *D36.1*
- pigmenté *D36.1*

Ganglion *M67.49*
- articulation *M67.49*
- axillaire, abcès, aigu *L04.2*
- bronchiques, tuberculose
- - confirmée par la bactériologie ou l'histologie *A15.4*
- - primitive *A16.7*
- - - confirmée par la bactériologie ou l'histologie *A15.7*
- cervicothoracique, lésion *S24.4*
- coalescent *M67.49*
- coeliaque(s), lésion *S34.5*
- de la base (noyaux gris centraux)
- - hémorragie *I61.3*
- - ictère *P57.9*
- - lésion *G25.9*
- - tumeur, maligne *C71.7*
- diffus *M67.49*
- dos de la main *M67.44*
- gaine tendineuse *M67.49*
- Gasser (de), affection *G50.8*
- géniculé
- - inflammation *G51.1*
- - - post-zostérienne *B02.2+, G53.0**

Ganglion *–suite*
- géniculé *–suite*
- - névralgie *G51.1*
- kyste *M67.49*
- main *M67.44*
- ménisque *M23.09*
- pied *M67.47*
- poignet *M67.43*
- stellaire, lésion *S24.4*
- tendon *M67.49*
- thoracique(s), lésion *S24.4*
- tuberculose *A18.0+, M68.09**
- tumeur *D48.2*

Ganglioneuroblastome *C47.9*

Ganglioneuromatose *D36.1*

Ganglioneurome *D36.1*

Ganglioneurome malin *C47.9*

Ganglionite
- Gasser (de), zostérienne *B02.3+, H58.8**
- géniculée *G51.1*
- - néonatale *P11.3*
- - post-zostérienne *B02.2+, G53.0**
- nerf crânien V *G50.0*
- zostérienne *B02.2+, G53.0**

Gangliosidose *E75.1*
- GM [marqueur de chaînes gamma] *E75.1*
- GM1 *E75.1*
- GM2 *E75.0*
- - forme
- - - adulte *E75.0*
- - - infantile *E75.0*
- - - juvénile *E75.0*
- GM3 *E75.1*

Gangliosidose GM1 *E75.1*

Gangliosidose GM2 *E75.0*
- forme
- - adulte *E75.0*
- - infantile *E75.0*
- - juvénile *E75.0*

Gangliosidose GM3 *E75.1*

Gangosa *A66.5+, J99.8**

gangrène
-
- *R02*
- alvéolaire *K10.3*
- angine de Vincent *A69.1*
- appendice *K35.9*
- - avec
- - - péritonite
- - - - localisée *K35.9*
- artérioscléreuse *I70.24*
- - sénile *I70.24*
- artérioscléreuse de la personne âgée *I70.24*
- Autre Hernie paroi abdominal antérieur non précisées avec occlusion sans *K43.6*
- - abdominal antérieur avec occlusion, sans *K43.68*
- - abdominal antérieur non précisées avec *K43.7*
- - abdominal antérieur avec *K43.78*
- - abdominal antérieur sans occlusion ni *K43.98*
- avant-pied *R02*
- - diabétique *E14.50*

gangrène –*suite*

- avec
- - diabète sucré *E14.50*
- - embolie
- - - artère intestinale *K55.0*
- - - artère mésentérique *K55.0*
- - - veine intestinale *K55.0*
- - - veine mésentérique *K55.0*
- - entérocèle *K46.1*
- - épiplocèle *K46.1*
- - hernie *K46.1*
- - - abdominale NCA *K45.1*
- - - diaphragmatique *K44.1*
- - - épigastrique *K43.1*
- - - fémorale
- - - - bilatérale *K41.1*
- - - - unilatérale, avec incarcération *K41.4*
- - - inguinale *K40.40*
- - - - bilatérale *K40.10*
- - - - - récidivante, *K40.11*
- - - - unilatérale *K40.40*
- - - interstitielle *K46.1*
- - - intra-abdominale *K46.1*
- - - ischiatique *K45.1*
- - - lombaire *K45.1*
- - - obturatrice *K45.1*
- - - ombilicale *K42.1*
- - - para-oesophagienne *K44.1*
- - - pudendale *K45.1*
- - - retropéritonéale *K45.1*
- - - ventrale *K43.1*
- - hernie hiatale *K44.1*
- - hernie par glissement *K40.40*
- - - récidivante *K40.41*
- - rupture, diaphragme *K44.1*
- - strangulation intestinale, avec hernie *K46.1*
- - thrombose
- - - artère mésentérique *K55.0*
- - - épiploon *K55.0*
- - - intestinale *K55.0*
- - ulcère *L89.99*
- - ulcère cutané *R02*
- bouche *A69.0*
- buccale *A69.0*
- canal déférent *N49.1*
- - non infectieuse *N50.8*
- côlon *K55.0*
- cornée *H18.8*
- corps caverneux *N48.2*
- - non infectieuse *N48.8*
- cutanée *R02*
- diabétique *E14.50*
- - associée à
- - - diabète sucré de type 1 *E10.50*
- - - diabète sucré de type 2 *E11.50*
- due à
- - Bacillus welchii *A48.0*
- - Clostridium perfringens *A48.0*
- - fusospirochètes *A69.0*
- - gelure *T34.9*
- - spirochètes NCA *A69.8*
- emphysémateuse *A48.0*
- épidémique *T62.2*
- épididyme *N45.9*
- Fournier, de
- - chez la femme *N76.80*

gangrène –*suite*

- Fournier, de –*suite*
- - chez l'homme *N49.80*
- gazeuse *A48.0*
- - entérite *A48.0*
- - myosite *A48.0*
- - septicémie *A48.0*
- - utérus *A48.0*
- Hernie
- - crurale unilatéral) : incarcérée sans *K41.3*
- - épigastrique
- - - avec occlusion, sans *K43.60*
- - - - *K43.70*
- - - sans occlusion ni *K43.90*
- - incisionnelle
- - - avec *K43.1*
- - - provoquant une occlusion sans *K43.0*
- - - sans occlusion ni *K43.2*
- - parastomale
- - - avec occlusion, sans *K43.3*
- - - - *K43.4*
- - - étranglée sans *K43.3*
- - - sans occlusion ni *K43.5*
- - paroi abdominal antérieur non précisées avec occlusion, sans *K43.69*
- - - antérieur non précisées avec *K43.79*
- - - antérieur non précisées sans occlusion ni *K43.99*
- humide *R02*
- intestin *K55.0*
- - avec occlusion intestinale *K56.6*
- intestin grêle *K55.0*
- intestinale *K55.0*
- jambe *R02*
- joue *A69.0*
- juvénile *I73.1*
- Meleney, de *L98.4*
- membre *R02*
- membre inférieur *R02*
- mentionné K43 6 tout hernie avec *K43.7*
- mesentère *K55.0*
- - avec occlusion intestinale *K56.6*
- oedémateuse *R02*
- ombilic *R02*
- ovaire *N70.9*
- pancréas *K85.91*
- paroi abdominale *R02*
- paroi intestinale *K55.0*
- pavillon de l'oreille *R02*
- peau *R02*
- - extensive *R02*
- pénis *N48.2*
- - non infectieuse *N48.8*
- périnée *R02*
- pharynx *J02.9*
- pied *R02*
- - diabétique *E14.50*
- - - associée à
- - - - diabète sucré de type 1 *E10.50*
- - - - diabète sucré de type 2 *E11.50*
- Plaut-Vincent, pharynx *A69.1*
- pulmonaire *J85.0*
- pulpaire *K04.1*
- rachis *R02*
- Raynaud, de *I73.0*
- rétropharyngée *J39.2*

gangrène –*suite*

- scrotum *N49.2*
- - non infectieuse *N50.8*
- sèche *R02*
- sénile, artérioscléreuse *I70.24*
- symétrique *I73.0*
- talon *R02*
- testicules *N45.9*
- - non infectieuse *N50.8*
- thyroïde *E07.8*
- tissu conjonctif *R02*
- tout hernie mentionné en K43 . 6 - : étranglée sans *K43.6*
- tuberculeuse NCA *A16.9*
- tunique vaginale *N49.1*
- - non infectieuse *N50.8*
- ulcéreuse *R02*
- utérus *N71.9*
- vésicule biliaire *K81.0*
- - sans calcul biliaire *K81.0*
- vessie *N30.8*
- - pendant la grossesse *O23.1*
- visage *A69.0*
- vulve *N76.80*

gangréneuse Dermite : *L08.0*

Gangréneux(se)

- adénite *L04.9*
- amygdalite *J03.9*
- - aiguë *J03.9*
- angiocholite *K83.0*
- appendicite *K35.9*
- balanite *N48.1*
- cholécystite *K81.0*
- - sans calcul biliaire *K81.0*
- cystite *N30.8*
- dermatite *L88*
- diphtérie *A36.9*
- entérite *A09*
- erysipèle *A46*
- étranglement, hernie *K46.1*
- hernie
- - avec
- - - étranglement, estomac *K46.1*
- - - incarcération *K46.1*
- - irréductible *K46.1*
- - obstructive *K46.1*
- inflammation, bassinet rénal *N12*
- lymphangite *I89.1*
- noma *A69.0*
- pancréatite *K85.91*
- pemphigus *R02*
- périurétrite *N34.2*
- pharyngite *J02.9*
- - aiguë *J02.9*
- pneumonie *J85.0*
- purpura *D69.0*
- - avec coagulopathie de consommation *D65.1*
- - sans coagulopathie de consommation *D69.0*
- pyodermie *L88*
- septicémie *A41.9*
- staphylite *K12.28*
- stomatite *A69.0*
- uvulite *K12.28*
- vulvite *N76.2*

Ganja, dépendance *F12.2*

Ganser, syndrome de, hystérique *F44.80*

Gardner-Diamond, syndrome de *D69.2*

Gardnerella
- cervicite *N76.0*
- infection *A48.8*
- vaginite *N76.0*

Gargoylisme *E76.0*

Garin-Bujadoux-Bannwarth, syndrome de *A69.2*

Garré, ostéite sclérosante de *M86.89*

Garré, ostéomyélite (sclérosante) de *M86.89*

Gartner, canal de
- anomalie *Q50.6*
- kyste *Q50.5*
- persistant *Q50.6*

Gasser, ganglion de
- lésion *G50.8*
- lésion traumatique *S04.3*

Gastralgie *R10.1*
- psychogène *F45.4*

Gastrectasie *K31.88*
- psychogène *F45.31*

gastrectomie Syndrome post - *K91.1*

Gastrectomie, troubles, fonctionnels *K31.9*

Gastrine, adénome pancréatique sécrétant *D13.6*

Gastrine, sécrétion
- anormale *E16.4*
- élevée *E16.4*
- excessive, en cas d'hyperplasie des cellules A du pancréas *E16.4*

Gastrinome *D37.78*
- pancréas, malin *C25.4*

Gastrique
- adénocarcinome *C16.9*
- crise, dans la syphilis *A52.7+, K93.8**
- douleurs *R10.1*
- - psychogènes *F45.4*
- dysfonctionnement neurovégétatif *F45.31*
- fistule *K31.6*
- hyperacidité *K31.88*
- hyperchylie psychogène *F45.31*
- hypersécrétion *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- hypoacidité *K31.88*
- neurasthénie *F45.31*
- syphilis tardive, avec polypose *A52.7+, K93.8**

Gastrite *K29.7*
- aiguë *K29.1*
- - hémorragique *K29.0*
- allergique *K29.6*
- antrale *K29.5*
- - chronique *K29.5*
- atrophique *K29.4*
- - chronique *K29.4*
- bactérienne *K29.6*
- chronique *K29.5*
- chronique récidivante *K29.5*
- corps *K29.7*
- dans
- - candidose *B37.88*
- - infection à cytomégalovirus *B25.80+, K93.8**
- - toxoplasmose *B58.8*
- due à

Gastrite *–suite*
- due à *–suite*
- - alcoolisme *K29.2*
- - aspergillose *B44.8+, K93.8**
- - cytomégalovirus *B25.80+, K93.8**
- - Helicobacter pylori *K29.7*
- - sous-alimentation *E63.9+, K93.8**
- - toxoplasmose *B58.8*
- entéro- *K52.9*
- - aiguë *A09*
- - - avec exsiccose *A09, E86*
- - avec exsiccose *K52.9, E86*
- éosinophile *K52.8*
- érosive *K29.1*
- - aiguë, avec hémorragie *K29.0*
- - chronique *K29.6*
- - hémorragique *K29.0*
- fundique chronique *K29.5*
- granulomateuse *K29.6*
- hémorragique *K29.0*
- hypersécrétoire *K29.6*
- hypertrophique *K29.6*
- irritative *K29.6*
- moignon *K29.7*
- nerveuse *F54, K29.7*
- phlegmoneuse *K29.6*
- psychosomatique *F54, K29.7*
- récidivante *K29.5*
- reflux, par *K29.6*
- spastique *K29.6*
- superficielle *K29.3*
- - chronique *K29.3*
- tuberculeuse *A18.8+, K93.8**
- virale *A08.4*

Gastro intestinal
- affection *K92.9*
- - examen de dépistage NCA *Z13.8*
- catarrhe *K52.9*
- - aigu *A09*
- grippe [influenza] *J11.8*
- hémorragie *K92.2*
- infection *K52.9*
- - bactérienne *A09*
- inflammation *K52.9*
- - aiguë *A09*
- intoxication *K63.8*
- spasme *K58.9*
- troubles
- - aigus *K92.9*
- - psychogènes *F45.37*

Gastro-cardiaque, syndrome *F45.37*

Gastro-colique
- érosion peptique *K28.9*
- fistule *K31.6*
- - congénitale *Q40.2*
- - tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- ulcère peptique *K28.9*

Gastrocolite *K52.9*

Gastrodiscoides hominis, infestation *B66.8*

Gastrodiscoides, distomatose à *B66.8*

Gastroduodénal(e)(s)
- fistule *K31.6*
- lésions *K31.9*

Gastroduodénite *K29.9*
- aiguë *K29.9*
- atrophique *K29.9*

Gastroduodénite *–suite*
- chronique *K29.9*
- virale *A08.4*

Gastroduodénopathie *K31.9*

Gastroduodénostomie, avec complications *K91.88*

Gastrodynie *R10.1*

Gastroentérique, dysfonctionnement neuro *F45.37*

Gastroentérite *K52.9*
- aiguë *A09*
- - avec exsiccose *A09, E86*
- - provoquée par
- - - norovirus *A08.1*
- - - virus de Norwalk *A08.1*
- allergique *K52.2*
- associée à
- - candidose *B37.88*
- - grippe *J11.8*
- - - virus de la grippe aviaire, présence confirmée *J09*
- - - virus grippal, présence confirmée, sauf virus de la grippe aviaire *J10.8*
- - maladie due au VIH *B23.8, K52.9*
- - paratyphus *A01.4*
- avec
- - diarrhée infectieuse *A09*
- - exsiccose *K52.9, E86*
- avec exsiccose *K52.9, E86*
- chronique *K52.9*
- colite médicamenteux *K52.1*
- diététique *K52.2*
- éosinophile *K52.8*
- épidémique *A09*
- hémorragique *K52.9*
- infectieuse *A09*
- - associée à maladie provoquée par le VIH *B20, A09*
- - avec exsiccose *A09, E86*
- non bactérienne, chez le nourrisson *A08.5*
- non infectieuse *K52.9*
- nourrisson *A09*
- - avec exsiccose *A09, E86*
- paratyphoïde *A01.4*
- présumée infectieuse *A09*
- - avec
- - - diarrhée *A09*
- - - exsiccose *A09, E86*
- provoquée par
- - allergie alimentaire *K52.2*
- - candidose *B37.88*
- - cryptosporidiose *A07.2*
- - intoxication alimentaire *A05.9*
- - irradiation *K52.0*
- - rotavirus *A08.0*
- - salmonellose *A02.0*
- - virus *A08.4*
- septique *A09*
- toxique *K52.1*
- - virale *A08.4*
- tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- ulcéreuse *K51.9*
- - chronique *K51.9*
- virale *A08.4*
- - épidémique *A08.1*
- - grave, chez le nourrisson *A08.3*

Gastro-entérite *K52.9*

Gastro-entérite –*suite*
- aiguë *A09*
- - avec ecsiccose *A09, E86*
- avec exsiccose *K52.9, E86*

Gastro-entérite aigue *A08.1*

Gastroentéritique, fièvre *A01.0*

Gastroentérocolique, fistule *K31.6*

Gastroentérocolite *K52.9*

Gastroentéropathie *K92.9*
- aiguë, due au virus de Norwalk *A08.1*

Gastro-entéroptose *K63.4*

Gastro-hépatite *K75.9*

Gastro-intestinal
- actinomycose *A42.1*
- affection, avec arthrite NCA *K63.9+, M03.69**
- agent pathogène, porteur NCA *Z22.1*
- allergie *K52.2*
- angiodysplasie *K55.8*
- appareil, avec hémorragie *T85.88*
- atrophie *K63.8*
- carcinome *C26.9*
- charbon *A22.2*
- complication *K92.9*
- - après une intervention chirurgicale *K91.9*
- détresse, fonctionnelle *K30*
- dispositif de ballon, avec complication *T85.9*
- - mécanique *T85.5*
- dyspepsie *K30*
- érosion, peptique *K28.9*
- hémorragie *K92.2*
- - nouveau-né *P54.3*
- hyperactivité *K31.88*
- hypersensibilité *K52.2*
- hypomotilité *K31.88*
- - psychogène *F45.32*
- implant
- - défaillance, mécanique *T85.5*
- - fuite *T85.5*
- infection *A09*
- - due à un virus *A08.4*
- irritation *K30*
- - psychogène *F45.39*
- lésion *K63.9*
- maladie *K92.9*
- - amyloïde *E85.4+, K93.8**
- - fonctionnelle *K59.9*
- maladie, antécédents personnels *Z87.1*
- mucormycose *B46.2+, K93.8**
- mycose, due à Candida *B37.88*
- névrose *F45.37*
- obstruction *K56.6*
- occlusion *K56.7*
- participation, en cas de grippe [influenza] *J11.8*
- polypeptide vasoactif, hypersécrétion, par la proportion de glandes pancréatiques endocrines *E16.8*
- réaction allergique due à un aliment *K52.2*
- système, douleurs psychogènes du *F45.4*
- transplant, défaillance mécanique *T85.5*
- trouble *K92.9*
- - fonctionnel *K59.9*
- - psychogène *F45.39*

Gastro-intestinal –*suite*
- tuberculose *A18.3+, K93.0**
- tularémie *A21.3*
- ulcère peptique *K28.9*

Gastro-jéjunal(e)
- érosion peptique *K28.9*
- fistule *K31.6*
- ulcère *K28.9*
- - aigu *K28.3*
- - - avec perforation *K28.1*
- - avec
- - - hémorragie *K28.4*
- - - perforation *K28.5*
- - chronique *K28.7*
- - - avec
- - - - hémorragie *K28.4*
- - - - perforation *K28.5*
- - peptique *K28.9*

Gastro-jéjunite *K52.9*
- non infectieuse *K52.9*
- présumée non infectieuse *K52.9*

Gastro-jéjuno-colique, fistule *K31.6*

Gastrolithe *K31.88*

Gastromalacie *K31.88*
- oesophagienne *K22.8*

Gastro-oesophagien(ienne)
- maladie de reflux *K21.9*
- reflux, avec oesophagite *K21.0*

Gastro-oesophagite *K29.6*

Gastroparésie *K31.88*
- diabétique *E14.40+, G99.0**
- - lors de
- - - diabète sucré de type 1 *E10.40+, G99.0**
- - - diabète sucré de type 2 *E11.40+, G99.0**

Gastropathie *K31.9*
- Ménétrier, hypertrophique *K29.6*

Gastropathie hypertrophique géante *K29.6*

Gastroptose *K31.88*

Gastrorragie *K92.2*

Gastroschisis *Q79.3*
- congénital *Q79.3*
- thorax *Q79.8*
- - congénital *Q79.8*

Gastrospasme *K31.88*
- neurogène *K31.88*
- psychogène *F45.31*
- réflexe *K31.88*

Gastrosténose *K31.88*

Gastrostomie
- présence de *Z93.1*
- surveillance *Z43.1*

Gastrostomie, avec complication *K91.88*

Gastrosuccorrhée *K31.88*
- continue *K31.88*
- intermittente *K31.88*
- persisitante *K31.88*
- psychogène *F45.31*

Gaté, -ée
- aliments, intoxication *T62.9*
- baies, intoxication *T62.1*
- coquillages, intoxication *T61.2*
- moules, intoxication *T61.2*

Gaucher, maladie de *E75.2*
- infantile *E75.2*

Gaz
- affection des voies respiratoires
- - aiguë *J68.3*
- - chronique *J68.4*
- affection respiratoire *J68.9*
- - aiguë *J68.3*
- asphyxie NCA *T59.9*
- bronchite chronique *J68.4*
- bronchopneumonie *J68.0*
- effet toxique *T59.9*
- embolie *T79.0*
- emphysème *J68.4*
- gastriques *R14*
- inhalation NCA *T59.9*
- inhalation, avec
- - bronchiolite oblitérante *J68.4*
- - - chronique *J68.4*
- - - subaiguë *J68.4*
- - emphysème *J68.4*
- - - chronique *J68.4*
- - - diffus *J68.4*
- - fibrose pulmonaire *J68.4*
- - - chronique *J68.4*
- intoxication NCA *T59.9*
- pneumonie *J68.0*
- pneumopathie *J68.0*
- thérapeutique, intoxication *T41.5*

Gaz intestinaux
- douloureux *R14*
- éructation *R14*

Gaz lacrymogène, effet toxique *T59.3*

Gaz, effet toxique *T59.8*

Gee (Herter) (Thaysen), maladie de *K90.0*

Gelatineux
- adénocarcinome *C80*
- distrophie, cornée, en goutte *H18.5*

Gélineau-Westphal, syndrome de *G47.4*

Gelure *T35.7*
- avec nécrose
- - épiderme *T33.9*
- - tissulaire *T34.9*
- bassin *T35.3*
- - avec nécrose, tissulaire *T34.3*
- - superficielle *T33.3*
- cou *T35.2*
- - avec nécrose tissulaire *T34.1*
- - séquelles de *T95.0*
- - superficielle *T33.1*
- cuisse *T35.5*
- - avec nécrose tissulaire *T34.6*
- - superficielle *T33.6*
- doigt *T35.4*
- - avec nécrose tissulaire *T34.5*
- - superficielle *T33.5*
- extrémité (membre)
- - inférieure *T35.5*
- - - séquelles de *T95.3*
- - supérieure *T35.4*
- - - séquelles de *T95.2*
- gangrène de gel *T34.9*
- genou *T35.5*
- - avec nécrose tissulaire *T34.7*
- - superficielle *T33.7*
- hanche *T35.5*
- - avec nécrose tissulaire *T34.6*
- - superficielle *T33.6*

Gelure –*suite*

- jambe
- - avec nécrose tissulaire *T34.7*
- - superficielle *T33.7*
- main *T35.4*
- - avec nécrose tissulaire *T34.5*
- - superficielle *T33.5*
- membre inférieur
- - avec nécrose tissulaire *T34.9*
- - superficielle *T33.9*
- membre supérieur
- - avec nécrose tissulaire *T34.4*
- - superficielle *T33.4*
- multiples parties du corps *T35.6*
- - avec nécrose tissulaire *T35.1*
- - superficielle *T35.0*
- nécrose des tissus *T34.9*
- oeil, séquelles de *T95.8*
- orteils *T35.5*
- - avec nécrose tissulaire *T34.8*
- paroi abdominale *T35.3*
- - avec nécrose tissulaire *T34.3*
- - superficielle *T33.3*
- parties multiples du corps *T35.6*
- - séquelles de *T95.8*
- pied *T35.5*
- - avec nécrose tissulaire *T34.8*
- - superficielle *T33.8*
- poignet *T35.4*
- - avec nécrose tissulaire *T34.5*
- - superficielle *T33.5*
- région malléolaire *T35.5*
- - avec nécrose tissulaire *T34.8*
- - superficielle *T33.8*
- séquelles de *T95.9*
- superficiel bras avant-bras *T33.4*
- superficielle *T33.9*
- tête *T35.2*
- - avec nécrose tissulaire *T34.0*
- - séquelles de *T95.0*
- - superficielle *T33.0*
- thorax *T35.3*
- - avec nécrose tissulaire *T34.2*
- - superficielle *T33.2*
- tronc *T35.3*
- - avec nécrose tissulaire *T34.9*
- - séquelles de *T95.1*
- - superficielle *T33.9*
- visage *T35.2*
- - avec nécrose tissulaire *T34.0*
- - séquelles de *T95.0*
- - superficielle *T33.0*

Gémellaire

- certains nés vivants, résultat de l'accouchement *Z37.6!*
- naissance
- - hors de l'hopital *Z38.7*
- - l'hôpital *Z38.6*
- résultat de l'accouchement *Z37.9!*
- tous
- - mort né, résultat de l'accouchement *Z37.7!*
- - né vivant, résultat de l'accouchement *Z37.5!*

Gémellaire, naissance, avant terme *P07.3*

Gencive

Gencive, gingival, gingivale

- abcès, aigu *K05.2*

Gencive, gingival, gingivale –*suite*

- anomalie *Q38.6*
- atrophie *K06.0*
- blessure *S09.9*
- - superficielle *S00.50*
- corps étranger *T18.0*
- déformation, acquise NCA *K06.8*
- dépôt, métal *K06.8*
- diminution *K05.4*
- épaississement *K06.1*
- épulis *K06.8*
- fibromatose *K06.1*
- granulome, pyogène *K06.8*
- hémorragie *K06.8*
- hyperplasie *K06.1*
- hypertrophie *K06.1*
- infection *K05.1*
- inflammation *K05.1*
- - aiguë *K05.0*
- - chronique *K05.1*
- kyste *K09.0*
- lésion *K06.2*
- lésion, due au traumatisme *K06.2*
- leucoplasie *K13.2*
- maladie *K06.9*
- occlusion, traumatique *K06.2*
- plaie, ouverte *S01.53*
- polype *K06.8*
- rétraction *K06.0*
- - généralisée *K06.0*
- - localisée *K06.0*
- - post infectieuse *K06.0*
- - postopératoire *K06.0*
- retrait *K06.0*
- - généralisé *K06.0*
- - localisé *K06.0*
- - post infectieux *K06.0*
- - postopératoire *K06.0*
- scorbutique *E54+, K93.8**
- trouble de la kératinisation *K05.1*
- tuméfaction *K06.8*
- ulcère *K06.8*
- - chronique *K06.8*

gène MLL Leucémie myéloïde aigu avec altération du *C92.6*

Générale - *voir* Type de maladie

Généralisé, type de maladie

Générateur d'impulsions (pile), pacemake *Z45.0*

Genèse

- non spécifiée
- - maux, tête *R51*
- - néoformation maligne *C80*
- - vertiges *R42*

Génétique

- amylose *E85.2*
- conseil, stérilité *Z31.5*
- examen, stérilité *Z31.5*
- induit par
- - Agranulocytose *D70.0*
- - Anomalie
- - - Granulocytes *D72.0*
- - - Leucocytes *D72.0*
- - carence en lactase *E73.0*
- résultats anormaux lors d'examens grossesse *O28.5*
- risque, elevé, chez le foetus *O35.9*

Génétique, examen *Z01.88*

génital féminines type

- 1 Mutilations *N90.81*
- 2 Mutilations *N90.82*
- 3 Mutilations *N90.83*
- 4 Mutilations *N90.84*
- non précisé , Mutilations *N90.80*

Génital, e, aux

- atrophie *N95.2*
- candidose *B37.4*
- démangeaison *L29.9*
- eczéma *L30.9*
- gonorrhée *A54.0*
- hémorragie anormale *N93.9*
- herpès *A60.0*
- infection, Chlamydia *A56.2*
- maladie fongique *B49*
- mycose, récidivante *B36.9*
- névrose *F45.34*
- organes
- - abcès
- - - puerpéral *O86.1*
- - - tuberculeux NCA *A18.1*
- - externes
- - - amputation traumatique *S38.2*
- - - condylome génital *A63.0*
- - - contusion *S30.2*
- - - lésion traumatique *S39.9*
- - - plaie ouverte NCA *S31.5*
- - féminins
- - - accessoires *Q52.8*
- - - anomalie *Q52.9*
- - - atrésie *Q52.8*
- - - défaut de développement congénital *Q52.8*
- - - défaut d'occlusion congénital NCA *Q52.8*
- - - externes
- - - - absence congénitale *Q52.7*
- - - - accessoires *Q52.7*
- - - - atrésie *Q52.7*
- - - - défaut de développement congénital *Q52.7*
- - - - défaut d'occlusion congénital *Q52.7*
- - - - écrasement *S38.0*
- - - - hypoplasie congénitale *Q52.7*
- - - - kyste NCA *N90.7*
- - - - malformation congénitale *Q52.7*
- - - - malposition congénitale NCA *Q52.7*
- - - - mélanome *C51.9*
- - - fistule *N82.9*
- - - hématome NCA *N94.8*
- - - hyperplasie *N94.8*
- - - hypoplasie congénitale *Q52.8*
- - - inflammation *N73.9*
- - - internes
- - - - défaut de développement congénital *Q52.8*
- - - - malformation congénitale NCA *Q52.8*
- - - - malposition congénitale NCA *Q52.8*
- - - kyste, glande sébacée *N94.8*
- - - malformation congénitale NCA *Q52.9*
- - - malposition congénitale *Q52.8*
- - - mélanome in situ NCA *D03.8*
- - - naevus NCA *D28.0*
- - - polype *N84.9*

Génital, e, aux *–suite*
- organes *–suite*
- - féminins *–suite*
- - - problème *N94.9*
- - - prolapsus *N81.9*
- - - tératome *D39.9*
- - - ulcération aphteuse *N76.6*
- - hypoplasie, dans la dystrophie adiposogénitale *E23.6*
- - infection
- - - après avortement *O08.0*
- - - pendant la grossesse *O23.5*
- - lésion traumatique interne *S37.9*
- - masculins
- - - abcès *N49.9*
- - - accessoires *Q55.8*
- - - affection *N50.9*
- - - anomalie *Q55.9*
- - - atrésie interne *Q55.8*
- - - atrophie *N50.8*
- - - défaut de développement congénital *Q55.8*
- - - défaut d'occlusion congénital *Q55.8*
- - - externes
- - - - atrésie *Q55.8*
- - - - écrasement *S38.0*
- - - fibrose *N50.8*
- - - furoncle *N49.9*
- - - hématome *N50.1*
- - - hyperplasie *N50.8*
- - - hypertrophie *N50.8*
- - - hypoplasie *Q55.8*
- - - inflammation *N49.9*
- - - kyste
- - - - glande sébacée *N50.8*
- - - - peau *N50.8*
- - - malformation
- - - - acquise *N50.8*
- - - - congénitale NCA *Q55.9*
- - - malposition congénitale *Q55.8*
- - - mélanome in situ NCA *D03.8*
- - - naevus NCA *D29.9*
- - - problème *N50.9*
- - - thrombose *N50.1*
- - - ulcération aphteuse *N50.8*
- - - ulcère *N50.8*
- - maternels, traumatisme obstétrical *O71.9*
- - syphilis *A51.0*
- - - primaire *A51.0*
- - tuberculose *A18.1*
- polype, adénomateux, chez la femme *D28.9*
- prolapsus, chez la femme *N81.9*
- prurit *L29.3*
- réaction, insuffisance *F52.2*
- soormycose *B37.4*
- syphilis *A51.0*
- traumatisme *S39.9*
- tuberculose *A18.1*
- tumeur, adenomateuse, chez la femme *D28.9*
- varices
- - couche *O87.8*
- - lors de la grossesse *O22.1*

génito urinaire
- Douleur due à prothèse, implant et greffe de l ' appareil *T83.8*

génito urinaire *–suite*
- Embolie due à prothèse, implant et greffe de l ' appareil *T83.8*

Génitofémoral, syndrome du nerf *G57.8*

Génitosurrénalien, syndrome *E25.9*

Génotype AS, hémoglobine *D57.3*

genou après fusion arthrodèse Guérison retardé du *M96.82*

Genou *voir aussi* articulation du genou
- abcès *L02.4*
- - tuberculeux *A18.0+, M01.16**
- Anomalie *Q74.1*
- arthropathie *M25.96*
- arthrose déformante *M17.9*
- Baker, kyste de *M71.2*
- brûlures *T24.0*
- bursite NCA *M70.5*
- Caries *A18.0+, M01.16**
- chondromalacie, second degré *M22.4*
- Chondropathie *M23.89*
- contusion *S80.0*
- corrosion *T24.4*
- coussinet graisseux, hypertrophie *M79.46*
- déchirure
- - ménisque *M23.39*
- - ménisque, traumatique, récent *S83.2*
- écrasement *S87.0*
- Enthésopathie *M76.8*
- entorse NCA *S83.6*
- - Cartillage, semi-lunaire *S83.6*
- - ligament croisé *S83.50*
- - ligament latéral *S83.40*
- - - latérale *S83.41*
- - - médiale *S83.42*
- - - tibiale *S83.42*
- - tibiofibulaire, proximal NCA *S83.6*
- épanchement *M25.46*
- et fémur inférieur
- - lésion
- - - multiples *S89.7*
- - - superficielle, multiples *S80.7*
- - plaies, ouvertes, multiples *S81.7*
- extrorsum
- - congénital *Q68.2*
- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*
- furoncle *L02.4*
- gelure *T35.5*
- - avec nécrose, tissu *T34.7*
- - superficielle *T33.7*
- grinçante *M23.89*
- haletante *M23.89*
- hématome *S80.0*
- Hoffa, hypertrophie *M79.46*
- hypertrophie du ménisque, congénitale *Q74.1*
- infection cutanée NCA *L08.9*
- irritation *M23.99*
- kyste, intraligamentaire *M23.89*
- lésion *M23.99*
- - *S89.9*
- - multiples NCA *S83.7*
- - superficielle *S80.9*
- lésion NCA *M23.99*
- - récente *S83.2*
- - récidivante *M24.46*
- ligament
- - calcification *M23.83*

Genou *voir aussi* articulation du genou *–suite*
- ligament *–suite*
- - insuffisance *M23.89*
- ligament croisé, antérieur, déchirure *S83.53*
- ligament externe, déchirure
- - complète *S83.43*
- - partielle *S83.43*
- ligament interne, déchirure
- - complète *S83.44*
- - partielle *S83.44*
- ligament latéral
- - fibula
- - - déchirure
- - - - complète *S83.43*
- - - - partielle *S83.43*
- - - entorse *S83.41*
- - tibia, déchirure
- - - complète *S83.44*
- - - partielle *S83.44*
- ligament, déchirure
- - ancienne *M23.59*
- - spontanée *M23.59*
- Luxation *S83.10*
- - ancienne *M23.89*
- - congénitale *Q68.2*
- - pathologique *M24.36*
- malformation congénitale NCA *Q68.2*
- malformation, de naissance *Q74.1*
- mélanome, in situ *D03.7*
- mélanome, malin *C43.7*
- ménisque
- - déchirure longitudinale du ménisque *S83.2*
- - latéral, déchirure *S83.2*
- - lésion, avec lésion du ligament *S83.7*
- - lésions *M23.39*
- - Vestiges ou persistance *M23.39*
- ménisque, interne, déchirure *S83.2*
- ménisque, lésions, récidivantes *M24.46*
- naevus *D22.7*
- phlégnome *L03.11*
- plaie, ouverte *S81.0*
- rachitique *E64.3*
- rapide *M23.89*
- recurvatum *M21.86*
- - congénital *Q68.2*
- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*
- rupture, cartillage *S83.3*
- tendinite, capsule médiale *M76.8*
- tendinopathie *M76.8*
- ténosynovite *M65.96*
- ténovaginite *M65.96*
- trouble de la cicatrisation *T79.9*
- troubles *M23.99*
- - *M25.86*
- valgum *M21.06*
- - congénital *Q74.1*
- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*
- varum *M21.16*
- - congénital *Q74.1*
- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*

Géotrichose *B48.3*
- pulmonaire *B48.3*

Géphyrophobie *F40.2*

Gerbasi, syndrome de *D53.1*

Germes dentaires, déplacés *K01.0*

Germinoblastome *C83.2*
- diffus *C83.2*
- folliculaire *C82.1*

Germinome, testicules *C62.9*

Gerold-Baller, syndrome de [syndrome de *Q75.0*

Gérontoxon *H18.4*
- cornée *H18.4*

Gerstmann, syndrome de, de développement *F81.2*

Gestation, prolongement *O48*
- suivi, mère *O48*

gestationnel transitoire SAI Hypertension *O13*

Gestose EPH (prééclampsie) [oedème, prot *O14.9*

Gestose, prééclampsie *O14.9*
- EPH [Œdème, Protéinurie, Hypertonie] *O14.9*
- surajoutée *O11*
- tardive *O14.9*

Getzowa-Struma *D34*

Getzowa-Struma, postbranchial *D34*

GGS-R, déficit en glutathion-réductase, *D55.1*

Ghon, foyer de *A16.7*
- confirmé bactériologiquement *A15.7*
- confirmé histologiquement *A15.7*

Gianotti-Crosti, syndrome de *L44.4*

Giardia
- intestinalis
- - entraînant une diarrhée *A07.1*
- - entraînant une dysenterie *A07.1*
- lamblia
- - entraînant une colite *A07.1*
- - entraînant une diarrhée *A07.1*
- - entraînant une dysenterie *A07.1*
- - entraînant une entérite *A07.1*
- - entraînant une infestation *A07.1*

Giardiase [lambliase] *A07.1*

Gibbosité
- formation *M40.19*
- sur mal de Pott *A18.0+, M49.09**
- tuberculeuse *A18.0+, M49.09**

Gibert, maladie de *L42*

Gibraltar, fièvre de *A23.0*

Gierke, maladie de von- *E74.0*

Gigantisme *E22.0*
- *E34.4*
- à un hyperfonctionnement du lobe antérieur de l'hypophyse *E22.0*
- cas d'hyperactivité du lobe antérieur de l'hypophyse *E22.0*
- constitutionnel *E34.4*

Gilbert Meulengracht Syndrome de *E80.4*

Gilbert-Lereboullet, syndrome avec ictèr *E80.4*

Gilbert-Meulengracht, syndrome avec ictè *E80.4*

Gilchrist, maladie de *B40.9*

Gilles de la Tourette, maladie de *F95.2*

Gilles de la Tourette, syndrome de *F95.2*

Gingembre
- neuropathie *G62.2*
- paralysie *G62.2*

Gingivite *K05.1*

Gingivite –*suite*
- aiguë *K05.0*
- aphteuse *B00.2*
- avec angine de Plaut-Vincent *A69.1*
- chronique *K05.1*
- desquamative *K05.1*
- - chronique *K05.1*
- hyperplasique *K05.1*
- - chronique *K05.1*
- marginale *K05.1*
- pellagreuse *E52+, K93.8**
- - nécrosante aiguë *A69.1*
- pendant la grossesse *O99.6*
- simple *K05.1*
- - marginale *K05.1*
- - - chronique *K05.1*
- ulcéreuse *K05.1*
- - chronique *K05.1*
- ulcéronécrosante *A69.1*
- - aiguë *A69.1*

Gingivite Plaut-Vincent *A69.1*

Gingivoglossite *K14.0*

Gingivostomatite *K05.1*
- aphteuse *B00.2*
- herpétique *B00.2*
- ulcéro-nécrotique *A69.1*
- - aiguë *A69.1*

Giomes sterno-cellulaire *C71.9*

Glabelle, mélanome malin *C43.3*

Gland
- catarrhe *N48.1*
- inflammation *- voir* Balanite *N48.1*

Gland du pénis (affecté par)
- anomalie *Q55.6*
- bifidité *Q55.6*
- candidose *B37.4+, N51.2**
- érosion *N48.1*
- fibrome *D29.0*
- infection NCA *N48.2*
- inflammation *N48.1*

Glande
- affectée par une tuberculose surrénalienne *A18.7+, E35.1**
- apocrine, mammaire, métaplasie *N60.8*
- bulbo-urétrales affectées par une inflammation *N34.2*
- cervicales de l'utérus affectées par une inflammation *N72*
- Cowper, adénite *N34.2*
- dysfonctionnement *E34.9*
- ectopique, avec sécrétion d'hormones *E34.2*
- endocrine
- - aberration NCA *Q89.2*
- - absence
- - - acquise NCA *E89.9*
- - - congénitale, NCA *Q89.2*
- - accessoire NCA *Q89.2*
- - agénésie NCA *Q89.2*
- - anomalie NCA *Q89.2*
- - carcinoma in situ *D09.3*
- - déformation NCA *Q89.2*
- - hypoplasie NCA *Q89.2*
- - maladie NCA *E34.9*
- - position, anomalie, congénitale NCA *Q89.2*
- - tuberculose NCA *A18.8+, E35.8**

Glande –*suite*
- enflée *R59.9*
- - due à une affection, par VIH *B23.8, R59.9*
- fièvre *B27.9*
- - mononucléose infectieuse *B27.0*
- gonflement *R59.9*
- héréditaire, dominante (de Doyne) *H35.5*
- iguinale
- - gonflement *R59.0*
- - inflammation, chronique *I88.1*
- - maladie *D75.9*
- inflammation *I88.9*
- kyste *K11.6*
- lacrymale, kyste *H04.1*
- lacrymales
- - abcès *H04.0*
- - adénome, pléomorphe *D31.5*
- - affection *H04.1*
- - atrophie *H04.1*
- - brûlure *T26.3*
- - contusion *S05.8*
- - corps étranger *T15.8*
- - corrosion *T26.8*
- - et canal lacrymal, tumeur, maligne *C69.5*
- - fistule *H04.6*
- - formation de calculs *H04.5*
- - furoncle *H04.0*
- - hypersécrétion *H04.2*
- - hypertrophie, chronique *H04.0*
- - infection *H04.0*
- - inflammation *H04.0*
- - insuffisance *H04.1*
- - kyste *H04.1*
- - lésion *S05.8*
- - luxation *H04.1*
- - mélanome in situ *D03.8*
- - mélanome, malin *C69.5*
- - nævus *D31.5*
- - syphilis *A52.7+, H06.0**
- - tumeur, évolution inconnue *D48.7*
- macula *H35.3*
- macula, dégénérative *H35.3*
- mammaire *- voir* Sein
- - adénofibrose *N60.2*
- - condensation *N63*
- - féminin, tumeur maligne *C50.9*
- - fibro-adénose *N60.2*
- - - chronique *N60.2*
- - - diffuse *N60.2*
- - - kystique *N60.2*
- - - périodique *N60.2*
- - - segmentaire *N60.2*
- - homme, tumeur maligne *C50.9*
- - hypertrophie *N62*
- - involution kystique *N60.8*
- - kyste, canal excréteur sébacé *N60.8*
- - nodule NCA *N63*
- - papillomatose kystique *N60.1*
- Meibomius
- - abcès *H00.0*
- - inflammation *H00.0*
- - kyste *H00.1*
- - orgelet *H00.0*
- Moll, de
- - inflammation *H00.0*
- - kyste *H02.8*

Glande –*suite*

- papille *H47.3*
- papille optique *H47.3*
- papille, congénitale *Q14.2*
- parathyroïdes
- para-urétrale, inflammation *N34.2*
- parotide entraînant un cancer *C07*
- paupière, carcinome *C44.1*
- pinéale
- -
- - calcification *E34.8*
- - dégénérescence *E34.8*
- - Épiphyse Dysfonctionnement de la *E34.8*
- - kyste *E34.8*
- - maladie *E34.8*
- - surinfection *E34.8*
- - tumeur
- - - évolution imprévisible ou inconnu : Epiphyse [*D44.5*
- - - malign : Epiphyse [*C75.3*
- - tumeur, précoce avec la puberté *E34.8*
- rétine *H35.3*
- salivaire
- - abcès *K11.3*
- - absence congénitale *Q38.4*
- - accessoire *Q38.4*
- - adénite *K11.2*
- - adénome *D11.9*
- - agénésie *Q38.4*
- - atrésie *Q38.4*
- - atrophie *K11.0*
- - blessure *S09.9*
- - calcul salivaire *K11.5*
- - déplacement congénital *Q38.4*
- - fistule *K11.4*
- - - congénitale *Q38.4*
- - hypersécrétion *K11.7*
- - hypertrophie *K11.1*
- - - congénitale *Q38.4*
- - hyposécrétion *K11.7*
- - infection *K11.2*
- - - due à un virus *B25.9*
- - inflammation *K11.2*
- - infractus *K11.8*
- - involution *K11.0*
- - kyste *K11.6*
- - - congénital *Q38.4*
- - kyste de rétention *K11.6*
- - - muqueux *K11.6*
- - kyste d'extravasation *K11.6*
- - - muqueux *K11.6*
- - lésion *K11.9*
- - - lympho-épithéliale bénigne *K11.8*
- - lipomatose *K11.0*
- - lymphangiome *D18.18*
- - maladie *K11.9*
- - - cas de maladie par VIH *B23.8, K11.9*
- - - corps d'inclusion *B25.9*
- - malformation
- - - acquise *K11.8*
- - - congénitale *Q38.4*
- - manque de sécrétion *K11.7*
- - mélanome in situ *D03.8*
- - mucocèle *K11.6*
- - plaie ouverte *S01.59*
- - rétrécissement *K11.8*
- - suppuration *K11.2*

Glande –*suite*

- salivaire –*suite*

- - trouble de la sécrétion *K11.7*
- - tuberculose *A18.8+, K93.8**
- - tumeur mixte *D37.0*
- salivaire parotide - *voir* parotide
- salivaires, tumeur mixte *D37.0*
- sébacée
- - adénocarcinome *C44.9*
- - adénome *D23.9*
- - Anomalie *Q82.9*
- - bouche, abérration, congénitale *Q38.6*
- - épithélium *D23.9*
- - hyperplasie *L73.8*
- - inflammation *H00.0*
- - kyste *L72.1*
- - - lèvres
- - - - grandes lèvres *N90.7*
- - - - petites lèvres *N90.7*
- - - organes génitaux
- - - - féminins *N94.8*
- - - - masculins *N50.8*
- - - pénis *N48.8*
- - - scrotum *L72.8*
- - - thorax *N60.8*
- - maladie *L73.9*
- - orgelet *H00.0*
- - tumeur* *L72.1*
- sébacée, inflammation *L73.8*
- sébacées, kyste *L72.1*
- - glandes mammaires *N60.8*
- sous-linguales
- - déplacement, congénital *Q38.4*
- - hypertrophie *K11.1*
- - - congénitale *Q38.4*
- - kyste *K11.6*
- sous-linguales, déplacement, congénital *Q38.4*
- sous-mandibulaire
- - affectée par un kyste *K11.6*
- - affectée par une adénite purulente *K11.2*
- - affectée par une atrophie *K11.0*
- - affectée par une inflammation *K11.2*
- sousmaxillaire
- - Agénésie *Q38.4*
- - anomalie *Q38.4*
- - difformité congénitale *Q38.4*
- - fistule *K11.4*
- - - congénitale *Q38.4*
- - hypertrophie *K11.1*
- - kyste *K11.6*
- - obstruction *K11.8*
- - surnuméraires *Q38.4*
- - tissu
- - - Fasciite *Q38.6*
- - - gorge, musculature *Q38.6*
- - - noeuds lymphatiques *Q38.6*
- sublinguale
- - affectée par un calcul *K11.5*
- - affectée par un kyste *K11.6*
- - affectée par une adénite purulente *K11.2*
- - affectée par une atrophie *K11.0*
- - affectée par une fistule *K11.4*
- - - congénitale *Q38.4*
- sublinguale, abcès *K11.3*
- submandibulaire, abcès *K11.3*

Glande –*suite*

- sudoripares
- - abcès *L74.8*
- - adénocarcinome *C44.9*
- - adénome, néoplasme bénin *D23.9*
- - affection, NCA *L74.9*
- - inflammation *L73.2*
- - kyste *L74.8*
- - maladie *L74.9*
- - - apocrine *L75.9*
- - - eccrine *L74.9*
- - troubles *L74.9*
- - tumeur *D48.5*
- thyroïde
- - abcès *E06.0*
- - aberrance *Q89.2*
- - absence
- - - acquise *E89.0*
- - - congénitale *E03.1*
- - adénocarcinome
- - - folliculaire *C73*
- - - sclérosant, non encapsulé *C73*
- - adénome *D34*
- - - autonome *D34*
- - - - compensé *D34*
- - - - décompensé *D34*
- - affection *E07.9*
- - agénésie *E03.1*
- - amyloïdose *E85.4*
- - angiosarcome *C73*
- - anomalie *Q89.2*
- - anomalie de la fonction thyroïdienne, néonatale, transitoire NCA *P72.2*
- - anomalie de position *Q89.2*
- - aplasie *E03.1*
- - - avec myxœdème *E03.1*
- - atrophie *E03.4*
- - - acquise *E03.4*
- - - avec crétinisme *E03.1*
- - - congénitale *E03.1*
- - autonomie
- - - cas de goitre *E04.9*
- - - - avec hyperthyréose *E05.2*
- - - multifocale, en cas de goitre, avec hyperthyréose *E05.2*
- - base de la langue *Q89.2*
- - carcinome *C73*
- - - anaplasique *C73*
- - - folliculaire *C73*
- - - médullaire *C73*
- - - papillaire *C73*
- - - parafolliculaire *C73*
- - crise *E05.5*
- - dégénérescence *E07.8*
- - dysfonctionnement *E07.9*
- - - complications, durant la grossesse *O99.2*
- - - fonction *E07.9*
- - - - avec exophtalmie *E05.0+, H06.2**
- - - - cours de la grossesse *O99.2*
- - - lié à une carence en iode *E01.8*
- - fistule *E07.8*
- - gangrène *E07.8*
- - grossissement *E04.9*
- - - endémique *E01.2*
- - - sporadique *E04.9*
- - hémorragie *E07.8*
- - hyperactivité *E05.9*
- - hyperplasie *E04.9*

Glande –*suite*
- thyroïde –*suite*
- - hyperplasie des cellules C *E07.0*
- - hyperthyroïdie *E05.9*
- - hypertrophie *E04.9*
- - hypoplasie *E03.1*
- - hypothyroïdie *E03.9*
- - - acquise *E03.9*
- - - congénitale *E03.1*
- - - congénitale, avec ictère, néonatal *E03.1*
- - infection due à des échinocoques granuleux *B67.3+, E35.0**
- - inferctus *E07.8*
- - - cas de saignements *E07.8*
- - inflammation *E06.9*
- - insuffisance *E03.9*
- - - acquise *E03.9*
- - - congénitale *E03.1*
- - kyste *E04.1*
- - kystique, adénomateux *E04.2*
- - - endémique *E01.1*
- - - sporadique *E04.2*
- - lésions traumatiques NCA *S19.8*
- - lipome *D17.7*
- - maladie *E07.9*
- - - dans l'anamnèse personnelle *Z86.3*
- - - examen de dépistage *Z13.8*
- - malformation, congénitale *Q89.2*
- - métastase *C79.88*
- - néoplasie *D44.0*
- - nodosités *E04.1*
- - - cas de hyperthyréose *E05.1*
- - - kystique *E04.1*
- - - non toxique *E04.9*
- - - - solitaire *E04.1*
- - - solitaire, en cas de thyréotoxicose *E05.1*
- - papillome *D34*
- - plaie ouverte *S11.1*
- - résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.6*
- - rétrosternale *Q89.2*
- - sous-sternale *E04.9*
- - - congénitale *Q89.2*
- - suppuration *E06.0*
- - surnuméraire *Q89.2*
- - syphilis tardive *A52.7+, E35.0**
- - tératome *D44.0*
- - tuberculose *A18.8+, E35.0**
- - tumeur *D44.0*
- - - sclérosante, non encapsulée *C73*
- tissu, ectopique, avec sécrétion hormonale NCA *E34.2*
- urétrales affectées par un abcès gonococcique *A54.1*
- vulvo-vaginale
- - abcès *N75.1*
- - - couche *O86.1*
- - kyste *N90.7*
- Zeis
- - infection *H00.0*
- - inflammation *H00.0*
- - orgelet *H00.0*

Glandulaire (Adj.)
- chéilite *K13.0*
- éléphantiasis *I89.0*
- hyperplasie
- - endométriale *N85.0*

Glandulaire (Adj.) –*suite*
- hyperplasie –*suite*
- - mammaire *N62*
- hypertrophie endométriale *N85.0*
- hypospadias *Q54.0*
- insuffisance *E31.9*
- obésité *E66.89*

Glanzmann-Naegeli, maladie [thrombopathi *D69.1*

Glaucome *H40.9*
- absolu *H44.5*
- aigu *H40.2*
- angle étroit *H40.2*
- - aigu *H40.2*
- - - résiduel *H40.2*
- - avec configuration iris plateau *H40.2*
- - chronique *H40.2*
- - - résiduel *H40.2*
- - configuration d'iris plateau *H40.2*
- - intermittent *H40.2*
- - - résiduel *H40.2*
- - primitif *H40.2*
- - - aigu *H40.2*
- - - - résiduel *H40.2*
- - - chronique *H40.2*
- - - - résiduel *H40.2*
- - - intermittent *H40.2*
- - - - résiduel *H40.2*
- - - retardé *H40.2*
- - - - résiduel *H40.2*
- - récidivant *H40.2*
- - récurrent (récidivant) *H40.2*
- - retardé *H40.2*
- angle étroit, primitif *H40.2*
- - aigu *H40.2*
- - récidive *H40.2*
- angle fermé *H40.2*
- angle fermé, primitif *H40.2*
- - aigu *H40.2*
- - récurrent (récidivant) *H40.2*
- angle ouvert *H40.1*
- - primitif *H40.1*
- angle ouvert, primaire *H40.1*
- aphakie *H40.5*
- avec pseudo-exfoliation cristallinienne *H40.1*
- basse tension *H40.1*
- capsulaire *H40.1*
- capsulaire, avec pseudo-exfoliation, cristallin *H40.1*
- cellule fantôme *H40.5*
- chronique *H40.1*
- - primitive *H40.1*
- chronique non congestif *H40.1*
- congénital *Q15.0*
- - avec macrophtalmie *Q15.0*
- dispersion pigmentaire *H40.1*
- hémorragique *H40.5*
- - postopératoires *H40.8*
- - traumatique *H40.3*
- infantile *Q15.0*
- juvénile *Q15.0*
- limite *H40.0*
- lors
- - amylose *E85.9+, H42.0**
- - Aniridie *Q13.1+, H42.8**
- - cataracte *H40.5*
- - cataracte hypermature *H40.5*

Glaucome –*suite*
- lors –*suite*
- - dislocation, cristallin *H40.5*
- - d'une affection
- - - cristallin, NCA *H40.5*
- - - oculaire NCA *H40.5*
- - iridocyclite *H40.4*
- - kératoglobus, congénital *Q15.0*
- - macrocornée *Q15.0*
- - maladie métabolique NCA *E88.9+, H42.0**
- - maladie, endocrinienne NCA *E34.9+, H42.0**
- - obturation, veine de la rétine *H40.5*
- - processus papillaire *H40.5*
- - rubéose irienne *H40.5*
- - syndrome de Lowe *E72.0+, H42.0**
- - syndrome de Rieger *Q13.8+, H42.8**
- - tumeur, globe oculaire *H40.5*
- malin *H40.2*
- membrane capsulaire *H40.1*
- néovasculaire *H40.5*
- - avec rétinopathie diabétique *E14.30+, H36.0**
- - - avec
- - - - diabète de type 1 *E10.30+, H36.0**
- - - - diabète de type 2 *E11.30+, H36.0**
- - suite à une thrombose, veine centrale *H40.5*
- néo-vasculaire *H40.5*
- - après thrombose, veine centrale *H40.5*
- nouveau-né *Q15.0*
- obstructif *H40.2*
- - avec affection du cristallin *H40.5*
- par
- - administration de médicaments *H40.6*
- - contusion oculaire *H40.3*
- - cortisone *H40.6*
- - hypersécrétion *H40.8*
- - hypersécrétion de l'humeur aqueuse *H40.8*
- phacomatose *H40.5*
- phakolytique *H40.5*
- pigmentaire *H40.1*
- - primitif, résiduel *H40.1*
- - résiduel *H40.1*
- postinfectieux *H40.4*
- primitif
- - capsulaire
- - - avec pseudo-exfoliation cristallinienne *H40.1*
- - - résiduel, avec pseudo-exfoliation cristalinienne *H40.1*
- - congénital *Q15.0*
- - infantile *Q15.0*
- primitif, à angle ouvert *H40.1*
- provoqué par corticostéroïdes *H40.6*
- pseudo-exfoliation *H40.1*
- sans augmentation de la tension *H40.1*
- screening *Z13.5*
- secondaire à une subluxation du cristallin *H40.5*
- secondaire, NCA *H40.5*
- - aigu, NCA *H40.5*
- - après
- - - contusion, globe *H40.3*
- - - lésion de l'angle irido-cornéen *H40.3*
- - - traumatisme oculaire *H40.3*
- - lentogène *H40.5*
- - médicamenteux *H40.6*

Glaucome –*suite*
- secondaire, NCA –*suite*
- - post-opératoire, provoqué par substance médicamenteuse, intra-oculaire *H40.6*
- - post-traumatique *H40.3*
- - suite à
- - - augmentation de la pression veineuse, épisclérale *H40.8*
- - - Cyclite hétérochromie de Fuchs *H40.4*
- - - Dystrophie, irido-cornéo-enthéliale (Syndrome ICE) *H40.5*
- - - hémorragie
- - - - non-traumatique *H40.5*
- - - - postopératoire *H40.8*
- - - - traumatique *H40.3*
- - - inflammation de l'oeil *H40.4*
- - - iritis *H40.4*
- - - kératite *H40.4*
- - - mydriase thérapeutique
- - - - localisée *H40.6*
- - - - systémique *H40.6*
- - - Seclusio pupillae *H40.5*
- - - synéchie antérieure, posttraumatique *H40.3*
- - - thérapie stéroïde
- - - - localisée *H40.6*
- - - - systémique *H40.6*
- - - tumeur oculaire *H40.5*
- simple *H40.1*
- stoppé par traitement médicamenteux, avec augmentation de la tension *H40.9*
- subluxation du cristallin *H40.5*
- suspect *H40.0*
- - suite à
- - - analyse des papilles *H40.0*
- - - défaillance, champ visuel *H40.0*
- - - défaut, couche des fibres nerveuses de la rétine *H40.0*
- suspicion *H40.0*
- syphilitique *A52.7+, H42.8**
- tension basse *H40.1*
- tension normale *H40.1*
- traumatique *H40.3*
- - par des lésions obstétricales *P15.3*
- tuberculeux *A18.5+, H42.8**

Glioblastome *C71.9*
- avec composants sarcomateux *C71.9*
- cellules géantes *C71.9*
- céphalique *C71.9*
- épendymal *C71.9*
- multiforme *C71.9*
- système nerveux *C72.9*

Gliocytome *C71.9*

Gliomatose cérébrale *C71.0*

Gliome *C71.9*
- adénome [adéno-] *C71.9*
- astrocytaire *C71.9*
- astrogliome [astro-] *C71.9*
- cellules amiboïdes *C71.9*
- cellules arachnoïdiennes *C71.9*
- cellules stellaires *C71.9*
- cérébral *C71.9*
- cerveau *C71.9*
- - malin *C71.9*
- cervelet, malin *C71.6*
- corps calleux *C71.0*
- diffus *C71.9*

Gliome –*suite*
- dur *C71.9*
- épendymome [épendymo-] *C71.9*
- épithélium olfactif *C71.9*
- malin *C71.9*
- mésencéphale *C71.9*
- microcellulaire *C71.9*
- micro-cellulaire *C71.9*
- mixte *C71.9*
- multiforme *C71.9*
- nasal *Q30.8*
- nerf optique *D33.3*
- oeil, malin *C69.9*
- oligodendrogliome [oligodendro-] *C71.9*
- - cérébral *C71.0*
- optique, nerf (IIe paire) *D33.3*
- papillon *C71.9*
- périphérique *D36.1*
- petites cellules rondes *C71.9*
- polymorphe *C71.9*
- pseudogliome [pseudo-] *H44.8*
- rétinien *C69.2*
- sarcomateux *C71.9*
- sous-épendymaire *D43.2*
- tronc cérébral *C71.7*

Gliosarcome *C71.9*

Gliose *G93.88*
- cérébrale *G93.88*
- épirétinienne *H35.3*
- rachidienne *G95.88*

Gliose épirétinienne *H35.3*

Glissement
- articulation sacro-iliaque *M53.28*
- épiphyse, fémur, supérieur *M93.0*
- nerf ulnaire, non-traumatique *G56.2*
- rotule *M22.3*

Glissement de la ligature ombilicale *P51.8*
- avec hémorragie *P51.8*

glissement épiphysaire *M93.9*
- traumatique *M93.9*

Glisson, maladie de *E55.0*

Global(e)
- amnésie transitoire *G45.49*
- aphasie *R47.0*
- insuffisance
- - cardiaque *I50.01*
- - glomérulo-tubulaire *N19*
- - rénale *N19*
- - respiratoire *J96.9*

Globe *F45.8*
- hystérique *F45.8*
- kératoglobe [kérato-] *H18.7*
- nerveux *F45.8*
- oculaire *D31.9*
- oculaire, rétraction *H50.8*

Globe oculaire
- absence
- - acquise *Z90.0*
- - congénitale *Q11.1*
- adhérence *H44.8*
- affection *H44.9*
- arrachement *S05.7*
- atrophie *H44.5*
- capsule, ténonite *H05.0*
- contusion *S05.1*

Globe oculaire –*suite*
- corps étranger *T15.8*
- - avec plaie, pénétrante *S05.5*
- - magnétique, intraoculaire, ancien *H44.6*
- - rétention *H44.7*
- dégénérescence *H44.5*
- déplacement *H05.2*
- - congénital *Q15.8*
- - latéral *H05.2*
- fistule *H44.4*
- hémorragie *H44.8*
- hypertension *H40.0*
- irritation, sympathique *H44.1*
- lacération
- - avec
- - - perte de tissu, intra-oculaire *S05.2*
- - - protrusion de tissu intra-oculaire *S05.2*
- - pénétrante *S05.6*
- - sans prolapsus *S05.3*
- lésion *S05.9*
- - pénétrante *S05.6*
- - - avec
- - - - perte de tissu, intra-oculaire *S05.2*
- - - - protrusion de tissu intra-oculaire *S05.2*
- - perforante *S05.6*
- - - sans corps étranger *S05.6*
- - superficielle NCA *S05.8*
- luxation *H44.8*
- luxation, non-traumatique *H44.8*
- malformation
- - acquise *H44.8*
- - congénitale *Q15.8*
- paroi interne, corps étranger, rétention *H44.7*
- paroi postérieure, corps étranger intra-oculaire ancien
- - magnétique *H44.6*
- - non magnétique *H44.7*
- phtisie, due à une infection *H44.5*
- prolapsus, non traumatique *H44.8*
- rupture *S05.3*
- - et
- - - destruction, en cas de brulure, oeil *T26.2*
- - - destruction, en cas de corrosion, oeil *T26.7*
- sidérose *H44.3*
- tumeur, avec glaucome *H40.5*

Globe sphérique de la dentine [denticule *K04.2*

Globoïde, leucodystrophie *E75.2*

Globules sanguins
- blancs
- - anomalie NCA *R72*
- - maladie NCA *D72.9*
- rouge, hypochromie *D50.8*

Globuline
- anormale *R77.1*
- antihémophilique, déficit NCA *D66*
- liant le cortisol, anomalie *E27.8*

Globulo-maxillaire/kyste *K09.1*

Glomangiomateux, sarcome *C49.9*

Glomangiome *D18.00*

Glomangiomyome *D18.00*

Glomérulaire (Adj.) - *voir* Type de malad

Glomérulaire, cellules de type glomérulé *D35.0*

Glomérule, lésion des glomérules *N00.0*

Glomérulite *N05.9*
- aiguë *N00.9*
- focale *N05.1*
- nécrosante *N05.8*
- subaiguë *N05.9*

Glomérulohyalinose extra-capillaire des *E14.20+, N08.3**
- entraînant
- - diabète sucré de type 1 *E10.20+, N08.3**
- - diabète sucré de type 2 *E11.20+, N08.3**

Glomérulonéphrite *N05.9*
- aiguë *N00.9*
- - post-streptococcique NCA *N00.9*
- avec
- - formation de croissants, diffuse (entraînant)
- - - hématurie
- - - - persistante *N02.7*
- - - - récidivante *N02.7*
- - - protéinurie isolée *N06.7*
- - - syndrome
- - - - néphritique
- - - - - aigu, *N00.7*
- - - - - d'évolution rapide, *N01.7*
- - - - néphrotique *N04.7*
- - oedème *N04.9*
- chronique *N03.9*
- - post-streptococcique NCA *N03.9*
- complexes immuns NCA *N05.8*
- d'évolution rapide *N01.9*
- - post-streptococcique NCA *N01.9*
- diabétique *E14.20+, N08.3**
- - entraînant
- - - diabète sucré de type 1 *E10.20+, N08.3**
- - - diabète sucré de type 2 *E11.20+, N08.3**
- entraînant
- - amylose *E85.9+, N08.4**
- - angéite granulomateuse de Wegener *M31.3+, N08.5**
- - coagulation intravasculaire disséminée *D65.1+, N08.2**
- - cryoglobulinémie *D89.1+, N08.2**
- - déficit en lécithine-cholestérol-acyl-transférase *E78.6+, N08.4**
- - drépanocytose *D57.8+, N08.2**
- - endocardite bactérienne subaiguë *I33.0+, N08.0**
- - infection à cytomégalovirus *B25.88+, N08.0**
- - lupus erythémateux disséminé *M32.1+, N08.5**
- - macroglobulinémie de Waldenström *C88.00+, N08.1**
- - maladie de Fabry-Anderson *E75.2+, N08.4**
- - myélome multiple *C90.00+, N08.1**
- - périartérite noueuse *M30.0+, N08.5**
- - purpura
- - - Henoch-Schönlein, de *D69.0+, N08.2**
- - - thrombotique thrombocytopénique *M31.1+, N08.5**
- - septicémie *A41.9+, N08.0**
- - strongyloïdose *B78.9+, N08.0**

Glomérulonéphrite *–suite*
- entraînant *–suite*
- - syndrome de défibrination *D65.9+, N08.2**
- - syndrome de Goodpasture *M31.0+, N08.5**
- - syndrome hémolytique-urémique *D59.3+, N08.2**
- focale
- - prolifératives *N05.1*
- - sclérosante *N05.1*
- hémorragique *N00.9*
- intercapillaire *N05.8*
- lésions minimes *N05.0*
- membraneuse *N05.2*
- - chronique *N03.2*
- - diffuse (entraînant)
- - - hématurie
- - - - persistante *N02.2*
- - - - récidivante *N02.2*
- - - protéinurie isolée *N06.2*
- - - syndrome
- - - - néphritique
- - - - - aigu, *N00.2*
- - - - - d'évolution rapide, *N01.2*
- - - - - chronique, *N03.2*
- - - - néphrotique *N04.2*
- - prolifératives chronique *N03.5*
- membrano-proliférative *N05.5*
- mésangio-capillaire diffuse (entraînant)
- - hématurie
- - - persistante *N02.5*
- - - récidivante *N02.5*
- - protéinurie isolée *N06.5*
- - syndrome
- - - néphritique
- - - - aigu *N00.5*
- - - - d'évolution rapide *N01.5*
- - - néphrotique *N04.5*
- mésangio-proliférative diffuse *N00.3*
- - entraînant
- - - hématurie
- - - - persistante *N02.3*
- - - - récidivante *N02.3*
- - - protéinurie isolée *N06.3*
- - - syndrome
- - - - néphritique
- - - - - aigu, *N00.3*
- - - - - d'évolution rapide, *N01.3*
- - - - - chronique, *N03.3*
- - - - néphrotique *N04.3*
- minima *N05.0*
- minimal change *N05.0*
- nécrosante *N05.8*
- post-streptococcique NCA *N05.9*
- - aiguë NCA *N00.9*
- - chronique NCA *N03.9*
- - d'évolution rapide *N01.9*
- progressive *N05.9*
- - aiguë *N00.7*
- - avec néphrite *N05.7*
- - chronique *N03.7*
- prolifération endocapillaire diffuse, entraînant
- - hématurie
- - - persistante *N02.4*
- - - récidivante *N02.4*
- - protéinurie isolée *N06.4*
- - syndrome

Glomérulonéphrite *–suite*
- prolifération endocapillaire diffuse, entraînant *–suite*
- - syndrome *–suite*
- - - néphritique
- - - - aigu *N00.4*
- - - - chronique *N03.4*
- - - - d'évolution rapide *N01.4*
- - - néphrotique *N04.4*
- prolifération extracapillaire *N05.8*
- proliférative *N05.8*
- - aiguë *N00.8*
- - chronique *N03.5*
- - - *N03.8*
- - diffuse NCA *M32.1+, N08.5**
- provoquée par
- - Cytomégalovirus *B25.88+, N08.0**
- - plasmodium malariae *B52.0+, N08.0**
- sclérosant diffus *N18*
- sclérosante *N18.9*
- - diffuse *N18.9*
- streptocoques NCA *N05.9*
- - aigues NCA *N00.9*
- - chroniques NCA *N03.9*
- - évolution rapide et progressive *N01.9*

Glomérulonéphrite proliférative endocapi
- Hématurie
- - persistante *N02.4*
- - récidivante *N02.4*
- Protéinurie isolée *N06.4*
- Syndrome
- - néphritique
- - - aigu *N00.4*
- - - chronique *N03.4*
- - - d'évolution rapide *N01.4*
- - néphrotique *N04.4*

Glomérulo-néphritique, lésion sclérosant *N18.9*

Glomérulonéphrose *N04.9*

Glomérulopathie *N05.9*
- idiopathique membraneuse *N05.2*
- membraneuse *N05.2*

Glomérulosclérose *N26*
- diabétique *E14.20+, N08.3**
- - entraînant
- - - diabète sucré de type 1 *E10.20+, N08.3**
- - - diabète sucré de type 2 *E11.20+, N08.3**
- diabétique, prolifération extracapillaire *E14.20+, N08.3**
- - entraînant
- - - diabète sucré de type 1 *E10.20+, N08.3**
- - - diabète sucré de type 2 *E11.20+, N08.3**
- focale *N05.1*
- intercapillaire *E14.20+, N08.3**

Glomérulotubulaire, insuffisance globale *N19*

Glomique, angiosarcome *C49.9*

Glomique, tumeur *D18.00*

Glomus
- aortique
- - paragangliome *D44.7*
- - - malin *C75.5*
- - tumoral *D44.7*
- carotidien

Glomus *–suite*
- carotidien *–suite*
- - paragangliome *D44.6*
- - tumoral *D44.6*
- jugulaire
- - paragangliome *D44.7*
- - tumoral *D44.7*
- tympanique atteinte d'une tumeur *D44.7*

Glossite *K14.0*
- atrophique *K14.4*
- entraînant
- - anémie pernicieuse *D51.0*
- - candidose *B37.0*
- - infection à cytomégalovirus *B25.88+, K93.8**
- - pellagre *E52+, K93.8**
- exfoliative
- - géographique *K14.1*
- - marginée *K14.1*
- exfoliative marginée *K14.1*
- exfoliative marginée migratoire *K14.1*
- gingivo-glossite [gingivo-] *K14.0*
- interstitielle sclérosante *K14.0*
- losangique médiane *K14.2*
- migratoire bénigne *K14.1*
- Möller-Hunter *K14.0*
- - atrophique *K14.4*
- - entraînant
- - - anémie pernicieuse *D51.0*
- - - carence en vitamine B *E53.9+, K93.8**
- mycosique *B37.0*
- provoquée par
- - Aspergillus *B44.8*
- - Candida *B37.0*
- - cytomégalovirus *B25.88+, K93.8**
- superficielle *K14.0*
- superficielle chronique *K14.0*

Glossodynie *K14.6*

Glossodynie exfoliatrice *K14.0*

Glossopathie *K14.9*

Glossopharynx, névralgie *G52.1*

Glossophytie *K14.3*

Glossoplégie *K14.8*

Glossopyrosis *K14.6*

Glossoschisis *Q38.3*

Glotte
- absence, congénitale *Q31.8*
- Agénésie *Q31.8*
- Anomalie *Q31.8*
- anomalie, position, congénitale *Q31.8*
- atrésie *Q31.8*
- hypoplasie *Q31.2*
- inflammation *J04.0*
- leucoplasie *J38.3*
- occlusion, absente *Q31.8*
- oedème *J38.4*
- - allergique *T78.3*
- - - héréditaire *D84.1*
- - obstructif, passif *J38.4*
- paralysie *J38.00*
- parésie *J38.00*
- spasme *J38.5*
- spasmes *J38.5*
- sténose *J38.6*
- sténose grave *J38.6*

Glotte *–suite*
- tuberculose *A16.4*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.5*
- ulcus *J38.7*

Glucagon
- hypersécrétion, en cas d'hyperplasie, cellules endocrines du pancréas *E16.3*
- sécrétion
- - anormale *E16.3*
- - élevée *E16.3*

Glucagonome *D13.7*
- malin *C25.4*
- pancréatique *D13.7*
- - malin *C25.4*

Glucides
- absorption, trouble *K90.4*
- intolérance *K90.4*
- - avec malabsorption *K90.4*
- malabsorption *K90.4*
- perte, en cas d'hyerémèse gravidique *O21.1*
- troubles du métabolisme *E74.9*
- - néonatal, transitoire *P70.9*

Glucocorticoïde
- effet secondaire *T88.7*
- intoxication, en cas d'indication topique *T49.8*

Glucocorticostéroïdes, intoxication *T38.0*

Glucoglycinurie *E72.5*

Gluconéogénèse, trouble *E74.4*

Glucose
- galactose, intolérance, congénitale *E74.3*
- galactose, malabsorption *E74.3*
- intolérance
- - anormal, lors de la grossesse *O99.8*
- - diminution *R73.0*
- - pathologique *R73.0*
- - troublée *R73.0*
- test de tolérance, anormal *R73.0*

Glucose-6-phosphate
- carence, avec affection des réserves en glycogène *E74.0*
- déshydrogénase (G6PD)
- - anémie, avec ictère, néonatal *D55.0*
- - carence
- - - antécédents familiaux *Z83.2*
- - - avec anémie *D55.0*
- - - - hémolytique, non sphérocytaire, congénitale *D55.0*
- déshydrogénase inactivité (G6PD-inactivité), avec anémie *D55.0*

Glutamine, acidurie *E72.3*

Glutamine, trouble du métabolisme *E72.8*

Glutathion, réductase, carence, avec ané *D55.1*

Glutathion, trouble du métabolisme, avec *D55.1*

Gluten
- allergie au *K90.0*
- entéropathie *K90.0*
- intolérance *K90.0*

Glutéthimide, dépendance *F13.2*

Glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase, *D55.2*

Glycérol, augmentation, examens chimique *R79.8*

Glycine, trouble du métabolisme *E72.5*

Glycinurie *E72.0*
- rénale *E72.0*

Glycogène
- carcinome *C50.9*
- formation, déficitaire *E74.0*
- infiltration *E74.0*
- - cardiaque *E74.0+, I43.1**
- - hépatique *E74.0+, K77.8**
- réserve de, maladie *E74.0*
- - avec
- - - cardiomégalie *E74.0+, I43.1**
- - - maladie, rénale, tubulo-interstitielle *E74.0+, N16.3**
- - - myopathie *E74.0+, G73.6**
- - - pyélonéphrite *E74.0+, N16.3**
- - avec carence, glucose-6-phosphatase *E74.0*
- - cardiaque *E74.0+, I43.1**
- - foie et reins *E74.0*
- - généralisée *E74.0*
- - hépato-rénale *E74.0*
- - myocarde *E74.0+, I43.1**
- rhabdomyome *D21.9*

Glycogénose *E74.0*
- avec cirrhose, foie *E74.0*
- cardiale *E74.0+, I43.1**
- diffuse *E74.0*
- généralisée *E74.0*

Glycol
- dermite de contact, toxique *L24.2*
- effet toxique *T52.3*

Glycol propylénique
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Glycolipide, lipidose à *E75.2*

Glycolyse, anaérobie, trouble, anémie *D55.2*

Glycolytique, enzyme
- carence, avec anémie *D55.2*
- troubles *E74.8*

Glycopénie *E16.2*

Glycopeptide antibiotique
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

glycopeptides
- Enterococcus
- - faecalis résistant au *U80.20!*
- - - au oxazolidinones ou hautement résistant au aminoglycosides et non résistant au *U80.21!*
- - faecium résistant au *U80.30!*
- - - au oxazolidinones ou au streptogramines ou hautement résistant au aminoglycosides et non résistant au *U80.31!*
- oxazolidinones streptogramines Enterococcus faecalis résistant au *U80.20!*
- - faecium résistant au *U80.30!*
- quinolones streptogramines oxazolidinoneset non résistant à l ' oxacilline ou à la méticilline , Staphylocoque doré résistant au *U80.01!*

Glycoprotéine
- désassimilation *E77.1*
- troubles du métabolisme *E77.9*

Glycosaminoglycane, trouble du métabolis *E76.9*

Glycosurie *E74.8*
- *R81*
- rénale *E74.8*

Glycuronyl-transférase, déficit *E80.5*

GMSI Gammapathie monoclonale signification indéterminé [*D47.2*

Gnathostoma spinigerum
- avec gonflement, migrant *B83.1*
- infection *B83.1*

Gnathostomiase *B83.1*

GnRH
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Goître *E04.9*
- à anomalie enzymatique *E07.1*
- adénomateux *E04.9*
- - avec
- - - hyperthyroïdie *E05.2*
- - - thyréotoxicose *E05.2*
- - avec hyperthyroïdie *E05.2*
- - endémique *E01.1*
- - non toxique *E04.9*
- - sporadique *E04.9*
- - toxique *E05.2*
- avec
- - autonomie
- - - multifocale, avec euthyroïdie *E04.2*
- - - thyroïdienne *E04.9*
- - - - avec hyperthyroïdie *E05.2*
- - - - multifocale, avec hyperthyroïdie *E05.2*
- - - unifocale, avec
- - - - euthyroïdie *E04.1*
- - - - hyperthyroïdie *E05.1*
- - Exophtalmie *E05.0+, H06.2**
- - hyperthyroïdie *E05.0*
- base de la bouche *Q89.2*
- Basedow, maladie de *E05.0*
- bénin *E04.9*
- carence en iode *E01.2*
- cas de thyréotoxicose *E05.0*
- cervical *E04.9*
- chez le nouveau né *P72.0*
- col vésical *N40*
- colloïde *E04.9*
- - endémique *E01.0*
- congénital *E03.0*
- - non toxique *E03.0*
- - parenchymateux *E03.0*
- - - non toxique *E03.0*
- - transitoire, avec fonction, normale, chez le nouveau né *P72.0*
- diffus *E04.0*
- - avec
- - - hyperthyroïdie *E05.0*
- - - hypothyroïdie congénitale *E03.0*
- - colloïde, non toxique *E04.0*
- - congénital *E03.0*
- - due à une carence en sodium *E01.0*
- - endémique *E01.0*
- - euthyroïdien *E04.0*
- - non toxique *E04.0*
- - sporadique *E04.0*
- - toxique *E05.0*
- due à un déficit enzymatique, en cas de de l'hormone thyroïdienne *E07.1*
- dyshormonal *E07.1*

Goître *–suite*
- dyshormonal *–suite*
- - familial *E07.1*
- endémique *E01.2*
- - due à une carence en sodium *E01.2*
- euthyroïdien *E04.9*
- exophtalmique *E05.0*
- familial, dyshormonal *E07.1*
- Getzowa, postbranchial *D34*
- Hashimoto *E06.3*
- hyperplasique *E04.9*
- - endémique *E01.2*
- - sporadique *E04.9*
- hyperthyroïdie, latent *E05.0*
- hypothyroïdie *E03.9*
- juvénil *E04.9*
- kystique *E04.2*
- - due à une carence en sodium *E01.1*
- - endémique *E01.1*
- - multinodulaire *E04.2*
- - sporadique *E04.2*
- Langhans *C73*
- lié à une carence en iode *E01.2*
- - diffus *E01.0*
- - multinodulaire *E01.1*
- lingual *Q89.2*
- lymphadénoïde *E06.3*
- lymphomateux *E06.3*
- malin *C73*
- mobile *E04.9*
- multinodulaire *E04.2*
- - cas de thyréotoxicose *E05.2*
- - due à une carence en sodium *E01.1*
- - endémique *E01.1*
- - kystique *E04.2*
- - non toxique *E04.2*
- - toxique *E05.2*
- néonatal *P72.0*
- néonatal NCA *P72.0*
- nodulaire *E04.9*
- - avec euthyroïdie *E04.9*
- - avec thyréotoxicose *E05.2*
- - cas de
- - - hyperthyroïdie *E05.2*
- - - thyréotoxicose *E05.2*
- - colloïde *E04.1*
- - diffus *E04.9*
- - due à une carence en sodium *E01.1*
- - endémique *E01.1*
- - endémique, non toxique *E01.1*
- - lié à une carence en iode *E01.1*
- - non toxique *E04.9*
- - sans thyrotoxicose *E04.2*
- - simple
- - - endémique *E01.1*
- - - sporadique *E04.9*
- - sporadique *E04.9*
- - toxique *E05.2*
- nodulaire, avec hyperthyroïdie *E05.2*
- nodules *E04.1*
- non toxique *E04.9*
- - congénital *E03.0*
- - multinodulaire *E04.2*
- - uninodulaire *E04.1*
- nouveau né *P72.0*
- ovarien *D27*
- - avec carcinoïdie *D39.1*
- - malin *C56*

Goître *–suite*
- ovarien avec carcinoïde *D39.1*
- parenchymateux *E04.9*
- - endémique *E01.2*
- - sporadique *E04.9*
- parenchymateux, congénital *E03.0*
- peau *E04.9*
- plongeant *E04.9*
- premier degré *E04.9*
- récidivant *E04.9*
- rein *C64*
- rétrosternal *E04.9*
- - avec limitation, trachée *E04.9*
- Riedel - *voir aussi* thyroïdite ligneuse *E06.5*
- second degré *E04.9*
- simple *E04.0*
- - endémique *E01.2*
- - non toxique *E04.0*
- - sporadique *E04.0*
- sous sternal *E04.9*
- sous-sternale *E04.9*
- toxique *E05.0*
- - *E05.9*
- - diffus *E05.0*
- - multinodulaire *E05.2*
- - uninodulaire *E05.1*
- transitoire, congénital, fonction normale *P72.0*
- troisième degré *E04.9*
- uninodulaire *E04.1*
- - cas de thyréotoxicose *E05.1*
- - due à une carence en sodium *E01.1*
- - non toxique *E04.1*
- - toxique *E05.1*
- uninodulaire, non toxique *E04.1*

Goldberg, Maxwell, syndrome de *E34.51*

Goldblatt
- hypertension *I70.1*
- hypertension rénovasculaire *I70.1*
- syndrome *I70.1*

Goldenhar, syndrome, dysplasie oculo-aur *Q87.0*

Goldflam-Erb-Oppenheim, syndrome de *G70.0*

Goldmann, spirale, champ visuel *H53.4*

Goldmann-Favre, syndrome de *H43.8*

Goldscheider, maladie de *Q81.8*

Golé-Touraine-Solente, syndrome de *M89.49*

Golf, bras, coude *M77.0*

Golf, coude *M77.0*

Gombault, neuropathie *G60.0*

Gomiome cérébral *C74.9*

Gomme *A52.7*
- amygdalienne *A52.7+, J99.8**
- artère *A52.0+, I79.8**
- artère cérébrale *A52.0+, I68.8**
- cerveau *A52.3*
- coeur *A52.0+, I52.0**
- congénitale *A50.5*
- corps ciliaire *A52.7+, H22.8**
- dans la syphilis tertiaire, paupière *A52.7+, H03.1**
- due à une syphilis congénitale *A50.5*
- foie *A52.7+, K77.0**
- hypophyse *A52.7+, E35.8**

Gomme –*suite*

- intracrânienne *A52.1+, G07**
- iris *A52.7+, H22.8**
- langue *A52.7+, K93.8**
- larynx *A52.7+, J99.8**
- leptoméninges *A52.1+, G07**
- méninges *A52.1+, G07**
- moelle épinière *A52.1+, G07**
- myocarde *A52.0+, I41.0**
- neurosyphilitique *A52.3+, G07**
- nez *A52.7+, J99.8**
- orbite *A52.7+, H06.3**
- os *A52.7+, M90.29**
- palais mou *A52.7+, K93.8**
- paupière *A52.7+, H03.1**
- peau *A52.7+, L99.8**
- péricarde *A52.0+, I32.0**
- pharynx *A52.7+, J99.8**
- queue de cheval *A52.1+, G07**
- rein *A52.7+, N29.0**
- rhinopharynx *A52.7+, J99.8**
- scrofuleuse *A18.4*
- syphilitique *A52.7*
- système cardiovasculaire *A52.0+, I98.0**
- système nerveux central *A52.3+, G07**
- - syphilitique *A52.3+, G07**
- trachéenne *A52.7+, J99.8**
- tuberculeuse *A18.4*
- ulcères pianiques *A66.4*
- uretère *A52.7+, N29.1**
- verge *A52.7+, N51.8**

Gomme adragante
- allergie [E 413] *T78.4*
- hypersensibilité [E 413] *T78.4*

Gonade
- Dysgénésie *Q96.9*
- - pure *Q99.1*
- trouble, en cas de pseudo-hermaphrodisme masculin *E29.9*

Gonadoblastome
- chez la femme *D39.1*
- chez l'homme *D40.1*

Gonadotropine, carence, isolée *E23.0*

Gonadotropine, résistant, ovaire, syndro *E28.3*

Gonalgie *M25.56*
- aigue *M25.56*

Gonarthrite *M13.16*
- gonorrhéique *A54.4+, M01.36**
- purulente* *M00.99*

Gonarthrose *M17.9*
- 1er degré *M17.9*
- 2-3 degré *M17.9*
- 3ème degré *M17.9*
- 4ème degré *M17.9*
- apparition *M17.9*
- bilatérale *M17.9*
- bilatérale, secondaire *M17.4*
- en valgus *M17.9*
- et arthrose, rétropatellaire *M17.9*
- fémoro-patellaire *M17.9*
- médiale *M17.9*
- périgonarthrose, début *M17.9*
- persistance malgré opération *M17.9*
- persistante, malgré une intervention *M17.9*

Gonarthrose –*suite*

- post-traumatique *M17.3*
- - bilatérale *M17.2*
- - unilatérale *M17.3*
- primaire *M17.1*
- - bilatérale *M17.0*
- - unilatérale *M17.1*
- second degré *M17.9*
- secondaire NCA *M17.5*
- secondaire, unilatérale *M17.5*
- valgus *M17.9*
- varus *M17.9*
- - et arthrose, fémoropatellaire *M17.9*

Gonflée
- ganglion lymphatique *R59.9*
- glande *R59.9*
- - cas de maladie due au VIH *B23.8, R59.9*
- jambe *R22.4*

Gonflement des jambes, chez la femme *R60.0*

Gongylonémose, infection *B83.8*

Goniome
- neurologique *C74.9*
- sympathique *C74.9*

Goniosynéchies *H21.5*

Gonite, gonorrhée *A54.4+, M01.36**

Gonococcie *A54.9*

Gonococcique
- arthrite *A54.4+, M01.39**
- bubon *A54.8*
- cystite *A54.0*
- endométrite *A54.2+, N74.3**
- épididymite *A54.2+, N51.1**
- ophtalmite chez le nouveau-né *A54.3+, H13.1**
- orchite
- - aiguë *A54.2+, N51.1**
- - chronique *A54.2+, N51.1**
- Pneumonie *A54.8†, J17.0**
- vaginite *A54.0+, N77.1**
- vulvite *A54.0+, N77.1**

Gonococcique - *voir* Type de maladie

Gonocoques
- abcès
- - encéphale *A54.8+, G07**
- - glande de Bartholin *A54.1*
- - glande urétrale *A54.1*
- - périurétral *A54.1*
- arthrite *A54.4+, M01.39**
- Bubon *A54.8*
- - blennoragique *A54.8*
- bursite *A54.4+, M73.09**
- cervicite *A54.0*
- conjonctivite *A54.3+, H13.1**
- contact *Z20.2*
- cystite *A54.0*
- endocardite *A54.8+, I39.8**
- épididymite *A54.2+, N51.1**
- hydrarthrose *A54.4+, M14.8**
- infection *A54.9*
- - aigue *A54.9*
- - bassin *A54.2*
- - chronique *A54.9*
- - lors de la grossesse *O98.2*
- - oeil *A54.3*

Gonocoques –*suite*
- infection –*suite*

- - vessie et organes génitaux, inférieurs *A54.0*
- inflammation
- - bassin, femme *A54.2+, N74.3**
- - tissu cellulaire NCA *A54.8*
- iridocyclite *A54.3+, H22.0**
- iris *A54.3+, H22.0**
- kératose *A54.8+, L86**
- lésion cutanée *A54.8*
- maladie, endocarde *A54.8+, I39.8**
- méningite *A54.8+, G01**
- myocardite *A54.8+, I41.0**
- ophtalmie, nouveau-né *A54.3+, H13.1**
- orchite *A54.2+, N51.1**
- ostéomyélite *A54.4+, M90.29**
- pelvi-péritonite *A54.2*
- péricardite *A54.8+, I32.0**
- péritonite *A54.8+, K67.1**
- pharyngite *A54.5*
- pneumonie *A54.8+, J17.0**
- proctite *A54.6*
- prostatite *A54.2+, N51.0**
- septicémie *A54.8*
- spondylite *A54.4+, M49.39**
- Synovite *A54.4+, M68.09**
- ténosynovite *A54.4+, M68.09**
- urétrite *A54.0*
- vulvovaginite *A54.0+, N77.1**
- - avec abcès *A54.1*

Gonocytome
- femme *D39.1*
- homme *D40.1*

Gonorrhée *A54.9*
- aiguë *A54.9*
- anus *A54.6*
- appareil génital
- - bas, chronique *A54.0*
- - haut
- - - aiguë *A54.2*
- - - chronique *A54.2*
- appareil génito-urinaire bas *A54.0*
- appareil urinaire
- - bas
- - - aiguë *A54.0*
- - - chronique *A54.0*
- - haut
- - - aiguë *A54.2*
- - - chronique *A54.2*
- articulaire *A54.4+, M01.39**
- avec
- - arthrite *A54.4+, M01.39**
- - bursite *A54.4+, M73.09**
- - contact *Z20.2*
- - incurvation du pénis *A54.0*
- - inflammation des organes pelviens de la femme *A54.2+, N74.3**
- - pneumonie *A54.8+, J17.0**
- - urétrite
- - - aiguë *A54.0*
- - - chronique *A54.0*
- bourse séreuse *A54.4+, M73.09**
- bubon *A54.8*
- canal déférent *A54.2+, N51.8**
- canal déférent, aiguë *A54.2+, N51.8**
- chronique *A54.9*

Gonorrhée –*suite*

- coeur *A54.8+, I52.0**
- col de l'utérus *A54.0*
- - aiguë *A54.0*
- - chronique *A54.0*
- endocardique *A54.8+, I39.8**
- épididyme *A54.2+, N51.1**
- ganglions lymphatiques *A54.8*
- génitale *A54.0*
- glande de Bartholin
- - abcédée *A54.1*
- - chronique *A54.0*
- - purulente *A54.0*
- glande de Cowper, abcédée *A54.1*
- œil *A54.3*
- - néonatale *A54.3+, H13.1**
- ovaire *A54.2+, N74.3**
- peau *A54.8+, L99.8**
- pelvienne *A54.2*
- pendant la grossesse *O98.2*
- pharynx *A54.5*
- prépuce *A54.0+, N51.2**
- prostate *A54.2+, N51.0**
- rectum *A54.6*
- rein *A54.2+, N29.1**
- sujet porteur *Z22.4*
- syndrome Curtis-Fitz-Hugh *A54.8+, K67.1**
- trompes de Fallope *A54.2+, N74.3**
- tubaire *A54.2+, N74.3**
- urètre *A54.0*
- utérus *A54.2+, N74.3**
- vagin *A54.0*
- verge *A54.0*
- vésicule séminale *A54.2+, N51.8**
- - aiguë *A54.2+, N51.8**
- - chronique *A54.2+, N51.8**
- vessie *A54.0*
- - aiguë *A54.0*
- - chronique *A54.0*

Goodall, maladie de *A08.1*

Goodpasture, syndrome de *M31.0*
- avec
- - glomérulonéphrite *M31.0+, N08.5**
- - glomérulopathie *M31.0+, N08.5**
- - néphrite, due à anticorps anti-membrane basale glomérulaire *M31.0+, N08.5**
- néphritique *M31.0+, N08.5**

Gordan-Overstreet, syndrome de *Q99.9*

Gorge
- abcès *J39.1*
- anomalie *Q38.8*
- Aspiration, mucus *T17.2*
- atrophie *J39.2*
- brulure *T28.0*
- carcinome in situ *D00.0*
- catarrhe *J02.9*
- - aigue *J02.9*
- - chez le fumeur *J31.2*
- - chronique *J31.2*
- cicatriciel *J39.2*
- contusion *S10.0*
- corps étranger *T17.2*
- - asphyxie *T17.2*
- corrosion *T28.5*
- Diphtérie *A36.0*
- diverticule *Q38.7*

Gorge –*suite*

- écrasement *S17.8*
- et bouche
- - brulure *T28.0*
- - corrosion *T28.5*
- gangrène *J02.9*
- gangrène de Plaut-Vincent *A69.1*
- hémorragie *R04.1*
- hypophyse *Q89.2*
- infection *J02.9*
- - due à
- - - pneumocoques *J02.8, B95.3!*
- - - staphylocoques *J02.8, B95.8!*
- - - streptocoques *J02.0*
- - - virus Coxsackie *B08.5*
- - - virus NCA *J02.8*
- - fiévreuse *J02.9*
- - - aigue *J02.9*
- inflammation *J02.9*
- - aigue *J02.9*
- - atrophique *J31.2*
- - chronique *J31.2*
- - diphtérique *A36.0*
- - due à des streptocoques *J02.0*
- kyste *J39.2*
- lésion NCA *S19.8*
- lésion, superficielle *S10.10*
- lipome *D17.0*
- maladie *J39.2*
- malformation, de naissance *Q38.8*
- mucus, asphyxie *T17.2*
- mycose, due à Candida *B37.88*
- oedème *J39.2*
- paralysie *J39.2*
- - diphtérique *A36.0*
- phlégnome *J39.1*
- plaie, ouverte *S11.21*
- polype *J39.2*
- sepsie, due à des streptocoques *J02.0*
- soor *B37.88*
- spasmes *J39.2*
- - hystériques *F45.33*
- - psychogènes *F45.33*
- syphilis *A52.7+, J99.8**
- - syphilis secondaire *A51.3*
- tératome *D37.0*
- tubeuculose *A16.8*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.8*
- tumeur mixte *D37.0*
- ulcère, spetique, dû à des streptocoques *J02.0*
- ulcus *J39.2*
- - diphtérique *A36.0*

Gorham-Stout, syndrome de *M89.59*

Gorlin-Chaudhry-Moss, syndrome de *Q87.0*

Gorlin-Goltz, syndrome de *Q85.8*

Gottron, papules de *L94.4*

Gougerot-Carteaud, maladie de *L83*

Gougerot-Hailey, maladie de *Q82.8*

Gougerot-Hailey-Hailey, syndrome de *Q82.8*

Gougerot-Sjögren, maladie de *M35.0*
- avec atteinte, poumon *M35.0+, J99.1**

Gougerot-Sjögren, syndrome de *M35.0*

Gougerot-Sjögren, syndrome de –*suite*

- avec atteinte pulmonaire *M35.0+, J99.1**

Goût
- perte *R43.2*
- - cas de perte, odorat *R43.8*
- perversion, psychogène *F45.8*
- perverti *R43.8*
- trouble *R43.8*
- - cas de trouble, odorat *R43.8*

Goutte *M10.96*
- arthritique *M10.09*
- arthropathie *M10.09*
- - entraînant
- - - drépanocytose *D57.8+, M14.0**
- - - syndrome de Lesch-Nyhan *E79.1+, M14.0**
- atteinte de phlébite *M10.99*
- atteinte d'inflammation
- - articulaire *M10.09*
- - rénale *M10.99+, N29.8**
- atteinte d'iritis *M10.99+, H22.1**
- avec
- - affection rénale *M10.99+, N29.8**
- - bursite *M10.09*
- - épisclérite *M10.99+, H19.0**
- - néphrite *M10.99+, N29.8**
- - néphrolithiase *M10.09+, N22.8**
- - néphrosclérose *M10.99+, N29.8**
- - névrite *M10.09+, G63.6**
- - périnévrite, autonome *M10.09+, G63.6**
- - spondylite *M10.09*
- - synovite *M10.09*
- calcaire *L94.2*
- dépistage *Z13.8*
- diathésique *M10.99*
- due à
- - altération de la fonction rénale *M10.39*
- - plomb *M10.19*
- eczématique *M10.99+, L99.8**
- épaule *M10.91*
- idiopathique *M10.09*
- primitive *M10.09*
- provoquée par un médicament *M10.29*
- pseudo- *M11.29*
- secondaire NCA *M10.49*
- syphilitique *A52.7+, M14.8**
- vraie *M10.09*

Gouttière ou attelle, externe
- changement *Z47.8*
- enlèvement *Z47.8*
- vérification *Z47.8*

Gowers, dystrophie musculaire type *G71.0*

Gowers, syndrome de *R55*

Graaf, follicules de
- kyste *N83.0*
- rompu, avec hémorragie *N83.0*
- rupture *N83.0*

grade
- I Lymphome folliculaire de *C82.0*
- II Lymphome folliculaire de *C82.1*
- III sans précision Lymphome folliculaire de *C82.2*
- IIIa Lymphome folliculaire de *C82.3*
- IIIb Lymphome folliculaire de *C82.4*

grade –*suite*

- Néoplasie intraépithéliale haut grade de la prostate [NIP de haut *D07.5*
- prostate NIP haut grade] , Néoplasie intraépithéliale de haut *D07.5*

Gradenigo(-Lanois), syndrome de *H66.0*

Graham, tumeur de *C73*

Graham-Burford-Mayer, syndrome de *J98.1*

Graham-Steel, souffle de *I37.1*

Graisse
- accumulation excessive *E66.99*
- - localisée *E65*
- allergie *L23.5*
- dans les selles *R19.5*
- défaut d'absorption *K90.4*
- - pancréatique *K90.3*
- dermite *L24.1*
- dermite de contact *L24.1*
- dermite de contact NCA *L24.1*
- eczéma *L24.1*
- eczéma professionnel *L24.1*
- excessive *E66.99*
- intolérance NCA *K90.4*
- intolérance, avec malabsorption *K90.4*
- malabsorption *K90.4*
- stockage *E75.6*
- trouble du métabolisme *E78.9*
- - congénital *E78.9*

Graisseux(se)
- dégénérescence
- - aortique *I77.8*
- - capillaire *I78.8*
- - cardiaque *I51.5*
- - hépatique alcoolique *K70.0*
- - hépatique NCA *K76.0*
- - moelle épinière *G31.88*
- - musculaire *M62.89*
- - myocardique *I51.5*
- - rénale *N28.8*
- - système nerveux *G31.88*
- - thymus *E32.8*
- hypertrophie du coeur *I51.5*

Gram négatif (à)
- bacilles, infection NCA *A49.9*
- bactéries
- - bactériémie *A49.9*
- - méningite *G00.9*
- coques, méningite NCA *G00.9*
- septicémie *A41.58*

Gram positif (à), coques, méningite NCA *G00.9*

Graminées, allergie, avec asthme *J45.0*

Graminées, dermite allergique de contact *L23.7*

Grand mal *G40.6*
- avec état épileptique *G41.0*
- crise du réveil *G40.3*
- crise, dans le petit mal *G40.6*
- du sommeil *G40.3*
- épileptique *G40.6*
- idiopathique *G40.6*
- sommeil (du) *G40.3*

Grand os, fracture *S62.16*

Grand pour l'âge gestationnel (foetus), *O36.6*

Grandes cellules oxyphiles, à
- adénocarcinome *C80*
- adénome *D36.9*

Grandes cellules, à
- lymphome *C83.3*
- - cellules encochées *C83.3*
- - cellules ki-1 positives *C85.7*
- - diffus *C83.3*
- - folliculaire *C82.2*
- - - cellules encochées *C82.2*
- lymphome non-hodgkinien folliculaire *C82.2*
- maladie à cytomégalovirus, inclusions *B25.9*
- naevus *D22.9*

Granulaire
- atrophie rénale *N26*
- dystrophie, cornée *H18.5*
- épendymite *G04.9*
- inflammation, pharynx *J31.2*
- pharyngite, chronique *J31.2*

Granulation
- conduit auditif *H60.4*
- moignon vaginal *N89.8*
- suite à une mastoïdectomie *H95.1*
- suture d'épisiotomie *L92.3*
- tympan *H71*
- - *H73.8*

Granuleuse, cellule, tumeur
- juvénile *D39.1*
- maligne *C56*
- théca *D39.1*

Granuleuse, dystrophie cornéenne *H18.5*

Granuleuse, pharyngite *J31.2*
- chronique *J31.2*

Granuleuses, à cellules, adénocarcinome *C80*

Granulocitaire
- ehrlichiose monocytique humaine (EMH) *A28.8*
- leucémie *C92.90*
- - aigue *C92.00*
- - aleucémique *C92.70*
- - cellules *C92.00*
- - chronique *C92.10*
- - - rémission complète *C92.11*
- - rémission complète *C92.91*
- - subaiguë *C92.20*
- pneumonie alvéolaire *J18.8*
- sarcome *C92.30*
- - rémission complète *C92.31*

Granulocytes
- anomalie génétique *D72.0*
- neutrophiles, trouble, fonctionnel *D71*

Granulocytopénie *D70.7*
- auto-immune *D70.6*
- cas de thrombocytopathie *D69.1*
- maligne *D70.6*
- primaire *D70.6*
- toxique *D70.6*

Granulomateux, -euse
- affection
- - chronique, pendant l'enfance *D71*
- - cutanée *L92.9*
- angéite, allergique *M30.1*
- blépharite *H01.0*
- colite *K50.1*
- cystite *N30.8*

Granulomateux, -euse –*suite*
- dermatophytose *B35.8*
- entérite *K50.9*
- gastrite *K29.6*
- hépatite NCA *K75.3*
- inflammation, vessie *N30.8*
- iridocyclite *H20.1*
- iritis *H20.1*
- monoliase, peau *B37.2*
- plaie opératoire *T81.8*
- prostatite *N41.1*
- rhinite *J31.0*
- - chronique *J31.0*
- sclérite *H15.0*
- thyroïdite *E06.1*

Granulomatose *L92.9*
- allergique *M30.1*
- bégnine *D86.9*
- chronique *D71*
- - pendant l'enfance *D71*
- Churg Strauss *M30.1*
- disciformis *L92.8*
- due au béryllium *J63.2*
- épithéloïde *D86.9*
- familaire, chronique *D71*
- Hutchinson Boeck *D86.9*
- Langerhans, cellules de NCA aiguës *C96.0*
- lipide *E75.5*
- lipo- *E78.8*
- - généralisée *E78.8*
- lymphoïde *C83.8*
- lymphomatoïde *C83.8*
- miliaire *A32.8*
- nécrosant, voies respiratoires *M31.3*
- poumon *M31.3+, J99.1**
- progressive, septique *D71*
- Wegener, de *M31.3*
- - avec
- - - affection, glomérulaire *M31.3+, N08.5**
- - - glomérulonéphrite *M31.3+, N08.5**

Granulome *L92.9*
- abdomen *K66.8*
- actinique *L57.5*
- annulaire *L92.0*
- - perforans *L92.0*
- apical *K04.5*
- bouche, purulent *K13.4*
- canal lacrymal *H04.6*
- cellules géantes *K10.1*
- - central *K10.1*
- - os maxillaire, réparation *K10.1*
- - périphérique *K06.8*
- cellules géantes, à *K10.1*
- - central *K10.1*
- - mâchoire, réparation *K10.1*
- - périphérique *K06.8*
- centro-facial, malin *M31.2*
- cérébral *G06.0*
- cerveau *G06.0*
- cicatrice *L90.5*
- côlon *K63.8*
- colonne vertébrale
- - syphilitique *A52.1+, G07**
- - tuberculeux *A18.0+, M49.09**
- conjonctive *H10.4*
- corde vocale *J38.3*

Granulome –*suite*

- corps étranger
- - conjonctive *H10.4*
- - hypoderme *L92.3*
- - orbite *H05.1*
- - paupière *H01.8*
- - peau *L92.3*
- - tissus des parties molles NCA *M60.29*
- cutanés au béryllium *L92.3*
- dentaire *K04.5*
- - chronique *K04.5*
- éosinophile *L92.2*
- - *C96.6*
- - muqueuse buccale *K13.4*
- facia *L92.2*
- foie NCA *K75.3*
- foie, associé à
- - bérylliose *J63.2+, K77.8**
- - sarcoïdose *D86.8+, K77.8**
- fongoïde *C84.0*
- gangraenescens *M31.3*
- - Nasi *M31.2*
- gingival, pyogène *K06.8*
- glande lymphatique *I88.8*
- Hodgkin (maladie), de *C81.9*
- iléum *K63.8*
- infectieux NCA *B99*
- inflammatoire *L98.0*
- inguinal *A58*
- - tropicum *A58*
- intestin NCA *K63.8*
- intracrânien *G06.0*
- - épidural *G06.0*
- - extradural *G06.0*
- - sous-dural *G06.0*
- intrarachidien
- - épidural *G06.1*
- - extradural *G06.1*
- - sous-dural *G06.1*
- Koebner, phénomène de *C46.9*
- larynx *J38.7*
- ligne médiane *M31.2*
- ligne médiane, de la, létal *M31.2*
- lipidique, en cas de syndrome de Weber Christian *M35.6*
- lipo-, dans la maladie de Weber-Christian *M35.6*
- lipophagique, dans la maladie de Weber -Christian *M35.6*
- lympho- *C81.9*
- - Chlamydia *A55*
- mâchoire *K10.1*
- Majocchi *B35.8*
- maxillaire, central *K10.1*
- muqueuse buccale *K13.4*
- nez *J32.9*
- nitidum *L44.1*
- ombilical *L92.8*
- - chez le nouveau né *P38*
- orbite *H05.1*
- oreille externe *H60.4*
- oreille moyenne *H71*
- osseux *M86.89*
- - provoqué par corps étrangers résiduels *M86.89*
- paracoccidioïdien *B41.8*
- paupière *H01.8*
- peau *L92.9*
- - éosinophile *L92.2*

Granulome –*suite*

- peau –*suite*
- - provoqué par candidose *B37.2*
- pediculatum *L98.0*
- - muqueuse buccale *K13.4*
- périapical *K04.5*
- péritonéal *K66.8*
- - provoqué par oeufs d'helminthes NCA *B83.9+, K67.8**
- piscine *A31.1*
- piscines, des *A31.1*
- post-mastoïdectomie *H95.0*
- prostate *N41.8*
- provoqué par
- - acide silicique, sur la peau *L92.3*
- - aspergillose *B44.8*
- - corps étranger, dans une plaie chirurgicale *T81.5*
- - fil *L92.3*
- - intubation *T81.4*
- - paraffine *T88.8*
- - rayonnement *L57.5*
- - talc *M60.29*
- - - dans la plaie chirurgicale *T81.6*
- pudendi *A58*
- pudendorum, ulcère *A58*
- pulmonaire
- - infectieux *J84.1*
- pulpe, interne *K03.3*
- pyogénique *L98.0*
- - muqueuse buccale *K13.4*
- rachis, tuberculeux *A18.0+, M49.09**
- rectum *K62.8*
- rein *N15.8*
- réticulohistiocytaire *D76.3*
- réticulo-histiocytaire *D76.3*
- rubrum nasi *L74.8*
- sac lacrymal *H04.6*
- septicum *L98.0*
- sinus paranasal, infectieux *J32.9*
- suppuré *L98.0*
- suture *L92.3*
- - paupière *H59.8*
- teleangiectaticum *L98.0*
- trichophyticum *B35.8*
- urètre *N36.8*
- vagin *A58*
- vénérien *A58*
- visage, malin *M31.2*
- xantho- *D76.3*
- xantho-sidero-gigantocellulare *D23.9*

Granulopénie *D70.7*

Granulosa, cellules, tumeur *D39.1*

Granulose rubra nasi *L74.8*

granulosus echinococcose kystique

- Infection hépatique à Echinococcus *B67.0*
- sans précision , Infection à Echinococcus *B67.4*

Graphite

- fibrose *J63.3*
- - avec tuberculose, organes respiratoires *J65*
- - poumon *J63.3*
- pneumoconiose *J63.3*

Graphospasme *F48.8*

- organique *G25.8*

Grave, type de maladie

Gravelle *N20.9*

- évacuation *N20.9*

Graves, maladie *E05.0*

Gravide, grossesse

Gravide, utérus

- complications, accouchement *O34.5*
- douleur chronique *O26.88*
- hernie *O34.5*
- incarcération, prise en charge, mère *O34.5*
- pénétration, instrument, complications, accouchement *O71.1*
- position anormale *O34.8*
- prolapsus
- - avec lésions, foetus/nouveau-né *P03.8*
- - prise en charge, mère *O34.5*
- rétroversion, prise en charge, mère *O34.5*
- rupture, pendant les contractions *O71.1*

Graviditas

- abdominale
- - avec foetus viable *O36.7*
- - ectopique *O00.0*
- ampullaris *O00.1*
- isthmica *O00.1*

Grawitz, tumeur de *C64*

Graybiel, syndrome de *I20.0*

Greenfield, maladie de, leucodystrophie *E75.2*

Greenfield, maladie de, sclérose concent *G37.5*

greffe

-
- appareil génito urinaire Douleur due à prothèse, implant et *T83.8*
- - Embolie due à prothèse, implant et *T83.8*
- appareil génital, avec
- - complication *T83.9*
- - - mécanique *T83.4*
- - infection *T83.6*
- - inflammation *T83.6*
- autogène cutanée, état après *Z94.5*
- canal déférent, avec complication *T83.9*
- - mécanique *T83.4*
- contre hôte, maladie *T86.09*
- - aiguë
- - - foie
- - - - stade
- - - - - 1, *T86.01+, K77.11**
- - - peau
- - - - stade
- - - - - 1, *T86.01+, L99.11**
- - - - - 2, *T86.01+, L99.12**
- - - - - 3, *T86.01+, L99.13**
- - - stade
- - - - I *T86.01*
- - - - II *T86.01*
- - - tube digestif
- - - - stade
- - - - - 1, *T86.01+, K93.21**
- - chronique
- - - forme étendue *T86.04*
- interne système nerveux Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèse, implant et *T85.72*
- musculaire, avec complications mécaniques *T84.4*

greffe *–suite*
- orthopédique interne Complication mécanique d ' Autre appareil, implant et *T84.4*
- os Complication mécanique d ' Autre appareil, implant et *T84.3*
- peau
- - avec complication *T86.59*
- - échec *T86.59*
- - infection *T86.59*
- - nécrose *T86.51*
- - perte *T86.52*
- - rejet *T86.59*
- - trouble circulatoire *T86.50*
- voies génitales, avec complications *T83.9*

Greffon
- artères coronaires
- - avec complication, mécanique *T82.2*
- - fuite *T82.2*
- - malposition *T82.2*
- - obstruction *T82.2*
- - perforation *T82.2*
- artériel
- - avec
- - - complication, mécanique *T82.3*
- - - fibrose NCA *T82.8*
- - - hémorragie NCA *T82.8*
- - - sténose NCA *T82.8*
- - - thrombose NCA *T82.8*
- - complication NCA *T82.3*
- - déplacement (glissement) *T82.3*
- - Echec (mauvais fonctionnement) NCA *T82.3*
- - Fissuration NCA *T82.3*
- - infection NCA *T82.7*
- - Inflammation NCA *T82.7*
- - Malposition NCA *T82.3*
- - obstruction NCA *T82.3*
- - perforation NCA *T82.3*
- articulaire, avec complications *T84.9*
- contre hôte
- - forme
- - - étendue , Maladie chronique du *T86.04*
- - - limité , Maladie chronique du *T86.03*
- - sans précision , Maladie chronique du *T86.09*
- - stade
- - - I et II , Maladie aigu du *T86.01†*
- - - III et IV , Maladie aigu du *T86.02†*
- - - - et IV , Maladie aigu du *T86.02†*
- rénal
- - défaillance *T86.19*
- - détérioration de la fonction
- - - aiguë *T86.10*
- - - chronique *T86.11*
- - rejet *T86.19*
- - - aigu *T86.10*
- - - chronique *T86.11*
- - reprise, fonction, retardée *T86.12*

Greig II, syndrome de, hypertélorisme hé *Q75.2*

Greither, syndrome de *Q82.8*

Grenouillette *K11.6*
- congénitale *Q38.4*

Griesinger Duchenne, maladie de *G71.0*

Griffure de chats *T14.08*

Grippal
- bronchite *J11.1*
- infection *J06.9*
- - avec
- - - infection, organes respiratoires *J06.9*
- - - surinfection, bactérienne *J06.9*
- - due à
- - - virus *J06.9*
- - - virus (influenza) *J11.1*
- - voies respiratoires *J06.9*
- infection, avec toux *J06.9*

Grippal, infection avec confirmation de *J10.1*

grippe
-
- avec myocardite, dû au virus de la grippe aviaire *J09*
- aviaire Influenza A / H5N1, épidémie de 2009 [*U69.21!*
- aviaire, avec détection du virus *J09*
- - pandémie de 2009 *U69.21*
- Balkans [fièvre Q] *A78*
- estivale *B33.8*
- infection grippale *J06.9*
- Influenza *J11.1*
- - asiatique *J11.1*
- - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.1*
- - avec
- - - angine *J11.1*
- - - arthralgie *J11.8*
- - - bronchiolite *J11.1*
- - - bronchite *J11.1*
- - - broncho-pneumonie *J11.0*
- - - - sans virus avéré *J11.0*
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.0*
- - - coryza *J11.1*
- - - encéphalite *J11.8+, G05.1**
- - - - virus de la grippe aviaire, avéré *J09*
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.8+, G05.1**
- - - encéphalopathie *J11.8+, G94.8**
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.8*
- - - entérite *J11.8*
- - - - virus de la grippe aviaire, avéré *J09*
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.8*
- - - épanchement pleural *J11.1*
- - - - virus de la grippe aviaire, avéré *J09*
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.1*
- - - ethmoïdite *J11.1*
- - - gastro-entérite *J11.8*
- - - - virus de la grippe aviaire, avéré *J09*
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.8*
- - - infection, voies respiratoires
- - - - supérieures virus de la grippe aviaire, avéré, *J09*
- - - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire, *J10.1*
- - - - - *J11.1*
- - - laryngite *J11.1*
- - - - virus de la grippe aviaire, avéré *J09*
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.1*
- - - laryngo-trachéite *J11.1*
- - - manifestation
- - - - organes digestifs *J11.8*

grippe *–suite*
- Influenza *–suite*
- - avec *–suite*
- - - manifestation *–suite*
- - - - voies respiratoires NCA *J11.1*
- - - méningisme *J11.8*
- - - - virus de la grippe aviaire, avéré *J09*
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.8*
- - - myocardite *J11.8+, I41.1**
- - - - aiguen, virus de la grippe avéré, à l'exception de la grippe aviaire *J10.8+, I41.1**
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.8+, I41.1**
- - - otite *J11.8+, H67.1**
- - - - moyenne
- - - - - virus de la grippe aviaire, avéré, *J09+, H67.1**
- - - - - nécrosante, aigue, *J11.8+, H67.1**
- - - - sans virus avéré *J11.8+, H67.1**
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.8+, H67.1**
- - - participation à
- - - - gastro-intestinale *J11.8*
- - - - système nerveux NCA *J11.8*
- - - participation gastro-intestinale *J11.8*
- - - pharyngite *J11.1*
- - - - virus de la grippe aviaire, avéré *J09*
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.1*
- - - pleurite *J11.1*
- - - pneumonie *J11.0*
- - - - sans virus avéré *J11.0*
- - - - virus de la grippe aviaire, avéré *J09*
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.0*
- - - polio-encéphalite *J11.8+, G05.1**
- - - - virus de la grippe aviaire, avéré *J09+, G05.1**
- - - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.8+, G05.1**
- - - sinusite *J11.1*
- - - surinfection, bactérienne *J11.8*
- - - tonsille, inflammation *J11.1*
- - - toux *J11.1*
- - - trachéite *J11.1*
- - - trachéo-bronchite *J11.1*
- - bronchique *J11.1*
- - cas de
- - - pneumonie, due à un virus *J11.0*
- - - rhume *J11.1*
- - due à
- - - virus *J11.1*
- - - virus de la grippe aviaire avéré *J09*
- - encéphale *J11.8+, G05.1**
- - épidémique *J11.1*
- - - sans virus avéré *J11.1*
- - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.1*
- - estomac *J11.8*
- - estomac, intestin *J11.8*
- - immunisation, nécessaire *Z25.1*
- - intestinale *J11.8*
- - mère, avec lésions, foetus/nouveau-né *P00.2*
- - sans virus avéré *J11.1*
- - tête *J11.8+, G05.1**
- - vaccination *Z25.1*

grippe *–suite*
- Influenza *–suite*
- - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.1*
- - vraie
- - - sans virus avéré *J11.1*
- - - virus Influenza avéré, à l'exclusion de la grippe aviaire *J10.1*
- influenza gastro intestinale *J11.8*
- manifestation, chez le nourrisson *P35.8*
- porcine
- - Influenza A / H1N1, pandémie de 2009 [*U69.20!*
- - pandémie de 2009 *U69.20*

Gris
- cataracte *H26.9*
- Cataracte sénile *H25.9*

Gris, syndrome *P93*
- au chloramphénicol, chez les nouveaux nés *P93*

Groenblad-Strandberg, syndrome de *Q89.8*

Groenblad-Strandberg-Touraine, syndrome *Q89.8*

Gros intestin
- absence
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q42.9*
- accessoire *Q43.41*
- agénésie *Q42.9*
- atonie *K59.8*
- atrésie *Q42.9*
- blocage *K56.4*
- brûlure caustique *T28.7*
- carcinome in situ *D01.0*
- corps étranger *T18.4*
- Crohn, maladie de *K50.1*
- diverticulite *K57.32*
- - avec
- - - abcès *K57.22*
- - - - avec saignement *K57.23*
- - - perforation *K57.22*
- - - - avec
- - - - - abcès, *K57.22*
- - - - - saignement, *K57.23*
- - - saignement *K57.33*
- diverticulose *K57.30*
- - avec
- - - abcès *K57.20*
- - - - avec saignement *K57.21*
- - - perforation *K57.20*
- - - - avec
- - - - - abcès, *K57.20*
- - - - - saignement, *K57.21*
- - - saignement *K57.31*
- - sans perforation ni abcès *K57.30*
- diverticulose, perforation *K57.20*
- duplication *Q43.41*
- entérite régionale *K50.1*
- et intestin grêle
- - diverticulite *K57.52*
- - - avec
- - - - abcès *K57.42*
- - - - - et saignement, *K57.43*
- - - - perforation *K57.42*
- - - - - et saignement, *K57.43*
- - - - péritonite *K57.42*
- - - - - et saignement, *K57.43*

Gros intestin *–suite*
- et intestin grêle *–suite*
- - diverticulite *–suite*
- - - avec *–suite*
- - - - saignement *K57.53*
- - diverticulose *K57.50*
- - - avec
- - - - abcès *K57.40*
- - - - - et saignement, *K57.41*
- - - - perforation *K57.40*
- - - - - et saignement, *K57.41*
- - - - péritonite *K57.40*
- - - - - et saignement, *K57.41*
- - - - saignement *K57.51*
- - entérite régionale *K50.8*
- - maladie de Crohn *K50.8*
- - - avec abcès *K50.8*
- fistule entéro-vaginale *N82.3*
- hémorragie *K92.2*
- hypoplasie *Q42.9*
- iléus *K56.7*
- infection *A09*
- inflammation *K52.9*
- ischémie *K55.9*
- kyste *K63.8*
- lésion traumatique *S36.50*
- maladie de Crohn *K50.1*
- malformation
- - acquise *K63.8*
- - congénitale NCA *Q43.9*
- malformation congénitale *Q43.3*
- métastase *C78.5*
- nécrose *K55.0*
- obstruction congénitale *Q42.9*
- occlusion *K56.7*
- - congénitale *Q42.9*
- - mécanique *K56.6*
- - paralytique *K56.0*
- occlusion congénitale *Q42.9*
- perforation *K63.1*
- polype *K63.5*
- rupture *K63.1*
- spastique *K58.9*
- sténose *K56.6*
- - congénitale *Q42.9*
- sténose grave *K56.6*
- - congénitale *Q42.9*
- transposition *Q43.8*
- tuberculose *A18.3+, K93.0**

Gros orteil
- articulation métatarso-phalangienne du
- - arthrose *M19.97*
- - empyème *M00.97*
- déformation acquise NCA *M20.3*
- exostose cartilagineuse *D16.3*
- fracturé *S92.4*
- surnuméraire *Q69.2*

Gros(se)
- altitude
- - effet NCA *T70.2*
- - - barotraumatique de l'oreille *T70.0*
- - - sinus paranasal *T70.1*
- articulation
- - arthrose *M15.9*
- - arthrose déformante *M15.9*
- foetus disproportionné *O33.5*
- lésion traumatique des parties molles
- - membre inférieur *T13.1*

Gros(se) *–suite*
- lésion traumatique des parties molles *–suite*
- - membre inférieur *–suite*
- - - avec atteinte des tendons *T13.8*
- - membre supérieur *T11.1*
- - - avec atteinte des tendons *T11.8*
- - tête *S01.9*
- - tronc *T09.1*
- lèvre cancéreuse *C51.0*
- plage de tissu due à une lésion traumatique cérébrale diffuse *S06.20*
- tronc artériel
- - anomalie *Q25.9*
- - malformation congénitale *Q25.9*
- - transposition *Q20.3*
- vaisseau
- - transposition
- - - complète, congénitale *Q20.3*
- - - corrigée *Q20.5*
- - tumeur *D48.1*
- veine
- - agénésie NCA *Q26.8*
- - anomalie *Q26.9*
- - malformation congénitale *Q26.8*

Grossesse *Z33!*
- albuminurie, avec hypertension
- - gestationnelle *O14.9*
- - préexistante *O11*
- anormale sans précision *O26.9*
- avec
- - abcès
- - - lèvres
- - - - grandes *O23.5*
- - - - petites *O23.5*
- - - rein *O23.0*
- - - sein *O91.10*
- - - vessie *O23.1*
- - - vulve *O23.5*
- - abdomen, penduleux *O34.8*
- - affection, hépatique *O26.6*
- - albuminurie *O12.1*
- - - avec oedème *O12.2*
- - amniotite *O41.1*
- - anémie *O99.0*
- - - lié au manque, fer *O99.0*
- - - macrocytaire *O99.0*
- - anomalie
- - - col utérin *O34.4*
- - - col utérin sans précision *O34.4*
- - - cordon ombilical *O69.9*
- - - os du bassin *O33.0*
- - - parties molles du bassin *O34.9*
- - - périnée *O34.7*
- - - utérus, congénital *O34.0*
- - - vagin *O34.6*
- - - vulve *O34.7*
- - anomalie, bassin *O33.0*
- - antécédents, avortement, habituel *O26.2*
- - antéversion, utérus *O34.5*
- - appendicite *O99.6*
- - athrophie, foie, avec ictère, aigu *O26.6*
- - bactériurie, asymptomatique *O23.4*
- - bassin rétréci *O33.1*
- - bassin, rétréci *O33.1*
- - béance, col utérin *O34.39*
- - candidose *O98.8*

Grossesse –*suite*
- avec –*suite*
- - cardiomyopathie *O99.4*
- - cardionéphropathie, hypertensive, préexistante *O10.3*
- - cardiotocogramme, pathologique *O28.8*
- - carence, acide folique *O26.88*
- - cervicite *O23.5*
- - cicatrice, utérus *O34.2*
- - complication sans précision *O26.9*
- - - due à
- - - - malposition, placenta *O44.10*
- - - - rachianesthésie et anesthésie épidurale sans précision *O29.5*
- - - syphilitique *O98.1*
- - congestion passive, veineuse *O22.9*
- - crevasse, mamelon *O92.10*
- - CTG [cardiotocogramme], pathologique *O28.8*
- - cystite *O23.1*
- - cystocèle *O34.8*
- - cystopyélite *O23.3*
- - déciduite *O41.1*
- - déformation, bassin *O33.0*
- - déhiscence, symphyse *O26.7*
- - dépendance
- - - alcool *O99.3*
- - - drogues *O99.3*
- - - médicaments *O99.3*
- - déplacement, utérus NCA *O34.5*
- - dépression *O99.3*
- - dermatose *O99.7*
- - - papuleuse *O99.7*
- - descente utérine *O34.5*
- - diabète sucré *O24.4*
- - - *O24.9*
- - - gestationnel *O24.4*
- - - latent *O24.9*
- - - préexistant *O24.3*
- - diabète sucré de type 1, préexistant *O24.0*
- - diabète sucré de type 2, préexistant *O24.1*
- - dispositif intra-utérin, rétention *O26.3*
- - dysfonction, appareil circulatoire *O99.4*
- - dysfonctionnement, thyroïde *O99.2*
- - dysrégulation, orthostatique *O99.4*
- - écartement, symphyse *O26.7*
- - éclampsie *O15.0*
- - embolie *O88.2*
- - - cerveau *O88.2*
- - - poumon *O88.2*
- - - pyohémique *O88.3*
- - - septique *O88.3*
- - embolie gazeuse *O88.0*
- - embolie graisseuse *O88.8*
- - embolie par caillot sanguin *O88.2*
- - embolie pyohémique *O88.3*
- - embolie septique *O88.3*
- - endométrite *O23.5*
- - - déciduale *O41.1*
- - épuisement *O26.88*
- - fibroïde *O34.1*
- - fibrome, utérus *O34.1*
- - fibromyome, utérus *O34.1*
- - fibrose, périnée *O34.7*
- - foetus papyracé *O31.0*

Grossesse –*suite*
- avec –*suite*
- - galactorrhée *O92.60*
- - gangrène, vessie *O23.1*
- - gestose *O14.9*
- - gingivite *O99.6*
- - gonorrhée *O98.2*
- - HELLP [Hemolysis, elevated liver function test, low platelet counts] syndrome *O14.1*
- - hémorragie *O46.9*
- - - avant la fin de la 22ème semaine de gestation *O20.9*
- - - intracérébrale *O99.4*
- - hémorroïdes *O22.4*
- - hépatite
- - - aiguë *O26.6*
- - - maligne *O26.6*
- - - subaiguë *O26.6*
- - - virale *O98.4*
- - hépatopathie *O26.6*
- - herpès génital *O23.5*
- - hydramnios *O40*
- - hydrops *O12.0*
- - - foetal NCA *O36.2*
- - hydrorrhée *O42.9*
- - hymen, persistant *O34.7*
- - hypertension *O13*
- - - accélérée *O13*
- - - avec
- - - - albuminurie, grave *O14.1*
- - - - oedème grave, *O14.1*
- - - - - *O14.9*
- - - éclamptique, préexistante *O11*
- - - essentielle, bénigne, préexistante *O10.0*
- - - maligne, préexistante *O10.0*
- - - mère NCA *O16*
- - - prééclamptique, préexistant *O11*
- - - rénale
- - - - due à une néphropathie préexistante *O10.4*
- - - - préexistante *O10.2*
- - - secondaire
- - - - maladie, rein, préexistante *O10.2*
- - - - préexistante
- - - - - après maladie, rein, *O10.4*
- - - - - due à une néphrite, *O10.4*
- - - transitoire *O16*
- - hypertension, avec albuminurie *O14.9*
- - hypotension *O26.5*
- - hystérocèle *O34.5*
- - ictère *O26.6*
- - incarcération, utérus *O34.5*
- - incompatibilité Rh *O36.0*
- - inertie, utérus *O62.2*
- - infarctus, placenta *O43.8*
- - infection *O98.9*
- - - intra-utérine *O23.5*
- - - mamelon *O91.00*
- - - mammaire *O91.20*
- - - organes génitaux *O23.5*
- - - par le gonocoque *O98.2*
- - - rein *O23.0*
- - - - dont le mode de transmission est essentiellement sexuel *O98.3*
- - - tractus urogénital *O23.9*
- - - urètre *O23.2*
- - - vessie *O23.1*

Grossesse –*suite*
- avec –*suite*
- - infection –*suite*
- - - voies urinaires *O23.4*
- - insuffisance
- - - col utérin *O34.39*
- - - plancher pelvien *O34.8*
- - - veineuse, chronique *O22.9*
- - invagination, mamelon *O92.00*
- - ischialgie *O99.8*
- - kyste
- - - bassin, féminin *O34.8*
- - - ovaire *O34.8*
- - labilité, appareil circulatoire *O99.4*
- - lésion, foetal ou du nouveau-né, due à
- - - rectocèle *P03.8*
- - - salpingo-oophorite *P00.8*
- - - tumeur
- - - - bassin *P03.8*
- - - - col utérin *P03.8*
- - - - périnée *P03.8*
- - - - utérus *P03.8*
- - - - vagin *P03.8*
- - - - vulve *P03.8*
- - - utérus, double *P03.8*
- - lombalgie *O99.8*
- - lombosciatique *O99.8*
- - maladie cardio-vasculaire, congénitale *O99.8*
- - maladie de Bechterew *O99.8*
- - maladie métabolique *O99.2*
- - maladie NCA *O26.9*
- - - bassin, inflammatoire *O23.5*
- - - cérébrovasculaire *O99.4*
- - - coeur, avec hypertension, préexistante *O10.1*
- - - due à
- - - - malnutrition NCA *O99.2*
- - - - protozoaire NCA *O98.6*
- - - infectieuse *O98.9*
- - - parasitaire NCA *O98.8*
- - - rein *O26.81*
- - maladie sexuellement transmissible *O98.3*
- - malformation
- - - organes pelviens NCA *O34.8*
- - - utérus, congénitale *O34.0*
- - malformation, placenta *O43.1*
- - malnutrition *O25*
- - Mastite *O91.20*
- - menstruation *O20.8*
- - mort NCA *O95*
- - myome, utérus *O34.1*
- - nécrose, foie *O26.6*
- - néoplasme NCA *O99.8*
- - néphrite *O23.0*
- - néphropathie *O26.81*
- - néphrose *O26.81*
- - névrite *O26.83*
- - névrose *O99.3*
- - oedème *O12.0*
- - - avec protéinurie *O12.2*
- - - veinostatique *O22.9*
- - oligohydramnios *O41.0*
- - oophorite *O23.5*
- - ostéomalacie *O99.8*
- - paludisme *O98.6*
- - péritonite *O26.88*
- - phlébite *O22.9*

Grossesse –*suite*
- avec –*suite*
- - phlébite –*suite*
- - - profonde *O22.8*
- - phlébopathie *O22.9*
- - phlébothrombose *O22.3*
- - - profonde *O22.3*
- - placentite *O41.1*
- - plastie du plancher pelvien *O34.8*
- - polyhydramnios *O40*
- - polype, col utérin *O34.4*
- - position, foetus, instable *O32.0*
- - prédiabète *O99.8*
- - prééclampsie *O14.9*
- - présentation anormale
- - - foetus *O32.9*
- - - utérus *O34.5*
- - présentation de la face *O32.3*
- - prise, poids
- - - excessive *O26.0*
- - - faible *O26.1*
- - prolapsus, utérus *O34.5*
- - protéinurie *O12.1*
- - prurit *O26.88*
- - psychose *O99.3*
- - ptyalisme *O26.88*
- - pyélite *O23.0*
- - pyélocystite *O23.3*
- - pyélonéphrite *O23.0*
- - pyélonéphrose *O26.81*
- - pyonéphrite *O23.0*
- - réaction, toxique, au cours d'une anésthésie locale *O29.3*
- - rectocèle *O34.8*
- - rétention, stérilet *O26.3*
- - rétrécissement, col utérin *O34.4*
- - rétrécissement, détroit inférieur *O33.3*
- - rétrécissement, détroit supérieur du bassin *O33.2*
- - rétroversion de l'utérus *O34.5*
- - rigidité, plancher pelvien *O34.8*
- - rubéole *O98.5*
- - rupture
- - - symphyse *O26.7*
- - - trompe utérine *O00.1*
- - rupture de la poche des eaux, prématurée *O42.9*
- - salivation, excessive *O26.88*
- - salpingite *O23.5*
- - salpingo-oophorite *O23.5*
- - subluxation
- - - ceinture pelvienne *O26.7*
- - - symphyse *O26.7*
- - subluxation, symphyse *O26.7*
- - superfécondation *O30.8*
- - superfoetation *O30.8*
- - suture de Shirodkar *O34.39*
- - syndrome de compression de la veine cave *O26.5*
- - syndrome de la veine cave *O26.5*
- - syndrome de Mendelson *O29.0*
- - syndrome du canal carpien *O26.82*
- - syphilis *O98.1*
- - tétanos *A34*
- - thrombophlébite *O22.2*
- - - jambe *O22.2*
- - - profonde *O22.3*
- - - superficielle *O22.2*
- - thrombose *O22.9*

Grossesse –*suite*
- avec –*suite*
- - thrombose –*suite*
- - - cerveau *O99.4*
- - - sinus veineux, cérébral *O22.5*
- - - sinus, veineux cérébral *O22.5*
- - - veine *O22.2*
- - - - profonde *O22.3*
- - - veine cérébrale *O22.5*
- - titre anti-E, positif *O36.0*
- - tolérance au glucose, anormale *O99.8*
- - torsion, utérus *O34.5*
- - toxicose *O14.9*
- - toxicose tardive *O14.9*
- - trouble métabolique, avec hyperémèse *O21.1*
- - trouble, psychique *O99.3*
- - tuberculose *O98.0*
- - tumeur NCA *O99.8*
- - - bassin *O34.8*
- - - col utérin *O34.4*
- - - ovaire *O34.8*
- - - - stroma *O34.8*
- - - périnée *O34.7*
- - - utérus *O34.1*
- - - vagin *O34.6*
- - - vulve *O34.7*
- - urémie *O26.81*
- - - éclamptique *O15.0*
- - urétrite *O23.2*
- - utérus
- - - bicorne *O34.0*
- - - double *O34.0*
- - - incarcéré *O34.5*
- - vaginite *O23.5*
- - varice membres inférieurs *O22.0*
- - varices *O22.0*
- - - anus *O22.4*
- - - extrémité, inférieure *O22.0*
- - - génitales *O22.1*
- - - périnée *O22.1*
- - - rectum *O22.4*
- - - vagin *O22.1*
- - - vulve *O22.1*
- - varicose
- - - veine *O22.0*
- - - veine anale *O22.4*
- - - veine génitale *O22.1*
- - - veine rectale *O22.4*
- - veine cave inférieure, syndrome d'obstruction de la *O26.5*
- - veine de la jambe, variqueuse *O22.0*
- - ventre en besace *O34.8*
- - vessie, phlegmon *O23.1*
- - vomissement *O21.9*
- - vomissements *O21.9*
- - - incoercibles *O21.0*
- - - - commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation *O21.2*
- - vomissements tardifs *O21.2*
- - vulvite *O23.5*
- cavité abdominale *O00.0*
- cervicale *O00.8*
- col utérin *O00.8*
- complication, rupture, foie, spontanée *O26.6*
- complications NCA *O26.9*
- - amputation, col utérin *O34.4*

Grossesse –*suite*
- complications NCA –*suite*
- - anémie, macrocytaire *O99.0*
- - cicatrice, col utérin *O34.4*
- - due à
- - - Amniotite *O41.1*
- - - atrésie, col utérin *O34.4*
- - - dilatation, col utérin *O34.39*
- - - dysfonctionnement de la glande thyroïde *O99.2*
- - - dysplasie, col utérin *O34.4*
- - - foetus papyracé *O31.0*
- - - Môle *O01.9*
- - - môle hydatiforme *O01.9*
- - - phlébite superficielle *O22.2*
- - - placentite *O41.1*
- - - sténose
- - - - col utérin *O34.4*
- - - - vagin *O34.6*
- - - thrombophlébite *O22.3*
- - mère, avec lésion, foetus/nouveau-né NCA *P01.9*
- compliquée *O26.9*
- - immunodéficience humaine *O98.7*
- - VIH *O98.7*
- compliquée par anomalie de forme du placenta *O43.1*
- confirmation *Z32*
- constatation *Z32*
- constatée fortuitement *Z33!*
- contraception *Z30.9*
- courte durée, avec hypoplasie pulmonaire *P28.0*
- dans la corne utérine *O00.8*
- - affectant le foetus ou nouveau-né *P01.4*
- difficultés *Z64.0*
- dissimulée *Z35.3*
- durée *O09*
- - entre 05 à 13 semaines révolues *O09.1!*
- - entre 14ème semaine à 19ème semaine révolues *O09.2!*
- - entre 20ème semaine à 25ème semaine révolues *O09.3!*
- - entre 26ème semaine à 33ème semaine révolues *O09.4!*
- - entre 34ème semaine à 36ème semaine révolues *O09.5!*
- - entre 37ème semaine à 41ème semaine révolues *O09.6!*
- - moins de 5 semaines révolues *O09.0!*
- - non précisée *O09.9!*
- - plus de 41 semaines révolues *O09.7!*
- ectopique *O00.9*
- épuisement *O26.88*
- examen, résultats
- - anormaux *O28.9*
- - - biochimiques *O28.1*
- - - cytologiques *O28.2*
- - - génétiques *O28.5*
- - - hématologiques *O28.0*
- - - radiologiques *O28.4*
- - chromosomique, anormal *O28.5*
- - ultrason, anormal *O28.3*
- exclusion *Z32*
- extra-utérine *O00.9*
- - avec
- - - hématocèle *O00.9*
- - - infection, organes génitaux *O08.0*

Grossesse –*suite*
- extra-utérine –*suite*
- - avec –*suite*
- - - tétanos *A34*
- - - thrombophlébite, veine du bassin *O08.0*
- - cervicale *O00.8*
- - dans la corne utérine *O00.8*
- - rompue *O00.9*
- gémellaire *O30.0*
- - affectant le foetus ou nouveau-né *P01.5*
- - avec lésion foetus/nouveau-né *P01.5*
- - dichoriale diamniotique *O30.0*
- hémorragie
- - dans l'anamnèse *Z35.2*
- - premier trimestre *O20.9*
- hypertension induite par
- - cas d'éclampsie NCA *O15.9*
- - rénale *O13*
- hypertonie *O13*
- - avec protéinurie *O14.9*
- illégitime *Z64.0*
- imaginaire *F45.8*
- induit par
- - abcès
- - - mamelon *O91.00*
- - - mammaire *O91.10*
- - - sous-aréolaire *O91.10*
- - diabète sucré *O24.4*
- - fissure, mamelon *O92.10*
- - hypertonie *O13*
- - lymphangite mammaire *O91.20*
- - Mastite *O91.20*
- - - interstitielle *O91.20*
- - - parenchymateuse *O91.20*
- - - purulente *O91.10*
- - phlébite *O22.9*
- - Phlébopathie *O22.9*
- - thrombose *O22.9*
- infertilité *N97.9*
- infirmée *Z32*
- interruption - *voir aussi* Avortement *O06.9*
- - demande d' *Z30.0*
- - illégale *O05.9*
- - légale *O04.9*
- - - avec complication *O04.8*
- - - incomplète *O04.4*
- - thérapeutique *O04.9*
- interruption, *voir aussi* avortement *O06.9*
- - demande d' *Z30.0*
- - illégale *O05.9*
- - légale *O04.9*
- - médicale *O04.9*
- - punissable *O05.9*
- interstitielle *O00.8*
- intraligamentaire *O00.8*
- intramurale *O00.8*
- intrapéritonéale *O00.0*
- intra-utérine *Z32*
- maladie de la peau *O99.7*
- mésomètre *O00.8*
- molaire avec
- - infection, organes génitaux *O08.0*
- - thrombophlébite, veine du bassin *O08.0*
- molaire avec accouchement *O01.9*

Grossesse –*suite*
- molaire NCA *O02.0*
- multiple NCA *O30.8*
- - *O30.9*
- - avec
- - - opération césarienne, avec présentation anormale *O32.5*
- - - présentation anormale *O32.5*
- - foetus papyracé *O31.0*
- néphrose *O26.81*
- nerveuse *F45.8*
- nerveuse (pseudocyesis) *F45.8*
- non (encore) confirmée *Z32*
- non confirmée *Z32*
- non désirée NCA *Z64.0*
- normale, surveillance *Z34*
- - prénatale *Z34*
- oedème *O12.0*
- ovaire *O00.2*
- période de, avec
- - décès *O95*
- - embolie gazeuse *O88.0*
- - embolie graisseuse *O88.8*
- - embolie, pyémique *O88.3*
- - mort subite, cause inconnue *O95*
- - Thromboembolie *O88.2*
- péritonéale *O00.0*
- peur *F45.2*
- phobie de *F45.2*
- poursuite de, après
- - avortement d'un ou plusieurs foetus *O31.1*
- - mort intra-utérine d'un ou plusieurs foetus *O31.2*
- poursuite, après
- - avortement d'un ou plusieurs foetus *O31.1*
- - mort intra-utérine d'un ou plusieurs foetus *O31.2*
- précoce *Z33!*
- - avec
- - - hémorragie *O20.9*
- - - hyperémèse *O21.0*
- - - métrorragie *O20.9*
- - - saignement *O20.9*
- - compliquée *O26.9*
- - compliquée par *O26.9*
- probème, à *O26.9*
- prolongée *O48*
- prolonger *O48*
- protéinurie *O12.1*
- pseudo- *F45.8*
- - hystérique *F45.8*
- psychose *O99.3*
- quadruple *O30.2*
- quintuple *O30.8*
- risque *Z35.9*
- rompue, ectopique *O00.9*
- s multiples *O30.8*
- sextuple *O30.8*
- stade final, avec vomissements *O21.2*
- supposition *Z32*
- surveillance *Z34*
- - pour
- - - antécédent d'avortement *Z35.1*
- - - antécédent de stérilité *Z35.0*
- - - infertilité, antécédents *Z35.0*
- - - multiparité, élevée *Z35.4*
- - - primipare, âgée *Z35.5*

Grossesse –*suite*
- surveillance –*suite*
- - pour –*suite*
- - - primipare, très jeune *Z35.6*
- suspicion *Z32*
- terme *Z34*
- test de *Z32*
- toxicose *O14.9*
- triple *O30.1*
- triplés *O30.1*
- - avec affection du foetus/nouveau-né *P01.5*
- - soins *O30.1*
- tubaire *O00.1*

Groupe sanguin
- détermination *Z01.7*
- incompatibilité
- - assistance médicale, femmes enceintes *O36.1*
- - avec réaction, lors d'une transfusion *T80.3*
- - chez le foetus/nouveau-né *P55.8*

Groupée, pigmentation congénitale de la *Q14.1*

Grover, maladie de [dermatose acantholyt *L11.1*

Grütz, maladie de Bürger- *E78.3*

Gryphose
- ongles *L60.2*

Gsell, maladie de
- Bouchet [maladie de Gsell-Bouchet] *A27.8*
- Erdheim [maladie de Gsell-Erdheim] *I71.00*

GSH [glutathion], déficit, anémie *D55.1*

Guam, syndrome de l'île de [complexe Par *G21.8+, F02.8**

Guanéthidine, intoxication *T46.5*

Guar, farine de [gomme guar]
- allergie [E 412] *T78.4*
- hypersensibilité [E 412] *T78.4*

Gubler, syndrome de Millard- *I67.9+, G46.3**

Guérin-Stern, syndrome de *Q74.3*
- Guerre
- - lésions dues à des faits *Y36*

Guérison retardé genou après fusion ou arthrodèse , *M96.82*

Guerre, victime de *Z65*

Guillain-Barré, syndrome (maladie) de [p *G61.0*

Guillain-Barré, syndrome de *G61.0*

Gunn, syndrome de *Q07.8*
- Marcus, syndrome de Marcus-Grunn *Q07.8*

Günther, maladie de *E80.0*

Gustatif(ve)
- hallucination *R44.2*
- hyperhidrose *R61.1*

GVH - *voir* Maladie greffon contre hôte *T86.09*

GVHD peau stade 1 4 , Maladie aigu *T86.02†, L99.14**

Gymnastique thérapeutique *Z50.1!*

Gynandrie *Q56.0*

Gynandrisme *Q56.0*

Gynandroblastome
- chez la femme *D39.1*
- chez l'homme *D40.1*

Gynatrésie *Q52.9*

Gynécologique
- examen *Z01.4*
- - général *Z01.4*
- - pour
- - - renouvellement de contraception *Z30.4*
- - - renouvellement de moyens contraceptifs *Z30.5*
- examen préventif NCA *Z01.4*
- maladie *N94.9*
- - psychosomatique *F45.9*
- saignement *N93.9*
- - anomalie *N93.9*
- - dysfonctionnel *N93.8*
- trouble hormonal *E34.9*

Gynécomastie *N62*

Gynécophobie *F40.1*

H1N1 *U69.20*
- pandémie 2009 grippe porcine] , Influenza A / *U69.20!*

H5N1 *U69.21*
- épidémie 2009 grippe aviaire] , Influenza A / *U69.21!*

Haab-Dimmer, syndrome de *H18.5*

Habermann, syndrome de, -Mucha *L41.0*

Habitude alimentaire, nadéquate *Z72.8*

Habitude pathologique *F63.9*
- stéréotypée *F98.4*

Habitudes alimentaires inadéquates *Z72.8*

Hachich
- abus, sans dépendance *F12.1*
- dépendance *F12.2*

Hadfield. syndrome de, -Clarke [mucovis *E84.9*

Haemophilus
- aegyptius, infection, systémique *A48.4*
- agent pathogène *B96.3!*
- ducreyi
- - adénite, chancrelleuse *A57*
- - bubon *A57*
- - - inguinal *A57*
- - infection *A57*
- - vulvite *A57*
- influenza siège non précisé , Infection à *A49.2*
- influenzae
- - arthrite *M00.89, B96.3!*
- - bronchite, aiguë *J20.1*
- - bronchopneumonie *J14*
- - colpite *N76.0*
- - - atrophique *N95.2, B96.3!*
- - - chronique *N76.1*
- - laryngite *J04.0, B96.3!*
- - laryngotrachéite *J04.2, B96.3!*
- - méningite *G00.0*
- - méningoencéphalite *G04.2, B96.3!*
- - méningoencéphalomyélite *G04.2, B96.3!*
- - pneumonie *J14*
- - - congénitale *P23.6, B96.3!*
- - - lobaire *J14*
- - septicémie *A41.3*
- - type B [HiB], vaccination, nécessité *Z23.8*
- - vaginite *N76.0*

Haff, maladie de *T56.1*

Hageman Carence facteur *D68.25*

Hageman, facteur de

Haglund I, syndrome de *M92.6*

Haglund, maladie (ostéochondrite) de *M92.6*

Hâle
- Diphtérie *A36.9*
- pharynx *A36.0*

Haleine fétide *R19.6*

Halitose *R19.6*

Hallermann-Streiff-François, syndrome de *Q87.0*

Hallervorden-Spatz, syndrome *G23.0*

Hallopeau, syndrome de *L40.2*

Hallucination *R44.3*
- auditive *R44.0*
- dans la schizophrénie paranoïde *F20.0*
- gustative *R44.2*

Hallucination –*suite*
- olfactive *R44.2*
- paranoïde *F22.0*
- psychogène *F28*
- tactile *R44.2*
- visuelle *R44.1*

Hallucinatoire
- état
- - non alcoolique, organique *F06.0*
- - organique *F06.0*
- psychose
- - chronique *F28*
- - due aux drogues *F19.5*

Hallucinogènes
- abus *F16.1*
- consommation
- - avec syndrome de dépendance *F16.2*
- - nocive *F16.1*
- dépendance *F16.2*
- intoxication
- - aiguë, sous forme d'état ébrieux *F16.0*
- - chez sujet dépendant *F16.0*
- intoxication aiguë *F16.0*
- présence dans le sang *R78.3*
- trouble persistant *F16.7*

Hallucinose *F28*
- chronique *F28*
- dans la psychose alcoolique *F10.5*
- et paranoïa dues aux drogues *F19.5*
- organique *F06.0*
- provoquée par
- - alcool *F10.5*
- - drogues *F19.5*

Hallux
- malleus *M20.3*
- - acquis NCA *M20.3*
- rigidus *M20.2*
- - congénital *Q74.2*
- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*
- valgus *M20.1*
- - acquis *M20.1*
- - congénital *Q66.8*
- - et rigidus *M20.3*
- varus *M20.3*
- - acquis *M20.3*
- - congénital *Q66.3*

Halo visuel *H53.1*

Halo-naevus *D22.9*

Halothane, intoxication *T41.0*

Haltlose, trouble de la personnalité [pe *F60.8*

Hamartoblastome *Q85.9*

Hamartome *Q85.9*

Hamartose *Q85.9*

Hamman-Rich, syndrome de *J84.1*

Hammond, syndrome de *G80.3*

Hamster, protéine de
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Hanche
- abcès *L02.4*
- - tuberculeux *A18.0+, M01.15**
- ankylose *M24.65*
- anomalie de rotation *Q65.8*
- anomalie NCA *Q74.2*

Hanche –*suite*
- anthrax *L02.4*
- arthrose *M16.9*
- articulation
- - affection *M25.95*
- - - congénitale *Q65.8*
- - - purulente *M00.95*
- - amputation traumatique *S78.0*
- - ankylose *M24.65*
- - arthrite *M13.15*
- - arthrose *M16.9*
- - contracture congénitale *Q65.8*
- - contracture en flexion *M24.55*
- - déformation en flexion congénitale *Q65.8*
- - déformation en rotation, congénitale *Q65.8*
- - descellement, PTH [prothèse totale de hanche] *T84.0*
- - douleurs *M25.55*
- - dysplasie *Q65.8*
- - endoprothèse totale [PTH], descellement du cotyle *T84.0*
- - infection *M00.95*
- - instabilité *Q65.6*
- - irritation *M24.85*
- - luxation *S73.00*
- - - congénitale *Q65.2*
- - - - bilatérale *Q65.1*
- - - - dépistage *Z13.7*
- - - - unilatérale *Q65.0*
- - - récidivante *M24.45*
- - malposition congénitale *Q65.8*
- - raideur *M25.65*
- - retard de maturation *Q65.6*
- - subluxation congénitale *Q65.5*
- - - bilatérale *Q65.4*
- - - unilatérale *Q65.3*
- - tuberculose *A18.0+, M01.15**
- brûlure *T24.0*
- - degré
- - - 2a *T24.20*
- - - 2b *T24.21*
- - deuxième degré *T24.20*
- - premier degré *T24.1*
- - troisième degré *T24.3*
- brûlure caustique *T24.4*
- - degré
- - - 2a *T24.60*
- - - 2b *T24.61*
- - deuxième degré *T24.60*
- - premier degré *T24.5*
- - troisième degré *T24.7*
- bursite NCA *M70.7*
- carcinome baso-cellulaire *C44.7*
- carie tuberculeuse *A18.0+, M01.15**
- contracture *M24.55*
- contusion *S70.0*
- coxa plana *M91.2*
- déformation
- - congénitale *Q65.9*
- - due à une ostéochondrite juvénile antérieure *M91.2*
- déformation de rotation, acquise *M21.85*
- déformation en flexion acquise *M21.25*
- dysplasie *Q65.8*
- écrasement *S77.0*
- - avec écrasement de la cuisse *S77.2*

Hanche –*suite*

- enthésopathie *M76.8*
- entorse *S73.10*
- et cuisse, lésions traumatiques multiples *S79.7*
- et cuisse, plaies ouvertes multiples *S71.7*
- fistule (articulaire) *M25.15*
- flexion anormale *Q65.8*
- foulure *S73.10*
- fracture *S72.08*
- - ouverte *S72.00*
- furoncle *L02.4*
- gelure *T35.5*
- - avec nécrose des tissus *T34.6*
- - superficielle *T33.6*
- instabilité acquise *M24.85*
- irritable *M24.85*
- lésion traumatique de nerf(s) *S74.9*
- lésion traumatique de tendon(s) *S76.0*
- lésion traumatique d'un vaisseau sanguin *S75.9*
- lésion traumatique musculaire *S76.0*
- lésion(s) traumatique(s) *S79.9*
- - superficielle(s) *S70.9*
- - - multiples *S70.7*
- luxable congénitale *Q65.6*
- luxation *S73.00*
- - antérieure *S73.02*
- - congénitale *Q65.2*
- - - bilatérale *Q65.1*
- - - unilatérale *Q65.0*
- - postérieure *S73.01*
- - récidivante *M24.45*
- lymphadénite aiguë *L04.3*
- malformation *Q74.2*
- mélanome in situ *D03.7*
- mélanome malin *C43.7*
- mélanome malin cutané *C43.7*
- nævus *D22.7*
- nécrose
- - aseptique *M87.95*
- - avasculaire *M87.95*
- ostéochondrite juvénile *M91.9*
- ostéomyélite *M86.95*
- périarthrite *M76.8*
- phlegmon *L03.11*
- plaie ouverte *S71.0*
- préarthrose *M16.9*
- préluxation congénitale *Q65.6*
- raccourcissement
- - acquis *M21.75*
- - congénital *Q65.8*
- ressort *M24.85*
- - *R29.4*
- - chez le nouveau-né *R29.4*
- sarcome *C49.2*
- sarcome du tissu conjonctif *C49.2*
- subluxable *Q65.6*
- ténosynovite *M65.95*
- tuberculose *A18.0+, M01.15**
- ulcération *L98.4*
- ulcère de décubitus *L89.93*

Handicap

- apprentissage *F81.9*
- au développement, examen *Z13.8*
- avec limitation, activités *Z73*
- dans les antécédents familiaux, NCA *Z82*

Handicap –*suite*

- marcher *R26.8*
- mental *F79.9*
- - grave *F72.9*
- - léger *F70.9*
- - moyen *F71.9*
- - profond *F73.9*
- miction *R39.1*
- naissance *O66.9*
- - causé par
- - - os, bassin, anormal *O65.9*
- - - tissus, bassin, mous *O65.5*
- respiration par le nez *R06.88*
- respiration, mécanique, avec manque, oxygène, systémique *T71*
- respiratoire *R06.88*

Hanhart, syndrome de [hypoglossie-hypoda *Q87.0*

Hanot, maladie de *K74.3*

Hanot, maladie de [cirrohse biliaire pri *K74.3*

Hanot-Chauffard, syndrome d' *E83.1*

- Troisier, syndrome de Troisier-Hanot-Chauffard *E83.1*

Hanot-Mac Mahon-Tannhäuser, syndrome de *K74.3*

Hanot-MacMahon-Tannhäuser, syndrome de *K74.3*

Hanot-Rössle, maladie de *K74.5*

Hanot-Rössle, syndrome de *K74.5*

Hanta, virus

- maladie, avec
- - atteinte réinale *A98.5+, N08.0**
- - manifestation pulmonaire *B33.4+, J17.1**
- syndrome cardio-pulmonaire *B33.4+, J17.1**
- syndrome cardio-pulmonaire à virus Hanta [SCPH] *B33.4+, J17.1**
- syndrome pulmonaire [SPH] *B33.4+, J17.1**

Harada, syndrome de Vogt-Koyanagi- *H30.8*

Harley, maladie de *D59.6*

Harris, lignes de *M89.19*

Hartnup, maladie de *E72.0*

Hashimoto, thyroïdite de *E06.3*

Hashitoxicose *E06.3*

- transitoire *E06.3*

Hass, maladie de *M92.0*

Hassal Henle, verrue de *H18.4*

Hassal-Henle, verrue de *H18.4*

Hauser, syndrome de, Mayer-Rokitansky, s *Q52.8*

Haut(e)

- calcul de l'uretère *N20.1*
- - avec congestion *N20.1*
- - sans congestion *N20.1*
- orifice urétéral *Q62.6*
- palais, congénital *Q38.5*
- rupture des membranes *O42.9*

Haute stature *E34.4*

- constitutionnelle *E34.4*

Haute stature constitutionnelle *E34.4*

hautement résistant aminoglycosides non résistant au glycopeptides , Enterococcus faecalis résistant au oxazolidinones ou *U80.21!*

- au glycopeptides , Enterococcus faecium résistant au oxazolidinones ou au streptogramines ou *U80.31!*

Haverhill, fièvre de *A25.1*

Haxthausen, syndrome de *L85.1*

Hayem-Luzet, anémie de von Jaksch-[aném *D52.0*

Hayem-Luzet, maladie de von Jaksch- *D64.8*

Haygarth, nodosités de *M15.8*

Hb [hémoglobine], carence *D64.9*

Hb-AS, génotype *D57.3*

HBc, sujet porteur de l'antigène *Z22.5*

HBs, sujet porteur de l'antigène *Z22.5*

HBsAG positive, hépatite chronique *B18.1*

HDL [lipoprotéine de haute densité], déf *E78.6*

Hébéphrénie *F20.1*

- aiguë *F20.1*

Hébéphrénique

- démence *F20.1*
- démence précoce *F20.1*
- schizophrénie *F20.1*

Heberden, nodosités d' *M15.1*

- avec arthropathie *M15.1*

Heberden, nodosités d', avec arthropathi *M15.1*

- doigts *M15.1*
- et arthrose de Bouchard *M15.8*

Hebra, de

- pityriasis *L26*
- prurigo chronique *L28.2*
- urticaire papuleuse *L28.2*

Hecht, syndrome de *Q79.8*

Hedinger, syndrome de *E34.0*

Heerfordt, syndrome de *D86.8*

Hegemann, maladie d'

- tête du radius *M92.1*
- trochlée de l'humérus *M92.0*

Hegglin, anomalie de *D72.0*

- May- [anomalie de May-Hegglin] *D72.0*

Hegglin, syndrome de *D72.0*

- Fanconi- [syndrome de Fanconi-Hegglin] *J18.0*

Heidenhain, syndrome de *A81.0+, F02.1**

Heilmeyer-Schöner, maladie de *C94.10*

- rémission complète *C94.11*

Heine Médin, maladie de *A80.9*

Heine-Médin, maladie de *A80.9*

Heinz, anémie congénitale à corps de *D58.2*

Helicobacter

- infection *A49.8*
- pylori
- - gastrite *K29.7*
- - infection *A49.8*
- - - entraînant
- - - - ulcère
- - - - - ventriculaire, *K25.9*
- - - - - duodénum, *K26.9*

Hélix de l'oreille

Hélix de l'oreille *–suite*
- mélanome in situ *D03.2*
- mélanome, malin *C43.2*
- nævus *D22.2*

Heller, syndrome de *F84.3*

HELLP, syndrome [hémolyse, élévation de *O14.1*
- pendant la grossesse *O14.1*
- syndrome *O14.2*

Helminthes, infestation intestinale NCA *B82.0*

Helminthes, oeufs, granulome péritonéal *B83.9+, K67.8**

Helminthiase *B83.9*
- avec arthrite NCA *B83.9+, M01.89**
- intestinale NCA *B82.0*
- - dépistage *Z11*
- - forme mixte *B81.4*

Hémangioblastique, méningiome *D32.9*

Hémangioblastome *D48.1*

Hémangioendothélial, sarcome *C49.9*

Hémangioendothéliome *D48.1*
- bénin *D18.00*
- diffus, os *C41.9*
- malin *C49.9*
- système nerveux, bénin *D18.00*

Hémangioléiomyolipome *D17.9*

Hémangiomateux, naevus *D18.00*

Hémangiomatose *Q82.8*
- limitée à un seul siège *D18.00*
- systémique *Q82.8*

Hémangiomatose, squelette, généralisée *D18.08*

Hémangiome *D18.00*
- artérioveineux *D18.00*
- capillaire *D18.00*
- cas de
- - chondrodysplasie *Q78.4*
- - dyschondroplasie *Q78.4*
- caverneux *D18.00*
- cerveau *D18.02*
- choroïde *D18.08*
- conjonctivite *D18.08*
- épithéloïde *D18.00*
- foie *D18.03*
- histiocytoïde *D18.00*
- infantile *D18.00*
- intramusculaire *D18.00*
- juvénile *D18.00*
- kétatosique verruqueux *D18.00*
- larynx *D18.05*
- lobe frontal *D18.01*
- malin *C49.9*
- nerf *D18.08*
- nez *D18.05*
- orbite
- - capillaire *D18.08*
- - caverneux *D18.08*
- oreille *D18.05*
- paupière *D18.01*
- peau *D18.01*
- placenta *O02.8*
- plexiforme *D18.00*
- racémeux *D18.00*
- rein *D18.08*
- rétine *D18.08*

Hémangiome *–suite*
- rétine *–suite*
- - capillaire *D18.08*
- - caverneux *D18.08*
- sclérosant *D23.9*
- simplex *D18.00*
- - caverneux *D18.01*
- veineux *D18.00*
- vessie *D18.08*

Hémangiopéricytome *D48.1*
- bénin *D21.9*
- malin *C49.9*
- méninges *D32.9*

Hémangiosarcome *C49.9*

Hémarthrose *M25.09*
- articulation, traumatique *T14.3*
- genou, articulation du *M25.06*
- ligament, traumatique *T14.3*
- non traumatique *M25.09*

Hématémèse *K92.0*
- cas d'ulcère de l'estomac *K25.4*
- cas d'ulcère ventriculaire *K25.4*
- chez le nouveau-né *P54.0*
- dans les antécédents personnels *Z87.1*
- et mélæna, chez le nouveau-né, dus à une déglutition de sang maternel *P78.2*

Hémathidrose *L74.8*

Hématocèle *N50.1*
- anté-utérine *N94.8*
- céphalique
- - chez le nouveau-né *P52.8*
- - traumatique *S09.8*
- chez l'homme NCA *N50.1*
- chez/lors de
- - femme NCA *N94.8*
- - grossesse, extra-utérine *O00.9*
- ligament
- - large de l'utérus *N94.8*
- - rond de l'utérus *N94.8*
- organes génitaux, masculins *N50.1*
- ovaire *N83.8*
- rétro-utérine *N94.8*

Hématocolpos *N89.7*
- avec
- - hématométrie *N89.7*
- - hématosalpinx *N89.7*

Hématocornée *H18.0*

Hématocrite, réduit *R79.8*

Hématogène
- abcès, foie *K75.0*
- ictère, acquis *D59.9*
- infection, cortex rénal *N15.9*
- ostéomyélite
- - aiguë *M86.09*
- - chronique NCA *M86.59*

Hématologique
- choc *R57.8*
- maladie
- - figurant dans les
- - - antécédents familiaux *Z83.2*
- - - antécédents personnels *Z86.2*
- résultat, anormal, en cas de
- - examen prénatal *O28.0*
- - grossesse, test de *O28.0*
- trouble *D75.9*
- - cas de maladie due au VIH NCA *B23.8*

Hématologique *–suite*
- trouble *–suite*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P61.9*

Hématome *T14.05*
- à une lésion lors de l'accouchement NCA *P15.8*
- aortique. dissection *I71.00*
- arachnoïdien, traumatique *S06.6*
- artériel dû à une blessure *T14.5*
- bassin
- - lors de la naissance *O71.7*
- - traumatique
- - - organes pelviens *S37.9*
- - - superficiel *S30.0*
- bras *S40.0*
- canal
- - déférent *N50.1*
- - spermatique *N50.1*
- canal déférent *N50.1*
- - non traumatique *N50.1*
- - traumatique *S37.84*
- canal séminal *N50.1*
- céphalique, dû à une lésion lors de l'accouchement *P12.0*
- cérébral, circonscrit *S06.33*
- cerveau
- - à une lésion lors de l'accouchement *P10.1*
- - avec
- - - contusion cérébrale *S06.28*
- - - déchirure cérébrale *S06.28*
- - chez le foetus/nouveau-né NCA *P52.4*
- - non traumatique *I61.9*
- - traumatique *S06.8*
- cervelet traumatique *S06.8*
- choroïde *H31.3*
- colonne vertébrale, chez le nouveau-né, dû à une lésion lors de l'accouchement *P11.59*
- complication, opération *T81.0*
- contusions *T14.05*
- corde vocale *S10.0*
- cordon ombilical *O69.5*
- - comme complication de l'accouchement *O69.5*
- cordon spermatique, non traumatique *N50.1*
- corps caverneux, non traumatique *N48.8*
- corps vitré *H43.1*
- cuir chevelu *S00.05*
- cuisse, traumatique *S70.1*
- déchirure du périnée, suites de couches *O90.2*
- dure-mère *I62.09*
- en chignon dû à un traumatisme obstétrical *P12.1*
- en lunettes *S00.1*
- épididyme, non traumatique *N50.1*
- épidural *S06.4*
- - non traumatique *I62.1*
- - traumatique *S06.4*
- épine sciatique, complication de l'accouchement *O71.7*
- extradural *S06.4*
- - non traumatique *I62.1*
- fascia rectal
- - à une contusion de la paroi abdominale *S30.1*
- - cas de

Hématome –*suite*
- fascia rectal –*suite*
- - cas de –*suite*
- - - Falithrom, traitement par *D68.3*
- - - Marcumar, traitement par *D68.3*
- foie *S36.11*
- - à une lésion lors de l'accouchement *P15.0*
- - non traumatique *K76.8*
- - sous-capsulaire, non traumatique *K76.8*
- gaines du nerf optique *H47.0*
- galéa *S00.05*
- genou *S80.0*
- glutéal *S30.0*
- intestin, lors d'un accouchement *O71.7*
- intracérébral *I61.9*
- intracrânien *I61.5*
- intracrânien traumatique *S06.8*
- lèvres
- - grandes lèvres, non obstétrical *N90.8*
- - petites lèvres, non obstétrical *N90.8*
- ligament large *N83.7*
- - non traumatique *N83.7*
- - traumatique *S37.88*
- ligament utérin, non traumatique *N83.7*
- lorgnette *S00.1*
- médiastinal *S27.88*
- mésosalpinx
- - non traumatique *N83.7*
- - traumatique *S37.88*
- moignon d'amputation, chirurgical *T87.6*
- monocle *S00.1*
- multiple *T00.9*
- muscles sterno-cléido-mastoïdiens *Q68.0*
- - congénital *Q68.0*
- musculaire
- - à une contusion de la paroi abdominale *S30.1*
- - cas de
- - - traitement par Falithrom *D68.3*
- - - traitement par Marcumar *D68.3*
- orbite *H05.2*
- - avec
- - - blessure de l'orbite *S05.1*
- - - exophtalmie *H05.2*
- - non traumatique *H05.2*
- - traumatique *S05.8*
- oreille *H61.1*
- oreille externe *S00.48*
- organes génitaux
- - féminins NCA *N94.8*
- - masculins *N50.1*
- paroi abdominale *R58*
- paroi thoracique *S20.2*
- paupière *S00.1*
- pavillon de l'oreille *H61.1*
- - non traumatique *H61.1*
- peau *T14.05*
- pénis *N48.8*
- - à une lésion lors de l'accouchement *P15.5*
- pénoscrotal *N48.8*
- périanal *K64.5*
- périnéal *S30.2*
- périnée, lors de la naissance *O71.7*
- péri-orbitaire unilatéral *S00.1*

Hématome –*suite*
- périrénal *S37.01*
- placenta *O43.8*
- plaie d'épisiotomie *O90.2*
- plaie obstétricale *O90.2*
- plaie opératoire *O90.2*
- poitrine, non traumatique *N64.8*
- postopératoire *T81.0*
- poumon *R04.8*
- prostate *N42.1*
- rate *S36.01*
- rein *S37.01*
- rétropéritonéal *K66.1*
- - non traumatique *K66.1*
- - traumatique *S36.83*
- sans lésion cutanée *T14.05*
- scrotum *S30.2*
- - superficiel, dû à une lésion lors de l'accouchement *P15.5*
- sein, non traumatique *N64.8*
- sous-arachnoïdien *I60.9*
- - à une lésion lors de l'accouchement *P10.3*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P52.5*
- - non traumatique *I60.9*
- - traumatique *S06.6*
- sous-dural *I62.09*
- - chez le foetus/nouveau-né *P52.8*
- - chronique *I62.02*
- - localisé, dû à une lésion lors de la naissance *P10.0*
- - non traumatique *I62.09*
- - traumatique *S06.5*
- sous-unguéal *T14.05*
- sterno-cléido-mastoïdien *Q68.0*
- - congénital *Q68.0*
- suite à
- - épisiotomie *O90.2*
- - intervention chirurgicale *T81.0*
- superficiel, nouveau-né *P54.5*
- suture, périnée, obstétrical *O90.2*
- tente *S06.8*
- testicules *N50.1*
- - à une lésion lors de l'accouchement *P15.5*
- tête, traumatique *S09.8*
- traumatique *T14.05*
- tunique vaginale, non traumatique *N50.1*
- vagin *N89.8*
- - lors de l'accouchement *O71.7*
- - non traumatique *N89.8*
- vaisseau sanguin, artérioveineux, traumatique *T14.5*
- vésicule séminale *N50.1*
- - traumatique *S37.83*
- vulve *N90.8*
- - à une lésion lors de l'accouchement *P15.5*
- - lors de l'accouchement *O71.7*
- - non obstétrical *N90.8*
- - non traumatique *N90.8*

Hématométrie *N85.7*
- avec
- - hématocolpos *N89.7*
- - hématosalpinx *N85.7*

Hématomyélie *G95.1*
- centrale *G95.1*

Hématomyélie –*suite*
- chez le nouveau-né, due à un traumatisme obstétrical *P11.59*
- traumatique *T14.4*

Hématomyélite *G04.9*

Hématopneumothorax *J94.2*
- lors de lésion pulmonaire *S27.2*

Hématopoïétique
- organe, maladie *D75.9*
- - cas de maladie due au VIH *B23.8, D75.9*
- - examen de dépistage *Z13.0*
- - niveau de
- - - l'anamnèse familiale *Z83.2*
- - - l'anamnèse personnelle *Z86.2*
- système, tumeur maligne, dépistage *Z12.8*
- tissu, tumeur maligne, dans
- - anamnèse familiale NCA *Z80.7*
- - anamnèse, NCA *Z85.7*
- Tissus, tumeur, maligne *C96.9*
- - cas de maladie due au VIH NCA *B21, C83.4*

Hématorrachis *G95.1*
- chez le nouveau-né, dû à un traumatisme obstétrical *P11.59*

Hématosalpinx *N83.6*
- avec hématocolpos *N89.7*
- avec hématométrie *N85.7*
- infectieux *N70.9*

Hématospermie *N50.1*

Hématurie *R31*
- cystite (sur-) *R31*
- d'effort *N02.9*
- douloureuse, syndrome d' *N39.81*
- essentielle *R31*
- familiale, bénigne *N02.9*
- - chez l'enfant *N02.9*
- idiopathique *N02.9*
- intermittente *N02.9*
- lors de
- - paludisme *B50.8*
- - traitement, anticoagulants *D68.3*
- macro- *R31*
- - initiale *N02.9*
- - terminale *N02.9*
- - totale *N02.9*
- massive *R31*
- micro- *R31*
- nocturne, paroxystique *D59.5*
- paroxystique *N02.9*
- persistante *N02.9*
- - avec
- - - glomérulonéphrite
- - - - croissant, diffuse *N02.7*
- - - - endocapillaire proliférative diffuse *N02.4*
- - - - membraneuse, diffuse *N02.2*
- - - - mésangiocapillaire, diffuse *N02.5*
- - - - mésangioprolifértative, diffuse *N02.3*
- - - lésion, glomérulaire
- - - - focale *N02.1*
- - - - segmentaire *N02.1*
- protéinurie *R80*
- récidivante *N02.9*
- - avec
- - - glomérulonéphrite

Hématurie –*suite*
- récidivante –*suite*
- - avec –*suite*
- - - glomérulonéphrite –*suite*
- - - - croissant, diffuse *N02.7*
- - - - endocapillaire proliférative, diffuse *N02.4*
- - - - membraneuse, diffuse *N02.2*
- - - - mésangiocapillaire, diffuse *N02.5*
- - - - mésangioprolifération, diffuse *N02.3*
- - - lésion
- - - - glomérulaire
- - - - - minime, *N02.0*
- - - - - focale, *N02.1*
- - - - - segmentaire, *N02.1*
- - - maladie à dépôt dense *N02.6*
- syndrome avec douleurs lombaires *N39.81*
- tuberculeuse *A18.1*

Héméralopie *H53.1*

Héméralopie, en cas de carence en vitami *E50.5+, H58.1**

Hémi-akinésie *R29.5*

Hémi-anencéphalie *Q00.0*

Hémi-anesthésie *R20.0*
- syphilitique *A52.1*

Hémianopsie *H53.4*
- binasale *H53.4*
- bitemporale *H53.4*
- hétéronyme *H53.4*
- homonyme *H53.4*
- nasale *H53.4*
- périphérique *H53.4*
- quadrant *H53.4*
- syphilitique *A52.7+, H58.1**

Hémi-athétose *R25.8*

Hémi-atrophie *R68.8*
- cervelet *G31.9*
- face *Q67.4*
- langue *K14.8*

Hémiballisme *G25.5*

Hémibloc *I44.6*
- antérieur gauche *I44.4*
- gauche NCA *I44.6*
- postérieur gauche *I44.5*

Hémicardie *Q24.8*

Hémicéphalie *Q00.0*

Hémichondrodysplasie *Q78.4*

Hémichondrodystrophie *Q78.4*

Hémichorée *G25.5*

Hémicrânie
- paroxystique chronique *G44.0*
- prenant la forme de
- - hémicéphalie *Q00.0*
- - migraine *G43.9*

Hémidrose *L74.8*

Hémi-ectromélie *Q73.8*

Hémi-encéphalie *Q00.0*

Hémifacial(e)
- atrophie, congénitale *Q67.4*
- hypertrophie *Q67.4*
- Romberg, atrophie de *G51.8*

Hémifaciale
- fracture *S02.7*

Hémifaciale –*suite*
- fracture –*suite*
- - multiples *S02.7*
- fracture multifragmentaire *S02.7*
- hypoplasie *Q75.8*

Hémihyperalgésie *R20.8*

Hémihyperesthésie *R20.3*

Hémihypertrophie faciale *Q67.4*

Hémihypoesthésie *R20.1*

Hémimélie *Q73.8*
- extrémité *Q73.8*
- membres
- - inférieurs *Q72.8*
- - supérieurs *Q71.8*

Héminégligence *R29.5*
- neurologique *R29.5*

Hémiparalysie *G81.9*

Hémiparésie *G81.9*
- flasque *G81.0*
- spastique *G81.1*
- syphilitique *A52.1*

Hémiparesthésie *R20.2*

Hémiparkinsonisme *G20.90*

Hémiplégie *G81.9*
- alterne faciale *G83.88*
- ascendante NCA *G81.9*
- cérébrale après l'accouchement *O99.4*
- chez le
- - nouveau-né NCA *P91.88*
- - nouveau-né, due à un traumatisme obstétrical *P11.9*
- congénitale *G80.8*
- embolique, événement en cours *I63.4, G81.9*
- entraînant
- - hémiparésie néonatale *G80.2*
- - paralysie cérébrale spastique *G80.2*
- flasque *G81.0*
- hystérique *F44.4*
- spastique *G81.1*
- - congénitale *G80.2*
- - infantile cérébrale *G80.2*
- spinale *G81.1*
- - ascendante *G95.88*
- syphilitique *A52.1*
- thrombotique, événement en cours *I63.3, G81.9*

Hémiplégique
- migraine *G43.1*
- paralysie cérébrale *G80.8*
- paralysie cérébrale infantile *G80.2*
- paralysie cérébrale spastique *G80.2*
- parésie cérébrale spastique *G80.2*
- sclérose en plaques *G35.9*

Hémispasme *R25.2*
- facial *G51.3*

Hémisphérique, atrophie *G31.9*

Hémisporose *B48.8*

Hémivertèbre *Q76.4*
- fusion, avec scoliose, congénitale *Q76.3*
- sans scoliose *Q76.4*

Hémobilie *K83.8*

Hémoblastose *C96.9*

Hémocéphale *I61.5*

Hémochromatose *E83.1*

Hémochromatose –*suite*
- avec
- - anémie, réfractaire *D46.1*
- - arthrite *E83.1+, M14.5**
- - arthropathie *E83.1+, M14.5**
- diabétique *E83.1*
- foie *E83.1+, K77.8**
- héréditaire *E83.1*
- myocarde *E83.1+, I43.1**
- primitive idiopathique *E83.1*
- secondaire *E83.1*

Hémochromatose ou cirrhose pigmentaire o *E83.1*

Hémoconcentration, polyglobulie *D75.1*

Hémocult, test, positif *R85.8*

Hémodialyse *Z49.1*
- avec amylose, secondaire *E85.3*

Hémoendothéliome *D48.1*

Hémoglobine
- C, prédisposition héréditaire *D58.2*
- - avec elliptocytose *D58.1*
- déficit *D64.9*
- - anémie *D64.9*
- foetale, persistance, héréditaire *D56.4*
- génotype AS *D57.3*
- - *D57.3*
- instable, avec anémie, hémolytique *D58.2*
- M, maladie *D74.0*
- maladie NCA *D58.2*
- - avec sphérocytose *D58.0*
- - pathologique NCA *D58.2*
- perte *D58.2*
- prédisposition héréditaire
- - pathologique NCA *D58.2*
- - pathologique, avec thalassémie *D56.3*
- S, génotype *D57.3*
- S, hétérozygote *D57.3*
- taux, abaissé *R79.8*

Hémoglobinémie *D59.9*
- par transfusion sanguine *T80.8*
- paroxystique *D59.6*
- - nocturne *D59.5*

Hémoglobinopathie NCA *D58.2*
- avec
- - arthrite NCA *D58.2+, M36.3**
- - arthropathie NCA *D58.2+, M36.3**
- - nécrose, os NCA *D58.2+, M90.49**
- - thalassémie *D56.9*
- cellules falciformes *D57.1*
- - avec thalassémie *D56.8*
- dépistage *Z36.8*
- dépistage NCA *Z13.0*
- Hb-C *D58.2*
- Hb-D *D58.2*
- Hb-E *D58.2*
- Hb-S *D57.1*
- Hb-SC *D57.2*
- Hb-SD *D57.2*
- Hb-SE *D57.2*
- Hb-SS, avec crises *D57.0*
- lors de thalassémie *D56.9*

Hémoglobinurie *R82.3*

Hémoglobinurie à agglutinines froides *D59.1*

Hémoglobinurie a frigore *D59.6*

Hémoglobinurie a frigore –*suite*
- paroxystique *D59.6*

Hémoglobinurie de marche *D59.6*

Hémoglobinurie d'effort *D59.6*

Hémoglobinurie malarienne *B50.8*

Hémoglobinurique, néphrose (par chromopr *N04.9*

Hémoglobulinurie *R82.3*
- agglutinines froides *D59.1*
- d'effort *D59.6*
- frigore *D59.6*
- - paroxystique *D59.6*
- intermittente *D59.6*
- lors de
- - néphrose *N17.0*
- - paludisme *B50.8*
- marche *D59.6*
- nocturne *D59.5*
- paroxystique, nocturne *D59.5*
- provoquée par
- - anémie, hémolytique, acquise NCA *D59.6*
- - effort NCA *D59.6*
- - hémolyse NCA *D59.6*

Hémolymphangiome *D18.19*

Hémolyse
- augmentée, avec
- - ictère néonatal *P58.9*
- - ictère, néonatal NCA *P58.9*
- auto-immune *D59.1*
- avec hémoglobinurie NCA *D59.6*
- intravasculaire
- - après
- - - avortement *O08.1*
- - - grossesse extra-utérine *O08.1*
- - - grossesse môlaire *O08.1*
- - après l'accouchement *O72.3*
- - avec hémorragie, pendant l'accouchement, augmentée *O67.0*
- néonatale, augmentée *P58.8*
- par
- - lymphocytes (transfusion de-) *T80.8*
- - plasma (transfusion de -) *T80.8*

Hémolytique - *voir* Type de maladie

hémopathie clonale non mastocytaire SM-AHNMD] , Mastocytose systémique associé à une *D47.0*

Hémopathie, avec arthrite NCA *D75.9+, M36.3**

Hémopéricarde *I31.2*
- chez le nouveau-né *P54.8*
- complication, aiguë, après infarctus du myocarde, aigu *I23.0*
- lors de
- - lacération. coeur *S26.0*
- - lésion traumatique, coeur *S26.0*
- - rupture, paroi cardiaque, après infarctus du myocarde, aigu *I23.0*
- traumatique *S26.0*

Hémopéritoine *K66.1*
- infectieux *K65.9*
- traumatique *S36.81*

Hémophagocytaire
- lymphohistiocytose *D76.1*
- réticulose, familiale *D76.1*
- syndrome, lors d'infection *D76.2*

Hémophile *D68.9*

Hémophile –*suite*
- héréditaire *D68.9*
- par prédisposition familiale *D68.9*

Hémophilie *D66*
- A *D66*
- - angio- *D68.0*
- acquise aux anticorps inhibiteurs *D68.8*
- avec
- - arthrite NCA *D66+, M36.2**
- - arthropathie NCA *D66+, M36.2**
- B *D67*
- - angio- *D68.0*
- C *D68.1*
- calciprive *D68.4*
- classique *D66*
- familiale *D66*
- héréditaire *D66*
- inhibiteurs immunitaires (avec manque en-) *D68.8*
- non familiale *D68.4*
- pseudo- *D68.0*
- - héréditaire *D68.0*
- - type
- - - A *D69.8*
- - - B *D68.0*
- pseudo- (Bernuth) *D68.0*
- vasculaire *D68.0*

Hémophtalmie *H44.8*

Hémophtalmie externe *H05.2*

Hémopneumopéricarde *I31.2*

Hémopneumothorax *J94.2*
- hydro- *J94.2*
- lors de lésion traumatique pulmonaire *S27.2*
- traumatique *S27.2*

Hémoptysie *R04.2*
- nouveau-né *P26.9*

Hémoptysie abondante *R04.2*

Hémorragie
- auriculaire *H92.2*
- - non-traumatique *H92.2*
- bronchique *R04.8*
- délivrance *O72.0*
- digestive *K92.2*
- dysfonctionnelle
- - utérus *N93.8*
- - vagin *N93.8*
- épicrânienne sous aponévrotique due à un traumatisme obstétrical *P12.2*
- érosion, artériel *I77.8*
- extériorisée haute *K92.0*
- fibrinolytique acquise *D65.2*
- globe oculaire *H44.8*
- intra-alvéolaire, nouveau-né *P26.8*
- intracérébrale *I61.9*
- intracérébrale hémisphérique *I61.2*
- - corticale *I61.1*
- - sous-corticale *I61.0*
- massives, cérébrales *I61.9*
- muqueuse gastrique *K92.2*
- pétéchiale *R23.3*
- - abdomen *R58*
- - accidentelle
- - - avant l'accouchement *O46.9*
- - - consécutive à un avortement *O08.1*
- - - mère, avec lésion, foetus/nouveau-né *P02.1*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - acyclique *N92.6*
- - adénoïde *J35.8*
- - aiguë, avec anémie *D62*
- - alvéole dentaire, après extraction *T81.0*
- - amygdale tonsille *J35.8*
- - anale *K62.5*
- - anévrisme *I72.9*
- - ano-rectal *K62.5*
- - anormale
- - - génitale *N93.9*
- - - organes génitaux, féminins *N93.9*
- - antepartum *O46.9*
- - - aggravée, par
- - - - coagulation, intravasculaire, disséminée *O46.0*
- - - - hyperfibrinolyse *O46.0*
- - - - hypofibrinogénémie *O46.0*
- - - cas de
- - - - syndrome de défibrination *O46.0*
- - - - trouble, coagulation *O46.0*
- - - cas de déficience, coagulation du sang *O46.0*
- - - dans l'anamnèse, qui infuence le déroulement de la grossesse *Z35.2*
- - anticoagulants tels que le Marcoumar *D68.3*
- - anticoagulants type Falithrom *D68.3*
- - apoplectique *I61.9*
- - après
- - - chirurgie des paupières *H59.8*
- - - expulsion
- - - - foetus *O72.1*
- - - - placenta *O72.1*
- - - interruption de grossesse *O08.1*
- - - intervention *T81.0*
- - - naissance, de l'enfant *O72.1*
- - artère *R58*
- - artères lenticulo-striées *I61.0*
- - articulation *M25.09*
- - articulation du genou, non-traumatique *M25.06*
- - atonique, post-partum *O72.1*
- - autosensibilité érythrocytaire *D69.2*
- - avec
- - - accident cérébro-vasculaire *I61.9*
- - - anémie, puerpérale *O99.0*
- - - choc *R57.1*
- - - ictère
- - - - chez le nouveau-né *P58.1*
- - - - foetal *P58.1*
- - - - néonatal *P58.1*
- - - infarctus, thyroïde *E07.8*
- - bandelette optique *H47.5*
- - basilaire *I61.0*
- - bassinet du rein *N28.8*
- - bronche souche *R04.8*
- - bronchique *R04.8*
- - - cas de tuberculose *A16.4*
- - - tuberculeuse avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.5*
- - buccale *K13.7*
- - bulbaire *I61.5*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - caecum *K92.2*
- - canal
- - - anal *K62.5*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - canal –*suite*
- - - biliaire *K83.8*
- - - déférent *N50.1*
- - - spermatique *N50.1*
- - capillaire *I78.8*
- - - primitive *D69.8*
- - - puerpérale *O72.2*
- - capsule du foie *K76.8*
- - capsule interne *I61.0*
- - capsule rénale *N28.8*
- - cas de
- - - angiodysplasie, côlon *K55.22*
- - - anomalie, placenta *O46.8*
- - - avortement *O06.6*
- - - - échec d'une tentative d'avortement médicale *O07.1*
- - - - septique *O08.8*
- - - - spontané *O03.6*
- - - complication lors de l'accouchement, par
- - - - descente du placenta *O44.10*
- - - - léiomyome, utérin *O67.8*
- - - - traumatisme *O67.8*
- - - début de la grossesse *O20.9*
- - - déchirure, muqueuse, zone cardiaque *K22.6*
- - - décollement prématuré du placenta *O45.9*
- - - descente du palcenta *O44.10*
- - - diverticulose
- - - - avec perforation *K57.81*
- - - - côlon avec péritonite, *K57.21*
- - - - - *K57.31*
- - - - gros intestin ou côlon avec,
- - - - - avec, abcès, *K57.21*
- - - - - avec, perforation, *K57.21*
- - - - - *K57.31*
- - - - l'intestin avec,
- - - - - avec, abcès, *K57.81*
- - - - - avec, perforation, *K57.81*
- - - - - avec, péritonite, *K57.81*
- - - - - *K57.91*
- - - - l'intestin grêle avec,
- - - - - avec, abcès, *K57.01*
- - - - - avec, perforation, *K57.01*
- - - - - avec, péritonite, *K57.01*
- - - - - *K57.11*
- - - - - et du gros intestin ou côlon, *K57.51*
- - - gastrite, érosive, aiguë *K29.0*
- - - grossesse *O46.9*
- - - - avant la fin de la 22ème semaine de grossesse *O20.9*
- - - - cours du 1er trimestre *O20.9*
- - - - dans l'anamnèse *Z35.2*
- - - hémorragie vasa praevia, chez le foetus *P50.0*
- - - inflammation d'un diverticule
- - - - côlon avec péritonite, *K57.23*
- - - - - *K57.33*
- - - - gros intestin ou côlon avec,
- - - - - avec, abcès, *K57.23*
- - - - - avec, perforation, *K57.23*
- - - - - *K57.33*
- - - - l'intestin avec,
- - - - - avec, abcès, *K57.83*
- - - - - avec, perforation, *K57.83*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - cas de –*suite*
- - - inflammation d'un diverticule –*suite*
- - - - l'intestin avec, –*suite*
- - - - - avec, péritonite, *K57.83*
- - - - - *K57.93*
- - - - l'intestin grêle avec,
- - - - - avec, abcès, *K57.03*
- - - - - avec, perforation, *K57.03*
- - - - - avec, péritonite, *K57.03*
- - - - - *K57.13*
- - - - - et du gros intestin ou côlon, *K57.53*
- - - lacération, cerveau, due à un traumatisme obstétrical *P10.1*
- - - placenta
- - - - adhérent *O72.0*
- - - - praevia *O44.11*
- - - - - marginal, *O44.11*
- - - - - partiel, *O44.11*
- - - - - total, *O44.11*
- - - rétention
- - - - caduque *O72.2*
- - - - d'une partie des membranes fœtales *O72.2*
- - - - placenta *O72.0*
- - - - - complication, accouchement, *O72.0*
- - - - rejet du placenta (délivrance), complication, accouchement *O72.0*
- - - - résidus placentaires *O72.2*
- - - rétention de membranes, complication, accouchement *O72.2*
- - - rupture, sinus marginal, placentaire *O46.8*
- - - thérapie à long terme, anticoagulants *D68.3*
- - - thérapie au Falithrom *D68.3*
- - - thérapie au Marcoumar *D68.3*
- - - toux *R04.2*
- - - ulcère
- - - - duodénal aigu, *K26.0*
- - - - - *K26.4*
- - - - - chronique, *K26.4*
- - - - duodénum *K26.4*
- - - - gastro-duodénal aigu, *K27.0*
- - - - - *K27.4*
- - - - - chronique, *K27.4*
- - - - - jéjunal, aigu, *K28.0*
- - - - l'estomac, aigü *K25.0*
- - - - stomacal aigu, *K25.0*
- - - - - *K25.4*
- - - - - chronique, *K25.4*
- - - ulcère NCA *K27.4*
- - - - gastro-jéjunal *K28.4*
- - - - - chronique, *K28.4*
- - - varices
- - - - cardia *I86.4*
- - - - muqueuse du fundus (muqueuse gastrique) *I86.4*
- - - - oesophagiennes *I85.0*
- - - - - cas de cirrhose, foie, alcoolique, *K70.3+*
- - - - - cas de cirrhose, foie, toxique, *K71.7+*
- - - - - cas de cirrhose, foie, *K74.6+*
- - cavité buccale *K13.7*
- - cavité péritonéale, libre *R58*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - cérébelleuse *S06.30*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P52.6*
- - - non-traumatique *I61.4*
- - - traumatique *S06.34*
- - cérébrale *I61.9*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P52.4*
- - - due à un traumatisme obstétrical *P10.1*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - cérébro-méningée *I61.8*
- - cérébro-spinale *I61.9*
- - cérébro-vasculaire *I61.9*
- - cerveau *I61.9*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P52.4*
- - - complication, accouchement *O99.4*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - - infratentorielle, traumatique *S06.8*
- - - intraventriculaire *I61.5*
- - - miliaire, non-traumatique *I61.9*
- - - non-traumatique, chez le foetus/nouveau-né *P52.4*
- - - par
- - - - syphilis *A52.0+, I68.8**
- - - - traumatisme obstétrical *P10.1*
- - - post-partum *O99.4*
- - - supratentorielle, traumatique *S06.8*
- - - traumatique *S06.8*
- - cervelet *I61.4*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - - intracérébrale *I61.4*
- - - non-traumatique *I61.4*
- - - traumatique *S06.8*
- - chambre antérieure de l'oeil *H21.0*
- - chambre antérieure, provoquée par l'opération *H59.8*
- - chez le nouveau-né *P54.9*
- - choroïde *H31.3*
- - - expulsive *H31.3*
- - - sous-rétinienne *H31.3*
- - climatérique *N92.4*
- - cochlée *H83.8*
- - coeur *I51.8*
- - col de l'utérus (cervix uteri) *N88.8*
- - - moignon NCA *N88.8*
- - col vésical *N32.8*
- - côlon *K92.2*
- - complication, accouchement *O67.9*
- - - cas de
- - - - afibrinogénémie *O67.0*
- - - - hyperfibrinolyse *O67.0*
- - - - hypofibrinogémie *O67.0*
- - - - troubles de la coagulation *O67.0*
- - compression cérébrale, hypertension intra-crânienne, avec lésions cérébrales, couvertes, graves *S06.21, S01.83!*
- - conduit auditif *H92.2*
- - conjonctive *H11.3*
- - - chez le nouveau-né *P54.8*
- - contact *N93.0*
- - contusions cérébrales *S06.8*
- - cordon ombilical *P51.9*
- - cordon ombilical, entraînant des complications, lors de l'accouchement *O69.5*
- - cordon spermatique *N50.1*
- - corps ciliaire *H21.0*
- - corps de Luys *I61.0*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - corps vitré *H43.1*
- - - avec foramen, rétinien *H43.1*
- - - cas de syphilis tardive *A52.7+, H45.0**
- - - peropératoire *H59.8*
- - - postopératoire *H59.8*
- - - traumatique *H43.1*
- - cortex rénal *N28.8*
- - cortex sensoriel *I61.9*
- - cortex, visuel *H47.6*
- - cortical
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - corticale
- - - cerveau *I61.1*
- - corticosurrénale *E27.4*
- - crânienne *I62.9*
- - cuir chevelu *S00.05*
- - cutanée *R23.3*
- - - chez le nouveau-né *P54.5*
- - - par autosensibilisation, érythrocytaire *D69.2*
- - dans la
- - - ménopause *N92.4*
- - - ménopause, artificielle *N95.3*
- - - post-ménopause *N95.0*
- - - puberté, abondante *N92.2*
- - délivrance *O72.0*
- - d'une trachéotomie *J95.0*
- - duodénum *K92.2*
- - endocarde *I51.8*
- - épicrânienne, sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical *P12.2*
- - épididyme *N50.1*
- - épidurale *S06.4*
- - - traumatique *S06.4*
- - épipharynx *R04.0*
- - épiploon *K66.1*
- - érosion artérielle *I77.8*
- - et
- - - abcès, en cas de
- - - - diverticulite de l'intestin grêle, du côlon *K57.43*
- - - - diverticulose de l'intestin grêle et du côlon *K57.41*
- - - perforation, en cas de
- - - - diverticulose de l'intestin grêle et du côlon *K57.41*
- - - - dverticulite de l'intestin grêle et du côlon *K57.43*
- - - - ulcère
- - - - - gastro-duodénal,
- - - - - l'estomac, aigu, *K25.2*
- - - - - duodénum, aigu, *K26.2*
- - - - - duodénum, *K26.6*
- - - - - duodénum, chronique, *K26.6*
- - - - - gastro-duodénal, aigu, *K27.2*
- - - - - gastro-duodénal, jéjunal, aigu, *K28.2*
- - - - ulcère, gastro-jéjunal, aigu *K28.2*
- - - péritonite en cas de
- - - - diverticulite de l'intestin grêle et du côlon *K57.43*
- - - - diverticulose de l'intestin grêle et du côlon *K57.41*
- - état puerpéral (post-partum) *O72.1*
- - état puerpéral, tardive, due à une rétention de résidus placentaires *O72.2*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - expansion alvéolaire *K08.88*
- - expulsive, après extraction du cristallin *T81.0*
- - extra-durale
- - - chez le foetus/nouveau-né *P52.8*
- - - due à un traumatisme obstétrical *P10.8*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - - traumatique *S06.4*
- - familiale *D68.9*
- - fibrinolyse acquise *D65.2*
- - fibrinolytique acquise *D65.2*
- - foetale
- - - par
- - - - placenta *P50.2*
- - - - rupture du cordon ombilical *P50.1*
- - - - section du cordon ombilical d'un jumeau *P50.5*
- - - par vasa praevia *P50.0*
- - foeto-foetale *P50.3*
- - fœto-maternelle *P50.4*
- - - avec césarienne *O43.0*
- - foetus *P50.9*
- - foie *K76.8*
- - follicule de De Graaf, rompu *N83.0*
- - fond de l'oeil *H35.6*
- - fosse crânienne postérieure
- - - chez le foetus/nouveau-né *P52.6*
- - - non-traumatique *I61.8*
- - Fuchs, globe oculaire *H44.8*
- - gaine du nerf optique *H47.0*
- - galéa *S00.05*
- - ganglions basaux *I61.0*
- - gastrique *K92.2*
- - gastro-intestinale *K92.2*
- - - chez le nouveau-né *P54.3*
- - gencive *K06.8*
- - glande parathyroïde, spontanée *E21.4*
- - globe oculaire *H44.8*
- - gorge *R04.1*
- - gros intestin ou côlon *K92.2*
- - gynécologique *N93.9*
- - - dysfonctionnelle *N93.8*
- - hémisphère cérébral, intracérébral
- - - sous-corticale *I61.0*
- - hémisphère cérébral, intra-cérébrale
- - - corticale *I61.1*
- - hile du poumon *R04.8*
- - hypopharyngienne *R58*
- - hypophyse *E23.6*
- - incision d'opération césarienne *O90.2*
- - intermenstruelle *N92.3*
- - - irrégulière *N92.1*
- - - régulière *N92.3*
- - interne *R58*
- - intestin *K92.2*
- - - chez le nouveau-né *P54.3*
- - - dans l'anamnèse personnelle *Z87.1*
- - - occulte *K92.2*
- - intestin grêle *K92.2*
- - intra-abdominale *R58*
- - intra-alvéolaire, chez le nouveau-né *P26.8*
- - intracérébrale *I61.9*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P52.4*
- - - complication, accouchement *O99.4*
- - - dans l'hémisphère cérébral *I61.2*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - intracérébrale –*suite*
- - - diffuse, traumatique *S06.20*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - - intraventriculaire *I61.5*
- - - lors d'une grossesse *O99.4*
- - - multiples *S06.23*
- - - - localisations *I61.6*
- - - par un angiome *D18.02*
- - - profonde *I61.0*
- - - séquelles *I69.1*
- - - superficielle *I61.1*
- - - traumatique, focal *S06.30*
- - intracrânienne *I62.9*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P52.9*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - - non-traumatique *I62.9*
- - - - séquelles, NCA *I69.2*
- - - par
- - - - anoxie, chez le foetus/nouveau-né *P52.9*
- - - - hypoxie, chez le foetus/nouveau-né *P52.9*
- - - - traumatisme obstétrical *P10.9*
- - - traumatique *S06.8*
- - intra-médullaire NCA *G95.1*
- - intra-oculaire *H44.8*
- - intrapartum
- - - aggravée *O67.8*
- - - - par
- - - - - coagulation, intravasculaire, disséminée, *O67.0*
- - - - - hémolyse, intravasculaire, *O67.0*
- - - - - hyperfibrinolyse, *O67.0*
- - - - - hypofibrinogémie, *O67.0*
- - - avec césarienne *O67.9*
- - - cas de
- - - - dyscrasie, sanguine *O67.0*
- - - - syndrome de défibrination *O46.0*
- - - - troubles, coagulation *O67.0*
- - intrapelvienne
- - - chez la femme *N94.8*
- - - chez l'homme *K66.1*
- - intra-péritonéale *K66.1*
- - intrapontine *I61.3*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - intra-rétinienne *H35.6*
- - intra-utérine *N85.7*
- - intraventriculaire *I61.5*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P52.3*
- - - due à un traumatisme obstétrical *P10.2*
- - intravésicale *N32.8*
- - iris *H21.0*
- - - post-infectieuse *H21.0*
- - - post-inflammatoire *H21.0*
- - - toxique *H21.0*
- - irrégulière *N92.6*
- - kyste, corps jaune, rupture *N83.1*
- - labyrinthe osseux *H83.8*
- - langue *K14.8*
- - légère, en cas d'omphalite *P38*
- - leptoméninge *I60.9*
- - liée à la gestation, mère, avec lésion, foetus *P02.1*
- - ligature, vaisseau *T81.0*
- - lobe, cérébral *I61.1*
- - maculaire *H35.6*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - mamelon *N64.5*
- - médullaire *G95.1*
- - - *I61.3*
- - - bulbe rachidien *I61.3*
- - - chez le nouveau-né, due à un traumatisme obstétrical *P11.59*
- - médullosurrénale *E27.8*
- - méninges *I60.8*
- - - cérébrales *I60.8*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - menstruations, irrégulières *N92.6*
- - mésencéphale *I61.3*
- - mésentère *K66.1*
- - moignon d'amputation, post-opératoire *T81.0*
- - muqueuse du larynx *J38.7*
- - muqueuse gastrique *K29.0*
- - muqueuse NCA *R58*
- - - chez le nouveau-né *P54.8*
- - - vésicule biliaire *K82.8*
- - musculaire *M62.89*
- - myocarde *I51.8*
- - nasale *R04.0*
- - - chez le nouveau-né *P54.8*
- - nasopharynx *R04.1*
- - nerf optique *H47.0*
- - non-traumatique
- - - avec glaucome secondaire *H40.5*
- - - cervelet, chez le foetus/nouveau-né *P52.6*
- - - épidurale *I62.1*
- - - extradurale *I62.1*
- - - intracérébrale, chez le foetus/nouveau-né *P52.4*
- - - intraventriculaire, chez le foetus/nouveau-né
- - - - 1er degré *P52.0*
- - - - 2ème degré *P52.1*
- - - - 3ème degré *P52.2*
- - - secondaire *R58*
- - - sous-arachnoïdienne, chez le foetus/nouveau-né *P52.5*
- - noyau subthalamique *I61.0*
- - noyaux gris centraux ou ganglions basaux *I61.3*
- - occulte NCA *R58*
- - oeil *H57.8*
- - oesophagienne *K22.8*
- - ombilicale
- - - chez le nouveau-né *P51.9*
- - - massive, chez le nouveau-né *P51.0*
- - ongle *L60.8*
- - oraganes génitaux, féminins *N93.9*
- - orbite *H05.2*
- - oreille interne *H83.8*
- - oreille moyenne *H74.8*
- - organe
- - - interne NCA *R58*
- - - interne, chez le nouveau-né *P54.8*
- - organes génitaux, masculins *N50.1*
- - oropharyngée *R04.1*
- - ovarienne NCA *N83.8*
- - ovulation *N92.3*
- - pancréas *K86.8*
- - par
- - - appareil
- - - - coeur NCA *T82.8*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - par –*suite*
- - - appareil –*suite*
- - - - dans l'appareil urinaire NCA *T83.8*
- - - - dans le tractus génital NCA *T83.8*
- - - - gastrointestinal *T85.88*
- - - - orthopédique NCA *T84.8*
- - - avortement, menace de (spontané) *O20.0*
- - - carence, en vitamine K *D68.4*
- - - cathéter NCA *T85.88*
- - - fixation orthopédique interne NCA *T84.8*
- - - glissement de la ligature ombilicale *P51.8*
- - - greffe de cornée NCA *T85.81*
- - - greffe ou transplantation cardiaque *T82.8*
- - - greffe vasculaire *T82.8*
- - - greffon artériel NCA *T82.8*
- - - implant cardiaque *T82.8*
- - - implant mammaire *T85.88*
- - - implant vasculaire *T82.8*
- - - omphalotomie (section du cordon ombilical), incorrecte *P51.8*
- - - prothèse articulaire *T84.8*
- - - prothèse cardiaque *T82.8*
- - - prothèse orbitaire *T85.81*
- - - prothèse vasculaire *T82.8*
- - - prothèses, implants ou greffes *T85.88*
- - - shunt ventriculaire intracrânien *T85.81*
- - - transfusion, foeto-foetale *P50.3*
- - parenchyme pulmonaire *R04.8*
- - parenchyme testiculaire *N50.1*
- - paroi abdominale *R58*
- - parties molles *R58*
- - pendant l'accouchement *O67.9*
- - périanale *K62.5*
- - péricarde *I31.2*
- - péritoine *K66.1*
- - permanente (gynécologique) *N93.9*
- - pétéchiale par autosensibilisation, érythrocytaire *D69.2*
- - pharyngienne *R58*
- - placenta *O46.8*
- - - antepartum *O46.8*
- - - avec lésion, affectant foetus *P02.1*
- - - complication, accouchement NCA *O67.8*
- - - intrapartum *O67.8*
- - - par
- - - - dommages chirugicaux ou instrumentaux, avec lésion, foetus/nouveau-né *P02.1*
- - - - dommages instrumentaux *O46.8*
- - plaie épisiotomique *O90.2*
- - plèvre *R04.8*
- - pontique *I61.3*
- - - dans l'état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - post-coïtale *N93.0*
- - post-ménopausique *N95.0*
- - post-menstruelle *N93.8*
- - post-opératoire *T81.0*
- - - avec glaucome secondaire *H40.8*
- - post-partum *O72.1*
- - - atonique *O72.1*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - post-partum –*suite*
- - - cas de placenta percreta *O72.0*
- - - dans l'anamnèse, qui infuence le déroulement de la grossesse *Z35.2*
- - - par rétention du placenta *O72.0*
- - - secondaire *O72.2*
- - - tardive *O72.2*
- - poumon *R04.8*
- - - chez le nouveau-né *P26.9*
- - précédant l'accouchement *O46.9*
- - - cas de
- - - - afibrinogénémie *O46.0*
- - - - coagulation intravasculaire disséminée *O46.0*
- - - - trouble de la coagulation *O46.0*
- - précédant l'accouchement, en cas de dyscrasie, sang *O46.0*
- - préménopause *N92.4*
- - prémenstruelle *N93.8*
- - prépubertaire, de l'utérus *N93.8*
- - prérétinienne *H35.6*
- - prolongée *D68.9*
- - prostate *N42.1*
- - protubérance cérébrale *I61.3*
- - psoas *M62.85*
- - pubertaire, de l'utérus *N92.2*
- - puerpérale *O72.1*
- - pulmonaire *R04.8*
- - - chez le nouveau-né *P26.9*
- - - massive
- - - - chez le nouveau-né *P26.1*
- - - - survenant pendant la période périnatale *P26.1*
- - - massive, chez le nouveau-né *P26.1*
- - pulpe *K04.9*
- - - avec coloration, des dents *K03.7*
- - rate *D73.5*
- - récidivante, consécutive à l'hémorragie initiale lors du traumatisme *T79.2*
- - rectum *K62.5*
- - - chez le nouveau-né *P54.2*
- - rénale *N28.8*
- - retardée, en période puerpérale *O72.2*
- - rétine *H35.6*
- - - diabétique *E14.30+, H36.0**
- - - interne *H35.6*
- - - sous-hyaloïde *H35.6*
- - - traumatique *S05.8*
- - rétropéritonéale *R58*
- - rétroplacentaire, soins, femmes enceintes *O43.8*
- - saignements post-coïtaux et de contact *N93.0*
- - saignements prémenstruels / traces de saignements *N93.9*
- - - début de grossesse *O20.9*
- - scrotum *N50.1*
- - secondaire, consécutive à l'hémorragie initiale lors du traumatisme *T79.2*
- - sein *N64.5*
- - sévère
- - - antepartum, en cas d'afibrinogénémie *O46.0*
- - - cas de
- - - - afibrinogénémie, lors d'un décollement placentaire *O45.0*
- - - - coagulation du sang, intravasculaire disséminée, par décollement placentaire *O45.0*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - sévère –*suite*
- - - cas de –*suite*
- - - - hyperfibrinogénémie, lors d'un décollement placentaire *O45.0*
- - - - hyperfibrinolyse, lors d'un décollement placentaire *O45.0*
- - - compliquant l'échec d'une tentative d'avortement *O07.6*
- - - intrapartum, en cas d'afibrinogénémie *O67.0*
- - sinus marginal, placenta *O46.8*
- - sous-arachnoïdienne *I60.9*
- - - anévrismale, dans l'anamnèse personnelle *Z86.7*
- - - artère
- - - - basilaire *I60.4*
- - - - cérébrale moyenne *I60.1*
- - - - communicante antérieure, *I60.2*
- - - - - postérieure, *I60.3*
- - - - - *I60.7*
- - - - vertébrale *I60.5*
- - - artère cérébrale *I60.7*
- - - artères intracrâniennes, plusieurs *I60.6*
- - - avec vasospasme *I67.80!*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P52.5*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - - non-traumatique *I60.9*
- - - par
- - - - anévrisme cérébral, rupture *I60.9*
- - - - traumatisme obstétrical *P10.3*
- - - post-partum *O99.4*
- - - provenant
- - - - sinus caverneux *I60.8*
- - - - siphon carotidien et bifurcation *I60.0*
- - - séquelles *I69.0*
- - - traumatique *S06.6*
- - sous-conjonctivale *H11.3*
- - - due à un traumatisme obstétrical *P15.3*
- - sous-corticale
- - - cérébrale *I61.0*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - sous-cutanée *R23.3*
- - sous-durale *I62.09*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P52.8*
- - - due à un traumatisme obstétrical *P10.0*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - - non-traumatique *I62.09*
- - - - aiguë *I62.00*
- - - - subaiguë *I62.01*
- - - spinale *G95.1*
- - - traumatique *S06.5*
- - sous-épendymaire
- - - avec envahissement, intraventriculaire, chez le foetus/nouveau-né *P52.1*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P52.0*
- - sous-hyaloïde *H35.6*
- - sous-périostée *M89.89*
- - sous-phrénique *R58*
- - sous-rétinienne *H35.6*
- - sous-tentorielle *I62.09*
- - sous-unguéale *L60.8*
- - sphincter du rectum *K62.5*
- - spinale *G95.1*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - stomacale *K92.2*
- - - chez le nouveau-né *P54.3*
- - - dans l'anamnèse personnelle *Z87.1*
- - strie, rétinienne *H35.6*
- - suites de couches *O72.0*
- - surrénale *E27.4*
- - - chez le nouveau-né *P54.4*
- - - par septicémie, par méningocoques *A39.1+, E35.1**
- - système bronchique *R04.8*
- - système des cavités rénales *N28.8*
- - système, trachéo-bronchique *R04.8*
- - tardive
- - - après
- - - - fausse couche *O08.1*
- - - - grossesse extra-utérine *O08.1*
- - - - grossesse môlaire *O08.1*
- - - consécutive à un avortement *O06.6*
- - tentorielle *S06.8*
- - testicule *N50.1*
- - - traumatique *S30.2*
- - thalamus *I61.3*
- - thymus *E32.8*
- - thyroïde *E07.8*
- - tissus, amygdaliens *J35.8*
- - trachée *R04.1*
- - trachéo-bronchique *R04.8*
- - - chez le nouveau-né *P26.0*
- - traumatique
- - - antepartum *O46.8*
- - - avec glaucome secondaire *H40.3*
- - trompe utérine *N83.6*
- - trompes de Fallope *N83.6*
- - tronc cérébral *I61.3*
- - - intracérébrale *I61.3*
- - trop abondante, durant la préménopause *N92.4*
- - troubles *N92.6*
- - - climatériques *N92.4*
- - - gynécologiques *N93.9*
- - - post-ménopausiques *N95.0*
- - - préménopause *N92.4*
- - tunique vaginale *N50.1*
- - ulcère de l'estomac *K25.4*
- - urètre *N36.8*
- - uro-génitale NCA *R31*
- - utérus NCA *N93.9*
- - - anomalie *N93.9*
- - - climatérique ou ménopausique *N92.4*
- - - dysfonctionnelle *N93.8*
- - - fonctionnelle *N93.8*
- - - indépendamment du cycle menstruel NCA *N93.9*
- - - intermenstruelle *N92.3*
- - - - irrégulière *N92.1*
- - - post-ménopausique *N95.0*
- - - préménopause *N92.4*
- - vagin *N93.9*
- - - aiguë *N93.9*
- - - anormale *N93.9*
- - - chez le nouveau-né *P54.6*
- - - dysfonctionnelle *N93.8*
- - - fonctionnelle *N93.8*
- - - post-coïtale *N93.0*
- - vaisseau rétinien *H35.6*
- - varices, membres inférieurs *I83.9*

Hémorragie –*suite*
- pétéchiale –*suite*
- - vasa praevia *O69.4*
- - - affectant foetus ou nouveau-né *P50.0*
- - veineuse *R58*
- - ventriculaire *I61.5*
- - - état puerpéral (post-partum) *O99.4*
- - verge *N48.8*
- - vésicale *N32.8*
- - vésicule séminale *N50.1*
- - vessie *N32.8*
- - vicariante *N94.8*
- - viscérale *R58*
- - - chez le nouveau-né *P54.8*
- - voies respiratoires *R04.9, R04.8*
- - - supérieures *R04.8*
- - voies urinaires *N39.88*
- - vulve *N90.8*
- secondaire *T81.0*
- - lors de rétention, placenta *O72.0*
- - post-partum *O72.1*
- - - tardive *O72.2*
- - secondaire, à
- - - Hémorragie traumatique *T79.2*
- - - l'accouchement *O72.2*
- sous-arachnoidienne *I60.9*
- - due à une rupture d'anévrismes cérébrale *I60.9*
- urétrale *N36.8*

Hémorragique - *voir* Type de maladie

Hémorroïdaire(s)

hémorroïdaires cutané résiduel cicatrice *K64.4*

Hémorroïde
- pendant la grossesse *O22.4*
- post-partum *O87.2*

hémorroïdes
- Autre *K64.8*
- avec saignement
- - avec procidence à l ' effort, spontanément réductible , *K64.1*
- - - à l ' effort, spontanément réductible, réintroduction manuelle possible , *K64.2*
- - - , réintroduction manuelle impossible , *K64.3*
- - SAI *K64.9*
- - sans procidence , *K64.0*
- deuxième degré *K64.1*
- premier degré *K64.0*
- quatrième degré *K64.3*
- sans autre précision *K64.9*
- thrombose veineux périanal *K64*
- troisième degré *K64.2*

Hémosidérine, accumulation *E83.1*

Hémosidérose *E83.1*
- diététique *E83.1*
- idiopathique pulmonaire *E83.1+, J99.8**
- plasma *E83.1*
- pulmonaire *E83.1+, J99.8**
- transfusionnelle *T80.8*

Hémosidérose plasmatique *E83.1*

Hémosidérose pulmonaire, anémie *E83.1+, J99.8**

Hémosidérose, transfusion *T80.8*

Hémostase, allongement *D68.9*

Hémostase, troubles *D68.9*

Hémothorax *J94.2*
- bactérien *J94.2*
- cas de lésion traumatique pulmonaire *S27.1*
- lors d'une lésion traumatique, ouverte *S27.1, S21.83!*
- non tuberculeux *J94.2*
- nouveau-né *P54.8*
- pneumo- *J94.2*
- - lors d'une lésion traumatique pulmonaire *S27.2*
- traumatique *S27.1*
- - avec pneumothorax *S27.2*
- tuberculeux NCA *A16.5*
- tuberculeux, avec confirmation bactériologique ou histologique NCA *A15.6*

Hench-Rosenberg, syndrome de *M12.39*

Henoch-Schoenlein, maladie de *D69.0*

Hepar
- crocatum, foie safran *K76.0*
- lobatum, syphilitique *A52.7+, K77.0**
- moschatum [congestion hépatique] *K76.1*

Héparine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Hépatalgie *K76.8*

hepatica Tumeur malign Angle droit du côlon [*C18.3*

hépatique
-
- abcès *K75.0*
- cirrhose avec décompensation portale *K74.6*
- commun Canal : *C24.0*
- congestion *K76.1*
- décompensation *K72.9*
- distomiase *B66.3+, K77.0**
- Echinococcus granulosus echinococcose kystique] , Infection *B67.0*
- embolie veineuse *I82.0*
- encéphalopathie *K72.9, K72.79!*
- insuffisance *K72.9*
- porphyrie *E80.2*
- - intermittente aiguë *E80.2*
- thrombose *I82.0*
- veine
- - phlébite *I80.8*
- - thrombophlébite *I80.8*

Hépatisation pulmonaire *J18.1*
- aiguë *J18.1*

Hépatite *K75.9*
- A *B15.9*
- - aiguë *B15.9*
- - sans
- - - coma hépatique *B15.9*
- - - séquelles *B15.9*
- - vaccination, nécessité *Z24.6*
- - virale *B15.9*
- - - avec coma hépatique *B15.0, K72.74!*
- acquise à Toxoplasma *B58.1+, K77.0**
- aiguë NCA *K72.0*
- - associée à maladie toxique du foie *K71.2*
- - avec
- - - grossesse *O26.6*

Hépatite *–suite*
- aiguë NCA *–suite*
- - avec *–suite*
- - - insuffisance hépatique *K72.9*
- alccolique *K70.1*
- - aiguë *K70.1*
- - chronique *K70.1*
- antigène Australia [HAA], sujet porteur *Z22.5*
- antigène positif *B19.9*
- antigène, associée à *B16.9*
- associée à
- - maladie toxique du foie NCA *K71.6*
- - mononucléose due à l'herpès virus gamma *B27.0+, K77.0**
- - oreillons *B26.8+, K77.0**
- auto-immune *K75.4*
- avec
- - antigène Australia *B16.9*
- - stéatose hépatique *K76.0*
- B *B16.9*
- - aiguë *B16.9*
- - avec
- - - mise en évidence de
- - - - HBcAG *B16.9*
- - - - HBeAG *B16.9*
- - - - HBsAG *B16.9*
- - chronique *B18.1*
- - et hépatite D *B16.1*
- - immunothérapie prophylactique [immunisation passive] (avec immunoglobuline spécifique) *Z29.1*
- - sans coma hépatique *B16.9*
- - vaccination, nécessité *Z24.6*
- - virale *B16.9*
- - - aiguë
- - - - avec infection associée par l'agent delta
- - - - - et coma hépatique, *B16.0, K72.74!*
- - - - - sans coma hépatique, *B16.1*
- - - - sans infection associée par l'agent delta, avec coma hépatique *B16.2, K72.74!*
- - - chronique *B18.1*
- - - - avec agent delta *B18.0*
- - - - sans agent delta *B18.1*
- B et Haemophilus influenzae type b [HB -Hib], vaccination *Z27.8*
- bactérienne *K75.8*
- B-C *B16.9*
- B-E *B16.9*
- BHsAG positive, chronique *B18.1*
- B-S *B16.9*
- C *B18.2*
- - virale *B18.2*
- - - aiguë *B17.1*
- - - chronique *B18.2*
- catarrhale
- - aiguë *B15.9*
- - avec coma hépatique *B15.0, K72.74!*
- cholangio- *K75.8*
- cholangiolitique *K75.8*
- cholestatique *K75.8*
- chronique *K73.9*
- chronique active *K73.2*
- chronique active, associée à une maladie toxique du foie *K71.5*
- chronique agressive *K73.2*
- chronique persistante *K73.0*

Hépatite *–suite*
- chronique persistante, associée à une maladie toxique du foie *K71.3*
- congénitale
- - syphilis tertiaire *A50.5+, K77.0**
- - Toxoplasma *P37.1+, K77.0**
- contagieuse *K75.9*
- cytomégalovirus, à *B25.1+, K77.0**
- D
- - avec hépatite B *B16.1*
- - virale *B17.8*
- d'inoculation *B16.9*
- E *B17.2*
- - virale *B17.2*
- - - aiguë *B17.2*
- épidémique *B15.9*
- épidémique, avec coma hépatique *B15.0, K72.74!*
- et B [HAB], vaccination *Z24.6*
- fulminante, avec insuffisance hépatique *K72.9*
- G, virale *B17.8*
- granulomateuse NCA *K75.3*
- incubation *Z20.5*
- infectieuse
- - aiguë *B15.9*
- - avec coma hépatique *B15.0, K72.74!*
- - subaiguë *B15.9*
- infectieuse, avec coma hépatique *B15.0, K72.74!*
- infection *B15.9*
- inoculation, d' *B16.9*
- interstitielle chronique *K74.6*
- lobulaire
- - chronique NCA *K73.1*
- - chronique, associée à maladie toxique du foie *K71.4*
- lupoïde non classée ailleurs , *K75.4*
- lupoïde, associée à maladie toxique du foie *K71.5*
- maligne *K72.9*
- - avec insuffisance hépatique NCA *K72.9*
- - pendant la grossesse *O26.6*
- mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P00.8*
- non A non B *B17.8*
- - aiguë *B17.8*
- non alcoolique, chronique *K73.9*
- non-A, non-B *B17.8*
- - aigue *B17.8*
- nouveau-né *P59.2*
- péri- *K65.8*
- provoquée par
- - amibes *A06.4*
- - Candida *B37.88*
- - cytomégalovirus *B25.1+, K77.0**
- - Entamoebia histolytica *A06.4*
- - immunisation *B16.9*
- - paludisme *B54+, K77.0**
- - sérum, hépatite virale aiguë *B16.9*
- - toxoplasmes *B58.1+, K77.0**
- - virus *B19.9*
- - - avec
- - - - arthrite postinfectieuse *B19.9+, M03.29**
- - - - arthropathie postinfectieuse NCA *B19.9+, M03.29**
- - - - coma hépatique *B19.0, K72.74!*
- - - chronique *B18.9*

Hépatite *–suite*
- provoquée par *–suite*
- - virus *–suite*
- - - congénitale *P35.3*
- - - lors de
- - - - grossesse *O98.4*
- - - - naissance *O98.4*
- - - postpartum *O98.4*
- - - séquelles *B94.2*
- - virus Coxsackie *B33.8+, K77.0**
- - virus de l'herpès *B00.8+, K77.0**
- purulente *K75.0*
- réactionnelle non spécifique *K75.2*
- récidivante *K73.9*
- sérum homologue *B16.9*
- subaiguë, pendant la grossesse *O26.6*
- syphilis précoce, congénitale *A50.0+, K77.0**
- syphilis tertiaire *A52.7+, K77.0**
- syphilitique *A52.7+, K77.0**
- - congénitale *A50.0+, K77.0**
- - - tardive *A50.5+, K77.0**
- - secondaire *A51.4+, K77.0**
- toxique *K71.6*
- - néonatale *P59.2*
- transfusion *B16.9*
- transfusionnelle *B16.9*
- tuberculeuse *A18.8+, K77.0**
- vaccination *Z24.6*
- virale, séquelles *B94.2*

Hépatoblastome *C22.2*

Hépatocellulaire
- adénome *D13.4*
- carcinome *C22.0*
- - avec cholangiosarcome associé *C22.0*

Hépatocérébral, syndrome *G93.7*

Hépatocholangiome *D13.4*

Hépatocholangite *K75.8*

Hépatocystite *K81.8*

Hépatolenticulaire, dégénérescence *E83.0*
- avec démence *E83.0+, F02.8**

Hépatome *C22.0*
- adéno- *D13.4*
- bénin *D13.4*
- embryonnaire *C22.0*
- malin *C22.0*

Hépatomégalie *R16.0*
- alcoolique *K70.9*
- associée à
- - mononucléose, due à herpès virus gamma *B27.0+, K77.0**
- - VIH *B23.8, R16.0*
- avec splénomégalie *R16.2*
- congénitale *Q44.7*

Hépatomégalie diffuse due à glycogénose *E74.0+, K77.8**

Hépatonéphromégalie glycogénique *E74.0*

Hépatopathie *K76.9*
- alcoolique *K70.9*
- chronique *K76.9*
- pendant la grossesse *O26.6*
- toxique, nutritionnelle *K71.9*

Hépatophosphorylase, carence *E74.0*

Hépatoptose *K76.8*

Hépatorénal(e)
- dégénérescence *K76.7*

Hépatorénal(e) *–suite*
- glycogénose *E74.0*
- insuffisance *K76.7*
- syndrome *K76.7*
- - après le travail et l'accouchement *O90.4*
- - postopératoire *K91.88*
- - postpartum *O90.4*

Hépatose *K76.8*
- cholangio- *K76.8*
- cholestatique *K76.8*
- lipochrome, associée à un ictère non hémolytique constitutionnel *E80.6*
- toxique *K71.9*

Hépatosplénique
- cellules T Lymphome *C86.1*
- cirrhose *K74.6*
- fibrose, avec hypertension portale *K76.6*

Hépatosplénomégalie *R16.2*
- congénitale *Q89.8*
- hyperlipémique, type Bürger-Grütz *E78.3+, K77.8**
- myéloïde, mégacaryocytaire *D75.8*

Herbicide, effets, toxiques *T60.3*

Héréditaie, ataxie, cérébelleuse *G11.9*

héréditaire
-
- Autre facteur coagulation Carence *D68.28*
- chorée *G10*
- facteur
- - Carence *D68.24*
- - I Carence *D68.20*
- - II Carence *D68.21*
- - V Carence *D68.22*
- - VII Carence *D68.23*
- - XII Carence *D68.25*
- - XIII Carence *D68.26*
- ostéosclérose systématisée *Q78.3*

Héréditaire, dégénerescence, maculaire *H35.5*

Héréditaire, familiale, amylose *E85.2*
- neuropathique *E85.1*
- non neuropathique *E85.0*

Héréditaire, rétinopathie *Q14.1*

Hérédopathie
- ataxique polynévritique *G60.1*
- hemeraloptica polyneuritiformis *G60.1*

Hérédosyphilis *A50.9*

Hériditaire, type de maladie

Heringswurm, maladie de *B81.0*

Herlitz, syndrome de *Q81.1*

Hermansky-Pudlak, syndrome *E70.3*

Hermansky-Pudlak, syndrome de *E70.3*

Hermaphrodisme *Q56.0*
- 46, XX, avec ovaires en bandelettes *Q99.1*
- 46,XY, avec ovaires en bandelettes *Q99.1*
- pseudo- *Q56.3*
- VRAI *Q56.0*
- - avec caryotype 46,XX *Q99.1*
- - chimère 46,XX/46,XY *Q99.0*

Hermaphrodyte *Q56.0*
- pseudo *Q56.3*

Hermaphrodyte *–suite*
- vraie *Q56.0*

hernie
- *K46.9*
- abdominale *K46.9*
- - avec gangrène NCA *K45.1*
- - avec occlusion, sans gangrène *K46.0*
- - avec occlusion, sans gangrène NCA *K45.0*
- - irréductible *K46.0*
- - - sans gangrène NCA *K45.0*
- - strangulation, sans gangrène NCA *K45.0*
- acquise *K46.9*
- aine *K40.90*
- - bilatérale
- - - récidivante, sans occlusion *K40.21*
- - - sans occlusion *K40.20*
- - directe *K40.90*
- - - récidivante *K40.91*
- - incarcérée *K40.30*
- - - récidivante *K40.31*
- - incomplète *K40.90*
- - indirecte *K40.90*
- - - récidivante *K40.91*
- - récidive *K40.91*
- - unilatérale
- - - récidivante, sans occlusion *K40.91*
- - - sans occlusion *K40.90*
- avec
- - gangrène *K46.1*
- - - mentionné K43 . 6 - , tout *K43.7*
- - occlusion *K46.0*
- - strangulation *K46.0*
- - - estomac *K46.0*
- - - intestinale *K46.0*
- Bochdaleck *K44.9*
- Bochdaleck, de *K44.9*
- cas de
- - agénésie, diaphragme *Q79.1*
- - occlusion *K46.0*
- - strangulation, intestin, avec gangrène *K46.1*
- cérébrale endo-auriculaire *Q01.8*
- cerveau *Q01.9*
- - canal auditif *Q01.8*
- - congénitale *Q01.9*
- cicatrice *K43.9*
- - incarcérée *K43.0*
- - paroi abdominale *K43.9*
- cicatrice abdominale *K43.9*
- cordis *Q24.8*
- corps cilaires, traumatique *S05.2*
- corps vitré *H43.3*
- - *S05.2*
- - dans la chambre antérieure de l'oeil *H43.0*
- - - *H43.0*
- crurale unilatéral incarcérée sans gangrène , *K41.3*
- cuisse *K41.9*
- - incarcérée *K41.3*
- diaphragmatique *K44.9*
- - avec
- - - blocage *K44.0*
- - - gangrène *K44.1*
- - congénitale *Q79.0*
- - gangréneuse *K44.1*
- - incarcérée, sans gangrène *K44.0*

hernie –*suite*
- diaphragmatique –*suite*
- - irréductible *K44.0*
- - - sans gangrène *K44.0*
- - occlusion, causé par, sans gangrène *K44.0*
- - strangulation, sans gangrène *K44.0*
- diaphragme *K44.9*
- discale *M51.2*
- - lombaires *M51.2*
- disque *M51.2*
- dorsale *K45.8*
- Douglas *N81.5*
- Douglas, de *N81.5*
- épigastrique
- - *K43.9*
- - avec
- - - gangrène *K43.70*
- - - occlusion sans gangrène , *K43.60*
- - partiellement incarcérée *K43.0*
- - sans occlusion gangrène , *K43.90*
- épigastrique, avec gangrène *K43.1*
- fascia *M62.89*
- fémorale *K41.9*
- - avec occlusion *K41.3*
- - bilatérale *K41.2*
- - - avec
- - - - gangrène *K41.1*
- - - - occlusion, sans gangrène *K41.0*
- - droite *K41.9*
- - gauche *K41.9*
- - incarcérée
- - - sans gangrène *K41.3*
- - - unilatérale, sans gangrène *K41.3*
- - irréductible *K41.3*
- - - sans gangrène *K41.3*
- - - unilatérale, sans gangrène *K41.3*
- - irrépétible *K41.3*
- - occlusion, causée par
- - - sans gangrène *K41.3*
- - - unilatérale, sans gangrène *K41.3*
- - strangulation
- - - sans gangrène *K41.3*
- - - unilatérale, sans gangrène *K41.3*
- - unilatérale *K41.9*
- - - avec blocage *K41.3*
- - - - avec gangrène *K41.4*
- fémoro-inguinale *K40.90*
- - récidivante *K40.91*
- Foramen magnum *G93.5*
- - congénitale *Q01.8*
- gangréneuse, avec
- - Incarcération *K46.1*
- - strangulation, estomac *K46.1*
- hiatale *K44.9*
- - abdominale *K44.9*
- - avec
- - - gangrène *K44.1*
- - - occlusion *K44.0*
- - avec occlusion *K44.0*
- - axiale *K44.9*
- - congénitale *Q40.1*
- - thoracique *K44.9*
- incarcérée, sans gangrène *K46.0*
- incisionnelle
- - avec gangrène *K43.1*
- - provoquant occlusion sans gangrène , *K43.0*

hernie –*suite*
- incisionnelle –*suite*
- - SAI *K43.2*
- - sans occlusion gangrène , *K43.2*
- indirecte *K40.90*
- - récidivante *K40.91*
- inguinale *K40.90*
- - avec
- - - gangrène *K40.40*
- - - Incarcération *K40.30*
- - - occlusion *K40.30*
- - - strangulation *K40.30*
- - bilatérale *K40.20*
- - - avec
- - - - gangrène *K40.10*
- - - - occlusion, sans gangrène *K40.00*
- - - récidivante *K40.21*
- - - - avec
- - - - - occlusion, sans gangrène, *K40.01*
- - - - - gangrène, *K40.11*
- - - - sans occlusion *K40.21*
- - - sans occlusion *K40.20*
- - directe *K40.90*
- - - récidivante *K40.91*
- - incarcérée
- - - sans gangrène *K40.30*
- - - unilatérale, sans gangrène *K40.30*
- - indirecte *K40.90*
- - - récidivante *K40.91*
- - irrépétible
- - - sans gangrène *K40.30*
- - - unilatérale, sans gangrène *K40.30*
- - oblique *K40.90*
- - - récidivante *K40.91*
- - occlusion, causée par
- - - sans gangrène *K40.30*
- - - unilatérale, sans gangrène *K40.30*
- - récidivante *K40.91*
- - - avec
- - - - Incarcération *K40.31*
- - - - occlusion *K40.31*
- - - - strangulation *K40.31*
- - - avec occlusion *K40.31*
- - strangulation
- - - sans gangrène *K40.30*
- - - unilatérale, sans gangrène *K40.30*
- - unilatérale *K40.90*
- - - avec
- - - - gangrène *K40.40*
- - - - occlusion *K40.30*
- - - récidivante *K40.91*
- - - récidivante, sans occlusion *K40.91*
- - - sans occlusion *K40.90*
- inguino-scrotale *K40.90*
- - récidivante *K40.91*
- interstitielle *K46.9*
- - avec gangrène *K46.1*
- - incarcérée, sans gangrène *K46.0*
- - irrépétible, sans gangrène *K46.0*
- - occlusion, causé par, sans gangrène *K46.0*
- - strangulation, sans gangrène *K46.0*
- intestinale *K46.9*
- - incarcérée, sans gangrène *K46.0*
- - irrépétible, sans gangrène *K46.0*
- - occlusion, causé par, sans gangrène *K46.0*
- - strangulation, sans gangrène *K46.0*

hernie –*suite*
- intra-abdominale *K46.9*
- - avec gangrène *K46.1*
- - incarcérée, sans gangrène *K46.0*
- - irrépétible, sans gangrène *K46.0*
- - occlusion, causé par, sans gangrène *K46.0*
- - strangulation, sans gangrène *K46.0*
- intraspongieuse *M51.4*
- intrathoracique, chez le nouveau-né *Q79.0*
- iris, traumatique *S05.2*
- irrépétible *K46.0*
- - gangréneuse *K46.1*
- - sans gangrène *K46.0*
- ischiatique *K45.8*
- - avec gangrène *K45.1*
- - incarcérée, sans gangrène *K45.0*
- - irréductible, sans gangrène *K45.0*
- - occlusion, causé par, sans gangrène *K45.0*
- - strangulation, sans gangrène *K45.0*
- labiale *K40.90*
- - récidivante *K40.91*
- labiale postérieure *K40.90*
- - récidivante *K40.91*
- lentille, traumatique *S05.2*
- ligne blanc *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- Littré *K45.8*
- lombale *K45.8*
- - avec gangrène *K45.1*
- - incarcérée, sans gangrène *K45.0*
- - irrépétible, sans gangrène *K45.0*
- - occlusion, causé par, sans gangrène *K45.0*
- - strangulation, sans gangrène *K45.0*
- malposition ovaire *N83.4*
- méat urinaire, congénitale *Q64.7*
- médiastinale *J98.5*
- mentionné K43 6 étranglée sans gangrène , tout *K43.6*
- musculaire *M62.89*
- nucleus pulposus NCA *M51.2*
- - avec
- - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - cervicale *M50.2*
- - - avec
- - - - névrite *M50.1+, G55.1**
- - - - radiculalgie *M50.1+, G55.1**
- - - - radiculopathie *M50.1+, G55.1**
- - cervico-thoracique *M50.2*
- - - avec
- - - - névrite *M50.1+, G55.1**
- - - - radiculalgie *M50.1+, G55.1**
- - - - radiculopathie *M50.1+, G55.1**
- - lombaire *M51.2*
- - - avec
- - - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - - radiculalgie *M51.1+, G55.1**
- - - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - lombo-sacrée, avec
- - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculalgie *M51.1+, G55.1**
- - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**

hernie –*suite*
- nucleus pulposus NCA –*suite*
- - thoracique *M51.2*
- - - avec
- - - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - - radiculalgie *M51.1+, G55.1**
- - - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - - due à une lésion, sévère *S23.10*
- - thoraco-lombaire *M51.2*
- - - avec
- - - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - - radiculalgie *M51.1+, G55.1**
- - - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - - due à une lésion, sévère *S23.10*
- oblique *K40.90*
- - récidivante *K40.91*
- obstructive *K46.0*
- - gangréneuse *K46.1*
- obturatrice *K45.8*
- - avec gangrène *K45.1*
- - incarcérée, sans gangrène *K45.0*
- - irréductible, sans gangrène *K45.0*
- - occlusion, causé par, sans gangrène *K45.0*
- - strangulation, sans gangrène *K45.0*
- occlusion, causé par, sans gangrène *K46.0*
- ombilic *K42.9*
- - incarcérée *K42.0*
- - sans occlusion *K42.9*
- ombilicale *K42.9*
- - avec
- - - gangrène *K42.1*
- - - occlusion *K42.0*
- - gangréneuse *K42.1*
- - incarcérée, sans gangrène *K42.0*
- - irrépétible *K42.0*
- - - sans gangrène *K42.0*
- - occlusion, causé par, sans gangrène *K42.0*
- - strangulation, sans gangrène *K42.0*
- ombilicale, sans occlusion *K42.9*
- omentalis *K46.9*
- ovaire *N83.4*
- par glissement *K40.90*
- - avec gangrène *K40.40*
- - hiatale *K44.9*
- - récurrent (récidivant) *K40.91*
- - - avec gangrène *K40.41*
- para-abdominale *K43.9*
- para-oesophagienne *K44.9*
- - avec gangrène *K44.1*
- - congénitale *Q40.1*
- para-ombilicale *K42.9*
- parastomale
- - avec
- - - gangrène *K43.4*
- - - occlusion sans gangrène , *K43.3*
- - étranglée sans gangrène , *K43.3*
- - SAI *K43.5*
- - sans occlusion gangrène , *K43.5*
- paroi abdominal antérieur
- - avec occlusion, sans gangrène , Autre *K43.68*
- - - gangrène , Autre *K43.78*
- - non précisées avec occlusion sans gangrène , Autre *K43.6*

hernie –*suite*
- paroi abdominal antérieur –*suite*
- - non précisées avec occlusion sans gangrène , Autre –*suite*
- - - précisées avec occlusion, sans gangrène , *K43.69*
- - - précisées avec gangrène , Autre *K43.7*
- - - précisées avec gangrène , *K43.79*
- - - précisées sans occlusion ni gangrène , *K43.99*
- - SAI , *K43.99*
- - sans occlusion ni gangrène , Autre *K43.98*
- paroi abdominale *K43.9*
- - infraombilicale *K42.9*
- paroi vaginale, inférieure *N81.6*
- poumons, sous-cutanée *J98.4*
- prévésical *N32.8*
- pudendale *K45.8*
- - avec gangrène *K45.1*
- - incarcérée, sans gangrène *K45.0*
- - irrépétible, sans gangrène *K45.0*
- - occlusion, causé par, sans gangrène *K45.0*
- - strangulation, sans gangrène *K45.0*
- rachis *Q05.9*
- - avec hydrocéphale *Q05.4*
- récidivante *K46.9*
- recto-vaginale *N81.6*
- reins *K45.8*
- retro-péritonéale *K45.8*
- - avec gangrène *K45.1*
- - incarcérée, sans gangrène *K45.0*
- - irréductible, sans gangrène *K45.0*
- - occlusion, causé par, sans gangrène *K45.0*
- - strangulation, sans gangrène *K45.0*
- scrotale *K40.90*
- - récidivante *K40.91*
- Spiegel, de *K43.9*
- Spieghel *K43.9*
- strangulation, gangréneuse *K46.1*
- strangulation, sans gangrène *K46.0*
- tendon *M67.89*
- trompes de Fallope *N83.4*
- tunique vaginale *Q55.2*
- uretère *N28.8*
- urètre, congénitale *Q64.7*
- utérus *N81.4*
- - gravide *O34.5*
- vaginale antérieure *N81.1*
- vagino-labiale *K45.8*
- varices *I86.1*
- ventre *K43.9*
- - avec
- - - gangrène *K43.1*
- - - occlusion *K43.0*
- - gangréneuse *K43.1*
- - incarcérée, sans gangrène *K43.0*
- - irréductible *K43.0*
- - - sans gangrène *K43.0*
- - occlusion, causé par, sans gangrène *K43.0*
- - strangulation, sans gangrène *K43.0*
- vésicale
- - chez la femme *N81.1*
- - chez l'homme *N32.8*
- vessie
- - chez la femme *N81.1*

hernie –*suite*
- vessie –*suite*
- - chez l'homme *N32.8*
- - congénitale *Q64.7*
- vessie, chez l'homme *N32.8*

Héroine
- abus *F11.1*
- dépendance *F11.2*
- intoxication
- - aiguë, au sens d'ivresse *F11.0*
- - lors de dépendance *F11.0*

héroïne voie
- intraveineuse Consommation d ' *U69.30!*
- non intraveineuse Consommation d ' *U69.31!*

Herpangine *B08.5*
- due au virus Coxsackie *B08.5*

Herpès *B00.9*
- anal *B00.8*
- anogénital *A60.9*
- avec
- - blépharite *B00.5+, H03.1**
- - complication *B00.8*
- - méningo-encéphalite *B00.4+, G05.1**
- - oesophagite *B00.8+, K23.8**
- circiné *B35.4*
- - bulleux *L12.0*
- cornéen *B00.5+, H19.1**
- couche cornée de la peau *B00.5+, H19.1**
- efflorescence *B00.0*
- fébrile *B00.1*
- génital
- - lors de la grossesse *O23.5*
- - récurrent *A60.0*
- gestationis, soins, femme enceinte *O26.4*
- gravidique *O26.4*
- infection *B00.9*
- iris, lors d'un érythème exsudatif multiforme *L51.1*
- kératite *B00.5+, H19.1**
- labial récurrent *B00.1*
- lèvre *B00.1*
- lors d'une maladie, due au VIH *B20, B00.9*
- oreille externe *B00.8*
- paupière *B02.3+, H03.1**
- paupière supérieure *B02.3+, H03.1**
- peau périanale *A60.1*
- pénis *A60.0+, N51.8**
- rectum *A60.1+, K93.8**
- scrotum *A60.0+, N51.8**
- simien, virus de l'
- - encéphalite *B00.4+, G05.1**
- - encéphalomyélite *B00.4+, G05.1**
- - maladie *B00.4+, G05.1**
- simplex *B00.9*
- - avec
- - - hépatite *B00.8+, K77.0**
- - - kératite
- - - - arborescente *B00.5+, H19.1**
- - - - dendritique *B00.5+, H19.1**
- - - - disciforme *B00.5+, H19.1**
- - - - interstitielle *B00.5+, H19.1**
- - - ulcère dendritique de la cornée *B00.5+, H19.1**
- - congénital *P35.2*

Herpès –*suite*
- simplex –*suite*
- - cutanéomuqueux génital *A60.0*
- - facial *B00.1*
- - génital *A60.0*
- - inflammation *B00.9*
- - labial *B00.1*
- - lors d'une maladie due au VIH *B20, B00.9*
- - oeil *B00.5+, H58.8**
- - oreille, externe *B00.1+, H62.1**
- - paupière *B00.5+, H03.1**
- - récidivant *B00.9*
- - récurrent *B00.9*
- - - in loco *B00.9*
- simplex, virus, infection *B00.9*
- - disséminé *B00.7*
- tondant *B35.0*
- - corporel *B35.4*
- urogénital *A60.0*
- virus alpha type 2 humain, dermatite vésiculaire
- - lèvre (buccale) *B00.1*
- - oreille *B00.1*
- virus de l'
- - balanite *A60.0+, N51.2**
- - cervicite *A60.0+, N74.8**
- - conjonctivite *B00.5+, H13.1**
- - dermite
- - - paupière *B00.5+, H03.1**
- - - vésiculaire *B00.1*
- - encéphalite *B00.4+, G05.1**
- - épididymite *A60.0+, N51.1**
- - hépatite *B00.8+, K77.0**
- - infection *B00.9*
- - - avec otite externe *B00.1+, H62.1**
- - - congénitale *P35.2*
- - - dans les antécédents personnels *Z86.1*
- - - lors d'une maladie due au VIH *B20, B00.9*
- - - organes génitaux
- - - - féminins *A60.0*
- - - - masculins *A60.0+, N51.8**
- - - périanale *A60.1*
- - iridocyclite *B00.5+, H22.0**
- - iritis *B00.5+, H22.0**
- - kératite *B00.5+, H19.1**
- - kératoconjonctivite *B00.5+, H19.1**
- - maladie
- - - disséminée *B00.7*
- - - oeil *B00.5+, H58.8**
- - méningite *B00.3+, G02.0**
- - méningo-encéphalite *B00.4+, G05.1**
- - myélite *B00.4+, G05.1**
- - orchite *A60.0+, N51.1**
- - panaris *B00.8*
- - pharyngite *B00.2*
- - pharyngo-amygdalite *B00.2*
- - prostatite *A60.0+, N51.0**
- - rectite *A60.1+, K93.8**
- - résistant aux virostatiques *U84!*
- - septicémie *B00.7*
- - stomatite *B00.2*
- - uvéite antérieure *B00.5+, H22.0**
- - vaginite *A60.0+, N77.1**
- - vulvite *A60.0+, N77.1**
- - vulvovaginite *A60.0+, N77.1**
- visage *B00.1*

Herpès –*suite*
- viscéral *B00.8+, K93.8**
- vulve *A60.0+, N77.1**
- zoster - *voir aussi* Zona *B02.9*
- - auriculaire *B02.2+, H94.0**
- - avec
- - - conjonctivite *B02.3+, H13.1**
- - - dermite de la paupière *B02.3+, H03.1**
- - - encéphalite *B02.0+, G05.1**
- - - ganglionite *B02.2+, G53.0**
- - - iridocyclite *B02.3+, H22.0**
- - - kératite interstitielle *B02.3+, H19.2**
- - - kératoconjonctivite *B02.3+, H19.2**
- - - méningite *B02.1+, G02.0**
- - - neuralgie *B02.2+, G53.0**
- - conjonctival *B02.3+, H13.1**
- - disséminé *B02.7*
- - généralisé *B02.7*
- - labial *B02.9*
- - lors d'une maladie due au VIH *B20, B02.9*
- - nerf facial *B02.2+, G53.0**
- - oeil *B02.3+, H58.8**
- - ophtalmique NCA *B02.3+, H58.8**
- - oreille *B02.2+, H94.0**
- - paupière *B02.3+, H03.1**
- - sans complication *B02.9*

Herpétiforme
- dermatose *L13.0*
- stomatite *K12.0*

Herpétique
- blépharite *B02.3+, H03.1**
- conjonctivite *B02.3+, H13.1**
- encéphalite *B00.4+, G05.1**
- ganglionite géniculée *B02.2+, G53.0**
- gingivostomatite *B00.2*
- inflammation
- - muqueuse buccale *B00.2*
- - muqueuse pharyngienne *B00.2*
- iridocyclite *B00.5+, H22.0**
- iritis *B00.5+, H22.0**
- kératite *B00.5+, H19.1**
- kératoconjonctivite *B00.5+, H19.1**
- méningite *B00.3+, G02.0**
- panaris *B00.8*
- pharyngite *B00.2*
- pharyngo-amygdalite *B00.2*
- septicémie *B00.7*
- stomatite *B00.2*
- vulvovaginite *A60.0+, N77.0**

Herrick, anémie de *D57.1*

Herrick, syndrome de *D57.1*

Hers, maladie de *E74.0*

Hers, syndrome de, -Forbes *E74.0*

Herter, infantilisme intestinal de *K90.0*

Herter, maladie de, -Heubner *K90.0*

Herter-Gee, syndrome de *K90.0*

Herter-Thaysen, maladie de, -Gee *K90.0*

Herxheimer, acrodermatite atrophiante *L90.4*

Herxheimer, maladie de *L90.4*

Herxheimer, réaction de *T78.2*

Hétérochromatime, marqueur *Q95.4*

Hétérochrome
- cataracte *H26.2*

Hétérochrome –*suite*
- cyclite *H20.8*
- uvéite *H20.8*

Hétérochromie *Q13.2*
- avec cataracte *H26.2*
- cas de
- - iritis *H20.8*
- - uvéite *H20.8*
- cheveux *L67.1*
- congénitale *Q13.2*
- due à un corps étranger, non magnétique, métallique *H44.7*
- iris, acquis *H21.2*

Hétérochromique, cyclite de Fuchs *H20.8*
- avec glaucome secondaire *H40.4*

Hétérogène, gliome *C71.9*

Hétérogène, rythme *I49.8*

Heteropagus *Q89.4*

Hétérophorie *H50.5*

Hétérophyiase *B66.8*
- intestin grêle *B66.8*

Hétérosexualité, féminine, pseudopuberté *E25.8*

Hétérotopie
- cérébrale *Q04.8*
- spinale *Q06.8*

Hétérotropie *H50.4*
- intermittente *H50.3*
- verticale *H50.2*

Hétérozygotes
- drépanocytose *D57.3*
- hémoglobine S *D57.3*
- hypercholestérolémie, type II a *E78.0*

Heubner Herter, maladie de *K90.0*

Heubner, maladie de *A52.0+, I68.1**

Heuck Assmann, anémie *D64.8*

Hexadactylie *Q69.9*

Hexokinase
- carence, avec anémie *D55.2*
- déficit, avec anémie *D55.2*

Heyd, syndrome de *K76.7*

Hiatus oesophageus
- avec déplacement, cardia *Q40.1*
- hypertrophie, congénitale *Q79.1*

Hiatus, insuffisance *K44.9*

Hibernome *D17.9*

Hidradénite *L73.2*
- aisselles *L73.2*
- suppurée *L73.2*

Hidradénocarcinome *C44.9*

Hidradénome, néoformation cutanée bégnin *D23.9*
- cellules claires *D23.9*
- nodulaire, néoformation cutanée bégnine *D23.9*
- papillaire *D23.9*

Hidrocytome *D23.9*

Hidrosadénite *L73.2*
- axillaire *L73.2*
- suppurée *L73.2*

Higashi-Chediak-Steinbrinck, syndrome de *E70.3*

Hilaire
- lymphome *C85.9*

Hilaire –*suite*
- nodules lymphatiques, tuberculose *A16.3*
- tuberculose, nodules lymphatiques, primaires *A16.7*
- tumeur* *D27*

hile splénique Arrachement du *S36.04*

Hile pulmonaire, hémorragie *R04.8*

Hippel-Lindau, syndrome de *Q85.8*

Hippocratisme digital *R68.3*
- cas de pachydermopéristose *M89.49+, L62.0**

Hippocratisme digital [doigt en baguette *R68.3*

Hippus pupillaire *H57.0*

Hirschfeld, tumeur de Birch- *C64*

Hirschhorn, syndrome de Wolf- *Q93.3*

Hirschsprung, maladie de *Q43.1*
- avec mégacôlon *Q43.1*

Hirsutisme *L68.0*

Hirudiniase
- externe *B88.3*
- interne *B83.4*

Hirudiniase, infestation par des sangsue *B88.3*
- externe *B88.3*

His, faisceau de
- interruption de la conduction *I44.3*
- sclérose *I44.3*

His-Bündel, altération de la conduction *I44.3*

Hiss-Russel, dysentérie de *A03.1*

Hiss-Russel, dysentrie *A03.1*

Histamine, maux de tête *G44.0*

Histaminique, syndrome de type *T61.1*

Histaminiques H2, antagoniste des récept
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Histaminiques H2, intoxication des inhib *T47.0*

Histamino-réfractaire, achylie *K31.88*

Histidine, trouble du métabolisme *E70.8*

Histidinémie *E70.8*

Histidinurie *E70.8*

histiocytaire
-
- évolution imprévisible inconnu tumeur *D47.7*
- leucémie *C93.90*
- lymphome
- - folliculaire *C82.2*
- - nodulaire *C82.2*
- lymphome de type *C83.3*
- Sarcome *C96.8*

Histiocytoïde, hémangiome *D18.00*

Histiocytome *D23.9*
- fibreux *D23.9*
- malin *C49.9*
- réticulo- *D76.3*
- réticulo-, à cellules géantes *D76.3*

Histiocytose
- *D76.3*
- cellules Langerhans multifocale

Histiocytose –*suite*
- cellules Langerhans multifocale –*suite*
- - multisystémique (disséminé) [Maladie d ' Abt - Letterer - Siwe] , *C96.0*
- - unisystémique , *C96.5*
- différenciée aiguë évolutive *C96.0*
- lipoïde essentielle *E75.2*
- lipoïdique essentielle *E75.2*
- lympho-, hémophagocytaire *D76.1*
- malign *C96.8*
- maligne avec arthropathie *C96.1+, M36.1**
- multifocale *C96.5*
- multisystémique *C96.0*
- phagocytes mononucléaires NCA *D76.1*
- réticulo-, multifocale *E78.8+, M14.3**
- sinusale *D76.3*
- - avec lymphadénopathie massive *D76.3*
- - avec lymphadénopathie, massive *D76.3*
- unifocale cellules Langerhans *C96.6*
- X aiguë *C96.0*

Histio-lymphocytaire, sarcome *C83.2*

Histio-monocytaire, leucémie *C93.90*

Histo-chromatose *L81.9*

Histologique(s)
- confirmation
- - épituberculose *A15.7*
- - foyer de Ghon *A15.7*
- résultats
- - anormaux NCA *R89.7*
- - liquide céphalo-rachidien, anormaux *R83.7*
- - urine, anormaux *R82.8*

Histoplasma
- capsulatum entraînant histoplasmose *B39.4*
- - disséminée *B39.3*
- duboisii entraînant histoplasmose *B39.5*

Histoplasmose *B39.9*
- aiguë, avec pneumonie *B39.0+, J17.2**
- chronique, avec pneumonie *B39.1+, J17.2**
- disséminée à Histoplasma capsulatum *B39.3*
- due à une maladie due au VIH *B20, B39.9*
- provoquée par
- - Histoplasma
- - - capsulatum *B39.4*
- - - duboisii *B39.5*
- pulmonaire NCA *B39.2+, J99.8**
- - aiguë *B39.0+, J99.8**
- - chronique *B39.1+, J99.8**

Histrionisme *F60.4*

Hodgkin
-
- classique
- - avec sclérose nodulaire , Lymphome de *C81.1*
- - cellularité mixte Lymphome de *C81.2*
- - déplétion lymphocytaire Lymphome de *C81.3*
- - riche lymphocytes Lymphome de *C81.4*
- - type non précisé , Lymphome de *C81.7*

Hodgkin –*suite*
- maladie de *C81.9*
- - avec déplétion lymphocytaire *C81.3*
- - dépistage *Z12.8*
- - diffuse, à prédominance lymphocytaire *C81.0*
- - fibrosante diffuse, avec déplétion lymphocytaire *C81.3*
- - forme à cellularité mixte *C81.2*
- - forme nodulaire sclérosante *C81.1*
- - nodulaire sclérosante
- - - avec déplétion lymphocytaire *C81.1*
- - - cellules mixtes *C81.1*
- - - phase cellulaire *C81.1*
- - - prédominance lymphocytaire *C81.1*
- - - syncytiale *C81.1*
- - nodulaire, à prédominance lymphocytaire *C81.0*
- - prédominance lymphocytaire *C81.0*
- - réticulaire, avec déplétion lymphocytaire *C81.3*
- nodulaire sclérosante *C81.1*
- - cellules mixtes *C81.1*
- - pauvre en lymphocytes *C81.1*
- - phase cellulaire *C81.1*
- - riche en lymphocytes *C81.1*
- - syncitial *C81.1*
- paragranulome de *C81.7*
- Prédominance lymphocytaire Maladie de *C81.0*
- sarcome de *C81.7*

Hodgkinien lymphome *C81.9*
- cérébral *C81.9*
- malin *C81.9*

Hoffa-Kastert, maladie de [idiopathie] *E88.8*

Hoffa-Kastert, syndrome de [HOFFA] *M79.46*

Hoffmann, maladie de *L66.3*

Hoffmann, maladie de Werdnig-[amyotroph *G12.0*

Hoffmann, syndrome de
- Bouveret- *I47.9*
- Charcot-Marie-Tooth- *G60.0*

Hollenhorst, plaques de *H34.2*

Holoprosencéphalie *Q04.2*

Holtermüller-Wiedemann, syndrome de *Q67.4*

Holt-Oram, syndrome de *Q87.2*

Homocystéine, anomalie du métabolisme *E72.1*

Homocystéinémie *E72.1*

Homocystéinurie *E72.1*

Homologue
- hépatite du sérum *B16.9*
- insémination *Z31.1*

Homonyme, hémianopsie *H53.4*

Homosexualité *F66.9*

Hoquet *R06.6*
- épidémique *B33.0*
- psychogène *F45.33*

Hordeolum *H00.0*
- externe *H00.0*
- interne *H00.0*
- récidivant *H00.0*

Hormonal(e)

Hormonal(e) –*suite*

- aménorrhée *N91.1*
- anomalie *E34.9*
- contraception *Z30.4*
- défaut de régulation, surrénale *E27.9*
- dysfonction *E34.9*
- - ovarienne *E28.9*
- dysfonction, hypophyse *E23.7*
- insuffisance *E34.9*
- modification, avec crise épileptique *G40.5*
- trouble, gynécologique *E34.9*

Hormone
- abus *F55.5*
- antéhypophysaire, déficit NCA *E23.0*
- antidiurétique, sécretion anormale *E22.2*
- corps jaune, faiblesse *E28.8*
- croissance
- - carence *E23.0*
- - - cas d'agammaglobulinémie, liée au chromosome X *D80.0*
- - - idiopathique *E23.0*
- - - isolée *E23.0*
- - hypersécrétion *E22.0*
- déficit *E34.9*
- - avec
- - - urétrite *N34.2*
- - - vaginite *N95.2*
- déséquilibre *E34.9*
- intestinale, hypersécretion NCA *E34.1*
- libérant la thyréotropine
- - allergie *T88.7*
- - hypersensibilité *T88.7*
- parathyroide
- - carence *E20.9*
- - intoxication *T50.9*
- parathyroïdienne, intoxication *T50.9*
- parathyroïdiennes, dérivé, intoxication *T50.9*
- sécretion, provoquée par
- - phéochromocytome *E27.5*
- - tumeur cancéreuse *E34.0*
- sexuelle, trouble *E34.9*
- stimulant la sécrétion de thyrotrophine, hyperproduction *E05.8*
- testiculaire
- - déficit *E29.1*
- - hypersécrétion *E29.0*
- thyréostimuline, hypersécrétion *E05.8*
- thyroïdienne, manque *E03.9*
- trouble du métabolisme surrénalien *E27.9*

Horner, syndrome de, symptômes *G90.2*

Horror trip [crise de terreur sous stupé *F19.0*

Horton, artérite temporale de *M31.6*

Horton, maladie de *M31.6*

Horton, syndrome de *G44.0*

Hospitalisme *F68.1*

Hostilité *R45.5*
- envers un enfant *Z62*

hôte
- forme
- - étendue Maladie chronique du greffon contre l ' *T86.04*
- - limité Maladie chronique du greffon contre l ' *T86.03*

hôte –*suite*

- sans précision Maladie chronique du greffon contre l ' *T86.09*
- stade
- - I II Maladie aigu du greffon contre l ' *T86.01†*
- - III IV Maladie aigu du greffon contre l ' *T86.02†*
- - - Maladie aigu du greffon contre l ' *T86.02†*

Howship-Romberg, syndrome de *G57.8*

HPV, agent pathogène - *voir* Papillomavir *B97.7!*

HSV-2, dermite vésiculaire
- lèvres *B00.1*
- oreille *B00.1*

HTLV [virus T-lymphotrope humain]-LAV [v *B24*

Hudson-Stahli, ligne de [cornée] *H18.0*

Huile
- dermatite de contact NCA *L24.1*
- inhalation, avec
- - bronchopneumonie *J69.1*
- - étouffement *T17.9*
- - pneumonite *J69.1*
- pneumonie par aspiration *J69.1*

Huile d'arachide
- allergie *T78.1*
- hypersensibilité *T78.1*

Huile de fusel, effet toxique *T51.3*

Humain(e)(s)
- ehrlichiose granulocytaire [EGH] *A28.8*
- papillomavirus [HPV], agent pathogène *B97.7!*
- virus de l'immunodéficience [VIH]
- - maladie *B24*
- - mise en évidence par examens de laboratoire *R75*
- virus T-lymphotrope de type I [HLTV-I], infection *B33.3*

Humérocubitale, articulation, luxation *S53.10*

Humérocubitale, entorse *S53.44*

Huméroradial, -le
- bursite *M77.8*
- entorse *S53.43*

Humérus
- agénésie *Q71.8*
- anomalie *Q74.0*
- apophyse articulaire, fracture *S42.40*
- cancer *C79.5*
- épiphyse proximale, fracture *S42.21*
- extrémité supérieure, luxation *S43.00*
- fracture *S42.3*
- - avec fracture
- - - clavicule *S42.7*
- - - omoplate *S42.7*
- - distale *S42.40*
- - extrémité supérieure *S42.20*
- - sous-capitale *S42.20*
- - supracondylaire *S42.41*
- - traumatisme obstétrical *P13.3*
- fracture(s) de la diaphyse *S42.3*
- - multiples *S42.3*
- fractures multiples avec l'omoplate et la clavicule *S42.7*
- hypoplasie congénitale *Q71.8*
- luxation

Humérus –*suite*
- luxation –*suite*

- - gléno-humérale *S43.00*
- - vers
- - - bas *S43.03*
- - - l'arrière *S43.02*
- malformation
- - acquise *M21.82*
- - congénitale *Q74.0*
- malformation NCA *Q68.8*
- ostéochondrite juvénile *M92.0*
- sarcome *C40.0*
- tête
- - fracture *S42.21*
- - - avec deux à quatre fragments *S42.21*
- - obliquité *M21.82*
- tête, ostéochondrite *M92.0*
- - juvénile *M92.0*
- trochlée, fracture *S42.49*

Humeur aqueuse, hypersécrétion, avec gla *H40.8*

Humeur, labilité *R45.8*

Humide
- dégénérescence maculaire *H35.3*
- - sénile *H35.3*
- eczéma *L30.8*
- gangrène *R02*
- maculopathie sénile *H35.3*
- oeil, subjectivement *H04.2*
- ombilicale *L30.8*
- toux, non caractéristique *R05*
- ulcère phagédénique *R02*

Humidificateur, maladie pulmonaire due à *J67.7*

Humidificateur, pneumonie due à *J67.7*

Humidification, anomalie
- kératoconjonctivale *H18.8*
- oeil *H04.1*

Humiliant, événement, dans l'enfance *Z61*

Humiliation dans l'enfance *Z61*

Humoral(e)(aux)
- anticorps, déficit *D80.8*
- déficit immunitaire *D80.9*
- déficit immunitaire, avec
- - hyper-gammaglobulinémie *D80.6*
- - normo-gammaglobulinémie *D80.6*

Hünermann, syndrome de Conradi- *Q77.3*

Hunner, ulcère (vésical) de *N30.1*

Hunt III, syndrome de *G11.1*

Hunt, dyssynergie cérébelleuse myocloniq *G11.1*

Hunt, syndrome de *B02.2+, G53.0**
- Ramsay- [dyssynergie cérébelleuse myoclonique] *G11.1*
- Tolosa- *H49.0*
- Willige- *G23.1*

Hunter(-Hurler), syndrome de *E76.1*

Hunter, chancre de *A51.0*

Hunter, glossite de *K14.0*
- atrophique *K14.4*
- entraînant
- - anémie pernicieuse *D51.0*
- - carence en vitamine B *E53.9+, K93.8**

Hunter, maladie [glossite] de *K14.0*

Hunter, maladie de [mucopolysaccharidose *E76.1*

Hunter-Addison, anémie de *D51.0*

Huntington, chorée de *G10*
- avec démence *G10+, F02.2**

Hurler Syndrome Pfaundler - *E76.0*

Hurler, maladie de
- Pfaundler- *E76.0*
- pseudo- *E77.0*

Hurler, syndrome de Hunter- *E76.1*

Hurler-Scheie, syndrome de *E76.0*

Hurst, maladie de *G36.1*

Hürthle, cellules de
- adénocarcinome *C73*
- adénome *D34*
- cancer *C73*

Hutchinson, syndrome de *A50.5*

Hutchinson, syphilis congénitale entraîn *A50.5*

Hutchinson-Boeck, maladie de *D86.9*

Hutchinson-Gilford, syndrome de *E34.8*

Hyalin(e)(s)
- dégénérescence
- - cornée *H18.4*
- - ganglions lymphatiques *I89.8*
- - muscles *M62.89*
- - sclérotique *H15.8*
- membrane
- - chez
- - - adulte *J80*
- - - nouveau-né *P22.0*
- membranes, maladie des *P22.0*
- nécrose, aorte *I71.9*
- néphrosclérose *I12.90*
- néphrosclérose artériolaire *I12.90*

Hyalinose
- artères et artérioles *I70.9*
- artérielle *I70.9*
- artério-artériolaire *I70.9*
- capsule splénique *D73.0*
- cortex surrénalien *E27.8*
- cutanéo-muqueuse *E78.8*
- glomérulo-, diabétique, extra-capillaire *E14.20+, N08.3**
- péritonéale *E75.5*
- pleurale *J94.1*
- pulpe de la rate *K04.2*
- sinus *J32.9*

Hyalite *H43.8*
- astéroïde *H43.2*
- dans la syphilis tertiaire *A52.7+, H45.8**
- syphilitique *A52.7+, H45.8**

Hyaloïde du corps vitré *H43.3*

Hyalose astéroïde *H43.2*
- dans la syphilis tertiaire *A52.7+, H45.8**

Hydantoïne
- dysmorphie *Q86.1*
- syndrome de malformation congénitale *Q86.1*

Hydantoïne, dérivés de
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Hydantoïne, intoxication par dérivés de *T42.0*

Hydarthrose *M25.49*
- Clutton, de *A50.5+, M03.19**

Hydarthrose *–suite*
- gonococcique *A54.4+, M14.8**
- intermittente *M12.49*
- syphilitique congénitale *A50.5+, M03.19**
- syphilitique tertiaire *A52.7+, M14.8**

Hydatide
- Morgagni
- - chez la femme *Q50.5*
- - chez l'homme *Q55.4*
- - testiculaire, chez l'homme *Q55.2*
- torsion *N44.1*

Hydatides
- infestation *B67.9*
- kyste *B67.9*
- - cerveau *B67.9+, G94.8**
- - foie NCA *B67.8+, K77.0**
- - poumon NCA *B67.9+, J99.8**
- - rate NCA *B67.9+, D77**

Hydatidose *B67.9*

Hydatiforme, môle *O01.9*
- classique *O01.0*
- complète *O01.0*
- compliquant la grossesse *O01.9*
- dans les antécédents, nécessitant une surveillance particulière de la grossesse *Z35.1*
- incomplète *O01.1*
- invasive *D39.2*
- maligne *D39.2*

Hydatique, kyste *B67.9*

Hydatique, kyste hépatique, provoqué par
- Echinococcus
- - granulosus *B67.0*
- - multiocularis *B67.5*

Hyde, maladie de *L28.1*

Hydralazine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Hydramnios *O40*
- avec atteinte du foetus/du nouveau-né *P01.3*
- compliquant la grossesse *O40*
- oligo- *O41.0*
- - avec atteinte du foetus/du nouveau-né *P01.2*

Hydranencéphalie *Q04.3*

Hydrargyrose NCA *T56.1*

Hydrate de choral, dépendance *F13.2*

Hydrémie *D64.8*

Hydro, hémopneumothorax *J94.2*

Hydroa *L13.0*
- estival *L56.4*
- herpétiforme *L13.0*
- infantile *L13.0*
- prurigineux *L13.0*
- vacciniforme *L56.4*

Hydrocalice *N13.3*

Hydrocarbure
- dermite de contact, toxique *L24.2*
- halogénisé
- - allergie *T88.7*
- - hypersensibilité *T88.7*

Hydrocarbures, dermite de contact, toxiq *L24.2*

Hydrocèle *N43.3*
- chez le foetus/nouveau-né *P83.5*
- congénitale *P83.5*
- cordon spermatique *N43.3*
- cordon spermatique, entraînant une hydrocèle testiculaire *N43.2*
- enkystée *N43.0*
- féminine NCA *N94.8*
- infectée *N43.1*
- kystique *N43.0*
- ligament large de l'utérus *N94.8*
- multiloculaire *N43.2*
- Nuck, canal de *N94.8*
- scrotum *N43.3*
- spermatique *N43.3*
- spinale *Q05.9*
- - avec hydrocéphalie *Q05.4*
- testiculaire *N43.3*
- - avec hydrocèle du cordon spermatique *N43.2*
- testicules *N43.3*
- vaginale
- - communiquante *N43.2*
- - testiculaire *N43.2*
- vaginale testiculaire *N43.3*
- vulve *N90.8*

Hydrocéphale *- voir* Hydrocéphalie *G91.9*
- acquise *G91.9*
- - due à obstruction du trou de Magendie *G91.1*
- associée à
- - absence, os du crâne
- - - avec spina bifida *Q05.4*
- - - congénitale *Q03.9*
- - agénésie, os du crâne, avec spina bifida *Q05.4*
- - anomalie, os du crâne *Q03.9*
- - - avec spina bifida *Q05.4*
- - atrésie du foramen de Magendie, congénitale *Q03.1*
- - fermeture
- - - crâne, anomalie *Q03.9*
- - - rachis, défaut congénital *Q05.4*
- - fissure rachidienne *Q05.4*
- - hernie médullaire *Q05.4*
- - hydrocèle rachidienne *Q05.4*
- - hydroméningocèle *Q05.4*
- - hydromyélocèle *Q05.4*
- - hypoplasie, os du crâne *Q03.9*
- - maladie infectieuse NCA *B99+, G94.0**
- - malformation crânienne congénitale *Q03.9*
- - - avec spina bifida *Q05.4*
- - malformation, os du crâne *Q03.9*
- - méningocèle *Q05.4*
- - myélocèle *Q05.4*
- - myélocystocèle *Q05.4*
- - myéloméningocèle *Q05.4*
- - parasitose *B89+, G94.0**
- - rachischisis *Q05.4*
- - spina bifida NCA *Q05.4*
- - - cervicale *Q05.0*
- - - dorsale *Q05.1*
- - - lombaire *Q05.2*
- - - lombosacrée *Q05.2*
- - - sacrée *Q05.3*
- - - thoracique *Q05.1*
- - - thoracolombaire *Q05.1*
- - syringomyélocèle *Q05.4*

Hydrocéphale - *voir* Hydrocéphalie *–suite*
- associée à *–suite*
- - tumeur NCA *D48.9+, G94.1**
- avec dégénérescence cérébrale, congénitale *Q03.9*
- congénitale *Q03.9*
- - due à une toxoplasmose *P37.1*
- - syphilitique *A50.4+, G94.0**
- due à obstruction de l'aqueduc de Sylvius *Q03.0*
- foetale, prise en charge de la mère *O35.0*
- foetus, avec
- - césarienne *O33.6*
- - disproportion foetopelvienne *O33.6*
- - dystocie *O66.3*
- - obstacle à l'accouchement *O66.3*
- macro- *G91.9*
- maligne *G91.9*
- nouveau-né *Q03.9*
- post-traumatique NCA *G91.3*
- pression normale *G91.29*
- - idiopathique *G91.20*
- - secondaire *G91.21*
- pression normale, à *G91.29*
- - idiopathique *G91.20*
- - secondaire *G91.21*
- récidivante *G91.9*
- sans augmentation de pression *G91.29*

Hydrocéphalie *G91.9*
- communicante *G91.0*
- congénitale *Q03.9*
- - avec spina bifida *Q05.4*
- - - cervicale *Q05.0*
- - - dorsale *Q05.1*
- - - dorsolombaire *Q05.1*
- - - lombaire *Q05.2*
- - - lombosacrée *Q05.2*
- - - sacrée *Q05.3*
- - - thoracique *Q05.1*
- externe *G91.9*
- interne *G91.9*
- - acquise *G91.9*
- non communiquante *G91.1*
- obstructive *G91.1*

Hydrocolpos *N89.8*
- congénital *N89.8*

Hydro-encéphalocèle *Q01.9*
- congénitale *Q01.9*

Hydro-encéphaloméningocèle *Q01.9*
- congénitale *Q01.9*

Hydro-hémopneumothorax *J94.2*

Hydroméningite *G03.9*

Hydroméningocèle *Q05.9*
- avec hydrocéphalie *Q05.4*
- crânienne *Q01.9*
- rachidienne *Q05.9*

Hydrométrie *N85.8*

Hydrométrocolpos *N89.8*

Hydromicrocéphalie *Q02*

Hydromphale *Q45.8*
- depuis la naissance *Q45.8*

Hydromyélie *Q06.4*

Hydromyélocèle *Q05.9*
- avec hydrocéphalie *Q05.4*

Hydronéphrose *N13.3*

Hydronéphrose *–suite*
- associée à
- - abcès rénal, avec calcul *N13.6*
- - calcul urétéral *N13.2*
- - coudure urétérale *N13.1*
- - obstruction
- - - provoquée par
- - - - calcul rénal *N13.2*
- - - - calcul urétéral *N13.2*
- - - uretère NCA *N13.1*
- - - urétéropelvienne *N13.0*
- - pyélite, due à un calcul *N13.2*
- - - chronique *N13.2*
- - pyélonéphrite, due à un calcul *N13.2*
- - sténose grave
- - - pyélourétérale *N13.0*
- - - uretère NCA *N13.1*
- - - urétéropelvienne *N13.0*
- - uretérite, non spécifique, avec calcul rénal *N13.2*
- atrophique *N13.3*
- avec
- - calcul, avec infection *N13.6*
- - infection *N13.6*
- - sténose grave uretère, avec infection *N13.6*
- calices rénaux *N13.3*
- congénitale *Q62.0*
- infectieuse *N13.6*
- intermittente *N13.3*
- précoce *N13.3*
- primitive *N13.3*
- sans déficit fonctionnel *N13.3*
- secondaire NCA *N13.3*
- tuberculeuse *A18.1+, N29.1**

Hydronéphrose précoce *N13.3*

Hydronéphrotique
- atrophie rénale, avec infection *N13.6*
- rein *N13.3*
- rein atrophié *N13.3*
- rein, à bas bruit *N13.3*
- rétraction rénale *N13.3*
- - avec infection *N13.6*

Hydropéricarde *I31.9*
- pneumo- *I31.9*

Hydropéricardite *I31.9*

Hydropéritoine *R18*

Hydrophobie - *voir* Rage *A82.9*

Hydrophtalmie *Q15.0*

Hydropisie *R60.9*
- articulaire intermittente *M12.49*
- articulation *M25.49*
- associée à
- - cholélithiase *K80.20*
- - grossesse *O12.0*
- cardiaque *I50.01*
- cavité abdominale *R18*
- cérébrale *G91.9*
- cordon spermatique *N43.3*
- due à malnutrition *E43*
- endolymphatique *H81.0*
- foetale *P83.2*
- - avec
- - - dystocie *O66.3*
- - - incompatibilité Rh, prise en charge de la mère *O36.0*

Hydropisie *–suite*
- foetale *–suite*
- - avec *–suite*
- - - iso-immunisation, prise en charge de la mère *O36.1*
- - due à une iso-immunisation *P56.0*
- - non immunologique *P83.2*
- - pendant la grossesse NCA *O36.2*
- - prise en charge de la mère *O36.2*
- - - non associée à une iso-immunisation *O36.2*
- genou *M25.46*
- labyrinthe *H81.0*
- membrane amniotique *O40*
- plèvre *J94.8*
- tubaire *N70.1*
- vésicule biliaire *K82.1*
- voies lacrymales *H04.5*

Hydropneumohémothorax *J94.2*

Hydropneumopéricarde *I31.9*

Hydropneumopéricardite *I31.9*

Hydropneumothorax *J94.8*
- traumatique *S27.38*
- tuberculeux NCA *A16.5*
- tuberculeux, avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.6*

Hydropyonéphrose *N13.6*

Hydrorachis *Q06.4*

Hydrorrhée
- gravidique *O42.9*
- nasale *J34.8*

Hydrosalpinx *N70.1*

Hydrospermatocèle *N43.3*

Hydrothorax *J94.8*
- bilatéral *J94.8*
- chyleux, non filarien *I89.8*
- pneumo- *J94.8*
- traumatique *S27.88*

Hydro-uretère *N13.4*
- avec infection *N13.6*
- congénital *Q62.3*
- primaire *Q62.3*

Hydro-urètre *N36.8*

Hydroxyapatite, cristaux, arthropathie *M11.09*

Hydroxyapatite, rhumatisme *M11.09*

Hydroxyde de potassium, effet toxique *T54.3*

Hydroxyde de sodium, effet toxique *T54.3*

Hydroxykynurénurie *E70.8*

Hydroxylase, 21-hydroxylase
- carence
- - forme classique *E25.00*
- - forme tardive *E25.01*
- déficit
- - forme classique *E25.00*
- - forme tardive *E25.01*

Hydroxylase, carence en 11-hydroxylase *E25.08*

Hydroxylysine, troubles du métabolisme *E72.3*

Hydroxylysinémie *E72.3*

Hydroxyproline, résidus, excrétion urina *R82.9*

Hydroxyprolinémie *E72.5*

Hydroxyquinoléine et dérivés, intoxicati *T37.8*

Hydroxyvitamine, carence 25-hydroxyvitam *E83.31*

Hygiène personnelle
- insuffisante, dans les antécédents *Z91.8*
- problème *Z91.8*

Hygroma *M67.49*
- colli, foetal, prise en charge de la mère *O35.8*
- congénital *D18.10*
- gaine tendineuse *M67.49*
- kystique *D18.10*
- prépatellaire *M70.4*

Hymen
- agénésie *Q52.4*
- anomalie *Q52.4*
- atrésie acquise *N89.6*
- atteinte, en cas de déchirure obstétricale du périnée *O70.0*
- cloisonné *Q52.3*
- cribriforme *Q52.3*
- épaissi *N89.6*
- falciforme *Q52.4*
- frangé *Q52.4*
- fusion *Q52.3*
- hyperplasie congénitale *Q52.4*
- hypertrophie congénitale *Q52.4*
- imperforatus *Q52.3*
- - sive occlusus *Q52.3*
- kyste *N89.8*
- - embryonnaire *Q52.4*
- lésion traumatique *S39.9*
- malformation *Q52.4*
- malformation congénitale *Q52.4*
- occlusion *N89.6*
- - congénitale *Q52.3*
- persistance, lors de la grossesse *O34.7*
- plaie ouverte *S31.4*
- rigide *N89.6*
- rupture accidentelle, non traumatique *N89.8*
- semilunaire, bifenestré *Q52.4*
- sténose *N89.6*
- sténose grave *N89.6*
- subseptus *Q52.3*
- surnuméraire *Q52.4*

Hyménal
- anneau
- - serré *N89.6*
- atrésie *Q52.3*
- imperforation *Q52.3*
- septum *Q52.3*

Hyménolépiase *B71.0*
- Hymenolepis diminuta *B71.0*
- Hymenolepis nana *B71.0*

Hyménolépiase, infection *B71.0*

Hyperabduction, syndrome d' *G54.0*

Hyperacidité *K31.88*
- gastrique *K31.88*
- psychogène *F45.31*

Hyperacidité gastrique *K31.88*

Hyperacousie *H93.2*

Hyperacousie, audition *H93.2*

Hyperactif(ve)
- comportement *R46.3*
- vessie *N32.8*

Hyperactif, -ive
- trouble, avec mouvement stéréotypé, et retard mental *F84.4*
- vessie *N32.8*

Hyperactivité *R46.3*
- détrusor *N32.8*
- enfant *F90.9*
- gastrique *K31.88*
- gastro-intestinale *K31.88*
- hypothalamus *E23.3*
- sexuelle *F52.7*
- surrénale NCA *E27.0*
- thyroïdienne *E05.9*
- trouble, avec déficit d'attention [THDA] *F90.0*

Hyperadrénocorticisme *E24.9*
- avec myopathie *E24.9+, G73.5**
- congénital *E25.09*
- hypophysaire *E24.0*
- non liée à la maladie de Cushing *E27.0*

Hyperaldostéronisme *E26.9*
- primitif *E26.0*
- rénal *E26.1*
- secondaire *E26.1*

Hyperalgésie *R20.8*

Hyperalimentation *R63.2*
- avec
- - carotène *E67.1*
- - vitamine A *E67.0*
- - vitamine D *E67.3*

Hyperaminoacidurie *E72.9*
- provoquée par
- - arginine *E72.2*
- - cystine *E72.0*
- - lysine *E72.3*
- - ornithine *E72.4*

Hyperammoniémie *E72.2*
- congénitale *E72.2*

Hyperandrogénémie *E29.0*
- féminine *E28.1*
- masculine *E29.0*

Hyperandrogénisme surrénalien *E27.0*

Hyperanxiété
- avec trouble durant l'enfance *F93.8*
- pendant l'enfance, en cas de trouble émotionnel identitaire *F93.8*

Hyperanxiété, syndrome *F43.9*

Hyperazotémie *N19*

Hyperbêtalipoprotéinémie *E78.0*
- associée à une hyperchylomicronémie *E78.3*
- avec pré-bêtalipoprotéinémie *E78.2*
- familiale *E78.0*
- - avec pré-bêtalipoprotéinémie *E78.2*

Hyperbilirubinémie *R79.8*
- constitutionnelle *E80.6*
- familiale, conjuguée *E80.6*
- nouveau-né *P59.9*
- prématuré *P59.0*

Hyperbilirubinémie du nouveau-né *P59.9*

Hypercalcémie *E83.58*
- avec démence *E83.58+, F02.8**
- diabétique *E83.58*
- familiale *E83.58*
- hypocalciurique familiale *E83.58*
- infantile idiopathique *E83.58*

Hypercalcémique

Hypercalcémique *–suite*
- crise *E83.58*
- néphropathie *N28.9*

Hypercalciurie *E83.58*
- idiopathique *E83.58*

Hypercapnie *R06.88*

Hypercaroténémie *E67.1*
- provoquée par malnutrition *E67.1*

Hypercémentose, dent *K03.4*

Hyperchlorémie *E87.8*

Hyperchlorhydrie *K31.88*
- psychogène *F45.31*
- psychosomatique *F45.31*

Hypercholestérolémie *E78.0*
- avec
- - hyperglycémie, endogène *E78.2*
- - hypertriglycéridémie, endogène *E78.2*
- - xanthomatose *E78.0*
- essentielle *E78.0*
- - familiale *E78.0*
- familiale *E78.0*
- idiopathique *E78.0*
- primitive *E78.0*
- pure *E78.0*

Hypercholestérolémique, xanthomatose *E78.0*

Hyperchrome, anémie *D64.8*

Hyperchylie gastrique psychogène *F45.31*

Hyperchylomicronémie *E78.3*
- avec hyperbêtalipoprotéinémie *E78.3*
- familiale *E78.3*
- primitive *E78.3*

Hypercorticisme *E24.9*
- hypophysaire *E24.0*

Hypercrinie, androgène, glande surrénale *E27.0*

Hypercyphose, rachis thoracique *M40.24*

Hyperdactylie *Q69.9*

Hyperdiurèse *R35*

Hyperélectrolytémie *E87.8*

Hyperémèse *R11*
- avec troubles du métabolisme, pendant la grossesse *O21.1*
- gravidique *O21.0*
- - avec
- - - atteinte du foetus/du nouveau-né *P01.8*
- - - déséquilibre
- - - - électrolytique *O21.1*
- - - - éléctrolytique, débutant avant la fin de la 20ème semaine de grossesse *O21.1*
- - - déshydratation *O21.1*
- - - déshydratation, débutant avant la fin de la 20ème semaine de grossesse *O21.1*
- - - hypoglycémie, débutant avant la fin de la 20ème semaine de grossesse *O21.1*
- - - perte, glucides *O21.1*
- - - troubles du métabolisme *O21.1*
- - - - débutant avant la fin de la 20ème semaine de grossesse *O21.1*
- - débutant avant la fin de la 20ème semaine de grossesse *O21.0*
- - psychogène *F50.5*
- psychogène *F45.31*

Hyperémie *R68.8*
- aiguë *R68.8*
- cérébrale *I67.88*
- conjonctive *H11.4*
- duodénum *K31.88*
- estomac *K31.88*
- foie, active *K76.8*
- généralisée *R68.8*
- intestin *K59.8*
- iris *H21.1*
- labyrinthe *H83.0*
- muqueuse anale *K62.8*
- oeil *H11.4*
- oreille interne *H83.0*
- passive *R68.8*
- paupière *H02.8*
- poumon, passive *J81*
- rein *N28.8*
- rétine *H35.8*
- urètre *N36.8*
- utérus *N85.8*
- vessie *N32.8*
- viscérale *R68.8*

Hyperéosinophilie *D72.1*
- associée à l'endocardite de Löffler *I42.3*

hyperéosinophilique Leucémie chronique éosinophile [syndrome *D47.5*

Hyperergique, conjonctivite *H10.1*

Hyperesthésie *R20.3*
- hémi- *R20.3*
- larynx *J38.7*
- - hystérique *F44.88*
- peau *R20.3*
- pharynx *J39.2*
- - hystérique *F44.88*
- surface du corps *R20.3*

Hyperexcitabilité
- bronches *R94.2*
- cérébrale du nouveau-né *P91.3*
- labyrinthe *H83.2*
- végétative *F45.9*

Hyperexcitabilité du nouveau-né *P91.3*

Hyperfibrinogénémie *R79.8*
- avec hémorragie, en cas de décollement placentaire *O45.0*

Hyperfibrinolyse *D65.2*
- avec saignement
- - compliquant l'accouchement *O67.0*
- - important, avant l'accouchement *O46.0*
- - important, en cas de décollement placentaire *O45.0*
- - important, pendant l'accouchement *O67.0*

Hyperfolliculinie *E28.8*

Hyperfonction (hyperactivité)
- cellules basales, col utérin *N87.9*
- - psychogène *F45.34*
- cortico-surrénale *E27.0*
- - avec puberté précoce *E25.9*
- - congénitale, avec puberté précoce *E25.09*
- épithélium, col utérin *N87.9*
- glande surrénale *E27.0*
- hypophyse *E22.9*
- - avec puberté précoce *E22.8*
- lobe antérieur de l'hypophyse *E22.9*
- - avec acromégalie *E22.0*

Hyperfonction (hyperactivité) *–suite*
- médullo-surrénale *E27.5*
- muqueuse nasale *J34.3*
- muscle oblique inférieur et parésie muscle oblique supérieur
- - avec
- - - ésotropie en V *H50.0*
- - - exotropie en V *H50.1*
- - l'oeil *H50.4*
- muscle oblique inférieur et parésie oblique supérieur
- - avec
- - - ésotropie en A *H50.0*
- - - exotropie en A *H50.1*
- - l'oeil *H50.4*
- ovaire *E28.8*
- pancréas *K86.8*
- parathyroïde *E21.3*
- pinéale *E34.8*
- pluriglandulaire *E31.1*
- testicule *E29.0*
- thyroïde *E05.9*

Hyperfonctionnelle, dysphonie *R49.0*

Hyperfonctionnement surrénalien *E27.5*

Hyperfructosémie *E74.1*

Hypergalactie puerpérale *O92.60*

hypergammaglobulinémique bénin Waldenström Purpura *D89.0*

Hypergammanoglobulinémie *D89.2*
- associée à immunodéficience humorale *D80.6*
- avec déficit en anticorps *D80.6*
- polyclonale *D89.0*

Hypergastrinémie *E16.4*

Hyperglobulinémie *R77.1*

Hyperglycémie *R73.9*
- post-pancréatectomie *E89.1*

Hyperglycémique, coma *E14.01*

Hyperglycéridémie *E78.1*
- endogène *E78.1*
- - avec hypercholestérolémie *E78.2*
- essentielle *E78.1*
- familiale *E78.1*
- héréditaire *E78.1*
- mixte *E78.3*
- pure *E78.1*

Hyperglycéridémie mixte *E78.3*

Hyperglycidémie endogène, dans l'hyperch *E78.2*

Hyperglycinémie *E72.5*
- non cétosique *E72.5*

Hypergonadisme
- masculin *E29.0*
- ovarien *E28.8*
- testiculaire *E29.0*

Hyperhéparinémie *D68.3*
- après l'accouchement *O72.3*

Hyperhidrose *R61.9*
- circonscrite *R61.0*
- dans maladie provoquée par le VIH *B23.8, R61.9*
- généralisée *R61.1*
- - *R61.9*
- psychogène *F45.8*

Hyperhidrose, pathologique *R61.9*

Hyperhidrose, pieds *R61.0*

Hyperhistidinémie *E70.8*

Hyperhomocystéinémie *E72.1*

Hyperhormonale, aménorrhée *E28.8*

Hyperhydratation *E87.7*
- hypotonique *E87.7*

Hyperhydroxyprolinémie *E72.5*

Hyperimmunoglobuline-E, syndrome *D82.4*

Hyperinsulinisme *E16.1*
- avec
- - coma *E15*
- - - hypoglycémique *E15*
- - encéphalopathie *E16.1+, G94.8**
- ectopique *E16.1*
- fonctionnel *E16.1*
- iatrogène *E15*

Hyperinvolution, utérus *N85.8*

Hyperkaliémie *E87.5*

Hyperkaliémique, paralysie périodique *G72.3*
- familiale *G72.3*

Hyperkératose *L85.9*
- associée à
- - avitaminose A *E50.8+, L86**
- - framboesia *A66.3*
- col de l'utérus *N87.9*
- corde vocale *J38.3*
- folliculaire *Q82.8*
- - et parafolliculaire, in cutem penetrans *L87.0*
- - penetrans *L87.0*
- gonococcique *A54.8+, L86**
- Haxthausen, de *L85.1*
- palmaire et plantaire de la ménopause *L85.1*
- plantaire *L85.1*
- rhagadiforme *L85.8*
- sénile *L57.0*
- vulve *N90.4*

Hyperkératosique
- eczéma *L30.8*
- mycose, pied *B35.3*

Hyperkératosique, lésion *L85.9*

Hyperkinésie *F90.9*
- adolescent *F90.9*
- avec retard mental et mouvements stéréotypés *F84.4*
- cardiaque *I51.8*
- enfant *F90.9*

Hyperkinétique
- syndrome *F90.9*
- - avec
- - - retard du développement *F90.0*
- - - trouble du comportement social, chez l'enfant *F90.1*
- - enfant *F90.9*
- tétanie *R29.0*
- - hystérique *F44.5*

Hyperkinétique, syndrome *I51.8*

Hyperkynésie laryngée *J38.5*

Hyperlactatémie *R79.8*

Hyperlaxité articulaire *M25.29*
- paralytique *M25.29*

Hyperleucine-isoleucinémie *E71.1*

Hyperleucino-isoleucinémie *E71.1*

Hyperleucocytose *D72.8*

Hyperlipémique, hépatosplénomégalie, typ *E78.3+, K77.8**

Hyperlipidémie *E78.5*
- A *E78.0*
- avec xanthomatose *E78.5*
- B *E78.1*
- C *E78.2*
- D *E78.3*
- essentielle *E78.4*
- familiale *E78.4*
- - combinée *E78.4*
- mixte *E78.2*
- type
- - I, de Frederickson *E78.3*
- - IIa, de Frederickson *E78.0*
- - IIb, de Frederickson *E78.2*
- - III, de Frederickson *E78.2*
- - IV, de Frederickson *E78.1*
- - V, de Frederickson *E78.3*

Hyperlipidose *E75.6*
- héréditaire NCA *E75.5*

Hyperlipoprotéinémie *E78.5*
- lipoprotéines de basse densité [LDL] *E78.0*
- lipoprotéines de très basse densité (VLDL) *E78.1*
- type
- - IIa *E78.0*
- - - hétérozygote *E78.0*
- - IIb *E78.2*
- - III *E78.2*
- - IV *E78.1*

Hyperlipoprotéinémie de type 2a de Fredr *E78.0*

Hyperlipoprotéinémie de type IV *E78.1*

Hyperlipoprotéinurie *E78.8*

Hyperlordose *M40.49*
- lombaire *M40.46*

Hyperlysinémie *E72.3*

Hypermagnésémie *E83.4*
- néonatale *P71.8*

Hypermastie *N62*

Hyperménorrhée *N92.0*
- préclimatérique *N92.4*

Hyperméthioninémie *E72.1*

Hypermétropie *H52.0*
- axiale *H52.0*
- congénitale *H52.0*
- réfractive *H52.0*

Hypermétropie axiale *H52.0*

Hypermobilité
- coccyx *M53.28*
- côlon, psychogène *F45.32*
- estomac *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- intestin, psychogène *F45.32*
- ménisque *M23.39*
- omoplate *M25.31*

Hypermobilité, syndrome de *M35.7*

Hypernatrémie *E87.0*

Hypernéphroïde
- carcinome, rein *C64*
- tumeur, rein *C64*

Hypernéphrome *C64*

Hyperodontie *K00.1*

Hyperoestrogénie *E28.0*

Hyperopie *H52.0*
- axiale *H52.0*
- élevée *H52.0*
- latente *H52.0*
- manifeste *H52.0*
- réfractive *H52.0*

Hyperorexia nervosa *F50.2*

Hyperornithinémie *E72.4*

Hyperosmie *R43.1*

Hyperosmolaire, coma, diabétique *E14.01*

Hyperosmolarité *E87.0*

Hyperostose *M85.89*
- colonne vertébrale, ankylosante *M48.19*
- corticale, infantile *M89.89*
- crâne *M85.2*
- - congénitale *Q75.8*
- hyperostose vertébrale ankylosante [maladie de Forestier] *M48.19*
- squelette, idiopathique diffuse *M48.19*
- table interne du frontal *M85.2*

Hyperovarie *E28.8*

Hyperoxalurie *E74.8*
- primitive *E74.8*
- secondaire *E74.8*

Hyperoxie *T59.8*

Hyperparathyroïdie *E21.1*
- *E21.3*
- avec
- - arthrite NCA *E21.3+, M14.1**
- - arthropathie à microcristaux *E21.3+, M14.1**
- - myopathie NCA *E21.3+, G73.5**
- primaire *E21.0*
- régulative *E21.1*
- secondaire NCA *E21.1*
- secondaire, rénale *N25.8*

Hyperpathie *R20.8*

Hyperpéristaltisme *R19.2*
- psychogène *F45.39*

Hyperperméabilité, capillaire *I78.8*

Hyperphagie *R63.2*

Hyperphalangie *Q74.0*

Hyperphénylalaninémie NCA *E70.1*

Hyperphorie *H50.5*
- alternante *H50.5*
- décompensée *H50.5*

Hyperphosphatémie *E83.38*

Hyperphosphaturie *E83.38*

Hyperpigmentation *L81.8*
- post-inflammatoire *L81.0*
- - *L81.0*
- sénile *L81.9*

Hyperpigmentation NCA *L81.8*
- mélanine NCA *L81.4*

Hyperpigmentation par la mélanine *L81.4*

Hyperpinéalisme *E34.8*

Hyperpituitarisme *E22.9*
- basophile *E24.9*

Hyperplasie
- adénoïde *J35.2*
- adénoïde, infectieuse *J35.2*
- adénomateux prostate *N40*
- adéno-tonsillaire *J35.3*

Hyperplasie –*suite*
- adréno-medullaire *E27.5*
- agranulocytose *D70.3*
- amygdale *J35.1*
- - et tissu, adénoïde *J35.3*
- amygdale linguale *J35.1*
- amygdale palatine *J35.1*
- - et amygdale pharyngée *J35.3*
- amygdale pharyngienne *J35.2*
- amygdalite *J35.0*
- appendice *K38.0*
- - lymphoïde *K38.0*
- artère rénale *I77.8*
- artère, fibromusculaire *I77.3*
- base de la langue *K14.8*
- bénigne de la prostate, HBP *N40*
- cellules alpha du pancréas *E16.8*
- - avec sécrétion excessive de gastrine *E16.4*
- cellules alpha, pancréas *E16.8*
- - avec sécrétion excessive de gastrine *E16.4*
- cellules bêta *E16.1*
- - ilots de Langerhans *E16.1*
- cellules C, thyroïde *E07.0*
- cellules insulaires *E16.9*
- cémentaire *K03.4*
- cervicite *N72*
- cirrhose rénale, artériolaire *I12.90*
- clitoris, congénitale *Q52.6*
- col utérin *N87.9*
- condyle maxillaire, unilatérale *K10.8*
- cornet du nez *J34.3*
- corps vitré, primaire, persistant *Q14.0*
- cortex surrénal *E27.8*
- - avec
- - - aldostéronisme, primaire *E26.0*
- - - développement, sexuel, prématuré *E25.9*
- - - précocité, sexuelle, chez les garçons *E25.9*
- - - virilisme, chez la femme *E25.9*
- - congénitale *E25.09*
- cystite *N30.9*
- due à une prothèse dentaire *K06.2*
- endocervicite *N72*
- endomètre *N85.0*
- - adénomateuse *N85.1*
- - atypique *N85.1*
- - col utérin *N87.9*
- - dans les antécédents personnels *Z87.4*
- - glandulaire *N85.0*
- - glandulo-kystique *N85.0*
- - kystique *N85.0*
- - polypoïde *N85.0*
- endométrite *N85.0*
- épithélium *L85.9*
- - buccal, focale *K13.2*
- épithélium du mamelon *N62*
- épithélium lingual *K13.2*
- épithélium vaginal *N89.3*
- épithélium vulvaire *N90.3*
- érythrocytaire *D75.8*
- foie
- - congénitale *Q44.7*
- - nodulaire, focale *K76.8*
- ganglions lymphatiques *R59.9*
- - généralisée NCA *R59.1*
- - localisée *R59.0*

Hyperplasie –*suite*

- ganglions lymphatiques cervicaux *R59.0*
- gencive *K06.1*
- gingivite *K05.1*
- glande salivaire *K11.1*
- glande sébacée *L73.8*
- glande surrénale *E27.8*
- - avec
- - - virilisation *E25.9*
- - - virilisme, surrénale *E25.9*
- - congénitale, avec
- - - précocité, sexuelle *E25.09*
- - - virilisation *E25.09*
- glandulo-kystique
- - endométriale *N85.0*
- - utérine *N85.0*
- goitre
- - endémique *E01.2*
- - sporadique *E04.9*
- hymen, congénitale *Q52.4*
- inflammatoire, crête alvéolaire, édentée *K06.2*
- laryngite, hypertrophique *J37.0*
- lèvres *N90.6*
- lèvres, épithéliale *N90.3*
- mâchoire *K07.0*
- mammaire *N62*
- - glandulaire *N62*
- mandibule *K07.0*
- - condylienne unilatérale *K10.8*
- maxillaire *K07.0*
- médullosurrénale *E27.5*
- mélanocytes, atypique *D22.9*
- moelle osseuse *D75.8*
- muqueuse buccale, inflammatoire *K13.6*
- myome, utérus *N85.2*
- natriurie, congénitale *E25.09*
- nez
- - lymphoïde *J34.8*
- - polypoïde *J33.9*
- organes génitaux
- - féminins *N94.8*
- - masculins *N50.8*
- osseuse *M89.39*
- ovaire *N83.8*
- palais, papillaire, inflammatoire *K13.6*
- pancréas *E16.9*
- pancréas, endocrine *E16.9*
- - avec hypersécrétion, glucagon *E16.3*
- pansinusite *J32.4*
- parathyroïde *E21.0*
- pavillon de l'oreille *Q17.8*
- périostose *M89.89*
- perte en sel de la glande surrénale, congénitale *E25.09*
- pharyngite *J31.2*
- pharynx, lymphoïde *J39.2*
- placenta *O43.8*
- polype
- - duodénum *K31.7*
- - estomac *K31.7*
- prostate *N40*
- - bénigne *N40*
- - nodulaire *N40*
- pulpe *K04.9*
- pulpite *K04.0*
- rein *Q63.3*
- réticulo-endothéliale *D75.8*

Hyperplasie –*suite*

- rhinite, chronique *J31.0*
- rhinopathie *J31.0*
- rhinopharynx, lymphoïde *J35.2*
- sinusite *J32.9*
- surrénale *E27.8*
- testicule *N50.8*
- thymus *E32.0*
- - persistante *E32.0*
- thyroïdienne *E04.9*
- tuberculose, iléo-caecale *A18.3+, K93.0**
- urothélium *N39.88*
- utérus *N85.2*
- - glandulo-kystique *N85.0*
- vésico-prostatique *N40*
- vulve *N90.6*

Hyperpnée *R06.4*
- cas de tétanie *R06.88*
- - hystérique *F45.33*
- - psychogène *F45.33*

Hyperprébêtalipoprotéinémie *E78.1*
- familiale *E78.1*

Hyperprolactinémie *E22.1*

Hyperprolinémie *E72.5*
- type
- - I *E72.5*
- - II *E72.5*

Hyperprotéinémie *E88.0*

Hyperprothrombinémie, avec défaut de coa *D68.4*

Hyperpyrexie *R50.9*
- étiologie inconnue *R50.80*
- maligne, due à une anesthésie *T88.3*

Hyperréactif, système bronchique *R94.2*
- allergique *J45.0*

Hyperréflexique, vessie *N32.8*

Hyperréflexivité *R29.2*
- détrusor, vessie *N31.1*

Hyperrégénération, nerf [névrome cicatri *T87.3*

Hyperréninémie *E26.8*

Hypersalivation *K11.7*

Hypersécrétion
- ADH (hormone antidiurétique) *E22.2*
- adrénaline *E27.5*
- adrénocorticotrophine [ACTH], non liée au syndrome de Cushing *E27.0*
- androgènes
- - ovarienne *E28.1*
- - testiculaire *E29.0*
- avec glaucome *H40.8*
- calcitonine *E07.0*
- catécholamines *E27.5*
- corticosurrénalienne *E24.9*
- cortisol *E24.9*
- gastrine *E16.4*
- gastrique *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- glandes lacrymales *H04.2*
- glucagon *E16.3*
- hormone
- - intestinale NCA *E34.1*
- - testiculaire *E29.0*
- - thyréostimuline *E05.8*
- hormone antidiurétique *E22.2*

Hypersécrétion –*suite*

- hormone de croissance *E22.0*
- hormone de libération de la somatotropine [SRH], par pancréas endocrine *E16.8*
- hormone hypophysaire *E22.9*
- humeur aqueuse, avec glaucome *H40.8*
- lait *O92.60*
- médulosurrénalienne *E27.5*
- nutritionnelle *K91.1*
- oestrogènes *E28.0*
- polypeptide
- - intestinal vasoactif, par pancréas endocrine *E16.8*
- - pancréatique, par pancréas endocrine *E16.8*
- salive *K11.7*
- somatostatine, par pancréas endocrine *E16.8*
- somatotropine *E22.0*
- thyrocalcitonine *E07.0*

Hypersécrétoire, gastrite *K29.6*

Hypersegmentation leucocytaire héréditai *D72.0*

Hypersensibilité *T78.4*
- additifs alimentaires *T78.1*
- angéite d' *M31.0*
- avec pneumonie NCA *J67.9*
- bruit *H93.2*
- chimique multiple, syndrome [MCS] *T78.4*
- côlon, psychogène *F45.32*
- conservateurs *T78.1*
- douleur *R20.8*
- douleurs *R20.8*
- due à
- - Aciclovir *T88.7*
- - acide benzenesulfonique *T78.4*
- - acide benzoique *T78.4*
- - acide citrique *T78.4*
- - acide sorbique *T78.4*
- - acide succinique *T78.4*
- - acide tropique *T78.4*
- - acide valproique, dérivés de *T88.7*
- - acridine, dérivés de l' *T88.7*
- - adrénergique produit *T88.7*
- - alcool cétylique *T78.4*
- - alcool de benzyl *T78.4*
- - alcool isopropylique *T78.4*
- - alcool stéarylique *T78.4*
- - amantadine *T88.7*
- - amarante (E123) *T78.4*
- - amidine *T88.7*
- - aminoglycoside *T88.7*
- - aminoquinoline *T88.7*
- - amoxicilline *T88.7*
- - amphotéricine B *T88.7*
- - anésthésique local *T88.7*
- - annatto *T78.4*
- - antagoniste du calcium *T88.7*
- - Antagonistes des récepteurs alpha *T88.7*
- - anthracycline *T88.7*
- - Anticholinergiques *T88.7*
- - anticorps monoclonal *T88.7*
- - antidépresseur tricyclique *T88.7*
- - Antihistaminiques *T88.7*
- - atropine *T88.7*
- - azorubine (E122) *T78.4*

Hypersensibilité *–suite*
- due à *–suite*
- - barbituriques *T88.7*
- - baume du Pérou *T88.7*
- - benzamide *T88.7*
- - benzimidazole, dérivés de *T88.7*
- - benzodiazépine *T88.7*
- - Bêta-adrénorécepteurs, antagonistes *T88.7*
- - bêtabloquant *T88.7*
- - bêta-lactame antibiotique *T88.7*
- - bisphosphonate *T88.7*
- - brun (E155) *T78.4*
- - butylhydroxyanisol *T78.4*
- - butylhydroxytoluène *T78.4*
- - butyrophénone, dérivés de *T88.7*
- - caféine *T88.7*
- - cannelle *T78.1*
- - carbamate *T88.7*
- - carbamazépine *T88.7*
- - carbapénème *T88.7*
- - carmins (E120) *T78.4*
- - caroube, farine de (E140) *T78.4*
- - carraghénane (E407) *T78.4*
- - céfotaxime *T88.7*
- - céphalosporine *T88.7*
- - chlorocresol *T78.4*
- - chlorure de benzalkonium *T78.4*
- - chrysanthème *T78.4*
- - citrate de triéthyle *T78.4*
- - clindamycine *T88.7*
- - colorant alimentaire *T78.1*
- - composé nitré *T78.4*
- - composite, plante *T78.4*
- - contraste, produit de *T88.7*
- - corticostéroïde *T88.7*
- - curcumine (E100) *T78.4*
- - dacarbazine *T88.7*
- - Darbépoïétine alpha *T88.7*
- - Dérivé de l'anthracène *T88.7*
- - désirudine *T88.7*
- - dihydropyridine *T88.7*
- - dioxyde de soufre *T78.4*
- - diphenylbutylpiperidine *T88.7*
- - drogues, conforme aux indications, en cas de mauvaise administration *T88.7*
- - ergot de seigle, alcaloïde de l' *T88.7*
- - erythromycine *T88.7*
- - erythrosine (E127) *T78.4*
- - estradiol *T88.7*
- - éthanol *T78.4*
- - fentanyl *T88.7*
- - filgastrim *T88.7*
- - fluorouracile *T88.7*
- - formaldéhyde *T78.4*
- - gadodiamide *T88.7*
- - gallate *T78.4*
- - glycopeptide antibiotique *T88.7*
- - glycoside cardiaque *T88.7*
- - gonadotrophine releasing hormone, analogue *T88.7*
- - guar, farine de (E412) *T78.4*
- - héparine *T88.7*
- - histamine antagoniste des récepteurs H2 *T88.7*
- - hormone corticotrope (ACTH) *T88.7*
- - huile d'arachide *T78.1*
- - hydantoïne, dérivés de *T88.7*
- - hydralazine *T88.7*

Hypersensibilité *–suite*
- due à *–suite*
- - hydrocarbure halogéné *T88.7*
- - imidazole, dérivés de *T88.7*
- - immunoglobuline *T88.7*
- - - humaine normale *T88.7*
- - indométacine *T88.7*
- - inhalation d'anesthésiques *T88.7*
- - inhibiteur bêta-lactamase *T88.7*
- - inhibiteurs d'enzyme de conversion (ECA) *T88.7*
- - jaune de quinoléine (E104) *T78.4*
- - jaune orangé S (E110) *T78.4*
- - Karaya (E416) *T78.4*
- - lacosamide *T88.7*
- - lidocaïne *T88.7*
- - lincomycine *T88.7*
- - lisinopril *T88.7*
- - lutéine-releasing hormone *T88.7*
- - lysozyme *T78.4*
- - macrogol *T88.7*
- - macrogol ricinoléate de glycérol *T78.4*
- - macrolide *T88.7*
- - macrolide, antibiotique *T88.7*
- - médication, conforme aux indications, en cas de mauvaise administration *T88.7*
- - mercaptopurine *T88.7*
- - mercure *T88.7*
- - métoprolol *T88.7*
- - myorelaxant *T88.7*
- - nadroparine *T88.7*
- - natamycine *T88.7*
- - néomycine *T88.7*
- - neuroleptique *T88.7*
- - nitrate *T88.7*
- - nitrofurane *T88.7*
- - nitroimidazole, dérivés de *T88.7*
- - nitroso-urée *T88.7*
- - noir brillant (E151) *T78.4*
- - norfluran *T78.4*
- - ombellifères *T78.4*
- - opiacé *T88.7*
- - oxicame *T88.7*
- - parabène *T78.4*
- - para-hydroxybenzoate de méthyle *T78.4*
- - perchlorate *T88.7*
- - phénothiazine *T88.7*
- - phénytoïne *T88.7*
- - pipérazine, dérivés de la *T88.7*
- - pipéridine, dévivés de la *T88.7*
- - podophyllotoxine *T88.7*
- - polymyxine B *T88.7*
- - ponceau (E124) *T78.4*
- - pravastatine *T88.7*
- - probénécide *T88.7*
- - propacétamol *T88.7*
- - propylène glycol *T78.4*
- - prostaglandine *T88.7*
- - protéine de soja *T78.1*
- - protéine d'oeuf *T78.1*
- - protéine, hamster *T78.4*
- - protéines plasmatiques *T88.7*
- - pyrazolone *T88.7*
- - pyréthrine *T88.7*
- - pyrrolidone *T78.4*
- - quinazoline *T78.4*
- - quinoline *T88.7*

Hypersensibilité *–suite*
- due à *–suite*
- - quinoline méthanol *T88.7*
- - quinolone *T88.7*
- - rifamycine *T88.7*
- - rouge (E128) *T78.4*
- - rouge allura (E129) *T78.4*
- - rouge cochenille (E124) *T78.4*
- - rouge de phénol *T78.4*
- - rubine, pigments (E180) *T78.4*
- - salicylates *T88.7*
- - sérotonine, antogonistes 5HT3 *T88.7*
- - sodium, benzoate de *T78.4*
- - sodium, bisulfate de *T78.4*
- - sodium, édétate de *T78.4*
- - soja *T78.1*
- - sorbitol *T78.1*
- - souris protéine de *T78.4*
- - sulfamidés *T88.7*
- - sulfasalazine *T88.7*
- - sulfite *T78.4*
- - sulfonylurée *T88.7*
- - Sympathomimétiques *T88.7*
- - tacrolimus *T88.7*
- - tartrazine (E102) *T78.4*
- - terbutaline *T88.7*
- - tétracycline *T88.7*
- - tétracycline, dérivés de *T88.7*
- - thiamine *T88.7*
- - thiazide *T88.7*
- - thionamide, dérivés de *T78.4*
- - thioxanthène *T88.7*
- - thyréotropine-releasing-hormone *T88.7*
- - tolycaïne *T88.7*
- - traganthe (E413) *T78.4*
- - triammonium citrate de *T78.4*
- - triarylméthane *T78.4*
- - triméthoprime *T88.7*
- - triphénylméthane, colorant *T78.4*
- - urée *T88.7*
- - valaciclovir *T88.7*
- - valériane, racine *T88.7*
- - vitamine D *T88.7*
- - xanthine *T88.7*
- estomac *K52.2*
- - psychogène *F45.31*
- examen *Z01.5*
- gastro-intestinale *K52.2*
- labyrinthe *H83.2*
- médication *T88.7*
- sinus carotidien *G90.00*
- voie respiratoire supérieur localisation non précisée , Réaction d ' *J39.3*

Hypersensible
- angéite *M31.0*
- labyrinthe *H83.2*
- pneumonie *J67.9*
- - due à poussière organique inhalée *J67.8*
- vessie *N31.9*

Hypersomie *E34.4*

Hypersomnie *F51.1*
- *G47.1*
- idiopathique *G47.1*
- non organique *F51.1*
- organique *G47.1*
- primitive *F51.1*

Hypersomnie –*suite*

- psychogène *F51.1*
- récidivante *G47.8*

Hypersomnie, type, troubles du sommeil *G47.1*

Hypersomnie-boulimie, syndrome *G47.8*

Hypersplénisme *D73.1*
- dans maladie liée au VIH *B23.8, D73.1*

Hyperstéatose *E66.99*

Hyperstimulation ovarienne *N98.1*
- associée à une ovulation induite *N98.1*

Hypersurrénalisme *E24.9*
- *E27.5*

Hypertélorisme *Q75.2*
- oculaire *Q75.2*
- orbitaire *Q75.2*

Hypertensif
- avec crise hypertensive *I10.91*
- - dans l'hypertension
- - - essentielle bénigne *I10.01*
- - - maligne *I10.11*
- - - vasculo-rénale *I15.01*
- dégénerescence, myocarde *I11.90*
- dysfonction de l'utérus, complication de l'accouchement NCA *O62.4*
- encéphalopathie *I67.4*
- hypertrophie cardiaque *I11.90*
- insuffisance
- - cardiaque *I11.00*
- - - avec
- - - - insuffisance rénale *I13.20*
- - - - néphropathie *I13.00*
- - - due à une congestion *I11.00*
- - cardiorénale *I13.20*
- - rénale *I12.00*
- insuffisance cardiaque congestive, avec néphropathie *I13.00*
- insuffisance rénale terminale *I12.00*
- insuffisance ventriculaire gauche *I11.00*
- maladie *I10.90*
- - cardiaque *I11.90*
- - - associée à atrophie rénale *I13.90*
- - - avec insuffisance cardiaque *I11.00*
- - - - avec crise hypertensive *I11.01*
- - - bénigne *I11.90*
- - - et rénale *I13.90*
- - - - avec insuffisance
- - - - - cardiaque, *I13.00*
- - - - - cardiaque, avec crise hypertensive, *I13.01*
- - - - - rénale, *I13.10*
- - - - - rénale, avec crise hypertensive, *I13.11*
- - - - - cardiaque, et rénale, *I13.20*
- - - maligne *I11.90*
- - - sans insuffisance cardiaque, avec crise hypertensive *I11.91*
- - cardiorénale *I13.90*
- - rénale *I12.90*
- - - avec insuffisance rénale *I12.00*
- - - - avec crise hypertensive *I12.01*
- - - sans insuffisance rénale *I12.90*
- - - - avec crise hypertensive *I12.91*
- maladie, coeur
- - avec insuffisance rénale *I13.10*
- - chronique, ischémique *I25.9*
- myocardite *I11.90*
- néphropathie *I12.90*

Hypertensif –*suite*

- oedème cérébral *G93.6*
- polyglobulie *D75.1*
- rétinopathie *H35.0*
- urémie *I12.00*
- urgence *I10.91*

Hypertension *I10.90*
- accélérée *I10.90*
- artérielle *I10.90*
- - essentielle *I10.90*
- - Goldblatt (type) *I70.1*
- - pulmonaire *I27.28*
- associée à
- - atrophie rénale *I12.90*
- - - avec insuffisance rénale *I12.00*
- - effort *I10.90*
- - gestation *O13*
- - - avec protéinurie *O14.9*
- - gestation, avec albuminurie, pendant la grossesse *O14.9*
- - grossesse, avec
- - - albuminurie *O14.9*
- - - - sévère *O14.1*
- - - oedème *O14.9*
- - - - sévère *O14.1*
- - insuffisance cardiorénale *I13.20*
- - rein de Page *I15.10*
- avec
- - atrophie rénale *I12.90*
- - atteinte
- - - cardiaque *I11.90*
- - - rénale *I12.90*
- - cardiopathie sénile *I11.90*
- - cardiopathie, préexistante, pendant la grossesse *O10.1*
- - cyanose *I11.90*
- - décompensation cardiaque *I11.00*
- - insuffisance
- - - cardiaque *I11.00*
- - - rénale *I12.00*
- - insuffisance rénale *I12.00*
- - lésion, glomérulonéphrite sclérosante diffuse *N18.9*
- - néphrosclérose et atteinte cardiaque *I13.10*
- avec cardiopathie *I11.90*
- avec complication, cardiaque *I11.90*
- bénigne *I10.00*
- - associée à cardiopathie *I11.90*
- - cardiorénale *I13.90*
- - essentielle, avec crise hypertensive *I10.01*
- borderline *I10.90*
- cardiorénale *I13.90*
- - avec insuffisance
- - - cardiaque et rénale *I13.20*
- - - rénale *I13.10*
- cardiovasculaire *I11.90*
- - avec insuffisance cardiaque et rénale *I13.20*
- - rénale *I13.90*
- - - avec insuffisance rénale *I13.10*
- compliquant l'accouchement *O16*
- d'effort *I10.90*
- dépistage *Z13.6*
- difficile à stabiliser *I10.90*
- due à une atteinte du parenchyme rénal *I15.10*

Hypertension –*suite*

- éclamptique, préexistante, pendant la grossesse *O11*
- essentielle *I10.90*
- - bénigne, préexistante, pendant la grossesse *O10.0*
- - pendant la grossesse, préexistante, avec protéinurie surajoutée *O11*
- - primitive *I10.90*
- essentielle primaire *I10.90*
- estomac *K31.88*
- gestationnel transitoire SAI *O13*
- gestationnelle *O13*
- gestationnelle, associée à une éclampsie NCA *O15.9*
- globe oculaire *H40.0*
- Goldblatt (type) *I70.1*
- hypertonie musculaire congénitale *P94.1*
- - néonatale *P94.1*
- idiopathique *I10.90*
- instable *I10.90*
- intracrânienne bégnine *G93.2*
- juvénile *I10.90*
- latente *I10.90*
- légère *I10.90*
- maligne *I10.10*
- - avec
- - - atteinte cardiaque *I11.90*
- - - crise hypertensive *I10.11*
- - cardiorénale *I13.90*
- - pendant la grossesse, préexistante *O10.0*
- maternelle
- - avec atteinte du foetus/nouveau-né (état O10-O11, O13-O16) *P00.0*
- - pendant la grossesse NCA *O16*
- néonatale *P29.2*
- oculaire *H40.0*
- passagère, pendant la grossesse *O13*
- portale *K76.6*
- - associée à fibrose hépatique et splénique *K76.6*
- - due à maladie hépatique chronique *K76.6*
- - idiopathique *K76.6*
- pré- *I10.90*
- pré-éclamptique, préexistante, pendant la grossesse *O11*
- préexistante
- - associée à éclampsie NCA *O15.9*
- - avec albuminurie, pendant la grossesse *O11*
- préexistante, avec pré-éclampsie *O11*
- provoquée par
- - atteinte
- - - artérielle rénale *I15.00*
- - - rénale NCA *I15.10*
- - maladie endocrinienne *I15.20*
- - - avec crise hypertensive *I15.21*
- - phéochromocytome *I15.20*
- psychogène *F45.30*
- pulmonaire *I27.28*
- - associée à thromboembolie chronique *I27.20*
- - idiopathique *I27.0*
- - persistante, chez le nouveau-né *P29.3*
- - primitive *I27.0*
- réfractaire au traitement *I10.90*
- rénale *I15.00*

Hypertension –*suite*
- rénale –*suite*
- - avec insuffisance cardiaque *I13.00*
- - - et rénale *I13.20*
- - bénigne *I15.00*
- - due à néphropathie, préexistante, pendant la grossesse *O10.4*
- - gestationnelle *O13*
- - maligne *I15.00*
- - préexistante, pendant la grossesse *O10.2*
- - transitoire *O16*
- rénale maligne *I12.90*
- rénale parenchymateuse *I15.10*
- rénoparenchymateuse *I15.10*
- secondaire *I15.90*
- - bénigne *I15.90*
- - due à troubles vasculaires rénaux *I15.00*
- - maligne *I15.90*
- - préexistante
- - - due à néphrite, pendant la grossesse *O10.4*
- - - due à néphropathie, pendant la grossesse *O10.4*
- stade I *I10.90*
- stade II *I10.90*
- stade III *I10.90*
- systémique *I10.90*
- transitoire, pendant la grossesse *O16*
- vasculo-rénale *I15.00*
- - avec crise hypertensive *I15.01*
- végétative *I10.90*

Hyperthécose ovarienne *E28.8*

Hyperthermie *R50.9*
- due à environnement, nouveau-né *P81.0*
- étiologie inconnue *R50.80*
- maligne
- - antécédents *Z88.4*
- - due à anesthésie *T88.3*

Hyperthymie *F38.0*

Hyperthymique, trouble de la personnalit *F34.0*

Hyperthyréose *E05.9*
- associée à
- - autonomie uninodulaire, en présence d'un goître *E05.1*
- - goître *E05.0*
- - - adénomateux *E05.2*
- - - avec autonomie thyroïdienne *E05.2*
- - - - multinodulaire *E05.2*
- - - diffus *E05.0*
- - - toxique
- - - - multinodulaire *E05.2*
- - - - uninodulaire *E05.1*
- auto-immune *E05.8*
- avec
- - arthropathie *E05.9+, M14.5**
- - chloasma, paupière *E05.9+, H03.8**
- - goître nodulaire *E05.2*
- - myopathie *E05.9+, G73.5**
- - nodule thyroïdien *E05.1*
- - syndrome myasthénique *E05.9+, G73.0**
- Basedow (type) *E05.0*
- due à nodules thyroïdiens ectopiques *E05.3*
- immunogène *E05.0*

Hyperthyréose –*suite*
- juvénile *E05.9*
- latente *E05.9*
- récidivante *E05.9*
- transitoire
- - associée à thyroïdite chronique *E06.2*
- - nouveau-né *P72.1*

Hyperthyroïdie *E05.9*
- avec
- - coma *E05.5*
- - délirium *E05.5*
- - neuropathie, nerfs périphériques autonomes *E05.9+, G99.0**
- sans goitre *E05.9*

Hyperthyroïdien, goître, latent *E05.0*

Hyperthyroïdienne, cardiopathie *E05.9+, I43.8**

Hypertonique
- altérations vasculaires de la rétine *H35.0*
- cardiopathie hypertensive *I11.90*
- contraction, utérus *O62.4*
- contractions *O62.4*
- contractions, avec lésions du foetus/nouveau-né *P03.6*
- crise hypertensive *I10.91*
- dysfonction utérine *O62.4*
- encéphalopathie hypertensive *I67.4*
- vessie *N31.88*

Hypertrichose *L68.9*
- congénitale *Q84.2*
- lanugineuse *Q84.2*
- - acquise *L68.1*
- localisée *L68.2*
- paupière *H02.8*

Hypertrichose lanugineuse *Q84.2*
- acquise *L68.1*
- persistante *Q84.2*

Hypertrophie
- adénoïde *J35.2*
- amygdale pharyngienne *J35.2*
- appendice, peau *L91.8*
- artère *I77.8*
- - congénitale NCA *Q27.8*
- Bartholin, glande de *N75.8*
- caecum *K59.3*
- canal
- - cholédoque *K83.8*
- - cystique *K82.8*
- - déférent *N50.8*
- - hépatique *K83.8*
- - spermatique *N50.8*
- canal déférent *N50.8*
- cardiaque *I51.7*
- cardiaque gauche *I51.7*
- - concentrique *I51.7*
- cartilage *M94.89*
- cartilage du nez *J34.8*
- cerveau *G93.88*
- cicatrice *L91.0*
- clitoris *N90.8*
- - cirrhotique *N90.8*
- - congénitale *Q52.6*
- coeur *I51.7*
- - avec fièvre, rhumatismale, non évolutive *I09.8*
- - bi-ventriculaire *I51.7*
- - chronique *I51.7*

Hypertrophie –*suite*
- coeur –*suite*
- - congénitale NCA *Q24.8*
- - graisseuse *I51.5*
- - hypertensive *I11.90*
- - rhumatismale *I09.8*
- - - aiguë *I01.8*
- - - évolutive *I01.8*
- col utérin *N88.8*
- - avec allongement *N88.4*
- - congénitale *Q51.8*
- col vésical *N32.8*
- colliculus séminal *N36.8*
- côlon *K59.3*
- - congénitale *Q43.2*
- conjonctive, lymphoïde *H11.8*
- corde vocale *J38.3*
- cordon spermatique *N50.8*
- cordon spermatique congénitale *Q55.4*
- cornet du nez *J34.3*
- corps
- - adipeux *M79.46*
- - caverneux *N48.8*
- cortex surrénalien *E27.8*
- coussinet graisseux rotulien *M79.46*
- crête alvéolaire *K08.88*
- duodénum *K31.88*
- endomètre
- - atypique *N85.1*
- - glandulaire *N85.0*
- épididyme *N50.8*
- estomac *K31.88*
- foetale, suivi requis pour la femme enceinte *O36.6*
- foie *R16.0*
- - aiguë *K76.8*
- - congénitale *Q44.7*
- frein de la langue *K14.8*
- frein de la lèvre *K13.0*
- ganglions lymphatiques *R59.9*
- - généralisée NCA *R59.1*
- - localisée *R59.0*
- gencive *K06.1*
- glande lacrymale, chronique *H04.0*
- glande salivaire *K11.1*
- - congénitale *Q38.4*
- glande sous-maxillaire *K11.1*
- glande sublinguale *K11.1*
- - congénitale *Q38.4*
- glande thyroïde *E04.9*
- glandes surrénales *E21.0*
- hémifaciale *Q67.4*
- hiatus diaphragmatique, congénital *Q79.1*
- hiatus oesophagien, congénitale *Q79.1*
- hile des ganglions lymphatiques *R59.0*
- Hoffa, genou de [maladie du paquet adipeux sous-rotulien] *M79.46*
- hymen, congénitale *Q52.4*
- hypophyse *E23.6*
- iléon *K63.8*
- intestin NCA *K63.8*
- jéjunum *K63.8*
- langue *K14.8*
- - congénitale *Q38.2*
- lèvre *K13.0*
- - congénitale *Q18.6*
- lèvres
- - grandes *N90.6*

Hypertrophie –*suite*
- lèvres –*suite*
- - petites *N90.6*
- lèvres vulvaires *N90.6*
- ligament *M24.29*
- luette *K13.7*
- mamelon *N62*
- Meckel, diverticule de, congénitale *Q43.0*
- Meibomius, glande de *H00.1*
- ménisque, genou, congénitale *Q74.1*
- métatarse *M89.37*
- muqueuse alvéolaire *K06.2*
- muqueuse gastrique *K29.6*
- muqueuse nasale *J34.3*
- muscle *M62.89*
- myocarde *I51.7*
- - idiopathique *I42.2*
- myomètre *N85.2*
- nez *J34.8*
- noeuds lymphatiques *R59.9*
- - cas de VIH *B23.8, R59.9*
- - circonscrite *R59.0*
- - généralisée *R59.1*
- - localisée *R59.0*
- oesophage *K22.8*
- ongle *L60.2*
- - congénitale *Q84.5*
- organes génitaux masculins *N50.8*
- orteil
- - acquise *M20.5*
- - congénitale *Q74.2*
- os du nez *J34.8*
- os nasal *J34.8*
- os naviculaire, pied *M89.37*
- osseuse *M89.39*
- ovaire *N83.8*
- palais
- - dur *K10.8*
- - mou *K13.7*
- pancréas, congénitale *Q45.3*
- papilles anales *K62.8*
- papilles foliées, langue *K14.3*
- papilles linguales *K14.3*
- paquet adipeux
- - genou *M79.46*
- - sous-rotulien *M79.46*
- paraprostatique *N40*
- parathyroïde *E21.0*
- parotide *K11.1*
- paupière *H02.8*
- peau *L91.9*
- pénis *N48.8*
- pharynx *J39.2*
- pied, congénitale *Q74.2*
- plexus pampiniforme *I78.8*
- prépuce *N47*
- processus alvéolaire *K08.88*
- prostate *N40*
- - avec cystite *N41.3*
- - bénigne *N40*
- - congénitale *Q55.4*
- pseudo-, muscle gastrocnémien *G71.0*
- pseudomusculaire *G71.0*
- pylore *K31.1*
- - congénitale *Q40.0*
- - infantile *Q40.0*
- rate *R16.1*

Hypertrophie –*suite*
- rein *N28.8*
- - congénitale *Q63.3*
- reins *E27.8*
- - *N28.8*
- scrotum *N50.8*
- sein *N62*
- - kystique *N60.1*
- - - avec prolifération épithéliale *N60.3*
- - lors de la puberté *N62*
- - nouveau-né *P83.4*
- - sénile *N62*
- sigmoïde *K59.3*
- sinus paranasal *J34.8*
- sphincter rectal *K62.8*
- sphincter vésical *N32.8*
- surrénales *E27.8*
- synoviale NCA *M67.29*
- tendon *M67.89*
- testicule *N50.8*
- testicules *N50.8*
- thymus *E32.0*
- - congénitale *E32.0*
- thyroïde *E04.9*
- - endémique *E01.2*
- - sporadique *E04.9*
- tonsille *J35.1*
- - et tissu, adénoïde *J35.3*
- tonsille palatine *J35.1*
- - et amygdale pharyngée *J35.3*
- trigone vésical *N32.8*
- tunique
- - musculaire, artère *I77.8*
- - vaginale *N50.8*
- uretère *N28.8*
- urètre *N36.8*
- utérus *N85.2*
- - puerpérale *O90.8*
- vagin *N89.8*
- valvule cardiaque *I38*
- veine *I87.8*
- ventriculaire droite *I51.7*
- ventriculaire gauche *I51.7*
- - concentrique *I51.7*
- ventricule
- - avec tétralogie de Fallot *Q21.3*
- - congénitale *Q24.8*
- ventricule cardiaque *I51.7*
- ventricule gauche *I51.7*
- vésicule biliaire *K82.8*
- vésicule séminale *N50.8*
- vessie *N32.8*
- voies biliaires *K83.8*
- vulve *N90.6*

Hypertrophique
- allongement, col utérin *N88.4*
- altération
- - sinus paranasal *J34.8*
- - voies respiratoires supérieures *J39.88*
- arthrite *M19.99*
- arthropathie *M19.99*
- arthrose *M19.99*
- barre moyenne, orifice de la vessie *N40*
- cardiomyopathie
- - non obstructive *I42.2*
- - obstructive *I42.1*
- - - congénitale *Q24.8*

Hypertrophique –*suite*
- Charcot-Marie-Tooth, neuropathie de *G60.0*
- cicatrice *L91.0*
- cirrhose *K74.3*
- dégénérescence du foie NCA *K76.8*
- Déjerine-Sottas, neuropathie de *G60.0*
- gastrite *K29.6*
- laryngite *J37.0*
- - hyperplasique *J37.0*
- laryngo-trachéite *J37.1*
- Ménétrier, maladie de *K29.6*
- neuropathie *G60.0*
- - interstitielle, progressive *G60.0*
- - pendant l'enfance *G60.0*
- névrite, interstitielle, progressive *G60.0*
- ostéoarthropathie *M19.99*
- - pulmonaire *M89.49*
- - secondaire *M89.49*
- ostéoarthrose *M19.99*
- pachyméningite *G03.9*
- pharyngite *J31.2*
- - chronique *J31.2*
- prostatite *N41.1*
- rétrécissement, pylore *K31.1*
- rhinite *J31.0*
- - chronique *J31.0*
- spondylopathie *M47.99*
- stase, vulve *N90.6*
- sténose sous-aortique *I42.1*
- - idiopathique *I42.1*
- sténose, pylore
- - congénitale *Q40.0*
- - l'adulte *K31.1*
- tonsillite *J35.0*
- vulvite *N76.2*

Hypertropie *H50.2*

Hypertyrosinémie *E70.2*
- transitoire, du nouveau-né *P74.5*

Hyperuricémie *E79.0*
- asymptomatique *E79.0*
- primaire, familiale *E79.0*

Hyperuricosurie *R82.9*

Hypervalinémie *E71.1*

Hyperventilation *R06.4*
- hystérique *F45.33*
- psychogène *F45.33*

Hyperventilation dyspnée *R06.0*

Hyperventilation tétanie *R06.4*
- hystérique *F45.33*
- psychogène *F45.33*

Hypervitaminose *E67.8*
- A *E67.0*
- - surdosage subit *T45.2*
- après administration excessive de préparations vitaminées *E67.8*
- B6 *E67.2*
- D *E67.3*
- - surdosage subit *T45.2*
- diabètique *E67.8*
- vitamine K *E67.8*
- - surdosage *T45.7*

Hypervolémie *E87.7*

Hyphéma *H21.0*
- traumatique *S05.1*

Hypnagogique, tremor du pied en état *G25.3*

Hypnolepsie *G47.4*

Hypnotique
- abus *F13.1*
- démence *F13.7*
- dépendance NCA *F13.2*
- et sédatif
- - intoxication
- - - aiguë, sous forme d'état ébrieux *F13.0*
- - - lors de dépendance *F13.0*
- - utilisation
- - - avec syndrome de dépendance *F13.2*
- - - nocive *F13.1*
- intoxication aiguë *F13.0*
- trouble persistant *F13.7*

Hypoacidité *K31.88*
- estomac *K31.88*
- psychogène *F45.31*

Hypoacousie *H91.9*
- acquise *H91.9*
- - avec mutisme NCA *H91.3*
- Agnosie *R48.1*
- aigue *H91.2*
- antécédents familiaux *Z82*
- bilatérale *H91.9*
- - combinée, due à une sensibilité au bruit *H90.6*
- bilatérale, combinée, due à des troubles de la sensibilité acoustique *H90.6*
- centrale *H90.5*
- cochlée *H90.5*
- combinée, due à des troubles de la sensibilité acoustique *H90.8*
- complète *H91.9*
- congénitale *H90.5*
- congénitale NCA *H90.5*
- congénitale, avec mutisme NCA *H91.3*
- corticale *H90.5*
- due à
- - aéro-otite *T70.0*
- - agents toxiques *H91.0*
- - anomalie, oreille *Q16.9*
- - toxicité *H91.0*
- - troubles, sensibilité acoustique *H90.5*
- due à l'âge *H91.1*
- due au bruit *H83.3*
- émotionnelle *F44.6*
- fonctionnelle *F44.6*
- fréquences
- - hautes *H91.9*
- - - et profonde *H91.9*
- - - et profondes *H91.9*
- - profondes *H91.9*
- fréquences hautes *H91.9*
- fréquences profondes *H91.9*
- hautes fréquences *H91.9*
- héréditaire *H91.9*
- Hocton- *H91.9*
- hystérique *F44.6*
- idiopathique, soudaine *H91.2*
- ischémique
- - transitoire *H93.0*
- - - liée au développement *H93.0*
- - volatile *H93.0*
- ischémique, pré-existante *H93.0*
- - due au développement *H93.0*
- labyrinthe *H90.5*

Hypoacousie –*suite*
- langage *F80.28*
- neurosensorielle *H90.5*
- - bilatérale *H90.3*
- - - congénitale *H90.3*
- - unilatérale *H90.4*
- - - congénitale *H90.4*
- oreille interne *H90.5*
- - bilatérale *H90.3*
- - cas de troubles de transmission *H90.8*
- - et surdité, oreille moyenne, combinée *H90.8*
- - toxique *H91.0*
- oreille moyenne *H90.2*
- - et surdité, oreille interne, combinée *H90.8*
- ototoxique *H91.0*
- partielle *H91.9*
- psychogène *F44.6*
- sensorielle *H90.5*
- syphilitique *A52.1+, H94.8**
- - congénitale *A50.0+, H94.8**
- transmission *H90.2*
- - avec perte de l'audition, oreille interne *H90.8*
- - bilatérale *H90.0*
- unilatérale *H91.9*
- - combinée, due à des troubles de la sensibilité acoustique *H90.7*
- unilatérale, combinée, due à des troubles de la sensibilité acoustique *H90.7*

Hypoacousie de perception *H90.5*

Hypoactivité
- détrusor, vessie *N31.2*
- sexuelle *F52.0*

Hypoadrénalisme *E27.4*
- primaire *E27.1*
- tuberculeuse *A18.7+, E35.1**

Hypoadrénocorticisme *E27.4*
- hypophysaire *E23.0*
- primaire *E27.1*

Hypoalbuminémie *E88.0*

Hypoaldostéronisme *E27.4*

Hypoalgésie *R20.8*

Hypoalimentation *E46*

Hypoalphalipoprotéinémie *E78.6*

Hypobaropathie *T70.2*

Hypobétalipoprotéinémie *E78.6*
- familiale *E78.6*

Hypocalcémie *E83.58*
- diabétique *E58*
- due au lait de vache, période néonatale *P71.0*
- nouveau-né *P71.1*

Hypocalciurie, hypercalcémie, familiale *E83.58*

Hypochlorémie *E87.8*

Hypochlorémie, syndrome rénal *N28.8*

Hypochlorhydrie *K31.88*
- neurologique *F45.31*
- psychogène *F45.31*

Hypochondrie
- plaie, ouverte *S31.1*
- sarcum *C49.4*

Hypochondrogénésie *Q77.0*

Hypochondroplasie *Q77.4*

Hypochromasie, globules rouges *D50.8*

Hypochrome, anémie *D50.9*
- avec accumulation de fer *D64.3*
- microcytaire *D50.8*
- normoblastique *D50.8*
- sidéroblastique liée au sexe *D64.0*

Hypochylie *K31.88*

Hypocitraturie *R82.9*

Hypocomplémentémique
- néphrotique, avec lésion glomérulaire *N04.5*
- vasculite, nécrosante *M31.8*

Hypocondriaque *F45.2*

Hypocondrie *F32.9*
- coeur *F45.2*
- délire *F45.2*
- dépression *F45.2*
- névrose *F45.2*
- troubles *F45.2*

Hypocondroplastie, ??? *Q77.4*

Hypocontractilité, muscle vésical, sans *N31.81*

Hypocorticisme *E27.4*

Hypodontie *K00.0*

Hypoéosinophilie *D72.8*

Hypoesthésie *R20.1*
- cornée *H18.8*
- hémi- *R20.1*
- peau *R20.1*

Hypoesthésie cutanée *R20.1*

Hypofibrinogénémie *D68.8*
- acquise *D65.0*
- avec hémorragie
- - antepartum *O46.0*
- - compliquant l'accouchement *O67.0*
- - intrapartum *O67.0*

Hypogalactie *O92.40*
- avec difficultés à la mise au sein *O92.41*
- suites de couches *O92.40*

Hypogammaglobulinémie *D80.1*
- avec
- - arthrite *D80.1+, M14.8**
- - atteinte du tissu conjonctif systémique *D80.1+, M36.8**
- - atteinte systémique du tissu conjonctif *D80.9+, M36.8**
- héréditaire *D80.0*
- non familiale *D80.1*
- transitoire du nourrisson *D80.7*

Hypogammaglobulinémique, syndrom de care *D80.1*
- héréditaire *D80.0*

Hypoglobulie *D64.9*

Hypoglosse
- maladie *G52.3*
- névralgie *G52.3*
- paralysie *G52.3*
- parésie *G52.3*

Hypoglossie *Q38.3*

Hypoglycémie *E16.1*
- avec polyneuropathie *E16.2+, G63.3**
- cas de
- - diabète sucré *E14.60*
- - diabète type I *E10.60*
- - diabète type II *E11.60*

Hypoglycémie –*suite*

- choc *E15*
- - cours de
- - - diabète sucré *E14.61*
- - - diabète type 1 *E10.61*
- - - diabète type 2 *E11.61*
- - non diabétique *E15*
- Coma *E15*
- - avec
- - - diabète sucré *E14.61*
- - - diabète type 1 *E10.61*
- - - diabète type 2 *E11.61*
- - - hyperinsulinisme *E15*
- - avec encéphalopathie *E16.1+, G94.8**
- - non diabétique *E15*
- cours de
- - diabète sucré *E14.60*
- - diabète type 1 *E10.60*
- - diabète type 2 *E11.60*
- - hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation *O21.1*
- Diabète sucré mère (préexistant), affectant le foetus ou le nouveau-né (avec *P70.1*
- due à l'insuline
- - accident ou erreur thérapeutique *T38.3*
- - avec coma *E15*
- fonctionelle, sans augmentation de l'insuline *E16.1*
- iatrogène *E16.0*
- - avec coma *E15*
- - nouveau-né *P70.3*
- induite par la leucine *E71.1*
- induite par l'insuline *E16.0*
- - cours de
- - - diabète sucré *E14.60*
- - - diabète type 1 *E10.60*
- - - diabète type 2 *E11.60*
- infantile *E16.1*
- médicamenteuse *E16.0*
- - avec coma *E15*
- néonatale, diabète maternel, gestationel *P70.0*
- nouveau-né, due au diabète de la mère *P70.1*
- postopératoire *E16.1*
- réaction due à l'insuline, avec coma, non diabètique *E15*
- réactive, non induite par l'insuline *E16.1*
- spontanée *E16.2*
- transitoire, du nouveau-né *P70.4*

Hypognathie *K07.0*

Hypogonadisme
- femme *E28.3*
- homme *E29.1*
- hypogonadotrope *E23.0*
- hypophysaire *E23.0*
- hypothalamique *E23.3*
- ovarienne *E28.3*
- - primaire *E28.3*
- testiculaire *E29.1*
- - primaire *E29.1*

Hypogonadotrope
- aménorrhée *N91.1*
- eunuchoïdisme *E23.0*
- Hypogonadisme *E23.0*

Hypogueusie *R43.8*

Hypohidrose *L74.4*

Hypohydratation *E86*

Hypoinsulinémie
- après
- - acte à visée diagnostique et thérapeutique *E89.1*
- - pancréatectomie *E89.1*
- postopératoire *E89.1*

Hypo-insulinémie postopératoire *E89.1*

Hypokaliémie *E87.6*

Hypokaliémie, paralysie, périodique *G72.3*
- familiale *G72.3*

Hypokaliémie, syndrome *E87.6*

Hypokinésie, réflexe choréique *G25.5*

Hypokinétique, syndrome, rigide *G23.8*

Hypokynésie, réflexe, chorée *G25.5*

Hypoleucocytose *D70.7*

Hypolipoprotéinémie *E78.6*
- alpha *E78.6*
- béta *E78.6*

Hypolipoprotéinémie (bêta) *E78.6*

Hypomagnésiémie *E83.4*
- nouveau-né *P71.2*

Hypomanie *F30.0*
- épisode *F30.0*
- - avec trouble, affectif, bipolaire *F31.0*
- forme, réaction, maniaco-dépressive *F31.8*
- psychose *F30.0*

Hypomastie *Q83.8*

Hypoménorrhée *N91.5*
- primaire *N91.3*
- secondaire *N91.4*

Hypométabolisme *R63.8*

Hypomotilité
- côlon *K59.8*
- - psychogène *F45.32*
- estomac *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- gastro-intestinale *K31.88*
- - psychogène *F45.32*

Hyponatrémie *E87.1*
- par hypervolémie *E87.7*

Hypoosmolarité *E87.1*

Hypo-ovarie *E28.3*

Hypoparathyroïdie *E20.9*
- après
- - acte à visée diagnostique et thérapeutique *E89.2*
- - parathyroïdectomie *E89.2*
- auto-immune *E20.0*
- avec
- - cataracte *E20.9+, H28.1**
- - myopathie *E20.9+, G73.5**
- - tétanie *E20.9*
- familiale *E20.8*
- idiopathique *E20.0*
- pseudo- *E20.1*
- transitoire, du nouveau-né *P71.4*

Hypopharyngiée, hémorragie *R58*

Hypopharyngite *J06.0*

Hypopharynx
- carcinome in situ *D00.0*
- cicatrice *J39.2*
- corps étranger *T17.2*

Hypopharynx –*suite*

- diverticule *Q38.7*
- fistule *J39.2*
- formation de poches *Q38.7*
- infection *J02.9*
- kyste *J39.2*
- perforation *J39.2*
- phlegmon *J39.0*
- rétrécissement *J39.2*
- tuberculose *A16.8*
- - prouvée de façon bactériologique ou histologique *A15.8*
- ulcère *J39.2*

Hypophorie *H50.5*
- décompensée *H50.5*

Hypophosphatasie *E83.38*
- acquise *E83.38*
- congénitale *E83.38*
- familiale *E83.38*

Hypophosphatémie
- acquise *E83.38*
- congénitale *E83.30*
- familiale *E83.30*
- rénale *E83.38*

Hypophosphatémique, rachitisme, avec nan *E72.0+, N16.3**

Hypophysaire
- basophilisme *E24.0*
- cachexie *E23.0*
- crétinisme *E23.0*
- Cushing, syndrome de *E24.0*
- diabète insipide *E23.2*
- gigantisme *E22.0*
- hyperadrénocorticisme *E24.0*
- hypercorticisme *E24.0*
- hypoadrénocorticisme *E23.0*
- hypogonadisme *E23.0*
- infantilisme *E23.0*
- nanisme *E23.0*
- obésité *E23.6*

Hypophysaire, hormone
- hypersécrétion *E22.9*
- insuffisance isolée *E23.0*

Hypophyse
- abcès *E23.6*
- aberrance *Q89.2*
- absence
- - acquise *E89.3*
- - congénitale *Q89.2*
- accessoire *Q89.2*
- adénome *D35.2*
- - avec compression chiasmatique *D35.2*
- - chromophobe *D35.2*
- - éosinophile *D35.2*
- agénésie *Q89.2*
- amyloïdose *E85.4*
- anomalie *Q89.2*
- atrophie *G31.9*
- déformation congénitale *Q89.2*
- dégénérescence *E23.6*
- dysfonction *E23.3*
- - *E23.7*
- - hormonale *E23.7*
- dystrophie *E23.6*
- embolie *E23.6*
- fonction
- - augmentée *E22.9*

Hypophyse –*suite*
- fonction –*suite*
- - diminuée *E23.0*
- gomme *A52.7+, E35.8**
- hémorragie *E23.6*
- hyperfonction, avec puberté précoce *E22.8*
- hypersecrétion, ACTH [adrénocorticotrophine] *E24.0*
- hypertrophie *E23.6*
- hypoplasie congénitale *Q89.2*
- infarctus *E23.6*
- inflammation *G04.9*
- insuffisance *E23.0*
- kyste *E23.6*
- lipome *D17.7*
- maladie *E23.7*
- nécrose *E23.0*
- - post-partum *E23.0*
- pharyngienne *Q89.2*
- position anormale congénitale *Q89.2*
- syphilis *A52.7+, E35.8**
- tératome *D44.3*
- trouble *E23.7*
- - iatrogène *E23.7*
- - sécrétion *E23.6*
- tuberculose *A18.8+, E35.8**
- tumeur *D44.3*
- - bénigne *D35.2*

Hypophyse, groge *Q89.2*

Hypophysite *G04.9*
- avec cytomégalovirus *B25.88+, G05.1**
- due à
- - cytomégalovirus *B25.88+, G05.1**
- - Toxoplasma *B58.2+, G05.2**

Hypopinéalisme *E34.8*

Hypopituitarisme *E23.0*
- après
- - examens médicaux *E89.3*
- - hypophysectomie *E89.3*
- - radiothéraphie *E89.3*
- avec
- - hypofonctionnement ovarien *E23.0*
- - myopathie *E23.0+, G73.5**
- juvénile *E23.0*
- post-partum *E23.0*
- provoquée par un médicament *E23.1*

Hypoplasie
- aorte *Q25.4*
- - ascendante, avec coeur gauche hypoplasique *Q23.4*
- aréole mammaire, congénitale *Q83.8*
- artère
- - ombilicale *Q27.0*
- - pulmonaire, congénitale *Q25.7*
- artère cérébrale *Q28.38*
- artère coronaire *Q24.5*
- artère ombilicale *Q27.0*
- artère pulmonaire *Q25.7*
- artère rétinienne *Q14.1*
- bassin *Q74.2*
- bras, congénitale *Q71.9*
- bronche *Q32.4*
- caecum *Q42.8*
- canal anal *Q42.3*
- - avec fistule *Q42.2*
- canal biliaire *Q44.5*
- carpe, congénitale *Q71.8*

Hypoplasie –*suite*
- cartilage cricoïde *Q31.2*
- cartilage thyroïde *Q31.2*
- ceinture pelvienne *Q74.2*
- ceinture scapulaire *Q74.0*
- cellules de la corne ventrale de la moelle épinière *Q06.1*
- cément *K00.4*
- céphalique *Q02*
- cerveau *Q02*
- cervelet *Q04.3*
- cheveux *Q84.2*
- circonvolution cérébrale *Q04.3*
- clavicule, congénitale *Q74.0*
- coccyx *Q76.4*
- coeur *Q24.8*
- coeur gauche, syndrome *Q23.4*
- col utérin, congénitale *Q51.8*
- côlon *Q42.9*
- conduit auditif *Q17.8*
- - avec atteinte de l'audition *Q16.9*
- - osseux *Q17.8*
- corps calleux *Q04.0*
- cortex surrénalien *E27.8*
- Corti, organe de *Q16.5*
- côte *Q76.6*
- cubitus, congénitale *Q71.8*
- doigt, congénitale *Q71.8*
- émail des dents *K00.4*
- - post-natale *K00.4*
- - prénatale *K00.4*
- endomètre *N85.8*
- épididyme, congénitale *Q55.4*
- épiglotte *Q31.2*
- érythrocytes, avec anémie *D61.9*
- érythroïde, congénitale *D61.0*
- fémur, congénitale *Q72.8*
- foie *Q44.7*
- glande surrénale *E27.8*
- glande thyroïde *E03.1*
- glande, endocrine NCA *Q89.2*
- glotte *Q31.2*
- gros intestin *Q42.9*
- hémiface *Q75.8*
- humérus, congénitale *Q71.8*
- hypophyse, congénitale *Q89.2*
- intestin *Q41.9*
- intestin grêle *Q41.9*
- iris *Q13.2*
- jambe, congénitale *Q72.9*
- labyrinthe membraneux *Q16.5*
- langue *Q38.3*
- larynx *Q31.2*
- lèvres
- - grandes, congénitale *Q52.7*
- - petites, congénitale *Q52.7*
- mâchoire *K07.0*
- mâchoire supérieure *K07.0*
- mandibule *K07.0*
- médullaire *D61.9*
- mégacaryocytaire, réfractaire aux transfusions *D69.40*
- membre *Q73.8*
- - inférieur *Q72.9*
- - supérieur *Q71.9*
- métacarpe *Q71.8*
- métatarse *Q72.8*
- moelle épinière *Q06.1*

Hypoplasie –*suite*
- moelle osseuse *D61.9*
- - mégacaryocytaire *D69.41*
- muscle *Q79.8*
- muscle oculaire *Q15.8*
- myocarde, ventricule droit *Q24.8*
- nez *Q30.1*
- œil *Q11.2*
- oesophage, congénitale *Q39.8*
- omoplate *Q74.0*
- ongle *Q84.6*
- oreille *Q17.2*
- oreille moyenne *Q16.4*
- organes digestifs
- - congénitale NCA *Q45.8*
- - supérieurs *Q40.8*
- organes génitaux
- - avec dystrophie adiposo-génitale *E23.6*
- - féminins
- - - congénitale *Q52.8*
- - - externes, congénitale *Q52.7*
- - masculins *Q55.8*
- organes respiratoires NCA *Q34.8*
- orteil *Q72.8*
- os de la face NCA *Q75.8*
- os du crâne *Q75.8*
- - avec
- - - anencéphalie *Q00.0*
- - - encéphalocèle *Q01.9*
- - - hydrocéphalie *Q03.9*
- - - microcéphalie *Q02*
- os NCA *Q79.9*
- ovaire, congénitale *Q50.3*
- pancréas *Q45.0*
- papille *Q14.2*
- parathyroïde *Q89.2*
- parotide *Q38.4*
- partie de l'encéphale *Q04.3*
- paupière *Q10.3*
- peau *Q82.8*
- pénis *Q55.6*
- péroné, congénitale *Q72.8*
- poumon *Q33.6*
- processus condylaire de la mandibule, unilatérale *K10.8*
- prostate *N42.8*
- pulmonaire *Q33.6*
- - associée à une brièveté de la gestation *P28.0*
- rachis *Q76.4*
- radio-ulnaire *Q71.8*
- radius *Q71.8*
- rate *Q89.0*
- rectum *Q42.1*
- - avec fistule *Q42.0*
- rein *Q60.5*
- - bilatérale *Q60.4*
- - unilatérale *Q60.3*
- reins *Q60.5*
- - bilatérale *N27.1*
- - unilatérale *N27.0*
- rotule *Q74.1*
- sacrum *Q76.4*
- sein *Q83.8*
- sinus paranasal *J34.8*
- sternum *Q76.7*
- système nerveux NCA *Q07.9*
- tarse *Q72.8*

Hypoplasie –*suite*
- testicule *Q55.1*
- thymus *E32.8*
- - avec immunodéficience *D82.1*
- tibia *Q72.5*
- tibio-fibulaire, congénitale *Q72.8*
- trompe d'Eustache *Q17.8*
- Turner, dentaire *K00.4*
- uretère *Q62.8*
- utérus *Q51.8*
- vagin *Q52.4*
- vaisseau, périphérique *Q27.8*
- valvule aortique *Q23.1*
- - avec hypoplasie du coeur gauche *Q23.4*
- veine
- - grosse *Q26.8*
- - périphérique *Q27.8*
- veine cave *Q26.8*
- - inférieure *Q26.8*
- - supérieure *Q26.8*
- veine cérébrale *Q28.38*
- veine porte *Q26.5*
- ventricule gauche *Q23.4*
- vésicule biliaire *Q44.0*
- vessie *Q64.7*
- visage *Q18.8*
- vulve, congénitale *Q52.7*
- zonule *Q12.8*

Hypoplasique
- anémie *D61.9*
- - congénitale *D61.0*
- - familiale *D61.0*
- chondrodystrophie *Q78.9*
- coeur droit, syndrome *Q22.6*
- coeur gauche, syndrome *Q23.4*
- - avec
- - - atrésie
- - - - aorte *Q23.4*
- - - - valvule mitrale *Q23.4*
- - - défaut de développement ventricule gauche, congénital *Q23.4*
- - - hypoplasie
- - - - aorte ascendante *Q23.4*
- - - - valvule aortique *Q23.4*

Hypoprolifératives, anémie, réfractaire *D61.9*

Hypoprotéinémie *E77.8*

Hypoprothrombinémie
- acquise *D68.4*
- transitoire, chez le nouveau-né *P61.6*

Hypoptyalisme *K11.7*

Hypopyon *H20.0*
- associé à
- - iridocyclite *H20.0*
- - kératite *H16.0*
- - ulcère
- - - chronique *H16.0*
- - - subaigu *H16.0*
- - ulcère de la cornée *H16.0*
- chambre antérieure de l'oeil *H20.0*

Hyporéflexie *R29.2*

Hyporéninémie *E26.8*

Hyposécrétion
- ACTH [hormone adrénocorticotrope] *E23.0*
- glandes salivaires *K11.7*

Hyposécrétion –*suite*
- hormone antidiurétique *E23.2*
- ovarienne *E28.3*
- vasopressine *E23.2*

Hyposegmentation leucocytaire héréditair *D72.0*

Hyposensibilisation aux allergènes *Z51.6*

Hyposialie *K11.7*

Hyposidérémie *D50.9*

Hyposmie *R43.0*

Hyposomnie *G47.0*
- non organique *F51.0*
- organique *G47.0*

Hypospadias *Q54.9*
- féminin *Q54.8*
- glandulaire *Q54.0*
- pénien *Q54.1*
- pénoscrotal *Q54.2*
- périnéal *Q54.3*

Hypospadias coronal *Q54.0*

Hypospermie *N46*

Hyposphagme *H11.3*
- conjonctive *H11.3*
- traumatique *S05.0*

Hyposplénisme *D73.0*

Hyposplénisme, syndrome *D73.0*

Hypostase
- pneumonie *J18.2*
- poumon *J81*
- pulmonaire passive *J81*

Hypostatique
- bronchite *J40*
- bronchopneumonie *J18.2*
- cardiopathie *I51.8*
- congestion pulmonaire *J81*
- dermite *I83.1*
- - associée à ulcère variqueux crural *I83.2*
- eczéma *I83.1*
- pneumonie *J18.2*
- - lobaire *J18.2*

Hyposthénurie *N28.8*

Hyposurrénalisme *E27.4*

Hypotélorisme *Q75.8*

Hypotension *I95.9*
- artérielle *I95.9*
- associée à
- - dysrégulation circulatoire *I95.9*
- - travail et accouchement *O75.8*
- chronique *I95.8*
- constitutionnelle *I95.9*
- idiopathique *I95.0*
- intracrânienne, après shunt ventriculaire *G97.2*
- musculaire *R29.8*
- - congénitale *P94.2*
- orthostatique *I95.1*
- - idiopathique, avec parkinsonisme *G90.3*
- - neurogène *G90.3*
- - - avec atrophie multisystématisée - *voir aussi* syndrome de Shy-Drager *G90.3*
- - symptomatique, avec parkinsonisme *G90.3*
- provoquée par

Hypotension –*suite*
- provoquée par –*suite*
- - dysrégulation *I95.9*
- - médicament *I95.2*
- suivi de la grossesse *O26.5*
- symptomatique *I95.9*
- systolique *I95.9*
- vessie *N31.2*

Hypothalamique
- aménorrhée *N91.1*
- hypogonadisme *E23.3*

Hypothalamus
- atteinte, non-traumatique *E23.7*
- dysfonctionnement *E23.3*
- hyperactivité *E23.3*

Hypothermie *T68*
- après anesthésie *T88.5*
- néonatale *P80.9*
- - due à environnement NCA *P80.8*
- - sévère *P80.0*
- non associée à température ambiante basse *R68.0*
- provoquée par
- - accident *T68*
- - température ambiante basse *T68*

Hypothermie néonatale NCA *P80.8*

Hypothymique
- psychopathie *F34.1*
- trouble, personnalité *F34.1*

Hypothyroïdie *E03.9*
- acquise *E03.4*
- - *E03.9*
- - avec démence *E03.9+, F02.8**
- - due à carence en iode, avec démence *E01.8+, F02.8**
- acquise, due à carence en iode NCA *E01.8*
- après
- - acte médical *E89.0*
- - irradiation *E89.0*
- - thyroïdectomie *E89.0*
- - traitement par iode *E03.2*
- avec
- - adipose *E03.9*
- - arthrite NCA *E03.9+, M14.5**
- - arthropathie *E03.9+, M14.5**
- - myopathie *E03.9+, G73.5**
- congénitale *E03.1*
- - avec goitre diffus *E03.0*
- - sans goitre *E03.1*
- iatrogène NCA *E03.2*
- latente *E03.9*
- postinfectieuse *E03.3*
- postopératoire *E89.0*
- provoquée par
- - acide para-aminosalicylique *E03.2*
- - carence en iode *E01.8*
- - - acquise *E01.8*
- - - congénitale *E00.9*
- - - subclinique *E02*
- - médicament NCA *E03.2*
- - phénylbutazone *E03.2*
- - produit exogène NCA *E03.2*
- - résorcine *E03.2*
- - sulfamides *E03.2*
- subclinique, due à carence en iode *E02*
- transitoire, chez le nouveau-né *P72.2*

Hypothyroïdien
- crétinisme, endémique *E00.1*
- goitre *E03.9*

Hypotonie oculaire *H44.4*

Hypotonique
- contraction, utérus NCA *O62.2*
- déshydratation *E86*
- dysfonction utérine *O62.2*
- - primitive *O62.0*
- - secondaire *O62.1*
- dysrégulation hypotensive *I95.9*
- - circulatoire *I95.9*
- hyperhydratation *E87.7*
- syndrome, akinétique *R29.8*

Hypotonique, dysfonction, utérus
- compliquant l'accouchement NCA *O62.2*
- primitive, compliquant l'accouchement *O62.0*
- secondaire, compliquant l'accouchement *O62.1*

Hypotrichose *L65.9*
- congénitale *Q84.0*
- médicamenteuse, due à cytotoxiques NCA *L65.8*
- paupière, congénitale *Q10.3*
- postinfectieuse NCA *L65.8*

Hypotrophe
- nouveau-né à terme *P05.9*
- prématuré *P07.3*
- utérus *Q51.8*

Hypotrophie *E34.3*
- achondroplastique *Q77.4*
- chondrodystrophique *Q77.4*
- congénitale *E34.3*
- constitutionnelle *E34.3*
- due à la malnutrition *E45*
- foetale *P05.2*
- hypochondroplastique *Q77.4*
- hypophysaire *E23.0*
- infantile *E34.3*
- Lorain *E23.0*
- mammaire *Q83.8*
- métatropique *Q77.8*
- névrotique, avec rachitisme, hypophosphatémique *E72.0+, N16.3**
- pancréatique *K86.8*
- psychosocial *E34.3*
- rénale *N25.0*
- testiculaire *N50.0*
- thanatophore *Q77.1*
- type Laron *E34.3*

Hypotropie *H50.2*
- avec orbitopathie, endocrinienne, dans la maladie de Basedow *E05.0+, H06.3**

Hypo-uricémie *N19*

Hypoventilation *R06.88*
- alvéolaire *R06.88*
- - dans l'obésité *E66.29*
- - - avec
- - - - indice de masse corporelle [IMC] de
- - - - - 30 à moins de 35, *E66.20*
- - - - - 35 à mois de 40, *E66.21*
- - - - - 40 et plus, *E66.22*
- - - enfant et adolescent *E66.29*
- - non obstructive du sommeil, idiopathique *G47.32*
- - syndrome *E66.29*

Hypoventilation *–suite*
- primitive idiopathique *G47.30*

Hypoventilation alvéolaire non-obstructi *G47.32*

Hypoventilation, syndrome
- alvéolaire centrale, congénital *G47.32*
- sommeil *G47.32*

Hypovitaminose *E56.9*
- A *E50.9*
- B *E53.9*
- C *E54*
- D *E55.9*
- K *E56.1*

Hypovolémie *E86*
- dans maladie due au VIH *B23.8, E86*

Hypovolémique, choc *R57.1*
- après intervention chirurgicale *T81.1*
- traumatique *T79.4*

Hypoxémique, polyglobulie *D75.1*

Hypoxie
- avec hémorragie intracrânienne, chez le foetus/nouveau-né *P52.9*
- cérébrale *G93.1*
- - due à acte médical NCA *G97.88*
- foetale *P20.9*
- - suivi de la grossesse *O36.3*
- intrautérine *P20.9*
- - détectée pour la première fois
- - - avant le début du travail *P20.0*
- - - lors du travail ou de l'accouchement *P20.1*
- myocardique *I24.8*
- nouveau-né *P21.9*
- obstétricale *P21.9*

Hypoxique
- encéphalopathie *G93.1*
- lésion cérébrale *G93.1*
- - due à acte médical *G97.88*
- - pendant acte médical *G97.88*

Hypsarythmie *G40.4*

Hystéralgie *O26.88*
- utérus gravide *O26.88*

Hystérie *F44.9*
- angoisse, d' *F41.8*
- associée à trouble de conversion *F44.9*
- avec trouble de la vision *F44.6*

Hystérie anxieuse *F41.8*

Hystérique *voir* sous l'affection décrite

Hystéro-adénose *N80.9*

Hystérocèle (prolapsus utérin) (hystérop *O34.5*

Hystéro-épilepsie *F44.5*

Hystéroscopique, insémination (synchrone *Z31.1*

Hystiocytaire
- lymphome diffus *C83.3*

Iatrogène
- abcès *T81.4*
- dysfonctionnement (perturbation) (trouble)
- - adréno-génital (génito-surrénalien) *E25.8*
- - hypophysaire *E23.7*
- hyperinsulinisme *E15*
- hyperoestrogénisme (hyperoestrogénie) *E28.0*
- hypoglycémie *E16.0*
- - avec coma *E15*
- - chez le nouveau-né *P70.3*
- hypothyroïdie, NCA *E03.2*
- insuffisance, cortico-surrénalienne *E27.3*
- obstruction *T81.8*
- pneumothorax *J95.80*
- syndrome de Cushing *E24.2*
- thyroïdite *E06.4*

Ichtyisme (ichtyotoxisme) (intoxication *T61.2*
- *T61.2*

Ichtyoparasitose à Vandellia cirrhosa, i *B88.8*

Ichtyose *Q80.9*
- acquise *L85.0*
- congenita *Q80.9*
- - gravis *Q80.4*
- foetale *Q80.4*
- folliculaire *Q80.0*
- hystrix *Q80.8*
- lamellaire *Q80.2*
- palmaire et plantaire *Q82.8*
- récessive liée au chromosome X (liée au sexe) *Q80.1*
- simplex *Q80.0*
- vera *Q80.8*
- vulgaire *Q80.0*

Ichtyosiforme
- eczéma *L30.8*
- érythème bulleux congénital *Q80.3*
- érythrodermie bulleuse congénitale *Q80.3*

Ichtyosisme scombridé *T61.1*

Ictère *R17*
- à
- - hépatite virale B aiguë après administration de sérum *B16.9*
- - hépatite virale B aiguë après injection *B16.9*
- - hépatite virale B aiguë post-vaccinale *B16.9*
- - obstruction *K83.1*
- - occlusion *K83.1*
- à hépatite virale B aiguë après administration de sérum homologue *B16.9*
- acholurique (à bilirubine libre) (à bilirubine non conjuguée) acquis *D59.8*
- acholurique familial *D58.0*
- catarrhalis
- - aigu *B15.9*
- - avec coma hepaticum (coma hépatique) *B15.0, K72.74!*
- conjonctival *R17*
- conjugaison *P59.9*
- contraceptifs oraux *T38.4*
- contraception orale, lié à *T38.4*
- cutané *R17*

Ictère *–suite*
- Dubin-Johnson, de (syndrome de D-J) *E80.6*
- Dubin-Sprinz, de (syndrome de D-S) *E80.6*
- épidémique *B15.9*
- - avec coma hépatique *B15.0, K72.74!*
- fébrile
- - avec coma hépatique *B15.0, K72.74!*
- - présence d'hépatite virale *B15.9*
- foetal
- - à
- - - absence de glucuronoconjugaison hépatique de la bilirubine *P59.8*
- - - hémorragie *P58.1*
- - - Iso-immunisation ABO *P55.1*
- - - Iso-immunisation Rh (rhésus) *P55.0*
- - - médicaments, transmission maternelle *P58.4*
- - physiologique *P59.9*
- gravidique (de la grossesse) *O26.6*
- gravidique aigu avec atrophie hépatique *O26.6*
- hématologique (secondaire à cause hématologique) acquis *D59.9*
- hémolytique *D58.0*
- - acquis *D59.9*
- - constitutionnel *D58.0*
- - familial *D58.0*
- - inné *D58.0*
- - sphérocytaire héréditaire *D58.0*
- hémorragique dû à
- - leptospires *A27.0*
- - spirochètes *A27.0*
- infectieux *B15.9*
- - avec coma hépatique *B15.0, K72.74!*
- intermittens juvenilis (juvénile intermittent) *E80.4*
- malin *K72.9*
- mécanique *K83.1*
- néonatal *P59.9*
- - à
- - - accouchement prématuré *P59.0*
- - - anémie hémolytique héréditaire *P58.8*
- - - anémie par déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase (G6PD) *D55.0*
- - - atrésie des voies biliaires (AVB) (oblitération congénitale des voies biliaires) *Q44.3*
- - - atteinte hépato-cellulaire *P59.2*
- - - bile épaisse, syndrome de la *P59.1*
- - - contusion *P58.0*
- - - déglutition de sang maternel *P58.5*
- - - galactosémie *E74.2*
- - - hémolyse augmentée NCA *P58.9*
- - - hémorragie *P58.1*
- - - hypo-activité thyroïdienne congénitale *E03.1*
- - - incompatibilité foeto-maternelle NCA *P55.9*
- - - infection *P58.2*
- - - inhibiteur de la glucuroconjugaison dans le lait maternel *P59.3*
- - - isoimmunisation NCA *P55.9*
- - - perturbation (trouble) (dysfonctionnement) du système enzymatique de la conjugaison de la bilirubine *P59.8*
- - - polycythémie *P58.3*
- - - sphérocytose *P58.8*

Ictère *–suite*
- néonatal *–suite*
- - à *–suite*
- - - syndrome de Crigler-Najjar *E80.5*
- - - trouble de la (glucuro-)conjugaison *P59.8*
- - associé à
- - - contusion *P58.0*
- - - déglutition de sang maternel *P58.5*
- - - hémolyse excessive *P58.9*
- - - hémorragie *P58.1*
- - - infection *P58.2*
- - - inhibiteur dans le lait maternel *P59.3*
- - - polyglobulie *P58.3*
- - - retard de glucuronoconjugaison lors de naissance prématurée *P59.0*
- - lié à
- - - mucoviscidose *E84.88*
- - - syndrome de Gilbert-Lereboullet (maladie (syndrome) de Gilbert) *E80.4*
- - - syndrome de Gilbert-Meulengracht (morbus Meulengracht) *E80.4*
- - lors de naissance prématurée *P59.0*
- - physiologique *P59.9*
- neonatorum (du nouveau-né)
- - gravis (grave) *P59.9*
- - prolongatus (prolongé) *P59.9*
- non hémolytique
- - constitutionnel, avec hépatopathie lipochrome *E80.6*
- - familial *E80.4*
- - - congénital *E80.5*
- nouveau né *P59.9*
- - à
- - - contusion *P58.0*
- - - hémolyse, excessive *P58.9*
- - - infection *P58.2*
- - - ingestion de sang maternel *P58.5*
- - - inhibiteur de lactation *P59.3*
- - - polyglobulie *P58.3*
- - - saignement *P58.1*
- nouveau-né *P59.9*
- - cas de naissance prématurée *P59.0*
- nucléaire *P57.9*
- - à une iso-immunisation *P57.0*
- - néonatal *P57.9*
- nucléaire (des noyaux gris centraux) (des ganglions de la base) *P57.9*
- obstructif *K83.1*
- obturation *K83.1*
- orangé (jaune-orangé) *R17*
- par trouble de la (glucuro-)conjugaison *P59.9*
- physiologique prolongé du nouveau-né *P59.9*
- puerpéral *O90.8*
- sclérotique *R17*
- transfusion, dû au virus de l'hépatite B, aigu *B16.9*
- transfusionnel dû à hépatite virale B aiguë *B16.9*

Ictus solaris (coup de chaleur) (insolat *T67.0*

ICV [Insuffisance cérébrovasculaire] *I67.88*
- avec céphalées *I67.88*

IDDM (diabète sucré insulino-dépendant (*E10.90*

Idées obsédantes *F42.0*

Idées suicidaires *R45.8*

Identité
- crise *F68.8*
- trouble de l'
- - chez l'enfant *F93.8*
- - l'enfant *F93.8*
- - trouble de la préférence sexuelle *F65.9*
- - - l'enfance *F64.2*
- - trouble des émotions de l'enfance avec hyperanxiété *F93.8*

Idéokinétique (idéomotrice), apraxie *R48.2*

Idéomotrice (idéokinétique), apraxie *R48.2*

Idioglossie *F80.0*

Idiopathique
- avec métaplasie myéloïde Myélofibrose (*D47.4*
- goutte *M10.09*
- paralysie *G20.90*
- polyarthrose *M15.9*
- polymyosite *M33.2*

Idiopathique, *voir* sous l'affection conc

Idiosyncrasie (réaction idiosyncrasique) *T78.4*
- à
- - drogue, admistrée dans les règles de l'art *T88.7*
- - médicament (substance médicamenteuse) administré dans les règles de l'art *T88.7*
- avec asthme *J45.1*

Idiosyncrasique, hépatopathie médicament *K71.9*

Idiotie (retard mental profond) *F73.9*
- amaurotique *E75.4*
- - familiale *E75.4*
- - forme tardive *E75.4*
- - infantile *E75.4*
- - juvénile *E75.4*
- congénitale *F73.9*
- dysostosique (syndrome de Hurler-Pfaundler) *E76.0*

Idiotie amaurotique, forme tardive *E75.4*

Idio-ventriculaire, rythme *I44.3*

IDM *I21.0*

IDM [infarctus aigu du myocarde], de la *I21.1*

Id-reaction (autosensibilisation cutanée *L30.2*
- bactéries *L30.2*

IEC - inhibiteur de l'enzyme de conversi
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

IgA (immunoglobuline A), néphropathie à *N02.8*
- avec lésions glomérulaires (glomérulonéphrite)
- - et
- - - hyalinose
- - - - focale *N02.1*
- - - - segmentaire *N02.1*
- - - sclérose
- - - - focale *N02.1*
- - - - segmentaire *N02.1*
- - membraneuse-s *N02.2*
- - membrano-proliférative-s *N02.5*
- - mésangio-capillaire-s *N02.5*
- - mésangio-prolifération-s *N02.3*
- - proliférative-s SAI *N02.8*

IgA (immunoglobuline A), plasmocytome à, *C90.01*

IgA linéaire, dermatose à (dermatose à d *L13.8*

IgE (immunoglobuline E), syndrome d'hype *D82.4*

IgG (immunoglobuline G)
- paraprotéinémie de type *D47.2*
- plastocytome à *C90.00*
- - rémission complète *C90.01*

IIIa Lymphome folliculaire grade *C82.3*

IIIb Lymphome folliculaire grade *C82.4*

IIO [implant intraoculaire]
- avec kératopathie bulleuse *H18.1*
- décentrage *T85.2*
- luxation *T85.2*

Iléite *K52.9*
- chronique *K52.9*
- Crohn *K50.0*
- diffuse *K50.0*
- due à
- - Aspergillus *B44.8+, K93.8**
- - Cytomégalovirus *B25.80+, K93.8**
- régionale *K50.0*
- segmentaire *K50.0*
- terminale *K50.0*
- ulcerosa chronica stenosans *K50.0*

Iléo-caecal
- adhérence *K66.0*
- anse, malformation congénitale *Q43.9*
- carcinome *C18.0*
- déformation acquise *K63.8*
- lésion *K63.9*
- tuberculose, hyperplasique *A18.3+, K93.0**
- tumeur *D37.4*
- valvule, anomalie de *Q43.9*

Iléocolite *K52.9*
- chronique *K52.9*
- régionale *K50.9*
- tuberculeuse *A18.3+, K93.0**

Iléon (ileum)
- absence d'
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q41.2*
- adhérence *K66.0*
- affection (maladie) *K63.9*
- agénésie *Q41.2*
- atrésie *Q41.2*
- carcinoïde *C17.2*
- corps étranger *T18.3*
- coude (pli) *K56.6*
- coudure *K56.6*
- Crohn, maladie de *K50.0*
- dilatation *K59.8*
- - psychogène *F45.32*
- diverticule *K57.10*
- diverticulite *K57.12*
- diverticulose *K57.10*
- entérite régionale *K50.0*
- fistule *K63.2*
- granulome *K63.8*
- hypertrophie *K63.8*
- inflammation *K52.9*
- - terminal *K50.0*
- irritabilité *K59.8*
- lésion traumatique *S36.49*
- malformation *Q43.9*
- malformation congénitale *Q43.9*
- métastase *C78.4*

Iléon (ileum) *–suite*
- nécrose *K55.0*
- obstruction *K56.6*
- occlusion (iléus) *K56.7*
- - mécanique *K56.6*
- - paralytique (fonctionnel) *K56.0*
- perforation *K63.1*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - tant que complication de l'accouchement chez la mère *O71.5*
- - traumatique *S36.49*
- rupture
- - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - non traumatique *K63.1*
- - traumatique *S36.49*
- stase *K59.8*
- sténose *K56.6*
- - congénitale *Q41.2*
- stricture *K56.6*
- - congénitale *Q41.2*
- tuberculose *A18.3+, K93.0**
- tumeur *D37.2*
- ulcère (ulcus) *K63.3*
- volvulus *K56.2*

Iléorectale, fistule *K63.2*

Iléosigmoïde, fistule *K63.2*

Iléostomie
- ajustement *Z46.5*
- avec
- - abcès *K91.4*
- - complications *K91.4*
- dysfonctionnement d' *K91.4*
- présence d'une *Z93.2*
- prolapsus *K91.4*
- soins d' *Z43.2*

Iléotyphus *A01.0*

Iléo-vaginale, fistule *N82.2*

Iléo-vésicale, fistule *N32.1*

Iléus *K56.7*
- à
- - calcul biliaire *K56.3*
- - méconial *E84.1+, P75**
- - - cas de mucoviscidose *E84.1+, P75**
- - - dans le sens de bouchon méconial, sans fibrose kystique *P76.0*
- adhérence *K56.5*
- adhérences *K56.5*
- atonique *K56.0*
- bride de *K56.5*
- - intestin grêle *K56.5*
- cas d'adhérence
- - intestin, post-infectieuse *K56.5*
- - intestinale *K56.5*
- - péritoine *K56.5*
- colon *K56.7*
- consécutif à une torsion *K56.2*
- duodénal, chronique *K31.5*
- étranglement *K56.6*
- fermentation de *K56.6*
- gros intestin *K56.7*
- intestin *K56.7*
- intestin grêle *K56.7*
- - mécanique *K56.6*
- - paralytique *K56.0*
- invagination de *K56.1*
- mécanique NCA *K56.6*
- neurogène *K56.0*

Iléus –*suite*
- obstructif *K56.4*
- obstructif NCA *K56.6*
- obstructif, pseudo- *K56.0*
- occlusif NCA *K56.6*
- paralytique *K56.0*
- pré- *K56.7*
- pseudo obstruction *K56.0*
- sub *K56.7*
- torsion *K56.2*
- transitoire du nouveau-né *P76.1*

Iliaque
- abcès *L02.2*
- artère, anévrisme *I72.3*
- région, blessure *S39.9*

Ilio-fémorale
- distorsion *S73.11*
- phlébite *I80.1*
- thrombophlébite *I80.1*
- veine, thrombose *I80.1*

Ilio-lombaire
- ligament, dégénérescence ligamentaire *M24.25*
- syndrome *M54.17*

Ilion, fracture *S32.3*

Iliosacré
- déformation, acquise *M43.88*
- dislocation, habituelle *M53.28*
- distorsion *S33.6*
- - ancienne *M53.28*
- - chronique *M53.28*
- douleurs *M53.3*
- fusion
- - acquise *M43.27*
- - chirurgicale *Z98.1*
- - congénitale *Q74.2*
- instabilité, articulation, posttraumatique *M53.28*
- ligament, distorsion *S33.6*
- spondylite NCA *M46.1*

Illégale, interruption de grossesse *O05.9*

Illégitime
- grossesse *Z64.0*
- naissance *Z64.0*

Illusion des sosies par méconnaissance d *F22.0*

Ilot résiduel, champs visuel, temporal *H53.4*

Ilots de Langershans, hyperplasie cellul *E16.1*

Imbécilité *F71.9*
- légère *F70.9*

Imerslund-Gräsbeck, syndrome d' *D51.1*

Iminostilbene, intoxication *T42.1*

Immaturité cellulalire
- leucémie, aigue *C95.00*
- tératome, embryonnaire, ovaire, malin *C56*

Immersion *T75.1*
- Anoxie *T75.1*
- Asphyxie *T75.1*
- mortelle *T75.1*
- non mortelle *T75.1*
- non-mortelle *T75.1*
- oedème pulmonaire *T75.1*

Imminent, avortement *O20.0*

immobilité *R26.3*

Immunisation - *voir aussi* vaccination *Z26.9*
- avec hépatite *B16.9*

Immunisation - *voir aussi* vaccination ou *Z26.9*
- iso-, avec thrombocytopénie, chez le nouveau-né *P61.0*
- prophylactique *Z29.1*
- Rh, lors de la grossesse *O36.0*

immunitaire SIRI Syndrome inflammatoire de restauration *D89.3*

Immunité
- contre la rubéole
- - absente *Z24.5*
- - incertaine *Z24.5*
- contre l'hépatite virale, absente *Z24.6*
- déficit *D84.9*
- - cellulaire *D84.8*
- - combinée *D81.9*
- - humorale *D80.9*
- trouble *D89.9*
- - dans les antécédents personnels *Z86.2*

immunoblastique
-
- avec dysprotéinémie LAID Lymphadénopathie angio - *C86.5*
- cellules T Lymphome angio - *C86.5*
- lymphome à cellules T *C84.4*
- sarcome
- - cas de maladie, due au VIH *B21, C83.4*

Immunocytome *C83.0*
- cellules B *C83.0*

Immunogène
- hyperthyroïdie *E05.0*
- infiltrat, cornée *H18.2*
- - à
- - - blépharoconjonctivite, due à staphylocoques *H16.2*
- - - staphylocoques *H16.2*

Immunoglobuline
- A, déficit *D80.2*
- administration, prophylactique *Z29.1*
- allergie *T88.7*
- élevée *R76.8*
- G, déficit *D80.3*
- humaine, normale
- - allergie *T88.7*
- - hypersensibilité *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*
- intoxication *T50.9*
- M
- - déficit *D80.4*
- - élevée, avec déficit immunitaire *D80.5*

Immunologique
- dépendant
- - avortement *O05.9*
- - stérilité, chez la femme *N97.8*
- résultat, anormal *R89.4*
- résultat, anormal, dans le liquide céphalo-rachidien *R83.4*
- substance, active, intoxication *T50.9*
- valeur sérique, anormale *R76.9*

Immunopathie *D84.9*

Immunoprophylaxie [vaccination passive],
- hépatite B (avec immunoglobuline spécifique) *Z29.1*

Immunoprophylaxie [vaccination passive], –*suite*
- rage (avec immunoglobuline spécifique) *Z29.1*
- tétanos (avec immunoglobuline spécifique) *Z29.1*

immunoreconstruction syndrome de *D89.3*

Impact
- colon *K56.4*
- excréments *K56.4*

Impacté
- cérumen *H61.2*
- dent *K01.1*
- - avec position, anormale *K07.3*
- - - dent, adjacente *K07.3*

Impacts crâniens *S09.7*

Imperforation
- anal, avec fistule *Q42.2*
- anale *Q42.3*
- col utérin *Q51.8*
- jéjunum *Q41.1*
- oesophagienne *Q39.0*
- - avec fistule trachéo-oesophagienne *Q39.1*
- pharynx *Q38.8*
- rectum *Q42.1*
- - avec fistule *Q42.0*
- urètre *Q64.3*
- vaginale *Q52.4*

Impétigo *L01.0*
- avec otite externe *L01.0+, H62.4**
- Bockhart *L01.0*
- bulleux *L01.0*
- circiné *L01.0*
- contagieux *L01.0*
- - à
- - - staphylocoques *L01.0*
- - - streptocoques *L01.0*
- eczéma *L01.0*
- - atopique endogène *L20.9*
- - endogène *L20.9*
- folliculaire *L01.0*
- furfuracea *L30.5*
- herpétiforme *L40.1*
- miliaire *L01.0*
- neonaturum *L01.0*
- oreille, externe *L01.0+, H62.4**
- paupière *L01.0+, H03.8**
- secondaire, dermatose *L01.1*
- simplex *L01.0*
- ulcératif *L01.0*
- vésicules *L01.0*
- vulgaire *L01.0*

implant
-
- avec complications *T85.9*
- - mécanique NCA *T85.6*
- cardiaque, avec
- - complication *T82.8*
- - douleurs *T82.8*
- - embolie *T82.8*
- - fibrose *T82.8*
- - hémorragie *T82.8*
- - sténose *T82.8*
- - thrombose *T82.8*
- gastro-intestinal
- - insuffisance mécanique *T85.5*

implant –*suite*
- gastro-intestinal –*suite*
- - perte de poids *T85.5*
- greffe
- - appareil génito urinaire , Douleur due à prothèse, *T83.8*
- - - , Embolie due à prothèse, *T83.8*
- - interne système nerveux , Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèse, *T85.72*
- - orthopédique interne Complication mécanique d ' Autre appareil, *T84.4*
- - os Complication mécanique d ' Autre appareil, *T84.3*
- interne, avec complications *T85.9*
- mammaire
- -
- - Autre complication dues à une prothèse ou un *T85.83*
- - avec
- - - complication *T85.9*
- - - - mécanique *T85.4*
- - - embolie *T85.88*
- - - fibrose *T85.82*
- - - hémorragie *T85.88*
- - - sténose *T85.88*
- - - thrombose *T85.88*
- - déplacement *T85.4*
- - fuite *T85.4*
- - Infection réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un *T85.73*
- - insuffisance *T85.4*
- - perforation *T85.4*
- - présence *Z41.1*
- nerveux, avec complications mécaniques *T85.6*
- oculaire
- - avec complication *T85.9*
- - - mécanique *T85.3*
- - extrusion *T85.3*
- position anormale *T85.6*
- respiratoire, avec complication *T85.9*
- vasculaire, avec
- - douleurs *T82.8*
- - embolie *T82.8*
- - fibrose *T82.8*
- - hémorragie *T82.8*
- - sténose *T82.8*
- - thrombose *T82.8*
- voie biliaire, avec complication *T85.9*
- - mécanique *T85.5*

Implantation
- ovules *Z31.2*
- uretère, abouchement, anormale *Q62.6*
- uretère, anormale *Q62.6*

Implanté
- Adaptation manipulation
- - défibrillateur cardiaque *Z45.01*
- - stimulateur cardiaque *Z45.00*
- défibrilateur
- - batterie faible *T82.1*
- - dysfonctionnement *T82.1*
- - infection *T82.7*
- kyste
- - chambre antérieure de l'oeil *H21.3*
- - corps ciliaire *H21.3*
- - iris *H21.3*
- - vaginal *N89.8*
- - vulve *N90.7*

Implanté –*suite*
- pacemaker
- - avec infection *T82.7*
- - batterie faible *T82.1*
- - dysfonctionnement *T82.1*
- prothèse, pénis, avec complications *T83.9*

Implication
- catastrophe *Z65*
- Guerre *Z65*

Implusion, contrôle, troubles *F63.9*
- avec irritabilité, intermittente *F63.8*

Importante dénutrition, avec marasme *E41*

impossible Hémorroïdes avec saignement) avec procidence, réintroduction manuelle *K64.3*

Impuissance *F52.2*
- d'origine organique NCA *N48.4*
- éréction *F52.2*
- post-traumatique *N48.4*
- psychogène *F52.2*
- - masculine *F52.2*
- sexuelle *F52.2*

Impulsion, générateur, contrôle *Z45.0*

Impureté, peau *L98.8*

Inactif
- cardiopathie, rhumatisme *I09.9*
- fièvre, avec rhumatismes
- - cardiopathie *I09.9*
- - dégénérescence coeur *I09.0*
- - endocardite *I09.1*
- - - valvule pulmonaire *I09.8*
- - hypertrophie cardiaque *I09.8*
- - insuffisance ventricule gauche *I09.8*
- - insuffisance, coeur *I09.8*
- - maladie cardiaque NCA *I09.8*
- - myocardite *I09.0*
- - péricardite *I09.2*
- - - *I09.9*
- neurosyphilis *A52.3*
- rachitisme *E64.3*
- tuberculose ancienne *B90.9*

Inactivité
- atrophie NCA *M62.59*
- atrophie, os NCA *M81.29*
- glucose - phosphate déhydrogénase (G6PD_inactivité), avec anémie *D55.0*
- ostéoporose *M81.29*
- - avec fracture *M80.29*
- - - pathologique *M80.29*

Inadéquat
- alimentation, carence nutritionnelle *E63.9*
- éducation *Z55*
- habitudes alimentaires *Z72.8*
- logement *Z59*
- réaction, aux exigences de la vie quotidienne *F60.7*
- sécrétion, antidiurétique, syndrome *E22.2*
- trouble, personnalité *F60.7*

Inanition *R64*
- atrophie *E46*
- avec oedème *E43*
- due à
- - faim *T73.0*
- - malnutrition *E46*

Inanition –*suite*
- dystrophie *E46*
- fièvre *R50.9*

Inapaisable
- éternuements *R06.7*
- vomissements *R11*
- - avec érosion des dents *K03.2*

Incapacité
- mouvement *R29.8*
- stérilité *N46*

Incarcération
- calcul
- - uretère *N20.1*
- - urètre *N21.1*
- calcul biliaire
- - conduit
- - - cholédoque *K80.50*
- - - - avec
- - - - - Angiocholite, *K80.30*
- - - - - Angiocholite, et obtruction des voies biliaires, *K80.31*
- - - - - Cholécystite, *K80.40*
- - - - - Cholécystite, et obtruction des voies biliaires, *K80.41*
- - - - - obstruction des voies biliaires, *K80.51*
- - - cystique *K80.20*
- - - - avec
- - - - - Cholécystite,
- - - - - Cholécystite, aiguë, *K80.00*
- - - - - Cholécystite, aiguë, et obstruction des voies biliaires, *K80.01*
- - - - - Cholécystite, chronique, *K80.10*
- - - - - Cholécystite, chronique, et obstruction des voies biliaires, *K80.11*
- - - - - obstruction des voies biliaires, *K80.21*
- - - hépatique *K80.50*
- - - - avec
- - - - - Angiocholite, *K80.30*
- - - - - Angiocholite, et obstruction des voies biliaires, *K80.31*
- - - - - Cholécystite, *K80.40*
- - - - - Cholécystite, et obstruction des voies biliaires, *K80.41*
- - - - - obstruction des voies biliaires, *K80.51*
- - Vésicule biliaire *K80.20*
- - - avec
- - - - Cholécystite
- - - - - aiguë, *K80.00*
- - - - - aiguë, et obstruction des voies biliaires, *K80.01*
- - - - - chronique, *K80.10*
- - - - - chronique, et obstruction des voies biliaires, *K80.11*
- - - - obstruction des voies biliaires *K80.21*
- - voies biliaires *K80.50*
- - - avec
- - - - Angiocholite *K80.30*
- - - - - et obstruction des voies biliaires, *K80.31*
- - - - Cholécystite *K80.40*
- - - - - et obstruction des voies biliaires, *K80.41*
- - - - obstruction des voies biliaires *K80.51*
- cas de hernie

Incarcération –*suite*
- cas de hernie –*suite*
- - avec gangrène *K46.1*
- - inguinale *K40.30*
- - - récidivante *K40.31*
- coprolithe *K56.4*
- hernie *K46.0*
- iris dans la plaie *S05.2*
- lentille dans la plaie *S05.2*
- utérus *N85.8*
- - avec césarienne *O34.5*
- - grossesse *O34.5*
- - obstacle à l'accouchement *O65.5*
- Utérus, lors de la grossesse *O34.5*

Incarcéré
- entérocèle, sans gangrène *K46.0*
- épiplocèle, sans gangrène *K46.0*
- hernie *K46.0*
- - abdominale, sans gangrène *K43.0*
- - cicatrice *K43.0*
- - crurale *K41.3*
- - diaphragmatique, sans gangrène *K44.0*
- - fémorale
- - - sans gangrène *K41.3*
- - - unilatérale, sans gangrène *K41.3*
- - inguinale *K40.30*
- - - récidivante *K40.31*
- - - sans gangrène *K40.30*
- - - unilatérale, sans gangrène *K40.30*
- - interstitielle, sans gangrène *K46.0*
- - intestinale, sans gangrène *K46.0*
- - intra-abdominale, sans gangrène *K46.0*
- - ischiocèle, sans gangrène *K45.0*
- - lombaire, sans gangrène *K45.0*
- - nombril *K42.0*
- - obturatrice, sans gangrène *K45.0*
- - ombilicale, sans gangrène *K42.0*
- - rétropéritonéale, sans gangrène *K45.0*
- - sans gangrène *K46.0*
- - vulvaire, sans gangrène *K45.0*

incarcérée sans gangrène Hernie crurale (unilatéral) : *K41.3*

incarnatus Unguis *L60.0*

Incertitude
- état *R26.8*
- mouvements *R29.8*

Incident NCA *T88.9*

Incident, en cas de
- mesures médicales sans précision *Y84.9!*
- prise d'insuline *T38.3*
- rayonnements NCA *T66*
- traitement médical *T88.9*
- transfusion *T80.9*
- usage local NCA *T88.9*
- utilisation d'appareils ou de produits médicaux *Y82.8!*

incisionnelle
- avec gangrène Hernie *K43.1*
- provoquant occlusion sans gangrène , Hernie *K43.0*
- SAI Hernie *K43.2*
- sans occlusion gangrène Hernie *K43.2*

Incisives, en forme de pelle *K00.2*

Inclusion maladiie, cellule à (mucolipid *E77.0*

Inclusion, kyste
- épidermique *L72.0*
- mésothélium *K66.8*
- vagin *N89.8*
- vulve *N90.7*

Inclusion, maladie
- cellule géante *B25.9*
- - cytomégalique *B25.9*
- généralisé, cytomégalique *B25.9*

Inclusions cytomégaliques, maladie des [*B25.9*

Incompatibilité
- foeto-maternelle, avec ictère néonatal NCA *P55.9*
- rhésus
- - grossesse *O36.0*
- - hydrops foetal, soins, mère *O36.0*

Incompatibilité transfusionnelle *T80.3*

Incomplet
- avortement *O04.4*
- - *O06.4*
- - avec complications *O04.3*
- - - *O06.3*
- - spontané *O03.4*
- - - avec complications *O03.3*
- - spontanée *O03.4*
- avortement légal *O04.4*
- Bec-de-lièvre *Q36.9*
- bloc AV (bloc atrioventriculaire) *I44.3*
- bloc de branche droit *I45.1*
- bloc de branche gauche *I44.6*
- bras de chromosome, duplication *Q92.3*
- deutéranopie *H53.5*
- Développement
- - bronches *Q32.4*
- - cardiaque, congénital *Q24.9*
- - foetus *P05.9*
- - pulmonaire, congénital *Q33.6*
- - voies respiratoires *Q34.8*
- érection *N48.4*
- fausse couche *O06.4*
- - avec complications *O06.3*
- fusion, os du crâne *Q75.0*
- hernie, inguinale *K40.90*
- lésion transversale, moelle lombaire *S34.11*
- lésion tranversale, thoracique *S24.12*
- môle hydatiforme *O01.1*
- paralysie *G83.9*
- protanopie *H53.5*
- rachis
- - double *Q06.8*
- - surnuméraire *Q06.8*
- rotation
- - caecum *Q43.3*
- - colon *Q43.3*
- rotation, colon *Q43.3*
- rupture
- - coiffe des rotateurs, non traumatique *M75.1*
- - supraspinatus, tendon, non traumatique *M75.1*
- ségmentation
- - os NCA *Q78.8*
- - vertèbre *Q76.4*
- - - sacro-lombaire *Q76.4*
- syndrome de la queue de cheval *G83.41*
- - traumatique *S34.31*

Incomplet –*suite*
- ventilation, poumons, chez les nouveaux-nés *P28.1*

inconnu
- Autre organe digestif tumeur à évolution imprévisible ou *D37.7*
- - Tumeur de la cavité buccal et des organe digestif à évolution imprévisible ou *D37.78*
- Epiphyse glande pinéale tumeur à évolution imprévisible ou *D44.5*
- Pancréas Tumeur cavité buccal et des organe digestif à évolution imprévisible ou *D37.70*
- tumeur histiocytaire évolution imprévisible ou *D47.7*

Incontinence *R32*
- de pression *N39.42*
- d'urgence *N39.42*
- fécale *R15*
- - d'origine non-organique *F98.1*
- - non-organique *F98.1*
- paradoxe *N39.41*
- récidivante *N39.47*
- réflexe *N39.40*
- regorgement *N39.41*
- regorgement, incontinence urinaire *N39.41*
- selles *R15*
- - involontaire *R15*
- - - origine non organique *F98.1*
- - non organique *F98.1*
- sphincter
- - anus *R15*
- - urètre *R32*
- sphincter anal *R15*
- sphincter vésical *N31.88*
- stress, post-opératoire *N99.8*
- urinaire *R32*
- - cause, organique *N39.48*
- - d'effort *N39.3*
- - d'origine non organique *F98.0*
- - d'origine organique *N39.48*
- - due au stress *N39.3*
- - extra-urétrale *N39.43*
- - impérieuse *N39.42*
- - neurogène *N31.0*
- - non organique *F98.0*
- - par regorgement *N39.41*
- - regorgement *N39.41*
- - stress *N39.3*
- - vessie *R32*
- urinaire d'effort *N39.3*
- urinaire par regorgement (par trop-plein) *N39.41*
- vesicae *R32*
- vessie *R32*

incontinentia pigmenti *Q82.3*

Incoordination névrotique *F45.8*
- corde vocale *F45.33*
- larynx *F45.33*

Incoordination, musculaire *R27.8*

Incorporation, corps étranger *T14.04*

Incrustation d'un corps étranger dans la *T15.0*

Incubation
- coqueluche *Z20.8*
- hépatite *Z20.5*
- oreillons *Z20.8*

Incubation *–suite*
- rougeole *Z20.8*
- rubéole *Z20.4*
- salmonellose *Z20.0*
- tuberculose *Z20.1*
- varicelle *Z20.8*
- VIH *Z20.6*

Incurvation congénitale des os longs du *Q68.5*

Indétermination du sexe *Q56.4*

indéterminé GMSI Gammapathie monoclonale de signification *D47.2*

Indéterminé, lèpre (I) *A30.0*

Index de Barthel en début de réhabilitat
- 200 à 76 points *U52.2*
- 31 points et plus *U52.0*
- 75 à 30 points *U52.1*
- moins de 200 points *U52.3*

Indication
- Avortement
- - légal *O04.9*
- - psychiatrique *O04.9*
- médicale, avortement *O04.9*
- sociale, avortement *O04.9*

Indications, conforme à
- Médication
- - effet indésirable, non souhaité, par administration, juste *T88.7*
- - hypersensibilité, par administration juste *T88.7*
- - idiosyncrasie, par administration, juste *T88.7*
- - réaction, allergique, par administration, juste *T88.7*
- stupéfiants
- - effet indésirable, non souhaité, par administration, juste *T88.7*
- - hypersensibilité, par administration juste *T88.7*
- - idiosyncrasie, par administration, juste *T88.7*
- - réaction, allergique, par administration, juste *T88.7*

Indien(ne)
- chanvre, dépendance *F12.2*
- teigne du membre inférieur *B35.6*

Indifférencié
- carcinome *C80*
- leucémie *C95.00*
- liposarcome *C49.9*
- rétinoblastome *C69.2*
- sarcomes petites cellules osseux *C41.9*
- schizophrénie *F20.3*
- - aigue *F23.2*
- - chronique *F20.5*
- tératome *C80*
- trouble somatoforme *F45.1*
- troubles psycho-somatiques *F45.1*

Indigestion *K30*
- acide *K30*
- aliments, périmés NCA *A05.9*
- bile *K30*
- fonctionnelle *K30*
- psychogène *F45.37*

Indirecte *- voir* Type de maladie

indirectement cause obstétrical Mort de Séquelle relevant *O96.1*
- de Séquelle relevant *O97.1*

Indisposition *R53*

Indol-acétique, taux urinaires élevés d' *R82.5*

Indolore, ulcère du pied *L97*

Indométacine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Induit par les corticostéroïdes, glaucom *H40.6*

Induit(e)
- ovulation, avec hyperstimulation des ovaires *N98.1*
- psychose *F24*
- - paranoïde *F24*
- trouble
- - délirant *F24*
- - psychotique *F24*

Induit(e) par l'alcool
- insuffisance pancréatique *K86.0*
- nécrose, pancréas *K85.21*
- pancréatite *K85.20*
- - aiguë *K85.20*
- - avec complication organique *K85.21*
- - chronique *K86.0*
- pancréatopathie *K86.0*
- pseudosyndrome de Cushing *E24.4*

Induration
- cerveau *G93.88*
- conjonctive *H11.1*
- corps caverneux *N48.6*
- corps caverneux, pénis *N48.6*
- cristallin, avec iridocyclite *H20.2*
- foie *K76.1*
- - *K76.8*
- ligament large de l'utérus *N83.8*
- ligament utérin large *N83.8*
- mammaire *N63*
- paupière *H02.8*
- peau *R23.4*
- pénis *N48.6*
- plastique des corps caverneux *N48.6*
- poumons, fibroide, chronique *J84.1*
- prostate *N42.8*
- pulmonaire *J84.1*
- - essentielle, brune *E83.1+, J99.8**
- - fibreuse, chronique *J84.1*
- sein *N64.5*
- - fibreuse, dans les suites de l'accouchement *O92.20*
- tympan *H74.0*
- voies lacrymales *H04.5*

Inégalité
- allongement
- - canal
- - - cholédoque *Q44.5*
- - - cystique *Q44.5*
- - col de l'utérus
- - - hypertrophique *N88.4*
- - - inégalité congénitale *Q51.8*
- - côlon *Q43.8*
- - dents ou macrodontie (gigantisme dentaire) *K00.2*
- - frein du prépuce (frenulum praeputii) *Q55.6*
- - hypertrophie du col de l'utérus (cervix) *Q51.8*
- - jambe *M21.79*
- - ligament patellaire (Ligamentum patellae), congénital *Q74.1*

Inégalité *–suite*
- allongement *–suite*
- - pétiole de l'épiglotte (Petiolus epiglottidis) *Q31.8*
- - petites lèvres vulvaires, inégalité acquise *N90.6*
- - travail à l'accouchement *O63.9*
- - - prolongation du travail en deuxième période *O63.1*
- - - prolongation du travail en première période *O63.0*
- - travail, complication, accouchement *O63.9*
- jambes *M21.79*
- - acquise *M21.79*
- longueur des membres *M21.79*
- longueur des membres inférieurs *M21.79*
- - acquise *M21.79*
- - congénitale *Q72.9*
- longueur d'un membre, congénitale *Q74.8*
- pupilles *H57.0*
- - congénitale *Q13.2*

Inémotivité *F52.0*

Inertie
- gastrique *K31.88*
- utérine *O62.2*
- - compliquant l'accouchement *O62.2*
- - primitive *O62.0*
- - secondaire *O62.1*
- utérine, pendant la grossesse *O62.2*

infant death syndrome SIDS Sudden *R95*

Infantile
- autisme *F84.0*
- esotropie *H50.0*
- lésion cérébrale *P91.9*
- lésion, cerveau, avec syndrome résiduel, cérébral *P91.9*
- psychose *F84.0*

Infantile *- voir* Type de maladie

Infantilisme *R62.8*
- cardiaque *Q24.9*
- cœliaque *K90.0*
- hypophysaire *E23.0*
- intestinal *K90.0*
- intestinal [maladie de Herter] *K90.0*
- pancréatique *K86.8*
- rénal *N25.0*
- vulvaire *Q52.7*

Infarcissement
- antéroseptal, ancien *I25.29*
- artère cérébrale
- - antérieure *I63.5*
- - moyenne *I63.5*
- - postérieure *I63.5*
- artère cérébrale moyenne *I63.5*
- artère coronaire *I21.9*
- artériel *I77.9*
- artério-mésentérique *K55.0*
- capsule interne *I63.5*
- cardiaque *- voir* Infarctus du myocarde ou Myocarde, infarctus *I21.9*
- - aigu *I21.9*
- - ancien *I25.29*
- - épaississement *I25.29*
- - imminent *I20.0*
- - paroi antérieure *I21.0*

Infarcissement –*suite*
- cardiaque - *voir* Infarctus du myocarde ou Myocarde, infarctus –*suite*
- - paroi latérale *I21.2*
- - paroi postérieure *I21.1*
- cérébelleux *I63.9*
- - embolique *I63.4*
- cérébral *I63.9*
- - embolique *I63.4*
- - ischémique *I63.9*
- - provoqué par
- - - embolie
- - - - artère
- - - - - basilaire, *I63.1*
- - - - - carotide, *I63.1*
- - - - - précérébrale extra-crânienne, *I63.1*
- - - - - vertébrale, *I63.1*
- - - - - cérébelleuse, *I63.4*
- - - - - cérébrale, *I63.4*
- - - - - intra-crânienne, *I63.4*
- - - - artères perforantes *I63.4*
- - - occlusion
- - - - artère
- - - - - cérébrale,
- - - - - basilaire, *I63.2*
- - - - - basilaire, complète, *I63.2*
- - - - - basilaire, partielle, *I63.2*
- - - - - carotide, *I63.2*
- - - - - carotide, complète, *I63.2*
- - - - - carotide, partielle, *I63.2*
- - - - - précérébrale extra-crânienne, *I63.2*
- - - - - vertébrale, *I63.2*
- - - - - vertébrale, complète, *I63.2*
- - - - - vertébrale, partielle, *I63.2*
- - - - - cérébrale, antérieure, *I63.5*
- - - - - cérébrale, antérieure, complète, *I63.5*
- - - - - cérébrale, antérieure, partielle, *I63.5*
- - - - - cérébrale, moyenne, *I63.5*
- - - - - cérébrale, moyenne, complète, *I63.5*
- - - - - cérébrale, moyenne, partielle, *I63.5*
- - - - - cérébrale, postérieure, *I63.5*
- - - - - cérébrale, postérieure, complète, *I63.5*
- - - - - cérébrale, postérieure, partielle, *I63.5*
- - - - - intra-crânienne, *I63.5*
- - - - artère de Charcot *I63.5*
- - - - artères
- - - - - cérébelleuses, *I63.5*
- - - - - perforantes, *I63.5*
- - - - artères cérébelleuses
- - - - - complète, *I63.5*
- - - - - partielle, *I63.5*
- - - - cérébro-vasculaire *I63.5*
- - - sténose
- - - - artère
- - - - - précérébrale extra-crânienne, *I63.2*
- - - - - intra-crânienne, *I63.5*
- - - - artère cérébrale
- - - - - antérieure, *I63.5*
- - - - - moyenne, *I63.5*
- - - - - postérieure, *I63.5*
- - - - artère de Charcot *I63.5*

Infarcissement –*suite*
- cérébral –*suite*
- - provoqué par –*suite*
- - - sténose –*suite*
- - - - artères cérébelleuses *I63.5*
- - - thrombose
- - - - artère
- - - - - basilaire, *I63.0*
- - - - - carotide, *I63.0*
- - - - - précérébrale extra-crânienne, *I63.0*
- - - - - vertébrale, *I63.0*
- - - - - cérébelleuse, *I63.3*
- - - - - cérébrale, *I63.3*
- - - - - intra-crânienne, *I63.3*
- - - - artères perforantes *I63.3*
- - - - non purulente
- - - - - sinus veineux intra-crânien, *I63.6*
- - - - - veine cérébrale, *I63.6*
- - séquelles *I69.3*
- cérébro-vasculaire *I63.9*
- choroïdien *H34.2*
- colique *K55.0*
- coronarien *I21.9*
- embolique *I74.9*
- épiploïque *K55.0*
- feuillet intérieur du myocarde *I21.4*
- ganglion(s) lymphatique(s) *I89.8*
- glande salivaire *K11.8*
- hépatique *K76.3*
- hypophyse *E23.6*
- inféro-latéral, ancien *I25.29*
- intestin grêle *K55.0*
- intestinal *K55.0*
- - aigu *K55.0*
- ischémique, dans la région de l'artère cérébrale moyenne *I63.5*
- lobe frontal *I63.9*
- mammaire *N64.8*
- médullaire *I63.9*
- moelle épinière
- - aigu *G95.1*
- - embolique, aigu *G95.1*
- - non embolique, aigu *G95.1*
- musculaire ischémique *M62.29*
- myocarde *I21.9*
- myocardique *I21.9*
- - aigu *I21.9*
- - - non transmural *I21.4*
- - - sous-endocardique *I21.4*
- - - transmural *I21.3*
- - - - antérieur *I21.0*
- - - - antéro-apical *I21.0*
- - - - antéro-latéral *I21.0*
- - - - antéro-septal *I21.0*
- - - - apico-latéral *I21.2*
- - - - baso-latéral *I21.2*
- - - - diaphragmatique *I21.1*
- - - - inférieur *I21.1*
- - - - inféro-latéral *I21.1*
- - - - inféro-postérieur *I21.1*
- - - - latéral *I21.2*
- - - - paroi antérieure *I21.0*
- - - - paroi latérale *I21.2*
- - - - paroi postérieure *I21.1*
- - - - postérieur *I21.2*
- - - - postéro-basal *I21.2*
- - - - postéro-latéral *I21.2*

Infarcissement –*suite*
- myocardique –*suite*
- - aigu –*suite*
- - - transmural –*suite*
- - - - postéro-septal *I21.2*
- - - - septal *I21.2*
- - - - supéro-latéral *I21.2*
- - aigu, paroi inférieure *I21.1*
- - ancien *I25.29*
- - - survenu entre 29 jours et moins de 4 mois plus tôt *I25.20*
- - - survenu entre 4 mois et moins d'un an plus tôt *I25.21*
- - - survenu il y a 1 an ou plus *I25.22*
- - chronique *I25.8*
- - durant depuis plus de 4 semaines *I25.8*
- - imminent *I20.0*
- - non transmural *I21.4*
- - récidivant *I22.9*
- - - antérieur *I22.0*
- - - antéro-apical *I22.0*
- - - antéro-latéral *I22.0*
- - - antéro-septal *I22.0*
- - - apico-latéral *I22.8*
- - - baso-latéral *I22.8*
- - - diaphragmatique *I22.1*
- - - inférieur *I22.1*
- - - inféro-latéral *I22.1*
- - - inféro-postérieur *I22.1*
- - - latéral *I22.8*
- - - paroi antérieure *I22.0*
- - - paroi latérale *I22.8*
- - - paroi postérieure *I22.1*
- - - postérieur *I22.8*
- - - postéro-basal *I22.8*
- - - postéro-latéral *I22.8*
- - - postéro-septal *I22.8*
- - - septal *I22.8*
- - - supéro-latéral *I22.8*
- - rudimentaire *I25.29*
- - sans onde Q *I21.4*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- - transmural *I21.3*
- osseux *M87.99*
- ovarien *N83.8*
- placentaire *O43.8*
- - avec atteinte du foetus/nouveau-né *P02.2*
- - pendant la grossesse *O43.8*
- pontique *I63.9*
- prostatique *N42.8*
- pulmonaire *I26.9*
- - embolique *I26.9*
- - hémorragique *I26.9*
- - thrombotique *I26.9*
- récidivant - *voir* Infarctus du myocarde, récidive *I22.9*
- - apoplectique *I63.9*
- rénal *N28.0*
- rétinien *H34.2*
- sans élévation de ST *I21.4*
- sous-endocardique aigu, non traumatique *I21.4*
- splénique *D73.5*
- - embolique *I74.8*
- - thrombotique *I74.8*
- substance blanche *I63.9*
- surrénalien *E27.4*

Infarcissement –*suite*
- thalamique *I63.9*
- thrombotique *I82.9*
- thyroïdien *E07.8*
- - entraînant une hémorragie *E07.8*
- trompes de Fallope *N83.8*
- tronc cérébral *I63.9*
- vasculaire mésentérique *K55.0*
- ventricule cardiaque *I21.9*

Infarctus
- aigu du myocarde *I21.9*
- avant apparition, syndrome *I20.0*
- glande surrénale *E27.4*
- myocarde *I24.8*
- - guéri *I25.29*
- - non transmural *I21.4*
- - sans ondes Q *I21.4*
- progressif *I63.9*
- rate *D73.5*
- récidivant *I22.9*
- - apoplectique *I63.9*
- - cérébral *I63.9*
- - cérébrovasculaire *I63.9*
- - myocarde *I22.9*
- renal *N28.0*
- thyroïde *E07.8*

Infecté(e)(s)
- athérome *L72.1*
- avortement *O06.5*
- - spontané *O03.5*
- cal *L84*
- callosité *L84*
- cicatrice cutanée *L08.8*
- cor *L84*
- déhiscence de plaie opératoire *T81.4*
- exanthème cutané *L08.9*
- hydrocèle *N43.1*
- hydronéphrose *N13.6*
- kyste
- - adénoïde *J35.8*
- - coccygien *L05.9*
- - glande de Meibom *H00.0*
- - paupière *H00.0*
- lésion traumatique *T79.3*
- oeil-de-perdrix *L84*
- phanères *L91.8*
- piqûre d'insecte *T79.3*
- plaie *T79.3*
- - sans premiers soins *T79.3*
- sinus cutané NCA *L08.8*
- sinus pilonidal *L05.9*
- stéatome de la paupière *H00.0*
- suture périnéale, après accouchement *O86.0*
- varice, avec ulcère *I83.2*
- varices *I83.1*
- - avec ulcère *I83.2*
- vestige d'amygdale *J35.0*

infectieux Pneumonie due Autre micro - organisme *J16.8*

Infectieux *voir* type de la maladie
- maladie *B99*
- - avec
- - - hydrocéphalie NCA *B99+, G94.0**
- - - iridocyclite NCA *B99+, H22.0**
- - - kératite NCA *B99+, H19.2**
- - - mastoïdite NCA *B99+, H75.0**
- - - myopathie NCA *B99+, G73.4**

Infectieux *voir* type de la maladie –*suite*
- maladie –*suite*
- - avec –*suite*
- - - névrite
- - - - nerf
- - - - - vestibulo-cochléaire NCA, *B99+, H94.0**
- - - otite externe NCA *B99+, H62.3**
- - - paralysie de plusieurs nerfs crâniens NCA *B99+, G53.1**
- - - polynévrite NCA *B99+, G63.0**
- - - psychose *F05.9*
- - - - aiguë *F05.9*
- - - - organique aiguë, *F05.8*
- - - - - *F06.8*
- - - - subaiguë *F05.8*
- pneumonie
- - acquise à la naissance *P23.9*
- - acquise in utero *P23.9*
- syndrome
- - amnios *O41.1*
- - - affectant le nouveau-né *P02.7*
- - VIH, aigu *B23.0*

Infection *B99*
- acromio-claviculaire *M00.91*
- actinomycosique NCA *A42.9*
- adénoïde *J03.9*
- - chronique *J35.0*
- aiguë *B99*
- - avec
- - - agent delta, chez un sujet porteur du virus de l'hépatite B *B17.0*
- - - asthme *J45.1*
- alimentaire, listeria *A32.9*
- alvéolaire (dent) *K04.7*
- alvéole dentaire *K10.3*
- amygdale *J03.9*
- - aiguë *J03.9*
- - chronique *J35.0*
- - subaiguë *J03.9*
- anastomose *T82.7*
- anus *K62.8*
- - due à des Chlamydias *A56.3*
- appareil génital
- - complication, lors de l'échec d'un avortement *O07.5*
- - échec d'une tentative d'avortement médical *O07.0*
- - état puerpéral (post-partum) NCA *O86.1*
- appareil respiratoire NCA *J98.8*
- - aiguë *J22*
- - cas d'affection, grippale *J06.9*
- - chronique *J98.8*
- - due à un virus *J98.8, B97.8!*
- - voies inférieures *J22*
- - - chronique *J42*
- - voies supérieures
- - - chronique *J39.88*
- - - par
- - - - virus NCA *J06.9*
- - - provoquée par
- - - - streptocoques *J06.9, B95.5!*
- appareil urinaire, tuberculeux *A18.1*
- appareil urogénital NCA *N39.0*
- - cours de la grossesse *O23.9*
- - état puerpéral (post-partum) *O86.3*
- après
- - immunisation *T88.0*

Infection –*suite*
- après –*suite*
- - perfusion, injection thérapeutique ou transfusion *T80.2*
- - vaccination *T88.0*
- artérielle *I77.9*
- articulation *M00.99*
- atypique, par voie virale *A81.9*
- avec
- - anémie *D64.9*
- - - aplastique *D61.2*
- - ictère
- - - chez le nouveau-né *P58.2*
- - - néonatale *P58.2*
- - VIH *Z21*
- avec fièvre *B99*
- bacilles de Boyd *A03.2*
- bactérienne *A49.9*
- - cas de maladie, induite par le VIH NCA *B20, A49.9*
- - spécifique *A49.9*
- bassin
- - cas d'échec d'une tentative d'avortement médical *O07.0*
- - complication, lors de l' échec d'un avortement *O07.5*
- - féminin *N73.9*
- blastomycosique *B40.9*
- bronche *J40*
- - aiguë *J20.9*
- bronchopulmonaire *J22*
- buccale *K13.7*
- caecum *K37*
- calice rénal *N12*
- calicielle *N12*
- canal
- - biliaire *K83.0*
- - cholédoque *K83.0*
- - cystique *K81.9*
- - déférent NCA *N49.1*
- - excréteur de la glande salivaire ou canal de Wharton *K11.2*
- - hépatique *K83.0*
- - lacrymal *H04.3*
- - para-urétral *N34.2*
- - skene *N34.2*
- - thyréoglosse *K14.8*
- cartilagineuse *M94.89*
- cathéter vasculaire *T82.7*
- cellules ethmoïdales *J32.2*
- cérébale *G04.9*
- - méningocoques *A39.8+, G05.0**
- - psychose, organique
- - - aiguë *F05.8*
- - - subaiguë *F05.8*
- - septique *G06.0*
- cérébro-spinale, par des méningocoques *A39.0+, G01**
- champignons imparfaits, chromomycose *B43.8*
- chlamydia, sténose, rectum *A55*
- cholédoque *K83.9*
- coeur *I51.8*
- col de l'utérus *N72*
- - puerpéral (post partum) *O86.1*
- - trichomonas *A59.0+, N74.8**
- côlon *A09*
- complication infectieuse suite à vaccination *T88.0*

Infection –*suite*

- complication, lors de l'échec d'un avortement *O07.5*
- conduit
- - auditif *H68.0*
- - trompe d'Eustache *H68.0*
- - utérin *N70.9*
- congénitale NCA *P39.9*
- congénitale, par
- - Candida *P37.5*
- - Clostridium tetani (tétanos) *A33*
- - cytomégalovirus *P35.1*
- - hépatite, virus *P35.3*
- - Listeria monocytogènes *P37.2*
- - Plasmodium falciparum (paludisme) *P37.3*
- - vaccination variole *P35.8*
- - varicelle *P35.8*
- contact, bactérielle *A49.9*
- cordon spermatique *N49.1*
- - par
- - - staphylocoques *N49.1*
- - - streptocoques *N49.1*
- corps jaune *N70.9*
- cortex rénal, hématogène *N15.9*
- cou *J02.9*
- cutanée *L08.9*
- - avec ulcère *L98.4*
- - chez le nouveau-né *P39.4*
- - cuisse *L08.9*
- - doigt *L08.9*
- - genou NCA *L08.9*
- - jambe NCA *L08.9*
- - localisée *L08.9*
- - - par
- - - - staphylocoques *L08.9, B95.8!*
- - - - stretocoques *L08.9, B95.5!*
- - mycosique NCA *B36.9*
- - niveau fessier *L08.9*
- - orteil *L08.9*
- - par
- - - mycobacterium marinum *A31.1*
- - - mycobacterium, atypique *A31.1*
- - pied *L08.9*
- - purulente, non-caractéristique *L08.0*
- déciduale, lors de la grossesse *O41.1*
- décubitus *L89.99*
- dent *K04.7*
- - focale *K04.7*
- dentaire *K04.9*
- diffuse, conduit auditif, externe *H60.3*
- disque intervertébral *M46.39*
- - pyogène *M46.39*
- disque intervertébral, pyogène *M46.39*
- disséminée, due au virus de l'herpès simplex *B00.7*
- due à
- - absidia *B46.5*
- - acétobacter *A49.8*
- - acinobacter *A49.8*
- - Actinobacillus actinomycetemcomitans *A28.8*
- - Actinomyces israelii *A42.9*
- - adénovirus *B34.0*
- - Allescheria boydii *B48.2*
- - Alternaria *B48.7*
- - amibes *A06.9*
- - anoxybiontes *A49.9*
- - anthrax bacilles *A22.9*

Infection –*suite*

- due à –*suite*

- - appareil urinaire *T83.5*
- - appareils, implants ou greffes NCA *T85.78*
- - arbovirus *A94*
- - ascaris lumbricoides *B77.9*
- - Aspergillus *B44.9*
- - - flavus *B44.9*
- - - fumigatus *B44.9*
- - - terreus *B44.9*
- - bacille de Boyd *A03.2*
- - bacille Ducrey *A57*
- - bacille NCA *A49.9*
- - bacille Welch-Fraenkel NCA *A48.0*
- - bacilles gram négatif NCA *A49.9*
- - Bacillus anthracis, *voir aussi* anthrax ou fièvre charbonneuse *A22.9*
- - bactéries anaérobes *A49.9*
- - bactéries de Flexner *A03.1*
- - bactéries de Friedländer *A49.8*
- - bactéries E-Ruhr *A03.3*
- - bactéries Kruse-Sonne-Ruhr *A03.3*
- - Bacterium thyphosum *A01.0*
- - bactéroïdes NCA *A49.8*
- - Balantidium coli *A07.0*
- - basidiobolus *B46.8*
- - blastomyces *B40.9*
- - - dermatitidi *B40.9*
- - Bordetella *A37.9*
- - - parapertussis *A37.1*
- - - pertussis *A37.0*
- - Borrélia
- - - buccalis *A69.1*
- - - burgdorferi *A69.2*
- - - Vincent *A69.1*
- - brucella *A23.9*
- - - abortus *A23.1*
- - - canis *A23.3*
- - - melitensis *A23.0*
- - - suis *A23.2*
- - campylobacter *A49.8*
- - candida *B37.9*
- - - albicans, tropique *B37.9*
- - - chez le nouveau-né *P37.5*
- - - invasive *B37.9*
- - - maladie, provoquée par le VIH *B20, B37.9*
- - Candiru *B88.8*
- - Capillaria
- - - hepatica *B83.8*
- - - philippinensis *B81.1*
- - cathéter de cystostomie *T83.5*
- - cathéter de dialyse péritonéale *T85.71*
- - cathéter de perfusion NCA *T82.7*
- - cathéter NCA *T85.78*
- - cathéter spinal *T85.78*
- - cathéters de dialyse *T82.7*
- - cestoda *B71.9*
- - cestode *B71.9*
- - cestode ou ténia nain (Hymenolepis nana) *B71.0*
- - champignon NCA *B49*
- - - aine *B35.6*
- - - appareil digestif *B49+, K93.8**
- - - barbe *B35.0*
- - - corps *B35.4*
- - - crachats *B48.8*
- - - interdigital *B35.9*

Infection –*suite*

- due à –*suite*
- - champignon NCA –*suite*
- - - interdigital –*suite*

- - - - main *B35.2*
- - - - pied *B35.3*
- - - main *B35.2*
- - - maladie, induite par le VIH *B20, B49*
- - - ongle *B35.1*
- - - ongle des orteils *B35.1*
- - - oreille *B49*
- - - peau *B36.9*
- - - périanal *B35.6*
- - - pied *B35.3*
- - - superficiel *B36.9*
- - - tête *B35.0*
- - - vagin *B37.3+, N77.1**
- - Chilomastix intestinalis *A07.8*
- - Chlamydia *A74.9*
- - - appareil génito-urinaire *A56.2*
- - - dans le petit bassin *A56.1*
- - - organes génitaux, inférieurs *A56.0*
- - - par transmission sexuelle NCA *A56.8*
- - - pharynx *A56.4*
- - Chlamydia psittaci *A70*
- - Cladosporium
- - - castellani *B36.1*
- - - werneckii *B36.1*
- - Clonorchis sinensis *B66.1*
- - Clostridium
- - - bifermentans *A48.0*
- - - botulinum *A05.1*
- - - congénital *P39.8*
- - - histolyticum *A48.0*
- - - novyi, germe de la gangrène gazeuse *A48.0*
- - - oedematiens *A48.0*
- - - septicum, germe de la gangrène gazeuse *A48.0*
- - - sordellii, germ de la gangrène gazeuse *A48.0*
- - Clostridium NCA *A48.0*
- - CMV [cytomégalovirus], en cas de maladie, induite par le VIH *B20, B25.9*
- - coccidies *A07.3*
- - coeur artificiel *T82.7*
- - Conidiobolus *B46.8*
- - coronavirus NCA *B34.2*
- - Coxiella burnetii *A78*
- - Coxsackie virus *B34.1*
- - - système nerveux central NCA *A88.8*
- - Cryptococcus (cryptocoque) neoformans *B45.9*
- - cryptocoques *B45.9*
- - Cryptosporidium *A07.2*
- - - maladie, provoquée par le VIH *B20, A07.2*
- - Cunninghamella *B46.5*
- - cytomégalovirus *B25.9*
- - DCI (défibrillateur cardiaque implantable) *T82.7*
- - défibrillateur implanté *T82.7*
- - denrées alimentaires *A05.9*
- - Dibothriocephalus *B70.0*
- - Dicrocoelium dendriticum *B66.2*
- - Dicrocoelium dendriticum ou petite douve du foie *B66.2*
- - Diphyllobothrium *B70.0*
- - - forme, adulte *B70.0*
- - - latum, forme, adulte *B70.0*

Infection –*suite*
- due à –*suite*
- - Diphyllobothrium –*suite*
- - - pacificum, forme, adulte *B70.0*
- - dispositif d'anti-reflux, oesophagien *T85.78*
- - douve du foie de mouton (Fasciola hepatica) *B66.3*
- - douve du foie du chat (Opisthorchis felineus) *B66.0*
- - Drechslera hawaiiensis *B43.8*
- - Eberthella typhosa *A01.0*
- - Echinococcus (échinocoque) *B67.9*
- - - alveolaris (échinococcose alvéolaire) *B67.7*
- - - cysticus *B67.4*
- - - cystique *B67.4*
- - - foie *B67.8+, K77.0**
- - - granulosus *B67.4*
- - - multilocularis *B67.7*
- - Ecthyma contagieux, virus Orf *B08.0*
- - Entamoeba histolytica, *voir aussi* amibiase ou maladies provoquées par des amibes *A06.9*
- - Enterobius vermicularis *B80*
- - Enterobius vermicularis ou oxyures *B80*
- - - avec
- - - - vaginite *B80+, N77.1**
- - - - vulvite *B80+, N77.1**
- - - - vulvovaginite *B80+, N77.1**
- - entérovirus NCA *B34.1*
- - Entomophthora *B46.8*
- - Epidermophyton *B35.9*
- - Erysipelothrix insidiosa rhusiopathiae *A26.9*
- - Escherichia
- - - coli, congénitale NCA *P39.8*
- - - coli, NCA *A49.8*
- - Fasciola
- - - gigantica *B66.3*
- - - hepatica *B66.3*
- - - indica *B66.3*
- - Fasciolopsis buski *B66.5*
- - flore, bactérienne, mélangée NCA *A49.8*
- - Francisella tularensis *A21.9*
- - Fusarium *B48.7*
- - Gardnerella *A48.8*
- - génioplastie *T85.78*
- - Geotrichum candidum *B48.3*
- - germe pathogène de la gangrène gazeuse NCA *A48.0*
- - Giardia lamblia *A07.1*
- - Glenosporella *B48.0*
- - Gnathostoma spinigerum *B83.1*
- - Gongylonémose *B83.8*
- - gonococcie *A54.9*
- - - aiguë *A54.9*
- - - appareil génito-urinaire *A54.0*
- - - bassin *A54.2*
- - - chronique *A54.9*
- - - cours de la grossesse *O98.2*
- - - oeil *A54.3*
- - greffe de tendons *T84.7*
- - greffe musculaire *T84.7*
- - greffe nerveuse *T85.78*
- - greffe osseuse *T84.7*
- - Haemophilus
- - - Ducrey *A57*

Infection –*suite*
- due à –*suite*
- - Helicobacter *A49.8*
- - - pylori *A49.8*
- - - - cas de
- - - - - ulcère,
- - - - - ulcère, l'estomac, *K25.9*
- - - - - ulcère, duodénum, *K26.9*
- - helminthes *B83.9*
- - helminthes (vers parasites) *B83.9*
- - herpès *B00.9*
- - herpès simplex *B00.9*
- - Heterophyes *B66.8*
- - Heterophyidae, Metagonimus *B66.8*
- - Hymenolepis *B71.0*
- - - nana *B71.0*
- - implant canal biliaire *T85.78*
- - implant de la cornée *T85.78*
- - implant oculaire *T85.78*
- - implant pour le canal déférent *T83.6*
- - Isospora
- - - beli *A07.3*
- - - hominis *A07.3*
- - - maladie, induite par le VIH *B20, A07.3*
- - Klebsiella
- - - friedlaenderi *A49.8*
- - - pneumonia NCA *A49.8*
- - - rhinoscleromatis *A49.8*
- - larves d'anisakis *B81.0*
- - larves de Spirometra *B70.1*
- - larves du ténia du porc, *voir aussi* cysticercose *B69.9*
- - Legionella pneumophila *A48.1*
- - - sans pneumonie *A48.2*
- - lentille, prothèse, intraoculaire *T85.78*
- - Leptospira interrogans (leptospirose) *A27.9*
- - - autumnalis *A27.8*
- - - canicola *A27.8*
- - - hebdomadis *A27.8*
- - - icterohaemorrhagiae (ictéro-hémorragique) *A27.0*
- - - pomona *A27.8*
- - leptospires *A27.9*
- - levures *B37.9*
- - l'implant d'un ballon de contre-pulsation intra-aortique *T82.7*
- - Listeria monocytogenes *A32.9*
- - lobomycose, Loboa loboi *B48.0*
- - maladie de Bang *A23.1*
- - Malassezia furfur *B36.0*
- - mélioïdose
- - - mallei *A24.0*
- - - pseudomallei *A24.4*
- - méningocoques *A39.9*
- - microsporon (microsporum) *B35.9*
- - Mimea polymorpha *A49.8*
- - Monilia *B37.9*
- - Monkeypox virus, Orthopoxvirus NCA *B08.0*
- - Mucor *B46.5*
- - mycélium NCA *B49*
- - mycobactérie *A31.9*
- - mycobacterium
- - - avium intracellulaire, en cas de VIH *B20, A31.0*
- - - Battey (maladie de) *A31.0*
- - - chelonae *A31.88*

Infection –*suite*
- due à –*suite*
- - mycobacterium –*suite*
- - - fortuitum *A31.88*
- - - scrofulaceum *A31.88*
- - - simiae *A31.88*
- - - szulgai, atypique *A31.88*
- - - terrae, atypique *A31.88*
- - - triviale *A31.88*
- - - ulcerans *A31.1*
- - - xenopi *A31.88*
- - mycoplasmes, urogénitaux *N39.0, B96.0!*
- - Naegleria, amibe *B60.2*
- - - avec
- - - - encéphalite *B60.2+, G05.2**
- - - - encéphalomyélite *B60.2+, G05.2**
- - - - myélite *B60.2+, G05.2**
- - nématodes *B82.0*
- - - intestin NCA *B82.0*
- - Nocardia *A43.9*
- - Oesophagostomum *B81.8*
- - Opisthorchis ou douve du foie
- - - felineus (du chat) *B66.0*
- - Opisthorchis ou la douve du foie
- - - felineus, tenuicollis *B66.0*
- - - viverrini *B66.0*
- - oxyure *B80*
- - Oxyuris vermicularis (ou nématode entérobius vermicularis) *B80*
- - Papillomavirus, humain [HPV] *B07*
- - Papovavirus NCA *B34.4*
- - Papovavirus, en cas de maladie, induite par le VIH *B20*
- - Paragonimus *B66.4*
- - Paragonimus westermani *B66.4*
- - parasites *B89*
- - Paravaccinia, virus pseudocowpox NCA *B08.0*
- - Parvovirus, virus de la maladie aléoutienne du vison NCA *B34.3*
- - Pasteurella *A28.0*
- - - multocida *A28.0*
- - - tularensis *A21.9*
- - Petriellidium boydii *B48.2*
- - Piedraia hortae *B36.3*
- - plasmodium
- - - falciparum *B50.9*
- - - malariae *B52.9*
- - - ovale *B53.0*
- - - vivax NCA *B51.9*
- - Pleuropneumonia-like-organism [PPLO] *A49.3*
- - Pneumocystis carinii *B59+, J17.3**
- - - maladie, induite par le VIH *B20, B59*
- - pontage coronaro-artériel *T82.7*
- - porozoaires (Sporozoa) *B64*
- - présence de Cysticercus cellulosae *B69.9*
- - produits alimentaires *A05.9*
- - proteus
- - - mirabilis *A49.8*
- - - morganii *A49.8*
- - - vulgaris *A49.8*
- - Proteus NCA *A49.8*
- - prothèse articulaire *T84.5*
- - prothèse au niveau des organes génitaux *T83.6*
- - prothèse de pénis *T83.6*
- - prothèse mammaire *T85.78*

Infection –*suite*
- due à –*suite*
- - prothèse NCA *T85.78*
- - prothèse pour le canal déférent *T83.6*
- - protozoaires *B64*
- - Pseudallescheria boydii *B48.2*
- - pseudomonas
- - - aeruginosa *A49.8*
- - - mallei *A24.0*
- - - pseudomallei *A24.4*
- - Pseudomonas NCA *A49.8*
- - rétrovirus NCA *B33.3*
- - Rhinocladium *B42.9*
- - Rhinosporidium seeberi *B48.1*
- - rhinovirus *B34.1*
- - Rhizopus *B46.5*
- - Rickettsia (rickettsies) *A79.9*
- - - akari *A79.1*
- - - burnetii *A78*
- - - mooseri *A75.2*
- - - orientalis *A75.3*
- - - prowazeki *A75.0*
- - - quintana *A79.0*
- - - tsutsugamushi *A75.3*
- - - typhi *A75.2*
- - rotavirus *A08.0*
- - rubéole *B06.9*
- - Salmonella
- - - hirschfeldii *A01.3*
- - - paratyphi *A01.4*
- - - - A *A01.1*
- - - - B *A01.2*
- - - - C *A01.3*
- - - schottmuelleri *A01.2*
- - - typhi *A01.0*
- - salmonelles *A02.9*
- - - congénitales *P39.8*
- - Sarcocystis *A07.8*
- - Scedodporium *B48.2*
- - Shigella *A03.9*
- - - boydii *A03.2*
- - - dysenteriae *A03.0*
- - - flexneri *A03.1*
- - - schmitzii *A03.0*
- - - shigae *A03.0*
- - - sonnei *A03.3*
- - shigelles
- - - groupe
- - - - A *A03.0*
- - - - B *A03.1*
- - - - C *A03.2*
- - - - D *A03.3*
- - shunt, intracrânien, ventriculaire *T85.78*
- - sonde urinaire *T83.5*
- - Sparganum *B70.1*
- - - mansoni *B70.1*
- - - proliferum *B70.1*
- - Spirillum minus *A25.0*
- - spirochètes ictérogènes *A27.0*
- - spirochètes NCA *A69.9*
- - spirochètes, avec pneumonie *A69.8+, J17.8**
- - Sporothrix schenckii *B42.9*
- - Sporotrichum *B42.9*
- - Stellantchasmus falcatus *B66.8*
- - stérilet intra-utérin *T83.6*
- - stimulateur cardiaque *T82.7*

Infection –*suite*
- due à –*suite*
- - stimulateur cardiaque –*suite*
- - - implanté *T82.7*
- - stimulateur du cortex cérébral *T85.78*
- - stimulateur électronique implantable de la vessie *T83.5*
- - stimulateur musculaire, électronique *T84.7*
- - stimulateur osseuse *T84.7*
- - stimulateur, cortex cérébral, électronique *T85.78*
- - Streptobacillus moniliformis, fièvre par morsure de rat *A25.1*
- - stretocoques, congénitale *P39.8*
- - suture permanente *T85.78*
- - taenia du poisson (Diphyllobothrium latum ou larve bothriocéphale) *B70.0*
- - taenia du poisson (Diphyllobothrium latum ou larve bothriocéphale), finlandais *B70.1*
- - ténia *B68.9*
- - - saginata *B68.1*
- - - - forme, adulte *B68.1*
- - - solium *B68.0*
- - ténia du boeuf (Taenia saginata) *B68.1*
- - ténia du chien (Dipylidium Caninum) *B67.4*
- - ténia du porc *B68.0*
- - ténia du rat *B71.0*
- - Ternidens diminutus *B81.8*
- - torula histolytica *B45.9*
- - Toxocara *B83.0*
- - Toxoplasma gondii *B58.9*
- - - maladie, induite par le VIH *B20, B58.9*
- - toxoplasmes *B58.9*
- - transplant, une prothèse, une greffe de l'appareil génital *T83.6*
- - trématodes NCA *B66.9*
- - Treponema pallidum *A53.9*
- - Trichinella spiralis *B75*
- - trichocéphale ver parasite (Trichuris trichiuria) *B79*
- - trichomonades *A59.9*
- - - trichomonase uro-géntitale *A59.0*
- - Trichomonas intestinalis (intestins) *A07.8*
- - Trichophyton *B35.9*
- - Trichosporon *B36.2*
- - Vaccinia virus *B08.0*
- - VIH
- - - asymptomatique *Z21*
- - - nécessitant un traitement médical *B24*
- - virus avéré de la grippe, de l'Influenza, à l'exception du virus de la grippe aviaire *J10.1*
- - virus de la varicelle *B01.9*
- - virus de l'herpès
- - - anamnèse personnelle *Z86.1*
- - - cas de maladie, induite par le VIH *B20, B00.9*
- - - congénital *P35.2*
- - - otite externe *B00.1+, H62.1**
- - - péri-anale *A60.1*
- - virus d'Epstein-Barr *B27.0*
- - virus du Nil occidental *A92.3*
- - virus ECHO *B34.1*
- - virus NCA *B34.9*

Infection –*suite*
- due à –*suite*
- - virus NCA –*suite*
- - - congénitale *P35.9*
- - - gastro-intestinale *A08.4*
- - - glande salivaire *B25.9*
- - - grippale *J06.9*
- - - grippale (Influenza) *J11.1*
- - - maladie, induite par le VIH *B20, B34.9*
- - - récidivante *B34.9*
- - - système nerveux central *A89*
- - virus para-influenza *B34.8*
- - virus T-lymphotropique humain de type 1 (HTLV) *B33.3*
- - Yersinia
- - - enterocolitica *A04.6*
- - - pseudotuberculosis *A28.2*
- Eaton, agent *A49.3*
- endocarde, par méningocoques *A39.5+, I39.8**
- endocervix *N72*
- entérique *A09*
- épididyme *N45.9*
- épisiotomie, plaie de l' *O90.1*
- épisiotomie, puerpérale *O86.0*
- estomac-intestins (gastro-entérite) *K52.9*
- - bactérienne *A09*
- état puerpérale (post-partum) *O86.4*
- ethmoïde *J32.2*
- - aiguë *J01.2*
- - chronique *J32.2*
- fistule
- - artério-véneux, générée par chirurgie *T82.7*
- - follicule pileux *L05.9*
- fixation, interne, orthopédique, NCA *T84.6*
- foetus, intra-amniotique *P39.2*
- foetus, nouveau-né *P39.9*
- foie, par
- - Clonorchis sinensis *B66.1*
- - Echinococcus (échinocoque)
- - - granulosus *B67.0+, K77.0**
- - - multilocularis *B67.5+, K77.0**
- fongique
- - anévrysme *I72.9*
- - - cérébral *I72.9*
- - - - rompu *I60.9*
- - arthrite NCA *B49+, M01.69**
- - dartre, pied *B35.3*
- - diarrhée NCA *B49+, K93.8**
- - eczéma *B36.9*
- - endocardite *I33.0*
- - Endophtalmie *H44.1*
- - fluor *B37.3+, N77.1**
- - infection NCA *B49*
- - - cas de VIH *B20, B49*
- - - cutanée NCA *B36.9*
- - méningite NCA *B49+, G02.1**
- - Panophtalmie *H44.0*
- - rétinite, associée au VIH *B20+, H32.0**
- - stomatite *B37.0*
- - Sycosis contagiosa *B35.0*
- - vaginite *B37.3+, N77.1**
- - vulvovaginite *B37.3+, N77.1**
- gaine des tendons *M65.19*

Infection –*suite*

- ganglion lymphatique *L04.9*
- - axilaire *L04.2*
- - cervical *L04.0*
- - mésentérique NCA *I88.0*
- gastro-intestinale *A09*
- gencive *K05.1*
- généralisée NCA *A41.9*
- généralisée par
- - Escherichia coli *A41.51*
- - méningocoques *A39.4*
- - pneumocoques *A40.3*
- - - avec pneumonie *J13*
- - staphylocoques *A41.2*
- généralisée, *voir* également septicémie *A41.9*
- - cours du travail *O75.3*
- - puerpérale (post-partum) *O85*
- - virale *B34.9*
- genou, articulation du *M00.96*
- gland du pénis NCA *N48.2*
- glande de Bartholin *N75.8*
- glande de Meibomius (glandes tarsiennes) *H00.0*
- glande lacrymale *H04.0*
- glande salivaire *K11.2*
- globe oculaire, phtisie *H44.5*
- gonococcique NCA *A54.9*
- - aiguë *A54.9*
- - chronique *A54.9*
- greffe artérielle NCA *T82.7*
- greffe de peau *T86.59*
- grippale *J06.9*
- - avec
- - - affection des voies respiratoires *J06.9*
- - - surinfection, bactérienne *J06.9*
- hanche, articulation *M00.95*
- hospitalière *T88.8*
- HTLV [Human T-lymphotropic virus] - LAV [Virus associé à la Lymphadénopathie] *B24*
- hypopharynx *J02.9*
- intestin *A09*
- - par
- - - Escherichia coli, entéro-hémorragique *A04.3*
- - - flagellés *A07.9*
- - - protozoaires *A07.9*
- intestinale *A09*
- - dépistage NCA *Z11*
- - par
- - - Campylobacter *A04.5*
- - - Capillaria *B81.1*
- - - taenia solium *B68.0*
- intracrânienne
- - avec psychose *F06.8*
- - - organique *F06.8*
- - pyogène, séquelles *G09*
- intraspinale, pyogène, séquelles *G09*
- intrautérine
- - cours de grossesse *O23.5*
- - puerpérale *O85*
- kyste, follicule pileux *L05.9*
- kystique, rein, et uretère *N28.8*
- langue NCA *K14.0*
- langue, parasitaire *B37.0*
- larynx NCA *J38.7*

Infection –*suite*

- LAV [Virus associé à la lymphadénopathie]- HTLV [virus T-lymphotropique humain] *B24*
- lèvre (Labia)
- - grande(s) lèvre(s) de la vulve (majora pudendi), aiguë *N76.2*
- - petite(s) lèvre(s) de la vulve (minora pudendi), aiguë *N76.2*
- lèvres de la vulve *N76.2*
- liquide amniotique *O41.1*
- Listéria, liée à l'alimentation, *voir aussi* listériose *A32.9*
- locale
- - cutanée, et sous-cutanée *L08.9*
- - salmonelles NCA *A02.2*
- longue durée *B99*
- lors de
- - accouchement NCA *O75.3*
- - aponévrose, périrénale *N13.6*
- - atrophie, rein, avec hydronéphrose *N13.6*
- - constriction, de l'uretère *N13.6*
- - contracture
- - - orifice urétéral *N13.6*
- - - rein, hydronéphrotique *N13.6*
- - coude de l'uretère *N13.6*
- - diabète sucré *E14.60*
- - diabète sucré de type 1 *E10.60*
- - diabète sucré de type 2 *E11.60*
- - fibrose, rétropéritonéale, idiopatique *N13.6*
- - grossesse *O98.9*
- - hydronéphrose *N13.6*
- - - avec
- - - - calcul *N13.6*
- - - - sténose urétérale *N13.6*
- - insémination, artificielle *N98.0*
- - lithiase urétérale *N21.1*
- - maladie, induite par le VIH *B20, B99*
- - oblitération, de l'uretère *N13.6*
- - phimosis *N47*
- - prolapsus, de l'uretère, avec obstruction *N13.6*
- - rétrécissement, de l'uretère *N13.6*
- - sténose
- - - orifice urétéral *N13.6*
- - - urétéro-vésicale *N13.6*
- - ulcère
- - - membre inférieur, variqueux *I83.2*
- - - pied, variqueux *I83.2*
- - ulcère de stase ou variqueux *I83.2*
- - ulcère variqueux *I83.2*
- - urétéro-hydrose *N13.6*
- - uropathie, obstructive *N13.6*
- - varices *I83.1*
- - - ulcéreuses *I83.2*
- mâchoire inférieure *K10.28*
- mâchoire supérieure *K10.28*
- mâchoires *K10.28*
- maladie de Bang *A23.1*
- mamelon
- - durant la grossesse *O91.00*
- - liée à la gestation, avec difficultés lors de la mise au sein *O91.01*
- - puerpéral (post-partum) *O91.00*
- maternelle, avec lésion, foetus/nouveau -né *P00.8*
- méatite urétrale (Meatus urethrae) *N34.2*

Infection –*suite*

- médiastin *J98.5*
- membranes foetales *O41.1*
- - membranes amniotiques *O41.1*
- membres, réimplantés *T87.2*
- méninges *G00.9*
- - méningocoques *A39.0+, G01**
- métatarso-phalangienne *M00.97*
- moëlle épinière *G04.9*
- moëlle épinière, par des streptocoques *G04.8, B95.5!*
- moignon d'amputation *T87.4*
- - chirurgicale *T87.4*
- moignon urétéral *T81.4*
- muqueuse nasale *J00*
- musculaire NCA *M60.09*
- mycobactérienne
- - atypique *A31.9*
- - maladie, induite par VIH *B20, A31.9*
- mycosique NCA *B49*
- mycosique, en cas de maladie, induite par le VIH *B20, B49*
- myocarde NCA *I40.0*
- myocarde, par des méningocoques *A39.5+, I41.0**
- néonatale, par Monilia *P37.5*
- nez *J00*
- nosocomiale *T88.8*
- oeil *H44.0*
- - purulente *H44.0*
- ombilicale *L08.9*
- - chez le nouveau-né *P38*
- ongle d'orteils *L03.02*
- ongles *L03.01*
- opportuniste *B99*
- orbite *H05.0*
- oreille *H66.9*
- - externe *H60.3*
- - interne *H83.0*
- oreille moyenne *H66.9*
- organes génitaux
- - cas de
- - - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - - grossesse môlaire *O08.0*
- - cours de la grossesse *O23.5*
- - état puerpéral (post-partum) NCA *O86.1*
- - féminins *N73.9*
- - - herpès *A60.0*
- - masculins *N49.9*
- - - herpès *A60.0+, N51.8**
- - mére, avec lésion foetus *P00.8*
- - post-partum *O86.1*
- - suite à un avortement *O08.0*
- organes pelviens, après avortement *O08.0*
- osseuse NCA *M86.99*
- osseuse, à Echinococcus granulosus *B67.2+, M90.29**
- ovaire *N70.9*
- pancréas, aiguë *K85.90*
- parasitaire intestinale NCA *B82.9*
- parasitaire NCA *B89*
- - dépistage NCA *Z11*
- - maladie, induite par VIH *B20, B89*
- paroi abdominale *L08.9*
- - sonde vésicale sus-pubienne *T81.4*
- parotide *K11.2*
- paupière *H01.9*

Infection –*suite*

- paupière glandes sébacées (glandes de Zeiss) *H00.0*
- paupière, profonde *H00.0*
- pénis NCA *N48.2*
- périapicale *K04.5*
- péricarde, par des méningocoques *A39.5+, I32.0**
- péridontale *K05.2*
- périorbitaire *H05.0*
- périrectale *K62.8*
- périrénale *N15.9*
- péritonéale *K65.9*
- - état puerpéral (post-partum) *O85*
- périurétérale *N28.8*
- pharynx *J02.9*
- - Coxsackie, virus *B08.5*
- - face postérieure, lymphatique *J35.0*
- - par
- - - pneumocoques *J02.8, B95.3!*
- - - staphylocoques *J02.8, B95.8!*
- - - streptocoques *J02.0*
- - - virus NCA *J02.8*
- - phlegmoneuse *J02.9*
- plaie
- - suture de césarienne *O86.0*
- - suture de l'épisiotomie *O86.0*
- plaie NCA *T79.3*
- - diphtérique *A36.3*
- - localisée *T79.3*
- - post-opératoire *T81.4*
- - post-traumatique *T79.3*
- plaie opératoire obstétricale, puerpérale *O86.0*
- plaie suite à une césarienne *O86.0*
- plaies opératoires *T81.4*
- Plaut-Vincent *A69.1*
- poitrine *N61*
- pôle rénal *N15.9*
- post-opératoire *T81.4*
- post-partum
- - appareil urinaire *O86.2*
- - mamelon *O91.00*
- post-traumatique NCA *T79.3*
- post-vaccinale *T88.0*
- prépuce NCA *N48.1*
- primaire, tuberculeuse, prouvée de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- prostate *N41.9*
- - capsule *N41.9*
- - trichomonas *A59.0+, N51.0**
- prothèse, un implant, une greffe de l'appareil urinaire *T83.5*
- puerpérale *O86.4*
- - plaie d'origine obstétricale chirurgicale *O86.0*
- pulmonaire à mycoplasmes *J15.7*
- pulmonaire NCA
- - par
- - - Echinococcus (échinocoque) granulosus *B67.1+, J99.8**
- - - Mycobacterium (mycobactérie)
- - - - avuim *A31.0*
- - - - intracellulare *A31.0*
- - - - kansasii *A31.0*
- - - mycobacterium, atypique *A31.0*
- - - spirochètes *A69.8*
- - tuberculeuse, par mycobacterium, atypique *A16.2*

Infection –*suite*

- pyélonéphritique *N10*
- rate *D73.8*
- récidivante *B99*
- - voies respiratoires, inférieures *J22*
- rectum
- - Chlamidia *A56.3*
- - gonococcique *A54.6*
- rénale *N15.9*
- - aiguë
- - - glomérulaire *N00.9*
- - - tubulo-interstitielle *N10*
- - cours de la grossesse *O23.0*
- - - transmise par relations sexuelles *O98.3*
- - état puerpéral (post-partum) *O86.2*
- rhino-pharyngée *J00*
- Rhinosporidium seeberi *B48.1*
- sac ou cavité amniotique *O41.1*
- sarcocyste *A07.8*
- scedosporium *B48.2*
- scrotum, aiguë, NCA *N49.2*
- sein *N61*
- - cous de grossesse *O91.20*
- - post-partum *O91.20*
- sensibilité aux *Z86.1*
- shunt *T82.7*
- sillon latéral de l'ongle
- - doigt *L03.01*
- - orteil *L03.02*
- sinus
- - maxillaire, chronique *J32.0*
- - paranasal, chronique *J32.9*
- - pilonidal *L05.9*
- - - avec abcès *L05.0*
- sinus cutané NCA *L08.8*
- sinus frontal *J32.1*
- - aiguë *J01.1*
- - chronique *J32.1*
- sinus maxillaire *J32.0*
- - aiguë *J01.0*
- - chronique *J32.0*
- sinus paranasal *J32.9*
- - aiguë *J01.9*
- - chronique *J32.9*
- - tous *J32.4*
- - - aiguë *J01.4*
- - - chronique *J32.4*
- sinus paranasal, chronique *J32.9*
- sinus sphénoïdal *J32.3*
- - aiguë *J01.3*
- sinus sphénoïdien *J32.3*
- - chronique *J32.3*
- sous-cutanée *L08.9*
- sous-cutanée, locale NCA *L08.9*
- sphincter du rectum *K62.8*
- surinfection, bactérienne, lors d'une infection, grippale *J06.9*
- suture périnéale, puerpérale *O86.0*
- système nerveux central, par entérovirus NCA *A88.8*
- systémique, par Haemophilus aegyptius *A48.4*
- tendon *M65.19*
- testicule *N45.9*
- testicules *N45.9*
- tétanos *A35*

Infection –*suite*

- thyroïde, par Echinococcus (échinocoque) granulosus *B67.3+, E35.0**
- trachée, chronique *J42*
- Trachéite *J04.1*
- tractus digestif NCA *A09*
- tuberculeuse NCA *A16.9*
- - confirmation bactériologique ou histologique *A15.9*
- - maladie, induite par le VIH *B20, A16.9*
- - primaire *A16.7*
- - sans manifestation clinique *A16.7*
- tubo-ovarienne *N70.9*
- tunique vaginale commune testicule (Tunica vaginalis testis) *N49.1*
- tympan NCA *H73.8*
- typhus *A01.0*
- uretère *N28.8*
- urètre *N34.2*
- - cours de la grossesse *O23.2*
- - trichomonas *A59.0+, N37.0**
- urinaire *N39.0*
- utérus *N71.9*
- vagin
- - aiguë *N76.0*
- - bactérienne *N76.0*
- - état puerpéral (post-partum) *O86.1*
- - trichomonas *A59.0+, N77.1**
- vénérienne *A64*
- vésicule biliaire *K81.9*
- vésicule ou vessie *N30.9*
- vésicule séminale *N49.0*
- vessie (cystite) *N30.9*
- - cours de la grossesse *O23.1*
- virale *B34.9*
- virus lent (slow virus) *A81.9*
- - maladie, induite par le VIH *B20, A81.9*
- - système nerveux central *A81.9*
- virus T-lymphotropique humain de type 1 *B33.3*
- voies biliaires *K83.0*
- voies respiratoires *J98.8*
- - aiguë *J22*
- - chronique *J98.8*
- - grippale *J06.9*
- - inférieures *J22*
- - - aiguë *J22*
- - - - cas de
- - - - - bronchite,
- - - - - bronchite, asthmatique, chronique, *J44.09*
- - - - - bronchite, emphysémateuse, chronique, *J44.09*
- - - - - bronchite, obstructive chronique, *J44.09*
- - - - - maladie pulmonaire, obstructive, *J44.09*
- - - - - trachéo-bronchite, obstructive-chronique, *J44.09*
- - supérieures *J06.9*
- - - aiguë *J06.9*
- - - - localisations multiples *J06.8*
- - - - virus de la grippe confirmé, excepté virus de la grippe aviaire *J10.1*
- - - cas de
- - - - grippe [influenza] NCA virus de la grippe aviaire avérée, *J09*
- - - - - virus de la grippe avéré, excepté virus de la grippe aviaire, *J10.1*

Infection *–suite*
- voies respiratoires *–suite*
- - supérieures *–suite*
- - - cas de *–suite*
- - - - grippe [influenza] NCA virus de la grippe aviaire avérée, *–suite*
- - - - - *J11.1*
- - - récidivante *J06.9*
- voies respiratoires NCA *J98.8*
- voies urinaires NCA *N39.0*
- - aiguë *N39.0*
- - ascendantes *N39.0*
- - asymptomatique, pendant les suites de couches *O86.2*
- - bactérienne *N39.0*
- - cas de
- - - cours de grossesse *O23.4*
- - - échec d'une tentative d'avortement médical *O07.3*
- - chez le nouveau-né *P39.3*
- - chronique *N39.0*
- - complication, lors de l'échec d'un avortement *O07.8*
- - état puerpéral (post-partum) NCA *O86.2*
- - par
- - - entérocoques *N39.0, B95.2!*
- - - Escherichia coli *N39.0, B96.2!*
- - - pseudomonas *N39.0, B96.5!*
- - - trichomonas *A59.0*
- - récidivante *N39.0*
- - suite à un avortement *O08.8*
- vulve *N76.2*
- - aiguë *N76.2*
- - trichomonas *A59.0+, N77.1**

Inférieur, infarctus du myocarde
- aigu, transmural *I21.1*
- récidivant *I22.1*

Inférieur, -re

Inférieur, -re, type de maladie

Infériorité, sentiment de *F60.6*

Inféro-latéral, infarctus
- ancien *I25.29*
- myocarde
- - aigu, transmural *I21.1*
- - récidivant *I22.1*

Inféro-postérieur, infarctus du myocarde
- aigu, transmural *I21.1*
- récidivant *I22.1*

Infertilité
- cas d'insuffisance, ovulation *N97.0*
- féminine *N97.9*
- - due à
- - - adhérence, péritubaire *N97.1*
- - - endométrite, tuberculeuse *N97.2*
- - - troubles, implantation oeuf *N97.2*
- masculine *N46*

Infestation *B70.1*
- externe, par
- - hirudinée *B88.3*
- - sangsues *B88.3*
- foie, par Clonorchis sinensis NCA *B66.1*
- interne, par hirudiniase *B83.4*
- intestin NCA *B82.9*
- intestin, par
- - Fasciolopsis buski *B66.5*
- - helminthes NCA *B82.0*

Infestation *–suite*
- intestin, par *–suite*
- - parasites NCA *B82.9*
- intestinale NCA *B82.9*
- intestinale, par
- - Capillaria *B81.1*
- - douve *B66.5*
- - nématodes NCA *B82.0*
- myriapodes *B88.2*
- nématodes, intestinale *B82.0*
- par
- - acarien du follicule pileux *B88.0*
- - acarien du fromage *B88.0*
- - acariens *B88.0*
- - - *B88.9*
- - amibes *A06.9*
- - Angiostrongylus
- - - cantonensis *B83.2*
- - - costaricensis *B81.3*
- - Anguillula stercoralis *B78.9*
- - anguillule *B78.9*
- - anguillules *B78.9*
- - Anisakis marina *B81.0*
- - aoûtats *B88.0*
- - arthropodes NCA *B88.2*
- - ascaride de chat *B83.0*
- - Ascaris lumbricoides *B77.9*
- - Ascaris NCA *B77.9*
- - Balantidium coli *A07.0*
- - bothriocéphale *B70.0*
- - Bothriocephalus latum *B70.0*
- - Candida *B37.9*
- - candiru *B88.8*
- - Capillaria
- - - hepatica *B83.8*
- - - philippinensis *B81.1*
- - cestode de rat *B71.0*
- - cestodes NCA *B71.9*
- - champignon *B49*
- - - corps *B35.4*
- - - langue *B37.0*
- - - ongle *B35.1*
- - Chilomastix *A07.8*
- - chique *B88.1*
- - Clonorchis sinensis *B66.1*
- - Coccidium *A07.3*
- - Cysticercus cellulosae *B69.9*
- - cysticerques
- - - bothriocéphale *B70.1*
- - - Bothriocephalus latum *B70.1*
- - - Dibothriocephalus *B70.1*
- - - Diphyllobothrium *B70.1*
- - - taenia du poisson *B70.1*
- - - ver solitaire de porc *B69.9*
- - - ver solitaire, plat *B70.1*
- - Demodex folliculorum *B88.0*
- - Dermanyssus gallinae *B88.0*
- - Dibothriocephalus *B70.0*
- - Dicrocoelium dendriticum *B66.2*
- - Dioctophyme rénale *B83.8*
- - Diphyllobothrium latum, forme, adulte *B70.0*
- - Diplogonoporus grandis *B71.8*
- - Dipylidium caninum *B71.1*
- - Distoma hepaticum *B66.3*
- - douve de poumon *B66.4*
- - douve du foie *B66.3*
- - - asiatique *B66.1*

Infestation *–suite*
- par *–suite*
- - douve du foie *–suite*
- - - chinois *B66.1*
- - - grande *B66.3*
- - - orientale *B66.1*
- - douve du foie de mouton *B66.3*
- - douve du foie du chat *B66.0*
- - douve intestinale *B66.5*
- - douves *B66.9*
- - échinococcose, orbite *B67.9+, H06.1**
- - Echinococcus *B67.9*
- - Echinostoma ilocanum *B66.8*
- - Embadomonas *A07.8*
- - Entamoeba histolytica *A06.9*
- - entérobiase *B80*
- - Enterobius vermicularis *B80*
- - Fasciola hepatica *B66.3*
- - filaires *B80*
- - gale *B86*
- - Gastrodiscoides hominis *B66.8*
- - Giardia lamblia *A07.1*
- - Gnathostoma spinigerum *B83.1*
- - Gongylonema *B83.8*
- - helminthiases NCA *B83.9*
- - hétérophyes *B66.8*
- - Hymenolepis *B71.0*
- - ixodes *B88.8*
- - Larva migrans visceralis NCA *B83.0*
- - larve de Trombicula *B88.0*
- - larves d'Anisakis *B81.0*
- - larves d'ascaride de chien *B83.0*
- - larves de Spirometra *B70.1*
- - larves de Toxocara canis *B83.0*
- - larves de Toxocara cati *B83.0*
- - larves, Diphyllobothrium *B70.1*
- - Linguatula *B88.8*
- - Liponyssoides sanguineus *B88.0*
- - Metagonimus yokogawai *B66.8*
- - morpions *B85.3*
- - Oesophagostomum apistomum *B81.8*
- - oxyures *B80*
- - Paragonimus
- - - ringeri *B66.4*
- - - westermani *B66.4*
- - parasites cutanés NAC *B88.9*
- - parasites intestinaux NCA *B82.9*
- - parasites NCA *B89*
- - parasites, orbite NCA *B89+, H06.1**
- - Parastrongylus
- - - cantonensis *B83.2*
- - - costaricensis *B81.3*
- - Pediculus *B85.2*
- - - capitis *B85.0*
- - - corporis *B85.1*
- - - pubis *B85.3*
- - pentastomides *B88.8*
- - petite douve du foie *B66.2*
- - Phthirus pubis *B85.3*
- - plérocercoide *B70.1*
- - poux *B85.2*
- - - multiples *B85.4*
- - poux de la tête *B85.0*
- - poux des vêtements *B85.1*
- - poux du corps *B85.1*
- - protozoaires NCA *B64*
- - Rhabdonema intestinalis *B78.9*
- - Rodentolepis nana *B71.0*

Infestation –*suite*
- par –*suite*
- - sangsues *B88.3*
- - saprophytes NCA *B88.8*
- - Sarcoptes scabiei *B86*
- - Sparganum
- - - mansoni *B70.1*
- - - proliferum *B70.1*
- - Stellantchasmus falcatus *B66.8*
- - Strongyloides stercoralis *B78.9*
- - Taenia *B68.9*
- - - diminuta *B71.0*
- - - mediocanellata *B68.1*
- - - nana *B71.0*
- - - saginata *B68.1*
- - - solium *B68.0*
- - - - forme larvaire *B69.9*
- - taenia du poisson *B70.0*
- - ténia nain *B71.0*
- - Ternidens deminutus *B81.8*
- - Tetranychus molestissimus *B88.0*
- - trématodes NCA *B66.9*
- - Trichinella spiralis *B75*
- - trichocéphale *B79*
- - Trichocephalus trichiura *B79*
- - Trichostrongylus orientalis *B81.2*
- - Trichuris trichiura *B79*
- - Tunga penetrans *B88.1*
- - Vandellia cirrhosa *B88.8*
- - ver NCA *B83.9*
- - ver solitaire de boeuf *B68.1*
- - ver solitaire NCA *B71.9*
- - ver solitaire, plat *B70.0*
- - vers solitaire de chien *B67.4*
- paupière
- - cours de
- - - leishmaniose *B55.1+, H03.0**
- - - loase *B74.3+, H03.0**
- - - onchocercose *B73+, H03.0**
- - - phtiriase *B85.3+, H03.0**
- - par des parasites NCA *B89+, H03.0**
- poux de vêtement *B85.1*
- poux du pubis *B85.3*
- saprophytique NCA *B88.8*

Infiltrant, lipome *D17.9*

Infiltration
- amyloïde généralisée *E85.9*
- amyloïde localisée *E85.4*
- aspécifique *R22.9*
- bassinet rénal *C79.0*
- calcifiante NCA *R89.7*
- cancer *C80*
- cancéreuse, de la paroi vésicale *C79.1*
- cornée *H18.2*
- corps vitré *H43.8*
- - inflammatoire *H43.8*
- cul-de-sac de Douglas
- - aspécifique *D48.4*
- - inflammatoire *N73.8*
- Douglas
- - incertaine *D48.4*
- - inflammatoire *N73.8*
- foie *K76.8*
- ganglions lymphatiques *I88.9*
- glycogénique *E74.0*
- - coeur *E74.0+, I43.1**
- - foie *E74.0+, K77.8**
- graisseuse des muscles *M62.89*

Infiltration –*suite*
- graisseuse du coeur *I51.5*
- graisseuse du thymus *E32.8*
- immunogène de la cornée *H18.2*
- - due à
- - - blépharo-conjonctivite staphylococcique *H16.2*
- - - staphylocoques *H16.2*
- leucémique *C95.90*
- lymphatique *C91.90*
- lymphoïde réactive de la conjonctive *H11.8*
- paupière *H01.8*
- péritoine *R22.2*
- péritonsillaire *J36*
- plèvre *J94.8*
- pulmonaire *J82*
- - éosinophile *J82*
- - - avec asthme bronchique *J82*
- pulmonaire tuberculeuse *A16.2*
- rénale *N28.8*
- sel de calcium *R89.7*
- tumorale, de la vessie *C79.1*
- urinaire *R39.0*
- vésicule séminale *C79.82*

Infiltrative, maladie cutanée *L98.6*

Inflammation
- adénocarcinome *C50.9*
- adhérentielle, capsule articulaire (capsulite rétractile) de l'épaule *M75.0*
- alvéole dentaire *K10.3*
- - scorbutique *E54+, K93.8**
- amygdale - *voir* auss Tonsillite *J03.9*
- - aiguë *J03.9*
- - chronique *J35.0*
- amygdale pharyngée *J03.9*
- amygdale, aiguë *L04.0*
- anastomose *T82.7*
- annexe *N70.9*
- antre
- - chronique *J32.0*
- - mastoïdienne *H70.9*
- antre mastoïdien, chronique, après mastoïdectomie *H95.1*
- anus *K62.8*
- apophyse mastoïde, aiguë *H70.0*
- appendice *K37*
- après mastoïdectomie *H95.1*
- aréole mammaire *N61*
- - post-partum *O91.00*
- - puerpérale *O91.00*
- artère *I77.6*
- artère coronaire *I25.8*
- articulation de l'épaule *M13.11*
- articulation du genou *M13.16*
- - tuberculeuse *A18.0+, M01.16**
- articulation NCA *M13.99*
- - aiguë *M13.99*
- - gonorrhéique *A54.4+, M01.39**
- - goutteuse *M10.09*
- articulation sacro-iliaque *M46.1*
- athérome *L72.1*
- bactérienne près d'une implantation alloplastique, à staphylocoque épidermidis *T82.7+, B95.7**
- bassinet *N12*
- - gangréneuse *N12*
- - kystique *N12*
- - purulente *N12*

Inflammation –*suite*
- bouche *K12.1*
- bourse *M71.99*
- - gonococcique *A54.4+, M73.09**
- - région de l'épaule *M75.5*
- bronchique *J40*
- caecum - *voir aussi* Appendicite ou voir aussi Inflammation de l'appendice *K37*
- - aiguë *K35.9*
- - - avec péritonite *K35.9*
- - chronique *K36*
- - purulente *K35.9*
- - récidivante *K36*
- caisse du tympan *H66.9*
- - aiguë *H66.9*
- canal
- - anal *K62.8*
- - cholédoque *K83.0*
- - déférent *N49.1*
- - hépatique *K83.0*
- - lacrymal *H04.3*
- - - aiguë *H04.3*
- - - chronique *H04.4*
- - Skene *N34.2*
- - sous-mandibulaire *K11.2*
- - Wharton, purulente *K11.2*
- capitons, plante du pied *M20.1*
- capsule *M77.9*
- - adhésive *M77.9*
- - articulation *M77.9*
- - épaule *M75.0*
- - foie *K65.8*
- - rate
- - - aiguë *D73.8*
- - - chronique *D73.8*
- - Tenon *H05.0*
- cartilage *M94.89*
- cas de
- - maladie, vulve *N76.88*
- - stase veineuse avec ulcère *I83.2*
- - ulcère
- - - variqueux, membre inférieur *I83.2*
- - - variqueux, pied *I83.2*
- - ulcère crural (de jambe) variqueux *I83.2*
- - varices *I83.1*
- - - ulcérées *I83.2*
- cavité buccale *K12.1*
- cellules ethmoïdales *J32.2*
- cérébrale *G04.9*
- cérébrospinale à méningocoques *A39.0+, G01**
- cerveau *G04.9*
- cholédoque *K83.0*
- cholestéatome, oreille *H71*
- choroïde *H30.9*
- - et rétine *H30.9*
- cicatrice *L90.5*
- coeur *I51.8*
- col de l'utérus *N72*
- - chronique *N72*
- col utérin *N72*
- colonne vertébrale *M46.99*
- conduit auditif *H60.9*
- - externe *H60.9*
- conjonctive *H10.9*
- - aiguë *H10.3*
- - allergique *H10.1*

Inflammation –*suite*
- conjonctive –*suite*
- - bactérienne *H10.8*
- - chronique *H10.4*
- - gonococcique *A54.3+, H13.1**
- - purulente *H10.0*
- - virale *B30.9+, H13.1**
- cor (cal cutané) *L84*
- corde vocale *J38.2*
- cordon spermatique *N49.1*
- cornée *H16.9*
- - chronique *H16.8*
- corps caverneux *N48.2*
- corps ciliaire *H20.9*
- corps érectile *N48.2*
- corps vitré *H43.8*
- cortex visuel *H47.6*
- cutanée paupière (blépharite) *H01.0*
- diaphragme *J98.6*
- diaphyse *M86.89*
- dispositif, système nerveux, électronique *T85.78*
- diverticule *K57.92*
- due à
- - appareil *T85.78*
- - - électronique, tractus urinaire *T83.5*
- - appareil cardiaque électronique *T82.7*
- - appareil osseux, électronique *T84.7*
- - ballon de contre-pulsion intra-aortique *T82.7*
- - cathéter de dialyse *T82.7*
- - cathéter de dialyse péritonéale *T85.71*
- - cathéter de perfusion *T82.7*
- - - spinal *T85.78*
- - cathéter NCA *T85.78*
- - cathéter spinal *T85.78*
- - cathéter urinaire *T83.5*
- - coeur artificiel *T82.7*
- - dispositif anti-reflux, oesophagien *T85.78*
- - dispositif contraceptif intra-utérin *T83.6*
- - dispositif intra-vésical *T83.5*
- - génioplastie *T85.78*
- - greffe de cornée NCA *T85.78*
- - greffe de tendon *T84.7*
- - greffe d'organes génitaux *T83.6*
- - greffe du tractus génital *T83.6*
- - greffe musculaire *T84.7*
- - greffe nerveuse *T85.78*
- - greffe osseuse *T84.7*
- - greffe valvulaire cardiaque *T82.7*
- - Herpes simplex *B00.9*
- - implant *T85.78*
- - implant intra-oculaire (cristallin artificiel) *T85.78*
- - implant oculaire *T85.78*
- - pontage coronarien *T82.7*
- - prothèse articulaire *T84.5*
- - prothèse biliaire *T85.78*
- - prothèse du canal déférent *T83.6*
- - prothèse mammaire *T85.78*
- - prothèse NCA *T85.78*
- - prothèse orbitaire NCA *T85.78*
- - prothèse pénienne *T83.6*
- - prothèse valvulaire cardiaque *T82.6*
- - shunt ventriculaire intra-crânien *T85.78*
- - stimulateur cardiaque *T82.7*

Inflammation –*suite*
- due à –*suite*
- - stimulateur des nerfs crâniens *T85.78*
- - stimulateur musculaire, électronique *T84.7*
- - stimulateur osseux *T84.7*
- - stimulateur vésical, électronique *T83.5*
- - stimulateur, système nerveux, électronique *T85.78*
- - suture permanente *T85.78*
- - transplant *T85.78*
- duodénum *K29.8*
- endocarde *I38*
- endomètre *N71.9*
- épididyme *N45.9*
- - gonococcique *A54.2+, N51.1**
- - tuberculeuse *A18.1+, N51.1**
- épiglotte
- - aiguë *J05.1*
- - chronique *J37.0*
- épisclère *H15.1*
- érythémateuse NCA *L53.9*
- estomac *K29.7*
- exocol utérin (museau de tanche) (ectocervix) *N72*
- fascia *M72.99*
- fistule, artério-veineuse, chirurgicalement pratiquée (créée) *T82.7*
- fixation orthopédique interne NCA *T84.6*
- foie *K75.9*
- - chronique *K73.9*
- - purulente *K75.0*
- follicule pileux *L73.9*
- gaine tendineuse NCA *M65.99*
- gaine tendineuse, gonococcique *A54.4+, M68.09**
- ganglion géniculé *G51.1*
- - post-zostérienne *B02.2+, G53.0**
- ganglion inguinal, chronique *I88.1*
- ganglion lymphatique *I88.9*
- - aiguë *L04.9*
- - chronique *I88.1*
- gastro-intestinale *K52.9*
- - aiguë *A09*
- gencive *K05.1*
- - aiguë *K05.0*
- - chronique *K05.1*
- gland - *voir aussi* Balanite *N48.1*
- gland du pénis *N48.1*
- glande *I88.9*
- - para-urétrale *N34.2*
- glande de Bartholin *N75.8*
- glande de Cowper *N34.2*
- glande de Littré (urétrale) *N34.2*
- glande de Meibomius *H00.0*
- glande de Moll *H00.0*
- glande de Zeis *H00.0*
- glande lacrymale *H04.0*
- glande salivaire *K11.2*
- glande sébacée *L73.8*
- glande sous-mandibulaire *K11.2*
- glande surrénale *E27.8*
- glande surrénale, hémorragique, à méningocoques *A39.1+, E35.1**
- glandes (para-urétrales) de Skene *N34.2*
- glandes bulbo-urétrales *N34.2*
- glandes parathyroïdes *E21.4*

Inflammation –*suite*
- glandes sudoripares *L73.2*
- glandes surrénales *E27.8*
- - auto-immune *E27.1*
- - hémorragique, par méningocoques *A39.1+, E35.1**
- - immune *E27.1*
- - lors de
- - - cytomégalie *B25.88+, E35.1**
- - - toxoplasmose *B58.8*
- - par cryptocoques *B45.8*
- glotte *J04.0*
- gorge *J02.9*
- - aiguë *J02.9*
- - chronique *J31.2*
- - Streptocoque *J02.0*
- - ulcéreuse *J02.9*
- granulome *L98.0*
- greffe artérielle NCA *T82.7*
- greffe d'organe urinaire *T83.5*
- gros intestin *K52.9*
- hypophyse *G04.9*
- iléon *K52.9*
- intestin *K52.9*
- intestin grêle *K52.9*
- intra-oculaire, avec opacification du corps vitré *H43.3*
- iris *H20.9*
- - gonococcique *A54.3+, H22.0**
- labyrinthe *H83.0*
- langue *K14.0*
- larynx *J04.0*
- - aiguë *J04.0*
- - chronique *J37.0*
- - diphtérique *A36.2*
- lèvre buccale *K13.0*
- lèvres vulvaires *N76.2*
- ligament large de l'utérus *N73.2*
- ligament parodontal (parodonte) (desmodonte) (ligament alvéolo-dentaire) *K04.5*
- - aiguë *K04.4*
- ligament utérin (paramètre) *N73.2*
- lit de l'ongle
- - doigt *L03.01*
- - - purulente *L03.01*
- - orteil *L03.02*
- lit prostatique *N41.9*
- luette *K12.28*
- mâchoire
- - aiguë *K10.29*
- - chronique *K10.29*
- - purulente *K10.28*
- mâchoire supérieure *K10.29*
- mamelon *N61*
- - liée à la grossesse *O91.00*
- mandibule *K10.29*
- méat urétral *N34.2*
- médiastin *J98.5*
- Membranes chorio-amniotiques *O41.1*
- - avec pathologie chez le foetus/nouveau né *P02.7*
- méninges *G03.9*
- - épidémique *A39.0+, G01**
- moelle épinière *G04.9*
- moelle osseuse *M86.99*
- moignon d'amputation *T87.4*
- muqueuse buccale, herpétique *B00.2*

Inflammation –*suite*

- muqueuse pharyngée, herpétique *B00.2*
- muscle *M60.99*
- - aiguë *M60.99*
- muscle cardiaque *I51.4*
- - aiguë *I40.9*
- myocarde *I51.4*
- naevus naevo-cellulaire *D22.9*
- narine *J34.8*
- nerf
- - facial (n. VII) *G51.8*
- - moteur oculaire commun (n. III) *H49.0*
- - moteur oculaire externe (n. VI) (n. abducens) *H49.2*
- - optique *H46*
- - trochléaire (pathétique) (n. IV) *H49.1*
- - vestibulocochléaire (n. VIII), en cas de syphilis *A52.1+, H94.0**
- nerf facial *G51.8*
- nerf NCA *M79.29*
- nerf optique (II) *H46*
- nez *J31.0*
- - purulente *J31.0*
- odontogène *K08.88*
- œil *H57.8*
- - allergique *H10.1*
- - avec glaucome secondaire *H40.4*
- oesophage *K20*
- ombilic *L08.9*
- - chez le nouveau-né *P38*
- ongle *L03.01*
- ongle du pied (orteil) *L03.02*
- orbite
- - aiguë *H05.0*
- - chronique *H05.1*
- oreille *H66.9*
- - externe *H60.9*
- oreille interne *H83.0*
- oreille moyenne *H66.9*
- - aiguë *H66.9*
- - chronique *H66.9*
- - purulente *H66.4*
- organes génitaux
- - féminins *N73.9*
- - masculins *N49.9*
- organes génitaux masculins, localisations multiples *N49.88*
- organes pelviens, chez la femme *N73.9*
- os *M86.99*
- os de la mâchoire *K10.29*
- ovaire *N70.9*
- - aiguë *N70.0*
- - chronique *N70.1*
- pancréas *K85.90*
- - aiguë *K85.90*
- papille optique *H46*
- paramètre *N73.2*
- parotide *K11.2*
- pars plana du corps ciliaire *H30.2*
- paupière *H01.9*
- - profonde *H00.0*
- paupière précisé *H01.8*
- paupière SAI *H01.9*
- pavillon de l'oreille *H61.0*
- peau *L08.9*
- pelvienne (bassin), femme *N73.9*
- - due à
- - - Chlamydia *A56.1+, N74.4**

Inflammation –*suite*

- pelvienne (bassin), femme –*suite*
- - due à –*suite*
- - - gonocoques *A54.2+, N74.3**
- pénis *N48.2*
- périanale *K62.8*
- péricarde *I31.9*
- péricarde, en cas de tuberculose *A18.8+, I32.0**
- périnée
- - chez la femme *L08.9*
- - chez l'homme *L08.9*
- périoste *M86.99*
- périrectale *K62.8*
- péritoine *K65.9*
- - gonococcique *A54.8+, K67.1**
- - localisée *K65.9*
- péri-utérine *N73.2*
- péri-vésicale *N30.9*
- pharynx *J02.9*
- - aiguë *J02.9*
- - atrophique *J31.2*
- - chronique *J31.2*
- - diphtérique *A36.0*
- - folliculaire *J31.2*
- - granulaire *J31.2*
- - Streptocoque *J02.0*
- plèvre *R09.1*
- - aiguë *R09.1*
- - purulente *J86.9*
- pli salpingo-pharyngien *J02.9*
- post-opératoire *T81.4*
- poumon - *voir aussi* Pneumonie *J18.9*
- - aiguë *J18.9*
- - hémorragique *J18.9*
- - interstitielle *J84.9*
- - purulente *J18.9*
- prépuce *N48.1*
- prostate *N41.9*
- - aiguë *N41.0*
- - chronique *N41.1*
- - tuberculeuse *A18.1+, N51.0**
- pulpe dentaire *K04.0*
- pylore *K29.9*
- racine de la dent *K04.0*
- racine, nerf optique *H46*
- rate, syphilitique *A52.7+, D77**
- rectale *K62.8*
- rein *N05.9*
- - aiguë *N00.9*
- - chronique *N03.9*
- - goutteuse *M10.99+, N29.8**
- rétine *H30.9*
- rétropéritonéale *K65.9*
- rhinopharynx *J00*
- - aiguë *J00*
- - chronique *J31.1*
- rocher *H70.2*
- - aiguë *H70.2*
- - chronique *H70.2*
- sac lacrymal *H04.3*
- sclérotique *H15.0*
- scrotum *N49.2*
- sein *N61*
- - en-dehors de la période néonatale *N61*
- - infectieuse chez le nouveau-né *P39.0*
- - liée à la gestation *O91.20*

Inflammation –*suite*

- sein –*suite*
- - post-partum *O91.20*
- - puerpérale *O91.20*
- shunt *T82.7*
- sinus *J32.9*
- - aiguë, avec inflammation aiguë du sinus frontal *J01.8*
- - chronique *J32.9*
- - éthmoïdal *J32.2*
- - - aiguë *J01.2*
- - - chronique *J32.2*
- - frontal *J32.1*
- - - aiguë *J01.1*
- - - - avec inflammation, sinus, aiguë *J01.8*
- - - chronique *J32.1*
- - maxillaire *J32.0*
- - - aiguë *J01.0*
- - - chronique *J32.0*
- - paranasal *J32.9*
- - - aiguë *J01.9*
- - - chronique *J32.9*
- - - tous (pansinusite) *J32.4*
- - - - aiguë *J01.4*
- - - - chronique *J32.4*
- - pilonidal, abcédante *L05.0*
- - sphénoïdal *J32.3*
- - - aiguë *J01.3*
- - - chronique *J32.3*
- - veineux intracrânien, purulente *G08*
- site (lit) opératoire *T81.4*
- syphilitique secondaire, organes pelviens, femme *A51.4+, N74.2**
- syphilitique tardive, organes pelviens, femme *A52.7+, N74.2**
- syphilitique, valvule tricuspide *A52.0+, I39.2**
- tarse palpébral (tarsite) *H01.8*
- tendon d'Achille *M76.6*
- tendon, gonococcique *A54.4+, M68.09**
- testicule *N45.9*
- - et épididyme *N45.9*
- - purulente *N45.0*
- thymus *E32.8*
- thyroïde *E06.9*
- tissu *L03.9*
- - aréolaire NCA *L08.9*
- - cellulaire *L03.9*
- - - due à
- - - - Clostridium *A48.0*
- - - - germes anaérobes *A48.0*
- - - - gonocoques NCA *A54.8*
- - - érysipélateux *A46*
- - - érysipèle *A46*
- - - gonococcique NCA *A54.8*
- - - gonorrhéique, NCA *A54.8*
- - - jambe *L03.11*
- - - membre inférieur *L03.11*
- - - orbite *H05.0*
- - - tuberculeuse primaire *A18.4*
- - - tuberculeux, primaire *A18.4*
- - - via
- - - - clostridium *A48.0*
- - - - germes anaérobies *A48.0*
- - - - gonocoques NCA *A54.8*
- - cellulaire sous-cutané NCA *L03.9*
- - - avec lymphangite *L03.9*

Inflammation –*suite*
- tissu –*suite*
- - cellulaire sous-cutané NCA –*suite*
- - - diffuse *L03.9*
- - - tuberculeuse primaire *A18.4*
- - conjonctif
- - - bassin *N73.2*
- - - - aiguë *N73.0*
- - - - chez la femme aiguë, *N73.0*
- - - - - *N73.2*
- - - - chronique *N73.1*
- - - chronique, bassin, femme *N73.1*
- - - diffuse NCA *M79.89*
- tonsilla (amygdale) *J03.9*
- tonsilla (amygdale) pharyngée *J03.9*
- trachée *J04.1*
- tractus uvéal *H20.9*
- trompe
- - auditive *H68.0*
- - eustache, catarrhale *H68.0*
- - utérine *N70.9*
- - - aiguë, avec abcès *N70.0*
- tuberculeuse NCA *A16.9*
- tuberculeuse, organes pelviens, femme *A18.1+, N74.1**
- tubo-ovarienne *N70.9*
- - aiguë *N70.0*
- - chronique *N70.1*
- tunique
- - conjonctive *H10.9*
- - vaginale du testicule *N49.1*
- tympan *H73.9*
- - aiguë *H73.0*
- - chronique *H73.1*
- uretère *N28.8*
- urètre *N34.2*
- utérus *N71.9*
- - aiguë *N71.0*
- - chronique *N71.1*
- vagin *N76.0*
- vaisseau lymphatique *I89.1*
- vaisseau, lié à dispositif, implant ou greffe intra-vasculaire ou intra-cardiaque NCA *T82.7*
- valvule
- - aortique *I35.8*
- - - chronique rhumatismale *I06.9*
- - - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- - cardiaque *I38*
- - - aiguë *I33.9*
- - - - rhumatismale *I01.1*
- - - chronique rhumatismale *I09.1*
- - - syphilitique *A52.0+, I39.8**
- - mitrale *I05.9*
- - - et valvule aortique *I08.0*
- - - - chronique rhumatismale *I08.0*
- - - rhumatismale chronique *I05.9*
- - - syphilitique *A52.0+, I39.0**
- - pulmonaire, syphilitique *A52.0+, I39.3**
- varice *I83.1*
- - avec ulcère *I83.2*
- varice avec ulcère *I83.2*
- veine *I80.9*
- - membre (extrémité) inférieur *I80.3*
- - profonde *I80.9*
- - superficielle *I80.9*
- - thrombotique *I80.9*
- - - profonde, membre inférieur *I80.2*

Inflammation –*suite*
- veine –*suite*
- - thrombotique –*suite*
- - - superficielle, membre inférieur *I80.0*
- vésicule biliaire *K81.9*
- - chronique *K81.1*
- - purulente *K81.0*
- vésicule séminale *N49.0*
- vessie *N30.9*
- - aiguë *N30.0*
- - chronique *N30.2*
- - - interstitielle *N30.1*
- - gonococcique (gonorrhéique) *A54.0*
- - granulomateuse *N30.8*
- - hémorragique *N30.9*
- - interstitielle *N30.1*
- - intramurale *N30.8*
- - kystique *N30.8*
- - tuberculeuse *A18.1+, N33.0**
- voie biliaire *K83.0*
- voies (organes) respiratoires supérieurs *J06.9*
- - aiguë, due à une irradiation *J70.0*
- voies respiratoires *J98.8*
- - supérieures, due à
- - - fumées *J68.2*
- - - vapeurs *J68.2*
- voies spermatiques *N49.1*
- voies urinaires *N39.0*
- - bactérienne *N39.0*
- vulve *N76.2*

inflammatoire
-
- affection
- - chiasma *H47.4*
- - mâchoire *K10.29*
- - pelvienne *N73.9*
- - utérus *N71.9*
- altération (modification)
- - articulation sacro-iliaque *M46.1*
- - pyélo-caliciel (système) *N12*
- arthropathie *M13.99*
- cancer *C50.9*
- catarrhe *J00*
- décollement de rétine exsudatif *H33.2*
- dermatite, allergique *L23.9*
- diarrhée *A09*
- dues prothèse implant
- - greffe interne du système nerveux , Infection et réaction *T85.72*
- - mammaire , Infection et réaction *T85.73*
- eczéma *L30.9*
- faux-croup (croup non-diphtérique) *J05.0*
- infiltration du cul-de-sac de Douglas *N73.8*
- infiltration, corps vitré *H43.8*
- kyste, tubo-ovarien *N70.1*
- maladie
- - bassin
- - - aiguë *N73.0*
- - - après
- - - - avortement *O08.0*
- - - - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - - - grossesse molaire *O08.0*
- - - chronique *N73.1*
- - - cours de la grossesse *O23.5*
- - col utérin *N72*

inflammatoire –*suite*
- maladie –*suite*
- - vagin NCA *N76.88*
- - vulve NCA *N76.88*
- myopathie *G72.4*
- nodule, scrotum *N49.2*
- oedème, orbite *H05.1*
- polyarthrite *M06.49*
- polyarthropathie *M06.40*
- polyneuropathie démyélinisante, chronique *G61.8*
- post traumatique macula (pôle postérieur) , Cicatrice (post - *H31.0*
- processus, système nerveux central *G04.9*
- restauration immunitaire SIRI Syndrome *D89.3*
- spondylopathie *M46.99*

Influenza
- A
- - H1N1 pandémie 2009 [grippe porcine] , *U69.20!*
- - H5N1 épidémie 2009 [grippe aviaire] , *U69.21!*
- siège non précisé Infection à Haemophilus *A49.2*

Influenza - *voir* Grippe *J11.1*
- avec
- - amygdalite *J11.1*
- - bronchite *J11.1*
- - ethmoïdite *J11.1*
- - laryngite *J11.1*
- - pharyngite *J11.1*
- - pneumonie *J11.0*
- - - lobaire *J11.0*
- - - virus grippal identifié, sauf virus de la grippe aviaire *J10.0*
- - trachéo-bronchite *J11.1*
- avec rhume *J11.1*
- aviaire, avec identification du virus *J09*
- virus grippal identifié, sauf virus de la grippe aviaire *J10.1*
- virus non-identifié *J11.1*

Infractus de l'artère cérébrale moyenne *I63.5*

Infra-rouges, rayons
- dermite *L59.8*
- eczéma *L59.8*
- lésion NCA *T66*

Infra-sons, vertiges dus aux *T75.2*

Infundibulaire
- défaut du septum ventriculaire *Q21.0*
- sténose de l'artère pulmonaire *Q24.3*

Infundibulum pulmonaire, sténose *Q24.3*

Ingestion
- cigarettes *T65.2*
- comprimés *T50.9*
- corps étranger, chez l'enfant *T18.9*
- drogues, avec ulcère de l'œsophage *K22.1*
- entraînant tularémie *A21.3*
- médicaments, avec ulcère de l'œsophage *K22.1*

Ingestion, sang, maternel, avec
- hématémèse et mélaena, chez les nouveaux nés *P78.2*
- ictère
- - chez les nouveaux-nés *P58.5*
- - néonatal *P58.5*

Inguinal
- abcès *L02.2*
- adénite *I88.9*
- - aiguë *L04.1*
- - chronique *I88.1*
- - subaiguë *I88.1*
- adénopathie *R59.0*
- bubon à Haemophilus ducreyi *A57*
- contusion *S30.1*
- épidermophytose [épidermophytie] *B35.6*
- ganglions lymphatiques
- - abcès *L04.1*
- - infection *L04.1*
- - tuberculose *A18.2*
- hernie *K40.90*
- - avec
- - - gangrène *K40.40*
- - - incarcération *K40.30*
- - - occlusion *K40.30*
- - - strangulation *K40.30*
- - bilatérale *K40.20*
- - - récidivante *K40.21*
- - récidivante *K40.91*
- - - avec
- - - - gangrène *K40.41*
- - - - incarcération *K40.31*
- - - - occlusion *K40.31*
- - - - strangulation *K40.31*
- - unilatérale *K40.90*
- - - récidivante *K40.91*
- lymphadénite aiguë *L04.1*
- lymphangiome *D18.12*
- métastase lymphatique rétro-péritonéale *C77.8*
- mycose *B35.6*
- plaie ouverte *S31.1*
- testicules *Q53.9*

Inhalation
- aliment *T17.9*
- allergie *J30.3*
- avec
- - bronchopneumonie *J69.0*
- - brûlures NCA *T27.3*
- charbon *A22.1*
- colle neuropathie *G62.2*
- contenu gastrique *T17.9*
- corps étranger *T17.9*
- dépendance *F18.2*
- essence, avec
- - bronchopneumonie *J69.1*
- - pneumopathie *J69.1*
- flamme *T27.3*
- fumée NCA *T59.9*
- gaz anesthésiques
- - allergie *T88.7*
- - hypersensibilité *T88.7*
- - intoxication *T41.0*
- gaz NCA *T59.9*
- huile, avec
- - bronchopneumonie *J69.1*
- - étouffement *T17.9*
- liquide *T17.9*
- méconium *P24.0*
- monoxyde de carbone *T58*
- mucosités *T17.9*
- mucus *T17.9*
- produit alimentaire *T17.9*
- substance

Inhalation *–suite*
- substance *–suite*
- - abus *F18.1*
- - démence *F18.7*
- substance chimique, entraînant
- - Bronchiolite oblitérante *J68.4*
- - - chronique *J68.4*
- - - subaiguë *J68.4*
- - Emphysème *J68.4*
- - - chronique *J68.4*
- - - diffus *J68.4*
- - Fibrose pulmonaire *J68.4*
- - - chronique *J68.4*
- vomissements *T17.9*
- - avec
- - - pneumonie *J69.0*

Inhaler
- cocaine *F14.2*
- essence, avec dépendance *F18.2*
- solvants volatiles *F18.1*

Inhibiteur
- lactation ictère néonatal *P59.3*
- lupus erythémateux, systémique *D68.8*

Inhibiteur, hémophilie à *D68.8*

Inhibition
- croissance *R62.8*
- - fœtale *P05.9*
- développement
- - due à la malnutrition *E45*
- - fœtal *P05.9*
- - l'enfant *R62.8*
- lactation *O92.50*
- - avec difficultés à la mise au sein *O92.51*
- libido *F52.0*
- motrice *R29.8*
- orgasme
- - féminin *F52.3*
- - masculin *F52.3*

Iniencéphalie *Q00.2*

Initial
- carie *K02.0*
- coxarthrose *M16.9*
- macrohématurie *N02.9*

Injection
- complication *T80.9*
- fluides *T70.4*
- - industrielle *T70.4*
- - via
- - - air *T70.4*
- - - eau *T70.4*
- - - solutions colorées *T70.4*
- sperme, intracytoplasmique *Z31.2*
- traumatique sous haute pression, accident industriel *T70.4*

inlet ventricle Ventricule double issue [Double *Q20.4*

Innervation, utérus
- parasympathique, anomalie *N85.8*
- sympatique, anomalie *N85.8*

Inoculation, avec complication *T80.9*

Inosite, carence *E53.8*

Inquiétude exagérée et lors d'évènemen *R46.6*

Inquiétude, non justifiée, état de santé *Z71*

Insecte venimeux
- intoxication NCA *T63.4*
- morsure *T63.4*
- piqûre NCA *T63.4*

Insecticide
- allergie *L23.5*
- dermite de contact *L25.3*
- - allergique *L23.5*
- - toxique *L24.5*
- halogéné, effet toxique *T60.1*

Insécurité *R26.8*

Insémination
- artificielle *Z31.1*
- - avec
- - - hyperstimulation des ovaires *N98.1*
- - - infection *N98.0*
- - par
- - - sperme donneur anonyme, avec complication *N98.8*
- - - sperme partenaire, avec complication *N98.8*
- hétérologue *Z31.1*
- homologue *Z31.1*
- in vitro *Z31.2*
- intratérine *Z31.1*
- synchrone, hystéroscopique *Z31.1*

Insensibilité aux androgènes *E34.59*
- complète [CAIS : syndrome d'insensibilié totale aux androgènes] *E34.51*
- partielle [PAIS : syndrome d'insensibilié partielle aux androgènes] *E34.50*

Insertion
- centrale *O43.1*
- latérale *O43.1*
- marginale *O43.1*
- non équilibrée *Q92.8*
- réciproque, équilibrée *Q95.8*
- Robertson, de *Q95.8*
- vélamenteuse *O43.1*
- - avec perte de sang foetal *P50.0*
- - cordon ombilical, compliquant l'accouchement *O69.8*

Insertion, placenta
- anormale *O44.00*
- basse *O44.00*
- - avec hémorragie *O44.10*
- - sans hémorragie *O44.00*

Insolation *T67.0*

Insomnie *G47.0*
- aiguë [troubles d'adaptation au sommeil] *F51.0*
- comportementale, pendant l'enfance *F98.8*
- fatale familiale *A81.8*
- idiopathique *F51.0*
- ménopausique *N95.1*
- non organique *F51.0*
- organique *G47.0*
- paradoxale *F51.0*
- pendant l'enfance *F98.8*
- psychogène *F51.0*
- - *G47.0*
- psychophysiologique *F51.0*
- type de trouble du sommeil *G47.0*

Inspiratoire, phonation *R47.8*

Instabilité
- après lésion ligamentaire ancienne *M24.29*

Instabilité –*suite*

- articulaire
- - après explantation de prothèse articulaire *M96.88*
- - post-traumatique *M25.39*
- articulation de la hanche *Q65.6*
- articulation sacro-iliaque *M25.35*
- charnière lombosacrée, congénitale *Q76.4*
- cheville, chronique *M25.37*
- détrusor
- - avec dysfontionnement vésical, en cas de neuropathie autonome *N31.1*
- - d'origine cérébrale *N31.0*
- émotionnelle excessive *F60.30*
- épaule *M25.31*
- genou, chronique *M23.59*
- hanche, acquise *M24.85*
- lombaire *M53.26*
- lombosacrée *M53.27*
- nerveuse *F60.8*
- oculomotrice *H55*
- rachis *M53.29*
- - lombaire *M53.26*
- thorax *S22.5*
- vasomotrice *R55*
- vésicale ou vessie paresseuse *N31.81*
- vessie *N31.9*

Instable
- angor *I20.0*
- hanche, congénitale *Q65.6*
- hémoglobine, avec anémie hémolytique *D58.2*
- hémoglobinopathie hémolytique *D58.2*
- hypertension *I10.90*
- personnalité, troubles émotionnels, type impulsif *F60.30*
- pression intracrânienne *R29.8*
- thorax *S22.5*
- - après intervention chirurgicale thoracique *M96.81*
- - cas de fracture
- - - côte *S22.5*
- - - sternum *S22.5*
- vessie, sans substrat neurologique *N31.82*

Instinctif
- émission d'urine *R32*
- mouvement, anormal *R25.8*
- spasme, tic *F95.9*

Institution, en
- éducation *Z62*
- séjour *Z62*

Instrument, perforation de l'utérus grav *O71.1*

Instrumental(e)
- accouchement, avec lésion du foetus/nouveau-né NCA *P03.8*
- déclenchement, accouchement, échec *O61.1*
- non chirurgicale, lésion traumatique *T14.9*

Insuffisance *I50.01*
- accomodation *H52.5*
- - due à l'âge *H52.4*
- anale *K62.8*
- anastomose, dans appareil digestif *K91.88*

Insuffisance –*suite*
- anastomoses suture après opération de la trachée, des bronche et des poumon , *J95.82*
- - de la vésicule et des voie biliaire , *K91.81*
- - du pancréas , *K91.82*
- - de : l ' anus , *K91.83*
- - d ' Autre organe du système digestif , *K91.83*
- antéhypophysaire, aiguë, post-partum *E23.0*
- arrière, avant, en cas d'insuffisance cardiaque *I50.9*
- artère
- - basilaire *G45.09*
- - carotide *G45.19*
- - mésentérique *K55.1*
- - vertébrale *G45.09*
- artérielle *I77.1*
- - précérébrale *G45.29*
- artérioveineuse *I99*
- associée à
- - cardiopathie sénile *I50.9*
- - obstruction
- - - valvule mitrale *I05.2*
- - - valvule tricuspide *I07.2*
- - sténose
- - - valvule aortique, rhumatoïde *I06.2*
- - - valvule mitrale *I05.2*
- - - valvule tricuspide *I07.2*
- - - - avec atteinte de la valvule aortique *I08.2*
- auto-immune, pluriglandulaire *E31.0*
- autonome, idiopatique *G90.08*
- avec sténose
- - valvule aortique *I35.2*
- - valvule pulmonaire *I37.2*
- - valvule tricuspide, non rhumatoïde *I36.2*
- basilaire *G45.09*
- cardia *K22.8*
- cardiaque *I50.01*
- - aiguë *I50.9*
- - artérioscléreuse *I50.9*
- - associée à
- - - cardiopathie
- - - - et néphropathie hypertensives *I13.00*
- - - - hypertensive *I11.00*
- - - effort *I50.9*
- - - fièvre, rhumatoïde, inactive *I09.8*
- - - hypertension *I11.00*
- - - - rénale *I13.00*
- - - intervention chirurgicale *T81.8*
- - avec
- - - cardiopathie
- - - - et néphropathie hypertensives, avec crise hypertensive *I13.01*
- - - - hypertensive, avec crise hypertensive *I11.01*
- - - congestion pulmonaire *I50.19*
- - - insuffisance antérograde et rétrograde *I50.9*
- - - oedème *I50.01*
- - - - pulmonaire aigu *I50.14*
- - biventriculaire *I50.01*
- - cardiopulmonaire *I27.9*
- - chronique *I50.9*
- - compensée *I50.9*

Insuffisance –*suite*
- cardiaque –*suite*
- - compliquant l'accouchement *O75.4*
- - congénitale *Q24.8*
- - congestive *I50.01*
- - coronarienne *I24.8*
- - décompensée *I50.9*
- - dégénérative *I51.5*
- - diastolique *I50.19*
- - due à prothèse cardiaque *I97.1*
- - et rénale, associée à
- - - cardiopathie et néphropathie hypertensives *I13.20*
- - - hypertension
- - - - cardiorénale *I13.20*
- - - - cardiovasculaire *I13.20*
- - - - rénale *I13.20*
- - gauche *I50.19*
- - - active, avec fièvre, rhumatismale *I01.8*
- - - avec
- - - - défaillance cardiaque droite *I50.01*
- - - - douleurs en cas de
- - - - - effort plus important, *I50.12*
- - - - - effort plus léger, *I50.13*
- - - cas de fièvre, rhumatismale, inactive *I09.8*
- - - décompensée *I50.19*
- - - hypertensive *I11.00*
- - - rhumatismale *I09.8*
- - - - active *I01.8*
- - - - - avec chorée, *I02.0*
- - - - aiguë *I01.8*
- - - - - avec chorée, *I02.0*
- - - sans douleurs *I50.11*
- - - stade NYHA
- - - - I *I50.11*
- - - - II *I50.12*
- - - - III *I50.13*
- - - - IV *I50.14*
- - globale *I50.01*
- - hypertensive
- - - avec
- - - - insuffisance rénale *I13.20*
- - - - néphropathie *I13.00*
- - - congestive *I11.00*
- - hypertensive, avec pathologie, rénale *I13.00*
- - ischémique *I25.9*
- - musculaire *I50.9*
- - myocardique *I50.9*
- - nouveau-né *P29.0*
- - postopératoire *I97.8*
- - rhumatoïde *I09.9*
- - - active *I01.2*
- - - aiguë *I01.2*
- - - subaiguë *I01.2*
- - sénile *I50.9*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- - thyréotoxique *E05.9+, I43.8**
- cardiocirculatoire *I50.9*
- cardiopulmonaire *R09.2*
- cardiorénale, hypertensive *I13.20*
- cardiorespiratoire *R09.2*
- cardiovasculaire *I50.9*
- - rénale *I13.20*
- cellules de Leydig *E29.1*
- cellules insulaires, pancréas *E16.9*
- cérébrale *I67.88*

Insuffisance –*suite*

- cérébrovasculaire *I67.88*
- - 1er stade *I67.88*
- - aiguë *I67.88*
- cérébro-vasculaire *I67.88*
- cervico-utérine, pendant la grossesse *O34.39*
- circulatoire NCA *I99*
- - aiguë *R57.9*
- - foetus/nouveau-né *P29.8*
- circulatoire veineuse *I87.2*
- col utérin *N88.3*
- - avec
- - - atteinte du foetus/nouveau-né *P01.0*
- - - cerclage, pendant la grossesse *O34.39*
- - dehors de la grossesse *N88.3*
- - présence d'un cerclage de Shirodkar, avec suivi de la mère *O34.39*
- - suivi de la mère *O34.39*
- - suspicion, avec suivi, en dehors de la grossesse *N88.3*
- col vésical *R32*
- congestive *I50.01*
- - cardiaque, hypertensive, avec néphropathie *I13.00*
- - décompensée *I50.01*
- convergence *H51.1*
- coronarienne *I24.8*
- - aiguë *I24.8*
- - chronique *I25.8*
- corps jaune *E28.8*
- corticosurrénalienne *E27.4*
- - aiguë *E27.2*
- - iatrogène *E27.3*
- - médicamenteuse *E27.3*
- - primitive *E27.1*
- croissance *E34.3*
- - chondrodystrophique *Q77.4*
- - congénitale *E34.3*
- - constitutionnelle *E34.3*
- - disproportion, avec déficit immunitaire *D82.2*
- - due à la malnutrition *E45*
- - hypochondroplastique *Q77.4*
- - hypophysaire *E23.0*
- - Laron, type *E34.3*
- - Levi *E23.0*
- - Lorain Levi, de *E23.0*
- - psychosocial *E34.3*
- - rénale *N25.0*
- - thanatophore *Q77.1*
- décompensée *I50.01*
- détrusor *R32*
- diététique *E63.9*
- digestive *K30*
- divergence *H51.8*
- fascia orbitaire, congénitale *Q10.3*
- fermeture paroi opératoire *T81.3*
- film lacrymal *H04.1*
- foetoplacentaire, avec suivi de la mère *O36.5*
- glande lacrymale *H04.1*
- glandulaire *E31.9*
- glomérulotubulaire globale *N19*
- hépatique *K72.9*
- hiatale *K44.9*
- hormonale *E34.9*
- hypophysaire *E23.0*

Insuffisance –*suite*

- immunitaire *D84.9*
- intestin *K63.9*
- - vasculaire *K55.9*
- ischémique cérébrale *I67.88*
- ligament croisé antérieur *M23.81*
- ligamentaire, genou *M23.83*
- lombosacrée *M53.27*
- lymphatique *I89.8*
- mentale congénitale *F79.9*
- mitrale *I34.0*
- - avec sténose *I05.2*
- moelle osseuse *D61.9*
- muscles abdominaux *M62.98*
- muscles du pied *M62.97*
- muscles oculomoteurs NCA *H50.9*
- musculaire *M62.99*
- musculature dorsale *M62.98*
- myocarde *I50.01*
- myocardique *I50.9*
- - biventriculaire *I50.01*
- - chronique *I50.9*
- - décompensée *I50.9*
- - nouveau-né *P29.0*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- organique *R68.8*
- ortique
- - congénitale *Q23.1*
- - rhumatoïde *I06.1*
- - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- ostium urétéral, congénitale *Q62.8*
- ovarienne *E28.3*
- - après actes médicaux *E89.4*
- - fonctionnelle *E28.8*
- - primitive *E28.3*
- pancréatique *K86.8*
- - alcoolique *K86.0*
- - endocrine *K86.8*
- - excrétoire *K86.8*
- - exocrine *K86.8*
- - totale *K86.8*
- parathyroïdienne *E20.9*
- perforante *I87.2*
- périnée *N81.8*
- placentaire *O36.5*
- - avec atteinte du foetus/nouveau-né *P02.2*
- - avec césarienne *O36.5*
- - suivi, mère *O36.5*
- plancher pelvien, pendant la grossesse *O34.8*
- pluriglandulaire *E31.9*
- - progressive *E31.0*
- posturale
- - ceinture scapulaire *R29.3*
- - rachis *M43.99*
- posturale statique et dynamique *R29.3*
- pulmonaire *J98.4*
- - aiguë, après
- - - opération chirurgicale (non thoracique) *J95.2*
- - - opération chirurgicale thoracique *J95.1*
- - après
- - - choc *J80*
- - - traumatisme *J80*
- - chronique, consécutive à une opération *J95.3*
- - nouveau-né *P28.5*

Insuffisance –*suite*

- pulmonaire –*suite*

- - postopératoire *J95.3*
- - post-traumatique *J98.4*
- pulmonaire consécutive à choc *J80*
- pylorique *K31.88*
- rénale *N19*
- - aiguë *N17.8, N17.9*
- - - avec nécrose
- - - - corticale *N17.1*
- - - - médullaire *N17.2*
- - après
- - - avortement *O08.4*
- - - grossesse môlaire *O08.4*
- - - mesures médicales *N99.0*
- - - traumatisme par écrasement *T79.5*
- - - travail et accouchement *O90.4*
- - après actes médicaux *N99.0*
- - artérioscléreuse *I12.00*
- - associée à
- - - artériosclérose rénale *I12.00*
- - - atteinte
- - - - cardiaque et rénale hypertensive *I13.10*
- - - - rénale hypertensive *I12.00*
- - - hypertension *I12.00*
- - - - avec atrophie rénale *I12.00*
- - - - cardiorénale *I13.10*
- - - - cardiovasculaire, rénale *I13.10*
- - - insuffisance cardiaque, hypertensive *I13.20*
- - - néphroangiosclérose *I12.00*
- - - néphropathie artérioscléreuse *I12.00*
- - - - chronique *I12.00*
- - - - interstitielle *I12.00*
- - - néphrosclérose *I12.00*
- - avec
- - - atteinte
- - - - cardiaque et rénale, hypertensive, avec crise hypertensive *I13.11*
- - - - rénale, hypertensive, avec crise hypertensive *I12.01*
- - - dialyse *Z49.1*
- - - dialyse au long cours *Z99.2*
- - - nécrose tubulaire *N17.0*
- - chronique *N18.9*
- - - stade 1 *N18.1*
- - - stade 2 *N18.2*
- - - stade 3 *N18.3*
- - - stade 4 *N18.4*
- - - stade 5 *N18.5*
- - congénitale *P96.0*
- - globale *N19*
- - hypertensive *I12.00*
- - nécessitant une dialyse *N19*
- - prérénale *N19*
- - secondaire *N19*
- - stade non précisé, rétention *N18.89*
- - - décompensée *N18.89*
- rénale consécutive à un choc *N19*
- - suite à
- - - avortement *O08.4*
- - - grossesse extra-utérine *O08.4*
- - - grossesse molaire *O08.4*
- respiration *R06.88*
- - nouveau-né NCA *P28.5*
- respiratoire *J96.9*
- - aiguë *J96.0*
- - - consécutive à

Insuffisance –*suite*
- respiratoire –*suite*
- - aiguë –*suite*
- - - consécutive à –*suite*
- - - - opération chirurgicale (non thoracique) *J95.2*
- - - - opération chirurgicale thoracique *J95.1*
- - chronique *J96.1*
- - - consécutive à une opération *J95.3*
- - globale *J96.9*
- - nouveau-né *P28.5*
- - partielle *J96.9*
- - post-narcotique *J96.9*
- respiratoire - *voir aussi* Respiratoire, insuffisance *J96.9*
- - aiguë *J96.0*
- - chronique *J96.1*
- - post-anesthésie *J96.9*
- respiratoire après consommation de narcotiques *J96.9*
- saturale *E34.3*
- - congénitale *E34.3*
- - constitutionnelle *E34.3*
- - due à la malnutrition *E45*
- - hypochondroplastique *Q77.4*
- - hypophysaire *E23.0*
- - Lorain *E23.0*
- - psychosocial *E34.3*
- - rénale *N25.0*
- sécrétion lacrymale *H04.1*
- selon type de la maladie
- spermatogenèse *E29.1*
- sphincter anal *K62.8*
- sphincter urétéral *R32*
- sphincter vésical *R32*
- statique, pied *R29.8*
- surrénalienne *E27.4*
- - primitive *E27.1*
- testiculaire *E29.1*
- thyréo-adrénocorticale, syndrome *E31.0*
- thyroïdienne *E03.9*
- - acquise *E03.9*
- - congénitale *E03.1*
- trompe d'Eustache *H69.8*
- valvule
- - aortique *I35.1*
- - - avec atteinte
- - - - valvule mitrale *I08.0*
- - - - - et valvule tricuspide, *I08.3*
- - - - valvule tricuspide *I08.2*
- - - congénitale *Q23.1*
- - - non rhumatoïde *I35.1*
- - - rhumatoïde *I06.1*
- - - - avec atteinte
- - - - - valvule mitrale, *I08.0*
- - - - - valvule tricuspide, *I08.2*
- - - - - valvule mitrale, et valvule tricuspide, *I08.3*
- - cardiaque *I38*
- - - congénitale *Q24.8*
- - - non rhumatoïde *I38*
- - - rhumatoïde *I09.1*
- - - - chronique *I09.1*
- - mitrale *I34.0*
- - - avec
- - - - atteinte
- - - - - valvule aortique, *I08.0*
- - - - - valvule tricuspide, *I08.1*

Insuffisance –*suite*
- valvule –*suite*
- - mitrale –*suite*
- - - avec –*suite*
- - - - atteinte –*suite*
- - - - - valvule aortique, et valvule tricuspide, *I08.3*
- - - - sténose, valvule mitrale, non rhumatoïde *I34.80*
- - - congénitale *Q23.3*
- - - dégénérative *I34.0*
- - - et valvule aortique *I08.0*
- - - - chronique, rhumatoïde *I08.0*
- - - non rhumatoïde *I34.0*
- - - rhumatoïde *I05.1*
- - - - active, avec chorée *I02.0*
- - - - aiguë, avec chorée *I02.0*
- - - - avec
- - - - - atteinte,
- - - - - obstruction, *I05.2*
- - - - - sténose, *I05.2*
- - - - - atteinte, valvule aortique, *I08.0*
- - - - - atteinte, valvule tricuspide, *I08.1*
- - pulmonaire *I37.1*
- - - avec sténose *I37.2*
- - - congénitale *Q22.2*
- - - - avec régurgitation *Q22.2*
- - - non rhumatoïde *I37.1*
- - - rhumatoïde *I09.8*
- - - syphilitique *A52.0+, I39.3**
- - tricuspide *I07.1*
- - - avec atteinte
- - - - valvule aortique *I08.2*
- - - - valvule mitrale *I08.1*
- - - - - et valvule aortique, *I08.3*
- - - congénitale *Q22.8*
- - - non rhumatoïde *I36.1*
- - - rhumatoïde *I07.1*
- vasculaire *I99*
- - mésentérique *K55.1*
- - périphérique *I73.9*
- - rénale *I12.90*
- vasculaire cérébrale *I67.88*
- vasculaire mésentérique *K55.1*
- vasculaire périphérique *I73.9*
- veines perforantes *I87.2*
- veineuse *I87.2*
- - cérébrale *I67.88*
- - chronique *I87.2*
- - - périphérique *I87.2*
- - chronique périphérique *I87.2*
- - chronique, membre inférieur *I87.2*
- - chronique, pendant la grossesse *O22.9*
- ventilation *R06.88*
- ventriculaire *I50.9*
- ventriculaire droite *I50.01*
- - décompensée *I50.01*
- - primitive *I50.00*
- - secondaire, après insuffisance ventriculaire gauche *I50.01*
- ventriculaire gauche *I50.19*
- - active, avec fièvre, rhumatoïde *I01.8*
- - associée à fièvre, rhumatoïde, inactive *I09.8*
- - avec
- - - insuffisance ventriculaire droite *I50.01*
- - - symptômes, en cas de

Insuffisance –*suite*
- ventriculaire gauche –*suite*
- - avec –*suite*
- - - symptômes, en cas de –*suite*
- - - - effort important *I50.12*
- - - - effort léger *I50.13*
- - décompensée *I50.19*
- - hypertensive *I11.00*
- - rhumatoïde *I09.8*
- - - active *I01.8*
- - - - avec chorée *I02.0*
- - - aiguë *I01.8*
- - - - avec chorée *I02.0*
- - sans symptômes *I50.11*
- - stade NYHA
- - - I *I50.11*
- - - II *I50.12*
- - - III *I50.13*
- - - IV *I50.14*
- vertébrobasilaire *G45.09*
- vésicule biliaire *K82.8*
- vessie *R32*
- voies lacrymales *H04.5*
- voies respiratoires *J98.8*

Insuffisant
- approvisionnement en eau potable *Z58*
- attention des parents envers l'enfant *Z62*
- communication dans la famille *Z63*
- contracture, utérus
- - primitive *O62.0*
- - secondaire *O62.1*
- couverture sociale *Z59*
- croissance, foetus NCA *P05.9*
- développement
- - foetus *P05.9*
- - pulmonaire *Q33.6*
- - - cas de naissance prématurée *P28.0*
- développement des organes génitaux
- - féminins, congénital *Q52.8*
- - masculins, congénital *Q55.8*
- environnement NCA *Z59*
- environnement professionnel NCA *Z56*
- fonction, poumons *R06.88*
- - chez les nouveaux-nés *P28.5*
- personnalité *F60.8*
- revenus *Z59*
- trouble, personnalité *F60.7*
- ventilation, poumons, chez les nouveaux-nés *P28.5*

Insufflation des trompes de Fallope *Z31.4*

Insufflation tubaire *Z31.4*

Insulaire, sclérose cérébrale *G35.9*

Insulaires, cellules
- adénocarcinome *C25.4*
- adénome *D13.7*
- cancer *C25.4*
- hyperplasie *E16.9*
- insuffisance, pancréas *E16.9*
- tumeur *D37.70*
- - bénigne *D13.7*
- - maligne, pancréas *C25.4*
- - pancréas *D13.7*

Insuline
- accident d'administration *T38.3*
- effets secondaires *T88.7*
- hypoglycémie

Insuline –*suite*
- hypoglycémie –*suite*
- - avec coma *E15*
- - par accident thérapeutique *T38.3*
- hypoglycémie provoquée par *E16.0*
- - dans
- - - diabète sucré *E14.60*
- - - diabète sucré de type 1 *E10.60*
- - - diabète sucré de type 2 *E11.60*
- réaction hypoglycémique, avec coma non diabétique *E15*

Insulino-dépendant
- diabète sucré de type 1 *E10.90*
- - avec
- - - acidocétose *E10.11*
- - - coma *E10.01*
- - - complications
- - - - multiples *E10.70*
- - - - neurologiques *E10.40+, G63.2**
- - - - ophtalmiques *E10.30+, H58.8**
- - - - rénales *E10.20+, N08.3**
- - - - vasculaires périphériques *E10.50+, I79.2**
- diabète sucré de type 2 *E11.90*
- - avec
- - - acidocétose *E11.11*
- - - coma *E11.01*
- - - complications
- - - - multiples *E11.70*
- - - - ophtalmiques *E11.30+, H58.8**
- - - - rénales *E11.20+, N08.3**
- - - - vasculaires périphériques *E11.50*

Insulinome *D13.7*
- bénin *D13.7*
- malin *C25.4*
- pancréas *D13.7*
- pancréatique *D13.7*

Intellectuel(le)(s)
- baisse des performances dans la sénilité *F03*
- fonctions limitées *R41.8*

Intelligence
- baisse *F79.9*
- - avec
- - - traits autistiques *F84.1*
- - - trouble(s) du comportement *F79.8*
- - et stéréotypies motrices, entraînant
- - - hyperkinésie *F84.4*
- - - trouble hyperactif *F84.4*
- - grave *F72.9*
- - - avec trouble(s) du comportement *F72.8*
- - - - nécessitant manifestement un traitement *F72.1*
- - gravissime *F73.9*
- - - avec trouble(s) du comportement *F73.8*
- - - - nécessitant manifestement un traitement *F73.1*
- - légère *F70.9*
- - - avec trouble(s) du comportement *F70.8*
- - moyenne *F71.9*
- - - avec trouble(s) du comportement *F71.8*
- - sans trouble du comportement *F79.0*
- dissociée *F74.9*
- manque *F79.9*
- test NCA *Z01.88*

Intelligence –*suite*
- test, chez l'enfant *Z00.1*

Intence, extrême
- affectivité, dans la famille *Z63*
- dysplasie
- - col de l'utérus *N87.2*
- - entraînant des néoplasies
- - - intra-épithéliales de la vulve de stade III *D07.1*
- - - intraépithéliales du col de l'utérus de stade III *D06.9*
- - - intra-épithéliales du vagin de stade III *D07.2*
- - vagin *N89.2*
- - vulve *N90.2*
- retard mental *F73.9*

Intercapillaire
- glomérulonéphrite *N05.8*
- glomérulosclérose *E14.20+, N08.3**

Intercostal(e)
- blocage *M99.88*
- myalgie *M79.18*
- neuropathie *G58.0*
- - non induite par une tumeur *G58.0*
- névralgie *G58.0*

Interdigital(e)
- mycose *B35.9*
- - main *B35.2*
- - pied *B35.3*
- névrome *G58.8*
- - main *G56.8*
- - pied *G57.8*
- pseudo-névrome
- - main *G56.8*
- - pied *G57.8*

Interférence névrotique phobique *F48.9*

Interlobulaire, emphysème *J43.9*

Intermédiaire, lymphome nodulaire de typ *C82.7*

Intermédiaire, syndrome coronarien *I20.0*

Intermenstruel(le)(s)
- douleurs *N94.0*
- dysménorrhée *N94.6*
- pertes de sang NCA *N92.3*
- pertes de sang régulières *N92.3*
- saignements
- - irréguliers *N92.1*
- - réguliers *N92.3*
- - utérins *N92.3*
- - - irréguliers *N92.1*

Intermétatarsien, névrome NCA *G57.8*

Intermittent(e)
- arythmie absolue *I48.19*
- bloc de branche gauche *I44.7*
- claudication *I73.9*
- - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- douleur *R52.2*
- ésotropie *H50.3*
- - alternante *H50.3*
- ésotropie résiduelle *H50.3*
- exophtalmie NCA *H05.2*
- exotropie *H50.3*
- - alternante *H50.3*
- exotropie résiduelle *H50.3*
- fibrillation auriculaire *I48.10*
- fièvre
- - dans le paludisme *B54*

Intermittent(e) –*suite*
- fièvre –*suite*
- - d'étiologie inconnue *R50.80*
- - pernicieuse *B50.9*
- gastrosuccorrhée *K31.88*
- glaucome à angle fermé *H40.2*
- - primitif *H40.2*
- - - résiduel *H40.2*
- - résiduel *H40.2*
- hématurie *N02.9*
- hémoglobulinurie *D59.6*
- hétérotropie *H50.3*
- hydarthrose *M12.49*
- hydronéphrose *N13.3*
- hydrops *M12.49*
- ischémie cérébrale *G45.99*
- myotonie *M62.89*
- porphyrie
- - aiguë *E80.2*
- - hépatique aiguë *E80.2*
- strabisme concomitant *H50.3*
- torticolis *M43.6*

Interne
- agitation *R45.0*
- corrosion *T30.4*
- coude, lésion *M24.92*
- granulome pulpaire *K03.3*
- hémorragie *R58*
- joue, blessure, ouverte *S01.52*
- lésion *T14.8*
- - multiple *T06.5*
- - thorax *S27.9*
- - tronc, multiple *T06.5*
- lésions des organes génitaux *S37.9*
- muscle oculaire, paralysie *H52.5*
- oreille
- - abcès *H83.0*
- - infection *H83.0*
- - labyrinthite *H83.0*
- - suppuration *H83.0*
- organe
- - écrasement *T14.7*
- - hémorragie NCA *R58*
- - lésion, séquelles *T91.9*
- organes génito-urinaires
- - brûlures *T28.3*
- - corrosion *T28.8*
- orgelet *H00.0*
- orifice de l'utérus, contracture *N88.2*
- parésie du nerf moteur oculaire commun (III) *H49.0*
- sécrétion, pancréas, troubles *E16.9*
- trachéocèle *J39.88*

Internucléaire
- ophtalmoplégie *H51.2*
- paralysie *H51.2*

Interphalangien(ne)
- entorse
- - doigt *S63.62*
- - orteil *S93.5*
- mycose *B35.9*
- - main *B35.2*
- - pied *B35.3*

Interphalangienne, articulation
- doigt
- - distale, arthrose *M15.1*
- - proximale, arthrose *M15.2*

Interphalangienne, articulation –*suite*
- élongation *S93.5*
- entorse, main *S63.12*
- foulure *S93.5*

Interrompu, -ue

Interruption
- Conduction *I45.9*
- faisceau de His *I44.3*
- grossesse, *voir aussi* Avortement *O06.9*
- - demande de *Z30.0*
- - illégale *O05.9*
- - légale *O04.9*
- - - avec complications *O04.8*
- - - incomplète *O04.4*
- - punissable *O05.9*
- - thérapeutique *O04.9*
- légale de grossesse *O04.9*
- - avec complications *O04.8*
- - incomplète *O04.4*
- régulation cataméniale *Z30.3*
- - complète *O04.9*
- - - avec complications *O04.8*
- - grossesse
- - - demande *Z30.0*
- - - médicale *O04.9*
- - incomplète *O04.4*
- - - avec complications *O04.3*
- - légale *O04.9*
- - par contrainte sociale *O04.9*
- trompes de Fallope *Z30.2*
- vas deferens *Z30.2*

Inter-scapulaire, région
- brûlure *T21.04*
- - degré
- - - 2a *T21.24*
- - - 2b *T21.84*
- - deuxième degré *T21.24*
- - premier degré *T21.14*
- - troisième degré *T21.34*
- brûlure caustique *T21.44*
- - degré
- - - 2a *T21.64*
- - - 2b *T21.94*
- - deuxième degré *T21.64*
- - premier degré *T21.54*
- - troisième degré *T21.74*
- contusion *S20.2*
- lésion traumatique superficielle *S20.40*
- mélanome in situ *D03.5*
- mélanome malin *C43.5*
- nævus *D22.5*
- plaie ouverte *S21.2*

Inter-scapulalgie *M54.6*

Intersection musculaire, rachis, lésion *M46.09*

Interspinale
- irritation *M54.19*
- névralgie *M54.19*

Interstitielle - *voir* Type de maladie

Intertrigineux(se)
- candidose *B37.2*
- eczéma *L30.4*
- - infectieux *L30.4*
- érythème *L30.4*
- mycose *B36.9*
- psoriasis *L40.9*

Intertrigineux(se) –*suite*
- vulvite *N76.2*

Intertrigo *L30.4*
- cutané *L30.4*

Inter-trochantérienne, fracture du fémur *S72.11*

Intervalles raccourcis et irréguliers en *N92.1*

Intervention
- avec
- - choc, septique *T81.1*
- - prostration *T81.1*
- chirurgicale
- - col utérin, antérieure, avec
- - - complication, accouchement *O34.4*
- - - Soins maternels *O34.4*
- - importante, anamnèse *Z92.4*
- - Périnée, antérieure
- - - avec complication, accouchement *O34.7*
- - - Soins maternels *O34.7*
- - utérus, antérieure, avec complication, accouchement *O34.2*
- - vagin, antérieure
- - - avec complication, accouchement *O34.6*
- - - soins maternels *O34.6*
- - vulve, antérieure
- - - avec complication, accouchement *O34.7*
- - - soins maternels *O34.7*

Inter-vertébral(e)
- arthrose *M47.89*
- chondrite tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- tuberculose cartilagineuse *A18.0+, M49.09**

Intestin
- abcédation *K63.0*
- abcès *K63.0*
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- absence, congénitale *Q41.9*
- actinomycose *A42.1*
- adénome *D13.9*
- adhérence *K66.0*
- - avec occlusion *K56.5*
- - partant du péritoine, anormale, congénitale *Q43.3*
- - post-infectieuse, avec occlusion *K56.5*
- agénésie *Q41.9*
- amœbome *A06.3*
- amyloïdose *E85.4+, K93.8**
- angiodysplasie *K55.8*
- anomalie *Q43.9*
- - avec
- - - adhérence anormale *Q43.3*
- - - malrotation *Q43.3*
- appendice, épiploïque *Q43.8*
- atonie *K59.0*
- - *K59.8*
- - psychogène *F45.32*
- atrésie *Q41.9*
- - congénitale *Q41.9*
- atrophie *K63.8*
- atteinte NCA *B82.9*
- atteinte, par
- - Fasciolopsis buski *B66.5*
- - helminthes NCA *B82.0*
- - parasites NCA *B82.9*

Intestin –*suite*
- Autre maladie de l ' *K55-K64*
- bézoard *T18.3*
- bride tissulaire
- - adhérente *K66.0*
- - obstructive *K56.5*
- bride, anormale, péritonéale, congénital *Q43.3*
- bruit
- - absence *R19.1*
- - anormal *R19.1*
- - excessif *R19.1*
- calcul *K56.4*
- carcinome rectosigmoïdien *C19*
- catarrhe *K52.9*
- - aigu *A09*
- charbon *A22.2*
- communication avec l'utérus, congénitale *Q51.7*
- compression *K56.6*
- constriction *K56.6*
- contracture *K56.6*
- corps étranger *T18.3*
- corrosion *T28.7*
- coude *K56.6*
- crampe *R10.4*
- - psychogène *F45.32*
- dégénérescence amyloïde *E85.4+, K93.8**
- diphyllobothriase *B70.0*
- diverticule *K57.90*
- - congénital *Q43.8*
- - rupture *K57.80*
- diverticulite *K57.92*
- - avec
- - - abcès *K57.82*
- - - - avec hémorragie *K57.83*
- - - hémorragie *K57.93*
- - - perforation *K57.82*
- - - - avec hémorragie *K57.83*
- - - péritonite *K57.82*
- - - - avec hémorragie *K57.83*
- diverticulose *K57.90*
- - avec
- - - abcès *K57.80*
- - - - avec hémorragie *K57.81*
- - - hémorragie *K57.91*
- - - perforation *K57.80*
- - - - avec hémorragie *K57.81*
- - - péritonite *K57.80*
- - - - avec hémorragie *K57.81*
- - sans perforation *K57.90*
- duplication *Q43.49*
- dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme *F45.32*
- dyspepsie *K30*
- endométriose *N80.5*
- érosion *K63.3*
- étranglement *K56.4*
- - par calcul bilière *K56.3*
- fibrose *K63.8*
- fistule NCA *K63.2*
- fixation, anomalie *Q43.3*
- flatulence *R14*
- fuite *K63.1*
- gangrène *K55.0*
- - avec occlusion intestinale *K56.6*
- granulome NCA *K63.8*
- grêle

Intestin –*suite*
- grêle –*suite*

- - absence, acquise *Z90.4*
- - accessoire *Q43.40*
- - adhérence *K66.0*
- - adhérences *K66.0*
- - agénésie *Q41.9*
- - amyloïdose *E85.4+, K93.8**
- - angiodysplasie *K55.8*
- - anomalie de la flore *K63.8*
- - atonie *K59.8*
- - atrésie *Q41.9*
- - blindage tumoral *R19.0*
- - bride *K66.0*
- - brûlure caustique *T28.7*
- - carcinoïde *C17.9*
- - - métastatique *C17.9*
- - corps étranger *T18.3*
- - déformation
- - - acquise *K63.8*
- - - congénitale, NCA *Q43.9*
- - diverticule de Meckel *Q43.0*
- - diverticulite *K57.12*
- - - avec
- - - - abcès *K57.02*
- - - - - avec hémorragie, *K57.03*
- - - - hémorragie *K57.13*
- - - - perforation *K57.02*
- - - - - avec hémorragie, *K57.03*
- - - - péritonite *K57.02*
- - - - - avec hémorragie, *K57.03*
- - diverticulose *K57.10*
- - - avec
- - - - abcès *K57.00*
- - - - - avec hémorragie, *K57.01*
- - - - hémorragie *K57.11*
- - - - perforation *K57.00*
- - - - - avec hémorragie, *K57.01*
- - - - péritonite *K57.00*
- - - - - avec hémorragie, *K57.01*
- - duplication *Q43.40*
- - entérite régionale *K50.0*
- - et
- - - côlon, entérite *K50.8*
- - - gros intestin
- - - - diverticulite avec,
- - - - - avec, abcès, *K57.42*
- - - - - avec, perforation, *K57.42*
- - - - - avec, péritonite, *K57.42*
- - - - - avec, abcès, et hémorragie, *K57.43*
- - - - - avec, perforation, et hémorragie, *K57.43*
- - - - - avec, péritonite, et hémorragie, *K57.43*
- - - - - *K57.52*
- - - - - avec, hémorragie, *K57.53*
- - - - diverticulose avec,
- - - - - avec, abcès, *K57.40*
- - - - - avec, perforation, *K57.40*
- - - - - avec, péritonite, *K57.40*
- - - - - avec, abcès, et hémorragie, *K57.41*
- - - - - avec, perforation, et hémorragie, *K57.41*
- - - - - avec, péritonite, et hémorragie, *K57.41*
- - - - - *K57.50*
- - - - - avec, hémorragie, *K57.51*

Intestin –*suite*
- grêle –*suite*
- - et –*suite*
- - - gros intestin –*suite*

- - - - entérite régionale *K50.8*
- - - - maladie de Crohn *K50.8*
- - - - - avec abcès, *K50.8*
- - fistule *K63.2*
- - - entéro-vaginale *N82.2*
- - gangrène *K55.0*
- - hémorragie *K92.2*
- - hétérophyiase *B66.8*
- - hypoplasie *Q41.9*
- - iléus *K56.7*
- - - congénital *Q41.9*
- - - mécanique *K56.6*
- - - paralytique *K56.0*
- - iléus sur bride *K56.5*
- - imperméable *Q41.9*
- - infarctus *K55.0*
- - inflammation *K52.9*
- - invagination *K56.1*
- - ischémie *K55.9*
- - - aiguë *K55.0*
- - kyste *K63.8*
- - lésion traumatique *S36.40*
- - lymphome *C85.9*
- - maladie de Crohn *K50.0*
- - maladie immunoprolifération *C88.30*
- - - rémission complète *C88.31*
- - métastase *C78.4*
- - nécrose *K55.0*
- - néoplasie *D37.2*
- - obstruction congénitale *Q41.9*
- - occlusion congénitale *Q41.9*
- - paralysie *K56.0*
- - perforation *K63.1*
- - phlegmon *K63.0*
- - polype *D13.3*
- - prolapsus *K63.4*
- - sténose *K56.6*
- - - congénitale *Q41.9*
- - sténose grave *K56.6*
- - - congénitale *Q41.9*
- - syphilis *A52.7+, K93.8**
- - transposition *Q43.8*
- - trichostrongylose *B81.2*
- - trouble vasculaire, artériel *K55.9*
- - tuberculose *A18.3+, K93.0**
- - Ulcère primaire *K63.3*
- - volvulus *K56.2*
- grippe *J11.8*
- helminthiase mixte *B81.4*
- hémorragie *K92.2*
- - chez le nouveau-né *P54.3*
- - dans les antécédents personnels *Z87.1*
- - occulte *K92.2*
- hernie *K46.9*
- hyperémie *K59.8*
- hypermobilité, psychogène *F45.32*
- hypertrophie NCA *K63.8*
- hypomotilité *K59.8*
- - psychogène *F45.32*
- hypoplasie *Q41.9*
- iléus *K56.7*
- image radiographique anormale *R93.3*
- infarctus *K55.0*
- - aigu *K55.0*

Intestin –*suite*

- infection *A09*
- - due à
- - - Escherichia coli *A04.4*
- - - Escherichia coli, entéro-hémorragique *A04.3*
- - - flagellés *A07.9*
- - - nématodes NCA *B82.0*
- inflammation *K52.9*
- insuffisance *K63.9*
- - vasculaire *K55.9*
- intussusception *K56.1*
- invagination *K56.1*
- irritabilité *K58.9*
- - avec diarrhée *K58.0*
- ischémie *K55.9*
- - aiguë *K55.0*
- - chronique *K55.1*
- kyste *K63.8*
- lacération, complication de l'accouchement *O71.5*
- lacération, lésion traumatique de la mère lors de l'accouchement *O71.5*
- lésion *S36.9*
- lymphome *C85.9*
- malabsorption des glucides, en postopératoire *K91.2*
- maladie *K63.9*
- - fonctionnelle *K59.9*
- - infectieuse, avec contact *Z20.0*
- - organique *K63.9*
- - provoquée par
- - - protozoaires *A07.9*
- - - ver *B82.0*
- maladie infectieuse, porteur de germe *Z22.1*
- malformation
- - acquise *K63.8*
- - congénitale NCA *Q43.9*
- malposition congénitale *Q43.8*
- - avec
- - - adhérence anormale *Q43.3*
- - - fixation anormale *Q43.3*
- - - malrotation *Q43.3*
- malrotation *Q43.3*
- manifestation lors de fibrose kystique *E84.1*
- métastase *C78.5*
- mycose *B49+, K93.8**
- nécrose *K55.0*
- - aiguë *K55.0*
- - hémorragique *K55.0*
- nécrose sur troubles vasculaires *K55.0*
- nématodes (parasitose à -) *B82.0*
- obturation *K56.4*
- occlusion *K56.6*
- - *K56.7*
- - adynamique *K56.0*
- - avec adhérence *K56.5*
- - chez le nouveau-né *P76.9*
- - congénitale *Q41.9*
- - - *Q41.9*
- - lors de
- - - adhérence
- - - - péritonéale *K56.5*
- - - - postopératoire *K91.3*
- - - gangrène
- - - - intestinale *K56.6*
- - - - mésentérique *K56.6*

Intestin –*suite*
- occlusion –*suite*
- - mécanique *K56.6*
- - - *K56.6*
- - neurogène *K56.0*
- - paralytique *K56.0*
- - paroxystique *K56.6*
- - post-infectieuse *K56.6*
- - postopératoire *K91.3*
- - - *K91.3*
- - provoquée par
- - -
- - - bride *K56.5*
- - - calcul biliaire *K56.3*
- - - - *K56.3*
- - - coprolithes, chez le nouveau-né *P76.8*
- - - lait épaissi, chez le nouveau-né *P76.2*
- - - volvulus *K56.2*
- - - - *K56.2*
- paralysie *K56.0*
- parésie *K56.0*
- perforation *K63.1*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - non traumatique *K63.1*
- - périnatale *P78.0*
- - tant que lésion obstétricale de la mère *O71.5*
- - traumatique *S36.9*
- péridiverticulite *K57.92*
- péristaltisme apparent *R19.2*
- phlegmon *K63.0*
- phytobézoard *T18.3*
- pli *K56.6*
- polype *D13.9*
- - malin *C26.0*
- polypose *D13.9*
- prolapsus *K63.4*
- ptose *K63.4*
- rupture *K63.1*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - non traumatique NCA *K63.1*
- - traumatique *S36.9*
- spasme *K58.9*
- - psychogène *F45.32*
- sténose *K56.6*
- - congénitale *Q41.9*
- strangulation *K56.2*
- - avec hernie, avec gangrène *K46.1*
- - sur hernie *K46.0*
- stricture *K56.6*
- - congénitale *Q41.9*
- - ischémique *K55.1*
- strogyloïdose (anguillulose) *B78.0*
- syphilis tardive *A52.7+, K93.8**
- thrombose, avec gangrène *K55.0*
- torsion *K56.2*
- transplant *Z94.88*
- - échec *T86.88*
- - rejet *T86.88*
- transposition *Q43.8*
- trichobézoard *T18.3*
- trichophytobézoard *T18.3*
- trouble de la circulation sanguine *K55.9*
- - artérielle *K55.9*
- trouble de la motilité *K59.9*
- trouble de l'évacuation *K59.9*
- troubles *K63.9*

Intestin –*suite*
- troubles –*suite*
- - fonctionnels *K59.9*
- - motilité *K59.9*
- - psychogènes *F45.32*
- troubles fonctionnels *K59.9*
- tuberculose *A18.3+, K93.0**
- tumeur *D37.78*
- - bénigne *D13.9*
- typhus *A01.0*
- ulcère *K63.3*
- - dans les antécédents personnels *Z87.1*
- - marginal *K28.9*
- - par amibes *A06.1*
- - perforé *K63.1*
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- - typhique *A01.0*
- - variqueux *I86.8*
- vessie, trouble neurogène NCA *K59.2*
- volvulus *K56.2*

intestinal
- Douve *B66.5*
- due bouchon méconium dans la mucoviscidose , [Au cours de fibrose kystique] : occlusion *E84.1†, P75**

Intestinale - *voir* Type de maladie

Intestino-utérine, fistule *N82.4*
- congénitale *Q51.7*

Intolérance
- ABO, réaction *T80.3*
- alimentaire *K90.4*
- - *T78.1*
- - avec
- - - conseil diététique *Z71*
- - - suivi diététique *Z71*
- - avec choc *T78.0*
- amidon avec malabsorption *K90.4*
- amidon NCA *K90.4*
- analgésiques *T88.7*
- anesthésique local *T88.7*
- Antibiotique *T88.7*
- anti-ovulation *T88.7*
- disaccharides, héréditaire *E73.0*
- fructose *E74.1*
- - héréditaire *E74.1*
- fructose, héréditaire *E74.1*
- galactose *E74.2*
- galactose, au glucose, congénitale *E74.3*
- galactose, congénitale *E74.2*
- glucose-galactose congénitale *E74.3*
- gluten *K90.0*
- graisses avec malabsorption *K90.4*
- graisses NCA *K90.4*
- groupe sanguin
- - avec réaction lors de la transfusion *T80.3*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P55.8*
- - prise en charge mère *O36.1*
- hydrates de carbone *K90.4*
- - avec malabsorption *K90.4*
- lactose *E73.9*
- - congénitale *E73.9*
- lait NCA *K90.4*
- lentilles de contact *H18.8*
- lévulose héréditaire *E74.1*
- lévulose, héréditaire *E74.1*
- Médication *T88.7*

Intolérance –*suite*
- protéines *K90.4*
- protéines lait de vache *T78.1*
- protéines, avec malabsorption *K90.4*
- Rh, lors de la grossesse *O36.0*
- Rh, rhésus
- - avec réaction à la transfusion *T80.4*
- - foetus/nouveau-né *P55.0*
- saccharose-isomaltose congénitale *E74.3*
- sorbitol *T78.1*

Intoxication *T65.9*
- aiguë *T65.9*
- alcoolique, aiguë, avec psychose, organique *F10.5*
- alimentaire *T62.9*
- - avec gastroentérite *A05.9*
- - par
- - - Bacillus cereus *A05.4*
- - - Clostridium
- - - - botulinum *A05.1*
- - - - difficile *A04.7*
- - - - perfringens *A05.2*
- - - - welchii *A05.2*
- - - entérotoxine *A05.0*
- - - salmonelles *A02.9*
- - - staphylocoques *A05.0*
- - - Vibrio parahaemolyticus *A05.3*
- alimentaire aux poissons, coquillages (Ichtyisme) (ichtyotoxisme) *T61.2*
- - par
- - - animaux marins comestibles, NCA *T61.8*
- - - coquillages, NCA *T61.2*
- - - scombridés *T61.1*
- - - toxines de la ciguatera *T61.0*
- auto- *R68.8*
- avec démence *T65.9+, F02.8**
- bactérienne *A05.9*
- - par
- - - l'ingestation de crustacés *A05.9*
- - - l'ingestion de fruits de mer, comestibles *A05.9*
- - - l'ingestion de moules *A05.9*
- - - l'ingestion de produits alimentaires *A05.9*
- - - l'ingestion de viande *A05.9*
- Ciguatera ou intoxication Ciguatérique par les poissons *T61.0*
- dans l'anamnèse *Z91.8*
- dentées alimentaires *T62.9*
- - avec gastro-entérite *A05.9*
- - intoxication alimentaire à
- - - Bacillus cereus *A05.4*
- - - Clostridium
- - - - botulinum *A05.1*
- - - - difficile *A04.7*
- - - - perfringens *A05.2*
- - - - welchii *A05.2*
- - - salmonelles *A02.9*
- - - staphylocoques *A05.0*
- - - Vibrio parahaemolyticus *A05.3*
- - par
- - - entérotoxine *A05.0*
- gastro-intestinale *K63.8*
- hormones antéhypophysaires *T38.8*
- intestinale *K63.8*
- médicaments et substances acides *T50.9*

Intoxication –*suite*

- par ingestion de poisson
- - bactérienne *A05.9*
- - épidémique *T61.2*
- par le biais
- - absorption de médicaments *T50.9*
- - - acidifiants *T50.9*
- - - alcalinisants *T50.9*
- - - avec réaction *T50.9*
- - - lipotropes *T50.9*
- - acétazolamide *T50.2*
- - acide nicotinique *T46.7*
- - acide nicotinique, dérivés de *T46.7*
- - acide oxalatique *T54.2*
- - acide valproïque *T42.6*
- - agents de diagnostic *T50.8*
- - alcaloides de Rauwolfia *T46.5*
- - alcool *T51.9*
- - - aiguë, état d'ébriété *F10.0*
- - - avec empoisonnement dû à des comprimés *T51.9*
- - - cas de dépendance *F10.0*
- - aliments *T62.9*
- - - avariés *T62.9*
- - amalgame *T49.7*
- - amantadine *T42.8*
- - anesthésiques gazeux *T41.0*
- - anesthésiques intraveineux *T41.1*
- - anesthésiques locaux *T41.3*
- - anorexigènes *T50.5*
- - antiallergiques *T45.0*
- - antianémiques *T45.8*
- - antibiotiques anti-néoplasiques ou anti-cancéreux *T45.1*
- - anticoagulants *T45.5*
- - antidépresseurs
- - - inhibiteurs de la mono-amine-oxydase *T43.1*
- - - tétracycliques *T43.0*
- - - tricycliques *T43.0*
- - antidiarrhéiques *T47.6*
- - antiémétiques *T45.0*
- - anti-infectieux ophtalmiques *T49.5*
- - anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques (nez) *T49.6*
- - anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques (oreille) *T49.6*
- - anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques (pharynx) *T49.6*
- - antiprurigineux *T49.1*
- - antitussifs *T48.3*
- - argent *T56.8*
- - arsenic *T57.0*
- - associations d'oestrogènes *T38.5*
- - atropine *T44.3*
- - bacille
- - - botulique *A05.1*
- - - infection à Salmonella cholerae-suis (ou salmonellose) *A02.9*
- - bactéries du groupe Suipestifer (comme Salmonella suipestifer) *A02.9*
- - baies
- - - avariées *T62.1*
- - - toxiques *T62.1*
- - barbituriques *T42.3*
- - benzène *T52.1*
- - benzodiazépines *T42.4*
- - bismuthothérapie *T65.8*
- - bloquants, neuro-musculaires *T48.1*
- - cannabinoïdes

Intoxication –*suite*

- par le biais –*suite*
- - cannabinoïdes –*suite*
- - - aiguë, état d'ébriété *F12.0*
- - - cas de dépendance *F12.0*
- - cannabis *T40.7*
- - cannabis, dérivés de *T40.7*
- - carbamazépine *T42.1*
- - champignons, vénéneux *T62.0*
- - chloroforme *T53.1*
- - chrome *T56.2*
- - clonidine *T46.5*
- - cocaïne *T40.5*
- - - aiguë, état d'ébriété *F14.0*
- - - cas de dépendance *F14.0*
- - codéine *T40.2*
- - composés du fer *T45.4*
- - comprimés *T50.9*
- - - avec intoxication, par l'alcool *T51.9*
- - contraceptifs oraux *T38.4*
- - coumarine *T45.5*
- - crustacés, avariés *T61.2*
- - cyanure d'hydrogène *T57.3*
- - cytarabine *T45.1*
- - dérivés 4-aminophénol *T39.1*
- - digitale *T46.0*
- - dioxyde de carbone *T41.5*
- - dipyridamole *T46.3*
- - diurétiques de l'anse *T50.1*
- - drogues *T50.9*
- - - avec psychose *F19.5*
- - eau *E87.7*
- - émanations de gaz de fermentation *T59.8*
- - émanations de gaz et fumées NCA *T59.9*
- - émétiques *T47.7*
- - expectorants *T48.4*
- - fer *T45.4*
- - féveroles *D55.0*
- - fruits de mer, comestibles *T61.9*
- - fumées *T59.9*
- - gaz d'éclairage *T58*
- - gaz thérapeutiques *T41.5*
- - glucocorticoïdes, en cas d'utilisation topique *T49.8*
- - glucocorticostéroïdes *T38.0*
- - guanéthidine *T46.5*
- - hallucinogènes
- - - aiguë, état d'ébriété *F16.0*
- - - cas de dépendance *F16.0*
- - héroïne *T40.1*
- - - aiguë, état d'ébriété *F11.0*
- - - cas de dépendance *F11.0*
- - hormones adénohypophysaires *T38.8*
- - hormones parathyroïdiennes *T50.9*
- - hormones parathyroïdiennes, dérivés de *T50.9*
- - hormones sécrétées par le lobe antérieur de l'hypophyse *T38.8*
- - hydantoïne, dérivés de *T42.0*
- - hydroxyquinoléine, dérivés de *T37.8*
- - hypervitaminose D *E67.3*
- - iminostilbènes *T42.1*
- - immunglobuline *T50.9*
- - ingestion d'éthanol *T51.0*
- - inhibiteurs calciques ou antagonistes du calcium *T46.1*

Intoxication –*suite*

- par le biais –*suite*
- - inhibiteurs de la synthèse d'acide urique *T50.4*
- - inhibiteurs de la cholinestérase *T44.0*
- - inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2 *T47.0*
- - insectes venimeux NCA *T63.4*
- - laxatifs stimulants *T47.2*
- - LSD (acide lysergique diéthylamide) *T40.8*
- - lysergide *T40.8*
- - médicaments *T50.9*
- - médicaments contre la l'atonie intestinale *T47.4*
- - médicaments facilitant la digestion *T47.5*
- - médicaments ophtalmologiques *T49.5*
- - méduse *T63.6*
- - méprobamate *T43.5*
- - mescaline *T40.9*
- - métaraminol *T44.4*
- - métaux lourds, examen de dépistage *Z13.8*
- - méthadone *T40.3*
- - méthaqualone *T42.6*
- - minéralocorticoïdes *T50.0*
- - monoxyde de carbone, avec démence *T58+, F02.8**
- - morphine *T40.2*
- - morsure *T63.9*
- - - de
- - - - anémone de mer *T63.6*
- - - - animaux marins NCA *T63.6*
- - - - arthropodes NCA *T63.4*
- - - - crustacés *T63.6*
- - - - étoiles de mer *T63.6*
- - - - reptiles NCA *T63.1*
- - - - serpents *T63.0*
- - - - serpents marins *T63.0*
- - moules avariées *T61.2*
- - myorelaxants *T48.1*
- - ocytocine *T48.0*
- - opioïdes
- - - aiguë, état d'ébriété *F11.0*
- - - cas de dépendance *F11.0*
- - opium *T40.0*
- - oxazolidine *T42.2*
- - oxygène *T41.5*
- - papavérine *T44.3*
- - parasympathomimétiques *T44.1*
- - péthidine *T40.4*
- - phosgènes *T59.8*
- - piqûre *T63.9*
- - - par
- - - - anémone de mer *T63.6*
- - - - animaux marins NCA *T63.6*
- - - - anthropodes NCA *T63.4*
- - - - étoile de mer *T63.6*
- - plantes nocives *T62.2*
- - plomb *T56.0*
- - poissons et coquillages *T61.2*
- - préparations à base de foie *T45.8*
- - présence de pus *A41.9*
- - produit vaisselle *T55*
- - produits de désintoxication alcoolique *T50.6*
- - produits sanguins *T45.8*
- - progestatifs, association de *T38.5*
- - psilocine *T40.9*

Intoxication –*suite*
- par le biais –*suite*
- - psilocybine *T40.9*
- - psychotropes, aiguë *T43.9*
- - ptomaïne *T62.9*
- - pyrazolés, dérivés de *T39.2*
- - quinine *T37.2*
- - salbutamol *T48.6*
- - salicylate *T39.0*
- - salmonelles *A02.9*
- - saucisse *T62.9*
- - - trichineuse *B75*
- - savon, après un avortement *O08.2*
- - sédatifs, et d'hypnotiques
- - - aiguë, état d'ébriété *F13.0*
- - - cas de dépendance *F13.0*
- - sels de réhydratation orale *T50.3*
- - sérum NCA *T80.6*
- - solvants volatils
- - - aiguë, état d'ébriété *F18.0*
- - - cas de dépendance *F18.0*
- - somnifères *T42.7*
- - - avec intention de se suicider *T42.7*
- - spermicides *T49.8*
- - stimulant des récepteurs alpha et bêta *T44.9*
- - streptomycine *T36.5*
- - substance(s) chimique(s) *T65.9*
- - - examen de dépistage *Z13.8*
- - substances biologiques actives *T50.9*
- - substances non médicales *T65.9*
- - substances, immunologiques actives *T50.9*
- - succédanés du plasma *T45.8*
- - succinimides *T42.2*
- - tabac *T65.2*
- - - aiguë *F17.0*
- - - cas de dépendance *F17.0*
- - tamoxifène *T38.6*
- - thalium *T60.4*
- - thiobarbituriques *T41.1*
- - thyréostatiques *T38.2*
- - toxine botulique *A05.1*
- - toxines bactériennes NCA *A05.9*
- - trichlorométhane *T53.1*
- - uranium *T66*
- - uricosuriques *T50.4*
- - vasodilatateurs périphériques *T46.7*
- - viande
- - - nocive *T62.9*
- - - trichineuse *B75*
- - Vicia faba ou fève *D55.0*
- poissons scombridés *T61.1*
- ptomaine *T62.9*
- sang ou septicémie *A41.9*
- septique *A41.9, R65.0!*
- - après
- - - avortement *O08.0*
- - - grossesse extra-utérine *O08.0*
- somnifères *T42.7*
- - avec intention suicidaire *T42.7*
- urinaire *N19*

intra oculaire Complication mécanique d ' une lentille *T85.2*

Intra-abdominal (-e)
- abcès *K65.0*
- - suite à un acte médical *T81.4*
- adhérence *K66.0*

Intra-abdominal (-e) –*suite*
- carcinome *C76.2*
- hernie *K46.9*
- - avec gangrène *K46.1*
- - avec occlusion sans gangrène *K46.0*
- - étranglée sans gangrène *K46.0*
- - incarcérée sans gangrène *K46.0*
- - irréductible sans gangrène *K46.0*
- lésion d'organes multiples *S36.7*
- lipome *D17.5*
- métastase ganglionnaire lymphatique *C77.2*
- métastatisation tumorale *C79.88*
- nodule *R19.0*
- organe
- - lésion traumatique *S36.9*
- - lésion traumatique, séquelle-s de *T91.5*
- processus expansif
- - diffus *R19.0*
- - généralisé *R19.0*

Intra-amniotique, infection foetale *P39.2*

Intraamygdalien, abcès *J36*

Intra-articulaire, fracture du radius *S52.59*

Intracanalaire (canalaire in situ) (intr
- adénocarcinome *D05.1*
- - mammaire *D05.1*
- - - non invasif *D05.1*
- - - papillaire *D05.1*
- carcinome *D05.1*
- - mammaire *D05.1*
- - - non invasif *D05.1*
- - - papillaire *D05.1*
- carcinome avec carcinome in situ lobulaire, mammaire *D05.7*
- carcinome in situ *D05.1*
- fibro-adénome *D24*

Intracanaliculaire, fibro-adénome *D24*
- cellulaire *D24*
- cellules géantes, à *D24*

Intracardiaque
- examen électrophysiologique, anormal *R94.3*
- thrombose NCA *I51.3*

Intracérébral(e)(s)
- hémorragie(s) *I61.9*
- - cervelet *I61.4*
- - compliquant l'accouchement *O99.4*
- - diffuse, traumatique *S06.20*
- - due à un angiome *D18.02*
- - hémisphère cérébral *I61.2*
- - - corticale *I61.1*
- - - sous-corticale *I61.0*
- - intraventriculaire *I61.5*
- - multiples *S06.23*
- - - circonscrites *I61.6*
- - non traumatique, chez le foetus/nouveau-né *P52.4*
- - pendant la grossesse *O99.4*
- - post-partum *O99.4*
- - profonde *I61.0*
- - séquelles *I69.1*
- - superficielle *I61.1*
- - traumatique, focale *S06.30*
- - tronc cérébral *I61.3*
- maladie *G93.9*
- malformation artérioveineuse *Q28.29*

intracrânien communication Déplacement dû à un shunt ventriculaire *T85.0*

Intracrânien-ne

Intracytoplasmique, injection de spermat *Z31.2*

Intradermique
- carcinome *D04.9*
- nævus *D22.9*

Intra-épidermique
- épithéliome de Jadassohn *D23.9*
- épithéliome type Borst-Jadassohn *D23.9*
- nævus *D22.9*

intraépithéliale haut grade prostate NIP de haut grade] , Néoplasie *D07.5*

Intra-épithélial-e
- épithéliome *D04.9*
- - type Borst-Jadassohn *D23.9*
- néoplasie
- - cervical
- - - grade I *N87.0*
- - - grade II *N87.1*
- - - grade III *D06.9*
- - - - avec dysplasie de haut grade *D06.9*
- - prostate [PIN]
- - - grade 1 *N40*
- - utérus, col *N87.9*
- - vagin *N89.3*
- - - grade I *N89.0*
- - - grade II *N89.1*
- - - grade III *D07.2*
- - - - avec dysplasie de haut grade *D07.2*
- - vulve *N90.3*
- - - grade I *N90.0*
- - - grade II *N90.1*
- - - grade III *D07.1*
- - - - avec dysplasie de haut grade *D07.1*
- vulve, lésion *N90.3*

Intrahépatique
- abcès *K75.0*
- adénome, voies biliaires *D13.4*
- cholangiolite *K83.0*
- cholélithiase *K80.50*
- - avec
- - - cholangite *K80.30*
- - - - avec obstruction voies bilaires *K80.31*
- - - cholécystite *K80.40*
- - - - avec obstruction voies bilaires *K80.41*
- - - obstruction voies biliaires *K80.51*
- cholestase NCA *K71.0*
- vésicule biliaire *Q44.1*

Intrakystique
- adénocarcinome papillaire *C80*
- adénome papillaire *D36.9*

Intraligamentaire
- grossesse *O00.8*
- kyste *M24.29*
- - genou *M23.89*

Intramédullaire, hémorragie NCA *G95.1*

Intramural-e
- cystite *N30.8*
- grossesse *O00.8*
- inflammation, vessie *N30.8*
- léiomyome utérus *D25.1*

Intramural-e *–suite*

- thrombose *I21.9*

Intramusculaire, lipome *D17.9*

Intranasal, malignome *C30.0*

Intranucléaire, paralysie *G83.9*

Intra-oculaire
- corps étranger *S05.5*
- - magnétique *S05.5*
- - - ancien
- - - - chambre antérieure de l'oeil *H44.6*
- - - - corps cilaire *H44.6*
- - - - corps vitré *H44.6*
- - - - cristallin *H44.6*
- - - - globe oculaire *H44.6*
- - - - iris *H44.6*
- - - - paroi postérieure du globe oculaire *H44.6*
- - non magnétique *S05.5*
- - - ancien
- - - - chambre antérieure *H44.7*
- - - - corps ciliaire *H44.7*
- - - - corps vitré *H44.7*
- - - - cristallin *H44.7*
- - - - iris *H44.7*
- - - - paroi postérieure du globe oculaire *H44.7*
- hémorragie *H44.8*
- inflammation avec opacification corps vitré *H43.3*
- lentille
- - avec complication mécanique *T85.2*
- - déplacement *T85.2*
- - dysfonctionnement mécanique *T85.2*
- - fuite *T85.2*
- - malposition *T85.2*
- - obstruction mécanique *T85.2*
- - perforation *T85.2*
- - protrusion *T85.2*
- lésion *S05.6*
- pression, élévation *H40.0*
- prothèse du cristallin, avec complication *T85.9*
- sepsis *H44.0*
- tissu
- - perte, lors de
- - - lacération globe oculaire *S05.2*
- - - plaie pénétrante globe oculaire *S05.2*
- - prolapsus, en cas de
- - - lacération globe oculaire *S05.2*
- - - plaie pénétrante globe oculaire *S05.2*

Intra-orbitaire, abcès *H05.0*

Intra-osseux, carcinome *C41.1*
- mâchoire supérieure *C41.02*

Intrapelvienne, hémorragie
- chez la femme *N94.8*
- chez l'homme *K66.1*

Intrapéritonéal, -ale
- abcès *K65.0*
- grossesse *O00.0*
- hémorragie *K66.1*
- rupture de la vessie *S37.22*
- transfert de gamètes *Z31.2*

Intrapontine, hémorragie *I61.3*
- couche *O99.4*

Intraspongieux(se)

Intraspongieux(se) *–suite*

- hernie *M51.4*
- prolapsus, disque *M51.4*

Intrathoracique
- anévrisme *I71.2*
- - syphilitique *A52.0+, I79.0**
- ganglion(s) lymphatique(s)
- - métastase(s) *C77.1*
- - tuberculose *A16.3*
- - - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.4*
- - - primitive, avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.7*
- lipome *D17.4*
- organe
- - lésion(s) traumatique(s) *S27.9*
- - - multiples *S27.7*
- - séquelles, lésion traumatique *T91.4*
- - tumeur maligne *C76.1*
- - - dans
- - - - antécédents familiaux NCA *Z80.2*
- - - - antécédents NCA *Z85.2*
- rein *Q63.2*
- trachée, plaie ouverte *S27.5*
- tuberculose primitive, ganglions lymphatiques *A16.7*

Intratrochantérienne, fracture, fémur *S72.10*

Intratubaire
- fécondation *Z31.2*
- transfert d'embryon *Z31.2*
- transfert gamètes, transabdominal *Z31.2*
- transfert pronucleus *Z31.2*
- transfert spermatozoïdes, transvaginal *Z31.1*
- transfert zygotes *Z31.2*

Intra-utérin
- acidose *P20.9*
- anoxie *P20.9*
- asphyxie *P20.9*
- bradycardie *P20.9*
- dérivation, méconium *P20.9*
- détresse *P20.9*
- dispositif
- - avec
- - - complications *T83.9*
- - - - mécaniques *T83.3*
- - - endocervicite *T83.6*
- - - infection *T83.6*
- - - inflammation *T83.6*
- - contrôle *Z30.5*
- - défaut de positionnement *T83.3*
- - déplacé *T83.3*
- - déplacement *T83.3*
- - extraction *Z30.5*
- - insertion *Z30.1*
- - occulte *T83.3*
- - présence *Z97.8*
- - remise en place *Z30.5*
- - rétention, pendant la grossesse *O26.3*
- dystrophie *P05.9*
- grossesse *Z32*
- hémorragie *N85.7*
- hypoxie *P20.9*
- - détectée pour la première fois
- - - avant le début du travail *P20.0*

Intra-utérin *–suite*
- hypoxie *–suite*
- - détectée pour la première fois *–suite*
- - - lors du travail ou de l'accouchement *P20.1*
- infection
- - pendant la grossesse *O23.5*
- - puerpérale *O85*
- insémination artificielle *Z31.1*
- insert contraceptif
- - avec complications *T83.9*
- - perforation, utérus *T83.3*
- malformation foetale *Q89.9*
- malnutrition *P05.2*
- môle *O02.0*
- mort *P95*
- - prise en charge de la mère *O36.4*
- mort foetale, prise en charge de la mère *O36.4*
- opération, avec atteinte du foetus, prise en charge de la mère *O35.7*
- retard de développement *P05.9*
- synéchie *N85.6*
- tachycardie *P20.9*
- transfert d'embryon *Z31.2*

Intravasal
- coagulation *D65.1*
- - cas d'échec d'un avortement médical *O07.1*
- - diffuse *D65.1*
- - disséminée *D65.1*
- - - avec
- - - - glomérulonéphrite *D65.1+, N08.2**
- - - - glomérulopathie *D65.1+, N08.2**
- - - - hémorragie précédant l'accouchement *O46.0*
- - - - saignements importants pendant l'accouchement *O67.0*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P60*
- coagulation, disséminée, avec hémorragie
- - aiguë
- - - cas de décollement placentaire *O45.0*
- - - prénatale *O46.0*

Intravasculaire
- hémolyse
- - après
- - - avortement *O08.1*
- - - grossesse extra-utérine *O08.1*
- - - grossesse molaire *O08.1*
- - avec saignements importants pendant l'accouchement *O67.0*
- - post-partum *O72.3*
- léiomyomatose - *voir* Tumeurs à évolution imprévisible, tissu conjonctif *D48.1*
- tumeur bronchoalvéolaire *D38.1*

intraveineuse Consommation
- Autre substance psycho - active par voie *U69.32!*
- héroïne voie *U69.30!*
- - non *U69.31!*

Intraventriculaire
- bloc, non spécifique *I45.4*
- conduction anormale *I45.6*
- dilatation, en cas d'hémorragie sous-épendymaire, chez le foetus/nouveau-né *P52.1*

Intraventriculaire –*suite*
- hémorragie *I61.5*
- - cérébrale *I61.5*
- - chez le foetus/nouveau-né *P52.3*
- - due à un trauatisme obstétrical *P10.2*
- - non traumatique, chez le foetus/nouveau-né
- - - stade 1 *P52.0*
- - - stade 2 *P52.1*
- - - stade 3 *P52.2*
- propagation, anormale *I45.4*

Intravésicale, hémorragie *N32.8*

Intrinsèque
- asthme *J45.1*
- - bronchique *J45.1*
- - non allergique *J45.1*
- asthme bronchique, origine extrinsèque *J45.8*
- coloration anormale, dents NCA *K00.8*
- eczéma *L20.8*
- - allergique *L20.8*
- moins déformation, paralysie, main *M21.84*
- mouvement d'émiettement [pill-rolling tremor] *G20.90*
- plus déformation, paralysie, main *M21.84*

Intrinsèque, facteur, carence
- avec anémie, due à une carence en vitamine B12 *D51.0*
- congénitale *D51.0*

Introduction (de)
- bougies *Z43.9*
- sonde *Z43.9*

Intubation
- difficile *T88.4*
- échec *T88.4*
- - pendant l'accouchement *O74.7*
- - post-partum *O89.6*
- insuffisante, pendant l'anesthésie *T88.4*

Intubation, granulome d' *T81.4*

Intumescence, cristallin *H26.9*

Intussusception *K56.1*
- appendice *K38.8*
- côlon *K56.1*
- congénitale *Q43.8*
- rectum *K56.1*
- uretère *N13.5*
- - avec séquestration *N13.5*

Invagination *K56.1*
- appendice *K38.8*
- colon *K56.1*
- hernie d' *K46.0*
- iléus par *K56.1*
- intestin *K56.1*
- intestin grêle *K56.1*
- mamelon *N64.5*
- - pendant la grossesse *O92.00*
- - - avec difficultés à la mise au sein *O92.01*
- rectum *K56.1*

Invalidité *R68.8*
- chronique *R68.8*
- depuis la naissance *R68.8*

Invasif(ve)
- adénocarcinome canalaire *C50.9*
- angiolipome *D17.9*

Invasif(ve) –*suite*
- aspergillose *B44.9*
- - avec pneumonie *B44.0+, J17.2**
- - pulmonaire *B44.0+, J99.8**
- canalaire, lobulaire, carcinome in situ du sein *C50.9*
- cancer *C80*
- - canalaire *C50.9*
- - lobulaire *C50.9*
- - sein, canalaire *C50.9*
- candidose *B37.9*
- fibrome *D48.1*
- lipome *D17.9*
- môle hydatiforme *D39.2*

Invasion stromale, douteuse, col de l'ut
- épidermoïde *D06.9*

Inversé
- déplacement, organe, interne, complet, en cas de dextrocardie *Q89.3*
- indication, oreillette, avec situs inversus *Q89.3*

Inversion
- albumine-globuline, rapport *E88.0*
- chromosome, chez un sujet normal *Q95.1*
- col de l'utérus *N88.8*
- mamelon *N64.5*
- - congénitale *Q83.8*
- - pendant la grossesse *O92.00*
- - post-partum *O92.00*
- papille optique *Q14.2*
- psychogène du rythme du circadien *F51.2*
- rythme circadien *G47.2*
- rythme circadien psychogène *F51.2*
- rythme de sommeil *G47.2*
- - origine non-organique *F51.2*
- - psychogène *F51.2*
- Rythme nycthéméral *G47.2*
- - psychogène *F51.2*
- testicules *Q55.2*
- utérus *N85.5*
- - chronique *N85.5*
- - lors de l'accouchement *O71.2*
- - post-partum *O71.2*
- vagin, suite à une hystérectomie *N99.3*
- ventricule *Q20.5*
- vessie *N32.8*
- viscérale *Q89.3*
- viscères, complète, en cas de transposition
- - cardiaque *Q89.3*
- - gastrique *Q89.3*

Involutif, naevus *D22.9*

Involution
- dépression d' *F32.8*
- glandes salivaires *K11.0*
- kystique, glande mammaire *N60.8*
- mammaire *N64.2*
- mélancolie d' *F32.8*
- ovarienne par dégénérescence, avec kyste ovarien NCA *N83.2*
- ovarienne sénile *N83.3*
- paraphrénie d' *F22.8*
- psychose d' *F28*
- - paranoïde *F22.8*
- sénile *R54*
- thymus *E32.8*

Involution –*suite*
- thymus –*suite*
- - dégénérescence *E32.0*
- troubles paranoïdes d'étiologie organique *F22.8*
- utérus *N85.8*
- vagin *N95.2*

Iode
- allergie *T78.4*
- carence *E61.8*
- - avec
- - - goitre
- - - - diffus *E01.0*
- - - - endémique *E01.2*
- - - - kystique *E01.1*
- - - - multinodulaire *E01.1*
- - - - uninodulaire *E01.1*
- - - hypothyroïdie *E01.8*
- - - - acquise *E01.8*
- - - - congénitale *E00.9*
- - - - subclinique *E02*

Iode négatif, col de l'utérus *N87.9*

Iridérémie *Q13.1*

Iridochoroïdite *H44.1*

Irido-cornéo-endothéliale, dystrophie [s *H21.8*
- avec glaucome secondaire *H40.5*

Iridocyclite *H20.2*
- *H20.9*
- aiguë *H20.0*
- allergique *H20.0*
- associée à
- - herpes zoster *B02.3+, H22.0**
- - hypopyon *H20.0*
- - maladie infectieuse NCA *B99+, H22.0**
- - parasitose NCA *B89+, H22.0**
- - sarcoïdose *D86.8+, H22.1**
- - spondylarthrite ankylosante *M45.09+, H22.1**
- - syphilis secondaire *A51.4+, H22.0**
- autre *H20.8*
- avec
- - glaucome *H40.4*
- - induration, lentille *H20.2*
- chronique *H20.1*
- - avec cataracte *H26.2*
- due à
- - gonocoques *A54.3+, H22.0**
- - virus de l'herpès *B00.5+, H22.0**
- endogène *H20.0*
- granulomateuse *H20.1*
- non granulomateuse *H20.0*
- phacogène *H20.2*
- récidivante *H20.0*
- subaiguë *H20.0*
- sympathique *H44.1*
- syphilitique *A51.4+, H22.0**
- - secondaire *A51.4+, H22.0**
- tuberculeuse *A18.5+, H22.0**

Iridocyclochoroïdite *H44.1*

Iridodialyse *H21.5*
- traumatique *S05.8*

Iridodonésis *H21.8*

Iridoplégie *H57.0*
- complète *H57.0*
- partielle *H57.0*

Iridoschisis *H21.2*

Iris
- abcès *H20.8*
- absence congénitale *Q13.1*
- adhérence NCA *H21.5*
- adhérence postinfectieuse, après greffe de cornée NCA *T85.88*
- affection *H21.9*
- - vasculaire *H21.1*
- agénésie *Q13.1*
- anévrisme *H21.1*
- anomalie *Q13.2*
- - acquise *H21.5*
- - épithelium pigmentaire *H21.2*
- aplasie *Q13.1*
- atrésie *Q15.0*
- atrophie *H21.2*
- - essentielle *H21.2*
- - - progressive *H21.2*
- - progressive *H21.2*
- bombé *H21.4*
- colobome *Q13.0*
- - congénital *Q13.0*
- contusion *S05.1*
- corps étranger *S05.5*
- - magnétique, intraoculaire, ancien *H44.6*
- - non magnétique, intraoculaire, ancien *H44.7*
- déchirure *H21.5*
- défaut de fermeture *Q13.0*
- dégénérescence *H21.2*
- - pigmentaire *H21.2*
- ectropion *H21.8*
- érythème *L51.1+, H22.8**
- et corps ciliaire, affection *H21.9*
- fibres dilatatrices, agénésie *Q13.2*
- gomme *A52.7+, H22.8**
- hémorragie *H21.0*
- - postinfectieuse *H21.0*
- - postinflammatoire *H21.0*
- - toxique *H21.0*
- hernie traumatique *S05.2*
- herpès, en cas d'erythème exsudatif multiforme *L51.1*
- hétérochromie acquise *H21.2*
- hyperémie *H21.1*
- hypoplasie *Q13.2*
- incarcération dans une plaie *S05.2*
- incarcération postopératoire *H59.8*
- inflammation *H20.9*
- - gonorrhéique *A54.3+, H22.0**
- kyste *H21.3*
- - exsudatif *H21.3*
- - parasitaire *H21.3*
- kyste, dû à un implant *H21.3*
- lacération *S05.3*
- lésion traumatique *S05.8*
- - pénétrante *S05.6*
- - sphincter *S05.8*
- maladie *H21.9*
- malformation
- - acquise *H21.5*
- - congénitale *Q13.2*
- mélanome in situ *D03.8*
- mélanome malin *C69.4*
- nævus *D31.4*
- néovascularisation *H21.1*
- oedème *H21.8*
- - *H21.8*

Iris *–suite*
- paralysie *H57.0*
- - complète *H57.0*
- - due à la diphtérie *A36.8+, H22.8**
- - partielle *H57.0*
- perte, congénitale *Q13.1*
- prolapsus
- - cas de perforation de la cornée *S05.2*
- - non traumatique *H21.8*
- - traumatique *S05.2*
- remaniement vasculaire *H21.1*
- rétroversion *H21.5*
- rupture *H21.5*
- rupture NCA *H21.5*
- synéchie *H21.5*
- syphilis secondaire *A51.4+, H22.0**
- transparence *H21.2*
- traumatisme *S05.8*
- tuberculose *A18.5+, H22.0**
- tumeur
- - bénigne *D31.4*
- - évolution inconnue *D48.7*
- - maligne *C69.4*

Iritis *H20.9*
- aiguë *H20.0*
- associée *H20.8*
- avec
- - glaucome secondaire *H40.4*
- - hétérochromie *H20.8*
- diabétique *E14.30+, H22.1**
- due à
- - gonocoques *A54.3+, H22.0**
- - herpes zoster *B02.3+, H22.0**
- - virus de l'herpès *B00.5+, H22.0**
- fibrineuse *H20.0*
- goutteuse *M10.99+, H22.1**
- granulomateuse *H20.1*
- kérato- *H20.9*
- papuleuse *A52.7+, H22.0**
- post-traumatique *T90.4*
- récidivante *H20.0*
- séreuse *H20.8*
- subaiguë *H20.0*
- syphilitique précoce, congénitale *A50.0+, H22.0**
- syphilitique secondaire *A51.4+, H22.0**
- syphilitique tardive *A52.7+, H22.0**
- tuberculeuse *A18.5+, H22.0**

Irradiation (rayonnement)
- affection respiratoire
- - aigue *J70.0*
- - chronique *J70.1*
- affection, organes respiratoires, chronique *J70.1*
- allergie *L59.8*
- anémie, aplastique *D61.2*
- avec incident NCA *T66*
- bronchite
- - aigue *J70.0*
- - subaiguë *J70.0*
- colite *K52.0*
- cystite *N30.4*
- dans les antécédents personnels *Z92.3*
- dermatite de contact *L59.8*
- dermite *L59.8*
- dermite solaire *L57.8*
- eczéma *L59.8*
- effet, indésirable NCA *T66*

Irradiation (rayonnement) *–suite*
- entérite *K52.0*
- inflammation, organes respiratoires, supérieurs, aiguë *J70.0*
- lésion NCA *T66*
- lésions *T66*
- - foetales *P04.8*
- manifestation, pulmonaire
- - aiguë *J70.0*
- - chronique *J70.1*
- oedème, poumon, aigu *J70.0*
- pneumonie *J70.0*
- syndrome de *T66*

Irréductible
- entérocèle, sans gangrène *K46.0*
- épiplocèle, sans gangrène *K46.0*
- hernie *K46.0*
- - abdominale *K46.0*
- - - sans gangrène NCA *K45.0*
- - diaphragmatique *K44.0*
- - - sans gangrène *K44.0*
- - fémorale *K41.3*
- - - sans gangrène *K41.3*
- - - unilatérale, sans gangrène *K41.3*
- - gangréneuse *K46.1*
- - inguinale
- - - sans gangrène *K40.30*
- - - unilatérale, sans gangrène *K40.30*
- - interstitielle, sans gangrène *K46.0*
- - intestinale, sans gangrène *K46.0*
- - intra-abdominale, sans gangrène *K46.0*
- - ischiatique, sans gangrène *K45.0*
- - lombaire, sans gangrène *K45.0*
- - obturatrice, sans gangrène *K45.0*
- - ombilicale *K42.0*
- - - sans gangrène *K42.0*
- - pudendale, sans gangrène *K45.0*
- - rétropéritonéale, sans gangrène *K45.0*
- - sans gangrène *K46.0*
- - ventrale *K43.0*
- - - sans gangrène *K43.0*

Irrégulier
- activité cardiaque *I49.9*
- contractions *O62.2*
- - avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.6*
- cornée, contour *H18.7*
- cycle menstruel *N92.6*
- cycles menstruels *N92.6*
- - avec menstraution particulièrement importantes *N92.1*
- dentine *K04.3*
- formation, tissus dentaires durs, dans la pulpe *K04.3*
- fréquence cardiaque foetale *O68.0*
- hémorragie *N92.6*
- intervalles, diminué, entre les menstruations *N92.1*
- menstruations *N92.6*
- oligoménorrhée *N91.4*
- position de l'enfant *O32.9*
- - avec accouchement *O64.9*
- processus alvéolaire *K08.88*
- pupille *H21.5*
- règles *N92.6*
- respiration *R06.88*
- rythme veille-sommeil *G47.2*
- Saignement intermenstruel *N92.1*
- - chronique *N92.1*

Irrégulier –*suite*
- saignements
- - intermenstruels *N92.1*
- - utérins, intermenstruels *N92.1*
- septum nasal *J34.2*
- travail *O62.2*
- - avec atteinte du foetus/nouveau-né *P03.6*
- vertèbres *M43.99*

Irrigation sanguine déficiente ou hypote *I99*
- cérébrale *I67.88*

Irritabilité *R45.4*
- cérébrale, chez le nouveau-né *P91.3*
- chez le petit enfant *R68.1*
- coeur *F45.30*
- côlon *K58.9*
- - avec diarrhée *K58.0*
- - psychogène *F45.32*
- duodénum *K59.8*
- estomac *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- iléum *K59.8*
- intermittente, impulsions *F63.8*
- intestin *K58.9*
- - avec diarrhée *K58.0*
- jéjunum *K59.8*
- myocarde *F45.30*
- nourisson *R68.1*
- rectum *K59.8*
- système nerveux autonome *G90.8*
- urètre *N36.8*
- vessie *N32.8*

Irritable, trouble, personnalité *F60.30*

Irritant
- avec dermite de contact *L24.9*
- dermite par contact, toxique *L24.5*
- externe
- - dermite NCA *L24.9*
- - - allergique NCA *L23.8*
- - - toxique NCA *L24.8*
- substance, effet, toxique *T54.9*

Irritatif, syndrome, mésodiencéphalique *R40.2*

Irritation
- anus *K62.8*
- appendice *K35.9*
- appendicite *K35.9*
- articulation *M24.89*
- articulation de la cheville *M24.87*
- - supérieure *M24.87*
- articulation de la main *M24.83*
- articulation du genou *M23.99*
- articulation hanches *M24.85*
- articulation sacroiliaque, avec lombalgie *M54.5*
- canal auditif *H61.9*
- capsule
- - articulation du genou *M23.99*
- - épaule *M75.8*
- - tibio-tarsienne (articulation) *M24.87*
- capsule articulaire de l'épaule *M24.81*
- cérébrale, chez le nouveau-né *P91.3*
- choroïde, sympathique *H44.1*
- cicatrice *L90.5*
- col utérin *N72*
- conjonctivite *H11.9*
- cornée, oeil *H18.9*

Irritation –*suite*
- eczéma *L30.8*
- facettes
- - cas de lombalgie *M54.5*
- - - aiguë *M54.5*
- - colonne vertébrale, intégrale *M47.20*
- - rachis *M47.20*
- - région cervicale *M47.22*
- - région dorsale *M47.24*
- - région lombaire *M47.26*
- gastrointestinal *K30*
- - psychogène *F45.39*
- globe oculaire, sympathique *H44.1*
- huile *L24.1*
- - contact *L24.1*
- - toxique *L24.1*
- interspinale *M54.19*
- labyrinthe osseux *H83.2*
- mamelon *N64.5*
- méninges, traumatique *S06.0*
- Ménisque interne *M23.33*
- ménisque, médial *M23.33*
- nerf
- - cutaneus femoris *G57.1*
- - ulnaire *G56.2*
- nerf périphérique *G58.9*
- nerf, périphérique *G58.9*
- nerveuse *R45.0*
- oreille *H93.9*
- palpébral *H02.9*
- peau *N83.9*
- pénis *N48.8*
- perineum NCA *L29.3*
- péritonite *K66.9*
- pharyngite *J39.2*
- Plexus brachial *G54.0*
- plexus lombosacré *G54.1*
- prostate, psychogène *F45.8*
- racine
- - cervicale *M54.2*
- - lombaire *M54.16*
- - région cervicale *M54.2*
- - sacrée *M54.18*
- racine, en cas de sciatique aiguë *M54.3*
- système nerveux
- - autonome, périphérique *G90.8*
- - sympathique NCA *G90.8*
- vagin *N89.8*
- vessie *N32.8*
- voies urinaires *K82.9*

Irritative, dermite *L98.8*

Irritative, hyperplasie
- crête alvéolaire, édentée *K06.2*
- muqueuse buccale *K13.6*
- palais, papillaire *K13.6*

Isaacs-Mertens, syndrome de *G71.1*

Ischémie *I99*
- cardiaque *I25.9*
- cardiaque chronique *I25.9*
- cérébrale *I67.88*
- - artérioscléreuse *I67.2*
- - avec convulsions, apoplectiforme *I67.88*
- - chronique *I67.88*
- - généralisée, chronique *I67.88*
- - nouveau-né *P91.0*
- - puerpérale *O99.4*

Ischémie –*suite*
- cérébrale –*suite*
- - récidivante, focale *G45.89*
- - transitoire *G45.92*
- cérébrale intermittente *G45.99*
- cérébrovasculaire *I67.88*
- - avec psychose organique *F01.9*
- chronique *I99*
- côlon *K55.9*
- côlon ascendant *K55.9*
- coronarienne *I25.9*
- coronarienne autre *I24.8*
- cortex visuel *H47.6*
- intestin, grêle *K55.9*
- - aiguë *K55.0*
- intestin, gros *K55.9*
- intestinale *K55.9*
- - aiguë *K55.0*
- - chronique *K55.1*
- membre *I99*
- membre inférieur *I73.9*
- mésentérique aiguë *K55.0*
- moelle épinière *G95.1*
- musculaire traumatique *T79.6*
- myocarde *I25.9*
- - bas bruit, à *I25.6*
- - transitoire, nouveau-né *P29.4*
- myocarde, chronique *I25.9*
- nerf optique *H47.0*
- paroi postérieure *I24.0*
- rénale *N28.0*
- rétine *H34.2*
- sous-endocardique *I24.8*
- tronc cérébral *I67.88*
- voies optiques *H47.5*

Ischémique
- affection, chiasma optique *H47.4*
- angor intestinal *K55.1*
- attaque
- - cérébrale *G45.99*
- - - dans les antécédents personnels *Z86.6*
- - transitoire *G45.92*
- - - dans les antécédents personnels *Z86.6*
- attaque cérébrale *I63.9*
- - apoplectique *I63.9*
- - cérébrale *I63.9*
- cardiomyopathie *I25.5*
- cardiopathie *I25.9*
- colite *K55.9*
- - aiguë *K55.0*
- - chronique *K55.1*
- - subaiguë *K55.0*
- contracture de Volkmann, complications, lésion traumatique *T79.6*
- contracture musculaire *T79.6*
- déficit neurologique, prolongé, réversible *I63.9*
- douleurs thoraciques *I20.9*
- entérite *K55.9*
- - aiguë *K55.0*
- - chronique *K55.1*
- entérocolite *K55.9*
- - aiguë *K55.0*
- - chronique *K55.1*
- - fulminante *K55.0*
- infarctus
- - cérébral *I63.9*

Ischémique *–suite*
- infarctus *–suite*
- - musculaire *M62.29*
- - territoire de l'artère cérébrale médiane *I63.5*
- insuffisance
- - cardiaque *I25.9*
- - cérébrale *I67.88*
- maladie
- - cardiaque *I25.9*
- - - aiguë *I24.9*
- - - chronique *I25.9*
- - - - hypertensive *I25.9*
- - - dans les antécédents familiaux *Z82*
- - cérébrale *I67.88*
- - cérébrovasculaire *I67.88*
- nécrose *R02*
- - cérébelleuse *I67.88*
- - cérébrale *I67.88*
- - système nerveux central NCA *I67.88*
- néphrose *N17.0*
- neuropathie
- - nerf optique *H47.0*
- - optique antérieure, idiopathique *H47.0*
- paralysie musculaire *T79.6*
- surdité *H93.0*
- - liée au développement *H93.0*
- surdité partielle
- - transitoire *H93.0*
- - - liée au développement *H93.0*

Ischiocapsulaire, entorse *S73.12*

Ischiofémorale, entorse *S73.18*

Ischion
- décubitus *L89.95*
- frature *S32.81*

Ischiopages *Q89.4*

Ischiorectal(e)
- abcès *K61.3*
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- fistule *K61.3*
- phlegmon *K61.3*
- tuberculose *A18.3+, K93.0**

Ischiothoracopages *Q89.4*

Iselin, maladie [ostéochondrose] d' *M92.7*

Iso-immunisation
- AB0
- - avec
- - - érythroblastose foetale *P55.1*
- - - ictère foetal *P55.1*
- - foetus/nouveau-né *P55.1*
- - prise en charge de la mère *O36.1*
- avec
- - encéphalopathie hyperbilirubinémique *P57.0*
- - - nouveau-né *P57.0*
- - hydropisie foetale *P56.0*
- - - prise en charge de la mère *O36.1*
- - ictère nucléaire *P57.0*
- - thrombocytopénie néonatale *P61.0*
- prise en charge de la mère *O36.1*
- Rh [rhésus]
- - avec ictère foetal *P55.0*
- - foetus/nouveau-né *P55.0*

Iso-immunisation, avec
- anémie, congénitale NCA *P55.9*
- ictère, néonatale NCA *P55.9*

Iso-immunisation, nouveau-né *P55.9*

isolé chromosome 5 del 5q)] , Syndrome myélodysplasique avec délétion *D46.6*

Isolé - *voir* Type de maladie

Isolement *Z29.0*
- familial *Z63*
- social *Z60*

Isoleucine
- anomalie de l'élimination *E71.1*
- anomalie du métabolisme *E71.1*

Isoleucinose *E71.1*

Isomaltose, intolérance, et saccharose, *E74.3*

Isomaltose, malabsorption *E74.3*

Isomérisme auriculaire *Q20.6*
- avec
- - asplénie *Q20.6*
- - polysplénie *Q20.6*

Isosexuelle, pseudo-puberté précoce chez *E25.8*

Isospora
- belli
- - colite *A07.3*
- - diarrhée *A07.3*
- - dysenterie *A07.3*
- - infection *A07.3*
- hominis
- - colite *A07.3*
- - diarrhée *A07.3*
- - dysenterie *A07.3*
- - infection *A07.3*
- infection, dans maladie causée par le VIH *B20, A07.3*

Isosthénurie *N19*

issue Double
- inlet ventricle Ventricule à double *Q20.4*
- outlet
- - left ventricle] , Ventricule gauche à double *Q20.2*
- - right ventricle] , Ventricule droit à double *Q20.1*

Isthme utérin
- sarcome
- - endomètre *C54.0*
- - muqueuse *C54.0*
- - stromal *C54.0*
- stromatose maligne *C54.0*

Itai-itai, maladie *T56.3*

itch Dhobie *B35.6*

Ivanoff-Blessig, kyste de *H33.1*

IVC [insuffisance veineuse chronique] *I87.2*

Ivemark, syndrome d' *Q89.0*

Ivresse
- aiguë
- - lors de dépendance à l'alcool *F10.0*
- - via
- - - alcool *F10.0*
- - - caféine *F15.0*
- - - cannabinoïdes *F12.0*
- - - cocaïne *F14.0*
- - - hallucinogènes *F16.0*
- - - hypnotiques *F13.0*
- - - opioïdes *F11.0*
- - - sédatifs *F13.0*
- - - solvant, gazéifiable *F18.0*

Ivresse *–suite*
- aiguë *–suite*
- - via *–suite*
- - - stimulants NCA *F15.0*
- - - substances psychotropes multiples *F19.0*
- aigue, en cas de dépendance à l'alcool *F10.0*
- chronique *F10.2*
- dépendance *F10.2*
- - chronique *F10.2*
- - périodique *F10.2*
- pathologique *F10.0*
- sommeil *F51.3*
- via
- - alcool *F10.0*
- - - avec délirium *F10.0*
- - - lors de dépendance *F10.2*
- - - pathologique *F10.0*
- - drogues, pathologiques *F19.0*
- - LSD (acide lysergique diéthylamide) *F16.0*
- - substances psychotropes NCA *F19.0*

IVU [infection des voies urinaires] *N39.0*

Ixodes, infestation *B88.8*

Ixodiase NCA *B88.8*

Jaccoud, arthropathie de *M12.09*
Jackson, épilepsie de *G40.1*
- Bravais- *G40.1*
- focale *G40.1*

Jackson, membrane de *Q43.3*
Jacobi, poïkilodermie atrophiante vascul *L94.5*
Jacquet, dermite de *L22*
Jactation *R25.0*
Jadassohn, épithélioma intraépidermique *D23.9*
Jadassohn, naevus bleu de *D22.9*
Jadassohn-Lewandowsky, syndrome de *Q84.6*
Jadassohn-Pellizzari, anétodermie de *L90.2*
Jaffé, ostéome ostéoïde de *D16.9*
Jaffé-Lichtenstein, maladie de
- monostotique *M85.09*
- polyostotique *Q78.1*

Jake, paralysie de *T62.2*
Jaksch-Hayem, anémie (anémie infantile) *D52.0*
Jalousie
- alcoolique avec psychose *F10.5*
- dans la fratrie *F93.3*
- infantile *F93.3*

Jamaïcaine, neuropathie *G62.2*
Jambe
- abcès *L02.4*
- absence
- - acquise *Z89.6*
- - au-dessus, genou, acquise *Z89.6*
- - bilatérale, acquise *Z89.7*
- - congénitale *Q72.8*
- - en-dessous, genou, acquise *Z89.5*
- agénésie totale *Q72.0*
- allongement *M21.79*
- amputation, traumatique *T13.6*
- angiospasme, traumatique *I73.9*
- anomalie NCA *Q74.2*
- anthrax *L02.4*
- arquées, difformité, tibia, syphilitique *A50.5+, M90.26**
- arquées, syphilitique *A50.5+, M90.29**
- arthrite *M13.99*
- artificielle, adaptation *Z44.1*
- athérosclérose *I70.20*
- AVC *I70.20*
- brûlure *T24.0*
- - 1er degré *T24.1*
- - 2ème degré, sauf cheville et pied *T24.20*
- - 3ème degré *T24.3*
- - degré
- - - 2a, sauf cheville et pied *T24.20*
- - - 2b, sauf cheville et pied *T24.21*
- - sauf cheville et pied *T24.0*
- carcinome *C76.5*
- contusion *T13.05*
- corrosion *T24.4*
- - cheville et du pied *T29.4*
- - degré
- - - 2a, sauf maléolle et pied *T24.60*
- - - 2b, sauf maléolle et pied *T24.61*
- - premier degré, sauf cheville et pied *T24.5*
- - sauf cheville et pied *T24.4*

Jambe *–suite*
- corrosion *–suite*
- - second degré, sauf cheville et pied *T24.60*
- - troisième degré, sauf cheville et pied *T24.7*
- crampe *R25.2*
- déformation *M21.06*
- - acquise *M21.06*
- déformation congénitale *Q74.1*
- deux
- - amputation, traumatique *T05.5*
- - paralysie *G82.29*
- difformité
- - acquise *M21.99*
- - congénitale *Q68.8*
- douleurs *M79.69*
- dysplasie *Q74.2*
- écrasement *T04.3*
- embolie *I80.3*
- - artérielle *I74.3*
- - et thrombose *I80.3*
- erysipèle *A46*
- et bras
- - absence
- - - acquise *Z89.8*
- - - bilatérale *Z89.8*
- - amputation traumatique, toute association *T05.6*
- forme O *M21.16*
- - acquise *M21.16*
- - congénitale *Q74.1*
- - rachitique *E64.3*
- fourmillements *R20.2*
- fracture
- - fermée *T12.0*
- - ouverte *T12.1*
- furoncle *L02.4*
- gangrène *R02*
- gelure
- - avec nécrose des tissus *T34.9*
- - superficielle *T33.9*
- gonflement *R22.4*
- hypoplasie, congénitale *Q72.9*
- infection cutanée NCA *L08.9*
- insuffisance veineuse chronique *I87.2*
- ischémie *I73.9*
- lésion *T13.9*
- - partie molle, grande *T13.1*
- - - avec tendinite *T13.8*
- lymphoedème *I89.0*
- maladie occlusive, artères *I70.20*
- malformation, NCA *Q68.8*
- mélanome, in situ *D03.7*
- mélanome, malin *C43.7*
- monoplégie *G83.1*
- muscle, lésion *T13.5*
- naevus *D22.7*
- nerf
- - lésion *T13.3*
- - lésion, périphérique *G57.9*
- occlusion, artère *I73.9*
- - aigu *I74.3*
- oedème *R60.0*
- - à obstruction, veine *I87.1*
- paralysie *G83.1*
- - hystérique *F44.4*
- - psychogène *F45.8*
- - transitoire *R29.8*

Jambe *–suite*
- paralysie *–suite*
- - transitoire *–suite*
- - - traumatique NCA *T13.3*
- parésie *G83.1*
- participation, à
- - brûlure
- - - cheville et pied *T29.0*
- - - pied *T29.0*
- - corrosion
- - - cheville *T29.4*
- - - pied *T29.4*
- phlébite *I80.3*
- - profonde *I80.2*
- - profonde, ulcère *I80.2*
- - superficielle *I80.0*
- - ulcèreuse *I80.3*
- - - superficielle *I80.0*
- - variqueuse *I83.1*
- phlegmon *L03.11*
- plaintes
- - rachis *M79.69*
- - vasculaires *I73.9*
- prolapsus
- - chez le foetus *P03.1*
- - complications, accouchement *O32.1*
- - obstruction, naissance *O64.8*
- - soins, mère *O32.1*
- pseudoparalysie *R29.8*
- raccourcissement *M21.79*
- - acquis *M21.79*
- - avec obliquité, bassin *M21.79*
- - congénital *Q72.8*
- sans repos *G25.8*
- septicémie, avec lymphangite *L03.11*
- thromboembolie, artérielle *I74.3*
- thrombophlébite *I80.3*
- - lors de la grossesse *O22.2*
- - prénatale *O22.2*
- - profonde *I80.2*
- - superficielle *I80.0*
- thrombose *I80.3*
- - artérielle *I74.3*
- - profonde *I80.2*
- - superficielle *I80.0*
- thrombose étagée *I80.3*
- trouble vasculaire *I73.9*
- - artériel *I73.9*
- - avec oedème *I73.9*
- ulcère variqueux *I83.0*
- ulcère, décubitus *L89.98*
- varice *I83.9*
- - avec dermite de stase, sans ulcère ou inflammation *I83.9*
- varices *I83.9*
- - couche *O87.8*
- - saignement *I83.9*
- veine, variqueuse *I83.9*

Janet, maladie de *F48.8*
Janiceps *Q89.4*
Japonaise
- encéphalite *A83.0*
- fièvre automnale *A27.8*
- fièvre des sept jours *A27.8*
- fièvre fluviale *A75.3*

Jarcho Levin, syndrome de *Q67.5*
Jarret

Jarret –*suite*
- blessure *S89.9*
- - superficielle *S80.9*
- mélanome in situ *D03.7*
- mélanome malin *C43.7*
- naevus *D22.7*
- plaie ouverte *S81.80*

Jaune
- atrophie, foie *K72.9*
- - aiguë *K72.0*
- - chronique *K72.1*
- - subaiguë *K72.0*
- corps. kyste du *N83.1*
- fièvre *A95.9*
- - dépistage *Z11*
- - jungle, de la *A95.0*
- - urbaine *A95.1*
- - vaccination, nécessité *Z24.3*
- orangé
- - allergie [E 110] *T78.4*
- - hypersensibilité [E 110] *T78.4*
- quinoléine
- - allergie [E 104] *T78.4*
- - hypersensibilité [E 104] *T78.4*
- syndrome des ongles *L60.5*

Jaunisse - *voir aussi* ictère *R17*
- fiévreuse, en cas d'hépatite virale *B15.9*

Jeghers, syndrome de Peutz- *Q85.8*

Jéjunal(e)
- diverticule *K57.10*
- érosion peptique *K28.9*
- ulcère peptique *K28.9*

Jéjunal, syndrome *K91.1*

Jéjunite *K52.9*
- due à
- - Aspergillus *B44.8+, K93.8**
- - cytomégalovirus *B25.80+, K93.8**
- gastro- *K52.9*
- - non infectieuse *K52.9*
- - présumée non infectieuse *K52.9*
- non infectieuse *K52.9*
- présumée non infectieuse *K52.9*

Jéjunostomie, avec complication *K91.4*

Jéjunum
- absence
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q41.1*
- agénésie *Q41.1*
- angiodysplasie *K55.8*
- anomalie *Q43.8*
- atrésie *Q41.1*
- - héréditaire *Q41.1*
- Crohn, maladie de *K50.0*
- dilatation *K59.8*
- - psychogène *F45.32*
- diverticule *K57.10*
- diverticulite *K57.12*
- diverticulose *K57.10*
- entérite régionale *K50.0*
- fistule *K63.2*
- hypertrophie *K63.8*
- imperforation *Q41.1*
- irritabilité *K59.8*
- lésion *S36.49*
- obstruction *K56.6*
- occlusion *K56.7*

Jéjunum –*suite*
- occlusion –*suite*
- - mécanique *K56.6*
- - paralytique *K56.0*
- perforation *K63.1*
- - foetus/nouveau né *P78.0*
- - traumatique *S36.49*
- - traumatisme obstétrical de la mère *O71.5*
- rétrécissement *K56.6*
- - congénital *Q41.1*
- rupture
- - foetus/nouveau né *P78.0*
- - non traumatique *K63.1*
- - traumatique *S36.49*
- stase *K59.8*
- sténose *K56.6*
- - congénitale *Q41.1*
- tuberculose *A18.3+, K93.0**

Jensen, syndrome de *H30.0*

Jet d'urine
- affaiblissement *R39.1*
- altération *R39.1*
- dévié *R39.1*
- division *R39.1*
- fractionné *R39.1*
- interrompu *R39.1*

Jet urinaire, diminué *R39.1*

Jeu
- obsessionnel *F63.0*
- pathologique *F63.0*

Jeune
- primigeste *Z35.6*
- primipare *Z35.6*

Jeune, maladie de *Q77.2*

Jirásek-Zuelzer-Wilson, syndrome de *Q43.1*

Joanny, Léri-, maladie de [mélorhéostose *M85.89*

Job, syndrome de *D82.4*

Jocularité (Witzelsucht) *F07.0*

Johansson-Larsen, ostéochondrose de *M92.4*

Johnson, syndrome de
- Dubin- *E80.6*
- Stevens- *L51.1*

Jonction
- pyélo-urétérale
- - atrésie *Q62.1*
- - obstruction *N13.5*
- - - congénitale *Q62.1*
- - sténose congénitale *Q62.1*
- recto-sigmoïdienne, carcinome in situ *D01.1*
- recto-sigmoïdienne, obstruction *K56.6*
- recto-sigmoïdienne, tumeur maligne *C19*
- sacro-iliaque, blocage *M99.84*

Jones, plasmocytome de Bence- *C90.00*

Jones-Henderson, Reichel- syndrome de *M24.09*

Joubert Boltshauser, syndrome de *Q04.3*

Joue
- abcès *K12.23*
- anomalie *Q18.9*
- basaliome *C44.3*

Joue –*suite*
- brulure *A69.0*
- carcinome, cellules basales *C44.3*
- difformité
- - acquise *M95.2*
- - congénitale *Q18.9*
- écrasement *S07.0*
- eczéma *L30.9*
- externe, mélanome malin *C43.3*
- interne
- - lésion, superficielle *S00.50*
- - plaie, ouverte *S01.52*
- lésion *S09.9*
- - superficielle *S00.80*
- mélanome, in situ *D03.3*
- mélanome, malin *C43.3*
- morsure *K13.1*
- naevus *D22.3*
- paroi, lésion *S09.9*
- peau, abcès *L02.0*
- phlégnome *L03.2*
- plaie, ouverte *S01.41*
- tumeur *D48.7*

Jugulaire, paragangliome *D44.7*

Jugulaire, veine
- anévrisme *I86.8*
- thrombose *I82.8*

Juhel-Renoy, syndrome de *N28.0*

Jumeaux
- accrochés, obstruction à la naissance *O66.1*
- dystocie, obstruction à la naissance *O66.1*
- elevés ensemble
- - avec
- - - disproportion, foeto-pelvienne *O33.7*
- - - dystocie *O66.3*
- - prise en charge de la mère *O33.7*
- fusion *Q89.4*
- mono-amniotique, avec compression cordon ombilical *O69.2*
- mono-amniotiques, avec compression cordon ombilical *O69.2*
- mort-né, à la suite de l'accouchement *Z37.4!*
- naissance
- - hors de l'hopital *Z38.4*
- - l'hôpital *Z38.3*
- né vivant, à la suite de l'accouchement *Z37.2!*
- né vivant, un mort né *Z37.3!*
- résultat de l'accouchement *Z37.9!*
- siamois *Q89.4*
- soudés asymétriques *Q89.4*

Jumeux, monstres *Q89.4*

Jüngling, syndrome de *D86.9*
- Perthes- *D86.8*

Junin, fièvre hémorragique de *A96.0*

juvénile Leucémie myélomonocytaire *C93.3*

Juvénile - *voir* Type de maladie

Juvénile, trouble du comportement *F93.2*

Juxtaarticulaire, nodule syphilitique *A52.7+, M14.8**

Juxtacortical
- chondrome *D16.9*

Juxtacortical *–suite*

- chondrosarcome *C41.9*
- ostéosarcome *C41.9*

Juxtaglomérulaire, tumeur *D41.0*

K43 6
- étranglée sans gangrène , tout hernie mentionné en *K43.6*
- tout hernie avec gangrène mentionné en *K43.7*

Kabuki-Niikawa-Kuroki, syndrome de *Q87.5*

Kahler, maladie de *C90.00*
- rémission complète *C90.01*

Kakké *E51.1*

Kallmann, syndrome de *E23.0*

Kanner, syndrome de *F84.0*

Kaolin, pneumoconiose *J62.8*

Kapok, allergie due à (avec rhinite) *J30.3*

Kaposi, éruption varicelliforme de *B00.0*

Kaposi, sarcome de *C46.9*
- cas de maladie due au VIH *B21, C46.9*
- conjonctive *C46.7*
- ganglion lymphatique *C46.3*
- organes multiples *C46.8*
- palais *C46.2*
- peau *C46.0*
- tissu conjonctif *C46.1*
- tissus mous *C46.1*

Karaya
- allergie [E 416] *T78.4*
- hypersensibilité [E 416] *T78.4*

Kartagener, syndrome de *Q89.3*

Kawasaki, syndrome de *M30.3*

Kazal Ronchese-Kern, angioréticulomatose *C46.9*

Kearns-Sayre, syndrome de *H49.8*

Kératite *H16.1*
- actinique *H16.1*
- arborescente, due au virus de l'herpes *B00.5+, H19.1**
- areolaris *H16.1*
- avec
- - glaucome secondaire *H40.4*
- - hypopyon *H16.0*
- - ulcère *H16.0*
- avec conjonctivite *H16.2*
- bande *H16.1*
- bullosa *H16.8*
- cas de
- - maladie infectieuse NCA *B99+, H19.2**
- - maladie, parasitaire NCA *B89+, H19.2**
- - rosacée *L71.8+, H19.3**
- - rougeole *B05.8+, H19.2**
- - syphilis, congénitale *A50.3+, H19.2**
- chronique *H16.8*
- dendritique *B00.5+, H19.1**
- - due au virus de l'herpes *B00.5+, H19.1**
- disciformis *B00.5+, H19.1**
- - cas de varicelle *B01.8+, H19.2**
- - due au virus de l'herpes *B00.5+, H19.1**
- due à
- - Acanthamibes *B60.1+, H19.2**
- - adénovirus *B30.0+, H19.2**
- - virus herpes *B00.5+, H19.1**
- - zoster *B02.3+, H19.2**
- eczémateuse *H16.8*
- filamenteuse *H16.1*
- filiforme *H16.1*

Kératite *–suite*
- gonorrhéique, prénatale *A54.3+, H19.2**
- herpétique *B00.5+, H19.1**
- interstitielle *H16.3*
- - congénitale
- - - syphilitique précoce *A50.0+, H19.2**
- - - syphilitique, tardive *A50.3+, H19.2**
- - non syphilitique *H16.3*
- - tuberculeuse *A18.5+, H19.2**
- interstitielle, en cas de
- - herpes
- - - simplex *B00.5+, H19.1**
- - - zoster *B02.3+, H19.2**
- lagophtalmique *H16.2*
- marginale *H16.0*
- neurotrophique *H16.2*
- non ulcéreuse *H16.9*
- nummulaire *H16.1*
- obstruction, conduit auditif *H60.4*
- oeil *T26.4*
- parenchymateuse *H16.3*
- - syphilitique, congénitale *A50.3+, H19.2**
- pétrifiante *H16.8*
- phlycténulaire *H16.2*
- photo- *H16.1*
- photo-électrique (des neiges) *H16.1*
- ponctuée *H16.1*
- - superficielle *H16.1*
- - syphilitique *A50.3+, H19.2**
- ponctuée superficielle, cornée *H16.1*
- profonde *H16.3*
- purulente *H16.8*
- - ulcéreuses *H16.8*
- scléro- *H16.8*
- sclérosante *H16.3*
- sicca
- - sous la forme de
- - - syphilitique, congénitale *A50.3+, H19.2**
- - - yeux secs, syndrome des *H04.1*
- soudeur *H16.1*
- stellaire *H16.1*
- superficielle *H16.1*
- - avec conjonctivite *H16.2*
- - sans conjonctivite *H16.1*
- superficielle cornée *H16.1*
- syphilitique, congénitale *A50.3+, H19.2**
- Thygesson *H16.8*
- tuberculeuse *A18.5+, H19.2**
- ulcère *H16.0*
- ulcéreuse *H16.0*
- uvéo- *H20.9*
- vésiculaire *H16.8*
- xérotique *H16.8*
- - cas d'avitaminose A *E50.4+, H19.8**

Kérato-acanthome *L85.8*
- paupière *L85.8*

Kératocèle *H18.7*

Kératocône *H18.6*
- congénital *Q13.4*
- syndrome de Down (dans le) *Q90.9+, H19.8**

Kératoconjonctive, troubles de l'humidit *H18.8*

Kératoconjonctivite *H16.2*

Kératoconjonctivite *–suite*
- actinique *H16.2*
- allergique *H16.2*
- cas de
- - Acanthamoebiose *B60.1+, H19.2**
- - herpes, zoster *B02.3+, H19.2**
- - Lagophtalmie *H16.2*
- - rougeole *B05.8+, H19.2**
- - syndrome de Sicca *M35.0+, H19.3**
- - syndrome de Sjögren *M35.0+, H19.3**
- - syphilis, congénitale *A50.3+, H19.2**
- - zoster *B02.3+, H19.2**
- chronique *H16.2*
- due à
- - adénovirus *B30.0+, H19.2**
- - - *H16.2*
- eczémateuse *H16.2*
- épidémique *B30.0+, H19.2**
- exposition *H16.2*
- herpétique *B00.5+, H19.1**
- infectieuse *B30.0+, H19.2**
- interstitielle
- - cas de
- - - rougeole *B05.8+, H19.2**
- - - syphilis, congénitale *A50.3+, H19.2**
- - - zoster *B02.3+, H19.2**
- - due à acanthamoebiose *B60.1+, H19.2**
- - tuberculeuse *A18.5+, H19.2**
- neurotrophique *H16.2*
- Newcastle *B30.8+, H13.1**
- phlycténulaire *H16.2*
- phlycténulaire, tuberculeuse *A18.5+, H19.2**
- photo-éléctrique *H16.2*
- Shipyard *B30.0+, H19.2**
- sicca
- - sous forme de
- - - syndrome de Sjögren *M35.0+, H19.3**
- - - yeux secs, syndrome des *H04.1*
- supérieure *H16.2*
- tuberculeuse *A18.5+, H19.2**

Kératodermie *Q82.8*
- acquise *L85.1*
- cas de syndrome de Reiter *M02.39+, L86**
- congénitale *Q82.8*
- gonorrhéique *A54.8+, L86**
- ménopausique *L85.1*
- palmaire et plantaire *Q82.8*
- palmo-plantaire *Q82.8*
- ponctuée *L85.2*
- symétrique *Q82.8*

Kératodermite congénitale *Q82.8*

Kérato-iritis *H20.9*
- syphilitique, congénitale *A50.3+, H22.0**
- tuberculeuse *A18.5+, H22.0**

Kératokyste *K09.0*
- odontogène *K09.0*

Kératomalacie *H18.4*
- avitaminose A, avec *E50.4+, H19.8**

Kératome *L57.0*
- angio- *D23.9*
- sénile *L57.0*

Kératomégalie *Q13.4*

Kératomycose *B49+, H19.2**
Keratomycosis nigricans *B36.1*
- palmaris *B36.1*
Kératopathie *H18.9*
- aiguë postopératoire *H59.8*
- avec érosion *H18.8*
- bulleuse *H18.1*
- - après chirurgie de la cataracte *H59.0*
- - associée à
- - - décompensation cornéenne *H18.1*
- - - dystrophie cornéenne *H18.1*
- - provoquée par glaucome *H18.1*
- - provoquée par IIO [implant intraoculaire] *H18.1*
- striée *H18.4*
- toxique d'origine médicamenteuse *H18.8*
Kératoprothèse, luxation *T85.3*
Kératosclérite tuberculeuse *A18.5+, H19.2**
Kératose *L57.0*
- actinique *L57.0*
- amygdales *J35.8*
- associée à avitaminose A *E50.8+, L86**
- folliculaire *Q82.8*
- - acquise *L11.0*
- - associée à avitaminose A *E50.8+, L86**
- - congénitale *Q82.8*
- - spinulosa *Q82.8*
- larynx *J38.7*
- leuco-, cordes vocales *J38.3*
- mibelli *Q82.8*
- nigricans *L83*
- obturante, oreille externe *H60.4*
- organes génitaux
- - féminins NCA *N94.8*
- - masculins *N50.8*
- palmaire et plantaire
- - acquise *L85.1*
- - héréditaire *Q82.8*
- palmaire et plantaire, héréditaire *Q82.8*
- palmoplantaire, acquise *L85.1*
- para-, cordes vocales *J38.3*
- pharynx *J39.2*
- pilaire
- - acquise *L85.8*
- - simple [kératose suprafolliculaire acquise] *L85.8*
- ponctuée palmaire et plantaire *L85.2*
- provoquée par
- - arsenic *L85.8*
- - gonocoques *A54.8+, L86**
- scrotum *N50.8*
- séborrhéique *L82*
- sénile *L57.0*
- suprafolliculaire [kératose pilaire simple], acquise *L85.8*
- végétante *Q82.8*
- verge *N48.8*
Kératosique, angiome verruqueux *D18.00*
Kératosique, syndrome *Q82.8*
Kérato-uvéite *H20.9*
Kératovitréen, syndrome *H59.0*
Kéraunique, paralysie *T75.0*
Kérion *B35.0*
- Celse, de *B35.0*
Kérosène, effet toxique *T52.0*
Keshan, maladie (cardiomyopathie) de *E59*
Khat, dépendance *F15.2*
Kinking *Q25.8*
Klavus *L84*
- infectieux *L84*
- inflammation *L84*
Klebsiella
- infection de Friedlaender *A49.8*
- infection rhinoscléromatis *A49.8*
- méningite *G00.8, B96.2!*
- pathogène *B96.2!*
- pneumoniae
- - bronchopneumonie *J15.0*
- - infection NCA *A49.8*
- - pneumonie *J15.0*
- - - congénitale *P23.6, B96.2!*
- - - lobaire *J15.0*
- résistante
- - amikacine *U80.4!*
- - bêta-lactamines [résistance ESBL] *U80.4!*
- - carbapénèmes *U80.4!*
- - quinolones *U80.4!*
Klinefelter
- anomalie de, chromosomes sexuels *Q98.4*
- Reifenstein, syndrome de *Q98.4*
- syndrome de *Q98.4*
- - caryotype 47 XXY *Q98.0*
- - phénotype masculin, avec
- - - caryotype 46XX *Q98.2*
- - - chromosome X, plus de deux *Q98.1*
Klippel-Feil, difformité de *Q76.1*
Klippel-Trenaunay-Weber, syndrome de *Q87.2*
Klumpke-Déjerine, paralysie de *P14.1*
Knuckle pads Coussinet phalange [*M72.1*
Köbner, maladie de *Q81.8*
Kocher, volvulus *K44.9*
Koch-Weeks, conjonctivite de *H10.0*
Köhler, maladie de *M92.4*
Köhler, ostéochondrose de
- Freiberg, de *M92.7*
- os métatarse II *M92.7*
- os naviculaire du pied *M92.6*
- patella *M92.4*
Köhler-I-, maladie de *M92.6*
Köhler-II, maladie de *M92.7*
- Freiberg, de *M92.7*
Köhler-Mouchet, syndrome de *M87.29*
Koïlonychie *L60.3*
- congénitale *Q84.6*
Kojewnikoff, épilepsie de *G40.5*
Kojewnikoff, syndrome de *G40.5*
König, ostéochondrose de *M92.8*
König-I, syndrome de *M92.8*
Krabbe maladie de *A66.1*
Kraurosis
- anus *K62.8*
- vagin *N89.8*
- verge *N48.0*
- vulve *N90.4*
- - et anus *N90.8*
- - et vagin *N90.4*
Kraurosis vulvaire *N90.4*
Krim-Congo, fièvre, hémorragique *A98.0*
Krukenberg, faisceau de *H18.0*
Krukenberg, tumeur de *C79.6*
Kufs, maladie de *E75.4*
- rétinienne *E75.4+, H36.8**
Kufs, syndrome de *E75.4*
- Batten *E75.4*
- - rétine *E75.4+, H36.8**
Kugelberg-Welander, syndrome de *G12.1*
Kuhnt-Junius, dégénérescence *H35.3*
- rétine *H35.3*
Kuhnt-Junius, syndrome de *H35.3*
- rétine *H35.3*
Kümmell-Verneuil, maladie de *M48.39*
Kunkel, syndrome de *K73.8*
- Bearn *K73.2*
Kupffer, sarcome des cellules de *C22.3*
Kuru *A81.8*
Kuru, maladie du (infection virale atypi *A81.8*
Kussmaul
- coma *E14.01*
- - cours de
- - - diabète type I *E10.01*
- - - diabète type II *E11.01*
- Landry, paralysie de *G61.0*
- Maier, syndrome de *M30.0*
- respiration *E87.2*
- - avec coma, diabétique *E14.01*
Kwashiorkor *E40*
Kwashiorkor avec marasme *E42*
Kyasanur, maladie de la forêt *A98.2*
Kyrle, maladie de *L87.0*
Kystadénome *D36.9*
Kyste
- à
- - échinocoques *B67.9*
- - hydatide (kyste hydatide) (kyste hydatiforme) *B67.9*
- adénoïde infecté *J35.8*
- amniotique *O41.8*
- anus *K62.8*
- apical *K04.8*
- appendice *K38.8*
- arachnoidien *G93.0*
- articulation NCA *M25.89*
- Baker, de *M71.2*
- - rupture *M66.0*
- - tuberculeux *A18.0+, M01.16**
- Bartholin, de *N75.0*
- bassin
- - accouchement difficile dû à (dystocie due à) *O65.5*
- - femme, chez la *N94.8*
- - - en cas de
- - - - accouchement *O34.8*
- - - - grossesse *O34.8*
- biliaire *K83.5*
- Blessig-Ivanoff, de *H33.1*
- bouche *K09.9*
- bouche, muqueuse *K09.9*
- bouche, région *K09.9*
- bouche, région, lié au développement *K09.1*
- bourse
- - pharyngée *J39.2*
- - synoviale NCA *M71.39*

Kyste –*suite*

- bourse séreuse *M71.39*
- branchial *Q18.0*
- - infectieux *Q18.0*
- - tumeur maligne *C10.4*
- bronchogénique *J98.4*
- - congénital *Q33.0*
- canal biliaire *K82.8*
- canal branchial *Q18.0*
- canal incisif (palatin antérieur) *K09.1*
- canthus, du *H11.4*
- carcinomateux (cancéreux) *C80*
- cartilage aryténoïde *J38.7*
- cérébral *G93.0*
- cerveau *G93.0*
- - à des hyatides *B67.9+, G94.8**
- - arachnoidien, congénital *Q04.6*
- - congénital *Q04.6*
- cervelet *G93.0*
- chambre antérieure de l'oeil *H21.3*
- - exsudatif *H21.3*
- - parasitaire *H21.3*
- chez la femme *Q52.8*
- chez l'homme *Q55.4*
- chiasma optique *H47.4*
- chocolat ovarien (endométriose) *N80.1*
- chocolat, ovaire *N80.1*
- cholédoque *Q44.4*
- - congénitale *Q44.4*
- chorionique *O41.8*
- chyleux *I89.8*
- clitoris *N90.7*
- coccyx *L05.9*
- - *M85.65*
- - avec abcès *L05.0*
- - infecté *L05.9*
- - malin *C44.5*
- coin de l'oeil *H11.4*
- col de l'utérus
- - utérus NCA *N88.8*
- - utérus, embryonnaire *Q51.6*
- colon *K63.8*
- congénital NCA *Q89.8*
- congénital, troisième ventricule cérébral *Q04.6*
- conjonctive *H11.4*
- corde vocale *J38.3*
- cordon spermatique *N50.8*
- cornée *H18.8*
- corps
- - albicans *N83.2*
- - luteum *N83.1*
- - - hémorragique *N83.1*
- - - rupture *N83.1*
- - pinéal *E34.8*
- - utérus, récidivant *N85.8*
- corps ciliaire *H21.3*
- - exsudatif *H21.3*
- - parasitaire *H21.3*
- corps jaune *N83.1*
- corps vitré *H43.8*
- couche *O92.70*
- Cowper, glandes de *N36.8*
- Dandy-Walker *Q03.1*
- dent *K09.0*
- - à un trouble du développement dentaire *K09.0*
- - éruption *K09.0*

Kyste –*suite*

- dent –*suite*
- - machoire inférieure *K09.0*
- - machoire supérieure *K09.0*
- - péri-odontal, latéral *K09.0*
- - primordial *K09.0*
- - radiculaire *K04.8*
- - résiduel *K04.8*
- dentaire *K04.8*
- - *K09.0*
- - mâchoire inférieure *K09.0*
- - mâchoire supérieure *K09.0*
- dermoïde *D36.9*
- - avec modifications, malignes *C56*
- - avec transformation maligne *C56*
- - bouche *K09.8*
- - coccygien *L05.9*
- - - avec abcès *L05.0*
- - coccyx *L05.9*
- - - avec abcès *L05.0*
- - orbite *D31.6*
- - ovaire *D27*
- dorsal *M70.8*
- ductus
- - cholédoque *K83.5*
- - - congénital *Q44.4*
- - cystique *K82.8*
- - déférent *N50.8*
- - hépatique *K83.5*
- - parotidien *K11.6*
- - sous-mandubulaire *K11.6*
- - sous-maxilaire *K11.6*
- - spermatique *N50.8*
- - stenonianus *K11.6*
- - thyroide *Q89.2*
- dura mater
- - encéphal *G93.0*
- - spinal *G96.1*
- endométriose *N80.9*
- endométriosique *N80.9*
- endometrium *N85.8*
- - ectopique *N80.9*
- entéral, congénital *Q43.8*
- entérique congénital *Q43.8*
- épidermique *L72.0*
- - bouche *K09.8*
- - orbite *D31.6*
- - peau *L72.0*
- - troisième ventricule *G93.0*
- épididyme *N50.8*
- épiglotte *J38.7*
- - congénital *Q31.8*
- épithélium *L72.0*
- éruptif, dent *K09.0*
- extravasation
- - glandes salivaires *K11.6*
- - - muqueux *K11.6*
- - parotide *K11.6*
- extravasation, par
- - glandes salivaires, muqueuse *K11.6*
- - parotidienne *K11.6*
- fente
- - bouche, région *K09.1*
- - machoire *K09.1*
- fissuraire
- - maxillaire *K09.1*
- - région buccale *K09.1*
- foie *K76.8*

Kyste –*suite*

- foie –*suite*
- - à des hydatides NCA *B67.8+, K77.0**
- - congénital *Q44.7*
- folliculaire
- - hémorragique *N83.0*
- - ovaire *N83.0*
- - ovarien *N83.0*
- - peau *L72.9*
- ganglion *M67.49*
- Gartner, canal de *Q50.5*
- gencive *K09.0*
- genou, intra-ligamentaire *M23.89*
- glande *K11.6*
- - lacrymale *H04.1*
- - sous-mandubulaire *K11.6*
- - sublinguale *K11.6*
- - vulvo-vaginale *N90.7*
- glande bulbo-urétrale *N36.8*
- glande pinéale *E34.8*
- glande sous-maxillaire *K11.6*
- glandes lacrymales *H04.1*
- glandes salivaires *K11.6*
- - congénital *Q38.4*
- glandes sous-linguales *K11.6*
- glandes sudoripares *L74.8*
- globulomaxilaire *K09.1*
- gorge
- - latéral *Q18.1*
- - médian *Q18.8*
- goudron ovaire *N83.1*
- Graaf, folicule de *N83.0*
- gros intestin *K63.8*
- hydatides, foie, dû à
- - échinococcose
- - - granulosus *B67.0*
- - - multiocularis *B67.5*
- hymen *N89.8*
- - embryonnaire *Q52.4*
- hypopharynx *J39.2*
- hypophyse *E23.6*
- implant
- - chambre antérieure de l'oeil *H21.3*
- - corps ciliaire *H21.3*
- - iris *H21.3*
- - vagin *N89.8*
- - vulve *N90.7*
- inclusion
- - peau *L72.0*
- - vagin *N89.8*
- - vulve *N90.7*
- intestin grêle *K63.8*
- intestinal *K63.8*
- intra-ligamentaire *M24.29*
- intra-sellaire *E23.6*
- involution, mammaire *N60.8*
- iris *H21.3*
- - exsudatif *H21.3*
- - parasitaire *H21.3*
- kérato- *K09.0*
- - odontogène *K09.0*
- lacrymal *H04.8*
- lait *N64.8*
- - couche *O92.70*
- langue *K14.8*
- - congénital *Q38.3*
- larmes *H04.8*
- larynx *J38.7*

Kyste –*suite*
- larynx –*suite*
- - congénital *Q31.8*
- lentille *H27.8*
- - congénital *Q12.8*
- lèvres *K13.0*
- - grandes lèvres *N90.7*
- - petites lèvres *N90.7*
- lèvres, fissure *K13.0*
- lié au développement, odontogène *K09.0*
- ligament large *Q50.5*
- ligament utérin large
- - bénin *N83.8*
- - embryonnaire *Q50.5*
- lors de
- - chromomycose sous-cutanée *B43.2+, L99.8**
- - cysticercose *B69.9*
- lutéine *N83.1*
- - *N83.2*
- - hémorragique *N83.1*
- - ovaire *N83.1*
- lutéinique técal (à lutéine técale) *N83.2*
- - ovaire *N83.1*
- lymphangiome *D18.19*
- lymphatique *I89.8*
- lympho-épithélial, dans la bouche *K09.8*
- mâchoire *K09.2*
- - anévrismatique *K09.2*
- - hémorragique *K09.2*
- - primordial *K09.0*
- - solitaire *K09.2*
- - traumatique *K09.2*
- machoire inférieure *K09.2*
- machoire supérieure *K09.2*
- macula *H35.3*
- malin *C80*
- mamelon *N60.0*
- mammaire *N60.0*
- - avec prolifération, épithéliale *N60.3*
- - bénin *N60.0*
- - chronique *N60.1*
- - pédiculé *N60.0*
- - solitaire *N60.0*
- marge de la paupière *H02.8*
- mastoide, cavité, suite à mastoidectomie *H95.1*
- maxilaire, antérieur, médian *K09.1*
- médian maxillaire antérieur *K09.1*
- médian palatin *K09.1*
- médian, face et cou *Q18.8*
- médian, palais *K09.1*
- médiastin, congénital *Q34.1*
- meibomius, glande de *H00.1*
- - infectée *H00.0*
- méninges *G93.0*
- - cérébral *G93.0*
- - spinal *G96.1*
- ménisque *M23.09*
- mésencéphale *G93.0*
- mésentère *K66.8*
- mesenterium *K66.8*
- - chyleux *I89.8+, K67.8**
- mésothélium *K66.8*
- moëlle épinière *G96.1*
- - sous-dural *G96.1*
- Moll, glande de *H02.8*

Kyste –*suite*
- mucus *M71.39*
- - vésicule biliaire *K82.8*
- Müller, voie de *Q50.4*
- muqueuse *L72.0*
- - mastoide, cavité, suite à mastoidectomie *H95.1*
- myometrium *N85.8*
- Naboth, folicule de, rompu *N88.8*
- narines *J34.1*
- naso labial naso - alvéolaire] , *K09.1*
- naso-palatin *K09.1*
- naso-pharynx *J39.2*
- néoplasique *D48.9*
- neurentérique, congénital *Q06.8*
- Nuck, canal de *N94.8*
- - congénital *Q52.4*
- odontogène *K09.0*
- - calcifié *D16.5*
- - foliculaire *K09.0*
- - primordial *K09.0*
- oeil NCA *H57.8*
- oeil, congénital *Q15.8*
- oesophage *K22.8*
- - congénital *Q39.8*
- omentum *K66.8*
- - congénital *Q45.8*
- ora serrata *H33.1*
- orbite *H05.8*
- - tissu *D31.6*
- oreille externe *Q18.1*
- organes génitaux, féminins, externes NCA *N90.7*
- origine, dent *K09.0*
- os de la machoire supérieure, odontogène, calcifié *D16.42*
- os de la machoire, latent *K10.0*
- os NCA *M85.69*
- - anévrismatique *M85.59*
- - solitaire *M85.49*
- - tibia, congénital *M85.66*
- ouraque *Q64.4*
- - congénital *Q64.4*
- ouverture, urétro-vésicale *N28.8*
- - congénital *Q62.8*
- ovaire *N83.1*
- - *N83.2*
- - à l'involution, manque, ovaire NCA *N83.2*
- - adhérent *N83.2*
- - au développement *Q50.1*
- - avec complications, naissance *O65.5*
- - congénital *Q50.1*
- - cours du développement *Q50.1*
- - foliculaire *N83.0*
- - hémorragique *N83.2*
- - lors de
- - - accouchement *O34.8*
- - - grossesse *O34.8*
- - multiloculaire *D39.1*
- - néoplasique *D27*
- - persistant *N83.2*
- - pseudo-mucineux *D27*
- - rompu *N83.2*
- - séreux *N83.2*
- - simple *N83.2*
- - torsion NCA *N83.2*
- - tuberculeux *A18.1+, N74.1**
- ovaire, adhérent *N83.2*

Kyste –*suite*
- ovaire, kystome (cystome) *D27*
- ovarien, dysontogénétique *Q50.1*
- palais, conduit nasal *K09.1*
- palais, médian *K09.1*
- pancréas *K86.2*
- - congénital *Q45.2*
- papille
- - incisif *K09.1*
- - palais *K09.1*
- para-ophoron *Q50.5*
- para-ovarien *Q50.5*
- paraphyse cérébrale, congénitale *Q04.6*
- parasitaire NCA *B89*
- parathyroïdien *E21.4*
- paraurétral *N36.8*
- parodontal *K04.8*
- - latéral *K09.0*
- parotide *K11.6*
- paupière *H02.8*
- - infectée *H00.0*
- paupière supérieure *H02.8*
- peau *L72.9*
- - épithélium *L72.0*
- - organes génitaux, masculins *N50.8*
- peau du sein *N60.8*
- pelvis rénal *N13.3*
- penis *N48.8*
- péri-apical *K04.8*
- péricoronaire *K09.0*
- péri-coronarien *K09.0*
- péri-dentaire *K04.8*
- péridontal *K04.8*
- - dent, latéral *K09.0*
- - latéral *K09.0*
- péri-pancréatique *K86.2*
- péritonéal *K66.8*
- peritoneum, chyleux *I89.8+, K67.8**
- péri-urétral, congénital *Q64.7*
- péri-ventriculaire, acquis, chez les nouveaux-nés *P91.1*
- pharynx *J39.2*
- pileux *L72.1*
- piliaire *L72.1*
- pilonidal *L05.9*
- - avec abcès *L05.0*
- - malin *C44.5*
- - sans abcès *L05.9*
- placenta, amniotique *O43.1*
- plèvre *J94.8*
- plexus choroïdes *G93.0*
- poplité *M71.2*
- poplité, rupture *M66.0*
- porencéphalique *Q04.6*
- - acquis *G93.0*
- portion (utérus) *N88.8*
- poumon *J98.4*
- - à des hydatides NCA *B67.9+, J99.8**
- poumon, bulbeux *J43.9*
- poumon, bulleux géant *J43.9*
- pré-auriculaire *Q18.1*
- prépuce *N48.8*
- - congénital *Q55.6*
- prétragal *Q18.1*
- processus vaginal *N94.8*
- - congénital *Q52.4*
- prostate *N42.8*
- pseudo-

Kyste –*suite*
- pseudo- –*suite*
- - pancréas *K86.3*
- - rétine *H33.1*
- pseudo-péritonéal *K66.8*
- pupille *H21.3*
- pupille, miotique *H21.2*
- racine, dent *K04.8*
- - machoire inférieure *K04.8*
- - machoire supérieure *K04.8*
- radiculaire
- - machoire supérieure *K04.8*
- - résiduel *K04.8*
- ramollissement, cerveau *G93.0*
- rate NCA *D73.4*
- rate, dû à des hydatides *B67.9+, D77**
- Rathke, fente de *E23.6*
- rectum *K62.8*
- - muqueux *K62.8*
- reins *N28.1*
- - *Q61.0*
- - *Q61.8*
- - acquis *N28.1*
- - - multiple *N28.1*
- - congénital *Q61.0*
- - multiple *Q61.3*
- - solitaire *N28.1*
- - - acquis *N28.1*
- - - congénital *Q61.0*
- rénal *Q61.0*
- rénal géant *N28.1*
- rétention
- - conjonctive *H11.4*
- - glandes salivaires *K11.6*
- - - muqueuse *K11.6*
- - glandes salivaires, muqueuse *K11.6*
- - mammaire *N60.0*
- - ovaire *N83.2*
- - palpébral *H02.8*
- - parotide *K11.6*
- - parotidienne *K11.6*
- - peau *L72.9*
- - sac lacrymal *H04.6*
- - vaginal *N89.8*
- - vulve *N90.7*
- rétine *H33.1*
- rétropéritonéale *K66.8*
- rhinopharynx *J39.2*
- Sampson *N80.1*
- sclère *H15.8*
- scrotum *L72.1*
- scrotum, peau *L72.9*
- sébacé *L72.1*
- - lèvres
- - - grandes lèvres *N90.7*
- - - petites lèvres *N90.7*
- - mammaire *N60.8*
- - organes génitaux
- - - féminins *N94.8*
- - - masculins *N50.8*
- - penis *N48.8*
- - scrotum *L72.8*
- sein, peau *N60.8*
- sinus éthmoïdal *J34.1*
- sinus frontal *J34.1*
- sinus maxillaire *J34.1*
- sinus pilonidal *L05.9*
- - avec abcès *L05.0*

Kyste –*suite*
- sinus pilonidal –*suite*
- - infection *L05.9*
- sinus sphénoïdal *J34.1*
- sinus, maxilaire *J34.1*
- sinus, nez *J34.1*
- Skene, glandes de *N36.8*
- sous arachnoïdien, fosse crânienne, postérieure *G93.0*
- sous-dural, cérébral *G93.0*
- sous-urétral *N36.8*
- Stafne *K10.0*
- - maxillaire inférieur *K10.0*
- Stafne, de *K10.0*
- - machoire inférieure *K10.0*
- Stensen, canal de *K11.6*
- suite à une mastoidectomie *H95.1*
- surrénal *E27.8*
- - congénital *Q89.1*
- Syndrome de la queue de cheval *G95.88*
- synovial *M71.39*
- - poplité *M71.2*
- système nerveux NCA *G96.8*
- tarse *H00.1*
- tendon *M67.89*
- testicule *N50.8*
- testicules *N50.8*
- thymus *E32.8*
- - congénital *Q89.2*
- thyroide *Q89.2*
- thyroïde *E04.1*
- tissu mou, oral *K09.9*
- tonsille *J35.8*
- Tornwaldt *J39.2*
- Tornwaldt, de *J39.2*
- tractus thyréoglosse *Q89.2*
- trichilemmal *L72.1*
- trompe de Fallope *N83.8*
- - congénital *Q50.4*
- trompes de Fallope *N83.8*
- - embryonnaire *Q50.4*
- tubo-ovarien *N83.8*
- - *Q50.4*
- - inflammatoire *N70.1*
- tunique vaginale *N50.8*
- Tyson, glande de *N48.8*
- uretère *N28.8*
- urètre *N36.8*
- utérus *N85.8*
- - bénin *N85.8*
- - embryonnaire *Q51.8*
- - récidive *N85.8*
- utriculus *N42.8*
- vagin *N89.8*
- - congénital *Q52.4*
- - embryonnaire *Q52.4*
- - squameux *N89.8*
- ventricule cortical, troisième, congénital *Q04.6*
- vésicule biliaire *K82.8*
- vésicule séminale *N50.8*
- vessie *N32.8*
- voies lacrymales *H04.6*
- vulve *N90.7*
- - congénital *Q52.7*
- Wharton, canal de *K11.6*
- Wolff, canal de
- - chez la femme *Q52.8*

Kyste –*suite*
- Wolff, canal de –*suite*
- - chez l'homme *Q55.4*

kystique
- Infection hépatique Echinococcus granulosus [echinococcose *B67.0*
- occlusion intestinal due bouchon de méconium dans la mucoviscidose , [Au cours de fibrose *E84.11†, P75**
- sans précision Infection à Echinococcus granulosus [echinococcose *B67.4*

Kystique - *voir* nature de la maladie

Kystique, cystite granulomateuse *N30.8*

Kystique, goitre *E04.2*

Kystique, maladie de la mamelle *N60.1*

Kystique, maladie du foie *Q44.6*
- congénitale *Q44.6*

Kystique, maladie du rein pluri- *Q61.9*
- autosomique dominant *Q61.2*
- autosomique récessif *Q61.1*
- médullaire *Q61.5*

Kystique, mastite chronique *N60.1*

Kystique, oeil *Q11.0*

Kystique, poumon *J98.4*
- congénital *Q33.0*

L5, syndrome *M54.16*

L5/S1, blocage *M99.83*

labial naso alvéolaire Kyste (de) : naso - *K09.1*

Labile
- diabète sucré *E10.90*
- facteur, carence
- - acquise *D68.4*
- hypertonie *I10.90*
- personnalité *F60.4*
- système vasomoteur *I73.9*
- Tension artérielle *I99*
- troubles émotionnels organiques *F06.6*

Labilité
- affective *F38.0*
- circulatoire *I99*
- - lors de la grossesse *O99.4*
- cycle, ménopause *N95.0*
- émotionnelle *R45.8*
- humeur *F38.0*
- - *R45.8*
- neurovégétative *R45.8*
- psychovégétative *R45.8*
- végétative *R45.8*

Laboratoire
- examens *Z01.7*
- Test *Z01.7*
- - des raisons de médecine légale NCA *Z04.8*

Labyrinthe *H83.0*
- affection *H83.9*
- aigue *H83.0*
- blocage *H83.8*
- dégénérescence *H83.8*
- - congénitale, avec atteinte de l'audition *Q16.5*
- déséquilibre *H83.2*
- fistule *H83.1*
- hémorragie *H83.8*
- hydrolabyrinthe *H81.0*
- hyperémie *H83.0*
- hyperréactivité *H83.2*
- hypersensibilité *H83.2*
- hypofonction *H83.2*
- inflammation *H83.0*
- irritation *H83.2*
- maladie *H83.9*
- membraneux
- - anomalie *Q16.5*
- - aplasie *Q16.5*
- - collapsus, congénital *Q16.5*
- - hypoplasie *Q16.5*
- oreille, blessure *S09.9*
- osseux
- - dégénérescence *H83.8*
- - fracture *S02.1*
- - implication, en cas d'otosclérose *H80.2*
- suppuration *H83.0*
- surdité *H90.5*
- tégumentaire
- - agénésie *Q16.5*
- - anomalie *Q16.5*
- trouble *H83.2*
- trouble vasculaire *H93.0*
- troubles fonctionnels *H83.2*

Labyrinthique, vertige *H81.0*

Labyrinthite *H83.0*

Labyrinthite *–suite*
- aiguë *H83.0*
- circonscrite *H83.0*
- destructrice *H83.0*
- diffuse *H83.0*
- fenêtre *H83.0*
- latente *H83.0*
- oreille interne *H83.0*
- purulente *H83.0*
- syphilitique *A52.7+, H94.8**

Lacération, contusion *T14.1*

Lacrymal, -le
- glande, kyste *H04.1*
- kyste *H04.8*

Lactase, carence
- congénitale *E73.0*
- génétique, induite par *E73.0*
- secondaire *E73.1*

Lactose
- intolérance *E73.9*
- - congénitale *E73.9*
- Malabsorption *E73.9*

Lacunaire
- crâne *Q75.8*
- syndrome NCA *I67.9+, G46.7**
- - pure
- - - moteur *I67.9+, G46.5**
- - - sensoriel *I67.9+, G46.6**

LADA [Latent (or late-onset) autoimmune *E10.90*

Lafora, maladie de *G40.3*

Lagophtalmie *H02.2*
- due à parésie, faciale *H02.2*
- induite par une cicatrice *H02.2*
- kératite avec conjonctivite *H16.2*
- mécanique *H02.2*
- nerveuse *H02.2*
- paralytique *H02.2*

LAH - *voir* , lobe antérieur de l'hypophy

LAID Lymphadénopathie angio immunoblastique avec dysprotéinémie [*C86.5*

Laissé en place, retardé
- développement mental *F79.9*
- placenta, avec saignement en couche *O72.2*
- placenta, avec saignement postpartum *O72.0*
- racine, dent *K08.3*

Lait
- aspiration *P24.3*
- carence, en couche *O92.40*
- dermite *L27.2*
- dermite par contact *L25.4*
- - allergique *L23.6*
- - toxique *L24.6*
- engorgement *P83.4*
- épaissi, avec obstruction intestinale, chez les nouveaux-nés *P76.2*
- hypersécrétion *O92.60*
- inhalation, avec pneumonie *J69.0*
- intolérance NCA *K90.4*
- maladie *T62.8*
- mamelon
- - adénome *D24*
- - carcinome *C50.8*
- - carcinome in situ *D05.1*

Lait *–suite*
- mamelon *–suite*
- - ectasie *N60.4*
- - kyste *N64.8*
- - papillomatose, sous-alvéolaire *D24*
- - papillome *D24*
- maternel, inhibiteur, avec ictère, chez les nouveaux-nés *P59.3*
- obstruction *O92.70*
- - couche *O92.70*
- pneumonie par aspiration *J69.0*
- rétention *O92.70*
- - post-partum *O92.70*
- - puerpérale *O92.70*
- vache
- - allergie *L27.2*
- - hypocalcémie, chez le nouveau-né *P71.0*
- - protéines, intolérance *T78.1*

Lallation *F80.0*
- psychique *F80.0*

Lambert-Eaton, syndrome de *C80+, G73.1**
- non associé à une tumeur *G70.8*

Lamblia intestinalis
- colite *A07.1*
- diarrhée *A07.1*
- dysenterie *A07.1*
- entérite, infectieuse *A07.1*

Lambliasis *A07.1*

Lamellaire
- Ichtyose *Q80.2*
- lésion, cornée *S05.0*

Landau-Kleffner, syndrome de *F80.3*

Landouzy-Déjerine, dystrophie de *G71.0*

Landry, maladie ou paralysie ascendante *G61.0*

Landry-Guillain-Barré, syndrome de *G61.0*

Landsteiner-Fanconi-Andersen, syndrome d *E84.9*

Langage
- indistinct *R47.1*
- inspiratoire *R47.8*
- non distinct *R47.1*
- perte *R48.8*
- problème, lié au développement *F80.9*
- troubles *R47.8*
- - développement
- - - réceptifs *F80.28*
- - - type expressif *F80.1*
- - expressifs *F80.1*
- - liés au développement, mixtes *F80.28*
- - réceptifs *F80.28*
- troubles NCA *R47.8*

Langat, virus, encéphalite *A84.8*

Langdon Down, syndrome de *Q90.9*

Lange II, syndrome, de *Q87.1*
- type de dégénérescence *Q87.1*

Langerhans
-
- Histiocytose unifocale cellules de *C96.6*
- multifocale
- - multisystémique disséminé Maladie d ' Abt - Letterer - Siwe] , Histiocytose à cellules de *C96.0*
- - unisystémique Histiocytose à cellules de *C96.5*

Langerhans –*suite*
- Sarcome cellules de *C96.4*

Langerhans, cellules de
- granulomatose NCA aigue *C96.0*

Langhans, tumeur *C73*

Langue
- abcès *K14.0*
- - à des staphylocoques *K14.0, B95.8!*
- acanthose *K14.3*
- adhérence, congénitale *Q38.3*
- - avec les gencives *Q38.3*
- affection congénitale *Q38.3*
- affection fongique *B37.0*
- agénésie *Q38.3*
- anomalie *Q38.3*
- anomalie de position, congénitale *Q38.3*
- atrophie *K14.8*
- - sénile *K14.8*
- base
- - angine *J03.9*
- - glande thyroïde *Q89.2*
- - hyperplasie *K14.8*
- - struma *Q89.2*
- - tonsillite *J03.9*
- bifide *Q38.3*
- brulure *K14.6*
- brulures *T28.0*
- cicatrice *K14.8*
- corps étranger *T18.0*
- corrosion *T28.5*
- crénelée *K14.8*
- diffuse *K14.8*
- douleurs *K14.6*
- duplication *Q38.3*
- entaillée *K14.8*
- épithélium buccal, erythroplasie *K13.2*
- érythème migrans *K14.1*
- érythroplasie *K13.2*
- fibrome *D21.0*
- fibrose, sous-muqueuse *K13.5*
- fissure
- - acquise *K14.5*
- - congénitale *Q38.3*
- fourchue, congénitale *Q38.3*
- frein, racourcissement *Q38.1*
- frénelum, hypertrophie *K14.8*
- géographique *K14.1*
- gumma syphilitique *A52.7+, K93.8**
- hémiatrophie *K14.8*
- hypertrophie *K14.8*
- - congénitale *Q38.2*
- hypertrophie papille *K14.3*
- hypertrophique *Q38.2*
- hypoplasie *Q38.3*
- infection NCA *K14.0*
- inflammation, migratoire *K14.1*
- inflammatoire *K14.0*
- kyste *K14.8*
- - congénital *Q38.3*
- lésions *S09.9*
- - superficielles *S00.50*
- leucoedème *K13.2*
- leucoplasie *K13.2*
- lèvres, larynx, paralysie *G12.2*
- maladie *K14.9*
- - parasitaire NCA *B37.0*
- malformation *Q38.3*

Langue –*suite*
- malformation –*suite*
- - acquise *K14.8*
- - congénitale *Q38.3*
- manque, congénital *Q38.3*
- myoblastome, cellules granuleuses *D10.1*
- papilles, hypertrophie *K14.3*
- papillite *K14.0*
- paralysie *K14.8*
- pileuse *K14.3*
- - noire *K14.3*
- plaie, ouverte *S01.54*
- plaques *K13.2*
- plaques des parois *K14.1*
- plicaturée *K14.5*
- - congénitale *Q38.3*
- saignements *K14.8*
- scission *Q38.3*
- scrotale *K14.5*
- - congénitale *Q38.3*
- sillons *K14.5*
- - congénitale *Q38.3*
- spasmes *K14.8*
- surnuméraire *Q38.3*
- syphillis tertiaire *A52.7+, K93.8**
- trifide *Q38.3*
- triple *Q38.3*
- troubles *K13.2*
- tubeuculose *A18.8+, K93.8**
- tylose *K13.2*
- ulcération *K14.0*
- - traumatique *K14.0*
- ulcère *K14.0*
- vésicules cutanées *K12.1*
- villeuse *K14.3*
- - noire *K14.3*

Languettes de la corne postérieure du mé *S83.2*

Lannelongue, maladie de *M92.5*

Lanugo *Q84.1*

Large
- Abcès du ligament utérin *N73.2*
- condylome *A51.3*
- - syphilitique, congénitale *A50.0*
- cysticercose *B70.0*

Large, grand, -de
- Angulus iridocornealis *H40.0*
- espacement, dent *K07.3*
- suture, chez le nouveau né *P96.3*

Larmes
- oeil *H57.8*
- problème *H04.9*

Larmoiement
- diminué *H04.1*
- excessif *H04.9*

Laron, nanisme de *E34.3*

Larsen, syndrome de *Q74.8*

Larsen-Johansson, maladie (ostéochondros *M92.4*

Larva migrans viscérale NCA *B83.0*

Larve
- anisakis, infection *B81.0*
- Diphyllobothrium, infestation *B70.1*
- infection *B70.1*
- Toxocara canis, infestation *B83.0*

Larve –*suite*
- vers
- - Bothriocephalus latus, infestation *B70.1*
- - Dibothriocephalus, infestation *B70.1*
- - Diphyllobothrium latum
- - - diphyllobothrium, infestation par *B70.1*
- - - infestation *B70.1*
- - Diphyllobothrium latum, infestation *B70.1*
- - Diphyllobothrium, infestation *B70.1*
- - Taenia solium, infestation *B69.9*

Larvé(e)
- dépression *F32.8*
- - épisode isolé *F32.8*
- psychose *F28*

Laryngé(e)
- stridor congénital *P28.8*
- toux, quinteuse *R05*

Laryngé, nerf, névralgie *G52.2*

Laryngisme *J38.5*
- congénital *P28.8*
- diphtérique *A36.2*
- striduleux *J38.5*

Laryngite *J04.0*
- aiguë *J04.0*
- allergique *J37.0*
- associée à
- - candidose *B37.88*
- - diphtérie *A36.2*
- - grippe *J11.1*
- - - présence du virus de la grippe aviaire confirmée *J09*
- - - présence d'un virus grippal confirmée, à l'exclusion du virus de la grippe aviaire *J10.1*
- - trachéite *J04.2*
- - - chronique *J37.1*
- atrophique *J37.0*
- - infectieuse *J37.0*
- avec
- - enrouement *J04.0*
- - trachéite obstructive *J05.0*
- catarrhale *J37.0*
- chronique *J37.0*
- - avec trachéite *J37.1*
- - provoquée par substance active exogène *J37.0*
- chronique hyperplasique *J37.0*
- congénitale, syphilis précoce *A50.0+, J99.8**
- diphtérique *A36.2*
- fébrile *J04.0*
- hyperplasique chronique *J37.0*
- hypertrophique *J37.0*
- - hyperplasique *J37.0*
- obstructive *J05.0*
- - aiguë *J05.0*
- oedémateuse *J04.0*
- - aiguë *J04.0*
- pachydermique *J38.7*
- pharyngo-, chronique *J37.0*
- Plaut-Vincent *A69.1*
- provoquée par
- - Borrelia vincenti *A69.1*
- - Haemophilus influenzae *J04.0, B96.3!*
- - streptocoques *J04.0, B95.5!*
- purulente *J04.0*

Laryngite *–suite*
- purulente *–suite*
- - aiguë *J04.0*
- rhino-, chronique *J37.0*
- rhinopharyngo- *J06.0*
- - chronique *J37.0*
- sèche *J37.0*
- sous-glottique *J04.0*
- - aiguë *J04.0*
- spasmodique *J05.0*
- - aiguë *J04.0*
- striduleuse *J05.0*
- suppurée *J04.0*
- syphilitique congénitale *A50.5+, J99.8**
- syphilitique tertiaire *A52.7+, J99.8**
- trachéo-, aiguë *J04.2*
- tuberculeuse *A16.4*
- - associée à une trachéite chronique *A16.4*
- - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.5*
- ulcéreuse *J04.0*
- - aiguë *J04.0*
- Vincent, de *A69.1*

Laryngobronchite *J40*

Laryngocèle *Q31.3*
- congénitale *Q31.3*
- ventriculaire *Q31.3*

Laryngocèle ventriculaire *Q31.3*

Laryngomalacie congénitale *Q31.5*

Laryngopharyngite *J06.0*
- aiguë *J06.0*
- chronique *J37.0*
- sicca *J37.0*

Laryngopharyngotrachéite *J06.8*

Laryngotrachéal
- fente *Q31.8*
- - partielle *Q31.8*
- - totale *Q31.8*
- fistule, congénitale *Q34.8*

Laryngotrachéite *J04.2*
- aiguë *J04.2*
- atrophiante *J37.1*
- cas de grippe *J11.1*
- catarrhale *J04.2*
- catarrhale chronique *J37.1*
- chronique *J37.1*
- - provoquée par substance active exogène *J37.1*
- diphtérique *A36.2*
- hypertrophique *J37.1*
- infectieuse *J04.2*
- pachydermique *J38.7*
- pharyngo- *J06.8*
- provoquée par
- - Borrelia vincenti *A69.1*
- - Haemophilus influenzae *J04.2, B96.3!*
- - streptocoques *J04.2, B95.5!*
- sèche *J37.1*
- spasmodique *J38.5*
- - aiguë *J05.0*
- striduleuse *J38.5*
- syphilitique congénitale *A50.5+, J99.8**
- syphilitique tertiaire *A52.7+, J99.8**
- tuberculeuse *A16.4*
- Vincent, de *A69.1*

Laryngotrachéite Plaut-Vincent *A69.1*

Laryngotrachéite, striduleuse *J38.5*

Laryngotrachéobronchite *J40*
- aiguë *J20.9*
- chez
- - l'adolescent *J40*
- - l'adulte *J40*
- - l'enfant *J20.9*
- chronique *J42*
- pharyngo- *J40*

Laryngotrachéobronchopneumonie *J18.0*

Larynx
- abcès *J38.7*
- absence
- - acquise *Z90.0*
- - congénitale *Q31.8*
- adénome *D14.1*
- affection *J38.7*
- agénésie *Q31.8*
- amylose *E85.4+, J99.8**
- anomalie musculaire *Q31.9*
- artificiel, présence *Z96.3*
- asphyxie causée par des mucosités *T17.3*
- atrésie *Q31.8*
- atrophie *J38.7*
- brûlure *T27.0*
- brûlure caustique *T27.4*
- - avec atteinte pulmonaire *T27.5*
- calcification sénile *J38.7*
- carcinome in situ *D02.0*
- catarrhe chronique *J37.0*
- chondromalacie *Q31.8*
- chondrome *D14.1*
- cicatrice *J38.7*
- constriction *J38.6*
- - congénitale *Q31.8*
- - sous-glottique congénitale *Q31.1*
- contusion *S10.0*
- corps étranger *T17.3*
- - asphyxie *T17.3*
- dilatation congénitale *Q31.3*
- diphtérie *A36.2*
- dysfonctionnement neurovégétatif *F45.33*
- - hystérique *F44.4*
- - sensoriel *F45.33*
- écrasement *S17.0*
- épaississement *J38.7*
- érysipèle *A46*
- fibrose cicatricielle *J38.7*
- fissure *J38.7*
- - congénitale *Q31.8*
- fistule *J38.7*
- fixation *J38.7*
- fracture *S12.8*
- gomme syphilitique *A52.7+, J99.8**
- granulome *J38.7*
- hémangiome *D18.05*
- hyperesthésie *J38.7*
- - hystérique *F44.88*
- hypoplasie *Q31.2*
- incoordination dystonique *F45.33*
- infection NCA *J38.7*
- inflammation *J04.0*
- - aiguë *J04.0*
- - chronique *J37.0*
- - diphtérique *A36.2*
- kératose *J38.7*
- kyste *J38.7*

Larynx *–suite*
- kyste *–suite*
- - congénital *Q31.8*
- léiomyosarcome *C32.9*
- lésion traumatique NCA *S19.8*
- lésion traumatique superficielle *S10.10*
- leucoplasie *J38.7*
- lipoïdose *E75.6*
- malformation
- - acquise *J38.7*
- - congénitale *Q31.8*
- malformation congénitale *Q31.9*
- malposition congénitale *Q31.8*
- membrane
- - glottique *Q31.0*
- - sous-glottique *Q31.0*
- muqueuse, hémorragie *J38.7*
- myome *D14.1*
- myxome *D14.1*
- nécrose *J38.7*
- nodule *J38.7*
- obstruction congénitale *Q31.8*
- obstruction NCA *J38.6*
- occlusion NCA *J38.6*
- - congénitale *Q31.8*
- - défectueuse *Q31.8*
- oedème *J38.4*
- ossification *J38.7*
- pachydermie *J38.7*
- papillomatose *D14.1*
- paralysie *J38.00*
- - complète *J38.00*
- - complète, unilatérale *J38.02*
- - due à la diphtérie *A36.2*
- - partielle
- - - bilatérale *J38.03*
- - - unilatérale *J38.01*
- périchondrite *J38.7*
- - syphilitique tertiaire *A52.7+, J99.8**
- - tuberculeuse *A16.4*
- perte *Z90.0*
- phtisie *A16.4*
- plaie ouverte *S11.01*
- plegmon *J38.7*
- polype *J38.1*
- ptérygion *Q31.0*
- - glottique *Q31.0*
- ptose *J38.7*
- sclérose *J38.7*
- spasme *J38.5*
- - hystérique *F44.4*
- - psychogène *F45.33*
- sténose *J38.6*
- - congénitale NCA *Q31.8*
- - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - - congénitale *A50.5+, J99.8**
- sténose grave NCA *J38.6*
- - congénitale NCA *Q31.8*
- - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - - congénitale *A50.5+, J99.8**
- syndrome *G24.0*
- syphilis *A52.7+, J99.8**
- - avec périchondrite *A52.7+, J99.8**
- syphillis tertiaire *A52.7+, J99.8**
- trachée
- - brûlure caustique, avec atteinte pulmonaire *T27.5*

Larynx –*suite*
- trachée –*suite*
- - brûlure, avec atteinte pulmonaire *T27.1*
- - fusion *Q34.8*
- tuberculose *A16.4*
- - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.5*
- ulcération *J38.7*
- - aphteuse *J38.7*
- - diphtérique *A36.2*
- urticaire *T78.3*
- - héréditaire *D84.1*
- ventricule, prolapsus *J38.7*
- voile, sous-glottique *Q31.0*

Lassitudo ou sensation de fatigue physiq *R53*
- due à la sénilité *R54*

Latah (Forme de dépression en Extrême-Or *F48.8*

Latent
- anémie *D64.9*
- diabète sucré *R73.0*
- - associé à l'auto-immunité *E10.90*
- - cours de la grossesse *O24.9*
- framboesia ou pian *A66.8*
- goitre, avec hyperthyroïdie *E05.0*
- hypéropie *H52.0*
- hyperthyréose *E05.9*
- hypertonie *I10.90*
- hypothyréose *E03.9*
- kyste, des maxillaires *K10.0*
- labyrinthite *H83.0*
- menstruations *N92.5*
- neurosyphilis *A52.3*
- nystagmus *H55*
- prolapsus, rectum *K62.3*
- psychose *F28*
- réaction, schizophrénique *F21*
- schizophrénie *F21*
- strabisme *H50.5*
- strabisme interne *H50.5*
- strabisme par dévation verticale, non parétique *H50.2*
- syndrome de dysfonctionnement sinusal *I49.5*
- syphilis *A53.0*
- - innée
- - - stade précoce *A50.1*
- - - stade tardif *A50.6*
- - post-cure *A53.0*
- - système nerveux central *A52.2*
- syphilis précoce *A51.5*
- - avec
- - - réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien *A51.5*
- - - récidive, sérlogique, après traitement *A51.5*
- - innée *A50.1*
- - - réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien *A50.1*
- - réaction sérologique positive *A51.5*
- syphilis tardive *A52.8*
- - innée *A50.6*
- - innée ou congénitale *A50.6*
- - - réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien *A50.6*
- - réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien *A52.8*
- tabès *A52.1*

Latent –*suite*
- tubeuculeux *A16.9*

Late-onset-Asthma ou asthme tardif *J45.9*

Latéral *voir* type de maladie
- branche terminale du nerf fibulaire profond, lésion traumatique *S94.2*
- déplacement du globe oculaire *H05.2*
- distorsion du ligament latéral, genou *S83.41*
- fistule, cou *Q18.1*
- fracture
- - col du fémur *S72.08*
- - l'extrémité supérieure du tibia *S82.18*
- fracture de compression, bassin *S32.89*
- infarctus du myocarde haut
- - récidivant *I22.8*
- - transmural aigu *I21.2*
- infarctus, myocarde
- - aigu, transmural *I21.2*
- - récidivant *I22.8*
- kyste
- - cou *Q18.1*
- - dentaire, périodontal *K09.0*
- - parodontal *K09.0*
- médullaire, Syndrome *I66.3+, G46.4**
- ménisque, déchirure, genou *S83.2*
- paralysie *G12.2*
- raccourcissement, du pénis *Q55.6*

Lateroflexio uteri ou latéroflexion de l *N85.4*

Lateropositio uteri ou latéroversion de *N85.4*

Latéroversion
- col de l'utérus, avec entrave, naissance *O65.5*
- utérus
- - avec
- - - césarienne *O34.5*
- - - entrave, accouchement *O65.5*
- - congénitale *Q51.8*
- - post-infectieux *N85.4*
- - post-partum *N85.4*

Lathyrisme *T62.2*

Laudanum, dépendance *F11.2*

Launois-Bernsaude, adénôlipomatose de *E88.8*

Laurence-Moon-Bardet-Biedl, syndrome de *Q87.8*

lavandière greffon contre l'hôte maladie de aigue stade 4 *T86.02+, L99.14**

Lavy-Palmer-Merritt, syndrome de *Q67.5*

Laxatifs
- abus *F55.1*
- accoutumance *F55.1*
- stimulants, empoisonnement *T47.2*

LCR, test négatif, en cas de
- syphilis précoce, latente, congénitale *A50.1*
- syphilis tertiaire, latente, congénitale *A50.6*

LCR, valve, dysfonctionnement *T85.0*

Leber, syndrome de *H47.2*

Lebert, anémie de *D51.0*

Lecture, trouble *R48.0*
- liée au développement *F81.0*

Lederer Brill, syndrome de *D59.1*

Lederer, anémie de, hémolytique *D59.1*

Lederer-Brill, syndrome de *D59.1*

left ventricle Ventricule gauche à double issue [Double outlet *Q20.2*

Légal (voir nature de la maladie)

Legg, maladie de *M91.1*

Legg-Perthes-Calvé, maladie de *M91.1*

Légionellose *A48.1*
- avec pneumonie *A48.1*
- sans pneumonie *A48.2*

Légumes, dermite de contact *L25.4*
- allergique *L23.6*
- toxique *L24.6*

Leigh, syndrome de *G31.88*

Leiner, maladie de *L21.1*

Léiomyofibrome *D21.9*
- col de l'utérus *D25.9*
- corps utérin *D25.9*

Léiomyolipome *D21.9*

Léiomyomatose, néoformation, tissu conjo *D48.1*
- intravasculaire, néoformation, tissu conjonctif, évolution inconnue *D48.1*

Léiomyome *D21.9*
- angio- *D21.9*
- caverneux *D21.9*
- cellulaire *D21.9*
- corde vocale *D14.1*
- épithéloïde *D21.9*
- hypervascularisé *D21.9*
- intramural, utérus *D25.1*
- prostate *D29.1*
- riche en vaisseaux sanguins *D21.9*
- sarcomateux *C49.9*
- sous-muqueux, utérus *D25.0*
- sous-séreux, utérus *D25.2*
- teleangiectaticum *D21.9*
- utérus *D25.9*
- - avec complications, accouchement, avec saignement *O67.8*
- - prise en charge de la mère *O34.1*
- vasculaire *D21.9*

Léiomyosarcome *C49.9*
- angio- *C49.9*
- corps utérin *C54.9*
- épithéloïde *C49.9*
- estomac *C16.9*
- larynx *C32.9*
- myxoïde *C49.9*
- utérus *C55*
- - sous-muqueux *C55*
- - sous-séreux *C55*
- vagin *C52*

Leishhmaniose *B55.9*

Leishmaniose
- avec infestation, paupière *B55.1+, H03.0**
- cutanée *B55.1*
- cutanéo-muqueuse *B55.2*
- screening *Z11*
- vaccination, nécessité *Z26.0*
- viscérale *B55.0*

Lejeune, syndrome de *Q93.4*

Lemming, fièvre de *A21.9*

Lemmome *D23.9*
- *D36.1*

Lemmome –*suite*

- trichilemmome *D23.9*

Lennert Lymphome de *C84.4*

Lennox Gastaut, syndrome de *G40.4*

Lennox, syndrome de *G40.4*
- pseudo- *G40.00*

Lennox-Gastaut, syndrome de *G40.4*

Lens tough, avec cataracte *H26.8*

lent Coronary slow flow syndrome) , Syndrome coronarien à flux *I20.8*

Lenteur et manque de réactivité au nivea *R46.4*

Lenticône *Q12.8*
- congénital *Q12.8*

Lenticulaire
- dégénérescence de Wilson *E83.0*
- dégénérescence, progressive *E83.0*
- sclérose *H25.1*
- - sénile *H25.1*

Lentiginose périorificielle avec polypos *Q85.8*

Lentiglobus *Q12.8*
- congénital *Q12.8*
- postérieure *Q12.8*

Lentigo *L81.4*
- aestiva *L81.4*
- bénin *L81.4*
- congénital *L81.4*
- malin *D03.9*
- naevus *L81.4*
- sénile *L81.4*

Lentille
- dégénérescence, progressive *E83.0*
- dystonie *G24.8*
- fibrome, dermatologique, néoformation, peau, bénin *D23.9*
- intra oculaire Complication mécanique d ' une *T85.2*

Lentilles de contact
- ajustement *Z46.0*
- intolérance *H18.8*
- mise en place avec *Z46.0*
- néovascularisation cornéenne *H16.4*

Lentivirus, porteur de germes *B97.3!*

Lentogène
- endophtalmie *H44.1*
- glaucome secondaire *H40.5*

Lenz, syndrome, Appelt Gerken *Q89.7*

Léontiase
- ossea *M85.2*
- syphilis tertiaire *A52.7*
- syphilitique, congénitale *A50.5*

Lèpre *A30.9*
- *E52*
- asturica *E52*
- borderline (BB-Lepra) *A30.3*
- borderline (lèpre BB) *A30.3*
- borderline lépromateuse (BL-lepra) *A30.4*
- borderline tuberculoide (TT-lepra) *A30.2*
- indéterminée (I-lepra) *A30.0*
- interpolaris *A30.8*
- lépromateuse (LL-lepra) *A30.5*
- lépromateuse borderline, (lèpre BL) *A30.4*

Lèpre –*suite*

- lombardica *E52*
- screening *Z11*
- séquelles *B92*
- tuberculoide (TT-lepra) *A30.1*
- tuberculoïde borderline (lèpre BT) *A30.2*

Lepréchaunisme *E34.8*

Lépromateuse, lépre (LL-lepra) *A30.5*

Leptocytose, héréditaire *D56.9*

Léptoméningeome *D32.9*

Leptoméninges
- fibrose *G96.1*
- sarcome *C70.9*

Leptoméninges, neurosyphilis, aseptique *A52.1+, G01**

Léptoméningite *G03.9*
- bactérienne *G00.9*
- chronique *G03.9*
- circonscrite *G03.9*
- gumma *A52.1+, G07**
- hémorragique *G03.9*
- - *I60.9*
- non purulente *G03.9*
- tuberculeuse *A17.0+, G01**
- - cérébrale *A17.0+, G01**
- - spinale *A17.0+, G01**
- tuberculose *A17.0+, G01**

Léptoméningopathie nCA *G96.1*

Leptospira interrogans
- automnale, infection *A27.8*
- canicola, infection *A27.8*
- hebdomadis, infection *A27.8*
- ictéro-hémorragique *A27.0*
- infection *A27.9*
- pomona, infection *A27.8*

Leptospirose *A27.9*
- automnale *A27.8*
- canicola *A27.8*
- canicule *A27.8*
- fièvre *A27.9*
- ictèro-hémorragique *A27.0*
- infection *A27.9*
- méningite, aspetique *A27.9+, G01**
- paludisme *A27.9*
- pomona *A27.8*
- screening *Z11*

Leptothrix
- col *A56.0*
- - atrophique *A56.0*
- - chronique *A56.0*
- vaginite *A56.0*

Leptotrichose *A42.9*

Lequesne *M81.69*

Lereboullet, syndrome, Gilbert, avec ict *E80.4*

Léri II, syndrome *Q78.8*

Léri Joanny, syndrome de *M85.89*

Léri Weill, syndrome de *Q77.8*

Leriche, syndrome de *I74.0*

Léri-Weil, syndrome de *Q77.8*

Lermoyez, syndrome de *H81.3*

Leroy Reiter Fiessinger, maladie de *M02.39*

Lesch Nyhan, syndrome de *E79.1*
- avec arthropathie, due à la goutte *E79.1+, M14.0**

Lesch-Nyhan, syndrome de *E79.1*
- avec arthropathie, due à la goutte *E79.1+, M14.0**

Leser-Trélat, maladie de *L82*

Lésion *T14.08*
- acoustique, oreille interne *H83.3*
- angiocentrique, immunoprolifférative *D47.7*
- ano-rectale *K62.9*
- artère coronaire *I25.9*
- articulation *M24.99*
- - *M25.99*
- - pian *A66.6+, M14.8**
- articulation pelvienne, au cours de l'accouchement *O71.6*
- articulation sacro-iliaque *M53.3*
- - non traumatique *M53.3*
- auto-infligée *X84.9!*
- axillaire *G56.8*
- Bankart *S43.01*
- buccale *K13.7*
- caecum *K63.9*
- canthus *H02.9*
- carieuse *K02.9*
- carotide *S15.00*
- cartilage articulaire *M24.19*
- cérébrovasculaire *I67.9*
- - dégénérative *I67.9*
- cerveau
- - congénitale *Q04.9*
- - infantile précoce, avec syndrome résiduel, cérébral *P91.9*
- - périnatale *P96.8*
- chiasme optique *H47.4*
- chorion *O41.9*
- coccyx, au cours de l'accouchement *O71.6*
- coiffe des rotateurs *M75.1*
- coin de l'oeil *H02.9*
- côlon *K63.9*
- côlon sigmoïde *K63.9*
- conjonctive *H11.9*
- corde tympanique *G51.8*
- corne antérieure du ménisque interne *M23.31*
- corne postérieure du ménisque interne *M23.32*
- corporelle *Z91.8*
- coude
- - interne *M24.92*
- - récidivante *M24.42*
- crânienne *S09.7*
- dent *K08.9*
- due à
- - accident *Z04.3*
- - Adriblastin *T88.5*
- - faits de guerres *Y36.9!*
- - foudre *T75.0*
- - halothane *T41.0*
- - lumière, rétine *H35.8*
- - manque d'eau *T73.1*
- - mersures judiciaires *Y35.7!*
- - radium NCA *T66*
- - rayonnement, dépistage *Z13.8*
- - tuméfaction, intracrânienne NCA *R90.0*
- duodénum *K31.9*

Lésion –*suite*

- émail des dents, due à une irradiation *K03.8*
- épaule *M75.9*
- - non traumatique *M75.9*
- - récente *S43.00*
- foetale *P04.9*
- foetus
- - due à
- - - absorption, substances, chimiques, absorbées par l'alimentation de la mère *P04.5*
- - - actes radiologiques chez la mère *P00.7*
- - - alcool, avec soins, mère *O35.4*
- - - altération, cordon ombilical *P02.6*
- - - amniocentèse, soins, femme enceinte *O35.7*
- - - amnionite, chorion *P02.7*
- - - anomalie, chorion *P02.9*
- - - avortement, menace de *P01.8*
- - - biopsie, soins, femme enceinte *O35.7*
- - - chimiothérapie, pour cancer, mère *P04.1*
- - - compression, cordon ombilical *P02.5*
- - - contraction utérine, menace de *P01.8*
- - - cytomégalovirus, maternel, avec soins, mère *O35.3*
- - - décollement placentaire *P02.1*
- - - dépendance à la drogue, avec soins, mère *O35.5*
- - - dispositif intra-utérin, soins, femme enceinte *O35.7*
- - - effets de radiation, avec soins, mère *O35.6*
- - - enchevêtrement, cordon ombilical *P02.5*
- - - enroulement, cordon ombilical *P02.5*
- - - examen, hématologique, avec soins, mère *O35.7*
- - - hémorragie
- - - - gestationnelle, mère *P02.1*
- - - - placenta *P02.1*
- - - infection, organes génitaux, mère *P00.8*
- - - listériose, maternelle, avec soins, mère *O35.8*
- - - maladie
- - - - infectieuse, mère (classée à A00-B99 et J09-J11) *P00.2*
- - - - parasitaire, mère (classée à A00-B99 et J09-J11) *P00.2*
- - - maladie virale, maternelle, avec soins, mère *O35.3*
- - - nécrose, cordon ombilical *P02.6*
- - - noeud, cordon ombilical *P02.5*
- - - opération, intra-utérine, avec soins, mère *O35.7*
- - - pharmacodépendance, avec soins, mère *O35.5*
- - - procidence, cordon ombilical *P02.4*
- - - rotation, manuelle *P03.8*
- - - rubéole, maternelle, avec soins, mère *O35.3*
- - - toxoplasmose, avec soins, mère *O35.8*
- - - varices, cordon ombilical *P02.6*
- - - vasa praevia *P02.6*
- - pour
- - - accouchement, due à une sténose, vagin *P03.8*

Lésion –*suite*

- foetus –*suite*
- - pour –*suite*

- - - craintes, par l'absorption de substances chimiques par le placenta, soins, mère *O35.8*
- - soins, femme enceinte *O35.9*
- - suspicion de, due à
- - - acte, médical, avec soins, mère *O35.7*
- - - contraceptifs, intra-utérins, avec soins, mère *O35.7*
- - - cytomégalovirus, maternel, avec soins, mère *O35.3*
- - - dépendance à la drogue, avec soins, mère *O35.5*
- - - examen, hématologique, avec soins, mère *O35.7*
- - - listériose, maternelle, avec soins, mère *O35.8*
- - - opération, intra-utérine, avec soins, mère *O35.7*
- - - pharmacodépendance, avec soins, mère *O35.5*
- - - rubéole, maternelle, avec soins, mère *O35.3*
- foetus ou nouveau-né
- - cas de
- - - accouchement, dû à
- - - - rectocèle *P03.8*
- - - - tumeur
- - - - - bassin, *P03.8*
- - - - - col utérin, *P03.8*
- - - - - périnée, *P03.8*
- - - - - utérus, *P03.8*
- - - - - vagin, *P03.8*
- - - - - vulve, *P03.8*
- - - grippe [influenza], mère *P00.2*
- - - jumeaux *P01.5*
- - - naissances multiples *P01.5*
- - - naissances, multiples *P01.5*
- - - obstruction, accouchement, due à malformation, organes pelviens *P03.1*
- - - quadruplés *P01.5*
- - - quintuplés *P01.5*
- - - sextuplés *P01.5*
- - - triplés *P01.5*
- - cours de la grossesse, due à
- - - rectocèle *P03.8*
- - - salpingo-oophorite *P00.8*
- - - tumeur
- - - - bassin *P03.8*
- - - - col utérin *P03.8*
- - - - périnée *P03.8*
- - - - utérus *P03.8*
- - - - vagin *P03.8*
- - - - vulve *P03.8*
- - - utérus, double *P03.8*
- - due à
- - - abcès, rein, mère *P00.1*
- - - abdomen penduleux *P03.8*
- - - absorption
- - - - médicament, entraînant une dépendance, par le placenta *P04.4*
- - - - substances de l'environnement, chimiques *P04.6*
- - - accouchement
- - - - déclenché artificiellement *P03.8*
- - - - instrumental NCA *P03.8*
- - - - provoqué NCA *P03.8*

Lésion –*suite*

- foetus ou nouveau-né –*suite*
- - due à –*suite*

- - - accouchement aux forceps *P03.2*
- - - accouchement césarienne *P03.4*
- - - - post mortem *P01.6*
- - - accouchement précipité *P03.5*
- - - adhérence, amnios, post-infectieuse *P02.8*
- - - albuminurie, prééclamptique *P00.0*
- - - alcoolisme *P04.3*
- - - amniotite *P02.7*
- - - anesthésie, mère *P04.0*
- - - anneau de Bandl *P03.6*
- - - anneau de contraction *P03.6*
- - - anomalie
- - - - amnios *P02.9*
- - - - chorion *P02.9*
- - - - organes pelviens *P03.8*
- - - - parties molles, mère *P03.8*
- - - - placenta *P02.2*
- - - - utérus *P03.8*
- - - antéversion, utérus *P03.8*
- - - arrêt en transverse *P03.1*
- - - - profondeur *P03.1*
- - - arrêt, phase du travail, active *P03.6*
- - - atonie, utérus, pendant les contractions *P03.6*
- - - atrophie, foie, jaune, aiguë, mère *P00.8*
- - - bassin
- - - - androïde, avec disproportion foeto-pelvienne *P03.1*
- - - - pithécoïde, avec disproportion foeto-pelvienne *P03.1*
- - - bassin en entonnoir, avec diproportion, foeto-pelvienne *P03.1*
- - - carence, facteur de coagulation, antepartum *P02.1*
- - - cervicite, mère *P00.8*
- - - chute, mère *P00.5*
- - - cicatrice
- - - - col utérin *P03.8*
- - - - utérus *P03.8*
- - - coagulopathie de consommation, intrapartum *P02.1*
- - - complication, grossesse, mère NCA *P01.9*
- - - consommation, alcool, mère *P04.3*
- - - contraction utérine *P03.6*
- - - contractions utérines
- - - - anormales *P03.6*
- - - - incoordonnées *P03.6*
- - - - irrégulières *P03.6*
- - - - non coordonnées *P03.6*
- - - - prolongées *P03.8*
- - - contracture en sablier, utérus *P03.6*
- - - contracture, bassin, avec disproportion, foeto-pelvienne *P03.1*
- - - contusion, cordon ombilical *P02.6*
- - - cordon ombilical
- - - - serré autour de cou *P02.5*
- - - - trop court *P02.6*
- - - cystite, mère *P00.1*
- - - cytocèle, mère *P03.8*
- - - déchirure, cordon ombilical *P50.1*
- - - déclenchement provoqué, accouchement *P03.8*
- - - défaillance, rein, mère *P00.1*

Lésion –*suite*
- foetus ou nouveau-né –*suite*
- - due à –*suite*
- - - déformation, bassin, avec disproportion foeto-pelvienne *P03.1*
- - - déformation, vertèbres lombaires, avec disproportion foeto-pelvienne *P03.1*
- - - dépendance, médicament, mère *P04.4*
- - - diabète sucré, gestationnel *P70.0*
- - - dilatation, col utérin *P01.0*
- - - - incomplète *P03.6*
- - - dysfonction, utérus, complication, accouchement *P03.6*
- - - dystocie *P03.1*
- - - éclampsie, mère *P00.0*
- - - empiètement, épaule *P03.1*
- - - endométrite, mère *P00.8*
- - - extraction par ventouse *P03.3*
- - - extraction, par le siège *P03.0*
- - - fibromyome, utérus *P03.8*
- - - grossesse, extra-utérine *P01.4*
- - - hémorragie
- - - - accidentelle, mère *P02.1*
- - - - placenta, due à une lésion chirurgicale ou instrumentale *P02.1*
- - - - vasa praevia *P50.0*
- - - hépatite, mère *P00.8*
- - - hydramnios *P01.3*
- - - hyperémèse gravidique *P01.8*
- - - hypertension, mère (classée à O10-O11, O13-O16) *P00.0*
- - - hypotonie, travail *P03.6*
- - - hystérotomie *P03.8*
- - - infarctus, placenta *P02.2*
- - - infection, maternelle *P00.8*
- - - inflammation, chorion *P02.7*
- - - insuffisance
- - - - col utérin *P01.0*
- - - - placenta *P02.2*
- - - lésion
- - - - placenta, due à
- - - - - accouchement césarienne, *P02.1*
- - - - - amniocentèse, *P02.1*
- - - - vaisseau du cordon ombilical, complication de l'accouchement *P02.6*
- - - liquide amniotique, anormal *P02.9*
- - - lupus érythémateux, systémique, mère *P00.8*
- - - maladie
- - - - bassin, inflammatoire, mère *P00.8*
- - - - coeur
- - - - - congénitale, mère (classée à Q20-Q24), *P00.3*
- - - - - rhumatismale, mère (classée à I0-I09), *P00.3*
- - - - glomérulaire, mère (classée à N00-N08) *P00.1*
- - - - infectieuse, mère (classée à A00-B99 et J09-J11) *P00.2*
- - - - mère NCA *P00.9*
- - - - parasitaire, mère (classée à A00-B99 et J09-J11) *P00.2*
- - - - placenta *P02.2*
- - - - rein, mère *P00.1*
- - - malformation, placenta *P02.6*
- - - malnutrition, mère *P00.4*
- - - médicament, cytotoxique, mère *P04.1*

Lésion –*suite*
- foetus ou nouveau-né –*suite*
- - due à –*suite*
- - - mort, mère *P01.6*
- - - nécrose
- - - - cortex rénal *P00.1*
- - - - corticale, rein, mère *P00.1*
- - - - foie, mère *P00.8*
- - - néphrite, mère (classée à N00-N08) *P00.1*
- - - néphrose, mère (classée à N00-N08) *P00.1*
- - - obstruction, accouchement *P03.1*
- - - oligohydramnios *P01.2*
- - - opération obstétricale *P03.8*
- - - opération, mère, sans lien avec l'accouchement *P00.6*
- - - paludisme, mère *P00.2*
- - - période d'expulsion, abrégée *P03.5*
- - - perte de sang, mère *P02.1*
- - - placenta praevia *P02.0*
- - - placenta, bas *P03.1*
- - - placentite *P02.7*
- - - polyhydramnios *P01.3*
- - - polype
- - - - col utérin *P03.8*
- - - - utérus *P03.8*
- - - position occipito-antérieure, persistante *P03.1*
- - - position transverse *P03.1*
- - - - avant le travail *P01.7*
- - - prééclampsie *P00.0*
- - - présentation de la face *P01.7*
- - - présentation du foetus, instable, avant le travail *P01.7*
- - - présentation du siège, avant le travail *P01.7*
- - - prolapsus, utérus, gravide *P03.8*
- - - protéinurie
- - - - mère *P00.1*
- - - - prééclamptique *P00.0*
- - - pyélite, mère *P00.1*
- - - pyélonéphrite, mère *P00.1*
- - - retard, accouchement *P03.9*
- - - rétrécissement, bassin, mère *P03.1*
- - - rétrécissement, cordon ombilical *P02.6*
- - - rétrécissement, vagin, mère *P03.8*
- - - rigidité
- - - - col utérin *P03.8*
- - - - plancher pelvien *P03.8*
- - - rubéole, mère *P00.2*
- - - rubéole, mère (classée à B06.-) *P00.2*
- - - rupture de la poche des eaux
- - - - avec accouchement, retardé *P01.1*
- - - - prématurée *P01.1*
- - - rupture, utérus
- - - - après le travail *P03.8*
- - - - pendant le travail *P03.8*
- - - scoliose, bassin, avec disproportion foeto-pelvienne *P03.1*
- - - spondylose, avec disproportion foeto-pelvienne *P03.1*
- - - sténose
- - - - col utérin *P03.8*
- - - - vagin, mère *P03.8*
- - - syndrome, néphrotique, mère (classé à N00-N08) *P00.1*

Lésion –*suite*
- foetus ou nouveau-né –*suite*
- - due à –*suite*
- - - syphilis, mère (classée à A50-A53) *P00.2*
- - - thrombophlébite, antepartum, mère *P00.3*
- - - thrombose, cordon ombilical, complication obstétricale *P02.6*
- - - torsion, vertèbres lombaires, avec disproportion foeto-pelvienne *P03.1*
- - - toxicose, mère *P00.0*
- - - toxoplasmose, mère (classée à B58.-) *P00.2*
- - - transfusion
- - - - foeto-foetale *P02.3*
- - - - foeto-maternelle *P02.3*
- - - - transplacentaire *P02.3*
- - - traumatisme, mère, au cours de la grosseses *P00.5*
- - - travail, hypertonique *P03.6*
- - - trouble nutritionnel, mère (classé à E40-E64) *P00.4*
- - - trouble(s)
- - - - chorion *P02.9*
- - - - liquide amniotique *P02.9*
- - - tuberculose, mère *P00.2*
- - - urémie, mère *P00.1*
- - - utérus
- - - - bicorne *P03.8*
- - - - double *P03.8*
- - - vaginite, mère *P00.8*
- - - version, externe, avant le travail *P01.7*
- - - vomissements, continuels, mère *P01.8*
- foie, toxique *K71.9*
- fonction, tubulo-rénale *N25.9*
- ganglion de Gasser *G50.8*
- ganglions de la base *G25.9*
- ganglions du tronc cérébral *G25.9*
- gencive *K06.2*
- genou NCA *M23.99*
- - récente *S83.2*
- - récidivante *M24.46*
- glande salivaire *K11.9*
- - lympho-épithéliale, bénigne *K11.8*
- glande salivaire lympho-épithéliale, bénigne *K11.8*
- glomérulaire
- - avec protéinurie isolée *N06.9*
- - focale, avec
- - - hématurie
- - - - persistante *N02.1*
- - - - récidivante *N02.1*
- - - protéinurie isolée *N06.1*
- - - syndrome
- - - - néphritique, d'évolution rapide *N01.1*
- - - - néphrotique *N04.1*
- - lors de
- - - néphrite sclérosante diffuse *N18.9*
- - - néphrose *N04.9*
- - - - hypocomplémentémique *N04.5*
- - membraneuse, avec
- - - néphropathie à IgA [immunglobuline A] *N02.2*
- - - protéinurie isolée *N06.2*
- - membrano-proliférative, avec néphropathie à IgA [immunoglobuline A] *N02.5*

Lésion –*suite*
- glomérulaire –*suite*
- - mésangio-capillaire, avec néphropathie à IgA [immunglobuline A] *N02.5*
- - mésangio-prolifération, avec
- - - néphropathie à IgA [immunglobuline A] *N02.3*
- - - protéinurie isolée *N06.3*
- - minime, avec
- - - hématurie récidivante *N02.0*
- - - syndrome
- - - - néphritique
- - - - - aigu, *N00.0*
- - - - - rapide, d'évolution, *N01.0*
- - - - néphrotique *N04.0*
- - prolifération, avec néphropathie à IgA [immunglobuline A] *N02.8*
- - segmentaire, avec
- - - hématurie
- - - - persistante *N02.1*
- - - - récidivante *N02.1*
- - - syndrome
- - - - néphritique, d'évolution rapide *N01.1*
- - - - néphrotique *N04.1*
- glomérule *N00.0*
- glomérulonéphritique sclérosante diffuse avec hypertension *N18.9*
- hépatocytes, en cas de cholestase *K71.0*
- hyperkératosique *L85.9*
- hypothalamus, non traumatique *E23.7*
- iléo-caecale *K63.9*
- iléon *K63.9*
- insertions ligamentaires, colonne vertébrale *M46.09*
- insertions musculaires de la colonne vertébrale *M46.09*
- interne
- - articulation de l'épaule *M24.91*
- - articulation du coude *M24.92*
- - articulation du genou *M23.99*
- - - récidivante *M24.46*
- - articulation du genou, récidivante *M24.46*
- - articulation scapulo-humérale *M24.91*
- - articulation temporo-mandibulaire *K07.6*
- - articulation, récidivante *M24.49*
- - coude, récidivante *M24.42*
- intestin *K63.9*
- lèvre *K13.0*
- ligament croisé *M23.89*
- ligament externe, articulation de la cheville, supérieure *S93.40*
- ligament pelvien, au cours de l'accouchement *O71.6*
- ligamentaire, maladie *M24.29*
- liquide amniotique *O41.9*
- loge amygdalienne *J35.9*
- Mallory-Weiss *K22.6*
- médiastin, due à une pression *J98.5*
- méninges, congénitale *Q06.9*
- ménisque *M23.39*
- - latéral *M23.36*
- - médial *M23.33*
- ménisque externe *M23.36*
- - articulation du genou *M23.36*
- - dégénérative *M23.36*
- ménisque interne *M23.33*

Lésion –*suite*
- ménisque interne –*suite*
- - dégénérative *M23.33*
- - et ménisque externe *M23.30*
- ménisque, due à un trausmatisme, ancien *M23.29*
- micro-traumatismes répétés, membre
- - inférieur *M76.9*
- - supérieur *M77.9*
- moelle épinière *G95.9*
- - avec
- - - douleurs de désafférentiation *G95.85*
- - - dyssynergie vésico-sphinctérienne *G95.84*
- - cas de
- - - fracture
- - - - colonne vertébrale *T08.0, T09.3*
- - - - sacrum *S32.1, S34.18*
- - - - vertèbre cervicale *S12.9, S14.10*
- - - - vertèbre dorsale *S22.00, S24.10*
- - - - vertèbre lombaire *S32.00, S34.18*
- - - hauteur fonctionnelle
- - - - C1-C3 *G82.60!*
- - - - C4-C5 *G82.61!*
- - - - C6-C8 *G82.62!*
- - - - L2-S1 *G82.66!*
- - - - S2-S5 *G82.67!*
- - - - Th11-L1 *G82.65!*
- - - - Th1-Th6 *G82.63!*
- - - - Th7-Th10 *G82.64!*
- - congénitale *Q06.9*
- - traumatique *T09.3*
- moelle osseuse *D75.9*
- - liée à l'alcool *D75.9*
- motoneurone du cortex NCA *G93.88*
- nerf *G58.9*
- - auditif *H93.3*
- - avec paralysie, muscle NCA *G58.9*
- - axillaire *G56.8*
- - bras, périphérique *G56.9*
- - cubital *G56.2*
- - fémoral *G57.2*
- - fibulaire commun *G57.3*
- - ischiatique *G57.0*
- - jambe, périphérique *G57.9*
- - laryngé récurrent *G52.2*
- - péronier commun *G57.3*
- - plantaire *G57.6*
- - radial *G56.3*
- - tibial *G57.4*
- - vestibulo-cochléaire *H93.3*
- nerf cubital *G56.2*
- nerf périphérique *G58.9*
- nerf sacré *S34.4*
- neurone, moteur
- - inférieur, avec paralysie, vessie [LMNL] *G95.81*
- - supérieur, avec paralysie, vessie [UMNL] *G95.80*
- non allopathique NCA *M99.99*
- obstétricale *P15.9*
- ongle, en cas de
- - contusion
- - - doigt *S60.1*
- - - orteil *S90.2*
- - - pouce *S60.1*
- - plaie, ouverte
- - - doigt *S61.1*

Lésion –*suite*
- ongle, en cas de –*suite*
- - plaie, ouverte –*suite*
- - - orteil *S91.2*
- - - pouce *S61.1*
- organe, alcoolique *F10.1*
- organes génitaux *S39.9*
- organes pelviens
- - après
- - - avortement *O08.6*
- - - grossesse extra-utérine *O08.6*
- - - grossesse môlaire *O08.6*
- - complication, accouchement *O71.5*
- os, du pian *A66.6+, M90.29**
- ostéolytique, non traumatique *M89.59*
- pancréas *K86.9*
- - alcoolique *K86.0*
- parodontale, due à une occlusion, traumatique *K05.5*
- paupière *H02.9*
- peau *L98.9*
- - due à une pression *L89.99*
- - gonococciques *A54.8*
- - purulente *L08.0*
- pharynx *J39.2*
- placenta, due à
- - accouchement par césarienne, avec lésion, foetus ou nouveau-né *P02.1*
- - amniocentèse, avec lésion, foetus ou nouveau-né *P02.1*
- plantaire *G57.6*
- plexus *G54.9*
- - brachial *G54.0*
- plexus brachial *G54.0*
- plexus lombosacré *G54.1*
- pont, syphilitique *A52.1+, G94.8**
- poumon *J98.4*
- - *R91*
- primaire
- - framboisie *A66.0*
- - pinta *A67.0*
- processus alvéolaire *K08.9*
- pylore *K31.9*
- queue de cheval *G83.49*
- - complète *G83.40*
- - incomplète *G83.41*
- racine
- - cervicale *G54.2*
- - lombo-sacrée *G54.4*
- - thoracique *G54.3*
- racine nerveuse
- - cervicale NCA *G54.2*
- - thoracique NCA *G54.3*
- racine, lombosacrée NCA *G54.4*
- rate, non traumatique *D73.8*
- recto-sigmoïdienne *K63.9*
- région sacrée NCA *M53.88*
- rein *S37.00*
- réno-parenchymateuse *N28.9*
- rétine *H35.9*
- rotule NCA *M22.3*
- s fémoro-patellaires *M22.2*
- sigmoïde *K63.9*
- sinus *J32.9*
- sinus paranasal *J34.8*
- sousendocardique *I51.5*
- spermatogenèse *E29.9*
- spinale, traumatique *S39.9*
- surcharge (par sollicitation excessive)

Lésion –*suite*
- surcharge (par sollicitation excessive) –*suite*
- - extrémité *M70.9*
- - l'avant-bras *M70.9*
- - poignet *M70.9*
- système nerveux, congénitale *Q07.9*
- tendon
- - doigts *M65.3*
- - - congénitale *Q74.0*
- - genou *M23.89*
- - hanches *M24.85*
- - - chez les nouveaux nés *R29.4*
- - pouce *M65.3*
- testicule *E29.9*
- transverse
- - complète, dos
- - - cervicale *S14.11*
- - - lombaire *S34.10*
- - - thoracique *S24.11*
- - incomplète, dos, lombaire *S34.11*
- - partie supérieure
- - - abdomen *T05.8*
- - - thorax *T05.8*
- - tronc *T05.8*
- transverse, throacique incomplète *S24.12*
- traumatique *T14.9*
- - abdominale *S39.9*
- - - avec blessures des organes pelviens *S39.6*
- - - superficielle *S30.90*
- - adénoïde *S09.9*
- - anale *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - ancienne, avec traumatisme du ménisque *M23.29*
- - annexes de l'oeil, lésion superficielle *S05.8*
- - aortique *S25.0*
- - - abdominalis ou abdominale *S35.0*
- - - thoracica ou thoracique *S25.0*
- - après un accident, examen et mise en observation NCA *Z04.3*
- - artères
- - - digitales *S65.5*
- - - inercostables *S25.5*
- - artères méningées *S06.8*
- - artérielle *T14.5*
- - - anonyma, Truncus brachiocephalicus ou artère innominée ou sous-clavière *S25.1*
- - - axillaris ou axillaire *S45.0*
- - - brachialis ou brachiale *S45.1*
- - - carotis ou carotide *S15.00*
- - - - communis ou commune *S15.01*
- - - - externa ou ou externe *S15.02*
- - - - interna ou interne *S15.03*
- - - cérébrale *S06.8*
- - - coeliaca ou artère cœliaque ou mésentérique *S35.2*
- - - dorsalis pedis ou artère dorsale du pied *S95.0*
- - - femoralis ou fémorale *S75.0*
- - - gastrica ou gastrique *S35.2*
- - - gastroduodenalis ou gastroduodénale *S35.2*
- - - hepatica ou hépatique *S35.2*
- - - hypagastrica ou hypogastrique *S35.5*
- - - iliaca ou iliaque *S35.5*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - artérielle –*suite*
- - - lienalis ou splénique *S35.2*
- - - mammaria ou mammaire *S25.8*
- - - mesenterica ou mésentérique *S35.2*
- - - - inférieure *S35.2*
- - - - supérieure *S35.2*
- - - ovarica ou ovarienne *S35.8*
- - - peronaea ou artère péronière *S85.2*
- - - plantaris pedis ou plantaire du pied *S95.1*
- - - poplitea ou artère poplitée *S85.0*
- - - pulmonalis ou pulmonaire *S25.4*
- - - radialis ou radiale
- - - - hauteur de
- - - - - l'avant-bras, *S55.1*
- - - - - main, *S65.1*
- - - renalis ou rénale *S35.4*
- - - subclavia ou sous-clavière *S25.1*
- - - tibialis ou tibiale *S85.1*
- - - ulnaris ou ulnaire
- - - - hauteur de
- - - - - l'avant-bras, *S55.0*
- - - - - main, *S65.0*
- - - uterina ou utérine *S35.5*
- - - vertebralis ou vertébrale *S15.1*
- - articulaire NCA *T14.9*
- - - ancienne *M25.89*
- - - résiduelle *M25.89*
- - avec
- - - cécité *S05.9*
- - - compression du cerveau NCA *S06.28*
- - avec infection *T79.3*
- - bassin *S39.9*
- - - abdomen *S34.8*
- - - ancienne *N81.8*
- - - complication, accouchement *O70.1*
- - - superficielle *S30.90*
- - bassinet des reins, en cas de déchirure, rein *S37.02*
- - boîte crânienne *S06.8*
- - bouche *S09.9*
- - branche terminale du nerf fibulaire profond (Nervus peronaeus profundus) latéral *S94.2*
- - bras *T11.9*
- - bronche *S27.4*
- - bulbe *S05.9*
- - - superficielle *S05.8*
- - caecum *S36.59*
- - canal
- - - cholédoque *S36.18*
- - - cystique *S36.18*
- - - hépatique *S36.18*
- - - lacrymal *S05.8*
- - - naso-lacrymal *S05.8*
- - - thoracique *S27.82*
- - canal biliaire *S36.18*
- - canal déférent *S37.84*
- - canal défrent *S37.84*
- - canal des glandes salivaires *S09.9*
- - capsule du rein, en cas de déchirure, rein *S37.02*
- - cardiaque *S26.9*
- - - avec hémopéricarde *S26.0*
- - carpe *S69.9*
- - - avec atteinte des tendons *S69.7*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - cas d'
- - - intervention chirurgicale *T81.2*
- - - intervention obstétricale NCA *O71.9*
- - Cauda equina ou queue de cheval *S34.38*
- - cavité buccale, superficielle *S00.50*
- - cavité nasale ou sinus nasal *S09.9*
- - cavité thoracique *S27.9*
- - cérébrale *S06.9*
- - - diffuse *S06.20*
- - - limitée *S06.30*
- - cerveau *S06.9*
- - - avec atteinte du nerf crânien *S09.7*
- - - diffuse *S06.20*
- - - et de la moëlle épinière *T06.0*
- - - limitée *S06.30*
- - - séquelles *T90.5*
- - - suite à un souffle d'explosion *S06.0*
- - cervelet *S06.8*
- - cervix utéri ou col de l'utérus *S37.6*
- - chambre antérieure de l'oeil *S05.8*
- - cheville *S99.9*
- - - avec atteinte des tendons *S99.7*
- - - superficielle *S90.9*
- - chez le foetus/nouveau-né, lors de l'accouchement *P15.9*
- - Chiasma opticum ou chiasme optique *S04.0*
- - Chorioidea ou de la choroïde *S05.8*
- - clitoris *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - coccyx *S39.9*
- - - lors de l'accouchement *O71.6*
- - cohabitation *S39.9*
- - coiffe des rotateurs *S46.0*
- - coin de l'oeil ou larmier *S09.9*
- - - superficielle *S00.20*
- - côlon *S36.50*
- - - ascendant *S36.51*
- - - descendant *S36.53*
- - - sigmoïde *S36.54*
- - - transverse *S36.52*
- - côlon ou gros intestin *S36.50*
- - colonne vertébrale au niveau spinal *T91.8*
- - combinée, grave *T07*
- - conjonctive
- - - lors de la naissance *P15.3*
- - - superficielle *S05.0*
- - - - avec corps étranger *T15.1*
- - coprs ciliaires *S05.8*
- - cordes vocales, superficielle *S10.10*
- - cordon spermatique, scrotal *S39.9*
- - cornée *S05.8*
- - - lamellaire *S05.0*
- - - lors de la naissance *P15.3*
- - - oeil, avec perforation *S05.6*
- - - par abrasion *S05.0*
- - - profonde *S05.0*
- - - superficielle *S05.0*
- - - - avec corps étranger *T15.0*
- - corps du pancrréas *S36.22*
- - corps vitré *S05.8*
- - cortex
- - - cérébral *S06.8*
- - - visuell *S04.0*
- - cortex visuel *S04.0*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - costale NCA *S29.9*
- - costo-chondrale NCA *S29.9*
- - cou *S19.9*
- - - multiples *S19.7*
- - - séquelles *T91.9*
- - - superficielle *S10.90*
- - - - multiples *S10.7*
- - - - séquelles *T91.0*
- - coude *S59.9*
- - - et de l'avant-bras, multiples traumatismes *S59.7*
- - - superficielle *S50.9*
- - - - multiples traumatismes *S50.7*
- - crâne NCA *S09.9*
- - crâne, suite à un traumatisme obstétrical NCA *P13.1*
- - crânio-cérébrale
- - - avec démence *T90.9+, F02.8**
- - - couverte, grave *S06.20, S01.83!*
- - - - avec compression cérébrale, hémorragie, hypertension intra-crânienne *S06.21, S01.83!*
- - - ouverte *S06.20, S01.83!*
- - creux axillaire *S49.9*
- - - superficielle *S40.9*
- - cristallin *S05.8*
- - cuir chevelu *P12.8*
- - - *S09.9*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P12.9*
- - - dans la région occipitale *S09.9*
- - cuisse ou partie fémorale *S79.9*
- - - superficielle *S70.9*
- - cutanée *T14.9*
- - - isolée *T14.9*
- - - superficielle NCA *T14.00*
- - - superficielle, neurotique *L98.1*
- - dans la région iliacale *S39.9*
- - de(s) vaisseau(x) sanguin(s) NCA *T14.5*
- - - abdomen *S35.9*
- - - - séquelles *T91.8*
- - - artère poplitée *S85.9*
- - - avant-bras, multiples *S55.7*
- - - bassin *S35.9*
- - - - séquelles *T91.8*
- - - bras *T11.4*
- - - - multiples *T06.3*
- - - cérébraux *S06.8*
- - - cheville *S95.9*
- - - - multiples *S95.7*
- - - chevlle *S95.9*
- - - cou, séquelles *T91.8*
- - - creux axillaire *S45.9*
- - - cuisse *S85.9*
- - - - multiples *S85.7*
- - - cuisse ou partie fémorale *S75.9*
- - - - multiples *S75.7*
- - - doigt *S65.5*
- - - épaule *S45.9*
- - - extrémité *T14.5*
- - - - inférieure *T13.4*
- - - - - séquelles, *T93.8*
- - - - supérieure *T11.4*
- - - - - séquelles, *T92.8*
- - - hanche *S75.9*
- - - - multiples *S75.7*
- - - hauteur de l'avant-bras *S55.9*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - de(s) vaisseau(x) sanguin(s) NCA –*suite*
- - - hauteur du cou *S15.9*
- - - intracrânien(s) *S06.9*
- - - main *S65.9*
- - - - multiples *S65.7*
- - - mésentérique(s) *S35.9*
- - - multiples *T06.3*
- - - partie supérieure du bras *S45.9*
- - - pied *S95.9*
- - - - multiples *S95.7*
- - - plusieurs
- - - - hauteur de
- - - - - l'épaule, *S45.7*
- - - - - partie supérieure du bras, *S45.7*
- - - poignet *S65.9*
- - - - multiples *S65.7*
- - - pouce *S65.4*
- - - rate *S35.9*
- - - région iliaque *S35.5*
- - - région lombo-sacrée *S35.9*
- - - régions, multiples *T06.3*
- - - rein *S35.4*
- - - séquelles *T94.1*
- - - tête *S09.0*
- - - - séquelles *T90.8*
- - - thorax *S25.9*
- - - - multiples *S25.7*
- - - - séquelles *T91.8*
- - déchirures multiples, cerveau, cervelet *S06.28*
- - dentaire *S09.9*
- - - superficielle *S00.50*
- - diaphragme *S27.81*
- - disque intervertébraux *T09.9*
- - doigt *S69.9*
- - - avec atteinte des tendons *S69.7*
- - - sous-unguéal *S69.9*
- - - - superficielle *S60.9*
- - - superficielle *S60.88*
- - dos *S39.9*
- - - partie inférieure, superficielle *S30.80*
- - dua à un instrumenrt, non chirurgical *T14.9*
- - dues à l'effet des fluides à haute pression, industriels *T70.4*
- - d'un ligament pelvien, lors de l'accouchement *O71.6*
- - d'un organe
- - - interne, séquelles *T91.9*
- - - intraabdominal *S36.9*
- - - - blessures multiples *S36.7*
- - - intrathoracique *S27.9*
- - - plusieurs, par le souffle d'une explosion *T70.8*
- - duodénum *S36.41*
- - externe *T14.00*
- - fermée *T14.00*
- - flanc, superficielle *S30.80*
- - foie *S36.10*
- - fosse
- - - supra-claviculaire NCA *S19.9*
- - - supraclaviculaire, superficielle *S10.80*
- - frontale *S09.9*
- - - superficielle *S00.80*
- - ganglion

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - ganglion –*suite*
- - - cervicothoracicum ou cervico-thoraciques *S24.4*
- - - stellatum ou stellaire *S24.4*
- - ganglion de Gasser *S04.3*
- - ganglions
- - - coeliaca ou coeliaque (ou plexus cœliaque) *S34.5*
- - - thoracica ou thoraciques *S24.4*
- - gencives *S09.9*
- - - superficielle *S00.50*
- - généralisée, due au souffle d'une explosion *T70.8*
- - genou *S89.9*
- - - et de la partie inférieure de la jambe, multiples traumatismes *S89.7*
- - - multiples traumatismes NCA *S83.7*
- - - superficielle *S80.9*
- - glande thyroïde *S19.8*
- - glandes salivaires *S09.9*
- - glandes surrénales *S37.81*
- - glandes vésiculaires *S37.83*
- - globe oculaire *S05.9*
- - - pénétrante *S05.6*
- - - - avec
- - - - - incident subi par les tissus intra-oculaires, *S05.2*
- - - - - pertes de tissus intra-oculaires, *S05.2*
- - - superficielle NCA *S05.8*
- - gorge NCA *S19.8*
- - groupe musculaire
- - - antérieur, au niveau inférieur de la jambe *S86.2*
- - - péronier, au niveau inférieur de la jambe *S86.3*
- - hanche *S79.9*
- - - superficielle *S70.9*
- - interne *T14.8*
- - - lésions multiples *T06.5*
- - intracrânienne *S06.9*
- - - avec
- - - - coma, prolongé *S06.9, S06.79!*
- - - - fracture, cheville, séquelles *T90.2*
- - - séquelles *T90.5*
- - intraoculaire *S05.6*
- - jambe *T13.9*
- - jéjunum *S36.49*
- - joue *S09.9*
- - - interne, superficielle *S00.50*
- - - paroi *S09.9*
- - - superficielle *S00.80*
- - labyrinthe de l'oreille *S09.9*
- - langue *S09.9*
- - - superficielle *S00.50*
- - l'apophyse alvéolaire *S09.9*
- - - superficielle *S00.50*
- - l'appareil gastro-intestinal *S36.9*
- - l'appareil lacrymal, superficellle *S05.8*
- - l'Arcus palmaris superficialis ou arc palmaire superficiel *S65.2*
- - l'artère carotide *S15.00*
- - l'artère mésentérique *S35.2*
- - l'artère poplitée *S85.0*
- - l'artère pulmonaire *S25.4*
- - l'artère sous-clavière *S25.1*
- - l'artère splénique *S35.2*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - l'articulation pelvienne, lors de l'accouchement *O71.6*
- - larynx NCA *S19.8*
- - larynx, superficielle *S10.10*
- - l'avant-bras *S59.9*
- - - multiples traumatismes *S59.7*
- - - superficielle *S50.9*
- - - - multiples traumatismes *S50.7*
- - légère, combinée *T00.9*
- - l'épaule *S49.9*
- - - superficielle *S40.9*
- - - - multiples traumatismes *S40.7*
- - l'épididyme *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - l'épiglotte NCA *S19.8*
- - l'épiglotte, superficielle *S10.80*
- - lésions traumatiques de multiples parties corporelles, séquelles *T94.0*
- - l'estomac *S36.3*
- - lèvre
- - - majora pudendi ou grande lèvre vulvaire *S39.9*
- - - - superficielle *S30.80*
- - - minora pudendi ou petite lèvre vulvaire *S39.9*
- - - - superficielle *S30.80*
- - lèvres (bouche) *S09.9*
- - - superficielle *S00.50*
- - l'extrémité *T14.9*
- - - inférieure *T13.9*
- - - - séquelles *T93.9*
- - - superficielle *T14.00*
- - - supérieure *T11.9*
- - - - séquelles *T92.9*
- - - - superficielle NCA *T11.00*
- - l'hymen *S39.9*
- - ligament
- - - latum uteri ou ligament large de l'utérus *S37.88*
- - - patellae ou patellaire *S76.1*
- - - teres uteri ou ligament rond de l'utérus *S37.88*
- - ligament capsulaire, articulation tibio-astragalienne ou de la cheville, supérieure *S93.40*
- - ligament croisé, en cas de traumatisme
- - - ménisque externe *S83.7*
- - - ménisque interne *S83.7*
- - ligament latéral, en cas de blessure
- - - ménisque externe *S83.7*
- - - ménisque interne *S83.7*
- - ligament, en cas de traumatisme, ménisque, genou *S83.7*
- - l'iléum *S36.49*
- - l'intestin *S36.9*
- - l'intestin grêle *S36.40*
- - l'iris *S05.8*
- - - pénétrante *S05.6*
- - lobe
- - - occipitalis ou occipital *S06.8*
- - - parietalis ou pariétal *S06.8*
- - lobe occipital *S06.8*
- - localisations multiples *T07*
- - l'oeil *S05.9*
- - - pénétrante *S05.6*
- - - séquelles *T90.4*
- - - superficielle *S05.8*
- - l'oesophage *S27.83*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - l'oesophage –*suite*
- - - cervicale NCA *S19.8*
- - - Pars cervicalis ou partie cervicale, superficielle *S10.10*
- - - thoracique, superficielle *S27.83*
- - lombes (reins) *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - l'orbite *S05.9*
- - - cas de
- - - - accouchement *P15.3*
- - - - hématome orbitaire *S05.1*
- - - pénétrante *S05.4*
- - - perforante *S05.4*
- - - séquelles *T90.4*
- - - superficielle *S00.20*
- - l'oreille *S09.9*
- - - externe *S09.9*
- - - superficielle *S00.40*
- - l'oreille moyenne *S09.9*
- - luette *S09.9*
- - - superficielle *S00.50*
- - l'uretère *S37.1*
- - - ouverte *S37.1, S31.83!*
- - l'urètre *S37.30*
- - - partie
- - - - membraneuse *S37.31*
- - - - prostatique *S37.33*
- - - - spongieuse *S37.32*
- - l'utérus *S37.6*
- - mâchoire *S09.9*
- - - superficielle *S00.80*
- - mâchoire supérieure *S09.9*
- - main *S69.9*
- - - avec atteinte des tendons *S69.7*
- - - poignet, lésions multiples *S69.7*
- - - superficielle *S60.9*
- - mastoïde *S09.9*
- - - superficielle *S00.80*
- - méat auditif *S09.9*
- - - externe *S09.9*
- - - superficielle *S00.40*
- - médiastin *S27.88*
- - médullaire dorsale *S24.10*
- - membrane du tympan, superficielle *S00.40*
- - méninges *S06.8*
- - - cérébrales *S06.8*
- - ménisque *S83.2*
- - - genou, avec traumtisme, ligament *S83.7*
- - ménisque externe, avec traumatisme
- - - ligament croisé *S83.7*
- - - ligament latéral *S83.7*
- - ménisque interne, avec traumatisme
- - - ligament croisé *S83.7*
- - - ligament latéral *S83.7*
- - menton *S09.9*
- - - superficielle *S00.80*
- - mère
- - - avec traumatisme, foetus/nouveau-né, durant la grossesse *P00.5*
- - - lors de l'accouchement *O71.9*
- - mésentère *S36.82*
- - mésosalpinx *S37.88*
- - moëlle cervicale *S14.10*
- - - lésion centrale *S14.12*
- - - lésions multiples *S19.7*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - moëlle osseuse *T09.3*
- - - cervicale *S14.10*
- - - lombaire *S34.18*
- - - niveau fonctionnel
- - - - C1 *S14.71!*
- - - - C2 *S14.72!*
- - - - C3 *S14.73!*
- - - - C4 *S14.74!*
- - - - C5 *S14.75!*
- - - - C6 *S14.76!*
- - - - C7 *S14.77!*
- - - - C8 *S14.78!*
- - - - L1 *S34.71!*
- - - - L2 *S34.72!*
- - - - L3 *S34.73!*
- - - - L4 *S34.74!*
- - - - L5 *S34.75!*
- - - - S1 *S34.76!*
- - - - S2-S5 *S34.77!*
- - - - T1 *S24.71!*
- - - - T10/T11 *S24.76!*
- - - - T12 *S24.77!*
- - - - T2/T3 *S24.72!*
- - - - T4/T5 *S24.73!*
- - - - T6/T7 *S24.74!*
- - - - T8/T9 *S24.75!*
- - - séquelles *T91.3*
- - - thoracique *S24.10*
- - - vertèbres cervicales *S14.10*
- - moëlle osseuse (médullaire) *T09.3*
- - - dorsale *S24.10*
- - multiples *T07*
- - multiples traumatismes *T07*
- - - hanche, cuisse *S79.7*
- - - organe intrathoracique *S27.7*
- - - région lombo-sacrée, bassin et abdomen *S39.7*
- - - vaisseaux sanguins
- - - - bassin *S35.7*
- - - - cou *S15.7*
- - - - l'abdomen *S35.7*
- - - - région lombo-sacrée *S35.7*
- - - viscères thoraciques NCA *S27.7*
- - muscle
- - - ¨- - sternocleidomastoide, suite à traumatisme obstétrical *P15.2*
- - - long fléchisseur du pouce *S66.0*
- - - quadriceps fémoral *S76.1*
- - - triceps brachial *S46.3*
- - muscles *T14.6*
- - - bassin *S39.0*
- - - biceps brachii ou biceps *S46.2*
- - - Caput longum, Musculus biceps brachii ou chef long du biceps brachial *S46.1*
- - - cheville *S96.9*
- - - - multiples lésions *S96.7*
- - - cou, séquelles *T91.8*
- - - courts, pouce *S66.4*
- - - cuisse NCA *S76.4*
- - - cuisse, multiples traumatismes *S76.7*
- - - extrémité
- - - - inférieure *T13.5*
- - - - supérieure *T11.5*
- - - hanche *S76.0*
- - - - multiples lésions *S76.7*
- - - jambes *T13.5*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - muscles –*suite*
- - - jusqu'aux tendons
- - - - extrémité
- - - - - supérieure, séquelles, *T92.5*
- - - - - inférieure, séquelles, *T93.5*
- - - - multiples lésions *T06.4*
- - - l'abdomen *S39.0*
- - - l'avant-bras *S56.8*
- - - - multiples lésions *S56.7*
- - - l'épaule *S46.9*
- - - - multiples lésions *S46.7*
- - - main *S66.9*
- - - multiples lésions *T06.4*
- - - multiples régions du corps, séquelles *T94.0*
- - - niveau du cou *S16*
- - - partie inférieure de la jambe *S86.9*
- - - - multiples lésions *S86.7*
- - - partie supérieure du bras *S46.9*
- - - - multiples *S46.7*
- - - pied *S96.9*
- - - - multiples *S96.7*
- - - poignet *S66.9*
- - - région lombo-sacrée *S39.0*
- - - séquelles *T94.1*
- - - superficielle *T14.6*
- - - tête *S09.1*
- - - - séquelles *T90.8*
- - - thorax *S29.0*
- - - torse *T09.5*
- - - - séquelles *T91.8*
- - - visage, séquelles *T90.8*
- - muscles abducteurs, au niveau des avant-bras *S56.3*
- - muscles fléchisseurs
- - - doigts *S56.1*
- - - longs, pouce *S66.0*
- - - main, lésions multiples *S66.6*
- - - orteils *S96.0*
- - - poignet, multiples *S66.6*
- - musculature, plancher pelvien, ancienne *N81.8*
- - myocarde *S26.9*
- - nasopharynx *S09.9*
- - nerf *T14.4*
- - - avant-bras, multiples blessures *S54.7*
- - - avec atteinte de plusieurs régions corporelles *T06.2*
- - - avec traumatisme *T14.4*
- - - bras *T11.3*
- - - caractère multiple *T06.2*
- - - ceinture pelvienne *S74.9*
- - - cheville, multiples lésions *S94.7*
- - - cou *S14.6*
- - - - séquelles *T91.8*
- - - cuisse ou partie fémorale *S74.9*
- - - - multiples blessures *S74.7*
- - - d'un doigt *S64.4*
- - - extrémité
- - - - inférieure *T13.3*
- - - - - séquelles, *T93.4*
- - - - supérieure *T11.3*
- - - - - séquelles, *T92.4*
- - - hanche *S74.9*
- - - - multiples blessures *S74.7*
- - - jambe *T13.3*
- - - l'abdomen *S34.8*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - nerf –*suite*
- - - lépaule *S44.9*
- - - - multiples blessures *S44.7*
- - - main *S64.9*
- - - - multiples blessures *S64.7*
- - - multiples régions corporelles, séquelles *T94.0*
- - - orteils *S94.9*
- - - partie inférieure de la jambe *S84.9*
- - - - multiples blessures *S84.7*
- - - partie supérieur du bras *S44.9*
- - - - multiples blessures *S44.7*
- - - périphérique *T14.4*
- - - - abdomen *S34.6*
- - - - bassin *S34.6*
- - - - cou *S14.4*
- - - - région lombo-sacrée *S34.6*
- - - - thorax *S24.3*
- - - pied *S94.9*
- - - - multiples traumatismes *S94.7*
- - - poignet *S64.9*
- - - - multiples blessures *S64.7*
- - - pouce *S64.3*
- - - séquelles NCA *T94.1*
- - - spinal *T09.4*
- - - sympathique NCA *S34.5*
- - - - cervical *S14.5*
- - - - cou *S14.5*
- - - - thorax *S24.4*
- - - thorax *S24.6*
- - - tronc *T09.4*
- - - - séquelles *T91.8*
- - nerf (Nervus)
- - - abducens ou moteur oculaire externe *S04.4*
- - - accessorius ou accessoire ou nerf spinal *S04.7*
- - - acusticus ou nerf acoustique *S04.6*
- - - axillaris ou axillaire *S44.3*
- - - facialis ou facial *S04.5*
- - - - chez le nouveau-nez *P11.3*
- - - femoralis ou nerf fémoral
- - - - niveau de
- - - - - cuisse, *S74.1*
- - - - - hanche, *S74.1*
- - - glossopharyngeus ou glossopharyngien *S04.8*
- - - hypoglossus ou grand hypoglosse *S04.8*
- - - ischiadicus ou sciatique
- - - - niveau de
- - - - - cuisse, *S74.0*
- - - - - hanche, *S74.0*
- - - medianus ou médian *S54.1*
- - - - niveau de
- - - - - partie supérieure du bras, *S44.1*
- - - - - l'avant-bras, *S54.1*
- - - - - main, *S64.1*
- - - - - poignet, *S64.1*
- - - musculocutaneus ou musuclo-cutané *S44.4*
- - - oculomotorius ou nerf moteur oculaire commun *S04.1*
- - - olfactorius ou olfactif *S04.8*
- - - opticus ou optique *S04.0*
- - - peronaeus ou nerf péronien
- - - - niveau de la partie inférieure de la jambe *S84.1*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - nerf (Nervus) –*suite*
- - - peronaeus ou nerf péronien –*suite*
- - - - profundus ou profond
- - - - - niveau,
- - - - - niveau, cheville, *S94.2*
- - - - - niveau, pied, *S94.2*
- - - phrénique, lors de l'accouchement *P14.2*
- - - plantaris ou nerf plantaire
- - - - lateralis ou latéral *S94.0*
- - - - medialis ou médial *S94.1*
- - - radialis ou radial *S54.2*
- - - - niveau
- - - - - partie supérieure du bras, *S44.2*
- - - - - l'avant-bras, *S54.2*
- - - - - main, *S64.2*
- - - - - poignet, *S64.2*
- - - statoacusticus ou nerf auditif, acoustique *S04.6*
- - - tibialis ou tibial, au niveau de la partie inférieure de la jambe *S84.0*
- - - trigeminus ou trijumeau *S04.3*
- - - trochlearis ou nerf trochléaire ou pathétique *S04.2*
- - - ulnaris ou ulnaire *S54.0*
- - - - niveau
- - - - - partie supérieure du bras, *S44.0*
- - - - - l'avant-bras, *S54.0*
- - - - - main, *S64.0*
- - - - - poignet, *S64.0*
- - - vagus ou nerf vague *S04.8*
- - - vestibulocochlearis ou nerf vestibulocochléaire ou auditif *S04.6*
- - nerf auditif *S04.6*
- - nerf auditif, menant à la surdité *S04.6*
- - nerf crânien *S04.9*
- - - I *S04.8*
- - - III *S04.1*
- - - IV *S04.2*
- - - IX *S04.8*
- - - séquelles *T90.3*
- - - V *S04.3*
- - - VI *S04.4*
- - - VII *S04.5*
- - - VIII *S04.6*
- - - X *S04.8*
- - - XI *S04.7*
- - - XII *S04.8*
- - nerf et des voies optiques *S04.0*
- - nerf optique *S04.0*
- - - lors de l'accouchement *P15.3*
- - nerfs (nervi)
- - - digitaux *S64.4*
- - - - pouce *S64.3*
- - - splanchniques *S34.5*
- - nerfs cutanés, sensible
- - - niveau de
- - - - cheville *S94.3*
- - - - cuisse ou partie fémorale *S74.2*
- - - - hanche *S74.2*
- - - - inférieur de la jambe *S84.2*
- - - - l'avant-bras *S54.3*
- - - - l'épaule *S44.5*
- - - - partie supérieure du bras *S44.5*
- - - - pied *S94.3*
- - nerfs sympathiques cervicaux, au niveau du cou *S14.5*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - nerveuse *T14.4*
- - - membres
- - - - inférieurs *T13.3*
- - - - supérieurs *T11.3*
- - nez *S09.9*
- - - superficielle *S00.30*
- - niveau de l'aine *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - niveau de l'avant-bras, nerf *S54.9*
- - niveau fessier *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - ongle(s) des pieds, superficielle *S90.9*
- - ongles des doigts *S69.9*
- - - superficielle *S60.9*
- - organes génitaux externes, superficielle *S30.2*
- - organes pelviens *S37.9*
- - - cas de
- - - - accouchement NCA *O71.5*
- - - - fausse couche *O08.6*
- - - internes, multiples lésions *S37.7*
- - - plusieurs *S37.7*
- - - séquelles *T91.5*
- - organes sexuels
- - - externes *S39.9*
- - - internes *S37.9*
- - orteils *S99.9*
- - - avec atteinte des tendons *S99.7*
- - - sous-unguéale *S90.9*
- - - - superficielle *S90.9*
- - - superficielle *S90.9*
- - ouverte *T14.1*
- - - avec
- - - - hémothorax *S27.1, S21.83!*
- - - - pneumothorax *S27.0, S21.83!*
- - ovarienne *S37.4*
- - palais
- - - molle *S09.9*
- - - superficielle *S00.50*
- - - voûte palatine *S09.9*
- - pancréatique *S36.20*
- - par
- - - arrachement du cuir chevelu *S08.0*
- - - corrosion *T30.4*
- - - coup *T14.1*
- - - effets de rayonnment NCA *T66*
- - - lacération par coup de couteau *T14.1*
- - - morsure *T14.1*
- - - morsure animale *T14.1*
- - - rayon X (radioscopie) NCA *T66*
- - - rayons infra-rouges NCA *T66*
- - - rayons ultra-violets NCA *T66*
- - - souffle d'une explosion NCA *T14.8*
- - - tir *T14.1*
- - - tir d'un projectile par arme à feu dans la tête *S09.7*
- - par blessures internes abdominales (viscérales), multiples *S36.7*
- - paroi abdominale *S30.1*
- - paroi abdominale, superficielle *S30.80*
- - paroi thoracique
- - - multiples lésions, superficielles *S20.7*
- - - superficielle *S20.80*
- - paroi vaginale, sans blessure, périnée *O71.4*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - Pars cervicalis ou partie cervicale, trachée NCA *S19.8*
- - partie inférieure de la jambe *S89.9*
- - - multiples traumatismes *S89.7*
- - - superficielle *S80.9*
- - - - multiples traumatismes *S80.7*
- - partie supérieure du bras *S49.9*
- - - et de l'épaule, lésions multiples *S49.7*
- - - superficielle *S40.9*
- - parties mollles *T14.9*
- - - bras, importante *T11.1*
- - - - avec atteinte des tendons *T11.8*
- - - jambe, importante *T13.1*
- - - - avec atteinte des tendons *T13.8*
- - - tête, importante *S01.9*
- - - tronc, importante *T09.1*
- - - visage *S01.80*
- - Partus ou partie *P15.9*
- - paupière *S09.9*
- - - naissance *P15.3*
- - - séquelles *T90.4*
- - - superficielle *S00.20*
- - pédicule rénal *S37.02*
- - pénis *S39.9*
- - - superficielle *S30.2*
- - perforante *T14.1*
- - - avec corps étranger, globe oculaire *S05.5*
- - - sans corps étranger, globe oculaire *S05.6*
- - périnée *S39.9*
- - - avec atteinte
- - - - cutanée, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - - fourchette vulvaire (réunion postérieure des petites lèvres), lors de l'accouchement *O70.0*
- - - - lèvres, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - - vagin, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - - vulve, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - lors de l'accouchement *O71.8*
- - - minime, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - superficielle *S30.80*
- - péritoine *S36.81*
- - phalanges
- - - main *S69.9*
- - - peid *S99.9*
- - pharynx *S09.9*
- - - superficielle *S10.10*
- - pharynx NCA *S19.8*
- - pharynx, superficielle *S10.10*
- - pied *S99.9*
- - - avec atteinte des tendons *S99.7*
- - - et région de la cheville, multiples trumatismes *S99.7*
- - - superficielle *S90.9*
- - plèvre *S27.6*
- - plexus
- - - brachial *S14.3*
- - - - chez le nouveau-né *P14.3*
- - - cardiaque *S24.4*
- - - coeliaque *S34.5*
- - - hypogastrique *S34.5*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - plexus –*suite*
- - - lombo-sacré *S34.4*
- - - mésentérique
- - - - inférieur *S34.5*
- - - - supérieur *S34.5*
- - - oesophagien *S24.4*
- - - pulmonaire *S24.4*
- - - sacral (anciennement sacré) *S34.4*
- - - spinal *T09.4*
- - plexus brachial *S14.3*
- - - chez le nouveau-né *P14.3*
- - plexus nerveux sacré *S34.4*
- - plexus nerveux spinal ou plexus rachidien, séquelles *T91.8*
- - plusieurs régions corporelles *T07*
- - poignet *S69.9*
- - - superficielle *S60.9*
- - pouce *S69.9*
- - - superficielle *S60.88*
- - prépuce *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - prolongée avec bronchite *J40*
- - prostate *S37.82*
- - provoqué par un acte obstétrical, complication, accouchement *O71.9*
- - pudendale *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - pulmonaire *S27.38*
- - - avec
- - - - hémopneumothorax *S27.2*
- - - - hémothorax *S27.1*
- - - - pneumothorax *S27.0*
- - queue du pancréas *S36.23*
- - racine nerveuse
- - - colonne vertébrale ou rachis thoracique *S24.2*
- - - lombaire *S34.2*
- - - lombo-sacrée *S34.2*
- - - moëlle épinière NCA *T09.4*
- - - - cervicale *S14.2*
- - - - dorsale *S24.2*
- - - - thoracique *S24.2*
- - - rachis cervical *S14.2*
- - - région sacrée *S34.2*
- - - spinale *T09.4*
- - racines des nerfs spinaux *T91.8*
- - rate *S36.00*
- - rectum *S36.6*
- - région
- - - lomabire, superficielle *S30.80*
- - - occipitale *S09.9*
- - - occipitale, superficielle *S00.00*
- - - orbitaire, superficielle *S00.20*
- - - pariétale *S09.9*
- - - pariétale, superficielle *S00.00*
- - - pubienne, superficielle *S30.80*
- - - sacrée, superficielle *S30.80*
- - - scapulaire, superficielle *S40.9*
- - - temporale *S09.9*
- - - - superficielle *S00.80*
- - région costale
- - - arrière, superficielle *S20.40*
- - - l'avant, superficielle *S20.30*
- - - traumatismes multiples, superficiels *S20.7*
- - région épigastrique *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - région iliaque, superficielle *S30.80*
- - région inter-scapulaire, superficielle *S20.40*
- - région lombo-sacrée *S39.9*
- - - abdomen *S34.8*
- - - superficielle *S30.90*
- - région orbitaire, superficielle *S00.20*
- - région pariétale *S09.9*
- - région péri-oculaire, superficielle *S00.20*
- - région pubienne *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - région sacrée (abdomen, lombes et bassin), superficielle *S30.80*
- - région scapulaire *S49.9*
- - - superficielle *S40.9*
- - région sternale *S29.9*
- - - superficielle *S20.30*
- - région temporale *S09.9*
- - région tissulaire cérébrale, importante, diffuse *S06.20*
- - rénale *S37.00*
- - - fermée *S37.00*
- - - ouverte *S37.00, S31.83!*
- - rétine *S05.8*
- - - lors de l'accouchement *P15.3*
- - - pénétrante *S05.6*
- - rétro-péritoine *S36.83*
- - sclérotique *S05.8*
- - - pénétrante *S05.6*
- - - sans perforation *S05.0*
- - - superficielle *S05.8*
- - scrotum *S39.9*
- - - superficielle *S30.2*
- - sein NCA *S29.9*
- - sein, superficiellle *S20.10*
- - septum recto-vaginal NCA *S39.88*
- - séquelles NCA *T94.1*
- - séquelles organiques
- - - intra-abdominales *T91.5*
- - - intrathoraciques *T91.4*
- - sinus
- - - caverneux *S06.8*
- - - paranasal *S09.9*
- - sourcils *S09.9*
- - - superficielle *S00.1*
- - sous-conjonctivale *S05.0*
- - - superficielle *S05.8*
- - sous-cutanée, superficielle NCA *T14.00*
- - sous-maxillaire *S09.9*
- - - superficielle *S00.80*
- - sous-mentonnière *S09.9*
- - - superficielle *S00.80*
- - sphincter
- - - l'iris *S05.8*
- - - vésical *S37.28*
- - superficielle *T14.00*
- - - extrémité
- - - - inférieure
- - - - - et,
- - - - - et, abdomen, *T00.8*
- - - - - et, bassin, *T00.8*
- - - - - et, région lombo-sacrée, *T00.8*
- - - - - et, thorax, *T00.8*
- - - - - séquelles, *T93.5*
- - - - supérieure

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - superficielle –*suite*
- - - extrémité –*suite*
- - - - supérieure –*suite*
- - - - - et,
- - - - - et, abdomen, *T00.8*
- - - - - et, bassin, *T00.8*
- - - - - et, région lombo-sacrée, *T00.8*
- - - - - et, thorax, *T00.8*
- - - - - séquelles, *T92.5*
- - - localisations, multiples, extrémité supérieure et extrémité inférieure *T00.6*
- - - multiples régions corporelles, séquelles *T94.0*
- - - multiples traumatismes *T00.9*
- - - - A... *S30.7*
- - - - bassin, région abdominale et région lombo-sacrée *S30.7*
- - - - cheville et pied *S90.7*
- - - - cuisse ou partie fémorale *S70.7*
- - - - genou, et partie inférieure de la jambe *S80.7*
- - - - hanche *S70.7*
- - - - main et poignet *S60.7*
- - - séquelles *T94.1*
- - supra-orbitaire *S09.9*
- - - superficielle *S00.80*
- - talon *S99.9*
- - - superficielle *S90.9*
- - tempe, superficielle *S00.80*
- - tendon d'Achillle *S86.0*
- - tendons *T14.6*
- - - abdomen *S39.0*
- - - cou, séquelles *T91.8*
- - - hanche *S76.0*
- - - multiples régions corporelles, séquelles *T94.0*
- - - niveau du cou *S16*
- - - organes pelviens *S39.0*
- - - région lombo-sacrée *S39.0*
- - - séquelles *T94.1*
- - - tête *S09.1*
- - - - séquelles *T90.8*
- - - tronc, séquelles *T91.8*
- - - visage, séquelles *T90.8*
- - tendons fléchisseurs *T14.6*
- - testicule *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - tête *S09.9*
- - - cuir chevelu, superficielle *S00.00*
- - - multiples traumatismes *S09.7*
- - - séquelles *T90.9*
- - - superficielle *S00.90*
- - - - multiples traumatismes *S00.7*
- - - - séquelles *T90.0*
- - tête du pancréas *S36.21*
- - thorax *S29.9*
- - - arrière, superficielle *S20.40*
- - - avant, superficielle *S20.30*
- - - interne *S27.9*
- - - multiples traumatismes *S29.7*
- - - - superficiels *S20.7*
- - - superficielle *S20.80*
- - thymus *S27.84*
- - tissus péri-urétraux *S37.30*
- - - complication lors de l'accouchement *O71.5*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - tonsilles ou amygdales *S09.9*
- - trachée
- - - partie thoracique *S27.5*
- - - - superficielle *S27.5*
- - - superficielle *S10.10*
- - traumatisme cervical dit en Whiplash, ou coup du lapin ou coup de fouet *S13.4*
- - traumatisme obtétrical *P15.9*
- - - avec
- - - - adiponécrose sous-cutanée *P15.6*
- - - - adiponécrose sous-cutanée du nouveau-né *P15.6*
- - - - augmentation de la pression intracrânienne *P11.0*
- - - - blessure, crâne NCA *P13.1*
- - - - céphalhématome *P12.0*
- - - - céphalhématome, foetus/nouveau-né *P10.8*
- - - - congestion faciale *P15.4*
- - - - contusion, cuir chevelu *P12.3*
- - - - déchirure, tentorielle *P10.4*
- - - - dilacération du cerveau *P10.1*
- - - - encéphalopathie *P11.1*
- - - - évicération *P15.8*
- - - - fracture
- - - - - vertébrale, *P11.59*
- - - - - crâne, *P13.0*
- - - - - fémur, *P13.2*
- - - - - squelette, *P13.9*
- - - - glaucome, traumatique *P15.3*
- - - - hématome NCA sous-dural, localisé, *P10.0*
- - - - - cerveau, *P10.1*
- - - - - foie, *P15.0*
- - - - - pénis, *P15.5*
- - - - - scrotum, superficiel, *P15.5*
- - - - - testiculaire, *P15.5*
- - - - - vulve, *P15.5*
- - - - - *P15.8*
- - - - hémorragie
- - - - - sous-durale, *P10.0*
- - - - - cérébrale, *P10.1*
- - - - - cerveau, *P10.1*
- - - - - intraventriculaire, *P10.2*
- - - - - sous-arachnoïdienne, *P10.3*
- - - - - extradurale, *P10.8*
- - - - - intracrânienne, *P10.9*
- - - - - épicrânienne, sous-aponévrotique, *P12.2*
- - - - - sous-conjonctivale, *P15.3*
- - - - lacération
- - - - - cerveau, avec hémorragie, *P10.1*
- - - - - intracrânienne, *P10.9*
- - - - névrite
- - - - - nerf crânien facial VII, *P11.3*
- - - - - nerf facial, *P11.3*
- - - - oedème cérébral *P11.0*
- - - - paralysie
- - - - - Nervus ou nerf,
- - - - - plexus brachial,
- - - - - nerf facial, *P11.3*
- - - - - Nervus ou nerf, facialis ou facial, *P11.3*
- - - - - plexus brachial, niveau supérieur, *P14.0*
- - - - - plexus brachial, niveau inférieur, *P14.1*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - traumatisme obtétrical –*suite*
- - - avec –*suite*
- - - - paralysie –*suite*
- - - - - Nervus ou nerf, radialis ou radial, *P14.3*
- - - - - nerf, *P14.9*
- - - - paralysie de Duchenne *P14.0*
- - - - paralysie de Klumpke *P14.1*
- - - - plaie contuse, cuir chevelu *P12.3*
- - - - rupture
- - - - - foie, *P15.0*
- - - - - rate, *P15.1*
- - - - - rein, *P15.8*
- - - - séquelles
- - - - - cérébrales, *P11.2*
- - - - - oculaires, *P15.3*
- - - - torticollis *P15.2*
- - - - tumeur à la naissance *P12.1*
- - - blessure, muscle sterno-cléido-mastoïdien *P15.2*
- - - cerveau *P11.2*
- - - cervelet *P11.1*
- - - colonne vertébrale *P11.59*
- - - - avec paraplégie
- - - - - aiguë, *P11.50*
- - - - - chronique, *P11.51*
- - - cuir chevelu *P12.9*
- - - - par
- - - - - incision pour prise d'échantillons, *P12.4*
- - - - - l'utilisation de forceps, *P12.4*
- - - - provoquée par
- - - - - électrodes, *P12.4*
- - - fémur *P13.2*
- - - ganglions basaux *P11.1*
- - - hépatique *P15.0*
- - - intracrânien *P11.2*
- - - mère *O71.9*
- - - - complication, accouchement *O71.9*
- - - nerf crânien NCA *P11.4*
- - - nerf facial *P11.3*
- - - oculaire *P15.3*
- - - organes génitaux externes *P15.5*
- - - organes génitaux maternels *O71.9*
- - - pénis *P15.5*
- - - plexus brachial *P14.3*
- - - provoquée par un instrument *O71.9*
- - - rachis et de la moelle épinière *P11.59*
- - - rate *P15.1*
- - - squelette *P13.9*
- - - système nerveux central NCA *P11.9*
- - - système nerveux périphérique *P14.9*
- - - testiculaire *P15.5*
- - - urétral *O71.5*
- - - vulve *P15.5*
- - trompes d'Eustache *S09.9*
- - tronc *T09.9*
- - - brachiocéphalique *S25.1*
- - - coeliaque *S35.2*
- - - internes, multiples lésions *T06.5*
- - - séquelles *T91.9*
- - - superficielle NCA *T09.00*
- - - superficielle, séquelles *T91.0*
- - tronc cérébral *S06.9*
- - tube utérin *S37.5*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - tunique
- - - corps caverneux du pénis *S39.80*
- - - vaginale testiculaire *S39.9*
- - - - superficielle *S30.80*
- - vagin *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - vaisseau sanguin *T14.5*
- - - Arcus palmaris ou arcade palmaire
- - - - profundus ou profonde *S65.3*
- - - - superficiel *S65.2*
- - vaisseaux sanguins intercostaux *S25.5*
- - veine *T14.5*
- - - axillaire *S45.2*
- - - azygos *S25.8*
- - - brachiale *S45.2*
- - - brachio-céphalique *S25.3*
- - - cave *S25.2*
- - - - inférieure *S35.1*
- - - - supérieure *S25.2*
- - - dorsale du pied *S95.2*
- - - fémorale
- - - - niveau de
- - - - - cuisse ou partie fémorale, *S75.1*
- - - - - hanche, *S75.1*
- - - gastrique *S35.8*
- - - hépatique *S35.1*
- - - hypogastrique *S35.5*
- - - iliaque *S35.5*
- - - intercostale *S25.5*
- - - jugulaire
- - - - externe *S15.2*
- - - - interne *S15.3*
- - - mammaire *S25.8*
- - - mésentérique *S35.3*
- - - - inférieure *S35.3*
- - - - supérieure *S35.3*
- - - ovarienne *S35.8*
- - - poplitée *S85.5*
- - - porte ou splénique *S35.3*
- - - rénale *S35.4*
- - - saphène
- - - - externe, au niveau inférieur de la jambe *S85.4*
- - - - interne ou grande niveau de,
- - - - - niveau de, cuisse ou partie fémorale, *S75.2*
- - - - - niveau de, hanche, *S75.2*
- - - - - *S85.3*
- - - - - niveau de, partie inférieure de la jambe, *S85.3*
- - - sous-clavière *S25.3*
- - - splénique (auparavant veine liénale) *S35.3*
- - - utérine *S35.5*
- - veine cave
- - - inférieure *S35.1*
- - - supérieure *S25.2*
- - veine jugulaire
- - - externe *S15.2*
- - - interne *S15.3*
- - veine mésentérique *S35.3*
- - veine popliée *S85.5*
- - veine porte *S35.3*
- - veine pulmonaire *S25.4*
- - veine sous-clavière *S25.3*
- - veine splénique *S35.3*
- - veines *T14.5*

Lésion –*suite*
- traumatique –*suite*
- - veines –*suite*
- - - niveau de l'avant-bras *S55.2*
- - - superficielle
- - - - niveau de
- - - - - l'épaule, *S45.3*
- - - - - partie supérieure du bras, *S45.3*
- - vertèbres cervicales *S13.4*
- - vésicule biliaire *S36.17*
- - vésicule séminale *S37.83*
- - vessie *S37.20*
- - - fermée *S37.20*
- - - lors de la naissance *O71.5*
- - - ouverte *S37.20, S31.83!*
- - visage *S09.9*
- - - lors de la naissance *P15.4*
- - - superficielle *S00.80*
- - - séquelles *T90.0*
- - viscères, multiples lésions *S36.7*
- - voies lacrymales
- - - cas de plaie, ouverte, de la paupière *S01.1*
- - - profonde *S05.8*
- - vulve *S39.9*
- - - lors de l'accouchement *O71.8*
- - - superficielle *S30.80*
- traumatique cérébrale diffuse *S06.20*
- traumatique NCA *T14.9*
- traumatique par corps étrangers multiples
- - conjonctive *T15.1*
- - cornée (kératoconiose) *T15.0*
- urètre *S37.30*
- utérus NCA *N85.9*
- vaisseau *T14.5*
- - cordon ombilical, en tant que complication, accouchement *O69.5*
- - rétine *H35.0*
- - système nerveux central *I67.9*
- vaisseau du cordon ombilical, complication de l'accouchement, avec lésion, foetus ou nouveau-né *P02.6*
- valvule aortique *I35.9*
- valvule pulmonaire *I37.9*
- valvule tricuspide *I07.9*
- - non rhumatismale *I36.9*
- vessie *S37.20*
- vestibule nasal *J34.8*
- voie biliaire *K83.9*
- voies urinaires *S37.9*
- vulve, intra-épithéliale *N90.3*

Lésion, NCA, anamnèse *Z91.8*

Lessive
- allergie *L23.5*
- dermite par contact *L24.0*
- eczéma *L24.0*

Léthargie *R53*

Letterer Siwe Histiocytose cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminé) [Maladie d ' Abt - *C96.0*

Letterer, réticulo-endothéliose *C96.0*

Letterer-Siwe, maladie de *C96.0*

Leucémie
- *C95.90*
- aigue NCA *C95.00*
- - lymphoblastique *C91.00*

Leucémie –*suite*
- aigue NCA –*suite*
- - lymphoblastique –*suite*
- - - rémission complète *C91.01*
- - lymphocytaire *C91.00*
- - - rémission complète *C91.01*
- - lympthatique *C91.00*
- - - rémission complète *C91.01*
- - monocytaire *C93.00*
- - - rémission complète *C93.01*
- - myéloïde *C92.00*
- - - rémission complète *C92.01*
- - myélomonocytaire *C92.50*
- - - rémission complète *C92.51*
- - promyélocytaire *C92.40*
- - - rémission complète *C92.41*
- - rémission complète *C95.01*
- aleucémique NCA *C95.70*
- avec
- - arthrite NCA *C95.90+, M36.1**
- - arthropathie NCA *C95.90+, M36.1**
- - maladie hépatique, tubulo-interstitielle *C95.90+, N16.1**
- - pyélonévrite NCA *C95.90+, N16.1**
- basophile *C94.30*
- - rémission complète *C94.31*
- blastique *C95.00*
- - rémission complète *C95.01*
- Burkitt, cellule de *C91.00*
- cellules blastiques, granulocytaire *C92.00*
- cellules lymphosarcomateuses *C94.70*
- - rémission complète *C94.71*
- cellules non jeunes, aigue *C95.00*
- cellules plasma *C90.10*
- - rémission complète *C90.11*
- cellules souches *C95.00*
- - rémission complète *C95.01*
- cellules T *C91.50*
- - chez l'adulte *C91.50*
- - - rémission complète *C91.51*
- chimiothérapie, induit par *C95.90*
- chronique
- - éosinophile syndrome hyperéosinophilique] , *D47.5*
- - neutrophile *D47.1*
- chronique NCA *C95.10*
- - granulocytaire *C92.10*
- - - rémission complète *C92.11*
- - lymphatique *C91.10*
- - - rémission complète *C91.11*
- - lympocytaire *C91.10*
- - - rémission complète *C91.11*
- - monocytaire *C93.10*
- - - rémission complète *C93.11*
- - myéloïde *C92.10*
- - - rémission complète *C92.11*
- - rémission complète *C95.11*
- dans
- - anamène *Z85.6*
- - antécédents familiaux *Z80.6*
- éosinophile *C92.70*
- erythro- *C94.00*
- - aiguë *C94.00*
- - - rémission complète *C94.01*
- - rémission complète *C94.01*
- granulocitaire *C92.90*
- - aigue *C92.00*
- - aleucémique *C92.70*

Leucémie –*suite*
- granulocitaire –*suite*
- - rémission complète *C92.91*
- - subaiguë *C92.20*
- histiomonicytaire *C93.90*
- hystocytaire *C93.90*
- indifférencié *C95.00*
- lymphatique *C91.90*
- - aleucémique *C91.70*
- - avec poussée blastique *C91.10*
- - rémission complète *C91.91*
- - subaigue, en rémission complète *C91.21*
- lymphoblastique *C91.00*
- - rémission complète *C91.01*
- lymphoblastique aiguë *C91.00*
- - rémission complète *C91.01*
- lymphocytaire, subaigue *C91.20*
- - rémission complète *C91.21*
- lymphocytes B *C91.70*
- - rémission complète *C91.71*
- lymphocytes, sarcome *C94.70*
- - rémission complète *C94.71*
- lymphoïde *C91.90*
- - aigue *C91.00*
- - - rémission complète *C91.01*
- - aleucémique *C91.70*
- - chronique *C91.10*
- - subaiguë *C91.20*
- mastocytes *C94.30*
- - rémission complète *C94.31*
- mégacaryocytaire *C94.20*
- - aigu *C94.20*
- - rémission complète *C94.21*
- mégacaryocytes, aigu *C94.20*
- - rémission complète *C94.21*
- monoblastique aigue *C93.00*
- monocitaire, type Schilling *C93.90*
- monocytaire *C93.90*
- - aleucémique *C93.70*
- - myéloide *C92.50*
- - rémission complète *C93.91*
- - Schilling, de type *C93.90*
- - subaiguë *C93.20*
- - - rémission complète *C93.21*
- monomyélocytaire *C92.90*
- myéloblastique, aigue *C92.00*
- myélocytaire *C92.90*
- - aigue *C92.00*
- - chronique *C92.10*
- myélogène *C92.90*
- - aigue *C92.00*
- - aleucémique *C92.70*
- - chronique *C92.10*
- - rémission *C92.91*
- - subaigue *C92.20*
- myéloide *C92.90*
- - aleucémique *C92.70*
- - atypique *C92.10*
- - avec poussée blastique *C92.10*
- - rémission complète *C92.91*
- - subaigue *C92.20*
- - - rémission complète *C92.21*
- myéloïde
- - aigu avec
- - - altération du gène MLL , *C92.6*
- - - anomalie 11q23 , *C92.6*
- - - dysplasie multilinéaire , *C92.8*

Leucémie –*suite*
- myéloïde –*suite*
- - chronique LMC Crise blastique au cours d ' une *C94.8!*
- myéloïde aiguë *C92.00*
- - rémission complète *C92.01*
- myélomonocitaire, chronique *C92.70*
- myélomonocytaire juvénile *C93.3*
- Naegeli, monocytaire *C92.10*
- - rémission complète *C92.11*
- ostéosclérotique *D75.8*
- prolymphocytaire cellules T *C91.6*
- prolymphocytes *C91.30*
- - rémission complète *C91.31*
- promyélocytaire, aigue *C92.40*
- - rémission complète *C92.41*
- promyélocytes *C92.40*
- - rémission complète *C92.41*
- pseudo- *D72.8*
- réfractaire, à un thérapie dinduction standard *C95.8!*
- rémission complète *C95.91*
- screening *Z12.8*
- subaiguë NCA *C95.20*
- - lymphatique *C91.20*
- - rémission complète *C95.21*
- thrombocytaire *C94.20*
- tricholeucocytes *C91.40*
- - rémission complète *C91.41*

Leucémique
- infiltration *C95.90*
- lymphomes à cellules T, de l'adulte *C91.50*
- lymphosarcome *C94.70*
- réticuloendothéliose *C91.40*
- - rémission complète *C91.41*

Leucine
- Troubles d'élimination *E71.1*
- troubles du métabolisme *E71.1*

Leucinose *E71.0*

Leucoblastose *C95.90*
- erythro *C94.00*
- - rémission complète *C94.01*
- rémission complète *C95.91*

Leucocytaire
- hypersegmentation héréditaire *D72.0*
- hyposegmentation héréditaire *D72.0*

Leucocytes
- anomalie génétique *D72.0*
- maladie NCA *D72.9*
- modification *R72*

Leucocytes, examens, résultats anormaux *R82.8*

Leucocytopénie *D70.7*

Leucocytose *D72.8*

Leucocyturie *R82.8*
- micro *R82.8*

Leucoderme *L81.5*
- lors de
- - syphilis *A51.3+, L99.8**
- - syphilis tardive, floride *A52.7+, L99.8**
- syphilis tardive *A52.7+, L99.8**

Leucodystrophie *E75.2*
- adréno *E71.3*
- avec atrophie, optique *E75.2+, H48.0**
- cellules globoïdes *E75.2*

Leucodystrophie –*suite*
- cérébrale *E75.2*
- - progressive *E75.2*
- Krabbe *E75.2*
- métachromatique *E75.2*
- myélo *E75.2*
- progressive *E75.2*
- soudanophile *E75.2*
- spongioforme *E75.2*

Leucoedème
- buccal *K13.2*
- lingual *K13.2*

Leuco-encéphalite *G04.8*
- hémorragique aiguë *G36.1*
- - après immunisation *G04.0*
- multifocale, lors d'une maladie due au HIV *B22+, G05.1**
- post-infectieuse *G04.8*
- sclérosante de Bogaert *A81.1*
- sclérosante, subaiguë *A81.1*

Leuco-encéphalopathie *G93.4*
- après immunisation *G04.0*
- métachromatique *E75.2*
- multifocale *A81.2*
- - progressive *A81.2*
- sclérosante, de Bogaert *A81.1*

Leucokératose
- corde vocale *J38.3*
- fumeur *K13.2*

Leucomalacie cérébrale, chez le nouveau- *P91.2*

Leucome *H17.8*

Leucome adhérent *H17.0*

Leucome, cornée *H17.8*

Leucomélanopathie héréditaire *D72.0*

Leuconychie *L60.8*
- congénitale *Q84.4*
- ponctuée *L60.8*
- striée *L60.8*

Leucopathie *D72.9*
- ongle *L60.8*
- - congénitale *Q84.4*
- universelle *E70.3*

Leucopénie *D70.7*
- après
- - radiothéraphie *D70.6*
- - thérapie cytostatique *D70.6*
- avec agranulocytose *D70.3*
- et lymphosplénomégalie, lors de polyarthrite chronique *M05.00*
- maligne *D70.6*

Leucoplasie
- anus *K62.8*
- avec vulvite *N90.4*
- bassinet rénal *N28.8*
- cavité buccale *K13.2*
- cheveux *K13.3*
- col utérin *N88.0*
- côlon *K63.8*
- corde vocale *J38.3*
- fumeurs *K13.2*
- gencive *K13.2*
- glotte *J38.3*
- larynx *J38.7*
- linguale *K13.2*
- muqueuse buccale *K13.2*

Leucoplasie –*suite*
- muqueuse buccale –*suite*
- - lors d'une maladie, due au VIH *B23.8, K13.2*
- oesophage *K22.8*
- orifice du col de l'utérus *N88.0*
- rectum *K62.8*
- rénale *N28.8*
- syphilitique tardive *A52.7*
- uretère, postinfectueux *N28.8*
- urètre, potinfectieux *N36.8*
- utérus *N85.8*
- vaginale *N89.4*
- verge *N48.0*
- - infectieuse *N48.0*
- vessie, postinfectueuse *N32.8*
- vulve *N90.4*

Leucorrhée *N89.8*
- vaginale, via trichomonas vaginale *A59.0+, N77.1**

Leucosarcome *C94.70*
- rémission complète *C94.71*

Leucose s.a. leucémie *C95.90*
- rémission complète *C95.91*

Leucostase *D72.8*

Levi-Minderwuchs *E23.0*
- Lorain *E23.0*

Lévocardie *Q24.1*

Lèvre
- abcès *K13.0*
- Agénésie *Q38.0*
- Angulus infectiosus *K13.0*
- anomalie *Q38.0*
- atrophie *K13.0*
- basaliome *C44.0*
- bord, carcinome in situ *D00.0*
- brûlures *T20.0*
- carcinome in situ *D00.0*
- cellules basales, carcinome *C44.0*
- chancre *A51.2*
- corrosion *T20.4*
- crevasses *R60.0*
- cyanose *R23.0*
- défaut de fermeture *Q36.9*
- dermatite vésiculaire, due au virus de l'herpes alpha, type 2, humain *B00.1*
- difformité
- - acquise, NCA *K13.0*
- - congénitale NCA *Q38.0*
- écrasement *S07.0*
- ectropion
- - acquis *K13.0*
- - congénital *Q38.0*
- épaississement, congénitale *Q18.6*
- fente *Q36.9*
- - avec fente, palais *Q37.9*
- - - dure, et palais mou *Q37.5*
- - bilatérale *Q36.0*
- - - avec fente, palais *Q37.8*
- - - - dure *Q37.0*
- - - - - et palais mou, *Q37.4*
- - - - molle *Q37.2*
- - cas de fente, palais
- - - dure *Q37.1*
- - - molle *Q37.3*
- - médiane *Q36.1*
- - unilatérale *Q36.9*

Lèvre –*suite*
- fente –*suite*
- - unilatérale –*suite*
- - - avec fente, palais
- - - - dure *Q37.1*
- - - - - et palais mou, *Q37.5*
- - - - molle *Q37.3*
- fissum leporinum *Q36.9*
- fissure *K13.0*
- - congénitale *Q36.9*
- fistule *K13.0*
- - congénitale *Q38.0*
- frein, hypertrophie *K13.0*
- furoncle *L02.0*
- gercées *K13.0*
- gonflement, douloureux *K13.0*
- grandes lèvres
- - abcès *N76.4*
- - - cours de la grossesse *O23.5*
- - - post-partum *O86.1*
- - - puerpéral *O86.1*
- - adhérence, congénitale *Q52.5*
- - agénésie *Q52.7*
- - amputation, traumatique *S38.2*
- - anomalie *Q52.7*
- - blessure *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - brûlure *T21.05*
- - - degré
- - - - 2a *T21.25*
- - - - 2b *T21.85*
- - - deuxième degré *T21.25*
- - - premier degré *T21.15*
- - - troisième degré *T21.35*
- - cicatrice *N90.8*
- - contusion *S30.2*
- - corrosion *T21.45*
- - - degré
- - - - 2a *T21.65*
- - - - 2b *T21.95*
- - difformité
- - - acquise *N90.8*
- - - congénitale *Q52.7*
- - écrasement *S38.0*
- - fistule *N82.9*
- - furoncle *N76.4*
- - fusion, congénitale *Q52.5*
- - hématome, non puerpéral *N90.8*
- - hypertrophie *N90.6*
- - hypoplasie, congénitale *Q52.7*
- - infection, aiguë *N76.2*
- - inflammation *N76.2*
- - kyste *N90.7*
- - - sébacé *N90.7*
- - malformation *Q52.7*
- - mélanome *C51.0*
- - mélanome in situ *D03.8*
- - naevus *D28.0*
- - plaie, ouverte *S31.4*
- - polype *N84.3*
- - ulcus *N76.6*
- - varices *I86.3*
- hernie *K40.90*
- - récidivante *K40.91*
- herpes *B00.1*
- Herpès simplex *B00.1*
- hypertrophie *K13.0*
- - congénitale *Q18.6*

Lèvre –*suite*

- inférieure
- - carcinome, épithélium pavimenteux *C00.1*
- - fente *Q36.9*
- inflammation *K13.0*
- kyste *K13.0*
- leporinum *Q36.9*
- lésion *S09.9*
- - superficielle *S00.50*
- maladie *K13.0*
- malformation, congénitale *Q38.0*
- mélanome, in situ *D03.0*
- mélanome, malin *C43.0*
- nævus *D22.0*
- naevus pigmentaire *D22.0*
- oedème *R60.0*
- papillome *D10.0*
- paralysie *K13.0*
- peau, carcinome in situ *D04.0*
- petites lèvres
- - abcès *N76.4*
- - - cours de la grossesse *O23.5*
- - - post-partum *O86.1*
- - - puerpéral *O86.1*
- - agénésie *Q52.7*
- - allongement, acquis *N90.6*
- - amputation, traumatique *S38.2*
- - anomalie *Q52.7*
- - brûlure *T21.05*
- - - degré
- - - - 2a *T21.25*
- - - - 2b *T21.85*
- - - deuxième degré *T21.25*
- - - premier degré *T21.15*
- - - troisième degré *T21.35*
- - cicatrice *N90.8*
- - Contusion *S30.2*
- - corrosion *T21.45*
- - - degré
- - - - 2a *T21.65*
- - - - 2b *T21.95*
- - déformation
- - - acquise *N90.8*
- - - congénitale *Q52.7*
- - division, congénitale *Q52.7*
- - écrasement *S38.0*
- - fistule *N82.9*
- - furoncle *N76.4*
- - fusion, congénitale *Q52.5*
- - hématome, non puerpéral *N90.8*
- - hypertrophie *N90.6*
- - hypoplastie, congénitale *Q52.7*
- - infection, aiguë *N76.2*
- - inflammation *N76.2*
- - kyste *N90.7*
- - - sébacé *N90.7*
- - lésion *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - malformation *Q52.7*
- - mélanome *C51.1*
- - mélanome, in situ *D03.8*
- - naevus *D28.0*
- - plaie, ouverte *S31.4*
- - polype *N84.3*
- - ulcus *N76.6*
- Plaie par rupture *S01.51*
- plaie, ouverte *S01.51*

Lèvre –*suite*

- purulence *K13.0*
- rhagade *K13.0*
- rougeur, douloureuse *K13.0*
- s vulve, *voir aussi* labia (lèvre) ou labien (lèvres)
- - abcès *N76.4*
- - adhérences congénitales *Q52.5*
- - anthrax *N76.4*
- - avec déchirure, périnée, lors de l'accouchement *O70.0*
- - catarrhe *N76.2*
- - déchirure, complications à l'accouchement *O70.0*
- - furoncle *N76.4*
- - hypertrophie *N90.6*
- - important(e)
- - - brûlure *T21.05*
- - - carcinome *C51.0*
- - infection *N76.2*
- - inflammation *N76.2*
- - petit(e)
- - - brûlure *T21.05*
- - - carcinome *C51.1*
- - polype *N84.3*
- sèches *K13.0*
- syphilis *A51.3*
- - stade primaire *A51.2*
- syphillis tertiaire *A52.7+, K93.8**
- Troubles *K13.0*
- tuberculose *A18.8+, K93.8**
- ulcus *K13.0*
- Vésicules cutanées *B00.1*

Lévulose, intolérance héréditaire *E74.1*

Levure, infection *B37.9*

Levurid *L30.2*

Levurinose *B37.9*

Levurose *B37.88*

Leyden, syndrome de, Duchenne *G71.0*

Leyden-Moebius, dystrophie de *G71.0*

LGA (Large for gestational age)-Foetus *P08.1*

Liaison chlorée, dermatite de contact, t *L24.2*

Liaison muscle, tendon, rupture, non-tra *M66.59*

Libéré
- cartilage, articulation *M24.09*
- flottante, anxiété *F41.1*
- souris intra-articulaire *M24.09*

Libido
- absence *F52.0*
- augmentation *F52.7*
- baisse *F52.0*
- perte *F52.0*
- trouble *F52.0*
- - chronique *F52.9*

Libman-Sacks, syndrome de *M32.1+, I39.8**

Lichen *L28.0*
- amyloïde *E85.4+, L99.0**
- atrophique *L90.0*
- - verge *N48.0*
- - vulve *N90.4*
- blanc *L90.0*
- - verge *N48.0*
- - vulve *N90.4*

Lichen –*suite*

- congénital *Q82.8*
- corné, disséminé *L28.1*
- folliculaire *L43.8*
- myxoedémateux *L98.5*
- nitidus *L44.1*
- obtusus corné *L28.0*
- pilaire *Q82.8*
- - acquis *L85.8*
- plan *L43.9*
- - acuminatus *L43.8*
- - annulaire *L43.8*
- - atrophique *L43.8*
- - bulleux *L43.1*
- - chronique *L43.9*
- - décalvante *L43.8*
- - exanthémateux *L43.8*
- - fein *L43.9*
- - folliculaire *L66.1*
- - hypertrophique *L43.0*
- - moniliforme *L44.3*
- - muqueux *L43.8*
- - obtusus *L43.8*
- - - corné Lailler-Brocq *L28.1*
- - pemphigoïdes *L43.1*
- - plan *L43.9*
- - - subaigu *L43.3*
- - striatus *L43.8*
- - tropical *L43.3*
- - verruqueux *L43.0*
- - Wilson *L43.9*
- plan actinique *L43.3*
- plano-pilaire *L66.1*
- sclereux *L90.0*
- - atrophique *L90.0*
- - - verge *N48.0*
- - - vulve *N90.4*
- - verge *N48.0*
- - vulve *N90.4*
- scrofulosorum, tuberculeux, primaire *A18.4*
- spinulosique *Q82.8*
- striatus *L44.2*
- urticatus *L28.2*
- Vidal *L28.0*
- vulgaire *L28.0*
- - chronique *L28.0*
- - - circonscrit *L28.0*

Lichénification *L28.0*

Lichénoïde
- éruption cutanée *L28.0*
- parapsoriasis *L41.0*
- pityriasis *L41.0*
- - chronique *L41.1*
- réaction aux médicaments *L43.2*
- tuberculide *A18.4*
- - primaire *A18.4*

Lidocaïne
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Lié à l'éducation
- handicap *Z55*
- problème *Z55*

Lié(e) à la carence en iode
- affection thyroïdienne *E01.8*
- goitre
- - diffus *E01.0*

Lié(e) à la carence en iode *–suite*
- goitre *–suite*
- - multinodulaire *E01.1*
- goître nodulaire *E01.1*
- hypothyroïdie, subclinique *E02*

Liée au cortisol, globuline, anomalie *E27.8*

Lien avec une infection
- asthme bronchique *J45.1*
- exacerbation, en cas d'asthme bronchique, allergique *J45.8*

Lien, social
- absence de, avec trouble comportement social *F91.1*
- Trouble du comportement social *F91.2*

Lieu de travail, effet psychosocial *Z56*

Lièvres, fièvre *A21.9*

Lièvres, oeil *H02.2*

Lièvres, peste *A21.9*

Lifting du visage, pour motifs cosmétiqu *Z41.1*

Ligament
- acromio-claviculaire
- - élongation *S43.5*
- - entorse *S43.5*
- anomalie *M24.29*
- - *Q79.9*
- arrachement *T14.3*
- arrachement, cartilagineux *T14.3*
- bassin, blessure, au cours de l'accouchement *O71.6*
- calcanéo-fibulaire, distorsion *S93.42*
- calcification *M24.29*
- collatéral
- - carpe
- - - cubital, rupture, traumatique *S63.3*
- - - radial, rupture, traumatique *S63.3*
- - cubital
- - - élongation *S53.42*
- - - rupture, traumatique *S53.3*
- - radial
- - - élongation *S53.41*
- - - rupture, traumatique *S53.2*
- - tibial
- - - calcification *M23.83*
- - - région, bursite *M76.4*
- collatéral médial du genou, foulure *S83.40*
- collatéral, rupture, traumatique *S63.4*
- contracture *M24.29*
- - congénitale *Q79.8*
- coraco-huméral
- - distorsion *S43.4*
- - élongation *S43.4*
- croisé
- - antérieur
- - - déchirure
- - - - complète *S83.53*
- - - - partielle *S83.53*
- - - entorse *S83.51*
- - - insuffisance *M23.81*
- - - rupture, articulation du genou, ancienne *M23.51*
- - Elongation *M23.89*
- - entorse, genou *S83.50*
- - inférieur
- - - déchirure
- - - - complète *S83.54*

Ligament *–suite*
- croisé *–suite*
- - inférieur *–suite*
- - - déchirure *–suite*
- - - - partielle *S83.54*
- - - entorse *S83.52*
- - lésion *M23.89*
- - lésion, en cas de lésion
- - - Ménisque interne *S83.7*
- - - Ménisque, externe *S83.7*
- - rupture *S83.50*
- croisé du genou, distorsion *S83.50*
- cubito-carpien palmaire, rupture, traumatique *S63.3*
- déchirure *T14.3*
- déformation, acquise *M24.29*
- deltoïde, distorsion, malléole *S93.41*
- doigt
- - collatéral, rupture, traumatique *S63.4*
- - palmaire, rupture, traumatique *S63.4*
- dos, relâchement *M53.29*
- élongation *T14.3*
- - cheville *S93.40*
- entorse *T14.3*
- externe
- - déchirure du genou
- - - complète *S83.43*
- - - partielle *S83.43*
- - lésion articulation tibio-tarsienne *S93.40*
- - rupture, articulation tibio-tarsienne *S93.2*
- - - supérieure *S93.2*
- fibulo-calcanéen, distorsion *S93.42*
- gastro-colique, perte, avec volvulus, estomac *K31.88*
- genou, calcification *M23.83*
- genou, déchirure
- - ancienne *M23.59*
- - spontanée *M23.59*
- hémarthrose, traumatique *T14.3*
- hypertrophie *M24.29*
- ilio-lombaire, enthésopathie *M77.8*
- ilio-lombaire, lésion *M24.25*
- insuffisance *M24.29*
- - familiale *M35.7*
- - genou *M23.89*
- lacération *T14.3*
- large de l'utérus
- - abcès *N73.2*
- - - aigu *N73.0*
- - - chronique *N73.1*
- - absence *Q50.6*
- - accessoire *Q50.6*
- - anomalie *Q50.6*
- - atrésie *Q50.6*
- - déchirure *N83.8*
- - - tant que lésion obstétricale de la mère *O71.6*
- - distorsion *S37.88*
- - durcissement *N83.8*
- - hématocèle *N94.8*
- - hématome *N83.7*
- - - non traumatique *N83.7*
- - - traumatique *S37.88*
- - hydrocèle *N94.8*
- - induration *N83.8*
- - inflammation *N73.2*
- - kyste

Ligament *–suite*
- large de l'utérus *–suite*
- - kyste *–suite*
- - - bénin *N83.8*
- - - embryonnaire *Q50.5*
- - lacération, en tant que lésion obstétricale de la mère *O71.6*
- - lésion *S37.88*
- - maladie, non inflammatoire *N83.9*
- - perforation *N83.8*
- - - tant que lésion obstétricale de la mère *O71.6*
- - tuberculose *A18.1+, N74.1**
- - varices *I86.2*
- latéral externe, genou
- - entorse *S83.41*
- - foulure
- - - complète *S83.43*
- - - partielle *S83.43*
- latéral interne
- - cheville, distorsion *S93.41*
- - genou, déchirure
- - - complète *S83.44*
- - - partielle *S83.44*
- - insuffisance, articulation du genou *M23.83*
- - rupture, genou *S83.44*
- lésion traumatique, en présence de déchirure du ménisque, genou *S83.7*
- longitudinal
- - antérieur, cervical
- - - distorsion *S13.4*
- - - élongation *S13.4*
- - postérieur, ossification *M48.89*
- malformation
- - acquise *M24.29*
- - congénitale *Q79.9*
- ossification *M67.89*
- palmaire, rupture, traumatique *S63.4*
- patellaire
- - allongement, congénital *Q74.1*
- - distorsion NCA *S76.1*
- - lésion *S76.1*
- radio-carpien
- - dorsal, rupture, traumatique *S63.3*
- - palmaire, rupture, traumatique *S63.3*
- rond
- - agénésie *Q52.8*
- - anomalie *Q52.8*
- - fémur, distorsion *S73.18*
- - utérus
- - - anomalie *Q52.8*
- - - aplasie *Q52.8*
- - - distorsion *S37.88*
- - - hématocèle *N94.8*
- - - lésion *S37.88*
- rupture *T14.3*
- - genou, ancienne *M23.59*
- - traumatique *T14.3*
- - traumatique, cheville *S93.2*
- sacro-iliaque, entorse *S33.6*
- sacrotubulaire, distorsion *S33.7*
- section
- - complète *T14.3*
- - partielle *T14.3*
- subluxation, traumatique *T14.3*
- talo-fibulaire, distorsion *S93.48*
- talofibulaire, entorse *S93.48*

Ligament –*suite*

- tibio fibulaire, déchirure, proximale *S83.6*
- tibio-fibulaire, distal, distorsion *S93.43*
- xanthome *E75.5*

Ligamentopathie *M77.9*
- insertion *M77.9*

Ligamentose
- ilio-lombaire, ligament *M24.25*
- tarse *M24.27*

Ligature
- ombilicale, glissement *P51.8*
- trompe *Z30.2*
- tubaire *Z30.2*
- vaisseau, hémorragie *T81.0*

Ligature ombilicale, glissement *P51.8*

Lightwood-Albright Syndrome de *N25.8*

Ligne
- blanc Hernie : de la *K43.68*
- - : de la *K43.78*
- - : de la *K43.98*
- fixation du corps vitré *H43.8*
- Hudson, cornée *H18.0*

Ligne de jonction du corps vitré *H43.8*

Ligne pigmentée de Stähli *H18.0*
- cornée *H18.0*

Ligne(s) pigmentée(s) de Stähli *H18.0*
- cornéenne(s) *H18.0*

Lignes de Beau *L60.4*

Limaçon, oreille *Q17.8*

Limbe de la cornée, pigmentation *H18.0*

Limbique
- encéphalopathie, paranéoplasique *D48.9+, G13.1**
- épilepsie, avec trouble, personnalité *F07.0*
- système, épilepsie *G40.2*

Limbique, kératoconjonctivite, supérieur *H16.2*

Limitation
- fonction
- - coeur, ventricule gauche *I50.19*
- - rein *N28.9*
- - ventricule gauche, en cas d'affection, coeur, coronaire *I25.9*
- miction *R39.1*
- mobilité
- - indépendance, soins *Z74.0*
- - spermatozoïdes *R86.9*

limité Maladie chronique greffon contre l ' hôte, forme *T86.03*

Lincomycine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Lincosamide
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Linéaire, sclérodermie *L94.1*

Lingual(e)
- abcès *K14.0*
- amygdale, syphilis tardive *A52.7+, J99.8**
- amygdalite *J03.9*
- goitre *Q89.2*

Linguatulose *B88.8*

Linite plastique *C16.9*
- *K31.9*
- cas de carcinome, estomac, squirrheux *C16.9*

Lipase
- fonction, diminuée *K90.3*
- taux sérique, anormal *R74.8*

Lipémie *E78.5*

Lipide
- bronchopneumonie, endogène *J84.8*
- pneumonie, endogène *J84.8*
- trouble du métabolisme *E78.9*
- - cérébral, avec démence *E75.6+, F02.8**
- - congénital *E78.9*

Lipidémie *E78.5*

Lipides, anomalie des réserves de, avec *E75.6+, H36.8**

Lipidose *E75.6*
- cérébrale *E75.4*
- - avec dégénérescence du cerveau *E75.4+, G32.8**
- cérébrorétinienne *E75.4*
- cérébroside *E75.2*
- due au cholestérol *E75.5*
- généralisée, avec dégénérescence du cerveau *E75.6+, G32.8**
- glycolipide *E75.2*
- neuro- *E75.4*
- sulfatidose *E75.2*
- système, avec dystrophie, rétine *E75.6+, H36.8**

Lipoblastique, sarcome *C49.9*

Lipoblastome *D17.9*

Lipocaique, carence *K86.8*

Lipochondrodystrophie *E76.0*

Lipodermoïde, orbite *D31.6*

Lipodystrophie *E88.1*
- intestinale *K90.8*

Lipoedème *R60.9*

Lipofibrome *D17.9*

Lipofuscinose
- céroïdes neuronaux, à *E75.4*
- neuronale *E75.4*

Lipogranulomatose *E78.8*
- généralisée *E78.8*

Lipogranulome, sclérosant *L92.8*

Lipoïde
- dermatoarthrite *E78.8+, M14.3**
- granulomatose *E75.5*
- multiplication *E78.5*
- nécrobiose *L92.1*
- - diabétique *E14.60+, L99.8**
- - - cas de
- - - - diabète de type 1 *E10.60+, L99.8**
- - - - diabète de type 2 *E11.60+, L99.8**
- néphrose *N04.9*
- stockage *E75.6*

Lipoïdémie *E78.5*

Lipoïdose *E75.6*
- aorte *E75.6*
- endocardite *E75.6*
- larynx *E75.6*
- reins *E75.6*

Lipoléiomyome *D21.9*

Lipomatose *E88.2*

Lipomatose –*suite*

- adéno- *E88.8*
- adéno-, Launois Bensaude *E88.8*
- bassinet *E88.2*
- dercum *E88.2*
- douloureuse *E88.2*
- épicardique *E88.2*
- épidural *E88.2*
- foetal *D17.9*
- glande salivaire *K11.0*
- hile *E88.2*
- médiastinale *E88.2*
- multiple *E88.2*
- neuro- *E88.2*
- pancréas *E88.2*
- rein *D17.7*
- sein *E88.2*
- sinus, rein *D17.7*
- sinusale, rein *D17.7*
- symétrique, bénigne *E88.8*

Lipome *D17.9*
- amygdale *D17.7*
- angio- *D17.9*
- angiomyo- *D17.9*
- - rein *D17.7*
- cellules adipeuses *D17.9*
- - foetales *D17.9*
- cellules fusiformes *D17.9*
- cellules graisseuses *D17.9*
- - foetal *D17.9*
- cordon spermatique *D17.6*
- estomac *D17.5*
- fibro- *D17.9*
- fibromyxo- *D17.9*
- foetal *D17.9*
- glande surrénale *D17.5*
- gorge *D17.0*
- hémangio- *D17.9*
- hémangioléiomyo- *D17.9*
- hypophyse *D17.7*
- intraabdominal *D17.5*
- intramusculaire *D17.9*
- intrathoracique *D17.4*
- leiomyo- *D21.9*
- membre *D17.2*
- myélo- *D17.9*
- myo- *D17.9*
- myxo- *D17.9*
- neurofibro- *D17.9*
- œsophage *D17.4*
- palais *D17.0*
- paroi abdominale *D17.1*
- paupière *D17.0*
- peau NCA *D17.3*
- péritoine *D17.7*
- pharynx *D17.0*
- pléomorphe *D17.9*
- rein *D17.7*
- rétropéritoine *D17.7*
- sarcomatoide *C49.9*
- sein *D17.1*
- sous cutané NCA *D17.3*
- tête *D17.0*
- thymo- *D17.4*
- thymus *D17.4*
- thyroïde *D17.7*
- tissu conjonctif NCA *D17.3*
- tronc *D17.1*

Lipome –*suite*
- visage *D17.0*

Lipomélanique, réticulose *I89.8*

Lipomyome *D17.9*

Lipomyxosarcome *C49.9*

Liponyssoides sanguineus, dermite *B88.0+, L99.8**

Lipophagique, granulome, en cas de malad *M35.6*

Lipoprotéine
- carence *E78.6*
- - familiale *E78.6*
- troubles du métabolisme *E78.9*

Lipoprotéinémie *E78.5*
- A bêta - *E78.6*
- alpha *E78.6*
- - familiale *E78.6*
- avec élargissement de la bande bêta - *voir aussi* bétalipoprotéinémie flottante *E78.2*
- broad bêta *E78.2*
- hyper- *E78.5*
- - type
- - - IIa *E78.0*
- - - IIb *E78.2*
- - - III *E78.2*
- - - IV *E78.1*
- hyperbêta- *E78.0*
- - familiale *E78.0*
- - - avec prébêtalipoprotéinémie *E78.2*
- hyperprébêta- *E78.1*
- - familiale *E78.1*
- hypoalpha- *E78.6*
- hypobêta- *E78.6*
- - familiale *E78.6*
- prébêta- *E78.1*
- - cas d'hyperbêtalipoprotéinémie, familiale *E78.2*
- - familiale *E78.1*

Lipoprotéines, carence *E78.6*

Liposarcome *C49.9*
- cellule mûre *C49.9*
- cellules polymorphes *C49.9*
- cellules rondes *C49.9*
- différencié *C49.9*
- embryonnaire *C49.9*
- fémur *C49.2*
- mixte *C49.9*
- myxoïde *C49.9*
- pléomorphe *C49.9*

Lipothymie *R55*

Lipotrope, médicament, intoxication *T50.9*

Lipurie *R82.0*

Liquide
- amniotique
- - anormal *O41.9*
- - - avec lésion, foetus/nouveau-né *P02.9*
- - aspiration *P24.1*
- - - avec pneumonie *P24.1*
- - avec méconium *P20.9*
- - bronche *T17.8*
- - dépistage *Z36.2*
- - diagnostique *Z36.9*
- - embolie *O88.1*
- - - complications, accouchement *O88.1*
- - - couche *O88.1*

Liquide –*suite*
- amniotique –*suite*
- - examen *Z36.2*
- - - prénatal NCA *Z36.2*
- - formation, élevée *O40*
- - infection *O41.1*
- - modification *O41.9*
- - résultats anormaux *R89.9*
- - suintement *O42.9*
- - - avec accouchement, retardé *O75.6*
- - taux élevé d'alpha-fœtoprotéines *Z36.1*
- - trachée *T17.8*
- - troubles *O41.9*
- - - avec lésion, foetus/nouveau-né *P02.9*
- - vert *P20.9*
- aspiration *T17.9*
- céphalorachidien
- - après rachicentèse Ecoulement de *G97.0*
- - Ecoulement de *G96.0*
- cérébrospinal
- - anormal *R83.9*
- - dérivation in situ *Z98.2*
- - Drainage *Z98.2*
- - écoulement *G96.0*
- - - suite à
- - - - ponction lombaire *G97.0*
- - - - ponction spinale *G97.0*
- - shunt *Z98.2*
- cérébro-spinal
- - dérivation in situ *Z98.2*
- - rhinorrhée *G96.0*
- - suintement *G96.0*
- - - après une ponction lombaire *G97.0*
- dans
- - abdomen *R18*
- - articulation *M25.49*
- - cavité péritonéale *R18*
- - cavité pleurale *J94.8*
- - poumons, *voir* également oedème pulmonaire *J81*
- - thorax *J94.8*
- encapsulé, poumon *J90*
- épanchement, cavité abdominale *R18*
- extracellulaire
- - déplétion *E86*
- - diminution *E86*
- lacrymal
- - insuffisance *H04.1*
- - - acquise *H04.1*
- - - congénitale *Q10.6*
- - sécrétion, diminuée NCA *H04.1*
- péritonéal, résultats anormaux *R85.9*
- perte *E86*
- - chez le nouveau-né *P74.1*
- résultats
- - anormaux *R83.9*
- - histologique, anormal *R83.7*
- - immunologique, anormal *R83.4*
- rétention *R60.9*
- substance
- - pneunomie par aspiration NCA *J69.8*
- synovial, résultat anormal d'examen *R89.9*
- taux anormal d'enzymes *R83.0*
- taux hormonal anormal *R83.1*

Lisfranc, articulation de

Lisfranc, articulation de –*suite*
- entorse *S93.6*
- luxation *S93.33*

Lisinopril
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Lissauer, paralysie de *A52.1*
- syphilitique *A52.1*

Listeria
- artérite cérébrale *A32.8+, I68.1**
- endocardite *A32.8+, I39.8**
- méningite *A32.1+, G01**
- méningoencéphalite *A32.1+, G05.0**
- monocytogenes
- - avec méningo-encéphalite *A32.1+, G05.0**
- - infestation *A32.9*
- - - congénitale *P37.2*
- - méningite *A32.1+, G01**
- septicémie *A32.7*

Listériose *A32.9*
- alimentaire *A32.9*
- avec
- - encéphalite *A32.1+, G05.0**
- - lésion foetale *P00.2*
- chez le nouveau-né *P37.2*
- cutanée *A32.0*
- disséminée, congénitale *P37.2*
- foetale *P37.2*
- maternelle, avec lésion, foetus, avec prise en charge de la mère *O35.8*
- oculo-glandulaire *A32.8*

Listériose néonatale *P37.2*

Literie
- Asphyxie *T71*
- étouffement *T71*

Lithiase
- broncho- *J98.0*
- choléocysto- *K80.20*
- choléocystocholédocho- *K80.80*
- néphro- *N20.0*
- - congénitale *N20.0*
- pancréo- *K86.8*
- prostate *N42.0*
- prostatite *N41.8*
- pyélite
- - avec hydronéphrose *N13.2*
- - chronique, avec hydronéphrose *N13.2*
- pyélonéphrite *N20.9*
- - avec hydronéphrose *N13.2*
- rhino- *J34.8*
- urétérale *N20.1*
- urétrale *N21.1*
- - avec
- - - colique *N21.1*
- - - infection *N21.1*
- urétro- *N21.1*
- - avec
- - - colique *N21.1*
- - - infection *N21.1*
- vésiculaire *K80.20*
- - avec
- - - cholécystite
- - - - aiguë *K80.00*
- - - - - avec obtruction des voies biliaires, *K80.01*
- - - - chronique *K80.10*

Lithiase *–suite*
- vésiculaire *–suite*
- - avec *–suite*
- - - cholécystite *–suite*
- - - - chronique *–suite*
- - - - - avec obstruction des voies biliaires, *K80.11*
- - - obstruction des voies biliaires *K80.21*
- vésiculaire et cholédocienne *K80.80*

Lithium, concentration anormale dans le *R78.8*

Litholrubin
- allergie (E180) *T78.4*
- hypersensibilité (E180) *T78.4*

Lithopédion *P95*

Little, maladie de *G80.9*

Littré, glandes de
- abcès *N34.0*
- inflammation *N34.2*
- maladie *N34.2*

Littré, hernie de *K45.8*

Littrite *N34.2*

Livide *R23.1*
- annulaire *R23.1*
- racemosa *R23.1*
- réticulaire *R23.1*

LLA-B cellules matures type Burkitt , *C91.8*

LLC [leucémie lymphoïde chronique] *C91.10*
- rémission complète *C91.11*

LMC Crise blastique cours d ' une leucémie myéloïde chronique [*C94.8!*

LMC [leucémie myéloïde chronique] *C92.10*
- rémission complète *C92.11*

LMP (leucoencéphalopathie multifocale pr *A81.2*

Loase *B74.3*
- avec infestation, paupière *B74.3+, H03.0**

Lobaire
- pneumonie *J18.1*
- - bactérienne *J15.9*
- - cas d'influenza *J11.0*
- - chronique *J84.1*
- - disséminée *J18.1*
- - due à
- - - bactéries de Friedländer *J15.0*
- - - Escherichia coli *J15.5*
- - - Haemophilus influenzae *J14*
- - - klebsiella pneumoniae *J15.0*
- - - pneumocoques *J13*
- - - proteus *J15.6*
- - - pseudomonas *J15.1*
- - - staphylocoques *J15.2*
- - - Streptococcus pneumoniae *J13*
- - - streptocoques NCA *J15.4*
- - - streptocoques, groupe B *J15.3*
- - - virus *J12.9*
- - hypostatique *J18.2*
- - interstitielle *J18.1*
- sclérose, cerveau, atrophique *G31.0*
- - avec démence *G31.0+, F02.0**

Lobe *J98.1*
- anormal du foie de Riedel *Q44.7*

Lobe *–suite*
- frontal
- - abcès *G06.0*
- - atrophie *G31.0*
- - méningiome *D32.0*
- - néoformation, maligne *C71.1*
- frontal, hémangiome *D18.01*
- hémorragie, cérébrale *I61.1*
- inférieur
- - Atélectasie *J98.1*
- - bronchopneumonie *J18.0*
- - carcinome bronchique *C34.3*
- - pneumonie *J18.1*
- moyen
- - Atélectasie *J98.1*
- - pneumonie *J18.1*
- moyen, syndrome du *J98.1*
- occipital, lésion *S06.8*
- oreille
- - absence, de naissance *Q17.8*
- - agénésie *Q17.8*
- - fissure, congénitale *Q17.8*
- - percé *Z41.8*
- - rudimentaire *Q17.3*
- - surnuméraires *Q17.0*
- oreille surnuméraire *Q17.0*
- pariétal
- - astrocytome *C71.3*
- - malin, néoformation *C71.3*
- - n>éoformation, maligne *C71.3*
- pariétal, astrocytome *C71.3*
- pariétal, lésion *S06.8*
- supérieur
- - bronchopneumonie *J18.0*
- - carcinome bronchique *C34.1*
- - pneumonie *J18.1*
- temporal, astrocytome *C71.2*
- veine azygos *Q33.1*

Loboa loboi, infection à *B48.0*

Lobstein, maladie de *Q78.0*

Lobulaire
- adénocarcinome *C50.9*
- carcinome
- - invasif *C50.9*
- - mammaire, non-invasif *D05.0*
- carcinome in situ du sein *D05.0*
- carcinome in situ mammaire invasif ductal *C50.9*
- hépatite
- - chronique NCA *K73.1*
- - chronique, en cas de maladie hépatique toxique *K71.4*
- intracanalaire, carcinome in situ mammaire *D05.7*
- pneumonie *J18.0*

Lobulation
- foie, anormale *Q44.7*
- rate *Q89.0*
- rein, foetale *Q63.1*

local Chimiothérapie prophylactique *Z29.20*

Local, type de maladie

localisation
- non précisée Réaction d ' hypersensibilité des voie respiratoire supérieur, *J39.3*
- Thrombose phlébite thrombophlébite d ' Autre *I80.88*

Localisé, -sée
- abcès NCA *L02.8*
- Adénopathie *R59.0*
- adiposité *E65*
- adiposité, excès *E65*
- amylose *E85.4*
- arthrose *M19.99*
- atrophie de la gencive *K06.0*
- bronchectasie *J47*
- Dermatosclérose *L94.0*
- dermite, due aux médicaments *L27.1*
- gonflement *R22.9*
- - superficiel *R22.9*
- grossissement, noeuds lymphatiques *R59.0*
- hématome, sous-dural, lésion congénitale *P10.0*
- hyperhidrose *R61.0*
- hyperplasie, noeuds lymphatiques *R59.0*
- hypertrichose *L68.2*
- hypertrophie, noeuds lymphatiques *R59.0*
- infiltration, amyloïde *E85.4*
- lymphadénopathie *R59.0*
- macronodules cutanés *R22.9*
- maladie, tissu conjonctif *L94.9*
- oedème *R60.0*
- ostéoarthrose *M19.99*
- ostéoporose *M81.69*
- péritonite *K65.9*
- perte de cheveux *L63.9*
- rash, dû à
- - Médication *L27.1*
- - vaccination *L27.1*
- retraction gencive *K06.0*
- sclérodermie *L94.0*
- sepsie, plaie opératoire *T81.4*
- tic, trouble, dégénératif *G25.6*

Lochiometra *O90.8*

Löffler-I, syndrome *J82*

Löffler-II, syndrome *I42.3*

Löfgren, syndrome de *D86.8*

Logement, absence *Z59*

Logement, manque
- permanent *Z59*
- temporaire *Z59*

Logements
- étroits *Z59*
- inadéquats *Z59*

Lögfren, syndrome de *D86.8*

Löhr-Léon-Kindberg, syndrome de *J82*

Lombaire *voir aussi* type de maladie
- région
- - anomalie structurelle *M43.16*
- - blocage *M99.83*
- - compression, muscle *S39.0*
- - syndrome *M54.16*
- - aigu *M54.16*
- - - avec blocage articulation sacro-iliaque *M54.16*
- - cas de
- - - modification, dégénérative *M47.26*
- - - pathologie lombo-sacrée *M54.17*
- - cervical, dorsale *M54.10*
- - - chronique *M54.10*
- - chronique *M54.16*

Lombaire *voir aussi* type de maladie *–suite*
- syndrome *–suite*
- - chronique *–suite*
- - - cas de changement, colonne vertébrale lombaire, dégénérative *M47.26*
- - chronique-dégénérative *M47.26*
- - dégénérative *M47.26*
- - - pseudo-radiculaire *M47.26*
- - dorso-lombaire *M54.15*
- - - dégénérative *M47.25*
- - région cervicale *M54.10*
- - - dégénérative *M47.20*
- syndrome de compression *M54.16*

Lombalgie *M54.5*
- à un déplacement de disque invertébral *M51.2*
- à un déplacement, disque invertébral *M51.2*
- aigue *M54.5*
- - avec douleurs *M54.5*
- - cas de blocage *M54.5*
- - récidivante *M54.5*
- avec douleurs *M54.5*
- basse *M54.5*
- cas de
- - irritation, région sacro-iliaque *M54.5*
- - sciatique *M54.4*
- cervico-brachiale *M54.10*
- cervicobrachio- *M54.10*
- chronique *M54.5*
- chronique-récidivante *M54.5*
- dorso- *M54.5*
- - aigue *M54.5*
- - chronique *M54.5*
- - réactive *M54.5*
- - récidivante *M54.5*
- statique *M54.5*
- thoraco- *M54.15*

Lombo-sacré, vertèbre, spondylose *M43.07*

Lombo-sciatique *M54.4*
- aigue *M54.4*
- avec blocage *M54.4*
- chronique *M54.4*
- - cas de prolapsus, disque *M51.2*
- due à des lésions, disque *M51.1+, G55.1**
- lors de la grossesse *O99.8*

Long
- pleurs, nourrisson *R68.1*
- réaction dépressive *F43.2*

Longitudinal, -le
- ongle *L60.8*
- - congénitale *Q84.6*
- raccourcissement
- - fémur *Q72.4*
- - fibula *Q72.6*
- - radius *Q71.4*
- - tibia *Q72.5*
- - ulna *Q71.5*
- raccourcissement, membres *Q73.8*

Long-QT, syndrome *I45.8*

Looser-Milkman-Debray, syndrome de *M83.89*

Lorain-levi, syndrome de *E23.0*

Lordose *M40.59*
- acquise *M40.49*

Lordose *–suite*
- congénitale *Q76.4*
- - sans scoliose *Q76.4*
- reins *M40.56*
- rhino- *M95.0*
- séquelle tardive du rachitisme *E64.3*
- suite à une intervention chirurgicale *M96.4*
- troubles, posture *M40.49*
- tuberculeuse *A18.0+, M49.09**

Lordotique
- albuminurie *N39.2*
- L5/S1 *M40.57*

Losir, manque *Z73*

Louis-Bar, syndrome de *G11.3*

Louping-ill, maladie de *A84.8*

Lowe, syndrome de *E72.0*
- avec
- - Fanconi, syndrome *E72.0*
- - glaucome *E72.0+, H42.0**

Lown-Ganong-Levine, syndrome *I45.6*

Lown-Ganong-Levine, syndrome de *I45.6*

LowT3-Low T4, syndrome *R79.8*

LSD (acide lysergique diéthylamide)
- abus, sans dépendance *F16.1*
- intoxication *T40.8*
- ivresse *F16.0*
- réaction *F16.0*

LSD, et dérivés, dépendance *F16.2*

Lubarsch-Pick, syndrome de *E85.8*

Ludwig, angine de *K12.20*

Luette
- absence *Q38.5*
- - congénitale *Q38.5*
- absence, congénitale *Q38.5*
- Agénésie *Q38.5*
- Anomalie *Q38.5*
- difformité, congénitale *Q38.5*
- fente *Q35.7*
- hypertrophie *K13.7*
- inflammation *K12.28*
- - aigue *K12.28*
- - catarrhale *K12.28*
- - chronique *K12.28*
- - gangréneuse *K12.28*
- - membraneuse *K12.28*
- - purulente *K12.28*
- - ulcéreuse *K12.28*
- lésion *S09.9*
- - superficielle *S00.50*
- occlusion, absente *Q35.7*
- oedème *J39.2*
- papillome *D10.3*
- paralysie, post-diphtérique *A36.0*
- perforation *K13.7*
- - syphilitique *A52.7+, K93.8**
- plaie, ouverte *S01.55*
- racourcissement, congénital *Q38.5*
- syphilis tertiaire, perforante *A52.7+, K93.8**
- tuberculose *A18.8+, K93.8**
- ulcus *K13.7*

Lumbago *M54.5*
- à
- - déplacement, disque interbertébral *M51.2*

Lumbago *–suite*
- à *–suite*
- - prolapsus *M51.2*
- aigu *M54.5*
- avec sciatique, lésions disque *M51.1+, G55.1**
- cas de
- - grossesse *O99.8*
- - sciatique *M54.4*
- chronique *M54.5*

Lumière
- dermatite aiguë *L56.8*
- dermatite NCA *L57.8*

Lumière du soleil
- allergie *L56.4*
- lésions *T67.9*
- urticaire *L56.3*

Lumière, chaleur, effet *T67.9*

Lunarite *M92.2*
- chez l'adulte *M93.1*
- juvénile *M92.2*

Lunatum
- fracture, poignet *S62.11*
- nécrose
- - aseptique *M92.2*
- - chez l'adulte *M93.1*
- - juvénile *M92.2*

Lunettes
- ajustement *Z46.0*
- défaut de réfraction *T88.9*
- fourniture *Z46.0*
- renouvellement d'ordonnance *Z76.0*

Lunettes, lecture, mise en place *Z46.0*

Lupoïde
- Boeck *D86.3*
- hépatite, en cas de maladie toxique du foie *K71.5*
- non classée ailleurs Hépatite *K75.4*

Lupoïde de Boeck *D86.3*

Lupoïde miliaire de Boeck *D86.3*

Lupus
- chronique, en cas de néphrite *M32.1+, N08.5**
- discoïde, focal *L93.0*
- erythémateux *L93.0*
- - aigu *M32.9*
- - avec
- - - encéphalopathie *M32.1+, G05.8**
- - - endocardite *M32.1+, I39.8**
- - chronique *L93.0*
- - cutané subaigu *L93.1*
- - discoïde *L93.0*
- - disséminé *M32.9*
- - paupière *H01.1*
- - phénomène cellulaire *M32.9*
- - profond *L93.2*
- - systémique
- - - avec
- - - - artérite cérébrale *M32.1+, I68.2**
- - - - démence *M32.1+, F02.8**
- - - - encéphalite *M32.1+, G05.8**
- - - - glomérulonéphrite *M32.1+, N08.5**
- - - - maladie
- - - - - glomérulaire, *M32.1+, N08.5**
- - - - - rénale tubulo-interstitielle, *M32.1+, N16.4**

Lupus –*suite*
- erythémateux –*suite*
- - systémique –*suite*
- - - avec –*suite*
- - - - myopathie *M32.1+, G73.7**
- - - - néphrite *M32.1+, N08.5**
- - - - néphrose *M32.1+, N08.5**
- - - - participation du
- - - - - rein,
- - - - - poumon, *M32.1+, J99.1**
- - - - - rein, glomérulaire, *M32.1+, N08.5**
- - - - - rein, tubulo-interstitiel, *M32.1+, N16.4**
- - - - péricardite *M32.1+, I32.8**
- - - - polynévrite *M32.1+, G63.5**
- - - inhibiteur *D68.8*
- - - médicamenteux *M32.0*
- - - mère affectant le fœtus/nouveau-né *P00.8*
- - systémique [LES] *M32.9*
- - viscéral *M32.1*
- érythémateux chronique discoïde *L93.0*
- - paupière *H01.1*
- érythémateux discoïde *L93.0*
- exedens *A18.4*
- panniculite (lupique) *L93.2*
- paupière *A18.4+, H03.1**
- - tuberculeux *A18.4+, H03.1**
- pernio (Besnier) *D86.3*
- tuberculeux *A18.4*
- vulgaire *A18.4*
- - paupière *A18.4+, H03.1**
- - tuberculeux *A18.4*

Lutéale, phase, tardive, trouble *N94.8*

Lutéine, hormone libératrice
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Lutéinisé, thécome *D27*

Lutéinome *D27*

Lutembacher, syndrome de *Q21.1*

Lutéome *D27*

Lutz-Miescher, elastome *L87.2*

Lutz-Miescher, élastome de *L87.2*

Luxable, hanche *Q65.6*
- congénitale *Q65.6*

Luxable, hanche, congénitale *Q65.6*

Luxation *T14.3*
- ancienne *M24.89*
- articulaire récidivante *M24.49*
- articulation *T14.3*
- - huméro-radiale *S53.0*
- - huméro-ulnaire *S53.10*
- - tibio-fibulaire *S83.10*
- articulation acromio-claviculaire *S43.1*
- articulation atlanto-axiale *S13.11*
- articulation atlanto-épistrophique *S13.11*
- articulation crico-aryténoïdienne *S13.2*
- articulation crico-thyroïdienne *S13.2*
- articulation de Chopart *S93.34*
- articulation de la cheville *S93.0*
- articulation de la hanche *S73.00*
- - congénitale *Q65.2*
- - - bilatérale *Q65.1*
- - - examen de dépistage *Z13.7*
- - - unilatérale *Q65.0*

Luxation –*suite*
- articulation de la hanche –*suite*
- - récidivante *M24.45*
- articulation de la mâchoire *S03.0*
- articulation de Lisfranc *S93.33*
- articulation des orteils *S93.10*
- articulation du genou *S83.10*
- - ancienne *M23.89*
- - congénitale *Q68.2*
- articulation du tarse *S93.31*
- articulation gléno-humérale [épaule] *S43.00*
- articulation intervertébrale *T09.2*
- articulation sacro-iliaque *S33.2*
- - chronique *M53.28*
- - congénitale *Q74.2*
- articulation sterno-claviculaire *S43.2*
- astragale *S93.0*
- atlanto-occipitale *S13.11*
- atlas *S13.11*
- avant bras, ouverte *S52.9*
- avant-bras *T11.2*
- axis *S13.11*
- bassin *S33.3*
- - séquelles *T91.8*
- bassin, ouverte *S33.3*
- carpo-métacarpienne (articulation) *S63.04*
- cartilage costal *S23.2*
- cartilage maxillaire *S03.0*
- cartilage sternal *S23.2*
- cartilage thyroïdien *S13.2*
- cartilage, cloison nasale *S03.1*
- cas de fracture *T14.20*
- cavité glénoïde *S43.00*
- ceinture scapulaire *S43.3*
- clavicule *S43.1*
- cloison nasale *J34.2*
- cloison nasale, cartilagineuse *S03.1*
- coccyx *S33.2*
- congénitale NCA *Q68.8*
- coracoïde *S43.00*
- côte *S23.2*
- cotyle *S73.00*
- cou *S13.10*
- - *S13.2*
- - et tête *T03.0*
- - multiple *S13.3*
- - - *S13.3*
- - séquelles *T91.8*
- coude *S53.10*
- - congénitale *Q68.8*
- - récidivante *M24.42*
- cristallin *H27.1*
- - avec glaucome *H40.5*
- - congénitale *Q12.1*
- - traumatique *S05.8*
- cubito-humérale (articulation) *S53.10*
- cubitus
- - distal *S63.08*
- - proximal *S53.10*
- dent *S03.2*
- disjonction symphysaire *S33.3*
- - cours de l'accouchement *O71.6*
- DIU [dispositif intrautérin] *T83.3*
- doigt *S63.10*
- - multiple *S63.2*
- - plusieurs *S63.2*

Luxation –*suite*
- dos *T09.2*
- endoprothèse totale de hanche [PTH] *T84.0*
- entorse *T14.3*
- - articulation, coude *S53.10*
- épaule *S43.00*
- - chronique *M24.41*
- - compliquée *S43.00*
- - congénitale *Q68.8*
- - récidivante *M24.41*
- extrémité
- - inférieure, séquelles *T93.3*
- - supérieure, séquelles *T92.3*
- fémur
- - distal *S83.10*
- - proximal *S73.00*
- genou *S83.10*
- - ancienne *M23.89*
- - congénitale *Q68.2*
- - pathologique *M24.36*
- genou, récidivante *M24.46*
- glande lacrymale *H04.1*
- globe oculaire *H44.8*
- - cours de l'accouchement *P15.3*
- globe oculaire, non traumatique *H44.8*
- globe oculaire, traumatique *S05.8*
- greffe cornéenne *T85.3*
- hanche *S73.00*
- - antérieure *S73.02*
- - congénitale *Q65.2*
- - - bilatérale *Q65.1*
- - - unilatérale *Q65.0*
- - postérieure *S73.01*
- - récidivante *M24.45*
- humérus *S43.00*
- - extrémité proximale *S43.00*
- - vers
- - - bas *S43.03*
- - - l'arrière *S43.02*
- humérus, extrémité proximale *S43.00*
- IIO [implant intraoculaire] *T85.2*
- interphalangienne (articulation), main *S63.12*
- jambe (du genou au pied)
- - distale *S93.0*
- - proximale *S83.10*
- lombosacrée *S33.10*
- - congénitale *Q76.4*
- mâchoire *S03.0*
- - séquelles *T90.8*
- mandibule *S03.0*
- médio-carpienne (articulation) *S63.03*
- médio-tarsienne (articulation) *S93.32*
- membre *T14.3*
- - inférieur *T13.2*
- - - séquelles *T93.3*
- - - supérieur *T03.4*
- - supérieur *T11.2*
- - - séquelles *T92.3*
- métacarpe *S63.7*
- - distal *S63.11*
- - proximal *S63.00*
- métacarpo-phalangienne (articulation) *S63.11*
- métatarsien *S93.34*
- métatarso-phalangienne (articulation) *S93.11*
- multiple, membre

Luxation –*suite*
- multiple, membre –*suite*
- - inférieur *T03.3*
- - - thorax, rachis lombosacré et bassin *T03.8*
- - supérieur *T03.2*
- - - thorax, rachis lombosacré et bassin *T03.8*
- omoplate *S43.3*
- ongle *T14.1*
- orteil *S93.10*
- - interphalangienne (articulation) *S93.12*
- orteils *S93.10*
- os du carpe *S63.00*
- os naviculare
- - main *S63.00*
- - pied *S93.31*
- os scaphoïde *S63.00*
- osselets *H74.2*
- partie du corps
- - multiple NCA *T03.8*
- - multiples, séquelles *T94.0*
- partie supérieure du bras, ouverte *S42.3*
- pathologique NCA *M24.39*
- péroné
- - distal *S93.0*
- - proximal *S83.10*
- péroné distal *S93.0*
- phalange
- - main *S63.10*
- - pied *S93.10*
- pied *S93.30*
- - ouverte *S93.30*
- poignet *S63.00*
- postérieure du fémur distal *S83.11*
- posturale *M70.9*
- pouce *S63.10*
- processus
- - articulaire *T09.2*
- - coracoïde *S43.00*
- rachis *T09.2*
- - cervical *S13.10*
- - cervico-dorsal *T03.8*
- - dorsal *S23.10*
- - lombaire *S33.10*
- - pathologique NCA *M53.29*
- rachis cervical *S13.10*
- - multiple *S13.3*
- rachis lombaire *S33.10*
- - ouverte *S32.00*
- rachis lombosacré, séquelles *T91.8*
- rachis thoracique *S23.10*
- radio-carpienne (articulation) *S63.02*
- radio-cubitale (articulation)
- - distale *S63.01*
- - proximale *S53.10*
- radio-humérale (articulation) *S53.0*
- radius
- - distal *S63.02*
- - proximal *S53.0*
- récidivante *M24.49*
- rein *N28.8*
- rotule *S83.0*
- - congénitale *Q74.1*
- - récidivante *M22.0*
- sacro-coccygienne *S33.2*
- sacro-iliaque, récidivante *M53.28*
- sacrum *S33.2*

Luxation –*suite*
- scaphoïde
- - main *S63.00*
- - pied *S93.31*
- séquelles *T94.1*
- sous-coracoïdienne *S43.00*
- sous-glénoïdienne *S43.00*
- spontanée *M24.39*
- sterno-claviculaire (articulation) *S43.2*
- sternum *S23.2*
- symphyse pubienne *S33.3*
- tarse *S93.31*
- tarso-métatarsienne (articulation) *S93.33*
- temporo-mandibulaire *S03.0*
- temporo-mandibulaire (articulation) *S03.0*
- tête *S03.3*
- - multiple *S03.5*
- - partielle NCA *S03.3*
- tête radiale *S53.0*
- thorax
- - multiples *S23.2*
- - séquelles *T91.8*
- thorax, ouverte *S22.9*
- tibia
- - distal *S93.0*
- - extrémité distale *S93.0*
- - extrémité proximale
- - - latérale *S83.14*
- - - médiane *S83.13*
- - - postérieure *S83.12*
- - proximal *S83.10*
- tibio-péronière (articulation)
- - inférieure *S93.0*
- - supérieure *S83.10*
- tibio-tarsienne (articulation) *S93.0*
- trachée *S23.2*
- tronc
- - multiple *T03.1*
- - séquelles *T91.8*
- uretère *Q62.6*
- vertèbre
- - cervico-dorsale *T03.8*
- - congénitale *Q76.4*
- vertèbre cervicale *S13.10*
- - C2/C3 *S13.12*
- - C3/C4 *S13.13*
- - C4/C5 *S13.14*
- - C5/C6 *S13.15*
- - C6/C7 *S13.16*
- - C7/T1 *S13.17*
- vertèbre dorsale *S23.10*
- vertèbre lombaire *S33.10*
- - L1/L2 *S33.11*
- - L2/L3 *S33.12*
- - L3/L4 *S33.13*
- - L4/L5 *S33.14*
- - L5/S1 *S33.15*
- vertèbre thoracique
- - T1/T2 *S23.11*
- - T10/T11 *S23.15*
- - T11/T12 *S23.16*
- - T12/L1 *S23.17*
- - T2/T3 *S23.11*
- - T3/T4 *S23.12*
- - T4/T5 *S23.12*
- - T5/T6 *S23.13*

Luxation –*suite*
- vertèbre thoracique –*suite*
- - T6/T7 *S23.13*
- - T7/T8 *S23.14*
- - T8/T9 *S23.14*
- - T9/T10 *S23.15*
- xiphoïde *S23.2*

Luzet, maladie de Jaksch-Hayem- *D64.8*

Lyell, syndrome de *L51.20*
- avec
- - infestation
- - - 30% de la surface corporelle et plus *L51.21*
- - - muqueuse *L51.21*
- conjonctive *L51.20*
- staphylococcique *L00.0*

Lyme, maladie de *A69.2*
- avec
- - arthrite *A69.2+, M01.29**
- - méningite *A69.2+, G01**
- - polyneuropathie *A69.2+, G63.0**
- stade
- - I *A69.2*
- - II *A69.2*
- - III *A69.2*
- suite à piqure de tique *A69.2*

Lymphadénie *R59.1*

Lymphadénite *I88.9*
- aigue *L04.3*
- - *L04.9*
- - cas de maladie par VIH *B23.8, L04.9*
- - membres
- - - inférieurs *L04.3*
- - - supérieurs *L04.2*
- - tronc *L04.1*
- axillaire, aigue *L04.2*
- cas de
- - Anthracose *J60*
- - Diphtérie *A36.8*
- - syphilis tertiaire *A52.7+, I98.8**
- cervicale aiguë *L04.0*
- chancre, congénitale *A57*
- chronique *I88.1*
- - mésentérique *I88.0*
- circonscrite *I88.9*
- colli *I88.9*
- cou, aigue *L04.0*
- due à
- - candida *B37.88*
- - cryptocoque *B45.8*
- - virus *A28.1*
- épaule, aigue *L04.2*
- généralisée *I88.9*
- gonorrhéique *A54.8*
- griffe *A28.1*
- griffure *A28.1*
- hanches, aigue *L04.3*
- induite par la grossesse, purulente, mammaire *O91.10*
- infectieuse *L04.9*
- inguinale, aigue *L04.1*
- mammaire, induite par la grossesse *O91.20*
- mésentérique *I88.0*
- - aigue *I88.0*
- - chronique *I88.0*
- - due à Salmonella Typhi *A01.0*
- - non spécifique *I88.0*

Lymphadénite *–suite*
- mésentérique *–suite*
- - subaiguë *I88.0*
- - tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- non bactérienne, régionale *A28.1*
- non mésentérique, aigue *L04.9*
- purulente *L04.9*
- septique *L04.9*
- syphilis tertiaire *A52.7+, I98.8**
- syphilitique précoce *A51.4*
- - secondaire *A51.4*
- syphylitique, secondaire *A51.4*
- tête, aigue *L04.0*
- tuberculeuse *A18.2*
- vénérienne, due à Chlamydia *A55*
- visage, aigue *L04.0*

Lymphadénoïde, goitre *E06.3*

Lymphadénoïde, thyroïdite, chronique *E06.3*

Lymphadénome *C85.9*
- angio-immunoblastique *C84.4*

Lymphadénopathie *R59.1*
- angio immunoblastique avec dysprotéinémie [LAID] , *C86.5*
- angio-immunoblastique *D47.7*
- cas de toxoplasmose *B58.8*
- congénitale, due à toxoplasmose *P37.1*
- généralisée *R59.1*
- - cas de maladie par VIH *B23.8, R59.1*
- localisée *R59.0*
- massive, en cas de histiocytose, sinus *D76.3*
- secondaire, syphilitique *A51.4*

Lymphadénose *C91.10*
- rémission complète *C91.11*

Lymphadénose cutanée bégnine, Bäfversted *L98.8*

Lymphangiectasie *I89.0*
- conjonctive *H11.8*
- post-infectieuse *I89.0*
- pulmonaire, kystique, congénitale *Q33.8*
- scrotum *I89.0+, N51.8**

Lymphangiéctasique, éléphantiasis *I89.0*

Lymphangio-endothéliome *D18.19*

Lymphangioleiomyomatose *D48.1*

Lymphangiomateux, kyste *D18.19*

Lymphangiome *D18.19*
- Aisselle *D18.11*
- capillaire *D18.19*
- caverneux *D18.19*
- cavité buccale *D18.18*
- cutané *D18.19*
- endothélium *D18.19*
- - malin *C49.9*
- estomac *D18.18*
- glandes salivaires *D18.18*
- hémo- *D18.19*
- inguinal *D18.12*
- kystique *D18.19*
- malin *C49.9*
- mésentérique *D18.18*
- orbite *D18.18*
- paupière *D18.18*
- rétropéritonéal *D18.13*
- surrénalien *D18.18*
- thymus *D18.18*

Lymphangiome *–suite*
- tonsille *D18.18*

Lymphangiomyomatose *D48.1*

Lymphangiosarcome *C49.9*

Lymphangiosis carcinomatosa *C49.9*

Lymphangite *I89.1*
- aigue *L03.9*
- avec sepsie, orteils *L03.02*
- cas de
- - circulation, doigt *L03.01*
- - inflammation, tissu sous-cutané *L03.9*
- - onychie, doigt *L03.01*
- - panari, doigt *L03.01*
- - phlegmon, doigt *L03.01*
- - phlégnome *L03.9*
- - septicémie
- - - bras *L03.10*
- - - doigts *L03.01*
- - - jambe *L03.11*
- - - main *L03.10*
- - - pied (hors orteils) *L03.11*
- chancrelleuse *A57*
- chronique *I89.1*
- couche *O86.8*
- gangréneuse *I89.1*
- mammaire
- - couche *O91.20*
- - induite par la grossesse *O91.20*
- - postpartum *O91.20*
- parasitaire *B88.9*
- pénis *N48.2*
- - aigue *N48.2*
- - gonorrhéique *A54.0*
- postpartum *O86.8*
- scrofuleuse *A18.2*
- subaiguë *I89.1*
- suite à
- - accouchement *O86.8*
- - Avortement *O08.8*
- - grossesse extra-utérine *O08.8*
- - grossesse môlaire *O08.8*
- tuberculeuse *A18.2*

Lymphatique
- Filariose *B74.0*
- fistule *I89.8*
- glande
- - catarrhe *R59.9*
- - gonflement *R59.9*
- - granulome *I88.8*
- - inflammation
- - - aigue *L04.9*
- - - chronique *I88.1*
- - tuberculose *A18.2*
- infection, pharynx, psotérieur *J35.0*
- infiltration *C91.90*
- insuffisance *I89.8*
- leucémie *C91.90*
- - aigue *C91.00*
- - - rémission complète *C91.01*
- - aleucémique *C91.70*
- - avec poussée blastique *C91.10*
- - chronique *C91.10*
- - - rémission complète *C91.11*
- - rémission complète *C91.91*
- - subaiguë *C91.20*
- - - rémission complète *C91.21*
- naevus *D18.19*

Lymphatique *–suite*
- noeud
- - abcès *L04.9*
- - - aigu *L04.9*
- - - non mésentérique, aigue *L04.9*
- - abdomen, tuberculose *A18.3*
- - axillaire
- - - infection *L04.2*
- - - tuberculose *A18.2*
- - calcification *I89.8*
- - - post-infectieuse *I89.8*
- - - tuberculeuse *B90.8*
- - carcinome, axillaire *C77.3*
- - cervicaux
- - - infection *L04.0*
- - - tuberculose *A18.2*
- - cou, abcès *L04.0*
- - dégénérescence, hyaline *I89.8*
- - fibrose *I89.8*
- - gonflement, axillaire *R59.0*
- - gonflés *R59.9*
- - gonorrhée *A54.8*
- - hyperplasie *R59.9*
- - - généralisée NCA *R59.1*
- - - localisée *R59.0*
- - hypertrophie *R59.9*
- - - cas de maladie par VIH *B23.8, R59.9*
- - - circonscrite *R59.0*
- - - généralisée *R59.1*
- - - généralisée NCA *R59.1*
- - - localisée *R59.0*
- - infarctus *I89.8*
- - infection *L04.9*
- - infiltration *I88.9*
- - inflammation *I88.9*
- - infraclaviculaire, tuberculose *A18.2*
- - inguinale
- - - abcès *L04.1*
- - - tuberculose *A18.2*
- - intrathoracique, tuberculose
- - - primaire, prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.4*
- - maladie *I89.9*
- - mediastinaux, tuberculose *A16.3*
- - - primitive *A16.7*
- - - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.4*
- - mésentérique
- - - abcès *I88.0*
- - - infection NCA *I88.0*
- - - tuberculose *A18.3*
- - métastase *C77.9*
- - - abdomen *C77.2*
- - - cervicale *C77.0*
- - - cou *C77.0*
- - - - cas de tumeur primaire, inconnue *C77.0*
- - - intraabdominale *C77.2*
- - - intrathoracique *C77.1*
- - - médiastinale *C77.1*
- - - pectorale *C77.3*
- - - pelvienne *C77.5*
- - - pli inguinal *C77.4*
- - - poumon *C77.1*

Lymphatique –*suite*
- noeud –*suite*
- - métastase –*suite*
- - - rétropéritonéale *C77.2*
- - - - inguinale *C77.8*
- - - supra-claviculaire *C77.0*
- - - tête *C77.0*
- - - visage *C77.0*
- - nécrose *A18.2*
- - - *L04.9*
- - - tuberculeuse *A18.2*
- - néoformation, maligne, examen de dépistage *Z12.8*
- - péritonéale, tuberculose *A18.3+, K93.0**
- - rétropéritonéal, tuberculose *A18.3*
- - sarcoïdose *D86.1*
- - - cas de sarcoidose, poumons *D86.2*
- - sarcome de Kaposi *C46.3*
- - sclérose *I89.8*
- - supraclaviculaire, tuberculose *A18.2*
- - syphilis précoce, secondaire *A51.4*
- - syphilis tertiaire *A52.7+, I98.8**
- - trachéo-bronchique, tuberculose
- - - primaire, prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.4*
- - tuberculose
- - - hilaire *A16.3*
- - - - primaire *A16.7*
- - - intrathoracique *A16.3*
- - - - primaire *A16.7*
- - - périphérique *A18.2*
- - - trachéobronchique *A16.3*
- - - - primaire *A16.7*
- occlusion *I89.0*
- oedème *I89.0*
- stase *I89.8*
- tissu, néoformation, maligne
- - anamnèse, NCA *Z85.7*
- - antécédents familiaux NCA *Z80.7*
- vaisseau
- - compression *I89.0*
- - dilatation *I89.0*
- - dysplasie *Q89.8*
- - éléphantiasis *I89.0*
- - érosion *I89.8*
- - inflammation *I89.1*
- - maladie *I89.9*
- - oblitération *I89.0*
- - - suite à une mastéctomie *I97.2*
- - occlusion *I89.0*
- - - avec oedème *I89.0*
- - - suite à une mastectomie *I97.2*
- - rupture *I89.8*
- - tumeur* *D18.19*
- - - bégnine *D18.19*
- - ulcère *D18.19*

Lymphe
- extravasation, dans le mésentère *I89.8*
- fistule *I89.8*
- obstruction *I89.8*

Lymphéctasie *I89.0*

Lymphoblastique
- dysgénésie, cytologique, héréditaire *D82.1*
- leucémie aiguë *C91.00*

Lymphoblastique –*suite*
- leucémie aiguë –*suite*
- - rémission complète *C91.01*
- lymphome, diffus *C83.5*
- sarcome *C83.5*

Lymphoblastome *C83.5*
- diffus *C83.5*

Lymphocèles *I89.8*

Lymphocitaire
- chorio-encéphalite *A87.2+, G05.1**
- - séreuse, aiguë *A87.2+, G05.1**
- chorio-méningite *A87.2+, G02.0**
- - séreuse, aiguë *A87.2+, G02.0**
- colite *K52.8*
- encéphalite *A87.2+, G05.1**
- leucémie *C91.90*
- - aiguë *C91.00*
- - - rémission complète *C91.01*
- - chronique *C91.10*
- - - rémission complète *C91.11*
- - rémission complète *C91.91*
- - subaiguë *C91.20*
- - - rémission complète *C91.21*
- lymphome
- - diffus *C83.0*
- - nodulaire *C82.9*
- méningite *A87.2+, G02.0**
- - aiguë *A87.2+, G02.0**
- méningo-encéphalite *A87.2+, G05.1**
- Méningo-radiculite (syndrome de Bannwarth) *A69.2*
- réaction, leucémoïde *D72.8*
- thyroïdite *E06.3*
- - chronique *E06.3*
- thyroïdite auto-immune *E06.3*

Lympho-cutanée, sporotrichose *B42.1*

lymphocytaire
- Lymphome Hodgkin classique) à déplétion *C81.3*
- Maladie Hodgkin Prédominance *C81.0*

Lymphocytes
- B, numération basse, avec déficit immunitaire combiné, sévère *D81.2*
- B, positifs à l'immunoglobuline, dans l'agammaglobulinémie *D80.1*
- C
- - carcinome *C73*
- - hyperplasie, thyroïde *E07.0*
- donneur *Z52.08*
- Lymphome Hodgkin classique) riche en *C81.4*
- nus, syndrome des *D81.6*

Lymphocytome *L98.8*
- Spiegler Fendt *L98.8*

Lymphocytose *D72.8*
- infectieuse, aiguë *B33.8*
- symptomatique *D72.8*

Lymphocytose infectieuse aiguë *B33.8*

Lymphoedème *I89.0*
- après
- - acte chirurgical, non classé ailleurs *I97.8*
- - mammectomie *I97.2*
- bras *I89.0*
- héréditaire *Q82.0*
- jambe *I89.0*

Lymphoedème –*suite*
- partie humérale (supérieure du bras) *I97.2*
- secondaire *I89.0*

Lymphœdème précoce ou maladie de Meige *I89.0*

Lympho-épithélial
- kyste de la région buccale *K09.8*

Lympho-épithélial (e)
- lésion, glandes salivaires, bénigne *K11.8*

Lymphogène
- abcès du foie *K75.0*
- dissémination métastatique *C77.9*

Lymphogranulomatose *C81.9*
- bénigne *D86.9*
- maligne *C81.9*
- Schaumann, bénigne *D86.9*

Lymphogranulomatose bénigne de Schaumann *D86.9*

Lymphogranulome *C81.9*
- Chlamydia *A55*
- inguinal *A55*
- - avec stricture, rectum *A55*
- malin *C81.9*
- vénérien *A55*
- - Chlamydia *A55*

Lymphohistiocytaire
- lymphome
- - mixte à petites et grandes cellules *C83.2*
- - nodulaire *C82.1*
- - - mixte à petites et grandes cellules *C82.1*
- prédominance, en cas de maladie d'Hodgkin *C81.0*

Lymphohistiocytose, hémophagocytaire *D76.1*

Lymphoïde
- associé
- - bronche lymphome BALT] , Lymphome des tissu *C88.4*
- - muqueuse lymphome MALT] , Lymphome extranodal de la zone marginal à cellules B, lymphome des tissu *C88.4*
- granulomatose *C83.8*
- hyperplasie
- - l'appendice *K38.0*
- - nez *J34.8*
- - pharynx *J39.2*
- - rhinopharynx *J35.2*
- hypertrophie, conjonctive *H11.8*
- infiltration, conjonctive, réactionnelle *H11.8*
- leucémie *C91.90*
- - aiguë *C91.00*
- - - rémission complète *C91.01*
- - aleucémique *C91.70*
- - chronique *C91.10*
- - subaiguë *C91.20*
- pneumonie, interstitielle, en cas de maladie induite par le VIH *B22, B59*
- thyroïdite *E06.3*

Lymphomateux
- adénome *D11.9*
- thyroïdite *E06.3*

Lymphomateux(se)
- polypose, intestinale, maligne *C83.8*

lymphomatoïde Granulomatose *C83.8*

Lymphome
- *C85.9*
- abdominal *C85.9*
- adéno- *D11.9*
- anaplasique grand cellules
- - ALK positif , *C84.6*
- - - négatif , *C84.7*
- - CD30 positif , *C84.6*
- angio immunoblastique cellules T , *C86.5*
- angio-immunoblastique [AILD] *C84.4*
- associé à une splénomégalie, et leucopénie, en cas de polyarthrite, chronique *M05.00*
- associé aux muqueuses *C88.30*
- - rémission complète *C88.31*
- avec pyélonéphrite NCA *C85.9+, N16.1**
- axillaire *C85.9*
- BALT Lymphome tissu lymphoïde associé au bronche [*C88.4*
- bénin *D36.0*
- bien différencié, nodulaire *C82.7*
- blastique cellules NK *C86.4*
- Burkitt-like *C83.7*
- cas de maladie induite par le VIH *B21*
- cellules
- - manteau *C83.1*
- - précurseur B *C83.5*
- - T associé entéropathie , *C86.2*
- - T/NK
- - - matures
- - - - Autre *C84.5*
- - - - sans précision , *C84.9*
- - - spécifiés Autre *C86*
- cellules à noyaux convolutés *C83.5*
- cellules B monocytoïdes *C85.7*
- cellules B NCA *C85.1*
- - cérébral *C85.1*
- cellules convolutées *C83.5*
- cellules de la zone manteau *C83.8*
- cellules du manteau *C83.8*
- cellules mixtes *C83.2*
- cellules T angiocentrique *C85.7*
- cellules T NCA *C84.5*
- - adulte *C91.50*
- - angioimmunoblastique *C84.4*
- - angio-immunoblastique *C84.4*
- - cutané *C84.5*
- - cutanée *C84.5*
- - immunoblastique *C84.4*
- - l'adulte *C91.50*
- - leucémique, aigu *C91.50*
- - leucémique, de l'adulte *C91.50*
- - périphérique *C84.4*
- - - cellules moyennes et grandes, pléomorphes *C84.4*
- - - cellules moyennes et grosses, pléomorphes *C84.4*
- - - petites cellules, pléomorphe *C84.4*
- - - petites cellules, pléomorphes *C84.4*
- centroblastique-centrocytique *C83.8*
- centrocytaire *C83.1*
- centrocytique *C83.8*
- centrofolliculaire
- - cutané *C82.6*
- - diffus *C82.5*
- cérébral *C85.9*
- choroïde *C85.9*

Lymphome –*suite*
- conjonctive *C85.9*
- cutané
- - *C84.5*
- - anaplasique grand cellules , *C86.6*
- - cellules T sans précision , *C84.8*
- - grand cellules T , CD30 positif , *C86.6*
- cystadéno-lymphome au niveau de la parotide *D11.0*
- d'Afrique centrale *C83.7*
- diffus *C83.9*
- - cellules mixtes *C83.2*
- - centroblastique *C83.8*
- - centroblastique-centrocytique *C83.8*
- - encoché *C83.1*
- - grand cellules B , anaplasique *C83.3*
- - - , CD30 positif *C83.3*
- - - , *C83.3*
- - grandes cellules *C83.3*
- - histiocytique *C83.3*
- - lymphoblastiques *C83.5*
- - lymphocytaire *C83.0*
- - noyau non encoché *C83.3*
- - petites cellules *C83.0*
- examen spécial de dépistage *Z12.8*
- extranodal
- - cellules T/NK type nasal , *C86.0*
- - zone marginal cellules B, lymphome des tissu lymphoïde associé au muqueuse [lymphome MALT] , *C88.4*
- folliculaire *C82.9*
- - avec propagation diffuse *C82.9*
- - centroblastique *C82.7*
- - centroblastique-centrocytique *C82.7*
- - encoché *C82.0*
- - - mixte à petites et grandes cellules *C82.1*
- - grade
- - - I *C82.0*
- - - II *C82.1*
- - - III sans précision , *C82.2*
- - - IIIa *C82.3*
- - - IIIb *C82.4*
- - grandes cellules *C82.2*
- - - noyau encoché *C82.2*
- - histiocytaire *C82.2*
- - mixte *C82.1*
- - noyau non encoché *C82.2*
- - sans propagation diffuse *C82.9*
- folliculaire à grandes cellules *C82.2*
- follicules géantes *C82.2*
- grandes cellules *C83.3*
- grandes cellules Ki-1+ *C85.7*
- hépatosplénique cellules T *C86.1*
- hilaire *C85.9*
- hilaire bilatéral [syndrome de Löfgren] *D86.8*
- Hodgkin *C81.9*
- - cérébral *C81.9*
- - classique
- - - avec sclérose nodulaire , *C81.1*
- - - cellularité mixte , *C81.2*
- - - déplétion lymphocytaire , *C81.3*
- - - riche lymphocytes , *C81.4*
- - - type non précisé , *C81.7*
- - malin *C81.9*
- Lennert *C84.4*
- l'estomac *C85.9*

Lymphome –*suite*
- l'estomac –*suite*
- - primaire *C85.9*
- l'intestin *C85.9*
- l'intestin grêle *C85.9*
- l'prbite *C85.9*
- lymphocytaire-histiocytaire
- - mixte (mélange de petites et grandes cellules) *C83.2*
- - nodulaire *C82.1*
- - - mixte (mélange de petites et grandes cellules) *C82.1*
- lymphoplasmocytaire *C83.0*
- lymphoplasmocytoïde *C83.8*
- malin *C85.9*
- MALT Lymphome extranodal de la zone marginal à cellules B, lymphome des tissu lymphoïde associé au muqueuse [*C88.4*
- manteau *C83.8*
- médiastin *C85.9*
- médiastinal thymique grand cellules B , *C85.2*
- nodulaire *C82.9*
- - histiocytaire *C82.2*
- - lymphocytaire *C82.9*
- - mixte *C82.1*
- - type intermédiaire *C82.7*
- non
- - folliculaire sans précision , *C83.9*
- - folliculaires Autre *C83.8*
- - hodgkinien non précisé , *C85.9*
- non-hodgkinien NCA *C85.9*
- - angioimmunoblastique *C84.4*
- - cellules B *C85.1*
- - cellules T *C84.4*
- - cérébral *C85.9*
- - diffus folliculaire, petites cellules *C82.0*
- - due au VIH *B21*
- - folliculaire
- - - grosses cellules *C82.2*
- - - mixte, petites et grosses cellules *C82.1*
- non-hodgkinien NHL *C85.9*
- non-Hogkinien NCA *C85.9*
- - à une maladie induite par VIH *B21*
- - angio-immunoblastique *C84.4*
- - cellules B *C85.1*
- - cellules T *C84.4*
- - cérébral *C85.9*
- - folliculaire
- - - grandes cellules *C82.2*
- - - noyau encoché, mixte à petites et grandes cellules *C82.1*
- - noyau encoché
- - - folliculaire, à petites cellules *C82.0*
- noyau encoché
- - et non encoché, à grandes cellules *C83.3*
- - folliculaire, à petites cellules *C82.0*
- - grandes cellules *C83.3*
- - petites cellules *C83.1*
- noyau non encoché, à petites cellules *C83.0*
- ou maladie de Castleman *D36.0*
- paupière *C85.9*
- périphérique cellules T non spécifié , *C84.4*
- périphérique à cellules T, petites et grandes cellules, pléomorphe *C84.4*

Lymphome –*suite*

- petit cellules B *C83.0*
- petites cellules, lymphocitaire *C83.0*
- peu différencié
- - diffus *C83.1*
- - - *C83.8*
- - nodulaire *C82.7*
- plasmacellulaire *C83.8*
- plasmacytoïde *C83.8*
- précurseur B NCA *C85.1*
- primaire, cerveau, en cas de maladie due au VIH *B21, C85.9*
- Pseudolymphome *L98.8*
- sous cutané cellules T de type panniculite , *C86.3*
- tissu lymphoïde associé
- - bronche [lymphome BALT] , *C88.4*
- - muqueuse [lymphome MALT] , Lymphome extranodal de la zone marginal à cellules B, *C88.4*
- tissus lymphoïdes associés aux muqueuses ou MALT [Muco Associated Lymphoid Tissue] *C88.30*
- - l'estomac *C85.1*
- - poumon *C85.1*
- tumeur (lymphome) de Burkitt *C83.7*
- - cas de maladie induite par le VIH *B21, C83.7*
- tumeur ou lymphome de Burkitt *C83.7*
- - noyau non encoché, à petites cellules *C83.7*
- type histiocytaire *C83.3*
- type lymphoplasmocytoïde *C83.8*

Lymphonodulaire, pharyngite, due à un en *B08.8*

Lymphopathie vénérienne *A55*

Lymphopénie *D72.8*
- avec agammaglobulinémie *D81.9*
- familiale *D72.8*

lymphoplasmocytaire Lymphome *C83.0*

lymphoprolifératif cutané primitif cellules T , CD30 positif , Syndrome *C86.6*

Lymphoprolifération liée au chromosome X *D82.3*

Lymphoprolifératives
- maladie *D47.9*
- - liée au chromosome X *D82.3*
- maladie de type T gamma *D47.7*

Lymphoréticulose
- bénigne *A28.1*
- d'inoculation, bénigne *A28.1*

Lymphoréticulose d'inoculation, bénigne *A28.1*

Lymphorragie *I89.8*

Lymphorrhée *I89.8*

Lymphosarcome
- épidémique *C83.7*
- folliculaire *C82.9*
- - mixte *C82.1*
- leucémique *C94.70*
- réticulolymphosarcome *C83.2*
- - diffus *C83.2*

Lymphostase *I89.8*

lyse tumorale, syndrome de *E88.3*

Lysergide, intoxication *T40.8*

Lysine
- hyperaminoacidurie *E72.3*

Lysine –*suite*

- troubles du métabolisme *E72.3*

Lysozyme
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

Moyen de diffusion	*Contact*
Service de renseignements individuels	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
L'OFS sur Internet	www.statistique.admin.ch
Communiqués de presse: information rapide concernant les résultats les plus récents	www.news-stat.admin.ch
Publications: information approfondie	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Données interactives (banques de données, accessibles en ligne)	www.stattab.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse www.statistique.admin.ch → Services → Les publications de Statistique suisse

Santé

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse Version 2015, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 544-1500, 166 pages, 22 francs (TVA excl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2012 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 532-1404-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2012 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 532-1403-05, 40 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2012 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 532-1402-05, 60 pages, gratuit

Statistiques de la santé 2012, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 1291-1200, 100 pages, 23 francs (TVA excl.)

Statistique des causes de décès: La mortalité en Suisse et les principales causes de décès, Neuchâtel 2013, numéro de commande: 1258-1000, 4 pages, gratuit

Epidémiologie du cancer. Le mélanome de la peau: état des lieux et prévention, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 1268-0800, 4 pages, gratuit

Décès dus aux maladies infectieuses et au sida de 1970 à 2009: évolution d'une génération à l'autre, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 1411-0901, 8 pages, gratuit

Décès dus aux cancers de 1970 à 2009: évolution d'une génération à l'autre, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 1411-0902, 13 pages, gratuit

Coûts des prises en charge hospitalières 2011, Neuchâtel 2013, numéro de commande: 1403-1100-05, 4 pages, gratuit

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat de codage de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CIM-10-GM-2014 parue le 31.10.2014.

Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2015.

N° de commande
1188-1403

Commandes
Tél. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prix
33 francs (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14224-0