

2026

14

Santé

Neuchâtel 2026

CIM-10-GM 2026

Index alphabétique – Version française

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de la statistique OFS

Domaine «Santé»

Publications actuelles sur des thèmes apparentés

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.admin.ch). Les publications imprimées peuvent être commandées à l'adresse www.publicationsfederales.admin.ch

Santé – Statistique de poche 2025, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2025, numéro OFS: 1541-2500, 36 pages

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2027, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2026, numéro OFS: 544-2700, 237 pages

Statistiques des établissements hospitaliers 2024, Communiqué de presse, Tableau, Données, Diagrammes, Cartes, Infographie, Liens, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2025, https://statistik.admin.ch/fr/news/2025-0239

Séjours stationnaires en hôpitaux: Utilisation multiple des données (Projet SpiGes): Plateforme-SpiGes, Lien, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, https://www.spiges.admin.ch/home

Principales causes de décès 2024, Tableau, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2026, https://statistik.admin.ch/fr/asset/36864311

Enquête suisse sur la santé: Résultats et publications, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2023 et 2024, https://statistik.admin.ch/fr/comprendre-donnees-statistiques/enquetes/sgb/resultats-publications

Enquête suisse sur la santé 2022: Santé et genre, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2025, numéro OFS: 213-2219, 12 pages

Statistique nationale sur le cancer – Monitorage du cancer de 1993 à 2022, Tableaux, Données, Tableaux de bord, Diagrammes, Liens, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2025, https://statistik.admin.ch/fr/news/2025-0099

Données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires pour 2024, Données, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2026, https://statistik.admin.ch/fr/news/2026-0481

Coûts et financement du système de santé en 2024, Communiqués de presse, Tableau, Données, Diagrammes, Infographie, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2026, https://statistik.admin.ch/fr/news/2026-0479

Hospitalisations pour brûlures, Diagrammes, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2026, https://statistik.admin.ch/fr/news/2026-0490

Domaine «Santé» sur Internet

www.statistique.admin.ch → Santé ou www.health-stat.admin.ch

CIM-10-GM 2026

Index alphabétique – Version française

Rédaction Section Santé de la population,
domaine Classifications médicales
Éditeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Neuchâtel 2026

Éditeur	Office fédéral de la statistique (OFS) www.bfs.admin.ch/fr
Renseignements:	Secrétariat de codage codeinfo@bfs.admin.ch
Rédaction:	Office fédéral de la statistique (OFS) Traduction basée sur la version du Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
Série	Statistique de la Suisse
Domaine	14 Santé
Langue du texte original	allemand
Traduction	Services linguistiques de l'OFS
Mise en page	Publishing et diffusion PUB, OFS Ce document a été produit automatiquement à partir de banques de données. Il ne répond donc pas aux normes typographiques des publications de l'OFS.
En ligne	www.statistique.admin.ch/asset/1188-2634
Numéro OFS	1188-2634
ISBN	978-3-303-14396-4
Distribution	www.publicationsfederales.admin.ch No d'art. 317.101.26F

Copyright	OFS, Neuchâtel 2026 La reproduction est autorisée si la source est mentionnée.

Table des matières

Introduction V

Index alphabétique – Volume 1 (A – L)

A 3

B 79

C 99

D 177

E 221

F 261

G 289

H 319

I 357

J 391

K 395

L 401

Index alphabétique – Volume 2 (M–Z)

M 433

N 491

O 517

P 553

Q 631

R 633

S 663

T 715

U 765

V 773

W 801

X 803

Y 805

Z 807

Annexe

Tableau des tumeurs XI

Introduction

Contexte et validité

La «Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes – 10e révision» (CIM-10) est établie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En Suisse, le codage des diagnostics, dans le cadre du relevé Séjours stationnaires en hôpitaux (SpiGes), se fait avec la version German Modification (GM). La CIM-10-GM se base sur la version de l'OMS et comporte des modifications spécifiques à l'Allemagne. Elle est établie par le *«Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)»* en Allemagne. À partir de l'ICD-10-GM 2026, le BfArM n'actualisera l'ICD-10-GM plus que tous les trois ans, ceci jusqu'à l'introduction de l'ICD-11, en Allemagne.

La version 2026 de l'index alphabétique de la CIM-10-GM en français se base sur l'index systématique de la CIM-10-GM 2026 ainsi que sur une liste d'enrichissements. La version française de l'index systématique est la traduction de la version allemande de l'index systématique de référence, ICD-10-GM 2026, publié par le BfArM. La liste des enrichissements prend en compte les termes introduits dans l'index alphabétique allemand entre 2010 et 2026, si la traduction en est pertinente. De nombreux changements ont été entrepris dans l'index alphabétique allemand entre les versions 2024 et 2026.

La version 2026 de la CIM-10-GM entrera en vigueur le 1er janvier 2027 en Suisse. À cette date, son application sera obligatoire pour le codage des diagnostics dans le cadre du relevé Séjours stationnaires en hôpitaux (SpiGes).

En cas de divergence entre l'index systématique et l'index alphabétique, c'est l'index systématique qui l'emporte. En cas de divergence entre les divers formats techniques de l'index systématique et de l'index alphabétique, ce sont les documents PDF qui font foi.

Langues, formats, accès

L'index alphabétique de la CIM-10-GM 2026 est disponible en allemand auprès du BfArM, ainsi qu'en français et en italien auprès de l'OFS.

La version française de l'index alphabétique est disponible aux formats PDF, CSV et imprimé. Les versions PDF et CSV peuvent être téléchargées directement sur le site Internet de l'OFS. Une version imprimée payante peut également être commandée sur ce dernier.

Les instruments pour le codage médical sont disponibles sous www.statistik.admin.ch/fr → Comprendre les statistiques → Nomenclatures, répertoires et codes → Classifications et codage médicaux → Instruments pour le codage médical → Instruments en vigueur pour le codage médical, par année.

La version allemande de l'ICD-10-GM 2026 est disponible sur le site internet du BfArM: www.bfarm.de → Kodiersysteme → Klassifikationen → ICD → ICD-10-GM

Remarques techniques

Les changements entre les versions 2024 et 2026 dans les listes *«Alphabet EDV-Fassung TXT (CSV)»* et *«Alpha-ID-SE EDV-Fassung TXT (CSV)»* publiées par le BfArM ont été analysés. Les termes pertinents pour la version française ont été traduits et intégrés dans la liste d'enrichissements.

L'index alphabétique est produit par permutation. Ni l'index systématique, ni la liste des enrichissements ne sont permutés dans leur intégralité. Les nombreuses répétitions aux différents niveaux hiérarchiques de la classification surchargeraient l'index alphabétique. Seuls les titres et inclusions de l'index systématique, ainsi que les termes de la liste des enrichissements dotés d'une marque de permutation sont donc sélectionnés.

Les textes sélectionnés sont décomposés en leurs termes. Un fichier de règles définit la forme sous laquelle ces termes apparaissent dans l'index alphabétique.

Les mots ou combinaisons de mots sémantiquement importants sont identifiés pour apparaître comme entrée de l'index. Certains substantifs et adjectifs sont réduits à leur forme neutre pour regrouper les textes permutés les contenant sous la même entrée de l'index. Des mots de faible importance sémantique, resp. très fréquents, n'apparaissent pas comme entrée principale de l'index ou sont suivis du renvoi «v./v. a. Type de maladie», mais figurent encore dans les textes permutés. Ce sont p. ex. des mots abondants comme acquis, idiopathique, interstitiel. Des mots sans contenu informatif et ne devant pas apparaître comme entrée dans l'index sont éliminés.

Les textes apurés sont permutés. Par le biais de cette permutation, chaque terme sémantiquement important apparaît comme terme principal (entrée dans l'index). Dans l'index alphabétique l'ordre initial des mots dans les libellés peut être reconstitué grâce à des retraits, traits et signes introduits automatiquement (voir les explications dans le paragraphe consacré à l'utilisation de l'index).

Les règles liées aux «voir/voir aussi» sont intégrées par ordre alphabétique sous les entrées concernées de l'index. Pour certains termes composés, des «voir/voir aussi» sous la seconde ou troisième partie du terme renvoient au terme complet, p. ex. pour le terme ostéo-articulaire (= ostéo ; articulaire), un «voir/voir aussi» sous articulaire fait référence à ostéo-articulaire.

Pour réduire le volume de l'index alphabétique certaines combinaisons de mots ont été protégées pour apparaître comme entrée de l'index. Les textes permutés ne sont donc pas répétés sous chaque terme de la combinaison de mots. «Carcinome bronchique» apparaît p. ex. comme entrée sous «C» avec les textes permutés relatifs. Sous l'entrée «bronchique» de l'index un renvoi à la combinaison de mots est présent «v./v. a. Carcinome bronchique». Les textes permutés relatifs au «carcinome bronchique» ne sont pas répétés sous «bronchique».

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne sert, dans un premier temps, qu'à trouver un code. Ce code doit ensuite impérativement être vérifié dans l'index systématique.

Tous les termes importants peuvent être trouvés en raison de la permutation des textes choisis de l'index systématique, resp. de la liste des enrichissements. Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer selon la morphologie (par ex. cirrhose), l'étiologie (par ex. alcoolique), l'agent pathogène (par ex. Escherichia coli), le diagnostic (par ex. varicelle), la localisation (par ex. poumon) ou certains adjectifs particuliers (par ex. aérien). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières :

C 84.6 Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif
Lymphome anaplasique à grandes cellules, CD30 positif

Apparaît sous

ALK
[…]
- Positif ¬
- - Lymphome anaplasique à grandes cellules, C 84.6

Anaplasique
v./v. a. Lymphome anaplasique

CD30 positif ¬
[…]
- Lymphome anaplasique à grandes cellules, C 84.6

Cellule
[…]
- ALK
[…]
- - Positif ¬
- - - Lymphome anaplasique à grandes C 84.6
[…]
- CD30 positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes C 84.6

Lymphome anaplasique grandes cellule[1]
- ALK
[…]
- - Positif ¬ C 84.6
- CD30 positif ¬ C 84.6

Positif
v./v. a. Type de maladie

Les combinaisons de codes primaires, codes dague (†), codes étoile (*) ou codes avec point d'exclamation (!) sont reprises dans l'index alphabétique.

P. ex. l'enrichissement «Méningite typhoïde A01.0† G01*» apparaît sous :

Méningite
[…]
- Typhoïde ¬ A01.0†, G01*

Typhoïde
[…]
- ¬
[…]
- - Méningite A01.0†, G01*

À noter :
Lisibilité : Il convient de remarquer que l'effacement des mots vides, la réduction à la forme neutre de certains termes et le réarrangement des mots rendent les textes moins lisibles. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (¬) pour marquer le début et la fin du texte des codes. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut lire le mot clé qui figure juste après le symbole, y compris les autres termes jusqu'à ce que l'on tombe sur le contenu recherché avec le code.

[1] *Remarque pour expliquer la rédaction de cette entrée d'index : «Lymphome anaplasique» est une combinaison de mots protégée et identifiée pour apparaître comme entrée de l'index. «Grandes» et «cellule» viennent s'ajouter par logique de permutation. Si une forme canonique (lemme) est définie pour un terme, celle-ci est reprise dans l'entrée de l'index, p. ex. ici «cellule» et non pas «cellules». Les mots vides, p. ex. ici «à», quand ils ne font pas partie de la combinaison de mots protégée, ne sont pas repris dans les entrées de l'index.*

Entrées en anglais : les termes anglais forment un tout. Les entrées en anglais n'apparaissent donc que sous la première lettre du premier mot ; P. ex. «Periodic Limb Movements in Sleep» apparaît qu'à la lettre «P» (pour «Periodic») mais pas aux lettres «L» (pour «Limb»), «M» (pour «Movements») ou «S» (pour «Sleep»).

Renvois : Deux types de renvois sont utilisés dans l'index alphabétique de la CIM-10-GM :

- «Voir/voir aussi» (v./v. a.) suivi d'un terme :
  - si l'entrée de l'index n'est suivie d'aucun texte permuté, «voir/voir aussi» renvoie à une entrée plus spécifique, P. ex. acylcarnitine v./v. a. carnitine-acylcarnitine,
  - si l'entrée de l'index est suivie de textes permutés, «voir/voir aussi» fait référence à d'autres entrées (synonymes, hyponymes, etc.), qui peuvent en outre aider à trouver le code recherché, p. ex. ectodermique v./v. a. dysplasie ectodermique
- «Voir/voir aussi type de maladie» (v./v. a. Type de maladie) : si l'entrée de l'index est un terme très fréquent, il n'est suivi d'aucun texte permuté. Le renvoi «voir/voir aussi Type de maladie» invite à chercher sous une entrée plus spécifique, P. ex. aigu v./v. a. Type de maladie.

Sous une même entrée de l'index les deux types de renvoi peuvent apparaître.

Tableau des tumeurs : De plus nous aimerions attirer votre attention sur le fait que le tableau des tumeurs se trouve à la fin de l'index alphabétique et non sous la lettre «T».

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées à établir cet index alphabétique. Nous sommes également reconnaissants à tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger.

Index alphabétique

A01 [Albinisme oculaire type 1] ¬ *E70.3*

Aa
v./v.a. Helsmoortel-Van Der Aa

Aagenaes ¬ Syndrome d' *K71.0*

Aalfs
v./v.a. Ruijs-Aalfs

Aarons
v./v.a. Johnston-Aarons-Schelley

Aarskog ¬ Syndrome d' *Q87.1*

Aarskog-Scott ¬ Syndrome d' *Q87.1*

Aase-Smith type
- 1 ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- II ¬ Syndrome d' *D61.0*

AAT] ¬ Déficit en alpha1-antitrypsine [*E88.00*

Abactérienne ¬ Conjonctivite *H10.8*

Abandon ¬ Délaissement et *T74.0*

Abasie
- Fonctionnelle ¬ *F44.4*
- Hystérique ¬ *F44.4*

Abattement ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R53.9*

ABCA3 ¬ Pneumopathie interstitielle par déficit en *J84.80*

ABCB4 ¬ Cholélithiase par mutation du gène *K80.80*

Abcès
- Abdomino-pelvien ¬ *K65.09*
- Aigu
- - Chronique non puerpéral
- - - Aréole ¬ *N61*
- - - Sein ¬ *N61*
- - Sinus de la face ¬ *J01*
- - Tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique ¬ *L04*
- Amibes ¬ *A06.4†, K77.0**
- Amygdale ¬ *J36*
- Anal ¬ *K61.0*
- Ano-rectal ¬ *K61.2*
- Articulaire
- - Tuberculeux NCA ¬ *A18.0†, M01.19**
- - Vertébral non tuberculeux ¬ *M46.59*
- Aseptiques corticosensibles ¬ Syndrome des *M35.8*
- Aspergillaire du poumon ¬ *B44.1*
- Bouche, sans autre précision ¬ Phlegmon et *K12.29*
- Bourses séreuses ¬ *M71.0*
- Brodie ¬ *M86.8*
- Buccal ¬ Autres phlegmon ou *K12.28*
- Candida ¬ *B37.9*
- Cérébral
- - Gonocoques ¬ *A54.8†, G07**
- - ¬ Abcès amibien
- - - Foie avec *A06.6†, G07**
- - - Poumon avec *A06.6†, G07**
- Cerveau à Entamoeba histolytica ¬ *A06.6†, G07**

Abcès *–suite*
- Chromomycotique du cerveau ¬ *B43.1†, G07**
- Chronique) d'un sinus (de la face) ¬ *J32*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Corps
- - Caverneux et de la verge ¬ *N48.2*
- - Vitré ¬ *H44.0*
- Dentaire
- - Fistule ¬ *K04.6*
- - SAI ¬ *K04.7*
- Dento alvéolaire
- - Fistule ¬ *K04.6*
- - SAI ¬ *K04.7*
- Dysentérique du foie ¬ *A06.4†, K77.0**
- Embolique
- - Cérébelleux ¬ *G06.0*
- - Cérébral ¬ *G06.0*
- - Cerveau [toute région] ¬ *G06.0*
- - Moelle épinière [toute localisation] ¬ *G06.1*
- - Otogène ¬ *G06.0*
- Épididyme ou du testicule ¬ *N45.0*
- Épidural tuberculeux ¬ *A17.8†, G07**
- Épiploïque ¬ *K65.09*
- Extra-dural et sous-dural, sans précision ¬ *G06.2*
- Fascia ¬ *M72.8*
- Foie
- - Entamoeba histolytica ¬ *A06.4†, K77.0**
- - ¬ *K75.0*
- Fosse ischio-rectale ¬ *K61.3*
- Furoncle et anthrax du nez ¬ *J34.0*
- Gaine du tendon ¬ *M65.0*
- Glande
- - Littré ¬ *N34.0*
- - Sébacée ¬ *L02.9*
- - Tarsiennes ¬ *H00.0*
- Glande de Bartholin ¬ *N75.1*
- Glande de Cowper ¬ *N34.0*
- Glandes salivaires ¬ *K11.3*
- Gonococcique des glandes de Bartholin ¬ *A54.1*
- Gonorrhéique de la prostate ¬ *A54.2†, N51.0**
- Granulome
- - Intracrânien
- - - Épidural ¬ *G06.0*
- - - Extra-dural ¬ *G06.0*
- - - Sous-dural ¬ *G06.0*
- - Intracrâniens
- - - Intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs ¬ *G07**
- - - ¬ *G06.0*
- - Intrarachidien
- - - Épidural ¬ *G06.1*
- - - Extra-dural ¬ *G06.1*
- - - Sous-dural ¬ *G06.1*

Abcès *–suite*
- Granulome *–suite*
- - Intrarachidien *–suite*
- - - ¬ *G06.1*
- Hypophyse ¬ *E23.6*
- Indication saignement ¬
- - Diverticulite de l'intestin grêle sans perforation , *K57.12*
- - Diverticulose de l'intestin grêle sans perforation , *K57.10*
- Intestin ¬ *K63.0*
- Intestinal tuberculeux ¬ *A18.3†, K93.0**
- Intra-abdominal après des actes médicaux ¬ *T81.4*
- Intrasphinctérien ¬ *K61.4*
- Ischio-rectal
- - Tuberculeux ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K61.3*
- Joue ¬ *K12.23*
- Langue ¬ *K14.0*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Ligament large précisé aigu ¬ *N73.0*
- Lombaire tuberculeux ¬ *A18.0†, M49.06**
- Mamelon
- - Gestationnel ¬ *O91.0*
- - Puerpéral ¬ *O91.0*
- Mammaire gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ *O91.1*
- Mastoïde ¬ *H70.0*
- Maxillaire
- - Extension dans la fosse canine ¬ *K10.21*
- - Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ *K10.20*
- Médiastin ¬ *J85.3*
- Médullaire tuberculeux ¬ *A17.8†, G07**
- Méningé tuberculeux ¬ *A17.0†, G01**
- Mésentérique ¬ *K65.09*
- Non puerpéral du col utérin ¬ *N72*
- Œsophage ¬ *K20.8*
- Orbite ¬ *H05.0*
- Oreille externe ¬ *H60.0*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Osseux rachidien non tuberculeux ¬ *M46.29*
- Ovaire ¬ *N70*
- Paramètre précisé aigu ¬ *N73.0*
- Parapharyngé et rétropharyngé ¬ *J39.0*
- Parodontal ¬ *K05.2*
- Paroi
- - Thoracique ¬ *L02.2*
- - Vessie ¬ *N30.80*
- Paroi abdominale ¬ *L02.2*
- Paupière ¬ *H00.0*
- Pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe ¬ *H60.0*
- Périamygdalien ¬ *J36*
- Périanal

Abcès *–suite*
- Périanal *–suite*
- - Tuberculeux ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K61.0*
- Périapical
- - Fistule ¬ *K04.6*
- - SAI ¬ *K04.7*
- - Sans fistule ¬ *K04.7*
- Périmandibulaire ¬ *K12.28*
- Périnéphrétique tuberculeux ¬ *A18.1†, N29.1**
- Périodontal ¬ *K05.2*
- Péripharyngé ¬ *J39.0*
- Périrectal
- - Tuberculeux ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K61.1*
- Périrénal ¬ *N15.11*
- Péritonéal ¬
- - *K65.09*
- - Appendicite aiguë avec *K35.32*
- Périurétral
- - Glandes annexes ¬ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec *A54.1*
- - ¬ *N34.0*
- Périvésical ¬ *N30.88*
- Phaeohyphomycosique sous-cutané ¬ *B43.2†, L99.8**
- Pharynx ¬ Autres *J39.1*
- Plaie après des actes médicaux ¬ *T81.4*
- Pleural
- - Fistule ¬ *J86.09*
- - ¬
- - - *J86*
- - - *J86.9*
- Posttyphoïdique ¬ *A01.0*
- Poumon
- - Entamoeba histolytica ¬ *A06.5†, J99.8**
- - Pneumonie ¬ *J85.1*
- - SAI ¬ *J85.2*
- - Sans pneumonie ¬ *J85.2*
- Prostate ¬ *N41.2*
- Psoas ¬ *M60.05*
- Pulmonaire tuberculeux primaire
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.7*
- - ¬ *A16.7*
- Rate
- - Amibes ¬ *A06.8†, D77**
- - ¬ *D73.3*
- Rectal ¬ *K61.1*
- Rectovésical ¬ *N30.88*
- Régions anale et rectale, avec ou sans fistule ¬ *K61*
- Rénal
- - Calcul et hydronéphrose ¬ *N13.64*
- - ¬ *N15.10*

Abcès *–suite*
- Rétro-cæcal ¬ *K65.09*
- Rétropéritonéal ¬ *K65.09*
- Rétropharyngé tuberculeux avec confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- Rétrovésical ¬ *N30.88*
- Rhinopharyngé ¬ *J39.1*
- Saignement ¬
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation, *K57.23*
- - - - Sans perforation ni *K57.33*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation, *K57.43*
- - - - - Côlon sans perforation ni *K57.53*
- - - - - Perforation, *K57.03*
- - - - - Sans perforation ni *K57.13*
- - - - Siège non précisé
- - - - - Perforation, *K57.83*
- - - - - Sans perforation ni *K57.93*
- - Diverticulose
- - - Côlon sans perforation ni *K57.31*
- - - Grêle et du colon sans perforation ni *K57.51*
- - - Intestin
- - - - Grêle sans perforation ni *K57.11*
- - - - Siège non précisé, sans perforation ni *K57.91*
- - Maladie diverticulaire
- - - Colon avec perforation, *K57.23*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation, *K57.43*
- - - - - Perforation, *K57.03*
- - - - Perforation, *K57.83*
- Sans indication saignement ¬
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation et *K57.22*
- - - - Sans perforation ni *K57.32*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation et *K57.42*
- - - - - Côlon sans perforation ni *K57.52*
- - - - - Perforation et *K57.02*
- - - - Siège non précisé
- - - - - Perforation et *K57.82*
- - - - - Sans perforation ni *K57.92*
- - Diverticulose
- - - Côlon sans perforation ni *K57.30*
- - - Intestin
- - - - Grêle et du côlon sans perforation ni *K57.50*
- - - - Siège non précisé, sans perforation ni *K57.90*

Abcès *–suite*
- Sein associé à l'accouchement ¬ *O91.1*
- Sous-diaphragmatique
- - Tuberculeux ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K65.09*
- Sous-hépatique ¬ *K65.09*
- Sous-mandibulaire
- - Indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ *K12.22*
- - Sans indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ *K12.21*
- Sous-phrénique
- - Actes médicaux ¬ *T81.4*
- - ¬ *K65.09*
- Staphylocoque
- - Langue ¬ *K14.0, B95.8!*
- - Moelle épinière ¬ *G06.1, B95.8!*
- Subaréolaire gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ *O91.1*
- Sutures après des actes médicaux ¬ *T81.4*
- Thoracique
- - Fistule ¬ *J86.09*
- - ¬ *J86*
- Thymus ¬ *E32.1*
- Thyroïde ¬ *E06.0*
- Trompe de Fallope ¬ *N70*
- Tubo-ovarien ¬ *N70*
- Urétral
- - Glande urétrale) ¬ *N34.0*
- - ¬ *N34.0*
- Utérin ¬ *N71*
- Vésicule biliaire sans calcul ¬ *K81.0*
- Vessie ¬ *N30.80*
- Vulve ¬ *N76.4*
- ¬
- - Chromomycose sous-cutanée avec *B43.2†, L99.8**
- - Kyste sacro-coccygien avec *L05.0*
- - Maladie diverticulaire
- - - Côlon avec perforation et *K57.22*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation et *K57.42*
- - - - - Perforation et *K57.02*
- - - - Perforation et *K57.82*
- - Orchite épididymite épididymo-orchite
- - - *N45.0*
- - - Sans *N45.9*
- - Sinus pilonidal
- - - *L05.0*
- - - Sans *L05.9*
- - Tuberculose du rectum avec *A18.3†, K93.0**
- - Vaginite gonorrhéique avec *A54.1†, N77.1**
- - Vulvite gonorrhéique avec *A54.1†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite à gonocoques avec *A54.1†, N77.1**

Abcès amibien
- Cerveau
- - Foie) (et du poumon) ¬ *A06.6†*
- - ¬ *A06.6†, G07**
- Foie
- - Abcès cérébral ¬ *A06.6†, G07**
- - Poumon ¬ *A06.5†, J99.8**
- - ¬ *A06.4†, K77.0**
- Peau ¬ *A06.7*
- Poumon
- - Abcès cérébral ¬ *A06.6†, G07**
- - Pneumonie ¬ *A06.5†, J17.3**
- - ¬ *A06.5†, J99.8**

Abcès cutané furoncle anthrax
- Cou ¬ *L02.1*
- Face ¬ *L02.0*
- Fesse ¬ *L02.3*
- Localisations ¬ *L02.8*
- Membre ¬ *L02.4*
- Sans précision ¬ *L02.9*
- Tronc ¬ *L02.2*

Abcès hépatique
- Angiocholique ¬ *K75.0*
- Hématogène ¬ *K75.0*
- Lymphogène ¬ *K75.0*
- Pyléphlébitique ¬ *K75.0*
- SAI ¬ *K75.0*

Abcès tuberculeux
- Appareil génito-urinaire ¬ *A18.1*
- Bassin féminin ¬ *A18.1†, N74.1**
- Cerveau ¬ *A17.8†, G07**
- Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- Dure-mère ¬ *A17.0†, G01**
- Genou ¬ *A18.0†, M01.16**
- Glande de Cowper ¬ *A18.1†, N51.8**
- Hanche ¬ *A18.0†, M01.15**
- Intestin ¬ *A18.3†, K93.0**
- Muscle ¬ *A18.8†, M63.09**
- Organes génitaux NCA ¬ *A18.1*
- Organes urinaires et génitaux ¬ *A18.1*
- Os ¬ *A18.0†, M90.09**
- Péritoine ¬ *A18.3†, K67.3**
- Rein ¬ *A18.1†, N29.1**
- Rétropharyngé ¬ *A16.8*
- Scrotum ¬ *A18.1†, N51.8**
- Sinus frontal
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*
- Testicule ¬ *A18.1†, N51.1**
- ¬ *A16.9*

Abdomen
- Lombes bassin
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S30.81*

Abdomen *–suite*
- Lombes bassin *–suite*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S30.84*
- - Décollement sous-cutané (fermé) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S30.86*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S30.83*
- - Phlyctène (non due à la chaleur) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S30.82*
- - Sans précision ¬
- - - Gelure du thorax, de l' *T35.3*
- - - Lésion traumatique de l' *S39.9*
- - ¬
- - - Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l' *S38.3*
- - - Écrasement de parties autres et non précisées de l' *S38.1*
- - - Lésion traumatique
- - - - Multiples vaisseaux sanguins au niveau de l' *S35.7*
- - - - Muscles et de tendons de l' *S39.0*
- - - - Nerf
- - - - - Non précisés au niveau de l' *S34.8*
- - - - - S) périphérique(s) de l' *S34.6*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - Niveau de l' *S35.88*
- - - - - Non précisés, au niveau de l' *S35.9*
- - - Lésions traumatiques
- - - - Multiples de l' *S39.7*
- - - - Superficielles
- - - - - *S30.88*
- - - - - Multiples de l' *S30.7*
- - - - - Thorax, de l' *T00.1*
- - - Plaie ouverte
- - - - Multiples de l' *S31.7*
- - - - Thorax avec plaies ouvertes de l' *T01.1*
- Membre(s) ou du thorax, de la région lombosacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du thorax, de l' *T04.7*
- Penduleux (ventre en besace) ¬ Soins maternels pour: *O34.8*
- Région lombo-sacrée bassin
- - Associée à une lésion intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l' *S31.83!*
- - SAI ¬ Plaie ouverte de l' *S31*
- - ¬
- - - Lésion traumatique Vaisseau sanguin
- - - - Épiduraux au niveau de l' *S35.80*
- - - - Sous-arachnoïdiens au niveau de l' *S35.82*
- - - - Sous-duraux au niveau de l' *S35.81*
- - - Lésions précisées de l' *S39.88*
- Sensible SAI ¬ *R10.4*

Abdomen *–suite*
- Thorax et de la région lombosacrée ou du thorax et du bassin ¬ Écrasement du thorax et de l' *T04.1*
- Y compris l'espace rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l' *R93.5*
- ¬
- - Angiosarcome de l' *C49.4*
- - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des tissus mous de l' *C49.4*
- - Décollement sous-cutané de l' *S30.86*
- - Dissection transversale de: *T05.8*
- - Douleur localisée
- - - Partie supérieure de l' *R10.1*
- - - Parties inférieures de l' *R10.3*
- - Fibromyxosarcome des tissus mous de l' *C49.4*
- - Fibrosarcome de l' *C49.4*
- - Ganglioneuroblastome des nerfs de l' *C47.4*
- - Hémangioendothéliome kaposiforme de l' *C49.4*
- - Liposarcome bien différencié des tissus mous de l' *C49.4*
- - Liposarcome dédifférencié des tissus mous de l' *C49.4*
- - Liposarcome des tissus mous de l' *C49.4*
- - Liposarcome myxoïde des tissus mous de l' *C49.4*
- - Liposarcome pléiomorphe des tissus mous de l' *C49.4*
- - Lymphangiomatose kaposiforme de l' *C49.4*
- - Mélanome malin du bas- *C43.59*
- - Myopéricytome bénin de l' *D21.4*
- - Neuroblastome des nerfs de l' *C47.4*
- - Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l' *S31.80*
- - Rhabdomyosarcome
- - - Alvéolaire des tissus mous de l' *C49.4*
- - - Pléomorphe des tissus mous de l' *C49.4*
- - - Tissus mous de l' *C49.4*
- - Sarcome alvéolaire des tissus mous de l' *C49.4*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des tissus mous de l' *C49.4*
- - Sarcome des tissus mous de l' *C49.4*
- - Sarcome du tissu conjonctif de l' *C49.4*
- - Sarcome épithélioïde des tissus mous de l' *C49.4*
- - Sarcome pléomorphe indifférencié de l' *C49.4*
- - Sarcome synovial des tissus mous de l' *C49.4*
- - Schwannome malin des nerfs de l' *C47.4*
- - Symptômes précis du système digestif et de l' *R19.88*
- - Tumeur
- - - Desmoïde de l' *D48.1*

Abdomen *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Fibreuse solitaire bénigne de l' *D21.4*
- - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l' *D21.4*
- - Tumeur desmoplastique à petites cellules rondes des tissus mous de l' *C49.4*
- - Tumeur maligne
- - - *C76.2*
- - - Nerfs périphériques de l' *C47.4*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous de l' *C49.4*
- - Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des tissus mous de l' *C49.4*
- - Tumeur rhabdoïde
- - - Nerfs de l' *C47.4*
- - - Tissus mous de l' *C49.4*

Abdominal
v./v.a. Aorte abdominale
v./v.a. Hernie abdominale
v./v.a. Paroi abdominale
- Aigu ¬ Syndrome *R10.0*
- Anormaux ¬ Bruits *R19.1*
- Excessifs ¬ Bruits *R19.1*
- Fœtus viable ¬ Soins maternels pour grossesse *O36.7*
- Gazeuse) ¬ Distension *R14*
- Généralisée) (localisée) ¬ Douleur abdominale intense (avec contracture *R10.0*
- Intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée) ¬ Douleur *R10.0*
- Non précisées ¬ Douleurs *R10.4*
- Rompu ¬ Anévrisme aortique *I71.3*
- Sans mention de rupture ¬ Anévrisme aortique *I71.4*
- Siège précisé NCA ¬ hernie: *K45*
- Type glande salivaire ¬ Carcinome de l'œsophage *C15.2*
- ¬
- - Absence de bruits *R19.1*
- - Actinomycose *A42.1*
- - Adénocarcinome de l'œsophage *C15.2*
- - Aplasie congénitale de la musculature *Q79.4*
- - Carcinome épidermoïde de l'œsophage *C15.2*
- - Carcinome indifférencié de l'œsophage *C15.2*
- - Contracture *R19.3*
- - Grossesse
- - - *O00.0*
- - - *P01.4*
- - Hernie sur cicatrice *K43.2*
- - Néoplasie neuroendocrine de l'œsophage *C15.2*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité *R85*
- - Situs inversus ou transversus *Q89.3*

Abdominal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome compartiment
- - - *R19.80*
- - - *R19.80*
- - Thrombose d'une veine *I82.88*
- - Transposition des viscères *Q89.3*
- - TSGI [Tumeur stromale gastro-intestinale] de l'œsophage *C15.2*
- - Tularémie *A21.3*
- - Tumeur maligne: Œsophage *C15.2*
- - Typhus *A01.0*

Abdominis ¬ Syndrome rectus *G58.0*

Abdomino
- Pelvien ¬ Abcès: *K65.09*
- Pelviens ¬ Schwannome malin des nerfs *C47.8*

Abducteur
- Larynx associé à un retard mental ¬ Syndrome de paralysie des muscles *J38.00*
- Pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et *S56.3*

Aberfeld
v./v.a. Schwartz-Jampel-Aberfeld

Aberrant ¬
- Artère pulmonaire *Q25.7*
- Artère sous-clavière *Q27.8*
- Vaisseau rénal *Q27.8*

Aberration
- Mammaire ¬ *Q83.88*
- Pancréas ¬ *Q45.3*
- Rate ¬ *Q89.08*

ABeta2M variante ¬ Amylose *E85.1*

ABeta2Mwt ¬ Amylose *E85.38*

Abêtalipoprotéinémie
- Large bande bêta ¬ *E78.2*
- ¬ *E78.6*

Abidi ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Ablation
- Condylome ¬ Rétrécissement urétral secondaire à *N99.18*
- Organe à titre prophylactique ¬ Admission pour *Z40.0*
- Prothèse ostéo-articulaire ¬ Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l' *M96.88*
- Sutures ¬ *Z48.0*

Ablépharie ¬ *Q10.3*

Ablépharie-macrostomie ¬ Syndrome d' *Q87.0*

ABO
- Fœtus et du nouveau-né ¬ Iso-immunisation *P55.1*
- ¬
- - Iso-immunisation: *O36.1*
- - Réaction d'incompatibilité *T80.3*

Abortive ¬
- Peste *A20.8*

Abortive ¬ *–suite*
- Poliomyélite *A80.4*

Abortus ¬
- Brucellose à Brucella *A23.1*
- Infection à Brucella *A23.1*

Abouchement
- Oreillette gauche via le sinus coronaire ¬ Persistance de la veine cave supérieure gauche avec *Q26.1*
- Veine cave supérieure
- - Droite dans l'oreillette gauche ¬ *Q26.8*
- - Gauche
- - - Oreillette gauche par le sinus coronaire ¬ *Q26.1*
- - - Toit de l'oreillette gauche ¬ *Q26.1*

Abrasion
- Cornée sans mention de corps étranger ¬ Lésion traumatique de la conjonctive et *S05.0*
- Cou ¬ *S10.91*
- Dentifrice des dents ¬ *K03.1*
- Dents ¬ *K03.1*
- Éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: *S40.81*
- Habituelle des dents ¬ *K03.1*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Professionnelle des dents ¬ *K03.1*
- Rituelle des dents ¬ *K03.1*
- Sur
- - Coude ¬ *S50.81*
- - Genou ¬ *S80.81*
- - Main ¬ *S60.81*
- Thorax
- - Antérieure ¬ *S20.31*
- - ¬ *S20.81*
- Traditionnelle des dents ¬ *K03.1*
- ¬
- - Lésion traumatique superficielle
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.01*
- - - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.01*
- - - Partie du corps non précisée: *T14.01*
- - - Tronc, niveau non précisé: *T09.01*
- - Lésions traumatiques superficielles
- - - Abdomen, des lombes et du bassin: *S30.81*
- - - Avant-bras: *S50.81*
- - - Cheville et du pied: *S90.81*
- - - Hanche et de la cuisse: *S70.81*
- - - Jambe: *S80.81*
- - - Poignet et de la main: *S60.81*

Abruzzo-Erickson ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Abscedens suffodien
- Hoffmann] ¬ Folliculite et périfolliculite capitis *L66.3*
- ¬ Maladie de Hoffmann [folliculitis et perifolliculitis capitis *L66.3*

Absence
- Adolescence ¬ Épilepsie (avec): *G40.3*
- Agénésie
- - Appareil lacrymal ¬ *Q10.4*
- - Cils ¬ *Q10.3*
- - Paupière ¬ *Q10.3*
- Anus avec fistule ¬ *Q42.2*
- Aplasie
- - Cordon spermatique ¬ *Q55.4*
- - Prostate ¬ *Q55.4*
- - Testicule ¬ *Q55.0*
- Artère ou d'une veine NCA ¬ *Q27.8*
- Artère pulmonaire ¬ *Q25.7*
- Atrésie
- - Rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) ¬ *Q16.1*
- - Sténose congénitales
- - - Côlon, sans précision de localisation ¬ *Q42.9*
- - - Duodénum ¬ *Q41.0*
- - - Intestin SAI ¬ *Q41.9*
- - - Localisations
- - - - Côlon ¬ *Q42.8*
- - - - Précisées de l'intestin grêle ¬ *Q41.8*
- - - Rectum, avec fistule ¬ *Q42.0*
- Bronches ¬ *Q32.4*
- Bruits abdominaux ¬ *R19.1*
- Canal artériel ¬ Syndrome d'agénésie de la valve pulmonaire-tétralogie de Fallot- *Q24.8, Q25.8*
- Cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Complète
- - Isolée du vermis cérébelleux ¬ *Q04.3*
- - Partielle) des voies digestives SAI ¬ *Q45.8*
- Congénital e
- - Aorte ¬ *Q25.4*
- - Vulve ¬ *Q52.7*
- Côtes congénitale ¬ *Q76.6*
- Diaphragme ¬ *Q79.1*
- Enfance ¬ Épilepsie avec *G40.3*
- Épileptiques ¬ État d' *G41.1*
- Familiale de cils nasaux ¬ *Q30.8*
- Fibres sensitives myélinisées de gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec surdité, déficience intellectuelle et *G60.0*
- Foie congénital(e) ¬ *Q44.7*
- Glandes ou de canaux salivaires ¬ *Q38.4*
- Luette ¬ *Q38.5*
- Mamelon
- - Congénitale) ¬ *Q83.2*
- - ¬
- - - Absence congénitale de sein avec *Q83.0*
- - - Agénésie de sein avec *Q83.0*
- - - Amastie avec *Q83.0*
- Membres de la famille ¬ *Z63*
- Menstruation SAI ¬ *N91.2*

Absence *–suite*
- Muscle ¬ *Q79.8*
- Myocloniques ¬ Épilepsie avec: *G40.4*
- Œsophage ¬ *Q39.8*
- Orifice lacrymal ¬ *Q10.4*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Partielle acquise deux membres
- - Inférieurs ¬ *Z89.7*
- - Supérieurs ¬ *Z89.3*
- Perte de désir sexuel ¬ *F52.0*
- Point lacrymal ¬ Syndrome de ptosis-mouvement oculaire limité- *Q87.0*
- Radius
- - Anomalies ano-génitales ¬ Syndrome d' *Q87.2*
- - TAR] ¬ Thrombopénie avec *Q87.2*
- Rate ¬ *Q89.01*
- Reconnue de fibrose kystique du pancréas ¬ Iléus méconial en l' *P76.0*
- Rectum avec fistule ¬ *Q42.0*
- Septum aortico-pulmonaire ¬ *Q21.4*
- Sinus frontaux ¬ Syndrome de microcornée-glaucome- *Q15.0, Q13.4*
- Tendon ¬ *Q79.8*
- Trompe d'Eustache ¬ *Q16.2*
- Trompe de Fallope ou du ligament large ¬ *Q50.6*
- Unilatérale congénitale de rein ¬ *Q60.0*
- Uretère ¬ *Q62.4*
- Veine
- - Cave
- - - Inférieure) (supérieure) ¬ *Q26.8*
- - - Supérieure ¬ *Q26.8*
- - Innominée ¬ *Q26.8*
- ¬ POMA [Myoclonie périorale avec *G40.3*

Absence acquise
- Canal déférent ¬ *Z90.7*
- Col de l'utérus ¬ *Z90.7*
- Deux bras ¬ *Z89.3*
- Doigt s
- - Bilatérale ¬ *Z89.3*
- - Y compris le pouce], unilatérale ¬ *Z89.0*
- Épididyme ¬ *Z90.7*
- Fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau] ¬ *Z89.8*
- Main et poignet, unilatéral ¬ *Z89.1*
- Membre
- - Inférieur
- - - Au-dessus du genou, unilatérale ¬ *Z89.6*
- - - Niveau du genou ou au-dessous ¬ *Z89.5*
- - Sans précision ¬ *Z89.9*
- - Supérieur au-dessus du poignet, unilatérale ¬ *Z89.2*
- Organe
- - Voies urinaires ¬ *Z90.6*
- - ¬ *Z90.8*
- Organes génitaux ¬ *Z90.7*

Absence acquise *–suite*
- Ovaire ¬ *Z90.7*
- Partie
- - Estomac ¬ *Z90.3*
- - Tête et du cou ¬ *Z90.0*
- Parties de l'appareil digestif ¬ *Z90.4*
- Pénis ¬ *Z90.7*
- Pied et cheville, unilatérale ¬ *Z89.4*
- Poumon [partie de] ¬ *Z90.2*
- Prostate ¬ *Z90.7*
- Rein ¬ *Z90.5*
- Sein(s) ¬ *Z90.1*
- Testicule ¬ *Z90.7*
- Utérus ¬ *Z90.7*
- Vésicules séminales ¬ *Z90.7*

Absence congénitale
- Anus ¬ *Q42.3*
- Articulation d'une extrémité, n.c.a. ¬ *Q74.8*
- Avant-bras et de la main ¬ *Q71.2*
- Bilatérale de la jambe et du pied ¬ *Q72.2*
- Bras
- - Avant-bras, main présente ¬ *Q71.1*
- - ¬ *Q71.0*
- Col de l'utérus ¬ *Q51.5*
- Complète membre
- - Inférieur ¬ *Q72.0*
- - S) supérieur(s) ¬ *Q71.0*
- Cuisse et de la jambe, pied présent ¬ *Q72.1*
- Doigt ¬ *Q71.3*
- Duodénum ¬ *Q41.0*
- Fémur ¬ *Q72.4*
- Hypoplasie de l'artère ombilicale ¬ *Q27.0*
- Iléon ¬ *Q41.2*
- Iris ¬ *Q13.1*
- Jambe et du pied ¬ *Q72.2*
- Jéjunum ¬ *Q41.1*
- Lobe de l'oreille ¬ *Q17.8*
- Main ¬ *Q71.3*
- Membre
- - S) non précisé(s) ¬ *Q73.0*
- - ¬ *Q73.0*
- Musculature du ventre ¬ *Q79.4*
- Nez ¬ *Q30.1*
- Oreille
- - Interne ¬ *Q16.5*
- - SAI ¬ *Q16.9*
- Organe de Corti ¬ *Q16.5*
- Organes respiratoires ¬ *Q34.9*
- Os du crâne ¬ *Q75.8*
- Ovaire(s) ¬ *Q50.0*
- Pancréas ¬ *Q45.0*
- Pavillon de l'oreille ¬ *Q16.0*
- Pénis ¬ *Q55.5*
- Péricarde ¬ *Q24.8*
- Pied
- - Cheville ¬ *Q72.3*

Absence congénitale *–suite*
- Pied *–suite*
- - Orteil(s) ¬ *Q72.3*
- Pouce ¬ *Q71.3*
- Poumon ¬ *Q33.3*
- Rectum ¬ *Q42.1*
- Rein
- - Bilatéral ¬ *Q60.1*
- - ¬ *Q60.2*
- Rotule ¬ *Q74.1*
- Scrotum ¬ *Q55.2*
- Sein
- - Absence de mamelon ¬ *Q83.0*
- - ¬ *Q83.88*
- Septum auriculaire ¬ *Q21.1*
- Sternum ¬ *Q76.7*
- Thyroïde ¬ *E03.1*
- Utérus ¬ *Q51.0*
- Vagin ¬ *Q52.0*
- Vertèbres sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Vésicule biliaire ¬ *Q44.0*
- Vessie et de l'urètre ¬ *Q64.5*

Absent
- Cæcum et du côlon ¬ Rotation: *Q43.3*
- Lent dans le corps) ¬ Blessure de reperfusion (retour *T88.8*
- Polydactylie-kyste arachnoïdien ¬ Syndrome de tibia *Q79.8, G93.0*
- ¬ Syndrome d'aniridie-rotule *Q87.8*

Absidia ¬ Infection à *B46.5*

Absolu ¬ Glaucome *H44.5*

Absorption
- Aliments et de liquides ¬ Autres symptômes et signes relatifs à l' *R63.8*
- Intestinale hydrates carbone ¬
- - Anomalies de l' *E74.3*
- - Trouble de l' *E74.3*
- Transport des acides aminés ¬ Trouble de l' *E72.0*

Abt-Letterer-Siwe ¬ Maladie d' *C96.0*

Abus
- Alcool
- - Sevrage ¬ *F10.3*
- - ¬ *F10.1*
- Antiacides ¬ *F55*
- Chronique d'alcool ¬ *F10.2*
- Gabapentine ¬ *F13.1*
- Médicament
- - Toxicomanie ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- - ¬ Rééducation des drogués et après *Z50.3!*
- Prégabaline ¬ *F13.1*
- Préparations à base de plantes ou remèdes populaires ¬ *F55*
- Sans précision ¬ *Z91.8*
- Sexuel allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un *Z04.5*

Abus *–suite*
- Stéroïdes ou hormones ¬ *F55*
- Substances psycho-actives ¬ Antécédents personnels d' *Z86.4*
- Vitamines ¬ *F55*
- ¬ Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d' *T43.6*

Acalculie
- Développement ¬ *F81.2*
- ¬ *R48.8*

Acanthamoeba ¬
- Conjonctivite due à *B60.1†, H13.1**
- Kératoconjonctivite interstitielle à *B60.1†, H19.2**

Acanthamœbiose
- Conjonctive ¬ *B60.1†, H13.1**
- Kératite ¬ *B60.1†, H19.2**
- Kératoconjonctivite ¬ *B60.1†, H19.2**
- ¬ *B60.1*

Acanthocéphalose ¬ *B83.8*

Acanthocytose ¬
- *E78.6*
- Chorée- *E78.6*

Acantholyse
- Sans précision ¬ *L11.9*
- ¬ Autres formes précisées d' *L11.8*

Acantholytique
- Transitoire [Grover] ¬ Dermatose *L11.1*
- ¬ Épidermolyse bulleuse létale *Q81.0*

Acanthose buccale ¬ *K13.2*

Acanthosis nigricans
- Cheveux anormaux ¬ Syndrome de leuconychie totale-lésions de type *Q84.4, L83*
- Résistance à l'insuline-crampes-hypertrophie acrale ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬
- - *L83*
- - Syndrome d'achondroplasie sévère-retard de développement- *Q77.4*

Acariase
- Infestations ¬ Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l' *Z20.7*
- ¬ *B88.0*

Acarien ¬
- Dermatite due aux *B88.0*
- Infestation SAI par des *B88.9*

Acarodermatite ¬ *B88.0*

Accélération de la vitesse de sédimentation ¬ *R70.0*

Accélératrice) ¬ **Déficit héréditaire en globuline AC (** *D68.22*

Accéléré
- Dysmorphie faciale-retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse *Q87.3*
- ¬
- - Angine: *I20.0*
- - Conduction auriculoventriculaire: *I45.6*

Accentuation de certains traits de la personnalité ¬ *Z73*

Acceptation intervention
- Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et *Z64.8*
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et *Z64.8*

Accès
- Établissements de santé et autres structures d'aide ¬ Non disponibilité ou impossibilité d' *Z75.8*
- Vasculaire, non précisé ¬ Adaptation et manipulation d'un autre *Z45.29*

Accessoire
v./v.a. Type de maladie

Accident
- Accident non précisé ¬ Autre *X59.9!*
- Aiguille à injection ¬ *W49.9!*
- Armes à feu ¬ *W49.9!*
- Bicyclette ¬ *V99!*
- Bus ¬ *V99!*
- Camion ¬ *V99!*
- Cardio-vasculaire SAI ¬ *I51.6*
- Cérébrovasculaire
- - Imminent ¬ *G45.9*
- - SAI ¬ *I64*
- Chaleur artificielle ¬ *W92.9!*
- Changement de pression atmosphérique ¬ *W94.9!*
- Chute (dans l'eau) ¬ *X59.9!*
- Complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux ¬ *Y69!*
- Contact avec des plantes vénéneuses ou des animaux venimeux ¬ *X29.9!*
- Corps de feu d'artifice ¬ *W49.9!*
- Coup de couteau ¬ *W49.9!*
- Courant électrique ¬ *W87.9!*
- Équitation ou accident de véhicule attelé à un animal ¬ *V99!*
- Explosion de chaudière/bouilloire ¬ *W49.9!*
- Exposition forces mécaniques objet
- - Animés ¬ *W64.9!*
- - Inanimés ¬ *W49.9!*
- Extraction ou affection périodontale localisée ¬ Perte de dents consécutive à *K08.1*
- Froid artificiel ¬ *W93.9!*
- Ischémique
- - Cérébral transitoire
- - - Régression complète
- - - - 1 à 24 heures ¬ *G45.92*
- - - - Heure ¬ *G45.93*
- - - Sans précision ¬ *G45.9*
- - Cérébraux transitoires
- - - AIT] ¬ *G45*
- - - Syndromes apparentés ¬ Autres *G45.8*

Accident *–suite*
- Ischémique *–suite*
- - Transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux ¬ *G45.2*
- Machines ¬ *W49.9!*
- Moto ¬ *V99!*
- Non précisé ¬ Autre accident et *X59.9!*
- Objet (jeté) (tombant) ¬ *W49.9!*
- Outils ¬ *W49.9!*
- Pénétration d'un corps étranger à travers la peau ¬ *W49.9!*
- Piéton ¬ *V99!*
- Radiation ¬ *W91.9!*
- Train ¬ *V99!*
- Tram ¬ *V99!*
- Transport
- - Aérien ¬ *V99!*
- - ¬
- - - *V99!*
- - - Examen et mise en observation après un *Z04.1*
- Travail ¬ Examen et mise en observation après un *Z04.2*
- Vasculaire cérébral
- - Ischémique
- - - Embolie d'artères cérébrales durant l'enfance ¬ *I63.4*
- - - Thrombose d'une artère intracrânienne durant l'enfance ¬ *I63.3*
- - Non précisé étant hémorragique infarctus ¬
- - - *I64*
- - - Séquelles d' *I69.4*
- - ¬ Antécédents personnels d' *Z86.7*
- Véhicule
- - Aquatique ¬ *V99!*
- - Attelé à un animal ¬ Accident d'équitation ou *V99!*
- - Livraison ¬ *V99!*
- - Moteur causé délibérément ¬ *Y09.9!*
- - Spécialisé ¬ *V99!*
- Voiture ¬ *V99!*
- ¬ Examen et mise en observation après un autre *Z04.3*

Accommodation ¬
- Paralysie hystérique de l' *F44.88†, H58.1**
- Parésie de l' *H52.5*
- Spasme de l' *H52.5*
- Troubles de l' *H52.5*

Accompagnant un sujet malade ¬ Personne en bonne santé *Z76.3*

Accompagné d'autres manifestations neurologiques ¬ Zona *B02.2†*

Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du fœtus avec menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ *O35.8*

Accouchement
v./v.a. Complication de l'accouchement
v./v.a. Hémorragie pendant l'accouchement

Accouchement *–suite*
- Anomalie de la coagulation ¬ Hémorragie précédant l' *O46.0*
- Associée
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- Avant terme ¬ Ictère
- - Néonatal associé à un *P59.0*
- - Retard de la glycuronoconjugaison associée à un *P59.0*
- Césarienne ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.4*
- Compliqué
- - Anomalie
- - - Cordon ombilical, sans précision ¬ Travail et *O69.9*
- - - Rythme cardiaque fœtus
- - - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et *O68.2*
- - - - ¬ Travail et *O68.0*
- - Anomalies du cordon ombilical ¬ Travail et *O69.8*
- - Brièveté du cordon ¬ Travail et *O69.3*
- - Circulaire du cordon, avec compression ¬ Travail et *O69.1*
- - Détresse fœtale, sans précision ¬ Travail et *O68.9*
- - Forme d'enchevêtrement du cordon ¬ Travail et *O69.2*
- - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ Travail et *O69.4*
- - Lésions vasculaires du cordon ¬ Travail et *O69.5*
- - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et *O68.1*
- - Prolapsus du cordon ¬ Travail et *O69.0*
- - Signe
- - - Biochimiques de détresse fœtale ¬ Travail et *O68.3*
- - - Détresse fœtale ¬ Travail et *O68.8*
- Due à l'administration de médicaments ¬ détresse fœtale au cours du travail ou de l' *O68*
- Enfant ¬ Hémorragie après expulsion du fœtus ou *O72*
- Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.3*
- Extraction par le siège ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.0*
- Forceps
- - Césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un *O66.5*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.2*

Accouchement *–suite*
- Mère ¬ Lacération du tissu péri-urétral en tant que lésion due à l' *O70.0*
- Précipité ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.5*
- Prématuré
- - Césarienne
- - - Sans travail spontané ¬ *O60.3*
- - - ¬ Travail prématuré spontané avec *O60.1*
- - Induit ¬ *O60.3*
- - Sans travail spontané ¬ *O60.3*
- - ¬ Travail prématuré spontané avec *O60.1*
- Présence d'un léiomyome utérin ¬ *O34.1*
- Puerpéralité
- - Sans précision ¬
- - - Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.9*
- - - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l' *O98.9*
- - ¬
- - - Anémie compliquant la grossesse, l' *O99.0*
- - - Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l' *Z87.5*
- - - Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.3*
- - - Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.1*
- - - Cours
- - - - *O24*
- - - - Travail, de l' *O87*
- - - Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l' *O95*
- - - Embolies de la grossesse, de l' *O88*
- - - Gonococcie compliquant la grossesse, l' *O98.2*
- - - Hépatite virale compliquant la grossesse, l' *O98.4*
- - - Hypertension
- - - - Essentielle préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.0*
- - - - Secondaire préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.4*
- - - Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l' *O98.7*
- - - Maladies
- - - - Affections précisées compliquant la grossesse, l' *O99.8*
- - - - Appareil
- - - - - Circulatoire compliquant la grossesse, l' *O99.4*
- - - - - Digestif compliquant la grossesse, l' *O99.6*
- - - - - Respiratoire compliquant la grossesse, l' *O99.5*
- - - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l' *O98.3*

Accouchement *–suite*
- Puerpéralité *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Maladies *–suite*
- - - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l' *O99.2*
- - - - Infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l' *O98.8*
- - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l' *O99.7*
- - - - Protozoaires compliquant la grossesse, l' *O98.6*
- - - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l' *O99.1*
- - - - Virales compliquant la grossesse, l' *O98.5*
- - - Malnutrition au cours de l' *O25*
- - - Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.2*
- - - Séquelles de complications de la grossesse, de l' *O94*
- - - Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l' *O26.7*
- - - Syphilis compliquant la grossesse, l' *O98.1*
- - - Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l' *O99.3*
- - - Tuberculose compliquant la grossesse, l' *O98.0*
- Retardé
- - Deuxième jumeau, triplé, etc. ¬ *O63.2*
- - Rupture
- - - Artificielle des membranes ¬ *O75.5*
- - - Spontanée ou non précisée des membranes ¬ *O75.6*
- SAI ¬
- - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l' *O75.4*
- - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l' *O75.4*
- - Dépression (du): après un *F53.0*
- - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l' *O75.4*
- - Travail prématuré avec *O60.1*
- Sans
- - Hémorragie ¬ Rétention de produits de la conception après l' *O73.1*
- - Précision ¬
- - - Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.9*

Accouchement *–suite*
- Sans *–suite*
- - Précision ¬ *–suite*
- - - Complication du travail et de l' *O75.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l' *P03.9*
- - - Hémorragie précédant l' *O46.9*
- - - Mastopathies associées à l' *O92.2*
- - - Résultat de l' *Z37.9!*
- Spontané avec présentation en tête ¬ *O80*
- Terme
- - Césarienne ¬ Travail prématuré spontané avec *O60.2*
- - ¬ Travail prématuré avec *O60.2*
- Tout à fait normal ¬ *O80*
- Unique
- - Césarienne ¬ *O82*
- - Forceps et ventouse ¬ *O81*
- - Spontané ¬ *O80*
- Voie vaginale après une césarienne ¬ *O75.7*
- ¬
- - Abcès du sein associé à l' *O91.1*
- - Amputation du fœtus pour faciliter l' *P03.8*
- - Anomalie du tissu pelvien lors de l' *O34.9*
- - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.3*
- - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.2*
- - Blessure de la mère par un instrument pendant l' *O71.9*
- - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l' *O74.5*
- - Cervicite après *O86.1*
- - Choc pendant ou après le travail et l' *O75.1*
- - Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.1*
- - Complication
- - - Anesthésie au cours du travail et de l' *O74.8*
- - - Cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.2*
- - - Intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.3*
- - - Précisées du travail et de l' *O75.8*
- - - Pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.1*
- - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l' *O74.6*
- - Crevasses du mamelon associées à l' *O92.1*
- - Déchirure
- - - Rupture
- - - - Périnatal
- - - - - Intéressant): fourchette au cours de l' *O70.0*

Accouchement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Déchirure *–suite*
- - - Rupture *–suite*
- - - - Périnatal *–suite*
- - - - - Intéressant): légère au cours de l' *O70.0*
- - - - - Intéressant): lèvres au cours de l' *O70.0*
- - - - - Intéressant): peau au cours de l' *O70.0*
- - - - - Intéressant): vagin au cours de l' *O70.0*
- - - - - Intéressant): vulve au cours de l' *O70.0*
- - - - - O70.0, intéressant aussi: muscles du: périnée au cours de l' *O70.1*
- - - - - O70.0, intéressant aussi: muscles du: vagin au cours de l' *O70.1*
- - - - - O70.0, intéressant aussi: plancher pelvien au cours de l' *O70.1*
- - - - - O70.1, intéressant aussi: cloison recto-vaginale au cours de l' *O70.2*
- - - - - O70.1, intéressant aussi: sphincter: anal au cours de l' *O70.2*
- - - - - O70.1, intéressant aussi: sphincter: SAI au cours de l' *O70.2*
- - - - - O70.2, intéressant aussi la muqueuse anale au cours de l' *O70.3*
- - - - - O70.2, intéressant aussi la muqueuse rectale au cours de l' *O70.3*
- - - - Tissus périurétraux au cours de l' *O70.0*
- - - Sillon vaginal pendant l' *O71.4*
- - - Tiers
- - - - Moyen du vagin pendant l' *O71.4*
- - - - Supérieur du vagin pendant l' *O71.4*
- - - Utérus pendant l' *O71.1*
- - Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l' *O74.7*
- - Épuisement maternel au cours du travail et de l' *O75.0*
- - Fœtus nouveau-né affectés
- - - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l' *P04.0*
- - - Complications précisées du travail et de l' *P03.8*
- - - Présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l' *P03.1*
- - Fracture proximale de l'humérus en tant que traumatisme dû à l' *P13.3*
- - Galactorrhée sans relation avec un *N64.3*
- - Hémorragie
- - - Importante pendant l' *O67.8*
- - - Pendant l' *O67.8*
- - - Précédant l' *O46.8*
- - Hyperthermie d'origine inconnue, après *O86.4*
- - Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l' *P20.1*

Accouchement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Infection
- - - Mamelon associée à l' *O91.0*
- - - Suture: périnéale après *O86.0*
- - - Voies urinaires, après *O86.2*
- - Infections
- - - Voies génitales, après *O86.1*
- - - Voies génito-urinaires, après *O86.3*
- - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.2*
- - Intervention destructrice pour faciliter l' *P03.8*
- - Invagination du mamelon associée à l' *O92.0*
- - Lésion du nerf optique au cours de l' *P11.4*
- - Malformation des organes pelviens lors de l' *O34.9*
- - Mastite non purulente associée à l' *O91.2*
- - Mort Séquelle relevant
- - - Cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96.9*
- - - Directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96.0*
- - - Indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96.1*
- - Pneumonie
- - - Chimique d'aspiration dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - - Infectieuse acquise in utero ou pendant l' *P23*
- - Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - Réaction
- - - Intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l' *P04.0*
- - - Toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l' *O74.4*
- - Rétention de produits de la conception SAI, après l' *O72.2*
- - Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de: *N35.0*
- - Soins et examens immédiatement après l' *Z39.0*
- - Syndrome
- - - Hépato-rénal consécutif au travail et à l' *O90.4*
- - - Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - Tétanos à l' *A34*
- - Thrombophlébite des veines pelviennes, avant l' *O22.3*

Accouchement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Thrombose veineuse profonde, avant l' *O22.3*
- - Travail prématuré sans *O60.0*
- - Vaginite après *O86.1*

Accretio cordis ¬ *I31.0*

Accrétion sur dent
- Bétel ¬ Dépôts [*K03.6*
- Materia alba ¬ Dépôts [*K03.6*
- Noir ¬ Dépôts [*K03.6*
- Orange ¬ Dépôts [*K03.6*
- Tabac ¬ Dépôts [*K03.6*
- Vert ¬ Dépôts [*K03.6*
- ¬ Dépôts [*K03.6*

Acculturation ¬ Difficultés liées à l' *Z60*

Acéruléoplasminémie ¬ *G23.0*

Acétabulaire
- Congénitale ¬ Dysplasie *Q65.8*
- ¬ Protrusion *M24.7*

Acétabulum ¬
- Chondrosarcome de l' *C41.4*
- Fracture de l' *S32.4*
- Ostéoblastome de l' *D16.8*
- Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*

Acétazolamide ¬
- *T50.2*
- Myotonie répondant à l' *G71.1*

Acétique ¬ Taux urinaires élevés de: acide indol- *R82.5*

Acétoacétate transférase ¬ Déficit en succinyl-CoA *E71.3*

Acétoacétyl
v./v.a. alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA

Acétoacétyl-CoA thiolase mitochondriale ¬ Déficit en *E71.1*

Acétonurie ¬ *R82.4*

Acétyl
v./v.a. alpha-N-acétyl-galactosaminidase
v./v.a. N-acétyl-6-sulfatase

Acetylgalactosamine
v./v.a. N-acetylgalactosamine

Acétylglucosamine
v./v.a. N-acétylglucosamine-1-phosphotransférase

Acétylsalicylique ¬ Acide *Z92.2*

Acétyltransférase ¬ Déficit en composé dihydrolipoamide *E74.4*

Achalasie
- Idiopathique
- - Œsophage ¬ *K22.0*
- - ¬ *K22.0*
- Œsophage ¬ *K22.0*
- Précoce ¬ Maladie de Moyamoya avec *I67.5*
- Primitive de l'œsophage ¬ *K22.0*
- SAI ¬ *K22.0*
- ¬
- - Cardialgie gastrique au cours d' *K22.0*

Achalasie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-alacrimie- *Q87.8*

Achalasie-microcéphalie ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Acheirie ¬ *Q71.3*

Acheiropodie ¬ *Q73.8*

Achiasma congénital ¬ *H47.4*

Achille ¬
- Brièveté du tendon d' *M67.0*
- Bursite du tendon d' *M76.6*
- Lésion traumatique du tendon d' *S86.0*
- Tendinite du tendon d' *M76.6*

Achlorhydrie ¬ *K31.8*

Acholurique familial ¬ Ictère *D58.0*

Achondrogénésie ¬ *Q77.0*

Achondroplasie
- Sévère-retard de développement-acanthosis nigricans ¬ Syndrome d' *Q77.4*
- ¬ *Q77.4*

Achondroplastique ¬ Insuffisance staturale d'origine *Q77.4*

Achromatopsie ¬ *H53.5*

Achromie ¬ *E70.3*

Achromique
- Lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.3*
- Pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.2*

Achylia pancreatica ¬ *K86.88*

Achylie pancréatique ¬ *K86.88*

Acide
- Acétylsalicylique ¬ *Z92.2*
- Amidohydrolase ¬ Déficit en N-acyl-L-amino *E72.8*
- Argininosuccinique ¬ Anomalies du métabolisme de l' *E72.2*
- Ascorbique ¬ Carence en *E54*
- Biliaire
- - Cholestase et malabsorption ¬ Défaut de synthèse des *K76.8*
- - CoA ligase et défaut d'amidation ¬ Insuffisance en *K76.8*
- - ¬
- - - Déficit congénital de synthèse des *K76.8*
- - - Malabsorption idiopathique par défaut de synthèse des *K90.8*
- Chlorhydrique ¬ *T54.2*
- Corrosifs et substances similaires ¬ Effet toxique: *T54.2*
- Esters nitriques ¬ Effet toxique: Nitroglycérine et autres *T65.5*
- Folinique ¬ Convulsions sensibles à l' *G40.3*
- Folique
- - Due à des médicaments ¬ Anémie par carence en *D52.1*
- - SAI ¬ Anémie par carence en *D52.9*
- - Sans précision ¬ Anémie par carence en *D52.9*

Acide *–suite*
- Folique *–suite*
- - ¬
- - - Anémie par carence
- - - - *D52.8*
- - - - Alimentaire en *D52.0*
- - - Carence en: *E53.8*
- Gallique ¬ Allergie à l' *T78.4*
- Gamma-aminobutyrique ¬
- - Déficit en transaminase de l' *E72.8*
- - Trouble du métabolisme de l' *E72.8*
- Gras
- - Chaîne
- - - Courte ¬
- - - - Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - - - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - - - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - - Longue ¬ Déficit
- - - - 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - - - Acyl-CoA-déshydrogénase des *E71.3*
- - - Moyenne ¬ Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - Essentiels ¬ Carence en *E63.0*
- - Métabolisme des corps cétoniques ¬ Trouble de l'oxydation des *E71.3*
- - ¬
- - - Anomalie du métabolisme des *E71.3*
- - - Déficit d'oxydoréduction des alcools d' *Q87.1*
- - - Neurodégénérescence associée à l'hydroxylase des *G23.0*
- Homogentisique ¬ Déficit en oxydase de l' *E70.2*
- Iminés ¬ Maladie des *E72.8*
- Indol-acétique ¬ Taux urinaires élevés de: *R82.5*
- Labile ¬ Petite taille par déficit primaire en sous-unité *E34.3*
- Lactique déshydrogénase ¬ Augmentation des taux de transaminase et d' *R74.0*
- Lipoïque synthétase ¬ Déficit en *E88.8*
- Lysergique] ¬ Intoxication au LSD [diéthylamide de l' *T40.8*
- Lysosomale ¬ Déficit
- - Lipase *E75.5*
- - Phosphatase *E83.38*
- Nicotinique
- - Dérivés) ¬ *T46.7*
- - Pellagre] ¬ Carence en *E52*
- - Tryptophane) ¬ Carence en: *E52*
- - ¬ Démence au cours de carence en *E52†, F02.8**
- Normale ¬ Glycogénose lysosomale à activité maltase *E74.0*

Acide *–suite*
- Pantothénique ¬ Carence en: *E53.8*
- Sialique libre ¬ Maladie de surcharge en *E77.8*
- Sulfurique ¬ *T54.2*
- Urique ¬
- - Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l' *T50.4*
- - Néphrolithiase avec calcul d' *M10.09†, N22.8**
- Valproïque ¬
- - *T42.6*
- - Intoxication à l' *T42.6*
- - ¬
- - Anomalies des taux de: phosphatase: *R74.8*
- - Déficit
- - - Alpha-1,4-glucosidase *E74.0*
- - - Céramidase *E75.2*
- - - Phosphatase *E83.38*
- - - Sphingomyélinase *E75.2*
- - Exposition à l' *T54.9*
- - Glycogénose par déficit en maltase *E74.0*

Acidémie
- 2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Argininosuccinique ¬ *E72.2*
- D-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Fœtale ¬ *O68.3*
- Glutarique type
- - 1 ¬ *E72.3*
- - 2 ¬ *E71.3*
- Isovalérique ¬ *E71.1*
- L-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Méthylmalonique
- - Homocystinurie
- - - Type
- - - - CblC ¬ *E72.8*
- - - - CblD ¬ *E72.8*
- - - - CblF ¬ *E72.8*
- - - - CblJ ¬ *E72.8*
- - - ¬ *E71.1, E72.1*
- - Résistante à la vitamine B12 ¬ *E71.1*
- - Sensible vitamine B12
- - - Type cblB ¬ *E71.1*
- - - ¬ *E71.1*
- - ¬ *E71.1*
- Pipécolique ¬ *E72.3*
- Propionique ¬ *E71.1*

Acides aminés
- Aromatiques, sans précision ¬ Anomalies du métabolisme des *E70.9*
- Bêta ¬ Anomalies du métabolisme des *E72.8*
- Chaîne ramifié ¬
- - Anomalie du métabolisme des *E71.2*
- - Anomalies du métabolisme des *E71.1*

Acides aminés *–suite*
- Non ramifiés ¬ Trouble du métabolisme des *E72.8*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E72.9*
- Soufrés ¬ Anomalies du métabolisme des *E72.1*
- ¬
- - Anémie (par): carence en *D53.0*
- - Anomalies précisées du métabolisme des *E72.8*
- - Carence en *E72.9*
- - Trouble
- - - Absorption et du transport des *E72.0*
- - - Congénital du métabolisme des *E72.9*
- - - Métabolisme des *E72.9*

Acidifiants ¬ *T50.9*

Acido-basique
- Fœtale ¬ Anomalie de l'équilibre *O68.3*
- ¬ Anomalie mixte de l'équilibre *E87.4*

Acidocétose ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.11*

Acidophile
- Basophile de l'hypophyse ¬ Carcinome mixte *C75.1*
- Hypophyse ¬
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome
- - - *C75.1*
- - - Mixte basophile et *C75.1*

Acidose
v./v.a. Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes
- Fœtale ou intra-utérine ¬ *P20*
- Lactique
- - Anémie sidéroblastique-défaillance multisystémique ¬ Syndrome d'anasarque- *Q87.8*
- - Congénitale type Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ *G31.88*
- - Déficit en MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique mitochondriale avec *I42.2*
- - Épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, *G31.81*
- - Fatale avec acidurie méthylmalonique ¬ *E71.1, E87.2*
- - Hyperammoniémie ¬ Hypotonie avec *I42.2*
- - Néonatale sévère par déficit en complexe NFS1-ISD11 ¬ *E87.2*
- - Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, *G31.81*
- - Surdité ¬ Syndrome de myopathie mitochondriale- *G71.3*
- - ¬
- - - *E87.2*
- - - Syndrome de cardiomyopathie-hypotonie- *I42.2*

Acidose *–suite*
- Métabolique
- - Tardive du nouveau-né ¬ *P74.0*
- - ¬ *E87.2*
- Respiratoire ¬ *E87.2*
- SAI ¬ *E87.2*
- Tubulaire
- - Anémie ¬ Syndrome de calcification du système nerveux central-surdité- *Q87.8*
- - Rénale
- - - Distale
- - - - Autosomique récessive ¬ *N25.8*
- - - - ¬ *N25.8*
- - - Proximale ¬ *N25.8*
- - - Type
- - - - 1 ¬ *N25.8*
- - - - 2 ¬ *N25.8*
- - - ¬
- - - - *N25.8*
- - - - Ostéopétrose avec *Q78.2, N25.8*
- ¬ *E87.2*

Acidurie
- 2
- - Hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- - Méthylbutyrique ¬ *E71.1*
- 2-méthyl-3-hydroxybutyrique ¬ *E72.8*
- 3
- - Hydroxy-3-méthylglutarique ¬ *E71.1*
- - Hydroxyisobutyrique ¬ *E71.1*
- - Méthylglutaconique
- - - Surdité-encéphalopathie] ¬ Syndrome MEGDEL [Syndrome Leigh-like- *G31.88*
- - - Type
- - - - 1 ¬ *E71.1*
- - - - 2 ¬ *E71.1*
- - - - 3 ¬ *E71.1*
- - - - 4 ¬ *E71.1*
- - - - 5 ¬ *E71.1†, I43.1**
- - - - 7 ¬ *E71.1*
- - - - 8 ¬ *E71.1*
- - - - 9 ¬ *E71.1*
- 4-hydroxybutyrique ¬ *E72.8*
- Alpha-aminoadipique ¬ *E72.3*
- Alpha-méthyl-acétoacétylique ¬ *E71.1*
- Argininosuccinique ¬ *E72.2*
- Combinée malonique et méthylmalonique ¬ *E71.1, E72.8*
- D,L-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- D-2-hydroxyglutarique ¬
- - *E72.8*
- - Chondromatose métaphysaire avec *Q78.4, E72.8*
- Formiminoglutamique ¬ *E70.8*
- Fumarique ¬ *E88.8*
- Gamma-hydroxybutyrique ¬ *E72.8*
- Glutarique type
- - 1 ¬ *E72.3*

Acidurie *–suite*
- Glutarique type *–suite*
- - 2 ¬ *E71.3*
- - 3 ¬ *E72.3*
- Glycolique ¬ *E74.8*
- Hydroxyméthylglutarique ¬ *E71.1*
- Isobutyrique ¬ *E71.1*
- L-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Malonique ¬ *E72.8*
- Méthylmalonique
- - Déficit
- - - Méthylmalonyl-CoA épimérase ¬ *E71.1*
- - - Récepteur de la transcobalamine ¬ *E71.1*
- - Résistante à la vitamine B12 ¬ *E71.1*
- - Sensible vitamine B12
- - - Type cblA ¬ *E71.1*
- - - ¬ *E71.1*
- - ¬
- - - Acidose lactique fatale avec *E71.1, E87.2*
- - - Syndrome de déplétion de l'ADN mitochondrial forme encéphalomyopathique avec *G31.81, E71.1*
- Mévalonique ¬ *E88.8*
- Orotique héréditaire ¬ *E79.8*
- Oxoglutarique ¬ *E88.8*
- Propionique ¬ *E71.1*
- Xanthurénique ¬ *E70.8*

Acinésie pure avec freezing de la marche ¬ Syndrome de paralysie supranucléaire progressive- *G23.1*

Acinetobacter
- Baumannii multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Groupe *U81.11!*
- - 3MRGN ¬ Groupe *U81.31!*
- - 4MRGN ¬ Groupe *U81.51!*
- Multirésistants 3MRGN ¬ Pseudomonas et *U81.3!*
- ¬
- - *B96.5!*
- - Bactériémie à *A49.85*
- - Infection à *A49.85*

Acineuse
v./v.a. Carcinome à cellules acineuses

Ackerman ¬ Syndrome de molaires avec racines fusionnées d' *Q87.8*

AcN] anti-interféron ¬ Détection d'anticorps neutralisants [*R76.88*

Acné
- Apocrine ¬ *L73.2*
- Chéloïde [Folliculite sclerotisans nuchae] ¬ *L73.0*
- Conglobata ¬ *L70.1*
- Due aux stéroïdes ¬ *L70.8*
- Excoriée
- - Jeunes filles ¬ *L70.5*
- - ¬ *L70.5*

Acné *–suite*
- Hidradénite suppurée
- - Spondylarthrite ankylosante] ¬ Syndrome PASS [pyoderma gangrenosum- *M35.8*
- - ¬ Syndrome
- - - PAPASH [arthrite pyogénique-pyoderma gangrenosum- *M35.8*
- - - PASH [pyoderma gangrenosum- *M35.8*
- - - PsAPASH [arthrite psoriasique-pyoderma gangrenosum- *M35.8*
- Infantile ¬ *L70.4*
- Inversée ¬ *L73.2*
- Laissant des cicatrices ¬ *L70.9*
- Miliaire nécrosante ¬ *L70.2*
- Pustulose hyperostose ostéite ostéite
- - Avant-bras ¬ Syndrome SAPHO [Synovite- *M86.33*
- - Bras ¬ Syndrome SAPHO [Synovite- *M86.32*
- - Cheville ¬ Syndrome SAPHO [Synovite- *M86.37*
- - Colonne vertébrale ¬ Syndrome SAPHO [Synovite- *M86.38*
- - Jambe ¬ Syndrome SAPHO [Synovite- *M86.36*
- - Localisations multiples ¬ Syndrome SAPHO [Synovite- *M86.30*
- - Main ¬ Syndrome SAPHO [Synovite- *M86.34*
- - Région de l'épaule ¬ Syndrome SAPHO [Synovite- *M86.31*
- - Région pelvienne ¬ Syndrome SAPHO [Synovite- *M86.35*
- Rosacée
- - Sans précision ¬ *L71.9*
- - ¬
- - - Blépharite au cours d' *L71.8†, H03.8**
- - - Blépharo-conjonctivite au cours d' *L71.8†, H13.2**
- - - Conjonctivite au cours d' *L71.9†, H13.2**
- - - Formes d' *L71.8*
- - - Kératite au cours d' *L71.8†, H19.3**
- Sans précision ¬ *L70.9*
- Tropicale ¬ *L70.3*
- Varioliforme ¬ *L70.2*
- Vulgaire ¬ *L70.0*
- ¬
- - Formes d' *L70.8*
- - Syndrome PAPA [d'arthrite purulente-pyoderma gangrenosum- *M35.8*

Acnéiforme ¬ Érythème *L66.4*

Acnéique ¬ Triade *L73.2*

Acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique ¬ Hypo- et *N31.81*

Acouphènes ¬ *H93.1*

Acoustique
- Conduction osseuse ¬ Appareil *Z96.2*
- Cours de la syphilis ¬ Névrite *A52.1†, H94.0**

Acoustique *–suite*
- Inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite *H94.0**
- N. stato-acoustique] ¬ Nerf *S04.6*
- ¬
- - Nerf acoustique [N. stato- *S04.6*
- - Neurinome de l' *D33.3*
- - Perte auditive neurosensorielle aigüe brutale due à un traumatisme *H83.3*
- - Syphilis du nerf *A52.1†, H94.0**
- - Traumatisme *H83.3*

Acquired Renal Cystic Disease] ¬ ACRD [*N28.1*

Acquis
v./v.a. Type de maladie

Acquisition
- Arithmétique ¬ Trouble
- - *F81.2*
- - Spécifique de l' *F81.2*
- Articulation ¬ Trouble spécifique de l' *F80.0*
- Connaissances SAI ¬ Incapacité (de): concernant l' *F81.9*
- Coordination ¬ Trouble de l' *F82*
- Expression écrite ¬ Trouble de l' *F81.8*
- Langage, de type expressif ¬ Trouble de l' *F80.1*
- Orthographe ¬ Trouble spécifique de l' *F81.1*
- Scolaires
- - Sans précision ¬ Trouble du développement des *F81.9*
- - ¬
- - - Trouble mixte des *F81.3*
- - - Troubles du développement des *F81.8*

Acrânie ¬ *Q00.0*

ACRD [Acquired Renal Cystic Disease] ¬ *N28.1*

Acro-calleux] ¬ ACS [Syndrome *Q04.0*

Acro-capito-fémorale ¬ Dysplasie *Q78.8*

Acrocardiofacial ¬ Syndrome *Q87.8*

Acrocéphalie ¬ *Q75.0*

Acrocéphalopolydactylie ¬ *Q87.0*

Acrocéphalosyndactylie
- Type
- - 3 ¬ ACS [*Q87.0*
- - 4 ¬ *Q87.0*
- - 5 ¬ ACS [*Q87.0*
- - ¬
- - *Q87.0*
- - ACS [*Q87.0*

Acrochordon
- Anus ¬ *K64.4*
- ¬ *Q82.8*

Acro-cranio-faciale ¬ Dysostose *Q87.0*

Acrocyanose ¬
- *I73.8*

Acrocyanose ¬ *–suite*
- Syndrome de kératodermie palmoplantaire diffuse- *Q82.8*

Acrodermatite
- Chronique atrophiante ¬ *L90.4*
- Continue de Hallopeau ¬ *L40.2*
- Entéropathique ¬ *E83.2*
- Érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] ¬ *L44.4*

Acrodermatitis enteropathica ¬ *E83.2*

Acrodynie ¬ *T56.1*

Acrodysostose
- Résistance aux multiples hormones ¬ *Q75.4*
- ¬ *Q75.4*

Acrodystrophie ¬
- Maladie de Charcot-Marie-Tooth axonale autosomique récessive avec *G60.0*
- Neuropathie sensitivo-motrice axonale héréditaire avec *G60.0*

Acrofacial
- Kennedy-Teebi ¬ Dysostose *Q75.4*
- Nager ¬ Dysostose *Q75.4*
- Postaxiale ¬ Dysostose *Q75.4*
- Type
- - Catane ¬ Dysostose *Q75.4*
- - Palagonia ¬ Dysostose *Q75.4*
- - Rodríguez ¬ Dysostose *Q75.4*
- - Weyers ¬ Dysostose *Q75.4*

Acrofrontofacionasale ¬ Dysostose *Q75.1*

Acrogérie type Gottron ¬ *E34.8*

Acrogigantisme lié à l'X ¬ *E22.0*

Acrokeratodermie ponctuée avec pigmentation de type taches de rousseur ¬ *L85.8*

Acrokératose verruciforme de Hopf ¬ *Q82.8*

Acrokératosique congénitale ¬ Poïkilodermie *Q82.8*

Acromégalie
- Gigantisme ¬ *E22.0*
- Hyperactivité ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Infantile et juvénile ¬ *E22.0*
- ¬
- - Arthrites au cours de l' *E22.0†, M14.59**
- - Arthropathie au cours de l' *E22.0†, M14.59**
- - Forme infantile de l' *E22.0*
- - Hypersécrétion antéhypophysaire avec *E22.0*

Acromégalique ¬ Syndrome du faciès *Q87.0*

Acromégaloïde ¬ Syndrome du faciès *Q87.0*

Acromélanose ¬ *L81.4*

Acromélique ¬ Dysplasie fronto-nasale *Q87.0*

Acromésomélique type
- Grebe ¬ Dysplasie *Q78.8*
- Hunter-Thompson ¬ Dysplasie *Q78.8*
- Maroteaux ¬ Dysplasie *Q77.8*

Acromicrie
- Ménopause prématurée ¬ Syndrome de polyneuropathie-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-calvitie-luxation de la rotule- *Q87.8*

Acromicrique ¬ Dysplasie *Q77.8*

Acromio-claviculaire ¬
- Articulation *T84.10*
- Entorse et foulure de l'articulation *S43.5*
- Ligament *S43.5*
- Luxation de l'articulation *S43.1*

Acromion ¬ Fracture de l'omoplate: *S42.12*

Acroostéolyse phalangienne idiopathique ¬ *M89.58*

Acrootooculaire ¬ Syndrome *Q87.0*

Acroparesthésie
- Simple [type Schultze] ¬ *I73.8*
- Vasomotrice [type Nothnagel] ¬ *I73.8*

Acropectoral ¬ Syndrome *Q74.8, Q76.7*

Acro-pectoro-vertébrale ¬ Dysgénésie *Q74.8*

Acrophobie ¬ *F40.2*

Acro-rénal ¬ Syndrome *Q87.2*

Acrorénomandibulaire ¬ Syndrome *Q87.8*

Acrosarcome ¬ *C46.0*

Acroscyphodysplasie métaphysaire ¬ *Q78.5*

Acrostéolyse autosomique dominante ¬ *M89.59*

ACS
- Acrocéphalosyndactylie
- - Type
- - - 3 ¬ *Q87.0*
- - - 5 ¬ *Q87.0*
- - ¬ *Q87.0*
- Syndrome acro-calleux] ¬ *Q04.0*

ACTH
- Hormone adrénocorticotrope
- - Extra-hypophysaire ¬ Syndrome d' *E24.3*
- - ¬
- - - Hypersécrétion hypophysaire d' *E24.0*
- - - Syndrome de Cushing dû à la production ectopique d' *E24.3*
- Non associée à la maladie de Cushing ¬ Hypersécrétion d' *E27.0*
- ¬
- - Déficit
- - - Congénital isolé en *E23.0*
- - - Isolé tardif en *E23.0*
- - Hypersécrétion hypophysaire d' *E24.0*
- - Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- - Syndrome
- - - Cushingoïde de sécrétion ectopique d' *E24.3*
- - - Sécrétion ectopique d' *E24.3*

Actif
v./v.a. Type de maladie

Actine ¬ Myopathie avec surcharge en *G71.2*

Actinique
- Superficielle disséminée ¬ Porokératose *Q82.8*
- ¬
- - Granulome *L57.5*
- - Kératose *L57.0*
- - Lichen plan *L43.3*
- - Otite aiguë externe: *H60.5*
- - Prurigo *L56.4*

Actinobacillus
- Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, *B96.3!*
- ¬ Bactériémie à *A49.83*

Actinomyces israelii ¬ Infection à *A42.9*

Actinomycètes
- Thermophiles ¬ Alvéolite allergique due à des *J67.70*
- ¬ Mycétome à *B47.1*

Actinomycétome ¬ *B47.1*

Actinomycose
- Abdominale ¬ *A42.1*
- Cervico-faciale ¬ *A42.2*
- Cutanée ¬ *A42.8*
- Gastro-intestinale ¬ *A42.1*
- Pneumonie ¬ *A42.0†, J17.0**
- Pulmonaire ¬ *A42.0*
- ¬
- - *A42.9*
- - Canaliculite au cours d' *A42.8†, H06.0**
- - Encéphalite au cours d' *A42.8†, G05.0**
- - Formes d' *A42.8*
- - Méningite au cours d' *A42.8†, G01**
- - Méningo-encéphalomyélite au cours d' *A42.8†, G05.0**

Actinomycosique ¬
- Infection *A42.9*
- Nodule *A42.9*
- Septicémie *A42.7*

Actinoréticulose ¬ *L57.1*

Action
- Centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d' *T44.8*
- Insuffisance rénale ¬ Syndrome de myoclonus d' *G40.3*
- Similaire ¬ Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d' *T46.0*

Activateur du plasminogène ¬ Déficit congénital en inhibiteur 1 de l' *D68.8*

Activation
- Macrophages associé à NLRC4 ¬ Syndrome d' *M35.8*
- Macrophagique ¬ Syndrome d' *D76.1*
- Mastocytaire monoclonal ¬ Syndrome d' *D89.8*
- Phosphoinositide 3 kinase delta type
- - 1 ¬ APDS [Syndrome d' *D81.8*
- - 2 ¬ APDS [Syndrome d' *D81.8*

Activée [mutation du facteur V Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C *D68.5*

Activité
- Accrue de la phosphoribosylpyrophosphatase synthétase ¬ *E79.8*
- Anti-MAG ¬ Polyneuropathie associée à une gammopathie monoclonale IgM ayant une *D47.2†, G63.1**
- Attention ¬ Perturbation de l' *F90.0*
- Cérébrale du nouveau-né ¬ Baisse de l' *P91.4*
- Continue familiale de la fibre musculaire ¬ *G71.1*
- Électrique sans pouls, non classée ailleurs ¬ *R00.3*
- Incapacité ¬ Limites imposées aux *Z73*
- Inflammatoire
- - Faible réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, AgHBe négatif, sans *B18.13*
- - Forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta AgHBe
- - - Négatif, avec *B18.14*
- - - Positif
- - - - *B18.12*
- - - - Sans *B18.11*
- Maltase acide normale ¬ Glycogénose lysosomale à *E74.0*
- Répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- Sexuelle excessive ¬ *F52.7*
- Vie quotidienne NCA ¬ Thérapie concernant les *Z50.8!*

Acute Kidney Injury] ¬ AKI [*N17.99*

Acute respiratory distress syndrome
- Adolescent ¬ ARDS [*J80.09*
- Enfant ¬ ARDS [*J80.09*
- Léger
- - Adolescent ¬ ARDS [*J80.04*
- - Adulte ¬ ARDS [*J80.01*
- - Enfant ¬ ARDS [*J80.04*
- Modéré
- - Adolescent ¬ ARDS [*J80.05*
- - Adulte ¬ ARDS [*J80.02*
- - Enfant ¬ ARDS [*J80.05*
- Sévère
- - Adolescent ¬ ARDS [*J80.06*
- - Adulte ¬ ARDS [*J80.03*
- - Enfant ¬ ARDS [*J80.06*
- ¬
- - *J80.09*
- - ARDS [*J80.09*

Acyanopsie ¬ *H53.5*

Acylcarnitine
v./v.a. carnitine-acylcarnitine

Acyl-CoA
- Oxydase ¬ Déficit en *E71.3*
- Réductase 1 ¬ Déficit en *E71.3*

Acyl-CoA-déshydrogénase
- 9 ¬ Déficit en *E71.3*
- Acide gras chaîne
- - Courte ¬ Déficit en *E71.3*
- - Longue ¬ Déficit en *E71.3*
- - Moyenne ¬ Déficit en *E71.3*
- - ¬ Déficit
- - Multiple en *E71.3*
- - Néonatal transitoire multiple en *P72.8*

Acyltransférase
v./v.a. lécithine-cholestérol-acyltransférase

ADA] ¬ Déficit en adénosine désaminase [*D81.3*

ADA2 ¬ Vascularite par déficit en *M30.8*

Adactylie
- Unilatérale de la main ¬ *Q71.3*
- ¬ Syndrome d'aglossie- *Q87.0*

Adamantinome
- Maxillaire
- - Inférieur ¬ *D16.5*
- - Supérieur ¬ *D16.42*
- Os longs
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C40.2*
- - - Supérieurs ¬ *C40.0*
- - ¬ *C40.9*
- Tibia ¬ *C40.2*
- ¬ *D16.5*

Adams
v./v.a. Bickers-Adams
- Stokes ¬ Maladie d' *I45.9*

Adams-Oliver ¬ Syndrome d' *Q87.2*

ADANE [Encéphalopathie nécrosante aiguë familiale] ¬ *G93.4*

Adaptation
- Éducative ¬ Mauvaise *Z55*
- Manipulation
- - Accès vasculaire, non précisé ¬ *Z45.29*
- - Appareils médicaux implantés ¬ *Z45.88*
- - Défibrillateur cardiaque implanté ¬ *Z45.01*
- - Dispositifs cardiaques (électroniques) ¬ *Z45.08*
- - Extenseur
- - - Bronchique ¬ *Z45.84*
- - - Trachéal ¬ *Z45.85*
- - Neurostimulateur ¬ *Z45.80*
- - Stimulateur
- - - Cardiaque implanté ¬ *Z45.00*
- - - Diaphragmatique ¬ *Z45.81*
- - Système
- - - Assistance cardiaque ¬ *Z45.02*
- - - Cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement ¬ *Z45.20*
- Pompe
- - Extracorporelle ¬ *Z45.02*
- - Intracorporelle ¬ *Z45.02*
- - Paracorporelle ¬ *Z45.02*

Adaptation *–suite*
- Travail ¬ Mauvaise *Z56*
- ¬
- - Réaction dépressive
- - - Courte durée au cours d'un trouble de l' *F43.2*
- - - Prolongée au cours d'un trouble de l' *F43.2*
- - Troubles de l' *F43.2*

Adapté ¬ Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge *Z75.8*

ADAR ¬ Paraplégie spastique héréditaire associée à *G11.4*

Addison
- Auto-immune ¬ Maladie d' *E27.1*
- Tuberculeuse ¬ Maladie d' *A18.7†, E35.1**
- ¬
- - Anémie (de): *D51.0*
- - Chéloïde d' *L94.0*
- - Complexe de Schilder- *E71.3*
- - Maladie d' *E27.1*
- - Mélanose d' *E27.1*
- - Myopathie au cours de maladie d' *E27.1†, G73.5**
- - Syndrome d'hypoparathyroïdie auto-immune-candidose chronique-maladie d' *E31.0*

Addisonienne ¬ Crise *E27.2*

Addison-Schilder ¬
- Adrénoleucodystrophie [*E71.3*
- Maladie d' *E71.3*

Adducteurs de la cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S76.2*

Adduction-arthrogrypose type
- Christian ¬ Syndrome des pouces en *Q87.0*
- Dundar ¬ Syndrome des pouces en *Q79.6*

Adduction-spasticité-hydrocéphalie] ¬ Syndrome CRASH [hypoplasie du corps calleux-retard mental-pouces en *Q04.8*

Adénite
- Chronique, de tout ganglion autre que mésentérique ¬ *I88.1*
- Gonorrhéique ¬ *A54.8*
- Tuberculeuse ¬ *A18.2*

Adéno
- Cutanéo-muqueux [Maladie de Kawasaki] ¬ Syndrome *M30.3*
- Splénomégalie et leucopénie ¬ Arthrite rhumatoïde avec *M05.00*

Adénocarcinome
- Acidophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Apocrine
- - Corps glandulaire central du sein ¬ *C50.1*
- - Mamelon ¬ *C50.0*
- - Prolongement axillaire du sein ¬ *C50.6*
- - Quadrant
- - - Inféro-externe du sein ¬ *C50.5*
- - - Inféro-interne du sein ¬ *C50.3*

Adénocarcinome *–suite*
- Apocrine *–suite*
- - Quadrant *–suite*
- - - Supéro-externe du sein ¬ *C50.4*
- - - Supéro-interne du sein ¬ *C50.2*
- - Sein
- - - Localisations contiguës ¬ *C50.8*
- - - ¬ *C50.9*
- Basophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Canal anal ¬ *C21.1*
- Cellule claire
- - Endomètre ¬ *C54.1*
- - Ovaire ¬ *C56*
- Chromophobe de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Clitoris ¬ *C51.2*
- Col de l'utérus
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C53.8*
- - ¬ *C53.9*
- Cordon spermatique ¬ *C63.1*
- Corps de la verge ¬ *C60.2*
- Cortex de la surrénale ¬ *C74.0*
- Diffus de l'estomac ¬ *C16.9*
- Diverticule de Meckel ¬ *C17.3*
- Duodénum ¬ *C17.0*
- Endocol ¬ *C53.0*
- Endométrioïde de l'ovaire ¬ *C56*
- Éosinophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Épididyme ¬ *C63.0*
- Estomac ¬ *C16.9*
- Exocol ¬ *C53.1*
- Fœtal bien différencié lobe
- - Moyen du poumon ¬ *C34.2*
- - Pulmonaire inférieur ¬ *C34.3*
- - Supérieur du poumon ¬ *C34.1*
- Foie et des voies biliaires intrahépatiques ¬ *C22.0, C22.1*
- Gastrique
- - Diffus héréditaire ¬ *C16.9*
- - Polypose proximale de l'estomac] ¬ GAPPS [*C16.9*
- Gland ¬ *C60.1*
- Grandes lèvres ¬ *C51.0*
- Hypophysaire à cellules mucoïdes ¬ *C75.1*
- Iléon ¬ *C17.2*
- Intestin grêle ¬ *C17.9*
- Jéjunum ¬ *C17.1*
- Jonction
- - Duodéno-jéjunale ¬ *C17.8*
- - Œsophago-gastrique ¬ *C16.0*
- Mucineux
- - Appendice ¬ *C18.1*
- - Ovaire ¬ *C56*
- Œsophage
- - Abdominal ¬ *C15.2*
- - ¬ *C15.9*
- Ovaire ¬ *C56*

Adénocarcinome *–suite*
- Papillaire
- - Kystique de l'ovaire ¬ *C56*
- - Ovaire ¬ *C56*
- Paratesticulaire
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C63.8*
- - ¬ *C63.9*
- Parathyroïdien à cellules eau de roche ¬ *C75.0*
- Petites lèvres ¬ *C51.1*
- Portion vaginale du col de l'utérus ¬ *C53.1*
- Prépuce ¬ *C60.0*
- Pseudo-mucineux de l'ovaire ¬ *C56*
- Pulmonaire bien différencié type fœtal
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C34.8*
- - ¬ *C34.9*
- Scrotum ¬ *C63.2*
- Siège primitif inconnu ¬ *C80.0*
- Tiers inférieur de l'œsophage ¬ *C15.5*
- Tubulaire
- - Corps glandulaire central du sein ¬ *C50.1*
- - Mamelon ¬ *C50.0*
- - Prolongement axillaire du sein ¬ *C50.6*
- - Quadrant
- - - Inféro-externe du sein ¬ *C50.5*
- - - Inféro-interne du sein ¬ *C50.3*
- - - Supéro-externe du sein ¬ *C50.4*
- - - Supéro-interne du sein ¬ *C50.2*
- - Sein
- - - Localisations contiguës ¬ *C50.8*
- - - ¬ *C50.9*
- Vagin ¬ *C52*
- Verge
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C60.8*
- - ¬ *C60.9*
- Vésicule
- - Biliaire
- - - Voies biliaires extrahépatiques ¬ *C23, C24.0*
- - - ¬ *C23*
- - Séminale ¬ *C63.7*
- Voie biliaire extra-hépatique ¬ *C24.0*
- Vulve
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C51.8*
- - ¬ *C51.9*

Adénofibrome
- Géant
- - Sein ¬ *D24*
- - ¬ *D24*
- Métanéphrique ¬ *D30.0*

Adénofibrose du sein ¬ *N60.2*

Adénohypophysaires] ¬ Hormones antéhypophysaires [*T38.8*

Adénohypophysite ¬ *E23.6*

Adénoïde
v./v.a. Carcinome adénoïde

Adénoïde *–suite*
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Tuberculose du tissu *A15.8*
- Jonction cervico-vaginale ¬ Carcinome basocellulaire *C53.8*
- Kystique de Brooke ¬ Épithéliome *D23.9*
- Mâchoire supérieure ¬ Améloblastome *D16.42*
- Mandibule ¬ Améloblastome *D16.5*
- SAI ¬ Maladie (chronique) des amygdales et des végétations *J35.9*
- Sans précision ¬ Maladie chronique des amygdales et des végétations *J35.9*
- ¬
- - Carcinome des végétations *C11.1*
- - Hyperplasie des végétations *J35.2*
- - Hypertrophie
- - - Amygdales et des végétations *J35.3*
- - - Végétations *J35.2*
- - Maladies chroniques des amygdales et des végétations *J35.8*
- - Tissu *C11.1*
- - Tuberculose du tissu *A16.8*

Adénoïdienne) ¬ Cicatrice amygdalienne (et *J35.8*

Adénomateux
- Associée
- - AXIN2 ¬ Polypose *D12.6*
- - MSH3 ¬ Polypose *D12.6*
- - NTHL1 ¬ Polypose *D12.6*
- Endomètre ¬ Hyperplasie *N85.1*
- Familiale
- - Atténué
- - - Associée
- - - - MSH3 ¬ Polypose *D12.6*
- - - - NTHL1 ¬ Polypose *D12.6*
- - - Liée
- - - - APC ¬ Polypose *D12.6*
- - - - MUTYH ¬ Polypose *D12.6*
- - - ¬ PAFA [Polypose *D12.6*
- - Liée au gène MUTYH ¬ PAF [polypose *D12.6*
- - ¬ PAF [Polypose *D12.6*
- Prostate ¬ Hyperplasie *N40*
- ¬
- - Hyperplasie atypique de l'endomètre (*N85.1*
- - Polype *D28*

Adénomatoïde
- Kystique du poumon] ¬ CCAM [Malformation *Q33.0*
- Péritoine ¬ Tumeur *D19.1*
- Plèvre ¬ Tumeur *D19.0*

Adénomatose
- Côlon ¬ *D12.6*
- Endocrinien
- - Multiple ¬ *D44.8*
- - Multiples ¬ *D44.8*

Adénomatose *–suite*
- Hépatique ¬ *D13.4*
- Pluriendocrinienne ¬ *D44.8*

Adénome
v./v.a. Chorio-adénome
- Adrénocortical ¬ *D35.0*
- Alvéoles pulmonaires ¬ *D14.3*
- Bronchique ¬ Carcinoïde de type *C34.9*
- Canal de Wolff chez la femme ¬ *D28.7*
- Cellules principales de la parathyroïde ¬ *D35.1*
- Cortex surrénalien produisant du cortisol ¬ Syndrome de Cushing dû à un *D35.0, E24.8*
- Corticotrope hypophysaire ¬ *D35.2*
- Gonadotrope fonctionnel ¬ *D35.2*
- Hépatique ¬ *D13.4*
- Hépatocellulaire télangiectasique ¬ *D13.4*
- Hypophysaire
- - Cellules mucoïdes ¬ *D35.2*
- - Non
- - - Fonctionnel] ¬ NFPA [*D35.2*
- - - Immunoréactif ¬ *D35.2*
- - PRL ¬ *D35.2*
- - Prolactine ¬ *D35.2*
- - ¬ *D35.2*
- Lactotrope hypophysaire ¬ *D35.2*
- Métanéphrique ¬ *D30.0*
- Microkystique ¬ *D13.6*
- Oncocytaire au cours de syndrome de Birt-Hogg-Dubé ¬ *D36.9, Q85.8*
- Pancréas ¬ *D13.6*
- Pancréatique
- - Microkystique ¬ *D13.6*
- - Sécrétant de la gastrine ¬ *D13.6*
- Parathyroïdien
- - Cellules eau de roche ¬ *D35.1*
- - Familial ¬ *D35.1*
- Para-urétral ¬ *D36.7*
- Pituitaire isolé familial ¬ *D35.2*
- Pléomorphe de la glande parotide ¬ *D11.0*
- Sigmoïde ¬ *D12.5*
- Surrénalien (bilatéral) ¬ Hyperaldostéronisme primaire dû à un *E26.0*
- Thyréotrope ¬ *D35.2*

Adénomyose ¬ *N80.0*

Adénopathie
v./v.a. Sialo-adénopathie
- Généralisées ¬ *R59.1*
- Localisées ¬ *R59.0*
- Massive] ¬ SHML [Histiocytose sinusale avec *D76.3*
- Sans précision ¬ *R59.9*
- Tuberculeuse périphérique ¬ *A18.2*
- ¬
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, R59.9*
- - Syndrome PFAPA [fièvre périodique-stomatite aphteuse-pharyngite- *M35.8*

Adénosarcome
- Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Embryonnaire du rein [tumeur de Wilms] ¬ *C64*
- Endocol ¬ *C53.0*
- Exocol ¬ *C53.1*
- Jonction cervico-vaginale ¬ *C53.8*
- Wilms ¬ *C64*

Adénosine
- Désaminase
- - ADA] ¬ Déficit en *D81.3*
- - ¬
- - - Anémie hémolytique due à une surproduction d' *D55.3*
- - - Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en *D81.3*
- Diphosphate] ¬ Trouble de la coagulation dû à une anomalie du récepteur plaquettaire P2Y12 de l'ADP [*D69.1*
- Monophosphate désaminase ¬ Déficit en *E79.8*
- Phosphoribosyltransférase ¬ Déficit en *E79.8*

Adénosine-kinase ¬ Hyperméthioninémie provoquée par un déficit en *E72.1*

Adénosylhomocystéine
v./v.a. S-adénosylhomocystéine

Adénosyltransférase ¬
- Déficit en méthionine *E72.1*
- Démyélinisation du cerveau par déficit en méthionine *E72.1*

Adénovirale
- Siège non précisé ¬ Infection *B34.0*
- ¬ Pneumonie *J12.0*

Adénovirus
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.0!*
- Patient ayant subi une greffe de cellules-souches hématopoïétiques avec une immunosuppression actuelle ¬ Infection à *B34.0, Z94.81*
- ¬
- - Conjonctivite
- - - *B30.1†, H13.1**
- - - Folliculaire aiguë à *B30.1†, H13.1**
- - Encéphalite à *A85.1†, G05.1**
- - Encéphalomyélite à *A85.1†, G05.1**
- - Entérite à *A08.2*
- - Kératite à *B30.0†, H19.2**
- - Kératoconjonctivite à *B30.0†, H19.2**
- - Méningite à *A87.1†, G02.0**
- - Méningo-encéphalite à *A85.1†, G05.1**
- - Myélite à *A85.1†, G05.1**

Adénylate kinase ¬ Anémie hémolytique par déficit en *D55.3*

Adénylosuccinase ¬ Déficit en *E79.8*

Adénylosuccinate lyase ¬ Déficit en *E79.8*

Adermatoglyphie congénitale isolée ¬ *Q82.8*

Adhaerens
- Saignement ¬ Placenta *O43.20, O72.0*
- Sans saignement ¬ Placenta *O43.20, O73.0*
- ¬ Placenta *O43.20*

Adhérence
- Appendice vermiculaire ¬ *K66.0*
- Brides congénitales
- - Épiploïques anormales ¬ *Q43.3*
- - Péritonéales ¬ *Q43.3*
- Canal biliaire ¬ *K83.8*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Col de l'utérus ¬ *N88.1*
- Congénitale
- - Langue ¬ *Q38.3*
- - Méninges spinales ¬ *Q06.8*
- Diaphragmatiques ¬ *K66.0*
- Due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire ¬ *T81.5*
- Endocardiques ¬ *I38*
- Épiploïques ¬ *K66.0*
- Focale post-infectieuse du péricarde ¬ *I31.88*
- Gastriques ¬ *K66.0*
- Intestin [brides] avec occlusion ¬ *K56.5*
- Intestinales ¬ *K66.0*
- Intra-utérines ¬ *N85.6*
- Méningées (cérébrales) (rachidiennes) ¬ *G96.1*
- Mésentériques ¬ *K66.0*
- Paroi abdominale ¬ *K66.0*
- Paroi extérieure de l'utérus ¬ *N73.6*
- Pelvi péritonéal
- - Actes médicaux ¬ *N99.4*
- - Femme ¬ *N73.6*
- Pelviennes, chez l'homme ¬ *K66.0*
- Péricarde
- - Rhumatismale ¬ *I09.2*
- - ¬ *I31.0*
- Péricardique focale ¬ *I31.88*
- Péritonéal
- - Brides), avec occlusion intestinale ¬ *K56.5*
- - ¬ *K66.0*
- Perturbations de l'iris et du corps ciliaire ¬ Autres *H21.5*
- Placenta
- - Tant que complication de l'accouchement sans saignement ¬ *O43.20, O73.0*
- - ¬ Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l' *O72.0*
- Pleural ¬
- - *A16.5*
- - *J94.8*
- Tuberculeuse
- - Bassin ¬ *A18.1†, N74.1**
- - Péricarde ¬ *A18.8†, I32.0**
- Vagin ¬ *N89.5*

Adhérence *–suite*
- Vaginales postopératoires ¬ *N99.2*
- Vulve ¬ *N90.8*
- ¬
- - Brides d' *K66.0*
- - Strabisme dû à des *H50.6*

Adhérent
- Peau) ¬ Cicatrice: *L90.5*
- ¬
- - Leucome *H17.0*
- - Prépuce: *N47*

Adhésif
- Arachnoïde ¬ Syphilis *A52.1†, G01**
- Chronique ¬ Péricardite *I31.0*
- Méninges ¬ Neurosyphilis *A52.1†, G01**
- Oreille moyenne ¬ Maladie *H74.1*
- Syphilitique ¬ Arachnoïdite *A52.1†, G01**
- ¬
- - Arachnoïdite *G03.9*
- - Dermite allergique de contact due aux *L23.1*
- - Médiastino-péricardite *I31.0*
- - Otite *H74.1*

Adhésion
- Leucocytaire
- - Déficit en protéine RAC2 ¬ Maladie infantile de type DAL [déficit d' *D71*
- - Type
- - - I ¬ Déficit d' *D84.8*
- - - III ¬ Déficit d' *D84.8*
- - ¬ Déficit d' *D84.8*
- Leucocytes type II ¬ Déficit d' *D84.8*
- Tuberculeuse des méninges ¬ *A17.0†, G01**

Adiaspiromycose ¬ *B48.88*

Adie
v./v.a. Holmes-Adie

Adipeux
v./v.a. Tissu adipeux
- Segmentaire) du sein ¬ Nécrose *N64.1*
- ¬ Bourrelet *E65*

Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.6*

Adipose douloureuse ¬ *E88.29*

Adipositas
- Gigantea ¬ *E66.88*
- Permagna
- - Indice de masse corporelle IMC
- - - 40 et moins de 50 ¬ *E66.86*
- - - 50 et moins de 60 ¬ *E66.87*
- - - 60 et plus ¬ *E66.88*
- - ¬ *E66.89*

Adiposité localisée ¬ *E65*

Adiposo-génitale ¬ Dystrophie *E23.6*

Adiurétine ¬ Hyposécrétion d' *E23.2*

Adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents *K07.3*

ADLD [Leucodystrophie autosomique dominante de l'adulte] ¬ *E75.2*

Administration
- Accidentelle ou prise erronée d'un médicament ¬ *X49.9!*
- Anesthésique général local analgésique sédatif cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l' *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l' *O89*
- Chloramphénicol au nouveau-né ¬ Syndrome gris dû à l' *P93*
- Immunoglobuline ¬ *Z29.1*
- Locale prophylactique d'antibiotiques ¬ *Z29.20*
- Médicaments ¬ détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l' *O68*

ADN
- Mitochondrial
- - Adulte par déficit en DGUOK ¬ Syndrome de délétions multiples de l' *G71.3*
- - Associée à DNA2 ¬ Syndrome de délétion de l' *G71.3*
- - Forme
- - - Encéphalomyopathique
- - - - Acidurie méthylmalonique ¬ Syndrome de déplétion de l' *G31.81, E71.1*
- - - - Anomalies cranio-faciales variables ¬ Syndrome de déplétion de l' *G31.81, Q75.9*
- - - - Tubulopathie rénale ¬ Déplétion de l' *G31.81†, N16.8**
- - - Hépatocérébrale par déficit en DGUOK ¬ Déplétion de l' *G31.81*
- - - Hépato-cérébro-rénale ¬ Déplétion de l' *G31.81*
- - - Myopathique ¬ Déplétion de l' *G71.3*
- - ¬
- - - Cardiomyopathie
- - - - Hypertrophique et tubulopathie dues à une mutation de l' *I42.2*
- - - - Surdité dues à une mutation de l' *G31.81*
- - - Insuffisance hépatique infantile aiguë par défaut de synthèse des protéines codées par l' *K72.0*
- - - Tubulopathie rénale Gitelman-like due à une mutation de l' *N15.8*
- ¬ Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l' *G11.3*

ADNFLE [Épilepsie frontale à crises nocturnes autosomique dominante] ¬ *G40.1*

ADNP ¬ Syndrome *Q87.8*

Adolescence
- SAI ¬ Réaction hyperkinétique de l'enfance ou de l' *F90.9*
- Sans précision ¬ Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l' *F98.9*
- ¬
- - Épilepsie (avec): absences de l' *G40.3*

Adolescence *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Evitement de l'enfance et de l' *F93.2*
- - Trouble de l'attention sans hyperactivité survenant dans l'enfance et l' *F98.80*
- - Troubles
- - - Dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance et l' *F44.82*
- - - Précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l' *F98.88*

Adolescent
- 3 18 ¬ Obésité
- - Déficit
- - - CEP19 chez l'enfant et l' *E66.84*
- - - Congénital en leptine chez l'enfant et l' *E66.84*
- - - Prohormone convertase I chez l'enfant et l' *E66.84*
- - - Pro-opiomélanocortine chez l'enfant et l' *E66.84*
- - - Récepteur de la mélanocortine 4 chez l'enfant et l' *E66.84*
- - - SIM1 chez l'enfant et l' *E66.84*
- - Due à une résistance congénitale à la leptine chez l'enfant et l' *E66.84*
- - Extrême
- - - Déficit
- - - - CEP19 chez l'enfant et l' *E66.85*
- - - - Congénital en leptine chez l'enfant et l' *E66.85*
- - - - Prohormone convertase 1 chez l'enfant et l' *E66.85*
- - - - Pro-opiomélanocortine chez l'enfant et l' *E66.85*
- - - - Récepteur de la mélanocortine 4 chez l'enfant et l' *E66.85*
- - - - SIM1 chez l'enfant et l' *E66.85*
- - - Due à une résistance congénitale à la leptine chez l'enfant et l' *E66.85*
- - - Mutations du gène récepteur à la leptine chez l'enfant et l' *E66.85*
- - Mutations du gène récepteur de la leptine chez l'enfant et l' *E66.84*
- Adulte [SDRA] ¬ Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant, de l' *J80.0*
- Cours de croissance ¬ Examen de l' *Z00.3*
- Temporellement associé au COVID-19 ¬ Choc cytokinique chez l'enfant et l' *U10.90*
- Type non transsexuel ¬ Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l' *F64.1*
- ¬
- - Apophysite tibiale chez l' *M92.5*
- - ARDS Acute respiratory distress syndrome
- - - *J80.09*
- - - Léger de l' *J80.04*
- - - Modéré de l' *J80.05*
- - - Sévère de l' *J80.06*
- - Diabète insulino-dépendant non primaire chez l' *E11*
- - Épilepsie focale bénigne de l' *G40.1*

Adolescent *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie des membranes hyalines de l' *J80.09*
- - Obésité
- - - Due à un excès calorique chez l'enfant et l' *E66.04*
- - - Endogène chez l'enfant et l' *E66.84*
- - - Enfant et l' *E66.94*
- - - Extrême
- - - - Due à un excès calorique chez l'enfant et l' *E66.05*
- - - - Hypoventilation alvéolaire chez l'enfant et l' *E66.25*
- - - Hypoventilation alvéolaire chez l'enfant et l' *E66.24*
- - - Médicamenteux
- - - - Enfant et l' *E66.14*
- - - - Extrême chez l'enfant et l' *E66.15*
- - Scoliose de l' *M41.1*
- - Syndrome détresse respiratoire aiguë
- - - *J80.09*
- - - Léger de l' *J80.04*
- - - Modéré de l' *J80.05*
- - - Sévère de l' *J80.06*

Adoption ¬ Examen en vue de: *Z02*

Adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: attente d'une famille *Z76.2*

ADP [adénosine diphosphate] ¬ Trouble de la coagulation dû à une anomalie du récepteur plaquettaire P2Y12 de l' *D69.1*

ADPKD [Polykystose rénale autosomique dominante] ¬ *Q61.2*

Adrénalite
- Auto-immune ¬ *E27.1*
- Cryptocoques ¬ *B45.8*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, E35.1**
- Hémorragique à méningocoques ¬ *A39.1†, E35.1**

Adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents bloquants neuronaux *T44.8*

Adrénocortical
- Nodulaire pigmentée primaire ¬ Maladie *E24.8*
- ¬
- - Adénome *D35.0*
- - Carcinome *C74.0*
- - Syndrome *E27.0*

Adrénocorticotrope
- Extra-hypophysaire ¬ Syndrome d'ACTH [hormone *E24.3*
- ¬
- - Hypersécrétion hypophysaire d'ACTH [hormone *E24.0*
- - Syndrome de Cushing dû à la production ectopique d'ACTH [hormone *E24.3*

Adrénogénital
- Congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision ¬ Anomalie *E25.09*
- Congénitales liées à un déficit enzymatique ¬ Autres anomalies *E25.08*
- Perte de sel ¬ Syndrome *E25.0*

Adrénoleucodystrophie
- Addison-Schilder] ¬ *E71.3*
- Liée X
- - Forme cérébrale ¬ *E71.3*
- - ¬ X-ALD [*E71.3*
- Néonatale ¬
- - NALD [*E71.3*
- - Pseudo-ALDN [*E71.3*
- ¬ *E71.3*

Adrénomyéloneuropathie ¬ *E71.3*

Adrénomyodystrophie ¬ *E27.1*

Adriblastine ¬ Lésion par *T88.7*

ADULT ¬ Syndrome *Q87.8*

Adulte
v./v.a. Type de maladie

Adult-onset still disease] ¬ AOSD [*M06.10*

Adynamie
- Épisodique héréditaire ¬ *G72.3*
- ¬ *R53.9*

Aegyptius ¬ Infection généralisée à Haemophilus *A48.4*

Aérien
v./v.a. Voie aérienne
- ¬ Accident de transport *V99!*

Aerobacter aerogenes ¬ Entérite infectieuse à *A04.8, B96.2!*

Aérobie
- Gram négatif SAI ¬ Pneumonie due à: des bactéries (*J15.6*
- Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes *B95.90!*

Aerogene
- Capsulatus ¬ Gangrène à Bacillus *A48.0*
- ¬ Entérite infectieuse
- - Aerobacter *A04.8, B96.2!*
- - Enterobacter *A04.8, B96.2!*

Aérophagie ¬ Formes psychogènes de: *F45.3*

Aérosols ¬ Pulseurs pour *T59*

Aeruginosa
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Pseudomonas *U81.10!*
- - 3MRGN ¬ Pseudomonas *U81.30!*
- - 4MRGN ¬ Pseudomonas *U81.50!*
- ¬
- - Bactériémie à Pseudomonas *A49.85*
- - Infection à Pseudomonas *A49.85*
- - Otite externe à Pseudomonas *H60.2, B96.5!*
- - Pneumonie due à une infection à Pseudomonas *J15.1*

Aeruginosa *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pseudomonas *B96.5!*

Affaissé
- Acquis ¬ Pied *M21.63*
- Perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou *L98.7*
- SAI ¬ Peau flasque ou *L98.7*
- Valgus acquis ¬ Pied *M21.63*

Affaissement de la peau du visage après une perte de poids ¬ *L98.7*

Affectant
- Cou et le dos ¬ Panniculite *M54.0*
- Fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) ¬ Diabète sucré de la mère (préexistant), *P70.1*
- Fois les canaux biliaires intra- et extra-hépatiques ¬ Tumeur maligne *C24.8*
- Fonction palpébrale ¬ Autres troubles *H02.5*
- Plusieurs organes ¬ Tuberculose *A18.8*
- Principalement
- - Lobe frontal] ¬ AIEF [encéphalopathie infantile aiguë *G40.2*
- - Système nerveux central cours
- - - Maladies classées ailleurs ¬ Affections dégénératives systémiques *G13.8**
- - - Maladies tumorales ¬ Autres affections dégénératives systémiques *G13.1**
- Vésicule biliaire ¬ Typhus *A01.0*

Affectif
- Bipolaire
- - Actuellement en rémission ¬ Trouble *F31.7*
- - Épisode actuel
- - - Dépression
- - - - Légère ou moyenne ¬ Trouble *F31.3*
- - - - Sévère
- - - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.4*
- - - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.5*
- - - Hypomaniaque ¬ Trouble *F31.0*
- - - Maniaque
- - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.1*
- - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.2*
- - - Mixte ¬ Trouble *F31.6*
- - Sans précision ¬ Trouble *F31.9*
- - ¬ Autres troubles *F31.8*
- Forme de négligence d'un enfant ¬ Négligence *Z62*
- Isolés ¬ Autres troubles de l'humeur [*F38.0*
- Lors de démence ¬ Symptômes *U63.1!*
- Mixte
- - Isolé ¬ Episode *F38.0*
- - ¬ Psychose schizophrénique et *F25.2*
- Organique de l'hémisphère droit ¬ Trouble *F07.8*

Affectif *–suite*
- Pendant l'enfance ¬ Perte de relation *Z61*
- Persistant, sans précision ¬ Trouble de l'humeur [*F34.9*
- Persistants ¬ Autres troubles de l'humeur [*F34.8*
- Précisés ¬ Autres troubles de l'humeur [*F38.8*
- Récurrents ¬ Autres troubles de l'humeur [*F38.1*
- SAI ¬ Psychose *F39*
- Sans précision ¬ Trouble de l'humeur [*F39*
- ¬
- - Épilepsie partielle bénigne à symptômes *G40.02*
- - Personnalité: *F34.0*
- - Psychopathie de privation *F94.2*
- - Psychose schizophrénique de type *F25.9*
- - Troubles organiques de l'humeur [*F06.3*

Afférente chirurgicale ¬ Vessie neurogène: après dénervation *N31.2*

Afib ¬ Amylose *E85.0†, N08.4**

Afibrinogénémie
- Acquise ¬ *D65.00*
- Familiale ¬ *D68.20*
- Post-partum ¬ *O72.3*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.1*
- ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- - Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*

Aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments ¬ Effet toxique de l' *T64*

Africain
- Est répandue ¬ Trypanosomiase SAI, en des lieux où la trypanosomiase *B56.9*
- ¬
- - Démence au cours de trypanosomiase *B56.9†, F02.8**
- - Hémochromatose *E83.1*
- - Trypanosomiase *B56.9*

Agalactie
- Primaire ¬ *O92.3*
- Secondaire ¬ *O92.5*
- Thérapeutique ¬ *O92.5*
- ¬ *O92.3*

Agammaglobulinémie
- Autosomique récessive (type suisse) ¬ *D80.0*
- Commune variable ¬ *D80.1*
- Isolée ¬ *D80.0*
- Liée
- - Chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance) ¬ *D80.0*
- - X ¬ *D80.0*

Agammaglobulinémie *–suite*
- Lymphocytes B porteurs d'immunoglobulines ¬ *D80.1*
- Microcéphalie-cranioténose-dermatite sévère ¬ Syndrome d' *D80.0*
- Syndromique déficit protéine
- - FNIP1 ¬ *D80.0*
- - ZIP7 ¬ *D80.0*
- Type
- - Bruton ¬ *D80.0*
- - Suisse ¬ *D80.0*
- ¬ *D80.1*

Aganglionique ¬ Mégacôlon *Q43.1*

Aganglionose
- Intestinale
- - Congénitale ¬ *Q43.1*
- - Totale ¬ *Q43.1*
- Rectum
- - Sigmoïde
- - - Côlon descendant
- - - - Côlon transverse ¬ *Q43.1*
- - - - ¬ *Q43.1*
- - - ¬ *Q43.1*
- - ¬ *Q43.1*
- ¬ *Q43.1*

AGAT ¬ Déficit en *E72.8*

Âge
- Humide ¬ Dégénérescence de la macula liée à l' *H35.30*
- Néovasculaire ¬ Dégénérescence de la macula liée à l' *H35.30*
- Osseux
- - Avancé-arthrose précoce ¬ Syndrome de petite taille- *Q79.8*
- - Déficit du métabolisme de l'hormone thyroïdienne ¬ Petite taille-retard d' *E03.1*
- Sèche ¬ Dégénérescence maculaire liée à l' *H35.31*
- ¬
- - Mort subite
- - - Inexpliquée mort subite nourrisson
- - - - *R96.0*
- - - - Avant l' *R95*
- - - Nourrisson
- - - - *R96.0*
- - - - Avant l' *R95.9*
- - SIDS [Sudden infant death syndrome], après l' *R96.0*
- - Sudden infant death syndrome, avant l' *R95.9*

Âge gestationnel
- Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du fœtus [trop grand pour l' *O36.6*
- ¬
- - Enfant
- - - Gros pour l' *P08.1*
- - - Né après terme, qui n'est pas gros pour l' *P08.2*

Âge gestationnel *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Faible poids pour l' *P05.0*
- - Léger pour l' *P05.0*
- - Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l' *P05.2*
- - Petit
- - - *P05.1*
- - - Léger pour l' *P05.1*
- - Petite taille pour l' *P05.1*
- - Soin maternels cause connue présumée fœtus
- - - Léger pour l' *O36.5*
- - - Petit pour l' *O36.5*

Âgées ¬ Lymphome B diffus à grandes cellules positif au virus Epstein-Barr [EBV] chez les personnes *C83.3*

Agénésie
- Anus
- - Fistule ¬ *Q42.2*
- - ¬ *Q42.3*
- Aplasie
- - Hypoplasie du pancréas ¬ *Q45.0*
- - Utérus ¬ *Q51.0*
- Appareil lacrymal ¬ Absence et *Q10.4*
- Artère pulmonaire ¬ *Q25.7*
- Bronches ¬ *Q32.4*
- Canal anal ¬ *Q42.3*
- Carotide interne ¬ *Q28.18*
- Cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Cérébelleuse ¬ *Q04.3*
- Cérébrale ¬ *Q00.0*
- Cervelet ¬ *Q04.3*
- Cils ¬ Absence ou *Q10.3*
- Col de l'utérus ¬ *Q51.5*
- Complète
- - Isolée du vermis cérébelleux ¬ *Q04.3*
- - Jambe ¬ *Q72.0*
- Congénitale
- - Grandes lèvres-malformation cérébelleuse-dystrophie cornéenne-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- - Scrotum
- - - Malformation cérébelleuse-dystrophie cornéenne-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- - - ¬ *Q55.2*
- Corps calleux
- - Déficience intellectuelle
- - - Colobome et micrognathie ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - - ¬ Syndrome d'hypoplasie de la substance blanche- *Q04.8*
- - Dysmorphie faciale-ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère- *Q87.0*
- - Quadriparésie spastique ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*

Agénésie *–suite*
- Corps calleux *–suite*
- - ¬
- - - *Q04.0*
- - - Forme isolée d' *Q04.0*
- - - Syndrome de microcéphalie-polymicrogyrie- *Q02, Q04.0*
- Dentaire sélective ¬ *K00.0*
- Enclume ¬ *Q16.3*
- Humérus ¬ *Q71.8*
- Hypoplasie cérébro-réno-génito-urinaire ¬ Syndrome létal fœtal d' *Q87.8*
- Isolée
- - Partielle du vermis cérébelleux ¬ *Q04.3*
- - Vermis cérébelleux ¬ *Q04.3*
- Jambe et du pied ¬ *Q72.2*
- Labyrinthe membraneux ¬ *Q16.5*
- Langue ¬ *Q38.3*
- Membres
- - Inférieurs ¬ *Q72.0*
- - Supérieurs
- - - Main conservée ¬ *Q71.1*
- - - ¬ *Q71.0*
- Nerf ¬ *Q07.8*
- Nez ¬ *Q30.1*
- Œil ¬ *Q11.1*
- Pancréas-holoprosencéphalie ¬ Syndrome d' *Q04.2, Q45.0*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Partielle du corps calleux-hypoplasie du vermis avec kystes de la fosse postérieure ¬ Syndrome d' *Q04.3*
- Paupière ¬ Absence ou *Q10.3*
- Pénis ¬ *Q55.5*
- Péronière ¬ *Q72.6*
- Poumon ¬ *Q33.3*
- Pulmonaire-anomalie cardiaque-pouce triphalangé ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Rate ¬ *Q89.01*
- Rénale
- - Bilatérale ¬ *Q60.1*
- - Retard psychomoteur ¬ Syndrome d'aniridie- *Q87.8*
- - Sans précision ¬ *Q60.2*
- - Unilatérale ¬ *Q60.0*
- - ¬ Syndrome d'utérus double-hémivagin- *Q51.2, Q60.0*
- Rotule ¬ *Q74.1*
- Sacrée-ossification anormale des corps vertébraux-persistance de la notochorde ¬ Syndrome d' *Q79.8*
- Scrotum ¬ *Q55.2*
- Sein avec absence de mamelon ¬ *Q83.0*
- Thyroïde ¬ *E03.1*
- Tibiale ¬ *Q72.5*
- Trachée ¬ *Q32.1*
- Unilatérale de l'artère pulmonaire ¬ *Q25.7*
- Uretère ¬ *Q62.4*

Agénésie *–suite*
- Vaginal
- - Isolée partielle ¬ *Q52.0*
- - ¬ *Q52.0*
- Valve pulmonaire
- - Septum ventriculaire intact-persistance du canal artériel ¬ Syndrome d' *Q22.3, Q25.0*
- - Tétralogie de Fallot-absence du canal artériel ¬ Syndrome d' *Q24.8, Q25.8*
- - ¬ *Q22.3*
- Valves tricuspides ¬ *Q22.4*
- Vermis cérébelleux ¬ *Q04.3*
- Vésicule biliaire ¬ *Q44.0*

Agent
- Anti-infectieux ¬ Antécédents personnels d'allergie à d'autres *Z88.3*
- Bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.8*
- Chimique ¬ Voies de fait/agression par : *Y09.9!*
- Diagnostic ¬ Intoxication: *T50.8*
- Externe, sans précision ¬ Affection respiratoire due à un *J70.9*
- Immunologiques ¬ *T50.9*
- Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T44.3*
- Pathogène ¬
- - Coronavirus en tant qu' *B97.2!*
- - Staphylocoques en tant qu' *B95.8!*
- Principalement
- - Alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.4*
- - Bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.5*
- Sclérosants ¬ Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les *T46.8*
- Viral ¬ Pneumonie congénitale due à un *P23.0*
- ¬ Dermite
- - Allergique de contact due à d'autres *L23.8*
- - Contact, sans précision, due à d'autres *L25.8*
- - Irritante de contact due à d'autres *L24.8*

Agent alkylant ¬
- Leucémie myéloïde aiguë due à des *C92.00*
- Syndrome myélodysplasique dû à des *D46.9*

Agent bactérien
- Précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B96.8!*
- ¬ Pneumonie congénitale due à d'autres *P23.6*

Agent chimique
- Émanation fumée gaz
- - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des *J68.2*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des *J68.9*

Agent chimique *–suite*
- Émanation fumée gaz *–suite*
- - ¬
- - - Affections respiratoires
- - - - *J68.8*
- - - - Aiguës et subaiguës dues à des *J68.3*
- - - - Chroniques dues à des *J68.4*
- - - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d' *J68.4*
- - - Bronchite et pneumonie dues à des *J68.0*
- - - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d' *J68.4*
- - - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d' *J68.4*
- - - Œdème du poumon dû à des *J68.1*
- ¬
- - Bronchite (aiguë) due à des *J68.0*
- - Œdème (aigu) du poumon dû à des *J68.1*

Agent delta
- AgHBe
- - Négatif
- - - Activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.14*
- - - Sans activité inflammatoire, faible réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.13*
- - Positif
- - - Activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.12*
- - - Sans activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.11*
- Coma hépatique ¬ Hépatite aiguë B
- - *B16.0*
- - Co-infection à *B16.0, K72.74!*
- - Sans
- - - *B16.2*
- - - Co-infection à *B16.2, K72.74!*
- Phase
- - 1 ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.11*
- - 2 ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.12*
- - 3 ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.13*
- - 4 ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.14*
- - Immunotolérance ¬ Hépatite virale chronique B sans *B18.11*
- Sans coma hépatique ¬ Hépatite aiguë B
- - *B16.1*
- - Co-infection à *B16.1*
- - Sans *B16.9*
- Sujet porteur de l'hépatite B ¬ Infection aiguë par *B17.0*
- ¬ Hépatite virale chronique B avec *B18.0*

Agent extern
- Précisés ¬ Affections respiratoires dues à d'autres *J70.8*

Agent extern *–suite*
- ¬
- - Anémies aplastiques due à d'autres *D61.2*
- - Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres *G21.2*

Agent pathogène ¬
- Klebsiella pneumoniae comme *B96.2!*
- Proteus
- - Mirabilis comme *B96.2!*
- - Morganii comme *B96.2!*

Agent toxique ¬
- Myopathie due à d'autres *G72.2*
- Polynévrite due à d'autres *G62.2*

Agglutinine froid
- CAD] ¬ Maladie des *D59.10*
- ¬
- - Hémoglobinurie à *D59.18*
- - Syndrome
- - - *D59.18*
- - - *D59.18*

Aggrécane ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

AgHBe
- Négatif
- - Activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.14*
- - Sans activité inflammatoire, faible réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.13*
- Positif
- - Activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.12*
- - Sans activité inflammatoire, forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta: *B18.11*

AgHBs] ¬ Porteur de l'antigène de surface du virus de l'hépatite B [*B18.13*

Agissant
- Essentiellement sur
- - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ Intoxication: Substances *T48.7*
- - Muscles, autres et sans précision ¬ Intoxication: Substances *T48.2*
- - Système
- - - Cardio-vasculaire, autres et sans précision ¬ Intoxication: Substances *T46.9*
- - - Nerveux autonome, autres et sans précision ¬ Intoxication: Médicaments *T44.9*
- - Tractus gastro-intestinal
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substance *T47.9*
- - - ¬ Intoxication: Autres substances *T47.8*
- Sur
- - Équilibre électrolytique, calorique et hydrique ¬ Intoxication: Produits *T50.3*
- - Fibrinolyse ¬ Intoxication: Médicaments *T45.6*

Agissant *–suite*
- Sur *–suite*
- - Métabolisme de l'acide urique ¬ Intoxication: Médicaments *T50.4*
- - Protozoaires du sang ¬ Intoxication: Antipaludiques et médicaments *T37.2*

Agitante
v./v.a. Paralysie agitante

Agitation
- Lors de démence ¬ *U63.4!*
- Utilisation d'hypnotiques ¬ *F13.8*
- ¬ *R45.1*

Agitée épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F32.2*

Aglossie
- Adactylie ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- Congénitale ¬ *Q38.3*
- ¬ *Q38.3*

Agnathie-holoprosencéphalie-situs inversus ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Agnosie
- Développement ¬ *F88*
- ¬ *R48.1*

Agoraphobie
- Sans mention de trouble panique ¬ *F40.00*
- Trouble panique ¬ *F40.01*

Agranulocytaire ¬ Angine *D70*

Agranulocytose
- Cyclique ¬ *D70.5*
- Génétique infantile ¬ *D70.0*
- Infantile ¬ *D70.0*
- Neutropénie
- - Congénitale ¬ *D70.0*
- - Médicament
- - - Non précisées ¬ *D70.19*
- - - Phase critique
- - - - 4 jours
- - - - - 7 jours ¬ *D70.13*
- - - - - ¬ *D70.10*
- - - - 7 jours à moins de 10 jours ¬ *D70.14*
- - - SAI ¬ *D70.19*
- - - ¬
- - - - *D70.1*
- - - - Formes évolutives d' *D70.18*
- - Phase critique
- - - 10 à moins de 20 jours ¬ *D70.11*
- - - 20 jours ou plus ¬ *D70.12*
- - Traitement ¬ *D70.1*
- SAI ¬ *D70.3*
- ¬
- - *D70.3*
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, D70.3*

Agraphie ¬ *R48.8*

Agressif
- Cellule NK
- - Rémission complète ¬ Leucémie *C94.71*
- - ¬ Leucémie *C94.70*

Agressif *–suite*
- Réarrangement MYC
- - BCL2
- - - BCL6 ¬ Lymphome B d 'évolution *C83.8*
- - - ¬ Lymphome B d 'évolution *C83.8*
- - BCL6 ¬ Lymphome B d 'évolution *C83.8*
- Type mal socialisé ¬ Trouble (des): *F91.1*
- ¬
- - Fibromatose *D48.1*
- - Lymphome T cutané épidermotrope CD8+ d'évolution *C84.5*
- - Mastocytose systémique *C96.2*
- - Parodontite *K05.4*
- - Personnalité: passive- *F60.8*
- - Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypotonie-dysmorphie faciale-comportement *Q87.8*
- - Trouble
- - - Conduites, type solitaire- *F91.1*
- - - Personnalité: *F60.30*

Agression
- Agent chimique ¬ Voies de fait/ *Y09.9!*
- Armes ¬ Voies de fait/ *Y09.9!*
- Médicament ¬ Voies de fait/ *Y09.9!*
- Moyens non précisés ¬ Effets non précisés de: *T76*
- ¬
- - Examen
- - - Mise en observation après d'autres blessures dues à une *Z04.5*
- - - Victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une *Z04.5*
- - Voies de fait/ *Y09.9!*

Agressivité lors de démence ¬ *U63.4!*

Agricoles et industrielles ¬ Substances toxiques *Z57*

Agrumes ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*

Aguirre Negrete
v./v.a. Hernández-Aguirre Negrete

Agyrie
- Dysplasie rétinienne ¬ Syndrome d'hydrocéphalie- *Q04.3*
- ¬ *Q04.3*

Ahlbäck [ostéonécrose aseptique de la tête fémorale médiale] ¬ Maladie d' *M87.05*

Ahn-Lerman-Sagie ¬ Syndrome d' *Q87.8*

AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [SM- *D47.0*

Aicardi ¬ Syndrome d' *Q04.0*

Aicardi-Goutières ¬ Syndrome d' *G31.88*

Aide
- Toux) ¬ Dépendance (de longue durée) envers: insufflateur/exsufflateur (appareil d' *Z99.0*
- ¬ Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d' *Z75.8*

AIEF [encéphalopathie infantile aiguë affectant principalement le lobe frontal] ¬ *G40.2*

Aigu
v./v.a. Type de maladie

Aiguille à injection ¬ Accident dû à: *W49.9!*

Aine
- SAI ¬ *C76.3*
- ¬
- - *C49.5*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *S31.1*
- - *T21*
- - Dermatophytose de l' *B35.6*
- - Mélanome malin de l' *C43.59*

Aïnhum ¬ *L94.6*

Aïnhumoïde et mutilante ¬ Kératodermie *Q82.8*

AINS] ¬ Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [*T39.3*

AIOLOS ¬ Déficit immunitaire avec dérèglement immunitaire dû à une haploinsuffisance en *D84.8*

AIP] ¬ Pancréatite auto-immune [*K86.10*

Air
- Ambiant ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible teneur en oxygène de l' *T71*
- Comprimé ¬ Maladie de l' *T70.3*
- Poussée aiguë ¬ Maladie pulmonaire due systèmes
- - Conditionnement de l' *J67.71*
- - Humidification de l' *J67.71*
- Sans mention poussée aiguë ¬ Maladie pulmonaire due systèmes
- - Conditionnement de l' *J67.70*
- - Humidification de l' *J67.70*
- ¬
- - Hypoplasie dermique en *Q82.8*
- - Mal de: *T75.3*
- - Pneumonie due systèmes
- - - Conditionnement de l' *J67.70*
- - - Humidification de l' *J67.70*
- - Pollution de l' *Z58*
- - Poussières et autres impuretés dans l' *Z57*

Aird
v./v.a. Flynn-Aird

Aisselle
v./v.a. creux axillaire
- Membre supérieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l' *C77.3*
- SAI ¬ *C76.1*
- ¬
- - *C49.3*
- - *D21.3*
- - *L02.4*
- - *L04.2*
- - *T22*

Aisselle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Basaliome de l' *C44.59*
- - Carcinome cutané de l' *C44.59*
- - Mélanome malin de l' *C43.59*

AIT] ¬ Accidents ischémiques cérébraux transitoires [*G45*

Ajustement
- Appareil
- - Auditif ¬ Mise en place et *Z46.1*
- - Orthodontique ¬ Mise en place et *Z46.4*
- - Orthopédique ¬ Mise en place et *Z46.7*
- - Prothèse externe non précisé ¬ Mise en place et *Z44.9*
- - Sans précision ¬ Mise en place et *Z46.9*
- - Urinaire ¬ Mise en place et *Z46.6*
- Appareils
- - Précisés ¬ Mise en place et *Z46.8*
- - Prothèse externe ¬ Mise en place et *Z44.8*
- - Rapport avec le système nerveux et les organes des sens ¬ Mise en place et *Z46.2*
- Bras artificiel (total) (partiel) ¬ Mise en place et *Z44.0*
- Entretien
- - Pompe à perfusion ¬ *Z45.1*
- - Prothèse
- - - Auditive implantée ¬ *Z45.3*
- - - Interne non précisée ¬ *Z45.9*
- Iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux ¬ Mise en place et *Z46.5*
- Jambe artificielle (totale) (partielle) ¬ Mise en place et *Z44.1*
- Lunettes et verres de contact ¬ Mise en place et *Z46.0*
- Œil artificiel ¬ Mise en place et *Z44.2*
- Pompe à médicaments implantée ¬ *Z45.1*
- Prothèse
- - Dentaire ¬ Mise en place et *Z46.3*
- - Externe du sein ¬ Mise en place et *Z44.3*
- Transitions entre les différentes périodes de vie ¬ Difficultés d' *Z60*

Akari ¬
- Infection due à Rickettsia *A79.1*
- Rickettsiose varicelliforme due à Rickettsia *A79.1*

Akathisie (induite par le traitement) (médicamenteuse) ¬ *G25.88*

Akée ¬ Intoxication aiguë par le fruit d' *T62.2*

AKI [Acute Kidney Injury] ¬ *N17.99*

Akinésie fœtale
- Familiale ¬ Syndrome de lissencéphalie type 3-séquence d' *Q04.3*
- Hémorragies cérébrales et rétiniennes ¬ Syndrome d' *G71.2, P52.4*
- ¬ Syndrome de microphtalmie-microtie- *Q87.8*

AKS [Syndrome alcoolique de Korsakoff] ¬ *F10.6*

AKT2 ¬ Lipodystrophie partielle familiale associée à *E88.1*

Akureyri ¬ Syndrome d' *G93.30*

Al Awadi-Raas-Rothschild ¬ Syndrome d' *Q87.2*

Al Gazali-Aziz-Salem ¬ Syndrome d' *Q87.1*

Alacrymie
- Achalasie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Congénitale isolée ¬ *Q10.6*

Alactasie ¬ *E73.0*

Alagille
- Microdélétion 20p12 ¬ Syndrome d' *Q44.7*
- ¬ Syndrome d' *Q44.7*

Alagille-Watsons
- Monosomie 20p12 ¬ Syndrome d' *Q44.7*
- Mutation ponctuelle de JAG1 ¬ Syndrome d' *Q44.7*

Alajouanine] ¬ Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix- *G37.4*

Alanine aminotransférase ¬ Taux anormal d' *R74.8*

Alanine-glyoxylate aminotransférase peroxysomale ¬ Déficit en *E74.8*

Alazami ¬ Syndrome d' *Q87.1*

Alazami-Yuan ¬ Syndrome d' *Q87.0*

Alba ¬
- Dépôts [accrétions] sur les dents: materia *K03.6*
- Pityriasis *L30.5*

Albers-Schönberg ¬ Syndrome d' *Q78.2*

Albescente
- Vitelliforme) ¬ Dystrophie: rétinienne (pigmentaire) (ponctuée *H35.5*
- ¬ Rétinite ponctuée *H35.5*

Albinisme
- Anomalies digitales ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.8*
- Cutané
- - Phénotype hermine ¬ *E70.3*
- - ¬ *E70.3*
- Cutanéo-oculaire ¬ *E70.3*
- Isolé ¬ *E70.3*
- Partiel ¬ *E70.3*
- ¬ *E70.3*

Albinisme oculaire
- Récessif lié à l'X ¬ *E70.3*
- Surdité
- - Neurosensorielle congénitale ¬ *E70.3*
- - Sensorielle tardive ¬ *E70.3*
- Type
- - 1] ¬ A01 [*E70.3*
- - Nettleship-Falls ¬ *E70.3*
- ¬ *E70.3*

Albinisme oculo-cutané
- Jaune ¬ *E70.3*
- Rouge ¬ *E70.3*
- Type

Albinisme oculo-cutané *–suite*
- Type *–suite*
- - 1
- - - Pigmentation minime ¬ *E70.3*
- - - Thermosensible ¬ *E70.3*
- - 8] ¬ AOC8 [*E70.3*
- - Amish ¬ *E70.3*
- Tyrosinase-négatif ¬ *E70.3*
- ¬ AOC [*E70.3*

Albinisme-surdité ¬ Syndrome
- *H90.5*
- COMMAD [colobome-ostéopétrose-microphtalmie-macrocéphalie- *Q87.8*

Albipunctatus ¬ Fundus *H35.5*

Albo-papuloïde ¬ Dystrophie cutanée bulleuse atrophiante et *Q81.2*

Albright
- Pseudohypoparathyroïdie de type 1A ¬ Syndrome d'ostéodystrophie héréditaire de *E20.1*
- ¬ Syndrome de McCune- *Q78.1*

Albuginée du corps caverneux du pénis ¬ Lésion de la tunique *S39.80*

Albumine
- Globuline ¬ Inversion du rapport *E88.08*
- ¬ Anomalie de l' *R77.0*

Albuminémie
v./v.a. dyspré-albuminémie

Albuminurie
- SAI ¬ *R80*
- Scarlatineuse ¬ *A38*
- Sévère ¬ Hypertension lors de grossesse avec *O14.1*

Albuminurique ¬ Rétinite *N18.9†, H32.8**

Alcaline ¬
- Anomalies des taux de: phosphatase: *R74.8*
- Œsophagite *K20.8*

Alcalinisants ¬ *T50.9*

Alcalis corrosifs et substances similaires ¬ Effet toxique: *T54.3*

Alcalose
- Métabolique ¬ *E87.3*
- Respiratoire ¬ *E87.3*
- SAI ¬ *E87.3*
- ¬
- - *E87.3*
- - Syndrome d'hyperuricémie-hypertension artérielle pulmonaire-insuffisance rénale- *E72.8*

Alcaptonurie ¬
- *E70.2*
- Arthrose au cours d' *E70.2†, M36.8**

Alcock] ¬ hernie: honteuse [du canal d' *K45*

Alcool
- Acides gras ¬ Déficit d'oxydoréduction des *Q87.1*
- Amylique ¬ *T51.3*
- Butylique [1-butanol] ¬ *T51.3*

Alcool *–suite*
- Cétylstéarylique ¬ Hypersensibilité à l' *T78.4*
- Drogue dans le sang ¬ Recherche d' *Z04.8*
- Éthylique ¬ *T51.0*
- Isopropylique ¬ *T51.2*
- Méthylique ¬
- - *T51.1*
- - Effet toxique de l' *T51.1*
- Propylique [1-propanol] ¬ *T51.3*
- Sang ¬ Présence d' *R78.0*
- Sans précision ¬ Effet toxique: *T51.9*
- Sevrage ¬ Abus d' *F10.3*
- Substances psycho-actives ¬ Syndrome amnésique organique, non induit par l' *F04*
- Sur la moelle osseuse ¬ Effets toxiques de l' *D61.2*
- Tabac, de médicaments ou de drogues ¬ Difficultés liées à: la consommation d' *Z72.0*
- ¬
- - Abus
- - - *F10.1*
- - - Chronique d' *F10.2*
- - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- - Dégénérescence du système nerveux liée à l' *G31.2*
- - Dysfonctionnement du système nerveux végétatif du à l' *G31.2*
- - Effet toxique: Autres *T51.8*
- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- - Intolérance à l' *E88.8*
- - Pseudosyndrome de Cushing dû à l' *E24.4*
- - Sevrage d' *Z50.2!*
- - Trouble du métabolisme de l' *E88.8*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d' *F10*

Alcoolique
- Aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ état confusionnel (non *F05*
- Aiguë
- - Sur chronique ¬ Insuffisance hépatique *K70.42*
- - ¬ Insuffisance hépatique *K70.40*
- Chronique ¬ Insuffisance hépatique *K70.41*
- Coma hépatique ¬ Insuffisance hépatique *K70.48*
- Foie
- - Hémorragie par rupture des varices œsophagiennes ¬ Cirrhose *K70.3†, I98.3**
- - Saignement de varices gastriques ¬ Cirrhose *K70.3†, I98.3**
- - Sans précision ¬ Maladie *K70.9*
- - Varice
- - - Gastriques ¬ Cirrhose *K70.3†, I98.2**
- - - Œsophagiennes ¬ Cirrhose *K70.3†, I98.2**
- - ¬
- - - Cirrhose *K70.3*

Alcoolique *–suite*
- Foie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Dégénérescence graisseuse *K70.0*
- - - Fibrose et sclérose *K70.2*
- Korsakoff] ¬ AKS [Syndrome *F10.6*
- NASH] ¬ Stéatohépatite non *K75.8*
- Subaiguë ¬ Insuffisance hépatique *K70.40*
- ¬
- - Ataxie cérébelleuse *G31.2*
- - Cirrhose *K70.3*
- - Dégénérescence cérébelleuse *G31.2*
- - Dégénérescence cérébrale *G31.2*
- - Encéphalopathie *G31.2*
- - État hallucinatoire organique (non *F06.0*
- - Gastrite *K29.2*
- - Hépatite *K70.1*
- - Insuffisance hépatique *K70.48*
- - Myocardiopathie *I42.6*
- - Myopathie *G72.1*
- - Pancréatite
- - - Aiguë *K85.2*
- - - Chronique *K86.0*
- - Pellagre
- - - *E52*
- - - *E52*
- - Polynévrite *G62.1*
- - Produits de désintoxication *T50.6*
- - Psychose ou syndrome de Korsakov non *F04*
- - Séquelles d'intoxication *T97*
- - Stéatohépatite *K70.1*
- - Stéatose hépatique non *K76.0*

Alcoolisation fœtale ¬ Syndrome d' *Q86.0*

Alcoolisme
- Fœtal dysmorphique ¬ Syndrome
- - *Q86.0*
- - *Q86.0*
- Maternel ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l' *O35.4*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l' *P04.3*
- ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*

Aldéhyde
v./v.a. succinate-semi-aldéhyde
- Oxydase
- - Type A ¬ Déficit combiné en sulfite oxydase, xanthine déshydrogénase et *E72.1*
- - ¬ Déficit combiné en xanthine déshydrogénase et xanthine *E79.8*

Alder ¬ Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: *D72.0*

Aldolase
- A musculaire ¬
- - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - GSD par déficit en *E74.0*
- ¬

Aldolase *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carence héréditaire en *E74.1*
- - Déficit héréditaire en fructose-1-phosphate *E74.1*

Aldostérone
- Ovaire ¬ Tumeur ectopique sécrétrice d' *D39.1, E26.0*
- Rétropéritoine ¬ Tumeur ectopique sécrétrice d' *D48.3, E26.0*
- Synthase
- - Non lié à CYP11B2 ¬ Déficit en *E27.4*
- - ¬ Déficit en *E27.4*
- Testicule ¬ Tumeur ectopique sécrétrice d' *D40.1, E26.0*
- ¬
- - Angio-œdème secondaire aux inhibiteurs du système rénine-angiotensine- *T78.3*
- - Carcinome corticosurrénalien à hypersécrétion pure d' *C74.0, E26.0*
- - Tumeur ectopique sécrétrice d' *D48.9, E26.0*

Aldred ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Aldrich
v./v.a. Wiskott-Aldrich

ALECT2 [Amylose à Leucocyte chemotactic factor-2] ¬ Amylose *E85.0*

Alembik
v./v.a. Stoll-Alembik-Finck

Aleucémique
- Leucémie à mastocytes ¬ Variante *C94.30*
- ¬ Réticulose *C96.0*

Alexander ¬ Maladie d' *E75.2*

Alexie ¬ Dyslexie et *R48.0*

Al-Gazali ¬ Dysplasie épiphysaire multiple type *Q77.3*

Al-Gazali-al-Talabani ¬ Syndrome d' *Q79.8*

Algie
- Céphaliques ¬ Autres syndromes précisés d' *G44.8*
- Dentaires SAI ¬ *K08.8*
- Faciale atypique ¬ *G50.1*
- Vasculaire face
- - Chronique ¬ *G44.0*
- - Épisodique ¬ *G44.0*
- - ¬ Syndrome d' *G44.0*

Algique chronique ¬ Modification durable de la personnalité liée à un syndrome *F62.80*

Algodystrophie ¬ *M89.09*

Algoneurodystrophie ¬ *M89.09*

Alibert-Bazin ¬ Syndrome d' *C84.0*

Aliment
- Contact peau ¬ Dermite
- - Allergique de contact due à des *L23.6*
- - Contact, sans précision, due à des *L25.4*
- - Irritante de contact due à des *L24.6*
- Liquides ¬ Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d' *R63.8*
- Régurgités ¬

Aliment *–suite*
- Régurgités ¬ *–suite*
- - Aspiration néonatale de lait et d' *P24.3*
- - Pneumonie par aspiration (de): *J69.0*
- - Suffocation par: *T17*
- Sans précision ¬ Effet toxique: Substance nocive absorbée par le biais d' *T62.9*
- Vomissements ¬ Pneumonie due à des *J69.0*
- ¬
- - Dermite
- - - Allergique de contact due aux végétaux, sauf *L23.7*
- - - Contact, sans précision, due aux végétaux, sauf *L25.5*
- - - Due à l'ingestion d' *L27.2*
- - - Irritante de contact due aux végétaux, sauf *L24.7*
- - Effet toxique
- - - Aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des *T64*
- - - Substances nocives précisées absorbées par le biais d' *T62.8*

Alimentaire
- Acide folique ¬ Anémie par carence *D52.0*
- Bacillus cereus ¬ Intoxication *A05.4*
- Base poisson
- - Exacerbation aiguë ¬ Poumon des travailleurs de préparations *J67.81*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des travailleurs de préparations *J67.80*
- - ¬ Poumon des travailleurs de préparations *J67.80*
- Calcium ¬ Carence *E58*
- Carencé ¬ Arthropathie lors d'un état *E63.9†, M14.59**
- Clostridium botulinum ¬ Intoxication *A05.1*
- Clostridium perfringens [Clostridium welchii] ¬ Intoxication *A05.2*
- Inadéquats ¬ Régime et habitudes *Z72.8*
- Non classées ailleurs ¬ Autres réactions d'intolérance *T78.1*
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬ Problème *P92.9*
- - ¬ Autres problèmes *P92.8*
- Précisées ¬ Autres intoxications bactériennes d'origine *A05.8*
- Sélénium ¬ Carence *E59*
- Staphylocoques ¬ Intoxication *A05.0*
- Vibrio parahaemolyticus ¬ Intoxication *A05.3*
- Vitamine B12 ¬
- - Anémies par carence *D51.3*
- - Polyneuropathie au cours de l'anémie par carence *D51.3†, G63.4**
- Zinc ¬ Carence *E60*
- ¬
- - Asthme dû aux denrées *J45.09*

Alimentaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Choc anaphylactique dû à une intolérance *T78.0*
- - Déséquilibre *E63.1*
- - Entérocolite par hypersensibilité *K52.2*
- - Érosion des dents: due à: régime *K03.2*
- - Gastroentérite colite
- - - Allergiques et *K52.2*
- - - Hypersensibilité *K52.2*
- - Infection
- - - Listeria d'origine *A32.9*
- - - Listérienne d'origine *A32*
- - Listériose d'origine *A32.9*
- - Peau flasque ou affaissée: après une perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime *L98.7*
- - SEIPA [Syndrome d'entérocolite induite par les protéines *K52.2*

Alimentation
- Défectueuse ¬ *Z59*
- Enfant ¬ Trouble de l' *F98.2*
- Excessive ¬ *R63.2*
- Lente du nouveau-né ¬ *P92.2*
- Lié à DHX30 ¬ Syndrome de retard neurodéveloppemental-déficience intellectuelle-ataxie-trouble de l' *G11.8*
- Mouvements stéréotypés des mains-cataracte bilatérale ¬ Trouble neurologique du développement sévère avec troubles de l' *G31.88*
- Rapport avec le sommeil ¬ Troubles de l' *F51.3*
- SAI ¬ Difficultés d' *R63.3*
- Sans précision ¬ Trouble de l' *F50.9*
- Sein difficile chez le nouveau-né ¬ *P92.5*
- ¬
- - Cataracte au cours de trouble de l' *E63.9†, H28.1**
- - Épilepsie réflexe à l' *G40.8*
- - Polyneuropathie liée à l' *E63.9†, G63.4**
- - Troubles de l' *F50.8*

Aliphatiques
- Aromatiques, sans précision ¬ Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures *T53.9*
- ¬ Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures *T53.6*

ALK
- Négatif ¬ Lymphome anaplasique à grandes cellules, *C84.7*
- Positif ¬
- - Lymphome
- - - B à grandes cellules *C83.3*
- - - Diffus à grandes cellules B *C83.3*
- - Lymphome anaplasique à grandes cellules, *C84.6*

Alkaline céramidase 3 ¬ Leucodystrophie par déficit en *E75.2*

Alkaptonurica ¬ Osteoarthrosis deformans *E70.2†, M36.8**

Alkuraya-Kucinskas ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Alkylant
v./v.a. Agent alkylant

ALL
- Leucémie aiguë lymphoblastique précurseur B
- - Rémission complète ¬ B- *C91.01*
- - ¬ B- *C91.00*
- Rémission complète ¬ Leucémie lymphoblastique aiguë [*C91.01*

Allaitement
- Maternel ¬ Soins et examens de l' *Z39.1*
- ¬ Surveillance de l' *Z39.1*

Allbright ¬ Ostéodystrophie héréditaire d' *E20.1*

Allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus sexuel *Z04.5*

Allen-Masters] ¬ Syndrome de déchirure du ligament large [*N83.8*

Allergènes ¬ Désensibilisation aux *Z51.6*

Allergie
- Acide gallique ¬ *T78.4*
- Agents anti-infectieux ¬ Antécédents personnels d' *Z88.3*
- Ambroisie avec asthme ¬ *J45.09*
- Analgésiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.6*
- Anesthésiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.4*
- Antibiotiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.1*
- Cucurbitacées ¬ *T78.1*
- Dérivé
- - Azole ¬ *T88.7*
- - Triazole ¬ *T88.7*
- Farine ¬ Asthme dû à une *J45.09*
- Gallate de propyle ¬ *T78.4*
- Graisses industrielles ¬ *L23.5*
- Huile de sésame ¬ *T78.1*
- Lait de vache ¬ *L27.2*
- Légumineuses ¬ *T78.1*
- Médicament substance biologique
- - Sans précision ¬ Antécédents personnels d' *Z88.9*
- - ¬ Antécédent personnel
- - - *Z88.8*
- - - *Z91.0*
- Moisissures ¬ *J30.3*
- Multiples-cachexie métabolique] ¬ Syndrome SAM [dermatite sévère- *Q80.8*
- Narcotiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.5*
- Paragroupes ¬ *T78.4*
- Pénicilline ¬
- - *T88.7*
- - Antécédents personnels d' *Z88.0*
- Plumes ¬ *J30.3*
- Poisson ¬ *T78.1*

Allergie *–suite*
- Pollens avec asthme ¬ *J45.09*
- Poussière de maison avec asthme ¬ *J45.09*
- Produits cosmétiques ¬ *L23.2*
- Protéine
- - Cacahuètes ¬ *T78.1*
- - Poulet ¬ *T78.1*
- SAI due au pollen ¬ *J30.1*
- Sans précision ¬ *T78.4*
- Sérum et vaccin ¬ Antécédents personnels d' *Z88.7*
- Solvants organiques ¬ *L23.5*
- Sulfamides ¬ Antécédents personnels d' *Z88.2*
- Viande rouge ¬ *T78.1*
- ¬ Tests (de): *Z01.5*

Allergique
v./v.a. Type de maladie

Allescheriase ¬ *B48.2*

Alloanticorps contre facteur
- IX ¬ Hémophilie B avec *D67*
- VIII ¬ Hémophilie A avec *D66*

Allodynie ¬ *R20.8*

Allo-immune ¬
- Neutropénie néonatale *P61.5*
- Thrombopénie materno-fœtale et néonatale *P61.0*

Allongé
- Bulbe rachidien] ¬ Astrocytome de la moelle *C71.7*
- ¬
- - Dent *K00.2*
- - Syndrome du processus styloïde *M77.9*

Allongement
- Acquis du côlon ¬ *K59.8*
- Complexe QRS ¬ *R94.3*
- Hypertrophique du col de l'utérus ¬ *N88.4*

Allumer des incendies [pyromanie] ¬ Tendance pathologique à *F63.1*

Allure schizophrénique
- Cours d'une épilepsie ¬ Psychose d' *F06.2*
- ¬ Trouble
- - Délirant organique [d' *F06.2*
- - Psychotique aigu d' *F23.2*

Alobaire ¬ Holoprosencéphalie *Q04.2*

Alopécie
v./v.a. folliculaire-alopécie-photophobie
- Androgénique
- - Médicamenteuse ¬ *L64.0*
- - Sans précision ¬ *L64.9*
- - ¬ Autres formes d' *L64.8*
- Anomalie de la pigmentation ¬ Syndrome d'hypoplasie du pouce- *Q87.1*
- Anomalies génitales ¬ Dysplasie fronto-nasale avec *Q87.0*
- Atrophique ¬ *L66.0*
- Cicatriciel
- - Sans précision ¬ *L66.9*

Alopécie *–suite*
- Cicatriciel *–suite*
- - ¬ Autres formes d' *L66.8*
- Circonscrite-polydactylie ¬ Syndrome d' *Q87.2*
- Congénitale
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ Kératodermie palmoplantaire et *Q82.8*
- - - Récessive ¬ Hyperkératose palmoplantaire et *Q82.8, Q84.0*
- - ¬ *Q84.0*
- Contractures-nanisme-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Cutis laxa-scoliose] ¬ Syndrome MACS [macrocéphalie- *Q82.8*
- Déficience intellectuelle
- - Hypogonadisme hypergonadotrope ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Déficit immunitaire ¬ Syndrome d' *D84.9, L63.0*
- Due à un médicament cytotoxique ¬ *L65.8*
- Épilepsie-pyorrhée-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Frontale fibrosante ¬ *L66.1*
- Fronto-pariétale ¬ Syndrome d'hypogonadisme hypergonadotrope- *E23.0, L65.9*
- Macrocéphalie-dysmorphie faciale-anomalies cérébrales structurelles ¬ Syndrome de retard global de développement- *Q87.8*
- Masculine ¬ *L64*
- Mucineuse de Pinkus ¬ *L65.2*
- Partielle ¬ Syndrome d'hypogonadisme hypergonadotrope primaire- *E29.1, Q84.0*
- Post-infectieuse ¬ *L65.8*
- SAI ¬ *L65.9*
- Suite d'une infection ¬ *L65.8*
- Syphilitique ¬ *A51.3†, L99.8**
- Totale ¬ *L63.0*
- ¬
- - Dysostose mandibulo-faciale avec *Q75.4, L65.9*
- - Syndrome d'atrophie choroïdienne- *H31.1, Q82.8*
- - Syphilis avec *A51.3†, L99.8**

Alorainy
v./v.a. Bosley-Salih-Alorainy

Alpers ¬
- Polydystrophie sclérosante progressive d' *G31.88*
- Syndrome d' *G31.88*

Alpers-Huttenlocher ¬ Syndrome d' *G31.88*

Alpha
- 5] ¬ Syndrome multisystémique lié à LAMA5 [laminine- *M79.89*
- Bêta-adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs *T44.9*

Alpha *–suite*
- CD8 ¬ Susceptibilité aux infections respiratoires associée à une mutation de la chaîne *D84.8*
- Complexe protéique coatomère] ¬ Syndrome COPA [sous-unité *M35.8*
- Cytosolique] ¬ Anomalie plaquettaire associée à PLA2G4A [phospholipase-A2 *D69.1*
- Delta ¬ Déficit en granules *D69.1*
- Fibrinogène A ¬ Amylose à chaîne *E85.0†, N08.4**
- HSV-2 ¬ Dermite vésiculaire
- - Lèvre due au virus humain type 2 (*B00.1*
- - Oreille due au virus humain type 2 (*B00.1*
- Rémission complète ¬ Maladie des chaînes lourdes *C88.31*
- ¬
- - Déficit en cellules TCR [récepteur des cellules T] *D81.8*
- - Résistance aux hormones thyroïdiennes par mutations du récepteur aux hormones thyroïdiennes *E03.8*

Alpha-1
- Antitrypsine ¬
- - Déficit en *E88.00*
- - Hémorragie due à la mutation Pittsburgh de l' *E88.08†, D77**
- Protéinase ¬ Déficit en inhibiteur d' *E88.00*

Alpha-1,4-glucosidase acide ¬ Déficit en *E74.0*

Alpha-1-antichymotrypsine ¬ Déficit en *E88.08*

Alpha-2
- Laminine R23 ¬ Dystrophie musculaire des ceintures liée à la sous-unité *G71.08*
- ¬ Dystrophie musculaire congénitale par déficit en laminine *G71.2*

Alpha2-antiplasmine ¬ Déficit congénital en *D68.8*

Alpha-7 ¬ Dystrophie musculaire congénitale par déficit en intégrine *G71.2*

Alpha-aminoadipique ¬ Acidurie *E72.3*

Alpha-B cristalline ¬ Myopathie distale tardive associée à l' *G71.08*

Alphabétisation ¬ Difficultés liées à l'éducation et l' *Z55*

Alpha-bloquants, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.6*

Alpha-cétoglutarate réductase ¬ Déficit en lysine *E72.3*

Alpha-D-mannosidase lysosomale ¬ Déficit en *E77.1*

Alpha-fœtoprotéine ¬
- Anomalie de l' *R77.2*
- Dépistage prénatal d'un taux élevé d' *Z36.1*

Alpha-gal ¬ Syndrome de l' *T78.1*

Alpha-galactosidase A ¬ Déficit en *E75.2*

Alpha-hydroxylase ¬
- Déficit en 25-hydroxyvitamine-D-1- *E83.31*

Alpha-hydroxylase ¬ *–suite*
- Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 17- *E25.08*

Alpha-hydroxyphénylpyruvate hydroxylase ¬ Déficit en 4- *E70.2*

Alpha-L-fucosidase ¬ Déficit en *E77.1*

Alpha-L-iduronidase ¬ Déficit en *E76.0*

Alpha-mannosidose ¬ *E77.1*

Alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA thiolase ¬ Déficit en *E71.1*

Alpha-méthyl-acétoacétylique ¬ Acidurie *E71.1*

Alpha-méthylacyl-CoA racémase ¬ Déficit en *K76.8*

Alpha-N-acétyl-galactosaminidase
- Adulte ¬ Déficit en *E77.1*
- ¬ Déficit en *E77.1*

Alpha-réductase (avec pseudo-hermaphroditisme masculin) ¬ Déficit en 5- *E29.1*

Alpha-sarcoglycanopathie ¬ *G71.08*

Alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents principalement *T44.4*

Alpha-thalassémie
- Déficience intellectuelle
- - Délétion 16p ¬ Syndrome d' *Q93.5*
- - Liée à l'X ¬ *D56.0*
- Syndrome myélodysplasique ¬ Syndrome d' *D56.0, D46.9*
- ¬ *D56.0*

ALPI ¬ Maladie inflammatoire de l'intestin associée à *K52.8*

Alport lié X
- Léiomyomatose diffuse ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬ Syndrome d' *Q87.8*

ALPS [Syndrome lymphoprolifératif auto-immun] ¬ *D47.9*

ALSG] ¬ Aplasie des glandes salivaires et lacrymales [*Q10.4, Q38.4*

Alström ¬ Syndrome d' *Q87.8*

ALTE] ¬ Apparent life-threatening event [*R06.80*

Altération
- Attention
- - Syndrome avec hyperactivité ¬ *F90.0*
- - Trouble avec hyperactivité ¬ *F90.0*
- Audition oreille ¬ Surdité
- - Neurosensorielle unilatérale sans *H90.4*
- - Unilatérale
- - - Mixte de transmission et neurosensorielle sans *H90.7*
- - - Transmission sans *H90.1*
- Fonction rénale ¬ Goutte due à une *M10.3*
- Gène MLL ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec *C92.60*
- Intragénique ¬ Syndrome FOXG1 dû à une *Q93.5*
- Osseuse diabétique ¬ *E14.60†, M90.89**

Altération *–suite*
- Vasculaire
- - Rétine ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, H35.0*
- - ¬ Diabète sucré
- - - *E14.50†, I79.2**
- - - Type
- - - - 1 avec *E10.50†, I79.2**
- - - - 2 avec *E11.50†, I79.2**
- Vasculaires
- - Rétine ¬ *H35.0*
- - Rétiniennes ¬ Autres rétinopathies et *H35.0*

Alternante
- Enfance ¬ Hémiplégie *Q07.8*
- Monoculaire
- - Non intermittente ¬
- - - Ésotropie (*H50.0*
- - - Exotropie (*H50.1*
- - ¬
- - - Ésotropie [strabisme convergent] intermittente (*H50.3*
- - - Exotropie [strabisme divergens] intermittente (*H50.3*
- Nerf oculomoteur ¬ Paralysie *G83.8*
- Nocturne bénigne de l'enfance ¬ Hémiplégie *G81.9*
- ¬ Hémiplégie faciale *G83.8*

Alternaria ¬ Infection à *B48.7*

Altherr
v./v.a. Von-Meyenburg-Altherr-Uehlinger

Altitude
- Non précisés ¬ Effets de l' *T70.2*
- ¬
- - Anoxie due à l' *T70.2*
- - Œdème pulmonaire de haute *T70.2*
- - Polycythémie: due à: *D75.1*

Aluminium
- Dialyse ¬ Anémie induite par l' *N18.5†, D63.8**
- ¬ Maladie osseuse due à l' *M83.4*

Aluminose (du poumon) ¬ *J63.0*

Alvéolaire
v./v.a. Hypoventilation alvéolaire
v./v.a. Protéinose alvéolaire
v./v.a. Sarcome alvéolaire
- Diffuse ¬ Hémorragie *R04.8*
- Édentée
- - Associées à un traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la crête *K06.2*
- - Sans précision ¬ Affection de la gencive et de la crête *K06.9*
- - ¬
- - - Affections précisées de la gencive et de la crête *K06.8*
- - - Atrophie de la crête *K08.2*
- Exacerbation aiguë ¬ Microlithiase pulmonaire *J84.01*
- Fistule ¬ Abcès: dento- *K04.6*

Alvéolaire *–suite*
- Foie ¬ Échinococcose *B67.5†, K77.0**
- Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus multilocularis [échinococcose *B67.6*
- Maxillaire
- - Inférieur ¬ Fracture de la partie *S02.67*
- - Supérieur ¬ Fracture de la partie *S02.43*
- Primaires ¬ Multiples tumeurs *C34.9, C97!*
- SAI ¬
- - Abcès: dento- *K04.7*
- - Hypertrophie de la crête *K08.8*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Microlithiase pulmonaire *J84.00*
- Tissu mou
- - Abdomen ¬ Rhabdomyosarcome *C49.4*
- - Cou ¬ Rhabdomyosarcome *C49.0*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ Rhabdomyosarcome *C49.8*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ Rhabdomyosarcome *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ Rhabdomyosarcome *C49.1*
- - Pelvis ¬ Rhabdomyosarcome *C49.5*
- - Tête ¬ Rhabdomyosarcome *C49.0*
- - Thorax ¬ Rhabdomyosarcome *C49.3*
- - Tronc ¬ Rhabdomyosarcome *C49.6*
- ¬
- - Affections précisées des dents et de l'appareil *K08.88*
- - Echinococcose *B67.7*
- - Fente
- - - Labial
- - - - Bilatérale avec fente de la partie *Q37.4*
- - - - Fente de la partie *Q37.5*
- - - - Unilatérale avec fente de la partie *Q37.5*
- - - Processus) *K08.8*
- - Irrégularité de la crête *K08.8*
- - Kyste (de): naso-labial [naso- *K09.1*
- - Lésion des parois *J84.00*
- - Microlithiase pulmonaire *J84.00*
- - Muqueuse (de la crête) *C03*
- - Ostéite *K10.3*
- - Plaie ouverte
- - - Lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus *S01.53*
- - - Zone de l'os *S01.59*
- - Pneumopathie
- - - *J84.00*
- - - Pariéto- *J84.00*

Alvéole
- Dentaires au cours de scorbut ¬ Inflammation des *E54†, K93.8**
- Maxillaire supérieur ¬ Fracture de l' *S02.43*
- Pulmonaires ¬
- - Adénome des *D14.3*
- - Collapsus primitif des *P28.0*
- - ¬ Fracture de l' *S02.8*

Alvéolite
- Allergique
- - Due
- - - Actinomycètes thermophiles ¬ *J67.70*
- - - Moisissures ¬ *J67.70*
- - - Organismes se développant dans les systèmes de ventilation ¬ *J67.70*
- - - Poussière organiques
- - - - Exacerbation aiguë ¬ *J67.91*
- - - - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J67.90*
- - - - ¬ *J67.8*
- - Exogène ¬ *J67.90*
- - ¬
- - - *J67.90*
- - - Obstruction des voies respiratoires avec *J67.90*
- Due
- - Aspergillus clavatus ¬ *J67.40*
- - Cryptostroma corticale ¬ *J67.60*
- Extrinsèque ¬ *J67.90*
- Fibreux
- - Cryptogénique ¬ *J84.10*
- - Exacerbation aiguë ¬ *J84.11*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J84.10*
- - ¬ *J84.10*
- Fibrosante cryptogénique] ¬ CFA [*J84.10*
- Mâchoires ¬ *K10.3*
- Sèche ¬ *K10.3*

Alvéolo-capillaire congénitale ¬ Dysplasie *P27.8*

Alymphoplasie thymique ¬ *D82.1*

Alzheimer
- Apparition
- - Présénile ¬ Démence dégénérative primaire de type *G30.0†, F00.0**
- - Sénile ¬ Démence dégénérative primaire de type *G30.1†, F00.1**
- Début
- - Précoce (type 2) ¬ Démence de la maladie d' *G30.0†, F00.0**
- - Présénile ¬ Démence dégénérative primaire de type *F00.0**
- - Sénile ¬ Démence dégénérative primaire de type *F00.1**
- - Tardif
- - - Type 1) ¬ Démence de la maladie d' *G30.1†, F00.1**
- - - ¬ Démence de la maladie d' *G30.1†, F00.1**
- DSTA) ¬ Démence sénile, de type *F00.1**
- Forme
- - Atypique ¬ Démence de type *G30.8†, F00.2**
- - Mixte ¬ Démence de type *G30.8†, F00.2**
- Précoce autosomique dominante ¬ Maladie d' *G30.0*
- Type

Alzheimer *–suite*
- Type *–suite*
- - 1 ¬ Maladie d' *F00.1**
- - 2 ¬ Maladie d' *F00.0**
- ¬ Démence
- - *G30.9†, F00.9**
- - Atypique, de type *F00.2**
- - Cours
- - - Maladie d' *G30.9†, F00.9**
- - - Sclérose d' *G30.9†, F00.9**
- - Dégénérative primaire de type *G30.9†, F00.9**
- - Présénile
- - - Cours de maladie d' *G30.0†, F00.0**
- - - Type *F00.0**
- - Sénile au cours de maladie d' *G30.1†, F00.1**

Alzheimerlike ¬ Maladie à prions familiale *A81.9*

Amantadine ¬ *T42.8*

Amastie
- Absence de mamelon ¬ *Q83.0*
- Congénitale isolée ¬ *Q83.0*
- Présence du mamelon ¬ *Q83.88*
- ¬ *Q83.88*

Amaurose
- Congénitale Leber ¬
- - *H35.5*
- - Syndrome de dysplasie spondylo-épiphysaire-surdité neurosensorielle-déficience intellectuelle- *Q87.1*
- Fugace régression totale
- - 1 à 24 heures ¬ *G45.32*
- - Heure ¬ *G45.33*
- Hypertrichose ¬ Syndrome d' *H35.5, Q84.2*
- Tapéto-rétinienne de Leber ¬ *H35.5*
- Traumatique ¬ *S05.9*

Amaurotique
- Familiale ¬ Idiotie *E75.4*
- Infantile ¬ Idiotie *E75.4*
- Juvénile ¬ Idiotie *E75.4*
- ¬
- - Forme tardive de l'idiotie *E75.4*
- - Idiotie *E75.4*

Ambiant
- Eau ¬ Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique *T70.0*
- ¬
- - Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique *T70.1*
- - Hypothermie, non associée à une baisse de la température *R68.0*
- - Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible teneur en oxygène de l'air *T71*

Ambiguïté
- Organes génitaux ¬ *Q56.4*

Ambiguïté *–suite*
- Sexuelle XX-prédisposition au carcinome spinocellulaire ¬ Syndrome de kératodermie palmoplantaire- *Q56.0, Q82.8*

Amblyopie
- Anisométrique ¬ *H53.0*
- Défaut d'usage ¬ *H53.0*
- Ex anopsia ¬ *H53.0*
- Strabisme ¬ *H53.0*

Ambras ¬ Syndrome d' *Q84.2*

Ambroisie avec asthme ¬ Allergie à l' *J45.09*

AMC [Arthrogrypose multiple congénitale] ¬ *Q74.3*

Amégacaryocytaire congénitale ¬ Thrombocytopénie *D69.41*

Amégacaryocytique ¬ Syndrome de synostose radioulnaire-thrombocytopénie *Q87.2*

Amélanotique stellaire multiforme] ¬ CASM [Choroïdopathie *H31.8*

Amélie
- Autosomique récessive ¬ *Q73.0*
- Malformations multiples ¬ Syndrome de tetra- *Q87.8*
- Membre
- - Inférieur ¬ *Q72.0*
- - Supérieur ¬ *Q71.0*
- SAI ¬ *Q73.0*

Améloblastique
v./v.a. Carcinome améloblastique
- Mandibule ¬
- - Fibrosarcome *C41.1*
- - Odontosarcome *C41.1*
- - Sarcome *C41.1*
- Maxillaire supérieur ¬ Fibrosarcome *C41.02*
- ¬
- - Fibro-odontosarcome *C41.1*
- - Fibrosarcome *C41.1*

Améloblastome
- Adénoïde
- - Mâchoire supérieure ¬ *D16.42*
- - Mandibule ¬ *D16.5*
- Maligne du maxillaire supérieur ¬ *C41.02*
- Maxillaire inférieur ¬ *D16.5*
- ¬ *D16.5*

Amélogenèse imparfaite
- Hyperplasie gingivale ¬ Syndrome d' *K00.5*
- Hypocalcifiée ¬ *K00.5*
- Hypomature ¬ *K00.5*
- Hypoplasique ¬ *K00.5*
- Néphrocalcinose ¬ Syndrome d' *K00.5†, N29.8**
- ¬ Syndrome
- - Dystrophie des cônes et des bâtonnets- *K00.5, H35.5*
- - Trichodysplasie- *Q82.8*

Amelogenesis imperfecta ¬ *K00.5*

Amélo-onycho-hypohidrotique ¬ Syndrome *Q82.4*

Amélosarcome de la mandibule ¬ *C41.1*

Aménorrhée
- Primaire ¬ *N91.0*
- Sans précision ¬ *N91.2*
- Secondaire ¬ *N91.1*

Américaine
- Atteinte cardiaque ¬ Trypanosomiase *B57.2†, I41.2**
- ¬ trypanosomiase *B57*

Amérindienne ¬ Myopathie *G71.2*

Amérique du Nord ¬ Cirrhose héréditaire des enfants indiens d' *K74.6*

Amertume post-traumatique ¬ Trouble d' *F43.1*

Amiante
- Mention d'exacerbation aiguë ¬ Pneumoconiose due à l' *J61.1*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Pneumoconiose due à l' *J61.0*
- ¬ Pneumoconiose due à l' *J61.0*

Amiantose ¬ *J61.0*

Amibes ¬
- Abcès
- - *A06.4†, K77.0**
- - Rate dû à des *A06.8†, D77**
- Cystite due à des *A06.8†, N33.8**
- Dermatite due à des *A06.7*
- Pneumonie due à des *A06.5†, J17.3**
- Vésiculite due à des *A06.8†, N51.8**
- Vulvo-vaginite due à des *A06.8†, N77.1**

Amibiase
- Aigüe ¬ *A06.0*
- Aiguë à Entamoeba histolytica ¬ *A06.0*
- Chronique ¬ Ulcère de l'intestin au cours d'une *A06.1*
- Cutanée ¬ *A06.7*
- Entamoeba histolytica ¬ *A06.9*
- Foie ¬ *A06.4†, K77.0**
- Hépatique ¬ *A06.4†, K77.0**
- Intestinale chronique
- - Entamoeba histolytica ¬ *A06.1*
- - ¬ *A06.1*
- Poumon ¬ *A06.5†, J99.8**
- ¬ *A06.9*

Amibien
v./v.a. Abcès amibien
- Aiguë ¬
- - Diarrhée *A06.0*
- - Dysenterie *A06.0*
- - Entérite *A06.0*
- Chronique ¬
- - Diarrhée *A06.1*
- - Dysenterie *A06.1*
- - Entérite *A06.1*
- Non dysentérique
- - Entamoeba histolytica ¬ Colite *A06.2*
- - ¬

Amibien *–suite*
- Non dysentérique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Colite *A06.2*
- - - Diarrhée *A06.2*
- - - Entérite *A06.2*
- Peau ¬ Ulcère *A06.7*
- Primitive ¬
- - MEAP [méningo-encéphalite *B60.2†, G05.2**
- - Méningo-encéphalite *B60.2†, G05.2**
- ¬
- - Appendicite *A06.8*
- - Balanite *A06.8†, N51.2**
- - Cystite *A06.8†, N33.8**
- - Diarrhée *A06.0*
- - Entérite *A06.0*
- - Infection *A06.9*
- - Kératite *B60.1†, H19.2**
- - Localisations d'une infection *A06.8*
- - Proctite aiguë *A06.8*

Amidation ¬ Insuffisance en acides biliaires-CoA ligase et défaut d' *K76.8*

Amidinotransférase ¬ Déficit en l-arginine:glycine *E72.8*

Amidohydrolase ¬ Déficit en N-acyl-L-amino acide *E72.8*

Amidon ¬ Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*

Amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l' *U81.6!*

Amincissement stromal] ¬ Syndrome EDICT [dystrophie endothéliale-hypoplasie de l'iris-cataracte congénitale- *Q13.8*

Aminé
v./v.a. acides aminés

Amino
v./v.a. N-acyl-L-amino

Amino-4-imidazole carboxamide ribosidurie ¬ 5- *E79.8*

Aminoacidopathie ¬ *E72.9*

Aminoacidurie
- Hyperdibasique type
- - 1 ¬ *E72.0*
- - 2 ¬ *E72.0*
- ¬
- - *E72.9*
- - Camptodactylie familiale avec une *Q68.1*

Aminoacylase 2 ¬ Déficit en *E75.2*

Aminobenzène] ¬ Aniline [*T65.3*

Aminobutyrique
v./v.a. gamma-aminobutyrique

Aminoglycoside
- Non résistant glycopeptides ¬

Aminoglycoside *–suite*
- Non résistant glycopeptides ¬ *–suite*
- - Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux *U80.21!*
- - Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux *U80.31!*
- ¬
- - Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et fortement résistant aux *U80.20!*
- - Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et hautement résistant aux *U80.30!*
- - Surdité neurosensorielle mitochondriale non syndromique avec sensibilité accrue aux *H90.5*

Aminolévulinate
v./v.a. delta-aminolévulinate

Aminophénol ¬ Intoxication par des dérivés du 4- *T39.1*

Aminoptérine
v./v.a. pseudo-aminoptérine
- ¬ Embryofœtopathie à l' *Q86.88*

Aminosides ¬ Intoxication: *T36.5*

Aminotransférase
- Forme
- - Infantile ¬ Déficit en phosphosérine *E72.8*
- - Juvénile ¬ Déficit en phosphosérine *E72.8*
- Peroxysomale ¬ Déficit en alanine-glyoxylate *E74.8*
- ¬
- - Déficit
- - - Ornithine *E72.4*
- - - Phosphosérine *E72.8*
- - Taux anormal
- - - Alanine *R74.8*
- - - Aspartate *R74.8*
- - Tyrosinémie par déficit en tyrosine *E70.2*

Amish ¬
- Albinisme oculo-cutané type *E70.3*
- Microcéphalie létale type *Q02*
- Myopathie némaline type *G71.2*

AMME ¬ Syndrome *Q87.8*

Ammoniac
v./v.a. histidine-ammoniac-lyase
- ¬ Trouble métabolisme
- - *E72.2*
- - Cycle de l'urée et de la détoxification de l' *E72.2*

Ammoniaque ¬ Taux accru d' *R79.8*

Ammonium quaternaire ¬ Hypersensibilité aux composés d' *T78.4*

Amnésie
- Antérograde ¬ *R41.1*
- Dissociative ¬ *F44.0*
- Globale transitoire régression totale
- - 1 à 24 heures ¬ *G45.42*
- - Heure ¬ *G45.43*

Amnésie *–suite*
- Rétrograde ¬ *R41.2*
- SAI ¬ *R41.3*
- ¬ Autres formes d' *R41.3*

Amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives ¬ Syndrome *F04*

Amnii) ¬ Aspiration de liquor (*P24.1*

Amniocentèse
- Césarienne ou déclenchement chirurgical ¬ Lésion du placenta par *P02.1*
- ¬
- - *Z36.0*
- - Dépistages prénatals par *Z36.2*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*

Amnio-perfusion ¬ Syndrome d' *O88.1*

Amniotique
- Membrane
- - Sans précision ¬ Anomalie du liquide *O41.9*
- - ¬
- - - Anomalies précisées du liquide *O41.8*
- - - Infection du sac *O41.1*
- Mucus ¬ Aspiration néonatale de liquide *P24.1*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): liquide *O08.2*
- Unique ¬ Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac *O69.2*
- ¬
- - Embolie *O88.1*
- - Présence de méconium dans le liquide *P20*
- - Syndrome de brides *Q79.8*
- - Travail accouchement compliqué
- - - Anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide *O68.2*
- - - Présence de méconium dans le liquide *O68.1*

Amniotite
v./v.a. Chorio-amniotite
- ¬ *O41.1*

AMNR] Neurorétinopathie aiguë maculaire ¬ [*H35.39*

Amœbome ¬ *A06.3*

Amorale ¬ Personnalité: *F60.2*

Amphétamine méthamphétamine ¬
- Consommation non intraveineuse de produits contenant de l' *U69.34!*
- Utilisation intraveineuse de produits contenant de l' *U69.33!*

Amphibien ¬ Venin d' *T63.8*

Ampoule
- Rectale ¬ *C20*
- Vater ¬
- - *D01.5*
- - *D37.6*
- - Carcinome de l' *C24.1*

Ampoule *–suite*
- Vater ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne: *C24.1*

Amputation
- Col utérin en tant que complication de l'accouchement ¬ *O65.5*
- Fœtus pour faciliter l'accouchement ¬ *P03.8*
- Partie inférieure du membre inférieur ¬ *S88.9*
- Traumatiques membre
- - Inférieur ¬ Séquelles d'écrasement et d' *T93.6*
- - Supérieur ¬ Séquelles d'écrasement et d' *T92.6*
- ¬
- - Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d' *T87.6*
- - Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d' *T87.6*
- - Hématome au niveau d'un moignon d' *T87.6*
- - Infection d'un moignon d' *T87.4*
- - Nécrose d'un moignon d' *T87.5*
- - Névrome sur moignon d' *T87.3*
- - Œdème au niveau d'un moignon d' *T87.6*

Amputation traumatique
- Articulation
- - Coude ¬ *S58.0*
- - Hanche ¬ *S78.0*
- Articulation de l'épaule ¬ *S48.0*
- Associations de parties du corps ¬ *T05.8*
- Associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main ¬ *S68.3*
- Avant-bras, niveau non précisé ¬ *S58.9*
- Bras SAI ¬ *T11.6*
- Coude et le poignet ¬ *S58.1*
- Deux
- - Doigts ou plus (complète) (partielle) ¬ *S68.2*
- - Mains ¬ *T05.0*
- - Membres
- - - Inférieurs [tout niveau] ¬ *T05.5*
- - - Supérieurs [tout niveau] ¬ *T05.2*
- - Orteils ou plus ¬ *S98.2*
- - Pieds ¬ *T05.3*
- Doigt (complète) (partielle) ¬ *S68.1*
- Épaule
- - Bras, niveau non précisé ¬ *S48.9*
- - Coude ¬ *S48.1*
- Genou et la cheville ¬ *S88.1*
- Hanche
- - Cuisse, niveau non précisé ¬ *S78.9*
- - Genou ¬ *S78.1*
- Jambe
- - Niveau non précisé ¬ *S88.9*
- - SAI ¬ *T13.6*
- Main

Amputation traumatique *–suite*
- Main *–suite*
- - Membre supérieur [tout niveau, sauf la main] ¬ *T05.1*
- - Niveau du poignet ¬ *S68.4*
- Membre
- - Inférieur, niveau non précisé ¬ *T13.6*
- - Supérieur, niveau non précisé ¬ *T11.6*
- Membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau] ¬ *T05.6*
- Multiples, sans précision ¬ *T05.9*
- Niveau
- - Cou ¬ *S18*
- - Genou ¬ *S88.0*
- Oreille ¬ *S08.1*
- Organes génitaux externes ¬ *S38.2*
- Orteil
- - S) et d'autres parties du pied ¬ *S98.3*
- - ¬ *S98.1*
- Partie
- - Corps non précisée ¬ Écrasement et *T14.7*
- - Tête non précisée ¬ *S08.9*
- - Thorax ¬ *S28.1*
- Parties
- - Non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S38.3*
- - Pied ¬ *S98.3*
- - Poignet et de la main ¬ *S68.8*
- - Tête ¬ *S08.8*
- Pied
- - Membre inférieur [tout niveau, sauf le pied] ¬ *T05.4*
- - Niveau
- - - Cheville ¬ *S98.0*
- - - Non précisé ¬ *S98.4*
- Plusieurs parties du corps ¬ *T05*
- Poignet et de la main, niveau non précisé ¬ *S68.9*
- Pouce (complète) (partielle) ¬ *S68.0*
- SAI ¬ *T14.7*
- Tronc, niveau non précisé ¬ *T09.6*

AMS-P [atrophie multisystématisée de type parkinsonien] ¬ *G23.2*

Amsterdam ¬ Maladie hémorragique du facteur V d' *D68.22*

Amyélie ¬ *Q06.0*

Amygdale
- Antérieur) (postérieur) ¬ Tumeur maligne: Pilier de l' *C09.1*
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Tuberculose des *A15.8*
- Lingual ¬
- - *D10.1*
- - Carcinome épidermoïde de l' *C02.4*
- - Syphilis tardive des *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur maligne: *C02.4*
- Palatin ¬
- - *C09.9*

Amygdale *–suite*
- Palatin ¬ *–suite*
- - *D10.4*
- Pharyngien ¬
- - *D10.6*
- - Carcinome des *C11.1*
- SAI ¬ *C09.9*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C09.9*
- Végétation adénoïde
- - SAI ¬ Maladie (chronique) des *J35.9*
- - Sans précision ¬ Maladie chronique des *J35.9*
- - ¬
- - - Hypertrophie des *J35.3*
- - - Maladies chroniques des *J35.8*
- ¬
- - Abcès de l' *J36*
- - Angiosarcome d' *C09.9*
- - Aspergillose des *B44.2†, J99.8**
- - Fosse des *D10.5*
- - Gomme d' *A52.7†, J99.8**
- - Hyperplasie des *J35.1*
- - Hypertrophie des *J35.1*
- - Piliers des *D10.5*
- - Syphilis des *A52.7†, J99.8**
- - Tératome de l' *D37.0*
- - Tuberculose des *A16.8*
- - Tumeur bénigne: *D10.4*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l' *C09.8*

Amygdalien
- Adénoïdienne) ¬ Cicatrice *J35.8*
- ¬
- - Diphtérie *A36.0*
- - Tumeur maligne: Fosse *C09.0*
- - Ulcère *J35.8*

Amygdalite
- Aiguë
- - Due à d'autres micro-organismes précisés ¬ *J03.8*
- - Folliculaire ¬ *J03.9*
- - Gangréneuse ¬ *J03.9*
- - Infectieuse ¬ *J03.9*
- - Sans précision ¬ *J03.9*
- - Ulcéreuse ¬ *J03.9*
- - ¬ *J03.9*
- Aspergillus ¬ *B44.2†, J99.8**
- Chronique ¬ *J35.0*
- Diphtérique ¬ *A36.0*
- Due au virus de l'herpès ¬ Gingivo-stomatite et pharyngo- *B00.2*
- Pneumocoques ¬ *J03.8, B95.3!*
- Récidivante avec épisode inflammatoire aigu en cours ¬ *J03.9*
- Staphylocoques ¬ *J03.8, B95.8!*
- Streptocoques ¬ *J03.0*
- Tuberculeuse

Amygdalite *–suite*
- Tuberculeuse *–suite*
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*

Amygdalolithe ¬ *J35.8*

Amylase ¬ Anomalies des taux de: *R74.8*

Amylique ¬ Alcool: *T51.3*

Amylo-1,6-glucosidase ¬ Déficit en *E74.0*

Amyloïde
- Autonome ¬ Neuropathie *E85.9†, G99.08**
- Familiale ¬ Néphropathie *E85.0†, N08.4**
- Héréditaire ¬ Néphropathie *E85.0†, N08.4**
- Moelle épinière ¬ Dégénérescence *E85.4†, G32.8**
- Portugaise ¬ Polyneuropathie *E85.1*
- Rate ¬ Maladie *E85.4†, D77**
- Système nerveux ¬ Dégénérescence *E85.4†, G99.8**
- Transthyrétine ¬ Cardiopathie *E85.4†, I43.1**
- Type portugais ¬ Polyneuropathie *E85.1†, G63.3**
- ¬
- - Angiopathie cérébrale *E85.4†, I68.0**
- - Dégénérescence capillaire *E85.88†, I79.8**
- - Glomérulopathie fibrillaire non *N03.8*
- - Lichen *E85.4†, L99.0**
- - Maladie gastro-intestinale *E85.4†, K93.8**
- - Néphropathie *E85.4†, N08.4**
- - Névrite *E85.4†, G63.3**
- - Polyneuropathie *E85.1†, G63.3**

Amyloïdose à transthyrétine wild type ¬ *E85.80*

Amylopectinose ¬ *E74.0*

Amylose
- AA ¬ *E85.38*
- AApoAI ¬ *E85.0*
- AApoAII [Amylose à apolipoprotéine A-II] ¬ *E85.0†, N08.4**
- ABeta2M variante ¬ *E85.1*
- ABeta2Mwt ¬ *E85.38*
- Afib ¬ *E85.0†, N08.4**
- AL
- - Localisée ¬ *E85.4*
- - Systémique ¬ *E85.30*
- - ¬ *E85.88*
- ALECT2 [Amylose à Leucocyte chemotactic factor-2] ¬ *E85.0*
- Apolipoprotéine
- - A-I ¬ *E85.0*
- - A-II] ¬ Amylose AApoAII [*E85.0†, N08.4**
- - A-IV ¬ *E85.88*
- ATTR wild type ¬ *E85.80*
- ATTRV122I ¬ *E85.4*
- ATTRV30M ¬ *E85.1†, G63.3**
- Chaîne
- - Alpha du fibrinogène A ¬ *E85.0†, N08.4**

Amylose *–suite*
- Chaîne *–suite*
- - Légère ¬ *E85.88*
- - Lourde ¬ *E85.9*
- Conjonctivale ¬ *E85.4†, H13.8**
- Cutané
- - Dyschromique ¬ *E85.4†, L99.0**
- - Familiale isolée ¬ *E85.4†, L99.0**
- - Nodulaire ¬ *E85.4†, L99.0**
- - ¬
- - - *E85.4†, L99.0**
- - - Pigmentation réticulée liée à l'X associée à une *Q82.8, E85.4*
- Dépôt conjonctival ¬ *E85.4†, H13.8**
- Familiale
- - Type finlandais ¬ *E85.1*
- - ¬ Polyneuropathie au cours d' *E85.1†, G63.3**
- Gastrique ¬ *E85.4†, K93.8**
- Généralisée secondaire ¬ *E85.3*
- Hérédofamiliale
- - Neuropathique ¬ *E85.1*
- - Non neuropathique ¬ *E85.0*
- - Sans précision ¬ *E85.2*
- Intestin grêle ¬ *E85.4†, K93.8**
- Intestinale ¬ *E85.4†, K93.8**
- ITM2B [protéine membranaire intégrale 2B] ¬ *E85.4†, I68.0**
- Larynx ¬ *E85.4†, J99.8**
- Leucocyte chemotactic factor-2] ¬ Amylose ALECT2 [*E85.0*
- Liée à la dialyse ¬ *E85.38*
- Limitée à un ou plusieurs organe(s) ¬ *E85.4*
- Pleurale ¬ *E85.4†, J99.8**
- Primitive
- - Systémique ¬ *E85.2*
- - ¬ *E85.88*
- Pulmonaire ¬ *E85.4†, J99.8**
- Rénale ¬ *E85.4†, N29.8**
- Sans précision ¬ *E85.9*
- Secondaire ¬ *E85.38*
- Sous-glottique ¬ *E85.4†, J99.8**
- Sujet âgé ¬ *E85.80*
- Systémique
- - Chaîne légère ¬ *E85.30*
- - Protéine prion ¬ *E85.88*
- - Secondaire ¬ *E85.38*
- - Sénile ¬ *E85.80*
- Transthyrétine héréditaire] ¬ h-ATTR [*E85.2*
- Type
- - Arctique ¬ Hémorragie cérébrale héréditaire avec *E85.4†, I68.0**
- - Flamande ¬ Hémorragie cérébrale héréditaire avec *E85.4†, I68.0**
- - Iowa ¬ Hémorragie cérébrale héréditaire avec *E85.4†, I68.0**
- - Islandais ¬ Hémorragie cérébrale héréditaire avec *E85.4†, I68.0**

Amylose *–suite*
- Type *–suite*
- - Italien ¬ Hémorragie cérébrale héréditaire avec *E85.4†, I68.0**
- - Néerlandais ¬ Hémorragie cérébrale héréditaire avec *E85.4†, I68.0**
- - Piémontais ¬ Hémorragie cérébrale héréditaire avec *E85.4†, I68.0**
- - ¬
- - - *E85.8*
- - Arthrite au cours d' *E85.4†, M14.49**
- - Arthropathie au cours d' *E85.9†, M14.49**
- - Glaucome au cours d' *E85.9†, H42.0**
- - Glomérulonéphrite au cours d' *E85.9†, N08.4**
- - Hémorragie cérébrale héréditaire avec *E85.4†, I68.0**
- - Maladie
- - - Glomérulaire au cours d' *E85.9†, N08.4**
- - - Pulmonaire au cours d' *E85.4†, J99.8**
- - Myopathie au cours d' *E85.4†, G73.6**
- - Neuropathie des nerfs périphériques autonomes au cours d' *E85.4†, G99.08**

Amyoplasie congénitale ¬ *Q79.8*

Amyotrophie
- Bulbospinale ¬ *G12.2*
- Congénitale ¬ *Q79.8*
- Diabétique ¬ *E14.40†, G73.0**
- Monomélique ¬ *G12.2*
- Névralgique de l'épaule] ¬ Syndrome de Parsonage-Turner [*G54.5*
- Péronière (type axonal) (type hypertrophique) ¬ *G60.0*
- Type 1 ¬ *G12.0*
- ¬
- - *G71.8*
- - Diabète sucré de type 2 avec *E11.40†, G73.0**

Amyotrophie spinale
- Adulte ¬ *G12.1*
- Détresse respiratoire type
- - 1 ¬ *G12.2*
- - 2 ¬ *G12.2*
- Distale
- - Autosomique récessive type 5 ¬ *G12.1*
- - Bénigne autosomique dominante ¬ *G12.1*
- - Type
- - - 3 ¬ *G12.1*
- - - 4 ¬ *G12.1*
- - ¬
- - - *G12.1*
- - - Syndrome d'encéphalopathie progressive à début précoce-ataxie spastique- *G31.88*
- Enfant, type II ¬ *G12.1*
- Forme
- - Juvénile, type III [Kugelberg-Welander] ¬ *G12.1*
- - Scapulo-péronière ¬ *G12.1*

Amyotrophie spinale *–suite*
- Héréditaires ¬ Autres *G12.1*
- Infantile
- - Liée à l'X ¬ *G12.1, Q74.3*
- - Type I ¬ *G12.0*
- Malformation de Dandy-Walker-cataracte ¬ Syndrome d' *G12.8†, H28.2*, Q03.1*
- Prénatale avec fractures congénitales des os ¬ *G12.2, Q74.8*
- Progressive ¬ *G12.2*
- Proximale
- - Autosomique dominante
- - - Adulte ¬ *G12.1*
- - - Enfance
- - - - Associée
- - - - - BICD2 ¬ *G12.1*
- - - - - DYNC1H1 ¬ *G12.1*
- - - - ¬ *G12.1*
- - Épilepsie myoclonique progressive ¬ Syndrome d' *G12.1, G40.3*
- - Type
- - - 1 ¬ *G12.0*
- - - 2 ¬ *G12.1*
- - - 3 ¬ *G12.1*
- - - 4 ¬ *G12.1*
- - - Jokela ¬ *G12.1*
- - ¬ *G12.1*
- Sans précision ¬ *G12.9*
- Syndromes apparentés ¬ Autres *G12.8*

Amyotrophique
- Type 4 ¬ Sclérose latérale *G12.2*
- ¬
- - Maladie de Charcot [sclérose latérale *G12.2*
- - Névralgie *G54.5*
- - Paralysie *G12.2*
- - Sclérose latérale *G12.2*
- - SLA [Sclérose latérale *G12.2*

Anabolisants ¬ Intoxication: Androgènes et autres *T38.7*

Anadysplasie métaphysaire ¬ *Q78.5*

Anaérobies
- Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus fragilis et autres micro-organismes *B96.6!*
- Gram positif non sporulants précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes *B95.91!*
- Sporulants à Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes *B96.7!*
- ¬
- - Bactériémie à des *A49.88*
- - Infection à des *A49.88*
- - Sepsis du nouveau-né dû à des *P36.5*
- - Septicémie à micro-organismes *A41.4*

Anagène ¬ *L65.1*

Anagènes caducs ¬
- Maladie des cheveux *L65.1*
- Syndrome Noonan-like avec cheveux *Q87.1*

Anal
v./v.a. Type de maladie

Analbuminémie
- Congénitale ¬ *E88.08*
- ¬ *E88.08*

Analeptiques et antagonistes des opiacés ¬ Intoxication: *T50.7*

Analgésie
- Congénitale avec déficience intellectuelle sévère ¬ *G90.88, F72.9*
- Mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une *P04.0*

Analgésique
- Non opioïde
- - Antipyrétique
- - - Antirhumatismal, sans précision ¬ Intoxication: *T39.9*
- - - Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T39.8*
- - ¬ Intoxication par *T39.9*
- Sédatif cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un *O89*
- ¬
- - Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.6*
- - Asthme due aux *J45.19*
- - Néphropathie due à un *N14.0*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.2*

Analphabétisme ¬ *Z55*

Analphalipoprotéinémie ¬ *E78.6*

Anankastique ¬
- Névrose: *F42*
- Personnalité *F60.5*

Anaphylactique
v./v.a. Choc anaphylactique
- Myorelaxants ¬ Réaction *T88.6*
- SAI ¬ Réaction *T78.2*
- ¬ Purpura *D69.0*

Anaphylactoïde pendant la grossesse ¬ Syndrome *O88.1*

Anaphylaxie SAI ¬ *T78.2*

Anaplasique
v./v.a. Lymphome anaplasique
- Cerveau ¬
- - Astrocytome *C71.0*
- - Oligoastrocytome *C71.0*
- Cervelet ¬
- - Astrocytome *C71.6*
- - Gangliogliome *C71.6*

Anaplasique *–suite*
- Cervelet ¬ *–suite*
- - Oligoastrocytome *C71.6*
- - Oligodendrogliome *C71.6*
- Encéphale ¬
- - Gangliogliome *C71.0*
- - Oligodendrogliome *C71.0*
- Grandes cellules ¬ Lymphome cutané *C86.6*
- Lésion localisations contiguës encéphale ¬
- - Astrocytome *C71.8*
- - Gangliogliome *C71.8*
- - Oligoastrocytome *C71.8*
- - Oligodendrogliome *C71.8*
- Lobe frontal ¬
- - Astrocytome *C71.1*
- - Gangliogliome *C71.1*
- - Oligoastrocytome *C71.1*
- - Oligodendrogliome *C71.1*
- Lobe occipital ¬
- - Astrocytome *C71.4*
- - Gangliogliome *C71.4*
- - Oligoastrocytome *C71.4*
- - Oligodendrogliome *C71.4*
- Lobe pariétal ¬
- - Astrocytome *C71.3*
- - Gangliogliome *C71.3*
- - Oligoastrocytome *C71.3*
- - Oligodendrogliome *C71.3*
- Lobe temporal ¬
- - Astrocytome *C71.2*
- - Gangliogliome *C71.2*
- - Oligoastrocytome *C71.2*
- - Oligodendrogliome *C71.2*
- Moelle épinière ¬ Épendymome *C72.0*
- Quatrième ventricule ¬
- - Épendymome *C71.7*
- - Gangliogliome *C71.7*
- - Oligodendrogliome *C71.7*
- Thyroïde ¬ Cancer *C73*
- Tronc cérébral ¬
- - Astrocytome *C71.7*
- - Gangliogliome *C71.7*
- - Oligoastrocytome *C71.7*
- - Oligodendrogliome *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬
- - Astrocytome *C71.5*
- - Épendymome *C71.5*
- - Gangliogliome *C71.5*
- - Oligodendrogliome *C71.5*
- ¬
- - Astrocytome *C71.9*
- - Épendymome *C71.9*
- - Gangliogliome *C71.9*
- - Lymphome diffus à grandes cellules B *C83.3*
- - Médulloblastome *C71.6*

Anaplasique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Oligoastrocytome *C71.9*
- - Oligodendrogliome *C71.9*
- - Séminome *C62.9*

Anarthrie ¬ Dysarthrie et *R47.1*

Anasarque
- Acidose lactique-anémie sidéroblastique-défaillance multisystémique ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Fièvre-insuffisance rénale-organomégalie] ¬ Syndrome de TAFRO [thrombocytopénie- *D89.8*
- Fœto-placentaire
- - Due
- - - Iso-immunisation ¬ *P56.0*
- - - Maladies hémolytiques, autres et sans précision ¬ *P56.9*
- - Non
- - - Associée à une iso-immunisation ¬ *O36.2*
- - - Due à une maladie hémolytique ¬ *P83.2*
- - SAI ¬ *O36.2*
- - ¬
- - - Incompatibilité Rh (avec *O36.0*
- - - Iso-immunisation: SAI (avec *O36.1*
- - - Soins maternels pour *O36.2*

Anastomose
- Congénitale entre vaisseaux rétiniens et chorioïdiens ¬ *Q14.8*
- Iléo-anale avec poche ¬ Incontinence fécale liée à une *R15, K91.88*
- Intestinale ¬
- - Inflammation d' *K91.88*
- - Status post dérivation ou *Z98.0*
- Opérations du pancréas ¬ Insuffisance d' *K91.82*
- Pancréas avec atteinte de l'intestin grêle ¬ Insuffisances d' *K91.82*
- Suture opération
- - Anus ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Estomac ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Intestin ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Œsophage ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Organes du système digestif ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Pancréas ¬ Insuffisances d' *K91.82*
- - Rectum ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Trachée, des bronches et des poumons ¬ Insuffisances d' *J95.82*
- - Vésicule et des voies biliaires ¬ Insuffisances d' *K91.81*
- Vasculaire ¬
- - Complication mécanique due à une *T82.3*
- - Infection d'une *T82.73*
- - Inflammation d'une *T82.73*
- Voies digestives ¬ Insuffisance d'une *K91.83*
- ¬ *Z49.0*

Anastomotique ¬
- Hémangiome *D18.00*
- Ulcère (peptique) ou érosion: *K28*

Anauxétique ¬ Dysplasie *Q77.7*

ANCA
- Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles] ¬ Glomérulonéphrite pauci-immune avec *N01.7*
- ¬ Vascularite associée aux *I77.6*

Ancien
v./v.a. Type de maladie

Ancrage osseux [BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse auditive à *Z96.2*

Andermann ¬ Syndrome d' *Q04.0, G60.0*

Andersen ¬
- Maladie de: *E74.0*
- Syndrome d' *I49.8, Q79.8*

Andersen-Tawil ¬ Syndrome d' *I49.8, Q79.8*

Anderson ¬
- Maladie d' *E78.6*
- Ostéodysplasie familiale type *Q75.1*

Anderson-Fabry ¬ Dégénérescence cérébrale au cours de maladie d' *E75.2†, G32.8**

Andopeptidase neutre ¬ Néphropathie membraneuse congénitale par anticorps maternels contre l' *P96.0*

Andrews ¬ Syndrome d' *L40.3*

Androgène
- Anabolisants ¬ Intoxication: *T38.7*
- CAIS] ¬ Insensibilité totale aux *E34.51*
- Ovariens ¬ Hypersécrétion des *E28.1*
- PAIS] ¬ Insensibilité partielle aux *E34.50*
- Sans précision ¬ Syndrome de résistance aux *E34.59*
- Testiculaire SAI ¬ Biosynthèse défectueuse de l'hormone *E29.1*
- ¬
- - Insensibilité aux *E34.5*
- - Pseudo-hermaphrodisme masculin avec résistance aux *E34.5*
- - Syndrome résistance
- - - Partielle aux *E34.50*
- - - Totale aux *E34.51*

Androgénique
- Médicamenteuse ¬ Alopécie *L64.0*
- Sans précision ¬ Alopécie *L64.9*
- ¬ Autres formes d'alopécie *L64.8*

ANE ¬ Syndrome *Q87.8*

Anémie
- Addison ¬ *D51.0*
- Anomalies enzymatiques ¬ Autres *D55.8*
- Aplasique
- - Autosomique dominante associée à une myélodysplasie ¬ *D61.0, D46.9*
- - Héréditaire isolée ¬ *D61.0*
- Arégénérative ¬ *D64.9*
- Associée carence
- - Cuivre ¬ *D53.8*

Anémie *–suite*
- Associée carence *–suite*
- - Molybdène ¬ *D53.8*
- - Zinc ¬ *D53.8*
- Biermer ¬ *D51.0*
- Blackfan-Diamond ¬ *D61.0*
- Bothriocephalus ¬ *B70.0†, D63.8**
- Carence en acides aminés ¬ *D53.0*
- Chronique simple ¬ *D53.9*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O99.0*
- Congénitale
- - Corps de Heinz ¬ *D58.2*
- - Perte de sang fœtal ¬ *P61.3*
- - SAI ¬ *P61.4*
- Congénitales, non classées ailleurs ¬ Autres *P61.4*
- Cours
- - Maladies chroniques classées ailleurs ¬ *D63.8**
- - Néphropathie chronique stade
- - - 3 ¬ *N18.3†, D63.8**
- - - 4 ¬ *N18.4†, D63.8**
- - - 5 ¬ *N18.5†, D63.8**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, D63.0**
- Déficit
- - 2,3 disphospho-glycérate-mutase [2,3 DGM] ¬ *D55.2*
- - Fer réfractaire au traitement par le fer ¬ *D50.8*
- - Glutathion réductase
- - - GGS-R] ¬ *D55.1*
- - - ¬ *D55.1*
- - Pyruvate kinase ¬ *D55.2*
- Dégénérescence combinée de la moelle épinière NCA ¬ *D51.0†, G32.0**
- Diphtérique ¬ *A36.8*
- Diphyllobothrium ¬ *B70.0†, D63.8**
- Due
- - Anomalies
- - - Enzymatiques, sans précision ¬ *D55.9*
- - - Enzymes glycolytiques ¬ *D55.2*
- - - Métabolisme
- - - - Glutathion ¬ *D55.1*
- - - - Nucléotides ¬ *D55.3*
- - Carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] ¬ *D55.0*
- - Déficience en glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ *D55.2*
- - Déficit
- - - 6-phosphogluconate déshydrogénase ¬ *D55.1*
- - - Enzymatique
- - - - Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ *D55.1*
- - - - Voie de l'hexose monophosphate [HMP] NCA ¬ *D55.1*
- - - Gamma-glutamylcystéine ligase ¬ *D55.1*

Anémie *–suite*
- Due *–suite*
- - Déficit *–suite*
- - - Hexokinase ¬ *D55.2*
- - - Triose-phosphate isomérase ¬ *D55.2*
- - Fièvre
- - - Marais ¬ *B54†, D63.8**
- - - Tierce bénigne ¬ *B54†, D63.8**
- - Myxœdème ¬ *E03.9†, D63.8**
- - Paludisme ¬ *B54†, D63.8**
- Dysérythropoïétique liée à l'X avec plaquettes anormales et neutropénie ¬ *D64.4, D70.0*
- Érythrocytaire aplasique congénitale ¬ *D61.0*
- Falciforme [HbS] ¬ *D57.1*
- Fanconi ¬ *D61.0*
- Ferriprive ¬ *D50*
- Hémorragie per- et postopératoire ¬ *D62*
- Hémosidérotique pulmonaire ¬ *E83.1†, J99.8**
- Héréditaire juvénile mégaloblastique due à une carence en facteur intrinsèque ¬ *D51.0*
- Herrick ¬ *D57.1*
- Hyperostose ¬ Syndrome d'insuffisance pancréatique- *K86.83, D64.4*
- Hypochrome
- - Congénitale sévère avec sidéroblastes en couronne ¬ *D64.0*
- - Sidéroblastique liée au sexe ¬ *D64.0*
- - ¬ *D50*
- Hypoplasique
- - Congénitale de Blackfan-Diamond ¬ *D61.0*
- - Familiale ¬ *D61.0*
- - SAI ¬ *D61.9*
- Induite par l'aluminium après dialyse ¬ *N18.5†, D63.8**
- Leuco-érythroblastique ¬ *D64.8*
- Lors de trouble de l'hématopoïèse dû à une lésion toxique directe de la moelle osseuse corrélée à la dose due à des cytostatiques ¬ *D61.10*
- Méditerranéen
- - Hémoglobinopathie) ¬ *D56.9*
- - ¬ *D56.9*
- Microcytaire avec surcharge hépatique en fer ¬ *D50.8*
- Myélofibreuse ¬ *D47.4†, D63.0**
- Myélose funiculaire NCA ¬ *D51.0†, G32.0**
- Nutritionnel
- - Précisées ¬ Autres *D53.8*
- - Sans précision ¬ *D53.9*
- Orotacidurique ¬ *D53.0*
- Paranéoplasique ¬ *C80.9†, D63.0**
- Polycythémie gémellaire ¬ Séquence *O43.0*
- Post-hémorragique
- - Aiguë ¬ *D62*
- - Chronique) ¬ *D50.0*
- Précisées ¬ Autres *D64.8*

Anémie *–suite*
- Prématurité ¬ *P61.2*
- Rénale ¬ *N18.9†, D63.8**
- Retard de croissance ¬ Syndrome CIMDAG [hypoplasie cérébelleuse-déficience intellectuelle-microcéphalie congénitale-dystonie- *Q87.8*
- Sans précision ¬ *D64.9*
- Scorbutique ¬ *D53.2*
- Sphérocytaire héréditaire ¬ *D58.0*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, D63.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, D63.8**
- Tumorale (tumeur primaire inconnue) ¬ *D48.9†, D63.0**
- Type Dyke-Young ¬ *D59.18*
- ¬
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, D64.9*
- - Syndrome de calcification du système nerveux central-surdité-acidose tubulaire- *Q87.8*

Anémie à hématies falciformes
- Drépanocytaire] SAI ¬ *D57.1*
- Sans crises ¬ *D57.1*

Anémie aplastique
- Acquise pure
- - Chronique ¬ *D60.0*
- - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [*D60.9*
- - Transitoire ¬ Aplasie médullaire [*D60.1*
- Acquises pures ¬ Autres aplasies médullaires [*D60.8*
- Constitutionnelle ¬ *D61.0*
- Due à d'autres agents externes ¬ *D61.2*
- Idiopathique ¬ *D61.3*
- Médicamenteux
- - Due à un traitement cytostatique ¬ Aplasie médullaire [*D61.10*
- - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [*D61.19*
- - ¬ Autre aplasie médullaire [*D61.18*
- Précisées ¬ Autres *D61.8*
- Pure congénitale ¬ *D61.0*
- ¬
- - *D61.9*
- - Dyskératose congénitale avec *Q82.8, D61.9*

Anémie dysérythropoïétique congénitale
- Type
- - 1 ¬ CDA [*D64.4*
- - 2 ¬ CDA [*D64.4*
- - 3 ¬ CDA [*D64.4*
- - 4 ¬ CDA [*D64.4*
- ¬ Thrombocytopénie avec *D69.41, D64.4*

Anémie hémolytique
- Acquise
- - Sans précision ¬ *D59.9*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, D59.9*
- Acquises ¬ Autres *D59.8*

Anémie hémolytique *–suite*
- Anticorps
- - Chauds ¬ *D59.18*
- - Froids ¬ *D59.18*
- Auto-anticorps chauds ¬ *D59.18*
- Auto-immun
- - Due à des médicaments ¬ *D59.0*
- - Mixte ¬ *D59.18*
- - Néonatale ¬ *D59.18*
- - Primaire type à auto-anticorps froids ¬ *D59.10*
- - Secondaire de type froid ¬ *D59.18*
- - Symptomatique ¬ *D59.18*
- - Type
- - - Chaud ¬ *D59.18*
- - - Froid ¬ *D59.18*
- - - Mixte ¬ *D59.18*
- - ¬ *D59.18*
- Congénitale non sphérocytaire due à un déficit en pyruvate kinase ¬ *D55.2*
- Déficit en adénylate kinase ¬ *D55.3*
- Donath-Landsteiner ¬ *D59.6*
- Due
- - Carence en glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ *D55.2*
- - Déficit
- - - Glutamate-cystéine ligase ¬ *D55.1*
- - - Glutathion réductase ¬ *D55.1*
- - - Phosphoglucose isomérase ¬ *D55.2*
- - - Phosphoglycéromutase ¬ *D55.2*
- - - Pyrimidine 5' nucléotidase ¬ *D55.3*
- - - Pyruvate kinase du globule rouge ¬ *D55.2*
- - Surproduction d'adénosine désaminase ¬ *D55.3*
- Héréditaire, sans précision ¬ *D58.9*
- Héréditaires précisées ¬ Autres *D58.8*
- Idiopathique chronique ¬ *D59.9*
- Lederer ¬ *D59.18*
- Non sphérocytique de type I ¬ *D55.1*
- Thrombocytopénie autoimmune et déficit immunitaire primaire par déficit en TPP2 ¬ Syndrome d' *D69.3, D82.9*

Anémie mégaloblastique
- Due à un déficit en dihydrofolate réductase ¬ *D52.8*
- Héréditaire ¬ *D51.1*
- Immunodéficience par déficit en transporteur de folate 1 ¬ *D52.8*
- Non classées ailleurs ¬ Autres *D53.1*
- Nutritionnelle ¬ *D52.0*
- SAI ¬ *D53.1*
- Sensible à la thiamine-diabète sucré-surdité de perception ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬ Syndrome de mucoviscidose-gastrite- *Q87.8*

Anémie par carence
- Acide folique

Anémie par carence *–suite*
- Acide folique *–suite*
- - Due à des médicaments ¬ *D52.1*
- - SAI ¬ *D52.9*
- - Sans précision ¬ *D52.9*
- - ¬ Autres *D52.8*
- Alimentaire
- - Acide folique ¬ *D52.0*
- - Vitamine B12 ¬
- - - *D51.3*
- - - Polyneuropathie au cours de l' *D51.3†, G63.4**
- Fer
- - Sans précision ¬ *D50.9*
- - Secondaire à une perte de sang (chronique) ¬ *D50.0*
- - ¬ Autres *D50.8*
- G6PD ¬ *D55.0*
- Protéines ¬ *D53.0*
- Vitamine B12
- - Due
- - - Carence en facteur intrinsèque ¬ *D51.0*
- - - Malabsorption sélective de la vitamine B12 avec protéinurie ¬ *D51.1*
- - Sans précision ¬ *D51.9*
- - ¬ Autres *D51.8*
- ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, D53.9*

Anémie pernicieuse
- Acquise ¬ *D51.0*
- Congénitale ¬ *D51.0*
- Glossite ¬ *D51.0*
- Juvénile ¬ *D51.0*
- ¬ Polyneuropathie au cours de l' *D51.0†, G63.4**

Anémie réfractaire
- Associée à l'hémochromatose ¬ *D46.1*
- Crise blastique
- - Cours de transformation ¬ *C92.00*
- - Prolifération de blastes en transformation) ¬ *C92.0*
- Dysplasie multilignées ¬ *D46.5*
- Excès blastes
- - AREB] ¬ *D46.2*
- - Transformation ¬ *D46.2*
- - Type
- - - I [AREB I] ¬ *D46.2*
- - - II [AREB II] ¬ *D46.2*
- - ¬ *D46.2*
- Non
- - Précisée ¬ *D46.4*
- - Sidéroblastique, ainsi précisée ¬ *D46.0*
- Sans sidéroblastes ¬ *D46.0*

Anémie sidéroblastique
- Associée à GLRX5 ¬ *D64.0*
- Autosomique récessive ¬ *D64.0*

Anémie sidéroblastique *–suite*
- Congénitale-immunodéficience à cellules B-fièvre périodique-retard de développement] ¬ Syndrome SIFD [*D64.0, D82.8*
- Défaillance multisystémique ¬ Syndrome d'anasarque-acidose lactique- *Q87.8*
- Héréditaire ¬ *D64.0*
- Idiopathique acquise ¬
- - *D46.1*
- - *D64.3*
- Liée X
- - Ataxie ¬ *D64.0*
- - Ataxie spinocérébelleuse ¬ *D64.0*
- - ¬ XLSA [*D64.0*
- Primaire acquise ¬ *D64.3*
- Réagissant à la pyridoxine NCA ¬ *D64.3*
- SAI ¬ *D64.3*
- Secondaire due
- - Maladie ¬ *D64.1*
- - Médicaments et des toxines ¬ *D64.2*
- ¬
- - *D64.3*
- - Myopathie mitochondriale et *G71.3*

Anémone de mer ¬ *T63.6*

Anencéphalie ¬
- *Q00.0*
- Difformité crânienne congénitale avec *Q00.0*
- Hypoplasie crânienne avec *Q00.0*

Anencéphalomyélie ¬ *Q00.0*

Anendocrinose entérique ¬ *K90.8*

Anergie des cellules T] ¬ Maladie BENTA [expansion des cellules B et *D81.8*

Anesthésie
v./v.a. Complication de l'anesthésie
- Analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P04.0*
- Congénitale du nerf trijumeau ¬ *G50.8*
- Cornée ¬ *H18.8*
- Cours
- - Grossesse
- - - Sans précision ¬ Complication d'une *O29.9*
- - - ¬
- - - - Anoxie cérébrale due à une *O29.2*
- - - - Arrêt cardiaque dû (due) à une *O29.1*
- - - - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à une *O29.0*
- - - - Complication
- - - - - *O29.8*
- - - - - Cardiaques d'une *O29.1*
- - - - - Impliquant le système nerveux central dues à une *O29.2*
- - - - - Pulmonaires d'une *O29.0*
- - - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une *O29.0*
- - - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une *O29.1*

Anesthésie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Grossesse *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Pneumonie chimique d'aspiration dû (due) à une *O29.0*
- - - - Pneumonie par aspiration dû (due) à une *O29.0*
- - - - Syndrome de Mendelson dû (due) à une *O29.0*
- - Puerpéralité ¬
- - - Anoxie cérébrale due à une *O89.2*
- - - Arrêt cardiaque dû (due) à une *O89.1*
- - - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à l' *O89.0*
- - - Complication
- - - - *O89.8*
- - - - Cardiaques de l' *O89.1*
- - - - Intéressant le système nerveux central dues à une *O89.2*
- - - - Pulmonaires de l' *O89.0*
- - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à l' *O89.0*
- - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une *O89.1*
- - - Pneumonie chimique d'aspiration dû (due) à l' *O89.0*
- - - Pneumonie par aspiration dû (due) à l' *O89.0*
- - - Syndrome de Mendelson dû (due) à l' *O89.0*
- - Travail accouchement ¬
- - - Anoxie cérébrale due à une *O74.3*
- - - Arrêt cardiaque dû (due) à une *O74.2*
- - - Collapsus pulmonaire par compression dû à une *O74.1*
- - - Complication
- - - - *O74.8*
- - - - Cardiaques de l' *O74.2*
- - - - Intéressant le système nerveux central dues à l' *O74.3*
- - - - Pulmonaires de l' *O74.1*
- - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une *O74.0*
- - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une *O74.2*
- - - Pneumonie chimique d'aspiration dû (due) à une *O74.0*
- - - Pneumonie par aspiration due à une *O74.0*
- - - Syndrome de Mendelson dû (due) à une *O74.0*
- Cutanée ¬ *R20.0*
- Dissociative et atteintes sensorielles ¬ *F44.6*
- Épidural cours
- - Grossesse ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une *O29.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une *O29.5*

Anesthésie *–suite*
- Épidural cours *–suite*
- - Puerpéralité ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une *O89.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une *O89.5*
- - Travail accouchement ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une *O74.5*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une *O74.6*
- Locale cours
- - Grossesse ¬ Réaction toxique au cours d'une *O29.3*
- - Puerpéralité ¬ Réaction toxique à une *O89.3*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Réaction toxique à une *O74.4*
- Tant que complication de l'accouchement ¬ Décès dû à l' *O74.9*
- ¬
- - Complications consécutives à une *T88.5*
- - Hyperpyrexie maligne due à une *T88.3*
- - Hyperthermie maligne due à une *T88.3*
- - Hypothermie consécutive à une *T88.5*
- - Pneumonie chimique d'aspiration due à l' *J95.4*

Anesthésique
v./v.a. Choc anesthésique
- Gazeux ¬ Intoxication: *T41.0*
- Général local analgésique sédatif cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un *O89*
- Généraux, autres et sans précision ¬ Intoxication: *T41.2*
- Inhalés ¬ Intoxication aux *T41.0*
- Intraveineux ¬ Intoxication
- - *T41.1*
- - *T41.1*
- Local ¬ Intoxication à l' *T41.3*
- Locaux ¬ Intoxication: *T41.3*
- Sans précision ¬ Intoxication: *T41.4*
- ¬ Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.4*

Anétodermie
v./v.a. exostoses-anétodermie-brachydactylie
- Familiale ¬ *L90.8*
- Jadassohn-Pellizzari ¬ *L90.2*
- Schweninger-Buzzi ¬ *L90.1*

Aneuploïdie en mosaïque ¬ Syndrome variable d' *Q99.8*

Anévrismal
- Acquise ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne *I60.9*
- Avant-bras ¬ Kyste osseux *M85.53*
- Bras ¬ Kyste osseux *M85.52*

Anévrismal *–suite*
- Clavicule ¬ Kyste osseux *M85.51*
- Colonne vertébrale ¬ Kyste osseux *M85.58*
- Cuisse ¬ Kyste osseux *M85.55*
- Jambe ¬ Kyste osseux *M85.56*
- Lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste *K09*
- Main ¬ Kyste osseux *M85.54*
- Os ¬ Kyste *M85.5*
- Pied ¬ Kyste osseux *M85.57*
- ¬ Kyste de la mâchoire: *K09.2*

Anévrisme
v./v.a. Arthrose-anévrisme
v./v.a. Micro-anévrisme
- Acquis d'artères précérébrales ¬ *I72.5*
- Aorte
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I79.0**
- - ¬
- - - *I71.9*
- - - Calcification d'un *I71.9*
- Aorte abdominale descendante ¬ Rupture d' *I71.3*
- Artère basilaire ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une rupture d' *I60.4*
- Artère carotide
- - Extra-crânienne ¬ *I72.0*
- - Interne dans sa portion intracrânienne ¬ *I67.10*
- Artère cérébrale moyenne ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une rupture d' *I60.1*
- Artère communicante
- - Antérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une rupture d' *I60.2*
- - Postérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une rupture d' *I60.3*
- - ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à la rupture d'un *I60.7*
- Artère coronaire ¬ *I25.4*
- Artère pulmonaire ¬ *I28.1*
- Artère vertébrale ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une rupture d' *I60.5*
- Artères précérébrales ¬ Rupture d' *I72.5*
- Artériel coronarien au cours de syndrome de Kawasaki ¬ *M30.3†, I79.8**
- Artériosclèreux cérébral ¬ Rupture d' *I60.7*
- Artério-veineux
- - Acquis ¬ *I77.0*
- - Sinus caverneux ¬ *Q28.20*
- Canal artériel ¬ *Q25.8*
- Carotidien ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une rupture d' *I60.0*
- Cirsoïde) (faux) (rompu) ¬ *I72*
- Congénital ventriculaire gauche ¬ *Q24.8*

Anévrisme *–suite*
- Conjonctive ¬ *H11.4*
- Coronarien syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- Crampes musculaires [HANAC] ¬ Syndrome héréditaire d'angiopathie-néphropathie- *Q28.88, Q61.8*
- Dissection
- - Artère basilaire (tronc) ¬ *I72.5*
- - Artère carotide ¬ *I72.0*
- - Artère de membre
- - - Inférieur ¬ *I72.4*
- - - Supérieur ¬ *I72.1*
- - Artère iliaque ¬ *I72.3*
- - Artère précérébrale ¬ *I72.5*
- - Artère rénale ¬ *I72.2*
- - Artère vertébrale ¬ *I72.6*
- - Artères précisées ¬ *I72.8*
- - Localisation non précisée ¬ *I72.9*
- Disséquant de l'aorte ¬ *I71.0*
- Familial
- - Aorte abdominale ¬ *I71.4*
- - Aorte thoracique ¬ *I71.2*
- - Rompu de l'aorte abdominale ¬ *I71.3*
- Fistule (artério-veineuse) traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Intracrânien sacculaire, forme familiale ¬ *Q28.30*
- Intrathoracique syphilitique ¬ *A52.0†, I79.0**
- Médiastinal syphilitique ¬ *A52.0†, I79.8**
- Pariétal) du cœur ¬ *I25.3*
- Périphérique) congénital(e) ¬ *Q27.8*
- Polygone de Willis ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une rupture d' *I60.6*
- Primitif veine cave
- - Inférieure ¬ *I86.88*
- - Supérieure ¬ *I86.88*
- Pulmonaire syphilitique ¬ *A52.0†, I79.8**
- Rasmussen NCA ¬ *A16.2*
- Rétinien diabétique ¬ *E14.30†, H36.0**
- Septum
- - Interauriculaire ¬ *Q21.0*
- - Interventriculaire ¬ *Q21.1*
- Sinus
- - Caverneux ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une rupture d' *I60.8*
- - Valsalva (rompu) ¬ *Q25.4*
- Spinal syphilitique ¬ *A52.0†, I79.8**
- Syphilitique congénital ¬ *A50.5†, I79.0**
- Système nerveux central ¬ Syphilis avec *A52.0†, I68.8**
- Variqueux ¬ *I77.0*
- Veine de Galien ¬ *Q28.20*
- Ventriculaire ¬ *I25.3*
- ¬
- - Compression chiasmatique par *I67.10†, H48.8**

Anévrisme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Nævus épidermique verruqueux avec angiodysplasie et *Q87.8*
- - Syndrome NEVADA [nævus épidermique verruqueux avec angiodysplasie et *Q87.8*

Anévrisme aortique
- Abdominal
- - Rompu ¬ *I71.3*
- - Sans mention de rupture ¬ *I71.4*
- Localisation non précisée
- - Rompu ¬ *I71.8*
- - Sans mention de rupture ¬ *I71.9*
- Thoracique
- - Rompu ¬ *I71.1*
- - Sans mention de rupture ¬ *I71.2*
- Thoraco-abdominal
- - Rompu ¬ *I71.5*
- - Sans mention de rupture ¬ *I71.6*

Anévrisme artério-veineux
- Congénital
- - Vaisseaux cérébraux ¬ *Q28.20*
- - Vaisseaux précérébraux ¬ *Q28.00*
- ¬ *Q27.3*

Anévrisme cérébral
- Acquis) ¬ *I67.10*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I68.8**
- ¬ Neurosyphilis avec *A52.0†, I68.8**

Anévrisme congénital
- Artère coronaire ¬ *Q24.5*
- Artère pulmonaire ¬ *Q25.7*
- Coronaire (artère) ¬ *Q24.5*
- E) de l'aorte ¬ *Q25.4*
- Rétine ¬ *Q14.1*
- Vaisseaux cérébraux ¬ *Q28.30*
- Vaisseaux précérébraux ¬ *Q28.10*
- ¬ Autre *Q28.80*

Anévrisme syphilitique
- Aorte ¬ *A52.0†, I79.0**
- Aorte thoracique ¬ *A52.0†, I79.0**
- Artère cérébrale ¬ Rupture d'un *A52.0†, I68.8**
- Artère sous-clavière ¬ *A52.0†, I79.8**
- Carotide ¬ *A52.0†, I79.8**
- Intracrânien
- - Artère carotide ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Carotide ¬ *A52.0†, I68.8**
- Tronc brachio-céphalique ¬ *A52.0†, I79.8**

Angéite
- Allergique ¬ *M31.0*
- Cutanée leucocytoclasique ¬ *M31.0*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88*
- Granulomateuse allergique ¬ *M30.1*
- Hypersensibilité ¬ *M31.0*
- Primaire du système nerveux central ¬ *I67.7*
- Vascularite] cryoglobulinémique ¬ *D89.1*

Angelman
- Mutation ponctuelle ¬ Syndrome d' *Q93.5*
- ¬ Syndrome d' *Q93.5*

Anges [ASPED] ¬ Dysplasie phalango-épiphysaire en ailes d' *Q78.8*

Angiectasie
- Duodénum
- - Saignement ¬ *K31.82*
- - Sans indication de saignement ¬ *K31.81*
- Estomac
- - Saignement ¬ *K31.82*
- - Sans indication de saignement ¬ *K31.81*

Angine
- Accélérée ¬ *I20.0*
- Aggravée à l'effort ¬ *I20.0*
- Agranulocytaire ¬ *D70*
- Aiguë
- - Pneumocoques ¬ *J03.8, B95.3!*
- - SAI ¬ *J02.9*
- - Staphylocoques ¬ *J03.8, B95.8!*
- - ¬ *J02*
- Chronique ¬ *J31.2*
- Diphtérique
- - Pseudomembraneuse ¬ *A36.0*
- - ¬ *A36.0*
- Effort ¬ *I20.8*
- Infarctus imminent [Impending infarction] ¬ *I20.0*
- Monocytes ¬ *B27*
- Novo à l'effort ¬ *I20.0*
- Poitrine
- - Angiospastique ¬ *I20.1*
- - Due à un spasme ¬ *I20.1*
- - Instable ¬ *I20.0*
- - Prinzmetal ¬ *I20.1*
- - SAI ¬ *I20.9*
- - Sans précision ¬ *I20.9*
- - Spasme coronaire vérifié ¬ *I20.1*
- - Variable ¬ *I20.1*
- - ¬ Autres formes d' *I20.8*
- Scarlatineuse ¬ *A38*
- Streptocoques ¬ *J02.0*
- Vincent ¬ *A69.1*

Angineux ¬ Syndrome *I20.9*

Angioblastique ¬ Méningiome *D32.9*

Angioblastome de Nakagawa ¬ *D18.01*

Angiocentrique
- Encéphale ¬ Gliome *D33.0*
- Éosinophiles ¬ Fibrose *J39.88*
- ¬
- - Gliome *D33.9*
- - Lésion immunoprolifération *C86.0*
- - Lymphome T *C86.0*

Angiocholécystite sans calcul ¬ *K81.0*

Angiocholique ¬ Abcès hépatique: *K75.0*

Angiocholite
v./v.a. Duodéno-angiocholite
- Ascendante ¬ *K83.08*
- Bactérienne ¬ *K83.09*
- Cholécystite ¬
- - Calcul
- - - Bloqué) d'un canal biliaire SAI sans précision ou sans *K80.5*
- - - Canaux biliaires sans *K80.5*
- - Cholédocholithiase sans précision ou sans *K80.5*
- - Cholélithiase
- - - Hépatique sans précision ou sans *K80.5*
- - - Intrahépatique sans précision ou sans *K80.5*
- - Colique hépatique (récidivante) sans précision ou sans *K80.5*
- - Lithiase du canal cholédoque sans précision ou sans *K80.5*
- Chronique ¬ *K83.09*
- Destructive chronique, non suppurée ¬ *K74.3*
- Primitive ¬ *K83.08*
- Récidivante ¬ *K83.08*
- Sclérosante ¬ *K83.08*
- Secondaire ¬ *K83.08*
- Sténosante ¬ *K83.08*
- Suppurée ¬ *K83.08*
- ¬
- - *K83.09*
- - Calcul des canaux biliaires avec *K80.3*

Angiodysplasie
- Anévrisme ¬
- - Nævus épidermique verruqueux avec *Q87.8*
- - Syndrome NEVADA [nævus épidermique verruqueux avec *Q87.8*
- Côlon
- - SAI ¬ *K55.21*
- - Saignement ¬ *K55.22*
- - Sans indication de saignement ¬ *K55.21*
- Estomac duodénum
- - Saignement ¬ *K31.82*
- - Sans indication de saignement ¬ *K31.81*
- Intestin grêle
- - Hémorragie ¬ *K55.32*
- - Sans indication d'une hémorragie ¬ *K55.31*
- - ¬ *K55.3*

Angio-eccrine ¬ Hamartome *Q85.8*

Angioendothéliomatose ¬ *C85.9*

Angioendothéliome intralymphatique primaire ¬ *C49.9*

Angiofibrome
- Juvénile ¬ *D10.6*
- Nasopharyngé juvénile ¬ *D10.6*

Angiofolliculaire ¬ Hyperplasie lymphoïde *D47.7*

Angiohémophilie
- A ¬ *D68.09*
- B ¬ *D68.09*
- ¬ *D68.09*

Angiohypertrophique sub-aiguë ¬ Myélomalacie *G37.4*

Angioid streaks] ¬ Stries angioïdes [*H35.38*

Angioïdes
- Angioid streaks] ¬ Stries *H35.38*
- Choroïde ¬ Stries *H35.38*
- Macula ¬ Stries *H35.38*
- Rétine ¬ Stries *H35.38*
- ¬ Stries *H35.38*

Angio-immunoblastique
- Dysprotéinémie [LAID] ¬ Lymphadénopathie *C86.5*
- LAID] ¬ Lymphadénopathie *C86.5*
- ¬
- - Lymphadénome *C86.5*
- - Lymphadénopathie *C86.5*
- - Lymphome non-hodgkinien *C86.5*

Angioimmunoblastome ¬ *C86.5*

Angiokératome diffus de Fabry ¬ *E75.2*

Angiolipomatose familiale
- Membres ¬ *D17.2*
- Tronc ¬ *D17.1*

Angiomatoïde ¬ Histiocytome fibreux *D48.5*

Angiomatose
- Bacillaire ¬ *A44.8*
- Cérébellorétinienne familiale ¬ *Q85.8*
- Cérébrale ¬ Syndrome de fibrose pulmonaire interstitielle-neurodégénérescence- *Q87.8*
- Cutanéoméningospinale ¬ *Q27.3*
- Encéphalofaciale ¬ *Q85.8*
- Encéphalotrigéminée ¬ *Q85.8*
- Hépatique ¬ *K76.4*
- Kaposi ¬ *C46.9*
- Réticulaire ¬ *C46.9*
- Rétinocérébelleuse de von Hippel-Lindau ¬ *Q85.8*
- Sturge-Weber-Krabbe ¬ *Q85.8*

Angiome
- Laryngotrachéal ¬ *D18.08*
- SAI ¬ *D18.0*
- Serpigineux ¬ *L81.7*
- Splénique à cellules littorales ¬ *D13.9*
- Stellaire] ¬ Téléangiectasie [*I78.1*
- Touffes ¬ *D18.01*

Angiomyolipome
- Rein ¬ *D17.7*
- ¬ *D17.9*

Angiomyoneurome ¬ *D18.00*

Angioneurotique
- Familial ¬ Œdème *D84.1*
- Héréditaire ¬
- - Œdème *D84.1*
- - Urticaire avec œdème *D84.1*

Angioneurotique *–suite*
- ¬ Œdème *T78.3*

Angio-œdème
- Acquis
- - Déficit en C1Inh ¬ *D84.1*
- - ¬ AOA [*T78.3*
- Bradykinique
- - Acquis ¬ *T78.3*
- - Héréditaire ¬ *D84.1*
- Héréditaire
- - C1Inh normal
- - - Lié
- - - - ANGPT1 ¬ *D84.1*
- - - - F12 ¬ *D84.1*
- - - - PLG ¬ *D84.1*
- - - Non associé à F12 ni PLG ¬ *D84.1*
- - - ¬ *D84.1*
- - Déficit en C1Inh ¬ *D84.1*
- - Type
- - - I ¬ *D84.1*
- - - II ¬ *D84.1*
- Non histaminique
- - Acquis ¬ *T78.3*
- - Héréditaire ¬ *D84.1*
- Secondaire aux inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone ¬ *T78.3*
- Vibratoire ¬ *L50.4*

Angio-ostéo-hypertrophique ¬ Syndrome *Q87.2*

Angiopathie
v./v.a. Macroangiopathie
v./v.a. Microangiopathie
- Cérébrale amyloïde ¬ *E85.4†, I68.0**
- Néphropathie-anévrismes-crampes musculaires [HANAC] ¬ Syndrome héréditaire d' *Q28.88, Q61.8*
- Périphérique au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I79.2**
- Prolifération cérébrale ¬ *I67.88*
- Syphilitique rétinienne ¬ *A52.01†, H36.8**
- ¬ Diabète sucré
- - *E14.50†, I79.2**
- - Type
- - - 1 avec *E10.50†, I79.2**
- - - 2 avec *E11.50†, I79.2**

Angioplastie coronarienne SAI ¬ Suites d'une *Z95.5*

Angiosarcome
- Abdomen ¬ *C49.4*
- Amygdales ¬ *C09.9*
- Cou ¬ *C49.0*
- Cuir chevelu ¬ *C44.4*
- Épaule ¬ *C49.1*
- Foie ¬ *C22.3*
- Hanche ¬ *C49.2*
- Membres
- - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - Supérieurs ¬ *C49.1*

Angiosarcome *–suite*
- Pelvis ¬ *C49.5*
- Prolongement axillaire du sein ¬ *C50.6*
- Quadrant
- - Inféro-externe du sein ¬ *C50.5*
- - Inféro-interne inféro-interne du sein ¬ *C50.3*
- - Supéro-externe du sein ¬ *C50.4*
- - Supéro-interne de la glande mammaire ¬ *C50.2*
- Rate ¬ *C26.1*
- Rein ¬ *C64*
- Sein
- - Localisations contiguës ¬ *C50.8*
- - ¬ *C50.9*
- Thorax ¬ *C49.3*
- Thyroïde ¬ *C73*
- Tissus mous, lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- Tronc ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Angiospastique ¬ Angine de poitrine (de): *I20.1*

Angiostrongyloïdose
- Angiostrongylus cantonensis ¬ *B83.2*
- Due
- - Angiostrongylus costaricensis ¬ *B81.3*
- - Parastrongylus costaricensis ¬ *B81.3*
- Intestinale ¬ *B81.3*
- Parastrongylus cantonensis ¬ *B83.2*

Angiostrongylus
- Cantonensis ¬
- - Angiostrongyloïdose à *B83.2*
- - Méningo-encéphalite à *B83.2†, G05.2**
- Costaricensis ¬ Angiostrongyloïdose due à *B81.3*

Angiotensine-aldostérone ¬ Angio-œdème secondaire aux inhibiteurs du système rénine- *T78.3*

Angle
- Droit côlon
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de l' *C18.3*
- - Hépatique] ¬ *D12.3*
- - ¬
- - - Carcinome épidermoïde de l' *C18.3*
- - - Carcinome héréditaire non polypeux de l' *C18.3*
- - - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] de l' *C18.3*
- - - Tumeur neuroendocrine
- - - - Bénigne du l' *D12.3*
- - - - Maligne de l' *C18.3*
- Étroit ¬ Glaucome primitif à *H40.2*
- Fermé primitif
- - Résiduel
- - - Aigu ¬ Glaucome à *H40.2*
- - - Chronique ¬ Glaucome à *H40.2*

Angle *–suite*
- Fermé primitif *–suite*
- - Résiduel *–suite*
- - - Intermittent ¬ Glaucome à *H40.2*
- - - Retardé ¬ Glaucome à *H40.2*
- - ¬ Glaucome à *H40.2*
- Gauche côlon
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de l' *C18.5*
- - Splénique ¬
- - - *D12.3*
- - - Tumeur maligne: *C18.5*
- - ¬
- - - Carcinome épidermoïde de l' *C18.5*
- - - Carcinome héréditaire non polypeux de l' *C18.5*
- - - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] de l' *C18.5*
- - - Tumeur neuroendocrine
- - - - Bénigne du l' *D12.3*
- - - - Maligne de l' *C18.5*
- Iridocornéen ¬ Récession de l' *H21.5*
- Maxillaire ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.65*
- Ouvert ¬ Glaucome
- - Primaire à *H40.18*
- - Primitif à *H40.1*
- Ponto-cérébelleux ¬
- - Chordome
- - - *D43.1*
- - - Bénin de l' *D33.1*
- - - Malin de l' *C71.6*
- - Kyste dermoïde de l' *D33.1*

Angoisse
- Séparation de l'enfance ¬ *F93.0*
- ¬
- - Hystérie d' *F41.8*
- - Rêves d' *F51.5*

Angor stable ¬ *I20.8*

Anguillulose
- Cutanée ¬ *B78.1†, L99.8**
- Disséminée ¬ *B78.7*
- Intestinale ¬ *B78.0*
- Sans précision ¬ *B78.9*
- ¬ *B78.9*

Angulaire
- Due carence vitamine
- - B NCA ¬ Stomatite *E53.9†, K93.8**
- - B2 ¬ Stomatite *E53.0†, K93.8**
- ¬ Grossesse: *O00.8*

Anhédonie
- Sexuelle ¬ *F52.1*
- ¬ *R45.8*

Anhidrose
- Céphalée migraineuse ¬ Syndrome de dystrophie rétinienne-œdème du nerf optique-splénomégalie- *Q87.8*

Anhidrose *–suite*
- Hypotrichotique ¬ *Q82.4*
- Isolée généralisée avec glandes sudoripares normales ¬ *L74.4*
- ¬ *L74.4*

Anhidrotique
- Déficit immunitaire-ostéopétrose-lymphœdème ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique *Q87.8*
- Immunodéficience ¬ Dysplasie ectodermique *Q82.4*
- Liée à l'X ¬ Dysplasie ectodermique *Q82.4*
- ¬ Dysplasie ectodermique (*Q82.4*

Anhydramnios
- Dysplasie rénale-hypoplasie cérébelleuse-hydranencéphalie ¬ Syndrome de neurones multinuclés- *Q87.8*
- ¬
- - *O41.0*
- - Fœtus affecté par un *P01.2*
- - Nouveau-né affecté par un *P01.2*

Anhydrase carbonique
- Benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l' *T50.2*
- VA ¬ Encéphalopathie hyperammoniémique par déficit en *E74.8†, G94.30**
- XII ¬ Déficit en *E74.8*

Anidulafungine ¬ Candida glabrata résistant à l' *U83.1!*

Aniline [aminobenzène] ¬ *T65.3*

Animal
- Marins ¬ Effet toxique d'un contact avec d'autres *T63.6*
- Multiples SAI ¬ Morsures d' *T01.9*
- Non venimeux) ¬ Morsure *W64.9!*
- Piqûre d'insecte venimeux ¬ Morsure d' *X29.9!*
- SAI ¬ Morsure d' *T14.1*
- Venimeux
- - Plantes vénéneuses ¬ Consommation d' *X49.9!*
- - Sans précision ¬ Effet toxique d'un contact avec un *T63.9*
- - ¬
- - - Accident dû au contact avec des plantes vénéneuses ou des *X29.9!*
- - - Effet toxique d'un contact avec d'autres *T63.8*
- ¬
- - Accident d'équitation ou accident de véhicule attelé à un *V99!*
- - Phobie(s) (des): *F40.2*

Animés ¬ Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets *W64.9!*

Aniridie
- Agénésie rénale-retard psychomoteur ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Ptosis-déficience intellectuelle-obésité ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Rotule absente ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Aniridie *–suite*
- ¬
- - *Q13.1*
- - Glaucome avec *Q13.1†, H42.8**

Anisakiase ¬ *B81.0*

Anisakis ¬ Infection à larve d' *B81.0*

Aniséiconie ¬ Anisométrie et *H52.3*

Anisocorie congénitale ¬ *Q13.2*

Anisocytose ¬ *R71*

Anisométrie et aniséiconie ¬ *H52.3*

Anisométrique ¬ Amblyopie: *H53.0*

ANK3 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-troubles du sommeil associé à *Q87.8*

Ankyloblépharon
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microphtalmie- *Q11.2*
- Dysplasie des ongles ¬ Syndrome CHAND [cheveux frisés- *Q82.4*
- Filiforme
- - Adnatum
- - - Imperforation anale ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - - Isolé ¬ *Q10.3*
- - - ¬ *Q10.3*
- - Fente palatine ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- - Imperforation anale ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬ *H02.5*

Ankyloglossie
- Liées à l'X ¬ Fente palatine et *Q38.6*
- ¬ *Q38.1*

Ankylopoïétique ¬ Spondylarthrite *M45.09*

Ankylosante
- Atteinte pulmonaire ¬ Spondylite *M45.09†, J99.8**
- Forestier] ¬ Hyperostose *M48.1*
- Juvénile ¬ Spondylarthrite *M08.19*
- Sièges multiples de la colonne vertébrale ¬ Spondylarthrite *M45.00*
- Tylose ¬ Hyperostose vertébrale *M48.19*
- ¬
- - Iridocyclite cours
- - - Spondylarthrite *M45.09†, H22.1**
- - - Spondylite *M45.09†, H22.1**
- - Syndrome PASS [pyoderma gangrenosum-acné-hidradénite suppurée-spondylarthrite *M35.8*
- - Troubles respiratoires au cours de spondylarthrite *M45.09†, J99.8**

Ankylose
- Articulaire ¬ *M24.6*
- Articulation vertébrale ¬ *M43.2*
- Congénitale temporomandibulaire ¬ *K07.6*
- Dentaire ¬ *K03.5*
- Étrier avec pouces et orteils larges ¬ *Q87.8*
- Glossopalatine ¬ *Q87.5*
- Infectieuse de l'enclume et de l'étrier ¬ *H74.3*
- Osselets ¬ *H74.3*

Ankylose *–suite*
- Postopératoire ¬ *Z98.1*

Ankylostomiase ¬
- *B76.8*
- *B76.9*

Ankylostomose ¬ *B76.0*

Anneau
- Cartilagineux de la trachée ¬ Fracture des *S12.8*
- Contraction ¬ Dystocie (de) (par): *O62.4*
- Hémorroïdaire ¬ *K64.9*
- Hyménal serré ¬ *N89.6*
- Kayser-Fleischer ¬ *H18.0*
- Mitral ¬ Hypoplasie de l' *Q23.2*
- Sidérose de la cornée ¬ *H18.0, T90.4*
- Soemmering ¬ *H26.4*
- Supravalvulaire mitral ¬ *Q23.2*
- Vasculaire de l'aorte] ¬ Double arc aortique [*Q25.4*
- Waldeyer ¬ Tumeur maligne: *C14.2*
- ¬ Chromosome
- - *Q93.2*
- - 1 en *Q93.2*
- - 2 en *Q93.2*
- - 3 en *Q93.2*
- - 4 en *Q93.2*
- - 5 en *Q93.2*
- - 6 en *Q93.2*
- - 7 en *Q93.2*
- - 8 en *Q93.2*
- - 9 en *Q93.2*
- - 10 en *Q93.2*
- - 11 en *Q93.2*
- - 12 en *Q93.2*
- - 13 en *Q93.2*
- - 14 en *Q93.2*
- - 15 en *Q93.2*
- - 16 en *Q93.2*
- - 17 en *Q93.2*
- - 18 en *Q93.2*
- - 19 en *Q93.2*
- - 20 en *Q93.2*
- - 21 en *Q93.2*
- - 22 en *Q93.2*
- - Y en *Q98.6*

Annexe
- Actes médical
- - Sans précision ¬ Affection de l'œil et de ses *H59.9*
- - ¬ Autres affections de l'œil et de ses *H59.8*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections précisées de l'œil et de ses *H58.8**
- Partie non précisée ¬
- - Brûlure de l'œil et de ses *T26.4*
- - Corrosion de l'œil et de ses *T26.9*

Annexe *–suite*
- Sans précision ¬ Affection de l'œil et de ses *H57.9*
- Utérus
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C57.4*
- - ¬ Région génitale, vessie, prostate, *I97.87*
- ¬
- - Affections précisées de l'œil et de ses *H57.8*
- - Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses *T26.3*
- - Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses *T26.8*
- - Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes *A54.1*
- - Tuberculose des *A18.1†, N74.1**
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses *C69.8*

Annexielle
- Bénigne ¬ Tumeur wolffienne *D28.7*
- Maligne d'origine wolffienne ¬ Tumeur *C57.4*

Annexite gonorrhéique ¬ *A54.2†, N74.3**

Annuel
- Périodique) ¬ Examen pelvien (*Z01.4*
- Physique) ¬ Examen périodique (*Z00.0*

Annulaire
- Aiguë ¬ Rétinopathie externe *H30.8*
- Atrophique ¬ Lichen plan *L43.8*
- Centrifuge ¬ Érythème *L53.1*
- Col de l'utérus ¬ Décollement *O71.3*
- Concentrique bénigne ¬ Dystrophie maculaire *H35.5*
- Infantile ¬ Érythème *L53.3*
- Limbique ¬ Dermoïde *D31.1*
- Nourrisson ¬ Érythème *L53.3*
- Perforant ¬ Granulome *L92.0*
- ¬
- - Granulome *L92.0*
- - Ichtyose épidermolytique *Q80.3*
- - Kératite: *H16.1*
- - Lichen plan *L43.8*
- - Pancréas *Q45.1*
- - Scotome (de): *H53.4*
- - Ulcère de (la): cornée: *H16.0*

Annulo-ectasiante ¬ Maladie aortique *I71.01*

ANOA [Syndrome de neuropathie auditive-atrophie optique] ¬ *H90.5, H47.2*

Anoctaminopathie distale ¬ *G71.08*

Anodins ¬ Souffles cardiaques bénins et *R01.0*

Anodontie
- Partielle ¬ *K00.0*
- ¬
- - *K00.0*
- - Epidermolyse bulleuse simple avec *Q81.0, K00.0*

Ano-génital
- Sans précision ¬ Prurit *L29.3*
- Vénériens) ¬ Condylomes *A63.0*
- WILD] ¬ Syndrome de verrues multiples-déficit immunitaire-lymphœdème-dysplasies *Q82.09*
- ¬ Syndrome d'absence de radius-anomalies *Q87.2*

Anonychie
- Congénitale
- - Isolée ¬ *Q84.3*
- - Totale ¬ *Q84.3*
- Hyper et hypopigmentation des plis des articulations ¬ *Q84.3*
- ¬ *Q84.3*

Anophtalmie
- Atrésie de l'œsophage ¬ Syndrome d' *Q11.1, Q39.0*
- Mégalocornée-cardiopathie-anomalies squelettiques ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Waardenburg ¬ Syndrome d' *Q87.2*
- ¬ Autres formes d' *Q11.1*

Anopsia ¬ Amblyopie ex *H53.0*

Anopsie d'un quadrant ¬ *H53.4*

Anorchidie bilatérale ¬ *Q55.0*

Anorectal
v./v.a. Malformation anorectale
- ¬
- - Abcès *K61.2*
- - Constipation lors d'un trouble fonctionnel *K59.01*
- - Syndrome d'anomalie du développement sexuel 46,XX-anomalies *Q56.2, Q43.9*

Anorectale
- Atrésie de l'anus) non syndromique avec fistule recto-vestibulaire ¬ Malformation *Q42.2*
- ¬
- - *C21.8*
- - Fistule *K60.5*
- - Hémorragie *K62.59*
- - Jonction *C21.8*

Anorexie
- Mental
- - Anorexie mentale non précisée ¬ Autres types d' *F50.08*
- - Atypique ¬ *F50.1*
- - Enfant ¬ *F50.08*
- - Mesures de perte de poids ¬ *F50.01*
- - Non précisée ¬ Autres types d'anorexie mentale et *F50.08*
- - SAI ¬ *F50.08*
- - Sans mesures de perte de poids ¬ *F50.00*
- - Type
- - - Actif ¬ *F50.01*
- - - Boulimique ¬ *F50.01*
- - - Restrictif ¬ *F50.00*
- ¬ *R63.0*

Anorexigènes ¬ Intoxication: *T50.5*

Anorgasmie psychogène ¬ *F52.3*

Anormal
v./v.a. Type de maladie

Anosmie
- Arthropathie neuropathique ¬ Insensibilité congénitale à la douleur- *G60.8†, M14.69*, Q07.8*
- Congénitale isolée ¬ *Q07.8*
- ¬
- - *R43.0*
- - Hypogonadisme hypogonadotrope congénital
- - - *E23.0*
- - - Sans *E23.0*

ANOTHER ¬ Syndrome *Q82.4*

Anotie ¬ *Q17.8*

Anovulation ¬ Stérilité
- Associée à une *N97.0*
- Origine endocrinienne chez la femme sans *N97.0*

Anoxie
- Cérébrale
- - Due anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.2*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.2*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.3*
- - Survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ *O75.4*
- Due à l'altitude ¬ *T70.2*
- Fœtale ou intra-utérine ¬ *P20*
- Hypoxie ¬ hémorragie intracrânienne due à une *P52*
- SAI ¬ *P21.9*

Anoxique, non classée ailleurs ¬ Lésion cérébrale *G93.1*

Anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ Encéphalopathie *P91.6*

Anoxybiontes ¬ Infection à *A49.88*

Anse
- Borgne
- - Congénital ¬ Syndrome de l' *Q43.8*
- - Non classé ailleurs ¬ Syndrome de l' *K90.2*
- - SAI ¬ Syndrome de l' *K90.2*
- - ¬ Syndrome post-chirurgical de l' *K91.2*
- Seau
- - Ménisque
- - - Externe ¬ Déchirure «en *S83.2*
- - - Interne ¬ Déchirure «en *S83.2*
- - SAI ¬ Déchirure «en *S83.2*
- - ¬ Déchirure ancienne «en *M23.2*
- ¬ Intoxication: Diurétiques de l' *T50.1*

Antagoniste
- Anticoagulants, vitamine K et autres coagulants ¬ Intoxication: *T45.7*
- Hormonaux, autres et sans précision ¬ Intoxication: *T38.9*

Antagoniste *–suite*
- Opiacés ¬ Intoxication: Analeptiques et *T50.7*
- Récepteur à l'interleukine-1] ¬ DIRA [Déficit de l' *M86.39*
- Vitamine K ¬
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des coumarines (*D68.33*
- - Troubles hémorragiques dus aux coumarines (*D68.33*
- ¬ Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs *T50.0*

Antécédent
- Avortement ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.1*
- Blessure
- - Corporelle ¬ *Z91.8*
- - ¬ *Z91.8*
- Contraception ¬ *Z92.8*
- Familial de tumeur maligne, sans précision ¬ *Z80.9*
- Infarctus du myocarde ¬ *I25.29*
- Mesures de réadaptation ¬ *Z92.8*
- Môle
- - Hydatiforme ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.1*
- - Vésiculaire ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.1*
- Mort
- - Néonatales ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.2*
- - Nés ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.2*
- Obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres *Z35.2*
- Soins prénatals insuffisants ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.3*
- Stérilité ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.0*
- Traumatisme
- - Psychique ¬ *Z91.8*
- - ¬ *Z91.8*
- Troubles psychiques ¬ *Z86.5*

Antécédent familial
- Affections précisées ¬ *Z84.8*
- Certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité ¬ *Z82*
- Consanguinité ¬ *Z84.3*
- Diabète sucré ¬ *Z83.3*
- Leucémie ¬ *Z80.6*
- Maladies
- - Appareil
- - - Digestif ¬ *Z83.7*
- - - Génito-urinaire ¬ *Z84.2*
- - - Respiratoire ¬ *Z83.6*
- - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *Z83.4*
- - Infectieuses et parasitaires ¬ *Z83.1*

Antécédent familial *–suite*
- Maladies *–suite*
- - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *Z84.0*
- - Rénales et de l'uretère ¬ *Z84.1*
- - Sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ *Z83.2*
- Troubles
- - Mentaux et du comportement ¬ *Z81*
- - Vue et de l'audition ¬ *Z83.5*
- Tumeur maligne
- - Organes digestifs ¬ *Z80.0*
- - Organes génitaux ¬ *Z80.4*
- - Organes respiratoires et intrathoraciques ¬ *Z80.2*
- - Peau ¬ *Z80.8*
- - Sein ¬ *Z80.3*
- - Systèmes et organes ¬ *Z80.8*
- - Trachée, des bronches et des poumons ¬ *Z80.1*
- - Voies urinaires ¬ *Z80.5*
- Tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ¬ *Z80.7*

Antécédent personnel
- Abus de substances psycho-actives ¬ *Z86.4*
- Accident vasculaire cérébral ¬ *Z86.7*
- Allergie
- - Agents anti-infectieux ¬ *Z88.3*
- - Analgésiques ¬ *Z88.6*
- - Anesthésiques ¬ *Z88.4*
- - Antibiotiques ¬ *Z88.1*
- - Médicament substance biologique
- - - Sans précision ¬ *Z88.9*
- - - ¬
- - - - *Z88.8*
- - - - *Z91.0*
- - Narcotiques ¬ *Z88.5*
- - Pénicilline ¬ *Z88.0*
- - Sérum et vaccin ¬ *Z88.7*
- - Sulfamides ¬ *Z88.2*
- Apoplexie ¬ *Z86.7*
- Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale ¬ *Z87.6*
- Chimiothérapie pour tumeur maligne ¬ *Z92.6*
- Complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ *Z87.5*
- Contraception ¬ *Z92.88*
- Correction et palliation interventionnelles d'une malformation cardiaque congénitale ¬ *Z92.80*
- COVID-19 ¬ *U08.9*
- Diabète gestationnel ¬ *Z87.5*
- États précisés ¬ *Z87.8*
- Facteurs de risque précisés, non classés ailleurs ¬ *Z91.8*
- Fibrose pulmonaire d'origine médicamenteuse ¬ *Z87.0*

Antécédent personnel *–suite*
- Gestose ¬ *Z87.5*
- Infection à VZV [virus de la varicelle et du zona] ¬ *Z86.1*
- Intervention chirurgicale importante ¬ *Z92.4*
- Irradiation ¬ *Z92.3*
- Leucémie ¬ *Z85.6*
- Maladie trophoblastique ¬ *Z87.5*
- Maladies
- - Appareil
- - - Circulatoire ¬ *Z86.7*
- - - Digestif ¬ *Z87.1*
- - - Génito-urinaire ¬ *Z87.4*
- - - Respiratoire ¬ *Z87.0*
- - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *Z86.3*
- - Infectieuses et parasitaires ¬ *Z86.1*
- - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *Z87.2*
- - Sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ *Z86.2*
- - Système
- - - Nerveux et des organes des sens ¬ *Z86.6*
- - - Ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif ¬ *Z87.3*
- Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ¬ *Z87.7*
- Non-observance d'un traitement médical et d'un régime ¬ *Z91.1*
- Réadaptation ¬ *Z92.88*
- Thrombo-embolie ¬ *Z86.7*
- Traitement médical
- - Sans précision ¬ *Z92.9*
- - ¬ *Z92.8*
- Traumatisme cranio-cérébral ¬ *Z87.8*
- Troubles mentaux et du comportement ¬ *Z86.5*
- Tumeur maligne
- - Organes digestifs ¬ *Z85.0*
- - Organes et systèmes ¬ *Z85.8*
- - Organes génitaux ¬ *Z85.4*
- - Organes respiratoires et intrathoraciques ¬ *Z85.2*
- - Sans précision ¬ *Z85.9*
- - Sein ¬ *Z85.3*
- - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ¬ *Z85.7*
- - Trachée, des bronches et des poumons ¬ *Z85.1*
- - Voies urinaires ¬ *Z85.5*
- Tumeurs ¬ *Z86.0*
- Utilisation
- - Actuelle) à long terme d'anticoagulants ¬ *Z92.1*
- - Long terme des médicaments ¬ *Z92.2*

Antécédent personnel de mutilation génitale féminine
- Plastie de correction ¬ *Z91.70*

Antécédent personnel de mutilation génitale féminine *–suite*
- Type
- - 1 ¬ *Z91.71*
- - 2 ¬ *Z91.72*
- - 3 ¬ *Z91.73*
- - 4 ¬ *Z91.74*
- - Sans précision ¬ *Z91.70*

Antécubital ¬ Syndrome du ptérygium *Q87.2*

Antéhypophysaire
- Acromégalie ¬ Hypersécrétion *E22.0*
- Adénohypophysaires] ¬ Hormones *T38.8*
- Déficit immunitaire variable] ¬ Syndrome DAVID [insuffisance *D83.0, E23.0*
- Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de polydactylie postaxiale-anomalies *Q87.0*
- Gigantisme ¬ Hypersécrétion *E22.0*

Anténatale
- Canal artériel ¬ Fermeture *Q25.8*
- CMV ¬ Infection *P35.1*

Antepartum ¬ Hémorragie: *P02.1*

Antérieur
v./v.a. Type de maladie

Antéro-apical
v./v.a. Type de maladie

Antérograde ¬ Amnésie *R41.1*

Antéro-latéral
v./v.a. Type de maladie

Antéro-septal
v./v.a. Type de maladie

Antéversion
- Col du fémur ¬ *Q65.8*
- Utérus ¬ *N85.4*

Anthelminthiques ¬ Intoxication: *T37.4*

Anthracis ¬
- Infection à Bacillus *A22*
- Vaccination contre le Bacillus *Z23.8*

Anthracose ¬ *J60*

Anthracosilicose ¬ *J60*

Anthrax
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.2*
- Cou ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.1*
- Face ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.0*
- Fesse ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.3*
- Localisations ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.8*
- Malin ¬ *A22.0*
- Membre ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.4*
- Nez ¬ Abcès, furoncle et *J34.0*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Paroi abdominale ¬ *L02.2*
- Pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe ¬ *H60.0*
- Sans précision ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.9*
- Tronc ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.2*

Anthropophobie ¬ *F40.1*

Anthropozoonoses bactériennes précisées, non classées ailleurs ¬ Autres *A28.8*

Antiacides
- Antisécrétoires gastriques ¬ Intoxication: Autres *T47.1*
- ¬
- - Abus de: *F55*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.3*

Antiagrégant plaquettaire
- Sans hémorragie ¬ Traitement continu par des *Z92.2*
- ¬
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des *D69.80*
- - Troubles hémorragiques dus à des *D69.80*

Antiallergiques et antiémétiques ¬ Intoxication: Médicaments *T45.0*

Anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, *T38.6*

Anti-anémiantes ¬ Préparation à base de foie et autres substances *T45.8*

Anti-AQP4 ¬ Trouble spectre neuromyélite optique
- Anticorps *G36.0*
- Sans anticorps anti-MOG et sans anticorps *G36.0*

Antiartériosclérosants ¬ Intoxication: Antihyperlipidémiants et *T46.6*

Antiarythmisants, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T46.2*

Antiasthmatiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T48.6*

Antibiothérapie prophylactique SAI ¬ *Z29.28*

Antibiotique
- Antifongiques administrés par voie générale ¬ Intoxication: *T36.7*
- Antitumoraux ¬ *T45.1*
- Endocardite ¬ Prophylaxie *Z29.21*
- Selon l'anamnèse personelle ¬ Colite associée aux *Z86.1*
- Systémique, sans précision ¬ Intoxication: *T36.9*
- Systémiques ¬ Intoxication: Autres *T36.8*
- ¬
- - Administration locale prophylactique d' *Z29.20*
- - Antécédents personnels d'allergie à d'autres *Z88.1*
- - Bactérie
- - - Gram négatif multirésistantes aux *U81.8!*
- - - Gram positif multirésistantes aux *U80.8!*
- - Prophylaxie locale par des *Z29.20*

Anti-CASPR2 et thymome ¬ Encéphalite limbique avec anticorps *G04.8, C37*

Anticholinergique
- Antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [*T44.3*
- ¬ Délire *T44.3*

Anticholinestérasiques ¬ Intoxication: *T44.0*

Anticoagulant
- Circulants ¬ Troubles hémorragiques dus aux *D68.35*
- Lupus ¬ Présence de l' *D68.6*
- Sans saignement ¬ Thérapie à long terme avec *Z92.1*
- Vitamine K et autres coagulants ¬ Intoxication: Antagonistes des *T45.7*
- ¬
- - Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d' *Z92.1*
- - Hématurie sous traitement *D68.35*
- - Hémorragie sous utilisation à long terme d'autres *D68.35*
- - Intoxication: *T45.5*
- - Troubles hémorragiques dus à d'autres *D68.35*

Anticorps
- Anti
- - Cytoplasme des polynucléaires neutrophiles] ¬ Glomérulonéphrite pauci-immune avec ANCA [*N01.7*
- - Insuline ¬ Détection d' *R76.88*
- - Mitochondries ¬ Détection d' *R76.88*
- - Muscle lisse ¬ Détection d' *R76.88*
- - Somatropine ¬ Détection d' *R76.88*
- Anti-AQP4 ¬ Trouble spectre neuromyélite optique
- - *G36.0*
- - Sans anticorps anti-MOG et sans *G36.0*
- Anti-CASPR2 et thymome ¬ Encéphalite limbique avec *G04.8, C37*
- Anticorps non précisés ¬ Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres *D68.38*
- Anti-D [Rh] ¬ *O36.0*
- Anti-dipeptidyl-peptidase 6] ¬ Encéphalite limbique avec anticorps anti-DPP6 [*G04.8*
- Anti-DPP6 [anticorps anti-dipeptidyl-peptidase 6] ¬ Encéphalite limbique avec *G04.8*
- Anti-érythrocytaires ¬ Détection d' *R76.88*
- Anti-facteur
- - VIII ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d' *D68.31*
- - ¬ Syndrome hémolytique et urémique atypique associé à des *D58.8*
- Anti-hirudine ¬ Détection d' *R76.88*
- Anti-LGI1 ¬ Encéphalite limbique
- - *G04.8, M35.9*
- - Paranéoplasique avec *G04.8, C80.9*
- Anti-MBG [membrane basale glomérulaire] au cours de syndrome de Goodpasture ¬ Néphrite à *M31.0†, N08.5**
- Anti-membrane basale glomérulaire ¬ Maladie des *M31.0†, N08.5**
- Anti-MOG
- - Sans anticorps anti-AQP4 ¬ Trouble du spectre de la neuromyélite optique sans *G36.0*

Anticorps *–suite*
- Anti-MOG *–suite*
- - ¬
- - - Encéphalomyélite aiguë disséminée
- - - - *G04.0*
- - - - Sans *G04.0*
- - - Myélite transverse aiguë avec *G37.3*
- - - Névrite optique isolée
- - - - *H46*
- - - - Sans *H46*
- - - Trouble du spectre de la neuromyélite optique avec *G36.0*
- Anti-NMDAr [N-méthyl-D-aspartate] ¬ Encéphalite post-infectieuse à *G04.8*
- Antiphospholipides ¬ Syndrome des *D68.6*
- Anti-polysaccharide ¬ Immunodéficience par déficit sélectif en *D80.6*
- Anti-récepteur
- - NMDA [N-méthyl-D-aspartate] ¬ Encéphalite limbique paranéoplasique avec *G04.8, C80.9*
- - N-méthyl-D-aspartate ¬ Encéphalite limbique avec *G04.8*
- - TSH ¬ Hypothyroïdie congénitale par passage transplacentaire d' *P72.2*
- Anti-streptokinase ¬ Détection d' *R76.88*
- Anti-thrombocytes ¬ Détection d' *R76.88*
- Anti-thyroïde ¬ Détection d' *R76.88*
- Anti-VHA ¬ Présence d' *B19.9*
- Anti-VHB ¬ Présence d' *B19.9*
- Anti-VHC ¬ Présence d' *B19.9*
- Caspr2 ¬ Encéphalite limbique avec *G04.8, M35.9*
- Chauds ¬ Anémie hémolytique à *D59.18*
- Connus ¬ Polyradiculoneuropathie gammapathie monoclonal
- - IgA sans *D47.2†, G63.1**
- - IgG sans *D47.2†, G63.1**
- - IgM sans *D47.2†, G63.1**
- Contre le facteur VIII ¬ Affection hémorragique due à multiplication des *D68.31*
- Cytoplasmiques anti-neutrophiles dirigés contre la myéloperoxydase ¬ Détection d' *R76.88*
- Dirigés contre facteur
- - Coagulation ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d' *D68.32*
- - Von Willebrand ¬
- - - Augmentation des *D68.32*
- - - Hémophilie due aux *D68.32*
- Froids ¬ Anémie hémolytique à *D59.18*
- Humoraux ¬ Déficit en *D80.9*
- IgG4 ¬ Maladie systémique liée à la présence d' *M35.8*
- Immunoglobulines presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en *D80.6*
- Inhibant la coagulation ¬ Hémophilie due à des *D68.38*

Anticorps *–suite*
- Maternels contre l'andopeptidase neutre ¬ Néphropathie membraneuse congénitale par *P96.0*
- Membrane basale antiglomérulaire ¬ Maladie des *M31.0†, N08.5**
- Neurexine-3 ¬ Encéphalite limbique avec *G04.8, M35.9*
- Neutralisants [AcN] anti-interféron ¬ Détection d' *R76.88*
- Non précisés ¬ Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps et d' *D68.38*
- Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d' *D80.9*
- ¬
- - Augmentation du taux d' *R76.0*
- - Déficits immunitaires avec déficit prédominant de la production d' *D80.8*

Anti-D [Rh] ¬ Anticorps *O36.0*

Antidépresseurs
- Inhibiteurs de la monoamine-oxydase ¬ Intoxication: *T43.1*
- Non précisés ¬ Intoxication: *T43.2*
- Tétracycliques ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*
- Tricycliques
- - Tétracycliques ¬ Intoxication: *T43.0*
- - ¬ Intoxication par les *T43.0*
- ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.0*

Antidiabétiques] ¬ Intoxication: Insuline et hypoglycémiants oraux [*T38.3*

Antidiarrhéiques ¬ Intoxication: *T47.6*

Anti-dipeptidyl-peptidase 6] ¬ Encéphalite limbique avec anticorps anti-DPP6 [anticorps *G04.8*

Antidiurétique ¬ Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone *E22.2*

Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T50.6*

Anti-DPP6 [anticorps anti-dipeptidyl-peptidase 6] ¬ Encéphalite limbique avec anticorps *G04.8*

Antiémétiques ¬ Intoxication: Médicaments antiallergiques et *T45.0*

Anti-endopeptidase neutre ¬ Néphropathie membraneuse congénitale par allo-immunisation fœto-maternelle *P96.0*

Anti-épileptiques
- Association, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T42.5*
- Sédatif hypnotiques
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T42.7*
- - ¬ Intoxication: Autres *T42.6*
- ¬ Embryopathie due aux *Q86.1*

Anti-érythrocytaires ¬ Détection d'anticorps *R76.88*

Anti-facteur
- VIII ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps *D68.31*

Anti-facteur *–suite*
- ¬ Syndrome hémolytique et urémique atypique associé à des anticorps *D58.8*

Antifongiques
- Administrés par voie générale ¬ Intoxication: Antibiotiques *T36.7*
- Anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments *T49.0*
- Groupe
- - Échinocandines
- - - Non résistant aux triazoles ¬ Candida auris résistant aux *U83.20!*
- - - Triazoles, résistant au fluconazole ¬ Candida auris résistant aux *U83.21!*
- - Triazoles
- - - Sauf aspergillus fumigatus résistant au fluconazole seulement ¬ Aspergillus fumigatus résistant aux *U83.3!*
- - - ¬ Candida albicans résistant aux *U83.0!*

Antigène
- 1 (LFA-1) ¬ Anomalie de la fonction lymphocytaire *D84.0*
- Australia ¬ Hépatite avec *B18.19*
- HBc identifié ¬ Hépatite B avec *B18.19*
- HBe identifié ¬ Hépatite B avec *B18.19*
- HBs
- - Identifié ¬ Hépatite B avec *B18.19*
- - ¬ Hépatite associée à l' *B18.19*
- Spécifique de la prostate [PSA] ¬ Modification du taux d' *R77.80*
- Surface du virus de l'hépatite B [AgHBs] ¬ Porteur de l' *B18.13*
- ¬ Hépatite associée aux *B18.19*

Antiglomérulaire ¬ Maladie des anticorps de la membrane basale *M31.0†, N08.5**

Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T38.6*

Anti-hirudine ¬ Détection d'anticorps *R76.88*

Anti-HLA post transfusion ¬ Hyperimmunisation *T80.6*

Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants ¬ Intoxication: *T46.6*

Antihypertenseurs, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T46.5*

Anti-infectieux
- Anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments antifongiques, *T49.0*
- Antiparasitaire systémiques
- - Précisés ¬ Intoxication: Autres *T37.8*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T37.9*
- Ophtalmiques ¬ *T49.5*
- Oto-rhino-laryngologiques ¬ *T49.6*
- ¬ Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents *Z88.3*

Anti-inflammatoire
- Non stéroïdien
- - AINS] ¬ Intoxication: Autres *T39.3*
- - ¬ Ulcère

Anti-inflammatoire *–suite*
- Non stéroïdien *–suite*
- - ¬ Ulcère *–suite*
- - - Estomac dû aux *K25.9, Y57.98!*
- - - Gastro-duodénal dû aux *K27.9, Y57.98!*
- - - Peptique dû aux *K27.9, Y57.98!*
- Usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et *T49.0*

Anti-interféron-gamma acquis ¬ Déficit immunitaire de l'adulte avec autoanticorps *D84.8*

Anti-IXa ¬
- Augmentation des *D68.32*
- Troubles hémorragiques due à l'augmentation des *D68.32*

Anti-LGI1 ¬ Encéphalite limbique
- Anticorps *G04.8, M35.9*
- Paranéoplasique avec anticorps *G04.8, C80.9*

Anti-lymphocyte
- B ¬ Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps *D83.2*
- T ¬ Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps *D83.2*

Anti-MAG ¬ Polyneuropathie associée à une gammopathie monoclonale IgM ayant une activité *D47.2†, G63.1**

Anti-MBG [membrane basale glomérulaire] au cours de syndrome de Goodpasture ¬ Néphrite à anticorps *M31.0†, N08.5**

Anti-membrane basale glomérulaire ¬ Maladie des anticorps *M31.0†, N08.5**

Anti-MOG
- Sans anticorps anti-AQP4 ¬ Trouble du spectre de la neuromyélite optique sans anticorps *G36.0*
- ¬
- - Encéphalomyélite aiguë disséminée
- - - Anticorps *G04.0*
- - - Sans anticorps *G04.0*
- - Myélite transverse aiguë avec anticorps *G37.3*
- - Névrite optique isolée
- - - Anticorps *H46*
- - - Sans anticorps *H46*
- - Trouble du spectre de la neuromyélite optique avec anticorps *G36.0*

Anti-Müller ¬ Déficit de l'hormone *E29.1*

Antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et *T44.3*

Antimycobactériens ¬ Intoxication: *T37.1*

Anti-NMDAr [N-méthyl-D-aspartate] ¬ Encéphalite post-infectieuse à anticorps *G04.8*

Anti-nucléaires ¬ Polyarthrite juvénile sans facteur rhumatoïde avec facteurs *M08.3*

Anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Antigonadotropines, *T38.6*

Anti-p200 ¬ Pemphigoïde *L12.8*

Antipaludéens ¬ Maculopathie toxique due aux *H35.38*

Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang ¬ Intoxication: *T37.2*

Antiparasitaire systémiques
- Précisés ¬ Intoxication: Autres anti-infectieux et *T37.8*
- Sans précision ¬ Intoxication: Anti-infectieux et *T37.9*

Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire ¬ Intoxication: *T42.8*

Antiphospholipide
- Néonatal ¬ Syndrome des *D68.6*
- ¬
- - SAPL [syndrome des *D68.6*
- - Syndrome
- - - *D68.6*
- - - Anticorps *D68.6*
- - - Catastrophique des *D68.6*

Anti-polysaccharide ¬ Immunodéficience par déficit sélectif en anticorps *D80.6*

Antiprotozoaires ¬ Intoxication: Autres *T37.3*

Antiprurigineux ¬ Intoxication: *T49.1*

Antipyrétique
- Antirhumatismal, sans précision ¬ Intoxication: Analgésique non opioïde, *T39.9*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et *T39.8*

Anti-récepteur
- NMDA [N-méthyl-D-aspartate] ¬ Encéphalite limbique paranéoplasique avec anticorps *G04.8, C80.9*
- N-méthyl-D-aspartate ¬ Encéphalite limbique avec anticorps *G04.8*
- TSH ¬ Hypothyroïdie congénitale par passage transplacentaire d'anticorps *P72.2*

Anti-reflux ¬ Complication mécanique d'un dispositif œsophagien *T85.50*

Anti-Rh ¬ Soins maternels pour iso-immunisation *O36.0*

Antirhumatismal
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T39.4*
- Sans précision ¬ Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et *T39.9*

Antisécrétoires gastriques ¬ Intoxication: Autres antiacides et *T47.1*

Antisociale ¬ Personnalité: *F60.2*

Anti-streptokinase ¬ Détection d'anticorps *R76.88*

Antisynthétases ¬ Syndrome des *M35.8*

Antitétanique ¬ Polyneuropathie due au sérum *G61.1, Y59.9!*

Antithrombine
- III ¬ Déficit acquis en *D68.8*
- ¬
- - Carence
- - - *D68.5*
- - - Héréditaire en *D68.5*

Antithrombine *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Thrombophilie héréditaire due au déficit congénital en *D68.5*

Anti-thrombocytes ¬ Détection d'anticorps *R76.88*

Anti-thyroïde ¬ Détection d'anticorps *R76.88*

Anti-thyroïdiens ¬
- Hypothyroïdie congénitale due à une exposition maternelle aux médicaments *P72.2*
- Intoxication: *T38.2*

Antitrypsine
- AAT] ¬ Déficit en alpha1- *E88.00*
- ¬
- - Déficit
- - - Alpha-1- *E88.00*
- - - Familial en *E88.08*
- - Hémorragie due à la mutation Pittsburgh de l'alpha-1- *E88.08†, D77**

Antitumoraux
- Immunosuppresseurs ¬ Intoxication: Médicaments *T45.1*
- ¬ Antibiotiques *T45.1*

Antitussifs ¬ Intoxication: *T48.3*

Antivariqueuses, y compris les agents sclérosants ¬ Intoxication: Substances *T46.8*

Anti-VHA ¬ Présence d'anticorps *B19.9*

Anti-VHB ¬ Présence d'anticorps *B19.9*

Anti-VHC ¬ Présence d'anticorps *B19.9*

Anti-VIIIa ¬ Augmentation des *D68.31*

Antiviraux ¬ Intoxication: *T37.5*

Anti-vitamine K ¬ Embryofœtopathie aux *Q86.2*

Anti-Xa ¬ Augmentation des *D68.32*

Anti-XIa ¬ Augmentation des *D68.32*

Antley-Bixler ¬ Syndrome d' *Q87.0*

Antral ¬ Gastrite chronique, type: *K29.5*

Antrale
- Chronique ¬ Maladie attico- *H66.2*
- Gastrique
- - Duodénum
- - - Saignement ¬ Syndrome GAVE [ectasie vasculaire *K31.82*
- - - Sans indication de saignement ¬ Syndrome GAVE [ectasie vasculaire *K31.81*
- - Estomac
- - - Saignement ¬ Syndrome GAVE [ectasie vasculaire *K31.82*
- - - Sans indication de saignement ¬ Syndrome GAVE [ectasie vasculaire *K31.81*
- Suppurée ¬ Otite moyenne chronique attico- *H66.2*

Antre
- Estomac
- - Type 1 ¬ Tumeur neuroendocrine familiale maligne de l' *C16.3*

Antre *–suite*
- Estomac *–suite*
- - ¬
- - - *C16.3*
- - - Carcinome épidermoïde de l' *C16.3*
- - - Carcinome héréditaire diffus de l' *C16.3*
- - - Linite plastique de l' *C16.3*
- - - Tumeur neuroendocrine maligne de l' *C16.3*
- Pylorique
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de l' *C16.3*
- - ¬
- - - Carcinome épidermoïde de l' *C16.3*
- - - Carcinome indifférencié de l' *C16.3*
- - - Tumeur maligne: *C16.3*
- - - Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l' *C16.3*

Antrite aiguë ¬ *J01.0*

Anurie
- Due aux sulfamides utilisés comme un médicament approprié à l'indication et correctement administrés ¬ *R34, Y57.98!*
- Oligurie ¬ *R34*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- Traumatique ¬ *T79.5*

Anus
- Canal anal ¬
- - Carcinoma in situ: *D01.3*
- - Tumeur bénigne: *D12.9*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l' *C21.8*
- Fistule
- - Rectobulbaire ¬ Atrésie congénitale de l' *Q42.2*
- - Rectoprostatique ¬ Atrésie congénitale de l' *Q42.2*
- - Rectovésicale ¬ Atrésie congénitale de l' *Q42.2*
- - ¬
- - - Absence de l' *Q42.2*
- - - Agénésie de l' *Q42.2*
- - - Atrésie de l' *Q42.2*
- - - Occlusion de l' *Q42.2*
- Fistule recto-urétrale ¬ Atrésie congénitale de l' *Q42.2*
- Non syndromique
- - Fistule
- - - Périnéale ¬ Malformation anorectale (atrésie de l' *Q42.2*
- - - Rectobulbaire ¬ Malformation anorectale (atrésie de l' *Q42.2*
- - - Rectovaginale ¬ Malformation anorectale (atrésie de l' *Q42.2*
- - - Rectovésicale ¬ Malformation anorectale (atrésie de l' *Q42.2*
- - - Recto-vestibulaire ¬ Malformation ano-rectale (atrésie de l' *Q42.2*

Anus *–suite*
- Non syndromique *–suite*
- - Fistule *–suite*
- - - Type H ¬ Malformation anorectale (atrésie de l' *Q42.2*
- - Fistule recto-urétrale ¬ Malformation anorectale (atrésie de l' *Q42.2*
- - Sans fistule ¬ Malformation anorectale (atrésie de l' *Q42.3*
- Poumon ¬ Dysplasie thymus-rein- *Q87.8*
- Rectum
- - Sans précision ¬ Maladie de l' *K62.9*
- - Virus de l'herpès ¬ Infection de la marge cutanée de l' *A60.1*
- - ¬
- - - Corps étranger dans l' *T18.5*
- - - Infection à Chlamydia de l' *A56.3*
- - - Maladies
- - - - *K62*
- - - - Précisées de l' *K62.8*
- - - Sténose de l' *K62.4*
- - - Ulcère de l' *K62.6*
- SAI ¬ *D37.78*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C21.0*
- Sphincter) ¬ Rétrécissement de l' *K62.4*
- ¬
- - *S31.80*
- - *T21*
- - Absence congénitale de l' *Q42.3*
- - Acrochordon de l' *K64.4*
- - Agénésie de l' *Q42.3*
- - Atrésie de l' *Q42.3*
- - Basaliome de l' *C44.50*
- - Ectopie de l' *Q43.5*
- - Fistule congénitale du rectum et de l' *Q43.6*
- - Hémorragie de l' *K62.50*
- - Infection gonococcique de l' *A54.6*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- - Occlusion congénitales de l' *Q42.3*
- - Spasme de l' *K59.4*
- - Sténose congénitales de l' *Q42.3*
- - Syndrome du muscle releveur de l' *K59.4*
- - Syphilis de l' *A52.7†, K93.8**
- - Tuberculose de l' *A18.3†, K93.0**
- - Ulcère
- - - Solitaire de l' *K62.6*
- - - Variqueux
- - - - *K64.8*
- - - - Externe de l' *K64.5*
- - - - Interne de l' *K64.8*

Anxiété
- Épisodique paroxystique] ¬ Trouble panique [*F41.0*
- Généralisée ¬ *F41.1*
- SAI ¬ *F41.9*

Anxiété *–suite*
- Sociale de l'enfance ¬ *F93.2*

Anxieux
- Dépressif mixte ¬ Trouble *F41.2*
- Évitante] ¬ Personnalité *F60.6*
- Légère ou non persistante) ¬ Dépression *F41.2*
- Lors de démence ¬ Symptômes *U63.2!*
- Mixtes ¬ Autres troubles *F41.3*
- Organique ¬ Trouble *F06.4*
- Persistante ¬ Dépression: *F34.1*
- Phobique
- - Enfance ¬ Trouble *F93.1*
- - Sans précision ¬ Trouble *F40.9*
- - ¬ Autres troubles *F40.8*
- Précisés ¬ Autres troubles *F41.8*
- Sans précision ¬ Trouble *F41.9*
- ¬
- - État *F41.1*
- - Névrose *F41.1*
- - Réaction *F41.1*

AO artériopathie oblitérante
- Type
- - Bassin
- - - Cuisse ¬ *I70.29*
- - - ¬ *I70.29*
- - Cuisse ¬ *I70.29*
- ¬ *I70.29*

AOA [Angio-œdème acquis] ¬ *T78.3*

AOA1 [Syndrome d'ataxie-apraxie oculomotrice type 1] ¬ *G11.3*

AOA2 [Syndrome d'ataxie-apraxie oculomotrice type 2] ¬ *G60.2*

AOA4 [Syndrome d'ataxie-apraxie oculomotrice type 4] ¬ *G11.1*

AOC [Albinisme oculo-cutané] ¬ *E70.3*

AOC8 [Albinisme oculo-cutané type 8] ¬ *E70.3*

AOMI
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs] ¬ *I70.29*
- SAI ¬ Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [*I70.29*
- Sans précision du stade (de Leriche et Fontaine) ¬ Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [*I70.29*
- Type bassin-jambe stade
- - IIb de Leriche et Fontaine ¬ *I70.22*
- - III de Leriche et Fontaine ¬ *I70.23*
- - IV de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- - IVa de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- - IVb de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*

AOPC [atrophie olivo-ponto-cérébelleuse] ¬ *G23.3*

Aorte
- Autosomique dominante ¬ Coarctation de l' *Q25.1*
- Avant le canal ¬ Coarctation de l' *Q25.1*

Aorte *–suite*
- Canal ¬ Coarctation de l' *Q25.1*
- Congénitale) ¬ Sténose de l' *Q25.3*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anévrisme de l' *I79.0**
- Hypertrophie ventricule droit ¬ Communication interventriculaire
- - Atrésie pulmonaire, dextroposition de l' *Q21.3*
- - Sténose pulmonaire, dextroposition de l' *Q21.3*
- Localisation non précisée
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.04*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.00*
- Non précisées ¬ Embolie et thrombose de parties de l' *I74.1*
- SAI ¬ Rupture de l' *I71.8*
- UPA] ¬ Ulcère pénétrant de l' *I77.80*
- ¬
- - Absence congénital(e) de l' *Q25.4*
- - Anévrisme
- - - *I71.9*
- - - Disséquant de l' *I71.0*
- - Anévrisme congénital(e) de l' *Q25.4*
- - Anévrisme syphilitique de l' *A52.0†*, *I79.0**
- - Aplasie congénital(e) de l' *Q25.4*
- - Artère pulmonaire naissant de l' *Q25.7*
- - Athérosclérose de l' *I70.0*
- - Atrésie de l' *Q25.2*
- - Calcification d'un anévrysme de l' *I71.9*
- - Coarctation de l' *Q25.1*
- - Dextroposition de l' *Q20.3*
- - Dilatation
- - - *I71.9*
- - - Congénital(e) de l' *Q25.4*
- - - Syphilitique de l' *A52.0†*, *I39.1**
- - Double arc aortique [anneau vasculaire de l' *Q25.4*
- - Hypoplasie de l' *Q25.4*
- - Infection due à un ballon de contre-pulsion dans l' *T82.72*
- - Insuffisance syphilitique de l' *A52.0†*, *I39.1**
- - ISTA [Sténose de l'isthme de l' *Q25.1*
- - Lésion traumatique de l' *S25.0*
- - Lipoïdose de l' *E75.6*
- - Malformations congénitales de l' *Q25.4*
- - Médianécrose kystique de l' *I71.00*
- - Nécrose hyaline de l' *I71.9*
- - Occlusion congénitale de l' *Q25.3*
- - Régurgitation syphilitique de l' *A52.0†*, *I39.1**
- - Rupture syphilitique de l' *A52.0†*, *I79.0**
- - Sténose syphilitique de l' *A52.0†*, *I39.1**
- - Syphilis
- - - *A52.0†*, *I79.1**
- - - La crosse de l' *A52.0†*, *I79.1**

Aorte abdominale
- Descendant ¬ Rupture
- - *I71.3*
- - Anévrysme de l' *I71.3*
- Rupture ¬ Dissection de l' *I71.06*
- Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.02*
- ¬
- - Anévrisme familial
- - - *I71.4*
- - - Rompu de l' *I71.3*
- - Coarctation de l' *Q25.1*
- - Embolie et thrombose de l' *I74.0*
- - Lésion traumatique de l' *S35.0*
- - Syphilis de l' *A52.0†*, *I79.1**

Aorte ascendante
- Cours de syndrome d'hypoplasie du cœur gauche ¬ Hypoplasie de l' *Q23.4*
- Malformation du ventricule gauche ¬ Atrésie aortique congénitale avec hypoplasie de l' *Q23.4*
- ¬ Anomalie de l' *Q25.4*

Aorte thoracique
- Rupture ¬ Dissection de l' *I71.05*
- ¬
- - Anévrisme familial de l' *I71.2*
- - Anévrisme syphilitique de l' *A52.0†*, *I79.0**
- - Dissection familiale
- - - *I71.01*
- - - Rompue de l' *I71.05*
- - Lésion traumatique de l' *S25.0*
- - Syphilis de l' *A52.0†*, *I79.1**

Aorte thoraco-abdominale
- Rupture ¬ Dissection de l' *I71.07*
- Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.03*

Aorte-artère pulmonaire congénitale ¬ Fistule *Q21.4*

Aortico-pulmonaire ¬ Absence de septum *Q21.4*

Aortique
v./v.a. Anévrisme aortique
v./v.a. Insuffisance aortique
v./v.a. Valve aortique
- Anneau vasculaire de l'aorte] ¬ Double arc *Q25.4*
- Annulo-ectasiante ¬ Maladie *I71.01*
- Anomalie des mains ¬ Syndrome de persistance du canal artériel-bicuspidie valvulaire *Q87.2*
- Anormaux ¬ Arcs *Q25.4*
- Atypique ¬ Coarctation *Q25.1*
- Bicuspide ¬ Valvule *Q23.1*
- Canal ¬ Coarctation de l'isthme *Q25.1*
- Cervicale ¬ Crosse *Q25.4*
- Combinées ¬ Atteintes des valves mitrale et *I08.0*
- Congénitale

Aortique *–suite*
- Congénitale *–suite*
- - Hypoplasie de l'aorte ascendante et malformation du ventricule gauche ¬ Atrésie *Q23.4*
- - ¬
- - - Atrésie *Q23.0*
- - - Dysplasie valvulaire *Q23.9*
- - - Sténose *Q23.0*
- Constriction circulaire de la trachée et de l'œsophage ¬ Double arc *Q25.4*
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la valvule *I39.1**
- - Syndrome d'hypoplasie du cœur gauche ¬ Atrésie *Q23.4*
- Droit ¬ Persistance de: arc *Q25.4*
- Familiale ¬
- - Bicuspidie *Q23.1*
- - Dissection *I71.00*
- Insuffisance ¬ Sténose (de la valvule) *I35.2*
- Isthmique atypique ¬ Sténose *Q25.1*
- Mitral
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des valvules *Q23.9*
- - ¬ Autres malformations congénitales des valvules *Q23.8*
- Paraganglions ¬
- - Tumeur bénigne: Glomus *D35.6*
- - Tumeur maligne: Glomus *C75.5*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glomus *D44.7*
- Précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée ¬ Lésions des valves mitrale et *I08.0*
- Rhumatismal
- - E) ¬ Reflux *I06.1*
- - Insuffisance
- - - Reflux ¬ Sténose *I06.2*
- - - ¬ Sténose *I06.2*
- - ¬ Sténose *I06.0*
- SAI cause précisée sauf rhumatismal ¬
- - Insuffisance (de la valvule) *I35.1*
- - Régurgitation (de la valvule) *I35.1*
- Sans précision ¬
- - Atteinte de la valvule *I35.9*
- - Maladie rhumatismale de la valvule *I06.9*
- Sous-valvulaire ¬ Rétrécissement *Q24.4*
- Streptocoques ¬ Endocardite de la valvule *I33.0, B95.5!*
- Supravalvulaire ¬ Sténose *Q25.3*
- Syndrome de Lericheˈ] ¬ Syndrome de la bifurcation *I74.0*
- Tricuspide combinées ¬ atteinte valve
- - *I08.2*
- - Mitrale, *I08.3*
- Valvulaire
- - Congénitale ¬ Sténose *Q23.0*
- - Rhumatismale SAI ¬ Maladie *I06.9*

Aortique *–suite*
- ¬
- - Artérite de la crosse *M31.4*
- - Atrésie valvulaire *Q23.0*
- - Atteintes de la valvule *I35.8*
- - Insuffisance
- - - Congénitale de la valvule *Q23.1*
- - - Valvule) *I35.1*
- - Interruption de la crosse *Q25.4*
- - Maladies rhumatismales de la valvule *I06.8*
- - Malformation du septum *Q21.4*
- - Persistance
- - - Cinquième arc *Q25.4*
- - - Convolution de l'arc *Q25.4*
- - Quadricuspidie valvulaire *Q23.8*
- - Rétrécissement rhumatismal (de la valvule) *I06.0*
- - Sténose
- - - Congénitale de la valvule *Q23.0*
- - - Valvule) *I35.0*
- - Syndrome de la crosse *M31.4*

Aortite
- Aspergillus ¬ *B44.8†, I79.1**
- Associée à IgG4 ¬ *I77.6*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I79.1**
- Rhumatismale ¬ *I01.1*
- SAI ¬ *I77.6*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.5†, I79.1**
- - ¬ *A52.0†, I79.1**

Aorto-coronaire ¬ Présence d'un pontage *Z95.1*

Aorto-pulmonaire
- Congénitale ¬ Fenêtre *Q21.4*
- ¬
- - Communication *Q21.4*
- - Fistule *Q21.4*

Aorto-ventriculaire
- Droit ¬ Tunnel *Q20.8*
- Gauche ¬ Tunnel *Q20.8*
- ¬ Tunnel *Q20.8*

AOSD [Adult-onset still disease] ¬ *M06.10*

Aoûtats ¬ Dermatite due aux *B88.0*

APAH] ¬ Hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale, affection du tissu conjonctif et hypertension portale [*I27.01*

Apallique
- Nouveau-né ¬ Syndrome d'enfermement et syndrome *P91.80*
- ¬ Syndrome *G93.80*

Apathie
- Lors de démence ¬ *U63.3!*
- ¬
- - *R45.3*
- - Découragement et *R45.3*

APDS Syndrome activation phosphoinositide 3 kinase delta type
- 1 ¬ *D81.8*
- 2 ¬ *D81.8*

Aperta
- Kystique) ¬ spina bifida (*Q05*
- ¬ Spina bifida *Q05.9*

Apesanteur ¬ Effets de: *T75.8*

Apex ventriculaire en ballon ¬ Syndrome de l' *I42.88*

Apexite [pétrosite] ¬ *H70.2*

Apgar minute
- 0 et 3 ¬ Asphyxie avec indice d' *P21.0*
- 4 et 7 ¬ Asphyxie avec indice d' *P21.1*

Aphakie
- Congénitale
- - Hypoplasie de l'iris-microphtalmie-microcornée ¬ Syndrome d' *Q13.8*
- - ¬ *Q12.3*
- Primaire congénitale ¬ *Q12.3*
- ¬ *H27.0*

Aphalangie-hémivertèbre-dysgénésie uro-génitointestinale ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Aphalangie-syndactylie-microcéphalie ¬ Syndrome d' *Q87.2*

Aphaque] ¬ Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la cataracte [de l' *H59.0*

Aphasie
- Acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] ¬ *F80.3*
- Cours de syphilis tertiaire ¬ *A52.1†, G94.8**
- Développement type
- - Expressif ¬ Dysphasie ou *F80.1*
- - Réceptif ¬ Dysphasie ou *F80.2*
- - Wernicke ¬ *F80.2*
- Expressive-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- Primaire progressive
- - Agrammatique ¬ *G31.0†, F02.0**
- - Logopénique ¬ *G31.0†, F02.0**
- Progressive
- - Isolée ¬ *G31.0*
- - Primaire [PPA] ¬ *G31.0†, F02.0**
- Syphilitique tertiaire ¬ *A52.1†, G94.8**
- ¬ Dysphasie et *R47.0*

Aphérèse ¬ *Z51.81*

Aphonie
- Psychogène ¬ *F44.4*
- Surdité-dystrophie rétinienne-gros orteil bifide-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- ¬
- - *R49.1*
- - Syndrome de dystonie- *G24.8*

Aphtes buccaux récidivants ¬ *K12.0*

Aphteuse
- Majeure) (mineure) ¬ Stomatite: *K12.0*

Aphteuse *–suite*
- Pharyngite-adénopathie] ¬ Syndrome PFAPA [fièvre périodique-stomatite *M35.8*
- Récidivante ¬ Ulcération *K12.0*
- ¬ Fièvre (de): *B08.8*

Aphtose de Bednar ¬ *K12.0*

Apical
- Aiguë
- - Origine pulpaire ¬ Périodontite *K04.4*
- - SAI ¬ Périodontite *K04.4*
- Chronique ¬ Périodontite *K04.5*
- Médiane du nez ¬ Dysplasie sus- *Q18.8*
- Périapical ¬ Granulome *K04.5*
- Périodontal) ¬ Kyste: *K04.8*
- SAI ¬ Périodontite *K04.5*
- ¬
- - Infarctus répété (aigu): antéro- *I22.0*
- - Infarctus transmural (aigu): antéro- *I21.0*
- - Syndrome de ballonisation *I42.88*
- - Thrombose (ancienne): *I51.3*

APLAID] ¬ Syndrome auto-inflammatoire-dérèglement avec déficit immunitaire lié à PLCG2 [*M35.8*

Aplasia cutis congenita
- Récessive des membres ¬ *Q84.8*
- ¬ *Q84.8*

Aplasia extracorticalis axialis ¬ *E75.2*

Aplasie
- Canaux de Müller et hyperandrogénie ¬ *Q51.8*
- Col de l'utérus ¬ *Q51.5*
- Congénital(e) de l'aorte ¬ *Q25.4*
- Congénitale
- - Bilatérale des canaux déférents ¬ *Q55.4*
- - Musculature abdominale ¬ *Q79.4*
- Cordon spermatique ¬ Absence ou *Q55.4*
- Corps calleux ¬ *Q04.0*
- Cubitale-pied fendu ¬ Syndrome d' *Q73.8*
- Cutané congénitale
- - Dermoïdes épibulbaires ¬ Syndrome d' *Q84.8, D31.4*
- - Hypoplasie de l'émail dentaire, un retard de développement et déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - Myopie ¬ Syndrome d' *Q84.8, Q15.8*
- Glandes salivaires et lacrymales [ALSG] ¬ *Q10.4, Q38.4*
- Hypoplasie
- - Cément ¬ *K00.4*
- - Pancréas ¬ Agénésie, *Q45.0*
- Isolée du nerf optique ¬ *Q07.8*
- Labyrinthe
- - Membraneux ¬ *Q16.5*
- - Microtie et microdontie ¬ Surdité avec *Q16.5*
- Médullaires [anémie aplastique] acquises pures ¬ Autres *D60.8*
- Membres

Aplasie *–suite*
- Membres *–suite*
- - Inférieurs ¬ *Q72.0*
- - Supérieurs ¬ *Q71.0*
- Moniliforme ¬ *Q84.1*
- Müllérienne-aplasie rénale-anomalies cervicothoraciques ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Muscles extenseurs des doigts et pouce-polyneuropathie ¬ *G60.0, Q68.1*
- Nerf cochléaire ¬ *Q07.8*
- Œil ¬ *Q11.1*
- Ovarienne ¬ *Q50.3*
- Parathyroïdes et du thymus ¬ *D82.1*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Pénis ¬ *Q55.5*
- Péroné-brachydactylie ¬ Syndrome d' *Q73.8*
- Péroné-ectrodactylie ¬ Syndrome d' *Q73.8*
- Pouce ¬ *Q71.3*
- Prostate ¬ Absence ou *Q55.4*
- Pure des globules rouges de l'adulte ¬ *D60.0*
- Radial
- - Aplasie tibiale ¬ Syndrome d' *Q73.8*
- - ¬ Syndrome de craniosynostose- *Q75.0*
- Rénale
- - Anomalies cervicothoraciques ¬ Syndrome d'aplasie müllérienne- *Q87.8*
- - ¬ *Q60.2*
- Testicule ¬ Absence et *Q55.0*
- Thymique ¬ *D82.1*
- Thyroïde ¬ *E03.1*
- Tibiale ¬ Syndrome d'aplasie radiale- *Q73.8*
- Trochlée de l'humérus ¬ *Q74.0*
- Unilatérale des canaux de Müller ¬ *Q51.4*
- Utérus ¬ Agénésie et *Q51.0*
- Vésicule biliaire ¬ *Q44.0*

Aplasie médullaire
- Anémie aplastique
- - Acquise pure
- - - Sans précision ¬ *D60.9*
- - - Transitoire ¬ *D60.1*
- - Médicamenteux
- - - Due à un traitement cytostatique ¬ *D61.10*
- - - Sans précision ¬ *D61.19*
- - - ¬ Autre *D61.18*
- Déficience intellectuelle-nanisme ¬ Syndrome d' *Q87.1*

Aplasique
v./v.a. Aplastique
- Autosomique dominante associée à une myélodysplasie ¬ Anémie *D61.0, D46.9*
- Congénitale ¬ Anémie érythrocytaire *D61.0*
- Héréditaire isolée ¬ Anémie *D61.0*
- ¬ Desmosis coli *Q43.2*

Aplasticosebacea ¬ Didymosis *Q84.8*

Aplastique
v./v.a. Anémie aplastique
- Ectrodactylie ¬ Syndrome de tibia *Q73.8*

Apnée
- Nouveau-né ¬
- - *P28.4*
- - *P28.4*
- Obstructive
- - Nouveau-né ¬ *P28.4*
- - Sommeil ¬ Encéphalopathie auto-immune avec parasomnie et *G04.8*
- Prématuré ¬ *P28.4*
- Primitive du sommeil chez le nouveau-né ¬ *P28.3*
- SAI ¬ *R06.88*
- Sommeil
- - Central ¬ Syndrome d' *G47.30*
- - Non précisée ¬ *G47.39*
- - Nouveau-né
- - - Centrale ¬ *P28.3*
- - - Obstructive ¬ *P28.3*
- - - SAI ¬ *P28.3*
- - Obstructif] ¬ SAOS [Syndrome d' *G47.31*
- - ¬
- - - *G47.38*
- - - Syndrome de glaucome- *H40.9, G47.39*

Apnée-bradycardie du prématuré ¬ Syndrome d' *P28.4*

Apneumatose par compression ¬ *J98.18*

ApoA-I ¬ Déficit familial en *E78.6*

Apocrine
- Corps glandulaire central du sein ¬ Adénocarcinome *C50.1*
- Mamelon ¬ Adénocarcinome *C50.0*
- Prolongement axillaire du sein ¬ Adénocarcinome *C50.6*
- Quadrant
- - Inféro-externe du sein ¬ Adénocarcinome *C50.5*
- - Inféro-interne du sein ¬ Adénocarcinome *C50.3*
- - Supéro-externe du sein ¬ Adénocarcinome *C50.4*
- - Supéro-interne du sein ¬ Adénocarcinome *C50.2*
- Sans précision ¬ Affection des glandes sudoripares *L75.9*
- Sein
- - Localisations contiguës ¬ Adénocarcinome *C50.8*
- - ¬
- - - Adénocarcinome *C50.9*
- - - Métaplasie des glandes *N60.8*
- ¬
- - Acné *L73.2*
- - Affections des glandes sudoripares *L75.8*
- - Miliaire *L75.2*

Apodie ¬ *Q72.3*

Apolipoprotéine
- A-I ¬
- - Amylose à *E85.0*

Apolipoprotéine *–suite*
- A-I ¬ *–suite*
- - Déficit en *E78.6*
- A-II] ¬ Amylose AApoAII [Amylose à *E85.0†, N08.4**
- A-IV ¬ Amylose à *E85.88*
- A-V ¬ Déficit familial en *E78.3*
- C-II ¬ Déficit familial en *E78.3*

Apollo ¬ Conjonctivite *B30.3†, H13.1**

Aponévrose
- Palmaire [Dupuytren] ¬ Fibromatose de l' *M72.0*
- Plantaire ¬ Fibromatose de l' *M72.2*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*

Aponévrotique
v./v.a. Fibromatose aponévrotique
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie épicrânienne sous- *P12.2*

Apophyse
- Condylienne ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.61*
- Coracoïde ¬ Fracture de l'omoplate: *S42.13*
- Coronoïde
- - Cubitus ¬ Fracture de la partie supérieure du cubitus: *S52.02*
- - ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.63*
- Épineux
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*
- Grand trochanter ¬ Arrachement de l' *S72.10*
- Mastoïde
- - Actes médical
- - - Sans précision ¬ Affection de l'oreille et de l' *H95.9*
- - - ¬ Autres affections de l'oreille et de l' *H95.8*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l' *H75.8**
- - Sans précision ¬ Affection de l'oreille moyenne et de l' *H74.9*
- - ¬
- - - Affections précisées de l'oreille moyenne et de l' *H74.8*
- - - Carie tuberculeuse de l' *A18.0†, H75.0**
- Petit trochanter ¬ Arrachement de l' *S72.10*
- Styloïde du cubitus ¬ *S52.8*
- Tibiale externe ¬ Ostéochondrite juvénile, *M92.6*
- Transverse
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*

Apophysite
- Calcaneum ¬ *M92.8*

Apophysite *–suite*
- Interne du coude ¬ *M77.0*
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*
- Tibiale chez l'adolescent ¬ *M92.5*

Apoplexie
- Hypophysaire ¬ *E23.6*
- Ischémique ¬ *I63.9*
- Surrénales due à un sepsis à méningocoques ¬ *A39.1†, E35.1**
- Urémique ¬ *N18.89†, I68.8**
- ¬ Antécédents personnels d' *Z86.7*

Apparence
- Comportement ¬ Autres symptômes et signes relatifs à l' *R46.8*
- Personnelle bizarre ¬ *R46.1*
- Progéroïde
- - Marbach-Rustad ¬ Syndrome d' *E34.8*
- - Marfanoïde-lipodystrophie ¬ Syndrome d' *E88.1*

Apparent
- Minéralocorticoïdes
- - Crise hypertensive ¬ Excès *I15.11*
- - ¬ Excès *I15.10*
- ¬ Péristaltisme *R19.2*

Apparent life-threatening event [ALTE] ¬ *R06.80*

Apparition
- Aiguë
- - Associé à une infection à streptocoques du groupe A ¬ Syndrome neuropsychiatrique à *G25.88, B95.0!, F07.8*
- - ¬ PANS [Syndrome neuropsychiatrique pédiatrique à *G25.88, F07.8*
- Présénile ¬ Démence dégénérative primaire de type Alzheimer avec *G30.0†, F00.0**
- Sénile ¬ Démence dégénérative primaire de type Alzheimer avec *G30.1†, F00.1**
- Tardive
- - Autosomique dominante ¬ Dégénérescence rétinienne d' *H35.5*
- - ¬
- - - État de mal épileptique réfractaire d' *G41.8*
- - - Syndrome de Marie-Pierre II d' *G11.2*

Appelt-Gerken-Lenz ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Appendice
- Caudal ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-retard de développement globale-dysmorphie faciale- *Q87.8*
- Cours de syndrome de Lynch ¬ Carcinome de l' *C18.1*
- Oreille ¬ *Q17.0*
- Préauriculaire ¬
- - *Q17.0*
- - Syndrome de déficience intellectuelle avec hypoplasie du corps calleux et *Q87.8*
- Sans précision ¬ Maladie de l' *K38.9*

Appendice *–suite*
- Vermiculaire ¬ Adhérences de l' *K66.0*
- ¬
- - Adénocarcinome mucineux de l' *C18.1*
- - Diverticule de l' *K38.2*
- - Fécalome de l' *K38.1*
- - Fistule de l' *K38.3*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] de l' *C18.1*
- - Hyperplasie de l' *K38.0*
- - Invagination de l' *K38.8*
- - Maladies précisées de l' *K38.8*
- - Méga- *Q43.8*
- - Néoplasme neuroendocrine
- - - *C18.1*
- - - *D12.1*
- - - Incertain de l' *D37.3*
- - Stercolithe de l' *K38.1*
- - Transposition de: *Q43.8*
- - Tuberculose de l' *A18.3†, K93.0**
- - Tumeur carcinoïde productrice de mucus de l' *C18.1*
- - Tumeur maligne: *C18.1*
- - Tumeur neuroendocrine classique de l ' *D37.3*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.3*

Appendicite
- Aiguë
- - Abcès péritonéal ¬ *K35.32*
- - Péritonite
- - - Généralisée
- - - - Diffuse) après perforation ou rupture ¬ *K35.2*
- - - - ¬ *K35.2*
- - - Localisée
- - - - Perforation ou rupture ¬ *K35.31*
- - - - Sans perforation ni rupture ¬ *K35.30*
- - Sans
- - - Mention de péritonite localisée ou généralisée ¬ *K35.8*
- - - Précision ¬ *K35.8*
- Amibienne ¬ *A06.8*
- Chronique ¬ *K36*
- Récidivante ¬ *K36*
- Sans précision ¬ *K37*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- ¬ Autres formes d' *K36*

Appendiculaires ¬ Concrétions *K38.1*

Appétit
- Psychogène ¬ Perte d' *F50.8*
- ¬ Perte de l' *R63.0*

Apple peel ¬ Syndrome d' *Q41.1*

Application
- Rouge lèvre ¬ Lèvre
- - Inférieure: zone d' *C00.1*
- - Supérieure: zone d' *C00.0*

Application *–suite*
- Thérapeutique de substances radioactives ¬ *Z51.0*
- Ventouse forceps
- - Sans précision ¬ Échec de l' *O66.5*
- - Suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne ¬ *O66.5*

Apport
- Iode ¬ Hypothyroïdie transitoire du nouveau-né due à une augmentation de l' *P72.2*
- ¬
- - Excès précisés d' *E67.8*
- - Séquelles d'excès d' *E68*

Apprentissage
- SAI ¬
- - Incapacité (de): *F81.9*
- - Trouble de l' *F81.9*
- Troubles du comportement ¬ Syndrome d'épilepsie liée à l'X-difficulté d' *G40.2*
- ¬ Syndrome de RIDDLE [radiosensibilité-déficit immunitaire-dysmorphie-difficultés d' *D82.8*

Apprêteurs du lin ¬ Maladie des *J66.1*

Approprié
- Correctement administrée ¬
- - Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse *T88.6*
- - Choc anesthésique dû à une substance *T88.2*
- - Effet indésirable dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- - Hypersensibilité dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- - Idiosyncrasie dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- - Réaction allergique dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- Indication et correctement administrés ¬ Anurie due aux sulfamides utilisés comme un médicament *R34, Y57.98!*

Approvisionnement insuffisant en eau potable ¬ *Z58*

Apraxie
- Oculomotrice
- - Type Cogan ¬ *H51.8*
- - ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique récessive-signes pyramidaux-nystagmus- *G11.1*
- Parole-dysmorphie cranio-faciale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-autisme- *Q87.0*
- Primaire progressive de la parole ¬ *G31.0*
- ¬ *R48.2*

Aprosencéphalie
- Dysgénésie cérébelleuse ¬ Syndrome d' *Q04.3*
- XK ¬ Syndrome d' *Q04.3*
- ¬ *Q04.3*

APS [Syndrome polyglandulaire auto-immun] ¬ *E31.0*

APS2) ¬ Syndrome de polyendocrinopathie auto-immune de type II (*E31.0*

Aptitudes sociales insuffisantes, non classées ailleurs ¬ *Z73*

Apudom ¬ *D44.9*

Aquagénique ¬ Kératodermie palmoplantaire *L85.8*

Aquatique ¬ Accident dû à un véhicule *V99!*

Aqueduc de Sylvius ¬
- Anomalie de l' *Q03.0*
- Hydrocéphalie
- - Occlusion de l' *Q03.0*
- - Sténose de l' *Q03.0*
- Malformations de l' *Q03.0*
- Obstruction congénitale de l' *Q03.0*
- Sténose de l' *Q03.0*

Aqueuse ¬ Diarrhée aiguë *A09.0*

Arab homozygote ¬ Hémoglobinose O- *D58.2*

Arachnéen ¬ Nævus: *I78.1*

Arachnodactylie
- Congénitale avec contractures ¬ *Q68.8*
- Déficience intellectuelle
- - Dysmorphie ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - ¬ Syndrome de cryptorchidie- *Q87.8*
- Ossification anormale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬ Syndrome de cécité-scoliose- *Q87.5*

Arachnoïde ¬
- Neurosyphilis de l' *A52.1†, G01**
- Syphilis
- - Adhésive de l' *A52.1†, G01**
- - Cérébrale de l' *A52.1†, G01**
- - Spinale de l' *A52.1†, G01**
- Tuberculose *A17.0†, G01**

Arachnoïdien
v./v.a. sous-arachnoïdien
- ¬
- - Kyste: *G93.0*
- - Syndrome de tibia absent-polydactylie-kyste *Q79.8, G93.0*

Arachnoïdite
- Adhésif
- - Syphilitique ¬ *A52.1†, G01**
- - ¬ *G03.9*
- Bactérienne ¬ *G00*
- Cérébrale syphilitique ¬ *A52.1†, G01**
- Due à des causes autres et non précisées ¬ *G03*
- Méningocoques ¬ *A39.0†, G01**
- Spinale
- - SAI ¬ *G03.9*
- - Syphilitique ¬ *A52.1†, G01**
- Syphilitique tardive ¬ *A52.1†, G01**
- Tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**

Araignée ¬ Effet toxique: Venin d' *T63.3*

ARAN-NM ¬ *G60.0*

Arboleda-Tham ¬ Syndrome de *Q87.8*

Arborescens à herpès simplex ¬ Keratitis *B00.5†, H19.1**

Arborescent ¬ Lipome *D17.7*

Arbovirus
- SAI ¬
- - Fièvre à *A94*
- - Infection à *A94*
- - ¬ Méningite à *A87.8†, G02.0**

ARC
- Aortique
- - Anneau vasculaire de l'aorte] ¬ Double *Q25.4*
- - Anormaux ¬ *Q25.4*
- - Constriction circulaire de la trachée et de l'œsophage ¬ Double *Q25.4*
- - Droit ¬ Persistance de: *Q25.4*
- - ¬ Persistance
- - - Cinquième *Q25.4*
- - - Convolution de l' *Q25.4*
- Axis ¬ Fracture bilatérale de la pédicule de l' *S12.1*
- Palmaire
- - Profond ¬ Lésion traumatique de l' *S65.3*
- - Superficiel ¬ Lésion traumatique de l' *S65.2*
- SAI ¬ Complexe relatif au SIDA [*B24*
- Sénile ¬ *H18.4*
- Vertébral
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*

Arcade
- Dentaire ¬
- - Anomalies de rapport entre les *K07.2*
- - Déviation médiane de l' *K07.2*
- Zygomatique
- - Os malaires ¬ Fracture de l' *S02.41*
- - ¬ Fracture de l' *S02.41*

Arciforme ¬ Scotome (de): *H53.4*

ARDS Acute respiratory distress syndrome
- Adolescent ¬ *J80.09*
- Enfant ¬ *J80.09*
- Léger
- - Adolescent ¬ *J80.04*
- - Adulte ¬ *J80.01*
- - Enfant ¬ *J80.04*
- Modéré
- - Adolescent ¬ *J80.05*
- - Adulte ¬ *J80.02*
- - Enfant ¬ *J80.05*
- Sévère
- - Adolescent ¬ *J80.06*
- - Adulte ¬ *J80.03*
- - Enfant ¬ *J80.06*
- ¬ *J80.09*

AREB
- I] ¬ Anémie réfractaire avec excès de blastes, type I [*D46.2*
- II] ¬ Anémie réfractaire avec excès de blastes, type II [*D46.2*
- ¬ Anémie réfractaire avec excès de blastes [*D46.2*

AREDYLD ¬ Syndrome *Q87.8*

Aréflexie
- Détresse respiratoire-dysphagie] ¬ EMARDD [Syndrome de myopathie à début précoce- *G71.2*
- Pieds creux-atrophie optique-surdité neurosensorielle ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse- *G11.8*
- Vésicale ¬ *G95.81*
- Vestibulaire bilatérale] ¬ CANVAS [Syndrome d'ataxie cérébelleuse avec neuropathie et *G11.8*

Aréflexique héréditaire de type Roussy-Lévy ¬ Dystasie *G60.0*

Arégénérative ¬ Anémie *D64.9*

Arénavirus
- Chapare ¬ Fièvre hémorragique à *A96.8*
- Lujo ¬ Fièvre hémorragique à *A96.8*
- ¬ Autres fièvres hémorragiques à *A96.8*

Aréolaire
- Centrale) (généralisée) (péripapillaire) ¬ Dystrophie choroïdienne (*H31.2*
- Épithélium pigmentaire ¬ Dystrophie choroïdienne centrale *H31.2*
- Généralisée ¬ Dystrophie choroïdienne *H31.2*

Aréole ¬
- Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de: *N61*
- Carcinome héréditaire de l' *C50.0*
- Tumeur maligne: Mamelon et *C50.0*

ARGHGEF1 ¬ Déficit immunitaire commun variable de l'enfance par déficit en *D83.0*

Arginase ¬ Déficit en *E72.2*

Arginine
v./v.a. l-arginine
- Vasopressine
- - Calcifications intracrâniennes-petite taille-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de résistance à l' *Q87.1*
- - ¬
- - - Résistance à l' *N25.1*
- - - Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-spasticité des membres-dystrophie de la rétine-déficit en *Q87.8*
- ¬
- - Hyperaminoacidurie provoquée par l' *E72.2*
- - Trouble du métabolisme de l' *E72.2*

Argininémie ¬ *E72.2*

Argininosuccinase ¬ Déficit en *E72.2*

Argininosuccinique ¬
- Acidémie *E72.2*
- Acidurie *E72.2*

Argininosuccinique ¬ *–suite*
- Anomalies du métabolisme de l'acide *E72.2*

Arginosuccinate lyase ¬ Déficit en *E72.2*

Argyll Robertson syphilitique ¬ Signe d' *A52.1†, H58.0**

Argyrie] de la conjonctive ¬ Argyrose [*H11.1*

Argyrose
- Argyrie] de la conjonctive ¬ *H11.1*
- ¬ *T56.8*

ARHGEF10, forme autosomique dominante ¬ Ralentissement de la vitesse de conduction nerveuse lié à *G60.0*

Arhinencéphalie ¬ *Q04.1*

Arhinie
- Atrésie des choanes-microphtalmie ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- Isolée ¬ *Q30.1*

Arias ¬ Syndrome d' *E80.5*

Ariboflavinose ¬ *E53.0*

Arithmétique ¬ Trouble
- Acquisition de l' *F81.2*
- Spécifique de l'acquisition de l' *F81.2*

Arlequin ¬ Fœtus *Q80.4*

Armature orthopédique(s) ¬ *Z46.7*

Arme
- Feu ¬
- - Accident dû à: *W49.9!*
- - Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou *Y35.7!*
- ¬ Voies de fait/agression par : *Y09.9!*

Armées ¬ Examen général en série de: membres des forces *Z10*

Armfield ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Arndt-Gottron ¬ Maladie d' *L98.5*

Arnold-Chiari
- Type
- - 1 ¬ Malformation d' *Q07.0*
- - 2 ¬ Malformation d' *Q07.0*
- ¬ Syndrome d' *Q07.0*

Aromatase ¬
- Déficit en *E25.8*
- Syndrome d'excès d' *E30.1*

Aromatiques
- Sans précision ¬
- - Anomalies du métabolisme des acides aminés *E70.9*
- - Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et *T53.9*
- ¬ Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures *T53.7*

ARPC4 ¬ Syndrome lié à *Q87.8*

Arquée syphilitique ¬ Jambe *A50.5†, M90.29**

Arrachement
- Apophyse
- - Grand trochanter ¬ *S72.10*
- - Petit trochanter ¬ *S72.10*

Arrachement *–suite*
- Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- Cartilage interne de la symphyse (pubienne) obstétrical(e) ¬ *O71.6*
- Cuir chevelu ¬ *S08.0*
- Frein lingual ¬ *S01.54*
- Hile splénique ¬ *S36.04*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Muscle(s) SAI ¬ *T14.6*
- Œil ¬ *S05.7*
- Plusieurs parties du corps ¬ *T05*
- Pulmonaire ¬ *S27.32*
- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*

Arrêt
- Auriculaire ¬ *I45.5*
- Cardiaque
- - Due anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.1*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.1*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.2*
- - Réanimation sans succès ¬ *I46.9*
- - Réanimé avec succès ¬ *I46.0*
- - Sans précision ¬ *I46.9*
- - Survenant
- - - Césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ *O75.4*
- - - États classés en O00-O07 ¬ *O08.8*
- Cardio-circulatoire avant l'admission à l'hôpital ¬ *U69.13!*
- Croissance dû à la malnutrition ¬ *E45*
- Épiphysaire ¬ *M89.1*
- Phase active du travail ¬ *O62.1*
- Prématuré du traitement ¬ *Y69!*
- Profondeur en position transverse ¬ *O64.0*
- Respiratoire ¬ *R09.2*

Arrhénoblastome malin chez la femme ¬ *C56*

Arriération mental
- Grave ¬ *F72*
- Légère ¬ *F70*
- Moyenne ¬ *F71*
- Profonde ¬ *F73*

Arroyo
v./v.a. Ramos-Arroyo

ARSACS [Ataxie spastique autosomique récessive de Charlevoix-Saguenay] ¬ *G11.1*

Arsenic et ses composés ¬ Effet toxique: *T57.0*

Artefacte ¬ *L98.1*

Artère
- Artérioles
- - Capillaires au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres atteintes des *I79.8**
- - Sans précision ¬ Atteinte des *I77.9*
- - ¬ Autres atteintes non précisées des *I77.88*

Artère *–suite*
- Centrale de la rétine ¬ Occlusion de l' *H34.1*
- Cervicales et cérébrales ¬ Dissection familiale des *I72.9*
- Cœliaque ¬
- - Lésion traumatique de l' *S35.2*
- - Syndrome de compression de l' *I77.4*
- Communicante SAI ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une *I60.7*
- Coronaires n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ Occlusion des *I24.0*
- Cou ¬ Artériosclérose d'une *I70.8*
- Distale NCA ¬ Embolie d'une *I74.4*
- Dorsale du pied ¬ Lésion traumatique de l' *S95.0*
- Extrémité ¬ Artériosclérose d'une *I70.29*
- Extrémité inférieure ¬ Oblitération d'une *I74.3*
- Gastrique ¬ Lésion traumatique de l' *S35.2*
- Gastro-duodénale ¬ Lésion traumatique de l' *S35.2*
- Hépatiques ¬ Syphilis des *A52.0†, I79.8**
- Heubner ¬ Maladie de l' *A52.0†, I68.1**
- Innominée ou sous-clavière ¬ Lésion traumatique de l' *S25.1*
- Jambe ¬ Oblitération d'une *I74.3*
- Membres
- - Inférieurs ¬ Embolie et thrombose des *I74.3*
- - Supérieurs ¬ Embolie et thrombose des *I74.2*
- - ¬ Embolie d'une *I74.4*
- Moelle épinière ¬ Thrombose syphilitique d'une *A52.0†, I79.8**
- Non précisées ¬ Embolie et thrombose d' *I74.9*
- Pied ¬ Oblitération d'une *I74.3*
- Précisées ¬ Anévrisme et dissection d'autres *I72.8*
- Rate ¬ Calcification d' *I70.8*
- Rétine ¬
- - Occlusion
- - - *H34.2*
- - - Transitoire de l' *H34.0*
- - Tortuosité des *Q14.1*
- Spinale antérieure ¬ Syndrome de compression de l' *M47.09†, G99.2**
- Veine
- - Hypogastrique ¬ *S35.88*
- - Mammaire ¬ *S25.88*
- - Ovarienne ¬ *S35.88*
- - Pulmonaire ¬ infarctus (d'une *I26*
- - Rénale ¬ *S35.4*
- - Utérine ¬ *S35.88*
- - ¬ Absence d'une *Q27.8*
- ¬
- - Anévrisme congénital coronaire (*Q24.5*
- - Athérosclérose d'autres *I70.8*
- - Atrésie d'une *Q27.8*

Artère *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Compression d' *I77.1*
- - Dysplasie fibromusculaire d'une *I77.3*
- - Embolie et thrombose d'autres *I74.8*
- - Gomme des *A52.0†, I79.8**
- - Nécrose d'une *I77.5*
- - Oblitération d'une *I74.9*
- - Occlusion d'une *I74.9*
- - Rupture d'une *I77.2*
- - Sténose d'une *I77.1*
- - Transposition
- - - Complète des grosses *Q20.3*
- - - Grosses *Q20.3*
- - - Isolée congénitalement non corrigée des grosses *Q20.3*
- - Tuberculose des *A18.8†, I79.8**

Artère axillaire ¬
- Embolie de l' *I74.2*
- Lésion traumatique de l' *S45.0*

Artère basilaire
- Carotide vertébral ¬
- - *I63.0*
- - *I63.1*
- - *I63.2*
- Régression complète
- - 1 à 24 heures ¬ Syndrome de l'artère vertébrale avec symptômes de l' *G45.02*
- - Heure ¬ Syndrome de l'artère vertébrale avec symptômes de l' *G45.03*
- Tronc) ¬ Anévrisme et dissection de l' *I72.5*
- ¬
- - Artériosclérose de l' *I65.1*
- - Embolie de l' *I65.1*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne
- - - *I60.4*
- - - Acquise due à une rupture d'anévrisme de l' *I60.4*
- - Obstruction
- - - *I65.1*
- - - Complète de l' *I65.1*
- - - Partielle de l' *I65.1*
- - Occlusion
- - - *I65.1*
- - - Sténose de l' *I65.1*
- - Sténose de l' *I65.1*
- - Thrombose de l' *I65.1*

Artère brachiale ¬
- Embolie de l' *I74.2*
- Lésion traumatique de l' *S45.1*

Artère carotide
- Extra-crânienne ¬ Anévrisme de l' *I72.0*
- Interne
- - Régression complète
- - - 1 à 24 heures ¬ Syndrome de l' *G45.12*
- - - Heure ¬ Syndrome de l' *G45.13*

Artère carotide *–suite*
- Interne *–suite*
- - Sa portion intracrânienne ¬ Anévrysme de l' *I67.10*
- - ¬
- - Anévrisme et dissection de l' *I72.0*
- - Anévrisme syphilitique intracrânien de l' *A52.0†, I68.8**
- - Artériosclérose de l' *I65.2*
- - Embolie de l' *I65.2*
- - Obstruction
- - - *I65.2*
- - - Complète de l' *I65.2*
- - - Partielle de l' *I65.2*
- - Occlusion
- - - *I65.2*
- - - Bilatérale de l' *I65.3*
- - - Sténose de l' *I65.2*
- - Sténose
- - - *I65.2*
- - - Bilatérale de l' *I65.3*
- - Thrombose de l' *I65.2*

Artère cérébelleuse ¬
- Artère cérébrale moyennes antérieures postérieures
- - *I63.3*
- - *I63.4*
- - *I63.5*
- Embolie de l' *I66.3*
- Obstruction
- - *I66.3*
- - Complète de l' *I66.3*
- - Partielle de l' *I66.3*
- Occlusion et sténose des *I66.3*
- Sténose de l' *I66.3*
- Thrombose de l' *I66.3*

Artère cérébrale
- Antérieure ¬
- - Embolie de l' *I66.1*
- - Obstruction
- - - *I66.1*
- - - Complète de l' *I66.1*
- - - Partielle de l' *I66.1*
- - Occlusion et sténose de l' *I66.1*
- - Sténose de l' *I66.1*
- - Syndrome de l' *I66.1†, G46.1**
- - Thrombose de l' *I66.1*
- Associée à HTRA1 ¬ Maladie autosomique dominante des petites *I67.88*
- Enfance ¬ Accident vasculaire cérébral ischémique dû à une embolie d' *I63.4*
- Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des *I63.5*
- Moyenne ¬
- - Embolie de l' *I66.0*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne
- - - *I60.1*

Artère cérébrale *–suite*
- Moyenne ¬ *–suite*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne *–suite*
- - - Acquise due à une rupture d'anévrisme de l' *I60.1*
- - Obstruction
- - - *I66.0*
- - - Complète de l' *I66.0*
- - - Partielle de l' *I66.0*
- - Occlusion et sténose de l' *I66.0*
- - Sténose de l' *I66.0*
- - Syndrome de l' *I66.0†, G46.0**
- - Thrombose de l' *I66.0*
- Moyennes antérieures postérieures Artère cérébelleuse ¬
- - *I63.3*
- - *I63.4*
- - *I63.5*
- Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et sténose des *I66.4*
- Postérieure ¬
- - Embolie de l' *I66.2*
- - Obstruction
- - - *I66.2*
- - - Complète de l' *I66.2*
- - - Partielle de l' *I66.2*
- - Occlusion et sténose de l' *I66.2*
- - Sténose de l' *I66.2*
- - Syndrome de l' *I66.2†, G46.2**
- - Thrombose de l' *I66.2*
- Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des *I63*
- Sans précision ¬ Occlusion et sténose d'une *I66.9*
- ¬
- - Athérome d' *I67.2*
- - Dissection d' *I67.0*
- - Gomme des *A52.0†, I68.8**
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une *I60.7*
- - Infarctus cérébral
- - - Embolie des *I63.4*
- - - Thrombose des *I63.3*
- - Occlusion
- - - *I66.9*
- - - Sténose d'une autre *I66.8*
- - Rupture d'un anévrisme syphilitique de l' *A52.0†, I68.8**
- - Spasme de l' *G45.9*
- - Sténose d'une *I66.9*
- - Tuberculose d'une *A18.8†, I68.1**

Artère communicante
- Antérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne
- - *I60.2*
- - Acquise due à une rupture d'anévrisme de l' *I60.2*

Artère communicante *–suite*
- Postérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne
- - *I60.3*
- - Acquise due à une rupture d'anévrisme de l' *I60.3*
- ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à la rupture d'un anévrisme d'une *I60.7*

Artère coronaire
- Droite ¬ Anomalie d'origine de l' *Q24.5*
- Gauche ¬
- - Anomalie d'origine de l' *Q24.5*
- - Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de l' *I25.14*
- Partir de l'artère pulmonaire ¬ Anomalie de naissance d'une *Q24.5*
- ¬
- - Anévrisme congénital d'une *Q24.5*
- - Anévrisme d'une *I25.4*
- - Anomalie congénitale des *Q24.5*
- - Dissection spontanée idiopathique de l' *I25.4*
- - Présence de prothèse de l' *Z95.5*
- - Rétrécissement syphilitique
- - - *A52.0†, I52.0**
- - - Congénital des *A50.5†, I52.0**
- - Syndrome de Bland-White-Garland [Anomalie d'une *Q24.5*
- - Thrombose syphilitique des *A52.0†, I52.0**
- - Vasospasme des *I20.1*

Artère coronarienne avec rupture ¬ Dissection d' *I21.9*

Artère cubitale niveau
- Avant-bras ¬ Lésion traumatique de l' *S55.0*
- Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de l' *S65.0*

Artère de membre
- Inférieur ¬ Anévrisme et dissection d'une *I72.4*
- Supérieur ¬ Anévrisme et dissection d'une *I72.1*

Artère distale
- Non précisées ¬ Athérosclérose des *I70.29*
- Sans précision ¬ Embolie et thrombose des *I74.4*
- Type
- - Bassin-jambe
- - - Douleur
- - - - Ischémique effort distance marche 200 m
- - - - - Plus ¬ Athérosclérose des *I70.21*
- - - - - ¬ Athérosclérose des *I70.22*
- - - - Repos ¬ Athérosclérose des *I70.23*
- - - Gangrène ¬ Athérosclérose des *I70.25*
- - - Sans douleurs ¬ Athérosclérose des *I70.20*
- - - Stade IV selon Fontaine avec ulcération ¬ Athérosclérose des *I70.24*
- - - Ulcération ¬ Athérosclérose des *I70.24*

Artère distale *–suite*
- Type *–suite*
- - Épaule-bras, tous stades ¬ Athérosclérose des *I70.26*

Artère fémorale
- Commune ¬ Embolie de l' *I74.3*
- ¬
- - Athérosclérose de l' *I70.29*
- - Embolie de l' *I74.3*
- - Lésion traumatique de l' *S75.0*

Artère hépatique
- Congénitale) ¬ Fistule entre la veine porte et l' *Q26.6*
- ¬ Lésion traumatique de l' *S35.2*

Artère iliaque ¬
- Anévrisme et dissection de l' *I72.3*
- Embolie et thrombose de l' *I74.5*
- Lésion traumatique de l' *S35.5*
- Occlusion de l' *I74.5*

Artère intracrânienne
- Enfance ¬
- - Accident vasculaire cérébral ischémique dû à une thrombose d'une *I63.3*
- - Infarctus musculaire ischémique d'une *I63.5*
- Sans précision ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une *I60.7*
- ¬
- - Atteinte de plusieurs *I60.6*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres *I60.6*

Artère mésentérique
- Inférieure ¬ Lésion traumatique de l' *S35.2*
- Supérieure
- - Acquise ¬ Syndrome de l ' *I77.88*
- - Congénitale ¬ Syndrome de l' *Q27.8*
- - ¬ Thrombose de l' *K55.0*
- ¬
- - Embolie de l' *K55.0*
- - Lésion traumatique
- - - *S35.2*
- - - *S35.2*
- - Thrombose de l' *K55.0*

Artère ombilicale
- Unique ¬ *Q27.0*
- ¬ Absence congénitale et hypoplasie de l' *Q27.0*

Artère perforante ¬ Occlusion et sténose d'une *I66.8*

Artère périphérique ¬
- Oblitération d'une *I74.4*
- Sclérose d'une *I70.29*

Artère péronière ¬ Lésion traumatique de l' *S85.2*

Artère plantaire du pied ¬ Lésion traumatique de l' *S95.1*

Artère poplitée
- Piégée

Artère poplitée *–suite*
- Piégée *–suite*
- - Popliteal artery entrapment syndrome] ¬ Syndrome de l' *I77.1*
- - ¬ Syndrome de l' *I77.1*
- ¬
- - Embolie de l' *I74.3*
- - Lésion traumatique de l' *S85.0*
- - Oblitération de l' *I74.3*

Artère précérébrale
- Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des *I63.2*
- Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et sténose des *I65.3*
- Régression complète
- - 1 24 heures ¬ Syndrome
- - - Bilatéral des *G45.22*
- - - Multiple des *G45.22*
- - Heure ¬ Syndrome
- - - Bilatéral des *G45.23*
- - - Multiple des *G45.23*
- SAI ¬ *I65.9*
- Sans précision ¬ Occlusion et sténose d'une *I65.9*
- ¬
- - Anévrisme
- - - Acquis d' *I72.5*
- - - Dissection d'une autre *I72.5*
- - Infarctus cérébral
- - - Embolie des *I63.1*
- - - Thrombose des *I63.0*
- - Occlusion
- - - *I65.9*
- - - Bilatérale des *I65.3*
- - - Sténose d'une autre *I65.8*
- - Rupture d'anévrysme d' *I72.5*
- - Sténose
- - - *I65.9*
- - - Bilatérale
- - - - *I65.3*
- - - - *I65.3*
- - - Multiples d' *I65.3*
- - Thrombose des *I65.9*

Artère pulmonaire
- Aberrante ¬ *Q25.7*
- Cœur pulmonaire ¬
- - Thromboembolie d'une *I26.0*
- - Thrombose d'une *I26.0*
- Naissant
- - Aorte ¬ *Q25.7*
- - Canal artériel ¬ *Q25.7*
- Origine anormale ¬ *Q25.7*
- ¬
- - Absence d'une *Q25.7*
- - Agénésie
- - - *Q25.7*
- - - Unilatérale de l' *Q25.7*

Artère pulmonaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anévrisme congénital de l' *Q25.7*
- - Anévrisme de l' *I28.1*
- - Anomalie
- - - *Q25.7*
- - - Naissance d'une artère coronaire à partir de l' *Q24.5*
- - - Origine de l' *Q25.7*
- - Artériosclérose de l' *I27.08*
- - Atrésie de l' *Q25.5*
- - Dilatation idiopathique de l' *I28.8*
- - Hypoplasie
- - - *Q25.7*
- - - *Q25.7*
- - Malformations congénitales de l' *Q25.7*
- - Sténose
- - - *Q25.6*
- - - Congénitale
- - - - *Q25.6*
- - - - *Q25.6*
- - - Supravalvulaire de l' *Q25.6*
- - Syphilis des *A52.0†, I98.0**
- - Thromboembolie d'une *I26.9*
- - Thrombose d'une *I26.9*

Artère radiale
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de l' *S55.1*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de l' *S65.1*
- ¬ Embolie de l' *I74.2*

Artère rénale
- Lentiginose ¬ Dissection de l' *I72.2, L81.4*
- Multiples ¬ *Q27.2*
- SAI ¬ Malformation congénitale de l' *Q27.2*
- ¬
- - Anévrisme et dissection de l' *I72.2*
- - Athérosclérose de l' *I70.1*
- - Embolie de l' *N28.0*
- - Malformations congénitales de l' *Q27.2*
- - Obstruction de l' *N28.0*
- - Occlusion de l' *N28.0*
- - Sténose
- - - Congénitale de l' *Q27.1*
- - - Fibromusculaire de l' *I77.3*
- - Thrombose de l' *N28.0*

Artère sous-clavière
- Aberrante ¬ *Q27.8*
- ¬
- - Anévrisme syphilitique de l' *A52.0†, I79.8**
- - Athérosclérose de l' *I70.26*

Artère tibiale antérieure
- Piégée ¬ Syndrome de l' *T79.62*
- Postérieure) ¬ Lésion traumatique de l' *S85.1*

Artère vertébrale
- Symptôme artère basilaire régression complète
- - 1 à 24 heures ¬ Syndrome de l' *G45.02*
- - Heure ¬ Syndrome de l' *G45.03*
- ¬
- - Anévrisme et dissection de l' *I72.6*
- - Artériosclérose de l' *I65.0*
- - Dissection
- - - Familiale de l' *I72.6*
- - - Spontanée de l' *I72.6*
- - Embolie de l' *I65.0*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne
- - - *I60.5*
- - - Acquise due à une rupture d'anévrisme de l' *I60.5*
- - Lésion traumatique de l' *S15.1*
- - Obstruction
- - - *I65.0*
- - - Complète de l' *I65.0*
- - - Partielle de l' *I65.0*
- - Occlusion
- - - *I65.0*
- - - Bilatérale de l' *I65.3*
- - - Sténose de l' *I65.0*
- - Sténose
- - - *I65.0*
- - - Bilatérale de l' *I65.3*
- - Syndrome de compression de l' *M47.09†, G99.2**
- - Thrombose de l' *I65.0*

Artères spinales ¬ Syndrome de compression des *M47.09†, G99.2**

Artériel
v./v.a. Canal artériel
- Aiguë
- - Bras ¬ Occlusion *I74.2*
- - Jambe ¬ Occlusion *I74.3*
- Articulaire ¬ Syndrome héréditaire de calcification *I70.29, M25.80*
- Bras ¬ Embolie *I74.2*
- Commun [TAC] ¬ Tronc *Q20.0*
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement *Q27.8*
- Coronarien au cours de syndrome de Kawasaki ¬ Anévrisme *M30.3†, I79.8**
- Cuisse ¬ Embolie *I74.3*
- Élevée ¬ Tension *I10*
- Érosion ¬ Hémorragie *I77.2*
- Essentielle) (primitive) (systémique) ¬ Hypertension (*I10*
- Généralisée infantile ¬ Calcification *Q28.88*
- Idiopathique infantile ¬ Calcification *Q28.88*
- Jambe ¬
- - Embolie *I74.3*
- - Occlusion *I74.3*
- - Ulcère *I70.24*
- Lentiginose ¬ Syndrome de dissection *I72.9, L81.4*

Artériel *–suite*
- Membres supérieurs ¬ Embolie *I74.2*
- Moelle épinière ¬ Thrombose *G95.18*
- Occlusive syphilitique ¬ Maladie *A52.0†, I79.8**
- Périphérique
- - Aiguë ¬ Occlusion *I74.4*
- - ¬
- - - Embolie *I74.4*
- - - Occlusion embolique *I74.4*
- Pied ¬ Embolie *I74.3*
- Précérébraux multiples et bilatéraux ¬ Accident ischémique transitoire de territoires *G45.2*
- Pulmonaire
- - Associée
- - - A une affection du tissu conjonctif ¬ Hypertension *I27.01*
- - - Cardiopathie congénitale
- - - - Affection du tissu conjonctif et hypertension portale [APAH] ¬ Hypertension *I27.01*
- - - - ¬ Hypertension *I27.01*
- - - Hypertension portale ¬ Hypertonie *I27.01*
- - Due à des médicaments ¬ Hypertension *I27.02*
- - Héréditaire
- - - HPAH] ¬ Hypertension *I27.00*
- - - ¬ Hypertension *I27.00*
- - Idiopathique [IPAH]] ¬ Hypertension *I27.00*
- - Induite
- - - Médicaments, des drogues, des toxines et des rayonnements [DPAH] ¬ Hypertension *I27.02*
- - - Rayonnements ¬ Hypertension *I27.02*
- - - Toxines ¬ Hypertension *I27.02*
- - Insuffisance rénale-alcalose ¬ Syndrome d'hyperuricémie-hypertension *E72.8*
- - Isolée ¬ Boucle *Q25.7*
- Rate ¬ Thrombose *I74.8*
- Rétine et sténose pulmonaire supravalvulaire ¬ Macroanévrisme *H35.0, Q25.6*
- Rétinien familial] ¬ FRAM [Macroanévrisme *H35.0, Q25.6*
- Rétinienne
- - Branche ¬ Occlusion *H34.2*
- - Partielle ¬ Occlusion *H34.2*
- Sans diagnostic d'hypertension ¬ Constatation d'une élévation de la tension *R03.0*
- Segmentaire ¬ Médiolyse *I77.88*
- Surdité ¬ Syndrome de fragilité osseuse-contractures-rupture *Q87.5*
- Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Hématome *T14.5*
- Veineuse SAI ¬ Anomalie *Q27.9*
- ¬
- - Bruits (*R09.8*

Artériel *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Constatation d'une baisse non spécifique de la tension *R03.1*
- - Dégénérescence
- - - *I70*
- - - Media *I70.29*
- - - Tunique intermédiaire *I70.29*
- - Diabète sucré
- - - MOA [maladie occlusive *E14.50†, I79.2**
- - - Type
- - - - 1 avec MOA [maladie occlusive *E10.50†, I79.2**
- - - - 2 avec MOA [maladie occlusive *E11.50†, I79.2**
- - Dysplasie fibromusculaire *I77.3*
- - Érosion *I77.88*
- - Infarctus *I74.9*
- - Infection d'un greffon *T82.73*
- - Mesure de la tension *Z01.3*
- - Persistance du tronc *Q20.0*
- - Septicémie due à un greffon *T82.73*
- - Spasme *I73.9*
- - Syndrome
- - - Brachydactylie-hypertension *I10.90, Q73.8*
- - - Tortuosité *I77.1*
- - Ulcération *I77.88*

Artério-hépatique
v./v.a. Dysplasie artério-hépatique

Artérioles
- Capillaires au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres atteintes des artères, *I79.8**
- Sans précision ¬ Atteinte des artères et *I77.9*
- ¬ Autres atteintes non précisées des artères et *I77.88*

Artériolosclérose ¬ *I70*

Artériopathie
- Cérébrale autosomique
- - Dominant-infarctus sous-cortical-leucoencéphalopathie] ¬ CADASIL [*I67.88*
- - Récessive-infarctus sous-cortical-leucoencéphalopathie] ¬ CARASIL [*I67.88*
- Infarctus cérébraux-leucoencéphalopathie liée à la cathepsine A] ¬ CARASAL [*I67.88*
- Létale par déficit en fibuline-4 ¬ Syndrome d' *Q25.8*
- Oblitérante
- - Cérébrale ¬ *I66.9*
- - Membres inférieurs
- - - AOMI
- - - - SAI ¬ *I70.29*
- - - - Sans précision du stade (de Leriche et Fontaine) ¬ *I70.29*
- - - ¬
- - - - AOMI [*I70.29*
- - - - Claudication intermittente avec *I70.29*
- - Type

Artériopathie *–suite*
- Oblitérante *–suite*
- - Type *–suite*
- - - Bassin
- - - - Cuisse ¬
- - - - - *I70.29*
- - - - - AO [*I70.29*
- - - - ¬
- - - - - *I70.29*
- - - - - AO [*I70.29*
- - - Cuisse ¬
- - - - *I70.29*
- - - - AO [*I70.29*
- - - Jambe ¬ *I70.29*
- - ¬
- - - *I70.29*
- - - AO [*I70.29*
- - - Douleurs ischémiques dans le cadre d'une *I70.29*
- - - Syndrome d' *I70.29*
- Obstructive périphérique des extrémités ¬ *I70.2*
- Occlusive infantile ¬ *Q28.88*

Artériopathique ¬ Démence *F01*

Artérioportale intrahépatique congénitale ¬ Fistule *Q26.6*

Artérioscléreux
- Cérébral ¬ Rupture d'anévrysme *I60.7*
- Chronique) (interstitielle) ¬ Néphrite *I12*
- Implication
- - Bitronculaire ¬ Cardiopathie *I25.12*
- - Monotronculaire ¬ Cardiopathie *I25.11*
- - Tritronculaire ¬ Cardiopathie *I25.13*
- Sans sténoses ayant un effet hémodynamique ¬ Cardiopathie *I25.10*
- Sous-corticale ¬ Encéphalopathie *I67.3*
- Sténose
- - Stents ¬ Cardiopathie *I25.16*
- - Tronc commun de l'artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie *I25.14*
- - Vaisseaux de pontage ¬ Cardiopathie *I25.15*
- ¬
- - Cardiopathie *I25.19*
- - Gangrène
- - - *I70.25*
- - - Sénile *I70.25*

Artériosclérotique
v./v.a. Type de maladie

Artériovasculaire ¬ Dégénérescence: *I70*

Artério-veineux
v./v.a. Anévrisme artério-veineux
v./v.a. Fistule artério-veineuse
v./v.a. Malformation artério-veineuse
- Acquis ¬ Anévrisme: *I77.0*
- Cérébro-facial
- - Type
- - - 1 ¬ Syndrome métamérique *Q28.28*

Artério-veineux *–suite*
- Cérébro-facial *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 2 ¬ Syndrome métamérique *Q28.28*
- - - 3 ¬ Syndrome métamérique *Q28.28*
- - ¬ Syndrome métamérique *Q28.28*
- Rétinienne congénitale ¬ Communication *Q14.1*
- Sinus caverneux ¬ Anévrysme *Q28.20*
- Spinal ¬ Syndrome métamérique *Q27.3*
- Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Anévrisme ou fistule (*T14.5*
- ¬ Syndrome de lymphœdème-anomalie cérébrale *Q82.08, Q28.39*

Artérite
- Cellule géante
- - Polymyalgie rhumatismale ¬ *M31.5*
- - ¬
- - - *M31.6*
- - - Myopathie au cours d' *M31.6†, G73.7**
- Cérébrale
- - Cours
- - - Listériose ¬ *A32.8†, I68.1**
- - - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, I68.2**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *I68.2**
- - - Maladies infectieuses et parasitaires ¬ *I68.1**
- - Non classée ailleurs ¬ *I67.7*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I68.1**
- - Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I68.1**
- - ¬ Neurosyphilis avec *A52.0†, I68.1**
- Coronaire
- - Rhumatismal
- - - Aiguë ¬ *I01.8*
- - - Chronique ¬ *I09.8*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- Crânienne ¬ *M31.6*
- La crosse aortique ¬ *M31.4*
- Nodosa ¬ *M30.0*
- Sans précision ¬ *I77.6*
- Sénile ¬ *I70*
- Spinale syphilitique ¬ *A52.0†, I79.8**
- Syphilitique généralisée ¬ *A52.0†, I79.8**
- Takayasu ¬ *M31.4*
- Temporal
- - Juvénile ¬ *L95.8*
- - ¬ *M31.6*
- Tronc brachio-céphalique ¬ *M31.4*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I79.8**

Arthrite
- Allergique ¬ *M13.8*
- Associée aux enthésopathies ¬ *M08.89*
- Bactérienne dysentérique ¬ *A03.9†, M01.39**
- Bactéries pyogènes, sans précision ¬ *M00.9*
- Colonne vertébrale ¬ *M46.99*

Arthrite *–suite*
- Consécutive à une infection de l'appareil génito-urinaire ¬ *M02.39*
- Cours
- - Acromégalie ¬ *E22.0†, M14.59**
- - Affection
- - - Endocrinienne NCA ¬ *E34.9†, M14.59**
- - - Gastro-intestinale NCA ¬ *K63.9†, M03.69**
- - - Neurologique NCA ¬ *G98†, M14.69**
- - - Respiratoire NCA ¬ *J98.9†, M14.89**
- - Amylose ¬ *E85.4†, M14.49**
- - Entérite NCA ¬ *A09.9†, M03.29**
- - Fièvre méditerranéenne familiale ¬ *E85.0†, M14.49**
- - Fièvre paratyphoïde ¬ *A01.4†, M01.39**
- - Fièvre typhoïde ¬ *A01.0†, M01.39**
- - Helminthiase NCA ¬ *B83.9†, M01.89**
- - Hémophilie NCA ¬ *D66†, M36.2**
- - Hyperparathyroïdie NCA ¬ *E21.3†, M14.19**
- - Hypogammaglobulinémie ¬ *D80.1†, M14.89**
- - Leucémie NCA ¬ *C95.90†, M36.1**
- - Maladie
- - - Bactérienne, NCA ¬ *A49.9†, M01.39**
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, M01.89**
- - - Lyme ¬ *A69.2†, M01.29**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, M01.89**
- - - Virale NCA ¬ *B34.9†, M01.59**
- - - Whipple ¬ *K90.8†, M14.89**
- - Maladies
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *M01.3**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *M01.8**
- - - Virales classées ailleurs ¬ *M01.5**
- - Myélomatose ¬ *C90.00†, M36.1**
- - Myélome multiple ¬ *C90.00†, M36.1**
- - Ochronose ¬ *E70.2†, M14.59**
- - Purpura de Schönlein-Henoch ¬ *D69.0†, M36.4**
- - Réaction d'hypersensibilité NCA ¬ *T78.4†, M36.4**
- - Recto-colite hémorragique ¬ *K51.9†, M07.59**
- - Réticulose maligne ¬ *C86.0†, M36.1**
- - Rubéole ¬ *B06.8†, M01.49**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, M14.89**
- - Scorbut ¬ *E54†, M14.59**
- - Sporotrichose ¬ *B42.8†, M01.69**
- - Syndrome de Behçet ¬ *M35.2*
- - Syphilis congénitale ¬ *A50.5†, M03.19**
- - Thalassémie NCA ¬ *D56.9†, M36.3**
- - Typhus ¬ *A01.0†, M01.39**
- Dérivation intestinale ¬ *M02.0*
- Dysentérique ¬
- - *A09.0†, M03.29**
- - *M02.39*

Arthrite *–suite*
- Enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois ¬ *M08*
- Entéropathiques ¬ Autres *M07.6**
- Escherichia coli ¬ *M00.89, B96.2!*
- Gonocoques ¬ *A54.4†, M01.39**
- Haemophilus influenzae ¬ *M00.89, B96.3!*
- IGDA] ¬ Syndrome de dermatite granulomateuse interstitielle- *M30.1*
- Infectieuse
- - Arthrite réactionnelle] ¬ *M02.99*
- - SAI ¬ *M00.9*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B20, M00.99*
- Infections récurrentes-lymphopénie ¬ Syndrome de dérèglement immunitaire-maladie inflammatoire de l 'intestin- *D84.8*
- Méningococcique ¬ *A39.8†, M01.09**
- Mycosique NCA ¬ *B49†, M01.69**
- Neuropathique
- - Cours de syphilis ¬ *A52.1†, M14.69**
- - Non syphilitique NCA ¬ *G98†, M14.69**
- Ourlienne ¬ *B26.8†, M01.59**
- Polyarthrite
- - Bactéries précisées ¬ *M00.8*
- - Pneumocoques ¬ *M00.1*
- - Staphylocoques ¬ *M00.0*
- - Streptocoques ¬ Autres *M00.2*
- Post-dysentérique ¬ *M02.1*
- Post-infectieuse au cours d'une entérite à Yersinia enterocolitica ¬ *A04.6†, M03.29**
- Post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *M03.2**
- Post-méningococcique ¬ *A39.8†, M03.09**
- Post-vaccinale ¬ *M02.2*
- Précisées ¬ Autres *M13.8*
- Pseudomonas ¬ *M00.89, B96.5!*
- Psoriasique
- - Axiale ¬ *L40.5†, M07.2**
- - Pyoderma gangrenosum-acné-hidradénite suppurée] ¬ Syndrome PsAPASH [*M35.8*
- - ¬ *L40.5†, M07.39**
- Purulente
- - Pyoderma gangrenosum-acné] ¬ Syndrome PAPA [d' *M35.8*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B20, M00.99*
- Pyogénique-pyoderma gangrenosum-acné-hidradénite suppurée] ¬ Syndrome PAPASH [*M35.8*
- Réactionnel
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *M03.6**
- - Sans précision ¬ *M02.9*
- - ¬
- - - *M02.8*
- - - Arthrite infectieuse [*M02.99*
- Rhumatismal
- - Aiguë
- - - Atteinte cardiaque ¬ *I01.9*

Arthrite *–suite*
- Rhumatismal *–suite*
- - Aiguë *–suite*
- - - Endocardite ¬ *I01.1*
- - - Multiples atteintes cardiaques ¬ *I01.8*
- - - Myocardite ¬ *I01.2*
- - - Péricardite ¬ *I01.0*
- - - Valvulite ¬ *I01.1*
- - - ¬ *I00*
- - Subaiguë
- - - Atteinte cardiaque ¬ *I01.9*
- - - Endocardite ¬ *I01.1*
- - - Multiples atteintes cardiaques ¬ *I01.8*
- - - Myocardite ¬ *I01.2*
- - - Péricardite ¬ *I01.0*
- - - Valvulite ¬ *I01.1*
- - - ¬ *I00*
- Salmonella ¬ *A02.2†*, *M01.39**
- Sans précision ¬ *M13.9*
- Spinale
- - Infectieuse ¬ *M46.59*
- - Pyogénique ¬ *M46.59*
- - Septique ¬ *M46.59*
- Syphilitique
- - Post-infectieuse ¬ *M03.1**
- - Tardive ¬ *A52.1†*, *M03.19**
- Tabique ¬ *A52.1†*, *M03.19**
- Urétrique ¬ *M02.39*
- Vénérienne ¬ *M02.39*
- ¬
- - Gonorrhée avec *A54.4†*, *M01.39**
- - Maladie de Caisson avec *T70.3†*, *M14.89**

Arthrite chronique juvénile
- Début systémique
- - Articulation
- - - Cheville ¬ *M08.27*
- - - Coude ¬ *M08.22*
- - - Genou ¬ *M08.26*
- - - Hanche ¬ *M08.25*
- - Articulation sacro-iliaque ¬ *M08.25*
- - Colonne vertébrale ¬ *M08.28*
- - Main ¬ *M08.24*
- - Pied ¬ *M08.27*
- - Poignet ¬ *M08.23*
- - Région scapulaire ¬ *M08.21*
- - Sièges multiples ¬ *M08.20*
- - ¬ *M08.2*
- Forme oligo pauci articulaire
- - Articulation
- - - Cheville ¬ *M08.47*
- - - Coude ¬ *M08.42*
- - - Genou ¬ *M08.46*
- - Colonne vertébrale ¬ *M08.48*
- - Main ¬ *M08.44*
- - Pied ¬ *M08.47*
- - Poignet ¬ *M08.43*

Arthrite chronique juvénile *–suite*
- Forme oligo pauci articulaire *–suite*
- - Région pelvienne ¬ *M08.45*
- - Région scapulaire ¬ *M08.41*
- - Sièges multiples ¬ *M08.40*
- Séronégative
- - Forme polyarticulaire ¬ *M08.3*
- - ¬ *M08.3*

Arthrite de Charcot
- Diabétique ¬ *E14.60†*, *M14.69**
- ¬ Diabète sucré type
- - 1 avec *E10.60†*, *M14.69**
- - 2 avec *E11.60†*, *M14.69**

Arthrite juvénile
- Articulation
- - Coude ¬ Psoriasis avec *L40.5†*, *M09.02**
- - Genou ¬ Psoriasis avec *L40.5†*, *M09.06**
- Chronique
- - Début oligoarticulaire à évolution polyarticulaire [oligoarthrite étendue] ¬ *M08.3*
- - ¬ *M08.99*
- Colonne vertébrale ¬ Psoriasis avec *L40.5†*, *M09.08**
- Cours
- - Entérite régionale ¬ *K50.9†*, *M09.19**
- - Maladie de Crohn ¬ *K50.9†*, *M09.19**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *M09.8**
- - Recto-colite hémorragique ¬ *K51.9†*, *M09.29**
- Début polyarticulaire ¬ *M08.3*
- Idiopathique
- - Associée
- - - Enthésopathie
- - - - Articulation de la cheville ¬ *M08.87*
- - - - Avant-bras ¬ *M08.83*
- - - - Bras ¬ *M08.82*
- - - - Colonne vertébrale ¬ *M08.88*
- - - - Cuisse ¬ *M08.85*
- - - - Jambe ¬ *M08.86*
- - - - Main ¬ *M08.84*
- - - - Pied ¬ *M08.87*
- - - - Région pelvienne ¬ *M08.85*
- - - - Région scapulaire ¬ *M08.81*
- - - - Sièges multiples ¬ *M08.80*
- - - - ¬ *M08.89*
- - - Psoriasis ¬ *L40.5†*, *M09.09**
- - Avant-bras ¬ *M08.93*
- - Bras ¬ *M08.92*
- - Colonne vertébrale ¬ *M08.98*
- - Indéterminée
- - - Avant-bras ¬ *M08.83*
- - - Bras ¬ *M08.82*
- - - Colonne vertébrale ¬ *M08.88*
- - - Jambe ¬ *M08.86*
- - - Main ¬ *M08.84*
- - - Pied ¬ *M08.87*

Arthrite juvénile *–suite*
- Idiopathique *–suite*
- - Indéterminée *–suite*
- - - Région pelvienne ¬ *M08.85*
- - - Région scapulaire ¬ *M08.81*
- - - Sièges multiples ¬ *M08.80*
- - - ¬ *M08.89*
- - Jambe ¬ *M08.96*
- - Localisations multiples ¬ *M08.90*
- - Main ¬ *M08.94*
- - Oligoarticulaire ¬ *M08.49*
- - Pied ¬ *M08.97*
- - Région pelvienne ¬ *M08.95*
- - Région scapulaire ¬ *M08.91*
- - ¬ *M08.99*
- Localisations multiples ¬ Psoriasis avec *L40.5†*, *M09.00**
- Main ¬ Psoriasis avec *L40.5†*, *M09.04**
- Pied ¬ Psoriasis avec *L40.5†*, *M09.07**
- Poignet ¬ Psoriasis avec *L40.5†*, *M09.03**
- Région de l'épaule ¬ Psoriasis avec *L40.5†*, *M09.01**
- Région pelvienne ¬ Psoriasis avec *L40.5†*, *M09.05**
- Sans précision ¬ *M08.9*
- ¬
- - *M08.8*
- - Vasculite au cours d' *M08.7*

Arthrite rhumatoïde
- Adéno-splénomégalie et leucopénie ¬ *M05.00*
- Juvénile avec ou sans facteur rhumatismal ¬ *M08.0*
- Séropositive chronique ¬
- - Cardite lors d' *M05.30†*, *I52.8**
- - Endocardite lors d' *M05.30†*, *I39.8**
- - Myocardite lors d' *M05.30†*, *I41.8**
- - Myopathie lors d' *M05.30†*, *G73.7**
- - Polynévrite lors d' *M05.30†*, *G63.6**
- - Vascularite lors d' *M05.2*
- ¬ Atteinte vertébrale au cours de la *M45*

Arthrite tuberculeuse
- Chronique ¬ *A18.0†*, *M01.19**
- Colonne vertébrale ¬ *A18.0†*, *M49.09**
- ¬ *A18.0†*, *M01.19**

Arthritique
- Épidémique ¬ Érythème *A25.1*
- ¬ Purpura *D69.0†*, *M36.4**

Arthritis mutilans psoriatica ¬ *L40.5†*, *M07.19**

Arthrochalasique ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Arthrodèse ¬
- Guérison osseuse retardée après fusion ou *M96.82*
- Pseudarthrose après fusion ou *M96.0*
- Status post *Z98.1*

Arthrogrypose
v./v.a. adduction-arthrogrypose
- Anomalies structurelles du cerveau ¬ Trouble du développement neurologique avec microcéphalie, *Q87.8*
- Congénitale multiple neurogénique ¬ *Q74.3*
- Distale type
- - 1 ¬ *Q68.8*
- - 2B ¬ *Q68.8*
- - 3 ¬ *Q68.8*
- - 4 ¬ *Q68.8*
- - 5 ¬ *Q68.8*
- - 5D ¬ *Q68.8*
- - 6 ¬ *Q68.8*
- - 7 ¬ *Q68.8*
- - 9 ¬ *Q68.8*
- - 10 ¬ *Q68.8*
- Insuffisance rénale-cholestase ¬ Syndrome d' *Q89.7*
- Maladie des cellules ganglionnaires de la corne antérieure ¬ Syndrome d' *Q74.3, G12.2*
- Membres inférieurs ¬ Dysplasie pelvienne avec *Q74.2*
- Multiple congénitale
- - Myogénique autosomique récessive ¬ *Q74.3*
- - Non létal autosomique récessive associé à MYBPC1 ¬ Syndrome d' *Q74.3*
- - ¬
- - - *Q74.3*
- - - AMC [*Q74.3*
- ¬ Syndrome de neuropathie hypomyélinisante- *G83.8, Q74.3*

Arthrolithe du genou ¬ *M23.4*

Arthromyodysplasia congenita ¬ *Q74.3*

Arthro-ophtalmoplégie héréditaire progressive ¬ *Q87.0*

Arthropathie
v./v.a. Cranio-ostéo-arthropathie
- Charcot
- - Cours de syphilis ¬ *A52.1†, M14.69**
- - Diabétique ¬ *E14.60†, M14.69**
- - ¬ *G98†, M14.69**
- Chronique post-rhumatismale [Jaccoud] ¬ *M12.0*
- Cours
- - Acromégalie ¬ *E22.0†, M14.59**
- - Amylose ¬ *E85.9†, M14.49**
- - Endocardite infectieuse ¬ *I33.0†, M03.69**
- - Entérite régionale ¬ *K50.9†, M07.49**
- - Érythème
- - - Noueux ¬ *L52†, M14.89**
- - - Polymorphe ¬ *L51.9†, M14.89**
- - Hémochromatose ¬ *E83.1†, M14.59**
- - Hémoglobinopathie NCA ¬ *D58.2†, M36.3**
- - Hémophilie NCA ¬ *D66†, M36.2**
- - Histiocytose maligne ¬ *C96.8†, M36.1**
- - Hyperthyroïdie ¬ *E05.9†, M14.59**

Arthropathie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Hypothyroïdie ¬ *E03.9†, M14.59**
- - Leucémie NCA ¬ *C95.90†, M36.1**
- - Maladie
- - - Crohn ¬ *K50.9†, M07.49**
- - - Endocrinienne NCA ¬ *E34.9†, M14.59**
- - - Métabolique NCA ¬ *E88.9†, M14.59**
- - - Sang NCA ¬ *D75.9†, M36.3**
- - Maladies
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *M14.5**
- - - Précisées classées ailleurs ¬ *M14.8**
- - Myélome multiple ¬ *C90.00†, M36.1**
- - Plasmocytome
- - - Rémission complète ¬ *C90.01†, M36.1**
- - - ¬ *C90.00†, M36.1**
- - Purpura de Schoenlein-Henoch ¬ *D69.0†, M36.4**
- - Réactions d'hypersensibilité classées ailleurs ¬ *M36.4**
- - Syphilis tardive ¬ *A52.7†, M03.19**
- - Syringomyélie ¬ *G95.0†, M14.69**
- - Thyréotoxicose ¬ *E05.9†, M14.59**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.0†, M36.1**
- Coxa vara-péricardite [CACP] ¬ Syndrome de camptodactylie- *M12.80*
- Diabétique NCA ¬ *E14.60†, M14.29**
- Digitale-brachydactylie familiale ¬ Syndrome d' *M25.94, Q71.8*
- Due
- - Microcristaux
- - - Cours d'hyperparathyroïdie ¬ *E21.3†, M14.19**
- - - Sans précision ¬ *M11.9*
- - Rubéole ¬ *B06.8†, M01.49**
- Goutte au cours de drépanocytose ¬ *D57.8†, M14.09**
- Goutteux
- - Cours de syndrome de Lesch-Nyhan ¬ *E79.1†, M14.09**
- - Due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires ¬ *M14.0**
- Inflammatoire SAI ¬ *M13.9*
- Lors
- - Entérite infectieuse ¬ *A09.0*
- - État alimentaire carencé ¬ *E63.9†, M14.59**
- Microcristaux
- - Cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs ¬ *M14.1**
- - Précisés ¬ Autres *M11.8*
- Neuropathique
- - Diabète sucré ¬ *E14.60†, M14.69**
- - Tabique ¬ *A52.1†, M14.69**
- - ¬
- - - *M14.6**
- - - Insensibilité congénitale à la douleur-anosmie- *G60.8†, M14.69*, Q07.8*

Arthropathie *–suite*
- Non syphilitique de Charcot NCA ¬ *G98†, M14.69**
- Post-infectieuse
- - Cours
- - - Entérite à Yersinia enterocolitica ¬ *A04.6†, M03.29**
- - - Hépatite virale NCA ¬ *B19.9†, M03.29**
- - ¬ *B99†, M03.29**
- Progressive ¬ Dysplasie spondylo-épiphysaire avec *Q77.7*
- Psoriasique
- - Distale interphalangienne ¬ *L40.5†, M07.09**
- - ¬ *L40.5†, M07.39**
- SAI ¬ *M25.9*
- Sarcoïdose ¬ *D86.8†, M14.89**
- Spécifiques, non classées ailleurs ¬ Autres *M12.8*
- Syphilitique
- - Charcot ¬ *A52.1†, M14.69**
- - Congénitale tardive ¬ *A50.5†, M03.19**
- - Déformante ¬ *A52.1†, M14.69**
- - ¬ *A52.1†, M14.69**
- Syringomyélique de Charcot ¬ *G95.0†, M49.49**
- Tabétique ¬ *A52.1†, M14.69**
- Tabique de Charcot ¬ *A52.1†, M14.69**
- Transitoire ¬ *M12.8*
- Traumatique ¬ *M12.5*
- ¬
- - Nodosités
- - - Bouchard (avec *M15.2*
- - - Heberden (avec *M15.1*
- - Spectre MONA [ostéolyse multicentrique-nodulose- *Q87.5*

Arthroplastie
- Digitale ¬ *Z96.68*
- Métatarsophalangienne du gros orteil ¬ *Z96.68*

Arthropodes
- Sans précision ¬
- - Encéphalite virale transmise par des *A85.2*
- - Fièvre virale transmise par des *A94*
- ¬
- - Effet toxique: Venin d'autres *T63.4*
- - Fièvres virales précisées, transmises par des *A93.8*
- - Infestations par *B88.2*
- - Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les *Z24.1*

Arthrose
- Cours d'alcaptonurie ¬ *E70.2†, M36.8**
- Érosive ¬ (Ostéo) *M15.4*
- Interépineuse [Maladie de Baastrup] ¬ *M48.2*
- Mention de plus d'une localisation ¬ *M15*
- Ostéoarthrite vertébrale ¬ *M47*

Arthrose *–suite*
- Post-traumatique
- - Articulations ¬ *M19.1*
- - Première articulation carpo-métacarpienne
- - - Bilatérale ¬ *M18.2*
- - - SAI ¬ *M18.3*
- - - Unilatérale ¬ *M18.3*
- - SAI ¬ *M19.1*
- Post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne ¬ Autres *M18.3*
- Précisées ¬ Autres *M19.8*
- Précoce
- - Articulation
- - - Coude avec dysplasie spondyloépiphysaire modérée due à une mutation du gène COL2A1 ¬ *Q77.7, M19.92*
- - - Hanche avec dysplasie spondyloépiphysaire modérée due à une mutation du gène COL2A1 ¬ *Q77.7, M19.95*
- - Dysplasie spondylo-épiphysaire intermédiaire due à une mutation du gène COL2A1 ¬ *Q77.7, M19.99*
- - ¬ Syndrome de petite taille-âge osseux avancé- *Q79.8*
- Première articulation carpo-métacarpienne, sans précision ¬ *M18.9*
- Primaire
- - Articulations ¬ *M19.0*
- - Généralisée ¬ (Ostéo) *M15.0*
- - Première articulation carpo-métacarpienne
- - - Bilatérale ¬ *M18.0*
- - - SAI ¬ *M18.1*
- - - Unilatérale ¬ *M18.1*
- - SAI ¬ *M19.0*
- Primaires de la première articulation carpo-métacarpienne ¬ Autres *M18.1*
- Sans précision ¬ *M19.9*
- Secondaire
- - Multiple ¬ *M15.3*
- - Première articulation carpo-métacarpienne
- - - SAI ¬ *M18.5*
- - - Unilatérale ¬ *M18.5*
- - SAI ¬ *M19.2*
- Secondaires
- - Première articulation carpo-métacarpienne
- - - Bilatérale ¬ Autres *M18.4*
- - - ¬ Autres *M18.5*
- - ¬ Autres *M19.2*

Arthrose-anévrisme ¬ Syndrome d' *Q87.4*

Articulaire
v./v.a. ostéo-articulaire
v./v.a. Type de maladie

Articulation
- Acromio-claviculaire ¬
- - *T84.10*
- - Entorse et foulure de l' *S43.5*

Articulation *–suite*
- Acromio-claviculaire ¬ *–suite*
- - Luxation de l' *S43.1*
- Atlanto-axiale ¬ *S13.4*
- Atlanto-occipitale ¬ *S13.4*
- Basale du gros orteil ¬ *T84.08*
- Capsule SAI ¬
- - Arrachement de *T14.3*
- - Déchirure traumatique de *T14.3*
- - Entorse de *T14.3*
- - Foulure de *T14.3*
- - Hémarthrose traumatique de *T14.3*
- - Lacération de *T14.3*
- - Rupture traumatique de *T14.3*
- - Subluxation traumatique de *T14.3*
- Carpienne ¬ Entorse et foulure du poignet: (*S63.51*
- Carpo-métacarpien ¬
- - Entorse et foulure du poignet: (*S63.53*
- - Luxation du poignet: (*S63.04*
- Charcot ¬ Tabo-paralysie avec *A52.1†, M14.69**
- Cheville ¬
- - *T84.16*
- - Arthrite chronique juvénile
- - - Début systémique, *M08.27*
- - - Forme oligo(pauci)- articulaire, *M08.47*
- - Arthrite juvénile idiopathique associée aux enthésopathies, *M08.87*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.06*
- - Dermato-arthrite lipoïdique, *E78.88†, M14.37**
- - Maladie de Still de l'adulte, *M06.17*
- - Tumeur ténosynoviale à cellules géantes de l' *M12.27*
- Chondro-costales [Tietze] ¬ Syndrome des *M94.0*
- Coude
- - Dysplasie spondyloépiphysaire modérée due à une mutation du gène COL2A1 ¬ Arthrose précoce de l' *Q77.7, M19.92*
- - ¬
- - - *T84.11*
- - - Amputation traumatique à dans l' *S58.0*
- - - Arthrite chronique juvénile
- - - - Début systémique, *M08.22*
- - - - Forme oligo(pauci)- articulaire, *M08.42*
- - - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.01*
- - - CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium dihydraté], *M11.12*
- - - Dermato-arthrite lipoïdique, *E78.88†, M14.32**
- - - Épanchement de l' *M25.42*
- - - Hydarthrose intermittente, *M12.42*
- - - Ostéochondrose disséquant
- - - - *M93.22*

Articulation *–suite*
- Coude *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ostéochondrose disséquant *–suite*
- - - - Familiale de l' *M93.22*
- - - Psoriasis avec arthrite juvénile de l' *L40.5†, M09.02**
- - - Rhumatisme fibroblastique de l' *M06.82*
- - - Tumeur ténosynoviale à cellules géantes de l' *M12.22*
- Cubito-humérale ¬ *S53.1*
- Doigt ¬
- - *T84.08*
- - Kyste mucoïde à l' *M67.44*
- Dysmorphie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-épilepsie-contracture progressive des *Q87.8*
- Extrémité, n.c.a. ¬ Absence congénitale d'une *Q74.8*
- Genou ¬
- - *T84.15*
- - Arthrite chronique juvénile
- - - Début systémique, *M08.26*
- - - Forme oligo(pauci)- articulaire, *M08.46*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.05*
- - CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium dihydraté], *M11.16*
- - Dermato-arthrite lipoïdique, *E78.88†, M14.36**
- - Hémarthrose
- - - Non traumatique de l' *M25.06*
- - - Traumatique de l' *S80.0*
- - Hydarthrose intermittente, *M12.46*
- - Inflammation tuberculeuse de l' *A18.0†, M01.16**
- - Ostéochondrose disséquante familiale de l' *M93.26*
- - Psoriasis avec arthrite juvénile de l' *L40.5†, M09.06**
- - Rhumatisme fibroblastique de l' *M06.86*
- - Synovite villonodulaire pigmentée, *M12.26*
- - TBC [Tuberculose] de l' *A18.0†, M01.16**
- - Tumeur ténosynoviale à cellules géantes de l' *M12.26*
- Gléno-humérale] SAI ¬ Luxation de l'épaule [*S43.00*
- Hanche
- - Dysplasie spondyloépiphysaire modérée due à une mutation du gène COL2A1 ¬ Arthrose précoce de l' *Q77.7, M19.95*
- - ¬
- - - *T84.14*
- - - Amputation traumatique de l' *S78.0*
- - - Arthrite chronique juvénile avec début systémique, *M08.25*
- - - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.04*

Articulation *–suite*
- Hanche *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Dermato-arthrite lipoïdique, *E78.88†, M14.35**
- - - Épanchement de l' *M25.45*
- - - Hydarthrose intermittente, *M12.45*
- - - Ostéochondrose disséquante familiale de l' *M93.25*
- - - Tuberculose de l' *A18.0†, M01.15**
- - - Tumeur ténosynoviale à cellules géantes de l' *M12.25*
- Interphalangienne
- - Main ¬ Dermato-arthrite lipoïdique, *E78.88†, M14.34**
- - ¬
- - - Entorse et foulure de doigt(s): (*S63.62*
- - - Luxation
- - - - Doigt: (*S63.12*
- - - - Orteil(s): (*S93.12*
- Ligament
- - Crico
- - - Aryténoïdien(ne) ¬ *S13.5*
- - - Thyroïdien(ne) ¬ *S13.5*
- - Non précisés membre
- - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une *T13.2*
- - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une *T11.2*
- - Parties non précisées
- - - Cou ¬ Entorse et foulure des *S13.6*
- - - Tête ¬ Entorse et foulure de l' *S03.5*
- - Pelviens ¬ Lésions obstétricales intéressant les *O71.6*
- - Radiocarpien ¬ Entorse et foulure du poignet: (*S63.52*
- Médiocarpienne ¬ Luxation du poignet: (*S63.03*
- Médiotarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (*S93.32*
- Métacarpo-phalangien
- - Interphalangienne ¬ Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des *S63.4*
- - ¬
- - - Entorse et foulure de doigt(s): (*S63.61*
- - - Luxation du doigt: (*S63.11*
- Métatarsophalangienne ¬ Luxation d'un (des) orteil(s): (*S93.11*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Luxation et subluxation pathologiques d'une *M24.3*
- - Précisée ¬ Luxation parties non précisées pied
- - - Métatarsien (os), *S93.34*
- - - Os) carpe, *S93.31*
- - Précisées de la main ¬ Entorse et foulure d' *S63.7*
- Plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation ¬ Contracture (flexion) (de l' *T87.6*

Articulation *–suite*
- Poignet ¬
- - *T84.12*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.03*
- - Dermato-arthrite lipoïdique, *E78.88†, M14.33**
- - Épanchement de l' *M25.43*
- Précisées ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: autres *T84.08*
- Radiocarpienne ¬ Luxation du poignet: (*S63.02*
- Radio-cubitale ¬ Luxation du poignet: (*S63.01*
- Radio-humérale ¬ *S53.0*
- S
- - Interphalangienne(s) ¬ *S93.5*
- - Métatarsophalangienne(s) ¬ *S93.5*
- Sacro-iliaque et sacro-coccygienne ¬ Luxation des *S33.2*
- Sterno-claviculaire ¬
- - *T84.10*
- - Entorse et foulure de l' *S43.6*
- - Luxation de l' *S43.2*
- - Tuberculose de l' *A18.0†, M01.11**
- Talo-crurale ¬ Syndrome d'empiètement de l' *M24.87*
- Tarsométatarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (*S93.33*
- Tibio-péronier
- - Supérieure et ses ligaments ¬ *S83.6*
- - ¬ *S83.1*
- Vertébrale ¬ Ankylose d' *M43.2*
- ¬
- - Anonychie avec hyper et hypopigmentation des plis des *Q84.3*
- - Arthrose
- - - Post-traumatique d'autres *M19.1*
- - - Primaire d'autres *M19.0*
- - Entorse foulure coude
- - - Humérocubitale (*S53.44*
- - - Huméroradiale (*S53.43*
- - Inflammation gonorrhéique des *A54.4†, M01.39**
- - Kératodermie palmoplantaire focale avec kératose localisée aux *Q82.8*
- - Nœud syphilitique à proximité de l' *A52.7†, M14.89**
- - Séquelles de tuberculose des os et des *B90.2*
- - Trouble
- - - Développement (de): l' *F80.0*
- - - Fonctionnel de l' *F80.0*
- - - Spécifique de l'acquisition de l' *F80.0*
- - Tuberculose des *A18.0†, M01.19**

Articulation carpo-métacarpienne
- Bilatérale ¬ Arthrose
- - Post-traumatique de la première *M18.2*
- - Primaire de la première *M18.0*

Articulation carpo-métacarpienne *–suite*
- Bilatérale ¬ Arthrose *–suite*
- - Secondaires de la première *M18.4*
- SAI ¬ Arthrose
- - Post-traumatique de la première *M18.3*
- - Primaire de la première *M18.1*
- - Secondaire de la première *M18.5*
- Sans précision ¬ Arthrose de la première *M18.9*
- Unilatérale ¬ Arthrose
- - Post-traumatique de la première *M18.3*
- - Primaire de la première *M18.1*
- - Secondaire de la première *M18.5*
- ¬ arthrose
- - Post-traumatiques de la première *M18.3*
- - Primaires de la première *M18.1*
- - Secondaires de la première *M18.5*

Articulation de l'épaule ¬
- *T84.10*
- Amputation traumatique de l' *S48.0*
- Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.00*
- CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium dihydraté], *M11.11*
- Dermato-arthrite lipoïdique, *E78.88†, M14.31**
- Empyème de l' *M00.97*
- Entorse et foulure de l' *S43.4*
- Épanchement de l' *M25.41*
- Infection de l' *M00.91*
- Lésion labrum
- - *S43.4*
- - Atteinte dégénérative de l' *M75.6*
- Tuberculose de l' *A18.0†, M01.11**
- Tumeur ténosynoviale à cellules géantes de l' *M12.21*

Articulation du genou
v./v.a. genou

Articulation sacro-iliaque
- Congénitale ¬
- - Fusion de l' *Q74.2*
- - Malformation de: *Q74.2*
- - ¬
- - *T84.14*
- - Arthrite chronique juvénile avec début systémique, *M08.25*
- - Entorse et foulure de l' *S33.6*
- - Tuberculose de l' *A18.0†, M49.08**

Articulation temporo-mandibulaire
- Ligament) ¬ *S03.4*
- ¬
- - *S03.0*
- - *T84.08*
- - Dysfonctionnement de l' *K07.6*
- - Lésions de l' *K07.6*
- - Syndrome de dysfonctionnement douloureux de l' *K07.6*

Articulation temporo-mandibulaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur ténosynoviale à cellules géantes de l' *M12.28*

Artifice ¬ Accident dû à: Corps de feu d' *W49.9!*

Arts ¬ Syndrome d' *E79.8*

Arylsulfatase
- A ¬ Déficit en *E75.2*
- B ¬ Déficit en *E76.2*

Aryténoïdien(ne) ¬ Articulation (ligament): crico- *S13.5*

Arythmie
- Associé à TANGO2 ¬ Syndrome d'encéphalopathie métabolique- *G31.88*
- Atriale ¬ *I49.8*
- Cardiaque
- - Associé à GNB5 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - Néonatale ¬ *P29.1*
- - SAI ¬ *I49.9*
- - Sans précision ¬ *I49.9*
- Cardiaques précisées ¬ Autres *I49.8*
- Complète
- - Cours d'une fibrillation auriculaire ¬ *I48.9*
- - Intermittente ¬ *I48.9*
- - ¬ *I48.9*
- Extrasystolique ¬ *I49.4*
- Fibrillation
- - Auriculaire ¬ *I48.9*
- - ¬ *I48.9*
- Nœud atrio-ventriculaire ¬ *I49.8*
- Ventriculaire de réentrée ¬ *I47.0*

Arythmogène
- CVDA] ¬ Cardiomyopathie ventriculaire droite *I42.80*
- Familiale isolée
- - Forme biventriculaire ¬ Dysplasie ventriculaire *I42.88*
- - Prédominance à gauche ¬ Cardiomyopathie ventriculaire *I42.88*
- - ¬ Dysplasie ventriculaire droite *I42.80*
- Héréditaire isolée ¬ Cardiomyopathie *I42.88*
- Isolée familiale
- - Prédominance ventriculaire droite ¬ Cardiomyopathie *I42.80*
- - ¬ Cardiomyopathie ventriculaire droite *I42.80*
- ¬
- - CVDA [Cardiomyopathie ventriculaire droite *I42.80*
- - Dysplasie ventriculaire droite *I42.80*
- - Syndrome
- - - Hyperkératose palmoplantaire-cardiomyopathie *Q87.8*
- - - Kératodermie palmoplantaire-cardiomyopathie *Q87.8*

Asbestose ¬
- *J61.0*

Asbestose ¬ *–suite*
- Plaque pleural
- - *J92.0*
- - Sans *J92.9*

ASC ataxie spinocérébelleuse
- Début précoce type 27A ¬ *G11.1*
- Tardive type 27A ¬ *G11.2*
- Type 22 ¬ *G11.2*

Ascaridiase
- Complication
- - Intestinales ¬ *B77.0†*, *K93.8**
- - ¬ *B77.8*
- Sans précision ¬ *B77.9*
- ¬ *B77.9*

Ascaridiose ¬ *B77.9*

Ascaridose ¬
- Pneumonie au cours de l' *B77.8†*, *J17.3**
- Pneumopathie au cours de l' *B77.8†*, *J17.3**

Ascaris ¬
- Infection
- - *B77*
- - *B77.9*
- Pneumonie à *B77.8†*, *J17.3**

Ascendant
v./v.a. Aorte ascendante
v./v.a. Côlon ascendant
- Aiguë ¬ myélite *G04*
- Héréditaire] ¬ IAHSP [Paralysie spastique infantile *G12.2*
- Nécrosante sub-aiguë ¬ Myélite *G37.4*
- ¬ Angiocholite *K83.08*

Ascher ¬ Syndrome d' *Q87.0*

Ascite
v./v.a. néphroblastomatose-ascite
- Chyleuse ¬ *I89.8*
- Fœtus
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- - ¬ Dystocie due à: *O66.3*
- Gélatineuse ¬ *C78.6*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3*
- ¬ *R18*

Ascorbique ¬ Carence en acide *E54*

ASD
- Défaut septal auriculaire] du type sinus venosus ¬ *Q21.1*
- Type
- - Ostium secundum ¬ *Q21.1*
- - Sinus coronaire ¬ *Q21.1*

Aseptique
v./v.a. Nécrose aseptique
- Corticosensibles ¬ Syndrome des abcès *M35.8*
- Idiopathique ¬ Ostéonécrose *M87.09*
- Nouveau-né ¬ Myocardite *B33.2†*, *I41.1**
- Tête fémorale médiale] ¬ Maladie d'Ahlbäck [ostéonécrose *M87.05*
- ¬

Aseptique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie due au VIH avec méningite *B20*, *G03.0*
- - Mesures insuffisantes de précautions *Y69!*
- - Ostéonécrose *M87.99*
- - Péritonite: *T81.6*

Asherman ¬ Syndrome d' *N85.6*

ASI] ¬ Ataxie spinocérébelleuse infantile [*G11.1*

Asiatique ¬ Fièvre russo- *A77.2*

Asie du Sud-Est ¬ Ovalocytose de l' *D58.1*

Asocial
- Sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: comportement *Z03.2*
- ¬ Personnalité: *F60.2*

Asomatognosie ¬ *R29.5*

Asparagine synthétase ¬ Déficit en *E72.8*

Aspartate
v./v.a. glutamate-aspartate
- Aminotransférase ¬ Taux anormal d' *R74.8*

Aspartate-glutamate 1 ¬ Déficit en transporteur mitochondrial *E72.0*

Aspartoacylase ¬ Déficit en *E75.2*

Aspartylglucosaminidase ¬ Déficit en *E77.1*

Aspartylglucosaminurie ¬ *E77.1*

Aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l' *Q87.0*

ASPED] ¬ Dysplasie phalango-épiphysaire en ailes d'anges [*Q78.8*

Asperger ¬ Syndrome d' *F84.5*

Aspergillaire du poumon ¬ Abcès *B44.1*

Aspergillome ¬ *B44*

Aspergillose
- Amygdales ¬ *B44.2†*, *J99.8**
- Broncho-pulmonaire
- - Allergique ¬ *B44.1†*, *J99.8**
- - ¬ *B44.1*
- Cérébrale ¬ *B44.8*
- Généralisée ¬ *B44.78*
- Invasif
- - Pneumonie ¬ *B44.0†*, *J17.2**
- - Poumon ¬ *B44.0†*, *J99.8**
- Pneumonie ¬ *B44.1†*, *J17.2**
- ¬
- - Formes d' *B44.8*
- - Otite externe au cours de *B44.8†*, *H62.2**
- - Otomycose au cours d' *B44.8†*, *H62.2**

Aspergillus
- Clavatus ¬ Alvéolite due à *J67.40*
- ¬
- - Amygdalite à *B44.2†*, *J99.8**
- - Aortite à *B44.8†*, *I79.1**
- - Bronchiolite à *B44.1†*, *J99.8**
- - Bronchite à *B44.1†*, *J99.8**
- - Bronchopneumonie à *B44.1†*, *J17.2**
- - Duodénite à *B44.8†*, *K93.8**

Aspergillus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Endocardite à *B44.8†, I39.8**
- - Entérite à *B44.8†, K93.8**
- - Gastrite à *B44.8†, K93.8**
- - Glossite à *B44.8*
- - Hypersensibilité à l'extrait d' *T78.4*
- - Iléite à *B44.8†, K93.8**
- - Infection à *B44.9*
- - Jéjunite à *B44.8†, K93.8**
- - Méningite à *B44.8†, G02.1**
- - Myocardite à *B44.8†, I41.2**
- - Néphrite à *B44.8†, N08.0**
- - Œsophagite à *B44.8†, K23.8**
- - Péricardite à *B44.8†, I32.1**
- - Pleurésie à *B44.8*
- - Prostatite à *B44.8†, N51.0**
- - Septicémie à *B44.70*
- - Splénite à *B44.8*
- - Thyroïdite à *B44.8†, E35.0**
- - Trachéite à *B44.8*
- - Trachéo-bronchite à *B44.1†, J99.8**
- - Vascularite à *B44.8*

Aspergillus fumigatus résistant
- Antifongiques du groupe des triazoles, sauf aspergillus fumigatus résistant au fluconazole seulement ¬ *U83.3!*
- Fluconazole seulement ¬ Aspergillus fumigatus résistant aux antifongiques du groupe des triazoles, sauf *U83.3!*
- Isavuconazole ¬ *U83.3!*
- Posaconazole ¬ *U83.3!*
- Voriconazole ¬ *U83.3!*

Asphyxiante ¬ Dystrophie thoracique *Q77.2*

Asphyxie
- Blanche ¬ *P21.0*
- Bleue ¬ *P21.1*
- Due à un corps étranger ¬ *T17*
- Fœtale ou intra-utérine ¬ *P20*
- Indice Apgar minute
- - 0 et 3 ¬ *P21.0*
- - 4 et 7 ¬ *P21.1*
- Obstétrical
- - Grave ¬ *P21.0*
- - Légère ou modérée ¬ *P21.1*
- - Sans précision ¬ *P21.9*
- SAI ¬ *P21.9*
- ¬
- - *R09.0*
- - *T71*

Aspirateur
- Sans précision ¬ Dépendance (de longue durée) envers: *Z99.0*
- ¬ Dépendance (de longue durée) envers: *Z99.0*

Aspiration
v./v.a. Pneumonie par aspiration

Aspiration *–suite*
- Canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une *R13.1*
- Due anesthésie
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Pneumonie chimique d' *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ Pneumonie chimique d' *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Pneumonie chimique d' *O74.0*
- - ¬ Pneumonie chimique d' *J95.4*
- Liquor (amnii) ¬ *P24.1*
- Méconium ¬ *P24.0*
- Néonatale
- - Lait et d'aliments régurgités ¬ *P24.3*
- - Liquide amniotique et de mucus ¬ *P24.1*
- - Méconium ¬ *P24.0*
- - Sang ¬ *P24.2*
- Sans précision ¬ Syndrome néonatal d' *P24.9*
- ¬
- - *X59.9!*
- - Pneumonie néonatale résultant d'une *P24*
- - Pneumopathie néonatale d' *P24.9*
- - Syndromes néonatals d' *P24.8*

Asplénie
- Congénitale
- - Familiale isolée ¬ *Q89.01*
- - ¬ *Q89.01*
- Polysplénie ¬ Isomérisme des auricules cardiaques avec *Q20.6*
- Post-chirurgicale ¬ *D73.0*
- ¬ Syndrome de hernie diaphragmatique-intestin court- *Q87.8*

Assistance
- Cardiaque ¬ Adaptation et manipulation d'un système d' *Z45.02*
- Cardio-vasculaire ¬ Présence système
- - *Z95.80*
- - *Z95.80*
- Domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d' *Z74.2*
- Minime ou sans assistance ¬ cas avec *O80*
- Soins d'hygiène ¬ Difficultés liées à: besoin d' *Z74.1*
- Ventriculaire épicardique ¬ Infection due à un dispositif d' *T82.72*
- ¬ cas avec assistance minime ou sans *O80*

Assistée ¬ Autres méthodes de fécondation *Z31.3*

Assmann avec signes de maladie NCA ¬ Infiltrat d' *A16.2*

Associant
- Hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome *O14.2*

Associant *–suite*
- Tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme *F95.2*

Association
- CHARGE] ¬ Syndrome CHARGE [*Q87.8*
- Dérivés ¬ *T38.5*
- Ligaments (latéraux) (croisés) ¬ Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en *S83.7*
- Maladies infectieuses ¬ Nécessité d'une vaccination contre d'autres *Z27.8*
- MURCS ¬ *Q87.8*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Anti-épileptiques en *T42.5*
- Parties corps ¬
- - Amputation traumatique avec d'autres *T05.8*
- - Écrasement d'autres *T04.8*
- - Fractures avec d'autres *T02.8*
- - Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres *T00.8*
- - Luxations, entorses et foulures avec d'autres *T03.8*
- - Plaies ouvertes avec d'autres *T01.8*
- Pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l' *U81.6!*
- Tout niveau] ¬ Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute *T05.6*
- VACTERL ¬ *Q87.2*
- ¬ Schisis *Q87.8*

Assoupissement ¬ *R40.0*

Assourdis, augmentés ou diminués ¬ Bruits cardiaques *R01.2*

Assurance ¬ inscription dans: *Z02*

Astasie
- Fonctionnelle ¬ *F44.4*
- Hystérique ¬ *F44.4*

Astato-myocloniques ¬ Épilepsie avec: crises *G40.4*

Asthénie
- Émotionnelle organique ¬ Labilité [*F06.6*
- Hystérique ¬ *F44.4*
- Neurocirculatoire ¬ *F45.30*
- Sénile ¬ *R54*
- ¬ *R53.9*

Asthénique ¬
- Syndrome *F48.0*
- Trouble de la personnalité: dépendante (*F60.7*

Asthénopie ¬ *H53.1*

Asthénozoospermie ¬ Infertilité masculine non syndromique par *N46*

Asthmatique
- Chronique VEF1
- - 35
- - - 50 % de la norme ¬ Bronchite *J44.81*

Asthmatique *–suite*
- Chronique VEF1 *–suite*
- - 35 *–suite*
- - - Norme ¬ Bronchite *J44.80*
- - 50 % et < 70 % de la norme ¬ Bronchite *J44.82*
- - 70 % de la norme ¬ Bronchite *J44.83*
- Obstructive) chronique ¬ bronchite: *J44*
- ¬
- - Bronchite *J45.99*
- - Dyspnée *J45.99*
- - État de mal *J46*

Asthme
- Allergie à la farine ¬ *J45.09*
- Allergique
- - Cause exogène ¬ *J45.09*
- - ¬ *J45.09*
- Associé
- - Qualifié
- - - Bien contrôlé
- - - - Non sévère ¬ *J45.80*
- - - - Sévère ¬ *J45.83*
- - - Non contrôlé
- - - - Non sévère ¬ *J45.82*
- - - - Sévère ¬ *J45.85*
- - - Partiellement contrôlé
- - - - Non sévère ¬ *J45.81*
- - - - Sévère ¬ *J45.84*
- - ¬ *J45.89*
- Atopique ¬ *J45.09*
- Bronchique
- - Allergique ¬ Exacerbation infectieuse d'un *J45.89*
- - Intrinsèque d'origine extrinsèque ¬ *J45.89*
- - Provoqué par infection ¬ *J45.19*
- - Psychogène ¬ *F54, J45.99*
- - ¬ Les affections mentionnées, associées à l' *J44*
- Cardiaque ¬ *I50.1*
- Croupal ¬ *J45.99*
- Denrées alimentaires ¬ *J45.09*
- Due aux analgésiques ¬ *J45.19*
- Effort ¬ *J45.19*
- Éosinophiles ¬ *J82*
- Exacerbé ¬ *J45.99*
- Extrinsèque ¬ *J45.09*
- Grave aigu ¬ *J46*
- Intrinsèque ¬ *J45.19*
- Lors d'idiosyncrasie ¬ *J45.19*
- Nerveux ¬ *J45.19*
- Non allergique
- - Endogène ¬ *J45.19*
- - Médicamenteux ¬ *J45.19*
- - Qualifié
- - - Bien contrôlé
- - - - Non sévère ¬ *J45.10*

Asthme *–suite*
- Non allergique *–suite*
- - Qualifié *–suite*
- - - Bien contrôlé *–suite*
- - - - Sévère ¬ *J45.13*
- - - Non contrôlé
- - - - Non sévère ¬ *J45.12*
- - - - Sévère ¬ *J45.15*
- - - Partiellement contrôlé
- - - - Non sévère ¬ *J45.11*
- - - - Sévère ¬ *J45.14*
- - ¬ *J45.19*
- Platine ¬ *J45.09*
- Prédominance allergique qualifié
- - Bien contrôlé
- - - Non sévère ¬ *J45.00*
- - - Sévère ¬ *J45.03*
- - Non contrôlé
- - - Non sévère ¬ *J45.02*
- - - Sévère ¬ *J45.05*
- - Partiellement contrôlé
- - - Non sévère ¬ *J45.01*
- - - Sévère ¬ *J45.04*
- Qualifié
- - Bien contrôlé
- - - Non sévère ¬ *J45.90*
- - - Sévère ¬ *J45.93*
- - Non contrôlé
- - - Non sévère ¬ *J45.92*
- - - Sévère ¬ *J45.95*
- - Partiellement contrôlé
- - - Non sévère ¬ *J45.91*
- - - Sévère ¬ *J45.94*
- Spastique ¬ *J45.99*
- Tardif ¬ *J45.99*
- Tuberculeux ¬ *A16.2*
- ¬
- - *J45.99*
- - Allergie
- - - Ambroisie avec *J45.09*
- - - Pollens avec *J45.09*
- - - Poussière de maison avec *J45.09*
- - Crise d' *J45.99*
- - Rhinite allergique avec *J45.09*
- - Rhume des foins avec *J45.09*

Astigmatisme ¬ *H52.2*

Astley-Kendall ¬ Dysplasie type *Q77.3*

Astragale
- Vertical ¬ *Q66.8*
- ¬
- - *S92.1*
- - *S93.0*
- - Fracture de l' *S92.1*
- - Ostéochondrite juvénile, *M92.6*

Astringents et détergents locaux ¬ Intoxication: *T49.2*

Astroblastome
- Cerveau ¬ *C71.0*
- Cervelet ¬ *C71.6*
- Encéphale, à localisations contiguës ¬ *C71.8*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*
- Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- ¬ *C71.9*

Astrocytome
- Anaplasique
- - Cerveau ¬ *C71.0*
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Cérébelleux ¬ *C71.6*
- Cerveau
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - ¬ *C71.0*
- Cours de syndrome mélanome-astrocytome ¬ *C71.9*
- Desmoplasique infantile ¬ *D33.0*
- Diffus
- - Cerveau ¬ *C71.0*
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Fibrillaire
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Encéphale ¬ *C71.0*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Gémistocytique

Astrocytome *–suite*
- Gémistocytique *–suite*
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Encéphale ¬ *C71.0*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*
- Maligne ¬ *C71.9*
- Moelle allongée [bulbe rachidien] ¬ *C71.7*
- Pilocytique
- - Bénin ¬ *D33.1*
- - Cerveau ¬ *C71.0*
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Quatrième ventricule ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Pilomyxoïde
- - Cerveau ¬ *C71.0*
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Hypothalamus ¬ *C71.0*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Quatrième ventricule ¬ *C71.7*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Sous-épendymaire
- - Cellules géantes ¬ *D43.2*
- - ¬ *D43.2*
- Thalamus ¬ *C71.0*
- Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- ¬
- - *C71.9*
- - Astrocytome au cours de syndrome mélanome- *C71.9*
- - Mélanome malin au cours de syndrome mélanome- *C43.9*

Astrocytome protoplasmique
- Cerveau ¬ *C71.0*
- Cervelet ¬ *C71.6*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*
- Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- ¬ *C71.9*

Asymétrie
- Cranio-faciale et anomalies acrales, oculaires et cérébrales ¬ Hypopigmentation linéaire avec *Q87.0*
- Facial
- - Pleurs isolée ¬ *Q18.8*
- - Strabisme-incisure du lobe de l'oreille ¬ Syndrome de retard de langage- *Q87.0*
- - ¬ *Q67.0*
- Mâchoires ¬ *K07.1*
- Mammaire ¬ *Q83.88*

Asymétrique ¬ Pied bot: *Q66.8*

Asymptomatique
v./v.a. Type de maladie

Ataxie
v./v.a. cataracte-ataxie-surdité
- Autosomique récessive déficit
- - PEX10 ¬ *G11.8*
- - PEX16 ¬ *G11.8*
- - PEX2 ¬ *G11.1*
- Cérébelleuse précoce
- - Myoclonies [Ramsay-Hunt] ¬ *G11.1*
- - Persistance des réflexes tendineux ¬ *G11.1*
- - Tremblement essentiel ¬ *G11.1*
- Congénitale non progressive ¬ *G11.0*
- Cordon postérieur-rétinite pigmentaire ¬ Syndrome d' *G11.1*
- Déficit en vitamine E ¬ *G11.1*
- Dégénérescence tapéto-rétinienne ¬ Syndrome d' *G11.9, H35.5*
- Épilepsie associé à PUM1 ¬ Syndrome de retard de développement- *Q87.1*
- Friedreich
- - Autosomique récessive) ¬ *G11.1*
- - ¬ *G11.1*
- Héréditaire ¬
- - *G11.9*
- - Neuropathie avec *G60.2*
- Héréditaires ¬ Autres *G11.8*
- Hypotonie-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de retard de développement- *Q87.0*
- Hystérique ¬ *F44.4*
- Myosis congénital ¬ Syndrome d' *G11.4*
- Neuropathie périphérique-retard global de développement ¬ Syndrome d'atrophie optique- *G31.81*

Ataxie *–suite*
- Neuropathique sensorielle-dysarthrie-ophtalmoplégie ¬ Syndrome d' *G31.81, H49.4*
- Origine non organique ¬ *F44.4*
- Pancytopénie ¬ Syndrome d' *G11.1, D61.0*
- Paroxystique familiale ¬ *G11.8*
- Psychogène ¬ *F44.4*
- SAI cérébelleux (cérébelleuse) héréditaire ¬ *G11.9*
- Sans précision ¬ *R27.0*
- Spasticité ¬ Syndrome de neurodégénérescence progressive de l'enfant-cécité- *G31.88*
- Spinocérébelleuse récessive liée au chromosome X ¬ *G11.1*
- Surdité-atrophie optique-létalité ¬ Syndrome d' *E79.8*
- Télangiectasie ¬ Variant de l' *G11.3*
- Télangiectasique ¬ *G11.3*
- Tronculaire ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-mouvements hyperkinétiques- *Q87.8*
- Trouble de l'alimentation lié à DHX30 ¬ Syndrome de retard neurodéveloppemental-déficience intellectuelle- *G11.8*
- Type
- - Caïman ¬ *G11.0*
- - Friedreich-like ¬ *G11.1*
- ¬
- - Anémie sidéroblastique liée à l'X avec *D64.0*
- - Cardiomyopathie avec dilatation et *E71.1†, I43.1**
- - Déviation tonique paroxystique du regard avec *G96.8, H51.8*

Ataxie cérébelleuse
- Acquise ¬ *G31.9*
- Alcoolique ¬ *G31.2*
- Aréflexie-pieds creux-atrophie optique-surdité neurosensorielle ¬ Syndrome d' *G11.8*
- Auto-immune ¬ *G31.88*
- Autosomique
- - Dominante
- - - Épilepsie-déficience intellectuelle par déficit de WWOX ¬ Syndrome d' *G11.1*
- - - Surdité-narcolepsie ¬ Syndrome d' *G11.2*
- - - ¬ *G11.9*
- - Récessive
- - - Adulte ¬ *G11.2*
- - - Associée à la spectrine ¬ *G11.1*
- - - Cécité-surdité ¬ Syndrome d' *G11.1*
- - - Déficit en ubiquinone ¬ *G11.1*
- - - Retard psychomoteur ¬ Syndrome d' *G11.1*
- - - Saccade oculaire ¬ Syndrome d' *G11.8*
- - - Signes pyramidaux-nystagmus-apraxie oculomotrice ¬ Syndrome d' *G11.1*
- - - Spasticité tardive ¬ *G11.1*

Ataxie cérébelleuse *–suite*
- Autosomique *–suite*
- - Récessive *–suite*
- - - Type Beauce ¬ *G11.2*
- - - ¬ *G11.9*
- Congénitale due à une mutation de RNU12 ¬ *G11.1*
- Cours
- - Myxœdème ¬ *E03.9†, G13.2**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G13.1**
- Début précoce ¬ *G11.1*
- Défaut de réparation de l'ADN ¬ *G11.3*
- Déficience intellectuelle atrophie optique anomalies cutané ¬ Syndrome
- - *G11.1*
- - CAMOS [*G11.1*
- Dysplasie ectodermique ¬ Syndrome d' *G11.1*
- Liée à l'X non progressive ¬ *G11.0*
- Modérée et œdème de la substance blanche ¬ Leucoencéphalopathie avec *E75.2*
- Neuropathie et aréflexie vestibulaire bilatérale] ¬ CANVAS [Syndrome d' *G11.8*
- Non progressive déficience intellectuelle ¬
- - *G11.0*
- - Syndrome d' *G11.8*
- Périphérique combinée-surdité-diabète sucré ¬ Syndrome d' *E10.60, G31.88*
- Progressive liée à l'X ¬ *G11.1*
- Rétinopathie pigmentaire ¬ Syndrome de myopathie mitochondriale- *G31.81*
- Surdité ¬ Syndrome de myoclonie- *G11.1*
- Tardive ¬ *G11.2*
- ¬
- - Neurosyphilis avec *A52.1†, G99.8**
- - Syndrome
- - - Déficience intellectuelle sévère-agénésie du corps calleux-dysmorphie faciale- *Q87.0*
- - - Tubulopathie proximale-diabète sucré- *Q87.8*

Ataxie épisodique
- Héréditaire ¬ *G11.8*
- Spasticité ¬ Choréoathétose dystonique paroxystique avec *G24.8*
- Type
- - 1 ¬ *G11.8*
- - 3 ¬ *G11.8*
- - 4 ¬ *G11.8*
- - 5 ¬ *G11.8*
- - 6 ¬ *G11.8*
- - 7 ¬ *G11.8*
- - 8 ¬ *G11.8*

Ataxie spastique
- Amyotrophie spinale distale ¬ Syndrome d'encéphalopathie progressive à début précoce- *G31.88*
- Autosomique
- - Dominante type 1 ¬ *G11.4*

Ataxie spastique *–suite*
- Autosomique *–suite*
- - Récessive
- - - Atrophie optique-dysarthrie ¬ Syndrome d' *G11.4*
- - - Charlevoix-Saguenay] ¬ ARSACS [*G11.1*
- - - Leucoencéphalopathie ¬ *G11.4*
- - - Type
- - - - 4 ¬ *G11.4*
- - - - 5 ¬ *G11.4*
- Dysarthrie par déficit en glutaminase ¬ *E72.8, G11.8*

Ataxie spinocérébelleuse
- Autosomique récessive type
- - 2 ¬ *G11.0*
- - 3 ¬ *G11.1*
- - 5 ¬ *G11.1*
- - 6 ¬ *G11.0*
- - 7 ¬ *G11.1*
- - 10 ¬ *G11.2*
- - 12 ¬ *G11.1*
- - 13 ¬ *G11.1*
- - 15 ¬ *G11.1*
- - 16 ¬ *G11.1*
- - 17 ¬ *G11.1*
- - 19 ¬ *G11.1*
- - 20 ¬ *G11.1*
- - 21 ¬ *G11.1†, K77.8**
- - 23 ¬ *G11.1*
- Début précoce type 27A ¬ ASC [*G11.1*
- Dysmorphie ¬ Syndrome d' *G11.1*
- Dystrophie cornéenne ¬ Syndrome d' *G11.8*
- Infantile [ASI] ¬ *G11.1*
- Liée X type
- - 3 ¬ *G11.1*
- - 4 ¬ *G11.1*
- Mitochondriale avec épilepsie ¬ *G31.81*
- Neuropathie axonale type 1 ¬ Syndrome d' *G60.2*
- SCA type
- - 1 ¬ *G11.8*
- - 2 ¬ *G11.2*
- - 3 ¬ *G11.8*
- - 4 ¬ *G11.2*
- - 5 ¬ *G11.8*
- - 6 ¬ *G11.2*
- - 7 ¬ *G11.8*
- - 8 ¬ *G11.2*
- - 10 ¬ *G11.2*
- - 11 ¬ *G11.8*
- - 12 ¬ *G11.2*
- - 13 ¬ *G11.2*
- - 14 ¬ *G11.2*
- - 15/16 ¬ *G11.2*
- - 17 ¬ *G11.8*
- - 18 ¬ *G11.8*

Ataxie spinocérébelleuse *–suite*
- SCA type *–suite*
- - 19/20 ¬ *G11.2*
- - 20 ¬ *G11.2*
- - 21 ¬ *G11.1*
- - 23 ¬ *G11.2*
- - 25 ¬ *G11.8*
- - 26 ¬ *G11.2*
- - 27 ¬ *G11.1*
- - 28 ¬ *G11.1*
- - 29 ¬ *G11.0*
- - 30 ¬ *G11.2*
- - 31 ¬ *G11.8*
- - 32 ¬ *G11.8*
- - 34 ¬ *G11.2*
- - 35 ¬ *G11.8*
- - 36 ¬ *G11.2*
- - 37 ¬ *G11.8*
- - 38 ¬ *G11.2*
- - 40 ¬ *G11.2*
- - 41 ¬ *G11.2*
- - 42 ¬ *G11.8*
- - 43 ¬ *G11.2*
- - 44 ¬ *G11.2*
- - 45 ¬ *G11.2*
- - 46 ¬ *G11.2*
- - 47
- - - Adulte ¬ *G11.2*
- - - ¬ *G11.2*
- - 48 ¬ *G11.2*
- - 49 ¬ *G11.2*
- Tardive type 27A ¬ ASC [*G11.2*
- Type
- - 22 ¬ ASC [*G11.2*
- - 27B ¬ SCA [*G11.2*
- ¬ Anémie sidéroblastique liée à l'X avec *D64.0*

Ataxie-apraxie
- Déficience intellectuelle lié à l'X ¬ Syndrome d' *G11.8*
- Oculomotrice type
- - 1] ¬ AOA1 [Syndrome d' *G11.3*
- - 2] ¬ AOA2 [Syndrome d' *G60.2*
- - 4] ¬ AOA4 [Syndrome d' *G11.1*

Ataxie-télangiectasie-like] ¬ ATLD [*G11.3*

Ataxique
- Polynévritique ¬ Hérédopathie *G60.1*
- Sensorielle aiguë ¬ Neuropathie *G61.0*
- ¬
- - Démarche *R26.0*
- - Paralysie cérébrale *G80.4*

Atélectasie
- Acquise par compression ¬ *J98.18*
- Compression ¬ *J98.18*
- Dirigée ¬ *J98.18*
- Lobaire ¬ *J98.12*

Atélectasie *–suite*
- Lobe
- - Inférieur ¬ *J98.11*
- - Moyen ¬ *J98.11*
- Massive ¬ *J98.18*
- Nouveau-né, autres et sans précision ¬ *P28.1*
- Partielle ¬
- - *J98.11*
- - *P28.1*
- Plane ¬ *J98.18*
- Primitive du nouveau-né ¬ *P28.0*
- Pulmonaire ¬ *J98.18*
- Résorption
- - Sans syndrome de détresse respiratoire ¬ *P28.1*
- - ¬ *J98.18*
- SAI ¬ *P28.1*
- Secondaire ¬ *P28.1*
- Totale ¬ *J98.12*
- Tuberculeuse ¬ *A16.2*
- ¬ *J98.18*

Atélencéphalie ¬ *Q04.3*

Atélomyélie ¬ *Q06.1*

Atélostéogenèse type
- 1 ¬ *Q78.8*
- 2 ¬ *Q77.5*
- 3 ¬ *Q78.8*

Athabascan ¬ Dysgénésie du tronc cérébral type *Q87.8*

Athélie
- Hypothyroïdie-retard pubertaire-petit taille ¬ Syndrome d'atrésie des choanes- *Q87.1*
- Retard de développement ¬ Syndrome de dérèglement immunitaire-anomalies craniofaciales-surdité- *Q87.8*

Athérome
- Artères cérébrales ¬ *I67.2*
- ¬ *I70*

Athéroscléreuse
- Bitronculaire ¬ Maladie *I25.12*
- Tritronculaire ¬ Maladie *I25.13*
- ¬
- - Gangrène *I70.25*
- - Rétinopathie *I70.8†, H36.8**

Athérosclérose
- Aorte ¬ *I70.0*
- Artère distale
- - Non précisées ¬ *I70.29*
- - Type
- - - Bassin-jambe
- - - - Douleur
- - - - - Ischémique à l'effort, distance de marche de 200 m et plus ¬ *I70.21*
- - - - - Ischémique à l'effort, distance de marche de moins de 200 m ¬ *I70.22*
- - - - - Repos ¬ *I70.23*
- - - - Gangrène ¬ *I70.25*

Athérosclérose *–suite*
- Artère distale *–suite*
- - Type *–suite*
- - - Bassin-jambe *–suite*
- - - - Sans douleurs ¬ *I70.20*
- - - - Stade IV selon Fontaine avec ulcération ¬ *I70.24*
- - - - Ulcération ¬ *I70.24*
- - - Épaule-bras, tous stades ¬ *I70.26*
- Artère fémorale ¬ *I70.29*
- Artère rénale ¬ *I70.1*
- Artère sous-clavière ¬ *I70.26*
- Artères ¬ *I70.8*
- Cardio-vasculaire, décrite ainsi ¬ *I25.0*
- Cérébrale ¬ *I67.2*
- Extrémité ¬ *I70.29*
- Extrémité inférieure ¬ *I70.29*
- Membre inférieur ¬ *I70.29*
- Mésentérique ¬ *K55.1*
- Périphérique ¬ *I70.29*
- Surdité-épilepsie-diabète-néphropathie ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬ Gangrène par *I70.2*

Athétosique ¬ Syndrome de microbrachycéphalie sévère-déficience intellectuelle-paralysie cérébrale *Q87.0*

Athetotique ¬ Parésie cérébrale *G80.3*

Athlète ¬ Pied d' *B35.3*

Athyréose
- Congénitale ¬ *E03.1*
- ¬ *E03.1*

Atkin-Flaitz ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Atlanta ¬ Maladie hémorragique du facteur V d' *D68.22*

Atlanto-axiale ¬ Articulation: *S13.4*

Atlanto-occipitale ¬ Articulation: *S13.4*

Atlas ¬
- *S12.0*
- Fracture de l' *S12.0*
- Ostéoblastome de l' *D16.6*

ATLD [Ataxie-télangiectasie-like] ¬ *G11.3*

Atloïdo-axoïdienne
- Myélopathie ¬ Subluxation récidivante *M43.3*
- Récidivantes ¬ Autres subluxations *M43.4*

Atmosphérique
- Ambiant
- - Eau ¬ Effets sur l'oreille des changements de la pression *T70.0*
- - ¬ Effets sur les sinus des changements de la pression *T70.1*
- Élevée ou basse (sans relation avec les conditions météorologiques) ¬ Exposition à une pression *W94.9!*
- Pression eau
- - Sans précision ¬ Effet de la pression *T70.9*
- - ¬ Autres effets de la pression *T70.8*

Atmosphérique *–suite*
- ¬ Accident dû à un changement de pression *W94.9!*

Atonie
- Côlon ¬ *K59.8*
- Intestinale ¬ médicaments pour l' *T47.4*
- Utérine) SAI ¬ Hémorragie (du): post-partum (*O72.1*
- Vésicale ¬ *G95.81*

Atonique
- Motrice) (sensorielle) ¬ Vessie neurogène: *N31.2*
- ¬ Crises non spécifiques: *G40.3*

Atopique
- Aiguë ¬ Conjonctivite *H10.1*
- Endogène
- - Sans précision ¬ Dermite *L20.9*
- - ¬ Autres dermites *L20.8*
- ¬
- - Asthme *J45.09*
- - Kératoconjonctivite *H16.2*
- - Névrodermite: *L20.8*

ATP-binding cassette A1 ¬ Déficit du transporteur à *E78.6*

Atransferrinémie
- Congénitale ¬ *E88.08*
- ¬ *E88.08*

Atrésie
- Anale
- - Anomalies cardiaques fistule trachéo-œsophagienne atrésie œsophage
- - - Anomalies rénales et des membres] ¬ Syndrome de VACTERL [anomalies vertébrales, *Q87.2*
- - - Dysplasie rénale et du radius] ¬ Syndrome de VATER [anomalies vertébrales, *Q87.2*
- - Malformation génito-urinaire ¬ Syndrome de dysostose spondylocostale- *Q87.8*
- - Uropathie ¬ Syndrome de cataracte-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Anus
- - Fistule ¬ *Q42.2*
- - Non syndromique
- - - Fistule
- - - - Périnéale ¬ Malformation anorectale (*Q42.2*
- - - - Rectobulbaire ¬ Malformation anorectale (*Q42.2*
- - - - Rectovaginale ¬ Malformation anorectale (*Q42.2*
- - - - Rectovésicale ¬ Malformation anorectale (*Q42.2*
- - - - Recto-vestibulaire ¬ Malformation anorectale (*Q42.2*
- - - - Type H ¬ Malformation anorectale (*Q42.2*
- - - Fistule recto-urétrale ¬ Malformation anorectale (*Q42.2*

Atrésie *–suite*
- Anus *–suite*
- - Non syndromique *–suite*
- - - Sans fistule ¬ Malformation anorectale (*Q42.3*
- - ¬ *Q42.3*
- Aorte ¬ *Q25.2*
- Aortique
- - Congénitale
- - - Hypoplasie de l'aorte ascendante et malformation du ventricule gauche ¬ *Q23.4*
- - - ¬ *Q23.0*
- - Cours de syndrome d'hypoplasie du cœur gauche ¬ *Q23.4*
- Appareil lacrymal ¬ *Q10.5*
- Artère NCA ¬ *Q27.8*
- Artère pulmonaire ¬ *Q25.5*
- Bronches ¬ *Q32.4*
- Bronchique
- - Congénitale non syndromique ¬ *Q32.4*
- - ¬ *Q32.4*
- Canal
- - Cholédoque ¬ *Q44.2*
- - Hépatique ¬ *Q44.2*
- Canal cystique ¬ *Q44.2*
- Canal déférent ¬ *Q55.3*
- Cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Choanale
- - Anomalie des yeux ¬ Syndrome de diarrhée intraitable- *Q87.8*
- - Postérieure-lymphœdème ¬ Syndrome d' *Q82.08, Q30.0*
- - Unilatérale ¬ *Q30.0*
- Choanes
- - Athélie-hypothyroïdie-retard pubertaire-petit taille ¬ Syndrome d' *Q87.1*
- - Déficience intellectuelle lié à l'X limité à la femme ¬ Syndrome de dysmorphie faciale-petite taille- *Q87.0*
- - Microphtalmie ¬ Syndrome d'arhinie- *Q87.0*
- - Surdité-cardiopathie-dysmorphie cranio-faciale ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - ¬
- - - *Q30.0*
- - - Syndrome d'hypoplasie du rayon radial- *Q71.8, Q30.0*
- Col utérin en tant que complication de l'accouchement ¬ *O65.5*
- Côlon ¬ *Q42.9*
- Conduit auditif externe-dilatation du canal auditif interne-dysmorphie faciale ¬ Syndrome lié à l'X d' *Q16.9, Q18.9*
- Congénitale
- - Anus
- - - Fistule
- - - - Rectobulbaire ¬ *Q42.2*
- - - - Rectoprostatique ¬ *Q42.2*

Atrésie *–suite*
- Congénitale *–suite*
- - Anus *–suite*
- - - Fistule *–suite*
- - - - Rectovésicale ¬ *Q42.2*
- - - Fistule recto-urétrale ¬ *Q42.2*
- - Vagin ¬ *Q52.4*
- Duodénale-hypoplasie rénale bilatérale fœtal létal ¬ Syndrome de malformation cérébrale- *Q87.8*
- Duodénum
- - Type
- - - 1 ¬ *Q41.0*
- - - II ¬ *Q41.0*
- - - III ¬ *Q41.0*
- - ¬ *Q41.0*
- Fentes de Luschka et du foramen de Magendie ¬ *Q03.1*
- Glandes ou de canaux salivaires ¬ *Q38.4*
- Iléon
- - Type
- - - I ¬ *Q41.2*
- - - II ¬ *Q41.2*
- - - IIIa ¬ *Q41.2*
- - - IIIb ¬ *Q41.2*
- - - IV ¬ *Q41.2*
- - ¬ *Q41.2*
- Intestinale
- - Hypoplasie de la vésicule biliaire ¬ Syndrome d'hypoplasie du pancréas- *Q45.8*
- - Multiple ¬ Déficit immunitaire combiné- *Q87.8*
- - ¬ Syndrome d'ulcération du cordon ombilical- *Q41.9, P02.6*
- Jéjuno-iléale ¬ *Q41.8*
- Jéjunum
- - Type
- - - I ¬ *Q41.1*
- - - II ¬ *Q41.1*
- - - IIIa ¬ *Q41.1*
- - - IIIb ¬ *Q41.1*
- - - IV ¬ *Q41.1*
- - ¬ *Q41.1*
- Larynx ¬ *Q31.8*
- Méat urinaire ¬ *Q64.3*
- Mitral
- - Congénitale ¬ *Q23.2*
- - Cours de syndrome d'hypoplasie du cœur gauche ¬ *Q23.4*
- - ¬ *Q23.2*
- Multiples
- - Congénitales ¬ Syndrome d' *Q89.8*
- - Intestin ¬ *Q43.8*
- Œsophage

Atrésie *–suite*
- Œsophage *–suite*
- - Anomalies rénales et des membres] ¬ Syndrome de VACTERL [anomalies vertébrales, atrésie anale, anomalies cardiaques, fistule trachéo-œsophagienne avec *Q87.2*
- - Dysplasie rénale et du radius] ¬ Syndrome de VATER [anomalies vertébrales, atrésie anale, anomalies cardiaques, fistule trachéo-œsophagienne avec *Q87.2*
- - Fistule broncho-œsophagienne ¬ *Q39.1*
- - Fistule trachéo-œsophagienne ¬ *Q39.1*
- - SAI ¬ *Q39.0*
- - Sans fistule ¬ *Q39.0*
- - Type
- - - 1 selon Vogt ¬ *Q39.0*
- - - 2 selon Vogt ¬ *Q39.0*
- - - 3a selon Vogt ¬ *Q39.1*
- - - 3b selon Vogt ¬ *Q39.1*
- - - 3c selon Vogt ¬ *Q39.1*
- - ¬
- - - *Q39.0*
- - - Syndrome
- - - - Anophtalmie- *Q11.1, Q39.0*
- - - - Microphtalmie- *Q11.2, Q39.0*
- Orifice
- - Col utérin ¬ *Q51.8*
- - Nasal (antérieur) (postérieur) ¬ *Q30.0*
- - Urétral ¬ *Q64.3*
- Ostiale coronaire ¬ *Q24.5*
- Portion vaginale du col utérin ¬ *Q51.8*
- Pulmonaire
- - Communication interventriculaire
- - - Cours de tétralogie de Fallot ¬ *Q21.3*
- - - ¬ Syndrome d' *Q22.0, Q21.0*
- - Dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec *Q21.3*
- - Septum ventriculaire intact ¬ Syndrome d' *Q22.0*
- Pupille ¬ *Q13.2*
- Pylore ¬ Épidermolyse bulleuse simple avec *Q81.0*
- Pylorique ¬ Épidermolyse bulleuse jonctionnelle avec *Q81.8, Q40.8*
- Rectum ¬
- - *Q42.1*
- - Fistule recto-cutanée avec *Q42.0*
- Rétrécissement
- - Congénitaux du conduit auditif (externe) ¬ Absence, *Q16.1*
- - Méat auditif osseux ¬ *Q16.1*
- Rhinopharynx ¬ *Q34.8*
- Sinus coronaire ¬ *Q21.1*
- Sténose
- - Congénitale) de l'urètre et du col vésical ¬ Autres formes d' *Q64.3*
- - Congénitales

Atrésie *–suite*
- Sténose *–suite*
- - Congénitales *–suite*
- - - Côlon, sans précision de localisation ¬ Absence, *Q42.9*
- - - Duodénum ¬ Absence, *Q41.0*
- - - Intestin SAI ¬ Absence, *Q41.9*
- - - Localisations
- - - - Côlon ¬ Absence, *Q42.8*
- - - - Précisées de l'intestin grêle ¬ Absence, *Q41.8*
- - - Rectum, avec fistule ¬ Absence, *Q42.0*
- - Uretère ¬ *Q62.1*
- Trachée ¬ *Q32.1*
- Trompe de Fallope ou du ligament large ¬ *Q50.6*
- Type 4 selon Vogt ¬ Fistule trachéo-œsophagienne congénitale de type H sans *Q39.2*
- Vagin ¬ Rétrécissement et *N89.5*
- Valve pulmonaire ¬ *Q22.0*
- Valvulaire aortique ¬ *Q23.0*
- Valvule tricuspide ¬ *Q22.4*
- Veine
- - Pulmonaires ¬ *Q26.3*
- - ¬ *Q27.8*
- Voies biliaires ¬ *Q44.2*
- ¬ Fistule trachéo-œsophagienne congénitale sans *Q39.2*

Atrial
- Chaotique ¬ Tachycardie *I47.1*
- Conduction cardiaque ¬ Trouble *I45.9*
- Droit ¬ Isomérisme *Q20.6*
- Gauche ¬ Isomérisme *Q20.6*
- Intervalle PR court ¬ Tachyarythmie *I45.6*
- Trouble
- - Conduction cardiaque infra-Hisienne familiales ¬ Tachyarythmie *I45.8*
- - Motilité intestinale chronique] ¬ Syndrome CAID [dysrythmie *I49.5, K59.8*
- Type ostium secundum ¬ Anomalie du septum *Q21.1*
- ¬
- - Arythmie *I49.8*
- - Myxome *D15.1*
- - Tachycardie (paroxystique): *I47.1*

Atrichie
- Congénitale ¬ *Q84.0*
- Lésions papuleuses ¬ *Q84.0*

Atrio-digitale type
- 1 ¬ Dysplasie *Q87.2*
- 3 ¬ Dysplasie *Q87.2*
- Slovène ¬ Dysplasie *Q87.2*

Atrio-ventriculaire
v./v.a. Canal atrio-ventriculaire
- AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- Complet ¬ Bloc: *I44.2*

Atrio-ventriculaire *–suite*
- Intermédiaire ¬ Défaut septal *Q21.2*
- Partielle ¬ Communication *Q21.2*
- ¬
- - Arythmie du nœud *I49.8*
- - Communication *Q21.2*
- - Défaut complet du septum *Q21.2*
- - Discordance ventriculo-artérielle avec concordance *Q20.3*
- - Syndrome de communication interauriculaire-trouble de la conduction *Q21.1*

Atrophia gyrata
- Chorioideae ¬ *H31.2*
- ¬ *H31.2*

Atrophiante
- Albo-papuloïde ¬ Dystrophie cutanée bulleuse *Q81.2*
- Bénigne ¬ Papulose *I77.88*
- Maligne ¬ Papulose *I77.88*
- Vasculaire] ¬ Poïkilodermie généralisée type Petges-Cléjat [*L94.5*
- ¬
- - Acrodermatite chronique *L90.4*
- - Papulose *I77.88*

Atrophie
- Acquise
- - Ovaire et de la trompe de Fallope ¬ *N83.3*
- - Utérus ¬ *N85.8*
- Bifocale choriorétinienne progressive ¬ *H35.5*
- Blanche
- - Plaques) ¬ *L95.0*
- - ¬ *L95.0*
- Canal biliaire ¬ *K83.8*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Canal pancréatique ¬ *K86.88*
- Cérébelleuse
- - Cécité corticale] ¬ Syndrome de NESCAV [neurodégénérescence - spasticité - *G31.88*
- - Progressive-hypotonie axiale ¬ Syndrome de retard global de développement-anomalies visuelles- *G31.88*
- - ¬ Retard du développement neurologique-épilepsie-anomalies ophtalmiques-ostéopénie- *E88.8*
- Cérébello-cérébrale progressiv] ¬ PCCA [*G31.88*
- Choriorétinienne-télécanthus] ¬ Syndrome MMCAT [microcornée-myopie avec *Q15.8*
- Choroïde ¬ *H31.1*
- Choroïdienne-alopécie ¬ Syndrome d' *H31.1, Q82.8*
- Congénitale de la thyroïde ¬ *E03.1*

Atrophie *–suite*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.8*
- Corticale postérieure ¬ *G31.0*
- Crête alvéolaire édentée ¬ *K08.2*
- Déjerine-Thomas ¬ *G23.3*
- Dentato-rubro-pallido-luysienne ¬ *G11.8*
- Due
- - Inactivité NCA ¬ *M62.5*
- - Malnutrition ¬ *E45*
- Dystrophie jaune du foie ¬ *K72*
- Facio-scapulo-humérale ¬ *G71.08*
- Fibres musculaires de type 2 ¬ Myopathie congénitale avec *G71.2*
- Fonte musculaires, non classées ailleurs ¬ *M62.5*
- Génitale ¬ *N95.8*
- Glande lacrymale ¬ *H04.1*
- Glandes salivaires ¬ *K11.0*
- Globe oculaire ¬ *H44.5*
- Héréditaire du nerf optique au cours de la maladie de Leber ¬ *H47.2*
- Hypertrophie hémifaciale ¬ *Q67.4*
- Hypophyse ¬ *E23.6*
- Inanition ¬ *E45*
- Iris (essentielle) (progressive) ¬ *H21.2*
- Langue
- - Myopathie myofibrillaire ¬ Syndrome de cyphose- *G71.8*
- - Paraplégie spastique héréditaire ¬ Syndrome de cyphoscoliose- *G11.4*
- - ¬ *K14.8*
- Maculaire
- - Choriorétinopathie ¬ Syndrome de papille optique colobomateuse- *Q14.8*
- - Syphilitique de la peau en stries ¬ *A52.7†, L99.8**
- Mammaire ¬ *N64.2*
- Microvillositaire congénitale ¬ *K90.8*
- Muqueuse buccale ¬ *K13.7*
- Muscles posturaux ¬ Myopathie liée à l'X avec *G71.08*
- Musculaire
- - Neuritique ¬ *G58.9†, M63.89**
- - Pseudo-hypertrophique ¬ *G71.08*
- - Spinale distale liée à l'X type 3 ¬ *G12.1*
- - Spinobulbaire de type Kennedy [Maladie de Kennedy] ¬ *G12.2*
- - Syphilitique ¬ *A52.7†, M63.89**
- - Werdnig-Hoffmann ¬ *G12.0*
- Nerf optique au cours de la maladie de Leber ¬ *H47.2*
- Nerf périphérique ¬ *G58.9*
- Noyaux gris centraux et du cervelet] ¬ H-ABC [Hypomyélinisation avec *E75.2*
- Olivo-ponto-cérébelleuse
- - Surdité ¬ Syndrome d' *G23.3, H90.5*
- - ¬ AOPC [*G23.3*
- Orbite ¬ *H05.3*

Atrophie *–suite*
- Osseux
- - Post-traumatique neurogène] ¬ Maladie de Sudeck [*G90.59*
- - Sudeck-Leriche ¬ *G90.5*
- - Tabique neurogène ¬ *A52.1†, M90.29**
- Pancréas ¬ *K86.88*
- Papilles de la langue ¬ *K14.4*
- Paupière ¬ *H02.5*
- Pluriglandulaire auto-immune ¬ *E31.0*
- Prostate ¬ *N42.2*
- Rate ¬ *D73.0*
- Rétino-choroïdienne paraveineuse pigmentée ¬ *H35.8*
- Sclérotique ¬ *H15.8*
- Sénile des organes génitaux ¬ *N95.8*
- Sinueuse de la choroïde et de la rétine ¬ Hyperornithinémie avec *E72.4*
- Surrénales ¬ *E27.8*
- Syphilitique
- - Congénitale du nerf optique ¬ *A50.4†, H48.0**
- - Nerf optique ¬ *A52.1†, H48.0**
- - Peau en stries ¬ *A52.7†, L99.8**
- Systémique système nerveux central cours
- - Myxœdème ¬ *E03.9†, G13.2**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G13.1**
- Temporale à droite ¬ Démence fronto-temporale, variante d' *G31.0†, F02.0**
- Testicule ¬ *N50.0*
- Thyroïde (acquise) ¬ *E03.4*
- Tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- Villositaire ¬ Syndrome de diarrhée chronique- *K52.8*
- Vulve ¬ *N90.5*

Atrophie cérébrale
- Autosomique récessive ¬ *G31.88*
- Cérébelleuse
- - Diffuse-épilepsie réfractaire-microcéphalie progressive ¬ Syndrome d' *Q02*
- - Infantile avec microcéphalie post-natale progressive ¬ *G31.9, Q02*
- Circonscrite ¬
- - *G31.0*
- - Démence au cours d' *G31.0†, F02.0**
- Diffuse précoce-microcéphalie-faiblesse musculaire-atrophie optique ¬ Syndrome d' *G31.88*

Atrophie cérébrale *–suite*
- Présénile ¬ Démence au cours d' *G31.88†, F02.8**
- Progressive
- - Anomalie des ganglions de la base ¬ Syndrome de spasmes infantiles-retard psychomoteur- *E51.8†, G99.8**
- - ¬ Syndrome de microcéphalie congénitale-encéphalopathie sévère- *E72.8*
- - ¬ Syndrome
- - Début précoce d'encéphalopathie progressive-surdité-hypoplasie du pont- *G31.88*
- - Déficience intellectuelle liée à l'X-dysmorphie- *Q87.8*
- - Kératose folliculaire-nanisme- *Q87.1*
- - Microphtalmie- *Q11.2*

Atrophie multisystématisée
- Type
- - Cérébelleux ¬
- - - *G23.3*
- - - *G23.3*
- - Parkinsonien ¬
- - - *G23.2*
- - - AMS-P [*G23.2*
- ¬ *G23.2*

Atrophie optique
- Anomalie de Pelger-Huët ¬ Syndrome de petite taille- *Q87.1*
- Anomalies cutané ¬ Syndrome
- - Ataxie cérébelleuse-déficience intellectuelle- *G11.1*
- - CAMOS [ataxie cérébelleuse, déficience intellectuelle, *G11.1*
- Ataxie-neuropathie périphérique-retard global de développement ¬ Syndrome d' *G31.81*
- Autosomique
- - Dominante
- - - Classique ¬ *H47.2*
- - - Kjer ¬ *H47.2*
- - - Plus ¬ *H47.2*
- - Récessive type OPA7 ¬ *H47.2*
- Bosch-Boonstra-Schaaf ¬ Syndrome d' *H47.2*
- Cataracte autosomique dominante ¬ Syndrome d' *H47.2*
- Costeff ¬ *E71.1*
- Cours
- - Carence en vitamine ¬ *E56.9†, H48.0**
- - Leucodystrophie ¬ *E75.2†, H48.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H48.0**
- Dysarthrie ¬ Syndrome d'ataxie spastique autosomique récessive- *G11.4*
- Infantile avec chorée et paraplégie spastique ¬ *E71.1*
- Isolée autosomique récessive ¬ *H47.2*
- Létalité ¬ Syndrome d'ataxie-surdité- *E79.8*

Atrophie optique *–suite*
- Neurodégénérescence à début infantile ¬ Syndrome de neuropathie sensitivo-motrice axonale- *G60.0, H47.2*
- Neuropathie ¬ Syndrome paraplégie spastique- *G11.4*
- Surdité
- - Neurosensorielle ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse-aréflexie-pieds creux- *G11.8*
- - Polyneuropathie-myopathie ¬ Syndrome d' *H47.2*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.1†, H48.0**
- Type
- - 2 [OPA2] ¬ *H47.2*
- - 3 autosomique
- - - Dominante ¬ *H47.2*
- - - Récessive ¬ *E71.1*
- ¬
- - *H47.2*
- - ANOA [Syndrome de neuropathie auditive- *H90.5, H47.2*
- - Neurosyphilis avec *A52.1†, H48.0**
- - Syndrome
- - - Atrophie cérébrale diffuse précoce-microcéphalie-faiblesse musculaire- *G31.88*
- - - PEHO [encéphalopathie progressive avec œdème, hypsarythmie, et *G31.88*

Atrophie rénale
- Bilatérale
- - Congénitale ¬ *Q60.4*
- - Infantile ¬ *Q60.4*
- Congénitale ¬
- - *Q60*
- - *Q60.5*
- Hydronéphrotique avec infection ¬ *N13.65*
- Infantile ¬
- - *Q60*
- - *Q60.5*
- Terminale) ¬ *N26*
- Unilatérale
- - Congénitale ¬ *Q60.3*
- - Infantile ¬ *Q60.3*

Atrophique
v./v.a. Type de maladie

Atrophoderma
- Maculatum
- - Striatum syphilitique ¬ *A52.7†, L99.8**
- - Syphilitique ¬ *A51.3†, L99.8**
- Vermiforme ¬ *L66.4*

Atrophodermie
- Linéaire de Moulin ¬ *L90.8*
- Pasini et Pierini ¬ *L90.3*
- Pigmentée ¬ *Q82.1*

Atrophy optique autosomique dominante avec neuropathie périphérique ¬ *H47.2*

ATRT [Tumeur rhabdoïde tératoïde atypique] ¬ *C72.9*

Attachement enfance
- Désinhibition ¬ Trouble de l' *F94.2*
- ¬ Trouble réactionnel de l' *F94.1*

Attaque de panique ¬ *F41.0*

Atteignant
- Épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte cutanée partielle *L89.1*
- Principalement l'aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux malformatifs *Q87.0*

Atteinte
- Appareil digestif après des actes médicaux, non classées ailleurs ¬ Autres *K91.88*
- Artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *I79.8**
- Bulleuses ¬ Kératose palmoplantaire focale non épidermolytique autosomique dominante avec *Q82.8*
- Cardiaques ¬ Arthrite rhumatismal
- - Aiguë avec multiples *I01.8*
- - Subaiguë avec multiples *I01.8*
- Cartilage articulaire ¬ Autres *M24.1*
- Disque
- - Cervical ¬ Autres *M50.8*
- - Dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés ¬ *M51*
- - Lombaire avec radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**
- Endocriniennes ¬ Hypertension secondaire à des *I15.2*
- Fonctions vestibulaires ¬ Autres *H81.8*
- Hépatiques cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ *K77.8**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *K77.0**
- Ménisque
- - Corne
- - - Antérieure ménisque
- - - - Externe ¬ Autres *M23.34*
- - - - Interne ¬ Autres *M23.31*
- - - Postérieure ménisque
- - - - Externe ¬ Autres *M23.35*
- - - - Interne ¬ Autres *M23.32*
- - Localisations multiples ¬ Autres *M23.30*
- - Ménisque SAI ¬ Autres *M23.39*
- - Partie partie non précisée ménisque
- - - Externe ¬ Autres *M23.36*
- - - Interne ¬ Autres *M23.33*
- Musculaire
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *M63.8**
- - Précisées ¬ Autres *M62.8*
- Non
- - Infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques ¬ Autres *I89.8*
- - Précisées des artères et artérioles ¬ Autres *I77.88*
- - Rhumatismales de la valvule tricuspide ¬ Autres *I36.8*

Atteinte *–suite*
- Œsophage au cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *K23.8**
- Organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs ¬ *K93.8**
- Péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs ¬ Autres *K67.8**
- Précisées
- - Disque intervertébral ¬ Autres *M51.8*
- - Synoviale et du tendon ¬ Autres *M67.8*
- Rénales ¬ Hypertension secondaire à d'autres *I15.1*
- Sacro-coccygiennes, non classées ailleurs ¬ *M53.3*
- Sensorielles ¬ Anesthésie dissociative et *F44.6*
- Synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *M68.8**
- Systémiques
- - Précisées du tissu conjonctif ¬ Autres *M35.8*
- - Tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *M36.8**
- Valve
- - Aortique et tricuspide, combinées ¬ *I08.2*
- - Mitral
- - - Aortique
- - - - Combinées ¬ *I08.0*
- - - - Tricuspide, combinées ¬ *I08.3*
- - - Tricuspide, combinées ¬ *I08.1*
- Valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.4**
- Valvule
- - Aortique
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.1**
- - - ¬ Autres *I35.8*
- - Mitrale au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.0**
- - Pulmonaire
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.3**
- - - ¬ Autres *I37.8*
- - Tricuspide au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.2**
- Veineuses précisées ¬ Autres *I87.8*

Attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté ¬ Personne *Z75.8*

Attendu ¬ Retard de: stade de développement physiologique *R62.0*

Attente
- Famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: *Z76.2*
- Investigation et traitement ¬ Autre période d' *Z75.2*

Attention
- Hyperactivité] ¬ TDAH [trouble du déficit de l' *F90.0*
- Sans hyperactivité survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ Trouble de l' *F98.80*
- Syndrome avec hyperactivité ¬ Altération de l' *F90.0*
- Trouble avec hyperactivité ¬ Altération de l' *F90.0*
- ¬ Perturbation de l'activité et de l' *F90.0*

Atténué
- Associée
- - MSH3 ¬ Polypose adénomateuse familiale *D12.6*
- - NTHL1 ¬ Polypose adénomateuse familiale *D12.6*
- Liée
- - APC ¬ Polypose adénomateuse familiale *D12.6*
- - MUTYH ¬
- - - PAF *D12.6*
- - - Polypose adénomateuse familiale *D12.6*
- ¬
- - Mucopolysaccharidose type II, forme *E76.1*
- - PAFA [Polypose adénomateuse familiale *D12.6*

Attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical *O34.30*

Attico antrale
- Chronique ¬ Maladie *H66.2*
- Suppurée ¬ Otite moyenne chronique *H66.2*

Attique ¬ Perforation du tympan, partie *H72.1*

Attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité ¬ Conseils relatifs aux *Z70*

ATTR wild type ¬ Amylose *E85.80*

Attribuable à la syphilis ¬ Nez en selle *A50.5*

Attrition excessive des dents ¬ *K03.0*

ATTRV30M ¬ Amylose *E85.1†, G63.3**

Atypique
v./v.a. Type de maladie

Audiogènes ¬ Crises *G40.8*

Audiologiques ¬ Présence d'implants otologiques et *Z96.2*

Auditif
v./v.a. Canal auditif
v./v.a. Conduit auditif
v./v.a. Nerf auditif
- Accessoires ¬ Osselets *Q16.3*
- Ancrage osseux [BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse *Z96.2*
- Anormales ¬ Autres perceptions *H93.2*
- Atrophie optique] ¬ ANOA [Syndrome de neuropathie *H90.5, H47.2*
- Brutale SAI ¬ Perte *H91.2*
- Canal auditif

Auditif *–suite*
- Canal auditif *–suite*
- - Externe ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.34*
- - ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.35*
- Congénital ¬ Trouble réceptif *F80.2*
- Due au bruit ¬ Perte *H83.3*
- Externe ¬ Appareil *Z97.8*
- Implantée ¬ Ajustement et entretien d'une prothèse *Z45.3*
- Neurosensoriel
- - Aigüe brutale due à un traumatisme acoustique ¬ Perte *H83.3*
- - Aiguë due à une surdité brusque ¬ Perte *H91.2*
- - Bilatéral ¬ Déficit *H90.3*
- - Malformations de la colonne vertébrale ¬ Syndrome de déficit congénital combiné en hormones hypophysaires, associé à une perte *E23.0*
- - Postopératoire ¬ Perte *H95.8*
- - SAI ¬ Déficit *H90.5*
- - Unilatéral ¬ Déficit *H90.4*
- Oreille interne ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.38*
- Osselets ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.36*
- Osseux ¬ Atrésie ou rétrécissement du méat *Q16.1*
- Partie non précisée ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.30*
- Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.39*
- Pavillon de l'oreille ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.31*
- Tragus ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.33*
- Tympan ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.37*
- ¬
- - Hallucinations *R44.0*
- - Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.1*
- - Modification temporaire du seuil *H93.2*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil *S01.39*
- - Recrutement *H93.2*
- - Trouble de l'élaboration et de la perception *F80.20*

Audition
- Conduction SAI ¬ Perte de l' *H90.2*
- Neurosensorielle SAI ¬ Perte de l' *H90.5*
- Oreille ¬ Surdité
- - Neurosensorielle unilatérale sans altération de l' *H90.4*
- - Unilatérale
- - - Mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l' *H90.7*

Audition *–suite*
- Oreille ¬ Surdité *–suite*
- - Unilatérale *–suite*
- - - Transmission sans altération de l' *H90.1*
- Ototoxicité ¬ Perte de l' *H91.0*
- Sans précision ¬
- - Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l' *Q16.9*
- - Perte de l' *H91.9*
- - ¬
- - Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l' *Z83.5*
- - Dégénérescence congénitale du labyrinthe avec atteinte de l' *Q16.5*
- - Examen des oreilles et de l' *Z01.1*
- - Neuropathie avec trouble de l' *G60.8*
- - Pertes précisées de l' *H91.8*

Augmentation
- Anticorps
- - Anticorps non précisés ¬ Autres troubles hémorragiques dus à l' *D68.38*
- - Anti-facteur VIII ¬ Troubles hémorragiques dus à l' *D68.31*
- - Dirigés contre facteur
- - - Coagulation ¬ Troubles hémorragiques dus à l' *D68.32*
- - - Von Willebrand ¬ *D68.32*
- Anti-IXa ¬
- - *D68.32*
- - Troubles hémorragiques due à l' *D68.32*
- Anti-VIIIa ¬ *D68.31*
- Anti-Xa ¬ *D68.32*
- Anti-XIa ¬ *D68.32*
- Apport en iode ¬ Hypothyroïdie transitoire du nouveau-né due à une *P72.2*
- Excrétion urinaire ¬ *R35.0*
- Glycémie ¬ *R73*
- Immunoglobuline M [IgM] ¬ Déficit immunitaire avec *D80.5*
- Marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec *E88.22*
- Modérée de la pression intraoculaire due à un glaucome résiduel ¬ *H40.18*
- Partie cutanée ¬ Rejet d'une mammoplastie d' *T86.59*
- Pathologique
- - Pression télédiastolique ventriculaire gauche ¬ *R94.3*
- - Taux de protéine C-réactive ¬ *R77.88*
- Pression intraoculaire ¬ Glaucome sans *H40.18*
- Quantité d'urine ¬ *R35.0*
- Sans partie cutanée ¬ Rejet d'une mammoplastie d' *T86.84*
- Taux
- - Anticorps ¬ *R76.0*

Augmentation *–suite*
- Taux *–suite*
- - Échanges entre chromatides sœurs ¬ Syndrome de retard de croissance intra-utérin avec multiples taches café-au-lait congénitales et *Q02*
- - Immunoglobulines ¬ *R76.88*
- - Transaminase et d'acide lactique déshydrogénase ¬ *R74.0*
- Urines du taux de médicaments et de substances biologiques ¬ *R82.5*

Au-Kline ¬ Syndrome de *Q87.0*

Aura
- Migraine
- - Classique] ¬ Migraine avec *G43.1*
- - Commune] ¬ Migraine sans *G43.0*
- Prolongée ¬ Migraine: avec: *G43.1*
- Sans céphalée ¬ Migraine: *G43.1*
- Typique ¬ Migraine: avec: *G43.1*
- ¬ Migraine: avec: installation aiguë de l' *G43.1*

Aureus du prématuré ¬ Sepsis à staphylocoque *P36.2*

Auriculaire
v./v.a. cervico-auriculaire
v./v.a. coxo-auriculaire
v./v.a. Oculo-auriculaire
- Atypique ¬ Flutter *I48.4*
- Chronique ¬
- - Fibrillation *I48.2*
- - Flutter *I48.9*
- Discordante ¬ Communication ventriculo- *Q20.3*
- Familiale ¬ Fibrillation *I48.9*
- Idiopathique du nouveau-né ¬ Flutter *P29.1*
- Intermittente ¬ Fibrillation *I48.0*
- Miroir avec situs inversus ¬ Disposition *Q89.3*
- Obstruction du canal lacrymal-surdité] ¬ HPPD [Syndrome d'hypertélorisme-sinus pré- *Q87.0*
- Paroxystique ¬
- - Fibrillation *I48.0*
- - Flutter *I48.9*
- Permanente ¬ Fibrillation
- - *I48.2*
- - *I48.2*
- Persistante ¬ Fibrillation *I48.1*
- Prématurée ¬ Dépolarisation *I49.1*
- Sans autre précision ¬ Fibrillation et flutter *I48.9*
- Syphilitique ¬ Fibrillation *A52.0†, I52.0**
- Traumatique ¬ Hématome *S00.48*
- Type
- - I ¬ Flutter *I48.3*
- - II ¬ Flutter *I48.4*
- - Sinus venosus ¬ ASD [défaut septal *Q21.1*
- Typique ¬ Flutter *I48.3*
- ¬

Auriculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Absence congénitale du septum *Q21.1*
- - Anomalie du septum *Q21.1*
- - Arrêt *I45.5*
- - Arythmie
- - - Complète au cours d'une fibrillation *I48.9*
- - - Fibrillation *I48.9*
- - Bloc *I45.5*
- - Déformation acquise: *H61.1*
- - Dysplasie lymphatique généralisée associée à EPHB4 avec défaut septal *Q82.09, Q21.1*
- - Extrasystoles *I49.1*
- - Fibrillations *I49.8*
- - Myiase *B87.4†, H94.8**
- - Périchondrite: *H61.0*
- - Tachyarythmie
- - - Absolue persistante au cours de fibrillation *I48.1*
- - - Complète
- - - - Paroxystique au cours d'une fibrillation *I48.0*
- - - - Permanente au cours d'une fibrillation *I48.2*
- - - Cours d'une fibrillation *I48.9*
- - Thrombose (ancienne): *I51.3*
- - Vertige: *H81.3*

Auriculaire-bloc cardiaque ¬ Syndrome de cardiomyopathie *I45.5*

Auricularis ¬ Herpès zoster *B02.2†, H94.0**

Auricule
- Cardiaques
- - Asplénie ou polysplénie ¬ Isomérisme des *Q20.6*
- - ¬ Isomérisme des *Q20.6*
- Droite ¬ Ectasie de l' *Q20.8*
- Gauche ¬ Ectasie de l' *Q20.8*
- Ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Thrombose de l'oreillette, de l' *I23.6*
- ¬
- - Anomalie
- - - *Q20.8*
- - - Acquise du septum (ancienne): communication interauriculaire, *I51.0*
- - Juxtaposition des *Q20.8*
- - Thrombose (ancienne): *I51.3*

Auriculo
v./v.a. facio-auriculo-vertébral
v./v.a. oculo-auriculo-fronto-nasal

Auriculo-condylaire ¬ Syndrome *Q75.8*

Auriculo-ostéodysplasie ¬ *Q87.5*

Auriculo-ventriculaire
- 3ème degré ¬ Bloc: *I44.2*
- Accélérée ¬ Conduction *I45.6*
- Accessoire ¬ Conduction *I45.6*
- Anormale ¬ Excitation *I45.6*
- AV

Auriculo-ventriculaire *–suite*
- AV *–suite*
- - SAI ¬ Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- - ¬ Dissociation: *I45.8*
- Choc et hyperkaliémie ¬ Syndrome de bradycardie avec insuffisance rénale, bloc *E87.5, T88.8*
- Commun ¬ Canal *Q21.2*
- Complet ¬ Bloc *I44.2*
- Congénital ¬ Bloc *Q24.6*
- Discordante ¬ Communication *Q20.5*
- Pré-excitée ¬ Conduction *I45.6*
- Premier degré ¬ Bloc *I44.0*
- SAI ¬ Bloc *I44.3*
- Sans précision ¬ Blocs *I44.3*
- Second degré ¬ Bloc *I44.1*
- TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) *I47.1*
- Type I et II ¬ Bloc (de) (du): *I44.1*
- ¬
- - Canal *Q21.2*
- - Communication *Q21.2*

Auris
- Résistant antifongiques groupe échinocandines
- - Non résistant aux triazoles ¬ Candida *U83.20!*
- - Triazoles, résistant au fluconazole ¬ Candida *U83.21!*
- ¬ Candidose à Candida *B37.9*

Austin ¬ Sulfatidose juvénile type *E75.2*

Autisme
- Apraxie de la parole-dysmorphie cranio-faciale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- Associés à GRIN2B ¬ Retard de développement, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l ' *F84.1*
- Atypique ¬ *F84.1*
- Déficit en AUTS2 ¬ Trouble du spectre de l' *Q87.1*
- Démarche instable ¬ Retard de développement avec trouble du spectre de l' *F84.1, R26.8*
- Épilepsie par déficit en kinase déshydrogénase des cétoacides à chaînes ramifiées ¬ Syndrome d' *E71.1*
- Nævus facial lie de vin ¬ *F84.0, Q82.5*
- Petite enfance ¬ *F84.0*
- ¬ Syndrome de macrocéphalie-déficience intellectuelle- *Q87.0*

Autistique ¬
- Psychopathie *F84.5*
- Retard mental avec caractéristiques *F84.1*
- Trouble *F84.0*

Autoanticorps
- Anti cellule
- - Îlots pancréatiques ¬ Présence de deux (ou plus) *R76.80*

Autoanticorps *–suite*
- Anti cellule *–suite*
- - Insulaires ¬ Examen spécial de dépistage d' *Z13.10*
- Anti-interféron-gamma acquis ¬ Déficit immunitaire de l'adulte avec *D84.8*
- Anti-lymphocyte
- - B ¬ Déficit immunitaire commun variable avec *D83.2*
- - T ¬ Déficit immunitaire commun variable avec *D83.2*
- Chauds ¬
- - Anémie hémolytique à *D59.18*
- - Maladie hémolytique auto-immun type
- - - *D59.18*
- - - *D59.18*
- - - Secondaire type à *D59.18*
- Froid ¬
- - Anémie hémolytique auto-immune primaire type à *D59.10*
- - Maladie hémolytique auto-immune type secondaire à *D59.18*

Autodestructeur
- Selon l'anamnèse familiale ¬ Comportement *Z81*
- ¬ Comportement *Z72.8*

Autoempoisonnement ¬ *Z91.8*

Autogène ¬ Thrombose d'un shunt AV *T82.8*

Autogreffe ¬ Rejet d'une *T86.9*

Auto-immun
- AIP] ¬ Pancréatite *K86.10*
- Associé à des infections chroniques ¬ Syndrome d'entéropathie et d'endocrinopathie *D82.8*
- Associée à RAS ¬ Maladie leucoprolifération *D47.9*
- Candidose chronique-maladie d'Addison ¬ Syndrome d'hypoparathyroïdie *E31.0*
- Déficit en CASP8 ¬ Syndrome lymphoprolifératif *D47.7*
- Dianzani ¬ Maladie lymphoprolifération *D47.7*
- Due à des médicaments ¬ Anémie hémolytique *D59.0*
- Haploinsuffisance de CTLA-4 ¬ Syndrome lymphoprolifératif *D47.7*
- Mixte ¬ Anémie hémolytique *D59.18*
- Multisystémique
- - Précoce associée à STAT3 ¬ Maladie *M35.8*
- - Syndromique par déficit en Itch ¬ Maladie *M35.8*
- Néonatale ¬ Anémie hémolytique *D59.18*
- Parasomnie et apnée obstructive du sommeil ¬ Encéphalopathie *G04.8*
- Pédiatrique avec infection streptococcique du groupe A] ¬ PANDAS [Maladie neuropsychiatrique *G25.88, B95.0!, F07.8*
- Primaire type à auto-anticorps froids ¬ Anémie hémolytique *D59.10*
- Primitive ¬ Entéropathie *K52.8*

Auto-immun *–suite*
- Secondaire de type froid ¬ Anémie hémolytique *D59.18*
- Susceptibilité aux infections chroniques associé à STAT1 ¬ Syndrome d'entéropathie et endocrinopathie *D82.8*
- Symptomatique ¬ Anémie hémolytique *D59.18*
- Systémique) SAI ¬ Maladie (du): *M35.9*
- Type
- - 1 ¬
- - - Entéropathie *E31.0*
- - - Pancréatite *K86.10*
- - - Polyendocrinopathie *E31.0*
- - - Syndrome polyglandulaire *E31.0*
- - 2 ¬
- - - Pancréatite *K86.10*
- - - Syndrome polyglandulaire *E31.0*
- - 3 ¬ Entéropathie *K52.8*
- - Autoanticorps chauds ¬ Maladie hémolytique
- - - *D59.18*
- - - *D59.18*
- - Chaud ¬ Anémie hémolytique *D59.18*
- - Froid ¬ Anémie hémolytique *D59.18*
- - II (APS2) ¬ Syndrome de polyendocrinopathie *E31.0*
- - Mixte ¬
- - - Anémie hémolytique *D59.18*
- - - Maladie hémolytique *D59.18*
- - Secondaire
- - - Auto-anticorps froids ¬ Maladie hémolytique *D59.18*
- - - Type à auto-anticorps chauds ¬ Maladie hémolytique *D59.18*
- ¬
- - Adrénalite *E27.1*
- - ALPS [Syndrome lymphoprolifératif *D47.9*
- - Anémie hémolytique *D59.18*
- - APS [Syndrome polyglandulaire *E31.0*
- - Ataxie cérébelleuse *G31.88*
- - Atrophie pluriglandulaire *E31.0*
- - Chevauchement cholangite
- - - Biliaire primitive et d'hépatite *K75.4, K74.3*
- - - Sclérosante primitive et d'hépatite *K75.4, K83.00*
- - Encéphalite limbique *G04.8*
- - Encéphalopathie sensible aux stéroïdes associée à une thyroïdite *G04.8, E06.3*
- - Hémolyse *D59.18*
- - Hépatite *K75.4*
- - Hépatite chronique *K75.4*
- - Hypoparathyroïdie *E20.0*
- - Insuffisance
- - - Pluriglandulaire *E31.0*
- - - Polyglandulaire *E31.0*
- - Maladie

Auto-immun *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Addison *E27.1*
- - - Hémolytique *D59.18*
- - Myasthénie *G70.0*
- - Myopathie nécrosante à médiation *G72.4*
- - Polyendocrinopathie *E31.0*
- - Protéinose alvéolaire pulmonaire *J84.00*
- - Sclérite *H15.0*
- - Sensibilité au froid *D59.18*
- - SREAT [Encéphalopathie sensible aux stéroïdes associée à une thyroïdite *G04.8, E06.3*
- - Surrénalite *E27.1*
- - Syndrome hypoglycémique
- - - *E16.0*
- - - *E16.1*
- - Thrombopénie induite par l'héparine *D69.53*
- - Thyroïdite *E06.3*

Auto-inflammation
- Anomalie des neutrophiles associé à CEBPE ¬ Syndrome de déficit immunitaire- *M35.8*
- Éruption cutanée-épisodes de lymphohistiocytose hémophagocytaire à début néonatal] ¬ Syndrome NOCARH [cytopénie- *D76.1*

Auto-inflammatoire
- Associé
- - OTULIN] ¬ ORAS [Syndrome *M35.8*
- - SAMD9L ¬ Syndrome *M35.8*
- - SOCS1 ¬ Syndrome *M35.8*
- Dérèglement avec déficit immunitaire lié à PLCG2 [APLAID] ¬ Syndrome *M35.8*
- Familial ¬ Syndrome hypothermique *L50.2*
- Fièvre périodique-entérocolite infantile ¬ Syndrome *M35.8*
- Froid
- - Associé à F12] ¬ FACAS [Syndrome *L50.2*
- - Type 4] ¬ SFAF4 [Syndrome familial *L50.2*
- - ¬ SFAF [Syndrome familial *L50.2*
- Infantile associé à OTULIN ¬ Syndrome *M35.8*
- Lié au protéasome] ¬ PRAAS [Syndrome *M35.8*
- Somatique] ¬ Syndrome VEXAS [Vacuole, mutation de l'Enzyme 1 à l'X, syndrome *M35.8*

Auto-infligé
- Délibéré
- - E) ¬ Empoisonnement ou lésion *X84.9!*
- - Suicide) par moyens non précisés ¬ Effets non précisés de: lésion *T76*
- - ¬ Lésion *X84.9!*
- ¬
- - Mouvement stéréotypés
- - - Lésion
- - - - *F98.41*

Auto-infligé *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Mouvement stéréotypés *–suite*
- - - Lésion *–suite*
- - - - *F98.41*
- - - Sans
- - - - Lésion
- - - - - *F98.40*
- - - - - *F98.40*
- - - - Précision d'une lésion *F98.49*
- - Spasmus nutans sans lésion *F98.40*

Autologue ¬
- Inflammation due à une greffe de valvule cardiaque *T82.6*
- Status post greffe de peau *Z94.5*

Automutilation et autres blessures physiques ¬ *Z91.8*

Autonome
- Cours
- - Amylose ¬ Neuropathie des nerfs périphériques *E85.4†, G99.08**
- - Hyperthyroïdie ¬ Neuropathie des nerfs périphériques *E05.9†, G99.08**
- - Maladie
- - - Endocrinienne NCA ¬ Neuropathie des nerfs périphériques *E34.9†, G99.08**
- - - Métabolique NCA ¬ Neuropathie des nerfs périphériques *E88.9†, G99.08**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du système nerveux *G99.1**
- Diabète sucré ¬ Neuropathie des nerfs périphériques *E14.40†, G99.08**
- Goutte ¬ Neuropathie des nerfs périphériques *M10.09†, G63.6**
- Héréditaire avec surdité neurosensorielle et retard général de développement ¬ Neuropathie sensorielle et *G60.8, H90.5*
- Manifestée crise
- - Hypertoniques ¬ Dysréflexie *G90.40*
- - Transpiration ¬ Dysréflexie *G90.41*
- Non précisée ¬ Dysréflexie *G90.49*
- Paraplégie spastique ¬ Neuropathie héréditaire sensorielle et *G60.8, G11.4*
- Périphérique
- - Idiopathique
- - - Non précisée ¬ Neuropathie *G90.09*
- - - ¬ Autre neuropathie *G90.08*
- - ¬
- - - Compression du système nerveux *G90.88*
- - - Paralysie du système nerveux *G90.88*
- Sans précision ¬
- - Affection du système nerveux *G90.9*
- - Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux *T44.9*
- - Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux *C47.9*
- ¬
- - Dysréflexies *G90.48*

Autonome *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Neuroblastome des nerfs *C47.9*
- - Neuropathie amyloïde *E85.9†, G99.08**
- - Trouble
- - - Équilibre *G90.88*
- - - Fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une neuropathie *N31.1*
- - Tumeur bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux *D36.1*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux *C47.8*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux *D48.2*
- - Vessie neurogène
- - - *N31.2*
- - - Due à une neuropathie *N31.2*

Autophagie excessive liée à l'X ¬ Myopathie avec *G71.8*

Autopsie ¬ Syndrome mort subite nourrisson
- Mention d' *R95.0*
- Sans mention d' *R95.9*

Autorités ¬ Examen psychiatrique général à la demande des *Z04.8*

Autosensibilisation cutanée ¬ *L30.2*

Autosomes
- Sans précision ¬
- - Délétion des *Q93.9*
- - Trisomie et trisomie partielle des *Q92.9*
- ¬
- - Délétions des *Q93.8*
- - Trisomies et trisomies partielles précisées des *Q92.8*

Autosomique dominante
v./v.a. Type de maladie

Autosomique récessive
v./v.a. Type de maladie

AUTS2 ¬
- Syndrome *Q87.1*
- Trouble du spectre de l'autisme par déficit en *Q87.1*

Auxiliaire
- CD4+
- - Microlitre sang ¬ 200
- - - 499 lymphocytes T *U61.2!*
- - - Lymphocytes T *U61.3!*
- - Non précisé ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.9!*
- - Plus par microlitre de sang ¬ 500 lymphocytes T *U61.1!*
- Maladie due VIH Catégorie
- - 1 ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.1!*
- - 2 ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.2!*
- - 3 ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.3!*
- Non précisé ¬ Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil *Z99.9*

Auxiliaire *–suite*
- ¬ Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils *Z99.8*

AV
- Autogène ¬ Thrombose d'un shunt *T82.8*
- Fœtus avec menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc *O35.8*
- Réentrée
- - Nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [*I47.1*
- - ¬ Tachycardie de la jonction *I47.1*
- SAI ¬ Tachycardie (paroxystique): auriculoventriculaire [*I47.1*
- ¬ Dissociation: auriculoventriculaire [*I45.8*

Avalé SAI ¬ Corps étranger *T18.9*

Avant-bras
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.81*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.84*
- Distal sans précision ¬ *S52.8*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.82*
- Incurvé-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de dysplasie spondylo-métaphysaire- *Q77.8*
- Main
- - Présente ¬ Absence congénitale du bras et de l' *Q71.1*
- - ¬ Absence congénitale de l' *Q71.2*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du bras et de l' *T34.4*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de l' *S58.9*
- Partie non précisée ¬
- - Écrasement de l' *S57.9*
- - Fracture de l' *S52.9*
- - Plaie ouverte de l' *S51.9*
- Poignet ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.02*
- Proximal sans précision ¬ *S52.8*
- SAI ¬ Plaie ouverte de l' *S51*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - *S59.9*
- - Superficielle de l' *S50.9*
- ¬
- - *L03.10*
- - Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- - Arthrite juvénile idiopathique
- - - *M08.93*
- - - Associée aux enthésopathies, *M08.83*
- - - Indéterminée, *M08.83*

Avant-bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.12*
- - Contusion de parties autres et non précisées de l' *S50.1*
- - Dysplasie fibreuse monostotique, *M85.03*
- - Écrasement d'autres parties de l' *S57.8*
- - Fibromatose aponévrotique juvénile, *M72.83*
- - Fibromatose pseudo-sarcomateuse, *M72.43*
- - Fracture
- - - Luxation ouverte de l' *S52.9, S51.87!*
- - - Ouverte de l' *S52.9, S51.87!*
- - - Parties de l' *S52.8*
- - Fractures multiples de l' *S52.7*
- - Gelure superficielle du bras et de l' *T33.4*
- - Hétéroplasie osseuse progressive, *M61.53*
- - Hyperostose corticale infantile de l' *M89.83*
- - Kyste
- - - Osseux anévrismal de l' *M85.53*
- - - Solitaire des os, *M85.43*
- - Lésion
- - - Tissu mou stade
- - - - I lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation de l' *S51.84!*
- - - - - Ouverte ou de luxation de l' *S51.87!*
- - - - II lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation de l' *S51.85!*
- - - - - Ouverte ou de luxation de l' *S51.88!*
- - - - III lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation de l' *S51.86!*
- - - - - Ouverte ou de luxation de l' *S51.89!*
- - - Traumatique
- - - - Artère cubitale au niveau de l' *S55.0*
- - - - Artère radiale au niveau de l' *S55.1*
- - - - Multiples
- - - - - Muscles et tendons au niveau de l' *S56.7*
- - - - - Nerfs au niveau de l' *S54.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S55.7*
- - - - Muscle tendon
- - - - - Extenseurs au niveau de l' *S56.5*
- - - - - Extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l' *S56.4*
- - - - - Extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l' *S56.3*
- - - - - Fléchisseurs au niveau de l' *S56.2*
- - - - - Fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l' *S56.1*
- - - - - Fléchisseurs du pouce au niveau de l' *S56.0*
- - - - - Non précisés, au niveau de l' *S56.8*
- - - - Nerf
- - - - - Médian au niveau de l' *S54.1*

Avant-bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Nerf *–suite*
- - - - - Niveau de l' *S54.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de l' *S54.9*
- - - - - Radial au niveau de l' *S54.2*
- - - - - Sensitif cutané au niveau de l' *S54.3*
- - - - Nerf cubital au niveau de l' *S54.0*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - Niveau de l' *S55.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de l' *S55.9*
- - - - Veine au niveau de l' *S55.2*
- - Lésions traumatiques
- - - Multiples de l' *S59.7*
- - - Précisées de l' *S59.8*
- - - Superficielles
- - - - *S50.88*
- - - - Multiples de l' *S50.7*
- - Maladie de Still de l'adulte, *M06.13*
- - Mélorhéostose de l' *M85.83*
- - Myosite
- - - Bactérienne, *M60.03*
- - - Éosinophile idiopathique, *M60.83*
- - - Fongique, *M60.03*
- - - Virale, *M60.03*
- - Nécrose avasculaire
- - - Idiopathique, *M87.03*
- - - Traumatique, *M87.23*
- - Ostéolyse
- - - Expansive familiale de l' *M89.53*
- - - Massive de Gorham de l' *M89.53*
- - Ostéomyélite multifocale chronique récurrente, *M86.33*
- - Ostéonécrose médicamenteuse, *M87.13*
- - Ostéoporose liée à l'X avec fracture pathologique de l' *M80.53*
- - Plaie ouverte
- - - Multiples de l' *S51.7*
- - - Non précisée d'autres parties de l' *S51.80*
- - Pyomyosite, *M60.03*
- - Séquelles d'une fracture du bras et de l' *T92.1*
- - Syndrome
- - - Felty, *M05.03*
- - - Oculo-urétro-synovial, *M02.33*
- - - SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec ostéite de l' *M86.33*
- - Synovite villonodulaire pigmentée, *M12.23*

Avant-pied ¬ Malformation de l' *M21.68*

Avasculaire
v./v.a. Nécrose avasculaire
- Idiopathique ¬ Ostéonécrose *M87.09*
- Secondaire non traumatique

Avasculaire *–suite*
- Secondaire non traumatique *–suite*
- - Localisations multiples ¬ Ostéonécrose médicamenteuse *M87.10*
- - Tête du fémur ¬ Nécrose médicamenteuse *M87.15*
- - ¬ Nécrose médicamenteuse *M87.19*
- ¬ Ostéonécrose *M87.99*

AVC
- Ischémique ¬ *I63.9*
- Spasme vasculaire ¬ *I63.8*
- ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, acidose lactique et épisodes ressemblant à des *G31.81*

Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel ¬ *F52.1*

Aveugle ¬ Elargissement de la tache *H53.4*

Aviaire
v./v.a. virus de la grippe aviaire
- Associée
- - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou *J09, U69.24!*
- - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou *J09, U69.24!*
- - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou *J09, U69.24!*
- - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou *J09, U69.24!*
- - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou *J09, U69.24!*
- - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou *J09, U69.24!*
- - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou *J09, U69.24!*

Aviaire *–suite*
- Associée *–suite*
- - ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou *J09†, G05.1*, U69.24!*
- Zoonotique pandémique identifié
- - Associée
- - - Encéphalite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, G94.31*, U69.23!*
- - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.23!*
- - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.23!*
- - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.23!*
- - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.23!*
- - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.23!*
- - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, I41.1*, U69.23!*
- - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, H67.1*, U69.23!*
- - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.23!*
- - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.23!*
- - - ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.23!*
- ¬ Grippe Influenza virus influenza zoonotique pandémique identifié
- - Associée à une encéphalite, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - Exception du virus d'influenza porcine ou *J09, U69.24!*

Avis
- Généraux
- - Concernant la contraception ¬ Conseils et *Z30.0*
- - Matière de procréation ¬ Conseils et *Z31.6*
- Médicaux, non classés ailleurs ¬ Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et *Z71*

Avitaminose
- Groupe B, sans précision ¬ *E53.9*
- Précisées du groupe B ¬ Autres *E53.8*
- Sans précision ¬ *E56.9*
- ¬ Polyneuropathie au cours d' *E56.9†, G63.4**

Avitaminose A
- Cicatrices xérophtalmiques de la cornée ¬ *E50.6†, H19.8**
- Héméralopie ¬ *E50.5†, H58.1**
- Kératomalacie ¬ *E50.4†, H19.8**
- Sans précision ¬ *E50.9*

Avitaminose A *–suite*
- Taches de Bitot et xérosis conjonctival ¬ *E50.1†, H13.8**
- Xérosis
- - Conjonctival ¬ *E50.0†, H13.8**
- - Cornéen ¬ *E50.2†, H19.8**
- - Ulcération de la cornée ¬ *E50.3†, H19.8**
- ¬
- - Kératose folliculaire due à l' *E50.8†, L86**
- - Manifestation
- - - *E50.8*
- - - Oculaires de l' *E50.7*
- - Séquelles d' *E64.1*
- - Xérodermie due à l' *E50.8†, L86**

Avitaminose C ¬ Séquelles d' *E64.2*

Avitaminose D ¬ *E55.9*

Avitaminose K ¬ Carence en facteur de coagulation due à: *D68.4*

Avium
- Intracellulare ¬ Maladie due au VIH avec infection à Mycobacterium *B20, A31.0*
- ¬ Infection à Mycobacterium *A31.0*

Avoine ¬ Carcinome à cellules en grains d' *C34.9*

Avortement
- Grossesse extra-utérine et molaire ¬ Troubles du métabolisme consécutifs à un *O08.5*
- Grossesse extra-utérine molaire
- - Sans précision ¬ Complication consécutive à un *O08.9*
- - ¬
- - - Choc consécutif à un *O08.3*
- - - Complication
- - - - Consécutives à un *O08.8*
- - - - Veineuses consécutives à un *O08.7*
- - - Embolie consécutive à un *O08.2*
- - - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un *O08.1*
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un *O08.0*
- - - Insuffisance rénale consécutive à un *O08.4*
- - - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un *O08.6*
- Médical
- - Complications autres et non précisées ¬ Échec d'une tentative d' *O07.3*
- - Compliqué
- - - Embolie ¬ Échec d'une tentative d' *O07.2*
- - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Échec d'une tentative d' *O07.1*
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Échec d'une tentative d' *O07.0*
- - SAI ¬ Échec d'une tentative d' *O07.4*
- - Sans complication ¬ Échec d'une tentative d' *O07.4*
- - ¬ *O04*
- Phase de suivi ¬ Lacération due à un *O08.6*

Avortement *–suite*
- Plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la grossesse après *O31.1*
- Provoqué SAI ¬ *O06*
- Répétition ¬
- - *N96*
- - Soins au cours de la grossesse pour *O26.2*
- SAI ¬ Échec d'une tentative d' *O07.9*
- Sans précision
- - Complications autres et non précisées ¬ Échecs d'une tentative d' *O07.8*
- - Compliqué
- - - Embolie ¬ Échecs d'une tentative d' *O07.7*
- - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Échecs d'une tentative d' *O07.6*
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Échecs d'une tentative d' *O07.5*
- - Sans complication ¬ Échecs d'une tentative d' *O07.9*
- - ¬ *O06*
- Septique ¬ Saignement lors d'un *O06.5, O08.1*
- Spontané
- - Fœtus ¬ *P01.8*
- - ¬ *O03*
- Thérapeutique ¬ *O04*
- Tubaire ¬ *O00.1*
- ¬
- - Choc septique après *O08.0, R57.2*
- - Formes d' *O05*
- - Hémorragie
- - - Accidentelle après un *O08.1*
- - - Due à une menace d' *O20.0*
- - Menace d' *O20.0*
- - Psychose post- *F53.1*
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent d' *Z35.1*
- - Tétanos au cours d' *A34*

Axe central [myopathie à cores centraux] ¬ Myopathie: à *G71.2*

Axenfeld
v./v.a. Rieger-Axenfeld
- Rieger ¬ Syndrome d' *Q13.8*
- ¬ Anomalie d' *Q13.8*

Axial
- Concentrique ¬ Encéphalite péri- *G37.5*
- Hydrocéphalie] ¬ Syndrome MPPH [mégalencéphalie-polymicrogyrie-polydactylie post- *Q04.8*
- Juvénile ¬ Spondylarthrite *M08.19*
- Non radiologique ¬ Spondylarthrite *M45.09*
- Radiologique ¬ Spondylarthrite *M45.09*
- Tétanie ¬ Syndrome *R29.0*
- Tétramélique ¬ Oligodactylie post- *Q73.8*
- ¬
- - Arthrite psoriasique *L40.5†, M07.2**
- - Dysplasie mésodermique *Q87.8*

Axial *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dysplasie spondylo-métaphysaire *Q77.8*
- - Iridocyclite au cours de spondylarthrite *M45.09†, H22.1**
- - Spondylarthrite *M45.09*
- - Syndrome de retard global de développement-anomalies visuelles-atrophie cérébelleuse progressive-hypotonie *G31.88*
- - Trouble respiratoire au cours de spondylarthrite *M45.09†, J99.8**

Axillaire
v./v.a. Artère axillaire
- Brachiale ¬ Lésion traumatique de la veine *S45.2*
- Sein
- - Type glande salivaire ¬ Carcinome du prolongement *C50.6*
- - ¬
- - - Adénocarcinome
- - - - Apocrine du prolongement *C50.6*
- - - - Tubulaire du prolongement *C50.6*
- - - Angiosarcome du prolongement *C50.6*
- - - Carcinome héréditaire du prolongement *C50.6*
- - - Carcinome métaplasique du prolongement *C50.6*
- - - Carcinome mucineux du prolongement *C50.6*
- - - Tumeur maligne: Prolongement *C50.6*
- Stade
- - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.81*
- - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.82*
- - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.83*
- ¬
- - Lésion traumatique du nerf *S44.3*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.81*
- - Tuberculose des ganglions *A18.2*

Axillaris ¬ Tinea *B35.8*

Axis ¬
- *S12.1*
- Fracture bilatérale de la pédicule de l'arc de l' *S12.1*
- Ostéoblastome de l' *D16.6*

Axonal
- Aiguë ¬ Neuropathie sensitivo-motrice *G61.0*
- Atrophie optique-neurodégénérescence à début infantile ¬ Syndrome de neuropathie sensitivo-motrice *G60.0, H47.2*
- Autosomique récessive
- - Acrodystrophie ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*

Axonal *–suite*
- Autosomique récessive *–suite*
- - Due a un défaut du métabolisme du cuivre ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- Cellules gliales pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à sphéroïdes *E75.2*
- Complexe ¬ Syndrome de microcéphalie-neuropathie sensitivo-motrice *G60.0, Q02*
- Congénitale avec encéphalopathie ¬ Neuropathie *G60.0, G93.4*
- Gammopathie monoclonal
- - IgA ¬ Polyneuropathie *D47.2†, G63.1**
- - IgG ¬ Polyneuropathie *D47.2†, G63.1**
- - IgM ¬ Polyneuropathie *D47.2†, G63.1**
- Héréditaire avec acrodystrophie ¬ Neuropathie sensitivo-motrice *G60.0*
- Hypogonadisme hypogonadotrope ¬ Syndrome de Mœbius-neuropathie *Q87.0*
- Motrice
- - Aiguë ¬ Neuropathie *G61.0*
- - Distale avec myopathie myofibrillaire ¬ Syndrome autosomique dominant de neuropathie *G71.2*
- Sévère précoce par déficit en chaîne légère des neurofilaments ¬ Neuropathie *G60.0*
- Type
- - 1 ¬ Syndrome d'ataxie spinocérébelleuse-neuropathie *G60.2*
- - Hypertrophique) ¬ Amyotrophie péronière (type *G60.0*

Axone géant ¬
- Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 avec *G60.0*
- Neuropathie à *G60.8*

Ayerza ¬ Maladie d' *I27.08*

Aymé-Gripp ¬ Syndrome *Q87.8*

Aziz
v./v.a. Al Gazali-Aziz-Salem

Azole ¬ Allergie aux dérivés d' *T88.7*

AZOOR [Rétinopathie occulte externe zonale aiguë] ¬ *H30.8*

Azoospermie
- SAI ¬ *N46*
- ¬ Infertilité masculine monogénique avec *N46*

Azote ¬ Effet toxique: Oxydes d' *T59.0*

Azotémique ¬ Ostéodystrophie *N25.0*

Azygos
- Veine cave inférieure ¬ Continuation *Q26.8*
- ¬
- - Continuation de la veine cave inférieure dans la veine *Q26.8*
- - Veine *S25.88*

B6-dépendante ¬ Épilepsie vitamine *G40.8*

Baastrup] ¬ Arthrose interépineuse [Maladie de *M48.2*

Babésiose ¬ *B60.0*

Bacillaire

- Shigella boydii ¬ Dysenterie *A03.2*
- ¬
- - Angiomatose *A44.8*
- - Dysenterie *A03.9*

Bacille

- Ducrey ¬ Balanite à *A57†, N51.2**
- Friedländer ¬
- - Infection à *A49.82*
- - Méningite
- - - *G00.8*
- - - *G00.8, B96.2!*
- Non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Pseudomonas et autres *B96.5!*

Bacilliformis ¬ Infection à Bartonella *A44.0*

Bacillose péritonéale par tuberculose bovine contagieuse ¬ *A18.3†, K93.0**

Bacillus

- Aerogenes capsulatus ¬ Gangrène à *A48.0*
- Anthracis ¬
- - Infection à *A22*
- - Vaccination contre le *Z23.8*
- Cereus ¬ Intoxication alimentaire à *A05.4*
- Fragilis
- - Micro-organismes anaérobies à Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.6!*
- - ¬
- - - Bactériémie à *A49.80*
- - - Infection à *A49.80*
- Thyphus ¬ Infection à *A01.0*

Bactéride pustuleuse ¬ *L40.3*

Bactérie

- Aérobies) à Gram négatif SAI ¬ Pneumonie due à: des *J15.6*
- Gram négatif
- - Multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres *U81.8!*
- - ¬ Pneumonie due
- - - *A49.88*
- - - *J15.6*
- Gram positif multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres *U80.8!*
- Gram positives ¬ Pneumonie due à des *A49.88*
- Précisées ¬ Arthrite et polyarthrite dues à d'autres *M00.8*
- Pyogènes, sans précision ¬ Arthrite à *M00.9*
- S. pneumoniae et H. influenzae ¬ bronchopneumonie due à des *J15*

Bactériémie

- Acinetobacter ¬ *A49.85*
- Actinobacillus ¬ *A49.83*
- Anaérobies ¬ *A49.88*

Bactériémie *–suite*

- Bacillus fragilis ¬ *A49.80*
- Burkholderia ¬ *A49.85*
- Cardiobacterium ¬ *A49.83*
- Corynébactéries ¬ *A49.86*
- Cutibacterium ¬ *A49.87*
- Eikenella ¬ *A49.83*
- Enterobacter ¬ *A49.82*
- Entérocoques ¬ *A49.13*
- Haemophilus ¬ *A49.83*
- Haemophilus influenzae ¬ *A49.2*
- Kingella ¬ *A49.83*
- Klebsiella ¬ *A49.82*
- Méningococcique SAI ¬ *A39.4*
- Méningocoques ¬ *A39.4*
- Morganella ¬ *A49.82*
- Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] ¬ *A49.3*
- Peptostreptococcus ¬ *A49.87*
- Propionibactéries ¬ *A49.87*
- Proteus ¬ *A49.82*
- Pseudomonas aeruginosa ¬ *A49.85*
- SAI ¬ *A49.9*
- Serratia ¬ *A49.82*
- Staphylocoques ¬ *A49.09*
- Stenotrophomonas ¬ *A49.85*
- Streptocoque ¬
- - *A49.15*
- - *A49.19*
- Vibrio vulnificus ¬ *A49.81*

Bactérien
v./v.a. Type de maladie

Bactériologique
v./v.a. Type de maladie

Bacteroides NCA ¬ Infection à *A49.80*

Bader ¬ Syndrome de *D16.5*

Badia
v./v.a. Prieto-Badia-Mulas

Bagasse ¬

- Pneumoconiose due à la *J67.10*
- Pneumopathie due
- - *J67.1*
- - *J67.10*

Bagassose

- Exacerbation aiguë ¬ *J67.11*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J67.10*
- ¬
- - *J67.10*
- - Fibrose pulmonaire avec *J67.10*

BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse auditive à ancrage osseux [*Z96.2*

Bahemuka-Brown ¬ Syndrome de *G11.4*

Baies ingérées ¬ Effet toxique: *T62.1*

Bain ¬ Conjonctivite due au *B30.1†, H13.1**

Bainbridge-Ropers ¬ Syndrome de *Q87.0*

Baird
v./v.a. Basan-Baird

Baisse

- Activité cérébrale du nouveau-né ¬ *P91.4*
- Désir sexuel ¬ *F52.0*
- Non spécifique de la tension artérielle ¬ Constatation d'une *R03.1*
- Performance ¬ *R53.9*
- Température
- - Ambiante ¬ Hypothermie, non associée à une *R68.0*
- - Sans précision ¬ Effet d'une *T69.9*
- - ¬ Autres effets précisés d'une *T69.8*
- Vision
- - Binoculaire ¬ Cécité et forte *H54.0*
- - Monoculaire ¬ Cécité et forte *H54.4*

Baker

- Tuberculeux ¬ Kyste de *A18.0†, M01.16**
- ¬ Kyste synovial poplité [*M71.2*

Baker-Gordon ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bakrania-Ragge ¬ Syndrome de *Q11.2*

Balanique ¬ Hypospadias *Q54.0*

Balanite

- Amibienne ¬ *A06.8†, N51.2**
- Bacilles de Ducrey ¬ *A57†, N51.2**
- Candida ¬ *B37.4†, N51.2**
- Candidosique ¬ *B37.4†, N51.2**
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *N51.2**
- Due au virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N51.2**
- Gonorrhéique ¬ *A54.0†, N51.2**
- Scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans] ¬ *N48.0*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N51.2**
- Vénérienne NCA ¬ *A64†, N51.2**
- ¬ *N48.1*

Balanitis

- Candidomycetica ¬ *B37.4†, N51.2**
- Mycotica ¬ *B37.4†, N51.2**
- Xerotica obliterans] ¬ Balanite scléreuse oblitérante [*N48.0*

Balano-posthite

- Due à une candidose ¬ *B37.4†, N51.2**
- Gonorrhéique ¬ *A54.0†, N51.2**
- Ulcéreuse spécifique ¬ *A63.8†, N51.2**
- ¬ *N48.1*

Balantidienne ¬ Dysenterie *A07.0*

Balantidiose ¬ *A07.0*

Balantidium coli ¬

- Colite à *A07.0*
- Diarrhée à *A07.0*
- Dysenterie à *A07.0*
- Infection à *A07.0*

Balint-Holmes ¬ Syndrome de *H51.8*

Balkans ¬ Néphropathie

- *N15.0*
- Endémique des *N15.0*

Baller-Gerold ¬ Syndrome de *Q75.0*

Ballon
- Contre-pulsion dans l'aorte ¬ Infection due à un *T82.72*
- ¬ Syndrome de l'apex ventriculaire en *I42.88*

Ballonisation apicale ¬ Syndrome de *I42.88*

Ballonnement ¬ *R14*

Ballonnet ¬ Complication mécanique due à un dispositif gastro-intestinal à *T85.59*

Ballonnisantes sur la conjonctive ¬ Nævus à cellules *D31.0*

Baló] ¬ Sclérose concentrique [*G37.5*

BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches [lymphome *C88.4*

Bamberger
v./v.a. Marie-Bamberger

Bamforth-Lazarus ¬ Syndrome de *E03.1, Q35.9*

Banal ¬
- Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume *T48.5*
- Rhinopharyngite aiguë [rhume *J00*

Bancrofti ¬ Filariose due à Wuchereria *B74.0*

Bande
- Bêta ¬ Abêtalipoprotéinémie à large *E78.2*
- Sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: activité répréhensible en *Z03.2*
- Ventriculaires ¬ *C32.1*
- ¬
- - Délits commis en *F91.2*
- - Hétérotopie sous-corticale en *Q04.3*
- - Kératodermie palmoplantaire striée ou en *Q82.8*

Bandelette
- Maissiat [ilio-tibiale] ¬ Syndrome de la *M76.3*
- Vaginale sans tension] ¬ Rétention urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, *T83.8*
- ¬
- - 46,XX avec ovaire en *Q99.1*
- - 46,XY avec ovaire en *Q99.1*
- - Kératopathie en *H18.4*

Bang] ¬ Fièvre ondulante [Maladie de *A23.1*

Bangstad ¬ Syndrome de *E31.8*

Banki ¬ Syndrome de *Q74.8*

Bannayan-Riley-Ruvalcaba ¬ Syndrome de *Q89.8*

Bannayan-Zonana ¬ Syndrome de *Q89.8*

Bannwarth ¬
- Méningoradiculite lymphocytaire (*A69.2*
- Syndrome de *A69.2*

Bantoue ¬ Sidérose *E83.1*

BAP1 ¬
- Carcinome à cellules rénales associé au syndrome de prédisposition tumorale liée au gène *C64*
- Mélanome malin de la peau associé au syndrome de prédisposition tumorale liée au *C43.9*

BAP1 ¬ *–suite*
- Prédisposition au développement de tumeurs liée à *Q99.8*

Bar
v./v.a. Louis-Bar

Barabas
v./v.a. Sack-Barabas

Baraitser
v./v.a. Clark-Baraitser
v./v.a. Nicolaides-Baraitser
v./v.a. Reardon-Baraitser
v./v.a. Schaap-Taylor-Baraitser
v./v.a. Temple-Baraitser

Baraitser-Winter cérébrofrontofacial ¬ Syndrome de *Q87.0*

Baralle-Macken ¬ Syndrome de *Q87.8*

Barbae ¬ Mycosis *B35.0*

Barbe
- Dermatophytie] ¬ Dermatophytose de la *B35.0*
- ¬
- - Mycose de la *B35.0*
- - Pseudofolliculite de la *L73.1*
- - Sycosis
- - - *L73.8*
- - - Parasitaire de la *B35.0*
- - Teigne de la *B35.0*

Barber
v./v.a. Blount-Barber
v./v.a. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson
v./v.a. Say-Barber-Miller

Barber-Say ¬ Syndrome de *Q87.0*

Barbituriques ¬ Intoxication
- *T42.3*
- *T42.3*

Bardet-Biedl ¬ Syndrome de *Q87.8*

Barel
v./v.a. Birk-Barel

Barett
v./v.a. Eagle-Barett

Barlow [prolapsus mitral] ¬ Syndrome de *I34.1*

Barnes ¬ Syndrome de *Q77.2*

Baroréflexe ¬ Insuffisance du *G90.88*

Barotraumatique ¬
- Otite moyenne *T70.0*
- Sinusite *T70.1*

Barotraumatisme
- Oreille ¬ *T70.0*
- SAI ¬ *T70.2*
- Sinus ¬ *T70.1*

Barr
v./v.a. Virus d'Epstein-Barr
- ¬ Syndrome de Jackson- *Q87.8*

Barraquer-Simons ¬ Syndrome de *E88.1*

Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique) ¬ *N40*

Barré
v./v.a. Guillain-Barré-Strohl
v./v.a. Landry-Guillain-Barré

Barrett ¬
- Dysplasie de haut grade chez les patients présentant un œsophage de *D00.1*
- Endobrachyœsophage [œsophage de *K22.7*
- Maladie de *K22.7*
- Œsophagite par reflux avec œsophage de *K21.0, K22.7*
- Syndrome de *K22.7*

Barrière de Mercier] (prostatique) ¬ Barre moyenne [*N40*

Barrow
v./v.a. Donnai-Barrow

Barsy
v./v.a. De Barsy

Barthel
v./v.a. Index de Barthel
v./v.a. Index de Barthel élargi

Bartholin
v./v.a. Glande de Bartholin

Bartholinite ¬ *N75.1*

Barton ¬ Fracture de *S52.52*

Bartonella
- Bacilliformis ¬ Infection à *A44.0*
- Henselae ¬ Bartonellose à *A28.1*

Bartonellose
- Bartonella henselae ¬ *A28.1*
- Cutanée ¬ *A44.1*
- Cutanéo-muqueuse ¬ *A44.1*
- Généralisée ¬ *A44.0*
- ¬ Autres formes de *A44.8*

Bart-Pumphrey ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bartsocas-Papas ¬ Syndrome de *Q87.2*

Bartter
- Type
- - 1 ¬ Syndrome de *E26.8*
- - 2 ¬ Syndrome de *E26.8*
- ¬ Syndrome de *E26.8*

Baruch
v./v.a. Gershoni-Baruch
v./v.a. Gershoni-Baruch-Leibo

Basal
- Col de l'utérus ¬ Carcinome adénoïde *C53.9*
- Endocol ¬ Carcinome adénoïde *C53.0*
- Exocol ¬ Carcinome adénoïde *C53.1*

Basaliome
- Aisselle ¬ *C44.59*
- Anus ¬ *C44.50*
- Dos ¬ *C44.59*
- Fesse ¬ *C44.59*
- Paroi abdominale ¬ *C44.59*
- Périnée ¬ *C44.50*
- Poitrine ¬ *C44.59*
- Tronc ¬ *C44.59*

Basaloïde folliculaire généralisé ¬ Syndrome d'hamartome *Q85.8*

Basan-Baird ¬ Syndrome de *Q82.8*

Basedow
- Exophtalmie ¬ Maladie de *E05.0†, H06.2**

Basedow *–suite*
- Maladie
- - Cardiaque ¬ Maladie de *E05.0†, I43.8**
- - Oculaire ¬ Maladie de *E05.0†, H58.8**
- Orbitopathie endocrinien
- - Ésotropie ¬ Maladie de *E05.0†, H06.3**
- - Hypotropie ¬ Maladie de *E05.0†, H06.3**
- - Rétraction de paupière ¬ Maladie de *E05.0†, H06.3**
- - ¬ Maladie de *E05.0†, H06.3**
- ¬
- - Exophtalmie au cours de maladie de *E05.0†, H06.2**
- - Maladie de *E05.0†, H06.2**

Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef ¬ Syndrome de *Q87.0*

Basidiobolus ¬ Infection à *B46.8*

Basilaire
v./v.a. Artère basilaire
- Primitive ¬ Invagination *Q75.8*
- Tuberculeuse ¬ Méningite *A17.0†, G01**
- ¬
- - Migraine: *G43.1*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.80*

BASM ¬ Syndrome *Q87.8*

Basocellulaire
v./v.a. Carcinome basocellulaire
- ¬ Nævomatose *Q85.8*

Basophile
- Acidophile de l'hypophyse ¬ Carcinome mixte *C75.1*
- Éosinophile de l'hypophyse ¬ Carcinome *C75.1*
- Hypophyse ¬
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome
- - - *C75.1*
- - - Mixte acidophile et *C75.1*
- Rémission complète ¬ Leucémie aiguë à *C94.71*
- ¬
- - Hyperpituitarisme *E24.9*
- - Leucémie *C94.30*
- - Leucémie aiguë à *C94.70*

Basophilie
- Cortico-surrénalien ¬ *E24.0*
- Thymique ¬ *E24.0*
- ¬ *E24.0*

Bassin
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du *S30.81*
- Associée à une lésion intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombosacrée et du *S31.83!*
- Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.82*

Bassin *–suite*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du *S30.84*
- Cuisse ¬
- - AO [artériopathie oblitérante] de type *I70.29*
- - Artériopathie oblitérante de type *I70.29*
- Décollement sous-cutané (fermé) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du *S30.86*
- Entraînant disproportion
- - SAI ¬ Malformation du *O33.0*
- - ¬ Rétrécissement
- - - Cavité médiane (*O33.3*
- - - Détroit
- - - - Inférieur (*O33.3*
- - - - Supérieur (du *O33.2*
- Féminin
- - Cours de gonorrhée ¬ Inflammation du *A54.2†, N74.3**
- - ¬
- - - Abcès tuberculeux du *A18.1†, N74.1**
- - - Inflammation syphilitique
- - - - Secondaire du *A51.4†, N74.2**
- - - - Tardive du *A52.7†, N74.2**
- - - Tuberculose du *A18.1†, N74.1**
- Généralement rétréci ¬ Dystocie due à un *O65.1*
- Ischion ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.81*
- Maternel
- - Généralement rétréci ¬ Soins maternels pour disproportion due à un *O33.1*
- - ¬ Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du *O33.2*
- Membre s ¬
- - Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombosacrée et de(s) membres, ou du thorax, du *T04.7*
- - Fractures du thorax, de la région lombosacrée et de(s) membre(s), ou du thorax, du *T02.7*
- Mère ¬ Soins maternels pour disproportion due à une malformation du *O33.0*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du *S30.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du *T34.3*
- Phlyctène (non due à la chaleur) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du *S30.82*
- Rétréci
- - SAI entraînant une disproportion ¬ *O33.1*
- - ¬ *P03.1*
- Sacrum et coccyx ¬ Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.8*

Bassin *–suite*
- SAI ¬ Plaie ouverte de l'abdomen, de la région lombosacrée et du *S31*
- Sans précision ¬
- - Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du *T35.3*
- - Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du *S39.9*
- - Ostéochondrite juvénile de la hanche et du *M91.9*
- ¬
- - *S31.0*
- - Adhérence tuberculeuse du *A18.1†, N74.1**
- - Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du *S38.3*
- - AO [artériopathie oblitérante] de type *I70.29*
- - Artériopathie oblitérante de type *I70.29*
- - Contusion des lombes et du *S30.0*
- - Décollement sous-cutané du *S30.86*
- - Déformation acquise du *M95.5*
- - Écrasement
- - - Parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du *S38.1*
- - - Thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombosacrée ou du thorax et du *T04.1*
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S33.7*
- - Fracture ouverte du *S32.89, S31.87!*
- - Fractures
- - - Complexes du *S32.7*
- - - Multiples
- - - - Fermées
- - - - - Membre, du thorax et du *T02.70*
- - - - - Thorax et du *T02.10*
- - - - Ouvertes
- - - - - Membre, du thorax et du *T02.71*
- - - - - Thorax et du *T02.11*
- - - - Rachis lombaire et du *S32.7*
- - Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du *T33.3*
- - Lésion
- - - Tissu mou stade
- - - - I lors fracture luxation
- - - - - Fermée de la colonne lombaire et du *S31.84!*
- - - - - Ouverte de la colonne lombaire et du *S31.87!*
- - - - II lors fracture luxation
- - - - - Fermée de la colonne lombaire et du *S31.85!*
- - - - - Ouverte de la colonne lombaire et du *S31.88!*
- - - - III lors fracture luxation
- - - - - Fermée de la colonne lombaire et du *S31.86!*

Bassin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Tissu mou stade *–suite*
- - - - III lors fracture luxation *–suite*
- - - - - Ouverte de la colonne lombaire et du *S31.89!*
- - - Traumatique
- - - - Multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35.7*
- - - - Muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du *S39.0*
- - - - Nerf
- - - - - Non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S34.8*
- - - - - S) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du *S34.6*
- - - - Nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du *S34.5*
- - - - Organe du *S37.88*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - Épiduraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du *S35.80*
- - - - - Niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35.88*
- - - - - Non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35.9*
- - - - - Sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du *S35.82*
- - - - - Sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du *S35.81*
- - Lésions
- - - Précisées de l'abdomen, de la région lombosacrée et du *S39.88*
- - - Traumatiques
- - - - Multiples de l'abdomen, des lombes et du *S39.7*
- - - - Superficielles
- - - - - Abdomen, des lombes et du *S30.88*
- - - - - Multiples de l'abdomen, des lombes et du *S30.7*
- - - - - Thorax, de l'abdomen, des lombes et du *T00.1*
- - Luxation
- - - Entorses et foulures du thorax et de la région lombosacrée ou du thorax et du *T03.1*
- - - Parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S33.3*
- - Myopéricytome bénin du *D21.5*
- - Ostéoblastome des os du *D16.8*
- - Ostéochondrite
- - - Juvénile du *M91.0*
- - - Juvéniles de la hanche et du *M91.8*
- - Plaie ouverte
- - - Lombes et du *S31.0*
- - - Multiples de l'abdomen, des lombes et du *S31.7*

Bassin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plaie ouverte *–suite*
- - - Parties autres et non précisées de la ceinture du *S71.80*
- - - Thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du *T01.1*
- - Sarcome d'Ewing du *C41.4*
- - Séquelles d'autres fractures du thorax et du *T91.2*
- - Syndrome oculo-urétro-synovial, *M02.35*
- - Tuberculose du *A18.0†, M90.05**
- - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du *D21.5*

Bassinet
- Non traumatique ¬ Rupture du *N28.80*
- Rein ¬ Déchirure de la capsule et du *S37.02*
- Rénal ¬
- - Défaut congénitale du *Q63.8*
- - Tumeur bénigne: *D30.1*
- Uretère ¬ Autres anomalies obstructives du *Q62.3*
- ¬
- - Carcinome à cellules transitionnelles du *C65*
- - Tumeur maligne
- - - *C65*
- - - Secondaire du rein et du *C79.0*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D41.1*

Bassin-jambe
- Douleur
- - Ischémique effort distance marche 200 m
- - - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.21*
- - - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.22*
- - Repos ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.23*
- Gangrène ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.25*
- Sans douleurs ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.20*
- Stade
- - IIb de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.22*
- - III de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.23*
- - IV
- - - Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.25*
- - - Selon Fontaine avec ulcération ¬ Athérosclérose des artères distales de type *I70.24*
- - IVa de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.25*
- - IVb de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.25*
- Ulcération ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.24*
- ¬

Bassin-jambe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Artériosclérose de type *I70.29*
- - Ulcère de jambe mixte de type *I70.24*

Bathing suit ichthyosis ¬ *Q80.2*

Bâtiment en feu ¬ Effondrement d'un *X59.9!*

Bâtonnets
- Amélogenèse imparfaite ¬ Syndrome de dystrophie des cônes et des *K00.5, H35.5*
- Cataracte-staphylome postérieur] ¬ Syndrome MRCS [microcornée-dystrophie des cônes et des *Q15.8*
- Petite taille ¬ Syndrome de dystrophie des cônes et des *H35.5, E34.3*
- ¬
- - Dystrophie des cônes et des *H35.5*
- - Monochromatie à *H53.5*
- - Myopathie congénitale à *G71.2*
- - Syndrome
- - - Dysplasie spondylo-métaphysaire-dystrophie des cônes et des *Q77.8*
- - - Fente labiale avec dystrophie des cônes et des *Q36.9, H35.5*

Battements cardiaques
- Prématurés [extrasystoles] ¬ *I49.4*
- ¬ Perception des *R00.2*

Batten
v./v.a. Curschmann-Batten-Steinert
- ¬ Maladie de *E75.4*

Batten-Kufs de la rétine ¬ Syndrome de *E75.4†, H36.8**

Batten-Mayou ¬ Syndrome de *E75.4*

Battey ¬ Infection à Mycobacterium *A31.0*

Baumannii multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Groupe Acinetobacter *U81.11!*
- 3MRGN ¬ Groupe Acinetobacter *U81.31!*
- 4MRGN ¬ Groupe Acinetobacter *U81.51!*

Bauxite ¬ Fibrose (du poumon) due à la *J63.1*

Bayer
v./v.a. Braun-Bayer

Bazex ¬ Syndrome de *C80.9†, L99.8**

Bazex-Dupré-Christol ¬ Syndrome de *Q82.8*

Bazin
v./v.a. Alibert-Bazin
- ¬ Maladie de *A18.4*

BB-Lepra] ¬ Lèpre de type intermédiaire atypique [*A30.3*

BCG] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [*Z23.2*

BCL6 ¬ Lymphome B d évolution agressif réarrangement MYC
- *C83.8*
- BCL2 et *C83.8*

BCR/ABL
- Négative
- - Rémission complète ¬ Leucémie myéloïde chronique atypique, *C92.21*

BCR/ABL *–suite*
- Négative *–suite*
- - ¬ Leucémie myéloïde chronique atypique, *C92.20*
- Positive
- - Rémission complète ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], *C92.11*
- - ¬ Leucémie myéloïde chronique, *C92.10*

BDV [Blakemore-Durmaz-Vasileiou] ¬ Syndrome de *Q87.8*

Beals ¬ Syndrome de *Q68.8*

Bean ¬ Syndrome de *Q27.8*

Béance
- Cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ Recherche et soins d'une *N88.3*
- Col ¬
- - Fœtus et nouveau-né affectés par la *P01.0*
- - Soin maternels
- - - Cerclage avec ou sans mention de *O34.3*
- - - Opération de Shirodkar avec ou sans mention de *O34.3*
- Col de l'utérus ¬ *N88.3*
- Occlusale dentaire (antérieure) (postérieure) ¬ *K07.2*

Beare-Stevenson ¬ Syndrome de *Q87.8*

Beau ¬ Lignes de *L60.4*

Beauce ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique récessive type *G11.2*

Beaulieu-Boycott-Innes ¬ Syndrome de *Q87.0*

Beaumont
v./v.a. Bonneau-Beaumont

Beaux-parents ¬ Difficultés dans les rapports avec les parents et les *Z63*

Bébé
- Bronzé ¬ Syndrome du *P83.8*
- Collodion
- - Guérison spontanée ¬ *Q80.2*
- - ¬ *Q80.2*
- Enfant battu SAI ¬ *T74.1*
- Poupée de son» ¬ Syndrome non spécifique du *P94.2*

Bêche (congénitale) ¬ Main en *Q68.1*

Beck
v./v.a. Kaschin-Beck

Becker
- Femme porteuse ¬ Forme symptomatique de la dystrophie musculaire de *G71.08*
- ¬
- - Dystrophie musculaire
- - - *G71.08*
- - - Bénigne [*G71.08*
- - Myotonie: congénitale: récessive [*G71.1*
- - Syndrome du nævus de *Q87.8*

Beck-Fahrner ¬ Syndrome de *Q87.8*

Beckwith-Wiedemann
- Défaut d'empreinte de la région 11p15 ¬ Syndrome de *Q87.3*

Beckwith-Wiedemann *–suite*
- Disomie uniparentale d'origine paternelle du chromosome 11 ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Inversion 11p15 ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Microdélétion 11p15 ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Microduplication 11p15 ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Mutation
- - CDKN1C ¬ Syndrome de *Q87.3*
- - NSD1 ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Translocation 11p15 ¬ Syndrome de *Q87.3*

Bednar ¬
- Aphtose de *K12.0*
- Tumeur de *C44.9*

Beemer
v./v.a. Hennekam-Beemer
v./v.a. Westerhof-Beemer-Cormane

Beemer-Ertbruggen ¬ Syndrome de *Q87.8*

Beemer-Langer ¬ Syndrome des côtes courte-spolydactylie type *Q77.2*

Bégaiement ¬ *F98.5*

Behçet ¬
- Arthrite au cours de syndrome de *M35.2*
- Maladie de *M35.2*
- Ulcération de la vulve au cours de la maladie de *M35.2†, N77.8**

Behçet-like héréditaire de l'enfant ¬ Maladie de *M35.8*

Behmel
v./v.a. Simpson-Golabi-Behmel

Behnke
v./v.a. Thiel-Behnke

Behr ¬ Syndrome de *H35.5*

Beighton ¬
- Dysplasie épiphysaire multiple type *Q77.3*
- Dysplasie spondylo-épimétaphysaire avec hyperlaxité ligamentaire type *Q77.7*
- Syndrome de Cilliers- *Q65.8*

Beignet avec fragilité osseuse ¬ Lésions de la voûte crânienne en forme de *Q78.8*

Béjel ¬ *A65*

Bell
v./v.a. Martin-Bell
- SAI ¬ Paralysie faciale (de) *G51.0*
- ¬ Spasme de *G51.3*

Belli
- Isospora hominis ¬ Infection due à Isospora *A07.3*
- ¬
- - Colite à Isospora *A07.3*
- - Diarrhée à Isospora *A07.3*
- - Dysenterie à Isospora *A07.3*
- - Infection à Isospora *A07.3*

Bellman
v./v.a. Tungland-Bellman

Bellussi
v./v.a. Gurrieri-Sammito-Bellussi

Benallegue Lacete ¬ Syndrome de *Q87.5*

Bence Jones ¬ Protéinurie (de): *R80*

Bencze ¬ Syndrome de *Q67.4*

Benedikt ¬ Syndrome de *I67.9†, G46.3**

Bénin
v./v.a. Type de maladie

Bennett ¬ Fracture de *S62.21*

Bensaude
v./v.a. Launois-Bensaude

BENTA [expansion des cellules B et anergie des cellules T] ¬ Maladie *D81.8*

Benzène
- Homologues ¬ Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du *T65.3*
- ¬ Effet toxique
- - *T52.1*
- - Homologues du *T52.2*

Benzodiazépines ¬ Intoxication
- *T42.4*
- *T42.4*

Benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, *T50.2*

Berant ¬ Syndrome de *Q87.8*

Berardinelli-Seip ¬ Lipodystrophie congénitale de *E88.1*

Berdon ¬ Syndrome de *Q43.8*

Berger ¬ Maladie de *N02.8*

Béribéri
- Humide avec implication du système circulatoire ¬ *E51.1†, I98.8**
- Sec ¬ *E51.1*
- ¬
- - *E51.1*
- - Cardiomyopathie avec *E51.1†, I43.2**
- - Dégénérescence cérébrale avec *E51.1†, G32.8**
- - Polio-encéphalomyélite avec *E51.2†, G32.8**
- - Polyneuropathie avec *E51.1†, G63.4**

Berlin
v./v.a. Mengel-Konigsmark-Berlin-McKusick
- Breakage ¬ Syndrome *Q87.8*
- ¬ Dysplasie ectodermique type *Q82.8*

Bernard
v./v.a. Claude-Bernard-Horner

Bernard-Horner ¬ Syndrome de Claude *G90.2*

Bernard-Soulier ¬ Thrombopathie de *D69.1*

Bernuth ¬
- Pseudohémophilie de *D68.09*
- Syndrome de *D68.09*

Berry
v./v.a. Forster-McCarthy-Berry

Bertini ¬ Syndrome neurodégénératif lié à l'X type *G31.88*

Bérylliose
- Pulmonaire ¬ *J63.2*
- ¬
- - *J63.2*
- - Fibrose pulmonaire avec *J63.2*

Bérylliose *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Granulomes hépatiques au cours de *J63.2†, K77.8**

Béryllium
- Composés ¬ Effet toxique: *T56.7*
- ¬
- - Granulomatose due au *J63.2*
- - Pneumoconiose due au *J63.2*

Besace) ¬ Soins maternels pour: abdomen penduleux (ventre en *O34.8*

Besnier ¬
- Érythème marginé discoïde de *L53.2*
- Prurigo de *L20.0*

Besnier-Boeck-Schaumann ¬ Maladie de *D86.9*

Best ¬ Syndrome de *H35.5*

Bestrophinopathie autosomique récessive ¬ *H35.5*

Bêta
- 1 de l'interleukine 12 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en récepteur *D84.8*
- Îlots de Langerhans SAI ¬ Hyperplasie des cellules *E16.1*
- Mineure ¬ Thalassémie (*D56.3*
- Thalassemie à hématies falciformes ¬ *D57.2*
- ¬
- - Abêtalipoprotéinémie à large bande *E78.2*
- - Anomalies du métabolisme des acides aminés *E72.8*
- - Résistance aux hormones thyroïdiennes par mutation du récepteur aux hormones thyroïdiennes *E05.8*

Bêta-1,4-galactosyltransférase ¬ Déficit en *E77.8*

Bêta-adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et *T44.9*

Bêta-alanine synthase ¬ Déficit en *E79.8*

Bêta-bloquants, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.7*

Bêta-cétothiolase ¬ Déficit en *E71.1*

Bêta-énolase musculaire ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Bêta-galactosidase-1 ¬ Déficit en *E75.1*

Bêta-glucoronidase ¬ Carence en *E76.2*

Bêta-hydroxylase ¬
- Déficit en DBH [opamine *G90.88*
- Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 11- *E25.08*

Bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase
- 3 ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XY par déficit en 17- *E29.1*
- Type 3 ¬
- - Déficit en 17- *E29.1*
- - Pseudo-hermaphrodisme masculin par déficit en 17- *E29.1*

Bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase *–suite*
- ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 3- *E25.08*

Bétaïne clorale ¬ Dépendance à la *F13.2*

Bêtalactamines ¬ Intoxication: Céphalosporines et autres *T36.1*

Bêta-lipoprotéinémie
- Flottante ¬ *E78.2*
- Large ou flottante ¬ *E78.2*

Bêta-mannosidase lysosomale ¬ Déficit en *E77.1*

Bêta-mannosidose ¬ *E77.1*

Bêta-oxydation peroxysomale ¬ Anomalie de la *E71.3*

Bêta-propeller ¬ Neurodégénérescence associée à une protéine *G23.0*

Bêta-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.08*

Bêta-sarcoglycanopathie ¬ *G71.08*

Bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents principalement *T44.5*

Bêta-synthase ¬
- Déficit en cystathionine *E72.1*
- Homocystinurie par déficit en cystathionine *E72.1*

Bêta-thalassémie
- Grave ¬ *D56.1*
- Mineure ¬ *D56.3*
- Thrombocytopénie liée à l 'X ¬ *D69.41, D56.1*
- ¬
- - *D56.1*
- - Delta- *D56.2*
- - Hémoglobine
- - - C- *D56.1*
- - - E- *D56.1*
- - - Lepore- *D56.8*
- - HPFH - *D56.4*
- - Syndrome de persistance familiale de l'hémoglobine fœtale- *D56.4*

Bêta-uréidopropionase ¬ Déficit en *E79.8*

Bétel ¬ Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*

Bethlem ¬ Myopathie de *G71.08*

Beukes ¬ Dysplasie de la hanche type *Q65.8*

Beuren
v./v.a. Williams-Beuren

BFIE] Épilepsie infantile familiale bénigne ¬ [*G40.3*

Bhan
v./v.a. Irons-Bhan

Biais aliment
- Sans précision ¬ Effet toxique: Substance nocive absorbée par le *T62.9*
- ¬ Effet toxique: Autres substances nocives précisées absorbées par le *T62.8*

Bialélique du gène BRCA2 ¬ Syndrome de prédisposition héréditaire au cancer dû à une mutation *D61.0*

Bialléliques dans le cluster de gènes ATAD3 ¬ Syndrome létal d'hypoplasie pontocérébelleuse-hypotonie-insuffisance respiratoire dû à des délétions *Q04.3*

Biauriculaire ¬ Cœur triloculaire *Q20.4*

Biceps brachial ¬
- Lésion traumatique muscle tendon
- - Chef long du *S46.1*
- - Parties du *S46.2*
- Tendinite du muscle *M75.2*

Bickel-Fanconi ¬ Glycogénose de *E74.0*

Bickers-Adams ¬ Syndrome de *Q03.0*

Bickerstaff ¬ Rhombencéphalite de *G61.0*

Biclonale ¬ Leucémie aiguë *C95.0*

Bicorne
- Bicervical
- - Col et vagin perméables ¬ Utérus *Q51.3*
- - Hémivagin borgne ¬ Utérus *Q51.3*
- Unicervical ¬ Utérus *Q51.3*
- ¬
- - Soins maternels pour utérus: *O34.0*
- - Utérus *Q51.3*

Bicuspide ¬ Valvule aortique *Q23.1*

Bicuspidie
- Aortique familiale ¬ *Q23.1*
- Valvulaire aortique-anomalie des mains ¬ Syndrome de persistance du canal artériel- *Q87.2*

Bicyclette ¬ Accident de *V99!*

Biedl
v./v.a. Bardet-Biedl

Bieganski ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Bielschowsky
v./v.a. Jansky-Bielschowsky
- Jansky ¬ Maladie de: *E75.4*

Biemond ¬ Syndrome de *Q87.8*

Biermer ¬ Anémie (de): *D51.0*

Biesecker
v./v.a. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson

Bietti ¬ Dystrophie cristalline de *H31.2*

Bifasciculaire ¬ Bloc *I45.2*

Bifida
v./v.a. Spina bifida

Bifide
- Anomalies
- - Extrémités ¬ Syndrome de trigonocéphalie-nez *Q87.0*
- - Membres supérieurs ¬ Syndrome de dysplasie fronto-nasale-nez *Q87.0*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'aphonie-surdité-dystrophie rétinienne-gros orteil *Q87.0*
- Héréditaire ¬ Crâne *Q75.8*
- ¬
- - Langue *Q38.3*
- - Luette *Q35.7*
- - Nez *Q30.2*
- - Pied *Q72.7*

Bifide *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Sternum *Q76.7*

Bifidité de la luette ¬ *Q35.7*

Bifidum ¬ Sternum *Q76.7*

Bifonctionnelle ¬ Déficit en enzyme *E71.3*

Bifurcati ¬ Pili *L67.8*

Bifurcation
- Aortique [syndrome de Leriche] ¬ Syndrome de la *I74.0*
- Fémorale distale congénitale ¬ *Q74.2*
- Siphon carotidien ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de la *I60.0*

Bilan de santé ¬ *Z00.0*

Bilatéral
v./v.a. Type de maladie

Bile
- Épaisse» ¬ Syndrome de la « *P59.1*
- ¬ Péritonite (due à): *K65.8*

Bilginturan
- Crise hypertensive ¬ Syndrome de *G90.71, Q73.8*
- ¬ Syndrome de *I10.90, Q73.8*

Bilharziose
- Urinaire] ¬ Snail fever [*B65*
- ¬
- - *B65.9*
- - Calcul urinaire au cours de *B65.0†, N22.0**
- - Glomérulopathie au cours de *B65.0†, N08.0**

Biliaire
v./v.a. Canal biliaire
v./v.a. Voie biliaire
- Accessoire ¬ Vésicule *Q44.1*
- Cholécystite aiguë ¬ Calcul de la vésicule *K80.0*
- Cholestase et malabsorption ¬ Défaut de synthèse des acides *K76.8*
- CoA ligase et défaut d'amidation ¬ Insuffisance en acides *K76.8*
- Exclue ¬ Vésicule *R93.2*
- Faible niveau de phospholipides ¬ Lithiase *K80.80*
- Forme de cholécystite ¬ Calcul de la vésicule *K80.1*
- Intrahépatique ¬ Vésicule *Q44.1*
- Primitive
- - Hépatite auto-immune ¬ Chevauchement de cholangite *K75.4, K74.3*
- - Stade Child-Pugh
- - - A ¬ Cirrhose *K74.3, K74.70!*
- - - B ¬ Cirrhose *K74.3, K74.71!*
- - - C ¬ Cirrhose *K74.3, K74.72!*
- - ¬
- - - CBP
- - - - Cholangite *K74.3*
- - - - Cirrhose *K74.3*
- - - Cholangite *K74.3*

Biliaire *–suite*
- Récidivante) sans précision ou sans cholécystite ¬ Colique *K80.2*
- SAI ¬
- - Canal: *C24.0*
- - Malformation congénitale de la vésicule *Q44.1*
- Sans
- - Calcul ¬
- - - Abcès de la vésicule *K81.0*
- - - Empyème de la vésicule *K81.0*
- - - Gangrène de la vésicule *K81.0*
- - - Occlusion du canal cystique ou de la vésicule *K82.0*
- - - Rétrécissement du canal cystique ou de la vésicule *K82.0*
- - - Sténose du canal cystique ou de la vésicule *K82.0*
- - Cholécystite ¬ Calcul de la vésicule *K80.2*
- - Précision
- - - Sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: vésicule *K80.2*
- - - ¬
- - - - Cirrhose *K74.5*
- - - - Maladie de la vésicule *K82.9*
- Secondaire
- - Stade Child-Pugh
- - - A ¬ Cirrhose *K74.4, K74.70!*
- - - B ¬ Cirrhose *K74.4, K74.71!*
- - - C ¬ Cirrhose *K74.4, K74.72!*
- - ¬ Cirrhose *K74.4*
- Stade Child-Pugh
- - A ¬ Cirrhose *K74.5, K74.70!*
- - B ¬ Cirrhose *K74.5, K74.71!*
- - C ¬ Cirrhose *K74.5, K74.72!*
- Voie biliaire
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la vésicule *K87.0**
- - Extra-hépatiques ¬
- - - Adénocarcinome de la vésicule *C23, C24.0*
- - - Carcinome épidermoïde de la vésicule *C23, C24.0*
- ¬
- - Absence congénitale de la vésicule *Q44.0*
- - Adénocarcinome de la vésicule *C23*
- - Adhérences du canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Agénésie de la vésicule *Q44.0*
- - Aplasie de la vésicule *Q44.0*
- - Atrophie du canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Carcinome épidermoïde de la vésicule *C23*
- - Cholestérolose de la vésicule *K82.4*
- - Cystadénocarcinome *C22.1*
- - Déficit congénital de synthèse des acides *K76.8*
- - Duplication
- - - Canal: *Q44.5*

Biliaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Duplication *–suite*
- - - Vésicule *Q44.1*
- - Dyskinésie du canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Exclusion du canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Fistule de la vésicule *K82.3*
- - Gastrite *K29.6*
- - Hypertrophie du canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Hypoplasie de la vésicule *Q44.0*
- - Iléus *K56.3*
- - Infection purulente aiguë de la vésicule *K81.0*
- - Kyste
- - - *K83.5*
- - - Canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Lésion traumatique: vésicule *S36.17*
- - Malabsorption idiopathique par défaut de synthèse des acides *K90.8*
- - Maladies précisées de la vésicule *K82.8*
- - Malformation artério-veineuse de la vésicule *Q27.3*
- - Malformations congénitales de la vésicule *Q44.1*
- - Mucocèle de la vésicule *K82.1*
- - Occlusion
- - - Intestin par calculs *K56.3*
- - - Vésicule *K82.0*
- - Pancréatite aiguë
- - - Origine *K85.1*
- - - Secondaire à des calculs *K85.1*
- - Perforation de la vésicule *K82.2*
- - Reflux *K29.6*
- - Rupture du canal cystique ou de la vésicule *K82.2*
- - Syndrome d'hypoplasie du pancréas-atrésie intestinale-hypoplasie de la vésicule *Q45.8*
- - Syphilis tardive de la vésicule *A52.7†, K87.0**
- - Tuberculose de la vésicule *A18.8†, K87.0**
- - Tumeur bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule *D13.5*
- - Tumeur neuroendocrine de la vésicule *C23*
- - Typhus affectant la vésicule *A01.0*
- - Ulcère du canal cystique ou de la vésicule *K82.8*

Bilieuse ¬ Fièvre *B50.8*

Biliosa ¬ Malaria *B50.8*

Bilirubine
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme de la *E80.7*
- Uridine-diphosphate glucuronosyltransférase
- - Type
- - - 1 ¬ Déficit en *E80.5*

Bilirubine *–suite*
- Uridine-diphosphate glucuronosyltransférase *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 2 ¬ Déficit en *E80.5*
- - ¬ Déficit en *E80.5*
- ¬ Autres anomalies du métabolisme de la *E80.6*

Bilirubine-UGT type
- 1 ¬ Déficit en *E80.5*
- 2 ¬ Déficit en *E80.5*

Bilirubinique
- Aiguë ¬ Encéphalopathie *P57.9*
- Chronique ¬ Encéphalopathie *P57.8*

Biliurie ¬ *R82.2*

Billson
v./v.a. Ouvrier-Billson

Bimalléolaire ¬ Fracture *S82.81*

Binder ¬ Syndrome de *Q75.8*

Bindewald-Ulmer-Müller ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bing ¬
- Erythroprosopalgie de type *G44.0*
- Syndrome de Taussig- *Q20.1*

Binge Eating ¬ Trouble de *F50.8*

Binoculaire
- Non précisée ¬ Atteinte de la vision (*H54.9*
- Sans précision ¬ Anomalie des mouvements *H51.9*
- ¬
- - Anomalies précisées des mouvements *H51.8*
- - Atteinte
- - - Légère de la vision *H54.3*
- - - Modérée de la vision *H54.2*
- - - Sévère de la vision *H54.1*
- - Cécité et forte baisse de la vision *H54.0*
- - Disparition de la vision *H53.3*
- - Troubles de la vision *H53.3*

Binswanger ¬
- Démence de *F01.2*
- Maladie de *I67.3*
- Syndrome de *G31.88*

Biochimiques
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.1*
- Détresse fœtale ¬ Travail et accouchement compliqués de signes *O68.3*

Biocides ¬ Intoxication par des *T60.9*

Bioélectrique pendant le sommeil ¬ État de mal épileptique *G40.01*

Biologie moléculaire
- Histologique ¬
- - Formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation, bactériologique, par *A15.8*
- - Pneumothorax tuberculeux sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - Tuberculose

Biologie moléculaire *–suite*
- Histologique ¬ *–suite*
- - Tuberculose *–suite*
- - - Bronches avec confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - Ganglionnaire
- - - - Hilaire avec confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - - Médiastinale avec confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - Trachéo-bronchique
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - Larynx
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - Pulmonaire
- - - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - Rhinopharyngée avec confirmation bactériologique, par *A15.8*
- - - Trachée
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - ¬
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*

Biologique
- Actives
- - Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances *Y59.9!*
- - ¬
- - - Complications dues à des vaccins ou à des substances *Y59.9!*
- - - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Médicament, drogues et autres substances *X49.9!*
- Sans précision ¬

Biologique *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance *Z88.9*
- - Intoxication: Médicaments et substances *T50.9*
- - Néphropathie due à un médicament ou une substance *N14.2*
- - ¬
- - Antécédent personnel allergie médicament substance
- - - *Z88.8*
- - - *Z91.0*
- - Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances *R82.5*
- - Néphropathie due à d'autres médicaments et substances *N14.1*
- - Séquelles d'intoxications par médicaments et substances *T96*

Biomécanique
- Sans précision ¬ Lésion *M99.9*
- ¬ Autres lésions *M99.8*

Biopsie ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*

Biörck-Thorson [syndrome carcinoïde] ¬ Syndrome de *E34.0*

Biosynthèse
- Associé à GPAA1 ¬ Défaut de *E88.8*
- Défectueuse de l'hormone androgène testiculaire SAI ¬ *E29.1*
- Glycoprotéine
- - Induite par déficience NGLY1 ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - Liée à ATP6AP1 ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- Sérine forme
- - Infantile ¬ Déficit de la voie de *E72.8*
- - Juvénile ¬ Déficit de la voie de *E72.8*

Biotine
- Dépendante ¬ Déficit en carboxylase *D81.8*
- ¬
- - Carence en: *E53.8*
- - Déficit en carboxylase dépendant de la *D81.8*
- - Maladie des ganglions de la base sensible à la *G25.88*

Biotinidase ¬ Déficit en *E53.8*

Biovar
- Cholerae ¬ Choléra à Vibrio cholerae 01, *A00.0*
- El Tor ¬ A Vibrio cholerae 01, *A00.1*

Bipartite ¬ Talus *Q66.8*

Biphénotypique ¬ Leucémie aiguë *C95.0*

Bipolaire
- Actuellement en rémission ¬ Trouble affectif *F31.7*
- Épisode
- - Actuel
- - - Dépression

Bipolaire *–suite*
- Épisode *–suite*
- - Actuel *–suite*
- - - Dépression *–suite*
- - - - Légère ou moyenne ¬ Trouble affectif *F31.3*
- - - - Sévère
- - - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.4*
- - - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.5*
- - - Hypomaniaque ¬ Trouble affectif *F31.0*
- - - Maniaque
- - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.1*
- - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.2*
- - - Mixte ¬ Trouble affectif *F31.6*
- - Maniaque isolé ¬ trouble *F30*
- II ¬ Trouble *F31.8*
- Sans précision ¬ Trouble affectif *F31.9*
- Type I ¬ Trouble *F31.8*
- ¬ Autres troubles affectifs *F31.8*

Birdshot ¬ Rétinochoroïdopathie type *H30.1*

Birk-Barel ¬ Déficience intellectuelle type *Q87.8*

Birt-Hogg-Dubé ¬
- Adénome oncocytaire au cours de syndrome de *D36.9, Q85.8*
- Carcinome à cellules rénales associé au syndrome de *C64, Q85.8*
- Syndrome de *Q85.8*

Bisalbuminemie ¬ *E88.08*

Bitot
- Jeune enfant ¬ Taches de *E50.1*
- Xérosis conjonctival ¬ Avitaminose A avec taches de *E50.1†, H13.8**

Bitronculaire
- Tritronculaire ¬ Maladie coronarienne *I25.13*
- ¬
- - Cardiopathie artérioscléreuse: Implication *I25.12*
- - Maladie athéroscléreuse *I25.12*

Bivalent ¬ Travestisme *F64.1*

Biventriculaire ¬ Dysplasie ventriculaire arythmogène familiale isolée, forme *I42.88*

Bixler
v./v.a. Antley-Bixler

Bizarre ¬ Apparence personnelle *R46.1*

Bjerrum ¬ Scotome (de): *H53.4*

Björnstad ¬ Syndrome de *Q87.8*

BK ¬ Infection à virus *B34.4*

BL] ¬ Lèpre lépromateuse de type intermédiaire atypique [lèpre *A30.4*

Black
v./v.a. Woods-Black-Norbury
v./v.a. Woods-Black-Norbury

Blackfan-Diamond ¬ Anémie
- *D61.0*

Blackfan-Diamond ¬ Anémie *–suite*
- Hypoplasique congénitale de *D61.0*

Blackwater fever ¬ *B50.8*

Blake ¬ Persistance du kyste de la poche de *Q03.1*

Blakemore-Durmaz-Vasileiou] ¬ Syndrome de BDV [*Q87.8*

Blanc
v./v.a. Bonnet-Dechaume-Blanc

Blanchisseurs ¬ Gale des *B35.6*

Bland-White-Garland [Anomalie d'une artère coronaire] ¬ Syndrome de *Q24.5*

Blastes
- AREB] ¬ Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- Transformation ¬ Anémie réfractaire
- - Crise blastique (prolifération de *C92.0*
- - Excès de *D46.2*
- Type
- - I [AREB I] ¬ Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- - II [AREB II] ¬ Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- ¬
- - Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- - Myélodysplasie avec excès de *D46.9*

Blastique
- Cellules NK ¬ Lymphome *C86.4*
- Cours
- - Leucémie myéloïde
- - - Chronique [LMC] ¬ Crise *C94.8!*
- - - ¬ Poussée *C92.10, C94.8!*
- - Transformation ¬ Anémie réfractaire avec crise *C92.00*
- Prolifération de blastes en transformation) ¬ Anémie réfractaire avec crise *C92.0*
- TCPDB] ¬ Tumeur à cellules plasmacytoïdes dendritiques *C86.4*

Blastocystis ¬ Infection à *B60.88*

Blastome
- Col du pancréas ¬ *C25.7*
- Corps du pancréas ¬ *C25.1*
- Pleuropulmonaire
- - Cours de syndrome de prédisposition tumorale DICER1 ¬ *C34.9, C38.4*
- - Lobe
- - - Inférieur du poumon ¬ *C34.3, C38.4*
- - - Moyen du poumon ¬ *C34.2, C38.4*
- - - Supérieur du poumon ¬ *C34.1, C38.4*
- - Type
- - - 1
- - - - Lésion à localisations contiguës ¬ *C34.8, C38.4*
- - - - Lobe
- - - - - Inférieur du poumon ¬ *C34.3, C38.4*
- - - - - Moyen du poumon ¬ *C34.2, C38.4*
- - - - - Supérieur du poumon ¬ *C34.1, C38.4*
- - - - ¬ *C34.9, C38.4*
- - - 2

Blastome *–suite*
- Pleuropulmonaire *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 2 *–suite*
- - - - Lésion à localisations contiguës ¬ *C34.8, C38.4*
- - - - Lobe
- - - - - Inférieur du poumon ¬ *C34.3, C38.4*
- - - - - Moyen du poumon ¬ *C34.2, C38.4*
- - - - - Supérieur du poumon ¬ *C34.1, C38.4*
- - - 3
- - - - Lésion à localisations contiguës ¬ *C34.8, C38.4*
- - - - Lobe
- - - - - Inférieur du poumon ¬ *C34.3, C38.4*
- - - - - Moyen du poumon ¬ *C34.2, C38.4*
- - - - - Supérieur du poumon ¬ *C34.1, C38.4*
- - - - ¬ *C34.9, C38.4*
- - ¬ *C34.9, C38.4*
- Pulmonaire
- - Lobe
- - - Inférieur du poumon ¬ *C34.3*
- - - Moyen du poumon ¬ *C34.2*
- - - Supérieur du poumon ¬ *C34.1*
- - ¬ *C34.9*
- Queue du pancréas ¬ *C25.2*
- Tête du pancréas ¬ *C25.0*

Blastomyces ¬ Septicémie à *B40.70*

Blastomycose
- Brésilienne ¬ *B41*
- Chéloïdienne ¬ *B48.0*
- Cutanée ¬ *B40.3†, L99.8**
- Disséminée ¬ *B40.78*
- Généralisée ¬ *B40.78*
- Primaire du poumon ¬ *B40.0†, J99.8**
- Pulmonaire
- - Aiguë ¬ *B40.0†, J99.8**
- - Chronique ¬ *B40.1†, J99.8**
- - ¬ *B40.2†, J99.8**
- ¬
- - Formes de *B40.8*
- - Méningo-encéphalite au cours de *B40.8†, G05.2**

Blau ¬ Syndrome de *D86.8*

Blennorhéique ¬
- Épididymite *A54.2†, N51.1**
- Vaginite *A54.0†, N77.1**

Blennorragique
- Aiguë ¬ Orchite *A54.2†, N51.1**
- Néonatale ¬ Conjonctivite *A54.3†, H13.1**
- ¬
- - Endométrite *A54.2†, N74.3**
- - Vulvite *A54.0†, N77.1**

Blennorrhée
- Inclusion ¬ *A74.0†, H13.1**
- Nouveau-né ¬ *A54.3†, H13.1**

Blénorragie ¬ Sujet porteur de: *Z22.4*

Blépharite
- Cours
- - Acné rosacée ¬ *L71.8†, H03.8**
- - Herpès ¬ *B00.5†, H03.1**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H03.1**
- ¬ *H01.0*

Blépharochalasis
- Congénitale ¬ *Q10.0*
- Isolé ¬ *Q10.0*
- ¬ *H02.3*

Blépharo-cheilo-odontique ¬ Syndrome *Q87.0*

Blépharo-conjonctivite
- Cours d'acné rosacée ¬ *L71.8†, H13.2**
- ¬ *H10.5*

Blépharo-naso-facial ¬ Syndrome *Q87.0*

Blépharophimose avec déficience intellectuelle de type SBBYS et du syndrome génito-patellaire ¬ Chevauchement du syndrome de *Q87.8*

Blépharophimosis
- Congénital ¬ *Q10.3*
- Déficience intellectuelle
- - Associé à SMARCA2 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Type
- - - Maat-Kievit-Brunner ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - Verloes ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Ptosis-ésotropie-syndactylie-petite taille ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬ *H02.5*

Blépharophimosis-ptosis-épicanthus inversus ¬
- BPES [Syndrome de *Q10.3*
- Syndrome de *Q10.3*

Blépharoptose congénitale ¬ *Q10.0*

Blépharoptosis
- Myopie-ectopie du cristallin ¬ Syndrome de *Q15.8*
- ¬ Syndrome de fusions des vertèbres lombo-sacrées- *Q76.4, Q10.0*

Blépharospasme ¬ *G24.5*

Blessure
- Agression ¬ Examen
- - Mise en observation après d'autres *Z04.5*
- - Victime ou du coupable après d'autres *Z04.5*
- Cervicale de l'œsophage ¬ *S19.9*
- Corporelle ¬ Antécédents de *Z91.8*
- Crânienne sévère non ouverte ¬ *S06.20*
- Cranio-cérébrale ¬ Démence après une *T90.9†, F02.8**
- Épiglotte, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Gorge, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Intracrânienne
- - Coma prolongé ¬ *S06.9, S06.79!*
- - ¬ Séquelles d'une fracture du crâne avec *T90.2*

Blessure *–suite*
- Larynx ¬
- - *S19.9*
- - *S19.9*
- Mère par un instrument pendant l'accouchement ¬ *O71.9*
- Moelle épinière cervicale ¬ Multiples *S14.10*
- Non perforante de la sclérotique ¬ *S05.8*
- Ouverte
- - Bout charnu du doigt ¬ *S61.0*
- - Crâne ¬ *S06.20, S01.83!*
- - Hémothorax ¬ *S27.1, S21.83!*
- - Pneumothorax ¬ *S27.0, S21.83!*
- - Rein ¬ *S37.00, S31.83!*
- - Urètre ¬ *S37.1, S31.83!*
- - Vessie ¬ *S37.20, S31.83!*
- Partie cervicale de la trachée, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Pharynx ¬
- - *S19.88*
- - *S19.9*
- Physiques ¬ Automutilation et autres *Z91.8*
- Pression d'une explosion, n.c.a. ¬ *T70.8*
- Reperfusion (retour absent ou lent dans le corps) ¬ *T88.8*
- Superficielle
- - Lèvre et de la cavité buccale ¬ *S00.5*
- - Nez ¬ *S00.3*
- - Oreille ¬ *S00.4*
- - Parties de la tête ¬ *S00.8*
- - Tête, partie non précisée ¬ *S00.9*
- Superficielles multiples de la tête ¬ *S00.7*
- Thyroïde, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Traumatique par poignardement du cœur ¬ Hémopéricarde dû à une *S26.0*
- Utérus par incision lors d'une intervention chirurgicale ¬ *T81.2*
- Vaisseau sanguin intracrânien ¬ *S06.8*
- ¬
- - Antécédents de *Z91.8*
- - Botulisme par *A05.1*
- - Paralysie ischémique de Volkmann en tant que complication de *T79.60*

Blizzard
v./v.a. Johanson-Blizzard

Bloc
- 1 ¬ Syndrome de Hermansky-Pudlak par déficit en *E70.3*
- 2 ¬ Syndrome de Hermansky-Pudlak par déficit en *E70.3*
- 3 ¬ Syndrome de Hermansky-Pudlak par déficit en *E70.3*
- Atrio-ventriculaire complet ¬ *I44.2*
- Auriculaire ¬ *I45.5*
- Auriculo-ventriculaire
- - 3ème degré ¬ *I44.2*
- - Choc et hyperkaliémie ¬ Syndrome de bradycardie avec insuffisance rénale, *E87.5, T88.8*

Bloc *–suite*
- Auriculo-ventriculaire *–suite*
- - Complet ¬ *I44.2*
- - Congénital ¬ *Q24.6*
- - Premier degré ¬ *I44.0*
- - SAI ¬ *I44.3*
- - Sans précision ¬ *I44.3*
- - Second degré ¬ *I44.1*
- - Type I et II ¬ *I44.1*
- AV du fœtus avec menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un *O35.8*
- Bifasciculaire ¬ *I45.2*
- Branche
- - Droit
- - - SAI ¬ *I45.1*
- - - Sans précision ¬ *I45.1*
- - Gauche, sans précision ¬ *I44.7*
- - Héréditaire ¬ *I45.8*
- - SAI ¬ *I45.4*
- Cardiaque
- - Complet SAI ¬ *I44.2*
- - Précisé ¬ Autre *I45.5*
- - SAI ¬ *I45.9*
- Congénital du cœur ¬ *Q24.6*
- Fasciculaire
- - Antérieur gauche ¬ *I44.4*
- - Droit ¬ *I45.0*
- - Postérieur gauche ¬ *I44.5*
- - Sans précision ¬ *I44.6*
- Möbitz, type I et II ¬ *I44.1*
- Second degré, type I et II ¬ *I44.1*
- Sino-atrial ¬ *I45.5*
- Sino-auriculaire ¬ *I45.5*
- Trifasciculaire ¬ *I45.3*
- Ventriculaire non spécifique ¬ *I45.4*
- Vertébral tuberculeux ¬ *A18.0†, M49.09**
- Wenckebach ¬ *I44.1*

Blocage
- Méiose ¬ Infertilité féminine due à un *N97.8*
- Ménisque ¬ *M23.3*
- Pupillaire ¬ Glaucome dû à un *H40.2*

Bloch-Siemens ¬ Syndrome de *Q82.3*

Bloch-Sulzberger ¬ Syndrome de *Q82.3*

Blok-Campeau
v./v.a. Snijders Blok-Campeau

Blomstrand ¬ Chondrodysplasie de *Q78.8*

Bloom ¬ Syndrome de *Q82.8*

Bloquants
- Neuromusculaires] ¬ Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [*T48.1*
- Neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents *T44.8*

Bloqué
- Canal biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul (*K80.5*

Bloqué *–suite*
- Canal cystique sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (*K80.2*
- Vésicule biliaire sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (*K80.2*
- ¬ Epaule *M75.0*

Blount ¬ Maladie de *M92.5*

Blount-Barber ¬ Maladie de *M92.5*

Blow-out » ¬ Fracture « *S02.3*

BLSS [Synostose bilatérale de la suture lambda associée à une synostose de la suture sagittale] ¬ *Q87.0*

Blumberg
v./v.a. Meier-Blumberg-Imahorn

BNAR ¬ Syndrome *Q87.8*

Bochdalek ¬ Hernie de *Q79.0*

Bockenheimer ¬ Syndrome de *Q27.4*

Bockhart ¬ Impétigo de *L01.0*

BOD [brachymorphie-onychodysplasie-dysphalangie] ¬ Syndrome *Q87.1*

Boeck ¬
- Granulomatose de Hutchinson- *D86.9*
- Lupoïde de *D86.3*
- Maladie de *D86.9*

Bœuf ¬
- Hypersensibilité aux protéines de *T78.1*
- Ver solitaire du *B68.1*

Bogaert
v./v.a. Van Bogaert
v./v.a. van Bogaert-Scherer-Epstein

Bohring-Opitz
- Like associé à KLHL7 ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Boichis
v./v.a. Senior-Boichis

Bois ¬
- Intoxication par des produits de protection du *T60.9*
- Produits de conservation du *T60*

Boissel ¬ Syndrome polymalformatif létal type *Q87.8*

Boisson
- Suite de négligence de soi ¬ Prise insuffisante de nourriture et de *R63.6*
- ¬ Prise insuffisante de nourriture et de *R63.6*

Boltshauser
v./v.a. Poretti-Boltshauser

Boman
v./v.a. Hapnes-Boman-Skeie

Bombé ¬ Iris *H21.4*

Bonneau-Beaumont ¬ Syndrome de *E83.1, Q12.0*

Bonnemann-Meinecke-Reich ¬ Syndrome de *Q87.1*

Bonnet-Dechaume-Blanc ¬ Syndrome de *Q28.28*

Böök ¬ Syndrome de *Q82.8*

Boomerang ¬ Dysplasie en *Q87.1*

Boonstra
v./v.a. Bosch-Boonstra-Schaaf

BOOP] avec exacerbation aiguë ¬ Bronchiolite oblitérante avec organisation pneumonique [*J84.01*

BOR ¬ Syndrome *Q87.8*

Bord
- Latéraux langue ¬
- - Carcinome épidermoïde de la pointe et *C02.1*
- - Tumeur maligne: Pointe et *C02.1*
- Libre
- - Face intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ Lèvre (*D10.0*
- - Lèvre
- - - Inférieure et le sillon mentolabial ¬ Peau pileuse entre le *C44.0*
- - - Supérieure et le nez ¬ Peau pileuse entre le *C44.0*
- - - ¬ *D00.0*
- - Marge] ¬ Epiglotte, *C10.1*
- - ¬
- - - Carcinome épidermoïde de la lèvre inférieure, *C00.1*
- - - Tumeur maligne Lèvre
- - - - Inférieure, *C00.1*
- - - - Sans précision, *C00.2*
- - - - Supérieure, *C00.0*
- Postérieur cloison nasal choanes ¬
- - *C11.3*
- - *D10.6*

Borderline ¬
- Personnalité émotionnellement labile: Type *F60.31*
- Schizophrénie: *F21*

Bordetella
- Parapertussis ¬ Coqueluche à *A37.1*
- Pertussis ¬
- - Coqueluche à *A37.0*
- - Pertussis à *A37.0*
- ¬ Coqueluche due à d'autres espèces de *A37.8*

Bordetella bronchiseptica ¬
- Coqueluche à *A37.8*
- Trachéo-bronchite à *A37.8*

Borer
v./v.a. Dahlberg-Borer-Newcomer

Borghgraef
v./v.a. Grubben-de Cock-Borghgraef

Borgne
- Congénital ¬ Syndrome de l'anse *Q43.8*
- Non classé ailleurs ¬ Syndrome de l'anse *K90.2*
- SAI ¬ Syndrome de l'anse *K90.2*
- ¬
- - Syndrome post-chirurgical de l'anse *K91.2*
- - Utérus bicorne bicervical avec hémivagin *Q51.3*

Borjeson-Forssman-Lehmann ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bork ¬ Syndrome de *Q82.8*

Borna ¬ Encéphalite due aux virus de *A85.8†, G05.1**

Bornholm ¬ Maladie de *B33.0*

Borrelia burgdorferi ¬
- Érythème chronique migrateur à *A69.2*
- Infection à *A69.2*

Borréliose
- Fièvre récurrente tropicale] ¬ *A68.9*
- Fièvre tropicale récurrente] à tiques ¬ *A68.1*
- Lyme
- - Stade
- - - I ¬ *A69.2*
- - - II ¬ *A69.2*
- - - III ¬ *A69.2*
- - ¬ *A69.2*
- Maladie de Lyme] à tiques ¬ *A69.2*

Borrmann 4 ¬ Cancer de l'estomac type *C16.9*

Bosch
v./v.a. Van der Bosch

Bosch-Boonstra-Schaaf ¬ Syndrome d'atrophie optique *H47.2*

Bosley-Salih-Alorainy ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bosma-Henkin-Christiansen ¬ Syndrome de *Q87.0*

Boston ¬
- Craniosynostose type *Q75.0*
- Exanthème de *A88.0*
- Fièvre exanthémateuse à entérovirus [exanthème de *A88.0*

Botal ¬ Perméabilité du canal de *Q25.0*

Bothnie ¬ Dystrophie rétinienne type *H35.5*

Bothriocephalus ¬ Anémie à *B70.0†, D63.8**

Botnien ¬ Kératose palmoplantaire diffuse type *Q82.8*

Botulisme
- Blessure ¬ *A05.1*
- Infantile ¬ *A05.1*
- Inhalation ¬ *A05.1*
- Intestinal ¬ *A05.1*
- ¬ *A05.1*

Bouba] ¬ Pian [*A66*

Bouc émissaire ¬ Hostilité envers un enfant transformé en *Z62*

Bouchard (avec arthropathie) ¬ Nodosités de *M15.2*

Bouche
- Feu ¬ Syndrome de la *K14.6*
- Non précisées ¬ Tumeur bénigne: Parties de la *D10.3*
- Partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.50*
- Parties autres et non précisées ¬ Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la *C06.8*
- Pharynx ¬

Bouche *–suite*
- Pharynx ¬ *–suite*
- - Brûlure de la *T28.0*
- - Corrosion de la *T28.5*
- Plancher) ¬ Phlegmon de la *K12.20*
- SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q38.6*
- Sans précision ¬
- - Phlegmon et abcès de la *K12.29*
- - Sécheresse de la *R68.2*
- - Tumeur maligne
- - - *C06.9*
- - - Plancher de la *C04.9*
- ¬
- - Carcinome basocellulaire
- - - Lésion à localisations contiguës du plancher de la *C04.8*
- - - Plancher
- - - - Antérieur de la *C04.0*
- - - - Latéral de la *C04.1*
- - Carcinome épidermoïde de la vestibule de la *C06.1*
- - Corps étranger dans la *T18.0*
- - Fibrose sous-muqueuse de la *K13.5*
- - Kyste
- - - Dermoïde de la *K09.8*
- - - Épidermoïde de la *K09.8*
- - - Lympho-épithélial de la *K09.8*
- - Maladie due au VIH avec candidose de la *B20, B37.0*
- - Malformations congénitales de la *Q38.6*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la *S01.54*
- - Respiration par la *R06.5*
- - Syndrome pied-main- *B08.4*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, K93.8**
- - Tuberculose de la *A18.8†, K93.8**
- - Tumeur bénigne: Plancher de la *D10.2*
- - Tumeur maligne
- - - Lésion à localisations contiguës du plancher de la *C04.8*
- - - Plancher
- - - - Antérieur de la *C04.0*
- - - - Latéral de la *C04.1*
- - - Vestibule de la *C06.1*

Boucher-Neuhäuser ¬ Syndrome de *G11.8*

Bouchon
- Cérumen ¬ *H61.2*
- Méconial ¬ Syndrome du *P76.0*
- ¬ Œsophage en tire- *K22.4*

Boucle artérielle pulmonaire isolée ¬ *Q25.7*

Bouffée
- Chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que *N95.1*
- Délirant
- - Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ *F23.0*
- - Symptômes schizophréniques ¬ *F23.1*

Bougie ¬ passage de sonde ou de *Z43*

Bouillaud ¬ Syndrome de *I01.8*

Bouilloire ¬ Accident dû à: Explosion de chaudière/ *W49.9!*

Boulimie
- Atypique ¬ *F50.3*
- Bulimia nervosa) ¬ *F50.2*
- SAI ¬ *F50.2*

Bourguignon
v./v.a. Verloes-Bourguignon

Bourneville ¬ Maladie de *Q85.1*

Bourrelet adipeux ¬ *E65*

Bourse
- Séreux
- - Précisées ¬ Autres affections des *M71.8*
- - Sans précision ¬ Affections des *M71.9*
- - ¬
- - - *C49*
- - - *D21*
- - - Abcès des *M71.0*
- - - Dépôts calciques dans une *M71.4*
- - - Kystes des *M71.3*
- - - Tuberculose des *A18.0†, M73.89**
- ¬
- - Gonorrhée de la *A54.4†, M73.09**
- - Syphilis tardive d'une *A52.7†, M73.19**

Boutonneuse méditerranéenne ¬ Fièvre *A77.1*

Boutonnière et en col de cygne ¬ Déformation en *M20.0*

Bouveret(-Hoffmann) ¬ Syndrome de *I47.9*

Bovine
- Contagieuse ¬ Bacillose péritonéale par tuberculose *A18.3†, K93.0**
- Paupière ¬ Variole *B08.0†, H03.1**
- ¬
- - Forme atypique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à ESB [Encéphalopathie spongiforme *A81.0*
- - Variole *B08.0*

Bowen-Conradi ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bowman type II ¬ Dystrophie cornéenne de la membrane de *H18.5*

Boxeur ¬ Syndrome du *F07.2*

Boycott
v./v.a. Beaulieu-Boycott-Innes

Boyd ¬ Dysenterie de *A03.2*

Boydii ¬
- Dysenterie
- - Bacillaire à Shigella *A03.2*
- - Shigella *A03.2*
- Infection
- - Pseudallescheria *B48.2*
- - Shigella *A03.2*
- Shigellose à Shigella *A03.2*

BP230 ¬ Épidermolyse bulleuse simple par déficit en *Q81.0*

BPES [Syndrome de blépharophimosis-ptosis-épicanthus inversus] ¬ *Q10.3*

BPTF ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie faciale-anomalies squelettiques associé à *Q87.0*

Brachial
v./v.a. Artère brachiale
v./v.a. cervico-brachial
v./v.a. thoracobrachial
- Due déplacement disque intervertébral ¬ Névrite
- - Nerf *M50.1†, G55.1**
- - Plexus *M50.1†, G55.1**
- Inférieur ¬ paralysie du plexus *P14.1*
- SAI ¬ Névrite ou radiculite: *M54.1*
- Supérieur ¬ paralysie du plexus *P14.0*
- Traumatisme obstétrical ¬ Autres lésions du plexus *P14.3*
- ¬
- - Affections du plexus *G54.0*
- - Anomalie du plexus *Q07.8*
- - Compression du plexus *G54.0*
- - Lésion traumatique
- - - Muscle tendon
- - - - Chef long du biceps *S46.1*
- - - - Parties du biceps *S46.2*
- - - Obstétricale persistente du plexus *P14.3*
- - - Plexus *S14.3*
- - - Veine axillaire et *S45.2*
- - Névrite du plexus *G54.5*
- - Plexopathie radio-induite du plexus *G54.0, G97.88*
- - Tendinite du muscle biceps *M75.2*

Brachialgie ¬ Syndrome cervical chronique avec *M53.1*

Brachio-céphalique
v./v.a. Tronc brachio-céphalique
- Sous-aortique ¬ Veine *Q26.8*

Brachycéphalie
- Isolée ¬ *Q75.0*
- Sténose du pylore-cryptorchidie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-hypotonie- *Q87.0*
- ¬ *Q75.0*

Brachydactylie
v./v.a. exostoses-anétodermie-brachydactylie
- Cyphoscoliose ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.8*
- Doigts ¬ *Q71.8*
- Familiale ¬ Syndrome d'arthropathie digitale- *M25.94, Q71.8*
- Hypertension artérielle ¬ Syndrome de *I10.90, Q73.8*
- Mésomélie-déficience intellectuelle-malformations cardiaques ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Microsphérophakie ¬ Syndrome d'ichtyose-petite taille- *Q87.1*
- Obésité-retard global de développement ¬ Syndrome de petite taille- *Q87.1*
- Orteils ¬ *Q72.8*

Brachydactylie *–suite*
- Petite taille-rétinite pigmentaire ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Préaxiale
- - Hallux varus ¬ Syndrome de *Q73.8, Q66.3*
- - Temtamy ¬ Syndrome de *Q87.2*
- Sugarman ¬ *Q73.8*
- Syndactylie
- - Préaxiales des doigts de la main ¬ *Q74.0*
- - Type Zhao ¬ *Q73.8, Q70.2*
- Trouble du langage ¬ Syndrome de dysplasie spondylo-épiphysaire- *Q77.7*
- Type
- - A5 ¬ *Q73.8*
- - B ¬ Syndrome de colobome maculaire- *Q87.8*
- - D ¬ Syndrome de maladie de Hirschsprung- *Q87.8*
- - Mseleni ¬ Syndrome de nanisme- *Q77.7*
- ¬
- - *Q73.8*
- - Syndrome
- - - Dysplasie métaphysaire-dysmorphie- *Q78.8*
- - - Pierre Robin-déficience intellectuelle- *Q87.0*
- - - Pouce long- *Q87.2*
- - - Trouble neurologique du développement-malformations cérébrales-dysmorphie facial- *Q87.0*

Brachyectrodactylie ¬ Syndrome de pouce triphalangé- *Q74.8*

Brachy-œsophage congénital-estomac intrathoracique-anomalies vertébrales ¬ Syndrome de *Q87.8*

Brachyolmie
- Scoliose ¬ *Q76.3*
- Type Maroteaux ¬ *Q76.4*
- ¬ *Q76.4*

Brachytéléphalangie
- Dysmorphie-syndrome de Kallman ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬ Chondrodysplasie ponctuée avec *Q77.3*

Braddock ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bradyarythmie complète
- Paroxystique ¬ *I48.0*
- Permanente ¬ *I48.2*
- Persistante ¬ *I48.1*
- ¬ *I48.9*

Bradycardie
- Fœtale ¬ *O68.0*
- Insuffisance rénale, bloc auriculo-ventriculaire, choc et hyperkaliémie ¬ Syndrome de *E87.5, T88.8*
- Sans précision ¬ *R00.1*
- Sinoatriale ¬ *R00.1*
- Sinusale ¬ *R00.1*
- Vagale ¬ *R00.1*
- ¬ Syndrome de tachycardie- *I49.5*

Bradykinique
- Acquis ¬ Angio-œdème *T78.3*
- Héréditaire ¬ Angio-œdème *D84.1*

Bradyopsie ¬ *H53.8*

Bragg
v./v.a. Fort-Bragg-Fever

Brailsford
v./v.a. Morquio-Ullrich-Brailsford
- ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête radiale [*M92.1*

Branchante
- Forme
- - Hépatique non progressive ¬ Glycogénose par déficit en enzyme *E74.0*
- - Neuromusculaire périnatal fatale ¬
- - - Glycogénose par déficit en enzyme *E74.0*
- - - GSD par déficit en enzyme *E74.0*
- ¬ GSD par déficit en enzyme *E74.0*

Branche
- Droit
- - SAI ¬ Bloc de *I45.1*
- - Sans précision ¬ Blocs de *I45.1*
- Gauche
- - SAI ¬ Hémibloc de *I44.6*
- - Sans précision ¬ Bloc de *I44.7*
- Héréditaire ¬ Bloc de *I45.8*
- Maxillaire, SAI ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.64*
- SAI ¬ Bloc de *I45.4*
- Terminale externe du nerf tibial antérieur ¬ *S94.2*
- ¬ Occlusion
- - Artérielle rétinienne (d'une): *H34.2*
- - Veine de la rétine (d'une): *H34.8*

Branchement ¬ Déficit en enzymes de *E74.0*

Branchial
- SAI ¬ Malformations de la fente *Q18.2*
- Siège de la tumeur] ¬ Kyste *C10.4*
- ¬
- - Anomalie
- - - Deuxième fente *Q18.0*
- - - Première fente *Q18.0*
- - - Quatrième fente *Q18.0*
- - - Troisième fente *Q18.0*
- - Carcinome épidermoïde d' un kyste *C10.4*
- - Fissure, fistule et kyste d'origine *Q18.0*
- - Malformations d'origine *Q18.2*
- - Syndrome de la poche *D82.1*
- - Tumeur maligne: Fente *C10.4*
- - Vestiges *Q18.0*

Branchio-oculo-facial ¬ Syndrome *Q18.8*

Branchio-otique ¬ Syndrome *Q18.2*

Branchio-oto-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Branchiosquelettogénital ¬ Syndrome *Q87.8*

Brandt ¬ Syndrome de *E83.2*

Bras
v./v.a. avant-bras
v./v.a. Stuart-Bras

Bras *–suite*
- Abrasion/éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.81*
- Artificiel (total) (partiel) ¬ Mise en place et ajustement d'un *Z44.0*
- Avant-bras
- - Main présente ¬ Absence congénitale du *Q71.1*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.4*
- - ¬
- - - Gelure superficielle du *T33.4*
- - - Séquelles d'une fracture du *T92.1*
- Cassé SAI ¬ *T10*
- Chromosome ¬ Duplication
- - *Q92.3*
- - Complète d'au moins un *Q92.2*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.84*
- Coude ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l'épaule, *R02.01*
- Court chromosome
- - 4 ¬ Délétion
- - - *Q93.3*
- - - Partielle du *Q93.3*
- - 5 ¬
- - - Délétion
- - - - *Q93.4*
- - - - Partielle du *Q93.4*
- - - Syndrome de délétion du *D46.6*
- Décollement sous-cutané (fermé) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.86*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.82*
- Long du chromosome 18 ¬ Délétion du *Q93.5*
- Lymphangite ¬
- - Infection purulente du *L03.10*
- - Inflammation purulente du *L03.10*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.83*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de l'épaule et du *S48.9*
- SAI ¬
- - *Z89.2*
- - Amputation traumatique du *T11.6*
- - Fracture du *T10*
- - Lésion traumatique du *T11.9*
- - Plaie ouverte de l'épaule ou du *S41*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - Épaule et du *S49.9*
- - Superficielle de l'épaule et du *S40.9*
- Sauf poignet main
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure de l'épaule et du *T22.2*

Bras *–suite*
- Sauf poignet main *–suite*
- - 2ème degré sans précision ¬ *–suite*
- - - Corrosion de l'épaule et du *T22.6*
- - Degré
- - - 2a ¬
- - - - Brûlure de l'épaule et du *T22.2*
- - - - Corrosion de l'épaule et du *T22.6*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure de l'épaule et du *T22.8*
- - - - Corrosion de l'épaule et du *T22.9*
- Toute partie, sauf poignet et main seuls] ¬ *T22*
- ¬
- - *L03.10*
- - Absence acquise des deux *Z89.3*
- - Absence congénitale d'un *Q71.0*
- - Arthrite juvénile idiopathique
- - - *M08.92*
- - - Associée aux enthésopathies, *M08.82*
- - - Indéterminée, *M08.82*
- - Chondrosarcome du *C40.0*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.11*
- - Contusion de l'épaule et du *S40.0*
- - Douleurs dans le *M79.62*
- - Dysplasie fibreuse monostotique, *M85.02*
- - Écrasement de l'épaule et du *S47*
- - Embolie artérielle du *I74.2*
- - Fibrodysplasie ossifiant progressive
- - - *M61.12*
- - - *M61.13*
- - Fibromatose aponévrotique juvénile, *M72.82*
- - Fibromatose pseudo-sarcomateuse, *M72.42*
- - Fracture
- - - Ouverte du *S42.3, S41.87!*
- - - Parties de l'épaule et du *S42.8*
- - Ganglioneuroblastome des nerfs du *C47.1*
- - Hétéroplasie osseuse progressive, *M61.52*
- - Kyste
- - - Osseux anévrismal du *M85.52*
- - - Solitaire des os, *M85.42*
- - Lésion
- - - Tissu mou stade
- - - - I lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation du *S41.84!*
- - - - - Ouverte ou de luxation du *S41.87!*
- - - - II lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation du *S41.85!*
- - - - - Ouverte ou de luxation du *S41.88!*
- - - - III lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation du *S41.86!*
- - - - - Ouverte ou de luxation du *S41.89!*
- - - Traumatique
- - - - Multiples

Bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Multiples *–suite*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de l'épaule et du *S46.7*
- - - - - Nerfs au niveau de l'épaule et du *S44.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du *S45.7*
- - - - Muscle tendon
- - - - - Niveau de l'épaule et du *S46.8*
- - - - - Non précisés, au niveau de l'épaule et du *S46.9*
- - - - Nerf
- - - - - Médian au niveau du *S44.1*
- - - - - Niveau de l'épaule et du *S44.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de l'épaule et du *S44.9*
- - - - - Radial au niveau du *S44.2*
- - - - Nerf cubital au niveau du *S44.0*
- - - - Nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du *S44.5*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - Niveau de l'épaule et du *S45.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de l'épaule et du *S45.9*
- - - - Veine superficielle au niveau de l'épaule et du *S45.3*
- - Lésions traumatiques
- - - Multiples de l'épaule et du *S49.7*
- - - Précisées de l'épaule et du *S49.8*
- - - Superficielles
- - - - Épaule et du *S40.88*
- - - - Multiples de l'épaule et du *S40.7*
- - Maladie de Still de l'adulte, *M06.12*
- - Mélorhéostose du *M85.82*
- - Myosite
- - - Bactérienne, *M60.02*
- - - Éosinophile idiopathique, *M60.82*
- - - Fongique, *M60.02*
- - - Virale, *M60.02*
- - Nécrose avasculaire
- - - Idiopathique, *M87.02*
- - - Traumatique, *M87.22*
- - Occlusion artérielle aiguë du *I74.2*
- - Ostéolyse
- - - Expansive familiale
- - - - *M89.52*
- - - - *M89.55*
- - - Massive de Gorham du *M89.52*
- - Ostéomyélite multifocale chronique récurrente, *M86.32*
- - Ostéonécrose médicamenteuse, *M87.12*
- - Ostéoporose liée à l'X avec fracture pathologique du *M80.52*
- - Plaie ouverte

Bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plaie ouverte *–suite*
- - - *S41.1*
- - - Multiples de l'épaule et du *S41.7*
- - Procidence d'un *O64.4*
- - Pyomyosite, *M60.02*
- - Syndrome
- - - Felty, *M05.02*
- - - Oculo-urétro-synovial, *M02.32*
- - - SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec ostéite du *M86.32*
- - Synovite villonodulaire pigmentée, *M12.22*
- - Thrombose veineuse du *I80.88*

BRASH ¬ Syndrome *E87.5, T88.8*

Brauer ¬ Syndrome de *Q82.8*

Braun-Bayer ¬ Syndrome de *Q87.8*

Braun-Tinschert ¬ Dysplasie métaphysaire type *Q78.5*

Breakage
v./v.a. Warsaw-Breakage
- ¬ Syndrome
- - Berlin *Q87.8*
- - Nijmegen *Q87.8*

Bredouillement [langage précipité] ¬ *F98.6*

Breloque ¬ Dermite
- *L56.2*
- Photocontact [dermite de *L56.2*

Brendel
v./v.a. Huppke-Brendel

Brenner maligne ¬ Tumeur de *C56*

BRESEK ¬ Syndrome *Q87.8*

Brésil ¬ Fièvre purpurique du *A48.4*

Brésilien ¬
- Blastomycose *B41*
- Fièvre hémorragique *A96.8*
- Fogo selvagem [pemphigus *L10.3*

Brève
- Injection conjonctivale ¬ Céphalée névralgique unilatérale *G44.8*
- SAI ¬ Psychose réactionnelle (*F23.9*

Brewer
v./v.a. Siegler-Brewer-Carey

BRIC [Cholestase intrahépatique récurrente bénigne] ¬ *K71.0*

Brides
- Adhérence ¬ *K66.0*
- Amniotiques ¬ Syndrome de *Q79.8*
- Congénitales
- - Épiploïques anormales ¬ Adhérences [*Q43.3*
- - Péritonéales ¬ Adhérences [*Q43.3*
- - ¬ *Q79.8*
- Occlusion
- - Intestinale ¬ Adhérences péritonéales (*K56.5*
- - ¬ Adhérences de l'intestin [*K56.5*

Bridging bronchus ¬ *Q32.4*

Brièveté

- Anormale du frein de la langue ¬ *Q38.1*
- Congénitale d'un tendon ¬ *Q79.8*
- Cordon ¬ Travail et accouchement compliqués d'une *O69.3*
- Gestation ¬ Hypoplasie pulmonaire associée à une *P28.0*
- Tendon d'Achille ¬ *M67.0*

Brill
v./v.a. Lederer-Brill

- Poux ¬ Maladie de *A75.1*
- Puces ¬ Maladie de *A75.2*

Brilli NCA ¬ Typhus exanthématique *A75.1*

Brill-Zinsser ¬ Maladie de *A75.1*

Briquet ¬ Syndrome de *F45.0*

Broad-beta ¬ Dyslipoprotéinémie à *E78.2*

Broche ¬ Enlèvement de: *Z47.0*

Brock ¬

- Érythrodermie congénitale ichtyosiforme bulleuse de *Q80.3*
- Syndrome de *J98.11*

Brocks
v./v.a. Townes-Brocks

Brocq ¬

- Dermatite polymorphe douloureuse de *L13.0*
- Pseudo-pelade de *L66.0*

Brodie ¬

- Abcès de *M86.8*
- Cystosarcome phyllode [tumeur de *D48.6*

Brody ¬ Myopathie de *G71.8*

Bromhidrose ¬ *L75.0*

Bronche

- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de: *A15.5*
- Lobaire
- - Inférieure ¬ Tumeur neuroendocrine de la *C34.3*
- - Supérieure ¬ Tumeur neuroendocrine de la *C34.1*
- Lobe moyen ¬ Tumeur neuroendocrine de la *C34.2*
- Lymphome BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux *C88.4*
- Non classées ailleurs ¬ Affections des *J98.0*
- Poumon
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C34.9*
- - ¬
- - - Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des *Z80.1*
- - - Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des *Z85.1*
- - - Carcinoma in situ: *D02.2*
- - - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la trachée, des *J95.82*
- - - Tumeur bénigne: *D14.3*
- - - Tumeur maligne

Bronche *–suite*

- Poumon *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Tumeur maligne *–suite*
- - - - Lésion à localisations contiguës des *C34.8*
- - - - Lobe
- - - - - Inférieur, *C34.3*
- - - - - Moyen, *C34.2*
- - - - - Supérieur, *C34.1*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, *D38.1*
- Souche ¬
- - Cancer du poumon à petites cellules de la *C34.0*
- - Carcinome bronchique de *C34.0*
- - Tumeur maligne: *C34.0*
- - Tumeur neuroendocrine de la *C34.0*
- - ¬
- - Absence des *Q32.4*
- - Agénésie des *Q32.4*
- - Atrésie des *Q32.4*
- - Calcification des *J98.0*
- - Corps étranger dans les *T17.5*
- - Lésion traumatique des *S27.4*
- - Malformation congénitale
- - - *Q32.4*
- - - SAI des *Q32.4*
- - Pyothorax avec fistule des *J86.01*
- - Rétrécissement syphilitique des *A52.7†, J99.8**
- - Sténose
- - - *J98.0*
- - - Syphilitique des *A52.7†, J99.8**
- - Ulcère des *J98.0*

Bronchectasie

- Congénitale ¬ *Q33.4*
- Idiopathique ¬ *J47*
- Sinusite chronique et polypes nasaux] [insuffisance pluriglandulaire résultant d'une anomalie dans le transport mucociliaire] [Immotile cilia syndrome] [triade de Kartagener] ¬ Syndrome de Kartagener [Situs inversus viscerum, *Q89.3*
- Tuberculeuse
- - Confirmation bactériologique ¬ *A15.0*
- - Confirmée par examen microscopique de l'expectoration et par culture ¬ *A15.0*
- - N'ayant pas fait l'objet d'un examen bactériologique ou histologique ¬ *A16.1*
- - Sans confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A16.0*
- - ¬ *A16.2*
- ¬ *J47*

Bronchiolectasie ¬ *J47*

Bronchioles ¬ *T17.8*

Bronchiolite

- Aiguë
- - Due

Bronchiolite *–suite*

- Aiguë *–suite*
- - Due *–suite*
- - - Micro-organismes précisés ¬ *J21.8*
- - - Virus respiratoire syncytial [VRS] ¬ *J21.0*
- - Metapneumovirus humain ¬ *J21.1*
- - Sans précision ¬ *J21.9*
- - ¬ *J21.9*
- Aspergillus ¬ *B44.1†, J99.8**
- Candida ¬ *B37.88*
- Cytomégalovirus ¬ *J21.8*
- Due à une candidose ¬ *B37.88*
- Oblitérante
- - Chronique
- - - Subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ *J68.4*
- - - ¬ *J44.89*
- - Fibreuse ¬ *J44.89*
- - Non liée transplantation
- - - VEF1
- - - - 35
- - - - - 50 % de la norme ¬ *J44.81*
- - - - - Norme ¬ *J44.80*
- - - - 50 % et < 70 % de la norme ¬ *J44.82*
- - - - 70 % de la norme ¬ *J44.83*
- - - ¬ *J44.89*
- - Organisation pneumonique
- - - BOOP] avec exacerbation aiguë ¬ *J84.01*
- - - ¬ *J84.00*
- - Post-greffe ¬ *J95.88*
- - Trouble ventilatoire obstructif ¬ *J44.89*
- Respiratoire avec pneumopathie interstitielle ¬ *J68.4*

Bronchique
v./v.a. Carcinome bronchique

- Allergique ¬ Exacerbation infectieuse d'un asthme *J45.89*
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Tuberculose *A15.5*
- Congénitale
- - Non syndromique ¬ Atrésie *Q32.4*
- - ¬ Sténose *Q32.3*
- Gauche isolé ¬ Isomérisme *Q32.4*
- Intrinsèque d'origine extrinsèque ¬ Asthme *J45.89*
- Neuroendocrine à localisations contiguës ¬ Tumeur *C34.8*
- Primaire tuberculeuse avec confirmation bactériologique ou histologique ¬ Fistule *A15.7*
- Provoqué par infection ¬ Asthme *J45.19*
- Psychogène ¬ Asthme *F54, J45.99*
- Tardive ¬ Syphilis *A52.7†, J99.8**
- Tuberculeuse
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Hémorragie *A15.5*
- - Primaire ¬ Fistule *A16.7*

Bronchique *–suite*
- ¬
- - Adaptation et manipulation d'un extenseur *Z45.84*
- - Affections mentionnées, associées à l'asthme *J44*
- - Atrésie *Q32.4*
- - Carcinoïde de type adénome *C34.9*
- - Croup *J20.9*
- - Diminution de la sécrétion *R09.3*
- - Diverticule *Q32.4*
- - Fistule
- - - *J86.01*
- - - Œsophago- *J86.05*
- - Moniliase *B37.1†, J99.8**
- - Présence d'un extenseur *Z96.80*
- - Résultats anormaux de: lavage *R84*
- - Syphilis *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur neuroendocrine *C34.9*

Bronchite
- Aiguë
- - Due
- - - Agents chimiques ¬ *J68.0*
- - - Haemophilus influenzae ¬ *J20.1*
- - - Micro-organismes précisés ¬ *J20.8*
- - - Mycoplasma pneumoniae ¬ *J20.0*
- - - Rhinovirus ¬ *J20.6*
- - - Streptocoques ¬ *J20.2*
- - - Virus
- - - - ECHO ¬ *J20.7*
- - - - Paragrippaux ¬ *J20.4*
- - - - Respiratoire syncytial [VRS] ¬ *J20.5*
- - - Virus Coxsackie ¬ *J20.3*
- - Obstruction ¬ *J20.9*
- - Sans précision ¬ *J20.9*
- - Subaiguë
- - - Bronchospasme ¬ *J20*
- - - Fibrineuse ¬ *J20*
- - - Membraneuse ¬ *J20*
- - - Obstructive ¬ *J20*
- - - Purulente ¬ *J20*
- - - Septique ¬ *J20*
- - - Trachéite ¬ *J20*
- Allergique ¬ *J45.09*
- Aspergillus ¬ *B44.1†, J99.8**
- Asthmatique
- - Chronique VEF1
- - - 35
- - - - 50 % de la norme ¬ *J44.81*
- - - - Norme ¬ *J44.80*
- - - 50 % et < 70 % de la norme ¬ *J44.82*
- - - 70 % de la norme ¬ *J44.83*
- - Obstructive) chronique ¬ *J44*
- - ¬ *J45.99*
- Candida ¬ *B37.88*
- Candidosique ¬ *B37.88†, J99.8**

Bronchite *–suite*
- Catarrhale ¬ *J40*
- Chronique
- - Mucopurulente ¬ *J41.1*
- - SAI ¬ *J42*
- - Sans précision ¬ *J42*
- - Simple
- - - Mucopurulente ¬ *J41.8*
- - - ¬ *J41.0*
- Emphysémateuse
- - Chronique ¬ *J44*
- - SAI chronique ¬ *J44.8*
- Emphysème chronique ¬ *J44*
- Fibrineuse
- - Aiguë ¬ *J20.9*
- - Sous-aiguë ¬ *J20.9*
- Métapneumovirus humain ¬ *J20.8*
- Non précisée comme aiguë ou chronique ¬ *J40*
- Obstructive chronique
- - VEF1
- - - 35
- - - - 50 % de la norme ¬ *J44.81*
- - - - Norme ¬ *J44.80*
- - - 50 % et < 70 % de la norme ¬ *J44.82*
- - - 70 % de la norme ¬ *J44.83*
- - ¬ *J44*
- Plastique ¬ *J20.9*
- Pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ *J68.0*
- SAI ¬ *J40*
- Spirochètes NCA ¬ *A69.8†, J99.8**
- Trachéite SAI ¬ *J40*
- Tuberculeuse
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.5*
- - ¬ *A16.4*
- Virale ¬ *J20.9*

Broncho
- Œsophagienne ¬ Atrésie de l'œsophage avec fistule *Q39.1*
- Pneumonie virale, sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ (*J11.0*
- Pneumopathie grippale, virus d'influenza saisonnière identifié ¬ (*J10.0*

Bronchoaspergillose ¬ *B44.1†, J99.8**

Bronchobiliaire congénitale ¬ Fistule *Q44.5*

Broncho-cutané
- Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.5*
- ¬
- - Fistule *J86.02*
- - Fistule tuberculeuse *A16.4*

Bronchogénique
- Congénital ¬ Kyste *Q33.0*
- ¬ Kyste *J98.4*

Broncholithiase ¬ *J98.0*

Bronchomalacie congénitale ¬ *Q32.2*

Broncho-médiastinal
- Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.5*
- ¬
- - Fistule *J86.08*
- - Fistule tuberculeuse *A16.4*

Bronchomycose
- Candida ¬ *B37.88†, J99.8**
- ¬ *B49†, J99.8**

Broncho-pleural
- Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.5*
- ¬
- - Fistule *J86.01*
- - Fistule tuberculeuse *A16.4*

Broncho-pleuro-médiastinale ¬ Fistule *J86.08*

Bronchopneumonie
- Aspergillus ¬ *B44.1†, J17.2**
- Candida ¬ *B37.1†, J17.2**
- Candidosique ¬ *B37.1†, J17.2**
- Cours de grippe [Influenza], virus de l'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.0*
- Due
- - Bactéries autres que S. pneumoniae et H. influenzae ¬ *J15*
- - Champignons ¬ *B49†, J17.2**
- - Virus autres que des virus grippaux ¬ *J12*
- Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- Lipidique endogène ¬ *J84.80*
- S. pneumoniae ¬ *J13*
- Sans précision ¬ *J18.0*
- Tuberculeuse ¬ *A16.2*

Broncho-pulmonaire
- Allergique ¬ Aspergillose *B44.1†, J99.8**
- ¬
- - Aspergillose *B44.1*
- - Dysplasie *P27.1*
- - Fistule *J86.00*

Bronchorrhée tuberculeuse ¬ *A16.4*

Bronchospasme ¬
- *J21*
- Bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*

Bronchotrachéale ¬ Tuberculose *A16.4*

Bronspiegel-Zelnick ¬ Syndrome de *Q84.8, I89.09*

Bronzé
- Tuberculeuse ¬ Maladie *A18.7†, E35.1**
- ¬ Syndrome du bébé *P83.8*

Brooke ¬ Épithéliome adénoïde kystique de *D23.9*

Brooke-Spiegler
- Peau
- - Cou ¬ Syndrome de *D23.4*

Brooke-Spiegler *–suite*
- Peau *–suite*
- - Face ¬ Syndrome de *D23.3*
- - Tête ¬ Syndrome de *D23.4*
- - Tronc ¬ Syndrome de *D23.5*
- ¬ Syndrome de *D23.9*

Brooks ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Broussailles ¬ Typhus des *A75.3*

Brown
v./v.a. Bahemuka-Brown
- ¬ Syndrome de *H50.6*

Brown-Séquard ¬
- Maladie de *G83.8*
- Paralysie de *G83.8*
- Syndrome de *G83.8*

Brown-Vialetto-van Laere ¬ Syndrome de *G12.2*

Brubakk
v./v.a. Verloove-Van Horick-Brubakk

Brucella
- Abortus ¬
- - Brucellose à *A23.1*
- - Infection à *A23.1*
- Canis ¬
- - Brucellose à *A23.3*
- - Infection à *A23.3*
- Melitensis ¬
- - Brucellose à *A23.0*
- - Infection à *A23.0*
- Suis ¬
- - Brucellose à *A23.2*
- - Infection à *A23.2*
- ¬
- - Infection à *A23.9*
- - Sepsis à *A23.9*

Brucellose
- Brucella
- - Abortus ¬ *A23.1*
- - Canis ¬ *A23.3*
- - Melitensis ¬ *A23.0*
- - Suis ¬ *A23.2*
- Porc et du sanglier ¬ *A23.2*
- ¬
- - *A23.8*
- - *A23.9*
- - Forme mixte de la *A23.8*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *A23.9†, N16.0**
- - Pyélonéphrite au cours de *A23.9†, N16.0**
- - Spondylite au cours de *A23.9†, M49.19**

Bruck ¬ Syndrome de *Q78.0*

Brugada ¬
- Fibrillation ventriculaire idiopathique type
- - *I49.8*
- - Non *I49.8*
- Syndrome de *I49.8*

Brugia
- Malayi ¬ Filariose à *B74.1*
- Timori ¬
- - Éléphantiasis à *B74.2*
- - Filariose à *B74.2*

Bruit
- Abdominal
- - Anormaux ¬ *R19.1*
- - Excessifs ¬ *R19.1*
- - ¬ Absence de *R19.1*
- Artériels) ¬ *R09.8*
- Cardiaques
- - Assourdis, augmentés ou diminués ¬ *R01.2*
- - ¬ Autres *R01.2*
- Sur oreille interne ¬
- - Conséquences du *H83.3*
- - Effets nuisibles de *H83.3*
- ¬
- - *Z57*
- - *Z58*
- - Exposition à : *W49.9!*
- - Perte auditive due au *H83.3*

Brûlant ¬ Brûlure échaudage
- Gaz *X19.9!*
- Liquides *X19.9!*
- Matériel *X19.9!*
- Nourriture *X19.9!*
- Objets *X19.9!*
- Vapeur *X19.9!*

Brûlure
- 1er degré
- - Corps entier ¬ *T29.1*
- - Vagin ¬ *T28.3*
- 2e degré
- - Corps entier ¬ *T29.20*
- - Vagin ¬ *T28.3*
- 2ème degré
- - Parties génitales externes ¬ *T21.25*
- - SAI
- - - Partie du corps non précisée ¬ *T30.20*
- - - ¬ *T30.20*
- 3e degré
- - Corps entier ¬ *T29.3*
- - Vagin ¬ *T28.3*
- Bouche et du pharynx ¬ *T28.0*
- Cheville et du pied, degré non précisé ¬ *T25.0*
- Chimique
- - 1er degré du vagin ¬ *T28.8*
- - 2e degré du vagin ¬ *T28.8*
- - 3e degré du vagin ¬ *T28.8*
- - Vaginal degré
- - - 2a ¬ *T28.8*
- - - 2b ¬ *T28.8*

Brûlure *–suite*
- Comprenant le larynx et la trachée avec les poumons ¬ *T27.1*
- Cornée et du sac conjonctival ¬ *T26.1*
- Corrosion
- - Classées selon leur étendue sur la surface du corps ¬ Séquelles de *T95.4*
- - Gelure
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Séquelles de *T95.3*
- - - - Supérieur ¬ Séquelles de *T95.2*
- - - Précisées ¬ Séquelles d'autres *T95.8*
- - - Sans précision ¬ Séquelles de *T95.9*
- - - Tête ou du cou ¬ Séquelles de *T95.0*
- - - Tronc ¬ Séquelles de *T95.1*
- Couvrant
- - 10 et 19% de la surface du corps ¬ *T31.1!*
- - 10% de la surface du corps ¬ *T31.0!*
- - 20 et 29% de la surface du corps ¬ *T31.2!*
- - 30 et 39% de la surface du corps ¬ *T31.3!*
- - 40 et 49% de la surface du corps ¬ *T31.4!*
- - 50 et 59% de la surface du corps ¬ *T31.5!*
- - 60 et 69% de la surface du corps ¬ *T31.6!*
- - 70 et 79% de la surface du corps ¬ *T31.7!*
- - 80 et 89% de la surface du corps ¬ *T31.8!*
- - 90 % ou plus de la surface du corps ¬ *T31.9!*
- Degré
- - 2a, partie du corps non précisé ¬ *T30.20*
- - 2b
- - - Organes génitaux externes ¬ *T21.85*
- - - ¬ *T30.21*
- Due au courant électrique ¬ *W87.9!*
- Échaudage
- - Gaz brûlants ¬ *X19.9!*
- - Liquides brûlants ¬ *X19.9!*
- - Matériel brûlant ¬ *X19.9!*
- - Nourriture brûlante ¬ *X19.9!*
- - Objets brûlants ¬ *X19.9!*
- - Vapeur brûlante ¬ *X19.9!*
- Épaule
- - Bras sauf poignet main
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T22.2*
- - - Degré
- - - - 2a ¬ *T22.2*
- - - - 2b ¬ *T22.8*
- - Membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé ¬ *T22.0*
- Hanche
- - Jambe sauf région malléolaire pied
- - - 2ème degré sans autre précision ¬ *T24.20*
- - - Degré
- - - - 2a ¬ *T24.20*
- - - - 2b ¬
- - - - - *T24.21*
- - - - - *T24.61*

Brûlure *–suite*
- Hanche *–suite*
- - Membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé ¬ *T24.0*
- Larynx et de la trachée ¬ *T27.0*
- Mentionnées dépassant le premier degré ¬ Brûlures de parties multiples du corps, pas de *T29.1*
- Multiples SAI ¬ *T29.0*
- Œil et de ses annexes, partie non précisée ¬ *T26.4*
- Œsophage ¬ *T28.1*
- Organes génito-urinaires internes ¬ *T28.3*
- Organes internes, autres et sans précision ¬ *T28.4*
- Partie du corps non précisée, degré non précisé ¬ *T30.0*
- Parties
- - Multiples corps
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T29.20*
- - - Brûlure
- - - - Mentionnées dépassant le premier degré ¬ *T29.1*
- - - - Troisième degré mentionnée ¬ *T29.3*
- - - Degré non précisé ¬ *T29.0*
- - - Indication degré
- - - - 2a au maximum ¬ *T29.20*
- - - - 2b au maximum ¬ *T29.21*
- - Œil et de ses annexes ¬ *T26.3*
- - Voies digestives ¬ *T28.2*
- - Voies respiratoires ¬ *T27.2*
- Paupière et de la région périoculaire ¬ *T26.0*
- Poignet main
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T23.20*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T23.20*
- - - 2b ¬ *T23.21*
- - - Non précisé ¬ *T23.0*
- Premier degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.1*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.1*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.1*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.1*
- - Parties génitales externes ¬ *T21.15*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.1*
- - SAI ¬ *T30.1*
- - Tête et du cou ¬ *T20.1*
- - Tronc ¬ *T21.1*
- Provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire ¬ *T26.2*
- Rayons X ¬ *T30.0*
- Région malléolaire pied
- - 2ème degré sans autre précision ¬ *T25.20*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T25.20*

Brûlure *–suite*
- Région malléolaire pied *–suite*
- - Degré *–suite*
- - - 2b ¬ *T25.21*
- SAI ¬ *T30.0*
- Tête cou
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T20.20*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T20.20*
- - - 2b ¬ *T20.21*
- - - Non précisé ¬ *T20.0*
- Troisième degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.3*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.3*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.3*
- - Mentionnée ¬ Brûlures de parties multiples du corps, au moins une *T29.3*
- - Parties génitales externes ¬ *T21.35*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.3*
- - SAI ¬ *T30.3*
- - Tête et du cou ¬ *T20.3*
- - Tronc ¬ *T21.3*
- - ¬ *T30.3*
- Tronc
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T21.2*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T21.2*
- - - 2b ¬ *T21.8*
- - - Non précisé ¬ *T21.0*
- - ¬ *T21.00*
- Vaginal degré
- - 2a ¬ *T28.3*
- - 2b ¬ *T28.3*
- Voies respiratoires, partie non précisée ¬ *T27.3*
- - ¬
- - Calcification et ossification de muscles associées à des *M61.3*
- - Myosite ossifiante associée à des *M61.3*

Brunescente ¬ Cataracte *H25.1*

Brunner
v./v.a. Maat-Kievit-Brunner

Brutale
- Due à un traumatisme acoustique ¬ Perte auditive neurosensorielle aigüe *H83.3*
- SAI ¬ Perte auditive *H91.2*

Bruton
- Déficit de l'hormone de croissance) ¬ Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [*D80.0*
- ¬ Agammaglobulinémie type *D80.0*

Bruxisme) psychogène ¬ Grincement des dents (*F45.8*

Bubon climatique ou tropical ¬ *A55*

Bubonique ¬ Peste *A20.0*

Buccal
- Bouche, partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.50*
- Gencive (processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.53*
- Génitaux avec chondrite ¬ Ulcères *M35.2, M94.1*
- Langue et plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.54*
- Lèvre ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.51*
- Muqueuse de la joue ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.52*
- Non
- - Classés ailleurs ¬ Autres kystes de la région *K09.8*
- - Liés au développement dentaire ¬ Kystes de la région *K09.1*
- Organe digestif évolution imprévisible inconnue
- - Organes digestifs ¬ Tumeur de la cavité *D37.78*
- - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité *D37.70*
- Palais ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.55*
- Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.59*
- Pharynx ¬
- - Carcinoma in situ: Lèvre, cavité *D00.0*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité *C14.8*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité *D37.0*
- Récidivants ¬ Aphtes *K12.0*
- SAI ¬
- - Cavité *C06.9*
- - Muqueuse *C06.0*
- Sans précision ¬
- - Kyste de la région *K09.9*
- - Lésions de la muqueuse *K13.7*
- Stade
- - 1 ¬ Maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.05†, K93.41**
- - 2 ¬ Maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.06†, K93.42**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.07†, K93.43**
- Supérieure) (inférieure) ¬ Gouttière: *C06.1*
- Y compris langue ¬
- - Érythroplasie de l'épithélium *K13.2*
- - Leuco-œdème de l'épithélium *K13.2*
- - Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium *K13.2*
- - ¬
- - Acanthose *K13.2*
- - Atrophie de la muqueuse *K13.7*
- - Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité *S00.5*
- - Carcinome basocellulaire de la muqueuse *C06.0*

Buccal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Granulome
- - - Éosinophile de la muqueuse *K13.4*
- - - Lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse *K13.4*
- - - Pyogène de la muqueuse *K13.4*
- - - Télangiectasique de la muqueuse *K13.4*
- - Hyperplasie inflammatoire de la muqueuse *K13.6*
- - Kyste du plancher *K11.6*
- - Maladie due au VIH avec leucoplasie de la muqueuse *B23.8, K13.2*
- - Malocclusion due à: respiration *K07.5*
- - Mélanome malin de la muqueuse *C06.0*
- - Muguet *B37.0*
- - Phlegmon ou abcès *K12.28*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité *S01.59*
- - Troubles spécifiques du développement de la motricité *F82.2*
- - Ulcère de la muqueuse *K12.1*
- - Xanthome verruqueux de la muqueuse *K13.4*

Bucco facial
- Idiopathique ¬ Dystonie *G24.4*
- ¬ Dyskinésie *G24.4*

Buchanan] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): crête iliaque [*M91.0*

Buckel
v./v.a. Pott-Buckel

Bücklers
v./v.a. Reis-Bücklers

Bucy
v./v.a. Klüver-Bucy

Budd-Chiari [Syndrome d'occlusion des veines hépatiques] ¬ Syndrome de *I82.0*

Buerger] ¬ Thrombo-angéite oblitérante [*I73.1*

Buissonnière ¬ Ecole *F91.2*

Bulbaire
v./v.a. Paralysie bulbaire
- Myéloïde ¬ Polio-encéphalite *A80.9†, G05.1**
- ¬ Polio-encéphalite *A80.9†, G05.1**

Bulbe
- Olfactif ¬
- - *C72.2*
- - *D33.3*
- Rachidien] ¬ Astrocytome de la moelle allongée [*C71.7*
- Sans protrusion ¬ Perforation du *S05.6*
- Veine jugulaire ¬ Thrombose du *I82.81*

Bulbospinale ¬ Amyotrophie *G12.2*

Bulbo-urétrales ¬ Tuberculose des glandes *A18.1†, N51.8**

Bulimia nervosa) ¬ Boulimie (*F50.2*

Bulle d'emphysème pulmonaire ¬ *J43.9*

Bulleux
- Acquise ¬ Epidermolyse *L12.3*

Bulleux *–suite*
- Atrophiante et albo-papuloïde ¬ Dystrophie cutanée *Q81.2*
- Brock ¬ Érythrodermie congénitale ichtyosiforme *Q80.3*
- Chirurgie de la cataracte [de l'aphaque] ¬ Kératopathie (*H59.0*
- Congénitale ¬ Érythrodermie ichtyosiforme *Q80.3*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Dermatoses *L14**
- Dermolytique ¬ Épidermolyse *Q81.2*
- Dystrophique
- - Acrale ¬ Épidermolyse *Q81.2*
- - Dominante
- - - Généralisée ¬ Épidermolyse *Q81.2*
- - - Isolée des ongles ¬ Épidermolyse *Q81.2*
- - Généralisée autosomique récessive, forme intermédiaire ¬ Épidermolyse *Q81.2*
- - Inversée récessive ¬ Epidermolyse *Q81.2*
- - Localisée ¬ Épidermolyse *Q81.2*
- - Prétibiale ¬ Épidermolyse *Q81.2*
- - Prurigineuse ¬ Épidermolyse *Q81.2*
- - ¬ Épidermolyse *Q81.2*
- Enfance ¬ Maladie chronique *L12.2*
- Héréditaire type maculaire ¬ Dystrophie *Q87.1*
- Jonctionnelle
- - Atrésie pylorique ¬ Épidermolyse *Q81.8, Q40.8*
- - Généralisée
- - - Forme intermédiaire ¬ Épidermolyse *Q81.8*
- - - Sévère ¬ Épidermolyse
- - - - *Q81.1*
- - - - *Q81.1*
- - Inversée ¬ Épidermolyse *Q81.8*
- - Létale ¬ Épidermolyse *Q81.1*
- - Localisée
- - - Début tardif-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'épidermolyse *Q81.8*
- - - ¬ Epidermolyse *Q81.8*
- - Type
- - - Herlitz [EBJ-H] ¬ Épidermolyse *Q81.1*
- - - Herlitz-Pearson ¬ Épidermolyse *Q81.1*
- - - Non-Herlitz
- - - - JEB-nH] ¬ Épidermolyse *Q81.8*
- - - - Localisé] ¬ EBJ-nH loc [Épidermolyse *Q81.8*
- Létal
- - Acantholytique ¬ Épidermolyse *Q81.0*
- - ¬ Epidermolyse *Q81.1*
- Précisées ¬ Autres dermatoses *L13.8*
- Sans précision ¬
- - Dermatose *L13.9*
- - Epidermolyse *Q81.9*
- Simple
- - Anodontie ¬ Epidermolyse *Q81.0, K00.0*

Bulleux *–suite*
- Simple *–suite*
- - Atrésie du pylore ¬ Épidermolyse *Q81.0*
- - Autosomique récessive associée à KRT14 ¬ Épidermolyse *Q81.0*
- - Déficit
- - - BP230 ¬ Épidermolyse *Q81.0*
- - - Exophiline 5 ¬ Épidermolyse *Q81.0*
- - - Plakophiline ¬ Épidermolyse *Q81.0*
- - Dystrophie musculaire ¬ Épidermolyse *Q81.0†, G73.7**
- - Généralisée
- - - Autosomique
- - - - Dominante, forme intermédiaire ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - - - Récessive ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - - Forme sévère ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - - Intermédiaire ¬ Épidermolyse *Q81.0*
- - Hypodontie ¬ Epidermolyse *Q81.0, K00.0*
- - Intermédiaire
- - - Cardiomyopathie ¬ Épidermolyse *Q81.0, I42.9*
- - - Sans manifestations extra-cutanées associée à PLEC ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - Localisée ¬ Épidermolyse *Q81.0*
- - Migratoire ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- - Pigmentation mouchetée ¬ Épidermolyse *Q81.0*
- - Superficielle ¬ Épidermolyse *Q81.0*
- - Type
- - - Dowling-Meara ¬ Épidermolyse *Q81.0*
- - - Ogna ¬ Épidermolyse *Q81.0*
- - ¬ épidermolyse
- - - *Q81.0*
- - - *Q81.0*
- Syndrome néphrotique-surdité neurosensorielle ¬ Syndrome d'épidermolyse *Q87.8*
- Transitoire du nouveau-né ¬ Dermolyse *Q81.2*
- ¬
- - Cystite *N30.88*
- - Emphysème (pulmonaire): *J43.9*
- - Épidermolyses *Q81.8*
- - Érythème polymorphe
- - - *L51.1*
- - - Non *L51.0*
- - Impétigo *L01.0*
- - Kératopathie *H18.1*
- - Kératose palmoplantaire focale non épidermolytique autosomique dominante avec atteintes *Q82.8*
- - Lichen
- - - *L43.1*
- - - Plan *L43.1*
- - Myringite *H73.0*
- - Pemphigoïde *L12.0*
- - Pyoderma gangrenosum, type *L88*

Bulleux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome de pneumopathie interstitielle-syndrome néphrotique-épidermolyse *J84.90†, N08.8*, Q81.8*

Bullosa ¬ Culicosis *L13.8*

Buphtalmie ¬ *Q15.0*

Burford
v./v.a. Graham-Burford-Mayer

Burgdorferi ¬
- Érythème chronique migrateur à Borrelia *A69.2*
- Infection à Borrelia *A69.2*

Bürger-Grütz ¬
- Hépatosplénomégalie hyperlipémique de type *E78.3†, K77.8**
- Maladie de *E78.3*

Burkholderia
- Mallei ¬ Infection à *A24.0*
- Pseudomallei ¬ Infection à *A24.4*
- Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ *U81.6!*
- ¬
- - *B96.5!*
- - Bactériémie à *A49.85*

Burkitt
- Atypique ¬ Lymphome de *C83.7*
- Rémission complète ¬ LLA-B à cellules matures de type *C91.81*
- ¬
- - Leucémie de *C91.80*
- - LLA-B à cellules matures de type *C91.80*
- - Lymphome de *C83.7*
- - Maladie due VIH
- - - Lymphome de *B21, C83.7*
- - - Tumeur de *B21, C83.7*

Burkitt-like» ¬ Lymphome « *C83.7*

Burnetii ¬
- Endocardite à Coxiella *A78†, I39.8**
- Infection Coxiella *A78*

Burn-McKeown ¬ Syndrome de *Q87.8*

Burn-out] ¬ Surmenage [*Z73*

Burns] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse inférieure du cubitus [*M92.1*

Bursite
- Calcifiante de l'épaule ¬ *M75.3*
- Coude ¬ Autres *M70.3*
- Épaule ¬ *M75.5*
- Genou ¬ Autres *M70.5*
- Gonococcique ¬ *A54.4†, M73.09**
- Gonocoques ¬ *A54.4†, M73.09**
- Goutteuse ¬ *M10.0*
- Hanche ¬ Autres *M70.7*
- Infectieuses ¬ Autres *M71.1*
- Ischiale ¬ *M70.7*

Bursite *–suite*
- Ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] ¬ *M76.4*
- Main ¬ *M70.1*
- Non classées ailleurs ¬ Autres *M71.5*
- Olécrânienne ¬ *M70.2*
- Prépatellaire ¬ *M70.4*
- Rhumatoïde ¬ *M06.2*
- SAI ¬ *M71.9*
- Syphilitique
- - Tardive ¬ *A52.7†, M73.19**
- - ¬ *A52.7†, M73.19**
- Tendon d'Achille ¬ *M76.6*
- Trochantérienne ¬ *M70.6*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M73.89**
- ¬ Gonorrhée avec *A54.4†, M73.09**

Bursts
v./v.a. suppression-bursts

Buruli] ¬ Infection par Mycobacterium: ulcerans [Ulcère de *A31.1*

Bury ¬ Maladie de *L95.1*

Bus ¬ Accident de *V99!*

Buschke
v./v.a. Busse-Buschke
- ¬ Sclérœdème de *M34.8*

Buschke-Ollendorff ¬ Syndrome de *Q89.8*

Buski ¬ Infection par Fasciolopsis *B66.5*

Busse-Buschke ¬ Maladie de *B45.3†, M90.29**

Butanol] ¬ Alcool: butylique [1- *T51.3*

Butylique [1-butanol] ¬ Alcool: *T51.3*

Butyrophénone et thioxanthène ¬ Intoxication: Neuroleptiques de type *T43.4*

Butyrylcholinestérase ¬ Déficit héréditaire en *E88.08*

Buzzi ¬ Anétodermie de Schweninger- *L90.1*

Byler ¬ Maladie de *K74.5*

Byssinose ¬ *J66.0*

C1Inh
- Normal
- - Lié
- - - ANGPT1 ¬ Angio-œdème héréditaire avec *D84.1*
- - - F12 ¬ Angio-œdème héréditaire avec *D84.1*
- - - PLG ¬ Angio-œdème héréditaire avec *D84.1*
- - Non associé à F12 ni PLG ¬ Angio-œdème héréditaire avec *D84.1*
- - ¬ Angio-œdème héréditaire avec *D84.1*
- ¬ Angio-œdème
- - Acquis avec déficit en *D84.1*
- - Héréditaire avec déficit en *D84.1*

C5-désaturase ¬ Déficit en stérol *Q87.8*

C9ORF72 ¬ Maladie de Huntington-like due à des expansions *G10*

Cabezas ¬ Syndrome de *Q87.8*

Cacahuètes ¬ Allergie aux protéines de *T78.1*

Cacchi-Ricci ¬ Maladie de *Q61.5*

CACH ¬ Syndrome *E75.2*

Cachexie
- Cours du paludisme ¬ *B54*
- Due au plomb ¬ *T56.0*
- Hypophysaire ¬ *E23.0*
- Métabolique] ¬ Syndrome SAM [dermatite sévère-allergies multiples- *Q80.8*
- Tuberculeuse NCA ¬ *A16.9*
- ¬
- - *R64*
- - Maladie due au VIH avec *B22, R64*

CACP] ¬ Syndrome de camptodactylie-arthropathie-coxa vara-péricardite [*M12.80*

CAD] ¬ Maladie des agglutinines froides [*D59.10*

CADASIL [Artériopathie cérébrale autosomique dominant-infarctus sous-cortical-leucoencéphalopathie] ¬ *I67.88*

Cadavre
- Sans cause apparente de décès ¬ Découverte fortuite d'un *R98*
- ¬ Découverte d'un *R98*

CADDS [Contiguous ABCD1 DXS1357E deletion syndrome] ¬ *Q87.8*

Cadmium et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.3*

Cadre
- Artériopathie oblitérante ¬ Douleurs ischémiques dans le *I70.29*
- Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Méningisme dans le *J10.8*
- Programme de recherche clinique ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le *Z00.6*

Cæcal
v./v.a. rétro-cæcal

Cæcum
- Côlon ¬ Rotation

Cæcum *–suite*
- Côlon ¬ Rotation *–suite*
- - Absente du *Q43.3*
- - Incomplète du *Q43.3*
- - Insuffisante du *Q43.3*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde du *C18.0*
- - Carcinome héréditaire non polypeux du *C18.0*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] du *C18.0*
- - Nécrose du *K35.8*
- - Tuberculose du *A18.3†, K93.0**
- - Tumeur bénigne: *D12.0*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - Bénigne du *D12.0*
- - - Maligne du *C18.0*

Café
- Exacerbation aiguë ¬ Poumon des torréfacteurs de *J67.81*
- Lait
- - Congénitales et augmentation du taux d'échanges entre chromatides sœurs ¬ Syndrome de retard de croissance intra-utérin avec multiples taches *Q02*
- - ¬
- - - Maladie familiale des taches *L81.3*
- - - Taches *L81.3*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des torréfacteurs de *J67.80*
- ¬ Poumon des torréfacteurs de *J67.80*

Caféine ¬
- Consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors *U69.36!*
- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la *F15*
- Utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors *U69.35!*

Caffey
v./v.a. Kenny-Caffey

CAHMR [cataracte-hypertrichose-déficience intellectuelle] ¬ Syndrome de *Q87.8*

CAID [dysrythmie atriale et trouble de la motilité intestinale chronique] ¬ Syndrome *I49.5, K59.8*

Caillot sanguin
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- ¬ Autre embolie obstétricale par *O88.28*

Caïman ¬ Ataxie type *G11.0*

CAIS] ¬ Insensibilité totale aux androgènes [*E34.51*

Caisson
- Arthrite ¬ Maladie de *T70.3†, M14.89**
- Maladie de la décompression] ¬ Maladie des *T70.3*
- ¬ Ostéonécrose de la maladie des *T70.3†, M90.39**

Calcanéenne ¬ Exostose *M77.3*

Calcanéopéronier ¬ Entorse et foulure de la cheville: Ligament *S93.42*

Calcanéum
- Adulte ¬ Ostéochondrose du *M93.87*
- ¬
- - Apophysite du *M92.8*
- - Fracture du *S92.0*
- - Ostéoblastome du *D16.3*
- - Ostéochondrite juvénile, *M92.6*

Calcifiante
- Dysplasie squelettique à début précoce ¬ Leucoencéphalopathie *G93.4, Q79.9*
- Épaule ¬
- - Bursite *M75.3*
- - Tendinite *M75.3*
- ¬
- - Chondrodystrophie congénitale *Q77.3*
- - Pancréatite *K86.18*
- - Tendinite *M65.2*

Calcification
- Anévrysme de l'aorte ¬ *I71.9*
- Artère de la rate ¬ *I70.8*
- Artériel
- - Articulaire ¬ Syndrome héréditaire de *I70.29, M25.80*
- - Généralisée infantile ¬ *Q28.88*
- - Idiopathique infantile ¬ *Q28.88*
- Bronches ¬ *J98.0*
- Cardio-vasculaire ¬ Syndrome de maladie de Gaucher-ophtalmoplégie- *E75.2*
- Cérébrale type Rajab ¬ *Q04.8*
- Cérébrales épilepsie ¬
- - CEC [Syndrome de maladie cœliaque- *K90.0, G40.8*
- - Syndrome de maladie cœliaque- *K90.0, G40.8*
- Conjonctive ¬ *H11.1*
- Cristallin ¬ *H26.88*
- Intracrâniennes petite taille dysmorphie facial ¬ Syndrome
- - Diabète insipide néphrogénique- *Q87.1*
- - Résistance à l'arginine vasopressine- *Q87.1*
- Muscles ¬ Autres *M61.4*
- Noyaux gris centraux ¬ *G23.8*
- Ossification
- - Muscle
- - - Associées à des brûlures ¬ *M61.3*
- - - Sans précision ¬ *M61.9*
- - Paralytiques d'un muscle ¬ *M61.2*
- Pancréas ¬ *K86.88*
- Péricarde ¬ *I31.1*
- Pleurale ¬ *J94.8*
- Plexus choroïde, forme infantile ¬ *G93.88*
- Poumon ¬ *J98.4*
- Pulpaires ¬ *K04.2*

Calcification *–suite*
- SNC, surdité et cécité ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie progressive à début précoce avec *G93.88*
- Système nerveux central-surdité-acidose tubulaire-anémie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Thalamiques symétriques ¬ *G93.88*
- Tuberculeuse
- - Glande surrénale ¬ *B90.8†, E35.1**
- - Plèvre avec confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.6*
- - Rein ¬ *B90.1†, N29.1**
- Vessie ¬ *N32.8*
- ¬
- - Leucoencéphalopathie avec kystes et *I67.88†, G94.39**
- - Syndrome de dysplasie spondylo-épimétaphysaire-membres courts-anomalies de *Q77.7*

Calcinose
- Cutanée ¬ *L94.2*
- Maladie de Raynaud-troubles moteurs œsophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de *M34.1*
- Pleurale ¬ *E83.58†, J99.8**
- Striopallidodentée bilatérale ¬ *G23.8*
- Tumorale
- - Familiale ¬ *E83.38*
- - Hyperphosphatémique familiale ¬ *E83.38*
- - Normophosphatémique familiale ¬ *E83.38*

Calciphylaxie ¬ *E83.50*

Calcique
- Bourse séreuse ¬ Dépôts *M71.4*
- ¬ Intoxication: Inhibiteurs *T46.1*

Calcitonine ¬ Hypersécrétion de *E07.0*

Calcium
- Dihydraté
- - Articulation
- - - Coude ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de *M11.12*
- - - Genou ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de *M11.16*
- - Articulation de l'épaule ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de *M11.11*
- - Colonne vertébrale ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de *M11.18*
- - Main ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de *M11.14*
- - Pied ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de *M11.17*
- - Poignet ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de *M11.13*
- - Région pelvienne ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de *M11.15*
- - Sièges multiples ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de *M11.10*
- - ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de *M11.19*
- Magnésium

Calcium *–suite*
- Magnésium *–suite*
- - Nouveau-né
- - - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du métabolisme du *P71.9*
- - - ¬ Autres anomalies transitoires du métabolisme du *P71.8*
- - ¬ Tétanie néonatale sans carence en *P71.3*
- Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme du *E83.59*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme du *E83.58*
- - Carence alimentaire en *E58*
- - Hypocalcémie due à une anomalie du métabolisme du *E83.58*
- - Néphrite à oxalate de *E74.8*

Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor-1] ¬ Troubles hémorragiques par déficit en CalDAG-GEFI [*D69.1*

Calcul
- Acide urique ¬ Néphrolithiase avec *M10.09†, N22.8**
- Biliaire ¬
- - Occlusion de l'intestin par *K56.3*
- - Pancréatite aiguë secondaire à des *K85.1*
- Bloqué
- - Canal biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- - Canal cystique sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- - Vésicule biliaire sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- Canal biliaire
- - Angiocholite ¬ *K80.3*
- - Cholécystite ¬ *K80.4*
- - Sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Canal pancréatique
- - Sans sténose du canal pancréatique ¬ *K86.80*
- - Sténose du canal pancréatique ¬ *K86.81*
- - ¬ *K86.80*
- Canal parotidien ¬ *K11.5*
- Coralliforme ¬ *N20.0*
- Cystinique ¬ *E72.0†, N22.8**
- Diverticule vésical ¬ *N21.0*
- Glandes salivaires ou d'un canal excréteur ¬ *K11.5*
- Hydronéphrose ¬ Abcès rénal avec *N13.64*
- Infection ¬ Hydronéphrose avec *N13.64*
- Intrarénal ¬ *N20.0*
- Prostate ¬ *N42.0*
- Rein
- - Calcul de l'uretère ¬ *N20.2*
- - ¬ *N20.0*
- Rénal
- - Hydronéphrose ¬ Urétérite non spécifique avec *N13.20*

Calcul *–suite*
- Rénal *–suite*
- - ¬ *N20.0*
- Urétéral ¬ *N20.1*
- Uretère
- - Hydronéphrose ¬ *N13.21*
- - ¬
- - - *N20.1*
- - - Calcul du rein avec *N20.2*
- Urètre ¬ *N21.1*
- Urinaire
- - Cours
- - - Bilharziose ¬ *B65.0†, N22.0**
- - - Schistosomiase ¬ *B65.0†, N22.0**
- - Sans précision ¬ *N20.9*
- Vésical
- - Néovessie ¬ *N21.0*
- - ¬ *N21.0*
- Vésicule biliaire
- - Cholécystite aiguë ¬ *K80.0*
- - Forme de cholécystite ¬ *K80.1*
- - Sans cholécystite ¬ *K80.2*
- Vessie ¬ *N21.0*
- Voie urinaire
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *N22.8**
- - Inférieures
- - - Sans précision ¬ *N21.9*
- - - ¬ Autres *N21.8*
- ¬
- - Abcès de la vésicule biliaire sans *K81.0*
- - Angiocholécystite sans *K81.0*
- - Cholécystite
- - - Emphysémateuse (aiguë) sans *K81.0*
- - - Gangréneuse sans *K81.0*
- - - Suppurée sans *K81.0*
- - Empyème de la vésicule biliaire sans *K81.0*
- - Gangrène de la vésicule biliaire sans *K81.0*
- - Occlusion
- - - Canal biliaire, sans *K83.1*
- - - Canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans *K82.0*
- - Rétrécissement
- - - Canal biliaire, sans *K83.1*
- - - Canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans *K82.0*
- - Sténose
- - - Canal biliaire, sans *K83.1*
- - - Canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans *K82.0*

Calculeuse
- Infection du rein ¬ Hydronéphrose avec obstruction *N13.64*
- Rénale
- - Infection du rein ¬ Hydronéphrose avec obstruction *N13.62*

Calculeuse *–suite*
- Rénale *–suite*
- - ¬ Hydronéphrose avec obstruction *N13.20*
- Urétéral
- - Infection du rein ¬ Hydronéphrose avec obstruction *N13.63*
- - ¬ Hydronéphrose avec obstruction *N13.21*

CalDAG-GEFI [Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor-1] ¬ Troubles hémorragiques par déficit en *D69.1*

Calice rénal, non traumatique [rupture de fornix] ¬ Rupture d'un *N28.80*

Calices ¬ *C65*

Calicielle-surdité ¬ Syndrome de dysmorphie rénale pelvi- *Q63.8, H90.5*

Californie ¬
- Encéphalite de *A83.5*
- Pseudotyphus de la *A79.8*

Calleux
v./v.a. acro-calleux
- Appendices pré-auriculaires ¬ Syndrome de déficience intellectuelle avec hypoplasie du corps *Q87.8*
- Déficience intellectuelle
- - Colobome et micrognathie ¬ Syndrome d'agénésie du corps *Q87.8*
- - Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de microcéphalie-hypoplasie du corps *Q87.0*
- - ¬ Syndrome d'hypoplasie de la substance blanche-agénésie du corps *Q04.8*
- Dysmorphie faciale-ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-agénésie du corps *Q87.0*
- Fin
- - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microcéphalie-corps *Q87.8*
- - Microcéphalie post-natale progressive ¬ Syndrome tétraplégie spastique-corps *Q02*
- Hypoplasie du vermis avec kystes de la fosse postérieure ¬ Syndrome d'agénésie partielle du corps *Q04.3*
- Quadriparésie spastique ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-agénésie du corps *Q87.8*
- Retard mental-pouces en adduction-spasticité-hydrocéphalie] ¬ Syndrome CRASH [hypoplasie du corps *Q04.8*
- Vermis cérébelleux-dysmorphie faciale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microcéphalie-hypoplasie du corps *Q87.0*
- ¬
- - Agénésie du corps *Q04.0*
- - Aplasie du corps *Q04.0*
- - Démyélinisation centrale du corps *G37.1*
- - Encéphalopathie démyélinisante du corps *G37.1*
- - Forme isolée d'agénésie du corps *Q04.0*
- - Malformations congénitales du corps *Q04.0*
- - Syndrome de microcéphalie-polymicrogyrie-agénésie du corps *Q02, Q04.0*

Callosités ¬ Cors et *L84*

Calmants et protecteurs ¬ Intoxication: Emollients, *T49.3*

Calorique
- Enfant adolescent ¬ Obésité
- - Due à un excès *E66.04*
- - Extrême due à un excès *E66.05*
- Hydrique ¬ Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, *T50.3*
- Indice de masse corporelle IMC
- - 40 et moins de 50 ¬ Obésité due à un excès *E66.06*
- - 50 et moins de 60 ¬ Obésité due à un excès *E66.07*
- - 60 et plus ¬ Obésité due à un excès *E66.08*
- - Compris
- - - 30 et moins de 35 ¬ Obésité due à un excès *E66.00*
- - - 35 et moins de 40 ¬ Obésité due à un excès *E66.01*
- ¬ Obésité grade
- - I (OMS) due à un excès *E66.00*
- - II (OMS) due à un excès *E66.01*
- - III (OMS) due à un excès *E66.09*

Calpaïne-3 D4 ¬ Dystrophie musculaire des ceintures liée à la *G71.08*

Calsequestrine et SERCA1 ¬ Myopathie due à une surcharge en *G71.2*

Calvé
- Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg- *M91.1*
- ¬ Maladie de: *M42.0*

Calvitie-luxation de la rotule-acromicrie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*

Cameron
- Érosive aiguë
- - Hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - Occlusion avec lésion de *K44.0, K29.0*
- - - Sans occlusion avec lésion de *K44.9, K29.0*
- - ¬ Hernie diaphragmatique
- - - Occlusion avec lésion de *K44.0, K29.1*
- - - Sans occlusion avec lésion de *K44.9, K29.1*
- Ulcéreux
- - Aiguë
- - - Hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - - Occlusion avec lésion de *K44.0, K25.0*
- - - - Sans occlusion avec lésion de *K44.9, K25.0*
- - - Sans hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - - Occlusion avec lésion de *K44.0, K25.3*
- - - - Sans occlusion avec lésion de *K44.9, K25.3*
- - Chronique
- - - Hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - - Occlusion avec lésion de *K44.0, K25.4*
- - - - Sans occlusion avec lésion de *K44.9, K25.4*

Cameron *–suite*
- Ulcéreux *–suite*
- - Chronique *–suite*
- - - Sans hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - - Occlusion avec lésion de *K44.0, K25.7*
- - - - Sans occlusion avec lésion de *K44.9, K25.7*
- - ¬ Hernie diaphragmatique
- - - Occlusion avec lésion de *K44.0, K25.9*
- - - Sans occlusion avec lésion de *K44.9, K25.9*

Camion ¬ Accident de *V99!*

CAMOS [ataxie cérébelleuse, déficience intellectuelle, atrophie optique, anomalies cutanées ¬ Syndrome *G11.1*

Camp de concentration ¬ Modification de la personnalité après: expériences de *F62.0*

Campeau
v./v.a. Snijders Blok-Campeau

Campomélie type Cumming ¬ *Q87.8*

Campomélique ¬ Dysplasie *Q87.1*

Camptobrachydactylie ¬ *Q74.8*

Camptocormie
- Hystérique ¬ *F44.4*
- Idiopathique ¬ *F44.4*
- Non psychogène idiopathique ¬ *M43.86*
- Psychogène ¬ *F44.4*

Camptodactylie
- Arthropathie-coxa vara-péricardite [CACP] ¬ Syndrome de *M12.80*
- Doigts ¬ *Q68.1*
- Familiale avec une aminoacidurie ¬ *Q68.1*
- Goodman ¬ *Q78.8*
- Guadalajara type
- - 1 ¬ *Q87.1*
- - 2 ¬ *Q87.1*
- - 3 ¬ *Q87.0*
- Raideur articulaire-anomalies osseuses de la face ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Tel Hashomer ¬ *Q79.8*
- ¬ Syndrome de macrothrombocytopénie-lymphœdème-retard de développement-dysmorphie faciale- *Q87.0*

Campylobacter ¬
- Entérite à *A04.5*
- Infection à *A49.88*

Canada
v./v.a. Cronkhite-Canada

Canal
- Alcock] ¬ hernie: honteuse [du *K45*
- Auriculo-ventriculaire
- - Commun ¬ *Q21.2*
- - ¬ *Q21.2*
- Biliaire
- - SAI ¬ *C24.0*
- - ¬ Duplication du *Q44.5*
- Botal ¬ Perméabilité du *Q25.0*
- Cholédoque

Canal *–suite*
- Cholédoque *–suite*
- - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Lithiase du *K80.5*
- - ¬
- - - *C24.0*
- - - Atrésie du *Q44.2*
- - - Carcinome du *C24.0*
- Cœur, NCA ¬ Défaut du *Q21.2*
- CRAC ¬ Déficit immunitaire combiné par dysfonctionnement du *D81.8*
- Cystique ¬
- - *C24.0*
- - Duplication du *Q44.5*
- Galactophores ¬ Ectasie des *N60.4*
- Gartner ¬ Kyste (de): *Q50.5*
- Glande sébacée du sein ¬ Kyste d'un *N60.8*
- Hépatique
- - Commune ¬ *C24.0*
- - Surnuméraire ¬ *Q44.5*
- - ¬
- - - *C24.0*
- - - Atrésie du *Q44.2*
- - - Inflammation du *K83.09*
- Incisif ¬ Kyste
- - *K09.1*
- - Naso-palatin [*K09.1*
- Ioniques ¬ Affection cardiaque des *I49.8*
- Médullaire ¬ Rétrécissement du *M48.0*
- Nück, congénital ¬ Kyste (du): *Q52.4*
- Omphalo-mésentérique ¬ Persistance du *Q43.0*
- Parotidien ¬ Calcul du *K11.5*
- Pylorique ¬
- - *C16.4*
- - Carcinome épidermoïde du *C16.4*
- Semi-circulaire ¬ Syndrome de déhiscence du *H83.8*
- Spermatique ¬ Torsion: *N44.0*
- Tarsien ¬ Syndrome du *G57.5*
- Thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.82*
- Thyréoglosse ¬ Persistance du *Q89.2*
- Vitellin ¬ Persistance du *Q43.0*
- Wharton ¬ Kyste du *K11.6*
- Wolff
- - Femme ¬ Adénome du *D28.7*
- - ¬ Corps ou *C57.7*
- ¬ Coarctation
- - Aorte
- - - *Q25.1*
- - - Avant le *Q25.1*
- - Isthme aortique après le *Q25.1*

Canal anal ¬
- *D37.78*
- *K62*

Canal anal ¬ *–suite*
- Adénocarcinome du *C21.1*
- Agénésie du *Q42.3*
- Carcinoma in situ: Anus et *D01.3*
- Carcinome épidermoïde du *C21.1*
- Duplication du *Q45.8*
- Hémorragie du *K62.50*
- Néoplasie du *D37.78*
- Prolapsus du *K62.2*
- Tumeur bénigne: Anus et *D12.9*
- Tumeur du *D37.78*
- Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du *C21.8*
- Tumeur neuroendocrine
- - Bénigne du *D12.9*
- - Incertain du *D37.78*
- - Maligne du *C21.1*

Canal artériel
- Bicuspidie valvulaire aortique-anomalie des mains ¬ Syndrome de persistance du *Q87.2*
- Familiale ¬ Persistance du *Q25.0*
- ¬
- - Anévrisme du *Q25.8*
- - Artère pulmonaire naissant du *Q25.7*
- - Fermeture anténatale du *Q25.8*
- - Obturation retardée du *P29.3*
- - Perméabilité du *Q25.0*
- - Persistance du *Q25.0*
- - Syndrome agénésie valve pulmonaire
- - - Septum ventriculaire intact-persistance du *Q22.3, Q25.0*
- - - Tétralogie de Fallot-absence du *Q24.8, Q25.8*

Canal atrio-ventriculaire
- Complet
- - Anomalies obstructives du cœur gauche ¬ *Q21.2*
- - Hypoplasie ventriculaire ¬ *Q21.2*
- - ¬ *Q21.2*
- Partiel ¬ *Q21.2*
- ¬ Anomalie du *Q21.2*

Canal auditif
- Externe ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.34*
- Interne-dysmorphie faciale ¬ Syndrome lié à l'X d'atrésie du conduit auditif externe-dilatation du *Q16.9, Q18.9*
- ¬
- - *T16*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.35*
- - Syphilis du *A52.7†, H94.8**

Canal biliaire
- Angiocholite ¬ Calcul des *K80.3*
- Cholécystite ¬ Calcul des *K80.4*
- Extra-hépatique ¬ Tumeur maligne: *C24.0*
- Intra- et extra-hépatiques ¬ Tumeur maligne affectant à la fois les *C24.8*

Canal biliaire *–suite*
- SAI sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul (bloqué) d'un *K80.5*
- Sans
- - Angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul des *K80.5*
- - Calcul ¬
- - - Occlusion d'un *K83.1*
- - - Rétrécissement d'un *K83.1*
- - - Sténose d'un *K83.1*
- - ¬
- - Adhérences d'un *K83.8*
- - Atrophie d'un *K83.8*
- - Hypertrophie d'un *K83.8*
- - Lésion traumatique: *S36.18*
- - Rupture d'un *K83.2*
- - Ulcère d'un *K83.8*

Canal carpien
- Pendant la grossesse ¬ Syndrome du *O26.82*
- ¬ Syndrome du *G56.0*

Canal cervical ¬ Présence congénitale d'épithélium pavimenteux dans le *Q51.8*

Canal cranio-pharyngien ¬
- Tumeur bénigne: *D35.3*
- Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D44.4*

Canal cystique
- Sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: *K80.2*
- Vésicule biliaire
- - Sans calcul ¬
- - - Occlusion du *K82.0*
- - - Rétrécissement du *K82.0*
- - - Sténose du *K82.0*
- - ¬
- - - Adhérences du *K82.8*
- - - Atrophie du *K82.8*
- - - Dyskinésie du *K82.8*
- - - Exclusion du *K82.8*
- - - Hypertrophie du *K82.8*
- - - Kyste du *K82.8*
- - - Rupture du *K82.2*
- - - Ulcère du *K82.8*
- ¬ Atrésie du *Q44.2*

Canal de Müller
- Corps de l'utérus ¬ Tumeur mixte maligne des *C54.9*
- Hyperandrogénie ¬ Aplasie des *Q51.8*
- ¬
- - Aplasie unilatérale des *Q51.4*
- - Syndrome
- - - Anomalies des membres-anomalies des *Q87.8*
- - - Persistance des *Q55.8*

Canal déférent
- Cordon spermatique scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬

Canal déférent *–suite*
- Cordon spermatique scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬ *–suite*
- - Atrophie du *N50.8*
- - Hypertrophie du *N50.8*
- - Œdème du *N50.8*
- - Ulcère du *N50.8*
- Épididyme vésicule séminal prostate
- - SAI ¬ Malformation congénitale du *Q55.4*
- - ¬ Autres malformations congénitales du *Q55.4*
- ¬
- - Absence acquise du *Z90.7*
- - Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du *N49.1*
- - Aplasie congénitale bilatérale des *Q55.4*
- - Atrésie du *Q55.3*
- - Gonorrhée
- - - *A54.2†, N51.8**
- - - Aiguë du *A54.2†, N51.8**
- - Lésion traumatique: *S37.84*
- - Rétrécissement de: *N50.8*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, N51.8**
- - Tuberculose du *A18.1†, N51.8**

Canal excréteur ¬
- Calcul des glandes salivaires ou d'un *K11.5*
- Lithiase des glandes salivaires ou d'un *K11.5*

Canal lacrymal
- Lacrymonasal ¬ Sténose du: *H04.5*
- Surdité] ¬ HPPD [Syndrome d'hypertélorisme-sinus pré-auriculaire-obstruction du *Q87.0*
- ¬
- - Fibrose du *H04.5*
- - Sténose ou rétrécissement congénital du *Q10.5*
- - Traumatisme du *S05.8*
- - Tumeur bénigne: Glande lacrymale et *D31.5*
- - Tumeur maligne: Glande lacrymale et *C69.5*

Canal lacrymo-nasal ¬
- *C69.5*
- *D31.5*
- Syndrome de microtie-colobome oculaire-imperforation du *Q15.8, Q17.2*

Canal pancréatique
- SAI ¬ Malformation congénitale du pancréas et du *Q45.3*
- Sans sténose du canal pancréatique ¬ Calcul du *K86.80*
- Sténose du canal pancréatique ¬ Calcul du *K86.81*
- ¬
- - Atrophie du *K86.88*
- - Calcul

Canal pancréatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Calcul *–suite*
- - - *K86.80*
- - - Canal pancréatique
- - - - Sans sténose du *K86.80*
- - - - Sténose du *K86.81*
- - Carcinome
- - - Familial du *C25.3*
- - - Intracanalaire tubulopapillaire du *C25.3*
- - Dilatation du *K86.88*
- - Malformations congénitales du pancréas et du *Q45.3*
- - Néoplasme neuroendocrine-non neuroendocrine mixte du *C25.3*
- - Obstruction du *K86.82*
- - Sténose du *K86.82*

Canal rachidien
- Lésion discale ¬ Rétrécissement du *M99.5*
- Région sacrée ¬ Sténose du *M48.08*
- Subluxation ¬ Rétrécissement du *M99.2*
- Tissu conjonctif ¬ Rétrécissement du *M99.4*
- ¬
- - Claudicatio spinalis cours sténose
- - - *M48.09†, G55.3**
- - - Lombaire du *M48.06†, G55.3**
- - Myélopathie au cours de sténose du *M48.09†, G99.2**
- - Rétrécissement osseux du *M99.3*

Canal salivaire
- Surnuméraires ¬ Glandes ou *Q38.4*
- ¬
- - Absence de glandes ou de *Q38.4*
- - Atrésie de glandes ou de *Q38.4*
- - Malformations congénitales des glandes et des *Q38.4*
- - Rétrécissement d'un *K11.8*
- - Sténose d'un *K11.8*

Canalaire ¬ Carcinome *C50.9*

Canale-Smith ¬ Syndrome de *D47.9*

Canaliculaire précalicielle ¬ Ectasie *Q61.5*

Canalicule lacrymal, lacrymonasal ¬ Sténose du: *H04.5*

Canaliculi ¬ Pili trianguli et *Q84.1*

Canaliculite
- Cours d'actinomycose ¬ *A42.8†, H06.0**
- Lacrymal
- - Aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ *H04.3*
- - Chronique ¬ *H04.4*

Canalopathie sodique ¬ Neuropathie
- Héréditaire des petites fibres due à une *G60.8*
- Petites fibres due à une *G60.8*

Canavan ¬ Maladie de *E75.2*

Cancer
- Anaplasique de la thyroïde ¬ *C73*

Cancer *–suite*
- Côlon héréditaire non polyposique [HNPCC] ¬ *C18.9, Z80.0*
- Diagnostiqué pendant la grossesse ¬ *C80.9, O99.8*
- Estomac
- - Diffus
- - - Familial ¬ *C16.9*
- - - Héréditaire ¬ *C16.9*
- - Type Borrmann 4 ¬ *C16.9*
- Familial
- - Papillaire de la thyroïde avec néoplasie rénale papillaire ¬ *C73, C64*
- - Prostate ¬ *C61*
- Folliculaire de la thyroïde ¬ *C73*
- Gastrique SAI ¬ *C16.9*
- Hématologiques associé à DDX41 ¬ Syndrome de prédisposition aux *Q99.8*
- Inflammatoire
- - Sein ¬ *C50.9*
- - ¬ *C50.9*
- Médullaire thyroïde
- - Familial ¬ *C73*
- - ¬ *C73*
- Multiples
- - SAI ¬ *C80.9*
- - ¬ *C80.9*
- Mutation bialélique du gène BRCA2 ¬ Syndrome de prédisposition héréditaire au *D61.0*
- Oligodontie ¬ Syndrome de prédisposition au *K00.0*
- Oropharyngé ¬ Télangiectasie cutanée familiale et syndrome de prédisposition au *L81.7*
- Ovaire ¬ *C56*
- Papillaire
- - Rénal héréditaire ¬ *C64*
- - Thyroïde ¬ *C73*
- Peau dû aux goudrons ¬ *C44.9*
- Poumon petites cellule
- - Bronche souche ¬ *C34.0*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C34.8*
- - ¬ *C34.9*
- Pulmonaire dû aux goudrons ¬ *C34.9*
- SAI ¬
- - *C80.9*
- - Généralisé (secondaire): *C79.9*
- Secondaires multiples SAI ¬ *C79.9*
- Sein
- - Familial ¬ *C50.9, Z80.3*
- - Héréditaire ¬ *C50.9*
- - Ovaire ¬
- - - Carcinome de l'ovaire au cours du syndrome héréditaire du *C56*
- - - Syndrome héréditaire de prédisposition au *C56, C97!, C50.9*
- - Type glande salivaire ¬ *C50.9*

Cancer *–suite*
- Verge ¬ *C60.9*
- Vessie dû aux goudrons ¬ *C67.9*
- Xanthosus [chlorome] en rémission complète ¬ *C92.31*
- ¬
- - Chimiothérapie du *P04.1*
- - Dissémination secondaire du *C79.9*

Cancer aquaticus ¬ *A69.0*

Cancer of Unknown Primary] ¬ CUP [*C80.0*

Cancéreuse secondaire ¬ Infiltration *C79.9*

Cancrum oris ¬ *A69.0*

Candida
- Auris
- - Résistant antifongiques groupe échinocandines
- - - Non résistant aux triazoles ¬ *U83.20!*
- - - Triazoles, résistant au fluconazole ¬ *U83.21!*
- - ¬ Candidose à *B37.9*
- ¬
- - Abcès à *B37.9*
- - Balanite à *B37.4†, N51.2**
- - Bronchiolite à *B37.88*
- - Bronchite à *B37.88*
- - Bronchomycose à *B37.88†, J99.8**
- - Bronchopneumonie à *B37.1†, J17.2**
- - Chéilite due à *B37.88*
- - Cystite à *B37.4†, N33.8**
- - Endocardite à *B37.6†, I39.8**
- - Entérite due à *B37.88*
- - Kératite à *B37.88†, H19.2**
- - Maladie due VIH
- - - Infection à *B20, B37.9*
- - - Rétinite à *B20†, H32.0*, B37.88*
- - Myocardite à *B37.88†, I41.2**
- - Néphrite à *B37.4†, N08.0**
- - Œsophagite à *B37.81*
- - Onyxis à *B37.2*
- - Périonyxis à *B37.2*
- - Péritonite à *B37.88†, K67.8**
- - Pneumonie à *B37.1†, J17.2**
- - Prostatite à *B37.4†, N51.0**
- - Pyélonéphrite à *B37.4†, N16.0**
- - Septicémie à *B37.7*
- - Stomatite à *B37.0*
- - Trachéite à *B37.88*
- - Urétrite à *B37.4†, N37.0**
- - Vaginite à *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite à *B37.3†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite à *B37.3†, N77.1**

Candida albicans résistant
- Antifongiques du groupe des triazoles ¬ *U83.0!*
- Fluconazole ¬ *U83.0!*
- Voriconazole ¬ *U83.0!*

Candida glabrata résistant
- Anidulafungine ¬ *U83.1!*
- Caspofungine ¬ *U83.1!*
- Échinocandines ¬ *U83.1!*
- Micafungine ¬ *U83.1!*

Candidiase ¬ *B37*

Candidide [lévuride] ¬ *L30.2*

Candidomycetica ¬
- Balanitis *B37.4†, N51.2**
- Urethritis *B37.4†, N37.0**
- Vaginitis *B37.3†, N77.1**
- Vulvovaginitis *B37.3†, N77.1**

Candidomycétique ¬ Vulvo-vaginite *B37.3†*

Candidomycose vulvo-vaginale ¬ *B37.3†, N77.1**

Candidose
- Appareil génital féminin ¬ *B37.3†, N77.1**
- Bouche ¬ Maladie due au VIH avec *B20, B37.0*
- Candida auris ¬ *B37.9*
- Chronique-maladie d'Addison ¬ Syndrome d'hypoparathyroïdie auto-immune- *E31.0*
- Cutanéo-muqueuse chronique ¬ *B37.88*
- Disséminée ¬
- - *B37.88*
- - Maladie due au VIH avec *B20, B37.88*
- Gland du pénis ¬ *B37.4†, N51.2**
- Localisations uro-génitales ¬ *B37.4*
- Néonatale ¬ *P37.5*
- Œil ¬ *B37.88†, H58.8**
- Peau ongle ¬
- - *B37.2*
- - Maladie due au VIH avec *B20, B37.2*
- Poumon ¬
- - *B37.1†, J99.8**
- - Maladie due au VIH avec *B20, B37.1*
- Pulmonaire ¬ *B37.1†, J99.8**
- Systémique ¬ *B37.88*
- Vaginale ¬ *B37.3†, N77.1**
- Vulve et du vagin ¬ *B37.3†, N77.1**
- ¬
- - Balano-posthite due à une *B37.4†, N51.2**
- - Bronchiolite due à une *B37.88*
- - Endocardite au cours de *B37.6†, I39.8**
- - Localisations de *B37.88*
- - Maladie due au VIH avec *B20, B37.9*
- - Méningite due à une *B37.5†, G02.1**
- - Otite externe au cours de *B37.2†, H62.2**
- - Otomycose au cours de *B37.88†, H62.2**
- - Pneumonie due à une *B37.1†, J17.2**
- - Trachéite due à une *B37.88*
- - Urétrite due à une *B37.4†, N37.0**
- - Vaginite due à une *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite due à une *B37.3†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite due à une *B37.3†, N77.1**

Candidosique
- Chronique récidivante ¬ Vaginite *B37.3†, N77.1**
- Gland du pénis ¬ Mycose *B37.4†, N51.2**
- Vagin ¬ Mycose *B37.3†, N77.1**
- ¬
- - Balanite *B37.4†, N51.2**
- - Bronchite *B37.88†, J99.8**
- - Bronchopneumonie *B37.1†, J17.2**
- - Méningite *B37.5†, G02.1**
- - Péritonite *B37.88†, K67.8**
- - Pneumonie *B37.1†, J17.2**
- - Pyélonéphrite *B37.4†, N16.0**
- - Vaginite *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite *B37.3†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite *B37.3†, N77.1**

CANDLE [dermatose neutrophile atypique chronique-lipodystrophie-fièvre] ¬ Syndrome *M35.8*

Canine ¬
- Abcès maxillaire
- - Extension dans la fosse *K10.21*
- - Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse *K10.20*
- Avant de la jonction prémolaire- *C04.0*

Canis ¬
- Brucellose à Brucella *A23.3*
- Infection à Brucella *A23.3*

Canitie ¬ *L67.1*

Cannabinose ¬ *J66.2*

Cannabis
- Dérivés) ¬ Intoxication: *T40.7*
- ¬
- - Intoxication
- - - *T40.7*
- - - Dérivé de *T40.7*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du *F12*

CANOMAD ¬ Syndrome *G61.8*

Cantagrel ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Canthus ¬
- Carcinoma in situ: Peau de la paupière, y compris le *D04.1*
- Mélanome
- - In situ de la paupière, y compris le *D03.1*
- - Malin
- - - Familial du *C43.1*
- - - Paupière, y compris le *C43.1*
- Nævus à mélanocytes de la paupière, y compris le *D22.1*
- Tumeur bénigne: Peau de la paupière, y compris le *D23.1*
- Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le *C44.1*

Cantonensis ¬
- Angiostrongyloïdose à Angiostrongylus *B83.2*

Cantonensis ¬ *–suite*
- Méningo-encéphalite à Angiostrongylus *B83.2†, G05.2**

Cantrell ¬ Syndrome de *Q87.8*

Cantu ¬
- Dysplasie spondylo-épiphysaire type *Q77.7*
- Ostéochondrodysplasie hypertrichotique type *Q87.3*
- Syndrome de *Q87.3*

Canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec *R13.1*

CANVAS [Syndrome d'ataxie cérébelleuse avec neuropathie et aréflexie vestibulaire bilatérale] ¬ *G11.8*

Caoutchouc ¬ *L23.5*

Cap
- Polypose ¬ *D12.6*
- ¬ Myopathie à *G71.2*

Capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant *Z74.2*

Capacité
- Respiratoire ¬ Diminution de la *R94.2*
- Vitale ¬ Diminution de la *R94.2*

Capillaire
v./v.a. Malformation capillaire
- Amyloïde ¬ Dégénérescence *E85.88†, I79.8**
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres atteintes des artères, artérioles et *I79.8**
- Familial ¬ Hémangiome *D18.00*
- Héréditaire) ¬ Fragilité *D69.88*
- Idiopathique ¬ Purpura due à une fragilité *D69.88*
- Primitif ¬ Saignement *D69.88*
- Pulmonaire ¬ Hémangiomatose *I27.28, D18.00*
- Sans précision ¬
  - Anomalie de la pigmentation et de la gaine *L67.9*
  - Maladie des *I78.9*
  - ¬
    - Anomalies de la pigmentation et de la gaine *L67.8*
    - Fragilité
      - *L67.8*
      - Congénitale des *D69.88*
    - Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations *T49.4*
    - Lymphangiome *D18.19*
    - Maladies des *I78.8*
    - Malformation lymphatique *D18.19*
    - Syndrome de fuite *I78.8*
    - Transplantation *Z41.8*

Capillaria phyilippinensis ¬ Infection à *B81.1*

Capillariose
- Hépatique ¬ *B83.8*
- Intestinale ¬ *B81.1*
- SAI ¬ *B81.1*

Capillarite pulmonaire isolée ¬ *J84.00*

Capillary leak syndrome ¬ *I78.8*

Capillitii ¬
- Mycosis *B35.0*
- Tinea *B35.0*

Capitis
- Abscedens suffodien
  - Hoffmann] ¬ Folliculite et périfolliculite *L66.3*
  - ¬ Maladie de Hoffmann [folliculitis et perifolliculitis *L66.3*
  - ¬
    - Pédiculose due à Pediculus humanus *B85.0*
    - Trichophytia *B35.0*

Capito
v./v.a. acro-capito-fémorale

Caplan-Colinet ¬ Syndrome de *M05.19†, J99.0**

Capnocytophaga canimorsus ¬ Infection à *B88.8*

CAPOS ¬ Syndrome *G11.8*

Capsulaire
v./v.a. Ligament capsulaire
- Postérieure ¬ Cataracte cortico-nucléaire et *H26.88*
- Pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ Glaucome
  - *H40.10*
  - Primitif *H40.10*
- Résiduel avec pseudo-exfoliation du cristallin ¬ Glaucome primaire *H40.10*
- Sein due à une prothèse ou un implant mammaire ¬ Fibrose *T85.82*
- ¬
  - Déchirure *S37.02*
  - Glaucome *H40.18*

Capsulatum ¬
- Histoplasmose
  - Disséminée à Histoplasma *B39.38*
  - Histoplasma *B39.4*
  - Pulmonaire
    - Aiguë à Histoplasma *B39.0†, J99.8**
    - Chronique à Histoplasma *B39.1†, J99.8**
- Septicémie à Histoplasma *B39.30*

Capsule
- Bassinet du rein ¬ Déchirure de la *S37.02*
- Labyrinthique ¬ Otosclérose intéressant la: *H80.2*
- Rate, sans atteinte plus importante du parenchyme ¬ Déchirure de la *S36.02*
- SAI ¬
  - Arrachement de articulation (*T14.3*
  - Déchirure traumatique de articulation (*T14.3*
  - Entorse de articulation (*T14.3*
  - Foulure de articulation (*T14.3*
  - Hémarthrose traumatique de articulation (*T14.3*

Capsule *–suite*
- SAI ¬ *–suite*
  - Lacération de articulation (*T14.3*
  - Rupture traumatique de articulation (*T14.3*
  - Subluxation traumatique de articulation (*T14.3*

Capsulite
- Rétractile de l'épaule ¬ *M75.0*
- SAI ¬ *M77.9*

Captation de la carnitine cellulaire ¬ Défaut de *E71.3*

Captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*

Caractère
- SAI ¬ Névrose de *F60.9*
- Soupçonneux et évasif ¬ *R46.5*

Caractériel SAI ¬ Trouble: *F68.8*

Caraïbes ¬ Parkinsonisme atypique des *G21.2*

CARASAL [Artériopathie-infarctus cérébraux-leucoencéphalopathie liée à la cathepsine A] ¬ *I67.88*

CARASIL [Artériopathie cérébrale autosomique récessive-infarctus sous-cortical-leucoencéphalopathie] ¬ *I67.88*

Caraté ¬
- Chancre (initial) de la pinta [*A67.0*
- Hyperkératose de la pinta [*A67.1*
- Lésions
  - Cutané
    - Achromique
      - Lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [*A67.3*
    - Pinta [*A67.2*
  - Cicatricielles de la pinta [*A67.2*
  - Dyschromiques de la pinta [*A67.2*
  - Hyperchromiques de la pinta [*A67.1*
- Papule (initiale) de la pinta [*A67.0*
- Plaques érythémateuses de la pinta [*A67.1*

Carbamates ¬ Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et *T60.0*

Carbamazépine ¬
- *T42.1*
- Embryofœtopathie à la *Q86.88*
- Intoxication à la *T42.1*

Carbamoyl-phosphate synthétase
- I ¬ Déficit en *E72.2*
- ¬ Déficit en *E72.2*

Carbamoyltransférase ¬ Déficit en ornithine *E72.4*

Carbone
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des hydrates de *E74.9*
- Type Iif ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- ¬
  - Anomalies

Carbone *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anomalies *–suite*
- - - Absorption intestinale des hydrates de *E74.3*
- - - Précisées du métabolisme des hydrates de *E74.8*
- - Démence au cours d'intoxication au dioxyde de *T58†, F02.8**
- - Dioxyde de *T41.5*
- - Effet toxique
- - - Dioxyde de *T59.7*
- - - Monoxyde de *T58*
- - - Sulfure de *T65.4*
- - - Tétrachlorure de *T53.0*
- - Encéphalopathie différée par intoxication au monoxyde de *T58†, G94.39**
- - Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: déplétion des hydrates de *O21.1*
- - Intoxication au dioxyde de *T41.5*
- - Séquelles d'intoxication au monoxyde de *T97*
- - Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - Trouble de l'absorption intestinale des hydrates de *E74.3*

Carbonique
- Benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase *T50.2*
- VA ¬ Encéphalopathie hyperammoniémique par déficit en anhydrase *E74.8†, G94.30**
- XII ¬ Déficit en anhydrase *E74.8*

Carboxamide ribosidurie ¬ 5-amino-4-imidazole *E79.8*

Carboxykinase phosphoénolpyruvate ¬ Déficit en: *E74.4*

Carboxylase
- Biotine-dépendante ¬ Déficit en *D81.8*
- Dépendant de la biotine ¬ Déficit en *D81.8*
- ¬
- - Déficience en phosphoribosylaminoimidazole *E79.8*
- - Déficit
- - - 3-méthylcrotonyl-CoA *E71.1*
- - - Multiple en *E53.8*
- - - Propionyl-CoA *E71.1*
- - - Pyruvate: *E74.4*

Carboxylate
v./v.a. pyrroline-5-carboxylate

Carburant halogéné ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*

Carcinofibrome
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Fond de l'utérus ¬ *C54.3*
- Isthme de l'utérus ¬ *C54.0*
- L 'endomètre ¬ *C54.1*
- Myomètre ¬ *C54.2*

Carcinoïde
- Héréditaire
- - Duodénum ¬ Tumeur *C17.0*
- - Iléon ¬ Tumeur *C17.2*
- - Intestin grêle
- - - Localisations contiguës ¬ Tumeur *C17.8*
- - - ¬ Tumeur *C17.9*
- - Jéjunum ¬ Tumeur *C17.1*
- Iléal ¬ *C17.2*
- Intestin grêle ¬ *C17.9*
- Métastatique de l'intestin grêle ¬ *C17.9*
- Poumon ¬ *C34.9*
- Productrice mucus
- - Appendice ¬ Tumeur *C18.1*
- - Poumons ¬ Tumeur *C34.9*
- Type adénome bronchique ¬ *C34.9*
- ¬ Syndrome
- - *E34.0*
- - Biörck-Thorson [syndrome *E34.0*

Carcinoma in situ
- Intracanalaire ¬ *D05.1*
- Lobulaire ¬ *D05.0*
- Sans précision ¬ *D09.9*
- Sein, sans précision ¬ *D05.9*
- Sièges précisés ¬ *D09.7*
- Vulve ¬ *D07.1*

Carcinomateux ¬
- Kyste *C80.9*
- Neuropathie *C80.9†, G13.0**
- Pleurésie *C78.2*

Carcinomatose
- Péritonéale ¬ *C78.6*
- Secondaire) SAI ¬ *C79.9*

Carcinome
- Acidophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Adrénocortical ¬ *C74.0*
- Ampoule de Vater ¬ *C24.1*
- Amygdales pharyngiennes ¬ *C11.1*
- Angle
- - Droit du côlon au cours du syndrome de Lynch ¬ *C18.3*
- - Gauche du côlon au cours du syndrome de Lynch ¬ *C18.5*
- Antre pylorique au cours du syndrome de Lynch ¬ *C16.3*
- Appendice au cours de syndrome de Lynch ¬ *C18.1*
- Basophile
- - Éosinophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- - Hypophyse ¬ *C75.1*
- Canal cholédoque ¬ *C24.0*
- Canalaire ¬ *C50.9*
- Cardia
- - Associé au virus d'Epstein-Barr ¬ *C16.0*
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ *C16.0*
- Cellule
- - C ¬ *C73*

Carcinome *–suite*
- Cellule *–suite*
- - Grains d'avoine ¬ *C34.9*
- - Rénales
- - - Associé syndrome
- - - - Birt-Hogg-Dubé ¬ *C64, Q85.8*
- - - - Prédisposition tumorale liée
- - - - - Gène BAP1 ¬ *C64*
- - - - - MITF ¬ *C64*
- - - ¬
- - - - Léiomyomatose héréditaire avec *C64, D21.9*
- - - - Néphropathie kystique acquise associée à un *C64, N28.1*
- Cholangiocellulaire ¬ *C22.1*
- Cholédoque ¬ *C24.0*
- Chromophobe de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Côlon
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ *C18.9*
- - Localisations contiguës au cours du syndrome de Lynch ¬ *C18.8*
- Côlon ascendant au cours du syndrome de Lynch ¬ *C18.2*
- Côlon descendant au cours du syndrome de Lynch ¬ *C18.6*
- Côlon sigmoïde au cours du syndrome de Lynch ¬ *C18.7*
- Côlon transverse au cours du syndrome de Lynch ¬ *C18.4*
- Colorectal
- - Cours syndrome
- - - Déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements ¬ *C19*
- - - Lynch ¬ *C19*
- - Familial de type X ¬ *C19*
- Corps
- - Estomac
- - - Associé au virus d'Epstein-Barr ¬ *C16.2*
- - - Cours du syndrome de Lynch ¬ *C16.2*
- - Pancréas au cours de syndrome de Lynch ¬ *C25.1*
- Corticosurrénalien à hypersécrétion pure d'aldostérone ¬ *C74.0, E26.0*
- Cutané de l'aisselle ¬ *C44.59*
- Diaphragme ¬ *C49.3*
- Diffus héréditaire
- - Cardia ¬ *C16.0*
- - Corps de l'estomac ¬ *C16.2*
- Duodénum au cours du syndrome de Lynch ¬ *C17.0*
- Embryonnaire
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Encéphale ¬
- - - *C71.0*
- - - *C71.9*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*

Carcinome *–suite*
- Embryonnaire *–suite*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Non localisé au système nerveux central ¬ *C80.9*
- - Noyaux gris centraux ¬ *C71.0*
- - Ovaire ¬ *C56*
- - Région pinéale ¬ *C75.3*
- - Système nerveux central ¬ *C72.9*
- - Testicule
- - - Descendu ¬ *C62.1*
- - - Non descendu ¬ *C62.0*
- - - ¬ *C62.9*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - ¬ *C80.9*
- Endomètre au cours du syndrome de Lynch ¬ *C54.1*
- Endométrioïde de l'ovaire ¬ *C56*
- Éosinophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Familial
- - Canal pancréatique ¬ *C25.3*
- - Col du pancréas ¬ *C25.7*
- - Corps du pancréas ¬ *C25.1*
- - Pancréas, à localisations contiguës ¬ *C25.8*
- - Queue du pancréas ¬ *C25.2*
- - Tête du pancréas ¬ *C25.0*
- Foie
- - Précisés ¬ Autres *C22.7*
- - Voies biliaires intrahépatiques ¬ *C22.0, C22.1*
- Fundus au cours de syndrome de Lynch ¬ *C16.1*
- Gastrique
- - Associé au virus Epstein-Barr ¬ *C16.9*
- - Cirrhotique ¬ Linite plastique au cours de *C16.9*
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ *C16.9*
- - Diffus ¬ *C16.9*
- - Héréditaire diffus à localisations contiguës ¬ *C16.8*
- Glande parotide ¬ *C07*
- Grande courbure de l'estomac au cours du syndrome de Lynch ¬ *C16.6*
- Grandes lèvres ¬ *C51.0*
- Hépatique embryonnaire ¬ *C22.7*
- Hépato-cholangio-cellulaire combiné ¬ *C22.0*
- Hypophysaire à cellules mucoïdes ¬ *C75.1*
- Iléon au cours du syndrome de Lynch ¬ *C17.2*
- In situ du sein ¬ Autres *D05.7*
- Intestin grêle cours syndrome
- - Déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements ¬ *C17.9*
- - Lynch ¬ *C17.9*

Carcinome *–suite*
- Intracanalaire
- - Papillaire mucineux pancréas ¬
- - - *C25.3*
- - - TIPMP [*C25.3*
- - Prostate [IDC-P] ¬ *C61*
- - Tubulopapillaire
- - - Canal pancréatique ¬ *C25.3*
- - - Pancréas] ¬ ITPN [*C25.3*
- Jéjunum au cours du syndrome de Lynch ¬ *C17.1*
- Jonction duodéno-jéjunale au cours du syndrome de Lynch ¬ *C17.8*
- Ligne médian NUT Nuclear protein in testis
- - Base de la langue ¬ *C01*
- - Cou ¬ *C76.0*
- - Médiastin
- - - Antérieur ¬ *C38.1*
- - - Postérieur ¬ *C38.2*
- - - ¬ *C38.3*
- - Rein ¬ *C64*
- - Rhinopharynx ¬ *C11.9*
- - Sinus
- - - Ethmoïdal ¬ *C31.1*
- - - Frontal ¬ *C31.2*
- - - Sphénoïdal ¬ *C31.3*
- - Thorax ¬ *C76.1*
- - Vessie ¬ *C67.9*
- - Vulve ¬ *C51.9*
- - ¬ *C80.9*
- Localisations contiguës de l'œsophage ¬ *C15.8*
- Lympho-épithélial-like
- - Estomac ¬ *C16.9*
- - Peau du cuir chevelu ¬ *C44.4*
- - Poumon ¬ *C34.9*
- - Thymus ¬ *C37*
- - ¬ *C80.9*
- Mamelon de type glande salivaire ¬ *C50.0*
- Mammaire
- - Invasif à récepteurs hormonaux positifs ¬ *C50.9*
- - Type glande salivaire, à localisations contiguës ¬ *C50.8*
- Marge anale ¬ *C44.50*
- Mixte
- - Acidophile et basophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- - Basophile et acidophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Mucineux
- - Corps glandulaire central du sein ¬ *C50.1*
- - Mamelon ¬ *C50.0*
- - Prolongement axillaire du sein ¬ *C50.6*
- - Quadrant
- - - Inféro-externe du sein ¬ *C50.5*
- - - Inféro-interne du sein ¬ *C50.3*

Carcinome *–suite*
- Mucineux *–suite*
- - Quadrant *–suite*
- - - Supéro-externe du sein ¬ *C50.4*
- - - Supéro-interne du sein ¬ *C50.2*
- - Sein
- - - Localisations contiguës ¬ *C50.8*
- - - ¬ *C50.9*
- Nasopharyngé
- - Localisations contiguës ¬ *C11.8*
- - ¬ *C11.9*
- Non
- - Médullaire familial de la thyroïde ¬ *C73*
- - Papillaire
- - - Cellule transitionnelle
- - - - Col vésical ¬ *C67.5*
- - - - Dôme de la vessie ¬ *C67.1*
- - - - Orifice urétéral ¬ *C67.6*
- - - - Ouraque ¬ *C67.7*
- - - - Paroi
- - - - - Antérieure de la vessie ¬ *C67.3*
- - - - - Latérale de la vessie ¬ *C67.2*
- - - - - Postérieure de la vessie ¬ *C67.4*
- - - - Trigone de la vessie ¬ *C67.0*
- - - Vessie à cellules transitionnelles ¬ *C67.9*
- Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*
- Œsophage
- - Abdominal de type glande salivaire ¬ *C15.2*
- - Cervical, type glande salivaire ¬ *C15.0*
- - Distal ¬ *C15.5*
- - Thoracique, type glande salivaire ¬ *C15.1*
- - Type glande salivaire
- - - Localisations contiguës ¬ *C15.8*
- - - ¬ *C15.9*
- - ¬ *C15.9*
- Ovaire cours syndrome
- - Déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements ¬ *C56*
- - Héréditaire du cancer du sein et de l'ovaire ¬ *C56*
- - Lynch ¬ *C56*
- Pancréas cours syndrome Lynch
- - Localisations contiguës ¬ *C25.8*
- - ¬ *C25.9*
- Pancréatique familial ¬ *C25.9*
- Parafolliculaire de la thyroïde ¬ *C73*
- Parathyroïdien à cellules eau de roche ¬ *C75.0*
- Paroi gastrique
- - Antérieure au cours du syndrome de Lynch ¬ *C16.8*
- - Postérieure au cours du syndrome de Lynch ¬ *C16.8*
- Partie centrale du sein de type salivaire ¬ *C50.1*
- Peau

Carcinome *–suite*
- Peau *–suite*
- - Anale ¬ *C44.50*
- - Dos ¬ *C44.59*
- - Fesse ¬ *C44.59*
- - Paroi abdominale ¬ *C44.59*
- - Périnée ¬ *C44.50*
- - ¬ Syndrome d'anomalie de pigmentation-kératodermie palmoplantaire- *C44.9, Q82.8*
- Péri-ampullaire ¬ *C26.9*
- Périanal ¬ *C44.50*
- Péritonéal primaire ¬ *C48.2*
- Petite courbure de l'estomac au cours du syndrome de Lynch ¬ *C16.5*
- Petites lèvres ¬ *C51.1*
- Pilomatriciel
- - Cou ¬ *C44.4*
- - Membres supérieurs ¬ *C44.6*
- - Peau de la face ¬ *C44.3*
- - Tête ¬ *C44.4*
- - Tronc ¬ *C44.59*
- - ¬ *C44.9*
- Plexus choroïdes ¬ *C71.5*
- Prolongement axillaire du sein de type glande salivaire ¬ *C50.6*
- Prostate au cours de syndrome de Lynch ¬ *C61*
- Pseudo-papillaire solide
- - Col du pancréas ¬ *C25.7*
- - Corps du pancréas ¬ *C25.1*
- - Localisations contiguës du pancréas ¬ *C25.8*
- - Pancréas ¬ *C25.9*
- - Queue du pancréas ¬ *C25.2*
- - Tête du pancréas ¬ *C25.0*
- Pylore au cours du syndrome de Lynch ¬ *C16.4*
- Quadrant
- - Inféro-externe du sein de type glande salivaire ¬ *C50.5*
- - Inféro-interne du sein de type glande salivaire ¬ *C50.3*
- - Supéro-externe du sein de type glande salivaire ¬ *C50.4*
- - Supéro-interne du sein de type glande salivaire ¬ *C50.2*
- Queue du pancréas au cours du syndrome de Lynch ¬ *C25.2*
- Région rhinopharyngée postérieure ¬ *C11.1*
- SAI ¬ *C80.9*
- Sébacé de la paupière ¬ *C44.1*
- Sein héréditaire ¬ *C50.9*
- Séreux
- - L 'endomètre ¬ *C54.1*
- - Papillaire primitif du péritoine ¬ *C48.2*
- Spinocellulaire ¬ Syndrome de kératodermie palmoplantaire-ambiguïté sexuelle XX-prédisposition au *Q56.0, Q82.8*

Carcinome *–suite*
- Tête du pancréas au cours du syndrome de Lynch ¬ *C25.0*
- Thymique ¬ *C37*
- Thyroïde ¬ *C73*
- Tiers
- - Inférieur œsophage
- - - Type glande salivaire ¬ *C15.5*
- - - ¬ *C15.5*
- - Moyen œsophage
- - - Type glande salivaire ¬ *C15.4*
- - - ¬ *C15.4*
- - Supérieur œsophage
- - - Type glande salivaire ¬ *C15.3*
- - - ¬ *C15.3*
- Tubes collecteurs ¬ *C64*
- Urothélial
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ *C68.9*
- - Voies supérieures ¬ *C68.9*
- Végétations adénoïdes ¬ *C11.1*
- Vésico-vaginal ¬ *C57.9*
- Voies biliaires intra et extrahépatiques ¬ *C24.8*
- Vulve, lésion à localisations contiguës ¬ *C51.8*
- ¬ Rétinopathie associée à un *C80.9†, H36.8**

Carcinome à cellules acineuses
- Col du pancréas ¬ *C25.7*
- Corps du pancréas ¬ *C25.1*
- Localisations contiguës du pancréas ¬ *C25.8*
- Pancréas ¬ *C25.9*
- Queue du pancréas ¬ *C25.2*
- Tête du pancréas ¬ *C25.0*

Carcinome à cellules de Merkel
- Cuir chevelu ¬ *C44.4*
- Face cutanée de la lèvre ¬ *C44.0*
- Paupière ¬ *C44.1*
- Peau
- - Cou ¬ *C44.4*
- - Face ¬ *C44.3*
- - Hanche ¬ *C44.7*
- - L 'épaule ¬ *C44.6*
- - Membre supérieur ¬ *C44.6*
- - Membres inférieurs ¬ *C44.7*
- - Oreille ¬ *C44.2*
- - Tronc ¬ *C44.59*
- - ¬ *C44.9*

Carcinome à cellules transitionnelles
- Bassinet ¬ *C65*
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Endomètre ¬ *C54.1*
- Uretère ¬ *C66*
- - ¬ *C68.9*

Carcinome à cellules vitreuses
- Col de l'utérus ¬ *C53.9*

Carcinome à cellules vitreuses *–suite*
- Endocol ¬ *C53.0*
- Exocol ¬ *C53.1*
- Jonction cervico-vaginale ¬ *C53.8*

Carcinome à petites cellules
- Col vésical ¬ *C67.5*
- Dôme de la vessie ¬ *C67.1*
- Orifice urétéral ¬ *C67.6*
- Ouraque ¬ *C67.7*
- Ovaire ¬ *C56*
- Paroi
- - Antérieure de la vessie ¬ *C67.3*
- - Latérale de la vessie ¬ *C67.2*
- - Postérieure de la vessie ¬ *C67.4*
- Trigone de la vessie ¬ *C67.0*
- Vessie, lésion à localisations contiguës ¬ *C67.8*

Carcinome adénoïde
- Basal
- - Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- - Endocol ¬ *C53.0*
- - Exocol ¬ *C53.1*
- Kystique
- - Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- - Endocol ¬ *C53.0*
- - Exocol ¬ *C53.1*
- - Jonction cervico-vaginale ¬ *C53.8*

Carcinome améloblastique
- Mandibule ¬ *C41.1*
- Maxillaire supérieur ¬ *C41.02*
- - ¬ *C41.1*

Carcinome basocellulaire
- Adénoïde de la jonction cervico-vaginale ¬ *C53.8*
- Clitoris ¬ *C51.2*
- Cours de syndrome de Gorlin-Goltz ¬ *C44.9, Q85.8*
- Grandes lèvres ¬ *C51.0*
- Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche ¬ *C04.8*
- Lèvre ¬ *C44.0*
- Muqueux
- - Buccal ¬ *C06.0*
- - Joue ¬ *C06.0*
- Petites lèvres ¬ *C51.1*
- Plancher
- - Antérieur de la bouche ¬ *C04.0*
- - Latéral de la bouche ¬ *C04.1*
- Région rétromolaire ¬ *C06.2*
- Voile du palais ¬ *C05.1*
- Voûte palatine ¬ *C05.0*
- Vulve
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C51.8*
- - ¬ *C51.9*

Carcinome bronchique
- Atteinte de plusieurs localisations contiguës ¬ *C34.8*

Carcinome bronchique *–suite*
- Bronche souche ¬ *C34.0*
- Lobe moyen ¬ *C34.2*
- Petites cellule
- - Lobe pulmonaire
- - - Inférieur ¬ *C34.3*
- - - Moyen ¬ *C34.2*
- - - Supérieur ¬ *C34.1*
- - Rétinopathie paranéoplasique ¬ *C34.9†, H36.8**

Carcinome épidermoïde
- Amygdale linguale ¬ *C02.4*
- Angle
- - Droit du côlon ¬ *C18.3*
- - Gauche du côlon ¬ *C18.5*
- Base de la langue ¬ *C01*
- Cæcum ¬ *C18.0*
- Canal anal ¬ *C21.1*
- Canal pylorique ¬ *C16.4*
- Cardia ¬ *C16.0*
- Cavité orale ¬ *C06.9*
- Clitoris ¬ *C51.2*
- Col
- - Cervical ¬ *C53.9*
- - Pancréas ¬ *C25.7*
- Col de l'utérus, lésion à localisations contiguës ¬ *C53.8*
- Côlon ¬ *C18.9*
- Côlon ascendant ¬ *C18.2*
- Côlon descendant ¬ *C18.6*
- Côlon sigmoïde ¬ *C18.7*
- Côlon transverse ¬ *C18.4*
- Commissure des lèvres ¬ *C00.6*
- Corps
- - Estomac ¬ *C16.2*
- - Pancréas ¬ *C25.1*
- - Utérus ¬ *C54.9*
- - Verge ¬ *C60.2*
- Diverticule de Meckel ¬ *C17.3*
- Duodénum ¬ *C17.0*
- Endocol ¬ *C53.0*
- Endomètre ¬ *C54.1*
- Épiglotte ¬ *C32.1*
- Estomac ¬ *C16.9*
- Exocol ¬ *C53.1*
- Extérieur de la lèvre ¬ *C00.2*
- Face
- - Antérieure de l'épiglotte ¬ *C10.1*
- - Dorsale de la langue ¬ *C02.0*
- - Inférieure de la langue ¬ *C02.2*
- - Interne lèvre
- - - Inférieure ¬ *C00.4*
- - - Supérieure ¬ *C00.3*
- - - ¬ *C00.5*
- Foie et des voies biliaires intrahépatiques ¬ *C22.0, C22.1*

Carcinome épidermoïde *–suite*
- Fosses nasales et des sinus paranasaux ¬ *C30.0*
- Fundus ¬ *C16.1*
- Gland ¬ *C60.1*
- Glotte ¬ *C32.0*
- Grande courbure de l'estomac ¬ *C16.6*
- Grandes lèvres ¬ *C51.0*
- Hypopharynx
- - Postérocricoïde ¬ *C13.0*
- - ¬ *C13.9*
- I antre
- - Estomac ¬ *C16.3*
- - Pylorique ¬ *C16.3*
- Iléon ¬ *C17.2*
- Intestin grêle ¬ *C17.9*
- Jéjunum ¬ *C17.1*
- Jonction
- - Duodéno-jéjunale ¬ *C17.8*
- - Œsophago-gastrique ¬ *C16.0*
- Kyste branchial ¬ *C10.4*
- Langue
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C02.8*
- - Mobile ¬ *C02.9*
- - ¬ *C02.9*
- Larynx
- - Localisations contiguës ¬ *C32.8*
- - ¬ *C32.9*
- Lésion à localisations contiguës de l'œsophage ¬ *C15.8*
- Lèvre
- - Inférieure
- - - Bord libre ¬ *C00.1*
- - - ¬ *C00.1*
- - Supérieure externe ¬ *C00.0*
- - ¬ *C00.9*
- Localisations contiguës
- - Hypopharynx ¬ *C13.8*
- - Lèvre ¬ *C00.8*
- - Oropharynx ¬ *C10.8*
- - Pancréas ¬
- - - *C18.8*
- - - *C25.8*
- Muqueuse de la joue ¬ *C06.0*
- Œsophage
- - Abdominal ¬ *C15.2*
- - Cervical ¬
- - - *C15.0*
- - - *C15.1*
- - ¬ *C15.9*
- Orifice œsophagien de l'estomac ¬ *C16.0*
- Oropharyngé ¬ *C10.9*
- Pancréas ¬ *C25.9*
- Paroi
- - Gastrique
- - - Antérieure ¬ *C16.8*

Carcinome épidermoïde *–suite*
- Paroi *–suite*
- - Gastrique *–suite*
- - - Postérieure ¬ *C16.8*
- - Latérale de l'oropharynx ¬ *C10.2*
- - Postérieure
- - - Hypopharynx ¬ *C13.2*
- - - Oropharynx ¬ *C10.3*
- Partie sous-glottique ¬ *C32.2*
- Petite courbure de l'estomac ¬ *C16.5*
- Petites lèvres ¬ *C51.1*
- Pointe et bords latéraux de la langue ¬ *C02.1*
- Prépuce ¬ *C60.0*
- Prépylore ¬ *C16.4*
- Pur
- - Col de l'appareil urinaire ¬ *C68.9*
- - Col vésical ¬ *C67.5*
- - Dôme de la vessie ¬ *C67.1*
- - Orifice urétéral ¬ *C67.6*
- - Paroi
- - - Antérieure de la vessie ¬ *C67.3*
- - - Latérale de la vessie ¬ *C67.2*
- - - Postérieure de la vessie ¬ *C67.4*
- - Trigone vésical ¬ *C67.0*
- - Urètre ¬ *C68.0*
- - Vessie
- - - Localisations contiguës ¬ *C67.8*
- - - ¬ *C67.9*
- Pylore ¬ *C16.4*
- Queue du pancréas ¬ *C25.2*
- Rectum ¬ *C20*
- Région rétromolaire ¬ *C06.2*
- Repli ary-épiglottique ¬ *C13.1*
- Sinus
- - Ethmoïdal ¬ *C31.1*
- - Face, à localisations contiguës ¬ *C31.8*
- - Frontal ¬ *C31.2*
- - Maxillaire ¬ *C31.0*
- - Piriforme ¬ *C12*
- - Sphénoïdal ¬ *C31.3*
- - ¬ *C31.9*
- Tête du pancréas ¬ *C25.0*
- Tiers
- - Inférieur de l'œsophage ¬ *C15.5*
- - Moyen de l'œsophage ¬ *C15.4*
- - Supérieur de l'œsophage ¬ *C15.3*
- Vagin ¬ *C52*
- Verge
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C60.8*
- - ¬ *C60.9*
- Vésicule biliaire
- - Voies biliaires extrahépatiques ¬ *C23, C24.0*
- - ¬ *C23*
- Vestibule de la bouche ¬ *C06.1*

Carcinome épidermoïde *–suite*
- Voies biliaires extra-hépatiques ¬ *C24.0*
- Vulve
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C51.8*
- - ¬ *C51.9*

Carcinome hépatocellulaire
- Cours du syndrome de Ruijs-Aalfs ¬ *C22.0, Q87.8*
- Fibrolamellaire ¬ *C22.0*
- Lympho-épithélial-like ¬ *C22.0*
- ¬ CHC [*C22.0*

Carcinome héréditaire
- Aréole ¬ *C50.0*
- Diffus
- - Antre de l'estomac ¬ *C16.3*
- - Fundus ¬ *C16.1*
- - Grande courbure de l'estomac ¬ *C16.6*
- - Petite courbure de l'estomac ¬ *C16.5*
- - Pylore ¬ *C16.4*
- Mamelon ¬ *C50.0*
- Non polypeux
- - Angle
- - - Droit du côlon ¬ *C18.3*
- - - Gauche du côlon ¬ *C18.5*
- - Cæcum ¬ *C18.0*
- - Côlon ascendant ¬ *C18.2*
- - Côlon descendant ¬ *C18.6*
- - Côlon sigmoïde ¬ *C18.7*
- - Côlon transverse ¬ *C18.4*
- - Côlon, à localisations contiguës ¬ *C18.8*
- Partie centrale du sein ¬ *C50.1*
- Prolongement axillaire du sein ¬ *C50.6*
- Quadrant
- - Inféro-externe du sein ¬ *C50.5*
- - Inféro-interne du sein ¬ *C50.3*
- - Supéro-externe du sein ¬ *C50.4*
- - Supéro-interne du sein ¬ *C50.2*
- Sein, à localisations contiguës ¬ *C50.8*

Carcinome in situ
- Anus et canal anal ¬ *D01.3*
- Appareil respiratoire, sans précision ¬ *D02.4*
- Bronches et poumon ¬ *D02.2*
- Col de l'utérus, sans précision ¬ *D06.9*
- Côlon ¬ *D01.0*
- Endocol ¬ *D06.0*
- Endomètre ¬ *D07.0*
- Estomac ¬ *D00.2*
- Exocol ¬ *D06.1*
- Foie, vésicule et voies biliaires ¬ *D01.5*
- Jonction recto-sigmoïdienne ¬ *D01.1*
- Larynx ¬ *D02.0*
- Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ *D00.0*
- Œil ¬ *D09.2*
- Œsophage ¬ *D00.1*
- Organe digestif
- - Précisés ¬ *D01.7*

Carcinome in situ *–suite*
- Organe digestif *–suite*
- - Sans précision ¬ *D01.9*
- Organe génital
- - Femme, autres et non précisés ¬ *D07.3*
- - Homme, autres et non précisés ¬ *D07.6*
- Organes urinaires, autres et non précisés ¬ *D09.1*
- Parties
- - Appareil respiratoire ¬ *D02.3*
- - Col de l'utérus ¬ *D06.7*
- - Intestin, autres et non précisées ¬ *D01.4*
- Peau
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *D04.4*
- - Lèvre ¬ *D04.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D04.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D04.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D04.2*
- - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D04.3*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *D04.1*
- - Sans précision ¬ *D04.9*
- - Sièges ¬ *D04.8*
- - Tronc ¬ *D04.5*
- Prostate ¬ *D07.5*
- Rectum ¬ *D01.2*
- Thyroïde et autres glandes endocrines ¬ *D09.3*
- Trachée ¬ *D02.1*
- Vagin ¬ *D07.2*
- Verge ¬ *D07.4*
- Vessie ¬ *D09.0*
- Vulve ¬ *D07.1*

Carcinome indifférencié
- Cardia ¬ *C16.0*
- Cellule géante type ostéoclastique
- - Col du pancréas ¬ *C25.7*
- - Corps du pancréas ¬ *C25.1*
- - Pancréas ¬ *C25.9*
- - Queue du pancréas ¬ *C25.2*
- - Tête du pancréas ¬ *C25.0*
- Corps de l'estomac ¬ *C16.2*
- Endomètre ¬ *C54.1*
- Estomac ¬ *C16.9*
- Foie et des voies biliaires intrahépatiques ¬ *C22.9, C22.1*
- Fundus ¬ *C16.1*
- Grande courbure de l'estomac ¬ *C16.6*
- l'antre pylorique ¬ *C16.3*
- Localisations contiguës
- - Estomac ¬ *C16.8*
- - Œsophage ¬ *C15.8*
- Œsophage
- - Abdominal ¬ *C15.2*
- - Cervical ¬ *C15.0*

Carcinome indifférencié *–suite*
- Œsophage *–suite*
- - Thoracique ¬ *C15.1*
- - ¬ *C15.9*
- Pancréas Cellule géante type ostéoclastique
- - Localisations contiguës ¬ *C25.8*
- - ¬ *C25.9*
- Petite courbure de l'estomac ¬ *C16.5*
- Pylore ¬ *C16.4*
- Tiers
- - Inférieur de l'œsophage ¬ *C15.5*
- - Moyen de l'œsophage ¬ *C15.4*
- - Supérieur de l'œsophage ¬ *C15.3*

Carcinome métaplasique
- Deux quadrant
- - Externes du sein ¬ *C50.8*
- - Internes du sein ¬ *C50.8*
- Partie centrale du sein ¬ *C50.1*
- Prolongement axillaire du sein ¬ *C50.6*
- Quadrant
- - Inféro-externe du sein ¬ *C50.5*
- - Inféro-interne du sein ¬ *C50.3*
- - Supéro-externe du sein ¬ *C50.4*
- - Supéro-interne de la glande mammaire ¬ *C50.2*
- Sein ¬ *C50.9*

Carcinome neuroendocrine
- Cellules insulaires du pancréas ¬ *C25.4*
- Cervical peu différencié ¬ *C53.9*
- Côlon ¬ *C18.9*
- Cutané ¬ *C44.9*
- Hépatique primaire ¬ *C22.7*
- Mal différencié
- - Corps utérin ¬ *C54.9*
- - Endomètre ¬ *C54.1*
- - Jonction cervico-vaginale ¬ *C53.8*
- Pancréas ¬ *C25.4*
- Peu différencié
- - Endocol ¬ *C53.0*
- - Exocol ¬ *C53.1*
- Thymique bien différencié ¬ *C37*
- ¬ *C80.9*

Carcinome papillaire
- Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Kystique de l'ovaire ¬ *C56*

Carcinome pulmonaire
- Non à petites cellules ¬ *C34.9*
- Petites cellules ¬ *C34.9*
- Sur cicatrice ¬ *C34.9*

Carcinome rénal
- Associé à une translocation de la famille MiT ¬ *C64*
- Cellules claires ¬ *C64*
- Chromophobe ¬ *C64*
- Héréditaire à cellules claires ¬ *C64*

Carcinome rénal *–suite*
- Médullaire ¬ *C64*
- Mélanome associé à MITF ¬ Syndrome de prédisposition au *Q99.8*
- Papillaire
- - Cellules claires ¬ *C64*
- - ¬ *C64*
- Tubulokystique ¬ *C64*
- Tubulo-mucineux à cellules fusiformes ¬ *C64*
- ¬
- - *C64*
- - RCC [*C64*

Carcinosarcome
- Col de l'utérus
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C53.8*
- - ¬ *C53.9*
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Endocol ¬ *C53.0*
- Exocol ¬ *C53.1*

CARD11 ¬ Déficit
- *D81.8*
- Immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

CARD9 ¬ Prédisposition aux infections fongiques invasives par déficit en *D84.8*

Cardia
- Associé au virus d'Epstein-Barr ¬ Carcinome du *C16.0*
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome du *C16.0*
- Travers le hiatus œsophagien ¬ Glissement du *Q40.1*
- Type 1 ¬ Tumeur neuroendocrine familiale maligne du *C16.0*
- ¬
- - Carcinome diffus héréditaire du *C16.0*
- - Carcinome épidermoïde du *C16.0*
- - Carcinome indifférencié du *C16.0*
- - Insuffisance du *K31.88*
- - Linite plastique du *C16.0*
- - Tumeur maligne: *C16.0*
- - Tumeur neuroendocrine du *C16.0*
- - Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] du *C16.0*

Cardialgie gastrique au cours d'achalasie ¬ *K22.0*

Cardiaque
v./v.a. cérébro-palato-cardiaque
v./v.a. cranio-cérébello-cardiaque
v./v.a. génito-palato-cardiaque
v./v.a. Type de maladie

Cardinale postérieure gauche ¬ Persistance de la veine *Q26.8*

Cardio
v./v.a. microcéphalie-facio-cardio-squelettique

Cardiobacterium
- Hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, *B96.3!*
- ¬ Bactériémie à *A49.83*

Cardio-facio-cutané ¬ Syndrome *Q87.8*

Cardiogénique ¬ Choc *R57.0*

Cardiogénital ¬ Syndrome *Q87.8*

Cardiomégalie
- Cours de maladie glycogénique ¬ *E74.0†, I43.1**
- Insuffisance cardiaque congénitale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- ¬ *I51.7*

Cardiomélique type 3 ¬ Syndrome *Q87.2*

Cardiomyopathie
v./v.a. microcéphalie-cardiomyopathie
- Arythmogène
- - Héréditaire isolée ¬ *I42.88*
- - Isolée familiale à prédominance ventriculaire droite ¬ *I42.80*
- - ¬ Syndrome
- - - Hyperkératose palmoplantaire- *Q87.8*
- - - Kératodermie palmoplantaire- *Q87.8*
- Auriculaire-bloc cardiaque ¬ Syndrome de *I45.5*
- Béribéri ¬ *E51.1†, I43.2**
- Cirrhotique ¬ *I42.88*
- Congestive ¬ *I42.0*
- Cours
- - Puerpéralité ¬ *O90.3*
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, I43.8**
- Dilatation et ataxie ¬ *E71.1†, I43.1**
- Dilatée
- - Familiale isolée ¬ *I42.0*
- - ¬
- - - *I42.0*
- - - Surdité neurosensorielle avec *H90.5, I42.0*
- - - Syndrome de tubulopathie rénale- *N25.8, I42.0*
- Histiocytoïde ¬ *I42.0*
- Hypertrophique
- - Congénitale létale par maladie de stockage du glycogène ¬ *E74.0†, I43.1**
- - Infantile létal déficit
- - - Complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ *I42.2*
- - - NADH-coenzyme Q réductase ¬ *I42.2*
- - - NADH-CoQ réductase ¬ *I42.2*
- - Mitochondriale avec acidose lactique par déficit en MTO1 ¬ *I42.2*
- - Myopathie mitochondriale ¬ Syndrome de cataracte congénitale- *Q87.8*
- - Néphropathie tubulaire ¬ Syndrome d'encéphalopathie- *E88.8*
- - Tubulopathie dues à une mutation de l'ADN mitochondrial ¬ *I42.2*
- - ¬ Syndrome de surdité neurosensorielle progressive- *H90.5, I42.2*
- Hypotonie-acidose lactique ¬ Syndrome de *I42.2*
- Létale ¬ Myopathie précoce avec *G71.8*
- Métabolique ¬ *E88.9†, I43.8**

Cardiomyopathie *–suite*
- Non-compaction du ventricule gauche associé à des crises d'épilepsie, une hypotonie, une cataracte et un retard de développement ¬ Syndrome létal de *G31.81*
- Post-partum ¬ *O90.3*
- Restrictive familiale isolée ¬ *I42.5*
- Sévère par déficit en glycogénine ¬ Glycogénose avec *E74.0†, I43.1**
- Stress ¬ *I42.88*
- Surdité dues à une mutation de l'ADN mitochondrial ¬ *G31.81*
- Tako-Tsubo ¬ *I42.88*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I43.0**
- Ventriculaire
- - Arythmogène familiale isolée avec prédominance à gauche ¬ *I42.88*
- - Droite arythmogène
- - - CVDA] ¬ *I42.80*
- - - Isolée familiale ¬ *I42.80*
- - - ¬ CVDA [*I42.80*
- - ¬
- - - *I42.88*
- - Épidermolyse bulleuse simple intermédiaire avec *Q81.0, I42.9*
- - Examens liés à une prédisposition aux *Z01.81*
- - Syndrome
- - - EKC [érythrokératodermie- *Q82.8, I42.0*
- - - Insuffisance rénale tubulaire- *N25.8, I42.0*
- - - Leigh avec *G31.88†, I43.8**

Cardiomyopathique ¬ Lentiginose *Q87.1*

Cardiomyovasculopathie ¬ Maladie
- Idiopathique de surcharge en lipides neutres avec *E75.5†, I43.1**
- Primaire de surcharge en lipides neutres avec *E75.5†, I43.1**
- Surcharge lipidique avec *E75.5†, I43.1**

Cardionéphropathie hypertensive
- Insuffisance cardiaque congestive
- - Rénale ¬ *I13.2*
- - ¬ *I13.0*
- Insuffisance rénale ¬ *I13.1*
- Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.3*
- Sans précision ¬ *I13.9*

Cardio-œsophagienne ¬ Jonction: *C16.0*

Cardiopathia nigra ¬ *I27.08*

Cardiopathie
v./v.a. microcéphalie-cardiopathie-malsegmentation
- Aiguë ou évolutive ¬ *I01.9*
- Amyloïde de la transthyrétine ¬ *E85.4†, I43.1**
- Anomalies squelettiques ¬ Syndrome d'anophtalmie-mégalocornée- *Q87.8*
- Artérioscléreux
- - Implication
- - - Bitronculaire ¬ *I25.12*

Cardiopathie *–suite*
- Artérioscléreux *–suite*
- - Implication *–suite*
- - - Monotronculaire ¬ *I25.11*
- - - Tritronculaire ¬ *I25.13*
- - Sans sténoses ayant un effet hémodynamique ¬ *I25.10*
- - Sténose
- - - Stents ¬ *I25.16*
- - - Tronc commun de l'artère coronaire gauche ¬ *I25.14*
- - - Vaisseaux de pontage ¬ *I25.15*
- - ¬ *I25.19*
- Congénitale
- - Affection du tissu conjonctif et hypertension portale [APAH] ¬ Hypertension artérielle pulmonaire associée à une *I27.01*
- - Défaut de fermeture du tube neural ¬ Syndrome de cataracte- *Q87.0*
- - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de craniosynostose- *Q87.8*
- - Dysmorphie faciale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de macrocéphalie- *Q87.0*
- - Fente palatin
- - - Mutation de MEIS2 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - - ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - Membres courts ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - Petite taille-laxité ligamentaire ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.1*
- - Polydactylie postaxiale ¬ Syndrome de malformations cérébrales- *Q87.8*
- - SAI ¬ *Q24.9*
- - Surdité ¬ Syndrome de fente labio-palatine-dysmorphie cranio-faciale- *Q87.0*
- - ¬
- - - Hypertension artérielle pulmonaire associée à une *I27.01*
- - - Syndrome d'hypoplasie pancréatique-diabète- *Q87.8*
- Coronarien
- - Chronique ¬ *I25.19*
- - Insuffisance fonctionnelle du ventricule gauche ¬ *I25.19*
- - ¬ *I25.19*
- Cours
- - Maladies
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ Autres *I52.0**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Autres *I52.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Autres *I52.8**
- - Mucopolysaccharidose ¬ *E76.3†, I52.8**
- Due à cyphoscoliose ¬ *I27.1*
- Dysmorphie cranio-faciale ¬ Syndrome d'atrésie des choanes-surdité- *Q87.8*
- Gauche ¬ Hypertension pulmonaire lors de *I27.21*
- Hypertensive

Cardiopathie *–suite*
- Hypertensive *–suite*
- - Insuffisance cardiaque (congestive) ¬ *I11.0*
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.1*
- - SAI ¬ *I11.9*
- - Sans insuffisance cardiaque (congestive) ¬ *I11.9*
- Ischémique
- - Aiguë, sans précision ¬ *I24.9*
- - Aiguës ¬ Autres formes de *I24.8*
- - Chronique
- - - Sans précision ¬ *I25.9*
- - - ¬ Autres formes de *I25.8*
- Mal définies ¬ Autres *I51.8*
- Méningocoques ¬ *A39.5†, I52.0**
- Rhumatismal
- - Aiguë ¬ *I01.9*
- - Aiguës ¬ Autres *I01.8*
- - Précisées ¬ Autres *I09.8*
- - Sans précision ¬ *I09.9*
- Sans précision ¬ *I51.9*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- Trouble neurologique développement
- - Mutation ponctuelle ¬ Syndrome de dysmorphie cranio-faciale-anomalies squelettiques- *Q87.0*
- - ¬ Syndrome de dysmorphie cranio-faciale-anomalies squelettiques- *Q87.0*
- ¬ Syndrome
- - Déficience intellectuelle autosomique dominante-anomalies cranio-faciales-hypotonie- *Q87.8*
- - Fente labio-palatine-malrotation- *Q87.8*
- - Kallmann- *E23.0, Q24.8*
- - Microcéphalie-épilepsie-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - Séquence de Potter-fente- *Q87.8*

Cardiopulmonaire
- Chronique ¬ Maladie *I27.9*
- Cours d'obésité ¬ Syndrome *E66.29*
- Précisées ¬ Autres affections *I27.8*
- Sans précision ¬ Affection *I27.9*
- Squelettiques ¬ Syndrome de mèches blanches avec dysmorphies faciales et malformations oculaires, *Q87.8*
- Virus Hanta
- - SCPH] ¬ Syndrome *B33.4†, J17.1**
- - ¬ Syndrome *B33.4†, J17.1**

Cardioquelettique et neutropénie liée à l'X ¬ Myopathie *E71.1*

Cardio-rénal ¬
- Maladie: *I13*
- Syndrome *I13.90*

Cardio-respiratoire ¬ Insuffisance *R09.2*

Cardiospasme de l'œsophage ¬ *K22.0*

Cardiosquelettique avec neutropénie et mitochondriopathie ¬ Myopathie *E71.1*

Cardiosquelettique-neutropénie ¬ Syndrome de myopathie *E71.1*

Cardiotoniques et médicaments d'action similaire ¬ Intoxication: Glucosides *T46.0*

Cardio-vasculaire
- Congénitale ¬ Anomalie *Q28.88*
- Cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Troubles *I98.1**
- Décrite ainsi ¬ Athérosclérose *I25.0*
- SAI ¬ Accident *I51.6*
- Sans précision ¬
- - Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système *T46.9*
- - Maladie *I51.6*
- Sévère ¬ Maladie à surcharge lipidique avec atteinte *E75.5†, I43.1**
- Survenant pendant période périnatal
- - Sans précision ¬ Affection *P29.9*
- - ¬ Autres affections *P29.8*
- Tardive ¬ Syphilis *A52.0†, I98.0**
- Tertiaire ¬ Syphilis *A52.0†, I98.0**
- ¬
- - Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Système *F45.30*
- - Examen spécial de dépistage des affections *Z13.6*
- - Gomme du système *A52.0†, I98.0**
- - Maladie de Gaucher, forme *E75.2*
- - Mise en observation pour suspicion d'autres affections *Z03.5*
- - Présence système assistance
- - - *Z95.80*
- - - *Z95.80*
- - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.3*
- - Syndrome de maladie de Gaucher-ophtalmoplégie-calcification *E75.2*
- - Syphilis
- - - *A52.0†*
- - - *A52.0†, I98.0**
- - - *I98.0**
- - Syphilis congénitale tardive *A50.5†, I98.0**
- - Syphilome *A52.0†, I98.0**

Cardio-vasculo-rénale ¬ maladie: *I13*

Cardioverteur
- Implantable] ¬ Infection liée à un système DCI [défibrillateur *T82.70*
- Implanté
- - DCI] ¬ Infection due à un défibrillateur *T82.70*
- - ¬ Infection due à un défibrillateur *T82.70*

Cardite
- Aiguë
- - Chronique) ¬ *I51.8*
- - Rhumatismale ¬ *I01.9*
- Cours
- - Maladie de Lyme ¬ *A69.2†, I52.0**
- - Polyarthrite chronique ¬ *M05.30†, I52.8**

Cardite *–suite*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.30†, I52.8**
- Méningocoques ¬ *A39.5†, I52.0**
- Rhumatismale ¬ *I09.9*
- Rhumatoïde ¬ *M05.39†, I52.8**
- Virale ¬ *B33.2†, I52.1**
- Virus Coxsackie ¬ *B33.2†, I52.1**

Carencé ¬ Arthropathie lors d'un état alimentaire *E63.9†, M14.59**

Carène congénital ¬ Thorax en *Q67.7*

Carey
v./v.a. Siegler-Brewer-Carey
v./v.a. Toriello-Carey

Carey-Fineman-Ziter ¬ Syndrome de *Q87.0*

Carie
- Cément ¬ *K02.2*
- Dentaire
- - Inactive ¬ *K02.3*
- - Sans précision ¬ *K02.9*
- - Stabilisée ¬ *K02.3*
- - ¬ Autres *K02.8*
- Dentine ¬ *K02.1*
- Exposition de la pulpe ¬ *K02.5*
- Initiales] ¬ Taches blanches [*K02.0*
- Limitée à l'émail ¬ *K02.0*
- Osseux
- - Mastoïde] ¬ Ostéite mastoïdienne [*H70.1*
- - ¬ *A18.0†, M90.09**
- Tuberculeuse
- - Apophyse mastoïde ¬ *A18.0†, H75.0**
- - Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Nez ¬ *A18.0†, M90.08**
- - Orbites ¬ *A18.0†, M90.08**
- - Sacrum ¬ *A18.0†, M49.08**
- - ¬ *A18.0†, M90.09**
- ¬ Syndrome des cheveux frisés-kératodermie acrale- *Q82.8*

Carinii ¬
- Infection à Pneumocystis *B48.5†, J17.2**
- Maladie due au VIH avec pneumonie à Pneumocystis *B20†, J17.2*, B48.5*
- Pneumonie
- - Due à: Pneumocystis *B48.5†*
- - Pneumocystis *B48.5†, J17.2**

Carman
v./v.a. Wellesley-Carman-French

Carmi ¬ Syndrome de *Q81.8*

CARMIL2 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.2*

Carnevale
v./v.a. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

Carney
- Trismus-pseudocamptodactylie ¬ Syndrome complexe de *Q87.8*
- ¬
- - Complexe de *D44.8, E24.8*

Carney *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome de *D44.8, E24.8*
- - Triade de *C26.9, D48.7*

Carney-Stratakis ¬ Syndrome de *D44.8*

Carnitine
- Cellulaire ¬ Défaut de captation de la *E71.3*
- Palmitoyltransférase
- - I hépatique ¬ Déficit en *E71.3*
- - IA ¬ Déficit en *E71.3*
- Palmityltransférase musculaire ¬ Carence en *E71.3*
- Travers la membrane plasmique ¬ Défaut du transporteur de *E71.3*
- ¬
- - Carence en *E63.8*
- - Déficit systémique primaire en *E71.3*

Carnitine-acylcarnitine translocase ¬ Déficit en *E71.3*

Carnosinase ¬ Déficit en *E72.8*

Caroli ¬
- Maladie de *Q44.6*
- Syndrome de *Q44.6*

Caroline du Nord ¬ Dystrophie maculaire de la *H35.5*

Caronculaire œil ¬
- Tumeur bénigne *D31.0*
- Tumeur maligne *C69.0*

Caroncule urétrale ¬ *N36.2*

Carotide
v./v.a. Artère carotide
- A carotide
- - Commune ¬ Lésion traumatique de la *S15.01*
- - Externe ¬ Lésion traumatique de la *S15.02*
- - Interne ¬ Lésion traumatique de la *S15.03*
- Carotide, partie non précisée ¬ Lésion traumatique de la *S15.00*
- Commune ¬ Lésion traumatique de la carotide: A. *S15.01*
- Externe ¬ Lésion traumatique de la carotide: A. *S15.02*
- Interne ¬
- - Agénésie de la *Q28.18*
- - Lésion traumatique de la carotide: A. *S15.03*
- Lentiginose ¬ Dissection de la *I72.0, L81.4*
- Partie non précisée ¬ Lésion traumatique de la carotide: *S15.00*
- Vertébral ¬ Artère basilaire
- - *I63.0*
- - *I63.1*
- - *I63.2*
- ¬
- - Anévrisme syphilitique
- - - *A52.0†, I79.8**
- - - Intracrânien de la *A52.0†, I68.8**
- - Dissection familiale de la *I72.0*

Carotide *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dysplasie fibromusculaire
- - - Atypique de la *I77.3*
- - - Intimale de la *I77.3*

Carotidien
- Syncope) ¬ Syndrome du sinus *G90.00*
- ¬
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne
- - - Acquise due à une rupture d'anévrisme *I60.0*
- - - Bifurcation et du siphon *I60.0*
- - Tumeur bénigne: Corpuscule *D35.5*
- - Tumeur maligne: Corpuscule *C75.4*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule *D44.6*

Carpe
- Articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (os) *S93.31*
- Carpe, sans précision ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.10*
- Grand os ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.16*
- Os
- - Crochu ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.17*
- - Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.13*
- - Pyramidal ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.12*
- - Semi-lunaire ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.11*
- - Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.14*
- - Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.15*
- Sans précision ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.10*
- Surnuméraire ¬ Os du *Q74.0*
- ¬
- - Fracture d'autres ou de plusieurs os du *S62.19*
- - Ostéoblastome des os du *D16.1*
- - Rupture traumatique de ligament du poignet et du *S63.3*

Carpenter
v./v.a. Cole-Carpenter
v./v.a. Miles-Carpenter
- ¬ Syndrome de *Q87.0*

Carpien
v./v.a. Canal carpien
v./v.a. médiocarpien
v./v.a. radio-carpien
- Palmaire) ¬ Ligament: cubito- *S63.3*
- Tarsien ¬ os naviculaire *S62.0*
- ¬
- - Entorse et foulure du poignet: (Articulation) *S63.51*
- - Spasme pédo- *R29.0*

Carpo
v./v.a. cranio-carpo-tarsien
- Tarsales-oligodontie ¬ Syndrome de fente palatine-anomalies *Q87.8*

Carpocyphose [maladie de Madelung] ¬ *Q74.0*

Carpo-métacarpien ¬
- Entorse et foulure du poignet: (Articulation) *S63.53*
- Luxation du poignet: (Articulation) *S63.04*

Carpo-métacarpienn
v./v.a. Articulation carpo-métacarpienne

Carpo-tarsien
- Multicentrique
- - Néphropathie ¬ Ostéolyse *M89.50, N28.9*
- - ¬ Ostéolyse *M89.50*
- ¬
- - Ostéochondromatose *Q78.4*
- - Synostose spondylo- *Q78.8*

Carrefour pharyngo-laryngé de l'oropharynx ¬ *C10.8*

CAR-T ¬ Syndrome de libération de cytokines lié au traitement par cellules *D76.4*

Carteaud] ¬ Papillomatose confluente et réticulée [Gougerot- *L83*

Cartilage
- Cheveux avec déficit immunitaire ¬ Hypoplasie du *Q78.5, D82.2*
- Cricoïde
- - Épiglotte glotte larynx cartilage thyroïdien ¬
- - - Absence de *Q31.8*
- - - Agénésie de *Q31.8*
- - - Atrésie de *Q31.8*
- - ¬
- - - *S12.8*
- - - Fissure (de): postérieure du *Q31.8*
- Interne de la symphyse (pubienne) obstétrical(e) ¬ Arrachement du *O71.6*
- Intervertébral ¬ Tuberculose du *A18.0†, M49.09**
- Laryngé ¬ Tumeur maligne: *C32.3*
- Ménisque
- - Genou ¬ Lésion récidivante du *M23.39*
- - ¬ Mâchoire (*S03.0*
- Nez ¬
- - *C30.0*
- - *D14.0*
- - *D38.5*
- Sans précision ¬ Affection du *M94.9*
- Thyroïde ¬
- - *S12.8*
- - *S13.5*
- Thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du *Q31.8*
- - Fissure (de): *Q31.8*
- Trachéal ¬ Anomalie du *Q32.1*

Cartilage *–suite*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Affections précisées du *M94.8*
- - Tuberculose du *A18.0†, M01.19**

Cartilage articulaire
- Bassin, sacrum et coccyx ¬ Tumeur bénigne des os et du *D16.8*
- Clavicule ¬
- - Tumeur bénigne des os et du *D16.72*
- - Tumeur maligne des os et du *C41.32*
- Côté
- - Sternum et clavicule ¬ Tumeur bénigne des os et du *D16.7*
- - ¬
- - - Tumeur bénigne des os et du *D16.70*
- - - Tumeur maligne des os et du *C41.30*
- Cranio-facial ¬
- - Tumeur bénigne des os et du *D16.41*
- - Tumeur maligne des os et du *C41.01*
- Genou ¬ Déchirure récente du *S83.3*
- Mandibule ¬ Tumeur maligne des os et du *C41.1*
- Maxillaire inférieur ¬ Tumeur bénigne des os et du *D16.5*
- Maxillofacial ¬
- - Tumeur bénigne des os et du *D16.42*
- - Tumeur maligne des os et du *C41.02*
- Membre, sans précision ¬ Tumeur maligne: Os et *C40.9*
- Membres ¬ Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du *C40.8*
- Omoplate os longs membre supérieur ¬
- - Tumeur bénigne des os et du *D16.0*
- - Tumeur maligne des os et du *C40.0*
- Os
- - Courts membre
- - - Inférieur ¬
- - - - Tumeur bénigne des os et du *D16.3*
- - - - Tumeur maligne des os et du *C40.3*
- - - Supérieur ¬
- - - - Tumeur bénigne des os et du *D16.1*
- - - - Tumeur maligne des os et du *C40.1*
- - Crâne et de la face ¬ Tumeur bénigne des os et du *D16.4*
- - Longs membre inférieur ¬
- - - Tumeur bénigne des os et du *D16.2*
- - - Tumeur maligne des os et du *C40.2*
- Pelvis ¬ Tumeur maligne des os et du *C41.4*
- Rachis ¬
- - Tumeur bénigne des os et du *D16.6*
- - Tumeur maligne des os et du *C41.2*
- Sans précision ¬
- - Tumeur bénigne: Os et *D16.9*
- - Tumeur maligne: Os et *C41.9*
- Sternum ¬

Cartilage articulaire *–suite*
- Sternum ¬ *–suite*
- - Tumeur bénigne des os et du *D16.71*
- - Tumeur maligne des os et du *C41.31*
- ¬
- - Atteintes du *M24.1*
- - Chondrosarcome du *C41.9*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du *C41.8*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Os et *D48.0*

Cartilagineux
- Multiples ¬ Exostoses *Q78.6*
- Trachée ¬ Fracture des anneaux *S12.8*

Carvajal ¬ Syndrome de *Q87.8*

Caryomégalique ¬ Néphrite interstitielle *N11.8*

Caryotype
- 45,X ¬ *Q96.0*
- 46 X
- - Chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) ¬ *Q96.2*
- - Iso (Xq) ¬ *Q96.1*
- 46,XX ¬
- - Phénotype masculin avec *Q98.3*
- - Syndrome de Klinefelter, homme avec *Q98.2*
- 46,XY ¬ Femme avec un *Q97.3*
- 47
- - XXX ¬ *Q97.0*
- - XXY ¬ Syndrome de Klinefelter, *Q98.0*
- - XYY ¬
- - - *Q98.5*
- - - Phénotype masculin avec *Q98.5*
- Type 46,XY ¬ Anomalie ovo-testiculaire du développement sexuel avec *Q56.0*

Casamassima-Morton-Nance ¬ Syndrome de *Q87.8*

CASM [Choroïdopathie amélanotique stellaire multiforme] ¬ *H31.8*

CASP8 ¬ Syndrome lymphoprolifératif auto-immune par déficit en *D47.7*

Caspofungine ¬ Candida glabrata résistant à la *U83.1!*

Caspr2 ¬ Encéphalite limbique avec anticorps *G04.8, M35.9*

Casse-noisettes
- Rénal ¬ Syndrome de *Q27.8*
- ¬ Œsophage *K22.4*

Cassette A1 ¬ Déficit du transporteur à ATP-binding *E78.6*

Cassidy-Scholte ¬ Syndrome de *E34.0*

Castleman ¬ Tumeur de *D47.7*

Castroviejo
v./v.a. Pascual-Castroviejo

Catalase ¬ Déficit en *E80.3*

Catalepsie schizophrénique ¬ *F20.2*

Cataméniale ¬
- Extraction *Z30.3*

Cataméniale ¬ *–suite*
- Régulation *Z30.3*

Catane ¬ Dysostose acrofaciale type *Q75.4*

Cataplexie ¬ Narcolepsie
- *G47.4*
- Sans *G47.4*

Cataracta diabetica ¬ Diabète sucré avec *E14.30†, H28.0**

Cataracte
v./v.a. hydrocéphalie-fibroélastoses-cataracte
- Anomalies squelettiques ¬ Syndrome de surdité- *Q87.8*
- Aphaque] ¬ Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la *H59.0*
- Atteinte cardiaque associé à ITPA ¬ Trouble neurologique létal infantile avec *G40.4*
- Autosomique dominante ¬ Syndrome d'atrophie optique- *H47.2*
- Bilatérale
- - Congénitale ¬ Syndrome de porencéphalie-microcéphalie- *Q04.8, Q12.0*
- - ¬ Trouble neurologique du développement sévère avec troubles de l'alimentation-mouvements stéréotypés des mains- *G31.88*
- Brunescente ¬ *H25.1*
- Cardiopathie congénitale-défaut de fermeture du tube neural ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Céruléenne ¬ *Q12.0*
- Compliquée ¬ *H26.2*
- Coralliforme ¬ *Q12.0*
- Cortico nucléaire
- - Capsulaire postérieure ¬ *H26.88*
- - Sous-capsulaire postérieure ¬ *H26.88*
- - ¬ *H26.88*
- Cours
- - Hypoparathyroïdie ¬ *E20.9†, H28.1**
- - Iridocyclite chronique ¬ *H26.2*
- - Maladie
- - - Endocrinienne NCA ¬ *E34.9†, H28.1**
- - - Métabolique NCA ¬ *E88.9†, H28.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H28.2**
- - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *H28.1**
- - Malnutrition-déshydratation ¬ *E46†, H28.1**
- - Myxœdème ¬ *E03.9†, H28.1**
- - Secondaire à des affections oculaires ¬ *H26.2*
- - Syndrome de pseudo-exfoliation ¬ *H26.80*
- - Trouble de l'alimentation NCA ¬ *E63.9†, H28.1**
- Cyphose ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Déficience intellectuelle
- - Atrésie anale-uropathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ Syndrome de dystrophie musculaire congénitale- *G71.2*

Cataracte *–suite*
- Due
- - Lentille rigide ¬ *H26.88*
- - Rayonnement thermique ¬ *H26.88*
- - Rayons ¬ *H26.88*
- Électrique ¬ *H26.88*
- Glaucome ¬ Syndrome de *Q12.0, H40.9*
- Héréditaire ¬ Syndrome d'hyperferritinémie- *E83.1, Q12.0*
- Hypertrichose-déficience intellectuelle] ¬ Syndrome de CAHMR [*Q87.8*
- Incipiente sénile ¬ *H25.0*
- Infantile
- - Hypogonadisme ¬ Syndrome de dystrophie musculaire congénitale- *G71.2*
- - Juvénile et présénile ¬ *H26.0*
- Juvénile
- - Microcornée-glucosurie rénale ¬ Syndrome de *E88.8*
- - Petite taille-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de rétinite pigmentaire- *Q87.1*
- Médicamenteuse ¬ *H26.3*
- Membraneuse congénitale ¬ *Q12.0*
- Microcornée ¬ Syndrome de *Q13.8*
- Myotonique ¬ *G71.1†, H28.2**
- Précisées ¬ Autres *H26.8*
- Pulvérulente ¬ *Q12.0*
- Retard de développement ¬ Syndrome létal
- - Cardiomyopathie par non-compaction du ventricule gauche associé à des crises d'épilepsie, une hypotonie, une *G31.81*
- - Non-compaction ventriculaire gauche-convulsions-hypotonie- *G31.81*
- Retard de langage ¬ Syndrome de paraparésie spastique- *G82.13, Q12.0*
- Sans précision ¬ *H26.9*
- Sapin de Noël ¬ *G71.1†, H28.2**
- Secondaire ¬ *H26.4*
- Souffleur de verre ¬ *H26.88*
- Sous-capsulaire postérieure ¬ *H26.88*
- Staphylome postérieur] ¬ Syndrome MRCS [microcornée-dystrophie des cônes et des bâtonnets- *Q15.8*
- Traumatique ¬ *H26.1*
- ¬
- - Diabète sucré type
- - - 1 avec *E10.30†, H28.0**
- - - 2 avec *E11.30†, H28.0**
- - Séquelles de *H26.4*
- - Syndrome
- - - Amyotrophie spinale-malformation de Dandy-Walker- *G12.8†, H28.2*, Q03.1*
- - - Dégénérescence cochléo-sacculaire- *H90.5†, H28.2**
- - - Hypogonadisme hypergonadotrope- *E29.1, H26.9*
- - - Ostéogenèse imparfaite-microcéphalie- *Q87.8*

Cataracte congénitale
- Amincissement stromal] ¬ Syndrome EDICT [dystrophie endothéliale-hypoplasie de l'iris- *Q13.8*
- Cardiomyopathie hypertrophique-myopathie mitochondriale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Dermatite psoriasiforme ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.8*
- Dysgénésie du segment antérieur ¬ Syndrome de *Q12.0*
- Dysmorphie faciale-neuropathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Hépatopathie néonatale sévère-retard global de développement ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Hypotonie musculaire progressive-surdité-retard de développement ¬ Syndrome de *G71.3*
- Microcornée-opacité cornéenne ¬ Syndrome de *Q13.8*
- ¬
- - *Q12.0*
- - Syndrome
- - - Familial de dystrophie rétinienne progressive-colobome d'iris- *Q15.8*
- - - Hypoplasie de la jambe- *Q87.1*

Cataracte sénile
- Coronaire ¬ *H25.0*
- Corticale ¬ *H25.0*
- Hypermûre ¬ *H25.2*
- Nucléaire ¬ *H25.1*
- Polaire sous-capsulaire (antérieure) (postérieure) ¬ *H25.0*
- Punctiforme ¬ *H25.0*
- Sans précision ¬ *H25.9*
- Type Morgagni ¬ *H25.2*
- ¬
- - *H25.8*
- - Formes combinées de *H25.8*

Cataracte-ataxie-surdité ¬ Syndrome de *G11.2*

Catarrhale ¬
- Bronchite: *J40*
- Laryngite: *J37.0*
- Otite moyenne: *H65.9*
- Trachéite (aiguë): *J04.1*

Catarrhe
- Intestinal ¬ *A09.0*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, J99.8**
- Tubo-tympanique chronique ¬ *H65.2*

Catastrophe
- Guerre et autres hostilités ¬ Exposition à une *Z65*
- Naturelles ¬ Chute d'objets lors de *X59.9!*
- ¬ Modification durable de la personnalité après une expérience de *F62.0*

Catatonie
- Idiopathique ¬ *F20.2*
- Organique ¬ *F06.1*
- Schizophrénique ¬ *F20.2*

Catatonique ¬
- Schizophrénie *F20.2*
- Stupeur *F20.2*

Catécholamine ¬
- Hypersécrétion de *E27.5*
- Taux urinaires élevés de: *R82.5*

Catécholaminergique ¬ Tachycardie ventriculaire polymorphe *I47.2*

Catel-Manzke ¬ Syndrome de *Q87.8*

Cathepsine A] ¬ CARASAL [Artériopathie-infarctus cérébraux-leucoencéphalopathie liée à la *I67.88*

Cathéter
- Broviac® ¬
- - *Z45.20*
- - *Z95.81*
- Cours acte visée diagnostique thérapeutique ¬ Perforation accidentelle
- - Nerf par *T81.2*
- - Organe par *T81.2*
- - Vaisseau sanguin par *T81.2*
- Dialyse
- - Péritonéale ¬ Infection et réaction inflammatoire due à un *T85.71*
- - ¬
- - - Infection due à un *T82.74*
- - - Septicémie due à un *T82.74*
- Perfusion ¬
- - Infection due à un *T80.2*
- - Septicémie due à un *T80.2*
- Pulmonaire ¬ Infection due à un *T82.74*
- Spinal de perfusion ¬ Sepsis dû à un *T85.72*
- Vasculaire
- - Central ¬
- - - Infection due à un *T82.74*
- - - Inflammation due à un *T82.74*
- - Demeure
- - - Implanté chirurgicalement ¬ Adaptation et manipulation d'un système de *Z45.20*
- - - Mis en place par voie chirurgicale ¬ Présence d'un système de *Z95.81*
- - Dialyse ¬ Complication mécanique d'un *T82.4*
- - ¬ Infection due à un *T80.2*
- Veineux central ¬ Infection due à un *T82.74*
- ¬
- - Enlèvement d'un *Z43*
- - Rétrécissement urétral par *N99.18*

Catlin ¬ Marques de *Q75.8*

CATSHL ¬ Syndrome *Q87.2*

Cauchemars ¬ *F51.5*

Caudal
- Familiale ¬ Dysgénésie *Q87.8*
- ¬
- - Duplication *Q89.4*
- - Rétrécissement *M48.0*
- - Syndrome

Caudal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Déficience intellectuelle-retard de développement globale-dysmorphie faciale-appendice *Q87.8*
- - - Holoprosencéphalie-dysgénésie *Q87.8*
- - - Régression *Q87.8*

Causalgie ¬ *G90.69*

Cave
- Inférieure
- - Oreillette gauche ¬ Drainage anormal de la veine *Q26.8*
- - Supérieure ¬
- - - Absence de veine *Q26.8*
- - - Sténose congénitale de la veine *Q26.0*
- - - Syndrome de la veine *I87.1*
- - Veine azygos ¬ Continuation de la veine *Q26.8*
- - ¬
- - - Anévrisme primitif de la veine *I86.88*
- - - Continuation azygos de la veine *Q26.8*
- - - Interruption de la veine *Q26.8*
- - - Léiomyosarcome de la veine *C49.4*
- - - Lésion traumatique de la veine *S35.1*
- - - Malformation congénitale de la veine *Q26.9*
- Supérieure
- - Droite dans l'oreillette gauche ¬ Abouchement de la veine *Q26.8*
- - Gauche
- - - Abouchement dans l'oreillette gauche via le sinus coronaire ¬ Persistance de la veine *Q26.1*
- - - Oreillette gauche par le sinus coronaire ¬ Abouchement de la veine *Q26.1*
- - - Toit de l'oreillette gauche ¬ Abouchement de la veine *Q26.1*
- - - ¬
- - - - Persistance de la veine *Q26.1*
- - - - Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec communication interatriale, séquence de Robin et persistance de la veine *Q87.8*
- - - ¬
- - - Absence de veine *Q26.8*
- - - Anévrisme primitif de la veine *I86.88*
- - - Lésion traumatique de la veine *S25.2*
- - - Malformation congénitale de la veine *Q26.9*
- - ¬
- - Embolie et thrombose de la veine *I82.2*
- - Lésion traumatique de la veine *S25.2*
- - Sténose congénitale de la veine *Q26.0*

Caverneux
- Cérébral familial ¬ Hémangiome *Q28.38*
- Cérébrale
- - Familiale ¬ Malformation *Q28.38*
- - Héréditaire ¬ Malformation *Q28.38*

Caverneux *–suite*
- Pénis ¬ Lésion de la tunique albuginée du corps *S39.80*
- Verge ¬
- - Abcès des corps *N48.2*
- - Anthrax des corps *N48.2*
- - Atrophie des corps *N48.8*
- - Furoncle des corps *N48.2*
- - Hypertrophie des corps *N48.8*
- - Phlegmon des corps *N48.2*
- - Thrombose des corps *N48.8*
- - ¬
- - Anévrysme artério-veineux du sinus *Q28.20*
- - Corps *C60.2*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une rupture d'anévrisme du sinus *I60.8*
- - Induration plastique des corps *N48.6*
- - Malformation lymphatique *D18.19*

Cavernite (de la verge) ¬ *N48.2*

Cavernomatose cérébrale familiale ¬ *Q28.38*

Cavité
- Abdominale ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la *R85*
- Buccal
- - Bouche, partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.50*
- - Gencive (processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.53*
- - Langue et plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.54*
- - Lèvre ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.51*
- - Muqueuse de la joue ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.52*
- - Organe digestif évolution imprévisible inconnue
- - - Organes digestifs ¬ Tumeur de la *D37.78*
- - - Pancréas ¬ Tumeur de la *D37.70*
- - Palais ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.55*
- - Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.59*
- - Pharynx ¬
- - - Carcinoma in situ: Lèvre, *D00.0*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la *C14.8*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, *D37.0*
- - SAI ¬ *C06.9*
- - ¬
- - - Blessure superficielle de la lèvre et de la *S00.5*
- - - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la *S01.59*
- Cœur ¬ Déchirure cardiaque
- - Ouverture d'une *S26.83*

Cavité *–suite*
- Cœur ¬ Déchirure cardiaque *–suite*
- - Sans ouverture d'une *S26.82*
- Corporel plaie opératoire
- - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- - ¬
- - - Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- - - Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- - - Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- Crânienne ¬ Tératome de la *D48.0*
- Glénoïde et col de l'omoplate ¬ Fracture de l'omoplate: *S42.14*
- Médiane (bassin) entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement de: *O33.3*
- Moyenne ¬ Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la *O65.3*
- Orale ¬ Carcinome épidermoïde de la *C06.9*
- Orifice cardiaques
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q20.9*
- - ¬ Autres malformations congénitales des *Q20.8*
- Thoracique ¬ *T27.2*
- ¬ Myiase des *B87.8*

CBP
- Cholangite biliaire primitive] ¬ *K74.3*
- Cirrhose biliaire primitive] ¬ *K74.3*

CCAM [Malformation adénomatoïde kystique du poumon] ¬ *Q33.0*

CCNK ¬ Syndrome de trouble neurodéveloppemental-déficience intellectuelle sévère-dysmorphie faciale associé à *Q87.0*

CCUS [Clonal cytopenia of undetermined significance] ¬ *U62.01!*

CD137 ¬ Maladie lymphoprolifération associée à l'EBV [virus Epstein-Barr] par déficit en *D82.3*

CD19 ¬ Déficit immunitaire commun variable par déficit en *D83.0*

CD21 ¬ Déficit immunitaire commun variable par déficit en *D83.0*

CD25 ¬ Déficit immunitaire par déficit en *D81.8*

CD27 ¬ Maladie lymphoprolifération autosomique récessive par déficit en *D47.7*

CD3 gamma ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.2*

CD30 positif ¬
- Lymphome anaplasique à grandes cellules, *C84.6*
- Lymphome diffus à grandes cellules B *C83.3*
- Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, *C86.6*

CD4
- Idiopathique ¬ Lymphocytopénie *D72.8*
- ¬ Nombre réduit de lymphocytes *R72*

CD4+
- Microlitre sang ¬ 200
- - 499 lymphocytes T auxiliaires (*U61.2!*
- - Lymphocytes T auxiliaires (*U61.3!*
- Non précisé ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires (*U61.9!*
- Plus par microlitre de sang ¬ 500 lymphocytes T auxiliaires (*U61.1!*
- ¬ Lymphome T cutané à cellules pléomorphes de taille petite à moyenne *C84.4*

CD59 ¬ Déficit primaire en *D84.1*

CD70 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D82.3*

CD8 ¬
- Nombre réduit de lymphocytes *R72*
- Susceptibilité aux infections respiratoires associée à une mutation de la chaîne alpha de *D84.8*

CD8+ d'évolution agressive ¬ Lymphome T cutané épidermotrope *C84.5*

CD81 ¬ Déficit immunitaire commun variable par déficit en *D83.0*

CDA Anémie dysérythropoïétique congénitale type
- 1 ¬ *D64.4*
- 2 ¬ *D64.4*
- 3 ¬ *D64.4*
- 4 ¬ *D64.4*

CDG
- Congenital disorder of glycosylation
- - Type Ic ¬ Syndrome *E77.8*
- - ¬ ST3GAL3- *E77.8*
- Trouble congénital de la glycosylation] de type IIv ¬ Syndrome *E77.8*
- Type IIc ¬ Syndrome *D84.8*

CDHS [Craniofacial-deafness-hand syndrome] ¬ *Q87.0*

CDK13 ¬ Syndrome de retard de développement-déficience intellectuelle-dysmorphie faciale- malformations cardiaques congénitales associé à *Q87.0*

CDKN1C ¬ Syndrome
- Beckwith-Wiedemann dû à une mutation de *Q87.3*
- Retard de croissance intra-utérin petite taille
- - Associé au gène *E34.8*
- - Diabète sucré associé au gène *E34.8, E10.90*

CDPX2] ¬ Chondrodysplasie ponctuée dominante liée à l'X [*Q77.3*

CEBPA ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec mutations somatiques de *C92.00*

CEBPE ¬ Syndrome de déficit immunitaire-auto-inflammation-anomalie des neutrophiles associé à *M35.8*

CEC [Syndrome de maladie cœliaque-calcifications cérébrales-épilepsie] ¬ *K90.0, G40.8*

Cécité
- Ataxie-spasticité ¬ Syndrome de neurodégénérescence progressive de l'enfant- *G31.88*
- Cortical
- - Déficience intellectuelle
- - - Dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'encéphalopathie épileptique infantile précoce- *G40.4*
- - - Polydactylie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Retard de développement ¬ Syndrome de microcéphalie progressive-épilepsie- *Q02*
- - ¬ Syndrome de NESCAV [neurodégénérescence - spasticité - atrophie cérébelleuse - *G31.88*
- Diurne ¬ *H53.1*
- Forte baisse vision
- - Binoculaire ¬ *H54.0*
- - Monoculaire ¬ *H54.4*
- Hyperlaxité articulaire ¬ Syndrome d'ostéoporose-macrocéphalie- *Q87.8*
- Hypopigmentation, type Yémen ¬ Syndrome de surdité avec *Q87.8*
- Nocturne
- - Anomalies squelettiques-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Stationnaire congénitale ¬ *H53.6*
- - ¬
- - - *H53.6*
- - - Dysplasie chondroectodermique avec *Q77.6*
- Pingelap ¬ *H53.5*
- Scoliose-arachnodactylie ¬ Syndrome de *Q87.5*
- Surdité ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique récessive- *G11.1*
- ¬
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, H54.0*
- - Syndrome
- - - Dysplasie ectodermique- *Q87.8*
- - - Leucoencéphalopathie progressive à début précoce avec calcification du SNC, surdité et *G93.88*

CEDNIK ¬ Syndrome *Q82.8*

Ceelen-Gellerstedt ¬ Syndrome de *E83.1†, J99.8**

Ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la *U81.6!*

Ceide
v./v.a. Zechi-Ceide

Ceinture
- Autosomique
- - Dominante type
- - - 1A ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 1B ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*

Ceinture *–suite*
- Autosomique *–suite*
- - Dominante type *–suite*
- - - 1C ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 1D ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 1E ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 1F ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 1G ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - Récessive type
- - - 2A ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2B ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2C ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2D ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2E ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2F ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2G ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2H ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2I ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2J ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2K ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2L ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2M ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2N ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2O ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2P ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2Q ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2R ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2S ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2T ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2U ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2Y ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - - 2Z ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- Bassin ¬ Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la *S71.80*
- Déficit
- - Bêta-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - Delta-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - FKRP ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - Gamma-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - Lamine A/C ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - POMK ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- Dystrophie musculaire ¬ Syndrome de contracture progressive de l'enfance-faiblesse musculaire des *G71.08*
- Liée
- - Calpaïne-3 D4 ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- - Sous-unité alpha 2 de la laminine R23 ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*
- Orthopédique(s) ¬ *Z46.7*
- Pelvienne ¬
- - Dystrophie musculaire de la *G71.08*

Ceinture *–suite*
- Pelvienne ¬ *–suite*
- - Malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la *Q74.2*
- - Myopathie de la *G71.08*
- Scapulaire
- - Partie non précisée ¬ Fracture de la *S42.9*
- - SAI ¬
- - - Entorse et foulure de la *S43.7*
- - - Luxation de la *S43.3*
- - ¬
- - - Dystrophie musculaire de la *G71.08*
- - - Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la *S43.7*
- - - Luxation de parties autres et non précisées de la *S43.3*
- - - Malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la *Q74.0*
- - - Myopathie de la *G71.08*
- - - Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de la *S41.80*
- ¬ Dystrophie musculaire des *G71.08*

Cellulaire
v./v.a. Tissu cellulaire sous-cutané
- Chromosome sexuel anormal ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/ lignées *Q96.4*
- CR3] ¬ Déficit en complexe récepteur de la membrane *D71*
- Indifférencié ¬ Lymphome de type *C83.9*
- Limitée ¬ Infection à cytomégalovirus lors d'une immunité à médiation *B25.9, D84.9*
- ¬
- - Défaut
- - - Captation de la carnitine *E71.3*
- - - Immunité *D84.8*
- - Mucolipidose II [maladie à inclusion *E77.0*

Cellularité mixte ¬ Lymphome de Hodgkin classique
- *C81.2*
- *C81.2*

Cellule
- Accessoires) ¬ Sarcome à cellules dendritiques (*C96.4*
- ALK
- - Négatif ¬ Lymphome anaplasique à grandes *C84.7*
- - Positif ¬
- - - Lymphome anaplasique à grandes *C84.6*
- - - Lymphome B à grandes *C83.3*
- Ballonnisantes sur la conjonctive ¬ Nævus à *D31.0*
- Bêta des îlots de Langerhans SAI ¬ Hyperplasie des *E16.1*
- Bronche souche ¬ Cancer du poumon à petites *C34.0*
- C
- - Thyroïde ¬ Hyperplasie des *E07.0*
- - ¬ Carcinome à *C73*

Cellule *–suite*
- CAR-T ¬ Syndrome de libération de cytokines lié au traitement par *D76.4*
- CD30 positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes *C84.6*
- Clivées ¬
- - Lymphome folliculaire
- - - *C82.9*
- - - Non-hodgkinien à petites *C82.9*
- - - Petites *C82.0*
- - Lymphome non hodgkinien à petites *C83.1*
- Cylindres dans les urines ¬ *R82.9*
- Effecteur immun ¬ Syndrome de neurotoxicité associée aux *G92.0*
- Endocrine pancréas
- - Hypersécrétion de glucagon ¬ Hyperplasie des *E16.3*
- - SAI ¬ Hyperplasie des *E16.9*
- Épithélioïdes périvasculaires ¬ Tumeur des *D48.1*
- Épithéloïdes ¬ Réticuloendothéliose à *D86.9*
- G
- - Pancréas ¬ Tumeur maligne à *C25.4*
- - ¬ Tumeur à *D37.70*
- Ganglionnaire
- - Corne antérieure ¬ Syndrome d'arthrogrypose avec maladie des *Q74.3, G12.2*
- - ¬ Dystrophie rétinienne avec anomalies de la couche nucléaire interne et des *H35.5*
- Germinal
- - Cervelet ¬ Tumeur mixte des *C71.6*
- - Encéphale ¬ Tumeur mixte des *C71.0*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Tumeur mixte des *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ Tumeur mixte des *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ Tumeur mixte des *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ Tumeur mixte des *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ Tumeur mixte des *C71.2*
- - Région pinéale ¬ Tumeur mixte des *C75.3*
- - Système nerveux central ¬ Tumeur mixte des *C72.9*
- - Tronc cérébral ¬ Tumeur mixte des *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ Tumeur mixte des *C71.5*
- Gliales pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à sphéroïdes axonaux et *E75.2*
- Globoïdes ¬ Leucodystrophie à *E75.2*
- Grains d'avoine ¬ Carcinome à *C34.9*
- Îlot
- - Langerhans SAI ¬ Hyperplasie des *E16.9*
- - Pancréatiques ¬
- - - Présence de deux (ou plus) autoanticorps anti- *R76.80*
- - - Tumeur à *D37.70*
- Indéterminée ¬ Histiocytose à *C96.4*
- Insulaires

Cellule *–suite*
- Insulaires *–suite*
- - Pancréas ¬ Carcinome neuroendocrine des *C25.4*
- - ¬
- - - Examen spécial de dépistage d'autoanticorps anti- *Z13.10*
- - - Tumeur à *D13.7*
- Ki-1+ ¬
- - Lymphome à grandes *C84.6*
- - Lymphome anaplasique à grandes *C84.6*
- Kupffer ¬ Sarcome des *C22.3*
- Lésion à localisations contiguës ¬ Cancer du poumon à petites *C34.8*
- Leydig ¬ Hypoplasie des *E34.59*
- Lié à un implant mammaire ¬ Lymphome anaplasique à grandes *C84.7*
- Littorales ¬ Angiome splénique à *D13.9*
- Lobe pulmonaire
- - Inférieur ¬ Carcinome bronchique à petites *C34.3*
- - Moyen ¬ Carcinome bronchique à petites *C34.2*
- - Supérieur ¬ Carcinome bronchique à petites *C34.1*
- Mastoïdiennes ¬ *C30.1*
- Matures
- - Type Burkitt
- - - Rémission complète ¬ LLA-B à *C91.81*
- - - ¬ LLA-B à *C91.80*
- - ¬ Tératome testiculaire adulte bénin à *D29.2*
- Mixtes
- - Type lymphocytaire-histiocytaire ¬ Lymphome nodulaire à *C82.1*
- - ¬
- - - Lymphome
- - - - *C85.9*
- - - - Diffus à *C83.9*
- - - Lymphome folliculaire à *C82.1*
- - - Lymphosarcome folliculaire à *C82.1*
- - - Méningiome à *D32.9*
- Natural Killer ¬ Déficit immunitaire primaire autosomique récessif avec un défaut de cytotoxicité spontanée des *D84.8*
- Neuroendocrine nourrisson
- - Exacerbation aiguë ¬ Hyperplasie des *J84.81*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Hyperplasie des *J84.80*
- Non
- - Clivées ¬
- - - Lymphome
- - - - Diffus à *C83.9*
- - - - Petites *C83.7*
- - - Lymphome folliculaire à *C82.2*
- - Précisées ¬
- - - Leucémie aiguë à *C95.0*
- - - Leucémie chronique à *C95.1*

Cellule *–suite*
- Non *–suite*
- - Précisées ¬ *–suite*
- - - Leucémies à *C95.7*
- Péritoine ¬ Tumeur desmoplastique à petites *C48.2*
- Plasmacytoïdes dendritiques blastiques [TCPDB] ¬ Tumeur à *C86.4*
- Pléomorphes de taille petite à moyenne CD4+ ¬ Lymphome T cutané à *C84.4*
- Positif Virus d'Epstein-Barr EBV
- - Personnes âgées ¬ Lymphome B diffus à grandes *C83.3*
- - ¬ Lymphome B diffus à grandes *C83.3*
- Principales de la parathyroïde ¬ Adénome à *D35.1*
- Rénales
- - Associé syndrome
- - - Birt-Hogg-Dubé ¬ Carcinome à *C64, Q85.8*
- - - Prédisposition tumorale liée
- - - - Gène BAP1 ¬ Carcinome à *C64*
- - - - MITF ¬ Carcinome à *C64*
- - ¬
- - - Léiomyomatose héréditaire avec carcinome à *C64, D21.9*
- - - Néphropathie kystique acquise associée à un carcinome à *C64, N28.1*
- Rétinopathie paranéoplasique ¬ Carcinome bronchique à petites *C34.9†, H36.8**
- Rondes
- - Tissu mou
- - - Abdomen ¬ Tumeur desmoplastique à petites *C49.4*
- - - Thorax ¬ Tumeur desmoplastique à petites *C49.3*
- - ¬ Tumeur desmoplastique à petites *C49.9*
- Rondesdes des tissus mous du pelvis ¬ Tumeur desmoplastique à petites *C49.5*
- Stéroïdiennes SAI ¬ Tumeur maligne à *C56*
- TCR [récepteur des cellules T] alpha ¬ Déficit en *D81.8*
- Type
- - Alpha-bêta et gamma-delta ¬ Contient des *C86.1*
- - Jambe ¬ Lymphome cutané à grandes *C83.3*
- - ¬
- - Cancer du poumon à petites *C34.9*
- - Carcinome pulmonaire
- - - Non à petites *C34.9*
- - - Petites *C34.9*
- - Lymphome
- - - B médiastinal primitif à grandes *C85.2*
- - - Cutané anaplasique à grandes *C86.6*
- - - Grandes *C85.9*
- - - Non-hodgkinien à grandes *C85.9*
- - Lymphome folliculaire à grandes *C82.2*

Cellule acineuse
v./v.a. Carcinome à cellules acineuses

Cellule acineuse *–suite*
- Pancréas ¬ Cystadénome à *D13.6*

Cellule B
- ALK positif ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- Anaplasique ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- Anergie des cellules T] ¬ Maladie BENTA [expansion des *D81.8*
- CD30 positif ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- Centroblastique ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- Dysplasie squelettique ¬ Syndrome de pancytopénie progressive congénitale-déficit immunitaire en *Q87.1*
- Effusion primaire ¬ Lymphome à *C83.8*
- Fièvre périodique-retard de développement] ¬ Syndrome SIFD [anémie sidéroblastique congénitale-immunodéficience à *D64.0, D82.8*
- Immunoblastique ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- Inflammation chronique ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à *C88.41*
- Monocytoïdes ¬ Lymphome à *C85.9*
- Plasmablastique ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- Rémission complète ¬
- - Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à *C91.11*
- - Leucémie prolymphocytaire à *C91.31*
- Riche Cellule T
- - Histiocytes ¬ Lymphome à grandes *C83.3*
- - ¬ Lymphome diffus grandes
- - - *C83.3*
- - - *C83.3*
- Sans précision ¬ Lymphomes à *C85.1*
- Sous-type non différencié ¬ Lymphome diffus grandes
- - *C83.3*
- - *C83.3*
- Système nerveux central ¬ Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- T ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de *D81.1*
- Zone marginale ¬ Lymphome nodulaire à *C83.0*
- ¬
- - Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de *D81.2*
- - Leucémie prolymphocytaire à *C91.3*
- - Lymphome
- - - Cérébral à *C85.1*
- - - Diffus
- - - - Centroblastique à grandes *C83.3*
- - - - Grandes *C83.3*

Cellule B *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lymphome *–suite*
- - - Grandes *C83.3*
- - - Petites *C83.0*
- - - Splénique diffus de la pulpe rouge à petites *C83.0*
- - Lymphome lymphoblastique à *C83.5*
- - Lymphome médiastinal thymique grandes
- - - *C85.2*
- - - *C85.2*
- - Lymphome non hodgkinien à *C85.1*

Cellule claire
- Endomètre ¬ Adénocarcinome à *C54.1*
- Membres
- - Inférieurs ¬ Sarcome des tissus mous à *C49.2*
- - Supérieurs ¬ Sarcome des tissus mous à *C49.1*
- Ovaire ¬ Adénocarcinome à *C56*
- Rein ¬ Sarcome à *C64*
- ¬ Carcinome rénal
- - *C64*
- - Héréditaire à *C64*
- - Papillaire à *C64*

Cellule de Langerhans
- Multifocale
- - Multisystémique ¬ Histiocytose à *C96.0*
- - Unisystémique ¬ Histiocytose à *C96.5*
- SAI ¬ Histiocytose à *C96.6*
- ¬
- - Granulomatose
- - - *C96.6*
- - - Aiguë à *C96.0*
- - - Chronique à *C96.6*
- - Histiocytose unifocale à *C96.6*
- - Sarcome à *C96.4*

Cellule de Merkel
v./v.a. Carcinome à cellules de Merkel

Cellule dendritique
- Cellules accessoires) ¬ Sarcome à *C96.4*
- Folliculaires ¬ Sarcome à *C96.4*
- Indéterminées ¬ Tumeur à *C96.4*
- Interdigitées ¬ Sarcome à *C96.4*
- Sans autre spécification ¬ Sarcome des *C96.4*

Cellule eau de roche ¬
- Adénocarcinome parathyroïdien à *C75.0*
- Adénome parathyroïdien à *D35.1*
- Carcinome parathyroïdien à *C75.0*

Cellule fusiforme
- Tissu cellulaire sous-cutané ¬ Hémangiome à *D18.01*
- Type
- - A ¬ Mélanome malin du corps ciliaire, à *C69.4*
- - B ¬ Mélanome malin du corps ciliaire, à *C69.4*

Cellule fusiforme *–suite*
- ¬
- - Carcinome rénal tubulo-mucineux à *C64*
- - Hémangiome à *D18.00*

Cellule géante
- Articulation
- - Cheville ¬ Tumeur ténosynoviale à *M12.27*
- - Coude ¬ Tumeur ténosynoviale à *M12.22*
- - Genou ¬ Tumeur ténosynoviale à *M12.26*
- - Hanche ¬ Tumeur ténosynoviale à *M12.25*
- Articulation de l'épaule ¬ Tumeur ténosynoviale à *M12.21*
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ Tumeur ténosynoviale à *M12.28*
- Central ¬ Granulome
- - *K10.1*
- - *K10.1*
- Cerveau ¬ Glioblastome à *C71.0*
- Cervelet ¬ Glioblastome à *C71.6*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Glioblastome à *C71.8*
- Lobe frontal ¬ Glioblastome à *C71.1*
- Lobe occipital ¬ Glioblastome à *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ Glioblastome à *C71.3*
- Lobe temporal ¬ Glioblastome à *C71.2*
- Main ¬ Tumeur ténosynoviale à *M12.24*
- Ostéoclastique
- - Col du pancréas ¬ Tumeur à *C25.7*
- - Pancréas, à localisations contiguës ¬ Tumeur à *C25.8*
- - Queue du pancréas ¬ Tumeur à *C25.2*
- Polymyalgie rhumatismale ¬ Artérite à *M31.5*
- SAI ¬ Granulome à *K10.1*
- Tronc cérébral ¬ Glioblastome à *C71.7*
- Type ostéoclastique
- - Col du pancréas ¬ Carcinome indifférencié à *C25.7*
- - Corps du pancréas ¬ Carcinome indifférencié à *C25.1*
- - Localisations contiguës ¬ Carcinome indifférencié du pancréas à *C25.8*
- - Pancréas ¬ Carcinome indifférencié à *C25.9*
- - Queue du pancréas ¬ Carcinome indifférencié à *C25.2*
- - Tête du pancréas ¬ Carcinome indifférencié à *C25.0*
- - ¬ Carcinome indifférencié du pancréas à *C25.9*
- ¬
- - Artérites à *M31.6*
- - Astrocytome sous-épendymaire à *D43.2*
- - Epulis (à): *K06.8*
- - Fibroadénome intracanaliculaire à *D24*
- - Glioblastome à *C71.9*
- - Granulome: périphérique à *K06.8*
- - Hépatite fœtale ou néonatale, à *P59.2*
- - Myocardite idiopathique à *I40.8*

Cellule géante *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Myopathie au cours d'artérite à *M31.6†, G73.7**
- - Réticulohistiocytome (à *D76.3*
- - Thyroïdite (à) (de): *E06.1*

Cellule mucoïde ¬
- Adénocarcinome hypophysaire à *C75.1*
- Adénome hypophysaire à *D35.2*
- Carcinome hypophysaire à *C75.1*

Cellule NK
- Rémission complète ¬ Leucémie agressive à *C94.71*
- ¬
- - Entéropathie à *K52.8*
- - Leucémie agressive à *C94.70*
- - Leucémie chronique à grands lymphocytes granuleux à *C84.5*
- - Lymphome blastique à *C86.4*

Cellule précurseur
- B ¬ Lymphome à *C83.5*
- T ¬ Lymphome à *C83.5*

Cellule souche
- Hématopoïétique
- - Immunosuppression actuelle ¬
- - - État consécutif à une transplantation de *Z94.81*
- - - Infection à adénovirus chez un patient ayant subi une greffe de *B34.0, Z94.81*
- - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un transplant de *T86.0*
- - Sans immunosuppression actuelle ¬ État consécutif à une transplantation de *Z94.80*
- - ¬ Échec d'un transplant de *T86.00*
- Lignée incertaine ¬ Leucémie à *C95.0*
- Limbiques ¬ Insuffisance des *H18.8*
- ¬
- - Donneur de *Z52.01*
- - Rejet de greffon après transplantation de *T86.00*

Cellule T
- Adulte
- - Associé HTLV-1 ¬
- - - Leucémie à *C91.50*
- - - Lymphome à *C91.51*
- - Associée au HTLV-1) en rémission complète ¬ Leucémie à *C91.51*
- - ¬
- - - Leucémie à *C91.50*
- - - Lymphome
- - - - *C91.50*
- - - - Lymphomateux à *C91.50*
- Alpha ¬ Déficit en cellules TCR [récepteur des *D81.8*
- Associé à des entéropathies ¬ Lymphome à *C86.2*
- CD30 positif ¬ Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à *C86.6*

Cellule T *–suite*
- Déficit en RHOH ¬ Déficit immunitaire à *D81.8*
- Élastolytique ¬ Lymphome cutané à *C84.0*
- Histiocytes ¬ Lymphome à grandes cellules B riche en *C83.3*
- Non spécifié ¬ Lymphome périphérique à *C84.4*
- Périphérique non spécifié ¬ Lymphome cutané primitif à *C84.4*
- Positive au virus Epstein-Barr chez l'enfant ¬ Maladie lymphoprolifératives systémique à *D82.3*
- Rémission complète ¬ Leucémie prolymphocytaire à *C91.61*
- Sans précision ¬ Lymphome cutané à *C84.8*
- Type panniculite ¬ Lymphome sous-cutané à *C86.3*
- ¬
- - Leucémie promyélocytaire à *C91.60*
- - Lymphome
- - - *C84.4*
- - - Diffus grandes Cellule B riche
- - - - *C83.3*
- - - - *C83.3*
- - - Hépatosplénique à *C86.1*
- - Lymphome folliculaire à *C84.5*
- - Lymphome lymphoblastique à *C83.5*
- - Lymphome non hodgkinien à *C84.4*
- - Maladie BENTA [expansion des cellules B et anergie des *D81.8*

Cellule T/NK
- Matures
- - Sans précision ¬ Lymphome à *C84.9*
- - ¬ Autres lymphomes à *C84.5*
- Sans précision ¬ Lymphome à *C84.9*

Cellule transitionnelle
v./v.a. Carcinome à cellules transitionnelles
- Col vésical ¬ Carcinome non papillaire à *C67.5*
- Dôme de la vessie ¬ Carcinome non papillaire à *C67.1*
- Orifice urétéral ¬ Carcinome non papillaire à *C67.6*
- Ouraque ¬ Carcinome non papillaire à *C67.7*
- Paroi
- - Antérieure de la vessie ¬ Carcinome non papillaire à *C67.3*
- - Latérale de la vessie ¬ Carcinome non papillaire à *C67.2*
- - Postérieure de la vessie ¬ Carcinome non papillaire à *C67.4*
- Trigone de la vessie ¬ Carcinome non papillaire à *C67.0*
- ¬
- - Carcinome non papillaire de la vessie à *C67.9*
- - Méningiome à *D32.9*

Cellule vitreuse
v./v.a. Carcinome à cellules vitreuses

Cellulite
- Orbite ¬ *H05.0*
- Phlegmoneuse
- - Conduit auditif externe ¬ *H60.1*
- - Oreille externe ¬ *H60.1*
- - Pavillon de l'oreille ¬ *H60.1*

Cellulosae ¬ Infection à Cysticercus *B69.9*

Celse ¬ Kérion de *B35.0*

CELSR1 ¬ Lymphœdème primaire tardif associé à *Q82.08*

Cément ¬
- Aplasie et hypoplasie du *K00.4*
- Carie du *K02.2*

Cémentaire ¬ Hyperplasie *K03.4*

Cémento-osseuse floride
- Mâchoire supérieure ¬ Dysplasie *D16.42*
- Maxillaire ¬ Dysplasie *D16.42*

Cenani-Lenz ¬ Syndactylie de *Q74.8*

Cénestopathique ¬ Schizophrénie *F20.8*

Centre
- Maladies rares ¬ Maladie rare sans diagnostic déterminé après investigation complète par un *R69*
- Respiratoire immature du prématuré ¬ *P28.8*

Centrifuge ¬
- Érythème annulaire *L53.1*
- Lipodystrophie *E88.1*

Centroblastique
- Centrocytique ¬ Lymphome folliculaire *C82.9*
- Diffus ¬ Lymphome *C83.3*
- Grandes cellules B ¬ Lymphome diffus *C83.3*
- Non-hodgkinien ¬ Lymphome *C83.3*
- ¬
- - Lymphome diffus à grandes cellules B *C83.3*
- - Lymphome folliculaire *C82.2*

Centroblastique-centrocytaire
- Diffus ¬ Lymphome *C83.9*
- ¬ Lymphome *C83.9*

Centroblastome ¬ *C83.3*

Centrocytaire ¬ Lymphome *C83.1*

Centrocytique ¬ Lymphome folliculaire centroblastique- *C82.9*

Centrofolliculaire
- Cutané
- - Primitif ¬ Lymphomes B *C82.6*
- - ¬ Lymphome *C82.6*
- Diffus ¬ Lymphome *C82.5*

Centro-lobulaire ¬ Emphysème *J43.2*

Centromérique-immunodéficience-dysmorphie] ¬ Syndrome ICF [instabilité *D82.8*

Centronucléaire
- Autosomique
- - Dominante ¬ Myopathie *G71.2*

Centronucléaire *–suite*
- Autosomique *–suite*
- - Récessive ¬ Myopathie *G71.2*
- Liée X
- - Anomalies génitales ¬ Syndrome de myopathie *G71.2, Q55.9*
- - Femme porteuse ¬ Forme symptomatique de la myopathie *G71.2*
- - ¬ Myopathie *G71.2*

Centro-nucléaire ¬ Myopathie myotubulaire *G71.2*

Centropontine ¬ Myélinolyse *G37.2*

Centro-temporales à l'EEG ¬ Épilepsie bénigne de l'enfance avec pointes *G40.08*

Centro-temporaux [Rolando] ¬ Épilepsie bénigne à pics *G40.08*

Cénurose ¬ *B71.8*

CEP [Porphyrie érythropoïétique congénitale] ¬ *E80.0*

CEP19
- Enfant adolescent 3 18 ¬ Obésité
- - Déficit en *E66.84*
- - Extrême par déficit en *E66.85*
- Indice de masse corporelle IMC
- - 60 et plus chez l'adulte ¬ Obésité par déficit congénital en *E66.88*
- - Compris
- - - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.80*
- - - 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.81*
- - - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.86*
- - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.87*
- ¬ Obésité par déficit en *E66.89*

Céphalée
- Cause allergique ¬ *G44.8*
- Chronique
- - Dite de tension ¬ *G44.2*
- - Post-traumatique ¬ *G44.3*
- Dite de tension ¬ *G44.2*
- Grappe ¬ *G44.0*
- Histaminique
- - Horton ¬ *G44.0*
- - ¬ *G44.0*
- Hypnique ¬ *G44.8*
- Inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, *N95.1*
- Médicamenteuse, non classée ailleurs ¬ *G44.4*
- Migraineuse ¬ Syndrome de dystrophie rétinienne-œdème du nerf optique-splénomégalie-anhidrose- *Q87.8*
- Névralgique unilatérale brève avec injection conjonctivale ¬ *G44.8*
- Origine vertébrale ¬ *M54.2*
- Provoquée rachianesthésie anesthésie épidural cours

Céphalée *–suite*
- Provoquée rachianesthésie anesthésie épidural cours *–suite*
- - Grossesse ¬ *O29.4*
- - Puerpéralité ¬ *O89.4*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.5*
- Tension
- - Épisodique ¬ *G44.2*
- - SAI ¬ *G44.2*
- Unilatérale dans le sens d'une migraine ¬ *G43.9*
- Vasculaire
- - Non classée ailleurs ¬ *G44.1*
- - SAI ¬ *G44.1*
- ¬
- - *R51*
- - Migraine: aura, sans *G43.1*
- - Psychogène: *F45.40*

Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.0*

Céphalique
v./v.a. cervico-céphalique
- Bénigne ¬ Histiocytose *D76.3*
- Fémoral ¬ Anomalie du noyau *Q72.4*
- ¬
- - Syndromes précisés d'algies *G44.8*
- - Tétanos *A35*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.80*

Céphalo-pelvienne SAI ¬ Disproportion: *O33.9*

Céphalopolysyndactylie Greig ¬ Syndrome
- *Q87.0*
- Gènes contigus de *Q87.0*

Céphalorachidien
- Postopératoire ¬ Fistule de liquide *G97.80*
- Rachicentèse ¬ Écoulement de liquide *G97.0*
- ¬
- - Écoulement de liquide *G96.0*
- - Présence d'un appareil de drainage du liquide *Z98.2*
- - Résultat
- - - Anormaux de l'examen du liquide *R83.9*
- - - Cytologique anormal du liquide *R83.6*
- - - Histologique anormal du liquide *R83.7*
- - - Immunologique anormal du liquide *R83.4*
- - - Microbiologique anormal du liquide *R83.5*
- - Syphilis congénitale tardive latente, avec réaction négative dans le liquide *A50.6*
- - Taux anormal
- - - Enzymes du liquide *R83.0*
- - - Hormones du liquide *R83.1*
- - - Substances d'origine principalement non médicinale du liquide *R83.3*

Céphalosporines et autres bêtalactamines ¬ Intoxication: *T36.1*

Céphalothoracique progressive ¬ Lipodystrophie *E88.1*

CEPT ¬ Déficit en *E78.4*

Céramidase
- 3 ¬ Leucodystrophie par déficit en alkaline *E75.2*
- Acide ¬ Déficit en *E75.2*

Cercarienne ¬ Dermite *B65.3*

Cerclage avec ou sans mention de béance du col ¬ Soins maternels pour: *O34.3*

Céréalier ¬ Maladie des travailleurs du secteur *J67.00*

Cérébellaire localisée de cause traumatique ¬ Hémorragie *S06.34*

Cerebellaris myoclonica ¬ Dyssynergia *G11.1*

Cérébelleux
v./v.a. Artère cérébelleuse
v./v.a. oculo-réno-cérébelleux
v./v.a. Type de maladie

Cérébellite post-infectieuse ¬ *G04.8*

Cérébello
v./v.a. cranio-cérébello-cardiaque
- Médullaire élargie-hydrocéphalie ¬ Syndrome de nævus en tache de vin-citerne *Q04.8, Q82.5*
- Rétinienne infantile ¬ Dégénérescence *G31.88*

Cérébello-cérébrale progressiv] ¬ PCCA [Atrophie *G31.88*

Cérébellofaciodentaire ¬ Syndrome *Q87.0*

Cérébellorétinienne familiale ¬ Angiomatose *Q85.8*

Cérébello-trigéminale dermique ¬ Dysplasie *Q87.8*

Cérébral
v./v.a. cérébello-cérébral
v./v.a. cranio-cérébral
v./v.a. méningo-cérébral
v./v.a. oculo-palato-cérébral
v./v.a. Type de maladie

Cérébro
v./v.a. endocrino-cérébro-ostéodysplasique
v./v.a. oculo-cérébro-facial
v./v.a. thyro-cérébro-rénal
- Cutané avec surcharge en fer ¬ Syndrome *G31.88*
- Rénal de Lowe ¬ Syndrome oculo- *E72.0*
- Rénale ¬ Déplétion de l'ADN mitochondrial, forme hépato- *G31.81*

Cérébro-cérébelleuse ¬ Syndrome d'épilepsie focale-déficience intellectuelle-malformation *Q04.8*

Cérébrocostomandibulaire ¬ Syndrome *Q87.5*

Cérébro-facial
- Type
- - 1 ¬ Syndrome métamérique artério-veineux *Q28.28*
- - 2 ¬ Syndrome métamérique artério-veineux *Q28.28*
- - 3 ¬ Syndrome métamérique artério-veineux *Q28.28*

Cérébro-facial *–suite*
- ¬ Syndrome métamérique artério-veineux *Q28.28*

Cérébrofaciothoracique ¬ Dysplasie *Q87.5*

Cérébrofrontofacial ¬ Syndrome de Baraitser-Winter *Q87.0*

Cérébro-hépato-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Cérébro-maculaire ¬ Dystrophie *E75.4*

Cérébro-oculo-facio-squelettique
- Autosomique récessif)] ¬ Syndrome de Pena-Shokeir type II [Syndrome *Q87.8*
- ¬ Syndrome
- - *Q87.8*
- - COFS [*Q87.8*

Cérébro-oculo-nasal ¬ Syndrome *Q87.0*

Cérébro-palato-cardiaque d'Hamel ¬ Syndrome *Q87.8*

Cérébrorénale, type Perez ¬ Syndrome *G31.88*

Cérébro-réno-génito-urinaire ¬ Syndrome létal fœtal d'agénésie/hypoplasie *Q87.8*

Cérébrorétinienne ¬ Lipidose *E75.4*

Cérébroside ¬ Lipidose *E75.2*

Cérébrosidose ¬ *E75.2*

Cérébrospinale
- Due au typhus ¬ Méningite *A75.9†, G01**
- Épidémique ¬ Méningite *A39.0†, G01**
- Méningocoques ¬
- - Fièvre *A39.0†, G01**
- - Infection *A39.0†, G01**
- Tuberculeuse ¬ Méningite *A17.0†, G01**
- ¬
- - Liquorrhée *G96.0*
- - Tuberculose *A17.8†, G07**

Cerebrospinalis epidemica ¬ Meningitis *A39.0†, G01**

Cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ Cholestérose *E75.5*

Cérébrovasculaire
- Aiguë, SAI ¬ Insuffisance *I67.88*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres troubles *I68.8**
- Dégénérative ¬ Lésion *I67.9†, G32.8**
- Imminent ¬ Accident *G45.9*
- Non précisées ¬ Séquelles de maladies *I69.8*
- Précisées ¬ maladies
- - *I67.8*
- - *I67.88*
- SAI ¬ Accident *I64*
- Sans précision ¬ Maladie *I67.9*
- ¬
- - Dégénérescence *I67.9†, G32.8**
- - Syndrome
- - - Vaisseaux cérébraux au cours de maladies *I67.9†, G46.8**
- - - Vasculaire au cours de maladies *I67.9†, G46.8**
- - Syphilis *A52.0†, I68.8**

Cereus ¬ Intoxication alimentaire à Bacillus *A05.4*

Cernunnos ¬ Déficit en *D81.1*

Cernunnos-XLF ¬ Déficit en *D81.1*

Céroïde-lipofuscinose neuronal

- Adulte ¬ *E75.4*
- Infantile tardive ¬ *E75.4*
- Juvénile
- - Associée à ATP13A2 ¬ *E75.4*
- - ¬ *E75.4*
- Type
- - 4 ¬
- - - *E75.4*
- - - Maladie CLN4 [*E75.4*
- - 4A ¬ *E75.4*
- - 11 ¬
- - - *E75.4*
- - - Maladie CLN11 [*E75.4*
- - 12 ¬
- - - *E75.4*
- - - Maladie CLN12 [*E75.4*
- - 13 ¬
- - - *E75.4*
- - - Maladie CLN13 [*E75.4*
- - 14 ¬
- - - *E75.4*
- - - Maladie CLN14 [*E75.4*
- Variante épilepsie nordique ¬ *E75.4*
- ¬ NCL [*E75.4*

Céroïdes neuronaux ¬ Lipofuscinose à *E75.4*

Certificat médical ¬ Établissement d'un *Z02*

Céruléenne ¬ Cataracte *Q12.0*

Cérumen ¬ Bouchon de *H61.2*

Cerveau

- Contusion localisée ¬ Compression du *S06.31*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections précisées du *G94.8**
- Déficit en méthionine adénosyltransférase ¬ Démyélinisation du *E72.1*
- Enfant ¬ Dégénérescence congénitale du *Q04.9*
- Entamoeba histolytica ¬ Abcès du *A06.6†*, *G07**
- Fœtal sporadique ¬ Syndrome de destruction du *Q02*
- Foie) (et du poumon) ¬ Abcès amibien du *A06.6†*
- Hémorragie et pression cérébrale lors d'une lésion cranio-cérébrale couverte grave ¬ Compression du *S06.21*, *S01.83!*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Astrocytome du *C71.8*
- Leucodystrophie multikystique bilatérale ¬ Syndrome muscle-œil- *G71.2*, *E75.2*
- Méninges cérébrales ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.3*
- Méningocoques ¬ Infection du *A39.8†*, *G05.0**

Cerveau *–suite*

- Nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou ¬ Lésions traumatiques du *T06.0*
- Poumon-thyroïde ¬ Syndrome *E03.1†*, *J99.8**, *G25.5*
- Sans précision ¬ Affection du *G93.9*
- Toute région] ¬ Abcès (embolique) (du): *G06.0*
- Tronc cérébral) ¬ Compression du *G93.5*
- ¬
- - Abcès amibien du *A06.6†*, *G07**
- - Abcès chromomycotique du *B43.1†*, *G07**
- - Abcès tuberculeux du *A17.8†*, *G07**
- - Astroblastome du *C71.0*
- - Astrocytome
- - - *C71.0*
- - - Anaplasique du *C71.0*
- - - Diffus du *C71.0*
- - - Pilocytique du *C71.0*
- - - Pilomyxoïde du *C71.0*
- - Astrocytome protoplasmique du *C71.0*
- - Compression du *G93.5*
- - Cryptococcose du *B45.1†*, *G05.2**
- - Endartérite syphilitique du *A52.0†*, *I68.1**
- - Ependymoblastome du *C71.0*
- - Glioblastome
- - - *C71.0*
- - - *C71.9*
- - - Cellules géantes du *C71.0*
- - Gliome du *C71.9*
- - Gliosarcome du *C71.0*
- - Hernie du *G93.5*
- - Kyste
- - - Dermoïde du *D33.2*
- - - Hydatique du *B67.9†*, *G94.8**
- - Maladie due au VIH avec lymphome primaire du *B21*, *C85.9*
- - Médulloépithéliome du *C71.0*
- - Oligoastrocytome
- - - *C71.0*
- - - Anaplasique du *C71.0*
- - Oligodendrogliome du *C71.0*
- - Syndrome muscle-œil- *G71.2*
- - Syphilis vasculaire du *A52.0†*, *I68.8**
- - TBC [Tuberculose] du *A17.8†*, *G07**
- - Tératome bénin du *D33.2*
- - Trouble du développement neurologique avec microcéphalie, arthrogrypose et anomalies structurelles du *Q87.8*
- - Tuberculome de *A17.8†*, *G07**
- - Tuberculose du *A17.8†*, *G07**
- - Tumeur oligoastrocytaire du *C71.0*
- - Tumeur rhabdoïde tératoïde atypique du *C71.0*
- - Xanthoastrocytome pléomorphe du *C71.0*

Cervelet

- Due à un traumatisme obstétrical ¬ Déchirure de la tente du *P10.4*
- Primitive ¬ Tumeur neuroectodermique du *C71.6*
- ¬
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- - Agénésie du *Q04.3*
- - Astroblastome du *C71.6*
- - Astrocytome
- - - Anaplasique du *C71.6*
- - - Diffus du *C71.6*
- - - Fibrillaire du *C71.6*
- - - Gémistocytique du *C71.6*
- - - Pilocytique du *C71.6*
- - - Pilomyxoïde du *C71.6*
- - Astrocytome protoplasmique du *C71.6*
- - Carcinome embryonnaire du *C71.6*
- - Gangliogliome anaplasique du *C71.6*
- - Germinome du *C71.6*
- - Glioblastome
- - - *C71.6*
- - - Cellules géantes du *C71.6*
- - Gliome malin du *C71.6*
- - Gliosarcome du *C71.6*
- - H-ABC [Hypomyélinisation avec atrophie des noyaux gris centraux et du *E75.2*
- - Médulloépithéliome du *C71.6*
- - Oligoastrocytome
- - - *C71.6*
- - - Anaplasique du *C71.6*
- - Oligodendrogliome
- - - *C71.6*
- - - Anaplasique du *C71.6*
- - Tératome malin du *C71.6*
- - Tuberculose du *A17.8†*, *G07**
- - Tumeur
- - - Embryonnaire avec rosettes pluristratifiées du *C71.6*
- - - Oligodendrogliale du *C71.6*
- - Tumeur maligne: *C71.6*
- - Tumeur mixte des cellules germinales du *C71.6*
- - Tumeur oligoastrocytaire du *C71.6*
- - Tumeur rhabdoïde tératoïde atypique du *C71.6*
- - Xanthoastrocytome pléomorphe du *C71.6*

Cervical
v./v.a. Type de maladie

Cervicalgie ¬

- *M54.2*
- Atteinte des disques: cervicaux avec *M50*

Cervicite

- Accouchement ¬ *O86.1*
- Chlamydia ¬ *A56.0*
- Due au virus de l'herpès ¬ *A60.0†*, *N74.8**

Cervicite *–suite*
- Sans érosion ou ectropion ¬ *N72*
- Syphilitique
- - Tardive ¬ *A52.7†, N74.2**
- - ¬ *A52.7†, N74.2**
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N74.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N74.0**

Cervico-auriculaire ¬ Fistule (du): *Q18.1*

Cervico-brachial ¬ Syndrome *M53.1*

Cervico-céphalique ¬ Syndrome *M53.0*

Cervico-dorsaux ¬ atteinte des disques: *M50*

Cervico-facial ¬
- Actinomycose *A42.2*
- Fibrochondrome *D21.0*

Cervicothoracique
- Noyau gélatineux
- - Névrite ¬ Hernie *M50.1†, G55.1**
- - Radiculopathie ¬ Hernie *M50.1†, G55.1**
- ¬ Syndrome
- - Aplasie müllérienne-aplasie rénale-anomalies *Q87.8*
- - Défilé *G54.0*

Cervicotrochantérienne ¬ Portion *S72.05*

Cervico-utérin
- Non précisé ¬ Suivi de la mère en cas d'insuffisance *O34.39*
- ¬ Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance *O34.38*

Cervico-vaginal ¬
- Adénosarcome de la jonction *C53.8*
- Carcinome à cellules vitreuses de la jonction *C53.8*
- Carcinome adénoïde kystique de la jonction *C53.8*
- Carcinome basocellulaire adénoïde de la jonction *C53.8*
- Carcinome neuroendocrine mal différencié de la jonction *C53.8*
- Léiomyosarcome de la jonction *C53.8*
- Rhabdomyosarcome de la jonction *C53.8*
- Tumeur germinale maligne de la jonction *C53.8*

Cervico-vaginite à Chlamydia ¬ *A56.0*

Cervico-vésicale ¬ Fistule: *N82.1*

Césarienne
- Acte chirurgie obstétrical acte visée diagnostique thérapeutique y compris accouchement SAI ¬
- - Anoxie cérébrale survenant après une *O75.4*
- - Arrêt cardiaque survenant après une *O75.4*
- - Insuffisance cardiaque survenant après une *O75.4*
- Antérieure ¬ Soins maternels pour cicatrice due à une *O34.2*
- Avant début travail ¬ lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris
- - *O32*

Césarienne *–suite*
- Avant début travail ¬ lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris *–suite*
- - *O34*
- Cours d'insuffisance placentaire ¬ *O36.5*
- Déclenchement chirurgical ¬ Lésion du placenta par amniocentèse, *P02.1*
- Sans travail spontané ¬ Accouchement prématuré (par): *O60.3*
- ¬
- - Accouchement
- - - Unique par *O82*
- - - Voie vaginale après une *O75.7*
- - Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par *O66.5*
- - Échec de l'épreuve de travail, suivi d'une *O66.4*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par *P03.4*
- - Infection d'une suture: après *O86.0*
- - Rupture d'une suture de *O90.0*
- - Travail prématuré spontané accouchement
- - - Prématuré par *O60.1*
- - - Terme par *O60.2*

Cesioflammea ¬ Phacomatose *Q85.8*

Cesiomarmorata ¬ Phacomatose *Q85.8*

Cestan Chenais ¬ Syndrome de *I63.0†, G46.3**

Cestodes
- Adultes (Taenia saginata) ¬ Infection par *B68.1*
- Chien ¬
- - Dipylidiose [infection par *B71.1*
- - Infection par *B67.4*
- Poisson ¬ Infection à *B70.0*
- Porc ¬ Infection par *B68.0*
- Précisées ¬ Autres infections par *B71.8*
- Rat ¬ Infection par *B71.0*
- SAI ¬ Infection à *B71.9*
- ¬ Infection à *B71.9*

Cétoacide
- Chaînes ramifiées ¬ Syndrome d'autisme-épilepsie par déficit en kinase déshydrogénase des *E71.1*
- CoA transférase ¬ Déficit en succinyl-CoA:3- *E71.3*
- Déshydrogénase des chaînes ramifiées ¬ Déficit en 2- *E71.0*

Cétoacidose par déficit en transporteur 1 de monocarboxylate ¬ *E88.8*

Cétoacidurie à chaînes ramifiées ¬ *E71.0*

Cétoglutarate
v./v.a. alpha-cétoglutarate

Cétolyse ¬ Trouble de la *E71.3*

Cétones ¬
- Effet toxique: *T52.4*
- Solvants du groupe: *L24.2*

Cétoniques ¬ Trouble de l'oxydation des acides gras et du métabolisme des corps *E71.3*

Cétonurie ¬ *R82.4*

Cétose ¬
- *E88.8*
- Diabète (sucré): sujet à *E10*

Cétosique ¬
- Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): non *E11*
- Glycinémie *E71.1*
- Hyperglycinémie non *E72.5*

Cétostéroïde
- Réductase ¬ Déficit en 17- *E29.1*
- ¬ Taux urinaires élevés de: 17- *R82.5*

Cétothiolase
v./v.a. bêta-cétothiolase

Cétylstéarylique ¬ Hypersensibilité à l'alcool *T78.4*

CF [Fibrose kystique] ¬ *E84.9*

CFA [Alvéolite fibrosante cryptogénique] ¬ *J84.10*

CFC ¬ Syndrome *Q87.8*

CFS [Chronic fatigue syndrome] ¬ *G93.39*

CGD [Granulomatose chronique] ¬ *D71*

Chagas
- Atteinte cardiaque ¬ Forme aiguë de la maladie de *B57.0†, I98.1**
- Chronique atteinte
- - Appareil digestif ¬ Maladie de *B57.3†, K93.8**
- - Cardiaque ¬ Maladie de *B57.2†, I98.1**
- - Organes ¬ Maladie de *B57.5*
- - Système nerveux ¬ Maladie de *B57.4†, G99.8**
- Sans atteinte organique ¬ Maladie de *B57.1*

Chaîne
- Alpha
- - CD8 ¬ Susceptibilité aux infections respiratoires associée à une mutation de la *D84.8*
- - Fibrinogène A ¬ Amylose à *E85.0†, N08.4**
- Courte ¬
- - Déficit
- - - Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- - - Mitochondrial en énoyl-CoA hydratase 1 à *G31.81*
- - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- Gamma] ¬ Gangliosidose GM [marqueur de *E75.1*
- Légère
- - Ig monoclonales ¬ Syndrome de Fanconi acquis associé à la *D47.2, E83.38*
- - Kappa ¬ Déficit de la *D80.8*

Chaîne *–suite*
- Légère *–suite*
- - Neurofilaments ¬ Neuropathie axonale sévère précoce par déficit en *G60.0*
- - ¬ Amylose
- - - *E85.88*
- - - Systémique à *E85.30*
- Longue ¬ Déficit
- - 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- - Acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- Lourde
- - Immunoglobulines ¬ Déficit en *D80.8*
- - ¬ Amylose à *E85.9*
- Lourdes
- - Alpha en rémission complète ¬ Maladie des *C88.31*
- - Gamma
- - - Rémission complète ¬ Maladie des *C88.21*
- - - ¬ Maladie des *C88.2*
- - Mu ¬ Maladie des *C88.21*
- - ¬ maladie
- - - *C88.2*
- - - *C88.20*
- Moyenne ¬ Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- Ramifié ¬
- - Anomalie du métabolisme des acides aminés à *E71.2*
- - Anomalies du métabolisme des acides aminés à *E71.1*
- - Cétoacidurie à *E71.0*
- - Déficit en 2-cétoacide déshydrogénase des *E71.0*
- - Syndrome d'autisme-épilepsie par déficit en kinase déshydrogénase des cétoacides à *E71.1*
- Respiratoire mitochondrial ¬
- - Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en complexe I de la *I42.2*
- - Déficit isolé complexe
- - - I de la *G31.81*
- - - III de la *G31.81*
- - - IV de la *G31.81*
- - - V de la *G31.81*

Chalazion ¬ *H00.1*

Chalcose ¬ *H44.3*

Chaleur
- Artificielle
- - Excessive ¬ Exposition à de la *W92.9!*
- - ¬ Accident dû à la *W92.9!*
- Froid naturel excessif ¬ Exposition à: *X59.9!*
- Insolation ¬ Coup de *T67.0*
- Insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de *N95.1*
- Lumière

Chaleur *–suite*
- Lumière *–suite*
- - Sans précision ¬ Effet de la *T67.9*
- - ¬ Autres effets de la *T67.8*
- Multiples SAI ¬ Phlyctènes (non dues à la *T00.9*
- Perte
- - Hydrique ¬ Épuisement dû à la *T67.3*
- - Sel
- - - Eau) ¬ Prostration due à la *T67.4*
- - - ¬ Épuisement dû à la *T67.4*
- SAI ¬ Prostration due à la *T67.5*
- Sans précision ¬ Épuisement dû à la *T67.5*
- ¬
- - Collapsus dû à la *T67.1*
- - Crampes dues à la *T67.2*
- - Fatigue transitoire due à la *T67.6*
- - Lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Phlyctène (non due à la *S30.82*
- - Œdème dû à la *T67.7*
- - Syncope due à la *T67.1*
- - Syndrome de pertes hydrosodées par la *T67.8*
- - Urticaire provoquée par le froid et la *L50.2*

Chambre
- Antérieure œil
- - Exsudatif ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Implant ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Parasitaire ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - SAI ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q13.9*
- - ¬
- - - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - - Malformations congénitales de la *Q13.8*
- - - Rétention (ancienne) de corps étranger magnétique dans: *H44.6*
- Implantable [port] ¬ Septicémie due à un système de *T82.75*
- Postérieure œil
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q14.9*
- - ¬ Autres malformations congénitales de la *Q14.8*

Champ visuel ¬
- Anomalies du *H53.4*
- Rétrécissement généralisé du *H53.4*

CHAMP1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie faciale-troubles du comportement associé à *Q87.0*

Champignonnistes
- Exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.51*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.50*

Champignonnistes *–suite*
- ¬ Poumon des *J67.50*

Champignons
- Ingérés ¬ Effet toxique: *T62.0*
- ¬ Bronchopneumonie due à des *B49†, J17.2**

Chanarin
v./v.a. Dorfman-Chanarin

Chancre
- Conjonctive ¬ *A51.2†, H13.1**
- Initial) de la pinta [caraté] ¬ *A67.0*
- Mou ¬ *A57*
- Paupières ¬ *A51.2†, H13.1**
- Pianique ¬ *A66.0*
- Syphilitique SAI ¬ *A51.0*
- ¬ *A51.0*

Chancrelle ¬ *A57*

CHAND [cheveux frisés-ankyloblépharon-dysplasie des ongles ¬ Syndrome *Q82.4*

Chandler ¬ Syndrome de *H21.8*

Changement
- Couleur pendant la formation de la dent ¬ *K00.8*
- Emploi ¬ *Z56*
- Générateur d'un stimulateur cardiaque ¬ *Z45.00*
- Pansement ¬ *Z48.0*
- Pression atmosphérique
- - Ambiant
- - - Eau ¬ Effets sur l'oreille des *T70.0*
- - - ¬ Effets sur les sinus des *T70.1*
- - ¬ Accident dû à un *W94.9!*
- Stimulateur cardiaque ¬ *Z45.00*
- Timbre SAI ¬ *R49.8*
- Tissu des relations familiales pendant l'enfance ¬ *Z61*
- Vérification enlèvement
- - Appareils externes de fixation ou de traction ¬ *Z47.8*
- - Plâtre ¬ *Z47.8*

CHAOS [Syndrome congénital d'obstruction des voies aériennes supérieures] ¬ *Q34.8*

Chapare ¬ Fièvre hémorragique à arénavirus *A96.8*

CHAPLE [hyperactivation du complément-thrombose-entéropathie avec perte de protéines] ¬ Syndrome *D84.1*

Char ¬ Syndrome de *Q87.8*

Charbon
- Cérébral ¬ *A22.8†, G01**
- Cutané ¬ *A22.0*
- Gastro-intestinal ¬ *A22.2†, K93.8**
- Inhalation ¬ *A22.1†, J17.0**
- Organes respiratoires ¬ *A22.1†, J17.0**
- Pneumonie ¬ *A22.1†, J17.0**
- Pulmonaire ¬ *A22.1†, J17.0**
- Respiratoire ¬ *A22.1†, J17.0**
- ¬

Charbon *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Formes de *A22.8*
- - Pneumoconiose des mineurs de *J60*
- - Poumon des mineurs de *J60*
- - Vaccination contre le *Z23.8*

Charbonneuse ¬
- Méningite *A22.8†, G01**
- Septicémie *A22.7*

Charcot
v./v.a. Arthrite de Charcot
v./v.a. Erb-Charcot
- Cours de syphilis ¬ Arthropathie de *A52.1†, M14.69**
- Diabétique ¬ Arthropathie de *E14.60†, M14.69**
- II ¬ Syndrome de *G12.2*
- Sclérose latérale amyotrophique] ¬ Maladie de *G12.2*
- ¬
- - Arthropathie
- - - *G98†, M14.69**
- - - Non syphilitique de *G98†, M14.69**
- - - Syphilitique de *A52.1†, M14.69**
- - - Syringomyélique de *G95.0†, M49.49**
- - - Tabique de *A52.1†, M14.69**
- - Cirrhose de *K74.3*
- - Syphilis articulaire de *A52.1†, M14.69**
- - Tabo-paralysie avec articulation de *A52.1†, M14.69**

Charcot-Marie-Tooth
- Autosomique
- - Dominante type
- - - 2
- - - - Associée
- - - - - ATP1A1 ¬ Maladie de *G60.0*
- - - - - MME ¬ Maladie de *G60.0*
- - - - Axones géants ¬ Maladie de *G60.0*
- - - - Due mutation
- - - - - DGAT2 ¬ Maladie de *G60.0*
- - - - - KIF5A ¬ Maladie de *G60.0*
- - - - - TFG ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2A1 ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2A2 ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2B ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2C ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2D ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2E ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2F ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2I ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2J ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2K ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2L ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2M ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2N ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2O ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2P ¬ Maladie de *G60.0*

Charcot-Marie-Tooth *–suite*
- Autosomique *–suite*
- - Dominante type *–suite*
- - - 2Q ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2U ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2V ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2W ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2Y ¬ Maladie de *G60.0*
- - - 2Z ¬ Maladie de *G60.0*
- - Récessive type
- - - 2 due à une mutation de SPG11 ¬ Maladie de *G60.0*
- - - Ouvrier ¬ Maladie de *G60.0*
- Axonal autosomique récessive
- - Acrodystrophie ¬ Maladie de *G60.0*
- - Due a un défaut du métabolisme du cuivre ¬ Maladie de *G60.0*
- Intermédiaire autosomique
- - Dominante
- - - A ¬ Maladie de *G60.0*
- - - B ¬ Maladie de *G60.0*
- - - C ¬ Maladie de *G60.0*
- - - D ¬ Maladie de *G60.0*
- - - Douleurs neuropathiques ¬ Maladie de *G60.0*
- - - E ¬ Maladie de *G60.0*
- - - Type F ¬ Maladie de *G60.0*
- - Récessive type
- - - A ¬ Maladie de *G60.0*
- - - B ¬ Maladie de *G60.0*
- - - C ¬ Maladie de *G60.0*
- - - D ¬ Maladie de *G60.0*
- Liée X type
- - 1 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 3 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 4 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 5 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 6 ¬ Maladie de *G60.0*
- Type
- - 1 associée à PMP2 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2 associée à DNAJB2 ¬ Maladie de *G60.0*
- - 2T ¬ Maladie de *G60.0*
- - 4C4 ¬ Maladie de *G60.0*
- ¬ Maladie
- - *G60.0*
- - *G60.0*

Charge
- Association CHARGE] ¬ Syndrome *Q87.8*
- Contraception ¬ Autres prises en *Z30.8*
- Domicile, nécessitant des soins ¬ Parent à *Z63*
- ¬ Syndrome CHARGE [Association *Q87.8*

Charité Mobility Index
- 0-4 points ¬ CHARMI [*U53.30*
- 5 points ¬ CHARMI [*U53.20*
- 6-8 points ¬ CHARMI [*U53.10*

Charité Mobility Index *–suite*
- 9-10 points ¬ CHARMI [*U53.00*

Charlevoix-Saguenay] ¬ ARSACS [Ataxie spastique autosomique récessive de *G11.1*

Charlie M ¬ Syndrome *Q87.0*

CHARMI Charité Mobility Index
- 0-4 points ¬ *U53.30*
- 5 points ¬ *U53.20*
- 6-8 points ¬ *U53.10*
- 9-10 points ¬ *U53.00*

Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Malformation congénitale (*Q76.4*

Chassaing-Lacombe ¬ Chondrodysplasie dominante liée à l'X type *Q78.9*

Chasse ¬ Syndrome (de): *K91.1*

Chat ¬
- Distomatose hépatique à douve du foie du *B66.0†, K77.0**
- Infection par douve du foie du *B66.0*
- Maladie des griffes du *A28.1*
- Syndrome des yeux de *Q92.8*

Chaudhry
v./v.a. Gorlin-Chaudhry-Moss

Chaudière/bouilloire ¬ Accident dû à: Explosion de *W49.9!*

Chauffard
- Still ¬ Syndrome de *M08.29*
- ¬ Syndrome de Minkowski- *D58.0*

Chaussures orthopédique(s) ¬ *Z46.7*

Chauveau
v./v.a. Davignon-Chauveau

Chavany
v./v.a. Foix-Chavany-Marie

CHC [carcinome hépatocellulaire] ¬ *C22.0*

Chédiak-Higashi atypique ¬ Syndrome de *E70.3*

Cheilite
- Commissurale ¬ *K13.0*
- Due à Candida ¬ *B37.88*
- Exfoliatrice ¬ *K13.0*
- Glandulaire ¬ *K13.0*
- Nodosités [PLACK] ¬ Syndrome de peau déciduale-leuconychie-kératose acrale ponctuée- *Q84.8*
- SAI ¬ *K13.0*

Cheilodynie ¬ *K13.0*

Chéilo-gnatho-palatoschisis ¬ *Q37.5*

Cheiloschisis ¬ *Q36.9*

Cheilose
- Cours
- - Carence en vitamine B2 ¬ *E53.0†, K93.8**
- - Pellagre ¬ *E52†, K93.8**
- ¬ *K13.0*

Cheiro-spondylo-enchondromatose ¬ *Q78.4*

Chélateurs, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Antidotes et *T50.6*

Chéloïde
- Addison ¬ *L94.0*

Chéloïde *–suite*
- Cryptorchidie-dysplasie rénale ¬ Syndrome de torticolis- *Q87.8*
- Folliculite sclerotisans nuchae] ¬ Acné *L73.0*
- Lié à l'X avec mobilité articulaire réduite et excavation papillaire accrue ¬ Syndrome de cicatrices *Q87.8*
- ¬
- - *L91.0*
- - Cicatrice *L91.0*

Chéloïdienne ¬ Blastomycose *B48.0*

Chemotactic factor-2] ¬ Amylose ALECT2 [Amylose à Leucocyte *E85.0*

Chenais
v./v.a. Cestan Chenais

Cheratite sèche au sens du syndrome de Sjögren ¬ *M35.0†, H19.3**

Cherstvoy
v./v.a. Von Voss-Cherstvoy

Chérubinisme ¬ *K10.8*

Chérubisme ¬ *K10.8*

Chester
v./v.a. Erdheim-Chester

Cheval
- Complet ¬ Syndrome de la queue de *G83.40*
- Incomplet ¬ Syndrome de la queue de *G83.41*
- Non précisé ¬ Syndrome de la queue de *G83.49*
- Rétine, sans décollement ¬ Déchirure en fer à *H33.3*
- ¬
- - Gomme de la queue de *A52.1†, G07**
- - Lésion autre et non précisée de la queue de *S34.38*
- - Malformations congénitales de la queue de *Q06.3*
- - Rein en fer à *Q63.1*
- - Syndrome traumatique
- - - Complet de la queue de *S34.30*
- - - Incomplet de la queue de *S34.31*
- - Tumeur maligne: Queue de *C72.1*

Chevauchement
- Cholangite
- - Biliaire primitive et d'hépatite auto-immune ¬ *K75.4, K74.3*
- - Sclérosante primitive et d'hépatite auto-immune ¬ *K75.4, K83.00*
- Juvénile ¬ Myosite de *M33.0*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*
- Syndrome de blépharophimose avec déficience intellectuelle de type SBBYS et du syndrome génito-patellaire ¬ *Q87.8*
- ¬ Myosite de *M35.1*

Chevelu
- Cou ¬
- - Carcinoma in situ: Peau du cuir *D04.4*
- - Mélanome
- - - In situ du cuir *D03.4*
- - - Malin du cuir *C43.4*

Chevelu *–suite*
- Cou ¬ *–suite*
- - Nævus à mélanocytes du cuir *D22.4*
- - Tumeur bénigne: Peau du cuir *D23.4*
- - Tumeur maligne: Peau du cuir *C44.4*
- Dermatophytie] ¬ Dermatophytose du cuir *B35.0*
- Due traumatisme obstétrical
- - Sans précision ¬ Lésion du cuir *P12.9*
- - ¬ Meurtrissure du cuir *P12.3*
- Liée à une surveillance électronique continue ¬ Lésion du cuir *P12.4*
- Toute partie] ¬ cuir *T20*
- Traumatisme obstétrical ¬ Autres lésions du cuir *P12.8*
- ¬
- - Angiosarcome du cuir *C44.4*
- - Arrachement du cuir *S08.0*
- - Carcinome à cellules de Merkel du cuir *C44.4*
- - Carcinome lympho-épithélial-like de la peau du cuir *C44.4*
- - Cuir
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans du cuir *C44.4*
- - Dermatose pustuleuse érosive du cuir *L30.8*
- - Favus du cuir *B35.0*
- - Hypotrichose simple du cuir *L65.8*
- - Lésion traumatique superficielle du cuir *S00.0*
- - Mélanome malin familial du cuir *C43.4*
- - Pachydermie vorticellée primaire essentielle du cuir *Q82.8*
- - Plaie ouverte du cuir *S01.0*
- - Teigne du cuir *B35.0*

Chevelure par des poux ¬ Infestation de la *B85.0*

Cheveux
- Anagènes caducs ¬
- - Maladie des *L65.1*
- - Syndrome Noonan-like avec *Q87.1*
- Anormaux ¬ Syndrome de leuconychie totale-lésions de type acanthosis nigricans- *Q84.4, L83*
- Crépus
- - Fil de fer) ¬ Maladie de: Menkes (*E83.0*
- - ¬ Syndrome des *E83.0*
- Déficit immunitaire ¬ Hypoplasie du cartilage et des *Q78.5, D82.2*
- Fils de fer de Menkes ¬ Syndrome des *E83.0*
- Frisés
- - Ankyloblépharon-dysplasie des ongles ¬ Syndrome CHAND [*Q82.4*
- - Kératodermie acrale-caries ¬ Syndrome des *Q82.8*
- Laineux

Cheveux *–suite*
- Laineux *–suite*
- - Hyperkératose palmoplantaire ¬ Syndrome de fragilité cutanée- *Q82.8*
- - Kératodermie palmoplantaire ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - Sur nævus ¬ *Q82.5*
- - ¬ *Q84.1*
- Non classées ailleurs ¬ Anomalies congénitales de la morphologie des *Q84.1*
- SAI ¬ Malformation congénitale des *Q84.2*
- ¬
- - Anomalies
- - - Congénitales des *Q84.2*
- - - Couleur des *L67.1*
- - Dysplasie ectodermique pure des ongles et des *Q82.8*
- - Hétérochromie des *L67.1*

Cheville
- Congénitale ¬ Malformation de: *Q74.2*
- Ligament
- - Calcanéopéronier ¬ Entorse et foulure de la *S93.42*
- - Deltoïde ¬ Entorse et foulure de la *S93.41*
- - Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et foulure de la *S93.43*
- Partie non précisée ¬ Entorse et foulure de la *S93.40*
- Parties ¬ Entorse et foulure de la *S93.48*
- Pied
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.81*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.84*
- - Décollement sous-cutané (fermé) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.86*
- - Degré non précisé ¬
- - - Brûlure
- - - - *T25.0*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.0*
- - - Corrosion
- - - - *T25.4*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.4*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.82*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.83*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.8*
- - Orteils ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la *R02.07*
- - Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S99.9*
- - - Superficielle de la *S90.9*
- - Seuls] ¬ jambe [toute partie, sauf *T24*

Cheville *–suite*
- Pied *–suite*
- - ¬
- - - Brûlure
- - - - Premier degré
- - - - - *T25.1*
- - - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.1*
- - - - Troisième degré
- - - - - *T25.3*
- - - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.3*
- - - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.16*
- - - Corrosion du premier degré
- - - - *T25.5*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.5*
- - - Corrosion du troisième degré
- - - - *T25.7*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.7*
- - - Déformations acquises de la *M21.68*
- - - Écrasement d'autres parties de la *S97.8*
- - - Gelure superficielle de la *T33.8*
- - - Lésion traumatique
- - - - Multiples
- - - - - Muscles et tendons au niveau de la *S96.7*
- - - - - Nerfs au niveau de la *S94.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la *S95.7*
- - - - Muscle tendon
- - - - - Intrinsèques au niveau de la *S96.2*
- - - - - Long extenseur d'un orteil, au niveau de la *S96.1*
- - - - - Long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la *S96.0*
- - - - - Niveau de la *S96.8*
- - - - - Non précisés, au niveau de la *S96.9*
- - - - Nerf
- - - - - Niveau de la *S94.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la *S94.9*
- - - - - Tibial antérieur au niveau de la *S94.2*
- - - - Nerf cutané sensitif au niveau de la *S94.3*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - Niveau de la *S95.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la *S95.9*
- - - Lésions traumatiques
- - - - Multiples de la *S99.7*
- - - - Précisées de la *S99.8*
- - - - Superficielles
- - - - - *S90.88*
- - - - - Multiples de la *S90.7*
- - - Plaies ouvertes multiples de la *S91.7*
- - - Rupture de ligaments au niveau de la *S93.2*

Cheville *–suite*
- Pronation ¬ *M21.68*
- SAI ¬ *S82.88*
- Unilatérale ¬ Absence acquise de pied et *Z89.4*
- - ¬
- - - Absence congénitale du pied et de la *Q72.3*
- - - Amputation traumatique
- - - - Genou et la *S88.1*
- - - - Pied au niveau de la *S98.0*
- - - Arthrite chronique juvénile
- - - - Début systémique, articulation de la *M08.27*
- - - - Forme oligo(pauci)- articulaire, articulation de la *M08.47*
- - - Arthrite juvénile idiopathique associée aux enthésopathies, articulation de la *M08.87*
- - - Articulation de la *T84.16*
- - - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la *T84.06*
- - - Contusion de la *S90.0*
- - - Déformation acquise de la *M21.68*
- - - Dermato-arthrite lipoïdique, articulation de la *E78.88†, M14.37**
- - - Écrasement de la *S97.0*
- - - Luxation de la *S93.0*
- - - Maladie de Still de l'adulte, articulation de la *M06.17*
- - - Malformation acquise de la *M21.68*
- - - Ostéochondrose disséquant
- - - - *M93.27*
- - - - Familiale de la *M93.27*
- - - Péroné, impliquant: *S82.6*
- - - Plaie ouverte de la *S91.0*
- - - Présence d'une prothèse de *Z96.66*
- - - Syndrome
- - - - Oculo-urétro-synovial, *M02.37*
- - - - SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec ostéite de la *M86.37*
- - - Tibia, impliquant: *S82.5*
- - - Tuberculose de la *A18.0†, M01.17**
- - - Tumeur ténosynoviale à cellules géantes de l'articulation de la *M12.27*

Cheyne-Stokes ¬ Dyspnée de *R06.3*

Chiari
v./v.a. Arnold-Chiari
v./v.a. Budd-Chiari

Chiasma optique
- Dysgénésie du segment antérieur de l'œil ¬ Syndrome d'hypoplasie de la fovéa avec anomalie du *Q15.8*
- - ¬
- - - *S04.0*
- - - Affections du *H47.4*

Chiasmatique par anévrysme ¬ Compression *I67.10†, H48.8**

Chien ¬
- Dipylidiose [infection par cestodes du *B71.1*
- Infection par cestodes du *B67.4*

Chiffonniers ¬ Maladie des *A22.1*

Chignon dû à un traumatisme obstétrical ¬ Hématome en *P12.1*

Chikungunya ¬
- Fièvre de *A92.0*
- Vaccination contre le virus du *Z25.8*

Chilblain ¬ Lupus érythémateux
- Familial type *L93.2*
- Type *L93.2*

CHILD ¬ Syndrome *Q87.8*

Child-Pugh
- A ¬ Cirrhose
- - Biliaire
- - - Primitive, stade *K74.3, K74.70!*
- - - Secondaire, stade *K74.4, K74.70!*
- - - Stade *K74.5, K74.70!*
- - Foie, stade *K74.6, K74.70!*
- B ¬ Cirrhose
- - Biliaire
- - - Primitive, stade *K74.3, K74.71!*
- - - Secondaire, stade *K74.4, K74.71!*
- - - Stade *K74.5, K74.71!*
- - Foie, stade *K74.6, K74.71!*
- C ¬ Cirrhose
- - Biliaire
- - - Primitive, stade *K74.3, K74.72!*
- - - Secondaire, stade *K74.4, K74.72!*
- - - Stade *K74.5, K74.72!*
- - Foie, stade *K74.6, K74.72!*

CHIME ¬ Syndrome *Q87.8*

Chimère 46,XX 46,XY
- Hermaphrodite vrai ¬ *Q99.0*
- ¬ *Q99.0*

Chimioprophylaxie SAI ¬ *Z29.28*

Chimiothérapie
- Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.2*
- Cancer ¬ *P04.1*
- Entretien SAI ¬ *Z51.2*
- Mesures immunosuppressives ¬ Immunocompromission après radiothérapie, *D90*
- Néoplasie maligne ¬ Cure combinée de radiothérapie et *Z51.82*
- Prophylactique
- - Locale ¬ *Z29.20*
- - Systémique ¬ *Z29.21*
- - ¬ mesure
- - - *Z29.2*
- - - *Z29.28*
- Tumeur maligne ¬
- - Antécédents personnels de *Z92.6*
- - Examen de contrôle après *Z08.2*
- - Séance de *Z51.1*

Chimiothérapie *–suite*
- ¬
- - Convalescence après *Z54.2!*
- - Envie de vomir au cours de *R11, Y57.98!*
- - Formes de *Z51.2*
- - Nausées au cours de *R11, Y57.98!*
- - Vomissements au cours de *R11, Y57.98!*

Chimique
v./v.a. Agent chimique
- 1er degré du vagin ¬ Brûlure *T28.8*
- 2e degré du vagin ¬ Brûlure *T28.8*
- 3e degré du vagin ¬ Brûlure *T28.8*
- Aspiration due anesthésie
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Pneumonie *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ Pneumonie *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Pneumonie *O74.0*
- - ¬ Pneumonie *J95.4*
- Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Environnement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances *P04.6*
- Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Nutritionnel
- - Connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions physiques, *Z64.8*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances *P04.5*
- Sang
- - Sans précision ¬ Résultat anormal des examens *R79.9*
- - ¬ Autres résultats anormaux précisés des examens *R79.8*
- Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Vaginal degré
- - 2a ¬ Brûlure *T28.8*
- - 2b ¬ Brûlure *T28.8*
- Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- ¬
- - Dermite
- - - Allergique de contact due à d'autres produits *L23.5*

Chimique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dermite *–suite*
- - - Contact, sans précision, due à d'autres produits *L25.3*
- - - Irritante de contact due à d'autres produits *L24.5*
- - Diabète sucré *R73.08*
- - Œsophagite *K20.8*
- - Otite aiguë externe: *H60.5*
- - Péritonite: *T81.6*
- - Sclérose systémique due
- - - Médicaments et des produits *M34.2*
- - - Substances *M34.2*
- - Ulcère de l'œsophage: dû à l'ingestion de: produits *K22.1*
- - Voies de fait/agression par : Agent *Y09.9!*

CHIP [Clonal hematopoiesis of indeterminate potential] ¬ *U62.00!*

Chique ¬ Infestation par puce- *B88.1*

Chirurgie
- Bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou affaissée: après une perte de poids (*L98.7*
- Cardiaque
- - Due présence prothèse cardiaque ¬
- - - Défaillance cardiaque après *I97.1*
- - - Insuffisance cardiaque après *I97.1*
- - Visant la correction et palliation d'une malformation cardiaque congénitale ¬ État après intervention de *Z98.80*
- - ¬ Autres troubles fonctionnels après *I97.1*
- Cataracte [de l'aphaque] ¬ Kératopathie (bulleuse) après *H59.0*
- Obstétrical acte visée diagnostique thérapeutique
- - Y compris accouchement SAI ¬
- - - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de *O75.4*
- - - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de *O75.4*
- - - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de *O75.4*
- - ¬ Autres complications d'un acte de *O75.4*
- Plastique
- - Correctrice pour cicatrice après traumatisme ¬ *Z42*
- - Motifs cosmétiques ¬ *Z41.1*
- Transurétrale ¬ Rétrécissement urétral secondaire à *N99.18*
- ¬
- - Échec du déclenchement (du travail) par: *O61.1*
- - Lordose après *M96.4*

Chlamydia
- Anus et du rectum ¬ Infection à *A56.3*
- Appareil génito-urinaire, sans précision ¬ Infection à *A56.2*
- Femme ¬ Affection inflammatoire pelvienne à *A56.1†, N74.4**

Chlamydia *–suite*
- Organes urinaires et génitaux ¬ Infection à *A56.2†, N29.1**
- Partie inférieure de l'appareil génito-urinaire ¬ Infection à *A56.0*
- Pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires ¬ Infection à *A56.1*
- Pharynx ¬ Infection à *A56.4*
- Précisées ¬ Autres infections à *A74.8*
- Psittaci ¬ Infection à *A70*
- Trachomatis transmises par voie sexuelle ¬ Infections à *A56*
- Transmise par voie sexuelle, autres localisations ¬ Infection à *A56.8*
- ¬
- - Cervicite à *A56.0*
- - Cervico-vaginite à *A56.0*
- - Conjonctivite
- - - *A74.0†, H13.1**
- - - Néonatale à *P39.1*
- - Cystite à *A56.0*
- - Endométrite à *A56.1†, N74.4**
- - Épididymite à *A56.1†, N51.1**
- - Infection génitale à *A56.2*
- - Lymphogranulomatose vénérienne à *A55*
- - Orchite à *A56.1†, N51.1**
- - Périhépatite à *A74.8†, K67.0**
- - Péritonite à *A74.8†, K67.0**
- - Pneumonie congénitale à *P23.1*
- - Pneumonie due à *J16.0*
- - Rétrécissement du rectum dû à une infection à *A55†, K93.8**
- - Salpingite à *A56.1†, N74.4**
- - Syndrome de Fitz-Hugh-Curtis à *A74.8†, K67.0**
- - Urétrite à *A56.0*
- - Vulvo-vaginite à *A56.0*

Chlamydiose SAI ¬ *A74.9*

Chloasma
- Mélasme] ¬ *L81.1*
- Paupière
- - Hyperthyroïdie ¬ *E05.9†, H03.8**
- - ¬
- - - *H02.7*
- - - Ochronose avec *E70.2†, H03.8**

Chlonorchis sinensis ¬ Distomatose du foie à *B66.1†, K77.0**

Chloramphénicol
- Nouveau-né ¬ Syndrome gris dû à l'administration de *P93*
- ¬ Intoxication: Groupe du *T36.2*

Chlorate ¬ Intoxication au *T60.3*

Chloré
- Congénitale ¬ Diarrhée *P78.3*
- ¬ Solvants du groupe: composés *L24.2*

Chlore gazeux ¬ Effet toxique: *T59.4*

Chlorhydrique ¬ Acide: *T54.2*

Chlorofluorocarbures ¬
- Effet toxique: *T53.5*
- Intoxication par *T53.5*

Chloroforme ¬ Effet toxique: *T53.1*

Chlorome rémission complète ¬
- *C92.31*
- Cancer xanthosus [*C92.31*

Chloroquine ¬ Maculopathie toxique provoquée par l'(hydroxy-) *H35.38*

Chlorure de méthylène ¬ *T53.4*

Choanale
- Anomalie des yeux ¬ Syndrome de diarrhée intraitable-atrésie *Q87.8*
- Postérieure-lymphœdème ¬ Syndrome d'atrésie *Q82.08, Q30.0*
- Unilatérale ¬ Atrésie *Q30.0*

Choanes
- Athélie-hypothyroïdie-retard pubertaire-petit taille ¬ Syndrome d'atrésie des *Q87.1*
- Déficience intellectuelle lié à l'X limité à la femme ¬ Syndrome de dysmorphie faciale-petite taille-atrésie des *Q87.0*
- Microphtalmie ¬ Syndrome d'arhinie-atrésie des *Q87.0*
- Surdité-cardiopathie-dysmorphie cranio-faciale ¬ Syndrome d'atrésie des *Q87.8*
- ¬
- - Atrésie des *Q30.0*
- - Bord postérieur cloison nasal
- - - *C11.3*
- - - *D10.6*
- - Polype (des): *J33.0*
- - Sténose acquise des *J34.8*
- - Syndrome d'hypoplasie du rayon radial-atrésie des *Q71.8, Q30.0*

Choc
- Allergique SAI ¬ *T78.2*
- Cardiogénique ¬ *R57.0*
- Consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.3*
- Courant électrique ¬ *T75.4*
- Culturel ¬ *F43.2*
- Cytokinique
- - Adulte, temporellement associé au COVID-19 ¬ *U10.91*
- - Enfant et l'adolescent, temporellement associé au COVID-19 ¬ *U10.90*
- Émotionnel et tension, sans précision ¬ État de *R45.7*
- Endotoxique
- - Hypovolémique) pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.1*
- - ¬ *R57.8*
- Foudre ¬ *T75.0*
- Hyperkaliémie ¬ Syndrome de bradycardie avec insuffisance rénale, bloc auriculo-ventriculaire, *E87.5, T88.8*

Choc *–suite*
- Hypoglycémique au cours de diabète MODY [Maturity onset diabetes of young people] ¬ *E11.61*
- Hypovolémique ¬ *R57.1*
- Immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme ¬ *T79.4*
- Obstétrical ¬ *O75.1*
- Pendant
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs ¬ *T81.1*
- - Travail et l'accouchement ¬ *O75.1*
- Postopératoire
- - SAI ¬ *T81.1*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.3*
- Psychique ¬ *F43.0*
- Rachidien ¬ Trouble des fonctions vésicales du à un *G95.82*
- Sans précision ¬ *R57.9*
- Traumatique ¬ *T79.4*
- ¬ Autres *R57.8*

Choc anaphylactique
- Effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.6*
- Intolérance alimentaire ¬ *T78.0*
- Sérum ¬ *T80.5*
- Vaccin contre le COVID-19 ¬ *T88.6, U12.9!*
- ¬ *T78.2*

Choc anesthésique
- Substance appropriée et correctement administrée ¬ *T88.2*
- ¬ *T88.2*

Choc septique
- Avortement ¬ *O08.0, R57.2*
- Escherichia coli ¬ *A41.51, R57.2*
- Grossesse extra-utérine ¬ *O08.0, R57.2*
- Grossesse molaire ¬ *O08.0, R57.2*
- Haemophilus influenzae ¬ *A41.3, R57.2*
- Mesures chirurgicales ¬ *T81.1, R57.2*
- Micro-organismes Gram négatif ¬ *A41.58, R57.2*
- Moment de survenue incertain par rapport à l'admission à l'hôpital ¬ *R57.2, U69.85!*
- Non nosocomial ¬ *R57.2, U69.83!*
- Nosocomial ¬ *R57.2, U69.84!*
- Pendant une intervention chirurgicale ¬ *T81.1, R57.2*
- Perfusion, injection thérapeutique ou transfusion ¬ *T80.2, R57.2*
- Post-opératoire ¬ *T81.1, R57.2*
- Pseudomonas ¬ *A41.52, R57.2*
- Staphylococcus aureus ¬ *A41.0, R57.2*
- Staphylocoque
- - Coagulase-négatifs ¬ *A41.1, R57.2*
- - ¬ *A41.2, R57.2*
- Streptocoques ¬ *A40.9, R57.2*
- ¬ *R57.2*

Choc toxique
- Bactérien ¬ Syndrome du *A48.3*
- Utilisation de tampon ¬ Syndrome du *A48.3*

Cholangiectasie ¬ *K83.8*

Cholangiocarcinome
- Hilaire ¬ *C24.0*
- ¬ *C22.1*

Cholangiocellulaire ¬ Carcinome *C22.1*

Cholangiolite
- Extrahépatique ¬ *K83.09*
- Gangréneuse ¬ *K83.09*
- Intrahépatique ¬ *K83.09*
- ¬ *K83.09*

Cholangiome malin ¬ *C22.1*

Cholangite
v./v.a. Angiocholite
- Biliaire primitive
- - Hépatite auto-immune ¬ Chevauchement de *K75.4, K74.3*
- - ¬
- - - *K74.3*
- - - CBP [*K74.3*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, K93.8**
- Scarlatineuse ¬ *A38†, K87.0**
- Sclérosant
- - IgG4 ¬ *K83.01*
- - Néonatale isolée ¬ *K83.00*
- - Primitive
- - - Hépatite auto-immune ¬ Chevauchement de *K75.4, K83.00*
- - - ¬ PSC [*K83.00*
- - Secondaire ¬ *K83.01*
- - ¬ NISCH [Syndrome néonatal d'ichtyose-*K83.00, Q80.8*

Cholécystite
- Aiguë ¬
- - *K81.0*
- - Calcul de la vésicule biliaire avec *K80.0*
- Cholélithiase SAI ¬ *K80.1*
- Chronique ¬ *K81.1*
- Emphysémateuse (aiguë) sans calcul ¬ *K81.0*
- Gangréneuse sans calcul ¬ *K81.0*
- Lithiasique ¬ *K80.10*
- Sans précision ¬ *K81.9*
- Suppurée sans calcul ¬ *K81.0*
- ¬
- - *K81.8*
- - Calcul
- - - Bloqué
- - - - Canal biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - - - Canal cystique sans précision ou sans *K80.2*
- - - - Vésicule biliaire sans précision ou sans *K80.2*
- - - Canal biliaire
- - - - *K80.4*

Cholécystite *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Calcul *–suite*
- - - Canal biliaire *–suite*
- - - - Sans angiocholite ni *K80.5*
- - - Vésicule biliaire
- - - - Forme de *K80.1*
- - - - Sans *K80.2*
- - Cholécystolithiase sans précision ou sans *K80.2*
- - Cholédocholithiase sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - Cholélithiase
- - - Hépatique sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - - Intrahépatique sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - - Sans précision ou sans *K80.2*
- - Colique
- - - Biliaire (récidivante) sans précision ou sans *K80.2*
- - - Hépatique (récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - Lithiase du canal cholédoque sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*

Cholécysto
- Colique ¬ Fistule *K82.3*
- Duodénale ¬ Fistule *K82.3*

Cholécystolithiase sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*

Cholédochite
- Purulente ¬ *K83.08*
- ¬ *K83.09*

Cholédocholithiase sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*

Cholédoco-duodénale ¬ Fistule *K83.3*

Cholédoque
- Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Lithiase du canal *K80.5*
- ¬
- - Atrésie du canal *Q44.2*
- - Canal: *C24.0*
- - Carcinome
- - - *C24.0*
- - - Canal *C24.0*
- - Inflammation du *K83.09*
- - Kyste du *Q44.4*

Cholélithiase
- Hépatique sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Intrahépatique sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Mutation du gène ABCB4 ¬ *K80.80*
- SAI ¬ Cholécystite avec *K80.1*
- Sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- ¬ Autres *K80.8*

Choléocystocholedocholithiase ¬ *K80.80*

Choléra
- Seul ¬ Nécessité d'une vaccination contre le *Z23.0*
- TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-parathyphoïde [*Z27.0*
- Typhoïde-parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le *Z27.0*
- Vibrio cholerae 01, biovar cholerae ¬ *A00.0*
- ¬ *A00.9*

Cholerae
- 01 biovar
- - Cholerae ¬ Choléra à Vibrio *A00.0*
- - El Tor ¬ A Vibrio *A00.1*
- ¬ Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar *A00.0*

Cholestase
- Gravidique ¬ *O26.60*
- Intrahépatique
- - Cours de la grossesse ¬ *O26.60*
- - Familiale ¬ *K71.0*
- - Gestationnelle récidivante ¬ *O26.60*
- - Néonatale par déficit en citrine ¬ *E72.2*
- - Progressive familiale ¬ *K74.5*
- - Récurrente bénigne] ¬ BRIC [*K71.0*
- Lésion des hépatocytes ¬ *K71.0*
- Liée à la nutrition parentérale ¬ *K91.88*
- Lymphœdème ¬ Syndrome de *K71.0*
- Malabsorption ¬ Défaut de synthèse des acides biliaires avec *K76.8*
- Pure» ¬ *K71.0*
- ¬
- - Maladie toxique du foie avec *K71.0*
- - Syndrome d'arthrogrypose-insuffisance rénale- *Q89.7*

Cholestéatome
- Congénital de l'oreille moyenne ¬ *H71*
- Oreille
- - Externe ¬ *H60.4*
- - Moyenne ¬ *H71*
- Réaction inflammatoire ¬ *H71*
- Récidivant après mastoïdectomie ¬ *H95.0*
- Tympan ¬ *H71*

Cholestérol
v./v.a. lécithine-cholestérol-acyltransférase
- 7alpha-hydroxylase ¬ Hypercholestérolémie due au déficit en *E78.0*
- Poussée aiguë ¬ Pneumonie à *J84.81*
- Sans mention de poussée aiguë ¬ Pneumonie à *J84.80*
- ¬
- - Déficit en protéine de transfert des esters de *E78.4*
- - Maladie de stockage des esters du *E75.5*

Cholestérolose de la vésicule biliaire ¬ *K82.4*

Cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ *E75.5*

Choline ¬ Carence en *E63.8*

Cholinergique
- Aigu ¬ Syndrome *T44.1*

Cholinergique *–suite*
- ¬
- - Intoxication: Autres parasympathomimétiques [*T44.1*
- - Urticaire *L50.5*

Chômage
- Sans précisions ¬ *Z56*
- ¬ Difficultés liées à l'emploi et au *Z56*

Chondrite
- Tuberculeuse
- - Intervertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - ¬ *A18.0†, M01.19**
- ¬ Ulcères buccaux et génitaux avec *M35.2, M94.1*

Chondro
v./v.a. dermo-chondro-cornéen

Chondrocalcinose
- Familiale ¬ *M11.19*
- SAI ¬ *M11.2*
- ¬ Autre *M11.2*

Chondro-costales [Tietze] ¬ Syndrome des articulations *M94.0*

Chondrodermite nodulaire chronique de l'hélix ¬ *H61.0*

Chondrodysplasia punctata type Sheffield ¬ *Q77.3*

Chondrodysplasie
- Anomalie du développement sexuel ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Associé à QRICH1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.1*
- Blomstrand ¬ *Q78.8*
- Dominante liée à l'X type Chassaing-Lacombe ¬ *Q78.9*
- Goldblatt ¬ *Q78.8*
- Hémangiome ¬ *Q78.4*
- Létale autosomique récessive ¬ *Q78.8*
- Luxation articulaire type gPAPP ¬ *Q79.8*
- Métaphysaire type
- - Jansen ¬ *Q78.5*
- - Kaitila ¬ *Q78.5*
- - McKusick
- - - Déficit immunitaire ¬ *Q78.5, D82.2*
- - - ¬ *Q78.5*
- - Rosenberg ¬ *Q78.5*
- - Schmid ¬ *Q78.5*
- - Spahr ¬ *Q78.5*
- Ponctuée
- - Brachytéléphalangie ¬ *Q77.3*
- - Dominante liée X
- - - CDPX2] ¬ *Q77.3*
- - - ¬ *Q77.3*
- - Liée à X type 2 ¬ *Q77.3*
- - Rhizomélique
- - - Type
- - - - 1 ¬ *Q77.3*
- - - - 2 ¬ *Q77.3*
- - - - 3 ¬ *Q77.3*

Chondrodysplasie *–suite*
- Ponctuée *–suite*
- - Rhizomélique *–suite*
- - - Type *–suite*
- - - - 5 ¬ *Q77.3*
- - - ¬ *Q77.3*
- - Tibiométacarpienne ¬ *Q77.3*
- - Type Toriello ¬ *Q77.3*
- - ¬ *Q77.3*
- Spondylo-métaphysaire ¬ Syndrome de leucodystrophie hypomyélinisante avec *E75.2, Q77.8*
- Type Grebe ¬ *Q78.8*

Chondrodystrophie
- Congénitale calcifiante ¬ *Q77.3*
- SAI ¬ *Q78.9*

Chondrodystrophique ¬
- Myotonie
- - *G71.1*
- - *Q78.8*
- Nanisme *Q77.4*

Chondroectodermique
- Cécité nocturne ¬ Dysplasie *Q77.6*
- ¬ Dysplasie *Q77.6*

Chondrogénèse imparfaite ¬ *Q77.4*

Chondroïde
- Coccyx ¬ Chordome *C41.4*
- Rachis ¬ Chordome *C41.2*

Chondrolyse ¬ *M94.3*

Chondromalacie
- Patellaire familiale ¬ *M22.4*
- ¬ *M94.2*

Chondromalacique ¬ Rotule *M22.4*

Chondromatose
- Articulaire ¬ *D48.0*
- Métaphysaire avec acidurie D-2-hydroxyglutarique ¬ *Q78.4, E72.8*

Chondromyxoïde
- Côte ¬ Fibrome *D16.70*
- Maxillaire inférieur ¬ Fibrome *D16.5*
- Os
- - Courts
- - - Membre supérieur ¬ Fibrome *D16.1*
- - - Membres inférieurs ¬ Fibrome *D16.3*
- - Longs membres
- - - Inférieurs ¬ Fibrome *D16.2*
- - - Supérieurs ¬ Fibrome *D16.0*
- Pelvis ¬ Fibrome *D16.8*
- Rachis ¬ Fibrome *D16.6*
- Sternum ¬ Fibrome *D16.71*
- Tête ¬ Fibrome *D16.41*
- ¬ Fibrome *D16.9*

Chondro-ostéoplastique ¬ Trachéo-bronchopathie *J98.0*

Chondropathie
- Genou ¬ *M23.89*
- Rotulienne ¬ *M22.4*

Chondropathie *–suite*
- ¬ *M94.99*

Chondroplasique ¬ Ostéosarcome *C41.9*

Chondrosarcome
- Acétabulum ¬ *C41.4*
- Bras ¬ *C40.0*
- Cartilage articulaire ¬ *C41.9*
- Clavicule ¬ *C41.32*
- Côte ¬ *C41.30*
- Épaule ¬ *C40.0*
- Fémur ¬ *C40.2*
- Juxtacortical ¬ *C41.9*
- Localisations contiguës ¬ *C41.8*
- Mandibule ¬ *C41.1*
- Maxillaire supérieur ¬ *C41.02*
- Omoplate ¬ *C40.0*
- Os
- - Courts
- - - Membre supérieur ¬ *C40.1*
- - - Membres inférieurs ¬ *C40.3*
- - Crâne ¬ *C41.01*
- - Longs du membres inférieurs ¬ *C40.2*
- - Membres, à localisations contiguës ¬ *C40.8*
- Pelvis ¬ *C41.4*
- Vertèbre thoracique ¬ *C41.2*
- ¬ *C41.9*

Chondrosarcome myxoïde
- Extrasquelettique
- - Tissu mou
- - - Abdomen ¬ *C49.4*
- - - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- - - Membres
- - - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - - Pelvis ¬ *C49.5*
- - - Tête ¬ *C49.0*
- - - Thorax ¬ *C49.3*
- - - Tronc ¬ *C49.6*
- - ¬ *C49.9*
- ¬ *C41.9*

CHOPS ¬ Syndrome de *Q87.8*

Chordée congénitale ¬ *Q54.4*

Chordoïde ¬ Gliome *C71.5*

Chordome
- Angle ponto-cérébelleux ¬ *D43.1*
- Bénin de l'angle ponto-cérébelleux ¬ *D33.1*
- Chondroïde
- - Coccyx ¬ *C41.4*
- - Rachis ¬ *C41.2*
- Colonne lombaire ¬ *C41.2*
- Malin de l'angle ponto-cérébelleux ¬ *C71.6*
- Os du crâne ¬ *C41.01*
- Sacrum ¬ *C41.4*
- ¬ *C80.9*

Chorée
- Acanthocytose ¬ *E78.6*
- Bénigne
- - Atteinte striatale ¬ Syndrome de *G25.5, G23.9*
- - Familiale ¬ *G25.5*
- Chronique progressive héréditaire de Huntington ¬ *G10*
- Huntington
- - Démence ¬ *G10†, F02.2**
- - ¬
- - - *G10*
- - - Démence de la *F02.2**
- Juvénile ¬ *I02.9*
- Médicamenteuse ¬ *G25.4*
- Paraplégie spastique ¬ Atrophie optique infantile avec *E71.1*
- Rhumatismal
- - Atteinte cardiaque
- - - Tout type classée en I01.- ¬ *I02.0*
- - - ¬ *I02.0*
- - Sans atteinte cardiaque ¬ *I02.9*
- - ¬ *I02.9*
- SAI
- - Atteinte cardiaque ¬ *I02.0*
- - ¬ *G25.5*
- Sydenham ¬ *I02*
- ¬ Autres *G25.5*

Choréoathétose
- Dystonique paroxystique avec ataxie épisodique et spasticité ¬ *G24.8*
- Hypothyroïdie-détresse respiratoire néonatale ¬ Syndrome de *E03.1†, J99.8*, G25.5*
- ¬ Syndrome de convulsions infantiles- *G40.4*

Chorio-adénome destruens ¬ *D39.2*

Chorio-amniotite ¬
- *O41.1*
- Fœtus et nouveau-né affectés par une *P02.7*

Choriocarcinome
- Gestationnel ¬ *C58*
- Glande pinéale ¬ *C75.3*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*
- Ovarien primitif non gestationnel ¬ *C56*
- SAI ¬ *C58*
- Système nerveux central ¬ *C72.9*

Chorio-encéphalite
- Aiguë ¬ *A87.2†, G05.1**
- Lymphocitaire ¬ *A87.2†, G05.1**
- Séreuse ¬ *A87.2†, G05.1**

Chorio-épithéliome
- SAI ¬ *C58*
- ¬ *D39.2*

Chorioideae ¬ Atrophia gyrata *H31.2*

Chorioïdien ¬

- Anastomose congénitale entre vaisseaux rétiniens et *Q14.8*
- Effusion *H31.4*

Chorioïdite syphilitique

- Congénitale
- - Tardive ¬ *A50.3†, H32.0**
- - ¬ *A50.0†, H32.0**
- Tardive ¬ *A52.7†, H32.0**

Chorioméningite

- Aiguë ¬ *A87.2†, G02.0**
- Lymphocytaire
- - Séreuse aiguë ¬ *A87.2†, G02.0**
- - ¬ *A87.2†, G02.0**
- Séreuse ¬ *A87.2†, G02.0**

Choriorétinien

- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections *H32.8**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Affections *H32.0**
- Myopie ¬ Syndrome d'ectopie du cristallin-dystrophie *Q15.8*
- Péripapillaire hélicoïdale ¬ Dégénérescence *H31.2*
- Progressive ¬ Atrophie bifocale *H35.5*
- Télécanthus] ¬ Syndrome MMCAT [microcornée-myopie avec atrophie *Q15.8*
- Traitement chirurgical du décollement ¬ Cicatrices *H59.8*
- ¬
- - Cicatrices *H31.0*
- - Colobome *Q14.8*

Chorio-rétinienne ¬ Dégénérescence *H31.1*

Choriorétinite

- Congénitale à toxoplasmose ¬ *P37.1†, H32.0**
- Cours de syphilis tardive ¬ *A52.7†, H32.0**
- Disséminée au cours de neurosyphilis ¬ *A52.1†, H32.0**
- Foyer ¬ *H30.0*
- SAI ¬ *H30.9*
- Sans précision ¬ *H30.9*
- Syphilitique
- - Congénitale
- - - Tardive ¬ *A50.3†, H32.0**
- - - ¬ *A50.0†, H32.0**
- - Disséminée ¬ *A52.7†, H32.0**
- - ¬ *A51.4†, H32.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.0†, H32.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H32.0**
- ¬ Autres *H30.8*

Choriorétinopathie

- Microcéphalie autosomique récessive ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Séreuse centrale ¬ *H35.7*

Choriorétinopathie *–suite*

- ¬ Syndrome de papille optique colobomateuse-atrophie maculaire- *Q14.8*

Choroïde

- Forme infantile ¬ Calcifications du plexus *G93.88*
- Rétine ¬ Hyperornithinémie avec atrophie sinueuse de la *E72.4*
- Sans précision ¬ Affection de la *H31.9*
- ¬
- - Affections précisées de la *H31.8*
- - Atrophie de la *H31.1*
- - Carcinome des plexus *C71.5*
- - Décollement de la *H31.4*
- - Dystrophie héréditaire de la *H31.2*
- - Hémorragie et rupture de la *H31.3*
- - Malformation congénitale de la *Q14.3*
- - Mélanome malin de la *C69.3*
- - Papillome
- - - Atypique des plexus *C71.5*
- - - Plexus *D33.0*
- - Sclérose de la *H31.1*
- - Stries angioïdes de la *H35.38*
- - Syphilis secondaire de la *A51.4†, H32.0**
- - Tuberculose de la *A18.5†, H32.0**
- - Tumeur bénigne: *D31.3*
- - Tumeur maligne: *C69.3*

Choroïdérémie

- Surdité et obésité ¬ *Q87.8*
- ¬ *H31.2*

Choroïdien

- Alopécie ¬ Syndrome d'atrophie *H31.1, Q82.8*
- Aréolaire
- - Centrale) (généralisée) (péripapillaire) ¬ Dystrophie *H31.2*
- - Généralisée ¬ Dystrophie *H31.2*
- Centrale aréolaire de l'épithélium pigmentaire ¬ Dystrophie *H31.2*
- Expulsive ¬ Hémorragie *H31.3*
- Quatrième ventricule ¬ Papillome du plexus *D33.1*
- SAI ¬ Hémorragie *H31.3*
- ¬
- - Dégénérescence *H31.1*
- - Mélanome *C69.3*
- - Néovascularisation *H31.8*
- - Ostéome *D31.3*

Choroïdite

- Foyer ¬ *H30.0*
- Serpigineuse ¬ *H30.8*
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H32.0**
- ¬ *H30.9*

Choroïdopathie

- Amélanotique stellaire multiforme] ¬ CASM [*H31.8*
- Interne ponctuée ¬ *H31.8*

Chotzen

v./v.a. Saethre-Chotzen

Chou-fleur» ¬ Oreille «en *M95.1*

Christian

v./v.a. Hand-Schüller-Christian
v./v.a. Pfeifer-Weber-Christian
v./v.a. Weber-Christian

- ¬ Syndrome des pouces en adduction-arthrogrypose, type *Q87.0*

Christiansen

v./v.a. Bosma-Henkin-Christiansen

Christianson ¬ Syndrome de *Q87.8*

Christianson-Fourie ¬ Dysplasie ectodermique hidrotique type *Q82.8*

Christol

v./v.a. Bazex-Dupré-Christol

Christ-Siemens-Touraine ¬ Syndrome de *Q82.4*

Chromatides sœurs ¬ Syndrome de retard de croissance intra-utérin avec multiples taches café-au-lait congénitales et augmentation du taux d'échanges entre *Q02*

Chrome

- Composés ¬ Effet toxique: *T56.2*
- ¬
- - *L23.0*
- - Carence en *E61.4*

Chromhidrose ¬ *L75.1*

Chromomycose

- Cutanée ¬ *B43.0†, L99.8**
- Sous-cutané
- - Abcès ¬ *B43.2†, L99.8**
- - Kyste ¬ *B43.2†, L99.8**
- ¬
- - *B43.9*
- - Formes de *B43.8*

Chromomycotique du cerveau ¬ Abcès *B43.1†, G07**

Chromophobe

- Hypophyse ¬
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome *C75.1*
- ¬ Carcinome rénal *C64*

Chromosome

- 1
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale origine
- - - Maternelle du *Q99.8*
- - - Paternelle du *Q99.8*
- 2
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale maternelle du *Q99.8*
- 3 en anneau ¬ *Q93.2*
- 4
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬
- - - Délétion
- - - - Bras court du *Q93.3*

Chromosome *–suite*
- 4 *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Délétion *–suite*
- - - - Partielle du bras court du *Q93.3*
- - - Disomie uniparentale maternelle du *Q99.8*
- 5
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - Del(5q)] ¬ Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du *D46.6*
- - ¬
- - - Délétion
- - - - Bras court du *Q93.4*
- - - - Partielle du bras court du *Q93.4*
- - - Disomie uniparentale paternelle du *Q99.8*
- - - Syndrome de délétion du bras court du *D46.6*
- 6
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale
- - - Maternelle du *Q99.8*
- - - Paternelle du *Q99.8*
- 7
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale paternelle du *Q99.8*
- 8
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - Recombinant ¬ Syndrome du *Q99.8*
- 9
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale maternelle du *Q99.8*
- 10 en anneau ¬ *Q93.2*
- 11
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une disomie uniparentale d'origine paternelle du *Q87.3*
- 12 en anneau ¬ *Q93.2*
- 13
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale
- - - Maternelle du *Q99.8*
- - - Paternelle du *Q99.8*
- 14 en anneau ¬ *Q93.2*
- 15
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - Isodicentrique ¬ Syndrome du *Q99.8*
- 16
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale maternelle du *Q99.8*
- 17 en anneau ¬ *Q93.2*
- 18
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Délétion du bras long du *Q93.5*

Chromosome *–suite*
- 18p ¬ Monosomie partielle du *Q93.5*
- 19 en anneau ¬ *Q93.2*
- 20
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale
- - - Maternelle du *Q99.8*
- - - Paternelle du *Q99.8*
- 21
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale
- - - Maternelle du *Q99.8*
- - - Paternelle du *Q99.8*
- 22
- - Anneau ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomie uniparentale maternelle du *Q99.8*
- Anneau ¬ *Q93.2*
- Dicentriques ¬ *Q93.2*
- Entier
- - Mosaïque chromosomique non-disjonction mitotique ¬
- - - Monosomie d'un *Q93.1*
- - - Trisomie
- - - - *Q92.1*
- - - - *Q92.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬
- - - Monosomie d'un *Q93.0*
- - - Trisomie d'un *Q92.0*
- Marqueurs supplémentaires ¬ *Q92.6*
- Philadelphie Ph1 positive
- - Rémission complète ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], *C92.11*
- - ¬ Leucémie myéloïde chronique, *C92.10*
- Sexuel
- - Anormal
- - - Sauf iso (Xq) ¬ Caryotype 46,X avec *Q96.2*
- - - ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/ lignées cellulaires avec *Q96.4*
- - Phénotype
- - - Féminin
- - - - Sans précision ¬ Anomalie des *Q97.9*
- - - - ¬ Autres anomalies précisées des *Q97.8*
- - - Masculin
- - - - Sans précision ¬ Anomalie des *Q98.9*
- - - - ¬ Autres anomalies précisées des *Q98.8*
- - Structure anormale ¬ Homme avec *Q98.6*
- - ¬ Homme avec mosaïque des *Q98.7*
- X
- - Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance) ¬ Agammaglobulinémie: liée au *D80.0*
- - Fragile ¬ *Q99.2*
- - ¬

Chromosome *–suite*
- X *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ataxie (de): spinocérébelleuse récessive liée au *G11.1*
- - - Disomie uniparentale
- - - - Maternelle du *Q99.8*
- - - - Paternelle du *Q99.8*
- - - Femme avec plus de trois *Q97.1*
- - - Ichtyose liée au *Q80.1*
- - - Maladie lymphoprolifération liée au *D82.3*
- - - Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de *Q97.2*
- - - Pigmentation réticulée liée au *Q82.8*
- - - Prédisposition aux mycobactérioses liée au *D84.8*
- - - Syndrome
- - - - Gusher lié au *H90.8*
- - - - Klinefelter, homme avec plus de deux *Q98.1*
- Y
- - Anneau ¬ *Q98.6*
- - ¬ Microdélétion du *Q98.6*
- ¬
- - Anomalies précisées des *Q99.8*
- - Délétions partielles d'un *Q93.5*
- - Duplication
- - - Bras du *Q92.3*
- - - Complète d'au moins un bras du *Q92.2*

Chromosomique
- 45 X
- - 46,XX ou XY ¬ Mosaïque *Q96.3*
- - Lignées cellulaires avec chromosome sexuel anormal ¬ Mosaïque *Q96.4*
- Génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.5*
- Isolée del(5q) ¬ Syndrome myélodysplasique associé à une anomalie *D46.6*
- Lignées avec divers nombres de chromosomes X ¬ Mosaïque *Q97.2*
- Non-disjonction mitotique ¬
- - Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque *Q93.1*
- - Trisomie
- - - 13 mosaïque
- - - - *Q91.5*
- - - - *Q91.5*
- - - 18 mosaïque
- - - - *Q91.1*
- - - - *Q91.1*
- - - 21, mosaïque *Q90.1*
- - - Chromosome entier mosaïque
- - - - *Q92.1*
- - - - *Q92.1*
- Présumée) du fœtus ¬ Soins maternels pour anomalie *O35.1*
- Sans précision ¬ Anomalie *Q99.9*

Chromosomique *–suite*
- Sujet normal ¬ Inversion *Q95.1*
- ¬
- - Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies *Z87.7*
- - Dépistage prénatal d'anomalies *Z36.0*
- - Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies *Z13.7*

Chronic fatigue syndrome ¬
- CFS [*G93.39*
- Syndrome de fatigue chronique [*G93.3*

Chronic regional pain syndrome [CRPS] Typ I ¬ *G90.59*

Chronique
v./v.a. Type de maladie

Chrysopidea ¬ Fièvre à *A21.9*

Chudley-McCullough ¬ Syndrome de *Q87.8*

Chung-Jansen ¬ Syndrome de *Q87.0*

Churg
v./v.a. Wegener-Klinger-Churg

Churg-Strauss ¬ Syndrome de *M30.1*

Chute
- Due à d'autres affections peu claires ¬ Tendance aux *R29.6*
- Eau) ¬ Accident par *X59.9!*
- Objets lors de catastrophes naturelles ¬ *X59.9!*
- Personne âgée ¬ Tendance aux *R29.6*
- Prématurée des dents temporaires ¬ *K00.6*
- Répétition, non classées ailleurs ¬ *R29.6*
- Volume plasmatique ¬ Polycythémie: due à: *D75.1*

Chuvash ¬ Polycythémie secondaire autosomique récessive type non *D75.1*

Chyleux
- Mésentère ¬ Kyste *I89.8†, K67.8**
- Péritoine ¬ Kyste *I89.8†, K67.8**
- ¬
- - Ascite *I89.8*
- - Épanchement *J94.0*

Chyliforme ¬ Épanchement
- *J94.0*
- Pleural *J94.0*

Chylocèle
- Non filarienne) ¬ *I89.8*
- Tunique vaginale (non filarienne) SAI ¬ *N50.8*

Chylomicronémie familiale ¬ Syndrome de *E78.3*

Chylomicrons ¬ Maladie de rétention des *E78.6*

Chylopéricarde ¬ *I31.3*

Chylothorax congénital ¬ *J94.0*

Chylurie ¬ *R82.0*

Chypriote ¬ Syndrome neuro-musculosquelettique type *Q87.8*

CIA
- Type ostium

CIA *–suite*
- Type ostium *–suite*
- - Primum ¬ *Q21.2*
- - Secondum ¬ *Q21.1*
- ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication interatriale [*I51.0*

Cible d'une discrimination ou d'une persécution ¬ *Z60*

Cicatrice
v./v.a. Hernie sur cicatrice
- Adhérente (peau) ¬ *L90.5*
- Amygdalienne (et adénoïdienne) ¬ *J35.8*
- Chéloïde
- - Lié à l'X avec mobilité articulaire réduite et excavation papillaire accrue ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ *L91.0*
- Choriorétinien
- - Traitement chirurgical du décollement ¬ *H59.8*
- - ¬ *H31.0*
- Col utérin en tant que complication de l'accouchement ¬ *O65.5*
- Conjonctive ¬ *H11.2*
- Cornée ¬ Carence en vitamine A avec *E50.6†, H19.8**
- Cornéenne tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.8**
- Due à une césarienne antérieure ¬ Soins maternels pour *O34.2*
- Fibrose cutanées ¬ *L90.5*
- Hémorroïdaires cutanées résiduelles ¬ *K64.4*
- Hypertrophique ¬ *L91.0*
- Muqueuse nasale ¬ *J34.8*
- Opacité cornéen
- - Sans précision ¬ *H17.9*
- - ¬ Autres *H17.8*
- Peau) ¬ Difformité de la *L90.5*
- Post-inflammatoire) (post-traumatique) de la macula (pôle postérieur) ¬ *H31.0*
- SAI ¬ *L90.5*
- Traumatisme ¬ chirurgie plastique et correctrice pour *Z42*
- Utérine due à une intervention chirurgicale antérieure ¬ Soins maternels pour *O34.2*
- Xérophtalmique cornée ¬
- - Avitaminose A avec *E50.6†, H19.8**
- - Carence en vitamine A avec *E50.6†, H19.8**
- ¬
- - Acné laissant des *L70.9*
- - Carcinome pulmonaire sur *C34.9*
- - Défiguration due à des *L90.5*
- - Endométriose sur *N80.6*
- - Reflux vésico-urétéral: avec *N13.7*

Cicatriciel
- Pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.2*
- Précisées de raréfaction du système pileux ¬ Autres formes non *L65.8*

Cicatriciel *–suite*
- Sans précision ¬
- - Alopécie *L66.9*
- - Raréfaction du système pileux non *L65.9*
- ¬
- - Formes d'alopécie *L66.8*
- - Opération réparation d'un tissu *Z42*
- - Pemphigoïde
- - - *L12.1*
- - - Oculaire *L12.1†, H13.3**
- - Soins maternels pour: plancher pelvien: *O34.8*

Cicatrisation
- Post-chirurgicale du glaucome ¬ *H59.8*
- Secondaire d'une plaie ¬ *T89.03*
- ¬ Trouble de la *T89.03*

CIDEC ¬ Lipodystrophie partielle familiale associée à *E88.1*

Cigarettes électroniques [vapoteuse] ¬ Trouble de la santé en lien avec l'utilisation de *U07.0!*

Ciguatera ¬ *T61.0*

Cilia syndrome] [triade de Kartagener] ¬ Syndrome de Kartagener [Situs inversus viscerum, bronchectasie, sinusite chronique et polypes nasaux] [insuffisance pluriglandulaire résultant d'une anomalie dans le transport mucociliaire] [Immotile *Q89.3*

Ciliaire
- Cellule fusiforme type
- - A ¬ Mélanome malin du corps *C69.4*
- - B ¬ Mélanome malin du corps *C69.4*
- Chambre antérieure œil
- - Exsudatif ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - Implant ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - Parasitaire ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - SAI ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de l'iris et du corps *H22.8**
- Primitive
- - Rétinite pigmentaire ¬ Syndrome de dyskinésie *Q34.8, H35.5*
- - ¬ Dyskinésie *Q34.8*
- Sans précision ¬ Affection de l'iris et du corps *H21.9*
- ¬
- - Adhérences et perturbations de l'iris et du corps *H21.5*
- - Affections
- - - Dégénératives de l'iris et du corps *H21.2*
- - - Précisées de l'iris et du corps *H21.8*
- - - Vasculaires de l'iris et du corps *H21.1*
- - Gomme du corps *A52.7†, H22.8**
- - Médulloépithéliome du corps *C69.4*
- - Néovascularisation de l'iris ou du corps *H21.1*
- - Rétention ancienne corps étranger

Ciliaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Rétention ancienne corps étranger *–suite*
- - - Magnétique dans: corps: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: corps: *H44.7*
- - Syndrome FLOTCH [Leukonychie totale familiale-kystes trichilemmaux-dystrophie *Q84.4*
- - Syphilis secondaire du corps *A51.4†, H22.0**
- - Syphilis tardive du corps *A52.7†, H22.0**
- - Tuberculose du corps *A18.5†, H22.0**
- - Tumeur bénigne: Corps *D31.4*
- - Tumeur maligne: Corps *C69.4*

Cilliers
- Beighton ¬ Syndrome de *Q65.8*
- ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Cils
- Nasaux ¬ Absence familiale de *Q30.8*
- ¬ Absence ou agénésie de: *Q10.3*

CIMDAG [hypoplasie cérébelleuse-déficience intellectuelle-microcéphalie congénitale-dystonie-anémie-retard de croissance ¬ Syndrome *Q87.8*

Ciment
- Osseux ¬ Réaction du *T84.8*
- ¬
- - *L23.5*
- - *L24.5*
- - *L25.3*

Cimeterre ¬ Syndrome du *Q26.8*

CINCA [Syndrome neurologique, cutané et articulaire infantile chronique] ¬ Syndrome *M35.8*

Cinétose ¬ *T75.3*

Circadien ¬ Inversion psychogène du rythme (du): *F51.2*

Circoncision
- Féminine ¬ *Z91.70*
- Rituelle et de routine ¬ *Z41.2*
- ¬ Rétrécissement urétral secondaire à *N99.18*

Circonscrit
v./v.a. Type de maladie

Circonstances
- Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*
- Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*
- Indéterminées ¬ Événement sans autre précision, *Y34!*
- Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*

Circonstances *–suite*
- Non précisées ¬ Sujet ayant recours aux services de santé dans des *Z76.9*
- Précisées ¬ Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres *Z76.8*
- Psychosociales ¬ Autres difficultés liées à certaines *Z64.8*
- Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*

Circulaire
- Bénins multiples de la peau des membres ¬ Plis *Q82.8*
- Cordon ombilical ¬ *P02.5*
- Cordon, avec compression ¬ Travail et accouchement compliqués d'une *O69.1*
- Trachée et de l'œsophage ¬ Double arc aortique avec constriction *Q25.4*

Circulants ¬
- Déficit en enzymes *E88.08*
- Troubles hémorragiques dus aux anticoagulants *D68.35*

Circulation
- Coronaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la *R93.1*
- Extracorporelle ¬ Complication lors de *T80.9*
- Fœtale ¬ Persistance de la *P29.3*
- Maternelle ¬ Hémorragie vers la *P50.4*

Circulatoire
- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Non classés ailleurs ¬ Autres troubles de l'appareil *I97.89*
- - Sans précision ¬ Trouble de l'appareil *I97.9*
- Avant l'admission à l'hôpital ¬ Arrêt cardio- *U69.13!*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de l'appareil *O99.4*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres troubles précisés de l'appareil *I98.8**
- Diabète sucré ¬ Trouble *E14.50†, I79.2**
- Greffe
- - Fascio-cutanée ¬ Troubles *T86.50*
- - Lipocutanée ¬ Troubles *T86.50*
- - Mammaire avec partie cutanée ¬ Troubles *T86.50*
- - Myocutanée ¬ Troubles *T86.50*
- - Peau ¬ Troubles *T86.50*
- Leriche et Fontaine ¬ Trouble *I70.29*
- Périphérique
- - SAI ¬ Insuffisance *R57.9*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de l'appareil *Q27.9*
- - ¬ Autres malformations congénitales précisées de l'appareil *Q27.8*
- Respiratoire ¬ Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils *R09.8*

Circulatoire *–suite*
- Respiratoires de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies *P00.3*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale de l'appareil *Q28.9*
- Selon Fontaine ¬ Troubles *I70.29*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ Maladie *A50.5†, I98.0**
- - ¬ Maladie *A52.0†, I98.0**
- Veineux ¬ Trouble *I87.20*
- ¬
- - Antécédents personnels de maladies de l'appareil *Z86.7*
- - Béribéri humide avec implication du système *E51.1†, I98.8**
- - Diabète sucré
- - - Trouble *E14.50†, I79.2**
- - - Type
- - - - 1 avec trouble *E10.50†, I79.2**
- - - - 2 avec trouble *E11.50†, I79.2**
- - Fistule congénitale de l'appareil *Q28.81*
- - Malformations congénitales précisées de l'appareil *Q28.88*
- - Syphilome du système *A52.0†, I98.0**
- - Troubles autres et non précisés de l'appareil *I99*

Circumvallata ¬ Placenta: *O43.1*

Cireuse schizophrénique ¬ Flexibilité *F20.2*

Cirrhosa ¬ Ichtyoparasitose à Vandellia *B88.8*

Cirrhose
- Alcoolique
- - Foie
- - - Hémorragie par rupture des varices œsophagiennes ¬ *K70.3†, I98.3**
- - - Saignement de varices gastriques ¬ *K70.3†, I98.3**
- - - Varice
- - - - Gastriques ¬ *K70.3†, I98.2**
- - - - Œsophagiennes ¬ *K70.3†, I98.2**
- - - ¬ *K70.3*
- - ¬ *K70.3*
- Biliaire
- - Primitive
- - - Stade Child-Pugh
- - - - A ¬ *K74.3, K74.70!*
- - - - B ¬ *K74.3, K74.71!*
- - - - C ¬ *K74.3, K74.72!*
- - - ¬ CBP [*K74.3*
- - Sans précision ¬ *K74.5*
- - Secondaire
- - - Stade Child-Pugh
- - - - A ¬ *K74.4, K74.70!*
- - - - B ¬ *K74.4, K74.71!*
- - - - C ¬ *K74.4, K74.72!*
- - - ¬ *K74.4*
- - Stade Child-Pugh

Cirrhose *–suite*
- Biliaire *–suite*
- - Stade Child-Pugh *–suite*
- - - A ¬ *K74.5, K74.70!*
- - - B ¬ *K74.5, K74.71!*
- - - C ¬ *K74.5, K74.72!*
- Charcot ¬ *K74.3*
- Congénitale (du foie) ¬ *P78.8*
- Dystonie-polycythémie-hypermanganésémie ¬ Syndrome de *E83.8*
- Foie
- - Cryptogénique ¬ *K74.6*
- - Dite) cardiaque ¬ *K76.1*
- - Hémorragie par rupture des varices œsophagiennes ¬ *K74.6†, I98.3**
- - Macronodulaire ¬ *K74.6*
- - Micronodulaire ¬ *K74.6*
- - Portale ¬ *K74.6*
- - Post-nécrotique ¬ *K74.6*
- - SAI ¬ *K74.6*
- - Sans précision ¬ *K74.6*
- - Stade Child-Pugh
- - - A ¬ *K74.6, K74.70!*
- - - B ¬ *K74.6, K74.71!*
- - - C ¬ *K74.6, K74.72!*
- - Type mixte ¬ *K74.6*
- - Varices œsophagiennes ¬ *K74.6†, I98.2**
- - ¬
- - - Glycogénose avec *E74.0*
- - - Maladie toxique du foie avec fibrose et *K71.7*
- Héréditaire des enfants indiens d'Amérique du Nord ¬ *K74.6*
- Idiopathique associée au cuivre ¬ *K74.6*
- Monolobulaire ¬ *K74.3*
- Pancréas ¬ *K86.88*
- Pulmonaire ¬ *J84.10*
- Syphilitique du foie ¬ *A52.7†, K77.0**
- Todd ¬ *K74.3*
- Toxique foie
- - Hémorragie par rupture des varices œsophagiennes ¬ *K71.7†, I98.3**
- - Varices œsophagiennes ¬ *K71.7†, I98.2**

Cirrhotique
- Familiale à début précoce ¬ Hypertension portale non *K76.6*
- ¬
- - Cardiomyopathie *I42.88*
- - Linite plastique au cours de carcinome gastrique *C16.9*
- - Thrombose de la veine porte non *I81*

Cirsoïde) (faux) (rompu) ¬ anévrisme (*I72*

Cisaillement verticale [Vertical shear fracture] ¬ Fracture de *S32.7*

Cistica ¬ Echinococcosi *B67.4*

Citadine ¬
- Fièvre jaune *A95.1*
- Rage *A82.1*

Citerne cérébello-médullaire élargie-hydrocéphalie ¬ Syndrome de nævus en tache de vin- *Q04.8, Q82.5*

Citrine ¬ Cholestase intrahépatique néonatale par déficit en *E72.2*

Citrobacter freundii multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Genre *U81.05!*
- 3MRGN ¬ Genre *U81.25!*
- 4MRGN ¬ Genre *U81.45!*

Citrulline ¬ Trouble du métabolisme de la *E72.2*

Citrullinémie
- Type I
- - Adulte ¬ *E72.2*
- - Néonatal aigu ¬ *E72.2*
- - Tardive ¬ *E72.2*
- - ¬ *E72.2*

Citrullinurie ¬ *E72.2*

CIV
- Communication interventriculaire] sous-pulmonaire non-committed ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec *Q20.1*
- ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication interventriculaire [*I51.0*

Civatte ¬ Poïkilodermie de *L57.3*

Civil ou pénal ¬ Condamnation, sans emprisonnement, après procès *Z65*

Claes-Jensen ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X syndromique de type *Q87.8*

Clair
v./v.a. Cellule claire

Clampage du cordon ombilical ¬ Déplacement d'un *P51.8*

CLAPO ¬ Syndrome *Q87.3*

Clark-Baraitser ¬ Syndrome de *Q87.0*

Claude
- Bernard-Horner ¬ Syndrome de *G90.2*
- ¬ Syndrome de *I66.8†, G46.3**

Claude-Bernard-Horner ¬ Syndrome congénital de *G90.2*

Claudicatio spinalis cours
- Atteinte lombaire des disques intervertébraux ¬ *M51.1†, G55.1**
- Sténose
- - Canal rachidien ¬ *M48.09†, G55.3**
- - Lombaire du canal rachidien ¬ *M48.06†, G55.3**

Claudication
- Intermittente
- - Artériopathie oblitérante des membres inférieurs ¬ *I70.29*
- - Médullaire (lors de myélopathie vasculaire) ¬ *G95.18*
- - SAI ¬ *I73.9*
- Syphilitique intermittente ¬ *A52.0†, I79.8**

Clausen
v./v.a. Dyggve-Melchior-Clausen

Claustrophobie ¬ *F40.2*

Clavatus ¬ Alvéolite due à Aspergillus *J67.40*

Claviculaire
v./v.a. costo-claviculaire
v./v.a. sterno-costo-claviculaire
- ¬
- - Foramen pariétal avec hypoplasie *Q74.0*
- - Tuberculose des ganglions sous- *A18.2*

Clavicule
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ Fracture de la *P13.4*
- Multiples ¬ Fracture de la *S42.09*
- Omoplate et de l'humérus ¬ Fractures multiples de la *S42.7*
- Partie non précisée ¬ Fracture de la *S42.00*
- SAI ¬ *S42.00*
- Tiers
- - Latéral ¬ Fracture de la *S42.03*
- - Médian ¬ Fracture de la *S42.01*
- - Moyen ¬ Fracture de la *S42.02*
- ¬
- - *T84.10*
- - Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- - Chondrosarcome de la *C41.32*
- - Kyste osseux anévrismal de la *M85.51*
- - Ostéite condensante médiane de la *M85.31*
- - Ostéoblastome de la *D16.72*
- - Ostéosarcome de la *C41.32*
- - Pseudarthrose congénitale de la *Q74.0*
- - Sarcome d'Ewing de la *C41.32*
- - Sarcome de la *C41.32*
- - Tumeur bénigne os cartilage articulaire
- - - *D16.72*
- - - Côtes, sternum et *D16.7*
- - Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: *C41.32*

Clayton Smith-Donnai ¬ Syndrome de *Q80.9, Q74.0*

Clefts (fentes) ¬ Water *H25.0*

Cléido-crânien ¬
- Dysostose *Q74.0*
- Dysplasie *Q74.0*

Cléjat
v./v.a. Petges-Cléjat
v./v.a. Petges-Cléjat-Jacobi

Clément
v./v.a. Müller-Ribbing-Clément

Clignement ¬ Mâchoire à *Q07.8*

Climatère féminin ¬ Troubles de la ménopause et du *N95.1*

Climatérique ¬ Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Climatique
- Gouttelettes ¬ Kératopathie *H18.5*
- Tropical ¬ Bubon *A55*

Climatisation] ¬ Pneumopathie liée à la ventilation [Pneumopathie liée à la *J67.70*

Clinique
- Épidémiologique ¬ Infection à coronavirus-2019, avec confirmation *Z20.8, U07.2!*
- Infection VIH Catégorie
- - A ¬ Catégories *U60.1!*
- - B ¬ Catégories *U60.2!*
- - C ¬ Catégories *U60.3!*
- Maladie due au VIH non précisée ¬ Catégorie *U60.9!*
- Sérologie positive ¬ Pian sans signes *A66.8*
- ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche *Z00.6*

Cliniquement, sans confirmation parasitologique ¬ Paludisme diagnostiqué *B54*

Clinodactylie
- Cinquième doigt ¬ Kératose palmo-plantaire avec *Q82.8, Q68.1*
- Doigts familiale isolée ¬ *Q68.1*

CLIPPERS ¬ *G04.8*

Clitoridien ¬ Epispadias *Q64.0*

Clitoris ¬
- Adénocarcinome du *C51.2*
- Carcinome basocellulaire du *C51.2*
- Carcinome épidermoïde du *C51.2*
- Hypertrophie du *N90.8*
- Malformation congénitale du *Q52.6*
- Mélanome malin muqueux du *C51.2*
- Tumeur maligne: *C51.2*

Clivées ¬
- Lymphome
- - Diffus à cellules non *C83.9*
- - Petites cellules non *C83.7*
- Lymphome folliculaire
- - Cellule
- - - *C82.9*
- - - Non *C82.2*
- - Non-hodgkinien à petites cellules *C82.9*
- - Petites cellules *C82.0*
- Lymphome non hodgkinien à petites cellules *C83.1*

Clivus ¬ Méningiome du *D32.0*

CLN
- Adulte ¬ *E75.4*
- Congénitale ¬ *E75.4*
- Infantile ¬ *E75.4*
- Juvénile ¬ *E75.4*

CLN1 ¬ Maladie *E75.4*

CLN10 ¬ Maladie *E75.4*

CLN11 [Céroïde lipofuscinose neuronale de type 11] ¬ Maladie *E75.4*

CLN12 [Céroïde lipofuscinose neuronale de type 12] ¬ Maladie *E75.4*

CLN13 [Céroïde lipofuscinose neuronale de type 13] ¬ Maladie *E75.4*

CLN14 [Céroïde lipofuscinose neuronale de type 14] ¬ Maladie *E75.4*

CLN2 ¬ Maladie *E75.4*

CLN3 ¬ Maladie *E75.4*

CLN4 [Céroïde lipofuscinose neuronale de type 4] ¬ Maladie *E75.4*

CLN4A ¬ Maladie *E75.4*

CLN4B ¬ Maladie *E75.4*

CLN5 ¬ Maladie *E75.4*

CLN6 ¬ Maladie *E75.4*

CLN7 ¬ Maladie *E75.4*

CLN8 ¬ Maladie *E75.4*

CLN9 ¬ Maladie *E75.4*

Cloacae multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Genre Enterobacter *U81.04!*
- 3MRGN ¬ Genre Enterobacter *U81.24!*
- 4MRGN ¬ Genre Enterobacter *U81.44!*

Cloacale
- Non syndromique ¬ Malformation *Q43.8*
- ¬ Tumeur maligne: Zone *C21.2*

Cloaque
- SAI ¬ *Q43.7*
- ¬ Persistance du *Q43.7*

Cloison
- Cardiaque, sans précision ¬ Malformation congénitale d'une *Q21.9*
- Cardiaques ¬ Autres malformations congénitales des *Q21.8*
- Nasal
- - Acquise) ¬ Déviation de la *J34.2*
- - Choanes ¬ Bord postérieur
- - - *C11.3*
- - - *D10.6*
- - SAI ¬ Perforation de la *J34.8*
- - ¬
- - - *C30.0*
- - - Déviation
- - - - *J34.2*
- - - - Congénitale de la *Q67.4*
- - - Nécrose du nez et de la *J34.0*
- - - Perforation congénitale de la *Q30.3*
- - - Phlegmon du nez et de la *J34.0*
- - - Syphilis de la *A52.7†, J99.8**
- - - Ulcération du nez et de la *J34.0*
- Nez ¬ Luxation de la *S03.1*
- Recto-vaginal
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: *O70.2*
- - ¬ Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: *C76.3*
- Recto-vésicale ¬ Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: *C76.3*
- ¬ nez (*T20*

Cloisonné
- Total ¬ Utérus *Q51.2*
- Transversal ¬ Vagin *Q52.1*

Cloisonnement du vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*

Clonal cytopenia of undetermined significance] ¬ CCUS [*U62.01!*

Clonal hematopoiesis of indeterminate potential] ¬ CHIP [*U62.00!*

Clonale
- Non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie *D47.0*
- Potentiel indéterminé ¬ Hématopoïèse *U62.00!*
- Signification indéterminée ¬ Cytopénie *U62.01!*

Clonidine ¬ *T46.5*

Clonique
- Généralisées ¬ Syndrome de Poirier-Bienvenu avec crises tonico- *G40.3*
- ¬
- - Crise non spécifique
- - - *G40.3*
- - - Tonico- *G40.3*
- - État de mal épileptique tonico- *G41.0*
- - Spasme hémifacial *G51.3*

Clonorchiase
- Foie ¬ *B66.1†, K77.0**
- ¬ *B66.1*

Clonorchis sinensis ¬ Infection
- *B66.1*
- Foie à *B66.1*

Clorale ¬ Dépendance à la bétaïne *F13.2*

Clostridioides difficile ¬ Infection à *A04.79*

Clostridium
- Tetani ¬ Infection congénitale à *A33*
- ¬
- - Infection congénitale à *P37.8, B96.7!*
- - Myonécrose à *A48.0*
- - Phlegmon à *A48.0*

Clostridium botulinum ¬
- Infection à *A05.1*
- Intoxication alimentaire à *A05.1*

Clostridium difficile
- Mégacôlon
- - Complications organiques ¬ Entérocolite à *A04.73*
- - Sans complications organiques ¬ Entérocolite à *A04.72*
- Sans mégacôlon
- - Complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à *A04.71*
- - Sans complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à *A04.70*
- ¬
- - Colite
- - - Infectieuse à *A04.79*
- - - Toxique à *A04.79*
- - Entérite
- - - Infectieuse à *A04.79*
- - - Toxique à *A04.79*
- - Infection

Clostridium difficile *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Infection *–suite*
- - - *A04.79*
- - - Récurrente par *U69.40!*
- - Sepsis à *A41.4*

Clostridium perfringens
- Clostridium welchii] ¬ Intoxication alimentaire à *A05.2*
- Micro-organismes anaérobies sporulants à Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.7!*
- ¬
- - Entérite infectieuse à *A04.8, B96.7!*
- - Infection à *A49.84*
- - Sepsis à *A41.4*

Clostridium welchii] ¬ Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [*A05.2*

Clou ¬
- *L02*
- Enlèvement de: *Z47.0*

Clouston ¬ Syndrome de *Q82.8*

CLOVES ¬ Syndrome *Q87.3*

Cluster de gènes ATAD3 ¬ Syndrome létal d'hypoplasie pontocérébelleuse-hypotonie-insuffisance respiratoire dû à des délétions bialléliques dans le *Q04.3*

Clutton ¬ Hydarthrose de *A50.5†, M03.19**

CM-AVM ¬ *Q27.3*

CMMRD] ¬ Glioblastome au cours du syndrome du déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements [*C71.9*

CMO I [Déficit en corticostérone méthyloxydase type I] ¬ *E27.4*

CMV
- Cytomégalovirus
- - VIH positif ¬ Décollement de la rétine au cours de rétinite à *B20†, H32.0*, B25.88*
- - ¬ Maladie due VIH
- - - Récidive de rétinite à *B20†, H32.0*, B25.88*
- - - Rétinite à *B20†, H32.0*, B25.88*
- ¬ Infection anténatale au *P35.1*

CNIBF] Convulsions néonatales-infantiles bénignes familiales ¬ [*G40.3*

CNTNAP2 ¬ Encéphalopathie épileptique et développementale associée à *G40.8*

CoA
v./v.a. acyl-CoA-déshydrogénase
v./v.a. alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA
v./v.a. propionyl-CoA
- Déshydrogénase acide gras chaîne courte ¬
- - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl- *E71.3*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl- *E71.3*
- Ligase et défaut d'amidation ¬ Insuffisance en acides biliaires- *K76.8*
- Transférase ¬ Déficit succinyl-CoA 3
- - Cétoacide *E71.3*
- - Oxoacide *E71.3*

Coagulants ¬ Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres *T45.7*

Coagulase-négatif ¬
- Choc septique à staphylocoques *A41.1, R57.2*
- Infection à staphylocoques *A49.08*
- Septicémie à staphylocoques *A41.1*

Coagulation
- Anomalie du récepteur plaquettaire P2Y12 de l'ADP [adénosine diphosphate] ¬ Trouble de la *D69.1*
- Cours du post-partum ¬ Anomalie de la *O72.3*
- Dépendants de la vitamine K ¬ Déficit héréditaire combiné en facteurs de la *D68.28*
- Due
- - Affections du foie ¬ Carence en facteur de *D68.4*
- - Avitaminose K ¬ Carence en facteur de *D68.4*
- Intravasculaire
- - Disséminée
- - - Fœtus et le nouveau-né ¬ *P60*
- - - ¬
- - - - *D65.1*
- - - - Glomérulonéphrite au cours de *D65.1†, N08.2**
- - - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- - - - Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - - - Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*
- - - - Maladie glomérulaire au cours de *D65.1†, N08.2**
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.1*
- Pendant la période néonatale ¬ Autres affections transitoires de la *P61.6*
- Prolongé ¬ Temps de *R79.8*
- Sanguin
- - Durablement acquis ¬ Troubles de la *U69.11!*
- - ¬ Trouble provisoire de la *U69.12!*
- Sans précision ¬ Anomalie de la *D68.9*
- Vitamine K-dépendants ¬ Maladie de type pseudoxanthome élastique associée à un déficit en facteurs de *D68.28, Q82.8*
- ¬
- - Anomalies précisées de la *D68.8*
- - Carence
- - - Acquise en facteur de *D68.4*
- - - Héréditaire d'autres facteurs de *D68.28*
- - Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la *O45.0*
- - Déficience de facteurs de *D68.28*
- - Déficit
- - - Acquis de la *D68.9*
- - - Héréditaire en facteurs de *D68.28*

Coagulation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hémophilie due à des anticorps inhibant la *D68.38*
- - Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la *O67.0*
- - Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la *O46.0*
- - Réduction des facteurs de *D68.9*
- - Troubles
- - - Facteurs de *D68.28*
- - - Hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de *D68.32*

Coagulopathie de consommation ¬ *D65.1*

Coalescence
- Congénitale des osselets ¬ *Q16.3*
- Côtes congénitale ¬ *Q76.6*
- Doigts ¬ *Q70.0*
- Orteils ¬ *Q70.2*
- Phalanges SAI ¬ *Q70.9*
- Tarsale ¬ *Q66.8*

Coalition
- Tarsienne ¬ *Q66.8*
- Tarsocarpienne ¬ Syndrome de *Q74.8*

Coarctation
- Aorte
- - Autosomique dominante ¬ *Q25.1*
- - Avant le canal ¬ *Q25.1*
- - Canal ¬ *Q25.1*
- - ¬ *Q25.1*
- Aorte abdominale ¬ *Q25.1*
- Aortique atypique ¬ *Q25.1*
- Isthme aortique après le canal ¬ *Q25.1*
- ¬ Transposition congénitalement non corrigée des gros vaisseaux avec *Q20.3*

COASY ¬ Neurodégénérescence associée à la protéine *G23.0*

Coatomère] ¬ Syndrome COPA [sous-unité alpha du complexe protéique *M35.8*

Coats ¬ Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*

Coats-plus ¬ Syndrome de *Q87.8*

Cobalamine ¬
- Carence en: *E53.8*
- Homocystinurie due à un défaut du métabolisme du cofacteur *E72.1*

Cobalamine-protéinurie ¬ Syndrome de malabsorption sélective de la *D51.1*

Cobalt ¬ Taux anormal de: *R79.0*

Cobb ¬ Syndrome de *Q27.3*

Cocaïne
- Sang ¬ Présence de *R78.2*
- ¬
- - Embryofœtopathie à la *Q86.88*
- - Intoxication par la *T40.5*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F14*

Cocardes ¬ Érythrokératodermie en *Q82.8*

Coccidioides ¬
- Infection à *B38.9*
- Septicémie à *B38.70*

Coccidioïdomycose
- Aiguë ¬ Pneumonie au cours de *B38.0†, J17.2**
- Chronique ¬ Pneumonie au cours de *B38.1†, J17.2**
- Cutanée ¬ *B38.3†, L99.8**
- Disséminée ¬ *B38.78*
- Prostate ¬ *B38.8†, N51.0**
- Pulmonaire
- - Aiguë ¬ *B38.0†, J17.2**
- - Chronique ¬ *B38.1†, J17.2**
- - ¬ *B38.2†, J17.2**
- ¬
- - *B38.9*
- - Formes de *B38.8*
- - Maladie due au VIH avec *B20, B38.9*
- - Méningite à *B38.4†, G02.1**

Coccidiose
- Intestinale ¬ *A07.3*
- ¬
- - *A07.3*
- - Maladie due au VIH avec *B20, A07.3*

Coccygien pilonidal e ¬
- Fistule *L05*
- Kyste *L05*

Coccygodynie ¬ *M53.3*

Coccyx
- Obstétrical(e) ¬ Lésion du *O71.6*
- ¬
- - *C41.4*
- - *D16.8*
- - Chordome chondroïde du *C41.4*
- - Fracture du *S32.2*
- - Kyste malin du *C44.59*
- - Ostéoblastome du *D16.8*
- - Sarcome d'Ewing du *C41.4*
- - Sarcome du *C41.4*
- - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: Bassin, sacrum et *D16.8*

Cochléaire
v./v.a. Nerf cochléaire
v./v.a. vestibulo-cochléaire
- ¬
- - Otosclérose *H80.2*
- - Prothèse (de): *Z45.3*

Cochlée ¬
- *S01.38*
- *Z96.2*

Cochléo-sacculaire-cataracte ¬ Syndrome de dégénérescence *H90.5†, H28.2**

Cochléo-vestibulaire ¬ Dysplasie *Q16.5*

Cochrane ¬ Syndrome de *E71.1*

Cockayne ¬
- Complexe XP/CS [Xeroderma pigmentosum-syndrome de *Q87.1*
- Syndrome
- - *Q87.1*
- - Weber- *Q81.0*

Cocon ¬ Syndrome des membres enveloppés dans un *Q87.8*

CODAS ¬ Syndrome *Q87.8*

Codéine ¬ *T40.2*

Cœliaque
- Calcification cérébrales épilepsie ¬
- - CEC [Syndrome de maladie *K90.0, G40.8*
- - Syndrome de maladie *K90.0, G40.8*
- Gluten ¬ Sensibilité non *K90.4*
- ¬
- - Ganglion ou plexus *S34.5*
- - Lésion traumatique de l'artère *S35.2*
- - Maladie *K90.0*
- - Syndrome de compression de l'artère *I77.4*

Cœur
- Artificiel ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Dépendance de longue durée envers un *Z99.4*
- - Infection due à un *T82.72*
- Chronique) SAI ¬ Maladie ischémique du *I25.9*
- Circulation coronaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R93.1*
- Croisé ¬ *Q24.8*
- Droit ¬ Hypoplasie du *Q22.6*
- Gauche
- - HLHS] ¬ Hypoplasie du *Q23.4*
- - ¬
- - - Atrésie
- - - - Aortique au cours de syndrome d'hypoplasie du *Q23.4*
- - - - Mitrale au cours de syndrome d'hypoplasie du *Q23.4*
- - - Canal atrio-ventriculaire complet - anomalies obstructives du *Q21.2*
- - - Hypoplasie
- - - - Aorte ascendante au cours de syndrome d'hypoplasie du *Q23.4*
- - - - Valve aortique au cours de syndrome d'hypoplasie du *Q23.4*
- - - Malformation congénitale du ventricule gauche lors du syndrome d'hypoplasie du *Q23.4*
- Inversion totale des viscères ¬ Transposition du *Q89.3*
- Médiastin et de la plèvre ¬ Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du *C38.8*
- Myocarde
- - Graisseuse ¬ Dégénérescence du *I51.5*
- - Sénile ¬ Dégénérescence du *I51.5*
- Poumon

Cœur *–suite*
- Poumon *–suite*
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency]] ¬ Inscription pour transplantation *U55.32*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription pour transplantation *U55.31*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour transplantation *U55.30*
- - ¬
- - - Échec d'une greffe *T86.3*
- - - Rejet d'une greffe *T86.3*
- - - Status post greffe de *Z94.3*
- Pulmonaire
- - Aigu ¬
- - - *I26.0*
- - - Embolie pulmonaire
- - - - Mention de *I26.0*
- - - - Sans mention de *I26.9*
- - Chronique) SAI ¬ *I27.9*
- - ¬
- - - Thromboembolie
- - - - Artère pulmonaire avec *I26.0*
- - - - Veine pulmonaire avec *I26.0*
- - - Thrombose
- - - - Artère pulmonaire avec *I26.0*
- - - - Veine pulmonaire avec *I26.0*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique du *S26.9*
- Triatrial
- - Droit ¬ *Q24.2*
- - Gauche ¬ *Q24.2*
- - ¬ *Q24.2*
- Triloculaire biauriculaire ¬ *Q20.4*
- Univentriculaire ¬ *Q20.4*
- ¬
- - *D48.7*
- - Anévrisme (pariétal) du *I25.3*
- - Bloc congénital du *Q24.6*
- - Déchirure cardiaque
- - - Ouverture d'une cavité du *S26.83*
- - - Sans ouverture d'une cavité du *S26.82*
- - Défaut du canal atrioventriculaire du *Q21.2*
- - Dégénérescence murale du *I51.5*
- - Dextroposition du *Q24.0*
- - Dilatation du *I51.7*
- - Diverticule du *Q24.8*
- - Donneur de *Z52.7*
- - Échec d'une greffe de *T86.2*
- - Gomme du *A52.0†, I52.0**
- - Gonorrhée du *A54.8†, I52.0**
- - Hémopéricarde dû à une blessure traumatique par poignardement du *S26.0*
- - Inflammation due à un appareil électronique implanté dans le *T82.70*
- - Lésion du *S26.88*

Cœur *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie glycogénique du *E74.0†, I43.1**
- - Malposition du *Q24.8*
- - Neuropathie diabétique du *E14.40†, G99.08**
- - Rejet d'une greffe de *T86.2*
- - Situs inversus ou transversus du *Q89.3*
- - Status post greffe du *Z94.1*
- - Syphilis congénitale du *A50.5†, I52.0**
- - Tophus goutteux du *M10.09†, I43.8**
- - Transposition du *Q24.0*
- - Tuberculose du *A18.8†, I43.0**
- - Tumeur bénigne: *D15.1*
- - Tumeurs malignes secondaires du *C79.84*

Cœur-main
- Type slovène ¬ Syndrome *Q87.2*
- ¬ Syndrome *Q87.2*

Cofacteur
- Cobalamine ¬ Homocystinurie due à un défaut du métabolisme du *E72.1*
- Molybdène
- - Type
- - - A ¬ Déficit en sulfite oxydase dû à un déficit en *E72.1*
- - - B ¬ Déficit en sulfite-oxydase dû à un déficit en *E72.1*
- - - C ¬ Déficit en sulfite-oxydase dû à un déficit en *E72.1*
- - ¬ Déficit en sulfite oxydase dû à un déficit en *E72.1*

Coffin-Lowry
- Femme porteuse ¬ Forme symptomatique du syndrome de *Q87.0*
- ¬ Syndrome de *Q87.0*

Coffin-Siris ¬ Syndrome de *Q87.1*

COFS [cérébro-oculo-facio-squelettique] ¬ Syndrome *Q87.8*

COG2 ¬ Maladie de glycosylation congénitale associée au *E77.8*

COG2-CDG ¬ *E77.8*

Cogan ¬
- Apraxie oculomotrice type *H51.8*
- Syndrome de *H16.3*

Cogan-Reese ¬ Syndrome de *H21.8*

Cognitif
- Conscience, autres et non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux fonctions *R41.8*
- Enfance avec syndrome extrapyramidal ¬ Syndrome de régression motrice et *G31.88*
- Léger ¬ Trouble *F06.7*
- Sévère ¬
- - Épilepsie temporale mésiale infantile avec régression *G40.2*
- - Syndrome d'hypotonie musculaire-trouble sévère du langage-retard *Q87.8*

Cohen
v./v.a. Lowe-Kohn-Cohen

Cohen *–suite*
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Cohen-Gibson ¬ Syndrome de *Q87.3*

Coiffe rotateurs
- Non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la *M75.1*
- ¬
- - *S43.4*
- - Lésion traumatique de muscles et de tendons de la *S46.0*
- - Syndrome de la *M75.1*

Coin SAI des dents ¬ Anomalie en *K03.1*

Co-infection agent delta
- Coma hépatique ¬ Hépatite aiguë B
- - *B16.0, K72.74!*
- - Sans *B16.2, K72.74!*
- Sans coma hépatique ¬ Hépatite aiguë B avec *B16.1*

Coït douloureux pour l'homme ¬ *N48.8*

Col
- Anatomique ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: *S42.23*
- Appareil urinaire ¬ Carcinome épidermoïde pur du *C68.9*
- Cervical ¬ Carcinome épidermoïde du *C53.9*
- Chirurgical ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: *S42.22*
- Cygne ¬ Déformation en boutonnière et en *M20.0*
- Néovessie ¬ Sténose du *N32.0*
- Omoplate ¬ Fracture de l'omoplate: Cavité glénoïde et *S42.14*
- Pancréas ¬
- - Blastome du *C25.7*
- - Carcinome
- - - Familial du *C25.7*
- - - Pseudo-papillaire et solide du *C25.7*
- - Carcinome à cellules acineuses du *C25.7*
- - Carcinome épidermoïde du *C25.7*
- - Carcinome indifférencié à cellules géantes de type ostéoclastique du *C25.7*
- - Cystadénocarcinome
- - - Mucineux du *C25.7*
- - - Séreux du *C25.7*
- - Néoplasme neuroendocrine-non neuroendocrine mixte du *C25.7*
- - Tumeur à cellules géantes ostéoclastiques du *C25.7*
- SAI ¬ Prolapsus (de): *N81.2*
- Vagin
- - Perméables ¬ Utérus bicorne bicervical avec *Q51.3*
- - ¬ Utérus double avec duplication du *Q51.1*
- Vésicale ¬ Dyssynergie du détrusor du *N32.0*
- Vessie ¬ Obstruction du *N32.0*
- ¬
- - *S82.41*

Col *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Affection inflammatoire
- - - Aiguë de l'utérus, à l'exclusion du *N71.0*
- - - Chronique de l'utérus, à l'exclusion du *N71.1*
- - - Utérus, sans précision, à l'exclusion du *N71.9*
- - Dilatation insuffisante du *O62.0*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du *P01.0*
- - Fracture
- - - Extrémité supérieure du radius: *S52.12*
- - - Os du métacarpe: *S62.33*
- - - Premier métacarpien: *S62.23*
- - Polype muqueux du *N84.1*
- - Soin maternels
- - - Anomalies du *O34.4*
- - - Cerclage avec ou sans mention de béance du *O34.3*
- - - Intervention chirurgicale antérieure sur le *O34.4*
- - - Opération de Shirodkar avec ou sans mention de béance du *O34.3*
- - - Polype du *O34.4*
- - - Rétrécissement ou sténose du *O34.4*
- - - Tumeur du *O34.4*

Col de l'utérus
- Inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du *O34.30*
- Lésion localisations contiguës ¬
- - Adénocarcinome du *C53.8*
- - Carcinome épidermoïde du *C53.8*
- - Carcinosarcome du *C53.8*
- - Léiomyosarcome du *C54.8*
- - Sarcome du *C53.8*
- - Tumeur neuroectodermique primitive du *C53.8*
- NIC stade
- - I ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N87.0*
- - II ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N87.1*
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ néoplasie intraépithéliale du *D06*
- Non classée ailleurs ¬ Dysplasie sévère du *N87.2*
- Sans précision ¬
- - Affection non inflammatoire du *N88.9*
- - Carcinoma in situ: *D06.9*
- - Dysplasie du *N87.9*
- - Malformation congénitale de l'utérus et du *Q51.9*
- - Tumeur maligne: *C53.9*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- Tant complication de l'accouchement ¬
- - Amputation du *O65.5*

Col de l'utérus *–suite*
- Tant complication de l'accouchement ¬ *–suite*
- - Atrésie du *O65.5*
- - Cicatrice au *O65.5*
- Trichomonas ¬ Infection du *A59.0†, N74.8**
- ¬
- - Abcès non puerpéral du *N72*
- - Absence acquise du *Z90.7*
- - Absence congénitale du *Q51.5*
- - Adénocarcinome
- - - *C53.9*
- - - Portion vaginale du *C53.1*
- - Adénosarcome du *C53.9*
- - Adhérences du *N88.1*
- - Affections
- - - Inflammatoires du *N72*
- - - Non inflammatoires précisées du *N88.8*
- - Agénésie du *Q51.5*
- - Allongement hypertrophique du *N88.4*
- - Aplasie du *Q51.5*
- - Atrésie
- - - Orifice du *Q51.8*
- - - Portion vaginale du *Q51.8*
- - Béance du *N88.3*
- - Carcinoma in situ: Autres parties du *D06.7*
- - Carcinome à cellules vitreuses du *C53.9*
- - Carcinome adénoïde
- - - Basal du *C53.9*
- - - Kystique du *C53.9*
- - Carcinome papillaire du *C53.9*
- - Carcinosarcome du *C53.9*
- - Déchirure
- - - Ancienne du *N88.1*
- - - Obstétricale du *O71.3*
- - Décollement annulaire du *O71.3*
- - Dysplasie
- - - Légère du *N87.0*
- - - Moyenne du *N87.1*
- - Dysplasie sévère du *N87.2*
- - Érosion et ectropion du *N86*
- - Eversion du *N86*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur du *Z12.4*
- - Frottis de Papanicolaou au niveau du *Z01.4*
- - Hypoplasie de l'utérus et du *Q51.8*
- - Kyste
- - - *N88.8*
- - - Embryonnaire du *Q51.6*
- - Léiomyosarcome du *C53.9*
- - Leucoplasie du *N88.0*
- - Malformations congénitales de l'utérus et du *Q51.8*
- - Mélanome in situ du *D03.8*
- - Papillome du *D26.0*
- - Polype du *N84.1*

Col de l'utérus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: *R87*
- - Rétrécissement et sténose du *N88.2*
- - Rhabdomyosarcome du *C53.9*
- - Sarcome du *C53.9*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, N74.2**
- - Tuberculose du *A18.1†, N74.0**
- - Tumeur bénigne: *D26.0*
- - Tumeur germinale maligne du *C53.9*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du *C53.8*
- - Tumeur müllérienne mixte maligne du *C53.9*
- - Tumeur neuroectodermique
- - - Périphérique maligne du *C53.9*
- - - Primitive du *C53.9*
- - Ulcère trophique du *N86*

Col du fémur
- Base ¬ Fracture du *S72.05*
- Épiphyse (proximale), décollement épiphysaire ¬ Fracture du *S72.02*
- Mésocervicale ¬ Fracture du *S72.04*
- Partie
- - Non précisée ¬ Fracture du *S72.00*
- - ¬ Fracture du *S72.08*
- Souscapitale ¬ Fracture du *S72.03*
- ¬
- - Antéversion du *Q65.8*
- - Fracture
- - - Base du *S72.05*
- - - Intracapsulaire du *S72.01*
- - - Mésocervicale du *S72.04*
- - - Transcervicale ouverte du *S72.04, S71.87!*

Col utérin
v./v.a. Col de l'utérus

Col vésical
- Acquise) ¬ Sténose du *N32.0*
- Congénital(e) ¬ Occlusion du *Q64.3*
- ¬
- - Carcinome à petites cellules du *C67.5*
- - Carcinome épidermoïde pur du *C67.5*
- - Carcinome non papillaire à cellules transitionnelles du *C67.5*
- - Formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du *Q64.3*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire du *C67.5*
- - Tumeur maligne: *C67.5*

Colchicine ¬ Intoxication par la *T50.4*

Cole
v./v.a. Zinsser-Engman-Cole
- ¬ Maladie de *Q82.8*

Cole-Carpenter ¬ Syndrome de *Q78.0*

Colère ¬
- *R45.4*

Colère ¬ *–suite*
- Irritabilité et *R45.4*

Coli
- Aplasique ¬ Desmosis *Q43.2*
- ¬
- - Hypersensibilité aux protéines d'E. *T78.4*
- - Septicémie: escherichia coli [E. *A41.51*

Colibacillaire ¬ Cystite *N30.88, B96.2!*

Colibacilles ¬ Sepsis à *A41.51*

Colibacillose
- Généralisée NCA ¬ *A41.51*
- ¬ *A49.82*

Colinet
v./v.a. Caplan-Colinet

Colipase pancréatique ¬ Déficit
- *K90.3*
- Combiné en lipase- *K90.3*

Colique
- Aiguë ¬ Pseudo-obstruction *K56.0*
- Biliaire (récidivante) sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- Hépatique (récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Infantile ¬ *R10.4*
- Néphrétique, sans précision ¬ *N23*
- SAI ¬ *R10.4*
- Saturnine ¬ *T56.0*
- Utérine ¬ *N94.8*
- ¬
- - Constipation lors d'un trouble du transit *K59.00*
- - Fistule cholécysto- *K82.3*
- - Varices *I86.81*

Colite
v./v.a. recto-colite
- Allergiques et alimentaires ¬ Gastroentérite et *K52.2*
- Amibien non dysentérique
- - Entamoeba histolytica ¬ *A06.2*
- - ¬ *A06.2*
- Associée aux antibiotiques selon l'anamnèse personelle ¬ *Z86.1*
- Balantidium coli ¬ *A07.0*
- Collagène ¬ *K52.8*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Due à un cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Granulomateuse ¬ *K50.1*
- Hémorragique ¬ Infectieuse ou septique: *A09.0*
- Hypersensibilité alimentaire ¬ Gastroentérite ou *K52.2*
- Hypothyroïdie-hypertrophie cardiaque-retard de développement ¬ Syndrome d'obésité- *Q87.8*
- Indéterminée
- - Côlon rectosigmoïde ¬ *K52.32*
- - Latérale gauche ¬ *K52.31*
- - Subtotale ¬ *K52.30*

Colite *–suite*
- Indéterminées ¬ Autres *K52.38*
- Infectieuse à Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- Irradiation ¬ Gastroentérite et *K52.0*
- Ischémique
- - Chronique ¬ *K55.1*
- - Fulminante aigu(ë) ¬ *K55.0*
- - SAI ¬ *K55.9*
- - Subaiguë ¬ *K55.0*
- Isospora
- - Belli ¬ *A07.3*
- - Hominis ¬ *A07.3*
- Latérale gauche ¬ *K51.5*
- Létale ¬ Syndrome de photosensibilité cutanée- *K52.8, L57.8*
- Lymphocytaire ¬ *K52.8*
- Médicamenteuses ¬ Gastroentérite et *K52.1*
- Microscopique (collagène ou lymphocytaire) ¬ *K52.8*
- Muqueuse psychogène ¬ *F54, K58.8*
- Non
- - Infectieuses
- - - Précisées ¬ Autres gastroentérites et *K52.8*
- - - Sans précision ¬ Gastroentérite et *K52.9*
- - Précisées origine
- - - Infectieuse ¬ Gastroentérites et *A09.0*
- - - Non précisée ¬ Gastroentérites et *A09.9*
- Protozoaires ¬ *A07.9*
- Pseudomembraneuse ¬ *A04.79*
- Régionale ¬ *K50.1*
- SAI ¬ Infectieuse ou septique: *A09.0*
- Toxique à Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- Toxiques ¬ Gastroentérite et *K52.1*
- Tuberculeuse
- - Ulcéreuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *A18.3†, K93.0**
- Ulcéreux
- - Chronique) subtotale ¬ *K51.0*
- - ¬
- - - CU [*K51.9*
- - - Recto-colite hémorragique [*K51*
- Virus d'Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**
- Virus de l'herpès ¬ *B00.8†, K93.8**

Collagène
- 9 ¬ Dysplasie épiphysaire multiple due à une anomalie du *Q77.3*
- Lymphocytaire) ¬ Colite microscopique (*K52.8*
- Pédiatrique ¬ Gastrite *K29.3*
- Type
- - III ¬ Glomérulopathie à dépôts de *N07.6*
- - VI, forme intermédiaire ¬ Dystrophie musculaire liée au *G71.2*
- Vasculaire) SAI ¬ Maladie (du): *M35.9*
- ¬
- - Colite *K52.8*

Collagène *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Troubles hémorragiques par déficit en récepteur du *D69.1*
- - Vasculopathie cutanée *M35.8†, L99.8**

Collagénome
- Cutané familial ¬ *Q82.8*
- Perforant verruciforme ¬ *L87.1*

Collagénose
- Perforante réactionnelle familiale ¬ *L87.1*
- ¬ Polyneuropathie au cours de *M35.9†, G63.5**

Collapsus
- Chaleur ¬ *T67.1*
- Pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.1*
- Poumon ¬ *J98.18*
- Primitif des alvéoles pulmonaires ¬ *P28.0*
- Pulmonaire
- - Compression
- - - Anesthésie au cours du travail et de l'accouchement ¬ *O74.1*
- - - Due anesthésie cours
- - - - Grossesse ¬ *O29.0*
- - - - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - ¬ *J98.18*
- Trachéo-bronchique ¬ *J98.0*
- Vasculaire survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.3*
- ¬ Syncope et *R55*

Collatéral
- Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament externe [Lig. péronier *M23.94*
- Cubital ¬ Entorse et foulure du coude: Ligament *S53.42*
- Doigt ¬ Lésion traumatique du nerf *S64.4*
- Médial du genou ¬ Distorsion du ligament *S83.42*
- Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [Lig. tibial *M23.93*
- Pouce ¬ Lésion traumatique du nerf *S64.3*
- Radial ¬ Entorse et foulure du coude: Ligament *S53.41*
- ¬
- - Instabilité chronique genou Ligament
- - - Externe [Lig. péronier *M23.54*
- - - Interne [Lig. tibial *M23.53*
- - Lésions internes genou ligament
- - - Externe [Lig. péronier *M23.84*
- - - Interne [Lig. tibial *M23.83*

Colle ¬ Intoxication à la *T65.8*

Collecteurs ¬ Carcinome des tubes *C64*

Collègues ¬ Désaccords avec des supérieurs ou des *Z56*

Colles ¬ Fracture de Pouteau- *S52.51*

Colli ¬ Pterygium *Q18.3*

Collins] ¬ Syndrome de Franceschetti [Syndrome de Treacher *Q75.4*

Collins-Pope ¬ Syndrome de *Q87.2*

Collodion
- Guérison spontanée ¬ Bébé *Q80.2*
- ¬ Bébé *Q80.2*

Colloïde
- Kystique) (thyroïdien) ¬ Nodule: *E04.1*
- ¬
- - Cystadénome *D27*
- - Goitre, non toxique: diffus (*E04.0*

Colobomateux
- Atrophie maculaire-choriorétinopathie ¬ Syndrome de papille optique *Q14.8*
- Microcéphalie-déficience intellectuelle-petite taille liée à l'X ¬ Syndrome de microphtalmie *Q87.1*
- Microcornée] ¬ Syndrome MACOM [macrophtalmie *Q15.8*
- Obésité-hypogénitalisme-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microphtalmie *Q87.8*
- Papille ¬ Fossette *Q14.2*
- ¬ Syndrome de microphtalmie-kyste *Q11.2*

Colobome
- Choriorétinien ¬ *Q14.8*
- Congénital de la papille optique ¬ *Q14.2*
- Cristallin ¬ *Q12.2*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de polydactylie préaxiale avec *Q87.2*
- Dysplasie rhizomélique ¬ Syndrome de microphtalmie- *Q87.1*
- Fond de l'œil ¬ *Q14.8*
- Iris
- - Cataracte congénitale ¬ Syndrome familial de dystrophie rétinienne progressive- *Q15.8*
- - ¬ *Q13.0*
- Maculaire
- - Brachydactylie type B ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Fente palatine-hallux valgus ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ *Q14.8*
- Micrognathie ¬ Syndrome d'agénésie du corps calleux avec déficience intellectuelle, *Q87.8*
- Oculaire-imperforation du canal lacrymonasal ¬ Syndrome de microtie- *Q15.8, Q17.2*
- Ostéopétrose-microphtalmie-macrocéphalie-albinisme-surdité] ¬ Syndrome COMMAD [*Q87.8*
- Papillaire ¬ *Q14.2*
- Paupière
- - Inférieure ¬ *Q10.3*
- - Supérieure ¬ *Q10.3*
- - ¬ *Q10.3*
- SAI ¬ *Q13.0*
- Téléthane ¬ Syndrome du lipome nasopalpébral *D17.0, Q10.3*

Colobome *–suite*
- ¬ Syndrome microcornéen avec lenticône postérieur, vitré primaire hyperplasique persistant et *Q15.8*

Côlon
- Côlon ascendant ¬ Lésion traumatique du *S36.51*
- Côlon descendant ¬ Lésion traumatique du *S36.53*
- Côlon sigmoïde ¬ Lésion traumatique du *S36.54*
- Côlon transverse ¬ Lésion traumatique du *S36.52*
- Cours syndrome Lynch ¬ Carcinome
- - *C18.9*
- - Angle
- - - Droit du *C18.3*
- - - Gauche du *C18.5*
- Gros intestin/côlon, partie non précisée ¬ Lésion traumatique du *S36.50*
- Hépatique] ¬ Angle: droit du *D12.3*
- Héréditaire non polyposique [HNPCC] ¬ Cancer du *C18.9, Z80.0*
- Intestin
- - Grêle, avec péritonite ¬ Diverticulite du *K57.4*
- - ¬
- - - Étranglement du *K56.2*
- - - Occlusion du *K56.6*
- - - Rétrécissement du *K56.6*
- - - Sténose du *K56.6*
- - - Torsion du *K56.2*
- Irritable ¬
- - *K58*
- - Formes psychogènes de: « *F45.3*
- Localisations contiguës
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome du *C18.8*
- - ¬
- - - Carcinome héréditaire non polypeux du *C18.8*
- - - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] du *C18.8*
- - - Tumeur neuroendocrine maligne du *C18.8*
- Partie non précisée ¬ Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/ *S36.50*
- Parties et parties multiples du gros intestin ¬ Lésion traumatique du *S36.59*
- Pelvien] ¬ Sigmoïde [*C18.7*
- Perforation abcès
- - Saignement ¬
- - - Diverticulite
- - - - *K57.23*
- - - - Intestin grêle et du *K57.43*
- - - Maladie diverticulaire
- - - - *K57.23*
- - - - Intestin grêle et du *K57.43*
- - Sans indication saignement ¬ Diverticulite

Côlon *–suite*
- Perforation abcès *–suite*
- - Sans indication saignement ¬ Diverticulite *–suite*
- - - *K57.22*
- - - Intestin grêle et du *K57.42*
- - ¬ Maladie diverticulaire
- - - *K57.22*
- - - Intestin grêle et du *K57.42*
- Recto-sigmoïde ¬
- - *C19*
- - Colite indéterminée du *K52.32*
- SAI ¬ Angiodysplasie du *K55.21*
- Saignement ¬
- - Angiodysplasie du *K55.22*
- - Maladie diverticulaire
- - - *K57.31*
- - - Intestin grêle et du *K57.51*
- Sans
- - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie du *K55.21*
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite
- - - - - *K57.33*
- - - - - Intestin grêle et du *K57.53*
- - - - Diverticulose
- - - - - *K57.31*
- - - - - Grêle et du *K57.51*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite
- - - - - *K57.32*
- - - - - Intestin grêle et du *K57.52*
- - - - Diverticulose
- - - - - *K57.30*
- - - - - Intestin grêle et du *K57.50*
- - Précision
- - - Localisation ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q42.9*
- - - ¬
- - - - Tumeur bénigne: *D12.6*
- - - - Tumeur maligne: *C18.9*
- Splénique ¬
- - Angle: gauche du *D12.3*
- - Tumeur maligne: Angle gauche du *C18.5*
- - ¬
- - Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du *Q42.8*
- - Adénomatose du *D12.6*
- - Allongement acquis du *K59.8*
- - Anomalies fonctionnelles congénitales du *Q43.2*
- - Atonie du *K59.8*
- - Atrésie du *Q42.9*
- - Carcinoma in situ: *D01.0*
- - Carcinome épidermoïde
- - - *C18.9*

Côlon *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carcinome épidermoïde *–suite*
- - - Angle
- - - - Droit du *C18.3*
- - - - Gauche du *C18.5*
- - Carcinome héréditaire non polypeux angle
- - - Droit du *C18.3*
- - - Gauche du *C18.5*
- - Carcinome neuroendocrine du *C18.9*
- - Corps étranger dans le *T18.4*
- - Dilatation
- - - *K59.3*
- - - Congénitale du *Q43.2*
- - Diverticulite congénitale du *Q43.8*
- - Duplication du *Q43.41*
- - Fistule du vagin au *N82.3*
- - GIST Tumeur stromale gastro-intestinale angle
- - - Droit du *C18.3*
- - - Gauche du *C18.5*
- - Invagination de: *K56.1*
- - Maladie
- - - Crohn [entérite régionale] du: *K50.1*
- - - Diverticulaire
- - - - *K57.30*
- - - - Intestin grêle et du *K57.50*
- - Malrotation du *Q43.3*
- - Mélanome malin du *C18.9*
- - Obstruction (du): *K56.4*
- - Obturation du *K56.4*
- - Occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du *Q42*
- - Paralysie: du *K56.0*
- - Polype
- - - *K63.5*
- - - Inflammatoires du *K51.4*
- - Polypose (héréditaire) du *D12.6*
- - Rotation
- - - Absente du cæcum et du *Q43.3*
- - - Incomplète du cæcum et du *Q43.3*
- - - Insuffisante du cæcum et du *Q43.3*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, K93.8**
- - Transposition de: *Q43.8*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du *C18.8*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - *C18.9*
- - - Bénigne angle
- - - - Droit du *D12.3*
- - - - Gauche du *D12.3*
- - - Incertain du *D37.4*
- - - Maligne angle
- - - - Droit du *C18.3*
- - - - Gauche du *C18.5*
- - Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] du *C18.9*

Côlon *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.4*

Côlon ascendant
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome du *C18.2*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde du *C18.2*
- - Carcinome héréditaire non polypeux du *C18.2*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] du *C18.2*
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.51*
- - Tumeur bénigne: *D12.2*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - Bénigne du *D12.2*
- - - Maligne du *C18.2*

Côlon descendant
- Côlon transverse ¬ Aganglionose du rectum, du sigmoïde, du *Q43.1*
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome du *C18.6*
- ¬
- - Aganglionose du rectum, du sigmoïde et du *Q43.1*
- - Carcinome épidermoïde du *C18.6*
- - Carcinome héréditaire non polypeux du *C18.6*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] du *C18.6*
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.53*
- - Tumeur bénigne: *D12.4*
- - Tumeur maligne: *C18.6*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - Bénigne du *D12.4*
- - - Maligne du *C18.6*

Côlon sigmoïde
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome du *C18.7*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde du *C18.7*
- - Carcinome héréditaire non polypeux du *C18.7*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] du *C18.7*
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.54*
- - Tuberculose du *A18.3†, K93.0**
- - Tumeur bénigne: *D12.5*
- - Tumeur maligne: *C18.7*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - Bénigne du *D12.5*
- - - Maligne du *C18.7*

Côlon transverse
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome du *C18.4*
- ¬
- - Aganglionose du rectum, du sigmoïde, du côlon descendant et du *Q43.1*

Côlon transverse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carcinome épidermoïde du *C18.4*
- - Carcinome héréditaire non polypeux du *C18.4*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] du *C18.4*
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.52*
- - Tumeur bénigne: *D12.3*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - Bénigne du *D12.3*
- - - Maligne du *C18.4*

Colonie de vacances ¬ inscription dans: *Z02*

Colonne iliaque supérieure ¬ Tuberculose de la *A18.0†, M90.05**

Colonne lombaire
- Bassin ¬ Lésion tissu mou stade
- - I lors fracture luxation
- - - Fermée de la *S31.84!*
- - - Ouverte de la *S31.87!*
- - II lors fracture luxation
- - - Fermée de la *S31.85!*
- - - Ouverte de la *S31.88!*
- - III lors fracture luxation
- - - Fermée de la *S31.86!*
- - - Ouverte de la *S31.89!*
- Hernie discale ¬ Syndrome de la *M51.1†, G55.1**
- Sacrum, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: *S32.82*
- SAI ¬ *S32.00*
- ¬ Chordome de la *C41.2*

Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ Entorse/foulure et déchirure de la *S33.50*

Colonne vertébrale
- Due à la tuberculose ¬ Déformation de la *A18.0†, M49.09**
- Lésion de la moelle épinière ¬ Fracture de la *T08.0, T09.3*
- Moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie ¬ Lésion de la *P11.59*
- ¬
- - Abcès tuberculeux de la *A18.0†, M49.09**
- - Arthrite chronique juvénile
- - - Début systémique, *M08.28*
- - - Forme oligo(pauci)- articulaire, *M08.48*
- - Arthrite de la *M46.99*
- - Arthrite juvénile idiopathique
- - - *M08.98*
- - - Associée aux enthésopathies, *M08.88*
- - - Indéterminée, *M08.88*
- - Arthrite tuberculeuse de la *A18.0†, M49.09**
- - Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la *M46.0*
- - Carie tuberculeuse de la *A18.0†, M49.09**
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: *T84.20*

Colonne vertébrale *–suite*
- ¬ *–suite*
- - CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium dihydraté], *M11.18*
- - Dermato-arthrite lipoïdique, *E78.88†, M14.38**
- - Granulome tuberculeux de la *A18.0†, M49.09**
- - Hémangiome de la partie osseuse de la *D18.07*
- - Kyste osseux anévrismal de la *M85.58*
- - Lésion sites insertion
- - - Ligamentaire de la *M46.09*
- - - Musculaire de la *M46.09*
- - Maladie de Still de l'adulte, *M06.18*
- - Nécrose avasculaire idiopathique, *M87.08*
- - Nécrose tuberculeuse de la *A18.0†, M49.09**
- - Ostéolyse massive de Gorham de la *M89.58*
- - Ostéomyélite multifocale chronique récurrente, *M86.38*
- - Ostéonécrose médicamenteuse, *M87.18*
- - Ostéoporose
- - - Idiopathique liée à la grossesse avec fracture de la *O99.8, M80.58*
- - - Liée à l'X avec fracture pathologique de la *M80.58*
- - Ostéosarcome de la *C41.2*
- - Psoriasis avec arthrite juvénile de la *L40.5†, M09.08**
- - Sarcome d'Ewing de la *C41.2*
- - Sarcome de la *C41.2*
- - Spondylarthrite ankylosante de sièges multiples de la *M45.00*
- - Syndrome
- - - Déficit congénital combiné en hormones hypophysaires, associé à une perte auditive neurosensorielle et à des malformations de la *E23.0*
- - - Felty, *M05.08*
- - - Oculo-urétro-synovial, *M02.38*
- - - SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec ostéite de la *M86.38*
- - Synovite
- - - Tuberculeuse de la *A18.0†, M49.09**
- - - Villonodulaire pigmentée, *M12.28*
- - TBC [Tuberculose] de la *A18.0†, M49.09**
- - Ténosynovite tuberculeuse de la *A18.0†, M49.09**
- - Ulcère tuberculeux de la *A18.0†, M49.09**

Colorado ¬ Fièvre à tiques du *A93.2*

Colorants ¬ Intoxication par des *T65.6*

Coloration anormale
- Ongle ¬ *L60.8*
- ¬ *R19.5*

Colorectal
- Cours syndrome

Colorectal *–suite*
- Cours syndrome *–suite*
- - Déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements ¬ Carcinome *C19*
- - Lynch ¬ Carcinome *C19*
- Familial de type X ¬ Carcinome *C19*

Colostomie
- Entérostomie ¬ Mauvais résultats fonctionnels d'une *K91.4*
- ¬
- - Présence d'une *Z93.3*
- - Sténose de la stomie consécutive à une *K91.4*
- - Surveillance de *Z43.3*

Colpite
- Atrophique à Haemophilus influenzae ¬ *N95.2, B96.3!*
- Mycosique ¬ *B37.3†, N77.1**

Colpocèle ¬ Soins maternels pour: *O34.8*

Coma
- Cours d'un diabète sucré de type 1 ¬ Hypoglycémie sévère sans *E10.60, U69.72!*
- Diabète sucré ¬ Hypoglycémie sévère sans *E14.60, U69.72!*
- Diabète sucré de type 2 ¬ Hypoglycémie sévère sans *E11.60, U69.72!*
- Hépatique
- - SAI ¬ *K72*
- - ¬
- - - *K72.9, K72.74!*
- - - Hépatite
- - - - A
- - - - - *B15.0, K72.74!*
- - - - - Sans *B15.9*
- - - - Épidémique avec *B15.0, K72.74!*
- - - Hépatite aiguë
- - - - B
- - - - - Agent delta, avec *B16.0*
- - - - - Agent delta, sans *B16.1*
- - - - - Co-infection à agent delta, avec *B16.0, K72.74!*
- - - - - Co-infection à agent delta, sans *B16.1*
- - - - - Sans agent delta et sans *B16.9*
- - - - - Sans agent delta, avec *B16.2*
- - - - - Sans co-infection à agent delta, avec *B16.2, K72.74!*
- - - - D
- - - - - *B16.0*
- - - - - Sans *B16.1*
- - - Hépatite B sans *B18.19*
- - - Hépatite infectieuse avec *B15.0, K72.74!*
- - - Hépatite virale
- - - - *B19.0, K72.74!*
- - - - Sans précision, sans *B19.9*
- - - Ictère
- - - - Épidémique avec *B15.0, K72.74!*
- - - - Infectieux avec *B15.0, K72.74!*

Coma *–suite*
- Hépatique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Insuffisance hépatique alcoolique avec *K70.48*
- Hypoglycémique
- - Cours
- - - Diabète MODY [Maturity onset diabetes of young people] ¬ *E11.61*
- - - Diabète sucré de type 1 ¬ *E10.61, U69.73!*
- - - Diabète sucré de type 2 ¬ *E11.61, U69.73!*
- - Diabète sucré ¬ *E14.61, U69.73!*
- - Non diabétique ¬ *E15*
- - SAI ¬ *E15*
- - ¬
- - - Encéphalopathie due à un *E16.1†, G94.30**
- - - Hyperinsulinisme avec *E15*
- Hypo-osmolaire ¬ *E87.1*
- Insulinique induit, chez un non diabétique ¬ *E15*
- Lors traumatisme cranio-cérébral
- - 30 minutes
- - - 24 heures ¬ Perte de connaissance/ *S06.71!*
- - - ¬ Perte de connaissance/ *S06.70!*
- - Durée non précisée ¬ Perte de connaissance/ *S06.79!*
- - Plus 24 heures
- - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/ *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/ *S06.73!*
- Myxœdémateux ¬ *E03.5*
- Nouveau-né ¬ *P91.5*
- Prolongé ¬ Blessure intracrânienne avec *S06.9, S06.79!*
- Sans précision ¬ *R40.2*
- Vigile] ¬ Semi-coma [*R40.1*
- ¬
- - Hypoglycémie médicamenteuse, sans *E16.0*
- - MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.01*

Combat ¬ Fatigue de *F43.0*

Combiné
v./v.a. Type de maladie

Comédocarcinome non invasif du sein ¬ *D05.1*

Comédonien
- Paume des mains ¬ Nævus *Q82.5*
- ¬ Syndrome du nævus *Q85.8*

Comèl-Netherton ¬ Syndrome de *Q80.8*

COMMAD [colobome-ostéopétrose-microphtalmie-macrocéphalie-albinisme-surdité] ¬ Syndrome *Q87.8*

Commençant
- Avant
- - 16 ans et durant plus de 3 mois ¬ arthrites chez l'enfant, *M08*
- - Fin 20ème gestation
- - - Troubles métabolique
- - - - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, *O21.1*
- - - - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, *O21.1*
- - - - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, *O21.1*
- - - ¬ Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, *O21.0*
- Fin de la 20ème semaine de gestation ¬ Vomissements importants *O21.2*

Commettre des vols [kleptomanie] ¬ Tendance pathologique à *F63.2*

Commis en bande ¬ Délits *F91.2*

Commissurale ¬ Chéilite: *K13.0*

Commissure
- Labiale ¬ Fistule de la *Q38.0*
- Lèvre ¬
- - Carcinome épidermoïde de la *C00.6*
- - Tumeur maligne: *C00.6*

Common variable immunodeficiency] ¬ CVID [*D83.9*

Commotio spinalis ¬ *T09.3*

Commotion
- Cérébrale ¬ *S06.0*
- ¬ *S06.0*

Communicant
- Congénitale ¬ Hydrocèle vaginale *P83.5*
- Fracture luxation
- - Plaie intraabdominale ¬ Plaie ouverte *S31*
- - ¬ Plaie ouverte
- - - *S11*
- - - *S41*
- - - *S91*
- SAI ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère: *I60.7*
- ¬ Hydrocéphalie
- - *G91.0*
- - Congénitale *Q03.8*
- - Obstructive (non *G91.1*

Communicante
v./v.a. Artère communicante

Communication
- Aorto-pulmonaire ¬ *Q21.4*
- Artério-veineuse rétinienne congénitale ¬ *Q14.1*
- Atrio-ventriculaire
- - Partielle ¬ *Q21.2*
- - ¬ *Q21.2*
- Auriculo-ventriculaire
- - Discordante ¬ *Q20.5*
- - ¬ *Q21.2*
- Cardiaque) SAI ¬ *Q21.9*

Communication *–suite*
- Interatriale
- - CIA] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): *I51.0*
- - Séquence de Robin et persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec *Q87.8*
- - ¬ *Q21.1*
- Interauriculaire
- - Auricules ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): *I51.0*
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.1*
- - Dysmorphie ¬ Syndrome de lymphœdème- *Q87.8*
- - Trouble de la conduction atrio-ventriculaire ¬ Syndrome de *Q21.1*
- - ¬ *Q21.1*
- Interventriculaire
- - Atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ *Q21.3*
- - CIV] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): *I51.0*
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.2*
- - Cours de tétralogie de Fallot ¬ Atrésie pulmonaire avec *Q21.3*
- - Sous-aortique
- - - Sous-aortique sous-pulmonaire sténose pulmonaire ¬
- - - - VDDI avec *Q20.1*
- - - - Ventricule droit à double issue avec *Q20.1*
- - - Sous-pulmonaire [double-committed ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec *Q20.1*
- - - ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec *Q20.1*
- - Sous-pulmonaire
- - - Non-committed ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec CIV [*Q20.1*
- - - ¬ Ventricule droit à double issue avec *Q20.1*
- - Sténose pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ *Q21.3*
- - ¬
- - - *Q21.0*
- - - Syndrome d'atrésie pulmonaire- *Q22.0, Q21.0*
- Ventriculo-auriculaire discordante ¬ *Q20.3*
- ¬ Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (*T85.0*

Communiquant avec une lésion intrathoracique ¬ Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) *S21.83!*

Compaction
v./v.a. Non-compaction

Comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique ¬ Examen de *Z00.6*

Compartiment
- Abdominal ¬ syndrome
- - *R19.80*
- - *R19.80*
- Non traumatique ¬ Syndrome de *M62.2*

Compensateur ¬ Emphysème *J98.3*

Compensation ¬ Névrose de *F68.0*

Complément
- Thrombose-entéropathie avec perte de protéines] ¬ Syndrome CHAPLE [hyperactivation du *D84.1*
- ¬ Déficit
- - Facteur C3 du *D84.1*
- - Système du *D84.1*

Complet
v./v.a. Type de maladie

Compliance, fixée organiquement ¬ Vessie à faible *N31.80*

Complication
- Acte
- - Chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Autres *O75.4*
- - Visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ¬ Autres *T81.8*
- Anesthésie cours
- - Grossesse
- - - Sans précision ¬ *O29.9*
- - - ¬ Autres *O29.8*
- - Puerpéralité ¬ Autres *O89.8*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Autres *O74.8*
- Blessure ¬ Paralysie ischémique de Volkmann en tant que *T79.60*
- Cardiaques anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.1*
- - Puerpéralité ¬ *O89.1*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.2*
- Cérébrale ¬
- - Malaria tropica avec *B50.0†, G94.8**
- - Paludisme à Plasmodium falciparum avec *B50.0†, G94.8**
- Consécutive
- - Avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision ¬ *O08.9*
- - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision ¬ *T80.9*
- Consécutives
- - Actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs ¬ *P96.5*
- - Anesthésie ¬ Autres *T88.5*
- - Avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Autres *O08.8*
- - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ Autres *T80.8*
- - Vaccination, non classées ailleurs ¬ Autres *T88.1*
- Cours d'actes médicaux et chirurgicaux ¬ Accidents et *Y69!*

Complication *–suite*
- Décompensé ¬ MODY Maturity onset diabetes of young people
- - *E11.81*
- - Sans *E11.91*
- Dialyse NCA ¬ *T80.9*
- Due à un trachéostome ¬ *J95.09*
- Fécondation artificielle
- - Sans précision ¬ *N98.9*
- - ¬ Autres *N98.8*
- Greffe de peau ¬ *T86.59*
- Grossesse avec infection au COVID-19, virus identifié ¬ *O98.5, U07.1!*
- Hémodialyse ¬ *T80.9*
- Impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse ¬ *O29.2*
- Insémination artificielle
- - Conjoint [IAC] ¬ *N98.8*
- - Donneur [IAD] ¬ *N98.8*
- Intéressant système nerveux central anesthésie cours
- - Puerpéralité ¬ *O89.2*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.3*
- Intestinales ¬
- - Ascaridiase avec *B77.0†, K93.8**
- - Rougeole avec *B05.4†, K93.8**
- Lors de circulation extracorporelle ¬ *T80.9*
- Maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la grossesse ¬ *O29*
- Médicaments ou à des drogues ¬ *Y57.9!*
- Membres recousus ¬ *T87.2*
- Mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité ¬ *O89*
- Multiples
- - Décompensé ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.73*
- - ¬
- - - MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.72*
- - - Syndrome d'insulino-résistance type A, avec *E13.72*
- Niveau organe ¬ Entérocolite Clostridium difficile sans mégacôlon
- - *A04.71*
- - Sans *A04.70*
- Non
- - Précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.9*
- - Précisées
- - - Niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- - - ¬ Échec tentative avortement
- - - - Médical, avec *O07.3*
- - - - Sans précision, avec *O07.8*
- Oculaire

Complication *–suite*
- Oculaire *–suite*
- - Décompensé ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.31†, H58.8**
- - ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.30†, H58.8**
- Organiques ¬
- - Entérocolite Clostridium difficile mégacôlon
- - - *A04.73*
- - - Sans *A04.72*
- - Syndrome réponse inflammatoire systémique SIRS origine
- - - Infectieuse
- - - - *R65.1!*
- - - - Sans *R65.0!*
- - - Non infectieuse
- - - - *R65.3!*
- - - - Sans *R65.2!*
- Pendant les contractions ¬ Anomalie du cordon ombilical, avec *O69.9*
- Plaie ouverte
- - Corps étranger (avec ou sans infection) ¬ *T89.01*
- - Infection ¬ *T89.02*
- - Sans précision ¬ *T89.00*
- - ¬ *T89.03*
- Précisées
- - Prothèses, implants ou greffes cardiaques et vasculaires ¬ Autres *T82.8*
- - Soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs ¬ Autres *T88.8*
- - Travail accouchement ¬
- - - *O75.8*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P03.8*
- Précoce d'un traumatisme, sans précision ¬ *T79.9*
- Précoces traumatisme ¬
- - *T79.8*
- - Séquelles de certaines *T98.2*
- Prothèse implant
- - Greffe internes
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres *T85.88*
- - - Système nerveux ¬ Autres *T85.81*
- - Mammaire ¬ Autres *T85.83*
- Puerpérale, sans précision ¬ *O90.9*
- Puerpérales, non classées ailleurs ¬ Autres *O90.8*
- Pulmonaires anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Autres *O74.1*
- Rachianesthésie anesthésie épidural cours
- - Grossesse ¬ Autres *O29.5*
- - Puerpéralité ¬ Autres *O89.5*

Complication *–suite*
- Rachianesthésie anesthésie épidural cours *–suite*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Autres *O74.6*
- Récente infarctus aigu du myocarde ¬
- - Communication
- - - Interauriculaire comme *I23.1*
- - - Interventriculaire comme *I23.2*
- - Hémopéricarde comme *I23.0*
- - Rupture
- - - Cordages tendineux comme *I23.4*
- - - Muscle papillaire comme *I23.5*
- - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme *I23.3*
- - Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme *I23.6*
- Récentes d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Autres *I23.8*
- Rénales
- - Décompensé ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.21†, N08.3**
- - ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.20†, N08.3**
- Scarlatine ¬ *A38*
- Soin chirurgicaux médical
- - Non classées ailleurs ¬ Séquelles de *T98.3*
- - Sans précision ¬ *T88.9*
- Spécifiques à une grossesse multiple ¬ Autres *O31.8*
- Tentative implantation
- - Embryon en cas de transfert d'embryon ¬ *N98.3*
- - Œuf fécondé après fécondation in vitro ¬ *N98.2*
- Traitement par inhalation ¬ *T81.8*
- Travail accouchement sans précision ¬
- - *O75.9*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P03.9*
- Ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de *Y84.9!*
- Vaccins ou à des substances biologiques actives ¬ *Y59.9!*
- Vasculaires consécutives
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ¬ *T81.7*
- - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ *T80.1*
- Veineuses
- - Consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Autres *O08.7*
- - Cours de la puerpéralité ¬ Autres *O87.8*
- - Grossesse ¬ Autres *O22.8*
- - ¬
- - Ascaridiase avec autres *B77.8*

Complication *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Échec tentative avortement
- - - Médical, sans *O07.4*
- - - Sans précision, sans *O07.9*
- - Hémorroïdes sans *K64.0*
- - MODY Maturity onset diabetes of young people
- - - *E11.80*
- - - Sans *E11.90*
- - Oreillons
- - - *B26.8*
- - - Sans *B26.9*
- - Paludisme Plasmodium
- - - Falciparum avec *B50.8*
- - - Malariae
- - - - *B52.8*
- - - - Sans *B52.9*
- - - Vivax
- - - - *B51.8*
- - - - Sans *B51.9*
- - Rougeole
- - - *B05.8*
- - - Sans *B05.9*
- - Rubéole
- - - *B06.8*
- - - Sans *B06.9*
- - Soins et mise en observation, cas sans *Z39.0*
- - Varicelle
- - - *B01.8*
- - - Sans *B01.9*
- - Zona
- - - *B02.8*
- - - Sans *B02.9*

Complication d'une prothèse implant greffe
- Appareil génito-urinaire
- - Sans précision ¬ *T83.9*
- - ¬ Autres *T83.8*
- Cardiaques et vasculaires, sans précision ¬ *T82.9*
- Internes
- - SAI ¬ *T85.9*
- - Sans précision ¬ *T85.9*
- Orthopédique internes
- - Sans précision ¬ *T84.9*
- - ¬ Autres *T84.8*

Complication d'une réimplantation partie
- Corps ¬ *T87.2*
- Membre
- - Inférieur ¬ *T87.1*
- - Supérieur ¬ *T87.0*

Complication de l'accouchement
- Anomalie d'implantation du placenta ¬ *O44.00*
- Sans saignement ¬

Complication de l'accouchement *–suite*
- Sans saignement ¬ *–suite*
- - Adhérence du placenta en tant que *O43.20, O73.0*
- - Placenta
- - - Increta en tant que *O43.21, O73.0*
- - - Percreta en tant que *O43.21, O73.0*
- - Placenta accreta en tant que *O43.20, O73.0*
- ¬
- - Amputation du col utérin en tant que *O65.5*
- - Atrésie du col utérin en tant que *O65.5*
- - Cicatrice au col utérin en tant que *O65.5*
- - Contraction hypotonique de l'utérus en tant que *O62.2*
- - Décès dû à l'anesthésie en tant que *O74.9*
- - Hypotonie de l'utérus en tant que *O62.2*
- - Lacération vaginale en tant que *O70.0*
- - Placenta
- - - Increta en tant que *O43.21*
- - - Percreta en tant que *O43.21*
- - Placenta accreta en tant que *O43.20*
- - Vasa praevia en tant que *O69.4*

Complication de l'anesthésie cours
- Puerpéralité, sans précision ¬ *O89.9*
- Travail et de l'accouchement, sans précision ¬ *O74.9*

Complication de la grossesse
- Accouchement puerpéralité ¬
- - Antécédents personnels de *Z87.5*
- - Séquelles de *O94*
- Infection COVID-19 ¬ *O98.5, U07.2!*
- Mère
- - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.9*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P01.8*

Complication mécanique
- Appareil
- - Cardiaque électronique ¬ *T82.1*
- - Fixation interne os
- - - Colonne vertébrale ¬ *T84.20*
- - - Membre
- - - - Avant-bras ¬ *T84.12*
- - - - Bras ¬ *T84.11*
- - - - Cheville et pied ¬ *T84.16*
- - - - Jambe ¬ *T84.15*
- - - - Main ¬ *T84.13*
- - - - Os précisés d'un membre ¬ *T84.18*
- - - - Région pelvienne et cuisse ¬ *T84.14*
- - - - Région scapulaire ¬ *T84.10*
- - - Os précisés ¬ *T84.28*
- Appareils implant greffe
- - Orthopédiques internes ¬ *T84.4*
- - Os ¬ *T84.3*
- Cathéter vasculaire de dialyse ¬ *T82.4*

Complication mécanique *–suite*
- Dispositif
- - Intra-utérin contraceptif ¬ *T83.3*
- - Œsophagien anti-reflux ¬ *T85.50*
- Due
- - Anastomose vasculaire ¬ *T82.3*
- - Dispositif gastro-intestinal à ballonnet ¬ *T85.59*
- Endoprothèse articulaire
- - Articulation
- - - Cheville ¬ *T84.06*
- - - Coude ¬ *T84.01*
- - - Genou ¬ *T84.05*
- - - Hanche ¬ *T84.04*
- - - Poignet ¬ *T84.03*
- - - Précisées ¬ *T84.08*
- - Articulation de l'épaule ¬ *T84.00*
- - Disque intervertébral ¬ *T84.07*
- - Mâchoire ¬ *T84.08*
- - Tête radiale ¬ *T84.02*
- Greffe
- - Organe urinaire ¬ *T83.2*
- - Vasculaires ¬ *T82.3*
- Implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux ¬ *T85.1*
- Lentille intraoculaire ¬ *T85.2*
- Pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque ¬ *T82.2*
- Prothèse
- - Implant
- - - Cardiaques et vasculaires ¬ *T82.5*
- - - Greffe
- - - - Appareil génital ¬ *T83.4*
- - - - Oculaires ¬ *T85.3*
- - - - Œsophage ¬ *T85.50*
- - - - Pancréas ¬ *T85.54*
- - - - Parties du tractus gastro-intestinal supérieur ¬ *T85.51*
- - - - Tractus gastro-intestinal inférieur ¬ *T85.52*
- - - - Voies biliaires ¬ *T85.53*
- - - Mammaires ¬ *T85.4*
- - - Urinaires ¬ *T83.1*
- - Valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Shunt ventriculaire intracrânien (communication) ¬ *T85.0*
- Sonde
- - Gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG] ¬ *T85.51*
- - Jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ] ¬ *T85.52*
- - Urinaire (à demeure) ¬ *T83.0*

Complication neurologique
- Décompensé ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.41†, G63.2**
- ¬
- - Diabète sucré

Complication neurologique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Diabète sucré *–suite*
- - - *E14.40*
- - - Type
- - - - 1 avec *E10.40†, G63.2**
- - - - 2 avec *E11.40†, G63.2**
- - Diabète sucré insulino-dépendant de type 2 avec *E11.40†, G63.2**
- - Diabète sucré non insulino-dépendant
- - - Primaire avec *E11.40†, G63.2**
- - - Type 2 avec *E11.40†, G63.2**
- - Diphtérie avec *A36.8†, G99.8**
- - MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.40†, G63.2**
- - Rubéole
- - - *B06.0†, G99.8**
- - - *B06.0†, G99.8**

Complication oculaire
- Diabétique
- - Diabète type
- - - 1 ¬ Saignement ponctuel comme *E10.30†, H58.8**
- - - 2 ¬ Saignement ponctuel comme *E11.30†, H58.8**
- - ¬ Saignement ponctuel comme *E14.30†, H58.8**
- ¬
- - Diabète sucré insulino-dépendant de type 2 avec *E11.30†, H58.8**
- - Diabète sucré non insulino-dépendant
- - - Primaire avec *E11.30†, H58.8**
- - - Type 2 avec *E11.30†, H58.8**

Complication rénale ¬
- Diabète sucré
- - *E14.30*
- - Type
- - - 1 avec *E10.20†, N08.3**
- - - 2 avec *E11.20†, N08.3**
- Diabète sucré insulino-dépendant de type 2 avec *E11.20†, N08.3**
- Diabète sucré non insulino-dépendant de type 2 avec *E11.20†, N08.3**

Complication vasculaire
- Périphérique
- - Décompensé ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.51*
- - ¬
- - - Diabète sucré de type 1 avec *E10.50†, I79.2**
- - - Diabète sucré insulino-dépendant
- - - - Primaire avec *E10.50†, I79.2**
- - - - Type 1 avec *E10.50†, I79.2**
- - - MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.50*
- Suite d'actes médicaux ¬ *I97.9*

Complication veineuse
- Cours de la puerpéralité, sans précision ¬ *O87.9*

Complication veineuse *–suite*
- Grossesse, sans précision ¬ *O22.9*

Compliquant
- Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ Hémorragie et hématome *T81.0*
- Grossesse
- - Accouchement puerpéralité
- - - Sans précision ¬
- - - - Hypertension préexistante *O10.9*
- - - - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère *O98.9*
- - - ¬
- - - - Anémie *O99.0*
- - - - Cardionéphropathie hypertensive préexistante *O10.3*
- - - - Cardiopathie hypertensive préexistante *O10.1*
- - - - Gonococcie *O98.2*
- - - - Hépatite virale *O98.4*
- - - - Hypertension
- - - - - Essentielle préexistante *O10.0*
- - - - - Secondaire préexistante *O10.4*
- - - - Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et *O98.7*
- - - - Maladies
- - - - - Affections précisées *O99.8*
- - - - - Appareil circulatoire *O99.4*
- - - - - Appareil digestif *O99.6*
- - - - - Appareil respiratoire *O99.5*
- - - - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, *O98.3*
- - - - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques *O99.2*
- - - - - Infectieuses et parasitaires de la mère *O98.8*
- - - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané *O99.7*
- - - - - Protozoaires *O98.6*
- - - - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire *O99.1*
- - - - - Virales *O98.5*
- - - - Néphropathie hypertensive préexistante *O10.2*
- - - - Syphilis *O98.1*
- - - - Troubles mentaux et maladies du système nerveux *O99.3*
- - - - Tuberculose *O98.0*
- - Aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux ¬ les états mentionnés *O98*
- - ¬ Vomissement
- - - *O21.8*
- - - Dus à des maladies classées ailleurs, *O21.8*

Compliqué
- Anomalie

Compliqué *–suite*
- Anomalie *–suite*
- - Cordon ombilical, sans précision ¬ Travail et accouchement *O69.9*
- - Insertion placentaire ¬ Grossesse *O44.00*
- - Rythme cardiaque fœtus
- - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement *O68.2*
- - - ¬ Travail et accouchement *O68.0*
- Anomalies du cordon ombilical ¬ Travail et accouchement *O69.8*
- Brièveté du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.3*
- Circulaire du cordon, avec compression ¬ Travail et accouchement *O69.1*
- Détresse fœtale, sans précision ¬ Travail et accouchement *O68.9*
- Embolie ¬ Échec tentative avortement
- - Médical, *O07.2*
- - Sans précision, *O07.7*
- Forme d'enchevêtrement du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.2*
- Hémorragie retardé sévère ¬ Échec tentative avortement
- - Médical, *O07.1*
- - Sans précision, *O07.6*
- Infection appareil génital Organe pelvien ¬ Échec tentative avortement
- - Médical, *O07.0*
- - Sans précision, *O07.5*
- Insertion vélamenteuse du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.4*
- Lésions vasculaires du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.5*
- Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement *O68.1*
- Prolapsus du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.0*
- Signe
- - Biochimiques de détresse fœtale ¬ Travail et accouchement *O68.3*
- - Détresse fœtale ¬ Travail et accouchement *O68.8*
- ¬
- - Cataracte *H26.2*
- - Migraine *G43.3*

Comportant
- Modification de conscience ¬ Crises: ne *G40.1*
- Souvent des automatismes ¬ Crises: avec modification de conscience, *G40.2*

Comportement
- A une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision ¬ Trouble organique de la personnalité et du *F07.9*
- Adulte
- - Sans précision ¬ Trouble de la personnalité et du *F69*

Comportement *–suite*
- Adulte *–suite*
- - ¬ Autres troubles précisés de la personnalité et du *F68.8*
- Agressif ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypotonie-dysmorphie faciale- *Q87.8*
- Asocial sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- Associé
- - CHAMP1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie faciale-troubles du *Q87.0*
- - WAC ¬ Syndrome de dysmorphie faciale-retard de développement-troubles du *Q87.0*
- Associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Autres troubles mentaux et du *F53.8*
- Autodestructeur
- - Selon l'anamnèse familiale ¬ *Z81*
- - ¬ *Z72.8*
- Compulsif
- - Rituels obsessionnels] au premier plan ¬ Avec *F42.1*
- - ¬ Forme mixte, avec idées obsédantes et *F42.2*
- Déficience intellectuelle modérée ¬ Syndrome de micrognathie-infections récurrentes-troubles du *Q87.0*
- Dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux ¬ Autres troubles organiques de la personnalité et du *F07.8*
- Dysmorphie
- - Associé à ZMYND11 ¬ Syndrome de retard du développement-retard de langage-épilepsie-troubles du *Q87.8*
- - Faciale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-petite taille-troubles du *Q87.8*
- Enfant SAI ¬ Trouble (des) (du): *F91.9*
- Étrange et inexplicable ¬ *R46.2*
- Légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles mentaux et du *F53.0*
- Lié utilisation
- - Alcool ¬ Troubles mentaux et du *F10*
- - Cocaïne ¬ Troubles mentaux et du *F14*
- - Dérivés du cannabis ¬ Troubles mentaux et du *F12*
- - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du *F19*
- - Hallucinogènes ¬ Troubles mentaux et du *F16*
- - Opiacés ¬ Troubles mentaux et du *F11*
- - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles mentaux et du *F13*
- - Solvants volatils ¬ Troubles mentaux et du *F18*
- - Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du *F15*

Comportement *–suite*
- Lié utilisation *–suite*
- - Tabac ¬ Troubles mentaux et du *F17*
- Nécessitant manifestement traitement ¬ Déficience intellectuelle
- - Légère avec trouble du *F70.1*
- - Moyen avec trouble du *F71.1*
- Orientation
- - Matière de sexualité ¬ Conseils relatifs aux attitudes, *Z70*
- - Tiers en matière de sexualité ¬ Conseil relatif au *Z70*
- Répétitifs ¬ Stéréotypies/ *F98.4*
- Sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles mentaux et du *F53.1*
- Sexuel à risques ¬ *Z72.8*
- Trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence, sans précision ¬ Trouble du *F98.9*
- Troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence ¬ Autres troubles précisés du *F98.88*
- ¬
- - Antécédents familiaux de troubles mentaux et du *Z81*
- - Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du *Z86.5*
- - Maladies psychiques et troubles du *Z13.8*
- - Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du *Z03.2*
- - Refus de manger en tant qu'anomalie du *F50.8*
- - Retard mental
- - - Léger
- - - - Sans troubles du *F70.0*
- - - - Troubles du *F70.8*
- - - Moyen sans trouble du *F71.0*
- - Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au *R46.8*
- - Syndrome
- - - Déficience intellectuelle-macrocéphalie-hypotonie-troubles du *Q87.8*
- - - Épilepsie liée à l'X-difficulté d'apprentissage-troubles du *G40.2*
- - - Retard du développement-surpoids-dysmorphie faciale-troubles du *F88*
- - - Tremblement essentiel progressif-trouble sévère du langage-dysmorphie faciale-déficience intellectuelle-trouble du *Q87.0*

Comportemental
- Associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs ¬ Facteurs psychologiques et *F54*
- Non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques ¬ Syndromes *F59*
- Psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions *Z64.8*

Comportemental *–suite*
- ¬ Démence fronto-temporale, variante *G31.0†, F02.0**

Composants du sang ¬ Donneur d'autres *Z52.08*

Compressif du nerf fémoral ¬ Syndrome *G57.2*

Compression
- Anesthésie au cours du travail et de l'accouchement ¬ Collapsus pulmonaire par *O74.1*
- Artère
- - Cœliaque ¬ Syndrome de *I77.4*
- - Spinale antérieure ¬ Syndrome de *M47.09†, G99.2**
- - ¬ *I77.1*
- Artère vertébrale ¬ Syndrome de *M47.09†, G99.2**
- Artères spinales ¬ Syndrome de *M47.09†, G99.2**
- Cerveau
- - Contusion localisée ¬ *S06.31*
- - Hémorragie et pression cérébrale lors d'une lésion cranio-cérébrale couverte grave ¬ *S06.21, S01.83!*
- - Tronc cérébral) ¬ *G93.5*
- - ¬ *G93.5*
- Chiasmatique par anévrysme ¬ *I67.10†, H48.8**
- Cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de *P02.5*
- Cordon SAI ¬ *O69.2*
- Due anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Collapsus pulmonaire par *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Collapsus pulmonaire par *O89.0*
- Latérale ¬ Fracture de *S32.7*
- Médullaire, sans précision ¬ *G95.2*
- Moelle épinière due à une hernie discale cervicale ¬ *M50.0†, G99.2**
- Nerf optique ¬ *H47.0*
- Nerf périphérique ¬ *G58.9*
- Nerf sympathique NCA ¬ *G90.88*
- Œsophage ¬ *K22.2*
- Plexus brachial ¬ *G54.0*
- Racine
- - Nerveux
- - - Cours
- - - - Spondylarthrose ¬ *M47.29†, G55.2**
- - - - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G55.0**
- - - Lors atteinte disque intervertébral
- - - - Cervicaux avec myélopathie ¬ *M50.0†, G99.2**
- - - - Myélopathie ¬ *M51.0†, G99.2**
- - - - ¬ *M51.1†, G55.1**
- - - ¬ Atteinte des disques intervertébraux cervicaux avec *M50.1†, G55.1**
- - Plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *G55.8**

Compression *–suite*
- Spondylogène de la moelle épinière ¬ *M47.19†, G99.2**
- Système nerveux autonome périphérique ¬ *G90.88*
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.1*
- Veineuse ¬ *I87.1*
- ¬
- - Anomalie morphologique faciale par *Q67.1*
- - Apneumatose par *J98.18*
- - Atélectasie
- - - *J98.18*
- - - Acquise par *J98.18*
- - Enchevêtrement du cordon, sans *O69.8*
- - Sténose pylorique de l'adulte par *K31.12*
- - Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec *O69.1*

Compressus ¬ Fœtus *O31.0*

Comprimé
- SAI ¬ Somnifères: *T42.7*
- ¬ Maladie de l'air *T70.3*

Compte d'un tiers ¬ Conseil et surveillance pour: Personne consultant pour le *Z71*

Compton-North ¬ Myopathie létale congénitale type *G71.2*

Compulsif
- Rituels obsessionnels] au premier plan ¬ Avec comportements *F42.1*
- Sans précision ¬ Trouble obsessionnel- *F42.9*
- ¬
- - Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements *F42.2*
- - Jeu *F63.0*
- - Névrose: obsessionnelle- *F42*
- - Trouble de la) personnalité: *F60.5*
- - Troubles obsessionnels- *F42.8*

Concentration
- Réduite de peptides C ¬ *R79.8*
- ¬ Modification de la personnalité après: expériences de camp de *F62.0*

Concentrique
- Baló] ¬ Sclérose *G37.5*
- Bénigne ¬ Dystrophie maculaire annulaire *H35.5*
- ¬
- - Démyélinisation *G37.5*
- - Encéphalite péri-axiale *G37.5*
- - Maladie de Greenfield [sclérose *G37.5*

Conception
- Accouchement, sans hémorragie ¬ Rétention de produits de la *O73.1*
- Précisés ¬ Autres produits anormaux de la *O02.8*
- SAI, après l'accouchement ¬ Rétention de produits de la *O72.2*
- Sans précision ¬ Produit anormal de la *O02.9*

Concomitant
- SAI ¬ Strabisme *H50.4*
- ¬ Strabisme
- - Convergent *H50.0*
- - Divergent *H50.1*

Concrescence dentaire ¬ *K00.2*

Concretio cordis ¬ *I31.1*

Concrétions appendiculaires ¬ *K38.1*

Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal ¬ *Z65*

Condensante
- Disséminée ¬ Ostéopathie *Q78.8*
- Iléon ¬ Ostéïte *M85.35*
- Médiane de la clavicule ¬ Ostéite *M85.31*
- Région pelvienne ¬ Ostéïte *M85.35*
- Sacrum ¬ Ostéïte *M85.38*
- ¬ Ostéïte *M85.3*

Conditionnement air
- Poussée aiguë ¬ Maladie pulmonaire due aux systèmes de *J67.71*
- Sans mention de poussée aiguë ¬ Maladie pulmonaire due aux systèmes de *J67.70*
- ¬ Pneumonie due aux systèmes de *J67.70*

Conditions
- Économiques ¬ Difficultés liées au logement et aux *Z59*
- Météorologiques) ¬ Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les *W94.9!*
- Travail difficiles ¬ *Z56*

Conduction
- Atrio-ventriculaire ¬ Syndrome de communication interauriculaire-trouble de la *Q21.1*
- Auriculo-ventriculaire
- - Accélérée ¬ *I45.6*
- - Accessoire ¬ *I45.6*
- - Pré-excitée ¬ *I45.6*
- Cardiaque
- - Infra-Hisienne familiales ¬ Tachyarythmie atriale et trouble de *I45.8*
- - ¬
- - - Syndrome de microcéphalie-hypoplasie cérébelleuse-trouble de la *Q87.0*
- - - Trouble
- - - - Atrial de la *I45.9*
- - - - Familial progressif de la *I45.8*
- Nerveuse lié à ARHGEF10, forme autosomique dominante ¬ Ralentissement de la vitesse de *G60.0*
- Osseux ¬
- - Appareil acoustique de *Z96.2*
- - Prothèse (de): *Z45.3*
- SAI ¬ Perte de l'audition par *H90.2*
- Sans précision ¬ Trouble de la *I45.9*
- ¬ Autres troubles précisés de la *I45.8*

Conduire ¬ inscription dans: obtention du permis de *Z02*

Conduisant à l'invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques *Z82*

Conduit auditif
- Externe
- - Dilatation du canal auditif interne-dysmorphie faciale ¬ Syndrome lié à l'X d'atrésie du *Q16.9, Q18.9*
- - ¬
- - - Abcès pavillon de l'oreille ou *H60.0*
- - - Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du *Q16.1*
- - - Anthrax pavillon de l'oreille ou *H60.0*
- - - Carcinoma in situ: Peau de l'oreille et du *D04.2*
- - - Cellulite phlegmoneuse du: *H60.1*
- - - Exostose du *H61.8*
- - - Furoncle pavillon de l'oreille ou *H60.0*
- - - Hypoplasie du *Q17.8*
- - - Mélanome
- - - - In situ de l'oreille et du *D03.2*
- - - - Malin
- - - - - Familial du *C43.2*
- - - - - Oreille et du *C43.2*
- - - Nævus à mélanocytes de l'oreille et du *D22.2*
- - - Rétrécissement du *H61.3*
- - - Sténose acquise du *H61.3*
- - - Tumeur bénigne: Peau de l'oreille et du *D23.2*
- - - Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du *C44.2*
- - ¬
- - Anomalie congénitale du *Q16.1*
- - Hypoplasie du *Q17.8*

Conduit) ¬ Kératose obturante de l'oreille externe (*H60.4*

Conduite
- Dépression ¬ Troubles des *F92.0*
- Échec ¬ Trouble de la personnalité: à *F60.7*
- Enfant SAI ¬ Trouble (des) (du): *F91.9*
- F91.- associé à un trouble dépressif en F32.- ¬ Trouble des *F92.0*
- Limité au milieu familial ¬ Trouble des *F91.0*
- Sans précision ¬ Trouble des *F91.9*
- Troubles émotionnel
- - Sans précision ¬ Trouble mixte des *F92.9*
- - ¬ Autres troubles mixtes des *F92.8*
- Type
- - Groupe» ¬ Troubles des *F91.2*
- - Mal socialisé ¬ Trouble des *F91.1*
- - Socialisé ¬ Trouble des *F91.2*
- - Solitaire-agressif ¬ Trouble (des): *F91.1*
- - ¬
- - Trouble hyperkinétique
- - - Associé à un trouble des *F90.1*
- - - Trouble des *F90.1*
- - Troubles des *F91.8*

Condyle
- Huméral ¬
- - Nécrose aseptique des *M92.0*
- - Ostéochondrite des *M92.0*
- Humérus ¬ Fracture du *S42.44*
- Latéral
- - Médial du tibia ¬ *S82.1*
- - Médian) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: *S72.41*
- Mandibulaire ¬ Fracture du *S02.61*

Condylien
- Mandibule ¬ Hyperplasie ou hypoplasie unilatérale du processus *K10.8*
- Primitive ¬ Hyperplasie *K07.6*
- Type 1 ¬ Hyperplasie *K07.6*
- ¬ Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse *S02.61*

Condylome
- Ano-génitaux (vénériens) ¬ *A63.0*
- Plan au cours de syphilis congénitale ¬ *A50.0*
- Plat ¬ *A51.3*
- ¬ Rétrécissement urétral secondaire à ablation de *N99.18*

Cône
- Bâtonnets
- - Amélogenèse imparfaite ¬ Syndrome de dystrophie des *K00.5, H35.5*
- - Cataracte-staphylome postérieur] ¬ Syndrome MRCS [microcornée-dystrophie des *Q15.8*
- - Petite taille ¬ Syndrome de dystrophie des *H35.5, E34.3*
- - ¬
- - - Dystrophie des *H35.5*
- - - Syndrome
- - - - Dysplasie spondylo-métaphysaire-dystrophie des *Q77.8*
- - - - Fente labiale avec dystrophie des *Q36.9, H35.5*
- Bleus ¬ Monochromatisme à *H53.5*
- Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de petite taille avec cyphose, épiphyses hypoplasiques en forme de *Q87.1*
- Myopie lié à l'X ¬ Syndrome d'anomalie des *H35.5, H52.1*
- Réponse scotopique supranormale ¬ Dystrophie des *H35.5*
- ¬
- - Dystrophie progressive des *H35.5*
- - Lipome spinal
- - - Chaotique du *Q76.0*
- - - Extramédullaire
- - - - *Q76.0*
- - - - Postérieur du *Q76.0*
- - - - Terminal du *Q76.0*
- - - - Transitionnel du *Q76.0*

Confinement en fauteuil ¬ *R26.3*

Conflit de rôle social, non classé ailleurs ¬ *Z73*

Confluente et réticulée [Gougerot-Carteaud] ¬ Papillomatose *L83*

Confusion
- SAI ¬ *R41.0*
- ¬ Psychogène: *F44.88*

Confusionnel (non alcoolique) aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ état *F05*

Congé de ses proches ¬ Prise en charge d'une personne dépendante pendant un *Z75.8*

Congenita
- Cutis laxa hyperelastica] [Cutis laxa (hereditaria)] ¬ Cutis laxa *Q82.8*
- ¬
- - Arthromyodysplasia *Q74.3*
- - Cutis marmorata telangiectatica *Q27.8*
- - Syndrome
- - - Macrocéphalie-cutis marmorata telangiectatica *Q87.3*
- - - Mégalencéphalie-cutis marmorata telangiectatica *Q87.3*

Congénital
v./v.a. Type de maladie

Congenital disorder of glycosylation
- Type Ic ¬ Syndrome CDG [*E77.8*
- ¬
- - MAN2B2-CDG [*E77.8*
- - SLC35A3-CDG [*E77.8*
- - ST3GAL3-CDG [*E77.8*
- - XYLT1-CDG [*E77.8*

Congestif ¬ Glaucome chronique non *H40.18*

Congestion
- Conjonctive ¬ *H11.4*
- Faciale due à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.4*
- Hémorragie prostatiques ¬ *N42.1*
- Pancréas ¬ *K86.88*
- Passive chronique du foie ¬ *K76.1*
- Pulmonaire (passive) ¬ *J81*
- ¬ Trachéo-bronchite par *J42*

Congestive
- Chronique ¬ Splénomégalie *D73.2*
- Rénale ¬ Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (*I13.2*
- ¬
- - Cardiomyopathie *I42.0*
- - Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (*I13.0*
- - Cardiopathie hypertensive
- - - Insuffisance cardiaque (*I11.0*
- - - Sans insuffisance cardiaque (*I11.9*

Conglobata ¬ Acné *L70.1*

Congruents humeur ¬ Manie symptôme psychotique
- *F30.2*
- Non *F30.2*

Conidiobolus ¬ Infection à *B46.8*

Conique ¬ Dent: *K00.2*

Conjoint
- IAC] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: *N98.8*
- Partenaire ¬ Difficultés dans les rapports avec le *Z63*

Conjonctif
v./v.a. Tissu conjonctif
- Orbite ¬ Tissu
- - *C69.6*
- - *D31.6*

Conjonctival
v./v.a. pharyngo-conjonctival
- Due) à un traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie sous- *P15.3*
- Virale ¬ Maladie *B30.9†, H13.1**
- ¬
- - Amylose
- - - *E85.4†, H13.8**
- - - Dépôt *E85.4†, H13.8**
- - Avitaminose A
- - - Taches de Bitot et xérosis *E50.1†, H13.8**
- - - Xérosis *E50.0†, H13.8**
- - Brûlure de la cornée et du sac *T26.1*
- - Céphalée névralgique unilatérale brève avec injection *G44.8*
- - Corps étranger dans le sac *T15.1*
- - Corrosion de la cornée et du sac *T26.6*
- - Hémorragie
- - - *H11.3*
- - - Sous- *H11.3*
- - Thrombose *H11.4*
- - Xanthome *E75.5†, H13.8**

Conjonctive
- Abrasion de la cornée sans mention de corps étranger ¬ Lésion traumatique de la *S05.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de la *H13.8**
- Sans précision ¬ Affection de la *H11.9*
- VIH ¬ Syndrome de microangiopathie de la *B23.8, M31.1*
- ¬
- - Acanthamœbiose de la *B60.1†, H13.1**
- - Affections précisées de la *H11.8*
- - Anévrisme de la *H11.4*
- - Argyrose [argyrie] de la *H11.1*
- - Calcification de la *H11.1*
- - Chancre de la *A51.2†, H13.1**
- - Cicatrices de la *H11.2*
- - Congestion de la *H11.4*
- - Dépôts et affections dégénératives de la *H11.1*
- - Érythème multiforme de la *L51.1†, H13.8**
- - Infection varicelleuse de la cornée et de la *B01.8†, H19.2**
- - Lymphome primitif de la *C85.9*
- - Mélanome malin de la *C69.0*
- - Nævus à cellules ballonnisantes sur la *D31.0*

Conjonctive *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Néoplasie squameuse de la *D48.7*
- - Neurofibrome de la *D31.6*
- - Œdème de la *H11.4*
- - Pigmentation de la *H11.1*
- - Ptérygium familial de la *H11.0*
- - Sarcome de Kaposi de la *C46.7*
- - Troubles vasculaires et kystes de la *H11.4*
- - Tumeur bénigne: *D31.0*
- - Tumeur maligne: *C69.0*
- - Xérosis SAI de la *H11.1*

Conjonctivite
v./v.a. Blépharo-conjonctivite
v./v.a. Pharyngo-conjonctivite
- Abactérienne ¬ *H10.8*
- Adénovirus ¬ *B30.1†, H13.1**
- Aiguë, sans précision ¬ *H10.3*
- Aiguës ¬ Autres *H10.2*
- Apollo ¬ *B30.3†, H13.1**
- Atopique aiguë ¬ *H10.1*
- Blennorragique néonatale ¬ *A54.3†, H13.1**
- Chlamydia ¬ *A74.0†, H13.1**
- Chronique ¬ *H10.4*
- Cours
- - Acné rosacée ¬ *L71.9†, H13.2**
- - Herpès zoster ¬ *B02.3†, H13.1**
- - Maladie parasitaire NCA ¬ *B89†, H13.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H13.2**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H13.1**
- - Syndrome urétro-oculo-synovial ¬ *M02.39*
- Dacryocystite néonatales ¬ *P39.1*
- Diphtérique ¬ *A36.8†, H13.1**
- Due
- - Acanthamoeba ¬ *B60.1†, H13.1**
- - Bain ¬ *B30.1†, H13.1**
- - Tularémie ¬ *A21.1†, H13.1**
- - Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H13.1**
- Entérovirus type 70 ¬ *B30.3†, H13.1**
- Folliculaire
- - Aiguë
- - - Adénovirus ¬ *B30.1†, H13.1**
- - - ¬ *H10.2†, H13.1**
- - Trachomateuse ¬ *A71.1*
- - ¬ *H10.4†, H13.1**
- Gonocoques ¬ *A54.3†, H13.1**
- Gonorrhéique ¬ *A54.3†, H13.1**
- Granuleuse (trachomateuse) ¬ *A71.1*
- Hémorragique
- - Aiguë ¬ *B30.3†, H13.1**
- - Entérovirus type 70 ¬ *B30.3†, H13.1**
- - Épidémique ¬ *B30.3†, H13.1**
- - ¬ *B30.3†, H13.1**
- Inclusion ¬ *A74.0†, H13.1**
- Infectieuse, n.c.a. ¬ *H10.8*

Conjonctivite *–suite*
- Ligneuse ¬ *H10.4*
- Méningocoques ¬ *A39.8†, H13.1**
- Mucopurulente ¬ *H10.0*
- Néonatale à Chlamydia ¬ *P39.1*
- Pneumocoques ¬ *H10.8, B95.3!*
- Sans précision ¬ *H10.9*
- Sèche au sens du syndrome de Sjögren ¬ *M35.0†, H13.2**
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, H13.1**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H13.1**
- Virale épidémique ¬ *B30.9†, H13.1**
- Virus Coxsackie A24 ¬ *B30.3†, H13.1**
- Virus de la maladie de Newcastle ¬ *B30.8†, H13.1**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H13.1**
- ¬
- - *H10.8*
- - Kératite
- - - Superficielle avec *H16.2*
- - - Superficielles sans *H16.1*

Conjugaison du regard ¬ Paralysie de la *H51.0*

Conjugale SAI ¬ Violence *T74.1*

Conjunctivae ¬ Pemphigus *L12.1†, H13.3**

Conn ¬ Syndrome de *E26.0*

Connaissance
- 30 minutes
- - 24 heures lors d'un traumatisme cranio-cérébral ¬ Perte de *S06.9, S06.71!*
- - Lors d'un traumatisme cranio-cérébral ¬ Perte de *S06.9, S06.70!*
- Antérieur
- - Lors traumatisme cranio-cérébral ¬ Perte connaissance plus 24 heures
- - - Retour au stade de *S06.9, S06.72!*
- - - Sans retour au stade de *S06.9, S06.73!*
- - ¬ Perte connaissance coma lors traumatisme cranio-cérébral Plus 24 heures
- - - Retour au stade de *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de *S06.73!*
- Coma lors traumatisme cranio-cérébral
- - 30 minutes
- - - 24 heures ¬ Perte de *S06.71!*
- - - ¬ Perte de *S06.70!*
- - Durée non précisée ¬ Perte de *S06.79!*
- - Plus 24 heures
- - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de *S06.73!*
- Lors de traumatisme cranio-cérébral ¬ Perte de *S06.9, S06.79!*
- Plus 24 heures
- - Retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un traumatisme cranio-cérébral ¬ Perte de *S06.9, S06.72!*

Connaissance *–suite*
- Plus 24 heures *–suite*
- - Sans retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un traumatisme cranio-cérébral ¬ Perte de *S06.9, S06.73!*
- SAI ¬ Incapacité (de): concernant l'acquisition des *F81.9*
- ¬ Perte de *R55*

Connectivite
- Associée à EMILIN-1 ¬ *M35.8*
- Indifférenciée ¬ *M35.8*
- Mixte ¬ *M35.1*

Conodysplasie cranio-faciale ¬ *Q87.5*

Conorii ¬ Fièvre pourprée à Rickettsia *A77.1*

Conradi
v./v.a. Bowen-Conradi

Conradi-Hünermann-Happle ¬ Syndrome de *Q77.3*

Consanguinité ¬
- Antécédents familiaux de *Z84.3*
- Conseil: à propos de la *Z71*

Conscience
- Comportant souvent des automatismes ¬ Crises: avec modification de *G40.2*
- Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la *R41.8*
- SAI ¬ Perte de *R40.2*
- ¬ Crises: ne comportant pas de modification de *G40.1*

Conscription ¬ Examen avant *Z02*

Conseil
- Avis
- - Généraux
- - - Concernant la contraception ¬ *Z30.0*
- - - Matière de procréation ¬ *Z31.6*
- - Médicaux, non classés ailleurs ¬ Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres *Z71*
- Génétique ¬ *Z31.5*
- Matière vaccination
- - Voyageurs ¬ *Z71*
- - ¬ *Z71*
- Médical, sans précisions ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- Propos
- - Consanguinité ¬ *Z71*
- - Tabagisme ¬ *Z71*
- - VIH [virus de l'immunodéficience humaine] ¬ *Z71*
- Relatif au comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité ¬ *Z70*
- Relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité ¬ *Z70*
- Surveillance
- - Abus de médicaments ou toxicomanie ¬ *Z71*
- - Alcoolisme ¬ *Z71*
- - Conseil
- - - Médical, sans précisions ¬ *Z71*

Conseil *–suite*
- Surveillance *–suite*
- - Conseil *–suite*
- - - Surveillance diététiques ¬ *Z71*
- - Consultation pour l'explication de résultats d'examen ¬ *Z71*
- - Diététiques ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- - Personne consultant pour le compte d'un tiers ¬ *Z71*
- - Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) ¬ *Z71*

Conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les *Z64.8*

Conséquence
- Bruit sur l'oreille interne ¬ *H83.3*
- Hémorragie sous-durale traumatique ¬ *T90.5*

Conservation du bois ¬ Produits de *T60*

Consolidation d'une fracture ¬ Retard de *M84.2*

Consolidée
- Pseudarthrose] ¬ Fracture non *M84.1*
- ¬ Fracture mal *M84.0*

Consommation
- Alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues ¬ Difficultés liées à: la *Z72.0*
- Animaux venimeux ou de plantes vénéneuses ¬ *X49.9!*
- Héroïne voie
- - Intraveineuse ¬ *U69.30!*
- - Non intraveineuse ¬ *U69.31!*
- Non intraveineuse
- - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ *U69.34!*
- - Stimulants hors caféine ¬ *U69.36!*
- Substances psycho-actives par voie intraveineuse ¬ *U69.32!*
- ¬ Coagulopathie de *D65.1*

Constatation
- Baisse non spécifique de la tension artérielle ¬ *R03.1*
- Élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension ¬ *R03.0*

Constipation
- Chronique-trouble du rythme veille-sommeil associé à NRXN1 ¬ Syndrome de trouble neurodéveloppemental sévère-stéréotypies motrices- *G96.8*
- Fonctionnelle ¬ Syndrome de *K59.01*
- Lors trouble
- - Défécation ¬ *K59.01*
- - Fonctionnel anorectal ¬ *K59.01*
- - Transit colique ¬ *K59.00*
- Origine médicamenteuse ¬ *K59.02*
- Prédominante [SII-C] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec *K58.2*
- Transit lent ¬ *K59.00*

Constituant un risque vital chez le nourrisson ¬ Événement aigu *R06.80*

Constitutionnel

- Proconvertine ¬ Déficit *D68.23*
- Réparation mésappariements
- - CMMRD] ¬ Glioblastome au cours du syndrome du déficit *C71.9*
- - ¬
- - - Carcinome
- - - - Colorectal au cours de syndrome de déficit *C19*
- - - - Intestin grêle au cours de syndrome de déficit *C17.9*
- - - - Ovaire au cours de syndrome de déficit *C56*
- - - Leucémie aiguë myéloïde au cours de syndrome de déficit *C92.00*
- - - Médulloblastome au cours de syndrome de déficit *C71.6*
- - - Neuroblastome au cours de syndrome de déficit *C74.9*
- ¬
- - Anémies aplastiques *D61.0*
- - Haute stature *E34.4*
- - Insuffisance staturale: *E34.3*
- - Retard de développement *E30.0*
- - Thrombopathie *D68.00*

Constriction

- Anormale congénitale d'un ligament des méninges ¬ *Q07.8*
- Circulaire de la trachée et de l'œsophage ¬ Double arc aortique avec *Q25.4*
- Congénital(e) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- Duodénum ¬ *K31.5*
- Œsophage ¬ *K22.2*

Constrictive

- Chronique ¬ Péricardite *I31.1*
- SAI ¬ Myocardiopathie *I42.5*

Consultant pour le compte d'un tiers ¬ Conseil et surveillance pour: Personne *Z71*

Consultation

- Explication de résultats d'examen ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- Gênant le contact ¬ Prolixité et détails masquant les raisons de la *R46.7*

Contagieuse

- Ovine] ¬ Orf [dermatite pustuleuse *B08.0*
- ¬ Bacillose péritonéale par tuberculose bovine *A18.3†, K93.0**

Contagiosum

- Paupière ¬ Molluscum *B08.1†, H03.1**
- ¬ Molluscum *B08.1*

Contaminant des aliments ¬ Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines *T64*

Contaminées ¬ Substances *Y69!*

Contenant

- Amphétamine méthamphétamine ¬
- - Consommation non intraveineuse de produits *U69.34!*

Contenant *–suite*

- Amphétamine méthamphétamine ¬ *–suite*
- - Utilisation intraveineuse de produits *U69.33!*
- Seule et plusieurs substances ¬ Préparations *T38.4*

Contenu sécrétion gastrique s SAI due anesthésie cours

- Grossesse ¬ Inhalation du *O29.0*
- Puerpéralité ¬ Inhalation du *O89.0*
- Travail et de l'accouchement ¬ Inhalation du *O74.0*

Contient des cellules de type alpha-bêta et gamma-delta ¬ *C86.1*

Contiguous ABCD1 DXS1357E deletion syndrome] ¬ CADDS [*Q87.8*

Contigus de céphalopolysyndactylie de Greig ¬ Syndrome des gènes *Q87.0*

Continuation

- Azygos de la veine cave inférieure ¬ *Q26.8*
- Veine cave inférieure dans la veine azygos ¬ *Q26.8*

Continuité osseux

- Sans précision ¬ Anomalie de la *M84.9*
- ¬ Autres anomalies de la *M84.8*

Contraceptif

- Intra-utérin
- - Stérilet] ¬ Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif *Z30.5*
- - ¬
- - - Mise en place d'un dispositif *Z30.1*
- - - Pessaire *Z97.8*
- - - Surveillance d'un dispositif *Z30.5*
- Oraux ¬ Intoxication: *T38.4*
- ¬
- - Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin *T83.3*
- - Première prescription de moyens *Z30.0*
- - Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres *Z30.4*
- - Surveillance de *Z30.4*

Contraception

- Contraceptifs ¬ Renouvellement d'une prescription de pilules *Z30.4*
- Sans précision ¬ Prise en charge d'une *Z30.9*
- ¬
- - Antécédents de *Z92.8*
- - Antécédents personnels de *Z92.88*
- - Conseils et avis généraux concernant la *Z30.0*
- - Examen de routine pour entretien de la *Z30.4*
- - Prises en charge d'une *Z30.8*

Contraction

- Fascia plantaire ¬ *M72.2*
- Hypotonique de l'utérus en tant que complication de l'accouchement ¬ *O62.2*
- Orifice urétéral avec infection ¬ *N13.67*
- Sablier de l'estomac ¬ *K31.8*

Contraction *–suite*

- ¬ Dystocie (de) (par): anneau de *O62.4*

Contractions

- Anormales de l'utérus ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P03.6*
- Initiales insuffisantes ¬ *O62.0*
- Non coordonnées de l'utérus ¬ *O62.4*
- Sablier de l'utérus ¬ *O62.4*
- SAI ¬ *R25.3*
- Tétaniques ¬ *O62.4*
- Utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées ¬ *O62.4*
- ¬
- - Anomalie du cordon ombilical, avec complication pendant les *O69.9*
- - Déchirure de l'utérus avant le début des *O71.0*
- - Faibles *O62.2*
- - Hyperactivité de l'utérus due à une stimulation excessive par des médicaments déclencheurs de *O62.8, Y57.98!*

Contracture

- Abdominal
- - Généralisée) (localisée) ¬ Douleur abdominale intense (avec *R10.0*
- - ¬ *R19.3*
- Articulaires multiples ¬ Syndrome de déficience intellectuelle récessive-dysfonctionnement moteur- *Q87.8*
- Congénitales
- - Létales ¬ Syndrome des *Q68.8*
- - Membres et de la face-hypotonie-retard de développement ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Multiples ¬ *Q74.3*
- Dysplasie ectodermique-fente labio-palatine ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- Hystérique ¬ *F44.4*
- Muscle sterno-cléido-mastoïdien ¬ *Q68.0*
- Musculaire
- - Psychogène en tant que réaction de conversion ¬ *F44.4*
- - ¬ *M62.4*
- Nanisme-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'alopécie- *Q87.8*
- Précoces (de type Emery-Dreifuss) ¬ Dystrophie musculaire scapulo-péronière bénigne avec *G71.08*
- Progressive
- - Articulations-dysmorphie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-épilepsie- *Q87.8*
- - Enfance-faiblesse musculaire des ceintures-dystrophie musculaire ¬ Syndrome de *G71.08*
- Retard de développement ¬ Syndrome de Pierre Robin- *Q87.0*
- Rupture artérielle-surdité ¬ Syndrome de fragilité osseuse- *Q87.5*

Contracture *–suite*
- ¬
- - Arachnodactylie congénitale avec *Q68.8*
- - Raideur articulaire par *M24.5*

Contre-indication ¬ Vaccination non effectuée raison
- *Z28*
- *Z53*

Contre-pulsion dans l'aorte ¬ Infection due à un ballon de *T82.72*

Contrôle
v./v.a. Examen de contrôle
- Cadre d'un programme de recherche clinique ¬ Examen de comparaison et de *Z00.6*
- Chirurgical, sans précision ¬ Soin de *Z48.9*
- Chirurgicaux précisés ¬ Autres soins de *Z48.8*
- Comprenant opération plastique
- - Extrémités inférieures ¬ Soins de *Z42.4*
- - Extrémités supérieures ¬ Soins de *Z42.3*
- - Parties
- - - Corps ¬ Soins de *Z42.8*
- - - Tronc ¬ Soins de *Z42.2*
- - Sans précision ¬ Soins de *Z42.9*
- - Sein ¬ Soins de *Z42.1*
- - Tête et du cou ¬ Soins de *Z42.0*
- Impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation ¬ Soins de *Z47.0*
- Inadéquats de la part des parents ¬ Surveillance et *Z62*
- Orthopédique
- - Précisés ¬ Autres soins de *Z47.8*
- - Sans précision ¬ Soin de *Z47.9*
- Paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments ¬ *Z45.1*
- Radiographique thoracique ¬ *Z01.6*
- Routine au cours du post-partum ¬ *Z39.2*
- Stimulateur cardiaque ¬ *Z45.00*
- Vérification d'un dispositif cardiaque (électronique) ¬ *Z45.0*

Contusio spinalis ¬ *T09.3*

Contusion
- Cardiaque ¬ *S26.81*
- Cérébelleuse
- - Circonscrite ¬ *S06.32*
- - Diffuse ¬ *S06.22*
- - ¬ Hémorragie traumatique, hématome traumatique, *S06.8*
- Cérébrale
- - Circonscrite ¬ *S06.31*
- - Diffuse ¬ *S06.21*
- - ¬ Hématome cérébral avec *S06.21*
- Cheville ¬ *S90.0*
- Cordon ¬ *O69.5*
- Coude ¬ *S50.0*
- Cuisse ¬ *S70.1*
- Doigt s

Contusion *–suite*
- Doigt s *–suite*
- - Lésion de l'ongle ¬ *S60.1*
- - SAI ¬ *S60.0*
- - Sans lésion de l'ongle ¬ *S60.0*
- Épaule et du bras ¬ *S40.0*
- Épiglotte ¬ *S10.0*
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- Genou ¬ *S80.0*
- Globe oculaire et des tissus de l'orbite ¬ *S05.1*
- Gorge ¬ *S10.0*
- Hanche ¬ *S70.0*
- Hématome
- - Foie ¬ *S36.11*
- - Poumon ¬ *S27.31*
- - Rein ¬ *S37.01*
- Intracrânienne SAI ¬ Hémorragie traumatique, hématome traumatique, *S06.8*
- Localisée ¬ Compression du cerveau par une *S06.31*
- Lombes et du bassin ¬ *S30.0*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Œdème
- - Moelle cervicale ¬ *S14.0*
- - Moelle dorsale ¬ *S24.0*
- - Moelle lombaire [Conus medullaris] ¬ *S34.0*
- Organes génitaux externes ¬ *S30.2*
- Orteil s
- - Lésion de l'ongle ¬ *S90.2*
- - SAI ¬ *S90.1*
- - Sans lésion de l'ongle ¬ *S90.1*
- Paroi abdominale ¬ *S30.1*
- Parties
- - Non précisées
- - - Avant-bras ¬ *S50.1*
- - - Jambe ¬ *S80.1*
- - - Pied ¬ *S90.3*
- - Poignet et de la main ¬ *S60.2*
- Paupière et de la région périoculaire ¬ *S00.1*
- Pulmonaire aiguë ¬ *S27.31*
- Sein ¬ *S20.0*
- Sous-galéale ¬ *S00.05*
- Thorax ¬ *S20.2*
- Vessie ¬ *S37.21*
- ¬
- - Ictère néonatal dû à des *P58.0*
- - Lésion traumatique superficielle
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.05*
- - - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.05*
- - - Partie du corps non précisée: *T14.05*
- - - Tronc, niveau non précisé: *T09.05*

Conus medullaris] ¬ Contusion et œdème de la moelle lombaire [*S34.0*

Convalescence
- Chimiothérapie ¬ *Z54.2!*
- Intervention chirurgicale ¬ *Z54.0!*
- Psychothérapie ¬ *Z54.3!*
- Radiothérapie ¬ *Z54.1!*
- Traitement
- - Combinés ¬ *Z54.7!*
- - Fracture ¬ *Z54.4!*
- - Non précisé ¬ *Z54.9!*
- - ¬ *Z54.8!*

Convergence ¬ Excès et insuffisance de *H51.1*

Convergent
- Concomitant ¬ Strabisme *H50.0*
- Intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Ésotropie [strabisme *H50.3*

Conversion
- Mixte ¬ Trouble dissociatif [de *F44.7*
- Sans précision ¬ Trouble dissociatif [de *F44.9*
- Transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles dissociatifs [de *F44.82*
- ¬
- - Contracture musculaire psychogène en tant que réaction de *F44.4*
- - Hystérie de *F44*
- - Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de *T46.4*
- - Réaction de *F44*
- - Troubles
- - - Dissociatifs [de *F44.8*
- - - Dissociation [troubles de *F44.88*

Convertase
- 1 chez l'enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ Obésité extrême par déficit en prohormone *E66.85*
- I
- - Enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ Obésité par déficit en prohormone *E66.84*
- - ¬ Obésité par déficit en prohormone *E66.89*

Convolution de l'arc aortique ¬ Persistance de: *Q25.4*

Convulsion
- Déficience intellectuelle par hydroxylysinurie ¬ Syndrome de *E72.3*
- Dissociatives ¬ *F44.5*
- Encéphalopathie ¬ Syndrome d'hypotonie musculaire néonatale sévère associé au PURA avec *G40.4*
- Épileptiques SAI ¬ *G40.9*
- Fébriles
- - Plus ¬ Épilepsie généralisée avec *G40.3*
- - ¬
- - - *R56.0*
- - - Épilepsie temporale mésiale familiale avec *G40.2*

Convulsion *–suite*
- Hypertension préexistante ou gestationnelle ¬ *O15*
- Hypotonie-cataracte-retard de développement ¬ Syndrome létal de non-compaction ventriculaire gauche- *G31.81*
- Infantiles
- - Bénignes associées à une gastroentérite modérée ¬ *G40.3*
- - Choréoathétose ¬ Syndrome de *G40.4*
- Néonatales
- - Bénignes
- - - Familiales) ¬ *G40.3*
- - - Idiopathiques ¬ *G40.3*
- - Infantiles bénignes familiales ¬ [CNIBF] *G40.3*
- Non précisées ¬ *R56.8*
- Nouveau-né ¬ *P90*
- Scoliose-macrocéphalie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Sensibles
- - Acide folinique ¬ *G40.3*
- - Phosphate de pyridoxal ¬ *G40.8*
- ¬
- - Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-malformation de Dandy-Walker-anomalies des ganglions de la base- *Q87.8*
- - Tétanos avec *A35*

Convulsive
- SAI ¬ Crise (*R56.8*
- ¬ Toux *A37.9*

Cooks ¬ Syndrome de *Q74.8*

Cooley ¬ Maladie de *D56.1*

Coombs ¬ Résultat positif au test de *R76.88*

Cooper ¬ Névralgie mammaire de *N64.4*

Cooper-Jabs ¬ Syndrome de *Q87.8*

Coordination
- Non précisés ¬ Troubles de la *R27.8*
- ¬
- - Trouble de l'acquisition de la *F82*
- - Troubles de la *R27*

COPA [sous-unité alpha du complexe protéique coatomère] ¬ Syndrome *M35.8*

Coproporphyrie héréditaire ¬ *E80.2*

Coqueluche
- Bordetella
- - Parapertussis ¬ *A37.1*
- - Pertussis ¬ *A37.0*
- Bordetella bronchiseptica ¬ *A37.8*
- DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos- *Z27.1*
- Due à d'autres espèces de Bordetella ¬ *A37.8*
- Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la *Z27.8*
- Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos- *Z27.3*

Coqueluche *–suite*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.7*
- Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos- *Z27.2*
- ¬
- - *A37.9*
- - Pneumonie au cours de *A37.9†, J17.0**

Coquillage ¬
- *T63.6*
- Intoxications par poissons et *T61.2*

Coquille ¬ Dent en *K00.5*

Cor au pied ¬ *L84*

Coraco-huméral ¬ Ligament *S43.4*

Coracoïde ¬ Fracture de l'omoplate: Apophyse *S42.13*

Coralliforme ¬
- Calcul: *N20.0*
- Cataracte *Q12.0*

Cordages
- Tendineux
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture des *I23.4*
- - Non classée ailleurs ¬ Rupture des *I51.1*
- Tricuspide ¬ Insertion anormale des *Q22.8*

Corde vocale
- Larynx ¬ Polype des *J38.1*
- ¬
- - Abcès des *J38.3*
- - Fausses *C32.1*
- - Granulome des *J38.3*
- - Hyperkératose des *J38.3*
- - Leucoplasie des *J38.3*
- - Maladies des *J38.3*
- - Myopathie distale avec faiblesse des *G71.08*
- - Nodules des *J38.2*
- - Parakératose des *J38.3*
- - Paralysie congénitale unilatérale complète des *J38.02*
- - Phlegmon des *J38.3*
- - Syndrome de ptosis-paralysie des *J38.03, Q10.0*

Cordis ¬
- Concretio *I31.1*
- Ectopia *Q24.8*

Cordite (fibrineuse) (nodulaire) (tubéreuse) ¬ *J38.2*

Cordon
- Compression ¬ Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du *O69.1*
- Court ¬ *P02.6*
- Jumeau
- - Sac amniotique unique ¬ Enchevêtrement des *O69.2*
- - ¬ Perte de sang fœtal au niveau de la section du *P50.5*
- Médullaire divisé ¬ Malformation du *Q06.2*

Cordon *–suite*
- SAI ¬ Compression du *O69.2*
- Sans compression ¬ Enchevêtrement du *O69.8*
- ¬
- - Contusion du *O69.5*
- - Hématome du *O69.5*
- - Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du *O69.4*
- - Nœud du *O69.2*
- - Perte sang fœtal due
- - - Insertion vélamenteuse du *P50.0*
- - - Rupture du *P50.1*
- - Procidence des vaisseaux du *P02.6*
- - Travail accouchement compliqué
- - - Brièveté du *O69.3*
- - - Forme d'enchevêtrement du *O69.2*
- - - Insertion vélamenteuse du *O69.4*
- - - Lésions vasculaires du *O69.5*
- - - Prolapsus du *O69.0*

Cordon ombilical
- Atrésie intestinale ¬ Syndrome d'ulcération du *Q41.9, P02.6*
- Complication pendant les contractions ¬ Anomalie du *O69.9*
- Provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du *P02.3*
- Sans précision ¬
- - Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du *P02.6*
- - Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du *O69.9*
- ¬
- - Circulaire du *P02.5*
- - Déplacement d'un clampage du *P51.8*
- - Fœtus nouveau-né affectés
- - - Formes de compression du *P02.5*
- - - Procidence du *P02.4*
- - Nœud du *P02.5*
- - Torsion du *P02.5*
- - Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du *O69.8*

Cordon postérieur
- Rétinite pigmentaire ¬ Syndrome d'ataxie du *G11.1*
- ¬
- - Sclérose tabique du *A52.1†, G32.8**
- - Syphilis sclérosante du *A52.1†, G32.8**

Cordon sexuel
- Stroma ¬ Tumeur testiculaire des *C62.9*
- Testicule
- - Dystopique ¬ Tumeur stromale des *C62.0*
- - Scrotal ¬ Tumeur stromale des *C62.1*

Cordon spermatique
- Scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - Atrophie du canal déférent, du *N50.8*

Cordon spermatique *–suite*
- Scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬ *–suite*
- - Hypertrophie du canal déférent, du *N50.8*
- - Œdème du canal déférent, du *N50.8*
- - Ulcère du canal déférent, du *N50.8*
- Testicule ou de la (tunique) vaginale ¬ hydrocèle du *N43*
- Tunique vaginale du testicule et du canal déférent ¬ Affections inflammatoires du *N49.1*
- ¬
- - *D29.7*
- - Absence ou aplasie de: *Q55.4*
- - Adénocarcinome du *C63.1*
- - Liposarcome bien différencié du *C63.1*
- - Rétrécissement de: *N50.8*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire du *C63.1*
- - Tuberculose du *A18.1†, N51.8**
- - Tumeur lipomateuse bénigne du *D17.6*
- - Tumeur maligne: *C63.1*

Cordylobia anthropophaga ¬ Myiase furonculoïde à *B87.0*

Corectopie ¬ *Q13.2*

Cores centraux] ¬ Myopathie: à axe central [myopathie à *G71.2*

Cori ¬ Maladie de: *E74.0*

Cormane
v./v.a. Westerhof-Beemer-Cormane

Corne
- Antérieure
- - Ménisque
- - - Externe ¬
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.34*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.04*
- - - - Lésion
- - - - - Interne du genou, sans précision: Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou *M23.94*
- - - - - Ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.24*
- - - Interne ¬
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.31*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.01*
- - - - Lésion
- - - - - Interne du genou, sans précision: Ligament croisé antérieur ou *M23.91*
- - - - - Ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.21*
- - ¬
- - - Maladie de la *G12.2*
- - - Syndrome
- - - - *S24.12*
- - - - Arthrogrypose avec maladie des cellules ganglionnaires de la *Q74.3, G12.2*
- Cutanée ¬ *L85.8*
- Occipitale ¬ Syndrome de la *E83.0*

Corne *–suite*
- Postérieure
- - Ménisque
- - - Externe ¬
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.35*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.05*
- - - - Lésion
- - - - - Interne du genou, sans précision: *M23.95*
- - - - - Ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.25*
- - - Interne ¬
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.32*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.02*
- - - - Lésion
- - - - - Interne du genou, sans précision: Ligament croisé postérieur ou *M23.92*
- - - - - Ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.22*
- - ¬ Syndrome de la *S24.12*

Cornea plana ¬ *Q13.4*

Cornée
- Annulaire ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Central ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Conjonctive ¬ Infection varicelleuse de la *B01.8†, H19.2**
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de la sclérotique et de la *H19.8**
- Due à Herpes simplex ¬ Endothélite de la *B00.5†, H19.1**
- Épithéliale ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Filaments sinueux ¬ Dystrophie de la *H18.5*
- Fragile ¬ Syndrome de la *Q79.6*
- Granuleuse ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Grillagée en réseau ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Herpès simplex ¬ Ulcus dendriticum de la *B00.5†, H19.1**
- Hyperkératose palmoplantaire et dyskératose laryngée ¬ Syndrome de dyskératose intraépithéliale de la *Q82.8*
- Hypopyon ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Maculaire ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Marginal ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Œil ¬
- - Décompensation de greffe de *T86.83*
- - Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de *T86.83*
- - Rejet
- - - Aigu de greffe de *T86.83*
- - - Chronique de greffe de *T86.83*
- Perforé ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Sac conjonctival ¬
- - Brûlure de la *T26.1*
- - Corrosion de la *T26.6*
- SAI ¬
- - Malformation congénitale de la *Q13.4*
- - Ulcère de (la): *H16.0*
- Sans

Cornée *–suite*
- Sans *–suite*
- - Mention de corps étranger ¬ Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la *S05.0*
- - Précision ¬ Affection de la *H18.9*
- - ¬
- - Affections précisées de la *H18.8*
- - Anesthésie de la *H18.8*
- - Anneau de sidérose de la *H18.0, T90.4*
- - Avitaminose A
- - - Cicatrices xérophtalmiques de la *E50.6†, H19.8**
- - - Xérosis et ulcération de la *E50.3†, H19.8**
- - Carence vitamine A cicatrice
- - - *E50.6†, H19.8**
- - - Xérophtalmique de la *E50.6†, H19.8**
- - Corps étranger dans la *T15.0*
- - Déformations de la *H18.7*
- - Dégénérescence de la *H18.4*
- - Donneur de *Z52.5*
- - Ectasie de la *H18.7*
- - Herpès de la *B00.5†, H19.1**
- - Hypoesthésie de la *H18.8*
- - Infection virale de la *B34.9†, H19.2**
- - Malformations congénitales de la *Q13.4*
- - Néovaisseaux (de la *H16.4*
- - Œdème de la *H18.2*
- - Opacité congénitale de la *Q13.3*
- - Pannus (de la *H16.4*
- - Staphylome de la *H18.7*
- - Status post greffe de *Z94.7*
- - Syphilis de la *A52.7†, H19.2**
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, H19.2**
- - Tuberculose de la *A18.5†, H19.2**
- - Tumeur bénigne: *D31.1*
- - Tumeur maligne: *C69.1*
- - Ulcère
- - - *H16.0*
- - - Tuberculeux de la *A18.5†, H19.2**

Cornéen
v./v.a. dermo-chondro-cornéen
v./v.a. Dystrophie cornéenne
- Centrales ¬ Autres opacités *H17.1*
- Lié à l'X ¬ Dermoïde *D31.1*
- Sans précision ¬ Cicatrice et opacité *H17.9*
- Tuberculeuse ¬ Cicatrice *A18.5†, H19.8**
- ¬
- - Avitaminose A avec xérosis *E50.2†, H19.8**
- - Cicatrices et opacités *H17.8*
- - Endothélite *H16.8*
- - Lésions des membranes *H18.3*
- - Nécrose *H18.8*
- - Néovascularisation *H16.4*
- - Pigmentation et dépôts *H18.0*

Cornéen *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome de cataracte congénitale-microcornée-opacité *Q13.8*

Cornéo
v./v.a. irido-cornéo-endothélial

Cornet nasal ¬
- Ostéoblastome du *D16.42*
- Ulcère de *J34.0*

Cornets
- Nez ¬ Hypertrophie des *J34.3*
- ¬
- - *C30.0*
- - *C41.02*
- - *D16.42*

CORO1A ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en *D81.2*

Coronaire
v./v.a. Artère coronaire
- Acquise ¬ Fistule artério-veineuse *I25.4*
- Aigu] ¬ SCA [Syndrome *I24.9*
- Artère) ¬ Anévrisme congénital *Q24.5*
- Congénitale ¬
- - Fistule artério-veineuse *Q24.5*
- - Sténose ostiale *Q24.5*
- Couleur rose (pink spot) ¬ Dyschromie *K03.3*
- Due à la syphilis ¬ Thrombose *A52.0†, I52.0**
- Interaortopulmonaire ¬ *Q24.5*
- Intermédiaire ¬ Syndrome (de): *I20.0*
- Intramurale ¬ *Q24.5*
- Intramyocardique ¬ *Q24.5*
- N entraînant infarctus du myocarde ¬
- - Embolie *I24.0*
- - Occlusion
- - - Artère *I24.0*
- - - Veines *I24.0*
- Rhumatismal
- - Aiguë ¬ Artérite *I01.8*
- - Chronique ¬ Artérite *I09.8*
- Syphilitique ¬ Artérite *A52.0†, I52.0**
- Vérifié ¬ Angine de poitrine avec spasme *I20.1*
- ¬
- - Abouchement de la veine cave supérieure gauche dans l'oreillette gauche par le sinus *Q26.1*
- - Anomalie
- - - Congénitale du sinus *Q21.1*
- - - Nombre des ostia *Q24.5*
- - - Position des ostia *Q24.5*
- - ASD type sinus *Q21.1*
- - Atrésie
- - - Ostiale *Q24.5*
- - - Sinus *Q21.1*
- - Cataracte sénile: *H25.0*
- - Fistule *Q24.5*

Coronaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Infection due à un stent *T82.71*
- - Insuffisance *I24.8*
- - Malformation
- - - Sinus
- - - - *Q21.1*
- - - - *Q21.1*
- - - Vaisseaux *Q24.5*
- - Persistance de la veine cave supérieure gauche avec abouchement dans l'oreillette gauche via le sinus *Q26.1*
- - Présence d'implant et de greffe vasculaires *Z95.5*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation *R93.1*
- - Sténose
- - - Ostiale *Q24.5*
- - - Sinus *Q21.1*
- - Trouble du rythme (du): sinus *I49.8*

Coronal
- Bilatérale ¬ Craniosynostose *Q75.0*
- Suture
- - Métopique ¬ Synostose bilatérale non syndromique de la suture *Q75.0*
- - Sagittale ¬ Synostose bilatérale non syndromique de la suture *Q75.0*
- ¬ Hypospadias: *Q54.0*

Coronarien
v./v.a. Artère coronarienne
- Bitronculaire à tritronculaire ¬ Maladie *I25.13*
- Chronique ¬ Cardiopathie *I25.19*
- Cours de syndrome de Kawasaki ¬ Anévrisme artériel *M30.3†, I79.8**
- Flux lent (Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome *I20.8*
- Greffe valvulaire cardiaque ¬ Complication mécanique d'un pontage *T82.2*
- Insuffisance fonctionnelle du ventricule gauche ¬ Cardiopathie *I25.19*
- Monotronculaire ¬ Maladie *I25.11*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Vasodilatateurs *T46.3*
- Quadritronculaire ¬ Maladie *I25.14*
- SAI ¬ Suites d'une angioplastie *Z95.5*
- Syphilitique ¬ Anévrisme *A52.0†, I52.0**
- ¬
- - Cardiopathie *I25.19*
- - Infection due à un pontage *T82.71*
- - Maladie *I25.19*

Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome coronarien à flux lent (*I20.8*

Coronavirale, siège non précisé ¬ Infection *B34.2*

Coronavirus
- 2019
- - Confirmation clinique et épidémiologique ¬ Infection à *Z20.8, U07.2!*

Coronavirus *–suite*
- 2019 *–suite*
- - Virus
- - - Identifié ¬ Infection à *U07.1!*
- - - Non identifié ¬ Infection à *U07.2!*
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.2!*
- MERS ¬ Infection à *B34.2*
- Syndrome respiratoire du Moyen-Orient ¬ Infection à *B34.2*
- Tant qu'agents pathogènes ¬ *B97.2!*

Coronoïde
- Cubitus ¬ Fracture de la partie supérieure du cubitus: Apophyse *S52.02*
- ¬ Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse *S02.63*

Corporel
v./v.a. Indice de masse corporelle
v./v.a. masse corporelle
- Plaie opératoire
- - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- - ¬
- - - Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- - - Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- - - Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- Plus ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS] avec atteinte de 30% de la surface *L00.1*
- ¬
- - Antécédents de blessure *Z91.8*
- - Déclin *R53.9*
- - Dysphorie de l'intégrité *F68.8*
- - Epidermolyse nécrosante avec atteinte de moins de 30% de la surface *L51.20*
- - Nécrolyse épidermique toxique avec atteinte de 30% et plus de la surface *L51.21*
- - Peur d'une dysmorphie *F45.2*
- - Syndrome
- - - Lyell avec atteinte de 30% et plus de la surface *L51.21*
- - - Staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface *L00.0*

Corporis ¬ Pédiculose due à Pediculus humanus *B85.1*

Corpus sterni ¬ Fracture du sternum: *S22.22*

Corpuscule carotidien ¬
- Tumeur bénigne: *D35.5*
- Tumeur maligne: *C75.4*
- Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D44.6*

Correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique *Y59.9!*

Correction
- Palliation
- - Interventionnelles d'une malformation cardiaque congénitale ¬ Antécédents personnels de *Z92.80*
- - Malformation cardiaque congénitale ¬
- - - État après intervention de chirurgie cardiaque visant la *Z98.80*
- - - Examen de contrôle après *Z09.81*
- ¬ Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, avec plastie de *Z91.70*

Correctrice pour cicatrice après traumatisme ¬ chirurgie plastique et *Z42*

Correspondance rétinienne ¬ Anomalies de la *H53.3*

Corrosif
- Couvrant 90 % ou plus de la surface du corps ¬ Lésions *T32.9!*
- Sans précision ¬ Effet toxique: Substance *T54.9*
- Substance similaire ¬ Effet toxique
- - Acides *T54.2*
- - Alcalis *T54.3*
- ¬
- - Effet toxique: Autres composés organiques *T54.1*
- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Liquide *X49.9!*

Corrosion
- 2ème degré
- - Parties génitales externes ¬ *T21.65*
- - Sans précision
- - - Partie du corps non précisée ¬ *T30.60*
- - - ¬ *T30.60*
- Bouche et du pharynx ¬ *T28.5*
- Cheville et du pied, degré non précisé ¬ *T25.4*
- Classées selon leur étendue sur la surface du corps ¬ Séquelles de brûlure et *T95.4*
- Comprenant le larynx et la trachée avec les poumons ¬ *T27.5*
- Cornée et du sac conjonctival ¬ *T26.6*
- Couvrant
- - 10 et 19% de la surface du corps ¬ *T32.1!*
- - 10% de la surface du corps ¬ *T32.0!*
- - 20 et 29% de la surface du corps ¬ *T32.2!*
- - 30 et 39% de la surface du corps ¬ *T32.3!*
- - 40 et 49% de la surface du corps ¬ *T32.4!*
- - 50 et 59% de la surface du corps ¬ *T32.5!*
- - 60 et 69% de la surface du corps ¬ *T32.6!*
- - 70 et 79% de la surface du corps ¬ *T32.7!*
- - 80 et 89% de la surface du corps ¬ *T32.8!*
- Degré
- - 2a, partie du corps non précisée ¬ *T30.60*
- - 2b

Corrosion *–suite*
- Degré *–suite*
- - 2b *–suite*
- - - Organes génitaux externes ¬ *T21.95*
- - - Partie du corps non précisée ¬ *T30.61*
- Épaule
- - Bras sauf poignet main
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T22.6*
- - - Degré
- - - - 2a ¬ *T22.6*
- - - - 2b ¬ *T22.9*
- - Membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé ¬ *T22.4*
- Gelure
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles de brûlure, *T95.3*
- - - Supérieur ¬ Séquelles de brûlure, *T95.2*
- - Précisées ¬ Séquelles d'autres brûlures, *T95.8*
- - Sans précision ¬ Séquelles de brûlure, *T95.9*
- - Tête ou du cou ¬ Séquelles de brûlure, *T95.0*
- - Tronc ¬ Séquelles de brûlure, *T95.1*
- Hanche
- - Jambe sauf région malléolaire pied
- - - 2ème degré sans autre précision ¬ *T24.60*
- - - Degré 2b ¬ *T24.60*
- - Membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé ¬ *T24.4*
- Larynx et de la trachée ¬ *T27.4*
- Mentionnées dépassant le premier degré ¬ Corrosions de parties multiples du corps, pas de *T29.5*
- Multiples SAI ¬ *T29.4*
- Œil et de ses annexes, partie non précisée ¬ *T26.9*
- Œsophage ¬ *T28.6*
- Organes génito-urinaires internes ¬ *T28.8*
- Organes internes, autres et sans précision ¬ *T28.9*
- Partie du corps non précisée, degré non précisé ¬ *T30.4*
- Parties
- - Multiples corps
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T29.60*
- - - Corrosion du troisième degré mentionnée ¬ *T29.7*
- - - Corrosions mentionnées dépassant le premier degré ¬ *T29.5*
- - - Degré non précisé ¬ *T29.4*
- - - Indication degré 2a maximum ¬
- - - - *T29.60*
- - - - *T29.61*
- - Œil et de ses annexes ¬ *T26.8*
- - Voies digestives ¬ *T28.7*
- - Voies respiratoires ¬ *T27.6*

Corrosion *–suite*
- Paupière et de la région périoculaire ¬ *T26.5*
- Poignet main
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T23.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T23.60*
- - - 2b ¬ *T23.61*
- - - Non précisé ¬ *T23.4*
- Provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire ¬ *T26.7*
- Région malléolaire pied
- - 2ème degré sans précision ¬ *T25.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T25.60*
- - - 2b ¬ *T25.61*
- SAI ¬ *T30.4*
- Tête cou
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T20.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T20.60*
- - - 2b ¬ *T20.61*
- - - Non précisé ¬ *T20.4*
- Tronc
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T21.6*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T21.6*
- - - 2b ¬ *T21.9*
- - - Non précisé ¬ *T21.4*
- Voies respiratoires, partie non précisée ¬ *T27.7*

Corrosion du premier degré
- Cheville et du pied ¬ *T25.5*
- Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.5*
- Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.5*
- Partie du corps non précisée ¬ *T30.5*
- Parties génitales externes ¬ *T21.55*
- Poignet et de la main ¬ *T23.5*
- SAI ¬ *T30.5*
- Tête et du cou ¬ *T20.5*
- Tronc ¬ *T21.5*

Corrosion du troisième degré
- Cheville et du pied ¬ *T25.7*
- Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.7*
- Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.7*
- Mentionnée ¬ Corrosions de parties multiples du corps, au moins une *T29.7*
- Organes génitaux externes ¬ *T21.75*
- Partie du corps non précisée ¬ *T30.7*
- Poignet et de la main ¬ *T23.7*
- SAI ¬ *T30.7*
- Tête et du cou ¬ *T20.7*
- Tronc ¬ *T21.7*

Cors et callosités ¬ *L84*

Corset orthopédique(s) ¬ *Z46.7*

Cortex
- Cérébral ¬ Défaut congénital d'une partie du *Q04.8*
- Frontal ¬ Vessie neurogène: due à un syndrome du *N31.2*
- Surrénale ¬
- - Adénocarcinome du *C74.0*
- - Tumeur maligne: *C74.0*
- Surrénalien produisant du cortisol ¬ Syndrome de Cushing dû à un adénome du *D35.0, E24.8*
- Visuel ¬
- - *S04.0*
- - Affections du *H47.6*

Corti
v./v.a. Organe de Corti

Cortical
v./v.a. Dysplasie corticale focale isolée
- Cérébrale ¬ Dysplasie *Q04.8*
- Déficience intellectuelle
- - Dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'encéphalopathie épileptique infantile précoce-cécité *G40.4*
- - Polydactylie ¬ Syndrome de cécité *Q87.8*
- Déformante juvénile ¬ Hyperostose *M88.99*
- Dysplasique
- - Type Kozlowski-Tsuruta ¬ Hyperostose *Q78.8*
- - ¬ Hyperostose *Q78.8*
- Familiale ¬ Myoclonie *G25.3*
- Généralisée ¬ Hyperostose *Q78.8*
- Habitus mince ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-microcéphalie-malformation *Q87.8*
- Hypoplasie pontocérébelleuse due à une mutation TUBB3 ¬ Dysgénésie *Q04.8*
- Infantile
- - Avant-bras ¬ Hyperostose *M89.83*
- - Côtes ¬ Hyperostose *M89.88*
- - Face ¬ Hyperostose *M89.88*
- - Jambe ¬ Hyperostose *M89.86*
- - Localisations multiples ¬ Hyperostose *M89.80*
- - Région de l'épaule ¬ Hyperostose *M89.81*
- - ¬ Hyperostose *M89.89*
- Infantiles ¬ Hyperostoses *M89.8*
- Leucoencéphalopathie ¬
- - CADASIL [Artériopathie cérébrale autosomique dominant-infarctus sous- *I67.88*
- - CARASIL [Artériopathie cérébrale autosomique récessive-infarctus sous- *I67.88*
- Microcéphaliques-petite taille par déficit en RTTN ¬ Malformations *Q87.1*
- Postérieure ¬ Atrophie *G31.0*
- Retard de développement ¬ Syndrome de microcéphalie progressive-épilepsie-cécité *Q02*

Cortical *–suite*
- Sous-corticale ¬ Démence vasculaire mixte, *F01.3*
- ¬
- - Alvéolite due à Cryptostroma *J67.60*
- - Cataracte sénile: *H25.0*
- - Démence à prédominance *F01.1*
- - Hémorragie intracérébrale hémisphérique, *I61.1*
- - Syndrome de NESCAV [neurodégénérescence - spasticité - atrophie cérébelleuse - cécité *G31.88*
- - Syphilis des surrénales avec hypofonctionnement *A52.7†, E35.1**

Corticale
v./v.a. Nécrose corticale

Cortico
- Nucléaire
- - Capsulaire postérieure ¬ Cataracte *H26.88*
- - Sous-capsulaire postérieure ¬ Cataracte *H26.88*
- - ¬ Cataracte *H26.88*
- Surrénalien ¬ Basophilie *E24.0*

Cortico-basal
- DCB] ¬ Dégénérescence *G31.0†, F02.0**
- ¬ Syndrome *G31.0†, F02.8**

Cortico-résistant
- Insuffisance surrénalienne ¬ Syndrome néphrotique familial *N04.1, E27.4*
- Surdité neurosensorielle ¬ Syndrome néphrotique familial *N04.1, H90.5*
- ¬ Syndrome néphrotique idiopathique sporadique *N04.9*

Cortico-sensible
- Glomérulosclérose segmentaire focale ¬ Syndrome néphrotique idiopathique *N04.1*
- ¬ Syndrome néphrotique idiopathique *N04.0*

Corticosensibles ¬ Syndrome des abcès aseptiques *M35.8*

Corticostérone méthyloxydase type I] ¬ CMO I [Déficit en *E27.4*

Corticosurrénal
- Hypersécrétion pure d'aldostérone ¬ Carcinome *C74.0, E26.0*
- Isolée ¬ Maladie micronodulaire *E24.8*
- Médicamenteuse ¬ Insuffisance *E27.3*
- Médullaire) après des actes médicaux ¬ Hypofonctionnement *E89.6*
- Primaire ¬ Insuffisance *E27.1*
- SAI ¬ Insuffisance *E27.4*
- Sans précision ¬ Insuffisances *E27.4*
- ¬
- - Hyperfonctionnements *E27.0*
- - Pseudohermaphroditisme féminin dû à un trouble *E25.8*

Corticotrope hypophysaire ¬
- *D35.2*
- Adénome *D35.2*

Cortisol ¬
- Déficit de la globuline fixant le *E27.8*

Cortisol ¬ *–suite*
- Syndrome de Cushing dû à un adénome du cortex surrénalien produisant du *D35.0, E24.8*

Cortisone réductase ¬ Hyperandrogénie due à un déficit en *E25.08*

Corynébactéries ¬
- *B95.90!*
- Bactériémie à *A49.86*

Corynebacterium diphtheriae ¬ Radiculomyélite toxique à *A36.8†, G05.0**

Coryza
- Aigu) ¬ *J00*
- Nouveau-né ¬ *P28.8*
- Rhume banal] ¬ Intoxication: Médicaments contre le *T48.5*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.0†, J99.8**
- - Nouveau-né ¬ *A50.0†, J99.8**

Cosmétiques ¬
- Allergie aux produits *L23.2*
- Chirurgie plastique pour motifs *Z41.1*
- Dermite
- - Allergique de contact due aux *L23.2*
- - Contact, sans précision, due aux *L25.0*
- - Irritante de contact due aux *L24.3*

Cossio ¬ Syndrome de *Q21.1*

Costa
v./v.a. Naguib-Richieri-Costa
v./v.a. Richieri-Costa-da Silva
v./v.a. Richieri-Costa-Pereira
- ¬ Syndrome de Da *F45.3*

Costal
v./v.a. Région costale
- ¬ Volet *S22.5*

Costaricensis ¬ Angiostrongyloïdose due à Angiostrongylus *B81.3*

Costeff ¬
- Atrophie optique de *E71.1*
- Syndrome de *E71.1*

Costello ¬ Syndrome de *Q87.8*

Costen ¬ Complexe ou syndrome de *K07.6*

Costo
v./v.a. sterno-costo-claviculaire

Costochondrite ¬ *M94.0*

Costo-claviculaire ¬ Syndrome *G54.0*

Costovertébral
- Anomalie de Sprengel ¬ Syndrome d'hydrocéphalie-dysplasie *Q87.8*
- ¬ Syndrome d'imperforation de l'oropharynx-anomalies *Q38.8, Q78.8*

Côte
- Cervicale ¬ *Q76.5*
- SAI ¬ Malformation congénitale d'une *Q76.6*
- Sans précision ¬ Fracture de *S22.32*
- Surnuméraire
- - Cervicale ¬ *Q76.5*
- - ¬ *Q76.6*
- ¬

Côte *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Chondrosarcome de la *C41.30*
- - Fibrome chondromyxoïde de la *D16.70*
- - Fracture
- - - *S22.32*
- - - 1ère *S22.31*
- - Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère *S22.41*
- - Ostéoblastome de la *D16.70*
- - Ostéosarcome de la *C41.30*
- - Sarcome d'Ewing de *C41.30*
- - Toute fracture multiple de côtes avec fracture de la 1ère *S22.41*

Côté
- Congénitale ¬
- - Absence de *Q76.6*
- - Coalescence des *Q76.6*
- Courte spolydactylie
- - Type
- - - Beemer-Langer ¬ Syndrome des *Q77.2*
- - - Majewski ¬ Syndrome des *Q77.2*
- - - Saldino-Noonan ¬ Syndrome des *Q77.2*
- - - Verma-Naumoff ¬ Syndrome des *Q77.2*
- - ¬ Syndrome des *Q77.2*
- Fracture 1ère côte ¬
- - Fractures multiples de *S22.41*
- - Toute fracture multiple de *S22.41*
- Fractures
- - Deux côtes ¬ Fractures multiples de *S22.42*
- - Quatre côtes ou plus ¬ Fractures multiples de *S22.44*
- - Trois côtes ¬ Fractures multiples de *S22.43*
- Gauche ¬ Négligence du *R29.5*
- Plus ¬ Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre *S22.44*
- SAI ¬ Fractures multiples de *S22.40*
- Sternum
- - Clavicule ¬ Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.7*
- - ¬ Entorse et foulure des *S23.4*
- ¬
- - *T84.28*
- - Déformation acquise du thorax et des *M95.4*
- - Dysplasie fibreuse monostotique, *M85.08*
- - Fractures multiples côté fractures
- - - Deux *S22.42*
- - - Trois *S22.43*
- - Hyperostose corticale infantile des *M89.88*
- - Malformations congénitales des *Q76.6*
- - Sarcome des *C41.30*
- - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.70*
- - Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: *C41.30*

Coton ¬ Affection des voies aériennes due aux poussières de *J66.0*

Cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au *U81.6!*

Couche
- Basale en palissade] ¬ Syndrome PENS [nævus épidermiques papulaires avec *Q87.8*
- Nucléaire interne et des cellules ganglionnaires ¬ Dystrophie rétinienne avec anomalies de la *H35.5*

Couchée ¬ Syndrome hypotensif en position *O26.5*

Couches
- Peau ¬ gelure avec atteinte partielle des *T33*
- Rétine ¬ Décollement des *H35.7*

Coude
- Dysplasie spondyloépiphysaire modérée due à une mutation du gène COL2A1 ¬ Arthrose précoce de l'articulation du *Q77.7, M19.92*
- Humérocubitale (articulation) ¬ Entorse et foulure du *S53.44*
- Humératoradiale (articulation) ¬ Entorse et foulure du *S53.43*
- Ligament collatéral
- - Cubital ¬ Entorse et foulure du *S53.42*
- - Radial ¬ Entorse et foulure du *S53.41*
- Non précisée
- - Antérieure ¬ Luxation du *S53.11*
- - Latérale ¬ Luxation du *S53.14*
- - Médiane ¬ Luxation du *S53.13*
- - Postérieure ¬ Luxation du *S53.12*
- - ¬ Luxation
- - - *S53.10*
- - - *S53.18*
- Partie
- - Non précisée ¬ Entorse et foulure du *S53.40*
- - ¬ Entorse et foulure du *S53.48*
- Poignet ¬ Amputation traumatique entre le *S58.1*
- SAI ¬
- - *S52.00*
- - Lésion traumatique superficielle du *S50.9*
- ¬
- - Abrasion sur le *S50.81*
- - Amputation traumatique
- - - Articulation du *S58.0*
- - - Épaule et le *S48.1*
- - Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- - Apophysite interne du *M77.0*
- - Arthrite chronique juvénile
- - - Début systémique, articulation du *M08.22*
- - - Forme oligo(pauci)- articulaire, articulation du *M08.42*
- - Articulation du *T84.11*

Coude *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Bursites du *M70.3*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du *T84.01*
- - Contusion du *S50.0*
- - CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium dihydraté], articulation du *M11.12*
- - Dermato-arthrite lipoïdique, articulation du *E78.88†, M14.32**
- - Écrasement du *S57.0*
- - Épanchement de l'articulation du *M25.42*
- - Hydarthrose intermittente, articulation du *M12.42*
- - Luxation congénitale du *Q68.8*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l'épaule, bras et *R02.01*
- - Ostéochondrose disséquant
- - - Articulation du *M93.22*
- - - Familiale de l'articulation du *M93.22*
- - Plaie ouverte du *S51.0*
- - Plaie superficielle du *S50.88*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.61*
- - Psoriasis avec arthrite juvénile de l'articulation du *L40.5†, M09.02**
- - Rhumatisme fibroblastique de l'articulation du *M06.82*
- - Rupture traumatique ligament latéral
- - - Externe du *S53.2*
- - - Interne du *S53.3*
- - Tuberculose du *A18.01†, M01.12**
- - Tumeur ténosynoviale à cellules géantes de l'articulation du *M12.22*

Coudure
- Jonction
- - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose ¬ *N13.5*
- Urétéral sans hydronéphrose avec infection du rein ¬ *N13.67*
- Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*

Couleur
- Cheveux ¬ Anomalies de la *L67.1*
- Expectoration ¬ Anomalie de: *R09.3*
- Pendant la formation de la dent ¬ Changement de *K00.8*
- Rose (pink spot) ¬ Dyschromie coronaire de *K03.3*
- ¬
- - Incapacité acquise de la vision des *H53.5*
- - Troubles de la vision des *H53.5*

Coumarine
- Antagoniste vitamine K ¬

Coumarine *–suite*
- Antagoniste vitamine K ¬ *–suite*
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des *D68.33*
- - Troubles hémorragiques dus aux *D68.33*
- ¬ Embryopathie due aux *Q86.2*

Coumariniques, sans hémorragie ¬ Traitement continu par des *Z92.1*

Coup
- Chaleur et insolation ¬ *T67.0*
- Couteau ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- Lapin» ¬ « *S13.4*
- Matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, *Y35.7!*
- Sabre ¬ Lésions en *L94.1*
- Soleil
- - Deuxième degré ¬ *L55.1*
- - Premier degré ¬ *L55.0*
- - Sans précision ¬ *L55.9*
- - Troisième degré ¬ *L55.2*
- - ¬ Autres *L55.8*

Coupable
- Blessures dues à une agression ¬ Examen de la victime ou du *Z04.5*
- Viol ou un abus sexuel allégué ¬ Examen de la victime ou du *Z04.5*

Couplage court ¬ Syndrome des torsades de pointes à *I47.2*

Coupure
- Multiples SAI ¬ *T01.9*
- SAI ¬ *T14.1*

Courant électrique ¬
- Accident dû au *W87.9!*
- Brûlure due au *W87.9!*
- Choc dû au *T75.4*
- Effets du *T75.4*

Courbure
- Estomac
- - Cours syndrome Lynch ¬ Carcinome
- - - Grande *C16.6*
- - - Petite *C16.5*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne
- - - Grande *C16.6*
- - - Petite *C16.5*
- - Type 1 ¬ Tumeur neuroendocrine familiale maligne
- - - Grande *C16.6*
- - - Petite *C16.5*
- - ¬
- - - Carcinome épidermoïde
- - - - Grande *C16.6*
- - - - Petite *C16.5*
- - - Carcinome héréditaire diffus
- - - - Grande *C16.6*
- - - - Petite *C16.5*
- - - Carcinome indifférencié
- - - - Grande *C16.6*

Courbure *–suite*
- Estomac *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Carcinome indifférencié *–suite*
- - - - Petite *C16.5*
- - - Linite plastique
- - - - Grande *C16.6*
- - - - Petite *C16.5*
- - - Tumeur neuroendocrine
- - - - Grande *C16.6*
- - - - Petite *C16.5*
- - - Tumeur stromale gastro-intestinale TSGI GIST
- - - - Grande *C16.6*
- - - - Petite *C16.5*
- Pénis (latérale) ¬ *Q55.6*

Couronne ¬ Anémie hypochrome congénitale sévère avec sidéroblastes en *D64.0*

Cousin
v./v.a. Maroteaux-Stanescu-Cousin
- ¬ Syndrome de *Q87.5*

Coussinet
- Absorbant
- - Postopératoire ¬
- - - Infection d'un *H59.8*
- - - Inflammation non infectieuse d'un *H59.8*
- - ¬ Endophtalmie associée à un *H59.8*
- Graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa] ¬ Hypertrophie du *M79.4*
- Phalanges [Knuckle pads] ¬ *M72.1*

Couteau ¬ Accident dû à: Coup de *W49.9!*

Couverture sociale et secours insuffisants ¬ *Z59*

COVID long ¬ *U09.9!*

COVID-19
v./v.a. post-COVID-19
- Exclu par un test de laboratoire négatif ¬ *Z03.8*
- Identifié par un test en laboratoire ¬ *U07.1!*
- Mère ¬ Nouveau-né affecté par une infection *P00.2*
- Négatif ¬ Test *Z03.8*
- Pneumonie ¬ Infection *J12.8, U07.2!*
- Virus
- - Identifié
- - - Associé à une pneumonie ¬ Infection au *J12.8, U07.1!*
- - - ¬
- - - - *U07.1!*
- - - - Complications de grossesse avec infection au *O98.5, U07.1!*
- - - - Grossesse avec infection au *O98.5, U07.1!*
- - Non identifié ¬
- - - *U07.2!*
- - - Grossesse avec infection au *O98.5, U07.2!*
- ¬
- - *U07.2!*

COVID-19 *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Antécédents personnels de *U08.9*
- - Choc anaphylactique dû au vaccin contre le *T88.6, U12.9!*
- - Choc cytokinique
- - - Adulte, temporellement associé au *U10.91*
- - - Enfant et l'adolescent, temporellement associé au *U10.90*
- - Complications de la grossesse avec infection *O98.5, U07.2!*
- - Effets secondaires indésirables de l'utilisation thérapeutique de vaccins contre le *U12.9!*
- - Grossesse avec infection *O98.5, U07.2!*
- - Infection *U07.2!*
- - MIS
- - - A [Syndrome inflammatoire multisystémique de l'adulte] temporellement associé au *U10.91*
- - - C [Multisystem inflammatory syndrome in children] temporairement associé au *U10.90*
- - Multisystem inflammatory syndrome in children temporairement associé au *U10.90*
- - Nécessité
- - - Immunisation contre le *U11.9*
- - - Vaccination contre le *U11.9*
- - Paediatric inflammatory multisystem syndrome temporairement associé au *U10.90*
- - PIMS [Paediatric inflammatory multisystem syndrome] temporairement associé au *U10.90*
- - Status post-infection *U09.9!*
- - Suspicion d'infection *U07.2!*
- - Syndrome
- - - Inflammatoire multisystémique chez l'adulte associé au *U10.91*
- - - Kawasaki-like
- - - - Adulte, temporellement associé au *U10.91*
- - - - Enfant, temporellement associé au *U10.90*
- - Vaccination prophylactique contre le *U11.9*

Cowden ¬ Syndrome de *Q85.8*

Cowper
v./v.a. Glande de Cowper

COX
- Cytochrome oxydase C] type franco-canadien ¬ Déficit en *G31.88*
- ¬ Myopathie mitochondriale avec déficit réversible en *G71.3*

Coxa
- Valga congénitale ¬ *Q65.8*
- Vara
- - Congénitale ¬ *Q65.8*
- - Péricardite [CACP] ¬ Syndrome de camptodactylie-arthropathie- *M12.80*

Coxa *–suite*
- Vara *–suite*
- - Retrosa) (non traumatique) ¬ Épiphysiolyse de la tête fémorale (*M93.0*

Coxa plana ¬ *M91.2*

Coxalgie
v./v.a. Pseudocoxalgie
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M01.15**

Coxarthrose
- Dysplasique
- - SAI ¬ *M16.3*
- - Unilatérale ¬ *M16.3*
- - ¬ Autres *M16.3*
- Origine dysplasique, bilatérale ¬ *M16.2*
- Post-traumatique
- - Bilatérale ¬ *M16.4*
- - SAI ¬ *M16.5*
- - Unilatérale ¬ *M16.5*
- Post-traumatiques ¬ Autres *M16.5*
- Primaire
- - Bilatérale ¬ *M16.0*
- - SAI ¬ *M16.1*
- - Unilatérale ¬ *M16.1*
- Primaires ¬ Autres *M16.1*
- Sans précision ¬ *M16.9*
- Secondaire
- - SAI ¬ *M16.7*
- - Unilatérale ¬ *M16.7*
- Secondaires
- - Bilatérales ¬ Autres *M16.6*
- - ¬ Autres *M16.7*

Coxiella burnetii ¬
- Endocardite à *A78†, I39.8**
- Infection *A78*

Coxite tuberculeuse ¬ *A18.0†, M01.15**

Coxitis tuberculosa [Ischiophthisis] ¬ *A18.0†, M01.15**

Coxo-auriculaire ¬ Syndrome *Q87.1*

COXPD10 ¬ *I42.2*

Coxsackie
v./v.a. Virus Coxsackie
- ¬
- - Infection SAI à virus: *B34.1*
- - Virus: *B97.1!*

CPEO de transmission maternelle ¬ *H49.4*

CPFE] ¬ Syndrome d'emphysème-fibrose pulmonaire combinés [*J84.10, J43.9*

CPPD familiale Maladie dépôt pyrophosphate calcium dihydraté
- Articulation
- - Coude ¬ *M11.12*
- - Genou ¬ *M11.16*
- Articulation de l'épaule ¬ *M11.11*
- Colonne vertébrale ¬ *M11.18*
- Main ¬ *M11.14*
- Pied ¬ *M11.17*
- Poignet ¬ *M11.13*

CPPD familiale Maladie dépôt pyrophosphate calcium dihydraté *–suite*
- Région pelvienne ¬ *M11.15*
- Sièges multiples ¬ *M11.10*
- ¬ *M11.19*

CPS1 ¬ Déficit en *E72.2*

CPT-1A ¬ Déficit en *E71.3*

CR3] ¬ Déficit en complexe récepteur de la membrane cellulaire [*D71*

Crabe) ¬ Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian- *A66.1*

CRAC ¬ Déficit immunitaire combiné par dysfonctionnement du canal *D81.8*

Crampe
- Chaleur ¬ *T67.2*
- Écrivain ¬
- - Névrose: professionnelle, y compris *F48.8*
- - Syndrome d'épilepsie rolandique-dystonie paroxystique induite par l'effort- *G40.08*
- Gastro-intestinale ¬ *R10.4*
- Généralisée ¬ *R56.8*
- Hypertrophie acrale ¬ Syndrome d'acanthosis nigricans-résistance à l'insuline- *Q87.8*
- Musculaires [HANAC] ¬ Syndrome héréditaire d'angiopathie-néphropathie-anévrismes- *Q28.88, Q61.8*
- Nageurs ¬ *T75.1*
- Spasme ¬ *R25.2*
- ¬ Syndrome myalgies-fasciculations- *G71.1*

Crandall ¬ Syndrome de *Q87.8*

Crâne
- Bifide héréditaire ¬ *Q75.8*
- Blessure intracrânienne ¬ Séquelles d'une fracture du *T90.2*
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ Fracture du *P13.0*
- Face
- - Mâchoire ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du *Q67.4*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des os du *Q75.9*
- - ¬
- - - Fractures d'autres os du *S02.8*
- - - Malformations congénitales précisées des os du *Q75.8*
- - - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: Os du *D16.4*
- Membraneux ¬ Retard d'ossification du *Q75.8*
- Os face
- - Partie non précisée ¬ Fracture du *S02.9*
- - ¬
- - - Fractures multiples du *S02.7*
- - - Séquelles d'une fracture du *T90.2*
- SAI ¬ Anomalie de: *Q75.9*
- Tête, non classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R93.0*
- Traumatisme obstétrical ¬ Autres lésions du *P13.1*

Crâne *–suite*
- Trèfle
- - Anomalies congénitales multiples ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Isolé ¬ *Q75.0*
- - ¬
- - - *S01.80*
- - - *T84.28*
- - Absence congénitale d'os du *Q75.8*
- - Anomalie de suture des os du *Q75.0*
- - Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du *K07.1*
- - Blessure ouverte du *S06.20, S01.83!*
- - Chondrosarcome de l'os du *C41.01*
- - Chordome de l'os du *C41.01*
- - Dépressions des os du *Q67.4*
- - Écrasement du *S07.1*
- - Fistule artério-veineuse durale du *Q28.21*
- - Fracture
- - - Base du *S02.1*
- - - Voûte du *S02.0*
- - Hyperostose
- - - *M85.2*
- - - Os autres que ceux du *M85.8*
- - Maladie de Paget du *M88.0*
- - Malformations artério-veineuses durales du *Q28.28*
- - Ostéoblastome des os du *D16.41*
- - Ostéosarcome de l'os du *C41.01*
- - Sarcome d'Ewing de la voûte du *C41.01*
- - Sarcome de l'os du *C41.01*
- - Syndrome de Paget juvénile, os du *M88.0*
- - Tératome du *D48.0*

Craniale ¬ Méningocèle *Q01.9*

Crânien
v./v.a. Nerf crânien
- Anencéphalie ¬ Hypoplasie *Q00.0*
- Congénitale avec anencéphalie ¬ Difformité *Q00.0*
- Forme de beignet avec fragilité osseuse ¬ Lésions de la voûte *Q78.8*
- Herpès zoster ¬ Névralgie *B02.2†, G53.0**
- Interne ¬ Hyperostose *M85.2*
- Liée à l'X ¬ Hyperostose de la voûte *M85.2*
- Sévère non ouverte ¬ Blessure *S06.20*
- Syndrome de Guillain-Barré ¬ Variant *G61.0*
- Teevan ¬ Fracture *S02.0*
- Type Pfeiffer ¬ Syndrome cardio- *Q87.8*
- ¬
- - Anévrisme de l'artère carotide extra- *I72.0*
- - Artérite *M31.6*
- - Hydrométingocèle *Q01*
- - Plaque *Z96.7*
- - Polynévrite *G52.7*
- - Retard de fermeture des sutures *P96.3*
- - Syndrome d'ostéopathie striée-sclérose *Q87.5*

Crânien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tératome de la cavité *D48.0*
- - Traumatisme *S09.9*
- - Tuberculose de la dure-mère *A17.0†, G01**

Cranio
v./v.a. acro-cranio-faciale
- Facio
- - Fronto-digital ¬ Syndrome *Q87.0*
- - Squelettique ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-syndrome *Q87.8*
- Métadiaphysaire type os wormien ¬ Dysplasie *Q78.8*
- ¬ Dysplasie fibreuse monostotique, *M85.08*

Cranio-carpo-tarsien ¬ Syndrome *Q87.0*

Cranio-cérébello-cardiaque ¬ Dysplasie *Q87.0*

Cranio-cérébral
- 1er degré ¬ Traumatisme *S06.0*
- 30 minutes
- - 24 heures ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.71!*
- - ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.70!*
- Couverte grave ¬ Compression du cerveau, hémorragie et pression cérébrale lors d'une lésion *S06.21, S01.83!*
- Durée non précisée ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.79!*
- Non ouvert ¬ Traumatisme *S06.9*
- Plus 24 heures
- - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.72!*
- - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.73!*
- ¬
- - Antécédents personnels de traumatisme *Z87.8*
- - Démence après une blessure *T90.9†, F02.8**
- - Perte connaissance
- - - 30 minutes
- - - - 24 heures lors d'un traumatisme *S06.9, S06.71!*
- - - - Lors d'un traumatisme *S06.9, S06.70!*
- - - Lors de traumatisme *S06.9, S06.79!*
- - - Plus 24 heures
- - - - Retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un traumatisme *S06.9, S06.72!*
- - - - Sans retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un traumatisme *S06.9, S06.73!*

Cranio-diaphysaire ¬ Dysplasie *M85.2*

Cranio-digital de Scott ¬ Syndrome *Q87.0*

Cranio-ectodermique ¬ Dysplasie *Q87.5*

Cranio-facial
- Anomalies

Cranio-facial *–suite*
- Anomalies *–suite*
- - Acrales, oculaires et cérébrales ¬ Hypopigmentation linéaire avec asymétrie *Q87.0*
- - Squelettiques cardiopathie trouble neurologique développement
- - - Mutation ponctuelle ¬ Syndrome de dysmorphie *Q87.0*
- - - ¬ Syndrome de dysmorphie *Q87.0*
- Cardiopathie congénitale-surdité ¬ Syndrome de fente labio-palatine-dysmorphie *Q87.0*
- Cryptorchidie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie *Q87.0*
- Hypogonadisme-diabète sucré ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphies *Q87.0*
- Hypotonie-cardiopathie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle autosomique dominante-anomalies *Q87.8*
- Petite taille-anomalies ectodermiques-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de dysplasie *Q87.0*
- Simosa ¬ Syndrome *Q87.0*
- Variables ¬ Syndrome de déplétion de l'ADN mitochondrial, forme encéphalomyopathique avec anomalies *G31.81, Q75.9*
- ¬
- - Conodysplasie *Q87.5*
- - Dysostose *Q75.1*
- - Dyssynostose *Q87.0*
- - Malformation *Q75.9*
- - Microsomie *Q87.0*
- - Syndrome
- - - Atrésie des choanes-surdité-cardiopathie-dysmorphie *Q87.8*
- - - Déficience intellectuelle-autisme-apraxie de la parole-dysmorphie *Q87.0*
- - - Surdité-syndrome *Q87.0*
- - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.41*
- - Tumeur maligne os
- - - *C41.01*
- - - Cartilage articulaire: *C41.01*

Cranio-facio-cubito-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Cranio-facio-digito-génital ¬ Syndrome *Q87.8*

Cranio-fronto-nasal
- Anomalie de Poland ¬ Syndrome de dysplasie *Q87.8*
- ¬ Dysplasie *Q75.1*

Cranio-lenticulo-suturale ¬ Dysplasie *Q75.8*

Cranio-métaphysaire ¬ Dysplasie *Q78.8*

Cranio-micromélique ¬ Syndrome *Q87.0*

Cranio-ostéo-arthropathie ¬ *M89.48*

Craniopages ¬ *Q89.4*

Cranio-pharyngien
v./v.a. Canal cranio-pharyngien
- ¬ Tumeur maligne: Tractus *C75.2*

Craniopharyngiome ¬ *D44.4*

Cranio-rachischisis ¬ *Q00.1*

Craniorhinie ¬ *Q30.8*

Craniosténose
- Dermatite sévère ¬ Syndrome d'agammaglobulinémie-microcéphalie- *D80.0*
- ¬ *Q75.0*

Craniosynostose
v./v.a. holoprosencéphalie-craniosynostose
- Anomalies anales-porokératose ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Aplasie radiale ¬ Syndrome de *Q75.0*
- Associé à ERF ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Cardiopathie congénitale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Coronale bilatérale ¬ *Q75.0*
- Fronto-pariétale non syndromique ¬ *Q75.0*
- Frontosphénoïdale unilatérale isolée ¬ *Q75.0*
- Herrmann-Opitz ¬ *Q87.0*
- Lambdoïde bilatérale non syndromique ¬ *Q75.0*
- Malformation de Dandy-Walker-hydrocéphalie ¬ Syndrome de *Q03.1, Q75.0*
- Métopique et sagittale non syndromique ¬ *Q75.0*
- Microrétrognathie-déficience intellectuelle sévère ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Multiple non syndromique ¬ *Q75.0*
- Squameuse unilatérale non syndromique ¬ *Q75.0*
- Syndromique liée
- - TCF12 ¬ *Q87.0*
- - ZIC1 ¬ *Q87.0*
- Type Boston ¬ *Q75.0*
- Unicoronale et sagittale non syndromique ¬ *Q75.0*
- ¬
- - *Q75.0*
- - Syndrome d'ostéosclérose-retard de développement- *Q87.5*

Craniotabès
- Cours de syphilis ¬ *A50.5*
- Nouveau-né ¬ *P96.3*

Cranio-télencéphalique ¬ Dysplasie *Q04.3*

Crapaud ¬ Peau de *E50.8†, L86**

CRASH [hypoplasie du corps calleux-retard mental-pouces en adduction-spasticité-hydrocéphalie] ¬ Syndrome *Q04.8*

C-réactive ¬ Augmentation pathologique du taux de protéine *R77.88*

Créatine
- Lié à l'X ¬ Déficit en transporteur de la *E88.8*
- Phosphokinase ¬ Elévation isolée asymptomatique de la *R74.8*
- ¬ Syndrome de déficit en *E72.8*

Crénelée ¬ Langue *K14.8*

Crépus
- Fil de fer) ¬ Maladie de: Menkes (cheveux *E83.0*
- ¬ Syndrome des cheveux *E83.0*

Crête
- Alvéolaire
- - Édentée
- - - Associées à un traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la *K06.2*
- - - Sans précision ¬ Affection de la gencive et de la *K06.9*
- - - ¬
- - - - Affections précisées de la gencive et de la *K06.8*
- - - - Atrophie de la *K08.2*
- - SAI ¬ Hypertrophie de la *K08.8*
- - ¬
- - - Irrégularité de la *K08.8*
- - - Muqueuse (de la *C03*
- Édentée (due à une prothèse) ¬ Hyperplasie par irritation de la *K06.2*
- Gingivale flottante ¬ *K06.8*
- Iliaque
- - Buchanan] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*
- - ¬ Exostose de la *M76.2*

Crête ¬ Pneumonie de *A78†, J17.8**

Crétinisme
- Endémique
- - Hypothyroïdien ¬ *E00.1*
- - Type
- - - Mixte ¬ *E00.2*
- - - Myxœdémateux ¬ *E00.1*
- - - Neurologique ¬ *E00.0*
- - ¬ *E00.9*
- Sans goitre ¬ *E00.9*
- ¬
- - *E00.9*
- - Myopathie dans le *E00.9†, G73.5**

Creutzfeldt-Jakob
- Acquise ¬ Maladie de *A81.0*
- ESB [Encéphalopathie spongiforme bovine] ¬ Forme atypique de la maladie de *A81.0*
- Héréditaire ¬ Maladie de *A81.0*
- Iatrogène] ¬ i-MCJ [Maladie de *A81.0*
- Variante] ¬ v-MCJ [Maladie de *A81.0*
- ¬
- - Démence de la maladie de *A81.0†, F02.1**
- - Maladie de *A81.0*
- - Psychose organique due à la maladie de *A81.0†, F02.1**

Creux
- Acquis ¬ Pied
- - *M21.60*
- - *M21.60*
- Atrophie optique-surdité neurosensorielle ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse-aréflexie-pieds *G11.8*

Creux *–suite*
- Valgus acquis ¬ Pied *M21.63*
- ¬
- - Pied *Q66.7*
- - Syndrome de télécanthus-hypertélorisme-strabisme-pied *Q87.8*

Creux axillaire ¬
- *L03.10*
- *S41.80*

Crevasses du mamelon associées à l'accouchement ¬ *O92.1*

Cri du chat ¬ Syndrome du *Q93.4*

Crico
- Aryténoïdien(ne) ¬ Articulation (ligament): *S13.5*
- Thyroïdien(ne) ¬ Articulation (ligament): *S13.5*

Cricoïde
- Épiglotte glotte larynx cartilage thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage *Q31.8*
- - ¬
- - Cartilage *S12.8*
- - Fissure (de): postérieure du cartilage *Q31.8*

Cricoïdien
v./v.a. rétro-cricoïdien

CRIE [Érythrodermie congénitale ichtyosiforme réticulaire] ¬ *Q80.3*

Crigler-Najjar ¬
- Ictère néonatal dû à un syndrome de *E80.5*
- Syndrome de *E80.5*

Crime, d'actes terroristes ou de tortures ¬ Victime d'un *Z65*

Crimée-Congo ¬ Fièvre hémorragique de *A98.0*

CRION [Neuropathie optique inflammatoire chronique récurrente] ¬ *H46*

Crise
- Addisonienne ¬ *E27.2*
- Astato-myocloniques ¬ Épilepsie avec: *G40.4*
- Asthme ¬ *J45.99*
- Audiogènes ¬ *G40.8*
- Blastique
- - Cours
- - - Leucémie myéloïde chronique [LMC] ¬ *C94.8!*
- - - Transformation ¬ Anémie réfractaire avec *C92.00*
- - Prolifération de blastes en transformation) ¬ Anémie réfractaire avec *C92.0*
- Complexes focales ¬ Épilepsie bénigne du nourrisson à *G40.08*
- Comportant pas de modification de conscience ¬ *G40.1*
- Convulsive) SAI ¬ *R56.8*
- Cyanose du nouveau-né ¬ *P28.2*

Crise *–suite*
- Épilepsie, une hypotonie, une cataracte et un retard de développement ¬ Syndrome létal de cardiomyopathie par non-compaction du ventricule gauche associé à des *G31.81*
- Épileptiforme au cours de cysticercose ¬ *B69.0†, G94.8**
- Épileptique
- - Facteur suivants
- - - Alcool ¬ *G40.5*
- - - Médicaments et drogues ¬ *G40.5*
- - - Modifications hormonales ¬ *G40.5*
- - - Privation de sommeil ¬ *G40.5*
- - - Stress ¬ *G40.5*
- - SAI ¬ *G40.9*
- Focales migratoires ¬ Épilepsie de la petite enfance avec *G40.4*
- Gastrique au cours de syphilis ¬ *A52.7†, K93.8**
- Généralisées
- - Déficience intellectuelle-obésité ¬ Syndrome d'hypomagnésémie primaire-*Q87.8*
- - Secondaires ¬ Épilepsie partielle bénigne du nourrisson avec *G40.1*
- Glaucomatocyclitiques ¬ Maladie à *H40.4*
- Grand mal
- - Réveil ¬ Épilepsie (avec): *G40.3*
- - Sans précision (avec ou sans petit mal) ¬ *G40.6*
- - ¬ Petit mal, sans précision, sans *G40.7*
- Hypertensive ¬
- - Excès apparent de minéralocorticoïdes avec *I15.11*
- - Néphropathie progressive avec hypertension autosomique dominante avec *I15.11*
- - Pseudoaldostéronisme avec *I15.11*
- - Pseudohyperaldostéronisme type
- - - 1 avec *I15.11*
- - - 2 avec *I15.11*
- - Pseudohypoaldostéronisme type
- - - 2 avec *I15.11*
- - - 2A avec *I15.11*
- - - 2B avec *I15.11*
- - - 2C avec *I15.11*
- - - 2D avec *I15.11*
- - - 2E avec *I15.11*
- - Syndrome
- - - Bilginturan avec *G90.71, Q73.8*
- - - Liddle avec *I15.11*
- Hypertoniques ¬ Dysréflexie autonome manifestée par des *G90.40*
- Induites
- - Miction ¬ *G40.8*
- - Orgasme ¬ *G40.8*
- - Praxis ¬ *G40.8*
- Initialement focales

Crise *–suite*
- Initialement focales *–suite*
- - Sans précision ¬ Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à *G40.09*
- - ¬ Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à *G40.08*
- Insuffisance surrénale ¬ *E27.2*
- Modification de conscience, comportant souvent des automatismes ¬ *G40.2*
- Myocloniques migrantes et continues ¬ Encéphalopathie progressive précoce avec *G40.4*
- Myoclonoastatiques ¬ Épilepsie avec *G40.4*
- Nocturnes autosomique dominante] ¬ ADNFLE [Épilepsie frontale à *G40.1*
- Non spécifique
- - Atoniques ¬ *G40.3*
- - Cloniques ¬ *G40.3*
- - Myocloniques ¬ *G40.3*
- - Tonico-cloniques ¬ *G40.3*
- - Toniques ¬ *G40.3*
- Partielles
- - Complexes
- - - Évoluant vers des crises secondairement généralisées ¬ *G40.2*
- - - ¬ Épilepsie
- - - - Bénigne partielle de l'enfant avec *G40.2*
- - - - Syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des *G40.2*
- - Simples
- - - Évoluant vers des crises secondairement généralisées ¬ *G40.1*
- - - ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec *G40.1*
- Réflexes à la lecture ¬ *G40.8*
- Secondairement généralisées ¬ crise partielles
- - Complexes évoluant vers des *G40.2*
- - Simples évoluant vers des *G40.1*
- Terreur] ¬ Épilepsie psychomotrice bénigne [*G40.02*
- Thyréotoxique aiguë ¬ *E05.5*
- Tonico-cloniques généralisées ¬ Syndrome de Poirier-Bienvenu avec *G40.3*
- Transpiration ¬ Dysréflexie autonome manifestée par des *G90.41*
- ¬
- - Anémie à hématies falciformes sans *D57.1*
- - État de *F43.0*
- - Maladie Hb-SS avec *D57.0*
- - Réaction aiguë (au) (de): *F43.0*

Crisponi
- Like associé à KLHL7 ¬ Syndrome de *Q74.3*
- ¬ Syndrome de *Q74.3*

Cristallin
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du *H28.8**
- Dystrophie choriorétinienne-myopie ¬ Syndrome d'ectopie du *Q15.8*
- Familiale ¬ Ectopie du *Q12.1*
- Mégalocornée ¬ Glaucome secondaire à une sphérophakie/ectopie du *Q15.8*
- Sans précision ¬
- - Affection du *H27.9*
- - Malformation congénitale du *Q12.9*
- Sphérophakie-raideur articulaire-petite taille] ¬ Syndrome GEMSS [glaucome-ectopie du *Q87.1*
- ¬
- - Affections précisées du *H27.8*
- - Anomalie congénitale du *Q12.9*
- - Calcification du *H26.88*
- - Colobome du *Q12.2*
- - Déplacement acquis du *H27.8*
- - Dépôt métallique dans le *H26.88*
- - Glaucome primaire capsulaire résiduel avec pseudo-exfoliation du *H40.10*
- - Inclusions pigmentaires dans le *H26.88*
- - Luxation congénitale du *Q12.1*
- - Luxation du *H27.1*
- - Malformations congénitales du *Q12.8*
- - Opacification d'un *T85.2*
- - Phacocèle [hernie du *H27.8*
- - Présence d'implants intraoculaires de *Z96.1*
- - Rétention ancienne corps étranger
- - - Magnétique dans: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: *H44.7*
- - Syndrome de blépharoptosis-myopie-ectopie du *Q15.8*
- - Syphilis du *A52.7†, H28.8**

Cristalline
- Bietti ¬ Dystrophie *H31.2*
- Corps vitré ¬ Opacités *H43.2*
- ¬
- - Miliaire *L74.1*
- - Myopathie distale tardive associée à l'alpha-B *G71.08*

Cristallinienne ¬ Glaucome
- Capsulaire avec pseudo-exfoliation *H40.10*
- Primitif capsulaire avec pseudo-exfoliation *H40.10*
- Pseudo-exfoliation *H40.10*

Cristallurie ¬ *R82.9*

Criswick-Schepens ¬ Syndrome de *H35.0*

Critique
- 4 jours
- - 7 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase *D70.13*
- - ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase *D70.10*

Critique *–suite*
- 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase *D70.14*
- 10 à moins de 20 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie: Phase *D70.11*
- 20 jours ou plus ¬ Agranulocytose et neutropénie: Phase *D70.12*

Crochu ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.17*

Crohn
- Entérite régionale
- - Côlon ¬ Maladie de *K50.1*
- - Duodénale ¬ Maladie de *K50.0*
- - Gros intestin ¬ Maladie de *K50.1*
- - Iléale ¬ Maladie de *K50.0*
- - Jéjunale ¬ Maladie de *K50.0*
- - Rectum ¬ Maladie de *K50.1*
- - ¬ Maladie de *K50*
- Gastrique ¬ Maladie de *K50.80*
- Gros intestin ¬ Maladie de *K50.1*
- Intestin grêle
- - Gros intestin ¬ Maladie de *K50.82*
- - ¬ Maladie de *K50.0*
- Œsophage
- - Tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments ¬ Maladie de *K50.82*
- - ¬ Maladie de *K50.81*
- Sans précision ¬ Maladie de *K50.9*
- ¬
- - Arthrite juvénile au cours de maladie de *K50.9†, M09.19**
- - Arthropathie au cours de maladie de *K50.9†, M07.49**
- - Formes de la maladie de *K50.88*

Croisé
v./v.a. Ligament croisé
- ¬
- - Cœur *Q24.8*
- - Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (*S83.7*
- - Polysyndactylie *Q70.4*
- - Ventricules *Q24.8*

Croissance
v./v.a. Retard de croissance
- Analogue insuline type 1 ¬ Retard de croissance
- - Déficit du facteur de *Q87.1*
- - Résistance au facteur de *E34.3*
- Développement osseux ¬ Autres troubles de la *M89.2*
- Épidermique] ¬ Lipodystrophie due à un déficit combiné en insuline, IGF1 [somatomédine-C] et EGF [facteur de *E88.1*
- Excessif
- - Associé à CHD8 ¬ Syndrome de *Q87.3*
- - Fœtus

Croissance *–suite*
- Excessif *–suite*
- - Fœtus *–suite*
- - - Trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de *O36.6*
- - - ¬ Soins maternels pour *O36.6*
- - Lié à DNMT3A ¬ Syndrome de *Q87.3*
- - Macrocéphalie-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.3*
- - Malan ¬ Syndrome de *Q87.3*
- - Mégalencéphalie-cyphoscoliose sévère ¬ Syndrome de *Q87.3*
- - Modelage métaphysaire réduit-dysplasie spondylaire ¬ Syndrome de *Q87.3*
- - Translocation 2q37 ¬ Syndrome de *Q87.3*
- - Tumeur de Wilms ¬ Syndrome de retard de développement-kystes pulmonaires- *C64, Q87.3*
- Fœtale retardée SAI ¬ *P05.9*
- Idiopathique ¬ Insuffisance (de): hormone de *E23.0*
- Intestin grêle ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l'hormone de *C17.9*
- Jéjunum ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l'hormone de *C17.1*
- Lente du fœtus, sans précision ¬ *P05.9*
- Lobe
- - Inférieur du poumon ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l'hormone de *C34.3*
- - Moyen du poumon ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l'hormone de *C34.2*
- - Supérieur du poumon ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l'hormone de *C34.1*
- Malnutrition ¬ Arrêt de *E45*
- Nourrisson ou de l'enfant ¬ Surveillance de la *Z00.1*
- Os longs rachis
- - Sans précision ¬ Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la *Q77.9*
- - ¬ Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la *Q77.8*
- Pancréas ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l'hormone de *C25.4*
- Poumon
- - Localisations contiguës ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l'hormone de *C34.8*
- - ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l'hormone de *C34.9*
- Rapide de l'enfance ¬ Examen à la période de *Z00.2*
- Ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la protéine de liaison du facteur de *R77.88*
- Segmentaire progressive avec hyperplasie fibroadipeuse ¬ Syndrome de *Q87.3*
- SRH] [GHRH] ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: «releasing factor» de l'hormone de *E16.8*
- Type

Croissance *–suite*
- Type *–suite*
- - IA ¬ Déficit congénital isolé en hormone de *E23.0*
- - IB ¬ Déficit congénital isolé en hormone de *E23.0*
- - II ¬ Déficit congénital isolé en hormone de *E23.0*
- - III ¬ Déficit congénital isolé en hormone de *E23.0*
- - ¬
- - Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de *D80.0*
- - Déficit congénital isolé en hormone de *E23.0*
- - Examen de l'adolescent en cours de *Z00.3*
- - Hypersécrétion de l'hormone de *E22.0*
- - Insuffisance (de): isolée en: hormone de *E23.0*
- - Petite taille par déficit en récepteur des secrétagogues de l'hormone de *E34.3*
- - Retard (de): *R62.8*

Crome ¬ Syndrome de *Q87.8*

Cronkhite-Canada ¬ Syndrome de *D12.6, Q82.8*

Cross ¬ Syndrome de: *E70.3*

Crosse
v./v.a. La Crosse
- Aortique cervicale ¬ *Q25.4*

Crosti] ¬ Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti- *L44.4*

Croup
- Bronchique ¬ *J20.9*
- Diphtérique ¬ *A36.2*
- ¬
- - Faux *J38.5*
- - Laryngite obstructive aiguë [*J05.0*

Croupal ¬ Asthme *J45.99*

Croûte lait
- Endogène ¬ *L20.8*
- ¬ *L21.0*

Crouzon ¬ Maladie de *Q75.1*

Croyances ¬ Vaccination non effectuée raison
- *Z28*
- *Z53*

CRPS
- Typ I ¬ Chronic regional pain syndrome [*G90.59*
- Type II membre
- - Inférieur ¬ Syndrome de douleur chronique localisée [*G90.61*
- - Supérieur ¬ Syndrome de douleur chronique localisée [*G90.60*

Cruchet
v./v.a. Von Economo-Cruchet

Crurale
v./v.a. Hernie crurale

Crurale *–suite*
- ¬ Teigne inguinale [teigne *B35.6*

Cruzi ¬ infection à Trypanosoma *B57*

Cryoglobulinémie
- Atteinte pulmonaire ¬ *D89.1†, J99.8**
- Essentielle ¬ *D89.1*
- Idiopathique ¬ *D89.1*
- Mixte ¬
- - *D89.1*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *D89.1†, N16.2**
- Primitive ¬ *D89.1*
- Secondaire ¬ *D89.1*
- ¬
- - *D89.1*
- - Glomérulonéphrite au cours de *D89.1†, N08.2**
- - Glomérulopathie au cours de *D89.1†, N08.2**
- - Pyélonéphrite au cours de *D89.1†, N16.2**
- - Troubles respiratoires au cours de *D89.1†, J99.8**

Cryoglobulinémique ¬
- Angéite [vascularite] *D89.1*
- Vascularite *D89.1*

Cryohydrocytose héréditaire
- Réduction de stomatine ¬ *D58.8*
- Stomatine normale ¬ *D58.8*

Cryptococcose
- Cérébrale ¬ *B45.1†, G05.2**
- Cerveau ¬ *B45.1†, G05.2**
- Cutané ¬ *B45.2†, L99.8**
- Disséminée ¬ *B45.78*
- Généralisée ¬ *B45.78*
- Méninges ¬ *B45.1†, G02.1**
- Méningo-cérébrale ¬ *B45.1†, G02.1**
- Osseuse ¬ *B45.3†, M90.29**
- Poumons ¬ *B45.0†, J99.8**
- Pulmonaire ¬ *B45.0†, J99.8**
- ¬
- - Encéphalite au cours de *B45.1†, G05.2**
- - Formes de *B45.8*
- - Maladie due au VIH avec *B20, B45.9*

Cryptococcus neoformans ¬ Infection à *B45.9*

Cryptocoques
- SIDA ¬ Méningite à *B20†, G02.1*, B45.1*
- ¬
- - Adrénalite à *B45.8*
- - Encéphalite à *B45.1†, G05.2**
- - Infection à *B45.9*
- - Lymphadénite à *B45.8*
- - Méningite à *B45.1†, G02.1**
- - Méningomyélite à *B45.1†, G05.2**
- - Myocardite à *B45.8*
- - Néphrite à *B45.8*
- - Parathyroïdite à *B45.8*

Cryptocoques *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pneumonie à *B45.0†, J17.2**
- - Septicémie à *B45.70*
- - Sialoadénite à *B45.8*
- - Thyroïdite à *B45.8*

Cryptogénique
- Début tardif ¬ Spasme *G40.8*
- POC
- - Exacerbation aiguë ¬ Pneumopathie organisée *J84.01*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Pneumopathie organisée *J84.00*
- ¬
- - Alvéolite fibreuse *J84.10*
- - CFA [Alvéolite fibrosante *J84.10*
- - Cirrhose (du foie): *K74.6*
- - Pneumopathie organisée *J84.00*

Cryptomicrotie-brachydactylie ¬ Syndrome de *Q17.2, Q73.8*

Cryptophtalmie
- Isolée ¬ *Q11.2*
- ¬ *Q11.2*

Cryptophtalmie-syndactylie ¬ Syndrome *Q87.0*

Cryptophtalmique ¬ Syndrome *Q87.0*

Cryptorchidie
- Arachnodactylie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Bilatérale ¬ *Q53.2*
- Dysplasie rénale ¬ Syndrome de torticolis-chéloïdes- *Q87.8*
- Hernie de Spiegel ¬ Syndrome de *K43.68, Q53.9*
- SAI ¬ *Q53.9*
- Sans précision ¬ *Q53.9*
- Unilatérale ¬ *Q53.1*
- ¬
- - Syndrome
- - - Déficience intellectuelle
- - - - Dysmorphie cranio-faciale- *Q87.0*
- - - - Hypotonie-brachycéphalie-sténose du pylore- *Q87.0*
- - - Lié à l'X de microcéphalie-retard de croissance-prognathisme- *Q87.8*
- - Tumeur maligne: *C62.0*

Cryptosporidiose ¬ *A07.2*

Cryptosporidium ¬
- Diarrhée à *A07.2*
- Entérite à *A07.2*
- Gastroentérite à *A07.2*
- Infection à *A07.2*
- Maladie due au VIH avec infection à *B20, A07.2*

Cryptostroma corticale ¬ Alvéolite due à *J67.60*

CSWS] [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] ¬ POCS [*G40.01*

CTLA-4 ¬ Syndrome lymphoprolifératif auto-immun dû à une haploinsuffisance de *D47.7*

CTNNB1 ¬ Syndrome *Q87.2*

CTPS1 ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en *D81.8*

CU [colite ulcéreuse] ¬ *K51.9*

Cubital
v./v.a. fémoro-péronéo-cubital
v./v.a. Nerf cubital
v./v.a. radio-cubital
- Luxation de la tête du radius ¬ Fracture proximale de la diaphyse *S52.21*
- Partie non précisée ¬ Fracture de la diaphyse *S52.20*
- Pied fendu ¬ Syndrome d'aplasie *Q73.8*
- Radiale ¬ Fracture des deux diaphyses, *S52.4*
- ¬
- - Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral *S53.42*
- - Hypertrichose *Q84.2*

Cubitale
v./v.a. Artère cubitale

Cubito
v./v.a. cranio-facio-cubito-rénal
- Carpien (palmaire) ¬ Ligament: *S63.3*
- Humérale ¬ Articulation *S53.1*

Cubito-mammaire ¬ Syndrome *Q87.8*

Cubitus
- Anomalies rénales ¬ Syndrome d'hypoplasie péroné- *Q87.8*
- Apophyse coronoïde du cubitus ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.02*
- Burns] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse inférieure du *M92.1*
- Court
- - Dysmorphie faciale-hypotonie musculaire-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - ¬ Syndrome de dysplasie spondylo-périphérique- *Q77.7*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypoplasie du *Q87.2*
- Olécrâne ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.01*
- Partie non précisée ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.00*
- Parties et parties multiples ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.09*
- Radius, combinée ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S52.6*
- SAI ¬
- - *S52.20*
- - Partie proximale du *S52.00*
- Valgus-dysmorphie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- ¬
- - Apophyse styloïde du *S52.8*
- - Extrémité inférieure du *S52.8*
- - Fracture
- - - Distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du *S52.31*

Cubitus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fracture *–suite*
- - - Partie supérieure du cubitus: Apophyse coronoïde du *S52.02*
- - Hypoplasie congénitale du *Q71.8*
- - Ostéoblastome du *D16.0*
- - Ostéochondrite juvénile du radius et du *M92.1*
- - Ostéosarcome du *C40.0*
- - Raccourcissement longitudinal du *Q71.5*
- - Sarcome d'Ewing du *C40.0*
- - Tête du *S52.8*

Cuboïde ¬ Fracture de l'os *S92.22*

Cucurbitacées ¬ Allergie aux *T78.1*

Cuir chevelu
- Cou ¬
- - Carcinoma in situ: Peau du *D04.4*
- - Mélanome
- - - In situ du *D03.4*
- - - Malin du *C43.4*
- - Nævus à mélanocytes du *D22.4*
- - Tumeur bénigne: Peau du *D23.4*
- - Tumeur maligne: Peau du *C44.4*
- Dermatophytie] ¬ Dermatophytose du *B35.0*
- Due traumatisme obstétrical
- - Sans précision ¬ Lésion du *P12.9*
- - ¬ Meurtrissure du *P12.3*
- Liée à une surveillance électronique continue ¬ Lésion du *P12.4*
- Toute partie] ¬ *T20*
- Traumatisme obstétrical ¬ Autres lésions du *P12.8*
- ¬
- - *L02.8*
- - *L03.8*
- - Angiosarcome du *C44.4*
- - Arrachement du *S08.0*
- - Carcinome à cellules de Merkel du *C44.4*
- - Carcinome lympho-épithélial-like de la peau du *C44.4*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans du *C44.4*
- - Dermatose pustuleuse érosive du *L30.8*
- - Favus du *B35.0*
- - Hypotrichose simple du *L65.8*
- - Lésion traumatique superficielle du *S00.0*
- - Mélanome malin familial du *C43.4*
- - Pachydermie vorticellée primaire essentielle du *Q82.8*
- - Plaie ouverte du *S01.0*
- - Teigne du *B35.0*

Cuisse
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.81*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.84*

Cuisse *–suite*
- Décollement sous-cutané (fermé) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.86*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.82*
- Hanche ¬ Ischémie traumatique des muscles de la *T79.61*
- Jambe, pied présent ¬ Absence congénitale de la *Q72.1*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la hanche et de la *T34.6*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de la hanche et de la *S78.9*
- SAI ¬ Plaie ouverte de la hanche et de la *S71*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - Hanche et de la *S79.9*
- - Superficielle de la hanche et de la *S70.9*
- ¬
- - *L03.11*
- - AO artériopathie oblitérante type
- - - *I70.29*
- - - Bassin et *I70.29*
- - Artériopathie oblitérante type
- - - *I70.29*
- - - Bassin et *I70.29*
- - Arthrite juvénile idiopathique associée aux enthésopathies, *M08.85*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: région pelvienne et *T84.14*
- - Contusion de la *S70.1*
- - Dysplasie fibreuse monostotique, *M85.05*
- - Écrasement
- - - *S77.1*
- - - Hanche et de la *S77.2*
- - Embolie artérielle de la *I74.3*
- - Fibrodysplasie ossifiante progressive, *M61.15*
- - Fibromatose pseudo-sarcomateuse, *M72.45*
- - Fracture ouverte de la *S72.9, S71.87!*
- - Gelure superficielle de la hanche et de la *T33.6*
- - Hétéroplasie osseuse progressive, *M61.55*
- - Kyste
- - - Osseux anévrismal de la *M85.55*
- - - Solitaire des os, *M85.45*
- - Lésion traumatique
- - - Multiples
- - - - Muscles et tendons au niveau de la hanche et de la *S76.7*
- - - - Nerfs au niveau de la hanche et de la *S74.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la *S75.7*

Cuisse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion traumatique *–suite*
- - - Muscle tendon
- - - - Adducteurs de la *S76.2*
- - - - Non précisés, au niveau de la *S76.4*
- - - - Postérieurs au niveau de la *S76.3*
- - - Nerf
- - - - Niveau de la hanche et de la *S74.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la hanche et de la *S74.9*
- - - - Sciatique au niveau de la hanche et de la *S74.0*
- - - Nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la *S74.2*
- - - Nerf fémoral au niveau de la hanche et de la *S74.1*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau de la hanche et de la *S75.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la hanche et de la *S75.9*
- - - Veine
- - - - Fémorale au niveau de la hanche et de la *S75.1*
- - - - Saphène interne au niveau de la hanche et de la *S75.2*
- - Lésions traumatiques
- - - Multiples de la hanche et de la *S79.7*
- - - Précisées de la hanche et de la *S79.8*
- - - Superficielles multiples de la hanche et de la *S70.7*
- - Liposarcome de la *C49.2*
- - Maladie de Still de l'adulte, *M06.15*
- - Mélorhéostose de la *M85.85*
- - Myosite
- - - Bactérienne, *M60.05*
- - - Éosinophile idiopathique, *M60.85*
- - - Focale, *M60.85*
- - - Fongique, *M60.05*
- - - Virale, *M60.05*
- - Nécrose avasculaire
- - - Idiopathique, *M87.05*
- - - Traumatique, *M87.25*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région pelvienne et *R02.05*
- - Ostéolyse massive de Gorham de la *M89.55*
- - Ostéomyélite multifocale chronique récurrente, *M86.35*
- - Ostéonécrose médicamenteuse, *M87.15*
- - Phlébite profonde de la *I80.28*
- - Phlébothrombose profonde de la *I80.28*
- - Plaie ouverte
- - - *S71.1*
- - - Multiples de la hanche et de la *S71.7*
- - Pyomyosite, *M60.05*
- - Séquelles de fracture de la *T93.1*
- - Syndrome

Cuisse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Felty, *M05.05*
- - - Oculo-urétro-synovial, *M02.35*
- - Synovite villonodulaire pigmentée, *M12.25*
- - Thrombophlébite profonde de la *I80.28*
- - Thrombose profonde de la *I80.28*

Cuivre
- Composés ¬ Effet toxique: *T56.4*
- Lié à l'X ¬ Déficit en *E83.0*
- ¬
- - Anémie associée à carence en: *D53.8*
- - Carence en *E61.0*
- - Cirrhose idiopathique associée au *K74.6*
- - Déficit familial bénin en *E83.0*
- - Intoxication au *T56.4*
- - Maladie de Charcot-Marie-Tooth axonale autosomique récessive due a un défaut du métabolisme du *G60.0*
- - Taux anormal de: *R79.0*

Cul-de-sac
- Douglas ¬ Tuberculose du *A18.1†, N74.1**
- Recto-utérin, comme rectum de remplacement ¬ Fistule entre le vagin et le *N82.80*

Culicosis bullosa ¬ *L13.8*

Culler-Jones ¬ Syndrome de *Q87.0*

Cultivateur ¬ Peau de: *L57.8*

Culture
- Positives ¬ *R82.7*
- Procédé biologie moléculaire ¬
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmée par examen microscopique de l'expectoration et par *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmée par examen microscopique de l'expectoration et par *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmée par examen microscopique de l'expectoration et par *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé par examen microscopique de l'expectoration et par *A15.0*
- - Tuberculose pulmonaire confirmée par *A15.1*

Culturel ¬ Choc *F43.2*

Cumming ¬ Campomélie type *Q87.8*

Cunéiforme
- Intermédiaire

Cunéiforme *–suite*
- Intermédiaire *–suite*
- - Latéral) (médian) ¬ Fracture: Os *S92.23*
- - ¬ Ostéochondrose juvénile de l'os *M92.6*
- Ostéoporotiques ¬ tassement vertébral et vertèbre *M80*
- SAI ¬ Vertèbre *M48.5*

Cunninghamella ¬ Infection à *B46.5*

CUP [Cancer of Unknown Primary] ¬ *C80.0*

Curatifs ¬ Exercices thérapeutiques et *Z50.1!*

Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne ¬ *Z51.82*

Currarino ¬ Syndrome de *Q42.9*

Curry-Jones ¬ Syndrome de *Q87.0*

Curschmann-Batten-Steinert ¬ Syndrome de *G71.1*

Curth-Macklin ¬ Ichtyose hystrix de *Q80.8*

Curtis
v./v.a. Fitz-Hugh-Curtis

Cushing
- Adénome du cortex surrénalien produisant du cortisol ¬ Syndrome de *D35.0, E24.8*
- Alcool ¬ Pseudosyndrome de *E24.4*
- Endogène ¬ Syndrome de *E24.9*
- Hyperplasie macronodulaire des surrénales ¬ Syndrome de *E24.8*
- Hypophyso-dépendante ¬ Maladie de *E24.0*
- Médicamenteux ¬ Syndrome de *E24.2*
- Production ectopique d'ACTH [hormone adrénocorticotrope] ¬ Syndrome de *E24.3*
- ¬
- - Hypersécrétion d'ACTH, non associée à la maladie de *E27.0*
- - Maladie de *E24.0*
- - Myopathie dans le syndrome de *E24.9†, G73.5**
- - Syndrome de *E24.9*
- - Syndromes de *E24.8*

Cushingoïde de sécrétion ectopique d'ACTH ¬ Syndrome *E24.3*

Cutané
v./v.a. Abcès cutané
v./v.a. cardio-facio-cutané
v./v.a. gastro-cutané
v./v.a. Nerf cutané
v./v.a. oculo-ostéo-cutané
v./v.a. œsophago-pleuro-cutané
v./v.a. recto-cutané
- Achromique
- - Lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.3*
- - Pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2*
- Aisselle ¬ Carcinome *C44.59*
- Anaplasique à grandes cellules ¬ Lymphome *C86.6*
- Anus et du rectum, par le virus de l'herpès ¬ Infection de la marge *A60.1*
- Articulaire infantile chronique] ¬ Syndrome CINCA [Syndrome neurologique, *M35.8*

Cutané *–suite*
- Bulleuse atrophiante et albo-papuloïde ¬ Dystrophie *Q81.2*
- Cellule T
- - Élastolytique ¬ Lymphome *C84.0*
- - Sans précision ¬ Lymphome *C84.8*
- Cellules pléomorphes de taille petite à moyenne CD4+ ¬ Lymphome T *C84.4*
- Cheveux laineux-hyperkératose palmoplantaire ¬ Syndrome de fragilité *Q82.8*
- Chronique ¬ Lupus érythémateux *L93.0*
- Cicatricielles de la pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2*
- Cinq ans après l'infection ¬ Pian *A66.2*
- Circonscrit ¬ Lymphangiome *D18.19*
- Colite létale ¬ Syndrome de photosensibilité *K52.8, L57.8*
- Collagène ¬ Vasculopathie *M35.8†, L99.8**
- Congénitale
- - Dermoïdes épibulbaires ¬ Syndrome d'aplasie *Q84.8, D31.4*
- - Hypoplasie de l'émail dentaire, un retard de développement et déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'aplasie *Q87.8*
- - Myopie ¬ Syndrome d'aplasie *Q84.8, Q15.8*
- - Précoce ¬ Syphilis *A50.0†, L99.8**
- Diagnostic et de sensibilisation ¬ Tests *Z01.5*
- Diffuse ¬
- - Mastocytose *Q82.2*
- - Sclérodermie systémique *M34.0*
- - Sclérose systémique *M34.0*
- Due à un syndrome de sensibilisation aux érythrocytes ¬ Hémorragie *D69.2*
- Dyschromique ¬ Amylose *E85.4†, L99.0**
- Dyschromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2*
- Entamoeba histolytica ¬ Infection *A06.7*
- Épidermotrope CD8+ d'évolution agressive ¬ Lymphome T *C84.5*
- Épisodes de lymphohistiocytose hémophagocytaire à début néonatal] ¬ Syndrome NOCARH [cytopénie-auto-inflammation-éruption *D76.1*
- Familial ¬ Collagénome *Q82.8*
- Familiale
- - Isolée ¬ Amylose *E85.4†, L99.0**
- - Syndrome de prédisposition au cancer oropharyngé ¬ Télangiectasie *L81.7*
- Gonococciques ¬ Lésions *A54.8*
- Grandes cellules de type jambe ¬ Lymphome *C83.3*
- Greffe-contre-hôte stade
- - 1 ¬ Maladie aiguë de rejet *T86.01†, L99.11**
- - 2 ¬ Maladie aiguë de rejet *T86.01†, L99.12**
- - 3 ¬ Maladie aiguë de rejet *T86.01†, L99.13**

Cutané *–suite*
- Greffe-contre-hôte stade *–suite*
- - 4 ¬ Maladie aiguë de rejet *T86.02†, L99.14**
- Hyperchromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées achromiques avec lésions *A67.3*
- Idiopathique ¬ Sarcomatose *C46.0*
- Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface *E88.21*
- Jessner ¬ Infiltration lymphocytaire *L98.6*
- Leucocytoclasique ¬ Angéite *M31.0*
- Lèvre ¬
- - Carcinome à cellules de Merkel de la face *C44.0*
- - Tumeur maligne: Face *C44.0*
- Limitée ¬ Sclérose systémique *M34.1*
- Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface *E88.20*
- LOC] ¬ Syndrome laryngo-onycho- *Q81.8*
- Locale
- - Staphylococcus aureus ¬ Infection *L08.9, B95.6!*
- - Staphylocoques ¬ Infection *L08.9, B95.8!*
- - Streptocoques ¬ Infection *L08.9, B95.5!*
- Lymphome SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus *C88.4*
- Maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (*A66.2*
- Maculeuse télangiectasique ¬ Mastocytose *Q82.2*
- Médicament ¬ Dermite de contact toxique par contact *L24.4*
- Médicamenteuse ¬ Embolie *T80.1*
- Mycobacterium ¬ Infection *A31.1*
- Néonatale ¬ Hémorragie *P54.5*
- Niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf sensitif *S54.3*
- Nodulaire ¬ Amylose *E85.4†, L99.0**
- Non
- - Précisés ¬ Troubles de la sensibilité *R20.8*
- - Spécifiques ¬ Rash et autres éruptions *R21*
- Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte *L89.1*
- Phénotype hermine ¬ Albinisme *E70.3*
- Précoces du pian ¬ Autres lésions *A66.2*
- Primitif
- - Cellule T
- - - CD30 positif ¬ Syndrome lymphoprolifératif *C86.6*
- - - Périphérique non spécifié ¬ Lymphome *C84.4*
- - Phénotype TCR gamma/delta ¬ Lymphome T *C84.5*

Cutané *–suite*
- Primitif *–suite*
- - ¬
- - - Lymphome T *C84.8*
- - - Lymphomes B centrofolliculaire *C82.6*
- Primitive
- - CD30+ ¬ Lymphoprolifération T *C86.6*
- - ¬ Plasmocytose *D47.9*
- Rampante ¬ Myiase *B87.0*
- Rare ¬ Lupus érythémateux *L93.0*
- Recherche
- - Hypersensibilité ¬ Tests (de): *Z01.5*
- - Maladie bactérienne ¬ Tests (de): *Z01.5*
- Récurrentes ¬ Hypotrichose héréditaire à vésicules *Q84.0, R23.8*
- Résiduelles ¬ Cicatrices hémorroïdaires *K64.4*
- SAI ¬ Ulcère
- - *L98.4*
- - Chronique *L98.4*
- Sous-cutané
- - Pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du tissu *E88.22*
- - Présence d'un corps étranger ¬ Granulome *L92.3*
- Spontanément régressive ¬ Mucinose *L98.5*
- Subaigu ¬ Lupus érythémateux *L93.1*
- Surcharge en fer ¬ Syndrome cérébro- *G31.88*
- Surdité-microtia syndrome ¬ Mastocytose *Q87.8*
- Tardive] ¬ PCT [Porphyrie *E80.1*
- Tuberculeux ¬ Ulcère *A18.4*
- Zone marginale ¬ Lymphome B *C83.0*
- ¬
- - Actinomycose *A42.8*
- - Albinisme *E70.3*
- - Amibiase *A06.7*
- - Amylose *E85.4†, L99.0**
- - Anesthésie *R20.0*
- - Anguillulose *B78.1†, L99.8**
- - Autosensibilisation *L30.2*
- - Bartonellose *A44.1*
- - Blastomycose *B40.3†, L99.8**
- - Calcinose *L94.2*
- - Carcinome neuroendocrine *C44.9*
- - Charbon *A22.0*
- - Chromomycose *B43.0†, L99.8**
- - Cicatrices et fibrose *L90.5*
- - Coccidioïdomycose *B38.3†, L99.8**
- - Corne *L85.8*
- - Cryptococcose *B45.2†, L99.8**
- - Diphtérie *A36.3*
- - Échec greffe mammaire
- - - Partie *T86.59*

Cutané *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Échec greffe mammaire *–suite*
- - - Sans partie *T86.84*
- - Érysipéloïde *A26.0*
- - Hypoesthésie *R20.1*
- - Leishmaniose *B55.1*
- - Listériose *A32.0*
- - Lymphome
- - - *C84.8*
- - - Centrofolliculaire *C82.6*
- - Maladie due au VIH avec éruption *B23.8, R21*
- - Mastocytome *Q82.2*
- - Mastocytose *Q82.2*
- - Modifications du tissu *R23.4*
- - Mucinose *L98.5*
- - Mucormycose *B46.3†, L99.8**
- - Myiase
- - - *B87.0†, L99.8**
- - - Plaies *B87.1*
- - Nécrose d'une greffe mammaire avec partie *T86.51*
- - Nocardiose *A43.1*
- - Paresthésie *R20.2*
- - Perte d'une greffe mammaire avec partie *T86.52*
- - Peste *A20.1*
- - Pigmentation réticulée liée à l'X associée à une amylose *Q82.8, E85.4*
- - Porphyrie hépato- *E80.1*
- - Pseudolymphome *L98.8*
- - Rejet
- - - Greffe mammaire
- - - - Partie *T86.59*
- - - - Sans partie *T86.84*
- - - Mammoplastie
- - - - Augmentation
- - - - - Partie *T86.59*
- - - - - Sans partie *T86.84*
- - - - Lambeau pectoro-mammaire avec partie *T86.59*
- - - - Partie
- - - - - *T86.59*
- - - - - *T86.84*
- - - - Plastie de glissement sans partie *T86.84*
- - Syndrome
- - - Ataxie cérébelleuse-déficience intellectuelle-atrophie optique-anomalies *G11.1*
- - - CAMOS [ataxie cérébelleuse, déficience intellectuelle, atrophie optique, anomalies *G11.1*
- - - Déficience intellectuelle-obésité-prognathisme-anomalies oculaires et *Q87.8*
- - - Dysplasie ectodermique
- - - - Fragilité *Q81.0*

Cutané *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Dysplasie ectodermique *–suite*
- - - - Hyperhidrose-syndactylie *Q82.8*
- - - - Pili torti-syndactylie *Q82.8*
- - - Nerf fémoro- *G57.1*
- - Troubles circulatoires d'une greffe mammaire avec partie *T86.50*
- - Vascularite des petits vaisseaux *M31.0*
- - Xérosis *L85.3*

Cutanéo
v./v.a. facio-cutanéo-squelettique
- Muqueux
- - Maladie de Kawasaki] ¬ Syndrome adéno- *M30.3*
- - ¬ Autres infections virales précisées, caractérisées par des lésions *B08.8*
- Oculaire ¬ Albinisme: *E70.3*

Cutanéoméningospinale ¬ Angiomatose *Q27.3*

Cutanéo-muqueux
- Chronique ¬ Candidose *B37.88*
- ¬
- - Bartonellose *A44.1*
- - Hyalinose *E78.88*
- - Leishmaniose *B55.2*
- - Syphilis congénitale précoce *A50.0*

Cutibacterium ¬ Bactériémie à *A49.87*

Cutis
- Laxa
- - Acquise ¬ *L98.8*
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *Q82.8*
- - - Récessive type
- - - - 1 ¬ *Q82.8*
- - - - 1C ¬ *Q82.8*
- - - - 2 ¬ *Q82.8*
- - - - 2A ¬ *Q82.8*
- - - - 2B ¬ *Q82.8*
- - Congenita [Cutis laxa hyperelastica] [Cutis laxa (hereditaria)] ¬ *Q82.8*
- - Hereditaria)] ¬ Cutis laxa congenita [Cutis laxa hyperelastica] [*Q82.8*
- - Hyperelastica
- - - Cutis laxa (hereditaria)] ¬ Cutis laxa congenita [*Q82.8*
- - - ¬ *Q82.8*
- - Hyperlaxité ligamentaire-retard de développement ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - Néonatale-habitus marfanoïde ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Scoliose] ¬ Syndrome MACS [macrocéphalie-alopécie- *Q82.8*
- - Senilis ¬ *L57.4*
- Marmorata telangiectatica
- - Congenita ¬
- - - *Q27.8*

Cutis *–suite*
- Marmorata telangiectatica *–suite*
- - Congenita ¬ *–suite*
- - - Syndrome
- - - - Macrocéphalie- *Q87.3*
- - - - Mégalencéphalie- *Q87.3*
- - Congenitale] ¬ Syndrome de Van Lohuizen [*Q27.8*
- Rhomboidalis ¬ *L57.2*
- Verticis gyrata primitif non essentiel ¬ *Q82.8*

CVDA
- Cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène] ¬ *I42.80*
- ¬ Cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène [*I42.80*

CVID [Common variable immunodeficiency] ¬ *D83.9*

Cyanocobalamine ¬ Carence en: *E53.8*

Cyanopsie ¬ *H53.5*

Cyanose
- Entérogène [méthémoglobinémie acquise] ¬ *D74.8*
- Nouveau-né ¬ Crises de *P28.2*
- ¬ *R23.0*

Cyanure
- Hydrogène ¬ Effet toxique: *T57.3*
- ¬
- - Effet toxique du *T65.0*
- - Intoxication par le *T65.0*
- - Parkinsonisme-dystonie par intoxication au *G21.2*

Cyclase 2C ¬
- Diarrhée infantile chronique par hyperactivité de la guanylate *K52.8*
- Iléus méconial par déficit en guanylate *P76.0*

Cycle
- Gamma-glutamyl ¬ Trouble du *E72.8*
- Menstruel
- - Dépendante ¬ Fièvre récurrente *N94.8*
- - Irrégulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec *N92.1*
- - Régulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec *N92.0*
- - Sans précision ¬ Affection des organes génitaux de la femme et du *N94.9*
- - ¬ Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du *N94.8*
- Méthionine ¬ Trouble du métabolisme du *E72.1*
- Urée et de la détoxification de l'ammoniac ¬ Trouble du métabolisme du *E72.2*
- Uréogenèse ¬ Anomalies du *E72.2*
- Veille sommeil
- - Anormal ¬ *Z91.8*
- - ¬ Troubles du *G47.2*

Cyclique ¬
- Agranulocytose *D70.5*
- Neutropénie *D70.5*

Cyclique ¬ *–suite*
- Schizophrénie *F25.2*

Cyclite
- Aiguë, subaiguë ou à répétition ¬ *H20.0*
- Hétérochrome] ¬ Syndrome de Fuchs III [*H20.8*
- Postérieure ¬ *H30.2*

Cyclitique] ¬ Syndrome de Posner-Schlossmann [glaucome *H40.4*

Cyclodésaminase ¬ Déficit en formiminotransférase *E70.8*

Cyclohexane ¬ Solvants du groupe: *L24.2*

Cyclohydrolase I ¬ Déficit en GTP *E70.1*

Cycloïde
- Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ Psychose *F23.0*
- Symptômes schizophréniques ¬ Psychose *F23.1*
- ¬ Personnalité: *F34.0*

Cyclopie ¬ *Q87.0*

Cyclosporose ¬ *A07.3*

Cyclothymie ¬ *F34.0*

Cyclothymique ¬ Personnalité: *F34.0*

Cyclotropie ¬ *H50.4*

Cygne ¬ Déformation en boutonnière et en col de *M20.0*

Cylindres dans les urines ¬ Cellules et *R82.9*

CYP11A1 ¬
- Différence du développement sexuel 46,XY-insuffisance surrénalienne par déficit en *E25.08*
- Insuffisance surrénalienne héréditaire isolée par déficit partiel en *E27.1*

CYP11B2 ¬ Déficit en aldostérone synthase non lié à *E27.4*

Cyphoscoliose
- Atrophie de la langue-paraplégie spastique héréditaire ¬ Syndrome de *G11.4*
- Problèmes d'ouïe ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos de type *Q79.6*
- Sévère ¬ Syndrome de croissance excessive-mégalencéphalie- *Q87.3*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - *M41*
- - Cardiopathie due à *I27.1*
- - Syndrome de microcéphalie-brachydactylie- *Q87.8*

Cyphoscoliotique
- Déficit
- - FKBP22 ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*
- - Lysyl hydroxylase 1 ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*
- ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Cyphose
- Atrophie de la langue-myopathie myofibrillaire ¬ Syndrome de *G71.8*
- Congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*

Cyphose *–suite*
- Épiphyses hypoplasiques en forme de cône et dysmorphie faciale ¬ Syndrome de petite taille avec *Q87.1*
- Irradiation ¬ *M96.2*
- Juvénile de Scheuermann familiale ¬ *M42.09*
- Laminectomie ¬ *M96.3*
- Non précisées ¬ *M40.2*
- Posturale ¬ *M40.0*
- Secondaires ¬ Autres *M40.1*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.5†, M49.39**
- Tant que conséquence tardive du rachitisme ¬ *E64.3, M40.19*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-cataracte- *Q87.8*

Cystadénocarcinome
- Biliaire ¬ *C22.1*
- Endométrioïde
- - Femme ¬ *C56*
- - Ovaire ¬ *C56*
- Mucineux
- - Col du pancréas ¬ *C25.7*
- - Corps du pancréas ¬ *C25.1*
- - Localisations contiguës du pancréas ¬ *C25.8*
- - Ovaire ¬ *C56*
- - Pancréas ¬ *C25.9*
- - Queue du pancréas ¬ *C25.2*
- - Tête du pancréas ¬ *C25.0*
- Papillaire de l'ovaire ¬ *C56*
- Pseudo-mucineux de l'ovaire ¬ *C56*
- Séreux
- - Col du pancréas ¬ *C25.7*
- - Corps du pancréas ¬ *C25.1*
- - Localisations contiguës du pancréas ¬ *C25.8*
- - Pancréas ¬ *C25.9*
- - Queue du pancréas ¬ *C25.2*
- - Tête du pancréas ¬ *C25.0*

Cystadénome
- Cellules acineuses du pancréas ¬ *D13.6*
- Colloïde ¬ *D27*
- Mucineux
- - Ovaire à la limite de la malignité ¬ *C56*
- - ¬ *D27*
- Ovarien
- - Enfant ¬ *D27*
- - ¬ *D27*
- Pancréatique ¬ *D13.6*
- Voies biliaires intrahépatiques ¬ *D13.4*

Cystathionase
v./v.a. gamma-cystathionase
- ¬ Déficit en *E72.1*

Cystathionine
- Bêta-synthase ¬
- - Déficit en *E72.1*

Cystathionine *–suite*
- Bêta-synthase ¬ *–suite*
- - Homocystinurie par déficit en *E72.1*
- Gamma-lyase ¬ Déficit en *E72.1*
- ¬ Trouble du métabolisme de la *E72.1*

Cystathioninémie ¬ *E72.1*

Cystathioninurie ¬ *E72.1*

Cystéine ligase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en glutamate- *D55.1*

Cystic eyeball ¬ *Q11.0*

Cysticercose
- Cérébrale ¬ *B69.0†, G94.8**
- Localisations ¬ *B69.8*
- Oculaire ¬ *B69.1†, H45.1**
- Œil ¬ *B69.1†, H45.1**
- Sans précision ¬ *B69.9*
- Système nerveux central ¬ *B69.0†, G99.8**
- ¬
- - Crise épileptiforme au cours de *B69.0†, G94.8**
- - Endophtalmie au cours de *B69.1†, H45.1**
- - Épilepsie au cours de *B69.0†, G94.8**
- - Myosite au cours de *B69.8†, M63.19**

Cysticercus cellulosae ¬ Infection à *B69.9*

Cystine ¬ Hyperaminoacidurie provoquée par la *E72.0*

Cystinique ¬
- Calcul *E72.0†, N22.8**
- Diathèse *E72.8*
- Thésaurismose *E72.0†, N29.8**

Cystinose
- Maligne ¬ *E72.0*
- ¬
- - *E72.0*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *E72.0†, N16.3**
- - Néphrosclérose au cours de *E72.0†, N29.8**
- - Pyélonéphrite au cours de *E72.0†, N16.3**

Cystinurie
- Type
- - A ¬ *E72.0*
- - B ¬ *E72.0*
- ¬
- - *E72.0*
- - Syndrome de microdélétion 2p21 sans *Q93.5*

Cystinurie-lysinurie ¬ Syndrome de *E72.0*

Cystique
v./v.a. Canal cystique
- ¬
- - Canal: *C24.0*
- - Duplication du canal: *Q44.5*

Cystite
- Aiguë ¬ *N30.0*
- Allergique ¬ *N30.88*
- Amibienne ¬ *A06.8†, N33.8**

Cystite *–suite*
- Bactérienne ¬ *N30.88*
- Bulleuse ¬ *N30.88*
- Candida ¬ *B37.4†, N33.8**
- Chlamydia ¬ *A56.0*
- Chroniques ¬ Autres *N30.2*
- Colibacillaire ¬ *N30.88, B96.2!*
- Diphtérique ¬ *A36.8†, N33.8**
- Due
- - Amibes ¬ *A06.8†, N33.8**
- - Irradiation ¬ *N30.4*
- Éosinophile ¬ *N30.88*
- Gangréneuse ¬ *N30.88*
- Granulomateuse
- - Kystique ¬ *N30.88*
- - ¬ *N30.88*
- Interstitielle
- - Chronique ¬ *N30.1*
- - ¬ *N30.1*
- Intramurale ¬ *N30.88*
- Kystique ¬ *N30.88*
- Parenchymateuse] ¬ Pancystite [*N30.88*
- Sans précision ¬ *N30.9*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, N33.8**
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N33.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N33.0**
- Ulcéreuse ¬ *N30.88*
- Urétrite ¬ avec *N21*
- ¬
- - *N30.8*
- - Prostato- *N41.3*
- - Urétéro- *N30.88*

Cystocèle
- Urétrocèle ¬ *N81.1*
- ¬ *N81.1*

Cystoïde
- Héréditaire dominant ¬ Œdème maculaire *H35.5*
- Multiple
- - Type
- - - Fleischner ¬ Ostéite *D86.8*
- - - Jüngling ¬ Ostéite *D86.8*
- - ¬ Ostéite *D86.8*
- ¬ Dystrophie maculaire *H35.5*

Cystosarcome
- Phyllode
- - Malin ¬ *C50.9*
- - Tumeur de Brodie] ¬ *D48.6*
- Phylloïde bénin ¬ *D24*

Cystostomie ¬
- *Z93.5*
- Surveillance de *Z43.5*

Cytarabine ¬ *T45.1*

Cytochrome
- Oxydase C

Cytochrome *–suite*
- Oxydase C *–suite*
- - Type franco-canadien ¬ Déficit en COX [*G31.88*
- - ¬ Cardio-encéphalo-myopathie fatale infantile par déficit en *G31.81*
- P450 oxydoréductase ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en *E25.08*

Cytokine
- Cytokine release syndrome] ¬ Syndrome de libération de *D76.4*
- Immunothérapie ¬ Syndrome de libération de *D76.4*
- Lié au traitement par cellules CAR-T ¬ Syndrome de libération de *D76.4*
- ¬
- - Hypersensibilité aux *T88.7*
- - Syndrome de libération de *D76.4*

Cytokine release syndrome] ¬ Syndrome de libération de cytokines [*D76.4*

Cytokinique
- Adulte, temporellement associé au COVID-19 ¬ Choc *U10.91*
- Enfant et l'adolescent, temporellement associé au COVID-19 ¬ Choc *U10.90*

Cytologique
- Anormal du liquide céphalorachidien ¬ Résultat *R83.6*
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.2*
- Histologique des urines ¬ Résultats anormaux de l'examen *R82.8*

Cytomégalie
- Congénitale] ¬ Syndrome de Wyatt [*P35.1*
- ¬ Maladie
- - Due au VIH avec *B20, B25.9*
- - Reins au cours de *B25.88†, N29.1**
- - Urètre au cours de *B25.88†, N29.1**
- - Vessie au cours de *B25.88†, N33.8**

Cytomégalique ¬ Hypoplasie surrénalienne congénitale *Q89.1*

Cytomégalovirus
- Appareil digestif ¬ Infection à *B25.80*
- Lors d'une immunité à médiation cellulaire limitée ¬ Infection à *B25.9, D84.9*
- Sujet immunocompétent ¬ Infection disséminée à *B25.88*
- VIH positif ¬ Décollement de la rétine au cours de rétinite à CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*
- ¬
- - Adrénalite à *B25.88†, E35.1**
- - Angéite à *B25.88*
- - Bronchiolite à *J21.8*
- - Cholangite à *B25.88†, K93.8**
- - Colite
- - - *B25.80†, K93.8**
- - - Due à un *B25.80†, K93.8**
- - Dermite à *B25.88†, L99.8**

Cytomégalovirus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Duodénite
- - - *B25.80†, K93.8**
- - - Due à un *B25.80†, K93.8**
- - Encéphalomyélite à *B25.88†, G05.1**
- - Entérite à *B25.80†, K93.8**
- - Entérocolite à *B25.80†, K93.8**
- - Épendymite à *B25.88†, G05.1**
- - Gastrite
- - - *B25.80†, K93.8**
- - - Due à un *B25.80†, K93.8**
- - Glomérulonéphrite à *B25.88†, N08.0**
- - Glossite à *B25.88†, K93.8**
- - Hépatite à *B25.1†, K77.0**
- - Hypophysite à *B25.88†, G05.1**
- - Iléite due à un *B25.80†, K93.8**
- - Infection congénitale à *P35.1*
- - Jéjunite à *B25.80†, K93.8**
- - Maladie
- - - Due VIH
- - - - Récidive de rétinite à CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*
- - - - Rétinite à CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*
- - - Rénale tubulo-interstitielle à *B25.88†, N16.0**
- - Maladies à *B25.88*
- - Mononucléose à *B27.1*
- - Myosite à *B25.88†, M63.29**
- - Œsophagite due à un *B25.80†, K23.8**
- - Pancréatite à *B25.2†, K87.1**
- - Parathyroïdite à *B25.88†, E35.8**
- - Pharyngite à *J02.8, B97.8!*
- - Pneumonie à *B25.0†, J17.1**
- - Proctite à *B25.80†, K93.8**
- - Prostatite à *B25.88†, N51.0**
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par: *O35.3*
- - Thyroïdite à *B25.88†, E35.0**
- - Urétrite à *B25.88†, N37.0**
- - Vasculite à *B25.88*
- - Vésiculite à *B25.88†, N51.8**

Cytopathie mitochondriale ¬ *G31.81*

Cytopénie
- Auto-inflammation-éruption cutanée-épisodes de lymphohistiocytose hémophagocytaire à début néonatal] ¬ Syndrome NOCARH [*D76.1*
- Clonale de signification indéterminée ¬ *U62.01!*

Cytophagique ¬ Panniculite histiocytaire *M35.8*

Cytoplasme des polynucléaires neutrophiles] ¬ Glomérulonéphrite pauci-immune avec ANCA [Anticorps anti- *N01.7*

Cytoplasmiques anti-neutrophiles dirigés contre la myéloperoxydase ¬ Détection d'anticorps *R76.88*

Cytosolique
- Groupement méthyle ¬ Anomalie du transfert *E72.1*
- ¬ Anomalie plaquettaire associée à PLA2G4A [phospholipase-A2 alpha *D69.1*

Cytostatique
- Maladies non malignes ¬ Traitement *Z51.2*
- Néoplasie) ¬ Lyse (spontanée) des tumeurs (après traitement *E88.3*
- ¬
- - Anémie lors de trouble de l'hématopoïèse dû à une lésion toxique directe de la moelle osseuse corrélée à la dose due à des *D61.10*
- - Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement *D61.10*
- - Leucopénie après un traitement *D70.19*

Cytostéatonécrose du sein ¬ *N64.1*

Cytotoxicité spontanée des cellules Natural Killer ¬ Déficit immunitaire primaire autosomique récessif avec un défaut de *D84.8*

Cytotoxique ¬
- Alopécie due à un médicament *L65.8*
- Hypotrichose due à un médicament *L65.8*
- Médicaments *P04.1*

Czarny-Ratajczak ¬ Dysplasie spondylo-métaphysaire type *Q77.7*

Czeizel-Losonci ¬ Syndrome de *Q87.8*

D-2-hydroxyglutarique ¬
- Acidémie *E72.8*
- Acidurie *E72.8*
- Chondromatose métaphysaire avec acidurie *Q78.4, E72.8*

Da Silva
v./v.a. Richieri-Costa-da Silva

Dacryoadénite
- Sialadénite à IgG4 ¬ *K11.8*
- ¬ *H04.0*

Dacryocèle ¬ *H04.6*

Dacryocystite
- Chronique ¬ *H04.4*
- Néonatales ¬ Conjonctivite et *P39.1*
- Ostéopoïkilose ¬ Syndrome de *Q78.8, H04.3*
- Phlegmoneuse) aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ *H04.3*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.0†, H06.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, H06.0**

Dacryolithe ¬ *H04.5*

Dacryopéricystite aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ *H04.3*

Dacryops ¬ *H04.1*

Dactylite
- Syphilitique ¬ *A52.7†, M90.19**
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M90.09**

Dahlberg ¬ Syndrome de *Q87.8*

Dahlberg-Borer-Newcomer ¬ Syndrome de *Q87.8*

Daim ¬ Fièvre (de): mouche du *A21*

Daltonisme ¬ *H53.5*

Dana ¬ Syndrome de *D51.3†, G32.0**

Danbolt ¬ Syndrome de *E83.2*

Dandy-Walker
- Anomalies des ganglions de la base-convulsions ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-malformation de *Q87.8*
- Cataracte ¬ Syndrome d'amyotrophie spinale-malformation de *G12.8†, H28.2*, Q03.1*
- Hydrocéphalie ¬ Syndrome de craniosynostose-malformation de *Q03.1, Q75.0*
- Isolée avec hydrocéphalie ¬ Malformation de *Q03.1*
- Polydactylie postaxiale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬ Syndrome
- - *Q03.1*
- - Dysmorphie-macrocéphalie-myopie-malformation de *Q87.8*

Danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un *F62.0*

Dangereuses nuisibles ¬ Recherche acceptation intervention
- Comportementales et psychologiques connues comme *Z64.8*

Dangereuses nuisibles ¬ Recherche acceptation intervention *–suite*
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme *Z64.8*

Danlos
v./v.a. Ehlers-Danlos

Darier
- Roussy ¬ Sarcoïde de *D86.3*
- ¬ Maladie de *Q82.8*

Darier-White ¬
- Kératose folliculaire *Q82.8*
- Maladie de *Q82.8*

Dauber ¬ Nanisme microcéphalique primordial type *Q87.1*

DAVID [insuffisance anténypophysaire-déficit immunitaire variable] ¬ Syndrome *D83.0, E23.0*

Davies ¬ Maladie de *I42.3*

Davignon-Chauveau ¬ Dystrophie musculaire congénitale, *G71.2*

Dawson ¬ Encéphalite
- *A81.1*
- Subaiguë à inclusions de *A81.1*

Day
v./v.a. Riley-Day

DBH [opamine bêta-hydroxylase] ¬ Déficit en *G90.88*

DCB] ¬ Dégénérescence corticobasale [*G31.0†, F02.0**

DCI
- Défibrillateur cardioverteur implantable] ¬ Infection liée à un système *T82.70*
- ¬ Infection due à un défibrillateur cardioverteur implanté [*T82.70*

DCLRE1C ¬ Immunodéficience combinée sévère due au déficit en *D81.1*

DCMA ¬ Syndrome *E71.1†, I43.1**

DDOD [surdité-onychodystrophie autosomique dominant] ¬ Syndrome *Q87.8*

De Barsy
- Associé
- - ALDH18A1 ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - PYCR1 ¬ Syndrome de *Q82.8*
- ¬ Syndrome de *Q82.8*

De Cock
v./v.a. Grubben-de Cock-Borghgraef

De Morsier
v./v.a. Kallmann-De Morsier

De Morton Mobility Index
- 0-30 points ¬ DEMMI [*U53.31*
- 33-36 points ¬ DEMMI [*U53.21*
- 39-53 points ¬ DEMMI [*U53.11*
- 57-100 points ¬ DEMMI [*U53.01*

De Vries
v./v.a. Gabriele-de Vries
v./v.a. Koolen-De Vries

Deardorff
v./v.a. Skraban-Deardorff

Débarquement ¬ Mal de *H81.8*

Débilité
v./v.a. Pseudodébilité

Débilité *–suite*
- Congénitale SAI ¬ *P96.9*
- Mentale SAI ¬ *F79*
- Motrice de l'enfant ¬ *F82*
- ¬ *F70*

Débit ¬ Insuffisance cardiaque à haut *I50.9*

Débranchante ¬ GSD par déficit en enzyme *E74.0*

Débranchement ¬ Déficit en enzymes de *E74.0*

Debré
v./v.a. De-Toni-Debré-Fanconi
v./v.a. Kocher-Debré-Semelaigne
- Fanconi ¬ Syndrome Toni
- - *E72.0*
- - *E72.0*
- ¬ Syndrome de *A28.1*

Débutante
- Oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme *M08.3*
- ¬ Occlusion de la veine de la rétine (d'une): *H34.8*

Decalvans de Siemens ¬ Kératose folliculaire spinulosa *Q82.8*

Décalvante
- Quinquaud ¬ Folliculite *L66.2*
- ¬ Folliculite *L66.2*

Décapitation ¬ *S18*

Décarboxylase
- Orotidylique ¬ Déficit en *E79.8*
- ¬ Déficit
- - *E71.0*
- - Malonyl-CoA *E72.8*

Décès
- Anesthésie en tant que complication de l'accouchement ¬ *O74.9*
- Mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité ¬ *O95*
- On sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue ¬ *R96.1*
- SAI ¬ *R99*
- Sans
- - Signe de maladie ¬ *R96.1*
- - Témoin ¬ *R98*
- Supposé) d'un membre de la famille ¬ Disparition ou *Z63*
- Survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication ¬ *R96.1*
- ¬ Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de *R98*

Dechaume
v./v.a. Bonnet-Dechaume-Blanc

Déchaussement dentaire ¬ *K08.88*

Déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges *G31.81*

Déchirure
- Accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ¬ Perforation et *T81.2*
- Aiguë du poumon ¬ *S27.32*
- Ancienne
- - Anse de seau» ¬ *M23.2*
- - Col de l'utérus ¬ *N88.1*
- - Muscles du plancher pelvien ¬ *N81.8*
- - Vagin ¬ *N89.8*
- Anse seau
- - Ménisque
- - - Externe ¬ *S83.2*
- - - Interne ¬ *S83.2*
- - SAI ¬ *S83.2*
- Capsulaire ¬ *S37.02*
- Capsule
- - Bassinet du rein ¬ *S37.02*
- - Rate, sans atteinte plus importante du parenchyme ¬ *S36.02*
- Cardiaque
- - Ouverture d'une cavité du cœur ¬ *S26.83*
- - Sans ouverture d'une cavité du cœur ¬ *S26.82*
- Cérébrale et cérébelleuse ¬ *S06.38*
- Cérébrales et cérébelleuses multiples ¬ *S06.28*
- Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ Entorse/foulure et *S33.50*
- Fer à cheval de la rétine, sans décollement ¬ *H33.3*
- Frein
- - Langue ¬ *S01.54*
- - Lingual ¬ *S01.54*
- Hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.9*
- Hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical ¬ Autres *P10.8*
- Hépatique
- - Majeure ¬ *S36.15*
- - Modérée ¬ *S36.14*
- - SAI ¬ *S36.12*
- Jonction lombosacrée et de ses ligaments ¬ *S33.51*
- Kyste
- - Poplité ¬ *M66.0*
- - Synoviale ¬ *M66.1*
- Lésions origine chimique
- - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*

Déchirure *–suite*
- Lésions origine chimique *–suite*
- - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- Ligament croisé
- - Antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.53*
- - Postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.54*
- - SAI ¬ *S83.50*
- Ligament large [Allen-Masters] ¬ Syndrome de *N83.8*
- Ligament latéral
- - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.43*
- - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.44*
- Ligamentaire SAI ¬ *S83.40*
- Minime hépatique ¬ *S36.13*
- Multiples moyennes avec ou sans hématomes ¬ *S36.15*
- Muscle(s) SAI ¬ *T14.6*
- Musculaires (non traumatiques) ¬ Autres *M62.1*
- Niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique ¬ *M66.5*
- Obstétrical
- - Col de l'utérus ¬ *O71.3*
- - Périnée
- - - Deuxième degré ¬ *O70.1*
- - - Premier degré ¬ *O70.0*
- - - Quatrième degré ¬ *O70.3*
- - - Sans précision ¬ *O70.9*
- - - Troisième degré ¬ *O70.2*
- - Vaginale haute isolée ¬ *O71.4*
- Partielle complète ¬
- - *S83.43*
- - *S83.44*
- - *S83.53*
- - *S83.54*
- Périnée ¬ Rupture d'une suture de: *O90.1*
- Périurétrale avec atteinte de l'urètre ¬ *O71.5*
- Poumon ¬ *S27.32*
- Rate, avec atteinte du parenchyme ¬ *S36.03*
- Récente
- - Cartilage articulaire du genou ¬ *S83.3*
- - Ménisque ¬ *S83.2*
- Rein ¬ *S37.02*
- Rétine ¬ Décollement de la rétine: sans *H33.2*
- Rétinienne
- - SAI ¬ *H33.3*

Déchirure *–suite*
- Rétinienne *–suite*
- - ¬ Décollement de la rétine avec *H33.0*
- Rétiniennes sans décollement ¬ *H33.3*
- Rupture
- - Périnatal
- - - Intéressant
- - - - Fourchette au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Légère au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Lèvres au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Peau au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Vulve au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - O70
- - - - 0 intéressant
- - - - - Muscles du: périnée au cours de l'accouchement ¬ *O70.1*
- - - - - Muscles du: vagin au cours de l'accouchement ¬ *O70.1*
- - - - - Plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ *O70.1*
- - - - 1 intéressant
- - - - - Cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ *O70.2*
- - - - - Sphincter: anal au cours de l'accouchement ¬ *O70.2*
- - - - - Sphincter: SAI au cours de l'accouchement ¬ *O70.2*
- - - - 2 intéressant muqueux
- - - - - Anale au cours de l'accouchement ¬ *O70.3*
- - - - - Rectale au cours de l'accouchement ¬ *O70.3*
- - Tissus périurétraux au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- Secondaire du périnée ¬ *O90.1*
- Sillon vaginal pendant l'accouchement ¬ *O71.4*
- Spontanée tendon
- - Extenseurs ¬ *M66.2*
- - Fléchisseurs ¬ *M66.3*
- - Sans précision ¬ *M66.5*
- - ¬ *M66.4*
- Spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale ¬ les *M66*
- Synoviale ¬ *M66.1*
- Tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.4*
- Tiers
- - Moyen du vagin pendant l'accouchement ¬ *O71.4*
- - Supérieur du vagin pendant l'accouchement ¬ *O71.4*
- Traumatique

Déchirure *–suite*
- Traumatique *–suite*
- - Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Traumatisme ancien
- - Corne
- - - Antérieure ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.24*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.21*
- - - Postérieure ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.25*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.22*
- - Localisations multiples ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.20*
- - Ménisque SAI ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.29*
- - Partie partie non précisée ménisque
- - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.26*
- - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.23*
- Utérus
- - Avant le début des contractions ¬ *O71.0*
- - Pendant l'accouchement ¬ *O71.1*
- ¬
- - Entorse
- - - *S46*
- - - Foulure
- - - - *S16*
- - - - *S56*
- - - - *S66*
- - - - *S76*
- - - - *S86*
- - - - *S96*
- - Épisiotomie agrandie par *O70*

Déciduale
- Acrale ¬ Syndrome de peau *Q80.8*
- Généralisée ¬ Peau *Q80.8*
- Leuconychie-kératose acrale ponctuée-chéilite-nodosités [PLACK] ¬ Syndrome de peau *Q84.8*

Déclenchement
- Chirurgical ¬ Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou *P02.1*
- Instrumental du travail ¬ Échec du *O61.1*
- Médical du travail ¬ Échec du *O61.0*
- Travail
- - Chirurgie ¬ Échec du *O61.1*
- - Moyens mécaniques ¬ Échec du *O61.1*
- - Ocytocique ¬ Échec du *O61.0*
- - Prostaglandines ¬ Échec du *O61.0*
- - Sans précision ¬ Échec du *O61.9*
- - ¬ Autres échecs du *O61.8*

Déclencheurs de contractions ¬ Hyperactivité de l'utérus due à une stimulation excessive par des médicaments *O62.8, Y57.98!*

Déclin
- Corporel ¬ *R53.9*
- Général ¬ *R53.9*
- Physique ¬ *R53.9*

Décollement
- Annulaire du col de l'utérus ¬ *O71.3*
- Choroïde ¬ *H31.4*
- Corps vitré ¬ *H43.8*
- Couches de la rétine ¬ *H35.7*
- Épiphysaire ¬ Fracture
- - Col du fémur: Épiphyse (proximale), *S72.02*
- - Extrémité inférieure du fémur: Épiphyse, *S72.42*
- Épithélium pigmentaire rétinien ¬ *H35.7*
- Hémorragie placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de *P02.1*
- Prématuré placenta
- - Anomalie de la coagulation ¬ *O45.0*
- - Sans précision ¬ *O45.9*
- - ¬ *P02.1*
- Prématurés du placenta ¬ Autres *O45.8*
- Rétine
- - Cours de rétinite à CMV [cytomégalovirus], VIH positif ¬ *B20†, H32.0*, B25.88*
- - Déchirure rétinienne ¬ *H33.0*
- - Rhegmatogène
- - - Autosomique dominant ¬ *H33.0*
- - - ¬ *H33.0*
- - SAI ¬ *H33.2*
- - Sans déchirure de la rétine ¬ *H33.2*
- - ¬ Vitréo-rétinopathie proliférante avec *H33.4*
- Rétiniens ¬ Autres *H33.5*
- Séreux de la rétine ¬ *H33.2*
- Sous-cutané
- - Abdomen ¬ *S30.86*
- - Bassin ¬ *S30.86*
- - Cou ¬ *S10.96*
- - Fermé ¬ lésions traumatiques superficielles
- - - Abdomen, des lombes et du bassin: *S30.86*
- - - Cheville et du pied: *S90.86*
- - - Épaule et du bras: *S40.86*
- - - Hanche et de la cuisse: *S70.86*
- - - Jambe: *S80.86*
- - - Poignet et de la main: *S60.86*
- - Lombes ¬ *S30.86*
- - Paroi thoracique
- - - Antérieure ¬ *S20.36*
- - - Postérieure ¬ *S20.46*
- - - ¬ *S20.86*

Décollement *–suite*
- Sous-cutané *–suite*
- - Région costale ¬ *S20.86*
- - Sein ¬ *S20.16*
- - Thorax postérieur ¬ *S20.41*
- Traction de la rétine ¬ *H33.4*
- Tractionnel
- - Cours rétinopathie diabétique diabète sucré type
- - - 1 ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - 2 ¬ *E11.30†, H36.0**
- - Rétinopathie diabétique ¬ *E14.30†, H36.0**
- ¬
- - Cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du *H59.8*
- - Déchirure
- - - Fer à cheval de la rétine, sans *H33.3*
- - - Rétiniennes sans *H33.3*
- - Opercule rétinien sans *H33.3*
- - Trou rond de la rétine, sans *H33.3*

Décompensation
- Cardiaque syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- Greffe de cornée de l'œil ¬ *T86.83*
- Hépatique ¬ *K72.9*

Décompression] ¬ Maladie des caissons [maladie de la *T70.3*

Découragement et apathie ¬ *R45.3*

Découvert
- Cadavre ¬ *R98*
- Corps ¬ Trichophytie des parties *B35.4*
- ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien *I25.2*
- Fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès ¬ *R98*

DECR ¬ Encéphalopathie progressive avec leucodystrophie par déficit en *G31.81*

Décrit
- Ainsi ¬
- - Athérosclérose cardio-vasculaire, *I25.0*
- - Mort cardiaque subite, *I46.1*
- ¬ Delirium non surajouté à une démence, ainsi *F05.0*

Décubitus
- Stade
- - 1 ¬ Ulcère de *L89.0*
- - 2 ¬ Ulcère de *L89.1*
- - 3 ¬ Ulcère de *L89.2*
- - 4 ¬ Ulcère de *L89.3*
- ¬ Escarre (de *L89*

Dedicator of cytokinesis 2] ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en DOCK2 [*D81.8*

Dédifférencié
v./v.a. Liposarcome dédifférencié

Dédoublement
- Estomac ¬ *Q40.2*
- Œsophage ¬ *Q39.8*

Dédoublement *–suite*
- Vagin ¬ *Q52.1*

Déefférentation motrice] ¬ Locked-in syndrome [syndrome de *G83.5*

Défaillance
- Cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque ¬ *I97.1*
- Multisystémique ¬ Syndrome d'anasarque-acidose lactique-anémie sidéroblastique- *Q87.8*

Défaillante ¬ Hygiène personnelle *Z91.8*

Défaut
- Amidation ¬ Insuffisance en acides biliaires-CoA ligase et *K76.8*
- Biosynthèse associé à GPAA1 ¬ *E88.8*
- Canal atrioventriculaire du cœur, NCA ¬ *Q21.2*
- Captation de la carnitine cellulaire ¬ *E71.3*
- Complet du septum atrio-ventriculaire ¬ *Q21.2*
- Congénital
  - Diaphragme, avec éventration ¬ *Q79.1*
  - Partie
    - Cortex cérébral ¬ *Q04.8*
    - Substance cérébrale ¬ *Q04.3*
- Congénitale du bassinet rénal ¬ *Q63.8*
- Cytotoxicité spontanée des cellules Natural Killer ¬ Déficit immunitaire primaire autosomique récessif avec un *D84.8*
- Dégradation glycoprotéine ¬
  - *E77.1*
  - *E77.1*
- Éducation ¬ Pression parentale inappropriée et autres *Z62*
- Empreinte région 11p15 ¬ Syndrome
  - Beckwith-Wiedemann dû à un *Q87.3*
  - Silver-Russell dû à un *Q87.1*
- Fermeture du tube neural ¬ Syndrome de cataracte-cardiopathie congénitale- *Q87.0*
- Fission mitochondrial peroxysomale
  - Associée
    - DNM1L ¬ Encéphalopathie par *G31.81*
    - MFF ¬ Encéphalopathie par *G31.81*
    - ¬ Encéphalopathie par *G31.81*
- Immunité cellulaire ¬ *D84.8*
- Métabolisme
  - Cofacteur cobalamine ¬ Homocystinurie due à un *E72.1*
  - Cuivre ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth axonale autosomique récessive due a un *G60.0*
- Myocarde ¬ *I51.5*
- Osseux ¬ Fracture ouverte de la mandibule avec *S02.60, S01.87!*
- Parole ¬ *R47.8*
- Pigmentation ¬ Syndrome de dysplasie osseuse terminale- *Q87.2*
- Réfraction ¬ Syndrome de dysplasie pilo-dentaire avec *Q82.8, H52.7*

Défaut *–suite*
- Remplissage
  - Rein ¬ *R93.4*
  - Uretère ¬ *R93.4*
  - Vessie ¬ *R93.4*
- Réparation de l'ADN ¬ Ataxie cérébelleuse avec *G11.3*
- Sécrétion
  - Parathormone ¬ Hypoparathyroïdie secondaire due à un *E20.8*
  - Plaquettaire ¬ Thrombocytopénie autosomique dominante avec *D69.41*
  - PTH ¬ Hypoparathyroïdie isolée familiale par *E20.8*
- Segmentation avec scoliose ¬ Synostose d'hémivertèbres ou *Q76.3*
- Septal
  - Atrio-ventriculaire intermédiaire ¬ *Q21.2*
  - Auriculaire
    - Type sinus venosus ¬ ASD [*Q21.1*
    - ¬ Dysplasie lymphatique généralisée associée à EPHB4 avec *Q82.09, Q21.1*
- Septum cardiaque ¬ Syndrome d'hypotonie sévère-retard de développement psychomoteur-strabisme- *Q87.8*
- Synthèse
  - Acide biliaire
    - Cholestase et malabsorption ¬ *K76.8*
    - ¬ Malabsorption idiopathique par *K90.8*
  - Protéine
    - Codées par l'ADN mitochondrial ¬ Insuffisance hépatique infantile aiguë par *K72.0*
    - Mitochondriales ¬ Maladie mitochondriale par *E88.8*
- Transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux ¬ *E77.0*
- Transport
  - Glutamate-aspartate ¬ *E72.0*
  - Lactate ¬ Myopathie métabolique par *E74.8†, G73.6**
- Transporteur de carnitine à travers la membrane plasmique ¬ *E71.3*
- Tympan ¬ *H72.9*
- Usage ¬
  - Amblyopie: par *H53.0*
  - Nystagmus (de): *H55*
- Zone pellucide ¬ Infertilité féminine par *N97.8*

Défécation
- Douloureuse ¬ *R19.88*
- ¬
  - Constipation lors d'un trouble de la *K59.01*
  - Trouble de la *K59.8*

Défectueux
- Hormone androgène testiculaire SAI ¬ Biosynthèse *E29.1*
- Trachéostome ¬ Fonctionnement *J95.09*
- ¬
  - Alimentation *Z59*

Défectueux *–suite*
- ¬ *–suite*
  - Hygiène personnelle très *R46.0*

Défenses immunitaires ¬ Faiblesse des *D89.9*

Déférent
v./v.a. Canal déférent

Déférentite
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N51.8**
- ¬ *N49.1*

Défibrillateur
- Cardiaque
  - Implanté ¬ Adaptation et manipulation d'un *Z45.01*
  - ¬ Présence de: *Z95.0*
- Cardioverteur
  - Implantable] ¬ Infection liée à un système DCI [*T82.70*
  - Implanté
    - DCI] ¬ Infection due à un *T82.70*
    - ¬ Infection due à un *T82.70*
- Thérapie de resynchronisation cardiaque ¬ Présence de: *Z95.0*

Défibrination
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ Syndrome de *P60*
- Hémorragie pendant l'accouchement ¬ Syndrome de *O67.0*
- Sans précision ¬ Syndrome de *D65.9*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Syndrome de *O08.1*
- ¬
  - Glomérulonéphrite au cours de syndrome de *D65.9†, N08.2**
  - Maladie glomérulaire au cours de syndrome de *D65.9†, N08.2**

Déficience
- Facteur
  - Coagulation, n.c.a. ¬ *D68.28*
  - Hageman ¬ *D68.25*
- Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ Anémie due à une *D55.2*
- Motrice et intellectuelle sévères-surdité neurosensorielle-dystonie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- NGLY1 ¬ Anomalie congénitale de la biosynthèse des glycoprotéines induite par *E77.8*
- Organique de la puissance sexuelle ¬ *N48.4*
- Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase ¬ *E79.8*

Déficience intellectuelle
- Absence de fibres sensitives myélinisées de gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec surdité, *G60.0*
- Acromicrie-ménopause prématurée ¬ Syndrome de polyneuropathie- *Q87.8*
- Amaurose congénitale de Leber ¬ Syndrome de dysplasie spondylo-épiphysaire-surdité neurosensorielle- *Q87.1*

Déficience intellectuelle *–suite*
- Anomalies
- - Neurologiques et ophthalmologiques ¬ Syndrome sévère de myélofibrose-pancytopénie- *Q87.8*
- - Squelettiques ¬ Syndrome neurodéveloppemental avec *Q87.5*
- Aphasie expressive-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Arythmie cardiaque associé à GNB5 ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Associé
- - DYRK1A ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - MED13L ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - SMARCA2 ¬ Syndrome de blépharophimosis- *Q87.0*
- - TBCK ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Associée à EGF ¬ Hypomagnésémie primaire avec *E83.4, F79.9*
- Ataxie-trouble de l'alimentation lié à DHX30 ¬ Syndrome de retard neurodéveloppemental- *G11.8*
- Atrésie anale-uropathie ¬ Syndrome de cataracte- *Q87.8*
- Atrophie optique anomalies cutané ¬ Syndrome
- - Ataxie cérébelleuse- *G11.1*
- - CAMOS [ataxie cérébelleuse, *G11.1*
- Autisme
- - Apraxie de la parole-dysmorphie cranio-faciale ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - ¬ Syndrome de macrocéphalie- *Q87.0*
- Autosomique
- - Dominante-anomalies cranio-faciales-hypotonie-cardiopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Récessif ¬ Syndrome marfanoïde- *Q87.8*
- Brachydactylie ¬ Syndrome de Pierre Robin- *Q87.0*
- Calvitie-luxation de la rotule-acromicrie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Cardiopathie
- - Congénitale
- - - Fente palatin
- - - - Mutation de MEIS2 ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - - ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - Petite taille-laxité ligamentaire ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - ¬ Syndrome de microcéphalie-épilepsie- *Q87.8*
- Cataracte-cyphose ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Chondrodysplasie associé à QRICH1 ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Colobome et micrognathie ¬ Syndrome d'agénésie du corps calleux avec *Q87.8*
- Déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante-épilepsie- *G11.1*
- Délétion 16p ¬ Syndrome d'alpha-thalassémie avec *Q93.5*
- Dysmorphie

Déficience intellectuelle *–suite*
- Dysmorphie *–suite*
- - Cranio-facial
- - - Cryptorchidie ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - Hypogonadisme-diabète sucré ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Facial
- - - Anomalie pseudo-Pelger-Huët ¬ Syndrome de retard global de développement- *Q87.0*
- - - Anomalies
- - - - Mains ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - - Squelettiques associé à BPTF ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - Habitus marfanoïde-scoliose associé à NKAP ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - Haploinsuffisance de SETD5 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - Malformations cardiaques congénitales associé à CDK13 ¬ Syndrome de retard de développement- *Q87.0*
- - - Reflux gastro-œsophagien associé à STAG1 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - Troubles du comportement associé à CHAMP1 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - ¬ Syndrome
- - - - Encéphalopathie épileptique infantile précoce-cécité corticale- *G40.4*
- - - - Microcéphalie
- - - - - Hypoplasie du corps calleux- *Q87.0*
- - - - - Petite taille- *Q87.1*
- - ¬ Syndrome d'arachnodactylie- *Q87.8*
- Épilepsie
- - Hypophosphatasie-anomalies ophtalmiques et squelettiques ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Lié à l'X ¬ Syndrome de spasticité- *G40.4*
- - Macrocéphalie-obésité ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ Syndrome
- - - Extrapyramidal- *Q87.8*
- - - Pachygyrie- *Q04.3*
- Faiblesse musculaire-petite taille-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Grave non syndromique autosomique dominante ¬ *F72.9*
- Hépatopathie ¬ Syndrome de retard de croissance- *Q87.8*
- Hydroxylysinurie ¬ Syndrome de convulsions- *E72.3*
- Hyperkératose palmoplantaire ¬ Syndrome de paraplégie- *Q87.8*
- Hypogonadisme hypergonadotrope ¬ Syndrome d'alopécie- *Q87.8*
- Hypoplasie cérébelleuse-dysplasie spondylo-épiphysaire ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Hypoplasie du corps calleux et appendices pré-auriculaires ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Hypotonie
- - Brachycéphalie-sténose du pylore-cryptorchidie ¬ Syndrome de *Q87.0*

Déficience intellectuelle *–suite*
- Hypotonie *–suite*
- - Musculaire, dysmorphies faciales et macrocéphalie ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Langue scrotale ¬ Syndrome d'ophtalmoplégie- *Q87.8*
- Légère
- - Non syndromique autosomique dominante ¬ *F70.9*
- - Trouble du comportement nécessitant manifestement un traitement ¬ *F70.1*
- Lésions de la substance blanche ¬ Syndrome de neurodégénération infantile-spasticité progressive- *G31.88*
- Lié
- - A l'X ¬ Syndrome d'anomalies squelettiques- *Q87.5*
- - X
- - - Limité à la femme ¬ Syndrome de dysmorphie faciale-petite taille-atrésie des choanes- *Q87.0*
- - - ¬ Syndrome
- - - - Ataxie-apraxie- *G11.8*
- - - - Surdité- *Q87.8*
- Liée X
- - Acromégalie-hyperactivité ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Agénésie du corps calleux-quadriparésie spastique ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Alacrimie-achalasie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Associé à CLCN4 ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Cardiomégalie-insuffisance cardiaque congénitale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Cubitus valgus-dysmorphie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Dysmorphie-atrophie cérébrale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Épilepsie
- - - Contracture progressive des articulations-dysmorphie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - Psoriasis ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Hypogammaglobulinémie-détérioration neurologique progressive ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Hypogonadisme-ichtyose-obésité-petite taille ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Hypoplasie cérébelleuse ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Hypotonie
- - - Anomalie du mouvement ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - Dysmorphie faciale-comportement agressif ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Macrocéphalie-emacroorchidie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Malformation de Dandy-Walker-anomalies des ganglions de la base-convulsions ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Microcéphalie
- - - Hypoplasie pontocérébelleuse ¬ Syndrome de *Q87.8*

Déficience intellectuelle *–suite*
- Liée X *–suite*
- - Microcéphalie *–suite*
- - - Malformation corticale-habitus mince ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Mutations de GRIA3 ¬ *Q87.8*
- - Petite taille-surpoids ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Psychose-macroorchidie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Rétinite pigmentaire ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Spasticité membres dystrophie rétine
- - - Déficit en arginine vasopressine ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - Diabète insipide ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Syndrome cranio-facio-squelettique ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Syndromique
- - - Associée à KDM5C ¬ *Q87.8*
- - - Type
- - - - 7 ¬ *Q87.8*
- - - - 10 ¬ *G25.5*
- - - - Claes-Jensen ¬ *Q87.8*
- - Type
- - - Abidi ¬ *Q87.8*
- - - Armfield ¬ *Q87.8*
- - - Brooks ¬ *Q87.8*
- - - Cantagrel ¬ *Q87.8*
- - - Cilliers ¬ *Q87.8*
- - - Golabi-Ito-Hall ¬ *Q87.8*
- - - Hedera ¬ *Q87.8*
- - - Kroes ¬ *Q87.8*
- - - Lubs ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - Miles-Carpenter ¬ *Q87.8*
- - - Najm ¬ *Q87.8*
- - - Nascimento ¬ *Q87.8*
- - - Pai ¬ *Q87.8*
- - - Porteous ¬ *Q87.8*
- - - Schimke ¬ *Q87.8*
- - - Seemanova ¬ *Q87.8*
- - - Shashi ¬ *Q87.8*
- - - Shrimpton ¬ *Q87.8*
- - - Siderius ¬ *Q87.8*
- - - Stevenson ¬ *Q87.8*
- - - Stocco Dos Santos ¬ *Q87.8*
- - - Stoll ¬ *Q87.8*
- - - Sutherland-Haan ¬ *Q87.8*
- - - Turner ¬ *Q87.8*
- - - Van Esch ¬ *Q87.8*
- - - Wilson ¬ *Q87.8*
- - ¬
- - - Alpha-thalassémie- *D56.0*
- - - Syndrome marfanoïde avec *Q87.8, F79.9*
- Liées à une mutation de GRIN2A ¬ Encéphalopathie épileptique à début précoce et *G40.4*
- Macrocéphalie

Déficience intellectuelle *–suite*
- Macrocéphalie *–suite*
- - Hypotonie-troubles du comportement ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Non-compaction ventriculaire gauche ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Malformation
- - Cérébro-cérébelleuse ¬ Syndrome d'épilepsie focale- *Q04.8*
- - Système nerveux central ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique- *Q87.8*
- Malformations cardiaques ¬ Syndrome de brachydactylie-mésomélie- *Q87.8*
- Microcéphalie congénitale-dystonie-anémie-retard de croissance ¬ Syndrome CIMDAG [hypoplasie cérébelleuse- *Q87.8*
- Modérée
- - Diabète juvénile ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.1*
- - ¬ Syndrome de micrognathie-infections récurrentes-troubles du comportement- *Q87.0*
- Mouvements hyperkinétiques-ataxie tronculaire ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Moyen avec trouble du comportement nécessitant manifestement un traitement ¬ *F71.1*
- Moyenne non syndromique autosomique dominante ¬ *F71.9*
- Mutation ponctuelle de DYRK1A ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Myopathie-petite taille-hypogonadisme hypogonadotrophique ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Nanisme
- - Anomalie rénale ¬ Syndrome d'ichtyose- *Q87.1*
- - ¬ Syndrome d'aplasie médullaire- *Q87.1*
- Non syndromique
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *F79.9*
- - - Récessive ¬ *F79.9*
- - Liée à l'X ¬ *F79.9*
- Nystagmus-obésité ¬ Syndrome de paraplégie spastique- *G11.4*
- Obésité
- - Malformations cérébrales-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Prognathisme-anomalies oculaires et cutanées ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Tronc-dystrophie rétinienne-micropénis] ¬ Syndrome MORM [*Q87.8*
- - ¬ Syndrome
- - - Aniridie-ptosis- *Q87.8*
- - - Hypomagnésémie primaire-crises généralisées- *Q87.8*
- Paralysie cérébrale athétosique ¬ Syndrome de microbrachycéphalie sévère- *Q87.0*
- Petite taille
- - Hypertélorisme ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Liée à l'X ¬ Syndrome de microphtalmie colobomateuse-microcéphalie- *Q87.1*
- - ¬ Syndrome de goniodysgénésie- *Q87.8*

Déficience intellectuelle *–suite*
- Polydactylie ¬ Syndrome de cécité corticale- *Q87.8*
- Profond non syndromique autosomique dominante ¬ *F73.9*
- Récessive-dysfonctionnement moteur-contractures articulaires multiples ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Retard de développement
- - Globale-dysmorphie faciale-appendice caudal ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Hypertrophie gingival ¬ Syndrome
- - - Dysmorphie faciale-hypertrichose-épilepsie- *Q87.0*
- - - FHEIG [dysmorphie faciale-hypertrichose-épilepsie- *Q87.0*
- Retard de langage-dysmorphie faciale-anomalies des lymphocytes T ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Rétinite pigmentaire ¬ Syndrome de tétraplégie spastique- *Q87.8*
- Rhombencéphalosynapsis ¬ Syndrome de dysmorphie faciale- *Q87.0*
- Sévère
- - Agénésie du corps calleux-dysmorphie faciale-ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Anomalies congénitales multiples associé à SETD2 ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.8*
- - Diplégie spastique progressive ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - Dysmorphie faciale associé à CCNK ¬ Syndrome de trouble neurodéveloppemental- *Q87.0*
- - Épilepsie-anomalies anales-hypoplasie des phalanges ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Hypotonie-strabisme-traits grossiers du visage-planovalgus ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Liée à l'X type Gustavson ¬ *Q87.8*
- - Paraplégie spastique progressive ¬ *G11.4*
- - Petite taille-troubles du comportement-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Trouble du langage-strabisme-visage grimaçant-doigts longs ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬
- - - Analgésie congénitale avec *G90.88, F72.9*
- - - Syndrome de craniosynostose-microrétrognathie- *Q87.8*
- Spasticité périphérique et vitréorétinopathie exsudative ¬ Syndrome de *Q87.2*
- Strabisme ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Surdité
- - Hypogénitalisme ¬ Syndrome de rétinite pigmentaire- *Q87.8*
- - Hypogonadisme ¬ Syndrome de rétinite pigmentaire- *Q87.8*
- - Neurosensoriel
- - - Épilepsie-tonus musculaire anormal ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.8*

Déficience intellectuelle *–suite*
- Surdité *–suite*
- - Neurosensoriel *–suite*
- - - ¬ Retard de développement associé à SLC12A2 avec *Q87.8*
- - ¬ Syndrome
- - - Dysostose métaphysaire- *Q87.2*
- - - Lipodystrophie- *Q87.8*
- Syndromique associée à IQSEC2 ¬ *Q87.8*
- Tétraplégie spastique ¬ Syndrome d'ichtyose congénitale- *Q87.8*
- Trouble
- - Comportement ¬ Syndrome de tremblement essentiel progressif-trouble sévère du langage-dysmorphie faciale- *Q87.0*
- - Sévère langage dysmorphie modérée
- - - Associé à FOXP1 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Spectre de l 'autisme associés à GRIN2B ¬ Retard de développement, *F84.1*
- Troubles du sommeil associé à ANK3 ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Type
- - Birk-Barel ¬ *Q87.8*
- - Finnois ¬ Syndrome d'épilepsie- *E75.4*
- - Lopes ¬ Hypotrichose- *Q87.0*
- - Maat-Kievit-Brunner ¬ Syndrome de blépharophimosis- *Q87.8*
- - Mietens-Weber ¬ *Q87.2*
- - SBBYS et du syndrome génito-patellaire ¬ Chevauchement du syndrome de blépharophimose avec *Q87.8*
- - Verloes ¬ Syndrome de blépharophimosis- *Q87.8*
- Voix nasonnée, dysmorphie craniofaciale et anomalies squelettiques ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬
- - Ataxie cérébelleuse non progressive avec *G11.0*
- - Dystrophie musculaire congénitale
- - - *G71.2*
- - - Sans *G71.2*
- - Syndrome
- - - Alopécie
- - - - *Q87.8*
- - - - Contractures-nanisme- *Q87.8*
- - - - Épilepsie-pyorrhée- *Q87.8*
- - - Anomalies ophtalmologiques-dysmorphie faciale- *Q87.0*
- - - Aphonie-surdité-dystrophie rétinienne-gros orteil bifide- *Q87.0*
- - - Aplasie cutanée congénitale avec hypoplasie de l'émail dentaire, un retard de développement et *Q87.8*
- - - Arachnodactylie-ossification anormale- *Q87.8*
- - - Ataxie cérébelleuse non progressive- *G11.8*
- - - CAHMR [cataracte-hypertrichose- *Q87.8*

Déficience intellectuelle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Craniosynostose-cardiopathie congénitale- *Q87.8*
- - - Cryptorchidie-arachnodactylie- *Q87.8*
- - - Cubitus court-dysmorphie faciale-hypotonie musculaire- *Q87.0*
- - - Dentinogenèse imparfaite-petite taille-surdité- *Q87.8*
- - - Dysostose spondylo-costale-hypospadias- *Q87.1*
- - - Dysplasie cranio-faciale-petite taille-anomalies ectodermiques- *Q87.0*
- - - Dysplasie mésomélique-anomalies digitales- *Q87.5*
- - - Dysplasie spondylo-épimétaphysaire progressive-petite taille-quatrième métatarsien court- *Q87.1*
- - - Dystrophie musculaire congénitale-cataracte- *G71.2*
- - - Épidermolyse bulleuse jonctionnelle localisée à début tardif- *Q81.8*
- - - Fibrose hépatique-kystes rénaux- *Q87.0*
- - - Hypogonadisme-prolapsus de la valve mitrale- *Q87.8*
- - - Hypohidrose-hypoplasie de l'émail-kératodermie palmoplantaire- *Q87.8*
- - - Hypomagnésémie primaire-épilepsie réfractaire- *E83.4*
- - - Hypoplasie
- - - - Cubitus- *Q87.2*
- - - - Substance blanche-agénésie du corps calleux- *Q04.8*
- - - Lié à MEF2C caractérisé par des anomalies cérébrales, un retard de développement sévère, des dysmorphies faciales et une *Q87.0*
- - - Macrocéphalie-cardiopathie congénitale-dysmorphie faciale- *Q87.0*
- - - Microcéphalie
- - - - Corps calleux fin- *Q87.8*
- - - - Hypoplasie du corps calleux et vermis cérébelleux-dysmorphie faciale- *Q87.0*
- - - - Post-natale-hypotonie infantile-diplégie spastique-dysarthrie- *Q87.8*
- - - - Surdité
- - - - - *Q87.8*
- - - - - Dysmorphie faciale- *Q87.0*
- - - Microphtalmie
- - - - Ankyloblépharon- *Q11.2*
- - - - Colobomateuse-obésité-hypogénitalisme- *Q87.8*
- - - Ostéogenèse imparfaite-rétinopathie-épilepsie- *Q87.8*
- - - Ostéolyse distale-petite taille- *Q87.1*
- - - Paraplégie spastique-glaucome- *G11.4*
- - - Parkinsonisme précoce- *G23.8*
- - - Polydactylie
- - - - Postaxiale- *Q87.2*
- - - - Préaxiale avec colobomes et *Q87.2*

Déficience intellectuelle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Protrusion maxillaire antérieure-strabisme- *Q87.8*
- - - Retard de croissance sévère-strabisme-mélanocytose dermique congénitale- *Q87.8*
- - - Retard global de développement-anomalies neuro-ophtalmologiques-épilepsie- *Q87.8*
- - - Retard neurodéveloppemental-malformations cérébrales-anomalies squelettiques- *Q87.8*
- - - Rétinite pigmentaire-cataracte juvénile-petite taille- *Q87.1*
- - - Surdité neurosensorielle-tétraplégie spastique- *Q87.8*

Déficit
v./v.a. Type de maladie

Défiguration due à des cicatrices ¬ *L90.5*

Défilé cervico-thoracique ¬ Syndrome du *G54.0*

Définissant le SIDA) ¬ Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies *U60.3!*

Deformans
- Alkaptonurica ¬ Osteoarthrosis *E70.2†, M36.8**
- Cours de tumeur maligne de l'os ¬ Osteodystrophia *C41.9†, M90.69**

Déformante
- Juvénile ¬ Hyperostose corticale *M88.99*
- Oblitérante ¬ Endartérite: *I70*
- Progressive ¬ Dystonie *G24.1*
- Tibia ¬ Ostéochondrose *M92.5*
- ¬
- - Arthropathie syphilitique *A52.1†, M14.69**
- - Dystonie musculaire *G24.1*
- - Polypose rhino-sinusienne *J33.1*

Déformation
- Acquise
- - Auriculaire ¬ *H61.1*
- - Bassin ¬ *M95.5*
- - Cheville, n.c.a. ¬ *M21.68*
- - Cou ¬ *M95.3*
- - Membre, sans précision ¬ *M21.9*
- - Nez ¬ *M95.0*
- - Pancréas ¬ *K86.88*
- - Pavillon de l'oreille ¬ *H61.1*
- - S) d'(es) orteil(s), sans précision ¬ *M20.6*
- - Système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision ¬ *M95.9*
- - Thorax et des côtes ¬ *M95.4*
- Acquises
- - Cheville et du pied ¬ Autres *M21.68*
- - Gros orteil ¬ Autres *M20.3*
- - Orteil(s) ¬ Autres *M20.5*
- - Précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif ¬ Autres *M95.8*

Déformation *–suite*
- Acquises *–suite*
- - Tête ¬ Autres *M95.2*
- Appareil urinaire SAI ¬ congénitale: *Q64.9*
- Boutonnière et en col de cygne ¬ *M20.0*
- Colonne vertébrale due à la tuberculose ¬ *A18.0†*, *M49.09**
- Congénitale
- - Doigt ¬ *Q68.1*
- - Pouce NCA ¬ *Q68.1*
- - Rate ¬ *Q89.08*
- Congénitales des doigts ¬ *Q68.1*
- Cornée ¬ Autres *H18.7*
- Doigt(s) ¬ *M20.0*
- Flexion ¬ *M21.2*
- Hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure ¬ *M91.2*
- Orbite ¬ *H05.3*
- Oreille ¬ Autres *Q17.3*
- Pelvienne ¬ Dystocie due à une *O65.0*
- Précisées
- - Membres ¬ Autres *M21.8*
- - ¬ Autres dorsopathies avec *M43.8*
- SAI
- - Téguments/phanères SAI ¬ *Q84.9*
- - ¬ congénitale: *Q89.9*
- Sans précision ¬ Dorsopathie avec *M43.9*
- Syphilitique
- - Tardive du nez ¬ *A52.7†*, *J99.8**
- - Tibia en lame de sabre ¬ *A50.5†*, *M90.26**
- Valgus, non classée ailleurs ¬ *M21.0*
- Varus, non classée ailleurs ¬ *M21.1*

Déformée en forme de pelle ¬ Incisive *K00.2*

Dégénératif
v./v.a. Type de maladie

Dégénérescence
- Amyloïde
- - Moelle épinière ¬ *E85.4†*, *G32.8**
- - Système nerveux ¬ *E85.4†*, *G99.8**
- Artérielle ¬ *I70*
- Artériovasculaire ¬ *I70*
- Capillaire amyloïde ¬ *E85.88†*, *I79.8**
- Cérébelleux (cérébelleuse) héréditaire ¬ *G11.9*
- Cérébello-rétinienne infantile ¬ *G31.88*
- Cérébro-vasculaire ¬ *I67.9†*, *G32.8**
- Chorio-rétinienne ¬ *H31.1*
- Choriorétinienne péripapillaire hélicoïdale ¬ *H31.2*
- Choroïdienne ¬ *H31.1*
- Cochléo-sacculaire-cataracte ¬ Syndrome de *H90.5†*, *H28.2**
- Cœur myocarde
- - Graisseuse ¬ *I51.5*
- - Sénile ¬ *I51.5*
- Combinée

Dégénérescence *–suite*
- Combinée *–suite*
- - Moelle épinière NCA ¬ Anémie avec *D51.0†*, *G32.0**
- - Subaiguë moelle épinière cours
- - - Carence en vitamine B12 ¬ *E53.8†*, *G32.0**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *G32.0**
- Congénitale
- - Cerveau chez l'enfant ¬ *Q04.9*
- - Labyrinthe avec atteinte de l'audition ¬ *Q16.5*
- Cornée ¬ *H18.4*
- Corps vitré ¬ *H43.8*
- Corticobasale [DCB] ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- Discale ¬ Radiculite due à une *M51.1†*, *G55.1**
- Facettes articulaires ¬ *M47*
- Familiale du neurone moteur ¬ *G12.2*
- Ganglions de la base de l'enfant ¬ Syndrome de *G23.8*
- Globe oculaire ¬ *H44.5*
- Hépatocytes ¬ *K76.8*
- Hépato-lenticulaire
- - Wilson ¬ *E83.0*
- - ¬
- - - *E83.0*
- - - Maladie de Wilson [*E83.0*
- Hépatolenticulaire ¬ Démence au cours de *E83.0†*, *F02.8**
- Iris (pigmentaire) ¬ *H21.2*
- Macula
- - Liée âge
- - - Humide ¬ *H35.30*
- - - Néovasculaire ¬ *H35.30*
- - Pôle postérieur ¬ Autres *H35.38*
- Maladie fibrokystique du rein ¬ *Q61.8*
- Marginal
- - Pellucide ¬ *H18.4*
- - Terrien ¬ *H18.4*
- Media artérielle ¬ *I70.29*
- Ménisque ¬ *M23.3*
- Mönckeberg ¬ *I70.29*
- Multisystématisée ¬ *G23.2*
- Murale du cœur ¬ *I51.5*
- Myocarde ¬ *I51.5*
- Nerf optique ¬ *H47.0*
- Neuronale progressive de l'enfant avec maladie du foie ¬ *G31.88*
- Olivo-ponto-cérébelleuse
- - Familiale ¬ *G23.3*
- - Héréditaire ¬ *G23.3*
- Pallidale pigmentaire ¬ *G23.0*
- Pancréas ¬ *K86.88*
- Partie irienne de la rétine ¬ *H21.2*
- Pigmentaire de la rétine ¬ *H35.5*
- Pulpaire ¬ *K04.2*

Dégénérescence *–suite*
- Rebord pupillaire ¬ *H21.2*
- Rein polykystique de type adulte ¬ *Q61.2*
- Spinocérébelleuse-dystrophie cornéenne ¬ Syndrome de *G11.9*, *H18.5*
- Striatonigrique ¬ *G23.2*
- Syphilitique du myocarde ¬ *A52.0†*, *I52.0**
- Système nerveux liée à l'alcool ¬ *G31.2*
- Tapéto-rétinien ¬ Syndrome
- - Ataxie- *G11.9*, *H35.5*
- - Hypoplasie cérébelleuse- *Q04.3*
- Tuberculeuse de la moelle épinière ¬ *A17.8†*, *G07**
- Tunique intermédiaire artérielle ¬ *I70.29*
- Vasculaire ¬ *I70*
- Vitréo-rétinien
- - Flocons de neige ¬ *H35.5*
- - Wagner ¬ *H35.5*

Dégénérescence cérébelleuse
- Acquise ¬ *G31.9*
- Alcoolique ¬ *G31.2*
- Paranéoplasique ¬ *C80.9†*, *G32.8**
- ¬ Syndrome d'ichtyose-hépatosplénomégalie- *Q87.8*

Dégénérescence cérébrale
- Alcoolique ¬ *G31.2*
- Artériosclérotique ¬ *I67.2†*, *G32.8**
- Béribéri ¬ *E51.1†*, *G32.8**
- Cours
- - Carence en vitamine B12 ¬ *E53.8†*, *G32.8**
- - Lipidose
- - - Cérébrale ¬ *E75.4†*, *G32.8**
- - - Généralisée ¬ *E75.6†*, *G32.8**
- - Maladie
- - - Anderson-Fabry ¬ *E75.2†*, *G32.8**
- - - Niemann-Pick ¬ *E75.2†*, *G32.8**
- - Maladies des vaisseaux cérébraux ¬ *I67.9†*, *G32.8**
- - Mucopolysaccharidose ¬ *E76.3†*, *G32.8**
- - Myxœdème ¬ *E03.9†*, *G32.8**
- - Sphingolipidose ¬ *E75.3†*, *G32.8**
- - Syndrome
- - - Gaucher ¬ *E75.2†*, *G32.8**
- - - Hunter ¬ *E76.1†*, *G32.8**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†*, *G32.8**
- Sénile, non classée ailleurs ¬ *G31.1*

Dégénérescence des disques
- Intervertébral
- - Cervicaux
- - - Myélopathie ¬ *M50.0†*, *G99.2**
- - - Névrite ¬ *M50.1†*, *G55.1**
- - - Radiculopathie ¬ *M50.1†*, *G55.1**
- - Lombaires avec myélopathie ¬ *M51.0†*, *G99.2**
- - Thoraciques avec radiculopathie ¬ *M51.1†*, *G55.1**
- - ¬ Myélopathie avec *M51.0†*, *G99.2**

Dégénérescence des disques *–suite*
- Névrite ¬ *M51.1†, G55.1**
- Radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**

Dégénérescence graisseuse
- Alcoolique du foie ¬ *K70.0*
- Foie, non classée ailleurs ¬ *K76.0*
- Rein
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ *E10.20†, N29.8**
- - - 2 ¬ *E11.20†, N29.8**
- - ¬ *E14.20†, N29.8**

Dégénérescence maculaire
- Héréditaire ¬ *H35.5*
- Juvénile ¬ Hypotrichose avec *Q87.8*
- Liée à l'âge, sèche ¬ *H35.31*
- Myopique ¬ *H35.38*
- Stargardt ¬ *H35.5*
- Vitelliforme de l'adulte ¬ *H35.5*

Dégénérescence rétinienne
- Apparition tardive autosomique dominante ¬ *H35.5*
- Entrecroisée ¬ *H35.4*
- Microcystoïde ¬ *H35.4*
- Microphtalmie-glaucome ¬ Syndrome de *H35.5†, H42.8*, Q11.2*
- Palissade ¬ *H35.4*
- Pavimenteuse ¬ *H35.4*
- Périphérique ¬ *H35.4*
- Pigmentaire ¬ *H35.5*
- Réticulaire ¬ *H35.4*
- SAI ¬ *H35.4*

Déglutition
- Anormale ¬ Malocclusion due à: *K07.5*
- SAI ¬ Troubles de la *R13.9*
- Sang maternel ¬
- - Hématémèse et mélæna néonatals dus à une *P78.2*
- - Ictère néonatal dû à une *P58.5*

Degos
v./v.a. Dowling-Degos

Degos-Delort-Tricot ¬ Syndrome de *I77.88*

Dégradation glycoprotéine ¬ Défaut
- *E77.1*
- *E77.1*

DEH [Dysplasie ectodermique hypohidrotique] ¬ *Q82.4*

Déhiscence
- Canal semi-circulaire ¬ Syndrome de *H83.8*
- Plaie opératoire ¬ *T81.3*

Déhydrocholestérol réductase ¬ Déficit en 7- *Q87.1*

Déhydrogénase 1 ¬ Déficit en méthylènetétrahydrofolate *E88.8*

Dejerine
v./v.a. Landouzy-Dejerine
- Klumpke due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de *P14.1*

Déjerine
- Sottas ¬ Maladie de: *G60.0*
- Thomas ¬ Atrophie de *G23.3*

Del(5q) ¬ Syndrome myélodysplasique
- Associé à une anomalie chromosomique isolée *D46.6*
- Délétion isolée du chromosome 5 [*D46.6*

Délaissement et abandon ¬ *T74.0*

Délétion
- 1p36 ¬
- - *Q93.5*
- - Syndrome de *Q93.5*
- 4q25 proximale ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 6q terminale ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 10p13-p14 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 10q11.2 ¬ *Q93.5*
- 11p13
- - Tumeur de Wilms ¬ *C64, Q93.5*
- - ¬ *Q93.5*
- 15q11q13 d'origine paternelle ¬ Syndrome de Prader-Willi dû à une *Q87.1*
- 16p ¬ Syndrome d'alpha-thalassémie avec déficience intellectuelle par *Q93.5*
- 16q22 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 21q ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 22q13 ¬ *Q93.5*
- 22q13.3 ¬ *Q93.5*
- ADN mitochondrial associée à DNA2 ¬ Syndrome de *G71.3*
- Autosomes
- - Sans précision ¬ *Q93.9*
- - ¬ Autres *Q93.8*
- Bialléliques dans le cluster de gènes ATAD3 ¬ Syndrome létal d'hypoplasie pontocérébelleuse-hypotonie-insuffisance respiratoire dû à des *Q04.3*
- Bras
- - Court chromosome
- - - 4 ¬ *Q93.3*
- - - 5 ¬
- - - - *Q93.4*
- - - - Syndrome de *D46.6*
- - Long du chromosome 18 ¬ *Q93.5*
- Distale
- - 3p ¬ *Q93.5*
- - 17q ¬ *Q93.5*
- - 19p ¬ *Q93.5*
- - 19p13.3 ¬ *Q93.5*
- Homozygote 15q15.3 ¬ *Q93.5*
- Intragénique de NF1 ¬ Neurofibromatose type 1 par mutation ou *Q85.0*
- Inversée 8p ¬ Syndrome de duplication/ *Q92.5*
- Isolée du chromosome 5 [del(5q)] ¬ Syndrome myélodysplasique avec *D46.6*
- Multiples de l'ADN mitochondrial de l'adulte par déficit en DGUOK ¬ Syndrome de *G71.3*
- Partielle bras court chromosome

Délétion *–suite*
- Partielle bras court chromosome *–suite*
- - 4 ¬ *Q93.3*
- - 5 ¬ *Q93.4*
- Partielles d'un chromosome ¬ Autres *Q93.5*
- Proximale 12q ¬ Syndrome de *Q93.5*
- Réarrangements complexes ¬ *Q93.7*
- Subtélomérique 1p36 ¬ *Q93.5*
- Vues seulement à la prométaphase ¬ *Q93.6*

Délibéré
- E) ¬ Empoisonnement ou lésion auto-infligé(e) *X84.9!*
- Suicide) par moyens non précisés ¬ Effets non précisés de: lésion auto-infligée *T76*
- ¬ Lésion auto-infligée *X84.9!*

Délibérément ¬ Accident de véhicule à moteur causé *Y09.9!*

Délinquance «de groupe» ¬ *F91.2*

Délirant
- États délirants et hallucinatoires d'origine organique ¬ États *F06.2*
- Hallucinatoires d'origine organique ¬ États délirants et états *F06.2*
- Induit ¬ Trouble *F24*
- Organique [d'allure schizophrénique] ¬ Trouble *F06.2*
- Persistant, sans précision ¬ Trouble *F22.9*
- Persistants ¬ Autres troubles *F22.8*
- Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ Bouffée *F23.0*
- Symptômes schizophréniques ¬ Bouffée *F23.1*
- ¬
- - Dysmorphophobie
- - - *F22.8*
- - - Non *F45.2*
- - Trouble
- - - *F22.0*
- - - Psychotique aigu, essentiellement *F23.3*

Délire
- Anticholinergique ¬ *T44.3*
- Postopératoire ¬ *F05.8*
- Relation des sensitifs ¬ *F22.0*

Delirium
- Non surajouté à une démence, ainsi décrit ¬ *F05.0*
- Origine mixte ¬ *F05.8*
- Sans précision ¬ *F05.9*
- Surajouté à une démence ¬ *F05.1*
- ¬ Autres formes de *F05.8*

Délits commis en bande ¬ *F91.2*

Délivrance
- Troisième période) ¬ Hémorragie de la *O72.0*
- ¬ Hémorragie (du): consécutive à la *O72.1*

Delleman ¬ Syndrome de *Q87.8*

Delort
v./v.a. Degos-Delort-Tricot

Delta
v./v.a. Agent delta
- Bêta-thalassémie ¬ *D56.2*
- Type
- - 1 ¬ APDS [Syndrome d'activation de la phosphoinositide 3-kinase *D81.8*
- - 2 ¬ APDS [Syndrome d'activation de la phosphoinositide 3-kinase *D81.8*
- ¬
- - Déficit
- - - Granules alpha et *D69.1*
- - - Isolé de stockage des granules plaquettaires *D69.1*
- - Lymphome T cutané primitif de phénotype TCR gamma/ *C84.5*

Delta-aminolévulinate déshydratase ¬ Porphyrie par déficit en *E80.2*

Delta-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.08*

Delta-sarcoglycanopathie ¬ *G71.08*

Deltoïde ¬ Entorse et foulure de la cheville: Ligament *S93.41*

Demande
- Autorités ¬ Examen psychiatrique général à la *Z04.8*
- Expertise ¬ *Z04.8*

Démangeaison SAI ¬ *L29.9*

Démarche
- Ataxique ¬ *R26.0*
- Ébrieuse ¬ *R26.0*
- Instable
- - SAI ¬ *R26.8*
- - ¬ Retard de développement avec trouble du spectre de l'autisme et *F84.1*, *R26.8*
- Motilité, autres et non précisées ¬ Anomalies de la *R26.8*
- Paralytique ¬ *R26.1*
- Spastique ¬ *R26.1*

Démence
v./v.a. SIDA-démence
- Ainsi décrit ¬ Delirium non surajouté à une *F05.0*
- Alzheimer ¬ *G30.9†*, *F00.9**
- Artériopathique ¬ *F01*
- Atypique, de type Alzheimer ¬ *F00.2**
- Binswanger ¬ *F01.2*
- Blessure cranio-cérébrale ¬ *T90.9†*, *F02.8**
- Cérébrale frontale ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- Chorée de Huntington ¬ *F02.2**
- Corps de Lewy ¬ *G31.82†*, *F02.8**
- Cours
- - Atrophie cérébrale
- - - Circonscrite ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- - - Présénile ¬ *G31.88†*, *F02.8**
- - Carence
- - - Acide nicotinique ¬ *E52†*, *F02.8**
- - - Vitamine B12 ¬ *E53.8†*, *F02.8**
- - Dégénérescence hépatolenticulaire ¬ *E83.0†*, *F02.8**

Démence *–suite*
- Cours *–suite*
- - Encéphalopathie ¬ *G93.4†*, *F02.8**
- - Hypercalcémie ¬ *E83.58†*, *F02.8**
- - Hypothyroïdie acquise
- - - Due à une carence en iode ¬ *E01.8†*, *F02.8**
- - - ¬ *E03.9†*, *F02.8**
- - Intoxication au dioxyde de carbone ¬ *T58†*, *F02.8**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†*, *F02.8**
- - Maladie
- - - Alzheimer ¬ *G30.9†*, *F00.9**
- - - Parkinson ¬ *G20.90†*, *F02.3**
- - - Wilson ¬ *E83.0†*, *F02.8**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *F02.8**
- - Neurosyphilis ¬ *A52.1†*, *F02.8**
- - Paralysie agitante ¬ *G20.90†*, *F02.3**
- - Pellagre ¬ *E52†*, *F02.8**
- - Périartérite noueuse ¬ *M30.0†*, *F02.8**
- - Sclérose
- - - Alzheimer ¬ *G30.9†*, *F00.9**
- - - Cérébrale lobaire atrophique ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- - - Présénile ¬ *G30.0†*, *F00.0**
- - Sclérose en plaques ¬ *G35.9†*, *F02.8**
- - Trouble cérébral du métabolisme des lipides ¬ *E75.6†*, *F02.8**
- - Trypanosomiase africaine ¬ *B56.9†*, *F02.8**
- - Tumeur intracrânienne incertaine ¬ *D43.2†*, *F02.8**
- Dégénérative primaire
- - SAI ¬ *F03*
- - Type Alzheimer
- - - Apparition
- - - - Présénile ¬ *G30.0†*, *F00.0**
- - - - Sénile ¬ *G30.1†*, *F00.1**
- - - Début
- - - - Présénile ¬ *F00.0**
- - - - Sénile ¬ *F00.1**
- - - ¬ *G30.9†*, *F00.9**
- Dialytique ¬ *N18.5†*, *F02.8**
- Encéphalique ¬ *G04.9†*, *F02.8**
- Épileptique ¬ *G40.9†*, *F02.8**
- Fronto-temporale
- - FTD] ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- - Maladie du motoneurone ¬ *G31.0†*, *F02.0**, *G12.2*
- - Variante
- - - Atrophie temporale à droite ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- - - Comportementale ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- - ¬ Syndrome de myopathie à inclusions-maladie de Paget- *G71.8*, *G31.0*
- Guam-Parkinson ¬ Complexe de *G21.8†*, *F02.8**

Démence *–suite*
- Heller ¬ *F84.3*
- Infantile ¬ *F84.3*
- Inhalation de drogues ¬ *F18.7*
- Maladie
- - Alzheimer début
- - - Précoce (type 2) ¬ *G30.0†*, *F00.0**
- - - Tardif
- - - - Type 1) ¬ *G30.1†*, *F00.1**
- - - - ¬ *G30.1†*, *F00.1**
- - Creutzfeldt-Jakob ¬ *A81.0†*, *F02.1**
- - Pick ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- Neurodégénérative avec filaments intermédiaires associée à PRKAR1B ¬ *G31.88*
- Paralysante au cours de syphilis ¬ *A52.1†*, *F02.8**
- Paralysie agitante ¬ *F02.3**
- Parkinsonisme ¬ *F02.3**
- Prédominance corticale ¬ *F01.1*
- Présénile
- - Cours de maladie d'Alzheimer ¬ *G30.0†*, *F00.0**
- - SAI ¬ *F03*
- - Type Alzheimer ¬ *F00.0**
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B22†*, *F02.4**
- Pugilistique ¬ *F07.2*
- Sans précision ¬ *F03*
- Sémantique ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- Sénile
- - Cours de maladie d'Alzheimer ¬ *G30.1†*, *F00.1**
- - Forme dépressive ou paranoïde ¬ *F03*
- - SAI ¬ *F03*
- - Type Alzheimer (DSTA) ¬ *F00.1**
- Syphilitique progressive ¬ *A52.1†*, *F02.8**
- Type Alzheimer forme
- - Atypique ¬ *G30.8†*, *F00.2**
- - Mixte ¬ *G30.8†*, *F00.2**
- Urémique ¬ *N18.89†*, *F02.8**
- ¬
- - Agitation lors de *U63.4!*
- - Agressivité lors de *U63.4!*
- - Apathie lors de *U63.3!*
- - Chorée de Huntington avec *G10†*, *F02.2**
- - Delirium surajouté à une *F05.1*
- - Désinhibition lors de *U63.5!*
- - Maladie
- - - Due au VIH avec *B22†*, *F02.4**
- - - Huntington avec *G10†*, *F02.2**
- - - Parkinson avec *G20.90†*, *F02.3**
- - Pseudosclérose spastique avec *A81.0†*, *F02.1**
- - Symptôme
- - - Affectifs lors de *U63.1!*
- - - Anxieux lors de *U63.2!*
- - - Psychotiques lors de *U63.0!*

Démence *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Vagabondage lors de *U63.6!*

Démence paralytique
- Congénitale ¬ *A50.4†, F02.8**
- Juvénile
- - Syphilitique ¬ *A50.4†, F02.8**
- - ¬ *A50.4†, F02.8**
- Syphilitique progressive ¬ *A52.1†, F02.8**
- ¬ *A52.1†, F02.8**

Démence vasculaire
- Début aigu ¬ *F01.0*
- Infarctus multiples ¬ *F01.1*
- Mixte, corticale et sous-corticale ¬ *F01.3*
- Sans précision ¬ *F01.9*
- Sous-corticale ¬ *F01.2*
- ¬ Autres formes de *F01.8*

Demeure
- Implanté chirurgicalement ¬ Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à *Z45.20*
- Mis en place par voie chirurgicale ¬ Présence d'un système de cathéter vasculaire à *Z95.81*
- ¬ Complication mécanique d'une sonde urinaire (à *T83.0*

Deminutus ¬ Infestation par: Ternidens *B81.8*

DEMMI De Morton Mobility Index
- 0-30 points ¬ *U53.31*
- 33-36 points ¬ *U53.21*
- 39-53 points ¬ *U53.11*
- 57-100 points ¬ *U53.01*

Démodécie ¬ *B88.0*

Demodex ¬
- Dermatite des paupières due à l'espèce *B88.0†, H03.0**
- Dermite due à *B88.0*

Demons-Meigs ¬ Syndrome de *D27*

Démyélinisante
- Aiguë disséminée, sans précision ¬ Affection *G36.9*
- Aiguës disséminées précisées ¬ Autres affections *G36.8*
- Corps calleux ¬ Encéphalopathie *G37.1*
- Inflammatoire aiguë ¬ Polyradiculonévrite *G61.0*
- Précisées du système nerveux central ¬ Autres affections *G37.8*
- Système nerveux
- - Central
- - - Sans précision ¬ Affection *G37.9*
- - - ¬ Myélite transverse aiguë au cours d'affections *G37.3*
- - Périphérique ¬ Maladie *G62.88*

Démyélinisation
- Centrale du corps calleux ¬ *G37.1*
- Cerveau par déficit en méthionine adénosyltransférase ¬ *E72.1*

Démyélinisation *–suite*
- Concentrique ¬ *G37.5*
- Cours d'une névrite optique ¬ *G36.0*
- ¬ Maladie due au VIH avec *B22†, G94.8**

Den Hoed-De Boer-Voisin ¬ Syndrome de *Q87.8*

Denborough
v./v.a. King-Denborough

DEND retard de développement épilepsie diabète néonatal
- Forme intermédiaire ¬ Syndrome *E10.40*
- ¬ Syndrome *E10.40*

Dendritica à herpès simplex ¬ Keratitis *B00.5†, H19.1**

Dendriticum
- Cornée à herpès simplex ¬ Ulcus *B00.5†, H19.1**
- ¬ Infection Dicrocoelium
- - *B66.2*
- - *B66.2*

Dendritique
v./v.a. Cellule dendritique
- Blastiques [TCPDB] ¬ Tumeur à cellules plasmacytoïdes *C86.4*
- Disciforme ¬ Kératite *H19.1**

Dénervation afférente chirurgicale ¬ Vessie neurogène: après *N31.2*

Dengue
- Hémorragique
- - Grade
- - - 1 ¬ *A97.0*
- - - 2 ¬ *A97.0*
- - Sans signes d'alerte ¬ *A97.0*
- - Sévère ¬ *A97.2*
- - Signes d'alertes ¬ *A97.1*
- - ¬ DHF [*A97.9*
- Sans signes d'alerte ¬ *A97.0*
- Sévère ¬ *A97.2*
- Signes d'alerte ¬ *A97.1*
- ¬
- - *A97.9*
- - Maladie à virus de la *A97.9*
- - Vaccination contre la *Z25.8*

Dennis
v./v.a. Medeira-Dennis-Donnai

Dennis-Fairhurst-Moore ¬ Syndrome de *Q87.0*

Denrées alimentaires ¬ Asthme dû aux *J45.09*

Dens in dente ¬ *K00.2*

Densité
- LDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse *E78.0*
- Structure osseux
- - Sans précision ¬ Anomalie de la *M85.9*
- - ¬ Autres anomalies précisées de la *M85.8*
- VLDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de très basse *E78.1*
- ¬ Déficit en: lipoprotéines de haute *E78.6*

Dent
- Adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des *K07.3*
- Allongée ¬ *K00.2*
- Appareil alvéolaire ¬ Autres affections précisées des *K08.88*
- Bétel ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Bruxisme) psychogène ¬ Grincement des *F45.8*
- Cassée ¬ *S02.5*
- Conique ¬ *K00.2*
- Consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée ¬ Perte de *K08.1*
- Coquille ¬ *K00.5*
- Dents adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces *K07.3*
- Due
- - Médicaments ¬ Érosion des *K03.2*
- - Régime alimentaire ¬ Érosion des *K03.2*
- - Vomissements persistants ¬ Érosion des *K03.2*
- Enclavées ¬ *K01.1*
- Évaginée ¬ *K00.2*
- Extrinsèque SAI ¬ Pigmentation des *K03.6*
- Hutchinson dues à une syphilis congénitale ¬ *A50.5*
- Hypoplasique de Turner ¬ *K00.4*
- Idiopathique ¬ Érosion des *K03.2*
- Incluses
- - Enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ *K07.3*
- - ¬ *K01.0*
- Inférieures ¬ Occlusion linguale postérieure des *K07.2*
- Invaginée ¬ *K00.2*
- Jumelles ¬ *K00.2*
- Materia alba ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Médiale causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- Naissance, type Turnpenny ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique- *Q82.8*
- Natale ¬ *K00.6*
- Néonatale ¬ *K00.6*
- Noir ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Ongle de Fried ¬ Syndrome *Q82.8*
- Opalescentes sans OI ¬ *K00.5*
- Orange ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Parodonte, sans précision ¬ Affection des *K08.9*
- Précoce ¬ *K00.6*
- Professionnelle ¬ Érosion des *K03.2*
- SAI ¬
- - Érosion des *K03.2*
- - Pigmentation
- - - *K03.6*
- - - Intrinsèque des *K00.8*

Dent *–suite*
- SAI ¬ *–suite*
- - Troubles du développement des *K00.9*
- Supplémentaire
- - Causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- - ¬ *K00.1*
- Surnuméraire
- - Causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- - ¬ *K00.1*
- Tabac ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Tachetées ¬ *K00.3*
- Temporaire
- - Persistantes] ¬ Rétention dentaire [*K00.6*
- - ¬ Chute prématurée des *K00.6*
- Vert ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- ¬
- - Abrasion
- - - *K03.1*
- - - Dentifrice des *K03.1*
- - - Habituelle des *K03.1*
- - - Professionnelle des *K03.1*
- - - Rituelle des *K03.1*
- - - Traditionnelle des *K03.1*
- - Anomalie en coin SAI des *K03.1*
- - Anomalies de volume et de forme des *K00.2*
- - Attrition excessive des *K03.0*
- - Changement de couleur pendant la formation de la *K00.8*
- - Chevauchement d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Dent
- - - Médiale causant un rapprochement des *K07.3*
- - - Supplémentaire causant un rapprochement des *K07.3*
- - - Surnuméraire causant un rapprochement des *K07.3*
- - Déplacement d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- - Diastème d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Érosion des *K03.2*
- - Espacement anormal d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Fracture pathologique de *K08.81*
- - Maladie de *N25.8*
- - Malposition des *K07.3*
- - Paramolaire causant un rapprochement des *K07.3*
- - Résorption pathologique des *K03.3*
- - Rotation d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Transposition d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Troubles de la formation des *K00.4*
- - Usure
- - - Occlusale des *K03.0*
- - - Proximale des *K03.0*

Dentaire
v./v.a. dermo-dentaire
v./v.a. oculo-dentaire
v./v.a. oculo-squeletto-dentaire
v./v.a. oto-dentaire
v./v.a. Tissu dentaire
v./v.a. tricho-dentaire
- Antérieure) (postérieure) ¬ Béance occlusale *K07.2*
- Complète)(partielle) ¬ Prothèse *Z97.8*
- Cours de scorbut ¬ Inflammation des alvéoles *E54†, K93.8**
- Dents temporaires persistantes] ¬ Rétention *K00.6*
- Due
- - Causes générales ¬ Exfoliation *K08.0*
- - Dysfonctionnement oro-facial ¬ Malocclusion *K07.5*
- Externe) ¬ Résorption *K03.3*
- Fistule ¬ Abcès: *K04.6*
- Inactive ¬ Carie *K02.3*
- Laissée en place ¬ Racine *K08.3*
- Liés au développement (odontogènes) ¬ Kystes *K09.0*
- Non classées ailleurs ¬ Anomalies héréditaires de la structure *K00.5*
- Prématurée ¬ Éruption *K00.6*
- Retard de développement et déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'aplasie cutanée congénitale avec hypoplasie de l'émail *Q87.8*
- SAI ¬
- - Abcès: *K04.7*
- - Algies *K08.8*
- Sans précision ¬ Carie *K02.9*
- Sélective ¬ Agénésie *K00.0*
- Sous-gingival ¬ Tartre (*K03.6*
- Stabilisée ¬ Carie *K02.3*
- Supra-gingival ¬ Tartre (*K03.6*
- Usage topique ¬ Intoxication: Médicaments *T49.7*
- Vertébrales ¬ Syndrome de polydactylie postaxiale-anomalies *Q87.2*
- ¬
- - Affections (des): *Z13.8*
- - Ankylose *K03.5*
- - Anomalies de rapport entre les arcades *K07.2*
- - Caries *K02.8*
- - Concrescence *K00.2*
- - Déchaussement *K08.88*
- - Déviation médiane de l'arcade *K07.2*
- - Dislocation du germe *K00.4*
- - Examen *Z01.2*
- - Fluorose *K00.3*
- - Fracture *S02.5*
- - Fusion *K00.2*
- - Gémination *K00.2*
- - Kyste
- - - Lame *K09.0*

Dentaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Kyste *–suite*
- - - Lié à l'éruption *K09.0*
- - - Région buccale non liés au développement *K09.1*
- - Luxation *S03.2*
- - Mise en place et ajustement d'une prothèse *Z46.3*
- - Présence d'implants maxillaires et sur racines *Z96.5*
- - Syndrome
- - - Déficit en stéroïde déshydrogénase-anomalies *K76.8*
- - - Éruption *K00.7*
- - Troubles de l'éruption *K00.6*

Dentato-rubro-pallido-luysienne ¬ Atrophie *G11.8*

Dente ¬ Dens in *K00.2*

Denticules ¬ *K04.2*

Dentifrice des dents ¬ Abrasion: par *K03.1*

Dentigère ¬ Kyste: *K09.0*

Dentine
- Secondaire ou irrégulière ¬ *K04.3*
- ¬
- - Carie de la *K02.1*
- - Dysplasie de la *K00.5*
- - Hypersensibilité de la *K03.8*

Dentinogenèse imparfaite
- Petite taille-surdité-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Type 2 ¬ *K00.5*

Dentition anormale ¬ Syndrome de dysplasie spondylo-épimétaphysaire- *Q77.7*

Dento
v./v.a. lacrymo-auriculo-dento-digital
- Alvéolaire
- - Fistule ¬ Abcès: *K04.6*
- - SAI ¬ Abcès: *K04.7*
- Digitale ¬ Dysplasie oculo- *Q87.0*
- Facial
- - Fonctionnelles ¬ Anomalies *K07.5*
- - Sans précision ¬ Anomalie *K07.9*
- - ¬ Autres anomalies *K07.8*

Denys-Drash ¬ Syndrome de *N04.1*

Départ du foyer pendant l'enfance ¬ *Z61*

Dépassant premier degré ¬
- Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées *T29.1*
- Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées *T29.5*

Dépendance
- Analgésiques ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.2*
- Antiacides ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.3*
- Antidépresseurs ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.0*
- Bétaïne clorale ¬ *F13.2*

Dépendance *–suite*
- Due à une mobilité restreinte ¬ Difficultés liées à: *Z74.0*
- Envers personne donne soin
- - Sans précision ¬ Difficulté liée à une *Z74.9*
- - ¬ Autres difficultés liées à une *Z74.8*
- Gabapentine ¬ *F13.2*
- Laxatifs ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.1*
- Longue durée
- - Envers
- - - Appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé ¬ *Z99.9*
- - - Appareils
- - - - Prise en charge des sécrétions ¬ *Z99.0*
- - - - Soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires ¬ *Z99.8*
- - - Aspirateur
- - - - Sans précision ¬ *Z99.0*
- - - - ¬ *Z99.0*
- - - Cœur artificiel ¬ *Z99.4*
- - - Dialyse en cas d'insuffisance rénale ¬ *Z99.2*
- - - Fauteuil roulant ¬ *Z99.3*
- - - Insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la toux) ¬ *Z99.0*
- - - Respirateur ¬ *Z99.1*
- - Respirateur ¬ *Z99.1*
- Médicamenteuse ¬ Syndromes de sevrage lors de *F19.3*
- Multiple ¬ *F19.2*
- Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.6*
- Prégabaline ¬ *F13.2*
- Propofol ¬ *F19.2*
- Stéroïdes et hormones ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.5*
- Substance
- - Non précisée ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.9*
- - ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.8*
- Vitamines ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.4*
- ¬ Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une *R78.4*

Dépendant
- Asthénique) ¬ Trouble de la personnalité: *F60.7*
- Biotine ¬ Déficit en carboxylase *D81.8*
- Gonadotropines ¬ Puberté précoce *E22.8*
- Pendant un congé de ses proches ¬ Prise en charge d'une personne *Z75.8*
- ¬
- - Déficit en carboxylase biotine- *D81.8*
- - Fièvre récurrente cycle menstruel- *N94.8*
- - Hypercorticisme hypophyso- *E24.0*
- - Maladie de Cushing hypophyso- *E24.0*

Dépendant *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Personnalité *F60.7*
- - Rachitisme hypocalcémique vitamine D- *E83.31*

Dépérissement ¬ Maladie due au VIH avec syndrome de *B22*

Dépersonnalisation-déréalisation ¬ Syndrome de *F48.1*

Dépistage
v./v.a. Examen spécial de dépistage
- Hémoglobinopathie ¬ *Z36.8*
- Prénatal
- - Amniocentèse ¬ Autres *Z36.2*
- - Anomalies chromosomiques ¬ *Z36.0*
- - Iso-immunisation ¬ *Z36.5*
- - Malformations par échographie et autres méthodes physiques ¬ *Z36.3*
- - Retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ *Z36.4*
- - Sans précision ¬ *Z36.9*
- - Taux élevé d'alpha-fœtoprotéines ¬ *Z36.1*
- - ¬ Autres *Z36.8*
- SARS-CoV-2 ¬ Procédures spéciales pour le *Z11*, *U99.0!*

Déplacement
- Acquis du cristallin ¬ *H27.8*
- Clampage du cordon ombilical ¬ *P51.8*
- Congénital
- - Estomac ¬ *Q40.2*
- - Œsophage ¬ *Q39.8*
- - Rein ¬ *Q63.2*
- Disque intervertébral ¬
- - Myélopathie avec *M51.0†, G99.2**
- - Névrite
- - - Due à un *M51.1†, G55.1**
- - - Nerf
- - - - Brachial due au *M50.1†, G55.1**
- - - - Sciatique due au *M51.1†, G55.1**
- - - Plexus brachial due au *M50.1†, G55.1**
- - Radiculite
- - - Cervicale due au *M50.1†, G55.1**
- - - Due au *M51.1†, G55.1**
- Due) à une prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Latéral) du globe SAI ¬ *H05.2*
- Médiastin ¬ *J98.58*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*
- SAI ¬ Fracture: avec: *T14.2*
- Uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*

Déplétion
- ADN mitochondrial forme
- - Encéphalomyopathique
- - - Acidurie méthylmalonique ¬ Syndrome de *G31.81*, *E71.1*
- - - Anomalies cranio-faciales variables ¬ Syndrome de *G31.81*, *Q75.9*

Déplétion *–suite*
- ADN mitochondrial forme *–suite*
- - Encéphalomyopathique *–suite*
- - - Tubulopathie rénale ¬ *G31.81†, N16.8**
- - Hépatocérébrale par déficit en DGUOK ¬ *G31.81*
- - Hépato-cérébro-rénale ¬ *G31.81*
- - Myopathique ¬ *G71.3*
- Hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: *O21.1*
- Lymphocytaire
- - Fibrose diffuse ¬ Lymphome de Hodgkin classique en *C81.3*
- - ¬ Lymphome de Hodgkin classique
- - - *C81.3*
- - - Type réticulaire en *C81.3*
- Mitochondriale focale ¬ Myopathie proximale avec *G71.3*
- Volume du plasma ou du liquide extracellulaire ¬ *E86*

Dépolarisation
- Auriculaire prématurée ¬ *I49.1*
- Jonctionnelle prématurée ¬ *I49.2*
- Prématurées, autres et sans précision ¬ *I49.4*
- Ventriculaire prématurée ¬ *I49.3*

Dépôt
- Accrétion sur dent
- - Bétel ¬ *K03.6*
- - Materia alba ¬ *K03.6*
- - Noir ¬ *K03.6*
- - Orange ¬ *K03.6*
- - Tabac ¬ *K03.6*
- - Vert ¬ *K03.6*
- - ¬ *K03.6*
- Affections dégénératives de la conjonctive ¬ *H11.1*
- Calciques dans une bourse séreuse ¬ *M71.4*
- Collagène de type III ¬ Glomérulopathie à *N07.6*
- Conjonctival ¬ Amylose avec *E85.4†, H13.8**
- Cornéens ¬ Pigmentation et *H18.0*
- Fibronectine ¬ Glomérulopathie à *N07.6*
- Hydroxyapatite ¬ Maladie par *M11.0*
- Immunoglobuline monoclonale ¬ Maladie des *D47.7*
- Iode ¬ Inflammation des glandes salivaires au cours d'une réaction à des *K11.2*
- Métallique dans le cristallin ¬ *H26.88*
- Paraamyloïde ¬ *E85.88*
- Pyrophosphate calcium dihydraté
- - Articulation
- - - Coude ¬ CPPD familiale [Maladie des *M11.12*
- - - Genou ¬ CPPD familiale [Maladie des *M11.16*

Dépôt *–suite*
- Pyrophosphate calcium dihydraté *–suite*
- - Articulation de l'épaule ¬ CPPD familiale [Maladie des *M11.11*
- - Colonne vertébrale ¬ CPPD familiale [Maladie des *M11.18*
- - Main ¬ CPPD familiale [Maladie des *M11.14*
- - Pied ¬ CPPD familiale [Maladie des *M11.17*
- - Poignet ¬ CPPD familiale [Maladie des *M11.13*
- - Région pelvienne ¬ CPPD familiale [Maladie des *M11.15*
- - Sièges multiples ¬ CPPD familiale [Maladie des *M11.10*
- - ¬ CPPD familiale [Maladie des *M11.19*

Dépresseurs centraux du tonus musculaire ¬ Intoxication: Antiparkinsoniens et autres *T42.8*

Dépressif
v./v.a. Type de maladie

Dépression
v./v.a. Échelle de dépression
- Accouchement SAI ¬ *F53.0*
- Agitée épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- Anxieux
- - Légère ou non persistante) ¬ *F41.2*
- - Persistante ¬ *F34.1*
- Atypique ¬ *F32.8*
- Endogène
- - Sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- - Symptômes psychotiques ¬ *F33.3*
- Légère ou moyenne ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de *F31.3*
- Majeur
- - Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- - Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- - Symptôme psychotique ¬ épisode
- - - Isolés de: *F32.3*
- - - Récurrents sévères de: *F33.3*
- Masquée» SAI ¬ Episodes isolés d'une *F32.8*
- Médullaire
- - Due à une toxicité ¬ *D61.9*
- - ¬ *D61.9*
- Névrotique ¬ *F34.1*
- Os du crâne ¬ *Q67.4*
- Post-partum SAI ¬ *F53.0*
- Post-schizophrénique ¬ *F20.4*
- Psychogène ¬ épisode
- - Isolés de: *F32*
- - Récurrents de (F33.0 ou F33.1): *F33*
- Psychotique ¬ épisode
- - Isolés de: *F32.3*
- - Récurrents sévères de: *F33.3*
- Réactionnel ¬ épisode

Dépression *–suite*
- Réactionnel ¬ épisode *–suite*
- - Isolés de: *F32*
- - Récurrents de (F33.0 ou F33.1): *F33*
- SAI ¬ *F32.9*
- Sévère
- - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de *F31.4*
- - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de *F31.5*
- Unipolaire SAI ¬ *F33.9*
- Vital
- - Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- - Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- ¬ Troubles des conduites avec *F92.0*

Deprez
v./v.a. Verloes-Deprez

Dercum] ¬ Lipomatose douloureuse [maladie de *E88.29*

Déréalisation ¬ Syndrome de dépersonnalisation- *F48.1*

Dérèglement
- Déficit immunitaire lié à PLCG2 [APLAID] ¬ Syndrome auto-inflammatoire- *M35.8*
- Immunitaire
- - Anomalies craniofaciales-surdité-athélie-retard de développement ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Début précoce
- - - Déficit complet en DOCK11 ¬ *M35.8*
- - - Immunité par déficit partiel en DOCK11 ¬ *M35.8*
- - Haploinsuffisance en AIOLOS ¬ Déficit immunitaire avec *D84.8*
- - Maladie inflammatoire de l 'intestin-arthrite-infections récurrentes-lymphopénie ¬ Syndrome de *D84.8*
- - Polyendocrinopathie-entéropathie lié à l'X ¬ Syndrome de *E31.0*

Dérivation
- Anastomose intestinale ¬ Status post *Z98.0*
- Intestinale ¬ Arthrite après *M02.0*
- LCR ¬ *Z98.2*

Dérivé
- 4-aminophénol ¬ Intoxication par des *T39.1*
- Aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues ¬ Effet toxique: *T65.3*
- Azole ¬ Allergie aux *T88.7*
- Cannabis ¬
- - Intoxication au *T40.7*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F12*
- Halogéné hydrocarbures
- - Aliphatiques
- - - Aromatiques, sans précision ¬ Effet toxique: *T53.9*
- - - ¬ Effet toxique: Autres *T53.6*
- - Aromatiques ¬ Effet toxique: Autres *T53.7*

Dérivé *–suite*
- Hydantoïne ¬ Intoxication
- - *T42.0*
- - *T42.0*
- Hydroxyquinoléine ¬ *T37.8*
- Mülléríens-lymphangiectasies-polydactylie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Pétrole ¬ Effet toxique: Produits *T52.0*
- Phénothiazine ¬ Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques *T43.3*
- Pyrazolés ¬ Intoxication: *T39.2*
- Rapamycine ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*
- Scopolamine ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*
- Triazole ¬ Allergie aux *T88.7*
- ¬
- - Acide nicotinique (*T46.7*
- - Associations et *T38.5*
- - Hormones parathyroïdiennes et leurs *T50.9*
- - Intoxication
- - - Cannabis (*T40.7*
- - - Hormones thyroïdiennes et leurs *T38.1*

Dermanyssus gallinae ¬ Dermite due à *B88.0*

Dermatillomanie ¬ *F63.9*

Dermatite
- Diabétique ¬ *E14.60†, L99.8**
- Diphtérique ¬ *A36.3*
- Due
- - Acariens ¬ *B88.0*
- - Amibes ¬ *A06.7*
- - Aoûtats ¬ *B88.0*
- Érysipélateuse ¬ *L00.0*
- Exfoliatrice staphylococcique du nourrisson ¬ *L00.0*
- Granulomateuse interstitielle-arthrite [IGDA] ¬ Syndrome de *M30.1*
- Herpétiforme sénile ¬ *L12.0*
- Infectieuse associée au virus T-lymphotrope humain de type I ¬ *L30.3*
- Migrante ¬ *B83.1*
- Paupières due à l'espèce Demodex ¬ *B88.0†, H03.0**
- Pellagreuse ¬ *E52*
- Polymorphe douloureuse de Brocq ¬ *L13.0*
- Psoriasiforme ¬ Syndrome de microcéphalie-cataracte congénitale- *Q87.8*
- Pustuleuse contagieuse ovine] ¬ Orf [*B08.0*
- Rampante ¬ *L40.2*
- Séborrhéique-like avec des éléments psoriasiques ¬ *L21.8*
- Sévère
- - Allergies multiples-cachexie métabolique] ¬ Syndrome SAM [*Q80.8*
- - ¬ Syndrome d'agammaglobulinémie-microcéphalie-craniosténose- *D80.0*
- Végétante ¬ *L40.2*
- Verruqueuse ¬ *B43.0*

Dermato-arthrite lipoïdique
- Articulation
- - Cheville ¬ *E78.88†, M14.37**
- - Coude ¬ *E78.88†, M14.32**
- - Genou ¬ *E78.88†, M14.36**
- - Hanche ¬ *E78.88†, M14.35**
- - Interphalangienne de la main ¬ *E78.88†, M14.34**
- - Poignet ¬ *E78.88†, M14.33**
- Articulation de l'épaule ¬ *E78.88†, M14.31**
- Colonne vertébrale ¬ *E78.88†, M14.38**
- ¬ *E78.88†, M14.39**

Dermatobia hominis ¬ Myiase furonculoïde à *B87.0*

Dermatofibrosarcoma protuberans
- Cuir chevelu ¬ *C44.4*
- Paroi abdominale ¬ *C44.59*
- Peau
- - Cou ¬ *C44.4*
- - Dos ¬ *C44.59*
- - Lésion à localisations contiguës de la peau ¬ *C44.8*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C44.7*
- - - Supérieurs ¬ *C44.6*
- - Tronc ¬ *C44.59*
- ¬ *C44.9*

Dermatofibrosarcome ¬ *C44.9*

Dermatoglyphes ¬ Anomalies des *Q82.8*

Dermatoleucodystrophie ¬ *E75.2†, L99.8**

Dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies *Q87.8*

Dermatolysis palpebrarum ¬ *H02.3*

Dermatomucomyosite ¬ *M33.1*

Dermatomycose ¬ Maladie due au VIH avec *B20, B36.9*

Dermatomyosite
- Atteinte pulmonaire ¬ *M33.9†, J99.1**
- Cours de tumeur NCA ¬ *D48.9†, M36.0**
- Juvénile ¬ *M33.0*
- Néonatale ¬ *M33.0*
- ¬
- - *M33.1*
- - *M33.1*

Dermato-ostéolyse type Kirghize ¬ *Q82.8, M89.59*

Dermatopathie réticulaire pigmentaire ¬ *Q82.4*

Dermatophytide ¬ *L30.2*

Dermatophytie ¬
- Dermatophytose
- - Barbe [*B35.0*
- - Cuir chevelu [*B35.0*
- - Disséminée [*B35.8*
- - Granulomateuse [*B35.8*

Dermatophytie ¬ *–suite*
- Dermatophytose *–suite*
- - Profonde [*B35.8*
- Maladie due au VIH avec dermatophytose [*B20, B35.9*

Dermatophytique ¬ Onyxis *B35.1*

Dermatophytose
- Aine ¬ *B35.6*
- Barbe [dermatophytie] ¬ *B35.0*
- Cuir chevelu [dermatophytie] ¬ *B35.0*
- Dermatophytie] ¬ Maladie due au VIH avec *B20, B35.9*
- Disséminée [dermatophytie] ¬ *B35.8*
- Granulomateuse [dermatophytie] ¬ *B35.8*
- Main ¬ *B35.2*
- Ongle ¬ *B35.1*
- Pied ¬ *B35.3*
- Profonde
- - Dermatophytie] ¬ *B35.8*
- - ¬ *B35.8*
- Sycosis ¬ *B35.0*

Dermato-polymyosite
- Cours de tumeur NCA ¬ *D48.9†, M36.0**
- Sans précision ¬ *M33.9*

Dermatose
- Acantholytique transitoire [Grover] ¬ *L11.1*
- Bulleux
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *L14**
- - Précisées ¬ Autres *L13.8*
- - Sans précision ¬ *L13.9*
- Érosive et vésiculaire congénitale ¬ *P83.8*
- Gonorrhéique ¬ *A54.8†, L99.8**
- Herpétiforme ¬ *L13.0*
- IgA linéaire ¬ *L13.8*
- Neutrophile
- - Aiguë fébrile [Syndrome de Sweet] ¬ *L98.2*
- - Atypique chronique-lipodystrophie-fièvre] ¬ Syndrome CANDLE [*M35.8*
- - Fébrile [Sweet] ¬ *L98.2*
- Non infectieuses de la paupière ¬ *H01.1*
- Papuleuse noire ¬ *L82*
- Psychogène ¬ *F54, L98.9*
- Psychosomatogène ¬ *F54, L98.9*
- Purpurique pigmentée ¬ *L81.7*
- Pustuleux
- - Érosive du cuir chevelu ¬ *L30.8*
- - Sous-cornée ¬ *L13.1*
- Réticulée des plis ¬ *L81.8*
- ¬
- - Impétiginisation d'autres *L01.1*
- - Syndrome infantile de fièvre récurrente-panniculite- *M35.8*

Dermatosparaxis ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Dermatostomatite type Stevens-Johnson ¬ *L51.1*

Derme
- Moyen ¬ Elastolyse du *L90.8*
- Tissu sous-cutané ¬ Déficit tissulaire limité à la peau [*I70.24*
- ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le *L89.1*

Dermique
- Aires ¬ Hypoplasie *Q82.8*
- Congénital ¬ Sinus *L05.9*
- Congénitale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de retard de croissance sévère-strabisme-mélanocytose *Q87.8*
- Facial focale
- - Type I ¬ Dysplasie *Q82.8*
- - ¬ Dysplasie *Q82.8*
- Focale tardive ¬ Elastose *L98.8*
- Papillaire, type pseudoxanthome élastique ¬ Elastolyse *L90.8*
- ¬ Dysplasie cérébello-trigéminale *Q87.8*

Dermite
- Allergique
- - Contact
- - - Cause non précisée ¬ *L23.9*
- - - Due
- - - - Adhésifs ¬ *L23.1*
- - - - Agents ¬ *L23.8*
- - - - Aliments en contact avec la peau ¬ *L23.6*
- - - - Cosmétiques ¬ *L23.2*
- - - - Médicaments en contact avec la peau ¬ *L23.3*
- - - - Métaux ¬ *L23.0*
- - - - Produits chimiques ¬ *L23.5*
- - - - Teintures ¬ *L23.4*
- - - - Végétaux, sauf aliments ¬ *L23.7*
- - Paupière ¬ *H01.1*
- Atopique endogène
- - Sans précision ¬ *L20.9*
- - ¬ Autres *L20.8*
- Breloque ¬
- - *L56.2*
- - Dermite de photocontact [*L56.2*
- Cercarienne ¬ *B65.3*
- Contact
- - Paupière ¬ *H01.1*
- - Professionnelle) SAI ¬ *L25.9*
- - Sans précision
- - - Cause non précisée ¬ *L25.9*
- - - Due
- - - - Agents ¬ *L25.8*
- - - - Aliments en contact avec la peau ¬ *L25.4*
- - - - Cosmétiques ¬ *L25.0*
- - - - Médicaments en contact avec la peau ¬ *L25.1*
- - - - Produits chimiques ¬ *L25.3*
- - - - Teintures ¬ *L25.2*

Dermite *–suite*
- Contact *–suite*
- - Sans précision *–suite*
- - - Due *–suite*
- - - - Végétaux, sauf aliments ¬ *L25.5*
- - Toxique par contact cutané avec un médicament ¬ *L24.4*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, L99.8**
- Due
- - Demodex ¬ *B88.0*
- - Dermanyssus gallinae ¬ *B88.0*
- - Feu] ¬ Érythème dû au feu [*L59.0*
- - Ingestion d'aliments ¬ *L27.2*
- - Liponyssoides sanguineus ¬ *B88.0*
- - Substance
- - - Non précisée prise par voie interne ¬ *L27.9*
- - - Prises par voie interne ¬ *L27.8*
- Eczémateuse de la paupière ¬ *H01.1*
- Eczématoïde
- - Déshydratation ¬ *L30.8*
- - Infectieuse ¬ *L30.3*
- - ¬ *L30.3*
- Exfoliatrice ¬ *L26*
- Factice ¬ *L98.1*
- Fessière du nourrisson ¬ *L22*
- Gangréneuse ¬
- - *L08.0*
- - *L88*
- Herpétiforme ¬ *L13.0*
- Irritant contact
- - Cause non précisée ¬ *L24.9*
- - Due
- - - Agents ¬ *L24.8*
- - - Aliments en contact avec la peau ¬ *L24.6*
- - - Cosmétiques ¬ *L24.3*
- - - Détergents ¬ *L24.0*
- - - Huiles et aux graisses ¬ *L24.1*
- - - Médicaments en contact avec la peau ¬ *L24.4*
- - - Produits chimiques ¬ *L24.5*
- - - Solvants ¬ *L24.2*
- - - Végétaux, sauf aliments ¬ *L24.7*
- Non allergique de contact ¬ *L24*
- Nummulaire ¬ *L30.0*
- Paupière due au virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H03.1**
- Peau sèche ¬ *L85.3*
- Périorale ¬ *L71.0*
- Photocontact [dermite de breloque] ¬ *L56.2*
- Précisées ¬ Autres *L30.8*
- Purulente ¬ *L08.0*
- Sans précision ¬ *L30.9*
- Séborrhéique
- - Infantile ¬ *L21.1*
- - Sans précision ¬ *L21.9*
- - ¬ Autres *L21.8*

Dermite *–suite*
- Septique ¬ *L08.0*
- Solaire ¬ *L57.8*
- Stase SAI ¬ *I83.1*
- Suppurée ¬ *L08.0*
- Toxique due à un irritant exogène, n.c.a. ¬ *L24.9*
- Vésiculaire
- - Due au virus de l'herpès ¬ *B00.1*
- - Lèvre due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ *B00.1*
- - Oreille due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ *B00.1*

Dermo-chondro-cornéenne ¬ Dystrophie *Q87.8*

Dermo-dentaire ¬ Dysplasie *Q82.4*

Dermographisme
- Urticarien ¬ *L50.3*
- ¬ *L50.3*

Dermoïde
- Angle ponto-cérébelleux ¬ Kyste *D33.1*
- Annulaire limbique ¬ *D31.1*
- Bouche ¬ Kyste: *K09.8*
- Cerveau ¬ Kyste *D33.2*
- Cervical ¬ Kyste *D36.7*
- Cornéen lié à l'X ¬ *D31.1*
- Encéphale ¬ Kyste *D33.0*
- Épibulbaires ¬ Syndrome d'aplasie cutanée congénitale- *Q84.8, D31.4*
- Face ¬ Kyste *Q18.8*
- Hypophyse ¬ Kystes *D35.2*
- Nasal ¬ Kyste *Q18.8*
- Système nerveux central ¬
- - *D33.9*
- - Kyste *D33.9*
- Transformation maligne ¬ Tumeur ovarienne *C56*

Dermolyse bulleuse transitoire du nouveau-né ¬ *Q81.2*

Dermolytique ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.2*

Dermopathie restrictive ¬ *Q82.8*

Dermotyphus ¬ *A01.0*

Derrick-Burnet ¬ Maladie de *A78*

Désaccord
- Conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ *Z64.8*
- Supérieurs ou des collègues ¬ *Z56*
- Voisins, les locataires et le propriétaire ¬ *Z59*

Désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière ¬ Douleur de *G95.85*

Désaminase
- ADA] ¬ Déficit en adénosine *D81.3*
- ¬
- - Anémie hémolytique due à une surproduction d'adénosine *D55.3*
- - Déficit
- - - Adénosine monophosphate *E79.8*

Désaminase *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Déficit *–suite*
- - - Immunitaire combiné sévère par déficit en adénosine *D81.3*

Désastres ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*

Désaturase
v./v.a. C5-désaturase

Desbuquois
v./v.a. Rolland-Desbuquois
- ¬ Syndrome de *Q78.8*

DESC ¬ Syndrome *G40.5*

Descemet ¬
- Plis de la membrane de *H18.3*
- Rupture de la membrane de *H18.3*

Descemétocèle ¬ *H18.7*

Descendant
v./v.a. Côlon descendant
- ¬ Rupture
- - Anévrysme de l'aorte abdominale *I71.3*
- - Aorte abdominale *I71.3*

Descendu ¬
- Carcinome embryonnaire testicule
- - *C62.1*
- - Non *C62.0*
- Polyembryome testicule
- - *C62.1*
- - Non *C62.0*
- Séminome
- - Spermatocytaire testicule
- - - *C62.1*
- - - Non *C62.0*
- - Testicule
- - - *C62.1*
- - - Non *C62.0*
- Tératome d'un testicule mal *C62.0*
- Tumeur germinale mixte testicule
- - *C62.1*
- - Non *C62.0*
- Tumeur maligne: Testicule *C62.1*
- Tumeur sac vitellin testicule
- - *C62.1*
- - Non *C62.0*

Descente placenta
- Hémorragie actuelle ¬
- - *O44.10*
- - Placenta praevia et *O44.1*
- Sans
- - Hémorragie actuelle ¬
- - - *O44.00*
- - - Placenta praevia et *O44.0*
- - Précisions ¬ Placenta praevia et *O44.0*

Désensibilisation aux allergènes ¬ *Z51.6*

Déséquilibre
- Alimentaire ¬ *E63.1*
- Électrolytique

Déséquilibre *–suite*
- Électrolytique *–suite*
- - Dysfonctionnement des glandes lacrymales-ichtyose-xérostomie] ¬ Syndrome HELIX [hypohidrose- *Q87.8*
- - SAI ¬ *E87.8*
- - ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: *O21.1*
- Hydro-électrolytiques, non classés ailleurs ¬ Autres *E87.8*
- Métabolisme du potassium ¬ *E87.8*
- Protéino-énergétique SAI ¬ *E46*

Déshydratase ¬
- Déficit en 4a-hydroxy-tétrahydrobioptérine *E70.1*
- Neurodégénérescence déficit
- - NADHX *E88.81†, G32.8**
- - NADPHX *E88.81†, G32.8**
- Porphyrie par déficit en delta-aminolévulinate *E80.2*

Déshydratation
- Nouveau-né ¬ *P74.1*
- ¬
- - *E86*
- - Dermite eczématoïde de *L30.8*
- - Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: *O21.1*

Déshydrogénase
- 3 ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XY par déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde *E29.1*
- Acide gras chaîne
- - Courte ¬
- - - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl-CoA *E71.3*
- - - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA *E71.3*
- - Longue ¬ Déficit en 3-hydroxyacyl-CoA *E71.3*
- Aldéhyde oxydase type A ¬ Déficit combiné en sulfite oxydase, xanthine *E72.1*
- Anomalies dentaires ¬ Syndrome de déficit en stéroïde *K76.8*
- Cétoacides à chaînes ramifiées ¬ Syndrome d'autisme-épilepsie par déficit en kinase *E71.1*
- Chaînes ramifiées ¬ Déficit en 2-cétoacide *E71.0*
- Classe I ¬ Déficit en glucose-6-phosphate *D55.0*
- E1-alpha ¬ Déficit en pyruvate *E74.4*
- E1-bêta ¬ Déficit en pyruvate *E74.4*
- E3 ¬ Déficit en pyruvate *E74.4*
- G6PD] ¬ Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate *D55.0*
- G6PDH] ¬ Déficit en glucose-6-phosphate *E74.8*
- Type 3 ¬

Déshydrogénase *–suite*
- Type 3 ¬ *–suite*
- - Déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde *E29.1*
- - Pseudo-hermaphrodisme masculin par déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde *E29.1*
- Xanthine aldéhyde oxydase ¬ Déficit combiné en xanthine *E79.8*
- ¬
- - Anémie due
- - - Déficience en glycéraldéhyde-3-phosphate *D55.2*
- - - Déficit en 6-phosphogluconate *D55.1*
- - Anémie hémolytique due à une carence en glycéraldéhyde-3-phosphate *D55.2*
- - Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique *R74.0*
- - Déficit
- - - 1-pyrroline-5-carboxylate *E72.5*
- - - 2-méthylbutyryl-CoA *E71.1*
- - - 3-phosphoglycerate *E72.8*
- - - Complexe sarcosine *E72.5*
- - - D-glycérate *E74.8*
- - - Dihydrolipoamide *E74.4*
- - - Dihydropyrimidine *E79.8*
- - - Diméthylglycine *E72.5*
- - - Glutaryl-CoA *E72.3*
- - - Isobutyryl-CoA *E71.1*
- - - Isovaléryl-CoA *E71.1*
- - - Phosphatase du complexe pyruvate *E74.4*
- - - Pyruvate: *E74.4*
- - - Saccharopine *E72.3*
- - - Succinate-semi-aldéhyde *E72.8*
- - - Xanthine *E79.8*
- - - Xylitol *E74.8*
- - Glycogénose par déficit en lactate *E74.4*
- - GSD par déficit en lactate *E74.4*
- - Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 3-bêta-hydroxystéroïde *E25.08*
- - Retard de développement déficit
- - - 2-méthylbutyryl-CoA *E71.1*
- - - Méthylmalonate semialdéhyde *E71.1*

Désinhibée d'origine centrale ¬ Vessie *N31.0*

Désinhibition
- Lors de démence ¬ *U63.5!*
- ¬ Trouble de l'attachement de l'enfance avec *F94.2*

Désintégratif
- Enfance ¬ Autre trouble *F84.3*
- ¬ Psychose
- - *F84.3*
- - *F84.3*

Désintoxication alcoolique ¬ Produits de *T50.6*

Désir sexuel ¬
- Absence ou perte de *F52.0*
- Baisse du *F52.0*

Desmine
- Inclusions de corps de Mallory ¬ Myopathie avec surcharge en *G71.8*
- ¬ Myopathie myofibrillaire liée à la *G71.8*

Desminopathie ¬ *G71.8*

Desmoïde
- Abdomen ¬ Tumeur *D48.1*
- Extraabdominale ¬ Tumeur *D48.1*
- ¬
- - Fibrome *D48.1*
- - Tumeur *D48.1*

Desmolase testiculaire ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XY par déficit en 17,20- *E29.1*

Desmoplastique
v./v.a. Tumeur desmoplastique
- Infantile ¬
- - Astrocytome *D33.0*
- - Ganglioglome *D33.0*

Desmosis coli aplasique ¬ *Q43.2*

Desmostérolose ¬ *Q87.8*

Désorganisée ¬ Schizophrénie *F20.1*

Désorientation, sans précision ¬ *R41.0*

Desquamation de la peau ¬ *R23.4*

Desquamative ¬
- Érythrodermie *L21.1*
- Gingivite (chronique): *K05.1*

Destombes-Rosaï-Dorfman ¬ Maladie de *D76.3*

Destruction
- Cerveau fœtal sporadique ¬ Syndrome de *Q02*
- Globe oculaire ¬
- - Brûlure provoquant la rupture et la *T26.2*
- - Corrosion provoquant la rupture et la *T26.7*

Destructive chronique, non suppurée ¬ Angiocholite *K74.3*

Destructrice
- Faciliter l'accouchement ¬ Intervention *P03.8*
- ¬ Môle hydatiforme *D39.2*

Destruens ¬ Chorio-adénome *D39.2*

Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs ¬ *T81.3*

Détaché ¬ Ménisque *M23.3*

Détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact ¬ Prolixité et *R46.7*

Détection anticorps
- Anti
- - Insuline ¬ *R76.88*
- - Mitochondries ¬ *R76.88*
- - Muscle lisse ¬ *R76.88*
- - Somatropine ¬ *R76.88*
- Anti-érythrocytaires ¬ *R76.88*
- Anti-hirudine ¬ *R76.88*
- Anti-streptokinase ¬ *R76.88*
- Anti-thrombocytes ¬ *R76.88*

Détection anticorps *–suite*
- Anti-thyroïde ¬ *R76.88*
- Cytoplasmiques anti-neutrophiles dirigés contre la myéloperoxydase ¬ *R76.88*
- Neutralisants [AcN] anti-interféron ¬ *R76.88*

Détergents
- Locaux ¬ Intoxication: Astringents et *T49.2*
- ¬
- - Dermite irritante de contact due aux *L24.0*
- - Effet toxique de savons et *T55*

Détérioration
- Disque
- - Cervical ¬ Autre *M50.3*
- - Intervertébral précisé ¬ *M51.3*
- Fonctionnelle
- - 29 jours et plus après la transplantation ¬ *T86.41*
- - Aiguë d'une greffe de rein ¬ *T86.10*
- - Chronique greffe
- - - Foie ¬ *T86.41*
- - - Rein ¬ *T86.11*
- - Greffe foie
- - - 29 jours et plus après la transplantation ¬ *T86.41*
- - - Pendant les premiers 28 jours après la transplantation ¬ *T86.40*
- Neurologique progressive ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypogammaglobulinémie- *Q87.8*

De-Toni-Debré-Fanconi ¬ Syndrome de *E72.0*

Détoxification de l'ammoniac ¬ Trouble du métabolisme du cycle de l'urée et de la *E72.2*

Détresse
- Fœtale
- - Cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments ¬ *O68*
- - Échographiques ¬ Signes de *O68.8*
- - Électrocardiographiques ¬ Signes de *O68.8*
- - Intra-utérine ¬ *P20*
- - Sans précision ¬ Travail et accouchement compliqués d'une *O68.9*
- - ¬ Travail accouchement compliqué signe
- - - *O68.8*
- - - Biochimiques de *O68.3*
- Maternelle ¬ *O75.0*
- Respiratoire
- - Adulte ¬ Syndrome de *J80.09*
- - Aiguë
- - - Adolescent ¬ Syndrome de *J80.09*
- - - Adulte ¬ Syndrome de *J80.09*
- - - Enfant
- - - - Adolescent et de l'adulte [SDRA] ¬ Syndrome de *J80.0*
- - - - ¬ Syndrome de *J80.09*
- - - Léger
- - - - Adolescent ¬ Syndrome de *J80.04*
- - - - Adulte ¬ Syndrome de *J80.01*

Détresse *–suite*
- Respiratoire *–suite*
- - Aiguë *–suite*
- - - Léger *–suite*
- - - - Enfant ¬ Syndrome de *J80.04*
- - - Modéré
- - - - Adolescent ¬ Syndrome de *J80.05*
- - - - Adulte ¬ Syndrome de *J80.02*
- - - - Enfant ¬ Syndrome de *J80.05*
- - - Néonatale par déficit en protéine B du surfactant ¬ *P22.0*
- - - Sévère
- - - - Adolescent ¬ Syndrome de *J80.06*
- - - - Adulte ¬ Syndrome de *J80.03*
- - - - Enfant ¬ Syndrome de *J80.06*
- - Dysphagie] ¬ EMARDD [Syndrome de myopathie à début précoce-aréflexie- *G71.2*
- - Infantile ¬ Syndrome de *P22.0*
- - Néonatale ¬ Syndrome de choréoathétose-hypothyroïdie- *E03.1†, J99.8*, G25.5*
- - Nourrisson ¬ Syndrome de *P22.0*
- - Nouveau-né
- - - Sans précision ¬ *P22.9*
- - - ¬
- - - - *P22.0*
- - - - Syndrome de *P22.0*
- - Prématuré ¬ Syndrome de *P22.0*
- - Type
- - - 1 ¬ Amyotrophie spinale avec *G12.2*
- - - 2 ¬ Amyotrophie spinale avec *G12.2*
- - ¬ Atélectasie (de): résorption, sans syndrome de *P28.1*
- Respiratoires du nouveau-né ¬ Autres *P22.8*

Détroit
- Inférieur
- - Bassin) entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement de: *O33.3*
- - Cavité moyenne ¬ Dystocie due à un rétrécissement du *O65.3*
- - ¬ Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du *O33.3*
- Supérieur
- - Bassin
- - - Entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement du *O33.2*
- - - Maternel ¬ Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du *O33.2*
- - ¬ Dystocie due à un rétrécissement du *O65.2*

Détrusor
- Col vésicale ¬ Dyssynergie du *N32.0*
- Due à une neuropathie autonome ¬ Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du *N31.1*
- Origine cérébrale ¬ Instabilité du *N31.0*
- Sphincter de la vessie ¬ Dysfonctionnement neurogène du *N31.88*

Deuil ¬ Réaction de *F43.2*

Deutéranomalie ¬ *H53.5*

Deutéranopie ¬ *H53.5*

Développement
v./v.a. Retard de développement
v./v.a. Retard général de développement
v./v.a. Retard global de développement
- Acquisition scolaires
- - Sans précision ¬ Trouble du *F81.9*
- - ¬ Autres troubles du *F81.8*
- Articulation ¬ Trouble: du *F80.0*
- Associé
- - CTCF ¬ Trouble neurologique du *Q87.8*
- - PLAA ¬ Trouble neurologique du *Q02*
- - RERE ¬ Trouble neurologique du *Q87.8*
- - SYT1 ¬ Trouble neurologique du *Q87.8*
- Cardiaque et cérébral ¬ Anomalies létales du *Q87.8*
- Dentaire ¬ Kystes de la région buccale non liés au *K09.1*
- Dents SAI ¬ Troubles du *K00.9*
- Encéphale ¬ Autres anomalies localisées du *Q04.3*
- Enfance ¬ Examen spécial de dépistage de certains troubles du *Z13.4*
- Excessif du système pileux ¬ *L68*
- Fonctions motrices, sans précision ¬ Troubles spécifiques du *F82.9*
- Insuffisant des glandes mammaires] ¬ Micromastie [*Q83.88*
- Langage ¬ Trouble
- - *F80.9*
- - Spécifique du *F80.9*
- Lié à SLC4A10 ¬ Trouble neurologique du *Q04.8*
- Mâchoires ¬ Maladies liées au *K10.0*
- Malformations cérébrales-dysmorphie facial-brachydactylie ¬ Syndrome de trouble neurologique du *Q87.0*
- Motricité
- - Buccale ¬ Troubles spécifiques du *F82.2*
- - Fine et graphique ¬ Troubles spécifiques du *F82.1*
- - Globale ¬ Troubles spécifiques du *F82.0*
- Mutation ponctuelle ¬ Syndrome de dysmorphie cranio-faciale-anomalies squelettiques-cardiopathie-trouble neurologique du *Q87.0*
- Neurologique avec microcéphalie, arthrogrypose et anomalies structurelles du cerveau ¬ Trouble du *Q87.8*
- Odontogènes) ¬ Kystes dentaires liés au *K09.0*
- Osseux ¬ Autres troubles de la croissance et du *M89.2*
- Parole et du langage ¬ Autres troubles du *F80.8*
- Phonologique ¬ Trouble: du *F80.0*
- Physiologique
- - Attendu ¬ Retard de: stade de *R62.0*
- - ¬ Autres retards du *R62.8*
- Psychologique

Développement *–suite*
- Psychologique *–suite*
- - Sans précision ¬ Trouble du *F89*
- - ¬ Autres troubles du *F88*
- Psychosexuel
- - Sans précision ¬ Trouble du *F66.9*
- - ¬
- - - Problème de *F66.9*
- - - Troubles du *F66.8*
- Pulmonaire insuffisant ¬ *Q33.6*
- SAI ¬ Trouble du *F89*
- Sans précision ¬ Trouble envahissant du *F84.9*
- Sévère avec troubles de l'alimentation-mouvements stéréotypés des mains-cataracte bilatérale ¬ Trouble neurologique du *G31.88*
- Sexuel
- - 46,XX
- - - Anomalies
- - - - Anorectales ¬ Syndrome d'anomalie du *Q56.2, Q43.9*
- - - - Squelettiques ¬ Syndrome d'anomalie du *Q56.2, Q79.9*
- - - Origine génétique ¬ Anomalie du *Q99.1*
- - - ¬ Anomalie
- - - - *Q56.2*
- - - - Ovotesticulaire du *Q56.0*
- - - - Testiculaire du *Q99.1*
- - 46,XY
- - - Déficit
- - - - 17
- - - - - 20-desmolase testiculaire ¬ Anomalie du *E29.1*
- - - - - Bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase 3 ¬ Anomalie du *E29.1*
- - - - Isolé en 17,20-lyase ¬ Anomalie du *E29.1*
- - - Insuffisance surrénalienne par déficit en CYP11A1 ¬ Différence du *E25.08*
- - Caryotype de type 46,XY ¬ Anomalie ovo-testiculaire du *Q56.0*
- - Retardé ¬ *E30.0*
- - ¬ Syndrome de chondrodysplasie-anomalie du *Q87.1*
- Surdité-dystonie ¬ Syndrome d'anomalies du *Q87.8*
- Tumeurs liée à BAP1 ¬ Prédisposition au *Q99.8*
- Type
- - Expressif ¬ Dysphasie ou aphasie de *F80.1*
- - Réceptif ¬ Dysphasie ou aphasie de *F80.2*
- - Wernicke ¬ Aphasie de *F80.2*
- ¬
- - Acalculie de *F81.2*
- - Agnosie de *F88*
- - Déficit du langage lié au *F80.9*
- - Dyslexie de *F81.0*
- - Dysphasie familiale de *F80.1*

Développement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dyspraxie
- - - *F82*
- - - Verbale de *F82.9*
- - Kyste ovarien au cours du *Q50.1*
- - Multikystique: rein (*Q61.4*
- - Myasthénie congénitale et au cours du *G70.2*
- - Reins multikystiques liés au *Q61.4*
- - Syndrome
- - - Dysmorphie cranio-faciale-anomalies squelettiques-cardiopathie-trouble neurologique du *Q87.0*
- - - Oculogastrointestinal-trouble neurologique du *Q87.8*
- - Troubles
- - - Envahissants du *F84.8*
- - - Spécifiques mixtes du *F83*

Développemental
- Associée
- - CNTNAP2 ¬ Encéphalopathie épileptique et *G40.8*
- - Ostéoporose ¬ Encéphalopathie épileptique et *G40.4*
- - SYNGAP1 ¬ Encéphalopathie épileptique et *F83, G40.4*
- Troubles du language-dystonie dopa-sensible-parkinsonisme ¬ Syndrome de retard *G25.88*

Devergie ¬ Syndrome de *L44.0*

Déviation
- Cloison nasal
- - Acquise) ¬ *J34.2*
- - ¬ *J34.2*
- Congénital(e) du nez ¬ Écrasement ou *Q67.4*
- Congénitale de la cloison nasale ¬ *Q67.4*
- Médiane de l'arcade dentaire ¬ *K07.2*
- Médiastinale ¬ *R93.8*
- Sexuelle SAI ¬ *F65.9*
- Tonique paroxystique du regard avec ataxie ¬ *G96.8, H51.8*
- Uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*

Devic ¬ Maladie de *G36.0*

Dextrinose limite ¬ *E74.0*

Dextrocardie
- Situs inversus
- - Total des organes internes ¬ *Q89.3*
- - ¬ *Q89.3*
- ¬ *Q24.0*

Dextroposition
- Aorte
- - Hypertrophie ventricule droit ¬ Communication interventriculaire
- - - Atrésie pulmonaire, *Q21.3*
- - - Sténose pulmonaire, *Q21.3*
- - ¬ *Q20.3*
- Cœur ¬ *Q24.0*

DFNA ¬ Surdité de perception non syndromique autosomique dominante type *H90.3*

DFNB ¬ Surdité de perception non syndromique autosomique récessive type *H90.3*

DGKE ¬ Syndrome hémolytique et urémique par déficit en *D58.8*

D-glycérate
- Déshydrogénase ¬ Déficit en *E74.8*
- Kinase ¬ Déficit en *E74.8*

DGM] ¬ Anémie par déficit en 2,3 disphospho-glycérate-mutase [2,3 *D55.2*

DGUOK ¬
- Déplétion de l'ADN mitochondrial, forme hépatocérébrale par déficit en *G31.81*
- Syndrome de délétions multiples de l'ADN mitochondrial de l'adulte par déficit en *G71.3*

Dhat ¬ Syndrome de *F48.8*

DHF [Dengue hémorragique] ¬ *A97.9*

Dhobie itch ¬ *B35.6*

Diabète
- Cardiopathie congénitale ¬ Syndrome d'hypoplasie pancréatique- *Q87.8*
- Galactosique ¬ *E74.2*
- Gestationnel ¬ Antécédents personnels de *Z87.5*
- Gluco-aminophosphaté ¬ *E72.0*
- Grossesse ¬ Syndrome de l'enfant dont la mère a un *P70.0*
- Insulino-dépendant non primaire chez l'adolescent ¬ *E11*
- Juvénile ¬ Syndrome
- - Kystes rénaux- *E11.20†, N29.8**
- - Microcéphalie-déficience intellectuelle modérée- *Q87.1*
- MODY Maturity onset diabetes of young people ¬
- - Choc hypoglycémique au cours de *E11.61*
- - Coma hypoglycémique au cours de *E11.61*
- Néonatal
- - Forme intermédiaire ¬ Syndrome DEND [retard de développement-épilepsie- *E10.40*
- - Hypothyroïdie congénitale-glaucome congénital-fibrose hépatique-polykystose rénale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Permanent ¬ Syndrome de microcéphalie primaire-épilepsie- *Q87.8*
- - ¬ Syndrome DEND [retard de développement-épilepsie- *E10.40*
- Néphropathie ¬ Syndrome d'athérosclérose-surdité-épilepsie- *Q87.8*
- Phosphaté ¬ *E83.30*
- Précoce ¬ *R73.08*
- SAI ¬ *E14*
- Sucré
- - Instable ¬ *E10*
- - Juvénile ¬ *E10*
- - Obésité sans obésité

Diabète *–suite*
- Sucré *–suite*
- - Obésité sans obésité *–suite*
- - - Adulte ¬ *E11*
- - - Maturité ¬ *E11*
- - - Non cétosique ¬ *E11*
- - - Stable ¬ *E11*
- - Sujet à cétose ¬ *E10*
- Type
- - 1 ¬ Saignement ponctuel comme complication oculaire diabétique du *E10.30†*, *H58.8**
- - 2
- - - Sous insulinothérapie ¬ *E11*
- - - ¬ Saignement ponctuel comme complication oculaire diabétique du *E11.30†*, *H58.8**
- ¬ Hémochromatose avec *E83.1*

Diabète insipide
- Central ¬ *E23.2*
- Néphrogénique
- - Calcifications intracrâniennes-petite taille-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - ¬ *N25.1*
- Neurogène ¬ *E23.2*
- Origine hypophysaire ¬ *E23.2*
- ¬
- - *E23.2*
- - Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-spasticité des membres-dystrophie de la rétine- *Q87.8*

Diabète sucré
- Altération vasculaire ¬ *E14.50†*, *I79.2**
- Angiopathie ¬ *E14.50†*, *I79.2**
- Associé au gène CDKN1C ¬ Syndrome de retard de croissance intra-utérin avec petite taille et *E34.8*, *E10.90*
- Ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de tubulopathie proximale- *Q87.8*
- Cataracta diabetica ¬ *E14.30†*, *H28.0**
- Chimique ¬ *R73.08*
- Complication neurologique ¬ *E14.40*
- Complication rénale ¬ *E14.30*
- Gestationnel SAI ¬ *O24.4*
- Glomérulosclérose ¬ *E14.20†*, *N08.3**
- Hépatogène ¬ *E13.90*
- Latent ¬ *R73.08*
- Maculopathie ¬ *E14.30†*, *H36.0**
- Maladie oculaire ¬ *E14.30†*, *H58.8**
- Malnutrition
- - Type
- - - 1 ¬ *E12*
- - - 2 ¬ *E12*
- - ¬ *E12*
- Mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) ¬ *P70.1*
- Microangiopathie et macroangiopathie ¬ *E14.50†*, *I79.2**

Diabète sucré *–suite*
- MOA [maladie occlusive artérielle] ¬ *E14.50†*, *I79.2**
- Myatrophie ¬ *E14.40†*, *G73.0**
- Néonatal ¬ *P70.2*
- Néphropathie ¬ *E14.20†*, *N08.3**
- Neuropathie ¬ *E14.40†*, *G63.2**
- Non type 1 ou 2 ¬ *E13.90*
- Œdème de la macula ¬ *E14.30†*, *H36.0**
- Pancréatoprive ¬ *E13.90*
- Polyneuropathie ¬ *E14.40†*, *G63.2**
- Préexistant
- - Lié à la malnutrition ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.2*
- - Sans précision ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.3*
- - Type
- - - 1 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.0*
- - - 2 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.1*
- Prurit ¬ *E14.60†*, *L99.8**
- Rétinopathie ¬ *E14.30†*, *H36.0**
- Sans précision ¬ *E14*
- Surdité de perception ¬ Syndrome d'anémie mégaloblastique sensible à la thiamine- *Q87.8*
- Survenant au cours de la grossesse ¬ *O24.4*
- Trouble circulatoire ¬ *E14.50†*, *I79.2**
- Type
- - 1
- - - Altération vasculaire ¬ *E10.50†*, *I79.2**
- - - Angiopathie ¬ *E10.50†*, *I79.2**
- - - Arthrite de Charcot ¬ *E10.60†*, *M14.69**
- - - Cataracte ¬ *E10.30†*, *H28.0**
- - - Complication neurologique ¬ *E10.40†*, *G63.2**
- - - Complication rénale ¬ *E10.20†*, *N08.3**
- - - Complication vasculaire périphérique ¬ *E10.50†*, *I79.2**
- - - Maculopathie ¬ *E10.30†*, *H36.0**
- - - Maladie oculaire ¬ *E10.30†*, *H58.8**
- - - Manifestation ophtalmologique ¬ *E10.30†*, *H58.8**
- - - MOA [maladie occlusive artérielle] ¬ *E10.50†*, *I79.2**
- - - Myatrophie ¬ *E10.40†*, *G73.0**
- - - Névralgie ¬ *E10.40†*, *G63.2**
- - - Névrite ¬ *E10.40†*, *G63.2**
- - - Polyneuropathie ¬ *E10.40†*, *G63.2**
- - - Prurit ¬ *E10.60†*, *L99.8**
- - - Rétinite ¬ *E10.30†*, *H36.0**
- - - Rétinopathie diabétique ¬ *E10.30†*, *H36.0**
- - - Trouble circulatoire ¬ *E10.50†*, *I79.2**
- - - ¬
- - - - *E10*

Diabète sucré *–suite*
- Type *–suite*
- - 1 *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Décollement tractionnel au cours de rétinopathie diabétique dans le *E10.30†*, *H36.0**
- - - - Dégénérescence graisseuse du rein dans le *E10.20†*, *N29.8**
- - - - Foie diabétique dans le *E10.60†*, *K77.8**
- - - - Fond d'œil diabétique dans le *E10.30†*, *H36.0**
- - - - Gastroparésie diabétique dans le *E10.40†*, *G99.00**
- - - - Glaucome de néovascularisation au cours de rétinopathie diabétique dans le *E10.30†*, *H36.0**
- - - - Glomérulonéphrite diabétique dans le *E10.20†*, *N08.3**
- - - - Glomérulosclérose diabétique dans le *E10.20†*, *N08.3**
- - - - Microangiopathie diabétique dans le *E10.50†*, *I79.2**
- - - - Nécrobiose lipoïdique diabétique dans le *E10.60†*, *L99.8**
- - - - Neuropathie diabétique dans le *E10.40†*, *G63.2**
- - - - Polyneuropathie diabétique dans le *E10.40†*, *G63.2**
- - - - Rubeosis diabetica dans le *E10.60†*, *L99.8**
- - - - Syndrome
- - - - - Kimmelstiel et Wilson extracapillaire diabétique dans le *E10.20†*, *N08.3**
- - - - - Kimmelstiel-Wilson dans le *E10.20†*, *N08.3**
- - - - Vulvitis diabetica dans le *E10.60†*, *N77.8**
- - 2
- - - Altération vasculaire ¬ *E11.50†*, *I79.2**
- - - Amyotrophie ¬ *E11.40†*, *G73.0**
- - - Angiopathie ¬ *E11.50†*, *I79.2**
- - - Arthrite de Charcot ¬ *E11.60†*, *M14.69**
- - - Cataracte ¬ *E11.30†*, *H28.0**
- - - Complication neurologique ¬ *E11.40†*, *G63.2**
- - - Complication rénale ¬ *E11.20†*, *N08.3**
- - - Maculopathie ¬ *E11.30†*, *H36.0**
- - - Maladie oculaire ¬ *E11.30†*, *H58.8**
- - - MOA [maladie occlusive artérielle] ¬ *E11.50†*, *I79.2**
- - - Myatrophie ¬ *E11.40†*, *G73.0**
- - - Néphropathie ¬ *E11.20†*, *N08.3**
- - - Neuropathie ¬ *E11.40†*, *G63.2**
- - - Névralgie ¬ *E11.40†*, *G63.2**
- - - Névrite ¬ *E11.40†*, *G63.2**
- - - Prurit ¬ *E11.60†*, *L99.8**
- - - Rétinite ¬ *E11.30†*, *H36.0**
- - - Rétinopathie diabétique ¬ *E11.30†*, *H36.0**
- - - Trouble circulatoire ¬ *E11.50†*, *I79.2**

Diabète sucré *–suite*
- Type *–suite*
- - 2 *–suite*
- - - ¬
- - - - *E11*
- - - - Décollement tractionnel au cours de rétinopathie diabétique dans le *E11.30†, H36.0**
- - - - Dégénérescence graisseuse du rein dans le *E11.20†, N29.8**
- - - - Foie diabétique dans le *E11.60†, K77.8**
- - - - Fond d'œil diabétique dans le *E11.30†, H36.0**
- - - - Gastroparésie diabétique dans le *E11.40†, G99.00**
- - - - Glaucome de néovascularisation au cours de rétinopathie diabétique dans le *E11.30†, H36.0**
- - - - Glomérulonéphrite diabétique dans le *E11.20†, N08.3**
- - - - Glomérulosclérose diabétique dans le *E11.20†, N08.3**
- - - - Hypoglycémie modérée
- - - - - Précisée non récidivante, dans le *E11.60, U69.70!*
- - - - - Précisées récidivante, dans le *E11.60, U69.71!*
- - - - Microangiopathie diabétique dans le *E11.50†, I79.2**
- - - - Nécrobiose lipoïdique diabétique dans le *E11.60†, L99.8**
- - - - Polyneuropathie diabétique dans le *E11.40†, G63.2**
- - - - Rubeosis diabetica dans le *E11.60†, L99.8**
- - - - Syndrome
- - - - - Kimmelstiel et Wilson extracapillaire diabétique dans le *E11.20†, N08.3**
- - - - - Kimmelstiel-Wilson dans le *E11.20†, N08.3**
- - - - Trouble de la perception de l'hypoglycémie au cours du *E11.60, U69.74!*
- - - - Vulvitis diabetica dans le *E11.60†, N77.8**
- - ¬
- - - Antécédents familiaux de *Z83.3*
- - - Arthropathie neuropathique dans le *E14.60†, M14.69**
- - - Coma hypoglycémique dans le *E14.61, U69.73!*
- - - Examen spécial de dépistage de *Z13.1*
- - - Examen spécial pour *Z13.18*
- - - Hypoglycémie
- - - - Modérée
- - - - - Précisée non récidivante, dans le *E14.60, U69.70!*
- - - - - Précisées récidivante, dans le *E14.60, U69.71!*
- - - - Sévère sans coma dans le *E14.60, U69.72!*

Diabète sucré *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lobulite lymphocytaire sclérosante au cours de *E14.60, N61*
- - Neuropathie des nerfs périphériques autonomes dans le *E14.40†, G99.08**
- - Syndrome
- - - Ataxie cérébelleuse et périphérique combinée-surdité- *E10.60, G31.88*
- - - Déficience intellectuelle-dysmorphies cranio-faciales-hypogonadisme- *Q87.0*
- - - Myasthénique dans le *E14.40†, G73.0**
- - - Myopathie mitochondriale- *G71.3, E14.90*
- - Trouble
- - - Circulatoire dans le *E14.50†, I79.2**
- - - Perception de l'hypoglycémie au cours du *E14.60, U69.74!*

Diabète sucré au cours de la grossesse
- Diabète sucré préexistant
- - Lié à la malnutrition ¬ *O24.2*
- - Sans précision ¬ *O24.3*
- - Type
- - - 1 ¬ *O24.0*
- - - 2 ¬ *O24.1*
- Sans précision ¬ *O24.9*

Diabète sucré de type 1
- Adultes ¬ Insulinorésistance au cours d'un *E10.90, U69.75!*
- Présymptomatique stade
- - 1 ¬ *R76.80*
- - 2 ¬ *R73.00*
- - ¬
- - Coma hypoglycémique au cours de *E10.61, U69.73!*
- - Hypoglycémie
- - - Modérée
- - - - Précisée non récidivante, au cours d'un *E10.60, U69.70!*
- - - - Précisées récidivante, au cours d'un *E10.60, U69.71!*
- - - Sévère sans coma, au cours d'un *E10.60, U69.72!*
- - Trouble de la perception de l'hypoglycémie au cours d'un *E10.60, U69.74!*

Diabète sucré de type 2 ¬
- Coma hypoglycémique au cours de *E11.61, U69.73!*
- Hypoglycémie sévère sans coma, dans le *E11.60, U69.72!*

Diabète sucré insulino-dépendant
- Primaire avec complication vasculaire périphérique ¬ *E10.50†, I79.2**
- Type
- - 1 avec complication vasculaire périphérique ¬ *E10.50†, I79.2**
- - 2
- - - Complication neurologique ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - Complication oculaire ¬ *E11.30†, H58.8**
- - - Complication rénale ¬ *E11.20†, N08.3**

Diabète sucré non insulino-dépendant
- Primaire
- - Complication neurologique ¬ *E11.40†, G63.2**
- - Complication oculaire ¬ *E11.30†, H58.8**
- Type 2
- - Complication neurologique ¬ *E11.40†, G63.2**
- - Complication oculaire ¬ *E11.30†, H58.8**
- - Complication rénale ¬ *E11.20†, N08.3**

Diabetes renalis ¬ *E74.8*

Diabète-surdité de transmission maternelle ¬ *E14.72*

Diabetica
- Diabète sucré type
- - 1 ¬
- - - Rubeosis *E10.60†, L99.8**
- - - Vulvitis *E10.60†, N77.8**
- - 2 ¬
- - - Rubeosis *E11.60†, L99.8**
- - - Vulvitis *E11.60†, N77.8**
- ¬ Diabète sucré avec Cataracta *E14.30†, H28.0**

Diabétique
v./v.a. Type de maladie

Diabolo] ¬ Tube(s) de myringotomie [*Z96.2*

Diacylglycérol kinase epsilon ¬ Syndrome hémolytique et urémique avec mutation de la *D58.8*

Diagnostic
- Déterminé après investigation complète par un centre pour maladies rares ¬ Maladie rare sans *R69*
- Hypertension ¬ Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans *R03.0*
- Sensibilisation ¬ Tests cutanés de *Z01.5*
- ¬
- - Conseil et surveillance pour: Sujet inquiet de son état de santé (sans *Z71*
- - Intoxication: Agents de *T50.8*
- - Transfusion sanguine, sans mention de *Z51.3*

Diagnostique
- Appareil urinaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.4*
- Cliniquement, sans confirmation parasitologique ¬ Paludisme *B54*
- Cœur et de la circulation coronaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.1*
- Crâne et de la tête, non classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.0*
- Foie et des voies biliaires ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.2*
- Membres ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.6*
- Non précisée quant au siège ou au système concerné ¬ Maladie: non *R69*
- Parties
- - Abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.5*

Diagnostique *–suite*
- Parties *–suite*
- - Corps précisées ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.8*
- - Système ostéo-musculaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.7*
- - Voies digestives ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.3*
- Pendant la grossesse ¬ Cancer *C80.9, O99.8*
- Poumon ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R91*
- Sein ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R92*
- Système nerveux central ¬ Autres résultats anormaux d'imagerie *R90.8*
- Thérapeutique
- - Intra-utérins, non classées ailleurs ¬ Complications consécutives à des actes à visée *P96.5*
- - Localisations, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.88*
- - Non
- - - Classé ailleurs ¬ Choc pendant ou après un acte à visée *T81.1*
- - - Classée ailleurs ¬ Infection après un acte à visée *T81.4*
- - - Classées ¬
- - - - Complication
- - - - - Acte à visée *T81.8*
- - - - - Vasculaires consécutives à un acte à visée *T81.7*
- - - - Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - Classés ¬
- - - - Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée *T81.0*
- - - - Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée *I97.89*
- - Sans précision ¬
- - - Affection du système nerveux après un acte à visée *G97.9*
- - - Trouble de l'appareil circulatoire après un acte à visée *I97.9*
- - Sur
- - - Appareil uro-génital, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.87*
- - - Territoire drainage lymphatique
- - - - Axillaire stade
- - - - - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.81*
- - - - - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.82*
- - - - - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.83*
- - - - Cervical, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.80*
- - - - Inguinal stade
- - - - - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.84*

Diagnostique *–suite*
- Thérapeutique *–suite*
- - Sur *–suite*
- - - Territoire drainage lymphatique *–suite*
- - - - Inguinal stade *–suite*
- - - - - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.85*
- - - - - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.86*
- - Y compris accouchement SAI ¬
- - - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée *O75.4*
- - - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée *O75.4*
- - - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée *O75.4*
- - ¬
- - - Choc (endotoxique) (hypovolémique) pendant ou après un acte à visée *T81.1*
- - - Collapsus pendant ou après un acte à visée *T81.1*
- - - Complication
- - - - Acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée *O75.4*
- - - - Non précisée d'un acte à visée *T81.9*
- - - Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée *T81.5*
- - - Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée *T81.7*
- - - Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée *T81.8*
- - - Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée *T81.0*
- - - Perforation accidentelle
- - - - Nerf
- - - - - Cathéter au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Endoscope au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Instrument au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Sonde au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Organe
- - - - - Cathéter au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Endoscope au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Instrument au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Sonde au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - Cathéter au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Endoscope au cours d'un acte à visée *T81.2*

Diagnostique *–suite*
- Thérapeutique *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Perforation accidentelle *–suite*
- - - - Vaisseau sanguin *–suite*
- - - - - Instrument au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Sonde au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée *T81.6*
- - - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée *O35.7*

Dialyse
- Extracorporelle ¬ *Z49.1*
- Insuffisance rénale ¬ Dépendance de longue durée envers une *Z99.2*
- Longue durée lors d'une insuffisance rénale ¬ *Z99.2*
- Péritonéal ¬
- - *Z49.2*
- - Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de *T85.71*
- Rénale) SAI ¬ *Z49.1*
- Traitement ¬ préparation d'une *Z49*
- ¬
- - *Z49.2*
- - Amylose liée à la *E85.38*
- - Anémie induite par l'aluminium après *N18.5†, D63.8**
- - Complication de *T80.9*
- - Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de *T82.4*
- - Infection due à un cathéter de *T82.74*
- - Insuffisance rénale chronique, nécessitant une *N18.5*
- - Septicémie due à un cathéter de *T82.74*
- - Soins préparatoires en vue d'une *Z49.0*
- - Syndrome de vol vasculaire après la mise en place d'un shunt pour la *I97.89*

Dialytique ¬
- Démence *N18.5†, F02.8**
- Encéphalopathie *N18.5†, G94.8**

Diamond
v./v.a. Blackfan-Diamond
v./v.a. Gardner-Diamond
v./v.a. Shwachman-Diamond

Dianzani ¬ Maladie lymphoprolifératives auto-immune de *D47.7*

DIAPH1 ¬ Syndrome de surdité neurosensorielle-thrombocytopénie associé à *H90.5, D69.41*

Diaphanospondylodysostose ¬ *Q78.8*

Diaphorase ¬ Déficit congénital en NADH *D74.0*

Diaphragmatique
v./v.a. Hernie diaphragmatique
- Induite par la ventilation mécanique ¬ Dysfonction *J95.88*

Diaphragmatique *–suite*
- ¬
- - Adaptation et manipulation d'un stimulateur *Z45.81*
- - Adhérences (de): *K66.0*
- - Infarctus répété (aigu) (de): paroi *I22.1*
- - Infarctus transmural (aigu) (de): paroi *I21.1*
- - Relâchement *J98.6*

Diaphragme
- Éventration ¬ Défaut congénital du *Q79.1*
- Induite par la ventilation ¬ Lésion du *J95.88*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q79.1*
- ¬
- - *C49.3*
- - *D21.3*
- - Absence de *Q79.1*
- - Carcinome du *C49.3*
- - Eventration du *Q79.1*
- - Inflammation du *J98.6*
- - Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.81*
- - Maladies du *J98.6*
- - Malformations congénitales du *Q79.1*
- - Paralysie du *J98.6*

Diaphysaire
v./v.a. gnatho-diaphysaire
- Histocytome fibreux ¬ Syndrome de sténose médullaire *Q78.8, C49.9*
- Progressive ¬ Dysplasie *Q78.3*
- Tachetée ¬ Dysplasie *Q77.3*

Diaphyse
- Cubital
- - Luxation de la tête du radius ¬ Fracture proximale de la *S52.21*
- - Partie non précisée ¬ Fracture de la *S52.20*
- - Radiale ¬ Fracture des deux *S52.4*
- Fémorale ¬ Fracture de la *S72.3*
- Humérus ¬ Fracture de la *S42.3*
- Radiale ¬ Fracture ouverte de la *S52.30, S51.87!*
- Radius
- - Luxation de la tête du cubitus ¬ Fracture distale de la *S52.31*
- - Partie non précisée ¬ Fracture de la *S52.30*
- Tibia
- - Fracture du péroné (toute partie) ¬ Fracture de la *S82.21*
- - Isolée ¬ *S82.28*
- - SAI ¬ *S82.28*
- - ¬ Fracture de la *S82.28*
- ¬
- - Fracture
- - - Os du métacarpe: *S62.32*
- - - Péroné seul: *S82.42*
- - - Premier métacarpien: *S62.22*

Diaphyse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fractures multiples de la *S42.3*

Diarrhée
- Aiguë
- - Aqueuse ¬ *A09.0*
- - Exsiccose ¬ *A09.9, E86*
- Amibien
- - Aiguë ¬ *A06.0*
- - Chronique ¬ *A06.1*
- - Non dysentérique ¬ *A06.2*
- - ¬ *A06.0*
- Balantidium coli ¬ *A07.0*
- Chlorée congénitale ¬ *P78.3*
- Chronique
- - Associée à un déficit en glucoamylase ¬ *E74.3*
- - Atrophie villositaire ¬ Syndrome de *K52.8*
- - Congénitale avec entéropathie exsudative ¬ *P78.3*
- Cryptosporidium ¬ *A07.2*
- Due aux médicaments ¬ *K52.1*
- Dysentérique ¬ *A09.0*
- Entéropathogène à Escherichia coli ¬ *A04.0*
- Épidémique ¬ *A09.0*
- Flagellés ¬ *A07.9*
- Fonctionnelle ¬ *K59.1*
- Hémorragique aiguë ¬ *A09.0*
- Infantile chronique par hyperactivité de la guanylate cyclase 2C ¬ *K52.8*
- Infectieuse
- - Exsiccose ¬ *A09.0, E86*
- - Néonatale ¬ *A09.0*
- - Nouveau-né ¬ *A09.0*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B20, A09.0*
- Intraitable-atrésie choanale-anomalie des yeux ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Isospora
- - Belli ¬ *A07.3*
- - Hominis ¬ *A07.3*
- Mycosique NCA ¬ *B49†, K93.8**
- Néonatale SAI ¬ *A09.9*
- Non infectieuse néonatale ¬ *P78.3*
- Post-antibiothérapie ¬ *K52.1*
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*
- Prédominante [SII-D] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec *K58.1*
- Probablement d'origine infectieuse, avec exsiccose ¬ *A09.0, E86*
- Protozoaires ¬ *A07.9*
- Rotavirus ¬ *A08.0*
- Sodé congénitale
- - Syndromique ¬ *K90.8*
- - ¬ *K90.8*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Vomissement
- - Dus à un déficit en tréhalase ¬ *E74.3*

Diarrhée *–suite*
- Vomissement *–suite*
- - Exsiccose ¬
- - - *A09.9, E86*
- - - *A09.9, E86*
- ¬
- - Formes psychogènes de: *F45.3*
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, K52.9*
- - Syndrome hémolytique et urémique avec *D59.3*

DIA-S Échelle de dépression personne âgée
- 0-3 points ¬ *U54.01*
- 4 points et plus ¬ *U54.11*

Dias-Logan ¬ Syndrome de *Q87.8*

Diastasis musculaire ¬ *M62.0*

Diastématomyélie ¬ *Q06.2*

Diastème
- Multiples-dysmorphie faciale-retard de développement ¬ Syndrome d'anomalies du palais- *Q87.0*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*

Diastolique ¬ Insuffisance cardiaque *I50.1*

Diastrophique ¬ Dysplasie *Q77.5*

Diathèse cystinique ¬ *E72.8*

Diaz ¬ Ostéochondrose de *M92.6*

Diazoxide
- Déficit
- - Kir6.2 ¬ Hyperinsulinisme focal résistant au *E16.1*
- - SUR1 ¬ Hyperinsulinisme focal résistant au *E16.1*
- ¬
- - Hyperinsulinisme diffus sensible au *E16.1*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique, forme diffuse sensible au *E16.1*

Dibothriocephalus ¬ Infection à *B70.0*

Dicarboxylique ¬ Hyperaminoacidurie *E72.0*

Dicentriques ¬ Chromosomes *Q93.2*

Dicéphales ¬ *Q89.4*

DICER1 ¬
- Blastome pleuropulmonaire au cours de syndrome de prédisposition tumorale *C34.9, C38.4*
- Syndrome de prédisposition tumorale lié à *Q99.8*

Dichlorométhane ¬ Effet toxique: *T53.4*

Dicrocoelium dendriticum ¬ Infection
- *B66.2*
- *B66.2*

DICS
- Dysgénésie réticulaire ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.0*
- Nombre faible
- - Cellules B et T ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.1*
- - Normal de cellules B ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.2*
- SAI ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.9*

Didelphe ¬ Utérus *Q51.2*

Didymosis aplasticosebacea ¬ *Q84.8*

Dieker
v./v.a. Miller-Dieker

Diencéphalique ¬ Syndrome *C72.8, E23.3*

Diététiques ¬ Conseil et surveillance pour: Conseil et surveillance *Z71*

Diéthylamide de l'acide lysergique] ¬ Intoxication au LSD [*T40.8*

Diéthylstilbestrol ¬ Syndrome *Q86.88*

Diets-Jongmans ¬ Syndrome de *Q87.0*

Dietz
v./v.a. Loeys-Dietz

Dieulafoy
- Duodénum ¬ Ulcère de *K26.0*
- Estomac ¬ Ulcère de *K25.0*

Différence du développement sexuel 46,XY-insuffisance surrénalienne par déficit en CYP11A1 ¬ *E25.08*

Différenciation
- Intermédiaire ¬ Tumeur du parenchyme pinéal à *D44.5*
- Minimale ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec *C92.00*

Difficile
- Famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation socio-économique *Z76.2*
- Nouveau-né ¬ Alimentation au sein *P92.5*
- ¬
- - Conditions de travail *Z56*
- - Infection à Clostridioides *A04.79*

Difficulté
- Ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie ¬ *Z60*
- Alimentation SAI ¬ *R63.3*
- Apprentissage
- - Troubles du comportement ¬ Syndrome d'épilepsie liée à l'X- *G40.2*
- - ¬ Syndrome de RIDDLE [radiosensibilité-déficit immunitaire-dysmorphie- *D82.8*
- Enseignants et les autres élèves ¬ *Z55*
- Intubation
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Échec ou *O29.6*
- - - Puerpéralité ¬ Échec ou *O89.6*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Échec ou *O74.7*
- - ¬ Échec ou *T88.4*
- Langage ¬ *R47.8*
- Liée
- - Dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision ¬ *Z74.9*
- - Installations médicales et autres soins de santé, sans précision ¬ *Z75.9*
- - Mode de vie, sans précision ¬ *Z72.9*
- - Vie en institution ¬ *Z59*
- Liées
- - Acculturation ¬ *Z60*

Difficulté *–suite*
- Liées *–suite*
- - Besoin
- - - Assistance
- - - - Domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ *Z74.2*
- - - - Soins d'hygiène ¬ *Z74.1*
- - - Surveillance permanente ¬ *Z74.3*
- - Certaines circonstances psychosociales ¬ Autres *Z64.8*
- - Consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues ¬ *Z72.0*
- - Dépendance
- - - Due à une mobilité restreinte ¬ *Z74.0*
- - - Envers la personne qui donne les soins ¬ Autres *Z74.8*
- - Éducation
- - - Alphabétisation ¬ *Z55*
- - - ¬ Autres *Z62*
- - Emploi et au chômage ¬ *Z56*
- - Enfance malheureuse ¬ *Z61*
- - Entourage immédiat, y compris la situation familiale ¬ Autres *Z63*
- - Environnement
- - - Physique ¬ *Z58*
- - - Social ¬ *Z60*
- - Grossesse non désirée ¬ *Z64.0*
- - Installations médicales et autres soins de santé ¬ Autres *Z75.8*
- - Libération de prison ¬ *Z65*
- - Logement et aux conditions économiques ¬ *Z59*
- - Mode de vie ¬ Autres *Z72.8*
- - Multiparité ¬ *Z64.1*
- - Orientation de son mode de vie ¬ *Z73*
- - Possible sévices
- - - Physiques infligés à un enfant ¬ *Z61*
- - - Sexuels infligés à un enfant ¬ *Z61*
- - Situations psycho-sociales ¬ *Z65*
- Marche, non classée ailleurs ¬ *R26.2*
- Mastication ¬ *R19.88*
- Nutritionnelles et nutrition inadaptée ¬ *R63.3*
- Procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et *Z35.2*
- Rapport
- - Conjoint ou le partenaire ¬ *Z63*
- - Parents et les beaux-parents ¬ *Z63*

Difformité
- Cicatrice (Peau) ¬ *L90.5*
- Crânienne congénitale avec anencéphalie ¬ *Q00.0*
- Nasale syphilitique congénitale ¬ *A50.5*

Diffus
v./v.a. Type de maladie

Digénique ¬ Hémochromatose *E83.1*

DiGeorge ¬ Séquence de *D82.1*

Digestif
v./v.a. Organe digestif
- Abdomen ¬ Autres symptômes précis du système *R19.88*
- Actes médical
- - Non classées ailleurs ¬ Autres atteintes de l'appareil *K91.88*
- - Sans précision ¬ Atteinte de l'appareil *K91.9*
- Cavité abdominale ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil *R85*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de l'appareil *O99.6*
- Greffe-contre-hôte stade
- - 1 ¬ Maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.01†, K93.21**
- - 2 ¬ Maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.02†, K93.22**
- - 3 ¬ Maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.02†, K93.23**
- - 4 ¬ Maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.02†, K93.24**
- Haut ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil *F45.31*
- SAI ¬
- - Appareil
- - - *D13.9*
- - - *T18.9*
- - Tube ou appareil *C26.9*
- Sans précision ¬
- - Affection périnatale de l'appareil *P78.9*
- - Maladie du système *K92.9*
- - Malformation congénitale de l'appareil *Q45.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil *D37.9*
- Siège non précisé ¬ Ulcère *K27*
- Utéro-urinaire ¬ Fistule congénitale utéro- *Q51.7*
- ¬
- - Absence acquise d'autres parties de l'appareil *Z90.4*
- - Affections périnatales précisées de l'appareil *P78.8*
- - Anomalie congénitale SAI de l'appareil *Q45.9*
- - Antécédents familiaux de maladies de l'appareil *Z83.7*
- - Antécédents personnels de maladies de l'appareil *Z87.1*
- - Infection
- - - Cytomégalovirus de l'appareil *B25.80*
- - - Fongique du tube *B49†, K93.8**
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations d'autres organes du système *K91.83*
- - Maladie de Chagas chronique avec atteinte de l'appareil *B57.3†, K93.8**
- - Maladies précisées du système *K92.8*
- - Malformations congénitales précisées de l'appareil *Q45.8*

Digestif *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Présence d'une autre stomie de l'appareil *Z93.4*
- - Sténose consécutive
- - - Intervention par endoscopie de l'appareil *K91.84*
- - - Opération de l'appareil *K91.84*
- - Surveillance d'autres stomies de l'appareil *Z43.4*
- - Tumeur bénigne: Sièges mal définis de l'appareil *D13.9*
- - Tumeur maligne
- - - Lésion à localisations contiguës de l'appareil *C26.8*
- - - Secondaire des organes respiratoires et *C78*
- - - Sièges mal définis de l'appareil *C26.9*

Digestion ¬ Intoxication: Médicaments facilitant la *T47.5*

Digestive
v./v.a. Voie digestive

Digital
v./v.a. cranio-digital
v./v.a. lacrymo-auriculo-dento-digital
v./v.a. oro-facio-digital
v./v.a. oto-palato-digital
- Brachydactylie familiale ¬ Syndrome d'arthropathie *M25.94, Q71.8*
- Congénital
- - Isolé ¬ Hippocratisme *Q68.1*
- - ¬ Hippocratisme *Q68.1*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de dysplasie mésomélique-anomalies *Q87.5*
- Doigt ¬ Fibromatose infantile *M72.84*
- Dysmorphie faciale-retard moteur et verbal associé à TRAF7 ¬ Syndrome d'anomalies cardiaques-anomalies *Q87.0*
- Infantile ¬ Fibromatose *M72.80*
- Orteil ¬ Fibromatose infantile *M72.87*
- ¬
- - Arthroplastie *Z96.68*
- - Dysplasie oculo-dento- *Q87.0*
- - Hippocratisme *R68.3*
- - Myopathie à empreintes *G71.2*
- - Pachydermopériostose avec hippocratisme *M89.49†, L62.0**
- - Syndrome
- - - Cranio-facio-fronto- *Q87.0*
- - - Microcéphalie-albinisme-anomalies *Q87.8*

Digitaliques ¬ Intoxication par les *T46.0*

Digito
v./v.a. cranio-facio-digito-génital
v./v.a. facio-digito-génital
v./v.a. odonto-tricho-unguéo-digito-palmaire
v./v.a. onycho-digito-mammaire

Dihydraté
- Articulation
- - Coude ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium *M11.12*

Dihydraté *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Genou ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium *M11.16*
- Articulation de l'épaule ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium *M11.11*
- Colonne vertébrale ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium *M11.18*
- Main ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium *M11.14*
- Pied ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium *M11.17*
- Poignet ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium *M11.13*
- Région pelvienne ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium *M11.15*
- Sièges multiples ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium *M11.10*
- ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium *M11.19*

Dihydrofolate réductase ¬ Anémie mégaloblastique due à un déficit en *D52.8*

Dihydrolipoamide
- Acétyltransférase ¬ Déficit en composé *E74.4*
- Déshydrogénase ¬ Déficit en *E74.4*

Dihydroptéridine réductase ¬ Déficit en *E70.1*

Dihydropyrimidinase ¬ Déficit en *E79.8*

Dihydropyrimidine déshydrogénase ¬ Déficit en *E79.8*

Dihydropyrimidinurie ¬ *E79.8*

Dilacération hémorragique gastro-œsophagienne ¬ Syndrome de *K22.6*

Dilatation
- Aiguë de l'estomac ¬ *K31.0*
- Aorte ¬ *I71.9*
- Ataxie ¬ Cardiomyopathie avec *E71.1†, I43.1**
- Canal auditif interne-dysmorphie faciale ¬ Syndrome lié à l'X d'atrésie du conduit auditif externe- *Q16.9, Q18.9*
- Canal pancréatique ¬ *K86.88*
- Cœur ¬ *I51.7*
- Côlon ¬ *K59.3*
- Congénital(e) de l'aorte ¬ *Q25.4*
- Congénitale
- - Côlon ¬ *Q43.2*
- - Œsophage ¬ *Q39.5*
- - Trachée ¬ *Q32.1*
- - Uretère ¬ *Q62.2*
- Idiopathique
- - Artère pulmonaire ¬ *I28.8*
- - Familiale de l'oreillette droite ¬ *Q20.8*
- Insuffisante du col ¬ *O62.0*

Dilatation *–suite*
- Syphilitique de l'aorte ¬ *A52.0†, I39.1**
- Ventriculaire ¬ *I51.7*
- Voies biliaires induite par la kétamine ¬ *K83.8, F13.1*
- ¬ Prolongation de la première période [*O63.0*

DILV [Double inlet left ventricle] ¬ *Q20.4*

Dimension des mâchoires ¬ Anomalies importantes de *K07.0*

Diméthylbenzène] ¬ Xylène [*T52.2*

Diméthylglycine déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.5*

Diminués ¬ Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou *R01.2*

Diminution
- Capacité
- - Respiratoire ¬ *R94.2*
- - Vitale ¬ *R94.2*
- Formation de mélanine ¬ Autres anomalies liées à une *L81.6*
- Œstrogènes ¬ *E28.3*
- Sécrétion bronchique ¬ *R09.3*
- Tolérance au glucose ¬ *R73.08*

Diminutus [ternidensiase] ¬ Infection par: Ternidens *B81.8*

Dimitri
v./v.a. Sturge-Weber-Dimitri

Dinno ¬ Syndrome de *Q87.8*

Diones ¬ Intoxication: Succinimides et oxazolidine- *T42.2*

Dioxyde
- Carbone ¬
- - *T41.5*
- - Démence au cours d'intoxication au *T58†, F02.8**
- - Effet toxique: *T59.7*
- - Intoxication au *T41.5*
- Soufre ¬ Effet toxique: *T59.1*

Dioxygénase ¬ Tyrosinémie par déficit en 4-hydroxyphénylpyruvate *E70.2*

Diparésie et diplégie des membres supérieurs ¬ *G83.0*

Diphallie ¬ *Q55.6*

Diphosphatase ¬ Déficit en fructose-1,6- *E74.1*

Diphosphate] ¬ Trouble de la coagulation dû à une anomalie du récepteur plaquettaire P2Y12 de l'ADP [adénosine *D69.1*

Diphosphate-galactose-4-épimérase ¬ Déficit en uridine *E74.2*

Diphtérie
- Amygdalienne ¬ *A36.0*
- Complication neurologique ¬ *A36.8†, G99.8**
- Cutanée ¬ *A36.3*
- Gangréneuse ¬ *A36.9*
- Hémorragique ¬ *A36.9*
- Laryngée ¬ *A36.2*
- Nasale ¬ *A36.8*
- Ombilicale ¬ *A36.3*

Diphtérie *–suite*
- Oreille moyenne ¬ *A36.8†, H67.0**
- Pharyngée ¬ *A36.0*
- Rhinopharyngée ¬ *A36.1*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.6*
- Sur lésions ¬ *A36.3*
- Tétanos
- - Coqueluche
- - - DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre *Z27.1*
- - - Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre *Z27.3*
- - - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre *Z27.2*
- - Poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la *Z27.8*
- Vaginale ¬ *A36.8†, N77.1**
- ¬
- - *A36.9*
- - Formes de *A36.8*
- - Lymphadénite au cours de *A36.8*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *A36.8†, N16.0**
- - Myocardiopathie au cours de *A36.8†, I43.0**
- - Paralysie
- - - Iris due à la *A36.8†, H22.8**
- - - Larynx due à la *A36.2*
- - Polyneuropathie au cours de *A36.8†, G63.0**
- - Pyélonéphrite au cours de *A36.8†, N16.0**
- - Sujet porteur de *Z22.2*

Diphtérique
- Pseudomembraneuse ¬ Angine *A36.0*
- ¬
- - Amygdalite *A36.0*
- - Anémie *A36.8*
- - Angine *A36.0*
- - Conjonctivite *A36.8†, H13.1**
- - Croup *A36.2*
- - Cystite *A36.8†, N33.8**
- - Dermatite *A36.3*
- - Laryngite *A36.2*
- - Laryngo-trachéite *A36.2*
- - Myocardite *A36.8†, I41.0**
- - Névrite *A36.8†, G59.8**
- - Ophtalmie *A36.8†, H13.1**
- - Paralysie pharyngée *A36.0†, G99.8**
- - Péritonite *A36.8†, K67.8**
- - Polynévrite *A36.8†, G63.0**
- - Stomatite *A36.8*
- - Trachéite *A36.8*
- - Ulcère du larynx *A36.2*

Diphtheriae ¬ Radiculomyélite toxique à Corynebacterium *A36.8†, G05.0**

Diphyllobothriase larvaire ¬ *B70.1*

Diphyllobothrium
- Latum ¬ Infection due à une forme adulte de *B70.0*
- Pacificum ¬ Infection due à une forme adulte de *B70.0*
- ¬
- - Anémie à *B70.0†, D63.8**
- - Infection
- - - *B70.0*
- - - Due à une forme adulte de *B70.0*

Diplacousie ¬ *H93.2*

Diplégie
- Congénitale faciale ¬ *Q87.0*
- Faciale avec paresthésies du syndrome Guillain-Barré ¬ Variant *G61.0*
- Facio-linguo-masticatrice ¬ *G12.2*
- Membres supérieurs ¬ Diparésie et *G83.0*
- Spastique
- - Dysarthrie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microcéphalie post-natale-hypotonie infantile- *Q87.8*
- - Progressive ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère- *Q87.2*
- Supérieure ¬ *G83.0*

Diplégique ¬ Paralysie cérébrale spastique *G80.1*

Diplocoques ¬ Méningite à *A39.0†, G01**

Diplopie ¬ *H53.2*

Diprosopie ¬ *Q18.8*

Dipylidiose [infection par cestodes du chien] ¬ *B71.1*

Dipylidium ¬ Infection à *B71.1*

Dipyridamole ¬ *T46.3*

DIRA [Déficit de l'antagoniste du récepteur à l'interleukine-1] ¬ *M86.39*

Dirofilariose ¬ *B74.8*

Discal
v./v.a. Hernie discale
- ¬
- - Névrite due à une rupture *M51.1†, G55.1**
- - Radiculite
- - - Cervicale due
- - - - Prolapsus *M50.1†, G55.1**
- - - - Rupture *M50.1†, G55.1**
- - - Due
- - - - Dégénérescence *M51.1†, G55.1**
- - - - Prolapsus *M51.1†, G55.1**
- - - - Rupture *M51.1†, G55.1**
- - Rétrécissement
- - - Canal rachidien par lésion *M99.5*
- - - Espaces intervertébraux par tissu conjonctif et *M99.7*

Disciforme ¬ Kératite dendritique et *H19.1**

Disciformis
- Cours de varicelle ¬ Keratitis *B01.8†, H19.2**
- Herpès simplex ¬ Keratitis *B00.5†, H19.1**

Discite
- Pyogène ¬ *M46.39*

Discite *–suite*
- Sans précision ¬ *M46.4*

Discoïde
- Besnier ¬ Érythème marginé *L53.2*
- Congénital
- - Localisations multiples ¬ Ménisque *M23.10*
- - Ménisque
- - - Externe ¬ Ménisque *M23.16*
- - - Interne ¬ Ménisque *M23.13*
- - - SAI ¬ Ménisque *M23.19*
- Paupière ¬ Lupus érythémateux *H01.1*
- ¬ Lupus érythémateux *L93.0*

Discopathie
- Intervertébrale ¬ Sciatique due à une *M51.1†, G55.1**
- ¬ Myélopathie au cours de *M51.0†, G99.2**

Discordance ventriculo-artériel
- Concordance atrio-ventriculaire ¬ *Q20.3*
- Isolée ¬ *Q20.3*

Discordante ¬ Communication
- Auriculo-ventriculaire *Q20.5*
- Ventriculo-auriculaire *Q20.3*

Discrimination ou d'une persécution ¬ Cible d'une *Z60*

Disease ¬ Pink *T56.1*

Dislocation
- Congénitale de la tête radiale ¬ *Q68.8*
- Famille par séparation ou divorce ¬ *Z63*
- Germe dentaire ¬ *K00.4*
- Multiples
- - Niveau de la tête et du cou ¬ *T03.0*
- - Type Hall ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire avec *Q77.7*
- Osselets ¬ Dissociation et *H74.2*

Disomie uniparentale
- Maternelle chromosome
- - 2 ¬ *Q99.8*
- - 4 ¬ *Q99.8*
- - 6 ¬ *Q99.8*
- - 9 ¬ *Q99.8*
- - 13 ¬ *Q99.8*
- - 16 ¬ *Q99.8*
- - 20 ¬ *Q99.8*
- - 21 ¬ *Q99.8*
- - 22 ¬ *Q99.8*
- - X ¬ *Q99.8*
- Origine
- - Maternelle du chromosome 1 ¬ *Q99.8*
- - Paternelle
- - - Chromosome
- - - - 1 ¬ *Q99.8*
- - - - 11 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une *Q87.3*
- - - Mosaïque ¬ Syndrome de *Q99.8*
- Paternelle chromosome
- - 5 ¬ *Q99.8*

Disomie uniparentale *–suite*
- Paternelle chromosome *–suite*
- - 6 ¬ *Q99.8*
- - 7 ¬ *Q99.8*
- - 13 ¬ *Q99.8*
- - 20 ¬ *Q99.8*
- - 21 ¬ *Q99.8*
- - X ¬ *Q99.8*

Disparition
- Décès (supposé) d'un membre de la famille ¬ *Z63*
- Vision binoculaire ¬ *H53.3*
- ¬ Noyade et *X59.9!*

Dispersion pigmentaire ¬ Glaucome à *H40.18*

Disphospho-glycérate-mutase [2,3 DGM] ¬ Anémie par déficit en 2,3 *D55.2*

Disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide ¬ Non *Z75.8*

Disponibles ¬ Soins à domicile non *Z75.8*

Dispositif
- Assistance ventriculaire épicardique ¬ Infection due à un *T82.72*
- Cardiaque électronique ¬
- - Contrôle et vérification d'un *Z45.0*
- - Présence d'un *Z95.0*
- Cardiaques (électroniques) ¬ Adaptation et manipulation d'autres *Z45.08*
- Contraceptif intra-utérin
- - Stérilet] ¬ Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un *Z30.5*
- - ¬
- - - Mise en place d'un *Z30.1*
- - - Surveillance d'un *Z30.5*
- Gastro-intestinal
- - Ballonnet ¬ Complication mécanique due à un *T85.59*
- - ¬ Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres *Z46.5*
- Intra-utérin
- - Contraceptif ¬ Complication mécanique d'un *T83.3*
- - ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*
- Œsophagien anti-reflux ¬ Complication mécanique d'un *T85.50*
- Ostéosynthèse interne ¬ Infection péri-implantaire par *T84.6*

Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus ¬ *Q89.3*

Disproportion
- Céphalo-pelvienne SAI ¬ *O33.9*
- Due
- - Anomalies du fœtus ¬ Soins maternels pour *O33.7*
- - Bassin maternel généralement rétréci ¬ Soins maternels pour *O33.1*
- - Fœtus

Disproportion *–suite*
- Due *–suite*
- - Fœtus *–suite*
- - - Anormalement gros ¬ Soins maternels pour *O33.5*
- - - Hydrocéphale ¬ Soins maternels pour *O33.6*
- - Malformation du bassin de la mère ¬ Soins maternels pour *O33.0*
- - Rétrécissement détroit
- - - Inférieur ¬ Soins maternels pour *O33.3*
- - - Supérieur du bassin maternel ¬ Soins maternels pour *O33.2*
- Fœtale SAI ¬ *O33.5*
- Fœto-pelvienne
- - Cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et *P03.1*
- - Origine mixte, maternelle et fœtale ¬ Soins maternels pour *O33.4*
- - SAI ¬ *O33.9*
- - Sans précision ¬ Dystocie due à une *O65.4*
- Origine
- - Fœtale avec fœtus normal ¬ *O33.5*
- - ¬ Soins maternels pour *O33.8*
- SAI ¬ Malformation du bassin entraînant une *O33.0*
- Sans précision ¬ Soins maternels pour *O33.9*
- Types fibre
- - Musculaires ¬ Myopathie congénitale avec *G71.2*
- - ¬ *G71.2*
- ¬
- - Ascite du fœtus entraînant une *O33.7*
- - Bassin rétréci SAI entraînant une *O33.1*
- - Hydropisie du fœtus entraînant une *O33.7*
- - Jumeaux soudés entraînant une *O33.7*
- - Méningomyélocèle du fœtus entraînant une *O33.7*
- - Rétrécissement
- - - Cavité médiane (bassin) entraînant une *O33.3*
- - - Détroit
- - - - Inférieur (bassin) entraînant une *O33.3*
- - - - Supérieur (du bassin) entraînant une *O33.2*
- - Tératome sacro-coccygien du fœtus entraînant une *O33.7*
- - Tumeur du fœtus entraînant une *O33.7*

Disque
v./v.a. Dégénérescence des disques
- Cervical
- - Myélopathie ¬ Atteinte d'un *M50.0†, G99.2**
- - Radiculopathie ¬ Atteinte d'un *M50.1*
- - Sans précision ¬ Atteinte d'un *M50.9*
- - ¬
- - - Atteintes d'un *M50.8*

Disque *–suite*
- Cervical *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Détérioration d'un *M50.3*
- - - Hernie d'un *M50.2*
- Cervicaux avec cervicalgie ¬ atteinte des *M50*
- Cervico-dorsaux ¬ atteinte des *M50*
- Dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés ¬ atteintes de *M51*
- Intervertébral
- - Cervical ¬ Rupture traumatique d'un *S13.0*
- - Cervicaux
- - - Compression des racines nerveuses ¬ Atteinte des *M50.1†, G55.1**
- - - Myélopathie ¬ Compression des racines nerveuses lors d'une atteinte des *M50.0†, G99.2**
- - - Névralgie cervicale ¬ Atteinte des *M50.8†, G55.1**
- - Dorsal ¬ Rupture traumatique d'un *S23.0*
- - Lombaire ¬ Rupture traumatique d'un *S33.0*
- - Myélopathie ¬ Compression des racines nerveuses lors d'une atteinte des *M51.0†, G99.2**
- - Précisé ¬
- - - Détérioration d'un autre *M51.3*
- - - Hernie d'un autre *M51.2*
- - Sans précision ¬ Atteinte d'un *M51.9*
- - ¬
- - - Atteintes précisées d'un *M51.8*
- - - Claudicatio spinalis au cours d'atteinte lombaire des *M51.1†, G55.1**
- - - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.07*
- - - Compression des racines nerveuses lors d'une atteinte des *M51.1†, G55.1**
- - - Infection (pyogène) d'un *M46.3*
- - - Lumbago avec ischialgie due à une atteinte des *M51.1†, G55.1**
- - - Myélopathie
- - - - Cours d'atteinte des *M51.0†, G99.2**
- - - - Déplacement de *M51.0†, G99.2**
- - - Neuropathie radiculaire avec atteinte des *M51.1†, G55.1**
- - - Névrite
- - - - Due
- - - - - Atteinte des *M51.1†, G55.1**
- - - - - Déplacement de *M51.1†, G55.1**
- - - - Nerf
- - - - - Brachial due au déplacement de *M50.1†, G55.1**
- - - - - Sciatique due au déplacement de *M51.1†, G55.1**
- - - - Plexus brachial due au déplacement de *M50.1†, G55.1**
- - - Présence d'une prothèse de *Z96.67*
- - - Radiculite

Disque *–suite*
- Intervertébral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Radiculite *–suite*
- - - - Cervicale due au déplacement de *M50.1†, G55.1**
- - - - Due
- - - - - Atteinte des *M51.1†, G55.1**
- - - - - Déplacement de *M51.1†, G55.1**
- - - Tuberculose du *A18.0†, M49.09**
- Lombaire avec radiculopathie ¬ Atteintes d'un *M51.1†, G55.1**

Dissection
- Aorte abdominale
- - Rupture ¬ *I71.06*
- - Sans indication de rupture ¬ *I71.02*
- Aorte localisation non précisée
- - Rupture ¬ *I71.04*
- - Sans indication de rupture ¬ *I71.00*
- Aorte thoracique, avec rupture ¬ *I71.05*
- Aorte thoraco-abdominale
- - Rupture ¬ *I71.07*
- - Sans indication de rupture ¬ *I71.03*
- Aortique familiale ¬ *I71.00*
- Artère basilaire (tronc) ¬ Anévrisme et *I72.5*
- Artère carotide ¬ Anévrisme et *I72.0*
- Artère coronarienne avec rupture ¬ *I21.9*
- Artère de membre
- - Inférieur ¬ Anévrisme et *I72.4*
- - Supérieur ¬ Anévrisme et *I72.1*
- Artère iliaque ¬ Anévrisme et *I72.3*
- Artère précérébrale ¬ Anévrisme et *I72.5*
- Artère rénale
- - Lentiginose ¬ *I72.2, L81.4*
- - ¬ Anévrisme et *I72.2*
- Artère vertébrale ¬ Anévrisme et *I72.6*
- Artères cérébrales ¬ *I67.0*
- Artères précisées ¬ Anévrisme et *I72.8*
- Artérielle-lentiginose ¬ Syndrome de *I72.9, L81.4*
- Carotide-lentiginose ¬ *I72.0, L81.4*
- Familiale
- - Aorte thoracique ¬ *I71.01*
- - Artère vertébrale ¬ *I72.6*
- - Artères cervicales et cérébrales ¬ *I72.9*
- - Carotide ¬ *I72.0*
- - Rompue de l'aorte thoracique ¬ *I71.05*
- Localisation non précisée ¬ Anévrisme et *I72.9*
- Spontanée
- - Artère vertébrale ¬ *I72.6*
- - Idiopathique de l'artère coronaire ¬ *I25.4*
- Transversal
- - Abdomen ¬ *T05.8*
- - Thorax ¬ *T05.8*

Dissémination secondaire du cancer ¬ *C79.9*

Disséminé
v./v.a. Type de maladie

Disséquant
- Aorte ¬ Anévrisme *I71.0*
- Articulation du coude ¬ Ostéochondrose *M93.22*
- Cheville ¬ Ostéochondrose *M93.27*
- Familiale
- - Articulation
- - - Coude ¬ Ostéochondrose *M93.22*
- - - Genou ¬ Ostéochondrose *M93.26*
- - - Hanche ¬ Ostéochondrose *M93.25*
- - Cheville ¬ Ostéochondrose *M93.27*
- - Localisations multiples ¬ Ostéochondrite *M93.20*
- Genou ¬ Ostéochondrite *M93.26*
- ¬ Ostéochondrite *M93.29*

Dissimulée ¬ Grossesse *Z35.3*

Dissociatif
- Atteintes sensorielles ¬ Anesthésie *F44.6*
- Conversion
- - Mixte ¬ Trouble *F44.7*
- - Sans précision ¬ Trouble *F44.9*
- - Transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles *F44.82*
- - ¬ Autres troubles *F44.8*
- Crépusculaire» ¬ Psychogène: état *F44.88*
- Organique ¬ Trouble *F06.5*
- ¬
- - Amnésie *F44.0*
- - Convulsions *F44.5*
- - Fugue *F44.1*
- - Stupeur *F44.2*
- - Trouble psychomoteur *F44.4*
- - Troubles moteurs *F44.4*

Dissociation
- Auriculoventriculaire [AV] ¬ *I45.8*
- Dislocation des osselets ¬ *H74.2*
- Interférente ¬ *I45.8*
- Troubles de conversion] ¬ Autres troubles de *F44.88*

Dissocié ¬
- Intelligence *F74*
- Nystagmus (de): *H55*

Distal
v./v.a. Artère distale
v./v.a. Type de maladie
- Dysmorphie faciale-retard global de développement ¬ Syndrome d'épilepsie à début précoce-anomalies des membres *Q87.0*

Distance marche 200 m
- Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, *I70.21*
- ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, *I70.22*

Distension
- Abdominale (gazeuse) ¬ *R14*
- Aiguë de l'estomac ¬ *K31.0*
- Trompe d'Eustache ¬ *H69.0*

Distichiase ¬ *Q10.3*

Distichiasis
- Isolé ¬ *Q10.3*
- ¬ Syndrome de lymphœdème- *Q82.08*

Distocclusion ¬ *K07.2*

Distomatose
- Foie à Chlonorchis sinensis ¬ *B66.1†, K77.0**
- Hépatique
- - Douve foie
- - - Chat ¬ *B66.0†, K77.0**
- - - Sibérienne ¬ *B66.0†, K77.0**
- - Fasciola hepatica ¬ *B66.3†, K77.0**
- - Opisthorchis felineus ¬ *B66.0†, K77.0**
- Pulmonaire ¬ *B66.4†, J99.8**
- ¬ *B66.9*

Distomiase
- Hépatique ¬ *B66.3†, K77.0**
- Voies biliaires ¬ *B66.3†, K87.0**
- ¬ *B66.9*

Distomolaire ¬ *K00.1*

Distorsion
- Ligament collatéral médial du genou ¬ *S83.42*
- Ligament croisé
- - Antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.51*
- - Postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.52*
- Ligament latéral
- - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.41*
- - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.42*

Diurèse osmotique ¬ *R35.0*

Diurétiques
- Anse ¬ Intoxication: *T50.1*
- ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres *T50.2*

Diutinum ¬ Erythema elevatum *L95.1*

Divergens] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Exotropie [strabisme *H50.3*

Divergent concomitant ¬ Strabisme *H50.1*

Diverticulaire
- Côlon
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬ Maladie *K57.23*
- - - ¬ Maladie *K57.22*
- - Saignement ¬ Maladie *K57.31*
- - ¬ Maladie *K57.30*

Diverticulaire *–suite*
- Intestin
- - Grêle
- - - Côlon
- - - - Perforation abcès
- - - - - Saignement ¬ Maladie *K57.43*
- - - - - ¬ Maladie *K57.42*
- - - - Saignement ¬ Maladie *K57.51*
- - - - ¬ Maladie *K57.50*
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ Maladie *K57.03*
- - - - ¬ Maladie *K57.02*
- - - Saignement ¬ Maladie *K57.11*
- - - ¬ Maladie *K57.10*
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬ Maladie *K57.83*
- - - ¬ Maladie *K57.82*
- - ¬ Maladie *K57.90*

Diverticule
- Acquis de l'œsophage ¬ *K22.5*
- Appendice ¬ *K38.2*
- Bronchique ¬ *Q32.4*
- Cœur ¬ *Q24.8*
- Congénital
- - Estomac ¬ *Q40.2*
- - Intestin ¬ *Q43.8*
- - Ventricule gauche ¬ *Q24.8*
- - Vessie ¬ *Q64.6*
- Gastrique ¬ *K31.4*
- Kommerel ¬ *Q25.4*
- Meckel ¬
- - *Q43.0*
- - Adénocarcinome d'un *C17.3*
- - Carcinome épidermoïde du *C17.3*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] d'un *C17.3*
- - Léiomyosarcome d'un *C17.3*
- Œsophage (congénital) ¬ *Q39.6*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Pharynx ¬ *Q38.7*
- Urétral ¬ *N36.1*
- Vésical ¬ Calcul: dans un *N21.0*
- Vessie ¬ *N32.3*

Diverticulite
- Côlon
- - Intestin grêle, avec péritonite ¬ *K57.4*
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.23*
- - - Sans indication de saignement ¬ *K57.22*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.33*
- - - Sans indication de saignement ¬ *K57.32*
- Congénitale du côlon ¬ *Q43.8*
- Intestin
- - Grêle
- - - Côlon

Diverticulite *–suite*
- Intestin *–suite*
- - Grêle *–suite*
- - - Côlon *–suite*
- - - - Perforation abcès
- - - - - Saignement ¬ *K57.43*
- - - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.42*
- - - - Sans perforation abcès
- - - - - Saignement ¬ *K57.53*
- - - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.52*
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.03*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.02*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Indication de saignement ¬ *K57.12*
- - - - Saignement ¬ *K57.13*
- - Siège non précisé
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.83*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.82*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.93*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.92*

Diverticulose
- Côlon sans perforation abcès
- - Saignement ¬ *K57.31*
- - Sans indication de saignement ¬ *K57.30*
- Grêle et du colon sans perforation ni abcès, avec saignement ¬ *K57.51*
- Intestin
- - Grêle
- - - Côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.50*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Indication de saignement ¬ *K57.10*
- - - - Saignement ¬ *K57.11*
- - Siège non précisé sans perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.91*
- - - Sans indication de saignement ¬ *K57.90*

Divorce ¬ Dislocation de la famille par séparation ou *Z63*

DLD ¬ Déficit en *E74.4*

DM1 [Dystrophie myotonique de type 1] ¬ *G71.1*

DMD [Dystrophie musculaire de Duchenne] ¬ *G71.00*

DMED ¬ *G71.0*

DNA ligase IV ¬ Déficit en *D81.1*

DNA2 ¬ Syndrome de délétion de l'ADN mitochondrial associée à *G71.3*

DNAJB4 ¬ Myopathie distale associée à *G71.08*

DNAJC12 ¬ Hyperphénylalaninémie par déficit en *E70.1*

DNA-PKcs ¬ Immunodéficience combinée sévère par déficit en *D81.1*

DNM1L ¬ Encéphalopathie par défaut de fission mitochondriale et peroxysomale associée à *G31.81*

DNMT3A ¬ Syndrome de croissance excessive lié à *Q87.3*

Dobrow ¬ Syndrome de *Q87.8*

DOCK11 ¬ Dérèglement immunitaire début précoce
- Déficit complet en *M35.8*
- Immunité par déficit partiel en *M35.8*

DOCK2 [Dedicator of cytokinesis 2] ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

DOCK8 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.1*

Doigt
v./v.a. Foulure de doigt
- Articulation
- - Interphalangienne ¬ Luxation du *S63.12*
- - Métacarpo-phalangienne ¬ Luxation du *S63.11*
- Complète) (partielle) ¬ Amputation traumatique d'un autre *S68.1*
- Familiale isolée ¬ Clinodactylie des *Q68.1*
- Longs ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-trouble du langage-strabisme-visage grimaçant- *Q87.8*
- Lymphangite ¬
- - Infection purulente du *L03.01*
- - Inflammation purulente du *L03.01*
- Main
- - Anomalies des orteils-pectus excavatum sévère ¬ Syndrome d'hyperphalangie des *Q79.8*
- - ¬
- - - Brachydactylie et syndactylie préaxiales des *Q74.0*
- - - Ostéoblastome des *D16.1*
- Nez ¬ Se mettre les *F98.88*
- Niveau
- - Articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ Rupture traumatique de ligaments du *S63.4*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs d'un autre *S66.3*
- - - Fléchisseurs d'un autre *S66.1*
- - - Intrinsèques d'un autre *S66.5*
- Ongle) ¬ *T23*
- Orteils ¬ Phlegmon des *L03.0*
- Partie non précisée ¬
- - Fracture d'un autre *S62.60*
- - Luxation du *S63.10*
- Phalange
- - Distale ¬ Fracture d'un autre *S62.63*
- - Médiane ¬ Fracture d'un autre *S62.62*
- - Proximale ¬ Fracture d'un autre *S62.61*
- Plus (complète) (partielle) ¬ Amputation traumatique de deux *S68.2*

Doigt *–suite*
- Pouce-polyneuropathie ¬ Aplasie des muscles extenseurs des *G60.0, Q68.1*
- Ressort» ¬ *M65.3*
- S
- - Bilatérale ¬ Absence acquise de *Z89.3*
- - Lésion ongle ¬
- - - Contusion de(s) *S60.1*
- - - Plaie ouverte de(s) *S61.1*
- - Niveau avant-bras ¬ Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs d'autre(s) *S56.4*
- - - Fléchisseurs d'autre(s) *S56.1*
- - Parties du poignet et de la main ¬ Amputation traumatique associée de (parties de) *S68.3*
- - SAI ¬
- - - Contusion de(s) *S60.0*
- - - Plaie ouverte de(s) *S61.0*
- - Sans lésion ongle ¬
- - - Contusion de(s) *S60.0*
- - - Plaie ouverte de(s) *S61.0*
- - Surnuméraire(s) ¬ *Q69.0*
- - Y compris le pouce], unilatérale ¬ Absence acquise de *Z89.0*
- - ¬
- - - Déformation de(s) *M20.0*
- - - Écrasement du pouce et d'autre(s) *S67.0*
- Sans synostose de type 3 ¬ Syndactylie des *Q70.1*
- Synostose
- - Type 3 ¬ Syndactylie des *Q70.0*
- - ¬ Syndactylie complexe des *Q70.0*
- ¬
- - Absence congénitale d'un *Q71.3*
- - Articulation du *T84.08*
- - Blessure ouverte du bout charnu du *S61.0*
- - Brachydactylie des *Q71.8*
- - Camptodactylie des *Q68.1*
- - Coalescence des *Q70.0*
- - Déformation
- - - Congénitale du *Q68.1*
- - - Congénitales des *Q68.1*
- - Fibromatose infantile digitale du *M72.84*
- - Fracture du métacarpe et du *S62.8*
- - Fractures multiples de *S62.7*
- - Kératose palmo-plantaire avec clinodactylie du cinquième *Q82.8, Q68.1*
- - Kyste mucoïde à l'articulation du *M67.44*
- - Lésion traumatique
- - - Nerf collatéral d'un autre *S64.4*
- - - Vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre *S65.5*
- - Luxations multiples des *S63.2*
- - Macrodactylie
- - - *Q74.0*
- - - *Q74.0*
- - Malocclusion due à: habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les *K07.5*

Doigt *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: main et *R02.03*
- - Onychomatricome des ongles de *D21.1*
- - Palmure des *Q70.1*
- - Phlegmon de *L03.01*
- - Syndactylie simple
- - - Complète des *Q70.1*
- - - Partielle des *Q70.1*

Dolichocéphalie ¬ *Q67.2*

Dolichocôlon ¬ *Q43.8*

Dolichol
- Kinase ¬ Déficit en *E77.8*
- Phosphate ¬ Hypotonie et ichtyose par déficit en *E77.8*

Dolichyl-phosphate N-acetylgalactosamine phosphotransférase ¬ Déficit en *E77.8*

Dol-P-mannosyltransférase ¬ Déficit en *E77.8*

Dôme vessie ¬
- Carcinome à petites cellules du *C67.1*
- Carcinome épidermoïde pur du *C67.1*
- Carcinome non papillaire à cellules transitionnelles du *C67.1*
- Rhabdomyosarcome embryonnaire du *C67.1*
- Tumeur maligne: *C67.1*

Domicile
- Aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à *Z74.2*
- Nécessitant des soins ¬ Parent à charge au *Z63*
- Non disponibles ¬ Soins à *Z75.8*

Dominant
v./v.a. Type de maladie

Dommages dus au froid et à l'humidité ¬ *T69.9*

Donath-Landsteiner ¬
- Anémie hémolytique de *D59.6*
- Syndrome de *D59.6*

Donnai
v./v.a. Clayton Smith-Donnai
v./v.a. Medeira-Dennis-Donnai
v./v.a. Thakker-Donnai

Donnai-Barrow ¬ Syndrome de *Q87.8*

Donné ¬ examen de routine limité à un organe *Z01*

Donne soin
- Sans précision ¬ Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui *Z74.9*
- ¬ Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui *Z74.8*

Donneur
- Cellules souches ¬ *Z52.01*
- Cœur ¬ *Z52.7*
- Composants du sang ¬ *Z52.08*
- Cornée ¬ *Z52.5*

Donneur *–suite*
- Éventuel d'organe et de tissu ¬ Examen d'un *Z00.5*
- Foie ¬ *Z52.6*
- IAD] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: *N98.8*
- Moelle osseuse ¬ *Z52.3*
- Organe tissu
- - Non précisés ¬ *Z52.9*
- - ¬ *Z52.88*
- Os ¬ *Z52.2*
- Peau ¬ *Z52.1*
- Poumons ¬ *Z52.80*
- Rein ¬ *Z52.4*
- SAI ¬ *Z52.9*
- Sang entier ¬ *Z52.00*
- Sperme ¬ *Z52.88*

Donohue ¬ Syndrome de *E34.8*

Donovanose ¬ *A58*

DONSON ¬ Spectre microcéphalie-petite taille-anomalies des membres associé à *Q87.1*

DOOR ¬ Syndrome *Q87.8*

Doose ¬ Syndrome de *G40.4*

Dopamine et de la sérotonine ¬ Déficit du transport vésiculaire cérébral de la *G25.88*

Dopa-sensible
- Autosomique
- - Dominante ¬ Dystonie *G24.1*
- - Récessive ¬ Dystonie *G24.1*
- Déficit
- - Sépiaptérine réductase ¬ Dystonie *G24.1*
- - Tyrosine hydroxylase ¬ Dystonie *G24.1*
- Parkinsonisme ¬ Syndrome de retard développemental-troubles du language-dystonie *G25.88*

Doré ¬
- Sepsis du nouveau-né à staphylocoques *P36.2*
- Septicémie à staphylocoques *A41.0*

Dorfman
v./v.a. Destombes-Rosaï-Dorfman

Dorfman-Chanarin ¬ Maladie de *E75.5*

Dorsal
v./v.a. Type de maladie

Dorsalgie
- Basse ¬ *M54.5*
- Sans précision ¬ *M54.9*
- ¬
- - *M54.8*
- - Psychogène: *F45.40*

Dorso
- Lombaire
- - Hydrocéphalie ¬ Spina bifida *Q05.1*
- - ¬ Spina bifida *Q05.6*
- Lombaires et lombo-sacrés ¬ atteintes de disques dorsaux, *M51*

Dorsopathie
- Déformation
- - Précisées ¬ Autres *M43.8*
- - Sans précision ¬ *M43.9*
- Précisées ¬ Autres *M53.8*
- Sans précision ¬ *M53.9*

Dorsoventral lié EN1 type extrémité
- Encéphale ¬ Syndrome
- - *Q04.3, Q74.8*
- - ENDOVESLB [Syndrome *Q04.3, Q74.8*
- Uniquement] ¬ ENDOVESL [Syndrome *Q74.8*
- ¬ Syndrome *Q74.8*

Dos
- Nez ¬ Fistule du *Q18.8*
- Plat ¬ Syndrome du *M40.3*
- SAI ¬
- - *C49.6*
- - *D21.6*
- - Mal de *M54.9*
- Toute
- - Partie
- - - Fesse] ¬ *L02.2*
- - - Sauf les fesses] ¬ *R02.04*
- - - ¬ *L03.3*
- - ¬ *T21*
- Voûté en tant que conséquence tardive du rachitisme ¬ *E64.3, M40.29*
- ¬
- - Basaliome du *C44.59*
- - Carcinome de la peau du *C44.59*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans de la peau du *C44.59*
- - Mélanome malin du *C43.59*
- - Panniculite affectant le cou et le *M54.0*
- - Sarcome des tissus mous du *C49.6*
- - Sarcome du tissu conjonctif du *C49.6*
- - Syndrome autosomique dominant de polydactylie préaxiale-hypertrichose du haut du *Q69.9, Q84.2*

Dosage ¬ Erreur de *Y69!*

Dose
- Due à des cytostatiques ¬ Anémie lors de trouble de l'hématopoïèse dû à une lésion toxique directe de la moelle osseuse corrélée à la *D61.10*
- Thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à *Y59.9!*

Doss ¬ Porphyrie de *E80.2*

Double
- Arc aortique
- - Anneau vasculaire de l'aorte] ¬ *Q25.4*
- - Constriction circulaire de la trachée et de l'œsophage ¬ *Q25.4*
- Duplication du col et du vagin ¬ Utérus *Q51.1*

Double *–suite*
- Hémivagin-agénésie rénale ¬ Syndrome d'utérus *Q51.2, Q60.0*
- Orifice de la valve mitrale ¬ *Q23.8*
- ¬
- - Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes *D57.2*
- - Méat urinaire *Q64.7*
- - Monstre *Q89.4*
- - Nez *Q30.8*
- - Soins maternels pour utérus: *O34.0*
- - Uretère: *Q62.5*
- - Vision *H53.2*

Double inlet left ventricle] ¬ DILV [*Q20.4*

Double inlet ventricle ¬
- *Q20.4*
- Ventricule à double issue [*Q20.4*

Double issue
- Communication interventriculaire
- - Sous-aortique ou sous-aortique et sous-pulmonaire et sténose pulmonaire ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- - Sous-pulmonaire ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- Double inlet ventricle] ¬ Ventricule à *Q20.4*
- Double outlet left ventricle] ¬ Ventricule gauche à *Q20.2*
- Double outlet right ventricle
- - CIV [communication interventriculaire] sous-pulmonaire non-committed ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- - Communication interventriculaire sous-aortique
- - - Sous-pulmonaire [double-committed ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- - - ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- - ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- ¬ Ventricule droit à *Q20.1*

Double outlet left ventricle] ¬ Ventricule gauche à double issue [*Q20.2*

Double outlet right ventricle
- CIV [communication interventriculaire] sous-pulmonaire non-committed ¬ Ventricule droit à double issue [*Q20.1*
- Communication interventriculaire sous-aortique
- - Sous-pulmonaire [double-committed ¬ Ventricule droit à double issue [*Q20.1*
- - ¬ Ventricule droit à double issue [*Q20.1*
- ¬ Ventricule droit à double issue [*Q20.1*

Douglas
v./v.a. Thong-Douglas-Ferrante
- ¬
- - Hernie du *N81.5*
- - Tuberculose du cul-de-sac de *A18.1†, N74.1**

Douleur
- Abdominal
- - Intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée) ¬ *R10.0*
- - Non précisées ¬ *R10.4*

Douleur *–suite*
- Aiguë ¬ *R52.0*
- Anosmie-arthropathie neuropathique ¬ Insensibilité congénitale à la *G60.8†, M14.69*, Q07.8*
- Articulaire ¬ *M25.5*
- Bras ¬ *M79.62*
- Chronique
- - Irréductible ¬ *R52.1*
- - Localisée CRPS type II membre
- - - Inférieur ¬ Syndrome de *G90.61*
- - - Supérieur ¬ Syndrome de *G90.60*
- - Où interviennent des facteurs somatiques et psychiques ¬ *F45.41*
- Chroniques ¬ Autres *R52.2*
- Désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière ¬ *G95.85*
- Due à prothèses, implants ou greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Épigastrique ¬ *R10.1*
- Extrême paroxystique ¬ Syndrome de *G90.88*
- Facial
- - Cours des maladies de l'appareil manducateur ¬ *K10.8*
- - Idiopathique persistante ¬ *G50.1*
- - SAI ¬ *R51*
- Généralisées SAI ¬ *R52.9*
- Gorge ¬ *R07.0*
- Hyperhidrose ¬ Insensibilité congénitale à la *G60.8, R61.9*
- Intermenstruelles ¬ *N94.0*
- Intermittentes ¬ *R52.9*
- Ischémique
- - Cadre d'une artériopathie oblitérante ¬ *I70.29*
- - Effort distance marche 200 m
- - - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.21*
- - - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.22*
- Localisée
- - Partie supérieure de l'abdomen ¬ *R10.1*
- - Parties inférieures de l'abdomen ¬ *R10.3*
- Lombaire ¬ *M54.5*
- Miction SAI ¬ *R30.9*
- Neuropathiques ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire autosomique dominante avec *G60.0*
- Niveau d'un membre ¬ *M79.6*
- Oculaire ¬ *H57.1*
- Organes génitaux féminins ¬ *N94.8*
- Paroi thoracique antérieure SAI ¬ *R07.3*
- Paupière ¬ *H02.8*
- Pelvienne et périnéale ¬ *R10.2*
- Pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps ¬ *R52*
- Précordiale ¬ *R07.2*

Douleur *–suite*
- Repos ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.23*
- Sans précision ¬ *R52.9*
- Somatoforme ¬ *F45.40*
- Thoracique
- - Ischémique ¬ *I20.9*
- - Musculosquelettiques ¬ *R07.3*
- - Respiratoire ¬ *R07.1*
- - Sans précision ¬ *R07.4*
- - ¬ Autres *R07.3*
- Utérines ¬ *N94.8*
- Zostériennes ¬ *B02.9*
- ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans *I70.20*

Douloureux
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ Syndrome de dysfonctionnement *K07.6*
- Brocq ¬ Dermatite polymorphe *L13.0*
- Épisodique familial ¬ Syndrome *M79.89*
- Face ¬ Tic *G50.0*
- Homme ¬ Coït *N48.8*
- Maladie de Dercum] ¬ Lipomatose *E88.29*
- Membre fantôme ¬ Syndrome *G54.6*
- Œdème
- - Augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.22*
- - SAI ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.28*
- - Stade non précisé ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.28*
- - Surface cutané
- - - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.21*
- - - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.20*
- Régional complexe
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Type
- - - - - I ¬ Syndrome *G90.51*
- - - - - II ¬ Syndrome *G90.61*
- - - - ¬ Syndrome *G90.71*
- - - Supérieur
- - - - Type
- - - - - I ¬ Syndrome *G90.50*
- - - - - II ¬ Syndrome *G90.60*
- - - - ¬ Syndrome *G90.70*
- - Type
- - - I ¬ Syndrome *G90.59*
- - - II

Douloureux *–suite*
- Régional complexe *–suite*
- - Type *–suite*
- - - II *–suite*
- - - - Extrémité inférieure ¬ Syndrome *G90.61*
- - - - Extrémité supérieure ¬ Syndrome *G90.60*
- - - - ¬ Syndrome *G90.69*
- Sans précision ¬ Miction *R30.9*
- Somatoforme persistant ¬ Syndrome *F45.40*
- ¬
- - Adipose *E88.29*
- - Défécation *R19.88*
- - Erection *N48.3*
- - Foie *R10.1*
- - Respiration *R07.1*
- - Syndrome
- - - Hématurie *N39.81*
- - - Marfanoïde-neurofibromes systémiques et orbitaux *Q87.8*
- - - Membre fantôme sans élément *G54.7*
- - - Vessie *N30.1*

Douve
- Foie
- - Chat ¬
- - - Distomatose hépatique à *B66.0†, K77.0**
- - - Infection par *B66.0*
- - Mouton ¬ Maladie due à la *B66.3*
- - Sibérienne ¬ Distomatose hépatique à *B66.0†, K77.0**
- - ¬ Infection (à): petite *B66.2*
- ¬ Infection
- - *B66.9*
- - Petite *B66.2*

Dowling-Degos ¬ Maladie de *L81.8*

Dowling-Meara ¬ Épidermolyse bulleuse simple type *Q81.0*

Down
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q90.9*
- Translocation ¬ Syndrome de *Q90.2*
- ¬
- - Kératocône dans le syndrome de *Q90.9†, H19.8**
- - Syndrome de *Q90.9*

DPAH] ¬ Hypertension artérielle pulmonaire induite par des médicaments, des drogues, des toxines et des rayonnements [*I27.02*

DPG [Duplication of the pituitary gland]-plus ¬ Syndrome *Q87.0*

DPTFM] ¬ Déficit en protéine trifonctionnelle mitochondriale [*E71.3*

Dracunculose ¬ *B72*

Drager] ¬ Hypotension orthostatique neurogène [syndrome de Shy- *G23.8*

Drainage
- Anormal de la veine cave inférieure dans l'oreillette gauche ¬ *Q26.8*

Drainage *–suite*
- Liquide céphalorachidien ¬ Présence d'un appareil de *Z98.2*
- Lymphatique
- - Axillaire stade
- - - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.81*
- - - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.82*
- - - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.83*
- - Cervical, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.80*
- - Inguinal stade
- - - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.84*
- - - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.85*
- - - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.86*
- ¬
- - Ostéomyélite chronique avec fistule de *M86.4*
- - Perforation due au *T81.2*

Drash
v./v.a. Denys-Drash

Dravet ¬ Syndrome de *G40.4*

Drechslera hawaiiensis ¬ Infection à *B43.8*

Dreifuss
v./v.a. Emery-Dreifuss

Drépanocytaire
- Hétérozygotes doubles ¬ Affections à hématies falciformes [*D57.2*
- Prolifération ¬ Rétinopathie *D57.8†, H36.8**
- SAI ¬
- - Anémie à hématies falciformes [*D57.1*
- - Maladie à hématies falciformes [*D57.1*
- - Trouble à hématies falciformes [*D57.1*
- ¬
- - Affections à hématies falciformes [*D57.8*
- - Trait de la maladie des hématies falciformes [*D57.3*

Drépanocytose ¬
- *D57.1*
- Arthropathie de la goutte au cours de *D57.8†, M14.09**
- Maladie glomérulaire au cours de *D57.8†, N08.2**
- Néphropathie au cours de *D57.1†, N08.2**
- Syndrome de persistance familiale de l'hémoglobine fœtale - *D56.4, D57.1*

DRESS [Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms] ¬ Syndrome *T88.7*

Dressler II ¬ Syndrome de *I24.1*

Driscoll
v./v.a. Lucey-Driscoll

Drogue
- Multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F19*
- SAI ¬ utilisation inadéquate de *F19*
- Sang ¬ Recherche d'alcool ou de *Z04.8*
- Substances biologiques actives ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Médicament, *X49.9!*
- Toxines et des rayonnements [DPAH] ¬ Hypertension artérielle pulmonaire induite par des médicaments, des *I27.02*
- ¬
- - Complications dues à des médicaments ou à des *Y57.9!*
- - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: médicaments et *G40.5*
- - Démence par inhalation de *F18.7*
- - Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de *Z72.0*
- - Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une *X49.9!*

Drogués et après abus de médicaments ¬ Rééducation des *Z50.3!*

Droits lors traitement
- Falithrom ¬ Hématome de la gaine des grands *D68.33, M62.88*
- Marcumar ¬ Hématome de la gaine des grands *D68.33, M62.88*

Droste
v./v.a. Toriello-Lacassie-Droste

Drought
v./v.a. Worster-Drought

Drug fever] ¬ Fièvre due à des médicaments [*R50.2*

Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms] ¬ Syndrome DRESS [*T88.7*

Drummond ¬ Syndrome de *E70.8*

Drusen
- Familiaux ¬ *H35.5*
- Papille optique ¬ Syndrome de microphtalmie-rétinite pigmentaire-fovéoschisis- *Q15.8*

Druses
- Dégénératives) au pôle postérieur ¬ *H35.38*
- Papille optique ¬ *H47.3*
- ¬ Maculopathie avec présence de *H35.31*

DSTA) ¬ Démence sénile, de type Alzheimer (*F00.1**

DTCoq
- Polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [*Z27.3*
- TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [*Z27.2*
- ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [*Z27.1*

Duane
- Surdité congénitale ¬ Syndrome de *H50.8, H90.5*
- ¬ Syndrome
- - Rétraction de *H50.8*
- - Stilling-Türk- *H50.8*

Dubé
v./v.a. Birt-Hogg-Dubé

Dubin-Johnson ¬ Syndrome de: *E80.6*

Dubium ¬ Trachoma *A71.0*

Dubowitz ¬ Syndrome de *Q87.1*

Duchenne
- Cours de dystrophie musculaire ¬ Paralysie de *G71.00*
- Erb due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de *P14.0*
- Femme porteuse ¬ Forme symptomatique de la dystrophie musculaire de *G71.00*
- Von-Leyden ¬ Syndrome de *G71.00*
- ¬
- - DMD [Dystrophie musculaire de *G71.00*
- - Dystrophie musculaire
- - - *G71.00*
- - - Progressive héréditaire de *G71.00*
- - - Sévère [de type *G71.00*
- - Dystrophinopathie
- - - *G71.00*
- - - Sévère de type *G71.00*

Ducrey ¬ Balanite à bacilles de *A57†, N51.2**

Ductopénie idiopathique de l'adulte ¬ *K83.8*

Dundar ¬ Syndrome des pouces en adduction-arthrogrypose, type *Q79.6*

Dunnigan ¬ Lipodystrophie partielle familiale de *E88.1*

Duodénal
v./v.a. duodénum
v./v.a. gastro-duodénal
v./v.a. pancréatico-duodénal
- Chronique) ¬ Iléus *K31.5*
- Hypoplasie rénale bilatérale fœtal létal ¬ Syndrome de malformation cérébrale-atrésie *Q87.8*
- Origine médicamenteuse ¬ Ulcère *K26.9, Y57.98!*
- ¬
- - Fistule
- - - Cholécysto- *K82.3*
- - - Cholédoco- *K83.3*
- - Infection à Helicobacter pylori au cours d'ulcère *K26.9, B98.0!*
- - Maladie de Crohn [entérite régionale]: *K50.0*
- - Ulcère: *K26*

Duodénite
- Aspergillus ¬ *B44.8†, K93.8**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Due à un cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Virus d'Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**
- Virus de l'herpès ¬ *B00.8†, K93.8**

Duodénite *–suite*
- ¬ *K29.8*

Duodéno-angiocholite ¬ *K83.09*

Duodéno-jéjunale
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de la jonction *C17.8*
- ¬
- - Adénocarcinome de la jonction *C17.8*
- - Carcinome épidermoïde de la jonction *C17.8*
- - GIST [tumeur stromale gastro-intestinale] de la jonction *C17.8*
- - Léiomyosarcome de la jonction *C17.8*

Duodénum
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome du *C17.0*
- Saignement ¬
- - Angiectasie du *K31.82*
- - Angiodysplasie de l'estomac et du *K31.82*
- - Syndrome GAVE [ectasie vasculaire antrale gastrique] au *K31.82*
- Sans
- - Indication saignement ¬
- - - Angiectasie du *K31.81*
- - - Angiodysplasie de l'estomac et du *K31.81*
- - - Syndrome GAVE [ectasie vasculaire antrale gastrique] au *K31.81*
- - Précision ¬ Maladie de l'estomac et du *K31.9*
- Type
- - 1 ¬ Atrésie du *Q41.0*
- - II ¬ Atrésie du *Q41.0*
- - III ¬ Atrésie du *Q41.0*
- ¬
- - Absence congénitale du *Q41.0*
- - Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q41.0*
- - Adénocarcinome du *C17.0*
- - Affections précisées de l'estomac et du *K31.88*
- - Atrésie du *Q41.0*
- - Carcinome épidermoïde du *C17.0*
- - Constriction du *K31.5*
- - Fistule de l'estomac et du *K31.6*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] du *C17.0*
- - Léiomyosarcome du *C17.0*
- - Lésion traumatique de l'intestin grêle: *S36.41*
- - Obstruction du *K31.5*
- - Polype de l'estomac et du *K31.7*
- - Rétrécissement du *K31.5*
- - Somatostatinome du *C17.0*
- - Sténose
- - - *K31.5*
- - - Congénitale du *Q41.0*
- - - Pylorique de l'adulte par tumeurs au *K31.12*

Duodénum *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur bénigne: *D13.2*
- - Tumeur carcinoïde héréditaire du *C17.0*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - Bénigne du *D13.2*
- - - Incertain du *D37.2*
- - - Maligne du *C17.0*
- - Ulcère
- - - *K26*
- - - Aigus de l'estomac et du *K27.3*
- - - Dieulafoy au *K26.0*

Duplication
- 1p36.33 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 8p23.1 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 9q11q33 ¬ *Q92.3*
- 14q32 ¬ *Q92.3*
- 17p13.3 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- Bras du chromosome. ¬ *Q92.3*
- Canal
- - Biliaire ¬ *Q44.5*
- - Cystique ¬ *Q44.5*
- Canal anal ¬ *Q45.8*
- Caudale ¬ *Q89.4*
- Col et du vagin ¬ Utérus double avec *Q51.1*
- Côlon ¬ *Q43.41*
- Complète d'au moins un bras du chromosome. ¬ *Q92.2*
- Délétion inversée 8p ¬ Syndrome de *Q92.5*
- Distale 19q ¬ *Q92.3*
- Entérique thoraco-abdominale ¬ *Q43.49*
- Hypophyse ¬ *Q89.2*
- Intestin
- - Grêle ¬ *Q43.40*
- - Non précisée ¬ *Q43.49*
- Kystique de la langue ¬ *Q38.3*
- Œsophagienne kystique ¬ *Q39.8*
- Organe digestif
- - SAI ¬ *Q45.8*
- - ¬ *Q45.8*
- Péroné avec polydactylie en miroir du pied ¬ Syndrome de *Q74.8*
- Pylorique congénitale ¬ *Q40.2*
- Réarrangements complexes ¬ *Q92.5*
- Rectum ¬ *Q43.42*
- Sourcils-syndactylie ¬ Syndrome de *Q82.8, Q70.9*
- Tubulaire de l'œsophage ¬ *Q39.8*
- Uretère ¬ *Q62.5*
- Urètre ¬ *Q64.7*
- Utérus ¬ Autres *Q51.2*
- Vésicule biliaire ¬ *Q44.1*
- Vues seulement à la prométaphase ¬ *Q92.4*
- Xp22.13p22.2 ¬ Syndrome de *Q99.8*
- Xq12-q13.3 ¬ Syndrome de *Q99.8*

Duplication of the pituitary gland]-plus ¬ Syndrome DPG [*Q87.0*

Dupré
v./v.a. Bazex-Dupré-Christol

Dupuytren ¬
- Fibromatose de l'aponévrose palmaire [*M72.0*
- Fracture ouverte de *S82.81*, *S81.87!*

Durablement acquis ¬ Troubles de la coagulation sanguine *U69.11!*

Dural
v./v.a. extra-dural
v./v.a. sous-dural
- Crâne ¬
- - Fistule artério-veineuse *Q28.21*
- - Malformations artério-veineuses *Q28.28*

Durand-)Nicolas-Favre ¬ Maladie de (*A55*

Durante ¬ Maladie de Porak et *Q78.0*

Dure-mère
- Crânienne ¬ Tuberculose de la *A17.0†*, *G01**
- Spinale ¬ Tuberculose de la *A17.0†*, *G01**
- ¬
- - Abcès tuberculeux de la *A17.0†*, *G01**
- - Anomalie congénitale de la *Q04.9*
- - Neurosyphilis de la *A52.1†*, *G01**
- - Syphilis de la *A52.1†*, *G01**

Durillon ¬ *L84*

Durmaz
v./v.a. Blakemore-Durmaz-Vasileiou

Duroziez ¬ Maladie de *Q23.2*

Durrie
v./v.a. Stern-Lubinsky-Durrie

Durs
- Éruption ¬ Modification de la teinte des tissus dentaires *K03.7*
- Pulpe ¬ Formation anormale de tissus dentaires *K04.3*
- Sans précision ¬ Maladie des tissus dentaires *K03.9*
- ¬ Autres maladies précisées des tissus dentaires *K03.8*

Dyggve-Melchior-Clausen ¬ Syndrome de *Q77.7*

Dyke-Young ¬ Anémie de type *D59.18*

DYRK1A ¬ Syndrome déficience intellectuelle
- Associé à *Q87.0*
- Mutation ponctuelle de *Q87.0*

Dysarthrie
- Anarthrie ¬ *R47.1*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microcéphalie post-natale-hypotonie infantile-diplégie spastique- *Q87.8*
- Déficit en glutaminase ¬ Ataxie spastique- *E72.8*, *G11.8*
- Ophtalmoplégie ¬ Syndrome d'ataxie neuropathique sensorielle- *G31.81*, *H49.4*
- ¬ Syndrome d'ataxie spastique autosomique récessive-atrophie optique- *G11.4*

Dysautonomie
- Tumeurs neurales] ¬ ROHHADNET [Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide-dysfonctionnement hypothalamique-hypoventilation- *E23.3*, *C80.9*

Dysautonomie *–suite*
- ¬
- - *G90.1*
- - ROHHAD [Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide-dysfonctionnement hypothalamique-hypoventilation- *E23.3*, *E66.29*

Dysbasie
- Hystérique ¬ *F44.4*
- Origine non organique ¬ *F44.4*

Dysbêtalipoprotéinémie familiale ¬ *E78.2*

Dyschésie ¬ *K59.01*

Dyschondroplasie ¬ *Q78.4*

Dyschondrostéose - néphropathie ¬ Syndrome de *Q77.8*, *N07.9*

Dyschromatopsie du bleu ¬ *H53.5*

Dyschromatose
- Héréditaire universelle ¬ *L81.8*
- Symétrique des extrémités ¬ *L81.8*

Dyschromie coronaire de couleur rose (pink spot) ¬ *K03.3*

Dyschromique ¬ Amylose cutanée *E85.4†*, *L99.0**

Dyschromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.2*

Dysembryoplasique ¬ Tumeur neuroépithéliale *D33.2*

Dysenteriae ¬
- Dysenterie à Shigella *A03.0*
- Infection à Shigella *A03.0*
- Shigellose à Shigella *A03.0*

Dysenterie
- Amibien
- - Aiguë ¬ *A06.0*
- - Chronique ¬ *A06.1*
- Bacillaire
- - Shigella boydii ¬ *A03.2*
- - ¬ *A03.9*
- Balantidienne ¬ *A07.0*
- Balantidium coli ¬ *A07.0*
- Boyd ¬ *A03.2*
- Flexner ¬ *A03.1*
- Hiss-Russel ¬ *A03.1*
- Isospora
- - Belli ¬ *A07.3*
- - Hominis ¬ *A07.3*
- Protozoaires ¬ *A07.9*
- Schmitz-Stutzer ¬ *A03.0*
- Shiga-Kruse ¬ *A03.0*
- Shigella
- - Boydii ¬ *A03.2*
- - Dysenteriae ¬ *A03.0*
- - Flexneri ¬ *A03.1*
- - Groupe
- - - A ¬ *A03.0*
- - - B ¬ *A03.1*
- - - C ¬ *A03.2*
- - - D ¬ *A03.3*

Dysenterie *–suite*
- Shigella *–suite*
- - Paradysenteriae ¬ *A03.1*
- - Sonnei ¬ *A03.3*
- - ¬ *A03.9*
- Sonne-Kruse ¬ *A03.3*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**

Dysentérique
- Entamoeba histolytica ¬ Colite amibienne non *A06.2*
- Foie ¬ Abcès *A06.4†, K77.0**
- ¬
- - Arthrite
- - - *A09.0†, M03.29**
- - - *M02.39*
- - - Bactérienne *A03.9†, M01.39**
- - Colite amibienne non *A06.2*
- - Diarrhée
- - - *A09.0*
- - - Amibienne non *A06.2*
- - Entérite amibienne non *A06.2*

Dysérythropoïétique
v./v.a. Anémie dysérythropoïétique congénitale
- Liée à l'X avec plaquettes anormales et neutropénie ¬ Anémie *D64.4, D70.0*

Dysfibrinogénémie (congénitale) ¬ *D68.20*

Dysfonction
- Appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) ¬ Échec ou *Y82.8!*
- Diaphragmatique induite par la ventilation mécanique ¬ *J95.88*
- Ovarien
- - Hyperandrogénie ¬ *E28.1*
- - Hyperœstrogénie ¬ *E28.0*
- - Sans précision ¬ *E28.9*
- - ¬ Autres *E28.8*
- Placentaire ¬ *P02.2*
- Sinusale et surdité ¬ *I49.8, H90.5*
- Testiculaire
- - Sans précision ¬ *E29.9*
- - ¬ Autres *E29.8*
- Thymus ¬ *E32.9*
- Vasculaire ¬ Déficit en facteur VIII avec *D68.09*
- Vésicale d'origine neuromusculaire ¬ Autre *N31.88*
- Voies respiratoires ¬ Syndrome réactionnel de *J68.3*

Dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI ¬ Saignements *N93.8*

Dysfonctionnement
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ *K07.6*
- Canal CRAC ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- Cérébral affection physique ¬

Dysfonctionnement *–suite*
- Cérébral affection physique ¬ *–suite*
- - Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un *F06.9*
- - Troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un *F06.8*
- Cérébraux
- - Sans précision ¬ Trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un *F07.9*
- - ¬ Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un *F07.8*
- Congénital de l'hypophyse dû à un déficit en facteurs de transcription, associé à une hypothyroïdie ¬ *Q89.2, E03.0*
- Douloureux de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Syndrome de *K07.6*
- Endocrinien-hypohémoglobinémie associé à MADD ¬ Syndrome de retard du développement- *Q87.8*
- Érectile psychogène ¬ *F52.2*
- Euthyroïdien ¬ Syndrome de *E07.8*
- Glande pinéale [Épiphyse] ¬ *E34.8*
- Glandes lacrymales-ichtyose-xérostomie] ¬ Syndrome HELIX [hypohidrose-déséquilibre électrolytique- *Q87.8*
- Hyperactif combiné des nerfs crâniens ¬ Syndrome de *G52.7*
- Hypophysaire ¬ *E23.7*
- Hypothalamique hypoventilation dysautonomie
- - Tumeurs neurales] ¬ ROHHADNET [Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide- *E23.3, C80.9*
- - ¬ ROHHAD [Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide- *E23.3, E66.29*
- Mitochondrial multiples
- - Type
- - - 1 ¬ Syndrome de *G31.81*
- - - 2 ¬ Syndrome de *G31.81*
- - - 3 ¬ Syndrome de *G31.81*
- - - 4 ¬ Syndrome de *G31.81*
- - - 5 ¬ Syndrome de *G31.81*
- - - 6 ¬ Syndrome de *G31.81*
- - ¬ Syndrome de *G31.81*
- Moteur-contractures articulaires multiples ¬ Syndrome de déficience intellectuelle récessive- *Q87.8*
- Muscles lisses ¬ Syndrome multisystémique de *I73.8*
- Neurogène du détrusor/sphincter de la vessie ¬ *N31.88*
- Neuromusculaire de la vessie, sans précision ¬ *N31.9*
- Neurovégétatif somatoforme
- - Appareil
- - - Digestif haut ¬ *F45.31*
- - - Uro-génital ¬ *F45.34*
- - Organe
- - - Système non précisé ¬ *F45.39*

Dysfonctionnement *–suite*
- Neurovégétatif somatoforme *–suite*
- - Organe *–suite*
- - - Systèmes ¬ *F45.38*
- - Plusieurs organes et systèmes ¬ *F45.37*
- - Système
- - - Cardio-vasculaire ¬ *F45.30*
- - - Respiratoire ¬ *F45.33*
- - Voies digestives basses ¬ *F45.32*
- Orgasmique ¬ *F52.3*
- Oro-facial ¬ Malocclusion dentaire due à un *K07.5*
- Physiologique psychogène SAI ¬ *F59*
- Placenta ¬ *O43.8*
- Pluriglandulaire
- - Sans précision ¬ *E31.9*
- - ¬ Autres *E31.8*
- Segmentaire et somatique ¬ *M99.0*
- Sexuel non
- - Dus à un trouble ou à une maladie organique ¬ Autres *F52.8*
- - Trouble ou à une maladie organique, sans précision ¬ *F52.9*
- Sinusal
- - Maladie du nœud sinusal] ¬ Syndrome de *I49.5*
- - ¬ Syndrome de *I49.5*
- Sphincter
- - Rectal ¬ *K59.9*
- - Urétral) ¬ Syndrome de Fowler (*N36.8*
- Symphysaire ¬ Grossesse avec *O26.7*
- Symphyse pubienne ¬ *M25.55*
- Système nerveux végétatif du à l'alcool ¬ *G31.2*
- Trachéostome ¬ *J95.09*
- Vessie neurogène SAI ¬ *N31.9*
- Voie de Kennedy ¬ Paraplégie spastique complexe autosomique récessive par *G11.4*

Dysgénésie
- Acro-pectoro-vertébrale ¬ *Q74.8*
- Caudal
- - Familiale ¬ *Q87.8*
- - ¬ Syndrome d'holoprosencéphalie- *Q87.8*
- Cérébelleuse ¬ Syndrome d'aprosencéphalie- *Q04.3*
- Cérébrale congénitale par déficit en glutamine synthétase ¬ *E72.8*
- Corticale avec hypoplasie pontocérébelleuse due à une mutation TUBB3 ¬ *Q04.8*
- Gonadique
- - 46,XX ¬ Syndrome de fibrose pulmonaire-déficit immunitaire- *D82.8, J84.10*
- - 46,XY
- - - Malformations multiples ¬ *Q99.1*
- - - Neuropathie sensitivo-motrice ¬ Syndrome de *Q56.1, G60.0*
- - Complète 46,XY ¬ *Q99.1*
- - Mixte 45,X/46,XY ¬ *Q99.8*

Dysgénésie *–suite*
- Gonadique *–suite*
- - Partielle 46,XY ¬ *Q56.1*
- - Pure ¬ *Q99.1*
- Ovarienne 46,XX-petite taille ¬ Syndrome de *Q96.8*
- Rénale
- - Bilatérale ¬ *Q60.4*
- - ¬ *Q60.5*
- Réticulaire ¬
- - *D81.0*
- - Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec *D81.0*
- Segment antérieur
- - Autosomique récessive ¬ *Q13.8*
- - Œil ¬ Syndrome d'hypoplasie de la fovéa avec anomalie du chiasma optique et *Q15.8*
- - ¬ Syndrome de cataracte congénitale- *Q12.0*
- Spinale segmentaire ¬ *Q76.4*
- Testicules ¬ Syndrome de mort subite du nourrisson- *R95.9, Q55.2*
- Tronc cérébral type Athabascan ¬ *Q87.8*
- Tubulaire rénale ¬ *Q63.8*
- Uro-génitointestinale ¬ Syndrome d'aphalangie-hémivertèbre- *Q87.8*

Dysgerminomateuse
- Maligne de l'ovaire ¬ Tumeur germinale *C56*
- Ovaire ¬ Tumeur germinale maligne non *C56*

Dysgerminome de l'ovaire ¬ *C56*

Dysgyrie associée à une tubulinopathie ¬ *Q04.3*

Dyshidrose [pompholyx] ¬ *L30.1*

Dyshormonosynthèse thyroïdienne ¬ *E03.0*

Dysimmunitaire subaiguë ¬ Polyradiculonévrite *G61.8*

Dyskératome verruqueux
- Face ¬ *D23.3*
- Peau
- - Cou ¬ *D23.4*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *D23.7*
- - - Supérieurs ¬ *D23.6*
- - Tronc ¬ *D23.5*
- ¬ *D23.9*

Dyskératose
- Congénitale
- - Anémie aplastique ¬ *Q82.8, D61.9*
- - ¬ *Q82.8*
- Intraépithéliale de la cornée avec hyperkératose palmoplantaire et dyskératose laryngée ¬ Syndrome de *Q82.8*
- Laryngée ¬ Syndrome de dyskératose intraépithéliale de la cornée avec hyperkératose palmoplantaire et *Q82.8*

Dyskinésie
- Bucco-faciale ¬ *G24.4*

Dyskinésie *–suite*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Ciliaire primitive
- - Rétinite pigmentaire ¬ Syndrome de *Q34.8, H35.5*
- - ¬ *Q34.8*
- Familiale avec myokymie faciale ¬ *G24.8, G51.4*
- Généralisée à début infantile avec atteinte oro-faciale ¬ *G24.8*
- Hystérique ¬ *F44.4*
- Non kinésigénique paroxystique ¬ *G24.8*
- Œsophage ¬ *K22.4*
- Origine non organique ¬ *F44.4*
- Paroxystique
- - Induite par l'effort ¬ *G24.8*
- - Kinésigénique ¬ *G24.8*
- - ¬
- - - *G24.8*
- - - Syndrome d'épilepsie généralisée- *G40.3, G24.8*
- SAI ¬ *G24.9*
- Tardive ¬ *G24.0*
- Trachéo-bronchique ¬ *J98.0*
- ¬ *G24*

Dyskinétique
- Infantile ¬ Encéphalopathie épileptique- *G40.3*
- Liée à FOXG1 ¬ Encéphalopathie épileptique- *Q93.5*
- ¬ Paralysie cérébrale *G80.3*

Dyslalie ¬ *F80.0*

Dyslexie
- Alexie ¬ *R48.0*
- Développement ¬ *F81.0*
- Troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs ¬ *R48*

Dyslipoprotéinémie à broad-beta ¬ *E78.2*

Dysmaturité pulmonaire ¬ *P27.0*

Dysménorrhée
- Primaire ¬ *N94.4*
- Psychogène ¬ *F45.8*
- Sans précision ¬ *N94.6*
- Secondaire ¬ *N94.5*

Dysmorphie
- Anomalies squelettiques ¬ Syndrome de déficience intellectuelle avec voix nasonnée, *Q87.0*
- Associé
- - TBCK ¬ Syndrome d'encéphalopathie-hypotonie sévère- *Q87.0*
- - ZMYND11 ¬ Syndrome de retard du développement-retard de langage-épilepsie-troubles du comportement- *Q87.8*
- Atrophie cérébrale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Brachydactylie ¬ Syndrome de dysplasie métaphysaire- *Q78.8*

Dysmorphie *–suite*
- Corporelle ¬ Peur d'une *F45.2*
- Cranio-facial
- - Anomalies squelettiques cardiopathie trouble neurologique développement
- - - Mutation ponctuelle ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Cardiopathie congénitale-surdité ¬ Syndrome de fente labio-palatine- *Q87.0*
- - Cryptorchidie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- - Hypogonadisme-diabète sucré ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- - ¬ Syndrome
- - - Atrésie des choanes-surdité-cardiopathie- *Q87.8*
- - - Déficience intellectuelle-autisme-apraxie de la parole- *Q87.0*
- Difficultés d'apprentissage] ¬ Syndrome de RIDDLE [radiosensibilité-déficit immunitaire- *D82.8*
- Due
- - Cause extérieure, n.c.a. ¬ *Q86.88*
- - Hydantoïne ¬ *Q86.1*
- Facial
- - Anomalie pseudo-Pelger-Huët ¬ Syndrome de retard global de développement-déficience intellectuelle- *Q87.0*
- - Anomalies
- - - Cérébrales structurelles ¬ Syndrome de retard global de développement-alopécie-macrocéphalie- *Q87.8*
- - - Lymphocytes T ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-retard de langage- *Q87.0*
- - - Mains ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- - - Oculaires-anomalies congénitales multiples ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.0*
- - - Squelettiques associé à BPTF ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- - Appendice caudal ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-retard de développement globale- *Q87.8*
- - Associé
- - - CCNK ¬ Syndrome de trouble neurodéveloppemental-déficience intellectuelle sévère- *Q87.0*
- - - THOC6 ¬ Syndrome de retard de développement-microcéphalie- *Q87.0*
- - Ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-agénésie du corps calleux- *Q87.0*
- - Brachydactylie ¬ Syndrome de trouble neurologique du développement-malformations cérébrales- *Q87.0*
- - Camptodactylie ¬ Syndrome de macrothrombocytopénie-lymphœdème-retard de développement- *Q87.0*

Dysmorphie *–suite*
- Facial *–suite*
- - Comportement agressif ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypotonie- *Q87.8*
- - Déficience intellectuelle
- - - Rhombencéphalosynapsis ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - Trouble du comportement ¬ Syndrome de tremblement essentiel progressif-trouble sévère du langage- *Q87.0*
- - - ¬ Syndrome
- - - - Anomalies ophtalmologiques- *Q87.0*
- - - - Lié à MEF2C caractérisé par des anomalies cérébrales, un retard de développement sévère, des *Q87.0*
- - - - Macrocéphalie-cardiopathie congénitale- *Q87.0*
- - - - Microcéphalie
- - - - - Hypoplasie du corps calleux et vermis cérébelleux- *Q87.0*
- - - - - Surdité- *Q87.0*
- - Déficit immunitaire-livedo-petite taille] ¬ Syndrome FILS [*Q87.1*
- - Fente palatine-excès de peau ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Habitus marfanoïde-scoliose associé à NKAP ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- - Haploinsuffisance de SETD5 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- - Hypertrichose épilepsie déficience intellectuelle retard de développement hypertrophie gingival ¬ Syndrome
- - - *Q87.0*
- - - FHEIG [*Q87.0*
- - Hypogonadisme hypergonadotrope ¬ Maladie de Moyamoya-petite taille- *Q87.1*
- - Hypotonie musculaire-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de cubitus court- *Q87.0*
- - Hypotrichose ¬ Syndrome de petite taille-onychodysplasie- *Q87.1*
- - Macrocéphalie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle avec hypotonie musculaire, *Q87.0*
- - Malformation
- - - Oculaires, cardiopulmonaires et squelettiques ¬ Syndrome de mèches blanches avec *Q87.8*
- - - Squelettique-malformation cardiaque ¬ Syndrome marfanoïde- *Q87.0*
- - Malformations cardiaques congénitales associé à CDK13 ¬ Syndrome de retard de développement-déficience intellectuelle- *Q87.0*
- - Neuropathie ¬ Syndrome de cataracte congénitale- *Q87.8*
- - Petite taille-atrésie des choanes-déficience intellectuelle lié à l'X limité à la femme ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Reflux gastro-œsophagien associé à STAG1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*

Dysmorphie *–suite*
- Facial *–suite*
- - Retard
- - - Moteur et verbal associé à TRAF7 ¬ Syndrome d'anomalies cardiaques-anomalies digitales- *Q87.0*
- - - Staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse accélérée- *Q87.3*
- - Retard de développement
- - - Associé à TMEM94 ¬ Syndrome d'anomalie cardiaque congénitale- *Q87.0*
- - - Troubles du comportement associé à WAC ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - ¬ Syndrome d'anomalies du palais-diastèmes multiples- *Q87.0*
- - Retard général de développement, hypotonie et polymicrogyrie ¬ Syndrome de *Q04.8*
- - Retard global de développement ¬ Syndrome d'épilepsie à début précoce-anomalies des membres distaux- *Q87.0*
- - Scrotum en châle-hyperlaxité ligamentaire ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Troubles comportement
- - - Associé à CHAMP1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- - - ¬ Syndrome de retard du développement-surpoids- *F88*
- - ¬
- - - Retard de développement neurologique avec malformations cérébrales et *Q04.8*
- - - Syndrome
- - - - Agénésie congénitale
- - - - - Grandes lèvres-malformation cérébelleuse-dystrophie cornéenne- *Q87.0*
- - - - - Scrotum-malformation cérébelleuse-dystrophie cornéenne- *Q87.0*
- - - - Anomalies cardiaques-petite taille-hypermobilité articulaire- *Q87.8*
- - - - Cécité nocturne-anomalies squelettiques- *Q87.8*
- - - - Croissance excessive-macrocéphalie- *Q87.3*
- - - - Déficience intellectuelle
- - - - - Aphasie expressive- *Q87.0*
- - - - - Faiblesse musculaire-petite taille- *Q87.1*
- - - - - Obésité-malformations cérébrales- *Q87.0*
- - - - - Sévère-petite taille-troubles du comportement- *Q87.8*
- - - - Diabète insipide néphrogénique-calcifications intracrâniennes-petite taille- *Q87.1*
- - - - Dysplasie épiphysaire-surdité- *Q87.0*
- - - - Dysplasie spondylo-métaphysaire-avant-bras incurvé- *Q77.8*
- - - - Encéphalopathie épileptique infantile précoce-cécité corticale-déficience intellectuelle- *G40.4*
- - - - Épaississement de la suture métopique-ptosis- *Q87.0*

Dysmorphie *–suite*
- Facial *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Syndrome *–suite*
- - - - Fente oro-faciale-anomalies cardiaques- *Q87.0*
- - - - Fibromatose gingivale- *Q87.0*
- - - - Hypotonie infantile-retard psychomoteur, *Q87.8*
- - - - Incurvation latérale sévère du tibia-petite taille-omoplate ailée- *Q87.1*
- - - - Lié à l'X d'atrésie du conduit auditif externe-dilatation du canal auditif interne- *Q16.9, Q18.9*
- - - - Maladie de Hirschsprung-hypoplasie des ongles- *Q87.8*
- - - - Malformation de Klippel-Feil-myopathie- *Q76.1*
- - - - Microcéphalie
- - - - - Hypoplasie du corps calleux-déficience intellectuelle- *Q87.0*
- - - - - Petite taille-déficience intellectuelle- *Q87.1*
- - - - Omphalocèle familial avec *Q87.1*
- - - - Petite taille
- - - - - Cyphose, épiphyses hypoplasiques en forme de cône et *Q87.1*
- - - - - Valvulopathie cardiaque- *Q87.1*
- - - - Polydactylie postaxiale-anomalies antéhypophysaires- *Q87.0*
- - - - Résistance à l'arginine vasopressine-calcifications intracrâniennes-petite taille- *Q87.1*
- - - - Retard de croissance intra-utérine avec micrognathie, petite taille rhizomélique et *Q87.1*
- - - - Retard de développement-ataxie-hypotonie- *Q87.0*
- - - - Rétinite pigmentaire-surdité-vieillissement prématuré-petite taille- *Q87.0*
- Macrocéphalie-myopie-malformation de Dandy-Walker ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Modérée
- - Associé à FOXP1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-trouble sévère du langage- *Q87.0*
- - ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-trouble sévère du langage- *Q87.0*
- Pectus carinatum-laxité ligamentaire ¬ Syndrome de *Q79.8*
- Rénale pelvi-calicielle-surdité ¬ Syndrome de *Q63.8, H90.5*
- Retard du développement ¬ Syndrome de neuropathie viscérale-anomalies cérébrales- *Q87.8*
- Surdité de transmission-malformation cardiaque ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Syndrome de Kallman ¬ Syndrome de brachytéléphalangie- *Q87.0*
- ¬ Syndrome
- - Arachnodactylie-déficience intellectuelle- *Q87.8*

Dysmorphie *–suite*
- ¬ Syndrome *–suite*
- - Ataxie spinocérébelleuse- *G11.1*
- - Déficience intellectuelle liée X
- - - Cubitus valgus- *Q87.8*
- - - Épilepsie-contracture progressive des articulations- *Q87.8*
- - Hypogonadisme hypogonadotrope-microcéphalie sévère-surdité neurosensorielle- *Q87.8*
- - ICF [instabilité centromérique-immunodéficience- *D82.8*
- - Lymphœdème-communication interauriculaire- *Q87.8*
- - Macrocéphalie-paraplégie spastique- *Q87.8*

Dysmorphique
- Infantile ¬ Sialidose *E77.1*
- ¬ Syndrome alcoolisme fœtal
- - *Q86.0*
- - *Q86.0*

Dysmorphisme dû à la warfarine ¬ *Q86.2*

Dysmorphophobie
- Délirante ¬ *F22.8*
- Non délirante) ¬ *F45.2*

Dysmyélinisante-syndrome de Waardenburg-maladie de Hirschsprung] ¬ PCWH [Syndrome de neuropathie périphérique-leucodystrophie centrale *Q87.8*

Dyson
v./v.a. Walker-Dyson

Dysostéosclérose ¬ *Q78.8*

Dysostose
- Acro-cranio-faciale ¬ *Q87.0*
- Acrofacial
- - Kennedy-Teebi ¬ *Q75.4*
- - Nager ¬ *Q75.4*
- - Postaxiale ¬ *Q75.4*
- - Type
- - - Catane ¬ *Q75.4*
- - - Palagonia ¬ *Q75.4*
- - - Rodríguez ¬ *Q75.4*
- - - Weyers ¬ *Q75.4*
- Acrofrontofacionasale ¬ *Q75.1*
- Cléido-crânienne ¬ *Q74.0*
- Cranio-faciale ¬ *Q75.1*
- Facio-crânienne hypomandibulaire ¬ *Q75.4*
- Fémoro-péronéo-cubitale ¬ *Q72.4*
- Mandibulo-facial
- - Alopécie ¬ *Q75.4, L65.9*
- - Macroblépharon-macrostomie ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Sans anomalies des extrémités ¬ *Q75.4*
- - ¬ *Q75.4*
- Métaphysaire-déficience intellectuelle-surdité ¬ Syndrome de *Q87.2*
- Oculo-mandibulaire ¬ *Q75.5*
- Oculo-maxillo-faciale ¬ *Q75.1*
- Scapulo-iliaque ¬ *Q87.5*

Dysostose *–suite*
- Spondylo-costale
- - Atrésie anale-malformation génito-urinaire ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *Q76.8*
- - - Récessive ¬ *Q76.8*
- - Hypospadias-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Syndrome de Pfaundler-Hurler] ¬ Idiotie à *E76.0*
- Type Stanescu ¬ *Q78.8*

Dyspareunie
- Non organique ¬ *F52.6*
- Psychogène ¬ *F52.6*
- ¬ *N94.1*

Dyspepsie
- Allergique fonctionnelle ¬ *K30*
- Chronique ¬ *R10.1*
- Fonctionnelle ¬ *K30*
- Gastro-intestinale fonctionnelle ¬ *K30*
- SAI ¬ *R10.1*
- ¬ Formes psychogènes de: *F45.3*

Dyspeptiques ¬ Troubles *R10.1*

Dysphagia lusoria ¬ *Q25.8*

Dysphagie
- Nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture ¬ *R13.0*
- Non précisés ¬ *R13.9*
- Sidéropénique ¬ *D50.1*
- Sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ *R13.1*
- Y compris la «boule hystérique» psychogène ¬ *F45.8*
- ¬ EMARDD [Syndrome de myopathie à début précoce-aréflexie-détresse respiratoire- *G71.2*

Dysphagocytose congénitale ¬ *D71*

Dysphasie
- Aphasie
- - Développement type
- - - Expressif ¬ *F80.1*
- - - Réceptif ¬ *F80.2*
- - ¬ *R47.0*
- Familiale de développement ¬ *F80.1*

Dysphonie
- Fonctionnelle ¬ *F44.4*
- Hystérique ¬ *F44.4*
- Psychogène ¬ *F44.4*
- ¬ *R49.0*

Dysphorie de l'intégrité corporelle ¬ *F68.8*

Dysplasia oculo-auriculo-vertebralis] ¬ Syndrome de Goldenhar [*Q87.0*

Dysplasie
v./v.a. Oculo-tricho-dysplasie
- Acétabulaire congénitale ¬ *Q65.8*
- Acro-capito-fémorale ¬ *Q78.8*

Dysplasie *–suite*
- Acromésomélique type
- - Grebe ¬ *Q78.8*
- - Hunter-Thompson ¬ *Q78.8*
- - Maroteaux ¬ *Q77.8*
- Acromicrique ¬ *Q77.8*
- Alvéolo-capillaire congénitale ¬ *P27.8*
- Anauxétique ¬ *Q77.7*
- Ano-génitales [WILD] ¬ Syndrome de verrues multiples-déficit immunitaire-lymphœdème- *Q82.09*
- Atrio-digitale type
- - 1 ¬ *Q87.2*
- - 3 ¬ *Q87.2*
- - Slovène ¬ *Q87.2*
- Bas grade de la prostate ¬ *N42.3*
- Boomerang ¬ *Q87.1*
- Broncho-pulmonaire ¬ *P27.1*
- Campomélique ¬ *Q87.1*
- Cémento-osseuse floride
- - Mâchoire supérieure ¬ *D16.42*
- - Maxillaire ¬ *D16.42*
- Cérébello-trigéminale dermique ¬ *Q87.8*
- Cérébrofaciothoracique ¬ *Q87.5*
- Chondroectodermique
- - Cécité nocturne ¬ *Q77.6*
- - ¬ *Q77.6*
- Cléido-crânienne ¬ *Q74.0*
- Cochléo-vestibulaire ¬ *Q16.5*
- Col de l'utérus, sans précision ¬ *N87.9*
- Congénitale de la valve tricuspide ¬ *Q22.8*
- Corticale cérébrale ¬ *Q04.8*
- Costovertébrale-anomalie de Sprengel ¬ Syndrome d'hydrocéphalie- *Q87.8*
- Cranio-cérébello-cardiaque ¬ *Q87.0*
- Cranio-diaphysaire ¬ *M85.2*
- Cranio-ectodermique ¬ *Q87.5*
- Cranio-faciale-petite taille-anomalies ectodermiques-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Cranio-fronto-nasal
- - Anomalie de Poland ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ *Q75.1*
- Cranio-lenticulo-suturale ¬ *Q75.8*
- Cranio-métadiaphysaire type os wormien ¬ *Q78.8*
- Cranio-métaphysaire ¬ *Q78.8*
- Cranio-télencéphalique ¬ *Q04.3*
- Dentine ¬ *K00.5*
- Dermique facial focale
- - Type I ¬ *Q82.8*
- - ¬ *Q82.8*
- Dermo-dentaire ¬ *Q82.4*
- Diaphysaire
- - Progressive ¬ *Q78.3*
- - Tachetée ¬ *Q77.3*
- Diastrophique ¬ *Q77.5*

Dysplasie *–suite*
- Dyssegmentaire type
- - Rolland-Desbuquois ¬ *Q77.7*
- - Silverman-Handmaker ¬ *Q77.7*
- Épaule et du pelvis ¬ *Q87.5*
- Épithéliale intestinale ¬ *K63.8*
- Facio-auriculo-vertébrale ¬ *Q87.0*
- Facio-cardio-mélique létale ¬ *Q87.8*
- Faciogénitale ¬ *Q87.1*
- Fémorale sévère ¬ Dysplasie épiphysaire multiple avec *Q77.3*
- Fibreux
- - Mâchoire ¬ *K10.8*
- - Os ¬ *M85.09*
- - ¬ *M85.09*
- Fibromusculaire
- - Artère ¬ *I77.3*
- - Artérielle ¬ *I77.3*
- - Atypique de la carotide ¬ *I77.3*
- - Intimale de la carotide ¬ *I77.3*
- Fronto-facio-nasale ¬ *Q75.1*
- Géléophysique ¬ *Q87.1*
- Gnatho-diaphysaire ¬ *Q78.8*
- Hanche type Beukes ¬ *Q65.8*
- Haut grade chez les patients présentant un œsophage de Barrett ¬ *D00.1*
- Hémato-diaphysaire de Ghosal ¬ *Q78.8, D61.9*
- Immuno-osseuse de Schimke ¬ *Q77.7, D82.8*
- Ischio-patellaire ¬ *Q74.1*
- Ischio-vertébrale ¬ *Q78.8*
- Kniest ¬ *Q87.1*
- Kyphomélique ¬ *Q78.8*
- Légère
- - Col de l'utérus ¬ *N87.0*
- - Vagin ¬ *N89.0*
- - Vulve ¬ *N90.0*
- Létale Kniest-like ¬ *Q78.8*
- Lymphatique généralisée
- - Associée
- - - EPHB4
- - - - Défaut septal auriculaire ¬ *Q82.09, Q21.1*
- - - - Hydrops fœtal non immunologique ¬ *Q82.09, P83.2*
- - - PIEZO1 avec hydrops fœtal non immunologique ¬ *Q82.09, P83.2*
- - Fotiou ¬ *Q82.09*
- Mammaire
- - Bénigne, sans précision ¬ *N60.9*
- - Bénignes ¬ Autres *N60.8*
- Mandibulo-acrale
- - Associée à MTX2 ¬ *Q87.5*
- - ¬ *Q87.5*
- Mésodermique axiale ¬ *Q87.8*
- Métacarpienne ¬ Syndrome de lissencéphalie type 3 *Q04.3*

Dysplasie *–suite*
- Métatropique ¬ *Q77.8*
- Modérée due mutation gène COL2A1 ¬ Arthrose précoce articulation
- - Coude avec *Q77.7, M19.92*
- - Hanche avec *Q77.7, M19.95*
- Moelle épinière ¬ Hypoplasie et *Q06.1*
- Moyenne
- - Col de l'utérus ¬ *N87.1*
- - Vagin ¬ *N89.1*
- - Vulve ¬ *N90.1*
- Mucoépithéliale héréditaire ¬ *Q87.8*
- Multilignées ¬ Anémie réfractaire avec *D46.5*
- Multilinéaire
- - Rémission complète ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec *C92.81*
- - ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec *C92.8*
- Neuroaxonale ¬ Ostéopétrose infantile avec *Q78.2, Q04.0*
- Oculo-dento-digitale ¬ *Q87.0*
- Odonto-maxillaire segmentaire ¬ *K00.4*
- Odonto-onychiale-alopécie ¬ Syndrome de *Q84.8*
- Odonto-onychodermique ¬ *Q82.8*
- Œil ¬ *Q11.2*
- Olfacto-génitale de Kallmann-De Morsier ¬ *E23.0*
- Ongle
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *L60.3*
- - - Récessive ¬ *Q84.6*
- - ¬ Syndrome CHAND [cheveux frisés-ankyloblépharon- *Q82.4*
- Ophtalmo-mandibulo-mélique ¬ *Q87.8*
- Osseux
- - Floride
- - - Mandibule ¬ *D16.5*
- - - Maxillaire supérieur ¬ *D16.42*
- - - ¬ *D16.42*
- - Larsen-like-nanisme ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - Létale type Holmgren-Forsell ¬ *Q78.8*
- - Liée à FGFR2 ¬ *Q79.8*
- - Membres courts-déficit immunitaire combiné sévère ¬ Syndrome de *D82.2*
- - Ostéosclérotique létale ¬ *Q78.2*
- - Terminale-défauts de pigmentation ¬ Syndrome de *Q87.2*
- Ostéodysplasique microcéphalique type Saul-Wilson ¬ *Q87.5*
- Ostéofibreux
- - Péroné ¬ *D16.2*
- - Tibia ¬ *D16.2*
- - ¬ *D16.9*
- Ostéoglophonique ¬ *Q87.1*
- Oto-spondylo-mégaépiphysaire
- - Autosomique récessive ¬ *Q77.7*
- - ¬ *Q77.7*

Dysplasie *–suite*
- Pacman ¬ *M89.50*
- Pelvienne avec arthrogrypose des membres inférieurs ¬ *Q74.2*
- Phalango-épiphysaire en ailes d'anges [ASPED] ¬ *Q78.8*
- Pilo-dentaire avec défaut de réfraction ¬ Syndrome de *Q82.8, H52.7*
- Platyspondylique type Torrance ¬ *Q77.8*
- Polyostotique fibreuse ¬ *Q78.1*
- Poumon ¬
- - *Q33.6*
- - Hypoplasie et *Q33.6*
- Prostate ¬ *N42.3*
- Pseudodiastrophique ¬ *Q78.8*
- Pseudorhumatoïde progressive ¬ *Q77.7*
- Réno-hépato-pancréatique ¬ *Q87.8*
- Rétinienne
- - Liée à l'X ¬ *Q14.1*
- - ¬ Syndrome d'hydrocéphalie-agyrie- *Q04.3*
- Rhizomélique
- - Patterson-Lowry ¬ *Q78.8*
- - ¬ Syndrome
- - - Autosomique dominant de myopie-retrusion du visage-surdité neurosensorielle- *Q87.0*
- - - Microphtalmie-colobome- *Q87.1*
- Schneckenbecken ¬ *Q77.7*
- Septum et des voies optiques ¬ *Q04.4*
- Smith-McCort ¬ *Q77.7*
- SPONASTRIME ¬ *Q77.7*
- Spondylaire ¬ Syndrome de croissance excessive-modelage métaphysaire réduit- *Q87.3*
- Spondylo
- - Mégaépiphysaire-métaphysaire ¬ *Q77.7*
- - Périphérique-cubitus court ¬ Syndrome de *Q77.7*
- Spondylo-enchondrale ¬ *Q77.7*
- Sus-apicale médiane du nez ¬ *Q18.8*
- Tchèque type métatarsique ¬ *Q77.7*
- Tegmentum pontique ¬ *Q04.8*
- Tête du fémur type Meyer ¬ *Q78.8*
- Thanatophore] ¬ TD [*Q77.1*
- Thoracique-hydrocéphalie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Thoracomélique ¬ *Q77.8*
- Thymus-rein-anus-poumon ¬ *Q87.8*
- Tricho-odonto-onychiale ¬ *Q82.8*
- Type Astley-Kendall ¬ *Q77.3*
- Unguéale ¬ Syndrome de pectus excavatum-macrocéphalie- *Q87.1*
- Vagin, sans précision ¬ *N89.3*
- Valvulaire
- - Aortique congénitale ¬ *Q23.9*
- - Congénitale ¬ *Q24.8*
- - Myxomatose liée à l'X associée à FLNA ¬ *Q24.8*

Dysplasie *–suite*
- Valvulaire *–suite*
- - Pulmonaire ¬ *I37.0*
- Ventriculaire
- - Arythmogène familiale isolée, forme biventriculaire ¬ *I42.88*
- - Droite arythmogène
- - - Familiale isolée ¬ *I42.80*
- - - ¬ *I42.80*
- Vulve ¬ *N90.3*

Dysplasie artério-hépatique
- Due
- - Monosomie 20p12 ¬ *Q44.7*
- - Mutation ponctuelle
- - - JAG1 ¬ *Q44.7*
- - - NOTCH2 ¬ *Q44.7*
- ¬ *Q44.7*

Dysplasie corticale focale isolée
- Type
- - I ¬ *Q04.8*
- - Ia ¬ *Q04.8*
- - Ib ¬ *Q04.8*
- - Ic ¬ *Q04.8*
- - II ¬ *Q04.8*
- - IIa ¬ *Q04.8*
- - IIb ¬ *Q04.8*
- ¬ *Q04.8*

Dysplasie ectodermique
- 1] ¬ EDSS1 [Syndrome de syndactylie- *Q82.8*
- 2] ¬ EDSS2 [Syndrome de syndactylie- *Q82.8*
- 14 autosomique récessive ¬ *Q82.8*
- Anhidrotique
- - Déficit immunitaire-ostéopétrose-lymphœdème ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Immunodéficience ¬ *Q82.4*
- - Liée à l'X ¬ *Q82.4*
- - ¬ *Q82.4*
- Cécité ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Déficience intellectuelle-malformation du système nerveux central ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Dents de naissance, type Turnpenny ¬ Syndrome de *Q82.8*
- Fente labio-palatine ¬ Syndrome de contractures- *Q87.8*
- Fragilité cutanée ¬ Syndrome de *Q81.0*
- Hidrotique
- - Type
- - - Christianson-Fourie ¬ *Q82.8*
- - - Halal ¬ *Q82.8*
- - ¬ *Q82.8*
- Hyperhidrose-syndactylie cutanée ¬ Syndrome de *Q82.8*
- Hypohidrotique
- - Liée à l'X ¬ *Q82.4*
- - ¬ DEH [*Q82.4*
- Odonto-micronychiale ¬ *Q82.8*

Dysplasie ectodermique *–suite*
- Petite taille ¬ Syndrome de *Q82.8, E34.3*
- Pili torti-syndactylie cutanée ¬ Syndrome de *Q82.8*
- Pure des ongles et des cheveux ¬ *Q82.8*
- Surdité neurosensorielle ¬ Syndrome de *Q82.8*
- Trichoodonto-onychiale ¬ *Q82.8*
- Type Berlin ¬ *Q82.8*
- ¬
- - *Q82.4*
- - Syndrome d'ataxie cérébelleuse- *G11.1*

Dysplasie épiphysaire
- Hémimélique ¬ *Q74.8*
- Multiple
- - Due à une anomalie du collagène 9 ¬ *Q77.3*
- - Dysplasie fémorale sévère ¬ *Q77.3*
- - Type
- - - Al-Gazali ¬ *Q77.3*
- - - Beighton ¬ *Q77.3*
- - - Lowry ¬ *Q78.8*
- - ¬ *Q77.3*
- Petite taille ¬ Syndrome de surdité- *Q87.8*
- Surdité-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Vertébrale-oreilles-nez]-plus ¬ Syndrome EVEN [*Q87.8*

Dysplasie fibreuse monostotique
- Avant-bras ¬ *M85.03*
- Bras ¬ *M85.02*
- Côtes ¬ *M85.08*
- Cranio ¬ *M85.08*
- Cuisse ¬ *M85.05*
- Jambe ¬ *M85.06*
- Localisations multiple ¬ *M85.00*
- Main ¬ *M85.04*
- Pied ¬ *M85.07*
- Région de l'épaule ¬ *M85.01*
- ¬ *M85.09*

Dysplasie fronto-nasale
- Acromélique ¬ *Q87.0*
- Alopécie et anomalies génitales ¬ *Q87.0*
- Associée à SIX2 ¬ *Q75.1*
- Nez bifide-anomalies des membres supérieurs ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Type
- - 1 ¬ *Q75.1*
- - 3 ¬ *Q75.1*

Dysplasie mésomélique
- Anomalies digitales-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.5*
- Membre supérieur ¬
- - *Q71.8*
- - *Q71.8*
- Reinhardt-Pfeiffer ¬ *Q78.8*
- Type

Dysplasie mésomélique *–suite*
- Type *–suite*
- - Kantaputra ¬ *Q78.8*
- - Langer ¬ *Q77.8*
- - Nievergelt ¬ *Q78.8*
- - Reardon ¬ *Q78.8*
- - Savarirayan ¬ *Q78.8*

Dysplasie métaphysaire
- Dysmorphie-brachydactylie ¬ Syndrome de *Q78.8*
- Hypoplasie congénitale des surrénales-anomalies génitales] ¬ Syndrome IMAGe [retard de croissance intra-utérin- *Q87.1*
- Ostéosclérotique ¬ *Q78.5*
- Type Braun-Tinschert ¬ *Q78.5*
- Ulna ¬ *Q78.5*
- ¬
- - *Q78.5*
- - Syndrome de microsphérophakie- *Q12.4, Q78.5*

Dysplasie rénale
- Hypoplasie cérébelleuse-hydranencéphalie ¬ Syndrome de neurones multinucléś-anhydramnios- *Q87.8*
- Multikystique [Potter type II] ¬ *Q61.4*
- Radius] ¬ Syndrome de VATER [anomalies vertébrales, atrésie anale, anomalies cardiaques, fistule trachéo-œsophagienne avec atrésie de l'œsophage, *Q87.2*
- ¬
- - *Q61.4*
- - Multikystique: *Q61.4*
- - Syndrome de torticolis-chéloïdes-cryptorchidie- *Q87.8*

Dysplasie sévère
- Col de l'utérus
- - Non classée ailleurs ¬ *N87.2*
- - ¬ *N87.2*
- Vagin
- - Non classée ailleurs ¬ *N89.2*
- - SAI ¬ *N89.2*
- Vulve
- - Non classée ailleurs ¬ *N90.2*
- - SAI ¬ *N90.2*
- ¬ néoplasie intraépithéliale
- - Col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de *D06*
- - Vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de *D07.2*
- - Vulve
- - - NIV], stade III, avec ou sans mention de *D07.1*
- - - Stade III avec *D07.1*

Dysplasie spondylo-épimétaphysaire
- Dentition anormale ¬ Syndrome de *Q77.7*
- Dislocations multiples, type Hall ¬ *Q77.7*
- Hyperlaxité ligamentaire
- - Associée à EXOC6B ¬ *Q77.7*
- - Type Beighton ¬ *Q77.7*

Dysplasie spondylo-épimétaphysaire *–suite*
- Liée à l'X ¬ *Q77.7*
- Luxations multiples ¬ *Q77.7*
- Membres courts-anomalies de calcification ¬ Syndrome de *Q77.7*
- Progressive-petite taille-quatrième métatarsien court-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Type
- - Aggrécane ¬ *Q77.7*
- - Bieganski ¬ *Q77.7*
- - Geneviève ¬ *Q77.7*
- - Handigodu ¬ *Q77.7*
- - Irapa ¬ *Q77.7*
- - Isidor-Toutain ¬ *Q77.7*
- - Matrilin-3 ¬ *Q77.7*
- - Missouri ¬ *Q77.7*
- - Pakistani ¬ *Q77.7*
- - PAPPS2 ¬ *Q77.7*
- - Shohat ¬ *Q77.7*
- - Strudwick ¬ *Q77.7*
- ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie- *E75.2, Q77.8*

Dysplasie spondylo-épiphysaire
- Arthropathie progressive ¬ *Q77.7*
- Brachydactylie-trouble du langage ¬ Syndrome de *Q77.7*
- Congénitale ¬ *Q77.7*
- Intermédiaire due à une mutation du gène COL2A1 ¬ Arthrose précoce avec *Q77.7, M19.99*
- Liée
- - MGP ¬ *Q77.7*
- - MIR140 ¬ *Q77.7*
- Surdité neurosensorielle-déficience intellectuelle-amaurose congénitale de Leber ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Tardive
- - Type Kohn ¬ *Q77.7*
- - ¬ *Q77.7*
- Type
- - Cantu ¬ *Q77.7*
- - Kimberley ¬ *Q77.7*
- - MacDermot ¬ *Q77.7*
- - Maroteaux ¬ *Q77.7*
- - Nishimura ¬ *Q77.7*
- - Reardon ¬ *Q77.7*
- - Stanescu ¬ *Q77.7*
- ¬
- - *Q77.7*
- - Syndrome de déficience intellectuelle hypoplasie cérébelleuse- *Q87.8*

Dysplasie spondylo-métaphysaire
- Autosomique récessive type Mégarbané ¬ *Q77.8*
- Avant-bras incurvé-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q77.8*
- Axiale ¬ *Q77.8*
- Dystrophie cornéenne ¬ Syndrome de *Q87.1*

Dysplasie spondylo-métaphysaire *–suite*
- Dystrophie des cônes et des bâtonnets ¬ Syndrome de *Q77.8*
- Hypotrichose ¬ Syndrome de *Q77.7*
- Néonatale sévère liée à SBDS ¬ *Q77.8*
- Régressive ¬ *Q77.8*
- Type
- - A4 ¬ *Q77.8*
- - Czarny-Ratajczak ¬ *Q77.7*
- - Golden ¬ *Q77.8*
- - Kozlowski ¬ *Q77.8*
- - Schmidt ¬ *Q77.8*
- - Sedaghatian ¬ *Q77.8*
- - Sutcliffe ¬ *Q77.8*

Dysplasie squelettique
- Associée à CHST3 ¬ *Q74.8*
- Début précoce ¬ Leucoencéphalopathie calcifiante- *G93.4, Q79.9*
- Déficit en EXTL3 ¬ Syndrome neuro-immunologique- *Q87.1*
- Létal
- - Associée à NEK9 ¬ *Q77.8*
- - Type Greenberg ¬ *Q77.3*
- Type Greenberg ¬ *Q77.3*
- ¬ Syndrome
- - Épilepsie-microcéphalie *Q87.8*
- - Létal d'encéphalocèle occipital- *Q87.5*
- - Pancytopénie progressive congénitale-déficit immunitaire en cellules B- *Q87.1*

Dysplasique
- Bilatérale ¬ Coxarthrose d'origine *M16.2*
- SAI ¬ Coxarthrose *M16.3*
- Type Kozlowski-Tsuruta ¬ Hyperostose corticale *Q78.8*
- Unilatérale ¬ Coxarthrose *M16.3*
- ¬
- - Coxarthroses *M16.3*
- - Hyperostose corticale *Q78.8*

Dyspnée
- Asthmatique ¬ *J45.99*
- Cheyne-Stokes ¬ *R06.3*
- ¬
- - *R06.0*
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, R06.0*

Dyspraxie
- Développement ¬ *F82*
- Parole ¬ Syndrome d'épilepsie rolandique- *G40.08, R48.2*
- Verbale de développement ¬ *F82.9*

Dyspré-albuminémie ¬ Hyperthyroxinémie euthyroïdienne par *E07.8*

Dysprotéinémie [LAID] ¬ Lymphadénopathie angio-immunoblastique avec *C86.5*

Dysprothrombinémie ¬ *D68.21*

Dysraphique ¬ Lipome spinal intramédullaire non- *D17.7*

Dysraphisme spinal fermé ¬ *Q76.0*

Dysréflexie autonome
- Manifestée crise
- - Hypertoniques ¬ *G90.40*
- - Transpiration ¬ *G90.41*
- Non précisée ¬ *G90.49*
- ¬ Autres *G90.48*

Dysrythmie
- Atriale et trouble de la motilité intestinale chronique] ¬ Syndrome CAID [*I49.5, K59.8*
- Malignes ¬ Examens liés à une prédisposition aux *Z01.80*

Dyssegmentaire type
- Rolland-Desbuquois ¬ Dysplasie *Q77.7*
- Silverman-Handmaker ¬ Dysplasie *Q77.7*

Dyssociale ¬ Personnalité *F60.2*

Dysspondyloenchondromatose ¬ *Q78.4*

Dyssynergia cerebellaris myoclonica ¬ *G11.1*

Dyssynergie
- Détrusor du col vésicale ¬ *N32.0*
- Vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière ¬ *G95.84*

Dyssynostose cranio-faciale ¬ *Q87.0*

Dystasie aréflexique héréditaire de type Roussy-Lévy ¬ *G60.0*

Dysthymie ¬ *F34.1*

Dystocie
- Anneau de contraction ¬ *O62.4*
- Due
- - Anomalie
- - - Organes pelviens de la mère ¬ *O65.5*
- - - Pelvienne de la mère, sans précision ¬ *O65.9*
- - Anomalies
- - - Fœtales ¬ *O66.3*
- - - Pelviennes de la mère ¬ *O65.8*
- - Ascite du fœtus ¬ *O66.3*
- - Bassin généralement rétréci ¬ *O65.1*
- - Déformation pelvienne ¬ *O65.0*
- - Disproportion fœto-pelvienne, sans précision ¬ *O65.4*
- - Dystocie des épaules ¬ *O66.0*
- - Fœtus
- - - Anormalement gros ¬ *O66.2*
- - - Hydrocéphale ¬ *O66.3*
- - Hydropisie du fœtus ¬ *O66.3*
- - Jumeaux soudés ¬ *O66.3*
- - Méningomyélocèle du fœtus ¬ *O66.3*
- - Persistance position occipito
- - - Iliaque ¬ *O64.0*
- - - Postérieure ¬ *O64.0*
- - - Sacrée ¬ *O64.0*
- - - Transverse ¬ *O64.0*
- - Position présentation anormales
- - - Sans précision ¬ *O64.9*
- - - ¬ *O64.8*
- - Présentation
- - - Complexe ¬ *O64.5*

Dystocie *–suite*
- Due *–suite*
- - Présentation *–suite*
- - - Épaule ¬ *O64.4*
- - - Face ¬ *O64.2*
- - - Front ¬ *O64.3*
- - - Pieds ¬ *O64.1*
- - - Siège ¬
- - - - *O64.1*
- - - - *O64.1*
- - Protrusion d'un membre inférieur ¬ *O64.1*
- - Rétrécissement détroit
- - - Inférieur et de la cavité moyenne ¬ *O65.3*
- - - Supérieur ¬ *O65.2*
- - Rotation incomplète de la tête du fœtus ¬ *O64.0*
- - Tératome sacro-coccygien du fœtus ¬ *O66.3*
- - Tumeur du fœtus ¬ *O66.3*
- Épaules ¬ Dystocie due à une *O66.0*
- Fœtale SAI ¬ *O66.9*
- Gémellaire ¬ *O66.1*
- Maternelle SAI ¬ *O66.9*
- Précisées ¬ Autres *O66.8*
- SAI ¬ *O66.9*
- Sans précision ¬ *O66.9*
- Utérus SAI ¬ *O62.4*

Dystonie
- 16 ¬ *G24.1*
- 24 ¬ *G24.1*
- 28 ¬ *G24.1*
- Anémie-retard de croissance ¬ Syndrome CIMDAG [hypoplasie cérébelleuse-déficience intellectuelle-microcéphalie congénitale- *Q87.8*
- Aphonie ¬ Syndrome de *G24.8*
- Autosomique récessive de l'enfant, type DYT29 ¬ *G24.1*
- Bucco-faciale idiopathique ¬ *G24.4*
- Cervicale
- - Adulte, type DYT23 ¬ *G24.1*
- - Combinée ¬ *G24.3*
- - Principalement rotatoire ¬ *G24.3*
- Déformante progressive ¬ *G24.1*
- Dopa-sensible
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *G24.1*
- - - Récessive ¬ *G24.1*
- - Déficit
- - - Sépiaptérine réductase ¬ *G24.1*
- - - Tyrosine hydroxylase ¬ *G24.1*
- - Parkinsonisme ¬ Syndrome de retard développemental-troubles du language- *G25.88*
- Épilepsie lié à IRF2BPL ¬ Syndrome de régression neurodéveloppementale- *G31.88*
- Focale autosomique dominante, type DYT25 ¬ *G24.1*

Dystonie *–suite*
- Généralisée à début précoce par les membres ¬ *G24.1*
- Idiopathique
- - Familiale ¬ *G24.1*
- - Non familiale ¬ *G24.2*
- - SAI ¬ *G24.1*
- Intoxication au cyanure ¬ Parkinsonisme- *G21.2*
- KMT2B ¬ *G24.1*
- Médicamenteuse ¬ *G24.0*
- Mitochondriale de transmission maternelle ¬ *G71.3*
- Musculaire déformante ¬ *G24.1*
- Neuropathie motrice ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie- *E75.2*
- Oppenheim ¬ *G24.1*
- Oromandibulaire ¬ *G24.4*
- Paroxystique induite par l'effort-crampe de l'écrivain ¬ Syndrome d'épilepsie rolandique- *G40.08*
- Polycythémie-hypermanganésémie ¬ Syndrome de cirrhose- *E83.8*
- Primaire type
- - DYT1 ¬ *G24.1*
- - DYT13 ¬ *G24.1*
- - DYT17 ¬ *G24.1*
- - DYT2 ¬ *G24.1*
- - DYT21 ¬ *G24.1*
- - DYT27 ¬ *G24.1*
- - DYT4 ¬ *G24.1*
- - DYT6 ¬ *G24.1*
- Progressive héréditaire avec fluctuations diurnes marquées ¬ *G24.1*
- Psychogène ¬ *F44.4*
- Torsion
- - Début précoce ¬ *G24.1*
- - ¬ *G24.1*
- ¬
- - *G24.9*
- - Épilepsie myoclonique progressive avec *G40.3, G24.9*
- - Myoclonus- *G24.1*
- - Syndrome
- - - Anomalies du développement-surdité- *Q87.8*
- - - Déficiences motrice et intellectuelle sévères-surdité neurosensorielle- *Q87.8*

Dystonie-parkinsonisme
- Associées à PLA2G6 ¬ *G24.1, G21.8*
- Début rapide ¬ *G24.1*
- Hypermanganésémie ¬ Syndrome de *E83.8*
- Infantile ¬ *G24.1*
- Liée à l'X ¬ *G24.1*

Dystonique
- Paroxystique avec ataxie épisodique et spasticité ¬ Choréoathétose *G24.8*
- ¬ Paralysie cérébrale *G80.3*

Dystrophia Smolandiensis ¬ *H18.5*

Dystrophie
- Adiposo-génitale ¬ *E23.6*
- Bulleuse héréditaire type maculaire ¬ *Q87.1*
- Cérébro-maculaire ¬ *E75.4*
- Choriorétinienne-myopie ¬ Syndrome d'ectopie du cristallin- *Q15.8*
- Choroïdien
- - Aréolaire
- - - Centrale) (généralisée) (péripapillaire) ¬ *H31.2*
- - - Généralisée ¬ *H31.2*
- - Centrale aréolaire de l'épithélium pigmentaire ¬ *H31.2*
- Ciliaire] ¬ Syndrome FLOTCH [Leukonychie totale familiale-kystes trichilemmaux- *Q84.4*
- Cône
- - Bâtonnets
- - - Amélogenèse imparfaite ¬ Syndrome de *K00.5, H35.5*
- - - Cataracte-staphylome postérieur] ¬ Syndrome MRCS [microcornée- *Q15.8*
- - - Petite taille ¬ Syndrome de *H35.5, E34.3*
- - - ¬
- - - - *H35.5*
- - - - Syndrome
- - - - - Dysplasie spondylo-métaphysaire- *Q77.8*
- - - - - Fente labiale avec *Q36.9, H35.5*
- - Réponse scotopique supranormale ¬ *H35.5*
- Cornée
- - Épithéliale ¬ *H18.5*
- - Filaments sinueux ¬ *H18.5*
- - Granuleuse ¬ *H18.5*
- - Grillagée en réseau ¬ *H18.5*
- - Maculaire ¬ *H18.5*
- Cristalline de Bietti ¬ *H31.2*
- Cutanée bulleuse atrophiante et albo-papuloïde ¬ *Q81.2*
- Dermo-chondro-cornéenne ¬ *Q87.8*
- Due à la malnutrition ¬ *E45*
- Endothélial
- - Congénitale héréditaire type
- - - 1 ¬ *H18.5*
- - - 2 ¬ *H18.5*
- - Hypoplasie de l'iris-cataracte congénitale-amincissement stromal] ¬ Syndrome EDICT [*Q13.8*
- Fuchs ¬
- - *H18.5*
- - *H18.5*
- Hépatique chronique ¬ *K72.18*
- Héréditaire de la choroïde ¬ *H31.2*
- Inanition ¬ *E45*
- Jaune du foie ¬ atrophie ou *K72*
- Kandori ¬ *H35.5*
- Landouzy-Dejerine ¬ *G71.08*
- Leyden-Moebius ¬ *G71.08*

Dystrophie *–suite*
- Neuroaxonale infantile [maladie de Seitelberger] ¬ *G31.88*
- Nuageuse centrale de François ¬ *H18.5*
- Oculaire ¬ *G71.08*
- Oculo-cérébro-rénale ¬ *E72.0*
- Ongles ¬ *L60.3*
- Osseuse sclérosante mixte avec manifestations extra-squelettiques ¬ *Q87.5*
- Postérieure polymorphe ¬ *H18.5*
- Progressive des cônes ¬ *H35.5*
- Pseudo-inflammatoire de Sorsby ¬ *H35.5*
- Réticulée de l'épithélium pigmentaire rétinien ¬ *H35.5*
- Rétine
- - Déficit en arginine vasopressine ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-spasticité des membres- *Q87.8*
- - Diabète insipide ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-spasticité des membres- *Q87.8*
- Rétinienne (pigmentaire) (ponctuée albescente) (vitelliforme) ¬ *H35.5*
- Tachetée multifocale de l'épithélium pigmentaire rétinien (simulant le fundus flavimaculatus) ¬ *H35.5*
- Tapétochoroïdienne ¬ *H31.2*
- Tapéto-rétinienne ¬ *H35.5*
- Thoracique asphyxiante ¬ *Q77.2*
- Thrombocytaire hémorragipare ¬ *D69.1*
- Vingt ongles ¬ *L60.3*
- Vitréo-rétinien ¬
- - *H35.5*
- - *H35.5*
- Vulve ¬ *N90.4*

Dystrophie cornéenne
- Amorphe postérieure ¬ *H18.5*
- Dysmorphie facial ¬ Syndrome agénésie congénitale
- - Grandes lèvres-malformation cérébelleuse- *Q87.0*
- - Scrotum-malformation cérébelleuse- *Q87.0*
- Endothéliale liée à l'X ¬ *H18.5*
- Grayson-Wilbrandt ¬ *H18.5*
- Héréditaires ¬ *H18.5*
- Lisch ¬ *H18.5*
- Membrane de Bowman type II ¬ *H18.5*
- Rayon de miel ¬ *H18.5*
- Reis-Bücklers ¬ *H18.5*
- Schnyder ¬ *H18.5*
- Sous-épithéliale mucineuse ¬ *H18.5*
- Stromal
- - Congénitale ¬ *H18.5*
- - ¬ *H18.5*
- Surdité de perception ¬ Syndrome de *H18.5, H90.5*
- Thiel-Behnke ¬ *H18.5*
- Waardenburg-Jonker ¬ *H18.5*

Dystrophie cornéenne *–suite*
- ¬ Syndrome
- - Ataxie spinocérébelleuse- *G11.8*
- - Dégénérescence spinocérébelleuse- *G11.9, H18.5*
- - Dysplasie spondylo-métaphysaire- *Q87.1*

Dystrophie maculaire
- Ailes de papillon ¬ *H35.5*
- Annulaire concentrique bénigne ¬ *H35.5*
- Caroline du Nord ¬ *H35.5*
- Cystoïde ¬ *H35.5*
- Occulte ¬ *H35.5*
- Rétinienne type 2 ¬ *H35.5*

Dystrophie musculaire
- Associée à POMGNT2 ¬ *G71.08*
- Becker
- - Femme porteuse ¬ Forme symptomatique de la *G71.08*
- - ¬ *G71.08*
- Bénigne [Becker] ¬ *G71.08*
- Ceinture
- - Autosomique
- - - Dominante type
- - - - 1A ¬ *G71.08*
- - - - 1B ¬ *G71.08*
- - - - 1C ¬ *G71.08*
- - - - 1D ¬ *G71.08*
- - - - 1E ¬ *G71.08*
- - - - 1F ¬ *G71.08*
- - - - 1G ¬ *G71.08*
- - - Récessive type
- - - - 2A ¬ *G71.08*
- - - - 2B ¬ *G71.08*
- - - - 2C ¬ *G71.08*
- - - - 2D ¬ *G71.08*
- - - - 2E ¬ *G71.08*
- - - - 2F ¬ *G71.08*
- - - - 2G ¬ *G71.08*
- - - - 2H ¬ *G71.08*
- - - - 2I ¬ *G71.08*
- - - - 2J ¬ *G71.08*
- - - - 2K ¬ *G71.08*
- - - - 2L ¬ *G71.08*
- - - - 2M ¬ *G71.08*
- - - - 2N ¬ *G71.08*
- - - - 2O ¬ *G71.08*
- - - - 2P ¬ *G71.08*
- - - - 2Q ¬ *G71.08*
- - - - 2R ¬ *G71.08*
- - - - 2S ¬ *G71.08*
- - - - 2T ¬ *G71.08*
- - - - 2U ¬ *G71.08*
- - - - 2Y ¬ *G71.08*
- - - - 2Z ¬ *G71.08*
- - Déficit
- - - Bêta-sarcoglycane ¬ *G71.08*

Dystrophie musculaire *–suite*
- Ceinture *–suite*
- - Déficit *–suite*
- - - Delta-sarcoglycane ¬ *G71.08*
- - - FKRP ¬ *G71.08*
- - - Gamma-sarcoglycane ¬ *G71.08*
- - - Lamine A/C ¬ *G71.08*
- - - POMK ¬ *G71.08*
- - Liée
- - - Calpaïne-3 D4 ¬ *G71.08*
- - - Sous-unité alpha 2 de la laminine R23 ¬ *G71.08*
- - Pelvienne ¬ *G71.08*
- - Scapulaire ¬ *G71.08*
- - ¬ *G71.08*
- Congénitale
- - Anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurelles] ¬ *G71.2*
- - Cataracte
- - - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *G71.2*
- - - Infantile-hypogonadisme ¬ Syndrome de *G71.2*
- - Davignon-Chauveau ¬ *G71.2*
- - Déficience intellectuelle ¬ *G71.2*
- - Déficit
- - - Intégrine alpha-7 ¬ *G71.2*
- - - Laminine alpha 2 ¬ *G71.2*
- - Hyperlaxité articulaire ¬ *G71.2*
- - Liée à LMNA ¬ *G71.2*
- - Mégaconiale ¬ *G71.2*
- - SAI ¬ *G71.2*
- - Sans déficience intellectuelle ¬ *G71.2*
- - Type
- - - 1A ¬ *G71.2*
- - - 1B ¬ *G71.2*
- - - Fukuyama ¬ *G71.2*
- - Ullrich ¬ *G71.2*
- - ¬ *G71.2*
- Distale ¬ *G71.08*
- Duchenne
- - Femme porteuse ¬ Forme symptomatique de la *G71.00*
- - ¬
- - - *G71.00*
- - - DMD [*G71.00*
- Emery-Dreifuss
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *G71.08*
- - - Récessive ¬ *G71.08*
- - ¬ *G71.08*
- Facio-scapulo-humérale ¬ *G71.08*
- Gowers ¬ *G71.08*
- Héréditaire ¬ *G71.08*
- Landouzy ¬ *G71.08*

Dystrophie musculaire *–suite*
- Liée au collagène de type VI, forme intermédiaire ¬ *G71.2*
- Oculaire ¬ *G71.08*
- Oculo-gastro-intestinale ¬ *Q43.8*
- Oculo-pharyngée ¬ *G71.08*
- Progressive héréditaire
- - Duchenne ¬ *G71.00*
- - ¬ *G71.08*
- Pseudo-hypertrophique ¬ *G71.08*
- Scapulo-péronière
- - Bénigne avec contractures précoces (de type Emery-Dreifuss) ¬ *G71.08*
- - Liée à l'X ¬ *G71.08*
- - Tardive associée à MYH7 ¬ *G71.08*
- - ¬ *G71.08*
- Sévère [de type Duchenne] ¬ *G71.00*
- Tibiale ¬ *G71.08*
- Type Selcen ¬ *G71.08*
- ¬
- - *G71.08*
- - Épidermolyse bulleuse simple avec *Q81.0†, G73.7**
- - Paralysie de Duchenne au cours de *G71.00*
- - Syndrome de contracture progressive de l'enfance-faiblesse musculaire des ceintures- *G71.08*

Dystrophie myotonique
- Proximale ¬ *G71.1*
- Steinert
- - Adulte ¬ *G71.1*
- - Début
- - - Juvénile ¬ *G71.1*
- - - Tardif ¬ *G71.1*
- - Forme
- - - Congénitale ¬ *G71.1*
- - - Infantile ¬ *G71.1*
- Type 1] ¬ DM1 [*G71.1*
- ¬ *G71.1*

Dystrophie rétinienne
- Anomalies de la couche nucléaire interne et des cellules ganglionnaires ¬ *H35.5*
- Cours
- - Lipidose systémique ¬ *E75.6†, H36.8**
- - Maladie de stockage des lipides ¬ *E75.6†, H36.8**
- Gros orteil bifide-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'aphonie-surdité- *Q87.0*
- Héréditaire ¬ *H35.5*
- Micropénis] ¬ Syndrome MORM [déficience intellectuelle-obésité du tronc- *Q87.8*
- Œdème du nerf optique-splénomégalie-anhidrose-céphalée migraineuse ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Pigmentaire ¬ *H35.5*
- Progressive
- - Colobome d'iris-cataracte congénitale ¬ Syndrome familial de *Q15.8*
- - Déficit de transport du rétinol ¬ *H35.5*

Dystrophie rétinienne *–suite*
- Type Bothnie ¬ *H35.5*
- ¬ *H35.5*

Dystrophinopathie
- Duchenne ¬ *G71.00*
- Sévère de type Duchenne ¬ *G71.00*

Dystrophique
- Acrale ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.2*
- Dominante
- - Généralisée ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.2*
- - Isolée des ongles ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.2*
- Généralisée autosomique récessive, forme intermédiaire ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.2*
- Inversée récessive ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.2*
- Localisée ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.2*
- Prétibiale ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.2*
- Prurigineuse ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.2*
- ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.2*

Dysurie ¬
- *R30.0*
- Formes psychogènes de: *F45.3*

E1-alpha ¬ Déficit en pyruvate déshydrogénase *E74.4*

Eagle-Barett ¬ Syndrome d' *Q79.4*

Eales ¬ Maladie d' *H35.0*

EAST ¬ Syndrome *Q87.8*

Eaton
v./v.a. Lambert-Eaton

Eau
- Chaude ¬ Épilepsie réflexe à l' *G40.8*
- Potable ¬ Approvisionnement insuffisant en *Z58*
- Sans précision ¬ Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l' *T70.9*
- ¬
- - Accident par chute (dans l' *X59.9!*
- - Effets
- - - Pression atmosphérique et de la pression de l' *T70.8*
- - - Sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l' *T70.0*
- - Pollution de l' *Z58*
- - Privation d' *T73.1*
- - Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d' *T67.4*

EBDR sévère généralisée ¬ *Q81.2*

Eberthella typhosa ¬ Infection à *A01.0*

EBJ-H] ¬ Épidermolyse bulleuse jonctionnelle type Herlitz [*Q81.1*

EBJ-nH loc [Épidermolyse bulleuse jonctionnelle type non-Herlitz localisé] ¬ *Q81.8*

Éblouissements ¬ Étourdissements et *R42*

Ebola ¬
- Fièvre *A98.4*
- Fièvre hémorragique à virus *A98.4*
- Maladie à virus *A98.4*

Ébrieuse ¬ Démarche *R26.0*

Ebstein
- Valve tricuspide ¬ Anomalie d' *Q22.5*
- ¬ Maladie d' *Q22.5*

EBV
- Personnes âgées ¬ Lymphome B diffus à grandes cellules positif au virus Epstein-Barr [*C83.3*
- Virus d'Epstein-Barr déficit
- - CD137 ¬ Maladie lymphoprolifération associée à l' *D82.3*
- - PRKCD ¬ Maladie lymphoprolifération associée à l' *D82.3*
- - RASGRP1 ¬ Maladie lymphoprolifération associée à l' *D82.3*
- - TET2 ¬ Maladie lymphoprolifération associée à l' *D82.3*
- ¬ Lymphome B diffus à grandes cellules positif au virus Epstein-Barr [*C83.3*

Écaille temporal ¬
- Os: temporal, *S02.0*
- Temporal, à l'exclusion de l' *S02.1*

Écartement traumatique de la symphyse (pubienne) obstétrical(e) ¬ *O71.6*

Ecchymoses
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Spontanées ¬ *R23.3*

Eccrine ¬ Hamartome angio- *Q85.8*

ECG
- Moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien découvert par *I25.2*
- ¬ Anomalies (de): électrocardiogramme [*R94.3*

Échancrure nasale ¬ *Q30.2*

Échantillons ¬ Incision pour prise d' *P12.4*

Écharde ¬
- Lésion traumatique superficielle
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé: Corps étranger superficiel (*T13.04*
- - - Supérieur, niveau non précisé: Corps étranger superficiel (*T11.04*
- - Partie du corps non précisée: Corps étranger superficiel (*T14.04*
- - Tronc, niveau non précisé: Corps étranger superficiel (*T09.04*
- Lésions traumatiques superficielles
- - Abdomen, des lombes et du bassin: Corps étranger superficiel (*S30.84*
- - Avant-bras: Corps étranger superficiel (*S50.84*
- - Cheville et du pied: Corps étranger superficiel (*S90.84*
- - Épaule et du bras: Corps étranger superficiel (*S40.84*
- - Hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (*S70.84*
- - Jambe: Corps étranger superficiel (*S80.84*
- - Poignet et de la main: Corps étranger superficiel (*S60.84*

Échaudage
- Gaz brûlants ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Liquides brûlants ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Matériel brûlant ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Nourriture brûlante ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Objets brûlants ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Vapeur brûlante ¬ Brûlure ou *X19.9!*

Échaudée
- Atteinte de la muqueuse ¬ Syndrome SSS [staphylococcique de peau *L00.1*
- Syndrome SSS
- - Atteinte 30% surface corporel
- - - Plus ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.1*
- - - ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.0*
- - SAP ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.0*
- - ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.0*

Échec
- Application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision ¬ *O66.5*
- Déclenchement
- - Instrumental du travail ¬ *O61.1*
- - Médical du travail ¬ *O61.0*
- - Travail
- - - Chirurgie ¬ *O61.1*
- - - Moyens mécaniques ¬ *O61.1*
- - - Ocytocique ¬ *O61.0*
- - - Prostaglandines ¬ *O61.0*
- - - Sans précision ¬ *O61.9*
- - - ¬ Autres *O61.8*
- Difficulté intubation
- - Cours
- - - Grossesse ¬ *O29.6*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.6*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.7*
- - ¬ *T88.4*
- Dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) ¬ *Y82.8!*
- Épreuve travail
- - Sans précision ¬ *O66.4*
- - Suivi d'une césarienne ¬ *O66.4*
- Examens ¬ *Z55*
- Greffe
- - Cœur
- - - Poumon ¬ *T86.3*
- - - ¬ *T86.2*
- - Fascio-cutanée ¬ *T86.59*
- - Foie ¬ *T86.49*
- - Lipocutanée ¬ *T86.59*
- - Lors status post greffe
- - - Foie ¬ *T86.49*
- - - Rein ¬ *T86.19*
- - Mammaire
- - - Partie cutanée ¬ *T86.59*
- - - Sans partie cutanée ¬ *T86.84*
- - - ¬ *T86.84*
- - Moelle osseuse ¬ *T86.00*
- - Myocutanée ¬ *T86.59*
- - Pancréas ¬ *T86.82*
- - Peau ¬ *T86.59*
- - Poumon ¬ *T86.81*
- - Rein ¬ *T86.19*
- - ¬ *T86.9*
- Lactation ¬ *O92.3*
- Rejet
- - Greffe de foie, autre et non précisé ¬ Trouble fonctionnel, *T86.49*
- - Organe tissu greffé
- - - Greffe de cornée de l'œil ¬ *T86.83*
- - - Organes ou tissus greffés ¬ *T86.88*
- Réponse génitale ¬ *F52.2*
- Tentative avortement

Échec *–suite*
- Tentative avortement *–suite*
- - Médical
- - - Complications autres et non précisées ¬ *O07.3*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ *O07.2*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ *O07.1*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ *O07.0*
- - - SAI ¬ *O07.4*
- - - Sans complication ¬ *O07.4*
- - SAI ¬ *O07.9*
- - Sans précision
- - - Complications autres et non précisées ¬ *O07.8*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ *O07.7*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ *O07.6*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ *O07.5*
- - - Sans complication ¬ *O07.9*
- Transplant Cellule souche hématopoïétique
- - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ *T86.0*
- - ¬ *T86.00*
- ¬ Trouble de la personnalité: à conduite d' *F60.7*

Échelle de dépression
- Gériatrique
- - 5
- - - 0-1 points ¬ GDS-5 [*U54.03*
- - - 2 points ou plus ¬ GDS-5 [*U54.13*
- - 15
- - - 0-5 points ¬ GDS-15 [*U54.02*
- - - 6 points ou plus ¬ GDS-15 [*U54.12*
- Personne âgée
- - 0-3 points ¬ DIA-S [*U54.01*
- - 4 points et plus ¬ DIA-S [*U54.11*

Échinocandines
- Non résistant aux triazoles ¬ Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des *U83.20!*
- Triazoles, résistant au fluconazole ¬ Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des *U83.21!*
- ¬ Candida glabrata résistant aux *U83.1!*

Échinococcose
- Alvéolaire
- - Foie ¬ *B67.5†, K77.0**
- - Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus multilocularis [*B67.6*
- - ¬ *B67.7*
- Foie NCA ¬ *B67.8†, K77.0**
- Kystique
- - Foie ¬ *B67.0†, K77.0**
- - Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus granulosus [*B67.3*
- - Os ¬ *B67.2†, M90.29**

Échinococcose *–suite*
- Kystique *–suite*
- - Poumon ¬ *B67.1†, J99.8**
- Orbite ¬ *B67.9†, H06.1**
- ¬ *B67.9*

Echinococcosi cistica ¬ *B67.4*

Echinococcus ¬
- Infection
- - *B67.9*
- - Foie à *B67.8†, K77.0**
- Kyste à *B67.9*

Echinococcus alveolaris ¬ Infection à *B67.7*

Echinococcus granulosus
- Echinococcose kystique], autres et à localisations multiples ¬ Infections à *B67.3*
- ¬
- - Infection
- - - *B67.4*
- - - Hépatique à *B67.0†, K77.0**
- - - Osseuse à *B67.2†, M90.29**
- - - Pulmonaire à *B67.1†, J99.8**
- - - Thyroïde à *B67.3†, E35.0**
- - Kyste hydatique du foie à *B67.0*

Echinococcus multilocularis
- Échinococcose alvéolaire], autres et à localisations multiples ¬ Infections à *B67.6*
- ¬
- - Infection
- - - *B67.7*
- - - Foie à *B67.5†, K77.0**
- - Kyste hydatique du foie à *B67.5*

Échinocoques ¬ Ostéomyélite due à *B67.2†, M90.29**

Echinostomose ¬ *B66.8*

ECHO ¬
- Bronchite aiguë due à des virus *J20.7*
- Infection SAI à virus: *B34.1*
- Méningite à virus *A87.0†, G02.0**
- Virus: *B97.1!*

Echocardiogramme anormal SAI ¬ *R93.1*

Echoencéphalogramme anormal ¬ *R90.8*

Échographie
- Méthode physique ¬ Dépistage prénatal
- - Malformations par *Z36.3*
- - Retard de croissance du fœtus par *Z36.4*
- Vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l' *O34.30*

Échographiques
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.3*
- ¬ Signes de détresse fœtale: *O68.8*

Eclampsie
- Cours
- - Grossesse ¬ *O15.0*
- - Puerpéralité ¬ *O15.2*

Eclampsie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Travail ¬ *O15.1*
- SAI ¬ *O15.9*
- Sans précision quant à la période ¬ *O15.9*

Ecole buissonnière ¬ *F91.2*

Économique
- Difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation socio- *Z76.2*
- ¬ Difficultés liées au logement et aux conditions *Z59*

Economo
v./v.a. Von Economo-Cruchet

Écorceurs érable
- Exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.61*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.60*

Écoulement
- Aigu et subaigu de l'oreille moyenne ¬ *H65.0*
- Liquide céphalorachidien
- - Rachicentèse ¬ *G97.0*
- - ¬ *G96.0*
- Mamelon ¬
- - *N64.5*
- - Résultats anormaux de: *R89*
- Pénien ¬ *R36*
- Urétral ¬ *R36*

ECP syndrome ¬ *Q82.8*

Écrasement
- Amputation traumatique d'une partie du corps non précisée ¬ *T14.7*
- Amputation traumatiques membre
- - Inférieur ¬ Séquelles d' *T93.6*
- - Supérieur ¬ Séquelles d' *T92.6*
- Associations de parties du corps ¬ *T04.8*
- Avant-bras, partie non précisée ¬ *S57.9*
- Cheville ¬ *S97.0*
- Cou
- - Partie non précisée ¬ *S17.9*
- - ¬ Écrasement de la tête avec *T04.0*
- Coude ¬ *S57.0*
- Crâne ¬ *S07.1*
- Cuisse ¬ *S77.1*
- Déviation congénital(e) du nez ¬ *Q67.4*
- Épaule et du bras ¬ *S47*
- Face ¬ *S07.0*
- Genou ¬ *S87.0*
- Hanche
- - Cuisse ¬ *S77.2*
- - ¬ *S77.0*
- Larynx et de la trachée ¬ *S17.0*
- Membre
- - Inférieur SAI ¬ *T04.3*
- - Supérieur SAI ¬ *T04.2*
- Multiples, sans précision ¬ *T04.9*

Écrasement *–suite*
- Organes génitaux externes ¬ *S38.0*
- Orteil(s) ¬ *S97.1*
- Parties
- - Avant-bras ¬ *S57.8*
- - Cheville et du pied ¬ *S97.8*
- - Cou ¬ *S17.8*
- - Non précisées
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S38.1*
- - - Jambe ¬ *S87.8*
- - - Poignet et de la main ¬ *S67.8*
- - Tête ¬ *S07.8*
- Pied SAI ¬ *S97.8*
- Plusieurs parties membre s
- - Inférieur(s) ¬ *T04.3*
- - Supérieur s
- - - Membre(s) inférieur(s) ¬ *T04.4*
- - - ¬ *T04.2*
- Pouce et d'autre(s) doigt(s) ¬ *S67.0*
- Tête
- - Écrasement du cou ¬ *T04.0*
- - Partie non précisée ¬ *S07.9*
- Thorax
- - Abdomen
- - - Membre(s) ou du thorax, de la région lombosacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ *T04.7*
- - - Thorax et de la région lombosacrée ou du thorax et du bassin ¬ *T04.1*
- - ¬ *S28.0*
- Traumatique SAI ¬ *T14.7*
- Tronc SAI ¬ *T04.1*
- ¬
- - Insuffisance rénale après *T79.5*
- - Syndrome d' *T79.5*

Écrite ¬ Trouble de l'acquisition de l'expression *F81.8*

Écriture ¬ Faible niveau de lecture et d' *Z55*

Écrivain ¬
- Névrose: professionnelle, y compris crampe de l' *F48.8*
- Syndrome d'épilepsie rolandique-dystonie paroxystique induite par l'effort-crampe de l' *G40.08*

Ectasie
- Auricule
- - Droite ¬ *Q20.8*
- - Gauche ¬ *Q20.8*
- Canaliculaire précalicielle ¬ *Q61.5*
- Canaux galactophores ¬ *N60.4*
- Cornée ¬ *H18.7*
- Vasculaire antrale gastrique
- - Duodénum
- - - Saignement ¬ Syndrome GAVE [*K31.82*
- - - Sans indication de saignement ¬ Syndrome GAVE [*K31.81*

Ectasie *–suite*
- Vasculaire antrale gastrique *–suite*
- - Estomac
- - - Saignement ¬ Syndrome GAVE [*K31.82*
- - - Sans indication de saignement ¬ Syndrome GAVE [*K31.81*

Ectodermique
v./v.a. cranio-ectodermique
v./v.a. Dysplasie ectodermique
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de dysplasie cranio-faciale-petite taille-anomalies *Q87.0*
- ¬ Syndrome de retard de développement-ostéopénie-anomalies *Q87.8*

Ectopia cordis ¬ *Q24.8*

Ectopie
- Anus ¬ *Q43.5*
- Cardiaque
- - Congénitale ¬ *Q24.8*
- - ¬ *Q24.8*
- Cristallin
- - Dystrophie choriorétinienne-myopie ¬ Syndrome d' *Q15.8*
- - Familiale ¬ *Q12.1*
- - Mégalocornée ¬ Glaucome secondaire à une sphérophakie/ *Q15.8*
- - Sphérophakie-raideur articulaire-petite taille] ¬ Syndrome GEMSS [glaucome-*Q87.1*
- - ¬ Syndrome de blépharoptosis-myopie-*Q15.8*
- Testiculaire unilatérale ou bilatérale ¬ *Q53.0*
- Thyroïdienne ¬ *E03.1*
- Tissu du sein ¬ *Q83.88*
- Uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*
- Vésicale ¬ *Q64.1*

Ectopique
- ACTH
- - Hormone adrénocorticotrope] ¬ Syndrome de Cushing dû à la production *E24.3*
- - ¬ Syndrome
- - - Cushingoïde de sécrétion *E24.3*
- - - Sécrétion *E24.3*
- Intrapulmonaire (congénital) ¬ Tissu *Q33.5*
- Non classée ailleurs ¬ Sécrétion hormonale *E34.2*
- Sécrétrice aldostérone
- - Ovaire ¬ Tumeur *D39.1, E26.0*
- - Rétropéritoine ¬ Tumeur *D48.3, E26.0*
- - Testicule ¬ Tumeur *D40.1, E26.0*
- - ¬ Tumeur *D48.9, E26.0*
- Siège de la tumeur] ¬ Testicule: *C62.0*
- ¬
- - Rein *Q63.2*
- - Syndrome de ptosis-strabisme-pupilles *Q15.8*
- - Tachycardie jonctionnelle *I47.1*
- - Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens *E05.3*

Ectopique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Trouble du rythme (du): *I49.8*

Ectrodactylie
- Polydactylie ¬ Syndrome d' *Q73.8, Q69.9*
- ¬
- - *Q73.8*
- - Syndrome de tibia aplastique- *Q73.8*

Ectromélie SAI d'un (des) membre(s) SAI ¬ *Q73.8*

Ectropion
- Col de l'utérus ¬ Érosion et *N86*
- Congénital
- - Isolé ¬ *Q10.1*
- - ¬ *Q10.1*
- Palpébral ¬ *H02.1*
- Uvéal congénital ¬ *Q10.1*
- ¬
- - Cervicite avec ou sans érosion ou *N72*
- - Endocervicite avec ou sans érosion ou *N72*
- - Exocervicite avec ou sans érosion ou *N72*

Eczéma
- Allergique contact
- - SAI ¬ *L23.9*
- - ¬ *L23*
- Bactérien ¬ *L30.3*
- Contact
- - Professionnel) SAI ¬ *L25.9*
- - Sans précision ¬ *L25*
- Frottement ¬ *L30.4*
- Goutteux ¬ *M10.99†, L99.8**
- Herpétique ¬ *B00.0*
- Infantile (aigu) (chronique) ¬ *L20.8*
- Intrinsèque (allergique) ¬ *L20.8*
- Irritant contact
- - SAI ¬ *L24.9*
- - ¬ *L24*
- Irritation ¬ *L30.4*
- Marginé de Hebra [Jock itch] ¬ *B35.6*
- Plis de flexion NCA ¬ *L20.8*
- SAI ¬ *L30.9*
- Séborrhéique ¬ *L21*
- Surinfecté ¬ *L30.3*
- ¬ Déficit immunitaire avec thrombocytopénie et *D82.0*

Eczémateuse de la paupière ¬ Dermite: *H01.1*

Eczématide ¬ *L30.2*

Eczématoïde
- Déshydratation ¬ Dermite *L30.8*
- Infectieuse ¬ Dermite *L30.3*
- ¬
- - Dermite *L30.3*
- - Otite aiguë externe: *H60.5*

Édentée
- Associées à un traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la crête alvéolaire *K06.2*
- Due à une prothèse) ¬ Hyperplasie par irritation de la crête *K06.2*
- Sans précision ¬ Affection de la gencive et de la crête alvéolaire *K06.9*
- ¬
- - Affections précisées de la gencive et de la crête alvéolaire *K06.8*
- - Atrophie de la crête alvéolaire *K08.2*

EDICT [dystrophie endothéliale-hypoplasie de l'iris-cataracte congénitale-amincissement stromal] ¬ Syndrome *Q13.8*

Édimbourg ¬ Syndrome malformatif d' *Q95.2*

EDS type
- Kosho ¬ *Q79.6*
- Progéroïde ¬ *Q79.6*

EDSS1 [Syndrome de syndactylie-dysplasie ectodermique 1] ¬ *Q82.8*

EDSS2 [Syndrome de syndactylie-dysplasie ectodermique 2] ¬ *Q82.8*

Éducation
- Alphabétisation ¬ Difficultés liées à l' *Z55*
- Institution ¬ Séjour et *Z62*
- Vision [orthoptique] ¬ *Z50.6!*
- ¬
- - Difficultés liées à l' *Z62*
- - Pression parentale inappropriée et autres défauts de l' *Z62*

Éducative ¬ Mauvaise adaptation *Z55*

Edwards
- Sans précision ¬ Syndrome d' *Q91.3*
- ¬ Syndrome d' *Q91.3*

EEG ¬
- Electro-encéphalogramme anormal [*R94.0*
- Épilepsie bénigne de l'enfance avec pointes centro-temporales à l' *G40.08*

EEM ¬ Syndrome *Q87.8*

Effecteur immun ¬ Syndrome de neurotoxicité associée aux cellules à *G92.0*

Efficacité ¬ Syndrome Parkinson héréditaire tardif
- Fluctuation de l' *G20.91*
- Handicap
- - Léger
- - - Fluctuation de l' *G20.01*
- - - Sans fluctuation de l' *G20.00*
- - Lourd
- - - Fluctuation
- - - - *G20.11*
- - - - *G20.21*
- - - Sans fluctuation
- - - - *G20.10*
- - - - *G20.20*

Effondrement d'un bâtiment en feu ¬ *X59.9!*

Effort
- Crampe de l'écrivain ¬ Syndrome d'épilepsie rolandique-dystonie paroxystique induite par l' *G40.08*
- Distance marche 200 m
- - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l' *I70.21*
- - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l' *I70.22*
- Important ¬ Insuffisance cardiaque
- - Droite
- - - Primaire avec symptôme en cas d' *I50.00, I50.03!*
- - - Symptôme en cas d' *I50.01, I50.03!*
- - Gauche: Avec symptôme en cas d' *I50.12*
- Incontinence de stress] ¬ Incontinence urinaire d' *N39.3*
- Intensif ¬ Épuisement dû à un *T73.3*
- Léger ¬ Insuffisance cardiaque
- - Droite
- - - Primaire avec symptôme en cas d' *I50.00, I50.04!*
- - - Symptôme en cas d' *I50.01, I50.04!*
- - Gauche: Avec symptôme en cas d' *I50.13*
- MPE ¬ Fatigue chronique
- - Indication d'un malaise post- *R53.0*
- - Sans indication d'un malaise post- *R53.1*
- Spontanément réductible
- - Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l' *K64.2*
- - ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l' *K64.1*
- Type suédois ¬ Myopathie avec intolérance à l' *G71.3*
- ¬
- - Angine
- - - *I20.8*
- - - Aggravée à l' *I20.0*
- - - Novo à l' *I20.0*
- - Asthme d' *J45.19*
- - Dyskinésie paroxystique induite par l' *G24.8*
- - Hémoglobinurie (de): *D59.6*
- - Hyperinsulinisme induit par l' *E16.1*
- - Hyperthermie d' *T67.8*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique induite par l' *E16.1*
- - Myopathie mitochondriale autosomique dominante avec intolérance à l' *G71.3*

Effusion
- Chorioïdienne ¬ *H31.4*
- Primaire ¬ Lymphome à cellules B à *C83.8*
- Uvéal
- - Idiopathique ¬ Syndrome d' *H33.2*
- - ¬ Syndrome d' *H33.2*

EGH] ¬ Ehrlichiose granulocytaire humaine [*A79.8*

Égodystonique ¬ Orientation sexuelle *F66.1*

EH [Elliptocytose héréditaire] ¬ *D58.1*

Ehlers-Danlos
- Classique ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Classique-like type
- - 1 ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - 2 ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Hétérotopie périventriculaire ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Hypermobile ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Lié à l'X ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Myopathique ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Ostéogenèse imparfaite ¬ Syndrome d' *Q79.6, Q78.0*
- Parodontal ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Progéroïde type
- - 1 ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - 2 ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Spondylodysplasique
- - Lié
- - - B3GALT6 ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - - B4GALT7 ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - - SLC39A13 ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Type
- - Arthrochalasique ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Cardiaque valvulaire ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Cyphoscoliose avec problèmes d'ouïe ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Cyphoscoliotique
- - - Déficit
- - - - FKBP22 ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - - - Lysyl hydroxylase 1 ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - - ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Dermatosparaxis ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Kosho ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Musculo-contractural ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Progéroïde ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Vasculaire ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Vasculaire-polymicrogyrie ¬ Syndrome d' *Q79.6, Q04.3*

Ehrlichiose granulocytaire humaine [EGH] ¬ *A79.8*

Eichner
v./v.a. Neuhauser-Eichner-Opitz

Eiken ¬ Syndrome d' *Q77.3*

Eikenella
- Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, *B96.3!*
- ¬ Bactériémie à *A49.83*

Eisenmenger ¬
- Malformation cardiaque congénitale d' *Q21.88*
- Syndrome d' *I27.8*

Ejaculation précoce ¬ *F52.4*

Éjection ventriculaire gauche
- Faiblement réduite] ¬ HFmrEF [Insuffisance cardiaque à fraction d' *I50.19*
- Préservée] ¬ HFpEF [Insuffisance cardiaque à fraction d' *I50.19*
- Réduite] ¬ HFrEF [Insuffisance cardiaque à fraction d' *I50.19*

EKC [érythrokératodermie-cardiomyopathie] ¬ Syndrome *Q82.8, I42.0*

El Tor ¬ A Vibrio cholerae 01, biovar *A00.1*

Élaboration et de la perception auditive ¬ Trouble de l' *F80.20*

Elargissement de la tache aveugle ¬ *H53.4*

Elastodermie ¬ *L98.8*

Elastofibrome dorsal ¬ *D21.6*

Elastolyse
- Derme moyen ¬ *L90.8*
- Dermique papillaire, type pseudoxanthome élastique ¬ *L90.8*

Elastome
- Perforant serpigineux ¬ *L87.2*
- ¬ *Q82.8*

Elastorrhexie papuleuse ¬ *L94.8*

Elastose
- Dermique focale tardive ¬ *L98.8*
- Focale linéaire ¬ *L94.8*
- Sénile ¬ *L57.4*

Élastotic acquis ¬ Hémangiome *D18.01*

Elbow ¬ Tennis *M77.1*

Électif ¬ Mutisme *F94.0*

Électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique ¬ Sternum laissé *M96.80*

Électrique
- Pendant le sommeil lent] ¬ ESES [état de mal épileptique *G40.01*
- Sans pouls, non classée ailleurs ¬ Activité *R00.3*
- ¬
- - Accident dû au courant *W87.9!*
- - Brûlure due au courant *W87.9!*
- - Cataracte *H26.88*
- - Choc dû au courant *T75.4*
- - Effets du courant *T75.4*

Électro
- Encéphalogramme anormal [EEG] ¬ *R94.0*
- Oculogramme [EOG] ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Électrocardiogramme [ECG] ¬ Anomalies (de): *R94.3*

Électrocardiographiques ¬ Signes de détresse fœtale: *O68.8*

Electrocution ¬
- *T75.4*
- *W87.9!*

Électrode ¬ Lésion due à la présence d'une *P12.4*

Électrolytique
v./v.a. hydro-électrolytique

Électrolytique *–suite*
- Calorique et hydrique ¬ Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre *T50.3*
- Dysfonctionnement des glandes lacrymales-ichtyose-xérostomie] ¬ Syndrome HELIX [hypohidrose-déséquilibre *Q87.8*
- SAI ¬ Déséquilibre *E87.8*
- Transitoires du nouveau-né ¬ Autres anomalies *P74.4*
- ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: déséquilibre *O21.1*

Électromyogramme [EMG] ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Électrons carence
- Flavoprotéine ¬ Trouble du transport d' *E71.3*
- Flavoprotéine-ubiquinone oxydoréductase ¬ Trouble du transport d' *E71.3*

Électrophysiologiques intracardiaques ¬ Anomalies (de): épreuves *R94.3*

Électrorétinogramme [ERG] ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Élément
- Douloureux ¬ Syndrome du membre fantôme sans *G54.7*
- Nutritionnel
- - Précisés ¬ Carence en autres *E61.8*
- - Sans précision ¬ Carence en *E61.9*
- - ¬ Carence en plusieurs *E61.7*
- Psoriasiques ¬ Dermatite séborrhéique-like avec des *L21.8*
- ¬ Épuisement dû aux *T73.2*

Eléphantiasis
- Brugia timori ¬ *B74.2*
- Due à Wuchereria malayi ¬ *B74.1*
- Mastectomie ¬ *I97.22*
- Membre
- - Inférieur ¬ *I89.02*
- - Supérieur ¬ *I89.02*
- Scrotum ¬ *I89.05†, N51.8**
- Testicule ¬ *I89.05*

Élévation
- Enzymes hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome associant une hémolyse, une *O14.2*
- Isolée asymptomatique de la créatine phosphokinase ¬ *R74.8*
- Lactates ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie avec atteinte du tronc cérébral et de la moelle épinière- *G31.81*
- Pression intracrânienne ¬ *G93.2*
- Segment ST NSTEMI
- - Infarctus de type 1 ¬ Infarctus sans *I21.40*
- - ¬ Infarctus sans *I21.48*
- Tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension ¬ Constatation d'une *R03.0*

Elevatum diutinum ¬ Erythema *L95.1*

Élèves ¬ Difficultés avec les enseignants et les autres *Z55*

Éleveurs
- Perruches ¬ Poumon des *J67.20*
- Pigeons ¬ Maladie des *J67.20*

ELF4 lié à l'X ¬ Déficit en *M35.8*

Élimination transépidermique
- Sans précision ¬ Anomalie de l' *L87.9*
- ¬ Autres anomalies de l' *L87.8*

Ellingson
v./v.a. Tsao-Ellingson

Elliptocytose
- Congénitale ¬ *D58.1*
- Héréditaire] ¬ EH [*D58.1*
- Néphrocalcinose ¬ Syndrome d'hypoplasie médiofaciale-surdité- *Q87.0*

Ellis-van Creveld ¬ Syndrome d' *Q77.6*

Ellis-Yale-Winter ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Elschnig ¬ Syndrome d' *Q87.0*

Émaciation ¬ Syndrome d'ophtalmoplégie externe progressive-myopathie- *G71.3*

Emacroorchidie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-macrocéphalie- *Q87.8*

EMAD] ¬ Encéphalomyélite aiguë disséminée [*G37.8*

Émail
- Dentaire, un retard de développement et déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'aplasie cutanée congénitale avec hypoplasie de l' *Q87.8*
- Irradié ¬ *K03.8*
- Kératodermie palmoplantaire-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypohidrose-hypoplasie de l' *Q87.8*
- Néonatale) (post-natale) (prénatale) ¬ Hypoplasie de l' *K00.4*
- Non associées à la fluorose ¬ Taches de l' *K00.3*
- Tacheté ¬ *K00.3*
- ¬ Carie limitée à l' *K02.0*

Émanation
- Fumée gaz
- - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des *J68.2*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents chimiques, des *J68.9*
- - ¬
- - - Affections respiratoires
- - - - Agents chimiques, des *J68.8*
- - - - Aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des *J68.3*
- - - - Chroniques dues à des agents chimiques, des *J68.4*
- - - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d' *J68.4*
- - - Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des *J68.0*
- - - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d' *J68.4*

Émanation *–suite*
- Fumée gaz *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d' *J68.4*
- - - Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des *J68.1*
- Gaz fumée
- - Précisés ¬ Effet toxique: Autres *T59.8*
- - Sans précision ¬ Effet toxique: *T59.9*

Emanuel ¬ Syndrome d' *Q92.6*

EMARDD [Syndrome de myopathie à début précoce-aréflexie-détresse respiratoire-dysphagie] ¬ *G71.2*

Embauche ¬ Examen avant *Z02*

Emberger ¬ Syndrome d' *D46.7*

Embolie
v./v.a. thromboembolie
- Amniotique ¬ *O88.1*
- Artère
- - Distale NCA ¬ *I74.4*
- - Membres ¬ *I74.4*
- Artère axillaire ¬ *I74.2*
- Artère basilaire ¬ *I65.1*
- Artère brachiale ¬ *I74.2*
- Artère carotide ¬ *I65.2*
- Artère cérébelleuse ¬ *I66.3*
- Artère cérébrale
- - Antérieure ¬ *I66.1*
- - Enfance ¬ Accident vasculaire cérébral ischémique dû à une *I63.4*
- - Moyenne ¬ *I66.0*
- - Postérieure ¬ *I66.2*
- - ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.4*
- Artère fémorale
- - Commune ¬ *I74.3*
- - ¬ *I74.3*
- Artère mésentérique ¬ *K55.0*
- Artère poplitée ¬ *I74.3*
- Artère radiale ¬ *I74.2*
- Artère rénale ¬ *N28.0*
- Artère vertébrale ¬ *I65.0*
- Artères précérébrales ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.1*
- Artériel
- - Bras ¬ *I74.2*
- - Cuisse ¬ *I74.3*
- - Jambe ¬ *I74.3*
- - Membres supérieurs ¬ *I74.2*
- - Périphérique ¬ *I74.4*
- - Pied ¬ *I74.3*
- Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.2*
- Coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*
- Cutanée médicamenteuse ¬ *T80.1*
- Due

Embolie *–suite*
- Due *–suite*
- - Caillot sanguin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - Gazeuse survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - Liquide amniotique survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - Prothèses, implants ou greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- - Pulmonaire survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - Pyohémique survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - SAI survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - Savon survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - Septique ou septicopyohémique survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Gazeux
- - Consécutive
- - - Acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA ¬ *T81.7*
- - - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ *T80.0*
- - Obstétricale ¬ *O88.0*
- - Traumatique ¬
- - - *T79.0*
- - - Séquelles d' *T98.2*
- Graisseux
- - Obstétricale ¬ *O88.8*
- - Traumatique ¬
- - - *T79.1*
- - - Séquelles d' *T98.2*
- Grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité ¬ *O88*
- Obstétrical
- - Caillot sanguin ¬ Autre *O88.28*
- - SAI ¬ *O88.28*
- - ¬ Autres *O88.8*
- Puerpérale SAI ¬ *O88.28*
- Pulmonaire
- - Cours de la puerpéralité ¬ *O88.20*
- - Fulminante ¬ *I26.0*
- - Massive ¬ *I26.0*
- - Mention de cœur pulmonaire aigu ¬ *I26.0*
- - Non massive ¬ *I26.9*
- - Obstétricale ¬ *O88.20*
- - Postopératoire ¬ *I26*
- - SAI ¬ *I26.9*
- - Sans mention de cœur pulmonaire aigu ¬ *I26.9*
- Pyohémique
- - Septique, obstétricale ¬ *O88.3*
- - Staphylocoques ¬ *A41.2*
- Rénale massive unilatérale ¬ *N28.0*
- Rétinienne ¬ Micro- *H34.2*

Embolie *–suite*
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Thrombose
- - Aorte abdominale ¬ *I74.0*
- - Artère
- - - Membres
- - - - Inférieurs ¬ *I74.3*
- - - - Supérieurs ¬ *I74.2*
- - - Non précisées ¬ *I74.9*
- - - ¬ *I74.8*
- - Artère iliaque ¬ *I74.5*
- - Artères distales, sans précision ¬ *I74.4*
- - Membre inférieur SAI ¬ *I80.3*
- - Parties de l'aorte, autres et non précisées ¬ *I74.1*
- - Veine
- - - Cave ¬ *I82.2*
- - - Jugulaire ¬ *I82.81*
- - - Non précisée ¬ *I82.9*
- - - Précisées ¬ *I82.88*
- - - Rénale ¬ *I82.3*
- - - Splénique ¬ *I82.80*
- Tronc brachio-céphalique ¬
- - *I65.8*
- - Infarctus cérébral par *I63.1*
- Veine
- - Hépatique ¬ *I82.0*
- - Mésentérique ¬ *K55.0*
- Veineuse
- - Hépatique ¬ *I82.0*
- - SAI ¬ *I82.9*
- - ¬ Échec tentative avortement
- - Médical, compliqué d'une *O07.2*
- - Sans précision, compliqués d'une *O07.7*

Embolique
- Artérielle périphérique ¬ Occlusion *I74.4*
- Cérébelleux ¬ Abcès (*G06.0*
- Cérébral ¬ Abcès (*G06.0*
- Cerveau [toute région] ¬ Abcès (*G06.0*
- Moelle épinière [toute localisation] ¬ Abcès (*G06.1*
- Non embolique) ¬ Infarctus aigu de la moelle épinière (*G95.18*
- Otogène ¬ Abcès (*G06.0*
- Tant événement cours ¬
- - Hémiplégie *I63.4, G81.9*
- - Monoplégie *I63.4, G83.3*
- - Tétraplégie *I63.4, G82.52*
- ¬
- - Infarctus
- - - *I74*
- - - Aigu de la moelle épinière (embolique) (non *G95.18*
- - Occlusion: *I74*
- - Pneumonie *I26.9†, J17.8**

Embouchure du nez ¬ Kyste de l' *K09.1*

Embrasement thérapeutique (flare phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ Phénomène d' *T88.7*

Embryofœtopathie
- Aminoptérine ¬ *Q86.88*
- Anti-vitamine K ¬ *Q86.2*
- Carbamazépine ¬ *Q86.88*
- Cocaïne ¬ *Q86.88*
- Indométacine ¬ *Q86.88*
- Isotrétinoïne ¬ *Q86.88*
- Méthimazole ¬ *Q86.88*
- Propylthiouracile ¬ *Q86.88*

Émbryofœtopathie rubéolique ¬ *P35.0*

Embryon
- Transfert d'embryon ¬ Complications de tentative d'implantation d'un *N98.3*
- ¬ Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d' *N98.3*

Embryonnaire
- Cervelet ¬ Carcinome *C71.6*
- Col de l'utérus ¬ Kyste *Q51.6*
- Col vésical ¬ Rhabdomyosarcome *C67.5*
- Cordon spermatique ¬ Rhabdomyosarcome *C63.1*
- Dôme de la vessie ¬ Rhabdomyosarcome *C67.1*
- Encéphale ¬ Carcinome
- - *C71.0*
- - *C71.9*
- Indifférencié du foie ¬ Sarcome *C22.4*
- Intérieur du nez ¬ Rhabdomyosarcome *C30.0*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Carcinome *C71.8*
- Ligament large ¬ Kyste *Q50.5*
- Lobe frontal ¬ Carcinome *C71.1*
- Lobe occipital ¬ Carcinome *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ Carcinome *C71.3*
- Lobe temporal ¬ Carcinome *C71.2*
- Non localisé au système nerveux central ¬ Carcinome *C80.9*
- Noyaux gris centraux ¬ Carcinome *C71.0*
- Orbites ¬ Rhabdomyosarcome *C69.6*
- Ovaire ¬ Carcinome *C56*
- Ovarien malin immature ¬ Tératome *C56*
- Paroi
- - Antérieure de la vessie ¬ Rhabdomyosarcome *C67.3*
- - Latérale de la vessie ¬ Rhabdomyosarcome *C67.2*
- - Postérieure de la vessie ¬ Rhabdomyosarcome *C67.4*
- Prostate ¬ Rhabdomyosarcome *C61*
- Région pinéale ¬ Carcinome *C75.3*
- Rein [tumeur de Wilms] ¬ Adénosarcome *C64*
- Rétropéritoine ¬ Rhabdomyosarcome *C48.0*
- Rosette
- - Lobe pariétal ¬ Tumeur *C71.3*

Embryonnaire *–suite*
- Rosette *–suite*
- - Pluristratifiées
- - - Cervelet ¬ Tumeur *C71.6*
- - - Encéphale ¬ Tumeur *C71.0*
- - - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Tumeur *C71.8*
- - - Lobe frontal ¬ Tumeur *C71.1*
- - - Lobe occipital ¬ Tumeur *C71.4*
- - - Lobe temporal ¬ Tumeur *C71.2*
- - - Tronc cérébral ¬ Tumeur *C71.7*
- - - ¬ Tumeur *C71.9*
- Sinus
- - Ethmoïdal ¬ Rhabdomyosarcome *C31.1*
- - Frontal ¬ Rhabdomyosarcome *C31.2*
- - Maxillaire ¬ Rhabdomyosarcome *C31.0*
- - Sphénoïdal ¬ Rhabdomyosarcome *C31.3*
- Système nerveux central ¬ Carcinome *C72.9*
- Testicule
- - Descendu ¬ Carcinome *C62.1*
- - Non descendu ¬ Carcinome *C62.0*
- - ¬ Carcinome *C62.9*
- Tissu mou
- - Cou ¬ Rhabdomyosarcome *C49.0*
- - Tête ¬ Rhabdomyosarcome *C49.0*
- Tissu neuroépithélial ¬ Tumeur *C72.9*
- Trigone de la vessie ¬ Rhabdomyosarcome *C67.0*
- Trompe de Fallope ¬ Kyste *Q50.4*
- Tronc cérébral ¬ Carcinome *C71.7*
- Vaginal ¬ Kyste (du): *Q52.4*
- Ventricule cérébral ¬ Carcinome *C71.5*
- Vessie
- - Lésion à localisations contiguës ¬ Rhabdomyosarcome *C67.8*
- - ¬ Rhabdomyosarcome *C67.9*
- ¬
- - Carcinome
- - - *C80.9*
- - - Hépatique *C22.7*
- - Néphroblastome *C64*

Embryopathie
- Diabétique ¬ *P70.1*
- Due
- - Anti-épileptiques ¬ *Q86.1*
- - Cause externe, n.c.a. ¬ *Q86.88*
- - Coumarines ¬ *Q86.2*
- - Thalidomide ¬ *Q86.80*
- Méthylmercure ¬ *Q86.88*
- Mycophénolate mofétil ¬ *Q86.88*
- Parvovirus ¬ *P35.8*
- Phénobarbital ¬ *Q86.88*
- Phénylcétonurique ¬ *E70.1*
- Rétinoïdes ¬ *Q86.88*
- Toluène ¬ *Q86.88*
- Triméthadione ¬ *Q86.88*

Embryopathie *–suite*
- Valproate ¬ *Q86.88*

Emergomyces ¬ Infection par *B48.7*

Émérinopathie ¬ *G71.08*

Emery-Dreifuss
- Autosomique
- - Dominante ¬ Dystrophie musculaire d' *G71.08*
- - Récessive ¬ Dystrophie musculaire d' *G71.08*
- ¬ Dystrophie musculaire
- - *G71.08*
- - Scapulo-péronière bénigne avec contractures précoces (de type *G71.08*

Emery-Nelson ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Emétiques ¬ Intoxication: *T47.7*

EMG] ¬ Anomalies (de): électromyogramme [*R94.1*

Éminence du maxillaire ¬ Fracture de l' *S02.48*

Émission de méconium ¬ *P20*

Emollients, calmants et protecteurs ¬ Intoxication: *T49.3*

Émotionnel
- Apparaissant habituellement enfance adolescence
- - Sans précision ¬ Trouble du comportement et trouble *F98.9*
- - ¬ Autres troubles précisés du comportement et troubles *F98.88*
- Enfance
- - Sans précision ¬ Trouble *F93.9*
- - ¬ Autres troubles *F93.8*
- Organique ¬ Labilité [asthénie] *F06.6*
- Sans précision ¬ Trouble mixte des conduites et troubles *F92.9*
- Sommeil SAI ¬ Trouble *F51.9*
- Tension, sans précision ¬ État de choc *R45.7*
- ¬ Autres troubles mixtes des conduites et troubles *F92.8*

Émotionnellement labile
- Type
- - Borderline ¬ Personnalité *F60.31*
- - Impulsif ¬ Personnalité *F60.30*
- ¬ Personnalité *F60.3*

Émotive ¬ Polycythémie: *D75.1*

Emphysémateuse
- Aiguë) sans calcul ¬ Cholécystite: *K81.0*
- Chronique ¬ bronchite: *J44*
- SAI chronique ¬ Bronchite: *J44.8*

Emphysème
- Centro-lobulaire ¬ *J43.2*
- Chronique ¬ bronchite: avec *J44*
- Compensateur ¬ *J98.3*
- Diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ *J68.4*

Emphysème *–suite*
- Fibrose pulmonaire combinés [CPFE] ¬ Syndrome d' *J84.10, J43.9*
- Interstitiel
- - Survenant pendant période périnatal ¬
- - - *P25.0*
- - - Affections apparentées à l' *P25.8*
- - ¬ *J98.2*
- Lobaire congénital ¬ *Q33.8*
- Médiastinal ¬ *J98.2*
- Panacinaire ¬ *J43.1*
- Panlobulaire ¬ *J43.1*
- Pulmonaire
- - Bulleux ¬ *J43.9*
- - SAI ¬ *J43.9*
- - Vésiculaire ¬ *J43.9*
- - ¬ Bulle d' *J43.9*
- Sans précision ¬ *J43.9*
- Sous-cutané
- - Origine traumatique ¬ *T79.7*
- - Résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.8*
- Tuberculeux ¬ *A16.2*
- Unilatéral ¬ *J43.0*
- ¬ Autres *J43.8*

Empiétant sur plusieurs Organe pelvien cloison
- Recto-vaginale ¬ Localisation *C76.3*
- Recto-vésicale ¬ Localisation *C76.3*

Empiètement
- Articulation talo-crurale ¬ Syndrome d' *M24.87*
- Épaule ¬ Syndrome d' *M75.4*

Emploi
- Chômage ¬ Difficultés liées à l' *Z56*
- ¬
- - Changement d' *Z56*
- - Menace de perte d' *Z56*

Empoisonnement
- Accidentel
- - Exposition
- - - Alcool ¬ *X49.9!*
- - - Carburant halogéné ¬ *X49.9!*
- - - Liquide corrosif ¬ *X49.9!*
- - - Médicament, drogues et autres substances biologiques actives ¬ *X49.9!*
- - - Pesticides ¬ *X49.9!*
- - - Solvant organique ¬ *X49.9!*
- - ¬ *X49.9!*
- Lésion auto-infligé(e) délibéré(e) ¬ *X84.9!*

Empreinte
- Digitales ¬ Myopathie à *G71.2*
- Région 11p15 ¬ Syndrome
- - Beckwith-Wiedemann dû à un défaut d' *Q87.3*
- - Silver-Russell dû à un défaut d' *Q87.1*

Emprisonnement
- Formes de privation de liberté ¬ *Z65*
- Procès civil ou pénal ¬ Condamnation, sans *Z65*

Empyème
- Aigu(ë), d'un sinus de la face ¬ *J01*
- Articulation de l'épaule ¬ *M00.97*
- Chronique) d'un sinus (de la face) ¬ *J32*
- Mastoïde ¬ *H70.0*
- Necessitatis ¬ *J86.02*
- Pleural
- - Fistule ¬ *J86.09*
- - ¬ *J86.9*
- Tuberculeux
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.6*
- - ¬ *A16.5*
- Vésicule biliaire sans calcul ¬ *K81.0*
- ¬ *J86*

EN1 type extrémité
- Encéphale ¬ Syndrome
- - Dorsoventral lié à *Q04.3, Q74.8*
- - ENDOVESLB [Syndrome dorsoventral lié à *Q04.3, Q74.8*
- Uniquement] ¬ ENDOVESL [Syndrome dorsoventral lié à *Q74.8*
- ¬ Syndrome dorsoventral lié à *Q74.8*

Enamélome ¬ *K00.2*

Enanthème viral SAI ¬ *B09*

Encéphale
- Infratentoriel ¬
- - Tumeur bénigne: *D33.1*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D43.1*
- Localisations contiguës ¬
- - Astroblastome de l' *C71.8*
- - Gliome malin de l' *C71.8*
- Parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l' *C72.8*
- Sans précision ¬
- - Malformation congénitale de l' *Q04.9*
- - Tumeur bénigne: *D33.2*
- - Tumeur maligne: *C71.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D43.2*
- Sauf lobes et ventricules ¬ Tumeur maligne: *C71.0*
- Supratentoriel ¬
- - Tumeur bénigne: *D33.0*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D43.0*
- ¬
- - Absence d'une partie de l' *Q04.3*
- - Agénésie d'une partie de l' *Q04.3*
- - Anomalies localisées du développement de l' *Q04.3*
- - Aplasie d'une partie de l' *Q04.3*

Encéphale *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Astrocytome
- - - Anaplasique, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - - Cerveau, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - - Diffus, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - - Fibrillaire
- - - - *C71.0*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - - Gémistocytique
- - - - *C71.0*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - - Pilocytique, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - - Pilomyxoïde, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Astrocytome protoplasmique, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Carcinome embryonnaire
- - - *C71.0*
- - - *C71.9*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Congénitale
- - - Anomalie SAI de l' *Q04.9*
- - - Anomalies multiples SAI de l' *Q04.9*
- - - Maladie ou lésion SAI de l' *Q04.9*
- - Épendymoblastome, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Épendymome
- - - *C71.9*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Gangliogliome anaplasique
- - - *C71.0*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Glioblastome
- - - Cellules géantes, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Gliome angiocentrique de l' *D33.0*
- - Gliosarcome, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Hypoplasie d'une partie de l' *Q04.3*
- - Kyste dermoïde de l' *D33.0*
- - Malformation congénitale
- - - *Q04.9*
- - - Précisées de l' *Q04.8*
- - Malformation de l' *Q04.9*
- - Médulloépithéliome, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Micro- *Q02*
- - Oligoastrocytome

Encéphale *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Oligoastrocytome *–suite*
- - - Anaplasique, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Oligodendrogliome
- - - Anaplasique
- - - - *C71.0*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Syndrome
- - - Dorsoventral lié à EN1, de type extrémités et *Q04.3, Q74.8*
- - - ENDOVESLB [Syndrome dorsoventral lié à EN1, de type extrémités et *Q04.3, Q74.8*
- - Tératome malin
- - - *C71.0*
- - - Géantes de l' *C71.9*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Tuberculose de l' *A17.8†, G07**
- - Tumeur
- - - Embryonnaire rosette pluristratifiées
- - - - *C71.0*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - - Oligodendrogliale
- - - - *C71.0*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Tumeur mixte cellule germinal
- - - *C71.0*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Tumeur neuroectodermique primitive
- - - *C71.0*
- - - *C71.9*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Tumeur oligoastrocytaire, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Tumeur rhabdoïde tératoïde atypique, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*
- - Typhus de l' *A01.0*
- - Xanthoastrocytome pléomorphe, lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*

Encéphalique ¬ Démence *G04.9†, F02.8**

Encéphalite
v./v.a. Chorio-encéphalite
v./v.a. Leucoencéphalite
v./v.a. Méningo-encéphalite
- Adénovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Aiguë disséminée ¬ *G04.0*
- Australienne ¬ *A83.4*

Encéphalite *–suite*
- Californie ¬ *A83.5*
- Congénitale à toxoplasmose ¬ *P37.1†, G05.2**
- Cours
- - Actinomycose ¬ *A42.8†, G05.0**
- - Cryptococcose ¬ *B45.1†, G05.2**
- - Herpès zoster ¬ *B02.0†, G05.1**
- - Listériose ¬ *A32.1†, G05.0**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, G05.8**
- - Maladie parasitaire NCA ¬ *B89†, G05.2**
- - Nægleriase ¬ *B60.2†, G05.2**
- - Syphilis congénitale ¬ *A50.4†, G05.0**
- - Syphilis tardive ¬ *A52.1†, G05.0**
- - Torulose ¬ *B45.1†, G05.2**
- - Trichinose ¬ *B75†, G05.2**
- - Tuberculose ¬ *A17.8†, G05.0**
- Cryptocoques ¬ *B45.1†, G05.2**
- Dawson ¬ *A81.1*
- Due
- - Rubéole ¬ *B06.0†, G05.1**
- - Virus
- - - Borna ¬ *A85.8†, G05.1**
- - - Poliomyélite ¬ *A80.9†, G05.1**
- - Virus de l'herpès ¬ *B00.4†, G05.1**
- - VZV [virus varicelle-zona] ¬ *B02.0†, G05.1**
- Encéphalomyélite post-infectieuses SAI ¬ *G04.8*
- Entérovirus ¬ *A85.0†, G05.1**
- Équin
- - Est ¬ *A83.2*
- - Orientale ¬ *A83.2*
- - Ouest ¬ *A83.1*
- Europe centrale transmise par des tiques ¬ *A84.1*
- Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09†, G05.1*, U69.24!*
- Grippale [Influenza] ¬ *J11.8†, G05.1**
- Japonaise
- - Type B ¬ *A83.0*
- - ¬ *A83.0*
- La Crosse ¬ *A83.5*
- Léthargique ¬ *A85.8†, G05.1**
- Lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié ¬ *J10.8†, G05.1**
- Lymphocytaire ¬ *A87.2†, G05.1**
- Méningocoques ¬ *A39.8†, G05.0**
- Métapneumovirus humain ¬ *A85.8†, G05.1**
- Murray Valley ¬ *A83.4*
- Mycoplasmes ¬ *G04.8, B96.0!*
- Myélite encéphalomyélite
- - Cours
- - - Infections
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *G05.0**
- - - - Virales classées ailleurs ¬ *G05.1**

Encéphalite *–suite*
- Myélite encéphalomyélite *–suite*
- - Cours *–suite*
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *G05.8**
- - - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *G05.2**
- - Sans précision ¬ *G04.9*
- - ¬ Autres *G04.8*
- Oreillons ¬ *B26.2†, G05.1**
- Otogène disséminée pNCA ¬ *H66.4†, G05.8**
- Paranéoplasique isolée du tronc cérébral ¬ *C80.9†, G05.8**
- Périaxiale ¬ *G37.0*
- Péri-axiale concentrique ¬ *G37.5*
- Post-infectieuse à anticorps anti-NMDAr [N-méthyl-D-aspartate] ¬ *G04.8*
- Post-vaccinale ¬ *G04.0*
- Post-varicelleuse ¬ *B01.1†*
- Rasmussen ¬ *G04.8*
- Rio Bravo ¬ *A85.8†, G05.1**
- Saint-Louis ¬ *A83.3*
- Subaiguë à inclusions de Dawson ¬ *A81.1*
- Syphilitique
- - Congénitale tardive ¬ *A50.4†, G05.0**
- - Tardive ¬ *A52.1†, G05.0**
- - ¬ *A52.1†, G05.0**
- Taïga transmise par des tiques ¬ *A84.0*
- Tiques ¬ *A84.9*
- Trauma chronique ¬ *F07.2*
- Varicelleuse ¬ *B01.1†, G05.1**
- Verno-estivale d'Europe centrale] ¬ FSME [*A84.1*
- Virale
- - Sans précision ¬ *A86*
- - Transmise
- - - Arthropodes
- - - - Sans précision ¬ *A85.2*
- - - - ¬ Nécessité d'une vaccination contre l' *Z24.1*
- - - Tiques ¬ *A84.9*
- - ¬ Séquelles d' *B94.1*
- Virales transmises par des moustiques ¬ Autres *A83.8*
- Virus
- - Herpes
- - - Simiae ¬ *B00.4†, G05.1**
- - - Simplex ¬ *B00.4†, G05.1**
- - Langat [LGTV] ¬ *A84.8*
- - Mengo ¬ *A85.8†, G05.1**
- Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, G05.1**
- Zostérienne ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬
- - Grippe Influenza
- - - *J11.8†, G05.1**
- - - Virus influenza

Encéphalite *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Grippe Influenza *–suite*
- - - Virus influenza *–suite*
- - - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - Infection au virus Hendra avec *A85.8*
- - Maladie due au VIH avec *B22†, G05.1**
- - Rougeole avec *B05.0†, G05.1**

Encéphalite limbique
- Aiguë après transplantation ¬ *T85.78†, G05.1**
- Anticorps
- - Anti-CASPR2 et thymome ¬ *G04.8, C37*
- - Anti-DPP6 [anticorps anti-dipeptidyl-peptidase 6] ¬ *G04.8*
- - Anti-LGI1 ¬ *G04.8, M35.9*
- - Anti-récepteur N-méthyl-D-aspartate ¬ *G04.8*
- - Caspr2 ¬ *G04.8, M35.9*
- - Neurexine-3 ¬ *G04.8, M35.9*
- Auto-immune ¬ *G04.8*
- Neuromyotonie-hyperhidrose-polyneuropathie ¬ Syndrome d' *G60.8*
- Paranéoplasique anticorps
- - Anti-LGI1 ¬ *G04.8, C80.9*
- - Anti-récepteur NMDA [N-méthyl-D-aspartate] ¬ *G04.8, C80.9*

Encephalitis saturnina ¬ *T56.0†, G05.8**

Encéphalo-cardio-myopathie mitochondriale associée à TMEM70 ¬ *G31.81*

Encéphalocèle
v./v.a. hydro-encéphalocèle
- Acquis ¬ *G93.5*
- Frontale ¬ *Q01.0*
- Isolée ¬ *Q01.9*
- Localisations ¬ *Q01.8*
- Naso-frontale ¬ *Q01.1*
- Occipital
- - Dysplasie squelettique ¬ Syndrome létal d' *Q87.5*
- - ¬ *Q01.2*
- Sans précision ¬ *Q01.9*
- ¬ *Q01.9*

Encéphalo-craniocutanée ¬ Lipomatose *E88.29*

Encéphalofaciale ¬ Angiomatose *Q85.8*

Encéphalogramme anormal [EEG] ¬ Electro- *R94.0*

Encéphalomyélite
v./v.a. Polio-encéphalomyélite
- Adénovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Aiguë
- - Disséminée
- - - Anticorps anti-MOG ¬ *G04.0*

Encéphalomyélite *–suite*
- Aiguë *–suite*
- - Disséminée *–suite*
- - - EMAD] ¬ *G37.8*
- - - Sans anticorps anti-MOG ¬ *G04.0*
- - Post-infectieuse disséminée ¬ *G04.0*
- Cours
- - Infections
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.0**
- - - Virales classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.8**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.2**
- - Nægleriase ¬ *B60.2†, G05.2**
- - Rougeole ¬ *B05.0†, G05.1**
- - Rubéole ¬ *B06.0†, G05.1**
- - Syphilis congénitale ¬ *A50.4†, G05.0**
- - Syphilis tardive ¬ *A52.1†, G05.0**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.2†, G05.2**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**
- Due à zona ¬ *B02.0†, G05.1**
- Entérovirus ¬ *A85.0†, G05.1**
- Myalgique
- - Non post-infectieux ¬ *G93.31*
- - Post-infectieux ¬ *G93.30*
- - ¬ *G93.39*
- Oreillons ¬ *B26.2†, G05.1**
- Ovine ¬ *A84.8*
- Post-infectieuses SAI ¬ Encéphalite et *G04.8*
- Précisée virale NCA ¬ *A85*
- Progressive avec rigidité et myoclonies ¬ *G25.88*
- Sans précision ¬ Encéphalite, myélite et *G04.9*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G05.0**
- Varicelleuse ¬ *B01.1†, G05.1**
- Virus
- - Herpes simiae ¬ *B00.4†, G05.1**
- - SAI ¬ *A86*
- ¬
- - Encéphalites, myélites et *G04.8*
- - Maladie due au VIH avec *B22†, G05.1**

Encéphalomyélocèle ¬
- *Q01*
- *Q01.9*

Encéphalomyélopathie
- Nécrosante subaiguë [syndrome de Leigh] ¬ *G31.88*
- Post-vaccinale ¬ *G04.0*

Encéphalomyopathie
- Mitochondrial
- - Due à un déficit combiné de la phosphorylation oxydative de type 6 ¬ *G31.81*

Encéphalomyopathie *–suite*
- Mitochondrial *–suite*
- - Sévère liée à l'X ¬ *G31.81*
- - Type Ghezzi-Zeviani ¬ *G31.81*
- Néonatale associée à COQ4 ¬ *G31.81*

Encéphalo-myopathie fatale infantile par déficit en cytochrome oxydase C ¬ Cardio- *G31.81*

Encéphalomyopathique
- Acidurie méthylmalonique ¬ Syndrome de déplétion de l'ADN mitochondrial forme *G31.81, E71.1*
- Anomalies cranio-faciales variables ¬ Syndrome de déplétion de l'ADN mitochondrial, forme *G31.81, Q75.9*
- Tubulopathie rénale ¬ Déplétion de l'ADN mitochondrial, forme *G31.81†, N16.8**

Encéphaloneuropathie-obésité-valvulopathie ¬ Syndrome de surdité- *G31.81*

Encéphalopathie
v./v.a. Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes
v./v.a. Polio-encéphalopathie
- Acidose lactique
- - Épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec *G31.81*
- - Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, *G31.81*
- Alcoolique ¬ *G31.2*
- Anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ *P91.6*
- Artérioscléreuse sous-corticale ¬ *I67.3*
- Auto-immune avec parasomnie et apnée obstructive du sommeil ¬ *G04.8*
- Bilirubinique
- - Aiguë ¬ *P57.9*
- - Chronique ¬ *P57.8*
- Cardiomyopathie hypertrophique-néphropathie tubulaire ¬ Syndrome d' *E88.8*
- Congénitale sévère due à une mutation du gène MECP2 ¬ *G93.4, Q02*
- Cours
- - Carence vitamine
- - - B NCA ¬ *E53.9†, G32.8**
- - - ¬ *E56.9†, G32.8**
- - Lupus érythémateux
- - - Disséminé de l'enfant ¬ *M32.1†, G05.8**
- - - ¬ *M32.1†, G05.8**
- - Sepsis
- - - Fongique ¬ *B48.80†, G94.32**
- - - Protozoaires ¬ *B60.80†, G94.32**
- - Septicémie
- - - Fongique SAI ¬ *B48.80†, G94.32**
- - - Virale ¬ *B34.80†, G94.32**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G13.1**
- Défaut fission mitochondrial peroxysomale
- - Associée
- - - DNM1L ¬ *G31.81*

Encéphalopathie *–suite*
- Défaut fission mitochondrial peroxysomale *–suite*
- - Associée *–suite*
- - - MFF ¬ *G31.81*
- - ¬ *G31.81*
- Déficit
- - GLUT1 ¬ *E74.8†, G94.30*, G40.4*
- - Prosaposine ¬ *E75.2*
- - Sulfite oxydase ¬ *E72.1*
- - Urocanase ¬ *E70.8*
- Démyélinisante du corps calleux ¬ *G37.1*
- Dialytique ¬ *N18.5†, G94.8**
- Différée par intoxication au monoxyde de carbone ¬ *T58†, G94.39**
- Due
- - Coma hypoglycémique ¬ *E16.1†, G94.30**
- - Hyperinsulinisme ¬ *E16.1†, G94.30**
- Enfant par déficit en thiamine pyrophosphokinase ¬ *E51.8†, G94.30**
- Éthylmalonique ¬ *G31.81*
- Familiale à corps d'inclusion de neuroserpine ¬ *G31.88*
- Glycinique ¬ *E72.5*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.8*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- Hyperammoniémique par déficit en anhydrase carbonique VA ¬ *E74.8†, G94.30**
- Hypertensive ¬ *I67.4*
- Hypotonie sévère-dysmorphie craniofaciale associé à TBCK ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- Infantile aiguë affectant principalement le lobe frontal] ¬ AIEF [*G40.2*
- Insuffisance hépatique ¬ Syndrome de tubulopathie rénale- *G31.81*
- Liée à STXBP1 avec épilepsie ¬ *G40.3*
- Limbique paranéoplasique ¬ *D48.9†, G13.1**
- Lors de grippe [Influenza], virus de la grippe saisonnière identifié ¬ *J10.8†, G94.31**
- Métabolique-arythmie associé à TANGO2 ¬ Syndrome d' *G31.88*
- Myoclonique précoce
- - Suppression-bursts» ¬ *G40.4*
- - Symptomatique) ¬ *G40.4*
- - ¬ *G40.4*
- Nécrosante aiguë
- - Enfant ¬ *G31.81*
- - Familiale] ¬ ADANE [*G93.4*
- Néonatale sévère avec microcéphalie ¬ *G93.4, Q02*
- Non-progressives ¬ Épilepsie myoclonique des *G40.4*
- Pellagreuse ¬ *E52†, G32.8**
- Porto-cave ¬ *K72.9, K72.79!*
- Postérieure réversible ¬ Syndrome d' *G93.6*
- Post-hypoglycémique ¬ *E16.1†, G94.30**

Encéphalopathie *–suite*
- Post-radiothérapie ¬ *G93.88*
- Post-radique ¬ *G93.88, W91.9!*
- Sans précision ¬ *G93.4*
- Saturnine ¬ *T56.0*
- Sensible
- - Stéroïdes associée thyroïdite auto-immun ¬
- - - *G04.8, E06.3*
- - - SREAT [*G04.8, E06.3*
- - Thiamine ¬ *E51.2, G40.9*
- Septique ¬ *G04.8†, G94.32**
- Sévère-atrophie cérébrale progressive ¬ Syndrome de microcéphalie congénitale- *E72.8*
- Spongieuse subaiguë ¬ *A81.0*
- Spongiforme bovine] ¬ Forme atypique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à ESB [*A81.0*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G94.31**
- Toxique
- - Sans précision ¬ *G92.9*
- - Sous immunothérapie ¬ *G92.0*
- Urémique ¬ *N18.89†, G94.39**
- Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, G94.31**
- Wernicke ¬ *E51.2†, G32.8**
- ¬
- - Démence au cours d' *G93.4†, F02.8**
- - Grippe Influenza
- - - *J11.8†, G94.31**
- - - Virus influenza
- - - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09†, G94.31*, U69.23!*
- - - - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09†, G94.31*, U69.22!*
- - - - Zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - Maladie due au VIH avec *B22†, G94.31**
- - Neuropathie axonale congénitale avec *G60.0, G93.4*
- - Syndrome
- - - Hypotonie musculaire néonatale sévère associé au PURA avec convulsions et *G40.4*
- - - MEGDEL [Syndrome Leigh-like-acidurie 3-méthylglutaconique-surdité- *G31.88*
- - - Post-contusionnel (*F07.2*

Encéphalopathie épileptique
- Associée
- - CDKL5 ¬ *G40.4*
- - KCNQ2 ¬ *G40.4*
- Début précoce
- - Déficience intellectuelle liées à une mutation de GRIN2A ¬ *G40.4*
- - ¬ *G40.4*

Encéphalopathie épileptique *–suite*
- Développemental associée
- - CNTNAP2 ¬ *G40.8*
- - Ostéoporose ¬ *G40.4*
- - SYNGAP1 ¬ *F83, G40.4*
- Dyskinétique
- - Infantile ¬ *G40.3*
- - Liée à FOXG1 ¬ *Q93.5*
- Infantile précoce
- - Cécité corticale-déficience intellectuelle-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d' *G40.4*
- - ¬ *G40.3*
- Néonatale
- - Associée à PNPO ¬ *G40.8*
- - Déficit en glutaminase ¬ *E72.8, G40.4*
- Sévère à début précoce associée à RNF13 ¬ *G40.4*
- ¬ Syndrome néonatal létal de spasticité- *G40.4, R09.2*

Encéphalopathie hépatique
- Degré
- - 1 ¬ *K72.71!*
- - 2 ¬ *K72.72!*
- - 3 ¬ *K72.73!*
- - 4 ¬ *K72.74!*
- - Non précisé ¬ *K72.79!*
- SAI ¬ *K72*
- ¬ *K72.9, K72.79!*

Encéphalopathie progressive
- Début précoce-ataxie spastique-amyotrophie spinale distale ¬ Syndrome d' *G31.88*
- Leucodystrophie par déficit en DECR ¬ *G31.81*
- Neurodégénérescence sévère-lipodystrophie ¬ Syndrome d' *G31.88, E88.1*
- Œdème, hypsarythmie, et atrophie optique] ¬ Syndrome PEHO [*G31.88*
- Précoce avec crises myocloniques migrantes et continues ¬ *G40.4*
- Surdité-hypoplasie du pont-atrophie cérébrale ¬ Syndrome à début précoce d' *G31.88*

Encéphalotrigéminée ¬ Angiomatose *Q85.8*

Enchevêtrement cordon
- Jumeaux dans un sac amniotique unique ¬ *O69.2*
- Sans compression ¬ *O69.8*
- ¬ Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d' *O69.2*

Enchondromatose
v./v.a. Cheiro-spondylo-enchondromatose
- ¬ *Q78.4*

Enclavées
- Position anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ Dents incluses ou *K07.3*
- ¬ Dents *K01.1*

Enclume
- Étrier ¬ Ankylose infectieuse de l' *H74.3*

Enclume *–suite*
- ¬ Agénésie de l' *Q16.3*

Encoprésie
- Fonctionnelle ¬ *F98.1*
- Non organique ¬ *F98.1*
- Psychogène ¬ *F98.1*
- SAI ¬ *R15*

Endartérite
- Déformante ou oblitérante ¬ *I70*
- SAI ¬ *I77.6*
- Sénile ¬ *I70*
- Syphilitique
- - Cerveau ¬ *A52.0†, I68.1**
- - Congénitale ¬ *A50.5†, I79.8**
- - Oblitérante d'un vaisseau cérébral ¬ *A52.0†, I68.1**
- - ¬ *A52.0†, I79.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I79.8**

Endemica ¬ Panneuritis *E51.1†, G63.4**

Endémique
- Balkans ¬ Néphropathie *N15.0*
- Hypothyroïdien ¬ Crétinisme *E00.1*
- Lié carence iode
- - Sans précision ¬ Goitre (*E01.2*
- - ¬ Goitre
- - - Diffus (*E01.0*
- - - Multinodulaire (*E01.1*
- SAI ¬ Goitre *E01.2*
- Tabardillo] ¬ Typhus murin [typhus mexicain, typhus *A75.9*
- Type
- - Mixte ¬ Crétinisme *E00.2*
- - Myxœdémateux ¬ Crétinisme *E00.1*
- - Neurologique ¬ Crétinisme *E00.0*
- ¬
- - Crétinisme *E00.9*
- - Funiculite tuberculeuse *A18.1†, N51.8**
- - Névrite *E51.1†, G63.4**
- - Polynévrite *E51.1†, G63.4**
- - Syphilis *A65*
- - Typhus *A75.0*

Endo(myo)métrite ¬ *N71*

Endobrachyœsophage [œsophage de Barrett] ¬ *K22.7*

Endocarde
- Cours de syphilis ¬ Maladie de l' *A52.0†, I39.8**
- Gonocoques ¬ Maladie de l' *A54.8†, I39.8**
- Méningocoques ¬ Infection de l' *A39.5†, I39.8**
- ¬
- - *C79.84*
- - Gonorrhée de l' *A54.8†, I39.8**
- - Lipoïdose de l' *E75.6*
- - Tuberculose de l' *A18.8†, I39.8**

Endocardique ¬
- Adhérences *I38*

Endocardique ¬ *–suite*
- Fibroélastose *I42.4*
- Malformation des replis *Q21.2*

Endocardite
- Aiguë
- - Maligne ¬ *I33.0*
- - Sans précision ¬ *I33.9*
- - Subaiguë
- - - Ulcéreuse ¬ *I33.0*
- - - ¬ *I33.9*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, I39.8**
- Bactérienne
- - Sub-aiguë ¬ Glomérulonéphrite au cours d' *I33.0†, N08.8**
- - Valve mitrale ¬ *I33.0*
- - ¬ *I33.0*
- Candida ¬ *B37.6†, I39.8**
- Chronique
- - Rhumatismale ¬ *I09.1*
- - SAI ¬ *I38*
- Congénitale ¬ *I42.4*
- Cours
- - Candidose ¬ *B37.6†, I39.8**
- - Fièvre Q ¬ *A78†, I39.8**
- - Lupus érythémateux
- - - Disséminé de l'enfant ¬ *M32.1†, I39.8**
- - - ¬ *M32.1†, I39.8**
- Coxiella burnetii ¬ *A78†, I39.8**
- Entérocoques ¬ *I33.0, B95.2!*
- Éosinophiles ¬ *I42.3*
- Fœtale ¬ *I42.4*
- Gonocoques ¬ *A54.8†, I39.8**
- Infectieuse
- - Aiguë ¬ *I33.0*
- - Subaiguë ¬ *I33.0*
- - ¬ Arthropathie au cours d' *I33.0†, M03.69**
- Lent
- - Subaiguë ¬ *I33.0*
- - ¬ *I33.0*
- Listeria ¬ *A32.8†, I39.8**
- Löffler ¬ *I42.3*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.30†, I39.8**
- Maligne ¬ *I33.0*
- Méningocoques ¬ *A39.5†, I39.8**
- Pariétal fibroplastique Löffler
- - Hyperéosinophilie ¬ *I42.3*
- - ¬ *I42.3*
- Pneumocoques ¬ *I33.0, B95.3!*
- Purulente ¬ *I33.0*
- Rhumatismal
- - Aiguë
- - - Valve aortique
- - - - Maladie de la valvule mitrale ¬ *I01.1*
- - - - ¬ *I01.1*
- - - Valve pulmonaire ¬ *I01.1*

Endocardite *–suite*
- Rhumatismal *–suite*
- - Aiguë *–suite*
- - - - ¬ *I01.1*
- - Subaiguë de la valve pulmonaire ¬ *I01.1*
- - Valvule non précisée ¬ *I09.1*
- Septique ¬ *I33.0*
- Staphylocoque doré ¬ *I33.0, B95.6!*
- Streptocoques ¬ *I33.0, B95.5!*
- Syphilitique
- - Valve aortique ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Valve pulmonaire ¬ *A52.0†, I39.3**
- - ¬ *A52.0†, I39.8**
- Tuberculeuse
- - Valve aortique ¬ *A18.8†, I39.1**
- - Valve mitrale ¬ *A18.8†, I39.0**
- - Valve pulmonaire ¬ *A18.8†, I39.3**
- - Valve tricuspide ¬ *A18.8†, I39.2**
- - ¬ *A18.8†, I39.8**
- Typhoïde ¬ *A01.0†, I39.8**
- Valvule
- - Aortique à streptocoques ¬ *I33.0, B95.5!*
- - Non précisée
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.8**
- - - ¬ *I38*
- Verruqueux
- - Atypique ¬ *M32.1†, I39.8**
- - Löffler ¬ *I42.3*
- - Non rhumatismale ¬ *M32.1†, I39.8**
- Virus Coxsackie ¬ *B33.2†, I39.8**
- ¬
- - Arthrite rhumatismal
- - - Aiguë avec *I01.1*
- - - Subaiguë avec *I01.1*
- - Prophylaxie
- - - *Z29.21*
- - - Antibiotique de l' *Z29.21*
- - Rhumatisme articulaire avec *I01.1*

Endocervical ¬ Polype *N84.1*

Endocervicite avec ou sans érosion ou ectropion ¬ *N72*

Endocol ¬
- Adénocarcinome de l' *C53.0*
- Adénosarcome de l' *C53.0*
- Carcinoma in situ: *D06.0*
- Carcinome à cellules vitreuses de l' *C53.0*
- Carcinome adénoïde
- - Basal de l' *C53.0*
- - Kystique de l' *C53.0*
- Carcinome épidermoïde de l' *C53.0*
- Carcinome neuroendocrine peu différencié de l' *C53.0*
- Carcinosarcome de l' *C53.0*
- Léiomyosarcome de l' *C53.0*
- Rhabdomyosarcome de l' *C53.0*

Endocol ¬ *–suite*
- Sarcome de l' *C53.0*
- Tumeur germinale maligne de l' *C53.0*
- Tumeur maligne: *C53.0*
- Tumeur neuroectodermique primitive de l' *C53.0*

Endocrine
v./v.a. Glande endocrine
- Pancréas
- - Hypersécrétion de glucagon ¬ Hyperplasie des cellules *E16.3*
- - SAI ¬ Hyperplasie des cellules (des): *E16.9*
- Pancréatique] ¬ IMNEPD [Maladie infantile multisystémique neurologique- *Q87.8*
- Polypeptide
- - Intestinal vaso-actif ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- - Pancréatique ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- Releasing factor» de l'hormone de croissance [SRH] [GHRH] ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- Somatostatine ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- ¬
- - Insuffisance pancréatique *K86.88*
- - Tumeur bénigne: Pancréas *D13.7*
- - Tumeur maligne: Pancréas *C25.4*

Endocrinien
- Ésotropie ¬ Maladie de Basedow avec orbitopathie *E05.0†, H06.3**
- Euthyroïdienne ¬ Orbitopathie *E05.0†, H06.2**
- Femme
- - Ovulation ¬ Stérilité d'origine *N97.8*
- - Sans anovulation ¬ Stérilité d'origine *N97.0*
- Hypohémoglobinémie associé à MADD ¬ Syndrome de retard du développement-dysfonctionnement *Q87.8*
- Hypotropie ¬ Maladie de Basedow avec orbitopathie *E05.0†, H06.3**
- Métabolique actes médical
- - Sans précision ¬ Anomalie *E89.9*
- - ¬ Autres anomalies *E89.8*
- Multiple ¬
- - Adénomatose *D44.8*
- - NEM [Néoplasie *D44.8*
- Multiples ¬ Adénomatoses *D44.8*
- Nutritionnel métabolique
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies *O99.2*
- - ¬
- - - Antécédents familiaux d'autres maladies *Z83.4*
- - - Antécédents personnels de maladies *Z86.3*
- - - Arthropathie au cours d'autres maladies *M14.5**
- - - Cataracte au cours d'autres maladies *H28.1**

Endocrinien *–suite*
- Nutritionnel métabolique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Glaucome au cours de maladies *H42.0**
- - - Glomérulopathie au cours de maladies *N08.4**
- Précisés ¬ Autres troubles *E34.8*
- Pseudoglaucome ¬ Orbitopathie *E05.0†, H06.2**
- Rétraction de paupière ¬ Maladie de Basedow avec orbitopathie *E05.0†, H06.3**
- SAI ¬ Trouble: *E34.9*
- Sans précision ¬ Anomalie *E34.9*
- Transitoire du nouveau-né, sans précision ¬ Anomalie *P72.9*
- Transitoires précisées du nouveau-né ¬ Autres anomalies *P72.8*
- ¬
- - Arthrite au cours d'une affection *E34.9†, M14.59**
- - Arthropathie au cours d'une maladie *E34.9†, M14.59**
- - Cataracte au cours d'une maladie *E34.9†, H28.1**
- - Glaucome au cours d'une maladie *E34.9†, H42.0**
- - Hypertension secondaire à des atteintes *I15.2*
- - Maladie de Basedow avec orbitopathie *E05.0†, H06.3**
- - Myopathie
- - - *E34.9†, G73.5**
- - - Cours
- - - - Maladie *E34.9†, G73.5**
- - - - Maladies *G73.5**
- - Neuropathie des nerfs périphériques autonomes au cours d'une maladie *E34.9†, G99.08**
- - Ophtalmopathie *E05.0†, H06.2**
- - Ostéoporose au cours d'une maladie *E34.9†, M82.19**
- - Polyneuropathie au cours d'une maladie *E34.9†, G63.3**
- - Présence d'implants *Z96.4*
- - Psychose
- - - Aiguë au cours d'un trouble *F05.8*
- - - Subaiguë dans au cours d'un trouble *F05.8*
- - Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles *R94.7*
- - Syndrome myasthénique cours
- - - Maladie *E34.9†, G73.0**
- - - Maladies *G73.0**

Endocrino-cérébro-ostéodysplasique ¬ Syndrome *Q87.8*

Endocrinologique
v./v.a. rétino-hépato-endocrinologique

Endocrinopathie auto-immun
- Associé à des infections chroniques ¬ Syndrome d'entéropathie et d' *D82.8*

Endocrinopathie auto-immun *–suite*
- Susceptibilité aux infections chroniques associé à STAT1 ¬ Syndrome d'entéropathie et *D82.8*

Endogène
- Enfant et l'adolescent ¬ Obésité *E66.84*
- Grade
- - I (OMS) ¬ Obésité *E66.80*
- - II (OMS) ¬ Obésité *E66.81*
- - III (OMS) ¬ Obésité *E66.89*
- Indice de masse corporelle IMC
- - 40 et moins de 50 ¬ Obésité *E66.86*
- - 50 et moins de 60 ¬ Obésité *E66.87*
- - 60 et plus ¬ Obésité *E66.88*
- - Compris
- - - 30 et moins de 35 ¬ Obésité *E66.80*
- - - 35 et moins de 40 ¬ Obésité *E66.81*
- Sans
- - Précision ¬ Dermite atopique (*L20.9*
- - Symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F33.2*
- Symptômes psychotiques ¬ Dépression *F33.3*
- ¬
- - Asthme non allergique *J45.19*
- - Bronchopneumonie lipidique *J84.80*
- - Croûte de lait, *L20.8*
- - Dermites atopiques [*L20.8*
- - Hypercholestérolémie avec hyperglycéridémie *E78.2*
- - Hyperglycéridémie *E78.1*
- - Ochronose *E70.2*
- - Pneumonie lipidique *J84.80*
- - Syndrome de Cushing *E24.9*

Endomètre
- Adénomateuse) ¬ Hyperplasie atypique de l' *N85.1*
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de l' *C54.1*
- Glandulo-kystique ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- Kystique ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- Polypoïde ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- SAI ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- ¬
- - Adénocarcinome à cellules claires de l' *C54.1*
- - Carcinofibrome de l ' *C54.1*
- - Carcinoma in situ: *D07.0*
- - Carcinome à cellules transitionnelles de l' *C54.1*
- - Carcinome épidermoïde de l' *C54.1*
- - Carcinome indifférencié de l' *C54.1*
- - Carcinome neuroendocrine mal différencié de l' *C54.1*
- - Carcinome séreux de l ' *C54.1*
- - Épaississement de l' *R93.5*
- - Hyperplasie
- - - Adénomateuse de l' *N85.1*

Endomètre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hyperplasie *–suite*
- - - Glandulaire de l' *N85.0*
- - Léiomyosarcome de l ' *C54.1*
- - Polype de: *N84.0*
- - Tuberculose de l' *A18.1†, N74.1**
- - Tumeur germinale maligne de l ' *C54.1*
- - Tumeur maligne: *C54.1*
- - Tumeur neuroectodermique primitive de l ' *C54.1*
- - Tumeur neuroendocrine bien différenciée de l ' *C54.1*

Endométrioïde
- Femme ¬ Cystadénocarcinome *C56*
- Ovaire ¬
- - Adénocarcinome *C56*
- - Carcinome *C56*
- - Cystadénocarcinome *C56*

Endométriose
- Intestin ¬ *N80.5*
- Ovaire ¬ *N80.1*
- Péritoine pelvien ¬ *N80.3*
- Sans précision ¬ *N80.9*
- Septum recto-vaginal ¬ *N80.4*
- Sur cicatrice ¬ *N80.6*
- Thoracique ¬ *N80.8*
- Trompe de Fallope ¬ *N80.2*
- Utérus ¬ *N80.0*
- Vagin ¬ *N80.4*
- Vessie ¬ *N80.8*
- ¬ Autres *N80.8*

Endométrite
- Blennorragique ¬ *A54.2†, N74.3**
- Chlamydia ¬ *A56.1†, N74.4**
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N74.3**
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N74.1**

Endomyocardique
- Éosinophilique ¬ Maladie *I42.3*
- Tropicale [TEMF] ¬ Fibrose *I42.3*
- ¬
- - Fibroélastose *I42.4*
- - Fibrose *I42.3*

Endophlébite
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- ¬ *I80*

Endophtalmie
- Aiguë ¬ *H44.1*
- Associée à un coussinet absorbant ¬ *H59.8*
- Cours
- - Cysticercose ¬ *B69.1†, H45.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H45.1**
- - Toxocarose ¬ *B83.0†, H45.1**
- Gonorrhéique ¬ *A54.3†, H45.1**

Endophtalmie *–suite*
- Infectieuse ¬ *H44.1*
- Parasitaire SAI ¬ *H44.1*
- Purulente ¬ *H44.0*
- ¬ Autres *H44.1*

Endoprothèse articulaire
- Articulation
- - Cheville ¬ Complication mécanique d'une *T84.06*
- - Coude ¬ Complication mécanique d'une *T84.01*
- - Genou ¬ Complication mécanique d'une *T84.05*
- - Hanche ¬ Complication mécanique d'une *T84.04*
- - Poignet ¬ Complication mécanique d'une *T84.03*
- - Précisées ¬ Complication mécanique d'une *T84.08*
- Articulation de l'épaule ¬ Complication mécanique d'une *T84.00*
- Disque intervertébral ¬ Complication mécanique d'une *T84.07*
- Épaule ¬ Infection consécutive à une *T84.5*
- Mâchoire ¬ Complication mécanique d'une *T84.08*
- Tête radiale ¬ Complication mécanique d'une *T84.02*

Endormissement et du maintien du sommeil ¬ Troubles de l' *G47.0*

Endoscope cours acte visée diagnostique thérapeutique ¬ Perforation accidentelle
- Nerf par *T81.2*
- Organe par *T81.2*
- Vaisseau sanguin par *T81.2*

Endoscopie de l'appareil digestif ¬ Sténose consécutive à une intervention par *K91.84*

Endostéale hypoplasie cérébelleuse ¬ Syndrome de sclérose *Q87.8*

Endothélial
- Congénitale héréditaire type
- - 1 ¬ Dystrophie *H18.5*
- - 2 ¬ Dystrophie *H18.5*
- Hypoplasie de l'iris-cataracte congénitale-amincissement stromal] ¬ Syndrome EDICT [dystrophie *Q13.8*
- Liée à l'X ¬ Dystrophie cornéenne *H18.5*
- ¬ Déficit en facteur VIII avec trouble fonctionnel *D68.09*

Endothéliomateux ¬ Méningiome *D32.9*

Endothéliome diffus des os [sarcome d'Ewing] ¬ *C41.9*

Endothéliose
- Infectieuse hémorragique ¬ *D69.88*
- ¬ *D69.88*

Endothélite
- Cornée due à Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Cornéenne ¬ *H16.8*

Endotoxique
- Hypovolémique) pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Choc (*T81.1*
- ¬ Choc *R57.8*

ENDOVESL [Syndrome dorsoventral lié à EN1, de type extrémités uniquement] ¬ *Q74.8*

ENDOVESLB [Syndrome dorsoventral lié à EN1, de type extrémités et encéphale] ¬ Syndrome *Q04.3, Q74.8*

Énergétique
- Grave
- - E43
- - - Forme intermédiaire ¬ Malnutrition protéino- *E42*
- - - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition protéino- *E42*
- - Sans précision ¬ Malnutrition protéino- *E43*
- Légère ¬ Malnutrition protéino- *E44.1*
- Modérée ¬ Malnutrition protéino- *E44.0*
- SAI ¬ Déséquilibre protéino- *E46*
- Sans précision ¬ Malnutrition protéino- *E46*
- ¬
- - Retard de développement après malnutrition protéino- *E45*
- - Séquelles de malnutrition protéino- *E64.0*

Énergie ¬ Manque d' *R53.9*

Enfance
- Adolescence
- - SAI ¬ Réaction hyperkinétique de l' *F90.9*
- - Sans précision ¬ Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l' *F98.9*
- - ¬
- - - Evitement de l' *F93.2*
- - - Trouble de l'attention sans hyperactivité survenant dans l' *F98.80*
- - - Troubles
- - - - Dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l' *F44.82*
- - - - Précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l' *F98.88*
- Associée
- - BICD2 ¬ Amyotrophie spinale proximale autosomique dominante de l' *G12.1*
- - DYNC1H1 ¬ Amyotrophie spinale proximale autosomique dominante de l' *G12.1*
- Crises focales migratoires ¬ Épilepsie de la petite *G40.4*
- Déficit en ARGHGEF1 ¬ Déficit immunitaire commun variable de l' *D83.0*
- Désinhibition ¬ Trouble de l'attachement de l' *F94.2*
- Faiblesse musculaire des ceintures-dystrophie musculaire ¬ Syndrome de contracture progressive de l' *G71.08*
- Familiale) ¬ hématurie: bénigne (de l' *N02*

Enfance *–suite*
- Malheureuse ¬ Difficultés liées à une *Z61*
- Pointes centro-temporales à l'EEG ¬ Épilepsie bénigne de l' *G40.08*
- Sans précision ¬ Trouble
- - Émotionnel de l' *F93.9*
- - Fonctionnement social de l' *F94.9*
- Syndrome extrapyramidal ¬ Syndrome de régression motrice et cognitive de l' *G31.88*
- ¬
- - Accident vasculaire cérébral ischémique
- - - Embolie d'artères cérébrales durant l' *I63.4*
- - - Thrombose d'une artère intracrânienne durant l' *I63.3*
- - Amyotrophie spinale proximale autosomique dominante de l' *G12.1*
- - Angoisse de séparation de l' *F93.0*
- - Anxiété sociale de l' *F93.2*
- - Autisme de la petite *F84.0*
- - Changements dans le tissu des relations familiales pendant l' *Z61*
- - Départ du foyer pendant l' *Z61*
- - Épilepsie
- - - Absences de l' *G40.3*
- - - Myoclonique bénigne
- - - - *G40.3*
- - - - *G40.3*
- - - Syndrome myoclonique sévère de l' *G40.4*
- - Erythroblastopénie transitoire de l' *D60.1*
- - Événements ayant entraîné la perte de l'estime de soi pendant l' *Z61*
- - Examen à la période de croissance rapide de l' *Z00.2*
- - Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l' *Z13.4*
- - Expérience personnelle terrifiante pendant l' *Z61*
- - Hémiplégie alternante
- - - *Q07.8*
- - - Nocturne bénigne de l' *G81.9*
- - Hypogammaglobulinémie transitoire de l' *D80.7*
- - Infarctus musculaire ischémique d'une artère intracrânienne durant l' *I63.5*
- - Maladie chronique bulleuse de l' *L12.2*
- - Mérycisme de l' *F98.2*
- - Neurodégénérescence progressive associée à CLCN6 avec neuropathie périphérique débutant durant l' *G31.88*
- - Perte de relation affective pendant l' *Z61*
- - Pneumopathie chronique de l' *J84.00*
- - Psychose de la petite *F84.0*
- - Spasticité avec hyperglycinémie survenant durant l' *E72.5, G11.8*
- - Syndrome épileptique de l' *G40.8*
- - Trouble
- - - Anxieux phobique de l' *F93.1*
- - - Désintégratif de l' *F84.3*

Enfance *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Trouble *–suite*
- - - Identité sexuelle de l' *F64.2*
- - - Réactionnel de l'attachement de l' *F94.1*
- - - Schizoïde de l' *F84.5*
- - Troubles
- - - Émotionnels de l' *F93.8*
- - - Fonctionnement social de l' *F94.8*

Enfant
- 2 ans, NCA ¬ Syphilis de l' *A50.2*
- Adolescent
- - 3 18 ¬ Obésité
- - - Déficit
- - - - CEP19 chez l' *E66.84*
- - - - Congénital en leptine chez l' *E66.84*
- - - - Prohormone convertase I chez l' *E66.84*
- - - - Pro-opiomélanocortine chez l' *E66.84*
- - - - Récepteur de la mélanocortine 4 chez l' *E66.84*
- - - - SIM1 chez l' *E66.84*
- - - Due à une résistance congénitale à la leptine chez l' *E66.84*
- - - Extrême
- - - - Déficit
- - - - - CEP19 chez l' *E66.85*
- - - - - Congénital en leptine chez l' *E66.85*
- - - - - Prohormone convertase 1 chez l' *E66.85*
- - - - - Pro-opiomélanocortine chez l' *E66.85*
- - - - - Récepteur de la mélanocortine 4 chez l' *E66.85*
- - - - - SIM1 chez l' *E66.85*
- - - - Due à une résistance congénitale à la leptine chez l' *E66.85*
- - - - Mutations du gène récepteur à la leptine chez l' *E66.85*
- - - Mutations du gène récepteur de la leptine chez l' *E66.84*
- - Adulte [SDRA] ¬ Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l' *J80.0*
- - Temporellement associé au COVID-19 ¬ Choc cytokinique chez l' *U10.90*
- - ¬ Obésité
- - - *E66.94*
- - - Due à un excès calorique chez l' *E66.04*
- - - Endogène chez l' *E66.84*
- - - Extrême
- - - - Due à un excès calorique chez l' *E66.05*
- - - - Hypoventilation alvéolaire chez l' *E66.25*
- - - Hypoventilation alvéolaire chez l' *E66.24*
- - - Médicamenteux
- - - - *E66.14*
- - - - Extrême chez l' *E66.15*
- Associée à STING [Stimulateur des Gènes de l'Interféron] ¬ Vasculopathie de l' *M35.8*
- Atteinte pulmonaire ¬ Lupus érythémateux disséminé de l' *M32.1†, J99.1**

Enfant *–suite*
- Battu SAI ¬ Bébé ou *T74.1*
- Bonne santé
- - Selon circonstances
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - - Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - - Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - ¬ Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et *Z76.2*
- Cécité-ataxie-spasticité ¬ Syndrome de neurodégénérescence progressive de l' *G31.88*
- Commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois ¬ arthrites chez l' *M08*
- Crises partielles complexes ¬ Épilepsie bénigne partielle de l' *G40.2*
- Déficit en thiamine pyrophosphokinase ¬ Encéphalopathie de l' *E51.8†, G94.30**
- Dont la mère a un diabète de la grossesse ¬ Syndrome de l' *P70.0*
- Exceptionnellement gros ¬ *P08.0*
- Forme
- - Familiale ¬ Nécrose striatale bilatérale de l' *G23.2*
- - Hépatique et myopathique ¬ Glycogénose type 4 de l' *E74.0*
- - Neuromusculaire ¬ Glycogénose type 4 de l' *E74.0*
- - Sporadique ¬ Nécrose striatale bilatérale de l' *G23.2*
- Gros pour l'âge gestationnel ¬ Autres *P08.1*
- Indiens d'Amérique du Nord ¬ Cirrhose héréditaire des *K74.6*
- Maladie du foie ¬ Dégénérescence neuronale progressive de l' *G31.88*
- Mère
- - Diabétique ¬ Syndrome de l' *P70.1*
- - Toxicomane ¬ Syndrome de sevrage chez un *P96.1*
- Mort-né ¬ Naissance unique, *Z37.1!*
- Né
- - Terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel ¬ *P08.2*
- - Vivant SAI ¬ *Z38.2*
- Nés
- - Avant terme ¬ Autres *P07.3*
- - Hôpital ¬ Autres naissances multiples, *Z38.6*
- - Hors d'un hôpital ¬ Autres naissances multiples, *Z38.7*
- - Vivants ¬ Autres naissances multiples, certains *Z37.6!*

Enfant *–suite*
- Rémittente évolution poussées
- - Exacerbation aiguë ¬ Sclérose en plaques de l' *G35.11*
- - ¬ Sclérose en plaques de l' *G35.10*
- SAI ¬
- - Effets de sévices infligés à un *T74.9*
- - Trouble
- - - Comportement chez l' *F91.9*
- - - Conduites chez l' *F91.9*
- Scolarisés ¬ Examen général en série de: *Z10*
- Temporellement associé au COVID-19 ¬ Syndrome Kawasaki-like de l' *U10.90*
- Transformé en bouc émissaire ¬ Hostilité envers un *Z62*
- Trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: *Z76.2*
- Trouvés ¬ Surveillance médicale et soins médicaux des *Z76.1*
- Type
- - DYT29 ¬ Dystonie autosomique récessive de l' *G24.1*
- - II ¬ Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- Unique
- - Lieu de naissance non précisé ¬ *Z38.2*
- - Né
- - - Hôpital ¬ *Z38.0*
- - - Hors d'un hôpital ¬ *Z38.1*
- - ¬ Naissance spontanée par voie vaginale d'un *O80*
- Vivant ¬ Naissance unique, *Z37.0!*
- ¬
- - Anorexie mentale de l' *F50.08*
- - ARDS Acute respiratory distress syndrome
- - - *J80.09*
- - - Léger de l' *J80.04*
- - - Modéré de l' *J80.05*
- - - Sévère de l' *J80.06*
- - Cystadénome ovarien de l' *D27*
- - Débilité motrice de l' *F82*
- - Dégénérescence congénitale du cerveau chez l' *Q04.9*
- - Difficulté liées possible sévices
- - - Physiques infligés à un *Z61*
- - - Sexuels infligés à un *Z61*
- - Encéphalopathie
- - - Cours de lupus érythémateux disséminé de l' *M32.1†, G05.8**
- - - Nécrosante aiguë de l' *G31.81*
- - Endocardite au cours de lupus érythémateux disséminé de l' *M32.1†, I39.8**
- - Examen de routine de l' *Z00.1*
- - Glomérulonéphrite au cours de lupus érythémateux disséminé de l' *M32.1†, N08.5**

Enfant *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hémorragie après expulsion du fœtus ou accouchement de l' *O72*
- - Hospitalisme chez l' *F43.2*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique persistante de l' *E16.1*
- - Lupus érythémateux disséminé médicamenteux de l' *M32.0*
- - Maladie
- - - Behçet-like héréditaire de l' *M35.8*
- - - Lymphoprolifération systémique à cellules T positive au virus Epstein-Barr chez l' *D82.3*
- - - Membranes hyalines de l' *J80.09*
- - Myopathie
- - - Autosomique récessive avec ophtalmoplégie externe de l' *G71.2, H49.8*
- - - Némaline de l' *G71.2*
- - Négligence affective ou autre forme de négligence d'un *Z62*
- - Neuropathie: hypertrophique de l' *G60.0*
- - Paralysie bulbaire progressive de l' *G12.1*
- - Péricardite au cours de lupus érythémateux disséminé de l' *M32.1†, I32.8**
- - Pica du nourrisson et de l' *F98.3*
- - Procédure de garde ou d'entretien d' *Z65*
- - Rhinite syphilitique chez le jeune *A50.0†, J99.8**
- - Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l' *Z00.1*
- - Syndrome
- - - Dégénérescence des ganglions de la base de l' *G23.8*
- - - Détresse respiratoire aiguë
- - - - *J80.09*
- - - - Léger de l' *J80.04*
- - - - Modéré de l' *J80.05*
- - - - Sévère de l' *J80.06*
- - Taches de Bitot chez le jeune *E50.1*
- - Torticolis paroxystique bénin de l' *G24.3*
- - Trouble de l'alimentation de l' *F98.2*
- - Tumeur cardiaque primaire
- - - *C38.0*
- - - *D15.1*

Enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né ¬ Syndrome d' *P91.80*

Enfoncement des os malaires ¬ Fracture avec *S02.42*

Engagée ¬ Epaule *O66.0*

Engelures ¬ *T69.1*

Engman
v./v.a. Zinsser-Engman-Cole

Engorgement du sein chez le nouveau-né ¬ *P83.4*

Engrais ¬ Intoxication aux *T65.8*

Eng-Strom ¬ Syndrome d' *Q79.8*

Enkystée ¬ Hydrocèle *N43.0*

Enlèvement
- Appareils externes de fixation ou de traction ¬ Changement, vérification ou *Z47.8*
- Broche ¬ *Z47.0*
- Cathéter ¬ *Z43*
- Clou ¬ *Z47.0*
- Dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] ¬ Vérification, réinsertion ou *Z30.5*
- Plaque
- - Prothèse interne de fixation ¬ Soins de contrôle impliquant l' *Z47.0*
- - ¬ *Z47.0*
- Plâtre ¬ Changement, vérification ou *Z47.8*
- Tige ¬ *Z47.0*
- Vis ¬ *Z47.0*

Ennuis SAI ¬ *R45.2*

Énolase
v./v.a. bêta-énolase

Enophtalmie ¬ *H05.4*

Énoyl-CoA hydratase 1 à chaîne courte ¬ Déficit mitochondrial en *G31.81*

Enquêtes de population ¬ Examen sanitaire au cours d' *Z00.8*

Enrouement ¬ *R49.0*

Enseignants et les autres élèves ¬ Difficultés avec les *Z55*

Enseignement inadéquat ¬ *Z55*

Entamoeba histolytica ¬
- Abcès
- - Cerveau à *A06.6†, G07**
- - Foie à *A06.4†, K77.0**
- - Poumon à *A06.5†, J99.8**
- Amibiase
- - *A06.9*
- - Aiguë à *A06.0*
- - Intestinale chronique à *A06.1*
- Colite amibienne non dysentérique à *A06.2*
- Hépatite à *A06.4†, K77.0**
- Infection
- - *A06.9*
- - Cutanée à *A06.7*

Entérique
- Thoraco-abdominale ¬ Duplication *Q43.49*
- ¬
- - Anendocrinose *K90.8*
- - Fièvre *A01.0*

Entérite
- Adénovirus ¬ *A08.2*
- Aiguë
- - Exsiccose ¬ *A09.9, E86*
- - Nécrosante ¬ *A05.2*
- Amibien
- - Aiguë ¬ *A06.0*
- - Chronique ¬ *A06.1*
- - Non dysentérique ¬ *A06.2*
- - ¬ *A06.0*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, K93.8**

Entérite *–suite*
- Bactérienne SAI ¬ *A04.9*
- Campylobacter ¬ *A04.5*
- Cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- Cryptosporidium ¬ *A07.2*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Due à Candida ¬ *B37.88*
- Entéro-aggrégative à Escherichia coli ¬ *A04.4*
- Entéro-hémorragique à Escherichia coli ¬ *A04.3*
- Entéro-invasive à Escherichia coli ¬ *A04.2*
- Entérotoxigène à Escherichia coli ¬ *A04.1*
- Escherichia coli ¬ *A04.4*
- Granulomateuse ¬ *K50*
- Hémorragique ¬ Infectieuse ou septique: *A09.0*
- Infectieuse
- - Aerobacter aerogenes ¬ *A04.8, B96.2!*
- - Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- - Clostridium perfringens ¬ *A04.8, B96.7!*
- - Enterobacter aerogenes ¬ *A04.8, B96.2!*
- - ¬ Arthropathie lors d' *A09.0*
- Ischémique
- - Chronique ¬ *K55.1*
- - SAI ¬ *K55.9*
- Microsporidiose ¬ *A07.8*
- Nécrosante du nouveau-né ¬ *P77*
- Norovirus ¬ *A08.1*
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*
- Probablement d'origine infectieuse, avec exsiccose ¬ *A09.0, E86*
- Régionale
- - Côlon ¬ Maladie de Crohn [*K50.1*
- - Duodénale ¬ Maladie de Crohn [*K50.0*
- - Gros intestin ¬ Maladie de Crohn [*K50.1*
- - Iléale ¬ Maladie de Crohn [*K50.0*
- - Jéjunale ¬ Maladie de Crohn [*K50.0*
- - Rectum ¬ Maladie de Crohn [*K50.1*
- - SAI ¬ *K50.9*
- - ¬
- - - Arthrite juvénile au cours d' *K50.9†, M09.19**
- - - Arthropathie au cours d' *K50.9†, M07.49**
- - - Maladie de Crohn [*K50*
- Rotavirus ¬ *A08.0*
- SAI ¬ Infectieuse ou septique: *A09.0*
- Salmonella ¬ *A02.0*
- Shigellose ¬ *A03.9*
- Staphylocoques ¬ *A04.8, B95.8!*
- Toxique à Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Virale ¬ *A08.4*
- Virales ¬ Autres *A08.3*
- Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*

Entérite *–suite*
- Yersinia enterocolitica ¬
- - *A04.6*
- - Arthrite post-infectieuse au cours d'une *A04.6†, M03.29**
- - Arthropathie post-infectieuse au cours d'une *A04.6†, M03.29**
- - ¬
- - - Arthrite au cours de l' *A09.9†, M03.29**
- - Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09, U69.23!*
- - - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09, U69.22!*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une *J09, U69.24!*

Entéro-aggrégative à Escherichia coli ¬ Entérite *A04.4*

Enterobacter
- Aerogenes ¬ Entérite infectieuse à *A04.8, B96.2!*
- Cloacae multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Genre *U81.04!*
- - 3MRGN ¬ Genre *U81.24!*
- - 4MRGN ¬ Genre *U81.44!*
- - ¬
- - Bactériémie à *A49.82*
- - Sepsis du nouveau-né à *P36.8*

Entérobactéries du prématuré ¬ Sepsis à *P36.8*

Entérobiase ¬ *B80*

Entérocèle
- Vaginale ¬ *N81.5*
- ¬ *K46*

Enterococcus faecalis
- Résistance à la vancomycine ¬ Infection invasive à *A49.13, U80.20!*
- Résistant
- - Glycopeptides
- - - Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ *U80.20!*
- - - Oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ *U80.20!*
- - - ¬ *U80.20!*
- - Oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ *U80.21!*

Enterococcus faecium
- Résistance à la vancomycine ¬ Infection invasive à *A49.13, U80.30!*
- Résistant
- - Glycopeptides
- - - Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ *U80.30!*
- - - Oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ *U80.30!*
- - - ¬ *U80.30!*

Enterococcus faecium *–suite*
- Résistant *–suite*
- - Oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ *U80.31!*

Entérocolite
- Clostridium difficile
- - Mégacôlon
- - - Complications organiques ¬ *A04.73*
- - - Sans complications organiques ¬ *A04.72*
- - Sans mégacôlon
- - - Complications au niveau des organes ¬ *A04.71*
- - - Sans complications au niveau des organes ¬ *A04.70*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Hypersensibilité alimentaire ¬ *K52.2*
- Induite par les protéines alimentaires] ¬ SEIPA [Syndrome d' *K52.2*
- Infantile ¬ Syndrome auto-inflammatoire-fièvre périodique- *M35.8*
- Ischémique
- - Chronique ¬ *K55.1*
- - SAI ¬ *K55.9*
- Nécrosante du nouveau-né ¬ *P77*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**

Enterocolitica ¬
- Arthrite post-infectieuse au cours d'une entérite à Yersinia *A04.6†, M03.29**
- Arthropathie post-infectieuse au cours d'une entérite à Yersinia *A04.6†, M03.29**
- Entérite à Yersinia *A04.6*

Entérocoques
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques de groupe D et *B95.2!*
- ¬
- - Bactériémie à *A49.13*
- - Endocardite à *I33.0, B95.2!*
- - Infection
- - - *A49.13*
- - - Voies urinaires à *N39.0, B95.2!*
- - Septicémie à streptocoques, groupe D, et *A40.2*

Entérocyte ¬ Déficit congénital en héparane sulfate de l' *K63.8*

Entérogène [méthémoglobinémie acquise] ¬ Cyanose *D74.8*

Entéro-hémorragique à Escherichia coli ¬ Entérite *A04.3*

Entéro-invasive Escherichia coli ¬
- Entérite *A04.2*
- Infection *A04.2*

Entérolithe ¬ *K56.4*

Entéromyiase ¬ *B87.8†, K93.8**

Enteropathica ¬ Acrodermatitis *E83.2*

Entéropathie
- Auto-immun

Entéropathie *–suite*
- Auto-immun *–suite*
- - Primitive ¬ *K52.8*
- - Type
- - - 1 ¬ *E31.0*
- - - 3 ¬ *K52.8*
- Cellules NK ¬ *K52.8*
- Congénitale
- - Due à un déficit de l'entéropeptidase ¬ *K90.8*
- - Touffes syndromique ¬ *K90.8*
- Endocrinopathie auto-immun
- - Associé à des infections chroniques ¬ Syndrome d' *D82.8*
- - Susceptibilité aux infections chroniques associé à STAT1 ¬ Syndrome d' *D82.8*
- Exsudative ¬ Diarrhée chronique congénitale avec *P78.3*
- Lié à l'X ¬ Syndrome de dérèglement immunitaire-polyendocrinopathie- *E31.0*
- Perte protéine ¬
- - *K90.4*
- - Syndrome CHAPLE [hyperactivation du complément-thrombose- *D84.1*
- Sensible au gluten ¬ *K90.0*
- ¬
- - Lymphome à cellules T associé à des *C86.2*
- - Syndrome MIRAGE [Syndrome de myélodysplasie-infections-retard de croissance-hypoplasie surrénalienne-anomalies génitales- *Q87.8*

Entéropathique ¬
- Acrodermatite *E83.2*
- Arthrites *M07.6**

Entéropathogène Escherichia coli ¬
- Diarrhée *A04.0*
- Infection *A04.0*

Entéropeptidase ¬ Entéropathie congénitale due à un déficit de l' *K90.8*

Entéroptose ¬ *K63.4*

Entérosténose ¬ *K56.6*

Entérostomie ¬
- Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une *K91.4*
- Sténose de la stomie consécutive à une *K91.4*

Entérotoxigène Escherichia coli ¬
- Entérite *A04.1*
- Infection *A04.1*

Entérovirale, siège non précisé ¬ Infection *B34.1*

Entérovirus
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.1!*
- Exanthème de Boston] ¬ Fièvre exanthémateuse à *A88.0*
- Système nerveux central NCA ¬ Infection à *A88.8*
- Type 70 ¬ Conjonctivite

Entérovirus *–suite*
- Type 70 ¬ Conjonctivite *–suite*
- - *B30.3†, H13.1**
- - Hémorragique à *B30.3†, H13.1**
- - ¬
- - Encéphalite à *A85.0†, G05.1**
- - Encéphalomyélite à *A85.0†, G05.1**
- - Fièvre avec exanthème à *A88.0*
- - Infection congénitale à *P35.8*
- - Méningite à *A87.0†, G02.0**
- - Pharyngite
- - - Lymphonodulaire à *B08.8*
- - - Vésiculaire due à un *B08.5*
- - Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un *B08.4*

Enthésite spinale ¬ *M46.09*

Enthésopathie
- Articulation de la cheville ¬ Arthrite juvénile idiopathique associée aux *M08.87*
- Avant-bras ¬ Arthrite juvénile idiopathique associée aux *M08.83*
- Bras ¬ Arthrite juvénile idiopathique associée aux *M08.82*
- Colonne vertébrale ¬ Arthrite juvénile idiopathique associée aux *M08.88*
- Cuisse ¬ Arthrite juvénile idiopathique associée aux *M08.85*
- Jambe ¬ Arthrite juvénile idiopathique associée aux *M08.86*
- Main ¬ Arthrite juvénile idiopathique associée aux *M08.84*
- Membre inférieur
- - Sans précision ¬ *M76.9*
- - Sauf le pied ¬ Autres *M76.8*
- Non classées ailleurs ¬ Autres *M77.8*
- Pied ¬
- - *M77.5*
- - Arthrite juvénile idiopathique associée aux *M08.87*
- Région pelvienne ¬ Arthrite juvénile idiopathique associée aux *M08.85*
- Région scapulaire ¬ Arthrite juvénile idiopathique associée aux *M08.81*
- Sans précision ¬ *M77.9*
- Sièges multiples ¬ Arthrite juvénile idiopathique associée aux *M08.80*
- Spinale ¬ *M46.0*
- ¬
- - Arthrite associée aux *M08.89*
- - Arthrite juvénile idiopathique associée aux *M08.89*

Entomophthora ¬ Infection à *B46.8*

Entomophthorose ¬ *B46.8*

Entonnoir
- Cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un *O34.30*
- Congénital ¬ Thorax en *Q67.6*

Entorse
- Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- Déchirure ¬ *S46*
- Foulure
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ *S43.5*
- - - Ligament
- - - - Non précisés membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, *T13.2*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, *T11.2*
- - - - Parties non précisées
- - - - - Cou ¬ *S13.6*
- - - - - Tête ¬ *S03.5*
- - - Non précisées de la main ¬ *S63.7*
- - - Sterno-claviculaire ¬ *S43.6*
- - Articulation de l'épaule ¬ *S43.4*
- - Articulation sacro-iliaque ¬ *S33.6*
- - Associations de parties du corps ¬ Luxations, *T03.8*
- - Ceinture scapulaire SAI ¬ *S43.7*
- - Cheville
- - - Ligament
- - - - Calcanéopéronier ¬ *S93.42*
- - - - Deltoïde ¬ *S93.41*
- - - - Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ *S93.43*
- - - Partie non précisée ¬ *S93.40*
- - - Parties ¬ *S93.48*
- - Côtes et du sternum ¬ *S23.4*
- - Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, *T03.0*
- - Coude
- - - Humérocubitale (articulation) ¬ *S53.44*
- - - Huméroradiale (articulation) ¬ *S53.43*
- - - Ligament collatéral
- - - - Cubital ¬ *S53.42*
- - - - Radial ¬ *S53.41*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S53.40*
- - - - ¬ *S53.48*
- - Déchirure
- - - Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ *S33.50*
- - - ¬
- - - - *S16*
- - - - *S56*
- - - - *S66*
- - - - *S76*
- - - - *S86*
- - - - *S96*
- - Hanche
- - - Ligament
- - - - Iliofémoral ¬ *S73.11*
- - - - Ischiocapsulaire ¬ *S73.12*
- - - Partie

Entorse *–suite*
- Foulure *–suite*
- - Hanche *–suite*
- - - Partie *–suite*
- - - - Non précisée ¬ *S73.10*
- - - - ¬ *S73.18*
- - Ligament croisé genou antérieur postérieur
- - - Déchirure ligament croisé
- - - - Antérieur ¬ *S83.53*
- - - - Postérieur ¬ *S83.54*
- - - Distorsion ligament croisé
- - - - Antérieur ¬ *S83.51*
- - - - Postérieur ¬ *S83.52*
- - - Ligament croisé non précisé ¬ *S83.50*
- - Ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure ligament latéral
- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ *S83.43*
- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ *S83.44*
- - - Distorsion ligament latéral
- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ *S83.41*
- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ *S83.42*
- - - Ligament latéral non précisé ¬ *S83.40*
- - Mâchoire ¬ *S03.4*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles de luxation, *T93.3*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d'une luxation, *T92.3*
- - Multiples, sans précision ¬ Luxations, *T03.9*
- - Muscle(s) SAI ¬ *T14.6*
- - Orteil(s) ¬ *S93.5*
- - Partie du corps non précisée ¬ Luxation, *T14.3*
- - Parties non précisées
- - - Ceinture scapulaire ¬ *S43.7*
- - - Genou ¬ *S83.6*
- - - Pied ¬ *S93.6*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ *S33.7*
- - - Thorax ¬ *S23.5*
- - Plusieurs parties membre s
- - - Inférieur(s) ¬ Luxations, *T03.3*
- - - Supérieur s
- - - - Membre(s) inférieur(s) ¬ Luxations, *T03.4*
- - - - ¬ Luxations, *T03.2*
- - Poignet
- - - Articulation
- - - - Carpienne ¬ *S63.51*
- - - - Carpo-métacarpienne ¬ *S63.53*
- - - - Ligament) radiocarpien ¬ *S63.52*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S63.50*
- - - - ¬ *S63.58*
- - Rachis
- - - Cervical ¬ *S13.4*
- - - Dorsal ¬ *S23.3*
- - Région thyroïdienne ¬ *S13.5*

Entorse *–suite*
- Foulure *–suite*
- - Tête avec luxations, entorses et foulures du cou ¬ Luxations, *T03.0*
- - Thorax et de la région lombosacrée ou du thorax et du bassin ¬ Luxations, *T03.1*
- Foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc ¬ Luxation, *T09.2*
- Foulure de doigt s
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ *S63.62*
- - - Métacarpo-phalangienne ¬ *S63.61*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ *S63.60*
- - - ¬ *S63.68*
- Jonction lombosacrée et de ses ligaments ¬ *S33.51*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*

Entourage immédiat, y compris la situation familiale ¬ Autres difficultés liées à l' *Z63*

Entraînant
- Dépendance
- - Analgésiques ¬ Usage nocif de substances n' *F55.2*
- - Antiacides ¬ Usage nocif de substances n' *F55.3*
- - Antidépresseurs ¬ Usage nocif de substances n' *F55.0*
- - Laxatifs ¬ Usage nocif de substances n' *F55.1*
- - Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage nocif de substances n' *F55.6*
- - Stéroïdes et hormones ¬ Usage nocif de substances n' *F55.5*
- - Substance
- - - Non précisée ¬ Usage nocif de substances n' *F55.9*
- - - ¬ Usage nocif de substances n' *F55.8*
- - Vitamines ¬ Usage nocif de substances n' *F55.4*
- Disproportion
- - SAI ¬ Malformation du bassin *O33.0*
- - ¬
- - - Ascite du fœtus *O33.7*
- - - Bassin rétréci SAI *O33.1*
- - - Hydropisie du fœtus *O33.7*
- - - Jumeaux soudés *O33.7*
- - - Méningomyélocèle du fœtus *O33.7*
- - - Rétrécissement
- - - - Cavité médiane (bassin) *O33.3*
- - - - Détroit
- - - - - Inférieur (bassin) *O33.3*
- - - - - Supérieur (du bassin) *O33.2*
- - - Tératome sacro-coccygien du fœtus *O33.7*
- - - Tumeur du fœtus *O33.7*
- Infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), *I63*
- Infarctus du myocarde ¬

Entraînant *–suite*
- Infarctus du myocarde ¬ *–suite*
- - Embolie coronaire n' *I24.0*
- - Occlusion
- - - Artère coronaires n' *I24.0*
- - - Veines coronaires n' *I24.0*
- - Thrombose cardiaque n' *I24.0*

Entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance ¬ Événements ayant *Z61*

Entraîner une dépendance ¬ Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d' *R78.4*

Entrant pas dans la catégorie A ou C ¬ Maladie symptomatique due au VIH, n' *U60.2!*

Entrecroisée ¬ Dégénérescence rétinienne: *H35.4*

Entretien
- Contraception ¬ Examen de routine pour *Z30.4*
- Enfants ¬ Procédure de garde ou d' *Z65*
- Pompe
- - Médicaments implantée ¬ *Z45.1*
- - Perfusion ¬ Ajustement et *Z45.1*
- Prothèse
- - Auditive implantée ¬ Ajustement et *Z45.3*
- - Interne non précisée ¬ Ajustement et *Z45.9*
- SAI ¬ Chimiothérapie d' *Z51.2*

Entropion
- Congénital ¬ *Q10.2*
- ¬ *H02.0*

Enucléation traumatique ¬ *S05.7*

Énurésie
- Diurne ¬ *F98.01*
- Fonctionnelle ¬ *F98.0*
- Nocturne
- - Ainsi que diurne ¬ *F98.02*
- - ¬ *F98.00*
- Non organique, autres et non précisées ¬ *F98.08*
- Primaire) (secondaire) d'origine non organique ¬ *F98.0*
- Psychogène ¬ *F98.0*
- SAI ¬ *R32*

Envahissant développement
- Sans précision ¬ Trouble *F84.9*
- ¬ Autres troubles *F84.8*

Envahissement
- Intraventriculaire
- - Degré
- - - 2, du nouveau-né ¬ Hémorragie sous-épendymaire avec *P52.1*
- - - 3, du nouveau-né ¬ Hémorragie sous-épendymaire avec *P52.2*
- - ¬ Hémorragie sous-épendymaire (sans *P52.0*
- Moelle osseuse ¬ Tumeur maligne avec *C79.5*

Envenimation suite
- Morsure serpent
- - Marin ¬ *T63.0*
- - ¬ *T63.0*
- Piqûre de scorpion ¬ *T63.2*

Envie
- SAI ¬ *Q82.5*
- Vomir
- - Cours de chimiothérapie ¬ *R11, Y57.98!*
- - Sous radiothérapie ¬ *R11, Y57.98!*

Environnement
- Physique ¬ Difficultés liées à l' *Z58*
- Social ¬ Difficultés liées à l' *Z60*
- ¬
- - Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l' *P04.6*
- - Hyperthermie du nouveau-né due à l' *P81.0*

Enzalutamide ¬ Toxicité de l' *T38.6*

Enzymatique
- Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit *D55.1*
- Sans précision ¬
- - Anémie due à des anomalies *D55.9*
- - Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit *E25.09*
- Troubles héréditaires ¬ Arthropathie goutteuse due à un déficit *M14.0**
- Voie de l'hexose monophosphate [HMP] NCA ¬ Anémie due à déficit *D55.1*
- ¬
- - Anémies dues à des anomalies *D55.8*
- - Anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit *E25.08*
- - Déficit *E88.08*

Enzyme
- 1 à l'X, syndrome auto-inflammatoire et somatique] ¬ Syndrome VEXAS [Vacuole, mutation de l' *M35.8*
- Bifonctionnelle ¬ Déficit en *E71.3*
- Branchante
- - Forme
- - - Hépatique non progressive ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - - Neuromusculaire périnatal fatale ¬
- - - - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - - - GSD par déficit en *E74.0*
- - ¬ GSD par déficit en *E74.0*
- Branchement ¬ Déficit en *E74.0*
- Circulants NCA ¬ Déficit en *E88.08*
- Conversion ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l' *T46.4*
- Débranchante ¬ GSD par déficit en *E74.0*
- Débranchement ¬ Déficit en *E74.0*
- Glycolytiques ¬
- - Anémie due à des anomalies des *D55.2*
- - Anomalie des *E74.8*

Enzyme *–suite*
- Hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome associant une hémolyse, une élévation des *O14.2*
- Liquide céphalorachidien ¬ Taux anormal d' *R83.0*
- Lysosomiaux ¬ Défauts de la transformation post-traductionnelle des *E77.0*
- Non classées ailleurs ¬ Intoxication: *T45.3*
- Sérique
- - Sans précision ¬ Anomalie du taux d'un *R74.9*
- - ¬ Anomalies d'autres taux d' *R74.8*

Eo avec inv(16) ou t(16;16) ¬ LMA M4 *C92.5*

EoE] ¬ Œsophagite à éosinophiles [*K20.0*

EOG] ¬ Anomalies (de): électro-oculogramme [*R94.1*

Éosinophile
- EoE] ¬ Œsophagite à *K20.0*
- Facial ¬ Granulome *L92.2*
- Hypophyse ¬
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome
- - - *C75.1*
- - - Basophile et *C75.1*
- Idiopathique
- - Aiguë ¬ Pneumonie à *J82*
- - Avant-bras ¬ Myosite *M60.83*
- - Bras ¬ Myosite *M60.82*
- - Cuisse ¬ Myosite *M60.85*
- - Jambe ¬ Myosite *M60.86*
- - Localisations multiples ¬ Myosite *M60.80*
- - ¬
- - - Myosite *M60.89*
- - - Pneumonie à *J82*
- Médullaire anormaux associée
- - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22) ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec *C92.50*
- Muqueuse buccale ¬ Granulome: *K13.4*
- Syndrome hyperéosinophilique] ¬ Leucémie chronique à *D47.5*
- Wells] ¬ Phlegmon à *L98.3*
- ¬
- - Asthme avec *J82*
- - Cystite *N30.88*
- - Endocardite à *I42.3*
- - Fasciite à *M35.4*
- - Fibrose angiocentrique à *J39.88*
- - Gastrite ou gastroentérite à *K52.8*
- - Granulome *C96.6*
- - Hépatite à *K71.6*
- - Méningite *B83.2†, G02.8**
- - Méningo-encéphalite *B83.2†, G05.2**
- - Péritonite
- - - *K65.8*
- - - Aiguë à *K65.09*

Éosinophile *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pneumonie à *J82*
- - Pneumopathie chronique idiopathique à *J82*

Éosinophilie
- Allergique ¬ *D72.1*
- Héréditaire ¬ *D72.1*
- Myalgies lié au tryptophane ¬ Syndrome d ' *M35.8*
- Œsophagienne répondant aux inhibiteurs de la pompe à protons ¬ *K20.0*
- Pulmonaire, non classée ailleurs ¬ *J82*
- Rémission complète ¬ Leucémie myélomonocytaire chronique [LMMC] avec *C93.11*
- Symptômes systémiques ¬ Réaction médicamenteuse avec *T88.7*
- Tropicale (pulmonaire) SAI ¬ *J82*
- ¬
- - *D72.1*
- - Leucémie myélomonocytaire chronique [LMMC] avec *C93.10*

Éosinophilique
- Classique ¬ Folliculite pustuleuse *L73.8*
- Os ¬ Granulome *C96.6*
- Polyangéite ¬ Granulomatose *M30.1*
- Poumons ¬ Granulome *C96.6*
- ¬ Maladie endomyocardique *I42.3*

Épaissi ¬
- Lipohypertrophie symétrique membres localisée douloureux œdème surface cutané
- - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané *E88.21*
- - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément *E88.20*
- Occlusion intestinale due à un lait *P76.2*

Épaississement
- Endomètre ¬ *R93.5*
- Épiderme
- - Sans précision ¬ *L85.9*
- - ¬ Autres formes précisées d' *L85.8*
- Pleural fibreux ¬ *J92*
- Suture métopique-ptosis-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d' *Q87.0*

Épanchement
- Articulaire ¬ *M25.4*
- Articulation
- - Coude ¬ *M25.42*
- - Hanche ¬ *M25.45*
- - Poignet ¬ *M25.43*
- Articulation de l'épaule ¬ *M25.41*
- Chyleux ¬ *J94.0*
- Chyliforme ¬ *J94.0*
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Pleurite tuberculeuse avec *A15.6†, J91**

Épanchement *–suite*
- Confirmée par analyse bactériologique ou histologique ¬ Pleurésie tuberculeuse primaire avec *A15.7†, J91**
- Glandes salivaires ¬ Kyste muqueux: par *K11.6*
- Non purulent ¬ Otite moyenne
- - *H65.9*
- - Chronique: avec *H65.4*
- Péricardique
- - Aigu ¬ *I30*
- - Non inflammatoire) ¬ *I31.3*
- - ¬ *I31.3*
- Périnéphrétiques-shunt pulmonaire] ¬ Syndrome TEMPI [télangiectasie-érythrocytose-gammopathie monoclonale- *D47.2*
- Péritonéal ¬ *R18*
- Pleural
- - Chyliforme ¬ *J94.0*
- - Cours
- - - Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *J91**
- - - Tumeur maligne secondaire de la plèvre ¬ *C78.2†, J91**
- - Grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.1*
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: *J10.1*
- - - ¬ *J11.1*
- - Non classé ailleurs ¬ *J90*
- - Tuberculeux
- - - Primaire, confirmé par analyse bactériologique ou histologique ¬ *A15.7†, J91**
- - - ¬ *A16.5†, J91**
- - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- - ¬
- - - *J90*
- - - Grippe Influenza virus influenza
- - - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à un *J09, U69.23!*
- - - - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à un *J09, U69.22!*
- - - - Zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à un *J09, U69.24!*
- - - Mésothéliome de la plèvre avec *C45.0†, J91**
- Tuberculeux NCA ¬ Pleurésie avec *A16.5†, J91**
- ¬ Pleurite avec *J90*

Épargnant le quadriceps ¬ Myopathie *G71.8*

Épaule
v./v.a. aisselle
v./v.a. Articulation de l'épaule
v./v.a. Région de l'épaule

Épaule *–suite*
- Articulation gléno-humérale] SAI ¬ Luxation de l' *S43.00*
- Bloquée ¬ *M75.0*
- Bras
- - Abrasion/éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.81*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.84*
- - Décollement sous-cutané (fermé) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.86*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.82*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.83*
- - Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de l' *S48.9*
- - SAI ¬ Plaie ouverte de l' *S41*
- - Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S49.9*
- - - Superficielle de l' *S40.9*
- - Sauf poignet main
- - - 2ème degré sans précision ¬
- - - - Brûlure de l' *T22.2*
- - - - Corrosion de l' *T22.6*
- - - Degré
- - - - 2a ¬
- - - - - Brûlure de l' *T22.2*
- - - - - Corrosion de l' *T22.6*
- - - - 2b ¬
- - - - - Brûlure de l' *T22.8*
- - - - - Corrosion de l' *T22.9*
- - ¬
- - - Contusion de l' *S40.0*
- - - Écrasement de l' *S47*
- - - Fracture d'autres parties de l' *S42.8*
- - - Lésion traumatique
- - - - Multiples
- - - - - Muscles et tendons au niveau de l' *S46.7*
- - - - - Nerfs au niveau de l' *S44.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S45.7*
- - - - Muscle tendon
- - - - - Niveau de l' *S46.8*
- - - - - Non précisés, au niveau de l' *S46.9*
- - - - Nerf
- - - - - Niveau de l' *S44.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de l' *S44.9*
- - - - Nerf cutané sensitif au niveau de l' *S44.5*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - Niveau de l' *S45.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de l' *S45.9*
- - - - Veine superficielle au niveau de l' *S45.3*

Épaule *–suite*
- Bras *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lésions traumatiques
- - - - Multiples de l' *S49.7*
- - - - Précisées de l' *S49.8*
- - - - Superficielles
- - - - - *S40.88*
- - - - - Multiples de l' *S40.7*
- - - Plaies ouvertes multiples de l' *S41.7*
- Coude ¬ Amputation traumatique entre l' *S48.1*
- Engagée ¬ *O66.0*
- Main ¬ Syndrome *M89.09*
- Membre supérieur sauf poignet main
- - Degré non précisé ¬
- - - Brûlure de l' *T22.0*
- - - Corrosion de l' *T22.4*
- - ¬
- - - Brûlure
- - - - Premier degré de l' *T22.1*
- - - - Troisième degré de l' *T22.3*
- - - Corrosion du premier degré de l' *T22.5*
- - - Corrosion du troisième degré de l' *T22.7*
- Pelvis ¬ Dysplasie de l' *Q87.5*
- SAI ¬ Fracture de l' *S42.9*
- Sans précision ¬ Lésion de l' *M75.9*
- ¬
- - *L02.4*
- - *L03.10*
- - *L04.2*
- - Angiosarcome de l' *C49.1*
- - Bursite
- - - *M75.5*
- - - Calcifiante de l' *M75.3*
- - Capsulite rétractile de l' *M75.0*
- - Carcinoma in situ: Peau du membre supérieur, y compris l' *D04.6*
- - Carcinome à cellules de Merkel de la peau de l ' *C44.6*
- - Chondrosarcome de l' *C40.0*
- - Dystocie due
- - - Dystocie des *O66.0*
- - - Présentation de l' *O64.4*
- - Fibrosarcome de l' *C49.1*
- - Infection consécutive à une endoprothèse de l'articulation de l' *T84.5*
- - Lésions de l' *M75.8*
- - Luxation congénitale
- - - *Q68.8*
- - - *Q68.8*
- - - Vraie de l' *Q68.8*
- - Luxation d'une autre partie de l' *S43.08*
- - Maladie de Forestier [Pseudopolyarthrite de la hanche et de l' *M35.3*
- - Mélanome

Épaule *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Mélanome *–suite*
- - - In situ du membre supérieur, y compris l' *D03.6*
- - - Malin
- - - - Familial de l' *C43.6*
- - - - Membre supérieur, y compris l' *C43.6*
- - Nævus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l' *D22.6*
- - Périarthrite de l' *M75.0*
- - Plaie ouverte de l' *S41.0*
- - Présence d'une prothèse d' *Z96.60*
- - Rhabdomyosarcome des tissus mous de l' *C49.1*
- - Sarcome des tissus mous de l' *C49.1*
- - Sarcome du tissu conjonctif de l' *C49.1*
- - Sarcome pléomorphe indifférencié de l' *C49.1*
- - Syndrome
- - - Empiètement de l' *M75.4*
- - - Parsonage-Turner [Amyotrophie névralgique de l' *G54.5*
- - Tendinite calcifiante de l' *M75.3*
- - Tissu mou: *C79.86*
- - Tumeur bénigne
- - - Peau du membre supérieur, y compris l' *D23.6*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l' *D21.1*
- - Tumeur maligne
- - - Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l' *C47.1*
- - - Peau du membre supérieur, y compris l' *C44.6*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l' *C49.1*

Épaule-bras
- Tous stades ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.26*
- ¬ Ulcère vasculaire mixte de type *I70.26*

Épendymaire ¬
- Glioblastome *C71.9*
- Kyste glioépendymaire/ *Q04.6*

Épendymite à cytomégalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**

Ependymoblastome
- Cerveau ¬ *C71.0*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*

Épendymoblastome
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- Quatrième ventricule ¬ *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- ¬ *C71.9*

Épendymome
v./v.a. Sub-épendymome
- Anaplasique
- - Moelle épinière ¬ *C72.0*
- - Quatrième ventricule ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Bas degré ¬ *D43.2*
- Encéphale ¬ *C71.9*
- Épithélial ¬ *C71.9*
- Fusion RELA ¬ *C71.5*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- Malin ¬ *C71.9*
- Moelle épinière ¬ *C72.0*
- Myxopapillaire ¬ *D43.2*
- Quatrième ventricule ¬ *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- ¬ *C71.9*

Eperon ¬ *C34.0*

EPH [œdème - protéinurie - hypertension] ¬ Gestose *O14.9*

Éphélides ¬ *L81.2*

Epiblépharon ¬ *Q10.3*

Épibulbaires ¬ Syndrome d'aplasie cutanée congénitale-dermoïdes *Q84.8, D31.4*

Épicanthus
v./v.a. blépharophimosis-ptosis-épicanthus

Épicardique ¬
- Infection due à un dispositif d'assistance ventriculaire *T82.72*
- Plaques *I31.88*

Épicondyle
- Épicondyles, non précisé ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.44*
- Latéral ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.42*
- Médial ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.43*
- Non précisé ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle, *S42.44*

Epicondylite ¬ *M77.1*

Épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie *P12.2*

Epidemica ¬ Meningitis cerebrospinalis *A39.0†, G01**

Épidémiologique ¬ Infection à coronavirus-2019, avec confirmation clinique et *Z20.8, U07.2!*

Épidémique
v./v.a. Type de maladie

Épiderme
- Derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte cutanée partielle atteignant l' *L89.1*
- Sans précision ¬ Epaississement de l' *L85.9*
- ¬ Autres formes précisées d'épaississement de l' *L85.8*

Épidermique
- Papulaires avec couche basale en palissade] ¬ Syndrome PENS [nævus *Q87.8*

Épidermique *–suite*
- Toxique
- - Atteinte
- - - 30% et plus de la surface corporelle ¬ Nécrolyse *L51.21*
- - - Muqueuse ¬ Nécrolyse *L51.21*
- - ¬
- - - NET [nécrolyse *L51.20*
- - - Spectre syndrome de Stevens-Johnson/nécrolyse *L51.20*
- Verruqueux
- - Angiodysplasie anévrisme ¬
- - - Nævus *Q87.8*
- - - Syndrome NEVADA [nævus *Q87.8*
- - Inflammatoire linéaire ¬
- - - Nævus *Q82.5*
- - - NEVIL [Nævus *Q82.5*
- ¬
- - Kyste
- - - *L72.0*
- - - Inclusion *L72.0*
- - Lipodystrophie due à un déficit combiné en insuline, IGF1 [somatomédine-C] et EGF [facteur de croissance *E88.1*
- - Nævus épidermolytique *Q80.3*
- - Syndrome SOLAMEN [hypertrophie segmentaire-lipomatose-malformation artério-veineuse-nævus *Q87.8*

Epidermodysplasie verruciforme ¬ *B07*

Épidermoïde
v./v.a. Carcinome épidermoïde
- Bouche ¬ Kyste: *K09.8*

Épidermolyse
- Bulleux
- - Acquise ¬ *L12.3*
- - Dermolytique ¬ *Q81.2*
- - Dystrophique
- - - Acrale ¬ *Q81.2*
- - - Dominante
- - - - Généralisée ¬ *Q81.2*
- - - - Isolée des ongles ¬ *Q81.2*
- - - Généralisée autosomique récessive, forme intermédiaire ¬ *Q81.2*
- - - Inversée récessive ¬ *Q81.2*
- - - Localisée ¬ *Q81.2*
- - - Prétibiale ¬ *Q81.2*
- - - Prurigineuse ¬ *Q81.2*
- - - ¬ *Q81.2*
- - Jonctionnelle
- - - Atrésie pylorique ¬ *Q81.8, Q40.8*
- - - Généralisée
- - - - Forme intermédiaire ¬ *Q81.8*
- - - - Sévère ¬
- - - - - *Q81.1*
- - - - - *Q81.1*
- - - Inversée ¬ *Q81.8*
- - - Létale ¬ *Q81.1*
- - - Localisée

Épidermolyse *–suite*
- Bulleux *–suite*
- - Jonctionnelle *–suite*
- - - Localisée *–suite*
- - - - Début tardif-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q81.8*
- - - - ¬ *Q81.8*
- - - Type
- - - - Herlitz [EBJ-H] ¬ *Q81.1*
- - - - Herlitz-Pearson ¬ *Q81.1*
- - - - Non-Herlitz
- - - - - JEB-nH] ¬ *Q81.8*
- - - - - Localisé] ¬ EBJ-nH loc [*Q81.8*
- - Létal
- - - Acantholytique ¬ *Q81.0*
- - - ¬ *Q81.1*
- - Sans précision ¬ *Q81.9*
- - Simple
- - - Anodontie ¬ *Q81.0, K00.0*
- - - Atrésie du pylore ¬ *Q81.0*
- - - Autosomique récessive associée à KRT14 ¬ *Q81.0*
- - - Déficit
- - - - BP230 ¬ *Q81.0*
- - - - Exophiline 5 ¬ *Q81.0*
- - - - Plakophiline ¬ *Q81.0*
- - - Dystrophie musculaire ¬ *Q81.0†, G73.7**
- - - Généralisée
- - - - Autosomique
- - - - - Dominante, forme intermédiaire ¬ *Q81.0*
- - - - - Récessive ¬ *Q81.0*
- - - - Forme sévère ¬ *Q81.0*
- - - - Intermédiaire ¬ *Q81.0*
- - - Hypodontie ¬ *Q81.0, K00.0*
- - - Intermédiaire
- - - - Cardiomyopathie ¬ *Q81.0, I42.9*
- - - - Sans manifestations extra-cutanées associée à PLEC ¬ *Q81.0*
- - - Localisée ¬ *Q81.0*
- - - Migratoire ¬ *Q81.0*
- - - Pigmentation mouchetée ¬ *Q81.0*
- - - Superficielle ¬ *Q81.0*
- - - Type
- - - - Dowling-Meara ¬ *Q81.0*
- - - - Ogna ¬ *Q81.0*
- - - ¬
- - - - *Q81.0*
- - - - *Q81.0*
- - Syndrome néphrotique-surdité neurosensorielle ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - ¬
- - - *Q81.8*
- - - Syndrome de pneumopathie interstitielle-syndrome néphrotique- *J84.90†, N08.8*, Q81.8*
- Nécrosante avec atteinte de moins de 30% de la surface corporelle ¬ *L51.20*

Épidermolyse *–suite*
- Toxique aiguë ¬ *L51.20*

Epidermolysis bullosa progressiva ¬ *Q81.8*

Épidermolytique
- Annulaire ¬ Ichtyose *Q80.3*
- Associée à KRT1 ¬ Kératodermie palmoplantaire non *Q82.8*
- Autosomique
- - Dominante avec atteintes bulleuses ¬ Kératose palmoplantaire focale non *Q82.8*
- - Récessive ¬ Ichtyose *Q80.3*
- Épidermique ¬ Nævus *Q80.3*
- Isolée ¬ Kératodermie palmoplantaire focale non *Q82.8*
- Superficielle ¬ Ichtyose *Q80.8*
- ¬
- - Hyperkératose *Q80.3*
- - Ichtyose *Q80.3*

Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ Infections causées par les espèces appartenant aux genres *B35*

Épidermotrope CD8+ d'évolution agressive ¬ Lymphome T cutané *C84.5*

Épididyme
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections du testicule et de l' *N51.1**
- Testicule ¬ Abcès de l' *N45.0*
- Vésicule séminal prostate
- - SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l' *Q55.4*
- - ¬ Autres malformations congénitales du canal déférent, de l' *Q55.4*
- ¬
- - Absence acquise de l' *Z90.7*
- - Adénocarcinome de l' *C63.0*
- - Gonorrhée de l' *A54.2†, N51.1**
- - Mésothéliome de l' *C63.0*
- - Syphilis de l' *A52.7†, N51.1**
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, N51.1**
- - Torsion: *N44.0*
- - Tuberculose
- - - *A18.1†, N51.1**
- - - Sinus de l' *A18.1†, N51.1**
- - Tumeur bénigne: *D29.3*
- - Tumeur maligne: *C63.0*

Épididymite
- Blennorhéique ¬ *A54.2†, N51.1**
- Chlamydia ¬ *A56.1†, N51.1**
- Due au virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N51.1**
- Épididymo-orchite
- - Abcès ¬ Orchite, *N45.0*
- - Sans abcès ¬ Orchite, *N45.9*
- Gonocoques ¬ *A54.2†, N51.1**
- SAI ¬ *N45.9*
- Syphilitique
- - Tardive ¬ *A52.7†, N51.1**
- - ¬ *A52.7†, N51.1**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N51.1**

Épididymo-orchite
- Abcès ¬ Orchite, épididymite et *N45.0*
- Neisseria gonorrhoeae ¬ *A54.2†, N51.1**
- Sans abcès ¬ Orchite, épididymite et *N45.9*

Épidural
v./v.a. Hémorragie épidurale
- Cours
- - Grossesse ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie *O29.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie *O29.5*
- - Puerpéralité ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie *O89.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie *O89.5*
- - Travail accouchement ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie *O74.5*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie *O74.6*
- Extra-dural] ¬ Hématome *S06.4*
- Niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S35.80*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S15.80*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.80*
- Postopératoire ¬ Hémorragie rachidienne *G97.82*
- Tuberculeux ¬ Abcès *A17.8†, G07**
- ¬ Abcès granulome
- - Intracrânien: *G06.0*
- - Intrarachidien: *G06.1*

Epigastre ¬ *S31.1*

Épigastrique
v./v.a. Hernie épigastrique
- ¬ Douleur *R10.1*

Épiglotte
- Bord libre [marge] ¬ *C10.1*
- Face antérieure ¬ *D10.5*
- Glotte larynx cartilage thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l' *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l' *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l' *Q31.8*
- Partie sus-hyoïdien
- - SAI ¬ *C32.1*
- - ¬
- - - *D02.0*
- - - *D14.1*
- - - *D38.0*
- ¬
- - *S11.01*
- - Blessure de l' *S19.9*
- - Carcinome épidermoïde
- - - *C32.1*

Épiglotte *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carcinome épidermoïde *–suite*
- - - Face antérieure de l' *C10.1*
- - Contusion de l' *S10.0*
- - Face postérieure (laryngée) de l' *C32.1*
- - Fissure (de): *Q31.8*
- - Plaie ouverte de l' *S11.01*
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur maligne: Face antérieure de l' *C10.1*
- - Tumeur neuroendocrine maligne de la face postérieure de l' *C32.1*

Épiglottique
v./v.a. Repli ary-épiglottique
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Tuberculose *A15.5*
- S) ¬ Pli(s) glosso- *C10.1*
- ¬
- - Tuberculose *A16.4*
- - Tumeur maligne: Sillon glosso- *C10.0*

Épiglottite
- Aiguë ¬ *J05.1*
- SAI ¬ *J05.1*

Épignathe ¬ Tératome *Q89.4*

Épilepsie
- Absence
- - Adolescence ¬ *G40.3*
- - Enfance ¬ *G40.3*
- - Myocloniques ¬ *G40.4*
- Anomalies
- - Anales-hypoplasie des phalanges ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère- *Q87.8*
- - Neurologiques ¬ Syndrome d'hyperaldostéronisme primitif- *E26.0†, G99.8**
- - Ophtalmiques-ostéopénie-atrophie cérébelleuse ¬ Retard du développement neurologique- *E88.8*
- Associé
- - MTHFS ¬ Syndrome de retard de développement-microcéphalie-petite taille- *G31.88*
- - PUM1 ¬ Syndrome de retard de développement-ataxie- *Q87.1*
- Atypique bénigne ¬ *G40.00*
- Bénigne
- - Enfance avec pointes centro-temporales à l'EEG ¬ *G40.08*
- - Nourrisson
- - - Crises complexes focales ¬ *G40.08*
- - - Watanabe] ¬ *G40.08*
- - Paroxysmes occipitaux ¬ *G40.08*
- - Partielle de l'enfant avec crises partielles complexes ¬ *G40.2*
- - Pics centro-temporaux [Rolando] ¬ *G40.08*
- Cécité corticale-retard de développement ¬ Syndrome de microcéphalie progressive- *Q02*

Épilepsie *–suite*
- Contracture progressive des articulations-dysmorphie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Cours de cysticercose ¬ *B69.0†, G94.8**
- Crise
- - Astato-myocloniques ¬ *G40.4*
- - Grand mal au réveil ¬ *G40.3*
- - Myoclonoastatiques ¬ *G40.4*
- Début précoce-anomalies des membres distaux-dysmorphie faciale-retard global de développement ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- Déficience intellectuelle
- - Cardiopathie ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.8*
- - Déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante- *G11.1*
- - Retard de développement hypertrophie gingival ¬ Syndrome
- - - Dysmorphie faciale-hypertrichose- *Q87.0*
- - - FHEIG [dysmorphie faciale-hypertrichose- *Q87.0*
- - Type finnois ¬ Syndrome d' *E75.4*
- - ¬ Syndrome
- - - Ostéogenèse imparfaite-rétinopathie- *Q87.8*
- - - Retard global de développement-anomalies neuro-ophtalmologiques- *Q87.8*
- Déficit en kinase déshydrogénase des cétoacides à chaînes ramifiées ¬ Syndrome d'autisme- *E71.1*
- Diabète
- - Néonatal
- - - Forme intermédiaire ¬ Syndrome DEND [retard de développement- *E10.40*
- - - Permanent ¬ Syndrome de microcéphalie primaire- *Q87.8*
- - - ¬ Syndrome DEND [retard de développement- *E10.40*
- - Néphropathie ¬ Syndrome d'athérosclérose-surdité- *Q87.8*
- Focale
- - Bénigne de l'adolescent ¬ *G40.1*
- - Déficience intellectuelle-malformation cérebro-cérébelleuse ¬ Syndrome d' *Q04.8*
- - Familiale Foyer variables ¬
- - - *G40.1*
- - - FFEVF [*G40.1*
- - Infantile bénigne avec pointes-ondes centrales pendant le sommeil ¬ *G40.01*
- Frontale à crises nocturnes autosomique dominante] ¬ ADNFLE [*G40.1*
- Gélastique ¬ Hamartomes hypothalamiques avec *Q85.8, G40.2*
- Généralisée
- - Convulsions fébriles plus ¬ *G40.3*
- - Dyskinésie paroxystique ¬ Syndrome d' *G40.3, G24.8*

Épilepsie *–suite*
- Hypophosphatasie-anomalies ophtalmiques et squelettiques ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Hypotonie, une cataracte et un retard de développement ¬ Syndrome létal de cardiomyopathie par non-compaction du ventricule gauche associé à des crises d' *G31.81*
- Idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision ¬ *G40.09*
- Idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales ¬ Autres *G40.08*
- Infantile familiale bénigne ¬ [BFIE] *G40.3*
- Landau-Kleffner] ¬ Aphasie acquise avec *F80.3*
- Lié
- - IRF2BPL ¬ Syndrome de régression neurodéveloppementale-dystonie- *G31.88*
- - X ¬ Syndrome de spasticité-déficience intellectuelle- *G40.4*
- Liée à l'X-difficulté d'apprentissage-troubles du comportement ¬ Syndrome d' *G40.2*
- Lobe mésio-temporal avec sclérose de l'hippocampe ¬ *G40.2, G37.8*
- Lobe temporal latéral autosomique dominante ¬ *G40.2*
- Macrocéphalie-obésité ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Microcéphalie dysplasie squelettique ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Myoclonie des paupières ¬ *G40.3*
- Myoclonique
- - Bénigne
- - - Enfance ¬
- - - - *G40.3*
- - - - *G40.3*
- - - Familiale de l'adulte ¬ *G40.3*
- - Encéphalopathies non-progressives ¬ *G40.4*
- - Familiale de l'adulte ¬ *G40.3*
- - Fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [*G31.81*
- - Petit mal impulsif] juvénile ¬ *G40.3*
- - Progressive
- - - Associée à PRDM8 ¬ *G40.3*
- - - Dystonie ¬ *G40.3, G24.9*
- - - Type
- - - - 4 ¬ *G40.3*
- - - - 5 ¬ *G40.3*
- - - ¬
- - - - *G40.3*
- - - - Syndrome d'amyotrophie spinale proximale- *G12.1, G40.3*
- Néonatale bénigne familial ¬ *G40.3*
- Nordique ¬
- - *E75.4*

Épilepsie *–suite*
- Nordique ¬ *–suite*
- - Céroïde-lipofuscinose neuronale, variante *E75.4*
- Occipitale photosensible ¬ *G40.8*
- Parasitaire NCA ¬ *B71.9†, G94.8**
- Partielle
- - Bénigne
- - - Nourrisson avec crises généralisées secondaires ¬ *G40.1*
- - - Symptômes affectifs ¬ *G40.02*
- - Continue [Kojevnikov] ¬ *G40.5*
- - Familiale ¬ *G40.1*
- - Migrante maligne du nourrisson ¬ *G40.4*
- Petite enfance avec crises focales migratoires ¬ *G40.4*
- Photosensible ¬ *G40.8*
- Pointes occipitales ¬ *G40.08*
- Psoriasis ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Psychomotrice bénigne [crises de terreur] ¬ *G40.02*
- Pyorrhée-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'alopécie- *Q87.8*
- Pyridoxino-dépendante ¬ *G40.8*
- Réflexe
- - Alimentation ¬ *G40.8*
- - Eau chaude ¬ *G40.8*
- Réfractaire
- - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypomagnésémie primaire- *E83.4*
- - Microcéphalie progressive ¬ Syndrome d'atrophie cérébrale et cérébelleuse diffuse- *Q02*
- Rolandique
- - Dyspraxie de la parole ¬ Syndrome d' *G40.08, R48.2*
- - Dystonie paroxystique induite par l'effort-crampe de l'écrivain ¬ Syndrome d' *G40.08*
- - ¬ *G40.08*
- Sans précision ¬ *G40.9*
- Sursaut ¬ *G40.8*
- Symptomatique] ¬ Syndrome PMSE [polyhydramnios-mégalencéphalie- *Q87.0*
- Syndrome myoclonique sévère de l'enfance ¬ *G40.4*
- Syndromes épileptique
- - Généralisés
- - - Idiopathiques ¬ *G40.3*
- - - ¬ Autres *G40.4*
- - Non précisés comme focaux ou généralisés ¬ *G40.8*
- - Symptomatique définis localisation focale partielle crise partielles
- - - Complexes ¬ *G40.2*
- - - Simples ¬ *G40.1*
- Système limbique ¬ Psychosyndrome de l' *F07.0*
- Télangiectasie ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- Temporal

Épilepsie *–suite*
- Temporal *–suite*
- - Familiale ¬ *G40.2*
- - Mésiale
- - - Familiale
- - - - Bénigne ¬ *G40.2*
- - - - Convulsions fébriles ¬ *G40.2*
- - - Infantile avec régression cognitive sévère ¬ *G40.2*
- Tonus musculaire anormal ¬ Syndrome de microcéphalie-déficience intellectuelle-surdité neurosensorielle- *Q87.8*
- Troubles du comportement-dysmorphie craniofaciale associé à ZMYND11 ¬ Syndrome de retard du développement-retard de langage- *Q87.8*
- Type
- - 2 ¬ Syndrome d'anomalies congénitales multiples-hypotonie- *Q87.8*
- - 3 ¬ Syndrome d'anomalies congénitales multiples-hypotonie- *Q87.8*
- Vitamine B6-dépendante ¬ *G40.8*
- ¬
- - *G40.8*
- - Ataxie spinocérébelleuse mitochondriale avec *G31.81*
- - CEC [Syndrome de maladie cœliaque-calcifications cérébrales- *K90.0, G40.8*
- - Encéphalopathie liée à STXBP1 avec *G40.3*
- - Psychose d'allure schizophrénique au cours d'une *F06.2*
- - Syndrome
- - - Anomalies congénitales multiples-hypotonie- *Q87.8*
- - - Extrapyramidal-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - - Hyperexplexie- *G25.88, G40.3*
- - - Maladie cœliaque-calcifications cérébrales- *K90.0, G40.8*
- - - Pachygyrie-déficience intellectuelle- *Q04.3*
- - - Paraplégie spastique-retard de développement sévère- *G11.4*

Épileptiforme au cours de cysticercose ¬ Crise *B69.0†, G94.8**

Épileptique
v./v.a. Encéphalopathie épileptique
- Bioélectrique pendant le sommeil ¬ État de mal *G40.01*
- Crise initialement focales
- - Sans précision ¬ Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes *G40.09*
- - ¬ Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes *G40.08*
- Électrique pendant le sommeil lent] ¬ ESES [état de mal *G40.01*
- Enfance ¬ Syndrome *G40.8*
- Facteur suivants
- - Alcool ¬ Crises *G40.5*

Épileptique *–suite*
- Facteur suivants *–suite*
- - Médicaments et drogues ¬ Crises *G40.5*
- - Modifications hormonales ¬ Crises *G40.5*
- - Privation de sommeil ¬ Crises *G40.5*
- - Stress ¬ Crises *G40.5*
- Généralisés
- - Idiopathiques ¬ Épilepsie et syndromes *G40.3*
- - ¬ Autres épilepsies et syndromes *G40.4*
- Infantile ¬ Grand mal *G40.4*
- Infantiles ¬ Syndrome des spasmes *G40.4*
- Non précisés comme focaux ou généralisés ¬ Épilepsies et syndromes *G40.8*
- Particuliers ¬ Syndromes *G40.5*
- Partiel complexe ¬ État de mal *G41.2*
- Réfractaire d'apparition tardive ¬ État de mal *G41.8*
- SAI ¬
- - Convulsions *G40.9*
- - Crises *G40.9*
- - Psychose *F06.8*
- Sans précision ¬ État de mal *G41.9*
- Symptomatique définis localisation focale partielle crise partielles
- - Complexes ¬ Épilepsie et syndromes *G40.2*
- - Simples ¬ Épilepsie et syndromes *G40.1*
- Tonico-clonique ¬ État de mal *G41.0*
- ¬
- - Démence *G40.9†, F02.8**
- - État
- - - Absences *G41.1*
- - - Grand mal *G41.0*
- - - Petit mal *G41.1*
- - États de mal *G41.8*
- - Syndrome *G40.9*

Epiloïa ¬ *Q85.1*

Épimérase
v./v.a. diphosphate-galactose-4-épimérase
- ¬
- - Acidurie méthylmalonique par déficit en méthylmalonyl-CoA *E71.1*
- - Déficit en galactose *E74.2*
- - Neurodégénérescence
- - - Déficit NADHX *E88.8†, G32.8**
- - - Due à un déficit en NADPHX *E88.8†, G32.8**

Epine scapulaire ¬ *S42.12*

Épineux
- Cervical(e) ¬ apophyse: *S12*
- Dorsal(e) ¬ apophyse: *S22*
- Lombo-sacré(e) ¬ apophyse: *S32*

Épingle [sténopéique] SAI ¬ Méat en trou d' *N35.9*

Épinière
v./v.a. moelle épinière

Epiphora ¬ *H04.2*

Épiphysaire
v./v.a. Dysplasie épiphysaire
v./v.a. Dysplasie spondylo-épiphysaire
- ¬
- - Arrêt *M89.1*
- - Fracture
- - - Col du fémur: Épiphyse (proximale), décollement *S72.02*
- - - Extrémité inférieure du fémur: Épiphyse, décollement *S72.42*

Épiphyse
- Décollement épiphysaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: *S72.42*
- Distale ¬ *S42.44*
- Glande pinéale ¬
- - Tumeur bénigne: *D35.4*
- - Tumeur maligne: *C75.3*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D44.5*
- Hypoplasiques en forme de cône et dysmorphie faciale ¬ Syndrome de petite taille avec cyphose, *Q87.1*
- Inférieure du cubitus [Burns] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.1*
- Proximale
- - Décollement épiphysaire ¬ Fracture du col du fémur: *S72.02*
- - Ulna ¬ Fracture de l' *S52.00*
- - ¬ *S42.21*
- Supérieure du tibia ¬ Ostéochondrite juvénile de l' *M92.5*
- Surnuméraires multiples ¬ Syndrome de grande taille-gros orteils longs- *Q87.3*
- ¬
- - Dysfonctionnement de la glande pinéale [*E34.8*
- - Tératome de l' *C40.9*

Épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) ¬ *M93.0*

Épiphysite
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, M90.29**

Épiplocèle ¬ *K46*

Épiploïque
- Anormales ¬ Adhérences [brides] congénitales: *Q43.3*
- ¬
- - Abcès: *K65.09*
- - Adhérences (de): *K66.0*

Épiploon ¬
- *C45.1*
- *C48.1*
- Mésothéliome de l' *C45.1*
- Tuberculose de l' *A18.3*
- Tumeur myofibroblastique inflammatoire
- - Bénigne de l' *D20.1*
- - Maligne de l' *C48.1*

Épipodophyllotoxines ¬ Syndrome myélodysplasique dû à des *D46.9*

Épirétinienne ¬ Gliose *H35.38*

Épisclérale élevée ¬ Glaucome secondaire à une pression veineuse *H40.5*

Épisclérite
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Sclérite et *H19.0**
- Goutte ¬ *M10.99†, H19.0**
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, H19.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.0**
- ¬ *H15.1*

Épisiotomie
- Agrandie par déchirure ¬ *O70*
- ¬
- - Infection d'une plaie d' *O86.0*
- - Rupture d'une suture de: *O90.1*

Épisode
- Actuel
- - Dépression
- - - Légère ou moyenne ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.3*
- - - Sévère
- - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.4*
- - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.5*
- - Hypomaniaque ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.0*
- - Léger ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.0*
- - Maniaque
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.1*
- - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.2*
- - Mixte ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.6*
- - Moyen ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.1*
- - Sévère
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.2*
- - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.3*
- Affectif mixte isolé ¬ *F38.0*
- Aiguë ¬ Poumon de fermier sans mention d' *J67.00*
- Aigus
- - VEF1
- - - 35
- - - - 50 % de la norme ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec *J44.11*
- - - - Norme ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec *J44.10*
- - - 50 % et < 70 % de la norme ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec *J44.12*
- - - 70 % de la norme ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec *J44.13*
- - ¬ Poumon de fermier avec *J67.01*
- Dépressif

Épisode *–suite*
- Dépressif *–suite*
- - Léger ¬ *F32.0*
- - Moyen ¬ *F32.1*
- - Sans précision ¬ *F32.9*
- - Sévère
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- - - Symptômes psychotiques ¬ *F32.3*
- Dépressifs
- - Récurrents de courte durée ¬ *F38.1*
- - ¬ Autres *F32.8*
- Hypotension-hyporéactivité ¬ *T88.1*
- Inflammatoire aigu en cours ¬ Amygdalite récidivante avec *J03.9*
- Isolé sans symptôme psychotique ¬ Dépression
- - Agitée *F32.2*
- - Majeure *F32.2*
- - Vitale *F32.2*
- Isolés
- - Dépression
- - - Majeure avec symptômes psychotiques ¬ *F32.3*
- - - Masquée» SAI ¬ *F32.8*
- - - Psychogène ¬ *F32*
- - - Psychotique ¬ *F32.3*
- - - Réactionnelle ¬ *F32*
- - Psychose dépressive
- - - Psychogène ¬ *F32.3*
- - - Réactionnelle ¬ *F32.3*
- - Réaction dépressive (F32.0, F32.1, F32.2) ¬ *F32*
- Lymphohistiocytose hémophagocytaire à début néonatal] ¬ Syndrome NOCARH [cytopénie-auto-inflammation-éruption cutanée- *D76.1*
- Maniaque
- - Isolé ¬ trouble bipolaire, *F30*
- - Récurrents SAI ¬ *F31.8*
- - Sans précision ¬ *F30.9*
- - ¬ Autres *F30.8*
- Récurrents
- - F33 0 F33 1
- - - Dépression
- - - - Psychogène ¬ *F33*
- - - - Réactionnelle ¬ *F33*
- - - Réaction dépressive ¬ *F33*
- - Sévères
- - - Dépression
- - - - Majeure, avec symptômes psychotiques ¬ *F33.3*
- - - - Psychotique ¬ *F33.3*
- - - Psychose dépressive
- - - - Psychogène ¬ *F33.3*
- - - - Réactionnelle ¬ *F33.3*
- Ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, acidose lactique et *G31.81*

Épisodique
v./v.a. Ataxie épisodique
- Familial ¬ Syndrome douloureux *M79.89*
- Héréditaire ¬ Adynamie *G72.3*
- Paroxystique] ¬ Trouble panique [anxiété *F41.0*
- ¬
- - Algie vasculaire de la face: *G44.0*
- - Céphalée (de): tension: *G44.2*
- - Leucoencéphalopathie à perte de mémoire *G93.4*

Épispadias
- Clitoridien ¬ *Q64.0*
- Femme ¬ *Q64.0*
- Homme ¬ *Q64.0*
- ¬ *Q64.0*

Epistaxis ¬ *R04.0*

Épithélial
v./v.a. Tumeur épithéliale
- Intestinale ¬ Dysplasie *K63.8*
- Origine infectieuse ¬ Kératite *B00.5†, H19.1**
- ¬
- - Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*
- - Épendymome *C71.9*
- - Mastopathie kystique avec prolifération *N60.3*
- - Néphroblastome *C64*

Épithélioïde
v./v.a. Sarcome épithélioïde
- Foie ¬ Hémangioendothéliome *C22.7*
- Périvasculaires ¬ Tumeur des cellules *D48.1*
- Tissu mou
- - Cou ¬ Hémangioendothéliome *C49.0*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ Hémangioendothéliome *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ Hémangioendothéliome *C49.1*
- - Tête ¬ Hémangioendothéliome *C49.0*
- ¬
- - Hémangioendothéliome *C49.9*
- - Hémangiome *D18.00*
- - Tumeur trophoblastique
- - - *C58*
- - - *D39.2*

Épithéliome
- Adénoïde kystique de Brooke ¬ *D23.9*
- Squameux multiple spontanément curable ¬ *D23.9*
- Thymique ¬ *D15.0*

Epithéliotrope monomorphe ¬ Lymphome T intestinal *C86.2*

Épithélium
- Buccal y compris langue ¬
- - Érythroplasie de l' *K13.2*
- - Leuco-œdème de l' *K13.2*
- - Leucoplasie et autres anomalies de l' *K13.2*

Épithélium *–suite*
- Langue ¬ anomalies de l' *K13*
- Pavimenteux
- - Canal cervical ¬ Présence congénitale d' *Q51.8*
- - Muqueuse utérine ¬ Présence congénitale d' *Q51.8*
- Pigmentaire
- - Rétine ¬ Hamartome combiné de l' *D31.2*
- - Rétinien
- - - Simulant le fundus flavimaculatus) ¬ Dystrophie tachetée multifocale de l' *H35.5*
- - - ¬
- - - - Décollement de l' *H35.7*
- - - - Dystrophie réticulée de l' *H35.5*
- - ¬ Dystrophie choroïdienne centrale aréolaire de l' *H31.2*
- Vaginal ¬ Érosion de l' *N89.8*

Épithéloïdes ¬ Réticuloendothéliose à cellules *D86.9*

Épituberculose
- Confirmation
- - Bactériologique ¬ *A15.7*
- - Histologique ¬ *A15.7*
- ¬ *A16.7*

Éponge ¬ Rein en *Q61.5*

Époophoron ¬ Kyste (de): *Q50.5*

Épreuve
- Électrophysiologiques intracardiaques ¬ Anomalies (de): *R94.3*
- Fixation de radio-isotopes [radionucléides] ¬ résultats anormaux de: *R94*
- Fonctionnelles
- - Rénales ¬ Anomalie des *R94.4*
- - Spléniques ¬ Anomalie de: *R94.8*
- - Vessie ¬ Anomalie de: *R94.8*
- Sensorielles spéciales ¬ Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et *R94.1*
- Tolérance au glucose ¬ Anomalie de l' *R73.08*
- Travail
- - Sans précision ¬ Échec de l' *O66.4*
- - Suivi d'une césarienne ¬ Échec de l' *O66.4*

Epstein
v./v.a. van Bogaert-Scherer-Epstein
- ¬
- - Perles d' *K09.8*
- - Syndrome d' *N04.9*

Epstein-Barr
v./v.a. Virus d'Epstein-Barr

Épuisement
- Chaleur
- - Perte
- - - Hydrique ¬ *T67.3*
- - - Sel ¬ *T67.4*
- - Sans précision ¬ *T67.5*
- Effort intensif ¬ *T73.3*

Épuisement *–suite*
- Éléments ¬ *T73.2*
- Fatigue ¬ *O26.88*
- Maternel au cours du travail et de l'accouchement ¬ *O75.0*
- Physique ¬ *R53.9*
- Total ¬ État d' *Z73*
- ¬ *R53.9*

Epulis
- Cellules géantes ¬ *K06.8*
- Congénital ¬ *K06.8*
- Fibreux ¬ *K06.8*

Équatorial ¬ Staphylome *H15.8*

Équilibre
- Acido-basique
- - Fœtale ¬ Anomalie de l' *O68.3*
- - ¬ Anomalie mixte de l' *E87.4*
- Autonome ¬ Trouble de l' *G90.88*
- Électrolytique, calorique et hydrique ¬ Intoxication: Produits agissant sur l' *T50.3*
- Potassique du nouveau-né ¬ Anomalies de l' *P74.3*
- Sodique du nouveau-né ¬ Anomalies de l' *P74.2*
- Sympathique ¬ Trouble de l' *G90.88*

Équilibré
- Marqueur structurel
- - Sans précision ¬ Réarrangement *Q95.9*
- - ¬ Autres réarrangements *Q95.8*
- Sujet
- - Anormal ¬ Réarrangement
- - - Autosomique *Q95.2*
- - - Sexuel/autosomique *Q95.3*
- - Normal ¬ Translocation ou insertion *Q95.0*
- ¬ translocation insertion
- - Non *Q92*
- - Réciproques robertsoniennes et *Q95*

Équin
- Acquis ¬ Pied *M21.62*
- Est ¬ Encéphalite *A83.2*
- Orientale ¬ Encéphalite *A83.2*
- Ouest ¬ Encéphalite *A83.1*
- Vénézuélienne ¬ Fièvre *A92.2*
- ¬ Pied bot varus *Q66.0*

Equinovarus avec communication interatriale, séquence de Robin et persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome TARP (Talipes *Q87.8*

Équipe
- Sportives ¬ Examen général en série de: *Z10*
- ¬ Travail en *Z56*

Équitation ou accident de véhicule attelé à un animal ¬ Accident d' *V99!*

Équivalents migraineux ¬ Migraine: *G43.1*

Érable
- Exacerbation aiguë ¬ Poumon des écorceurs d' *J67.61*
- Forme

Érable *–suite*
- Forme *–suite*
- - Intermédiaire ¬ Maladie des urines sirop d' *E71.0*
- - Intermittente ¬ Maladie des urines sirop d' *E71.0*
- - Sensible à la thiamine ¬ Maladie des urines sirop d' *E71.0*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des écorceurs d' *J67.60*
- ¬ Maladie
- - Menkes I [syndrome du sirop d' *E71.0*
- - Urines à odeur de sirop d' *E71.0*

Éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Abrasion/ *S40.81*

Erb due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de Duchenne- *P14.0*

Erb-Charcot ¬ Maladie d' *G11.4*

ERBIN ¬ Déficit immunitaire combiné autosomique dominant par déficit en *D81.8*

Erb-Oppenheim-Goldflam ¬ Syndrome d' *G70.0*

Erdheim ¬ Tumeur d' *D44.4*

Erdheim-Chester ¬ Maladie d' *D76.3*

Erdheim-Gsell ¬ Syndrome d' *I71.00*

Érectile
- Organique ¬ Insuffisance *N48.4*
- Psychogène ¬ Dysfonctionnement *F52.2*

Érection
- Douloureuse ¬ *N48.3*
- Homme ¬ Trouble de: *F52.2*
- Insuffisante ¬ *N48.4*

ERF ¬ Syndrome de craniosynostose associé à *Q87.0*

ERG] ¬ Anomalies (de): électrorétinogramme [*R94.1*

Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs ¬ *Z50.7!*

Erickson
v./v.a. Abruzzo-Erickson

Eriksson
v./v.a. Forsius-Eriksson
v./v.a. Laurell-Eriksson

Érosion
- Aiguë) de l'estomac ¬ *K29.6*
- Anastomotique ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Artérielle ¬ *I77.88*
- Dent
- - Due
- - - Médicaments ¬ *K03.2*
- - - Régime alimentaire ¬ *K03.2*
- - - Vomissements persistants ¬ *K03.2*
- - Idiopathique ¬ *K03.2*
- - Professionnelle ¬ *K03.2*
- - SAI ¬ *K03.2*
- - ¬ *K03.2*
- Ectropion
- - Col de l'utérus ¬ *N86*

Érosion *–suite*
- Ectropion *–suite*
- - ¬
- - - Cervicite avec ou sans *N72*
- - - Endocervicite avec ou sans *N72*
- - - Exocervicite avec ou sans *N72*
- Épithélium vaginal ¬ *N89.8*
- Gastro-colique ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Gastro-intestinal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Gastro-jéjunal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Jéjunal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Marginal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Œsophage ¬ *K20.8*
- Postopératoire post-TVT ¬ *T83.4*
- Stomal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- ¬ Hémorragie artérielle par *I77.2*

Érosive
- Aiguë
- - Hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - Occlusion avec lésion de Cameron *K44.0, K29.0*
- - - Sans occlusion avec lésion de Cameron *K44.9, K29.0*
- - ¬ Hernie diaphragmatique
- - - Occlusion avec lésion de Cameron *K44.0, K29.1*
- - - Sans occlusion avec lésion de Cameron *K44.9, K29.1*
- Cuir chevelu ¬ Dermatose pustuleuse *L30.8*
- Hémorragie ¬ Gastrite aiguë (*K29.0*
- Vésiculaire congénitale ¬ Dermatose *P83.8*
- ¬ (Ostéo)arthrose *M15.4*

ERP [Protoporphyrie érythropoïétique] ¬ *E80.0*

Erreur de dosage ¬ *Y69!*

Erronée d'un médicament ¬ Administration accidentelle ou prise *X49.9!*

Ertbruggen
v./v.a. Beemer-Ertbruggen

Éructation
- Nerveuse ¬ *F45.31*
- Psychogène ¬ *F45.31*
- ¬ *R14*

Éruptif
- Généralisée ¬ Histiocytose *D76.3*
- ¬ Xanthome: tubéro- *E78.2*

Éruption
- Consécutive à vaccination ¬ *T88.1*
- Cutané
- - Épisodes de lymphohistiocytose hémophagocytaire à début néonatal] ¬ Syndrome NOCARH [cytopénie-auto-inflammation- *D76.1*
- - Non spécifiques ¬ Rash et autres *R21*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R21*
- Dentaire
- - Prématurée ¬ *K00.6*

Éruption *–suite*
- Dentaire *–suite*
- - ¬
- - - Kyste: lié à l' *K09.0*
- - - Syndrome d' *K00.7*
- - - Troubles de l' *K00.6*
- Généralisée due à des médicaments ¬ *L27.0*
- Localisée due à des médicaments ¬ *L27.1*
- Polymorphe de la grossesse ¬ *O26.88*
- Sérique ¬ *T80.6*
- ¬ Modification de la teinte des tissus dentaires durs après l' *K03.7*

Érysipélateuse ¬ Dermatite *L00.0*

Érysipèle
- Oreille externe ¬ *A46†, H62.0**
- ¬
- - *A46*
- - Otite externe au cours d' *A46†, H62.0**

Érysipéloïde
- Cutanée ¬ *A26.0*
- ¬ Autres formes d' *A26.8*

Erysipelothrix ¬ Septicémie à *A26.7*

Erythema elevatum diutinum ¬ *L95.1*

Érythémateux
v./v.a. Lupus érythémateux
- Pinta [caraté] ¬ Plaques *A67.1*
- Réticulée ¬
- - Folliculite *L66.4*
- - Mucinose *L98.5*
- ¬
- - Intertrigo *L30.4*
- - Mucinose réticulée *L98.5*
- - Pemphigus *L10.4*

Erythematodes integumentalis ¬ Lupus *L93.0*

Érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite *L44.4*

Érythème
- Acnéiforme ¬ *L66.4*
- Annulaire
- - Centrifuge ¬ *L53.1*
- - Infantile ¬ *L53.3*
- - Nourrisson ¬ *L53.3*
- Arthritique épidémique ¬ *A25.1*
- Chronique migrateur à Borrelia burgdorferi ¬ *A69.2*
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *L54.8**
- Fessier ¬ *L22*
- Feu [dermite due au feu] ¬ *L59.0*
- Figuré chronique ¬ Autres formes d' *L53.3*
- Gingival linéaire ¬ *K05.1*
- Induré tuberculeux ¬ *A18.4*
- Infectieux aigu ¬ Cinquième maladie] [*B08.3*
- Iris ¬ *L51.1†, H22.8**
- Kératolytique hivernal ¬ *Q82.8*
- Localisé médicamenteux ¬ *L27.1*

Érythème *–suite*
- Marginé
- - Cours d'une fièvre rhumatismale aiguë ¬ *I00†, L54.0**
- - Discoïde de Besnier ¬ *L53.2*
- Migrant ¬ *A26.0*
- Multiforme de la conjonctive ¬ *L51.1†, H13.8**
- Nécrolytique acral ¬ *L53.8*
- Noueux ¬
- - *L52*
- - Arthropathie au cours d' *L52†, M14.89**
- Palmaire héréditaire ¬ *Q27.8*
- Pigmenté fixe ¬ *L27.1*
- Plantaire ¬ *L53.8*
- Polymorphe
- - Bulleux ¬ *L51.1*
- - Non bulleux ¬ *L51.0*
- - Sans précision ¬ *L51.9*
- - ¬
- - - Arthropathie au cours d' *L51.9†, M14.89**
- - - Formes d' *L51.8*
- SAI ¬ *L53.9*
- Sans précision ¬ *L53.9*
- Toxique
- - Nouveau-né ¬ *P83.1*
- - ¬ *L53.0*
- ¬ Autres formes précisées d' *L53.8*

Érythrasma ¬ *L08.1*

Érythrémie
- Aiguë
- - Rémission complète ¬ *C94.01*
- - ¬ *C94.00*
- Chronique
- - Rémission complète ¬ *D45*
- - ¬ *D45*
- Rémission complète ¬ *C94.01*
- ¬ *C94.00*

Érythrémique
- Aiguë en rémission complète ¬ Myélose *C94.01*
- ¬ Myélose *C94.00*

Érythroblastique
- Héréditaire avec test de lyse positif dans un sérum acidifié ¬ Multinucléarité *D64.4*
- ¬ Anémie leuco- *D64.8*

Érythroblastopénie
- Acquise) (adulte) (avec thymome) ¬ *D60*
- Congénitale ¬ *D61.0*
- Nourrisson ¬ *D61.0*
- Primaire ¬ *D61.0*
- Pure
- - Congénitale ¬ *D61.0*
- - Nourrisson ¬ *D61.0*
- - Primaire ¬ *D61.0*
- Transitoire de l'enfance ¬ *D60.1*

Érythroblastose chronique type Heilmeyer-Schöner
- Rémission complète ¬ *D45*
- ¬ *D45*

Érythrocyanose ¬ *I73.8*

Érythrocytaire
- Aplasique congénitale ¬ Anémie *D61.0*
- ¬ Déficit en pyruvate kinase *D55.2*

Érythrocyte ¬
- Hémorragie
- - Cutanée due à un syndrome de sensibilisation aux *D69.2*
- - Pétéchiale due à un syndrome de sensibilisation aux *D69.2*
- Syndrome de sensibilisation aux *D69.2*

Érythrocytose
- Congénitale primitive ¬ *D75.0*
- Familiale ¬ *D75.0*
- Gammopathie monoclonale-épanchements périnéphrétiques-shunt pulmonaire] ¬ Syndrome TEMPI [télangiectasie- *D47.2*
- Liée au stress ¬ *D75.1*
- Secondaire
- - Autosomique dominante ¬ *D75.1*
- - ¬ *D75.1*
- ¬ *D75.1*

Érythrodermie
- Congénitale
- - Ichtyosiforme
- - - Bulleuse de Brock ¬ *Q80.3*
- - - Non-bulleuse ¬ *Q80.2*
- - - Réticulaire ¬
- - - - *Q80.3*
- - - - CRIE [*Q80.3*
- - Létale ¬ *L21.1*
- Desquamative ¬ *L21.1*
- Ichtyosiforme bulleuse congénitale ¬ *Q80.3*
- Réticulo-leucémique maligne ¬ *C84.1*
- SAI ¬ *L53.9*

Érythrodermique diffuse type Voerner ¬ Kératodermie palmoplantaire *Q82.8*

Érythrodysesthésie palmoplantaire ¬ *L27.1*

Érythrœdème ¬
- *T56.1*
- Polynévrite *T56.1*

Érythrokératodermie
- Cardiomyopathie] ¬ Syndrome EKC [*Q82.8, I42.0*
- Cocardes ¬ *Q82.8*
- Progressive et symétrique ¬ *Q82.8*
- Variable ¬ *Q82.8*

Érythroleucémie
- Aiguë en rémission complète ¬ *C94.01*
- Rémission complète ¬ *C94.01*
- ¬ *C94.00*

Érythromélalgie
- Primaire ¬ *I73.8*

Érythromélalgie *–suite*
- Secondaire ¬ *I73.8*
- ¬
- - *I73.8*
- - Maladie de Mitchell (*I73.8*

Érythroplasie
- Épithélium buccal, y compris la langue ¬ *K13.2*
- Queyrat
- - SAI ¬ *D07.4*
- - ¬ *D07.4*

Érythropoïétine ¬ Polycythémie: due à: *D75.1*

Érythropoïétique
- Associée à un syndrome myéloprolifératif ¬ Uroporphyrie *D47.1, E80.2*
- Autosomique
- - Dominante ¬ Protoporphyrie *E80.0*
- - Récessive ¬ Protoporphyrie *E80.0*
- Congénitale] ¬ CEP [Porphyrie *E80.0*
- Syndrome myélodysplasique ¬ Uroporphyrie *D46.9, E80.2*
- ¬
- - ERP [Protoporphyrie *E80.0*
- - Protoporphyrie *E80.0*

Erythroprosopalgie de type Bing ¬ *G44.0*

Érythrose chronique
- Rémission complète ¬ *D45*
- ¬ *D45*

ESB [Encéphalopathie spongiforme bovine] ¬ Forme atypique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à *A81.0*

Escarre
- Décubitus) ¬ *L89*
- Pression
- - Perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [*L89.1*
- - Phlyctène (remplie de liquide séreux) (ouverte) (percée) ¬ Ulcère [*L89.1*
- - Sans indication de stade ¬ Ulcère [*L89.9*

Escher-Hort ¬ Syndrome de *H90.0*

Escherichia coli
- E. coli] ¬ Septicémie: *A41.51*
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.00!*
- - 3MRGN ¬ *U81.20!*
- - 4MRGN ¬ *U81.40!*
- Prématuré ¬ Sepsis à *P36.4*
- ¬
- - Arthrite à *M00.89, B96.2!*
- - Choc septique à *A41.51, R57.2*
- - Diarrhée entéropathogène à *A04.0*
- - Entérite
- - - *A04.4*
- - - Entéro-aggrégative à *A04.4*
- - - Entéro-hémorragique à *A04.3*
- - - Entéro-invasive à *A04.2*
- - - Entérotoxigène à *A04.1*

Escherichia coli *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Infection
- - - *A49.82*
- - - Congénitale à *P37.8, B96.2!*
- - - Entéro-invasive à *A04.2*
- - - Entéropathogène à *A04.0*
- - - Entérotoxigène à *A04.1*
- - - Généralisée à *A41.51*
- - - Voies urinaires à *N39.0, B96.2!*
- - Infections intestinales à *A04.4*
- - Méningite à *G00.8, B96.2!*
- - Méningo-encéphalite à *G04.2, B96.2!*
- - Pneumonie congénitale à *P23.4*
- - Pneumonie due à *J15.5*
- - Sepsis du nouveau-né à *P36.4*

Escobar ¬ Syndrome d' *Q87.1*

ESES [état de mal épileptique électrique pendant le sommeil lent] ¬ *G40.01*

Esophorie ¬ *H50.5*

Ésotropie
- Alternante) (monoculaire) non intermittente ¬ *H50.0*
- Strabisme convergent] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ *H50.3*
- Syndactylie-petite taille ¬ Syndrome de blépharophimosis-ptosis- *Q87.8*
- ¬ Maladie de Basedow avec orbitopathie endocrinienne et *E05.0†, H06.3**

Espace
- Intervertébral
- - Ossification et subluxation ¬ Rétrécissement des *M99.6*
- - Tissu conjonctif et discal ¬ Rétrécissement des *M99.7*
- Rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l' *R93.5*

Espacement anormal d'une ou de plusieurs dents ¬ *K07.3*

Espèce
- Appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ Infections causées par les *B35*
- Bordetella ¬ Coqueluche due à d'autres *A37.8*
- Demodex ¬ Dermatite des paupières due à l' *B88.0†, H03.0**
- Paragonimus ¬ Infection par l' *B66.4*
- Plasmodium
- - Exception Plasmodium falciparum
- - - Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres *B52*
- - - ¬ infections mixtes à Plasmodium vivax et autres *B51*
- - ¬ Infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre *B50*

Essence ¬
- *T52.0*
- Pneumonie due à des huiles et des *J69.1*

Essentiel
- Bénigne ¬ Hypertension *I10.0*
- Cuir chevelu ¬ Pachydermie vorticellée primaire *Q82.8*
- Maligne ¬ Hypertension *I10.1*
- Non précisée ¬ Hypertension *I10.9*
- Nystagmus-ulcère ¬ Syndrome de tremblement *Q87.8*
- Préexistante
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Hypertension *O10.0*
- - Cours de la grossesse, avec prééclampsie surajoutée ¬ Hypertension *O11*
- Primitive) (systémique) ¬ Hypertension (artérielle) (*I10*
- Progressif-trouble sévère du langage-dysmorphie faciale-déficience intellectuelle-trouble du comportement ¬ Syndrome de tremblement *Q87.0*
- Progressive) ¬ Atrophie de l'iris (*H21.2*
- ¬
- - Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: tremblement *G11.1*
- - Carence en acides gras *E63.0*
- - Cryoglobulinémie: *D89.1*
- - Cutis verticis gyrata primitif non *Q82.8*
- - Fructosémie *E74.1*
- - Histiocytose lipoïde *E75.2*
- - Hypercholestérolémie *E78.0*
- - Hyperglycéridémie *E78.1*
- - Pentosurie *E74.8*
- - Polyglobulie *D45*
- - Syndrome de surdité neurosensorielle-grisonnement précoce-tremblement *H90.5, G25.0*
- - Télangiectasie *L81.7*
- - Thrombocytémie
- - - *D47.3*
- - - *D47.3*
- - Thrombocytose *D47.3*
- - Tremblement *G25.0*

Essentiellement
- Délirant ¬ Autre trouble psychotique aigu, *F23.3*
- Non médicinale ¬ Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine *T97*
- Sexuel
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies dont le mode de transmission est *O98.3*
- - ¬
- - - Maladies précisées dont le mode de transmission est *A63.8*
- - - Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est *Z22.4*
- - - Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est *Z20.2*
- Sur

Essentiellement *–suite*
- Sur *–suite*
- - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ Intoxication: Substances agissant *T48.7*
- - Muscles, autres et sans précision ¬ Intoxication: Substances agissant *T48.2*
- - Système
- - - Cardio-vasculaire, autres et sans précision ¬ Intoxication: Substances agissant *T46.9*
- - - Nerveux autonome, autres et sans précision ¬ Intoxication: Médicaments agissant *T44.9*
- - Tractus gastro-intestinal
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substance agissant *T47.9*
- - - ¬ Intoxication: Autres substances agissant *T47.8*
- Systémique et hématologique, sans précision ¬ Intoxication: Substance *T45.9*
- Systémiques et hématologiques ¬ Intoxication: Autres substances *T45.8*

Essoufflement ¬ *R06.0*

Ester
- Cholestérol ¬
- - Déficit en protéine de transfert des *E78.4*
- - Maladie de stockage des *E75.5*
- Nitriques ¬ Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et *T65.5*
- ¬ Solvants du groupe: *L24.2*

Estérase ¬ Déficit de l'inhibiteur de la C1 *D84.1*

Esthésioneuroblastome ¬ *C30.0*

Esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération *U69.10!*

Esthiomène ¬ *A55*

Estime de soi pendant l'enfance ¬ Événements ayant entraîné la perte de l' *Z61*

Estival
- Europe centrale] ¬ FSME [Encéphalite verno-*A84.1*
- Russe ¬ Méningo-encéphalite verno- *A84.0*
- ¬
- - Hydroa *L56.4*
- - Vascularite livédoïde avec ulcérations *L95.0*

Estomac
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens ¬ Ulcère de l' *K25.9, Y57.98!*
- Associé au virus d'Epstein-Barr ¬ Carcinome du corps de l' *C16.2*
- Cours syndrome Lynch ¬ Carcinome
- - Corps de l' *C16.2*
- - Grande courbure de l' *C16.6*
- - Petite courbure de l' *C16.5*
- Diffus
- - Familial ¬ Cancer de l' *C16.9*

Estomac *–suite*
- Diffus *–suite*
- - Héréditaire ¬ Cancer de l' *C16.9*
- Duodénum
- - Saignement ¬ Angiodysplasie de l' *K31.82*
- - Sans
- - - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie de l' *K31.81*
- - - Précision ¬ Maladie de l' *K31.9*
- - ¬
- - - Affections précisées de l' *K31.88*
- - - Fistule de l' *K31.6*
- - - Polype de l' *K31.7*
- - - Ulcères aigus de l' *K27.3*
- Intrathoracique-anomalies vertébrales ¬ Syndrome de brachy-œsophage congénital- *Q87.8*
- Inversion totale des viscères ¬ Transposition de l' *Q89.3*
- Localisations contiguës ¬ Tumeur neuroendocrine maligne de l' *C16.8*
- Origine médicamenteuse ¬ Ulcère de l' *K25.9, Y57.98!*
- Sablier
- - Congénital ¬ *Q40.2*
- - Sténose de l'estomac ¬ *K31.2*
- Saignement ¬
- - Angiectasie de l' *K31.82*
- - Syndrome GAVE [ectasie vasculaire antrale gastrique] à l' *K31.82*
- Sans
- - Indication saignement ¬
- - - Angiectasie de l' *K31.81*
- - - Syndrome GAVE [ectasie vasculaire antrale gastrique] à l' *K31.81*
- - Précision ¬
- - - Malformation congénitale de l' *Q40.3*
- - - Tumeur maligne
- - - - *C16.9*
- - - - Grande courbure de l' *C16.6*
- - - - Petite courbure de l' *C16.5*
- Type
- - 1
- - - Forme familiale
- - - - Lésion à localisations contiguës ¬ Tumeur neuroendocrine de l' *C16.8*
- - - - ¬ Tumeur neuroendocrine de l' *D13.1*
- - - Localisations contiguës ¬ Tumeur neuroendocrine familiale maligne de l' *D13.1*
- - - ¬ Tumeur neuroendocrine familiale maligne
- - - - *C16.9*
- - - - Antre de l' *C16.3*
- - - - Corps de l' *C16.2*
- - - - Grande courbure de l' *C16.6*
- - - - Petite courbure de l' *C16.5*
- - Borrmann 4 ¬ Cancer de l' *C16.9*
- ¬

Estomac *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Absence acquise de partie d' *Z90.3*
- - Adénocarcinome
- - - *C16.9*
- - - Diffus de l' *C16.9*
- - Antre de l' *C16.3*
- - Carcinoma in situ: *D00.2*
- - Carcinome
- - - Diffus héréditaire du corps de l' *C16.2*
- - - Lympho-épithélial-like de l' *C16.9*
- - Carcinome épidermoïde
- - - *C16.9*
- - - Corps de l' *C16.2*
- - - Grande courbure de l' *C16.6*
- - - l'antre de l' *C16.3*
- - - Orifice œsophagien de l' *C16.0*
- - - Petite courbure de l' *C16.5*
- - Carcinome héréditaire diffus
- - - Antre de l' *C16.3*
- - - Grande courbure de l' *C16.6*
- - - Petite courbure de l' *C16.5*
- - Carcinome indifférencié
- - - *C16.9*
- - - Corps de l' *C16.2*
- - - Grande courbure de l' *C16.6*
- - - Localisations contiguës de l' *C16.8*
- - - Petite courbure de l' *C16.5*
- - Contraction en sablier de l' *K31.8*
- - Corps étranger dans l' *T18.2*
- - Dédoublement de l' *Q40.2*
- - Déplacement congénital de l' *Q40.2*
- - Dilatation aiguë de l' *K31.0*
- - Distension aiguë de l' *K31.0*
- - Diverticule congénital de l' *Q40.2*
- - Érosion (aiguë) de l' *K29.6*
- - Estomac en sablier et sténose de l' *K31.2*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur de l' *Z12.0*
- - GAPPS [Adénocarcinome gastrique et polypose proximale de l' *C16.9*
- - Infection à Helicobacter pylori au cours d'ulcère de l' *K25.9, B98.0!*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- - Léiomyosarcome de l' *C16.9*
- - Lésion traumatique de l' *S36.3*
- - Linite plastique
- - - *C16.9*
- - - Antre de l' *C16.3*
- - - Corps de l' *C16.2*
- - - Grande courbure de l' *C16.6*
- - - Petite courbure de l' *C16.5*
- - Lymphome MALT [Mucosa Associated Lymphoid Tissue] de l' *C88.40*
- - Malformations congénitales précisées de l' *Q40.2*

Estomac *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Œsophage et *C16.0*
- - Orifice œsophagien de l' *C16.0*
- - Rupture de l' *K31.88*
- - Sténose pylorique de l'adulte par tumeurs à l' *K31.12*
- - Syphilis de l' *A52.7†, K93.8**
- - Troubles fonctionnels de l' *K31*
- - Tuberculose de l' *A18.8†, K93.8**
- - Tumeur bénigne: *D13.1*
- - Tumeur maligne
- - - Corps de l' *C16.2*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C16.8*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - *C16.9*
- - - *D13.1*
- - - Grande courbure de l' *C16.6*
- - - Maligne
- - - - Antre de l' *C16.3*
- - - - Corps de l' *C16.2*
- - - Petite courbure de l' *C16.5*
- - Tumeur stromale gastro-intestinale TSGI GIST
- - - *C16.9*
- - - Corps de l' *C16.2*
- - - Grande courbure de l' *C16.6*
- - - Localisations contiguës de l' *C16.8*
- - - Petite courbure de l' *C16.5*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.1*
- - Ulcère
- - - *K25*
- - - Dieulafoy à l' *K25.0*

Établissement
- Certificat médical ¬ *Z02*
- Formation ¬ inscription dans: *Z02*
- Institutionnels ¬ Examen général en série de: résidents d' *Z10*
- Pénitentiaire ¬ inscription dans: *Z02*
- Prise en charge adapté ¬ Personne attendant d'être admise dans un *Z75.8*
- Résidentiel ¬ inscription dans: *Z02*
- Santé et autres structures d'aide ¬ Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux *Z75.8*
- Soins ¬ Autres pensionnaires d' *Z76.4*

Étage
- Sous-glottique ¬
- - Léiomyosarcome de l' *C32.2*
- - Tumeur maligne: *C32.2*
- Sus-glottique ¬
- - Léiomyosarcome de l' *C32.1*
- - Tumeur maligne: *C32.1*

Etain et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.6*

Étalage sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: vol à l' *Z03.2*

Étalé en eventail, acquis ¬ Pied *M21.63*

Étendue

- Sur la surface du corps ¬ Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur *T95.4*
- ¬ Arthrite juvénile chronique à début oligoarticulaire à évolution polyarticulaire [oligoarthrite *M08.3*

Eternuement ¬ *R06.7*

Ethanol ¬ Effet toxique: *T51.0*

Éthanolaminurie ¬ *E72.8*

Ether de pétrole ¬ *T52.0*

Ethmoïdal

- Aiguë ¬ Sinusite *J01.2*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.2*
- SAI ¬ Sinusite *J32.2*
- ¬
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] du sinus *C31.1*
- - Carcinome épidermoïde du sinus *C31.1*
- - Mélanome malin de la muqueuse du sinus *C31.1*
- - Polypes du sinus (de): *J33.8*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire du sinus *C31.1*
- - Sinus: *S02.1*

Ethmoïde ¬

- Os: *D16.41*
- Ostéoblastome de l'os *D16.41*
- Sarcome de l'os *C41.01*

Ethmoïdite de Woakes ¬ Syndrome ou *J33.1*

Éthylène glycol ¬ Effet toxique de l' *T52.3*

Éthylique ¬ Alcool *T51.0*

Éthylmalonique ¬ Encéphalopathie *G31.81*

Étiologie

- Inconnue ¬ Fièvre d' *R50.80*
- Indéterminée [ICEI] ¬ Intervillite chronique d' *O41.1*
- Non précisée ¬
- - *I07*
- - *I08*

Étoile

- Mer ¬ *T63.6*
- ¬ Hyalose syphilitique tardive en forme d' *A52.7†, H45.8**

Étouffement

- Lit ¬ *X59.9!*
- ¬ Sensation d' *R06.88*

Étourdissements et éblouissements ¬ *R42*

Étrange et inexplicable ¬ Comportement *R46.2*

Étranglé

- Sans gangrène ¬
- - Hernie
- - - Interstitielle *K46.0*
- - - Intestinale *K46.0*
- - - Intra-abdominale *K46.0*
- - Hernie crurale (unilatérale): *K41.3*

Étranglé *–suite*

- Sans gangrène ¬ *–suite*
- - Hernie diaphragmatique: *K44.0*
- - Hernie inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - Hernie ombilicale: *K42.0*
- - Hernie ventrale *K43.69*
- - ¬
- - Hémorroïdes
- - - Externes *K64.5*
- - - Internes *K64.8*
- - Hernie de la ligne médiane *K43.68*
- - Hernie de Spieghel *K43.68*
- - Hernie hypogastrique *K43.68*
- - Hernie incisionnelle *K43.0*
- - Hernie parastomale *K43.3*
- - Hernie sous-xiphoïdienne *K43.68*

Étranglement

- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.2*
- Ischémique de l'intestin ¬ *K55.1*
- ¬ *X59.9!*

Étrier

- Pouces et orteils larges ¬ Ankylose de l' *Q87.8*
- ¬
- - *Z96.2*
- - Ankylose infectieuse de l'enclume et de l' *H74.3*

Étroit ¬

- Glaucome primitif à angle *H40.2*
- Orifice hyménal *N89.6*

Étudiants ¬ Examen général en série de: *Z10*

Eulenburg] ¬ Paramyotonie congénitale [Maladie d' *G71.1*

Eumycétome ¬ *B47.0*

Eunuchoïdisme fertile ¬ Syndrome de: *E23.0*

Europe centrale

- Transmise par des tiques ¬ Encéphalite d' *A84.1*
- ¬ FSME [Encéphalite verno-estivale d' *A84.1*

Euryblépharon ¬ *Q10.3*

Eustache

v./v.a. Trompe d'Eustache

- Persistante ¬ Valve d' *Q26.8*

Euthyroïdien

- Dyspré-albuminémie ¬ Hyperthyroxinémie *E07.8*
- ¬
- - Orbitopathie endocrinienne *E05.0†, H06.2**
- - Syndrome de dysfonctionnement *E07.8*

Évaginée ¬ Dent: *K00.2*

Evanouissement ¬ *R55*

Evans

v./v.a. Howell-Evans

- Associé à une immunodéficience primaire ¬ Syndrome d' *D69.3, D82.9*
- ¬ Syndrome d' *D69.3*

Évasif ¬ Caractère soupçonneux et *R46.5*

EVEN [dysplasie épiphysaire-vertébrale-oreilles-nez]-plus ¬ Syndrome *Q87.8*

Événement

- Aigu constituant un risque vital chez le nourrisson ¬ *R06.80*
- Cours ¬
- - Hémiplégie
- - - Embolique en tant qu' *I63.4, G81.9*
- - - Thrombotique en tant qu' *I63.3, G81.9*
- - Monoplégie
- - - Embolique en tant qu' *I63.4, G83.3*
- - - Thrombotique en tant qu' *I63.3, G83.3*
- - Tétraplégie
- - - Embolique en tant qu' *I63.4, G82.52*
- - - Thrombotique en tant qu' *I63.3, G82.52*
- Entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance ¬ *Z61*
- Sans autre précision, circonstances indéterminées ¬ *Y34!*
- Sources de tension ¬ Inquiétude et préoccupation exagérées pour les *R46.6*

Eventail, acquis ¬ Pied étalé en *M21.63*

Éventration

- Diaphragme ¬ *Q79.1*
- ¬
- - *K43.99*
- - Défaut congénital du diaphragme, avec *Q79.1*

Eversion

- Col de l'utérus ¬ *N86*
- Point lacrymal ¬ *H04.5*

Évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Mise en *R75*

Évident ¬ Mise observation

- Activité répréhensible en bande sans trouble psychiatrique *Z03.2*
- Comportement asocial sans trouble psychiatrique *Z03.2*
- Pyromanie sans trouble psychiatrique *Z03.2*
- Vol à l'étalage sans trouble psychiatrique *Z03.2*

Évitante] ¬ Personnalité anxieuse [*F60.6*

Evitement de l'enfance et de l'adolescence ¬ *F93.2*

Évoluant vers crise secondairement généralisées ¬ crise partielles

- Complexes *G40.2*
- Simples *G40.1*

Évolutif

- Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament ¬ Autres formes *D70.18*
- ¬
- - Cardiopathie aiguë ou *I01.9*
- - Rachitisme *E55.0*

Évolution

v./v.a. Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue

- Agressif
- - Réarrangement MYC

Évolution *–suite*
- Agressif *–suite*
- - Réarrangement MYC *–suite*
- - - BCL2
- - - - BCL6 ¬ Lymphome B d ' *C83.8*
- - - - ¬ Lymphome B d ' *C83.8*
- - - BCL6 ¬ Lymphome B d ' *C83.8*
- - ¬ Lymphome T cutané épidermotrope CD8+ d' *C84.5*
- Imprévisible inconnue
- - Organes digestifs ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à *D37.78*
- - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à *D37.70*
- - Sans précision ¬ Tumeur
- - - *D48.9*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à *D47.9*
- - ¬ tumeur
- - - Histiocytaires à *D47.7*
- - - Histiocytes et mastocytes à *D47.0*
- - - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à *D47.7*
- Polyarticulaire
- - Extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d' *M08.3*
- - Oligoarthrite étendue] ¬ Arthrite juvénile chronique à début oligoarticulaire à *M08.3*
- Poussées
- - Exacerbation aiguë ¬ Sclérose en plaques de l'enfant rémittente (*G35.11*
- - Mention d'exacerbation aiguë ou de progression ¬ Sclérose en plaques rémittente (*G35.11*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression ¬ Sclérose en plaques rémittente (*G35.10*
- - ¬ Sclérose en plaques
- - - Aiguë de Marburg rémittente (*G35.10*
- - - Enfant rémittente (*G35.10*
- - - Rémittente (*G35.1*
- Rapide ¬
- - Glomérulonéphrite d' *N01*
- - Glomérulopathie d' *N01*
- - Néphrite d' *N01*
- - Syndrome néphritique d' *N01*

Évoqués visuellement ¬ Anomalies (de): potentiels *R94.1*

Ewing
v./v.a. Sarcome d'Ewing
- Squelettique des os courts du membre supérieur ¬ Sarcome d ' *C40.1*

Exacerbation
- Aiguë
- - Progression ¬ Sclérose en plaques
- - - Progressive emblée chronique progressive primaire
- - - - Mention d' *G35.21*
- - - - Sans mention d' *G35.20*
- - - Rémittente

Exacerbation *–suite*
- Aiguë *–suite*
- - Progression ¬ Sclérose en plaques *–suite*
- - - Rémittente *–suite*
- - - - Évolution poussées
- - - - - Mention d' *G35.11*
- - - - - Sans mention d' *G35.10*
- - - - Progressive (chronique, secondairement progressive), avec mention d' *G35.31*
- - ¬
- - - Alvéolite
- - - - Allergique due poussière organiques
- - - - - *J67.91*
- - - - - Sans mention d' *J67.90*
- - - - Fibreux
- - - - - *J84.11*
- - - - - Sans mention d' *J84.10*
- - - Bagassose
- - - - *J67.11*
- - - - Sans mention d' *J67.10*
- - - Bronchiolite oblitérante avec organisation pneumonique [BOOP] avec *J84.01*
- - - Fibrose pulmonaire
- - - - Diffuse
- - - - - *J84.11*
- - - - - Sans mention d' *J84.10*
- - - - Idiopathique
- - - - - *J84.11*
- - - - - Sans mention d' *J84.10*
- - - Hyperplasie cellule neuroendocrine nourrisson
- - - - *J84.81*
- - - - Sans mention d' *J84.80*
- - - Maladie due séquoïa
- - - - *J67.81*
- - - - Sans mention d' *J67.80*
- - - Microlithiase pulmonaire alvéolaire
- - - - *J84.01*
- - - - Sans mention d' *J84.00*
- - - Pneumoconiose due
- - - - Amiante
- - - - - Mention d' *J61.1*
- - - - - Sans mention d' *J61.0*
- - - - Fibre minérale
- - - - - Mention d' *J61.1*
- - - - - Sans mention d' *J61.0*
- - - Pneumonie interstitielle
- - - - *J84.91*
- - - - Aiguë
- - - - - *J84.11*
- - - - - Sans mention d' *J84.10*
- - - - Sans mention d' *J84.90*
- - - - Usuelle
- - - - - *J84.11*
- - - - - Sans mention d' *J84.10*
- - - Pneumopathie

Exacerbation *–suite*
- Aiguë *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Pneumopathie *–suite*
- - - - Interstitielle
- - - - - *J84.91*
- - - - - Sans mention d' *J84.90*
- - - - Organisée cryptogénique POC
- - - - - *J84.01*
- - - - - Sans mention d' *J84.00*
- - - Poumon
- - - - Champignonnistes
- - - - - *J67.51*
- - - - - Sans mention d' *J67.50*
- - - - Écorceurs érable
- - - - - *J67.61*
- - - - - Sans mention d' *J67.60*
- - - - Fourreurs
- - - - - *J67.81*
- - - - - Sans mention d' *J67.80*
- - - - Laveurs fromage
- - - - - *J67.81*
- - - - - Sans mention d' *J67.80*
- - - - Malteurs
- - - - - *J67.41*
- - - - - Sans mention d' *J67.40*
- - - - Oiseleurs
- - - - - *J67.21*
- - - - - Sans mention d' *J67.20*
- - - - Torréfacteurs café
- - - - - *J67.81*
- - - - - Sans mention d' *J67.80*
- - - - Travailleurs préparation alimentaire base poisson
- - - - - *J67.81*
- - - - - Sans mention d' *J67.80*
- - - Protéinose alvéolaire
- - - - *J84.01*
- - - - Sans mention d' *J84.00*
- - - Sclérose en plaques
- - - - Aiguë de Marburg progressive primaire avec *G35.21*
- - - - Enfant rémittente (évolution par poussées), avec *G35.11*
- - - Subérose
- - - - *J67.31*
- - - - Sans mention d' *J67.30*
- - - Syndrome Hamman Rich
- - - - *J84.11*
- - - - Sans mention d' *J84.10*
- Infectieuse d'un asthme bronchique allergique ¬ *J45.89*

Exacerbé ¬ Asthme *J45.99*

Exagérées pour les événements sources de tension ¬ Inquiétude et préoccupation *R46.6*

Examen
- Adolescent en cours de croissance ¬ *Z00.3*

Examen *–suite*
- Allaitement maternel ¬ Soins et *Z39.1*
- Avant
- - Conscription ¬ *Z02*
- - Embauche ¬ *Z02*
- Bactériologique histologique ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse n'ayant pas fait l'objet d'un *A16.1*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse n'ayant pas fait l'objet d'un *A16.1*
- - Pneumonie tuberculeuse n'ayant pas fait l'objet d'un *A16.1*
- - Tuberculose pulmonaire n'ayant pas fait l'objet d'un *A16.1*
- Chimique sang
- - Sans précision ¬ Résultat anormal des *R79.9*
- - ¬ Autres résultats anormaux précisés des *R79.8*
- Comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique ¬ *Z00.6*
- Cytologique et histologique des urines ¬ Résultats anormaux de l' *R82.8*
- Dentaire ¬ *Z01.2*
- Donneur éventuel d'organe et de tissu ¬ *Z00.5*
- Fins médico-légales ¬ *Z04*
- Général
- - Routine d'une sous-population définie ¬ *Z10*
- - Série
- - - Enfants scolarisés ¬ *Z10*
- - - Équipes sportives ¬ *Z10*
- - - Étudiants ¬ *Z10*
- - - Membres des forces armées ¬ *Z10*
- - - Résidents d'établissements institutionnels ¬ *Z10*
- Généraux ¬ Autres *Z00.8*
- Gynécologique (de routine) (général) ¬ *Z01.4*
- Hématologiques ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*
- Immédiatement après l'accouchement ¬ Soins et *Z39.0*
- Laboratoire
- - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Mise en évidence par des *R75*
- - ¬ *Z01.7*
- Lié prédisposition
- - Cardiomyopathies ¬ *Z01.81*
- - Dysrythmies malignes ¬ *Z01.80*
- Liquide céphalorachidien ¬ Résultats anormaux de l' *R83.9*
- Médecine du travail ¬ *Z10*
- Médical
- - Général ¬ *Z00.0*
- - Prise de contact à des fins administratives ¬ *Z02*

Examen *–suite*
- Microbiologique des urines ¬ Résultats anormaux de l' *R82.7*
- Mise observation
- - Accident
- - - Transport ¬ *Z04.1*
- - - Travail ¬ *Z04.2*
- - - ¬ *Z04.3*
- - Blessures dues à une agression ¬ *Z04.5*
- - Raison non précisée ¬ *Z04.9*
- - Raisons précisées ¬ *Z04.8*
- Oreilles et de l'audition ¬ *Z01.1*
- Parasitologique, non classés ailleurs ¬ Autres paludismes, confirmés par *B53.8*
- Pelvien (annuel) (périodique) ¬ *Z01.4*
- Période de croissance rapide de l'enfance ¬ *Z00.2*
- Périodique (annuel) (physique) ¬ *Z00.0*
- Psychiatrique général
- - Demande des autorités ¬ *Z04.8*
- - Non classé ailleurs ¬ *Z00.4*
- Radiologique, non classé ailleurs ¬ *Z01.6*
- Routine
- - Enfant ¬ *Z00.1*
- - Entretien de la contraception ¬ *Z30.4*
- - Limité à un organe donné ¬ *Z01*
- Sanitaire au cours d'enquêtes de population ¬ *Z00.8*
- Soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses couches ¬ *N96*
- Spécial
- - Diabète sucré ¬ *Z13.18*
- - Sans précision ¬ *Z01.9*
- Spéciaux non précisés ¬ Autres *Z01.88*
- Suivi
- - Traitement d'autres maladies ¬ *Z09.88*
- - Transplantation d'organe ¬ *Z09.80*
- Test de grossesse ¬ *Z32*
- Urines, autres et non précisés ¬ Résultats anormaux de l' *R82.9*
- Victime coupable
- - Blessures dues à une agression ¬ *Z04.5*
- - Viol ou un abus sexuel allégué ¬ *Z04.5*
- Vue de: adoption ¬ *Z02*
- Yeux et de la vision ¬ *Z01.0*
- ¬
- - Conseil et surveillance pour: Consultation pour l'explication de résultats d' *Z71*
- - Échec aux *Z55*
- - Infarctus du myocarde: ancien découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l' *I25.2*

Examen de contrôle
- Chimiothérapie
- - Affections ¬ *Z09.2*
- - Tumeur maligne ¬ *Z08.2*

Examen de contrôle *–suite*
- Correction et palliation de malformation cardiaque congénitale ¬ *Z09.81*
- Psychothérapie ¬ *Z09.3*
- Radiothérapie
- - Affections ¬ *Z09.1*
- - Tumeur maligne ¬ *Z08.1*
- Traitement
- - Affection, sans précision ¬ *Z09.9*
- - Affections ¬ *Z09.8*
- - Chirurgical
- - - Affections ¬ *Z09.0*
- - - Tumeur maligne ¬ *Z08.0*
- - Combinés
- - - Affections ¬ *Z09.7*
- - - Tumeur maligne ¬ *Z08.7*
- - Fracture ¬ *Z09.4*
- - Tumeur maligne
- - - Sans précision ¬ *Z08.9*
- - - ¬ *Z08.8*

Examen microscopique de l'expectoration
- Culture ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmée par *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmée par *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmée par *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé par *A15.0*
- Sans culture procédé biologie moléculaire ¬
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l' *A15.0*
- ¬ Tuberculose pulmonaire confirmée bactériologiquement et par *A15.0*

Examen prénatal systématique de la mère
- Sans précision ¬ Résultat anormal constaté au cours de l' *O28.9*
- ¬ résultat
- - Anormaux au cours de l' *O28.8*
- - Biochimiques anormaux au cours de l' *O28.1*
- - Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l' *O28.5*
- - Cytologiques anormaux au cours de l' *O28.2*
- - Échographiques anormaux au cours de l' *O28.3*
- - Hématologiques anormaux au cours de l' *O28.0*
- - Radiologiques anormaux au cours de l' *O28.4*

Examen spécial de dépistage
- Affections
- - Cardio-vasculaires ¬ *Z13.6*
- - Yeux et des oreilles ¬ *Z13.5*

Examen spécial de dépistage *–suite*
- Autoanticorps anti-cellules insulaires ¬ *Z13.10*
- Certains troubles du développement de l'enfance ¬ *Z13.4*
- Diabète sucré ¬ *Z13.1*
- Maladies
- - Infectieuses et parasitaires ¬ *Z11*
- - Précisées ¬ *Z13.8*
- - Sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ *Z13.0*
- Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ¬ *Z13.7*
- Sans précision ¬ *Z13.9*
- Troubles de la nutrition ¬ *Z13.2*
- Tumeur
- - Appareil respiratoire ¬ *Z12.2*
- - Col de l'utérus ¬ *Z12.4*
- - Estomac ¬ *Z12.0*
- - Intestin ¬ *Z12.1*
- - Localisations ¬ *Z12.8*
- - Prostate ¬ *Z12.5*
- - Sans précision ¬ *Z12.9*
- - Sein ¬ *Z12.3*
- - Vessie ¬ *Z12.6*

Exanthémateuse
- Entérovirus [exanthème de Boston] ¬ Fièvre *A88.0*
- ¬ Polyarthrite épidémique *B33.1*

Exanthématique
- Aiguë généralisée ¬
- - PEAG [pustulose *L27.0*
- - Pustulose
- - - *L27.0*
- - - *L27.1*
- Brilli NCA ¬ Typhus *A75.1*

Exanthème
- Boston ¬
- - *A88.0*
- - Fièvre exanthémateuse à entérovirus [*A88.0*
- Due à un entérovirus ¬ Stomatite vésiculaire avec *B08.4*
- Entérovirus ¬ Fièvre avec *A88.0*
- Épidémique avec méningite ¬ *A88.0†, G02.0**
- Scarlatineux ¬ *A38*
- Subit [fièvre des trois jours] ¬ *B08.2*
- Toxique dû au contact de la peau avec un médicament ¬ *L24.4*
- Varicelleux ¬ *B01.8*
- Viral SAI ¬ *B09*

Excavation
- Familiale de la papille optique ¬ *Q14.2*
- Papillaire accrue ¬ Syndrome de cicatrices chéloïdes lié à l'X avec mobilité articulaire réduite et *Q87.8*
- Papille optique ¬ *H47.2*

Excédentaire et flasque ¬ Peau et tissu sous-cutané *L98.7*

Excentrique ¬ Personnalité: *F60.8*

Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, *D55.1*

Exception
- Orteil lymphangite ¬
- - Infection purulente du pied (à l' *L03.11*
- - Inflammation purulente du pied (à l' *L03.11*
- Plasmodium falciparum
- - Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l' *B52*
- - ¬ infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l' *B51*
- Virus influenza porcine aviaire
- - Associée
- - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l' *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l' *J09, U69.24!*
- - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l' *J09, U69.24!*
- - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l' *J09, U69.24!*
- - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l' *J09, U69.24!*
- - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l' *J09, U69.24!*
- - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l' *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l' *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l' *J09, U69.24!*
- - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l' *J09, U69.24!*
- - - ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l' *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - ¬ Grippe Influenza virus influenza zoonotique pandémique identifié
- - - *J09, U69.24!*
- - - Associée à une encéphalite, à l' *J09†, G05.1*, U69.24!*
- Yeux) ¬ Nævus d'Ota sur la peau du visage (à l' *D22.3*

Exceptionnellement gros ¬ Enfant *P08.0*

Excès
- Apparent minéralocorticoïdes
- - Crise hypertensive ¬ *I15.11*

Excès *–suite*
- Apparent minéralocorticoïdes *–suite*
- - ¬ *I15.10*
- Apport ¬ Séquelles d' *E68*
- Aromatase ¬ Syndrome d' *E30.1*
- Blastes
- - AREB] ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - Transformation ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - Type
- - - I [AREB I] ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - - II [AREB II] ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - ¬
- - - Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - - Myélodysplasie avec *D46.9*
- Calorique
- - Enfant adolescent ¬ Obésité
- - - Due à un *E66.04*
- - - Extrême due à un *E66.05*
- - Indice de masse corporelle IMC
- - - 40 et moins de 50 ¬ Obésité due à un *E66.06*
- - - 50 et moins de 60 ¬ Obésité due à un *E66.07*
- - - 60 et plus ¬ Obésité due à un *E66.08*
- - - Compris
- - - - 30 et moins de 35 ¬ Obésité due à un *E66.00*
- - - - 35 et moins de 40 ¬ Obésité due à un *E66.01*
- - ¬ Obésité grade
- - - I (OMS) due à un *E66.00*
- - - II (OMS) due à un *E66.01*
- - - III (OMS) due à un *E66.09*
- Insuffisance de convergence ¬ *H51.1*
- Peau ¬ Syndrome de dysmorphie faciale-fente palatine- *Q87.0*
- Potassium [K] ¬ *E87.5*
- Précisés d'apport ¬ Autres *E67.8*
- Sel dans le sang ¬ *E87.0*
- Sodium [Na] ¬ *E87.0*

Excessif
- Associé à CHD8 ¬ Syndrome de croissance *Q87.3*
- Cours de la grossesse ¬ Prise de poids *O26.0*
- Dents ¬ Attrition *K03.0*
- Fœtus
- - Trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance *O36.6*
- - ¬ Soins maternels pour croissance *O36.6*
- Lié à DNMT3A ¬ Syndrome de croissance *Q87.3*
- Liée à l'X ¬ Myopathie avec autophagie *G71.8*

Excessif *–suite*
- Macrocéphalie-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de croissance *Q87.3*
- Malan ¬ Syndrome de croissance *Q87.3*
- Médicaments déclencheurs de contractions ¬ Hyperactivité de l'utérus due à une stimulation *O62.8, Y57.98!*
- Mégalencéphalie-cyphoscoliose sévère ¬ Syndrome de croissance *Q87.3*
- Modelage métaphysaire réduit-dysplasie spondylaire ¬ Syndrome de croissance *Q87.3*
- Mouvements stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au stress *X59.9!*
- Non classée ailleurs ¬ Fracture par sollicitation *M84.3*
- Nourrisson ¬ Pleurs *R68.1*
- Overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue ¬ Prise *X49.9!*
- Précisées ¬ Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses *P58.8*
- Sans précision ¬
- - Affection des tissus mous par sollicitation *M70.9*
- - Ictère néonatal dû à une hémolyse *P58.9*
- Système pileux ¬ développement *L68*
- Translocation 2q37 ¬ Syndrome de croissance *Q87.3*
- Tumeur de Wilms ¬ Syndrome de retard de développement-kystes pulmonaires-croissance *C64, Q87.3*
- Urine ¬ Sécrétion *R35.0*
- ¬
- - Activité sexuelle *F52.7*
- - Affections des tissus mous par sollicitation *M70.8*
- - Alimentation *R63.2*
- - Bruits abdominaux *R19.1*
- - Expectoration *R09.3*
- - Exposition
- - - Chaleur
- - - - Artificielle *W92.9!*
- - - - Froid naturel *X59.9!*
- - - Froid artificiel
- - - - *W93!*
- - - - *W93.9!*
- - Masturbation *F98.88*
- - Rougeur *R23.2*
- - Soif *R63.1*
- - Syndrome de carence en surfactant du à une inactivité *P22.0*
- - Troubles du sommeil par somnolence *G47.1*

Excitation auriculoventriculaire anormale ¬ *I45.6*

Exclusion
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Col ¬ Affection inflammatoire
- - Aiguë de l'utérus, à l' *N71.0*

Exclusion *–suite*
- Col ¬ Affection inflammatoire *–suite*
- - Chronique de l'utérus, à l' *N71.1*
- - Utérus, sans précision, à l' *N71.9*
- Écaille temporale ¬ Temporal, à l' *S02.1*
- Rejet sociaux ¬ *Z60*

Excoriation névrotique ¬ *L98.1*

Excoriée
- Jeunes filles ¬ Acné *L70.5*
- ¬ Acné *L70.5*

Excréteur
v./v.a. Canal excréteur

Excrétion urinaire ¬ Augmentation de l' *R35.0*

Excroissance préauriculaire-polythélie ¬ Syndrome de lipodermoïde du globe oculaire- *Q18.2*

Exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l' *Y84.9!*

Exedens ¬ Lupus *A18.4*

Exercice
- Physique ¬ Manque d' *Z72.8*
- Thérapeutiques et curatifs ¬ *Z50.1!*

Exfoliatif ¬
- Ichtyose *Q80.8*
- Psoriasis *L40.8*

Exfoliation
- Dentaire due à des causes générales ¬ *K08.0*
- Peau ¬ *R23.4*

Exfoliatrice
- Marginée ¬ Glossite: *K14.1*
- Staphylococcique du nourrisson ¬ Dermatite *L00.0*
- ¬
- - Chéilite: *K13.0*
- - Dermite *L26*

Exhibitionnisme ¬ *F65.2*

Existence
- Stomies ¬ *Z93.88*
- Thoracostomie ¬ *Z93.80*

Exocervicite avec ou sans érosion ou ectropion ¬ *N72*

Exocol ¬
- Adénocarcinome de l' *C53.1*
- Adénosarcome de l' *C53.1*
- Carcinoma in situ: *D06.1*
- Carcinome à cellules vitreuses de l' *C53.1*
- Carcinome adénoïde
- - Basal de l' *C53.1*
- - Kystique de l' *C53.1*
- Carcinome épidermoïde de l' *C53.1*
- Carcinome neuroendocrine peu différencié de l' *C53.1*
- Carcinosarcome de l' *C53.1*
- Léiomyosarcome de l' *C53.1*

Exocol ¬ *–suite*
- Rhabdomyosarcome de l' *C53.1*
- Sarcome de l' *C53.1*
- Tumeur germinale maligne de l' *C53.1*
- Tumeur maligne: *C53.1*
- Tumeur neuroectodermique primitive de l' *C53.1*

Exocrine ¬
- Insuffisance pancréatique *K86.83*
- Trouble de la fonction pancréatique *K86.83*

Exocrines
- Sans précision ¬ Affection des glandes sudoripares *L74.9*
- ¬ Autres affections des glandes sudoripares *L74.8*

Exogène
- Connues ¬ Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes *Q86.88*
- SAI ¬ Obésité *E66.9*
- ¬
- - Alvéolite allergique *J67.90*
- - Asthme allergique de cause *J45.09*
- - Dermite toxique due à un irritant *L24.9*
- - Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits *E03.2*

Exomphale ¬ *Q79.2*

Exophiline 5 ¬ Épidermolyse bulleuse simple par déficit en *Q81.0*

Exophorie ¬ *H50.5*

Exophtalmie
- Cours
- - Goitre ¬ *E05.0†, H06.2**
- - Maladie de Basedow ¬ *E05.0†, H06.2**
- - Thyréotoxicose ¬ *E05.0†, H06.2**
- Thyréotrope ¬ *E05.0†, H06.2**
- ¬
- - *H05.2*
- - Maladie de Basedow avec *E05.0†, H06.2**
- - Trouble de la fonction thyroïdienne avec *E05.0†, H06.2**

Exophtalmique ou toxique SAI ¬ Goitre: *E05.0*

Exostose
- Calcanéenne ¬ *M77.3*
- Cartilagineuses multiples ¬ *Q78.6*
- Conduit auditif externe ¬ *H61.8*
- Crête iliaque ¬ *M76.2*
- Gonorrhéique ¬ *A54.4†, M90.29**
- Haglund ¬ *M77.3*
- Mâchoire ¬ *K10.8*
- Multiples congénitales ¬ *Q78.6*
- Orbite ¬ *H05.3*
- SAI ¬ *M77.9*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, M90.29**

Exostoses-anétodermie-brachydactylie type E ¬ Syndrome d' *Q87.5*

Exotropie
- Alternante) (monoculaire) non intermittente ¬ *H50.1*
- Strabisme divergens] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ *H50.3*

Expansion
- C9ORF72 ¬ Maladie de Huntington-like due à des *G10*
- Cellules B et anergie des cellules T] ¬ Maladie BENTA [*D81.8*

Expansive
- Familiale
- - Avant-bras ¬ Ostéolyse *M89.53*
- - Bras ¬ Ostéolyse
- - - *M89.52*
- - - *M89.55*
- - Jambe ¬ Ostéolyse *M89.56*
- - Main ¬ Ostéolyse *M89.54*
- - Pied ¬ Ostéolyse *M89.57*
- - Région de l'épaule ¬ Ostéolyse *M89.51*
- - Sièges multiples ¬ Ostéolyse *M89.50*
- - ¬ Ostéolyse *M89.59*
- Paranoïaque ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.0*

Expectorants ¬ Intoxication: *T48.4*

Expectoration
v./v.a. Examen microscopique de l'expectoration
- Anormale ¬ *R09.3*
- Excessive ¬ *R09.3*
- Sanglantes ¬ *R04.2*
- ¬
- - Anomalie
- - - Couleur de l' *R09.3*
- - - Odeur de l' *R09.3*
- - - Quantité de l' *R09.3*
- - Infection fongique de l' *B48.88*
- - Résultats anormaux de: *R84*

Expérience
- Camp de concentration ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*
- Catastrophe ¬ Modification durable de la personnalité après une *F62.0*
- Personnelle terrifiante pendant l'enfance ¬ *Z61*

Expertise ¬ Demande d' *Z04.8*

Explication
- Résultats d'examen ¬ Conseil et surveillance pour: Consultation pour l' *Z71*
- ¬ Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre *R96.1*

Exploration
- Fonctionnelles
- - Cardio-vasculaires ¬ Résultats anormaux d' *R94.3*
- - Endocriniennes ¬ Résultats anormaux d'autres *R94.7*
- - Hépatiques ¬ Résultats anormaux d' *R94.5*

Exploration *–suite*
- Fonctionnelles *–suite*
- - Organes et appareils ¬ Résultats anormaux d' *R94.8*
- - Pulmonaires ¬ Résultats anormaux d' *R94.2*
- - Rénales ¬ Résultats anormaux d' *R94.4*
- - Système nerveux
- - - Central ¬ Résultats anormaux d' *R94.0*
- - - Périphérique et épreuves sensorielles spéciales ¬ Résultats anormaux d' *R94.1*
- - Thyroïdiennes ¬ Résultats anormaux d' *R94.6*
- Infections principalement transmises lors des rapports sexuels ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- Maladies intestinales d'origine infectieuse ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- Protozooses et helminthiases ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- Tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*

Explosif
- Intermittent ¬ Trouble *F63.8*
- ¬ (Trouble de la) personnalité: irritable (*F60.30*

Explosion
- Chaudière/bouilloire ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- ¬
- - Blessure par la pression d'une *T70.8*
- - Syndrome dû au souffle d'une *T70.8*

Exposés
- Hépatite virale ¬ Sujets en contact avec et *Z20.5*
- Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel ¬ Sujets en contact avec et *Z20.2*
- Maladie transmissible non précisée ¬ Sujets en contact avec et *Z20.9*
- Maladies
- - Infectieuses intestinales ¬ Sujets en contact avec et *Z20.0*
- - Transmissibles ¬ Sujets en contact avec et *Z20.8*
- Pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations ¬ Sujets en contact avec et *Z20.7*
- Rage ¬ Sujets en contact avec et *Z20.3*
- Rubéole ¬ Sujets en contact avec et *Z20.4*
- Tuberculose ¬ Sujets en contact avec et *Z20.1*
- Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Sujets en contact avec et *Z20.6*

Exposition
- Accidentelle) à d'autres facteurs ¬ *X59.9!*
- Acide ¬ *T54.9*
- Alcool ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*

Exposition *–suite*
- Bruit ¬ *W49.9!*
- Carburant halogéné ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Catastrophe, une guerre et autres hostilités ¬ *Z65*
- Chaleur
- - Artificielle excessive ¬ *W92.9!*
- - Froid naturel excessif ¬ *X59.9!*
- Chronique rayonnement non ionisants
- - Sans précision ¬ Modification de la peau due à une *L57.9*
- - ¬ Autres modifications de la peau dues à une *L57.8*
- Feu et flammes ¬ *X59.9!*
- Forces mécaniques objet
- - Animés ¬ Accident dû à l' *W64.9!*
- - Inanimés ¬ Accident dû à l' *W49.9!*
- Froid artificiel excessif ¬
- - *W93!*
- - *W93.9!*
- Fumée ¬ *X59.9!*
- Irradiation
- - Ionisante ¬ *W91.9!*
- - Isotopes ¬ *W91.9!*
- - Rayons X ¬ *W91.9!*
- Liquide corrosif ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Lumière
- - Artificielle
- - - Ultraviolette ¬ *W91.9!*
- - - Visible ¬ *W91.9!*
- - Soleil ¬ *X59.9!*
- Maternelle aux médicaments antithyroïdiens ¬ Hypothyroïdie congénitale due à une *P72.2*
- Médicament, drogues et autres substances biologiques actives ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l' *P04.6*
- Pesticides ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions météorologiques) ¬ *W94.9!*
- Professionnelle à des facteurs de risque ¬ *Z57*
- Prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*
- Pulpe ¬ Carie avec *K02.5*
- Solvant organique ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Vibration ¬ *W49.9!*
- VIH ¬ Prophylaxie avant *Z29.22*
- ¬ Kératoconjonctivite: d' *H16.2*

Expressif ¬
- Dysphasie ou aphasie de développement, de type *F80.1*
- Trouble de l'acquisition du langage, de type *F80.1*

Expression écrite ¬ Trouble de l'acquisition de l' *F81.8*

Expulsion
- Fœtus ou accouchement de l'enfant ¬ Hémorragie après *O72*
- ¬
- - Prolongation de la deuxième période [*O63.1*
- - Rapidité de l' *P03.5*

Expulsive ¬ Hémorragie choroïdienne: *H31.3*

Exsanguino-transfusion ¬ Thrombopénie néonatale due à: *P61.0*

Exsiccose ¬
- Diarrhée
- - Aiguë avec *A09.9, E86*
- - Infectieuse avec *A09.0, E86*
- - Probablement d'origine infectieuse, avec *A09.0, E86*
- - Vomissement
- - - *A09.9, E86*
- - - *A09.9, E86*
- Entérite
- - Aiguë avec *A09.9, E86*
- - Probablement d'origine infectieuse, avec *A09.0, E86*
- Gastroentérite
- - *A09.9, E86*
- - Aiguë avec *A09.9, E86*
- - Nourrisson avec *A09.9, E86*
- - Probablement d'origine infectieuse, avec *A09.0, E86*

Exstrophie vésical
- Classique ¬ *Q64.1*
- ¬ *Q64.1*

Exsudatif
- Familiale ¬ Vitréo-rétinopathie *H35.0*
- ¬
- - Diarrhée chronique congénitale avec entéropathie *P78.3*
- - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: *H21.3*
- - Otite moyenne
- - - *H65.9*
- - - Chronique: *H65.4*
- - Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*
- - Syndrome de déficience intellectuelle avec spasticité périphérique et vitréorétinopathie *Q87.2*

Exsufflateur (appareil d'aide à la toux) ¬ Dépendance (de longue durée) envers: insufflateur/ *Z99.0*

Extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [*M08.3*

Extenseur
- Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S56.3*
- Bronchique ¬
- - Adaptation et manipulation d'un *Z45.84*
- - Présence d'un *Z96.80*
- Doigt
- - Niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.3*
- - Pouce-polyneuropathie ¬ Aplasie des muscles *G60.0, Q68.1*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon *S56.5*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et tendons *S66.7*
- Orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long *S96.1*
- Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.2*
- S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S56.4*
- Trachéal ¬
- - Adaptation et manipulation d'un *Z45.85*
- - Présence d'un *Z96.81*
- ¬ Déchirure spontanée des tendons *M66.2*

Extension
- Fosse canine ¬ Abcès maxillaire avec *K10.21*
- Médiastinal parapharyngé cervicale ¬ Abcès sous-mandibulaire
- - Indication d' *K12.22*
- - Sans indication d' *K12.21*
- Radius distal ¬ Fracture en *S52.51*
- Rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ Abcès maxillaire sans indication d' *K10.20*

Extensive ¬
- Médulloblastome à nodularité *C71.6*
- Syndrome de polyangéite *M30.8*

Extérieur
- Lèvre
- - SAI ¬ *C00.2*
- - ¬
- - - *D37.0*
- - - Carcinome épidermoïde de l' *C00.2*
- Utérus ¬ Adhérences de la paroi *N73.6*
- ¬
- - Dysmorphie due à une cause *Q86.88*
- - Lèvre
- - - Inférieure: *C00.1*
- - - Supérieure: *C00.0*

Externe
v./v.a. Type de maladie

Extinction sensorielle ¬ *R29.5*

Extraabdominale ¬ Tumeur desmoïde *D48.1*

Extracapillaire diabétique
- Diabète sucré type
- - 1 ¬ Syndrome de Kimmelstiel et Wilson *E10.20†, N08.3**
- - 2 ¬ Syndrome de Kimmelstiel et Wilson *E11.20†, N08.3**
- ¬
- - Glomérulosclérose *E14.20†, N08.3**
- - Syndrome de Kimmelstiel et Wilson *E14.20†, N08.3**

Extracellulaire ¬ Déplétion du volume du plasma ou du liquide *E86*

Extracorporel ¬
- Adaptation d'une pompe *Z45.02*
- Complication lors de circulation *T80.9*
- Dialyse *Z49.1*
- Pompe
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*

Extracorticalis axialis ¬ Aplasia *E75.2*

Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par *P03.3*

Extraction
- Affection périodontale localisée ¬ Perte de dents consécutive à accident, *K08.1*
- Cataméniale ¬ *Z30.3*
- Siège ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une *P03.0*

Extra-cutané
- Associée à PLEC ¬ Epidermolyse bulleuse simple intermédiaire sans manifestations *Q81.0*
- ¬ Mastocytome *C96.2*

Extra-dural
- Non traumatique ¬ Hémorragie *I62.1*
- Sous-dural, sans précision ¬ Abcès *G06.2*
- Traumatique) ¬ Hémorragie *S06.4*
- ¬
- - Abcès granulome
- - - Intracrânien: *G06.0*
- - - Intrarachidien: *G06.1*
- - Hématome épidural [*S06.4*

Extragonadique ¬ Tératome *D48.9*

Extra-hépatique
- Vésicule biliaire ¬ Tumeur bénigne: Voies biliaires *D13.5*
- ¬
- - Adénocarcinome de la voie biliaire *C24.0*
- - Carcinome épidermoïde des voies biliaires *C24.0*
- - Cholangiolite *K83.09*
- - Tumeur maligne: Canal biliaire *C24.0*

Extra-hépatiques ¬
- Adénocarcinome de la vésicule biliaire et des voies biliaires *C23, C24.0*
- Carcinome des voies biliaires intra et *C24.8*
- Carcinome épidermoïde de la vésicule biliaire et des voies biliaires *C23, C24.0*

Extra-hypophysaire ¬ Syndrome d'ACTH [hormone adrénocorticotrope] *E24.3*

Extrait d'Aspergillus ¬ Hypersensibilité à l' *T78.4*

Extralobaire ¬ Séquestration pulmonaire congénitale *Q33.2*

Extramammaire ¬ Maladie Paget
- *C21.0*
- *C44.50*

Extramédullaire
- Cône ¬ Lipome spinal *Q76.0*
- Postérieur du cône ¬ Lipome spinal *Q76.0*
- Rémission complète ¬ Plasmacytome *C90.21*
- Terminal du cône ¬ Lipome spinal *Q76.0*
- Transitionnel du cône ¬ Lipome spinal *Q76.0*
- ¬ Tumeur myéloïde *C92.30*

Extraneural ¬ Périneuriome *D36.1*

Extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome *C88.41*

Extranodulaire type nasal ¬ Lymphome NK/T *C86.0*

Extra-oculaire ¬ Muscle
- *C69.6*
- *D31.6*

Extraosseux ¬ Sarcome d'Ewing *C49.9*

Extrapéritonéale ¬ *S37.22*

Extrapyramidal
- Déficience intellectuelle-épilepsie ¬ Syndrome *Q87.8*
- Trouble de la motricité, sans précision ¬ Syndrome *G25.9*
- Troubles motricité
  - Cours d'affections classées ailleurs ¬ Syndromes *G26**
  - ¬ Autres syndromes précisés *G25.88*
  - ¬
  - Myopathie proximale avec signes *G71.3, G25.9*
  - Syndrome de régression motrice et cognitive de l'enfance avec syndrome *G31.88*

Extrarénale ¬ Urémie *R39.2*

Extrasquelettique
- Hanche ¬ Sarcome d'Ewing *C49.2*
- Tissu mou
  - Abdomen ¬
    - Chondrosarcome myxoïde *C49.4*
    - Sarcome d'Ewing *C49.4*
  - Cou ¬ Sarcome d'Ewing *C49.0*
  - Lésion localisations contiguës ¬
    - Chondrosarcome myxoïde *C49.8*
    - Sarcome d'Ewing *C49.8*
  - Médiastin
    - Antérieur ¬ Sarcome d'Ewing *C38.1*
    - Postérieur ¬ Sarcome d'Ewing *C38.2*

Extrasquelettique *–suite*
- Tissu mou *–suite*
  - Médiastin *–suite*
    - ¬ Sarcome d'Ewing *C38.3*
  - Membres
    - Inférieurs ¬
      - Chondrosarcome myxoïde *C49.2*
      - Sarcome d'Ewing *C49.2*
    - Supérieurs ¬
      - Chondrosarcome myxoïde *C49.1*
      - Sarcome d'Ewing *C49.1*
  - Pelvis ¬
    - Chondrosarcome myxoïde *C49.5*
    - Sarcome d'Ewing *C49.5*
  - Tête ¬
    - Chondrosarcome myxoïde *C49.0*
    - Sarcome d'Ewing *C49.0*
  - Thorax ¬
    - Chondrosarcome myxoïde *C49.3*
    - Sarcome d'Ewing *C49.3*
  - Tronc ¬
    - Chondrosarcome myxoïde *C49.6*
    - Sarcome d'Ewing *C49.6*
  - ¬ Sarcome d'Ewing *C49.1*
- ¬
  - Chondrosarcome myxoïde *C49.9*
  - Sarcome d'Ewing *C49.9*

Extrasystoles
- Auriculaires ¬ *I49.1*
- Petite taille-hyperpigmentation-microcéphalie ¬ Syndrome d' *Q87.1*
- SAI ¬ *I49.4*
- Supraventriculaire ¬ *I49.4*
- Ventriculaires avec syncopes-pérodactylie-séquence de Robin ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬ Battements cardiaques prématurés [*I49.4*

Extrasystolique ¬ Arythmie *I49.4*

Extraurétrale ¬ Incontinence urinaire *N39.43*

Extra-utérin
v./v.a. Grossesse extra-utérine
- Molaire ¬ Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse *O08.5*
- ¬ Autres grossesses *O00.8*

Extravasation d'urine ¬ *R39.0*

Extraventriculaire ¬ Neurocytome *D43.2*

Extrémité
- Encéphale ¬ Syndrome
  - Dorsoventral lié à EN1, de type *Q04.3, Q74.8*
  - ENDOVESLB [Syndrome dorsoventral lié à EN1, de type *Q04.3, Q74.8*
- Proximale ¬ *S82.1*
- Uniquement] ¬ ENDOVESL [Syndrome dorsoventral lié à EN1, de type *Q74.8*
- ¬
  - Absence congénitale d'une articulation d'une *Q74.8*

Extrémité *–suite*
- ¬ *–suite*
  - Artériopathie obstructive périphérique des *I70.2*
  - Artériosclérose
    - *I70.29*
    - Artère d'une *I70.29*
  - Athérosclérose d'une *I70.29*
  - Dyschromatose symétrique des *L81.8*
  - Dysostose mandibulo-faciale sans anomalies des *Q75.4*
  - Syndrome
    - Dorsoventral lié à EN1, de type *Q74.8*
    - Trigonocéphalie-nez bifide-anomalies des *Q87.0*

Extrémité inférieure
- Cubitus
  - Radius, combinée ¬ Fracture de l' *S52.6*
  - ¬ *S52.8*
- Fémur
  - Condyle (latéral) (médian) ¬ Fracture de l' *S72.41*
  - Épiphyse, décollement épiphysaire ¬ Fracture de l' *S72.42*
  - Intercondylaire ¬ Fracture de l' *S72.44*
  - Partie non précisée ¬ Fracture de l' *S72.40*
  - Supracondylaire ¬ Fracture de l' *S72.43*
- Humérus
  - Épicondyle
    - Épicondyles, non précisé ¬ Fracture de l' *S42.44*
    - Latéral ¬ Fracture de l' *S42.42*
    - Médial ¬ Fracture de l' *S42.43*
  - Partie non précisée ¬ Fracture de l' *S42.40*
  - Parties ou parties multiples ¬ Fracture de l' *S42.49*
  - Supracondylaire ¬ Fracture de l' *S42.41*
  - Transcondylaire (en T ou en Y) ¬ Fracture de l' *S42.45*
- Péroné ¬ *S93.0*
- Radius
  - Fracture en flexion ¬ Fracture de l' *S52.52*
  - Parties et parties multiples ¬ Fracture de l' *S52.59*
  - Sans autre précision ¬ Fracture de l' *S52.50*
- Tibia
  - Fracture du péroné (toute partie) ¬ Fracture de l' *S82.31*
  - ¬
    - *S93.0*
    - Fracture de l' *S82.38*
  - ¬
    - Artériosclérose de l' *I70.29*
    - Athérosclérose de l' *I70.29*
    - Inflammation thrombotique veineuse profonde de l' *I80.28*
    - Oblitération d'une artère de l' *I74.3*
    - Phlébothrombose profonde de l' *I80.28*

Extrémité inférieure *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Soins de contrôle comprenant une opération plastique des *Z42.4*
- - Syndrome douloureux régional complexe de type II de l' *G90.61*
- - Thrombose profonde de l' *I80.28*

Extrémité supérieure

- Humérus
- - Col
- - - Anatomique ¬ Fracture de l' *S42.23*
- - - Chirurgical ¬ Fracture de l' *S42.22*
- - Grand tubercule ¬ Fracture de l' *S42.24*
- - Partie non précisée ¬ Fracture de l' *S42.20*
- - Parties et parties multiples ¬ Fracture de l' *S42.29*
- - Tête ¬ Fracture de l' *S42.21*
- Radius
- - Col ¬ Fracture de l' *S52.12*
- - Partie non précisée ¬ Fracture de l' *S52.10*
- - Parties et parties multiples ¬ Fracture de l' *S52.19*
- - Tête ¬ Fracture de l' *S52.11*
- Tibia
- - Fracture du péroné (toute partie) ¬ Fracture de l' *S82.11*
- - ¬ Fracture de l' *S82.18*
- ¬
- - Soins de contrôle comprenant une opération plastique des *Z42.3*
- - Syndrome douloureux régional complexe de type II de l' *G90.60*

Extrinsèque

- SAI ¬ Pigmentation des dents: *K03.6*
- ¬
- - Alvéolite *J67.90*
- - Asthme
- - - *J45.09*
- - - Bronchique intrinsèque d'origine *J45.89*
- - Larynx *C32.1*

Extroversion de la vessie ¬ *Q64.1*

Eyeball ¬ Cystic *Q11.0*

FAB) SAI ¬ LMA (sans classification *C92.0*

Fabry ¬ Angiokératome diffus de *E75.2*

Fabry-Anderson ¬ Glomérulopathie au cours de maladie de *E75.2†, N08.4**

FACAS [Syndrome auto-inflammatoire au froid associé à F12] ¬ *L50.2*

Face
- Antérieure
- - Épiglotte ¬
- - - Carcinome épidermoïde de la *C10.1*
- - - Tumeur maligne: *C10.1*
- - ¬ Epiglotte, *D10.5*
- Avant le travail ¬ Présentation (de): *P01.7*
- Chronique ¬ Algie vasculaire de la *G44.0*
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Tuberculose de sinus de la *A15.8*
- Cou
- - SAI ¬ Anomalie congénitale de la *Q18.9*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q18.9*
- - ¬
- - - Fistule médian(e) de la *Q18.8*
- - - Kyste médian(e) de la *Q18.8*
- - - Malformations congénitales précisées de la *Q18.8*
- - - Sinus médian(e) de la *Q18.8*
- - - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la *D21.0*
- - - Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la *D17.0*
- - - Tumeur maligne
- - - - Ganglions lymphatiques de la tête, de la *C77.0*
- - - - Nerfs périphériques de la tête, de la *C47.0*
- - - - Tête, *C76.0*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la *C49.0*
- Cutané lèvre ¬
- - Carcinome à cellules de Merkel de la *C44.0*
- - Tumeur maligne: *C44.0*
- Dorsale langue ¬
- - Carcinome épidermoïde de la *C02.0*
- - Tumeur maligne: *C02.0*
- Épisodique ¬ Algie vasculaire de la *G44.0*
- Front et du menton ¬ Soins maternels pour présentation de la *O32.3*
- Hypotonie-retard de développement ¬ Syndrome de contractures congénitales des membres et de la *Q87.0*
- Inférieure
- - Langue ¬
- - - Carcinome épidermoïde de la *C02.2*
- - - Tumeur maligne: *C02.2*
- - ¬ Deux tiers antérieurs de la langue, *C02.2*
- Intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ Lèvre (bord libre) (*D10.0*

Face *–suite*
- Interne
- - Joue ¬ *C06.0*
- - Lèvre
- - - Inférieure ¬ Carcinome épidermoïde de la *C00.4*
- - - Supérieure ¬ Carcinome épidermoïde de la *C00.3*
- - - ¬ Carcinome épidermoïde de la *C00.5*
- - ¬ Tumeur maligne Lèvre
- - - Inférieure, *C00.4*
- - - Sans précision, *C00.5*
- - - Supérieure, *C00.3*
- Localisations contiguës ¬ Carcinome épidermoïde des sinus de la *C31.8*
- Mâchoire ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la *Q67.4*
- Muqueux ¬ Lèvre
- - Inférieure: *C00.4*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: *C00.5*
- - Supérieure: *C00.3*
- Non précisées ¬
- - Carcinoma in situ: Peau des parties de la *D04.3*
- - Mélanome in situ de parties de la *D03.3*
- - Nævus à mélanocytes des parties de la *D22.3*
- - Tumeur bénigne: Peau des parties de la *D23.3*
- Oral ¬ Lèvre
- - Inférieure: *C00.4*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: *C00.5*
- - Supérieure: *C00.3*
- Partie non précisée ¬ Fracture du crâne et des os de la *S02.9*
- Parties non précisées ¬
- - Mélanome malin de la *C43.3*
- - Tumeur maligne: Peau de la *C44.3*
- Postérieure
- - Épiglotte ¬ Tumeur neuroendocrine maligne de la *C32.1*
- - Laryngée) de l'épiglotte ¬ *C32.1*
- SAI ¬
- - Anomalie de: os de la *Q75.9*
- - Lésion traumatique de: *S09.9*
- Sans
- - Précision ¬
- - - Malformation congénitale des os du crâne et de la *Q75.9*
- - - Tumeur maligne: Sinus de la *C31.9*
- - Précisions ¬ Os
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- Siffleur ¬ Syndrome de la *Q87.0*
- Supérieure
- - Base de la langue ¬ *C01*

Face *–suite*
- Supérieure *–suite*
- - ¬ Deux tiers antérieurs de la langue, *C02.0*
- Tête cou ¬
- - Lymphadénite aiguë de la *L04.0*
- - Œil avec d'autres parties de la *T20*
- - ¬
- - Abcès
- - - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - Abcès cutané, furoncle et anthrax de la *L02.0*
- - Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la *Q30.8*
- - Carcinome à cellules de Merkel de la peau de la *C44.3*
- - Carcinome pilomatriciel de la peau de la *C44.3*
- - Dyskératome verruqueux de la *D23.3*
- - Dystocie due à une présentation de la *O64.2*
- - Écrasement de la *S07.0*
- - Empyème
- - - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - Fractures
- - - Multiples du crâne et des os de la *S02.7*
- - - Os du crâne et de la *S02.8*
- - Herpes simplex de: *B00.1*
- - Hyperostose corticale infantile de la *M89.88*
- - Infection
- - - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - Inflammation aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - Kyste dermoïde de la *Q18.8*
- - Lipomatose congénitale infiltrante de la *D48.1*
- - Malformations congénitales précisées des os du crâne et de la *Q75.8*
- - Mélanome malin familial de la *C43.3*
- - Ostéoblastome de l'os de la *D16.42*
- - Ostéolyse massive de Gorham des os de la *M89.58*
- - Phlegmon de la *L03.2*
- - Pilomatrixome de la *D23.3*
- - Polypes du sinus (de): *J33.8*
- - Sarcome d'Ewing des os de la *C41.01*
- - Sarcome de l'os de la *C41.02*
- - Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la *T90.2*
- - Sinus
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - Suppuration
- - - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - Syndrome

Face *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Algie vasculaire de la *G44.0*
- - - Brooke-Spiegler de la peau de la *D23.3*
- - - Camptodactylie-raideur articulaire-anomalies osseuses de la *Q87.0*
- - Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la *Q87.0*
- - Tête toute partie
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Tic douloureux de la *G50.0*
- - Trichofolliculome de la peau de la *D23.3*
- - Tuberculose de sinus de la *A16.8*
- - Tumeur bénigne
- - - Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la *D14.0*
- - - Os et du cartilage articulaire: Os du crâne et de la *D16.4*
- - Tumeur maligne
- - - Lésion à localisations contiguës des sinus de la *C31.8*
- - - Os de la *C41.02*

Facette
- Articulaire ¬ Ostéophyte à la *M47.99*
- Articulaires ¬ dégénérescence des *M47*

Facial
v./v.a. acro-cranio-faciale
v./v.a. blépharo-naso-facial
v./v.a. Cervico-facial
v./v.a. fémoro-facial
v./v.a. Nerf facial
v./v.a. oculo-cérébro-facial
v./v.a. oculo-maxillo-facial
- 4 de Tessier ¬ Fente *Q18.8*
- 5 de Tessier ¬ Fente *Q18.8*
- 6 de Tessier ¬ Fente *Q18.8*
- Alternante ¬ Hémiplégie *G83.8*
- Anomalie pseudo-Pelger-Huët ¬ Syndrome de retard global de développement-déficience intellectuelle-dysmorphie *Q87.0*
- Anomalies
- - Cérébrales structurelles ¬ Syndrome de retard global de développement-alopécie-macrocéphalie-dysmorphie *Q87.8*
- - Lymphocytes T ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-retard de langage-dysmorphie *Q87.0*
- - Mains ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie *Q87.0*
- - Oculaires-anomalies congénitales multiples ¬ Syndrome de microcéphalie-dysmorphie *Q87.0*
- - Squelettiques associé à BPTF ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie *Q87.0*
- Appendice caudal ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-retard de développement globale-dysmorphie *Q87.8*
- Associé

Facial *–suite*
- Associé *–suite*
- - CCNK ¬ Syndrome de trouble neurodéveloppemental-déficience intellectuelle sévère-dysmorphie *Q87.0*
- - THOC6 ¬ Syndrome de retard de développement-microcéphalie-dysmorphie *Q87.0*
- Ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-agénésie du corps calleux-dysmorphie *Q87.0*
- Atypique ¬ Algie *G50.1*
- Bell SAI ¬ Paralysie *G51.0*
- Brachydactylie ¬ Syndrome de trouble neurologique du développement-malformations cérébrales-dysmorphie *Q87.0*
- Camptodactylie ¬ Syndrome de macrothrombocytopénie-lymphœdème-retard de développement-dysmorphie *Q87.0*
- Centrale ¬ Paralysie *G83.6*
- Comportement agressif ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypotonie-dysmorphie *Q87.8*
- Compression ¬ Anomalie morphologique *Q67.1*
- Congénitale
- - Héréditaire
- - - Isolée ¬ Paralysie *Q07.8*
- - - Surdité variable ¬ Syndrome de paralysie *Q87.0*
- - ¬ Paralysie oculo- *Q87.0*
- Cours des maladies de l'appareil manducateur ¬ Douleurs *K10.8*
- Déficience intellectuelle
- - Rhombencéphalosynapsis ¬ Syndrome de dysmorphie *Q87.0*
- - Trouble du comportement ¬ Syndrome de tremblement essentiel progressif-trouble sévère du langage-dysmorphie *Q87.0*
- - ¬ Syndrome
- - - Anomalies ophtalmologiques-dysmorphie *Q87.0*
- - - Lié à MEF2C caractérisé par des anomalies cérébrales, un retard de développement sévère, des dysmorphies *Q87.0*
- - - Macrocéphalie-cardiopathie congénitale-dysmorphie *Q87.0*
- - - Microcéphalie
- - - - Hypoplasie du corps calleux et vermis cérébelleux-dysmorphie *Q87.0*
- - - - Surdité-dysmorphie *Q87.0*
- Déficit immunitaire-livedo-petite taille] ¬ Syndrome FILS [dysmorphie *Q87.1*
- Due
- - Lésion neurone moteur
- - - Inférieur ¬ Paralysie faciale (parésie faciale) (faiblesse *G51.0*
- - - Supérieur ¬ Paralysie (parésie) (faiblesse) *G83.6*
- - Traumatisme obstétrical ¬
- - - Congestion *P15.4*

Facial *–suite*
- Due *–suite*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *–suite*
- - - Lésion *P15.4*
- - - Paralysie *P11.3*
- Faiblesse faciale) due à une lésion du neurone moteur inférieur ¬ Paralysie faciale (parésie *G51.0*
- Fente palatine-excès de peau ¬ Syndrome de dysmorphie *Q87.0*
- Focale
- - Type I ¬ Dysplasie dermique *Q82.8*
- - ¬ Dysplasie dermique *Q82.8*
- Fonctionnelles ¬ Anomalies dento- *K07.5*
- Habitus marfanoïde-scoliose associé à NKAP ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie *Q87.0*
- Haploinsuffisance de SETD5 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie *Q87.0*
- Hypertrichose épilepsie déficience intellectuelle retard de développement hypertrophie gingival ¬ Syndrome
- - Dysmorphie *Q87.0*
- - FHEIG [dysmorphie *Q87.0*
- Hypogonadisme hypergonadotrope ¬ Maladie de Moyamoya-petite taille-dysmorphie *Q87.1*
- Hypotonie musculaire-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de cubitus court-dysmorphie *Q87.0*
- Hypotrichose ¬ Syndrome de petite taille-onychodysplasie-dysmorphie *Q87.1*
- Idiopathique
- - Persistante ¬ Douleur *G50.1*
- - ¬ Dystonie bucco- *G24.4*
- Lie de vin ¬ Autisme avec nævus *F84.0, Q82.5*
- Liée à l'infection par le virus varicelle zona ¬ Paralysie *B02.2†, G53.0**
- Macrocéphalie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle avec hypotonie musculaire, dysmorphies *Q87.0*
- Malformation
- - Oculaires, cardiopulmonaires et squelettiques ¬ Syndrome de mèches blanches avec dysmorphies *Q87.8*
- - Squelettique-malformation cardiaque ¬ Syndrome marfanoïde-dysmorphie *Q87.0*
- Malformations cardiaques congénitales associé à CDK13 ¬ Syndrome de retard de développement-déficience intellectuelle-dysmorphie *Q87.0*
- Neuropathie ¬ Syndrome de cataracte congénitale-dysmorphie *Q87.8*
- Oblique ¬ Fente *Q18.8*
- Parésie faciale) (faiblesse faciale) due à une lésion du neurone moteur inférieur ¬ Paralysie *G51.0*
- Paresthésies du syndrome Guillain-Barré ¬ Variant diplégie *G61.0*
- Paroxystique ¬ Névralgie *G50.0*
- Périphérique récurrente familiale ¬ Paralysie *G51.0*

Facial *–suite*
- Petite taille-atrésie des choanes-déficience intellectuelle lié à l'X limité à la femme ¬ Syndrome de dysmorphie *Q87.0*
- Pleurs isolée ¬ Asymétrie *Q18.8*
- Progressive ¬ Hémiatrophie *G51.8*
- Reflux gastro-œsophagien associé à STAG1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie *Q87.0*
- Retard
- - Moteur et verbal associé à TRAF7 ¬ Syndrome d'anomalies cardiaques-anomalies digitales-dysmorphie *Q87.0*
- - Staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse accélérée-dysmorphie *Q87.3*
- Retard de développement
- - Associé à TMEM94 ¬ Syndrome d'anomalie cardiaque congénitale-dysmorphie *Q87.0*
- - Troubles du comportement associé à WAC ¬ Syndrome de dysmorphie *Q87.0*
- - ¬ Syndrome d'anomalies du palais-diastèmes multiples-dysmorphie *Q87.0*
- Retard général de développement, hypotonie et polymicrogyrie ¬ Syndrome de dysmorphie *Q04.8*
- Retard global de développement ¬ Syndrome d'épilepsie à début précoce-anomalies des membres distaux-dysmorphie *Q87.0*
- SAI ¬ Douleur *R51*
- Sans précision ¬ Anomalie dento- *K07.9*
- Scrotum en châle-hyperlaxité ligamentaire ¬ Syndrome de dysmorphie *Q87.0*
- Strabisme-incisure du lobe de l'oreille ¬ Syndrome de retard de langage-asymétrie *Q87.0*
- Troubles comportement
- - Associé à CHAMP1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie *Q87.0*
- - ¬ Syndrome de retard du développement-surpoids-dysmorphie *F88*
- ¬
- - Anomalies dento- *K07.8*
- - Asymétrie *Q67.0*
- - Diplégie congénitale *Q87.0*
- - Dyskinésie
- - - Bucco- *G24.4*
- - - Familiale avec myokymie *G24.8, G51.4*
- - Fente *Q18.8*
- - Granulome
- - - Éosinophile *L92.2*
- - - Malin *C86.0*
- - Hémispasme *G51.3*
- - Malformation artério-veineuse *Q27.3*
- - Myoclonie *G51.3*
- - Myokymies *G51.4*
- - Paralysie *G51.0*
- - Retard de développement neurologique avec malformations cérébrales et dysmorphie *Q04.8*

Facial *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome
- - - Agénésie congénitale
- - - - Grandes lèvres-malformation cérébelleuse-dystrophie cornéenne-dysmorphie *Q87.0*
- - - - Scrotum-malformation cérébelleuse-dystrophie cornéenne-dysmorphie *Q87.0*
- - - Anomalies cardiaques-petite taille-hypermobilité articulaire-dysmorphie *Q87.8*
- - - Cécité nocturne-anomalies squelettiques-dysmorphie *Q87.8*
- - - Croissance excessive-macrocéphalie-dysmorphie *Q87.3*
- - - Déficience intellectuelle
- - - - Aphasie expressive-dysmorphie *Q87.0*
- - - - Faiblesse musculaire-petite taille-dysmorphie *Q87.1*
- - - - Obésité-malformations cérébrales-dysmorphie *Q87.0*
- - - - Sévère-petite taille-troubles du comportement-dysmorphie *Q87.8*
- - - Diabète insipide néphrogénique-calcifications intracrâniennes-petite taille-dysmorphie *Q87.1*
- - - Dysplasie épiphysaire-surdité-dysmorphie *Q87.0*
- - - Dysplasie spondylo-métaphysaire-avant-bras incurvé-dysmorphie *Q77.8*
- - - Encéphalopathie épileptique infantile précoce-cécité corticale-déficience intellectuelle-dysmorphie *G40.4*
- - - Épaississement de la suture métopique-ptosis-dysmorphie *Q87.0*
- - - Fente oro-faciale-anomalies cardiaques-dysmorphie *Q87.0*
- - - Fibromatose gingivale-dysmorphie *Q87.0*
- - - FOSMN [Neuronopathie motrice et sensorielle à début *G60.0*
- - - Hypotonie infantile-retard psychomoteur, dysmorphie *Q87.8*
- - - Incurvation latérale sévère du tibia-petite taille-omoplate ailée-dysmorphie *Q87.1*
- - - Lié à l'X d'atrésie du conduit auditif externe-dilatation du canal auditif interne-dysmorphie *Q16.9, Q18.9*
- - - Maladie de Hirschsprung-hypoplasie des ongles-dysmorphie *Q87.8*
- - - Malformation de Klippel-Feil-myopathie-dysmorphie *Q76.1*
- - - Microcéphalie
- - - - Hypoplasie du corps calleux-déficience intellectuelle-dysmorphie *Q87.0*
- - - - Petite taille-déficience intellectuelle-dysmorphie *Q87.1*
- - - Omphalocèle familial avec dysmorphie *Q87.1*
- - - Petite taille
- - - - Cyphose, épiphyses hypoplasiques en forme de cône et dysmorphie *Q87.1*

Facial *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Petite taille *–suite*
- - - - Valvulopathie cardiaque-dysmorphie *Q87.1*
- - - Polydactylie postaxiale-anomalies antéhypophysaires-dysmorphie *Q87.0*
- - - Résistance à l'arginine vasopressine-calcifications intracrâniennes-petite taille-dysmorphie *Q87.1*
- - - Retard de croissance intra-utérine avec micrognathie, petite taille rhizomélique et dysmorphie *Q87.1*
- - - Retard de développement-ataxie-hypotonie-dysmorphie *Q87.0*
- - - Rétinite pigmentaire-surdité-vieillissement prématuré-petite taille-dysmorphie *Q87.0*
- - - Surdité-oreille anormale-paralysie *Q87.8*

Faciei ¬ Tinea *B35.0*

Faciès
- Acromégalique ¬ Syndrome du *Q87.0*
- Acromégaloïde ¬ Syndrome du *Q87.0*
- Particulier ¬ Syndrome d'hypoplasie du fémur *Q87.8*

Facilitant la digestion ¬ Intoxication: Médicaments *T47.5*

Faciliter accouchement ¬
- Amputation du fœtus pour *P03.8*
- Intervention destructrice pour *P03.8*

Facio
v./v.a. cardio-facio-cutané
v./v.a. cérébro-oculo-facio-squelettique
v./v.a. cranio-facio-cubito-rénal
v./v.a. cranio-facio-digito-génital
v./v.a. fronto-facio-nasale
v./v.a. microcéphalie-facio-cardio-squelettique
v./v.a. oro-facio-digital
v./v.a. oto-facio-cervical
v./v.a. vélo-facio-squelettique
- Fronto-digital ¬ Syndrome cranio- *Q87.0*
- Squelettique ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-syndrome cranio- *Q87.8*

Facio-auriculo-vertébrale ¬ Dysplasie *Q87.0*

Facio-cardio-mélique létale ¬ Dysplasie *Q87.8*

Facio-cardio-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Facio-crânienne hypomandibulaire ¬ Dysostose *Q75.4*

Facio-cutanéo-squelettique ¬ Syndrome *Q87.8*

Facio-digito-génital
- Autosomique récessif ¬ Syndrome *Q87.0*
- ¬ Syndrome *Q87.1*

Faciogénitale ¬ Dysplasie *Q87.1*

Facio-linguo-masticatrice ¬ Diplégie *G12.2*

Facio-scapulo-huméral ¬
- Atrophie *G71.08*
- Dystrophie musculaire *G71.08*

Facio-scapulo-huméral ¬ *–suite*
- Myopathie *G71.08*

Facteur
- 1 de maturation de la lipase] ¬ Déficit familial en LMF1 [*E78.3*
- 8 régulateur de l'interféron ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit partiel en *D84.8*
- Anti-nucléaires ¬ Polyarthrite juvénile sans facteur rhumatoïde avec *M08.3*
- C3 du complément ¬ Déficit en *D84.1*
- Coagulation
- - Dépendants de la vitamine K ¬ Déficit héréditaire combiné en *D68.28*
- - Due
- - - Affections du foie ¬ Carence en *D68.4*
- - - Avitaminose K ¬ Carence en *D68.4*
- - Vitamine K-dépendants ¬ Maladie de type pseudoxanthome élastique associée à un déficit en *D68.28, Q82.8*
- - ¬
- - - Carence
- - - - Acquise en *D68.4*
- - - - Héréditaire d'autres *D68.28*
- - - Déficience de *D68.28*
- - - Déficit héréditaire en *D68.28*
- - - Réduction des *D68.9*
- - - Troubles
- - - - *D68.28*
- - - - Hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres *D68.32*
- Croissance
- - Analogue insuline type 1 ¬ Retard de croissance
- - - Déficit du *Q87.1*
- - - Résistance au *E34.3*
- - Épidermique] ¬ Lipodystrophie due à un déficit combiné en insuline, IGF1 [somatomédine-C] et EGF [*E88.1*
- - Ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la protéine de liaison du *R77.88*
- D ¬ Infections récurrentes à Neisseria par déficit en *D84.1, A49.88*
- Hageman ¬
- - Carence en *D68.25*
- - Déficience du *D68.25*
- I ¬
- - Carence héréditaire en *D68.20*
- - Déficit
- - - *D68.20*
- - - Acquis en *D65.01*
- - - Immunitaire associé à une anomalie du *D84.1*
- II
- - VII, IX et X ¬ Déficit héréditaire combiné en *D68.28*
- - ¬
- - - Carence héréditaire en *D68.21*

Facteur *–suite*
- II *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Déficit acquis en *D68.4*
- IIa ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs réversibles du *D68.35*
- Intrinsèque ¬
- - Anémie héréditaire juvénile mégaloblastique due à une carence en *D51.0*
- - Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en *D51.0*
- - Carence congénitale en *D51.0*
- IX
- - Anomalie fonctionnelle ¬ Carence en *D67*
- - Hémophilie avec inhibiteurs ¬ Déficit en *D68.32*
- - ¬
- - - Carence
- - - - Acquise en *D68.4*
- - - - Héréditaire en *D67*
- - - Déficit en *D67*
- - - Hémophilie B avec alloanticorps contre le *D67*
- Labile ¬
- - Carence en *D68.22*
- - Déficit héréditaire en *D68.22*
- Libération hormone croissance
- - Intestin grêle ¬ Tumeur à GRF [*C17.9*
- - Jéjunum ¬ Tumeur à GRF [*C17.1*
- - Lobe
- - - Inférieur du poumon ¬ Tumeur à GRF [*C34.3*
- - - Moyen du poumon ¬ Tumeur à GRF [*C34.2*
- - - Supérieur du poumon ¬ Tumeur à GRF [*C34.1*
- - Pancréas ¬ Tumeur à GRF [*C25.4*
- - Poumon
- - - Localisations contiguës ¬ Tumeur à GRF [*C34.8*
- - - ¬ Tumeur à GRF [*C34.9*
- Nécrose tumorale] ¬ Syndrome TRAPS [Syndrome périodique associé au récepteur 1 du *E85.0*
- Nucléaire des lymphocytes T activés]-5 ¬ Haploinsuffisance de NFAT [*D84.8*
- Physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des *F59*
- Proconvertine ¬ Déficit acquis en *D68.4*
- Psychologique
- - Comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs ¬ *F54*
- - Influençant une affection physique ¬ *F54*
- Relevant de l'homme ¬ Stérilité de la femme associée à des *N97.4*
- Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion ¬ Réaction due au *T80.4*

Facteur *–suite*
- Rhumatismal ¬
- - Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans *M08.0*
- - Polyarthrite chronique juvénile type adulte
- - - *M08.00*
- - - Sans *M08.00*
- Rhumatoïde
- - Facteurs anti-nucléaires ¬ Polyarthrite juvénile sans *M08.3*
- - ¬ Polyarthrite juvénile
- - - *M08.00*
- - - Sans *M08.3*
- Risque
- - Précisés, non classés ailleurs ¬ Antécédents personnels d'autres *Z91.8*
- - Tumeur maligne opération prophylactique
- - - Organes ¬ Opération prophylactique pour *Z40.08*
- - - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour *Z40.01*
- - - Sein ¬ Opération prophylactique pour *Z40.00*
- - ¬ Exposition professionnelle à des *Z57*
- Rosenthal ¬ Déficit en *D68.1*
- Somatiques et psychiques ¬ Douleur chronique où interviennent des *F45.41*
- Stabilisant fibrine ¬
- - Carence en *D68.26*
- - Déficit héréditaire en *D68.26*
- Stable ¬ Carence en *D68.23*
- Stress
- - Sévère
- - - Sans précision ¬ Réaction à un *F43.9*
- - - ¬ Autres réactions à un *F43.8*
- - ¬ Réaction aiguë à un *F43.0*
- Stuart ¬ Déficit congénital en *D68.24*
- Stuart-Prowerr ¬ Déficit en *D68.24*
- Suivants
- - Alcool ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Médicaments et drogues ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Modifications hormonales ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Privation de sommeil ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Stress ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- Transcription, associé à une hypothyroïdie ¬ Dysfonctionnement congénital de l'hypophyse dû à un déficit en *Q89.2, E03.0*
- V
- - Amsterdam ¬ Maladie hémorragique du *D68.22*
- - Atlanta ¬ Maladie hémorragique du *D68.22*
- - Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C activée [mutation du *D68.5*
- - VIII ¬ Déficit combiné en *D68.8*
- - ¬

Facteur *–suite*
- V *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Carence
- - - - Acquise en *D68.4*
- - - - Héréditaire en *D68.22*
- - - Hémophilie avec inhibiteurs contre le *D68.32*
- VII
- - X ¬ Déficit combiné héréditaire en *D68.28*
- - ¬
- - - Carence
- - - - Acquise en *D68.4*
- - - - Héréditaire en *D68.23*
- - - Déficit en *D68.23*
- - - Hémophilie avec inhibiteurs contre le *D68.32*
- VIII
- - Anomalie fonctionnelle ¬ Carence en *D66*
- - Dysfonction vasculaire ¬ Déficit en *D68.09*
- - Hémophilie avec inhibiteurs ¬ Déficit en *D68.31*
- - Trouble fonctionnel endothélial ¬ Déficit en *D68.09*
- - ¬
- - - Affection hémorragique due à multiplication des anticorps contre le *D68.31*
- - - Carence
- - - - Acquise en *D68.4*
- - - - Héréditaire en *D66*
- - - Hémophilie
- - - - A avec alloanticorps contre le *D66*
- - - - Inhibiteurs contre le *D68.31*
- - - Syndrome de sclérose en plaques-ichtyose-déficit en *Q87.8*
- Von Willebrand ¬
- - Augmentation des anticorps dirigés contre le *D68.32*
- - Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le *D68.32*
- X
- - Hémophilie avec inhibiteurs ¬ Déficit en *D68.32*
- - ¬ Carence
- - - *D68.24*
- - - Acquise en *D68.4*
- - - Héréditaire en *D68.24*
- Xa ¬ Hémophilie avec inhibiteurs contre le *D68.32*
- XI
- - Hémophilie avec inhibiteurs ¬ Déficit en *D68.32*
- - ¬
- - - Carence
- - - - Acquise en *D68.4*
- - - - Héréditaire en *D68.1*
- - - Déficit congénital en *D68.1*

Facteur *–suite*
- XI *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hémophilie avec inhibiteurs contre le *D68.32*
- Xia ¬ Hémophilie avec inhibiteurs contre le *D68.32*
- XII ¬
- - Carence
- - - Acquise en *D68.4*
- - - Héréditaire en *D68.25*
- - Déficit en *D68.25*
- XIII ¬
- - Carence
- - - Acquise en *D68.4*
- - - Héréditaire en *D68.26*
- - Hémophilie avec inhibiteurs contre le *D68.32*
- ¬
- - Déficit immunitaire associé à une anomalie du *D84.1*
- - Exposition (accidentelle) à d'autres *X59.9!*

Facteur Rh
v./v.a. Rh

Factice ¬
- Dermite *L98.1*
- Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble *F68.1*
- Thyréotoxicose *E05.4*

Factor-2] ¬ Amylose ALECT2 [Amylose à Leucocyte chemotactic *E85.0*

FADD ¬ Déficit immunitaire lié à *D82.8*

Fahl
v./v.a. Melhem-Fahl

Faim ¬ Effets de la *T73.0*

Fairhurst
v./v.a. Dennis-Fairhurst-Moore

Faisceaux de Krukenberg ¬ *H18.0*

Faivre
v./v.a. Thauvin-Robinet-Faivre

Falciforme
v./v.a. Anémie à hématies falciformes
v./v.a. hématie falciforme
- HbS] ¬ Anémie *D57.1*

Falciparum
- Complication
- - Cérébrale ¬ Paludisme à Plasmodium *B50.0†, G94.8**
- - ¬ Paludisme à Plasmodium *B50.8*
- Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium *B52*
- Toute autre espèce de Plasmodium ¬ Infections mixtes à Plasmodium *B50*
- ¬
- - Infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium *B51*
- - Paludisme

Falciparum *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Paludisme *–suite*
- - - Congénital à Plasmodium *P37.3*
- - - Plasmodium *B50.9*

FALD [Maladie hépatique associée à l'intervention de Fontan] ¬ *K76.1, K91.88*

Falithrom ¬
- Hématome de la gaine des grands droits lors d'un traitement par *D68.33, M62.88*
- Hémorragie
- - *D68.33*
- - Sous traitement par *D68.33*

Fallope
- Due à la grossesse ¬ Rupture de la trompe (de *O00.1*
- Ligaments larges ¬ Autres malformations congénitales des trompes de *Q50.6*
- Vasectomie ¬ Admission pour ligature des trompes de *Z30.2*

Fallot
- Absence du canal artériel ¬ Syndrome d'agénésie de la valve pulmonaire-tétralogie de *Q24.8, Q25.8*
- ¬
- - Atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire au cours de tétralogie de *Q21.3*
- - Pentalogie de *Q21.80*

Falls
v./v.a. Nettleship-Falls

Familial
v./v.a. Type de maladie

Familiare ¬ Iperchilomicronemia *E78.3*

Famille
- Adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: attente d'une *Z76.2*
- MiT ¬ Carcinome rénal associé à une translocation de la *C64*
- Séparation ou divorce ¬ Dislocation de la *Z63*
- ¬
- - Absence d'un des membres de la *Z63*
- - Disparition ou décès (supposé) d'un membre de la *Z63*
- - Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation socio-économique difficile de la *Z76.2*

Famine ¬
- *T73.0*
- Œdème de *E43*

Fanatique ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.0*

Fanconi
v./v.a. Bickel-Fanconi
v./v.a. De-Toni-Debré-Fanconi
- Acquis

Fanconi *–suite*
- Acquis *–suite*
- - Associé à la chaîne légère des Ig monoclonales ¬ Syndrome de *D47.2, E83.38*
- - Secondaire à une gammapathie monoclonale ¬ Syndrome de *D47.2, E83.38*
- Primitif rénotubulaire ¬ Syndrome de *E72.0*
- Secondaire ¬ Syndrome de *E83.38*
- ¬
- - Anémie (de): *D61.0*
- - Pancytopénie de *D61.0*
- - Syndrome
- - - Lowe avec syndrome de *E72.0*
- - - Toni Debré
- - - - *E72.0*
- - - - *E72.0*

Faneur ¬ Poumon de *J67.00*

Fantôme
- SAI ¬ Syndrome du membre *G54.7*
- Sans élément douloureux ¬ Syndrome du membre *G54.7*
- ¬ Syndrome douloureux du membre *G54.6*

Farber ¬
- Lipogranulomatose de *E75.2*
- Maladie de *E75.2*

Farine ¬ Asthme dû à une allergie à la *J45.09*

Fascia
- Plantaire ¬ Contraction du *M72.2*
- ¬
- - Abcès de *M72.8*
- - Fibrosarcome des *C49.9*
- - Tuberculose de *A18.8†, M73.89**

Fasciculaire
- Antérieur gauche ¬ Bloc *I44.4*
- Droit ¬ Bloc *I45.0*
- Postérieur gauche ¬ Bloc *I44.5*
- Sans précision ¬ Blocs *I44.6*

Fasciculation
- Crampes ¬ Syndrome myalgies- *G71.1*
- Musculaires ¬ *R25.3*
- ¬ *R25.3*

Fasciite
- Éosinophiles ¬ *M35.4*
- Nécrosante ¬ *M72.69*
- Nodulaire ¬ *M72.4*
- Plantaire ¬ *M72.2*
- SAI ¬ *M72.9*

Fascio-cutané ¬
- Échec d'une greffe *T86.59*
- Nécrose d'une greffe *T86.51*
- Perte d'une greffe *T86.52*
- Rejet d'une greffe *T86.59*
- Troubles circulatoires d'une greffe *T86.50*

Fasciola
- Gigantica ¬ Infection à *B66.3*

Fasciola *–suite*
- Hepatica ¬
- - Distomatose hépatique à *B66.3†, K77.0**
- - Infection à *B66.3*
- Indica ¬ Infection à *B66.3*

Fasciolopsis buski ¬ Infection par *B66.5*

Fatigabilité ¬ *R53.9*

Fatigue
- Aiguë ¬ *R53.9*
- Chronique
- - Chronic fatigue syndrome] ¬ Syndrome de *G93.3*
- - Indication d'un malaise post-effort [MPE] ¬ *R53.0*
- - Non post-infectieux ¬ Syndrome de *G93.31*
- - Post-infectieux ¬ Syndrome de *G93.30*
- - Sans indication d'un malaise post-effort [MPE] ¬ *R53.1*
- - ¬
- - - *R53.1*
- - - Syndrome
- - - - *F48.0*
- - - - *G93.39*
- Combat ¬ *F43.0*
- Post-viral ¬ Syndrome de *G93.30*
- Post-virale chronique ¬ Syndrome de *G93.30*
- Transitoire due à la chaleur ¬ *T67.6*
- ¬
- - *R53.9*
- - Épuisement et *O26.88*
- - Fracture vertébrale de *M48.4*

Fausse
- Cordes vocales ¬ *C32.1*
- Règles ¬ *P54.6*
- Voie urétrale ¬ *N36.0*

Fausse couche ¬
- *O03*
- Examen ou soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs *N96*

Fauteuil ¬ Confinement en *R26.3*

Fauteuil roulant ¬
- *Z46.8*
- Dépendance de longue durée envers un *Z99.3*

Faux
- Croup ¬ *J38.5*
- Rompu) ¬ anévrisme (cirsoïde) (*I72*
- Travail
- - 37ème semaine entière de gestation ¬ *O47.1*
- - Avant 37 semaines entières de gestation ¬ *O47.0*
- - Sans précision ¬ *O47.9*

Favisme ¬ *D55.0*

Favre
v./v.a. Goldmann-Favre

Favre *–suite*
- ¬ Maladie de (Durand-)Nicolas- *A55*

Favus
- Cuir chevelu ¬ *B35.0*
- ¬ *B35*

Fazio-Londe ¬ Syndrome de *G12.1*

FCHO1 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

FCU [Urticaire familiale au froid] ¬ *L50.2*

Fébrile
v./v.a. Type de maladie

Febris uveoparotidea [syndrome de Heerfordt] ¬ *D86.8*

Fécale
- Liée à une anastomose iléo-anale avec poche ¬ Incontinence *R15, K91.88*
- Origine non organique ¬ Incontinence *F98.1*
- ¬
- - Anomalies des matières *R19.5*
- - Incontinence des matières *R15*
- - Obstruction (du): *K56.4*

Fécaloïde ¬ Vomissement *R11*

Fécalome
- Appendice ¬ *K38.1*
- ¬ *K56.4*

Fécondation
- Artificielle
- - Sans précision ¬ Complication de la *N98.9*
- - ¬ Autres complications de la *N98.8*
- Assistée ¬ Autres méthodes de *Z31.3*
- In vitro ¬
- - *Z31.2*
- - Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après *N98.2*

Fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de tentative d'implantation d'un œuf *N98.2*

Feer ¬
- Maladie de *T56.1*
- Polynévrite lors de maladie de *T56.1*

Feil
v./v.a. Klippel-Feil

Feingold ¬ Syndrome de *Q87.8*

Felineus ¬
- Distomatose hépatique à Opisthorchis *B66.0†, K77.0**
- Infection par Opisthorchis *B66.0*

Felty
- Avant-bras ¬ Syndrome de *M05.03*
- Bras ¬ Syndrome de *M05.02*
- Colonne vertébrale ¬ Syndrome de *M05.08*
- Cuisse ¬ Syndrome de *M05.05*
- Jambe ¬ Syndrome de *M05.06*
- Localisations multiples ¬ Syndrome de *M05.00*
- Main ¬ Syndrome de *M05.04*
- Pied ¬ Syndrome de *M05.07*
- Région de l'épaule ¬ Syndrome de *M05.01*

Felty *–suite*
- Région pelvienne ¬ Syndrome de *M05.05*

Female genital mutilation
- FGM type
- - 1 ¬ *Z91.71*
- - 2 ¬ *Z91.72*
- - 3 ¬ *Z91.73*
- - 4 ¬ *Z91.74*
- MGF], type non précisé ¬ *Z91.70*

Féminin
v./v.a. Type de maladie

Femininum ¬ Pudendum *C51.9*

Féminisation testiculaire (syndrome) ¬ *E34.51*

Femme
v./v.a. Génital de la femme
- Associée à des facteurs relevant de l'homme ¬ Stérilité de la *N97.4*
- Caryotype 46,XY ¬ *Q97.3*
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Affections inflammatoires pelviennes de la *N74.8**
- Cycle menstruel
- - Sans précision ¬ Affection des organes génitaux de la *N94.9*
- - ¬ Autres affections précisées des organes génitaux de la *N94.8*
- Enceinte
- - Cours
- - - Herpes gestationis ¬ Soin à *O26.4*
- - - Insuffisance fœto-placentaire ¬ Soin à *O36.5*
- - ¬ Présence hypertension
- - - Préexistante, due à une néphropathie, chez la *O10.4*
- - - Rénale préexistante chez la *O10.4*
- Homme ¬ Inhibition de l'orgasme chez la *F52.3*
- Non
- - Enceinte
- - - Plusieurs fausses couches ¬ Examen ou soins chez une *N96*
- - - ¬ Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une *N88.3*
- - Précisés ¬ Carcinoma in situ: Organes génitaux de la *D07.3*
- Origines ¬ Stérilité de la *N97.8*
- Ovulation ¬ Stérilité d'origine endocrinienne chez la *N97.8*
- Plus de trois chromosomes X ¬ *Q97.1*
- Porteuse ¬
- - Forme symptomatique
- - - Dystrophie musculaire
- - - - Becker de la *G71.08*
- - - - Duchenne de la *G71.00*
- - - Myopathie centronucléaire liée à l'X de la *G71.2*
- - - Syndrome
- - - - Coffin-Lowry de la *Q87.0*
- - - - X fragile de la *Q99.2*

Femme *–suite*
- Porteuse ¬ *–suite*
- - Maladie de Pelizaeus-Merzbacher chez les *E75.2*
- Précisé aigu ¬ Phlegmon pelvien chez la *N73.0*
- Précisés ¬
- - Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la *D28.7*
- - Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la *C57.7*
- SAI ¬
- - Infection ou inflammation pelvienne de la *N73.9*
- - Organes génitaux externes de la *C51.9*
- - Stérilité de la *N97*
- - Voies génito-urinaires de la *C57.9*
- Sans
- - Anovulation ¬ Stérilité d'origine endocrinienne chez la *N97.0*
- - Précision ¬
- - - Affection inflammatoire pelvienne de la *N73.9*
- - - Malformation congénitale des organes génitaux de la *Q52.9*
- - - Pelvipéritonite chez la *N73.5*
- - - Stérilité de la *N97.9*
- - - Tumeur bénigne: Organe génital de la *D28.9*
- - - Tumeur maligne: Organe génital de la *C57.9*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la *D39.9*
- ¬
- - Adénome du canal de Wolff chez la *D28.7*
- - Adhérences pelvi-péritonéales chez la *N73.6*
- - Affection inflammatoire pelvienne
- - - Chlamydia de la *A56.1†, N74.4**
- - - Gonococcique de la *A54.2†, N74.3**
- - Affections inflammatoires pelviennes précisées de la *N73.8*
- - Arrhénoblastome malin chez la *C56*
- - Cystadénocarcinome endométrioïde chez la *C56*
- - Épispadias chez la *Q64.0*
- - Fistule
- - - Appareil génito-urinaire de la *N82.1*
- - - Génito-cutanée chez la *N82.5*
- - - Intestino-génitales chez la *N82.4*
- - Gangrène de Fournier chez la *N76.80*
- - Hématocèle chez la *N94.8*
- - Hydrocèle chez la *N94.8*
- - Malformations congénitales précisées des organes génitaux de la *Q52.8*
- - Peau Organe génital
- - - *D28*
- - - *D39.7*
- - Pelvipéritonite

Femme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pelvipéritonite *–suite*
- - - Aiguë chez la *N73.3*
- - - Chronique chez la *N73.4*
- - Persistance du sinus urogénital chez la *Q52.8*
- - Prolapsus
- - - Muqueuse urétrale chez la *N81.0*
- - - Urètre chez la *N81.0*
- - Pseudo-hermaphrodisme surrénalien chez la *E25*
- - Pseudo-puberté hétérosexuelle précoce chez la *E25*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la *R87*
- - Syndrome de dysmorphie faciale-petite taille-atrésie des choanes-déficience intellectuelle lié à l'X limité à la *Q87.0*
- - Trouble de: réponse sexuelle chez la *F52.2*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la *C57.8*
- - Tumeur polyvésiculaire du sac vitellin chez la *C56*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la *D39.7*
- - Urétrocèle chez la *N81.0*
- - Virilisme (chez la *E25*

Fémoral
v./v.a. Artère fémorale
v./v.a. ilio-fémoral
v./v.a. Nerf fémoral
- Coxa vara retrosa) (non traumatique) ¬ Épiphysiolyse de la tête *M93.0*
- Distale congénitale ¬ Bifurcation *Q74.2*
- Médiale] ¬ Maladie d'Ahlbäck [ostéonécrose aseptique de la tête *M87.05*
- Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique de la veine *S75.1*
- Sévère ¬ Dysplasie épiphysaire multiple avec dysplasie *Q77.3*
- ¬
- - Anomalie du noyau céphalique *Q72.4*
- - Fracture de la diaphyse *S72.3*
- - Nécrose avasculaire familiale de la tête *M87.85*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine *I80.1*

Fémorale
v./v.a. acro-capito-fémorale

Fémoro
- Cutané ¬ Syndrome du nerf *G57.1*
- Patellaires ¬ Maladies *M22.2*

Fémoro-facial ¬ Syndrome *Q87.8*

Fémoro-péronéo-cubitale ¬ Dysostose *Q72.4*

Fémur
v./v.a. Col du fémur
- Condyle (latéral) (médian) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.41*

Fémur *–suite*
- Distal ¬ Luxation postérieure du *S83.11*
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ Lésion du *P13.2*
- Épiphyse, décollement épiphysaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.42*
- Faciès particulier ¬ Syndrome d'hypoplasie du *Q87.8*
- Intercondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.44*
- Legg-Calvé-Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du *M91.1*
- Partie non précisée ¬ Fracture
- - *S72.9*
- - Extrémité inférieure du *S72.40*
- Proximal ¬ Anomalie congénitale du *Q72.4*
- SAI ¬ Tête du *S72.08*
- Supracondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.43*
- Type Meyer ¬ Dysplasie de la tête du *Q78.8*
- ¬
- - Absence congénitale du *Q72.4*
- - Chondrosarcome du *C40.2*
- - Fracture
- - - Infratrochantérienne du *S72.11*
- - - Parties du *S72.8*
- - Fractures multiples du *S72.7*
- - Hypoplasie du *Q72.4*
- - Incurvation congénitale du *Q68.3*
- - Lésion tissu mou stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la hanche et du *S71.84!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la hanche et du *S71.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la hanche et du *S71.85!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la hanche et du *S71.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la hanche et du *S71.86!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la hanche et du *S71.89!*
- - Nécrose avasculaire, secondaire, non traumatique de la tête du *M87.35*
- - Nécrose médicamenteuse avasculaire, secondaire, non traumatique de la tête du *M87.15*
- - Ostéoblastome du *D16.2*
- - Ostéoporose liée à l'X avec fracture pathologique du *M80.55*
- - Ostéosarcome du *C40.2*
- - Raccourcissement
- - - Congénital du *Q72.4*
- - - Longitudinal du *Q72.4*
- - Sarcome d'Ewing du *C40.2*
- - Sarcome du *C40.2*
- - Séquelles d'une fracture du *T93.1*

Fendus
- Polydactylie mésoaxiale] ¬ SFMMP [Syndrome de pieds *Q74.8*
- Surdité ¬ Syndrome de mains et pieds *Q87.2*

Fenêtre
- Aorto-pulmonaire congénitale ¬ *Q21.4*
- Ovale
- - Non oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la *H80.0*
- - Oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la *H80.1*
- Ronde ¬ Otosclérose intéressant la: *H80.2*

Fentanyl ¬ Intoxication par *T40.2*

Fente
- Branchial
- - SAI ¬ Malformations de la *Q18.2*
- - ¬
- - - Anomalie
- - - - Deuxième *Q18.0*
- - - - Première *Q18.0*
- - - - Quatrième *Q18.0*
- - - - Troisième *Q18.0*
- - - Tumeur maligne: *C10.4*
- Cardiopathie ¬ Syndrome de séquence de Potter- *Q87.8*
- Cervicale médiane ¬ *Q18.8*
- Facial
- - 4 de Tessier ¬ *Q18.8*
- - 5 de Tessier ¬ *Q18.8*
- - 6 de Tessier ¬ *Q18.8*
- - Oblique ¬ *Q18.8*
- - ¬ *Q18.8*
- Labial
- - Bilatérale
- - - Fente de la partie alvéolaire ¬ *Q37.4*
- - - ¬
- - - - *Q36.0*
- - - - Fente
- - - - - Palatine, sans précision, avec *Q37.8*
- - - - - Voile du palais avec *Q37.2*
- - - - - Voûte du palais avec *Q37.0*
- - - - - Voûte et du voile du palais avec *Q37.4*
- - - - Malformations de la *Q36.0*
- - Dystrophie des cônes et des bâtonnets ¬ Syndrome de *Q36.9, H35.5*
- - Fente de la partie alvéolaire ¬ *Q37.5*
- - Isolée ¬ *Q36.9*
- - Médiane ¬ *Q36.1*
- - Rétinopathie ¬ Syndrome de *Q36.9, H35.5*
- - SAI ¬
- - - *Q36.9*
- - - Fente
- - - - Voile du palais avec *Q37.3*
- - - - Voûte
- - - - - Palais avec *Q37.1*
- - - - - Voile du palais avec *Q37.5*

Fente *–suite*
- Labial *–suite*
- - Unilatérale
- - - Fente de la partie alvéolaire ¬ *Q37.5*
- - - ¬
- - - - *Q36.9*
- - - - Fente
- - - - - Palatine, sans précision, avec *Q37.9*
- - - - - Voile du palais avec *Q37.3*
- - - - - Voûte du palais avec *Q37.1*
- - - - - Voûte et du voile du palais avec *Q37.5*
- - ¬
- - - *Q36.9*
- - - Malformation de la *Q36.9*
- - - Syndrome de microbrachycéphalie-ptosis- *Q87.8*
- Labio-maxillaire
- - Bilatérale ¬ *Q37.0*
- - Unilatérale ¬ *Q37.1*
- - ¬ *Q37.1*
- Labio-maxillo-palatine
- - Bilatérale ¬
- - - *Q37.4*
- - - *Q37.4*
- - Unilatérale ¬ *Q37.5*
- Labio-palatine
- - Anomalies oculaires ¬ Syndrome caractérisé par des anomalies de l'oreille, une *Q87.0*
- - Dysmorphie cranio-faciale-cardiopathie congénitale-surdité ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Malrotation-cardiopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - SAI ¬ *Q37.9*
- - Surdité-lipome sacré ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ Syndrome de contractures-dysplasie ectodermique- *Q87.8*
- Laryngo-trachéo-œsophagienne ¬ *Q34.8*
- Luette ¬ *Q35.7*
- Luschka et du foramen de Magendie ¬ Atrésie des *Q03.1*
- Médian
- - Labio-mandibulaire ¬ *Q36.1*
- - Lèvre et de la mâchoire supérieure ¬ *Q37.5*
- - Voile du palais ¬ *Q35.3*
- Mitrale ¬ *Q23.8*
- Nasal
- - Hypoplasie alaire et télécanthus ¬ Syndrome de *Q75.1*
- - ¬ *Q30.2*
- Oro-faciale-anomalies cardiaques-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Palais
- - Sans précision ¬ *Q35.9*
- - ¬ *Q35.9*
- Palatin
- - Ankyloglossie liées à l'X ¬ *Q38.6*

Fente *–suite*
- Palatin *–suite*
- - Anomalies carpo-tarsales-oligodontie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Excès de peau ¬ Syndrome de dysmorphie faciale- *Q87.0*
- - Grandes oreilles-petite taille ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - Hallux valgus ¬ Syndrome de colobome maculaire- *Q87.8*
- - Mutation de MEIS2 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-cardiopathie congénitale- *Q87.8*
- - Petite taille-anomalies vertébrales ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Pigmentation rétinienne anormale ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.8*
- - Sans précision fente labial
- - - Bilatérale ¬ *Q37.8*
- - - Unilatérale ¬ *Q37.9*
- - Submuqueuse ¬ *Q35.9*
- - Synéchies latérales ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Vélaire médiane ¬ *Q35.5*
- - ¬ Syndrome
- - - Ankyloblépharon filiforme- *Q87.0*
- - - Déficience intellectuelle-cardiopathie congénitale- *Q87.8*
- - - Létal d'omphalocèle- *Q87.8*
- - - Macrosomie-microphtalmie- *Q87.0*
- - - Microtie bilatérale-surdité- *Q87.0*
- - - Syngnathie- *Q67.4, Q35.9*
- Partie alvéolaire ¬ Fente labial
- - *Q37.5*
- - Bilatérale avec *Q37.4*
- - Unilatérale avec *Q37.5*
- Processus) alvéolaire ¬ *K08.8*
- Vélaire ¬ *Q35.3*
- Voile palais
- - Fente labial
- - - Bilatérale ¬ *Q37.2*
- - - SAI ¬ *Q37.3*
- - - Unilatérale ¬ *Q37.3*
- - ¬ *Q35.3*
- Voûte
- - Palais
- - - Fente labial
- - - - Bilatérale ¬ *Q37.0*
- - - - SAI ¬ *Q37.1*
- - - - Unilatérale ¬ *Q37.1*
- - - ¬ *Q35.1*
- - Voile palais
- - - Fente labial
- - - - Bilatérale ¬ *Q37.4*
- - - - SAI ¬ *Q37.5*
- - - - Unilatérale ¬ *Q37.5*
- - - ¬
- - - - *Q35.5*
- - - - Malformation de la *Q35.5*

Fente *–suite*
- ¬ Water clefts (*H25.0*

Fenton-Wilkinson-Toselano ¬ Syndrome de *Q87.1*

Fer
- Cheval
- - Rétine, sans décollement ¬ Déchirure en *H33.3*
- - ¬ Rein en *Q63.1*
- Composés ¬ Intoxication: *T45.4*
- Liée à des mutations de C19orf12 ¬ Neurodégénérescence avec surcharge cérébrale en *G23.0*
- Menkes ¬ Syndrome des cheveux en fils de *E83.0*
- Réfractaire au traitement par le fer ¬ Anémie par déficit en *D50.8*
- Sans précision ¬ Anémie par carence en *D50.9*
- Secondaire à une perte de sang (chronique) ¬ Anémie par carence en *D50.0*
- Type 1 ¬ Neurodégénérescence avec surcharge cérébrale en *G23.0*
- ¬
- - Anémie
- - - Déficit en fer réfractaire au traitement par le *D50.8*
- - - Microcytaire avec surcharge hépatique en *D50.8*
- - Anémies par carence en *D50.8*
- - Carence en *E61.1*
- - Maladie de: Menkes (cheveux crépus) (en fil de *E83.0*
- - Syndrome cérébro-cutané avec surcharge en *G31.88*
- - Taux anormal de: *R79.0*

Fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Pseudomonas et autres bacilles non *B96.5!*

Fermeture
- Anormale des maxillaires ¬ *K07.5*
- Anténatale du canal artériel ¬ *Q25.8*
- Infection ¬ Prolapsus urétéral avec *N13.67*
- Sutures crâniennes ¬ Retard de *P96.3*
- Tube neural ¬ Syndrome de cataracte-cardiopathie congénitale-défaut de *Q87.0*

Fermier
- Épisodes aigus ¬ Poumon de *J67.01*
- Sans mention d'épisodes aiguë ¬ Poumon de *J67.00*
- ¬
- - Fibrose pulmonaire avec poumon de *J67.00*
- - Poumon de *J67.00*

Ferrante
v./v.a. Thong-Douglas-Ferrante

Ferriprive ¬ anémie: *D50*

Ferrique ¬ Pigmentation: *L81.8*

Ferritine ¬ Neurodégénérescence associée à la *G23.0*

Ferroportine ¬ Maladie *E83.1*

Fertile ¬ Syndrome de: eunuchoïdisme *E23.0*

Fesse ¬
- *C49.5*
- *R02.05*
- *S31.0*
- Abcès cutané, furoncle et anthrax de la *L02.3*
- Basaliome de la *C44.59*
- Carcinome de la peau de la *C44.59*
- Dos toute partie
- - *L02.2*
- - Sauf les *R02.04*
- Mélanome malin de la *C43.59*
- Rougeurs des *L22*

Fessier
- Psoriasiforme ¬ Rash *L22*
- ¬ Érythème *L22*

Fessière
- Nourrisson ¬ Dermite *L22*
- ¬
- - Région
- - - *L02.3*
- - - *T21*
- - Tendinite de la région *M76.0*

Fétichisme
- Travestisme ¬ *F65.1*
- ¬ *F65.0*

Fétichiste ¬ Travestisme *F65.1*

Fétide ¬ Haleine *R19.6*

Feu
- Artifice ¬ Accident dû à: Corps de *W49.9!*
- Dermite due au feu] ¬ Érythème dû au *L59.0*
- Flammes ¬ Exposition à: *X59.9!*
- ¬
- - Accident dû à: Armes à *W49.9!*
- - Effondrement d'un bâtiment en *X59.9!*
- - Érythème dû au feu [dermite due au *L59.0*
- - Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à *Y35.7!*
- - Syndrome de la bouche en *K14.6*

Feuerstein
v./v.a. Schimmelpenning-Feuerstein-Mims

FFEVF [Épilepsie focale familiale à foyers variables] ¬ *G40.1*

FGM type
- 1 ¬ Female genital mutilation [*Z91.71*
- 2 ¬ Female genital mutilation [*Z91.72*
- 3 ¬ Female genital mutilation [*Z91.73*
- 4 ¬ Female genital mutilation [*Z91.74*

FHEIG [dysmorphie faciale-hypertrichose-épilepsie-déficience intellectuelle/retard de développement-hypertrophie gingivale ¬ Syndrome *Q87.0*

Fibre
- Due canalopathie sodique ¬ Neuropathie
- - Héréditaire des petites *G60.8*
- - Petites *G60.8*

Fibre *–suite*
- Hyaloïdes ¬ Membranes et *H43.3*
- Minérale
- - Mention d'exacerbation aiguë ¬ Pneumoconiose due à des *J61.1*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Pneumoconiose due à des *J61.0*
- - ¬ Pneumonie due à des *J61.0*
- Musculaire
- - Myopathies avec anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des *G71.2*
- - Type 2 ¬ Myopathie congénitale avec atrophie des *G71.2*
- - ¬
- - - Activité continue familiale de la *G71.1*
- - - Myopathie congénitale avec disproportion des types de *G71.2*
- Myéline rétiniennes ¬ *H47.0*
- Nerveuses intrarétiniennes myélinisées ¬ *H47.0*
- Rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec *G31.81*
- Sensitives myélinisées de gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec surdité, déficience intellectuelle et absence de *G60.0*
- ¬
- - Disproportion des types de *G71.2*
- - Neuropathie idiopathique des petites *G60.8*

Fibreux
- Blanche du cou ¬ Papulose *L90.8*
- Chronique ¬ Pancréatite *K86.18*
- Circonscrite ¬ Ostéite *M85.09*
- Cryptogénique ¬ Alvéolite *J84.10*
- Disséminée ¬
- - Ostéite *Q78.1*
- - Ostéodystrophie *Q78.1*
- Exacerbation aiguë ¬ Alvéolite *J84.11*
- Mâchoire ¬ Dysplasie *K10.8*
- Os ¬ Dysplasie *M85.09*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Alvéolite *J84.10*
- Solitaire
- - Bénigne
- - - Abdomen ¬ Tumeur *D21.4*
- - - Péritoine ¬ Tumeur *D20.1*
- - - Thorax ¬ Tumeur *D21.3*
- - ¬ Tumeur *D21.9*
- ¬
- - Alvéolite *J84.10*
- - Bronchiolite oblitérante *J44.89*
- - Dysplasie
- - - *M85.09*
- - - Polyostotique *Q78.1*
- - Thyroïdite (de): chronique: *E06.5*

Fibrillaire
- Cervelet ¬ Astrocytome *C71.6*
- Encéphale ¬ Astrocytome *C71.0*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Astrocytome *C71.8*
- Lobe frontal ¬ Astrocytome *C71.1*
- Lobe occipital ¬ Astrocytome *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ Astrocytome *C71.3*
- Lobe temporal ¬ Astrocytome *C71.2*
- Non amyloïde ¬ Glomérulopathie *N03.8*
- Tronc cérébral ¬ Astrocytome *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬ Astrocytome *C71.5*
- ¬ Astrocytome *C71.9*

Fibrillation
- Auriculaire
- - Chronique ¬ *I48.2*
- - Familiale ¬ *I48.9*
- - Intermittente ¬ *I48.0*
- - Paroxystique ¬ *I48.0*
- - Permanente ¬
- - - *I48.2*
- - - *I48.2*
- - Persistante ¬ *I48.1*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- - ¬
- - - *I49.8*
- - - Arythmie
- - - - *I48.9*
- - - - Complète au cours d'une *I48.9*
- - - Tachyarythmie
- - - - Absolue persistante au cours de *I48.1*
- - - - Complète
- - - - - Paroxystique au cours d'une *I48.0*
- - - - - Permanente au cours d'une *I48.2*
- - - - Cours d'une *I48.9*
- Flutter
- - Auriculaires, sans autre précision ¬ *I48.9*
- - Ventriculaires ¬ *I49.0*
- Ventriculaire idiopathique type
- - Brugada ¬ *I49.8*
- - Non Brugada ¬ *I49.8*
- ¬ Arythmie par *I48.9*

Fibrine ¬
- Carence en facteur stabilisant de la *D68.26*
- Déficit héréditaire en facteur stabilisant de la *D68.26*

Fibrineuse
- Aiguë ¬ Bronchite *J20.9*
- Nodulaire) (tubéreuse) ¬ Cordite (*J38.2*
- Sous-aiguë ¬ Bronchite *J20.9*
- ¬ Bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*

Fibrinogène
- A ¬ Amylose à chaîne alpha du *E85.0†, N08.4**
- ¬ Déficit
- - Acquis en *D65.01*

Fibrinogène *–suite*
- ¬ Déficit *–suite*
- - Héréditaire en *D68.20*

Fibrinogénopénie
v./v.a. Fibrinopénie
- Acquise ¬ *D65.01*
- Congénitale ¬ *D68.20*

Fibrinolyse
- Post-partum ¬ *O72.3*
- ¬ Intoxication: Médicaments agissant sur la *T45.6*

Fibrinolytique
- Acquise ¬ Hémorragie *D65.2*
- ¬ Purpura *D65.2*

Fibrinopénie
v./v.a. Fibrinogénopénie
- Héréditaire ¬ *D68.20*
- ¬ *D68.20*

Fibrino-purulente ¬ Pleurésie *J86.9*

Fibroadénome
- Intracanaliculaire à cellules géantes ¬ *D24*
- Multiples de la poitrine ¬ *D24*
- Phylloïde ¬ *D24*

Fibroadipeuse ¬ Syndrome de croissance segmentaire progressive avec hyperplasie *Q87.3*

Fibroblastique
- Articulation
- - Coude ¬ Rhumatisme *M06.82*
- - Genou ¬ Rhumatisme *M06.86*
- Main ¬ Rhumatisme *M06.84*
- Poignet ¬ Rhumatisme *M06.83*
- Sans précision ¬ Affection *M72.9*
- Sièges multiples ¬ Rhumatisme *M06.80*
- ¬
- - Affections
- - - *M72*
- - - *M72.8*
- - Méningiome *D32.9*
- - Ostéosarcome *C41.9*
- - Rhumatisme *M06.89*

Fibrocartilagineux triangulaire
- TFCC] ¬ Complexe *S63.3*
- ¬ Rupture traumatique
- - Complexe *S63.3*
- - TFCC [Complexe *S63.3*

Fibrochondrogenèse ¬ *Q77.7*

Fibrochondrome cervico-facial ¬ *D21.0*

Fibrodysplasie ossifiant progressive
- Bras ¬
- - *M61.12*
- - *M61.13*
- Cou ¬ *M61.18*
- Cuisse ¬ *M61.15*
- Jambe ¬ *M61.16*
- Main ¬ *M61.14*
- Pied ¬ *M61.17*

Fibrodysplasie ossifiant progressive *–suite*
- Région scapulaire ¬ *M61.11*
- Sièges multiples ¬ *M61.10*
- ¬ FOP [*M61.19*

Fibroélastose
- Endocardique ¬ *I42.4*
- Endomyocardique ¬ *I42.4*
- Pleuroparenchymateuse idiopathique ¬ *J84.10, J94.1*
- Pleuropulmonaire idiopathique ¬ *J84.10, J94.1*

Fibrohistiocytome myxoïde malin ¬ *C49.9*

Fibrokystique
- Foie ¬ Maladie *Q44.6*
- Généralisée
- - Maladie osseuse de von Recklinghausen] ¬ Ostéite *E21.0†, M90.89**
- - ¬ Ostéite *E21.0†, M90.89**
- Rein ¬ Dégénérescence ou maladie *Q61.8*
- ¬
- - Mastopathie *N60*
- - Rein *Q61.8*

Fibrolamellaire ¬ Carcinome hépatocellulaire *C22.0*

Fibromatose
- Agressive ¬ *D48.1*
- Aponévrose
- - Palmaire [Dupuytren] ¬ *M72.0*
- - Plantaire ¬ *M72.2*
- Congénitale généralisée ¬ *D48.1*
- Digitale infantile ¬ *M72.80*
- Gingival
- - Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Surdité ¬ Syndrome de *H90.3*
- - ¬
- - - *K06.1*
- - - Syndrome d'hypertrichose avec *L68.8, K06.1*
- Hyaline juvénile
- - Cou ¬ *M72.88*
- - Sièges multiples ¬ *M72.80*
- - Tête ¬ *M72.88*
- - ¬ *M72.89*
- Infantile digital
- - Doigt ¬ *M72.84*
- - Orteil ¬ *M72.87*
- SAI ¬ *M72.9*

Fibromatose aponévrotique juvénile
- Avant-bras ¬ *M72.83*
- Bras ¬ *M72.82*
- Jambe ¬ *M72.86*
- Main ¬ *M72.84*
- Pied ¬ *M72.87*
- Région pelvienne ¬ *M72.85*
- Région scapulaire ¬ *M72.81*
- Tronc ¬ *M72.88*
- ¬ *M72.89*

Fibromatose pseudo-sarcomateuse
- Avant-bras ¬ *M72.43*
- Bras ¬ *M72.42*
- Cuisse ¬ *M72.45*
- Jambe ¬ *M72.46*
- Localisations multiples ¬ *M72.40*
- Main ¬ *M72.44*
- Pied ¬ *M72.47*
- Région de l'épaule ¬ *M72.41*
- Tronc ¬ *M72.48*

Fibrome
- Chondromyxoïde
- - Côte ¬ *D16.70*
- - Maxillaire inférieur ¬ *D16.5*
- - Os
- - - Courts
- - - - Membre supérieur ¬ *D16.1*
- - - - Membres inférieurs ¬ *D16.3*
- - - Longs membres
- - - - Inférieurs ¬ *D16.2*
- - - - Supérieurs ¬ *D16.0*
- - Pelvis ¬ *D16.8*
- - Rachis ¬ *D16.6*
- - Sternum ¬ *D16.71*
- - Tête ¬ *D16.41*
- - ¬ *D16.9*
- Desmoïde ¬ *D48.1*
- Invasif ¬ *D48.1*
- Ossifiant familial
- - Mâchoire supérieure ¬ *D16.42*
- - Maxillaire inférieur ¬ *D16.5*
- Ovarien ¬ *D27*
- Utérus ¬ Soins maternels pour: *O34.1*

Fibromusculaire
- Artère ¬ Dysplasie *I77.3*
- Artère rénale ¬ Sténose *I77.3*
- Artérielle ¬ Dysplasie *I77.3*
- Atypique de la carotide ¬ Dysplasie *I77.3*
- Intimale de la carotide ¬ Dysplasie *I77.3*
- Modérée ¬ Sténose subaortique *Q24.4*

Fibromyalgie
- Juvénile ¬ *M79.7*
- ¬ *M79.7*

Fibromyome de l'utérus ¬ *D25*

Fibromyosite ¬ *M79.7*

Fibromyxosarcome tissu mou
- Abdomen ¬ *C49.4*
- Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- Membres
- - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - Supérieurs ¬ *C49.1*
- Pelvis ¬ *C49.5*
- Tête ¬ *C49.0*
- Thorax ¬ *C49.3*
- Tronc ¬ *C49.6*

Fibronectine ¬ Glomérulopathie à dépôts de *N07.6*

Fibro-odontosarcome améloblastique ¬ *C41.1*

Fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste anévrismal et d'une autre lésion *K09*

Fibroplasie rétrolentale ¬ *H35.1*

Fibroplastique Löffler
- Hyperéosinophilie ¬ Endocardite pariétale *I42.3*
- ¬ Endocardite pariétale *I42.3*

Fibrosante
- Cryptogénique] ¬ CFA [Alvéolite *J84.10*
- Myopathie rétractile-fibrose pulmonaire ¬ Syndrome de poïkilodermie héréditaire *Q82.8*
- ¬ Alopécie frontale *L66.1*

Fibrosarcome
- Abdomen ¬ *C49.4*
- Améloblastique
- - Mandibule ¬ *C41.1*
- - Maxillaire supérieur ¬ *C41.02*
- - ¬ *C41.1*
- Cou ¬ *C49.0*
- Épaule ¬ *C49.1*
- Fascias ¬ *C49.9*
- Hanche ¬ *C49.2*
- Membres
- - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - Supérieurs ¬ *C49.1*
- Odontogène
- - Mandibule ¬ *C41.1*
- - Maxillaire supérieur ¬ *C41.02*
- - ¬ *C41.1*
- Osseux ¬ *C41.9*
- Pelvis ¬ *C49.5*
- Périosté ¬ *C41.9*
- Rate ¬ *C26.1*
- Tête ¬ *C49.0*
- Thorax ¬ *C49.3*
- Tissus mous, lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- Tronc ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Fibrosclérose
- Multiple ¬ *M35.5*
- Sein ¬ *N60.3*

Fibrose
- Angiocentrique à éosinophiles ¬ *J39.88*
- Canal lacrymal ¬ *H04.5*
- Capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire ¬ *T85.82*
- Cirrhose du foie ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.7*
- Congénitale
- - Hépatique isolée ¬ *Q44.6*
- - Muscles oculomoteurs ¬ *H49.8*

Fibrose *–suite*
- Cutanées ¬ Cicatrices et *L90.5*
- Diffuse ¬ Lymphome de Hodgkin classique en déplétion lymphocytaire, avec *C81.3*
- Due à prothèses, implants ou greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Endomyocardique
- - Tropicale [TEMF] ¬ *I42.3*
- - ¬ *I42.3*
- Hépatique
- - Kystes rénaux-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Polykystose rénale ¬ Syndrome de diabète néonatal-hypothyroïdie congénitale-glaucome congénital- *Q87.8*
- - Sclérose hépatique ¬ *K74.2*
- - ¬ *K74.0*
- Interstitielle idiopathique ¬ *J84.10*
- Kystique
- - Manifestation
- - - Intestinales ¬ *E84.1*
- - - Multiples ¬ *E84.87*
- - - Pulmonaires ¬ *E84.0*
- - Pancréas ¬
- - - *E84.88†, K87.1**
- - - Iléus méconial en l'absence reconnue de *P76.0*
- - ¬
- - - CF [*E84.9*
- - - Iléus méconial au cours de *E84.1†, P75**
- Médiastinale ¬ *J98.58*
- Moelle osseuse ¬ *D47.4*
- Myocarde ¬ *I51.4*
- Origine médicamenteuse ¬ *M79.89*
- Pancréas ¬ *K86.88*
- Péricardique ¬ *I31.88*
- Périnée ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- Poumon
- - Due
- - - Bauxite ¬ *J63.1*
- - - Graphite ¬ *J63.3*
- - Médicamenteuse ¬ *J70.4*
- Pulmonaire
- - Atrophique ¬ *J84.10*
- - Bagassose ¬ *J67.10*
- - Bérylliose ¬ *J63.2*
- - Chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ *J68.4*
- - Combinés [CPFE] ¬ Syndrome d'emphysème- *J84.10, J43.9*
- - Congénitale ¬ *P27.8*
- - Déficit immunitaire-dysgénésie gonadique 46,XX ¬ Syndrome de *D82.8, J84.10*
- - Diffuse
- - - Exacerbation aiguë ¬ *J84.11*
- - - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J84.10*

Fibrose *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Diffuse *–suite*
- - - ¬ *J84.10*
- - Hyperplasie hépatique-hypoplasie de la moelle osseuse ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Idiopathique
- - - Exacerbation aiguë ¬ *J84.11*
- - - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J84.10*
- - - ¬ *J84.10*
- - Interstitielle-neurodégénérescence-angiomatose cérébrale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Origine médicamenteuse ¬ Antécédents personnels de *Z87.0*
- - Post-inflammatoire ¬ *J84.10*
- - Poumon de fermier ¬ *J67.00*
- - Tuberculeuse
- - - Confirmation bactériologique ¬ *A15.0*
- - - Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- - - Confirmée par examen microscopique de l'expectoration et par culture ¬ *A15.0*
- - - N'ayant pas fait l'objet d'un examen bactériologique ou histologique ¬ *A16.1*
- - ¬
- - - *J84.10*
- - - Syndrome de poïkilodermie héréditaire fibrosante-myopathie rétractile- *Q82.8*
- Rate SAI ¬ *D73.8*
- Rétripéritonéale idiopathique avec infection du rein ¬ *K66.2*
- Rétropéritonéale ¬ *K66.2*
- Sclérose alcooliques du foie ¬ *K70.2*
- Silicotique (massive) du poumon ¬ *J62*
- Sous-muqueux
- - Bouche ¬ *K13.5*
- - Langue ¬ *K13.5*
- - Voies respiratoires supérieures ¬ *J39.88*
- Syphilitique chronique du testicule ¬ *A52.7†, N51.1**
- Systémique néphrogénique ¬ *M35.8*
- Tuberculeuse
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose pulmonaire: *A16.2*
- - Sans confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A16.0*
- - ¬ *A16.2*
- Utérus SAI ¬ *N85.8*
- ¬ Autres affections pulmonaires interstitielles avec *J84.1*

Fibrosite ¬ *M79.7*

Fibrothécome ovarien ¬ *D27*

Fibrothorax ¬ *J94.1*

Fibroxanthome malin ¬ *C49.9*

Fibuline-4 ¬ Syndrome d'artériopathie létale par déficit en *Q25.8*

Ficoline 3 ¬ Déficit immunitaire par déficit en *D84.1*

Fiessinger-Leroy ¬ Maladie de *M02.39*

Fièvre
- Aphteuse ¬ *B08.8*
- Arbovirus SAI ¬ *A94*
- Bilieuse ¬ *B50.8*
- Boutonneuse méditerranéenne ¬ *A77.1*
- Canicola ¬ *A27.8*
- Causée par morsure de rat à Spirochaeta morsus muris ¬ *A25.0*
- Cérébrospinale à méningocoques ¬ *A39.0†, G01**
- Chikungunya ¬ *A92.0*
- Chrysopidea ¬ *A21.9*
- Due
- - Médicaments [Drug fever] ¬ *R50.2*
- - Morsures de rat ¬ *A25.9*
- - Virus
- - - O'nyong-nyong ¬ *A92.1*
- - - West-Nile ¬ *A92.3*
- Ebola ¬ *A98.4*
- Entérique ¬ *A01.0*
- Équine vénézuélienne ¬ *A92.2*
- Étiologie inconnue ¬ *R50.80*
- Exanthémateuse à entérovirus [exanthème de Boston] ¬ *A88.0*
- Exanthème à entérovirus ¬ *A88.0*
- Fluviale du Japon ¬ *A75.3*
- Frissons ¬ *R50.88*
- Ganglionnaire ¬ *B27*
- Hantavirus ¬ *A98.5*
- Haverhill ¬ *A25.1*
- Indiana] ¬ Stomatite vésiculaire virale [*A93.8*
- Insuffisance rénale-organomégalie] ¬ Syndrome de TAFRO [thrombocytopénie-anasarque- *D89.8*
- Intermittente au cours du paludisme ¬ *B54*
- Intestinale au cours du paludisme ¬ *B54*
- Jaune
- - Citadine ¬ *A95.1*
- - Sylvatique ¬ *A95.0*
- - ¬
- - - FJ [*A95.9*
- - - Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.3*
- Kedani ¬ *A75.3*
- Lassa ¬ *A96.2*
- Malte ¬ *A23.0*
- Marais ¬ Anémie due à la *B54†, D63.8**
- Méditerranéenne ¬ *A23*
- Montana ¬ *A78*
- Mouche du daim ¬ *A21*
- Nile occidental ¬ *A92.3*
- Nouveau-né SAI ¬ *P81.9*

Fièvre *–suite*
- Ondulante
- - Maladie de Bang] ¬ *A23.1*
- - ¬ *A23*
- Origine centrale ¬ *R50.88*
- Oropouche ¬ *A93.0*
- Pappataci ¬ *A93.1*
- Périodique
- - Entérocolite infantile ¬ Syndrome auto-inflammatoire- *M35.8*
- - Immunodéficience-thrombocytopénie ¬ Syndrome de *D72.0*
- - Retard de développement] ¬ Syndrome SIFD [anémie sidéroblastique congénitale-immunodéficience à cellules B- *D64.0, D82.8*
- - Stomatite aphteuse-pharyngite-adénopathie] ¬ Syndrome PFAPA [*M35.8*
- Perroquets ¬ *A70*
- Persistante ¬ *R50.88*
- Pharyngo-conjonctivale épidémique ¬ *B30.2†, H13.1**
- Phlébotome ¬ *A93.1*
- Pourprées ¬ Autres *A77.8*
- Précisée ¬ Autre *R50.88*
- Précisées ¬ Autres *R50.8*
- Puerpérale ¬ *O85*
- Purpurique du Brésil ¬ *A48.4*
- Quadrilatérale ¬ *A78*
- Quintane ¬ *A79.0*
- Ross River ¬ *B33.1*
- Russo-asiatique ¬ *A77.2*
- Sans précision ¬ *R50.9*
- Scarlatine ¬ *A38*
- Sept jours du Japon ¬ *A27.8*
- Sévère avec syndrome de thrombocytopénie [SFTG] ¬ *A93.8*
- Songo ¬ *A98.5†, N08.0**
- Spirillum minus causée par morsure de rat ¬ *A25.0*
- Streptobacillaire causée par morsure de rat ¬ *A25.1*
- Streptobacilles causée par morsure de rat ¬ *A25.1*
- Thrombocytopénie sévère à Haemaphysalis longicornis ¬ Syndrome de *A93.8*
- Tierce bénigne ¬ Anémie due à la *B54†, D63.8**
- Tiques
- - Colorado ¬ *A93.2*
- - Haemaphysalis longicornis ¬ *A93.8*
- - Queensland ¬ *A77.3*
- Tranchées ¬ *A79.0*
- Transmise par le lapin ¬ *A21*
- Trois jours] ¬ Exanthème subit [*B08.2*
- Tropicale récurrente] à tiques ¬ Borréliose [*A68.1*
- Tsutsugamushi ¬ *A75.3*
- Typhogastrique ¬ *A01.0*

Fièvre *–suite*
- Uvéo-parotidienne subchronique ¬ *D86.8*
- Vésiculeuse ¬ *A79.1*
- Virus Zika ¬ *A92.5*
- Volhynie ¬ *A79.0*
- Yaba ¬ *B08.8*
- ¬
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, R50.9*
- - Syndrome
- - - CANDLE [dermatose neutrophile atypique chronique-lipodystrophie- *M35.8*
- - - Insuffisance hépatique aiguë infantile associée à la *K72.0*

Fièvre hémorragique
- Arénavirus
- - Chapare ¬ *A96.8*
- - Lujo ¬ *A96.8*
- - ¬ Autres *A96.8*
- Brésilienne ¬ *A96.8*
- Crimée-Congo ¬ *A98.0*
- Junin ¬ *A96.0*
- Kyasanur ¬ *A98.2*
- Machupo ¬ *A96.1*
- Manifestations rénales ¬ *A98.5†, N08.0**
- Marbourg] ¬ MHF [*A98.3*
- Omsk ¬ *A98.1*
- Syndrome rénal ¬ *A98.5†, N08.0**
- Vénézuélienne ¬ *A96.8*
- Virale, sans précision ¬ *A99*
- Virales précisées ¬ Autres *A98.8*
- Virus Ebola ¬ *A98.4*

Fièvre méditerranéenne
- Familiale ¬
- - *A23.0*
- - Arthrite au cours de *E85.0†, M14.49**
- - FMF [*E85.0*
- ¬ *A23.9*

Fièvre paratyphoïde
- A ¬ *A01.1*
- B ¬ *A01.2*
- C ¬ *A01.3*
- ¬
- - *A01.4*
- - Arthrite au cours de *A01.4†, M01.39**
- - Gastroentérite au cours de *A01.4*

Fièvre pourprée
- Due à Rickettsia sibirica ¬ *A77.2*
- Rickettsia
- - Conorii ¬ *A77.1*
- - Rickettsii ¬ *A77.0*

Fièvre Q ¬
- *A78*
- Endocardite au cours de *A78†, I39.8**
- Pneumonie au cours de *A78†, J17.8**

Fièvre récurrente
- Cycle menstruel-dépendante ¬ *N94.8*

Fièvre récurrente *–suite*
- Infectieuse ¬ *A68.9*
- Novy
- - Poux ¬ *A68.0*
- - Tiques ¬ *A68.1*
- Panniculite-dermatose ¬ Syndrome infantile de *M35.8*
- Poux ¬ *A68.0*
- Tiques ¬ *A68.1*
- Tropicale] ¬ Borréliose [*A68.9*

Fièvre rhumatismale
- Aiguë ¬ Érythème marginé au cours d'une *I00†, L54.0**
- Atteinte du système nerveux central ¬ *I02.9*
- Pneumonie ¬ *I00†, J17.8**

Fièvre typhoïde ¬
- *A01.0*
- Arthrite au cours de *A01.0†, M01.39**
- Pneumonie au cours de *A01.0†, J17.0**
- Récidive tardive de la *A75.1*

Fièvre virale
- Précisées transmises
- - Arthropodes ¬ Autres *A93.8*
- - Moustiques ¬ Autres *A92.8*
- Transmise par des arthropodes, sans précision ¬ *A94*

Figuré chronique ¬ Autres formes d'érythème *L53.3*

Fil
- Dysmorphie faciale-déficit immunitaire-livedo-petite taille] ¬ Syndrome *Q87.1*
- Fer
- - Menkes ¬ Syndrome des cheveux en *E83.0*
- - ¬ Maladie de: Menkes (cheveux crépus) (en *E83.0*

Filamenteuse ¬ Kératite: *H16.1*

Filamine C ¬ Myopathie myofibrillaire liée à la *G71.8*

Filaminopathie musculaire ¬ *G71.8*

Filarienne
- SAI ¬ Chylocèle de la tunique vaginale (non *N50.8*
- ¬ Chylocèle (non *I89.8*

Filariose
- Brugia
- - Malayi ¬ *B74.1*
- - Timori ¬ *B74.2*
- Due à Wuchereria bancrofti ¬ *B74.0*
- ¬ Autres *B74.8*

Filiforme
- Adnatum
- - Imperforation anale ¬ Syndrome d'ankyloblépharon *Q87.8*
- - Isolé ¬ Ankyloblépharon *Q10.3*
- - ¬ Ankyloblépharon *Q10.3*
- Fente palatine ¬ Syndrome d'ankyloblépharon *Q87.0*

Filiforme *–suite*
- Imperforation anale ¬ Syndrome d'ankyloblépharon *Q87.8*

Filippi ¬ Syndrome de *Q87.8*

Fille ¬ Puberté précoce centrale
- Génétique de la *E22.8*
- Secondaire de la *E22.8*

Filles ¬ Acné excoriée des jeunes *L70.5*

Filum
- Terminal ¬ Lipome du *Q76.0*
- ¬ Lipome transitionnel du *Q76.0*

FIM cognitif
- 5-10 points ¬ *U51.21*
- 11-29 points ¬ *U51.11*
- 30-35 points ¬ *U51.01*

FIM moteur
- 13-30 points ¬ *U50.51*
- 31-42 points ¬ *U50.41*
- 43-58 points ¬ *U50.31*
- 59-68 points ¬ *U50.21*
- 69-84 points ¬ *U50.11*
- 85-91 points ¬ *U50.01*

Fin
- Administratives ¬ Examen médical et prise de contact à des *Z02*
- Médico-légales ¬ examen à des *Z04*
- Thérapeutiques ¬ Ulcère dû au plâtre utilisé à des *L89*

Finck
v./v.a. Stoll-Alembik-Finck

Fine-Lubinsky ¬ Syndrome de *Q87.8*

Fineman
v./v.a. Carey-Fineman-Ziter

Finlay-Marks ¬ Syndrome de *Q87.8*

Fisher ¬ Syndrome de Miller- *G61.0*

Fiskerstrand ¬ Neuropathie périphérique type *G60.1*

Fission mitochondrial peroxysomale
- Associée
  - DNM1L ¬ Encéphalopathie par défaut de *G31.81*
  - MFF ¬ Encéphalopathie par défaut de *G31.81*
  - ¬ Encéphalopathie par défaut de *G31.81*

Fissuraire ¬ Kyste *K09.1*

Fissure
- Anale
  - Aiguë ¬ *K60.0*
  - Chronique ¬ *K60.1*
  - Sans précision ¬ *K60.2*
- Cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Congénitale de la langue ¬ *Q38.3*
- Épiglotte ¬ *Q31.8*
- Fistule
  - Kyste d'origine branchiale ¬ *Q18.0*
  - Mamelon ¬ *N64.0*
- Labiale congénitale ¬ *Q36.9*

Fissure *–suite*
- Mamelon gestationnelles ou puerpérales ¬ *O92.1*
- Nasale ¬ *Q30.2*
- Palais ¬ *Q35.9*
- Postérieure du cartilage cricoïde ¬ *Q31.8*

Fissurée ¬ Langue: *K14.5*

Fistulans sinifica ¬ Pyodermia *L73.2*

Fistule
- Anale
  - Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
  - ¬ *K60.3*
- Ano-rectale ¬ *K60.5*
- Aorte-artère pulmonaire congénitale ¬ *Q21.4*
- Aorto-pulmonaire ¬ *Q21.4*
- Appareil
  - Génital de la femme
    - Sans précision ¬ *N82.9*
    - ¬ Autres *N82.88*
  - Génito-urinaire de la femme ¬ Autres *N82.1*
- Appendice ¬ *K38.3*
- Artérioportale intrahépatique congénitale ¬ *Q26.6*
- Artério-veineuse) traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Anévrisme ou *T14.5*
- Articulaire ¬ *M25.1*
- Bronches ¬ Pyothorax avec *J86.01*
- Bronchique
  - Primaire tuberculeuse avec confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.7*
  - Tuberculeuse primaire ¬ *A16.7*
  - ¬ *J86.01*
- Bronchobiliaire congénitale ¬ *Q44.5*
- Broncho-cutanée ¬ *J86.02*
- Broncho-médiastinale ¬ *J86.08*
- Broncho-œsophagienne ¬ Atrésie de l'œsophage avec *Q39.1*
- Broncho-pleurale ¬ *J86.01*
- Broncho-pleuro-médiastinale ¬ *J86.08*
- Broncho-pulmonaire ¬ *J86.00*
- Cervico-auriculaire ¬ *Q18.1*
- Cervico-vésicale ¬ *N82.1*
- Cholécysto
  - Colique ¬ *K82.3*
  - Duodénale ¬ *K82.3*
- Cholédoco-duodénale ¬ *K83.3*
- Coccygien(ne) ou pilonidal(e) ¬ *L05*
- Commissure labiale ¬ *Q38.0*
- Coronaire ¬ *Q24.5*
- Créée chirurgicalement ¬ Infection d'une *T82.73*
- Dos du nez ¬ *Q18.8*
- Drainage ¬ Ostéomyélite chronique avec *M86.4*
- Estomac et du duodénum ¬ *K31.6*
- Gastro-colique
  - Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**

Fistule *–suite*
- Gastro-colique *–suite*
  - ¬ *K31.6*
- Gastro-gastrique ¬ *K31.6*
- Gastro-jéjuno-colique ¬ *K31.6*
- Génito-cutanée chez la femme ¬ *N82.5*
- Glandes salivaires ¬ *K11.4*
- Hépato
  - Pleurale ¬ *J86.08*
  - Pulmonaire ¬ *J86.08*
- Intestin ¬ *K63.2*
- Intestino-génitales chez la femme ¬ Autres *N82.4*
- Intestino-utérine ¬ *N82.4*
- Kyste
  - Origine branchiale ¬ Fissure, *Q18.0*
  - Préauriculaires ¬ *Q18.1*
- Labiale inférieure ¬ *Q38.0*
- Labyrinthique ¬ *H83.1*
- Lacrymale ¬ *H04.6*
- Liquide céphalorachidien postopératoire ¬ *G97.80*
- Lombaire tuberculeuse ¬ *A18.0†, M49.06**
- Mamelon ¬ Fissure et *N64.0*
- Mastoïde ¬ *H70.1*
- Médian(e) de la face et du cou ¬ *Q18.8*
- Médiastinale ¬ *J86.08*
- Œsophage ¬ *K22.80*
- Œsophago
  - Bronchique ¬ *J86.05*
  - Pleural ¬
    - *J86.04*
    - Pyothorax avec *J86.04*
  - Pulmonaire ¬ *J86.05*
  - Trachéal
    - Consécutive à une trachéotomie ¬ *J95.03*
    - ¬ Pyothorax avec *J86.03*
- Œsophago-pleuro-cutanée ¬ *J86.05*
- Ouraque
  - Congénitale ¬ *Q64.4*
  - ¬ *Q64.4*
- Pancréatico-duodénale ¬ *K86.84*
- Pancréatique ¬ *K86.84*
- Parenchyme pulmonaire ¬ Pyothorax avec *J86.00*
- Paroi thoracique ¬
  - *J86.02*
  - Pyothorax avec *J86.02*
- Pavillon, congénitale ¬ *Q18.1*
- Périanale ¬ *K60.3*
- Périlymphatique ¬ Surdité mixte liée à l'X avec *H90.8*
- Périnatal
  - Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N37.8**
  - ¬ Malformation anorectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec *Q42.2*

Fistule *–suite*
- Périnéo-vaginale ¬ *N82.5*
- Périrectale tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Pleural
- - Tuberculeuse NCA ¬ *A16.5*
- - - ¬ *J86.09*
- Pleurocutané
- - Tuberculeuse NCA ¬ *A16.5*
- - - ¬ *J86.02*
- Pleuropéritonéal
- - Tuberculeuse NCA ¬ *A16.5*
- - - ¬ *J86.08*
- Pneumo-péritonéale ¬ *J86.08*
- Pneumo-pleurale ¬ *J86.00*
- Poche-intestin ¬ *N32.1*
- Portosystémique congénitale ¬ *Q26.5*
- Postopératoire persistante ¬ *T81.8*
- Pulmonaire
- - Tuberculeuse ¬ *A16.2*
- - - ¬ *J86.00*
- Rectal
- - Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- - - ¬ *K60.4*
- Recto vestibulaire
- - Congénitale ¬ *Q52.2*
- - - ¬ Malformation ano-rectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec *Q42.2*
- Rectobulbaire ¬
- - Atrésie congénitale de l'anus avec *Q42.2*
- - Malformation anorectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec *Q42.2*
- Recto-cutané
- - Atrésie du rectum ¬ *Q42.0*
- - - ¬ *K60.4*
- Rectoprostatique ¬ Atrésie congénitale de l'anus avec *Q42.2*
- Recto-vaginal
- - Congénitale ¬
- - - *Q52.2*
- - - *Q52.2*
- - Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N74.1**
- - - ¬ *N82.3*
- Rectovaginale ¬ Malformation anorectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec *Q42.2*
- Recto-vésicale
- - Congénitale ¬ *Q64.7*
- - ¬
- - - Atrésie congénitale de l'anus avec *Q42.2*
- - - Malformation anorectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec *Q42.2*
- Région costale ¬ *J86.02*
- Thoracique ¬ *J86.09*
- Thoraco-abdominale ¬ *J86.08*
- Trachée ¬ Pyothorax avec *J86.01*
- Trachéo-pleurale ¬ *J86.01*
- Trachéotomie ¬ *J95.08*

Fistule *–suite*
- Type H ¬ Malformation anorectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec *Q42.2*
- Typhoïdique ¬ *A01.0*
- Urétéro-vaginale ¬ *N82.1*
- Urétrale ¬ *N36.0*
- Urétro
- - Périnéale ¬ *N36.0*
- - Rectale ¬ *N36.0*
- - Scrotale ¬ *N50.8*
- - Vaginale ¬ *N82.1*
- Urinaire SAI ¬ *N36.0*
- Utéro
- - Pariétale ¬ *N82.5*
- - Urétérale ¬ *N82.1*
- - Vésicale ¬ *N82.1*
- Vagin
- - Côlon ¬ *N82.3*
- - Cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement ¬ *N82.80*
- - Intestin grêle ¬ *N82.2*
- - Vessie de remplacement ¬ *N82.81*
- Veine porte et l'artère hépatique (congénitale) ¬ *Q26.6*
- Vésicale, non classée ailleurs ¬ *N32.2*
- Vésico
- - Intestinale ¬ *N32.1*
- - Rectale ¬ *N32.1*
- Vésico-vaginale ¬ *N82.0*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.3*
- Voies biliaires ¬ *K83.3*
- ¬
- - Abcès
- - - Dentaire avec *K04.6*
- - - Dento-alvéolaire avec *K04.6*
- - - Périapical
- - - - *K04.6*
- - - - Sans *K04.7*
- - - Pleural avec *J86.09*
- - - Régions anale et rectale, avec ou sans *K61*
- - - Thoracique avec *J86.09*
- - Absence
- - - Anus avec *Q42.2*
- - - Atrésie et sténose congénitales du rectum, avec *Q42.0*
- - - Rectum avec *Q42.0*
- - Agénésie de l'anus avec *Q42.2*
- - Atrésie
- - - Anus avec *Q42.2*
- - - Œsophage sans *Q39.0*
- - Empyème pleural avec *J86.09*
- - Malformation anorectale (atrésie de l'anus) non syndromique sans *Q42.3*
- - Obstruction congénitale de l'œsophage sans *Q39.0*
- - Occlusion de l'anus avec *Q42.2*

Fistule *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Phlegmon des régions anale et rectale, avec ou sans *K61*
- - Pleurésie
- - - Purulente avec *J86.09*
- - - Septique avec *J86.09*
- - Pyopneumothorax avec *J86.09*
- - Pyothorax
- - - *J86.09*
- - - Sans *J86.9*
- - Tuberculose du rectum avec *A18.3†, K93.0**

Fistule artério-veineuse
- Associée
- - Greffe ¬ Infection due à une *T82.73*
- - Implant ¬ Infection due à une *T82.73*
- Cérébrale (acquise) ¬ *I67.11*
- Congénitale
- - Vaisseaux cérébraux ¬ *Q28.21*
- - Vaisseaux précérébraux ¬ *Q28.01*
- - ¬ *Q27.3*
- Coronaire
- - Acquise ¬ *I25.4*
- - Congénitale ¬ *Q24.5*
- Durale du crâne ¬ *Q28.21*
- Pulmonaire congénitale ¬ *Q25.7*
- Systémique congénitale ¬ *Q27.3*
- Vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.0*
- ¬ *I77.0*

Fistule congénitale
- Appareil circulatoire ¬ Autre *Q28.81*
- Glandes salivaires ¬ *Q38.4*
- Lèvre ¬ *Q38.0*
- Pavillon de l'oreille ¬ *Q17.8*
- Rectum et de l'anus ¬ *Q43.6*
- Utéro-digestive et utéro-urinaire ¬ *Q51.7*
- Vaisseaux cérébraux ¬ *Q28.31*
- Vaisseaux précérébraux ¬ *Q28.11*

Fistule recto-urétrale
- Congénitale ¬ *Q64.7*
- ¬
- - Atrésie congénitale de l'anus avec *Q42.2*
- - Malformation anorectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec *Q42.2*

Fistule trachéo-œsophagienne
- Atrésie œsophage
- - Anomalies rénales et des membres] ¬ Syndrome de VACTERL [anomalies vertébrales, atrésie anale, anomalies cardiaques, *Q87.2*
- - Dysplasie rénale et du radius] ¬ Syndrome de VATER [anomalies vertébrales, atrésie anale, anomalies cardiaques, *Q87.2*
- Congénitale
- - Sans atrésie ¬ *Q39.2*
- - Type H sans atrésie de type 4 selon Vogt ¬ *Q39.2*

Fistule trachéo-œsophagienne *–suite*
- Congénitale *–suite*
- - ¬ *Q39.2*
- Consécutive à une trachéotomie ¬ *J95.03*
- Isolée ¬ *Q39.2*
- ¬ Atrésie de l'œsophage avec *Q39.1*

Fistule tuberculeuse
- Broncho-cutané
- - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.5*
- - ¬ *A16.4*
- Broncho-médiastinal
- - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.5*
- - ¬ *A16.4*
- Broncho-pleural
- - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.5*
- - ¬ *A16.4*
- Pleurale, confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.6*
- Scrotum ¬ *A18.1†, N51.8**
- Urètre ¬ *A18.1†, N37.8**

Fitz-Hugh-Curtis
- Chlamydia ¬ Syndrome de *A74.8†, K67.0**
- ¬ Syndrome de *A54.8†, K67.1**

Fitzsimmons-McLachlan-Gilbert ¬ Syndrome de *Q87.8*

Fixation
- Interne
- - Os
- - - Colonne vertébrale ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.20*
- - - Membre
- - - - Avant-bras ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.12*
- - - - Bras ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.11*
- - - - Cheville et pied ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.16*
- - - - Jambe ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.15*
- - - - Main ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.13*
- - - - Os précisés d'un membre ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.18*
- - - - Région pelvienne et cuisse ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.14*
- - - - Région scapulaire ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.10*
- - - Os précisés ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.28*
- - Toute localisation] ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de *T84.6*
- Intestin ¬ Malformations congénitales de *Q43.3*
- Radio-isotopes [radionucléides] ¬ résultats anormaux de: épreuves de *R94*

Fixation *–suite*
- Traction ¬ Changement, vérification ou enlèvement de: appareils externes de *Z47.8*
- ¬ Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de *Z47.0*

Fixe
- Langue SAI ¬ Partie *C01*
- ¬ Érythème pigmenté *L27.1*

Fixée organiquement ¬ Vessie à faible compliance, *N31.80*

FJ [Fièvre jaune] ¬ *A95.9*

FKBP22 ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type cyphoscoliotique par déficit en *Q79.6*

FKRP ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.08*

Flaccida ¬ Perforation de la pars *H72.1*

Flagellés ¬ Diarrhée à *A07.9*

Flaitz
v./v.a. Atkin-Flaitz

Flammes ¬ Exposition à: Feu et *X59.9!*

Flammeus ¬ Nævus: *Q82.5*

Flanc ¬
- *S31.1*
- *T21*
- Mélanome malin du *C43.59*

Flare phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ Phénomène d'embrasement thérapeutique (*T88.7*

Flasque
- Affaissé
- - Perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau *L98.7*
- - SAI ¬ Peau *L98.7*
- Aiguë [MFA] ¬ Myélite *A88.8*
- Paraplégie complète
- - Aiguë origine non traumatique ¬
- - - Paraplégie *G82.00*
- - - Tétraplégie *G82.30*
- - Chronique ¬
- - - Paraplégie *G82.02*
- - - Tétraplégie *G82.32*
- Paraplégie incomplète
- - Aiguë origine non traumatique ¬
- - - Paraparésie *G82.01*
- - - Tétraparésie *G82.31*
- - Chronique ¬
- - - Paraparésie *G82.03*
- - - Tétraparésie *G82.33*
- Périphérique), non classée ailleurs ¬ Vessie neurogène *N31.2*
- ¬
- - Hémiparésie ou hémiplégie *G81.0*
- - Peau et tissu sous-cutané excédentaire et *L98.7*

Flatulence
- Troubles apparentés ¬ *R14*
- ¬ Formes psychogènes de: *F45.3*

Flava ¬ Tinea: *B36.0*

Flavimaculatus ¬
- Dystrophie tachetée multifocale de l'épithélium pigmentaire rétinien (simulant le fundus *H35.5*
- Fundus *H35.5*

Flavoprotéine ¬ Trouble du transport d'électrons par carence en *E71.3*

Flavoprotéine-ubiquinone oxydoréductase ¬ Trouble du transport d'électrons par carence en *E71.3*

Fléchisseur
- Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.1*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon *S56.2*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et tendons *S66.6*
- Orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long *S96.0*
- Pouce niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S56.0*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon longs *S66.0*
- S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S56.1*
- ¬ Déchirure spontanée des tendons *M66.3*

Flegel ¬ Maladie de *L85.8*

Fleischer ¬ Anneau de Kayser- *H18.0*

Fleischner ¬ Ostéite cystoïde multiple type *D86.8*

Flexibilité cireuse schizophrénique ¬ *F20.2*

Flexion
- Articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation ¬ Contracture (*T87.6*
- Dorsale, acquis ¬ Pied en *M21.68*
- Radius distal ¬ Fracture en *S52.52*
- ¬
- - Déformation en *M21.2*
- - Eczéma (de): plis de *L20.8*
- - Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en *S52.52*
- - Psoriasis des plis de *L40.8*

Flexner ¬ Dysenterie de *A03.1*

Flexneri ¬
- Dysenterie à Shigella *A03.1*
- Infection à Shigella *A03.1*
- Shigellose à Shigella *A03.1*

Floating-Harbor ¬ Syndrome de *Q87.8*

Flore bactérienne mixte NCA ¬ Infection à *A49.88*

Floride
- Mâchoire supérieure ¬ Dysplasie cémento-osseuse *D16.42*
- Mandibule ¬ Dysplasie osseuse *D16.5*
- Maxillaire

Floride *–suite*
- Maxillaire *–suite*
- - Supérieur ¬ Dysplasie osseuse *D16.42*
- - ¬ Dysplasie cémento-osseuse *D16.42*
- ¬
- - Dysplasie osseuse *D16.42*
- - Maladie lymphoprolifération post-transplantation, hyperplasie folliculaire *D47.7*

FLOTCH [Leukonychie totale familiale-kystes trichilemmaux-dystrophie ciliaire] ¬ Syndrome *Q84.4*

Flottante ¬
- Bêta-lipoprotéinémie
- - *E78.2*
- - Large ou *E78.2*
- Crête gingivale *K06.8*

Floue au cours d'hystérie ¬ Vision *F44.6†, H58.1**

Fluconazole
- Seulement ¬ Aspergillus fumigatus résistant aux antifongiques du groupe des triazoles, sauf aspergillus fumigatus résistant au *U83.3!*
- ¬
- - Candida albicans résistant au *U83.0!*
- - Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines et aux triazoles, résistant au *U83.21!*

Fluctuation
- Diurnes marquées ¬ Dystonie progressive héréditaire avec *G24.1*
- Effet ¬
- - Maladie Parkinson début précoce
- - - *G20.91*
- - - Handicap
- - - - Léger
- - - - - *G20.01*
- - - - - Sans *G20.00*
- - - - Lourd
- - - - - *G20.11*
- - - - - *G20.21*
- - - - - Sans *G20.10*
- - - - - Sans *G20.20*
- - Parkinsonisme atypique juvénile
- - - *G20.91*
- - - Handicap
- - - - Léger
- - - - - *G20.01*
- - - - - Sans *G20.00*
- - - - Lourd
- - - - - *G20.11*
- - - - - *G20.21*
- - - - - Sans *G20.10*
- - - - - Sans *G20.20*
- Efficacité ¬ Syndrome Parkinson héréditaire tardif
- - *G20.91*
- - Handicap

Fluctuation *–suite*
- Efficacité ¬ Syndrome Parkinson héréditaire tardif *–suite*
- - Handicap *–suite*
- - - Léger
- - - - *G20.01*
- - - - Sans *G20.00*
- - - Lourd
- - - - *G20.11*
- - - - *G20.21*
- - - - Sans
- - - - - *G20.10*
- - - - - *G20.20*

Fluide haute pression
- Industrielle) ¬ Injection traumatique de *T70.4*
- ¬ Effets des *T70.4*

Fluor
- Gaz) et fluorure d'hydrogène ¬ Effet toxique: *T59.5*
- Mycosique ¬ *B37.3†, N77.1**
- Trichomonas vaginalis ¬ *A59.0†, N77.1**

Fluorée ¬ Ostéose *M85.1*

Fluorose
- Dentaire ¬ *K00.3*
- ¬ Taches de l'émail non associées à la *K00.3*

Fluorouracile ¬ Intoxication au 5- *T45.1*

Fluorure d'hydrogène ¬ Effet toxique: Fluor (gaz) et *T59.5*

Flutter
- Auriculaire
- - Atypique ¬ *I48.4*
- - Chronique ¬ *I48.9*
- - Idiopathique du nouveau-né ¬ *P29.1*
- - Paroxystique ¬ *I48.9*
- - Sans autre précision ¬ Fibrillation et *I48.9*
- - Type
- - - I ¬ *I48.3*
- - - II ¬ *I48.4*
- - Typique ¬ *I48.3*
- Ventriculaires ¬ Fibrillation et *I49.0*

Fluviale du Japon ¬ Fièvre *A75.3*

Flux lent (Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome coronarien à *I20.8*

Flynn-Aird ¬ Syndrome de *Q87.8*

FMF [Fièvre méditerranéenne familiale] ¬ *E85.0*

FMPP [Puberté précoce familiale limitée aux garçons] ¬ *E30.1*

FNIP1 ¬ Agammaglobulinémie syndromique par déficit en protéine *D80.0*

Focaux ou généralisés ¬ Épilepsies et syndromes épileptiques non précisés comme *G40.8*

Fœtal
v./v.a. Type de maladie

Fœto
v./v.a. alpha-fœto-protéine

Fœto-fœtal ¬
- Lésions chez le nouveau-né dues à une transfusion *P02.3*
- Soins maternels au cours de syndrome de transfusion *O43.0*
- Syndrome de transfusion *P02.3*

Fœto-maternelle
- Anti-endopeptidase neutre ¬ Néphropathie membraneuse congénitale par allo-immunisation *P96.0*
- ¬ Transfusion (de): *O43.0*

Fœto-pelvienne
- Cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions *P03.1*
- Origine mixte, maternelle et fœtale ¬ Soins maternels pour disproportion *O33.4*
- SAI ¬ Disproportion: *O33.9*
- Sans précision ¬ Dystocie due à une disproportion *O65.4*

Fœto-placentaire
- Due
- - Iso-immunisation ¬ Anasarque *P56.0*
- - Maladies hémolytiques, autres et sans précision ¬ Anasarque *P56.9*
- Non
- - Associée à une iso-immunisation ¬ Anasarque *O36.2*
- - Due à une maladie hémolytique ¬ Anasarque *P83.2*
- SAI ¬ Anasarque *O36.2*
- ¬
- - Incompatibilité Rh (avec anasarque *O36.0*
- - Iso-immunisation: SAI (avec anasarque *O36.1*
- - Soin
- - - Femme enceinte au cours d'insuffisance *O36.5*
- - - Maternels pour anasarque *O36.2*

Fœtoprotéine
v./v.a. alpha-fœtoprotéine

Fœtus
v./v.a. Nouveau-né
- Accouchement de l'enfant ¬ Hémorragie après expulsion du *O72*
- Affecté
- - Anhydramnios ¬ *P01.2*
- - Hépatite aiguë de la mère ¬ *P00.2*
- - Maladie à virus Zika contractée par la mère ¬ *P00.2*
- Anormalement gros ¬
- - Dystocie due à un *O66.2*
- - Soins maternels pour disproportion due à un *O33.5*
- Arlequin ¬ *Q80.4*
- Compressus ¬ *O31.0*
- Cours de vasa praevia ¬ Hémorragie chez le *P50.0*
- Déficit maternel en riboflavine ¬ Lésion du *P00.4*

Fœtus *–suite*
- Disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du *P03.1*
- Échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de retard de croissance du *Z36.4*
- Entraînant disproportion ¬
- - Ascite du *O33.7*
- - Hydropisie du *O33.7*
- - Méningomyélocèle du *O33.7*
- - Tératome sacro-coccygien du *O33.7*
- - Tumeur du *O33.7*
- Faciliter l'accouchement ¬ Amputation du *P03.8*
- Hydrocéphale ¬
- - Dystocie due à: *O66.3*
- - Soins maternels pour disproportion due à un *O33.6*
- Léger pour l'âge gestationnel ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de: *O36.5*
- Menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du *O35.8*
- Mort in utero ¬ Rétention d'un *O02.1*
- Non classée ailleurs ¬ Infection intra-amniotique du *P39.2*
- Normal ¬ Disproportion: d'origine fœtale avec *O33.5*
- Nouveau-né
- - Affecté
- - - Infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées ¬ *P00.8*
- - - Lupus érythémateux disséminé de la mère ¬ *P00.8*
- - - Radiologie chez la mère ¬ *P00.7*
- - Affectés
- - - Accouchement
- - - - Césarienne ¬ *P03.4*
- - - - Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ *P03.3*
- - - - Extraction par le siège ¬ *P03.0*
- - - - Forceps ¬ *P03.2*
- - - - Précipité ¬ *P03.5*
- - - Affection maternelle, sans précision ¬ *P00.9*
- - - Affections
- - - - Cordon ombilical, autres et sans précision ¬ *P02.6*
- - - - Maternelles ¬ *P00.8*
- - - Alcoolisme de la mère ¬ *P04.3*
- - - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ *P04.0*
- - - Anomalie des membranes, sans précision ¬ *P02.9*
- - - Anomalies
- - - - Membranes ¬ *P02.8*

Fœtus *–suite*
- Nouveau-né *–suite*
- - Affectés *–suite*
- - - Anomalies *–suite*
- - - - Morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision ¬ *P02.2*
- - - Béance du col ¬ *P01.0*
- - - Chorio-amniotite ¬ *P02.7*
- - - Complication
- - - - Précisées du travail et de l'accouchement ¬ *P03.8*
- - - - Travail et de l'accouchement, sans précision ¬ *P03.9*
- - - Complication de la grossesse mère
- - - - Sans précision ¬ *P01.9*
- - - - ¬ *P01.8*
- - - Contractions anormales de l'utérus ¬ *P03.6*
- - - Effet nocif maternel, sans précision ¬ *P04.9*
- - - Effets nocifs maternels ¬ *P04.8*
- - - Exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ *P04.6*
- - - Formes
- - - - Compression du cordon ombilical ¬ *P02.5*
- - - - Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ *P02.1*
- - - Grossesse extra-utérine ¬ *P01.4*
- - - Grossesse multiple ¬ *P01.5*
- - - Hydramnios ¬ *P01.3*
- - - Intervention
- - - - Chirurgicale chez la mère ¬ *P00.6*
- - - - Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ *P00.7*
- - - Maladies
- - - - Circulatoires et respiratoires de la mère ¬ *P00.3*
- - - - Infectieuses et parasitaires de la mère ¬ *P00.2*
- - - - Rénales et des voies urinaires de la mère ¬ *P00.1*
- - - Médicaments absorbés par la mère ¬ *P04.1*
- - - Mort de la mère ¬ *P01.6*
- - - Oligoamnios ¬ *P01.2*
- - - Placenta praevia ¬ *P02.0*
- - - Présentation
- - - - Anormale avant le travail ¬ *P01.7*
- - - - Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ *P03.1*
- - - Procidence du cordon ombilical ¬ *P02.4*
- - - Rupture prématurée des membranes ¬ *P01.1*
- - - Syndromes de transfusion placentaire ¬ *P02.3*
- - - Tabagisme de la mère ¬ *P04.2*

Fœtus *–suite*
- Nouveau-né *–suite*
- - Affectés *–suite*
- - - Toxicomanie de la mère ¬ *P04.4*
- - - Traumatisme de la mère ¬ *P00.5*
- - - Troubles
- - - - Hypertensifs de la mère ¬ *P00.0*
- - - - Nutritionnels de la mère ¬ *P00.4*
- - - Utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ *P04.5*
- - Hypoglycémie) ¬ Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le *P70.1*
- - Sans précision ¬
- - - Affection des téguments spécifiques du *P83.9*
- - - Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le *P70.9*
- - - Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du *P52.9*
- - - Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du *P52.3*
- - - Maladie hémolytique du *P55.9*
- - - ¬
- - - Affections précisées des téguments spécifiques du *P83.8*
- - - Anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le *P70.8*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée chez le *P60*
- - - Contusions du *P54.5*
- - - Ecchymoses du *P54.5*
- - - États mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du *P08*
- - - Hématome superficiel du *P54.5*
- - - Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du *P52.6*
- - - Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du *P52.4*
- - - Hémorragie intracrânienne non
- - - - Traumatique), degré 1, du *P52.0*
- - - - Traumatiques) du *P52.8*
- - - Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du *P52.5*
- - - Interruption de la grossesse source d'affections chez le *P96.4*
- - - Iso-immunisation
- - - - ABO du *P55.1*
- - - - Rhésus du *P55.0*
- - - Maladie hémorragique du *P53*
- - - Maladies hémolytiques du *P55.8*
- - - Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du *P83.3*
- - - Pétéchies du *P54.5*
- - - Réactions et intoxications médicamenteuses du *P93*
- - - Syndrome de défibrination du *P60*
- Papyracé ¬ *O31.0*

Fœtus *–suite*
- Petit pour l'âge gestationnel ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de: *O36.5*
- Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du *O68.2*
- Sans
- - Mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel ¬ Malnutrition du *P05.2*
- - Précision ¬
- - - Croissance lente du *P05.9*
- - - Soin maternels
- - - - Affection du *O36.9*
- - - - Présentation anormale du *O32.9*
- Trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du *O36.6*
- Vasa praevia ¬ Lésions du *P02.6*
- Viable ¬ Soins maternels pour grossesse abdominale avec *O36.7*
- ¬
- - Avortement spontané, *P01.8*
- - Dystocie due
- - - Ascite du *O66.3*
- - - Hydropisie du *O66.3*
- - - Méningomyélocèle du *O66.3*
- - - Rotation incomplète de la tête du *O64.0*
- - - Tératome sacro-coccygien du *O66.3*
- - - Tumeur du *O66.3*
- - Poursuite grossesse
- - - Avortement d'un ou plusieurs *O31.1*
- - - Mort intra-utérine d'un ou plusieurs *O31.2*
- - Soin maternels
- - - Affections précisées du *O36.8*
- - - Anomalie chromosomique (présumée) du *O35.1*
- - - Croissance excessive du *O36.6*
- - - Disproportion due à d'autres anomalies du *O33.7*
- - - Grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs *O32.5*
- - - Maladie héréditaire (présumée) du *O35.2*
- - - Malformation (présumée) du système nerveux central du *O35.0*
- - - Mort intra-utérine du *O36.4*
- - - Présentations anormales du *O32.8*
- - - Spina bifida (présumé(e)) du *O35.0*
- - Thrombose de la veine rénale chez le *P29.8*
- - Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du *O68.0*

Fogo selvagem [pemphigus brésilien] ¬ *L10.3*

Foie
- 29 jours plus transplantation ¬

Foie *–suite*
- 29 jours plus transplantation ¬ *–suite*
- - Détérioration fonctionnelle d'une greffe de *T86.41*
- - Rejet d'une greffe de *T86.41*
- Abcès cérébral ¬ Abcès amibien du *A06.6†, G07**
- Chat ¬
- - Distomatose hépatique à douve du *B66.0†, K77.0**
- - Infection par douve du *B66.0*
- Chlonorchis sinensis ¬ Distomatose du *B66.1†, K77.0**
- Cholestase ¬ Maladie toxique du *K71.0*
- Clonorchis sinensis ¬ Infection du *B66.1*
- Congénital(e) ¬ Absence de *Q44.7*
- Cryptogénique ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ *E10.60†, K77.8**
- - - 2 ¬ *E11.60†, K77.8**
- - ¬ *E14.60†, K77.8**
- Dite) cardiaque ¬ Cirrhose du *K76.1*
- Douloureux ¬ *R10.1*
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ Rupture du *P15.0*
- Echinococcus ¬ Infection du *B67.8†, K77.0**
- Echinococcus granulosus ¬ Kyste hydatique du *B67.0*
- Echinococcus multilocularis ¬
- - Infection du *B67.5†, K77.0**
- - Kyste hydatique du *B67.5*
- Entamoeba histolytica ¬ Abcès du *A06.4†, K77.0**
- Fibrose et cirrhose du foie ¬ Maladie toxique du *K71.7*
- Ficelé syphilitique ¬ *A52.7†, K77.0**
- Granulomes hépatiques ¬ Maladie toxique du *K71.88*
- Hémorragie rupture Varice œsophagien ¬ Cirrhose
- - *K74.6†, I98.3**
- - Alcoolique du *K70.3†, I98.3**
- - Toxique du *K71.7†, I98.3**
- Hépatite
- - Lupoïde ¬ Maladie toxique du *K71.5*
- - Non classée ailleurs ¬ Maladie toxique du *K71.6*
- Hépatite aiguë ¬ Maladie toxique du *K71.2*
- Hépatite chronique
- - Active ¬ Maladie toxique du *K71.5*
- - Lobulaire ¬ Maladie toxique du *K71.4*
- - Persistante ¬ Maladie toxique du *K71.3*
- Hyperplasie nodulaire en foyer ¬ Maladie toxique du *K71.88*
- Lésions foie ¬ Maladie toxique
- - *K71.8*
- - *K71.88*
- Macronodulaire ¬ Cirrhose (du *K74.6*

Foie *–suite*
- Micronodulaire ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Mouton ¬ Maladie due à la douve du *B66.3*
- Nécrose hépatique ¬ Maladie toxique du *K71.1*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ Dégénérescence graisseuse du *K76.0*
- - Précisé ¬ Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de *T86.49*
- Origine cardiaque ¬ Sclérose du *K76.1*
- Paludéen ¬ *B54*
- Péliose hépatique ¬ Maladie toxique du *K71.88*
- Pendant premiers 28 jours transplantation ¬
- - Détérioration fonctionnelle d'une greffe de *T86.40*
- - Rejet d'une greffe de *T86.40*
- Portale ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Post-nécrotique ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Poumon ¬ Abcès amibien
- - *A06.5†, J99.8**
- - Cerveau (et du *A06.6†*
- Précisés ¬ Autres carcinomes du *C22.7*
- Reins ¬ Maladie glycogénique du *E74.0*
- Rejet de greffe-contre-hôte stade 1 ¬ Maladie aiguë du *T86.01†, K77.11**
- SAI
- - Congénital(e) ¬ Malformation du *Q44.7*
- - ¬
- - - Cirrhose (du *K74.6*
- - - Lésion du *S36.10*
- Saignement de varices gastriques ¬ Cirrhose alcoolique du *K70.3†, I98.3**
- Sans précision ¬
- - Cirrhoses du *K74.6*
- - Maladie
- - - *K76.9*
- - - Alcoolique du *K70.9*
- - - Inflammatoire du *K75.9*
- - - Toxique du *K71.9*
- - Tumeur maligne: *C22.9*
- Sibérienne ¬ Distomatose hépatique à douve du *B66.0†, K77.0**
- Stade Child-Pugh
- - A ¬ Cirrhose du *K74.6, K74.70!*
- - B ¬ Cirrhose du *K74.6, K74.71!*
- - C ¬ Cirrhose du *K74.6, K74.72!*
- Substances anti-anémiantes ¬ Préparation à base de *T45.8*
- Surnuméraire ¬ *Q44.7*
- Type mixte ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Varice
- - Gastriques ¬ Cirrhose alcoolique du *K70.3†, I98.2**
- - Œsophagien ¬ Cirrhose
- - - *K74.6†, I98.2**
- - - Alcoolique du *K70.3†, I98.2**

Foie *–suite*
- Varice *–suite*
- - Œsophagien ¬ Cirrhose *–suite*
- - - Toxique du *K71.7†, I98.2**
- Vésicule Voie biliaire ¬
- - Carcinoma in situ: *D01.5*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.6*
- Voie biliaire
- - Intrahépatique ¬
- - - Adénocarcinome du *C22.0, C22.1*
- - - Carcinome du *C22.0, C22.1*
- - - Carcinome épidermoïde du *C22.0, C22.1*
- - - Carcinome indifférencié du *C22.9, C22.1*
- - - Tumeur maligne secondaire du *C78.7*
- - ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R93.2*
- ¬
- - Abcès
- - - *K75.0*
- - - Dysentérique du *A06.4†, K77.0**
- - Abcès amibien du *A06.4†, K77.0**
- - Amibiase du *A06.4†, K77.0**
- - Angiosarcome du *C22.3*
- - Atrophie ou dystrophie jaune du *K72*
- - Carence en facteur de coagulation due à: affections du *D68.4*
- - Cirrhose
- - - Alcoolique du *K70.3*
- - - Congénitale (du *P78.8*
- - - Syphilitique du *A52.7†, K77.0**
- - Clonorchiase du *B66.1†, K77.0**
- - Congestion passive chronique du *K76.1*
- - Contusion et hématome du *S36.11*
- - Dégénérescence graisseuse alcoolique du *K70.0*
- - Dégénérescence neuronale progressive de l'enfant avec maladie du *G31.88*
- - Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de *T86.41*
- - Donneur de *Z52.6*
- - Échec greffe
- - - *T86.49*
- - - Lors de status post greffe du *T86.49*
- - Échinococcose
- - - *B67.8†, K77.0**
- - - Alvéolaire du *B67.5†, K77.0**
- - - Kystique du *B67.0†, K77.0**
- - Fibrose et sclérose alcooliques du *K70.2*
- - Glycogénose avec cirrhose du *E74.0*
- - Gomme du *A52.7†, K77.0**
- - Hémangioendothéliome épithélioïde du *C22.7*
- - Hémochromatose du *E83.1†, K77.8**
- - Hyperplasie nodulaire
- - - Focale télangiectasique du *D13.4*
- - - Régénérative du *K76.8*

Foie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Infection (à): petite douve (du *B66.2*
- - Infiltration de glycogène du *E74.0†, K77.8**
- - Kyste hydatique du *B67.8†, K77.0**
- - Lésion du *S36.16*
- - Maladie
- - - Fibrokystique du *Q44.6*
- - - Kystique du *Q44.6*
- - - Syphilitique du *A52.7†, K77.0**
- - - Toxique
- - - - Foie
- - - - - Fibrose et cirrhose du *K71.7*
- - - - - Lésions du *K71.8*
- - - - - Lésions du *K71.88*
- - - - Veino-occlusive du *K71.80*
- - - Veino-occlusive du *K76.5*
- - Maladies
- - - Inflammatoires précisées du *K75.8*
- - - Précisées du *K76.8*
- - Malformation artério-veineuse du *Q27.3*
- - Malformations congénitales du *Q44.7*
- - Mésothéliome du *C45.7*
- - Nécrose hémorragique centrale du *K76.2*
- - Nodule nécrotique solitaire du *K76.8*
- - Pseudotumeur inflammatoire du *K75.8*
- - Rejet d'une greffe de *T86.49*
- - Sarcome
- - - *C22.4*
- - - Embryonnaire indifférencié du *C22.4*
- - - Non différencié du *C22.4*
- - Status post greffe de *Z94.4*
- - Syphilis du *A52.7†, K77.0**
- - Syphilis secondaire du *A51.4†, K77.0**
- - Traumatisme obstétrical du *P15.0*
- - Tuberculose du *A18.8†, K77.0**
- - Tumeur bénigne: *D13.4*
- - Tumeur rhabdoïde du *C22.7*

Foin
- Asthme ¬ Rhume des *J45.09*
- ¬
- - Maladie des moisissures de *J67.00*
- - Rhume des *J30.1*

Foix
- Alajouanine] ¬ Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de *G37.4*
- Heubner ¬ Syndrome de Schilder- *G37.0*

Foix-Chavany-Marie ¬ Syndrome de *G12.2*

Folate
- 1 ¬ Anémie mégaloblastique-immunodéficience par déficit en transporteur de *D52.8*
- ¬
- - Carence en: *E53.8*
- - Malabsorption héréditaire des *E53.8*
- - Syndrome neurodégénératif dû au déficit de transport cérébral des *G31.88*

Foliacé ¬ Pemphigus *L10.2*

Folie à deux ¬ *F24*

Foliées ¬ Hypertrophie des papilles *K14.3*

Folinique ¬ Convulsions sensibles à l'acide *G40.3*

Folique
- Due à des médicaments ¬ Anémie par carence en acide *D52.1*
- SAI ¬ Anémie par carence en acide *D52.9*
- Sans précision ¬ Anémie par carence en acide *D52.9*
- ¬
- - Anémie par carence
- - - Acide *D52.8*
- - - Alimentaire en acide *D52.0*
- - Carence en: acide *E53.8*

Folliculaire
v./v.a. Lymphome folliculaire
- Acquise ¬ Kératose *L11.0*
- Aiguë
- - Adénovirus ¬ Conjonctivite *B30.1†, H13.1**
- - ¬ Conjonctivite *H10.2†, H13.1**
- Cellules mixtes ¬ Lymphosarcome *C82.1*
- Darier-White ¬ Kératose *Q82.8*
- Due à l'avitaminose A ¬ Kératose *E50.8†, L86**
- Floride ¬ Maladie lymphoprolifératives post-transplantation, hyperplasie *D47.7*
- Généralisé ¬ Syndrome d'hamartome basaloïde *Q85.8*
- Hémorragique (de l'ovaire) ¬ Kyste (de): *N83.0*
- Nanisme-atrophie cérébrale ¬ Syndrome de kératose *Q87.1*
- Ovaire ¬ Kyste *N83.0*
- Parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] ¬ Kératose *L87.0*
- Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Sans précision ¬ Kyste *L72.9*
- - ¬ Autres formes de kyste *L72.8*
- Pénétrante ¬ Hyperkératose *L87.0*
- Sans précision ¬
- - Affection *L73.9*
- - Lymphome non *C83.9*
- Spinulosa decalvans de Siemens ¬ Kératose *Q82.8*
- Thyroïde ¬ Cancer *C73*
- Trachomateuse ¬ Conjonctivite: *A71.1*
- ¬
- - Amygdalite (aiguë): *J03.9*
- - Conjonctivite *H10.4†, H13.1**
- - Formes
- - - Lymphome, *C82.7*
- - - Précisées d'affections *L73.8*
- - Germinoblastome *C82.9*
- - Kyste: *K09.0*
- - Lichen
- - - *L66.1*

Folliculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lichen *–suite*
- - - Plan *L66.1*
- - Lymphome
- - - Non *C83.8*
- - - Non-hodgkinien diffus non *C83.9*
- - Lymphosarcome réticulaire *C82.1*
- - Pancréatocholangite *K83.09, K85.90*
- - Sarcome à cellules dendritiques *C96.4*

Folliculaire-alopécie-photophobie ¬ Syndrome d'ichtyose *Q80.0*

Follicule
- Graaf ¬ Kyste (de): *N83.0*
- Pileux ¬
- - Inflammation de la glande du *L73.9*
- - Tumeurs bénignes de: *D23*

Folliculite
v./v.a. Pseudofolliculite
- Décalvante
- - Quinquaud ¬ *L66.2*
- - ¬ *L66.2*
- Érythémateuse réticulée ¬ *L66.4*
- Périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ *L66.3*
- Pustuleuse éosinophilique classique ¬ *L73.8*
- Sclerotisans nuchae] ¬ Acné chéloïde [*L73.0*

Folliculitis et perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens] ¬ Maladie de Hoffmann [*L66.3*

Folliculo-stimulante] ¬ Déficit isolé en FSH [hormone *E23.0*

Folliculotrope ¬ Mycosis fongoïde *C84.0*

Fölling ¬ Maladie de *E70.0*

Fonction
- Cérébrale ¬ Perte irréversible de la *G93.88*
- Cognitives et à la conscience, autres et non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux *R41.8*
- Greffe de rein ¬ Reprise retardée de la *T86.12*
- Labyrinthe ¬ Perte de la *H83.2*
- Labyrinthiques ¬ Troubles des *H83.2*
- Lymphocytaire antigène-1 (LFA-1) ¬ Anomalie de la *D84.0*
- Lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la *D83.0*
- Motrices, sans précision ¬ Troubles spécifiques du développement des *F82.9*
- Palpébrale ¬ Autres troubles affectant la *H02.5*
- Pancréatique exocrine ¬ Trouble de la *K86.83*
- Rénale
- - Chronique, unilatéral ¬ Trouble de la *N18.80*
- - ¬ Goutte due à une altération de la *M10.3*
- Symbolique non

Fonction *–suite*
- Symbolique non *–suite*
- - Classés ailleurs ¬ Dyslexie et autres troubles de la *R48*
- - Précisés ¬ Troubles de la *R48.8*
- Thyroïdien
- - Exophtalmie ¬ Trouble de la *E05.0†, H06.2**
- - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies néonatales de la *P72.2*
- - Normale ¬ Goitre congénital transitoire avec *P72.0*
- Vésicales du à un choc rachidien ¬ Trouble des *G95.82*
- Vestibulaire
- - Sans précision ¬ Atteinte des *H81.9*
- - ¬ Autres atteintes des *H81.8*

Fonctionnel
v./v.a. Type de maladie

Fonctionnement
- Défectueux d'un trachéostome ¬ *J95.09*
- Pompe à médicaments ¬ Contrôle des paramètres de *Z45.1*
- Social enfance
- - Sans précision ¬ Trouble du *F94.9*
- - ¬ Autres troubles du *F94.8*
- Stomie de l'appareil urinaire ¬ Mauvais *N99.5*

Fond
- Œil
- - Diabétique
- - - Diabète sucré type
- - - - 1 ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - - 2 ¬ *E11.30†, H36.0**
- - - ¬ *E14.30†, H36.0**
- - SAI ¬ Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*
- - ¬
- - - Artériosclérose du *I70.8†, H36.8**
- - - Colobome du *Q14.8*
- Utérus ¬
- - Carcinofibrome du *C54.3*
- - Léiomyosarcome du *C54.3*
- - Tumeur maligne: *C54.3*
- - Tumeur neuroectodermique primitive du *C54.3*

Fong
v./v.a. You-Hoover-Fong

Fongémie SAI ¬ *B49*

Fongicides ¬ Effet toxique: Herbicides et *T60.3*

Fongique
- Avant-bras ¬ Myosite *M60.03*
- Bras ¬ Myosite *M60.02*
- Cuisse ¬ Myosite *M60.05*
- Expectoration ¬ Infection *B48.88*
- Invasives par déficit en CARD9 ¬ Prédisposition aux infections *D84.8*
- Jambe ¬ Myosite *M60.06*
- Localisations multiples ¬ Myosite *M60.00*

Fongique *–suite*
- Main ¬ Myosite *M60.04*
- Ongle
- - Orteil ¬ Infection *B35.1*
- - ¬ Infection *B35.1*
- Pied ¬ Myosite *M60.07*
- Région de l'épaule ¬ Myosite *M60.01*
- Région pelvienne ¬ Myosite *M60.05*
- SAI ¬ Encéphalopathie au cours de septicémie *B48.80†, G94.32**
- Tronc ¬ Myosite *M60.08*
- Tube digestif ¬ Infection *B49†, K93.8**
- ¬
- - Encéphalopathie au cours de sepsis *B48.80†, G94.32**
- - Glomérulopathie au cours de sepsis *B48.80†, N08.0**
- - Maladie
- - - Due au VIH avec infection *B20, B49*
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de sepsis *B48.80†, N16.0**
- - Myosite *M60.09*
- - Septicémie *B48.80*
- - Ulcère de l'œsophage: *K22.1*

Fongoïde
- Folliculotrope ¬ Mycosis *C84.0*
- ¬ Mycosis *C84.0*

Fongus bénin du testicule ¬ *A18.1†, N51.8**

Fontaine
- Gangrène ¬ Stade IV de Leriche et *I70.25*
- Ulcération ¬
- - Athérosclérose des artères distales de type bassin-jambe, stade IV selon *I70.24*
- - Stade IV de Leriche et *I70.24*
- ¬
- - AOMI type bassin-jambe stade
- - - IIb de Leriche et *I70.22*
- - - III de Leriche et *I70.23*
- - - IV de Leriche et *I70.25*
- - - IVa de Leriche et *I70.25*
- - - IVb de Leriche et *I70.25*
- - Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI], sans précision du stade (de Leriche et *I70.29*
- - Gangrène
- - - Humide, stade IVb de Leriche et *I70.25*
- - - Sèche, stade IVa de Leriche et *I70.25*
- - Stade
- - - I de Leriche et *I70.20*
- - - IIa de Leriche et *I70.21*
- - - IIb de Leriche et *I70.22*
- - - III de Leriche et *I70.23*
- - Syndrome progéroïde de *Q87.8*
- - Trouble circulatoire d'après Leriche et *I70.29*
- - Troubles circulatoires selon *I70.29*

Fontan] ¬ FALD [Maladie hépatique associée à l'intervention de *K76.1, K91.88*

Fonte musculaire
- Non classées ailleurs ¬ Atrophie et *M62.5*
- ¬ *M62.89*

FOP [Fibrodysplasie ossifiante progressive] ¬ *M61.19*

Foramen
- Macula ¬ Trou (*H35.38*
- Magendie ¬ Atrésie des fentes de Luschka et du *Q03.1*
- Ovale ¬ Perméabilité ou persistance de: *Q21.1*
- Pariétal avec hypoplasie claviculaire ¬ *Q74.0*

Foramina parietalia
- Permagna ¬ *Q75.8*
- ¬ *Q75.8*

Forbes-Hers ¬ Syndrome de *E74.0*

Force ¬ Perte de *R53.9*

Forceps
- Césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par *O66.5*
- Sans précision ¬ Échec de l'application d'une ventouse et d'un *O66.5*
- Suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un *O66.5*
- Ventouse ¬ Accouchement unique par *O81*
- ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par *P03.2*

Forces
- Armées ¬ Examen général en série de: membres des *Z10*
- Gravité [G] anormales ¬ Effets de: *T75.8*
- Jeu cours travail
- - Sans précision ¬ Anomalie des *O62.9*
- - ¬ Autres anomalies des *O62.8*
- Mécaniques objet
- - Animés ¬ Accident dû à l'exposition à des *W64.9!*
- - Inanimés ¬ Accident dû à l'exposition à des *W49.9!*

Fordyce ¬ Maladie de Fox- *L75.2*

Forestier
- Pseudopolyarthrite de la hanche et de l'épaule] ¬ Maladie de *M35.3*
- ¬ Hyperostose ankylosante [*M48.1*

Forêt de Kyasanur ¬ Maladie de la *A98.2*

Formaldéhyde ¬ Effet toxique: *T59.2*

Formation
- Anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe ¬ *K04.3*
- Dent ¬
- - Changement de couleur pendant la *K00.8*
- - Troubles de la *K00.4*
- Entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de *O34.30*
- Mélanine ¬ Autres anomalies liées à une diminution de la *L81.6*

Formation *–suite*
- Tuberculeuse de phlyctènes ¬ *A18.5†, H19.2**
- Vésicule non thermiques ¬
- - Lésion traumatique superficielle
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.02*
- - - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.02*
- - - Partie du corps non précisée: *T14.02*
- - - Tronc, niveau non précisé: *T09.02*
- - Lésions traumatiques superficielles
- - - Avant-bras: *S50.82*
- - - Cheville et du pied: *S90.82*
- - - Épaule et du bras: *S40.82*
- - - Hanche et de la cuisse: *S70.82*
- - - Jambe: *S80.82*
- - - Poignet et de la main: *S60.82*
- ¬ inscription dans: établissement de *Z02*

Formiminoglutamique ¬ Acidurie *E70.8*

Formiminotransférase
- Cyclodésaminase ¬ Déficit en *E70.8*
- ¬ Déficit en glutamate *E70.8*

Formule leucocytaire anormale SAI ¬ *R72*

Forney-Robinson-Pascoe ¬ Syndrome de *Q87.8*

Fornix] ¬ Rupture d'un calice rénal, non traumatique [rupture de *N28.80*

Forsell
v./v.a. Holmgren-Forsell

Forsius-Eriksson ¬ Syndrome de *H35.5*

Forssman
v./v.a. Borjeson-Forssman-Lehmann

Forster-McCarthy-Berry ¬ Syndrome de Hyde *Q87.0*

Fort
v./v.a. Le Fort

Fort-Bragg-Fever ¬ *A27.8*

Fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès ¬ Découverte *R98*

Fortuitement ¬ Grossesse constatée *Z33!*

FOSMN [Neuronopathie motrice et sensorielle à début facial] ¬ Syndrome *G60.0*

Fosse
- Amygdales ¬ *D10.5*
- Amygdalienne ¬ Tumeur maligne: *C09.0*
- Antérieure ¬ *S02.1*
- Canine ¬ Abcès maxillaire
- - Extension dans la *K10.21*
- - Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la *K10.20*
- Ischio-rectale ¬ Abcès de la *K61.3*
- Moyenne ¬ *S02.1*
- Nasal
- - Sinus
- - - Face ¬ Tumeur bénigne: Oreille moyenne, *D14.0*
- - - Paranasaux ¬ Carcinome épidermoïde des *C30.0*
- - ¬

Fosse *–suite*
- Nasal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - - Polype des *J33.0*
- - - Tumeur maligne: *C30.0*
- - - Vestibule des *C30.0*
- Postérieure
- - Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie cérébelleuse et de la *P52.6*
- - ¬
- - - *S02.1*
- - - Syndrome
- - - - *G97.81*
- - - - Agénésie partielle du corps calleux-hypoplasie du vermis avec kystes de la *Q04.3*

Fossette
- Colobomateuse de la papille ¬ *Q14.2*
- Rosenmüller ¬ *C11.2*
- ¬ *D10.5*

Foster-)Kennedy ¬ Syndrome de (*H47.0*

Fothergill ¬ Névralgie de *G50.0*

Fotiou ¬ Dysplasie lymphatique généralisée de *Q82.09*

Foudre ¬
- Choc par la *T75.0*
- Effets de la *T75.0*

Foule
- Mouvement de panique de foule ¬ Être pressé ou poussé par une *W64.9!*
- ¬ Être pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de *W64.9!*

Foulure
v./v.a. Foulure d'articulation
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Entorse et *S43.5*
- - Capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Ligament
- - - Non précisés membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et *T13.2*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et *T11.2*
- - - Parties non précisées
- - - - Cou ¬ Entorse et *S13.6*
- - - - Tête ¬ Entorse et *S03.5*
- - Non précisées de la main ¬ Entorse et *S63.7*
- - Sterno-claviculaire ¬ Entorse et *S43.6*
- Articulation de l'épaule ¬ Entorse et *S43.4*
- Articulation sacro-iliaque ¬ Entorse et *S33.6*
- Associations de parties du corps ¬ Luxations, entorses et *T03.8*
- Ceinture scapulaire SAI ¬ Entorse et *S43.7*
- Cheville
- - Ligament

Foulure *–suite*
- Cheville *–suite*
- - Ligament *–suite*
- - - Calcanéopéronier ¬ Entorse et *S93.42*
- - - Deltoïde ¬ Entorse et *S93.41*
- - - Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et *S93.43*
- - Partie non précisée ¬ Entorse et *S93.40*
- - Parties ¬ Entorse et *S93.48*
- Côtes et du sternum ¬ Entorse et *S23.4*
- Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et *T03.0*
- Coude
- - Humérocubitale (articulation) ¬ Entorse et *S53.44*
- - Huméroradiale (articulation) ¬ Entorse et *S53.43*
- - Ligament collatéral
- - - Cubital ¬ Entorse et *S53.42*
- - - Radial ¬ Entorse et *S53.41*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S53.40*
- - - ¬ Entorse et *S53.48*
- Déchirure
- - Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ Entorse/ *S33.50*
- - ¬ Entorse
- - - *S16*
- - - *S56*
- - - *S66*
- - - *S76*
- - - *S86*
- - - *S96*
- Hanche
- - Ligament
- - - Iliofémoral ¬ Entorse et *S73.11*
- - - Ischiocapsulaire ¬ Entorse et *S73.12*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S73.10*
- - - ¬ Entorse et *S73.18*
- Ligament croisé genou antérieur postérieur
- - Déchirure ligament croisé
- - - Antérieur ¬ Entorse et *S83.53*
- - - Postérieur ¬ Entorse et *S83.54*
- - Distorsion ligament croisé
- - - Antérieur ¬ Entorse et *S83.51*
- - - Postérieur ¬ Entorse et *S83.52*
- - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et *S83.50*
- Ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et *S83.43*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et *S83.44*
- - Distorsion ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et *S83.41*

Foulure *–suite*
- Ligament latéral genou interne externe *–suite*
- - Distorsion ligament latéral *–suite*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et *S83.42*
- - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et *S83.40*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Mâchoire ¬ Entorse et *S03.4*
- Membre
- - Inférieur ¬ Séquelles de luxation, entorse et *T93.3*
- - Supérieur ¬ Séquelles d'une luxation, entorse et *T92.3*
- Multiples, sans précision ¬ Luxations, entorses et *T03.9*
- Muscle(s) SAI ¬ Entorses/ *T14.6*
- Musculaire ¬ *M62.6*
- Orteil(s) ¬ Entorse et *S93.5*
- Partie du corps non précisée ¬ Luxation, entorse et *T14.3*
- Parties non précisées
- - Ceinture scapulaire ¬ Entorse et *S43.7*
- - Genou ¬ Entorse et *S83.6*
- - Pied ¬ Entorse et *S93.6*
- - Rachis lombaire et du bassin ¬ Entorse et *S33.7*
- - Thorax ¬ Entorse et *S23.5*
- Plusieurs parties membre s
- - Inférieur(s) ¬ Luxations, entorses et *T03.3*
- - Supérieur s
- - - Membre(s) inférieur(s) ¬ Luxations, entorses et *T03.4*
- - - ¬ Luxations, entorses et *T03.2*
- Poignet
- - Articulation
- - - Carpienne ¬ Entorse et *S63.51*
- - - Carpo-métacarpienne ¬ Entorse et *S63.53*
- - - Ligament) radiocarpien ¬ Entorse et *S63.52*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S63.50*
- - - ¬ Entorse et *S63.58*
- Rachis
- - Cervical ¬ Entorse et *S13.4*
- - Dorsal ¬ Entorse et *S23.3*
- Région thyroïdienne ¬ Entorse et *S13.5*
- Tête avec luxations, entorses et foulures du cou ¬ Luxations, entorses et *T03.0*
- Thorax et de la région lombosacrée ou du thorax et du bassin ¬ Luxations, entorses et *T03.1*

Foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc ¬ Luxation, entorse et *T09.2*

Foulure de doigt s
- Articulation
- - Interphalangienne ¬ Entorse et *S63.62*

Foulure de doigt s *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Métacarpo-phalangienne ¬ Entorse et *S63.61*
- Partie
- - Non précisée ¬ Entorse et *S63.60*
- - ¬ Entorse et *S63.68*

Fountain ¬ Syndrome de *Q87.8*

Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*

Fourie
v./v.a. Christianson-Fourie

Fourmillements ¬ *R20.2*

Fournier
- Femme ¬ Gangrène de *N76.80*
- Homme ¬ Gangrène de *N49.80*

Fourreurs
- Exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.81*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.80*
- ¬ Poumon
- - *J67.8*
- - *J67.80*

Fovéa avec anomalie du chiasma optique et dysgénésie du segment antérieur de l'œil ¬ Syndrome d'hypoplasie de la *Q15.8*

Fovéale isolée ¬ Hypoplasie *Q14.1*

Fovéale-cataracte présénile ¬ Syndrome d'hypoplasie *H35.8†, H28.2**

Fovéoschisis-drusen de la papille optique ¬ Syndrome de microphtalmie-rétinite pigmentaire- *Q15.8*

Foville
v./v.a. Millard-Gubler-Foville
- ¬ Syndrome de *I67.88†, G46.3**

Fowler
- Dysfonctionnement du sphincter urétral) ¬ Syndrome de *N36.8*
- ¬
- - Syndrome de *Q87.8*
- - Vasculopathie de *Q87.8*

Fox-Fordyce ¬ Maladie de *L75.2*

FOXG1
- Altération intragénique ¬ Syndrome *Q93.5*
- Microdélétion 14q12 ¬ Syndrome *Q93.5*
- ¬
- - Encéphalopathie épileptique-dyskinétique liée à *Q93.5*
- - Syndrome *Q93.5*

FOXN1 ¬ Déficit immunitaire combiné
- Haploinsuffisance en *D81.8*
- Sévère par déficit en *D81.2*

FOXP1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-trouble sévère du langage-dysmorphie modérée associé à *Q87.0*

Foyer
- N'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du *Z74.2*

Foyer *–suite*
- Osseux (médullaires) de lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ *C79.5*
- Pendant l'enfance ¬ Départ du *Z61*
- Variables ¬
- - Épilepsie focale familiale à *G40.1*
- - FFEVF [Épilepsie focale familiale à *G40.1*
- ¬
- - Choriorétinite en *H30.0*
- - Choroïdite en *H30.0*
- - Maladie toxique du foie avec: hyperplasie nodulaire en *K71.88*
- - Mucinose en *L98.5*
- - Rétinite en *H30.0*
- - Rétinochoroïdite en *H30.0*

Fractionnement de la miction ¬ *R39.1*

Fragile
- Femme porteuse ¬ Forme symptomatique du syndrome de l'X *Q99.2*
- Position E] ¬ FRAXE [Syndrome de l'X *F70.9*
- ¬
- - Chromosome X *Q99.2*
- - FXPOI [Insuffisance ovarienne primitive liée à prémutation du X *E28.3*
- - FXS [Syndrome de l'X *Q99.2*
- - Insuffisance ovarienne primitive liée à prémutation du X *E28.3*
- - Sujet avec site autosomique *Q95.5*
- - Syndrome de la cornée *Q79.6*

Fragilis
- Micro-organismes anaérobies à Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus *B96.6!*
- ¬
- - Bactériémie à Bacillus *A49.80*
- - Infection à Bacillus *A49.80*

Fragilité
- Capillaire
- - Héréditaire) ¬ *D69.88*
- - Idiopathique ¬ Purpura due à une *D69.88*
- - ¬ *L67.8*
- Congénitale des capillaires ¬ *D69.88*
- Cutané
- - Cheveux laineux-hyperkératose palmoplantaire ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique- *Q81.0*
- Osseux
- - Contractures-rupture artérielle-surdité ¬ Syndrome de *Q87.5*
- - ¬
- - - *Q78.0*
- - - Lésions de la voûte crânienne en forme de beignet avec *Q78.8*

Fragments de la tête humérale ¬ Fracture de deux à quatre *S42.21*

Fraise ¬
- Nævus: *Q82.5*

Fraise ¬ *–suite*
- Vésicule *K82.4*

FRAM [Macroanévrisme artériel rétinien familial] ¬ *H35.0, Q25.6*

Framboesia initiale ou primaire ¬ *A66.0*

Framboesial initial ¬ Ulcère *A66.0*

Framboeside
- Gommeuse ¬ *A66.4*
- Pian récent ¬ *A66.2*

Framboesome ¬ *A66.1*

Franceschetti
v./v.a. Naegeli-Franceschetti-Jadassohn
- Syndrome de Treacher Collins] ¬ Syndrome de *Q75.4*

Franceschetti-Klein ¬ Syndrome de *Q75.4*

Francfort
v./v.a. Stoll-Lévy-Francfort

Francis ¬ Maladie de *A21.9*

Francisella tularensis
- Subsp. tularensis [Francisella tularensis] ¬ Infection à *A21*
- ¬
- - Infection
- - - *A21.9*
- - - Francisella tularensis subsp. tularensis [*A21*
- - Trachéo-bronchite à *A21.8*

François ¬ Dystrophie nuageuse centrale de *H18.5*

Frange ovarienne ¬ Kyste de la *Q50.4*

Franklin en rémission complète ¬ Maladie de *C88.21*

Frank-Ter Haar ¬ Syndrome de *Q87.8*

Fraser ¬ Syndrome de *Q87.0*

Frasier ¬ Syndrome de *N04.1*

Fratrie ¬
- Jalousie dans la *F93.3*
- Rivalité dans la *F93.3*

Fraumeni
v./v.a. Li-Fraumeni

FRAXE [Syndrome de l'X fragile - position E] ¬ *F70.9*

Fredrickson
- Type
- - I ¬ Hyperlipidémie de *E78.3*
- - IIb ou III ¬ Hyperlipoprotéinémie de *E78.2*
- - ¬ Hyperlipoprotéinémie type
- - IIa de *E78.0*
- - IV de *E78.1*

Freeman-Sheldon ¬ Syndrome de *Q87.0*

Freiberg-Köhler-II ¬ Maladie de *M92.7*

Frein
- Langue ¬
- - *C02.2*
- - Brièveté anormale du *Q38.1*
- - Déchirure du *S01.54*
- - Rupture du *S01.54*
- Lingual ¬

Frein *–suite*
- Lingual ¬ *–suite*
- - Arrachement du *S01.54*
- - Déchirure du *S01.54*
- Muqueuse) ¬ Lèvre (bord libre) (face intérieure) (*D10.0*
- ¬ Lèvre
- - Inférieure: *C00.4*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: *C00.5*
- - Supérieure: *C00.3*

Freire
v./v.a. Pinheiro-Freire-Maia-Miranda

French
v./v.a. Wellesley-Carman-French

Fréquences
- Basses ¬ Surdité partielle ou totale (pour): *H91.9*
- Hautes ¬ Surdité partielle ou totale (pour): *H91.9*

Fréquente
- Cycle menstruel
- - Irrégulier ¬ Menstruation trop abondante et trop *N92.1*
- - Régulier ¬ Menstruation trop abondante et trop *N92.0*
- ¬
- - Formes psychogènes de: mictions *F45.3*
- - Miction
- - - *R35.1*
- - - Nocturne *R35.2*
- - Selles *R19.4*

Freundii multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Genre Citrobacter *U81.05!*
- 3MRGN ¬ Genre Citrobacter *U81.25!*
- 4MRGN ¬ Genre Citrobacter *U81.45!*

Frey ¬ Syndrome de *G50.8*

Frias
v./v.a. Opitz-Frias

Fried ¬ Syndrome
- *Q87.8*
- Dent et ongle de *Q82.8*

Friedlaenderi ¬ Infection à Klebsiella *A49.82*

Friedländer ¬
- Infection à bacille de *A49.82*
- Méningite bacille
- - *G00.8*
- - *G00.8, B96.2!*

Friedman
v./v.a. Game-Friedman-Paradice

Friedman-Goodman ¬ Syndrome de *Q87.0*

Friedmann ¬ Syndrome de *G40.3*

Friedreich
- Autosomique récessive) ¬ Ataxie (de): *G11.1*
- ¬ Ataxie de *G11.1*

Friedreich-like ¬ Ataxie type *G11.1*

Frigidité ¬ *F52.0*

Frigore ¬ Hémoglobinurie (de): paroxystique a *D59.6*

Frissons ¬ Fièvre avec *R50.88*

Froid
- Artificiel
- - Excessif ¬ Exposition
- - - *W93!*
- - - *W93.9!*
- - ¬ Accident dû au *W93.9!*
- Associé à F12] ¬ FACAS [Syndrome auto-inflammatoire au *L50.2*
- Auto-immune ¬ Sensibilité au *D59.18*
- CAD] ¬ Maladie des agglutinines *D59.10*
- Chaleur ¬ Urticaire provoquée par le *L50.2*
- Humidité ¬ Dommages dus au *T69.9*
- Moite ¬ Peau *R23.1*
- Naturel excessif ¬ Exposition à: Chaleur ou *X59.9!*
- Type 4] ¬ SFAF4 [Syndrome familial auto-inflammatoire au *L50.2*
- ¬
- - Anémie hémolytique
- - - Anticorps *D59.18*
- - - Auto-immun
- - - - Primaire type à auto-anticorps *D59.10*
- - - - Secondaire de type *D59.18*
- - - - Type *D59.18*
- - FCU [Urticaire familiale au *L50.2*
- - Hémoglobinurie à agglutinines *D59.18*
- - Maladie hémolytique auto-immune type secondaire à auto-anticorps *D59.18*
- - SFAF [Syndrome familial auto-inflammatoire au *L50.2*
- - Syndrome
- - - Agglutinine
- - - - *D59.18*
- - - - *D59.18*
- - - Transpiration induite par le *G90.88*

Fromage
- Exacerbation aiguë ¬ Poumon des laveurs de *J67.81*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des laveurs de *J67.80*
- ¬ Poumon laveurs
- - *J67.8*
- - *J67.80*

Front
- Menton ¬ Soins maternels pour présentation de la face, du *O32.3*
- SAI ¬ *S01.80*
- ¬
- - Dystocie due à une présentation du *O64.3*
- - Malformation congénitale du *Q75.8*

Frontal
v./v.a. Lobe frontal
- Aiguë ¬ Sinusite *J01.1*
- Bilatérale ¬ Polymicrogyrie *Q04.3*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.1*

Frontal *–suite*
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Abcès tuberculeux du sinus *A15.8*
- Crises nocturnes autosomique dominante] ¬ ADNFLE [Épilepsie *G40.1*
- Fibrosante ¬ Alopécie *L66.1*
- Interne ¬ Hyperostose *M85.2*
- Isolée ¬ Plagiocéphalie *Q67.3*
- SAI ¬ Sinusite *J32.1*
- ¬
- - Abcès tuberculeux du sinus *A16.8*
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] du sinus *C31.2*
- - Carcinome épidermoïde du sinus *C31.2*
- - Démence cérébrale *G31.0†, F02.0**
- - Encéphalocèle
- - - *Q01.0*
- - - Naso- *Q01.1*
- - Lobe
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Mélanome malin de la muqueuse du sinus *C31.2*
- - Os
- - - *D16.41*
- - - *S02.0*
- - Ostéoblastome de l'os *D16.41*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire du sinus *C31.2*
- - Sarcome de l'os *C41.01*
- - Sinus: *S02.1*
- - Syndrome
- - - *F07.0*
- - - Microcornée-glaucome-absence de sinus *Q15.0, Q13.4*
- - Vessie neurogène: due à un syndrome du cortex *N31.2*

Fronto
v./v.a. oculo-auriculo-fronto-nasal
- Digital ¬ Syndrome cranio-facio- *Q87.0*
- Pariétal
- - Non syndromique ¬ Craniosynostose *Q75.0*
- - ¬ Syndrome d'hypogonadisme hypergonadotrope-alopécie *E23.0, L65.9*

Fronto-facio-nasale ¬ Dysplasie *Q75.1*

Fronto-nasal
v./v.a. Dysplasie fronto-nasale
- ¬ Malformation artério-veineuse *Q27.3*

Frontopariétale ¬ Polymicrogyrie bilatérale *Q04.3*

Frontosphénoïdale unilatérale isolée ¬ Craniosynostose *Q75.0*

Fronto-temporale
- Autosomique récessive ¬ Pachygyrie *Q04.3*
- FTD] ¬ Démence *G31.0†, F02.0**
- Maladie du motoneurone ¬ Démence *G31.0†, F02.0*, G12.2*

Fronto-temporale *–suite*
- Variante
- - Atrophie temporale à droite ¬ Démence *G31.0†, F02.0**
- - Comportementale ¬ Démence *G31.0†, F02.0**
- ¬ Syndrome de myopathie à inclusions-maladie de Paget-démence *G71.8, G31.0*

Frottement
- Précordial ¬ *R01.2*
- Thoracique(s) ¬ *R09.8*
- ¬ Eczéma de *L30.4*

Frotteurisme ¬ *F65.8*

Frottis
- Col de l'utérus ¬ Résultats anormaux de sécrétions et *R87*
- Papanicolaou au niveau du col de l'utérus ¬ *Z01.4*
- Vagin ¬ Résultats anormaux de sécrétions et *R87*
- Vulve ¬ Résultats anormaux de sécrétions et *R87*

Fructokinase ¬ Déficit en *E74.1*

Fructose
- 1,6-diphosphatase ¬ Déficit en *E74.1*
- Héréditaire ¬ Intolérance au *E74.1*
- ¬
- - Anomalie du métabolisme du *E74.1*
- - Intolérance
- - - *E74.1*
- - - Héréditaire au *E74.1*

Fructose-1-phosphate aldolase ¬ Déficit héréditaire en *E74.1*

Fructosémie
- Bénigne ¬ *E74.1*
- Congénitale ¬ *E74.1*
- Essentielle ¬ *E74.1*
- ¬ *E74.1*

Fruit
- Akée ¬ Intoxication aiguë par le *T62.2*
- Mer
- - Non précisé ¬ Effets toxiques d'un *T61.9*
- - ¬ Effets toxiques d'autres *T61.8*

Fryns
v./v.a. Haspeslagh-Fryns-Muelenaere
- ¬ Syndrome
- - *Q87.8*
- - Microphtalmie de *Q87.8*

Fryns-Smeets-Thiry ¬ Syndrome de *Q87.0*

FSH [hormone folliculo-stimulante] ¬ Déficit isolé en *E23.0*

FSME [Encéphalite verno-estivale d'Europe centrale] ¬ *A84.1*

FTCD ¬ Déficit en *E70.8*

FTD] ¬ Démence fronto-temporale [*G31.0†, F02.0**

Fuchs
- III [Cyclite hétérochrome] ¬ Syndrome de *H20.8*

Fuchs *–suite*
- ¬ Dystrophie
- - *H18.5*
- - *H18.5*

Fucosidase
v./v.a. alpha-L-fucosidase

Fucosidose ¬ *E77.1*

Fugace
- Régression totale
- - 1 à 24 heures ¬ Amaurose *G45.32*
- - Heure ¬ Amaurose *G45.33*
- ¬
- - Kératoendothélite héréditaire *H16.2*
- - Proctalgie *K59.4*

Fugue dissociative ¬ *F44.1*

Fuite
- Capillaire ¬ Syndrome de *I78.8*
- Due) à une prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Implant gastro-intestinal ¬ *T85.59*
- Phosphatée ¬ Tubulopathies avec *N25.0*

Fujimoto
v./v.a. Kikuchi-Fujimoto

Fukuyama ¬ Dystrophie musculaire congénitale type *G71.2*

Full-house non lupique idiopathique ¬ Néphropathie *N05.9*

Fulminans
- Acquis ¬ Purpura *D65.9*
- ¬
- - Purpura *D65*
- - Sepsis acutissima hyperergica *A39.1†, E35.1**

Fulminant
- Aigu(ë) ¬ Colite ischémique *K55.0*
- Insuffisance hépatique ¬ hépatite: *K72*
- Méningocoques ¬ Sepsis *A39.2*
- ¬
- - Embolie pulmonaire *I26.0*
- - Hépatite virale *K72.0, K72.79!*

Fumarique ¬ Acidurie *E88.8*

Fumarylacétoacétase ¬ Déficit en *E70.2*

Fumée
- Gaz
- - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des *J68.2*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des *J68.9*
- - ¬
- - - Affections respiratoires
- - - - Agents chimiques, des émanations, des *J68.8*
- - - - Aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des *J68.3*
- - - - Chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des *J68.4*

Fumée *–suite*
- Gaz *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68.4*
- - - Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des *J68.0*
- - - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68.4*
- - - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68.4*
- - - Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des *J68.1*
- Précisés ¬ Effet toxique: Autres émanations, gaz et *T59.8*
- Sans précision ¬ Effet toxique: Emanation, gaz et *T59.9*
- Vapeurs de métaux ¬ *T56*
- ¬ Exposition à: *X59.9!*

Fumeur ¬ Palais du *K13.2*

Fundique ¬ Gastrite chronique, type: *K29.5*

Fundus
- Albipunctatus ¬ *H35.5*
- Cours de syndrome de Lynch ¬ Carcinome du *C16.1*
- Flavimaculatus ¬
- - *H35.5*
- - Dystrophie tachetée multifocale de l'épithélium pigmentaire rétinien (simulant le *H35.5*
- Pulverulentus ¬ *H35.5*
- Type 1 ¬ Tumeur neuroendocrine familiale maligne du *C16.1*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde du *C16.1*
- - Carcinome héréditaire diffus du *C16.1*
- - Carcinome indifférencié du *C16.1*
- - Linite plastique du *C16.1*
- - Tumeur neuroendocrine maligne du *C16.1*
- - Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] du *C16.1*

Fungi imperfecti ¬ Infection à *B43.8*

Fungoides ¬ Granuloma *C84.0*

Funiculaire ¬
- Anémie avec myélose *D51.0†, G32.0**
- Myélite *E53.8†, G32.0**

Funiculite
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.8**
- Tuberculeuse
- - Aiguë ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Chronique ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Endémique ¬ *A18.1†, N51.8**

Furhmann ¬ Syndrome de *Q74.8*

Furoncle
- Anthrax
- - Cou ¬ Abcès cutané, *L02.1*

Furoncle *–suite*
- Anthrax *–suite*
- - Face ¬ Abcès cutané, *L02.0*
- - Fesse ¬ Abcès cutané, *L02.3*
- - Localisations ¬ Abcès cutané, *L02.8*
- - Membre ¬ Abcès cutané, *L02.4*
- - Nez ¬ Abcès, *J34.0*
- - Sans précision ¬ Abcès cutané, *L02.9*
- - Tronc ¬ Abcès cutané, *L02.2*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.2*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Paroi abdominale ¬ *L02.2*
- Paupière ¬ *H00.0*
- Pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe ¬ *H60.0*
- Sein ¬ *N61*
- Vulve ¬ *N76.4*

Furonculoïde
- Cordylobia anthropophaga ¬ Myiase *B87.0*
- Dermatobia hominis ¬ Myiase *B87.0*
- ¬ Myiase *B87.0*

Furonculose
- SAI ¬ *L02.9*
- ¬ *L02*

Furukawa-Takagi-Nakao ¬ Syndrome de *G11.8*

Fusariose ¬ *B48.7*

Fusarium ¬ Infection à *B48.7*

Fusel ¬ Effet toxique: Huile de *T51.3*

Fusion
- Anomalie de la vision stéréoscopique ¬ *H53.3*
- Arthrodèse ¬
- - Guérison osseuse retardée après *M96.82*
- - Pseudarthrose après *M96.0*
- Articulation sacro-iliaque congénitale ¬ *Q74.2*
- Congénitale des vertèbres cervicales ¬ *Q76.1*
- Dentaire ¬ *K00.2*
- Incisives mandibulaires ¬ *K00.2*
- RELA ¬ Épendymome avec *C71.5*
- Splénogonadique
- - Anomalie transversale des membres-micrognathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Isolée ¬ *Q89.08*
- Testicules ¬ *Q55.1*
- Vertébrale antérieure progressive non infectieuse ¬ *Q87.5*
- Vertèbre
- - Cervicales ¬ Syndrome de microcéphalie-*Q87.8*
- - Lombo-sacrées-blépharoptosis ¬ Syndrome de *Q76.4, Q10.0*
- - Progressive non infectieuse ¬ *Q87.5*
- Vulve ¬ *Q52.5*
- ¬ Perception simultanée sans *H53.3*

Fusospirochètes ¬
- Gangrène à *A69.0*
- Pharyngite à *A69.1*
- Stomatite à *A69.1*

FXPOI [Insuffisance ovarienne primitive liée à prémutation du X fragile] ¬ *E28.3*

FXS [Syndrome de l'X fragile] ¬ *Q99.2*

FXTAS ¬ Syndrome *G11.2*

G6P translocase ¬ Déficit en *E74.0*

G6PD

- Voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté *D55.1*
- ¬
- - Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [*D55.0*
- - Anémie par carence en *D55.0*

G6PDH] ¬ Déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase [*E74.8*

G6PT type Ib ¬ Déficit en *E74.0*

GABA

- Transaminase ¬ Déficit en *E72.8*
- ¬ Trouble du métabolisme de *E72.8*

Gabapentine ¬

- Abus de *F13.1*
- Dépendance à la *F13.2*
- Troubles liés à l'usage de *F13.1*

Gabriele-de Vries ¬ Syndrome de *Q87.0*

Gaine

- Capillaire
- - Sans précision ¬ Anomalie de la pigmentation et de la *L67.9*
- - ¬ Autres anomalies de la pigmentation et de la *L67.8*
- Grands droits lors traitement
- - Falithrom ¬ Hématome de la *D68.33, M62.88*
- - Marcumar ¬ Hématome de la *D68.33, M62.88*
- Nerf optique ¬ Hémorragie de la *H47.0*
- Nerfs périphériques ¬ [MPNST] Tumeur maligne des *C47.9*
- Nerveuses périphériques ¬ Tumeur bénigne des *D36.1*
- Tendon ¬ Abcès de la *M65.0*
- Vasculaire rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- ¬
- - Rétractions tendineuses (*M67.1*
- - Tendon
- - - *C49*
- - - *D21*

Galactocèle

- Puerpérale ¬ *O92.7*
- ¬ *N64.8*

Galactocérébrosidase ¬ Déficit en *E75.2*

Galactokinase ¬ Déficit en *E74.2*

Galactophores ¬ Ectasie des canaux *N60.4*

Galactorrhée

- Sans relation avec un accouchement ¬ *N64.3*
- ¬ *O92.6*

Galactosaminidase
v./v.a. alpha-N-acétyl-galactosaminidase

Galactose
v./v.a. diphosphate-galactose-4-épimérase
v./v.a. glucose-galactose

- Épimérase ¬ Déficit en *E74.2*

Galactose *–suite*

- Mutarotase ¬ Déficit en *E74.2*
- ¬
- - Anomalie du métabolisme du *E74.2*
- - Intolérance au *E74.2*
- - Malabsorption de *E74.2*

Galactosémie ¬

- *E74.2*
- Ictère néonatal dû à la *E74.2*

Galactosidase
v./v.a. alpha-galactosidase
v./v.a. bêta-galactosidase-1

Galactosique ¬ Diabète *E74.2*

Galactosurie ¬ *E74.2*

Galactosylcéramidase ¬ Déficit en *E75.2*

Gale

- Blanchisseurs ¬ *B35.6*
- ¬
- - *B86*
- - Prurit dû à la *B86*

Galéal
v./v.a. sous-galéal

Galeazzi ¬ Fracture de *S52.31*

Galien ¬

- Anévrisme de la veine de *Q28.20*
- Malformation artério-veineuse de la veine de *Q28.28*

GALK ¬ Déficit en *E74.2*

Gallate de propyle ¬ Allergie au *T78.4*

Gallian
v./v.a. Rambaud-Gallian

Gallinae ¬ Dermite due à Dermanyssus *B88.0*

Gallique ¬ Allergie à l'acide *T78.4*

Galloway-Mowat ¬ Syndrome de *Q87.8*

Galopante ¬ Mélioïdose *A24.1*

Gambiense ¬ Trypanosomiase à Trypanosoma *B56.0*

Gamborg-Nielsen ¬ Kératodermie palmoplantaire héréditaire type *Q82.8*

Game-Friedman-Paradice ¬ Syndrome de *Q87.8*

Gamma-aminobutyrique ¬

- Déficit en transaminase de l'acide *E72.8*
- Trouble du métabolisme de l'acide *E72.8*

Gamma-cystathionase ¬ Déficit en *E72.1*

Gamma-glutamyl

- Transpeptidase ¬ Déficit en *E72.8*
- ¬ Trouble du cycle du *E72.8*

Gamma-glutamylcystéine ligase ¬ Anémie due à un déficit en *D55.1*

Gamma-hydroxybutyrique ¬ Acidurie *E72.8*

Gamma-lyase ¬ Déficit en cystathionine *E72.1*

Gammapathie

- Monoclonal
- - IgA sans anticorps connus ¬ Polyradiculoneuropathie avec *D47.2†, G63.1**

Gammapathie *–suite*

- Monoclonal *–suite*
- - IgG sans anticorps connus ¬ Polyradiculoneuropathie avec *D47.2†, G63.1**
- - IgM sans anticorps connus ¬ Polyradiculoneuropathie avec *D47.2†, G63.1**
- - Signification indéterminée [GMSI] ¬ *D47.2*
- - ¬ Syndrome de Fanconi acquis secondaire à une *D47.2, E83.38*
- Polyclonale SAI ¬ *D89.0*

Gamma-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.08*

Gamma-sarcoglycanopathie ¬ *G71.08*

Gammopathie monoclonal

- Épanchements périnéphrétiques-shunt pulmonaire] ¬ Syndrome TEMPI [télangiectasie-érythrocytose- *D47.2*
- IgA ¬ Polyneuropathie axonale avec *D47.2†, G63.1**
- IgG ¬ Polyneuropathie axonale avec *D47.2†, G63.1**
- IgM
- - Activité anti-MAG ¬ Polyneuropathie associée à une *D47.2†, G63.1**
- - ¬ Polyneuropathie axonale avec *D47.2†, G63.1**

Gamstorp ¬ Maladie de *G72.3*

Gangliocytome

- Malin ¬ *C49.9*
- ¬ *D36.1*

Ganglioglioma

- Anaplasique
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Encéphale ¬ *C71.0*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Quatrième ventricule ¬ *C71.7*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Desmoplasique infantile ¬ *D33.0*
- Nasal ¬ *D38.5*
- ¬ *D43.2*

Ganglion

- Axillaires ¬ Tuberculose des *A18.2*
- Base
- - Convulsions ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-malformation de Dandy-Walker-anomalies des *Q87.8*
- - Enfant ¬ Syndrome de dégénérescence des *G23.8*
- - Sensible à la biotine ¬ Maladie des *G25.88*
- - ¬

Ganglion *–suite*
- Base *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Syndrome de spasmes infantiles-retard psychomoteur-atrophie cérébrale progressive-anomalie des *E51.8†, G99.8**
- - - Tumeur maligne des *C71.0*
- Cervicaux ¬ Tuberculose des *A18.2*
- Géniculé
- - Zostérien ¬ Névrite du *B02.2†, G53.0**
- - ¬ Atteinte
- - - *G51.1*
- - - Post-herpétique du *B02.2†, G53.0**
- Hilaire
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Primo-infection tuberculeuse des *A15.7*
- - ¬ Primo-infection tuberculeuse des *A16.7*
- Inguinaux ¬ Tuberculose des *A18.2*
- Intrathoracique
- - Confirmation bactériologique histologique ¬
- - - Primo-infection tuberculeuse des *A15.7*
- - - Tuberculose des *A15.4*
- - ¬
- - - Primo-infection tuberculeuse des *A16.7*
- - - Tuberculose des *A16.3*
- Lymphatique
- - Aisselle et du membre supérieur ¬ Tumeur maligne: *C77.3*
- - Inguinaux et du membre inférieur ¬ Tumeur maligne: *C77.4*
- - Intra-abdominal ¬
- - - Métastase des *C77.2*
- - - Tumeur maligne: *C77.2*
- - Intrapelviens ¬ Tumeur maligne: *C77.5*
- - Intrathoracique ¬
- - - Métastase des *C77.1*
- - - Tumeur maligne: *C77.1*
- - Péritonéaux ¬ Tuberculose des *A18.3†, K93.0**
- - Sans précision ¬
- - - Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des *I89.9*
- - - Tumeur maligne: *C77.9*
- - Sauf mésentérique ¬
- - - Abcès (aigu) tout *L04*
- - - Lymphadénite aiguë tout *L04*
- - Sièges multiples ¬ Tumeur maligne: *C77.8*
- - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur maligne: *C77.0*
- - ¬
- - - Atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des *I89.8*
- - - Sarcoïdose
- - - - *D86.1*
- - - - Poumon avec sarcoïdose des *D86.2*
- - - Sarcome de Kaposi des *C46.3*

Ganglion *–suite*
- Lymphatique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Syphilis secondaire précoce d'un *A51.4*
- - - Syphilis tardive d'un *A52.7†, I98.8**
- - - Tuberculose mésentérique des *A18.3†, K93.0**
- - - Tumeur bénigne: *D36.0*
- Médiastinal
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Primo-infection tuberculeuse des *A15.7*
- - ¬ Primo-infection tuberculeuse d'un *A16.7*
- Mésentérique ¬
- - Adénite chronique, de tout *I88.1*
- - Lymphadénite chronique, de tout *I88.1*
- Plexus cœliaque ¬ *S34.5*
- Sous-claviculaires ¬ Tuberculose des *A18.2*
- Stellaire ¬ *S24.4*
- Sus-claviculaires ¬ Tuberculose des *A18.2*
- Sympathique
- - Parasympathiques ¬ nerfs et *C47*
- - Thoracique ¬ *S24.4*
- Trachéo-bronchique
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Primo-infection tuberculeuse des *A15.7*
- - ¬ Primo-infection tuberculeuse des *A16.7*
- ¬ Mégacôlon congénital sans *Q43.1*

Ganglioneuroblastome
- Médullosurrénale ¬ *C74.1*
- Nerf
- - Abdomen ¬ *C47.4*
- - Bras ¬ *C47.1*
- - Thorax ¬ *C47.3*
- ¬ *C47.9*

Ganglioneurome ¬
- *D36.1*
- Maladie de Hirschsprung avec *Q43.1, C47.9*

Ganglionite
- Cours d'herpès zoster ¬ *B02.2†, G53.0**
- Trigéminale après herpès zoster ¬ *B02.3†, H58.8**

Ganglionnaire
- Corne antérieure ¬ Syndrome d'arthrogrypose avec maladie des cellules *Q74.3, G12.2*
- Hilaire
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A15.4*
- - ¬ Tuberculose *A16.3*
- Inguinale rétropéritonéale ¬ Métastase *C77.8*
- Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- Médiastinal

Ganglionnaire *–suite*
- Médiastinal *–suite*
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A15.4*
- - ¬
- - - Métastase *C77.1*
- - - Tuberculose *A16.3*
- Susclaviculaire ¬ Métastase *C77.0*
- Trachéo-bronchique
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A15.4*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- - ¬ Tuberculose *A16.3*
- ¬
- - Dystrophie rétinienne avec anomalies de la couche nucléaire interne et des cellules *H35.5*
- - Fièvre *B27*
- - Tuberculose *A18.0†, M68.09**
- - Tuméfaction *R59*

Ganglioplégiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.2*

Gangliosides ¬ Thésaurismose des *E75.1*

Gangliosidose
- GM [marqueur de chaînes Gamma] ¬ *E75.1*
- GM1
- - Adulte ¬ *E75.1*
- - Infantile ¬ *E75.1*
- - Juvénile ¬ *E75.1*
- - Type
- - - 1 ¬ *E75.1*
- - - 2 ¬ *E75.1*
- - - 3 ¬ *E75.1*
- GM2
- - Adulte ¬ *E75.0*
- - Juvénile ¬ *E75.0*
- - SAI ¬ *E75.0*
- - Variant AB ¬ *E75.0*
- - Variants B, B1 ¬ *E75.0*
- - ¬ *E75.0*
- GM3 ¬ *E75.1*
- SAI ¬ *E75.1*
- ¬ Autres *E75.1*

Gangosa ¬ *A66.5†, J99.8**

Gangraenescens nasi ¬ Granulome *C86.0*

Gangrène
- Artérioscléreuse ¬ *I70.25*
- Athéroscléreuse ¬ *I70.25*
- Athérosclérose ¬ *I70.2*
- Bacillus aerogenes capsulatus ¬ *A48.0*
- Diabétique ¬ *E14.50*
- Fournier
- - Femme ¬ *N76.80*
- - Homme ¬ *N49.80*

Gangrène *–suite*
- Fusospirochètes ¬ *A69.0*
- Gangrène non précisée, non classée ailleurs ¬ Autre *R02.8*
- Gazeuse ¬ *A48.0*
- Humide, stade IVb de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- Intestinale ¬ Iléus avec *K56.6*
- Mésentère ¬ Iléus avec *K56.6*
- Non
- - Précisée, non classée ailleurs ¬ Autre gangrène et *R02.8*
- - Précisées ¬ Hernies de la paroi abdominale antérieure avec *K43.7*
- Poumon ¬ *J85.0*
- Pulpaire ¬ *K04.1*
- Raynaud ¬ *I73.0*
- Sèche, stade IVa de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- Sénile
- - Artérioscléreuse ¬ *I70.25*
- - Liée à l'artériosclérose ¬ *I70.25*
- Tuberculeuse NCA ¬ *A16.9*
- Vésicule biliaire sans calcul ¬ *K81.0*
- Visage ¬ *A69.0*
- ¬
- - Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.25*
- - Hernie
- - - Hiatale avec *K44.1*
- - - Incisionnelle avec *K43.1*
- - - Interstitielle
- - - - *K46.1*
- - - - Étranglée sans *K46.0*
- - - - Incarcérée sans *K46.0*
- - - - Irréductible sans *K46.0*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K46.0*
- - - Intestinale
- - - - Étranglée sans *K46.0*
- - - - Incarcérée sans *K46.0*
- - - - Irréductible sans *K46.0*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K46.0*
- - - Intra-abdominal
- - - - *K46.1*
- - - - Étranglée sans *K46.0*
- - - - Incarcérée sans *K46.0*
- - - - Irréductible sans *K46.0*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K46.0*
- - - Ligne blanche avec *K43.78*
- - - Paroi abdominale antérieure
- - - - *K43.78*
- - - - Non précisées
- - - - - *K43.79*
- - - - - Occlusion, sans *K43.69*
- - - - - Sans occlusion ni *K43.99*
- - - - Occlusion, sans *K43.68*
- - - - Sans occlusion ni *K43.98*

Gangrène *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hernie *–suite*
- - - Provoquant une occlusion sans *K46.0*
- - Hernie abdominale
- - - Non précisée
- - - - *K46.1*
- - - - Occlusion, sans *K46.0*
- - - - Sans occlusion ni *K46.9*
- - - Précisées
- - - - *K45.1*
- - - - Sans occlusion ni *K45.8*
- - - Siège précisé, avec occlusion, sans *K45.0*
- - Hernie crurale
- - - Bilatérale
- - - - *K41.1*
- - - - Occlusion, sans *K41.0*
- - - - Récidivante, avec *K41.11*
- - - - Sans occlusion ni *K41.2*
- - - Récidivante, avec *K41.41*
- - - Unilatérale
- - - - Étranglée sans *K41.3*
- - - - Incarcérée sans *K41.3*
- - - - Irréductible sans *K41.3*
- - - - Occlusion, avec *K41.40*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K41.3*
- - - - Sans précision
- - - - - *K41.4*
- - - - - Occlusion, sans *K41.3*
- - - - - Sans occlusion ni *K41.9*
- - Hernie de Spiegel avec *K43.78*
- - Hernie diaphragmatique
- - - *K44.1*
- - - Étranglée sans *K44.0*
- - - Incarcérée sans *K44.0*
- - - Irréductible sans *K44.0*
- - - Occlusion, sans *K44.0*
- - - Provoquant une occlusion sans *K44.0*
- - - Sans occlusion ni *K44.9*
- - Hernie épigastrique
- - - *K43.70*
- - - Sans occlusion ni *K43.90*
- - Hernie hypogastrique avec *K43.78*
- - Hernie incisionnelle
- - - Occlusion, sans *K43.0*
- - - Sans occlusion ni *K43.2*
- - Hernie inguinale
- - - Bilatérale
- - - - *K40.1*
- - - - Occlusion, sans *K40.0*
- - - - Sans occlusion ni *K40.2*
- - - SAI, avec *K40.4*
- - - Unilatérale
- - - - Étranglée sans *K40.3*
- - - - Incarcérée sans *K40.3*

Gangrène *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hernie inguinale *–suite*
- - - Unilatérale *–suite*
- - - - Irréductible sans *K40.3*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K40.3*
- - - - Sans précision
- - - - - *K40.4*
- - - - - Occlusion, sans *K40.3*
- - - - - Sans occlusion ni *K40.9*
- - Hernie ombilicale
- - - *K42.1*
- - - Étranglée sans *K42.0*
- - - Incarcérée sans *K42.0*
- - - Irréductible sans *K42.0*
- - - Occlusion, sans *K42.0*
- - - Provoquant une occlusion sans *K42.0*
- - - Sans occlusion ni *K42.9*
- - Hernie parastomale
- - - *K43.4*
- - - Occlusion, sans *K43.3*
- - - Sans occlusion ni *K43.5*
- - Hernie sous-xiphoïdienne avec *K43.78*
- - Hernie ventrale
- - - Causant une occlusion, sans *K43.69*
- - - Étranglée, sans *K43.69*
- - - Incarcérée sans *K43.69*
- - - Non réductible, sans *K43.69*
- - Stade IV de Leriche et Fontaine, avec *I70.25*
- - Strangulation de l'intestin due à une hernie avec *K46.1*

Gangréneuse
- Sans calcul ¬ Cholécystite: *K81.0*
- ¬
- - Amygdalite (aiguë): *J03.9*
- - Cholangiolite *K83.09*
- - Cystite *N30.88*
- - Dermite
- - - *L08.0*
- - - *L88*
- - Diphtérie *A36.9*
- - Hernie diaphragmatique *K44.1*
- - Hernie ombilicale *K42.1*
- - Pharyngite (aiguë): *J02.9*
- - Pyodermite *L88*
- - Stomatite *A69.0*

Gangrenosum
v./v.a. Pyoderma gangrenosum

Ganong Levine
- LGL] ¬ Syndrome de Lown- *I45.6*
- ¬ Syndrome de Lown- *I45.6*

Ganser ¬ Syndrome de *F44.80*

GAPO ¬ Syndrome *Q87.8*

GAPPS [Adénocarcinome gastrique et polypose proximale de l'estomac] ¬ *C16.9*

Garcia
v./v.a. Lisker-Garcia-Ramos
v./v.a. Stratton-Garcia-Young

Garcia-Lurie ¬ Syndrome de *Q04.3*

Garçon ¬
- FMPP [Puberté précoce familiale limitée aux *E30.1*
- Puberté précoce centrale
- - Génétique du *E22.8*
- - Primaire du *E22.8*
- - Secondaire du *E22.8*

Garde ou d'entretien d'enfants ¬ Procédure de *Z65*

Gardner-Diamond ¬ Syndrome de *D69.2*

Gardner-Silengo-Wachtel ¬ Syndrome de *Q87.8*

Garrity
v./v.a. Kaler-Garrity-Stern

Gartner ¬ Kyste (de): canal de *Q50.5*

Gasping syndrome (syndrome de suffocation) ¬ *T51.9*

Gastaut
v./v.a. Lennox-Gastaut

Gastrine ¬
- Adénome pancréatique sécrétant de la *D13.6*
- Sécrétion anormale de *E16.4*

Gastrinome ¬ *D37.78*

Gastrique
- Antérieure
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de la paroi *C16.8*
- - ¬ Carcinome épidermoïde de la paroi *C16.8*
- Associé au virus Epstein-Barr ¬ Carcinome *C16.9*
- Cirrhotique ¬ Linite plastique au cours de carcinome *C16.9*
- Cours
- - Achalasie ¬ Cardialgie *K22.0*
- - Maladies classées chapitres
- - - Mention d'hémorragie ¬ Varices œsophagiennes et *I98.3**
- - - Sans indication d'hémorragie ¬ Varices œsophagiennes et *I98.2**
- - Schistosomiase ¬ Varices *B65.9†*, *I98.2**
- - Syndrome de Lynch ¬ Carcinome *C16.9*
- - Syphilis ¬ Crise *A52.7†*, *K93.8**
- Diffus
- - Héréditaire ¬ Adénocarcinome *C16.9*
- - ¬ Carcinome *C16.9*
- Duodénum
- - Saignement ¬ Syndrome GAVE [ectasie vasculaire antrale *K31.82*
- - Sans indication de saignement ¬ Syndrome GAVE [ectasie vasculaire antrale *K31.81*
- Estomac
- - Saignement ¬ Syndrome GAVE [ectasie vasculaire antrale *K31.82*

Gastrique *–suite*
- Estomac *–suite*
- - Sans indication de saignement ¬ Syndrome GAVE [ectasie vasculaire antrale *K31.81*
- Héréditaire diffus à localisations contiguës ¬ Carcinome *C16.8*
- Indication d'hémorragie, au cours de schistosomiase ¬ Varices *B65.9†*, *I98.3**
- Localisations contiguës ¬ Linite plastique *C16.8*
- Polypose proximale de l'estomac] ¬ GAPPS [Adénocarcinome *C16.9*
- Postérieure
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de la paroi *C16.8*
- - ¬ Carcinome épidermoïde de la paroi *C16.8*
- Psychogène ¬ Ulcère *F54*, *K25.9*
- S SAI due anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Inhalation du contenu ou de sécrétions *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Inhalation du contenu ou de sécrétions *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Inhalation du contenu ou de sécrétions *O74.0*
- SAI ¬
- - Cancer *C16.9*
- - Hémorragie: *K92.2*
- Tardive avec polypose ¬ Syphilis *A52.7†*, *K93.8**
- ¬
- - Adénocarcinome de la jonction œsophago- *C16.0*
- - Adhérences (de): *K66.0*
- - Amylose *E85.4†*, *K93.8**
- - Carcinome épidermoïde de la jonction œsophago- *C16.0*
- - Cirrhose alcoolique foie
- - - Saignement de varices *K70.3†*, *I98.3**
- - - Varices *K70.3†*, *I98.2**
- - Diverticule *K31.4*
- - Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires *T47.1*
- - Ischémie *K31.88*
- - Jonction: œsophago- *C16.0*
- - Lésion traumatique de l'artère *S35.2*
- - Maladie de Crohn *K50.80*
- - Névrose: *F45.3*
- - Pneumonie par aspiration (de): sécrétions *J69.0*
- - Ptose *K31.8*
- - Syndromes consécutifs à une intervention *K91.1*
- - Ulcère: *K25*
- - Varices *I86.4*

Gastrite
- Aiguë (érosive) avec hémorragie ¬ *K29.0*
- Aiguës ¬ Autres *K29.1*
- Alcoolique ¬ *K29.2*

Gastrite *–suite*
- Anémie mégaloblastique ¬ Syndrome de mucoviscidose- *Q87.8*
- Aspergillus ¬ *B44.8†*, *K93.8**
- Atrophique ¬ *K29.4*
- Biliaire ¬ *K29.6*
- Chronique
- - Atrophique ¬ *K29.4*
- - Helicobacter pylori ¬ *K29.5*
- - Sans précision ¬ *K29.5*
- - Superficielle ¬ *K29.3*
- - Type
- - - Antral ¬ *K29.5*
- - - Fundique ¬ *K29.5*
- Collagène pédiatrique ¬ *K29.3*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†*, *K93.8**
- Due
- - Cytomégalovirus ¬ *B25.80†*, *K93.8**
- - Sous-alimentation ¬ *E63.9†*, *K93.8**
- Gastroentérite à éosinophiles ¬ *K52.8*
- Granulomateuse ¬ *K29.6*
- Helicobacter pylori ¬ *K29.7*, *B98.0!*
- Hémorragique aiguë ¬ *K29.0*
- Hypertrophique géant ¬
- - *K29.6*
- - *K29.6*
- Nerveuse ¬ *F54*, *K29.7*
- Psychosomatique ¬ *F54*, *K29.7*
- Sans précision ¬ *K29.7*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†*, *K93.8**
- Virus d'Epstein-Barr ¬ *B27.0†*, *K93.8**
- Virus de l'herpès ¬ *B00.8†*, *K93.8**
- ¬ Autres *K29.6*

Gastro
v./v.a. Oculo-gastro-intestinal

Gastro-colique
- Tuberculeuse ¬ Fistule *A18.3†*, *K93.0**
- ¬
- - Fistule: *K31.6*
- - Ulcère (peptique) ou érosion: *K28*

Gastro-cutané ¬ Syndrome *Q87.8*

Gastro-duodénal
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens ¬ Ulcère *K27.9*, *Y57.98!*
- Hémorragique aigu ¬ Ulcère *K27.0*
- Nouveau-né ¬ Ulcère *P78.8*
- SAI ¬ ulcère *K27*
- ¬ Lésion traumatique de l'artère *S35.2*

Gastro-duodénite, sans précision ¬ *K29.9*

Gastroentérite
- Aiguë
- - Exsiccose ¬ *A09.9*, *E86*
- - Norovirus ¬ *A08.1*
- Colite
- - Allergiques et alimentaires ¬ *K52.2*
- - Hypersensibilité alimentaire ¬ *K52.2*

Gastroentérite *–suite*
- Colite *–suite*
- - Irradiation ¬ *K52.0*
- - Médicamenteuses ¬ *K52.1*
- - Non
- - - Infectieuses
- - - - Précisées ¬ Autres *K52.8*
- - - - Sans précision ¬ *K52.9*
- - - Précisées origine
- - - - Infectieuse ¬ *A09.0*
- - - - Non précisée ¬ *A09.9*
- - Toxiques ¬ *K52.1*
- Cours
- - Fièvre paratyphoïde ¬ *A01.4*
- - Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- Cryptosporidium ¬ *A07.2*
- Éosinophiles ¬ Gastrite ou *K52.8*
- Exsiccose ¬ *A09.9, E86*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.8*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- Hémorragique ¬ Infectieuse ou septique: *A09.0*
- Infectieuse ¬ Maladie due au VIH avec *B20, A09.0*
- Modérée ¬ Convulsions infantiles bénignes associées à une *G40.3*
- Non infectieuse ¬ Maladie par VIH avec *B23.8, K52.9*
- Nourrisson avec exsiccose ¬ *A09.9, E86*
- Probablement d'origine infectieuse, avec exsiccose ¬ *A09.0, E86*
- SAI ¬ Infectieuse ou septique: *A09.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Virale ¬ *A08.4*
- Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*

Gastro-entérocolite ¬ *A09.9*

Gastro-gastrique ¬ Fistule *K31.6*

Gastro-intestinal
v./v.a. Hémorragie gastro-intestinale
- Amyloïde ¬ Maladie *E85.4†, K93.8**
- Ballonnet ¬ Complication mécanique due à un dispositif *T85.59*
- E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- Fonctionnelle ¬ Dyspepsie *K30*
- Inférieur ¬ Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le tractus *T85.52*
- Juvénile ¬ Polypose *D12.6*
- Néonatales ¬ Autres hémorragies *P54.3*
- Neuroendocrine ¬ Tumeur *C26.9*
- Psychogène ¬
- - Hypomotilité *F45.37*
- - Irritation *F45.37*
- - Trouble *F45.37*

Gastro-intestinal *–suite*
- Sans précision ¬ Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus *T47.9*
- Supérieur ¬ Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans d'autres parties du tractus *T85.51*
- Sur plusieurs segments ¬ Maladie de Crohn de l'œsophage et du tractus *K50.82*
- ¬
- - Actinomycose *A42.1*
- - Anomalie congénitale du système *Q45.9*
- - Arthrite au cours d'affection *K63.9†, M03.69**
- - Charbon *A22.2†, K93.8**
- - Crampe *R10.4*
- - Fuite d'un implant *T85.59*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus *T85.76*
- - Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus *T47.8*
- - Malformation artério-veineuse du tractus *Q27.3*
- - Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs *Z46.5*
- - Mucormycose *B46.2†, K93.8**
- - Primo-infection tuberculeuse *A18.3†, K93.0**
- - Tuberculose *A18.3†, K93.0**
- - Tularémie *A21.3*
- - Vomissements consécutifs à une intervention *K91.0*

Gastro-jéjunal
- Aigu ¬ Ulcère *K28.3*
- E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- ¬ Ulcère *K28*

Gastro-jéjuno-colique ¬ Fistule: *K31.6*

Gastro-œsophagien
- Associé à STAG1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie faciale-reflux *Q87.0*
- Œsophagite ¬ Reflux *K21.0*
- Sans œsophagite ¬ Reflux *K21.9*
- ¬
- - Syndrome de dilacération hémorragique *K22.6*
- - Tumeur rare *D37.1*

Gastroparésie
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ *E10.40†, G99.00**
- - - 2 ¬ *E11.40†, G99.00**
- - ¬ *E14.40†, G99.00**
- Idiopathique ¬ *K31.88*

Gastropathie hypertrophique
- Ménétrier ¬ *K29.6*
- Sans hypoprotéinémie ¬ *K29.6*

Gastroschisis ¬ *Q79.3*

Gastrostomie
- Endoscopique percutanée
- - Sonde PEG] ¬ Complication mécanique de sonde de *T85.51*
- - ¬ Infection dues à une sonde de *T85.74*
- ¬
- - *Z46.5*
- - Présence d'une *Z93.1*
- - Sténose de stomie post- *K91.84*
- - Surveillance de *Z43.1*

Gaucher
- Adulte ¬
- - Maladie de *E75.2*
- - Splénomégalie de *E75.2*
- Cérébrale
- - Infantile ¬ Maladie de *E75.2*
- - Juvénile et de l'adulte ¬ Maladie de *E75.2*
- Forme cardio-vasculaire ¬ Maladie de *E75.2*
- Infantile ¬
- - Maladie de *E75.2*
- - Splénomégalie de *E75.2*
- Juvénile non cérébrale ¬ Maladie de *E75.2*
- Neuronopathique subaiguë ¬ Maladie de *E75.2*
- Ophtalmoplégie-calcification cardio-vasculaire ¬ Syndrome de maladie de *E75.2*
- Périnatale létale ¬ Maladie de *E75.2*
- ¬
- - Dégénérescence cérébrale au cours de syndrome de *E75.2†, G32.8**
- - Maladie de *E75.2*
- - Splénomégalie de *E75.2*

GAVE ectasie vasculaire antrale gastrique
- Duodénum
- - Saignement ¬ Syndrome *K31.82*
- - Sans indication de saignement ¬ Syndrome *K31.81*
- Estomac
- - Saignement ¬ Syndrome *K31.82*
- - Sans indication de saignement ¬ Syndrome *K31.81*

Gaz
- Brûlants ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Fluorure d'hydrogène ¬ Effet toxique: Fluor (*T59.5*
- Fumée
- - Précisés ¬ Effet toxique: Autres émanations, *T59.8*
- - Sans précision ¬ Effet toxique: Emanation, *T59.9*
- Lacrymogène
- - Coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que *Y35.7!*
- - ¬ Effet toxique: *T59.3*
- Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.2*

Gaz *–suite*
- Sang ¬ Taux anormal des *R79.8*
- Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.9*
- Thérapeutiques ¬ Intoxication
- - *T41.5*
- - *T41.5*
- ¬
- - Affections respiratoires
- - - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.8*
- - - Aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.3*
- - - Chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.4*
- - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68.4*
- - Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.0*
- - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68.4*
- - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68.4*
- - Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.1*

Gazali
v./v.a. Al Gazali-Aziz-Salem
v./v.a. Al-Gazali-al-Talabani

Gazeux
- Consécutive
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA ¬ Embolie *T81.7*
- - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ Embolie *T80.0*
- Obstétricale ¬ Embolie *O88.0*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- Traumatique ¬
- - Embolie *T79.0*
- - Séquelles d'embolie *T98.2*
- ¬
- - Distension abdominale (*R14*
- - Effet toxique: Chlore *T59.4*
- - Gangrène *A48.0*
- - Intoxication: Anesthésiques *T41.0*

GDS-15 Échelle de dépression gériatrique 15
- 0-5 points ¬ *U54.02*
- 6 points ou plus ¬ *U54.12*

GDS-5 Échelle de dépression gériatrique 5
- 0-1 points ¬ *U54.03*
- 2 points ou plus ¬ *U54.13*

Géant
v./v.a. Cellule géante

Géant *–suite*
- Encéphale ¬ Tératome malin *C71.9*
- Infantile ¬ Hémangiome *D18.00*
- Sein ¬ Adénofibrome *D24*
- ¬
- - Adénofibrome *D24*
- - Gastrite hypertrophique
- - - *K29.6*
- - - *K29.6*
- - Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 avec axones *G60.0*
- - Nævus pigmentaire congénital *D22.9*
- - Neuropathie à axones *G60.8*
- - Rein hyperplasique et *Q63.3*
- - Syndrome des plaquettes sanguines *D69.1*
- - Urticaire *T78.3*

Gélatine ¬ Hypersensibilité à la *T78.1*

Gélatineux
- Myélopathie ¬ Hernie du noyau *M51.0†, G99.2**
- Névrite ¬
- - Hernie cervicale du noyau *M50.1†, G55.1**
- - Hernie cervico-thoracique du noyau *M50.1†, G55.1**
- Radiculopathie ¬
- - Hernie
- - - Cervico-thoracique du noyau *M50.1†, G55.1**
- - - Lombosacrée du noyau *M51.1†, G55.1**
- - - Thoracique du noyau *M51.1†, G55.1**
- - - Thoraco-lombaire du noyau *M51.1†, G55.1**
- - Hernie cervicale du noyau *M50.1†, G55.1**
- - Hernie lombaire du noyau *M51.1†, G55.1**
- ¬
- - Ascite *C78.6*
- - Névrite au cours d'une hernie du noyau *M51.1†, G55.1**

Géléophysique ¬ Dysplasie *Q87.1*

Gélineau ¬ Maladie de *G47.4*

Gellerstedt
v./v.a. Ceelen-Gellerstedt

Gelure
- Atteinte partielle des couches de la peau ¬ *T33*
- Bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus ¬ *T34.4*
- Cheville et du pied, avec nécrose des tissus ¬ *T34.8*
- Cou, avec nécrose des tissus ¬ *T34.1*
- Genou et de la jambe, avec nécrose des tissus ¬ *T34.7*
- Hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus ¬ *T34.6*
- Localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus ¬ *T34.9*
- Membre
- - Inférieur

Gelure *–suite*
- Membre *–suite*
- - Inférieur *–suite*
- - - Sans précision ¬ *T35.5*
- - - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.3*
- - Supérieur
- - - Sans précision ¬ *T35.4*
- - - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.2*
- Multiples
- - Nécrose des tissus SAI ¬ *T35.1*
- - SAI ¬ *T35.6*
- Nécrose des tissus
- - Membre inférieur SAI ¬ *T34.9*
- - SAI ¬ *T34.9*
- - Tronc SAI ¬ *T34.9*
- Paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus ¬ *T34.3*
- Parties multiples corps
- - Nécrose des tissus ¬ *T35.1*
- - Sans précision ¬ *T35.6*
- Poignet et de la main, avec nécrose des tissus ¬ *T34.5*
- Précisées ¬ Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou *T95.8*
- SAI ¬ *T35.7*
- Sans précision
- - Localisation non précisée ¬ *T35.7*
- - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion ou *T95.9*
- Superficielle
- - Bras et de l'avant-bras ¬ *T33.4*
- - Cheville et du pied ¬ *T33.8*
- - Cou ¬ *T33.1*
- - Genou et de la jambe ¬ *T33.7*
- - Hanche et de la cuisse ¬ *T33.6*
- - Localisations autres et non précisées ¬ *T33.9*
- - Membre inférieur SAI ¬ *T33.9*
- - Paroi abdominale, des lombes et du bassin ¬ *T33.3*
- - Parties multiples du corps ¬ *T35.0*
- - Poignet et de la main ¬ *T33.5*
- - SAI ¬ *T33.9*
- - Tête ¬ *T33.0*
- - Thorax ¬ *T33.2*
- - Tronc SAI ¬ *T33.9*
- Superficielles multiples SAI ¬ *T35.0*
- Tête
- - Cou
- - - Sans précision ¬ *T35.2*
- - - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.0*
- - Nécrose des tissus ¬ *T34.0*
- Thorax
- - Abdomen, des lombes et du bassin, sans précision ¬ *T35.3*
- - Nécrose des tissus ¬ *T34.2*

Gelure *–suite*
- Tronc
- - SAI ¬ *T35.3*
- - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.1*

Gémellaire
- Jumeau
- - Morts-nés ¬ Naissance *Z37.4!*
- - Né vivant, l'autre mort-né ¬ Naissance *Z37.3!*
- - Nés vivants ¬ Naissance *Z37.2!*
- ¬
- - Dystocie *O66.1*
- - Grossesse: *P01.5*
- - Séquence anémie-polycythémie *O43.0*

Gemignani ¬ Syndrome de *Q87.8*

Gémination dentaire ¬ *K00.2*

Gémistocytique
- Cervelet ¬ Astrocytome *C71.6*
- Encéphale ¬ Astrocytome *C71.0*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Astrocytome *C71.8*
- Lobe frontal ¬ Astrocytome *C71.1*
- Lobe occipital ¬ Astrocytome *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ Astrocytome *C71.3*
- Lobe temporal ¬ Astrocytome *C71.2*
- Tronc cérébral ¬ Astrocytome *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬ Astrocytome *C71.5*

GEMSS [glaucome-ectopie du cristallin-sphérophakie-raideur articulaire-petite taille] ¬ Syndrome *Q87.1*

Gênant le contact ¬ Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et *R46.7*

Gencive
- Crête alvéolaire édentée
- - Sans précision ¬ Affection de la *K06.9*
- - ¬ Autres affections précisées de la *K06.8*
- Inférieure ¬ Tumeur maligne: *C03.1*
- Processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.53*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C03.9*
- Scorbutique ¬ *E54†, K93.8**
- Supérieure ¬ Tumeur maligne: *C03.0*
- ¬
- - *C03*
- - Anomalie congénitale de la *Q38.6*

Gène
- ABCB4 ¬ Cholélithiase par mutation du *K80.80*
- ATAD3 ¬ Syndrome létal d'hypoplasie pontocérébelleuse-hypotonie-insuffisance respiratoire dû à des délétions bialléliques dans le cluster de *Q04.3*
- BAP1 ¬ Carcinome à cellules rénales associé au syndrome de prédisposition tumorale liée au *C64*
- BRCA2 ¬ Syndrome de prédisposition héréditaire au cancer dû à une mutation bialélique du *D61.0*

Gène *–suite*
- CDKN1C ¬ Syndrome retard de croissance intra-utérin petite taille
- - Associé au *E34.8*
- - Diabète sucré associé au *E34.8, E10.90*
- COL2A1 ¬ Arthrose précoce
- - Articulation
- - - Coude avec dysplasie spondyloépiphysaire modérée due à une mutation du *Q77.7, M19.92*
- - - Hanche avec dysplasie spondyloépiphysaire modérée due à une mutation du *Q77.7, M19.95*
- - Dysplasie spondylo-épiphysaire intermédiaire due à une mutation du *Q77.7, M19.99*
- Contigus de céphalopolysyndactylie de Greig ¬ Syndrome des *Q87.0*
- DDX41
- - Rémission complète ¬ Leucémie myéloïde aiguë au cours de syndrome de prédisposition tumorale liée au *C92.01*
- - ¬
- - - Leucémie myéloïde aiguë au cours de syndrome de prédisposition tumorale liée au *C92.00*
- - - Syndrome myélodysplasique au cours de syndrome de prédisposition tumorale liée au *D46.9*
- Interféron] ¬ Vasculopathie de l'enfant associée à STING [Stimulateur des *M35.8*
- MBD4 ¬
- - Leucémie myéloïde aiguë au cours de syndrome de prédisposition tumorale liée au *C92.00*
- - Syndrome myélodysplasique au cours de syndrome de prédisposition tumorale liée au *D46.9*
- MECP2 ¬ Encéphalopathie congénitale sévère due à une mutation du *G93.4, Q02*
- MLL ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec altérations du *C92.60*
- MUTYH ¬ PAF [polypose adénomateuse familiale] liée au *D12.6*
- Prothrombine ¬ Mutation du *D68.5*
- Récepteur
- - Leptine
- - - Enfant adolescent 3 18 ¬ Obésité
- - - - Extrême par mutations du *E66.85*
- - - - Mutations du *E66.84*
- - - Indice de masse corporelle IMC
- - - - 60 et plus chez l'adulte ¬ Obésité par mutations du *E66.88*
- - - - Compris
- - - - - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ Obésité par mutations du *E66.80*
- - - - - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ Obésité par mutations du *E66.86*
- - - - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ Obésité par mutations du *E66.87*

Gène *–suite*
- Récepteur *–suite*
- - Letpine avec indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ Obésité par mutations du *E66.81*
- THOX2 ¬ Hypothyroïdie congénitale transitoire par mutations hétérozygotes du *P72.2*

Gêne mécanique à la respiration ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: *T71*

Général
v./v.a. Type de maladie

Généralisé
v./v.a. Type de maladie

Générateur d'un stimulateur cardiaque ¬ Changement du *Z45.00*

Génétique
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats chromosomiques et *O28.5*
- Connue ¬ Lissencéphalie isolée de type 1 sans anomalie *Q04.3*
- Fille ¬ Puberté précoce centrale *E22.8*
- Garçon ¬ Puberté précoce centrale *E22.8*
- Infantile ¬ Agranulocytose *D70.0*
- Leucocytes ¬ Anomalies *D72.0*
- Non syndromique
- - Bilatérale ¬ Surdité *H90.3*
- - Postlinguale ¬ Surdité *H90.5*
- - Prélinguale ¬ Surdité *H90.5*
- - ¬ Surdité *H90.5*
- Récurrente ¬
- - Leucémie lymphoblastique B avec anomalie *C91.00*
- - Lymphome lymphoblastique B avec anomalie *C83.5*
- Sévère aux infections mycobactériennes par déficit complet en IFNG ¬ Prédisposition *D84.8*
- ¬
- - Anomalie du développement sexuel 46,XX d'origine *Q99.1*
- - Conseil *Z31.5*
- - Hyperaldostéronisme *E26.0*
- - Myoglobinurie récurrente *R82.1*
- - Pancréatite *K86.11*
- - Panhypopituitarisme d'origine *E23.0*

Geneviève ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Géniculé
- Zostérien ¬ Névrite du ganglion *B02.2†, G53.0**
- ¬ Atteinte
- - Ganglion *G51.1*
- - Post-herpétique du ganglion *B02.2†, G53.0**

Géniospasme héréditaire ¬ *G25.3*

Génital
v./v.a. Antécédent personnel de mutilation génitale féminine
v./v.a. cranio-facio-digito-génital
v./v.a. facio-digito-génital
v./v.a. Organe génital
v./v.a. Région génitale
- Accouchement ¬ Autres infections des voies *O86.1*
- Chlamydia ¬ Infection *A56.2*
- Chondrite ¬ Ulcères buccaux et *M35.2, M94.1*
- Cours de la grossesse ¬ Infections de l'appareil *O23.5*
- Entéropathie] ¬ Syndrome MIRAGE [Syndrome de myélodysplasie-infections-retard de croissance-hypoplasie surrénalienne-anomalies *Q87.8*
- Externes
- - Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations *Q87.8*
- - ¬
- - - Brûlure
- - - - 2ème degré des parties *T21.25*
- - - - Premier degré des parties *T21.15*
- - - - Troisième degré des parties *T21.35*
- - - Corrosion du 2ème degré des parties *T21.65*
- - - Corrosion du premier degré des parties *T21.55*
- Féminin ¬ Candidose de l'appareil *B37.3†, N77.1**
- Féminine ¬ Mutilation *Z91.70*
- Féminines ¬ Mutilations *Z91.70*
- Mère et autres infections localisées ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: infection de l'appareil *P00.8*
- Organe pelvien
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Infection de l'appareil *O08.0*
- - ¬ Échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une infection de l'appareil *O07.0*
- - - Sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil *O07.5*
- Post gonorrhée ¬ Syndrome *B94.88*
- Primaire ¬ Syphilis *A51.0*
- Sans précision ¬ Prolapsus *N81.9*
- Synostoses métacarpiennes et métatarsiennes ¬ Syndrome de surdité-anomalies *Q87.8*
- ¬
- - Abcès tuberculeux des organes urinaires et *A18.1*
- - Atrophie *N95.8*
- - Complication mécanique d'autres prothèses, implants ou greffes de l'appareil *T83.4*

Génital *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dysplasie fronto-nasale avec alopécie et anomalies *Q87.0*
- - Dystrophie adiposo- *E23.6*
- - Échec de la réponse *F52.2*
- - Infection
- - - Chlamydia des organes urinaires et *A56.2†, N29.1**
- - - Réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant ou une greffe de l'appareil *T83.6*
- - Lissencéphalie liée à l'X avec anomalies *Q04.3*
- - Maladie de Queyrat des lèvres *D07.1*
- - Prolapsus *N81.8*
- - Syndrome
- - - IMAGe [retard de croissance intra-utérin-dysplasie métaphysaire-hypoplasie congénitale des surrénales-anomalies *Q87.1*
- - - Myopathie centronucléaire liée à l'X-anomalies *G71.2, Q55.9*

Génital de l'homme par le virus de l'herpès ¬ Infection de l'appareil *A60.0†, N51.8**

Génital de la femme
- Sans précision ¬
- - Fistule de l'appareil *N82.9*
- - Polype de l'appareil *N84.9*
- - ¬
- - Fistules de l'appareil *N82.88*
- - Polypes d'autres parties de l'appareil *N84.8*

Genitalis ¬ Tinea *B35.8*

Génito
v./v.a. cérébro-réno-génito-urinaire

Génito-cutanée chez la femme ¬ Fistule *N82.5*

Génito-palato-cardiaque ¬ Syndrome *Q87.8*

Génito-patellaire ¬
- Chevauchement du syndrome de blépharophimose avec déficience intellectuelle de type SBBYS et du syndrome *Q87.8*
- Syndrome *Q87.8*

Génito-surrénalien
- Idiopathique ¬ Anomalie *E25.8*
- SAI ¬ Syndrome *E25.9*
- Sans précision ¬ Anomalie *E25.9*
- ¬ Autres anomalies *E25.8*

Génito-urinaire
v./v.a. Organe génito-urinaire
v./v.a. Voie génito-urinaire
- Abcès périurétral et des glandes annexes ¬ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil *A54.1*
- Actes médical
- - Sans précision ¬ Affection de l'appareil *N99.9*
- - ¬ Autres affections de l'appareil *N99.8*
- Cours grossesse

Génito-urinaire *–suite*
- Cours grossesse *–suite*
- - SAI ¬ Infection de l'appareil *O23.9*
- - Sans précision ¬ Infections de l'appareil *O23.9*
- Femme ¬ Autres fistules de l'appareil *N82.1*
- Gonococciques ¬ Pelvipéritonite gonococcique et autres infections *A54.2*
- Sans précision ¬
- - Complication d'une prothèse, d'un implant ou d'une greffe de l'appareil *T83.9*
- - Infection à Chlamydia de l'appareil *A56.2*
- Virus de l'herpès ¬ Infection des organes génitaux et de l'appareil *A60.0*
- ¬
- - Abcès tuberculeux de l'appareil *A18.1*
- - Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil *Z84.2*
- - Antécédents personnels de maladies de l'appareil *Z87.4*
- - Arthrite consécutive à une infection de l'appareil *M02.39*
- - Complications de prothèses, implants ou greffes de l'appareil *T83.8*
- - Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil *A56.0*
- - NOCGUS [Syndrome neuro-oculo-cardio- *Q87.8*
- - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil *A18.1*
- - Séquelles de tuberculose *B90.1*
- - Syndrome de dysostose spondylocostale-atrésie anale-malformation *Q87.8*

Génochondromatose type
- 1 ¬ *Q78.4*
- 2 ¬ *Q78.4*

Genou
- Antérieur postérieur
- - Déchirure ligament croisé
- - - Antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.53*
- - - Postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.54*
- - Distorsion ligament croisé
- - - Antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.51*
- - - Postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.52*
- - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.50*
- Au-dessous ¬ Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du *Z89.5*
- Cheville ¬ Amputation traumatique entre le *S88.1*
- Interne externe
- - Déchirure ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.43*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.44*
- - Distorsion ligament latéral

Genou *–suite*
- Interne externe *–suite*
- - Distorsion ligament latéral *–suite*
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.41*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.42*
- - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.40*
- Jambe
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.7*
- - ¬ Gelure superficielle du *T33.7*
- Ligament
- - Externe
- - - Ligament péronier collatéral ¬
- - - - Instabilité chronique du *M23.54*
- - - - Lésions internes du *M23.84*
- - - ¬ Autres ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.64*
- - Interne
- - - Ligament tibial collatéral ¬
- - - - Instabilité chronique du *M23.53*
- - - - Lésions internes du *M23.83*
- - - ¬ Autres ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.63*
- - Non précisé ¬
- - - Instabilité chronique du *M23.59*
- - - Lésions internes du *M23.89*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.69*
- Ligament capsulaire ¬
- - Instabilité chronique du *M23.57*
- - Lésions internes du *M23.87*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.67*
- Ligament croisé
- - Antérieur ¬
- - - Instabilité chronique du *M23.51*
- - - Lésions internes du *M23.81*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.61*
- - Postérieur ¬
- - - Instabilité chronique du *M23.52*
- - - Lésions internes du *M23.82*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.62*
- Localisations multiples ¬
- - Instabilité chronique du *M23.50*
- - Lésions internes du *M23.80*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.60*
- Luxation
- - Latérale du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.14*
- - Médiane du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.13*
- - Postérieure du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.12*

Genou *–suite*
- Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du ligament latéral interne du *M76.4*
- Ressort» ¬ *M23.8*
- Sans précision
- - Corne postérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du *M23.95*
- - Ligament
- - - Externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du *M23.94*
- - - Interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du *M23.93*
- - - Non précisé ou ménisque non précisé ¬ Lésion interne du *M23.99*
- - Ligament capsulaire ¬ Lésion interne du *M23.97*
- - Ligament croisé
- - - Antérieur ou corne antérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du *M23.91*
- - - Postérieur ou corne postérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du *M23.92*
- - Localisations multiples ¬ Lésion interne du *M23.90*
- - Partie autre et non précisée du ménisque externe ¬ Lésion interne du *M23.96*
- - ¬ Luxation du *S83.10*
- Unilatérale ¬ Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du *Z89.6*
- ¬
- - Abcès tuberculeux du *A18.0†, M01.16**
- - Abrasion sur le *S80.81*
- - Amputation traumatique
- - - Hanche et le *S78.1*
- - - Niveau du *S88.0*
- - Anomalie morphologique congénitale du *Q68.2*
- - Arthrite chronique juvénile
- - - Début systémique, articulation du *M08.26*
- - - Forme oligo(pauci)- articulaire, articulation du *M08.46*
- - Arthrolithe du *M23.4*
- - Articulation du *T84.15*
- - Bursites du *M70.5*
- - Chondropathie du *M23.89*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du *T84.05*
- - Contusion du *S80.0*
- - Corps
- - - Étranger riziforme intra-articulaire du *M23.4*
- - - Libre intra-articulaire du *M23.4*
- - CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium dihydraté], articulation du *M11.16*
- - Déchirure récente du cartilage articulaire du *S83.3*

Genou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dermato-arthrite lipoïdique, articulation du *E78.88†, M14.36**
- - Distorsion du ligament collatéral médial du *S83.42*
- - Écrasement du *S87.0*
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S83.6*
- - Hémarthrose
- - - Non traumatique de l'articulation du *M25.06*
- - - Traumatique de l'articulation du *S80.0*
- - Hydarthrose intermittente
- - - *M12.46*
- - - Articulation du *M12.46*
- - Inflammation tuberculeuse de l'articulation du *A18.0†, M01.16**
- - Laxité des ligaments du *M23.8*
- - Lésion
- - - Intra-articulaire récidivante du *M23.99*
- - - Récidivante
- - - - *M23.99*
- - - - Cartilage du ménisque du *M23.39*
- - - Traumatique de multiples parties du *S83.7*
- - Luxation congénitale du *Q68.2*
- - Luxation du *S83.18*
- - Malformation congénitale du *Q74.1*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: jambe et *R02.06*
- - Ostéochondrite disséquante du *M93.26*
- - Ostéochondrose disséquante familiale de l'articulation du *M93.26*
- - Plaie ouverte du *S81.0*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.65*
- - Psoriasis avec arthrite juvénile de l'articulation du *L40.5†, M09.06**
- - Rhumatisme fibroblastique de l'articulation du *M06.86*
- - Souris
- - - Articulaire du *M23.4*
- - - Intra-articulaire du *M23.4*
- - Synovite villonodulaire pigmentée, articulation du *M12.26*
- - TBC [Tuberculose] de l'articulation du *A18.0†, M01.16**
- - Tumeur ténosynoviale à cellules géantes de l'articulation du *M12.26*

Genouillés et des radiations optiques de Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps *H47.5*

Genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ Infections causées par les espèces appartenant aux *B35*

Genu
- Recurvatum congénital ¬ *Q68.2*
- Valgum
- - Congénital ¬ *Q74.1*

Genu *–suite*
- Valgum *–suite*
- - ¬ Syndrome de pseudoanodontie-hypoplasie maxillaire- *K07.8, Q74.1*
- Varum congénital ¬ *Q74.1*

Géographique ¬ Langue *K14.1*

Géotrichose ¬ *B48.3*

Geotrichum ¬ Stomatite à *B48.3*

Gerbode ¬ Anomalie congénitale de *Q21.0*

Gériatrique
- 5
- - 0-1 points ¬ GDS-5 [Échelle de dépression *U54.03*
- - 2 points ou plus ¬ GDS-5 [Échelle de dépression *U54.13*
- 15
- - 0-5 points ¬ GDS-15 [Échelle de dépression *U54.02*
- - 6 points ou plus ¬ GDS-15 [Échelle de dépression *U54.12*

Gerken
v./v.a. Appelt-Gerken-Lenz

German ¬ Syndrome de *Q87.8*

Germe dentaire ¬ Dislocation du *K00.4*

Germinal
v./v.a. Tumeur germinale
- Cervelet ¬ Tumeur mixte des cellules *C71.6*
- Encéphale ¬ Tumeur mixte des cellules *C71.0*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Tumeur mixte des cellules *C71.8*
- Lobe frontal ¬ Tumeur mixte des cellules *C71.1*
- Lobe occipital ¬ Tumeur mixte des cellules *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ Tumeur mixte des cellules *C71.3*
- Lobe temporal ¬ Tumeur mixte des cellules *C71.2*
- Région pinéale ¬ Tumeur mixte des cellules *C75.3*
- Système nerveux central ¬ Tumeur mixte des cellules *C72.9*
- Tronc cérébral ¬ Tumeur mixte des cellules *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬ Tumeur mixte des cellules *C71.5*

Germinoblastome
- Diffus ¬ *C83.9*
- Folliculaire ¬ *C82.9*
- ¬ *C85.9*

Germinome
- Cervelet ¬ *C71.6*
- Médiastinal ¬ *C38.3*
- Noyaux gris centraux ¬ *C71.0*
- Région pinéale ¬ *C75.3*
- Rétropéritonéal ¬ *C48.0*
- Suprasellaire ¬ *C71.9*
- Système nerveux central ¬ *C72.9*

Germinome *–suite*
- Thalamus ¬ *C71.0*

Gérodermie ostéodysplasique ¬ *Q82.8*

Gerold
v./v.a. Baller-Gerold

Gershoni-Baruch ¬ Syndrome *Q87.8*

Gershoni-Baruch-Leibo ¬ Syndrome de *Q84.8, Q15.8*

Gerstmann ¬ Syndrome de *F81.2*

Gerstmann–Sträussler–Scheinker ¬ Syndrome de *A81.8*

Gestation
- Multiple SAI ¬ *O30.9*
- Troubles métabolique
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.1*
- - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.1*
- ¬
- - Faux travail
- - - 37ème semaine entière de *O47.1*
- - - Avant 37 semaines entières de *O47.0*
- - Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.0*
- - Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la *P28.0*
- - Vomissements importants commençant après la fin de la 20ème semaine de *O21.2*

Gestationis ¬ Soin à femme enceinte au cours d'herpes *O26.4*

Gestationnel
v./v.a. Âge gestationnel
- Hypertension induite par la grossesse] ¬ Hypertension *O13*
- Protéinurie ¬ Œdème *O12.2*
- Puerpéral e ¬
- - Abcès
- - - Mammaire *O91.1*
- - - Subaréolaire *O91.1*
- - Mastite purulente *O91.1*
- Puerpérale ¬
- - Lymphangite du sein *O91.2*
- - Mastite
- - - Interstitielle *O91.2*
- - - Parenchymateuse *O91.2*
- - - SAI *O91.2*
- Puerpérales ¬ Fissures du mamelon *O92.1*
- Récidivante ¬ Cholestase intrahépatique *O26.60*
- SAI ¬
- - Diabète sucré *O24.4*
- - Phlébite *O22.9*
- - Phlébopathie *O22.9*
- - Thrombose *O22.9*

Gestationnel *–suite*
- Transitoire) SAI ¬ Hypertension *O13*
- ¬
- - Abcès du mamelon: *O91.0*
- - Antécédents personnels de diabète *Z87.5*
- - Choriocarcinome
- - - *C58*
- - - Ovarien primitif non *C56*
- - Convulsions avec hypertension préexistante ou *O15*
- - Œdème *O12.0*
- - Protéinurie *O12.1*

Gestose
- EPH [œdème - protéinurie - hypertension] ¬ *O14.9*
- ¬
- - *O14.9*
- - Antécédents personnels de *Z87.5*

Geyser ¬ Oreille *H90.8*

GGS-R] ¬ Anémie par déficit en glutathion réductase [*D55.1*

Ghezzi-Zeviani ¬ Encéphalomyopathie mitochondriale de type *G31.81*

Ghon
- Confirmation
- - Bactériologique ¬ Complexe de *A15.7*
- - Histologique ¬ Complexe de *A15.7*
- ¬ Complexe de *A16.7*

Ghosal ¬ Dysplasie hémato-diaphysaire de *Q78.8, D61.9*

GHR ¬ Petite taille par déficit en *E34.3*

GHRH] ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: «releasing factor» de l'hormone de croissance [SRH] [*E16.8*

Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [*L44.4*

Giardiase [lambliase] ¬ *A07.1*

Gibbosité pottique ¬ *A18.0†, M49.09**

Gibbs
v./v.a. Xia-Gibbs

Gibert ¬ Pityriasis rosé de *L42*

Giedion
v./v.a. Langer-Giedion
v./v.a. Schinzel-Giedion

Gierke
v./v.a. Van Creveld von Gierke
v./v.a. Von Gierke

Gigantea ¬ Adipositas *E66.88*

Gigantica ¬ Infection à Fasciola *B66.3*

Gigantisme
v./v.a. omphalocèle-macroglossie-gigantisme
- 15q ¬ *Q87.3*
- Cérébral ¬ *Q87.3*
- Hypophysaire ¬ *E22.0*
- Infantile familial ¬ *E22.0*
- Néonatal ¬ Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un *Q87.3*
- ¬
- - *E22.0*

Gigantisme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Acromégalie et *E22.0*
- - Hypersécrétion antéhypophysaire avec *E22.0*

Gilbert
v./v.a. Fitzsimmons-McLachlan-Gilbert
- Meulengracht ¬ Syndrome de *E80.4*

Gilford
v./v.a. Hutchinson-Gilford

Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de *F95.2*

Gillespie ¬ Syndrome de *G11.0*

Gingival
- Crête alvéolaire édentée, associées à un traumatisme ¬ Lésions *K06.2*
- Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de fibromatose *Q87.0*
- Flottante ¬ Crête *K06.8*
- Généralisé) (localisé) (post-infectieux) (postopératoire) ¬ Retrait *K06.0*
- Linéaire ¬ Érythème *K05.1*
- Pyogène ¬ Granulome: *K06.8*
- Surdité ¬ Syndrome de fibromatose *H90.3*
- ¬
- - Fibromatose *K06.1*
- - Hyperkératose palmoplantaire focale et *Q82.8*
- - Hyperplasie *K06.1*
- - Kyste: *K09.0*
- - Rétraction *K06.0*
- - Syndrome
- - - Amélogenèse imparfaite-hyperplasie *K00.5*
- - - Dysmorphie faciale-hypertrichose-épilepsie-déficience intellectuelle/retard de développement-hypertrophie *Q87.0*
- - - FHEIG [dysmorphie faciale-hypertrichose-épilepsie-déficience intellectuelle/retard de développement-hypertrophie *Q87.0*
- - - Hypertrichose avec fibromatose *L68.8, K06.1*

Gingivite
- Aiguë ¬ *K05.0*
- Chronique
- - Desquamative ¬ *K05.1*
- - Hyperplasique ¬ *K05.1*
- - Marginale simple ¬ *K05.1*
- - SAI ¬ *K05.1*
- - Ulcérative ¬ *K05.1*
- - ¬ *K05.1*
- Pellagreuse ¬ *E52†, K93.8**
- Ulcéro-nécrotique aiguë ¬
- - *A69.1*
- - GUNA [*A69.1*
- Vincent ¬ *A69.1*

Gingivo stomatite
- Pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès ¬ *B00.2*

Gingivo stomatite *–suite*
- Ulcéro-nécrotique (aiguë) ¬ *A69.1*

GINS1 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

GIST
- Cardia ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C16.0*
- Côlon ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C18.9*
- Corps de l'estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C16.2*
- Estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C16.9*
- Fundus ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C16.1*
- Grande courbure de l'estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C16.6*
- l'antre pylorique ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C16.3*
- Intestin grêle ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C17.9*
- Localisations contiguës
- - Estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C16.8*
- - Œsophage ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C15.8*
- Petite courbure de l'estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C16.5*
- Pylore ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C16.4*
- Tumeur stromale gastro-intestinale
- - Angle
- - - Droit du côlon ¬ *C18.3*
- - - Gauche du côlon ¬ *C18.5*
- - Appendice ¬ *C18.1*
- - Cæcum ¬ *C18.0*
- - Côlon ascendant ¬ *C18.2*
- - Côlon descendant ¬ *C18.6*
- - Côlon sigmoïde ¬ *C18.7*
- - Côlon transverse ¬ *C18.4*
- - Côlon, à localisations contiguës ¬ *C18.8*
- - Diverticule de Meckel ¬ *C17.3*
- - Duodénum ¬ *C17.0*
- - Iléon ¬ *C17.2*
- - Jéjunum ¬ *C17.1*
- - Jonction
- - - Duodéno-jéjunale ¬ *C17.8*
- - - Recto-sigmoïdienne ¬ *C19*
- - Rectum ¬ *C20*
- ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C48.2*

Gitelman
- Like due à une mutation de l'ADN mitochondrial ¬ Tubulopathie rénale *N15.8*
- ¬ Syndrome de *N15.8*

Glabellaire anormal ¬ Réflexe *R29.2*

Glabre ¬ Teigne de la peau *B35.4*

Gland
- Pénis ¬

Gland *–suite*
- Pénis ¬ *–suite*
- - Candidose du *B37.4†, N51.2**
- - Mycose candidosique du *B37.4†, N51.2**
- ¬
- - Adénocarcinome du *C60.1*
- - Carcinome épidermoïde du *C60.1*
- - Inflammation gonorrhéique du *A54.0†, N51.2**
- - Tumeur maligne: *C60.1*

Glande
- Annexes ¬ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des *A54.1*
- Apocrines du sein ¬ Métaplasie des *N60.8*
- Bulbo-urétrales ¬ Tuberculose des *A18.1†, N51.8**
- Canal salivaire
- - Surnuméraires ¬ *Q38.4*
- - ¬
- - - Absence de *Q38.4*
- - - Atrésie de *Q38.4*
- - - Malformations congénitales des *Q38.4*
- Follicule pileux ¬ Inflammation de la *L73.9*
- Littré ¬ Abcès (de): *N34.0*
- Lymphatiques ¬ Tuberculose des *A18.2*
- Mammaire ¬
- - Angiosarcome du quadrant supéro-interne de la *C50.2*
- - Carcinome métaplasique du quadrant supéro-interne de la *C50.2*
- - Grosseur dans la *R92*
- - Micromastie [développement insuffisant des *Q83.88*
- Mésentériques ¬ Tuberculose des *A18.3†, K93.0**
- Para-urétrales ¬ *D30.7*
- Parotide ¬ Tumeur épithéliale bénigne des *D11.0*
- Sébacé
- - Scrotum ¬ Kyste de *L72.1*
- - Sein ¬ Kyste d'un canal de *N60.8*
- - ¬
- - - Abcès de *L02.9*
- - - Tumeur maligne des *C44*
- - - Tumeurs bénignes de: *D23*
- Sous-maxillaire ¬
- - *C08.0*
- - *D11.7*
- - Tumeur épithéliale bénigne de la *D11.7*
- Sublinguale ¬ *D11.7*
- Submandibulaire associée à IgG4 ¬ Maladie de la *K11.2*
- Sudoripare ¬
- - Tumeur maligne des *C44*
- - Tumeurs bénignes de: *D23*
- Tarsiennes ¬ Abcès des *H00.0*

Glande *–suite*
- Trachéo-bronchiques ¬ Tuberculose des *A16.3*
- ¬ Maladie due au VIH avec gonflement des *B23.8, R59.9*

Glande de Bartholin
- Glande vestibulaire principale] ¬ *C51.0*
- Sans précision ¬ Affection de la *N75.9*
- ¬
- - Abcès
- - - *N75.1*
- - - Gonococcique des *A54.1*
- - Affections de la *N75.8*
- - Kyste de la *N75.0*

Glande de Cowper ¬
- Abcès de *N34.0*
- Abcès tuberculeux de la *A18.1†, N51.8**
- Tuberculose de la *A18.1†, N51.8**

Glande endocrine
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies d'autres *E35.8**
- Métabolisme ¬ Affections (des): *Z13.8*
- Précisées ¬ Tumeur bénigne: Autres *D35.7*
- Sans précision ¬
- - Tumeur bénigne: *D35.9*
- - Tumeur maligne: *C75.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D44.9*
- ¬
- - Carcinoma in situ: Thyroïde et autres *D09.3*
- - Malformations congénitales des autres *Q89.2*
- - Tuberculose des *A18.8†, E35.8**

Glande lacrymale
- Canal lacrymal ¬
- - Tumeur bénigne: *D31.5*
- - Tumeur maligne: *C69.5*
- Ichtyose-xérostomie] ¬ Syndrome HELIX [hypohidrose-déséquilibre électrolytique-dysfonctionnement des *Q87.8*
- ¬
- - Affections des *H04.1*
- - Atrophie de la *H04.1*
- - Hypertrophie chronique de la *H04.0*
- - Kyste de la *H04.1*
- - Syphilis des *A52.7†, H06.0**

Glande parathyroïde
- Sans précision ¬ Maladie de la *E21.5*
- Thyroïde ¬ Malformation congénitale de la *Q89.2*
- ¬
- - Hyperplasie de la *E21.0*
- - Maladies précisées de la *E21.4*
- - Ostéite au cours d'une affection de la *E21.0†, M90.89**
- - Ostéodystrophie

Glande parathyroïde *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ostéodystrophie *–suite*
- - - Cours d'une affection de la *E21.0†, M90.89**
- - - Secondaire au cours d'une affection de la *E21.1†, M90.89**
- - Tuberculose de la *A18.8†, E35.8**

Glande parotide ¬
- Adénome pléomorphe de la *D11.0*
- Carcinome de la *C07*
- Tuberculose de la *A18.8†, K93.8**
- Tumeur bénigne: *D11.0*

Glande pinéale
- Épiphyse] ¬ Dysfonctionnement de la *E34.8*
- ¬
- - Choriocarcinome de la *C75.3*
- - Tumeur bénigne: Épiphyse [*D35.4*
- - Tumeur maligne: Épiphyse [*C75.3*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Épiphyse [*D44.5*

Glande salivaire
- Accessoire, siège non précisé ¬ *C06.9*
- Accessoires SAI ¬ *D10.3*
- Canal excréteur ¬
- - Calcul des *K11.5*
- - Lithiase des *K11.5*
- Cours d'une réaction à des dépôts d'iode ¬ Inflammation des *K11.2*
- Lacrymales [ALSG] ¬ Aplasie des *Q10.4, Q38.4*
- Localisations contiguës ¬ Carcinome
- - Mammaire, type *C50.8*
- - Œsophage type *C15.8*
- Principale
- - Accessoires ¬ *D37.0*
- - Sans précision ¬ Tumeur bénigne: *D11.9*
- - ¬
- - - Tumeur bénigne: Autres *D11.7*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des *C08.8*
- Sans précision ¬ Maladie des *K11.9*
- ¬
- - Abcès des *K11.3*
- - Atrophie des *K11.0*
- - Cancer du sein type *C50.9*
- - Carcinome
- - - Mamelon de type *C50.0*
- - - Œsophage
- - - - Abdominal de type *C15.2*
- - - - Cervical, type *C15.0*
- - - - Thoracique, type *C15.1*
- - - - Type *C15.9*
- - - Prolongement axillaire du sein de type *C50.6*
- - - Quadrant
- - - - Inféro-externe du sein de type *C50.5*

Glande salivaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carcinome *–suite*
- - - Quadrant *–suite*
- - - - Inféro-interne du sein de type *C50.3*
- - - - Supéro-externe du sein de type *C50.4*
- - - - Supéro-interne du sein de type *C50.2*
- - - Tiers
- - - - Inférieur de l'œsophage de type *C15.5*
- - - - Moyen de l'œsophage de type *C15.4*
- - - - Supérieur de l'œsophage de type *C15.3*
- - Fistule congénitale des *Q38.4*
- - Fistule des *K11.4*
- - Hypertrophie des *K11.1*
- - Kyste muqueux
- - - Épanchement des *K11.6*
- - - Rétention des *K11.6*
- - Lésion lympho-épithéliale bénigne des *K11.8*
- - Maladie due au VIH avec maladie des *B23.8, K11.9*
- - Maladies des *K11.8*
- - Mucocèle des *K11.6*
- - Tuberculose des *A18.8†, K93.8**
- - Tumeur épithéliale
- - - Bénigne des *D11.9*
- - - Maligne des *C07*

Glande sous-mandibulaire ¬
- Sialadénite chronique sclérosante de la *K11.2*
- Tumeur épithéliale maligne de la *C08.0*
- Tumeur maligne: *C08.0*

Glande sublinguale ¬
- Tumeur bénigne de la *D11.7*
- Tumeur épithéliale
- - Bénigne de la *D11.7*
- - Maligne de la *C08.1*
- Tumeur maligne: *C08.1*

Glande sudoripare
- Apocrine
- - Sans précision ¬ Affection des *L75.9*
- - ¬ Autres affections des *L75.8*
- Exocrines
- - Sans précision ¬ Affection des *L74.9*
- - ¬ Autres affections des *L74.8*
- Normales ¬ Anhidrose isolée généralisée avec *L74.4*
- SAI ¬ Affection des *L74.9*

Glande surrénale
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies de la *E35.1**
- Sans précision ¬ Maladie de la *E27.9*
- ¬
- - Calcification tuberculeuse de la *B90.8†, E35.1**
- - Maladies précisées de la *E27.8*
- - Tuberculose de la *A18.7†, E35.1**

Glande surrénale *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne secondaire de la *C79.7*

Glande thyroïde
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies de la *E35.0**
- ¬ Syphilis tardive de la *A52.7†, E35.0**

Glande urétrale ¬
- Abcès (de): urétral (*N34.0*
- Tumeur maligne: *C68.1*

Glande vestibulaire principale] ¬ Glande de Bartholin [*C51.0*

Glandulaire
- Central sein ¬
- - Adénocarcinome
- - - Apocrine du corps *C50.1*
- - - Tubulaire du corps *C50.1*
- - Carcinome mucineux du corps *C50.1*
- Endomètre ¬ Hyperplasie *N85.0*
- ¬
- - Chéilite *K13.0*
- - Hypospadias: *Q54.0*
- - Tularémie ulcéro- *A21.0*

Glandulo-kystique ¬ Hyperplasie de l'endomètre: *N85.0*

Glanzmann ¬ Thrombasthénie de *D69.1*

Glass ¬ Syndrome de *Q93.5*

Glaucomateuses (sous-capsulaires) ¬ Opacités *H26.2*

Glaucomatocyclitiques ¬ Maladie à crises *H40.4*

Glaucome
- Absence de sinus frontaux ¬ Syndrome de microcornée- *Q15.0, Q13.4*
- Absolu ¬ *H44.5*
- Angle fermé primitif
- - Résiduel
- - - Aigu ¬ *H40.2*
- - - Chronique ¬ *H40.2*
- - - Intermittent ¬ *H40.2*
- - - Retardé ¬ *H40.2*
- - ¬ *H40.2*
- Aniridie ¬ *Q13.1†, H42.8**
- Apnée du sommeil ¬ Syndrome de *H40.9, G47.39*
- Basse tension ¬ *H40.18*
- Blocage pupillaire ¬ *H40.2*
- Capsulaire
- - Pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ *H40.10*
- - ¬ *H40.18*
- Chronique
- - Non congestif ¬ *H40.18*
- - Primitif ¬ *H40.18*
- - ¬ *H40.18*
- Congénital
- - Fibrose hépatique-polykystose rénale ¬ Syndrome de diabète néonatal-hypothyroïdie congénitale- *Q87.8*

Glaucome *–suite*
- Congénital *–suite*
- - ¬
- - - *Q15.0*
- - - Macrophtalmie au cours d'un *Q15.0*
- Cours
- - Amylose ¬ *E85.9†, H42.0**
- - Maladie
- - - Endocrinienne NCA ¬ *E34.9†, H42.0**
- - - Métabolique NCA ¬ *E88.9†, H42.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H42.8**
- - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *H42.0**
- - Syndrome de Lowe ¬ *E72.0†, H42.0**
- Cyclitique] ¬ Syndrome de Posner-Schlossmann [*H40.4*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de paraplégie spastique- *G11.4*
- Dispersion pigmentaire ¬ *H40.18*
- Ectopie du cristallin-sphérophakie-raideur articulaire-petite taille] ¬ Syndrome GEMSS [*Q87.1*
- Infantile ¬ *Q15.0*
- Juvénile ¬ *Q15.0*
- Limite ¬ *H40.0*
- Lors de syndrome de Rieger ¬ *Q13.8†, H42.8**
- Médicamenteux ¬ *H40.6*
- Néovasculaire ¬ *H40.5*
- Néovascularisation
- - Cours rétinopathie diabétique diabète sucré type
- - - 1 ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - 2 ¬ *E11.30†, H36.0**
- - Rétinopathie diabétique ¬ *E14.30†, H36.0**
- Nouveau-né ¬ *Q15.0*
- PEX [glaucome pseudo-exfoliatif] ¬ *H40.10*
- Phakolitique ¬ *H40.5*
- Pigmentaire
- - Primaire résiduel ¬ *H40.18*
- - Résiduel ¬ *H40.18*
- - ¬ *H40.18*
- Pression normale ¬ *H40.18*
- Primaire
- - Angle ouvert ¬ *H40.18*
- - Capsulaire résiduel avec pseudo-exfoliation du cristallin ¬ *H40.10*
- Primitif
- - Angle
- - - Étroit ¬ *H40.2*
- - - Ouvert ¬ *H40.1*
- - Capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ *H40.10*
- Pseudo-exfoliatif ¬
- - *H40.10*
- - Glaucome PEX [*H40.10*
- Pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ *H40.10*

Glaucome *–suite*
- Résiduel ¬ Augmentation modérée de la pression intraoculaire due à un *H40.18*
- Sans
- - Augmentation de la pression intraoculaire ¬ *H40.18*
- - Précision ¬ *H40.9*
- Secondaire
- - Affections oculaires ¬ *H40.5*
- - Inflammation de l'œil ¬ *H40.4*
- - Pression veineuse épisclérale élevée ¬ *H40.5*
- - Sphérophakie/ectopie du cristallin et mégalocornée ¬ *Q15.8*
- - Traumatisme oculaire ¬ *H40.3*
- Simple ¬ *H40.18*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, H42.8**
- Traumatique dû (due) à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.3*
- Tuberculeux ¬ *A18.5†, H42.8**
- ¬
- - *H40.8*
- - Cicatrisation post-chirurgicale du *H59.8*
- - Kératoglobe congénital avec *Q15.0*
- - Macrocornée avec *Q15.0*
- - Mégalocornée avec *Q15.0*
- - Syndrome
- - - Cataracte - *Q12.0, H40.9*
- - - Dégénérescence rétinienne-microphtalmie- *H35.5†, H42.8*, Q11.2*

Glaudemans ¬ Hypomagnésémie isolée autosomique dominante type *E83.4*

Gléno huméral
- SAI ¬ Luxation de l'épaule [articulation *S43.00*
- Supérieur) (moyen) (inférieur) ¬ Ligament *S43.4*

Glénoïde et col de l'omoplate ¬ Fracture de l'omoplate: Cavité *S42.14*

Gliales pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à sphéroïdes axonaux et cellules *E75.2*

Glioblastome
- Cellule géante
- - Cerveau ¬ *C71.0*
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - ¬ *C71.9*
- Cérébral au cours de syndrome de Lynch ¬ *C71.9*
- Cerveau ¬
- - *C71.0*
- - *C71.9*

Glioblastome *–suite*
- Cervelet ¬ *C71.6*
- Cours du syndrome du déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements [CMMRD] ¬ *C71.9*
- Épendymaire ¬ *C71.9*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*
- Multiforme ¬ *C71.9*
- Système nerveux ¬ *C72.9*
- Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬ *C71.5*

Glioépendymaire/épendymaire ¬ Kyste *Q04.6*

Gliomatose cérébrale ¬ *C71.0*

Gliome
- Angiocentrique
- - Encéphale ¬ *D33.0*
- - ¬ *D33.9*
- Cerveau ¬ *C71.9*
- Chordoïde ¬ *C71.5*
- Hémisphérique de type infantile ¬ *C71.0*
- Infiltrant du tronc cérébral ¬ *C71.7*
- Malin
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Encéphale, à localisations contiguës ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Œil ¬ *C69.9*
- - ¬ *C71.9*
- Nasal ¬ *Q30.8*
- Nerf optique ¬ *D33.3*
- Papillon ¬ *C71.9*
- Sous-épendymaire ¬ *D43.2*
- Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- Voies optiques ¬ *D33.3*
- ¬ *C71.9*

Glioneuronale
- Formant des rosettes ¬ Tumeur *D43.2*
- Papillaire ¬ Tumeur *D43.2*

Gliosarcome
- Cerveau ¬ *C71.0*
- Cervelet ¬ *C71.6*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*
- Tronc cérébral ¬ *C71.7*

Gliosarcome *–suite*
- ¬ *C71.9*

Gliose épirétinienne ¬ *H35.38*

Glissement
- Cardia à travers le hiatus œsophagien ¬ *Q40.1*
- Ligature ombilicale SAI ¬ *P51.8*
- Sans partie cutanée ¬ Rejet d'une mammoplastie par plastie de *T86.84*
- ¬ Syndrome de *R54*

Globe
- Oculaire
- - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du *S05.5*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du corps vitré et du *H45.8**
- - Excroissance préauriculaire-polythélie ¬ Syndrome de lipodermoïde du *Q18.2*
- - Sans
- - - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du *S05.6*
- - - Précision ¬ Affection du *H44.9*
- - Tissus de l'orbite ¬ Contusion du *S05.1*
- - ¬
- - - *C69.9*
- - - *D31.9*
- - - Affections
- - - - *H44.8*
- - - - Dégénératives du *H44.3*
- - - Atrophie du *H44.5*
- - - Brûlure provoquant la rupture et la destruction du *T26.2*
- - - Corrosion provoquant la rupture et la destruction du *T26.7*
- - - Dégénérescence du *H44.5*
- - - Luxation du *H44.8*
- - - Mélanocytome du *D31.9*
- - - Phtisie du *H44.5*
- - - Rétention (ancienne) de corps étranger magnétique dans: paroi postérieure du *H44.6*
- SAI ¬ Déplacement (latéral) du *H05.2*

Globoïdes ¬ Leucodystrophie à cellules *E75.2*

Globule
- Blancs, non classées ailleurs ¬ Anomalies des *R72*
- Rouge
- - Adulte ¬ Aplasie pure des *D60.0*
- - ¬
- - - Anémie hémolytique due à un déficit en pyruvate kinase du *D55.2*
- - - Anomalies des *R71*

Globuline
- AC (accélératrice) ¬ Déficit héréditaire en *D68.22*
- Anti-hémophilique NCA ¬ Déficit en *D66*
- Fixant le cortisol ¬ Déficit de la *E27.8*

Globuline *–suite*
- ¬
- - Anomalie de la *R77.1*
- - Carence en AC- *D68.22*
- - Inversion du rapport albumine- *E88.08*

Glomangiome ¬ *D18.00*

Glomangiosarcome ¬ *C49.9*

Glomérulaire
- Cours
- - Amylose ¬ Maladie *E85.9†, N08.4**
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Maladie *D65.1†, N08.2**
- - Drépanocytose ¬ Maladie *D57.8†, N08.2**
- - Macroglobulinémie de Waldenström ¬ Trouble *C88.00†, N08.1**
- - Malaria quartana ¬ Maladie *B52.0†, N08.0**
- - Myélome multiple ¬ Trouble *C90.00†, N08.1**
- - Périartérite noueuse ¬ Maladie *M30.0†, N08.5**
- - Plasmocytome en rémission complète ¬ Maladie *C90.01†, N08.1**
- - Purpura de Schoenlein-Henoch ¬ Maladie *D69.0†, N08.2**
- - Sepsis NCA ¬ Maladie *A41.9†, N08.0**
- - Strongyloïdose ¬ Maladie *B78.9†, N08.0**
- - Syndrome
- - - Défibrination ¬ Maladie *D65.9†, N08.2**
- - - Goodpasture ¬ Néphrite à anticorps anti-MBG [membrane basale *M31.0†, N08.5**
- - - Hémolytique urémique ¬ Maladie *D59.3†, N08.2**
- - Syphilis ¬ Maladie *A52.7†, N08.0**
- Prolifératives ¬ Néphropathie à IgA [Immunoglobuline A] avec lésions *N02.8*
- Virus d'Epstein-Barr ¬ Maladie *B27.0†, N08.0**
- Virus de l'herpès ¬ Maladie *B00.8†, N08.0**
- ¬ Maladie des anticorps anti-membrane basale *M31.0†, N08.5**

Glomérulonéphrite
- Aiguë ¬ *N00*
- Chronique ¬ *N03*
- Cours
- - Amylose ¬ *E85.9†, N08.4**
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *D65.1†, N08.2**
- - Cryoglobulinémie ¬ *D89.1†, N08.2**
- - Déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase ¬ *E78.6†, N08.4**
- - Endocardite bactérienne sub-aiguë ¬ *I33.0†, N08.8**
- - Granulomatose
- - - Polyangéite ¬ *M31.3†, N08.5**
- - - Wegener ¬ *M31.3†, N08.5**
- - Lupus érythémateux disséminé
- - - Enfant ¬ *M32.1†, N08.5**
- - - ¬ *M32.1†, N08.5**

Glomérulonéphrite *–suite*
- Cours *–suite*
- - Macroglobulinémie de Waldenström ¬ *C88.00†, N08.1**
- - Myélome multiple ¬ *C90.00†, N08.1**
- - Périartérite noueuse ¬ *M30.0†, N08.5**
- - Purpura
- - - Schoenlein-Henoch ¬ *D69.0†, N08.2**
- - - Thrombotique-thrombocytopénique ¬ *M31.1†, N08.5**
- - Sepsis
- - - Streptocoques ¬ *A40.9†, N08.0**
- - - ¬ *A41.9†, N08.0**
- - Strongyloïdose ¬ *B78.9†, N08.0**
- - Syndrome
- - - Défibrination ¬ *D65.9†, N08.2**
- - - Hémolytique urémique ¬ *D59.3†, N08.2**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, N08.0**
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ *E10.20†, N08.3**
- - - 2 ¬ *E11.20†, N08.3**
- - ¬ *E14.20†, N08.3**
- Évolution rapide ¬ *N01*
- Extra membraneuse primitive ¬ *N05.2*
- Habitus marfanoïde ¬ Syndrome de microcéphalie, *Q87.8*
- IgA en croissant ¬ *N02.7*
- Membranoprolifération
- - Médiée par les immunoglobulines ¬ *N05.5*
- - ¬ Syndrome d'hypotrichose-lymphœdème-télangiectasie- *Q87.8*
- Pauci immun
- - ANCA [Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles] ¬ *N01.7*
- - ¬ *N01.7*
- Plasmodium malariae ¬ *B52.0†, N08.0**
- Proliférative diffuse au cours de lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, N08.5**
- SAI ¬ *N05*
- Sclérosante diffuse, sans précision ¬ *N18.9*

Glomérulopathie
- Aiguë ¬ *N00*
- Chronique ¬ *N03*
- Cours
- - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ *N08.5**
- - Bilharziose ¬ *B65.0†, N08.0**
- - Cryoglobulinémie ¬ *D89.1†, N08.2**
- - Déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase ¬ *E78.6†, N08.4**
- - Granulomatose
- - - Polyangéite ¬ *M31.3†, N08.5**
- - - Wegener ¬ *M31.3†, N08.5**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, N08.5**
- - Macroglobulinémie Waldenström
- - - Rémission complète ¬ *C88.01†, N08.1**

Glomérulopathie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Macroglobulinémie Waldenström *–suite*
- - - ¬ *C88.00†, N08.1**
- - Maladie de Fabry-Anderson ¬ *E75.2†, N08.4**
- - Maladies
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *N08.4**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *N08.0**
- - - Sang et des anomalies du système immunitaire ¬ *N08.2**
- - - Tumorales ¬ *N08.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *N08.8**
- - Myélome multiple ¬ *C90.00†, N08.1**
- - Oreillons ¬ *B26.8†, N08.0**
- - Plasmocytome ¬ *C90.00†, N08.1**
- - Purpura thrombocytopénique thrombotique ¬ *M31.1†, N08.5**
- - Sepsis
- - - Fongique ¬ *B48.80†, N08.0**
- - - Protozoaires ¬ *B60.80†, N08.0**
- - Septicémie
- - - Bactérienne ¬ *A41.9†, N08.0**
- - - Virale ¬ *B34.80†, N08.0**
- - Syndrome de Goodpasture ¬ *M31.0†, N08.5**
- Dépôt
- - Collagène de type III ¬ *N07.6*
- - Fibronectine ¬ *N07.6*
- Évolution rapide ¬ *N01*
- Fibrillaire non amyloïde ¬ *N03.8*
- Immunotactoïde ¬ *N03.6*
- Lipoprotéines ¬ *N07.8*
- Membraneuse idiopathique ¬ *N05.2*
- SAI ¬ *N05*

Glomérulosclérose
- Diabétique diabète sucré type
- - 1 ¬ *E10.20†, N08.3**
- - 2 ¬ *E11.20†, N08.3**
- Extracapillaire diabétique ¬ *E14.20†, N08.3**
- Intercapillaire ¬ *E14.20†, N08.3**
- Segmentaire focale ¬ Syndrome néphrotique idiopathique cortico-sensible avec *N04.1*
- ¬ Diabète sucré avec *E14.20†, N08.3**

Glomus
- Aortique paraganglions ¬
- - Tumeur bénigne: *D35.6*
- - Tumeur maligne: *C75.5*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D44.7*
- Poumon ¬ Tumeur du *D18.08*
- Tissu sous-cutané ¬ Tumeur du *D18.01*
- ¬ Tumeur du *D18.00*

Glomuveineuse ¬ Malformation *D18.00*

Glossalgie ¬ *K14.6*

Glossite
- Aspergillus ¬ *B44.8*
- Atrophique ¬ *K14.4*
- Cours de pellagre ¬ *E52†, K93.8**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, K93.8**
- Exfoliatrice marginée ¬ *K14.1*
- Losangique médiane ¬ *K14.2*
- Migratoire bénigne ¬ *K14.1*
- Möller Hunter due à une carence en vitamine B ¬ *E53.9†, K93.8**
- Syphilitique interstitielle ¬ *A52.7†, K93.8**
- ¬
- - *K14.0*
- - Anémie pernicieuse avec *D51.0*

Glosso épiglottique
- S) ¬ Pli(s) *C10.1*
- ¬ Tumeur maligne: Sillon *C10.0*

Glossodynie ¬ *K14.6*

Glossopalatine ¬ Ankylose *Q87.5*

Glossopathie SAI ¬ *K14.9*

Glossopharyngien
- IX] ¬ Nerf: *S04.8*
- ¬
- - Affection du nerf *G52.1*
- - Névralgie du nerf *G52.1*

Glossopyrosis ¬ *K14.6*

Glotte
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Tuberculose de *A15.5*
- Larynx cartilage thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la *Q31.8*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde de la *C32.0*
- - Léiomyosarcome de la *C32.0*
- - Œdème (de la): *J38.4*
- - Paralysie de la *J38.0*
- - Tuberculose de *A16.4*
- - Tumeur neuroendocrine maligne de la *C32.0*

Glottique
- Larynx ¬ Membrane *Q31.0*
- ¬ Ptérygion du larynx: *Q31.0*

GLRX5 ¬ Anémie sidéroblastique associée à *D64.0*

Glucagon ¬
- Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec hypersécrétion de *E16.3*
- Hypersécrétion de *E16.3*

Glucagonome
- Bénin du pancréas ¬ *D13.7*
- Incertain ¬ *D37.70*
- Pancréatique incertain ¬ *D37.70*
- ¬ *C25.4*

Glucides
- Fœtus nouveau-né
- - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du métabolisme des *P70.9*
- - ¬ Autres anomalies transitoires du métabolisme des *P70.8*
- ¬ Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*

Gluco-aminophosphaté ¬ Diabète *E72.0*

Glucoamylase ¬ Diarrhée chronique associée à un déficit en *E74.3*

Glucocérébrosidase ¬ Déficit en *E75.2*

Glucocorticoïdes
- Analogues synthétiques ¬ Intoxication: *T38.0*
- Usage topique ¬ *T49*
- ¬
- - Déficit isolé familial en *E27.1*
- - Hyperaldostéronisme pouvant être traité par des *E26.0*
- - Hypertension sensible aux *E26.0*
- - Syndrome de résistance généralisée aux *E25.8*

Glucoglycinurie ¬ *E72.5*

Glucokinase ¬
- Hyperinsulinisme
- - Congénital lié à la *E16.1*
- - Déficit en *E16.1*
- Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en *E16.1*

Gluconéogenèse ¬
- Anomalie de la *E74.4*
- Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la *E74.4*

Glucosamine N-acétyl-6-sulfatase ¬ Déficit en *E76.2*

Glucosaminide
v./v.a. héparane-alpha-glucosaminide

Glucosaminoglycanes
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E76.9*
- ¬ Autres anomalies du métabolisme des *E76.8*

Glucose
- Réduite ¬ Tolérance au *R73.08*
- ¬
- - Anomalie
- - - Épreuve de tolérance au *R73.08*
- - - Transport du *E74.8*
- - Diminution de la tolérance au *R73.08*
- - Faible tolérance au *R73.08*

Glucose-6-phosphatase ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Glucose-6-phosphate déshydrogénase
- Classe I ¬ Déficit en *D55.0*
- G6PD] ¬ Anémie due à une carence en *D55.0*
- G6PDH] ¬ Déficit en *E74.8*

Glucose-galactose ¬
- Intolérance congénitale au *E74.3*
- Malabsorption *E74.3*

Glucosidase
v./v.a. alpha-1,4-glucosidase
v./v.a. amylo-1,6-glucosidase
- 1 ¬ Déficit en *E77.8*

Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire ¬ Intoxication: *T46.0*

Glucosurie rénale
- Familiale ¬ *E74.8*
- ¬ Syndrome de cataracte juvénile-microcornée- *E88.8*

Glucosyltransférase
- 1 ¬ Déficit en *E77.8*
- 2 ¬ Déficit en *E77.8*

Glucuronosyltransférase
- Type
- - 1 ¬ Déficit en bilirubine uridine-diphosphate *E80.5*
- - 2 ¬ Déficit en bilirubine uridine-diphosphate *E80.5*
- ¬ Déficit en bilirubine uridine-diphosphate *E80.5*

Glucuronyltransférase ¬ Déficit en *E80.5*

GLUT1 ¬ Encéphalopathie par déficit en *E74.8†, G94.30*, G40.4*

GLUT2 ¬
- Glycogénose par déficit en *E74.0*
- GSD par déficit en *E74.0*

Glutamate
v./v.a. aspartate-glutamate
- Cystéine ligase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.1*
- Formiminotransférase ¬ Déficit en *E70.8*

Glutamate-aspartate ¬ Défaut de transport du *E72.0*

Glutaminase ¬
- Ataxie spastique-dysarthrie par déficit en *E72.8, G11.8*
- Encéphalopathie épileptique néonatale par déficit en *E72.8, G40.4*

Glutamine
- Synthétase ¬
- - Déficit héréditaire en *E72.8*
- - Dysgénésie cérébrale congénitale par déficit en *E72.8*
- ¬ Trouble du métabolisme de la *E72.8*

Glutaracidurie ¬ *E72.3*

Glutarique type
- 1 ¬
- - Acidémie *E72.3*
- - Acidurie *E72.3*
- 2 ¬
- - Acidémie *E71.3*
- - Acidurie *E71.3*
- 3 ¬ Acidurie *E72.3*

Glutaryl-CoA
- Déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.3*

Glutaryl-CoA *–suite*
- Oxydase ¬ Déficit en *E72.3*

Glutathion
- Réductase
- - GGS-R] ¬ Anémie par déficit en *D55.1*
- - ¬
- - - Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.1*
- - - Anémie par déficit en *D55.1*
- Synthétase ¬ Déficit en *D55.1*
- ¬
- - Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du *D55.1*
- - Taux réduit de *R79.8*

Glutathionurie ¬ *E72.8*

Gluten ¬
- Entéropathie sensible au *K90.0*
- Intolérance au *K90.0*
- Sensibilité non cœliaque au *K90.4*

Glycémie ¬ Augmentation de la *R73*

Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬
- Anémie due à une déficience en *D55.2*
- Anémie hémolytique due à une carence en *D55.2*

Glycérol kinase ¬ Déficit isolé en *E74.8*

Glycine
- Amidinotransférase ¬ Déficit en l-arginine: *E72.8*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme de la *E72.5*
- - Trouble du métabolisme de la *E72.5*

Glycinémie cétosique ¬ *E71.1*

Glycine-N-méthyltransférase ¬ Hyperméthioninémie provoquée par un déficit en *E72.1*

Glycinique ¬ Encéphalopathie *E72.5*

Glycinurie ¬
- *E72.0*
- 3-méthylcrotonyl *E71.1*

Glycogène
- Foie ¬ Infiltration de *E74.0†, K77.8**
- Phosphorylase musculaire ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*
- Synthase hépatique ¬
- - Déficit en *E74.0*
- - GSD par déficit en *E74.0*
- ¬
- - Cardiomyopathie hypertrophique congénitale létale par maladie de stockage du *E74.0†, I43.1**
- - GSD [Maladie de stockage du *E74.0*
- - Infiltration de *E74.0*
- - Myopathie au cours d'anomalies de stockage du *E74.0†, G73.6**

Glycogenica
- Diffusa ¬ Hepatomegalia *E74.0†, K77.8**
- ¬ Hepatonephromegalia *E74.0*

Glycogénine ¬ Glycogénose avec cardiomyopathie sévère par déficit en *E74.0†, I43.1**

Glycogénique
- Cœur ¬ Maladie *E74.0†, I43.1**
- Déficit
- - Myophosphorylase ¬ Maladie *E74.0*
- - Phosphoglycérate kinase 1 ¬ Maladie *E74.0*
- Foie et des reins ¬ Maladie *E74.0*
- ¬
- - Cardiomégalie au cours de maladie *E74.0†, I43.1**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladie *E74.0†, N16.3**
- - Pyélonéphrite au cours de maladie *E74.0†, N16.3**

Glycogénose
- Bickel-Fanconi ¬ *E74.0*
- Cardiaque ¬ *E74.0†, I43.1**
- Cardiomyopathie sévère par déficit en glycogénine ¬ *E74.0†, I43.1**
- Cirrhose du foie ¬ *E74.0*
- Déficit
- - Aldolase A musculaire ¬ *E74.0*
- - Bêta-énolase musculaire ¬ *E74.0*
- - Enzyme branchante forme
- - - Hépatique non progressive ¬ *E74.0*
- - - Neuromusculaire périnatale fatale ¬ *E74.0*
- - Glucose-6-phosphatase ¬ *E74.0*
- - GLUT2 ¬ *E74.0*
- - Glycogène phosphorylase musculaire ¬ *E74.0*
- - Lactate déshydrogénase ¬ *E74.4*
- - LAMP-2 ¬ *E74.0*
- - Maltase acide ¬ *E74.0*
- - PhK ¬ *E74.0*
- - Phosphofructokinase musculaire ¬ *E74.0*
- - Phosphoglucomutase ¬ GSD [*E74.0*
- - Phosphoglycérate mutase ¬ *E74.0†, G73.6**
- - Phosphorylase
- - - Hépatique ¬ *E74.0*
- - - Kinase
- - - - Hépatique et musculaire ¬ *E74.0*
- - - - ¬ *E74.0*
- Hépato-rénale ¬ *E74.0*
- Interstitielle pulmonaire ¬ *P22.8*
- Lysosomale à activité maltase acide normale ¬ *E74.0*
- Type
- - 2 à début infantile ¬ *E74.0*
- - 4
- - - Adulte, forme neuromusculaire ¬ *E74.0*
- - - Enfant forme
- - - - Hépatique et myopathique ¬ *E74.0*
- - - - Neuromusculaire ¬ *E74.0*

Glycogénose *–suite*
- Type *–suite*
- - 4 *–suite*
- - - Forme
- - - - Hépatique
- - - - - Non progressive ¬ *E74.0*
- - - - - Progressive ¬ *E74.0*
- - - - Neuromusculaire périnatale fatale ¬ *E74.0*
- - 15 ¬ *E74.0†, I43.1**
- - ¬
- - *E74.0*
- - Syndrome de Wagner-Parnas [Forme hépatique de la *E74.0*

Glycol ¬
- Effet toxique
- - *T52.3*
- - Éthylène *T52.3*
- Solvants du groupe: *L24.2*

Glycolipoïde ¬ Lipidose *E75.2*

Glycolique ¬ Acidurie *E74.8*

Glycolytiques ¬
- Anémie due à des anomalies des enzymes *D55.2*
- Anomalie des enzymes *E74.8*

Glycopeptides
- Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux *U80.20!*
- Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecium résistant aux *U80.30!*
- Oxazolidinones streptogramines ¬
- - Enterococcus faecalis résistant aux *U80.20!*
- - Enterococcus faecium résistant aux *U80.30!*
- Quinolones streptogramines oxazolidinones
- - Non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux *U80.01!*
- - ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline et le cas échéant aux *U80.00!*
- ¬
- - Enterococcus faecalis résistant
- - - *U80.20!*
- - - Oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux *U80.21!*
- - Enterococcus faecium résistant
- - - *U80.30!*
- - - Oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au *U80.31!*

Glycoprotéine
- Déficientes hydrates carbone
- - Type IIf ¬ Syndrome des *E77.8*
- - ¬ Syndrome des *E77.8*
- Induite par déficience NGLY1 ¬ Anomalie congénitale de la biosynthèse des *E77.8*

Glycoprotéine *–suite*
- Liée à ATP6AP1 ¬ Anomalie congénitale de la biosynthèse des *E77.8*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E77.9*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme des *E77.8*
- - Défaut dégradation
- - - *E77.1*
- - - *E77.1*
- - Thrombophilie héréditaire due au déficit congénital en histidine-rich (poly-L) *D68.5*

Glycosurie
- Rénale ¬ *E74.8*
- ¬ *R81*

Glycosylation
- Associée à PGM3 ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- Congénitale associée au COG2 ¬ Maladie de *E77.8*
- Déficit
- - PIGG ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - PIGM ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- Type
- - IIs ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - IIv ¬
- - - Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - - Syndrome CDG [trouble congénital de la *E77.8*
- ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*

Glycosylphosphatidylinositol HDL 1] ¬ Déficit familial en GPIHBP1 [protéine de liaison *E78.3*

Glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme ¬ Ictère dû à un retard de la *P59.0*

Glyoxylate
v./v.a. alanine-glyoxylate

GM [marqueur de chaînes Gamma] ¬ Gangliosidose *E75.1*

GM1
- Adulte ¬ Gangliosidose à *E75.1*
- Infantile ¬ Gangliosidose à *E75.1*
- Juvénile ¬ Gangliosidose à *E75.1*
- Type
- - 1 ¬ Gangliosidose à *E75.1*
- - 2 ¬ Gangliosidose à *E75.1*
- - 3 ¬ Gangliosidose à *E75.1*

GM2
- Adulte ¬ Gangliosidose *E75.0*
- Juvénile ¬ Gangliosidose *E75.0*
- SAI ¬ Gangliosidose *E75.0*
- Variant AB ¬ Gangliosidose à *E75.0*
- Variants B, B1 ¬ Gangliosidose à *E75.0*
- ¬ Gangliosidose *E75.0*

GM3
- Synthase ¬ Déficit en *E77.8*
- ¬ Gangliosidose *E75.1*

GMSI] ¬ Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [*D47.2*

GNAO1 ¬ Retard de développement neurologique lié à *G93.4*

Gnatho-diaphysaire ¬ Dysplasie *Q78.8*

Gnathostomiase ¬ *B83.1*

Goitre
- Congénital
- - Non toxique
- - - Parenchymateux ¬ *E03.0*
- - - SAI ¬ *E03.0*
- - Transitoire avec fonction thyroïdienne normale ¬ *P72.0*
- Diffus
- - Endémique) lié à une carence en iode ¬ *E01.0*
- - Non toxique ¬ *E04.0*
- - ¬
- - - Hypothyroïdie congénitale, avec *E03.0*
- - - Thyréotoxicose avec *E05.0*
- Endémique
- - Lié à une carence en iode, sans précision ¬ *E01.2*
- - SAI ¬ *E01.2*
- Exophtalmique ou toxique SAI ¬ *E05.0*
- Familial dû à un trouble de l'hormonosynthèse ¬ *E07.1*
- Kystique SAI ¬ *E04.2*
- Multinodulaire
- - Endémique) lié à une carence en iode ¬ *E01.1*
- - Familial ¬ Syndrome de *E04.2*
- - Kystique) SAI ¬ *E04.2*
- - Non toxique ¬ *E04.2*
- - Rein kystique-polydactylie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Toxique ¬ Thyréotoxicose avec *E05.2*
- Néonatal ¬ *P72.0*
- Nodulaire
- - Lié à une carence en iode ¬ *E01.1*
- - Non toxique) SAI ¬ *E04.9*
- - Toxique SAI ¬ *E05.2*
- Non
- - Toxique
- - - Diffus (colloïde) ¬ *E04.0*
- - - Sans précision ¬ *E04.9*
- - - Simple ¬ *E04.0*
- - Toxiques précisés ¬ Autres *E04.8*
- SAI ¬ *E04.9*
- Thyroïdien ¬ *Q89.2*
- Toxique diffus ¬ *E05.0*
- Trouble de l'hormonosynthèse ¬ *E07.1*
- Uninodulaire
- - Non toxique ¬ *E04.1*
- - Toxique ¬ Thyréotoxicose avec *E05.1*
- ¬
- - Crétinisme sans *E00.9*
- - Exophtalmie au cours de *E05.0†, H06.2**

Goitre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hypothyroïdie congénitale sans *E03.1*

Golabi
v./v.a. Simpson-Golabi-Behmel

Golabi-Ito-Hall ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Goldberg
v./v.a. Shprintzen-Goldberg

Goldberg-Shprintzen avec mégacôlon] ¬ GOSHS [Syndrome de *Q87.8*

Goldblatt
v./v.a. Wallis-Zieff-Goldblatt
- ¬
- - Chondrodysplasie de *Q78.8*
- - Rein de *I70.1*

Goldblatt-Wallis ¬ Syndrome de *Q87.8*

Golden ¬ Dysplasie spondylo-métaphysaire type *Q77.8*

Goldenhar
- Dysplasia oculo-auriculo-vertebralis] ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬ Syndrome de *Q87.0*

Goldmann-Favre ¬ Syndrome de *H35.5*

Gole
v./v.a. Touraine-Solente-Gole

Gollop-Wolfgang ¬ Complexe de *Q73.8*

Goltz
v./v.a. Gorlin-Goltz

Gombault ¬ Névrite de *G60.0*

Gómez-López-Hernández ¬ Syndrome de *Q87.8*

Gomme
- Amygdales ¬ *A52.7†, J99.8**
- Artères ¬ *A52.0†, I79.8**
- Artères cérébrales ¬ *A52.0†, I68.8**
- Cœur ¬ *A52.0†, I52.0**
- Corps ciliaire ¬ *A52.7†, H22.8**
- Due à la syphilis congénitale ¬ *A50.5*
- Foie ¬ *A52.7†, K77.0**
- Hypophyse ¬ *A52.7†, E35.8**
- Intracrânienne ¬ *A52.1†, G07**
- Iris ¬ *A52.7†, H22.8**
- Langue ¬ *A52.7†, K93.8**
- Larynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- Leptoméninge ¬ *A52.1†, G07**
- Méninges ¬ *A52.1†, G07**
- Moelle épinière ¬ *A52.1†, G07**
- Neurosyphilitique ¬ *A52.3†, G07**
- Nez ¬ *A52.7†, J99.8**
- Orbites ¬ *A52.7†, H06.3**
- Os ¬ *A52.7†, M90.29**
- Osseuse du pian (tardif) ¬ *A66.6*
- Peau ¬ *A52.7†, L99.8**
- Pénis ¬ *A52.7†, N51.8**
- Péricarde ¬ *A52.0†, I32.0**
- Pharynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- Queue de cheval ¬ *A52.1†, G07**

Gomme *–suite*
- Région rhinopharyngée ¬ *A52.7†, J99.8**
- Rein ¬ *A52.7†, N29.0**
- Syphilitique système nerveux central
- - SAI ¬ *A52.3*
- - ¬ *A52.3†, G07**
- Système cardiovasculaire ¬ *A52.0†, I98.0**
- Trachée ¬ *A52.7†, J99.8**
- Ulcères pianiques ¬ *A66.4*
- Uretère ¬ *A52.7†, N29.1**
- Voile du palais ¬ *A52.7†, K93.8**
- ¬ Syphilis tardive de la paupière avec *A52.7†, H03.1**

Gommeuse
- Pian (tardif) ¬ Ostéite ou périostite *A66.6*
- ¬ Framboeside *A66.4*

Gonadique
- 46,XX ¬ Syndrome de fibrose pulmonaire-déficit immunitaire-dysgénésie *D82.8, J84.10*
- 46,XY
- - Malformations multiples ¬ Dysgénésie *Q99.1*
- - Neuropathie sensitivo-motrice ¬ Syndrome de dysgénésie *Q56.1, G60.0*
- Complète 46,XY ¬ Dysgénésie *Q99.1*
- Mixte 45,X/46,XY ¬ Dysgénésie *Q99.8*
- Partielle 46,XY ¬ Dysgénésie *Q56.1*
- Pure ¬ Dysgénésie *Q99.1*

Gonadoblastome chez l'homme ¬ *D40.1*

Gonadotrope fonctionnel ¬ Adénome *D35.2*

Gonadotrophines ¬ Syndrome de l'ovaire résistant aux *E28.3*

Gonadotropine ¬
- Déficit congénital isolé en *E23.0*
- Puberté précoce dépendante des *E22.8*

Gonarthrite gonorrhéique ¬ *A54.4†, M01.36**

Gonarthrose
- Post-traumatique
- - Bilatérale ¬ *M17.2*
- - SAI ¬ *M17.3*
- - Unilatérale ¬ *M17.3*
- Post-traumatiques ¬ Autres *M17.3*
- Primaire
- - Bilatérale ¬ *M17.0*
- - SAI ¬ *M17.1*
- - Unilatérale ¬ *M17.1*
- Primaires ¬ Autres *M17.1*
- Sans précision ¬ *M17.9*
- Secondaire
- - SAI ¬ *M17.5*
- - Unilatérale ¬ *M17.5*
- Secondaires
- - Bilatérales ¬ Autres *M17.4*
- - ¬ Autres *M17.5*

Gondii ¬
- Infection Toxoplasma

Gondii ¬ *–suite*
- Infection Toxoplasma *–suite*
- - *B58*
- - *B58.98*
- Maladie due au VIH avec infection à Toxoplasma *B20, B58.98*

Gonflement
- Articulaire tuberculeux ¬ *A18.0†, M01.19**
- Glandes ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R59.9*

Gongylonémose ¬ *B83.8*

Goniodysgénésie-déficience intellectuelle-petite taille ¬ Syndrome de *Q87.8*

Goniosynéchies ¬ *H21.5*

Gonite gonorrhéique ¬ *A54.4†, M01.36**

Gonoblennorrhée ¬ *A54.3†, H13.1**

Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.2*

Gonococcique
- Anus ¬ Infection *A54.6*
- Femme ¬ Affection inflammatoire pelvienne *A54.2†, N74.3**
- Glandes de Bartholin ¬ Abcès *A54.1*
- Infections génito-urinaires gonococciques ¬ Pelvipéritonite *A54.2*
- Œil ¬ Infection *A54.3*
- Partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes ¬ Infection *A54.1*
- Rectum ¬ Infection *A54.6*
- Système ostéo-articulaire et des muscles ¬ Infection *A54.4†*
- ¬
- - Bursite *A54.4†, M73.09**
- - Infections *A54.8*
- - Lésions cutanées *A54.8*
- - Méningite *A54.8†, G01**
- - Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires *A54.2*
- - Pharyngite *A54.5*
- - Septicémie *A54.8*
- - Urétrite
- - - *A54.0*
- - - Non *N34.1*

Gonocoques
- Abcès ¬ Vulvo-vaginite à *A54.1†, N77.1**
- ¬
- - Abcès cérébral à *A54.8†, G07**
- - Arthrite à *A54.4†, M01.39**
- - Bursite à *A54.4†, M73.09**
- - Conjonctivite à *A54.3†, H13.1**
- - Endocardite à *A54.8†, I39.8**
- - Épididymite à *A54.2†, N51.1**
- - Hydrarthrose à *A54.4†, M14.89**
- - Iridocyclite à *A54.3†, H22.0**
- - Irite à *A54.3†, H22.0**
- - Kératose à *A54.8†, L86**
- - Maladie de l'endocarde à *A54.8†, I39.8**

Gonocoques *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Méningite à *A54.8†, G01**
- - Myocardite à *A54.8†, I41.0**
- - Ophtalmie néonatale à *A54.3†, H13.1**
- - Orchite à *A54.2†, N51.1**
- - Ostéomyélite à *A54.4†, M90.29**
- - Péricardite à *A54.8†, I32.0**
- - Péritonite à *A54.8†, K67.1**
- - Pneumonie à *A54.8†, J17.0**
- - Prostatite à *A54.2†, N51.0**
- - Spondylite à *A54.4†, M49.39**
- - Synovite à *A54.4†, M68.09**
- - Ténosynovite à *A54.4†, M68.09**
- - Vulvo-vaginite à *A54.0†, N77.1**

Gonorrhée
- Aiguë
- - Canal déférent ¬ *A54.2†, N51.8**
- - Vésicule séminale ¬ *A54.2†, N51.8**
- Arthrite ¬ *A54.4†, M01.39**
- Articulaire ¬ *A54.4†, M01.39**
- Bourse ¬ *A54.4†, M73.09**
- Bursite ¬ *A54.4†, M73.09**
- Canal déférent ¬ *A54.2†, N51.8**
- Chronique de la vésicule séminale ¬ *A54.2†, N51.8**
- Cœur ¬ *A54.8†, I52.0**
- Endocarde ¬ *A54.8†, I39.8**
- Épididyme ¬ *A54.2†, N51.1**
- Œil
- - Nouveau-né ¬ *A54.3†, H13.1**
- - ¬ *A54.3*
- Ovaire ¬ *A54.2†, N74.3**
- Peau ¬ *A54.8†, L99.8**
- Prépuce ¬ *A54.0†, N51.2**
- Prostate ¬ *A54.2†, N51.0**
- Rein ¬ *A54.2†, N29.1**
- Trompe de Fallope ¬ *A54.2†, N74.3**
- Utérus ¬ *A54.2†, N74.3**
- Vésicule séminale ¬ *A54.2†, N51.8**
- ¬
- - Inflammation du bassin féminin au cours de *A54.2†, N74.3**
- - Pneumonie au cours de *A54.8†, J17.0**
- - Syndrome
- - - Génital post *B94.88*
- - - Post *B94.88*
- - - Uro-génital post *B94.88*

Gonorrhéique
- Abcès ¬
- - Vaginite *A54.1†, N77.1**
- - Vulvite *A54.1†, N77.1**
- Aiguë ¬ Orchite *A54.2†, N51.1**
- Articulations ¬ Inflammation *A54.4†, M01.39**
- Chronique ¬ Orchite *A54.2†, N51.1**

Gonorrhéique *–suite*
- Gland ¬ Inflammation *A54.0†, N51.2**
- Nouveau-né ¬ Ophtalmie *A54.3†, H13.1**
- Péritoine ¬ Inflammation *A54.8†, K67.1**
- Prénatale ¬ Kératite *A54.3†, H19.2**
- Prostate ¬ Abcès *A54.2†, N51.0**
- Trompe de Fallope ¬ Rétrécissement *A54.2†, N74.3**
- ¬
- - Adénite *A54.8*
- - Annexite *A54.2†, N74.3**
- - Balanite *A54.0†, N51.2**
- - Balano-posthite *A54.0†, N51.2**
- - Conjonctivite *A54.3†, H13.1**
- - Déférentite *A54.2†, N51.8**
- - Dermatose *A54.8†, L99.8**
- - Endométrite *A54.2†, N74.3**
- - Endophtalmie *A54.3†, H45.1**
- - Exostose *A54.4†, M90.29**
- - Funiculite *A54.2†, N51.8**
- - Gonarthrite *A54.4†, M01.36**
- - Gonite *A54.4†, M01.36**
- - Hyperkératose *A54.8†, L86**
- - Kératodermie *A54.8†, L86**
- - Néphrite *A54.2†, N08.0**
- - Orchite *A54.2†, N51.1**
- - Ovarite *A54.2†, N74.3**
- - Périarthrite *A54.4†, M73.89**
- - Périhépatite *A54.8†, K67.1**
- - Périostite *A54.4†, M90.19**
- - Prostatite *A54.2†, N51.0**
- - Pyélite *A54.2†, N29.1**
- - Pyosalpinx *A54.2†, N74.3**
- - Salpingite *A54.2†, N74.3**
- - Salpingo-ovarite *A54.2†, N74.3**
- - Spermatocystite *A54.2†, N51.8**
- - Synovite *A54.4†, M68.09**
- - Tendinite *A54.4†, M68.09**
- - Ténosynovite *A54.4†, M68.09**
- - Urétérite *A54.2†, N29.1**
- - Vaginite *A54.0†, N77.1**
- - Vésiculite *A54.2†, N51.8**
- - Vulvite *A54.0†, N77.1**

Gonorrhoeae ¬ Épididymo-orchite à Neisseria *A54.2†, N51.1**

Gonosomes ¬ Anomalies des *Q99.8*

Good ¬ Syndrome de *D82.8*

Goodman
v./v.a. Friedman-Goodman
v./v.a. Passwell-Goodman-Siprkowski
- ¬
- - Camptodactylie de *Q78.8*
- - Syndrome de *Q87.0*

Goodpasture ¬
- Glomérulopathie au cours de syndrome de *M31.0†, N08.5**

Goodpasture ¬ *–suite*
- Néphrite à anticorps anti-MBG [membrane basale glomérulaire] au cours de syndrome de *M31.0†, N08.5**
- Syndrome de *M31.0*

Gordon
v./v.a. Baker-Gordon
v./v.a. Powell-Venencie-Gordon
- ¬ Lymphœdème primaire congénital de *Q82.09*

Gordon-Holmes ¬ Syndrome de *G11.8*

Gorge
- SAI ¬ *T17.2*
- Sans précision ¬ Lésions traumatiques superficielles de la *S10.1*
- ¬
- - Blessure de la *S19.9*
- - Contusion de la *S10.0*
- - Douleur de la *R07.0*
- - Hémorragie de la *R04.1*
- - Résultats anormaux de: prélèvements de *R84*
- - Syndrome de la langue et de la *G24.0*

Gorham
- Avant-bras ¬ Ostéolyse massive de *M89.53*
- Bras ¬ Ostéolyse massive de *M89.52*
- Colonne vertébrale ¬ Ostéolyse massive de *M89.58*
- Cuisse ¬ Ostéolyse massive de *M89.55*
- Jambe ¬ Ostéolyse massive de *M89.56*
- Localisations multiples ¬ Ostéolyse massive de *M89.50*
- Main ¬ Ostéolyse massive de *M89.54*
- Os de la face ¬ Ostéolyse massive de *M89.58*
- Pied ¬ Ostéolyse massive de *M89.57*
- Région de l'épaule ¬ Ostéolyse massive de *M89.51*
- Région pelvienne ¬ Ostéolyse massive de *M89.55*
- ¬
- - Maladie de *M89.59*
- - Ostéolyse massive de *M89.59*

Gorham-Stout ¬ Maladie de *M89.59*

Gorlin
v./v.a. Lopes-Gorlin
v./v.a. Meier-Gorlin

Gorlin-Chaudhry-Moss ¬ Syndrome de *Q87.0*

Gorlin-Goltz ¬
- Carcinome basocellulaire au cours de syndrome de *C44.9, Q85.8*
- Syndrome de *Q85.8*

GOSHS [Syndrome de Goldberg-Shprintzen avec mégacôlon] ¬ *Q87.8*

Gottron
v./v.a. Arndt-Gottron
- ¬
- - Acrogérie type *E34.8*
- - Papules de *L94.4*

Goudron ¬ Cancer
- Peau dû aux *C44.9*
- Pulmonaire dû aux *C34.9*
- Vessie dû aux *C67.9*

Gougerot
- Carteaud] ¬ Papillomatose confluente et réticulée [*L83*
- Hailey ¬ Maladie de *Q82.8*

Gougerot-Sjögren avec atteinte pulmonaire ¬ Syndrome de *M35.0†, J99.1**

Goût
- Non précisés ¬ Troubles de l'odorat et du *R43.8*
- ¬ Troubles associés de l'odorat et du *R43.8*

Goutières
v./v.a. Aicardi-Goutières

Goutte
- Cours de drépanocytose ¬ Arthropathie de la *D57.8†, M14.09**
- Due à une altération de la fonction rénale ¬ *M10.3*
- Idiopathique ¬ *M10.0*
- Médicamenteuse ¬ *M10.2*
- Primitive ¬ *M10.0*
- Sans précision ¬ *M10.9*
- Saturnine ¬ *M10.1*
- Secondaire ¬ Autre *M10.4*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, M14.89**
- ¬
- - Épisclérite dans la *M10.99†, H19.0**
- - Néphrite dans la *M10.99†, N29.8**
- - Néphrolithiase dans la *M10.09†, N22.8**
- - Néphropathie dans la *M10.99†, N29.8**
- - Néphrosclérose dans la *M10.99†, N29.8**
- - Neuropathie des nerfs périphériques autonomes dans la *M10.09†, G63.6**
- - Psoriasis en *L40.4*

Gouttelettes ¬ Kératopathie climatique en *H18.5*

Goutteux
- Cœur ¬ Tophus *M10.09†, I43.8**
- Cours de syndrome de Lesch-Nyhan ¬ Arthropathie *E79.1†, M14.09**
- Due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires ¬ Arthropathie *M14.0**
- ¬
- - Bursite *M10.0*
- - Eczéma *M10.99†, L99.8**
- - Irite *M10.99†, H22.1**
- - Névrite *M10.09†, G63.6**

Gouttière
- Buccale (supérieure) (inférieure) ¬ *C06.1*
- Labiale (supérieure) (inférieure) ¬ *C06.1*

Gowers ¬ Dystrophie musculaire de *G71.08*

GPA] ¬ Granulomatose avec polyangéite [*M31.3*

GPAA1 ¬ Défaut de biosynthèse associé à *E88.8*

GPAPP ¬ Chondrodysplasie avec luxation articulaire type *Q79.8*

GPIHBP1 [protéine de liaison glycosylphosphatidylinositol HDL 1] ¬ Déficit familial en *E78.3*

GPP] ¬ Psoriasis pustuleux généralisé [*L40.1*

Graaf ¬ Kyste (de): follicule de De *N83.0*

Grabataire ¬ *R26.3*

GRACILE ¬ Syndrome *E88.8*

Graham
v./v.a. Khalifa-Graham

Graham-Burford-Mayer ¬ Syndrome de *J98.11*

Grains d'avoine ¬ Carcinome à cellules en *C34.9*

Graisses
- Industrielles ¬ Allergie aux *L23.5*
- ¬
- - Dermite irritante de contact due aux huiles et aux *L24.1*
- - Stockage des *E75.6*

Graisseux
v./v.a. Dégénérescence graisseuse
- Obstétricale ¬ Embolie *O88.8*
- Pancréas ¬ Nécrose *K86.88*
- Rotulien) [Maladie de Hoffa] ¬ Hypertrophie du coussinet *M79.4*
- Stéato-nécrose] mésentérique ¬ Nécrose *K65.8*
- Traumatique ¬
- - Embolie *T79.1*
- - Séquelles d'embolie *T98.2*
- ¬
- - Dégénérescence du cœur ou du myocarde: *I51.5*
- - Syndrome de surcharge *T80.8*

Gram négatif
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies à *B96.6!*
- Multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres bactéries à *U81.8!*
- SAI ¬
- - Pneumonie due à: des bactéries (aérobies) à *J15.6*
- - Septicémie à micro-organismes à *A41.5*
- ¬
- - Choc septique à micro-organismes *A41.58, R57.2*
- - Pneumonie due bactérie
- - - *A49.88*
- - - *J15.6*
- - Septicémie micro-organisme
- - - *A41.5*
- - - *A41.58*

Gram positif
- Causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants à *B96.7!*

Gram positif *–suite*
- Multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres bactéries à *U80.8!*
- Non sporulants précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes anaérobies à *B95.91!*
- Précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes aérobies à *B95.90!*

Gram positives ¬ Pneumonie due à des bactéries *A49.88*

Grange ¬ Syndrome de *Q87.8*

Grant ¬ Syndrome de *Q87.5*

Granulation granulocyte syndrome
- Alder ¬ Anomalie (*D72.0*
- Pelger-Huët ¬ Anomalie (*D72.0*

Granules
- Alpha et delta ¬ Déficit en *D69.1*
- Plaquettaires delta ¬ Déficit isolé de stockage des *D69.1*
- Spécifiques ¬ Infections récurrentes par déficit en *D71*

Granuleux
- Cellules NK ¬ Leucémie chronique à grands lymphocytes *C84.5*
- T ¬ Leucémie à grands lymphocytes *C91.70*
- Trachomateuse) ¬ Conjonctivite: *A71.1*
- ¬
- - Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*
- - Leucémie à grands lymphocytes T *C91.70*
- - Pharyngite (chronique): *J31.2*

Granulocytaire
- Humaine [EGH] ¬ Ehrlichiose *A79.8*
- Rémission complète ¬ Sarcome *C92.31*
- ¬
- - Leucémie: *C92*
- - Sarcome *C92.30*

Granulocyte
- Neutrophile
- - Associée à une prédisposition à la parodontite juvénile localisée ¬ Anomalie des *D71*
- - ¬ Anomalies fonctionnelles des *D71*
- Syndrome
- - Alder ¬ Anomalie (granulation) (*D72.0*
- - Pelger-Huët ¬ Anomalie (granulation) (*D72.0*

Granulocytique chronique
- Rémission complète ¬ Leucémie *C92.11*
- ¬ Leucémie *C92.10*

Granulocytopénie
- Allergique ¬ *D70.6*
- Induite par des médicaments ¬ *D70.19*

Granuloma fungoides ¬ *C84.0*

Granulomateuse
- Allergique ¬ Angéite *M30.1*
- Dermatophytie] ¬ Dermatophytose *B35.8*
- Interstitielle-arthrite [IGDA] ¬ Syndrome de dermatite *M30.1*

Granulomateuse *–suite*
- Kystique ¬ Cystite *N30.88*
- Non classée ailleurs ¬ Hépatite *K75.3*
- Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Sans précision ¬ Lésion *L92.9*
- - ¬ Autres lésions *L92.8*
- ¬
- - Colite: *K50.1*
- - Cystite *N30.88*
- - Entérite *K50*
- - Gastrite: *K29.6*
- - Mastite *N61*
- - Rhinite (chronique): *J31.0*
- - Thyroïdite (à) (de): *E06.1*

Granulomatis multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Klebsiella *U81.03!*

Granulomatose
- Aiguë à cellules de Langerhans ¬ *C96.0*
- Bénigne ¬ *D86.9*
- Cellules de Langerhans ¬ *C96.6*
- Chronique
- - Cellules de Langerhans ¬ *C96.6*
- - Infantile ¬ *D71*
- - ¬ CGD [*D71*
- Due au béryllium ¬ *J63.2*
- Éosinophilique avec polyangéite ¬ *M30.1*
- Familiale chronique ¬ *D71*
- Hutchinson-Boeck ¬ *D86.9*
- Lipophagique intestinale ¬ *K90.8†, M14.89**
- Lymphoïde ¬ *C83.8*
- Lymphomatoïde] ¬ LYG [*C83.8*
- Miliaire ¬ *A32.8*
- Polyangéite
- - Atteinte
- - - Pulmonaire ¬ *M31.3†, J99.1**
- - - Rénale ¬ *M31.3†, N08.5**
- - GPA] ¬ *M31.3*
- - ¬
- - - Glomérulonéphrite au cours de *M31.3†, N08.5**
- - - Glomérulopathie au cours de *M31.3†, N08.5**
- - - Maladies respiratoires lors de *M31.3†, J99.1**
- Respiratoire nécrosante ¬ *M31.3*
- Septique
- - Chronique ¬ *D71*
- - Progressive ¬ *D71*
- Systémique ¬ Panniculite infantile avec uvéite et *M35.8*
- Wegener ¬
- - Glomérulonéphrite au cours de *M31.3†, N08.5**
- - Glomérulopathie au cours de *M31.3†, N08.5**

Granulome
- Actinique ¬ *L57.5*

Granulome *–suite*
- Annulaire
- - Perforant ¬ *L92.0*
- - ¬ *L92.0*
- Apical ou périapical ¬ *K04.5*
- Cellule géante
- - Central ¬
- - - *K10.1*
- - - *K10.1*
- - SAI ¬ *K10.1*
- Central de la mandibule ¬ *K10.1*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger ¬ *L92.3*
- Éosinophile
- - Facial ¬ *L92.2*
- - Muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- - ¬ *C96.6*
- Éosinophilique
- - Os ¬ *C96.6*
- - Poumons ¬ *C96.6*
- Gangraenescens nasi ¬ *C86.0*
- Gingival pyogène ¬ *K06.8*
- Hépatiques
- - Cours
- - - Bérylliose ¬ *J63.2†, K77.8**
- - - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, K77.8**
- - ¬ Maladie toxique du foie avec: *K71.88*
- Inguinal ¬ *A58*
- Intracrânien
- - Épidural ¬ Abcès ou *G06.0*
- - Extra-dural ¬ Abcès ou *G06.0*
- - Sous-dural ¬ Abcès ou *G06.0*
- Intracrâniens
- - Intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs ¬ Abcès et *G07**
- - ¬ Abcès et *G06.0*
- Intrarachidien
- - Épidural ¬ Abcès ou *G06.1*
- - Extra-dural ¬ Abcès ou *G06.1*
- - Sous-dural ¬ Abcès ou *G06.1*
- - ¬ Abcès et *G06.1*
- Intraspinal syphilitique ¬ *A52.1†, G07**
- Lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Létal de la ligne médiane ¬ *C86.0*
- Majocchi ¬ *B35.8*
- Malin facial ¬ *C86.0*
- Mastoïdectomie ¬ *H95.1*
- Orbite ¬ *H05.1*
- Paracoccidioïde ¬ *B41.8*
- Périphérique à cellules géantes ¬ *K06.8*
- Péritoine dû à des œufs d'helminthes NCA ¬ *B83.9†, K67.8**
- Prostatique ¬ *N42.8*
- Pulmonaire dû à une infection ¬ *J84.10*
- Pulpaire ¬ *K03.3*

Granulome *–suite*
- Pyogène de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Pyogénique ¬ *L98.0*
- Télangiectasique de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs ¬ *M60.2*
- Tuberculeux de la colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**

Graphique ¬ Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et *F82.1*

Graphite ¬ Fibrose (du poumon) due au *J63.3*

Grappe ¬ Céphalée en *G44.0*

Gras
- Chaîne
- - Courte ¬
- - - Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- - - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- - - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- - Longue ¬ Déficit
- - - 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- - - Acyl-CoA-déshydrogénase des acides *E71.3*
- - Moyenne ¬ Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- Essentiels ¬ Carence en acides *E63.0*
- Métabolisme des corps cétoniques ¬ Trouble de l'oxydation des acides *E71.3*
- ¬
- - Anomalie du métabolisme des acides *E71.3*
- - Déficit d'oxydoréduction des alcools d'acides *Q87.1*
- - Neurodégénérescence associée à l'hydroxylase des acides *G23.0*

Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations optiques de *H47.5*

Grave
- Aigu ¬ Asthme *J46*
- E43
- - Forme intermédiaire ¬ Malnutrition protéino-énergétique *E42*
- - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition protéino-énergétique *E42*
- Marasme ¬ Malnutrition *E41*
- Non syndromique
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ Déficience intellectuelle *F72.9*
- - - Récessif ¬ Retard mental *F72.9*
- - Lié à X ¬ Retard mental *F72.9*
- Sans précision ¬ Malnutrition protéino-énergétique *E43*

Grave *–suite*
- ¬
- - Arriération mentale *F72*
- - Asphyxie obstétricale *P21.0*
- - Bêta-thalassémie *D56.1*
- - Compression du cerveau, hémorragie et pression cérébrale lors d'une lésion cranio-cérébrale couverte *S06.21, S01.83!*
- - Retard mental *F72*

Gravide ¬ soin maternels
- Anomalies de l'utérus *O34.5*
- Incarcération de l'utérus *O34.5*
- Prolapsus de l'utérus *O34.5*
- Rétroversion de l'utérus *O34.5*

Gravidique
- Bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ Hyperémèse *O21.0*
- Commençant avant fin 20ème gestation troubles métabolique
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse *O21.1*
- - Déshydratation ¬ Hyperémèse *O21.1*
- Troubles métaboliques ¬ Hyperémèse *O21.1*
- ¬
- - Cholestase *O26.60*
- - Hyperémèse *O21.0*
- - Pemphigoïde *O26.4*
- - Toxémie *O14.9*

Graviditatis ¬ Herpes *O26.4*

Gravité
- G] anormales ¬ Effets de: forces de *T75.8*
- Psoriasis ¬ Degré de *L40.7!*

Grayson-Wilbrandt ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*

Grebe ¬
- Chondrodysplasie type *Q78.8*
- Dysplasie acromésomélique type *Q78.8*

Greenberg ¬ Dysplasie squelettique
- Létale type *Q77.3*
- Type *Q77.3*

Greenfield
- Leucodystrophie métachromatique] ¬ Maladie de *E75.2*
- Sclérose concentrique] ¬ Maladie de *G37.5*

Greffe
- Appareil
- - Génital ¬
- - - Complication mécanique d'autres prothèses, implants ou *T83.4*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant ou une *T83.6*
- - Génito-urinaire
- - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant ou d'une *T83.9*

Greffe *–suite*
- Appareil *–suite*
- - Génito-urinaire *–suite*
- - - ¬ Autres complications de prothèses, implants ou *T83.8*
- - Urinaire ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant ou une *T83.5*
- Cardiaques vasculaires
- - Sans précision ¬
- - - Complication d'une prothèse, d'un implant ou d'une *T82.9*
- - - Présence d'implant et de *Z95.9*
- - ¬
- - - Complications précisées de prothèses, implants ou *T82.8*
- - - Douleur due à prothèses, implants ou *T82.8*
- - - Embolie due à prothèses, implants ou *T82.8*
- - - Fibrose due à prothèses, implants ou *T82.8*
- - - Hémorragie due à prothèses, implants ou *T82.8*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou *T82.7*
- - - Présence d'autres implants et *Z95.8*
- - - Sténose due à prothèses, implants ou *T82.8*
- - - Thrombose due à prothèses, implants ou *T82.8*
- Cellules-souches hématopoïétiques avec une immunosuppression actuelle ¬ Infection à adénovirus chez un patient ayant subi une *B34.0, Z94.81*
- Cœur
- - Poumon ¬
- - - Échec d'une *T86.3*
- - - Rejet d'une *T86.3*
- - - Status post *Z94.3*
- - ¬
- - - Échec d'une *T86.2*
- - - Rejet d'une *T86.2*
- - - Status post *Z94.1*
- Cornée
- - Œil ¬
- - - Décompensation de *T86.83*
- - - Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés: *T86.83*
- - - Rejet
- - - - Aigu de *T86.83*
- - - - Chronique de *T86.83*
- - ¬ Status post *Z94.7*
- Fascio-cutané ¬
- - Échec d'une *T86.59*
- - Nécrose d'une *T86.51*
- - Perte d'une *T86.52*
- - Rejet d'une *T86.59*
- - Troubles circulatoires d'une *T86.50*
- Foie

Greffe *–suite*
- Foie *–suite*
- - 29 jours plus transplantation ¬
- - - Détérioration fonctionnelle d'une *T86.41*
- - - Rejet d'une *T86.41*
- - Non précisé ¬ Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une *T86.49*
- - Pendant premiers 28 jours transplantation ¬
- - - Détérioration fonctionnelle d'une *T86.40*
- - - Rejet d'une *T86.40*
- - ¬
- - - Détérioration fonctionnelle chronique d'une *T86.41*
- - - Échec
- - - - *T86.49*
- - - - Greffe lors de status post *T86.49*
- - - Rejet d'une *T86.49*
- - - Status post *Z94.4*
- Hétérologue ou homologue ¬ organe ou tissu remplacé par *Z94*
- Internes
- - Non classées ailleurs ¬ Autres complications dues à des prothèses, implants ou *T85.88*
- - Partie du tractus gastro-intestinal ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou *T85.76*
- - SAI ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant ou d'une *T85.9*
- - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant ou d'une *T85.9*
- - Système
- - - Hépatobiliaire et le pancréas ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants ou *T85.75*
- - - Nerveux ¬
- - - - Complications dues à des prothèses, implants ou *T85.81*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants ou *T85.72*
- - ¬ Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants ou *T85.78*
- Intestin ¬ Rejet de *T86.88*
- Lipocutané ¬
- - Échec d'une *T86.59*
- - Nécrose d'une *T86.51*
- - Perte d'une *T86.52*
- - Troubles circulatoires d'une *T86.50*
- Lors status post greffe
- - Foie ¬ Échec de *T86.49*
- - Rein ¬ Échec de *T86.19*
- Mammaire
- - Partie cutané ¬
- - - Échec d'une *T86.59*
- - - Nécrose d'une *T86.51*
- - - Perte d'une *T86.52*
- - - Rejet d'une *T86.59*
- - - Troubles circulatoires d'une *T86.50*

Greffe *–suite*
- Mammaire *–suite*
- - Sans partie cutané ¬
- - - Échec d'un *T86.84*
- - - Rejet d'un *T86.84*
- - ¬
- - - Échec d'un *T86.84*
- - - Rejet d'un *T86.84*
- Moelle osseuse ¬
- - Échec d'une *T86.00*
- - Rejet d'une *T86.00*
- Myocutané ¬
- - Échec d'une *T86.59*
- - Nécrose d'une *T86.51*
- - Perte d'une *T86.52*
- - Rejet d'une *T86.59*
- - Troubles circulatoires d'une *T86.50*
- Oculaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses, implants ou *T85.3*
- Œsophage ¬ Complication mécanique de prothèses, implants ou *T85.50*
- Organe ou de tissu, sans précision ¬ Status post *Z94.9*
- Organe urinaire ¬ Complication mécanique d'une *T83.2*
- Orthopédique internes
- - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant ou d'une *T84.9*
- - ¬
- - - Complication mécanique d'autres appareils, implants et *T84.4*
- - - Complications de prothèses, implants ou *T84.8*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou *T84.7*
- Os ¬ Complication mécanique d'autres appareils, implants ou *T84.3*
- Osseux ¬
- - Rejet de *T86.88*
- - Status post *Z94.6*
- Pancréas ¬
- - Complication mécanique de prothèses, implants ou *T85.54*
- - Échec de *T86.82*
- - Rejet de *T86.82*
- Parties du tractus gastro-intestinal supérieur ¬ Complication mécanique de prothèses, implants ou *T85.51*
- Peau
- - Autologue ¬ Status post *Z94.5*
- - ¬
- - - Complication d'une *T86.59*
- - - Échec d'une *T86.59*
- - - Infection d'une *T86.59*
- - - Nécrose d'une *T86.51*
- - - Perte d'une *T86.52*
- - - Rejet d'une *T86.59*
- - - Status post *Z94.5*
- - - Troubles circulatoires d'une *T86.50*

Greffe *–suite*
- Poumon ¬
- - Échec de *T86.81*
- - Rejet de *T86.81*
- - Status post *Z94.2*
- Rein ¬
- - Détérioration fonctionnelle
- - - Aiguë d'une *T86.10*
- - - Chronique d'une *T86.11*
- - Échec
- - - *T86.19*
- - - Greffe lors de status post *T86.19*
- - Rejet
- - - *T86.19*
- - - Aigu d'une *T86.10*
- - - Chronique d'une *T86.11*
- - Reprise retardée de la fonction de la *T86.12*
- - Status post *Z94.0*
- Tractus gastro-intestinal inférieur ¬ Complication mécanique de prothèses, implants ou *T85.52*
- Valvulaire cardiaque ¬ Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une *T82.2*
- Valvule cardiaque
- - Allogène ¬ Inflammation due à une *T82.6*
- - Autologue ¬ Inflammation due à une *T82.6*
- - Xénogène ¬ Inflammation due à une *T82.6*
- - ¬ Septicémie dues à une *T82.6*
- Vasculaire ¬
- - Infection due à une *T82.73*
- - Inflammation due à une *T82.73*
- Vasculaires
- - Coronaires ¬ Présence d'implant et de *Z95.5*
- - ¬ Complication mécanique d'autres *T82.3*
- Voies biliaires ¬ Complication mécanique de prothèses, implants ou *T85.53*
- ¬
- - Bronchiolite oblitérante post- *J95.88*
- - Échec de *T86.9*
- - Infection due à une fistule artério-veineuse associée à une *T82.73*
- - Pyélonéphrite au cours d'un rejet de *T86.91†, N16.5**
- - Rejet de *T86.9*

Greffé
- Greffe de cornée de l'œil ¬ Échec et rejet d'autres organes et tissus *T86.83*
- Lors d'hypertension ¬ Prééclampsie *O11*
- Organes ou tissus greffés ¬ Échec et rejet d'autres organes et tissus *T86.88*
- ¬ Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus *T86.88*

Greffe-contre-hôte stade
- 1 ¬ Maladie aiguë
- - Foie de rejet de *T86.01†, K77.11**
- - Rejet

Greffe-contre-hôte stade *–suite*
- 1 ¬ Maladie aiguë *–suite*
- - Rejet *–suite*
- - - Appareil digestif *T86.01†, K93.21**
- - - Cutané de *T86.01†, L99.11**
- 2 ¬ Maladie aiguë rejet
- - Appareil digestif *T86.02†, K93.22**
- - Cutané de *T86.01†, L99.12**
- 3 ¬ Maladie aiguë rejet
- - Appareil digestif *T86.02†, K93.23**
- - Cutané de *T86.01†, L99.13**
- 4 ¬ Maladie aiguë rejet
- - Appareil digestif *T86.02†, K93.24**
- - Cutané de *T86.02†, L99.14**

Greffon
- Artériel ¬
- - Infection d'un *T82.73*
- - Septicémie due à un *T82.73*
- Contre hôte
- - Chronique forme
- - - Modérée ¬ Maladie du *T86.06*
- - - Sévère ¬ Maladie du *T86.07*
- - Forme légère ¬ Maladie chronique du *T86.05*
- - Stade
- - - I ¬ Maladie aiguë du *T86.01*
- - - II ¬ Maladie aiguë du *T86.01*
- - - III ¬ Maladie aiguë du *T86.02*
- - - IV ¬ Maladie aiguë du *T86.02*
- - ¬
- - - Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques et maladie du *T86.0*
- - - Maladie du *T86.09*
- - - Réaction du *T86.09*
- Transplantation de cellules souches ¬ Rejet de *T86.00*

Greig ¬ Syndrome
- Céphalopolysyndactylie de *Q87.0*
- Gènes contigus de céphalopolysyndactylie de *Q87.0*

Greither ¬ Maladie de *Q82.8*

Grêle
- Aigu(ë) ¬ Ischémie de l'intestin *K55.0*
- Côlon
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.43*
- - - - Maladie diverticulaire de l'intestin *K57.43*
- - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite de l'intestin *K57.42*
- - - ¬ Maladie diverticulaire de l'intestin *K57.42*
- - Saignement ¬ Maladie diverticulaire de l'intestin *K57.51*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.53*

Grêle *–suite*
- Côlon *–suite*
- - Sans perforation abcès *–suite*
- - - Saignement ¬ *–suite*
- - - - Diverticulose du *K57.51*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.52*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.50*
- - ¬ Maladie diverticulaire de l'intestin *K57.50*
- Cours syndrome
- - Déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements ¬ Carcinome de l'intestin *C17.9*
- - Lynch ¬ Carcinome de l'intestin *C17.9*
- Duodénum ¬ Lésion traumatique de l'intestin *S36.41*
- Gros intestin ¬ Maladie de Crohn de l'intestin *K50.82*
- Hémorragie ¬ Angiodysplasie de l'intestin *K55.32*
- In rémission complète ¬ Maladie immunoprolifération de l'intestin *C88.31*
- Intestin
- - Grêle, partie non précisée ¬ Lésion traumatique de l'intestin *S36.40*
- - SAI ¬ obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin *Q41*
- Localisations contiguës ¬ Tumeur carcinoïde héréditaire de l'intestin *C17.8*
- Non précisées ¬ Tumeur bénigne: Parties de l'intestin *D13.3*
- Partie non précisée ¬ Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin *S36.40*
- Parties et parties multiples de l'intestin grêle ¬ Lésion traumatique de l'intestin *S36.49*
- Perforation abcès
- - Saignement ¬
- - - Diverticulite de l'intestin *K57.03*
- - - Maladie diverticulaire de l'intestin *K57.03*
- - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite de l'intestin *K57.02*
- - ¬ Maladie diverticulaire de l'intestin *K57.02*
- Péritonite ¬ Diverticulite du côlon et de l'intestin *K57.4*
- Saignement ¬ Maladie diverticulaire de l'intestin *K57.11*
- Sans
- - Indication d'une hémorragie ¬ Angiodysplasie de l'intestin *K55.31*
- - Perforation abcès
- - - Indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.12*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.10*
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.13*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.11*
- - Précision ¬ Tumeur maligne: Intestin *C17.9*

Grêle *–suite*
- Type méditerranéen en rémission complète ¬ Maladie immunoprolifération de l'intestin *C88.31*
- ¬
- - Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin *Q41.8*
- - Adénocarcinome de l'intestin *C17.9*
- - Amylose de l'intestin *E85.4†, K93.8**
- - Angiodysplasie de l'intestin *K55.3*
- - Carcinoïde
- - - Intestin *C17.9*
- - - Métastatique de l'intestin *C17.9*
- - Carcinome épidermoïde de l'intestin *C17.9*
- - Corps étranger dans l'intestin *T18.3*
- - Duplication de l'intestin *Q43.40*
- - Fistule du vagin à l'intestin *N82.2*
- - Insuffisance
- - - Anastomoses au pancréas avec atteinte de l'intestin *K91.82*
- - - Suture au pancréas avec atteinte de l'intestin *K91.82*
- - Léiomyosarcome de l'intestin *C17.9*
- - Lésion traumatique de l'intestin grêle: Autres parties et parties multiples de l'intestin *S36.49*
- - Maladie
- - - Crohn de l'intestin *K50.0*
- - - Diverticulaire de l'intestin *K57.10*
- - - Immunoprolifération de l'intestin *C88.30*
- - Obstruction congénitale de l'intestin *Q41.9*
- - Occlusion congénitale de l'intestin *Q41.9*
- - Polype de l'intestin *K63.8*
- - Sténose congénitale de l'intestin *Q41.9*
- - Syphilis de l'intestin *A52.7†, K93.8**
- - Tumeur
- - - Carcinoïde héréditaire de l'intestin *C17.9*
- - - GRF [facteur de libération de l'hormone de croissance] de l'intestin *C17.9*
- - Tumeur maligne
- - - Lésion à localisations contiguës de l'intestin *C17.8*
- - - Secondaire de l'intestin *C78.4*
- - Tumeur neuroendocrine maligne de l'intestin *C17.9*
- - Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l'intestin *C17.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Intestin *D37.2*
- - Ulcère primaire de l'intestin *K63.3*

Grêliques ¬ Varices *I86.80*

Grenouillette ¬ *K11.6*

GRF facteur libération hormone croissance
- Intestin grêle ¬ Tumeur à *C17.9*
- Jéjunum ¬ Tumeur à *C17.1*
- Lobe
- - Inférieur du poumon ¬ Tumeur à *C34.3*
- - Moyen du poumon ¬ Tumeur à *C34.2*

GRF facteur libération hormone croissance *–suite*
- Lobe *–suite*
- - Supérieur du poumon ¬ Tumeur à *C34.1*
- Pancréas ¬ Tumeur à *C25.4*
- Poumon
- - Localisations contiguës ¬ Tumeur à *C34.8*
- - ¬ Tumeur à *C34.9*

GRIA3 ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X par mutations de *Q87.8*

Griffe
- Acquis(e) ¬ Main et pied bot(e) ou en *M21.5*
- Chat ¬ Maladie des *A28.1*

Griggs
v./v.a. Markesbery-Griggs

Grillagée en réseau ¬ Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*

Grincement des dents (bruxisme) psychogène ¬ *F45.8*

Grippal
- Influenza
- - Virus de l'influenza saisonnière identifié ¬ Pneumonie *J10.0*
- - ¬
- - - Encéphalite *J11.8†, G05.1**
- - - Otite *J11.8†, H67.1**
- Sans précision virus spécifique non identifié ¬
- - Encéphalopathie *J11.8*
- - Épanchement pleural *J11.1*
- - Gastroentérite *J11.8*
- - Laryngite *J11.1*
- - Myocardite (aiguë) *J11.8*
- - Pharyngite *J11.1*
- Virus d'influenza saisonnière identifié ¬
- - Broncho)pneumopathie *J10.0*
- - Encéphalopathie *J10.8*
- - Gastroentérite *J10.8*
- - Grippe
- - - Épanchement pleural *J10.1*
- - - Laryngite *J10.1*
- - - Pharyngite *J10.1*
- - Myocardite (aiguë) *J10.8*
- Voies respiratoires supérieures sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ Infection *J11.1*
- ¬
- - Bronchopneumonie due à des virus autres que des virus *J12*
- - Épanchement pleural *J11.1*
- - Infection *J06.9*

Grippe
v./v.a. Virus de la grippe aviaire
- Épanchement pleural grippal à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*

Grippe *–suite*
- Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- Influenza
- - Encéphalite
- - - Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09†, G05.1**
- - - ¬ *J11.8†, G05.1**
- - Encéphalopathie
- - - Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09†, G94.31**
- - - ¬ *J11.8†, G94.31**
- - Entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Épanchement pleural, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Gastroentérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- - Infection
- - - Aiguë des voies respiratoires supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- - - Respiratoire supérieure, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Laryngite
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- - - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Méningisme, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Myocardite, virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09†, I41.1**
- - Otite
- - - Moyenne, virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09†, H67.1**
- - - Virus de la grippe saisonnière identifié ¬ *J10.8†, H67.1**
- - Pharyngite
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- - - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Pneumonie, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Polio-encéphalite, virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09†, G05.1**
- - Virus
- - - Grippe saisonnière identifié ¬
- - - - Encéphalite lors de *J10.8†, G05.1**
- - - - Encéphalopathie lors de *J10.8†, G94.31**
- - - - Myocardite lors de *J10.8†, I41.1**
- - - - Polio-encéphalite lors de *J10.8†, G05.1**

Grippe *–suite*
- Influenza *–suite*
- - Virus *–suite*
- - - Influenza
- - - - A, B et C identifié ¬ *J10.8*
- - - - Aviaire zoonotique pandémique identifié
- - - - - Associée à un épanchement pleural ¬ *J09, U69.23!*
- - - - - Associée à un méningisme ¬ *J09, U69.23!*
- - - - - Associée à une encéphalite ¬ *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - - - Associée à une encéphalopathie ¬ *J09†, G94.31*, U69.23!*
- - - - - Associée à une entérite ¬ *J09, U69.23!*
- - - - - Associée à une infection des voies respiratoires supérieures ¬ *J09, U69.23!*
- - - - - Associée à une laryngite ¬ *J09, U69.23!*
- - - - - Associée à une myocardite ¬ *J09†, I41.1*, U69.23!*
- - - - - Associée à une otite moyenne ¬ *J09†, H67.1*, U69.23!*
- - - - - Associée à une pharyngite ¬ *J09, U69.23!*
- - - - - Associée à une pneumonie ¬ *J09, U69.23!*
- - - - - Associée à une polioencéphalite ¬ *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - - - ¬ *J09, U69.23!*
- - - - B ou C identifié ¬ *J10.8*
- - - - Porcine zoonotique pandémique identifié
- - - - - Associée à un épanchement pleural ¬ *J09, U69.22!*
- - - - - Associée à un méningisme ¬ *J09, U69.22!*
- - - - - Associée à une encéphalite ¬ *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - - - Associée à une encéphalopathie ¬ *J09†, G94.31*, U69.22!*
- - - - - Associée à une entérite ¬ *J09, U69.22!*
- - - - - Associée à une infection des voies respiratoires supérieures ¬ *J09, U69.22!*
- - - - - Associée à une laryngite ¬ *J09, U69.22!*
- - - - - Associée à une myocardite ¬ *J09†, I41.1*, U69.22!*
- - - - - Associée à une otite moyenne ¬ *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - - - - Associée à une pharyngite ¬ *J09, U69.22!*
- - - - - Associée à une pneumonie ¬ *J09, U69.22!*
- - - - - Associée à une polioencéphalite ¬ *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - - - ¬ *J09, U69.22!*
- - - - Saisonnière identifié ¬
- - - - - Bronchopneumonie au cours de *J10.0*

Grippe *–suite*
- Influenza *–suite*
- - Virus *–suite*
- - - Influenza *–suite*
- - - - Saisonnière identifié ¬ *–suite*
- - - - - Myocardite aiguë au cours de *J10.8†, I41.1**
- - - - - Vraie *J10.1*
- - - - Zoonotique pandémique identifié
- - - - - Associée à une encéphalite, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire ¬ *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - - - Exception du virus d'influenza porcine ou aviaire ¬ *J09, U69.24!*
- - - - - Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à un épanchement pleural ¬ *J09, U69.24!*
- - - - - Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à un méningisme ¬ *J09, U69.24!*
- - - - - Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une encéphalopathie ¬ *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - - - Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une entérite ¬ *J09, U69.24!*
- - - - - Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une infection des voies respiratoires supérieures ¬ *J09, U69.24!*
- - - - - Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une laryngite ¬ *J09, U69.24!*
- - - - - Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une myocardite ¬ *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - - - - Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une otite moyenne ¬ *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - - - Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une pharyngite ¬ *J09, U69.24!*
- - - - - Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une pneumonie ¬ *J09, U69.24!*
- - - - - Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une polioencéphalite ¬ *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬
- - - *J10.1*
- - - Entérite au cours de la *J10.8*
- - - Épanchement pleural au cours de la *J10.1*
- - - Gastroentérite au cours de la *J10.8*
- - - Méningisme dans le cadre de la *J10.8*
- - ¬
- - - Myocardite lors de *J11.8†, I41.1**
- - - Otite moyenne nécrosante aiguë lors de *J11.8†, H67.1**
- - - Polio-encéphalite lors de *J11.8†, G05.1**

Grippe *–suite*
- Laryngite grippale à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- Manifestation
- - Respiratoires
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- - - Virus non identifié ¬ *J11.1*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- - Virus non identifié ¬ *J11.8*
- Pharyngite grippale à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- Pneumonie
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.0*
- - Virus non identifié ¬ *J11.0*
- SAI ¬ *J11.1*
- Saisonnière identifié ¬
- - Encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la *J10.8†, G05.1**
- - Encéphalopathie lors de grippe [Influenza], virus de la *J10.8†, G94.31**
- - Grippe [Influenza] avec otite, virus de la *J10.8†, H67.1**
- - Myocardite lors de grippe [Influenza], virus de la *J10.8†, I41.1**
- - Polio-encéphalite lors de grippe [Influenza], virus de la *J10.8†, G05.1**
- Sans mention d'identification d'un virus spécifique ¬ *J11*
- Virale sans mention d'identification d'un virus spécifique ¬ *J11*
- Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- ¬
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z25.1*
- - Séquelle de la *B94.80*

Gris
- Administration de chloramphénicol au nouveau-né ¬ Syndrome *P93*
- Centraux
- - Cervelet] ¬ H-ABC [Hypomyélinisation avec atrophie des noyaux *E75.2*
- - Sans précision ¬ Maladie dégénérative des noyaux *G23.9*
- - ¬
- - - Calcification des noyaux *G23.8*
- - - Carcinome embryonnaire des noyaux *C71.0*
- - - Germinome des noyaux *C71.0*
- - - Maladies dégénératives précisées des noyaux *G23.8*
- ¬ Syndrome des plaquettes *D69.1*

Griscelli
- Type
- - 1 ¬ Syndrome de *E70.3*
- - 3 ¬ Syndrome de *E70.3*

Griscelli *–suite*
- ¬ Syndrome de *E70.3*

Grisel ¬ Syndrome de *M43.6*

Grisonnement précoce-tremblement essentiel ¬ Syndrome de surdité neurosensorielle- *H90.5, G25.0*

Groenblad-Strandberg ¬ Syndrome de *Q82.8*

Groll-Hirschowitz ¬ Syndrome de *Q87.8*

Grosse atteinte du tissu cérébral ¬ *S06.2*

Grossesse
v./v.a. Complication de la grossesse
v./v.a. Diabète sucré au cours de la grossesse
- 5
- - 13 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.1!*
- - Révolues ¬ Durée de la *O09.0!*
- 14e semaine à 19 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.2!*
- 20e semaine à 25 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.3!*
- 26e semaine à 33 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.4!*
- 34e semaine à 36 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.5!*
- 37e semaine à 41 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.6!*
- Abdominal
- - Fœtus viable ¬ Soins maternels pour *O36.7*
- - ¬
- - - *O00.0*
- - - *P01.4*
- Accouchement puerpéralité
- - Sans précision ¬
- - - Hypertension préexistante compliquant la *O10.9*
- - - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la *O98.9*
- - ¬
- - - Anémie compliquant la *O99.0*
- - - Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la *O10.3*
- - - Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la *O10.1*
- - - Embolies de la *O88*
- - - Gonococcie compliquant la *O98.2*
- - - Hépatite virale compliquant la *O98.4*
- - - Hypertension
- - - - Essentielle préexistante compliquant la *O10.0*
- - - - Secondaire préexistante compliquant la *O10.4*
- - - Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la *O98.7*
- - - Maladies
- - - - Affections précisées compliquant la *O99.8*
- - - - Appareil
- - - - - Circulatoire compliquant la *O99.4*
- - - - - Digestif compliquant la *O99.6*

Grossesse *–suite*
- Accouchement puerpéralité *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Maladies *–suite*
- - - - Appareil *–suite*
- - - - - Respiratoire compliquant la *O99.5*
- - - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la *O98.3*
- - - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la *O99.2*
- - - - Infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la *O98.8*
- - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la *O99.7*
- - - - Protozoaires compliquant la *O98.6*
- - - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la *O99.1*
- - - - Virales compliquant la *O98.5*
- - - Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la *O10.2*
- - - Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la *O26.7*
- - - Syphilis compliquant la *O98.1*
- - - Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la *O99.3*
- - - Tuberculose compliquant la *O98.0*
- Aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux ¬ les états mentionnés compliquant la *O98*
- Albuminurie sévère ¬ Hypertension lors de *O14.1*
- Angulaire ¬ *O00.8*
- Antécédent
- - Avortement ¬ Surveillance d'une *Z35.1*
- - Môle
- - - Hydatiforme ¬ Surveillance d'une *Z35.1*
- - - Vésiculaire ¬ Surveillance d'une *Z35.1*
- - Mort
- - - Néonatales ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - - Nés ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - Obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - Soins prénatals insuffisants ¬ Surveillance d'une *Z35.3*
- - Stérilité ¬ Surveillance d'une *Z35.0*
- Avortement
- - Plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la *O31.1*
- - Répétition ¬ Soins au cours de la *O26.2*
- Cervicale ¬ *O00.8*
- Compliquée par une anomalie d'insertion placentaire ¬ *O44.00*
- Constatée fortuitement ¬ *Z33!*
- Dissimulée ¬ *Z35.3*
- Dysfonctionnement symphysaire ¬ *O26.7*
- Extra-utérin
- - Molaire ¬ Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une *O08.5*
- - ¬ Autres *O00.8*

Grossesse *–suite*
- Fracture
- - Colonne vertébrale ¬ Ostéoporose idiopathique liée à la *O99.8, M80.58*
- - ¬ Ostéoporose idiopathique liée à la *O99.8, M80.59*
- Gémellaire ¬ *P01.5*
- Haut risque
- - Sans précision ¬ Surveillance de *Z35.9*
- - ¬ Surveillance d'autres *Z35.8*
- Infection COVID-19
- - Virus
- - - Identifié ¬
- - - - *O98.5, U07.1!*
- - - - Complications de *O98.5, U07.1!*
- - - Non identifié ¬ *O98.5, U07.2!*
- - ¬ *O98.5, U07.2!*
- Interstitielle ¬ *O00.8*
- Intraligamentaire ¬ *O00.8*
- Légale ¬ interruption de *O04*
- Molaire ¬ Choc septique après *O08.0, R57.2*
- Mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la *O31.2*
- Multiparité élevée ¬ Surveillance de *Z35.4*
- Multiples ¬ Autres *O30.8*
- Naissance et de la perpuéralité ¬ Autres affections hépatiques au cours de la *O26.68*
- Non
- - Désirée ¬ Difficultés liées à une *Z64.0*
- - Précisée ¬ Durée de la *O09.9!*
- Normale ¬ Surveillance d'une *Z34*
- Origine de soins obstétricaux ¬ les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la *O98*
- Ovarienne ¬ *O00.2*
- Plus de 41 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.7!*
- Prééclampsie surajoutée ¬ Hypertension essentielle préexistante au cours de la *O11*
- Prolongée ¬ *O48*
- Puerpéralité lactation ¬ états mentionnés cours
- - *O91*
- - *O92*
- Risques liée à des problèmes sociaux ¬ *Z35.8*
- SAI ¬
- - *Z33!*
- - Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la *O23.9*
- Sans précision ¬
- - Affection liée à la *O26.9*
- - Complication d'une anesthésie au cours de la *O29.9*
- - Complication veineuse de la *O22.9*
- - Hémorragie du début de la *O20.9*
- - Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la *O23.9*
- - Vomissements de la *O21.9*

Grossesse *–suite*
- Source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né ¬ Interruption de la *P96.4*
- Syndrome HELLP [Hemolysis, elevated liver function test, low platelet counts] ¬ *O14.2*
- Terme ¬ incapacité de mener une *N97*
- Thérapeutique ¬ interruption de *O04*
- Travail accouchement
- - Puerpéralité ¬ Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la *O95*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la *P04.0*
- Trigémellaire ¬ *P01.5*
- Trompe de Fallope ¬ *O00.1*
- Tubaire ¬ *O00.1*
- ¬
- - Anomalie du tissu pelvien lors de la *O34.9*
- - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la *O29.2*
- - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.1*
- - Cancer diagnostiqué pendant la *C80.9, O99.8*
- - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la *O29.4*
- - Cholestase (intrahépatique) au cours de la *O26.60*
- - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Complication
- - - Anesthésie au cours de la *O29.8*
- - - Cardiaques d'une anesthésie au cours de la *O29.1*
- - - Impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la *O29.2*
- - - Maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la *O29*
- - - Pulmonaires d'une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la *O29.5*
- - - Veineuses de la *O22.8*
- - Diabète sucré survenant au cours de la *O24.4*
- - Échec ou difficulté d'intubation au cours de la *O29.6*
- - Eclampsie au cours de la *O15.0*
- - Éruption polymorphe de la *O26.88*
- - Examen et test de *Z32*
- - Faible prise de poids au cours de la *O26.1*
- - Hémorragies du début de la *O20.8*
- - Hémorroïdes au cours de la *O22.4*
- - Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la *O13*

Grossesse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hyperthyroïdie familiale liée à la *O99.2, E05.9*
- - Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la *O23.4*
- - Infections
- - - Appareil génital au cours de la *O23.5*
- - - Parties de l'appareil urinaire au cours de la *O23.3*
- - - Rénales au cours de la *O23.0*
- - - Urétrales au cours de la *O23.2*
- - - Vésicales au cours de la *O23.1*
- - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.1*
- - Interruption de *Z30.3*
- - Lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris interruption
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- - Maladies non précisées associées à la *O26.88*
- - Malformation des organes pelviens lors de la *O34.9*
- - Malnutrition au cours de la *O25*
- - Néphrite pendant la *O26.81*
- - Néphropathie liée à la *O26.81*
- - Névrite périphérique pendant la *O26.83*
- - Nouveau-né affecté par une salpingo-oophorite de la mère pendant la *P00.8*
- - Ostéoporose idiopathique liée à la *O99.8, M81.59*
- - Phlébothrombose profonde au cours de la *O22.3*
- - Pneumonie chimique d'aspiration dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Pneumonie par aspiration dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Prééclampsie durant la *O14.9*
- - Prise de poids excessive au cours de la *O26.0*
- - Prurit pendant la *O26.88*
- - Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la *O29.3*
- - Rétention d'un stérilet au cours d'une *O26.3*
- - Rupture de la trompe (de Fallope), due à la *O00.1*
- - Stéatose hépatique aiguë de la *O26.68*
- - Syndrome
- - - Anaphylactoïde pendant la *O88.1*
- - - Canal carpien pendant la *O26.82*
- - - Enfant dont la mère a un diabète de la *P70.0*
- - - Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Tétanie pendant la *A34*

Grossesse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Thrombophlébite
- - - Membres inférieurs au cours de la *O22.2*
- - - Superficielle au cours de la *O22.2*
- - Thrombose
- - - Sinus veineux cérébral au cours de la *O22.5*
- - - Veineuse cérébrale au cours de la *O22.5*
- - Varice
- - - Membres inférieurs au cours de la *O22.0*
- - - Organes génitaux au cours de la *O22.1*
- - - Périnée, de vagin et de vulve au cours de la *O22.1*
- - - SAI au cours de la *O22.0*
- - Vomissement
- - - Compliquant la *O21.8*
- - - Dus à des maladies classées ailleurs, compliquant la *O21.8*
- - - Tardifs de la *O21.2*

Grossesse extra-utérine
- Molaire
- - Sans précision ¬ Complication consécutive à un avortement, une *O08.9*
- - ¬
- - - Choc consécutif à un avortement, une *O08.3*
- - - Complication
- - - - Consécutives à un avortement, une *O08.8*
- - - - Veineuses consécutives à un avortement, une *O08.7*
- - - Embolie consécutive à un avortement, une *O08.2*
- - - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une *O08.1*
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une *O08.0*
- - - Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une *O08.4*
- - - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une *O08.6*
- Sans précision ¬ *O00.9*
- ¬
- - Choc septique après *O08.0, R57.2*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.4*
- - Rupture de *O00*

Grossesse multiple
- Présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus ¬ Soins maternels pour *O32.5*
- Sans précision ¬ *O30.9*
- ¬
- - Complications spécifiques à une *O31.8*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.5*

Grosseur dans la glande mammaire ¬ *R92*

Grouchy de type I ¬ Syndrome de *Q93.5*

Groupe
- A
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques, *B95.0!*
- - ¬
- - - Dysenterie à shigelles du *A03.0*
- - - Hyperlipidémie, *E78.0*
- - - Infection
- - - - Shigella du *A03.0*
- - - - Streptocoques, *A49.10*
- - - PANDAS [Maladie neuropsychiatrique auto-immune pédiatrique avec infection streptococcique du *G25.88, B95.0!, F07.8*
- - - Septicémie à streptocoques, *A40.0*
- - - Syndrome neuropsychiatrique à apparition aiguë associé à une infection à streptocoques du *G25.88, B95.0!, F07.8*
- Acinetobacter baumannii multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.11!*
- - 3MRGN ¬ *U81.31!*
- - 4MRGN ¬ *U81.51!*
- B
- - Prématuré ¬ Sepsis à streptocoques du *P36.0*
- - ¬
- - - Dysenterie à shigelles du *A03.1*
- - - Shigellose à shigelles du *A03.1*
- C
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques, *B95.41!*
- - ¬
- - - Dysenterie à shigelles du *A03.2*
- - - Hyperlipidémie, *E78.2*
- - - Infection
- - - - Shigella du *A03.2*
- - - - Streptocoques, *A49.12*
- - - Shigellose à shigelles du *A03.2*
- Cétones ¬ Solvants du *L24.2*
- Chloramphénicol ¬ Intoxication: *T36.2*
- Composés chlorés ¬ Solvants du *L24.2*
- Cyclohexane ¬ Solvants du *L24.2*
- D
- - Entérocoques
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques de *B95.2!*
- - - ¬ Septicémie à streptocoques, *A40.2*
- - ¬
- - - Dysenterie à shigelles du *A03.3*
- - - Hyperlipidémie, *E78.3*
- - - Infection
- - - - Shigella du *A03.3*
- - - - Streptocoques, *A49.13*
- - - Shigellose à shigelles du *A03.3*
- Échinocandines
- - Non résistant aux triazoles ¬ Candida auris résistant aux antifongiques du *U83.20!*

Groupe *–suite*
- Échinocandines *–suite*
- - Triazoles, résistant au fluconazole ¬ Candida auris résistant aux antifongiques du *U83.21!*
- Ester ¬ Solvants du *L24.2*
- G
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques, *B95.42!*
- - ¬ Infection à streptocoques, *A49.14*
- Glycol ¬ Solvants du *L24.2*
- HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ *B96.3!*
- Hydrocarbures ¬ Solvants du *L24.2*
- Indéterminé (I)] ¬ Lèpre indéterminée [*A30.0*
- Sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ Réaction à une incompatibilité de *T80.3*
- Triazoles
- - Sauf aspergillus fumigatus résistant au fluconazole seulement ¬ Aspergillus fumigatus résistant aux antifongiques du *U83.3!*
- - ¬ Candida albicans résistant aux antifongiques du *U83.0!*
- ¬
- - Délinquance «de *F91.2*
- - Troubles des conduites, type «en *F91.2*
- - Vaccination non effectuée raison pression
- - - *Z28*
- - - *Z53*
- - Vols en *F91.2*

Grover] ¬ Dermatose acantholytique transitoire [*L11.1*

Grubben-de Cock-Borghgraef ¬ Syndrome de *Q87.8*

Gruber ¬ Syndrome de Meckel- *Q61.9*

Grütz
v./v.a. Bürger-Grütz

GSD
- Déficit
- - Aldolase A musculaire ¬ *E74.0*
- - Enzyme
- - - Branchante
- - - - Forme neuromusculaire périnatale fatale ¬ *E74.0*
- - - - ¬ *E74.0*
- - - Débranchante ¬ *E74.0*
- - GLUT2 ¬ *E74.0*
- - Glycogène synthase hépatique ¬ *E74.0*
- - Lactate déshydrogénase ¬ *E74.4*
- - Phosphoglycérate kinase ¬ *E74.0*
- - Phosphorylase kinase
- - - Musculaire ¬ *E74.0*
- - - ¬ *E74.0*
- Glycogénose] par déficit en phosphoglucomutase ¬ *E74.0*
- Maladie de stockage du glycogène] ¬ *E74.0*
- Type

GSD *–suite*
- Type *–suite*
- - 0a ¬ *E74.0*
- - 0b ¬ *E74.0*
- - 1 ¬ *E74.0*
- - 1b ¬ *E74.0*
- - 2 ¬ *E74.0*
- - 3 ¬ *E74.0*
- - 4
- - - Forme neuromusculaire
- - - - Congénitale ¬ *E74.0*
- - - - Périnatale fatale ¬ *E74.0*
- - - ¬ *E74.0*
- - 5 ¬ *E74.0*
- - 6 ¬ *E74.0*
- - 7 ¬ *E74.0*
- - 9 ¬ *E74.0*
- - 9B ¬ *E74.0*
- - 9D ¬ *E74.0*
- - 9E ¬ *E74.0*
- - 12 ¬ *E74.0*

GSDX type 13 ¬ *E74.0*

GTP cyclohydrolase I ¬ Déficit en *E70.1*

GTPCH ¬ Déficit en *E70.1*

Guadalajara type
- 1 ¬ Camptodactylie de *Q87.1*
- 2 ¬ Camptodactylie de *Q87.1*
- 3 ¬ Camptodactylie de *Q87.0*

Guam-Parkinson ¬ Complexe de démence de *G21.8†, F02.8**

Guanéthidine ¬ *T46.5*

Guanidinoacétate méthyltransférase ¬ Déficit en *E72.8*

Guanine phosphoribosyltransférase grade IV ¬ Déficit en hypoxanthine *E79.1*

Guanylate cyclase 2C ¬
- Diarrhée infantile chronique par hyperactivité de la *K52.8*
- Iléus méconial par déficit en *P76.0*

Gubler
v./v.a. Millard-Gubler-Foville

Guéri ¬ Infarctus du myocarde: *I25.2*

Guérin-Stern ¬ Syndrome de *Q74.3*

Guérison
- Osseux retardé
- - Fusion ou arthrodèse ¬ *M96.82*
- - Ostéotomie ¬ *M96.82*
- Retardé ¬ *T89.03*
- Spontanée ¬ Bébé collodion à *Q80.2*

Guerre
- Hostilités ¬ Exposition à une catastrophe, une *Z65*
- ¬ Lésions dues à des faits de *Y36.9!*

Guglielmo
- Rémission complète ¬ Maladie de Di- *C94.01*
- ¬ Maladie de Di- *C94.00*

Guibaud-Vainsel ¬ Syndrome de *Q78.2, N25.8*

Guillain
v./v.a. Landry-Guillain-Barré

Guillain-Barré ¬
- Polyradiculonévrite de *G61.0*
- Variant
- - Crânien du syndrome de *G61.0*
- - Diplégie faciale avec paresthésies du syndrome *G61.0*
- - Paraparétique du syndrome de *G61.0*
- - Pharyngo-cervico-brachial du syndrome de *G61.0*

Guillain-Barré-Strohl ¬ Syndrome de *G61.0*

Guillermo
v./v.a. Nestor-Guillermo

GUNA [gingivite ulcéro-nécrotique aiguë] ¬ *A69.1*

Gunn ¬ Syndrome de Marcus- *Q07.8*

Günther ¬ Maladie de *E80.0*

Gupta
v./v.a. Van den Ende-Gupta

Gurrieri-Sammito-Bellussi ¬ Syndrome de *Q87.5*

Gusher lié au chromosome X ¬ Syndrome de *H90.8*

Gustavson ¬ Déficience intellectuelle sévère liée à l'X type *Q87.8*

Guttata modéré à sévère ¬ Psoriasis *L40.4, L40.70!*

Guttmacher ¬ Syndrome de *Q74.8, Q54.9*

GVH
- Chronique
- - Muqueux buccal stade
- - - 1 ¬ Maladie *T86.05†, K93.41**
- - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, K93.42**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, K93.43**
- - Peau stade
- - - 1 ¬ Maladie *T86.05†, L99.21**
- - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, L99.22**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, L99.23**
- - Poumon stade
- - - 1 ¬ Maladie *T86.06†, J99.21**
- - - 2 ¬ Maladie *T86.07†, J99.22**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, J99.23**
- - Tissu conjonctif stade
- - - 1 ¬ Maladie *T86.05†, M36.51**
- - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, M36.52**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, M36.53**
- - Voie digestive stade
- - - 1 ¬ Maladie *T86.05†, K93.31**
- - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, K93.32**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, K93.33**
- Hépatique chronique stade
- - 1 ¬ Maladie *T86.05†, K77.21**
- - 2 ¬ Maladie *T86.06†, K77.22**
- - 3 ¬ Maladie *T86.07†, K77.23**
- Oculaire chronique stade

GVH *–suite*
- Oculaire chronique stade *–suite*
- - 1 ¬ Maladie *T86.05†, H58.21**
- - 2 ¬ Maladie *T86.06†, H58.22**
- - 3 ¬ Maladie *T86.07†, H58.23**
- Vulvo-vaginal chronique stade
- - 1 ¬ Maladie *T86.05†, N77.21**
- - 2 ¬ Maladie *T86.06†, N77.22**
- - 3 ¬ Maladie *T86.07†, N77.23**
- ¬ Maladie *T86.09*

Gynécologique (de routine) (général) ¬ Examen *Z01.4*

Gynécomastie ¬ *N62*

Gyrata
- Chorioideae ¬ Atrophia *H31.2*
- Primitif non essentiel ¬ Cutis verticis *Q82.8*
- ¬ Atrophia *H31.2*

H. influenzae
v./v.a. Haemophilus influenzae

H. pylori
v./v.a. Helicobacter pylori

Haan
v./v.a. Sutherland-Haan

Haas] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête de l'humérus [*M92.0*

Haberland ¬ Syndrome de *E88.29*

Habermann] ¬ Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha- *L41.0*

Habitudes
- Alimentaires inadéquats ¬ Régime et *Z72.8*
- Impliquant la langue, les lèvres ou les doigts ¬ Malocclusion due à: *K07.5*
- Impulsions
- - Sans précision ¬ Trouble des *F63.9*
- - ¬ Autres troubles des *F63.8*

Habitus
- Marfanoïde
- - Scoliose associé à NKAP ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie facial- *Q87.0*
- - ¬ Syndrome
- - - Cutis laxa néonatale- *Q87.8*
- - - Microcéphalie, glomérulonéphrite et *Q87.8*
- Mince ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-microcéphalie-malformation corticale- *Q87.8*

HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe *B96.3!*

Haddad ¬ Syndrome de *G47.30, Q43.1*

Hadziselimovic ¬ Syndrome
- *Q87.8*
- Microcéphalie-facio-cardio-squelettique, type *Q87.8*

Haemaphysalis longicornis ¬
- Fièvre à tiques *A93.8*
- Syndrome de fièvre avec thrombocytopénie sévère à *A93.8*

Haematobium ¬ Schistosomiase due à Schistosoma *B65.0*

Haemophilus
- Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [*B96.3!*
- Aegyptius ¬ Infection généralisée à *A48.4*
- ¬
- - Bactériémie à *A49.83*
- - Infection à *A49.83*

Haemophilus influenzae
- Influenzae] ¬ *B96.3!*
- Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.3!*
- Type b
- - Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, *Z27.8*
- - ¬ Infection à *A49.2*
- ¬

Haemophilus influenzae *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Arthrite à *M00.89, B96.3!*
- - Bactériémie à *A49.2*
- - Bronchite aiguë due à *J20.1*
- - Bronchopneumonie à *J14*
- - Choc septique à *A41.3, R57.2*
- - Colpite atrophique à *N95.2, B96.3!*
- - Laryngite à *J04.0, B96.3!*
- - Laryngotrachéite à *J04.2, B96.3!*
- - Méningite à *G00.0*
- - Méningo-encéphalite à *G04.2, B96.3!*
- - Méningo-encéphalomyélite à *G04.2, B96.3!*
- - Pneumonie congénitale à *P23.6, B96.3!*
- - Pneumonie due à *J14*
- - Septicémie à *A41.3*

Hagberg-Santavuori ¬ Maladie de *E75.4*

Hageman ¬
- Carence en facteur *D68.25*
- Déficience du facteur *D68.25*
- Maladie d' *D68.25*

Haglund
- I ¬ Syndrome de *M77.3*
- ¬
- - Exostose de *M77.3*
- - Ostéochondrose de *M92.6*

Hailey ¬ Maladie de Gougerot- *Q82.8*

Haim-Munk ¬ Syndrome de *Q82.8*

Hairy cell leukemia ¬ *C91.40*

Hakola
v./v.a. Nasu-Hakola

Halal ¬ Dysplasie ectodermique hidrotique type *Q82.8*

Halal-Setton-Wang ¬ Syndrome de *Q82.8*

Halasz ¬ Syndrome de *Q26.8*

Haleine fétide ¬ *R19.6*

Halitose extra-orale autosomique récessive due à un déficit en méthanethiol oxydase ¬ *E88.8*

Hall
v./v.a. Golabi-Ito-Hall
v./v.a. Pallister-Hall
v./v.a. Sheldon-Hall
- ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire avec dislocations multiples, type *Q77.7*

Hallermann-Streiff-like ¬ Syndrome de *Q87.0*

Hallervorden-Spatz ¬ Syndrome de *G23.0*

Hall-Hittner ¬ Syndrome de *Q87.8*

Hallopeau
- Pemphigus végétant] ¬ Syndrome d' *L10.1*
- ¬ Acrodermatite continue de *L40.2*

Hall-Riggs ¬ Syndrome de *Q87.8*

Hallucinations
- Auditives ¬ *R44.0*
- Sans précision ¬ *R44.3*
- Visuelles ¬ *R44.1*
- ¬ Autres *R44.2*

Hallucinatoire
- Chronique ¬ Psychose *F28*
- Organique
- - Non alcoolique) ¬ État *F06.0*
- - ¬ État *F06.0*
- Origine organique ¬ États délirants et états délirants et *F06.2*

Hallucinogène
- Sang ¬ Présence d' *R78.3*
- Sans précision ¬ Intoxication: Psychodysleptiques [*T40.9*
- ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d' *F16*

Hallux
- Rigidus ¬ *M20.2*
- Valgus
- - Acquis) ¬ *M20.1*
- - ¬ Syndrome de colobome maculaire-fente palatine- *Q87.8*
- Varus
- - Congénital
- - - Polysyndactylie préaxiale ¬ Syndrome d' *Q66.3, Q70.4*
- - - ¬ *Q66.3*
- - ¬
- - - *M20.3*
- - - Syndrome de brachydactylie préaxiale- *Q73.8, Q66.3*

Halogéné
- Hydrocarbures
- - Aliphatiques
- - - Aromatiques, sans précision ¬ Effet toxique: Dérivé *T53.9*
- - - ¬ Effet toxique: Autres dérivés *T53.6*
- - Aromatiques ¬ Effet toxique: Autres dérivés *T53.7*
- ¬
- - Effet toxique: Insecticides *T60.1*
- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Carburant *X49.9!*

Halos visuels ¬ *H53.1*

Halothane ¬ Lésion due à l' *T41.0*

Hamamy ¬ Syndrome de *Q87.0*

Hamanishi-Ueba-Tsuji ¬ Syndrome de *G60.0, Q68.1*

Hamano-Tsukamoto ¬ Syndrome de *G12.2, H91.9*

Hamartomateux associé à PTEN ¬ Syndrome tumoral *Q85.8*

Hamartome
- Angio-eccrine ¬ *Q85.8*
- Basaloïde folliculaire généralisé ¬ Syndrome d' *Q85.8*
- Combiné de l'épithélium pigmentaire et de la rétine ¬ *D31.2*
- Hypothalamiques avec épilepsie gélastique ¬ *Q85.8, G40.2*
- Kystique hépatique ¬ *D13.4*
- Langue-polysyndactylie ¬ Syndrome d'anomalie cardiaque- *Q87.8*

Hamartome *–suite*
- Musculaire lisse congénital ¬ *Q85.8*
- SAI ¬ *Q85.9*

Hamel
v./v.a. Sengers-Hamel-Otten
- ¬ Syndrome
- - Cérébro-palato-cardiaque d' *Q87.8*
- - Neurodégénératif lié à l'X type *G31.88*

Hamman Rich
- Exacerbation aiguë ¬ Syndrome de *J84.11*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Syndrome de *J84.10*
- ¬ Syndrome de *J84.10*

HANAC] ¬ Syndrome héréditaire d'angiopathie-néphropathie-anévrismes-crampes musculaires [*Q28.88, Q61.8*

Hanche
- Antérieure ¬ Luxation de la *S73.02*
- Bassin
- - Sans précision ¬ Ostéochondrite juvénile de la *M91.9*
- - ¬ Autres ostéochondrites juvéniles de la *M91.8*
- Bilatérale ¬
- - Luxation congénitale de la *Q65.1*
- - Subluxation congénitale de la *Q65.4*
- Cuisse
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.81*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.84*
- - Décollement sous-cutané (fermé) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.86*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.82*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.83*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.6*
- - Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de la *S78.9*
- - SAI ¬ Plaie ouverte de la *S71*
- - Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S79.9*
- - - Superficielle de la *S70.9*
- - ¬
- - - Écrasement de la *S77.2*
- - - Gelure superficielle de la *T33.6*
- - - Lésion traumatique
- - - - Multiples
- - - - - Muscles et tendons au niveau de la *S76.7*
- - - - - Nerfs au niveau de la *S74.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la *S75.7*
- - - - Nerf
- - - - - Niveau de la *S74.8*

Hanche *–suite*
- Cuisse *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lésion traumatique *–suite*
- - - - Nerf *–suite*
- - - - - Non précisé, au niveau de la *S74.9*
- - - - - Sciatique au niveau de la *S74.0*
- - - - Nerf cutané sensitif au niveau de la *S74.2*
- - - - Nerf fémoral au niveau de la *S74.1*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - Niveau de la *S75.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la *S75.9*
- - - - Veine
- - - - - Fémorale au niveau de la *S75.1*
- - - - - Saphène interne au niveau de la *S75.2*
- - - Lésions traumatiques
- - - - Multiples de la *S79.7*
- - - - Précisées de la *S79.8*
- - - - Superficielles multiples de la *S70.7*
- - - Plaies ouvertes multiples de la *S71.7*
- Due à une ostéochondrite juvénile antérieure ¬ Déformation de la *M91.2*
- Dysplasie spondyloépiphysaire modérée due à une mutation du gène COL2A1 ¬ Arthrose précoce de l'articulation de la *Q77.7, M19.95*
- Épaule] ¬ Maladie de Forestier [Pseudopolyarthrite de la *M35.3*
- Fémur ¬ Lésion tissu mou stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la *S71.84!*
- - - Ouverte ou de luxation de la *S71.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la *S71.85!*
- - - Ouverte ou de luxation de la *S71.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la *S71.86!*
- - - Ouverte ou de luxation de la *S71.89!*
- Genou ¬ Amputation traumatique entre la *S78.1*
- Instable (congénitale) ¬ *Q65.6*
- Irritable ¬ *M65.8*
- Jambe sauf région malléolaire pied
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure de la *T24.20*
- - - Corrosion de la *T24.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ Brûlure de la *T24.20*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure
- - - - - *T24.21*
- - - - - *T24.61*
- - - - Corrosion de la *T24.60*
- Ligament
- - Iliofémoral ¬ Entorse et foulure de la *S73.11*
- - Ischiocapsulaire ¬ Entorse et foulure de la *S73.12*

Hanche *–suite*
- Luxable ¬ *Q65.6*
- Membre inférieur sauf cheville pied
- - Degré non précisé ¬
- - - Brûlure de la *T24.0*
- - - Corrosion de la *T24.4*
- - ¬
- - - Brûlure
- - - - Premier degré de la *T24.1*
- - - - Troisième degré de la *T24.3*
- - - Corrosion du premier degré de la *T24.5*
- - - Corrosion du troisième degré de la *T24.7*
- Partie
- - Non précisée ¬ Entorse et foulure de la *S73.10*
- - ¬ Entorse et foulure de la *S73.18*
- Postérieure ¬ Luxation de la *S73.01*
- Ressort» ¬ *R29.4*
- SAI ¬ Fracture de la *S72.08*
- Sans précision ¬
- - Luxation congénitale de la *Q65.2*
- - Luxation de la *S73.00*
- - Malformation congénitale de la *Q65.9*
- - Subluxation congénitale de la *Q65.5*
- Subluxable ¬ *Q65.6*
- Type Beukes ¬ Dysplasie de la *Q65.8*
- Unilatérale ¬
- - Luxation congénitale de la *Q65.0*
- - Subluxation congénitale de la *Q65.3*
- ¬
- - *L02.4*
- - *L03.11*
- - *L04.3*
- - *R02.05*
- - Abcès tuberculeux de la *A18.01†, M01.15**
- - Amputation traumatique de l'articulation de la *S78.0*
- - Angiosarcome de la *C49.2*
- - Anomalie congénitale de la *Q74.2*
- - Arthrite chronique juvénile avec début systémique, articulation de la *M08.25*
- - Articulation de la *T84.14*
- - Bursites de la *M70.7*
- - Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la *D04.7*
- - Carcinome à cellules de Merkel de la peau de la *C44.7*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la *T84.04*
- - Contusion de la *S70.0*
- - Dermato-arthrite lipoïdique, articulation de la *E78.88†, M14.35**
- - Écrasement de la *S77.0*
- - Épanchement de l'articulation de la *M25.45*
- - Fibrosarcome de la *C49.2*
- - Fracture ouverte de la *S72.08, S71.87!*

Hanche *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hydarthrose intermittente, articulation de la *M12.45*
- - Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la *T79.61*
- - Lésion traumatique de muscles et de tendons de la *S76.0*
- - Luxation de la *S73.08*
- - Malformations congénitales de la *Q65.8*
- - Mélanome
- - - In situ du membre inférieur, y compris la *D03.7*
- - - Malin
- - - - Familial de la *C43.7*
- - - - Membre inférieur, y compris la *C43.7*
- - Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la *D22.7*
- - Nécrose aseptique de la *M87.95*
- - Nécrose avasculaire de la *M87.95*
- - Ostéoblastome des os de la *D16.8*
- - Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la *M91.8*
- - Ostéochondrose disséquante familiale de l'articulation de la *M93.25*
- - Plaie ouverte de la *S71.0*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.64*
- - Rhabdomyosarcome des tissus mous de la *C49.2*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique de la *C49.2*
- - Sarcome de tissu conjonctif de la *C49.2*
- - Sarcome des tissus mous de la *C49.2*
- - Sarcome pléomorphe indifférencié de la *C49.2*
- - Schwannome malin des nerfs de la *C47.2*
- - TBC [Tuberculose] de la *A18.0†, M01.15**
- - Tissu mou: *C79.86*
- - Tuberculose de l'articulation de la *A18.0†, M01.15**
- - Tumeur bénigne
- - - Peau du membre inférieur, y compris la *D23.7*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la *D21.2*
- - Tumeur maligne
- - - Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la *C47.2*
- - - Peau du membre inférieur, y compris la *C44.7*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la *C49.2*
- - Tumeur ténosynoviale à cellules géantes de l'articulation de la *M12.25*

Handicap
- Handicap léger ¬ Maladie de Parkinson sans *G20.0*
- Léger
- - Fluctuation
- - - Effet ¬

Handicap *–suite*
- Léger *–suite*
- - Fluctuation *–suite*
- - - Effet ¬ *–suite*
- - - - Maladie de Parkinson à début précoce avec un *G20.01*
- - - - Parkinsonisme atypique juvénile avec un *G20.01*
- - - Efficacité ¬ Syndrome de Parkinson héréditaire tardif avec *G20.01*
- - Sans fluctuation
- - - Effet ¬
- - - - Maladie de Parkinson à début précoce avec un *G20.00*
- - - - Parkinsonisme atypique juvénile avec un *G20.00*
- - - Efficacité ¬ Syndrome de Parkinson héréditaire tardif avec *G20.00*
- - ¬ Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un *G20.0*
- Lourd
- - Fluctuation
- - - Effet ¬
- - - - Maladie Parkinson début précoce
- - - - - *G20.11*
- - - - - *G20.21*
- - - - Parkinsonisme atypique juvénile
- - - - - *G20.11*
- - - - - *G20.21*
- - - Efficacité ¬ Syndrome Parkinson héréditaire tardif
- - - - *G20.11*
- - - - *G20.21*
- - Sans fluctuation
- - - Effet ¬
- - - - Maladie Parkinson début précoce
- - - - - *G20.10*
- - - - - *G20.20*
- - - - Parkinsonisme atypique juvénile
- - - - - *G20.10*
- - - - - *G20.20*
- - - Efficacité ¬ Syndrome Parkinson héréditaire tardif
- - - - *G20.10*
- - - - *G20.20*
- Modéré à lourd ¬ Maladie de Parkinson avec un *G20.1*
- ¬ Maladie de Parkinson avec un très lourd *G20.2*

Handigodu ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Handmaker
v./v.a. Silverman-Handmaker

Hand-Schüller-Christian ¬ Syndrome de *C96.5*

Hanhart
v./v.a. Richner-Hanhart
- Syndrome d'hypoglossie-hypodactylie] ¬ Syndrome de *Q87.0*

Hanot ¬ Syndrome de *K74.3*

Hanta
- Hantavirus] avec manifestations rénales ¬ Maladie à virus *A98.5†, N08.0**
- Manifestations pulmonaires ¬ Maladie à virus *B33.4†*
- SCPH] ¬ Syndrome cardio-pulmonaire à virus *B33.4†, J17.1**
- ¬ Syndrome cardio-pulmonaire à virus *B33.4†, J17.1**

Hantavirus
- Manifestations rénales ¬ Maladie à virus Hanta [*A98.5†, N08.0**
- SPH] ¬ Syndrome pulmonaire à *B33.4†, J17.1**
- ¬ Fièvre à *A98.5*

Hao-Fountain ¬ Syndrome *Q87.0*

Haploinsuffisance
- AIOLOS ¬ Déficit immunitaire avec dérèglement immunitaire dû à une *D84.8*
- CTLA-4 ¬ Syndrome lymphoprolifératif auto-immun dû à une *D47.7*
- EP300 ¬ Syndrome de Rubinstein-Taybi par *Q87.2*
- FOXN1 ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- IKAROS ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- NFAT [facteur nucléaire des lymphocytes T activés]-5 ¬ *D84.8*
- PDE4D ¬ Syndrome par *Q93.5*
- RELA ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- SETD5 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie faciale par *Q87.0*

Hapnes-Boman-Skeie ¬ Syndrome de *Q74.0*

Happle
v./v.a. Conradi-Hünermann-Happle

Haptocorrine ¬ Déficit en *E53.8*

Harada ¬ Maladie de *H30.8*

Harboyan ¬ Syndrome de *H18.5, H90.5*

HARD ¬ Syndrome *Q04.3*

Harderoporphyrie ¬ *E80.2*

Hardikar ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Harel
v./v.a. Yuan-Harel-Lupski

Harel-Yoon ¬ Syndrome de *G31.81*

Harlequin ¬ Syndrome de *G90.88*

Hartnup ¬ Maladie de *E72.0*

Hartsfield ¬ Syndrome de *Q87.8*

Hasard ou des paris ¬ Participation à des jeux de *Z72.8*

Hasharon
v./v.a. Rambam-Hasharon

Hashimoto ¬
- Lobulite lymphocytaire sclérosante au cours de thyroïdite de *E06.3, N61*
- Thyroïdite (de): *E06.3*

Hashimoto-Pritzker ¬ Syndrome d' *P83.8*

Hashitoxicose (transitoire) ¬ *E06.3*

Hashomer
v./v.a. Tel Hashomer

Haspeslagh-Fryns-Muelenaere ¬ Syndrome de *Q87.8*

H-ATTR [Amylose à transthyrétine héréditaire] ¬ *E85.2*

Hauser
v./v.a. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Hautes ¬ Surdité partielle ou totale (pour): fréquences *H91.9*

Hauteur fonctionnelle lésions moelle épinière
- C1-C3 ¬ *G82.60!*
- C4-C5 ¬ *G82.61!*
- C6-C8 ¬ *G82.62!*
- D11-L1 ¬ *G82.65!*
- D1-D6 ¬ *G82.63!*
- D7-D10 ¬ *G82.64!*
- L2-S1 ¬ *G82.66!*
- Non précisée ¬ *G82.69!*
- S2-S5 ¬ *G82.67!*

Haverhill ¬ Fièvre d' *A25.1*

Hawaiiensis ¬ Infection à Drechslera *B43.8*

Hawkinsinurie ¬ *E70.2*

Hayward
v./v.a. Juberg-Hayward

Hay-Wells ¬ Syndrome de *Q82.4*

Hb Zurich) ¬ Hémoglobine instable (*D58.2*

Hb-C ¬ Maladie à *D58.2*

HBc identifié ¬ Hépatite B avec antigène *B18.19*

Hb-Cologne ¬ Anomalie de l'hémoglobine, *D58.2*

Hb-D ¬ Maladie à *D58.2*

Hb-E ¬ Maladie à *D58.2*

HBe identifié ¬ Hépatite B avec antigène *B18.19*

HbF] ¬ Persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [*D56.4*

Hb-M] ¬ Hémoglobinose M [*D74.0*

HBs
- Identifié ¬ Hépatite B avec antigène *B18.19*
- ¬
- - Anémie falciforme [*D57.1*
- - Hépatite associée à l'antigène *B18.19*

Hb-S ¬ Trait *D57.3*

Hb-SC ¬ Maladie à *D57.2*

Hb-SD ¬ Maladie à *D57.2*

Hb-SE ¬ Maladie à *D57.2*

Hb-SS avec crise ¬ Maladie *D57.0*

HCL
- V [variante de la leucémie à tricholeucocytes] en rémission complète ¬ *C91.41*
- ¬ *C91.40*

HDR ¬ Syndrome *Q87.8*

Heavy chain disease ¬ *C88.20*

Heavy-or-large-for-dates ¬ Autres *P08.1*

Hebdomadis ¬ Infection à Leptospira interrogans *A27.8*

Hébéphrénie ¬ *F20.1*

Hébéphrénique ¬ Schizophrénie *F20.1*

Heberden (avec arthropathie) ¬ Nodosités d' *M15.1*

Hebra
- Jock itch] ¬ Eczéma marginé de *B35.6*
- ¬
- - Pityriasis rubra (*L26*
- - Prurigo (de): *L28.2*

HEC ¬ Syndrome *Q87.8*

Hecht ¬ Syndrome de *Q68.8*

Hecht-Scott ¬ Syndrome de *Q87.2*

Hedera ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Heerfordt] ¬ Febris uveoparotidea [syndrome de *D86.8*

Heerfordt-Mylius ¬ Syndrome de *D86.8*

Hegglin
v./v.a. May-Hegglin

Heidenhain ¬ Syndrome de *A81.0†, H58.1**

Heilmeyer-Schöner
- Rémission complète ¬
- - Érythroblastose chronique type *D45*
- - Maladie de *D45*
- ¬
- - Érythroblastose chronique type *D45*
- - Maladie de *D45*

Heimler ¬ Syndrome de *Q87.0*

Heiner ¬ Syndrome de *E83.1†, J99.8**

Heinz ¬ Anémie congénitale à corps de *D58.2*

Hélice «winged» ¬ Déficit en *D81.2*

Helicobacter ¬ Infection à *A49.88*

Helicobacter pylori
- Cours ulcère
- - Duodénal ¬ Infection à *K26.9, B98.0!*
- - Estomac ¬ Infection à *K25.9, B98.0!*
- Pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B98.0!*
- ¬
- - Gastrite
- - - *K29.7, B98.0!*
- - - Chronique à *K29.5*
- - Infection à *A49.88*

Hélicoïdale ¬ Dégénérescence choriorétinienne péripapillaire *H31.2*

HELIOS ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

HELIX [hypohidrose-déséquilibre électrolytique-dysfonctionnement des glandes lacrymales-ichtyose-xérostomie] ¬ Syndrome *Q87.8*

Hélix ¬ Chondrodermite nodulaire chronique de l' *H61.0*

Heller ¬
- Démence de *F84.3*
- Syndrome de *F84.3*

Hellman
v./v.a. Juberg-Hellman

HELLP
- Hemolysis, elevated liver function test, low platelet counts] ¬ Grossesse avec syndrome *O14.2*
- ¬ Syndrome *O14.2*

Helminthes NCA ¬ Granulome du péritoine dû à des œufs d' *B83.9†, K67.8**

Helminthiase
- Intestinale NCA ¬ *B82.0*
- Intestinales
- - Mixtes ¬ *B81.4*
- - Précisées ¬ Autres *B81.8*
- Mixte SAI ¬ *B81.4*
- Précisées ¬ Autres *B83.8*
- ¬
- - *B83.9*
- - Arthrite au cours de l' *B83.9†, M01.89**
- - Méthodes spéciales pour l'exploration de: Protozooses et *Z11*

Helsmoortel-Van Der Aa ¬ Syndrome de *Q87.8*

Hémangioblastique ¬ Méningiome *D32.9*

Hémangioblastome ¬ *D48.1*

Hémangioendothéliome
- Composite ¬ *D48.1*
- Épithélioïde
- - Foie ¬ *C22.7*
- - Tissu mou
- - - Cou ¬ *C49.0*
- - - Membres
- - - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - - Tête ¬ *C49.0*
- - ¬ *C49.9*
- Kaposiforme
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *C49.2*
- - - Supérieur ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Tête ¬ *C49.0*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - Tronc ¬ *C49.6*
- - ¬ *C49.9*
- Pseudo-myogénique ¬ *D48.1*
- Rétiforme ¬ *D48.1*

Hémangiomatose
- Capillaire pulmonaire ¬ *I27.28, D18.00*
- Néonatale diffuse ¬ *Q82.8*

Hémangiome
- Anastomotique ¬ *D18.00*
- Capillaire familial ¬ *D18.00*
- Caverneux cérébral familial ¬ *Q28.38*
- Cellule fusiforme
- - Tissu cellulaire sous-cutané ¬ *D18.01*
- - ¬ *D18.00*
- Congénital

Hémangiome *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Non involutif
- - - Tissu cellulaire sous-cutané ¬ *D18.01*
- - - ¬
- - - - *D18.00*
- - - - NICH [*D18.00*
- - Partiellement involutif
- - - Tissu cellulaire sous-cutané ¬ *D18.01*
- - - ¬ *D18.00*
- - Rapidement involutif
- - - Tissu cellulaire sous-cutané ¬ *D18.01*
- - - ¬
- - - - *D18.00*
- - - - RICH [*D18.00*
- Corps vertébral ¬ *D18.07*
- Élastotic acquis ¬ *D18.01*
- Épithélioïde ¬ *D18.00*
- Géant infantile ¬ *D18.00*
- Hobnail de la peau ¬ *D18.01*
- Infantile segmentaire ¬ *D18.00*
- Intraosseux ¬ *D18.08*
- Microveinulaire de la peau ¬ *D18.01*
- Papillaire ¬ *D18.01*
- Partie osseuse de la colonne vertébrale ¬ *D18.07*
- Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [*Q87.8*
- Racémeux
- - Rétine ¬ *D18.06*
- - Rétinien isolé ¬ *D18.06*
- Verruqueux ¬ *D18.00*
- ¬
- - *D18.0*
- - Chondrodysplasie avec *Q78.4*

Hémangiome-thrombocytopénie ¬ Syndrome d' *D18.00*

Hémangiopéricytome ¬ *D48.1*

Hémarthrose
- Non traumatique de l'articulation du genou ¬ *M25.06*
- Traumatique
- - Articulation
- - - Capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - - Genou ¬ *S80.0*
- - Ligament SAI ¬ *T14.3*
- ¬ *M25.0*

Hématémèse
- Mélæna néonatals dus à une déglutition de sang maternel ¬ *P78.2*
- Néonatale ¬ *P54.0*
- ¬ *K92.0*

Hématie
v./v.a. Anémie à hématies falciformes

Hématie *–suite*
- Hyperhydratées ¬ Stomatocytose héréditaire avec *D58.8*
- Morphologique SAI ¬ Anomalie des *R71*
- Volume SAI ¬ Anomalie des *R71*

Hématie falciforme
- Drépanocytaire
- - Hétérozygotes doubles ¬ Affections à *D57.2*
- - SAI ¬
- - - Maladie à *D57.1*
- - - Trouble à *D57.1*
- - ¬
- - - Affections à *D57.8*
- - - Trait de la maladie des *D57.3*
- ¬ Béta-thalassemie à *D57.2*

Hématocèle
- Femme ¬ *N94.8*
- SAI des organes génitaux de l'homme ¬ *N50.1*

Hématochézie ¬ *K92.1*

Hématocolpos
- Hématométrie ou hématosalpinx ¬ *N89.7*
- ¬ *N89.7*

Hématocornée ¬ *H18.0*

Hémato-diaphysaire de Ghosal ¬ Dysplasie *Q78.8, D61.9*

Hématogène
- Aiguë ¬ Ostéomyélite *M86.0*
- Chroniques ¬ Autres ostéomyélites *M86.5*
- ¬ Abcès hépatique: *K75.0*

Hématologique
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.0*
- Associé à DDX41 ¬ Syndrome de prédisposition aux cancers *Q99.8*
- Période périnatale, sans précision ¬ Affection *P61.9*
- Précisées de la période périnatale ¬ Autres affections *P61.8*
- Sans précision ¬ Intoxication: Substance essentiellement systémique et *T45.9*
- ¬
- - Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et *T45.8*
- - Maladie par VIH avec trouble *B23.8*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: examens *O35.7*

Hématome
- Artériel traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Auriculaire traumatique ¬ *S00.48*
- Cérébelleux circonscrit ¬ *S06.34*
- Cérébral
- - Cérébelleux multiples
- - - Traumatiques ¬ *S06.23*
- - - ¬ *S06.23*
- - Circonscrit ¬ *S06.33*
- - Contusion cérébrale ¬ *S06.21*

Hématome *–suite*
- Chignon dû à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.1*
- Compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ Hémorragie et *T81.0*
- Cordon ¬ *O69.5*
- Épidural [extra-dural] ¬ *S06.4*
- Foie ¬ Contusion et *S36.11*
- Gaine grands droits lors traitement
- - Falithrom ¬ *D68.33, M62.88*
- - Marcumar ¬ *D68.33, M62.88*
- Intracérébral ¬ *S06.33*
- Ligament large ¬ *N83.7*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Musculaire non traumatique ¬ *M62.8*
- Niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- Non traumatique du pavillon de l'oreille ¬ *H61.1*
- Obstétrical
- - Périnée ¬ *O71.7*
- - Vagin ¬ *O71.7*
- - Vulve ¬ *O71.7*
- Organes sexuels féminins ¬ *N94.8*
- Pelvien d'origine obstétricale ¬ *O71.7*
- Périanal
- - Cause non traumatique ¬ *K64.5*
- - ¬ *K64.5*
- Plaie obstétricale ¬ *O90.2*
- Poumon ¬ Contusion et *S27.31*
- Rein ¬ Contusion et *S37.01*
- Rétroplacentaire
- - Hémorragie importante associée
- - - Afibrinogénémie ¬ *O45.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *O45.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ *O45.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ *O45.0*
- - SAI ¬ *O45.9*
- - ¬ *P02.1*
- Sous-dural
- - Chronique non traumatique ¬ *I62.02*
- - Localisé) dû à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.0*
- Sous-galéal
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P12.2*
- - ¬ *S00.05*
- Spinal subdural de cause non traumatique ¬ *G95.10*
- Splénique ¬ *S36.01*
- Subdural de cause non traumatique chez le nouveau-né ¬ *P52.8*
- Superficiel du fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- Traumatique contusion
- - Cérébelleuse ¬ Hémorragie traumatique, *S06.8*

Hématome *–suite*
- Traumatique contusion *–suite*
- - Intracrânienne SAI ¬ Hémorragie traumatique, *S06.8*
- ¬ Déchirure multiples moyennes avec ou sans *S36.15*

Hématométrie
- Hématosalpinx ¬ Hématocolpos avec *N89.7*
- ¬
- - *N85.7*
- - Hématosalpinx avec *N85.7*

Hématomyélie
- Traumatique SAI ¬ *T14.4*
- ¬ *G95.10*

Hématopoïèse
- Clonale de potentiel indéterminé ¬ *U62.00!*
- Lésion toxique directe de la moelle osseuse corrélée à la dose due à des cytostatiques ¬ Anémie lors de trouble de l' *D61.10*

Hématopoïétique
v./v.a. Organe hématopoïétique
- Apparentés
- - Évolution imprévisible inconnue
- - - Sans précision ¬ Tumeur des tissus lymphoïde, *D47.9*
- - - ¬ Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, *D47.7*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne des tissus lymphoïde, *C96.9*
- - ¬
- - - Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, *Z80.7*
- - - Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, *Z85.7*
- - - Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, *C79.3*
- - - Tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, *C96.7*
- Immunosuppression actuelle ¬
- - État consécutif à une transplantation de cellules-souches *Z94.81*
- - Infection à adénovirus chez un patient ayant subi une greffe de cellules-souches *B34.0, Z94.81*
- Maladie du greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un transplant de cellules souches *T86.0*
- Sans immunosuppression actuelle ¬ État consécutif à une transplantation de cellules-souches *Z94.80*
- ¬
- - Échec d'un transplant de cellules souches *T86.00*
- - Maladie due au VIH avec tumeur maligne du tissu *B21, C96.9*
- - Syndrome de mucopolysaccharidose avec malformations cardiaques congénitales et troubles *Q87.8*

Hématosalpinx
- Hématométrie ¬ *N85.7*
- ¬
- - *N83.6*

Hématosalpinx *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hématocolpos avec hématométrie ou *N89.7*

Hématurie
- Bénigne (de l'enfance) (familiale) ¬ *N02*
- Douloureuse ¬ Syndrome d' *N39.81*
- Récidivante et persistante ¬ *N02*
- Sans précision ¬ *R31*
- Sous traitement anticoagulant ¬ *D68.35*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1*

Hème oxygénase-1 ¬ Déficit en *E88.8*

Hémendothéliome ¬ *D48.1*

Héméralopie ¬ Avitaminose A avec *E50.5†, H58.1**

Hémi 3 ¬ Syndrome *Q87.3*

Hémiagénésie de la thyroïde ¬ *E03.1*

Hémiakinésie ¬ *R29.5*

Hémianencéphalie ¬ *Q00.0*

Hémianopsie
- Hétéronyme) (homonyme) ¬ *H53.4*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, H58.1**

Hémiatrophie
v./v.a. hémidystonie-hémiatrophie
- Faciale progressive ¬ *G51.8*
- ¬ Syndrome d'hémiparkinsonisme- *G31.0†, G22**

Hémibloc
- Antérieur gauche ¬ *I44.4*
- Branche gauche SAI ¬ *I44.6*
- Postérieur gauche ¬ *I44.5*

Hémicéphalie ¬ *Q00.0*

Hemicolite gauche ¬ *K51.5*

Hémiconvulsion-hémiplégie-épilepsie idiopathique ¬ Syndrome *G40.4*

Hémicrânie
- Continue ¬ *G44.0*
- Paroxystique chronique ¬ *G44.0*
- Sens d'une migraine ¬ *G43.9*

Hémidysplasie congénitale-nævus ichtyosiforme-anomalies des membres ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Hémidystonie-hémiatrophie ¬ Syndrome d' *S06.9, G24.8*

Hémifacial
- Clonique ¬ Spasme *G51.3*
- ¬
- - Atrophie ou hypertrophie *Q67.4*
- - Myohyperplasie *Q67.0*
- - Myokymie *G51.3*

Hémihyperplasie
v./v.a. multiple-hémihyperplasie
- Isolée ¬ *Q87.3*

Hémihypertrophie du corps ¬ Hypoglycémie hypoinsulinémique avec *E16.8*

Hémilatérale ¬ Négligence *R29.5*

Hémimégalencéphalie ¬ *Q04.5*

Hémimélie
- Péronière ¬ *Q72.6*
- Radiale ¬ *Q71.4*
- SAI d'un (des) membre(s) SAI ¬ *Q73.8*
- Tibial
- - Polysyndactylie-pouce triphalangé ¬ Syndrome d' *Q87.2*
- - ¬ *Q72.5*
- Ulnaire ¬ *Q71.5*
- ¬ *Q73.8*

Hémimélique ¬ Dysplasie épiphysaire *Q74.8*

Héminégligence ¬ *R29.5*

Hémiparésie hémiplégie
- Flasque ¬ *G81.0*
- Sans précision ¬ *G81.9*
- Spastique ¬ *G81.1*

Hémiparkinsonisme
- Hémiatrophie ¬ Syndrome d' *G31.0†, G22**
- ¬ *G20*

Hémiplégie
- Alternante
- - Enfance ¬ *Q07.8*
- - Nocturne bénigne de l'enfance ¬ *G81.9*
- Embolique en tant qu'événement en cours ¬ *I63.4, G81.9*
- Faciale alternante ¬ *G83.8*
- Flasque ¬ Hémiparésie ou *G81.0*
- Hystérique ¬ *F44.4*
- Post-critique ¬ *G83.8*
- Sans précision ¬ Hémiparésie ou *G81.9*
- Spastique ¬ Hémiparésie ou *G81.1*
- Thrombotique en tant qu'événement en cours ¬ *I63.3, G81.9*
- Transitoire ¬ *G83.8*

Hémiplégique ¬
- Infirmité motrice cérébrale, forme spastique *G80.2*
- Migraine: familiale, *G43.1*

Hémispasme facial ¬ *G51.3*

Hémisphère
- Cérébelleux ¬ Hypoplasie isolée
- - Bilatérale des *Q04.3*
- - Unilatérale des *Q04.3*
- Cérébraux ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Droit ¬ Trouble affectif organique de l' *F07.8*

Hémisphérique
- Corticale ¬ Hémorragie intracérébrale *I61.1*
- Non précisée ¬ Hémorragie intracérébrale *I61.2*
- Sous-corticale ¬ Hémorragie intracérébrale *I61.0*
- Type infantile ¬ Gliome *C71.0*
- ¬ Polymicrogyrie unilatérale *Q04.3*

Hémispondylie] sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Hémivertèbre [*Q76.4*

Hémisporose ¬ *B48.88*

Hémivagin

- Agénésie rénale ¬ Syndrome d'utérus double- *Q51.2, Q60.0*
- Borgne ¬ Utérus bicorne bicervical avec *Q51.3*

Hémivertèbre

- Défaut de segmentation avec scoliose ¬ Synostose d' *Q76.3*
- Dysgénésie uro-génitointestinale ¬ Syndrome d'aphalangie- *Q87.8*
- Hémispondylie] sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*

Hémochromatose

- Africaine ¬ *E83.1*
- Associée à SLC40A1 ¬ *E83.1*
- Autosomique dominante ¬ *E83.1*
- Diabète ¬ *E83.1*
- Digénique ¬ *E83.1*
- Foie ¬ *E83.1†, K77.8**
- Juvénile ¬ *E83.1*
- Liée à TFR2 ¬ *E83.1*
- Myocarde ¬ *E83.1†, I43.1**
- Néonatale ¬ *E83.1*
- Type
- - 1 ¬ Forme symptomatique de l' *E83.1*
- - 2 ¬ *E83.1*
- - 3 ¬ *E83.1*
- - 4 ¬ *E83.1*
- - 5 ¬ *E83.1*
- ¬
- - *E83.1*
- - Anémie réfractaire associée à l' *D46.1*
- - Arthropathie au cours de *E83.1†, M14.59**

Hémodialyse ¬ Complication de l' *T80.9*

Hémodynamique ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet *I25.10*

Hémoglobine

- Anormale SAI ¬ *D58.2*
- C-bêta-thalassémie ¬ *D56.1*
- E-bêta-thalassémie ¬ *D56.1*
- Fœtale
- - Bêta-thalassémie ¬ Syndrome de persistance familiale de l' *D56.4*
- - Drépanocytose ¬ Syndrome de persistance familiale de l' *D56.4, D57.1*
- - HbF] ¬ Persistance héréditaire de l' *D56.4*
- Hb-Cologne ¬ Anomalie de l' *D58.2*
- Instable
- - Hb Zurich) ¬ *D58.2*
- - ¬ Maladie hémolytique à *D58.2*
- Lepore-bêta-thalassémie ¬ *D56.8*
- S hétérozygote ¬ *D57.3*

Hémoglobinopathie

- Sans précision) ¬ Thalassémie (mixte) (avec autre *D56.9*
- Toms River ¬ *D58.2*

Hémoglobinopathie *–suite*

- ¬
- - *D58.2*
- - *D58.2*
- - Anémie méditerranéenne (avec autre *D56.9*
- - Arthropathie au cours d'une *D58.2†, M36.3**
- - Dépistage d' *Z36.8*
- - Ostéonécrose au cours d'une *D58.2†, M90.49**

Hémoglobinose

- M [Hb-M] ¬ *D74.0*
- O-Arab homozygote ¬ *D58.2*

Hémoglobinurie

- Agglutinines froides ¬ *D59.18*
- Due à une hémolyse relevant d'autres causes externes ¬ *D59.6*
- Effort ¬ *D59.6*
- Marche ¬ *D59.6*
- Nocturne
- - Paroxystique ¬ *D59.5*
- - ¬ *D59.5*
- Paroxystique
- - A frigore ¬ *D59.6*
- - Nocturne ¬ *D59.5*
- ¬ *R82.3*

Hémoglobinurique ¬ Paludisme *B50.8*

Hémolymphangiome ¬ *D18.1*

Hémolyse

- Auto-immune ¬ *D59.18*
- Élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome associant une *O14.2*
- Excessif
- - Précisées ¬ Ictère néonatal dû à d'autres *P58.8*
- - Sans précision ¬ Ictère néonatal dû à une *P58.9*
- Relevant d'autres causes externes ¬ Hémoglobinurie due à une *D59.6*

Hemolysis, elevated liver function test, low platelet counts] ¬ Grossesse avec syndrome HELLP [*O14.2*

Hémolytique
v./v.a. Type de maladie

Hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une *D47.0*

Hémopéricarde

- Blessure traumatique par poignardement du cœur ¬ *S26.0*
- Complication récente infarctus aigu du myocarde ¬
- - *I23.0*
- - Rupture de la paroi cardiaque sans *I23.3*
- Non classé ailleurs ¬ *I31.2*
- Traumatique ¬ *S26.0*

Hémopéritoine ¬ *K66.1*

Hémophagocytaire

- Acquise associée à une tumeur maligne ¬ Lymphohistiocytose *C96.9, D76.1*
- Associé à une infection ¬ Syndrome *D76.2*
- Début néonatal] ¬ Syndrome NOCARH [cytopénie-auto-inflammation-éruption cutanée-épisodes de lymphohistiocytose *D76.1*
- Familiale
- - LHF] ¬ Lymphohistiocytose *D76.1*
- - ¬ Réticulose *D76.1*
- ¬
- - Lymphohistiocytose *D76.1*
- - Syndrome *D76.1*

Hémophilie
v./v.a. Pseudohémophilie

- A avec alloanticorps contre le facteur VIII ¬ *D66*
- Acquise ¬ *D68.4*
- B
- - Alloanticorps contre le facteur IX ¬ *D67*
- - Leyden ¬ *D67*
- C ¬ *D68.1*
- Classique ¬ *D66*
- Due
- - Anticorps
- - - Dirigés contre le facteur de von Willebrand ¬ *D68.32*
- - - Inhibant la coagulation ¬ *D68.38*
- - Inhibiteurs produits par le système immunitaire ¬ *D68.38*
- Héréditaire ¬ *D66*
- Inhibiteur
- - Contre facteur
- - - V ¬ *D68.32*
- - - VII ¬ *D68.32*
- - - VIII ¬ *D68.31*
- - - Xa ¬ *D68.32*
- - - XI ¬ *D68.32*
- - - Xia ¬ *D68.32*
- - - XIII ¬ *D68.32*
- - ¬ Déficit facteur
- - - IX dû à une *D68.32*
- - - VIII dû à une *D68.31*
- - - X dû à une *D68.32*
- - - XI dû à une *D68.32*
- Vasculaire ¬ *D68.09*
- ¬
- - Arthrite au cours d' *D66†, M36.2**
- - Arthropathie au cours de l' *D66†, M36.2**

Hémophilique NCA ¬ Déficit en globuline anti- *D66*

Hémophtalmie ¬ *H44.8*

Hémopneumothorax

- Traumatique ¬ *S27.2*
- ¬ *J94.2*

Hémoptysie ¬ *R04.2*

Hémorragie
v./v.a. Saignement
- Accidentelle
- - Avortement ¬ *O08.1*
- - ¬ *P02.1*
- Actuelle ¬
- - Descente placenta
- - - *O44.10*
- - - Sans *O44.00*
- - Placenta praevia
- - - *O44.11*
- - - Descente placenta
- - - - *O44.1*
- - - - Sans *O44.0*
- - - Sans *O44.01*
- Alvéolaire diffuse ¬ *R04.8*
- Anale ¬ *K62.50*
- Ano-rectale ¬ *K62.59*
- Antepartum ¬ *P02.1*
- Anus ¬ *K62.50*
- Artérielle par érosion ¬ *I77.2*
- Associée
- - Marcoumar ¬ *D68.33*
- - Rétention
- - - Incarcération ou l'adhérence du placenta ¬ *O72.0*
- - - Partielle du placenta ou des membranes ¬ *O72.2*
- Bronchique tuberculeuse avec confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.5*
- Canal anal ¬ *K62.50*
- Cérébellaire localisée de cause traumatique ¬ *S06.34*
- Cérébelleuse
- - Fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.6*
- - ¬ *S06.34*
- Cérébrales et rétiniennes ¬ Syndrome d'akinésie fœtale- *G71.2, P52.4*
- Choroïdien
- - Expulsive ¬ *H31.3*
- - SAI ¬ *H31.3*
- Conjonctivale ¬ *H11.3*
- Consécutive à la délivrance ¬ *O72.1*
- Corps vitré
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *H45.0**
- - ¬
- - - *H43.1*
- - - Syphilis tardive avec *A52.7†, H45.0**
- Cours de schistosomiase ¬ Varices gastriques avec indication d' *B65.9†, I98.3**
- Cutané
- - Due à un syndrome de sensibilisation aux érythrocytes ¬ *D69.2*
- - Néonatale ¬ *P54.5*
- Début grossesse
- - Sans précision ¬ *O20.9*

Hémorragie *–suite*
- Début grossesse *–suite*
- - ¬ Autres *O20.8*
- Délivrance (troisième période) ¬ *O72.0*
- Due
- - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ *O69.4*
- - Menace d'avortement ¬ *O20.0*
- - Mutation Pittsburgh de l'alpha-1-antitrypsine ¬ *E88.08†, D77**
- - Négligence ¬ Incision, ponction, perforation ou *Y69!*
- - Prothèses, implants ou greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.2*
- Expulsion du fœtus ou accouchement de l'enfant ¬ *O72*
- Extra-dural
- - Non traumatique ¬ *I62.1*
- - Traumatique) ¬ *S06.4*
- Falithrom ¬ *D68.33*
- Fibrinolytique acquise ¬ *D65.2*
- Fœtale
- - Cours de vasa praevia ¬ *P50.0*
- - SAI ¬ *P50.9*
- Fœtus au cours de vasa praevia ¬ *P50.0*
- Gaine du nerf optique ¬ *H47.0*
- Gastrique SAI ¬ *K92.2*
- Gastro-intestinales néonatales ¬ Autres *P54.3*
- Gorge ¬ *R04.1*
- Hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ *T81.0*
- Immédiates du post-partum ¬ Autres *O72.1*
- Importante
- - Associée
- - - Afibrinogénémie ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - Pendant l'accouchement ¬ *O67.8*
- - Précédant accouchement associée
- - - Afibrinogénémie ¬ *O46.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *O46.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ *O46.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ *O46.0*
- Intestinale SAI ¬ *K92.2*
- Intracérébelleuse ¬ *S06.34*
- Intracérébrale superficielle ¬ *I61.1*
- Intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical ¬ Déchirure et *P10.9*
- Légère ¬ Omphalite du nouveau-né, avec ou sans *P38*

Hémorragie *–suite*
- Liée à un vasa praevia ¬ Lésions chez le nouveau-né dues à une *P50.0*
- Lobe cérébral ¬ *I61.1*
- Méningée ¬ *I60.8*
- Mère ¬ *P02.1*
- Néonatale, sans précision ¬ *P54.9*
- Néonatales précisées ¬ Autres *P54.8*
- Nez ¬ *R04.0*
- Niveau de la trachéotomie ¬ *J95.00*
- Non classée ailleurs ¬ *R58*
- Œsophage ¬
- - *K22.81*
- - Œsophagite par reflux avec *K21.0, K22.81*
- Ombilicales du nouveau-né ¬ Autres *P51.8*
- Orbite ¬ *H05.2*
- Organes génitaux de l'homme ¬ *N50.1*
- Pancréas ¬ *K86.88*
- Parties des voies respiratoires ¬ *R04.8*
- Pendant l'accouchement ¬ Autres *O67.8*
- Per- et postopératoire ¬ Anémie après *D62*
- Périanale ¬ *K62.50*
- Pétéchiale due à un syndrome de sensibilisation aux érythrocytes ¬ *D69.2*
- Placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d' *P02.1*
- Post-partum
- - Atonie utérine) SAI ¬ *O72.1*
- - Tardive et secondaire ¬ *O72.2*
- Précédant accouchement
- - Anomalie de la coagulation ¬ *O46.0*
- - Sans précision ¬ *O46.9*
- - ¬ Autres *O46.8*
- Pression cérébrale lors d'une lésion cranio-cérébrale couverte grave ¬ Compression du cerveau, *S06.21, S01.83!*
- Prolongée ¬ *R79.8*
- Prostatiques ¬ Congestion et *N42.1*
- Rectale néonatale ¬ *P54.2*
- Rectum ¬ *K62.51*
- Retardé sévère
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.1*
- - ¬ Échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une *O07.1*
- - - Sans précision, compliqués d'une *O07.6*
- Rétinienne ¬ *H35.6*
- Rupture
- - Choroïde ¬ *H31.3*
- - Varice œsophagien ¬ Cirrhose
- - - Alcoolique du foie avec *K70.3†, I98.3**
- - - Foie avec *K74.6†, I98.3**
- - - Toxique du foie avec *K71.7†, I98.3**
- SAI ¬ *R58*
- Sous
- - Conjonctival

Hémorragie *–suite*
- Sous *–suite*
- - Conjonctival *–suite*
- - - Due) à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.3*
- - - ¬ *H11.3*
- - Traitement
- - - Falithrom ¬ *D68.33*
- - - Héparine ¬ *D68.34*
- - - Marcoumar ¬ *D68.33*
- - Utilisation long terme
- - - Antiagrégants plaquettaires ¬ *D69.80*
- - - Anticoagulants ¬ *D68.35*
- - - Coumarines (antagonistes de la vitamine K) ¬ *D68.33*
- - - Héparines ¬ *D68.34*
- Sous-épendymaire
- - Envahissement intraventriculaire degré
- - - 2, du nouveau-né ¬ *P52.1*
- - - 3, du nouveau-né ¬ *P52.2*
- - Sans envahissement intraventriculaire) ¬ *P52.0*
- Sphincter rectal ¬ *K62.51*
- Surrénale
- - Due à un sepsis à méningocoques ¬ *A39.1†, E35.1**
- - ¬ *E27.4*
- Surrénalienne néonatale ¬ *P54.4*
- Thyroïde ¬ *E07.8*
- Toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.0*
- Trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale ¬ *P26.0*
- Vaginale néonatale ¬ *P54.6*
- Vasa praevia ¬ *O69.4*
- Ventriculaire
- - Légère à modérée de moins de 50 % du volume ventriculaire, du nouveau-né ¬ *P52.1*
- - Sévère de 50 % ou plus du volume ventriculaire du nouveau-né ¬ *P52.2*
- Vers
- - Circulation maternelle ¬ *P50.4*
- - Jumeau ¬ *P50.3*
- Voies respiratoires, sans précision ¬ *R04.9*
- ¬
- - Angiodysplasie intestin grêle
- - - *K55.32*
- - - Sans indication d'une *K55.31*
- - Gastrite aiguë (érosive) avec *K29.0*
- - Hernie diaphragmatique
- - - Occlusion lésion Cameron
- - - - Érosive aiguë, avec *K44.0, K29.0*
- - - - Ulcéreux
- - - - - Aiguë, avec *K44.0, K25.0*
- - - - - Aiguë, sans *K44.0, K25.3*
- - - - - Chronique, avec *K44.0, K25.4*
- - - - - Chronique, sans *K44.0, K25.7*

Hémorragie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hernie diaphragmatique *–suite*
- - - Sans occlusion lésion Cameron
- - - - Érosive aiguë, avec *K44.9, K29.0*
- - - - Ulcéreux
- - - - - Aiguë, avec *K44.9, K25.0*
- - - - - Aiguë, sans *K44.9, K25.3*
- - - - - Chronique, avec *K44.9, K25.4*
- - - - - Chronique, sans *K44.9, K25.7*
- - Rétention
- - - Partielle du placenta et des membranes, sans *O73.1*
- - - Placenta sans *O73.0*
- - - Produits de la conception après l'accouchement, sans *O73.1*
- - Toux avec *R04.2*
- - Traitement continu
- - - Antiagrégants plaquettaires, sans *Z92.2*
- - - Coumariniques, sans *Z92.1*
- - - Héparines, sans *Z92.1*
- - Varice œsophagien gastrique cours maladies classées chapitres
- - - Mention d' *I98.3**
- - - Sans indication d' *I98.2**

Hémorragie cérébrale
- Due
- - Syphilis ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P10.1*
- Héréditaire amylose
- - Type
- - - Arctique ¬ *E85.4†, I68.0**
- - - Flamande ¬ *E85.4†, I68.0**
- - - Iowa ¬ *E85.4†, I68.0**
- - - Islandais ¬ *E85.4†, I68.0**
- - - Italien ¬ *E85.4†, I68.0**
- - - Néerlandais ¬ *E85.4†, I68.0**
- - - Piémontais ¬ *E85.4†, I68.0**
- - ¬ *E85.4†, I68.0**

Hémorragie épidurale
- Non traumatique ¬ *I62.1*
- ¬ *S06.4*

Hémorragie gastro-intestinale
- Sans précision ¬ *K92.2*
- ¬ *K92.2*

Hémorragie intracérébrale
- Cérébelleuse ¬ *I61.4*
- Hémisphérique
- - Corticale ¬ *I61.1*
- - Non précisée ¬ *I61.2*
- - Sous-corticale ¬ *I61.0*
- Intraventriculaire ¬ *I61.5*
- Localisations multiples ¬ *I61.6*
- Massive ¬ *I61.6*
- Multiples ¬ *I61.6*
- Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.4*

Hémorragie intracérébrale *–suite*
- Profonde ¬ *I61.0*
- Sans précision ¬ *I61.9*
- Traumatiques multiples ¬ *S06.23*
- Tronc cérébral ¬ *I61.3*
- ¬
- - *I61.8*
- - *S06.33*
- - Séquelles d' *I69.1*

Hémorragie intracrânienne
- Due à une anoxie ou une hypoxie ¬ *P52*
- Non
- - Traumatique
- - - Degré 1
- - - - Fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.0*
- - - - Nouveau-né ¬ *P52.0*
- - - Fœtus et du nouveau-né, sans précision ¬ *P52.9*
- - - Sans précision ¬ *I62.9*
- - Traumatiques
- - - Fœtus et du nouveau-né ¬ Autres *P52.8*
- - - ¬ Séquelles d'autres *I69.2*
- Traumatisme obstétrical ¬ Autres déchirures et *P10.8*

Hémorragie intraventriculaire
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.2*
- Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision ¬ *P52.3*

Hémorragie ombilicale
- Massive du nouveau-né ¬ *P51.0*
- Nouveau-né, sans précision ¬ *P51.9*

Hémorragie pendant l'accouchement
- Anomalie de la coagulation ¬ *O67.0*
- Importante associée
- - Afibrinogénémie ¬ *O67.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *O67.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ *O67.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ *O67.0*
- Sans précision ¬ *O67.9*
- ¬ Syndrome de défibrination avec *O67.0*

Hémorragie pulmonaire
- Massive survenant pendant la période périnatale ¬ *P26.1*
- Non précisée survenant pendant la période périnatale ¬ *P26.9*
- SAI ¬ *R04.8*
- Survenant pendant la période périnatale ¬ Autres *P26.8*

Hémorragie rachidienne
- Épidurale postopératoire ¬ *G97.82*
- Non traumatique ¬ *G95.10*
- Sous-arachnoïdienne postopératoire ¬ *G97.84*
- Sous-durale postopératoire ¬ *G97.83*

Hémorragie sous-arachnoïdienne
- Acquise due rupture anévrisme
- - Artère basilaire ¬ *I60.4*

Hémorragie sous-arachnoïdienne *–suite*
- Acquise due rupture anévrisme *–suite*
- - Artère cérébrale moyenne ¬ *I60.1*
- - Artère communicante
- - - Antérieure ¬ *I60.2*
- - - Postérieure ¬ *I60.3*
- - - ¬ *I60.7*
- - Artère vertébrale ¬ *I60.5*
- - Carotidien ¬ *I60.0*
- - Polygone de Willis ¬ *I60.6*
- - Sinus caverneux ¬ *I60.8*
- Anévrismale acquise ¬ *I60.9*
- Artère basilaire ¬ *I60.4*
- Artère cérébrale
- - Moyenne ¬ *I60.1*
- - ¬ *I60.7*
- Artère communicante
- - Antérieure ¬ *I60.2*
- - Postérieure ¬ *I60.3*
- Artère intracrânienne
- - Sans précision ¬ *I60.7*
- - ¬ *I60.6*
- Artère vertébrale ¬ *I60.5*
- Artère: communicante SAI ¬ *I60.7*
- Bifurcation et du siphon carotidien ¬ *I60.0*
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.3*
- Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.5*
- Sans précision ¬ *I60.9*
- Traumatique ¬ *S06.6*
- ¬
- - *I60.8*
- - Séquelles d' *I69.0*
- - Vasospasme au cours d' *I67.80!*

Hémorragie sous-durale
- Chronique non traumatique ¬ *I62.02*
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.0*
- Non traumatique ¬ *I62.0*
- Traumatique
- - Aiguë ¬ *S06.5*
- - ¬
- - - *S06.5*
- - - Conséquences d'une *T90.5*

Hémorragie traumatique
- Hématome traumatique contusion
- - Cérébelleuse ¬ *S06.8*
- - Intracrânienne SAI ¬ *S06.8*
- Secondaire et récidivante ¬ *T79.2*

Hémorragipare ¬ Dystrophie thrombocytaire *D69.1*

Hémorragique
v./v.a. Type de maladie

Hémorroïdaire
- Cutanées résiduelles ¬ Cicatrices *K64.4*
- Stade III ¬ Thrombose *K64.2*
- Thrombose ¬ Paquet *K64.8*

Hémorroïdaire *–suite*
- ¬
- - Affection *K64.9*
- - Anneau *K64.9*
- - Maladie *K64.9*
- - Marisques *K64.4*
- - Paquet *K64.9*
- - Symptômes *K64.9*
- - Thrombose des plexus *K64.5*
- - Varices *K64.9*

Hémorroïdes
- Cours
- - Grossesse ¬ *O22.4*
- - Puerpéralité ¬ *O87.2*
- Deuxième degré ¬ *K64.1*
- Externes
- - Étranglées ¬ *K64.5*
- - Hémorragiques ¬ *K64.5*
- - Incarcérés ¬ *K64.5*
- - ¬
- - - Prolapsus d' *K64.5*
- - - Protrusion d' *K64.5*
- - - Thrombose d' *K64.5*
- - - Ulcère d' *K64.5*
- Internes
- - Étranglées ¬ *K64.8*
- - Incarcérés ¬ *K64.8*
- - ¬
- - - Prolapsus d' *K64.9*
- - - Protrusion d' *K64.9*
- - - Thrombose d' *K64.8*
- - - Ulcère d' *K64.8*
- Premier degré ¬ *K64.0*
- Quatrième degré ¬ *K64.3*
- Saignement
- - Procidence
- - - Effort spontanément réductible
- - - - Réintroduction manuelle possible ¬ *K64.2*
- - - - ¬ *K64.1*
- - - Réintroduction manuelle impossible ¬ *K64.3*
- - SAI ¬ *K64.9*
- - Sans
- - - Indication du degré ¬ *K64.9*
- - - Procidence ¬ *K64.0*
- Sans
- - Complication ¬ *K64.0*
- - Précision ¬ *K64.9*
- Stade
- - 1 ¬ *K64.0*
- - 2 ¬ *K64.1*
- - 3 ¬ *K64.2*
- - 4 ¬ *K64.3*
- Troisième degré ¬ *K64.2*
- ¬

Hémorroïdes *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *K64.8*
- - Inflammation d' *K64.8*

Hémosidérose pulmonaire
- Idiopathique ¬ *E83.1†, J99.8**
- Secondaire ¬ *E83.1†, J99.8**
- ¬ *E83.1†, J99.8**

Hémosidérotique pulmonaire ¬ Anémie *E83.1†, J99.8**

Hémothorax
- Traumatique ¬ *S27.1*
- Tuberculeux
- - Confirmation bactériologique ou histologique NCA ¬ *A15.6*
- - ¬ *A16.5*
- ¬
- - *J94.2*
- - Blessure ouverte avec *S27.1, S21.83!*

HEMS [Hypomyelination of early myelinating structures] ¬ *G37.8*

Hendra
- Encéphalite ¬ Infection au virus *A85.8*
- ¬ Infection à virus *B33.8*

Hengel-Maroofian-Schols ¬ Syndrome de *Q87.0*

Henkin
v./v.a. Bosma-Henkin-Christiansen

Hennekam
v./v.a. Menke-Hennekam
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Hennekam-Beemer ¬ Syndrome de *Q87.8*

Henoch
v./v.a. Schoenlein-Henoch
- ¬ Arthrite au cours de purpura de Schönlein-*D69.0†, M36.4**

Henselae ¬ Bartonellose à Bartonella *A28.1*

Héparane
- Sulfamidase ¬ Déficit en *E76.2*
- Sulfate de l'entérocyte ¬ Déficit congénital en *K63.8*

Héparane-alpha-glucosaminide N-acétyltransférase ¬ Déficit en *E76.2*

Héparine
- Auto-immune ¬ Thrombopénie induite par l' *D69.53*
- Sans hémorragie ¬ Traitement continu par des *Z92.1*
- Type
- - I ¬ Thrombopénie induite par l' *D69.52*
- - II ¬ Thrombopénie induite par l' *D69.53*
- ¬
- - Hémorragie sous
- - - Traitement par une *D68.34*
- - - Utilisation à long terme des *D68.34*
- - Troubles hémorragiques dus aux *D68.34*

Héparino-induite ¬ Thrombocytopénie *D69.52*

Hepatica ¬
- Distomatose hépatique à Fasciola *B66.3†, K77.0**
- Infection à Fasciola *B66.3*

Hépatique
v./v.a. Artère hépatique
v./v.a. Type de maladie

Hépatite
- A
- - Coma hépatique ¬ *B15.0, K72.74!*
- - Sans coma hépatique ¬ *B15.9*
- - ¬ *B15.9*
- Acquise à toxoplasmose ¬ *B58.1†, K77.0**
- Active chronique B ¬ *B18.12*
- Alcoolique ¬ *K70.1*
- Antigène Australia ¬ *B18.19*
- Associée antigène
- - HBs ¬ *B18.19*
- - ¬ *B18.19*
- Auto-immun ¬
- - *K75.4*
- - Chevauchement cholangite
- - - Biliaire primitive et d' *K75.4, K74.3*
- - - Sclérosante primitive et d' *K75.4, K83.00*
- C chez les transplantés hépatiques ¬ Manifestations hépatiques récurrentes causées par le virus de l ' *B18.2, Z94.4*
- Chroniques, non classées ailleurs ¬ Autres *K73.8*
- Congénitale à toxoplasmose ¬ *P37.1†, K77.0**
- Cours
- - Mononucléose à virus de l'herpès gamma ¬ *B27.0†, K77.0**
- - Paludisme ¬ *B54†, K77.0**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.1†, K77.0**
- D ¬ Virus de l' *B17.8*
- Due
- - Médicaments ¬ *K71.6*
- - Virus de l'herpes ¬ *B00.8†, K77.0**
- Entamoeba histolytica ¬ *A06.4†, K77.0**
- Éosinophiles ¬ *K71.6*
- Épidémique avec coma hépatique ¬ *B15.0, K72.74!*
- Fœtale néonatale
- - Cellules géantes ¬ *P59.2*
- - Idiopathique) ¬ *P59.2*
- Fulminante NCA, avec insuffisance hépatique ¬ *K72*
- Granulomateuse, non classée ailleurs ¬ *K75.3*
- Immunisation ¬ *B19.9*
- Inoculation ¬ *B19.9*
- Lupoïde ¬
- - *K75.4*
- - Maladie toxique du foie avec *K71.5*
- Maligne NCA, avec insuffisance hépatique ¬ *K72*
- Nécrosante ¬ *K72.9*

Hépatite *–suite*
- Non
- - A non B (aiguë) (virale) NCA ¬ *B17.8*
- - Classée ailleurs ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.6*
- - Virale ¬ *K75.9*
- Oreillons ¬ *B26.8†, K77.0**
- Post-transfusionnelle ¬ *B19.9*
- Réactive non spécifique ¬ *K75.2*
- SAI ¬ *K75.9*
- Sérique (ictère sérique homologue) ¬ *B19.9*
- Subaiguë non virale ¬ *K72.0*
- Toxoplasma ¬ *B58.1†, K77.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, K77.0**
- Virus Coxsackie ¬ *B33.8†, K77.0**
- ¬
- - Herpès simplex avec *B00.8†, K77.0**
- - Infection par le virus de l' *B19.9*

Hépatite aiguë
- B
- - Agent delta
- - - Coma hépatique ¬ *B16.0*
- - - Sans coma hépatique ¬ *B16.1*
- - Co-infection agent delta
- - - Coma hépatique ¬ *B16.0, K72.74!*
- - - Sans coma hépatique ¬ *B16.1*
- - Sans
- - - Agent delta
- - - - Coma hépatique ¬ *B16.2*
- - - - Sans coma hépatique ¬ *B16.9*
- - - Co-infection à agent delta, avec coma hépatique ¬ *B16.2, K72.74!*
- C ¬ *B17.1*
- D
- - Coma hépatique ¬ *B16.0*
- - Sans coma hépatique ¬ *B16.1*
- E ¬ *B17.2*
- Mère ¬
- - Fœtus affecté par une *P00.2*
- - Nouveau-né affecté par une *P00.2*
- Non virale ¬ *K72.0*
- ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.2*

Hépatite B
- AgHBs] ¬ Porteur de l'antigène de surface du virus de l' *B18.13*
- Antigène
- - HBc identifié ¬ *B18.19*
- - HBe identifié ¬ *B18.19*
- - HBs identifié ¬ *B18.19*
- C ¬ *B18.19*
- D ¬ *B18.0*
- E ¬ *B18.19*
- Réactivée ¬ *B18.14*
- S ¬ *B18.19*
- Sans coma hépatique ¬ *B18.19*
- Transplantation hépatique ¬ Réinfection par l ' *B18.14, Z94.4*

Hépatite B *–suite*
- ¬
- - Infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l' *B17.0*
- - Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l' *Z27.8*

Hépatite chronique
- Active
- - Non classée ailleurs ¬ *K73.2*
- - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.5*
- Auto-immune ¬ *K75.4*
- Lobulaire
- - Non classée ailleurs ¬ *K73.1*
- - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.4*
- Persistante
- - Non classée ailleurs ¬ *K73.0*
- - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.3*
- Sans précision ¬ *K73.9*
- ¬ Syndrome de retard de croissance-retard de développement modéré- *K73.8*

Hépatite infectieuse
- Aiguë ¬ *B17.9*
- Coma hépatique ¬ *B15.0, K72.74!*
- Subaiguë ¬ *B17.9*

Hépatite syphilitique
- Congénitale
- - Précoce ¬ *A50.0†, K77.0**
- - Stade tardif ¬ *A50.5†, K77.0**
- - Tardive ¬ *A50.5†, K77.0**
- - ¬ *A50.0†, K77.0**
- Secondaire ¬ *A51.4†, K77.0**
- Tardive ¬ *A52.7†, K77.0**
- ¬ *A52.7†, K77.0**

Hépatite virale
- Chronique
- - B
- - - Agent delta ¬ *B18.0*
- - - Sans agent delta
- - - - AgHBe
- - - - - Négatif, avec activité inflammatoire, forte réplication ¬ *B18.14*
- - - - - Négatif, sans activité inflammatoire, faible réplication ¬ *B18.13*
- - - - - Positif, avec activité inflammatoire, forte réplication ¬ *B18.12*
- - - - - Positif, sans activité inflammatoire, forte réplication ¬ *B18.11*
- - - - Phase
- - - - - 1 ¬ *B18.11*
- - - - - 2 ¬ *B18.12*
- - - - - 3 ¬ *B18.13*
- - - - - 4 ¬ *B18.14*
- - - - - Immunotolérance ¬ *B18.11*
- - C ¬ *B18.2*
- - D ¬ *B18.0*
- - E ¬ *B18.80*

Hépatite virale *–suite*
- Coma hépatique ¬ *B19.0, K72.74!*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.4*
- Congénitale ¬ *P35.3*
- Fulminante ¬ *K72.0, K72.79!*
- Infectieuse) aiguë SAI ¬ *B17.9*
- Sans précision, sans coma hépatique ¬ *B19.9*
- ¬
- - Arthropathie post-infectieuse au cours d' *B19.9†, M03.29**
- - Nécessité d'une vaccination contre l' *Z24.6*
- - Séquelles d' *B94.2*
- - Sujets en contact avec et exposés à l' *Z20.5*

Hépato
v./v.a. cérébro-hépato-rénal
v./v.a. réno-hépato-pancréatique
v./v.a. rétino-hépato-endocrinologique
- Cérébro-rénale ¬ Déplétion de l'ADN mitochondrial, forme *G31.81*
- Cutanée ¬ Porphyrie *E80.1*
- Pleurale ¬ Fistule *J86.08*
- Pulmonaire ¬ Fistule *J86.08*
- Rénal
- - Consécutif au travail et à l'accouchement ¬ Syndrome *O90.4*
- - Type
- - - 1 ¬ Syndrome *K76.7*
- - - 2 ¬ Syndrome *K76.7*
- - ¬ Syndrome *K76.7*

Hépatobiliaire
- Cause toxique ¬ Affection *K71.9*
- Néonatale au cours de mucoviscidose ¬ Maladie *E84.88*
- Pancréas ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants ou greffes internes dans le système *T85.75*
- ¬
- - Maladie *K83.9*
- - Obstruction *K83.1*

Hépatoblastome ¬ *C22.2*

Hépatocellulaire
v./v.a. Carcinome hépatocellulaire
- Sans précision ¬ Ictère néonatal dû à des lésions *P59.2*
- Télangiectasique ¬ Adénome *D13.4*

Hépatocérébrale par déficit en DGUOK ¬ Déplétion de l'ADN mitochondrial, forme *G31.81*

Hépatocholangiocarcinome ¬ *C22.0*

Hépato-cholangio-cellulaire combiné ¬ Carcinome *C22.0*

Hépatocytes
- Insuffisance hépatique ¬ nécrose des *K72*
- ¬
- - Cholestase: avec lésion des *K71.0*
- - Dégénérescence des *K76.8*

Hépatoencéphalopathie par déficit combiné de la phosphorylation oxydative de type 1 ¬ *E88.8, K72.79!*

Hépatogène ¬ Diabète sucré *E13.90*

Hépato-lenticulaire
- Wilson ¬ Dégénérescence *E83.0*
- ¬
- - Dégénérescence *E83.0*
- - Maladie de Wilson [dégénérescence *E83.0*

Hépatolenticulaire ¬ Démence au cours de dégénérescence *E83.0†, F02.8**

Hépatolithiase primitive ¬ *K80.30*

Hépatome (malin) ¬ *C22.0*

Hepatomegalia glycogenica diffusa ¬ *E74.0†, K77.8**

Hépatomégalie
- Congénital(e) ¬ *Q44.7*
- Cours de mononucléose à virus de l'herpès gamma ¬ *B27.0†, K77.0**
- Non classée ailleurs ¬ *R16.0*
- Polyhydramnios ¬ Syndrome d'hypertrophie musculaire- *Q87.8*
- SAI ¬ *R16.0*
- Splénomégalie, non classées ailleurs ¬ *R16.2*
- ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R16.0*

Hepatonephromegalia glycogenica ¬ *E74.0*

Hépatopathie
- Associée aux IgG4 ¬ *K75.4*
- Néonatale sévère-retard global de développement ¬ Syndrome de cataracte congénitale- *Q87.8*
- ¬ Syndrome de retard de croissance-déficience intellectuelle- *Q87.8*

Hépatophlébite ¬ *I80.88*

Hépatoptose ¬ *K76.8*

Hépato-rénal ¬
- Glycogénose *E74.0*
- Tyrosinémie *E70.2*

Hépatosplénique à cellules T ¬ Lymphome *C86.1*

Hépatosplénomégalie
- Dégénérescence cérébelleuse ¬ Syndrome d'ichtyose- *Q87.8*
- Hyperlipémique de type Bürger-Grütz ¬ *E78.3†, K77.8**
- Myéloïde mégacaryocytaire ¬ *D47.4*
- SAI ¬ *R16.2*

Herbicides
- Fongicides ¬ Effet toxique: *T60.3*
- ¬ Effet toxique des *T60.3*

Héréditaire
v./v.a. Type de maladie

Hérédofamiliale
- Neuropathique ¬ Amylose *E85.1*
- Non neuropathique ¬ Amylose *E85.0*
- Sans précision ¬ Amylose *E85.2*

Hérédopathie ataxique polynévritique ¬ *G60.1*

Hérédosyphilis ¬ *A50.9*

Herlitz
- EBJ-H] ¬ Épidermolyse bulleuse jonctionnelle type *Q81.1*
- ¬ Syndrome de *Q81.1*

Herlitz-Pearson ¬ Épidermolyse bulleuse jonctionnelle type *Q81.1*

Hermansky-Pudlak
- Déficit
- - AP-3 ¬ Syndrome de *E70.3*
- - BLOC
- - - 1 ¬ Syndrome de *E70.3*
- - - 2 ¬ Syndrome de *E70.3*
- - - 3 ¬ Syndrome de *E70.3*
- ¬
- - SHP [Syndrome de *E70.3*
- - Syndrome de: *E70.3*

Hermaphrodisme, non classé ailleurs ¬ *Q56.0*

Hermaphrodite vrai
- 46,XX ¬ *Q99.1*
- ¬ Chimère 46,XX/46,XY *Q99.0*

Hermaphroditisme
v./v.a. Pseudo-hermaphroditisme

Hernández
v./v.a. Gómez-López-Hernández

Hernández-Aguirre Negrete ¬ Syndrome de *Q87.8*

Hernie
- Abdominale, siège précisé NCA ¬ *K45*
- Bochdalek ¬ *Q79.0*
- Cérébrale de cause traumatique ¬ *S06.38*
- Cerveau ¬ *G93.5*
- Cervicothoracique noyau gélatineux
- - Névrite ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Radiculopathie ¬ *M50.1†, G55.1**
- Congénitale de la vessie ¬ *Q64.7*
- Corps vitré ¬ *H43.0*
- Cristallin] ¬ Phacocèle [*H27.8*
- Disque
- - Cervical ¬ Autre *M50.2*
- - Intervertébral précisé ¬ *M51.2*
- Douglas ¬ *N81.5*
- Gangrène ¬ Strangulation de l'intestin due à une *K46.1*
- Hiatale
- - Congénitale ¬ *Q40.1*
- - Gangrène ¬ *K44.1*
- - Occlusion ¬ *K44.0*
- - ¬ *K44.9*
- Honteuse [du canal d'Alcock] ¬ *K45*
- Incarcérée de Spieghel ¬ *K43.68*
- Incisionnelle avec gangrène ¬ *K43.1*
- Interstitielle
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K46.0*
- - Gangrène ¬ *K46.1*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K46.0*

Hernie *–suite*
- Interstitielle *–suite*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K46.0*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K46.0*
- - ¬ *K46.9*
- Intestinale
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K46.0*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K46.0*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K46.0*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K46.0*
- - ¬ *K46.9*
- Intra-abdominal
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K46.0*
- - Gangrène ¬ *K46.1*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K46.0*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K46.0*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K46.0*
- - ¬ *K46.9*
- Larrey ¬ *Q79.0*
- Ligne blanche
- - Gangrène ¬ *K43.78*
- - ¬ *K43.98*
- Lombaire ¬ *K45*
- Lombosacrée du noyau gélatineux avec radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**
- Médiastinale ¬ *J98.58*
- Morgagni ¬ *Q79.0*
- Musculaire ¬ *M62.8*
- Noyau gélatineux
- - Myélopathie ¬ *M51.0†, G99.2**
- - ¬ Névrite au cours d'une *M51.1†, G55.1**
- Obturatrice ¬ *K45*
- Occlusion intestinale ¬ *K46.0*
- Ovaire et de la trompe de Fallope ¬ Prolapsus et *N83.4*
- Para-ombilicale ¬ *K42*
- Paroi abdominale antérieure
- - Gangrène
- - - Non précisées ¬ *K43.7*
- - - ¬ Autres *K43.78*
- - Non précisées
- - - Gangrène ¬ *K43.79*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K43.69*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.99*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres *K43.68*
- - SAI ¬ *K43.99*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres *K43.98*
- Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K46.0*
- Rétropéritonéale ¬ *K45*
- Sciatique ¬ *K45*
- Scrotale ¬ *K40*
- Thoracique du noyau gélatineux avec radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**

Hernie *–suite*
- Thoraco-lombaire du noyau gélatineux avec radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**
- Tronc cérébral ¬ *G93.5*
- ¬ Iléus paralytique et occlusion intestinale sans *K56*

Hernie abdominale
- Non précisée
- - Gangrène ¬ *K46.1*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K46.0*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K46.9*
- Précisées
- - Gangrène ¬ Autres *K45.1*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres *K45.8*
- SAI ¬ *K46.9*
- Siège précisé, avec occlusion, sans gangrène ¬ Autres *K45.0*

Hernie cervicale noyau gélatineux
- Névrite ¬ *M50.1†, G55.1**
- Radiculopathie ¬ *M50.1†, G55.1**

Hernie crurale
- Bilatérale
- - Gangrène ¬ *K41.1*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K41.0*
- - Récidivante
- - - Gangrène ¬ *K41.11*
- - - ¬ *K41.21*
- - SAI ¬ *K41.2*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K41.2*
- Récidivante
- - Gangrène ¬ *K41.41*
- - Occlusion ¬ *K41.31*
- - ¬ *K41.91*
- Unilatérale
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K41.3*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K41.3*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K41.3*
- - Occlusion, avec gangrène ¬ *K41.40*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K41.3*
- - Récidivante, avec occlusion ¬ *K41.31*
- - SAI ¬ *K41.9*
- - Sans précision
- - - Gangrène ¬ *K41.4*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K41.9*
- - ¬ *K41.90*

Hernie de la ligne médiane
- Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- Étranglée ¬ *K43.68*
- Incarcérée ¬ *K43.68*
- Non réductible ¬ *K43.68*
- Occlusion ¬ *K43.68*

Hernie de la paroi abdominale ¬ *K43.99*

Hernie de Spiegel
- Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- Étranglée ¬ *K43.68*

Hernie de Spiegel *–suite*
- Gangrène ¬ *K43.78*
- Non réductible ¬ *K43.68*
- Occlusion ¬ *K43.68*
- ¬
- - *K43.98*
- - Syndrome de cryptorchidie- *K43.68, Q53.9*

Hernie diaphragmatique
- Anomalies des membres ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Congénitale ¬
- - *Q79.0*
- - Anomalie congénitale du péricarde avec *Q24.8, Q79.0*
- Étranglée sans gangrène ¬ *K44.0*
- Gangrène ¬ *K44.1*
- Gangréneuse ¬ *K44.1*
- Incarcérée sans gangrène ¬ *K44.0*
- Intestin court-asplénie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Irréductible sans gangrène ¬ *K44.0*
- Létale ¬ Syndrome d'hydranencéphalie- *Q04.3, Q79.0*
- Occlusion
- - Lésion Cameron
- - - Érosive aiguë
- - - - Hémorragie ¬ *K44.0, K29.0*
- - - - ¬ *K44.0, K29.1*
- - - Ulcéreux
- - - - Aiguë
- - - - - Hémorragie ¬ *K44.0, K25.0*
- - - - - Sans hémorragie ¬ *K44.0, K25.3*
- - - - Chronique
- - - - - Hémorragie ¬ *K44.0, K25.4*
- - - - - Sans hémorragie ¬ *K44.0, K25.7*
- - - - ¬ *K44.0, K25.9*
- - Sans gangrène ¬ *K44.0*
- Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K44.0*
- SAI ¬ *K44.9*
- Sans occlusion
- - Gangrène ¬ *K44.9*
- - Lésion Cameron
- - - Érosive aiguë
- - - - Hémorragie ¬ *K44.9, K29.0*
- - - - ¬ *K44.9, K29.1*
- - - Ulcéreux
- - - - Aiguë
- - - - - Hémorragie ¬ *K44.9, K25.0*
- - - - - Sans hémorragie ¬ *K44.9, K25.3*
- - - - Chronique
- - - - - Hémorragie ¬ *K44.9, K25.4*
- - - - - Sans hémorragie ¬ *K44.9, K25.7*
- - - - ¬ *K44.9, K25.9*
- ¬ Syndrome de microphtalmie-retard moteur-retard de langage-anomalies cérébrales- *Q11.2*

Hernie discale
- Cervicale ¬ Compression de la moelle épinière due à une *M50.0†, G99.2**
- ¬
- - Lumbago dû à une *M51.2*
- - Névrite due à une *M51.1†, G55.1**
- - Syndrome de la colonne lombaire dû à une *M51.1†, G55.1**

Hernie épigastrique
- Causant une occlusion ¬ *K43.60*
- Gangrène ¬ *K43.70*
- Incarcérée ¬ *K43.60*
- Non réductible ¬ *K43.60*
- Occlusion ¬ *K43.60*
- Partiellement incarcérée ¬ *K43.60*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.90*

Hernie hypogastrique
- Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- Étranglée ¬ *K43.68*
- Gangrène ¬ *K43.78*
- Incarcérée ¬ *K43.68*
- Non réductible ¬ *K43.68*
- ¬ *K43.98*

Hernie incisionnelle
- Étranglée ¬ *K43.0*
- Incarcérée ¬ *K43.0*
- Irréductible ¬ *K43.0*
- Occlusion, sans gangrène ¬ *K43.0*
- Provoquant une occlusion ¬ *K43.0*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.2*
- ¬ *K43.2*

Hernie inguinale
- Bilatérale
- - Gangrène ¬ *K40.1*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K40.0*
- - SAI ¬ *K40.2*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K40.2*
- - ¬ *K40*
- Directe ¬ *K40*
- Incomplète ¬ *K40.90*
- Indirecte ¬ *K40*
- Oblique ¬ *K40*
- SAI
- - Gangrène ¬ *K40.4*
- - ¬ *K40*
- Unilatérale
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K40.3*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K40.3*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K40.3*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K40.3*
- - SAI ¬ *K40.9*
- - Sans précision
- - - Gangrène ¬ *K40.4*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K40.9*

Hernie inguinale *–suite*
- Vieillissement osseux prématuré ¬ Syndrome marfanoïde- *Q87.0*

Hernie lombaire du noyau gélatineux avec radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**

Hernie ombilicale
- Étranglée sans gangrène ¬ *K42.0*
- Gangrène ¬ *K42.1*
- Gangréneuse ¬ *K42.1*
- Incarcérée sans gangrène ¬ *K42.0*
- Irréductible sans gangrène ¬ *K42.0*
- Occlusion, sans gangrène ¬ *K42.0*
- Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K42.0*
- SAI ¬ *K42.9*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ *K42.9*

Hernie parastomale
- Étranglée ¬ *K43.3*
- Gangrène ¬ *K43.4*
- Incarcérée ¬ *K43.3*
- Irréductible ¬ *K43.3*
- Occlusion
- - Sans gangrène ¬ *K43.3*
- - ¬ *K43.3*
- Provoquant une occlusion ¬ *K43.3*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.5*
- ¬ *K43.5*

Hernie sous-xiphoïdienne
- Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- Étranglée ¬ *K43.68*
- Gangrène ¬ *K43.78*
- Incarcérée ¬ *K43.68*
- Non réductible ¬ *K43.68*
- Occlusion ¬ *K43.68*
- ¬ *K43.98*

Hernie sur cicatrice abdominale ¬ *K43.2*

Hernie ventrale
- Causant une occlusion, sans gangrène ¬ *K43.69*
- Étranglée, sans gangrène ¬ *K43.69*
- Incarcérée sans gangrène ¬ *K43.69*
- Non réductible
- - Sans gangrène ¬ *K43.69*
- - ¬ *K43.69*

Héroïne
- Voie
- - Intraveineuse ¬ Consommation d' *U69.30!*
- - Non intraveineuse ¬ Consommation d' *U69.31!*
- ¬ Intoxication: *T40.1*

Herpangine ¬ *B08.5*

Herpes
- Gestationis ¬ Soin à femme enceinte au cours d' *O26.4*
- Graviditatis ¬ *O26.4*
- Simiae ¬
- - Encéphalite à virus *B00.4†, G05.1**

Herpes *–suite*
- Simiae ¬ *–suite*
- - Encéphalomyélite à virus *B00.4†, G05.1**
- Simplex
- - Face ¬ *B00.1*
- - Lèvre ¬ *B00.1*
- - SAI ¬ Infection à *B00.9*
- - ¬
- - - Encéphalite à virus *B00.4†, G05.1**
- - - Endothélite de la cornée due à *B00.5†, H19.1**
- - - Infection virale congénitale herpétique [*P35.2*
- - - Kératite stromale à *B00.5†, H19.1**
- - - Otite externe au cours de l'infection due au virus de l'herpès [*B00.1†, H62.1**
- Tonsurans ¬ *B35.0*
- Zoster
- - Ophthalmicus NCA ¬ *B02.3†, H58.8**
- - ¬ *B02*
- ¬ Hépatite due au virus de l' *B00.8†, K77.0**

Herpès
v./v.a. Virus de l'herpès
- Cornée ¬ *B00.5†, H19.1**
- Peau périanale ¬ *A60.1*
- Pénis ¬ *A60.0†, N51.8**
- Rectum ¬ *A60.1†, K93.8**
- Scrotum ¬ *A60.0†, N51.8**
- Virus gamma ¬ Mononucléose due à *B27.0*
- Viscéral ¬ *B00.8†, K93.8**
- Vulve ¬ *A60.0†, N77.1**
- ¬
- - Blépharite au cours d' *B00.5†, H03.1**
- - Kératite au cours d' *B00.5†, H19.1**
- - Méningo-encéphalite au cours d' *B00.4†, G05.1**
- - Œsophagite au cours d' *B00.8†, K23.8**

Herpès simplex
- Hépatite ¬ *B00.8†, K77.0**
- Œil ¬ *B00.5†, H58.8**
- Oreille externe ¬ *B00.1†, H62.1**
- Paupière ¬ *B00.5†, H03.1**
- ¬
- - Infection disséminée due à des virus *B00.78*
- - Keratitis
- - - Arborescens à *B00.5†, H19.1**
- - - Dendritica à *B00.5†, H19.1**
- - - Disciformis à *B00.5†, H19.1**
- - - Interstitialis à *B00.5†, H19.1**
- - Maladie due au VIH avec *B20, B00.9*
- - Ulcus dendriticum de la cornée à *B00.5†, H19.1**

Herpès zoster
- Auricularis ¬ *B02.2†, H94.0**
- Nerf facial ¬ *B02.2†, G53.0**
- Névralgie ¬ *B02.2†, G53.0**

Herpès zoster *–suite*
- Oticus ¬ *B02.2†, H94.0**
- Paupière ¬ *B02.3†, H03.1**
- ¬
- - Conjonctivite au cours d' *B02.3†, H13.1**
- - Encéphalite au cours d' *B02.0†, G05.1**
- - Ganglionite
- - - Cours d' *B02.2†, G53.0**
- - - Trigéminale après *B02.3†, H58.8**
- - Iridocyclite au cours d' *B02.3†, H22.0**
- - Maladie oculaire au cours d' *B02.3†, H58.8**
- - Méningite à *B02.1†, G02.0**
- - Névralgie crânienne après *B02.2†, G53.0**

Herpétiforme
- Sénile ¬ Dermatite *L12.0*
- ¬
- - Dermatose *L13.0*
- - Dermite *L13.0*
- - Impétigo *L40.1*
- - Pemphigus *L10.2*
- - Stomatite: *K12.0*

Herpétique
- Herpes simplex] ¬ Infection virale congénitale *P35.2*
- Humain de type 5 ¬ Infection par le virus *B25.9*
- Oropharyngée ¬ Infection *B00.2*
- Périanale ¬ Infection *A60.1*
- ¬
- - Eczéma *B00.0*
- - Kératite stromale *B00.5†, H19.1**
- - Panaris *B00.8†, L99.8**
- - Rétinite *B00.5†, H32.0**
- - Vulvo-vaginite *A60.0†, N77.0**

Herrick ¬ Anémie de *D57.1*

Herrmann-Opitz ¬ Craniosynostose de *Q87.0*

Hers ¬ Syndrome de Forbes- *E74.0*

Herxheimer ¬ Maladie de *L90.4*

Hétérochromatine ¬ Sujet avec marqueur d' *Q95.4*

Hétérochrome] ¬ Syndrome de Fuchs III [Cyclite *H20.8*

Hétérochromie des cheveux ¬ *L67.1*

Hétérologue ou homologue ¬ organe ou tissu remplacé par greffe *Z94*

Hétéronyme) (homonyme) ¬ Hémianopsie (*H53.4*

Hétérophorie ¬ *H50.5*

Hétérophyiase ¬ *B66.8*

Hétéroplasie osseux progressive
- Avant-bras ¬ *M61.53*
- Bras ¬ *M61.52*
- Cuisse ¬ *M61.55*
- Jambe ¬ *M61.56*
- Localisations multiples ¬ *M61.50*
- Main ¬ *M61.54*

Hétéroplasie osseux progressive *–suite*
- Pied ¬ *M61.57*
- Région scapulaire ¬ *M61.51*
- Tronc ¬ *M61.58*
- ¬ *M61.59*

Hétérosexuelle précoce chez la femme ¬ pseudo-puberté *E25*

Hétérotaxie ¬
- *Q89.3*
- Syndrome d'anomalies cardiaques- *Q28.88*

Hétérotopie
- Neuronale nodulaire ¬ *Q04.8*
- Nodulaire
- - Périventriculaire ¬ *Q04.8*
- - Sous-corticale ¬ *Q04.8*
- - Sous-épendymaire ¬ *Q04.8*
- Périventriculaire ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos avec *Q79.6*
- Sous-corticale en bandes ¬ *Q04.3*

Hétérotropie
- Intermittente ¬ *H50.3*
- Sans précision ¬ *H50.4*

Hétérozygote
- Doubles ¬ Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] *D57.2*
- Gène THOX2 ¬ Hypothyroïdie congénitale transitoire par mutations *P72.2*
- ¬ Hémoglobine S *D57.3*

Heubner ¬
- Maladie de l'artère d' *A52.0†, I68.1**
- Syndrome de Schilder-Foix- *G37.0*

Hexagonale des tubules ¬ Myopathie avec configuration *G71.2*

Hexokinase ¬ Anémie due à un déficit en *D55.2*

Hexosaminidase A ¬ Déficit en *E75.0*

Hexose monophosphate HMP ¬ Anémie due déficit enzymatique
- Excepté G6PD, de la voie de l' *D55.1*
- Voie de l' *D55.1*

Heyn-Sproul-Jackson ¬ Syndrome de *Q87.1*

HFmrEF [Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche faiblement réduite] ¬ *I50.19*

HFpEF [Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée] ¬ *I50.19*

HFrEF [Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche réduite] ¬ *I50.19*

HHH ¬ Syndrome *E72.4*

HHML [Syndrome de la lipomatose multiple-hémihyperplasie] ¬ *Q87.3*

HHRH [Rachitisme hypophosphatémique héréditaire avec hypercalciurie] ¬ *E83.30, E83.58*

Hiatale
- Congénitale ¬ Hernie *Q40.1*
- Gangrène ¬ Hernie *K44.1*
- Occlusion ¬ Hernie *K44.0*

Hiatale *–suite*
- ¬ Hernie *K44.9*

Hiatus œsophagien ¬ Glissement du cardia à travers le *Q40.1*

Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (*Z27.8*

Hidradénite suppurée
- Spondylarthrite ankylosante] ¬ Syndrome PASS [pyoderma gangrenosum-acné- *M35.8*
- ¬ Syndrome
- - PAPASH [arthrite pyogénique-pyoderma gangrenosum-acné- *M35.8*
- - PASH [pyoderma gangrenosum-acné- *M35.8*
- - PsAPASH [arthrite psoriasique-pyoderma gangrenosum-acné- *M35.8*

Hidrosadénite suppurée ¬ *L73.2*

HIDS [Syndrome d'hyperimmunoglobuline D] ¬ *D89.8*

HIES
- Autosomique dominant par déficit en STAT3 ¬ Syndrome d'hyperimmunoglobulinémie E [*D82.4*
- Syndrome hyperimmunoglobulinémie E autosomique
- - Dominant ¬ *D82.4*
- - Récessif ¬ *D82.4*

Higashi
v./v.a. Chédiak-Higashi

High Urgency ¬ Inscription
- Effectuée transplantation
- - Organe
- - - Niveau d'urgence HU (*Z75.7*
- - - Sans niveau d'urgence HU (*Z75.6*
- - Pulmonaire
- - - Niveau d'urgence HU [*U55.22*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [*U55.20*
- Transplantation
- - Cardiaque
- - - Niveau d'urgence HU [*U55.12*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [*U55.10*
- - Cœur poumon
- - - Niveau d'urgence HU [*U55.32*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [*U55.30*

High-flow ¬ Priapisme de type *N48.31*

HIGM avec susceptibilité aux infections opportunistes ¬ *D80.5*

Hilaire
- Bilatérale [syndrome de Löfgren] ¬ Lymphadénopathie *D86.8*
- Confirmation bactériologique
- - Biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A15.4*
- - Histologique ¬ Primo-infection tuberculeuse des ganglions *A15.7*

Hilaire *–suite*
- ¬
- - Cholangiocarcinome *C24.0*
- - Primo-infection tuberculeuse des ganglions *A16.7*
- - Tuberculose ganglionnaire *A16.3*

Hilare ¬ Syndrome du pantin *Q93.5*

Hile
- Poumon) ¬ *C34.0*
- Splénique ¬ Arrachement du *S36.04*

Hines
v./v.a. Sommer-Hines

Hinman ¬ Syndrome de *N32.8*

Hiob ¬ Syndrome de *D82.4*

Hippel
v./v.a. von Hippel-Lindau

Hippocampe ¬ Épilepsie du lobe mésio-temporal avec sclérose de l' *G40.2, G37.8*

Hippocratisme
- Digital
- - Congénital
- - - Isolé ¬ *Q68.1*
- - - ¬ *Q68.1*
- - ¬
- - - *R68.3*
- - - Pachydermopériostose avec *M89.49†*, *L62.0**
- Ongles ¬ *R68.3*
- Unguéal congénital(e) ¬ *Q84.6*

Hirschfeldii ¬ Infection à Salmonella *A01.3*

Hirschowitz
v./v.a. Groll-Hirschowitz

Hirschsprung
- Brachydactylie type D ¬ Syndrome de maladie de *Q87.8*
- Ganglioneurome ¬ Maladie de *Q43.1*, *C47.9*
- HSCR] ¬ Maladie de *Q43.1*
- Hypoplasie des ongles-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de maladie de *Q87.8*
- Polydactylie-surdité ¬ Syndrome de maladie de *Q87.8*
- ¬ PCWH [Syndrome de neuropathie périphérique-leucodystrophie centrale dysmyélinisante-syndrome de Waardenburg-maladie de *Q87.8*

Hirsutisme ¬ *L68.0*

Hirudine ¬ Troubles hémorragiques dus à l' *D68.35*

Hirudiniase
- Externe ¬ *B88.3*
- Interne ¬ *B83.4*

Hisienne ¬ Tachycardie *I47.1*

Hiss-Russel ¬ Dysenterie de *A03.1*

Histamine ¬ Maux de tête dus à l' *G44.0*

Histaminique
- Acquis ¬ Angio-œdème non *T78.3*
- H2 ¬ Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs *T47.0*
- Héréditaire ¬ Angio-œdème non *D84.1*

Histaminique *–suite*
- Horton ¬ Céphalée *G44.0*
- ¬
- - Céphalée *G44.0*
- - Syndrome de type *T61.1*

Histidase ¬ Déficit en *E70.8*

Histidine ¬ Anomalies du métabolisme de l' *E70.8*

Histidine-ammoniac-lyase ¬ Déficit en *E70.8*

Histidinémie ¬ *E70.8*

Histidinémique ¬ Syndrome *E70.8*

Histidine-rich (poly-L) glycoprotéine ¬ Thrombophilie héréditaire due au déficit congénital en *D68.5*

Histidinurie
- Tubulopathie ¬ Syndrome d' *N15.8†*, *E90**
- ¬ *E70.8*

Histiocytaire
- Cytophagique ¬ Panniculite *M35.8*
- Diffus ¬ Lymphome *C83.9*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeurs *D47.7*
- Vrai ¬ Lymphome *C96.8*
- ¬
- - Lymphome de type *C85.9*
- - Réticulose médullaire *C96.8*
- - Sarcome *C96.8*
- - Syndromes *D76.3*

Histiocytaire-lymphocytaire ¬ Sarcome *C85.9*

Histiocytes
- Mastocytes à évolution imprévisible et inconnue ¬ Tumeurs à *D47.0*
- ¬ Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T/ *C83.3*

Histiocytoïde ¬ Cardiomyopathie *I42.0*

Histiocytome fibreux angiomatoïde ¬ *D48.5*

Histiocytose
- Aiguë
- - Progressive différenciée ¬ *C96.0*
- - X ¬ *C96.0*
- Bleu de mer ¬ *D76.3*
- Cellule de Langerhans
- - Multifocale
- - - Multisystémique ¬ *C96.0*
- - - Unisystémique ¬ *C96.5*
- - SAI ¬ *C96.6*
- Cellule indéterminée ¬ *C96.4*
- Céphalique bénigne ¬ *D76.3*
- Éruptive généralisée ¬ *D76.3*
- Langerhansienne aiguë et disséminée ¬ *C96.0*
- Lipoïde essentielle ¬ *E75.2*
- Lipoïdique ¬ *C96.6*
- Lymphadénopathie massive ¬ Syndrome d' *D76.3*
- Maligne ¬ Arthropathie au cours de l' *C96.8†*, *M36.1**

Histiocytose *–suite*
- Phagocytes mononucléés ¬ *D76.1*
- Progressive
- - Mucineuse héréditaire ¬ *D76.3*
- - Nodulaire ¬ *D76.3*
- Pulmonaire X ¬ *C96.5*
- Sinusal
- - Adénopathie massive] ¬ SHML [*D76.3*
- - ¬ *D76.3*
- Unifocale à cellules de Langerhans ¬ *C96.6*
- X
- - Chronique ¬ *C96.6*
- - Multifocale ¬ *C96.5*
- - Multisystémique ¬ *C96.0*
- - SAI ¬ *C96.6*
- - Unifocale ¬ *C96.6*

Histocompatibilité classe
- I ¬ Déficit en complexe majeur d' *D81.6*
- II ¬ Déficit en complexe majeur d' *D81.7*

Histocytome fibreux ¬ Syndrome de sténose médullaire diaphysaire- *Q78.8, C49.9*

Histologique
- Kyste anévrismal et d'une autre lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques *K09*
- Stade
- - 1 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats *N17.81*
- - 2 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats *N17.82*
- - 3 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats *N17.83*

Histolytica ¬
- Méningo-encéphalomyélite à Torula *B45.1†*, *G05.2**
- Méningomyélite à Torula *B45.1†*, *G05.2**

Histoplasma capsulatum ¬
- Histoplasmose
- - *B39.4*
- - Disséminée à *B39.38*
- - Pulmonaire
- - - Aiguë à *B39.0†*, *J99.8**
- - - Chronique à *B39.1†*, *J99.8**
- Septicémie à *B39.30*

Histoplasmose
- Aiguë
- - Poumon ¬ *B39.0†*, *J99.8**
- - ¬ Pneumonie au cours d' *B39.0†*, *J17.2**
- Chronique
- - Poumon ¬ *B39.1†*, *J99.8**
- - ¬ Pneumonie au cours d' *B39.1†*, *J17.2**
- Disséminée à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.38*
- Histoplasma capsulatum ¬ *B39.4*
- Pulmonaire
- - Aiguë à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.0†*, *J99.8**

Histoplasmose *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Chronique à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.1†, J99.8**
- - ¬ *B39.2†, J99.8**
- ¬
- - *B39.9*
- - Maladie due au VIH avec *B20, B39.9*

Histrionique ¬ Personnalité *F60.4*

Hittner
v./v.a. Hall-Hittner

HIV-1 ¬ *U85!*

HIV-2 ¬ *U85!*

HLHS] ¬ Hypoplasie du cœur gauche [*Q23.4*

HLP type 3 ¬ *E78.2*

HMC ¬ Syndrome *Q87.0*

HMI] ¬ Hypominéralisation molaires-incisives [*K00.4*

HMP ¬ Anémie due déficit enzymatique
- Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [*D55.1*
- Voie de l'hexose monophosphate [*D55.1*

HNF1A ¬ Hyperinsulinisme par déficit en *E16.1*

HNF4A ¬ Hyperinsulinisme par déficit en *E16.1*

HNPCC] ¬ Cancer du côlon héréditaire non polyposique [*C18.9, Z80.0*

HNRNPA1 ¬ Myopathie distale de l'adulte associée à *G71.08*

Hobnail de la peau ¬ Hémangiome de *D18.01*

Hodes
v./v.a. Ulbright-Hodes

Hodgkin
v./v.a. Lymphome de Hodgkin
- ¬ Sarcome de *C81.3*

Hodgkinien
v./v.a. Lymphome non hodgkinien
- Non hodgkinien ¬ Lymphome composite *C81.9, C85.9*
- SAI ¬ Lymphome: non *C85.9*
- Sans zones diffuses ¬ lymphome folliculaire non *C82*
- ¬
- - Lymphome
- - - Composite hodgkinien et non *C81.9, C85.9*
- - - Oculo-cérébral primitif non *C83.3*
- - Lymphome folliculaire non *C82.9*
- - Paragranulome *C81.0*

Hoehn Yahr ¬
- Stade 5 selon *G20.2*
- Stades
- - 0 à moins de 3 selon *G20.0*
- - 3 à 4 selon *G20.1*

Hoeve
v./v.a. Van der Hoeve

Hofer
v./v.a. Jagel-Holmgren-Hofer

Hoffa] ¬ Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de *M79.4*

Hoffa-Castert ¬ Maladie idiopathique de *E88.8*

Hoffmann
- Folliculitis et perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens] ¬ Maladie de *L66.3*
- ¬
- - Atrophie musculaire de Werdnig- *G12.0*
- - Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [*L66.3*
- - Syndrome de Bouveret(- *I47.9*

Hogg
v./v.a. Birt-Hogg-Dubé

HOIL1 [heme-oxidized iron-regulatory-protein-2-ubiquitin-ligase-1] ¬ Déficit en *D81.8*

Hollenhorst ¬ Plaque d' *H34.2*

Holmes
v./v.a. Balint-Holmes
v./v.a. Gordon-Holmes

Holmes-Adie ¬ Syndrome de *H57.0*

Holmgren
v./v.a. Jagel-Holmgren-Hofer

Holmgren-Forsell ¬ Dysplasie osseuse létale type *Q78.8*

Holocarboxylase synthétase ¬ Déficit en *D81.8*

Holoprosencéphalie
- Alobaire ¬ *Q04.2*
- Dysgénésie caudale ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Lobaire ¬ *Q04.2*
- Microforme ¬ *Q04.2*
- Semi-lobaire ¬ *Q04.2*
- Septo-préoptique ¬ *Q04.2*
- Situs inversus ¬ Syndrome d'agnathie- *Q87.8*
- ¬
- - Syndrome d'agénésie du pancréas- *Q04.2, Q45.0*
- - Variant interhémisphérique médian de l' *Q04.2*

Holoprosencéphalie-craniosynostose ¬ Syndrome d' *Q04.2*

Holt-Oram ¬ Syndrome de *Q87.2*

Holzgreve-Wagner-Rehder ¬ Syndrome de *Q87.8*

Homard ¬ Main en pince de *Q71.6*

Homicide ¬ *Y09.9!*

Hominis
- Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium *B96.3!*
- ¬
- - Colite à Isospora *A07.3*
- - Diarrhée à Isospora *A07.3*
- - Dysenterie à Isospora *A07.3*
- - Infection
- - - Due à Isospora belli et Isospora *A07.3*
- - - Isospora *A07.3*

Hominis *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Myiase furonculoïde à Dermatobia *B87.0*

Homme
v./v.a. Génital de l'homme
- Caryotype 46,XX ¬ Syndrome de Klinefelter, *Q98.2*
- Chromosomes sexuels de structure anormale ¬ *Q98.6*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections des organes génitaux de l' *N51.8**
- Mosaïque des chromosomes sexuels ¬ *Q98.7*
- Non précisés ¬ Carcinoma in situ: Organes génitaux de l' *D07.6*
- Pierre ¬ Maladie de l' *M61.19*
- Plus de deux chromosomes X ¬ Syndrome de Klinefelter, *Q98.1*
- Précisés ¬ Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l' *C63.7*
- Raide [rigidité musculaire] ¬ Syndrome de l' *G25.88*
- SAI ¬ Voies génito-urinaires de l' *C63.9*
- Sans précision ¬
- - Affection des organes génitaux de l' *N50.9*
- - Malformation congénitale des organes génitaux de l' *Q55.9*
- - Tumeur bénigne: Organe génital de l' *D29.9*
- - Tumeur maligne: Organe génital de l' *C63.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l' *D40.9*
- ¬
- - Abcès des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Adhérences (de): pelviennes, chez l' *K66.0*
- - Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Affections
- - - Inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l' *N49.8*
- - - Précisées des organes génitaux de l' *N50.8*
- - - Vasculaires des organes génitaux de l' *N50.1*
- - Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l' *Q55.9*
- - Anthrax des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Coït douloureux pour l' *N48.8*
- - Épispadias chez l' *Q64.0*
- - Furoncle des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Gangrène de Fournier chez l' *N49.80*
- - Gonadoblastome chez l' *D40.1*
- - Hématocèle SAI des organes génitaux de l' *N50.1*
- - Hémorragie des organes génitaux de l' *N50.1*
- - Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l' *N49.8*

Homme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l' *F52.3*
- - Macrogénitosomie précoce chez l' *E25*
- - Malformation congénitale
- - - Organes génitaux de l' *Q55*
- - - Précisées des organes génitaux de l' *Q55.8*
- - Peau Organe génital
- - - *D29*
- - - *D40.7*
- - Péritonite (aiguë): pelvienne, chez l' *K65.09*
- - Persistance du sinus urogénital chez l' *Q55.8*
- - Phlegmon des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale chez l' *E25*
- - Prolapsus de l'urètre chez l' *N36.3*
- - Pseudo-puberté isosexuelle précoce chez l' *E25*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l' *R86*
- - Stérilité
- - - *N46*
- - - Femme associée à des facteurs relevant de l' *N97.4*
- - Thrombose des organes génitaux de l' *N50.1*
- - Trouble de: érection chez l' *F52.2*
- - Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l' *D29.7*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l' *C63.8*
- - Tumeur polyvésiculaire du sac vitellin chez l' *C62.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l' *D40.7*
- - Urétrocèle chez l' *N36.3*

Homocarnosinose ¬ *E72.8*

Homocystine ¬ Trouble du métabolisme de l' *E72.1*

Homocystinurie
- Déficit en cystathionine bêta-synthase ¬ *E72.1*
- Due
- - Défaut du métabolisme du cofacteur cobalamine ¬ *E72.1*
- - Déficit en méthylène tétrahydrofolate réductase ¬ *E72.1*
- Type
- - CblC ¬ Acidémie méthylmalonique avec *E72.8*
- - CblD ¬ Acidémie méthylmalonique avec *E72.8*
- - CblF ¬ Acidémie méthylmalonique avec *E72.8*

Homocystinurie *–suite*
- Type *–suite*
- - CblJ ¬ Acidémie méthylmalonique avec *E72.8*
- - ¬
- - - *E72.1*
- - Acidémie méthylmalonique avec *E71.1, E72.1*

Homologue
- Benzène ¬ Effet toxique: *T52.2*
- Phénol ¬ Effet toxique: Phénol et *T54.0*
- ¬
- - Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses *T65.3*
- - Hépatite sérique (ictère sérique *B19.9*
- - Organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou *Z94*

Homonyme) ¬ Hémianopsie (hétéronyme) (*H53.4*

Homozygote
- 15q15.3 ¬ Délétion *Q93.5*
- ¬
- - Hémoglobinose O-Arab *D58.2*
- - Hypercholestérolémie familiale *E78.0*
- - Phytostérolémie *E75.5*

Honteuse [du canal d'Alcock] ¬ hernie: *K45*

Hoover
v./v.a. You-Hoover-Fong

Hopf ¬ Acrokératose verruciforme de *Q82.8*

Hôpital ¬
- Arrêt cardio-circulatoire avant l'admission à l' *U69.13!*
- Choc septique au moment de survenue incertain par rapport à l'admission à l' *R57.2, U69.85!*
- Enfant unique né
- - *Z38.0*
- - Hors d'un *Z38.1*
- Jumeau nés
- - *Z38.3*
- - Hors d'un *Z38.4*
- Lésion acquise à l' *U69.9!*
- Naissance multiples enfant nés
- - *Z38.6*
- - Hors d'un *Z38.7*
- Pneumonie classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l'admission à l' *U69.01!*
- Septicémie au moment de survenue incertain par rapport à l'admission à l' *A41.9, U69.82!*

Hopkins
v./v.a. Pitt-Hopkins

HOPP] ¬ Syndrome d'hypotrichose-ostéolyse-périodontite-kératodermie palmoplantaire [*Q82.8*

Hoquet
- Chronique ¬ *G25.3*
- ¬
- - *R06.6*

Hoquet *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Formes psychogènes de: *F45.3*

Horan
v./v.a. Nance-Horan

Horizontal ¬
- Nystagmus *H55*
- Surocclusion: *K07.2*

Hormonal
- Ectopique, non classée ailleurs ¬ Sécrétion *E34.2*
- Périphériques ¬ Anomalies des récepteurs *E34.5*
- Positifs ¬ Carcinome mammaire invasif à récepteurs *C50.9*
- SAI ¬ Trouble: *E34.9*
- Sans précision ¬ Intoxication: Antagonistes *T38.9*
- ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: modifications *G40.5*

Hormone
- Adrénocorticotrope
- - Extra-hypophysaire ¬ Syndrome d'ACTH [*E24.3*
- - ¬
- - - Hypersécrétion hypophysaire d'ACTH [*E24.0*
- - - Syndrome de Cushing dû à la production ectopique d'ACTH [*E24.3*
- Androgène testiculaire SAI ¬ Biosynthèse défectueuse de l' *E29.1*
- Antéhypophysaires [adénohypophysaires] ¬ *T38.8*
- Antidiurétique ¬ Syndrome de sécrétion anormale de l' *E22.2*
- Anti-Müller ¬ Déficit de l' *E29.1*
- Croissance
- - Idiopathique ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- - Intestin grêle ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l' *C17.9*
- - Jéjunum ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l' *C17.1*
- - Lobe
- - - Inférieur du poumon ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l' *C34.3*
- - - Moyen du poumon ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l' *C34.2*
- - - Supérieur du poumon ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l' *C34.1*
- - Pancréas ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l' *C25.4*
- - Poumon
- - - Localisations contiguës ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l' *C34.8*
- - - ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l' *C34.9*
- - SRH] [GHRH] ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: «releasing factor» de l' *E16.8*
- - Type
- - - IA ¬ Déficit congénital isolé en *E23.0*

Hormone *–suite*
- Croissance *–suite*
- - Type *–suite*
- - - IB ¬ Déficit congénital isolé en *E23.0*
- - - II ¬ Déficit congénital isolé en *E23.0*
- - - III ¬ Déficit congénital isolé en *E23.0*
- - ¬
- - - Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l' *D80.0*
- - - Déficit congénital isolé en *E23.0*
- - - Hypersécrétion de l' *E22.0*
- - - Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- - - Petite taille par déficit en récepteur des secrétagogues de l' *E34.3*
- Folliculo-stimulante] ¬ Déficit isolé en FSH [*E23.0*
- Hypophysaire
- - Associé à une perte auditive neurosensorielle et à des malformations de la colonne vertébrale ¬ Syndrome de déficit congénital combiné en *E23.0*
- - ¬ Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- Intestinales ¬ Autres hypersécrétions d' *E34.1*
- Libération de la thyrotrophine] ¬ Hypothyréose par déficit isolé en TRH [*E03.1*
- Liquide céphalorachidien ¬ Taux anormal d' *R83.1*
- Lutéinisante] ¬ Hypoplasie surrénalienne familiale sans LH [*E27.1*
- Parathyroïdiennes et leurs dérivés ¬ *T50.9*
- Somatotrope ¬ Hypersécrétion de l' *E22.0*
- Substituts synthétiques, autres et sans précision ¬ Intoxication: *T38.8*
- Testiculaires ¬ Hypersécrétion d' *E29.0*
- Thyroïdien
- - Alpha ¬ Résistance aux hormones thyroïdiennes par mutations du récepteur aux *E03.8*
- - Bêta ¬ Résistance aux hormones thyroïdiennes par mutation du récepteur aux *E05.8*
- - Dérivés ¬ Intoxication: *T38.1*
- - Mutation récepteur hormone thyroïdien
- - - Alpha ¬ Résistance aux *E03.8*
- - - Bêta ¬ Résistance aux *E05.8*
- - ¬
- - - Hypothyroïdie due à une résistance périphérique aux *E03.8*
- - - Petite taille-retard d'âge osseux par déficit du métabolisme de l' *E03.1*
- ¬
- - Abus de: stéroïdes ou *F55*
- - Acrodysostose avec résistance aux multiples *Q75.4*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Stéroïdes et *F55.5*

Hormonosynthèse ¬ Goitre
- Familial dû à un trouble de l' *E07.1*

Hormonosynthèse ¬ Goitre *–suite*
- Trouble de l' *E07.1*

Horner
v./v.a. Bernard-Horner
v./v.a. Claude-Bernard-Horner
- Congénital ¬ Syndrome de *G90.2*
- ¬
- - Pupille de *G90.2*
- - Triade de *G90.2*

Hornstein-Knickenberg ¬ Syndrome de *Q85.8*

Hort
v./v.a. Escher-Hort

Horton ¬
- Céphalée histaminique de *G44.0*
- Maladie de *M31.6*
- Névralgie de *G44.0*

Hospitalisation soin obstétrical y compris
- Césarienne avant début travail ¬ lorsqu y a mise observation
- - *O32*
- - *O34*
- Interruption grossesse ¬ lorsqu y a mise observation
- - *O35.0*
- - *O36*

Hospitalisme
- Enfant ¬ *F43.2*
- ¬ *F68.1*

Hostilité
- Envers un enfant transformé en bouc émissaire ¬ *Z62*
- ¬
- - *R45.5*
- - Exposition à une catastrophe, une guerre et autres *Z65*

Hôte
- Chronique forme
- - Modérée ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.06*
- - Sévère ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.07*
- Forme légère ¬ Maladie chronique du greffon contre l' *T86.05*
- Stade
- - I ¬ Maladie aiguë du greffon contre l' *T86.01*
- - II ¬ Maladie aiguë du greffon contre l' *T86.01*
- - III ¬ Maladie aiguë du greffon contre l' *T86.02*
- - IV ¬ Maladie aiguë du greffon contre l' *T86.02*
- ¬
- - Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques et maladie du greffon contre l' *T86.0*
- - Maladie du greffon contre l' *T86.09*
- - Réaction du greffon contre l' *T86.09*

Houlston-Ironton-Temple ¬ Syndrome de *Q87.8*

Howell-Evans ¬ Syndrome de *Q82.8, C15.9*

Hoyeraal-Hreidarsson ¬ Syndrome de *Q87.8*

HPA modérée ¬ *E70.1*

HPAH] ¬ Hypertension artérielle pulmonaire héréditaire [*I27.00*

HPFH - bêta-thalassémie ¬ *D56.4*

HPPD [Syndrome d'hypertélorisme-sinus pré-auriculaire-obstruction du canal lacrymal-surdité] ¬ *Q87.0*

HPRT
- Grade IV ¬ Déficit en *E79.1*
- ¬ Hyperuricémie associée à *E79.8*

Hreidarsson
v./v.a. Hoyeraal-Hreidarsson

HSCR] ¬ Maladie de Hirschsprung [*Q43.1*

HSD10 atypique ¬ Déficit en *G25.5*

HSH] Hypomagnésémie avec hypocalcémie secondaire ¬ [*E83.4*

HSV-2 ¬ Dermite vésiculaire
- Lèvre due au virus humain type 2 (alpha) [*B00.1*
- Oreille due au virus humain type 2 (alpha) [*B00.1*

HTLV-1
- Rémission complète ¬ Leucémie à cellules T de l'adulte (associée au *C91.51*
- ¬
- - Leucémie à cellules T de l'adulte (associé au *C91.50*
- - Lymphome à cellules T de l'adulte (associé au *C91.51*
- - Myélopathie due à une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 (*G04.1*
- - Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [*Z22.6*

Hugh
v./v.a. Fitz-Hugh-Curtis

Hughes ¬ Syndrome de *D68.6*

Hughes-Stovin ¬ Syndrome de *M35.2*

Huile
- Essences ¬ Pneumonie due à des *J69.1*
- Fusel ¬ Effet toxique: *T51.3*
- Graisses ¬ Dermite irritante de contact due aux *L24.1*
- Sésame ¬ Allergie à l' *T78.1*
- Toxique ¬ Syndrome de l' *T62.8*

Huileuse ¬ Pneumonie *J69.1*

Humain
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Papillomavirus *B97.7!*
- EGH] ¬ Ehrlichiose granulocytaire *A79.8*
- Maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l'immunodéficience *Z11*
- Orthopoxvirus ¬ Infection *B08.0*
- Type
- - 1 HTLV-1 ¬

Humain *–suite*
- Type *–suite*
- - 1 HTLV-1 ¬ *–suite*
- - - Myélopathie due à une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T *G04.1*
- - - Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T *Z22.6*
- - 2 alpha HSV-2 ¬ Dermite vésiculaire
- - - Lèvre due au virus *B00.1*
- - - Oreille due au virus *B00.1*
- - 5 ¬ Infection par le virus herpétique *B25.9*
- - I ¬ Dermatite infectieuse associée au virus T-lymphotrope *L30.3*
- Virale VIH
- - Origine de maladies infectieuses et parasitaires ¬ Immunodéficience *B20*
- - Sans précision ¬ Immunodéficience *B24*
- ¬
- - Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus *J21.1*
- - Bronchite à métapneumovirus *J20.8*
- - Encéphalite à métapneumovirus *A85.8†, G05.1**
- - Métapneumovirus *B97.8!*
- - Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T *G04.1*
- - Pneumonie due au Metapneumovirus *J12.3*
- - Vaccination contre le papillomavirus *Z25.8*

Humaine
v./v.a. Virus de l'immunodéficience humaine

Humanus
- Capitis ¬ Pédiculose due à Pediculus *B85.0*
- Corporis ¬ Pédiculose due à Pediculus *B85.1*

Huméral
v./v.a. radio-huméral
- SAI ¬ Luxation de l'épaule [articulation gléno- *S43.00*
- Supérieur) (moyen) (inférieur) ¬ Ligament gléno- *S43.4*
- ¬
- - Articulation cubito- *S53.1*
- - Fracture de deux à quatre fragments de la tête *S42.21*
- - Ligament coraco- *S43.4*
- - Nécrose aseptique des condyles *M92.0*
- - Ostéochondrite des condyles *M92.0*

Humérocubitale (articulation) ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.44*

Huméroradiale
- Articulation) ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.43*
- ¬ Synostose *Q74.0*

Huméro-radio-ulnaire ¬ Synostose *Q74.0*

Huméro-ulnaire
- Bilatérale ¬ Synostose *Q74.0*
- Unilatérale ¬ Synostose *Q74.0*
- ¬ Synostose *Q74.0*

Humérus
- Col
- - Anatomique ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.23*
- - Chirurgical ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.22*
- Épicondyle
- - Épicondyles, non précisé ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.44*
- - Latéral ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.42*
- - Médial ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.43*
- Grand tubercule ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.24*
- Haas] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête de l' *M92.0*
- Partie non précisée ¬ Fracture
- - Extrémité inférieure de l' *S42.40*
- - Extrémité supérieure de l' *S42.20*
- Parties parties multiples ¬ Fracture
- - Extrémité inférieure de l' *S42.49*
- - Extrémité supérieure de l' *S42.29*
- Proximal ¬ *S43.0*
- SAI ¬ *S42.3*
- Supracondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.41*
- Tant que traumatisme dû à l'accouchement ¬ Fracture proximale de l' *P13.3*
- Tête ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.21*
- Transcondylaire (en T ou en Y) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.45*
- ¬
- - Agénésie de l' *Q71.8*
- - Aplasie de la trochlée de l' *Q74.0*
- - Fracture
- - - Condyle de l' *S42.44*
- - - Diaphyse de l' *S42.3*
- - Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l' *S42.7*
- - Hypoplasie congénitale de l' *Q71.8*
- - Luxation
- - - Antérieure de l' *S43.01*
- - - Inférieure de l' *S43.03*
- - - Postérieure de l' *S43.02*
- - Ostéoblastome de l' *D16.0*
- - Ostéochondrite juvénile de l' *M92.0*
- - Ostéosarcome de l ' *C40.0*
- - Sarcome d'Ewing de l' *C40.0*
- - Sarcome de l' *C40.0*

Humeur
- Affectif
- - Isolés ¬ Autres troubles de l' *F38.0*
- - Persistant, sans précision ¬ Trouble de l' *F34.9*
- - Persistants ¬ Autres troubles de l' *F34.8*
- - Précisés ¬ Autres troubles de l' *F38.8*
- - Récurrents ¬ Autres troubles de l' *F38.1*

Humeur *–suite*
- Affectif *–suite*
- - Sans précision ¬ Trouble de l' *F39*
- - ¬ Troubles organiques de l' *F06.3*
- ¬
- - Manie symptôme psychotique
- - - Congruents à l' *F30.2*
- - - Non congruents à l' *F30.2*
- - Symptômes et signes relatifs à l' *R45.8*

Humide
v./v.a. Type de maladie

Humidification air
- Poussée aiguë ¬ Maladie pulmonaire due aux systèmes de d' *J67.71*
- Sans mention de poussée aiguë ¬ Maladie pulmonaire due aux systèmes d' *J67.70*
- ¬ Pneumonie due aux systèmes d' *J67.70*

Humidité ¬ Dommages dus au froid et à l' *T69.9*

Humoraux ¬ Déficit en anticorps *D80.9*

Hünermann
v./v.a. Conradi-Hünermann-Happle

Hunt
v./v.a. Tolosa-Hunt
- ¬
- - Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: myoclonies [Ramsay- *G11.1*
- - Syndrome de *B02.2†, G53.0**

Hunter ¬
- Dégénérescence cérébrale au cours de syndrome de *E76.1†, G32.8**
- Syndrome de *E76.1*

Hunter-Hurler ¬ Syndrome de *E76.1*

Hunter-Jurenka-Thompson ¬ Syndrome de *Q87.8*

Hunter-McAlpine ¬ Syndrome de *Q87.0*

Hunter-Rudd-Hoffmann ¬ Syndrome de *Q79.8*

Hunter-Thompson ¬ Dysplasie acromésomélique type *Q78.8*

Huntington
- Démence ¬
- - Chorée de *G10†, F02.2**
- - Maladie de *G10†, F02.2**
- Juvénile ¬ Maladie de *G10*
- ¬
- - Chorée
- - - *G10*
- - - Chronique progressive héréditaire de *G10*
- - Démence de la chorée de *F02.2**
- - Maladie de *G10*

Huntington-like
- 1 ¬ Maladie de *A81.8*
- 2 ¬ Maladie de *G10*
- 3 ¬ Maladie de *G10*
- Due à des expansions C9ORF72 ¬ Maladie de *G10*

Huppert en rémission complète ¬ Maladie de *C90.01*

Huppke-Brendel ¬ Syndrome de *E83.0†, G32.8**

Huriez ¬ Syndrome de *Q82.8*

Hurler
v./v.a. Hunter-Hurler
- ¬ Pseudopolydystrophie de *E77.0*

Hurler-Scheie ¬ Syndrome de *E76.0*

Hurst] ¬ Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [*G36.1*

Hutchinson
- Boeck ¬ Granulomatose de *D86.9*
- Syphilis congénitale ¬ Dents de *A50.5*
- ¬ Triade de *A50.5*

Hutchinson-Gilford ¬ Syndrome de *E34.8*

Huttenlocher
v./v.a. Alpers-Huttenlocher

Hyaline
- Adolescent ¬ Maladie des membranes *J80.09*
- Adulte ¬ Maladie des membranes *J80.09*
- Aorte ¬ Nécrose *I71.9*
- Enfant ¬ Maladie des membranes *J80.09*
- Juvénile
- - Cou ¬ Fibromatose *M72.88*
- - Sièges multiples ¬ Fibromatose *M72.80*
- - Tête ¬ Fibromatose *M72.88*
- - ¬ Fibromatose *M72.89*
- Nouveau-né ¬ Maladie des membranes *P22.0*

Hyalinose
- Cutanéo-muqueuse ¬ *E78.88*
- Focale et segmentaire ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux stéroïdes avec *N04.1*
- Systémique infantile ¬ *E78.88*

Hyalins ¬ Myopathie à corps *G71.2*

Hyalite syphilitique
- Tardive ¬ *A52.7†, H45.8**
- ¬ *A52.7†, H45.8**

Hyaloïdes ¬ Membranes et fibres *H43.3*

Hyalose syphilitique tardive en forme d'étoile ¬ *A52.7†, H45.8**

Hyaluronidase ¬ Déficit en *E76.2*

Hydantoïne ¬
- Dysmorphie due à l' *Q86.1*
- Intoxication dérivé
- - *T42.0*
- - *T42.0*
- Syndrome fœtal dû à l' *Q86.1*

Hydarthrose
- Clutton ¬ *A50.5†, M03.19**
- Intermittente
- - Articulation
- - - Coude ¬ *M12.42*
- - - Genou ¬ *M12.46*
- - - Hanche ¬ *M12.45*

Hydarthrose *–suite*
- Intermittente *–suite*
- - Genou ¬ *M12.46*
- - Sièges multiples ¬ *M12.40*
- - ¬ *M12.49*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.5†, M03.19**
- - Tardive ¬ *A52.7†, M14.89**

Hydatide
- Morgagni ¬ Torsion (de): *N83.5*
- ¬ Torsion *N44.1*

Hydatidose ¬
- *B67*
- *B67.9*

Hydatiforme
- Classique ¬ Môle *O01.0*
- Complète ¬ Môle *O01.0*
- Destructrice ¬ Môle *D39.2*
- Incomplète ¬ Môle *O01.1*
- Invasive ¬ Môle *D39.2*
- Maligne ¬ Môle *D39.2*
- Sans précision ¬ Môle *O01.9*
- ¬
- - Môle *O01.9*
- - Œuf clair et môle non *O02.0*
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle: *Z35.1*

Hydatique
- Cerveau ¬ Kyste *B67.9†, G94.8**
- Foie
- - Echinococcus granulosus ¬ Kyste *B67.0*
- - Echinococcus multilocularis ¬ Kyste *B67.5*
- - ¬ Kyste *B67.8†, K77.0**
- Poumon NCA ¬ Kyste *B67.9†, J99.8**
- Rate NCA ¬ Kyste *B67.9†, D77**
- ¬ Kyste *B67.9*

Hyde
- Forster-McCarthy-Berry ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬ Prurigo nodulaire de *L28.1*

Hydramnios ¬
- *O40*
- *P01.3*
- Fœtus et nouveau-né affectés par un *P01.3*

Hydranencéphalie
- Hernie diaphragmatique létale ¬ Syndrome d' *Q04.3, Q79.0*
- ¬
- - *Q04.3*
- - Syndrome de neurones multinucléés-anhydramnios-dysplasie rénale-hypoplasie cérébelleuse- *Q87.8*

Hydrargyrie NCA ¬ *T56.1*

Hydrarthrose à gonocoques ¬ *A54.4†, M14.89**

Hydratase ¬ Déficit en 3-méthylglutaconyl-CoA *E71.1*

Hydrates carbone
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E74.9*
- Type Iif ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- ¬
- - Anomalies
- - - Absorption intestinale des *E74.3*
- - - Précisées du métabolisme des *E74.8*
- - Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: déplétion des *O21.1*
- - Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - Trouble de l'absorption intestinale des *E74.3*

Hydrique ¬
- Épuisement dû à la chaleur avec perte *T67.3*
- Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et *T50.3*

Hydroa
- Estival ¬ *L56.4*
- Vacciniforme ¬
- - *L56.4*
- - Lymphome à type d' *C84.5*
- ¬ *L13.0*

Hydrocarbures
- Aliphatiques
- - Aromatiques, sans précision ¬ Effet toxique: Dérivé halogéné d' *T53.9*
- - ¬ Effet toxique: Autres dérivés halogénés d' *T53.6*
- Aromatiques ¬ Effet toxique: Autres dérivés halogénés d' *T53.7*
- ¬ Solvants du groupe: *L24.2*

Hydrocèle
- Congénitale ¬ *P83.5*
- Cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale ¬ *N43*
- Enkystée ¬ *N43.0*
- Femme ¬ *N94.8*
- Infectée ¬ *N43.1*
- Sans précision ¬ *N43.3*
- Vaginale communicante congénitale ¬ *P83.5*
- ¬ Autres *N43.2*

Hydrocéphale ¬
- Dystocie due à: fœtus *O66.3*
- Soins maternels pour disproportion due à un fœtus *O33.6*

Hydrocéphalie
v./v.a. VACTERL-hydrocéphalie
- Acquise
- - Nouveau-né ¬ *P91.7*
- - ¬ *G91*
- Agyrie-dysplasie rétinienne ¬ Syndrome d' *Q04.3*

Hydrocéphalie *–suite*
- Communicante ¬ *G91.0*
- Congénitale
- - Communicante ¬ *Q03.8*
- - Due à la toxoplasmose ¬ *P37.1*
- - Obstructive ¬ *Q03.8*
- - ¬ *Q03.9*
- Congénitales ¬ Autres *Q03.8*
- Cours
- - Maladie
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, G94.0**
- - - Parasitaire ¬ *B89†, G94.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *G94.2**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G94.1**
- Due à une toxoplasmose congénitale ¬ *P37.1*
- Dysplasie costovertébrale-anomalie de Sprengel ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Grande taille-hyperlaxité ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Implantation basse de l'ombilic ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Nouveau-né ¬
- - *Q03*
- - *Q03.9*
- Obésité-hypogonadisme ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Obstructive (non communicante) ¬ *G91.1*
- Occlusion de l'aqueduc de Sylvius ¬ *Q03.0*
- Post-hémorragique du nouveau-né ¬ *P91.7*
- Post-traumatique, sans précision ¬ *G91.3*
- Pression normale
- - Idiopathique ¬ *G91.20*
- - Non précisée ¬ *G91.29*
- - Secondaire ¬ *G91.21*
- Sans précision ¬ *G91.9*
- Sclérotiques bleues-néphropathie ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Sténose de l'aqueduc de Sylvius ¬ *Q03.0*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.4†, G94.0**
- ¬
- - *G91.8*
- - Malformation de Dandy-Walker isolée avec *Q03.1*
- - Méningomyélocèle avec *Q05.4*
- - Myéloméningocèle avec *Q05.4*
- - Spina bifida
- - - *Q05.4*
- - - Cervical
- - - - *Q05.0*
- - - - Sans *Q05.5*
- - - Dorsal avec *Q05.1*
- - - Dorso-lombaire avec *Q05.1*
- - - Lombaire
- - - - *Q05.2*
- - - - Sans *Q05.7*
- - - Lombo-sacré avec *Q05.2*

Hydrocéphalie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Spina bifida *–suite*
- - - Sacré
- - - - *Q05.3*
- - - - Sans
- - - - - *Q05.8*
- - - - - *Q05.8*
- - - Thoracique
- - - - *Q05.1*
- - - - Sans
- - - - - *Q05.6*
- - - - - *Q05.6*
- - Syndrome
- - - Craniosynostose-malformation de Dandy-Walker- *Q03.1, Q75.0*
- - - CRASH [hypoplasie du corps calleux-retard mental-pouces en adduction-spasticité- *Q04.8*
- - - Dysplasie thoracique- *Q87.8*
- - - MPPH [mégalencéphalie-polymicrogyrie-polydactylie post-axiale- *Q04.8*
- - - Nævus en tache de vin-citerne cérébello-médullaire élargie- *Q04.8, Q82.5*

Hydrocéphalie-fibroélastoses-cataracte ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Hydrocholécyste ¬ *K82.1*

Hydro-électrolytiques, non classés ailleurs ¬ Autres déséquilibres *E87.8*

Hydro-encéphalocèle ¬ *Q01*

Hydrogène ¬ Effet toxique
- Cyanure d' *T57.3*
- Fluor (gaz) et fluorure d' *T59.5*
- Sulfure d' *T59.6*

Hydrolabyrinthe ¬ *H81.0*

Hydrolase ¬
- Déficit en S-adénosylhomocystéine *E72.1*
- Hyperméthioninémie par déficit en S-adénosylhomocystéine *E72.1*
- Neurodégénérescence par déficit en 3-hydroxyisobutyryl-CoA *E71.1*
- Retard psychomoteur par déficit en S-adénosylhomocystéine *E72.1*

Hydrolethalus ¬ *Q87.8*

Hydrométingocèle
- Crânienne ¬ *Q01*
- Rachidienne) ¬ *Q05*

Hydromicrocéphalie ¬ *Q02*

Hydromyélie ¬ *Q06.4*

Hydronéphose
v./v.a. Urétéro-pyélo-hydronéphrose

Hydronéphrose
- Calcul et infection ¬ *N13.64*
- Congénitale ¬ *Q62.0*
- Infectée ¬ *N13.65*
- Infection rein ¬
- - *N13.65*
- - Coudure urétéral sans *N13.67*

Hydronéphrose *–suite*
- Infection rein ¬ *–suite*
- - Rétrécissement urétéral sans *N13.67*
- Obstruction
- - Calculeuse
- - - Infection du rein ¬ *N13.64*
- - - Rénale
- - - - Infection du rein ¬ *N13.62*
- - - - ¬ *N13.20*
- - - Urétéral
- - - - Infection du rein ¬ *N13.63*
- - - - ¬ *N13.21*
- - Jonction pyélo-urétérale ¬ *N13.0*
- - Pyélo-urétérale avec infection du rein ¬ *N13.60*
- Rétrécissement urétéral
- - Infection du rein ¬ *N13.61*
- - Non classée ailleurs ¬ *N13.1*
- - ¬ *N13.61*
- Sans précision ¬ *N13.3*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬
- - *N13.65*
- - Abcès rénal avec calcul et *N13.64*
- - Calcul de l'uretère avec *N13.21*
- - Coudure et rétrécissement urétéral, sans *N13.5*
- - Pyélite lithiasique avec *N13.64*
- - Pyélonéphrite lithiasique avec *N13.64*
- - Urétérite non spécifique avec calcul rénal et *N13.20*

Hydronéphrotique
- Infection ¬ Atrophie rénale *N13.65*
- Reins avec infection ¬ Rétraction *N13.65*

Hydrophtalmie ¬ *Q15.0*

Hydropisie fœtus
- Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- ¬ Dystocie due à: *O66.3*

Hydropneumothorax
- Traumatique ¬ *S27.38*
- Tuberculeux avec confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.6*

Hydrops fetalis non immunologique ¬ *P83.2*

Hydrops fœtal non immunologique ¬ Dysplasie lymphatique généralisée associée
- EPHB4 avec *Q82.09, P83.2*
- PIEZO1 avec *Q82.09, P83.2*

Hydrorachis ¬ *Q06.4*

Hydrosalpinx ¬ *N70.1*

Hydrosodées par la chaleur ¬ Syndrome de pertes *T67.8*

Hydrothorax ¬ *J94.8*

Hydro-uretère
- Infection
- - Rein ¬ *N13.66*
- - ¬ *N13.66*
- ¬ *N13.4*

Hydroxy-)chloroquine ¬ Maculopathie toxique provoquée par l'(*H35.38*

Hydroxy-3-méthylglutarique ¬ Acidurie 3- *E71.1*

Hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA

- Lyase ¬ Déficit en 3- *E71.1*
- Synthétase ¬ Déficit en 3- *E71.3*

Hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne longue ¬ Déficit en 3- *E71.3*

Hydroxyapatite ¬ Maladie par dépôt d' *M11.0*

Hydroxybutyrique
v./v.a. gamma-hydroxybutyrique

- ¬ Acidurie 4- *E72.8*

Hydroxyde

- Potassium [potasse] ¬ *T54.3*
- Sodium [soude] ¬ *T54.3*

Hydroxyglutarique
v./v.a. D-2-hydroxyglutarique
v./v.a. L-2-hydroxyglutarique

- ¬
- - Acidémie 2- *E72.8*
- - Acidurie 2- *E72.8*

Hydroxyisobutyrique ¬ Acidurie 3- *E71.1*

Hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase ¬ Neurodégénérescence par déficit en 3- *E71.1*

Hydroxykynuréninurie ¬ *E70.8*

Hydroxylacyl CoA déshydrogénase acide gras chaîne courte ¬

- Hyperinsulinisme par déficit en 3- *E71.3*
- Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3- *E71.3*

Hydroxylase

- 1 ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type cyphoscoliotique par déficit en lysyl *Q79.6*
- Acides gras ¬ Neurodégénérescence associée à l' *G23.0*
- Classique
- - Perte de sel ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21- *E25.00*
- - ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21- *E25.00*
- SAG type 3 forme
- - Classique ¬ Déficit en 21- *E25.00*
- - Tardive ¬ Déficit en 21- *E25.01*
- ¬
- - Déficit
- - - 4-alpha-hydroxyphénylpyruvate *E70.2*
- - - 18- *E27.4*
- - - Phénylalanine *E70.1*
- - - Stérol 27- *E75.5*
- - - Tyrosine *G24.1*
- - Dystonie dopa-sensible par déficit en tyrosine *G24.1*
- - Hypercholestérolémie due au déficit en cholestérol 7alpha- *E78.0*

Hydroxylysine ¬ Trouble du métabolisme de l' *E72.3*

Hydroxylysinémie ¬ *E72.3*

Hydroxylysinurie ¬ Syndrome de convulsions-déficience intellectuelle par *E72.3*

Hydroxyméthylglutarique ¬ Acidurie *E71.1*

Hydroxyphénylpyruvate
v./v.a. alpha-hydroxyphénylpyruvate

- Dioxygénase ¬ Tyrosinémie par déficit en 4- *E70.2*

Hydroxyquinoléine ¬ Dérivés de l' *T37.8*

Hydroxystéroïde
v./v.a. bêta-hydroxystéroïde

Hydroxy-tétrahydrobioptérine déshydratase ¬ Déficit en 4a- *E70.1*

Hydroxyvitamine-D-1-alpha-hydroxylase ¬ Déficit en 25- *E83.31*

Hygiène

- Personnelle
- - Défaillante ¬ *Z91.8*
- - Défectueuse ¬ *R46.0*
- ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance et de soins d' *Z74.1*

Hygrome kystique ¬ *D18.10*

Hymen ¬

- Imperforation de l' *Q52.3*
- Rigidité de l' *N89.6*

Hyménal

- Étroit ¬ Orifice *N89.6*
- Serré ¬ Anneau *N89.6*

Hyménolépiase ¬ *B71.0*

Hymenolepis nana ¬ Infection par *B71.0*

Hyoïde ¬ Os *S12.8*

Hyper

- Hypopigmentation
- - Plis des articulations ¬ Anonychie avec *Q84.3*
- - Progressive familiale ¬ *L81.8*
- Inflammatoire associée à NCKAP1L ¬ Maladie *D84.8*

Hyperacousie ¬ *H93.2*

Hyperactif combiné des nerfs crâniens ¬ Syndrome de dysfonctionnement *G52.7*

Hyperactivation du complément-thrombose-entéropathie avec perte de protéines] ¬ Syndrome CHAPLE [*D84.1*

Hyperactive ¬ Vessie: *N32.8*

Hyperactivité

- Associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés ¬ *F84.4*
- Guanylate cyclase 2C ¬ Diarrhée infantile chronique par *K52.8*
- PRPP synthétase ¬ *E79.8*
- Survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ Trouble de l'attention sans *F98.80*
- Utérus due à une stimulation excessive par des médicaments déclencheurs de contractions ¬ *O62.8, Y57.98!*
- ¬
- - Altération attention
- - - Syndrome avec *F90.0*
- - - Trouble avec *F90.0*

Hyperactivité *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-acromégalie- *Q87.8*
- - TDAH [trouble du déficit de l'attention / *F90.0*

Hyperadrénocorticisme ¬

- *E24.9*
- Myopathie au cours de l' *E24.9†, G73.5**

Hyperaldostéronisme

- Familial
- - Type IV ¬ *E26.0*
- - ¬ *E26.0*
- Génétique ¬ *E26.0*
- Pouvant être traité par des glucocorticoïdes ¬ *E26.0*
- Primaire
- - Adénome surrénalien (bilatéral) ¬ *E26.0*
- - ¬ *E26.0*
- Primitif-épilepsie-anomalies neurologiques ¬ Syndrome d' *E26.0†, G99.8**
- Sans précision ¬ *E26.9*
- Secondaire ¬ *E26.1*
- ¬ Autres *E26.8*

Hyperalphalipoprotéinémie familiale ¬ *E78.4*

Hyperalvéolie ¬ *K08.88*

Hyperaminoacidurie

- Dicarboxylique ¬ *E72.0*
- Provoquée
- - Arginine ¬ *E72.2*
- - Cystine ¬ *E72.0*
- - Ornithine ¬ *E72.4*
- ¬ *E72.9*

Hyperammoniémie
v./v.a. hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie

- Déficit en N-acétylglutamate synthase ¬ *E72.2*
- Transitoire du nouveau-né ¬ *P74.8*
- ¬
- - *E72.2*
- - Hypotonie avec acidose lactique et *I42.2*
- - Syndrome d'hyperinsulinisme et *E16.1, E72.2*

Hyperammoniémique par déficit en anhydrase carbonique VA ¬ Encéphalopathie *E74.8†, G94.30**

Hyperandrogénie

- Due à un déficit en cortisone réductase ¬ *E25.08*
- ¬
- - Aplasie des canaux de Müller et *Q51.8*
- - Dysfonction ovarienne: *E28.1*

Hyperanxiété ¬ *F93.8*

Hyperargininémie ¬ *E72.2*

Hyper-bêta-alaninémie ¬ *E79.8*

Hyperbêtalipoprotéinémie

- Prébêtalipoprotéinémie ¬ *E78.2*

Hyperbêtalipoprotéinémie *–suite*
- ¬ *E78.0*

Hyperbilirubinémie
- Conjuguée familiale ¬ *E80.6*
- Héréditaire ¬ *E80.6*
- Indication d'ictère, non classée ailleurs ¬ *R17.0*
- Non conjuguée
- - Familiale ¬ *E80.5*
- - Héréditaire type
- - - 1 ¬ *E80.5*
- - - 2 ¬ *E80.5*
- Prématurité ¬ *P59.0*
- Type
- - 2 ¬ *E80.6*
- - Rotor ¬ *E80.6*

Hyperbiliverdinémie ¬ *K76.8*

Hypercalcémie
- Familiale-néphrocalcinose-indicanurie ¬ Syndrome d' *E70.8*
- Hypocalciurique
- - Bénigne familiale ¬ *E83.58*
- - Familiale ¬ *E83.58*
- Infantile
- - Autosomique récessive ¬ *E83.58*
- - Idiopathique ¬ *E83.58*
- ¬ Démence au cours de *E83.58†, F02.8**

Hypercalciurie
- Idiopathique ¬ *E83.58*
- Néphrocalcinose
- - Atteinte oculaire sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec *E83.4*
- - Sans atteinte oculaire sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec *E83.4*
- - ¬ Hypomagnésémie primaire
- - - *E83.4*
- - - Familiale avec *E83.4*
- ¬ HHRH [Rachitisme hypophosphatémique héréditaire avec *E83.30, E83.58*

Hypercalprotectinémie ¬ Hyperzincémie et *E83.2*

Hypercapnie hypoxémie ¬ Insuffisance respiratoire
- *J96.91*
- Aiguë avec *J96.01*
- Chronique avec *J96.11*

Hypercaroténémie ¬ *E67.1*

Hypercarotinémie héréditaire ¬ Déficit en vitamine A et *E67.1, E50.9*

Hypercémentose ¬ *K03.4*

Hyperchlorémie ¬ *E87.8*

Hypercholanémie familiale ¬ *K76.8*

Hypercholestérolémie
- Due au déficit en cholestérol 7alpha-hydroxylase ¬ *E78.0*
- Essentielle ¬ *E78.0*

Hypercholestérolémie *–suite*
- Familiale
- - Homozygote ¬ *E78.0*
- - ¬ *E78.0*
- Hyperglycéridémie endogène ¬ *E78.2*
- ¬ Xanthomatose au cours d' *E78.0*

Hyperchromiques pinta caraté ¬ Lésions
- *A67.1*
- Cutanées achromiques avec lésions cutanées *A67.3*

Hyperchylomicronémie
- Primaire ¬ *E78.3*
- ¬ *E78.5*

Hyperclarté pulmonaire unilatérale ¬ *J43.0*

Hypercoagulabilité ¬ *D68.9*

Hypercontractile
- Généralisée ¬ Syndrome congénital de rigidité musculaire *E72.8*
- ¬ Œsophage *K22.4*

Hypercorticisme
- Hypophysaire ¬ *E24.0*
- Hypophyso-dépendant ¬ *E24.0*

Hypercortisolisme ¬ *E24.9*

Hypercroissance de Kosaki ¬ Syndrome d' *Q87.3*

Hyperdibasique type
- 1 ¬ Aminoacidurie *E72.0*
- 2 ¬ Aminoacidurie *E72.0*

Hyperdiploïdie ¬
- Leucémie lymphoblastique B avec *C91.00*
- Lymphome lymphoblastique B avec *C83.5*

Hyperekplexie héréditaire ¬ *G25.88*

Hyperelastica
- Cutis laxa (hereditaria)] ¬ Cutis laxa congenita [Cutis laxa *Q82.8*
- ¬ Cutis laxa *Q82.8*

Hyperélasticité de la peau ¬ Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec *G60.0*

Hyperémèse gravidique
- Bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ *O21.0*
- Commençant avant fin 20ème gestation troubles métabolique
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ *O21.1*
- - Déshydratation ¬ *O21.1*
- Troubles métaboliques ¬ *O21.1*
- ¬ *O21.0*

Hyperéosinophilie ¬
- Déficit immunitaire combiné avec *D81.8*
- Endocardite pariétale fibroplastique (de Löffler) avec *I42.3*

Hyperéosinophilique
- Idiopathique ¬ Syndrome *D47.5*
- ¬ Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome *D47.5*

Hyperergica fulminans ¬ Sepsis acutissima *A39.1†, E35.1**

Hyperesthésie ¬ *R20.3*

Hyperexplexie
- Épilepsie ¬ Syndrome d' *G25.88, G40.3*
- Sporadique ¬ *G25.88*

Hyperferritinémie
- Bénigne ¬ *R77.88*
- Cataracte héréditaire ¬ Syndrome d' *E83.1, Q12.0*

Hyperfibrinolyse ¬
- Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*

Hyperfonction
- Ovarienne SAI ¬ *E28.8*
- Testiculaire ¬ *E29.0*
- Thymus ¬ *E32.8*

Hyperfonctionnement
- Corticosurrénaux ¬ Autres *E27.0*
- Médullosurrénale ¬ *E27.5*
- Pancréas ¬ *K86.88*
- Pluriglandulaire ¬ *E31.1*

Hypergammaglobulinémie
- Polyclonale ¬ *D89.0*
- Sans précision ¬ *D89.2*

Hypergammaglobulinémique bénin [de Waldenström] ¬ Purpura *D89.0*

Hypergastrinémie ¬ *E16.4*

Hyperglobulinémie SAI ¬ *R77.1*

Hyperglycémie
- Pancréatectomie ¬ *E89.1*
- Sans précision ¬ *R73.9*

Hyperglycéridémie
- Endogène ¬
- - *E78.1*
- - Hypercholestérolémie avec *E78.2*
- Essentielle ¬ *E78.1*
- Mixte ¬ *E78.3*

Hyperglycérolémie ¬ *E74.8*

Hyperglycinémie
- Non cétosique ¬ *E72.5*
- Survenant durant l'enfance ¬ Spasticité avec *E72.5, G11.8*

Hypergonadotrope
- Alopécie fronto-pariétale ¬ Syndrome d'hypogonadisme *E23.0, L65.9*
- Cataracte ¬ Syndrome d'hypogonadisme *E29.1, H26.9*
- Primaire-alopécie partielle ¬ Syndrome d'hypogonadisme *E29.1, Q84.0*
- ¬
- - Insuffisance ovarienne *E28.3*
- - Maladie de Moyamoya-petite taille-dysmorphie faciale-hypogonadisme *Q87.1*

Hypergonadotrope *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome d'alopécie-déficience intellectuelle-hypogonadisme *Q87.8*

Hyperhéparinémie ¬ *D68.34*

Hyperhidrose
- Généralisée ¬ *R61.1*
- Localisée ¬ *R61.0*
- Polyneuropathie ¬ Syndrome d'encéphalite limbique-neuromyotonie- *G60.8*
- Sans précision ¬ *R61.9*
- Syndactylie cutanée ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique- *Q82.8*
- ¬
- - Insensibilité congénitale à la douleur avec *G60.8, R61.9*
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, R61.9*

Hyperhomocystéinémie ¬ *E72.1*

Hyperhydroxyprolinémie ¬ *E72.5*

Hyper-IgE autosomique récessif
- Déficit
- - TYK2 ¬ Syndrome *D82.4*
- - ZNF341 ¬ Syndrome *D82.4*
- ¬ Syndrome *D82.4*

Hyper-IgM
- Sans susceptibilité aux infections opportunistes ¬ Syndrome *D80.5*
- Susceptibilité aux infections opportunistes ¬ Syndrome *D80.5*

Hyperimidodipeptidurie ¬ *E72.8*

Hyperimmunisation anti-HLA post transfusion ¬ *T80.6*

Hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales ou avec *D80.6*

Hyperimmunoglobuline D] ¬ HIDS [Syndrome d' *D89.8*

Hyperimmunoglobulinémie E
- Autosomique
- - Dominant ¬ HIES [syndrome d' *D82.4*
- - Récessif ¬ HIES [syndrome d' *D82.4*
- HIES] autosomique dominant par déficit en STAT3 ¬ Syndrome d' *D82.4*
- IgE] ¬ Syndrome d' *D82.4*

Hyperinsulinémique
- Déficit
- - 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte ¬ Hypoglycémie *E71.3*
- - Glucokinase ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- - Récepteur à l'insuline ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- - UCP2 ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- Fonctionnelle ¬ Hypoglycémie non *E16.1*
- Forme diffuse sensible au diazoxide ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- Induite par l'effort ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- Persistante
- - Adulte noninsulinome ¬ Hypoglycémie *E16.1*

Hyperinsulinémique *–suite*
- Persistante *–suite*
- - Enfant ¬ Hypoglycémie *E16.1*

Hyperinsulinisme
- Autosomique
- - Dominant déficit
- - - Kir6.2 ¬ *E16.1*
- - - SUR1 ¬ *E16.1*
- - Récessif déficit
- - - Kir6.2 ¬ *E16.1*
- - - SUR1 ¬ *E16.1*
- Coma hypoglycémique ¬ *E15*
- Congénital
- - Lié à la glucokinase ¬ *E16.1*
- - ¬ *E16.1*
- Déficit
- - 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte ¬ *E71.3*
- - Glucokinase ¬ *E16.1*
- - HNF1A ¬ *E16.1*
- - HNF4A ¬ *E16.1*
- - SLC16A1 ¬ *E16.1*
- - UCP2 ¬ *E16.1*
- Diffus sensible au diazoxide ¬ *E16.1*
- Focal résistant diazoxide déficit
- - Kir6.2 ¬ *E16.1*
- - SUR1 ¬ *E16.1*
- Fonctionnel ¬ *E16.1*
- Hyperammoniémie ¬ Syndrome d' *E16.1, E72.2*
- Induit par l'effort ¬ *E16.1*
- SAI ¬ *E16.1*
- ¬
- - *E16.1*
- - Encéphalopathie due à l' *E16.1†, G94.30**

Hyperkaliémie ¬
- *E87.5*
- Syndrome de bradycardie avec insuffisance rénale, bloc auriculo-ventriculaire, choc et *E87.5, T88.8*

Hyperkaliémique familiale ¬ Paralysie périodique *G72.3*

Hyperkératose
- Acrale focale ¬ *Q82.8*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Épidermolytique ¬ *Q80.3*
- Folliculaire pénétrante ¬ *L87.0*
- Gonorrhéique ¬ *A54.8†, L86**
- Hyperpigmentation ¬ Syndrome d' *Q82.8*
- Lenticulaire persistante ¬ *L85.8*
- Palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au pian ¬ *A66.3*
- Palmoplantaire
- - Alopécie congénitale autosomique récessive ¬ *Q82.8, Q84.0*
- - Cardiomyopathie arythmogène ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Hyperkératose *–suite*
- Palmoplantaire *–suite*
- - Dyskératose laryngée ¬ Syndrome de dyskératose intraépithéliale de la cornée avec *Q82.8*
- - Focale et gingivale ¬ *Q82.8*
- - ¬ Syndrome
- - - Fragilité cutanée-cheveux laineux- *Q82.8*
- - - Paraplégie-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Palmoplantaire-périodontopathie-onychogrypose ¬ Syndrome d' *Q82.8*
- Pianique ¬ *A66.3*
- Pinta [caraté] ¬ *A67.1*

Hyperkératosiques et trichophytoïdes ¬ Pianides plantaires *A66.3*

Hyperkinésie ventriculaire ¬ *R93.1*

Hyperkinétique
- Associé à un trouble des conduites ¬ Trouble *F90.1*
- Ataxie tronculaire ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-mouvements *Q87.8*
- Enfance ou de l'adolescence SAI ¬ Réaction *F90.9*
- Retard de développement ¬ Syndrome d'hypotonie infantile-anomalies oculomotrices-mouvements *Q87.8*
- SAI ¬ Syndrome *F90.9*
- Sans précision ¬ Trouble *F90.9*
- Trouble des conduites ¬ Trouble *F90.1*
- ¬ Autres troubles *F90.8*

Hyperlaxité
- Articulaire
- - Généralisée-petite taille ¬ Syndrome de myopie sévère- *Q87.1*
- - ¬
- - - *M25.2*
- - - Dystrophie musculaire congénitale avec *G71.2*
- - - Syndrome d'ostéoporose-macrocéphalie-cécité- *Q87.8*
- Ligamentaire
- - Associée à EXOC6B ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire avec *Q77.7*
- - Retard de développement ¬ Syndrome de cutis laxa- *Q82.8*
- - Type Beighton ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire avec *Q77.7*
- - ¬ Syndrome de dysmorphie faciale-scrotum en châle- *Q87.0*
- ¬ Syndrome d'hydrocéphalie-grande taille- *Q87.8*

Hyperleucine-isoleucinémie ¬ *E71.1*

Hyperlipémique de type Bürger-Grütz ¬ Hépatosplénomégalie *E78.3†, K77.8**

Hyperlipidémie
- Combinée ¬ *E78.2*
- Due à un déficit en lipase hépatique ¬ *E78.4*
- Fredrickson, type I ¬ *E78.3*
- Groupe

Hyperlipidémie *–suite*
- Groupe *–suite*
- - A ¬ *E78.0*
- - C ¬ *E78.2*
- - D ¬ *E78.3*
- Groupe B ¬ *E78.1*
- Mixte
- - Familiale ¬ *E78.4*
- - ¬ *E78.2*
- Post-transplantation ¬ *E78.5*
- Sans précision ¬ *E78.5*
- ¬ Autres *E78.4*

Hyperlipidose ¬ *E75.6*

Hyperlipoprotéinémie
- A) ¬ *E78.80*
- Fredrickson, type IIb ou III ¬ *E78.2*
- Lipoprotéine
- - A) ¬ *E78.80*
- - Basse densité
- - - LDL] ¬ *E78.0*
- - - VLDL] ¬ *E78.1*
- Type
- - 1 ¬ *E78.3*
- - IIa de Fredrickson ¬ *E78.0*
- - IV de Fredrickson ¬ *E78.1*

Hyperlipoprotéinéurie ¬ *E78.88*

Hyperlysinémie
- Type
- - I ¬ *E72.3*
- - II ¬ *E72.3*
- ¬ *E72.3*

Hypermagnésiémie ¬ *E83.4*

Hypermanganésémie ¬ Syndrome
- Cirrhose-dystonie-polycythémie- *E83.8*
- Dystonie-parkinsonisme- *E83.8*

Hypermélanose naevoïde linéaire et spiralée ¬ *L81.4*

Hyperméthioninémie
- Déficit en S-adénosylhomocystéine hydrolase ¬ *E72.1*
- Provoquée déficit
- - Adénosine-kinase ¬ *E72.1*
- - Glycine-N-méthyltransférase ¬ *E72.1*
- ¬ *E72.1*

Hypermétropie ¬ *H52.0*

Hypermobile ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos *Q79.6*

Hypermobilité
- Articulaire
- - Dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'anomalies cardiaques-petite taille- *Q87.8*
- - Familiale ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- ¬ Syndrome d' *M35.7*

Hypermûre ¬ Cataracte sénile *H25.2*

Hypernasalité et hyponasalité ¬ *R49.2*

Hypernatrémie
- Adipsique hypothalamique ¬ Syndrome d' *E23.3*
- ¬
- - Hyperosmolarité et *E87.0*
- - Syndrome de microcéphalie - malformation cérébrale - spasticité - *Q04.8*

Hypernyctéméral ¬ Syndrome *G47.2*

Hyperœstrogénie ¬ Dysfonction ovarienne: *E28.0*

Hyperorexia nervosa ¬ *F50.2*

Hyperornithinémie avec atrophie sinueuse de la choroïde et de la rétine ¬ *E72.4*

Hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie ¬ Syndrome d' *E72.4*

Hyperosmolarité et hypernatrémie ¬ *E87.0*

Hyperostose
- Ankylosante [Forestier] ¬ *M48.1*
- Cortical
- - Déformante juvénile ¬ *M88.99*
- - Dysplasique
- - - Type Kozlowski-Tsuruta ¬ *Q78.8*
- - - ¬ *Q78.8*
- - Généralisée ¬ *Q78.8*
- - Infantile
- - - Avant-bras ¬ *M89.83*
- - - Côtes ¬ *M89.88*
- - - Face ¬ *M89.88*
- - - Jambe ¬ *M89.86*
- - - Localisations multiples ¬ *M89.80*
- - - Région de l'épaule ¬ *M89.81*
- - - ¬ *M89.89*
- - Infantiles ¬ *M89.8*
- Crâne ¬ *M85.2*
- Crânienne interne ¬ *M85.2*
- Diffuse idiopathique ¬ *M48.1*
- Frontale interne ¬ *M85.2*
- Os autres que ceux du crâne ¬ *M85.8*
- Ostéite ostéite
- - Avant-bras ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose- *M86.33*
- - Bras ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose- *M86.32*
- - Cheville ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose- *M86.37*
- - Colonne vertébrale ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose- *M86.38*
- - Jambe ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose- *M86.36*
- - Localisations multiples ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose- *M86.30*
- - Main ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose- *M86.34*
- - Région de l'épaule ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose- *M86.31*
- - Région pelvienne ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose- *M86.35*
- Sterno-costo-claviculaire isolée ¬ *M85.81*

Hyperostose *–suite*
- Vertébrale ankylosante avec tylose ¬ *M48.19*
- Voûte crânienne liée à l'X ¬ *M85.2*
- ¬ Syndrome d'insuffisance pancréatique-anémie- *K86.83, D64.4*

Hyperoxalurie
- Primitive
- - Type
- - - 1 ¬ *E74.8*
- - - 2 ¬ *E74.8*
- - - 3 ¬ *E74.8*
- - ¬ *E74.8*
- Secondaire ¬ *E74.8*

Hyperparathyroïdie
v./v.a. néphropathie-surdité-hyperparathyroïdie
- Isolée familiale ¬ *E21.0*
- Primaire ¬ *E21.0*
- Primitive
- - Familiale ¬ *E21.0*
- - Sévère néonatale ¬ *E21.0*
- Sans précision ¬ *E21.3*
- Secondaire
- - Non classée ailleurs ¬ *E21.1*
- - Origine rénale ¬ *N25.8*
- Tertiaire ¬ *E21.2*
- Tumeur mandibulaire ¬ Syndrome d' *E21.0, D16.42*
- ¬
- - *E21.2*
- - Arthrite au cours de l' *E21.3†, M14.19**
- - Arthropathie due à des microcristaux au cours d' *E21.3†, M14.19**
- - Myopathie au cours de l' *E21.3†, G73.5**

Hyperpéristaltisme ¬ *R19.2*

Hyperphagie
- Associée à d'autres perturbations psychologiques ¬ *F50.4*
- Psychogène ¬ *F50.4*
- Retard du développement sévère ¬ Syndrome d'obésité précoce- *E66.89*

Hyperphalangie
- Doigts de la main-anomalies des orteils-pectus excavatum sévère ¬ Syndrome d' *Q79.8*
- ¬ *Q74.8*

Hyperphénylalaninémie
- Déficit
- - 6-pyruvoyl-tétrahydroptérine synthase ¬ *E70.1*
- - DNAJC12 ¬ *E70.1*
- - Tétrahydrobioptérine ¬ *E70.1*
- Maternelle ¬ *E70.1*
- Modérée ¬ *E70.1*
- ¬ Autres *E70.1*

Hyperphosphatémique familiale ¬ Calcinose tumorale *E83.38*

Hyperpigmentation
- Mélanine ¬ Autres *L81.4*
- Microcéphalie ¬ Syndrome d'extrasystoles-petite taille- *Q87.1*
- Post-inflammatoire ¬ *L81.0*
- Progressive familiale ¬ *L81.4*
- ¬ Syndrome d'hyperkératose- *Q82.8*

Hyperpituitarisme basophile ¬ *E24.9*

Hyperplasie
- Adénomateux
- - Endomètre ¬ *N85.1*
- - Prostate ¬ *N40*
- Amygdales ¬ *J35.1*
- Appendice ¬ *K38.0*
- Atypique de l'endomètre (adénomateuse) ¬ *N85.1*
- Bénigne) de la prostate ¬ *N40*
- Cellule
- - Bêta des îlots de Langerhans SAI ¬ *E16.1*
- - C de la thyroïde ¬ *E07.0*
- - Endocrine pancréas
- - - Hypersécrétion de glucagon ¬ *E16.3*
- - - SAI ¬ *E16.9*
- - Îlots de Langerhans SAI ¬ *E16.9*
- - Neuroendocrine nourrisson
- - - Exacerbation aiguë ¬ *J84.81*
- - - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J84.80*
- Cémentaire ¬ *K03.4*
- Condylien
- - Primitive ¬ *K07.6*
- - Type 1 ¬ *K07.6*
- Congénitale
- - Lipoïde des surrénales par déficit en STAR ¬ *E25.08*
- - Surrénale déficit
- - - 3-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase ¬ *E25.08*
- - - 11-bêta-hydroxylase ¬ *E25.08*
- - - 17-alphahydroxylase ¬ *E25.08*
- - - 21 hydroxylase classique
- - - - Perte de sel ¬ *E25.00*
- - - - ¬ *E25.00*
- - - Cytochrome P450 oxydoréductase ¬ *E25.08*
- Endomètre
- - Glandulo-kystique ¬ *N85.0*
- - Kystique ¬ *N85.0*
- - Polypoïde ¬ *N85.0*
- - SAI ¬ *N85.0*
- Fibroadipeuse ¬ Syndrome de croissance segmentaire progressive avec *Q87.3*
- Folliculaire floride ¬ Maladie lymphoprolifération post-transplantation, *D47.7*
- Gingival ¬
- - *K06.1*

Hyperplasie *–suite*
- Gingival ¬ *–suite*
- - Syndrome d'amélogenèse imparfaite- *K00.5*
- Glande parathyroïde ¬ *E21.0*
- Glandulaire de l'endomètre ¬ *N85.0*
- Hépatique
- - Hypoplasie de la moelle osseuse ¬ Syndrome de fibrose pulmonaire- *Q87.8*
- - Nodulaire focale ¬ *K76.8*
- Hypoplasie
- - Mandibulaire ¬ *K07.0*
- - Maxillaire ¬ *K07.0*
- - Unilatérale du processus condylien de la mandibule ¬ *K10.8*
- Inflammatoire de la muqueuse buccale ¬ *K13.6*
- Irritation de la crête édentée (due à une prothèse) ¬ *K06.2*
- Lymphoïde
- - Angiofolliculaire ¬ *D47.7*
- - Nodulaire pulmonaire ¬ *J84.80*
- Macronodulaire des surrénales ¬ Syndrome de Cushing dû à une *E24.8*
- Médullaire des surrénales ¬ *E27.5*
- Médullosurrénale ¬ *E27.5*
- Moelle osseuse ¬ *D47.4*
- Neuroendocrine pulmonaire diffuse idiopathique ¬ *D14.3*
- Nodulaire
- - Focale télangiectasique du foie ¬ *D13.4*
- - Foyer ¬ Maladie toxique du foie avec: *K71.88*
- - Régénérative du foie ¬ *K76.8*
- Persistante du thymus ¬ *E32.0*
- Primaire de la parathyroïde ¬ *E21.0*
- Prostate ¬ *N40*
- Surrénale
- - Congénitale ¬ *E25.0*
- - Homme ¬ précocité sexuelle avec *E25*
- Surrénalienne unilatérale primitive ¬ *E26.0*
- Végétations adénoïdes ¬ *J35.2*

Hyperplasique
- Géant ¬ Rein *Q63.3*
- Persistant et colobome ¬ Syndrome microcornéen avec lenticône postérieur, vitré primaire *Q15.8*
- Ulcéreuse) ¬ Pulpite chronique (*K04.0*
- ¬
- - Gingivite (chronique): *K05.1*
- - Polype
- - - *K31.7*
- - - *K63.5*
- - Polypose *D12.6*
- - Tuberculose iléo-cæcale *A18.3†, K93.0**
- - Vitré primitif persistant *Q14.0*

Hyperprébêtalipoprotéinémie ¬ *E78.1*

Hyperproduction de thyrotrophine ¬ *E05.8*

Hyperprolactinémie
- Familiale ¬ *E22.1*
- ¬ *E22.1*

Hyperprolinémie (type I, II) ¬ *E72.5*

Hyperpyrexie
- Maligne due à une anesthésie ¬ *T88.3*
- SAI ¬ *R50.9*

Hyperréninémique familial type
- 1 ¬ Hypoaldostéronisme *E27.4*
- 2 ¬ Hypoaldostéronisme *E27.4*

Hypersécrétion
- ACTH, non associée à la maladie de Cushing ¬ *E27.0*
- Androgènes ovariens ¬ *E28.1*
- Antéhypophysaire
- - Acromégalie ¬ *E22.0*
- - Gigantisme ¬ *E22.0*
- Calcitonine ¬ *E07.0*
- Catécholamine ¬ *E27.5*
- Glucagon ¬
- - *E16.3*
- - Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec *E16.3*
- Hormone
- - Croissance ¬ *E22.0*
- - Intestinales ¬ Autres *E34.1*
- - Somatotrope ¬ *E22.0*
- - Testiculaires ¬ *E29.0*
- Hypophysaire ACTH
- - Hormone adrénocorticotrope] ¬ *E24.0*
- - ¬ *E24.0*
- Hypophyse
- - Sans précision ¬ *E22.9*
- - ¬ Autres *E22.8*
- Pancréas endocrine
- - Polypeptide
- - - Intestinal vaso-actif ¬ *E16.8*
- - - Pancréatique ¬ *E16.8*
- - Releasing factor» de l'hormone de croissance [SRH] [GHRH] ¬ *E16.8*
- - Somatostatine ¬ *E16.8*
- Pure d'aldostérone ¬ Carcinome corticosurrénalien à *C74.0, E26.0*
- Thyrocalcitonine ¬ *E07.0*

Hypersegmentation leucocytaire, héréditaire ¬ *D72.0*

Hypersensibilité
- 2-phénoxyéthanol ¬ *T78.4*
- Agrumes ¬ *T78.1*
- Alcool cétylstéarylique ¬ *T78.4*
- Alimentaire ¬
- - Entérocolite par *K52.2*
- - Gastroentérite ou colite par *K52.2*
- Antidépresseurs tétracycliques ¬ *T88.7*
- Classées ailleurs ¬ Arthropathie au cours de réactions d' *M36.4**

Hypersensibilité *–suite*
- Composés d'ammonium quaternaire ¬ *T78.4*
- Cytokines ¬ *T88.7*
- Dentine ¬ *K03.8*
- Dérivé
- - Rapamycine ¬ *T88.7*
- - Scopolamine ¬ *T88.7*
- Due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.7*
- Extrait d'Aspergillus ¬ *T78.4*
- Gélatine ¬ *T78.1*
- Labyrinthe ¬ *H83.2*
- Médicament SAI ¬ *T88.7*
- Médicamenteuse ¬ *T88.7*
- Métaux lourds ¬ *T78.4*
- Noix ¬ *T78.1*
- Polysorbate 20 ¬ *T78.4*
- Prasugrel ¬ *T88.7*
- Pression ¬ Neuropathie héréditaire avec *G60.0*
- Protéine
- - Bœuf ¬ *T78.1*
- - E. coli ¬ *T78.4*
- - Poisson ¬ *T78.1*
- SAI ¬ *T78.4*
- Sirolimus ¬ *T88.7*
- Streptomycine ¬ *T88.7*
- Succinimides ¬ *T88.7*
- Thiourée ¬ *T78.4*
- Ticlopidine ¬ *T88.7*
- Vinca-alcaloïdes ¬ *T88.7*
- Voies respiratoires supérieures, localisation non précisée ¬ Réaction d' *J39.3*
- ¬
- - Angéite d' *M31.0*
- - Arthrite au cours de réaction d' *T78.4†, M36.4**
- - Pneumopathie d' *J67.90*
- - Tests (de): cutanés à la recherche d'une: *Z01.5*

Hypersomnie
- Idiopathique) ¬ *G47.1*
- Non organique ¬ *F51.1*

Hypersplénisme ¬
- *D73.1*
- Maladie due au VIH avec *B23.8, D73.1*
- Neutropénie lors d' *D70.6*

Hyperstimulation ovaire
- Associée à une ovulation induite ¬ *N98.1*
- Lors
- - Induction de l'ovulation ¬ *N98.1*
- - Insémination artificielle ¬ *N98.1*
- SAI ¬ *N98.1*
- ¬ *N98.1*

Hypersudation ¬ *R61.9*

Hypertélorisme
- Associé à SPECC1L ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- Sinus pré-auriculaire-obstruction du canal lacrymal-surdité] ¬ HPPD [Syndrome d' *Q87.0*
- Strabisme-pied creux ¬ Syndrome de télécanthus- *Q87.8*
- Teebi ¬ *Q87.0*
- ¬
- - *Q75.2*
- - Syndrome de déficience intellectuelle-petite taille- *Q87.8*

Hypertensif
v./v.a. Type de maladie

Hypertension
- Artériel
- - Essentielle) (primitive) (systémique) ¬ *I10*
- - Pulmonaire
- - - Associée
- - - - A une affection du tissu conjonctif ¬ *I27.01*
- - - - Cardiopathie congénitale
- - - - - Affection du tissu conjonctif et hypertension portale [APAH] ¬ *I27.01*
- - - - - ¬ *I27.01*
- - - Due à des médicaments ¬ *I27.02*
- - - Héréditaire
- - - - HPAH] ¬ *I27.00*
- - - - ¬ *I27.00*
- - - Idiopathique [IPAH]] ¬ *I27.00*
- - - Induite
- - - - Médicaments, des drogues, des toxines et des rayonnements [DPAH] ¬ *I27.02*
- - - - Rayonnements ¬ *I27.02*
- - - - Toxines ¬ *I27.02*
- - - Insuffisance rénale-alcalose ¬ Syndrome d'hyperuricémie- *E72.8*
- - ¬ Syndrome de brachydactylie- *I10.90, Q73.8*
- Autosomique dominante
- - Crise hypertensive ¬ Néphropathie progressive avec *I15.11*
- - ¬ Néphropathie progressive avec *I15.10*
- Chronique avec prééclampsie surajoutée ¬ *O11*
- Essentiel
- - Bénigne ¬ *I10.0*
- - Maligne ¬ *I10.1*
- - Non précisée ¬ *I10.9*
- - Préexistante
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.0*
- - - Cours de la grossesse, avec prééclampsie surajoutée ¬ *O11*
- Gestationnel
- - Hypertension induite par la grossesse] ¬ *O13*
- - Transitoire) SAI ¬ *O13*

Hypertension *–suite*
- Induite par la grossesse] ¬ Hypertension gestationnelle [*O13*
- Intracrânienne
- - Bénigne ¬ *G93.2*
- - Idiopathique ¬ *G93.2*
- Lors de grossesse avec albuminurie sévère ¬ *O14.1*
- Mère, sans précision ¬ *O16*
- Néonatale ¬ *P29.2*
- Oculaire ¬ *H40.0*
- Portal
- - APAH] ¬ Hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale, affection du tissu conjonctif et *I27.01*
- - Non cirrhotique familiale à début précoce ¬ *K76.6*
- - ¬
- - - *K76.6*
- - - Hypertonie artérielle pulmonaire associée à une *I27.01*
- Préexistante
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision ¬ *O10.9*
- - Due à une néphropathie, chez la femme enceinte ¬ Présence d'une *O10.4*
- - Gestationnelle ¬ convulsions avec *O15*
- - Prééclampsie surajoutée ¬ *O11*
- Pulmonaire
- - Idiopathique ¬ *I27.00*
- - Lors
- - - Cardiopathie gauche ¬ *I27.21*
- - - Hypoxie ¬ *I27.22*
- - - Maladie du poumon ¬ *I27.22*
- - Persistante) du nouveau-né ¬ *P29.3*
- - Présence d'une thromboembolie chronique ¬ *I27.20*
- - Primitive ¬ Syndrome de lymphœdème-anomalie cérébrale artérioveineuse- *Q82.08, Q28.39*
- Pulmonaires secondaires précisées ¬ Autres *I27.28*
- Rénale préexistante chez la femme enceinte ¬ Présence d'une *O10.4*
- Rénoparenchymateuse ¬ *I15.1*
- SAI ¬ Prééclampsie surajoutée dans: l' *O11*
- Secondaire
- - Atteinte
- - - Endocriniennes ¬ *I15.2*
- - - Rénales ¬ *I15.1*
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.4*
- - Sans précision ¬ *I15.9*
- Secondaires ¬ Autres *I15.8*
- Sensible aux glucocorticoïdes ¬ *E26.0*
- Vasculo-rénale ¬ *I15.0*
- ¬
- - Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d' *R03.0*

Hypertension *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Gestose EPH [œdème - protéinurie - *O14.9*
- - Prééclampsie greffée lors d' *O11*

Hyperthermie
- Effort ¬ *T67.8*
- Maligne
- - Due à une anesthésie ¬ *T88.3*
- - ¬ Syndrome des ptérygiums multiples- *Q87.8*
- Maternelle ¬ Malformation congénitale due à une *Q86.88*
- Nouveau-né due à l'environnement ¬ *P81.0*
- Origine inconnue, après accouchement ¬ *O86.4*

Hyperthyroïdie
- Familiale
- - Liée à la grossesse ¬ *O99.2, E05.9*
- - Mutation du récepteur de la TSH ¬ *E05.8*
- Non-immune familiale ¬ *E05.8*
- SAI ¬ *E05.9*
- Transitoire néonatale ¬ *P72.1*
- ¬
- - Arthropathie au cours de l' *E05.9†, M14.59**
- - Chloasma des paupières dû à l' *E05.9†, H03.8**
- - Myopathie au cours de l' *E05.9†, G73.5**
- - Neuropathie des nerfs périphériques autonomes au cours de l' *E05.9†, G99.08**
- - Syndrome myasthénique au cours de *E05.9†, G73.0**

Hyperthyroïdien ¬ Maladie
- Cardiaque *E05.9†, I43.8**
- Oculaire *E05.9†, H58.8**

Hyperthyroxinémie euthyroïdienne par dyspré-albuminémie ¬ *E07.8*

Hypertonie
- Artérielle pulmonaire associée à une hypertension portale ¬ *I27.01*
- Congénitale ¬ *P94.1*
- Utérine ¬ *O62.4*

Hypertonique
- Infantile fatale ¬ Myopathie myofibrillaire *G71.2*
- Non coordonnées et prolongées ¬ Contractions utérines *O62.4*
- ¬
- - Dysréflexie autonome manifestée par des crises *G90.40*
- - Travail *P03.6*

Hypertrabéculation ventriculaire gauche ¬ *I42.88*

Hypertrichose
- Cervicale
- - Antérieure isolée ¬ *L68.2*
- - Neuropathie sensorimotrice périphérique ¬ Syndrome d' *G60.0, Q84.2*
- Congénitale

Hypertrichose *–suite*
- Congénitale *–suite*
- - Lanugineuse ¬ *Q84.2*
- - ¬ *Q84.2*
- Cubitale ¬ *Q84.2*
- Déficience intellectuelle] ¬ Syndrome de CAHMR [cataracte- *Q87.8*
- Épilepsie déficience intellectuelle retard de développement hypertrophie gingival ¬ Syndrome
- - Dysmorphie faciale- *Q87.0*
- - FHEIG [dysmorphie faciale- *Q87.0*
- Fibromatose gingivale ¬ Syndrome d' *L68.8, K06.1*
- Haut du dos ¬ Syndrome autosomique dominant de polydactylie préaxiale- *Q69.9, Q84.2*
- Localisée ¬ *L68.2*
- Paupières ¬ *H02.8*
- Sans précision ¬ *L68.9*
- ¬
- - *L68.9*
- - Formes d' *L68.8*
- - Syndrome d'amaurose- *H35.5, Q84.2*

Hypertrichotique type Cantu ¬ Ostéochondrodysplasie *Q87.3*

Hypertriglycéridémie transitoire et stéatose hépatique du nourrisson ¬ *E78.1, K76.0*

Hypertrophiantes ¬ Autres ostéoarthropathies *M89.4*

Hypertrophie
- Acrale ¬ Syndrome d'acanthosis nigricans-résistance à l'insuline-crampes- *Q87.8*
- Amygdale
- - Végétations adénoïdes ¬ *J35.3*
- - ¬ *J35.1*
- Bénigne) de la prostate ¬ *N40*
- Canal biliaire ¬ *K83.8*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Cardiaque
- - Retard de développement ¬ Syndrome d'obésité-colite-hypothyroïdie- *Q87.8*
- - Rhumatismale aiguë ¬ *I01.8*
- - ¬ *I51.7*
- Chronique de la glande lacrymale ¬ *H04.0*
- Clitoris ¬ *N90.8*
- Congénital(e) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- Congénitale
- - Lèvre ¬ *Q18.6*
- - Orteils ¬ *Q74.2*
- Cornets du nez ¬ *J34.3*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.8*
- Coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa] ¬ *M79.4*
- Crête alvéolaire SAI ¬ *K08.8*

Hypertrophie *–suite*
- Gingival ¬ Syndrome
- - Dysmorphie faciale-hypertrichose-épilepsie-déficience intellectuelle/retard de développement- *Q87.0*
- - FHEIG [dysmorphie faciale-hypertrichose-épilepsie-déficience intellectuelle/retard de développement- *Q87.0*
- Glandes salivaires ¬ *K11.1*
- Hémifaciale ¬ Atrophie ou *Q67.4*
- Langue ¬ *K14.8*
- Lèvres ¬ *N90.6*
- Mammaire
- - Juvénile familiale ¬ *N62*
- - Massive de la puberté ¬ *N62*
- - SAI ¬ *N62*
- - ¬ *N62*
- Musculaire
- - Hépatomégalie-polyhydramnios ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - Liée à la myostatine ¬ *M62.89*
- Ongles (congénitale) ¬ *Q84.5*
- Osseuse ¬ *M89.3*
- Papille
- - Foliées ¬ *K14.3*
- - Linguales ¬ *K14.3*
- Prépuce, phimosis et paraphimosis ¬ *N47*
- Pseudo-musculaire ¬ *G71.08*
- Pylore ¬ *K31.10*
- Rénale ¬ *N28.88*
- Segmentaire-lipomatose-malformation artério-veineuse-nævus épidermique] ¬ Syndrome SOLAMEN [*Q87.8*
- Synoviale, non classée ailleurs ¬ *M67.2*
- Thymus ¬ *E32.0*
- Utérus ¬ *N85.2*
- Végétations adénoïdes ¬ *J35.2*
- Ventricule droit ¬ Communication interventriculaire
- - Atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et *Q21.3*
- - Sténose pulmonaire, dextroposition de l'aorte et *Q21.3*
- Vulve ¬ *N90.6*
- ¬ Pli anal *K64.4*

Hypertrophique
v./v.a. angio-ostéo-hypertrophique
- Adulte ¬ Sténose pylorique *K31.10*
- Col de l'utérus ¬ Allongement *N88.4*
- Congénitale
- - Létale par maladie de stockage du glycogène ¬ Cardiomyopathie *E74.0†, I43.1**
- - Pylore ¬ Sténose *Q40.0*
- Enfant ¬ Neuropathie: *G60.0*
- Géant ¬ Gastrite
- - *K29.6*
- - *K29.6*
- Infantile létal déficit

Hypertrophique *–suite*
- Infantile létal déficit *–suite*
- - Complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- - NADH-coenzyme Q réductase ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- - NADH-CoQ réductase ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- Ménétrier ¬ Gastropathie *K29.6*
- Mitochondriale avec acidose lactique par déficit en MTO1 ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- Myopathie mitochondriale ¬ Syndrome de cataracte congénitale-cardiomyopathie *Q87.8*
- Néphropathie tubulaire ¬ Syndrome d'encéphalopathie-cardiomyopathie *E88.8*
- Non obstructive ¬ Myocardiopathie *I42.2*
- Peau
- - Sans précision ¬ Affection *L91.9*
- - ¬ Autres affections *L91.8*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ Périostite (*A66.6*
- Pylore ¬ Rétrécissement *K31.10*
- Sans hypoprotéinémie ¬ Gastropathie *K29.6*
- Tubulopathie dues à une mutation de l'ADN mitochondrial ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- ¬
- - Amyotrophie péronière (type axonal) (type *G60.0*
- - Cicatrice *L91.0*
- - Laryngite: *J37.0*
- - Lichen plan *L43.0*
- - Lupus érythémateux verruqueux ou *L93.2*
- - Myocardiopathie
- - - *I42.2*
- - - Obstructive *I42.1*
- - Pharyngite (chronique): *J31.2*
- - Rhinite (chronique): *J31.0*
- - Sténose subaortique *I42.1*
- - Syndrome de surdité neurosensorielle progressive-cardiomyopathie *H90.5, I42.2*

Hypertropie ¬ *H50.2*

Hypertryptophanémie familiale ¬ *E70.8*

Hypertyrosinémie ¬ *E70.2*

Hyperuricémie
- Associée à HPRT ¬ *E79.8*
- Asymptomatique ¬ *E79.0*
- Hypertension artérielle pulmonaire-insuffisance rénale-alcalose ¬ Syndrome d' *E72.8*
- ¬ Maladie rénale kystique médullaire autosomique dominante avec *Q61.5*

Hypervalinémie ¬ *E71.1*

Hyperventilation ¬
- *R06.4*
- Formes psychogènes de: *F45.3*

Hyperviscosité polyclonale ¬ Syndrome d' *R70.1*

Hypervitaminose
- A ¬ *E67.0*

Hypervitaminose *–suite*
- B6 ¬
- - *E67.2*
- - Syndrome d' *E67.2*
- D ¬ *E67.3*
- E ¬ *E67.8*

Hyperzincémie et hypercalprotectinémie ¬ *E83.2*

Hyphéma
- Traumatique ¬ *S05.1*
- ¬ *H21.0*

Hypnique ¬ Céphalée *G44.8*

Hypnotiques
- Sans précision ¬ Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et *T42.7*
- ¬
- - Agitation après utilisation d' *F13.8*
- - Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et *T42.6*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d' *F13*

Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique ¬ *N31.81*

Hypoalbuminémie
- Nouveau-né ¬ *P74.8*
- ¬ *E88.01*

Hypoaldostéronisme
- Familial ¬ *E27.4*
- Hyperréninémique familial type
- - 1 ¬ *E27.4*
- - 2 ¬ *E27.4*
- ¬ *E27.4*

Hypoalphalipoprotéinémie ¬ *E78.6*

Hypobaropathie ¬ *T70.2*

Hypobêtalipoprotéinémie
- Sévère précoce ¬ *E78.6*
- ¬ *E78.6*

Hypocalcémie
- Autosomique dominante ¬ *E20.8*
- Due à une anomalie du métabolisme du calcium ¬ *E83.58*
- Nouveau-né
- - Due au lait de vache ¬ *P71.0*
- - ¬ Autres *P71.1*
- Secondaire ¬
- - HSH] Hypomagnésémie avec *E83.4*
- - Hypomagnésémie
- - - Intestinale avec *E83.4*
- - - Primaire avec *E83.4*

Hypocalcémique vitamine D-dépendant ¬ Rachitisme *E83.31*

Hypocalcifiée ¬ Amélogenèse imparfaite *K00.5*

Hypocalciurie ¬ Hypomagnésémie primaire autosomique dominante avec *E83.4*

Hypocalciurique
- Bénigne familiale ¬ Hypercalcémie *E83.58*
- Familiale ¬ Hypercalcémie *E83.58*

Hypochlorémie ¬ *E87.8*

Hypochondrogénésie ¬ *Q77.0*

Hypochondroplasie ¬ *Q77.4*

Hypochrome
- Congénitale sévère avec sidéroblastes en couronne ¬ Anémie *D64.0*
- Sidéroblastique liée au sexe ¬ Anémie *D64.0*
- ¬ anémie: *D50*

Hypocomplémentémique ¬ Vascularite urticarienne *M31.8*

Hypocondre ¬ *C49.4*

Hypocondriaque ¬
- Névrose *F45.2*
- Trouble *F45.2*

Hypocondrie ¬ *F45.2*

Hypodactylie
- Unilatérale des phalanges de la main 2-5 ¬ *Q71.8*
- ¬ Syndrome de Hanhart [Syndrome d'hypoglossie- *Q87.0*

Hypodiploïdie ¬
- Leucémie lymphoblastique B avec *C91.00*
- Lymphome lymphoblastique B avec *C83.5*

Hypodontie ¬
- *K00.0*
- Epidermolyse bulleuse simple avec *Q81.0, K00.0*
- Leucodystrophie 4H [hypomyélinisation, hypogonadisme hypogonadotrope, *E75.2*
- Syndrome d'hypomyélinisation-hypogonadisme hypogonadotrope- *G11.1*

Hypoesthésie
- Cornée ¬ *H18.8*
- Cutanée ¬ *R20.1*

Hypofibrinogénémie
- Acquise ¬ *D65.01*
- Congénitale ¬ *D68.20*
- Familiale ¬ *D68.20*
- ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- - Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*

Hypofonction
- Labyrinthe ¬ *H83.2*
- Testiculaire ¬ *E29.1*

Hypofonctionnement
- Cortical ¬ Syphilis des surrénales avec *A52.7†, E35.1**
- Corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux ¬ *E89.6*
- Parenchyme pancréatique ¬ *K86.88*
- Testiculaire après des actes médicaux ¬ *E89.5*

Hypogalactie ¬ *O92.4*

Hypogammaglobulinémie
v./v.a. verrues-hypogammaglobulinémie-infections-myélokathexis
- Détérioration neurologique progressive ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Héréditaire ¬ *D80.0*
- Non familiale ¬ *D80.1*
- SAI ¬ *D80.1*
- Transitoire
- - Enfance ¬ *D80.7*
- - Nourrisson ¬ *D80.7*
- ¬
- - Arthrite au cours d'une *D80.1†, M14.89**
- - Maladie systémique du tissu conjonctif au cours d'une *D80.1†, M36.8**
- - Protéinose alvéolaire pulmonaire à début infantile avec *J84.00, D80.0*
- - Syndrome d'ostéopétrose- *Q78.2, D80.1*

Hypogastrique
v./v.a. Hernie hypogastrique
- ¬
- - Artère ou veine: *S35.88*
- - Plexus: *S34.5*

Hypogénésie pulmonaire ¬ *Q26.8*

Hypogénitalisme
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microphtalmie colobomateuse-obésité- *Q87.8*
- ¬ Syndrome de rétinite pigmentaire-déficience intellectuelle-surdité- *Q87.8*

Hypoglosse
- Nerf crânien XII] ¬ Affections du nerf grand *G52.3*
- XII] ¬ Nerf: grand *S04.8*

Hypoglossie
- Hypodactylie] ¬ Syndrome de Hanhart [Syndrome d' *Q87.0*
- ¬ *Q38.3*

Hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] ¬ Intoxication: Insuline et *T38.3*

Hypoglycémie
- Cours
- - Diabète sucré
- - - Type 2 ¬ Trouble de la perception de l' *E11.60, U69.74!*
- - - ¬ Trouble de la perception de l' *E14.60, U69.74!*
- - Diabète sucré de type 1 ¬ Trouble de la perception de l' *E10.60, U69.74!*
- Hyperinsulinémique
- - Déficit
- - - 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte ¬ *E71.3*
- - - Glucokinase ¬ *E16.1*
- - - Récepteur à l'insuline ¬ *E16.1*
- - - UCP2 ¬ *E16.1*
- - Forme diffuse sensible au diazoxide ¬ *E16.1*
- - Induite par l'effort ¬ *E16.1*

Hypoglycémie *–suite*
- Hyperinsulinémique *–suite*
- - Persistante
- - - Adulte noninsulinome ¬ *E16.1*
- - - Enfant ¬ *E16.1*
- Hypoinsulinémique avec hémihypertrophie du corps ¬ *E16.8*
- Médicamenteuse, sans coma ¬ *E16.0*
- Modérée
- - Précisée non récidivante
- - - Cours d'un diabète sucré de type 1 ¬ *E10.60, U69.70!*
- - - Diabète sucré
- - - - Type 2 ¬ *E11.60, U69.70!*
- - - - ¬ *E14.60, U69.70!*
- - Précisées récidivante
- - - Cours d'un diabète sucré de type 1 ¬ *E10.60, U69.71!*
- - - Diabète sucré
- - - - Type 2 ¬ *E11.60, U69.71!*
- - - - ¬ *E14.60, U69.71!*
- Néonatale iatrogène ¬ *P70.3*
- Néonatales ¬ Autres *P70.4*
- Non hyperinsulinémique fonctionnelle ¬ *E16.1*
- Pancréatogène sans insulinome ¬ Syndrome d' *E16.1*
- Réactive non induite par les médicaments ¬ *E16.1*
- Sans précision ¬ *E16.2*
- Sévère sans coma
- - Cours d'un diabète sucré de type 1 ¬ *E10.60, U69.72!*
- - Diabète sucré ¬ *E14.60, U69.72!*
- - Diabète sucré de type 2 ¬ *E11.60, U69.72!*
- Transitoire du nouveau-né ¬ *P70.4*
- ¬
- - *E16.1*
- - Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec *P70.1*
- - MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.60*
- - Polyneuropathie au cours de l' *E16.2†, G63.3**

Hypoglycémique
- Auto-immun ¬ Syndrome
- - *E16.0*
- - *E16.1*
- Cours
- - Diabète MODY Maturity onset diabetes of young people ¬
- - - Choc *E11.61*
- - - Coma *E11.61*
- - Diabète sucré de type 1 ¬ Coma *E10.61, U69.73!*
- - Diabète sucré de type 2 ¬ Coma *E11.61, U69.73!*
- Diabète sucré ¬ Coma *E14.61, U69.73!*

Hypoglycémique *–suite*
- Non diabétique ¬ Coma *E15*
- SAI ¬ Coma: *E15*
- ¬
- - Encéphalopathie due à un coma *E16.1†, G94.30**
- - Hyperinsulinisme avec coma *E15*

Hypogonadisme
- Diabète sucré ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphies cranio-faciales- *Q87.0*
- Hypergonadotrope
- - Alopécie fronto-pariétale ¬ Syndrome d' *E23.0, L65.9*
- - Cataracte ¬ Syndrome d' *E29.1, H26.9*
- - Primaire-alopécie partielle ¬ Syndrome d' *E29.1, Q84.0*
- - ¬
- - - Maladie de Moyamoya-petite taille-dysmorphie faciale- *Q87.1*
- - - Syndrome d'alopécie-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Hypogonadotrope
- - Congénital
- - - Anosmie ¬ *E23.0*
- - - Isolé ¬ *E23.0*
- - - Sans anosmie ¬ *E23.0*
- - - ¬ *E23.0*
- - Hypodontie ¬
- - - Leucodystrophie 4H [hypomyélinisation, *E75.2*
- - - Syndrome d'hypomyélinisation- *G11.1*
- - Microcéphalie sévère-surdité neurosensorielle-dysmorphie ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - Rétinite pigmentaire ¬ Syndrome d' *E23.0, H35.5*
- - ¬ Syndrome de Mœbius-neuropathie axonale- *Q87.0*
- Hypogonadotrophique ¬
- - *E23.0*
- - Syndrome de déficience intellectuelle-myopathie-petite taille- *Q87.1*
- Ichtyose-obésité-petite taille ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Prolapsus de la valve mitrale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Testiculaire SAI ¬ *E29.1*
- ¬ Syndrome
- - Dystrophie musculaire congénitale-cataracte infantile- *G71.2*
- - Hydrocéphalie-obésité- *Q87.8*
- - Rétinite pigmentaire-déficience intellectuelle-surdité- *Q87.8*
- - Surdité- *H90.6, E29.1*

Hypogonadotrope
- Congénital
- - Anosmie ¬ Hypogonadisme *E23.0*
- - Isolé ¬ Hypogonadisme *E23.0*
- - Sans anosmie ¬ Hypogonadisme *E23.0*

Hypogonadotrope *–suite*
- Congénital *–suite*
- - ¬ Hypogonadisme *E23.0*
- Hypodontie ¬
- - Leucodystrophie 4H [hypomyélinisation, hypogonadisme *E75.2*
- - Syndrome d'hypomyélinisation-hypogonadisme *G11.1*
- Microcéphalie sévère-surdité neurosensorielle-dysmorphie ¬ Syndrome d'hypogonadisme *Q87.8*
- Rétinite pigmentaire ¬ Syndrome d'hypogonadisme *E23.0, H35.5*
- ¬ Syndrome de Mœbius-neuropathie axonale-hypogonadisme *Q87.0*

Hypogonadotrophique ¬
- Hypogonadisme *E23.0*
- Syndrome de déficience intellectuelle-myopathie-petite taille-hypogonadisme *Q87.1*

Hypohémoglobinémie associé à MADD ¬ Syndrome de retard du développement-dysfonctionnement endocrinien- *Q87.8*

Hypohidrose
- Déséquilibre électrolytique-dysfonctionnement des glandes lacrymales-ichtyose-xérostomie] ¬ Syndrome HELIX [*Q87.8*
- Hypoplasie de l'émail-kératodermie palmoplantaire-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬ *L74.4*

Hypohidrotique
- Liée à l'X ¬ Dysplasie ectodermique *Q82.4*
- ¬ DEH [Dysplasie ectodermique *Q82.4*

Hypohomocystéinémie ¬ Syndrome de retard du développement-immunodéficience-leucoencéphalopathie- *Q87.1*

Hypoinsulinémie
- Actes médicaux ¬ *E89.1*
- Postchirurgicale ¬ *E89.1*

Hypoinsulinémique avec hémihypertrophie du corps ¬ Hypoglycémie *E16.8*

Hypokaliémie ¬ *E87.6*

Hypokaliémique ¬ Paralysie périodique
- *G72.3*
- Familiale): *G72.3*

Hypokératose palmoplantaire circonscrite ¬ *L98.8*

Hypomagnésémie
- Hypocalcémie secondaire ¬ [HSH] *E83.4*
- Intestinale
- - Hypocalcémie secondaire ¬ *E83.4*
- - Type 1 ¬ *E83.4*
- Isolée autosomique dominante
- - Type Glaudemans ¬ *E83.4*
- - ¬ *E83.4*
- Malabsorption sélective de magnésium ¬ *E83.4*
- Néonatale ¬ *P71.2*
- Primaire

Hypomagnésémie *–suite*
- Primaire *–suite*
- - Autosomique dominante avec hypocalciurie ¬ *E83.4*
- - Crises généralisées-déficience intellectuelle-obésité ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - Déficience intellectuelle associée à EGF ¬ *E83.4, F79.9*
- - Épilepsie réfractaire-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *E83.4*
- - Familiale
- - - Hypercalciurie néphrocalcinose
- - - - Atteinte oculaire sévère ¬ *E83.4*
- - - - Sans atteinte oculaire sévère ¬ *E83.4*
- - - - ¬ *E83.4*
- - - Normocalciurie et normocalcémie ¬ *E83.4*
- - - ¬ *E83.4*
- - Hypercalciurie et néphrocalcinose ¬ *E83.4*
- - Hypocalcémie secondaire ¬ *E83.4*
- Rénale type
- - 2 ¬ *E83.4*
- - 3 ¬ *E83.4*
- - 4 ¬ *E83.4*

Hypomagnésiémie ¬ *E83.4*

Hypomandibulaire ¬ Dysostose facio-crânienne *Q75.4*

Hypomaniaque ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel *F31.0*

Hypomanie ¬ *F30.0*

Hypomastie ¬ *Q83.88*

Hypomature ¬ Amélogenèse imparfaite *K00.5*

Hypoménorrhée SAI ¬ *N91.5*

Hypominéralisation molaires-incisives [HMI] ¬ *K00.4*

Hypomotilité gastro-intestinale psychogène ¬ *F45.37*

Hypomyelination of early myelinating structures] ¬ HEMS [*G37.8*

Hypomyélinisante
- Arthrogrypose ¬ Syndrome de neuropathie *G83.8, Q74.3*
- Associée à POLR ¬ Leucodystrophie *E75.2*
- Autosomique récessive associée
- - C11ORF73 ¬ Leucodystrophie *E75.2*
- - NKX6-2 ¬ Leucodystrophie *E75.2*
- - RARS ¬ Leucodystrophie *E75.2*
- - VPS11 ¬ Leucodystrophie *E75.2*
- Chondrodysplasie spondylo-métaphysaire ¬ Syndrome de leucodystrophie *E75.2, Q77.8*

Hypomyélinisation
- Atrophie des noyaux gris centraux et du cervelet] ¬ H-ABC [*E75.2*
- Atteinte du tronc cérébral et de la moelle épinière et spasticité des jambes ¬ *E75.2*
- Hypogonadisme hypogonadotrope hypodontie ¬
- - Leucodystrophie 4H [*E75.2*
- - Syndrome d' *G11.1*

Hypomyélinisation-cataracte congénitale ¬ Syndrome d' *G37.8†, H28.2**

Hyponasalité ¬ Hypernasalité et *R49.2*

Hyponatrémie ¬ Hypo-osmolarité et *E87.1*

Hypo-osmolaire ¬ Coma *E87.1*

Hypo-osmolarité et hyponatrémie ¬ *E87.1*

Hypoparathyroïdie
v./v.a. lymphœdème-hypoparathyroïdie
v./v.a. Pseudohypoparathyroïdie
- Actes médicaux ¬ *E89.2*
- Auto-immun
- - Candidose chronique-maladie d'Addison ¬ Syndrome d' *E31.0*
- - ¬ *E20.0*
- Familiale ¬ *E20.8*
- Idiopathique ¬ *E20.0*
- Isolée familiale
- - Défaut de sécrétion de la PTH ¬ *E20.8*
- - ¬ *E20.8*
- Néonatale transitoire ¬ *P71.4*
- Sans précision ¬ *E20.9*
- Secondaire due à un défaut de sécrétion de parathormone ¬ *E20.8*
- ¬
- - Cataracte au cours de l' *E20.9†, H28.1**
- - Myopathie au cours de l' *E20.9†, G73.5**

Hypopharyngé ¬
- Repli ary-épiglottique versant
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant *C13.1*

Hypopharynx
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Tuberculose de l' *A15.8*
- Postérocricoïde ¬ Carcinome épidermoïde de l' *C13.0*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde
- - - *C13.9*
- - - Localisations contiguës de l' *C13.8*
- - - Paroi postérieure de l' *C13.2*
- - Saignement de l' *R04.1*
- - Tuberculose de l' *A16.8*
- - Tumeur bénigne: *D10.7*
- - Tumeur maligne
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C13.8*
- - - Paroi postérieure de l' *C13.2*

Hypophosphatasie
- Anomalies ophtalmiques et squelettiques ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-épilepsie- *Q87.8*
- Congénitale ¬ *E83.38*
- Syndrome de Rathbun] ¬ Hypophosphatémie familiale [*E83.38*
- ¬ *E83.38*

Hypophosphatémie
- Dominante

Hypophosphatémie *–suite*
- Dominante *–suite*
- - Néphrolithiase
- - - Ostéoporose ¬ *E83.30†, N22.8*, M81.99*
- - - ¬ *E83.30†, N22.8**
- - Ostéoporose ¬ *E83.30, M81.99*
- Familiale
- - Hypophosphatasie] [syndrome de Rathbun] ¬ *E83.38*
- - ¬ *E83.38*
- Liée à l'X ¬ *E83.30*

Hypophosphatémique
- Autosomique
- - Dominant ¬ Rachitisme *E83.30*
- - Récessif ¬ Rachitisme *E83.30*
- Familial ¬ Rachitisme *E83.30*
- Héréditaire avec hypercalciurie] ¬ HHRH [Rachitisme *E83.30, E83.58*
- ¬ Nanisme néphrotico-glycosurique avec rachitisme *E72.0†, N16.3**

Hypophysaire
- ACTH
- - Hormone adrénocorticotrope] ¬ Hypersécrétion *E24.0*
- - ¬ Hypersécrétion *E24.0*
- Associé
- - Kyste de la poche de Rathke ¬ Déficit *E23.6*
- - Perte auditive neurosensorielle et à des malformations de la colonne vertébrale ¬ Syndrome de déficit congénital combiné en hormones *E23.0*
- - Syndrome de la selle turcique vide ¬ Déficit *E23.0*
- Cellule mucoïde ¬
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Adénome *D35.2*
- - Carcinome *C75.1*
- Cérébelleuses-selle turcique anormale ¬ Syndrome de petite taille-anomalies *Q87.1*
- Hypothalamique ¬ les états mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie *E23*
- Non
- - Fonctionnel] ¬ NFPA [Adénome *D35.2*
- - Immunoréactif ¬ Adénome *D35.2*
- Origine post-traumatique ¬ Insuffisance *E23.6*
- Précoce ¬ Puberté *E22.8*
- PRL ¬ Adénome *D35.2*
- Prolactine ¬ Adénome *D35.2*
- ¬
- - Adénome
- - - *D35.2*
- - - Corticotrope *D35.2*
- - - Lactotrope *D35.2*
- - Apoplexie *E23.6*
- - Cachexie *E23.0*
- - Corticotrope *D35.2*
- - Déficit *E23.7*

Hypophysaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Diabète insipide d'origine *E23.2*
- - Dysfonctionnement *E23.7*
- - Gigantisme *E22.0*
- - Hypercorticisme *E24.0*
- - Insuffisance (de): isolée en: hormone *E23.0*
- - Tumeur *D44.3*

Hypophyse
- Déficit en facteurs de transcription, associé à une hypothyroïdie ¬ Dysfonctionnement congénital de l' *Q89.2, E03.0*
- Sans précision ¬
- - Anomalie de l' *E23.7*
- - Hypersécrétion de l' *E22.9*
- ¬
- - Abcès de l' *E23.6*
- - Adénocarcinome
- - - Acidophile de l' *C75.1*
- - - Basophile de l' *C75.1*
- - - Chromophobe de l' *C75.1*
- - - Éosinophile de l' *C75.1*
- - Anomalies de l' *E23.6*
- - Atrophie de l' *E23.6*
- - Carcinome
- - - Acidophile de l' *C75.1*
- - - Basophile
- - - - *C75.1*
- - - - Éosinophile de l' *C75.1*
- - - Chromophobe de l' *C75.1*
- - - Éosinophile de l' *C75.1*
- - - Mixte
- - - - Acidophile et basophile de l' *C75.1*
- - - - Basophile et acidophile de l' *C75.1*
- - Duplication de l' *Q89.2*
- - Gomme de l' *A52.7†, E35.8**
- - Hypersécrétions de l' *E22.8*
- - Insuffisance post-partum aiguë du lobe antérieur de l' *E23.0*
- - Kystes dermoïde de l' *D35.2*
- - Syphilis de l' *A52.7†, E35.8**
- - Tératome de l' *D44.3*
- - Tuberculose de l' *A18.8†, E35.8**
- - Tumeur bénigne: *D35.2*
- - Tumeur maligne: *C75.1*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D44.3*

Hypophysite
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**
- Induite par l'immunothérapie ¬ *G04.9, Y57.98!*
- Toxoplasmes ¬ *B58.2†, G05.2**

Hypophyso dépendant ¬
- Hypercorticisme *E24.0*
- Maladie de Cushing *E24.0*

Hypopigmentation
- Linéaire avec asymétrie cranio-faciale et anomalies acrales, oculaires et cérébrales ¬ *Q87.0*
- Oculo-cutanée ¬ Syndrome d'ostéoporose- *Q87.1*
- Plis des articulations ¬ Anonychie avec hyper et *Q84.3*
- Progressive familiale ¬ Hyper- et *L81.8*
- Type
- - Preus ¬ Syndrome oculo-cérébral d' *E70.3*
- - Yémen ¬ Syndrome de surdité avec cécité et *Q87.8*

Hypopituitarisme
- Actes médicaux ¬ *E89.3*
- Congénital familial ¬ *E23.0*
- Irradiation ¬ *E89.3*
- Médicamenteux ¬ *E23.1*
- Post-partum ¬ *E23.0*
- ¬
- - *E23.0*
- - Myopathie au cours de l' *E23.0†, G73.5**

Hypoplasie
v./v.a. hypoplasie mandibulaire-surdité-apparence progéroïde-lipodystrophie
- Alaire et télécanthus ¬ Syndrome de fente nasale avec *Q75.1*
- Anneau mitral ¬ *Q23.2*
- Aorte ¬ *Q25.4*
- Aorte ascendante
- - Cours de syndrome d'hypoplasie du cœur gauche ¬ *Q23.4*
- - Malformation du ventricule gauche ¬ Atrésie aortique congénitale avec *Q23.4*
- Artère ombilicale ¬ Absence congénitale et *Q27.0*
- Artère pulmonaire ¬
- - *Q25.7*
- - *Q25.7*
- Cartilage et des cheveux avec déficit immunitaire ¬ *Q78.5, D82.2*
- Cellules de Leydig ¬ *E34.59*
- Cément ¬ Aplasie et *K00.4*
- Cérébro-réno-génito-urinaire ¬ Syndrome létal fœtal d'agénésie/ *Q87.8*
- Claviculaire ¬ Foramen pariétal avec *Q74.0*
- Cœur
- - Droit ¬ *Q22.6*
- - Gauche
- - - HLHS] ¬ *Q23.4*
- - - ¬
- - - - Atrésie
- - - - - Aortique au cours de syndrome d' *Q23.4*
- - - - - Mitrale au cours de syndrome d' *Q23.4*
- - - - Hypoplasie
- - - - - Aorte ascendante au cours de syndrome d' *Q23.4*

Hypoplasie *–suite*
- Cœur *–suite*
- - Gauche *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Hypoplasie *–suite*
- - - - - Valve aortique au cours de syndrome d' *Q23.4*
- - - - Malformation congénitale du ventricule gauche lors du syndrome d' *Q23.4*
- Conduit auditif
- - Externe ¬ *Q17.8*
- - ¬ *Q17.8*
- Congénitale
- - Cubitus ¬ *Q71.8*
- - Humérus ¬ *Q71.8*
- - Pouce ¬ *Q71.8*
- - Surrénales-anomalies génitales] ¬ Syndrome IMAGe [retard de croissance intra-utérin-dysplasie métaphysaire- *Q87.1*
- Corps calleux
- - Appendices pré-auriculaires ¬ Syndrome de déficience intellectuelle avec *Q87.8*
- - Déficience intellectuelle-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.0*
- - Retard mental-pouces en adduction-spasticité-hydrocéphalie] ¬ Syndrome CRASH [*Q04.8*
- - Vermis cérébelleux-dysmorphie faciale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.0*
- Crânienne avec anencéphalie ¬ *Q00.0*
- Cubitus-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.2*
- Dermique en aires ¬ *Q82.8*
- Dysplasie
- - Moelle épinière ¬ *Q06.1*
- - Poumon ¬ *Q33.6*
- Émail
- - Dentaire, un retard de développement et déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'aplasie cutanée congénitale avec *Q87.8*
- - Kératodermie palmoplantaire-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypohidrose- *Q87.8*
- - Néonatale) (post-natale) (prénatale) ¬ *K00.4*
- Fémur
- - Faciès particulier ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - ¬ *Q72.4*
- Fovéa avec anomalie du chiasma optique et dysgénésie du segment antérieur de l'œil ¬ Syndrome d' *Q15.8*
- Fovéale isolée ¬ *Q14.1*
- Fovéale-cataracte présénile ¬ Syndrome d' *H35.8†, H28.2**
- Iris
- - Cataracte congénitale-amincissement stromal] ¬ Syndrome EDICT [dystrophie endothéliale- *Q13.8*
- - Microphtalmie-microcornée ¬ Syndrome d'aphakie congénitale- *Q13.8*

Hypoplasie *–suite*
- Isolée
- - Bilatérale des hémisphères cérébelleux ¬ *Q04.3*
- - Nerf optique ¬ *Q07.8*
- - Unilatérale des hémisphères cérébelleux ¬ *Q04.3*
- - Vermis cérébelleux ¬ *Q04.3*
- Jambe-cataracte congénitale ¬ Syndrome d' *Q87.1*
- Labyrinthe membraneux ¬ *Q16.5*
- Langue ¬ *Q38.3*
- Larynx ¬ *Q31.2*
- Mandibulaire ¬ Hyperplasie, *K07.0*
- Maxillaire
- - Genu valgum ¬ Syndrome de pseudoanodontie- *K07.8, Q74.1*
- - ¬ Hyperplasie, *K07.0*
- Médiofaciale-surdité-elliptocytose-néphrocalcinose ¬ Syndrome d' *Q87.0*
- Médullaire ¬ *D61.9*
- Moelle osseuse ¬ Syndrome de fibrose pulmonaire-hyperplasie hépatique- *Q87.8*
- Nerf cochléaire ¬ *Q07.8*
- Nerf optique ¬ Polymicrogyrie avec *Q04.3*
- Nez ¬ *Q30.1*
- Œil ¬ *Q11.2*
- Ongles-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de maladie de Hirschsprung- *Q87.8*
- Oreille ¬ *Q17.2*
- Organe de Corti ¬ *Q16.5*
- Pancréas
- - Atrésie intestinale-hypoplasie de la vésicule biliaire ¬ Syndrome d' *Q45.8*
- - ¬ Agénésie, aplasie et *Q45.0*
- Pancréatique-diabète-cardiopathie congénitale ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Pavillon de l'oreille ¬ *Q17.2*
- Pénis ¬ *Q55.6*
- Péroné-cubitus-anomalies rénales ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Phalanges ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-épilepsie-anomalies anales- *Q87.8*
- Pont-atrophie cérébrale ¬ Syndrome à début précoce d'encéphalopathie progressive-surdité- *G31.88*
- Pouce-alopécie-anomalie de la pigmentation ¬ Syndrome d' *Q87.1*
- Pulmonaire
- - Associée à une brièveté de la gestation ¬ *P28.0*
- - Congénitale unilatérale ¬ *Q33.6*
- Radius-pouces triphalangés-hypospadias-progénie ¬ Syndrome d' *Q87.2*
- Rate ¬ *Q89.08*
- Rayon radial-atrésie des choanes ¬ Syndrome d' *Q71.8, Q30.0*
- Rénale

Hypoplasie *–suite*
- Rénale *–suite*
- - Bilatérale
- - - Fœtal létal ¬ Syndrome de malformation cérébrale-atrésie duodénale- *Q87.8*
- - - ¬ *Q60.4*
- - Sans précision ¬ *Q60.5*
- - Unilatérale ¬ *Q60.3*
- Substance blanche-agénésie du corps calleux-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q04.8*
- Surrénales liée à l'X ¬ *Q89.1*
- Surrénalien
- - Anomalies génitales-entéropathie] ¬ Syndrome MIRAGE [Syndrome de myélodysplasie-infections-retard de croissance- *Q87.8*
- - Congénitale cytomégalique ¬ *Q89.1*
- - Familiale sans LH [hormone lutéinisante] ¬ *E27.1*
- Testicule(s) et du scrotum ¬ *Q55.1*
- Thyroïde ¬ *E03.1*
- Unilatérale du processus condylien de la mandibule ¬ Hyperplasie ou *K10.8*
- Utérine ¬ *Q51.8*
- Utérus et du col de l'utérus ¬ *Q51.8*
- Valve aortique au cours de syndrome d'hypoplasie du cœur gauche ¬ *Q23.4*
- Ventriculaire
- - Droite isolée ¬ *Q22.6*
- - ¬ Canal atrio-ventriculaire complet - *Q21.2*
- Vermis avec kystes de la fosse postérieure ¬ Syndrome d'agénésie partielle du corps calleux- *Q04.3*
- Vésicule biliaire ¬
- - *Q44.0*
- - Syndrome d'hypoplasie du pancréas-atrésie intestinale- *Q45.8*

Hypoplasie cérébelleuse
- Déficience intellectuelle-microcéphalie congénitale-dystonie-anémie-retard de croissance ¬ Syndrome CIMDAG [*Q87.8*
- Dégénérescence tapéto-rétinienne ¬ Syndrome d' *Q04.3*
- Dysplasie spondylo-épiphysaire ¬ Syndrome de déficience intellectuelle *Q87.8*
- Hydranencéphalie ¬ Syndrome de neurones multinuclés-anhydramnios-dysplasie rénale- *Q87.8*
- Malformations internes ¬ Syndrome de porencéphalie- *Q87.8*
- Trouble de la conduction cardiaque ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.0*
- Type
- - A ¬ Lissencéphalie- *Q04.3*
- - B ¬ Lissencéphalie- *Q04.3*
- - C ¬ Lissencéphalie- *Q04.3*
- - D ¬ Lissencéphalie- *Q04.3*
- - E ¬ Lissencéphalie- *Q04.3*
- - F ¬ Lissencéphalie- *Q04.3*
- ¬ Syndrome

Hypoplasie cérébelleuse *–suite*
- ¬ Syndrome *–suite*
- - Déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- - Sclérose endostéale *Q87.8*

Hypoplasie mammaire ¬ *Q83.88*

Hypoplasie mandibulaire-surdité-apparence progéroïde-lipodystrophie
- MDPL ¬ Syndrome [d' *E34.8*
- ¬ Syndrome d' *E34.8*

Hypoplasie pontocérébelleuse
- Due à une mutation TUBB3 ¬ Dysgénésie corticale avec *Q04.8*
- Hypotonie insuffisance respiratoire
- - Délétions bialléliques dans le cluster de gènes ATAD3 ¬ Syndrome létal d' *Q04.3*
- - Mutation ponctuelle ¬ Syndrome létal d' *Q04.3*
- - ¬ Syndrome létal d' *Q04.3*
- Type
- - 1 ¬ *Q04.3*
- - 2 ¬ *Q04.3*
- - 3 ¬ *Q04.3*
- - 4 ¬ *Q04.3*
- - 6 ¬ *Q04.3*
- - 7 ¬ *Q04.3*
- - 8 ¬ *Q04.3*
- - 9 ¬ *Q04.3*
- - 10 ¬ *Q04.3*
- - 11 ¬ *Q04.3*
- - 12 ¬ *Q04.3*
- - 13 ¬ *Q04.3*
- - 14 ¬ *Q04.3*
- ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-microcéphalie- *Q87.8*

Hypoplasique
- Congénitale de Blackfan-Diamond ¬ Anémie *D61.0*
- Familiale ¬ Anémie (de): *D61.0*
- Forme de cône et dysmorphie faciale ¬ Syndrome de petite taille avec cyphose, épiphyses *Q87.1*
- SAI ¬ Anémie *D61.9*
- Turner ¬ Dent *K00.4*
- ¬ Amélogenèse imparfaite *K00.5*

Hypoproaccélérinémie ¬ *D68.22*

Hypoproconvertinémie
- Congénitale
- - Héréditaire ¬ *D68.23*
- - ¬ *D68.23*
- ¬ *D68.23*

Hypoprotéinémie ¬ Gastropathie hypertrophique sans *K29.6*

Hypoprothrombinémie
- Acquise ¬ *D68.4*
- Héréditaire ¬ *D68.21*
- Idiopathique ¬ *D68.21*
- ¬ *D68.21*

Hypoptyalisme ¬ *K11.7*

Hypopyon ¬ Ulcère de (la): cornée: avec *H16.0*

Hyporéactivité
v./v.a. hypotension-hyporéactivité

Hyposécrétion d'adiurétine ¬ *E23.2*

Hyposegmentation leucocytaire, héréditaire ¬ *D72.0*

Hyposomnie ¬ *G47.0*

Hypospadias
- Balanique ¬ *Q54.0*
- Coronal ¬ *Q54.0*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de dysostose spondylo-costale- *Q87.1*
- Féminin ¬ *Q54.8*
- Glandulaire ¬ *Q54.0*
- Pénien ¬ *Q54.1*
- Pénoscrotal ¬ *Q54.2*
- Périnéal ¬ *Q54.3*
- Progénie ¬ Syndrome d'hypoplasie du radius-pouces triphalangés- *Q87.2*
- Sans précision ¬ *Q54.9*
- ¬
- - *Q54.8*
- - Syndrome
- - - Anomalie du membre inférieur- *Q74.2, Q54.9*
- - - Spina bifida- *Q05.7, Q54.0*

Hyposphagme ¬ *H11.3*

Hyposplénisme ¬ *D73.0*

Hypostatique, sans précision ¬ Pneumonie *J18.2*

Hyposurrénalisme tuberculeux ¬ *A18.7†, E35.1**

Hypotensif en position couchée ¬ Syndrome *O26.5*

Hypotension
- Chronique ¬ *I95.8*
- Idiopathique ¬ *I95.0*
- Intracrânienne
- - Spontanée ¬ *G96.0*
- - Suite à un pontage ventriculaire ¬ *G97.2*
- Maternelle ¬ Syndrome d' *O26.5*
- Médicamenteuse ¬ *I95.2*
- Orthostatique
- - Neurogène
- - - Syndrome de Shy-Drager] ¬ *G23.8*
- - - ¬ Syndrome parkinsonien au cours d' *G23.8*
- - Symptomatique ¬ Syndrome parkinsonien au cours d' *G23.8*
- - ¬
- - - *I95.1*
- - - Syndrome parkinsonien au cours d' *G23.8*
- Posturale ¬ *I95.1*
- Sans précision ¬ *I95.9*
- ¬ Autres *I95.8*

Hypotension-hyporéactivité ¬ Épisode d' *T88.1*

Hypothalamique
- Acquise ¬ Obésité *E23.3, E66.89*
- Épilepsie gélastique ¬ Hamartomes *Q85.8, G40.2*
- Hypoventilation dysautonomie
- - Tumeurs neurales] ¬ ROHHADNET [Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide-dysfonctionnement *E23.3, C80.9*
- - ¬ ROHHAD [Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide-dysfonctionnement *E23.3, E66.29*
- Non classée ailleurs ¬ Anomalie *E23.3*
- ¬
- - États mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie hypophysaire ou *E23*
- - Syndrome d'hypernatrémie adipsique *E23.3*

Hypothalamus ¬ Astrocytome pilomyxoïde de l' *C71.0*

Hypothermie
- Accidentelle ¬ *T68*
- Consécutive à une anesthésie ¬ *T88.5*
- Légère du nouveau-né ¬ *P80.8*
- Non associée à une baisse de la température ambiante ¬ *R68.0*
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬ *P80.9*
- - ¬ Autres formes d' *P80.8*
- Périodique spontanée ¬ *G90.88*
- ¬ *T68*

Hypothermique
- Auto-inflammatoire familial ¬ Syndrome *L50.2*
- Nouveau-né ¬ Syndrome *P80.0*

Hypothyréose par déficit isolé en TRH [hormone de libération de la thyrotrophine] ¬ *E03.1*

Hypothyroïdie
- Acquise
- - Due à une carence en iode ¬ Démence au cours d' *E01.8†, F02.8**
- - ¬ Démence au cours d' *E03.9†, F02.8**
- Actes médicaux ¬ *E89.0*
- Carence acquise en iode SAI ¬ *E01.8*
- Centrale due à un déficit du récepteur de la TRH ¬ *E03.1*
- Congénital ¬ *E03.1*
- Congénitale
- - Centrale
- - - Macroorchidie tardive liée à l'X ¬ *E03.1*
- - - ¬ *E03.1*
- - Déficit isolé en TSH [thyréostimuline] ¬ *E03.1*
- - Due à une exposition maternelle aux médicaments antithyroïdiens ¬ *P72.2*
- - Glaucome congénital-fibrose hépatique-polykystose rénale ¬ Syndrome de diabète néonatal- *Q87.8*
- - Goitre diffus ¬ *E03.0*
- - Idiopathique ¬ *E03.1*

Hypothyroïdie *–suite*
- Congénitale *–suite*
- - Passage transplacentaire d'anticorps anti-récepteur de la TSH ¬ *P72.2*
- - Sans goitre ¬ *E03.1*
- - Transitoire par mutations hétérozygotes du gène THOX2 ¬ *P72.2*
- - ¬ Ictère néonatal dû à une *E03.1*
- Détresse respiratoire néonatale ¬ Syndrome de choréoathétose- *E03.1†, J99.8*, G25.5*
- Due
- - Médicaments et à d'autres produits exogènes ¬ *E03.2*
- - Résistance périphérique aux hormones thyroïdiennes ¬ *E03.8*
- Hypertrophie cardiaque-retard de développement ¬ Syndrome d'obésité-colite- *Q87.8*
- Insuffisance congénitale en iode ¬ *E00.9*
- Irradiation ¬ *E89.0*
- Mutation du récepteur de la TSH ¬ *E03.1*
- Post-infectieuse ¬ *E03.3*
- Précisées ¬ Autres *E03.8*
- Retard pubertaire-petit taille ¬ Syndrome d'atrésie des choanes-athélie- *Q87.1*
- Sans précision ¬ *E03.9*
- Transitoire
- - Néonatale ¬ *P72.2*
- - Nouveau-né due à une augmentation de l'apport en iode ¬ *P72.2*
- ¬
- - *E03*
- - Arthropathie au cours de l' *E03.9†, M14.59**
- - Dysfonctionnement congénital de l'hypophyse dû à un déficit en facteurs de transcription, associé à une *Q89.2, E03.0*
- - Myopathie au cours de l' *E03.9†, G73.5**
- - Syndrome de pseudohypertrophie musculaire- *E03.1*

Hypothyroïdien ¬ Crétinisme endémique (de): *E00.1*

Hypotonie
- Acidose lactique
- - Hyperammoniémie ¬ *I42.2*
- - ¬ Syndrome de cardiomyopathie- *I42.2*
- Anomalie du mouvement ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Axiale ¬ Syndrome de retard global de développement-anomalies visuelles-atrophie cérébelleuse progressive- *G31.88*
- Brachycéphalie-sténose du pylore-cryptorchidie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- Cardiopathie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle autosomique dominante-anomalies cranio-faciales- *Q87.8*
- Cataracte retard de développement ¬ Syndrome létal
- - Cardiomyopathie par non-compaction du ventricule gauche associé à des crises d'épilepsie, une *G31.81*

Hypotonie *–suite*
- Cataracte retard de développement ¬ Syndrome létal *–suite*
- - Non-compaction ventriculaire gauche-convulsions- *G31.81*
- Congénitale ¬ *P94.2*
- Dysmorphie facial
- - Comportement agressif ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- - ¬ Syndrome de retard de développement-ataxie- *Q87.0*
- Épilepsie
- - Type
- - - 2 ¬ Syndrome d'anomalies congénitales multiples- *Q87.8*
- - - 3 ¬ Syndrome d'anomalies congénitales multiples- *Q87.8*
- - ¬ Syndrome d'anomalies congénitales multiples- *Q87.8*
- Ichtyose par déficit en dolichol phosphate ¬ *E77.8*
- Infantile
- - Anomalies oculomotrices-mouvements hyperkinétiques-retard de développement ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - Diplégie spastique-dysarthrie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microcéphalie post-natale- *Q87.8*
- - Retard psychomoteur, dysmorphie faciale ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Insuffisance respiratoire
- - Délétions biallélliques dans le cluster de gènes ATAD3 ¬ Syndrome létal d'hypoplasie pontocérébelleuse- *Q04.3*
- - Mutation ponctuelle ¬ Syndrome létal d'hypoplasie pontocérébelleuse- *Q04.3*
- - ¬ Syndrome létal d'hypoplasie pontocérébelleuse- *Q04.3*
- Musculaire
- - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de cubitus court-dysmorphie faciale- *Q87.0*
- - Dysmorphies faciales et macrocéphalie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle avec *Q87.0*
- - Néonatale sévère associé au PURA avec convulsions et encéphalopathie ¬ Syndrome d' *G40.4*
- - Progressive-surdité-retard de développement ¬ Syndrome de cataracte congénitale- *G71.3*
- - Trouble sévère du langage-retard cognitif sévère ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - ¬ Syndrome de synostose radio-cubitale-retard de développement- *Q87.0*
- Œil ¬ *H44.4*
- Polymicrogyrie ¬ Syndrome de dysmorphie faciale avec retard général de développement, *Q04.8*
- Retard de développement ¬ Syndrome de contractures congénitales des membres et de la face- *Q87.0*
- Sévère

Hypotonie *–suite*
- Sévère *–suite*
- - Dysmorphie craniofaciale associé à TBCK ¬ Syndrome d'encéphalopathie- *Q87.0*
- - Retard de développement psychomoteur-strabisme-défaut du septum cardiaque ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Strabisme-traits grossiers du visage-planovalgus ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère- *Q87.8*
- Troubles du comportement ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-macrocéphalie- *Q87.8*
- Utérin
- - Post-partum ¬ *O72.1*
- - Primitive ¬ *O62.0*
- - SAI ¬ *O62.2*
- - Secondaire ¬ *O62.1*
- Utérus en tant que complication de l'accouchement ¬ *O62.2*

Hypotonie-cystinurie
- Atypique ¬ Syndrome d' *E72.0*
- ¬ Syndrome d' *E72.0*

Hypotonique de l'utérus en tant que complication de l'accouchement ¬ Contraction *O62.2*

Hypotrichose
v./v.a. ichtyose-hypotrichose
- Déficience intellectuelle, type Lopes ¬ *Q87.0*
- Dégénérescence maculaire juvénile ¬ *Q87.8*
- Due à un médicament cytotoxique ¬ *L65.8*
- Héréditaire à vésicules cutanées récurrentes ¬ *Q84.0, R23.8*
- Lymphœdème-télangiectasie-glomérulonéphrite membranoprolifération ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Ostéolyse-périodontite-kératodermie palmoplantaire [HOPP] ¬ Syndrome d' *Q82.8*
- Post-infectieuse ¬ *L65.8*
- Simple
- - Cuir chevelu ¬ *L65.8*
- - ¬ *L65.8*
- Type Marie Unna ¬ *Q84.0*
- ¬ Syndrome
- - Dysplasie spondylo-métaphysaire- *Q77.7*
- - Petite taille-onychodysplasie-dysmorphie faciale- *Q87.1*

Hypotrichotique ¬ Anhidrose *Q82.4*

Hypotrophie mammaire ¬ *Q83.88*

Hypotrophique ¬ Utérus *Q51.8*

Hypotropie ¬
- *H50.2*
- Maladie de Basedow avec orbitopathie endocrinienne et *E05.0†, H06.3**

Hypo-uricémie rénale héréditaire ¬ *N25.8*

Hypoventilation
- Associée à l'obésité ¬ Syndrome d' *E66.29*
- Dysautonomie

Hypoventilation *–suite*
- Dysautonomie *–suite*
- - Tumeurs neurales] ¬ ROHHADNET [Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide-dysfonctionnement hypothalamique- *E23.3, C80.9*
- - ¬ ROHHAD [Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide-dysfonctionnement hypothalamique- *E23.3, E66.29*
- SOH] ¬ Syndrome obésité *E66.2*
- Sommeil ¬ Syndrome d' *G47.32*

Hypoventilation alvéolaire
- Centrale congénital ¬ Syndrome d' *G47.32*
- Enfant adolescent ¬ Obésité
- - *E66.24*
- - Extrême avec *E66.25*
- Indice de masse corporelle IMC
- - 40 et moins de 50 ¬ Obésité avec *E66.26*
- - 50 et moins de 60 ¬ Obésité avec *E66.27*
- - 60 et plus ¬ Obésité avec *E66.28*
- - Compris
- - - 30 et moins de 35 ¬ Obésité avec *E66.20*
- - - 35 et moins de 40 ¬ Obésité avec *E66.21*
- Non obstructive idiopathique du sommeil ¬ *G47.32*
- ¬
- - Obésité grade
- - - I (OMS) avec *E66.20*
- - - II (OMS) avec *E66.21*
- - - III (OMS) avec *E66.29*
- - Syndrome de l' *E66.29*

Hypovitaminose A SAI ¬ *E50.9*

Hypovolémie ¬
- *E86*
- Maladie due au VIH avec *B23.8, E86*

Hypovolémique
- Pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Choc (endotoxique) (*T81.1*
- ¬ Choc *R57.1*

Hypoxanthine guanine phosphoribosyltransférase grade IV ¬ Déficit en *E79.1*

Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase grade I ¬ Déficit en *E79.8*

Hypoxémie ¬ Insuffisance respiratoire
- Aiguë avec hypercapnie et *J96.01*
- Chronique avec hypercapnie et *J96.11*
- Hypercapnie et *J96.91*

Hypoxémique
- Aiguë ¬ Insuffisance respiratoire *J96.00*
- Chronique ¬ Insuffisance respiratoire *J96.10*
- ¬
- - Insuffisance respiratoire *J96.90*
- - Polycythémie: *D75.1*

Hypoxie
- Fœtale

Hypoxie *–suite*
- Fœtale *–suite*
- - Intra-utérine ¬ *P20*
- - ¬ Soins maternels pour signes d' *O36.3*
- Intra-utérine
- - Constatée première fois
- - - Avant le début du travail ¬ *P20.0*
- - - Pendant le travail et l'accouchement ¬ *P20.1*
- - Sans précision ¬ *P20.9*
- Périnatale ¬ *P21.9*
- SAI ¬ *P21.9*
- ¬
- - Hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une *P52*
- - Hypertension pulmonaire lors de *I27.22*

Hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ Encéphalopathie anoxo-ischémique [*P91.6*

Hypsarythmie, et atrophie optique] ¬ Syndrome PEHO [encéphalopathie progressive avec œdème, *G31.88*

Hypsicéphalie ¬ *Q75.0*

Hystérectomie ¬ Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après *N99.3*

Hystérie
- Angoisse ¬ *F41.8*
- Conversion ¬ *F44*
- ¬
- - *F44*
- - Vision floue au cours d' *F44.6†, H58.1**

Hystérique
v./v.a. Type de maladie

Hystrix de Curth-Macklin ¬ Ichtyose *Q80.8*

IAC] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: conjoint [*N98.8*

IAD] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: donneur [*N98.8*

Iatrogène ¬
- Hypoglycémie néonatale *P70.3*
- I-MCJ [Maladie de Creutzfeldt-Jakob *A81.0*
- Pneumothorax *J95.80*

IBS-C] ¬ Irritable bowel syndrome with predominant constipation [*K58.2*

IBS-D] ¬ Irritable bowel syndrome with predominant diarrhoea [*K58.1*

IBS-M] ¬ Irritable bowel syndrome with mixed bowel habits [*K58.3*

IC/BPS ¬ *N30.1*

ICCA ¬ Syndrome *G40.4*

ICE ¬ Syndrome *H21.8*

ICEI] ¬ Intervillite chronique d'étiologie indéterminée [*O41.1*

ICF [instabilité centromérique-immunodéficience-dysmorphie] ¬ Syndrome *D82.8*

Ichthyosis ¬ Bathing suit *Q80.2*

Ichtyoparasitose à Vandellia cirrhosa ¬ *B88.8*

Ichtyose
- Acquise ¬ *L85.0*
- Cholangite sclérosante] ¬ NISCH [Syndrome néonatal d' *K83.00, Q80.8*
- Congénitale
- - Déficience intellectuelle-tétraplégie spastique ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - Kératodermie sclérosante ¬ Syndrome de kératose linéaire- *Q82.8*
- - Microcéphalie-tétraplégie ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- - ¬ *Q80.9*
- Congénitales ¬ Autres *Q80.8*
- Déficience intellectuelle-nanisme-anomalie rénale ¬ Syndrome d' *Q87.1*
- Déficit
- - Dolichol phosphate ¬ Hypotonie et *E77.8*
- - Facteur VIII ¬ Syndrome de sclérose en plaques- *Q87.8*
- Épidermolytique
- - Annulaire ¬ *Q80.3*
- - Autosomique récessive ¬ *Q80.3*
- - Superficielle ¬ *Q80.8*
- - ¬ *Q80.3*
- Exfoliative ¬ *Q80.8*
- Folliculaire-alopécie-photophobie ¬ Syndrome d' *Q80.0*
- Hépatosplénomégalie-dégénérescence cérébelleuse ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Héréditaire ¬ *Q80.9*
- Hystrix de Curth-Macklin ¬ *Q80.8*
- Insuffisance ovarienne précoce ¬ Syndrome d'ostéosclérose- *Q87.5*
- Lamellaire ¬ *Q80.2*
- Liée au chromosome X ¬ *Q80.1*

Ichtyose *–suite*
- Obésité-petite taille ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypogonadisme- *Q87.8*
- Petite taille-brachydactylie-microsphérophakie ¬ Syndrome d' *Q87.1*
- Récessive liée à l'X syndromique ¬ *Q80.1*
- Trichothiodystrophie ¬ *L67.8*
- Vulgaire ¬ *Q80.0*
- Xérostomie] ¬ Syndrome HELIX [hypohidrose-déséquilibre électrolytique-dysfonctionnement des glandes lacrymales- *Q87.8*
- ¬
- - Kératodermie mutilante avec *Q82.8*
- - Lipidose avec surcharge en triglycérides et *E75.5*

Ichtyose-hypotrichose ¬ Syndrome d' *Q80.8*

Ichtyose-prématurité ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Ichtyosiforme
- Anomalies des membres ¬ Syndrome d'hémidysplasie congénitale-nævus *Q87.8*
- Bulleux
- - Brock ¬ Érythrodermie congénitale *Q80.3*
- - Congénitale ¬ Érythrodermie *Q80.3*
- Non-bulleuse ¬ Érythrodermie congénitale *Q80.2*
- Réticulaire ¬
- - CRIE [Érythrodermie congénitale *Q80.3*
- - Érythrodermie congénitale *Q80.3*

ICOS ¬ Déficit immunitaire combiné à début tardif par déficit en *D81.8*

ICOSL ¬ Déficit immunitaire combiné à début tardif par déficit en *D81.8*

Ictère
- Acholurique familial ¬ *D58.0*
- Congénital familial non hémolytique ¬ *E80.5*
- Épidémique avec coma hépatique ¬ *B15.0, K72.74!*
- Hémolytique congénital
- - Sphérocytaire ¬ *D58.0*
- - ¬ *D58.0*
- Hémorragique
- - Leptospires ¬ *A27.0*
- - Spirochètes ¬ *A27.0*
- Infectieux avec coma hépatique ¬ *B15.0, K72.74!*
- Néonatal
- - Associé à un accouchement avant terme ¬ *P59.0*
- - Causes précisées ¬ *P59.8*
- - Contusions ¬ *P58.0*
- - Déglutition de sang maternel ¬ *P58.5*
- - Galactosémie ¬ *E74.2*
- - Hémolyse excessif
- - - Précisées ¬ *P58.8*
- - - Sans précision ¬ *P58.9*
- - Hypothyroïdie congénitale ¬ *E03.1*
- - Infection ¬ *P58.2*

Ictère *–suite*
- Néonatal *–suite*
- - Inhibiteurs de la lactation ¬ *P59.3*
- - Lésions hépatocellulaires, autres et sans précision ¬ *P59.2*
- - Médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né ¬ *P58.4*
- - Polycythémie ¬ *P58.3*
- - Saignement ¬ *P58.1*
- - Sans précision ¬ *P59.9*
- - Syndrome de Crigler-Najjar ¬ *E80.5*
- Non classée ailleurs ¬ Hyperbilirubinémie, avec indication d' *R17.0*
- Nucléaire
- - Iso-immunisation ¬ *P57.0*
- - Nouveau-né ¬ *P57.9*
- - ¬
- - - *P57.9*
- - - Formes précisées d' *P57.8*
- Physiologique (intense) (prolongé) SAI ¬ *P59.9*
- Réaction hémolytique à la transfusion ¬ *T80.8*
- Retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme ¬ *P59.0*
- Sérique homologue) ¬ Hépatite sérique (*B19.9*
- Transfusion ¬ *T80.8*

Ictéro hémorragique
- Maladie de Weil] ¬ Leptospirose *A27.0*
- ¬ Leptospirose *A27.0*

IDC-P] ¬ Carcinome intracanalaire de la prostate [*C61*

Idées
- Obsédantes et comportements compulsifs ¬ Forme mixte, avec *F42.2*
- Ruminations obsédantes au premier plan ¬ Avec *F42.0*
- Tendances] suicidaires ¬ *R45.8*

Identité
- Sexuel
- - Adulte ou l'adolescent, type non transsexuel ¬ Trouble de l' *F64.1*
- - Enfance ¬ Trouble de l' *F64.2*
- - Sans précision ¬ Trouble de l' *F64.9*
- - ¬ Autres troubles de l' *F64.8*
- ¬ Trouble de l' *F93.8*

Idiopathique
v./v.a. Type de maladie

Idiosyncrasie
- Due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.7*
- SAI ¬ *T78.4*
- ¬ Asthme lors d' *J45.19*

Idiosyncrasique (imprévisible) médicamenteuse ¬ lésion hépatique: *K71*

Idiotie
- Amaurotique

Idiotie *–suite*
- Amaurotique *–suite*
- - Familiale ¬ *E75.4*
- - Infantile ¬ *E75.4*
- - Juvénile ¬ *E75.4*
- - ¬
- - - *E75.4*
- - - Forme tardive de l' *E75.4*
- Dysostose [syndrome de Pfaundler-Hurler] ¬ *E76.0*

Iduronate 2-sulfatase ¬ Déficit en *E76.1*

Iduronidase
v./v.a. alpha-L-iduronidase

Ieshima-Koeda-Inagaki ¬ Syndrome de *Q87.8*

IFF [Insomnie fatale familiale] ¬ *A81.8*

IFIH1 ¬ Paraplégie spastique héréditaire associée à *G11.4*

IFNG ¬ Prédisposition génétique sévère aux infections mycobactériennes par déficit complet en *D84.8*

IFNgammaR1 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en *D84.8*

IFNgammaR2 ¬
- MSMD autosomique récessive par déficit partiel en *D84.8*
- Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en *D84.8*

IgA
- Croissant ¬ Glomérulonéphrite à *N02.7*
- Immunoglobuline A
- - Lésions glomérulaires prolifératives ¬ Néphropathie à *N02.8*
- - ¬ Néphropathie à *N02.8*
- Linéaire ¬ Dermatose à *L13.8*
- Sans anticorps connus ¬ Polyradiculoneuropathie avec gammapathie monoclonale *D47.2†*, *G63.1**
- ¬
- - Déficit sélectif en immunoglobuline A [*D80.2*
- - Pemphigus à *L10.8*
- - Polyneuropathie axonale avec gammopathie monoclonale *D47.2†*, *G63.1**
- - Vascularite à *D69.0*

IGDA] ¬ Syndrome de dermatite granulomateuse interstitielle-arthrite [*M30.1*

IgE] ¬ Syndrome d'hyperimmunoglobulinémie E [*D82.4*

IGF1 [somatomédine-C] et EGF [facteur de croissance épidermique] ¬ Lipodystrophie due à un déficit combiné en insuline, *E88.1*

IgG
- Sans anticorps connus ¬ Polyradiculoneuropathie avec gammapathie monoclonale *D47.2†*, *G63.1**
- ¬ Polyneuropathie axonale avec gammopathie monoclonale *D47.2†*, *G63.1**

IgG4 ¬
- Aortite associée à *I77.6*
- Cholangite sclérosante à *K83.01*
- Dacryoadénite et sialadénite à *K11.8*
- Hépatopathie associée aux *K75.4*
- Maladie
- - Glande submandibulaire associée à *K11.2*
- - Rénale associée à *N11.8*
- - Systémique liée à la présence d'anticorps *M35.8*
- Médiastinite associée à *J98.50*
- Pachyméningite associée à *G03.8*

IgM
- Activité anti-MAG ¬ Polyneuropathie associée à une gammopathie monoclonale *D47.2†*, *G63.1**
- Rémission complète ¬ Lymphome lymphoplasmocytaire avec production d' *C88.01*
- Sans anticorps connus ¬ Polyradiculoneuropathie avec gammapathie monoclonale *D47.2†*, *G63.1**
- ¬
- - Déficit
- - - Immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [*D80.5*
- - - Sélectif en immunoglobuline M [*D80.4*
- - Lymphome lymphoplasmocytaire
- - - Production d' *C88.00*
- - - Sans sécrétion d' *C83.0*
- - Polyneuropathie axonale avec gammopathie monoclonale *D47.2†*, *G63.1**

IKAROS ¬ Déficit immunitaire combiné
- Déficit en *D81.8*
- Haploinsuffisance d' *D81.8*

IKBKB ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

IKK2 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

IKZF1 ¬ Déficit immunitaire combiné par mutation dominante négative d' *D81.8*

IL10 ¬ Maladie inflammatoire de l'intestin précoce associée à *K52.8*

IL12B ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en *D84.8*

IL21R ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

IL6R [Interleukin 6 receptor] ¬ Déficit immunitaire combiné autosomique récessif par déficit en *D81.8*

IL6ST interleukin 6 signal transducer ¬ Déficit immunitaire combiné autosomique
- Dominant par déficit partiel en *D81.8*
- Récessif déficit
- - Complet en *D81.8*
- - Partiel en *D81.8*

Iléal ¬ Carcinoïde *C17.2*

Iléale ¬
- Atrésie jéjuno- *Q41.8*

Iléale ¬ *–suite*
- Maladie de Crohn [entérite régionale]: *K50.0*
- Mucosite *K92.8*

Iléite
- Aspergillus ¬ *B44.8†*, *K93.8**
- Due à un cytomégalovirus ¬ *B25.80†*, *K93.8**
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*
- Reflux ¬ *K51.0*
- Régionale ¬ *K50.0*
- Terminale ¬ *K50.0*
- Virus d'Epstein-Barr ¬ *B27.0†*, *K93.8**
- Virus de l'herpès ¬ *B00.8†*, *K93.8**

Iléo-anale avec poche ¬ Incontinence fécale liée à une anastomose *R15*, *K91.88*

Iléo-cæcal
- Hyperplasique ¬ Tuberculose *A18.3†*, *K93.0**
- ¬ Valvule *D12.0*

Iléocolite tuberculeuse ¬ *A18.3†*, *K93.0**

Iléon
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de l' *C17.2*
- Type
- - I ¬ Atrésie de l' *Q41.2*
- - II ¬ Atrésie de l' *Q41.2*
- - IIIa ¬ Atrésie de l' *Q41.2*
- - IIIb ¬ Atrésie de l' *Q41.2*
- - IV ¬ Atrésie de l' *Q41.2*
- ¬
- - Absence congénitale de l' *Q41.2*
- - Adénocarcinome de l' *C17.2*
- - Atrésie de l' *Q41.2*
- - Carcinome épidermoïde de l' *C17.2*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] de l' *C17.2*
- - Léiomyosarcome de l' *C17.2*
- - Ostéïte condensante de l' *M85.35*
- - Sténose congénitale de l' *Q41.2*
- - Tuberculose de l' *A18.3†*, *K93.0**
- - Tumeur carcinoïde héréditaire de l' *C17.2*
- - Tumeur maligne: *C17.2*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - *C17.2*
- - - *D13.3*
- - - Incertain de l' *D37.2*

Iléostomie
- Dispositifs gastro-intestinaux ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z46.5*
- ¬
- - Présence d'une *Z93.2*
- - Surveillance d' *Z43.2*

Iléotyphus ¬ *A01.0*

Iléus
- Biliaire ¬ *K56.3*
- Duodénal (chronique) ¬ *K31.5*
- Gangrène

Iléus *–suite*
- Gangrène *–suite*
- - Intestinale ¬ *K56.6*
- - Mésentère ¬ *K56.6*
- Méconial
- - Absence reconnue de fibrose kystique du pancréas ¬ *P76.0*
- - Cours de fibrose kystique ¬ *E84.1†, P75**
- - Déficit en guanylate cyclase 2C ¬ *P76.0*
- - ¬ Mucoviscidose avec *E84.1†, P75**
- Occlusif SAI ¬ *K56.6*
- Paralytique
- - Occlusion intestinale sans hernie ¬ *K56*
- - ¬ *K56.0*
- Sans précision ¬ *K56.7*
- Strangulation ¬ *K56.2*
- Transitoire du nouveau-né ¬ *P76.1*

Iliaque
v./v.a. Artère iliaque
v./v.a. Colonne iliaque
v./v.a. scapulo-iliaque
- Buchanan] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): crête *M91.0*
- ¬
- - Dystocie due à la persistance en position: occipito- *O64.0*
- - Exostose de la crête *M76.2*
- - Lésion traumatique
- - - Vaisseau sanguin *S35.5*
- - - Veine *S35.5*
- - Os *D16.8*
- - Région *S31.1*
- - Thrombose de la veine *I80.20*

Iliofémoral ¬ Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) *S73.11*

Ilion ¬
- Fracture de l' *S32.3*
- Ostéoblastome de l' *D16.8*

Ilio-tibiale] ¬ Syndrome de la bandelette de Maissiat [*M76.3*

Illum ¬ Syndrome d' *Q87.2*

Îlot
- Langerhans
- - SAI ¬ Hyperplasie cellule
- - - *E16.9*
- - - Bêta des *E16.1*
- - ¬ *C25.4*
- Pancréatiques ¬
- - Présence de deux (ou plus) autoanticorps anti-cellules des *R76.80*
- - Tumeur à cellules des *D37.70*

Imagawa-Matsumoto ¬ Syndrome de *Q87.3*

Image
- Cardiaque anormale ¬ *R93.1*
- Retard de croissance intra-utérin-dysplasie métaphysaire-hypoplasie congénitale des surrénales-anomalies génitales] ¬ Syndrome *Q87.1*

Imagerie diagnostique
- Appareil urinaire ¬ Résultats anormaux d' *R93.4*
- Cœur et de la circulation coronaire ¬ Résultats anormaux d' *R93.1*
- Crâne et de la tête, non classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d' *R93.0*
- Foie et des voies biliaires ¬ Résultats anormaux d' *R93.2*
- Membres ¬ Résultats anormaux d' *R93.6*
- Parties
- - Abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d' *R93.5*
- - Corps précisées ¬ Résultats anormaux d' *R93.8*
- - Système ostéo-musculaire ¬ Résultats anormaux d' *R93.7*
- - Voies digestives ¬ Résultats anormaux d' *R93.3*
- Poumon ¬ Résultats anormaux d' *R91*
- Sein ¬ Résultats anormaux d' *R92*
- Système nerveux central ¬ Autres résultats anormaux d' *R90.8*

Imahorn
v./v.a. Meier-Blumberg-Imahorn

Imbriquée ¬ Teigne *B35.5*

IMC
- 40 50 ¬
- - Adipositas permagna avec un indice de masse corporelle [*E66.86*
- - Obésité
- - - Due à un excès calorique avec un indice de masse corporelle [*E66.06*
- - - Endogène avec un indice de masse corporelle [*E66.86*
- - - Extrême avec un indice de masse corporelle [*E66.86*
- - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de masse corporelle [*E66.26*
- - - Indice de masse corporelle [*E66.96*
- - - Médicamenteuse avec un indice de masse corporelle [*E66.16*
- 50 60 ¬
- - Adipositas permagna avec un indice de masse corporelle [*E66.87*
- - Obésité
- - - Due à un excès calorique avec un indice de masse corporelle [*E66.07*
- - - Endogène avec un indice de masse corporelle [*E66.87*
- - - Extrême avec un indice de masse corporelle [*E66.87*
- - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de masse corporelle [*E66.27*
- - - Indice de masse corporelle [*E66.97*
- - - Médicamenteuse avec un indice de masse corporelle [*E66.17*
- 60 plus
- - Adulte ¬ Obésité
- - - Déficit

IMC *–suite*
- 60 plus *–suite*
- - Adulte ¬ Obésité *–suite*
- - - Déficit *–suite*
- - - - Congénital
- - - - - CEP19 avec indice de masse corporelle [*E66.88*
- - - - - Leptine avec indice de masse corporelle [*E66.88*
- - - - Pro-opiomélanocortine avec indice de masse corporelle [*E66.88*
- - - - Récepteur de la mélanocortine 4 avec indice de masse corporelle [*E66.88*
- - - - SIM1 avec indice de masse corporelle [*E66.88*
- - - Due à une résistance congénitale à la leptine avec indice de masse corporelle [*E66.88*
- - - Mutations du gène récepteur de la leptine avec indice de masse corporelle [*E66.88*
- - ¬
- - - Adipositas permagna avec un indice de masse corporelle [*E66.88*
- - - Obésité
- - - - Due à un excès calorique avec un indice de masse corporelle [*E66.08*
- - - - Endogène avec un indice de masse corporelle [*E66.88*
- - - - Extrême avec un indice de masse corporelle [*E66.88*
- - - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de masse corporelle [*E66.28*
- - - - Indice de masse corporelle [*E66.98*
- - - - Médicamenteuse avec un indice de masse corporelle [*E66.18*
- Compris
- - 30 35
- - - Adulte ¬ Obésité
- - - - Déficit
- - - - - CEP19 avec indice de masse corporelle [*E66.80*
- - - - - Pro-opiomélanocortine avec indice de masse corporelle [*E66.80*
- - - - - Récepteur de la mélanocortine 4 avec indice de masse corporelle [*E66.80*
- - - - - SIM1 avec indice de masse corporelle [*E66.80*
- - - - Due à une résistance congénitale à la leptine avec indice de masse corporelle [*E66.80*
- - - - Mutations du gène récepteur de la leptine avec indice de masse corporelle [*E66.80*
- - - ¬
- - - - Indice de masse corporelle [*E66.90*
- - - - Obésité
- - - - - Due à un excès calorique avec un indice de masse corporelle [*E66.00*
- - - - - Endogène avec un indice de masse corporelle [*E66.80*
- - - - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de masse corporelle [*E66.20*

IMC *–suite*
- Compris *–suite*
- - 30 35 *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Obésité *–suite*
- - - - - Médicamenteuse avec un indice de masse corporelle [*E66.10*
- - 35 40
- - - Adulte ¬ Obésité
- - - - Déficit
- - - - - CEP19 avec indice de masse corporelle [*E66.81*
- - - - - Pro-opiomélanocortine avec indice de masse corporelle [*E66.81*
- - - - - Récepteur de la mélanocortine 4 avec indice de masse corporelle [*E66.81*
- - - - - SIM1 avec indice de masse corporelle [*E66.81*
- - - - Due à une résistance congénitale à la leptine avec indice de masse corporelle [*E66.81*
- - - - Mutations du gène récepteur de la letpine avec indice de masse corporelle [*E66.81*
- - - ¬
- - - - Indice de masse corporelle [*E66.91*
- - - - Obésité
- - - - - Due à un excès calorique avec un indice de masse corporelle [*E66.01*
- - - - - Endogène avec un indice de masse corporelle [*E66.81*
- - - - - Hypoventilation alvéolaire avec un indice de masse corporelle [*E66.21*
- - - - - Médicamenteuse avec un indice de masse corporelle [*E66.11*
- - 40 50 adulte ¬ Obésité
- - - Déficit
- - - - CEP19 avec indice de masse corporelle [*E66.86*
- - - - Congénital en leptine avec indice de masse corporelle [*E66.86*
- - - - Pro-opiomélanocortine avec indice de masse corporelle [*E66.86*
- - - - Récepteur de la mélanocortine 4 avec indice de masse corporelle [*E66.86*
- - - - SIM1 avec indice de masse corporelle [*E66.86*
- - - Due à une résistance congénitale à la leptine avec indice de masse corporelle [*E66.86*
- - - Mutations du gène récepteur de la leptine avec indice de masse corporelle [*E66.86*
- - 50 60 adulte ¬ Obésité
- - - Déficit
- - - - CEP19 avec indice de masse corporelle [*E66.87*
- - - - Congénital en leptine avec indice de masse corporelle [*E66.87*
- - - - Pro-opiomélanocortine avec indice de masse corporelle [*E66.87*
- - - - Récepteur de la mélanocortine 4 avec indice de masse corporelle [*E66.87*

IMC *–suite*
- Compris *–suite*
- - 50 60 adulte ¬ Obésité *–suite*
- - - Déficit *–suite*
- - - - SIM1 avec indice de masse corporelle [*E66.87*
- - - Due à une résistance congénitale à la leptine avec indice de masse corporelle [*E66.87*
- - - Mutations du gène récepteur de la leptine avec indice de masse corporelle [*E66.87*

I-MCJ [Maladie de Creutzfeldt-Jakob iatrogène] ¬ *A81.0*

Imerslund ¬ Syndrome d' *D51.1*

Imidazolique ¬ Syndrome *E70.8*

Iminés ¬ Maladie des acides *E72.8*

Iminoglycinurie ¬ *E72.0*

Iminostilbènes ¬ Intoxication
- *T42.1*
- *T42.1*

Immature
- Prématuré ¬ Centre respiratoire *P28.8*
- ¬
- - Personnalité: *F60.8*
- - Prématuré *P07.3*
- - Tératome embryonnaire ovarien malin *C56*

Immaturité
- Extrême ¬ *P07.2*
- Pulmonaire SAI ¬ *P28.0*

Immersion ¬
- *T75.1*
- Main et pied d' *T69.0*

Immigration ¬ inscription dans: *Z02*

Imminent
- Impending infarction] ¬ Angine: Infarctus *I20.0*
- ¬ Accident cérébrovasculaire *G45.9*

Immobilité
- Paraplégique) ¬ Syndrome d' *M62.3*
- ¬ *R26.3*

Immotile cilia syndrome] [triade de Kartagener] ¬ Syndrome de Kartagener [Situs inversus viscerum, bronchectasie, sinusite chronique et polypes nasaux] [insuffisance pluriglandulaire résultant d'une anomalie dans le transport mucociliaire] [*Q89.3*

Immun
v./v.a. auto-immun
- ANCA [Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles] ¬ Glomérulonéphrite pauci- *N01.7*
- ¬
- - Glomérulonéphrite pauci- *N01.7*
- - Syndrome
- - - Neurotoxicité associée aux cellules à effecteur *G92.0*
- - - Réactivation *D89.3*
- - - Reconstitution *D89.3*
- - Thrombocytopénie *D69.3*

Immunisation
v./v.a. iso-immunisation
- Contre le COVID-19 ¬ Nécessité de l' *U11.9*
- Fœto-maternelle anti-endopeptidase neutre ¬ Néphropathie membraneuse congénitale par allo- *P96.0*
- ¬ Hépatite par *B19.9*

Immunitaire
- Adulte avec autoanticorps anti-interféron-gamma acquis ¬ Déficit *D84.8*
- Anomalies craniofaciales-surdité-athélie-retard de développement ¬ Syndrome de dérèglement *Q87.8*
- Associé
- - Anomalie
- - - Facteur
- - - - I ¬ Déficit *D84.1*
- - - - ¬ Déficit *D84.1*
- - - Majeure, sans précision ¬ Déficit *D82.9*
- - Anomalies majeures précisées ¬ Déficit *D82.8*
- Augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] ¬ Déficit *D80.5*
- Auto-inflammation-anomalie des neutrophiles associé à CEBPE ¬ Syndrome de déficit *M35.8*
- Cellules B-dysplasie squelettique ¬ Syndrome de pancytopénie progressive congénitale-déficit *Q87.1*
- Cellules T par déficit en RHOH ¬ Déficit *D81.8*
- Combiné
- - Atrésie intestinale multiple ¬ Déficit *Q87.8*
- - Autosomique
- - - Dominant déficit
- - - - ERBIN ¬ Déficit *D81.8*
- - - - Partiel en IL6ST [Interleukin 6 signal transducer] ¬ Déficit *D81.8*
- - - Récessif déficit
- - - - Complet en IL6ST [interleukin 6 signal transducer] ¬ Déficit *D81.8*
- - - - IL6R [Interleukin 6 receptor] ¬ Déficit *D81.8*
- - - - Partiel en IL6ST [Interleukin 6 signal transducer] ¬ Déficit *D81.8*
- - Début tardif déficit
- - - ICOS ¬ Déficit *D81.8*
- - - ICOSL ¬ Déficit *D81.8*
- - Déficit
- - - CARD11 ¬ Déficit *D81.8*
- - - CARMIL2 ¬ Déficit *D81.2*
- - - CD3 gamma ¬ Déficit *D81.2*
- - - CD70 ¬ Déficit *D82.3*
- - - C-REL ¬ Déficit *D81.8*
- - - DOCK2 [Dedicator of cytokinesis 2] ¬ Déficit *D81.8*
- - - DOCK8 ¬ Déficit *D81.1*
- - - FCHO1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - GINS1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - HELIOS ¬ Déficit *D81.8*

Immunitaire *–suite*
- Combiné *–suite*
- - Déficit *–suite*
- - - IKAROS ¬ Déficit *D81.8*
- - - IKBKB ¬ Déficit *D81.8*
- - - IKK2 ¬ Déficit *D81.8*
- - - IL21R ¬ Déficit *D81.8*
- - - ITK ¬ Déficit *D82.3*
- - - LRBA ¬ Déficit *D81.8*
- - - MAGT1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - MALT1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - Moesin ¬ Déficit *D81.8*
- - - NIK [NF-Kappa-B-inducing kinase] ¬ Déficit *D81.8*
- - - ORAI1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - OX40 ¬ Déficit *D81.8*
- - - Partiel en RAG1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - RAG1/2 ¬ Déficit *D81.1*
- - - RELB ¬ Déficit *D81.8*
- - - STIM1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - STK4 ¬ Déficit *D81.8*
- - - TFRC ¬ Déficit *D81.8*
- - - ZAP70 ¬ Déficit *D81.8*
- - Dysfonctionnement du canal CRAC ¬ Déficit *D81.8*
- - Haploinsuffisance
- - - FOXN1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - IKAROS ¬ Déficit *D81.8*
- - - RELA ¬ Déficit *D81.8*
- - Hyperéosinophilie ¬ Déficit *D81.8*
- - Induit par des troubles de la motilité des neutrophiles par déficit en MKL1 ¬ Déficit *D81.8*
- - Lié à l'X par déficit en SASH3 ¬ Déficit *D81.8*
- - Microcéphalie-retard de croissance-sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit *D81.1*
- - Mutation dominante négative d'IKZF1 ¬ Déficit *D81.8*
- - Sans précision ¬ Déficit *D81.9*
- - Sévère
- - - Déficit
- - - - Adénosine désaminase ¬ Déficit *D81.3*
- - - - Complet en RAG1/2 ¬ Déficit *D81.1*
- - - - CORO1A ¬ Déficit *D81.2*
- - - - CTPS1 ¬ Déficit *D81.8*
- - - - FOXN1 ¬ Déficit *D81.2*
- - - - LAT ¬ Déficit *D81.2*
- - - - LCK [tyrosine kinase spécifique des lymphocytes] ¬ Déficit *D81.2*
- - - DICS
- - - - Dysgénésie réticulaire ¬ Déficit *D81.0*
- - - - Nombre faible
- - - - - Cellules B et T ¬ Déficit *D81.1*
- - - - - Normal de cellules B ¬ Déficit *D81.2*
- - - - SAI ¬ Déficit *D81.9*
- - - T-B- ¬ Déficit *D81.1*

Immunitaire *–suite*
- Combiné *–suite*
- - Sévère *–suite*
- - - T-B+
- - - - Déficit en JAK3 ¬ Déficit *D81.2*
- - - - Lié à l'X ¬ Déficit *D81.2*
- - - ¬
- - - - SCID
- - - - - Déficit *D81.9*
- - - - - T-B- [Déficit *D81.1*
- - - - - T-B+ [Déficit *D81.2*
- - - - Syndrome de dysplasie osseuse à membres courts-déficit *D82.2*
- Combinés ¬ Autres déficits *D81.8*
- Commun variable
- - Adulte par déficit en BAFFR ¬ Déficit *D83.0*
- - Anomalies prédominant
- - - Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ Déficit *D83.1*
- - - Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ Déficit *D83.0*
- - Autoanticorps anti-lymphocyte
- - - B ¬ Déficit *D83.2*
- - - T ¬ Déficit *D83.2*
- - Déficit
- - - CD19 ¬ Déficit *D83.0*
- - - CD21 ¬ Déficit *D83.0*
- - - CD81 ¬ Déficit *D83.0*
- - - IRF2BP2 ¬ Déficit *D83.0*
- - - TACI ¬ Déficit *D83.0*
- - - TWEAK ¬ Déficit *D83.0*
- - Enfance par déficit en ARGHGEF1 ¬ Déficit *D83.0*
- - Lié à l'X par déficit en SH3KBP1 ¬ Déficit *D83.0*
- - ¬ Déficit *D83.9*
- Communs variables ¬ Autres déficits *D83.8*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système *O99.1*
- Début précoce
- - Déficit complet en DOCK11 ¬ Dérèglement *M35.8*
- - Immunité par déficit partiel en DOCK11 ¬ Dérèglement *M35.8*
- Déficit
- - CD25 ¬ Déficit *D81.8*
- - Ficoline 3 ¬ Déficit *D84.1*
- - Prédominant production anticorps
- - - Sans précision ¬ Déficit *D80.9*
- - - ¬ Autres déficits *D80.8*
- Dérèglement immunitaire dû à une haploinsuffisance en AIOLOS ¬ Déficit *D84.8*
- Dysgénésie gonadique 46,XX ¬ Syndrome de fibrose pulmonaire-déficit *D82.8, J84.10*
- Dysmorphie-difficultés d'apprentissage] ¬ Syndrome de RIDDLE [radiosensibilité-déficit *D82.8*

Immunitaire *–suite*
- Haploinsuffisance en AIOLOS ¬ Déficit immunitaire avec dérèglement *D84.8*
- Induite par un vaccin] ¬ TTIV [Thrombocytopénie thrombotique *D69.58*
- Lié
- - FADD ¬ Déficit *D82.8*
- - PLCG2 [APLAID] ¬ Syndrome auto-inflammatoire-dérèglement avec déficit *M35.8*
- Livedo-petite taille] ¬ Syndrome FILS [dysmorphie faciale-déficit *Q87.1*
- Lymphocytes B-anomalie des membres-malformation urogénitale ¬ Syndrome de déficit *Q87.0*
- Lymphœdème-dysplasies ano-génitales [WILD] ¬ Syndrome de verrues multiples-déficit *Q82.09*
- Maladie inflammatoire de l 'intestin-arthrite-infections récurrentes-lymphopénie ¬ Syndrome de dérèglement *D84.8*
- Neutrophile ¬ Syndrome de déficit *D71*
- Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies précisées du système *D89.8*
- Ostéopétrose-lymphœdème ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique anhidrotique-déficit *Q87.8*
- Polyendocrinopathie-entéropathie lié à l'X ¬ Syndrome de dérèglement *E31.0*
- Précisés ¬ Autres déficits *D84.8*
- Primaire
- - Autosomique récessif
- - - Défaut de cytotoxicité spontanée des cellules Natural Killer ¬ Déficit *D84.8*
- - - Due à une mutation de RORC ¬ Déficit *D84.8*
- - Déficit
- - - LAMTOR2 ¬ Syndrome de déficit *D82.8*
- - - MCM4 ¬ Déficit *D84.8*
- - - TPP2 ¬ Syndrome d'anémie hémolytique autoimmune avec thrombocytopénie autoimmune et déficit *D69.3, D82.9*
- - Infection virale disséminée post-vaccination
- - - ROR ¬ Déficit *D84.8, T88.0*
- - - Rougeole, des oreillons et de la rubéole ¬ Déficit *D84.8, B05.9*
- - Mutation de RORC ¬ Déficit *D84.8*
- - ¬ Déficit *D84.9*
- Réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr ¬ Déficit *D82.3*
- SAI ¬ Maladie *D89.9*
- Sans précision ¬
- - Anomalie du système *D89.9*
- - Déficit *D84.9*
- SIRI] ¬ Syndrome inflammatoire de restauration *D89.3*
- Thrombocytopénie et eczéma ¬ Déficit *D82.0*
- Variable] ¬ Syndrome DAVID [insuffisance antéhypophysaire-déficit *D83.0, E23.0*
- ¬

Immunitaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système *Z83.2*
- - Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système *Z86.2*
- - Chondrodysplasie métaphysaire de type McKusick avec déficit *Q78.5, D82.2*
- - Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système *Z13.0*
- - Faiblesse des défenses *D89.9*
- - Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système *N08.2**
- - Hémophilie due aux inhibiteurs produits par le système *D68.38*
- - Hypoplasie du cartilage et des cheveux avec déficit *Q78.5, D82.2*
- - Maladie
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système *N16.2**
- - - VIH avec trouble *B23.8*
- - Syndrome
- - - Alopécie - déficit *D84.9, L63.0*
- - - Laron avec déficit *D82.2*
- - - Maladie veino-occlusive hépatique-déficit *D82.8, K76.5*
- - - Pouces absents-petite taille-déficit *D82.8, Q87.1*

Immunité
- Cellulaire ¬ Défaut de l' *D84.8*
- Déficit partiel en DOCK11 ¬ Dérèglement immunitaire à début précoce avec auto- *M35.8*
- Médiation cellulaire limitée ¬ Infection à cytomégalovirus lors d'une *B25.9, D84.9*

Immunoblastique
v./v.a. Lymphome immunoblastique
- Diffus ¬ Sarcome *C83.3*
- ¬
- - Lymphome diffus à grandes cellules B *C83.3*
- - Lymphome T *C84.9*
- - Maladie par VIH avec sarcome *B21, C83.3*

Immunoblastome
- Malin ¬ *C83.3*
- ¬ *C83.3*

Immunocompétent ¬ Infection disséminée à cytomégalovirus chez le sujet *B25.88*

Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives ¬ *D90*

Immunodéficience
v./v.a. Virus de l'immunodéficience humaine
- Acquise [SIDA] SAI ¬ Syndrome d' *B24*
- Cellules B-fièvre périodique-retard de développement] ¬ Syndrome SIFD [anémie sidéroblastique congénitale- *D64.0, D82.8*
- Combinée sévère

Immunodéficience *–suite*
- Combinée sévère *–suite*
- - Déficit en DNA-PKcs ¬ *D81.1*
- - Due au déficit en DCLRE1C ¬ *D81.1*
- - T-B+ ¬ *D81.2*
- Déficit
- - Interleukin-1 receptor-associated kinase-4 ¬ *D84.8*
- - MASP-2 ¬ *D84.1*
- - Sélectif en anticorps anti-polysaccharide ¬ *D80.6*
- - Transporteur de folate 1 ¬ Anémie mégaloblastique- *D52.8*
- Due déficit
- - C1 ¬ *D84.1*
- - C2 ¬ *D84.1*
- - C4 ¬ *D84.1*
- - C5 ¬ *D84.1*
- - C6 ¬ *D84.1*
- - C7 ¬ *D84.1*
- - C8 ¬ *D84.1*
- - C9 ¬ *D84.1*
- Dysmorphie] ¬ Syndrome ICF [instabilité centromérique- *D82.8*
- Humain
- - Maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l' *Z11*
- - Virale VIH
- - - Origine de maladies infectieuses et parasitaires ¬ *B20*
- - - Sans précision ¬ *B24*
- Leucoencéphalopathie-hypohomocystéinémie ¬ Syndrome de retard du développement- *Q87.1*
- Primaire ¬ Syndrome d'Evans associé à une *D69.3, D82.9*
- Thrombocytopénie ¬ Syndrome de fièvre périodique- *D72.0*
- ¬
- - Dysplasie ectodermique anhidrotique avec *Q82.4*
- - Inflammation généralisée des muqueuses par *K91.80*

Immunoglobuline
- A
- - IgA] ¬ Déficit sélectif en *D80.2*
- - Lésions glomérulaires prolifératives ¬ Néphropathie à IgA [*N02.8*
- - ¬ Néphropathie à IgA [*N02.8*
- G ¬ Déficit sélectif en sous-classes d' *D80.3*
- M IgM ¬ Déficit
- - Immunitaire avec augmentation de l' *D80.5*
- - Sélectif en *D80.4*
- Monoclonale ¬ Maladie des dépôts d' *D47.7*
- Presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en anticorps avec *D80.6*
- ¬
- - *T50.9*

Immunoglobuline *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Administration d' *Z29.1*
- - Agammaglobulinémie: avec lymphocytes B porteurs d' *D80.1*
- - Augmentation du taux d' *R76.88*
- - Déficit en chaîne lourde des *D80.8*
- - Glomérulonéphrite membranoproliférative médiée par les *N05.5*
- - Infection récurrente associée à un déficit rare en isotype d' *D80.8*

Immunologique
- Anormal du liquide céphalorachidien ¬ Résultat *R83.4*
- Dysplasie squelettique par déficit en EXTL3 ¬ Syndrome neuro- *Q87.1*
- Sérique
- - Sans précision ¬ Anomalie de résultats *R76.9*
- - ¬ Autres anomalies précisées de résultats *R76.8*
- ¬
- - Agents *T50.9*
- - Dysplasie lymphatique généralisée associée
- - - EPHB4 avec hydrops fœtal non *Q82.09, P83.2*
- - - PIEZO1 avec hydrops fœtal non *Q82.09, P83.2*
- - Hydrops fetalis non *P83.2*

Immuno-osseuse de Schimke ¬ Dysplasie *Q77.7, D82.8*

Immunoprolifératif
- Angiocentrique ¬ Lésion *C86.0*
- Intestin grêle
- - In rémission complète ¬ Maladie *C88.31*
- - Type méditerranéen en rémission complète ¬ Maladie *C88.31*
- - ¬ Maladie *C88.30*
- Maligne, sans précision ¬ Maladie *C88.9*
- Malignes ¬ Autres maladies *C88.7*
- SAI ¬ Maladie *C88.9*

Immunoréactif ¬ Adénome hypophysaire non *D35.2*

Immunoreconstitution ¬ Syndrome d' *D89.3*

Immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T *D83.1*

Immunosuppresseurs ¬ Intoxication: Médicaments antitumoraux et *T45.1*

Immunosuppression actuelle ¬
- État consécutif transplantation Cellule souche hématopoïétique
- - *Z94.81*
- - Sans *Z94.80*
- Infection à adénovirus chez un patient ayant subi une greffe de cellules-souches hématopoïétiques avec une *B34.0, Z94.81*

Immunosuppressives ¬ Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures *D90*

Immunotactoïde ¬ Glomérulopathie *N03.6*

Immunothérapie

- Prophylactique ¬ *Z29.1*
- ¬
- - Encéphalopathie toxique sous *G92.0*
- - Hypophysite induite par l' *G04.9, Y57.98!*
- - Syndrome de libération de cytokines après une *D76.4*

Immunotolérance ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta: Phase d' *B18.11*

IMNEPD [Maladie infantile multisystémique neurologique-endocrine-pancréatique] ¬ *Q87.8*

Imparfaite
v./v.a. Type de maladie

Impending infarction] ¬ Angine: Infarctus imminent [*I20.0*

Imperfecti ¬ Infection à Fungi *B43.8*

Imperforation

- Anale
- - Anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une *Q87.8*
- - ¬
- - - *Q42.3*
- - - Syndrome ankyloblépharon filiforme
- - - - *Q87.8*
- - - - Adnatum avec *Q87.8*
- Canal lacrymonasal ¬ Syndrome de microtie-colobome oculaire- *Q15.8, Q17.2*
- Hymen ¬ *Q52.3*
- Jéjunum ¬ *Q41.1*
- Oropharynx-anomalies costovertébrales ¬ Syndrome d' *Q38.8, Q78.8*
- Rectum ¬ *Q42.1*

Imperméabilité

- Tubaire ¬ *N97.1*
- Uretère ¬ *Q62.1*
- Urètre ¬ *Q64.3*

Impétiginisation d'autres dermatoses ¬ *L01.1*

Impétigo

- Bockhart ¬ *L01.0*
- Bulleux ¬ *L01.0*
- Herpétiforme ¬ *L40.1*
- Oreille externe ¬ *L01.0†, H62.4**
- Staphylocoques ¬ *L01.0*
- Tout micro-organisme] [toute localisation] ¬ *L01.0*
- ¬
- - Atteinte de la paupière au cours d' *L01.0†, H03.8**
- - Otite externe avec *L01.0†, H62.4**

Implant

- Articulaire orthopédique (partiel) (total) ¬ Présence d'un *Z96.6*
- Cardiaques et vasculaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses et *T82.5*

Implant *–suite*

- Endocriniens ¬ Présence d' *Z96.4*
- Fonctionnel, sans précision ¬ Présence d' *Z96.9*
- Fonctionnels précisés ¬ Présence d'autres *Z96.88*
- Gastro-intestinal ¬ Fuite d'un *T85.59*
- Greffe
- - Appareil
- - - Génital ¬
- - - - Complication mécanique d'autres prothèses, *T83.4*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un *T83.6*
- - - Génito-urinaire
- - - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T83.9*
- - - - ¬ Autres complications de prothèses, *T83.8*
- - - Urinaire ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un *T83.5*
- - Cardiaques vasculaires
- - - Sans précision ¬
- - - - Complication d'une prothèse, d'un *T82.9*
- - - - Présence d' *Z95.9*
- - - ¬
- - - - Complications précisées de prothèses, *T82.8*
- - - - Douleur due à prothèses, *T82.8*
- - - - Embolie due à prothèses, *T82.8*
- - - - Fibrose due à prothèses, *T82.8*
- - - - Hémorragie due à prothèses, *T82.8*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, *T82.7*
- - - - Présence d'autres *Z95.8*
- - - - Sténose due à prothèses, *T82.8*
- - - - Thrombose due à prothèses, *T82.8*
- - Internes
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres complications dues à des prothèses, *T85.88*
- - - Partie du tractus gastro-intestinal ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, *T85.76*
- - - SAI ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T85.9*
- - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T85.9*
- - - Système
- - - - Hépatobiliaire et le pancréas ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, *T85.75*
- - - - Nerveux ¬
- - - - - Complications dues à des prothèses, *T85.81*
- - - - - Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, *T85.72*
- - - ¬ Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, *T85.78*

Implant *–suite*

- Greffe *–suite*
- - Oculaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses, *T85.3*
- - Œsophage ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.50*
- - Orthopédique internes
- - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T84.9*
- - - ¬
- - - - Complication mécanique d'autres appareils, *T84.4*
- - - - Complications de prothèses, *T84.8*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, *T84.7*
- - Os ¬ Complication mécanique d'autres appareils, *T84.3*
- - Pancréas ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.54*
- - Parties du tractus gastro-intestinal supérieur ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.51*
- - Tractus gastro-intestinal inférieur ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.52*
- - Vasculaires coronaires ¬ Présence d' *Z95.5*
- - Voies biliaires ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.53*
- Intraoculaires de cristallin ¬ Présence d' *Z96.1*
- Mammaire ¬
- - *Z41.1*
- - Complication mécanique d'une prothèse ou d'un *T85.4*
- - Complications dues à une prothèse ou un *T85.83*
- - Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un *T85.82*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un *T85.73*
- - Lymphome anaplasique à grandes cellules lié à un *C84.7*
- Maxillaires et sur racines dentaires ¬ Présence d' *Z96.5*
- Orthopédique ¬ Fracture osseuse après retrait d'un *M96.6*
- Osseux et tendineux ¬ Présence d'autres *Z96.7*
- Otologiques et audiologiques ¬ Présence d' *Z96.2*
- Prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un *M96.6*
- Transplants cardiaques ou vasculaires ¬ Présence d'autres *Z95.88*
- Urinaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses ou *T83.1*
- Uro-génitaux ¬ Présence d' *Z96.0*
- Vasculaire ¬ Infection due à un *T82.73*
- ¬
- - Infection due à une fistule artério-veineuse associée à un *T82.73*

Implant *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: après *H21.3*

Implantation
- Anormale de l'uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*
- Basse de l'ombilic ¬ Syndrome d'hydrocéphalie- *Q87.8*
- Embryon en cas de transfert d'embryon ¬ Complications de tentative d' *N98.3*
- Œuf fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de tentative d' *N98.2*
- Ovules ¬ Admission pour prélèvement ou *Z31.2*
- Placenta ¬ Complication de l'accouchement par une anomalie d' *O44.00*
- Stimulateur électronique du système nerveux ¬ Complication mécanique de l' *T85.1*
- Utilisation) ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après *Y82.8!*

Implication
- Bitronculaire ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.12*
- Monotronculaire ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.11*
- Système circulatoire ¬ Béribéri humide avec *E51.1†, I98.8**
- Tritronculaire ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.13*

Impliquant
- Cheville ¬
- - Péroné, *S82.6*
- - Tibia, *S82.5*
- Enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation ¬ Soins de contrôle *Z47.0*
- Langue, les lèvres ou les doigts ¬ Malocclusion due à: habitudes *K07.5*
- Malléole ¬
- - Péroné, *S82.6*
- - Tibia, *S82.5*
- Moyens de rééducation ¬ Soins *Z50.8!*
- Principalement les membres ¬ Syndromes congénitaux malformatifs *Q87.2*
- Rééducation, sans précision ¬ Soin *Z50.9!*
- Système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse ¬ Complications *O29.2*

Importé ¬ Poliomyélite paralytique, virus sauvage *A80.1*

Imposées aux activités par une incapacité ¬ Limites *Z73*

Impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide ¬ Non disponibilité ou *Z75.8*

Imprévisible
v./v.a. Type de maladie

Impuissance
- Origine organique ¬ *N48.4*
- Psychogène ¬ *F52.2*

Impulsif
- Juvénile ¬ Épilepsie (avec): myoclonique [petit mal *G40.3*
- ¬ Personnalité émotionnellement labile: Type *F60.30*

Impulsions
- Sans précision ¬ Trouble des habitudes et des *F63.9*
- ¬ Autres troubles des habitudes et des *F63.8*

Impuretés dans l'air ¬ Poussières et autres *Z57*

In vitro ¬
- Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation *N98.2*
- Fécondation *Z31.2*

Inaccessible ¬ Scolarisation inexistante ou *Z55*

Inactive ¬ Carie dentaire *K02.3*

Inactivité
- Excessive ¬ Syndrome de carence en surfactant du à une *P22.0*
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose d' *M80.2*
- ¬
- - Atrophie due à l' *M62.5*
- - Ostéoporose d' *M81.2*

Inadaptée ¬ Difficultés nutritionnelles et nutrition *R63.3*

Inadéquat
- Drogues SAI ¬ utilisation *F19*
- Part des parents ¬ Surveillance et contrôle *Z62*
- ¬
- - Enseignement *Z55*
- - Logement *Z59*
- - Régime et habitudes alimentaires *Z72.8*
- - Soutien familial *Z63*
- - Trouble de la personnalité: *F60.7*

Inagaki
v./v.a. Ieshima-Koeda-Inagaki

Inanimés ¬ Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets *W49.9!*

Inanition ¬
- Atrophie d' *E45*
- Dystrophie d' *E45*

Inappétence psychogène ¬ *F50.8*

Inappropriée
- Défauts de l'éducation ¬ Pression parentale *Z62*
- ¬ Syndrome de renutrition *E87.8*

Inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, *N95.1*

Incapacité
- Acquise de la vision des couleurs ¬ *H53.5*
- Apprentissage SAI ¬ *F81.9*
- Concernant l'acquisition des connaissances SAI ¬ *F81.9*

Incapacité *–suite*
- Maladies chroniques conduisant à l'invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines *Z82*
- Mener une grossesse à terme ¬ *N97*
- Soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une *F68.1*
- ¬ Limites imposées aux activités par une *Z73*

Incarcération
- Adhérence du placenta ¬ Hémorragie associée à la rétention, l' *O72.0*
- Utérus gravide ¬ Soins maternels pour: *O34.5*
- ¬ *Z65*

Incarcéré
- Sans gangrène ¬
- - Hernie
- - - Interstitielle *K46.0*
- - - Intestinale *K46.0*
- - - Intra-abdominale *K46.0*
- - Hernie crurale (unilatérale): *K41.3*
- - Hernie diaphragmatique: *K44.0*
- - Hernie inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - Hernie ombilicale: *K42.0*
- - Hernie ventrale *K43.69*
- Spieghel ¬ Hernie *K43.68*
- ¬
- - Hémorroïdes
- - - Externes *K64.5*
- - - Internes *K64.8*
- - Hernie de la ligne médiane *K43.68*
- - Hernie épigastrique
- - - *K43.60*
- - - Partiellement *K43.60*
- - Hernie hypogastrique *K43.68*
- - Hernie incisionnelle *K43.0*
- - Hernie parastomale *K43.3*
- - Hernie sous-xiphoïdienne *K43.68*

Incarné ¬ Ongle *L60.0*

Incendies [pyromanie] ¬ Tendance pathologique à allumer des *F63.1*

Incertain
v./v.a. Type de maladie

Incident
- Dus
- - Appareils ou à des produits médicaux ¬ *Y82.8!*
- - Mesures médicales, sans précision ¬ *Y84.9!*
- Moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d' *Y84.9!*

Incipiente sénile ¬ Cataracte *H25.0*

Incisif ¬ Kyste
- Canal *K09.1*
- Naso-palatin [canal *K09.1*

Incision
- Lors d'une intervention chirurgicale ¬ Blessure de l'utérus par *T81.2*
- Ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence ¬ *Y69!*
- Prise d'échantillons ¬ *P12.4*

Incisive
- Déformée en forme de pelle ¬ *K00.2*
- Mandibulaires ¬ Fusion des *K00.2*

Incisure du lobe de l'oreille ¬ Syndrome de retard de langage-asymétrie faciale-strabisme- *Q87.0*

Incluses
- Enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ Dents *K07.3*
- ¬ Dents *K01.0*

Inclusion
- Cellulaire] ¬ Mucolipidose II [maladie à *E77.0*
- Corps de Mallory ¬ Myopathie avec surcharge en desmine et *G71.8*
- Dawson ¬ Encéphalite subaiguë à *A81.1*
- Épidermique ¬ Kyste d' *L72.0*
- Héréditaire type
- - 2 ¬ Myopathie à *G71.8*
- - 3 ¬ Myopathie à *G71.8*
- - 4 ¬ Myopathie à *G71.8*
- Intranucléaires neuronales ¬ Maladie des *G31.88*
- Maladie de Paget-démence fronto-temporale ¬ Syndrome de myopathie à *G71.8, G31.0*
- Neuroserpine ¬ Encéphalopathie familiale à corps d' *G31.88*
- Pigmentaires dans le cristallin ¬ *H26.88*
- Type 2 ¬ Myopathie à corps d' *G71.8*
- ¬
- - Blennorrhée à *A74.0†, H13.1**
- - Conjonctivite à *A74.0†, H13.1**
- - Myopathie à *G71.8*
- - Myosite à *G72.4*

Incompatibilité
- ABO ¬ Réaction d' *T80.3*
- Groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ Réaction à une *T80.3*
- Rh
- - Anasarque fœto-placentaire) ¬ *O36.0*
- - ¬ Réaction d' *T80.4*

Incompatible ¬ Transfusion de sang *T80.3*

Incompétence vélopharyngienne congénitale ¬ *Q38.8*

Incomplet
v./v.a. Type de maladie

Inconnu
v./v.a. Type de maladie

Incontinence
- Fécale
- - Liée à une anastomose iléo-anale avec poche ¬ *R15, K91.88*
- - Origine non organique ¬ *F98.1*

Incontinence *–suite*
- Matières fécales ¬ *R15*
- Pression ¬ *N39.42*
- Récidivante ¬ *N39.47!*
- Réflexe ¬ *N39.40*
- Regorgement ¬ *N39.41*
- Stress] ¬ Incontinence urinaire d'effort [*N39.3*
- Urinaire
- - Effort [incontinence de stress] ¬ *N39.3*
- - Extraurétrale ¬ *N39.43*
- - Origine non organique ¬ *F98.0*
- - Précisée ¬ Autre *N39.48*
- - Sans précision ¬ *R32*

Incontinentia pigmenti ¬ *Q82.3*

Incoordonné ¬ Travail *O62.4*

Increta
- Percreta ¬ Placenta *O43.21*
- Sans saignement ¬ Placenta *O43.21, O73.0*
- Tant complication de l'accouchement
- - Sans saignement ¬ Placenta *O43.21, O73.0*
- - ¬ Placenta *O43.21*
- ¬ Placenta *O43.21*

Incurvation
- Congénitale
- - Fémur ¬ *Q68.3*
- - Os longs
- - - Membre inférieur ¬ *Q68.5*
- - - ¬ *Q68.8*
- - Tibia et du péroné ¬ *Q68.4*
- Latérale sévère du tibia-petite taille-omoplate ailée-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d' *Q87.1*
- Vertébrale SAI ¬ *M43.9*

Index ¬ Polydactylie de l' *Q69.0*

Index de Barthel
- 0-15 points ¬ *U50.50*
- 20-35 points ¬ *U50.40*
- 40-55 points ¬ *U50.30*
- 60-75 points ¬ *U50.20*
- 80-95 points ¬ *U50.10*
- 100 points ¬ *U50.00*

Index de Barthel élargi
- 0-15 points ¬ *U51.20*
- 20-65 points ¬ *U51.10*
- 70-90 points ¬ *U51.00*

Indiana] ¬ Stomatite vésiculaire virale [fièvre de l' *A93.8*

Indicanurie ¬ Syndrome d'hypercalcémie familiale-néphrocalcinose- *E70.8*

Indication
- Correctement administrés ¬ Anurie due aux sulfamides utilisés comme un médicament approprié à l' *R34, Y57.98!*
- Degré
- - 2a maximum ¬

Indication *–suite*
- Degré *–suite*
- - 2a maximum ¬ *–suite*
- - - Brûlures de parties multiples du corps, avec *T29.20*
- - - Corrosion parties multiples corps
- - - - *T29.60*
- - - - *T29.61*
- - 2b au maximum ¬ Brûlures de parties multiples du corps, avec *T29.21*
- - ¬ Hémorroïdes (avec saignement): sans *K64.9*
- Dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux *Y59.9!*
- Extension
- - Médiastinal parapharyngé cervicale ¬ Abcès sous-mandibulaire
- - - *K12.22*
- - - Sans *K12.21*
- - Rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ Abcès maxillaire sans *K10.20*
- Hémorragie
- - Cours de schistosomiase ¬ Varices gastriques avec *B65.9†, I98.3**
- - ¬
- - - Angiodysplasie de l'intestin grêle sans *K55.31*
- - - Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans *I98.2**
- Ictère, non classée ailleurs ¬ Hyperbilirubinémie, avec *R17.0*
- Incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans *Y84.9!*
- Inférieure supérieure
- - Face
- - - Muqueuse ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- - - Orale ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- - Frein ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- - Muqueuse ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- Malaise post effort MPE ¬ Fatigue chronique
- - *R53.0*
- - Sans *R53.1*
- Rupture ¬ Dissection
- - Aorte abdominale, sans *I71.02*
- - Aorte localisation non précisée, sans *I71.00*
- - Aorte thoracoabdominale, sans *I71.03*
- Saignement ¬
- - Angiectasie
- - - Duodénum sans *K31.81*
- - - Estomac sans *K31.81*
- - Angiodysplasie
- - - Côlon: Sans *K55.21*

Indication *–suite*
- Saignement ¬ *–suite*
- - Angiodysplasie *–suite*
- - - Estomac et du duodénum sans *K31.81*
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation et abcès, sans *K57.22*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans *K57.32*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation et abcès sans *K57.42*
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans *K57.52*
- - - - - Perforation et abcès, sans *K57.02*
- - - - - Sans perforation , abcès ou *K57.12*
- - - - Siège non précisé
- - - - - Perforation et abcès, sans *K57.82*
- - - - - Sans perforation ni abcès, sans *K57.92*
- - Diverticulose
- - - Côlon sans perforation ni abcès, sans *K57.30*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans *K57.50*
- - - - - Sans perforation , abcès ou *K57.10*
- - - - Siège non précisé, sans perforation ni abcès, sans *K57.90*
- - Syndrome GAVE ectasie vasculaire antrale gastrique
- - - Duodénum sans *K31.81*
- - - Estomac sans *K31.81*
- Stade ¬ Ulcère [escarre] de pression sans *L89.9*
- ¬ Trouble mental, sans autre *F99*

Indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA) ¬ Présente de maladies *U60.3!*

Indice de masse corporelle IMC
- 40 50 ¬
- - Adipositas permagna avec un *E66.86*
- - Obésité
- - - *E66.96*
- - - Due à un excès calorique avec un *E66.06*
- - - Endogène avec un *E66.86*
- - - Extrême avec un *E66.86*
- - - Hypoventilation alvéolaire avec un *E66.26*
- - - Médicamenteuse avec un *E66.16*
- 50 60 ¬
- - Adipositas permagna avec un *E66.87*
- - Obésité
- - - *E66.97*
- - - Due à un excès calorique avec un *E66.07*
- - - Endogène avec un *E66.87*
- - - Extrême avec un *E66.87*

Indice de masse corporelle IMC *–suite*
- 50 60 ¬ *–suite*
- - Obésité *–suite*
- - - Hypoventilation alvéolaire avec un *E66.27*
- - - Médicamenteuse avec un *E66.17*
- 60 plus
- - Adulte ¬ Obésité
- - - Déficit
- - - - Congénital
- - - - - CEP19 avec *E66.88*
- - - - - Leptine avec *E66.88*
- - - - Pro-opiomélanocortine avec *E66.88*
- - - - Récepteur de la mélanocortine 4 avec *E66.88*
- - - - SIM1 avec *E66.88*
- - - Due à une résistance congénitale à la leptine avec *E66.88*
- - - Mutations du gène récepteur de la leptine avec *E66.88*
- - ¬
- - - Adipositas permagna avec un *E66.88*
- - - Obésité
- - - - *E66.98*
- - - - Due à un excès calorique avec un *E66.08*
- - - - Endogène avec un *E66.88*
- - - - Extrême avec un *E66.88*
- - - - Hypoventilation alvéolaire avec un *E66.28*
- - - - Médicamenteuse avec un *E66.18*
- Compris
- - 30 35
- - - Adulte ¬ Obésité
- - - - Déficit
- - - - - CEP19 avec *E66.80*
- - - - - Pro-opiomélanocortine avec *E66.80*
- - - - - Récepteur de la mélanocortine 4 avec *E66.80*
- - - - - SIM1 avec *E66.80*
- - - - Due à une résistance congénitale à la leptine avec *E66.80*
- - - - Mutations du gène récepteur de la leptine avec *E66.80*
- - - ¬
- - - - *E66.90*
- - - - Obésité
- - - - - Due à un excès calorique avec un *E66.00*
- - - - - Endogène avec un *E66.80*
- - - - - Hypoventilation alvéolaire avec un *E66.20*
- - - - - Médicamenteuse avec un *E66.10*
- - 35 40
- - - Adulte ¬ Obésité
- - - - Déficit
- - - - - CEP19 avec *E66.81*
- - - - - Pro-opiomélanocortine avec *E66.81*

Indice de masse corporelle IMC *–suite*
- Compris *–suite*
- - 35 40 *–suite*
- - - Adulte ¬ Obésité *–suite*
- - - - Déficit *–suite*
- - - - - Récepteur de la mélanocortine 4 avec *E66.81*
- - - - - SIM1 avec *E66.81*
- - - - Due à une résistance congénitale à la leptine avec *E66.81*
- - - - Mutations du gène récepteur de la letpine avec *E66.81*
- - - ¬
- - - - *E66.91*
- - - - Obésité
- - - - - Due à un excès calorique avec un *E66.01*
- - - - - Endogène avec un *E66.81*
- - - - - Hypoventilation alvéolaire avec un *E66.21*
- - - - - Médicamenteuse avec un *E66.11*
- - 40 50 adulte ¬ Obésité
- - - Déficit
- - - - CEP19 avec *E66.86*
- - - - Congénital en leptine avec *E66.86*
- - - - Pro-opiomélanocortine avec *E66.86*
- - - - Récepteur de la mélanocortine 4 avec *E66.86*
- - - - SIM1 avec *E66.86*
- - - Due à une résistance congénitale à la leptine avec *E66.86*
- - - Mutations du gène récepteur de la leptine avec *E66.86*
- - 50 60 adulte ¬ Obésité
- - - Déficit
- - - - CEP19 avec *E66.87*
- - - - Congénital en leptine avec *E66.87*
- - - - Pro-opiomélanocortine avec *E66.87*
- - - - Récepteur de la mélanocortine 4 avec *E66.87*
- - - - SIM1 avec *E66.87*
- - - Due à une résistance congénitale à la leptine avec *E66.87*
- - - Mutations du gène récepteur de la leptine avec *E66.87*

Indifférencié
v./v.a. Type de maladie

Indigestion ¬ *K30*

Indirect
v./v.a. Type de maladie

Indol-acétique ¬ Taux urinaires élevés de: acide *R82.5*

Indolente ¬ Mastocytose systémique *D47.0*

Indométacine ¬ Embryofœtopathie à l' *Q86.88*

Induction
- Ovulation ¬ Hyperstimulation de l'ovaire lors d' *N98.1*
- Standard ¬ Leucémie, réfractaire au traitement d' *C95.8!*

Induction *–suite*
- ¬ Leucémie myéloïde aiguë réfractaire à un traitement d' *C92.00*

Induration
- Peau ¬ *R23.4*
- Péricardique ¬ *I31.88*
- Plastique des corps caverneux ¬ *N48.6*
- Sein ¬ *N64.5*

Induré tuberculeux ¬ Érythème *A18.4*

Inégalité des membres (acquise) ¬ *M21.7*

Inertie utérin
- Pendant la phase de latence ¬ *O62.0*
- SAI ¬ *O62.2*
- Secondaire ¬ *O62.1*
- ¬
- - *P03.6*
- - Formes d' *O62.2*

Inexistante ou inaccessible ¬ Scolarisation *Z55*

Inexplicable ¬ Comportement étrange et *R46.2*

Inexpliquée mort subite nourrisson
- Âge d'un an ¬ Mort subite *R96.0*
- Avant l'âge d'un an ¬ Mort subite *R95*

Infantile
v./v.a. Type de maladie

Infantilisme
- Pancréatique ¬ *K86.88*
- SAI ¬ *R62.8*

Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique) ¬ *M62.2*

Infarctus
- Aigu de la moelle épinière (embolique) (non embolique) ¬ *G95.18*
- Artère) (d'une veine) pulmonaire ¬ *I26*
- Artériel ¬ *I74.9*
- Cérébraux
- - Leucoencéphalopathie liée à la cathepsine A] ¬ CARASAL [Artériopathie- *I67.88*
- - Rétinite pigmentaire ¬ Leucoencéphalopathie autosomique récessive- *Q87.0*
- - ¬ Autres *I63.8*
- Embolique ¬ *I74*
- Hépatique ¬ *K76.3*
- Imminent [Impending infarction] ¬ Angine: *I20.0*
- Intestin aigu(ë) ¬ *K55.0*
- Lacunaire ¬ *I63.5*
- Mésentérique ¬ *K55.0*
- Multiples ¬ Démence vasculaire par *F01.1*
- Musculaire ischémique d'une artère intracrânienne durant l'enfance ¬ *I63.5*
- Non transmural ¬ *I21.48*
- Placentaire ¬
- - *O43.8*
- - *P02.2*
- Rate ¬ *D73.5*

Infarctus *–suite*
- Récidivant ¬ *I22*
- Rein ¬ Ischémie et *N28.0*
- Rénal ¬ *N28.0*
- Répété aigu
- - Antérieur (paroi) SAI ¬ *I22.0*
- - Antéro
- - - Apical ¬ *I22.0*
- - - Latéral ¬ *I22.0*
- - - Septal ¬ *I22.0*
- - Inférieur SAI ¬ *I22.1*
- - Inféro-latéral ¬ *I22.1*
- - Paroi
- - - Diaphragmatique ¬ *I22.1*
- - - Postérieur SAI ¬ *I22.1*
- - Postéro-inférieur ¬ *I22.1*
- Sans élévation segment ST NSTEMI
- - Infarctus de type 1 ¬ *I21.40*
- - ¬ *I21.48*
- Sous cortical leucoencéphalopathie ¬
- - CADASIL [Artériopathie cérébrale autosomique dominant- *I67.88*
- - CARASIL [Artériopathie cérébrale autosomique récessive- *I67.88*
- Sous-endocardique aigu myocarde
- - Infarctus type
- - - 1 ¬ *I21.40*
- - - 2 ¬ *I21.41*
- - ¬ *I21.48*
- Surrénale ¬ *E27.4*
- Thrombotique ¬ *I74*
- Thyroïde ¬ *E07.8*
- Type
- - 1 ¬ Infarctus
- - - Sans élévation du segment ST [NSTEMI], *I21.40*
- - - Sous-endocardique aigu du myocarde, *I21.40*
- - 2 ¬ Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, *I21.41*
- - ¬
- - Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par *I64*
- - Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par *I69.4*

Infarctus aigu du myocarde
- Sans précision ¬ *I21.9*
- ¬
- - Communication
- - - Interauriculaire comme complication récente d'un *I23.1*
- - - Interventriculaire comme complication récente d'un *I23.2*
- - Complications récentes d'un *I23.8*
- - Hémopéricarde comme complication récente d'un *I23.0*
- - Rupture

Infarctus aigu du myocarde *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Rupture *–suite*
- - - Cordages tendineux comme complication récente d'un *I23.4*
- - - Muscle papillaire comme complication récente d'un *I23.5*
- - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un *I23.3*
- - Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un *I23.6*

Infarctus cérébral
- Embolie
- - Artères cérébrales ¬ *I63.4*
- - Artères précérébrales ¬ *I63.1*
- - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.1*
- Occlusion
- - Sténose
- - - Artères cérébrales, de mécanisme non précisé ¬ *I63.5*
- - - Artères précérébrales, de mécanisme non précisé ¬ *I63.2*
- - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.2*
- Sans précision ¬ *I63.9*
- Sténose du tronc brachio-céphalique ¬ *I63.2*
- Thrombose
- - Artères cérébrales ¬ *I63.3*
- - Artères précérébrales ¬ *I63.0*
- - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.0*
- - Veineuse cérébrale, non pyogène ¬ *I63.6*
- ¬
- - Occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un *I63*
- - Séquelles d' *I69.3*

Infarctus du myocarde
- Aigu) SAI ¬ *I21.9*
- Ancien
- - Découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ *I25.2*
- - Sans précision ¬ *I25.29*
- - Survenu
- - - 4 mois et moins d'un an plus tôt ¬ *I25.21*
- - - 29 jours et moins de 4 mois plus tôt 29 ¬ *I25.20*
- - - Y a 1 an ou plus ¬ *I25.22*
- Guéri ¬ *I25.2*
- Récidivant ¬ *I22*
- Répétition
- - Aigu
- - - Latéral
- - - - Haut ¬ *I22.8*
- - - - Paroi) SAI ¬ *I22.8*
- - - Latéro-apical ¬ *I22.8*
- - - Latéro-basal ¬ *I22.8*
- - - Postérieur (vrai) ¬ *I22.8*

Infarctus du myocarde *–suite*
- Répétition *–suite*
- - Aigu *–suite*
- - - Postéro-basal ¬ *I22.8*
- - - Postéro-latéral ¬ *I22.8*
- - - Postéro-septal ¬ *I22.8*
- - - Septal SAI ¬ *I22.8*
- - Localisation non précisée ¬ *I22.9*
- - Localisations ¬ *I22.8*
- - Paroi
- - - Antérieure ¬ *I22.0*
- - - Inférieure ¬ *I22.1*
- Sans onde Q ¬ *I21.48*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- ¬
- - Antécédent d' *I25.29*
- - Embolie coronaire n'entraînant pas un *I24.0*
- - Mise en observation pour suspicion d' *Z03.4*
- - Occlusion
- - - Artère coronaires n'entraînant pas un *I24.0*
- - - Veines coronaires n'entraînant pas un *I24.0*
- - Thrombose cardiaque n'entraînant pas un *I24.0*

Infarctus transmural
- Aigu
- - Antérieur SAI ¬ *I21.0*
- - Antéro
- - - Apical ¬ *I21.0*
- - - Latéral ¬ *I21.0*
- - - Septal ¬ *I21.0*
- - Inférieur (paroi) SAI ¬ *I21.1*
- - Inféro-latéral ¬ *I21.1*
- - Latéral
- - - Haut ¬ *I21.2*
- - - SAI ¬ *I21.2*
- - Latéro-apical ¬ *I21.2*
- - Latéro-basal ¬ *I21.2*
- - Myocarde
- - - Localisation non précisée ¬ *I21.3*
- - - Localisations ¬ *I21.2*
- - - Paroi
- - - - Antérieure ¬ *I21.0*
- - - - Inférieure ¬ *I21.1*
- - Paroi
- - - Antérieure SAI ¬ *I21.0*
- - - Diaphragmatique ¬ *I21.1*
- - - Latérale SAI ¬ *I21.2*
- - Postérieur
- - - Paroi postérieur] SAI ¬ *I21.1*
- - - Vrai) ¬ *I21.2*
- - Postéro-basal ¬ *I21.2*
- - Postéro-inférieur ¬ *I21.1*
- - Postéro-latéral ¬ *I21.2*

Infarctus transmural *–suite*
- Aigu *–suite*
- - Postéro-septal ¬ *I21.2*
- - Septal SAI ¬ *I21.2*
- Myocarde SAI ¬ *I21.3*

Infectée ¬
- Hydrocèle *N43.1*
- Hydronéphrose *N13.65*

Infectieux
v./v.a. Type de maladie

Inférieur
v./v.a. Type de maladie

Inféro-externe sein
- Type glande salivaire ¬ Carcinome du quadrant *C50.5*
- ¬
- - Adénocarcinome
- - - Apocrine du quadrant *C50.5*
- - - Tubulaire du quadrant *C50.5*
- - Angiosarcome du quadrant *C50.5*
- - Carcinome héréditaire du quadrant *C50.5*
- - Carcinome métaplasique du quadrant *C50.5*
- - Carcinome mucineux du quadrant *C50.5*
- - Tumeur maligne: Quadrant *C50.5*

Inféro-interne
- Inféro-interne du sein ¬ Angiosarcome du quadrant *C50.3*
- Sein
- - Type glande salivaire ¬ Carcinome du quadrant *C50.3*
- - ¬
- - - Adénocarcinome
- - - - Apocrine du quadrant *C50.3*
- - - - Tubulaire du quadrant *C50.3*
- - - Angiosarcome du quadrant inféro-interne *C50.3*
- - - Carcinome héréditaire du quadrant *C50.3*
- - - Carcinome métaplasique du quadrant *C50.3*
- - - Carcinome mucineux du quadrant *C50.3*
- - - Tumeur maligne: Quadrant *C50.3*

Inféro-latéral ¬
- Infarctus répété (aigu) (de): *I22.1*
- Infarctus transmural (aigu) (de): *I21.1*

Infertilité
- Féminine
- - Défaut de la zone pellucide ¬ *N97.8*
- - Due à un blocage en méiose ¬ *N97.8*
- Masculine
- - Anomalie de la spermatogenèse ¬ *N46*
- - Monogénique
- - - Azoospermie ¬ *N46*
- - - Oligozoospermie ¬ *N46*
- - - Tératozoospermie ¬ *N46*
- - Non syndromique par asthénozoospermie ¬ *N46*
- ¬ Syndrome de surdité- *Q93.5*

Infestation
- Arthropodes ¬ Autres *B88.2*
- Chevelure par des poux ¬ *B85.0*
- Corps par des poux ¬ *B85.1*
- Larves de mouches ¬ *B87*
- Mixte, pédiculose et phtiriase ¬ *B85.4*
- Morpions ¬ *B85.3*
- Parasitaire des paupières NCA ¬ *B89†, H03.0**
- Paupière
- - Cours
- - - Loase ¬ *B74.3†, H03.0**
- - - Onchocercose ¬ *B73†, H03.0**
- - - Phtiriase ¬ *B85.3†, H03.0**
- - Parasites NCA ¬ *B89†, H03.0**
- Phthirus pubis ¬ *B85.3*
- Poux du pubis] ¬ Phtiriase [*B85.3*
- Précisées ¬ Autres *B88.8*
- Puce-chique ¬ *B88.1*
- SAI par des acariens ¬ *B88.9*
- Sangsues SAI ¬ *B88.3*
- Ternidens deminutus ¬ *B81.8*
- ¬ Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres *Z20.7*

Infiltrat d'Assmann avec signes de maladie NCA ¬ *A16.2*

Infiltration
- Cancéreuse secondaire ¬ *C79.9*
- Glycogène
- - Foie ¬ *E74.0†, K77.8**
- - ¬ *E74.0*
- Lymphatique ¬ *D47.9*
- Lymphocytaire cutanée de Jessner ¬ *L98.6*
- Pulmonaire tuberculeuse ¬ *A16.2*
- ¬ Sténose pylorique de l'adulte par *K31.12*

Infirmiers surveillance médical enfant bonne santé selon circonstances
- Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*
- Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*
- Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*
- Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*

Infirmité motrice
- Cérébrale, forme spastique hémiplégique ¬ *G80.2*
- Cérébrales ¬ Autres *G80.8*

Inflammation
- Aigu(ë), d'un sinus de la face ¬ *J01*
- Aiguë
- - Orbite ¬ *H05.0*
- - Sans précision des voies lacrymales ¬ *H04.3*
- Alvéoles dentaires au cours de scorbut ¬ *E54†, K93.8**
- Anastomose

Inflammation *–suite*
- Anastomose *–suite*
- - Intestinale ¬ *K91.88*
- - Vasculaire ¬ *T82.73*
- Bassin féminin au cours de gonorrhée ¬ *A54.2†, N74.3**
- Canal hépatique ¬ *K83.09*
- Cholédoque ¬ *K83.09*
- Chronique
- - Mastoïdectomie ¬ *H95.1*
- - Voies lacrymales ¬ *H04.4*
- - ¬ Lymphome diffus à grandes cellules B avec *C83.3*
- Diaphragme ¬ *J98.6*
- Due
- - Appareil électronique implanté dans le cœur ¬ *T82.70*
- - Cathéter vasculaire central ¬ *T82.74*
- - Greffe
- - - Valvule cardiaque
- - - - Allogène ¬ *T82.6*
- - - - Autologue ¬ *T82.6*
- - - - Xénogène ¬ *T82.6*
- - - Vasculaire ¬ *T82.73*
- - Port ¬ *T82.75*
- - Sonde vésicale ¬ *T83.5*
- Généralisée des muqueuses par immunodéficience ¬ *K91.80*
- Glande du follicule pileux ¬ *L73.9*
- Glandes salivaires au cours d'une réaction à des dépôts d'iode ¬ *K11.2*
- Gonorrhéique
- - Articulations ¬ *A54.4†, M01.39**
- - Gland ¬ *A54.0†, N51.2**
- - Péritoine ¬ *A54.8†, K67.1**
- Hémorroïdes ¬ *K64.8*
- Localisations multiples des organes génitaux de l'homme ¬ *N49.8*
- Localisée purulente d'une plaie d'opération ¬ *T81.4*
- Nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [*H94.0**
- Nerf optique ¬ *H46*
- Non infectieuse d'un coussinet absorbant postopératoire ¬ *H59.8*
- Œil ¬ Glaucome secondaire à une *H40.4*
- Paupière, sans précision ¬ *H01.9*
- Pelvienne de la femme SAI ¬ Infection ou *N73.9*
- Plèvre ¬ *R09.1*
- Précisées
- - Paupière ¬ Autres *H01.8*
- - Vagin et de la vulve ¬ Autres *N76.8*
- Profondes de la paupière ¬ Orgelet et autres *H00.0*
- Purulente
- - Aiguë de la rate ¬ *D73.8*

Inflammation *–suite*
- Purulente *–suite*
- - Bras avec lymphangite ¬ *L03.10*
- - Doigt avec lymphangite ¬ *L03.01*
- - Main avec lymphangite ¬ *L03.10*
- - Membre inférieur avec lymphangite ¬ *L03.11*
- - Ongle ¬ *L03.01*
- - Orteil avec lymphangite ¬ *L03.02*
- - Pied (à l'exception des orteils) avec lymphangite ¬ *L03.11*
- - Utérus ¬ *N71.9*
- Rhumatismale aiguë de la valve cardiaque ¬ *I01.1*
- Rocher (aiguë) (chronique) ¬ *H70.2*
- Shunt vasculaire ¬ *T82.73*
- Syphilitique
- - Rate ¬ *A52.7†, D77**
- - Secondaire du bassin féminin ¬ *A51.4†, N74.2**
- - Tardive du bassin féminin ¬ *A52.7†, N74.2**
- - Valve
- - - Cardiaque ¬ *A52.0†, I39.8**
- - - Tricuspide ¬ *A52.0†, I39.2**
- - Valve aortique ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Valve mitrale ¬ *A52.0†, I39.0**
- - Valve pulmonaire ¬ *A52.0†, I39.3**
- Thrombotique veineuse profonde de l'extrémité inférieure ¬ *I80.28*
- Tuberculeuse
- - Articulation du genou ¬ *A18.0†, M01.16**
- - Organes pelviens féminins ¬ *A18.1†, N74.1**
- Veineuse ¬ *I80*
- Voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs ¬ *J68.2*
- Vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Ulcération et *N77.8**
- Zone postérieure ¬ *H30.2*
- ¬ Varice membres inférieurs
- - *I83.1*
- - Sans ulcère ou *I83.9*
- - Ulcère et *I83.2*

Inflammatoire
v./v.a. auto-inflammatoire
- Adulte ¬ Sténose pylorique *K31.11*
- Aigu en cours ¬ Amygdalite récidivante avec épisode *J03.9*
- Aiguë
- - Utérus, à l'exclusion du col ¬ Affection *N71.0*
- - ¬ Polyradiculonévrite démyélinisante *G61.0*
- Appareil de fixation interne [toute localisation] ¬ Infection et réaction *T84.6*
- Associée à NCKAP1L ¬ Maladie hyper- *D84.8*

Inflammatoire *–suite*
- Bénigne
- - Épiploon ¬ Tumeur myofibroblastique *D20.1*
- - Mésentère ¬ Tumeur myofibroblastique *D20.1*
- - Poumon ¬ Tumeur myofibroblastique *D14.3*
- - Rétropéritoine ¬ Tumeur myofibroblastique *D20.0*
- Chronique
- - Intestin] ¬ MICI [maladie *K52.9*
- - Récurrente] ¬ CRION [Neuropathie optique *H46*
- - Utérus, à l'exclusion du col ¬ Affection *N71.1*
- Chroniques de l'orbite ¬ Affections *H05.1*
- Col de l'utérus
- - Sans précision ¬ Affection non *N88.9*
- - ¬ Affections *N72*
- Côlon ¬ Polypes *K51.4*
- Cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent ¬ Affections *N49.1*
- Due
- - Cathéter de dialyse péritonéale ¬ Infection et réaction *T85.71*
- - Prothèses, implants ou greffes internes ¬ Infection et réaction *T85.78*
- Faible réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, AgHBe négatif, sans activité *B18.13*
- Foie
- - Sans précision ¬ Maladie *K75.9*
- - ¬ Pseudotumeur *K75.8*
- Forte réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta AgHBe
- - Négatif, avec activité *B18.14*
- - Positif
- - - Activité *B18.12*
- - - Sans activité *B18.11*
- Infantile de l'intestin avec atteinte neurologique ¬ Maladie *K52.8, G31.88*
- Intestin
- - Associée
- - - ALPI ¬ Maladie *K52.8*
- - - TRIM22 ¬ Maladie *K52.8*
- - Infantile associée à IL21 ¬ Maladie *D83.8, K52.8*
- - Précoce associée à IL10 ¬ Maladie *K52.8*
- L 'intestin-arthrite-infections récurrentes-lymphopénie ¬ Syndrome de dérèglement immunitaire-maladie *D84.8*
- Linéaire ¬
- - Nævus épidermique verruqueux *Q82.5*
- - NEVIL [Nævus épidermique verruqueux *Q82.5*
- Mâchoire, sans autre précision ¬ État *K10.29*
- Maligne

Inflammatoire *–suite*
- Maligne *–suite*
- - Épiploon ¬ Tumeur myofibroblastique *C48.1*
- - Mésentère ¬ Tumeur myofibroblastique *C48.1*
- - Poumon ¬ Tumeur myofibroblastique *C34.9*
- - Rétropéritoine ¬ Tumeur myofibroblastique *C48.0*
- Multisystémique adulte
- - Associé au COVID-19 ¬ Syndrome *U10.91*
- - Temporellement associé au COVID-19 ¬ MIS-A [Syndrome *U10.91*
- Muqueuse buccale ¬ Hyperplasie *K13.6*
- Néonatale de la peau et de l'intestin ¬ Maladie *D84.9*
- Néovasculaire autosomique dominante ¬ Vitréo-rétinopathie *H35.2*
- Non classée ailleurs ¬ Myopathie *G72.4*
- Organe génital
- - Masculins précisés ¬ Maladies *N49.88*
- - Non précisés de l'homme ¬ Affection *N49.9*
- - Précisés de l'homme ¬ Affections *N49.8*
- Ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large ¬ Autres affections non *N83.8*
- Pelvienne
- - Chlamydia de la femme ¬ Affection *A56.1†, N74.4**
- - Femme, sans précision ¬ Affection *N73.9*
- - Gonococcique de la femme ¬ Affection *A54.2†, N74.3**
- Pelviennes
- - Femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Affections *N74.8**
- - Précisées de la femme ¬ Autres affections *N73.8*
- Précisée du vagin et de la vulve ¬ Autre maladie *N76.88*
- Précisées
- - Col de l'utérus ¬ Autres affections non *N88.8*
- - Foie ¬ Autres maladies *K75.8*
- - Utérus ¬ Autres affections non *N85.8*
- - Vagin ¬ Autres affections non *N89.8*
- - Vulve et du périnée ¬ Autres affections non *N90.8*
- - ¬ Autres spondylopathies *M46.8*
- Précisés de la mâchoire ¬ Autres états *K10.28*
- Prostate
- - Sans précision ¬ Affection *N41.9*
- - ¬ Autres affections *N41.8*
- Prothèse
- - Articulaire interne ¬ Infection et réaction *T84.5*
- - Implant
- - - Greffe

Inflammatoire *–suite*
- Prothèse *–suite*
- - Implant *–suite*
- - - Greffe *–suite*
- - - - Appareil
- - - - - Génital ¬ Infection et réaction *T83.6*
- - - - - Urinaire ¬ Infection et réaction *T83.5*
- - - - Cardiaques et vasculaires ¬ Infection et réaction *T82.7*
- - - - Internes
- - - - - Partie du tractus gastro-intestinal ¬ Infection et réaction *T85.76*
- - - - - Système hépatobiliaire et le pancréas ¬ Infection et réaction *T85.75*
- - - - - Système nerveux ¬ Infection et réaction *T85.72*
- - - - Orthopédiques internes ¬ Infection et réaction *T84.7*
- - - Mammaire ¬ Infection et réaction *T85.73*
- - Valvulaire cardiaque ¬ Infection et réaction *T82.6*
- Restauration immunitaire [SIRI] ¬ Syndrome *D89.3*
- SAI ¬ Arthropathie *M13.9*
- Sans précision ¬
- - Polynévrite *G61.9*
- - Spondylopathie *M46.9*
- Scrotum ¬ Affections *N49.2*
- Sein ¬
- - Affections *N61*
- - Cancer *C50.9*
- Sonde
- - Jéjunostomie endoscopique percutanée ¬ Réaction *T85.74*
- - PEG ¬ Réaction *T85.74*
- - PEJ ¬ Réaction *T85.74*
- Système nerveux central ¬ Séquelles d'affections *G09*
- Systémique SIRS
- - Non précisé ¬ Syndrome de réponse *R65.9!*
- - Origine
- - - Infectieuse
- - - - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.1!*
- - - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.0!*
- - - Non infectieuse
- - - - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.3!*
- - - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.2!*
- Tubo-ovarienne ¬ affection *N70*
- Utérus sans précision
- - Exclusion du col ¬ Affection *N71.9*
- - ¬ Affection non *N85.9*
- Vagin, sans précision ¬ Affection non *N89.9*
- Verge ¬ Autres affections *N48.2*
- Vésicules séminales ¬ Affections *N49.0*

Inflammatoire *–suite*
- Vulve et du périnée, sans précision ¬ Affection non *N90.9*
- ¬
- - Cancer *C50.9*
- - Cholestéatome avec réaction *H71*
- - Épanchement péricardique (non *I31.3*
- - Polyarthropathie *M06.4*
- - Polynévrites *G61.8*
- - Tumeur myofibroblastique *D48.9*

Influenza
v./v.a. Virus d'influenza saisonnière
- A, B et C identifié ¬ Grippe [Influenza], virus de l' *J10.8*
- Aviaire zoonotique pandémique identifié
- - Associée
- - - Encéphalite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, G94.31*, U69.23!*
- - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.23!*
- - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.23!*
- - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.23!*
- - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.23!*
- - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.23!*
- - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, I41.1*, U69.23!*
- - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, H67.1*, U69.23!*
- - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.23!*
- - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.23!*
- - - ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.23!*
- B ou C identifié ¬ Grippe [influenza], virus d' *J10.8*
- Encéphalite
- - Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09†, G05.1**
- - ¬ Grippe [*J11.8†, G05.1**
- Encéphalopathie
- - Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09†, G94.31**
- - ¬ Grippe [*J11.8†, G94.31**
- Entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Épanchement pleural, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Gastroentérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*

Influenza *–suite*
- Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe [*J10.1*
- Infection
- - Aiguë des voies respiratoires supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe [*J10.1*
- - Respiratoire supérieure, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Laryngite
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe [*J10.1*
- - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Méningisme, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Myocardite, virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09†, I41.1**
- Otite
- - Moyenne, virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09†, H67.1**
- - Virus de la grippe saisonnière identifié ¬ Grippe [*J10.8†, H67.1**
- Pharyngite
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe [*J10.1*
- - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Pneumonie virus influenza
- - Saisonnière identifié ¬ *J10.0*
- - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Polio-encéphalite, virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09†, G05.1**
- Porcine
- - Aviaire
- - - Associée
- - - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l' *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l' *J09, U69.24!*
- - - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l' *J09, U69.24!*
- - - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l' *J09, U69.24!*
- - - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l' *J09, U69.24!*

Influenza *–suite*
- Porcine *–suite*
- - Aviaire *–suite*
- - - Associée *–suite*
- - - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l' *J09, U69.24!*
- - - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l' *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l' *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l' *J09, U69.24!*
- - - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l' *J09, U69.24!*
- - - - ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l' *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - ¬ Grippe Influenza virus influenza zoonotique pandémique identifié
- - - - Associée à une encéphalite, à l'exception du virus de l' *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - - Exception du virus d' *J09, U69.24!*
- - Zoonotique pandémique identifié
- - - Associée
- - - - Encéphalite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, G94.31*, U69.22!*
- - - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.22!*
- - - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.22!*
- - - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.22!*
- - - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.22!*
- - - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.22!*
- - - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, I41.1*, U69.22!*
- - - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.22!*
- - - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.22!*
- - - - ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.22!*
- Saisonnière identifié ¬

Influenza *–suite*
- Saisonnière identifié ¬ *–suite*
- - Bronchopneumonie au cours de grippe [Influenza], virus de l' *J10.0*
- - Influenza avec pneumonie, virus de l' *J10.0*
- - Myocardite aiguë au cours de grippe [Influenza], virus de l' *J10.8†, I41.1**
- - Pneumonie grippale [Influenza], virus de l' *J10.0*
- - Vraie grippe [Influenza], virus de l' *J10.1*
- Virus
- - Grippe saisonnière identifié ¬
- - - Encéphalite lors de grippe [*J10.8†, G05.1**
- - - Encéphalopathie lors de grippe [*J10.8†, G94.31**
- - - Myocardite lors de grippe [*J10.8†, I41.1**
- - - Polio-encéphalite lors de grippe [*J10.8†, G05.1**
- - Influenza
- - - A, B et C identifié ¬ Grippe [*J10.8*
- - - Aviaire zoonotique pandémique identifié
- - - - Associée
- - - - - Encéphalite ¬ Grippe [*J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - - - Encéphalopathie ¬ Grippe [*J09†, G94.31*, U69.23!*
- - - - - Entérite ¬ Grippe [*J09, U69.23!*
- - - - - Épanchement pleural ¬ Grippe [*J09, U69.23!*
- - - - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [*J09, U69.23!*
- - - - - Laryngite ¬ Grippe [*J09, U69.23!*
- - - - - Méningisme ¬ Grippe [*J09, U69.23!*
- - - - - Myocardite ¬ Grippe [*J09†, I41.1*, U69.23!*
- - - - - Otite moyenne ¬ Grippe [*J09†, H67.1*, U69.23!*
- - - - - Pharyngite ¬ Grippe [*J09, U69.23!*
- - - - - Pneumonie ¬ Grippe [*J09, U69.23!*
- - - - - ¬ Grippe [*J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - - ¬ Grippe [*J09, U69.23!*
- - - B ou C identifié ¬ Grippe [*J10.8*
- - - Porcine zoonotique pandémique identifié
- - - - Associée
- - - - - Encéphalite ¬ Grippe [*J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - - - Encéphalopathie ¬ Grippe [*J09†, G94.31*, U69.22!*
- - - - - Entérite ¬ Grippe [*J09, U69.22!*
- - - - - Épanchement pleural ¬ Grippe [*J09, U69.22!*
- - - - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [*J09, U69.22!*
- - - - - Laryngite ¬ Grippe [*J09, U69.22!*
- - - - - Méningisme ¬ Grippe [*J09, U69.22!*
- - - - - Myocardite ¬ Grippe [*J09†, I41.1*, U69.22!*
- - - - - Otite moyenne ¬ Grippe [*J09†, H67.1*, U69.22!*

Influenza *–suite*
- Virus *–suite*
- - Influenza *–suite*
- - - Porcine zoonotique pandémique identifié *–suite*
- - - - Associée *–suite*
- - - - - Pharyngite ¬ Grippe [*J09, U69.22!*
- - - - - Pneumonie ¬ Grippe [*J09, U69.22!*
- - - - - ¬ Grippe [*J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - - ¬ Grippe [*J09, U69.22!*
- - - Saisonnière identifié ¬
- - - - Bronchopneumonie au cours de grippe [*J10.0*
- - - - Myocardite aiguë au cours de grippe [*J10.8†, I41.1**
- - - - Pneumonie grippale [*J10.0*
- - - - Vraie grippe [*J10.1*
- - - Zoonotique pandémique identifié
- - - - Associée à une encéphalite, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire ¬ Grippe [*J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - - Exception virus influenza porcine aviaire
- - - - - Associée à un épanchement pleural ¬ Grippe [*J09, U69.24!*
- - - - - Associée à un méningisme ¬ Grippe [*J09, U69.24!*
- - - - - Associée à une encéphalopathie ¬ Grippe [*J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - - - Associée à une entérite ¬ Grippe [*J09, U69.24!*
- - - - - Associée à une infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [*J09, U69.24!*
- - - - - Associée à une laryngite ¬ Grippe [*J09, U69.24!*
- - - - - Associée à une myocardite ¬ Grippe [*J09†, I41.1*, U69.24!*
- - - - - Associée à une otite moyenne ¬ Grippe [*J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - - - Associée à une pharyngite ¬ Grippe [*J09, U69.24!*
- - - - - Associée à une pneumonie ¬ Grippe [*J09, U69.24!*
- - - - - Associée à une polioencéphalite ¬ Grippe [*J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - - - ¬ Grippe [*J09, U69.24!*
- Virus d'influenza saisonnière identifié ¬
- - Entérite au cours de la grippe [*J10.8*
- - Épanchement pleural au cours de la grippe [*J10.1*
- - Gastroentérite au cours de la grippe [*J10.8*
- - Grippe
- - - *J10.1*
- - - Épidémique [*J10.1*
- - Méningisme dans le cadre de la grippe [*J10.8*
- Zoonotique pandémique identifié

Influenza *–suite*
- Zoonotique pandémique identifié *–suite*
- - Associée à une encéphalite, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - Exception virus influenza porcine aviaire
- - - Associée
- - - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.24!*
- - - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.24!*
- - - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.24!*
- - - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.24!*
- - - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.24!*
- - - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.24!*
- - - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.24!*
- - - - ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - ¬ Grippe [Influenza] à virus d' *J09, U69.24!*
- - ¬ Grippe
- - - Influenza
- - - - Entérite, virus d' *J09*
- - - - Épanchement pleural, virus d' *J09*
- - - - Gastroentérite, virus d' *J09*
- - - - Infection respiratoire supérieure, virus d' *J09*
- - - - Laryngite, virus d' *J09*
- - - - Méningisme, virus d' *J09*
- - - - Pharyngite, virus d' *J09*
- - - - Pneumonie, virus d' *J09*
- - - Virus d' *J09*
- - ¬
- - Bronchopneumonie due à des bactéries autres que S. pneumoniae et H. *J15*
- - Encéphalite grippale [*J11.8†, G05.1**
- - Haemophilus influenzae [H. *B96.3!*
- - Myocardite lors de grippe [*J11.8†, I41.1**
- - Otite
- - - Grippale [*J11.8†, H67.1**
- - - Moyenne nécrosante aiguë lors de grippe [*J11.8†, H67.1**
- - Polio-encéphalite lors de grippe [*J11.8†, G05.1**

Infra-Hisienne familiales ¬ Tachyarythmie atriale et trouble de conduction cardiaque *I45.8*

Infra-sons ¬ Vertige dû aux *T75.2*

Infratentoriel
- SAI ¬ *C71.7*
- ¬
- - Tumeur bénigne: Encéphale, *D33.1*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, *D43.1*

Infratrochantérienne du fémur ¬ Fracture *S72.11*

Infundibulum pulmonaire ¬ Sténose de l' *Q24.3*

Ingéré ¬
- Effet toxique
- - Baies *T62.1*
- - Champignons *T62.0*
- Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances *Z03.6*

Ingestion
- Aliments ¬ Dermite due à l' *L27.2*
- Médicaments ¬ Ulcère de l'œsophage: dû à l' *K22.1*
- Produits chimiques ¬ Ulcère de l'œsophage: dû à l' *K22.1*

Inguinal
v./v.a. Hernie inguinale
- Membre inférieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques *C77.4*
- Rétropéritonéale ¬ Métastase ganglionnaire *C77.8*
- Stade
- - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.84*
- - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.85*
- - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.86*
- Teigne crurale] ¬ Teigne *B35.6*
- ¬
- - Granulome *A58*
- - Lymphadénopathie *R59.0*
- - Région *S31.1*
- - Tuberculose des ganglions *A18.2*

INH ¬ Déficit de C1- *D84.1*

Inhalation
- Agent chimique émanation fumée gaz ¬
- - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l' *J68.4*
- - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l' *J68.4*
- - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l' *J68.4*
- Contenu sécrétion gastrique s SAI due anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.0*
- Drogues ¬ Démence par *F18.7*
- Liquides ou de vomissements SAI ¬ *T17*

Inhalation *–suite*
- Sang ¬ Pneumonie due à l' *J69.8*
- ¬
- - Botulisme par *A05.1*
- - Charbon par *A22.1†, J17.0**
- - Complication d'un traitement par *T81.8*

Inhibant la coagulation ¬ Hémophilie due à des anticorps *D68.38*

Inhibée, non classée ailleurs ¬ Vessie neurogène non *N31.0*

Inhibiteur
- 1 de l'activateur du plasminogène ¬ Déficit congénital en *D68.8*
- Alpha-1 protéinase ¬ Déficit en *E88.00*
- Anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: *T50.2*
- C1 estérase ¬ Déficit de l' *D84.1*
- Calciques ¬ Intoxication: *T46.1*
- Contre facteur
- - V ¬ Hémophilie avec *D68.32*
- - VII ¬ Hémophilie avec *D68.32*
- - VIII ¬ Hémophilie avec *D68.31*
- - Xa ¬ Hémophilie avec *D68.32*
- - XI ¬ Hémophilie avec *D68.32*
- - Xia ¬ Hémophilie avec *D68.32*
- - XIII ¬ Hémophilie avec *D68.32*
- Enzyme de conversion ¬ Intoxication: *T46.4*
- Lactation ¬ Ictère néonatal dû à des *P59.3*
- Monoamine-oxydase ¬ Intoxication: Antidépresseurs *T43.1*
- Pompe à protons ¬ Eosinophilie œsophagienne répondant aux *K20.0*
- Produits par le système immunitaire ¬ Hémophilie due aux *D68.38*
- Protéases ¬ Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux *U85!*
- Récepteurs histaminiques H2 ¬ Intoxication: *T47.0*
- Réversible
- - Facteur IIa ¬ Troubles hémorragiques dus à des *D68.35*
- - Thrombine ¬ Troubles hémorragiques dus à des *D68.35*
- Système rénine-angiotensine-aldostérone ¬ Angio-œdème secondaire aux *T78.3*
- Topoisomérase
- - II ¬ Syndrome myélodysplasique dû à des *D46.9*
- - Type II ¬ Leucémie myéloïde aiguë due à un *C92.00*
- ¬ Déficit facteur
- - IX dû à une hémophilie avec *D68.32*
- - VIII dû à une hémophilie avec *D68.31*
- - X dû à une hémophilie avec *D68.32*
- - XI dû à une hémophilie avec *D68.32*

Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l'homme ¬ *F52.3*

Iniencéphalie ¬ *Q00.2*

Initial
- Insuffisantes ¬ Contractions *O62.0*
- Membres supérieurs, type finlandais ¬ Myopathie distale avec atteinte *G71.08*
- Pian ¬ Lésions *A66.0*
- Pinta
- - Caraté ¬
- - - Chancre (*A67.0*
- - - Papule (*A67.0*
- - ¬ Lésions *A67.0*
- Primaire ¬ Framboesia *A66.0*
- Trachome ¬ Phase *A71.0*
- ¬
- - Taches blanches [caries *K02.0*
- - Ulcère framboesial *A66.0*

Initialement focales
- Sans précision ¬ Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises *G40.09*
- ¬ Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises *G40.08*

Injection
- Conjonctivale ¬ Céphalée névralgique unilatérale brève avec *G44.8*
- Thérapeutique
- - Perfusion transfusion
- - - Sans précision ¬ Complication consécutive à une *T80.9*
- - - ¬
- - - - Complication
- - - - - Consécutives à une *T80.8*
- - - - - Vasculaires consécutives à une *T80.1*
- - - - Embolie gazeuse consécutive à une *T80.0*
- - - - Infection consécutif(ve) à *T80.2*
- - - - Infections consécutives à une *T80.2*
- - - - Phlébite consécutive à *T80.1*
- - - - Septicémie consécutif(ve) à *T80.2*
- - - - Thrombo-embolie consécutive à *T80.1*
- - - - Thrombophlébite consécutive à *T80.1*
- - Transfusion ¬ Choc septique après perfusion, *T80.2, R57.2*
- Traumatique de fluide à haute pression (industrielle) ¬ *T70.4*
- ¬ Accident dû à: Aiguille à *W49.9!*

Innes
v./v.a. Beaulieu-Boycott-Innes

Innominée
- Sous-clavière ¬ Lésion traumatique
- - Artère *S25.1*
- - Veine *S25.3*
- ¬ Absence de veine *Q26.8*

Inoculation ¬
- Hépatite par *B19.9*
- Lymphoréticulose bénigne d' *A28.1*

Inorganiques précisées ¬ Pneumoconiose due à d'autres poussières *J63.8*

Inositol ¬ Carence en *E63.8*

Inquiet de son état de santé (sans diagnostic) ¬ Conseil et surveillance pour: Sujet *Z71*

Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension ¬ *R46.6*

Inscription
- Assurance ¬ *Z02*
- Colonie de vacances ¬ *Z02*
- Effectuée transplantation
- - Organe
- - - Niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ *Z75.7*
- - - Sans niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ *Z75.6*
- - Pulmonaire
- - - Niveau urgence
- - - - HU [High Urgency] ¬ *U55.22*
- - - - U [Urgency] ¬ *U55.21*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ *U55.20*
- Établissement
- - Formation ¬ *Z02*
- - Pénitentiaire ¬ *Z02*
- - Résidentiel ¬ *Z02*
- Immigration ¬ *Z02*
- Mariage ¬ *Z02*
- Naturalisation ¬ *Z02*
- Obtention du permis de conduire ¬ *Z02*
- Pratique sportive ¬ *Z02*
- Transplantation
- - Cardiaque
- - - Niveau urgence
- - - - HU [High Urgency] ¬ *U55.12*
- - - - U [Urgency] ¬ *U55.11*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ *U55.10*
- - Cœur poumon
- - - Niveau urgence
- - - - HU [High Urgency]] ¬ *U55.32*
- - - - U [Urgency] ¬ *U55.31*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ *U55.30*

Insecte
- Non venimeux
- - Multiples SAI ¬ Piqûres d' *T00.9*
- - ¬
- - - Lésion traumatique superficielle
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d' *T13.03*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d' *T11.03*
- - - - Partie du corps non précisée: Morsure ou piqûre d' *T14.03*
- - - - Tronc, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d' *T09.03*
- - - Lésions traumatiques superficielles
- - - - Abdomen, des lombes et du bassin: Morsure ou piqûre d' *S30.83*

Insecte *–suite*
- Non venimeux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lésions traumatiques superficielles *–suite*
- - - - Avant-bras: Morsure ou piqûre d' *S50.83*
- - - - Cheville et du pied: Morsure ou piqûre d' *S90.83*
- - - - Épaule et du bras: Morsure ou piqûre d' *S40.83*
- - - - Hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d' *S70.83*
- - - - Jambe: Morsure ou piqûre d' *S80.83*
- - - - Poignet et de la main: Morsure ou piqûre d' *S60.83*
- - - Piqûre d' *W64.9!*
- Venimeux ¬
- - Morsure d'animal ou piqûre d' *X29.9!*
- - Piqûre ou morsure d' *T63.4*

Insecticide
- Halogénés ¬ Effet toxique: *T60.1*
- Insecticides sans autre précision ¬ Effet toxique: autres *T60.2*
- Organo-phosphorés et carbamates ¬ Effet toxique: *T60.0*
- Sans autre précision ¬ Effet toxique: autres insecticides et *T60.2*
- ¬
- - *L23.5*
- - *L24.5*
- - *L25.3*
- - Intoxication par *T60.2*

Insémination artificielle
- Conjoint [IAC] ¬ Complications de l' *N98.8*
- Donneur [IAD] ¬ Complications de l' *N98.8*
- ¬
- - *Z31.1*
- - Hyperstimulation de l'ovaire lors d' *N98.1*
- - Infection associée à l' *N98.0*

Insensibilité
- Androgènes ¬ *E34.5*
- Congénitale douleur
- - Anosmie-arthropathie neuropathique ¬ *G60.8†, M14.69*, Q07.8*
- - Hyperhidrose ¬ *G60.8, R61.9*
- Partielle aux androgènes [PAIS] ¬ *E34.50*
- Totale aux androgènes [CAIS] ¬ *E34.51*

Insertion
- Anormale des cordages de la tricuspide ¬ *Q22.8*
- Équilibrée chez un sujet normal ¬ Translocation ou *Q95.0*
- Ligamentaire
- - Colonne vertébrale ¬ Lésion des sites d' *M46.09*
- - Musculaires de la colonne vertébrale ¬ Atteinte des *M46.0*

Insertion *–suite*
- Musculaire de la colonne vertébrale ¬ Lésion des sites d' *M46.09*
- Non équilibrées ¬ translocations et *Q92*
- Placentaire ¬ Grossesse compliquée par une anomalie d' *O44.00*
- Réciproques robertsoniennes et équilibrées ¬ translocations et *Q95*
- Vélamenteuse cordon ¬
- - Hémorragie due à une *O69.4*
- - Perte de sang fœtal due à une *P50.0*
- - Travail et accouchement compliqués par une *O69.4*
- ¬ Tendinite d' *M77.9*

Insolation ¬
- *T67.0*
- Coup de chaleur et *T67.0*

Insomnie
- Céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de chaleur, *N95.1*
- Fatale
- - Familiale] ¬ IFF [*A81.8*
- - Sporadique ¬ *A81.8*
- Non organique ¬ *F51.0*
- ¬ *G47.0*

Instabilité
- Articulaire familiale ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- Articulaires ¬ Autres *M25.3*
- Centromérique-immunodéficience-dysmorphie] ¬ Syndrome ICF [*D82.8*
- Chronique genou
- - Ligament
- - - Externe [Lig. péronier collatéral] ¬ *M23.54*
- - - Interne [Lig. tibial collatéral] ¬ *M23.53*
- - - Non précisé ¬ *M23.59*
- - Ligament capsulaire ¬ *M23.57*
- - Ligament croisé
- - - Antérieur ¬ *M23.51*
- - - Postérieur ¬ *M23.52*
- - Localisations multiples ¬ *M23.50*
- Détrusor
- - Due à une neuropathie autonome ¬ Trouble fonctionnel vésical avec *N31.1*
- - Origine cérébrale ¬ *N31.0*
- Secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire ¬ *M24.2*
- Système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire ¬ *M96.88*
- Vertébrales ¬ *M53.2*

Instable
- Avant le travail ¬ Position *P01.7*
- Congénitale) ¬ Hanche *Q65.6*
- Hb Zurich) ¬ Hémoglobine *D58.2*
- Intervention chirurgicale thoracique ¬ Thorax *M96.81*
- SAI ¬ Démarche *R26.8*
- Sans substrat neurologique ¬ Vessie *N31.82*

Instable *–suite*
- ¬
- - Angine de poitrine *I20.0*
- - Diabète (sucré): *E10*
- - Maladie hémolytique à hémoglobine *D58.2*
- - Retard de développement avec trouble du spectre de l'autisme et démarche *F84.1, R26.8*
- - Soins maternels pour position *O32.0*

Installation
- Aiguë de l'aura ¬ Migraine: avec: *G43.1*
- Médical soin santé
- - Sans précision ¬ Difficulté liée aux *Z75.9*
- - ¬ Autres difficultés liées aux *Z75.8*
- Rapide dysfonctionnement hypothalamique hypoventilation dysautonomie
- - Tumeurs neurales] ¬ ROHHADNET [Syndrome d'obésité infantile d' *E23.3, C80.9*
- - ¬ ROHHAD [Syndrome d'obésité infantile d' *E23.3, E66.29*

Instantanée
- Dont la cause reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou *R96.1*
- ¬ Mort *R96.0*

Institution ¬
- Difficulté liée à la vie en *Z59*
- Séjour et éducation en *Z62*

Institutionnel ¬
- Examen général en série de: résidents d'établissements *Z10*
- Syndrome *F94.2*

Instrument
- Cours acte visée diagnostique thérapeutique ¬ Perforation accidentelle
- - Nerf par *T81.2*
- - Organe par *T81.2*
- - Vaisseau sanguin par *T81.2*
- Pendant l'accouchement ¬ Blessure de la mère par un *O71.9*

Instrumental
- Travail ¬ Échec du déclenchement *O61.1*
- ¬ lésions par manœuvre *O71*

Insuffisance
- Acides biliaires-CoA ligase et défaut d'amidation ¬ *K76.8*
- Anastomose
- - Opérations du pancréas ¬ *K91.82*
- - Pancréas avec atteinte de l'intestin grêle ¬ *K91.82*
- - Suture opération
- - - Anus ¬ *K91.83*
- - - Estomac ¬ *K91.83*
- - - Intestin ¬ *K91.83*
- - - Œsophage ¬ *K91.83*
- - - Organes du système digestif ¬ *K91.83*
- - - Pancréas ¬ *K91.82*
- - - Rectum ¬ *K91.83*

Insuffisance *–suite*
- Anastomose *–suite*
- - Suture opération *–suite*
- - - Trachée, des bronches et des poumons ¬ *J95.82*
- - - Vésicule et des voies biliaires ¬ *K91.81*
- - Voies digestives ¬ *K91.83*
- Antéhypophysaire-déficit immunitaire variable] ¬ Syndrome DAVID [*D83.0, E23.0*
- Baroréflexe ¬ *G90.88*
- Cardia ¬ *K31.88*
- Cardio-respiratoire ¬ *R09.2*
- Cellules souches limbiques ¬ *H18.8*
- Cérébrovasculaire aiguë, SAI ¬ *I67.88*
- Cervico-utérin
- - Non précisé ¬ Suivi de la mère en cas d' *O34.39*
- - ¬ Suivi de la mère dans les autres cas d' *O34.38*
- Circulatoire périphérique SAI ¬ *R57.9*
- Congénitale
- - Iode ¬ Hypothyroïdie par *E00.9*
- - Valve pulmonaire ¬ *Q22.2*
- - Valvule aortique ¬ *Q23.1*
- Convergence ¬ Excès et *H51.1*
- Coronaire ¬ *I24.8*
- Corticosurrénal
- - Médicamenteuse ¬ *E27.3*
- - Primaire ¬ *E27.1*
- - SAI ¬ *E27.4*
- - Sans précision ¬ *E27.4*
- Érectile organique ¬ *N48.4*
- Fœto-placentaire ¬ Soin à femme enceinte au cours d' *O36.5*
- Fonctionnelle du ventricule gauche ¬ Cardiopathie coronarienne avec *I25.19*
- Hormone de croissance idiopathique ¬ *E23.0*
- Hypophysaire d'origine post-traumatique ¬ *E23.6*
- Intestinale chronique ¬ *K90.9*
- Isolée
- - ACTH ¬ *E23.0*
- - Hormone
- - - Croissance ¬ *E23.0*
- - - Hypophysaire ¬ *E23.0*
- - Prolactine ¬ *E23.0*
- - Thyréotropine ¬ *E23.0*
- Mitral
- - Congénitale ¬ *Q23.3*
- - Rhumatismale ¬ *I05.1*
- - ¬
- - - Macrothrombocytopénie avec *D69.1, I34.0*
- - - Sténose non rhumatismale de la valvule mitrale avec *I34.80*
- Myocardique
- - Rhumatismal

Insuffisance *–suite*
- Myocardique *–suite*
- - Rhumatismal *–suite*
- - - Aiguë ¬ *I01.2*
- - - Subaiguë ¬ *I01.2*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- Non rhumatismale (de la valvule) tricuspide ¬ *I36.1*
- Oxygénation systémique due
- - Faible teneur en oxygène de l'air ambiant ¬ *T71*
- - Gêne mécanique à la respiration ¬ *T71*
- Périnéale ¬ *N81.8*
- Placentaire ¬
- - *P02.2*
- - Césarienne au cours d' *O36.5*
- Pluriglandulaire
- - Auto-immune ¬ *E31.0*
- - Résultant d'une anomalie dans le transport mucociliaire] [Immotile cilia syndrome] [triade de Kartagener] ¬ Syndrome de Kartagener [Situs inversus viscerum, bronchectasie, sinusite chronique et polypes nasaux] [*Q89.3*
- Polyglandulaire auto-immune ¬ *E31.0*
- Post-partum aiguë du lobe antérieur de l'hypophyse ¬ *E23.0*
- Reflux ¬ Sténose aortique rhumatismale avec *I06.2*
- Régurgitation ¬ Sténose mitrale avec *I05.2*
- Rénales aiguës ¬ Autres *N17.8*
- Surrénale
- - Aiguë ¬ *E27.2*
- - ¬ Crise d' *E27.2*
- Surrénalien
- - Aiguë ¬ *E27.2*
- - Déficit en CYP11A1 ¬ Différence du développement sexuel 46,XY- *E25.08*
- - Héréditaire isolée par déficit partiel en CYP11A1 ¬ *E27.1*
- - ¬ Syndrome néphrotique familial corticorésistant avec *N04.1, E27.4*
- Suture
- - Opérations du pancréas ¬ *K91.82*
- - Pancréas avec atteinte de l'intestin grêle ¬ *K91.82*
- Syphilitique
- - Aorte ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Valve pulmonaire ¬ *A52.0†, I39.3**
- Tricuspidienne ¬ *I07.1*
- Valvule
- - Aortique
- - - SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I35.1*
- - - ¬ *I35.1*
- - Mitral
- - - E) SAI ou de cause précisée sauf rhumatismale ¬ *I34.0*
- - - ¬ *I34.0*

Insuffisance *–suite*
- Valvule *–suite*
- - Non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- - Pulmonaire
- - - SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I37.1*
- - - ¬ *I37.1*
- - Tricuspide
- - - Cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I36.1*
- - - Rhumatismale) ¬ *I07.1*
- Vasculaire mésentérique ¬ *K55.1*
- Veine
- - Perforantes ¬ *I87.20*
- - Profondes du membre inférieur ¬ *I87.20*
- Ventriculaire gauche: Non précisée ¬ *I50.19*
- Voies lacrymales ¬ Sténose et *H04.5*
- ¬ Sténose
- - Aortique rhumatismale avec *I06.2*
- - Mitrale avec *I05.2*
- - Non rhumatismale (de la valvule) tricuspide avec *I36.2*
- - Tricuspidienne avec *I07.2*
- - Valvule
- - - Aortique avec *I35.2*
- - - Pulmonaire avec *I37.2*

Insuffisance aortique
- Congénitale ¬ *Q23.1*
- Rhumatismale ¬ *I06.1*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I39.1**

Insuffisance cardiaque
- Aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du fœtus avec menace d' *O35.8*
- Chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque ¬ *I97.1*
- Congénitale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-cardiomégalie- *Q87.8*
- Congestive
- - Rénale ¬ Cardionéphropathie hypertensive, avec *I13.2*
- - ¬
- - - Cardionéphropathie hypertensive, avec *I13.0*
- - - Cardiopathie hypertensive
- - - - *I11.0*
- - - - Sans *I11.9*
- Diastolique ¬ *I50.1*
- Droite
- - Consécutive à une insuffisance cardiaque gauche ¬ *I50.01*
- - Post-cardiotomie ¬ *I97.1*
- - Primaire
- - - Sans symptôme ¬ *I50.00, I50.02!*
- - - Stade NYHA
- - - - I ¬ *I50.00, I50.02!*
- - - - II ¬ *I50.00, I50.03!*

Insuffisance cardiaque *–suite*
- Droite *–suite*
- - Primaire *–suite*
- - - Stade NYHA *–suite*
- - - - III ¬ *I50.00, I50.04!*
- - - - IV ¬ *I50.00, I50.05!*
- - - Symptôme
- - - - Effort
- - - - - Important ¬ *I50.00, I50.03!*
- - - - - Léger ¬ *I50.00, I50.04!*
- - - - Repos ¬ *I50.00, I50.05!*
- - - ¬ *I50.00*
- - SAI ¬ *I50.01*
- - Sans symptôme ¬ *I50.01, I50.02!*
- - Secondaire ¬ *I50.01*
- - Stade NYHA
- - - II ¬ *I50.01, I50.03!*
- - - III ¬ *I50.01, I50.04!*
- - - IV ¬ *I50.01, I50.05!*
- - Symptôme
- - - Effort
- - - - Important ¬ *I50.01, I50.03!*
- - - - Léger ¬ *I50.01, I50.04!*
- - - Repos ¬ *I50.01, I50.05!*
- Due anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.1*
- - Puerpéralité ¬ *O89.1*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.2*
- Fraction éjection ventriculaire gauche
- - Faiblement réduite] ¬ HFmrEF [*I50.19*
- - Préservée] ¬ HFpEF [*I50.19*
- - Réduite] ¬ HFrEF [*I50.19*
- Gauche
- - Cours de rhumatisme articulaire aigu ¬ Présence d'une *I01.8*
- - Rhumatismale aiguë ¬ *I01.8*
- - Sans symptôme ¬ *I50.11*
- - Symptôme
- - - Effort
- - - - Important ¬ *I50.12*
- - - - Léger ¬ *I50.13*
- - - Repos ¬ *I50.14*
- - ¬ Insuffisance cardiaque droite consécutive à une *I50.01*
- Globale ¬ *I50.01*
- Haut débit ¬ *I50.9*
- Hypertensive ¬ *I11.0*
- Intervention chirurgicale ¬ *I97.89*
- Myocardique SAI ¬ *I50.9*
- Néonatale ¬ *P29.0*
- Rhumatismale ¬ *I09.9*
- Sans précision ¬ *I50.9*
- Survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ *O75.4*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**

Insuffisance cardiaque *–suite*
- Thyréotoxique ¬ *E05.9†, I43.8**
- ¬ Œdème pulmonaire (aigu) avec mention de maladie cardiaque SAI ou d' *I50.1*

Insuffisance hépatique
- Aiguë
- - Chronique) médicamenteuse ¬ *K71.1*
- - Infantile
- - - Associée à la fièvre ¬ Syndrome d' *K72.0*
- - - Manifestations multisystémiques ¬ Syndrome d' *K72.0*
- - Subaiguë, non classée ailleurs ¬ *K72.0*
- - Sur chronique ¬ *K72.10*
- Alcoolique
- - Aiguë
- - - Sur chronique ¬ *K70.42*
- - - ¬ *K70.40*
- - Chronique ¬ *K70.41*
- - Coma hépatique ¬ *K70.48*
- - Subaiguë ¬ *K70.40*
- - ¬ *K70.48*
- Chronique ¬ *K72.18*
- Début tardif [late-onset] ¬ *K72.0*
- Due aux médicaments ¬ *K71.9*
- Infantile aiguë par défaut de synthèse des protéines codées par l'ADN mitochondrial ¬ *K72.0*
- Origine médicamenteuse ¬ *K71.1, Y57.98!*
- Sans précision ¬ *K72.9*
- Tardive ¬ *K72.0*
- Toxicomanie ¬ *K71.1, Y57.98!*
- ¬
- - Hépatite
- - - Fulminante NCA, avec *K72*
- - - Maligne NCA, avec *K72*
- - Nécrose des hépatocytes avec *K72*
- - Syndrome de tubulopathie rénale-encéphalopathie- *G31.81*

Insuffisance ovarienne
- Actes médicaux ¬ *E89.4*
- Hypergonadotrope ¬ *E28.3*
- Précoce ¬ Syndrome d'ostéosclérose-ichtyose- *Q87.5*
- Primaire ¬ *E28.3*
- Primitive liée prémutation X fragile ¬
- - *E28.3*
- - FXPOI [*E28.3*

Insuffisance pancréatique
- Anémie-hyperostose ¬ Syndrome d' *K86.83, D64.4*
- Endocrine ¬ *K86.88*
- Exocrine ¬ *K86.83*
- ¬ *K86.88*

Insuffisance pulmonaire
- Aiguë consécutive intervention chirurgicale
- - Non thoracique ¬ *J95.2*
- - Thoracique ¬ *J95.1*

Insuffisance pulmonaire *–suite*
- Chronique consécutive à une intervention chirurgicale ¬ *J95.3*
- Mesures médicales ¬ *J95.88*

Insuffisance rénale
- Actes médicaux ¬ *N99.0*
- Aiguë
- - Nécrose corticale aiguë
- - - Stade
- - - - 1 ¬ *N17.11*
- - - - 2 ¬ *N17.12*
- - - - 3 ¬ *N17.13*
- - - ¬ *N17.1*
- - Nécrose médullaire
- - - Stade
- - - - 1 ¬ *N17.21*
- - - - 2 ¬ *N17.22*
- - - - 3 ¬ *N17.23*
- - - ¬ *N17.2*
- - Nécrose papillaire stade
- - - 1 ¬ *N17.21*
- - - 2 ¬ *N17.22*
- - - 3 ¬ *N17.23*
- - Nécrose tubulaire
- - - Stade
- - - - 1 ¬ *N17.01*
- - - - 2 ¬ *N17.02*
- - - - 3 ¬ *N17.03*
- - - ¬ *N17.0*
- - Post-partum ¬ *O90.4*
- - Prérénale ¬ *N17*
- - Résultat histologique stade
- - - 1 ¬ *N17.81*
- - - 2 ¬ *N17.82*
- - - 3 ¬ *N17.83*
- - Sans
- - - Précision ¬ *N17.9*
- - - Résultat histologique ¬ *N17.9*
- - Stade
- - - 1 ¬ *N17.91*
- - - 2 ¬ *N17.92*
- - - 3 ¬ *N17.93*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- Alcalose ¬ Syndrome d'hyperuricémie-hypertension artérielle pulmonaire- *E72.8*
- Bloc auriculo-ventriculaire, choc et hyperkaliémie ¬ Syndrome de bradycardie avec *E87.5, T88.8*
- Cholestase ¬ Syndrome d'arthrogrypose- *Q89.7*
- Chronique
- - Nécessitant une dialyse ¬ *N18.5*
- - ¬ *N18*
- Congénitale ¬ *P96.0*
- Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.4*

Insuffisance rénale *–suite*
- Diabétique ¬ *E14.20†, N08.3**
- Écrasement ¬ *T79.5*
- Hypertensive ¬ *I12.0*
- Non précisée comme aiguë ou chronique ¬ *N19*
- Organomégalie] ¬ Syndrome de TAFRO [thrombocytopénie-anasarque-fièvre- *D89.8*
- Préterminale ¬ *N18.4*
- SAI ¬ *N19*
- Sans précision ¬ *N19*
- Terminale ¬ *N18.5*
- Tubulaire-cardiomyopathie ¬ Syndrome d' *N25.8, I42.0*
- ¬
- - Cardionéphropathie hypertensive, avec *I13.1*
- - Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d' *Z99.2*
- - Dialyse de longue durée lors d'une *Z99.2*
- - Néphropathie hypertensive
- - - *I12.0*
- - - Sans *I12.9*
- - Syndrome de myoclonus d'action- *G40.3*

Insuffisance respiratoire
- Aiguë
- - Hypercapnie et hypoxémie ¬ *J96.01*
- - Type
- - - I ¬ *J96.00*
- - - II ¬ *J96.01*
- Chronique
- - Hypercapnie et hypoxémie ¬ *J96.11*
- - Type
- - - I ¬ *J96.10*
- - - II ¬ *J96.11*
- Délétions bialléliques dans le cluster de gènes ATAD3 ¬ Syndrome létal d'hypoplasie pontocérébelleuse-hypotonie- *Q04.3*
- Hypercapnie et hypoxémie ¬ *J96.91*
- Hypoxémique
- - Aiguë ¬ *J96.00*
- - Chronique ¬ *J96.10*
- - ¬ *J96.90*
- Mutation ponctuelle ¬ Syndrome létal d'hypoplasie pontocérébelleuse-hypotonie- *Q04.3*
- Nouveau-né ¬ *P28.5*
- Postopératoire ¬ *J95.88*
- Sans précision ¬ *J96.9*
- Type
- - I ¬ *J96.90*
- - II ¬ *J96.91*
- ¬ Syndrome létal d'hypoplasie pontocérébelleuse-hypotonie- *Q04.3*

Insuffisance staturale
- Constitutionnelle ¬ *E34.3*
- Infantile ¬ *E34.3*
- Métatropique ¬ *Q77.8*

Insuffisance staturale *–suite*
- Non classée ailleurs ¬ *E34.3*
- Nutritionnelle ¬ *E45*
- Origine
- - Achondroplastique ¬ *Q77.4*
- - Pancréatique ¬ *K86.88*
- - Rénale ¬ *N25.0*
- Pituitaire ¬ *E23.0*
- Psychosociale ¬ *E34.3*
- SAI ¬ *E34.3*
- Thanatophore ¬ *Q77.1*
- Type Laron ¬
- - *E34.3*
- - *E34.3*

Insuffisance thyroïdienne
- Congénitale
- - Type
- - - Mixte ¬ Syndrome d' *E00.2*
- - - Myxœdémateux ¬ Syndrome d' *E00.1*
- - - Neurologique ¬ Syndrome d' *E00.0*
- - ¬ Syndrome d' *E00.9*
- Fœtale ¬ Syndrome d' *E00.9*

Insuffisance veineuse
- Chronique
- - Membre inférieur ¬ *I87.20*
- - Périphérique
- - - SAI ¬ *I87.20*
- - - Sans ulcération ¬ *I87.20*
- - - Ulcération ¬ *I87.21*
- Membres inférieurs, avec ulcération ¬ *I87.21*
- ¬ Ulcère de jambe dû à une *I87.21*

Insuffisant
- Cæcum et du côlon ¬ Rotation: *Q43.3*
- Col ¬ Dilatation *O62.0*
- Eau potable ¬ Approvisionnement *Z58*
- Glandes mammaires] ¬ Micromastie [développement *Q83.88*
- Non classées ailleurs ¬ Aptitudes sociales *Z73*
- Nourriture boisson
- - Suite de négligence de soi ¬ Prise *R63.6*
- - ¬ Prise *R63.6*
- Précautions aseptiques ¬ Mesures *Y69!*
- ¬
- - Contractions initiales *O62.0*
- - Couverture sociale et secours *Z59*
- - Développement pulmonaire *Q33.6*
- - Érection *N48.4*
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals *Z35.3*

Insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la toux) ¬ Dépendance (de longue durée) envers: *Z99.0*

Insufflation tubaire ¬ *Z31.4*

Insulaires
- Pancréas ¬ Carcinome neuroendocrine des cellules *C25.4*

Insulaires *–suite*
- ¬
- - Examen spécial de dépistage d'autoanticorps anti-cellules *Z13.10*
- - Tumeur à cellules *D13.7*

Insuline
- Cinquièmes métacarpiens courts ¬ Syndrome de résistance à l' *E14.90*
- Crampes-hypertrophie acrale ¬ Syndrome d'acanthosis nigricans-résistance à l' *Q87.8*
- Hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] ¬ Intoxication: *T38.3*
- IGF1 [somatomédine-C] et EGF [facteur de croissance épidermique] ¬ Lipodystrophie due à un déficit combiné en *E88.1*
- Type
- - 1 ¬ Retard de croissance
- - - Déficit du facteur de croissance analogue à l' *Q87.1*
- - - Résistance au facteur de croissance analogue à l' *E34.3*
- - A ¬ Syndrome de résistance à l' *E13.60*
- ¬
- - Détection d'anticorps anti- *R76.88*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en récepteur à l' *E16.1*
- - Pompe à *Z96.4*
- - Syndrome de nanisme microcéphalique primordial-résistance à l' *Q87.1*
- - Taux réduit de la protéine de liaison du facteur de croissance ressemblant à l' *R77.88*

Insulinique induit, chez un non diabétique ¬ Coma: *E15*

Insulino-dépendant
v./v.a. Diabète sucré
- Non primaire chez l'adolescent ¬ Diabète *E11*

Insulinome
- Bénin
- - Pancréas ¬ *D13.7*
- - ¬ *D13.7*
- Incertain ¬ *D37.70*
- Malin ¬ *C25.4*
- Pancréatique
- - Incertain ¬ *D37.70*
- - Malin ¬ *C25.4*
- ¬
- - *D13.7*
- - Syndrome d'hypoglycémie pancréatogène sans *E16.1*

Insulinorésistance au cours d'un diabète sucré de type 1 chez des adultes ¬ *E10.90, U69.75!*

Insulino-résistance type
- A
- - Complications multiples ¬ Syndrome d' *E13.72*
- - Décompensé ¬ Syndrome d' *E13.61*
- B

Insulino-résistance type *–suite*
- B *–suite*
- - Décompensé ¬ Syndrome d' *E13.73*
- - ¬ Syndrome d' *E13.72*

Insulinothérapie ¬ Diabète de type 2 sous *E11*

Intégrine alpha-7 ¬ Dystrophie musculaire congénitale par déficit en *G71.2*

Intégrité corporelle ¬ Dysphorie de l' *F68.8*

Integumentalis ¬ Lupus erythematodes *L93.0*

Intellectuel
- Sévères-surdité neurosensorielle-dystonie ¬ Syndrome de déficiences motrice et *Q87.8*
- ¬ Syndrome de lymphœdème-lymphangiectasie-déficience *Q87.8*

Intellectuelle
v./v.a. Déficience intellectuelle

Intelligence dissociée ¬ *F74*

Intense
- Contracture abdominale) (généralisée) (localisée) ¬ Douleur abdominale *R10.0*
- Prolongé) SAI ¬ Ictère physiologique (*P59.9*

Intensif ¬ Épuisement dû à un effort *T73.3*

Intensive ¬ État après un traitement de médecine *U70.0!*

Intention
- Personne de léser ou de tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l' *Y09.9!*
- Suicidaire ¬ Intoxication aux somnifères avec *T42.7*

Intentionnel
- Simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production *F68.1*
- ¬ Tremblement *G25.2*

Interaortopulmonaire ¬ Coronaire *Q24.5*

Interatriale
- CIA] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication *I51.0*
- Séquence de Robin et persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec communication *Q87.8*
- ¬ Communication *Q21.1*

Interauriculaire
- Auricules ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication *I51.0*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Communication *I23.1*
- Dysmorphie ¬ Syndrome de lymphœdème-communication *Q87.8*
- Trouble de la conduction atrio-ventriculaire ¬ Syndrome de communication *Q21.1*
- ¬
- - Anévrisme du septum *Q21.0*
- - Communication *Q21.1*

Intercapillaire ¬ Glomérulosclérose *E14.20†, N08.3**

Intercondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: *S72.44*

Intercostal ¬
- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.5*
- Névrite *G58.0*

Interdigital
- Distalisé ¬ Pli *Q70.1*
- Membre
- - Inférieur ¬ Névrome *G57.8*
- - Supérieur ¬ Névrome *G56.8*

Interdigitées ¬ Sarcome à cellules dendritiques *C96.4*

Interépineuse [Maladie de Baastrup] ¬ Arthrose *M48.2*

Interférente ¬ Dissociation: *I45.8*

Interféron
- Gamma ¬ MSMD autosomique
- - Dominante déficit partiel récepteur
- - - 1 de l' *D84.8*
- - - 2 de l' *D84.8*
- - Récessive par déficit partiel en récepteur 1 de l' *D84.8*
- - ¬
- - Détection d'anticorps neutralisants [AcN] anti- *R76.88*
- - Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit partiel en facteur 8 régulateur de l' *D84.8*
- - Vasculopathie de l'enfant associée à STING [Stimulateur des Gènes de l' *M35.8*

Interferon regulatory factor-7] ¬ Déficit en IRF7 [*D84.8*

Interhémisphérique médian de l'holoprosencéphalie ¬ Variant *Q04.2*

Intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ Lèvre (bord libre) (face *D10.0*

Interleukin 6
- Receptor] ¬ Déficit immunitaire combiné autosomique récessif par déficit en IL6R [*D81.8*
- Signal transducer ¬ Déficit immunitaire combiné autosomique
- - Dominant par déficit partiel en IL6ST [*D81.8*
- - Récessif déficit
- - - Complet en IL6ST [*D81.8*
- - - Partiel en IL6ST [*D81.8*

Interleukin-1 receptor-associated kinase-4 ¬ Immunodéficience par déficit en *D84.8*

Interleukine
- 1] ¬ DIRA [Déficit de l'antagoniste du récepteur à l' *M86.39*
- 12 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en récepteur bêta 1 de l' *D84.8*

Intermédiaire
- Artérielle ¬ Dégénérescence de la tunique *I70.29*
- Associée à PRKAR1B ¬ Démence neurodégénérative avec filaments *G31.88*
- Atypique
- - BB-Lepra] ¬ Lèpre de type *A30.3*

Intermédiaire *–suite*
- Atypique *–suite*
- - Lèpre
- - - BL] ¬ Lèpre lépromateuse de type *A30.4*
- - - TT] ¬ Lèpre tuberculoïde de type *A30.2*
- Autosomique
- - Dominante
- - - A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - B ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - C ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - D ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - Douleurs neuropathiques ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - E ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - Type F ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - Récessive type
- - - A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - B ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - C ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - D ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- Cardiomyopathie ¬ Épidermolyse bulleuse simple *Q81.0, I42.9*
- Due à une mutation du gène COL2A1 ¬ Arthrose précoce avec dysplasie spondylo-épiphysaire *Q77.7, M19.99*
- Latéral) (médian) ¬ Fracture: Os cunéiforme (*S92.23*
- Moyenne ¬ Thalassémie: *D56.1*
- Pinta ¬ Lésions *A67.1*
- Sans manifestations extra-cutanées associée à PLEC ¬ Epidermolyse bulleuse simple *Q81.0*
- ¬
- - Défaut septal atrio-ventriculaire *Q21.2*
- - Dystrophie musculaire liée au collagène de type VI, forme *G71.2*
- - Épidermolyse bulleux
- - - Dystrophique généralisée autosomique récessive, forme *Q81.2*
- - - Jonctionnelle généralisée, forme *Q81.8*
- - - Simple généralisée
- - - - *Q81.0*
- - - - Autosomique dominante, forme *Q81.0*
- - Lymphome nodulaire de type *C82.9*
- - Maladie des urines sirop d'érable, forme *E71.0*
- - Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: forme *E42*
- - Ostéochondrose juvénile de l'os cunéiforme *M92.6*
- - Ostéopétrose *Q78.2*

Intermédiaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome
- - - Coronaire *I20.0*
- - - DEND [retard de développement-épilepsie-diabète néonatal], forme *E10.40*
- - Tumeur du parenchyme pinéal à différenciation *D44.5*
- - Uvéite *H30.2*

Intermittent
v./v.a. Type de maladie

Internucléaire ¬ Ophtalmoplégie *H51.2*

Interphalangienne
- Main ¬ Dermato-arthrite lipoïdique, articulation *E78.88†, M14.34**
- S) ¬ Articulation(s): *S93.5*
- ¬
- - Arthropathie psoriasique distale *L40.5†, M07.09**
- - Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) *S63.62*
- - Luxation
- - - Doigt: (Articulation) *S63.12*
- - - Orteil(s): (Articulation) *S93.12*
- - Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et *S63.4*

Interrogans
- Autumnalis ¬ Infection à Leptospira *A27.8*
- Canicola ¬ Infection à Leptospira *A27.8*
- Hebdomadis ¬ Infection à Leptospira *A27.8*
- Pomona ¬ Infection à Leptospira *A27.8*
- ¬ Infection à Leptospira *A27.9*

Interruption
- Grossesse
- - Légale ¬ *O04*
- - Source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né ¬ *P96.4*
- - Thérapeutique ¬ *O04*
- - ¬
- - - *Z30.3*
- - - Lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- La crosse aortique ¬ *Q25.4*
- Veine cave inférieure ¬ *Q26.8*

Interscapulaire ¬
- Mélanome malin de la région *C43.59*
- Région *T21*

Interstitiel
v./v.a. Type de maladie

Intertrigo érythémateux ¬ *L30.4*

Intervalle
- PR court ¬ Tachyarythmie atriale avec *I45.6*
- Raccourcis et irréguliers entre les règles ¬ *N92.1*

Intervention
- Chirurgicale

Intervention *–suite*
- Chirurgicale *–suite*
- - Antérieure
- - - Sur
- - - - Col ¬ Soins maternels pour: *O34.4*
- - - - Périnée ou la vulve ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- - - - Vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- - - ¬ Soins maternels pour cicatrice utérine due à une *O34.2*
- - Importante ¬ Antécédents personnels d' *Z92.4*
- - Intra-utérine ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*
- - Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P00.6*
- - Non thoracique ¬ Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une *J95.2*
- - Post-traumatique ¬ perte d'une partie du corps NCA après *Z90*
- - Thoracique ¬
- - - Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une *J95.1*
- - - Sternum laissé électivement ouvert après *M96.80*
- - - Thorax instable après *M96.81*
- - ¬
- - - Blessure de l'utérus par incision lors d'une *T81.2*
- - - Choc septique pendant une *T81.1, R57.2*
- - - Convalescence après *Z54.0!*
- - - Insuffisance cardiaque après *I97.89*
- - - Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une *J95.3*
- - - Perte d'un membre: après *Z89*
- Chirurgie cardiaque visant la correction et palliation d'une malformation cardiaque congénitale ¬ État après *Z98.80*
- Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d' *Z64.8*
- Destructrice pour faciliter l'accouchement ¬ *P03.8*
- Endoscopie de l'appareil digestif ¬ Sténose consécutive à une *K91.84*
- Fontan] ¬ FALD [Maladie hépatique associée à l' *K76.1, K91.88*
- Gastrique ¬ Syndromes consécutifs à une *K91.1*
- Gastro-intestinale ¬ Vomissements consécutifs à une *K91.0*
- Implantation) (durant leur utilisation) ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une *Y82.8!*
- Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P00.7*
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d' *Z64.8*

Interventriculaire
- Atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication *Q21.3*
- CIV] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication *I51.0*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Communication *I23.2*
- Cours de tétralogie de Fallot ¬ Atrésie pulmonaire avec communication *Q21.3*
- Sous-aortique
- - Sous-aortique sous-pulmonaire sténose pulmonaire ¬
- - - VDDI avec communication *Q20.1*
- - - Ventricule droit à double issue avec communication *Q20.1*
- - Sous-pulmonaire [double-committed ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec communication *Q20.1*
- - ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec communication *Q20.1*
- Sous-pulmonaire
- - Non-committed ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec CIV [communication *Q20.1*
- - ¬ Ventricule droit à double issue avec communication *Q20.1*
- Sténose pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication *Q21.3*
- ¬
- - Anévrisme du septum *Q21.1*
- - Communication *Q21.0*
- - Syndrome d'atrésie pulmonaire-communication *Q22.0, Q21.0*

Intervertébral
- Cervical ¬ Rupture traumatique d'un disque *S13.0*
- Cervicaux
- - Compression des racines nerveuses ¬ Atteinte des disques *M50.1†, G55.1**
- - Myélopathie ¬
- - - Compression des racines nerveuses lors d'une atteinte des disques *M50.0†, G99.2**
- - - Dégénérescence des disques *M50.0†, G99.2**
- - Névralgie cervicale ¬ Atteinte des disques *M50.8†, G55.1**
- - Névrite ¬ Dégénérescence des disques *M50.1†, G55.1**
- - Radiculopathie ¬ Dégénérescence des disques *M50.1†, G55.1**
- Dorsal ¬ Rupture traumatique d'un disque *S23.0*
- Lombaire ¬ Rupture traumatique d'un disque *S33.0*
- Lombaires avec myélopathie ¬ Dégénérescence des disques *M51.0†, G99.2**

Intervertébral *–suite*
- Myélopathie ¬ Compression des racines nerveuses lors d'une atteinte des disques *M51.0†, G99.2**
- Ossification et subluxation ¬ Rétrécissement des espaces *M99.6*
- Précisé ¬
- - Détérioration d'un autre disque *M51.3*
- - Hernie d'un autre disque *M51.2*
- Sans précision ¬ Atteinte d'un disque *M51.9*
- Thoraciques avec radiculopathie ¬ Dégénérescence des disques *M51.1†, G55.1**
- Tissu conjonctif et discal ¬ Rétrécissement des espaces *M99.7*
- ¬
- - Atteintes précisées d'un disque *M51.8*
- - Chondrite tuberculeuse *A18.0†, M49.09**
- - Claudicatio spinalis au cours d'atteinte lombaire des disques *M51.1†, G55.1**
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: disque *T84.07*
- - Compression des racines nerveuses lors d'une atteinte des disques *M51.1†, G55.1**
- - Infection (pyogène) d'un disque *M46.3*
- - Lumbago avec ischialgie due à une atteinte des disques *M51.1†, G55.1**
- - Myélopathie
- - - Cours d'atteinte des disques *M51.0†, G99.2**
- - - Dégénérescence des disques *M51.0†, G99.2**
- - - Déplacement de disque *M51.0†, G99.2**
- - Neuropathie radiculaire avec atteinte des disques *M51.1†, G55.1**
- - Névrite
- - - Due
- - - - Atteinte des disques *M51.1†, G55.1**
- - - - Déplacement de disque *M51.1†, G55.1**
- - - Nerf
- - - - Brachial due au déplacement de disque *M50.1†, G55.1**
- - - - Sciatique due au déplacement de disque *M51.1†, G55.1**
- - - Plexus brachial due au déplacement de disque *M50.1†, G55.1**
- - Présence d'une prothèse de disque *Z96.67*
- - Radiculite
- - - Cervicale due au déplacement de disque *M50.1†, G55.1**
- - - Due
- - - - Atteinte des disques *M51.1†, G55.1**
- - - - Déplacement de disque *M51.1†, G55.1**
- - Sciatique due à une discopathie *M51.1†, G55.1**
- - Tuberculose
- - - Cartilage *A18.0†, M49.09**
- - - Disque *A18.0†, M49.09**

Intervillite chronique d'étiologie indéterminée [ICEI] ¬ *O41.1*

Intestin
- Aigu(ë) ¬ Infarctus de l' *K55.0*
- Arthrite-infections récurrentes-lymphopénie ¬ Syndrome de dérèglement immunitaire-maladie inflammatoire de l ' *D84.8*
- Associée
- - ALPI ¬ Maladie inflammatoire de l' *K52.8*
- - TRIM22 ¬ Maladie inflammatoire de l' *K52.8*
- Atteinte neurologique ¬ Maladie inflammatoire infantile de l' *K52.8, G31.88*
- Brides] avec occlusion ¬ Adhérences de l' *K56.5*
- Calculs biliaires ¬ Occlusion de l' *K56.3*
- Côlon, partie non précisée ¬ Lésion traumatique du côlon: Gros *S36.50*
- Cours d'une amibiase chronique ¬ Ulcère de l' *A06.1*
- Court
- - Asplénie ¬ Syndrome de hernie diaphragmatique- *Q87.8*
- - Congénital ¬ Syndrome de l' *Q41.9*
- - Thrombose ¬ Syndrome de l' *K91.2, K55.0*
- - Volvulus ¬ Syndrome de l' *K91.2, K56.2*
- - ¬ Syndrome de l' *K91.2*
- Due à une hernie avec gangrène ¬ Strangulation de l' *K46.1*
- Grêle
- - Aigu(ë) ¬ Ischémie de l' *K55.0*
- - Côlon
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬
- - - - - Diverticulite de l' *K57.43*
- - - - - Maladie diverticulaire de l' *K57.43*
- - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.42*
- - - - ¬ Maladie diverticulaire de l' *K57.42*
- - - Saignement ¬ Maladie diverticulaire de l' *K57.51*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.53*
- - - - Sans indication saignement ¬
- - - - - Diverticulite de l' *K57.52*
- - - - - Diverticulose de l' *K57.50*
- - - ¬ Maladie diverticulaire de l' *K57.50*
- - Cours syndrome
- - - Déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements ¬ Carcinome de l' *C17.9*
- - - Lynch ¬ Carcinome de l' *C17.9*
- - Duodénum ¬ Lésion traumatique de l' *S36.41*
- - Gros intestin ¬ Maladie de Crohn de l' *K50.82*
- - Hémorragie ¬ Angiodysplasie de l' *K55.32*
- - In rémission complète ¬ Maladie immunoprolifération de l' *C88.31*
- - Intestin
- - - Grêle, partie non précisée ¬ Lésion traumatique de l' *S36.40*

Intestin *–suite*
- Grêle *–suite*
- - Intestin *–suite*
- - - SAI ¬ obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l' *Q41*
- - Localisations contiguës ¬ Tumeur carcinoïde héréditaire de l' *C17.8*
- - Non précisées ¬ Tumeur bénigne: Parties de l' *D13.3*
- - Partie non précisée ¬ Lésion traumatique de l'intestin grêle: *S36.40*
- - Parties et parties multiples de l'intestin grêle ¬ Lésion traumatique de l' *S36.49*
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.03*
- - - - Maladie diverticulaire de l' *K57.03*
- - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.02*
- - - ¬ Maladie diverticulaire de l' *K57.02*
- - Péritonite ¬ Diverticulite du côlon et de l' *K57.4*
- - Saignement ¬ Maladie diverticulaire de l' *K57.11*
- - Sans
- - - Indication d'une hémorragie ¬ Angiodysplasie de l' *K55.31*
- - - Perforation abcès
- - - - Indication saignement ¬
- - - - - Diverticulite de l' *K57.12*
- - - - - Diverticulose de l' *K57.10*
- - - - Saignement ¬
- - - - - Diverticulite de l' *K57.13*
- - - - - Diverticulose de l' *K57.11*
- - - Précision ¬ Tumeur maligne: *C17.9*
- - Type méditerranéen en rémission complète ¬ Maladie immunoprolifération de l' *C88.31*
- - ¬
- - - Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l' *Q41.8*
- - - Adénocarcinome de l' *C17.9*
- - - Amylose de l' *E85.4†, K93.8**
- - - Angiodysplasie de l' *K55.3*
- - - Carcinoïde
- - - - *C17.9*
- - - - Métastatique de l' *C17.9*
- - - Carcinome épidermoïde de l' *C17.9*
- - - Corps étranger dans l' *T18.3*
- - - Duplication de l' *Q43.40*
- - - Fistule du vagin à l' *N82.2*
- - - Insuffisance
- - - - Anastomoses au pancréas avec atteinte de l' *K91.82*
- - - - Suture au pancréas avec atteinte de l' *K91.82*
- - - Léiomyosarcome de l' *C17.9*

Intestin *–suite*
- Grêle *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lésion traumatique de l'intestin grêle: Autres parties et parties multiples de l' *S36.49*
- - - Maladie
- - - - Crohn de l' *K50.0*
- - - - Diverticulaire de l' *K57.10*
- - - - Immunoprolifération de l' *C88.30*
- - - Obstruction congénitale de l' *Q41.9*
- - - Occlusion congénitale de l' *Q41.9*
- - - Polype de l' *K63.8*
- - - Sténose congénitale de l' *Q41.9*
- - - Syphilis de l' *A52.7†, K93.8**
- - - Tumeur
- - - - Carcinoïde héréditaire de l' *C17.9*
- - - - GRF [facteur de libération de l'hormone de croissance] de l' *C17.9*
- - - Tumeur maligne
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C17.8*
- - - - Secondaire de l' *C78.4*
- - - Tumeur neuroendocrine maligne de l' *C17.9*
- - - Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l' *C17.9*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.2*
- - - Ulcère primaire de l' *K63.3*
- Infantile associée à IL21 ¬ Maladie inflammatoire de l' *D83.8, K52.8*
- Irritable
- - Constipation prédominante [SII-C] ¬ Syndrome de l' *K58.2*
- - Diarrhée prédominante [SII-D] ¬ Syndrome de l' *K58.1*
- - Troubles du transit changeants (mixtes) [SII-M] ¬ Syndrome de l' *K58.3*
- Neurogène, non classé ailleurs ¬ *K59.2*
- Non
- - Précisée ¬ Duplication de l' *Q43.49*
- - Précisées ¬ Carcinoma in situ: Parties de l' *D01.4*
- - Traumatique) ¬ Perforation de l' *K63.1*
- Perforation abcès
- - Saignement ¬ Maladie diverticulaire de l' *K57.83*
- - ¬ Maladie diverticulaire de l' *K57.82*
- Précoce associée à IL10 ¬ Maladie inflammatoire de l' *K52.8*
- Rectum ¬ Tumeur maligne secondaire du gros *C78.5*
- SAI ¬
- - *D13.9*
- - *D37.78*
- - Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q41.9*
- - Gros
- - - *C18.9*

Intestin *–suite*
- SAI ¬ *–suite*
- - Gros *–suite*
- - - *D12.6*
- - Obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l' *Q41*
- Sans précision ¬
- - Maladie de l' *K63.9*
- - Malformation congénitale de l' *Q43.9*
- - Trouble
- - - Fonctionnel de l' *K59.9*
- - - Vasculaire de l' *K55.9*
- Siège non précisé
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.83*
- - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.82*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.93*
- - - - Diverticulose de l' *K57.91*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.92*
- - - - Diverticulose de l' *K57.90*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- ¬
- - *Z94.88*
- - Abcès de l' *K63.0*
- - Abcès tuberculeux de l' *A18.3†, K93.0**
- - Atrésies multiples de l' *Q43.8*
- - Diverticule congénital de l' *Q43.8*
- - Endométriose de l' *N80.5*
- - Étranglement
- - - Côlon ou de l' *K56.2*
- - - Ischémique de l' *K55.1*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur de l' *Z12.1*
- - Fistule de l' *K63.2*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- - Invagination de: *K56.1*
- - Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros *S36.59*
- - Maladie
- - - Crohn
- - - - Entérite régionale] du: gros *K50.1*
- - - - Gros *K50.1*
- - - - Intestin grêle et du gros *K50.82*
- - - Diverticulaire de l' *K57.90*
- - - Inflammatoire néonatale de la peau et de l' *D84.9*
- - Maladies précisées de l' *K63.8*
- - Malformation congénitale
- - - Fixation de l' *Q43.3*
- - - Précisées de l' *Q43.8*

Intestin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - MICI [maladie inflammatoire chronique de l' *K52.9*
- - Mycose de l' *B49†, K93.8**
- - Obstructions de l' *K56.4*
- - Occlusion du côlon ou de l' *K56.6*
- - Paralysie: *K56.0*
- - Polype malin de l' *C26.0*
- - Rejet de greffe d' *T86.88*
- - Rétrécissement du côlon ou de l' *K56.6*
- - Sténose du côlon ou de l' *K56.6*
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, K93.8**
- - TBC [Tuberculose] de l' *A18.3†, K93.0**
- - Torsion du côlon ou de l' *K56.2*
- - Transposition de: *Q43.8*
- - Troubles
- - - Fonctionnels précisés de l' *K59.8*
- - - Vasculaires
- - - - *K55.8*
- - - - Aigus de l' *K55.0*
- - - - Chroniques de l' *K55.1*
- - Ulcère
- - - *K63.3*
- - - Tuberculeux de l' *A18.3†, K93.0**

Intestinal
v./v.a. Oculo-gastro-intestinal
v./v.a. Type de maladie

Intestino-génitales chez la femme ¬ Autres fistules *N82.4*

Intolérance
- Alcool ¬ *E88.8*
- Alimentaire
- - Non classées ailleurs ¬ Autres réactions d' *T78.1*
- - ¬ Choc anaphylactique dû à une *T78.0*
- Amidon ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Congénitale
- - Glucose-galactose ¬ *E74.3*
- - Saccharose-isomaltose ¬ *E74.3*
- Effort
- - Type suédois ¬ Myopathie avec *G71.3*
- - ¬ Myopathie mitochondriale autosomique dominante avec *G71.3*
- Fructose
- - Héréditaire ¬ *E74.1*
- - ¬ *E74.1*
- Galactose ¬ *E74.2*
- Glucides ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Gluten ¬ *K90.0*
- Héréditaire au fructose ¬ *E74.1*
- Lactose
- - Sans précision ¬ *E73.9*
- - ¬ Autres *E73.8*
- Lentilles de contact ¬ *H18.8*
- Lipides ¬ Malabsorption due à une *K90.4*

Intolérance *–suite*
- Non classée ailleurs ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Olfactive ¬ *R44.8*
- Orthostatique par déficit en NET ¬ *I95.1*
- Protéines dibasiques avec lysinurie] ¬ LPI [*E72.0*
- Protides ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Saccharose ¬ *E74.3*
- Sérum ¬ *T88.1*
- Sucrose ¬ *E74.3*
- Vaccins ¬ *T88.1*

Intoxication
- 5-fluorouracile ¬ *T45.1*
- Acide valproïque ¬ *T42.6*
- Agent
- - Bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ *T44.8*
- - Diagnostic ¬ *T50.8*
- - Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ *T44.3*
- - Principalement
- - - Alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ *T44.4*
- - - Bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ *T44.5*
- Aiguë
- - Fruit d'akée ¬ *T62.2*
- - Médicaments avec effet stabilisant de membrane ¬ *T50.9*
- - Narcotiques ¬ *F19.0*
- Alcoolique ¬ Séquelles d' *T97*
- Alimentaire
- - Bacillus cereus ¬ *A05.4*
- - Clostridium botulinum ¬ *A05.1*
- - Clostridium perfringens [Clostridium welchii] ¬ *A05.2*
- - Staphylocoques ¬ *A05.0*
- - Vibrio parahaemolyticus ¬ *A05.3*
- Alpha-bloquants, non classés ailleurs ¬ *T44.6*
- Aminosides ¬ *T36.5*
- Analeptiques et antagonistes des opiacés ¬ *T50.7*
- Analgésique non opioïde
- - Antipyrétique
- - - Antirhumatismal, sans précision ¬ *T39.9*
- - - Non classés ailleurs ¬ *T39.8*
- - ¬ *T39.9*
- Androgènes et autres anabolisants ¬ *T38.7*
- Anesthésique
- - Gazeux ¬ *T41.0*
- - Généraux, autres et sans précision ¬ *T41.2*
- - Inhalés ¬ *T41.0*
- - Intraveineux ¬
- - - *T41.1*
- - - *T41.1*

Intoxication *–suite*
- Anesthésique *–suite*
- - Local ¬ *T41.3*
- - Locaux ¬ *T41.3*
- - Sans précision ¬ *T41.4*
- Anorexigènes ¬ *T50.5*
- Antagoniste
- - Anticoagulants, vitamine K et autres coagulants ¬ *T45.7*
- - Hormonaux, autres et sans précision ¬ *T38.9*
- Anthelminthiques ¬ *T37.4*
- Antiacides et antisécrétoires gastriques ¬ *T47.1*
- Antiarythmisants, non classés ailleurs ¬ *T46.2*
- Antiasthmatiques, non classés ailleurs ¬ *T48.6*
- Antibiotique
- - Antifongiques administrés par voie générale ¬ *T36.7*
- - Systémique, sans précision ¬ *T36.9*
- - Systémiques ¬ *T36.8*
- Anticholinestérasiques ¬ *T44.0*
- Anticoagulants ¬ *T45.5*
- Antidépresseurs
- - Inhibiteurs de la monoamine-oxydase ¬ *T43.1*
- - Non précisés ¬ *T43.2*
- - Tricycliques
- - - Tétracycliques ¬ *T43.0*
- - - ¬ *T43.0*
- Antidiarrhéiques ¬ *T47.6*
- Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs ¬ *T50.6*
- Anti-épileptiques
- - Association, non classés ailleurs ¬ *T42.5*
- - Sédatif hypnotiques
- - - Sans précision ¬ *T42.7*
- - - ¬ *T42.6*
- Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ *T38.6*
- Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants ¬ *T46.6*
- Antihypertenseurs, non classés ailleurs ¬ *T46.5*
- Anti-infectieux antiparasitaire systémiques
- - Précisés ¬ *T37.8*
- - Sans précision ¬ *T37.9*
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] ¬ *T39.3*
- Antimycobactériens ¬ *T37.1*
- Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang ¬ *T37.2*
- Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire ¬ *T42.8*
- Antiprotozoaires ¬ *T37.3*
- Antiprurigineux ¬ *T49.1*

Intoxication *–suite*
- Antirhumatismaux, non classés ailleurs ¬ *T39.4*
- Anti-thyroïdiens ¬ *T38.2*
- Antitussifs ¬ *T48.3*
- Antiviraux ¬ *T37.5*
- Astringents et détergents locaux ¬ *T49.2*
- Bactériennes d'origine alimentaire précisées ¬ Autres *A05.8*
- Barbituriques ¬
- - *T42.3*
- - *T42.3*
- Benzodiazépines ¬
- - *T42.4*
- - *T42.4*
- Bêta-bloquants, non classés ailleurs ¬ *T44.7*
- Biocides ¬ *T60.9*
- Cannabis
- - Dérivés) ¬ *T40.7*
- - ¬ *T40.7*
- Carbamazépine ¬ *T42.1*
- Céphalosporines et autres bêtalactamines ¬ *T36.1*
- Chlorate ¬ *T60.3*
- Chlorofluorocarbures ¬ *T53.5*
- Cocaïne ¬ *T40.5*
- Colchicine ¬ *T50.4*
- Colle ¬ *T65.8*
- Colorants ¬ *T65.6*
- Contraceptifs oraux ¬ *T38.4*
- Cuivre ¬ *T56.4*
- Cyanure ¬
- - *T65.0*
- - Parkinsonisme-dystonie par *G21.2*
- Dérivé
- - 4-aminophénol ¬ *T39.1*
- - Cannabis ¬ *T40.7*
- - Hydantoïne ¬
- - - *T42.0*
- - - *T42.0*
- - Pyrazolés ¬ *T39.2*
- Digitaliques ¬ *T46.0*
- Dioxyde carbone ¬
- - *T41.5*
- - Démence au cours d' *T58†, F02.8**
- Diurétiques de l'anse ¬ *T50.1*
- Emétiques ¬ *T47.7*
- Emollients, calmants et protecteurs ¬ *T49.3*
- Engrais ¬ *T65.8*
- Enzymes, non classées ailleurs ¬ *T45.3*
- Expectorants ¬ *T48.4*
- Fentanyl ¬ *T40.2*
- Fer et ses composés ¬ *T45.4*
- Ganglioplégiques, non classés ailleurs ¬ *T44.2*
- Gaz thérapeutiques ¬
- - *T41.5*

Intoxication *–suite*
- Gaz thérapeutiques ¬ *–suite*
- - *T41.5*
- Glucocorticoïdes et analogues synthétiques ¬ *T38.0*
- Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire ¬ *T46.0*
- Groupe du chloramphénicol ¬ *T36.2*
- Héroïne ¬ *T40.1*
- Hormone
- - Substituts synthétiques, autres et sans précision ¬ *T38.8*
- - Thyroïdiennes et leurs dérivés ¬ *T38.1*
- Iminostilbènes ¬
- - *T42.1*
- - *T42.1*
- Inhibiteur
- - Anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ *T50.2*
- - Calciques ¬ *T46.1*
- - Enzyme de conversion ¬ *T46.4*
- - Récepteurs histaminiques H2 ¬ *T47.0*
- Insecticide ¬ *T60.2*
- Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] ¬ *T38.3*
- Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ¬ *T49.4*
- Laxatifs
- - Salins et osmotiques ¬ *T47.3*
- - Stimulants ¬ *T47.2*
- - ¬ *T47.4*
- Létrozole ¬ *T50.9*
- Lithium ¬ *T43.8*
- LSD [diéthylamide de l'acide lysergique] ¬ *T40.8*
- Lysergide
- - LSD] ¬ *T40.8*
- - ¬ *T40.8*
- Macrolides ¬ *T36.3*
- Médicament
- - Agissant
- - - Essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision ¬ *T44.9*
- - - Sur
- - - - Fibrinolyse ¬ *T45.6*
- - - - Métabolisme de l'acide urique ¬ *T50.4*
- - Antiallergiques et antiémétiques ¬ *T45.0*
- - Antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ *T49.0*
- - Antitumoraux et immunosuppresseurs ¬ *T45.1*
- - Contre le coryza [rhume banal] ¬ *T48.5*
- - Dentaires à usage topique ¬ *T49.7*
- - Facilitant la digestion ¬ *T47.5*
- - Préparation
- - - Ophtalmologiques ¬ *T49.5*

Intoxication *–suite*
- Médicament *–suite*
- - Préparation *–suite*
- - - Utilisés en oto-rhino-laryngologie ¬ *T49.6*
- - Psychotrope
- - - Non classés ailleurs ¬ *T43.8*
- - - Sans précision ¬ *T43.9*
- - Substance biologique
- - - Sans précision ¬ *T50.9*
- - - ¬ Séquelles d' *T96*
- Médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né ¬ Réactions et *P93*
- Mercure ¬ *T56.1*
- Mescaline ¬ *T40.9*
- Métaux lourds ¬ *T56.9*
- Méthadone ¬ *T40.3*
- Méthanol ¬
- - *T51.1*
- - *T51.1*
- Méthaqualone ¬ *T42.6*
- Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes ¬ *T50.0*
- Monoxyde carbone ¬
- - Encéphalopathie différée par *T58†, G94.39**
- - Séquelles d' *T97*
- Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires] ¬ *T48.1*
- Narcotiques
- - Sans précision ¬ *T40.6*
- - Synthétiques ¬ *T40.4*
- Neuroleptiques
- - Type butyrophénone et thioxanthène ¬ *T43.4*
- - ¬ *T43.5*
- Nitrile ¬ *T65.0*
- Nucléides transuraniens de métaux lourds ¬ *T66*
- Ocytociques ¬ *T48.0*
- Œstrogènes et progestatifs ¬ *T38.5*
- Opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et *P04.0*
- Opioïdes ¬ *T40.2*
- Opium ¬ *T40.0*
- Oxazolidine ¬ *T42.2*
- Oxygène ¬ *T41.5*
- Paracétamol ¬ *T39.1*
- Paraquat ¬ *T60.3*
- Parasympathomimétiques [cholinergiques] ¬ *T44.1*
- Peinture ¬ *T65.6*
- Pénicillines ¬ *T36.0*
- Pesticide ¬ *T60.9*
- Plantes vénéneuses ¬ *T62.2*
- Plomb ¬ *T56.0*
- Poisson
- - Coquillages ¬ Autres *T61.2*

Intoxication *–suite*
- Poisson *–suite*
- - Scombridés ¬ *T61.1*
- Produit
- - Agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique ¬ *T50.3*
- - Protection du bois ¬ *T60.9*
- Psilocine ¬ *T40.9*
- Psilocybine ¬ *T40.9*
- Psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et sans précision ¬ *T40.9*
- Psycholeptiques neuroleptiques
- - Dérivés de la phénothiazine ¬ *T43.3*
- - Non précisés ¬ *T43.5*
- Psychostimulants présentant un risque d'abus ¬ *T43.6*
- Ricine ¬ *T62.2*
- Rifamycines ¬ *T36.6*
- SAI ¬ *T65.9*
- Salicylés ¬ *T39.0*
- Savon ¬ *T55*
- Sérique ¬ *T80.6*
- Somnifères
- - Intention suicidaire ¬ *T42.7*
- - ¬ *T42.7*
- Substance
- - Agissant essentiellement sur
- - - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ *T48.7*
- - - Muscles, autres et sans précision ¬ *T48.2*
- - - Système cardio-vasculaire, autres et sans précision ¬ *T46.9*
- - - Tractus gastro-intestinal
- - - - Sans précision ¬ *T47.9*
- - - - ¬ *T47.8*
- - Antivariqueuses, y compris les agents sclérosants ¬ *T46.8*
- - Essentiellement
- - - Systémique et hématologique, sans précision ¬ *T45.9*
- - - Systémiques et hématologiques ¬ *T45.8*
- Succinimide
- - Oxazolidine-diones ¬ *T42.2*
- - ¬ *T42.2*
- Sulfamides ¬ *T37.0*
- Systémique au monochloroacétate ¬ *T60.3*
- Tétracyclines ¬ *T36.4*
- Thiobarbituriques ¬ *T41.1*
- Topique
- - Sans précision ¬ *T49.9*
- - ¬ *T49.8*
- Tranquillisants ¬ *T43.5*
- Vaccin ¬ *T50.9*
- Vasodilatateur
- - Coronariens, non classés ailleurs ¬ *T46.3*
- - Périphériques ¬ *T46.7*
- Vitamines, non classées ailleurs ¬ *T45.2*

Intoxication *–suite*
- Zinc ¬ *T56.5*
- ¬ Mise en observation pour suspicion de: *Z03.6*

Intra-abdominal
v./v.a. Organe intra-abdominal
- Actes médicaux ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K46.0*
- Gangrène ¬ Hernie *K46.1*
- Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K46.0*
- Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K46.0*
- Non précisé ¬ Lésion traumatique d'un organe *S36.9*
- Organe(s) pelvien(s) ¬ Lésion traumatique d'organe(s) *S39.6*
- Organes intrathoraciques et pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et *T06.5*
- Pelviennes ¬ Tuméfaction et masse *R19.0*
- Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K46.0*
- SAI ¬ Tuméfaction diffuse ou généralisée: *R19.0*
- ¬
  - Hernie *K46.9*
  - Métastase des ganglions lymphatiques *C77.2*
  - Plaie ouverte
    - Communicant avec une fracture, une luxation ou plaie *S31*
    - Toute partie de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin) associée à une lésion *S31.83!*
  - Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques *C77.2*

Intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs ¬ Infection *P39.2*

Intra-articulaire
- Genou ¬
  - Corps
    - Étranger riziforme *M23.4*
    - Libre *M23.4*
  - Souris *M23.4*
- Récidivante du genou ¬ Lésion *M23.99*
- ¬
  - Fracture *S52.59*
  - Souris *M24.0*

Intracanalaire
- Papillaire mucineux pancréas ¬
  - Carcinome *C25.3*
  - TIPMP [Carcinome *C25.3*
- Prostate [IDC-P] ¬ Carcinome *C61*
- Tubulopapillaire
  - Canal pancréatique ¬ Carcinome *C25.3*
  - Pancréas] ¬ ITPN [Carcinome *C25.3*
- ¬ Carcinome in situ *D05.1*

Intracanaliculaire à cellules géantes ¬ Fibroadénome *D24*

Intracapsulaire du col du fémur ¬ Fracture *S72.01*

Intracardiaque
- Non classée ailleurs ¬ Thrombose *I51.3*
- ¬ Anomalies (de): épreuves électrophysiologiques *R94.3*

Intracellulare ¬
- Infection à Mycobacterium *A31.0*
- Maladie due au VIH avec infection à Mycobacterium avium *B20, A31.0*

Intracérébelleuse ¬ Hémorragie *S06.34*

Intracérébral
v./v.a. Hémorragie intracérébrale
- Superficielle ¬ Hémorragie (du): *I61.1*
- ¬ Hématome *S06.33*

Intracorporelle ¬
- Adaptation d'une pompe *Z45.02*
- Pompe
  - *Z45.02*
  - *Z95.80*

Intracrânien
v./v.a. Type de maladie

Intraépithéliale
- Bas degré de la prostate [PIN] ¬ Néoplasie *N40*
- Col de l'utérus NIC stade
  - I ¬ Néoplasie *N87.0*
  - II ¬ Néoplasie *N87.1*
  - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ néoplasie *D06*
- Cornée avec hyperkératose palmoplantaire et dyskératose laryngée ¬ Syndrome de dyskératose *Q82.8*
- Haut grade de la prostate [NIP de haut grade] ¬ Néoplasie *D07.5*
- Vagin NIVA stade
  - I ¬ Néoplasie *N89.0*
  - II ¬ Néoplasie *N89.1*
  - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie *D07.2*
- Vulve
  - NIV stade
    - I ¬ Néoplasie *N90.0*
    - II ¬ Néoplasie *N90.1*
    - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie *D07.1*
  - Stade III avec dysplasie sévère ¬ Néoplasie *D07.1*
  - VIN] ¬ Néoplasie *N90.3*

Intragénique
- NF1 ¬ Neurofibromatose type 1 par mutation ou délétion *Q85.0*
- ¬ Syndrome FOXG1 dû à une altération *Q93.5*

Intrahépatique
- Acquis ¬ Shunt vasculaire *K76.8*
- Congénitale ¬ Fistule artérioportale *Q26.6*
- Cours de la grossesse ¬ Cholestase (*O26.60*
- Familiale ¬ Cholestase *K71.0*
- Gestationnelle récidivante ¬ Cholestase *O26.60*

Intrahépatique *–suite*
- Néonatale par déficit en citrine ¬ Cholestase *E72.2*
- Progressive familiale ¬ Cholestase *K74.5*
- Récurrente bénigne] ¬ BRIC [Cholestase *K71.0*
- Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Cholélithiase *K80.5*
- Voie transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un shunt porto-systémique *Z95.88*
- ¬
  - Adénocarcinome du foie et des voies biliaires *C22.0, C22.1*
  - Carcinome du foie et des voies biliaires *C22.0, C22.1*
  - Carcinome épidermoïde du foie et des voies biliaires *C22.0, C22.1*
  - Carcinome indifférencié du foie et des voies biliaires *C22.9, C22.1*
  - Cholangiolite *K83.09*
  - Cystadénome des voies biliaires *D13.4*
  - Tumeur de Klatskin avec atteinte des voies biliaires *C24.8*
  - Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires *C78.7*
  - Vésicule biliaire *Q44.1*
  - Voies biliaires *D13.4*

Intraligamentaire ¬ Grossesse: *O00.8*

Intralobaire ¬ Séquestration pulmonaire congénitale *Q33.2*

Intralymphatique primaire ¬ Angioendothéliome *C49.9*

Intramédullaire non-dysraphique ¬ Lipome spinal *D17.7*

Intramural
- Utérus ¬ Léiomyome *D25.1*
- ¬
  - Coronaire *Q24.5*
  - Cystite *N30.88*

Intramyocardique ¬ Coronaire *Q24.5*

Intraneural ¬ Périneuriome *D36.1*

Intranucléaires neuronales ¬ Maladie des inclusions *G31.88*

Intraoculaire
- Corps étranger
  - Magnétique ¬ Rétention (ancienne) *H44.6*
  - Non magnétique ¬ Rétention (ancienne) *H44.7*
- Cristallin ¬ Présence d'implants *Z96.1*
- Due à un glaucome résiduel ¬ Augmentation modérée de la pression *H40.18*
- Primaire ¬ Lymphome *C85.7*
- ¬
  - Complication mécanique d'une lentille *T85.2*
  - Glaucome sans augmentation de la pression *H40.18*
  - Lacération
    - Oculaire sans protrusion ou perte de tissu *S05.3*

Intraoculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lacération *–suite*
- - - Rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu *S05.2*
- - Médulloépithéliome *C69.9*

Intraosseux ¬ Hémangiome *D18.08*

Intrapelviens ¬ Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques *C77.5*

Intrapéritonéale ¬ *S37.22*

Intrapulmonaire (congénital) ¬ Tissu ectopique *Q33.5*

Intrarachidien
- Cours d'affections classées ailleurs ¬ Abcès et granulome intracrâniens et *G07**
- Épidural ¬ Abcès ou granulome *G06.1*
- Extra-dural ¬ Abcès ou granulome *G06.1*
- Origine non pyogène ¬ Phlébite et thrombophlébite *G95.18*
- Sous-dural ¬ Abcès ou granulome *G06.1*
- ¬
- - Abcès et granulome *G06.1*
- - Embolie septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - Endophlébite septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - Phlébite
- - - Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - - Thrombophlébite intracrâniennes et *G08*
- - Thrombophlébite septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - Thrombose septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*

Intrarénal ¬ Calcul: *N20.0*

Intrarétiniennes myélinisées ¬ Fibres nerveuses *H47.0*

Intrasphinctérien ¬ Abcès *K61.4*

Intraspinal syphilitique ¬ Granulome *A52.1†, G07**

Intrathoracique
v./v.a. Organe intrathoracique
- Anomalies vertébrales ¬ Syndrome de brachy-œsophage congénital-estomac *Q87.8*
- Confirmation bactériologique histologique ¬
- - Primo-infection tuberculeuse des ganglions *A15.7*
- - Tuberculose des ganglions *A15.4*
- Non précisé ¬ Lésion traumatique d'un organe *S27.9*
- Précisées ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Autres organes et structures *S27.88*
- Précisés
- - Canal thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.82*
- - Diaphragme ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.81*

Intrathoracique *–suite*
- Précisés *–suite*
- - Œsophage, partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.83*
- - Organes et structures intrathoraciques précisées ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.88*
- - Thymus ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.84*
- - ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.8*
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A16.3*
- - ¬ *C76.1*
- Sans précision ¬ Tumeur bénigne: Organe *D15.9*
- Syphilitique ¬ Anévrisme *A52.0†, I79.0**
- ¬
- - Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et *Z80.2*
- - Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et *Z85.2*
- - Métastase des ganglions lymphatiques *C77.1*
- - Plaie ouverte
- - - Associée à une fracture ou une luxation ou avec une lésion *S21*
- - - N'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion *S21.83!*
- - Primo-infection tuberculeuse des ganglions *A16.7*
- - Tuberculose des ganglions *A16.3*
- - Tumeur maligne
- - - Ganglions lymphatiques *C77.1*
- - - Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et *C39.8*

Intravasculaire
- Disséminée
- - Fœtus et le nouveau-né ¬ Coagulation *P60*
- - ¬
- - - Coagulation *D65.1*
- - - Glomérulonéphrite au cours de coagulation *D65.1†, N08.2**
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: coagulation *O45.0*
- - - Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à: coagulation *O46.0*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à: coagulation *O67.0*
- - - Maladie glomérulaire au cours de coagulation *D65.1†, N08.2**
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Coagulation *O08.1*
- ¬ Léiomyomatose *D48.1*

Intraveineux ¬ Intoxication anesthésique
- *T41.1*
- *T41.1*

Intraventriculaire
v./v.a. Hémorragie intraventriculaire
- Degré
- - 2, du nouveau-né ¬ Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement *P52.1*
- - 3, du nouveau-né ¬ Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement *P52.2*
- ¬
- - Hémorragie intracérébrale *I61.5*
- - Hémorragie sous-épendymaire (sans envahissement *P52.0*

Intrinsèque
- Allergique) ¬ Eczéma (de): *L20.8*
- Dents SAI ¬ Pigmentation *K00.8*
- Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S66.5*
- Larynx ¬ Musculature *C32.0*
- Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon *S96.2*
- Origine extrinsèque ¬ Asthme bronchique *J45.89*
- Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S66.4*
- ¬
- - Anémie héréditaire juvénile mégaloblastique due à une carence en facteur *D51.0*
- - Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en facteur *D51.0*
- - Asthme *J45.19*
- - Carence congénitale en facteur *D51.0*

Intubation
- Cours
- - Grossesse ¬ Échec ou difficulté d' *O29.6*
- - Puerpéralité ¬ Échec ou difficulté d' *O89.6*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Échec ou difficulté d' *O74.7*
- ¬ Échec ou difficulté d' *T88.4*

Inv
- 3)(q21q26.2) ¬ Leucémie myéloïde aiguë associée à *C92.00*
- 16) ou t(16;16) ¬ LMA M4 Eo avec *C92.5*

Invagination
- Appendice ¬ *K38.8*
- Basilaire primitive ¬ *Q75.8*
- Côlon ¬ *K56.1*
- Intestin ¬ *K56.1*
- Mamelon associée à l'accouchement ¬ *O92.0*
- Rectum ¬ *K56.1*
- ¬ *K56.1*

Invaginée ¬ Dent: *K00.2*

Invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l' *Z82*

Invasif
- Déficit en CARD9 ¬ Prédisposition aux infections fongiques *D84.8*
- Enterococcus faecalis avec résistance à la vancomycine ¬ Infection *A49.13, U80.20!*
- Enterococcus faecium avec résistance à la vancomycine ¬ Infection *A49.13, U80.30!*
- Pneumonie ¬ Aspergillose *B44.0†, J17.2**
- Poumon ¬ Aspergillose *B44.0†, J99.8**
- Récepteurs hormonaux positifs ¬ Carcinome mammaire *C50.9*
- Scopulariopsis ¬ Infection *B48.7*
- Sein ¬ Comédocarcinome non *D05.1*
- ¬
- - Fibrome *D48.1*
- - Môle
- - - *D39.2*
- - - Hydatiforme *D39.2*
- - Salmonellose non typhique *A02.8*

Inversa modéré à sévère ¬ Psoriasis *L40.8, L40.70!*

Inversé
- 8p ¬ Syndrome de duplication/délétion *Q92.5*
- Récessive ¬ Epidermolyse bulleuse dystrophique *Q81.2*
- ¬
- - Acné *L73.2*
- - Épidermolyse bulleuse jonctionnelle *Q81.8*

Inverse ¬ Syndrome de Klippel-Trénaunay *Q87.2*

Inversion
- 11p15 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une *Q87.3*
- Chromosomique chez un sujet normal ¬ *Q95.1*
- Congénitale des mamelons ¬ *Q83.88*
- Post-partum de l'utérus ¬ *O71.2*
- Psychogène rythme
- - Circadien ¬ *F51.2*
- - Nycthéméral ¬ *F51.2*
- - Sommeil ¬ *F51.2*
- Rapport albumine-globuline ¬ *E88.08*
- Totale viscères ¬ Transposition
- - Cœur avec *Q89.3*
- - Estomac avec *Q89.3*
- Utérus ¬ *N85.5*
- Ventriculaire ¬ *Q20.5*

Inversus
v./v.a. Situs inversus
- ¬
- - BPES [Syndrome de blépharophimosis-ptosis-épicanthus *Q10.3*
- - Syndrome de blépharophimosis-ptosis-épicanthus *Q10.3*

Investigation
- Anormaux, autres et non précisés ¬ Mouvements *R25.8*
- Complète par un centre pour maladies rares ¬ Maladie rare sans diagnostic déterminé après *R69*
- Mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien découvert par ECG ou autre moyen d' *I25.2*
- Traitement ¬ Autre période d'attente pour *Z75.2*

Involution ¬ État paranoïaque d' *F22.8*

Iode
- SAI ¬ Hypothyroïdie par carence acquise en *E01.8*
- Sans précision ¬ Goitre (endémique) lié à une carence en *E01.2*
- ¬
- - Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en *E01.8*
- - Démence au cours d'hypothyroïdie acquise due à une carence en *E01.8†, F02.8**
- - Goitre
- - - Diffus (endémique) lié à une carence en *E01.0*
- - - Multinodulaire (endémique) lié à une carence en *E01.1*
- - - Nodulaire lié à une carence en *E01.1*
- - Hypothyroïdie
- - - Insuffisance congénitale en *E00.9*
- - - Transitoire du nouveau-né due à une augmentation de l'apport en *P72.2*
- - Inflammation des glandes salivaires au cours d'une réaction à des dépôts d' *K11.2*

Ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie-retard de croissance-sensibilité aux radiations *D81.1*

IPAH]] ¬ Hypertension artérielle pulmonaire idiopathique [*I27.00*

Iperchilomicronemia familiare ¬ *E78.3*

Irapa ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

IRF1 ¬ Sévère prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en *D84.8*

IRF2BP2 ¬ Déficit immunitaire commun variable par déficit en *D83.0*

IRF2BPL ¬ Syndrome de régression neurodéveloppementale-dystonie-épilepsie lié à *G31.88*

IRF7 [Interferon regulatory factor-7] ¬ Déficit en *D84.8*

Irido-cornéo-endothélial ¬ Syndrome *H21.8*

Iridocyclite
- Aiguë et subaiguë ¬ *H20.0*
- Chronique ¬
- - *H20.1*
- - Cataracte (au cours de): *H26.2*
- Cours
- - Herpès zoster ¬ *B02.3†, H22.0**
- - Maladie

Iridocyclite *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, H22.0**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, H22.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H22.1**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H22.0**
- - Spondylarthrite
- - - Ankylosante ¬ *M45.09†, H22.1**
- - - Axiale ¬ *M45.09†, H22.1**
- - Spondylite ankylosante ¬ *M45.09†, H22.1**
- Due
- - Lentilles de contact ¬ *H20.2*
- - Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H22.0**
- Gonocoques ¬ *A54.3†, H22.0**
- Sans précision ¬ *H20.9*
- Sarcoïdose ¬ *D86.8†, H22.1**
- Syphilitique
- - Congénitale tardive ¬ *A50.3†, H22.0**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, H22.0**
- - ¬ *A51.4†, H22.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H22.0**
- ¬ Autres *H20.8*

Iridodialyse ¬ *H21.5*

Iridoschisis ¬ *H21.2*

Iris
- Antérieures ¬ Synéchies (*H21.5*
- Bombé ¬ *H21.4*
- Cataracte congénitale
- - Amincissement stromal] ¬ Syndrome EDICT [dystrophie endothéliale-hypoplasie de l' *Q13.8*
- - ¬ Syndrome familial de dystrophie rétinienne progressive-colobome d' *Q15.8*
- Corps ciliaire
- - Chambre antérieure œil
- - - Exsudatif ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - Implant ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - Parasitaire ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - SAI ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de l' *H22.8**
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H21.9*
- - ¬
- - - Adhérences et perturbations de l' *H21.5*
- - - Affections
- - - - Dégénératives de l' *H21.2*
- - - - Précisées de l' *H21.8*
- - - - Vasculaires de l' *H21.1*
- - - Néovascularisation de l' *H21.1*
- Due à la diphtérie ¬ Paralysie de l' *A36.8†, H22.8**
- Essentielle) (progressive) ¬ Atrophie de l' *H21.2*
- Microphtalmie-microcornée ¬ Syndrome d'aphakie congénitale-hypoplasie de l' *Q13.8*

Iris *–suite*
- Pigmentaire) ¬ Dégénérescence de: *H21.2*
- Postérieures ¬ Synéchies (*H21.5*
- SAI ¬
- - Malformation congénitale de l' *Q13.2*
- - Synéchies (*H21.5*
- ¬
- - Absence congénitale d' *Q13.1*
- - Anomalie congénitale de l' *Q13.2*
- - Colobome de l' *Q13.0*
- - Érythème de l' *L51.1†, H22.8**
- - Gomme de l' *A52.7†, H22.8**
- - Malformations congénitales de l' *Q13.2*
- - Médulloépithéliome de l' *C69.4*
- - Rétention ancienne corps étranger
- - - Magnétique dans: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: *H44.7*
- - Rubéose de l' *H21.1*
- - Syphilis secondaire de l' *A51.4†, H22.0**
- - Translucidité de l' *H21.2*
- - Tuberculose de l' *A18.5†, H22.0**

Irite
- Diabétique ¬ *E14.30†, H22.1**
- Gonocoques ¬ *A54.3†, H22.0**
- Goutteuse ¬ *M10.99†, H22.1**
- Syphilitique
- - Congénitale
- - - Précoce ¬ *A50.0†, H22.0**
- - - Tardive ¬ *A50.3†, H22.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, H22.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H22.0**

Iritis
- Aiguë, subaiguë ou à répétition ¬ *H20.0*
- Due au virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H22.0**
- Papulosa ¬ *A52.7†, H22.0**
- Syphilitique secondaire ¬ *A51.4†, H22.0**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H22.0**

Irons-Bhan ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Ironton
v./v.a. Houlston-Ironton-Temple

Irradiation
- Ionisante ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Isotopes ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Rayons X ¬
- - Exposition à : *W91.9!*
- - Syndrome myélodysplasique dû à *D46.9*
- Sans précision ¬ Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une *L59.9*
- ¬
- - Affections
- - - Précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une *L59.8*
- - - Pulmonaires chroniques et autres dues à une *J70.1*
- - Antécédents personnels d' *Z92.3*
- - Cyphose après *M96.2*
- - Cystite due à une *N30.4*

Irradiation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Gastroentérite et colite dues à une *K52.0*
- - Hypopituitarisme après *E89.3*
- - Hypothyroïdie après: *E89.0*
- - Leucémie secondaire due à l' *C95.90*
- - Œsophagite due à une *K20.1*
- - Ostéonécrose de la mâchoire due à l' *K10.28*
- - Phénomène de rappel d' *T78.8*
- - Pneumopathie par *J70.0*
- - Polynévrite due à une *G62.8*
- - Rectite due à une *K62.7*
- - Scoliose après *M96.5*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une *O35.6*

Irradié ¬ Émail *K03.8*

Irréductible
- Sans gangrène ¬
- - Hernie
- - - Interstitielle *K46.0*
- - - Intestinale *K46.0*
- - - Intra-abdominale *K46.0*
- - Hernie crurale (unilatérale): *K41.3*
- - Hernie diaphragmatique: *K44.0*
- - Hernie inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - Hernie ombilicale: *K42.0*
- ¬
- - Douleur chronique *R52.1*
- - Hernie incisionnelle *K43.0*
- - Hernie parastomale *K43.3*

Irrégularité
- Crête alvéolaire ¬ *K08.8*
- Menstruel
- - Précisées ¬ Autres *N92.5*
- - Sans précision ¬ *N92.6*
- Rythme
- - Cardiaque fœtale ¬ *O68.0*
- - Veille-sommeil ¬ *G47.2*

Irrégulier
- Ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée *E88.21*
- Règles ¬ Intervalles raccourcis et *N92.1*
- SAI ¬
- - Règles *N92.6*
- - Saignements *N92.6*
- ¬
- - Dentine secondaire ou *K04.3*
- - Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel *N92.1*
- - Saignements intermenstruels *N92.1*
- - Travail *O62.2*

Irréversible
- Fonction cérébrale ¬ Perte *G93.88*

Irréversible *–suite*
- ¬ Pulpite *K04.0*

Irritabilité
- Cérébrale du nouveau-né ¬ *P91.3*
- Colère ¬ *R45.4*

Irritable
- Constipation prédominante [SII-C] ¬ Syndrome de l'intestin *K58.2*
- Diarrhée prédominante [SII-D] ¬ Syndrome de l'intestin *K58.1*
- Explosive) ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.30*
- Troubles du transit changeants (mixtes) [SII-M] ¬ Syndrome de l'intestin *K58.3*
- ¬
- - Côlon *K58*
- - Formes psychogènes de: «côlon *F45.3*
- - Hanche *M65.8*
- - Nourrisson *R68.1*

Irritable bowel syndrome with mixed bowel habits [IBS-M] ¬ *K58.3*

Irritable bowel syndrome with predominant constipation [IBS-C] ¬ *K58.2*

Irritable bowel syndrome with predominant diarrhoea [IBS-D] ¬ *K58.1*

Irritant
- Contact
- - Cause non précisée ¬ Dermite *L24.9*
- - Due
- - - Agents ¬ Dermite *L24.8*
- - - Aliments en contact avec la peau ¬ Dermite *L24.6*
- - - Cosmétiques ¬ Dermite *L24.3*
- - - Détergents ¬ Dermite *L24.0*
- - - Huiles et aux graisses ¬ Dermite *L24.1*
- - - Médicaments en contact avec la peau ¬ Dermite *L24.4*
- - - Produits chimiques ¬ Dermite *L24.5*
- - - Solvants ¬ Dermite *L24.2*
- - - Végétaux, sauf aliments ¬ Dermite *L24.7*
- - SAI ¬ Eczéma *L24.9*
- - ¬ eczéma *L24*
- Exogène, n.c.a. ¬ Dermite toxique due à un *L24.9*

Irritation
- Crête édentée (due à une prothèse) ¬ Hyperplasie par *K06.2*
- Gastro-intestinale psychogène ¬ *F45.37*
- Nerf périphérique ¬ *G58.9*
- Racine nerveuse lombaire ¬ Syndrome d' *M51.1†, G55.1**
- ¬ Eczéma d' *L30.4*

IRVAN ¬ Syndrome *H35.0*

Isaacs-Mertens ¬ Syndrome d' *G71.1*

Isavuconazole ¬ Aspergillus fumigatus résistant à l' *U83.3!*

Ischémie
- Cérébrale
- - Chronique) ¬ *I67.88*

Ischémie *–suite*
- Cérébrale *–suite*
- - Néonatale ¬ *P91.0*
- - Transitoire SAI ¬ *G45.9*
- Gastrique ¬ *K31.88*
- Infarctus du rein ¬ *N28.0*
- Intestin grêle aigu(ë) ¬ *K55.0*
- Musculaire ¬ *M62.29*
- Myocardique asymptomatique ¬ *I25.6*
- Transitoire du myocarde du nouveau-né ¬ *P29.4*
- Traumatique muscle
- - Cuisse et de la hanche ¬ *T79.61*
- - Jambe ¬ *T79.62*
- - Localisation
- - - Non précisée ¬ *T79.69*
- - - ¬ *T79.68*
- - Membre supérieur ¬ *T79.60*
- - Pied ¬ *T79.63*
- - ¬ *T79.6*

Ischémique
- Aiguë, sans précision ¬ Cardiopathie *I24.9*
- Aiguës ¬ Autres formes de cardiopathies *I24.8*
- Artère intracrânienne durant l'enfance ¬ Infarctus musculaire *I63.5*
- Cadre d'une artériopathie oblitérante ¬ Douleurs *I70.29*
- Cérébral transitoire
- - Régression complète
- - - 1 à 24 heures ¬ Accident *G45.92*
- - - Heure ¬ Accident *G45.93*
- - Sans précision ¬ Accident *G45.9*
- Cérébraux transitoires
- - AIT] ¬ Accidents *G45*
- - Syndromes apparentés ¬ Autres accidents *G45.8*
- Chronique
- - Sans précision ¬ Cardiopathie *I25.9*
- - ¬
- - - Colite *K55.1*
- - - Entérite *K55.1*
- - - Entérocolite *K55.1*
- - - Formes de cardiopathie *I25.8*
- Cœur (chronique) SAI ¬ Maladie *I25.9*
- Effort distance marche 200 m
- - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur *I70.21*
- - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur *I70.22*
- Embolie d'artères cérébrales durant l'enfance ¬ Accident vasculaire cérébral *I63.4*
- Fulminante aigu(ë) ¬ Colite *K55.0*
- Hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ Encéphalopathie anoxo- *P91.6*
- Intestin ¬ Étranglement *K55.1*

Ischémique *–suite*
- Musculaire (non traumatique) ¬ Infarcissement *M62.2*
- Nouveau-né ¬ Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique *P91.6*
- SAI ¬
- - Colite *K55.9*
- - Entérite *K55.9*
- - Entérocolite *K55.9*
- Subaiguë ¬ Colite *K55.0*
- Thrombose d'une artère intracrânienne durant l'enfance ¬ Accident vasculaire cérébral *I63.3*
- Transitoire
- - Territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux ¬ Accident *G45.2*
- - ¬ Surdité *H93.0*
- Volkmann en tant que complication de blessure ¬ Paralysie *T79.60*
- ¬
- - Apoplexie *I63.9*
- - AVC *I63.9*
- - Douleur thoracique *I20.9*
- - Myocardiopathie *I25.5*
- - Neuropathie optique
- - - *H47.0*
- - - Non *H46*
- - Paralysie musculaire *T79.60*
- - Syndrome de Volkmann [rétraction musculaire *T79.60*

Ischiadicus ¬ Zoster *B02.2†, G59.8**

Ischiale ¬ Bursite *M70.7*

Ischialgie due à une atteinte des disques intervertébraux ¬ Lumbago avec *M51.1†, G55.1**

Ischio
- Pubienne [van Neck] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*
- Vertébrale ¬ Dysplasie *Q78.8*

Ischiocapsulaire ¬ Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) *S73.12*

Ischion ¬
- Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: *S32.81*
- Ostéoblastome de l' *D16.8*

Ischio-patellaire ¬ Dysplasie *Q74.1*

Ischiophthisis] ¬ Coxitis tuberculosa [*A18.0†, M01.15**

Ischio-rectal
- Tuberculeux ¬ Abcès *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Abcès
- - - *K61.3*
- - - Fosse *K61.3*
- - Tuberculose *A18.3†, K93.0**

Iselin ¬ Ostéochondrose d' *M92.7*

ISG15 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en *D84.8*

Isidor-Toutain ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Islande ¬ Maladie d' *G93.30*

Isobutyrique ¬ Acidurie *E71.1*

Isobutyryl-CoA déshydrogénase ¬ Déficit en *E71.1*

Isochromosome 21 ¬ *Q99.8*

Isochromosomie
- Yp ¬ *Q99.8*
- Yq ¬ *Q98.6*

Isodicentrique ¬ Syndrome du chromosome 15 *Q99.8*

Iso-immunisation
- ABO
- - Fœtus et du nouveau-né ¬ *P55.1*
- - ¬ *O36.1*
- Anti-Rh ¬ Soins maternels pour *O36.0*
- Néonatale, NCA ¬ *P55.9*
- Rhésus du fœtus et du nouveau-né ¬ *P55.0*
- SAI (avec anasarque fœto-placentaire) ¬ *O36.1*
- ¬
- - Anasarque fœto-placentaire
- - - Due à une *P56.0*
- - - Non associée à une *O36.2*
- - Dépistage prénatal d' *Z36.5*
- - Ictère nucléaire dû à une *P57.0*
- - Soins maternels pour une autre *O36.1*
- - Thrombopénie néonatale due à: *P61.0*

Iso-Kikuchi ¬ Syndrome d' *Q84.6*

Isolé
v./v.a. Type de maladie

Isolement prophylactique ¬ *Z29.0*

Isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l' *Z29.0*

Isoleucinémie ¬ Hyperleucine- *E71.1*

Isomaltase
v./v.a. saccharase-isomaltase

Isomaltose
v./v.a. saccharose-isomaltose
- ¬ Malabsorption d' *E74.3*

Isomérase ¬
- Anémie (due à): déficit en: triose-phosphate *D55.2*
- Anémie hémolytique due à un déficit en phosphoglucose *D55.2*
- Déficit
- - Phosphomannose *E77.8*
- - Ribose-5-phosphate *E74.8*

Isomérisme
- Atrial
- - Droit ¬ *Q20.6*
- - Gauche ¬ *Q20.6*
- Auricule cardiaques
- - Asplénie ou polysplénie ¬ *Q20.6*
- - ¬ *Q20.6*
- Bronchique gauche isolé ¬ *Q32.4*

Isopropylique ¬ Alcool *T51.2*

Isosexuelle précoce chez l'homme ¬ pseudo-puberté *E25*

Isospora

- Belli
- - Isospora hominis ¬ Infection due à *A07.3*
- - ¬
- - - Colite à *A07.3*
- - - Diarrhée à *A07.3*
- - - Dysenterie à *A07.3*
- - - Infection à *A07.3*
- Hominis ¬
- - Colite à *A07.3*
- - Diarrhée à *A07.3*
- - Dysenterie à *A07.3*
- - Infection
- - - *A07.3*
- - - Due à Isospora belli et *A07.3*
- ¬ Maladie due au VIH avec infection à *B20, A07.3*

Isotopes ¬ Exposition à : irradiation par *W91.9!*

Isotrétinoïne

- Like ¬ Syndrome *Q87.8*
- ¬ Embryofœtopathie à l' *Q86.88*

Isotype d'immunoglobuline ¬ Infection récurrente associée à un déficit rare en *D80.8*

Isovalérique ¬ Acidémie: *E71.1*

Isovaléryl-CoA déshydrogénase ¬ Déficit en *E71.1*

ISTA [Sténose de l'isthme de l'aorte] ¬ *Q25.1*

Isthme

- Aorte] ¬ ISTA [Sténose de l' *Q25.1*
- Aortique après le canal ¬ Coarctation de l' *Q25.1*
- Utérus ¬
- - Carcinofibrome de l' *C54.0*
- - Léiomyosarcome de l' *C54.0*
- - Tumeur maligne: *C54.0*
- - Tumeur neuroectodermique primitive de l' *C54.0*

Isthmique atypique ¬ Sténose aortique *Q25.1*

Itch ¬

- Eczéma marginé de Hebra [Jock *B35.6*
- Maladie auto-immune multisystémique syndromique par déficit en *M35.8*

Itinérant ¬ Patient *F68.1*

ITK ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D82.3*

ITM2B [protéine membranaire intégrale 2B] ¬ Amylose *E85.4†, I68.0**

Ito
v./v.a. Golabi-Ito-Hall

- ¬ Nævus d' *D22.6*

ITPA ¬ Trouble neurologique létal infantile avec cataracte et atteinte cardiaque associé à *G40.4*

ITPN [Carcinome intracanalaire tubulopapillaire du pancréas] ¬ *C25.3*

Ivemark ¬ Syndrome d' *Q20.6*

Jabs
v./v.a. Cooper-Jabs

Jaccoud] ¬ Arthropathie chronique post-rhumatismale [*M12.0*

Jackson
- Barr ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬
- - Membrane de *Q43.3*
- - Paralysie de *G83.8*

Jackson-Weiss ¬ Syndrome de *Q87.8*

Jacobi
v./v.a. Petges-Cléjat-Jacobi

Jacobsen ¬ Syndrome de *Q93.5*

Jadassohn
v./v.a. Naegeli-Franceschetti-Jadassohn
- Pellizzari ¬ Anétodermie de *L90.2*

Jaffe-Lichtenstein
- Polyostotique ¬ Syndrome de *Q78.1*
- ¬ Maladie
- - *M85.09*
- - *Q78.1*

JAG1 ¬
- Dysplasie artério-hépatique due à une mutation ponctuelle de *Q44.7*
- Paucité des voies biliaires syndromique due à une mutation ponctuelle de *Q44.7*
- Syndrome d'Alagille-Watsons dû à une mutation ponctuelle de *Q44.7*

Jagel-Holmgren-Hofer ¬ Syndrome de *Q82.8*

JAK1 ¬ Prédisposition mendélien
- Autosomique récessive aux infections mycobactériennes par déficit partiel en *D84.8*
- Infections mycobactériennes par déficit partiel en *D84.8*

Jakob
v./v.a. Creutzfeldt-Jakob

Jalili ¬ Syndrome de *K00.5, H35.5*

Jalousie dans la fratrie ¬ *F93.3*

Jambe
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.81*
- Arquée syphilitique ¬ *A50.5†, M90.29**
- Artificielle (totale) (partielle) ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z44.1*
- Cassée SAI ¬ *T12*
- Cataracte congénitale ¬ Syndrome d'hypoplasie de la *Q87.1*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.84*
- Cours du sommeil ¬ Mouvements périodiques des *G25.80*
- Décollement sous-cutané (fermé) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.86*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.82*
- Genou ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.06*

Jambe *–suite*
- Insuffisance veineuse ¬ Ulcère de *I87.21*
- Mixte de type bassin-jambe ¬ Ulcère de *I70.24*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.83*
- Muscles antérieurs des mains ¬ Myopathie distale avec atteinte des muscles postérieurs des *G71.08*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du genou et de la *T34.7*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de la *S88.9*
- Non variqueux ¬ Ulcère de *I87.21*
- Partie non précisée ¬
- - Fracture de la *S82.9*
- - Plaie ouverte de la *S81.9*
- Pied
- - Présent ¬ Absence congénitale de la cuisse et de la *Q72.1*
- - ¬
- - - Absence congénitale
- - - - *Q72.2*
- - - - Bilatérale de la *Q72.2*
- - - Agénésie de la *Q72.2*
- Post-thrombotique ¬ Ulcère de *I83.0*
- SAI ¬
- - *Z89.6*
- - Amputation traumatique de la *T13.6*
- - Fracture de la *T12*
- - Lésion traumatique de la *T13.9*
- - Plaie ouverte de la *S81*
- Sans
- - Précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S89.9*
- - - Superficielle de la *S80.9*
- - Repos [Restless Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) *G25.81*
- - Varices ¬ Ulcère veineux de la *I87.21*
- Sauf région malléolaire pied
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure de la hanche et de la *T24.20*
- - - Corrosion de la hanche et de la *T24.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ Brûlure de la hanche et de la *T24.20*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure hanche
- - - - - *T24.21*
- - - - - *T24.61*
- - - - Corrosion de la hanche et de la *T24.60*
- Toute partie, sauf cheville et pied seuls] ¬ *T24*
- ¬
- - *L03.11*
- - Agénésie complète de la *Q72.0*
- - Artériopathie oblitérante de type *I70.29*
- - Arthrite juvénile idiopathique

Jambe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Arthrite juvénile idiopathique *–suite*
- - - *M08.96*
- - - Associée aux enthésopathies, *M08.86*
- - - Indéterminée, *M08.86*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.15*
- - Contusion de parties autres et non précisées de la *S80.1*
- - Dysplasie fibreuse monostotique, *M85.06*
- - Écrasement de parties autres et non précisées de la *S87.8*
- - Embolie artérielle de la *I74.3*
- - Fibrodysplasie ossifiante progressive, *M61.16*
- - Fibromatose aponévrotique juvénile, *M72.86*
- - Fibromatose pseudo-sarcomateuse, *M72.46*
- - Fracture
- - - Ouverte de la *S82.9, S81.87!*
- - - Parties de la *S82.88*
- - Fractures multiples de la *S82.7*
- - Gelure superficielle du genou et de la *T33.7*
- - Hétéroplasie osseuse progressive, *M61.56*
- - Hyperostose corticale infantile de la *M89.86*
- - Hypomyélinisation avec atteinte du tronc cérébral et de la moelle épinière et spasticité des *E75.2*
- - Ischémie traumatique des muscles de la *T79.62*
- - Kyste
- - - Osseux anévrismal de la *M85.56*
- - - Solitaire des os, *M85.46*
- - Lésion
- - - Tissu mou stade
- - - - I lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation de la *S81.84!*
- - - - - Ouverte ou de luxation de la *S81.87!*
- - - - II lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation de la *S81.85!*
- - - - - Ouverte ou de luxation de la *S81.88!*
- - - - III lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation de la *S81.86!*
- - - - - Ouverte ou de luxation de la *S81.89!*
- - - Traumatique
- - - - Multiples
- - - - - Muscles et tendons au niveau de la *S86.7*
- - - - - Nerfs au niveau de la *S84.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la *S85.7*
- - - - Muscle
- - - - - S) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la *S86.2*

Jambe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Muscle *–suite*
- - - - - S) et de tendon(s) péroniers au niveau de la *S86.3*
- - - - - Tendon non précisés, au niveau de la *S86.9*
- - - - - Tendons au niveau de la *S86.8*
- - - - Nerf
- - - - - Niveau de la *S84.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la *S84.9*
- - - - - Sciatique poplité externe au niveau de la *S84.1*
- - - - - Sciatique poplité interne au niveau de la *S84.0*
- - - - Nerf cutané sensitif au niveau de la *S84.2*
- - - - S) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la *S86.1*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - Niveau de la *S85.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la *S85.9*
- - - - Veine saphène
- - - - - Externe au niveau de la *S85.4*
- - - - - Interne au niveau de la *S85.3*
- - Lésions traumatiques
- - - Multiples de la *S89.7*
- - - Précisées de la *S89.8*
- - - Superficielles
- - - - *S80.88*
- - - - Multiples de la *S80.7*
- - Lymphome cutané à grandes cellules de type *C83.3*
- - Maladie de Still de l'adulte, *M06.16*
- - Mélorhéostose de la *M85.86*
- - Myosite
- - - Bactérienne, *M60.06*
- - - Éosinophile idiopathique, *M60.86*
- - - Focale, *M60.86*
- - - Fongique, *M60.06*
- - - Virale, *M60.06*
- - Nécrose avasculaire
- - - Idiopathique, *M87.06*
- - - Traumatique, *M87.26*
- - Oblitération d'une artère d'une *I74.3*
- - Occlusion artériel
- - - *I74.3*
- - - Aiguë de la *I74.3*
- - Ostéolyse
- - - Expansive familiale de la *M89.56*
- - - Massive de Gorham de la *M89.56*
- - Ostéomyélite multifocale chronique récurrente, *M86.36*
- - Ostéonécrose médicamenteuse, *M87.16*
- - Ostéoporose liée à l'X avec fracture pathologique de la *M80.56*

Jambe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Phlébite profonde de la *I80.28*
- - Phlébothrombose profonde de la *I80.28*
- - Plaie ouverte
- - - Multiples de la *S81.7*
- - - Non précisée d'autres parties de la *S81.80*
- - Pyomyosite, *M60.06*
- - Séquelles d'une fracture de la *T93.2*
- - Syndrome
- - - Felty, *M05.06*
- - - Oculo-urétro-synovial, *M02.36*
- - - SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec ostéite de la *M86.36*
- - Synovite villonodulaire pigmentée, *M12.26*
- - Thrombophlébite profonde de la *I80.28*
- - Thrombose profonde de la *I80.28*
- - Ulcère
- - - Artériel de *I70.24*
- - - Infectieux de *L97*

Jampel
v./v.a. Schwartz-Jampel-Aberfeld

Jancar ¬ Syndrome de *Q87.2*

Jansen
v./v.a. Chung-Jansen
- ¬ Chondrodysplasie métaphysaire type *Q78.5*

Jansen-de Vries ¬ Syndrome *Q87.8*

Jansky ¬ Maladie de: Bielschowsky- *E75.4*

Jansky-Bielschowsky ¬ Maladie de *E75.4*

Japon ¬ Fièvre
- Fluviale du *A75.3*
- Sept jours du *A27.8*

Japonaise
- Type B ¬ Encéphalite *A83.0*
- ¬ Encéphalite *A83.0*

Japonicum ¬ Schistosomiase due à Schistosoma *B65.2*

Jarcho-Levin ¬ Syndrome de *Q76.8*

Jaune
- Citadine ¬ Fièvre *A95.1*
- Foie ¬ atrophie ou dystrophie *K72*
- Sylvatique ¬ Fièvre *A95.0*
- ¬
- - Albinisme oculo-cutané *E70.3*
- - FJ [Fièvre *A95.9*
- - Kyste
- - - Corps *N83.1*
- - - Hémorragique du corps *N83.1*
- - Lymphœdème avec ongles *L60.5*
- - Nécessité d'une vaccination contre la fièvre *Z24.3*
- - Syndrome des ongles *L60.5*

Jawad ¬ Syndrome de *Q87.8*

Jeavons ¬ Syndrome de *G40.3*

JEB-nH] ¬ Épidermolyse bulleuse jonctionnelle type non-Herlitz [*Q81.8*

Jefferson ¬ Fracture de *S12.0*

Jeghers ¬ Syndrome de: Peutz- *Q85.8*

Jéjunal
v./v.a. duodéno-jéjunale
- E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- ¬ Maladie de Crohn [entérite régionale]: *K50.0*

Jéjunite
- Aspergillus ¬ *B44.8†, K93.8**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*

Jéjuno-iléale ¬ Atrésie *Q41.8*

Jéjunostomie endoscopique percutanée
- Sonde PEJ] ¬ Complication mécanique de sonde de *T85.52*
- ¬
- - Infection dues à une sonde de *T85.74*
- - Réaction inflammatoire dues à une sonde de *T85.74*

Jéjunum
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome du *C17.1*
- Type
- - I ¬ Atrésie du *Q41.1*
- - II ¬ Atrésie du *Q41.1*
- - IIIa ¬ Atrésie du *Q41.1*
- - IIIb ¬ Atrésie du *Q41.1*
- - IV ¬ Atrésie du *Q41.1*
- ¬
- - Absence congénitale du *Q41.1*
- - Adénocarcinome du *C17.1*
- - Atrésie du *Q41.1*
- - Carcinome épidermoïde du *C17.1*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] du *C17.1*
- - Imperforation du *Q41.1*
- - Léiomyosarcome du *C17.1*
- - Sténose congénitale du *Q41.1*
- - Tuberculose du *A18.3†, K93.0**
- - Tumeur
- - - Carcinoïde héréditaire du *C17.1*
- - - GRF [facteur de libération de l'hormone de croissance] du *C17.1*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - *C17.1*
- - - *D13.3*
- - - Incertain du *D37.2*

Jensen
v./v.a. Claes-Jensen

Jerash ¬ Neuropathie motrice distale héréditaire type *G12.2*

Jervell et Lange-Nielsen ¬ Syndrome de *I49.8*

Jessner ¬ Infiltration lymphocytaire cutanée de *L98.6*

Jet urinaire ¬ Troubles du *R39.1*

Jeté) (tombant) ¬ Accident dû à: Objet (*W49.9!*

Jeu
- Compulsif ¬ *F63.0*
- Cours travail
- - Sans précision ¬ Anomalie des forces en *O62.9*
- - ¬ Autres anomalies des forces en *O62.8*
- Hasard ou des paris ¬ Participation à des *Z72.8*
- Pathologique ¬ *F63.0*

Jeune
- Enfant ¬
- - Rhinite syphilitique chez le *A50.0†, J99.8**
- - Taches de Bitot chez le *E50.1*
- Filles ¬ Acné excoriée des *L70.5*
- ¬
- - Surveillance d'une primigeste très *Z35.6*
- - Syndrome de *Q77.2*

Jewtt
v./v.a. Thomas-Jewtt-Raines

Jirásek-Zuelzer-Wilson ¬ Syndrome de *Q43.1*

Jirovecii ¬ Pneumonie
- Due à: Pneumocystis *B48.5†*
- Pneumocystis *B48.5†, J17.2**

Joanny
v./v.a. Léri-Joanny

Jock itch] ¬ Eczéma marginé de Hebra [*B35.6*

Johanson-Blizzard ¬ Syndrome de *Q87.8*

Johansson
v./v.a. Larsen-Johansson
v./v.a. Sinding-Larsen-Johansson

Johnsen
v./v.a. Rasmussen-Johnsen-Thomsen

Johnson
v./v.a. Stevens-Johnson
- ¬ Syndrome
- - Dubin- *E80.6*
- - Neuroectodermique de *Q87.8*

Johnson-McMillin ¬ Syndrome de *Q87.8*

Johnston-Aarons-Schelley ¬ Syndrome de *Q68.8, L85.9*

Jokela ¬ Amyotrophie spinale proximale type *G12.1*

Jonction
- Ano-rectale ¬ *C21.8*
- AV par réentrée ¬ Tachycardie de la *I47.1*
- Cardio-œsophagienne ¬ *C16.0*
- Cervico-vaginal ¬
- - Adénosarcome de la *C53.8*
- - Carcinome à cellules vitreuses de la *C53.8*
- - Carcinome adénoïde kystique de la *C53.8*
- - Carcinome basocellulaire adénoïde de la *C53.8*
- - Carcinome neuroendocrine mal différencié de la *C53.8*
- - Léiomyosarcome de la *C53.8*

Jonction *–suite*
- Cervico-vaginal ¬ *–suite*
- - Rhabdomyosarcome de la *C53.8*
- - Tumeur germinale maligne de la *C53.8*
- Duodéno-jéjunale
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de la *C17.8*
- - ¬
- - - Adénocarcinome de la *C17.8*
- - - Carcinome épidermoïde de la *C17.8*
- - - GIST [tumeur stromale gastro-intestinale] de la *C17.8*
- - - Léiomyosarcome de la *C17.8*
- Lombosacrée ligament ¬
- - Déchirure de la *S33.51*
- - Entorse de la *S33.51*
- Musculo-tendineuse, non traumatique ¬ Déchirure au niveau de la *M66.5*
- Œsophago gastrique ¬
- - *C16.0*
- - Adénocarcinome de la *C16.0*
- - Carcinome épidermoïde de la *C16.0*
- Pelvi-urétérale ¬
- - *C65*
- - Pyélonéphrite chronique associée
- - - Anomalie de *N11.1*
- - - Coudure de *N11.1*
- - - Obstruction de *N11.1*
- - - Rétrécissement de *N11.1*
- Prémolaire-canine ¬ En avant de la *C04.0*
- Pyélo-urétéral ¬
- - Hydronéphrose avec obstruction de la *N13.0*
- - Occlusion congénitale de: *Q62.1*
- - Pyélonéphrite chronique associée
- - - Anomalie de *N11.1*
- - - Coudure de *N11.1*
- - - Obstruction de *N11.1*
- - - Rétrécissement de *N11.1*
- Recto-sigmoïdien ¬
- - *D37.5*
- - *T18.5*
- - Carcinoma in situ: *D01.1*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] de la *C19*
- - Tumeur bénigne: *D12.7*

Jonctionnelle
- Atrésie pylorique ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.8, Q40.8*
- Ectopique ¬ Tachycardie *I47.1*
- Généralisée
- - Forme intermédiaire ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.8*
- - Sévère ¬ Épidermolyse bulleux
- - - *Q81.1*
- - - *Q81.1*
- Inversée ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.8*

Jonctionnelle *–suite*
- Létale ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.1*
- Localisée
- - Début tardif-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'épidermolyse bulleuse *Q81.8*
- - ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.8*
- Prématurée ¬ Dépolarisation *I49.2*
- Type
- - Herlitz [EBJ-H] ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.1*
- - Herlitz-Pearson ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.1*
- - Non-Herlitz
- - - JEB-nH] ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.8*
- - - Localisé] ¬ EBJ-nH loc [Épidermolyse bulleuse *Q81.8*
- ¬ Tachycardie (paroxystique): *I47.1*

Jones
v./v.a. Bence Jones
v./v.a. Culler-Jones
v./v.a. Curry-Jones

Jongmans
v./v.a. Diets-Jongmans

Jonker
v./v.a. Waardenburg-Jonker

Joseph
v./v.a. Machado-Joseph

Joubert
- Atteinte rénale ¬ Syndrome de *Q04.3, Q61.5*
- Type A ¬ Syndrome de *Q04.3*

Joubert-Boltshauser ¬ Syndrome de *Q04.3*

Joue
- Lèvre ¬ Morsure de la *K13.1*
- Région
- - Temporo maxillaire
- - - Joue ¬ Plaie ouverte de la *S01.41*
- - - Parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la *S01.49*
- - - Région maxillaire
- - - - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la *S01.43*
- - - - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la *S01.42*
- - Temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la *S01.49*
- SAI ¬ *C76.0*
- ¬
- - Abcès de la *K12.23*
- - Carcinome basocellulaire de la muqueuse de la *C06.0*
- - Carcinome épidermoïde de la muqueuse de la *C06.0*
- - Face interne de la *C06.0*
- - Plaie ouverte
- - - Joue et de la région temporo-maxillaire: *S01.41*
- - - Lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la *S01.52*
- - Tumeur maligne: Muqueuse de la *C06.0*

Juberg-Hayward ¬ Syndrome de *Q87.8*

Juberg-Hellman syndrome ¬ *G40.3*

Juberg-Marsidi ¬ Syndrome de *Q87.0*

Judiciaire

- Gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures *Y35.7!*
- Travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs *Z64.8*
- ¬ Lésion due à des mesures *Y35.7!*

Jugulaire

- Externe ¬ Lésion traumatique de la veine *S15.2*
- Interne ¬ Lésion traumatique de la veine *S15.3*
- ¬
- - Embolie et thrombose de la veine *I82.81*
- - Thrombose
- - - Bulbe de la veine *I82.81*
- - - Veine *I82.81*

Jumeau

- Jumeau ¬ Transfusion
- - *O43.0*
- - *O43.0*
- Lieu de naissance non précisé ¬ *Z38.5*
- Morts-nés ¬ Naissance gémellaire, *Z37.4!*
- Né vivant, l'autre mort-né ¬ Naissance gémellaire, l'un des *Z37.3!*
- Nés
- - Hôpital ¬ *Z38.3*
- - Hors d'un hôpital ¬ *Z38.4*
- - Vivants ¬ Naissance gémellaire, *Z37.2!*
- Sac amniotique unique ¬ Enchevêtrement des cordons de *O69.2*
- Soudé
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- - ¬
- - - *Q89.4*
- - - Dystocie due à: *O66.3*
- Transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre *P02.3*
- Triplé, etc. ¬ Accouchement retardé du deuxième *O63.2*
- ¬
- - *O30.0*
- - Hémorragie vers un *P50.3*
- - Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un *P50.5*
- - Transfusion jumeau
- - - *O43.0*
- - - *O43.0*

Jung ¬ Syndrome de *Q87.1*

Jüngling
v./v.a. Perthes-Jüngling

- ¬ Ostéite cystoïde multiple type *D86.8*

Junin ¬ Fièvre hémorragique de *A96.0*

Jurenka
v./v.a. Hunter-Jurenka-Thompson

Juvénile
v./v.a. Type de maladie

Juxta-articulaire au cours de syphilis ¬ Nodule *A52.7†, M14.89**

Juxtacortical ¬

- Chondrosarcome *C41.9*
- Ostéosarcome *C41.9*

Juxtaposition des auricules ¬ *Q20.8*

Kaeser ¬ Syndrome scapulo-péronier neurogénique type *G12.1*

Kagami-Ogata ¬ Syndrome de *Q87.5*

Kahler

- Rémission complète ¬ Maladie de *C90.01*
- ¬ Maladie de *C90.00*

Kahler-Buzzolo en rémission complète ¬ Maladie de *C90.01*

Kaitila ¬ Chondrodysplasie métaphysaire type *Q78.5*

Kaler-Garrity-Stern ¬ Syndrome de *Q87.8*

Kallin ¬ Syndrome de *Q81.0, K00.0*

Kallman ¬ Syndrome de brachytéléphalangie-dysmorphie-syndrome de *Q87.0*

Kallmann

- Cardiopathie ¬ Syndrome de *E23.0, Q24.8*
- ¬ Syndrome de: *E23.0*

Kallmann-De Morsier ¬ Dysplasie olfacto-génitale de *E23.0*

Kandori ¬ Dystrophie de *H35.5*

Kanner ¬ Syndrome de *F84.0*

Kansasii ¬ Infection à Mycobacterium *A31.0*

Kantaputra ¬ Dysplasie mésomélique type *Q78.8*

Kanzaki ¬ Maladie de *E77.1*

Kaposi

v./v.a. Sarcome de Kaposi

- ¬
- - Angiomatose de *C46.9*
- - Pustulose varicelliforme de *B00.0*

Kaposiforme

- Abdomen ¬
- - Hémangioendothéliome *C49.4*
- - Lymphangiomatose *C49.4*
- Membre
- - Inférieur ¬ Hémangioendothéliome *C49.2*
- - Supérieur ¬ Hémangioendothéliome *C49.1*
- Pelvis ¬ Hémangioendothéliome *C49.5*
- Tête ¬ Hémangioendothéliome *C49.0*
- Thorax ¬
- - Hémangioendothéliome *C49.3*
- - Lymphangiomatose *C49.3*
- Tronc ¬ Hémangioendothéliome *C49.6*
- ¬
- - Hémangioendothéliome *C49.9*
- - Lymphangiomatose *C49.9*

Kappa ¬ Déficit de la chaîne légère *D80.8*

Kapur-Toriello ¬ Syndrome de *Q87.8*

Karnes

v./v.a. Mononen-Karnes-Senac

Karsck-Neugebauer ¬ Syndrome de *Q73.8, H55*

Kartagener

- Situs inversus viscerum, bronchectasie, sinusite chronique et polypes nasaux] [insuffisance pluriglandulaire résultant d'une anomalie dans le transport mucociliaire] [Immotile cilia syndrome] [triade de Kartagener] ¬ Syndrome de *Q89.3*

Kartagener *–suite*

- ¬ Syndrome de Kartagener [Situs inversus viscerum, bronchectasie, sinusite chronique et polypes nasaux] [insuffisance pluriglandulaire résultant d'une anomalie dans le transport mucociliaire] [Immotile cilia syndrome] [triade de *Q89.3*

Kasabach-Merritt ¬ Syndrome de *D18.00*

Kaschin-Beck ¬ Maladie de *M12.1*

KAT6A ¬ Syndrome de *Q87.8*

Kaufman

v./v.a. McKusick-Kaufman

- ¬ Syndrome oculo-cérébro-facial type *Q87.0*

Kaufmann

v./v.a. Parrot-Kaufmann

Kaurah

v./v.a. Teebi-Kaurah

Kaveggia

v./v.a. Opitz-Kaveggia

Kawasaki ¬

- Anévrisme artériel coronarien au cours de syndrome de *M30.3†, I79.8**
- Syndrome adéno-cutanéo-muqueux [Maladie de *M30.3*

Kawasaki-like

- Adulte, temporellement associé au COVID-19 ¬ Syndrome *U10.91*
- Enfant, temporellement associé au COVID-19 ¬ Syndrome *U10.90*

Kaya-Barakat-Masson ¬ Syndrome de *Q04.8*

Kaye

v./v.a. Zunich-Kaye

Kayser-Fleischer ¬ Anneau de *H18.0*

KBG ¬ Syndrome *Q87.8*

KCNQ2 ¬ Encéphalopathie épileptique associée à *G40.4*

Kearns Sayre

- Ophtalmoplégie associée] ¬ Syndrome de *G31.81*
- ¬
- - Strabisme paralytique au cours de syndrome de *H49.8*
- - Syndrome de *G31.81*

Kedani ¬ Fièvre de *A75.3*

Keipert ¬ Syndrome de *Q87.0*

Kelley-Seegmiller ¬ Syndrome de *E79.8*

Kelly-Paterson ¬ Syndrome de *D50.1*

Kendall

v./v.a. Astley-Kendall

Kennedy

- Maladie de Kennedy] ¬ Atrophie musculaire spinobulbaire de type *G12.2*
- ¬
- - Atrophie musculaire spinobulbaire de type Kennedy [Maladie de *G12.2*
- - Maladie de *G12.2*
- - Paraplégie spastique complexe autosomique récessive par dysfonctionnement de la voie de *G11.4*
- - Syndrome de (Foster-) *H47.0*

Kennedy-Teebi ¬ Dysostose acrofaciale de *Q75.4*

Kenny-Caffey

- Autosomique
- - Dominant ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - Récessif ¬ Syndrome de *Q87.1*
- ¬ Syndrome de *Q87.1*

Keppen-Lubinsky ¬ Syndrome de *E88.1*

Kératite

- Adénovirus ¬ *B30.0†, H19.2**
- Amibienne ¬ *B60.1†, H19.2**
- Annulaire ¬ *H16.1*
- Candida ¬ *B37.88†, H19.2**
- Cours
- - Acné rosacée ¬ *L71.8†, H19.3**
- - Herpès ¬ *B00.5†, H19.1**
- - Maladie
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, H19.2**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, H19.2**
- - Rougeole ¬ *B05.8†, H19.2**
- - Syphilis congénitale ¬ *A50.3†, H19.2**
- Dendritique et disciforme ¬ *H19.1**
- Due au virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H19.1**
- Épithéliale d'origine infectieuse ¬ *B00.5†, H19.1**
- Filamenteuse ¬ *H16.1*
- Gonorrhéique prénatale ¬ *A54.3†, H19.2**
- Héréditaire ¬ *H16.8*
- Interstitielle
- - Cours de zona ¬ *B02.3†, H19.2**
- - Linéaire idiopathique ¬ *H16.3*
- - Profonde ¬ *H16.3*
- - Syphilitique congénitale
- - - Précoce ¬ *A50.0†, H19.2**
- - - Tardive ¬ *A50.3†, H19.2**
- - Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.2**
- Kératoconjonctivite cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H19.3**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H19.2**
- Mycosique ¬ *B49†, H19.2**
- Nummulaire ¬ *H16.1*
- Ponctuée superficielle
- - Thygeson ¬ *H16.1*
- - ¬ *H16.1*
- Sans précision ¬ *H16.9*
- Stellaire ¬ *H16.1*
- Striée ¬ *H16.1*
- Stromal
- - Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- - Herpétique ¬ *B00.5†, H19.1**
- - ¬ *H16.3*
- Superficielle avec conjonctivite ¬ *H16.2*
- Superficielles sans conjonctivite ¬ Autres *H16.1*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.3†, H19.2**

Kératite *–suite*
- Xérotique ¬ Carence en vitamine A avec *E50.4†, H19.3**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H19.2**
- ¬
- - *H16.8*
- - Acanthamœbiose avec *B60.1†, H19.2**

Keratitis
- Arborescens à herpès simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Dendritica à herpès simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Disciformis
- - Cours de varicelle ¬ *B01.8†, H19.2**
- - Herpès simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Interstitialis à herpès simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Punctata syphilitica ¬ *A50.3†, H19.2**

Kératoacanthome familial ¬ *L85.8*

Kératocône
- Syndrome de Down ¬ *Q90.9†, H19.8**
- ¬ *H18.6*

Kératoconjonctivite
- Adénovirus ¬ *B30.0†, H19.2**
- Allergique ¬ *H16.2*
- Atopique ¬ *H16.2*
- Chronique ¬ *H16.2*
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Kératite et *H19.3**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Kératite et *H19.2**
- - Rougeole ¬ *B05.8†, H19.2**
- - Syphilis congénitale ¬ *A50.3†, H19.2**
- Due au virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H19.1**
- Épidémique ¬ *B30.0†, H19.2**
- Exposition ¬ *H16.2*
- Infectieuse ¬ *B30.0†, H19.2**
- Interstitielle
- - Acanthamœba ¬ *B60.1†, H19.2**
- - Cours de zona ¬ *B02.3†, H19.2**
- - Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.2**
- Interstitielles cours
- - Rougeole ¬ *B05.8†, H19.2**
- - Syphilis ¬ *A50.3†, H19.2**
- Neurotrophique ¬ *H16.2*
- Phlycténulaire
- - Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.2**
- - ¬ *H16.2*
- SAI ¬ *H16.2*
- Sèche au sens du syndrome de Sjögren ¬ *M35.0†, H19.3**
- Vernale ¬ *H16.2*
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H19.2**
- ¬
- - *H16.2*
- - Acanthamœbiose avec *B60.1†, H19.2**

Kératoconjonctivite *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome
- - - Sec avec *M35.0†, H19.3**
- - - Sjögren avec *M35.0†, H19.3**

Kératodermie
- Acrale-caries ¬ Syndrome des cheveux frisés- *Q82.8*
- Aïnhumoïde et mutilante ¬ *Q82.8*
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ *L86**
- - Syndrome urétro-oculo-synovial ¬ *M02.39†, L86**
- Gonorrhéique ¬ *A54.8†, L86**
- Mutilante avec ichtyose ¬ *Q82.8*
- Palmaire et plantaire acquise ¬ Kératose [*L85.1*
- Palmoplantaire
- - Alopécie congénitale autosomique dominante ¬ *Q82.8*
- - Ambiguïté sexuelle XX-prédisposition au carcinome spinocellulaire ¬ Syndrome de *Q56.0, Q82.8*
- - Aquagénique ¬ *L85.8*
- - Carcinome de la peau ¬ Syndrome d'anomalie de pigmentation- *C44.9, Q82.8*
- - Cardiomyopathie arythmogène ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypohidrose-hypoplasie de l'émail- *Q87.8*
- - Diffuse
- - - Acrocyanose ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - - Autosomique dominante type Norrbotten ¬ *Q82.8*
- - Érythrodermique diffuse type Voerner ¬ *Q82.8*
- - Focale
- - - Kératose localisée aux articulations ¬ *Q82.8*
- - - Non épidermolytique isolée ¬ *Q82.8*
- - Héréditaire type Gamborg-Nielsen ¬ *Q82.8*
- - HOPP] ¬ Syndrome d'hypotrichose-ostéolyse-périodontite- *Q82.8*
- - Mutilante avec plaques kératosiques péri-orificielles ¬ *Q82.8*
- - Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire ¬ Syndrome de *G60.0, Q82.8*
- - Non épidermolytique associée à KRT1 ¬ *Q82.8*
- - Nummulaire ¬ *Q82.8*
- - Ponctuée type
- - - 1 ¬ *Q82.8*
- - - 2 ¬ *Q82.8*
- - - 3 ¬ *Q82.8*
- - Striée ou en bandes ¬ *Q82.8*
- - Surdité ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - Transgrediens et progrediens ¬ *Q82.8*
- - Type Nagashima ¬ *Q82.8*
- - ¬ Syndrome de cheveux laineux- *Q82.8*

Kératodermie *–suite*
- Palmoplantaire-périodontopathie ¬ Syndrome de *Q82.8*
- Sclérosante ¬ Syndrome de kératose linéaire-ichtyose congénitale- *Q82.8*

Kératoendothélite héréditaire fugace ¬ *H16.2*

Kératoglobe congénital avec glaucome ¬ *Q15.0*

Kérato-irite
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.3†, H22.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H22.0**

Kératokyste
- Odontogène
- - Maxillaire ¬ *D16.42*
- - ¬ *D16.5*
- ¬ *D16.5*

Kératokystique
- Mandibule ¬ Tumeur odontogène *D16.5*
- Maxillaire ¬ Tumeur odontogène *D16.42*

Kératolytique
- Hivernal ¬ Érythème *Q82.8*
- Kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ¬ Intoxication: *T49.4*

Kératomalacie ¬ Avitaminose A avec *E50.4†, H19.8**

Kératomycose ¬ *B49†, H19.2**

Keratomycosis nigricans palmaris ¬ *B36.1*

Kératopathie
- Bandelettes ¬ *H18.4*
- Bulleux
- - Chirurgie de la cataracte [de l'aphaque] ¬ *H59.0*
- - ¬ *H18.1*
- Climatique en gouttelettes ¬ *H18.5*
- Labrador ¬ *H18.5*
- Neurotrophique ¬ *B00.5†, H19.1**

Kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ¬ Intoxication: Kératolytiques, *T49.4*

Kératosclérite tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.2**

Kératose
- Acrale ponctuée-chéilite-nodosités [PLACK] ¬ Syndrome de peau déciduale-leuconychie- *Q84.8*
- Actinique ¬ *L57.0*
- Folliculaire
- - Acquise ¬ *L11.0*
- - Darier-White ¬ *Q82.8*
- - Due à l'avitaminose A ¬ *E50.8†, L86**
- - Nanisme-atrophie cérébrale ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - Parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] ¬ *L87.0*
- - Spinulosa decalvans de Siemens ¬ *Q82.8*
- Gonocoques ¬ *A54.8†, L86**
- Kératodermie] palmaire et plantaire acquise ¬ *L85.1*

Kératose *–suite*
- Linéaire-ichtyose congénitale-kératodermie sclérosante ¬ Syndrome de *Q82.8*
- Localisée aux articulations ¬ Kératodermie palmoplantaire focale avec *Q82.8*
- Obturante de l'oreille externe (conduit) ¬ *H60.4*
- Orale ¬ *K13.2*
- Organes génitaux féminins ¬ *N94.8*
- Palmoplantaire
- - Diffuse type Botnien ¬ *Q82.8*
- - Focale non épidermolytique autosomique dominante avec atteintes bulleuses ¬ *Q82.8*
- - Héréditaire ¬ *Q82.8*
- - Paralysie spastique ¬ *Q82.8, G11.4*
- - ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie- *G93.4, Q82.8*
- Palmo-plantaire avec clinodactylie du cinquième doigt ¬ *Q82.8, Q68.1*
- Ponctuée (palmaire et plantaire) ¬ *L85.2*
- SAI ¬ *L57.0*
- Séborrhéique ¬ *L82*
- Sénile ¬ *L57.0*
- Solaire ¬ *L57.0*
- ¬ Carence en vitamine A avec *E50.8†, L86**

Kératosiques péri-orificielles ¬ Kératodermie palmoplantaire mutilante avec plaques *Q82.8*

Keratosis
- Palmoplantaris transgrediens de Siemens ¬ *Q82.8*
- Vegetans ¬ *Q82.8*

Kératovitréen ¬ Syndrome *H59.0*

Kérion
- Celse ¬ *B35.0*
- ¬ *B35.0*

Kérosène [pétrole lampant] ¬ *T52.0*

Keshan ¬ Maladie de *E59*

Kétamine ¬ Dilatation des voies biliaires induite par la *K83.8, F13.1*

Keutel ¬ Syndrome de *Q87.8*

Khalifa-Graham ¬ Syndrome de *Q87.0*

Ki-1+ ¬
- Lymphome à grandes cellules *C84.6*
- Lymphome anaplasique à grandes cellules *C84.6*

KID ¬ Syndrome *Q80.8*

Kienböck
- Adulte ¬ Maladie de *M93.1*
- ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): semi-lunaire [*M92.2*

Kienbock ¬ Maladie de *M92.2*

Kieser
v./v.a. Turner-Kieser

Kievit
v./v.a. Maat-Kievit-Brunner

KIF5A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 due à une mutation de *G60.0*

Kikuchi-Fujimoto ¬ Maladie de *I88.1*

Killian
v./v.a. Pallister-Killian

Kim
v./v.a. Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

Kimberley ¬ Dysplasie spondylo-épiphysaire type *Q77.7*

Kimmelstiel Wilson extracapillaire diabétique
- Diabète sucré type
- - 1 ¬ Syndrome de *E10.20†, N08.3**
- - 2 ¬ Syndrome de *E11.20†, N08.3**
- ¬ Syndrome de *E14.20†, N08.3**

Kimmelstiel-Wilson
- Diabète sucré type
- - 1 ¬ Syndrome de *E10.20†, N08.3**
- - 2 ¬ Syndrome de *E11.20†, N08.3**
- ¬ Syndrome de *E14.20†, N08.3**

Kimura
- Tissu mou
- - Cou ¬ Maladie de *D21.0*
- - Tête ¬ Maladie de *D21.0*
- ¬ Maladie de *D21.9*

Kinase
- 1 ¬ Maladie glycogénique par déficit en phosphoglycérate *E74.0*
- Delta type
- - 1 ¬ APDS [Syndrome d'activation de la phosphoinositide 3- *D81.8*
- - 2 ¬ APDS [Syndrome d'activation de la phosphoinositide 3- *D81.8*
- Déshydrogénase des cétoacides à chaînes ramifiées ¬ Syndrome d'autisme-épilepsie par déficit en *E71.1*
- Epsilon ¬ Syndrome hémolytique et urémique avec mutation de la diacylglycérol *D58.8*
- Érythrocytaire ¬ Déficit en pyruvate *D55.2*
- Globule rouge ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en pyruvate *D55.2*
- Hépatique et musculaire ¬ Glycogénose par déficit en phosphorylase *E74.0*
- Musculaire ¬ GSD par déficit en phosphorylase *E74.0*
- Spécifique des lymphocytes] ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en LCK [tyrosine *D81.2*
- ¬
- - Anémie hémolytique
- - - Congénitale non sphérocytaire due à un déficit en pyruvate *D55.2*
- - - Déficit en adénylate *D55.3*
- - Anémie par déficit en:pyruvate *D55.2*
- - Déficit
- - - Complet en mévalonate *E88.8*
- - - D-glycérate *E74.8*
- - - Dolichol *E77.8*
- - - Isolé
- - - - Glycérol *E74.8*
- - - - Sédoheptulose *E74.8*
- - - Partiel en mévalonate *D89.8*

Kinase *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Glycogénose par déficit en phosphorylase *E74.0*
- - GSD déficit
- - - Phosphoglycérate *E74.0*
- - - Phosphorylase *E74.0*
- - Neurodégénérescence associée à un déficit en pantothénate *G23.0*

Kinase-4 ¬ Immunodéficience par déficit en interleukin-1 receptor-associated *D84.8*

Kindler ¬ Syndrome de *Q81.8*

Kinésigénique
- Paroxystique ¬ Dyskinésie non *G24.8*
- ¬ Dyskinésie paroxystique *G24.8*

King-Denborough ¬ Syndrome de *G71.2*

Kingella ¬
- Bactériémie à *A49.83*
- Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, *B96.3!*

Kingsmore
v./v.a. Smith-Kingsmore

Kininogène de haut poids moléculaire ¬ Déficit congénital en *D68.8*

Kir6 2 ¬ Hyperinsulinisme
- Autosomique
- - Dominant par déficit en *E16.1*
- - Récessif par déficit en *E16.1*
- Focal résistant au diazoxide par déficit en *E16.1*

Kirghize ¬ Dermato-ostéolyse type *Q82.8, M89.59*

Kjer ¬
- Atrophie optique autosomique dominante de *H47.2*
- Maladie de *H47.2*

Klatskin
- Atteinte des voies biliaires intrahépatiques ¬ Tumeur de *C24.8*
- ¬ Tumeur de *C24.0*

Klebsiella
- Friedlaenderi ¬ Infection à *A49.82*
- Granulomatis multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.03!*
- Oxytoca multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.02!*
- - 3MRGN ¬ *U81.22!*
- - 4MRGN ¬ *U81.42!*
- Pneumoniae
- - Agent pathogène ¬ *B96.2!*
- - Multirésistant
- - - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.01!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.21!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.41!*
- - ¬
- - - Infection à *A49.82*
- - - Pneumonie congénitale à *P23.6, B96.2!*

Klebsiella *–suite*
- Pneumoniae *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Pneumonie due à *J15.0*
- Rhinoscleromatis ¬ Infection à *A49.82*
- ¬
- - Bactériémie à *A49.82*
- - Méningite à *G00.8, B96.2!*

Klebsielle multirésistantes
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Autres *U81.03!*
- 3MRGN ¬ Autres *U81.23!*
- 4MRGN ¬ Autres *U81.43!*

Kleefstra ¬ Syndrome de *Q87.8*

Kleestadt ¬ Kyste de *K09.1*

Kleffner] ¬ Aphasie acquise avec épilepsie [Landau- *F80.3*

Klein
v./v.a. Franceschetti-Klein

Kleine-Levin ¬ Syndrome de *G47.8*

Klein-Waardenburg ¬ Syndrome de *E70.3*

Kleptomanie] ¬ Tendance pathologique à commettre des vols [*F63.2*

KLHL9 ¬ Myopathie distale précoce associée à *G71.08*

Kline
v./v.a. Au-Kline

Klinefelter
- Caryotype 47,XXY ¬ Syndrome de *Q98.0*
- Homme
- - Caryotype 46,XX ¬ Syndrome de *Q98.2*
- - Plus de deux chromosomes X ¬ Syndrome de *Q98.1*
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q98.4*

Klinger
v./v.a. Wegener-Klinger-Churg

Klippel-Feil
- Myopathie-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de malformation de *Q76.1*
- ¬ Malformation de *Q76.1*

Klippel-Trénaunay
- Inverse ¬ Syndrome de *Q87.2*
- ¬ Syndrome de *Q87.2*

Klippel-Trénaunay-Weber ¬ Syndrome de *Q87.2*

Klumpke due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de Dejerine- *P14.1*

Klüver-Bucy ¬ Syndrome de *F07.8*

Knickenberg
v./v.a. Hornstein-Knickenberg

Kniest
- Like ¬ Dysplasie létale *Q78.8*
- ¬ Dysplasie de *Q87.1*

Knobloch ¬ Syndrome de *Q87.8*

Knuckle pads] ¬ Coussinet des phalanges [*M72.1*

Köbberling ¬ Lipodystrophie partielle familiale type *E88.1*

Koch ¬ Maladie de *A16.9*

Kocher-Debré-Semelaigne ¬ Syndrome de *E03.1*

Koeda
v./v.a. Ieshima-Koeda-Inagaki

Köhler
- II ¬ Maladie
- - *M92.7*
- - Freiberg- *M92.7*
- Rotule ¬ Ostéochondrose de *M92.4*

Kohler I ¬ Maladie de *M92.6*

Köhler-Mouchet ¬ Syndrome de *M87.24*

Kohlschütter-Tönz ¬ Syndrome de *G31.88*

Kohn
v./v.a. Lowe-Kohn-Cohen
- ¬ Dysplasie spondylo-épiphysaire tardive type *Q77.7*

Koïlonychie congénital(e) ¬ *Q84.6*

Kojevnikov] ¬ Épilepsie partielle continue [*G40.5*

Kok ¬ Maladie de *G25.88*

Kolk
v./v.a. Witteveen-Kolk

Kommerel ¬ Diverticule de *Q25.4*

Konigsmark
v./v.a. Mengel-Konigsmark-Berlin-McKusick

Koolen-De Vries ¬ Syndrome de *Q93.5*

Korsakoff] ¬ AKS [Syndrome alcoolique de *F10.6*

Korsakov non alcoolique ¬ Psychose ou syndrome de *F04*

Kosaki
v./v.a. Takenouchi-Kosaki
- ¬ Syndrome d'hypercroissance de *Q87.3*

Kosho ¬
- EDS type *Q79.6*
- Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Kostmann ¬ Syndrome de *D70.0*

Kousseff ¬ Syndrome de *Q87.8*

Kozlowski ¬ Dysplasie spondylo-métaphysaire type *Q77.8*

Kozlowski-Krajewska ¬ Syndrome de *Q87.2*

Kozlowski-Tsuruta ¬ Hyperostose corticale dysplasique type *Q78.8*

KPP diffuse progressive ¬ *Q82.8*

Krabbe
v./v.a. Sturge-Weber-Krabbe
- ¬
- - Leucodystrophie de *E75.2*
- - Sclérose cérébrale de *E75.2*

Krajewska
v./v.a. Kozlowski-Krajewska

Krasnow-Qazi ¬ Syndrome de *Q87.8*

Kraurosis
- Verge ¬ *N48.0*
- Vulve ¬ *N90.4*

Kreiborg-Pakistani ¬ Syndrome de *Q75.0*

Kroes ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

KRT14 ¬ Épidermolyse bulleuse simple autosomique récessive associée à *Q81.0*

Krukenberg ¬ Faisceaux de *H18.0*

Kruse
v./v.a. Shiga-Kruse
v./v.a. Sonne-Kruse

Kuba
v./v.a. Saito-Kuba-Tsuruta

Kucinskas
v./v.a. Alkuraya-Kucinskas

Kufor-Rakeb ¬ Syndrome de *G23.0*

Kugelberg-Welander] ¬ Amyotrophie spinale (de): forme juvénile, type III [*G12.1*

Kunjin ¬ Maladie virale de *A83.4*

Kupffer ¬ Sarcome des cellules de *C22.3*

Kuroki
v./v.a. Niikawa-Kuroki

Kuru ¬ *A81.8*

Kuskokwim ¬ Syndrome de *Q74.3*

Küster
v./v.a. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Kwashiorkor
- Marasme ¬
- - *E42*
- - Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: avec signes de *E42*
- ¬ *E40*

Kyasanur ¬
- Fièvre hémorragique de *A98.2*
- Maladie de la forêt de *A98.2*

Kynuréninase ¬ Déficit en *E70.8*

Kyphomélique ¬ Dysplasie *Q78.8*

Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [*L87.0*

Kyste
v./v.a. Pseudokyste
- Anévrismal
- - Lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un *K09*
- - Os ¬ *M85.5*
- Apical (périodontal) ¬ *K04.8*
- Arachnoïdien ¬
- - *G93.0*
- - Syndrome de tibia absent-polydactylie- *Q79.8, G93.0*
- Baker tuberculeux ¬ *A18.0†, M01.16**
- Bilatéraux de la partie antérieure du lobe temporal ¬ Leucoencéphalopathie avec *E75.2*
- Biliaire ¬ *K83.5*
- Bourses séreuses ¬ Autres *M71.3*
- Branchial
- - Siège de la tumeur] ¬ *C10.4*
- - ¬ Carcinome épidermoïde d' un *C10.4*
- Bronchogénique
- - Congénital ¬ *Q33.0*
- - ¬ *J98.4*
- Calcifications ¬ Leucoencéphalopathie avec *I67.88†, G94.39**
- Canal
- - Gartner ¬ *Q50.5*

Kyste *–suite*
- Canal *–suite*
- - Glande sébacée du sein ¬ *N60.8*
- - Incisif ¬ *K09.1*
- - Nück, congénital ¬ *Q52.4*
- - Wharton ¬ *K11.6*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Carcinomateux ¬ *C80.9*
- Cérébraux
- - Congénitaux ¬ *Q04.6*
- - ¬ *G93.0*
- Cholédoque ¬ *Q44.4*
- Chyleux
- - Mésentère ¬ *I89.8†, K67.8**
- - Péritoine ¬ *I89.8†, K67.8**
- Coccygien(ne) ou pilonidal(e) ¬ *L05*
- Col utérin ¬ *N88.8*
- Colobomateux ¬ Syndrome de microphtalmie- *Q11.2*
- Congénital
- - E) de la vulve ¬ *Q52.7*
- - Médiastin ¬ *Q34.1*
- Conjonctive ¬ Autres troubles vasculaires et *H11.4*
- Corps jaune ¬ *N83.1*
- Dentaires liés au développement (odontogènes) ¬ *K09.0*
- Dentigère ¬ *K09.0*
- Dermoïde
- - Angle ponto-cérébelleux ¬ *D33.1*
- - Bouche ¬ *K09.8*
- - Cerveau ¬ *D33.2*
- - Cervical ¬ *D36.7*
- - Encéphale ¬ *D33.0*
- - Face ¬ *Q18.8*
- - Hypophyse ¬ *D35.2*
- - Nasal ¬ *Q18.8*
- - Système nerveux central ¬ *D33.9*
- Echinococcus ¬ *B67.9*
- Embouchure du nez ¬ *K09.1*
- Embryonnaire
- - Col de l'utérus ¬ *Q51.6*
- - Ligament large ¬ *Q50.5*
- - Trompe de Fallope ¬ *Q50.4*
- - Vaginal ¬ *Q52.4*
- Épidermique ¬ *L72.0*
- Épidermoïde de la bouche ¬ *K09.8*
- Époophoron ¬ *Q50.5*
- Fissuraire ¬ *K09.1*
- Folliculaire
- - Hémorragique (de l'ovaire) ¬ *N83.0*
- - Ovaire ¬ *N83.0*
- - Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - - Sans précision ¬ *L72.9*
- - - ¬ Autres formes de *L72.8*
- - ¬ *K09.0*

Kyste *–suite*
- Follicule de De Graaf ¬ *N83.0*
- Fosse postérieure ¬ Syndrome d'agénésie partielle du corps calleux-hypoplasie du vermis avec *Q04.3*
- Frange ovarienne ¬ *Q50.4*
- Gingival ¬ *K09.0*
- Glande de Bartholin ¬ *N75.0*
- Glande lacrymale ¬ *H04.1*
- Glande sébacée du scrotum ¬ *L72.1*
- Glioépendymaire/épendymaire ¬ *Q04.6*
- Hémorragique du corps jaune ¬ *N83.1*
- Hépatique simple ¬ *K76.8*
- Hydatique
- - Cerveau ¬ *B67.9†, G94.8**
- - Foie
- - - Echinococcus granulosus ¬ *B67.0*
- - - Echinococcus multilocularis ¬ *B67.5*
- - - ¬ *B67.8†, K77.0**
- - Poumon NCA ¬ *B67.9†, J99.8**
- - Rate NCA ¬ *B67.9†, D77**
- - ¬ *B67.9*
- Inclusion épidermique ¬ *L72.0*
- Iris corps ciliaire chambre antérieure œil
- - Exsudatif ¬ *H21.3*
- - Implant ¬ *H21.3*
- - Parasitaire ¬ *H21.3*
- - SAI ¬ *H21.3*
- - ¬ *H21.3*
- Kleestadt ¬ *K09.1*
- Lacrymo-nasal ¬ *H04.6*
- Lame dentaire ¬ *K09.0*
- Latent des maxillaires ¬ *K10.0*
- Latéral du cou ¬ *Q18.0*
- Lié à l'éruption dentaire ¬ *K09.0*
- Lingual ¬ *K14.8*
- Lympho-épithélial de la bouche ¬ *K09.8*
- Mâchoire
- - Anévrismal ¬ *K09.2*
- - Hémorragique ¬ *K09.2*
- - SAI ¬ *K09.2*
- - Traumatique ¬ *K09.2*
- - ¬ Autres *K09.2*
- Macula ¬ *H35.38*
- Malin du coccyx ¬ *C44.59*
- Médian(e) de la face et du cou ¬ *Q18.8*
- Médullaire du rein ¬ *Q61.5*
- Ménisque
- - Corne
- - - Antérieure ménisque
- - - - Externe ¬ *M23.04*
- - - - Interne ¬ *M23.01*
- - - Postérieure ménisque
- - - - Externe ¬ *M23.05*
- - - - Interne ¬ *M23.02*
- - Localisations multiples ¬ *M23.00*

Kyste *–suite*
- Ménisque *–suite*
- - Ménisque SAI ¬ *M23.09*
- - Partie partie non précisée ménisque
- - - Externe ¬ *M23.06*
- - - Interne ¬ *M23.03*
- Mésentérique ¬ *K66.8*
- Mucocèle du nez et des sinus du nez ¬ *J34.1*
- Mucoïde à l'articulation du doigt ¬ *M67.44*
- Multiloculaire bénin du rein ¬ *D30.0*
- Muqueux
- - Épanchement des glandes salivaires ¬ *K11.6*
- - Mastoïdectomie ¬ *H95.1*
- - Rétention des glandes salivaires ¬ *K11.6*
- Naso
- - Labial [naso-alvéolaire] ¬ *K09.1*
- - Palatin [canal incisif] ¬ *K09.1*
- Oculaire congénital ¬ *Q15.8*
- Omphalo-mésentérique ¬ *Q43.0*
- Ora serrata ¬ *H33.1*
- Orbite ¬ *H05.8*
- Origine branchiale ¬ Fissure, fistule et *Q18.0*
- Osseux
- - Anévrismal
- - - Avant-bras ¬ *M85.53*
- - - Bras ¬ *M85.52*
- - - Clavicule ¬ *M85.51*
- - - Colonne vertébrale ¬ *M85.58*
- - - Cuisse ¬ *M85.55*
- - - Jambe ¬ *M85.56*
- - - Main ¬ *M85.54*
- - - Pied ¬ *M85.57*
- - Solitaire de la mâchoire ¬ *K09.2*
- - ¬ Autres *M85.6*
- Ouraque
- - Congénital ¬ *Q64.4*
- - ¬ *Q64.4*
- Ovaire, autres et sans précision ¬ *N83.2*
- Ovarien
- - Cours du développement ¬ *Q50.1*
- - Tuberculeux ¬ *A18.1†, N74.1**
- Pancréas ¬
- - *K86.2*
- - *K86.2*
- Pancréatique congénital ¬ *Q45.2*
- Paraovarien ¬ *Q50.5*
- Parasitaire de la rétine SAI ¬ *H33.1*
- Périapical ¬ *K04.8*
- Périodontal latéral ¬ *K09.0*
- Péri-radiculaire ¬ *G54.8*
- Périventriculaires acquis du nouveau-né ¬ *P91.1*
- Phaeohyphomycosique sous-cutané ¬ *B43.2†, L99.8**
- Pharynx ou du rhinopharynx ¬ *J39.2*

Kyste *–suite*
- Pilaire ¬ *L72.1*
- Pileux ¬ *L72.1*
- Pilonidal
- - Malin ¬ *C44.59*
- - SAI ¬ *L05.9*
- Plancher buccal ¬ *K11.6*
- Pleuro-péricardiques ¬ *Q24.8*
- Poche
- - Blake ¬ Persistance du *Q03.1*
- - Rathke ¬ Déficit hypophysaire associé à un *E23.6*
- Poplité ¬ Déchirure d'un *M66.0*
- Porencéphalique
- - Acquis ¬ *G93.0*
- - ¬ *Q04.6*
- Préauriculaires ¬ Fistule et *Q18.1*
- Primordial ¬ *K09.0*
- Pulmonaire acquis ¬ *J98.4*
- Pulmonaires-croissance excessive-tumeur de Wilms ¬ Syndrome de retard de développement- *C64, Q87.3*
- Pupillaire miotique ¬ *H21.2*
- Radiculaire ¬ *K04.8*
- Rate ¬ *D73.4*
- Région buccal
- - Non
- - - Classés ailleurs ¬ Autres *K09.8*
- - - Liés au développement dentaire ¬ *K09.1*
- - Sans précision ¬ *K09.9*
- Rein
- - Acquis) (multiple) (solitaire) ¬ *N28.1*
- - Congénital unique ¬
- - - *Q61.0*
- - - *Q61.0*
- - ¬ *N28.1*
- Rénaux
- - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de fibrose hépatique- *Q87.0*
- - Diabète juvénile ¬ Syndrome *E11.20†, N29.8**
- - ¬ Syndrome de ventriculomégalie-maladie des *Q04.8, Q61.9*
- Résiduel radiculaire ¬ *K04.8*
- Rétentionnel de l'ovaire ¬ *N83.2*
- Rétiniens ¬ Rétinoschisis et *H33.1*
- Sacro-coccygien avec abcès ¬ *L05.0*
- Scrotal ¬ *L72.9*
- Sébacé ¬ *L72.1*
- Sein ¬ *N60.0*
- Simple de l'ovaire ¬ *N83.2*
- Solitaire
- - Os
- - - Avant-bras ¬ *M85.43*
- - - Bras ¬ *M85.42*
- - - Cuisse ¬ *M85.45*
- - - Jambe ¬ *M85.46*

Kyste *–suite*
- Solitaire *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Main ¬ *M85.44*
- - - Pied ¬ *M85.47*
- - - ¬ *M85.4*
- - Sein ¬ *N60.0*
- Sous-corticaux ¬ Leucoencéphalopathie mégalencéphalique avec *E75.2*
- Stafne ¬ *K10.0*
- Synovial
- - Poplité [Baker] ¬ *M71.2*
- - SAI ¬ *M71.3*
- - ¬ Déchirure d'un *M66.1*
- Thyréoglosse ¬ *Q89.2*
- Trachée ¬ *J39.88*
- Trichilemmal proliférant ¬ *L72.1*
- Trichilemmaux-dystrophie ciliaire] ¬ Syndrome FLOTCH [Leukonychie totale familiale- *Q84.4*
- Vulve ¬ *N90.7*
- ¬
- - *M67.4*
- - Chromomycose sous-cutanée avec *B43.2†, L99.8**

Kystique
v./v.a. Type de maladie

L-2-HGA ¬ *E72.8*

L-2-hydroxyglutarique ¬
- Acidémie *E72.8*
- Acidurie
- - *E72.8*
- - D, *E72.8*

La crosse
- Aorte ¬ Syphilis de *A52.0†, I79.1**
- Aortique ¬
- - Artérite de *M31.4*
- - Interruption de *Q25.4*
- - Syndrome de *M31.4*
- ¬ Encéphalite de *A83.5*

Laband
v./v.a. Zimmermann-Laband

Labhart
v./v.a. Prader-Labhart-Willi

Labial
- Bilatérale
- - Fente de la partie alvéolaire ¬ Fente *Q37.4*
- - ¬
- - - Fente
- - - - *Q36.0*
- - - - Palatine, sans précision, avec fente *Q37.8*
- - - - Voile du palais avec fente *Q37.2*
- - - - Voûte
- - - - - Palais avec fente *Q37.0*
- - - - - Voile du palais avec fente *Q37.4*
- - - Malformations de la fente *Q36.0*
- Congénitale ¬ Fissure *Q36.9*
- Dystrophie des cônes et des bâtonnets ¬ Syndrome de fente *Q36.9, H35.5*
- Fente de la partie alvéolaire ¬ Fente *Q37.5*
- Inférieure ¬ Fistule *Q38.0*
- Isolée ¬ Fente *Q36.9*
- Médiane ¬ Fente *Q36.1*
- Naso-alvéolaire] ¬ Kyste (de): naso- *K09.1*
- Rétinopathie ¬ Syndrome de fente *Q36.9, H35.5*
- SAI ¬ Fente
- - *Q36.9*
- - Voile du palais avec fente *Q37.3*
- - Voûte
- - - Palais avec fente *Q37.1*
- - - Voile du palais avec fente *Q37.5*
- Supérieure) (inférieure) ¬ Gouttière: *C06.1*
- Unilatérale
- - Fente de la partie alvéolaire ¬ Fente *Q37.5*
- - ¬ Fente
- - - *Q36.9*
- - - Palatine, sans précision, avec fente *Q37.9*
- - - Voile du palais avec fente *Q37.3*
- - - Voûte
- - - - Palais avec fente *Q37.1*
- - - - Voile du palais avec fente *Q37.5*

Labial *–suite*
- ¬
- - Fente *Q36.9*
- - Fistule de la commissure *Q38.0*
- - Malformation de la fente *Q36.9*
- - Syndrome de microbrachycéphalie-ptosis-fente *Q87.8*

Labile
- Type
- - Borderline ¬ Personnalité émotionnellement *F60.31*
- - Impulsif ¬ Personnalité émotionnellement *F60.30*
- ¬
- - Carence en facteur *D68.22*
- - Déficit héréditaire en facteur *D68.22*
- - Personnalité émotionnellement *F60.3*
- - Petite taille par déficit primaire en sous-unité acide *E34.3*

Labilité [asthénie] émotionnelle organique ¬ *F06.6*

Labio-maxillaire
- Bilatérale ¬ Fente *Q37.0*
- Unilatérale ¬ Fente *Q37.1*
- ¬ Fente *Q37.1*

Labio-maxillo-palatine
- Bilatérale ¬ Fente
- - *Q37.4*
- - *Q37.4*
- Unilatérale ¬ Fente *Q37.5*

Labio-palatine
- Anomalies oculaires ¬ Syndrome caractérisé par des anomalies de l'oreille, une fente *Q87.0*
- Dysmorphie cranio-faciale-cardiopathie congénitale-surdité ¬ Syndrome de fente *Q87.0*
- Malrotation-cardiopathie ¬ Syndrome de fente *Q87.8*
- SAI ¬ Fente *Q37.9*
- Surdité-lipome sacré ¬ Syndrome de fente *Q87.8*
- ¬ Syndrome de contractures-dysplasie ectodermique-fente *Q87.8*

Laboratoire
- Négatif ¬ COVID-19 exclu par un test de *Z03.8*
- Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Mise en évidence par des examens de *R75*
- ¬
- - COVID-19 identifié par un test en *U07.1!*
- - Examens de *Z01.7*

Labrador ¬ Kératopathie de *H18.5*

Labrum
- Articulation de l'épaule ¬ Lésion du *S43.4*
- Atteinte dégénérative de l'articulation de l'épaule ¬ Lésion du *M75.6*
- Non précisée comme traumatique ¬ Lésion du *M75.6*

Labrune ¬ Syndrome de *I67.88†, G94.39**

Labyrinthe
- Atteinte de l'audition ¬ Dégénérescence congénitale du *Q16.5*
- Membraneux ¬
- - Agénésie du *Q16.5*
- - Anomalie du *Q16.5*
- - Aplasie du *Q16.5*
- - Hypoplasie du *Q16.5*
- Microtie et microdontie ¬ Surdité avec aplasie du *Q16.5*
- ¬
- - Hypersensibilité du *H83.2*
- - Hypofonction du *H83.2*
- - Perte de la fonction du *H83.2*
- - Vertige périphérique par atteinte du *H81.3*

Labyrinthiques ¬ Troubles des fonctions *H83.2*

Labyrinthite
- Syphilitique ¬ *A52.7†, H94.8**
- ¬ *H83.0*

Lacassie
v./v.a. Toriello-Lacassie-Droste

Lacération
- Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- Due à un avortement, en phase de suivi ¬ *O08.6*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Multiples SAI ¬ *T01.9*
- Muscle(s) SAI ¬ *T14.6*
- Oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire ¬ *S05.3*
- Œil SAI ¬ *S05.3*
- Perforation déchirure lésions origine chimique
- - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- Rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire ¬ *S05.2*
- SAI ¬ *T14.1*
- Tissu péri-urétral en tant que lésion due à l'accouchement chez la mère ¬ *O70.0*
- Vaginale en tant que complication de l'accouchement ¬ *O70.0*
- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Vessie ¬ *S37.22*

Lacete
v./v.a. Benallegue Lacete

Lacombe
v./v.a. Chassaing-Lacombe

Lacrymal
v./v.a. Canal lacrymal
v./v.a. Voie lacrymale
- Aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ Canaliculite *H04.3*
- ALSG] ¬ Aplasie des glandes salivaires et *Q10.4, Q38.4*
- Chronique ¬
- - Canaliculite *H04.4*
- - Mucocèle du sac *H04.4*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections de l'appareil *H06.0**
- Lacrymo-nasal ¬ Sténose
- - Canalicule *H04.5*
- - Sac *H04.5*
- SAI ¬ Malformation congénitale de l'appareil *Q10.6*
- Sans précision ¬ Affection de l'appareil *H04.9*
- ¬
- - Absence
- - - Agénésie de l'appareil *Q10.4*
- - - Orifice *Q10.4*
- - Affections de l'appareil *H04.8*
- - Atrésie de l'appareil *Q10.5*
- - Fistule *H04.6*
- - Malformations congénitales de l'appareil *Q10.6*
- - Sac
- - - *C69.5*
- - - *D31.5*
- - Syphilis tardive de l'appareil *A52.7†, H06.0**

Lacrymale
v./v.a. Glande lacrymale

Lacrymo-auriculo-dento-digital ¬ Syndrome *Q87.8*

Lacrymogène
- Coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz *Y35.7!*
- ¬ Effet toxique: Gaz *T59.3*

Lacrymo-nasal
v./v.a. Canal lacrymo-nasal
- ¬
- - Kyste *H04.6*
- - Mucocèle *H04.6*
- - Sténose
- - - Canal lacrymal, *H04.5*
- - - Canalicule lacrymal, *H04.5*
- - - Sac lacrymal, *H04.5*

Lactamine
v./v.a. bêtalactamine

Lactase ¬ Déficit
- Congénital en *E73.0*
- Secondaire en *E73.1*

Lactate
- Déshydrogénase ¬
- - Glycogénose par déficit en *E74.4*

Lactate *–suite*
- Déshydrogénase ¬ *–suite*
- - GSD par déficit en *E74.4*
- - ¬
- - - Myopathie métabolique par défaut de transport du *E74.8†, G73.6**
- - Syndrome de leucoencéphalopathie avec atteinte du tronc cérébral et de la moelle épinière-élévation des *G31.81*

Lactation
- Sans précision ¬ Anomalies de la *O92.7*
- ¬
- - Échec de *O92.3*
- - États mentionnés cours grossesse puerpéralité
- - - *O91*
- - - *O92*
- - Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la *P59.3*
- - Psychose de la *F53.1*
- - Subinvolution du sein (après *N64.8*
- - Suppression de la *O92.5*

Lactique
- Anémie sidéroblastique-défaillance multisystémique ¬ Syndrome d'anasarque-acidose *Q87.8*
- Congénitale type Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ Acidose *G31.88*
- Déficit en MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique mitochondriale avec acidose *I42.2*
- Déshydrogénase ¬ Augmentation des taux de transaminase et d'acide *R74.0*
- Épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, acidose *G31.81*
- Fatale avec acidurie méthylmalonique ¬ Acidose *E71.1, E87.2*
- Hyperammoniémie ¬ Hypotonie avec acidose *I42.2*
- Néonatale sévère par déficit en complexe NFS1-ISD11 ¬ Acidose *E87.2*
- Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose *G31.81*
- Surdité ¬ Syndrome de myopathie mitochondriale-acidose *G71.3*
- ¬
- - Acidose: *E87.2*
- - Syndrome de cardiomyopathie-hypotonie-acidose *I42.2*

Lactose
- Sans précision ¬ Intolérance au *E73.9*
- ¬ Autres intolérances au *E73.8*

Lactotrope hypophysaire ¬ Adénome *D35.2*

Lacunaire
- Moteur pur ¬ Syndrome *I67.9†, G46.5**
- Sensitif pur ¬ Syndrome *I67.9†, G46.6**
- ¬

Lacunaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Infarctus *I63.5*
- - Syndrome *I67.9†, G46.7**

LAD-II ¬ *D84.8*

Laere
v./v.a. Brown-Vialetto-van Laere

Lafora
- Début précoce ¬ Maladie à corps de *G40.3*
- ¬ Maladie de *G40.3*

Lagophtalmie ¬ *H02.2*

LAID ¬ Lymphadénopathie angio-immunoblastique
- *C86.5*
- Dysprotéinémie [*C86.5*

Laineux
- Hyperkératose palmoplantaire ¬ Syndrome de fragilité cutanée-cheveux *Q82.8*
- Kératodermie palmoplantaire ¬ Syndrome de cheveux *Q82.8*
- Sur nævus ¬ Cheveux *Q82.5*
- ¬ Cheveux *Q84.1*

Laing ¬ Myopathie distale précoce type *G71.08*

Laissé
- Accidentellement
- - Cavité corporel plaie opératoire
- - - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger *T81.5*
- - - ¬
- - - - Adhérences due(s) à un corps étranger *T81.5*
- - - - Occlusion due(s) à un corps étranger *T81.5*
- - - - Perforation due(s) à un corps étranger *T81.5*
- - Cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Réaction aiguë à une substance étrangère *T81.6*
- Électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique ¬ Sternum *M96.80*
- Place ¬ Racine dentaire *K08.3*

Lait
- Aliments régurgités ¬ Aspiration néonatale de *P24.3*
- Congénitales et augmentation du taux d'échanges entre chromatides sœurs ¬ Syndrome de retard de croissance intra-utérin avec multiples taches café-au- *Q02*
- Endogène ¬ Croûte de *L20.8*
- Épaissi ¬ Occlusion intestinale due à un *P76.2*
- Vache ¬
- - Allergie au *L27.2*
- - Hypocalcémie du nouveau-né, due au *P71.0*
- ¬
- - Croûte de *L21.0*
- - Maladie familiale des taches café-au- *L81.3*

Lait *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pneumonie par aspiration (de): *J69.0*
- - Taches café au *L81.3*

LAL ¬ Déficit en *E75.5*

Lallation ¬ *F80.0*

LAM
- Rémission complète ¬ Leucémie myéloïde aiguë [*C92.01*
- ¬ Leucémie myéloïde aiguë [*C92.00*

LAM M6 ¬ *C94.00*

LAMA5 [laminine-alpha-5] ¬ Syndrome multisystémique lié à *M79.89*

LAMB2 ¬ Syndrome néphrotique infantile lié à *N04.8*

Lambda associée à une synostose de la suture sagittale] ¬ BLSS [Synostose bilatérale de la suture *Q87.0*

Lambdoïde bilatérale non syndromique ¬ Craniosynostose *Q75.0*

Lambeau
- Pectoro-mammaire avec partie cutanée ¬ Rejet d'une mammoplastie par *T86.59*
- ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands *E88.22*

Lambert ¬ Syndrome de *Q87.8*

Lambert-Eaton ¬ Syndrome myasthénique de *C80.9†, G73.1**

Lambliase] ¬ Giardiase [*A07.1*

Lamb-Shaffer ¬ Syndrome de *Q93.5*

Lame
- Dentaire ¬ Kyste de la *K09.0*
- Sabre ¬ Déformation syphilitique du tibia en *A50.5†, M90.26**

Lamellaire ¬ Ichtyose *Q80.2*

Lamine A/C ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.08*

Laminectomie ¬ Cyphose après *M96.3*

Laminine
- Alpha 2 ¬ Dystrophie musculaire congénitale par déficit en *G71.2*
- Alpha-5] ¬ Syndrome multisystémique lié à LAMA5 [*M79.89*
- R23 ¬ Dystrophie musculaire des ceintures liée à la sous-unité alpha 2 de la *G71.08*

Laminopathie lipodystrophique sévère autosomique dominante ¬ *E88.1*

LAMP-2 ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Lampant] ¬ Kérosène [pétrole *T52.0*

LAMTOR2 ¬ Syndrome de déficit immunitaire primaire par déficit en *D82.8*

Lamy (léger) (sévère) ¬ Syndrome de: Maroteaux- *E76.2*

Landau-Kleffner] ¬ Aphasie acquise avec épilepsie [*F80.3*

Landing
v./v.a. Norman-Landing
- ¬ Maladie de *E75.1*

Landouzy ¬ Dystrophie musculaire de *G71.08*

Landouzy-Dejerine ¬ Dystrophie de *G71.08*

Landry-Guillain-Barré ¬ Syndrome de *G61.0*

Landsteiner
v./v.a. Donath-Landsteiner

Langage
v./v.a. Retard de langage
- Déficit en SOX5 ¬ Retard de développement et de *Q93.5*
- Dysmorphie
- - Faciale-déficience intellectuelle-trouble du comportement ¬ Syndrome de tremblement essentiel progressif-trouble sévère du *Q87.0*
- - Modérée
- - - Associé à FOXP1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-trouble sévère du *Q87.0*
- - - ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-trouble sévère du *Q87.0*
- Lié au développement NCA ¬ Déficit du *F80.9*
- Non précisés ¬ Troubles du *R47.8*
- Précipité] ¬ Bredouillement [*F98.6*
- Retard cognitif sévère ¬ Syndrome d'hypotonie musculaire-trouble sévère du *Q87.8*
- SAI ¬ Trouble du *F80.9*
- Strabisme-visage grimaçant-doigts longs ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-trouble du *Q87.8*
- Type expressif ¬ Trouble de l'acquisition du *F80.1*
- ¬
- - Difficultés de *R47.8*
- - Problèmes de *R47.8*
- - Syndrome de dysplasie spondylo-épiphysaire-brachydactylie-trouble du *Q77.7*
- - Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du *Z50.5!*
- - Trouble
- - - *R47.8*
- - - Développement du *F80.9*
- - - Spécifique du développement du *F80.9*
- - Troubles
- - - Développement de la parole et du *F80.8*
- - - Réceptifs du *F80.28*

Langat [LGTV] ¬ Encéphalite à virus de *A84.8*

Lange ¬ Syndrome de Cornelia de *Q87.1*

Lange-Nielsen ¬ Syndrome de Jervell et *I49.8*

Langer
v./v.a. Beemer-Langer
- ¬ Dysplasie mésomélique type *Q77.8*

Langer-Giedion ¬ Syndrome de *Q87.8*

Langerhans
v./v.a. Cellule de Langerhans
- SAI ¬ Hyperplasie cellule
- - Bêta des îlots de *E16.1*

Langerhans *–suite*
- SAI ¬ Hyperplasie cellule *–suite*
- - Îlots de *E16.9*
- ¬ îlots de *C25.4*

Langerhansienne aiguë et disséminée ¬ Histiocytose *C96.0*

Langes bleus ¬ Maladie des *E70.8*

Language-dystonie dopa-sensible-parkinsonisme ¬ Syndrome de retard développemental-troubles du *G25.88*

Langue
- Bifide ¬ *Q38.3*
- Chargée ¬ *K14.3*
- Crénelée ¬ *K14.8*
- Face
- - Inférieure ¬ Deux tiers antérieurs de la *C02.2*
- - Supérieure ¬ Deux tiers antérieurs de la *C02.0*
- Fissurée ¬ *K14.5*
- Géographique ¬ *K14.1*
- Gorge ¬ Syndrome de la *G24.0*
- Lésion à localisations contiguës ¬ Carcinome épidermoïde de la *C02.8*
- Lèvres ou les doigts ¬ Malocclusion due à: habitudes impliquant la *K07.5*
- Mobile ¬ Carcinome épidermoïde de la *C02.9*
- Myopathie myofibrillaire ¬ Syndrome de cyphose-atrophie de la *G71.8*
- Noir villeuse ¬
- - *K14.3*
- - *K14.3*
- Paraplégie spastique héréditaire ¬ Syndrome de cyphoscoliose-atrophie de la *G11.4*
- Plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.54*
- Plicaturée ¬ *K14.5*
- Polysyndactylie ¬ Syndrome d'anomalie cardiaque-hamartome de la *Q87.8*
- SAI ¬
- - Partie
- - - Fixe de la *C01*
- - - Mobile de la *C02.3*
- - Tiers moyen de la *C02.3*
- Sans précision ¬
- - Maladie de la *K14.9*
- - Tumeur maligne: Deux tiers antérieurs de la *C02.3*
- Scrotal ¬
- - *K14.5*
- - Syndrome d'ophtalmoplégie-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Striée ¬ *K14.5*
- ¬
- - Abcès
- - - *K14.0*
- - - Staphylocoques à la *K14.0, B95.8!*
- - Adhérence congénitale de la *Q38.3*

Langue *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Agénésie de la *Q38.3*
- - Anomalies de l'épithélium de la *K13*
- - Atrophie
- - - *K14.8*
- - - Papilles de la *K14.4*
- - Brièveté anormale du frein de la *Q38.1*
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] de la base de la *C01*
- - Carcinome épidermoïde
- - - *C02.9*
- - - Base de la *C01*
- - - Face
- - - - Dorsale de la *C02.0*
- - - - Inférieure de la *C02.2*
- - - Pointe et bords latéraux de la *C02.1*
- - Déchirure du frein de la *S01.54*
- - Duplication kystique de la *Q38.3*
- - Érythroplasie de l'épithélium buccal, y compris la *K13.2*
- - Face supérieure de la base de la *C01*
- - Fibrose sous-muqueuse de la *K13.5*
- - Fissure congénitale de la *Q38.3*
- - Frein de la *C02.2*
- - Gomme de la *A52.7†, K93.8**
- - Hypertrophie de la *K14.8*
- - Hypoplasie de la *Q38.3*
- - Leuco-œdème de l'épithélium buccal, y compris la *K13.2*
- - Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y compris la *K13.2*
- - Maladies de la *K14.8*
- - Malformation SAI congénitale de la *Q38.3*
- - Malformations congénitales de la *Q38.3*
- - Pointe de la *C02.1*
- - Rupture du frein de la *S01.54*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, K93.8**
- - Tiers postérieur de la *C01*
- - Tuberculose de la *A18.8†, K93.8**
- - Tumeur bénigne: *D10.1*
- - Tumeur maligne
- - - Base de la *C01*
- - - Face
- - - - Dorsale de la *C02.0*
- - - - Inférieure de la *C02.2*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C02.8*
- - - Pointe et bords latéraux de la *C02.1*
- - Ulcération (traumatique) de la *K14.0*

Lanugineuse ¬ Hypertrichose congénitale *Q84.2*

Lanugo ¬ Persistance du *Q84.2*

Laparocèle ¬ *K43.99*

Laparoschisis ¬ *Q79.3*

Lapin ¬
- Coup du *S13.4*
- Fièvre (de): transmise par le *A21*

Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du fœtus [trop grand pour l'âge gestationnel] [*O36.6*

L-arginine:glycine amidinotransférase ¬ Déficit en *E72.8*

Laron
- Déficit immunitaire ¬ Syndrome de *D82.2*
- ¬ Insuffisance staturale type
- - *E34.3*
- - *E34.3*

Larrey ¬ Hernie de *Q79.0*

Larsen
v./v.a. Sinding-Larsen-Johansson
- Autosomique dominant ¬ Syndrome de *Q74.8*
- Like
- - Nanisme ¬ Syndrome de dysplasie osseuse *Q87.1*
- - Type B3GAT3 ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - ¬ Syndrome létal de *Q87.1*

Larsen-Johansson ¬ Ostéochondrose de *M92.4*

Larsson
v./v.a. Sjögren-Larsson

Larva migrans viscérale ¬ *B83.0*

Larvaire ¬ Diphyllobothriase *B70.1*

Larve
- Anisakis ¬ Infection à *B81.0*
- Mouches ¬ infestation par *B87*
- Spirometra ¬ Infection à: *B70.1*

Laryngé
- Congénitale ¬ Paralysie *J38.00*
- Épiglotte ¬ Face postérieure (*C32.1*
- Hystérique ¬
- - Névrose *F44.4*
- - Spasme *F44.4*
- Oropharynx ¬ Carrefour pharyngo- *C10.8*
- Primaire ¬ Lymphangiome *D18.18*
- SAI ¬ Stridor congénital (*P28.8*
- ¬
- - Diphtérie *A36.2*
- - Myiase *B87.3*
- - Nodules *J38.2*
- - Repli ary-épiglottique versant
- - - *C32.1*
- - - *D02.0*
- - - *D38.0*
- - Spasme *J38.5*
- - Syndrome de dyskératose intraépithéliale de la cornée avec hyperkératose palmoplantaire et dyskératose *Q82.8*
- - Tumeur maligne: Cartilage *C32.3*

Laryngisme (striduleux) ¬ *J38.5*

Laryngite
- Aiguë
- - Œdémateuse ¬ *J04.0*
- - SAI ¬ *J04.0*
- - Sous-glottique ¬ *J04.0*
- - Suppurée ¬ *J04.0*
- - Ulcéreuse ¬ *J04.0*
- - ¬
- - - *J04.0*
- - - Trachéite (aiguë) avec *J04.2*
- Atrophique (sèche) ¬ *J37.0*
- Catarrhale ¬ *J37.0*
- Chronique
- - Trachéite (chronique) ¬ *J37.1*
- - ¬ *J37.0*
- Diphtérique ¬ *A36.2*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.1*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: *J10.1*
- Haemophilus influenzae ¬ *J04.0, B96.3!*
- Hypertrophique ¬ *J37.0*
- Obstructive
- - Aiguë [croup] ¬ *J05.0*
- - SAI ¬ *J05.0*
- Streptocoques ¬ *J04.0, B95.5!*
- Syphilitique
- - Congénitale
- - - Précoce ¬ *A50.0†, J99.8**
- - - ¬ *A50.5†, J99.8**
- - Tardive ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tuberculeuse
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.5*
- - ¬ *A16.4*
- Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J10.1*
- Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- ¬
- - Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09, U69.23!*
- - - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09, U69.22!*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une *J09, U69.24!*
- - Trachéite chronique avec *J37.1*

Laryngo
- Onycho-cutané [LOC] ¬ Syndrome *Q81.8*
- Pharyngite aiguë ¬ *J06.0*
- Trachéite
- - Aiguë ¬ *J04.2*
- - Chronique ¬ *J37.1*
- - Diphtérique ¬ *A36.2*
- - SAI ¬ *J04.2*

Laryngocèle
- Ventriculaire ¬ *Q31.3*
- ¬ *Q31.3*

Laryngomalacie congénitale ¬ *Q31.5*

Laryngotrachéal ¬ Angiome *D18.08*

Laryngotrachéite
- Haemophilus influenzae ¬ *J04.2, B96.3!*
- Sous-glottique obstructive ¬ *J05.0*
- Streptocoques ¬ *J04.2, B95.5!*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.5†, J99.8**
- - Tardive ¬ *A52.7†, J99.8**

Laryngo-trachéo-œsophagienne ¬ Fente *Q34.8*

Larynx
- Artificiel ¬ Présence d'un *Z96.3*
- Associé à un retard mental ¬ Syndrome de paralysie des muscles abducteurs du *J38.00*
- Cartilage thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du *Q31.8*
- Confirmation bactériologique
- - Biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de: *A15.5*
- - Histologique ¬ Tuberculose du *A15.5*
- Diphtérique ¬ Ulcère du *A36.2*
- Due à la diphtérie ¬ Paralysie du *A36.2*
- Extrinsèque ¬ *C32.1*
- Glottique ¬ Ptérygion du *Q31.0*
- Localisations contiguës ¬ Carcinome épidermoïde du *C32.8*
- Périchondrite ¬ Syphilis du *A52.7†, J99.8**
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- - ¬ Ptérygion du *Q31.0*
- Sans précision ¬
- - Malformation congénitale du *Q31.9*
- - Tumeur maligne: *C32.9*
- Sous-glottique ¬ Ptérygion
- - *Q31.0*
- - *Q31.0*
- Trachée
- - Poumon ¬
- - - Brûlure comprenant le *T27.1*
- - - Corrosion comprenant le *T27.5*
- - ¬
- - - Brûlure du *T27.0*
- - - Corrosion du *T27.4*
- - - Écrasement du *S17.0*
- ¬
- - *S10.0*

Larynx *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *S12.8*
- - *Z90.0*
- - Abcès du *J38.7*
- - Amylose du *E85.4†, J99.8**
- - Atrésie du *Q31.8*
- - Blessure
- - - *S19.9*
- - - *S19.9*
- - Carcinoma in situ: *D02.0*
- - Carcinome épidermoïde du *C32.9*
- - Corps étranger dans le *T17.3*
- - Gomme du *A52.7†, J99.8**
- - Hypoplasie du *Q31.2*
- - Léiomyosarcome
- - - *C32.9*
- - - Lésion à localisations contiguës du *C32.8*
- - Lipoïdose du *E75.6*
- - Maladie SAI du *J38.7*
- - Maladies du *J38.7*
- - Malformations congénitales du *Q31.8*
- - Membrane
- - - Glottique du *Q31.0*
- - - Sous-glottique du *Q31.0*
- - Musculature intrinsèque du *C32.0*
- - Nécrose du *J38.7*
- - Néoplasie du *D38.0*
- - Œdème du *J38.4*
- - Pachydermie du *J38.7*
- - Palmure congénitale du *Q31.0*
- - Paralysie
- - - *J38.00*
- - - Complète unilatérale du *J38.02*
- - - Muscles du *J38.00*
- - - Partielle
- - - - Bilatérale du *J38.03*
- - - - Unilatérale du *J38.01*
- - Périchondrite
- - - *J38.7*
- - - Syphilitique tardive du *A52.7†, J99.8**
- - Phlegmon du *J38.7*
- - Polype des cordes vocales et du *J38.1*
- - Ptérygion du *Q31.0*
- - Rétrécissement syphilitique
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Congénitale du *A50.5†, J99.8**
- - Sténose
- - - *J38.6*
- - - Congénitale du *Q31.8*
- - - Syphilitique
- - - - *A52.7†, J99.8**
- - - - Congénitale du *A50.5†, J99.8**
- - Syphilis du *A52.7†, J99.8**
- - Syphilis tardive du *A52.7†, J99.8**

Larynx *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Trachée thoracique: *S11.01*
- - Tuberculose du *A16.4*
- - Tumeur bénigne: *D14.1*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du *C32.8*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - *C32.9*
- - - Bénigne du *D14.1*
- - - Incertain du *D38.0*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D38.0*
- - Ulcération du *J38.7*

Lassa ¬ Fièvre de *A96.2*

Lassitude ¬ *R53.9*

Lassueur
v./v.a. Little-Piccardi-Lassueur

LAT ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en *D81.2*

Latence
- Lymphœdème ¬ Stade de *I89.08*
- ¬ Inertie utérine pendant la phase de *O62.0*

Latent
v./v.a. Type de maladie

Late-onset] ¬ Insuffisance hépatique à début tardif [*K72.0*

Latéral
v./v.a. Type de maladie

Lathostérolose ¬ *Q87.8*

Latum ¬ Infection due à une forme adulte de Diphyllobothrium *B70.0*

Laubry-Pezzi ¬ Syndrome de *Q21.0, Q23.1*

Launois-Bensaude ¬ Lipomatose de *E88.8*

Laurell-Eriksson ¬ Syndrome de *E88.00*

Laurence-Moon ¬ Syndrome de *Q87.8*

Laurin-Sandrow ¬ Syndrome de *Q87.2*

Lavage bronchique ¬ Résultats anormaux de: *R84*

Laveurs fromage
- Exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.81*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.80*
- ¬ Poumon
- - *J67.8*
- - *J67.80*

Lawrence ¬ Syndrome de *E88.1*

Laxa
- Acquise ¬ Cutis *L98.8*
- Autosomique
- - Dominante ¬ Cutis *Q82.8*
- - Récessive type
- - - 1 ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 1C ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 2 ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 2A ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 2B ¬ Cutis *Q82.8*

Laxa *–suite*
- Congenita [Cutis laxa hyperelastica] [Cutis laxa (hereditaria)] ¬ Cutis *Q82.8*
- Hereditaria)] ¬ Cutis laxa congenita [Cutis laxa hyperelastica] [Cutis *Q82.8*
- Hyperelastica
- - Cutis laxa (hereditaria)] ¬ Cutis laxa congenita [Cutis *Q82.8*
- - ¬ Cutis *Q82.8*
- Hyperlaxité ligamentaire-retard de développement ¬ Syndrome de cutis *Q82.8*
- Néonatale-habitus marfanoïde ¬ Syndrome de cutis *Q87.8*
- Scoliose] ¬ Syndrome MACS [macrocéphalie-alopécie-cutis *Q82.8*
- Senilis ¬ Cutis *L57.4*

Laxatifs
- Salins et osmotiques ¬ Intoxication: *T47.3*
- Stimulants ¬ Intoxication: *T47.2*
- ¬
- - Intoxication: Autres *T47.4*
- - Prise régulière de *F55*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.1*

Laxité
- Ligamentaire
- - Familiale ¬ *M35.7*
- - Région pelvienne ¬ *M24.25*
- - SAI ¬ *M24.2*
- - ¬ Syndrome
- - - Déficience intellectuelle-cardiopathie congénitale-petite taille- *Q87.1*
- - - Dysmorphie-pectus carinatum- *Q79.8*
- Ligaments du genou ¬ *M23.8*

Laxova
v./v.a. Neu-Laxova
v./v.a. Petty-Laxova-Wiedemann

Lazarus
v./v.a. Bamforth-Lazarus

LBWC ¬ Syndrome *Q87.8*

LCAT ¬ Déficit
- *E78.6*
- Familial complet en *E78.6*

LCHAD ¬ Déficit en *E71.3*

LCK [tyrosine kinase spécifique des lymphocytes] ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en *D81.2*

LCR ¬ Dérivation du *Z98.2*

LDH ¬ Déficit en *E74.4*

LDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse densité [*E78.0*

LDM Myéloschisis dorsal limité
- Non sacculaire ¬ *Q76.0*
- Sacculaire ¬ *Q76.0*

Le Fort
- I ¬ Fracture de *S02.48*
- Type
- - II ¬ Fracture de *S02.49*
- - III ¬ Fracture de *S02.49*

Léage
v./v.a. Papillon-Léage-Psaume

Leary
v./v.a. Winship-Viljoen-Leary

Leber ¬
- Amaurose
- - Congénitale de *H35.5*
- - Tapéto-rétinienne de *H35.5*
- Atrophie
- - Héréditaire du nerf optique au cours de la maladie de *H47.2*
- - Nerf optique au cours de la maladie de *H47.2*
- Neuropathie optique héréditaire de *H47.2*
- Syndrome de dysplasie spondylo-épiphysaire-surdité neurosensorielle-déficience intellectuelle-amaurose congénitale de *Q87.1*

Leber hereditary optic neuropathy] plus ¬ Maladie de LHON [*G31.81*

Lécithine-cholestérol-acyltransférase ¬
- Déficit en: *E78.6*
- Glomérulonéphrite au cours d'un déficit en *E78.6†, N08.4**
- Glomérulopathie au cours de déficit en *E78.6†, N08.4**

Lecture
- Écriture ¬ Faible niveau de *Z55*
- ¬
- - Crises réflexes à la *G40.8*
- - Retard spécifique
- - - *F81.0*
- - - Orthographe (sans trouble de la *F81.1*
- - Trouble spécifique de la *F81.0*

Ledderhose ¬ Maladie de *M72.2*

Lederer ¬ Anémie hémolytique de *D59.18*

Lederer-Brill ¬ Syndrome de *D59.18*

Lee
v./v.a. Lynch-Lee-Murday

Lefèvre
v./v.a. Papillon-Lefèvre

Legg-Calvé-Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [*M91.1*

Legionella pneumophila
- Sans pneumonie ¬ Infection à *A48.2*
- ¬ Infection à *A48.1*

Légionellose ¬ *A48.1*

Légionnaire ¬ Pneumonie du *A48.1*

Légionnaires
- Pneumonie ¬ Maladie des *A48.1*
- Sans pneumonie ¬ Maladie des *A48.2*
- ¬ Maladie des *A48.1*

Legius
- Mosaïque ¬ Syndrome de *Q85.0*
- ¬ Syndrome de *Q85.0*

Lehmann
v./v.a. Borjeson-Forssman-Lehmann

Leibo
v./v.a. Gershoni-Baruch-Leibo

Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C activée [mutation du facteur V *D68.5*

Leigh
- Cardiomyopathie ¬ Syndrome de *G31.88†, I43.8**
- Leucodystrophie ¬ Syndrome de *G31.88, E75.2*
- Syndrome néphrotique ¬ Syndrome de *G31.88†, N08.8**
- Transmission maternelle ¬ Maladie de *G31.88*
- Type Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ Syndrome de *G31.88*
- ¬ Encéphalomyélopathie nécrosante subaiguë [syndrome de *G31.88*

Leigh-like-acidurie 3-méthylglutaconique-surdité-encéphalopathie] ¬ Syndrome MEGDEL [Syndrome *G31.88*

Leiner-Moussous ¬ Maladie de *L21.1*

Léiomyomatose
- Diffuse ¬ Syndrome d'Alport lié à l'X- *Q87.8*
- Héréditaire avec carcinome à cellules rénales ¬ *C64, D21.9*
- Intravasculaire ¬ *D48.1*
- Péritonéale disséminée ¬ *D20.1*
- ¬ *D48.1*

Léiomyome
- Intramural de l'utérus ¬ *D25.1*
- Orbitaire ¬ *D31.6*
- Sous-muqueux de l'utérus ¬ *D25.0*
- Sous-séreux de l'utérus ¬ *D25.2*
- Utérin ¬ Accouchement en présence d'un *O34.1*
- Utérus, sans précision ¬ *D25.9*

Léiomyosarcome
- Col de l'utérus
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C54.8*
- - ¬ *C53.9*
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Diverticule de Meckel ¬ *C17.3*
- Duodénum ¬ *C17.0*
- Endocol ¬ *C53.0*
- Estomac ¬ *C16.9*
- Étage
- - Sous-glottique ¬ *C32.2*
- - Sus-glottique ¬ *C32.1*
- Exocol ¬ *C53.1*
- Fond de l'utérus ¬ *C54.3*
- Glotte ¬ *C32.0*
- Iléon ¬ *C17.2*
- Intestin grêle ¬ *C17.9*
- Isthme de l'utérus ¬ *C54.0*
- Jéjunum ¬ *C17.1*
- Jonction
- - Cervico-vaginale ¬ *C53.8*
- - Duodéno-jéjunale ¬ *C17.8*
- L 'endomètre ¬ *C54.1*
- Larynx ¬ *C32.9*

Léiomyosarcome *–suite*
- Lésion à localisations contiguës du larynx ¬ *C32.8*
- Mésentère ¬ *C48.1*
- Myomètre ¬ *C54.2*
- Rétropéritoine ¬ *C48.0*
- Utérus ¬ *C55*
- Vagin ¬ *C52*
- Veine cave inférieure ¬ *C49.4*
- ¬ *C49.9*

Leishmaniose
- Cutanée ¬ *B55.1*
- Cutanéo-muqueuse ¬ *B55.2*
- Viscérale ¬ *B55.0*
- ¬
- - *B55.9*
- - Infection parasitaire de la paupière au cours de *B55.1†, H03.0**
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z26.0*

Lejeune ¬ Syndrome de *Q93.4*

Lelis ¬ Syndrome de *Q82.4*

Lemierre ¬ Syndrome de *I80.88*

Lemli
v./v.a. Smith-Lemli-Opitz

Lenaerts
v./v.a. Piussan-Lenaerts-Mathieu

Lenègre
- Familiale ¬ Maladie de *I45.8*
- Héréditaire ¬ Maladie de Lev- *I45.8*

Lenk-Ploski ¬ Syndrome de *G23.8*

Lennert ¬ Lymphome de *C84.4*

Lennox-Gastaut ¬ Syndrome de *G40.4*

Lent
- Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome coronarien à flux *I20.8*
- Corps) ¬ Blessure de reperfusion (retour absent ou *T88.8*
- Fœtus, sans précision ¬ Croissance *P05.9*
- Nerf cubital ¬ Paralysie *G56.2*
- Nouveau-né ¬ Alimentation *P92.2*
- Subaiguë ¬ Endocardite *I33.0*
- ¬
- - Constipation à transit *K59.00*
- - Endocardite *I33.0*
- - ESES [état de mal épileptique électrique pendant le sommeil *G40.01*
- - Maladie due au VIH avec infection à virus *B20, A81.9*
- - POCS [CSWS] [pointes ondes continues pendant le sommeil *G40.01*
- - Rythme cardiaque *R00.1*

Lenteur
- Manque de réactivité ¬ *R46.4*
- Travail SAI ¬ *O63.9*

Lenticône postérieur, vitré primaire hyperplasique persistant et colobome ¬ Syndrome microcornéen avec *Q15.8*

Lenticulaire
v./v.a. hépato-lenticulaire
- Persistante ¬ Hyperkératose *L85.8*
- Progressive ¬ Mélanose *Q82.1*

Lentigines
- Multiples familial ¬ Syndrome des *Q87.1*
- ¬ PUVA *L81.4*

Lentiginose
- Cardiomyopathique ¬ *Q87.1*
- Généralisée familiale ¬ *L81.4*
- ¬
- - Dissection
- - - Artère rénale- *I72.2, L81.4*
- - - Carotide- *I72.0, L81.4*
- - Syndrome de dissection artérielle- *I72.9, L81.4*

Lentigo ¬ *L81.4*

Lentille
- Intraoculaire ¬ Complication mécanique d'une *T85.2*
- Rigide ¬ Cataracte due à une *H26.88*

Lentille de contact ¬
- *Z97.8*
- Intolérance aux *H18.8*
- Iridocyclite due aux *H20.2*

Lentis ¬ Pseudoexfoliation *H26.80*

Lentivirus ¬ *B97.3!*

Lenz
v./v.a. Appelt-Gerken-Lenz
v./v.a. Cenani-Lenz
- ¬ Microphtalmie type *Q11.2*

Lenz-Majewski ¬ Nanisme de *Q87.1*

Léontiasis syphilitique congénitale ¬ *A50.5†, M90.89**

Lepore-bêta-thalassémie ¬ Hémoglobine *D56.8*

Lepra interpolaris ¬ *A30.8*

Leprae ¬ Infection
- Mycobacterium *A30*
- Oculaire à Mycobacterium *A30.9†, H58.8**

Lèpre
- BL] ¬ Lèpre lépromateuse de type intermédiaire atypique [*A30.4*
- Indéterminée [Groupe indéterminé (I)] ¬ *A30.0*
- Lépromateuse
- - Lépromateuse polaire (LL)] ¬ *A30.5*
- - Type intermédiaire atypique [lèpre BL] ¬ *A30.4*
- TT] ¬ Lèpre tuberculoïde de type intermédiaire atypique [*A30.2*
- Tuberculoïde
- - Tuberculoïde polaire (TT)] ¬ *A30.1*
- - Type intermédiaire atypique [lèpre TT] ¬ *A30.2*
- Type intermédiaire atypique [BB-Lepra] ¬ *A30.3*
- ¬
- - *A30.9*

Lèpre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Formes de *A30.8*
- - Séquelles de *B92*

Lepréchaunisme ¬
- *E34.8*
- Syndrome de *E34.8*

Lépromateuse
- Lépromateuse polaire (LL)] ¬ Lèpre *A30.5*
- Polaire (LL)] ¬ Lèpre lépromateuse [*A30.5*
- Type intermédiaire atypique [lèpre BL] ¬ Lèpre *A30.4*

Leptine
- Enfant adolescent 3 18 ¬ Obésité
- - Déficit congénital en *E66.84*
- - Due à une résistance congénitale à la *E66.84*
- - Extrême
- - - Déficit congénital en *E66.85*
- - - Due à une résistance congénitale à la *E66.85*
- - - Mutations du gène récepteur à la *E66.85*
- - Mutations du gène récepteur de la *E66.84*
- Indice de masse corporelle IMC
- - 60 plus adulte ¬ Obésité
- - - Déficit congénital en *E66.88*
- - - Due à une résistance congénitale à la *E66.88*
- - - Mutations du gène récepteur de la *E66.88*
- - Compris
- - - 30 35 adulte ¬ Obésité
- - - - Due à une résistance congénitale à la *E66.80*
- - - - Mutations du gène récepteur de la *E66.80*
- - - 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ Obésité due à une résistance congénitale à la *E66.81*
- - - 40 50 adulte ¬ Obésité
- - - - Déficit congénital en *E66.86*
- - - - Due à une résistance congénitale à la *E66.86*
- - - - Mutations du gène récepteur de la *E66.86*
- - - 50 60 adulte ¬ Obésité
- - - - Déficit congénital en *E66.87*
- - - - Due à une résistance congénitale à la *E66.87*
- - - - Mutations du gène récepteur de la *E66.87*
- Mélanocortine ¬ Obésité monogénique due à une anomalie de la voie *E66.89*
- ¬ Obésité
- - Déficit
- - - Congénital en *E66.89*
- - - Récepteur de la *E66.89*
- - Due à une résistance congénitale à la *E66.89*

Leptoméninge
- Diffuse
- - Méninge
- - - Rachidiennes ¬ Mélanocytose *D42.1*
- - - ¬ Mélanocytose *D42.0*
- - ¬ Mélanocytose *D42.9*
- ¬
- - Gomme de la *A52.1†, G07**
- - Neurosyphilis des *A52.1†, G01**
- - Tuberculose *A17.0†, G01**

Leptoméningiome ¬ *D32.9*

Leptoméningite
- Bactérienne ¬ *G00*
- Due à des causes autres et non précisées ¬ *G03*
- Tuberculeuse
- - Cérébrale ¬ *A17.0†, G01**
- - Spinale ¬ *A17.0†, G01**
- - ¬ *A17.0†, G01**

Leptomyélolipoma ¬ *Q05.7*

Leptospira
- Interrogans
- - Autumnalis ¬ Infection à *A27.8*
- - Canicola ¬ Infection à *A27.8*
- - Hebdomadis ¬ Infection à *A27.8*
- - Pomona ¬ Infection à *A27.8*
- - ¬ Infection à *A27.9*
- ¬ Méningite à *A27.9†, G01**

Leptospires ¬
- Ictère hémorragique à *A27.0*
- Infection à *A27.9*

Leptospirose
- Ictéro hémorragique
- - Maladie de Weil] ¬ *A27.0*
- - ¬ *A27.0*
- ¬ Autres formes de *A27.8*

Leptospirosis
- Autumnalis ¬ *A27.8*
- Canicola ¬ *A27.8*
- ¬ *A27.9*

Leptospirosis pomona ¬ *A27.8*

Lequesne] ¬ Ostéoporose localisée [*M81.6*

Leri
v./v.a. Roch-Leri

Léri
- II ¬ Syndrome de *Q78.8*
- ¬ Pléonostéose de *Q68.8*

Leriche
- Fontaine
- - Gangrène ¬ Stade IV de *I70.25*
- - Ulcération ¬ Stade IV de *I70.24*
- - ¬
- - - AOMI type bassin-jambe stade
- - - - IIb de *I70.22*
- - - - III de *I70.23*
- - - - IV de *I70.25*

Leriche *–suite*
- Fontaine *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - AOMI type bassin-jambe stade *–suite*
- - - - IVa de *I70.25*
- - - - IVb de *I70.25*
- - - Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI], sans précision du stade (de *I70.29*
- - - Gangrène
- - - - Humide, stade IVb de *I70.25*
- - - - Sèche, stade IVa de *I70.25*
- - - Stade
- - - - I de *I70.20*
- - - - IIa de *I70.21*
- - - - IIb de *I70.22*
- - - - III de *I70.23*
- - - Trouble circulatoire d'après *I70.29*
- ¬
- - Atrophie osseuse de Sudeck- *G90.5*
- - Syndrome de la bifurcation aortique [syndrome de *I74.0*

Léri-Joanny [mélorhéostose] ¬ Syndrome de *M85.89*

Léri-Weill ¬ Syndrome de *Q77.8*

Lerman
v./v.a. Ahn-Lerman-Sagie

Lermoyez ¬ Syndrome de *H81.3*

Leroy ¬ Maladie de Fiessinger- *M02.39*

Lesch-Nyhan ¬
- Arthropathie goutteuse au cours de syndrome de *E79.1†, M14.09**
- Syndrome de *E79.1*

Léser ou de tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre personne de *Y09.9!*

Leser-Trélat ¬ Maladie de *L82*

Létal
- Acantholytique ¬ Épidermolyse bulleuse *Q81.0*
- Associée à NEK9 ¬ Dysplasie squelettique *Q77.8*
- Autosomique récessive
- - Associé à MYBPC1 ¬ Syndrome d'arthrogrypose multiple congénitale non *Q74.3*
- - ¬
- - - Chondrodysplasie *Q78.8*
- - - Polyneuropathie sensitivo-motrice néonatale *G60.0*
- Cardiomyopathie par non-compaction du ventricule gauche associé à des crises d'épilepsie, une hypotonie, une cataracte et un retard de développement ¬ Syndrome *G31.81*
- Congénitale type Compton-North ¬ Myopathie *G71.2*
- Déficit
- - Complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile *I42.2*

Létal *–suite*
- Déficit *–suite*
- - Fibuline-4 ¬ Syndrome d'artériopathie *Q25.8*
- - NADH-coenzyme Q réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile *I42.2*
- - NADH-CoQ réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile *I42.2*
- Développement cardiaque et cérébral ¬ Anomalies *Q87.8*
- Encéphalocèle occipital-dysplasie squelettique ¬ Syndrome *Q87.5*
- Fœtal d'agénésie/hypoplasie cérébro-réno-génito-urinaire ¬ Syndrome *Q87.8*
- Hypoplasie pontocérébelleuse hypotonie insuffisance respiratoire
- - Délétions bialléliques dans le cluster de gènes ATAD3 ¬ Syndrome *Q04.3*
- - Mutation ponctuelle ¬ Syndrome *Q04.3*
- - ¬ Syndrome *Q04.3*
- Infantile
- - Cataracte et atteinte cardiaque associé à ITPA ¬ Trouble neurologique *G40.4*
- - ¬ Myopathy mitochondriale *G71.3*
- Kniest-like ¬ Dysplasie *Q78.8*
- Larsen-like ¬ Syndrome *Q87.1*
- Liée à l'X du syndrome des ptérygiums multiples ¬ Forme *Q87.8*
- Ligne médiane ¬ Granulome *C86.0*
- Maladie de stockage du glycogène ¬ Cardiomyopathie hypertrophique congénitale *E74.0†, I43.1**
- Non-compaction ventriculaire gauche-convulsions-hypotonie-cataracte-retard de développement ¬ Syndrome *G31.81*
- Omphalocèle-fente palatine ¬ Syndrome *Q87.8*
- Spasticité-encéphalopathie épileptique ¬ Syndrome néonatal *G40.4, R09.2*
- Syndrome des ptérygiums multiples ¬ Forme *Q87.1*
- Type
- - Amish ¬ Microcéphalie *Q02*
- - Boissel ¬ Syndrome polymalformatif *Q87.8*
- - Greenberg ¬ Dysplasie squelettique *Q77.3*
- - Holmgren-Forsell ¬ Dysplasie osseuse *Q78.8*
- ¬
- - Dysplasie
- - - Facio-cardio-mélique *Q87.8*
- - - Osseuse ostéosclérotique *Q78.2*
- - Épidermolyse bulleux
- - - *Q81.1*
- - - Jonctionnelle *Q81.1*
- - Érythrodermie congénitale *L21.1*
- - Maladie de Gaucher périnatale *E75.2*
- - Myopathie précoce avec cardiomyopathie *G71.8*
- - Syndrome

Létal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Contractures congénitales *Q68.8*
- - - Hydranencéphalie-hernie diaphragmatique *Q04.3, Q79.0*
- - - Malformation cérébrale-atrésie duodénale-hypoplasie rénale bilatérale fœtal *Q87.8*
- - - Photosensibilité cutanée-colite *K52.8, L57.8*
- - - Ptérygiums multiples autosomique récessif non *Q87.1*

Léthargie ¬ *R53.9*

Léthargique ¬ Encéphalite *A85.8†, G05.1**

Letpine avec indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ Obésité par mutations du gène récepteur de la *E66.81*

Létrozole ¬ Intoxication par *T50.9*

Letterer-Siwe ¬ Maladie d'Abt- *C96.0*

Leucémie
v./v.a. Pseudoleucémie
- Agressif Cellule NK
- - Rémission complète ¬ *C94.71*
- - ¬ *C94.70*
- Associée à une ostéosclérose ¬ *D47.4*
- Basophile ¬ *C94.30*
- Burkitt ¬ *C91.80*
- Cellule T adulte
- - Associé au HTLV-1) ¬ *C91.50*
- - Associée au HTLV-1) en rémission complète ¬ *C91.51*
- - ¬ *C91.50*
- Cellules non précisées ¬ Autres *C95.7*
- Cellules souches de lignée incertaine ¬ *C95.0*
- Grands lymphocytes
- - Granuleux T ¬ *C91.70*
- - T granuleux ¬ *C91.70*
- Granulocytaire ¬ *C92*
- Granulocytique chronique
- - Rémission complète ¬ *C92.11*
- - ¬ *C92.10*
- Lymphocytaire chronique
- - Rémission complète ¬ *C91.11*
- - ¬ *C91.10*
- Lymphocytique aiguë ¬ *C91.00*
- Lymphoplasmocytoïde en rémission complète ¬ *C91.11*
- Mastocytes
- - Rémission complète ¬ *C94.31*
- - ¬
- - - *C94.30*
- - - Variante aleucémique de la *C94.30*
- Mégacaryocytaire aiguë ¬ *C94.20*
- Monoblastique aiguë
- - Rémission complète ¬ *C93.01*
- - ¬ *C93.00*

Leucémie *–suite*
- Monocytoïde ¬ *C93*
- Myéloblastique aiguë
- - Associée à une translocation t(8;16)(p11;p13) ¬ *C92.00*
- - LMA] ¬ *C92.0*
- - Type associée à une translocation t(8;21)(q22;q22) ¬ *C92.00*
- Myélogène
- - Chronique ¬ *C92.10*
- - ¬ *C92*
- Myéloïde
- - Aiguë
- - - Altérations du gène MLL ¬ *C92.60*
- - - Associée
- - - - Inv(3)(q21q26.2) ¬ *C92.00*
- - - - Mutations somatiques de NPM1 ¬ *C92.00*
- - - - T(3;3)(q21;q26.2) ¬ *C92.00*
- - - - T(6;9)(p23;q34) ¬ *C92.00*
- - - - T(9;11)(p22;q23) ¬ *C92.00*
- - - - T(9;22)(q34.1;q11.2) ¬ *C92.00*
- - - Cours syndrome
- - - - Familial de monosomie 7 ¬ *C92.00*
- - - - Prédisposition tumorale liée gène
- - - - - DDX41 ¬ *C92.00*
- - - - - DDX41 en rémission complète ¬ *C92.01*
- - - - - MBD4 ¬ *C92.00*
- - - Différenciation minimale ¬ *C92.00*
- - - Due
- - - - Agents alkylants ¬ *C92.00*
- - - - Inhibiteur de la topoisomérase de type II ¬ *C92.00*
- - - Dysplasie multilinéaire
- - - - Rémission complète ¬ *C92.81*
- - - - ¬ *C92.8*
- - - LAM
- - - - Rémission complète ¬ *C92.01*
- - - - ¬ *C92.00*
- - - M6 a b
- - - - Rémission complète ¬ *C94.01*
- - - - ¬ *C94.00*
- - - M7
- - - - Rémission complète ¬ *C94.21*
- - - - ¬ *C94.20*
- - - Maturation) ¬ *C92.0*
- - - Mégacaryoblastique associée à t(1;22)(p13;q13) ¬ *C94.20*
- - - Mutations somatiques de CEBPA ¬ *C92.00*
- - - Réfractaire à un traitement d'induction ¬ *C92.00*
- - - ¬ Syndrome des plaquettes familial associé à une prédisposition à la *D69.1*
- - Chronique
- - - Atypique BCR/ABL négative
- - - - Rémission complète ¬ *C92.21*

Leucémie *–suite*
- Myéloïde *–suite*
- - Chronique *–suite*
- - - Atypique BCR/ABL négative *–suite*
- - - - ¬ *C92.20*
- - - BCR/ABL positive ¬ *C92.10*
- - - Chromosome Philadelphie (Ph1) positive ¬ *C92.10*
- - - LMC
- - - - BCR/ABL positive en rémission complète ¬ *C92.11*
- - - - Chromosome Philadelphie (Ph1) positive en rémission complète ¬ *C92.11*
- - - - Rémission complète ¬ *C92.11*
- - - - ¬
- - - - - *C92.10*
- - - - - Crise blastique au cours d'une *C94.8!*
- - - T(9;22) (q34;q11)
- - - - Rémission complète ¬ *C92.11*
- - - - ¬ *C92.10*
- - Sans précision ¬ *C92.9*
- - ¬
- - - *C92.7*
- - - Poussée blastique au cours de *C92.10, C94.8!*
- Myélomonocytaire
- - Aiguë
- - - Rémission complète ¬ *C92.51*
- - - ¬ *C92.50*
- - Chronique LMMC
- - - Éosinophilie
- - - - Rémission complète ¬ *C93.11*
- - - - ¬ *C93.10*
- - - Rémission complète ¬ *C93.11*
- - - ¬ *C93.10*
- - Juvénile
- - - LMMJ
- - - - Rémission complète ¬ *C93.31*
- - - - ¬ *C93.30*
- - - ¬ Syndrome Noonan-like avec *Q87.0, C93.30*
- Plasmocytaire
- - Rémission complète ¬ *C90.11*
- - ¬ *C90.10*
- Plasmocytes en rémission complète ¬ *C90.11*
- Précisées ¬ Autres *C94.7*
- Prolymphocytaire
- - Cellule B
- - - Rémission complète ¬ *C91.31*
- - - ¬ *C91.3*
- - Cellules T en rémission complète ¬ *C91.61*
- Promyélocytaire
- - Aiguë
- - - Rémission complète ¬ *C92.41*
- - - ¬ *C92.40*

Leucémie *–suite*
- Promyélocytaire *–suite*
- - Cellules T ¬ *C91.60*
- Réfractaire au traitement d'induction standard ¬ *C95.8!*
- Sans précision ¬ *C95.9*
- Secondaire due à l'irradiation ¬ *C95.90*
- T de l'adulte ¬ *C91.50*
- Tricholeucocytes
- - Classique
- - - Rémission complète ¬ *C91.41*
- - - ¬ *C91.40*
- - Rémission complète ¬ HCL-V [variante de la *C91.41*
- - ¬ *C91.40*
- ¬
- - Antécédents familiaux de *Z80.6*
- - Antécédents personnels de *Z85.6*
- - Arthrite au cours de *C95.90†, M36.1**
- - Arthropathie au cours de *C95.90†, M36.1**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *C95.90†, N16.1**
- - Pyélonéphrite au cours de *C95.90†, N16.1**
- - Trouble tubulo-interstitiel au cours de *C95.90†, N16.1**

Leucémie aiguë
- Basophile
- - Rémission complète ¬ *C94.71*
- - ¬ *C94.70*
- Biclonale ¬ *C95.0*
- Biphénotypique ¬ *C95.0*
- Cellules non précisées ¬ *C95.0*
- Lignée mixte en rémission complète ¬ *C95.01*
- Lymphoblastique précurseur
- - B
- - - Rémission complète ¬ B-ALL [*C91.01*
- - - ¬
- - - - *C91.00*
- - - - B-ALL [*C91.00*
- - T
- - - Rémission complète ¬ *C91.01*
- - - ¬ *C91.00*
- Mégacaryocytes
- - Rémission complète ¬ *C94.21*
- - ¬ *C94.20*
- Myéloïde
- - Associée à des anomalies en 11q23 ¬ *C92.60*
- - Cours de syndrome de déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements ¬ *C92.00*
- - Éosinophile médullaire anormaux associée
- - - Inv(16)(p13q22) ¬ *C92.50*
- - - T(16;16)(p13;q22) ¬ *C92.50*
- - Familiale ¬ *C92.00*

Leucémie aiguë *–suite*
- Myéloïde *–suite*
- - Syndromes myélodysplasiques liés aux radiations ¬ *C92.00*
- Phénotype mixte
- - Associé
- - - T(9;22)(q34.1;q11.2) ¬ *C95.00*
- - - T(v;11q23.3) ¬ *C95.00*
- - ¬ *C95.00*

Leucémie chronique
- Cellules non précisées ¬ *C95.1*
- Éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] ¬ *D47.5*
- Grands lymphocytes granuleux à cellules NK ¬ *C84.5*
- Neutrophiles ¬ *D47.1*

Leucémie lymphoblastique
- Aiguë
- - ALL] en rémission complète ¬ *C91.01*
- - Rémission complète ¬ *C91.01*
- - ¬ *C91.00*
- B
- - Anomalie génétique récurrente ¬ *C91.00*
- - Hyperdiploïdie ¬ *C91.00*
- - Hypodiploïdie ¬ *C91.00*
- - T(1;19)(q23;p13.3) ¬ *C91.00*
- - T(12;21)(p13.2;q22.1) ¬ *C91.00*
- - T(5;14)(q31.1;q32.3) ¬ *C91.00*
- - T(9;22)(q34.1;q11.2) ¬ *C91.00*
- - T(v;11q23.3) ¬ *C91.00*

Leucémie lymphoïde
- Aiguë ¬ *C91.00*
- Chronique
- - LLC] à cellules B en rémission complète ¬ *C91.11*
- - Rémission complète ¬
- - - *C91.11*
- - - LLC [*C91.11*
- - ¬
- - - *C91.10*
- - - LLC [*C91.10*
- Sans précision ¬ *C91.9*
- ¬ Autres *C91.7*

Leucémie monocytaire
- Aiguë
- - Rémission complète ¬ *C93.01*
- - ¬ *C93.00*
- Chronique ¬ *C93.10*
- Naegeli
- - Rémission complète ¬ *C93.11*
- - ¬ *C93.10*
- Sans précision ¬ *C93.9*
- ¬ Autres *C93.7*

Leucémique
v./v.a. réticulo-leucémique
- LLC-B ¬ Variante non *C83.0*

Leucémique *–suite*
- Rémission complète ¬ Réticulo-endothéliose *C91.41*
- ¬ Péricardite *C95.90†, I32.8**

Leucémoïde type
- Lymphocytaire ¬ Réaction *D72.8*
- Monocytaire ¬ Réaction *D72.8*
- Myélocytaire ¬ Réaction *D72.8*

Leucinose ¬ *E71.0*

Leuco
- Érythroblastique ¬ Anémie *D64.8*
- Œdème de l'épithélium buccal, y compris la langue ¬ *K13.2*

Leucocytaire
- Anormale SAI ¬ Formule *R72*
- Déficit en protéine RAC2 ¬ Maladie infantile de type DAL [déficit d'adhésion *D71*
- Héréditaire ¬
- - Hypersegmentation *D72.0*
- - Hyposegmentation *D72.0*
- Type
- - I ¬ Déficit d'adhésion *D84.8*
- - III ¬ Déficit d'adhésion *D84.8*
- ¬ Déficit d'adhésion *D84.8*

Leucocyte
- Chemotactic factor-2] ¬ Amylose ALECT2 [Amylose à *E85.0*
- Sans précision ¬ Anomalie des *D72.9*
- Type II ¬ Déficit d'adhésion des *D84.8*
- ¬ Anomalies
- - Génétiques des *D72.0*
- - Précisées des *D72.8*

Leucocytoclasique ¬ Angéite cutanée *M31.0*

Leucocytose ¬ *D72.8*

Leucoderme
- Syphilitique tardif ¬ *A52.7†, L99.8**
- ¬
- - Syphilis avec *A51.3†, L99.8**
- - Syphilis tardive symptomatique avec *A52.7†, L99.8**

Leucodermie, non classée ailleurs ¬ *L81.5*

Leucodystrophie
- 4H [hypomyélinisation, hypogonadisme hypogonadotrope, hypodontie] ¬ *E75.2*
- Associée à la polymérase III ¬ *E75.2*
- Autosomique dominante de l'adulte] ¬ ADLD [*E75.2*
- Cellules globoïdes ¬ *E75.2*
- Centrale dysmyélinisante-syndrome de Waardenburg-maladie de Hirschsprung] ¬ PCWH [Syndrome de neuropathie périphérique- *Q87.8*
- Cérébrale ¬ *E75.2*
- Déficit
- - Alkaline céramidase 3 ¬ *E75.2*
- - DECR ¬ Encéphalopathie progressive avec *G31.81*
- Hypomyélinisante

Leucodystrophie *–suite*
- Hypomyélinisante *–suite*
- - Associée à POLR ¬ *E75.2*
- - Autosomique récessive associée
- - - C11ORF73 ¬ *E75.2*
- - - NKX6-2 ¬ *E75.2*
- - - RARS ¬ *E75.2*
- - - VPS11 ¬ *E75.2*
- - Chondrodysplasie spondylo-métaphysaire ¬ Syndrome de *E75.2, Q77.8*
- Krabbe ¬ *E75.2*
- Métachromatique] ¬ Maladie de Greenfield [*E75.2*
- Multikystique bilatérale ¬ Syndrome muscle-œil-cerveau avec *G71.2, E75.2*
- Sudanophile
- - Pelizaeus-Merzbacher ¬ *E75.2*
- - ¬ *E75.2*
- ¬
- - Atrophie optique au cours de *E75.2†, H48.0**
- - Syndrome de Leigh avec *G31.88, E75.2*

Leucoencéphalite
- Hémorragique aiguë
- - Post-vaccination ¬ *G04.0*
- - Subaiguë [Hurst] ¬ *G36.1*
- Multifocale ¬ Maladie due au VIH avec *B22†, G05.1**
- Sclérosante subaiguë ¬ *A81.1*

Leucoencéphalopathie
- Aiguë réversible par déficit en SLC13A3 ¬ *E75.2*
- Ataxie cérébelleuse modérée et œdème de la substance blanche ¬ *E75.2*
- Atteinte du tronc cérébral et de la moelle épinière-élévation des lactates ¬ Syndrome de *G31.81*
- Autosomique récessive-infarctus cérébraux-rétinite pigmentaire ¬ *Q87.0*
- Calcifiante-dysplasie squelettique à début précoce ¬ *G93.4, Q79.9*
- Cérébrale et manifestations systémiques [RVCL-S] ¬ Vasculopathie rétinienne avec *Q28.38, Q14.1*
- Dysplasie spondylo-épimétaphysaire ¬ Syndrome de *E75.2, Q77.8*
- Dystonie-neuropathie motrice ¬ Syndrome de *E75.2*
- Héréditaire diffuse à sphéroïdes axonaux et cellules gliales pigmentées ¬ *E75.2*
- Hypohomocystéinémie ¬ Syndrome de retard du développement-immunodéficience- *Q87.1*
- Kératose palmoplantaire ¬ Syndrome de *G93.4, Q82.8*
- Kyste
- - Bilatéraux de la partie antérieure du lobe temporal ¬ *E75.2*
- - Calcifications ¬ *I67.88†, G94.39**
- Kystique
- - Déficiente en RNASET2 ¬ *E75.2*

Leucoencéphalopathie *–suite*
- Kystique *–suite*
- - Sans mégalencéphalie ¬ *E75.2*
- Liée à la cathepsine A] ¬ CARASAL [Artériopathie-infarctus cérébraux- *I67.88*
- Mégalencéphalique avec kystes sous-corticaux ¬ *E75.2*
- Métachromatique ¬ *E75.2*
- Multifocale
- - Progressive] ¬ LMP [*A81.2*
- - SAI ¬ *A81.2*
- Perte de mémoire épisodique ¬ *G93.4*
- Postérieure réversible (SLEPR) ¬ Syndrome de *G93.6*
- Progressive
- - Adulte ¬ Surdité congénitale associée à une *G31.88*
- - Associée à PYCR2 ¬ Microcéphalie avec *Q87.0*
- - Début précoce avec calcification du SNC, surdité et cécité ¬ Syndrome de *G93.88*
- Sclérosante de Van Bogaert ¬ *A81.1*
- Vasculaire
- - Familiale
- - - Associée
- - - - COL4A1 ¬ *I67.88, G93.4*
- - - - COL4A2 ¬ *I67.88, G93.4*
- - - ¬ *I67.88, G93.4*
- - Progressive ¬ *I67.3*
- ¬
- - Ataxie spastique autosomique récessive avec *G11.4*
- - CADASIL [Artériopathie cérébrale autosomique dominant-infarctus sous-cortical- *I67.88*
- - CARASIL [Artériopathie cérébrale autosomique récessive-infarctus sous-cortical- *I67.88*
- - PADMAL [Microangiopathie cérébrale pontine autosomique dominante avec *I67.88, G93.4*

Leucokératose nicotinique du palais ¬ *K13.2*

Leucomalacie
- Cérébrale néonatale ¬ *P91.2*
- Périventriculaire néonatale ¬ *P91.2*

Leucome adhérent ¬ *H17.0*

Leucomélanopathie héréditaire ¬ *D72.0*

Leuconychie
- Congénitale ¬ *Q84.4*
- Kératose acrale ponctuée-chéilite-nodosités [PLACK] ¬ Syndrome de peau déciduale- *Q84.8*
- Totale
- - Congénitale ¬ *Q84.4*
- - Lésions de type acanthosis nigricans-cheveux anormaux ¬ Syndrome de *Q84.4, L83*

Leucopénie
- Traitement cytostatique ¬ *D70.19*

Leucopénie *–suite*
- ¬ Arthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et *M05.00*

Leucoplasie
- Anomalies de l'épithélium buccal, y compris la langue ¬ *K13.2*
- Col de l'utérus ¬ *N88.0*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Muqueuse buccale ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, K13.2*
- Vagin ¬ *N89.4*
- Verge ¬ *N48.0*
- Vulve ¬ *N90.4*

Leucoprolifération auto-immune associée à RAS ¬ Maladie *D47.9*

Leucorrhée
- SAI ¬ *N89.8*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N77.1**
- Vaginale) à Trichomonas (vaginalis) ¬ *A59.0*

Leucosarcome
- Rémission complète ¬ *C85.9*
- ¬ *C85.9*

Leucotriène-C4 synthétase ¬ Déficit en *E88.8*

Leukonychie totale familiale-kystes trichilemmaux-dystrophie ciliaire] ¬ Syndrome FLOTCH [*Q84.4*

Leukopathia universalis ¬ *E70.3*

Lev
- Familiale ¬ Maladie de *I45.8*
- Lenègre héréditaire ¬ Maladie de *I45.8*

Leventhal ¬ Syndrome (de): Stein- *E28.2*

Lévi ¬ Syndrome de: Lorain- *E23.0*

Levic-Stefanovic-Nikolic ¬ Syndrome de *Q87.8*

Levin ¬ Syndrome de Kleine- *G47.8*

Levine
- LGL] ¬ Syndrome de Lown-Ganong- *I45.6*
- ¬ Syndrome de Lown-Ganong- *I45.6*

Lévocardie
- Situs inversus ¬ *Q24.1*
- ¬ *Q24.1*

Lèvre
- Bord libre) (face intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ *D10.0*
- Cavité buccal
- - Bouche, partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la *S01.50*
- - Gencive (processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la *S01.53*
- - Langue et plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la *S01.54*
- - Lèvre ¬ Plaie ouverte de la *S01.51*
- - Muqueuse de la joue ¬ Plaie ouverte de la *S01.52*
- - Palais ¬ Plaie ouverte de la *S01.55*
- - Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ Plaie ouverte de la *S01.59*

Lèvre *–suite*
- Cavité buccal *–suite*
- - Pharynx ¬
- - - Carcinoma in situ: *D00.0*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la *C14.8*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.0*
- - ¬
- - - Blessure superficielle de la *S00.5*
- - - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des *S01.59*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*
- Doigts ¬ Malocclusion due à: habitudes impliquant la langue, les *K07.5*
- Due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite vésiculaire de: *B00.1*
- Génitales ¬ Maladie de Queyrat des *D07.1*
- Grandes) (petites) ¬ *S38.2*
- Inférieure
- - Bord libre ¬
- - - Carcinome épidermoïde de la *C00.1*
- - - Tumeur maligne: *C00.1*
- - Extérieur ¬ *C00.1*
- - Face
- - - Interne ¬ Tumeur maligne: *C00.4*
- - - Muqueuse ¬ *C00.4*
- - - Orale ¬ *C00.4*
- - Frein ¬ *C00.4*
- - Muqueuse ¬ *C00.4*
- - SAI ¬ *C00.1*
- - Sillon mentolabial ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la *C44.0*
- - Zone d'application du rouge à lèvres ¬ *C00.1*
- - ¬ Carcinome épidermoïde
- - - *C00.1*
- - - Face interne de la *C00.4*
- Mâchoire supérieure ¬ Fente médiane de la *Q37.5*
- Malformation cérébelleuse-dystrophie cornéenne-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'agénésie congénitale des grandes *Q87.0*
- Non classées ailleurs ¬ Malformations congénitales des *Q38.0*
- SAI ¬
- - Extérieur de la *C00.2*
- - Malformation congénitale de la *Q38.0*
- Sans
- - Indication inférieure supérieure
- - - Face
- - - - Muqueuse ¬ *C00.5*
- - - - Orale ¬ *C00.5*
- - - Frein ¬ *C00.5*
- - - Muqueuse ¬ *C00.5*
- - Précision
- - - Bord libre ¬ Tumeur maligne: *C00.2*

Lèvre *–suite*
- Sans *–suite*
- - Précision *–suite*
- - - Face interne ¬ Tumeur maligne: *C00.5*
- - - ¬ Tumeur maligne: *C00.9*
- Supérieure
- - Bord libre ¬ Tumeur maligne: *C00.0*
- - Extérieur ¬ *C00.0*
- - Externe ¬ Carcinome épidermoïde de la *C00.0*
- - Face
- - - Interne ¬ Tumeur maligne: *C00.3*
- - - Muqueuse ¬ *C00.3*
- - - Orale ¬ *C00.3*
- - Frein ¬ *C00.3*
- - Muqueuse ¬ *C00.3*
- - Nez ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la *C44.0*
- - SAI ¬ *C00.0*
- - Zone d'application du rouge à lèvres ¬ *C00.0*
- - ¬
- - - Carcinome épidermoïde de la face interne de la *C00.3*
- - - Nodule congénital médian de la *Q38.0*
- Vulve (grande) (petite) ¬ *T21*
- ¬
- - *T20*
- - Adénocarcinome
- - - Grandes *C51.0*
- - - Petites *C51.1*
- - Bord libre de la *D00.0*
- - Carcinoma in situ: Peau de la *D04.0*
- - Carcinome
- - - Grandes *C51.0*
- - - Petites *C51.1*
- - Carcinome à cellules de Merkel de la face cutanée de la *C44.0*
- - Carcinome basocellulaire
- - - *C44.0*
- - - Grandes *C51.0*
- - - Petites *C51.1*
- - Carcinome épidermoïde
- - - *C00.9*
- - - Commissure des *C00.6*
- - - Extérieur de la *C00.2*
- - - Face interne de la *C00.5*
- - - Grandes *C51.0*
- - - Localisations contiguës de la *C00.8*
- - - Petites *C51.1*
- - Extérieur de la *D37.0*
- - Fistule congénitale de la *Q38.0*
- - Herpes simplex de: *B00.1*
- - Hypertrophie
- - - *N90.6*
- - - Congénitale de la *Q18.6*
- - Lèvre

Lèvre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lèvre *–suite*
- - - Inférieure: zone d'application du rouge à *C00.1*
- - - Supérieure: zone d'application du rouge à *C00.0*
- - Maladies des *K13.0*
- - Mélanome
- - - In situ de la *D03.0*
- - - Malin
- - - - *C43.0*
- - - - Familial de la *C43.0*
- - - - Muqueux
- - - - - Grandes *C51.0*
- - - - - Petites *C51.1*
- - Morsure de la joue et de la *K13.1*
- - Nævus à mélanocytes de la *D22.0*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.51*
- - Polype des *N84.3*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, K93.8**
- - Tuberculose des *A18.8†, K93.8**
- - Tumeur bénigne
- - - *D10.0*
- - - Peau de la *D23.0*
- - Tumeur maligne
- - - Commissure des *C00.6*
- - - Face cutanée de la *C44.0*
- - - Grande *C51.0*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C00.8*
- - - Petite *C51.1*

Lévuride] ¬ Candidide [*L30.2*

Lévy
v./v.a. Roussy-Lévy
v./v.a. Stoll-Lévy-Francfort

Lewandowsky-Lutz ¬ Syndrome de *B07*

Lewis-Sumner ¬ Syndrome de *G61.8*

Lewy ¬
- Démence à corps de *G31.82†, F02.8**
- Maladie à corps de *G31.82*

Leyden ¬
- Hémophilie B *D67*
- Syndrome de Duchenne-von- *G71.00*

Leyden-Moebius ¬ Dystrophie de *G71.08*

Leydig
v./v.a. Sertoli-Leydig
- ¬ Hypoplasie des cellules de *E34.59*

Lézard ¬ Venin de *T63.1*

LFA-1) ¬ Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (*D84.0*

L-ferritine ¬ Déficit en *E83.1*

LGL] ¬ Syndrome de Lown-Ganong-Levine [*I45.6*

LGMD Limb-girdle muscular dystrophy type
- 1B ¬ *G71.08*
- 2C ¬ *G71.08*

LGMD Limb-girdle muscular dystrophy type *–suite*
- 2D ¬ *G71.08*
- 2E ¬ *G71.08*
- 2F ¬ *G71.08*
- 2I ¬ *G71.08*
- 2K ¬ *G71.08*
- 2M ¬ *G71.08*

LGTV] ¬ Encéphalite à virus de Langat [*A84.8*

Lhermitte-Duclos ¬ Maladie de *D33.1*

LHF] ¬ Lymphohistiocytose hémophagocytaire familiale [*D76.1*

LHON [Leber hereditary optic neuropathy] plus ¬ Maladie de *G31.81*

Liaison
- Facteur de croissance ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la protéine de *R77.88*
- Glycosylphosphatidylinositol HDL 1] ¬ Déficit familial en GPIHBP1 [protéine de *E78.3*

Liang-Wang ¬ Syndrome de *Q87.0*

Liberal
v./v.a. Prata-Liberal-Goncalves

Libération
- Cytokine
- - Cytokine release syndrome] ¬ Syndrome de *D76.4*
- - Immunothérapie ¬ Syndrome de *D76.4*
- - Lié au traitement par cellules CAR-T ¬ Syndrome de *D76.4*
- - ¬ Syndrome de *D76.4*
- Hormone croissance
- - Intestin grêle ¬ Tumeur à GRF [facteur de *C17.9*
- - Jéjunum ¬ Tumeur à GRF [facteur de *C17.1*
- - Lobe
- - - Inférieur du poumon ¬ Tumeur à GRF [facteur de *C34.3*
- - - Moyen du poumon ¬ Tumeur à GRF [facteur de *C34.2*
- - - Supérieur du poumon ¬ Tumeur à GRF [facteur de *C34.1*
- - Pancréas ¬ Tumeur à GRF [facteur de *C25.4*
- - Poumon
- - - Localisations contiguës ¬ Tumeur à GRF [facteur de *C34.8*
- - - ¬ Tumeur à GRF [facteur de *C34.9*
- Prison ¬ Difficultés liées à une *Z65*
- Thyrotrophine] ¬ Hypothyréose par déficit isolé en TRH [hormone de *E03.1*

Liberfarb ¬ Syndrome de *Q87.1*

Liberté ¬ Emprisonnement et autres formes de privation de *Z65*

Libman-Sacks ¬
- Maladie de *M32.1†, I39.8**
- Syndrome de *M32.1†, I39.8**

Lichen
- Amyloïde ¬ *E85.4†, L99.0**
- Bulleux ¬ *L43.1*
- Folliculaire ¬ *L66.1*
- Myxœdémateux nodulaire ¬ *L98.5*
- Nitidus ¬ *L44.1*
- Plan
- - Actinique ¬ *L43.3*
- - Annulaire
- - - Atrophique ¬ *L43.8*
- - - ¬ *L43.8*
- - Atrophique ¬ *L43.8*
- - Bulleux ¬ *L43.1*
- - Folliculaire ¬ *L66.1*
- - Hypertrophique ¬ *L43.0*
- - Linéaire ¬ *L43.8*
- - Pigmentaire ¬ *L43.8*
- - Sans précision ¬ *L43.9*
- - Subaigu (actif) ¬ *L43.3*
- - Tropical ¬ *L43.3*
- - Tropicalis ¬ *L43.3*
- Plano-pilaire ¬ *L66.1*
- Ruber
- - Acuminatus ¬ *L66.1*
- - Moniliforme ¬ *L44.3*
- SAI ¬ *L28.0*
- Scléreux et atrophique ¬ *L90.0*
- Scrofulosorum tuberculeux primaire ¬ *A18.4*
- Simplex chronique [Vidal] ¬ *L28.0*
- Strié ¬ *L44.2*

Lichéniforme
- Papulaire et sclérodermoïde généralisé ¬ Myxœdématose *L98.5*
- ¬ Myxœdématose *L98.5*

Lichénoïde
- Chronique ¬ Pityriasis *L41.1*
- Médicamenteuse ¬ Réaction *L43.2*
- Varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] ¬ Pityriasis *L41.0*

Lichens plans ¬ Autres *L43.8*

Lichtenstein
v./v.a. Jaffe-Lichtenstein
- ¬ Syndrome de *D82.8, Q79.8*

Liddle
- Crise hypertensive ¬ Syndrome de *I15.11*
- ¬ Syndrome de *I15.10*

Lié
- Développement
- - Dentaire ¬ Kystes de la région buccale non *K09.1*
- - Odontogènes) ¬ Kystes dentaires *K09.0*
- - ¬ Reins multikystiques *Q61.4*
- Prédisposition
- - Cardiomyopathies ¬ Examens *Z01.81*
- - Dysrythmies malignes ¬ Examens *Z01.80*
- Radiations ¬ Leucémie aiguë myéloïde et syndromes myélodysplasiques *C92.00*

Lié *–suite*
- Usage
- - Gabapentine ¬ Troubles *F13.1*
- - Prégabaline ¬ Troubles *F13.1*
- Utilisation
- - Alcool ¬ Troubles mentaux et du comportement *F10*
- - Cocaïne ¬ Troubles mentaux et du comportement *F14*
- - Dérivés du cannabis ¬ Troubles mentaux et du comportement *F12*
- - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement *F19*
- - Hallucinogènes ¬ Troubles mentaux et du comportement *F16*
- - Opiacés ¬ Troubles mentaux et du comportement *F11*
- - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles mentaux et du comportement *F13*
- - Solvants volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement *F18*
- - Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du comportement *F15*
- - Substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles *F19*
- - Tabac ¬ Troubles mentaux et du comportement *F17*
- X ¬ Syndrome parkinsonien et spasticité *G20.90*

Liebenberg ¬ Syndrome de *Q73.8*

Liège ¬ Maladie poumon
- Manipulateurs de *J67.3*
- Travailleurs du *J67.3*

Lieu
- Naissance non précisé ¬
- - Enfant unique, *Z38.2*
- - Jumeaux, *Z38.5*
- - Naissances multiples, *Z38.8*
- Où la trypanosomiase africaine est répandue ¬ Trypanosomiase SAI, en des *B56.9*

Li-Fraumeni ¬ Syndrome de *C80.9, C97!*

Ligament
- Acromio-claviculaire ¬ *S43.5*
- Calcanéopéronier ¬ Entorse et foulure de la cheville: *S93.42*
- Collatéral
- - Cubital ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.42*
- - Médial du genou ¬ Distorsion du *S83.42*
- - Radial ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.41*
- Coraco-huméral ¬ *S43.4*
- Crico
- - Aryténoïdien(ne) ¬ Articulation (*S13.5*
- - Thyroïdien(ne) ¬ Articulation (*S13.5*
- Cubito-carpien (palmaire) ¬ *S63.3*

Ligament *–suite*
- Deltoïde ¬ Entorse et foulure de la cheville: *S93.41*
- Doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ Rupture traumatique de *S63.4*
- Externe
- - Ligament péronier collatéral
- - - Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.94*
- - - ¬
- - - - Instabilité chronique du genou: *M23.54*
- - - - Lésions internes du genou: *M23.84*
- - ¬ Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.64*
- Genou ¬ Laxité des *M23.8*
- Gléno-huméral (supérieur) (moyen) (inférieur) ¬ *S43.4*
- Iliofémoral ¬ Entorse et foulure de la hanche: (*S73.11*
- Interne
- - Ligament tibial collatéral
- - - Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.93*
- - - ¬
- - - - Instabilité chronique du genou: *M23.53*
- - - - Lésions internes du genou: *M23.83*
- - ¬ Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.63*
- Ischiocapsulaire ¬ Entorse et foulure de la hanche: (*S73.12*
- Latéraux) (croisés) ¬ Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les *S83.7*
- Longitudinal
- - Antérieur cervical ¬ *S13.4*
- - Postérieur [OLLP] ¬ Ossification du *M48.8*
- Médian ¬ Entorse foulure Ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral tibial (*S83.44*
- - Distorsion du ligament latéral tibial (*S83.42*
- Méninges ¬ Constriction anormale congénitale d'un *Q07.8*
- Niveau de la cheville et du pied ¬ Rupture de *S93.2*
- Non
- - Précisé
- - - Ménisque non précisé ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.99*
- - - ¬
- - - - Instabilité chronique du genou: *M23.59*
- - - - Lésions internes du genou: *M23.89*
- - - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.69*
- - Précisés
- - - Membre

Ligament *–suite*
- Non *–suite*
- - Précisés *–suite*
- - - Membre *–suite*
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un *T13.2*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un *T11.2*
- - - Tronc ¬ Luxation, entorse et foulure d'articulation et de *T09.2*
- Parties non précisées
- - Cou ¬ Entorse et foulure des articulations et des *S13.6*
- - Tête ¬ Entorse et foulure de l'articulation et des *S03.5*
- Pelviens ¬ Lésions obstétricales intéressant les articulations et les *O71.6*
- Péronier collatéral
- - Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament externe [*M23.94*
- - ¬
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament externe [*M23.54*
- - - Lésions internes du genou: Ligament externe [*M23.84*
- Poignet et du carpe ¬ Rupture traumatique de *S63.3*
- Radio-carpien ¬
- - *S63.3*
- - Entorse et foulure du poignet: (Articulation) (*S63.52*
- Rond ¬ Tumeur maligne: *C57.2*
- Rotulien ¬ *S76.1*
- S genou
- - Ligament
- - - Externe] ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.64*
- - - Interne ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.63*
- - - Non précisé ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.69*
- - Ligament capsulaire ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.67*
- - Ligament croisé
- - - Antérieur ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.61*
- - - Postérieur ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.62*
- - Localisations multiples ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.60*
- SAI ¬
- - Arrachement de *T14.3*
- - Déchirure traumatique de *T14.3*
- - Entorse de *T14.3*
- - Foulure de *T14.3*
- - Hémarthrose traumatique de *T14.3*
- - Lacération de *T14.3*
- - Rupture traumatique de *T14.3*

Ligament *–suite*
- SAI ¬ *–suite*
- - Subluxation traumatique de *T14.3*
- Sauf utérus ¬
- - *C49*
- - *D21*
- Tarsien ¬ *S93.6*
- Tarso-métatarsien ¬ *S93.6*
- Tibial collatéral
- - Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [*M23.93*
- - ¬
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament interne [*M23.53*
- - - Lésions internes du genou: ligament interne [*M23.83*
- Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et foulure de la cheville: *S93.43*
- Transverse supérieur de l'omoplate ¬ Raccourcissement congénital du *Q68.8*
- Utérus
- - Large) (rond) ¬ *D28.2*
- - SAI ¬ *C57.3*
- - ¬ Tumeur bénigne: Trompe et *D28.2*
- Volaire ¬ *S63.4*
- ¬
- - Articulation temporo-mandibulaire (*S03.4*
- - Articulation tibio-péronière supérieure et ses *S83.6*
- - Déchirure de la jonction lombosacrée et de ses *S33.51*
- - Entorse de la jonction lombosacrée et de ses *S33.51*

Ligament capsulaire ¬
- Instabilité chronique du genou: *M23.57*
- Lésion interne du genou, sans précision: *M23.97*
- Lésions internes du genou: *M23.87*
- Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.67*

Ligament croisé
- Antérieur
- - Corne antérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.91*
- - ¬
- - - Entorse foulure Ligament croisé genou antérieur postérieur
- - - - Déchirure du *S83.53*
- - - - Distorsion du *S83.51*
- - - Instabilité chronique du genou: *M23.51*
- - - Lésions internes du genou: *M23.81*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.61*
- Genou antérieur postérieur
- - Déchirure ligament croisé
- - - Antérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.53*
- - - Postérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.54*

Ligament croisé *–suite*
- Genou antérieur postérieur *–suite*
- - Distorsion ligament croisé
- - - Antérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.51*
- - - Postérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.52*
- - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et foulure des *S83.50*
- Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.50*
- Postérieur
- - Corne postérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.92*
- - ¬
- - - Entorse foulure Ligament croisé genou antérieur postérieur
- - - - Déchirure du *S83.54*
- - - - Distorsion du *S83.52*
- - - Instabilité chronique du genou: *M23.52*
- - - Lésions internes du genou: *M23.82*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.62*
- SAI ¬ Déchirure de *S83.50*

Ligament large
- Allen-Masters] ¬ Syndrome de déchirure du *N83.8*
- Précisé aigu ¬ Abcès de: *N73.0*
- SAI ¬ Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- ¬
- - Absence de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*
- - Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du *N83.8*
- - Atrésie de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*
- - Hématome du *N83.7*
- - Kyste embryonnaire du *Q50.5*
- - Malformations congénitales des trompes de Fallope et des *Q50.6*
- - Présence en surnombre de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*
- - Tuberculose du *A18.1†, N74.1**
- - Tumeur maligne: *C57.1*

Ligament latéral
- Externe du coude ¬ Rupture traumatique du *S53.2*
- Genou interne externe
- - Déchirure ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des *S83.43*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des *S83.44*
- - Distorsion ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des *S83.41*

Ligament latéral *–suite*
- Genou interne externe *–suite*
- - Distorsion ligament latéral *–suite*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des *S83.42*
- - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et foulure des *S83.40*
- Interne
- - Coude ¬ Rupture traumatique du *S53.3*
- - Genou [Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du *M76.4*
- Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.40*
- Péronier Ligament latéral ¬ Entorse foulure Ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du *S83.43*
- - Distorsion du *S83.41*
- Tibial Ligament médian ¬ Entorse foulure Ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du *S83.44*
- - Distorsion du *S83.42*
- ¬ Entorse foulure Ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral péronier (*S83.43*
- - Distorsion du ligament latéral péronier (*S83.41*

Ligamentaire
- Associée à EXOC6B ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire avec hyperlaxité *Q77.7*
- Colonne vertébrale ¬ Lésion des sites d'insertion *M46.09*
- Familiale ¬ Laxité *M35.7*
- Musculaires de la colonne vertébrale ¬ Atteinte des insertions *M46.0*
- Région pelvienne ¬ Laxité *M24.25*
- Retard de développement ¬ Syndrome de cutis laxa-hyperlaxité *Q82.8*
- SAI ¬
- - Déchirure *S83.40*
- - Laxité *M24.2*
- Type Beighton ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire avec hyperlaxité *Q77.7*
- ¬
- - Instabilité secondaire à une ancienne atteinte *M24.2*
- - Lésion *M24.2*
- - Syndrome
- - - Déficience intellectuelle-cardiopathie congénitale-petite taille-laxité *Q87.1*
- - - Dysmorphie
- - - - Faciale-scrotum en châle-hyperlaxité *Q87.0*
- - - - Pectus carinatum-laxité *Q79.8*
- - Xanthome *E75.5*

Ligase
- 4 ¬ Syndrome *D81.1*
- Défaut d'amidation ¬ Insuffisance en acides biliaires-CoA *K76.8*

Ligase *–suite*
- IV ¬ Déficit en DNA *D81.1*
- ¬
- - Anémie due à un déficit en gamma-glutamylcystéine *D55.1*
- - Anémie hémolytique due à un déficit en glutamate-cystéine *D55.1*

Ligature
- Ombilicale SAI ¬ Glissement de la *P51.8*
- Trompes de Fallope ou vasectomie ¬ Admission pour *Z30.2*

Lightwood-Albright ¬ Syndrome de *N25.8*

Lignac ¬ Syndrome de *E72.0*

Ligne
- Beau ¬ *L60.4*
- Blanche
- - Gangrène ¬ Hernie de la *K43.78*
- - ¬ Hernie de la *K43.98*
- Médian
- - NUT Nuclear protein in testis
- - - Base de la langue ¬ Carcinome de la *C01*
- - - Cou ¬ Carcinome de la *C76.0*
- - - Médiastin
- - - - Antérieur ¬ Carcinome de la *C38.1*
- - - - Postérieur ¬ Carcinome de la *C38.2*
- - - - ¬ Carcinome de la *C38.3*
- - - Rein ¬ Carcinome de la *C64*
- - - Rhinopharynx ¬ Carcinome de la *C11.9*
- - - Sinus
- - - - Ethmoïdal ¬ Carcinome de la *C31.1*
- - - - Frontal ¬ Carcinome de la *C31.2*
- - - - Sphénoïdal ¬ Carcinome de la *C31.3*
- - - Thorax ¬ Carcinome de la *C76.1*
- - - Vessie ¬ Carcinome de la *C67.9*
- - - Vulve ¬ Carcinome de la *C51.9*
- - - ¬ Carcinome de la *C80.9*
- - ¬ Granulome létal de la *C86.0*
- Stähli ¬ *H18.0*
- ¬
- - Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première *U82.2!*
- - Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première *U82.0!*
- - Tuberculose avec résistance au médicament de première *A16.9, U82.0!*

Lignée
- Cellulaires avec chromosome sexuel anormal ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/ *Q96.4*
- Divers nombres de chromosomes X ¬ Mosaïque chromosomique, *Q97.2*
- Incertaine ¬ Leucémie à cellules souches de *C95.0*
- Mixte en rémission complète ¬ Leucémie aiguë de *C95.01*

Ligneux ¬
- Conjonctivite *H10.4*

Ligneux ¬ *–suite*
- Thyroïdite (de): *E06.5*

Like
- Associé
- - KLHL7 ¬ Syndrome
- - - Bohring-Opitz- *Q87.8*
- - - Crisponi- *Q74.3*
- - MAGEL2 ¬ Syndrome de Prader-Willi- *Q87.1*
- - SIM1 ¬ Syndrome de Prader-Willi- *Q87.1*
- Due à une mutation de l'ADN mitochondrial ¬ Tubulopathie rénale Gitelman- *N15.8*
- Nanisme ¬ Syndrome de dysplasie osseuse Larsen- *Q87.1*
- Rétinite pigmentaire ¬ Syndrome pseudoxanthome élastique- *Q82.8, H35.5*
- Type B3GAT3 ¬ Syndrome de Larsen- *Q87.1*
- ¬
- - Dysplasie létale Kniest- *Q78.8*
- - Syndrome
- - - Isotrétinoïne- *Q87.8*
- - - Létal de Larsen- *Q87.1*
- - - Prader-Willi- *Q87.1*

Limb-girdle muscular dystrophy type
- 1B ¬ LGMD [*G71.08*
- 2C ¬ LGMD [*G71.08*
- 2D ¬ LGMD [*G71.08*
- 2E ¬ LGMD [*G71.08*
- 2F ¬ LGMD [*G71.08*
- 2I ¬ LGMD [*G71.08*
- 2K ¬ LGMD [*G71.08*
- 2M ¬ LGMD [*G71.08*

Limbique
v./v.a. Encéphalite limbique
- Paranéoplasique ¬ Encéphalopathie *D48.9†, G13.1**
- ¬
- - Dermoïde annulaire *D31.1*
- - Insuffisance des cellules souches *H18.8*
- - Psychosyndrome de l'épilepsie du système *F07.0*

Limb-mammary ¬ Syndrome *Q87.2*

Limitation
- Complète des mouvements ¬ Raideur articulaire avec *M25.69*
- Fonctionnelle motrice ¬ *U50*
- Partielle des mouvements ¬ Raideur articulaire avec *M25.69*
- Traumatique des mouvements des muscles oculaires ¬ *H50.6*

Limite
- Imposées aux activités par une incapacité ¬ *Z73*
- Malignité ¬
- - Cystadénome mucineux de l'ovaire à la *C56*
- - Tumeur épithéliale de l'ovaire, à la *C56*
- ¬
- - Dextrinose *E74.0*

Limite *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Glaucome *H40.0*

Lindau
v./v.a. von Hippel-Lindau

Lindemann
v./v.a. Orstavik-Lindemann-Solberg

Linéaire
- Asymétrie cranio-faciale et anomalies acrales, oculaires et cérébrales ¬ Hypopigmentation *Q87.0*
- Ichtyose congénitale-kératodermie sclérosante ¬ Syndrome de kératose *Q82.8*
- Idiopathique ¬ Kératite interstitielle *H16.3*
- Moulin ¬ Atrophodermie *L90.8*
- Spiralée ¬ Hypermélanose naevoïde *L81.4*
- ¬
- - Dermatose à IgA *L13.8*
- - Elastose focale *L94.8*
- - Érythème gingival *K05.1*
- - Lichen plan *L43.8*
- - Nævus
- - - Épidermique verruqueux inflammatoire *Q82.5*
- - - Verruqueux de forme *Q82.5*
- - NEVIL [Nævus épidermique verruqueux inflammatoire *Q82.5*
- - Sclérodermie *L94.1*
- - Syndrome du nævus sébacé *Q85.8*

Lingual
- Postérieure des dents inférieures ¬ Occlusion *K07.2*
- ¬
- - Amygdale *D10.1*
- - Arrachement du frein *S01.54*
- - Carcinome épidermoïde de l'amygdale *C02.4*
- - Déchirure du frein *S01.54*
- - Hypertrophie des papilles *K14.3*
- - Kyste *K14.8*
- - Syphilis tardive des amygdales *A52.7†, J99.8**
- - Thyroïde *Q89.2*
- - Tumeur maligne: Amygdale *C02.4*

Linguatulose ¬ *B88.8*

Linite plastique
- Antre de l'estomac ¬ *C16.3*
- Cardia ¬ *C16.0*
- Corps de l'estomac ¬ *C16.2*
- Cours de carcinome gastrique cirrhotique ¬ *C16.9*
- Estomac ¬ *C16.9*
- Fundus ¬ *C16.1*
- Gastrique, à localisations contiguës ¬ *C16.8*
- Grande courbure de l'estomac ¬ *C16.6*
- Petite courbure de l'estomac ¬ *C16.5*
- Pylore ¬ *C16.4*

Lipase
- Acide lysosomale ¬ Déficit en *E75.5*
- Colipase pancréatique ¬ Déficit combiné en *K90.3*
- Hépatique ¬ Hyperlipidémie due à un déficit en *E78.4*
- Pancréatique ¬ Déficit en triglycéride *K90.3*
- Triacylglycerol lipase] ¬ Anomalies des taux de: *R74.8*
- ¬
- - Anomalies des taux de: lipase [triacylglycerol *R74.8*
- - Déficit
- - - Familial
- - - - Lipoprotéine *E78.3*
- - - - LMF1 [facteur 1 de maturation de la *E78.3*
- - - Lipoprotéine *E78.3*

LIPE ¬ Lipodystrophie partielle familiale associée à *E88.1*

Lipides
- Neutres cardiomyovasculopathie ¬ Maladie
- - Idiopathique de surcharge en *E75.5†, I43.1**
- - Primaire de surcharge en *E75.5†, I43.1**
- Sans précision ¬ Anomalie du stockage des *E75.6*
- ¬
- - Anomalie stockage
- - - *E75.6*
- - - *E75.6*
- - Anomalies du stockage des *E75.5*
- - Démence au cours de trouble cérébral du métabolisme des *E75.6†, F02.8**
- - Dystrophie rétinienne au cours de maladie de stockage des *E75.6†, H36.8**
- - Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*
- - Myopathie au cours de maladie de stockage des *E75.6†, G73.6**

Lipidique
- Atteinte cardiovasculaire sévère ¬ Maladie à surcharge *E75.5†, I43.1**
- Cardiomyovasculopathie ¬ Maladie à surcharge *E75.5†, I43.1**
- Endogène ¬
- - Bronchopneumonie *J84.80*
- - Pneumonie *J84.80*

Lipidose
- Cérébrale ¬
- - *E75.4*
- - Dégénérescence cérébrale au cours de *E75.4†, G32.8**
- Cérébrorétinienne ¬ *E75.4*
- Cérébroside ¬ *E75.2*
- Généralisée ¬ Dégénérescence cérébrale au cours de *E75.6†, G32.8**
- Glycolipoïde ¬ *E75.2*
- Sulfatidose ¬ *E75.2*
- Surcharge triglycéride

Lipidose *–suite*
- Surcharge triglycéride *–suite*
- - Ichtyose ¬ *E75.5*
- - Myopathie] ¬ NLSDM [*E75.5†*, *G73.6**
- - ¬ *E75.5*
- Systémique ¬ Dystrophie rétinienne au cours de *E75.6†*, *H36.8**
- ¬ *E75.6*

Lipo-atrophie
- Localisée due à la pression ¬ *E88.1*
- ¬ *E88.1*

Lipoblastome
- Membres ¬ *D17.2*
- Rétropéritoine ¬ *D17.7*
- Tronc ¬ *D17.1*
- ¬ *D17.9*

Lipocutané ¬
- Échec d'une greffe *T86.59*
- Nécrose d'une greffe *T86.51*
- Perte d'une greffe *T86.52*
- Troubles circulatoires d'une greffe *T86.50*

Lipodermoïde du globe oculaire-excroissance préauriculaire-polythélie ¬ Syndrome de *Q18.2*

Lipodystrophie
v./v.a. hypoplasie mandibulaire-surdité-apparence progéroïde-lipodystrophie
- Associé à PLAAT3 ¬ Syndrome de *E88.1*
- Centrifuge ¬ *E88.1*
- Céphalothoracique progressive ¬ *E88.1*
- Congénitale
- - Berardinelli-Seip ¬ *E88.1*
- - Généralisée
- - - Myopathie ¬ *E88.1*
- - - Type 4 ¬ *E88.1*
- Déficience intellectuelle-surdité ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Due à un déficit combiné en insuline, IGF1 [somatomédine-C] et EGF [facteur de croissance épidermique] ¬ *E88.1*
- Fièvre] ¬ Syndrome CANDLE [dermatose neutrophile atypique chronique- *M35.8*
- Généralisée acquise ¬ *E88.1*
- Intestinale ¬ *K90.8*
- Localisée
- - Idiopathique ¬ *E88.1*
- - Induite par une panniculite ¬ *E88.1*
- - Médicamenteuse ¬ *E88.1*
- Non classée ailleurs ¬ *E88.1*
- Partielle
- - Acquise ¬ *E88.1*
- - Familiale
- - - Associée
- - - - AKT2 ¬ *E88.1*
- - - - CIDEC ¬ *E88.1*
- - - - LIPE ¬ *E88.1*
- - - - PLIN1 ¬ *E88.1*
- - - - PPARG ¬ *E88.1*

Lipodystrophie *–suite*
- Partielle *–suite*
- - Familiale *–suite*
- - - Dunnigan ¬ *E88.1*
- - - Type
- - - - 9 ¬ *E88.1*
- - - - Köbberling ¬ *E88.1*
- - - ¬ *E88.1*
- SAI ¬ *E88.1*
- ¬ Syndrome
- - Apparence progéroïde et marfanoïde- *E88.1*
- - Encéphalopathie progressive-neurodégénérescence sévère- *G31.88*, *E88.1*
- - Neurodégénératif sévère avec *G31.88*, *E88.1*

Lipodystrophique sévère autosomique dominante ¬ Laminopathie *E88.1*

Lipœdème
- Stade
- - I ¬ *E88.20*
- - II ¬ *E88.21*
- - III ¬ *E88.22*
- ¬ *E88.28*

Lipofuscinose
v./v.a. Céroïde-lipofuscinose
- Céroïdes neuronaux ¬ *E75.4*
- Neuronale ¬ *E75.4*

Lipogranulomatose
- Farber ¬ *E75.2*
- Généralisée ¬ *E78.88*
- ¬ *E78.88*

Lipogranulome au cours de syndrome de Pfeifer-Weber-Christian ¬ *M35.6*

Lipohypertrophie
- Symétrique membres localisée douloureux œdème
- - Augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ *E88.22*
- - SAI ¬ *E88.28*
- - Stade non précisé ¬ *E88.28*
- - Surface cutané
- - - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ *E88.21*
- - - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ *E88.20*
- ¬ *E88.29*

Lipoïde
- Essentielle ¬ Histiocytose *E75.2*
- Surrénales par déficit en STAR ¬ Hyperplasie congénitale *E25.08*
- ¬ Protéinose *E78.88*

Lipoïdique
- Articulation
- - Cheville ¬ Dermato-arthrite *E78.88†*, *M14.37**

Lipoïdique *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Coude ¬ Dermato-arthrite *E78.88†*, *M14.32**
- - Genou ¬ Dermato-arthrite *E78.88†*, *M14.36**
- - Hanche ¬ Dermato-arthrite *E78.88†*, *M14.35**
- - Interphalangienne de la main ¬ Dermato-arthrite *E78.88†*, *M14.34**
- - Poignet ¬ Dermato-arthrite *E78.88†*, *M14.33**
- Articulation de l'épaule ¬ Dermato-arthrite *E78.88†*, *M14.31**
- Colonne vertébrale ¬ Dermato-arthrite *E78.88†*, *M14.38**
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ Nécrobiose *E10.60†*, *L99.8**
- - - 2 ¬ Nécrobiose *E11.60†*, *L99.8**
- - ¬ Nécrobiose *E14.60†*, *L99.8**
- Sites multiples ¬ Dermatoarthrite *E78.88†*, *M14.30**
- ¬
- - Dermato-arthrite *E78.88†*, *M14.39**
- - Histiocytose *C96.6*
- - Maladie d'Oppenheim-Urbach [Nécrobiose *L92.1*
- - Nécrobiose *L92.1*
- - Néphrose *N04*

Lipoïdose
- Aorte ¬ *E75.6*
- Endocarde ¬ *E75.6*
- Larynx ¬ *E75.6*
- ¬ *E75.6*

Lipoïque synthétase ¬ Déficit en acide *E88.8*

Lipomateuse
v./v.a. Tumeur lipomateuse

Lipomatose
- Cervicale bénigne familiale ¬ *E88.8*
- Congénitale infiltrante de la face ¬ *D48.1*
- Douloureuse [maladie de Dercum] ¬ *E88.29*
- Encéphalo-craniocutanée ¬ *E88.29*
- Launois-Bensaude ¬ *E88.8*
- Malformation artério-veineuse-nævus épidermique] ¬ Syndrome SOLAMEN [hypertrophie segmentaire- *Q87.8*
- Mésosomatique de Roch-Leri ¬ *E88.29*
- Multiple familiale ¬ *E88.29*
- Multiple-hémihyperplasie] ¬ HHML [Syndrome de la *Q87.3*
- Non classée ¬
- - *E88.2*
- - *E88.29*
- SAI ¬ *E88.29*

Lipome
- Arborescent ¬ *D17.7*
- Filum terminal ¬ *Q76.0*
- Médullaire

Lipome *–suite*
- Médullaire *–suite*
- - Dorsal ¬ *Q76.0*
- - ¬ *Q76.0*
- Nasopalpébral colobome-téléthane ¬ Syndrome du *D17.0, Q10.3*
- Sacré ¬ Syndrome de fente labio-palatine-surdité- *Q87.8*
- SAI ¬ *D17.9*
- Sein ¬ *D17.1*
- Spinal
- - Chaotique du cône ¬ *Q76.0*
- - Extramédullaire
- - - Cône ¬ *Q76.0*
- - - Postérieur du cône ¬ *Q76.0*
- - - Terminal du cône ¬ *Q76.0*
- - - Transitionnel du cône ¬ *Q76.0*
- - Intramédullaire non-dysraphique ¬ *D17.7*
- Transitionnel du filum ¬ *Q76.0*

Lipomélanique ¬ Réticulose *I89.8*

Lipomucopolysaccharidose ¬ *E77.1*

Lipomyéloméningocèle
- Anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un *Q87.8*
- ¬ *Q05.9*

Liponeurocytome cérébelleux ¬ *D43.1*

Liponyssoides sanguineus ¬ Dermite due à *B88.0*

Lipophagique intestinale ¬ Granulomatose *K90.8†, M14.89**

Lipoprotéine
- A) ¬ Hyperlipoprotéinémie de la *E78.80*
- Basse densité
- - LDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à *E78.0*
- - VLDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à *E78.1*
- Haute densité ¬ Déficit en: *E78.6*
- Lipase ¬ Déficit
- - *E78.3*
- - Familial en *E78.3*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E78.9*
- ¬
- - Déficit en *E78.6*
- - Glomérulopathie à *N07.8*

Lipoprotéinémie
v./v.a. bêta-lipoprotéinémie

Liporéticulose ¬ *C96.6*

Liposarcome
v./v.a. Liposarcome myxoïde
- Cuisse ¬ *C49.2*
- Différencié ¬ *C49.9*
- Rétropéritoine ¬ *C48.0*
- Tissu mou
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*

Liposarcome *–suite*
- Tissu mou *–suite*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Tête ¬ *C49.0*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - Tronc ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Liposarcome bien différencié
- Cordon spermatique ¬ *C63.1*
- Rétropéritoine ¬ *C48.0*
- Tissu mou
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Tête ¬ *C49.0*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Liposarcome dédifférencié
- Rétropéritoine ¬ *C48.0*
- Tissu mou
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Cou ¬ *C49.0*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Tête ¬ *C49.0*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - Tronc ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Liposarcome myxoïde
- Rétropéritoine ¬ *C48.0*
- Tissu mou
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Tête ¬ *C49.0*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - Tronc ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Liposarcome pléiomorphe
- Rétropéritoine ¬ *C48.0*
- Tissu mou
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*

Liposarcome pléiomorphe *–suite*
- Tissu mou *–suite*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Tête ¬ *C49.0*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - Tronc ¬ *C49.6*

Lipotropes ¬ *T50.9*

Lipoyl transférase
- 1 ¬ Déficit en *E88.8*
- 2 ¬ Déficit en *E78.88*

Liquide
- Amniotique
- - Membrane
- - - Sans précision ¬ Anomalie du *O41.9*
- - - ¬ Autres anomalies précisées du *O41.8*
- - Mucus ¬ Aspiration néonatale de *P24.1*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- - ¬
- - - Présence de méconium dans le *P20*
- - - Travail accouchement compliqué
- - - - Anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le *O68.2*
- - - - Présence de méconium dans le *O68.1*
- Brûlants ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Céphalorachidien
- - Postopératoire ¬ Fistule de *G97.80*
- - Rachicentèse ¬ Écoulement de *G97.0*
- - ¬
- - - Écoulement de *G96.0*
- - - Présence d'un appareil de drainage du *Z98.2*
- - - Résultat
- - - - Anormaux de l'examen du *R83.9*
- - - - Cytologique anormal du *R83.6*
- - - - Histologique anormal du *R83.7*
- - - - Immunologique anormal du *R83.4*
- - - - Microbiologique anormal du *R83.5*
- - - Syphilis congénitale tardive latente, avec réaction négative dans le *A50.6*
- - - Taux anormal
- - - - Enzymes du *R83.0*
- - - - Hormones du *R83.1*
- - - - Substances d'origine principalement non médicinale du *R83.3*
- Clair ¬ Méningite à *G03.0*
- Corrosif ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- Extracellulaire ¬ Déplétion du volume du plasma ou du *E86*
- Péritonéal ¬ Résultats anormaux de: *R85*
- Pleural ¬ Résultats anormaux de: *R84*
- Séminal ¬ Résultats anormaux de: sperme, *R86*

Liquide *–suite*
- Séreux) (ouverte) (percée) ¬ Ulcère [escarre] de pression avec phlyctène (remplie de *L89.1*
- Synovial ¬ Résultats anormaux de: *R89*
- Vomissements SAI ¬ inhalation de *T17*
- ¬
- - Pneumonie due à d'autres substances solides et *J69.8*
- - Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de *R63.8*

Liquidienne
- SAI ¬ Rétention *R60.9*
- ¬ Surcharge *E87.7*

Liquor (amnii) ¬ Aspiration de *P24.1*

Liquorrhée cérébrospinale ¬ *G96.0*

LIS1 ¬ Lissencéphalie par mutation de *Q04.3*

Lisch ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*

Lisker-Garcia-Ramos ¬ Syndrome de *G54.8, K22.0*

Lissencéphalie
- Due à une mutation de TUBA1 ¬ *Q04.3*
- Hypoplasie cérébelleuse type
- - A ¬ *Q04.3*
- - B ¬ *Q04.3*
- - C ¬ *Q04.3*
- - D ¬ *Q04.3*
- - E ¬ *Q04.3*
- - F ¬ *Q04.3*
- Isolée de type 1 sans anomalie génétique connue ¬ *Q04.3*
- Liée à l'X avec anomalies génitales ¬ *Q04.3*
- Mutation de LIS1 ¬ *Q04.3*
- Pavimenteuse sans atteinte musculaire ou oculaire ¬ *Q04.3*
- Type
- - 1 liée à l'X ¬ *Q04.3*
- - 3
- - - Dysplasie métacarpienne ¬ Syndrome de *Q04.3*
- - - Séquence d'akinésie fœtale familiale ¬ Syndrome de *Q04.3*
- - 9 avec malformation cérébrale complexe ¬ *Q04.3*
- - Norman-Roberts ¬ *Q04.3*
- ¬ *Q04.3*

Lisses ¬ Syndrome multisystémique de dysfonctionnement des muscles *I73.8*

Listeria
- Monocytogenes ¬
- - Infection à *A32.9*
- - Méningite à *A32.1†, G01**
- - Méningo-encéphalite à *A32.1†, G05.0**
- Origine alimentaire ¬ Infection à *A32.9*
- ¬
- - Endocardite à *A32.8†, I39.8**
- - Sepsis à *A32.7*

Listérienne
- Origine alimentaire ¬ Infection *A32*
- ¬
- - Méningite
- - - Cours de) *A32.1†, G01**
- - - Méningo-encéphalite *A32.1†*
- - Méningo-encéphalite *A32.1†, G05.0**

Listériose
- Cutanée ¬ *A32.0*
- Néonatale (disséminée) ¬ *P37.2*
- Oculo-glandulaire ¬ *A32.8*
- Origine alimentaire ¬ *A32.9*
- ¬
- - *A32.9*
- - Artérite cérébrale au cours de *A32.8†, I68.1**
- - Encéphalite au cours de *A32.1†, G05.0**
- - Formes de *A32.8*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.8*

Lit ¬ Étouffement au *X59.9!*

Lithiase
- Biliaire à faible niveau de phospholipides ¬ *K80.80*
- Canal cholédoque sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Glandes salivaires ou d'un canal excréteur ¬ *K11.5*
- Pancréatique ¬ *K86.88*
- Prostatique ¬ *N42.0*
- Pulmonaire ¬ *J98.4*
- Rénale congénitale ¬ *Q63.8*

Lithiasique
- Hydronéphrose ¬
- - Pyélite *N13.64*
- - Pyélonéphrite *N13.64*
- ¬ Cholécystite *K80.10*

Lithium
- Sang ¬ Présence d'un taux anormal de *R78.8*
- ¬ Intoxication au *T43.8*

Little-Piccardi-Lassueur ¬ Syndrome de Graham *L66.1*

Littorales ¬ Angiome splénique à cellules *D13.9*

Littré ¬ Abcès (de): glande de: *N34.0*

Livédoïde
- Ulcérations estivales ¬ Vascularite *L95.0*
- ¬ Vasculopathie *L95.0*

Livedo-petite taille] ¬ Syndrome FILS [dysmorphie faciale-déficit immunitaire- *Q87.1*

Livraison ¬ Accident de véhicule de *V99!*

LL)] ¬ Lèpre lépromateuse [Lépromateuse polaire (*A30.5*

LLA-B cellule matures type Burkitt
- Rémission complète ¬ *C91.81*
- ¬ *C91.80*

LLC
- B ¬ Variante non leucémique de la *C83.0*
- Cellules B en rémission complète ¬ Leucémie lymphoïde chronique [*C91.11*
- Leucémie lymphoïde chronique
- - Rémission complète ¬ *C91.11*
- - ¬ *C91.10*

LMA
- M0 ¬ *C92.0*
- M1 ¬ *C92.0*
- M2 ¬ *C92.00*
- M3
- - Rémission complète ¬ *C92.41*
- - ¬ *C92.40*
- M4
- - Eo avec inv(16) ou t(16;16) ¬ *C92.5*
- - Rémission complète ¬ *C92.51*
- - ¬ *C92.50*
- M5
- - Rémission complète ¬ *C93.01*
- - ¬ *C93.00*
- M5a
- - Rémission complète ¬ *C93.01*
- - ¬ *C93.00*
- M5b
- - Rémission complète ¬ *C93.01*
- - ¬ *C93.00*
- Sans classification FAB) SAI ¬ *C92.0*
- T(15;17)
- - Rémission complète ¬ *C92.41*
- - ¬ *C92.40*
- T(8;21) ¬ *C92.0*
- ¬ Leucémie myéloblastique aiguë [*C92.0*

LMA 1/ETO ¬ *C92.0*

LMC
- BCR/ABL positive en rémission complète ¬ Leucémie myéloïde chronique [*C92.11*
- Chromosome Philadelphie (Ph1) positive en rémission complète ¬ Leucémie myéloïde chronique [*C92.11*
- Rémission complète ¬ Leucémie myéloïde chronique [*C92.11*
- ¬
- - Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [*C94.8!*
- - Leucémie myéloïde chronique [*C92.10*

LMF1 [facteur 1 de maturation de la lipase] ¬ Déficit familial en *E78.3*

LMIEHG] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade [*D06.9*

LMMC
- 1
- - Rémission complète ¬ *C93.11*
- - ¬ *C93.10*
- 2
- - Rémission complète ¬ *C93.11*
- - ¬ *C93.10*
- Éosinophilie

LMMC *–suite*
- Éosinophilie *–suite*
- - Rémission complète ¬ Leucémie myélomonocytaire chronique [*C93.11*
- - ¬ Leucémie myélomonocytaire chronique [*C93.10*
- Rémission complète ¬ Leucémie myélomonocytaire chronique [*C93.11*
- ¬ Leucémie myélomonocytaire chronique [*C93.10*

LMMJ
- Rémission complète ¬ Leucémie myélomonocytaire juvénile [*C93.31*
- ¬ Leucémie myélomonocytaire juvénile [*C93.30*

LMNA ¬
- Dystrophie musculaire congénitale liée à *G71.2*
- Syndrome progéroïde cardio-cutané lié à *E34.8*

LMNL] ¬ Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [*G95.81*

LMP [Leucoencéphalopathie multifocale progressive] ¬ *A81.2*

LNH] Lymphome non hodgkinien ¬ [*C85.9*

Loase
- Loïase] ¬ *B74.3*
- ¬ Infestation des paupières au cours de *B74.3†*, *H03.0**

Lobaire
- Atrophique ¬ Démence au cours de sclérose cérébrale *G31.0†*, *F02.0**
- Congénital ¬ Emphysème *Q33.8*
- Inférieure ¬ Tumeur neuroendocrine de la bronche *C34.3*
- Sans précision ¬ Pneumonie *J18.1*
- Supérieure ¬ Tumeur neuroendocrine de la bronche *C34.1*
- ¬
- - Atélectasie *J98.12*
- - Holoprosencéphalie
- - - *Q04.2*
- - - Semi- *Q04.2*

Lobe
- Antérieur de l'hypophyse ¬ Insuffisance post-partum aiguë du *E23.0*
- Cérébral ¬ Hémorragie (du): *I61.1*
- Frontal ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Inférieur
- - Bronches ou poumon ¬ Tumeur maligne: *C34.3*
- - Poumon ¬
- - - Blastome
- - - - Pleuropulmonaire
- - - - - *C34.3, C38.4*
- - - - - Type 1 du *C34.3, C38.4*
- - - - - Type 2 du *C34.3, C38.4*
- - - - - Type 3 du *C34.3, C38.4*

Lobe *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - Poumon ¬ *–suite*
- - - Blastome *–suite*
- - - - Pulmonaire du *C34.3*
- - - Tumeur à GRF [facteur de libération de l'hormone de croissance] du *C34.3*
- - ¬ Atélectasie du *J98.11*
- Mésio-temporal avec sclérose de l'hippocampe ¬ Épilepsie du *G40.2, G37.8*
- Moyen
- - Bronches ou poumon ¬ Tumeur maligne: *C34.2*
- - Poumon ¬
- - - Adénocarcinome fœtal bien différencié du *C34.2*
- - - Blastome
- - - - Pleuropulmonaire
- - - - - *C34.2, C38.4*
- - - - - Type 1 du *C34.2, C38.4*
- - - - - Type 2 du *C34.2, C38.4*
- - - - - Type 3 du *C34.2, C38.4*
- - - - Pulmonaire du *C34.2*
- - - Tumeur à GRF [facteur de libération de l'hormone de croissance] du *C34.2*
- - ¬
- - - Atélectasie du *J98.11*
- - - Carcinome bronchique de *C34.2*
- - - Syndrome du *J98.11*
- - - Tumeur neuroendocrine de la bronche du *C34.2*
- Occipital ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Oreille
- - Anormal ¬ Syndrome de syndactylie-polydactylie- *Q74.8, Q17.8*
- - ¬
- - - Absence congénitale du *Q17.8*
- - - Syndrome de retard de langage-asymétrie faciale-strabisme-incisure du *Q87.0*
- - - Trichofolliculome du *D23.2*
- Pariétal ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Pulmonaire
- - Inférieur ¬
- - - Adénocarcinome fœtal bien différencié du *C34.3*
- - - Carcinome bronchique à petites cellules du *C34.3*
- - Moyen ¬ Carcinome bronchique à petites cellules du *C34.2*
- - Supérieur ¬ Carcinome bronchique à petites cellules du *C34.1*
- - Surnuméraire ¬ *Q33.1*
- Supérieur

Lobe *–suite*
- Supérieur *–suite*
- - Bronches ou poumon ¬ Tumeur maligne: *C34.1*
- - Poumon ¬
- - - Adénocarcinome fœtal bien différencié du *C34.1*
- - - Blastome
- - - - Pleuropulmonaire
- - - - - *C34.1, C38.4*
- - - - - Type 1 du *C34.1, C38.4*
- - - - - Type 2 du *C34.1, C38.4*
- - - - - Type 3 du *C34.1, C38.4*
- - - - Pulmonaire du *C34.1*
- - - Tumeur à GRF [facteur de libération de l'hormone de croissance] du *C34.1*
- Temporal ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Ventricules ¬ Tumeur maligne: Encéphale, sauf *C71.0*

Lobe frontal ¬
- AIEF [encéphalopathie infantile aiguë affectant principalement le *G40.2*
- Astroblastome du *C71.1*
- Astrocytome
- - *C71.1*
- - Anaplasique du *C71.1*
- - Diffus du *C71.1*
- - Fibrillaire du *C71.1*
- - Gémistocytique du *C71.1*
- - Pilocytique du *C71.1*
- - Pilomyxoïde du *C71.1*
- Astrocytome protoplasmique du *C71.1*
- Carcinome embryonnaire du *C71.1*
- Choriocarcinome du *C71.1*
- Ependymoblastome du *C71.1*
- Ganglioglioma anaplasique du *C71.1*
- Glioblastome
- - *C71.1*
- - Cellules géantes du *C71.1*
- Gliome malin du *C71.1*
- Gliosarcome du *C71.1*
- Médulloépithéliome du *C71.1*
- Méningiome du *D32.0*
- Oligoastrocytome
- - *C71.1*
- - Anaplasique du *C71.1*
- Oligodendrogliome
- - *C71.1*
- - Anaplasique du *C71.1*
- Tératome malin du *C71.1*
- Tumeur
- - Embryonnaire avec rosettes pluristratifiées du *C71.1*
- - Oligodendrogliale du *C71.1*
- Tumeur maligne: *C71.1*

Lobe frontal ¬ *–suite*
- Tumeur mixte des cellules germinales du *C71.1*
- Tumeur neuroectodermique primitive du *C71.1*
- Tumeur oligoastrocytaire du *C71.1*
- Tumeur rhabdoïde tératoïde atypique du *C71.1*
- Xanthoastrocytome pléomorphe du *C71.1*

Lobe occipital ¬
- Astroblastome du *C71.4*
- Astrocytome
- - *C71.4*
- - Anaplasique du *C71.4*
- - Diffus du *C71.4*
- - Fibrillaire du *C71.4*
- - Gémistocytique du *C71.4*
- - Pilocytique du *C71.4*
- - Pilomyxoïde du *C71.4*
- Astrocytome protoplasmique du *C71.4*
- Carcinome embryonnaire du *C71.4*
- Choriocarcinome du *C71.4*
- Ependymoblastome du *C71.4*
- Ganglioglíome anaplasique du *C71.4*
- Glioblastome
- - *C71.4*
- - Cellules géantes du *C71.4*
- Gliome malin du *C71.4*
- Gliosarcome du *C71.4*
- Médulloépithéliome du *C71.4*
- Oligoastrocytome
- - *C71.4*
- - Anaplasique du *C71.4*
- Oligodendrogliome
- - *C71.4*
- - Anaplasique du *C71.4*
- Tératome malin du *C71.4*
- Tumeur
- - Embryonnaire avec rosettes pluristratifiées du *C71.4*
- - Oligodendrogliale du *C71.4*
- Tumeur maligne: *C71.4*
- Tumeur mixte des cellules germinales du *C71.4*
- Tumeur neuroectodermique primitive du *C71.4*
- Tumeur oligoastrocytaire du *C71.4*
- Tumeur rhabdoïde tératoïde atypique du *C71.4*
- Xanthoastrocytome pléomorphe du *C71.4*

Lobe pariétal ¬
- Astroblastome du *C71.3*
- Astrocytome
- - *C71.3*
- - Anaplasique du *C71.3*
- - Diffus du *C71.3*
- - Fibrillaire du *C71.3*

Lobe pariétal ¬ *–suite*
- Astrocytome *–suite*
- - Gémistocytique du *C71.3*
- - Pilocytique du *C71.3*
- - Pilomyxoïde du *C71.3*
- Astrocytome protoplasmique du *C71.3*
- Carcinome embryonnaire du *C71.3*
- Choriocarcinome du *C71.3*
- Ependymoblastome du *C71.3*
- Ganglioglíome anaplasique du *C71.3*
- Glioblastome
- - *C71.3*
- - Cellules géantes du *C71.3*
- Gliome malin du *C71.3*
- Gliosarcome du *C71.3*
- Médulloépithéliome du *C71.3*
- Oligoastrocytome
- - *C71.3*
- - Anaplasique du *C71.3*
- Oligodendrogliome
- - *C71.3*
- - Anaplasique du *C71.3*
- Tératome malin du *C71.3*
- Tumeur
- - Embryonnaire avec rosettes du *C71.3*
- - Oligodendrogliale du *C71.3*
- Tumeur maligne: *C71.3*
- Tumeur mixte des cellules germinales du *C71.3*
- Tumeur neuroectodermique primitive du *C71.3*
- Tumeur oligoastrocytaire du *C71.3*
- Tumeur rhabdoïde tératoïde atypique du *C71.3*
- Xanthoastrocytome pléomorphe du *C71.3*

Lobe temporal
- Latéral autosomique dominante ¬ Épilepsie du *G40.2*
- ¬
- - Astroblastome du *C71.2*
- - Astrocytome
- - - *C71.2*
- - - Anaplasique du *C71.2*
- - - Diffus du *C71.2*
- - - Fibrillaire du *C71.2*
- - - Gémistocytique du *C71.2*
- - - Pilocytique du *C71.2*
- - - Pilomyxoïde du *C71.2*
- - Astrocytome protoplasmique du *C71.2*
- - Carcinome embryonnaire du *C71.2*
- - Choriocarcinome du *C71.2*
- - Ependymoblastome du *C71.2*
- - Ganglioglíome anaplasique du *C71.2*
- - Glioblastome
- - - *C71.2*
- - - Cellules géantes du *C71.2*
- - Gliome malin du *C71.2*

Lobe temporal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Gliosarcome du *C71.2*
- - Leucoencéphalopathie avec kystes bilatéraux de la partie antérieure du *E75.2*
- - Médulloépithéliome du *C71.2*
- - Oligoastrocytome
- - - *C71.2*
- - - Anaplasique du *C71.2*
- - Oligodendrogliome
- - - *C71.2*
- - - Anaplasique du *C71.2*
- - Tératome malin du *C71.2*
- - Tumeur
- - - Embryonnaire avec rosettes pluristratifiées du *C71.2*
- - - Oligodendrogliale du *C71.2*
- - Tumeur maligne: *C71.2*
- - Tumeur mixte des cellules germinales du *C71.2*
- - Tumeur neuroectodermique primitive du *C71.2*
- - Tumeur oligoastrocytaire du *C71.2*
- - Tumeur rhabdoïde tératoïde atypique du *C71.2*
- - Xanthoastrocytome pléomorphe du *C71.2*

Lobomycose ¬ *B48.0*

Lobotomisés ¬ Syndrome (des): *F07.0*

Lobstein ¬ Maladie de *Q78.0*

Lobulaire
- Non classée ailleurs ¬ Hépatite chronique *K73.1*
- ¬
- - Carcinome in situ *D05.0*
- - Maladie toxique du foie avec hépatite chronique *K71.4*

Lobulations spléniques ¬ Persistance de *Q89.08*

Lobule surnuméraire ¬ *Q17.0*

Lobulite lymphocytaire sclérosant cours
- Diabète sucré insulinodépendant ¬ *E14.60, N61*
- Thyroïdite de Hashimoto ¬ *E06.3, N61*

LOC] ¬ Syndrome laryngo-onycho-cutané [*Q81.8*

Localisation
v./v.a. entrée plus spécifique

Localisé
v./v.a. Type de maladie

Locataires et le propriétaire ¬ Désaccord avec les voisins, les *Z59*

Locaux ¬ Intoxication
- Anesthésiques *T41.3*
- Astringents et détergents *T49.2*

Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice] ¬ *G83.5*

Loeys
v./v.a. Meester-Loeys

Loeys-Dietz ¬ Syndrome de *Q87.4*

Löffler
- Hyperéosinophilie ¬ Endocardite pariétale fibroplastique (de *I42.3*
- II ¬ Syndrome de *I42.3*
- ¬
- - Endocardite
- - - *I42.3*
- - - Pariétale fibroplastique (de *I42.3*
- - - Verruqueuse de *I42.3*
- - Syndrome de *J82*

Löfgren ¬
- Lymphadénopathie hilaire bilatérale [syndrome de *D86.8*
- Syndrome de *D86.8*

Logan
v./v.a. Dias-Logan

Loge
- Musculaire ¬ Syndrome de *T79.6*
- Néonatal ¬ Syndrome des *M62.29, P96.8*
- Tibiale antérieure ¬ Syndrome de la *M76.8*
- ¬ Syndrome de *T79.69*

Logement
- Conditions économiques ¬ Difficultés liées au *Z59*
- Inadéquat ¬ *Z59*

Logopénique ¬ Aphasie primaire progressive *G31.0†, F02.0**

Loïase] ¬ Loase [*B74.3*

Loiselet
v./v.a. Mégarbané-Loiselet

Loisirs ¬ Manque de repos ou de *Z73*

Loken
v./v.a. Senior-Loken

Lombaire
v./v.a. Type de maladie

Lombalgie basse ¬ *M54.5*

Lombes
- Bassin
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des *S30.81*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des *S30.84*
- - Décollement sous-cutané (fermé) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des *S30.86*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des *S30.83*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la paroi abdominale, des *T34.3*
- - Phlyctène (non due à la chaleur) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des *S30.82*
- - Sans précision ¬
- - - Gelure du thorax, de l'abdomen, des *T35.3*
- - - Lésion traumatique de l'abdomen, des *S39.9*
- - ¬

Lombes *–suite*
- Bassin *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des *S38.3*
- - - Contusion des *S30.0*
- - - Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des *S38.1*
- - - Gelure superficielle de la paroi abdominale, des *T33.3*
- - - Lésion traumatique
- - - - Multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des *S35.7*
- - - - Muscles et de tendons de l'abdomen, des *S39.0*
- - - - Nerf
- - - - - Non précisés au niveau de l'abdomen, des *S34.8*
- - - - - S) périphérique(s) de l'abdomen, des *S34.6*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - Niveau de l'abdomen, des *S35.88*
- - - - - Non précisés, au niveau de l'abdomen, des *S35.9*
- - - Lésions traumatiques
- - - - Multiples de l'abdomen, des *S39.7*
- - - - Superficielles
- - - - - Abdomen, des *S30.88*
- - - - - Multiples de l'abdomen, des *S30.7*
- - - - - Thorax, de l'abdomen, des *T00.1*
- - - Plaie ouverte
- - - - *S31.0*
- - - - Multiples de l'abdomen, des *S31.7*
- - - - Thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des *T01.1*
- ¬ Décollement sous-cutané des *S30.86*

Lombo-sacrées-blépharoptosis ¬ Syndrome de fusions des vertèbres *Q76.4, Q10.0*

Lombo-sacré
v./v.a. Type de maladie

Londe ¬ Syndrome de Fazio- *G12.1*

Longicornis ¬
- Fièvre à tiques Haemaphysalis *A93.8*
- Syndrome de fièvre avec thrombocytopénie sévère à Haemaphysalis *A93.8*

Longitudinal
- Antérieur cervical ¬ Ligament *S13.4*
- Cubitus ¬ Raccourcissement *Q71.5*
- Fémur ¬ Raccourcissement *Q72.4*
- Membre(s) non précisé(s) ¬ Raccourcissement *Q73.8*
- Péroné ¬ Raccourcissement *Q72.6*
- Postérieur [OLLP] ¬ Ossification du ligament *M48.8*
- Radius ¬
- - Déficit congénital *Q71.4*
- - Raccourcissement *Q71.4*
- Tibia ¬ Raccourcissement *Q72.5*

Longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de *O34.30*

Lopes ¬ Hypotrichose-déficience intellectuelle, type *Q87.0*

Lopes-Gorlin ¬ Syndrome de *Q10.3*

López
v./v.a. Gómez-López-Hernández

Lorain-Lévi ¬ Syndrome de: *E23.0*

Lordose
- Acquise ¬ *M40.4*
- Chirurgie ¬ *M96.4*
- Congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Posturale ¬ *M40.4*
- Sans précision ¬ *M40.5*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬ Autres *M40.4*

Lorrain
v./v.a. Strümpell-Lorrain

Losangique médiane ¬ Glossite *K14.2*

Losonci
v./v.a. Czeizel-Losonci

Louis ¬ Encéphalite de Saint- *A83.3*

Louis-Bar ¬ Syndrome de *G11.3*

Louping ill ¬ *A84.8*

Lowe
- Syndrome de Fanconi ¬ Syndrome de *E72.0*
- ¬
- - Glaucome au cours de syndrome de *E72.0†, H42.0**
- - Syndrome
- - - *E72.0*
- - - Oculo-cérébro-rénal de *E72.0*

Lowe-Kohn-Cohen ¬ Syndrome de *Q87.8*

Low-flow ¬ Priapisme de type *N48.30*

Lown Ganong Levine
- LGL] ¬ Syndrome de *I45.6*
- ¬ Syndrome de *I45.6*

Lowry
v./v.a. Coffin-Lowry
- ¬
- - Dysplasie épiphysaire multiple type *Q78.8*
- - Dysplasie rhizomélique de Patterson- *Q78.8*

Lowry-MacLean ¬ Syndrome de *Q87.8*

Lowry-Wood ¬ Syndrome de *Q87.5*

LPG] ¬ Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [*U60.1!*

LPI [Intolérance aux protéines dibasiques avec lysinurie] ¬ *E72.0*

LQT8 Syndrome QT long type 8 type
- 1 ¬ *I49.8*
- 2 ¬ *I49.8*

LRBA ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

LSD
- Diéthylamide de l'acide lysergique] ¬ Intoxication au *T40.8*
- ¬ Intoxication: Lysergide [*T40.8*

LSIL] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade [*N87.0*

L-transposition des gros vaisseaux ¬ *Q20.5*

Lubarsch-Pick ¬ Syndrome de *E85.88*

Lubinsky
v./v.a. Fine-Lubinsky
v./v.a. Keppen-Lubinsky
v./v.a. Stern-Lubinsky-Durrie

Lubs ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Lucey-Driscoll ¬ Syndrome de *P59.8*

Lucite polymorphe ¬ *L56.4*

Luette
- Bifide ¬ *Q35.7*
- ¬
- - Absence de *Q38.5*
- - Bifidité de la *Q35.7*
- - Fente de la *Q35.7*
- - Perforation syphilitique de la *A52.7†*, *K93.8**
- - Syphilis perforée tardive de la *A52.7†*, *K93.8**
- - Tuberculose de la *A18.8†*, *K93.8**
- - Tumeur maligne: *C05.2*

Lujo ¬ Fièvre hémorragique à arénavirus *A96.8*

Lumbago
- Hernie discale ¬ *M51.2*
- Ischialgie due à une atteinte des disques intervertébraux ¬ *M51.1†*, *G55.1**
- SAI ¬ *M54.5*
- Sciatique ¬ *M54.4*

Lumière
- Artificielle
- - Ultraviolette ¬ Exposition à : *W91.9!*
- - Visible ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Sans précision ¬ Effet de la chaleur et de la *T67.9*
- Soleil ¬ Exposition à: *X59.9!*
- ¬ Autres effets de la chaleur et de la *T67.8*

Lumish
v./v.a. Luscan-Lumish

Lundborg
v./v.a. Unverricht-Lundborg

Lunettes
- Verres de contact ¬ Mise en place et ajustement de *Z46.0*
- ¬
- - *Z97.8*
- - Renouvellement d'une ordonnance pour: *Z76.0*

Lupique
- Idiopathique ¬ Néphropathie full-house non *N05.9*
- ¬ Panniculite *L93.2*

Lupoïde
- Boeck ¬ *D86.3*
- ¬
- - Hépatite *K75.4*
- - Maladie toxique du foie avec hépatite *K71.5*

Lupski
v./v.a. Yuan-Harel-Lupski

Lupus
- Erythematodes integumentalis ¬ *L93.0*
- Exedens ¬ *A18.4*
- Tumidus ¬ *L93.2*
- Vulgaire
- - Paupière ¬ *A18.4†*, *H03.1**
- - ¬ *A18.4*
- ¬ Présence de l'anticoagulant du *D68.6*

Lupus érythémateux
- Aigu ¬ *M32.9*
- Cutané
- - Chronique ¬ *L93.0*
- - Rare ¬ *L93.0*
- - Subaigu ¬ *L93.1*
- Discoïde
- - Paupière ¬ *H01.1*
- - ¬ *L93.0*
- Disséminé
- - Atteinte
- - - Poumons ¬ *M32.1†*, *J99.1**
- - - Rénale tubulo-interstitielle ¬ *M32.1†*, *N16.4**
- - Enfant
- - - Atteinte pulmonaire ¬ *M32.1†*, *J99.1**
- - - ¬
- - - - Encéphalopathie au cours de *M32.1†*, *G05.8**
- - - - Endocardite au cours de *M32.1†*, *I39.8**
- - - - Glomérulonéphrite au cours de *M32.1†*, *N08.5**
- - - - Péricardite au cours de *M32.1†*, *I32.8**
- - Médicamenteux
- - - Enfant ¬ *M32.0*
- - - ¬ *M32.0*
- - Mère ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: *P00.8*
- - ¬
- - - *M32.9*
- - - Artérite cérébrale au cours de *M32.1†*, *I68.2**
- - - Démence au cours de *M32.1†*, *F02.8**
- - - Encéphalite au cours d'un *M32.1†*, *G05.8**
- - - Formes de *M32.8*
- - - Glomérulonéphrite
- - - - Cours de *M32.1†*, *N08.5**
- - - - Prolifération diffuse au cours de *M32.1†*, *N08.5**
- - - Glomérulopathie au cours de *M32.1†*, *N08.5**

Lupus érythémateux *–suite*
- Disséminé *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Myopathie au cours de *M32.1†*, *G73.7**
- - - Néphrite au cours de *M32.1†*, *N08.5**
- - - Néphropathie tubulo-interstitielle au cours de *M32.1†*, *N16.4**
- - - Néphrose au cours de *M32.1†*, *N08.5**
- - - Péricardite au cours de *M32.1†*, *I32.8**
- - - Polyneuropathie au cours de *M32.1†*, *G63.5**
- Familial type Chilblain ¬ *L93.2*
- Localisés ¬ Autres *L93.2*
- Néonatal ¬ *P00.8*
- Profond ¬ *L93.2*
- SAI ¬ *L93.0*
- Systémique
- - Familial ¬ *M32.8*
- - SLE] ¬ *M32.9*
- Type Chilblain ¬ *L93.2*
- Verruqueux ou hypertrophique ¬ *L93.2*
- ¬
- - Encéphalopathie au cours de *M32.1†*, *G05.8**
- - Endocardite au cours de *M32.1†*, *I39.8**

Lurie
v./v.a. Garcia-Lurie

Luscan-Lumish ¬ Syndrome de *Q87.8*

Luschka et du foramen de Magendie ¬ Atrésie des fentes de *Q03.1*

Lusoria ¬ Dysphagia *Q25.8*

Lutéinisante] ¬ Hypoplasie surrénalienne familiale sans LH [hormone *E27.1*

Lutz
v./v.a. Lewandowsky-Lutz
- ¬ maladie de *B41*

Luxable ¬ Hanche: *Q65.6*

Luxation
- Antérieure
- - Humérus ¬ *S43.01*
- - Tibia proximal ¬ *S83.11*
- Articulaire type gPAPP ¬ Chondrodysplasie avec *Q79.8*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ *S43.1*
- - Sacro-iliaque et sacro-coccygienne ¬ *S33.2*
- - Sterno-claviculaire ¬ *S43.2*
- Avant-bras ¬ Lésion tissu mou stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S51.84!*
- - - Ouverte ou de *S51.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S51.85!*
- - - Ouverte ou de *S51.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S51.86!*
- - - Ouverte ou de *S51.89!*

Luxation *–suite*
- Bras ¬ Lésion tissu mou stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S41.84!*
- - - Ouverte ou de *S41.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S41.85!*
- - - Ouverte ou de *S41.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S41.86!*
- - - Ouverte ou de *S41.89!*
- Ceinture scapulaire SAI ¬ *S43.3*
- Cheville ¬ *S93.0*
- Cloison du nez ¬ *S03.1*
- Cou ¬ Lésion tissu mou stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S11.84!*
- - - Ouverte ou de *S11.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S11.85!*
- - - Ouverte ou de *S11.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S11.86!*
- - - Ouverte ou de *S11.89!*
- Coude Non précisée
- - Antérieure ¬ *S53.11*
- - Latérale ¬ *S53.14*
- - Médiane ¬ *S53.13*
- - Postérieure ¬ *S53.12*
- - ¬
- - - *S53.10*
- - - *S53.18*
- Cristallin ¬ *H27.1*
- Dentaire ¬ *S03.2*
- Doigt
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ *S63.12*
- - - Métacarpo-phalangienne ¬ *S63.11*
- - Partie non précisée ¬ *S63.10*
- Entorse
- - Foulure
- - - Articulation ligament non précisés membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ *T13.2*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ *T11.2*
- - - Associations de parties du corps ¬ *T03.8*
- - - Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la tête avec *T03.0*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Séquelles de *T93.3*
- - - - Supérieur ¬ Séquelles d'une *T92.3*
- - - Multiples, sans précision ¬ *T03.9*
- - - Partie du corps non précisée ¬ *T14.3*
- - - Plusieurs parties membre s
- - - - Inférieur(s) ¬ *T03.3*
- - - - Supérieur s

Luxation *–suite*
- Entorse *–suite*
- - Foulure *–suite*
- - - Plusieurs parties membre s *–suite*
- - - - Supérieur s *–suite*
- - - - - Membre(s) inférieur(s) ¬ *T03.4*
- - - - - ¬ *T03.2*
- - - Tête avec luxations, entorses et foulures du cou ¬ *T03.0*
- - - Thorax et de la région lombosacrée ou du thorax et du bassin ¬ *T03.1*
- - Foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc ¬ *T09.2*
- Épaule [articulation gléno-humérale] SAI ¬ *S43.00*
- Fermée colonne lombaire bassin ¬ Lésion tissu mou stade
- - I lors de fracture ou de *S31.84!*
- - II lors de fracture ou de *S31.85!*
- - III lors de fracture ou de *S31.86!*
- Genou
- - Luxation
- - - Latérale du tibia proximal ¬ *S83.14*
- - - Médiane du tibia proximal ¬ *S83.13*
- - - Postérieure du tibia proximal ¬ *S83.12*
- - Sans autre précision ¬ *S83.10*
- - ¬ *S83.18*
- Globe oculaire ¬ *H44.8*
- Hanche
- - Antérieure ¬ *S73.02*
- - Fémur ¬ Lésion tissu mou stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de *S71.84!*
- - - - Ouverte ou de *S71.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de *S71.85!*
- - - - Ouverte ou de *S71.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de *S71.86!*
- - - - Ouverte ou de *S71.89!*
- - Postérieure ¬ *S73.01*
- - Sans autre précision ¬ *S73.00*
- - ¬ *S73.08*
- Inférieure de l'humérus ¬ *S43.03*
- Jambe ¬ Lésion tissu mou stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S81.84!*
- - - Ouverte ou de *S81.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S81.85!*
- - - Ouverte ou de *S81.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S81.86!*
- - - Ouverte ou de *S81.89!*
- Latérale du tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.14*
- Lésion

Luxation *–suite*
- Lésion *–suite*
- - Intracrânienne ¬ Plaie ouverte associée à une fracture, une *S01*
- - Intrathoracique ¬ Plaie ouverte associée à une fracture ou une *S21*
- Mâchoire ¬ *S03.0*
- Médiane du tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.13*
- Multiples
- - Cou ¬ *S13.3*
- - Doigts ¬ *S63.2*
- - ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire avec *Q77.7*
- Omoplate ¬ *S43.3*
- Orteil s
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ *S93.12*
- - - Métatarsophalangienne ¬ *S93.11*
- - Sans autre précision ¬ *S93.10*
- Ouverte
- - Avant-bras ¬ Fracture de *S52.9, S51.87!*
- - Colonne lombaire bassin ¬ Lésion tissu mou stade
- - - I lors de fracture ou de *S31.87!*
- - - II lors de fracture ou de *S31.88!*
- - - III lors de fracture ou de *S31.89!*
- - Pied ¬ *S93.30, S91.87!*
- - Sans précision stade ¬ Fracture
- - - *S01.87!*
- - - *S11.87!*
- - - *S21.87!*
- - - *S31.87!*
- - - *S41.87!*
- - - *S51.87!*
- - - *S61.87!*
- - - *S71.87!*
- - - *S81.87!*
- - - *S91.87!*
- Partie de l'épaule ¬ *S43.08*
- Parties non précisées
- - Ceinture scapulaire ¬ *S43.3*
- - Cou ¬ *S13.2*
- - Pied
- - - Articulation
- - - - Médiotarsienne ¬ *S93.32*
- - - - Tarsométatarsienne ¬ *S93.33*
- - - Métatarsien (os), articulation non précisée ¬ *S93.34*
- - - Os) carpe, articulation non précisée ¬ *S93.31*
- - - Partie non précisée ¬ *S93.30*
- - - ¬ *S93.38*
- - Rachis lombaire et du bassin ¬ *S33.3*
- - Tête ¬ *S03.3*
- - Thorax ¬ *S23.2*
- Pied ¬ Lésion tissu mou stade

Luxation *–suite*
- Pied ¬ Lésion tissu mou stade *–suite*
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S91.84!*
- - - Ouverte ou de *S91.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S91.85!*
- - - Ouverte ou de *S91.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S91.86!*
- - - Ouverte ou de *S91.89!*
- Plaie intraabdominale ¬ Plaie ouverte communicant avec une fracture, une *S31*
- Poignet
- - Articulation
- - - Carpo-métacarpienne ¬ *S63.04*
- - - Médiocarpienne ¬ *S63.03*
- - - Radiocarpienne ¬ *S63.02*
- - - Radio-cubitale ¬ *S63.01*
- - Main ¬ Lésion tissu mou stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de *S61.84!*
- - - - Ouverte ou de *S61.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de *S61.85!*
- - - - Ouverte ou de *S61.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de *S61.86!*
- - - - Ouverte ou de *S61.89!*
- - Partie non précisée ¬ *S63.00*
- - ¬ *S63.08*
- Postérieure
- - Fémur distal ¬ *S83.11*
- - Humérus ¬ *S43.02*
- - Tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.12*
- Récidivante de la rotule ¬ *M22.0*
- Rotule
- - Acromicrie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-calvitie- *Q87.8*
- - ¬ *S83.0*
- SAI ¬ Fracture: avec: *T14.2*
- Subluxation
- - Articulaires récidivantes ¬ *M24.4*
- - Pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs ¬ *M24.3*
- Tête
- - Cubitus ¬ Fracture distale de la diaphyse du radius avec *S52.31*
- - Radiale ¬ *S53.0*
- - Radius ¬ Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec *S52.21*
- - ¬ Lésion tissu mou stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de *S01.84!*
- - - - Ouverte ou de *S01.87!*
- - - II lors fracture

Luxation *–suite*
- Tête *–suite*
- - ¬ Lésion tissu mou stade *–suite*
- - - II lors fracture *–suite*
- - - - Fermée ou de *S01.85!*
- - - - Ouverte ou de *S01.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de *S01.86!*
- - - - Ouverte ou de *S01.89!*
- Thorax ¬ Lésion tissu mou stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S21.84!*
- - - Ouverte ou de *S21.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S21.85!*
- - - Ouverte ou de *S21.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S21.86!*
- - - Ouverte ou de *S21.89!*
- Vertèbres lombaires SAI ¬ *S33.10*
- ¬ Plaie ouverte
- - Associée fracture
- - - *S51*
- - - *S61*
- - - *S71*
- - - *S81*
- - Communicant fracture
- - - *S11*
- - - *S41*
- - - *S91*

Luxation congénitale
- Coude ¬ *Q68.8*
- Cristallin ¬ *Q12.1*
- Épaule ¬
- - *Q68.8*
- - *Q68.8*
- Genou ¬ *Q68.2*
- Hanche
- - Bilatérale ¬ *Q65.1*
- - Sans précision ¬ *Q65.2*
- - Unilatérale ¬ *Q65.0*
- - ¬ Ostéochondrite juvénile après réduction d'une *M91.8*
- Rotule ¬ *Q74.1*
- Vraie de l'épaule ¬ *Q68.8*

Luxation d'une vertèbre
- Cervicale
- - C1/C2 ¬ *S13.11*
- - C2/C3 ¬ *S13.12*
- - C3/C4 ¬ *S13.13*
- - C4/C5 ¬ *S13.14*
- - C5/C6 ¬ *S13.15*
- - C6/C7 ¬ *S13.16*
- - C7/D1 ¬ *S13.17*
- - Niveau SAI ¬ *S13.10*
- - ¬ *S13.18*

Luxation d'une vertèbre *–suite*
- Dorsale
- - D1/D2 et D2/D3 ¬ *S23.11*
- - D11/D12 ¬ *S23.16*
- - D12/L1 ¬ *S23.17*
- - D3/D4 et D4/D5 ¬ *S23.12*
- - D5/D6 et D6/D7 ¬ *S23.13*
- - D7/D8 et D8/D9 ¬ *S23.14*
- - D9/D10 et D10/D11 ¬ *S23.15*
- - Niveau non précisé ¬ *S23.10*
- Lombaire
- - L1/L2 ¬ *S33.11*
- - L2/L3 ¬ *S33.12*
- - L3/L4 ¬ *S33.13*
- - L4/L5 ¬ *S33.14*
- - L5/S1 ¬ *S33.15*
- - Niveau non précisé ¬ *S33.10*

Luysienne
v./v.a. dentato-rubro-pallido-luysienne

Lyase
v./v.a. gamma-lyase
- ¬
- - Anomalie du développement sexuel 46,XY par déficit isolé en 17,20- *E29.1*
- - Déficit
- - - 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA *E71.1*
- - - Adénylosuccinate *E79.8*
- - - Arginosuccinate *E72.2*

Lyell
- Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle ¬ Syndrome de *L51.21*
- Staphylococcique ¬ Syndrome de *L00*
- ¬ Syndrome de *L51.20*

LYG [Granulomatose lymphomatoïde] ¬ *C83.8*

Lyme
- Stade
- - I ¬ Borréliose de *A69.2*
- - II ¬ Borréliose de *A69.2*
- - III ¬ Borréliose de *A69.2*
- Tiques ¬ Borréliose [maladie de *A69.2*
- ¬
- - Arthrite au cours de la maladie de *A69.2†, M01.29**
- - Borréliose de *A69.2*
- - Cardite au cours de maladie de *A69.2†, I52.0**
- - Maladie de *A69.2*
- - Méningite au cours de maladie de *A69.2†, G01**
- - Polynévrite au cours de la maladie de *A69.2†, G63.0**

Lymphadénectomie stade
- I ¬ Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec *I97.20*
- II ¬ Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec *I97.21*
- III ¬ Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec *I97.22*

Lymphadénite
- Aiguë
- - Face, de la tête et du cou ¬ *L04.0*
- - Localisations ¬ *L04.8*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *L04.3*
- - - Supérieur ¬ *L04.2*
- - Sans précision ¬ *L04.9*
- - Tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique ¬ *L04*
- - Tronc ¬ *L04.1*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, L04.9*
- Chronique
- - Sauf mésentérique ¬ *I88.1*
- - Tout ganglion autre que mésentérique ¬ *I88.1*
- Cours de diphtérie ¬ *A36.8*
- Cryptocoques ¬ *B45.8*
- Mésentérique
- - Aiguë) (chronique) ¬ *I88.0*
- - Non spécifique ¬ *I88.0*
- - Salmonella typhi ¬ *A01.0*
- - Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Non spécifique
- - Sans précision ¬ *I88.9*
- - ¬ Autres *I88.8*
- SAI ¬ *I88.9*
- Syphilitique
- - Précoce ¬ *A51.4*
- - Secondaire
- - - Précoce ¬ *A51.4*
- - - ¬ *A51.4*
- Tuberculeuse primaire ¬ *A18.2*
- ¬ Syphilis tardive avec *A52.7†, I98.8**

Lymphadénome angio-immunoblastique ¬ *C86.5*

Lymphadénopathie
- Angio-immunoblastique
- - Dysprotéinémie [LAID] ¬ *C86.5*
- - LAID] ¬ *C86.5*
- - ¬ *C86.5*
- Congénitale due à la toxoplasmose ¬ *P37.1*
- Généralisée
- - Persistante) [LPG] ¬ Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou *U60.1!*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R59.1*
- Hilaire bilatérale [syndrome de Löfgren] ¬ *D86.8*
- Inguinale ¬ *R59.0*
- Massive ¬ Syndrome d'histiocytose avec *D76.3*
- Médiastinale ¬ *R59.0*
- Mésentérique ¬ *R59.0*
- SAI ¬ *R59.1*
- Syphilitique secondaire ¬ *A51.4*
- Trachéo-bronchique

Lymphadénopathie *–suite*
- Trachéo-bronchique *–suite*
- - Tuberculeuse primaire avec confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.7*
- - ¬ *R59.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.2*

Lymphangiectasie
- Intestinale
- - Primitive ¬ *I89.09*
- - Secondaire ¬ *I89.09*
- - ¬ *I89.09*
- Polydactylie ¬ Syndrome de dérivés müllériens- *Q87.8*
- Pulmonaire
- - Congénitale ¬ *Q33.8*
- - Kystique congénitale ¬ *Q33.8*
- Scrotum ¬ *I89.09†, N51.8**
- ¬ *I89.0*

Lymphangioendothéliomatose multifocale avec thrombocytopénie [MLT] ¬ *D18.19, D69.61*

Lymphangioléiomyomatose
- Poumon ¬ *D38.1*
- ¬ *D48.1*

Lymphangiomatose
- Diffuse ¬ *D18.19*
- Disséminée ¬ *D18.19*
- Kaposiforme
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - ¬ *C49.9*
- Pulmonaire ¬ *Q33.8*

Lymphangiome
- Capillaire ¬ *D18.19*
- Circonscrit ¬ *D18.19*
- Cutané circonscrit ¬ *D18.19*
- Diffus ¬ *D18.19*
- Disséminé ¬ *D18.19*
- Kystique mixte ¬ *D18.19*
- Laryngé primaire ¬ *D18.18*
- Superficiel ¬ *D18.19*
- ¬ *D18.1*

Lymphangite
- Aiguë ¬ *L03*
- Chronique ¬ *I89.1*
- SAI ¬ *I89.1*
- Sein gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*
- Subaiguë ¬ *I89.1*
- ¬
- - *I89.1*
- - Infection purulente
- - - Bras avec *L03.10*
- - - Doigt avec *L03.01*
- - - Main avec *L03.10*
- - - Membre inférieur avec *L03.11*
- - - Orteil avec *L03.02*

Lymphangite *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Infection purulente *–suite*
- - - Pied (à l'exception des orteils) avec *L03.11*
- - Inflammation purulente
- - - Bras avec *L03.10*
- - - Doigt avec *L03.01*
- - - Main avec *L03.10*
- - - Membre inférieur avec *L03.11*
- - - Orteil avec *L03.02*
- - - Pied (à l'exception des orteils) avec *L03.11*

Lymphatique
v./v.a. Malformation lymphatique
- Aisselle et du membre supérieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.3*
- Axillaire stade
- - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.81*
- - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.82*
- - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.83*
- Cervical, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.80*
- Généralisée
- - Associée
- - - EPHB4
- - - - Défaut septal auriculaire ¬ Dysplasie *Q82.09, Q21.1*
- - - - Hydrops fœtal non immunologique ¬ Dysplasie *Q82.09, P83.2*
- - - PIEZO1 avec hydrops fœtal non immunologique ¬ Dysplasie *Q82.09, P83.2*
- - Fotiou ¬ Dysplasie *Q82.09*
- Hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus *C79.3*
- Inguinal
- - Membre inférieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.4*
- - Stade
- - - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.84*
- - - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.85*
- - - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.86*
- Intra-abdominal ¬
- - Métastase des ganglions *C77.2*
- - Tumeur maligne: Ganglions *C77.2*

Lymphatique *–suite*
- Intrapelviens ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.5*
- Intrathoracique ¬
- - Métastase des ganglions *C77.1*
- - Tumeur maligne: Ganglions *C77.1*
- Péritonéaux ¬ Tuberculose des ganglions *A18.3†, K93.0**
- Réarrangement JAK2 associé forme
- - Aiguë ¬ Tumeur mixte myéloïde/ *C95.00*
- - Chronique ¬ Tumeur mixte myéloïde/ *C95.10*
- SAI ¬ Maladie des vaisseaux *I89.9*
- Sans précision ¬
- - Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions *I89.9*
- - Tumeur maligne: Ganglion *C77.9*
- Sauf mésentérique ¬
- - Abcès (aigu) tout ganglion *L04*
- - Lymphadénite aiguë tout ganglion *L04*
- Sièges multiples ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.8*
- Suite à mastectomie ¬ Oblitération des vaisseaux *I97.2*
- Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.0*
- ¬
- - Atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions *I89.8*
- - Infiltration *D47.9*
- - Sarcoïdose
- - - Ganglions *D86.1*
- - - Poumon avec sarcoïdose des ganglions *D86.2*
- - Sarcome de Kaposi des ganglions *C46.3*
- - Syphilis secondaire précoce d'un ganglion *A51.4*
- - Syphilis tardive d'un ganglion *A52.7†, I98.8**
- - Tuberculose
- - - Glandes *A18.2*
- - - Mésentérique des ganglions *A18.3†, K93.0**
- - - Système *A18.2*
- - Tumeur bénigne: Ganglions *D36.0*
- - Vaisseau
- - - *C49*
- - - *D21*

Lymphoblastique
v./v.a. Leucémie lymphoblastique
v./v.a. Lymphome lymphoblastique
- Précurseur
- - B
- - - Rémission complète ¬ B-ALL [Leucémie aiguë *C91.01*
- - - ¬
- - - - B-ALL [Leucémie aiguë *C91.00*
- - - - Leucémie aiguë *C91.00*
- - T

Lymphoblastique *–suite*
- Précurseur *–suite*
- - T *–suite*
- - - Rémission complète ¬ Leucémie aiguë *C91.01*
- - - ¬ Leucémie aiguë *C91.00*

Lymphoblastome
- Diffus ¬ *C85.9*
- ¬ *C85.9*

Lymphocitaire ¬ Chorio-encéphalite *A87.2†, G05.1**

Lympho-cutanée ¬ Sporotrichose *B42.1*

Lymphocytaire
- Aiguë ¬ Méningite *A87.2†, G02.0**
- Antigène-1 (LFA-1) ¬ Anomalie de la fonction *D84.0*
- Bannwarth) ¬ Méningoradiculite *A69.2*
- Chronique
- - Rémission complète ¬ Leucémie *C91.11*
- - ¬ Leucémie *C91.10*
- Cutanée de Jessner ¬ Infiltration *L98.6*
- Fibrose diffuse ¬ Lymphome de Hodgkin classique en déplétion *C81.3*
- Sclérosant cours
- - Diabète sucré insulinodépendant ¬ Lobulite *E14.60, N61*
- - Thyroïdite de Hashimoto ¬ Lobulite *E06.3, N61*
- Séreuse aiguë ¬ Chorioméningite *A87.2†, G02.0**
- ¬
- - Chorioméningite *A87.2†, G02.0**
- - Colite
- - - *K52.8*
- - - Microscopique (collagène ou *K52.8*
- - Encéphalite *A87.2†, G05.1**
- - Lymphome de Hodgkin classique
- - - Déplétion *C81.3*
- - - Type réticulaire en déplétion *C81.3*
- - Méningite *A87.2†, G02.0**
- - Méningo-encéphalite *A87.2†, G05.1**
- - Pneumopathie interstitielle *J84.10*
- - Réaction leucémoïde de type: *D72.8*
- - Sarcome *C85.9*
- - Thyroïdite (de): *E06.3*

Lymphocytaire-histiocytaire ¬
- Lymphome de Hodgkin à prédominance *C81.0*
- Lymphome mixte *C85.9*
- Lymphome nodulaire
- - Cellules mixtes de type *C82.1*
- - Type *C82.1*

Lymphocytes
- B
- - Anomalie des membres-malformation urogénitale ¬ Syndrome de déficit immunitaire en *Q87.0*

Lymphocytes *–suite*
- B *–suite*
- - Porteurs d'immunoglobulines ¬ Agammaglobulinémie: avec *D80.1*
- - ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des *D83.0*
- CD4 ¬ Nombre réduit de *R72*
- CD8 ¬ Nombre réduit de *R72*
- Granuleux
- - Cellules NK ¬ Leucémie chronique à grands *C84.5*
- - T ¬ Leucémie à grands *C91.70*
- Nus ¬ Syndrome des *D81.6*
- T
- - Activés]-5 ¬ Haploinsuffisance de NFAT [facteur nucléaire des *D84.8*
- - Auxiliaire
- - - CD4+
- - - - Microlitre sang ¬ 200
- - - - - *U61.3!*
- - - - - 499 *U61.2!*
- - - - Non précisé ¬ Nombre de *U61.9!*
- - - - Plus par microlitre de sang ¬ 500 *U61.1!*
- - - Maladie due VIH Catégorie
- - - - 1 ¬ Nombre de *U61.1!*
- - - - 2 ¬ Nombre de *U61.2!*
- - - - 3 ¬ Nombre de *U61.3!*
- - Granuleux ¬ Leucémie à grands *C91.70*
- - Humain
- - - Type 1 HTLV-1 ¬
- - - - Myélopathie due à une infection à virus lymphotrope des *G04.1*
- - - - Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des *Z22.6*
- - - ¬ Myélopathie associée à un virus lymphotrope des *G04.1*
- - Immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des *D83.1*
- - ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-retard de langage-dysmorphie faciale-anomalies des *Q87.0*
- ¬
- - *Z52.08*
- - Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en LCK [tyrosine kinase spécifique des *D81.2*
- - Lymphome de Hodgkin
- - - Classique) riche en *C81.4*
- - - Diffus riche en *C81.4*
- - - Nodulaire riche en *C81.4*

Lymphocytique aiguë ¬ Leucémie *C91.00*

Lymphocytopénie CD4 idiopathique ¬ *D72.8*

Lymphocytose
- B polyclonale persistante ¬ *D72.8*
- Symptomatique) ¬ *D72.8*

Lymphoedema praecox ¬ *I89.09*

Lymphœdème
v./v.a. microcéphalie-lymphœdème-choriorétinopathie
- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Localisations, tous les stades ¬ *I97.88*
- - Sur
- - - Appareil uro-génital, tous les stades ¬ *I97.87*
- - - Territoire drainage lymphatique
- - - - Axillaire stade
- - - - - I ¬ *I97.81*
- - - - - II ¬ *I97.82*
- - - - - III ¬ *I97.83*
- - - - Cervical, tous les stades ¬ *I97.80*
- - - - Inguinal stade
- - - - - I ¬ *I97.84*
- - - - - II ¬ *I97.85*
- - - - - III ¬ *I97.86*
- Anomalie cérébrale
- - Artério-veineuse ¬ Syndrome de *Q82.08, Q28.39*
- - Hypertension pulmonaire primitive ¬ Syndrome de *Q82.08, Q28.39*
- Communication interauriculaire-dysmorphie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Congénital primaire ¬ *Q82.09*
- Distichiasis ¬ Syndrome de *Q82.08*
- Dysplasies ano-génitales [WILD] ¬ Syndrome de verrues multiples-déficit immunitaire- *Q82.09*
- Héréditaire
- - Localisation stade
- - - I ¬ *Q82.03*
- - - II ¬ *Q82.04*
- - - III ¬ *Q82.05*
- - Membre s supérieur s inférieur s stade
- - - I ¬ *Q82.00*
- - - II ¬ *Q82.01*
- - - III ¬ *Q82.02*
- - Sans précision ¬ *Q82.09*
- - Type
- - - I ¬ *Q82.09*
- - - II ¬ *Q82.09*
- - ¬ Autre *Q82.08*
- Localisation stade
- - I ¬ *I89.03*
- - II ¬ *I89.04*
- - III ¬ *I89.05*
- Mastectomie partielle
- - Lymphadénectomie stade
- - - I ¬ *I97.20*
- - - II ¬ *I97.21*
- - - III ¬ *I97.22*
- - Sans précision ¬ *I97.29*
- Meige ¬ *Q82.09*
- Membre s supérieur s inférieur s stade
- - II ¬ *I89.01*
- - III ¬ *I89.02*

Lymphœdème *–suite*
- Non classé ailleurs ¬ Autre *I89.08*
- Nonne-Milroy ¬ *Q82.09*
- Ongles jaunes ¬ *L60.5*
- Primaire
- - Congénital de Gordon ¬ *Q82.09*
- - Membre
- - - Inférieur stade
- - - - I ¬ *I89.00*
- - - - II ¬ *I89.01*
- - - - III ¬ *I89.02*
- - - Supérieur stade
- - - - I ¬ *I89.00*
- - - - II ¬ *I89.01*
- - - - III ¬ *I89.02*
- - Tardif
- - - Associé
- - - - CELSR1 ¬ *Q82.08*
- - - - GJC2
- - - - - Membre inférieur, stade I ¬ *Q82.00*
- - - - - Membre inférieur, stade II ¬ *Q82.01*
- - - - - Membre inférieur, stade III ¬ *Q82.02*
- - - - - Membres supérieurs et inférieurs, stade I ¬ *Q82.00*
- - - - - Membres supérieurs et inférieurs, stade II ¬ *Q82.01*
- - - - - Membres supérieurs et inférieurs, stade III ¬ *Q82.02*
- - - - - ¬ *Q82.09*
- - - Membre
- - - - Inférieur stade
- - - - - I ¬ *I89.00*
- - - - - II ¬ *I89.01*
- - - - - III ¬ *I89.02*
- - - - Supérieur stade
- - - - - I ¬ *I89.00*
- - - - - II ¬ *I89.01*
- - - - - III ¬ *I89.02*
- - - Non héréditaire ¬ *I89.09*
- - - ¬ *I89.09*
- - ¬ *I89.09*
- Retard de développement-dysmorphie faciale-camptodactylie ¬ Syndrome de macrothrombocytopénie- *Q87.0*
- Sans précision ¬ *I89.09*
- Télangiectasie-glomérulonéphrite membranoprolifératives ¬ Syndrome d'hypotrichose- *Q87.8*
- ¬
- - Stade de latence du *I89.08*
- - Syndrome
- - - Atrésie choanale postérieure- *Q82.08, Q30.0*
- - - Cholestase- *K71.0*
- - - Dysplasie ectodermique anhidrotique-déficit immunitaire-ostéopétrose- *Q87.8*

Lymphœdème-hypoparathyroïdie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Lymphœdème-lymphangiectasie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*

Lympho-épithélial
- Bénigne des glandes salivaires ¬ Lésion *K11.8*
- Bouche ¬ Kyste: *K09.8*

Lympho-épithélial-like
- Estomac ¬ Carcinome *C16.9*
- Peau du cuir chevelu ¬ Carcinome *C44.4*
- Poumon ¬ Carcinome *C34.9*
- Thymus ¬ Carcinome *C37*
- ¬
- - Carcinome *C80.9*
- - Carcinome hépatocellulaire *C22.0*

Lympho-épithélioïde ¬ Lymphome *C84.4*

Lymphogène ¬ Abcès hépatique: *K75.0*

Lymphogranulomatose
- Bénigne
- - Schaumann ¬ *D86.9*
- - ¬ *D86.9*
- Vénérienne à Chlamydia ¬ *A55*

Lymphogranulome vénérien ¬ Rétrécissement du rectum dû à un *A55†, K93.8**

Lymphohistiocytose hémophagocytaire
- Acquise associée à une tumeur maligne ¬ *C96.9, D76.1*
- Début néonatal] ¬ Syndrome NOCARH [cytopénie-auto-inflammation-éruption cutanée-épisodes de *D76.1*
- Familiale [LHF] ¬ *D76.1*
- ¬ *D76.1*

Lymphoïde
v./v.a. Leucémie lymphoïde
v./v.a. Tissu lymphoïde
v./v.a. Tumeur lymphoïde
- Angiofolliculaire ¬ Hyperplasie *D47.7*
- Hématopoïétique apparentés
- - Évolution imprévisible inconnue
- - - Sans précision ¬ Tumeur des tissus *D47.9*
- - - ¬ Autres tumeurs précisées des tissus *D47.7*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne des tissus *C96.9*
- - ¬
- - - Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus *Z80.7*
- - - Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus *Z85.7*
- - - Tumeurs malignes précisées des tissus *C96.7*
- Interstitielle ¬
- - Maladie due au VIH avec pneumonie *B22, J84.90*
- - VIH avec pneumopathie *B22, J84.90*
- Nodulaire pulmonaire ¬ Hyperplasie *J84.80*
- ¬ Granulomatose *C83.8*

Lymphomateux
- Cellules T de l'adulte ¬ Lymphome *C91.50*

Lymphomateux *–suite*
- Maligne ¬ Polypose *C83.1*
- ¬ Strumite *E06.3*

Lymphomatoïde ¬
- LYG [Granulomatose *C83.8*
- Papulose *C86.6*

Lymphome
- B
- - Centrofolliculaire cutané primitif ¬ *C82.6*
- - Cutané de la zone marginale ¬ *C83.0*
- - D évolution agressif réarrangement MYC
- - - BCL2
- - - - BCL6 ¬ *C83.8*
- - - - ¬ *C83.8*
- - - BCL6 ¬ *C83.8*
- - Diffus grandes cellule positif Virus d'Epstein-Barr EBV
- - - Personnes âgées ¬ *C83.3*
- - - ¬ *C83.3*
- - Grandes cellules ALK positif ¬ *C83.3*
- - Médiastinal primitif à grandes cellules ¬ *C85.2*
- BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches [*C88.4*
- Blastique à cellules NK ¬ *C86.4*
- Burkitt
- - Atypique ¬ *C83.7*
- - ¬
- - - *C83.7*
- - - Maladie due au VIH avec *B21, C83.7*
- Burkitt-like» ¬ *C83.7*
- Cellule B
- - Effusion primaire ¬ *C83.8*
- - Monocytoïdes ¬ *C85.9*
- - Sans précision ¬ *C85.1*
- Cellule précurseur
- - B ¬ *C83.5*
- - T ¬ *C83.5*
- Cellule T
- - Adulte
- - - Associé au HTLV-1) ¬ *C91.51*
- - - ¬ *C91.50*
- - Associé à des entéropathies ¬ *C86.2*
- - ¬ *C84.4*
- Cellule T/NK
- - Matures
- - - Sans précision ¬ *C84.9*
- - - ¬ Autres *C84.5*
- - Sans précision ¬ *C84.9*
- Cellules mixtes ¬ *C85.9*
- Centroblastique
- - Diffus ¬ *C83.3*
- - Non-hodgkinien ¬ *C83.3*
- Centroblastique-centrocytaire
- - Diffus ¬ *C83.9*
- - ¬ *C83.9*

Lymphome *–suite*
- Centrocytaire ¬ *C83.1*
- Centrofolliculaire
- - Cutané ¬ *C82.6*
- - Diffus ¬ *C82.5*
- Cérébral à cellules B ¬ *C85.1*
- Composite hodgkinien et non hodgkinien ¬ *C81.9, C85.9*
- Cutané
- - Anaplasique à grandes cellules ¬ *C86.6*
- - Cellule T
- - - Élastolytique ¬ *C84.0*
- - - Sans précision ¬ *C84.8*
- - Grandes cellules de type jambe ¬ *C83.3*
- - Primitif à cellules T périphérique non spécifié ¬ *C84.4*
- - ¬ *C84.8*
- Diffus
- - Cellule
- - - Mixtes ¬ *C83.9*
- - - Non clivées ¬ *C83.9*
- - Centroblastique à grandes cellules B ¬ *C83.3*
- - Grandes Cellule B
- - - ALK positif ¬ *C83.3*
- - - Anaplasique ¬ *C83.3*
- - - CD30 positif ¬ *C83.3*
- - - Centroblastique ¬ *C83.3*
- - - Immunoblastique ¬ *C83.3*
- - - Inflammation chronique ¬ *C83.3*
- - - Plasmablastique ¬ *C83.3*
- - - Riche Cellule T ¬
- - - - *C83.3*
- - - - *C83.3*
- - - Sous-type non différencié ¬
- - - - *C83.3*
- - - - *C83.3*
- - - Système nerveux central ¬ *C83.3*
- - - ¬ *C83.3*
- - Modérément différencié ¬ *C83.0*
- Extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ *C88.41*
- Folliculaire ¬ Autres formes de *C82.7*
- Grandes
- - Cellule
- - - Ki-1+ ¬ *C84.6*
- - - ¬ *C85.9*
- - Cellule B
- - - Riche en cellules T/histiocytes ¬ *C83.3*
- - - ¬ *C83.3*
- Hépatosplénique à cellules T ¬ *C86.1*
- Histiocytaire
- - Diffus ¬ *C83.9*
- - Vrai ¬ *C96.8*
- Intraoculaire primaire ¬ *C85.7*
- Lennert ¬ *C84.4*

Lymphome *–suite*
- Lympho-épithélioïde ¬ *C84.4*
- Lymphomateux à cellules T de l'adulte ¬ *C91.50*
- Malin SAI ¬ *C85.9*
- Malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ Foyers osseux (médullaires) de *C79.5*
- MALT
- - Mucosa Associated Lymphoid Tissue
- - - Estomac ¬ *C88.40*
- - - Poumon ¬ *C88.40*
- - ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [*C88.41*
- Méditerranéen ¬ *C88.30*
- Mixte lymphocytaire-histiocytaire ¬ *C85.9*
- NK/T extranodulaire type nasal ¬ *C86.0*
- Nodal de la zone marginale ¬ *C83.0*
- Nodulaire SAI ¬ *C82.9*
- Non
- - Folliculaire
- - - Sans précision ¬ *C83.9*
- - - ¬ Autres *C83.8*
- - Hodgkinien SAI ¬ *C85.9*
- Non hodgkinien
- - Angio-immunoblastique ¬ *C86.5*
- - Diffus non folliculaire ¬ *C83.9*
- - Grandes cellules ¬ *C85.9*
- - Indifférencié ¬ *C83.9*
- Oculo-cérébral primitif non hodgkinien ¬ *C83.3*
- Périphérique à cellules T, non spécifié ¬ *C84.4*
- Petites
- - Cellules B ¬ *C83.0*
- - Cellules non clivées ¬ *C83.7*
- Plasmoblastique ¬ *C83.3*
- Plasmocytaire ¬ *C83.0*
- Post-transplantation ¬ *D47.9*
- Précurseurs B, n.c.a. ¬ *C83.5*
- Primaire du cerveau ¬ Maladie due au VIH avec *B21, C85.9*
- Primitif
- - Conjonctive ¬ *C85.9*
- - Os ¬ *C85.7*
- - Séreuses ¬ *C83.8*
- - Système nerveux central ¬ *C83.3*
- Pulmonaire primitif ¬ *C85.9*
- SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [*C88.4*
- Sézary ¬ *C84.1*
- Sous-cutané à cellules T de type panniculite ¬ *C86.3*
- Splénique
- - Diffus de la pulpe rouge à petites cellules B ¬ *C83.0*
- - Zone marginale ¬ *C83.0*

Lymphome *–suite*
- Thyroïdien ¬ *C85.9*
- Tissu lymphoïde associés
- - Bronches [lymphome BALT] ¬ *C88.4*
- - Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, *C88.41*
- - Tissus cutanés [lymphome SALT] ¬ *C88.4*
- Type
- - Cellulaire indifférencié ¬ *C83.9*
- - Histiocytaire ¬ *C85.9*
- - Hydroa vacciniforme ¬ *C84.5*
- - Non-Burkitt, indifférencié ¬ *C83.3*
- Zone
- - Marginale splénique ¬ *C83.0*
- - T ¬ *C84.4*
- ¬
- - *C85.9*
- - Maladie
- - - Due au VIH avec *B21, C85.9*
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours d'un *C85.9†, N16.1**
- - Pyélonéphrite au cours d'un *C85.9†, N16.1**

Lymphome anaplasique grandes cellule
- ALK
- - Négatif ¬ *C84.7*
- - Positif ¬ *C84.6*
- CD30 positif ¬ *C84.6*
- Ki-1+ ¬ *C84.6*
- Lié à un implant mammaire ¬ *C84.7*

Lymphome de Hodgkin
- Classique
- - Cellularité mixte ¬
- - - *C81.2*
- - - *C81.2*
- - Déplétion lymphocytaire
- - - Fibrose diffuse ¬ *C81.3*
- - - ¬ *C81.3*
- - Riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- - Sclérose nodulaire ¬ *C81.1*
- - Type
- - - Non précisé ¬ *C81.7*
- - - Réticulaire en déplétion lymphocytaire ¬ *C81.3*
- - ¬ Autres formes de *C81.7*
- Diffus riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- Nodulaire riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- Prédominance lymphocytaire-histiocytaire ¬ *C81.0*
- Sans précision ¬ *C81.9*

Lymphome folliculaire
- Cellule
- - Clivées ¬ *C82.9*
- - Mixtes ¬ *C82.1*
- - Non clivées ¬ *C82.2*
- Cellules T ¬ *C84.5*

Lymphome folliculaire *–suite*
- Centroblastique
- - Centrocytique ¬ *C82.9*
- - ¬ *C82.2*
- Diffus ¬ *C82.9*
- Grade
- - II ¬ *C82.1*
- - III, sans précision ¬ *C82.2*
- - IIIa ¬ *C82.3*
- - IIIb ¬ *C82.4*
- Grandes cellules ¬ *C82.2*
- Non
- - Diffus ¬ *C82.9*
- - Hodgkinien
- - - Sans zones diffuses ¬ *C82*
- - - ¬ *C82.9*
- Non-hodgkinien à petites cellules clivées ¬ *C82.9*
- Petites cellules clivées ¬ *C82.0*
- Sans précision ¬ *C82.9*

Lymphome immunoblastique
- Diffus ¬ *C83.3*
- Non-hodgkinien ¬ *C83.3*

Lymphome lymphoblastique
- B
- - Anomalie génétique récurrente ¬ *C83.5*
- - Associé
- - - T(1;19)(q23;p13.3) ¬ *C83.5*
- - - T(12;21)(p13.2;q22.1) ¬ *C83.5*
- - - T(5;14)(q31.1;q32.3) ¬ *C83.5*
- - - T(9;22)(q34.1;q11.2) ¬ *C83.5*
- - - T(v;11q23.3) ¬ *C83.5*
- - Hyperdiploïdie ¬ *C83.5*
- - Hypodiploïdie ¬ *C83.5*
- Cellules B ¬ *C83.5*
- Cellules T ¬ *C83.5*
- Diffus ¬ *C85.9*
- ¬ *C83.5*

Lymphome lymphoplasmocytaire
- Production IgM
- - Rémission complète ¬ *C88.01*
- - ¬ *C88.00*
- Sans sécrétion d'IgM ¬ *C83.0*
- ¬ *C83.0*

Lymphome médiastinal
- Thymique grandes Cellule B ¬
- - *C85.2*
- - *C85.2*
- ¬ *C85.2*

Lymphome nodulaire
- Bien différencié ¬ *C82.9*
- Cellules B de la zone marginale ¬ *C83.0*
- Cellules mixtes de type lymphocytaire-histiocytaire ¬ *C82.1*
- Mixte ¬ *C82.1*
- Modérément différencié ¬ *C82.9*

Lymphome nodulaire *–suite*
- Peu différencié ¬ *C82.9*
- Type
- - Intermédiaire ¬ *C82.9*
- - Lymphocytaire-histiocytaire ¬ *C82.1*

Lymphome non hodgkinien
- Cellules B ¬ *C85.1*
- Cellules T ¬ *C84.4*
- Non précisé ¬ *C85.9*
- Petites cellules clivées ¬ *C83.1*
- ¬
- - LNH] *C85.9*
- - Maladie due au VIH avec *B21, C85.9*
- - Neurolymphomatose lors d'un *C85.9†, G63.1**
- - Types précisés de *C85.7*

Lymphome T
- Angiocentrique ¬ *C86.0*
- Cutané
- - Cellules pléomorphes de taille petite à moyenne CD4+ ¬ *C84.4*
- - Épidermotrope CD8+ d'évolution agressive ¬ *C84.5*
- - Primitif
- - - Phénotype TCR gamma/delta ¬ *C84.5*
- - - ¬ *C84.8*
- Immunoblastique ¬ *C84.9*
- Intestinal epithéliotrope monomorphe ¬ *C86.2*
- Sous-cutané type panniculite ¬ *C86.3*

Lymphonodulaire à entérovirus ¬ Pharyngite *B08.8*

Lymphopénie ¬
- *D72.8*
- Syndrome de dérèglement immunitaire-maladie inflammatoire de l 'intestin-arthrite-infections récurrentes- *D84.8*

Lymphoplasmocytaire
v./v.a. Lymphome lymphoplasmocytaire

Lymphoplasmocytoïde en rémission complète ¬ Leucémie *C91.11*

Lymphoprolifératif
- Associée EBV Virus d'Epstein-Barr déficit
- - CD137 ¬ Maladie *D82.3*
- - PRKCD ¬ Maladie *D82.3*
- - RASGRP1 ¬ Maladie *D82.3*
- - TET2 ¬ Maladie *D82.3*
- Associés au méthotréxate ¬ Troubles *D47.9, Y57.98!*
- Auto-immun
- - Déficit en CASP8 ¬ Syndrome *D47.7*
- - Dianzani ¬ Maladie *D47.7*
- - Haploinsuffisance de CTLA-4 ¬ Syndrome *D47.7*
- - ¬ ALPS [Syndrome *D47.9*
- Autosomique récessive par déficit en CD27 ¬ Maladie *D47.7*
- Cutané primitif à cellules T, CD30 positif ¬ Syndrome *C86.6*

Lymphoprolifératif *–suite*
- Liée
- - Chromosome X ¬ Maladie *D82.3*
- - X
- - - Déficit
- - - - SAP ¬ Maladie *D82.3*
- - - - SH2D1A ¬ Maladie *D82.3*
- - - - XIAP ¬ Maladie *D82.3*
- - - ¬ Maladie *D82.3*
- Post-transplantation
- - Hyperplasie folliculaire floride ¬ Maladie *D47.7*
- - Lésion précoce ¬ Maladie *D47.7*
- - Polymorphe
- - - Rémission
- - - - Complète ¬ Maladie *C88.71*
- - - - Partielle ¬ Maladie *C88.70*
- - - Sans mention de rémission ¬ Maladie *C88.70*
- SAI ¬ Maladie *D47.9*
- Systémique à cellules T positive au virus Epstein-Barr chez l'enfant ¬ Maladie *D82.3*
- Type T-gamma ¬ Maladie *D47.9*

Lymphoprolifération T cutanée primitive CD30+ ¬ *C86.6*

Lymphoréticulosarcome ¬ *C85.9*

Lymphoréticulose bénigne
- Inoculation ¬ *A28.1*
- ¬ *A28.1*

Lymphosarcome
v./v.a. Réticulolymphosarcome
- Diffus ¬ *C85.9*
- Folliculaire à cellules mixtes ¬ *C82.1*
- Réticulaire folliculaire ¬ *C82.1*
- ¬ *C85.9*

Lymphotrope lymphocytes T humain
- Type 1 HTLV-1 ¬
- - Myélopathie due à une infection à virus *G04.1*
- - Sujet porteur d'une infection à virus *Z22.6*
- ¬ Myélopathie associée à un virus *G04.1*

Lynch
- Localisations contiguës ¬ Carcinome du pancréas au cours de syndrome de *C25.8*
- ¬
- - Carcinome
- - - Angle
- - - - Droit du côlon au cours du syndrome de *C18.3*
- - - - Gauche du côlon au cours du syndrome de *C18.5*
- - - Antre pylorique au cours du syndrome de *C16.3*
- - - Appendice au cours de syndrome de *C18.1*
- - - Cardia au cours du syndrome de *C16.0*
- - - Côlon
- - - - Cours du syndrome de *C18.9*

Lynch *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carcinome *–suite*
- - - Côlon *–suite*
- - - - Localisations contiguës au cours du syndrome de *C18.8*
- - - Côlon ascendant au cours du syndrome de *C18.2*
- - - Côlon descendant au cours du syndrome de *C18.6*
- - - Côlon sigmoïde au cours du syndrome de *C18.7*
- - - Côlon transverse au cours du syndrome de *C18.4*
- - - Colorectal au cours du syndrome de *C19*
- - - Corps
- - - - Estomac au cours du syndrome de *C16.2*
- - - - Pancréas au cours de syndrome de *C25.1*
- - - Duodénum au cours du syndrome de *C17.0*
- - - Endomètre au cours du syndrome de *C54.1*
- - - Fundus au cours de syndrome de *C16.1*
- - - Gastrique au cours du syndrome de *C16.9*
- - - Grande courbure de l'estomac au cours du syndrome de *C16.6*
- - - Iléon au cours du syndrome de *C17.2*
- - - Intestin grêle au cours du syndrome de *C17.9*
- - - Jéjunum au cours du syndrome de *C17.1*
- - - Jonction duodéno-jéjunale au cours du syndrome de *C17.8*
- - - Ovaire au cours du syndrome de *C56*
- - - Pancréas au cours du syndrome de *C25.9*
- - - Paroi gastrique
- - - - Antérieure au cours du syndrome de *C16.8*
- - - - Postérieure au cours du syndrome de *C16.8*
- - - Petite courbure de l'estomac au cours du syndrome de *C16.5*
- - - Prostate au cours de syndrome de *C61*
- - - Pylore au cours du syndrome de *C16.4*
- - - Queue du pancréas au cours du syndrome de *C25.2*
- - - Tête du pancréas au cours du syndrome de *C25.0*
- - - Urothélial au cours du syndrome de *C68.9*
- - Glioblastome cérébral au cours de syndrome de *C71.9*
- - Syndrome de *C18.9*

Lynch-Lee-Murday ¬ Syndrome de *Q87.8*

Lyse
- Positif dans un sérum acidifié ¬ Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec test de *D64.4*

Lyse *–suite*
- Spontanée) des tumeurs (après traitement cytostatique d'une néoplasie) ¬ *E88.3*
- Tumorale ¬ Syndrome de *E88.3*

Lysergide
- LSD] ¬ Intoxication: *T40.8*
- ¬ Intoxication au *T40.8*

Lysergique] ¬ Intoxication au LSD [diéthylamide de l'acide *T40.8*

Lysine alpha-cétoglutarate réductase ¬ Déficit en *E72.3*

Lysinurie
v./v.a. cystinurie-lysinurie
- ¬ LPI [Intolérance aux protéines dibasiques avec *E72.0*

Lysosomale
- Activité maltase acide normale ¬ Glycogénose *E74.0*
- ¬ Déficit
- - Alpha-D-mannosidase *E77.1*
- - Bêta-mannosidase *E77.1*
- - Lipase acide *E75.5*
- - Phosphatase acide *E83.38*

Lysosomiaux ¬ Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes *E77.0*

Lyssavirus ¬ Maladie à *A82.9*

Lysyl hydroxylase 1 ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type cyphoscoliotique par déficit en *Q79.6*

Maat-Kievit-Brunner ¬ Syndrome de blépharophimosis-déficience intellectuelle type *Q87.8*

Mabry ¬ Syndrome de *E83.38*

MacDermot ¬ Dysplasie spondylo-épiphysaire type *Q77.7*

MacDermot-Winter ¬ Syndrome de *Q87.8*

Machado-Joseph ¬ Maladie de *G11.8*

Machines ¬ Accident dû à: *W49.9!*

Mâchoire
- Aiguë chronique purulente ¬
- - Ostéite de la *K10.2*
- - Ostéomyélite (néonatale) de la *K10.2*
- - Ostéonécrose (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) de la *K10.2*
- - Ostéoradionécrose de la *K10.2*
- - Périostite de la *K10.2*
- Anévrismal ¬ Kyste de la *K09.2*
- Base du crâne ¬ Anomalies de rapport entre les *K07.1*
- Cartilage) (ménisque) ¬ *S03.0*
- Clignement ¬ *Q07.8*
- Due
- - Irradiation ¬ Ostéonécrose de la *K10.28*
- - Médicaments ¬ Nécrose de la *K10.28*
- Hémorragique ¬ Kyste de la *K09.2*
- Inférieure (mandibule) ¬ *S02.6*
- Ressort ¬ *K07.6*
- SAI ¬ Kyste de la *K09.2*
- Sans précision ¬
- - État inflammatoire de la *K10.29*
- - Maladie des *K10.9*
- Supérieure ¬
- - Améloblastome adénoïde de la *D16.42*
- - Dysplasie cémento-osseuse floride de la *D16.42*
- - Fente médiane de la lèvre et de la *Q37.5*
- - Fibrome ossifiant familial de la *D16.42*
- - Sarcome du *C41.02*
- Traumatique ¬ Kyste de la *K09.2*
- ¬
- - Alvéolite des *K10.3*
- - Anomalies
- - - Importantes de dimension des *K07.0*
- - - Morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la *Q67.4*
- - Asymétrie des *K07.1*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire de la *T84.08*
- - Dysplasie fibreuse *K10.8*
- - Entorse et foulure de la *S03.4*
- - États inflammatoires précisés de la *K10.28*
- - Exostose *K10.8*
- - Kyste
- - - *K09.2*
- - - Osseux solitaire de la *K09.2*
- - Luxation de la *S03.0*

Mâchoire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladies
- - - Liées au développement des *K10.0*
- - - Précisées des *K10.8*
- - Ostéite de la *K10.28*
- - Ostéonécrose de la *K10.28*
- - Plaie ouverte dans la région de la *S01.80*
- - Tuberculose de la *A18.0†, M90.08**

Machupo ¬ Fièvre hémorragique de *A96.1*

Macken
v./v.a. Baralle-Macken

Macklin
v./v.a. Curth-Macklin

MacLeod ¬ Syndrome de *J43.0*

MACOM [macrophtalmie colobomateuse-microcornée] ¬ Syndrome *Q15.8*

Macroanévrisme artériel
- Rétine et sténose pulmonaire supravalvulaire ¬ *H35.0, Q25.6*
- Rétinien familial] ¬ FRAM [*H35.0, Q25.6*

Macroangiopathie ¬ Diabète sucré avec microangiopathie et *E14.50†, I79.2**

Macroblépharon-macrostomie ¬ Syndrome de dysostose mandibulo-faciale- *Q87.0*

Macrocéphalie
- Albinisme-surdité] ¬ Syndrome COMMAD [colobome-ostéopétrose-microphtalmie- *Q87.8*
- Alopécie-cutis laxa-scoliose] ¬ Syndrome MACS [*Q82.8*
- Cardiopathie congénitale-dysmorphie faciale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Cécité-hyperlaxité articulaire ¬ Syndrome d'ostéoporose- *Q87.8*
- Cutis marmorata telangiectatica congenita ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Déficience intellectuelle-autisme ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Dysmorphie facial
- - Anomalies cérébrales structurelles ¬ Syndrome de retard global de développement-alopécie- *Q87.8*
- - ¬ Syndrome de croissance excessive- *Q87.3*
- Dysplasie unguéale ¬ Syndrome de pectus excavatum- *Q87.1*
- Emacroorchidie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Hypotonie-troubles du comportement ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Malformation capillaire ¬ Syndrome *Q87.3*
- Myopie-malformation de Dandy-Walker ¬ Syndrome de dysmorphie- *Q87.8*
- Non-compaction ventriculaire gauche ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- Obésité ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-épilepsie- *Q87.8*
- Paraplégie spastique-dysmorphie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Petite taille-paraplégie ¬ Syndrome de *Q87.1*

Macrocéphalie *–suite*
- Retard de développement ¬ Syndrome de *Q75.3*
- ¬
- - *Q75.3*
- - Syndrome
- - - Convulsions-scoliose- *Q87.8*
- - - Déficience intellectuelle avec hypotonie musculaire, dysmorphies faciales et *Q87.0*

Macrocheilie ¬ *Q18.6*

Macrocornée avec glaucome ¬ *Q15.0*

Macrocytose érythroïde] ¬ Syndrome OSLAM [ostéosarcome-anomalies des membres- *C41.9, Q74.9*

Macrodactylie
- Doigt ¬
- - *Q74.0*
- - *Q74.0*
- Orteil
- - Bilatérale ¬ *Q74.2*
- - Unilatérale ¬ *Q74.2*
- - ¬
- - - *Q74.2*
- - - *Q74.2*
- Pouce ¬ *Q74.0*

Macrodontie ¬ *K00.2*

Macroencéphalie ¬ *Q04.5*

Macrogénitosomie précoce chez l'homme ¬ *E25*

Macroglobulinémie
- Idiopathique ¬ *C88.00*
- Monoclonale ¬ *D47.2*
- Primitive ¬ *C88.00*
- Waldenström
- - Rémission complète ¬
- - - *C88.01*
- - - Glomérulopathie au cours de *C88.01†, N08.1**
- - ¬
- - - Glomérulonéphrite au cours de *C88.00†, N08.1**
- - - Glomérulopathie au cours de *C88.00†, N08.1**
- - - Trouble glomérulaire au cours de *C88.00†, N08.1**
- ¬ Syndrome de Waldenström [*C88.00*

Macroglossie
v./v.a. omphalocèle-macroglossie-gigantisme
- Congénitale) ¬ *Q38.2*

Macrognathie (mandibulaire) (maxillaire) ¬ *K07.0*

Macrogyrie
- Centrale bilatérale ¬ *Q04.8*
- ¬ *Q04.8*

Macrokystique ¬ Malformation lymphatique *D18.19*

Macrolides
- Oxazolidinones streptogramines
- - Nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus pneumoniae résistant aux *U80.11!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline et le cas échéant aux *U80.10!*
- ¬ Intoxication: *T36.3*

Macronodulaire
- Surrénales ¬ Syndrome de Cushing dû à une hyperplasie *E24.8*
- ¬ Cirrhose (du foie): *K74.6*

Macroorchidie
- Tardive liée à l'X ¬ Hypothyroïdie congénitale centrale avec *E03.1*
- ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-psychose- *Q87.8*

Macrophages
- Associé à NLRC4 ¬ Syndrome d'activation des *M35.8*
- Région de l'épaule ¬ Myofasciite à *M60.81*
- ¬ Myofasciite à *M60.89*

Macrophagique ¬ Syndrome d'activation *D76.1*

Macrophtalmie
- Colobomateuse-microcornée] ¬ Syndrome MACOM [*Q15.8*
- Cours d'un glaucome congénital ¬ *Q15.0*
- ¬ *Q11.3*

Macrosome-tumeur de Wilms ¬ Syndrome de néphroblastomatose-ascite fœtale- *Q87.3*

Macrosomie
- Microphtalmie-fente palatine ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬ *E22.0*

Macrostomie
v./v.a. ablépharie-macrostomie
- Anomalies préauriculaires-ophtalmoplégie externe ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬
- - *Q18.4*
- - Syndrome de dysostose mandibulo-faciale-macroblépharon- *Q87.0*

Macrothrombocytopénie
- Autosomique dominant ¬ *D69.1*
- Insuffisance mitrale ¬ *D69.1, I34.0*
- Lymphœdème-retard de développement-dysmorphie faciale-camptodactylie ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Medich ¬ *D69.1*
- Sévère autosomique récessive ¬ *D69.1*

Macrotie ¬ *Q17.1*

MACS [macrocéphalie-alopécie-cutis laxa-scoliose] ¬ Syndrome *Q82.8*

Macula
- Liée âge
- - Humide ¬ Dégénérescence de la *H35.30*
- - Néovasculaire ¬ Dégénérescence de la *H35.30*

Macula *–suite*
- Pôle postérieur ¬
- - Cicatrice (post-inflammatoire) (post-traumatique) de la *H31.0*
- - Dégénérescences de la *H35.38*
- ¬
- - Diabète sucré avec œdème de la *E14.30†, H36.0**
- - Kyste *H35.38*
- - Stries angioïdes de la *H35.38*
- - Trou (foramen) *H35.38*

Maculaire
v./v.a. Dégénérescence maculaire
v./v.a. Dystrophie maculaire
- Brachydactylie type B ¬ Syndrome de colobome *Q87.8*
- Choriorétinopathie ¬ Syndrome de papille optique colobomateuse-atrophie *Q14.8*
- Cystoïde héréditaire dominant ¬ Œdème *H35.5*
- Fente palatine-hallux valgus ¬ Syndrome de colobome *Q87.8*
- Idiopathique type
- - 1 ¬ Télangiectasie *H35.0*
- - 3 ¬ Télangiectasie *H35.0*
- Maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (*A66.2*
- Syphilitique de la peau en stries ¬ Atrophie *A52.7†, L99.8**
- ¬
- - AMNR] Neurorétinopathie aiguë *H35.39*
- - Colobome *Q14.8*
- - Dystrophie
- - - Bulleuse héréditaire type *Q87.1*
- - - Cornée: *H18.5*
- - Télangiectasie *H35.0*
- - Traction vitréo- *H35.38*

Maculatum
- Striatum syphilitique ¬ Atrophoderma *A52.7†, L99.8**
- Syphilitique ¬ Atrophoderma *A51.3†, L99.8**

Maculeuse télangiectasique ¬ Mastocytose cutanée *Q82.2*

Maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (*A66.2*

Maculopathie
- Placoïde persistante ¬ *H35.38*
- Présence de druses ¬ *H35.31*
- Torpille ¬ *H35.8*
- Toxique
- - Due aux antipaludéens ¬ *H35.38*
- - Provoquée par l'(hydroxy-)chloroquine ¬ *H35.38*
- - ¬ *H35.38*
- ¬ Diabète sucré
- - *E14.30†, H36.0**
- - Type
- - - 1 avec *E10.30†, H36.0**

Maculopathie *–suite*
- ¬ Diabète sucré *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 2 avec *E11.30†, H36.0**

Madarosis de la paupière ¬ *H02.7*

MADD ¬ Syndrome de retard du développement-dysfonctionnement endocrinien-hypohémoglobinémie associé à *Q87.8*

Madelung] ¬ Carpocyphose [maladie de *Q74.0*

Madras ¬ Maladie du motoneurone type *G12.2*

Maffucci ¬ Syndrome de *Q78.4*

Magendie ¬ Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de *Q03.1*

Magenis
v./v.a. Smith-Magenis

MAGIC [Mouth and genital ulcers with inflamed cartilage] ¬ Syndrome *M35.2, M94.1*

Magnésium
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du *P71.9*
- - ¬ Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du *P71.8*
- Reins ¬ Perte isolée de *E83.4*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme du *E83.4*
- - Carence en *E61.2*
- - Hypomagnésémie par malabsorption sélective de *E83.4*
- - Syndrome de carence en *E83.4*
- - Taux anormal de: *R79.0*
- - Tétanie néonatale sans carence en calcium ou *P71.3*

MAGT1 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Mahvash ¬ Maladie de *E16.3*

Main
- 2-5 ¬ Hypodactylie unilatérale des phalanges de la *Q71.8*
- 2ème degré sans précision ¬
- - Brûlure
- - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.2*
- - - Poignet et de la *T23.20*
- - Corrosion
- - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.6*
- - - Poignet et de la *T23.60*
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.81*
- Anomalies des orteils-pectus excavatum sévère ¬ Syndrome d'hyperphalangie des doigts de la *Q79.8*
- Bêche (congénitale) ¬ *Q68.1*
- Bouche ¬ Syndrome pied- *B08.4*
- Cataracte bilatérale ¬ Trouble neurologique du développement sévère avec troubles de l'alimentation-mouvements stéréotypés des *G31.88*

Main *–suite*
- Conservée ¬ Agénésie des membres supérieurs avec *Q71.1*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.84*
- Décollement sous-cutané (fermé) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.86*
- Degré
- - 2a ¬
- - - Brûlure
- - - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.2*
- - - - Poignet et de la *T23.20*
- - - Corrosion
- - - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.6*
- - - - Poignet et de la *T23.60*
- - 2b ¬
- - - Brûlure
- - - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.8*
- - - - Poignet et de la *T23.21*
- - - Corrosion
- - - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.9*
- - - - Poignet et de la *T23.61*
- - Non précisé ¬
- - - Brûlure
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.0*
- - - - Poignet et de la *T23.0*
- - - Corrosion
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.4*
- - - - Poignet et de la *T23.4*
- Doigt ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.03*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.82*
- Lymphangite ¬
- - Infection purulente de la *L03.10*
- - Inflammation purulente de la *L03.10*
- Membre supérieur [tout niveau, sauf la main] ¬ Amputation traumatique d'une *T05.1*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du poignet et de la *T34.5*
- Niveau
- - Non précisé ¬ Amputation traumatique du poignet et de la *S68.9*
- - Poignet ¬ Amputation traumatique de la *S68.4*
- Partie non précisée ¬ Plaie ouverte du poignet et de la *S61.9*
- Pied
- - Fendus-surdité ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - Immersion ¬ *T69.0*
- - Sans précision ¬ Polydactylie (*Q69.9*

Main *–suite*
- Pied *–suite*
- - ¬ Syndrome de symphalangie-anomalies multiples des *Q74.8*
- Pied bot(e) ou en griffe acquis(e) ¬ *M21.5*
- Pince de homard ¬ *Q71.6*
- Poignet
- - Unilatéral ¬ Absence acquise de *Z89.1*
- - ¬ Ténosynovite sèche de la *M70.0*
- Présente ¬ Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, *Q71.1*
- SAI ¬ Plaie ouverte du poignet et de la *S61*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - Poignet et de la *S69.9*
- - Superficielle du poignet et de la *S60.9*
- SAP ¬ *L03.10*
- Seuls] ¬ bras [toute partie, sauf poignet et *T22*
- Vampire ¬ *A66.3*
- ¬
- - Abrasion sur la *S60.81*
- - Absence congénitale
- - - *Q71.3*
- - - Avant-bras et de la *Q71.2*
- - Adactylie unilatérale de la *Q71.3*
- - Amputation traumatique
- - - Associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la *S68.3*
- - - Deux *T05.0*
- - - Main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la *T05.1*
- - - Parties du poignet et de la *S68.8*
- - Anomalie morphologique congénitale de la *Q68.1*
- - Arthrite chronique juvénile
- - - Début systémique, *M08.24*
- - - Forme oligo(pauci)- articulaire, *M08.44*
- - Arthrite juvénile idiopathique
- - - *M08.94*
- - - Associée aux enthésopathies, *M08.84*
- - - Indéterminée, *M08.84*
- - Brachydactylie et syndactylie préaxiales des doigts de la *Q74.0*
- - Brûlure
- - - Premier degré
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.1*
- - - - Poignet et de la *T23.1*
- - - Troisième degré
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.3*
- - - - Poignet et de la *T23.3*
- - Bursite de la *M70.1*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.13*
- - Contusion d'autres parties du poignet et de la *S60.2*
- - Corrosion du premier degré

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Corrosion du premier degré *–suite*
- - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.5*
- - - Poignet et de la *T23.5*
- - Corrosion du troisième degré
- - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.7*
- - - Poignet et de la *T23.7*
- - CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium dihydraté], *M11.14*
- - Dermato-arthrite lipoïdique, articulation interphalangienne de la *E78.88†, M14.34**
- - Dermatophytose de la *B35.2*
- - Dysplasie fibreuse monostotique, *M85.04*
- - Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la *S67.8*
- - Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la *S63.7*
- - Fibrodysplasie ossifiante progressive, *M61.14*
- - Fibromatose aponévrotique juvénile, *M72.84*
- - Fibromatose pseudo-sarcomateuse, *M72.44*
- - Fracture
- - - Os scaphoïde de la *S62.0*
- - - Ouverte de la *S62.8, S61.87!*
- - - Parties autres et non précisées du poignet et de la *S62.8*
- - Fractures multiples de la *S62.8*
- - Gelure superficielle du poignet et de la *T33.5*
- - Hétéroplasie osseuse progressive, *M61.54*
- - Kyste
- - - Osseux anévrismal de la *M85.54*
- - - Solitaire des os, *M85.44*
- - Lésion
- - - Tissu mou stade
- - - - I lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation du poignet et de la *S61.84!*
- - - - - Ouverte ou de luxation du poignet et de la *S61.87!*
- - - - II lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation du poignet et de la *S61.85!*
- - - - - Ouverte ou de luxation du poignet et de la *S61.88!*
- - - - III lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation du poignet et de la *S61.86!*
- - - - - Ouverte ou de luxation du poignet et de la *S61.89!*
- - - Traumatique
- - - - Artère cubitale au niveau du poignet et de la *S65.0*
- - - - Artère radiale au niveau du poignet et de la *S65.1*

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Multiples
- - - - - Muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la *S66.7*
- - - - - Muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la *S66.6*
- - - - - Nerfs au niveau du poignet et de la *S64.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la *S65.7*
- - - - Muscle tendon
- - - - - Extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la *S66.3*
- - - - - Extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la *S66.2*
- - - - - Fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la *S66.1*
- - - - - Intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la *S66.5*
- - - - - Intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la *S66.4*
- - - - - Longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la *S66.0*
- - - - - Niveau du poignet et de la *S66.8*
- - - - - Non précisés, au niveau du poignet et de la *S66.9*
- - - - Nerf
- - - - - Médian au niveau du poignet et de la *S64.1*
- - - - - Niveau du poignet et de la *S64.8*
- - - - - Non précisé, au niveau du poignet et de la *S64.9*
- - - - - Radial au niveau du poignet et de la *S64.2*
- - - - Nerf cubital au niveau du poignet et de la *S64.0*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - Niveau du poignet et de la *S65.8*
- - - - - Non précisé, au niveau du poignet et de la *S65.9*
- - Lésions traumatiques
- - - Multiples du poignet et de la *S69.7*
- - - Précisées du poignet et de la *S69.8*
- - - Superficielles
- - - - Multiples du poignet et de la *S60.7*
- - - - Poignet et de la *S60.88*
- - Maladie de Still de l'adulte, *M06.14*
- - Mélorhéostose de la *M85.84*
- - Myopathie distale avec atteinte des muscles postérieurs des jambes et des muscles antérieurs des *G71.08*
- - Myosite
- - - Bactérienne, *M60.04*
- - - Fongique, *M60.04*
- - - Virale, *M60.04*
- - Nævus comédonien de la paume des *Q82.5*

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Nécrose avasculaire
- - - Idiopathique, *M87.04*
- - - Traumatique, *M87.24*
- - Ostéoblastome
- - - *D16.1*
- - - Doigts de la *D16.1*
- - - Phalanges de la *D16.1*
- - Ostéochondrite juvénile de la *M92.2*
- - Ostéolyse
- - - *M89.54*
- - - Expansive familiale de la *M89.54*
- - - Massive de Gorham de la *M89.54*
- - Ostéomyélite multifocale chronique récurrente, *M86.34*
- - Ostéonécrose médicamenteuse, *M87.14*
- - Paume de la *S61.80*
- - Plaie ouverte
- - - Multiples du poignet et de la *S61.7*
- - - Non précisée d'autres parties du poignet et de la *S61.80*
- - Psoriasis avec arthrite juvénile de la *L40.5†, M09.04**
- - Pyomyosite, *M60.04*
- - Rhumatisme fibroblastique de la *M06.84*
- - Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la *T92.2*
- - Symbrachydactylie des pieds et des *Q73.8*
- - Syndrome
- - - Déficience intellectuelle-dysmorphie faciale-anomalies des *Q87.0*
- - - Épaule- *M89.09*
- - - Felty, *M05.04*
- - - Oculo-urétro-synovial, *M02.34*
- - - Persistance du canal artériel-bicuspidie valvulaire aortique-anomalie des *Q87.2*
- - - SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec ostéite de la *M86.34*
- - Synovite villonodulaire pigmentée, *M12.24*
- - Teigne de la *B35.2*
- - Trichophytie de la *B35.2*
- - Tumeur ténosynoviale à cellules géantes de la *M12.24*

Main bote radiale ¬ *Q71.4*

Main-pied ¬ Syndrome *L27.1*

Main-pied-utérus ¬ Syndrome *Q87.8*

Maintien du sommeil ¬ Troubles de l'endormissement et du *G47.0*

Mainzer
v./v.a. Saldino-Mainzer

Maison
- Asthme ¬ Allergie à la poussière de *J45.09*
- Pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la *Z76.2*

Maissiat [ilio-tibiale] ¬ Syndrome de la bandelette de *M76.3*

Majeed ¬ Syndrome de *M86.39, D64.4*

Majeur
- Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F32.2*
- Histocompatibilité classe
- - I ¬ Déficit en complexe *D81.6*
- - II ¬ Déficit en complexe *D81.7*
- Mineure) ¬ Stomatite: aphteuse (*K12.0*
- Précisées ¬ Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies *D82.8*
- Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F33.2*
- Sans précision ¬ Déficit immunitaire associé à une anomalie *D82.9*
- Symptôme psychotique ¬ épisode
- - Isolés de: dépression: *F32.3*
- - Récurrents sévères de: dépression: *F33.3*
- ¬
- - Déchirure hépatique *S36.15*
- - Thalassémie: *D56.1*
- - Trisomie partielle *Q92.2*

Majewski
v./v.a. Lenz-Majewski
- ¬ Syndrome des côtes courte-spolydactylie type *Q77.2*

Majocchi ¬ Granulome de *B35.8*

Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques ¬ *F68.0*

Malabsorption
- Due intolérance
- - Amidon ¬ *K90.4*
- - Glucides ¬ *K90.4*
- - Lipides ¬ *K90.4*
- - Non classée ailleurs ¬ *K90.4*
- - Protides ¬ *K90.4*
- Galactose ¬ *E74.2*
- Glucose-galactose ¬ *E74.3*
- Héréditaire des folates ¬ *E53.8*
- Idiopathique par défaut de synthèse des acides biliaires ¬ *K90.8*
- Intestinale
- - Sans précision ¬ *K90.9*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, K90.9*
- Intestinales ¬ Autres *K90.8*
- Isomaltose ¬ *E74.3*
- Méthionine ¬ Syndrome de *E72.1*
- Monosaccharide ¬ *E74.3*
- Post-chirurgical
- - Fracture pathologique ¬ Ostéoporose consécutive à une *M80.3*
- - Non classée ailleurs ¬ *K91.2*
- - ¬
- - - Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une *M83.2*
- - - Ostéoporose consécutive à une *M81.3*
- Saccharose-isomaltose ¬ *E74.3*

Malabsorption *–suite*
- Sélective
- - Cobalamine-protéinurie ¬ Syndrome de *D51.1*
- - Magnésium ¬ Hypomagnésémie par *E83.4*
- - Vitamine B12 avec protéinurie ¬ Anémie par carence en vitamine B12 due à une *D51.1*
- ¬
- - Défaut de synthèse des acides biliaires avec cholestase et *K76.8*
- - Ostéomalacie de l'adulte par *M83.2*

Malade ¬ Personne en bonne santé accompagnant un sujet *Z76.3*

Maladie
v./v.a. Type de maladie

Maladive ¬ Faiblesse *R53.9*

Malaire
- Maxillaire ¬ Fracture de l'os *S02.49*
- ¬ Fracture
- - Arcade zygomatique des os *S02.41*
- - Enfoncement des os *S02.42*
- - Os *S02.42*

Malaise
- Post effort MPE ¬ Fatigue chronique
- - Indication d'un *R53.0*
- - Sans indication d'un *R53.1*
- Vasovagale psychogène ¬ *F45.30*
- ¬
- - *R53.9*
- - Sensation de *R53.9*

Malakoplakie ¬
- *N28.88*
- *N32.8*

Malan ¬ Syndrome de croissance excessive de *Q87.3*

Malaria
- Biliosa ¬ *B50.8*
- Quartana ¬ Maladie glomérulaire au cours de *B52.0†, N08.0**
- Quotidiana ¬ *B50.9*
- Tertiana maligne ¬ *B50.9*
- Tropica avec complication cérébrale ¬ *B50.0†, G94.8**

Malariae
- Atteinte rénale ¬ Paludisme à Plasmodium *B52.0†, N08.0**
- Complications ¬ Paludisme à Plasmodium *B52.8*
- Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium *B52*
- Sans complication ¬ Paludisme à Plasmodium *B52.9*
- ¬
- - Glomérulonéphrite à Plasmodium *B52.0†, N08.0**
- - Paludisme à Plasmodium *B52.9*

Malayi ¬
- Éléphantiasis due à Wuchereria *B74.1*
- Filariose à Brugia *B74.1*

Malformatif
- Associés principalement à une petite taille ¬ Syndromes congénitaux *Q87.1*
- Atteignant principalement l'aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux *Q87.0*
- Comprenant un gigantisme néonatal ¬ Syndromes congénitaux *Q87.3*
- Dus à des causes exogènes connues ¬ Autres syndromes congénitaux *Q86.88*
- Édimbourg ¬ Syndrome *Q95.2*
- Impliquant principalement les membres ¬ Syndromes congénitaux *Q87.2*
- Modifications du squelette ¬ Autres syndromes congénitaux *Q87.5*
- Précisés, non classés ailleurs ¬ Autres syndromes congénitaux *Q87.8*

Malformation
- Adénomatoïde kystique du poumon] ¬ CCAM [*Q33.0*
- Ano-rectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec fistule recto-vestibulaire ¬ *Q42.2*
- Aqueduc de Sylvius ¬ *Q03.0*
- Arnold-Chiari type
- - 1 ¬ *Q07.0*
- - 2 ¬ *Q07.0*
- Articulation sacro-iliaque congénitale ¬ *Q74.2*
- Associées
- - EPHB4 ¬ Malformation capillaire- *Q27.3*
- - RASA1 ¬ Malformation capillaire- *Q27.3*
- Avant-pied ¬ *M21.68*
- Bassin
- - Entraînant une disproportion SAI ¬ *O33.0*
- - Mère ¬ Soins maternels pour disproportion due à une *O33.0*
- Caverneux cérébrale
- - Familiale ¬ *Q28.38*
- - Héréditaire ¬ *Q28.38*
- Cérébelleuse dystrophie cornéenne dysmorphie facial ¬ Syndrome agénésie congénitale
- - Grandes lèvres- *Q87.0*
- - Scrotum- *Q87.0*
- Cérebro-cérébelleuse ¬ Syndrome d'épilepsie focale-déficience intellectuelle- *Q04.8*
- Cheville congénitale ¬ *Q74.2*
- Cloacale non syndromique ¬ *Q43.8*
- Colonne vertébrale ¬ Syndrome de déficit congénital combiné en hormones hypophysaires, associé à une perte auditive neurosensorielle et à des *E23.0*
- Cordon médullaire divisé ¬ *Q06.2*
- Cortical
- - Habitus mince ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-microcéphalie- *Q87.8*

Malformation *–suite*
- Cortical *–suite*
- - Microcéphaliques-petite taille par déficit en RTTN ¬ *Q87.1*
- Cranio-faciale ¬ *Q75.9*
- Dandy-Walker
- - Anomalies des ganglions de la base-convulsions ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- - Cataracte ¬ Syndrome d'amyotrophie spinale- *G12.8†, H28.2*, Q03.1*
- - Hydrocéphalie ¬ Syndrome de craniosynostose- *Q03.1, Q75.0*
- - Isolée avec hydrocéphalie ¬ *Q03.1*
- - ¬ Syndrome de dysmorphie-macrocéphalie-myopie- *Q87.8*
- Échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de *Z36.3*
- Encéphale ¬ *Q04.9*
- Fente
- - Branchiale SAI ¬ *Q18.2*
- - Labial
- - - Bilatérale ¬ *Q36.0*
- - - ¬ *Q36.9*
- - Voûte et du voile du palais ¬ *Q35.5*
- Foie SAI congénital(e) ¬ *Q44.7*
- Génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de *Q87.8*
- Génito-urinaire ¬ Syndrome de dysostose spondylocostale-atrésie anale- *Q87.8*
- Glomuveineuse ¬ *D18.00*
- Internes ¬ Syndrome de porencéphalie-hypoplasie cérébelleuse- *Q87.8*
- Klippel-Feil
- - Myopathie-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q76.1*
- - ¬ *Q76.1*
- Mitrale congénitale ¬ *Q23.9*
- Multiples ¬
- - Dysgénésie gonadique 46,XY avec *Q99.1*
- - Syndrome de tetra-amélie- *Q87.8*
- Myélique limitée dorsale ¬
- - *Q76.0*
- - MyeLDM [*Q76.0*
- Neurocutanée héréditaire ¬ *D18.08*
- Oculaires, cardiopulmonaires et squelettiques ¬ Syndrome de mèches blanches avec dysmorphies faciales et *Q87.8*
- Organe pelvien lors
- - Accouchement ¬ *O34.9*
- - Grossesse ¬ *O34.9*
- Origine branchiale ¬ Autres *Q18.2*
- Osseuse congénitale ¬ Scoliose congénitale due à une *Q76.3*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Pied ¬ *M21.68*

Malformation *–suite*
- Placenta ¬
- - *O43.1*
- - Nouveau-né affecté par une *P02.2*
- Présumée) du système nerveux central du fœtus ¬ Soins maternels pour *O35.0*
- Rachis sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Replis endocardiques ¬ *Q21.2*
- SAI
- - Congénital(e) de la vulve ¬ *Q52.7*
- - Congénitale de la langue ¬ *Q38.3*
- Septum
- - Aortique ¬ *Q21.4*
- - Urorectal ¬ Succession de *Q87.8*
- Sinus
- - Coronaire ¬
- - - *Q21.1*
- - - *Q21.1*
- - Veineux ¬ *Q21.1*
- Split-Cord, type mixte ¬ *Q06.2*
- Squelettique-malformation cardiaque ¬ Syndrome marfanoïde-dysmorphie faciale- *Q87.0*
- Système nerveux central ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Tricuspide congénitale ¬ *Q22.9*
- Urogénitale ¬ Syndrome de déficit immunitaire en lymphocytes B-anomalie des membres- *Q87.0*
- Vaisseaux coronaires ¬ *Q24.5*
- Ventricule gauche ¬ Atrésie aortique congénitale avec hypoplasie de l'aorte ascendante et *Q23.4*
- ¬ Pancytopénie avec *D61.0*

Malformation acquise
- Cheville, n.c.a. ¬ *M21.68*
- Métatarse ¬ *M21.68*
- Pied ¬ *M21.68*
- Talon ¬ *M21.68*

Malformation anorectale
- Atrésie anus non syndromique
- - Fistule
- - - Périnéale ¬ *Q42.2*
- - - Rectobulbaire ¬ *Q42.2*
- - - Rectovaginale ¬ *Q42.2*
- - - Rectovésicale ¬ *Q42.2*
- - - Type H ¬ *Q42.2*
- - Fistule recto-urétrale ¬ *Q42.2*
- - Sans fistule ¬ *Q42.3*
- Non syndromique
- - Pouch colon» ¬ *Q42.3, Q43.8*
- - ¬ *Q43.9*

Malformation artério-veineuse
- Appareil urinaire ¬ *Q27.3*
- Cérébrale ¬ *Q28.29*
- Congénitale

Malformation artério-veineuse *–suite*
- Congénitale *–suite*
- - Vaisseaux cérébraux, non précisée ¬ *Q28.29*
- - Vaisseaux précérébraux, non précisée ¬ *Q28.09*
- Congénitales
- - Vaisseaux cérébraux ¬ Autres *Q28.28*
- - Vaisseaux précérébraux ¬ Autres *Q28.08*
- Durales du crâne ¬ *Q28.28*
- Faciale ¬ *Q27.3*
- Foie ¬ *Q27.3*
- Fronto-nasale ¬ *Q27.3*
- Intracrânienne ¬ *Q28.29*
- Mandibulaire ¬ *Q27.3*
- Maxillaire ¬ *Q27.3*
- Nævus épidermique] ¬ Syndrome SOLAMEN [hypertrophie segmentaire-lipomatose- *Q87.8*
- Pancréas ¬ *Q27.3*
- Périphérique ¬ *Q27.3*
- Pulmonaire ¬ *Q25.7*
- Rate ¬ *Q27.3*
- Reins ¬ *Q27.3*
- Spinale ¬ *G37.4*
- Tractus gastro-intestinal ¬ *Q27.3*
- Utérus ¬ *Q27.3*
- Veine de Galien ¬ *Q28.28*
- Vésicule biliaire ¬ *Q27.3*
- ¬ Malformation capillaire- *Q27.3*

Malformation capillaire
- Malformation artério-veineuse ¬ *Q27.3*
- Malformation associées
- - EPHB4 ¬ *Q27.3*
- - RASA1 ¬ *Q27.3*
- Polymicrogyrie ¬ Syndrome mégalencéphalie- *Q87.3*
- Rétine ¬ *D18.06*
- ¬ Syndrome
- - Macrocéphalie- *Q87.3*
- - Mégalencéphalie- *Q87.3*
- - Microcéphalie- *Q87.8*

Malformation cardiaque
- Congénitale
- - Eisenmenger ¬ *Q21.88*
- - ¬
- - - *Q24.9*
- - - Antécédents personnels de correction et palliation interventionnelles d'une *Z92.80*
- - - État après intervention de chirurgie cardiaque visant la correction et palliation d'une *Z98.80*
- - - Examen de contrôle après correction et palliation de *Z09.81*
- Congénitales
- - Associé à CDK13 ¬ Syndrome de retard de développement-déficience intellectuelle-dysmorphie faciale- *Q87.0*

Malformation cardiaque *–suite*
- Congénitales *–suite*
- - Précisées ¬ Autres *Q24.8*
- - Troubles hématopoïétiques ¬ Syndrome de mucopolysaccharidose avec *Q87.8*
- Pied bot ¬ Syndrome
- - Pierre Robin- *Q87.8*
- - Séquence de Pierre Robin- *Q87.8*
- Structurelles-anomalies rénales [SHDRA] ¬ Syndrome des *Q87.8*
- - ¬
- - Syndrome
- - - Brachydactylie-mésomélie-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - - Dysmorphie-surdité de transmission- *Q87.8*
- - - Marfanoïde-dysmorphie faciale-malformation squelettique- *Q87.0*
- - - Polysyndactylie- *Q87.8*
- - Transposition congénitalement non corrigée des gros vaisseaux avec *Q20.3, Q24.9*

Malformation cérébrale
- Anomalies squelettiques-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de retard neurodéveloppemental- *Q87.8*
- Atrésie duodénale-hypoplasie rénale bilatérale fœtal létal ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Cardiopathie congénitale-polydactylie postaxiale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Complexe ¬ Lissencéphalie de type 9 avec *Q04.3*
- Dysmorphie facial
- - Brachydactylie ¬ Syndrome de trouble neurologique du développement- *Q87.0*
- - ¬
- - - Retard de développement neurologique avec *Q04.8*
- - - Syndrome de déficience intellectuelle-obésité- *Q87.0*
- Spasticité - hypernatrémie ¬ Syndrome de microcéphalie - *Q04.8*
- ¬ *Q04.9*

Malformation congénitale
- Anomalies chromosomique ¬
- - Antécédents personnels de *Z87.7*
- - Examen spécial de dépistage des *Z13.7*
- Aorte ¬ Autres *Q25.4*
- Appareil
- - Circulatoire
- - - Périphérique, sans précision ¬ *Q27.9*
- - - Sans précision ¬ *Q28.9*
- - Digestif, sans précision ¬ *Q45.9*
- - Lacrymal
- - - SAI ¬ *Q10.6*
- - - ¬ Autres *Q10.6*
- - Respiratoire, sans précision ¬ *Q34.9*
- - Urinaire, sans précision ¬ *Q64.9*
- Artère pulmonaire ¬ Autres *Q25.7*
- Artère rénale

Malformation congénitale *–suite*
- Artère rénale *–suite*
- - SAI ¬ *Q27.2*
- - ¬ Autres *Q27.2*
- Bouche
- - SAI ¬ *Q38.6*
- - ¬ Autres *Q38.6*
- Bronches ¬ Autres *Q32.4*
- Canal déférent épididyme vésicule séminal prostate
- - SAI ¬ *Q55.4*
- - ¬ Autres *Q55.4*
- Cavité orifice cardiaques
- - Sans précision ¬ *Q20.9*
- - ¬ Autres *Q20.8*
- Chambre
- - Antérieure œil
- - - Sans précision ¬ *Q13.9*
- - - ¬ Autres *Q13.8*
- - Postérieure œil
- - - Sans précision ¬ *Q14.9*
- - - ¬ Autres *Q14.8*
- Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Cheveux SAI ¬ *Q84.2*
- Choroïde ¬ *Q14.3*
- Clitoris ¬ *Q52.6*
- Cloison
- - Cardiaque, sans précision ¬ *Q21.9*
- - Cardiaques ¬ Autres *Q21.8*
- Cornée
- - SAI ¬ *Q13.4*
- - ¬ Autres *Q13.4*
- Corps
- - Calleux ¬ *Q04.0*
- - Vitré ¬ *Q14.0*
- Côte SAI ¬ *Q76.6*
- Côtes ¬ Autres *Q76.6*
- Cristallin
- - Sans précision ¬ *Q12.9*
- - ¬ Autres *Q12.8*
- Diaphragme
- - SAI ¬ *Q79.1*
- - ¬ Autres *Q79.1*
- Due à une hyperthermie maternelle ¬ *Q86.88*
- Encéphale
- - Sans précision ¬ *Q04.9*
- - ¬ *Q04.9*
- Estomac, sans précision ¬ *Q40.3*
- Face et du cou, sans précision ¬ *Q18.9*
- Fixation de l'intestin ¬ *Q43.3*
- Foie ¬ Autres *Q44.7*
- Front ¬ *Q75.8*
- Genou ¬ *Q74.1*
- Glande parathyroïde ou thyroïde ¬ *Q89.2*

Malformation congénitale *–suite*
- Glandes endocrines ¬ *Q89.2*
- Glandes et des canaux salivaires ¬ *Q38.4*
- Grandes veines ¬ Autres *Q26.8*
- Gros vaisseau
- - Sans précision ¬ *Q25.9*
- - ¬ Autres *Q25.8*
- Grosses veines ¬ *Q26.9*
- Hanche
- - Sans précision ¬ *Q65.9*
- - ¬ Autres *Q65.8*
- Intestin, sans précision ¬ *Q43.9*
- Iris
- - SAI ¬ *Q13.2*
- - ¬ Autres *Q13.2*
- Langue ¬ Autres *Q38.3*
- Larynx
- - Sans précision ¬ *Q31.9*
- - ¬ Autres *Q31.8*
- Lèvre
- - Non classées ailleurs ¬ *Q38.0*
- - SAI ¬ *Q38.0*
- Membre
- - S
- - - Inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne ¬ Autres *Q74.2*
- - - Supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire ¬ Autres *Q74.0*
- - ¬ *Q74.9*
- Moelle épinière, sans précision ¬ *Q06.9*
- Multiples, non classées ailleurs ¬ *Q89.7*
- Myocarde ¬ *Q24.8*
- Nez
- - Sans précision ¬ *Q30.9*
- - ¬ Autres *Q30.8*
- Non précisée d'un (des) membre(s) ¬ *Q74.9*
- Œil, sans précision ¬ *Q15.9*
- Œsophage
- - Sans précision ¬ *Q39.9*
- - ¬ Autres *Q39.8*
- Ongle
- - SAI ¬ *Q84.6*
- - ¬ Autres *Q84.6*
- Orbite ¬ *Q10.7*
- Oreille
- - Atteinte de l'audition, sans précision ¬ *Q16.9*
- - Interne ¬ *Q16.5*
- - Moyenne
- - - SAI ¬ *Q16.4*
- - - ¬ Autres *Q16.4*
- - Sans précision ¬ *Q17.9*
- Organe génital
- - Femme, sans précision ¬ *Q52.9*
- - Homme
- - - Sans précision ¬ *Q55.9*

Malformation congénitale *–suite*
- Organe génital *–suite*
- - Homme *–suite*
- - - ¬ Autres *Q55*
- Os du crâne et de la face, sans précision ¬ *Q75.9*
- Osselets ¬ *Q16.3*
- Ovaire
- - SAI ¬ *Q50.3*
- - ¬ Autres *Q50.3*
- Palais
- - Non classées ailleurs ¬ *Q38.5*
- - SAI ¬ *Q38.5*
- Pancréas canal pancréatique
- - SAI ¬ *Q45.3*
- - ¬ Autres *Q45.3*
- Papille optique ¬ *Q14.2*
- Paroi abdominale ¬ Autres *Q79.5*
- Paupière ¬ *Q10.3*
- Pavillon de l'oreille ¬ *Q17.3*
- Peau
- - Phanères, sans précision ¬ *Q84.9*
- - Sans précision ¬ *Q82.9*
- Pénis
- - SAI ¬ *Q55.6*
- - ¬ Autres *Q55.6*
- Péricarde ¬
- - *Q24.8*
- - *Q24.8*
- Pharynx
- - SAI ¬ *Q38.8*
- - ¬ Autres *Q38.8*
- Poumon
- - Sans précision ¬ *Q33.9*
- - ¬ Autres *Q33.8*
- Précisées
- - Appareil
- - - Circulatoire
- - - - Périphérique ¬ Autres *Q27.8*
- - - - ¬ Autres *Q28.88*
- - - Digestif ¬ Autres *Q45.8*
- - - Respiratoire ¬ Autres *Q34.8*
- - - Urinaire ¬ Autres *Q64.8*
- - Encéphale ¬ Autres *Q04.8*
- - Estomac ¬ Autres *Q40.2*
- - Face et du cou ¬ Autres *Q18.8*
- - Intestin ¬ Autres *Q43.8*
- - Membre(s) ¬ Autres *Q74.8*
- - Moelle épinière ¬ Autres *Q06.8*
- - Œil ¬ Autres *Q15.8*
- - Oreille ¬ Autres *Q17.8*
- - Organe génital
- - - Femme ¬ Autres *Q52.8*
- - - Homme ¬ Autres *Q55.8*
- - Os du crâne et de la face ¬ Autres *Q75.8*
- - Peau

Malformation congénitale *–suite*
- Précisées *–suite*
- - Peau *–suite*
- - - Phanères ¬ Autres *Q84.8*
- - - ¬ Autres *Q82.8*
- - Rein ¬ Autres *Q63.8*
- - Système nerveux ¬ Autres *Q07.8*
- - Voies digestives supérieures ¬ Autres *Q40.8*
- - ¬ Autres *Q89.8*
- Queue de cheval ¬ Autres *Q06.3*
- Rachis, non associées à une scoliose ¬ Autres *Q76.4*
- Rate ¬
- - *Q89.08*
- - *Q89.08*
- Rein, sans précision ¬ *Q63.9*
- Rétine ¬ *Q14.1*
- SAI des bronches ¬ *Q32.4*
- Sans précision ¬ *Q89.9*
- Sein
- - Sans précision ¬ *Q83.9*
- - ¬ Autres *Q83.88*
- Septums cardiaques ¬ Autres *Q21.88*
- Sprengel ¬ *Q74.0*
- Surrénales ¬ *Q89.1*
- Système
- - Nerveux, sans précision ¬ *Q07.9*
- - Ostéo-articulaire muscle
- - - Sans précision ¬ *Q79.9*
- - - ¬ Autres *Q79.8*
- Testicule s scrotum
- - SAI ¬ *Q55.2*
- - ¬ Autres *Q55.2*
- Thorax osseux
- - Sans précision ¬ *Q76.9*
- - ¬ Autres *Q76.8*
- Trachée ¬
- - *Q32.1*
- - *Q32.1*
- Trompe de Fallope ou du ligament large SAI ¬ *Q50.6*
- Trompes de Fallope et des ligaments larges ¬ Autres *Q50.6*
- Uretère ¬ Autres *Q62.8*
- Utérus
- - Col de l'utérus
- - - Sans précision ¬ *Q51.9*
- - - ¬ Autres *Q51.8*
- - ¬ Soins maternels pour *O34.0*
- Vagin
- - SAI ¬ *Q52.4*
- - ¬ Autres *Q52.4*
- Vaisseau cérébral
- - Non précisée ¬ *Q28.39*
- - ¬ Autres *Q28.38*
- Vaisseau précérébral

Malformation congénitale *–suite*
- Vaisseau précérébral *–suite*
- - Non précisée ¬ *Q28.19*
- - ¬ Autres *Q28.18*
- Valve pulmonaire
- - SAI ¬ *Q22.3*
- - ¬ Autres *Q22.3*
- Valvule
- - Aortique mitral
- - - Sans précision ¬ *Q23.9*
- - - ¬ Autres *Q23.8*
- - Tricuspide
- - - Sans précision ¬ *Q22.9*
- - - ¬ Autres *Q22.8*
- Veine cave
- - Inférieure ¬ *Q26.9*
- - Supérieure ¬ *Q26.9*
- Ventricule gauche lors du syndrome d'hypoplasie du cœur gauche ¬ *Q23.4*
- Vésicule biliaire
- - SAI ¬ *Q44.1*
- - ¬ Autres *Q44.1*
- Vessie urètre
- - SAI ¬ *Q64.7*
- - ¬ Autres *Q64.7*
- Voie biliaire
- - SAI ¬ *Q44.5*
- - ¬ Autres *Q44.5*
- Voies digestives supérieures, sans précision ¬ *Q40.9*
- Vulve ¬ Autres *Q52.7*

Malformation lymphatique
- Capillaire ¬ *D18.19*
- Caverneux ¬ *D18.19*
- Macrokystique ¬ *D18.19*
- Microkystique tissulaire infiltrante ¬ *D18.19*
- Rare ¬ *D18.19*

Malformation veineuse
- Osseux
- - Primaire ¬ *D18.08*
- - ¬ *D18.08*
- Splénique ¬ *Q27.8*

Malgaigne ¬ Fracture de *S32.7*

Malherbe ¬ Tumeur calcifiée de *D23.9*

Malheureuse ¬ Difficultés liées à une enfance *Z61*

Malik-Percin ¬ Syndactylie type *Q70.4*

Malin
v./v.a. Type de maladie

Mallei ¬ Infection
- Burkholderia *A24.0*
- Pseudomonas *A24.0*

Malléolaire
v./v.a. Région malléolaire

Malléole
- Externe ¬ Fracture de la *S82.6*
- Interne ¬ Fracture de la *S82.5*

Malléole *–suite*
- Pied
- - SAI ¬ Plaie ouverte de la *S91*
- - ¬ Plaie ouverte d'autre partie de la *S91.80*
- SAI ¬ *S82.88*
- ¬
- - *S82*
- - Péroné, impliquant: *S82.6*
- - Tibia, impliquant: *S82.5*

Malleomyces pseudomallei ¬ Infection à *A24.4*

Malleus ¬ *A24.0*

Mallory
- Weiss ¬ Syndrome de *K22.6*
- ¬ Myopathie avec surcharge en desmine et inclusions de corps de *G71.8*

Malnutrition
- Cours
- - Accouchement et de la puerpéralité ¬ *O25*
- - Grossesse ¬ *O25*
- Fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel ¬ *P05.2*
- Grave avec marasme ¬ *E41*
- Mère SAI ¬ *P00.4*
- Protéino énergétique
- - Grave
- - - E43
- - - - Forme intermédiaire ¬ *E42*
- - - - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ *E42*
- - - Sans précision ¬ *E43*
- - Légère ¬ *E44.1*
- - Modérée ¬ *E44.0*
- - Sans précision ¬ *E46*
- - ¬
- - - Retard de développement après *E45*
- - - Séquelles de *E64.0*
- SAI ¬ *E46*
- Type
- - 1 ¬ Diabète sucré de *E12*
- - 2 ¬ Diabète sucré de *E12*
- ¬
- - Arrêt de croissance dû à la *E45*
- - Atrophie due à la *E45*
- - Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la *O24.2*
- - Diabète sucré de *E12*
- - Dystrophie due à la *E45*
- - Ostéomalacie de l'adulte due à la *M83.3*
- - Retard de développement physique dû à la *E45*

Malnutrition-déshydratation ¬ Cataracte au cours de *E46†, H28.1**

Malocclusion
- Dentaire due à un dysfonctionnement oro-facial ¬ *K07.5*
- Due
- - Déglutition anormale ¬ *K07.5*

Malocclusion *–suite*
- Due *–suite*
- - Habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les doigts ¬ *K07.5*
- - Respiration buccale ¬ *K07.5*
- Sans précision ¬ *K07.4*

Malonique
- Méthylmalonique ¬ Acidurie combinée *E71.1, E72.8*
- ¬ Acidurie *E72.8*

Malonyl-CoA décarboxylase ¬ Déficit en *E72.8*

Malpighien intra-épithéliale
- Bas grade [LSIL] ¬ Lésion *N87.0*
- Haut grade [LMIEHG] ¬ Lésion *D06.9*

Malposition
- Cœur ¬ *Q24.8*
- Congénitale des organes digestifs SAI ¬ *Q45.8*
- Dents ¬ *K07.3*
- Due) à une prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Uretère ¬ *Q62.6*
- Utérus ¬ *N85.4*

Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale ¬ Syndrome *Q87.8*

Malrotation
- Cardiopathie ¬ Syndrome de fente labio-palatine- *Q87.8*
- Côlon ¬ *Q43.3*
- Rein ¬ *Q63.2*

Malsegmentation
v./v.a. microcéphalie-cardiopathie-malsegmentation

MALT
- Mucosa Associated Lymphoid Tissue
- - Estomac ¬ Lymphome *C88.40*
- - Poumon ¬ Lymphome *C88.40*
- ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome *C88.41*

MALT1 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Maltase acide
- Normale ¬ Glycogénose lysosomale à activité *E74.0*
- ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Malte ¬ Fièvre de *A23.0*

Malteurs
- Exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.41*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.40*
- ¬ Poumon des *J67.40*

Malum vertebrale suboccipitale ¬ *A18.0†, M49.01**

Mamelon
- Accessoire ¬ *Q83.3*
- Aréole ¬ Tumeur maligne: *C50.0*
- Associée accouchement ¬

Mamelon *–suite*
- Associée accouchement ¬ *–suite*
- - Infection du *O91.0*
- - Invagination du *O92.0*
- Associées à l'accouchement ¬ Crevasses du *O92.1*
- Congénitale) ¬ Absence de *Q83.2*
- Gestationnel
- - Puerpérales ¬ Fissures du *O92.1*
- - ¬ Abcès du *O91.0*
- Puerpéral ¬ Abcès du *O91.0*
- Surnuméraire ¬ *Q83.3*
- Type glande salivaire ¬ Carcinome du *C50.0*
- ¬
- - Absence congénitale de sein avec absence de *Q83.0*
- - Adénocarcinome
- - - Apocrine du *C50.0*
- - - Tubulaire du *C50.0*
- - Agénésie de sein avec absence de *Q83.0*
- - Amastie
- - - Absence de *Q83.0*
- - - Présence du *Q83.88*
- - Carcinome héréditaire du *C50.0*
- - Carcinome mucineux du *C50.0*
- - Écoulement par le *N64.5*
- - Fissure et fistule du *N64.0*
- - Inversion congénitale des *Q83.88*
- - Résultats anormaux de: écoulement du *R89*
- - Rétraction
- - - *N64.5*
- - - Congénitale des *Q83.88*

Mammaire
v./v.a. cubito-mammaire
v./v.a. Hypoplasie mammaire
v./v.a. onycho-digito-mammaire
- Bénigne, sans précision ¬ Dysplasie *N60.9*
- Bénignes ¬ Autres dysplasies *N60.8*
- Cooper ¬ Névralgie *N64.4*
- Gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ Abcès: *O91.1*
- Invasif à récepteurs hormonaux positifs ¬ Carcinome *C50.9*
- Juvénile familiale ¬ Hypertrophie *N62*
- Massive de la puberté ¬ Hypertrophie *N62*
- Partie cutané ¬
- - Échec d'une greffe *T86.59*
- - Nécrose d'une greffe *T86.51*
- - Perte d'une greffe *T86.52*
- - Rejet d'une greffe *T86.59*
- - Troubles circulatoires d'une greffe *T86.50*
- S) SAI ¬ Nodule(s) *N63*
- SAI ¬ Hypertrophie *N62*
- Sans
- - Partie cutané ¬
- - - Échec d'un greffe *T86.84*
- - - Rejet d'un greffe *T86.84*

Mammaire *–suite*
- Sans *–suite*
- - Précision ¬ Tuméfaction *N63*
- Type glande salivaire, à localisations contiguës ¬ Carcinome *C50.8*
- ¬
- - Aberration *Q83.88*
- - Angiosarcome du quadrant supéro-interne de la glande *C50.2*
- - Artère ou veine *S25.88*
- - Asymétrie *Q83.88*
- - Atrophie *N64.2*
- - Carcinome métaplasique du quadrant supéro-interne de la glande *C50.2*
- - Complication mécanique d'une prothèse ou d'un implant *T85.4*
- - Complications dues à une prothèse ou un implant *T85.83*
- - Échec d'un greffe *T86.84*
- - Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant *T85.82*
- - Grosseur dans la glande *R92*
- - Hypertrophie *N62*
- - Hypotrophie *Q83.88*
- - Implant *Z41.1*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant *T85.73*
- - Lymphome anaplasique à grandes cellules lié à un implant *C84.7*
- - Mélanome malin de la peau *C43.59*
- - Micromastie [développement insuffisant des glandes *Q83.88*
- - Rejet d'un greffe *T86.84*
- - Tuberculose *A18.8*

Mammographie de routine ¬ *Z01.6*

Mammoplastie
- Augmentation
- - Partie cutanée ¬ Rejet d'une *T86.59*
- - Sans partie cutanée ¬ Rejet d'une *T86.84*
- Lambeau pectoro-mammaire avec partie cutanée ¬ Rejet d'une *T86.59*
- Partie cutané ¬ Rejet
- - *T86.59*
- - *T86.84*
- Plastie de glissement sans partie cutanée ¬ Rejet d'une *T86.84*
- ¬ Rejet d'une *T86.84*

MAN2B2-CDG [Congenital disorder of glycosylation] ¬ *E77.8*

Mandibulaire
- Maxillaire ¬
- - Macrognathie (*K07.0*
- - Micrognathie (*K07.0*
- - Prognathie (*K07.1*
- - Rétrognathie (*K07.1*
- ¬
- - Fente médiane labio- *Q36.1*
- - Fracture du condyle *S02.61*
- - Fusion des incisives *K00.2*

Mandibulaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hyperplasie, hypoplasie: *K07.0*
- - Malformation artério-veineuse *Q27.3*
- - Syndrome d'hyperparathyroïdie-tumeur *E21.0, D16.42*
- - Torus: *K10.0*

Mandibule
- Défaut osseux ¬ Fracture ouverte de la *S02.60, S01.87!*
- ¬
- - *S03.0*
- - Améloblastome adénoïde de la *D16.5*
- - Amélosarcome de la *C41.1*
- - Carcinome améloblastique de la *C41.1*
- - Carcinome odontogène de la *C41.1*
- - Chondrosarcome de la *C41.1*
- - Dysplasie osseuse floride de la *D16.5*
- - Fibrosarcome
- - - Améloblastique de la *C41.1*
- - - Odontogène de la *C41.1*
- - Fracture ouverte
- - - *S02.60, S01.87!*
- - - Corps de la *S02.68, S01.87!*
- - Granulome central de la *K10.1*
- - Hyperplasie ou hypoplasie unilatérale du processus condylien de la *K10.8*
- - Mâchoire inférieure (*S02.6*
- - Odontosarcome
- - - *C41.1*
- - - Améloblastique de la *C41.1*
- - Ostéoblastome de la *D16.5*
- - Sarcome
- - - *C41.1*
- - - Améloblastique de la *C41.1*
- - - Odontogène de la *C41.1*
- - Sarcome d'Ewing de la *C41.1*
- - Tumeur maligne
- - - Odontogène de la *C41.1*
- - - Os et du cartilage articulaire: *C41.1*
- - Tumeur odontogène kératokystique de la *D16.5*

Mandibulo
v./v.a. ophtalmo-mandibulo-mélique

Mandibulo-acrale
- Associée à MTX2 ¬ Dysplasie *Q87.5*
- ¬ Dysplasie *Q87.5*

Mandibulo-facial
- Alopécie ¬ Dysostose *Q75.4, L65.9*
- Macroblépharon-macrostomie ¬ Syndrome de dysostose *Q87.0*
- Sans anomalies des extrémités ¬ Dysostose *Q75.4*
- ¬ Dysostose *Q75.4*

Manducateur ¬ Douleurs faciales au cours des maladies de l'appareil *K10.8*

Manganèse ¬
- Carence en *E61.3*

Manganèse ¬ *–suite*
- Effet toxique
- - *T57.2*
- - Composés du *T57.2*

Maniaco dépressive
- Forme dépressive
- - Sans symptômes psychotiques ¬ Psychose *F33.2*
- - Symptômes psychotiques ¬ Psychose *F33.3*
- ¬
- - Maladie *F31*
- - Psychose *F31*
- - Réaction *F31*

Maniaque
- Isolé ¬ trouble bipolaire, épisode *F30*
- Récurrents SAI ¬ Episodes *F31.8*
- Sans
- - Précision ¬ Episode *F30.9*
- - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel *F31.1*
- Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel *F31.2*
- ¬
- - Épisodes *F30.8*
- - Psychose
- - - Schizo-affective, type *F25.0*
- - - Schizophréniforme, type *F25.0*
- - Stupeur *F30.2*
- - Trouble schizo-affectif, type *F25.0*

Manie
- SAI ¬ *F30.9*
- Sans symptômes psychotiques ¬ *F30.1*
- Symptôme psychotique
- - Congruents à l'humeur ¬ *F30.2*
- - Non congruents à l'humeur ¬ *F30.2*
- - ¬ *F30.2*

Manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle *Y09.9!*

Manifestation
- Avitaminose A ¬ Autres *E50.8*
- Carence en thiamine ¬ Autres *E51.8*
- Extra-cutanées associée à PLEC ¬ Epidermolyse bulleuse simple intermédiaire sans *Q81.0*
- Extra-squelettiques ¬ Dystrophie osseuse sclérosante mixte avec *Q87.5*
- Hépatiques récurrentes causées par le virus de l 'hépatite C chez les transplantés hépatiques ¬ *B18.2, Z94.4*
- Intestinales ¬ Fibrose kystique avec *E84.1*
- Multiples ¬
- - Fibrose kystique avec autres *E84.87*
- - Mucoviscidose avec autres *E84.87*
- Multisystémiques ¬ Syndrome d'insuffisance hépatique aiguë infantile- *K72.0*

Manifestation *–suite*
- Neurologiques ¬ Zona accompagné d'autres *B02.2†*
- Oculaires de l'avitaminose A ¬ Autres *E50.7*
- Ophtalmologique ¬ Diabète sucré de type 1 avec *E10.30†, H58.8**
- Pian ¬ Autres *A66.7*
- Pulmonaire
- - Intestinale ¬ Mucoviscidose à *E84.80*
- - ¬ Polyarthrite chronique avec *M05.10†, J99.0**
- Pulmonaires ¬
- - Fibrose kystique avec *E84.0*
- - Maladie à virus Hanta avec *B33.4†*
- Rénales ¬
- - Fièvre hémorragique avec *A98.5†, N08.0**
- - Maladie à virus Hanta [hantavirus] avec *A98.5†, N08.0**
- Respiratoires
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe avec d'autres *J10.1*
- - Virus non identifié ¬ Grippe avec d'autres *J11.1*
- Sclérose en plaques
- - Aiguë de Marburg ¬ Première *G35.0*
- - ¬ Première *G35.0*
- Systémiques [RVCL-S] ¬ Vasculopathie rétinienne avec leucoencéphalopathie cérébrale et *Q28.38, Q14.1*
- Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe avec d'autres *J10.8*
- Virus non identifié ¬ Grippe avec d'autres *J11.8*
- ¬ Mucoviscidose avec autres *E84.88*

Manifestée crise
- Hypertoniques ¬ Dysréflexie autonome *G90.40*
- Transpiration ¬ Dysréflexie autonome *G90.41*

Manifestement traitement ¬ Déficience intellectuelle
- Légère avec trouble du comportement nécessitant *F70.1*
- Moyen avec trouble du comportement nécessitant *F71.1*

Manipulateurs de liège ¬ Maladie ou poumon des: *J67.3*

Manipulation
- Accès vasculaire, non précisé ¬ Adaptation et *Z45.29*
- Appareils médicaux implantés ¬ Adaptation et *Z45.88*
- Défibrillateur cardiaque implanté ¬ Adaptation et *Z45.01*
- Dispositifs cardiaques (électroniques) ¬ Adaptation et *Z45.08*
- Extenseur
- - Bronchique ¬ Adaptation et *Z45.84*
- - Trachéal ¬ Adaptation et *Z45.85*
- Neurostimulateur ¬ Adaptation et *Z45.80*
- Stimulateur

Manipulation *–suite*
- Stimulateur *–suite*
- - Cardiaque implanté ¬ Adaptation et *Z45.00*
- - Diaphragmatique ¬ Adaptation et *Z45.81*
- Système
- - Assistance cardiaque ¬ Adaptation et *Z45.02*
- - Cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement ¬ Adaptation et *Z45.20*

Mannosidase
v./v.a. alpha-D-mannosidase
v./v.a. bêta-mannosidase

Mannosidose ¬ *E77.1*

Mannosyltransférase
v./v.a. Dol-P-mannosyltransférase
- 1 ¬ Déficit en *E77.8*
- 2 ¬ Déficit en *E77.8*
- 6 ¬ Déficit en *E77.8*
- 7-9 ¬ Déficit en *E77.8*
- 8 ¬ Déficit en *E77.8*

Manœuvre instrumentale ¬ lésions par *O71*

Manque
- Énergie ¬ *R53.9*
- Exercice physique ¬ *Z72.8*
- Plaisir sexuel ¬ Aversion sexuelle et *F52.1*
- Réactivité ¬ Lenteur et *R46.4*
- Repos ou de loisirs ¬ *Z73*

Mansoni
- S. proliferum) ¬ Infection à: Sparganum (S. *B70.1*
- ¬ Schistosomiase due à Schistosoma *B65.1*

Mantoux ¬ Résultats anormaux au test de *R76.1*

Manubrium sterni ¬ Fracture du sternum: *S22.21*

Manuum et pedum ¬ Tinea *B35.8*

Manzke
v./v.a. Catel-Manzke

Maple syrup urine disease] ¬ MSUD [*E71.0*

Marais ¬ Anémie due à la fièvre des *B54†, D63.8**

Marasme
- Nutritionnel ¬ *E41*
- Tuberculeux NCA ¬ *A16.9*
- ¬
- - Kwashiorkor avec *E42*
- - Malnutrition
- - - Grave avec *E41*
- - - Protéino-énergétique grave [comme en E43]: avec signes de kwashiorkor et de *E42*

Marbach-Rustad ¬ Syndrome d'apparence progéroïde de *E34.8*

Marbach-Schaaf ¬ Syndrome de *F84.1*

Marbourg] ¬ MHF [Fièvre hémorragique de *A98.3*

Marburg
- Progressive primaire

Marburg *–suite*
- Progressive primaire *–suite*
- - Exacerbation aiguë ¬ Sclérose en plaques aiguë de *G35.21*
- - ¬ Sclérose en plaques aiguë de *G35.20*
- Rémittente (évolution par poussées) ¬ Sclérose en plaques aiguë de *G35.10*
- ¬
- - Maladie de *A98.3*
- - Première manifestation d'une sclérose en plaques aiguë de *G35.0*
- - Sclérose en plaques aiguë de *G35.9*

Marcescens
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Serratia *U81.06!*
- - 3MRGN ¬ Serratia *U81.26!*
- - 4MRGN ¬ Serratia *U81.46!*
- ¬ Pneumonie due à: Serratia *J15.6*

Marche
- 200 m
- - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de *I70.21*
- - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de *I70.22*
- Non classée ailleurs ¬ Difficulté à la *R26.2*
- SAI ¬ Fracture de *M84.3*
- Tardive ¬ *R62.0*
- ¬
- - Freezing progressif primaire de la *G31.88*
- - Hémoglobinurie (de): *D59.6*
- - Syndrome de paralysie supranucléaire progressive-acinésie pure avec freezing de la *G23.1*
- - Trouble hystérique de la *F44.4*

Marchesani
v./v.a. Weill-Marchesani

Marchiafava-Bignami ¬ Maladie de *G37.1*

Marchiafava-Micheli ¬ Maladie de *D59.5*

Marcoumar ¬ Hémorragie
- Associée à *D68.33*
- Sous traitement par *D68.33*

Marcumar ¬ Hématome de la gaine des grands droits lors d'un traitement par *D68.33, M62.88*

Marcus-Gunn ¬ Syndrome de *Q07.8*

Marden-Walker ¬ Syndrome de *Q74.3*

Marfan
- Néonatal ¬ Syndrome de *Q87.4*
- ¬ MFS [Syndrome de *Q87.4*

Marfanoïde
- Déficience intellectuelle
- - Autosomique récessif ¬ Syndrome *Q87.8*
- - Liée à l'X ¬ Syndrome *Q87.8, F79.9*
- Dysmorphie faciale-malformation squelettique-malformation cardiaque ¬ Syndrome *Q87.0*

Marfanoïde *–suite*
- Hernie inguinale-vieillissement osseux prématuré ¬ Syndrome *Q87.0*
- Lipodystrophie ¬ Syndrome d'apparence progéroïde et *E88.1*
- Neurofibromes systémiques et orbitaux douloureux ¬ Syndrome *Q87.8*
- Scoliose associé à NKAP ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie facial-habitus *Q87.0*
- Type de Silva ¬ Syndrome *Q87.8*
- ¬ Syndrome
- - Cutis laxa néonatale-habitus *Q87.8*
- - Microcéphalie, glomérulonéphrite et habitus *Q87.8*

Marge
- Anale ¬
- - *D03.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- - Carcinome de la *C44.50*
- - Mélanome malin du *C43.50*
- - Tumeur maligne de la *C44.50*
- Cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès ¬ Infection de la *A60.1*
- ¬ Epiglotte, bord libre [*C10.1*

Marginal
- Cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone *C88.41*
- E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- Pellucide ¬ Dégénérescence *H18.4*
- Simple ¬ Gingivite (chronique): *K05.1*
- Splénique ¬ Lymphome de la zone *C83.0*
- Terrien ¬ Dégénérescence *H18.4*
- Tympan ¬ Autres perforations *H72.2*
- ¬
- - Lymphome
- - - B cutané de la zone *C83.0*
- - - Nodal de la zone *C83.0*
- - - Splénique de la zone *C83.0*
- - Lymphome nodulaire à cellules B de la zone *C83.0*
- - Repli ary-épiglottique zone
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Ulcère de (la): cornée: *H16.0*

Marginé
- Cours d'une fièvre rhumatismale aiguë ¬ Érythème *I00†, L54.0**
- Discoïde de Besnier ¬ Érythème *L53.2*
- Hebra [Jock itch] ¬ Eczéma *B35.6*
- ¬ Glossite: exfoliatrice *K14.1*

Mariage ¬ inscription dans: *Z02*

Marie
v./v.a. Charcot-Marie-Tooth
v./v.a. Foix-Chavany-Marie
- Unna ¬ Hypotrichose type *Q84.0*

Marie-Bamberger ¬ Maladie de *M89.4*

Marie-Pierre II d'apparition tardive ¬ Syndrome de *G11.2*

Marin ¬
- Effet toxique
- - Contact avec d'autres animaux *T63.6*
- - Venin de serpent *T63.0*
- Envenimation suite à une morsure de serpent *T63.0*
- Peau de: *L57.8*

Marinesco-Sjögren ¬ Syndrome de *G11.1*

Marinum ¬ Infection par Mycobacterium: *A31.1*

Marisques
- Hémorroïdaires ¬ *K64.4*
- Péri-anales ¬ *K64.4*
- Rectales ¬ *K64.4*

Markesbery-Griggs ¬ Myopathie distale tardive type *G71.08*

Markouizos
v./v.a. Qazi-Markouizos

Marks
v./v.a. Finlay-Marks

Marmorata telangiectatica
- Congenita ¬
- - Cutis *Q27.8*
- - Syndrome
- - - Macrocéphalie-cutis *Q87.3*
- - - Mégalencéphalie-cutis *Q87.3*
- Congenitale] ¬ Syndrome de Van Lohuizen [Cutis *Q27.8*

Maroteaux
- Lamy (léger) (sévère) ¬ Syndrome de: *E76.2*
- ¬
- - Brachyolmie type *Q76.4*
- - Dysplasie acromésomélique type *Q77.8*
- - Dysplasie spondylo-épiphysaire type *Q77.7*

Maroteaux-Stanescu-Cousin ¬ Syndrome de *Q78.8*

Marques de Catlin ¬ *Q75.8*

Marqueur
- Chaînes Gamma] ¬ Gangliosidose GM [*E75.1*
- Hétérochromatine ¬ Sujet avec *Q95.4*
- Structurel
- - Sans précision ¬ Réarrangement équilibré et *Q95.9*
- - ¬ Autres réarrangements équilibrés et *Q95.8*
- Supplémentaires ¬ Chromosomes *Q92.6*

MARS à début précoce ¬ Protéinose alvéolaire pulmonaire sévère par déficit en *J84.00*

Marshall ¬ Syndrome de *Q87.0*

Marshall-Smith ¬ Syndrome de *Q87.3*

Marsidi
v./v.a. Juberg-Marsidi

Marsili ¬ Syndrome de *G60.8*

Marteau
- Acquis) ¬ Autre(s) orteil(s) en *M20.4*
- Congénital ¬ Orteil en *Q66.8*
- Piqueur ¬ Syndrome de: *T75.2*

Martin-Bell ¬ Syndrome de *Q99.2*

Martorell
v./v.a. Servelle-Martorell

Martsolf ¬ Syndrome de *Q87.8*

Masculin
v./v.a. Type de maladie

Masochisme ¬
- *F65.5*
- Sado- *F65.5*

Mason
v./v.a. Wyburn-Mason

MASP-2 ¬ Immunodéficience par déficit en *D84.1*

Masquant les raisons de la consultation et gênant le contact ¬ Prolixité et détails *R46.7*

Masquée» SAI ¬ Episodes isolés d'une dépression « *F32.8*

Masse
v./v.a. Indice de masse corporelle
- Intra-abdominales et pelviennes ¬ Tuméfaction et *R19.0*
- Localisées peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Niveau
- - - Cou ¬ Tuméfaction et *R22.1*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Tuméfaction et *R22.4*
- - - - Supérieur ¬ Tuméfaction et *R22.3*
- - - Tête ¬ Tuméfaction et *R22.0*
- - - Tronc ¬ Tuméfaction et *R22.2*
- - Sans précision ¬ Tuméfaction et *R22.9*
- - Sièges multiples ¬ Tuméfaction et *R22.7*
- Pulmonaire SAI ¬ *R91*
- Télangiectasiques périphériques ¬ *D31.2*

Massif
v./v.a. Type de maladie

Masson ¬ Tumeur de *D18.00*

Mastectomie
- Partielle
- - Lymphadénectomie stade
- - - I ¬ Lymphœdème après *I97.20*
- - - II ¬ Lymphœdème après *I97.21*
- - - III ¬ Lymphœdème après *I97.22*
- - Sans précision ¬ Lymphœdème après *I97.29*
- ¬
- - Éléphantiasis après *I97.22*
- - Oblitération des vaisseaux lymphatiques suite à *I97.2*

Masters] ¬ Syndrome de déchirure du ligament large [Allen- *N83.8*

Mastication ¬ Difficultés de *R19.88*

Mastite
- Aiguë subaiguë non puerpérale
- - Infectieuse ¬ *N61*
- - SAI ¬ *N61*
- Granulomateuse ¬ *N61*
- Infectieuse néonatale ¬ *P39.0*
- Interstitielle gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*
- Non
- - Infectieuse du nouveau-né ¬ *P83.4*
- - Purulente associée à l'accouchement ¬ *O91.2*
- Parenchymateuse gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*
- Purulente gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ *O91.1*
- SAI gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*

Mastocytaire
- Monoclonal ¬ Syndrome d'activation *D89.8*
- SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non *D47.0*
- ¬ Sarcome *C96.2*

Mastocytes
- Évolution imprévisible et inconnue ¬ Tumeurs à histiocytes et *D47.0*
- Rémission complète ¬ Leucémie à *C94.31*
- SAI ¬ Tumeur à *D47.0*
- Tissulaires ¬ Maladie systémique due aux *D47.0*
- ¬
- - Leucémie à *C94.30*
- - Sarcome à *C96.2*
- - Tumeur maligne à *C96.2*
- - Variante aleucémique de la leucémie à *C94.30*

Mastocytome
- Cutané ¬ *Q82.2*
- Extra-cutané ¬ *C96.2*
- SAI ¬ *D47.0*

Mastocytose
- Congénitale) ¬ *Q82.2*
- Cutané
- - Diffuse ¬ *Q82.2*
- - Maculeuse télangiectasique ¬ *Q82.2*
- - Surdité-microtia syndrome ¬ *Q87.8*
- - ¬ *Q82.2*
- Isolée de la moelle osseuse ¬ *D47.0*
- Systémique
- - Agressive ¬ *C96.2*
- - Associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ *D47.0*
- - Indolente ¬ *D47.0*
- - Type smoldering ¬ *D47.0*
- - ¬ *D47.0*

Mastodynie ¬ *N64.4*

Mastoïde
- Actes médical

Mastoïde *–suite*
- Actes médical *–suite*
- - Sans précision ¬ Affection de l'oreille et de l'apophyse *H95.9*
- - ¬ Autres affections de l'oreille et de l'apophyse *H95.8*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse *H75.8**
- Sans précision ¬ Affection de l'oreille moyenne et de l'apophyse *H74.9*
- ¬
- - Abcès de la *H70.0*
- - Affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse *H74.8*
- - Carie tuberculeuse de l'apophyse *A18.0†, H75.0**
- - Empyème de la *H70.0*
- - Fistule de la *H70.1*
- - Ostéite mastoïdienne [carie osseuse de la *H70.1*

Mastoïdectomie ¬
- Affections survenant après *H95.1*
- Cholestéatome récidivant après *H95.0*
- Granulome après *H95.1*
- Inflammation chronique après *H95.1*
- Kyste muqueux après *H95.1*

Mastoïdien
- Carie osseuse de la mastoïde] ¬ Ostéite *H70.1*
- Congénitale) ¬ Tuméfaction sterno- *Q68.0*
- ¬
- - Cellules *C30.1*
- - Torticolis congénital (sterno- *Q68.0*

Mastoïdite
- Affections apparentées ¬ Autres *H70.8*
- Aiguë ¬ *H70.0*
- Chronique ¬ *H70.1*
- Cours
- - Maladie
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, H75.0**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, H75.0**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H75.0**
- Sans précision ¬ *H70.9*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, H75.0**

Mastopathie
- Associées à l'accouchement, autres et sans précision ¬ *O92.2*
- Fibrokystique ¬ *N60*
- Grade
- - I ¬ *N60.1*
- - II ¬ *N60.3*
- - III ¬ *N60.3*
- Kystique
- - Diffuse ¬ *N60.1*
- - Prolifération épithéliale ¬ *N60.3*

Masturbation excessive ¬ *F98.88*

Materia alba ¬ Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*

Matériel brûlant ¬ Brûlure ou échaudage par : Autre *X19.9!*

Maternel
- Cours du travail et de l'accouchement ¬ Épuisement *O75.0*
- Généralement rétréci ¬ Soins maternels pour disproportion due à un bassin *O33.1*
- Riboflavine ¬ Lésion du fœtus par déficit *P00.4*
- Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif *P04.9*
- ¬
- - Hématémèse et mélæna néonatals dus à une déglutition de sang *P78.2*
- - Ictère néonatal dû à une déglutition de sang *P58.5*
- - Soin
- - - Examens de l'allaitement *Z39.1*
- - - Maternels
- - - - Disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin *O33.2*
- - - - Lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme *O35.4*

Materno fœtale
- Néonatale allo-immune ¬ Thrombopénie *P61.0*
- ¬ Transfusion (de): *O43.0*

Mathieu
v./v.a. Piussan-Lenaerts-Mathieu

Matière
- Fécale ¬
- - Anomalies des *R19.5*
- - Incontinence des *R15*
- Procréation ¬ Conseils et avis généraux en *Z31.6*
- Sexualité ¬ conseil
- - Relatif au comportement ou à l'orientation de tiers en *Z70*
- - Relatifs aux attitudes, comportement et orientation en *Z70*
- Vaccination
- - Voyageurs ¬ Conseil en *Z71*
- - ¬ Conseil en *Z71*

Matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de *Y35.7!*

Matricome onychocytique
- Ongle
- - Orteil ¬ *D23.7*
- - ¬ *D23.6*
- ¬ *D23.9*

Matthew-Wood ¬ Syndrome de *Q11.2*

Maturation
- Lipase] ¬ Déficit familial en LMF1 [facteur 1 de *E78.3*
- Osseuse accélérée-dysmorphie faciale-retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Retardée ¬ *R62.0*

Maturation *–suite*
- Sexuelle ¬ Trouble de la *F66.0*
- ¬ Leucémie myéloïde aiguë (avec *C92.0*

Matures
- Sans précision ¬ Lymphome à cellules T/NK *C84.9*
- Type Burkitt
- - Rémission complète ¬ LLA-B à cellules *C91.81*
- - ¬ LLA-B à cellules *C91.80*
- ¬
- - Lymphomes à cellules T/NK *C84.5*
- - Tératome testiculaire adulte bénin à cellules *D29.2*

Maturity onset diabetes of young people
- Acidocétose ¬ MODY [*E11.11*
- Coma ¬ MODY [*E11.01*
- Complication
- - Décompensé ¬ MODY [*E11.81*
- - Multiples
- - - Décompensé ¬ MODY [*E11.73*
- - - ¬ MODY [*E11.72*
- - Oculaire
- - - Décompensé ¬ MODY [*E11.31†, H58.8**
- - - ¬ MODY [*E11.30†, H58.8**
- - Rénales
- - - Décompensé ¬ MODY [*E11.21†, N08.3**
- - - ¬ MODY [*E11.20†, N08.3**
- - ¬ MODY [*E11.80*
- Complication neurologique
- - Décompensé ¬ MODY [*E11.41†, G63.2**
- - ¬ MODY [*E11.40†, G63.2**
- Complication vasculaire périphérique
- - Décompensé ¬ MODY [*E11.51*
- - ¬ MODY [*E11.50*
- Hypoglycémie ¬ MODY [*E11.60*
- Polyneuropathie
- - Décompensé ¬ MODY [*E11.41†, G63.2**
- - ¬ MODY [*E11.40†, G63.2**
- Sans complication
- - Décompensé ¬ MODY [*E11.91*
- - ¬ MODY [*E11.90*
- Syndrome pied diabétique
- - Décompensé ¬ MODY [*E11.75*
- - ¬ MODY [*E11.74*
- Type 5] ¬ MODY5 [*E11.20†, N29.8**
- ¬
- - *E11.90*
- - Choc hypoglycémique au cours de diabète MODY [*E11.61*
- - Coma hypoglycémique au cours de diabète MODY [*E11.61*
- - MODY [*E11.90*

Mauclaire] ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): têtes métacarpiennes [*M92.2*

Maux de tête dus à l'histamine ¬ *G44.0*

Maxillaire
- Aiguë ¬ Sinusite *J01.0*
- Antérieure-strabisme-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de protrusion *Q87.8*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.0*
- Extension dans la fosse canine ¬ Abcès *K10.21*
- Genu valgum ¬ Syndrome de pseudoanodontie-hypoplasie *K07.8, Q74.1*
- Inférieur
- - Angle maxillaire ¬ Fracture du *S02.65*
- - Apophyse
- - - Condylienne ¬ Fracture du *S02.61*
- - - Coronoïde ¬ Fracture du *S02.63*
- - Branche maxillaire, SAI ¬ Fracture du *S02.64*
- - Maxillaire, autre partie ou partie non précisée ¬ Fracture du *S02.68*
- - Partie non précisée ¬ Fracture du *S02.60*
- - Parties multiples ¬ Fracture du *S02.69*
- - Sub-condylienne ¬ Fracture du *S02.62*
- - Symphyse maxillaire ¬ Fracture du *S02.66*
- - ¬
- - - *C41.1*
- - - Adamantinome du *D16.5*
- - - Améloblastome du *D16.5*
- - - Fibrome
- - - - Chondromyxoïde du *D16.5*
- - - - Ossifiant familial du *D16.5*
- - - Fracture de la partie alvéolaire du *S02.67*
- - - Ostéosarcome du *C41.1*
- - - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.5*
- Inférieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Région *S01.43*
- Joue ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.41*
- Partie ou partie non précisée ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.68*
- Parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.49*
- Région maxillaire
- - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.43*
- - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.42*
- SAI ¬
- - Fracture du maxillaire inférieur: Branche *S02.64*
- - Sinusite *J32.0*
- Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ Abcès *K10.20*
- Supérieur ¬
- - *C41.0*
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - Adamantinome du *D16.42*
- - Améloblastome maligne du *C41.02*

Maxillaire *–suite*
- Supérieur ¬ *–suite*
- - Carcinome améloblastique du *C41.02*
- - Chondrosarcome du *C41.02*
- - Dysplasie osseuse floride du *D16.42*
- - Fibrosarcome
- - - Améloblastique du *C41.02*
- - - Odontogène du *C41.02*
- - Fracture
- - - *S02.48*
- - - Alvéole du *S02.43*
- - - Partie alvéolaire du *S02.43*
- - Odontosarcome du *C41.02*
- - Ostéoblastome du *D16.42*
- - Ostéosarcome du *C41.02*
- - Sarcome d'Ewing du *C41.02*
- Supérieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Région *S01.42*
- Sur racines dentaires ¬ Présence d'implants *Z96.5*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde du sinus *C31.0*
- - Dysplasie cémento-osseuse floride du *D16.42*
- - Fermeture anormale des *K07.5*
- - Fracture
- - - Éminence du *S02.48*
- - - Maxillaire inférieur
- - - - Angle *S02.65*
- - - - Symphyse *S02.66*
- - - Os malaire et *S02.49*
- - - Ouverte du *S02.48, S01.87!*
- - Hyperplasie, hypoplasie: *K07.0*
- - Kératokyste odontogène du *D16.42*
- - Kyste (de): latent des *K10.0*
- - Macrognathie (mandibulaire) (*K07.0*
- - Malformation artério-veineuse du *Q27.3*
- - Mélanome malin de la muqueuse du sinus *C31.0*
- - Micrognathie (mandibulaire) (*K07.0*
- - Ostéoblastome du *D16.42*
- - Polypes du sinus (de): *J33.8*
- - Prognathie (mandibulaire) (*K07.1*
- - Rétrognathie (mandibulaire) (*K07.1*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire du sinus *C31.0*
- - Sarcome du *C41.1*
- - Séquestre du *K10.2*
- - Tumeur odontogène kératokystique du *D16.42*

Maxillofacial ¬
- Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.42*
- Tumeur maligne os
- - *C41.02*
- - Cartilage articulaire: *C41.02*

Maximum ¬
- Brûlure parties multiples corps indication degré
- - 2a au *T29.20*
- - 2b au *T29.21*
- Corrosion parties multiples corps indication degré 2a
- - *T29.60*
- - *T29.61*

Mayer
v./v.a. Graham-Burford-Mayer

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser type 1 ¬ Syndrome de *Q51.8*

May-Hegglin ¬
- MHA [Anomalie de *D72.0*
- Syndrome de *D72.0*
- Thrombopénie de *D72.0*

Mayou
v./v.a. Batten-Mayou

May-Thurner ¬ Syndrome de *I87.1*

Mazabraud ¬ Syndrome de *Q78.1, D21.9*

MBD4 ¬
- Leucémie myéloïde aiguë au cours de syndrome de prédisposition tumorale liée au gène *C92.00*
- Syndrome myélodysplasique au cours de syndrome de prédisposition tumorale liée au gène *D46.9*

MCAD ¬ Déficit en *E71.3*

McAlpine
v./v.a. Hunter-McAlpine

McArdle ¬ Maladie de: *E74.0*

McArdle-Schmidt-Pearson ¬ Syndrome de *E74.0*

MCC ¬ Déficit en *E71.1*

McCarthy
v./v.a. Forster-McCarthy-Berry

McCort
v./v.a. Smith-McCort

McCullough
v./v.a. Chudley-McCullough

McCune-Albright ¬ Syndrome de *Q78.1*

McDonough ¬ Syndrome de *Q87.8*

McFarlane
v./v.a. Oliver-McFarlane

McGillivray ¬ Scaphocéphalie familiale type *Q75.0*

McGrath ¬ Syndrome de *Q81.0*

MCJ sporadique ¬ *A81.0*

McKusick
v./v.a. Mengel-Konigsmark-Berlin-McKusick
- Déficit immunitaire ¬ Chondrodysplasie métaphysaire de type *Q78.5, D82.2*
- ¬ Chondrodysplasie métaphysaire type *Q78.5*

McKusick-Kaufman ¬ Syndrome de *Q87.8*

McLachlan
v./v.a. Fitzsimmons-McLachlan-Gilbert

McLeod
v./v.a. O'Sullivan-McLeod
- ¬ Syndrome neuroacanthocytaire de *E78.6*

MCM4 ¬ Déficit immunitaire primaire par déficit en *D84.8*

McMillin
v./v.a. Johnson-McMillin

MCTD [Mixed connective tissue disease] ¬ *M35.1*

MDPL ¬ Syndrome [d'hypoplasie mandibulaire-surdité-apparence progéroïde-lipodystrophie] *E34.8*

MDR-TB] ¬ Tuberculose multirésistante [*U82.1!*

Meacham ¬ Syndrome de *Q87.8*

Meadows ¬ Syndrome de *O90.3*

MEAP [méningo-encéphalite amibienne primitive] ¬ *B60.2†, G05.2**

Meara
v./v.a. Dowling-Meara

Méat
- Auditif osseux ¬ Atrésie ou rétrécissement du *Q16.1*
- Trou d'épingle [sténopéique] SAI ¬ *N35.9*
- Urinaire
- - Congénital(e) ¬ Rétrécissement de: *Q64.3*
- - Double ¬ *Q64.7*
- - ¬
- - - Atrésie du *Q64.3*
- - - Prolapsus congénital de: *Q64.7*
- ¬ Ulcère de l'urètre (*N34.2*

Méatite urétrale ¬ *N34.2*

Mécanique
v./v.a. Type de maladie

Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral occlusion sténose
- Artères cérébrales, de *I63.5*
- Artères précérébrales, de *I63.2*

Mèches blanches avec dysmorphies faciales et malformations oculaires, cardiopulmonaires et squelettiques ¬ Syndrome de *Q87.8*

Meckel
- Gruber ¬ Syndrome de *Q61.9*
- Type 7 ¬ Syndrome de *Q61.9*
- ¬
- - Adénocarcinome d'un diverticule de *C17.3*
- - Carcinome épidermoïde du diverticule de *C17.3*
- - Diverticule de *Q43.0*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] d'un diverticule de *C17.3*
- - Léiomyosarcome d'un diverticule de *C17.3*

Méconial
- Absence reconnue de fibrose kystique du pancréas ¬ Iléus *P76.0*
- Cours de fibrose kystique ¬ Iléus *E84.1†, P75**
- Déficit en guanylate cyclase 2C ¬ Iléus *P76.0*
- ¬
- - Mucoviscidose avec iléus *E84.1†, P75**
- - Péritonite *P78.0*

Méconial *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pneumonie *P24.0*
- - Syndrome du bouchon *P76.0*

Méconium
- Liquide amniotique ¬
- - Présence de *P20*
- - Travail accouchement compliqué
- - - Anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de *O68.2*
- - - Présence de *O68.1*
- ¬
- - Aspiration
- - - *P24.0*
- - - Néonatale de *P24.0*
- - Émission de *P20*

MECP2 ¬ Encéphalopathie congénitale sévère due à une mutation du gène *G93.4, Q02*

Médecine
- Intensive ¬ État après un traitement de *U70.0!*
- Travail ¬ Examen de *Z10*

Medeira-Dennis-Donnai ¬ Syndrome de *Q87.5*

Media
- Artérielle ¬ Dégénérescence de la *I70.29*
- ¬
- - Artériosclérose de la *I70.29*
- - Sclérose
- - - *I70.29*
- - - Mönckeberg (de la *I70.2*

Médial
- Causant un rapprochement des dents ¬ Dent *K07.3*
- Genou ¬ Distorsion du ligament collatéral *S83.42*
- Tibia ¬ Condyles latéral ou *S82.1*
- ¬
- - Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle *S42.43*
- - Maladie d'Ahlbäck [ostéonécrose aseptique de la tête fémorale *M87.05*

Médian
- Arcade dentaire ¬ Déviation *K07.2*
- Bassin) entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement de: cavité *O33.3*
- Clavicule ¬ Ostéite condensante *M85.31*
- E face cou ¬
- - Fistule *Q18.8*
- - Kyste *Q18.8*
- - Sinus *Q18.8*
- Holoprosencéphalie ¬ Variant interhémisphérique *Q04.2*
- Labio-mandibulaire ¬ Fente *Q36.1*
- Lèvre
- - Mâchoire supérieure ¬ Fente *Q37.5*
- - Supérieure ¬ Nodule congénital *Q38.0*

Médian *–suite*
- Nez ¬ Dysplasie sus-apicale *Q18.8*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S54.1*
- - Bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S44.1*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du nerf *S64.1*
- NUT Nuclear protein in testis
- - Base de la langue ¬ Carcinome de la ligne *C01*
- - Cou ¬ Carcinome de la ligne *C76.0*
- - Médiastin
- - - Antérieur ¬ Carcinome de la ligne *C38.1*
- - - Postérieur ¬ Carcinome de la ligne *C38.2*
- - - ¬ Carcinome de la ligne *C38.3*
- - Rein ¬ Carcinome de la ligne *C64*
- - Rhinopharynx ¬ Carcinome de la ligne *C11.9*
- - Sinus
- - - Ethmoïdal ¬ Carcinome de la ligne *C31.1*
- - - Frontal ¬ Carcinome de la ligne *C31.2*
- - - Sphénoïdal ¬ Carcinome de la ligne *C31.3*
- - Thorax ¬ Carcinome de la ligne *C76.1*
- - Vessie ¬ Carcinome de la ligne *C67.9*
- - Vulve ¬ Carcinome de la ligne *C51.9*
- - ¬ Carcinome de la ligne *C80.9*
- SAI ¬ Nerf *S54.1*
- Tibia proximal ¬ Luxation du genou: Luxation *S83.13*
- Voile du palais ¬ Fente *Q35.3*
- ¬
- - Entorse foulure Ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament *S83.44*
- - - Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament *S83.42*
- - Fente
- - - Cervicale *Q18.8*
- - - Labiale *Q36.1*
- - - Palatine et vélaire *Q35.5*
- - Fracture
- - - Clavicule: Tiers *S42.01*
- - - Doigt: Phalange *S62.62*
- - - Extrémité inférieure du fémur: Condyle (latéral) (*S72.41*
- - - Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (*S92.23*
- - Glossite losangique *K14.2*
- - Granulome létal de la ligne *C86.0*
- - Lésions du nerf *G56.1*
- - Luxation du coude autre et non précisée: *S53.13*

Médianécrose kystique de l'aorte ¬ *I71.00*

Médias ¬ Trouble lié à l'utilisation des *F63.8*

Médiastin
- Antérieur ¬

Médiastin *–suite*
- Antérieur ¬ *–suite*
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] du *C38.1*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des tissus mous du *C38.1*
- - Tumeur maligne: *C38.1*
- Non classées ailleurs ¬ Autres maladies du *J98.58*
- Partie non précisée ¬ Tumeur maligne: *C38.3*
- Plèvre ¬ Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du cœur, du *C38.8*
- Postérieur ¬
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] du *C38.2*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des tissus mous du *C38.2*
- - Tumeur maligne: *C38.2*
- ¬
- - Abcès du *J85.3*
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] du *C38.3*
- - Déplacement du *J98.58*
- - Kyste congénital du *Q34.1*
- - Mésothéliome du *C45.7*
- - Primo-infection tuberculeuse du *A16.7*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des tissus mous du *C38.3*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, J99.8**
- - Tumeur bénigne: *D15.2*
- - Tumeur maligne secondaire du *C78.1*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D38.3*

Médiastinal
v./v.a. Lymphome médiastinal
- Confirmation bactériologique
- - Biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A15.4*
- - Histologique ¬
- - - Primo-infection tuberculeuse des ganglions *A15.7*
- - - Tuberculose *A15.8*
- Parapharyngé cervicale ¬ Abcès sous-mandibulaire
- - Indication d'extension *K12.22*
- - Sans indication d'extension *K12.21*
- Primitif à grandes cellules ¬ Lymphome B *C85.2*
- Syphilitique ¬ Anévrisme *A52.0†, I79.8**
- ¬
- - Déviation *R93.8*
- - Emphysème *J98.2*
- - Fibrose *J98.58*
- - Fistule *J86.08*
- - Germinome *C38.3*
- - Hernie *J98.58*
- - Lymphadénopathie *R59.0*
- - Métastase ganglionnaire *C77.1*

Médiastinal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Primo-infection tuberculeuse d'un ganglion *A16.7*
- - Tuberculose
- - - *A16.8*
- - - Ganglionnaire *A16.3*

Médiastinale
v./v.a. broncho-pleuro-médiastinale

Médiastinite
- Associée à IgG4 ¬ *J98.50*
- Syphilitique
- - Tardive ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tuberculeuse
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - Primaire ¬ *A16.7*
- - ¬ *A16.8*
- ¬ *J98.50*

Médiastino péricardite
- Adhésive ¬ *I31.0*
- Rhumatismale chronique ¬ *I09.2*

Médiation
- Auto-immune ¬ Myopathie nécrosante à *G72.4*
- Cellulaire limitée ¬ Infection à cytomégalovirus lors d'une immunité à *B25.9, D84.9*

Médical
- Appareil auxiliaire non précisé ¬ Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil *Z99.9*
- Appareils auxiliaires ¬ Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils *Z99.8*
- Cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou *Y84.9!*
- Chirurgicaux
- - Non classées ailleurs ¬ Autres complications précisées de soins *T88.8*
- - ¬ Accidents et complications au cours d'actes *Y69!*
- Complications autres et non précisées ¬ Échec d'une tentative d'avortement *O07.3*
- Compliqué
- - Embolie ¬ Échec d'une tentative d'avortement *O07.2*
- - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Échec d'une tentative d'avortement *O07.1*
- - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Échec d'une tentative d'avortement *O07.0*
- Enfant
- - Bonne santé selon circonstances
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance *Z76.2*

Médical *–suite*
- Enfant *–suite*
- - Bonne santé selon circonstances *–suite*
- - - Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance *Z76.2*
- - - Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance *Z76.2*
- - - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance *Z76.2*
- - Trouvés ¬ Surveillance médicale et soins *Z76.1*
- Général ¬ Examen *Z00.0*
- Implantés ¬ Adaptation et manipulation d'autres appareils *Z45.88*
- Infirmiers surveillance médical enfant bonne santé selon circonstances
- - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins *Z76.2*
- - Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins *Z76.2*
- - Maladie de la mère ¬ Soins *Z76.2*
- - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins *Z76.2*
- Mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions *P00.7*
- Non
- - Classées ¬
- - - Atteintes de l'appareil digestif après des actes *K91.88*
- - - Séquelles de complications de soins chirurgicaux et *T98.3*
- - Classés ailleurs ¬ Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis *Z71*
- Nourrissons et enfants en bonne santé ¬ Surveillance médicale et soins *Z76.2*
- Précisés ¬ Autres traitements *Z51.88*
- Prise de contact à des fins administratives ¬ Examen *Z02*
- Régime ¬ Antécédents personnels de non-observance d'un traitement *Z91.1*
- SAI ¬ Échec d'une tentative d'avortement *O07.4*
- Sans
- - Complication ¬ Échec d'une tentative d'avortement *O07.4*
- - Précision ¬
- - - Affection
- - - - Appareil génito-urinaire après des actes *N99.9*
- - - - Œil et de ses annexes après des actes *H59.9*
- - - - Oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes *H95.9*
- - - - Système ostéo-articulaire et des muscles après des actes *M96.9*
- - - Anomalie endocrinienne et métabolique après des actes *E89.9*

Médical *–suite*
- Sans *–suite*
- - Précision ¬ *–suite*
- - - Antécédents personnels de traitement *Z92.9*
- - - Atteinte de l'appareil digestif après des actes *K91.9*
- - - Complication de soins chirurgicaux et *T88.9*
- - - Incidents dus à des mesures *Y84.9!*
- - - Soin *Z51.9*
- - - Thérapie sans raison *Z41.9*
- - - Trouble respiratoire après des actes *J95.9*
- - Précisions ¬ Conseil et surveillance pour: Conseil *Z71*
- Soin
- - Médical
- - - Enfants trouvés ¬ Surveillance *Z76.1*
- - - Nourrissons et enfants en bonne santé ¬ Surveillance *Z76.2*
- - Santé
- - - Sans précision ¬ Difficulté liée aux installations *Z75.9*
- - - ¬ Autres difficultés liées aux installations *Z75.8*
- Spécifiques, non effectués ¬ Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes *Z53*
- Traitement ¬ surveillance
- - *Z08*
- - *Z09*
- Travail ¬ Échec du déclenchement *O61.0*
- ¬
- - Abcès
- - - Intra-abdominal après des actes *T81.4*
- - - Plaie après des actes *T81.4*
- - - Sous-phrénique après des actes *T81.4*
- - - Sutures après des actes *T81.4*
- - Adhérences pelvi-péritonéales après des actes *N99.4*
- - Affections
- - - Appareil génito-urinaire après des actes *N99.8*
- - - Œil et de ses annexes après des actes *H59.8*
- - - Oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes *H95.8*
- - - Système
- - - - Nerveux après des actes *G97.8*
- - - - Ostéo-articulaire et des muscles après des actes *M96.88*
- - Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes *E89.8*
- - Antécédents personnels d'autres traitements *Z92.8*
- - Avortement *O04*
- - Complication vasculaire à la suite d'actes *I97.9*
- - Établissement d'un certificat *Z02*

Médical *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hypofonctionnement
- - - Corticosurrénal (de la médullaire) après des actes *E89.6*
- - - Testiculaire après des actes *E89.5*
- - Hypoinsulinémie après des actes *E89.1*
- - Hypoparathyroïdie après des actes *E89.2*
- - Hypopituitarisme après des actes *E89.3*
- - Hypothyroïdie après des actes *E89.0*
- - Incidents dus à des appareils ou à des produits *Y82.8!*
- - Insuffisance ovarienne après des actes *E89.4*
- - Insuffisance pulmonaire après des mesures *J95.88*
- - Insuffisance rénale après des actes *N99.0*
- - Maladies
- - - Système nerveux après des actes *G97.88*
- - - Voies respiratoires après des actes *J95.88*
- - Pseudoméningocèle après des actes *G97.88*
- - Rétrécissement urétral après des actes *N99.18*
- - Septicémie après des actes *T81.4*
- - Sténose
- - - Sous-glottique après des actes *J95.5*
- - - Trachéale après des actes *J95.81*
- - Thérapies sans raison *Z41.8*

Médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée *U69.10!*

Médicament
- Absorbés par la mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P04.1*
- Action similaire ¬ Intoxication: Glucosides cardiotoniques et *T46.0*
- Agissant
- - Essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision ¬ Intoxication: *T44.9*
- - Sur
- - - Fibrinolyse ¬ Intoxication: *T45.6*
- - - Métabolisme de l'acide urique ¬ Intoxication: *T50.4*
- - - Protozoaires du sang ¬ Intoxication: Antipaludiques et *T37.2*
- Antiallergiques et antiémétiques ¬ Intoxication: *T45.0*
- Antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T49.0*
- Antithyroïdiens ¬ Hypothyroïdie congénitale due à une exposition maternelle aux *P72.2*
- Antitumoraux et immunosuppresseurs ¬ Intoxication: *T45.1*

Médicament *–suite*
- Approprié à l'indication et correctement administrés ¬ Anurie due aux sulfamides utilisés comme un *R34, Y57.98!*
- Atonie intestinale ¬ *T47.4*
- Causes externes ¬ Myocardiopathie due à des *I42.7*
- Contact peau ¬ Dermite
- - Allergique de contact due à des *L23.3*
- - Contact, sans précision, due à des *L25.1*
- - Irritante de contact due à des *L24.4*
- Contre le coryza [rhume banal] ¬ Intoxication: *T48.5*
- Cytotoxique ¬
- - *P04.1*
- - Alopécie due à un *L65.8*
- - Hypotrichose due à un *L65.8*
- Déclencheurs de contractions ¬ Hyperactivité de l'utérus due à une stimulation excessive par des *O62.8, Y57.98!*
- Dentaires à usage topique ¬ Intoxication: *T49.7*
- Drogue
- - Substances biologiques actives ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- - Toxines et des rayonnements [DPAH] ¬ Hypertension artérielle pulmonaire induite par des *I27.02*
- - ¬
- - - Complications dues à des *Y57.9!*
- - - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- - - Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de *Z72.0*
- - - Prise excessive (overdose) accidentelle d'un *X49.9!*
- Drug fever] ¬ Fièvre due à des *R50.2*
- Effet stabilisant de membrane ¬ Intoxication aiguë par les *T50.9*
- Facilitant la digestion ¬ Intoxication: *T47.5*
- Implantée ¬
- - Ajustement d'une pompe à *Z45.1*
- - Entretien d'une pompe à *Z45.1*
- Non précisées ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.19*
- Nouveau-né ¬ Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de *P96.2*
- Phase critique
- - 4 jours
- - - 7 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.13*
- - - ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.10*
- - 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.14*
- Première ligne ¬
- - Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs *U82.2!*

Médicament *–suite*

- Première ligne ¬ *–suite*
- - Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs *U82.0!*
- - Tuberculose avec résistance au *A16.9, U82.0!*
- Préparation
- - Capillaires ¬ Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres *T49.4*
- - Ophtalmologiques ¬ Intoxication: *T49.5*
- - Utilisés en oto-rhino-laryngologie ¬ Intoxication: *T49.6*
- Produit
- - Chimiques ¬ Sclérose systémique due à des *M34.2*
- - Exogènes ¬ Hypothyroïdie due à des *E03.2*
- Psychotrope
- - Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T43.8*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T43.9*
- SAI ¬
- - Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.19*
- - Hypersensibilité à un *T88.7*
- - Réaction à un *T88.7*
- - Somnifères: *T42.7*
- Sans précision ¬ Effet indésirable d'un *T88.7*
- Stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques ¬ *T44.9*
- Substance biologique
- - Sans précision ¬
- - - Antécédents personnels d'allergie à un *Z88.9*
- - - Intoxication: *T50.9*
- - - Néphropathie due à un *N14.2*
- - ¬
- - - Antécédent personnel allergie
- - - - *Z88.8*
- - - - *Z91.0*
- - - Augmentation dans les urines du taux de *R82.5*
- - - Néphropathie due à d'autres *N14.1*
- - - Séquelles d'intoxications par *T96*
- Toxicomanie ¬ Conseil et surveillance pour: abus de *Z71*
- Toxines
- - Transmis par la mère ou administrés au nouveau-né ¬ Ictère néonatal dû à des *P58.4*
- - ¬ Anémie sidéroblastique secondaire, due à des *D64.2*
- ¬
- - Administration accidentelle ou prise erronée d'un *X49.9!*
- - Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.1*
- - Anémie hémolytique auto-immune, due à des *D59.0*
- - Anémie par carence en acide folique due à des *D52.1*

Médicament *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Antécédents personnels d'utilisation à long terme des *Z92.2*
- - Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à *Z45.1*
- - Dermite de contact toxique par contact cutané avec un *L24.4*
- - Détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de *O68*
- - Diarrhée due aux *K52.1*
- - Effets résiduels dus aux *T88.7*
- - Érosion des dents: due à: *K03.2*
- - Éruption
- - - Généralisée due à des *L27.0*
- - - Localisée due à des *L27.1*
- - Exanthème toxique dû au contact de la peau avec un *L24.4*
- - Formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.18*
- - Granulocytopénie induite par des *D70.19*
- - Hépatite due aux *K71.6*
- - Hypertension artérielle pulmonaire due à des *I27.02*
- - Hypoglycémie réactive non induite par les *E16.1*
- - Insuffisance hépatique due aux *K71.9*
- - Mise en observation pour suspicion de: effet indésirable d'un *Z03.6*
- - Nécrose de la mâchoire due à des *K10.28*
- - Réaction
- - - Photoallergique à un *L56.1*
- - - Phototoxique à un *L56.0*
- - Rééducation des drogués et après abus de *Z50.3!*
- - Renouvellement d'une ordonnance pour: *Z76.0*
- - Syndromes secondaires parkinsoniens dus à des *G21.1*
- - Tremblement dû à des *G25.1*
- - Ulcère de l'œsophage: dû à l'ingestion de: *K22.1*
- - Vascularite induite par les *D69.0*
- - Voies de fait/agression par : *Y09.9!*

Médicamenteux

- Adulte ¬ Autres ostéomalacies *M83.5*
- Approprié correctement administrée ¬
- - Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance *T88.6*
- - Effet indésirable dû (due) à une substance *T88.7*
- - Hypersensibilité dû (due) à une substance *T88.7*
- - Idiosyncrasie dû (due) à une substance *T88.7*
- - Réaction allergique dû (due) à une substance *T88.7*
- Avant-bras ¬ Ostéonécrose *M87.13*
- Avasculaire secondaire non traumatique

Médicamenteux *–suite*

- Avasculaire secondaire non traumatique *–suite*
- - Localisations multiples ¬ Ostéonécrose *M87.10*
- - Tête du fémur ¬ Nécrose *M87.15*
- - ¬ Nécrose *M87.19*
- Bras ¬ Ostéonécrose *M87.12*
- Colonne vertébrale ¬ Ostéonécrose *M87.18*
- Cuisse ¬ Ostéonécrose *M87.15*
- Due à un traitement cytostatique ¬ Aplasie médullaire [anémie aplastique] *D61.10*
- Enfant
- - Adolescent ¬ Obésité *E66.14*
- - ¬ Lupus érythémateux disséminé *M32.0*
- Éosinophilie et symptômes systémiques ¬ Réaction *T88.7*
- Extrême chez l'enfant et l'adolescent ¬ Obésité *E66.15*
- Fœtus et du nouveau-né ¬ Réactions et intoxications *P93*
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose *M80.4*
- Grade
- - I (OMS) ¬ Obésité *E66.10*
- - II (OMS) ¬ Obésité *E66.11*
- - III (OMS) ¬ Obésité *E66.19*
- Indice de masse corporelle IMC
- - 40 et moins de 50 ¬ Obésité *E66.16*
- - 50 et moins de 60 ¬ Obésité *E66.17*
- - 60 et plus ¬ Obésité *E66.18*
- - Compris
- - - 30 et moins de 35 ¬ Obésité *E66.10*
- - - 35 et moins de 40 ¬ Obésité *E66.11*
- Jambe ¬ Ostéonécrose *M87.16*
- Localisations multiples ¬ Ostéonécrose *M87.10*
- Mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ Ostéonécrose (induite par la radiothérapie) (*K10.2*
- Main ¬ Ostéonécrose *M87.14*
- Non classée ailleurs ¬ Céphalée *G44.4*
- Pied ¬ Ostéonécrose *M87.17*
- Région de l'épaule ¬ Ostéonécrose *M87.11*
- Région pelvienne ¬ Ostéonécrose *M87.15*
- Sans
- - Coma ¬ Hypoglycémie *E16.0*
- - Précision ¬
- - - Affection pulmonaire interstitielle, *J70.4*
- - - Aplasie médullaire [anémie aplastique] *D61.19*
- Systémique ¬ Prophylaxie *Z29.21*
- Tics d'origine organique ¬ Tics *G25.6*
- ¬
- - Affections pulmonaires interstitielles
- - - Aiguës, *J70.2*
- - - Chroniques, *J70.3*
- - Akathisie (induite par le traitement) (*G25.88*

Médicamenteux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Alopécie androgénique *L64.0*
- - Antécédents personnels de fibrose pulmonaire d'origine *Z87.0*
- - Aplasie médullaire [anémie aplastique] *D61.18*
- - Asthme non allergique *J45.19*
- - Cataracte *H26.3*
- - Chorée *G25.4*
- - Constipation d'origine *K59.02*
- - Dystonie *G24.0*
- - Embolie cutanée *T80.1*
- - Érythème localisé *L27.1*
- - Fibrose
- - - Origine *M79.89*
- - - Poumon *J70.4*
- - Gastroentérite et colite *K52.1*
- - Glaucome *H40.6*
- - Goutte *M10.2*
- - Hypersensibilité *T88.7*
- - Hypopituitarisme *E23.1*
- - Hypotension *I95.2*
- - Insuffisance corticosurrénale *E27.3*
- - Insuffisance hépatique
- - - Aiguë) (chronique) *K71.1*
- - - Origine *K71.1, Y57.98!*
- - Lésion hépatique
- - - Idiosyncrasique (imprévisible) *K71*
- - - Toxique (prévisible) *K71*
- - Lipodystrophie localisée *E88.1*
- - Lupus érythémateux disséminé *M32.0*
- - Métaux de toutes origines, sauf substances *T56*
- - Mucite (orale) (oropharyngée) *K12.3*
- - Myélopathie: *G95.8*
- - Myoclonie *G25.3*
- - Myopathie *G72.0*
- - Myotonie: *G71.1*
- - Obésité *E66.19*
- - Ostéonécrose *M87.19*
- - Ostéoporose *M81.4*
- - Pancréatite aiguë *K85.3*
- - Pancytopénie *D61.1*
- - Pemphigus *L10.5*
- - Pneumopathie
- - - Aiguë d'origine *J70.2*
- - - Chronique d'origine *J70.3*
- - - Origine *J70.4*
- - Polynévrite *G62.0*
- - Réaction lichénoïde *L43.2*
- - Sclérose systémique *M34.2*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.5*
- - Syndrome de Cushing *E24.2*
- - Syndromes de sevrage lors de dépendance *F19.3*

Médicamenteux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Thyroïdite *E06.4*
- - Ulcère
- - - Duodénal d'origine *K26.9, Y57.98!*
- - - Estomac d'origine *K25.9, Y57.98!*
- - - Peptique d'origine *K27.9, Y57.98!*

Medich ¬ Macrothrombocytopénie de *D69.1*

Médiocarpienne ¬ Luxation du poignet: (Articulation) *S63.03*

Médiofaciale-surdité-elliptocytose-néphrocalcinose ¬ Syndrome d'hypoplasie *Q87.0*

Médiolyse artérielle segmentaire ¬ *I77.88*

Médiotarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (Articulation) *S93.32*

Méditerranéen
v./v.a. Fièvre méditerranéenne
- Hémoglobinopathie) ¬ Anémie *D56.9*
- Rémission complète ¬ Maladie immunoprolifératives de l'intestin grêle de type *C88.31*
- ¬
- - Anémie *D56.9*
- - Fièvre
- - - *A23*
- - - Boutonneuse *A77.1*
- - Lymphome *C88.30*

MEDNIK ¬ Syndrome *Q87.8*

Médullaire
v./v.a. Aplasie médullaire
v./v.a. Nécrose médullaire
- Actes médicaux ¬ Hypofonctionnement corticosurrénal (de la *E89.6*
- Anémie aplastique] acquises pures ¬ Autres aplasies *D60.8*
- Anormaux associée
- - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec éosinophiles *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22) ¬ Leucémie aiguë myéloïde avec éosinophiles *C92.50*
- Autosomique dominante
- - Hyperuricémie ¬ Maladie rénale kystique *Q61.5*
- - ¬ Maladie rénale kystique *Q61.5*
- Central ¬ Syndrome *S24.12*
- Diaphysaire-histocytome fibreux ¬ Syndrome de sténose *Q78.8, C49.9*
- Divisé ¬ Malformation du cordon *Q06.2*
- Dorsal ¬ Lipome *Q76.0*
- Dorsale sans autre précision ¬ Lésion *S24.10*
- Due à une toxicité ¬ Dépression *D61.9*
- Élargie-hydrocéphalie ¬ Syndrome de nævus en tache de vin-citerne cérébello- *Q04.8, Q82.5*
- Familial de la thyroïde ¬ Carcinome non *C73*
- Histiocytaire ¬ Réticulose *C96.8*
- Latéral ¬ Syndrome *I66.3†, G46.4**

Médullaire *–suite*
- Lombo-sacrée
- - L1 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.71!*
- - L2 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.72!*
- - L3 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.73!*
- - L4 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.74!*
- - L5 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.75!*
- - Niveau SAI ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.70!*
- - S1 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.76!*
- - S2-S5 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.77!*
- Lors de myélopathie vasculaire) ¬ Claudication intermittente *G95.18*
- Lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ Foyers osseux (*C79.5*
- Rein ¬ Kyste *Q61.5*
- Rémission complète ¬ Plasmocytome *C90.01*
- Sans précision ¬ Compression *G95.2*
- Surrénales ¬ Hyperplasie *E27.5*
- Thyroïde
- - Familial ¬ Cancer *C73*
- - ¬ Cancer *C73*
- Tuberculeux ¬ Abcès *A17.8†, G07**
- ¬
- - Carcinome rénal *C64*
- - Dépression *D61.9*
- - Hypoplasie *D61.9*
- - Lipome *Q76.0*
- - Paralysie *G83.8*
- - Rétrécissement du canal *M48.0*
- - Tuberculose *A17.8†, G07**

Medullaris] ¬ Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus *S34.0*

Médulloblastome
- Anaplasique ¬ *C71.6*
- Classique ¬ *C71.6*
- Cours de syndrome de déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements ¬ *C71.6*
- Nodularité extensive ¬ *C71.6*
- ¬ *C71.6*

Médulloépithéliome
- Cerveau ¬ *C71.0*
- Cervelet ¬ *C71.6*
- Corps ciliaire ¬ *C69.4*
- Intraoculaire ¬ *C69.9*
- Iris ¬ *C69.4*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*

Médulloépithéliome *–suite*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*
- Nerf optique ¬ *C72.3*
- Orbite ¬ *C69.6*
- Rétine ¬ *C69.2*
- Système nerveux central ¬ *C72.9*
- Tronc cérébral ¬ *C71.7*

Médullosurrénale ¬
- Ganglioneuroblastome de la *C74.1*
- Hyperfonctionnement de la *E27.5*
- Hyperplasie de la *E27.5*
- Neuroblastome de la *C74.1*
- Tumeur maligne: *C74.1*

Méduse ¬ *T63.6*

Meester-Loeys ¬ Syndrome de *Q87.8*

MEF2C caractérisé par des anomalies cérébrales, un retard de développement sévère, des dysmorphies faciales et une déficience intellectuelle ¬ Syndrome lié à *Q87.0*

Méga
- Appendice ¬ *Q43.8*
- Prépuce congénital ¬ *Q55.6*

Mégacalicose congénitale ¬ *Q63.8*

Mégacaryoblastique associée à t(1;22)(p13;q13) ¬ Leucémie myéloïde aiguë *C94.20*

Mégacaryocytaire
- Aiguë ¬ Leucémie *C94.20*
- Chronique ¬ Myélose *D47.4*
- Métaplasie myéloïde ¬ Myélosclérose *D47.4*
- ¬
  - Hépatosplénomégalie myéloïde *D47.4*
  - Ostéomyélosclérose *D47.4*

Mégacaryocytes
- Rémission complète ¬ Leucémie aiguë à *C94.21*
- ¬ Leucémie aiguë à *C94.20*

Méga-cisterna magna ¬ *Q03.1*

Mégacôlon
- Aganglionique ¬ *Q43.1*
- Complication
  - Niveau des organes ¬ Entérocolite à Clostridium difficile sans *A04.71*
  - Organiques ¬ Entérocolite à Clostridium difficile avec *A04.73*
- Congénital sans ganglion ¬ *Q43.1*
- Idiopathique ¬ *K59.3*
- Non classé ailleurs ¬ *K59.3*
- Sans complication
  - Niveau des organes ¬ Entérocolite à Clostridium difficile sans *A04.70*
  - Organiques ¬ Entérocolite à Clostridium difficile avec *A04.72*
- Toxique ¬ *K59.3*
- ¬
  - *Q43.1*

Mégacôlon *–suite*
- ¬ *–suite*
  - GOSHS [Syndrome de Goldberg-Shprintzen avec *Q87.8*

Mégaconiale ¬ Dystrophie musculaire congénitale *G71.2*

Mégaduodénum ¬ *Q43.8*

Mégaépiphysaire-métaphysaire ¬ Dysplasie spondylo- *Q77.7*

Mégalencéphalie
- Cutis marmorata telangiectatica congenita ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Cyphoscoliose sévère ¬ Syndrome de croissance excessive- *Q87.3*
- Épilepsie symptomatique] ¬ Syndrome PMSE [polyhydramnios- *Q87.0*
- Malformation capillaire
  - Polymicrogyrie ¬ Syndrome *Q87.3*
  - ¬ Syndrome *Q87.3*
- Polymicrogyrie-polydactylie post-axiale-hydrocéphalie] ¬ Syndrome MPPH [*Q04.8*
- ¬
  - *Q04.5*
  - Leucoencéphalopathie kystique sans *E75.2*

Mégalencéphalique avec kystes sous-corticaux ¬ Leucoencéphalopathie *E75.2*

Mégalérythème épidémique ¬ *B08.3*

Mégaloblastique
v./v.a. Anémie mégaloblastique
- Due à une carence en facteur intrinsèque ¬ Anémie héréditaire juvénile *D51.0*

Mégalocornée
- Cardiopathie-anomalies squelettiques ¬ Syndrome d'anophtalmie- *Q87.8*
- Glaucome ¬ *Q15.0*
- Isolée congénitale ¬ *Q15.8*
- ¬
  - *Q15.8*
  - Glaucome secondaire à une sphérophakie/ectopie du cristallin et *Q15.8*

Mégalodactylie du pouce ¬ *Q74.0*

Mégalogastrie ¬ *Q40.2*

Mégalopapille isolée ¬ *Q14.2*

Mégarbané ¬ Dysplasie spondylo-métaphysaire autosomique récessive type *Q77.8*

Mégarbané-Loiselet ¬ Syndrome de *Q87.0*

Méga-uretère
- Congénital ¬ *Q62.2*
- Primitif
  - Congénital ¬ *Q62.2*
  - ¬ *Q62.2*
- ¬ *N28.88*

Mégavessie-méga-uretères ¬ Syndrome *Q62.7*

MEGDEL [Syndrome Leigh-like-acidurie 3-méthylglutaconique-surdité-encéphalopathie] ¬ Syndrome *G31.88*

Mehes
v./v.a. Morava-Mehes

MEHMO ¬ Syndrome de *Q87.8*

Meier-Blumberg-Imahorn ¬ Syndrome de *E83.4*

Meier-Gorlin ¬ Syndrome de *Q87.1*

Meige ¬
- Lymphœdème de *Q82.09*
- Syndrome de *G24.4*

Meige-like ¬ Maladie de *I89.09*

Meigs
v./v.a. Demons-Meigs
v./v.a. pseudo-Meigs
- Atypique ¬ Syndrome de *D27*

Meinecke
v./v.a. Bonnemann-Meinecke-Reich

Méiose ¬ Infertilité féminine due à un blocage en *N97.8*

Méïotique ¬
- Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction *Q93.0*
- Trisomie
  - 13, non-disjonction *Q91.4*
  - 18, non-disjonction *Q91.0*
  - 21, non-disjonction *Q90.0*
  - Chromosome entier, non-disjonction *Q92.0*

MEIS2 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-cardiopathie congénitale-fente palatine dû à une mutation de *Q87.8*

Mélæna
- Néonatal ¬ *P54.1*
- Néonatals dus à une déglutition de sang maternel ¬ Hématémèse et *P78.2*
- ¬ *K92.1*

Mélanine ¬
- Anomalies liées à une diminution de la formation de *L81.6*
- Hyperpigmentations par la *L81.4*

Melanoblastosis cutis linearis sive systematisata ¬ *Q82.3*

Mélanocortine
- 4
  - Enfant adolescent 3 18 ¬ Obésité
    - Déficit du récepteur de la *E66.84*
    - Extrême par déficit du récepteur de la *E66.85*
  - Indice de masse corporelle IMC
    - 60 et plus chez l'adulte ¬ Obésité par déficit du récepteur de la *E66.88*
    - Compris
      - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit du récepteur de la *E66.80*
      - 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit du récepteur de la *E66.81*
      - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit du récepteur de la *E66.86*

Mélanocortine *–suite*
- 4 *–suite*
- - Indice de masse corporelle IMC *–suite*
- - - Compris *–suite*
- - - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit du récepteur de la *E66.87*
- - ¬ Obésité par déficit du récepteur de la *E66.89*
- ¬ Obésité monogénique due à une anomalie de la voie leptine- *E66.89*

Mélanocytaire
- Uvéale bilatérale diffuse] ¬ PMUBD [Prolifération *C80.9†, H32.8**

- ¬ Nævus: *D22*

Mélanocytes
- Cuir chevelu et du cou ¬ Nævus à *D22.4*
- Lèvre ¬ Nævus à *D22.0*
- Membre
- - Inférieur, y compris la hanche ¬ Nævus à *D22.7*
- - Supérieur, y compris l'épaule ¬ Nævus à *D22.6*
- Oreille et du conduit auditif externe ¬ Nævus à *D22.2*
- Parties de la face, autres et non précisées ¬ Nævus à *D22.3*
- Paupière, y compris le canthus ¬ Nævus à *D22.1*
- Sans précision ¬ Nævus à *D22.9*
- Tronc ¬ Nævus à *D22.5*

Mélanocytome
- Globe oculaire ¬ *D31.9*
- Méningé
- - Méninge cérébrale ¬ *D42.0*
- - Moelle épinière ¬ *D42.1*
- - ¬ *D42.9*

Mélanocytose
- Dermique congénitale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de retard de croissance sévère-strabisme- *Q87.8*
- Leptoméninge diffuse
- - Méninge
- - - Rachidiennes ¬ *D42.1*
- - - ¬ *D42.0*
- - ¬ *D42.9*
- Neurocutanée ¬ *D22.9*

Mélanodontie infantile ¬ *K02.4*

Mélanodontoclasie ¬ *K02.4*

Mélanolysosomale ¬ Maladie neuroectodermique *E70.3*

Mélanome
- Anal ¬ *C21.0*
- Associé à MITF ¬ Syndrome de prédisposition au carcinome rénal et *Q99.8*
- Astrocytome ¬
- - Astrocytome au cours de syndrome *C71.9*
- - Mélanome malin au cours de syndrome *C43.9*

Mélanome *–suite*
- Choroïdien ¬ *C69.3*
- In situ
- - Col utérin ¬ *D03.8*
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *D03.4*
- - Lèvre ¬ *D03.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D03.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D03.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D03.2*
- - Organes génitaux ¬ *D03.8*
- - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D03.3*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *D03.1*
- - Sans précision ¬ *D03.9*
- - Sièges ¬ *D03.8*
- - Tronc ¬ *D03.5*
- Malin
- - Aine ¬ *C43.59*
- - Aisselle ¬ *C43.59*
- - Bas-abdomen ¬ *C43.59*
- - Choroïde ¬ *C69.3*
- - Côlon ¬ *C18.9*
- - Conjonctive ¬ *C69.0*
- - Corps ciliaire Cellule fusiforme type
- - - A ¬ *C69.4*
- - - B ¬ *C69.4*
- - Cours de syndrome mélanome-astrocytome ¬ *C43.9*
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *C43.4*
- - Dos ¬ *C43.59*
- - Face, parties autres et non précisées ¬ *C43.3*
- - Familial
- - - Canthus ¬ *C43.1*
- - - Conduit auditif externe ¬ *C43.2*
- - - Cou ¬ *C43.4*
- - - Cuir chevelu ¬ *C43.4*
- - - Épaule ¬ *C43.6*
- - - Face ¬ *C43.3*
- - - Hanche ¬ *C43.7*
- - - Lésion à localisations contiguës de la peau ¬ *C43.8*
- - - Lèvre ¬ *C43.0*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ *C43.7*
- - - - Supérieur ¬ *C43.6*
- - - Paupière ¬ *C43.1*
- - - Tronc ¬ *C43.59*
- - - ¬ *C43.9*
- - Fesse ¬ *C43.59*
- - Flanc ¬ *C43.59*
- - Lèvre ¬ *C43.0*
- - Marge anale ¬ *C43.50*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *C43.7*

Mélanome *–suite*
- Malin *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *C43.6*
- - Méninges ¬ *C70.9*
- - Muqueux
- - - Buccale ¬ *C06.0*
- - - Clitoris ¬ *C51.2*
- - - Grandes lèvres ¬ *C51.0*
- - - Naso-sinusienne ¬ *C31.9*
- - - Petites lèvres ¬ *C51.1*
- - - Préputiale ¬ *C60.0*
- - - Sinus
- - - - Ethmoïdal ¬ *C31.1*
- - - - Frontal ¬ *C31.2*
- - - - Maxillaire ¬ *C31.0*
- - - - Sphénoïdal ¬ *C31.3*
- - - ¬ *C43.9*
- - Ombilic ¬ *C43.59*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *C43.2*
- - Paroi abdominale ¬ *C43.59*
- - Paroi thoracique ¬ *C43.59*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *C43.1*
- - Peau
- - - Anale ¬ *C43.50*
- - - Associé syndrome prédisposition tumorale liée
- - - - BAP1 ¬ *C43.9*
- - - - MITF ¬ *C43.9*
- - - Mammaire ¬ *C43.59*
- - - Périanale ¬ *C43.50*
- - - Sans précision ¬ *C43.9*
- - - Sein ¬ *C43.59*
- - - ¬ Lésion à localisations contiguës d'un *C43.8*
- - Pénis ¬ *C60.9*
- - Périnée ¬ *C43.59*
- - Prépuce ¬ *C60.0*
- - Région
- - - Interscapulaire ¬ *C43.59*
- - - Lombaire ¬ *C43.59*
- - SAI ¬ *C43.9*
- - Sein ¬ *C43.59*
- - Tronc NCA ¬ *C43.59*
- Primaire méninge
- - Cérébrales ¬ *C70.0*
- - Rachidiennes ¬ *C70.1*
- Primitif du système nerveux central ¬ *C72.9*

Mélanose
- Addison ¬ *E27.1*
- Lenticulaire progressive ¬ *Q82.1*
- Surrénalienne ¬ *E27.1*

Melanosis corii degenerativa ¬ *Q82.3*

Mélanurie ¬ *R82.9*

MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome *G31.81*

Mélasme] ¬ Chloasma [*L81.1*

Melchior
v./v.a. Dyggve-Melchior-Clausen

Melhem-Fahl ¬ Syndrome de *Q76.4*

Mélioïdose
- Aiguë ¬ *A24.1*
- Chronique ¬ *A24.2*
- Galopante ¬ *A24.1*
- Pneumonie ¬ *A24.1†, J17.0**
- Pulmonaire ¬ *A24.1*
- Septicémique ¬ *A24.1*
- Subaiguë ¬ *A24.2*
- ¬
- - *A24.3*
- - *A24.4*

Melitensis ¬
- Brucellose à Brucella *A23.0*
- Infection à Brucella *A23.0*

Melkersson-Rosenthal ¬ Syndrome de *G51.2*

Melliturie ¬ *E74.8*

Melnick-Needles ¬ Syndrome de *Q87.5*

Mélorhéostose
- Avant-bras ¬ *M85.83*
- Bras ¬ *M85.82*
- Cuisse ¬ *M85.85*
- Jambe ¬ *M85.86*
- Localisations multiples ¬ *M85.80*
- Main ¬ *M85.84*
- Ostéopoïkilose ¬ *Q78.8*
- Pied ¬ *M85.87*
- ¬
- - *M85.89*
- - Syndrome de Léri-Joanny [*M85.89*

Membrane
- Basale
- - Antiglomérulaire ¬ Maladie des anticorps de la *M31.0†, N08.5**
- - Glomérulaire] au cours de syndrome de Goodpasture ¬ Néphrite à anticorps anti-MBG [*M31.0†, N08.5**
- Bowman type II ¬ Dystrophie cornéenne de la *H18.5*
- Cellulaire [CR3] ¬ Déficit en complexe récepteur de la *D71*
- Cornéennes ¬ Lésions des *H18.3*
- Début travail
- - 1 à 7 jours ¬ Rupture prématurée des *O42.11*
- - 24 heures ¬ Rupture prématurée des *O42.0*
- - Plus de 7 jours ¬ Rupture prématurée des *O42.12*
- Descemet ¬
- - Plis de la *H18.3*

Membrane *–suite*
- Descemet ¬ *–suite*
- - Rupture de la *H18.3*
- Fibres hyaloïdes ¬ *H43.3*
- Glottique du larynx ¬ *Q31.0*
- Hyaline
- - Adolescent ¬ Maladie des *J80.09*
- - Adulte ¬ Maladie des *J80.09*
- - Enfant ¬ Maladie des *J80.09*
- - Nouveau-né ¬ Maladie des *P22.0*
- Jackson ¬ *Q43.3*
- Mitochondriale ¬ Neurodégénérescence associée à la protéine de *G23.0*
- Muqueuses ¬ Pemphigoïde des *L12.1*
- Plasmique ¬ Défaut du transporteur de carnitine à travers la *E71.3*
- Pupillaires ¬ *H21.4*
- Sans
- - Hémorragie ¬ Rétention partielle du placenta et des *O73.1*
- - Précision ¬
- - - Anomalie du liquide amniotique et des *O41.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des *P02.9*
- - - Rupture prématurée des *O42.9*
- Sous-glottique du larynx ¬ *Q31.0*
- Synoviale ¬ Syphilis de la *A52.7†, M68.09**
- Traitement tocolytique
- - Début travail
- - - 1 à 7 jours ¬ Rupture prématurée des *O42.21*
- - - 24 heures ¬ Rupture prématurée des *O42.20*
- - - Plus de 7 jours ¬ Rupture prématurée des *O42.22*
- - Sans précision du début du travail ¬ Rupture prématurée des *O42.29*
- ¬
- - Accouchement retardé rupture
- - - Artificielle des *O75.5*
- - - Spontanée ou non précisée des *O75.6*
- - Anomalies précisées du liquide amniotique et des *O41.8*
- - Fœtus nouveau-né affectés
- - - Anomalies des *P02.8*
- - - Rupture prématurée des *P01.1*
- - Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des *O72.2*
- - Infection du sac amniotique et des *O41.1*
- - Intoxication aiguë par les médicaments avec effet stabilisant de *T50.9*
- - Oligoamnios, sans mention de rupture des *O41.0*
- - Suivi de la mère en cas de prolapsus des *O34.31*

Membraneux
- Congénitale

Membraneux *–suite*
- Congénitale *–suite*
- - Allo-immunisation fœto-maternelle anti-endopeptidase neutre ¬ Néphropathie *P96.0*
- - Anticorps maternels contre l'andopeptidase neutre ¬ Néphropathie *P96.0*
- - ¬ Cataracte *Q12.0*
- Idiopathique ¬ Glomérulopathie *N05.2*
- Modérée ¬ Sténose subaortique *Q24.4*
- Primitive ¬ Glomérulonéphrite extra *N05.2*
- ¬
- - Agénésie du labyrinthe *Q16.5*
- - Anomalie du labyrinthe *Q16.5*
- - Aplasie du labyrinthe *Q16.5*
- - Bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*
- - Hypoplasie du labyrinthe *Q16.5*
- - Lésion traumatique de l'urètre: Partie *S37.31*
- - Retard d'ossification du crâne *Q75.8*

Membranite ¬
- *O41.1*
- *P02.7*

Membranoprolifération
- Médiée par les immunoglobulines ¬ Glomérulonéphrite *N05.5*
- ¬ Syndrome d'hypotrichose-lymphœdème-télangiectasie-glomérulonéphrite *Q87.8*

Mémoire épisodique ¬ Leucoencéphalopathie à perte de *G93.4*

Menace
- Avortement ¬
- - *O20.0*
- - Hémorragie due à une *O20.0*
- Insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du fœtus avec *O35.8*
- Perte d'emploi ¬ *Z56*

Ménarche ¬ Saignements abondants de la *N92.2*

MEND ¬ Syndrome *Q87.8*

Mendélien
- Autosomique récessive aux infections mycobactériennes par déficit partiel en JAK1 ¬ Prédisposition *D84.8*
- Infections mycobactérien
- - Déficit
- - - Complet
- - - - IFNgammaR1 ¬ Prédisposition *D84.8*
- - - - IFNgammaR2 ¬ Prédisposition *D84.8*
- - - - IL12B ¬ Prédisposition *D84.8*
- - - - IRF1 ¬ Sévère prédisposition *D84.8*
- - - - ISG15 ¬ Prédisposition *D84.8*
- - - - Récepteur bêta 1 de l'interleukine 12 ¬ Prédisposition *D84.8*
- - - Partiel
- - - - Facteur 8 régulateur de l'interféron ¬ Prédisposition *D84.8*

Mendélien *–suite*
- Infections mycobactérien *–suite*
- - Déficit *–suite*
- - - Partiel *–suite*
- - - - JAK1 ¬ Prédisposition *D84.8*
- - - - STAT1 ¬ Prédisposition *D84.8*
- - ¬ Prédisposition *D84.8*

Mendelson
- Due anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Syndrome de *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Syndrome de *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Syndrome de *O74.0*
- ¬ Syndrome de *J95.4*

Mendenhall
v./v.a. Rabson-Mendenhall

Mener une grossesse à terme ¬ incapacité de *N97*

Ménétrier ¬
- Gastropathie hypertrophique de *K29.6*
- Maladie de *K29.6*

Mengel-Konigsmark-Berlin-McKusick ¬ Syndrome de *Q17.8, H90.5*

Mengo ¬ Encéphalite à virus *A85.8†, G05.1**

Ménière ¬
- Maladie de *H81.0*
- Syndrome ou vertiges de *H81.0*

Méninge
- Cérébrale ¬ Mélanocytome méningé de la *D42.0*
- Cérébrales ¬
- - Mélanome primaire des *C70.0*
- - Tumeur bénigne: *D32.0*
- - Tumeur maligne
- - - *C70.0*
- - - Secondaire du cerveau et des *C79.3*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D42.0*
- Non classée ailleurs ¬ Affection des *G96.1*
- Rachidien
- - Cervicales ¬ Lésion traumatique des *S19.80*
- - Dorsales ¬ Lésion traumatique des *S29.80*
- - Lombosacrées ¬ Lésion traumatique des *S39.81*
- - ¬
- - - Mélanocytose leptoméningée diffuse des *D42.1*
- - - Mélanome primaire des *C70.1*
- - - Méningiome des *D32.1*
- - - Tumeur bénigne: *D32.1*
- - - Tumeur maligne
- - - - *C70.1*
- - - - *C70.1*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D42.1*
- Sans précision ¬
- - Tumeur bénigne: *D32.9*

Méninge *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne: *C70.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D42.9*
- Spinales ¬ Adhérence congénitale de *Q06.8*
- ¬
- - Adhésion tuberculeuse des *A17.0†, G01**
- - Anomalie congénitale SAI de la moelle épinière et des *Q06.9*
- - Constriction anormale congénitale d'un ligament des *Q07.8*
- - Cryptococcose des *B45.1†, G02.1**
- - Gomme des *A52.1†, G07**
- - Lésion congénitale SAI de la moelle épinière et des *Q06.9*
- - Maladie congénitale SAI de la moelle épinière et des *Q06.9*
- - Mélanocytose leptoméningée diffuse des *D42.0*
- - Mélanome malin des *C70.9*
- - Neurosyphilis adhésive des *A52.1†, G01**
- - Syphilis
- - - *A52.1†, G01**
- - - Aiguë des *A51.4†, G01**
- - TBC [tuberculose] *A17.0†, G01**
- - Thrombose d'une veine des *I67.6*
- - Tuberculome des *A17.1†, G07**
- - Tumeur bénigne des *D32*

Méningé
- Cérébrales) (rachidiennes) ¬ Adhérences *G96.1*
- Méninge cérébrale ¬ Mélanocytome *D42.0*
- Moelle épinière ¬ Mélanocytome *D42.1*
- Tuberculeux ¬ Abcès *A17.0†, G01**
- ¬
- - Hémorragie *I60.8*
- - Mélanocytome *D42.9*
- - Peste *A20.3†, G01**
- - Tuberculose *A17.0†, G01**

Méningiome
- Angioblastique ¬ *D32.9*
- Atypique ¬ *D42.9*
- Cellules mixtes ¬ *D32.9*
- Cellules transitionnelles ¬ *D32.9*
- Cérébral ¬ *D32.0*
- Clivus ¬ *D32.0*
- Endothéliomateux ¬ *D32.9*
- Fibreux ¬ *D32.9*
- Fibroblastique ¬ *D32.9*
- Hémangioblastique ¬ *D32.9*
- Intracrânien ¬ *D32.0*
- Lobe frontal ¬ *D32.0*
- Malin ¬ *C70.9*
- Méninges rachidiennes ¬ *D32.1*
- Méningothéliomateux ¬ *D32.9*
- Moelle épinière ¬ *D32.1*

Méningiome *–suite*
- Multiples familiaux ¬ *D32.9*
- Nerf optique ¬ *D32.0*
- Orbite ¬ *D32.0*
- Papillaire ¬ *D42.9*
- Psammomateux ¬ *D32.9*
- SAI ¬ *D32.9*
- Spinal ¬ *D32.1*
- Tente ¬ *D32.0*
- ¬ *D32.9*

Méningisme
- Cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- ¬
- - *R29.1*
- - Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à un *J09, U69.23!*
- - - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à un *J09, U69.22!*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à un *J09, U69.24!*

Méningite
- Adénovirus ¬ *A87.1†, G02.0**
- Aiguë ¬ Neurosyphilis avec *A52.1†, G01**
- Arbovirus ¬ *A87.8†, G02.0**
- Aseptique ¬ Maladie due au VIH avec *B20, G03.0*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, G02.1**
- Bacille Friedländer ¬
- - *G00.8*
- - *G00.8, B96.2!*
- Bactérienne
- - Sans précision ¬ *G00.9*
- - ¬ *G00*
- Bactériennes ¬ Autres *G00.8*
- Basilaire tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**
- Candidosique ¬ *B37.5†, G02.1**
- Cérébrale tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**
- Cérébrospinale
- - Due au typhus ¬ *A75.9†, G01**
- - Épidémique ¬ *A39.0†, G01**
- - Tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**
- Charbonneuse ¬ *A22.8†, G01**
- Chronique ¬ *G03.1*
- Coccidioïdomycose ¬ *B38.4†, G02.1**
- Cours
- - Actinomycose ¬ *A42.8†, G01**
- - Affections bactériennes classées ailleurs ¬ *G01**
- - Infections virales classées ailleurs ¬ *G02.0**
- - Listérienne ¬ *A32.1†, G01**
- - Maladie
- - - Lyme ¬ *A69.2†, G01**

Méningite *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, G02.8**
- - - Virale NCA ¬ *A87.9*
- - Maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs ¬ *G02.8**
- - Mononucléose infectieuse ¬ *B27.9†, G02.0**
- - Mycoses classées ailleurs ¬ *G02.1**
- - Neurosyphilis ¬ *A52.1†, G01**
- - Rubéole ¬ *B06.0†, G02.0**
- - Sporotrichose ¬ *B42.8†, G02.1**
- - Syphilis ¬ *A52.1†, G01**
- - Syphilis congénitale ¬ *A50.4†, G01**
- - Varicelle ¬ *B01.0†, G02.0**
- Cryptocoques
- - SIDA ¬ *B20†, G02.1*, B45.1*
- - ¬ *B45.1†, G02.1**
- Diplocoques ¬ *A39.0†, G01**
- Due
- - Candidose ¬ *B37.5†, G02.1**
- - Causes
- - - Non précisées ¬ *G03*
- - - Précisées ¬ *G03.8*
- - Mesures préventives ¬ *G03.8, Y84.9!*
- - Torulose ¬ *B45.1†, G02.1**
- - Vaccination ¬ *G03.8, Y59.9!*
- - Virus de l'herpès
- - - Simplex ¬ *B00.3†, G02.0**
- - - ¬ *B00.3†, G02.0**
- - Virus poliomyélite ¬
- - - *A80.9†, G01**
- - - *A80.9†, G02.0**
- - VZV [virus varicelle-zona] ¬ *B02.1†, G02.0**
- Entérovirus ¬ *A87.0†, G02.0**
- Éosinophile ¬ *B83.2†, G02.8**
- Épidémique NCA ¬ *A39.0†, G01**
- Escherichia coli ¬ *G00.8, B96.2!*
- Gonococcique ¬ *A54.8†, G01**
- Gonocoques ¬ *A54.8†, G01**
- Haemophilus influenzae ¬ *G00.0*
- Herpès zoster ¬ *B02.1†, G02.0**
- Infectieuse à méningocoques ¬ *A39.0†, G01**
- Klebsiella ¬ *G00.8, B96.2!*
- Leptospira ¬ *A27.9†, G01**
- Liquide clair ¬ *G03.0*
- Listeria monocytogenes ¬ *A32.1†, G01**
- Lymphocytaire
- - Aiguë ¬ *A87.2†, G02.0**
- - ¬ *A87.2†, G02.0**
- Méningocoques ¬ *A39.0†, G01**
- Méningo-encéphalite listériennes ¬ *A32.1†*
- Mycoplasmes ¬ *G00.8, B96.0!*
- Mycosique ¬ *B49†, G02.1**

Méningite *–suite*
- Neisseria meningitidis ¬ *A39.0†, G01**
- Néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ *C79.3*
- Non suppurée ¬ *G03.0*
- Oreillons ¬ *B26.1†, G02.0**
- Pneumocoques ¬ *G00.1*
- Post-morbilleuse ¬ *B05.1†*
- Purulente SAI ¬ *G00.9*
- Pyogène SAI ¬ *G00.9*
- Récurrente bénigne [Mollaret] ¬ *G03.2*
- Salmonella ¬ *A02.2†, G01**
- Sans précision ¬ *G03.9*
- Scarlatineuse ¬ *A38†, G01**
- Spinale tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**
- Staphylocoques ¬ *G00.3*
- Streptocoques ¬ *G00.2*
- Suppurée SAI ¬ *G00.9*
- Syphilitique
- - Aiguë précoce ¬ *A51.4†, G01**
- - Congénitale tardive ¬ *A50.4†, G01**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, G01**
- - Tardive ¬ *A52.1†, G01**
- Tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**
- Typhoïde ¬ *A01.0†, G01**
- Varicelleuse ¬ *B01.0†, G02.0**
- Virale ¬ *A87.9*
- Virales ¬ Autres *A87.8*
- Virus coxsackie ¬ *A87.0†, G02.0**
- Virus ECHO ¬ *A87.0†, G02.0**
- Zostérienne ¬ *B02.1†, G02.0**
- ¬
- - Exanthème épidémique avec *A88.0†, G02.0**
- - Rougeole avec *B05.1†, G02.0**

Meningitis cerebrospinalis epidemica ¬ *A39.0†, G01**

Méningocèle
- Cérébrale ¬
- - *Q01*
- - *Q01.9*
- Craniale ¬ *Q01.9*
- Latérale ¬ Syndrome de *Q87.5*
- Postérieure ¬ *Q05.9*
- Rachidienne) ¬ *Q05*
- ¬ *Q05.9*

Méningo-cérébrale ¬ Cryptococcose *B45.1†, G02.1**

Méningococcémie
- Aiguë ¬ *A39.2*
- Chronique ¬ *A39.3*

Méningococcique
- SAI ¬
- - Bactériémie *A39.4*
- - Maladie *A39.9*
- Surrénalien ¬ Syndrome *A39.1†*

Méningococcique *–suite*
- ¬ Arthrite *A39.8†, M01.09**

Méningocoques ¬
- Adrénalite hémorragique à *A39.1†, E35.1**
- Apoplexie des surrénales due à un sepsis à *A39.1†, E35.1**
- Arachnoïdite à *A39.0†, G01**
- Bactériémie à *A39.4*
- Cardiopathie à *A39.5†, I52.0**
- Cardite à *A39.5†, I52.0**
- Conjonctivite à *A39.8†, H13.1**
- Encéphalite à *A39.8†, G05.0**
- Endocardite à *A39.5†, I39.8**
- Fièvre cérébrospinale à *A39.0†, G01**
- Hémorragie des surrénales due à un sepsis à *A39.1†, E35.1**
- Infection
- - Cérébrospinale à *A39.0†, G01**
- - Cerveau à *A39.8†, G05.0**
- - Endocarde à *A39.5†, I39.8**
- - Généralisée à *A39.4*
- - Myocarde à *A39.5†, I41.0**
- - Péricarde à *A39.5†, I32.0**
- Infections à *A39.8*
- Méningite
- - *A39.0†, G01**
- - Infectieuse à *A39.0†, G01**
- Méningomyélite à *A39.8†, G05.0**
- Myocardite à *A39.5†, I41.0**
- Névrite rétrobulbaire à *A39.8†, H48.1**
- Péricardite à *A39.5†, I32.0**
- Sepsis
- - *A39.4*
- - Fulminant à *A39.2*
- Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des: *Z22.3*
- Surrénalite hémorragique à *A39.1†, E35.1**
- Syndrome hémorragique surrénalien dû à un sepsis à *A39.1†, E35.1**

Méningo-encéphalite
- Acquise au cours de toxoplasmose ¬ *B58.2†, G05.2**
- Adénovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Amibien primitive ¬
- - *B60.2†, G05.2**
- - MEAP [*B60.2†, G05.2**
- Angiostrongylus cantonensis ¬ *B83.2†, G05.2**
- Biphasique ¬ *A84.1*
- Congénitale à toxoplasmose ¬ *P37.1†, G05.2**
- Cours
- - Blastomycose NCA ¬ *B40.8†, G05.2**
- - Herpès ¬ *B00.4†, G05.1**
- Éosinophile ¬ *B83.2†, G05.2**
- Épidémique ¬ *A39.8†, G05.0**
- Escherichia coli ¬ *G04.2, B96.2!*

Méningo-encéphalite *–suite*
- Haemophilus influenzae ¬ *G04.2, B96.3!*
- Listeria monocytogenes ¬ *A32.1†, G05.0**
- Listérienne ¬
- - *A32.1†, G05.0**
- - Méningite et *A32.1†*
- Lymphocytaire ¬ *A87.2†, G05.1**
- Méningomyélite
- - Bactériennes, non classées ailleurs ¬ *G04.2*
- - Cours d'affections classées ailleurs ¬ *G05**
- Nægleria ¬ *B60.2†, G05.2**
- Oreillons ¬ *B26.2†, G05.1**
- Parasitaire NCA ¬ *B89†, G05.2**
- Parastrongylus cantonensis ¬ *B83.2†, G05.2**
- Pneumocoques ¬ *G04.2, B95.3!*
- Précisée virale NCA ¬ *A85*
- Rubéoleuse ¬ *B06.0†, G05.1**
- Staphylocoques ¬ *G04.2, B95.8!*
- Streptocoques ¬ *G04.2, B95.5!*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G05.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.2†, G05.2**
- Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G05.0**
- Verno-estivale russe ¬ *A84.0*
- Virale transmise par des tiques ¬ *A84*
- Virus
- - SAI ¬ *A86*
- - Transmise par des moustiques ¬ *A83*
- Virus de l'herpès ¬ *B00.4†, G05.1**
- Zostérienne ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬ *G04*

Méningo-encéphalocèle
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.4†, G94.8**
- - ¬ *A52.1†, G94.8**
- ¬
- - *Q01*
- - *Q01.9*

Méningo-encéphalomyélite
- Acquise au cours de toxoplasmose ¬ *B58.2†, G05.2**
- Congénitale à toxoplasmose ¬ *P37.1†, G05.2**
- Cours d'actinomycose ¬ *A42.8†, G05.0**
- Haemophilus influenzae ¬ *G04.2, B96.3!*
- Torula histolytica ¬ *B45.1†, G05.2**

Méningomyélite
- Bactériennes, non classées ailleurs ¬ Méningo-encéphalite et *G04.2*
- Cours d'affections classées ailleurs ¬ méningo-encéphalite et *G05**
- Cryptocoques ¬ *B45.1†, G05.2**
- Méningocoques ¬ *A39.8†, G05.0**
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G05.0**
- Torula histolytica ¬ *B45.1†, G05.2**
- Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G05.0**

Méningomyélite *–suite*
- ¬ *G04*

Méningomyélocèle
- Fœtus
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- - ¬ Dystocie due à: *O66.3*
- Hydrocéphalie ¬ *Q05.4*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G94.8**

Méningoradiculite lymphocytaire (Bannwarth) ¬ *A69.2*

Méningothéliomateux ¬ Méningiome *D32.9*

Méningo-vasculaire
- Cérébrale ¬ Syphilis *A52.1†, G01**
- Congénitale ¬ Syphilis *A50.4†, G01**
- ¬ Neurosyphilis *A52.1†, G01**

Ménisque
- Corne
- - Antérieure ménisque
- - - Externe ¬
- - - - Atteintes du *M23.34*
- - - - Kyste du *M23.04*
- - - Interne ¬
- - - - Atteintes du *M23.31*
- - - - Kyste du *M23.01*
- - Postérieure ménisque
- - - Externe ¬
- - - - Atteintes du *M23.35*
- - - - Kyste du *M23.05*
- - - Interne ¬
- - - - Atteintes du *M23.32*
- - - - Kyste du *M23.02*
- Détaché ¬ *M23.3*
- Discoïde congénital
- - Localisations multiples ¬ *M23.10*
- - Ménisque
- - - Externe ¬ *M23.16*
- - - Interne ¬ *M23.13*
- - - SAI ¬ *M23.19*
- Due déchirure traumatisme ancien
- - Corne
- - - Antérieure ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du *M23.24*
- - - - Interne ¬ Lésion du *M23.21*
- - - Postérieure ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du *M23.25*
- - - - Interne ¬ Lésion du *M23.22*
- - Localisations multiples ¬ Lésion du *M23.20*
- - Ménisque SAI ¬ Lésion du *M23.29*
- - Partie partie non précisée ménisque
- - - Externe ¬ Lésion du *M23.26*
- - - Interne ¬ Lésion du *M23.23*
- Externe
- - Interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés) ¬ Lésion traumatique du *S83.7*
- - ¬

Ménisque *–suite*
- Externe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Atteinte ménisque
- - - - Corne
- - - - - Antérieure du *M23.34*
- - - - - Postérieure du *M23.35*
- - - - Partie et partie non précisée du *M23.36*
- - - Déchirure «en anse de seau» (de): *S83.2*
- - - Kyste ménisque
- - - - Corne
- - - - - Antérieure du *M23.04*
- - - - - Postérieure du *M23.05*
- - - - Partie et partie non précisée du *M23.06*
- - - Lésion
- - - - Interne genou sans précision
- - - - - Corne postérieure du *M23.95*
- - - - - Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du *M23.94*
- - - - - Partie autre et non précisée du *M23.96*
- - - - Ménisque due déchirure traumatisme ancien
- - - - - Corne antérieure du *M23.24*
- - - - - Corne postérieure du *M23.25*
- - - - - Partie et partie non précisée du *M23.26*
- - - Ménisque discoïde (congénital): *M23.16*
- Genou ¬ Lésion récidivante du cartilage du *M23.39*
- Interne ¬
- - Atteinte ménisque
- - - Corne
- - - - Antérieure du *M23.31*
- - - - Postérieure du *M23.32*
- - - Partie et partie non précisée du *M23.33*
- - Déchirure «en anse de seau» (de): *S83.2*
- - Kyste ménisque
- - - Corne
- - - - Antérieure du *M23.01*
- - - - Postérieure du *M23.02*
- - - Partie et partie non précisée du *M23.03*
- - Lésion
- - - Interne genou sans précision
- - - - Ligament croisé
- - - - - Antérieur ou corne antérieure du *M23.91*
- - - - - Postérieur ou corne postérieure du *M23.92*
- - - - Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du *M23.93*
- - - Ménisque due déchirure traumatisme ancien
- - - - Corne
- - - - - Antérieure du *M23.21*
- - - - - Postérieure du *M23.22*
- - - - Partie et partie non précisée du *M23.23*

Ménisque *–suite*
- Interne ¬ *–suite*
- - Ménisque discoïde (congénital): *M23.13*
- Localisations multiples ¬
- - Atteintes du *M23.30*
- - Kyste du *M23.00*
- Ménisque SAI ¬
- - Atteintes du *M23.39*
- - Kyste du *M23.09*
- Non précisé ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament non précisé ou *M23.99*
- Partie partie non précisée ménisque
- - Externe ¬
- - - Atteintes du *M23.36*
- - - Kyste du *M23.06*
- - Interne ¬
- - - Atteintes du *M23.33*
- - - Kyste du *M23.03*
- SAI ¬
- - Atteintes du ménisque: *M23.39*
- - Kyste du ménisque: *M23.09*
- - Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.29*
- - Ménisque discoïde (congénital): *M23.19*
- ¬
- - Blocage du *M23.3*
- - Déchirure récente d'un *S83.2*
- - Dégénérescence du *M23.3*
- - Lésion récidivante du *M23.39*
- - Mâchoire (cartilage) (*S03.0*

Menke-Hennekam ¬ Syndrome de *Q87.0*

Menkes
- Cheveux crépus) (en fil de fer) ¬ Maladie de: *E83.0*
- I [syndrome du sirop d'érable] ¬ Maladie de *E71.0*
- ¬ Syndrome des cheveux en fils de fer de *E83.0*

Ménométrorragie ¬ *N92.1*

Ménopause
- Artificielle ¬
- - Syndrome survenant après une *N95.3*
- - Troubles au cours d'une *N95.3*
- Climatère féminin ¬ Troubles de la *N95.1*
- Périménopause
- - Sans précision ¬ Trouble de la *N95.9*
- - ¬ Autres troubles précisés de la *N95.8*
- Prématurée
- - SAI ¬ *E28.3*
- - ¬ Syndrome de polyneuropathie-déficience intellectuelle-acromicrie- *Q87.8*
- ¬
- - Saignement anormal dans la *N95.0*
- - Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la *N95.1*

Ménopausique
- Anormal ¬ Saignement utérin *N95.0*

Ménopausique *–suite*
- ¬ Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Ménorragie
- Métrorragie
- - Climatérique ¬ *N92.4*
- - Ménopausique ¬ *N92.4*
- - Préclimatérique ¬ *N92.4*
- - Préménopausique ¬ *N92.4*
- Puberté ¬ *N92.2*
- SAI ¬ *N92.0*

Menstruation
- Précoce ¬ *E30.1*
- SAI ¬ Absence de *N91.2*
- Trop abondante
- - Puberté ¬ *N92.2*
- - Trop fréquente cycle menstruel
- - - Irrégulier ¬ *N92.1*
- - - Régulier ¬ *N92.0*

Menstruel
- Dépendante ¬ Fièvre récurrente cycle *N94.8*
- Irrégulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle *N92.1*
- Précisées ¬ Autres irrégularités *N92.5*
- Régulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle *N92.0*
- Sans précision ¬
- - Affection des organes génitaux de la femme et du cycle *N94.9*
- - Irrégularités *N92.6*
- ¬ Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle *N94.8*

Mental
v./v.a. Retard mental
- Anorexie mentale non précisée ¬ Autres types d'anorexie *F50.08*
- Atypique ¬ Anorexie *F50.1*
- Comportement
- - Associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Autres troubles *F53.8*
- - Légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles *F53.0*
- - Lié utilisation
- - - Alcool ¬ Troubles *F10*
- - - Cocaïne ¬ Troubles *F14*
- - - Dérivés du cannabis ¬ Troubles *F12*
- - - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles *F19*
- - - Hallucinogènes ¬ Troubles *F16*
- - - Opiacés ¬ Troubles *F11*
- - - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles *F13*
- - - Solvants volatils ¬ Troubles *F18*
- - - Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles *F15*
- - - Tabac ¬ Troubles *F17*
- - Sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles *F53.1*
- - ¬

Mental *–suite*
- Comportement *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Antécédents familiaux de troubles *Z81*
- - - Antécédents personnels d'autres troubles *Z86.5*
- - - Mise en observation pour suspicion de troubles *Z03.2*
- Enfant ¬ Anorexie *F50.08*
- Grave ¬ arriération *F72*
- Légère ¬ Arriération *F70*
- Maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Troubles *O99.3*
- Mesures de perte de poids ¬ Anorexie *F50.01*
- Moyenne ¬ arriération *F71*
- Non
- - Précisé ¬ Stress physique ou *Z73*
- - Précisée ¬ Autres types d'anorexie mentale et anorexie *F50.08*
- Organique
- - SAI ¬ Trouble *F06.9*
- - Symptomatique, sans précision ¬ Trouble *F09*
- Précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique ¬ Autres troubles *F06.8*
- Profonde ¬ arriération *F73*
- Puerpéralité, sans précision ¬ Trouble *F53.9*
- SAI ¬
- - Anorexie *F50.08*
- - Débilité *F79*
- - Déficit *F79*
- - Maladie *F99*
- Sans
- - Indication ¬ Trouble *F99*
- - Mesures de perte de poids ¬ Anorexie *F50.00*
- - Précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique ¬ Trouble *F06.9*
- Type
- - Actif ¬ Anorexie *F50.01*
- - Boulimique ¬ Anorexie *F50.01*
- - Restrictif ¬ Anorexie *F50.00*

Mentolabial ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre inférieure et le sillon *C44.0*

Menton ¬
- *S01.80*
- Présentation du *O64.2*
- Soins maternels pour présentation de la face, du front et du *O32.3*

Mer
- Non précisé ¬ Effets toxiques d'un fruit de *T61.9*
- ¬
- - Anémone de *T63.6*
- - Effets toxiques d'autres fruits de *T61.8*

Mer *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Etoile de *T63.6*
- - Histiocytose bleu de *D76.3*
- - Mal de: *T75.3*

Méralgie paresthésique ¬ *G57.1*

Mercaptopyruvate sulfurtransferase ¬ Déficit en 3- *E72.1*

Mercier] (prostatique) ¬ Barre moyenne [barrière de *N40*

Mercure ¬
- Effet toxique du *T56.1*
- Effets toxiques de composés de *T56.1*
- Intoxication au *T56.1*
- Tremblements dus au *T56.1*

Mercurialisme ¬ *T56.1*

Merkel
v./v.a. Carcinome à cellules de Merkel

Méromélie longitudinale
- Fibulaire ¬ *Q72.6*
- Radiale ¬ *Q71.4*
- ¬ *Q73.8*

MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome *G31.81*

Merritt
v./v.a. Kasabach-Merritt

MERS ¬ Infection à coronavirus *B34.2*

MERS-CoV ¬ Infection à *B34.2*

Merten
v./v.a. Singleton-Merten

Mertens
v./v.a. Isaacs-Mertens

Mérycisme
- Enfance ¬ *F98.2*
- Nouveau-né ¬ Régurgitation et *P92.1*

Merzbacher
v./v.a. Pelizaeus-Merzbacher

Mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant stéroïdes
- Prolifération *N04.3*
- Sclérose *N04.8*

Mésappariements
- CMMRD] ¬ Glioblastome au cours du syndrome du déficit constitutionnel de la réparation des *C71.9*
- ¬
- - Carcinome
- - - Colorectal au cours de syndrome de déficit constitutionnel de la réparation des *C19*
- - - Intestin grêle au cours de syndrome de déficit constitutionnel de la réparation des *C17.9*
- - - Ovaire au cours de syndrome de déficit constitutionnel de la réparation des *C56*
- - Leucémie aiguë myéloïde au cours de syndrome de déficit constitutionnel de la réparation des *C92.00*

Mésappariements *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Médulloblastome au cours de syndrome de déficit constitutionnel de la réparation des *C71.6*
- - Neuroblastome au cours de syndrome de déficit constitutionnel de la réparation des *C74.9*

Mésartérite syphilitique ¬ *A52.0†, I79.8**

Mescaline ¬
- *T40.9*
- Intoxication à la *T40.9*

Mésencéphalique/tegmentale ¬ Paralysie *G83.8*

Mésenchymateux ¬ Néphroblastome *C64*

Mésentère
- Universel ¬ *Q43.3*
- ¬
- - *C45.1*
- - *C48.1*
- - Iléus avec gangrène du *K56.6*
- - Kyste chyleux du *I89.8†, K67.8**
- - Léiomyosarcome du *C48.1*
- - Lésion traumatique: *S36.82*
- - Mésothéliome du *C45.1*
- - Tumeur myofibroblastique inflammatoire
- - - Bénigne du *D20.1*
- - - Maligne du *C48.1*

Mesenterica ¬ Tabes *A18.3†, K93.0**

Mésentérique
v./v.a. Artère mésentérique
v./v.a. omphalo-mésentérique
- Aiguë) (chronique) ¬ Lymphadénite *I88.0*
- Ganglions lymphatiques ¬ Tuberculose *A18.3†, K93.0**
- Inférieur) (supérieur) ¬ Plexus: *S34.5*
- Inférieure ¬ Lésion traumatique de la veine *S35.3*
- Non spécifique ¬ Lymphadénite *I88.0*
- Salmonella typhi ¬ Lymphadénite *A01.0*
- Supérieure ¬ Lésion traumatique de la veine *S35.3*
- Tuberculeuse ¬ Lymphadénite *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Abcès
- - - *K65.09*
- - - Aigu) tout ganglion lymphatique, sauf *L04*
- - Adénite chronique, de tout ganglion autre que *I88.1*
- - Adhérences (de): *K66.0*
- - Athérosclérose *K55.1*
- - Embolie de la veine *K55.0*
- - Infarctus *K55.0*
- - Insuffisance vasculaire *K55.1*
- - Kyste *K66.8*
- - Lésion traumatique veine
- - - *S35.3*

Mésentérique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion traumatique veine *–suite*
- - - *S35.3*
- - Lymphadénite
- - - Aiguë tout ganglion lymphatique, sauf *L04*
- - - Chronique
- - - - Sauf *I88.1*
- - - - Tout ganglion autre que *I88.1*
- - Lymphadénopathie *R59.0*
- - Nécrose graisseuse [stéato-nécrose] *K65.8*
- - Saponification *K65.8*
- - Thrombose de la veine *K55.0*
- - Tuberculose des glandes *A18.3†, K93.0**

Mésiale
- Familiale
- - Bénigne ¬ Épilepsie temporale *G40.2*
- - Convulsions fébriles ¬ Épilepsie temporale *G40.2*
- Infantile avec régression cognitive sévère ¬ Épilepsie temporale *G40.2*

Mésiocclusion ¬ *K07.2*

Mesiodens ¬ *K00.1*

Mésio-temporal avec sclérose de l'hippocampe ¬ Épilepsie du lobe *G40.2, G37.8*

Mésoblastique congénital ¬ Néphrome *D41.0*

Mésocardie ¬ *Q24.8*

Mésocervicale
- Col du fémur ¬ Fracture *S72.04*
- ¬ Fracture du col du fémur: *S72.04*

Mésocôlon ¬
- *C45.1*
- *C48.1*
- Mésothéliome du *C45.1*

Mésodermique axiale ¬ Dysplasie *Q87.8*

Mésomélie
- Déficience intellectuelle-malformations cardiaques ¬ Syndrome de brachydactylie- *Q87.8*
- Synostoses ¬ Syndrome de *Q78.8*

Mésomélique
v./v.a. Dysplasie mésomélique

Mésosomatique de Roch-Leri ¬ Lipomatose *E88.29*

Mésothélial
- Péritoine ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D19.1*
- Plèvre ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D19.0*
- Sans précision ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D19.9*
- Sièges ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D19.7*

Mésothéliale papillaire bien différenciée
- Péritoine ¬ Tumeur *D19.1*
- Plèvre ¬ Tumeur *D19.0*

Mésothéliome
- Bénin SAI ¬ *D19.9*

Mésothéliome *–suite*
- Épididyme ¬ *C63.0*
- Épiploon ¬ *C45.1*
- Foie ¬ *C45.7*
- Kystique du péritoine ¬ *D19.1*
- Malin
- - Tunique vaginale ¬ *C45.7*
- - ¬ *C45.9*
- Médiastin ¬ *C45.7*
- Mésentère ¬ *C45.1*
- Mésocôlon ¬ *C45.1*
- Péricarde ¬ *C45.2*
- Péricardique
- - Primitif ¬ *C45.2*
- - ¬ *C45.2*
- Péritoine
- - Pariétal ¬ *C45.1*
- - Pelvien ¬ *C45.1*
- Péritonéal
- - Malin ¬ *C45.1*
- - ¬ *C45.1*
- Plèvre avec épanchement pleural ¬ *C45.0†, J91**
- Poumon ¬ *C45.7*
- Rétropéritoine ¬ *C45.7*
- Sans précision ¬ *C45.9*
- Sièges ¬ *C45.7*
- Testiculaire ¬ *C62.9*
- Tunique vaginale ¬ *C63.7*

Mesure
- Chimiothérapie prophylactique ¬
- - *Z29.2*
- - *Z29.28*
- Chirurgicales
- - Médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ *Y84.9!*
- - ¬ Choc septique après *T81.1, R57.2*
- Immunosuppressives ¬ Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres *D90*
- Insuffisantes de précautions aseptiques ¬ *Y69!*
- Judiciaire
- - Gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des *Y35.7!*
- - ¬ Lésion due à des *Y35.7!*
- Médical
- - Sans précision ¬ Incidents dus à des *Y84.9!*
- - ¬ Insuffisance pulmonaire après des *J95.88*
- Perte poids ¬ Anorexie mental
- - *F50.01*
- - Sans *F50.00*
- Préventives ¬ Méningite due à des *G03.8, Y84.9!*

Mesure *–suite*
- Procréative
- - Sans précision ¬ *Z31.9*
- - ¬ Autres *Z31.8*
- Prophylactique, sans précision ¬ *Z29.9*
- Prophylactiques précisées ¬ Autres *Z29.8*
- Réadaptation ¬ Antécédents de *Z92.8*
- Tension artérielle ¬ *Z01.3*
- ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la *Y84.9!*

Métabolique
- Actes médical
- - Sans précision ¬ Anomalie endocrinienne et *E89.9*
- - ¬ Autres anomalies endocriniennes et *E89.8*
- Arythmie associé à TANGO2 ¬ Syndrome d'encéphalopathie *G31.88*
- Classés ailleurs ¬ Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles *M14.1**
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies endocriniennes, nutritionnelles et *O99.2*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies nutritionnelles et *E90**
- Défaut de transport du lactate ¬ Myopathie *E74.8†, G73.6**
- Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles *O21.1*
- Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles *O21.1*
- Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles *O21.1*
- Précisées ¬ Autres anomalies *E88.8*
- Sans précision ¬ Anomalie *E88.9*
- Tardive du nouveau-né ¬ Acidose *P74.0*
- Transitoire du nouveau-né, sans précision ¬ Anomalie *P74.9*
- Transitoires du nouveau-né ¬ Autres anomalies *P74.8*
- ¬
- - Acidose: *E87.2*
- - Alcalose: *E87.3*
- - Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et *Z83.4*
- - Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et *Z86.3*
- - Arthropathie cours
- - - Maladie *E88.9†, M14.59**
- - - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et *M14.5**
- - Cardiomyopathie *E88.9†, I43.8**
- - Cataracte cours

Métabolique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Cataracte cours *–suite*
- - - Maladie *E88.9†, H28.1**
- - - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et *H28.1**
- - Glaucome cours
- - - Maladie *E88.9†, H42.0**
- - - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et *H42.0**
- - Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et *N08.4**
- - Hyperémèse gravidique avec troubles *O21.1*
- - Maladie
- - - Peau au cours de trouble *E88.9†, L99.8**
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies *N16.3**
- - Myocardiopathie au cours de maladies *I43.1**
- - Myopathie cours
- - - Maladie *E88.9†, G73.6**
- - - Maladies *G73.6**
- - Neuropathie des nerfs périphériques autonomes au cours de maladie *E88.9†, G99.08**
- - Polyneuropathie au cours de maladie *E88.9†, G63.3**
- - Psychose aiguë au cours d'un trouble *F05.8*
- - Syndrome SAM [dermatite sévère-allergies multiples-cachexie *Q80.8*

Métabolisme
- Acide
- - Argininosuccinique ¬ Anomalies du *E72.2*
- - Gamma-aminobutyrique ¬ Trouble du *E72.8*
- - Gras ¬ Anomalie du *E71.3*
- - Urique ¬ Intoxication: Médicaments agissant sur le *T50.4*
- Acides aminés
- - Aromatiques, sans précision ¬ Anomalies du *E70.9*
- - Bêta ¬ Anomalies du *E72.8*
- - Chaîne ramifié ¬
- - - Anomalie du *E71.2*
- - - Anomalies du *E71.1*
- - Non ramifiés ¬ Trouble du *E72.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E72.9*
- - Soufrés ¬ Anomalies du *E72.1*
- - ¬
- - - Anomalies précisées du *E72.8*
- - - Trouble
- - - - *E72.9*
- - - - Congénital du *E72.9*
- Alcool ¬ Trouble du *E88.8*
- Ammoniac ¬ Trouble du *E72.2*
- Arginine ¬ Trouble du *E72.2*
- Base ¬ Anomalie de: *R94.8*

Métabolisme *–suite*
- Bilirubine
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E80.7*
- - ¬ Autres anomalies du *E80.6*
- Calcium
- - Magnésium nouveau-né
- - - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du *P71.9*
- - - ¬ Autres anomalies transitoires du *P71.8*
- - Sans précision ¬ Anomalies du *E83.59*
- - ¬
- - - Anomalies du *E83.58*
- - - Hypocalcémie due à une anomalie du *E83.58*
- Citrulline ¬ Trouble du *E72.2*
- Cofacteur cobalamine ¬ Homocystinurie due à un défaut du *E72.1*
- Consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Troubles du *O08.5*
- Corps cétoniques ¬ Trouble de l'oxydation des acides gras et du *E71.3*
- Cuivre ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth axonale autosomique récessive due a un défaut du *G60.0*
- Cycle
- - Méthionine ¬ Trouble du *E72.1*
- - Urée et de la détoxification de l'ammoniac ¬ Trouble du *E72.2*
- Cystathionine ¬ Trouble du *E72.1*
- Fructose ¬ Anomalie du *E74.1*
- GABA ¬ Trouble du *E72.8*
- Galactose ¬ Anomalie du *E74.2*
- Glucides fœtus nouveau-né
- - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du *P70.9*
- - ¬ Autres anomalies transitoires du *P70.8*
- Glucosaminoglycanes
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E76.9*
- - ¬ Autres anomalies du *E76.8*
- Glutamine ¬ Trouble du *E72.8*
- Glutathion ¬ Anémie due à d'autres anomalies du *D55.1*
- Glycine ¬
- - Anomalies du *E72.5*
- - Trouble du *E72.5*
- Glycoprotéine
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E77.9*
- - ¬ Autres anomalies du *E77.8*
- Histidine ¬ Anomalies du *E70.8*
- Homocystine ¬ Trouble du *E72.1*
- Hormone thyroïdienne ¬ Petite taille-retard d'âge osseux par déficit du *E03.1*
- Hydrates carbone
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E74.9*
- - ¬ Autres anomalies précisées du *E74.8*
- Hydroxylysine ¬ Trouble du *E72.3*
- Lipides ¬ Démence au cours de trouble cérébral du *E75.6†, F02.8**

Métabolisme *–suite*
- Lipoprotéines, sans précision ¬ Anomalie du *E78.9*
- Magnésium ¬ Anomalies du *E83.4*
- Minéraux
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E83.9*
- - ¬ Autres anomalies du *E83.8*
- Nucléotides ¬ Anémie due à des anomalies du *D55.3*
- Pentoses-phosphates ¬ Trouble du *E74.8*
- Phosphore phosphatase
- - Sans précision ¬ Anomalies du *E83.39*
- - ¬ Autres anomalies du *E83.38*
- Potassium ¬ Déséquilibre du *E87.8*
- Protéine plasmatique
- - Non classées ailleurs ¬ Anomalies du *E88.0*
- - ¬ Anomalies du *E88.08*
- Purine
- - Pyrimidine
- - - Sans précision ¬ Anomalie du *E79.9*
- - - ¬ Autres anomalies du *E79.8*
- - ¬ Anomalie du *E79.9*
- Pyrimidine ¬ Anomalie du *E79.9*
- Pyruvate
- - Gluconéogenèse ¬ Anomalies du *E74.4*
- - ¬ Trouble du *E74.4*
- Sérine ¬ Trouble du *E72.8*
- Thréonine ¬ Trouble du *E72.8*
- Tryptophane ¬
- - Anomalies du *E70.8*
- - Trouble du *E70.8*
- Valine ¬ Trouble du *E71.1*
- ¬ Affections (des): glandes endocrines et du *Z13.8*

Métacarpe
- Base ¬ Fracture d'un autre os du *S62.31*
- Col ¬ Fracture d'un autre os du *S62.33*
- Diaphyse ¬ Fracture d'un autre os du *S62.32*
- Doigt ¬ Fracture du *S62.8*
- Partie non précisée ¬ Fracture d'un autre os du *S62.30*
- Tête ¬ Fracture d'un autre os du *S62.34*

Métacarpien
v./v.a. carpo-métacarpien
- Col ¬ Fracture du premier *S62.23*
- Courts ¬ Syndrome de résistance à l'insuline-cinquièmes *E14.90*
- Diaphyse ¬ Fracture du premier *S62.22*
- Mauclaire] ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): têtes *M92.2*
- Métatarsiennes ¬ Syndrome de surdité-anomalies génitales-synostoses *Q87.8*
- Partie non précisée ¬ Fracture du premier *S62.20*
- Tête ¬ Fracture du premier *S62.24*
- ¬
- - Fracture de la base du premier *S62.21*

Métacarpien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fractures multiples des *S62.4*
- - Ostéoblastome des *D16.1*
- - Syndrome de lissencéphalie type 3 dysplasie *Q04.3*

Métacarpo-phalangien
- Interphalangienne ¬ Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations *S63.4*
- ¬
- - Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) *S63.61*
- - Luxation du doigt: (Articulation) *S63.11*

Métachondromatose ¬ *Q78.4*

Métachromatique ¬
- Leucoencéphalopathie *E75.2*
- Maladie de Greenfield [Leucodystrophie *E75.2*

Métadiaphysaire type os wormien ¬ Dysplasie cranio- *Q78.8*

Métagonimiase ¬ *B66.8*

Métal
- Lourds
- - Sang ¬ Présence d'un taux anormalement élevé de *R78.7*
- - Urines ¬ Taux anormal de *R82.6*
- - ¬
- - - Hypersensibilité aux *T78.4*
- - - Intoxication
- - - - *T56.9*
- - - - Nucléides transuraniens de *T66*
- - - Néphropathie due à des *N14.3*
- Sans précision ¬ Effet toxique: *T56.9*
- Toutes origines, sauf substances médicamenteuses ¬ *T56*
- ¬
- - Dermite allergique de contact due aux *L23.0*
- - Effet toxique: Autres *T56.8*
- - Fumées et vapeurs de *T56*

Métamérique artério-veineux
- Cérébro-facial
- - Type
- - - 1 ¬ Syndrome *Q28.28*
- - - 2 ¬ Syndrome *Q28.28*
- - - 3 ¬ Syndrome *Q28.28*
- - ¬ Syndrome *Q28.28*
- Spinal ¬ Syndrome *Q27.3*

Métamorphopsie ¬ *H53.1*

Métanéphrique
- Bénigne ¬ Tumeur *D30.0*
- ¬
- - Adénofibrome *D30.0*
- - Adénome *D30.0*

Métaphysaire
v./v.a. Dysplasie métaphysaire

Métaphysaire *–suite*
- Acidurie D-2-hydroxyglutarique ¬ Chondromatose *Q78.4, E72.8*
- Déficience intellectuelle-surdité ¬ Syndrome de dysostose *Q87.2*
- Réduit-dysplasie spondylaire ¬ Syndrome de croissance excessive-modelage *Q87.3*
- Type
- - Jansen ¬ Chondrodysplasie *Q78.5*
- - Kaitila ¬ Chondrodysplasie *Q78.5*
- - McKusick
- - - Déficit immunitaire ¬ Chondrodysplasie *Q78.5, D82.2*
- - - ¬ Chondrodysplasie *Q78.5*
- - Rosenberg ¬ Chondrodysplasie *Q78.5*
- - Schmid ¬ Chondrodysplasie *Q78.5*
- - Spahr ¬ Chondrodysplasie *Q78.5*
- ¬
- - Acroscyphodysplasie *Q78.5*
- - Anadysplasie *Q78.5*
- - Dysplasie spondylo-mégaépiphysaire- *Q77.7*

Métaplasie
- Glandes apocrines du sein ¬ *N60.8*
- Myéloïde ¬ Myélosclérose mégacaryocytaire avec *D47.4*

Métaplasique
v./v.a. Carcinome métaplasique

Métapneumovirus humain ¬
- *B97.8!*
- Bronchiolite aiguë au *J21.1*
- Bronchite à *J20.8*
- Encéphalite à *A85.8†, G05.1**
- Pneumonie due au *J12.3*

Métaraminol ¬ *T44.4*

Métastase
- Ganglion lymphatique
- - Intra-abdominaux ¬ *C77.2*
- - Intrathoraciques ¬ *C77.1*
- Ganglionnaire
- - Inguinale rétropéritonéale ¬ *C77.8*
- - Médiastinale ¬ *C77.1*
- - Susclaviculaire ¬ *C77.0*
- Ombilicale ¬ *C79.2*
- ¬ Fracture vertébrale due à une *C79.5†, M49.59**

Métastatique
- Intestin grêle ¬ Carcinoïde *C17.9*
- ¬
- - Fracture *C79.5†, M90.79**
- - Tumeur neuroendocrinienne *C80.9*

Métastrongylose ¬ *B83.8*

Métatarsalgie
- Morton ¬ *G57.6*
- ¬ *M77.4*

Métatarse ¬
- Fracture
- - Os du *S92.3*

Métatarse ¬ *–suite*
- Fracture *–suite*
- - Ouverte du *S92.3, S91.87!*
- Malformation acquise du *M21.68*
- Ostéochondrite juvénile
- - *M92.7*
- - Os du *M92.7*
- Raccourcissement acquise du *M21.68*

Métatarsien
- Court-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de dysplasie spondylo-épimétaphysaire progressive-petite taille-quatrième *Q87.1*
- Os), articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: *S93.34*
- ¬
- - Ostéoblastome des *D16.3*
- - Ostéochondrite juvénile
- - - Cinquième *M92.7*
- - - Deuxième *M92.7*
- - Syndrome de surdité-anomalies génitales-synostoses métacarpiennes et *Q87.8*

Métatarsique ¬ Dysplasie tchèque type *Q77.7*

Métatarsophalangien
- Gros orteil ¬ Arthroplastie *Z96.68*
- S) ¬ Articulation(s): *S93.5*
- ¬ Luxation d'un (des) orteil(s): (Articulation) *S93.11*

Metatarsus valgus ¬ *Q66.6*

Metatarsus varus
- Acquis ¬ Pied en *M21.68*
- ¬ *Q66.2*

Métatropique ¬
- Dysplasie *Q77.8*
- Insuffisance staturale *Q77.8*

Météorisme ¬ *R14*

Météorologiques) ¬ Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions *W94.9!*

Méthadone ¬
- Intoxication: *T40.3*
- Traitement de substitution à la *Z51.83*

Méthamphétamine ¬
- Consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la *U69.34!*
- Utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la *U69.33!*

Méthanethiol oxydase ¬ Halitose extra-orale autosomique récessive due à un déficit en *E88.8*

Méthanol ¬
- Effet toxique: *T51.1*
- Intoxication
- - *T51.1*
- - *T51.1*

Méthaqualone ¬
- *T42.6*
- Intoxication à la *T42.6*

Méthémoglobinémie
- Acquise
- - Sulfhémoglobinémie ¬ *D74.8*
- - ¬ Cyanose entérogène [*D74.8*
- Congénitale ¬ *D74.0*
- Sans précision ¬ *D74.9*
- Toxique ¬ *D74.8*
- ¬ Autres *D74.8*

Méthicilline ¬ Staphylocoque doré résistant à la *U80.0!*

Méthimazole ¬ Embryofœtopathie au *Q86.88*

Méthionine
- Adénosyltransférase ¬
- - Déficit en *E72.1*
- - Démyélinisation du cerveau par déficit en *E72.1*
- Synthase
- - Type cblG ¬ Déficit fonctionnel en *E72.1*
- - ¬ Déficit fonctionnel en *E72.1*
- ¬
- - Syndrome de malabsorption de la *E72.1*
- - Trouble du métabolisme du cycle de la *E72.1*

Méthioninémie ¬ *E72.1*

Méthode
- Fécondation assistée ¬ Autres *Z31.3*
- Physique ¬ Dépistage prénatal
- - Malformations par échographie et autres *Z36.3*
- - Retard de croissance du fœtus par échographie et autres *Z36.4*
- Spéciales exploration
- - Infections principalement transmises lors des rapports sexuels ¬ *Z11*
- - Maladies intestinales d'origine infectieuse ¬ *Z11*
- - Protozooses et helminthiases ¬ *Z11*
- - Tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes ¬ *Z11*
- - VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales ¬ *Z11*

Méthotrexate ¬ Toxicité au *T45.1*

Méthotréxate ¬ Troubles lymphoprolifératifs associés au *D47.9, Y57.98!*

Méthyl
v./v.a. alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA
v./v.a. alpha-méthyl-acétoacétylique
v./v.a. N-méthyl-D-aspartate

Méthylacyl
v./v.a. alpha-méthylacyl-CoA

Méthylbenzène] ¬ Toluène [*T52.2*

Méthylbutyrique ¬ Acidurie 2- *E71.1*

Méthylbutyryl-CoA déshydrogénase ¬
- Déficit en 2- *E71.1*
- Retard de développement par déficit en 2- *E71.1*

Méthylcobalamine
- Type
- - CblE ¬ Déficit en *E72.1*
- - CblG ¬ Déficit en *E72.1*
- ¬ Déficit en *E72.1*

Méthylcrotonyl glycinurie ¬ 3- *E71.1*

Méthylcrotonyl-CoA carboxylase ¬ Déficit en 3- *E71.1*

Méthyle ¬ Anomalie du transfert cytosolique du groupement *E72.1*

Méthylène
- Tétrahydrofolate réductase ¬ Homocystinurie due à un déficit en *E72.1*
- ¬ Chlorure de *T53.4*

Méthylènetétrahydrofolate déhydrogénase 1 ¬ Déficit en *E88.8*

Méthylglutaconique
- Surdité-encéphalopathie] ¬ Syndrome MEGDEL [Syndrome Leigh-like-acidurie 3- *G31.88*
- Type
- - 1 ¬ Acidurie 3- *E71.1*
- - 2 ¬ Acidurie 3- *E71.1*
- - 3 ¬ Acidurie 3- *E71.1*
- - 4 ¬ Acidurie 3- *E71.1*
- - 5 ¬ Acidurie 3- *E71.1†, I43.1**
- - 7 ¬ Acidurie 3- *E71.1*
- - 8 ¬ Acidurie 3- *E71.1*
- - 9 ¬ Acidurie 3- *E71.1*

Méthylglutaconyl-CoA hydratase ¬ Déficit en 3- *E71.1*

Méthylglutaryl
v./v.a. hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA

Méthylique ¬
- Alcool *T51.1*
- Effet toxique de l'alcool *T51.1*

Méthylmalonate semialdéhyde déshydrogénase ¬ Retard de développement par déficit en *E71.1*

Méthylmalonique
- Déficit
- - Méthylmalonyl-CoA épimérase ¬ Acidurie *E71.1*
- - Récepteur de la transcobalamine ¬ Acidurie *E71.1*
- Homocystinurie
- - Type
- - - CblC ¬ Acidémie *E72.8*
- - - CblD ¬ Acidémie *E72.8*
- - - CblF ¬ Acidémie *E72.8*
- - - CblJ ¬ Acidémie *E72.8*
- - ¬ Acidémie *E71.1, E72.1*
- Résistante vitamine B12 ¬
- - Acidémie *E71.1*
- - Acidurie *E71.1*
- Sensible vitamine B12
- - Type
- - - CblA ¬ Acidurie *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidémie *E71.1*

Méthylmalonique *–suite*
- Sensible vitamine B12 *–suite*
- - ¬
- - - Acidémie *E71.1*
- - - Acidurie *E71.1*
- ¬
- - Acidémie: *E71.1*
- - Acidose lactique fatale avec acidurie *E71.1, E87.2*
- - Acidurie combinée malonique et *E71.1, E72.8*
- - Syndrome de déplétion de l'ADN mitochondrial forme encéphalomyopathique avec acidurie *G31.81, E71.1*

Méthylmalonyl-CoA
- Épimérase ¬ Acidurie méthylmalonique par déficit en *E71.1*
- Mutase ¬ Déficit
- - Complet en *E71.1*
- - Partiel en *E71.1*

Méthylmercure ¬ Embryopathie au *Q86.88*

Méthyloxydase type I] ¬ CMO I [Déficit en corticostérone *E27.4*

Méthyltransférase ¬ Déficit
- Congénital en TPMT (thiopurine *E88.8*
- Guanidinoacétate *E72.8*

Méticilline
- Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la *U80.00!*
- MRSA] ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la *U80.00!*
- ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la *U80.01!*

Métopique
- Ptosis-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'épaississement de la suture *Q87.0*
- Sagittale non syndromique ¬ Craniosynostose *Q75.0*
- ¬ Synostose bilatérale non syndromique de la suture coronale et de la suture *Q75.0*

Métrite ¬ *N71*

Métrorragie
- Climatérique ¬ Ménorragie ou *N92.4*
- Ménopausique ¬ Ménorragie ou *N92.4*
- Préclimatérique ¬ Ménorragie ou *N92.4*
- Préménopausique ¬ Ménorragie ou *N92.4*
- ¬ *N92.1*

Mettre les doigts dans le nez ¬ Se *F98.88*

Meulengracht ¬ Syndrome de Gilbert *E80.4*

Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.3*

Mévalonate kinase ¬ Déficit
- Complet en *E88.8*
- Partiel en *D89.8*

Mévalonique ¬ Acidurie *E88.8*

Meyenburg
v./v.a. Von-Meyenburg-Altherr-Uehlinger

Meyer
v./v.a. Say-Meyer
- ¬ Dysplasie de la tête du fémur type *Q78.8*

Meyer-Schwickerath ¬ Syndrome de *Q87.0*

MFA] ¬ Myélite flasque aiguë [*A88.8*

MFDM ¬ Syndrome *Q87.0*

MFF ¬ Encéphalopathie par défaut de fission mitochondriale et peroxysomale associée à *G31.81*

MFS [Syndrome de Marfan] ¬ *Q87.4*

MGF], type non précisé ¬ Female genital mutilation [*Z91.70*

MGP ¬ Dysplasie spondylo-épiphysaire liée à *Q77.7*

MHA [Anomalie de May-Hegglin] ¬ *D72.0*

MHF [Fièvre hémorragique de Marbourg] ¬ *A98.3*

Miasi urogenitale ¬ *B87.8*

Mibelli ¬ Porokératose de *Q82.8*

Micafungine ¬ Candida glabrata résistant à la *U83.1!*

Micheli
v./v.a. Marchiafava-Micheli

Michels
v./v.a. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

MICI [maladie inflammatoire chronique de l'intestin] ¬ *K52.9*

Micro
- Embolie rétinienne ¬ *H34.2*
- Encéphale ¬ *Q02*
- Papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (*A66.2*
- ¬ Syndrome *Q04.3*

Micro-anévrisme
- Diabétique de la rétine ¬ *E14.30†, H36.0**
- Rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*

Microangiopathie
- Cérébrale pontine autosomique dominante avec leucoencéphalopathie] ¬ PADMAL [*I67.88, G93.4*
- Conjonctive dû au VIH ¬ Syndrome de *B23.8, M31.1*
- Diabétique diabète sucré type
- - 1 ¬ *E10.50†, I79.2**
- - 2 ¬ *E11.50†, I79.2**
- Macroangiopathie ¬ Diabète sucré avec *E14.50†, I79.2**
- Rétine dû au VIH ¬ Syndrome de *B23.8, H35.0*
- Thrombotique
- - Novo après transplantation rénale ¬ *M31.1, Z94.0*
- - ¬ *M31.1*

Microbiologique
- Anormal du liquide céphalorachidien ¬ Résultat *R83.5*
- Urines ¬ Résultats anormaux de l'examen *R82.7*

Microbrachycéphalie
- Ptosis-fente labiale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Sévère-déficience intellectuelle-paralysie cérébrale athétosique ¬ Syndrome de *Q87.0*

Microcéphalie
v./v.a. achalasie-microcéphalie
v./v.a. aphalangie-syndactylie-microcéphalie
- Albinisme-anomalies digitales ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Arthrogrypose et anomalies structurelles du cerveau ¬ Trouble du développement neurologique avec *Q87.8*
- Autosomique récessive ¬ Syndrome de choriorétinopathie- *Q87.8*
- Brachydactylie-cyphoscoliose ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Cataracte
  - - Bilatérale congénitale ¬ Syndrome de porencéphalie- *Q04.8, Q12.0*
  - - ¬ Syndrome d'ostéogenèse imparfaite- *Q87.8*
- Cataracte congénitale-dermatite psoriasiforme ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Congénitale
  - - Due à la toxoplasmose ¬ *P37.1*
  - - Dystonie-anémie-retard de croissance ¬ Syndrome CIMDAG [hypoplasie cérébelleuse-déficience intellectuelle- *Q87.8*
  - - Encéphalopathie sévère-atrophie cérébrale progressive ¬ Syndrome de *E72.8*
- Corps calleux fin-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Cranioténose-dermatite sévère ¬ Syndrome d'agammaglobulinémie- *D80.0*
- Déficience intellectuelle
  - - Modérée-diabète juvénile ¬ Syndrome de *Q87.1*
  - - Petite taille liée à l'X ¬ Syndrome de microphtalmie colobomateuse- *Q87.1*
  - - Sévère-anomalies congénitales multiples associé à SETD2 ¬ Syndrome de *Q87.8*
  - - Surdité neurosensorielle-épilepsie-tonus musculaire anormal ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Due à la maladie congénitale à virus Zika ¬ *P35.4*
- Dysmorphie facial
  - - Anomalies oculaires-anomalies congénitales multiples ¬ Syndrome de *Q87.0*
  - - Associé à THOC6 ¬ Syndrome de retard de développement- *Q87.0*
- Dysplasie squelettique ¬ Syndrome d'épilepsie- *Q87.8*
- Épilepsie-déficience intellectuelle-cardiopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Faiblesse musculaire-atrophie optique ¬ Syndrome d'atrophie cérébrale diffuse précoce- *G31.88*
- Fente palatine-pigmentation rétinienne anormale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Fusions des vertèbres cervicales ¬ Syndrome de *Q87.8*

Microcéphalie *–suite*
- Glomérulonéphrite et habitus marfanoïde ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Hypoplasie cérébelleuse-trouble de la conduction cardiaque ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Hypoplasie corps calleux
  - - Déficience intellectuelle-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.0*
  - - Vermis cérébelleux-dysmorphie faciale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Hypoplasie pontocérébelleuse ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Létale type Amish ¬ *Q02*
- Leucoencéphalopathie progressive associée à PYCR2 ¬ *Q87.0*
- Malformation capillaire ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Malformation cérébrale - spasticité - hypernatrémie ¬ Syndrome de *Q04.8*
- Malformation corticale-habitus mince ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Microcornée type Seemanova ¬ *Q87.8*
- Neuropathie sensitivo-motrice axonale complexe ¬ Syndrome de *G60.0, Q02*
- Petite taille
  - - Anomalies des membres associé à DONSON ¬ Spectre *Q87.1*
  - - Déficience intellectuelle-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.1*
  - - Épilepsie associé à MTHFS ¬ Syndrome de retard de développement- *G31.88*
- Polymicrogyrie-agénésie du corps calleux ¬ Syndrome de *Q02, Q04.0*
- Post-natal
  - - Hypotonie infantile-diplégie spastique-dysarthrie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
  - - Progressive ¬
    - - - Atrophie cérébrale et cérébelleuse infantile avec *G31.9, Q02*
    - - - Syndrome tétraplégie spastique-corps calleux fin- *Q02*
- Primaire-épilepsie-diabète néonatal permanent ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Progressive
  - - Épilepsie-cécité corticale-retard de développement ¬ Syndrome de *Q02*
  - - ¬ Syndrome d'atrophie cérébrale et cérébelleuse diffuse-épilepsie réfractaire- *Q02*
- Retard de croissance
  - - Prognathisme-cryptorchidie ¬ Syndrome lié à l'X de *Q87.8*
  - - Sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné- *D81.1*
- Scoliose ¬ Syndrome de synostose radio-ulnaire- *Q02, Q77.8*
- Sévère-surdité neurosensorielle-dysmorphie ¬ Syndrome d'hypogonadisme hypogonadotrope- *Q87.8*

Microcéphalie *–suite*
- Surdité
  - - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
  - - Dysmorphie faciale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Tétraplégie ¬ Syndrome d'ichtyose congénitale- *Q87.8*
- ¬
  - - *Q02*
  - - Encéphalopathie néonatale sévère avec *G93.4, Q02*
  - - Syndrome d'extrasystoles-petite taille-hyperpigmentation- *Q87.1*

Microcéphalie-cardiomyopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Microcéphalie-cardiopathie-malsegmentation pulmonaire ¬ Syndrome de *Q87.8*

Microcéphalie-facio-cardio-squelettique, type Hadziselimovic ¬ Syndrome de *Q87.8*

Microcéphalie-lymphœdème-choriorétinopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Microcéphalique
- Déficit en ZNF335 ¬ Nanisme primordial *Q87.1*
- Ostéodysplasique primordial
  - - Type II ¬ Nanisme *Q87.1*
  - - Types
    - - - I ¬ Nanisme *Q87.1*
    - - - III ¬ Nanisme *Q87.1*
- Petite taille par déficit en RTTN ¬ Malformations corticales *Q87.1*
- Primordial
  - - Résistance à l'insuline ¬ Syndrome de nanisme *Q87.1*
  - - Type
    - - - Dauber ¬ Nanisme *Q87.1*
    - - - Montréal ¬ Nanisme *Q87.1*
    - - - Toriello ¬ Nanisme *Q87.1*
- Type Saul-Wilson ¬ Dysplasie ostéodysplasique *Q87.5*

Microcheilie ¬ *Q18.7*

Microcôlon ¬ *Q43.8*

Microcorie congénitale ¬ *Q13.2*

Microcorie-néphrose congénitale) ¬ Syndrome de Pierson (*N04.1, Q13.8*

Microcornée
- Dystrophie des cônes et des bâtonnets-cataracte-staphylome postérieur] ¬ Syndrome MRCS [*Q15.8*
- Glaucome-absence de sinus frontaux ¬ Syndrome de *Q15.0, Q13.4*
- Glucosurie rénale ¬ Syndrome de cataracte juvénile- *E88.8*
- Lenticône postérieur, vitré primaire hyperplasique persistant et colobome ¬ Syndrome *Q15.8*
- Myopie avec atrophie choriorétinienne-télécanthus] ¬ Syndrome MMCAT [*Q15.8*

Microcornée *–suite*
- Opacité cornéenne ¬ Syndrome de cataracte congénitale- *Q13.8*
- Type Seemanova ¬ Microcéphalie- *Q87.8*
- ¬
- - *Q13.4*
- - Syndrome
- - - Aphakie congénitale-hypoplasie de l'iris-microphtalmie- *Q13.8*
- - - Cataracte- *Q13.8*
- - - MACOM [macrophtalmie colobomateuse- *Q15.8*

Microcristaux
- Cours
- - Hyperparathyroïdie ¬ Arthropathie due à des *E21.3†, M14.19**
- - Troubles métaboliques classés ailleurs ¬ Arthropathie à *M14.1**
- Précisés ¬ Autres arthropathies dues à des *M11.8*
- Sans précision ¬ Arthropathie due à des *M11.9*

Microcystoïde ¬ Dégénérescence rétinienne: *H35.4*

Microcytaire avec surcharge hépatique en fer ¬ Anémie *D50.8*

Microdélétion
- 1p21.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 1p31p32 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 1p35.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 1q21.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 1q41q42 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 1q44 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2p13.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2p15p16.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2p21
- - Sans cystinurie ¬ Syndrome de *Q93.5*
- - ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2q13 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2q23.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2q24 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2q31.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2q32q33 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2q33.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 2q37 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 3p25.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 3q13 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 3q26q27 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 3q26q28 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 3q27.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 3q29 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 4q21 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 5q14.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 5q22 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 5q35 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 6p22 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 6p25 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 6q16 ¬ Syndrome de *Q93.5*

Microdélétion *–suite*
- 6q25 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 6q25.2q25.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 7q11.23 distale ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 7q31 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 8p11.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 8p23.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 8q21.11 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 8q22.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 8q24.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 9 q31.1q31.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 9p13 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 9q21.13 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 9q22.3 ¬ *Q93.5*
- 9q33.3q34.11 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 10p13-p14 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 10q22.3q23.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 11p15 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une *Q87.3*
- 11q22.2q22.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 12p12.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 12p13.33 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 12q14 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 12q15q21 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 12q15q21.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 13q12.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 13q14 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 14q11.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 14q12 ¬ Syndrome
- - *Q93.5*
- - FOXG1 dû à une *Q93.5*
- 14q22q23 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 14q24.1q24.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 15q11.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 15q13.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 15q14 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 15q24 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 16p11.2 proximale ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 16p11.2p12.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 16p13.11 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 16p13.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 16q24.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 16q24.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 17p13.1 distale ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 17q12 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 17q21.31 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 17q23.1q23.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 17q24.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 19p13.12 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 19p13.13 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 19q13.11 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 20p12 ¬ Syndrome d'Alagille dû à une *Q44.7*
- 20p12.3 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 20p13 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 20q11.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*

Microdélétion *–suite*
- 20q13.2q13.3 paternelle ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 20q13.33 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 21q22.11q22.12 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 22q11.2 distale ¬ Syndrome de *Q93.5*
- Chromosome Y ¬ *Q98.6*
- Xp11.3 ¬ Maladie de Norrie atypique due à une *Q15.8*
- Xp21 ¬ Syndrome de *Q99.8*
- Xp22.3 ¬ Syndrome de *Q99.8*
- Xq21 ¬ Syndrome de *Q99.8*

Microdélétion-neurofibromatose type 1 ¬ Syndrome de *Q85.0*

Microdélétion-NF1 ¬ Syndrome de *Q85.0*

Microdontie ¬
- *K00.2*
- Surdité avec aplasie du labyrinthe, microtie et *Q16.5*

Microduplication
- 1q21.1 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 2p25.3 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 2q23.1 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 2q31.1 ¬ Syndrome de syndactylie-nystagmus dû à une *Q92.3*
- 3q26 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 3q29 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 4p16.3 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 5p13 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 5q35 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 7p22.1 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 7q11.23 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 8q12 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 10q22.3q23.3 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 10q24 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 11p15 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une *Q87.3*
- 11p15.4 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 14q11.2 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 15q11q13 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 16p11.2 proximale ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 16p11.2p12.2 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 16p13.11 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 17p11.2 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 17q11.2 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 17q12 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 17q21.31 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 19p13.3 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 20q11.2 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- 22q11.2 distale ¬ Syndrome de *Q92.3*
- Xp11.22p11.23 ¬ Syndrome de *Q99.8*
- Xq25 ¬ Syndrome de *Q99.8*
- Xq27.3-q28 ¬ Syndrome de *Q99.8*

Microgastrie
- Anomalie des membres ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬ *Q40.2*

Microgliome ¬ *C85.7*

Microglossie ¬ *Q38.3*

Micrognathie

- Infections récurrentes-troubles du comportement-déficience intellectuelle modérée ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Mandibulaire) (maxillaire) ¬ *K07.0*
- Petite taille rhizomélique et dysmorphie faciale ¬ Syndrome de retard de croissance intra-utérine avec *Q87.1*
- ¬ Syndrome
- - Agénésie du corps calleux avec déficience intellectuelle, colobome et *Q87.8*
- - Fusion splénogonadique-anomalie transversale des membres- *Q87.8*

Microgyrie ¬ *Q04.3*

Micro-hémorragie ¬ *R58*

Microhydranencéphalie associée à NDE1 ¬ *Q04.8*

Microkystique

- Tissulaire infiltrante ¬ Malformation lymphatique *D18.19*
- ¬
- - Adénome
- - - *D13.6*
- - - Pancréatique *D13.6*
- - Tumeur stromale *D27*

Microlissencéphalie ¬ *Q04.3*

Microlithiase pulmonaire alvéolaire

- Exacerbation aiguë ¬ *J84.01*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J84.00*
- ¬ *J84.00*

Micromastie

- Développement insuffisant des glandes mammaires] ¬ *Q83.88*
- ¬ *Q83.88*

Micromélie ¬ *Q73.8*

Micronodulaire

- Corticosurrénalienne isolée ¬ Maladie *E24.8*
- ¬ Cirrhose (du foie): *K74.6*

Micro-organisme

- Aérobies à Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.90!*
- Anaérobies
- - Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus fragilis et autres *B96.6!*
- - Gram positif non sporulants précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.91!*
- - Sporulants à Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres *B96.7!*
- - ¬ Septicémie à *A41.4*
- Gram négatif
- - SAI ¬ Septicémie à *A41.5*
- - ¬
- - - Choc septique à *A41.58, R57.2*
- - - Septicémie

Micro-organisme *–suite*

- Gram négatif *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Septicémie *–suite*
- - - - *A41.5*
- - - - *A41.58*
- Infectieux ¬ Pneumonie due à d'autres *J16.8*
- Non précisé ¬ Autres pneumonies, *J18.8*
- Précisés ¬
- - Amygdalite aiguë due à d'autres *J03.8*
- - Bronchiolite aiguë due à d'autres *J21.8*
- - Bronchite aiguë due à d'autres *J20.8*
- - Pharyngite aiguë due à d'autres *J02.8*
- Toute localisation] ¬ Impétigo [tout *L01.0*
- ¬ Pneumonie congénitale due à d'autres *P23.8*

Micropénis

- Isolé idiopathique ¬ *Q55.6*
- ¬ Syndrome MORM [déficience intellectuelle-obésité du tronc-dystrophie rétinienne- *Q87.8*

Microphtalmie

- Ankyloblépharon-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q11.2*
- Atrésie de l'œsophage ¬ Syndrome de *Q11.2, Q39.0*
- Atrophie cérébrale ¬ Syndrome de *Q11.2*
- Colobomateux
- - Microcéphalie-déficience intellectuelle-petite taille liée à l'X ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - Obésité-hypogénitalisme-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Colobome-dysplasie rhizomélique ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Congénitale due à la toxoplasmose ¬ *P37.1*
- Fente palatine ¬ Syndrome de macrosomie- *Q87.0*
- Fryns ¬ Syndrome *Q87.8*
- Glaucome ¬ Syndrome de dégénérescence rétinienne- *H35.5†, H42.8*, Q11.2*
- Kyste colobomateux ¬ Syndrome de *Q11.2*
- Macrocéphalie-albinisme-surdité] ¬ Syndrome COMMAD [colobome-ostéopétrose- *Q87.8*
- Microcornée ¬ Syndrome d'aphakie congénitale-hypoplasie de l'iris- *Q13.8*
- Microtie-akinésie fœtale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Retard moteur-retard de langage-anomalies cérébrales-hernie diaphragmatique ¬ Syndrome de *Q11.2*
- Rétinite pigmentaire-fovéoschisis-drusen de la papille optique ¬ Syndrome de *Q15.8*
- Syndromique type 5 ¬ *Q11.2*
- Type Lenz ¬ *Q11.2*
- ¬
- - *Q11.2*
- - Syndrome d'arhinie-atrésie des choanes- *Q87.0*

Micropolyangéite microscopique ¬ *M31.7*

Microrétrognathie-déficience intellectuelle sévère ¬ Syndrome de craniosynostose- *Q87.8*

Microsomie

- Cranio-faciale ¬ *Q87.0*
- Latéro-faciale ¬ *Q87.0*

Microsphérophakie

- Dysplasie métaphysaire ¬ Syndrome de *Q12.4, Q78.5*
- Isolée ¬ *Q12.4*
- ¬ Syndrome d'ichtyose-petite taille-brachydactylie- *Q87.1*

Microsporidiose

- Intestinale ¬ *A07.8*
- ¬
- - *B60.88*
- - Entérite à *A07.8*

Microsporosis nigra ¬ *B36.1*

Microsporum et Trichophyton ¬ Infections causées par les espèces appartenant aux genres Epidermophyton, *B35*

Microstomie ¬ *Q18.5*

Microtia syndrome ¬ Mastocytose cutanée-surdité- *Q87.8*

Microtie

- Akinésie fœtale ¬ Syndrome de microphtalmie- *Q87.8*
- Anomalies squelettiques-petite taille ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Bilatérale-surdité-fente palatine ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Colobome oculaire-imperforation du canal lacrymonasal ¬ Syndrome de *Q15.8, Q17.2*
- Congénitale ¬ *Q17.2*
- Microdontie ¬ Surdité avec aplasie du labyrinthe, *Q16.5*
- Oreille externe ¬ *Q17.2*

Microtropie ¬ *H50.4*

Microveinulaire de la peau ¬ Hémangiome *D18.01*

Microvillositaire congénitale ¬ Atrophie *K90.8*

Micro-Warburg ¬ Syndrome *Q04.3*

Miction

- Douloureuse, sans précision ¬ *R30.9*
- Fréquente ¬
- - *R35.1*
- - Formes psychogènes de: *F45.3*
- Nocturne fréquente ¬ *R35.2*
- Ralentie ¬ *R39.1*
- SAI ¬ Douleurs à la *R30.9*
- ¬
- - Crises induites par la *G40.8*
- - Fractionnement de la *R39.1*
- - Troubles de la *R39.1*

Mictionnelle ¬ Syncope *R55*

Mid-aortic» ¬ Syndrome « *Q25.1*

MIDAS ¬ Syndrome *Q11.2*

Miel ¬ Dystrophie cornéenne en rayon de *H18.5*

Mietens ¬ Syndrome de *Q87.2*

Mietens-Weber ¬ Déficience intellectuelle type *Q87.2*

Migraine

- Aura
- - Migraine classique] ¬ *G43.1*
- - Prolongée ¬ *G43.1*
- - Sans céphalée ¬ *G43.1*
- - Typique ¬ *G43.1*
- Basilaire ¬ *G43.1*
- Classique] ¬ Migraine avec aura [*G43.1*
- Commune] ¬ Migraine sans aura [*G43.0*
- Compliquée ¬ *G43.3*
- Équivalents migraineux ¬ *G43.1*
- Familiale, hémiplégique ¬ *G43.1*
- Installation aiguë de l'aura ¬ *G43.1*
- Ophtalmoplégique ¬ *G43.8*
- Rétinienne ¬ *G43.8*
- Sans
- - Aura [migraine commune] ¬ *G43.0*
- - Précision ¬ *G43.9*
- ¬
- - *G43.8*
- - Céphalée unilatérale dans le sens d'une *G43.9*
- - Hémicrânie dans le sens d'une *G43.9*

Migraineux ¬

- État de mal *G43.2*
- Migraine: équivalents *G43.1*
- Névralgie *G44.0*
- Syndrome de dystrophie rétinienne-œdème du nerf optique-splénomégalie-anhidrose-céphalée *Q87.8*

Migrans viscérale ¬ Larva *B83.0*

Migrant

- Continues ¬ Encéphalopathie progressive précoce avec crises myocloniques *G40.4*
- Maligne du nourrisson ¬ Épilepsie partielle *G40.4*
- ¬
- - Dermatite *B83.1*
- - Érythème *A26.0*

Migrateur à Borrelia burgdorferi ¬ Érythème chronique *A69.2*

Migration du testicule ¬ *Q55.2*

Migratoire

- Bénigne ¬ Glossite: *K14.1*
- ¬
- - Epidermolyse bulleuse simple *Q81.0*
- - Épilepsie de la petite enfance avec crises focales *G40.4*

Migratrice ¬ Thrombophlébite *I82.1*

Mikati-Najjar-Sahli ¬ Syndrome de *Q87.1*

Mikity ¬ Syndrome de Wilson- *P27.0*

Mikulicz ¬ Maladie de *K11.8*

Miles-Carpenter ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Miliaire

- Aiguë
- - Localisation unique et précisée ¬ Tuberculose *A19.0*
- - Multiple ¬ Tuberculose *A19.1*
- - ¬ Tuberculose *A19.2*
- Apocrine ¬ *L75.2*
- Chronique ¬ Tuberculose *A19.8*
- Cristalline ¬ *L74.1*
- Nécrosante ¬ Acné *L70.2*
- Profonde ¬ *L74.2*
- Rouge ¬ *L74.0*
- Sans précision ¬ *L74.3*
- Tropicale ¬ *L74.2*
- Viscères NCA ¬ Tuberculose *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Granulomatose *A32.8*
- - Pneumonie *J18.8*
- - Tuberculose
- - - *A19.9*
- - - Pulmonaire *A19.9*

Milieu

- Familial ¬ Trouble des conduites limité au *F91.0*
- Isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour protéger le sujet de son *Z29.0*

Millard-Gubler ¬ Syndrome de *I67.9†, G46.3**

Millard-Gubler-Foville ¬ Paralysie de *I67.9†, G46.3**

Miller

v./v.a. Say-Barber-Miller

- Fisher ¬ Syndrome de *G61.0*

Miller-Dieker ¬ Syndrome de *Q93.5*

Mills ¬ Syndrome de *G12.2*

Milroy

v./v.a. Nonne-Milroy

- ¬ Maladie de *Q82.09*

Mims

v./v.a. Schimmelpenning-Feuerstein-Mims

Minamata

- Acquise ¬ Maladie de *T56.1*
- Congénitale ¬ Maladie de *Q86.88*
- ¬ Maladie de *T56.1*

Minérale

- Mention d'exacerbation aiguë ¬ Pneumoconiose due à des fibres *J61.1*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Pneumoconiose due à des fibres *J61.0*
- ¬
- - Pneumonie due à des fibres *J61.0*
- - Taux anormal de: substance *R79.0*

Minéralocorticoïdes

- Antagonistes ¬ Intoxication: *T50.0*
- Crise hypertensive ¬ Excès apparent de *I15.11*

Minéralocorticoïdes *–suite*

- ¬ Excès apparent de *I15.10*

Minéraux

- Sang ¬ Taux anormal de *R79.0*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E83.9*
- ¬ Autres anomalies du métabolisme des *E83.8*

Mingarelli

v./v.a. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

Mini-core» ¬ Myopathie: de type: « *G71.2*

Minimale ¬

- Leucémie myéloïde aiguë avec différenciation *C92.00*
- Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux stéroïdes avec lésions *N04.0*

Minkowski-Chauffard ¬ Syndrome de *D58.0*

Minoxidil fœtal ¬ Syndrome du *Q86.88*

Miotique ¬ Kyste pupillaire *H21.2*

Mirabilis

- Agent pathogène ¬ Proteus *B96.2!*
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Proteus *U81.07!*
- - 3MRGN ¬ Proteus *U81.27!*
- - 4MRGN ¬ Proteus *U81.47!*
- ¬ Infection à Proteus *A49.82*

MIRAGE [Syndrome de myélodysplasie-infections-retard de croissance-hypoplasie surrénalienne-anomalies génitales-entéropathie] ¬ Syndrome *Q87.8*

Miroir

- Congénitaux familiaux ¬ Mouvements en *G25.88*
- Pied ¬ Syndrome de duplication du péroné avec polydactylie en *Q74.8*
- Segmentation vertébrale-anomalies des membres ¬ Syndrome de polydactylie en *Q87.2*
- Situs inversus ¬ Disposition auriculaire en *Q89.3*
- ¬ Polydactylie en *Q69.9*

Missouri ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

MiT ¬ Carcinome rénal associé à une translocation de la famille *C64*

Mitchell

- Érythromélalgie) ¬ Maladie de *I73.8*
- Polyneuropathie) ¬ Syndrome de *G37.8*

Mitis ¬ Prurigo (de): *L28.2*

Mitochondrial

- Acidose lactique
- - Déficit en MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique *I42.2*
- - Surdité ¬ Syndrome de myopathie *G71.3*
- Adulte par déficit en DGUOK ¬ Syndrome de délétions multiples de l'ADN *G71.3*
- Anémie sidéroblastique ¬ Myopathie *G71.3*
- Aspartate-glutamate 1 ¬ Déficit en transporteur *E72.0*

Mitochondrial *–suite*
- Associée
- - DNA2 ¬ Syndrome de délétion de l'ADN *G71.3*
- - MT-AP6 ¬ Paraplégie spastique *G11.4*
- - TMEM70 ¬ Encéphalo-cardio-myopathie *G31.81*
- Ataxie cérébelleuse-rétinopathie pigmentaire ¬ Syndrome de myopathie *G31.81*
- Autosomique dominante avec intolérance à l'effort ¬ Myopathie *G71.3*
- Défaut de synthèse des protéines mitochondriales ¬ Maladie *E88.8*
- Déficit réversible en COX ¬ Myopathie *G71.3*
- Diabète sucré ¬ Syndrome de myopathie *G71.3, E14.90*
- DPTFM] ¬ Déficit en protéine trifonctionnelle *E71.3*
- Due à un déficit combiné de la phosphorylation oxydative de type 6 ¬ Encéphalomyopathie *G31.81*
- Encéphalopathie, acidose lactique et épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie *G31.81*
- Énoyl-CoA hydratase 1 à chaîne courte ¬ Déficit *G31.81*
- Épilepsie ¬ Ataxie spinocérébelleuse *G31.81*
- Focale ¬ Myopathie proximale avec déplétion *G71.3*
- Forme
- - Encéphalomyopathique
- - - Acidurie méthylmalonique ¬ Syndrome de déplétion de l'ADN *G31.81, E71.1*
- - - Anomalies cranio-faciales variables ¬ Syndrome de déplétion de l'ADN *G31.81, Q75.9*
- - - Tubulopathie rénale ¬ Déplétion de l'ADN *G31.81†, N16.8**
- - Hépatocérébrale par déficit en DGUOK ¬ Déplétion de l'ADN *G31.81*
- - Hépato-cérébro-rénale ¬ Déplétion de l'ADN *G31.81*
- - Myopathique ¬ Déplétion de l'ADN *G71.3*
- Létale infantile ¬ Myopathy *G71.3*
- Multiples
- - Type
- - - 1 ¬ Syndrome de dysfonctionnements *G31.81*
- - - 2 ¬ Syndrome de dysfonctionnements *G31.81*
- - - 3 ¬ Syndrome de dysfonctionnements *G31.81*
- - - 4 ¬ Syndrome de dysfonctionnements *G31.81*
- - - 5 ¬ Syndrome de dysfonctionnements *G31.81*
- - - 6 ¬ Syndrome de dysfonctionnements *G31.81*
- - ¬ Syndrome de dysfonctionnements *G31.81*
- Non syndromique avec sensibilité accrue aux aminoglycosides ¬ Surdité neurosensorielle *H90.5*

Mitochondrial *–suite*
- Peroxysomale
- - Associée
- - - DNM1L ¬ Encéphalopathie par défaut de fission *G31.81*
- - - MFF ¬ Encéphalopathie par défaut de fission *G31.81*
- - ¬ Encéphalopathie par défaut de fission *G31.81*
- Pure ¬ Myopathie *G71.3*
- Pyruvate ¬ Déficit en transporteur *G31.81*
- Sévère liée à l'X ¬ Encéphalomyopathie *G31.81*
- Transmission maternelle ¬ Dystonie *G71.3*
- Type Ghezzi-Zeviani ¬ Encéphalomyopathie *G31.81*
- ¬
- - Cardiomyopathie
- - - Hypertrophique
- - - - Infantile létale par déficit en complexe I de la chaîne respiratoire *I42.2*
- - - - Tubulopathie dues à une mutation de l'ADN *I42.2*
- - - Surdité dues à une mutation de l'ADN *G31.81*
- - Cytopathie *G31.81*
- - Déficit
- - - Acétoacétyl-CoA thiolase *E71.1*
- - - Isolé complexe
- - - - I de la chaîne respiratoire *G31.81*
- - - - III de la chaîne respiratoire *G31.81*
- - - - IV de la chaîne respiratoire *G31.81*
- - - - V de la chaîne respiratoire *G31.81*
- - - Protéine trifonctionnelle *E71.3*
- - Insuffisance hépatique infantile aiguë par défaut de synthèse des protéines codées par l'ADN *K72.0*
- - Maladie mitochondriale par défaut de synthèse des protéines *E88.8*
- - Myoencéphalopathie *G31.81*
- - Neurodégénérescence associée à la protéine de membrane *G23.0*
- - Ophtalmoplégie externe progressive chronique de l'adulte avec myopathie *G71.3, H49.4*
- - Surdité neurosensorielle non syndromique *H90.5*
- - Syndrome de cataracte congénitale-cardiomyopathie hypertrophique-myopathie *Q87.8*
- - Tubulopathie rénale Gitelman-like due à une mutation de l'ADN *N15.8*

Mitochondries ¬ Détection d'anticorps anti- *R76.88*

Mitochondriopathie ¬
- *G31.81*
- Myopathie cardiosquelettique avec neutropénie et *E71.1*

Mitotique ¬
- Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q93.1*
- Trisomie
- - 13 mosaïque chromosomique non-disjonction
- - - *Q91.5*
- - - *Q91.5*
- - 18 mosaïque chromosomique non-disjonction
- - - *Q91.1*
- - - *Q91.1*
- - 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q90.1*
- - Chromosome entier mosaïque chromosomique non-disjonction
- - - *Q92.1*
- - - *Q92.1*

Mitral
v./v.a. Valve mitrale
- Accessoire ¬ Tissu valvulaire *Q23.8*
- Aortique
- - Combinées ¬ Atteintes des valves *I08.0*
- - Précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée ¬ Lésions des valves *I08.0*
- - Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des valves *I08.3*
- Chronique) SAI ¬ Atteinte (valvulaire) *I05.9*
- Congénital ¬ Rétrécissement *Q23.2*
- Congénitale ¬
- - Atrésie *Q23.2*
- - Insuffisance *Q23.3*
- - Malformation *Q23.9*
- - Sténose *Q23.2*
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la valvule *I39.0**
- - Syndrome d'hypoplasie du cœur gauche ¬ Atrésie *Q23.4*
- E
- - Rhumatismal(e) ¬ Reflux *I05.1*
- - SAI cause précisée sauf rhumatismal ¬
- - - Insuffisance (de la valvule) *I34.0*
- - - Régurgitation (de la valvule) *I34.0*
- - ¬ Prolapsus (de la valvule) *I34.1*
- Familial ¬ Prolapsus valvulaire *I34.1*
- Insuffisance
- - Mitrale ¬ Sténose non rhumatismale de la valvule *I34.80*
- - Régurgitation ¬ Sténose *I05.2*
- - ¬ Sténose *I05.2*
- Rhumatismale ¬ Insuffisance *I05.1*
- Sans précision ¬
- - Atteinte non rhumatismale de la valvule *I34.9*
- - Maladie de la valvule *I05.9*

Mitral *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Malformation congénitale des valvules aortique et *Q23.9*
- Subvalvulaire ¬ Anomalie de l'appareil *Q23.8*
- Syphilitique ¬ Sténose *A52.0†, I39.0**
- Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des valves *I08.1*
- ¬
- - Anneau supravalvulaire *Q23.2*
- - Anomalie de l'appareil sous-valvulaire *Q23.3*
- - Atrésie *Q23.2*
- - Endocardite rhumatismale aiguë de la valve aortique avec maladie de la valvule *I01.1*
- - Fente *Q23.8*
- - Hypoplasie de l'anneau *Q23.2*
- - Insuffisance (de la valvule) *I34.0*
- - Macrothrombocytopénie avec insuffisance *D69.1, I34.0*
- - Maladies de la valvule *I05.8*
- - Malformations congénitales des valvules aortique et *Q23.8*
- - Rétrécissement (rhumatismal) de la valvule *I05.0*
- - Sténose
- - - *I05.0*
- - - Non rhumatismal valvule
- - - - *I34.2*
- - - - Mitrale avec insuffisance *I34.80*
- - Syndrome de Barlow [prolapsus *I34.1*
- - Valvulopathie *I05.8*

Mixed connective tissue disease] ¬ MCTD [*M35.1*

Miyoshi ¬ Myopathie distale type *G71.08*

MKL1 ¬ Déficit immunitaire combiné induit par des troubles de la motilité des neutrophiles par déficit en *D81.8*

MLL ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec altérations du gène *C92.60*

MLT] ¬ Lymphangioendothéliomatose multifocale avec thrombocytopénie [*D18.19, D69.61*

MMCAT [microcornée-myopie avec atrophie choriorétinienne-télécanthus] ¬ Syndrome *Q15.8*

MME ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 associée à *G60.0*

MMEP ¬ Syndrome *Q87.8*

MMSE
- 0-16 points ¬ *U51.22*
- 17-23 points ¬ *U51.12*
- 24-30 points ¬ *U51.02*

MOA maladie occlusif artériel ¬ Diabète sucré
- *E14.50†, I79.2**
- Type
- - 1 avec *E10.50†, I79.2**

MOA maladie occlusif artériel ¬ Diabète sucré *–suite*
- Type *–suite*
- - 2 avec *E11.50†, I79.2**

Mobbing ¬ *Z60*

Mobilité
- Articulaire réduite et excavation papillaire accrue ¬ Syndrome de cicatrices chéloïdes lié à l'X avec *Q87.8*
- Restreinte ¬ Difficultés liées à: dépendance due à une *Z74.0*

Möbitz, type I et II ¬ Bloc (de) (du): *I44.1*

MoCA Montreal Cognitive Assessment
- 0-8 points ¬ *U51.23*
- 9-16 points ¬ *U51.13*
- 17 points ou plus ¬ *U51.03*

Modelage métaphysaire réduit-dysplasie spondylaire ¬ Syndrome de croissance excessive- *Q87.3*

Modification
- Aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision ¬ *L56.9*
- Aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets ¬ Autres *L56.8*
- Conscience
- - Comportant souvent des automatismes ¬ Crises: avec *G40.2*
- - ¬ Crises: ne comportant pas de *G40.1*
- Durable personnalité
- - Expérience de catastrophe ¬ *F62.0*
- - Liée à un syndrome algique chronique ¬ *F62.80*
- - Maladie psychiatrique ¬ *F62.1*
- - Sans précision ¬ *F62.9*
- Durables personnalité ¬
- - *F62.8*
- - *F62.88*
- Hormonales ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- Peau
- - Due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision ¬ *L57.9*
- - Exposition chronique aux rayonnements non ionisants ¬ Autres *L57.8*
- - Non précisées ¬ *R23.8*
- Personnalité
- - Captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment ¬ *F62.0*
- - Désastres ¬ *F62.0*
- - Expériences de camp de concentration ¬ *F62.0*
- - Exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ *F62.0*
- - Torture ¬ *F62.0*
- Précisées des taux de protéines plasmatiques ¬ Autres *R77.88*
- Qualitatives des plaquettes ¬ *D69.1*
- Squelette ¬ Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres *Q87.5*

Modification *–suite*
- Taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA] ¬ *R77.80*
- Teinte des tissus dentaires durs après l'éruption ¬ *K03.7*
- Temporaire du seuil auditif ¬ *H93.2*
- Tissu cutané ¬ *R23.4*
- Transit intestinal ¬ *R19.4*

MODY Maturity onset diabetes of young people
- Acidocétose ¬ *E11.11*
- Coma ¬ *E11.01*
- Complication
- - Décompensé ¬ *E11.81*
- - Multiples
- - - Décompensé ¬ *E11.73*
- - - ¬ *E11.72*
- - Oculaire
- - - Décompensé ¬ *E11.31†, H58.8**
- - - ¬ *E11.30†, H58.8**
- - Rénales
- - - Décompensé ¬ *E11.21†, N08.3**
- - - ¬ *E11.20†, N08.3**
- - ¬ *E11.80*
- Complication neurologique
- - Décompensé ¬ *E11.41†, G63.2**
- - ¬ *E11.40†, G63.2**
- Complication vasculaire périphérique
- - Décompensé ¬ *E11.51*
- - ¬ *E11.50*
- Hypoglycémie ¬ *E11.60*
- Polyneuropathie
- - Décompensé ¬ *E11.41†, G63.2**
- - ¬ *E11.40†, G63.2**
- Sans complication
- - Décompensé ¬ *E11.91*
- - ¬ *E11.90*
- Syndrome pied diabétique
- - Décompensé ¬ *E11.75*
- - ¬ *E11.74*
- ¬
- - *E11.90*
- - Choc hypoglycémique au cours de diabète *E11.61*
- - Coma hypoglycémique au cours de diabète *E11.61*

MODY5 [Maturity onset diabetes of young people type 5] ¬ *E11.20†, N29.8**

Mœbius
- Neuropathie axonale-hypogonadisme hypogonadotrope ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬ Syndrome de *Q87.0*

Moelle allongée [bulbe rachidien] ¬ Astrocytome de la *C71.7*

Moelle cervicale
- C1 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.71!*

Moelle cervicale *–suite*
- C2 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.72!*
- C3 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.73!*
- C4 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.74!*
- C5 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.75!*
- C6 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.76!*
- C7 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.77!*
- C8 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.78!*
- Lésion transversale incomplète) ¬ Lésion centrale de la *S14.12*
- Niveau SAI ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.70!*
- SAI ¬
- - *S14.70!*
- - Lésion de la *S14.10*
- ¬
- - Contusion et œdème de la *S14.0*
- - Lésion transversale complète de la *S14.11*
- - Lésions transversales incomplètes de la *S14.13*

Moelle dorsale
- D1 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.71!*
- D10/D11 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.76!*
- D12 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.77!*
- D2/D3 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.72!*
- D4/D5 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.73!*
- D6/D7 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.74!*
- D8/D9 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.75!*
- Lésion transversale incomplète) ¬ Lésion centrale de la *S24.12*
- Niveau SAI ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.70!*
- SAI ¬
- - *S24.70!*
- - Lésions transversales incomplètes de la *S24.12*
- ¬
- - Contusion et œdème de la *S24.0*
- - Lésion transversale complète de la *S24.11*

Moelle épinière
- C1-C3 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.60!*
- C4-C5 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.61!*
- C6-C8 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.62!*
- Cervicale ¬ Multiples blessures de la *S14.10*

Moelle épinière *–suite*
- Cours
- - Carence en vitamine B12 ¬ Dégénérescence combinée subaiguë de la *E53.8†*, *G32.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Dégénérescence combinée subaiguë de la *G32.0**
- D11-L1 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.65!*
- D1-D6 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.63!*
- D7-D10 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.64!*
- Dédoublée type
- - 1 ¬ *Q06.2*
- - 2 ¬ *Q06.2*
- Due
- - Hernie discale cervicale ¬ Compression de la *M50.0†*, *G99.2**
- - Traumatisme obstétrical
- - - Non précisé ¬ Lésion du rachis et de la *P11.59*
- - - Paraplégie
- - - - Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la *P11.50*
- - - - Chronique ¬ Lésion du rachis et de la *P11.51*
- Élévation des lactates ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie avec atteinte du tronc cérébral et de la *G31.81*
- Embolique) (non embolique) ¬ Infarctus aigu de la *G95.18*
- L2-S1 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.66!*
- Méninge ¬
- - Anomalie congénitale SAI de la *Q06.9*
- - Lésion congénitale SAI de la *Q06.9*
- - Maladie congénitale SAI de la *Q06.9*
- Niveau du cou ¬ Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la *T06.0*
- Non précisée ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.69!*
- Plusieurs autres parties du corps ¬ Lésions traumatiques des nerfs et de la *T06.1*
- S2-S5 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.67!*
- Sans précision ¬
- - Affection de la *G95.9*
- - Malformation congénitale de la *Q06.9*
- Spasticité des jambes ¬ Hypomyélinisation avec atteinte du tronc cérébral et de la *E75.2*
- Toute localisation] ¬ Abcès (embolique) de la *G06.1*
- ¬
- - Abcès à staphylocoques de la *G06.1*, *B95.8!*
- - Anémie avec dégénérescence combinée de la *D51.0†*, *G32.0**

Moelle épinière *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Compression spondylogène de la *M47.19†*, *G99.2**
- - Dégénérescence
- - - Amyloïde de la *E85.4†*, *G32.8**
- - - Tuberculeuse de la *A17.8†*, *G07**
- - Douleur de désafférentation liée à une lésion de la *G95.85*
- - Dyssynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la *G95.84*
- - Épendymome
- - - *C72.0*
- - - Anaplasique de *C72.0*
- - Fracture
- - - Colonne vertébrale avec lésion de la *T08.0*, *T09.3*
- - - Sacrum avec lésion de la *S32.1*, *S34.18*
- - - Vertèbre
- - - - Cervicales avec lésion de la *S12.9*, *S14.10*
- - - - Lombaires avec lésion de la *S32.00*, *S34.18*
- - - - Thoraciques avec lésion de la *S22.00*, *S24.10*
- - Gomme de la *A52.1†*, *G07**
- - Hypoplasie et dysplasie de la *Q06.1*
- - Infection à streptocoques de la *G04.8*, *B95.5!*
- - Lésion
- - - *T09.3*
- - - Traumatique de la *T09.3*
- - Maladies précisées de la *G95.88*
- - Malformations congénitales précisées de la *Q06.8*
- - Mélanocytome méningé de la *D42.1*
- - Méningiome de la *D32.1*
- - Myélodysplasie de la *Q06.1*
- - Myéloméningocèle de la *Q05.9*
- - Œdème
- - - *G95.18*
- - - Traumatique de la *T09.3*
- - Paralysie de la *G83.8*
- - Sclérose en plaques (de): *G35*
- - Séquelles de lésion traumatique de la *T91.3*
- - Thrombose
- - - Artérielle de la *G95.18*
- - - Syphilitique d'une artère de la *A52.0†*, *I79.8**
- - Tuberculome de *A17.8†*, *G07**
- - Tuberculose de la *A17.8†*, *G07**
- - Tumeur bénigne: *D33.4*
- - Tumeur maligne: *C72.0*
- - Tumeur neuroectodermique primitive de *C72.0*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D43.4*

Moelle lombaire
- Conus medullaris] ¬ Contusion et œdème de la *S34.0*
- SAI ¬ *S34.70!*
- ¬ Lésion
- - *S34.18*
- - Transversal
- - - Complète de la *S34.10*
- - - Incomplète de la *S34.11*

Moelle osseuse
- Corrélée à la dose due à des cytostatiques ¬ Anémie lors de trouble de l'hématopoïèse dû à une lésion toxique directe de la *D61.10*
- Naissance, sans paraplégie ¬ Lésion de la colonne vertébrale et de la *P11.59*
- ¬
- - Donneur de *Z52.3*
- - Échec d'une greffe de *T86.00*
- - Effets toxiques de l'alcool sur la *D61.2*
- - Fibrose de la *D47.4*
- - Hyperplasie de la *D47.4*
- - Lésions de la *D61.9*
- - Mastocytose isolée de la *D47.0*
- - Rejet d'une greffe de *T86.00*
- - Syndrome de fibrose pulmonaire-hyperplasie hépatique-hypoplasie de la *Q87.8*
- - Tumeur maligne
- - - Envahissement de la *C79.5*
- - - Secondaire des os et de la *C79.5*

Moersch-Woltman ¬ Syndrome de *G25.88*

Moesin ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Mofétil ¬ Embryopathie au mycophénolate *Q86.88*

Mohr ¬ Syndrome de *Q87.0*

Mohr-Tranebjaerg ¬ Syndrome de *G31.81*

Moignon amputation ¬
- Complications autres et non précisées au niveau d'un *T87.6*
- Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un *T87.6*
- Hématome au niveau d'un *T87.6*
- Infection d'un *T87.4*
- Nécrose d'un *T87.5*
- Névrome sur *T87.3*
- Œdème au niveau d'un *T87.6*

Moisissure
- Foin ¬ Maladie des *J67.00*
- ¬
- - Allergie aux *J30.3*
- - Alvéolite allergique due à des *J67.70*

Moissonneurs ¬ Poumon des *J67.00*

Moite ¬ Peau froide et *R23.1*

Molaire
- Racines fusionnées d'Ackerman ¬ Syndrome de *Q87.8*

Molaire *–suite*
- Sans précision ¬ Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.9*
- ¬
- - Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.3*
- - Choc septique après grossesse *O08.0, R57.2*
- - Complication
- - - Consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.8*
- - - Veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.7*
- - Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.2*
- - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.1*
- - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.0*
- - Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.4*
- - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.6*
- - Quatrième *K00.1*
- - Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.5*

Molaires-incisives [HMI] ¬ Hypominéralisation *K00.4*

Môle
- Charnue ¬ *O02.0*
- Hémorragique ¬ *O02.0*
- Hydatiforme
- - Classique ¬ *O01.0*
- - Complète ¬ *O01.0*
- - Destructrice ¬ *D39.2*
- - Incomplète ¬ *O01.1*
- - Invasive ¬ *D39.2*
- - Maligne ¬ *D39.2*
- - Sans précision ¬ *O01.9*
- - ¬
- - - *O01.9*
- - - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de *Z35.1*
- Intra-utérine SAI ¬ *O02.0*
- Invasive ¬ *D39.2*
- Non hydatiforme ¬ Œuf clair et *O02.0*
- Vésiculaire
- - SAI ¬ *O01.9*
- - ¬
- - - *O01.9*
- - - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de *Z35.1*

Mollaret] ¬ Méningite récurrente bénigne [*G03.2*

Möller Hunter due à une carence en vitamine B ¬ Glossite de *E53.9†, K93.8**

Möller-Boeck ¬ Maladie de *D86.9*

Molluscum contagiosum
- Paupière ¬ *B08.1†, H03.1**
- ¬ *B08.1*

Molybdène
- Type
- - A ¬ Déficit en sulfite oxydase dû à un déficit en cofacteurs du *E72.1*
- - B ¬ Déficit en sulfite-oxydase dû à un déficit en cofacteurs du *E72.1*
- - C ¬ Déficit en sulfite-oxydase dû à un déficit en cofacteurs du *E72.1*
- ¬
- - Anémie associée à carence en: *D53.8*
- - Carence en *E61.5*
- - Déficit en sulfite oxydase dû à un déficit en cofacteurs du *E72.1*

MOMO ¬ Syndrome *Q87.3*

MONA [ostéolyse multicentrique-nodulose-arthropathie] ¬ Spectre *Q87.5*

Mönckeberg
- Media) ¬ Sclérose de *I70.2*
- ¬
- - Artériosclérose de *I70.29*
- - Dégénérescence de *I70.29*
- - Sclérose de *I70.29*

Mondor ¬ Maladie de *I80.88*

Monge ¬ Maladie de(s): *T70.2*

Monilethrix ¬ *Q84.1*

Monilia ¬ Vaginite à *B37.3†, N77.1**

Moniliase
- Bronchique ¬ *B37.1†, J99.8**
- Pulmonaire ¬ *B37.1†, J99.8**
- ¬
- - *B37*
- - Otomycose au cours de *B37.88†, H62.2**
- - Vulvite due à une *B37.3†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite due à une *B37.3†, N77.1**

Moniliforme ¬
- Aplasie *Q84.1*
- Lichen ruber *L44.3*

Monkeypox ¬ *B04*

Monoamine-oxydase
- A ¬ Déficit en *E70.8*
- ¬ Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la *T43.1*

Monoarthrite, non classée ailleurs ¬ *M13.1*

Monoblastique aiguë
- Rémission complète ¬ Leucémie *C93.01*
- ¬ Leucémie *C93.00*

Monobrachius ¬ *Q71.0*

Monocarboxylate ¬ Cétoacidose par déficit en transporteur 1 de *E88.8*

Monochloroacétate ¬ Intoxication systémique au *T60.3*

Monochromatie à bâtonnets ¬ *H53.5*

Monochromatisme à cônes bleus ¬ *H53.5*

Monoclonal

- Épanchements périnéphrétiques-shunt pulmonaire] ¬ Syndrome TEMPI [télangiectasie-érythrocytose-gammopathie *D47.2*
- IgA
- - Sans anticorps connus ¬ Polyradiculoneuropathie avec gammapathie *D47.2†, G63.1**
- - ¬ Polyneuropathie axonale avec gammopathie *D47.2†, G63.1**
- IgG
- - Sans anticorps connus ¬ Polyradiculoneuropathie avec gammapathie *D47.2†, G63.1**
- - ¬ Polyneuropathie axonale avec gammopathie *D47.2†, G63.1**
- IgM
- - Activité anti-MAG ¬ Polyneuropathie associée à une gammopathie *D47.2†, G63.1**
- - Sans anticorps connus ¬ Polyradiculoneuropathie avec gammapathie *D47.2†, G63.1**
- - ¬ Polyneuropathie axonale avec gammopathie *D47.2†, G63.1**
- Signification indéterminée [GMSI] ¬ Gammapathie *D47.2*
- ¬
- - Macroglobulinémie *D47.2*
- - Maladie des dépôts d'immunoglobuline *D47.7*
- - Syndrome
- - - Activation mastocytaire *D89.8*
- - - Fanconi acquis
- - - - Associé à la chaîne légère des Ig *D47.2, E83.38*
- - - - Secondaire à une gammapathie *D47.2, E83.38*

Monoculaire

- Non intermittente ¬
- - Ésotropie (alternante) (*H50.0*
- - Exotropie (alternante) (*H50.1*
- ¬
- - Atteinte
- - - Moyennement sévère de la vision *H54.6*
- - - Sévère de la vision *H54.5*
- - Cécité et forte baisse de la vision *H54.4*
- - Ésotropie [strabisme convergent] intermittente (alternante) (*H50.3*
- - Exotropie [strabisme divergens] intermittente (alternante) (*H50.3*

Monocytaire
v./v.a. Leucémie monocytaire

- ¬ Réaction leucémoïde de type: *D72.8*

Monocytes ¬ angine à *B27*

Monocytogenes ¬

- Infection à Listeria *A32.9*
- Méningite à Listeria *A32.1†, G01**

Monocytogenes ¬ *–suite*

- Méningo-encéphalite à Listeria *A32.1†, G05.0**

Monocytoïde ¬

- Leucémie *C93*
- Lymphome à cellules B *C85.9*

Monocytopénie
v./v.a. neutropénie-monocytopénie-surdité

- Syndrome de l'infection bactérienne ¬ *D81.8*
- ¬ *R72*

Monocytose (symptomatique) ¬ *D72.8*

Monogénique

- Azoospermie ¬ Infertilité masculine *N46*
- Due à une anomalie de la voie leptine-mélanocortine ¬ Obésité *E66.89*
- Oligozoospermie ¬ Infertilité masculine *N46*
- Tératozoospermie ¬ Infertilité masculine *N46*

Monolobulaire ¬ Cirrhose *K74.3*

Monomélique ¬ Amyotrophie *G12.2*

Mononen-Karnes-Senac ¬ Syndrome de *Q74.8*

Mononeuropathie

- Diabétique NCA ¬ *E14.40†, G59.0**
- Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G59.8**

Mononévrite

- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *G59.8**
- Membre
- - Inférieur
- - - Sans précision ¬ *G57.9*
- - - ¬ Autres *G57.8*
- - Supérieur
- - - Sans précision ¬ *G56.9*
- - - ¬ Autres *G56.8*
- Multiple ¬ *G58.7*
- Précisées ¬ Autres *G58.8*
- Sans précision ¬ *G58.9*
- Sièges multiples ¬ *G58.7*

Mononucléés ¬ Histiocytoses de phagocytes *D76.1*

Mononucléose

- Cytomégalovirus ¬ *B27.1*
- Due
- - Herpès virus gamma ¬ *B27.0*
- - Virus d'Epstein-Barr ¬
- - - *B27.0*
- - - Séquelle de *B94.81*
- - Virus de l'herpès gamma ¬ Séquelle de *B94.81*
- Infectieuse
- - Due
- - - Virus d'Epstein-Barr ¬ Séquelle de *B94.81*
- - - Virus de l'herpès gamma ¬ Séquelle de *B94.81*
- - ¬
- - - Méningite au cours de *B27.9†, G02.0**

Mononucléose *–suite*

- Infectieuse *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Polyneuropathie au cours de *B27.9†, G63.0**
- Infectieuses ¬ Autres *B27.8*
- Virus de l'herpès gamma ¬
- - Hépatite au cours de *B27.0†, K77.0**
- - Hépatomégalie au cours de *B27.0†, K77.0**

Monoparésie monoplégie

- Membre supérieur ¬ *G83.2*
- Sans précision ¬ *G83.3*

Monophosphate

- Désaminase ¬ Déficit en adénosine *E79.8*
- HMP ¬ Anémie due déficit enzymatique
- - Excepté G6PD, de la voie de l'hexose *D55.1*
- - Voie de l'hexose *D55.1*
- Synthase ¬ Déficit en uridine *E79.8*

Monoplégie

- Embolique en tant qu'événement en cours ¬ *I63.4, G83.3*
- Hystérique passagère ¬ *F44.4*
- Membre
- - Inférieur ¬ *G83.1*
- - Supérieur ¬ Monoparésie et *G83.2*
- Psychogène ¬ *F44.4*
- Sans précision ¬ Monoparésie et *G83.3*
- Thrombotique en tant qu'événement en cours ¬ *I63.3, G83.3*

Monorchidie ¬ *Q55.0*

Monosaccharide ¬ Malabsorption de *E74.3*

Monosomie

- 1p36 ¬ *Q93.5*
- 1qter ¬ *Q93.5*
- 2q22 ¬ Syndrome de Mowat-Wilson dû à une *Q87.8*
- 7
- - Familiale ¬ Syndrome de *Q93.0*
- - ¬
- - - Leucémie myéloïde aiguë au cours de syndrome familial de *C92.00*
- - - Syndrome myélodysplasique au cours de syndrome familial de *D46.9*
- 9p ¬ *Q93.5*
- 13q34 ¬ *Q93.5*
- 16p11.2 distale ¬ *Q93.5*
- 17p13.3 distale ¬ *Q93.5*
- 18p ¬ *Q93.5*
- 18q ¬ *Q93.5*
- 20p12 ¬
- - Dysplasie artério-hépatique due à une *Q44.7*
- - Paucité des voies biliaires syndromique due à une *Q44.7*
- - Syndrome d'Alagille-Watsons dû à une *Q44.7*
- 22 ¬ *Q93.0*

Monosomie *–suite*
- Chromosome entier
- - Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ¬ *Q93.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q93.0*
- Distale
- - 7p ¬ *Q93.5*
- - 7q36 ¬ *Q93.5*
- - 9p ¬ *Q93.5*
- - 10p ¬ *Q93.5*
- - 10q ¬ *Q93.5*
- - 12q ¬ *Q93.5*
- - 13q32 ¬ *Q93.5*
- - 14q ¬ *Q93.5*
- - 15q ¬ *Q93.5*
- Partielle du chromosome 18p ¬ *Q93.5*
- X
- - Mosaïque ¬ *Q96.3*
- - ¬ *Q96.0*

Monostotique
v./v.a. Dysplasie fibreuse monostotique
- Plasmocytes ¬ Myélome *C90.00*

Monotronculaire ¬
- Cardiopathie artérioscléreuse: Implication *I25.11*
- Maladie coronarienne *I25.11*

Monoxyde carbone ¬
- Effet toxique du *T58*
- Encéphalopathie différée par intoxication au *T58†, G94.39**
- Séquelles d'intoxication au *T97*

Monstre
- Double ¬ *Q89.4*
- SAI ¬ *Q89.7*

Montagnes ¬ Mal des *T70.2*

Montana ¬ Fièvre du *A78*

Monteggia ¬ Fracture de *S52.21*

Montréal ¬ Nanisme
- Microcéphalique primordial type *Q87.1*
- Tête d'oiseau type *Q87.1*

Montreal Cognitive Assessment
- 0-8 points ¬ MoCA [*U51.23*
- 9-16 points ¬ MoCA [*U51.13*
- 17 points ou plus ¬ MoCA [*U51.03*

Moon
v./v.a. Laurence-Moon

Moore
v./v.a. Dennis-Fairhurst-Moore

Mooren ¬ Ulcère de (la): *H16.0*

Morava-Mehes ¬ Syndrome de *Q79.8*

Moraxella
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Haemophilus influenzae et *B96.3!*
- ¬ Infection à *A49.83*

Morbidité
- Soin supplémentaire

Morbidité *–suite*
- Soin supplémentaire *–suite*
- - Fœtus ou du nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de *P08*
- - Nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de *P07*
- ¬ Causes inconnues et non précisées de *R69*

Morgagni ¬
- Cataracte sénile, de type *H25.2*
- Hernie de *Q79.0*
- Torsion (de): hydatide de *N83.5*

Morganella ¬ Bactériémie à *A49.82*

Morganii
- Agent pathogène ¬ Proteus *B96.2!*
- ¬ Infection à Proteus *A49.82*

MORM [déficience intellectuelle-obésité du tronc-dystrophie rétinienne-micropénis] ¬ Syndrome *Q87.8*

Morphine ¬ *T40.2*

Morphologie des cheveux, non classées ailleurs ¬ Anomalies congénitales de la *Q84.1*

Morpions ¬ Infestation par: *B85.3*

Morquio (-semblable à) (classique) ¬ Syndrome de: *E76.2*

Morquio-Ullrich-Brailsford ¬ Syndrome de *E76.2*

Morse-Rawnsley-Sargent ¬ Syndrome *Q04.2*

Morsier ¬ Syndrome de De *Q04.4*

Morsure
- Animal
- - Multiples SAI ¬ *T01.9*
- - Non venimeux) ¬ *W64.9!*
- - Piqûre d'insecte venimeux ¬ *X29.9!*
- - SAI ¬ *T14.1*
- Insecte venimeux ¬ Piqûre ou *T63.4*
- Joue et de la lèvre ¬ *K13.1*
- Piqûre insecte non venimeux ¬
- - Lésion traumatique superficielle
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.03*
- - - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.03*
- - - Partie du corps non précisée: *T14.03*
- - - Tronc, niveau non précisé: *T09.03*
- - Lésions traumatiques superficielles
- - - Abdomen, des lombes et du bassin: *S30.83*
- - - Avant-bras: *S50.83*
- - - Cheville et du pied: *S90.83*
- - - Épaule et du bras: *S40.83*
- - - Hanche et de la cuisse: *S70.83*
- - - Jambe: *S80.83*
- - - Poignet et de la main: *S60.83*
- Rat
- - Spirochaeta morsus muris ¬ Fièvre causée par *A25.0*

Morsure *–suite*
- Rat *–suite*
- - ¬ Fièvre
- - - Due aux *A25.9*
- - - Spirillum minus causée par *A25.0*
- - - Streptobacillaire causée par *A25.1*
- - - Streptobacilles causée par *A25.1*
- Scorpion ¬ *T63.2*
- Serpent
- - Marin ¬ Envenimation suite à une *T63.0*
- - ¬ Envenimation suite à une *T63.0*

Mort
- Cardiaque subite, décrite ainsi ¬ *I46.1*
- Fœtale
- - Cause non précisée ¬ *P95*
- - Précoce avec rétention ¬ *O02.1*
- In utero ¬ Rétention d'un fœtus *O02.1*
- Instantanée ¬ *R96.0*
- Intra-utérine
- - Fœtus ¬ Soins maternels pour *O36.4*
- - Plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la grossesse après *O31.2*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par la *P01.6*
- Néonatales ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de: *Z35.2*
- Nés ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de: *Z35.2*
- Origine obstétricale de cause non précisée ¬ *O95*
- Séquelle relevant
- - Cause obstétrical sans précision
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ *O96.9*
- - - ¬ *O97.9*
- - Directement cause obstétrical
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ *O96.0*
- - - ¬ *O97.0*
- - Indirectement cause obstétrical
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ *O96.1*
- - - ¬ *O97.1*
- Violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une *R96.1*

Mort subite
- Cause inconnue ¬ Autre *R96*
- Inexpliquée mort subite nourrisson
- - Âge d'un an ¬ *R96.0*
- - Avant l'âge d'un an ¬ *R95*
- Nourrisson
- - Âge ¬
- - - *R96.0*
- - - Mort subite inexpliquée (*R96.0*
- - Avant âge ¬
- - - *R95.9*
- - - Mort subite inexpliquée (*R95*

Mort subite *–suite*
- Nourrisson *–suite*
- - Dysgénésie des testicules ¬ Syndrome de *R95.9, Q55.2*
- - Mention d'autopsie ¬ Syndrome de la *R95.0*
- - SAI ¬ Syndrome de la *R95.9*
- - Sans mention d'autopsie ¬ Syndrome de la *R95.9*
- - ¬
- - - Quasi-syndrome de *R06.80*
- - - Syndrome de la *R95.9*

Mortelle ¬ Noyade et submersion non *T75.1*

Mort-né
- SAI ¬ *P95*
- ¬ Naissance
- - Gémellaire Jumeau
- - - *Z37.4!*
- - - Né vivant, l'autre *Z37.3!*
- - Multiples, tous *Z37.7!*
- - Unique, enfant *Z37.1!*

Morton
v./v.a. Casamassima-Morton-Nance
- ¬ Métatarsalgie de *G57.6*

Morvan ¬ Syndrome de *G60.8*

Morve ¬
- *A24.0*
- Septicémie au cours de *A24.0*

Mosaïque
- Chromosomes sexuels ¬ Homme avec *Q98.7*
- Chromosomique
- - 45 X
- - - 46,XX ou XY ¬ *Q96.3*
- - - Lignées cellulaires avec chromosome sexuel anormal ¬ *Q96.4*
- - Lignées avec divers nombres de chromosomes X ¬ *Q97.2*
- - Non-disjonction mitotique ¬
- - - Monosomie d'un chromosome entier, *Q93.1*
- - - Trisomie
- - - - 13
- - - - - *Q91.5*
- - - - - *Q91.5*
- - - - 18
- - - - - *Q91.1*
- - - - - *Q91.1*
- - - - 21, *Q90.1*
- - - - Chromosome entier
- - - - - *Q92.1*
- - - - - *Q92.1*
- ¬
- - Monosomie X en *Q96.3*
- - Neurofibromatose type
- - - 1 *Q85.0*
- - - 2 *Q85.0*
- - - 3 *Q85.0*

Mosaïque *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome
- - - Disomie uniparentale d'origine paternelle en *Q99.8*
- - - Legius *Q85.0*
- - - Variable d'aneuploïdie en *Q99.8*
- - Tétrasomie 12p en *Q99.8*
- - Trisomie
- - - 1 en *Q92.1*
- - - 2 en *Q92.1*
- - - 3 en *Q92.1*
- - - 4 en *Q92.1*
- - - 5 en *Q92.1*
- - - 7 en *Q92.1*
- - - 8 en *Q92.1*
- - - 9 en *Q92.1*
- - - 10 en *Q92.1*
- - - 12 en *Q92.1*
- - - 14 en *Q92.1*
- - - 15 en *Q92.1*
- - - 16 en *Q92.1*
- - - 17 en *Q92.1*
- - - 20 en *Q92.1*
- - - 22 en *Q92.1*

Moss
v./v.a. Gorlin-Chaudhry-Moss

Moteur
- Causé délibérément ¬ Accident de véhicule à *Y09.9!*
- Contractures articulaires multiples ¬ Syndrome de déficience intellectuelle récessive-dysfonctionnement *Q87.8*
- Dissociatifs ¬ Troubles *F44.4*
- Inférieur ¬ Paralysie faciale (parésie faciale) (faiblesse faciale) due à une lésion du neurone *G51.0*
- Oculaire
- - Commun
- - - III) ¬ Paralysie du nerf *H49.0*
- - - ¬ Lésion traumatique du nerf *S04.1*
- - Externe
- - - VI) ¬ Paralysie du nerf *H49.2*
- - - ¬ Lésion traumatique du nerf *S04.4*
- Œsophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de Raynaud-troubles *M34.1*
- Psychogène ¬ Trouble *F44.4*
- Pur ¬ Syndrome lacunaire *I67.9†, G46.5**
- Retard de langage-anomalies cérébrales-hernie diaphragmatique ¬ Syndrome de microphtalmie-retard *Q11.2*
- Supérieur ¬ Paralysie (parésie) (faiblesse) faciale due à une lésion du neurone *G83.6*
- Syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et tics *F95.2*
- Verbal associé à TRAF7 ¬ Syndrome d'anomalies cardiaques-anomalies digitales-dysmorphie faciale-retard *Q87.0*

Moteur *–suite*
- Vocal chronique ¬ Tic *F95.1*
- ¬
- - Dégénérescence familiale du neurone *G12.2*
- - Maladies du neurone *G12.2*

Motifs cosmétiques ¬ Chirurgie plastique pour *Z41.1*

Motilité
- Intestinale chronique] ¬ Syndrome CAID [dysrythmie atriale et trouble de la *I49.5, K59.8*
- Neutrophiles par déficit en MKL1 ¬ Déficit immunitaire combiné induit par des troubles de la *D81.8*
- Non précisées ¬ Anomalies de la démarche et de la *R26.8*
- Œsophage tubulaire ¬ Troubles de la *K22.4*

Moto ¬ Accident de *V99!*

Motoneurone
- Type Madras ¬ Maladie du *G12.2*
- ¬ Démence fronto-temporale avec maladie du *G31.0†, F02.0*, G12.2*

Motrice
- Aiguë ¬ Neuropathie axonale *G61.0*
- Cérébrale, forme spastique hémiplégique ¬ Infirmité *G80.2*
- Cérébrales ¬ Autres infirmités *G80.8*
- Cognitive de l'enfance avec syndrome extrapyramidal ¬ Syndrome de régression *G31.88*
- Constipation chronique-trouble du rythme veille-sommeil associé à NRXN1 ¬ Syndrome de trouble neurodéveloppemental sévère-stéréotypies *G96.8*
- Distale
- - Héréditaire
- - - Associée à COQ7 ¬ Neuropathie *G12.2*
- - - Type
- - - - 1 ¬ Neuropathie *G12.2*
- - - - 2 ¬ Neuropathie *G12.2*
- - - - 5 ¬ Neuropathie *G12.2*
- - - - 7 ¬ Neuropathie *G12.2*
- - - - Jerash ¬ Neuropathie *G12.2*
- - Myopathie myofibrillaire ¬ Syndrome autosomique dominant de neuropathie axonale *G71.2*
- - Tardive ¬ Paralysie périodique avec neuropathie *G72.3*
- Enfant ¬ Débilité *F82*
- Héréditaire distale autosomique récessive type 8 ¬ Neuropathie *G12.2*
- Intellectuelle sévères-surdité neurosensorielle-dystonie ¬ Syndrome de déficiences *Q87.8*
- Multifocale ¬
- - Neuropathie *G61.8*
- - NMM [neuropathie *G61.8*
- Sans précision ¬ Troubles spécifiques du développement des fonctions *F82.9*
- Sensoriel

Motrice *–suite*
- Sensoriel *–suite*
- - Début facial] ¬ Syndrome FOSMN [Neuronopathie *G60.0*
- - Types I-IV ¬ Neuropathie héréditaire *G60.0*
- - ¬ Vessie neurogène: atonique (*N31.2*
- ¬
- - Limitation fonctionnelle *U50*
- - Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation *G83.5*
- - Stéréotypies *F98.49*
- - Syndrome de leucoencéphalopathie-dystonie-neuropathie *E75.2*

Motricité
- Buccale ¬ Troubles spécifiques du développement de la *F82.2*
- Cours d'affections classées ailleurs ¬ Syndromes extrapyramidaux et troubles de la *G26**
- Fine et graphique ¬ Troubles spécifiques du développement de la *F82.1*
- Globale ¬ Troubles spécifiques du développement de la *F82.0*
- Sans précision ¬ Syndrome extrapyramidal et trouble de la *G25.9*
- ¬ Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la *G25.88*

Mouche
- Daim ¬ Fièvre (de): *A21*
- ¬ infestation par larves de *B87*

Mouchet
v./v.a. Köhler-Mouchet

Moulin ¬ Atrophodermie linéaire de *L90.8*

Moussous
v./v.a. Leiner-Moussous

Moustiques ¬
- Encéphalites virales transmises par des *A83.8*
- Fièvres virales précisées, transmises par des *A92.8*
- Méningo-encéphalite à virus transmise par des *A83*

Mouth and genital ulcers with inflamed cartilage] ¬ Syndrome MAGIC [*M35.2, M94.1*

Mouton ¬ Maladie due à la douve du foie de *B66.3*

Mouvement
- Anormaux
- - Psychogènes ¬ *F44.4*
- - Tête ¬ *R25.0*
- Binoculaire
- - Sans précision ¬ Anomalie des *H51.9*
- - ¬ Autres anomalies précisées des *H51.8*
- Hyperkinétique
- - Ataxie tronculaire ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - Retard de développement ¬ Syndrome d'hypotonie infantile-anomalies oculomotrices- *Q87.8*
- Involontaires anormaux, autres et non précisés ¬ *R25.8*

Mouvement *–suite*
- Miroir congénitaux familiaux ¬ *G25.88*
- Muscles oculaires ¬ Limitation traumatique des *H50.6*
- Oculaire
- - Limité-absence de point lacrymal ¬ Syndrome de ptosis- *Q87.0*
- - ¬ Nystagmus et autres anomalies des *H55*
- Panique de foule ¬ Être pressé ou poussé par une foule ou dans un *W64.9!*
- Périodiques des jambes au cours du sommeil ¬ *G25.80*
- Stéréotypés
- - Lésion auto-infligé ¬
- - - *F98.41*
- - - *F98.41*
- - Mains-cataracte bilatérale ¬ Trouble neurologique du développement sévère avec troubles de l'alimentation- *G31.88*
- - Sans
- - - Lésion auto-infligé ¬
- - - - *F98.40*
- - - - *F98.40*
- - - Précision d'une lésion auto-infligée ¬ *F98.49*
- - ¬
- - - Hyperactivité associée à un retard mental et à des *F84.4*
- - - Trichotillomanie au cours de *F98.40*
- Stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des *X59.9!*
- ¬
- - Raideur articulaire limitation
- - - Complète des *M25.69*
- - - Partielle des *M25.69*
- - Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypotonie-anomalie du *Q87.8*

Mowat
v./v.a. Galloway-Mowat

Mowat-Wilson
- Monosomie 2q22 ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Moyamoya
- Achalasie précoce ¬ Maladie de *I67.5*
- Petite taille-dysmorphie faciale-hypogonadisme hypergonadotrope ¬ Maladie de *Q87.1*
- ¬ Maladie de *I67.5*

Moyen
v./v.a. Type de maladie

Moyenne
- Aiguë
- - SAI ¬ Otite *H66.9*
- - Subaiguë
- - - Allergique (muqueuse) (sanglante) (séreuse) ¬ Otite *H65.1*
- - - Muqueuse ¬ Otite *H65.1*
- - - Non suppurée SAI ¬ Otite *H65.1*
- - - Sanglante ¬ Otite *H65.1*

Moyenne *–suite*
- Aiguë *–suite*
- - Subaiguë *–suite*
- - - Séromuqueuse ¬ Otite *H65.1*
- - Suppurée ¬ Otite *H66.0*
- Allergique ¬ Otite *H65.9*
- Apophyse mastoïde
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections précisées de l'oreille *H75.8**
- - Sans précision ¬ Affection de l'oreille *H74.9*
- - ¬ Autres affections précisées de l'oreille *H74.8*
- Barotraumatique ¬ Otite *T70.0*
- Barrière de Mercier] (prostatique) ¬ Barre *N40*
- Catarrhale ¬ Otite *H65.9*
- CD4+ ¬ Lymphome T cutané à cellules pléomorphes de taille petite à *C84.4*
- Chronique
- - Allergique ¬ Otite *H65.4*
- - Attico-antrale suppurée ¬ Otite *H66.2*
- - Épanchement (non purulent) ¬ Otite *H65.4*
- - Exsudative ¬ Otite *H65.4*
- - Muqueuse ¬ Otite *H65.3*
- - Non suppurée SAI ¬ Otite *H65.4*
- - SAI ¬ Otite *H66.9*
- - Sécrétoire ¬ Otite *H65.3*
- - Séromuqueuse ¬ Otite *H65.4*
- - Transsudative ¬ Otite *H65.3*
- Col de l'utérus ¬ Dysplasie *N87.1*
- Cours
- - Maladie virale NCA ¬ Otite *B34.9†, H67.1**
- - Maladies
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ Otite *H67.0**
- - - Virales classées ailleurs ¬ Otite *H67.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Otite *H67.8**
- - Rougeole ¬ Otite *B05.3†, H67.1**
- Épanchement (non purulent) ¬ Otite *H65.9*
- Exsudative ¬ Otite *H65.9*
- Fosses nasales et sinus de la face ¬ Tumeur bénigne: Oreille *D14.0*
- Mucoïde chronique ¬ Otite *H65.3*
- Muqueuse ¬ Otite *H65.9*
- Nécrosante aiguë
- - Cours de scarlatine ¬ Otite *A38†, H67.0**
- - Lors de grippe [Influenza] ¬ Otite *J11.8†, H67.1**
- Non
- - Suppurée, sans précision ¬ Otite *H65.9*
- - Syndromique autosomique dominante ¬ Déficience intellectuelle *F71.9*
- Purulente SAI ¬ Otite *H66.4*
- SAI ¬
- - Malformation congénitale de l'oreille *Q16.4*
- - Otite *H66.9*

Moyenne *–suite*
- Sans précision ¬ Otite *H66.9*
- Sécrétoire ¬ Otite *H65.9*
- Séreux
- - Aiguë ¬ Otite *H65.0*
- - Chronique ¬ Otite *H65.2*
- - ¬ Otite *H65.9*
- Séromuqueuse ¬ Otite *H65.9*
- Suppurée
- - Chronique
- - - Bénigne ¬ Otite *H66.1*
- - - SAI ¬ Otite *H66.3*
- - - Tubo-tympanique ¬ Otite *H66.1*
- - Sans précision ¬ Otite *H66.4*
- Transsudative ¬ Otite *H65.9*
- Tuberculeuse ¬ Otite *A18.6†, H67.0**
- Vagin ¬ Dysplasie *N89.1*
- Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [Influenza] avec otite *J09†, H67.1**
- Vulve ¬ Dysplasie *N90.1*
- ¬
- - Anomalie congénitale de l'oreille *Q16.4*
- - Arriération mentale *F71*
- - Cholestéatome
- - - Congénital de l'oreille *H71*
- - - Oreille *H71*
- - Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne *E71.3*
- - Diphtérie de l'oreille *A36.8†, H67.0**
- - Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité *O65.3*
- - Écoulement aigu et subaigu de l'oreille *H65.0*
- - Embolie de l'artère cérébrale *I66.0*
- - Fosse: *S02.1*
- - Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à une otite *J09†, H67.1*, U69.23!*
- - - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à une otite *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une otite *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne
- - - Acquise due à une rupture d'anévrisme de l'artère cérébrale *I60.1*
- - - Artère cérébrale *I60.1*
- - Maladie adhésive de l'oreille *H74.1*
- - Malformations congénitales de l'oreille *Q16.4*
- - Obstruction
- - - Artère cérébrale *I66.0*
- - - Complète de l'artère cérébrale *I66.0*
- - - Partielle de l'artère cérébrale *I66.0*

Moyenne *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Occlusion et sténose de l'artère cérébrale *I66.0*
- - Oreille
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - Polype de l'oreille *H74.4*
- - Sténose de l'artère cérébrale *I66.0*
- - Syndrome de l'artère cérébrale *I66.0†, G46.0**
- - Syphilis de l'oreille *A52.7†, H75.8**
- - Thalassémie: intermédiaire *D56.1*
- - Thrombose de l'artère cérébrale *I66.0*
- - Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou *F31.3*
- - Tuberculose de l'oreille *A18.6†, H67.0**
- - Tumeur maligne
- - - Neuroendocrine de l 'oreille *C30.1*
- - - Oreille *C30.1*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - Bénigne de l'oreille *D14.0*
- - - Incertain de l'oreille *D38.5*

Moyennement sévère de la vision monoculaire ¬ Atteinte *H54.6*

Moynahan ¬ Syndrome de *Q87.8*

MPA [polyangite microscopique] ¬ *M31.7*

MPE ¬ Fatigue chronique
- Indication d'un malaise post-effort [*R53.0*
- Sans indication d'un malaise post-effort [*R53.1*

MPNST] Tumeur maligne des gaines des nerfs périphériques ¬ [*C47.9*

MPPH [mégalencéphalie-polymicrogyrie-polydactylie post-axiale-hydrocéphalie] ¬ Syndrome *Q04.8*

MPSI [Mucopolysaccharidose type 1] ¬ *E76.0*

MRCS [microcornée-dystrophie des cônes et des bâtonnets-cataracte-staphylome postérieur] ¬ Syndrome *Q15.8*

MRSA] ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [*U80.00!*

Mseleni ¬ Syndrome de nanisme-brachydactylie type *Q77.7*

MSMD autosomique
- Dominante déficit partiel récepteur
- - 1 de l'interféron gamma ¬ *D84.8*
- - 2 de l'interféron gamma ¬ *D84.8*
- Récessive déficit partiel
- - IFNgammaR2 ¬ *D84.8*
- - Récepteur 1 de l'interféron gamma ¬ *D84.8*

MSUD [Maple syrup urine disease] ¬ *E71.0*

MTHFS ¬ Syndrome de retard de développement-microcéphalie-petite taille-épilepsie associé à *G31.88*

MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique mitochondriale avec acidose lactique par déficit en *I42.2*

Mucha-Habermann] ¬ Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de *L41.0*

Mucineux
- Appendice ¬ Adénocarcinome *C18.1*
- Col du pancréas ¬ Cystadénocarcinome *C25.7*
- Corps
- - Glandulaire central du sein ¬ Carcinome *C50.1*
- - Pancréas ¬ Cystadénocarcinome *C25.1*
- Héréditaire ¬ Histiocytose progressive *D76.3*
- Localisations contiguës du pancréas ¬ Cystadénocarcinome *C25.8*
- Mamelon ¬ Carcinome *C50.0*
- Ovaire
- - Faible potentiel malignité ¬ Tumeur
- - - *C56*
- - - Papillaire *C56*
- - Limite de la malignité ¬ Cystadénome *C56*
- - ¬
- - - Adénocarcinome *C56*
- - - Cystadénocarcinome *C56*
- Pancréas ¬
- - Carcinome intracanalaire papillaire *C25.3*
- - Cystadénocarcinome *C25.9*
- - TIPMP [Carcinome intracanalaire papillaire *C25.3*
- Pinkus ¬ Alopécie *L65.2*
- Prolongement axillaire du sein ¬ Carcinome *C50.6*
- Quadrant
- - Inféro-externe du sein ¬ Carcinome *C50.5*
- - Inféro-interne du sein ¬ Carcinome *C50.3*
- - Supéro-externe du sein ¬ Carcinome *C50.4*
- - Supéro-interne du sein ¬ Carcinome *C50.2*
- Queue du pancréas ¬ Cystadénocarcinome *C25.2*
- Sein
- - Localisations contiguës ¬ Carcinome *C50.8*
- - ¬ Carcinome *C50.9*
- Tête du pancréas ¬ Cystadénocarcinome *C25.0*
- ¬
- - Cystadénome *D27*
- - Dystrophie cornéenne sous-épithéliale *H18.5*

Mucinose
- Cutané
- - Spontanément régressive ¬ *L98.5*
- - ¬ *L98.5*
- Érythémateuse réticulée ¬ *L98.5*
- Focale orale ¬ *K13.7*
- Foyer ¬ *L98.5*
- Papuleux
- - Acrale persistante ¬ *L98.5*
- - Infantile ¬ *L98.5*

Mucinose *–suite*
- Papuleux *–suite*
- - ¬ *L98.5*
- Réticulée érythémateuse ¬ *L98.5*

Mucite oral oropharyngé
- Induite par des rayonnements ¬ *K12.3*
- Médicamenteuse ¬ *K12.3*
- SAI ¬ *K12.3*
- Virale ¬ *K12.3*

Muckle-Wells ¬ Syndrome de *M35.8*

Mucocèle
- Glandes salivaires ¬ *K11.6*
- Lacrymo-nasal ¬ *H04.6*
- Nez et des sinus du nez ¬ Kyste et *J34.1*
- Sac lacrymal chronique ¬ *H04.4*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.1*

Mucoépithéliale héréditaire ¬ Dysplasie *Q87.8*

Mucoïde
v./v.a. Cellule mucoïde
- Articulation du doigt ¬ Kyste *M67.44*
- Chronique ¬ Otite moyenne *H65.3*
- ¬ Otite *H65.3*

Mucolipidose
- I] ¬ Sialidose [*E77.1*
- II [maladie à inclusion cellulaire] ¬ *E77.0*
- IV ¬ *E75.1*

Mucopolysaccharides ¬ Maladie de surcharge en *E76.3*

Mucopolysaccharidose
- Malformations cardiaques congénitales et troubles hématopoïétiques ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Sans précision ¬ *E76.3*
- Type
- - 1] ¬ MPSI [*E76.0*
- - 10 ¬ *E76.2*
- - II
- - - Forme
- - - - Atténuée ¬ *E76.1*
- - - - Sévère ¬ *E76.1*
- - - ¬ *E76.1*
- - III, IV, VI, VII ¬ *E76.2*
- - IIIB ¬ *E76.2*
- - IS ¬ *E76.0*
- ¬
- - *E76.2*
- - *E76.3*
- - Cardiopathie au cours de *E76.3†, I52.8**
- - Dégénérescence cérébrale au cours de *E76.3†, G32.8**

Mucopurulente ¬
- Bronchite chronique
- - *J41.1*
- - Simple et *J41.8*
- Conjonctivite *H10.0*

Mucorales ¬ Septicémie à *B46.40*

Mucormycose
- Cutanée ¬ *B46.3†, L99.8**
- Disséminée ¬ *B46.48*
- Gastro-intestinale ¬ *B46.2†, K93.8**
- Pulmonaire ¬ *B46.0†, J99.8**
- Rhinocérébrale ¬ *B46.1†, G99.8**
- Sous-cutanée ¬ *B46.3†, L99.8**
- ¬ *B46.5*

Mucosa Associated Lymphoid Tissue
- Estomac ¬ Lymphome MALT [*C88.40*
- Poumon ¬ Lymphome MALT [*C88.40*

Mucosite
- Iléale ¬ *K92.8*
- Orale (ulcéreuse) ¬ *K12.3*
- Sigmoïde ¬ *K92.8*

Mucosulfatidose ¬ *E75.2*

Mucoviscidose
- Gastrite-anémie mégaloblastique ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Iléus méconial ¬ *E84.1†, P75**
- Manifestation
- - Multiples ¬ *E84.87*
- - Pulmonaire et intestinale ¬ *E84.80*
- - ¬ *E84.88*
- ¬
- - *E84*
- - Maladie hépatobiliaire néonatale au cours de *E84.88*

Mucus
- Appendice ¬ Tumeur carcinoïde productrice de *C18.1*
- Poumons ¬ Tumeur carcinoïde productrice de *C34.9*
- Selles ¬ *R19.5*
- ¬
- - Aspiration néonatale de liquide amniotique et de *P24.1*
- - Suffocation par: *T17*

Muelenaere
v./v.a. Haspeslagh-Fryns-Muelenaere

Muenke ¬ Syndrome de *Q87.0*

Muguet
- Buccal ¬ *B37.0*
- SAI ¬ *B37.9*
- Vaginal ¬ *B37.3†*

MUL [Maladie de Unverricht-Lundborg] ¬ *G40.3*

Mulas
v./v.a. Prieto-Badia-Mulas

Mulcahy] ¬ Myélosclérose [type *D47.4*

Mulibrey ¬ Nanisme *Q87.1*

Müller
v./v.a. Anti-Müller
v./v.a. Bindewald-Ulmer-Müller
v./v.a. Canal de Müller

Müllérien
- Aplasie rénale-anomalies cervicothoraciques ¬ Syndrome d'aplasie *Q87.8*

Müllérien *–suite*
- Lymphangiectasies-polydactylie ¬ Syndrome de dérivés *Q87.8*
- Mixte maligne du col de l'utérus ¬ Tumeur *C53.9*
- Ovaire ¬ Tumeur maligne mixte *C56*

Müller-Ribbing-Clément ¬ Syndrome de *Q78.8*

Multicentrique
- Néphropathie ¬ Ostéolyse carpo-tarsienne *M89.50, N28.9*
- Nodulose-arthropathie] ¬ Spectre MONA [ostéolyse *Q87.5*
- ¬
- - Ostéolyse carpo-tarsienne *M89.50*
- - Réticulohistiocytose *E78.88†, M14.39**

Multi-core» ¬ Myopathie: de type: « *G71.2*

Multifocale
- Chronique récurrente
- - Avant-bras ¬ Ostéomyélite *M86.33*
- - Bras ¬ Ostéomyélite *M86.32*
- - Colonne vertébrale ¬ Ostéomyélite *M86.38*
- - Cuisse ¬ Ostéomyélite *M86.35*
- - Jambe ¬ Ostéomyélite *M86.36*
- - Main ¬ Ostéomyélite *M86.34*
- - Pied ¬ Ostéomyélite *M86.37*
- - Région pelvienne ¬ Ostéomyélite *M86.35*
- - Région scapulaire ¬ Ostéomyélite *M86.31*
- - ¬ Ostéomyélite *M86.30*
- Épithélium pigmentaire rétinien (simulant le fundus flavimaculatus) ¬ Dystrophie tachetée *H35.5*
- Multisystémique ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans *C96.0*
- Périostéite et pustulose ¬ Ostéomyélite stérile *M86.30*
- Progressive] ¬ LMP [Leucoencéphalopathie *A81.2*
- SAI ¬ Leucoencéphalopathie *A81.2*
- Thrombocytopénie [MLT] ¬ Lymphangioendothéliomatose *D18.19, D69.61*
- Unisystémique ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans *C96.5*
- ¬
- - Histiocytose X *C96.5*
- - Maladie due au VIH avec leucoencéphalite *B22†, G05.1**
- - Neuropathie motrice *G61.8*
- - NMM [neuropathie motrice *G61.8*
- - Tuberculose *A18.8*

Multiforme
- Conjonctive ¬ Érythème *L51.1†, H13.8**
- ¬
- - CASM [Choroïdopathie amélanotique stellaire *H31.8*
- - Glioblastome *C71.9*

Multigemini ¬ Pili *L67.8*

Multikystique
- Bilatérale ¬ Syndrome muscle-œil-cerveau avec leucodystrophie *G71.2, E75.2*
- Dysplasie rénale ¬ *Q61.4*
- Liés au développement ¬ Reins *Q61.4*
- Néphropathie ¬ *Q61.4*
- Potter type II] ¬ Dysplasie rénale *Q61.4*
- Rein (développement) ¬ *Q61.4*

Multilignées ¬ Anémie réfractaire avec dysplasie *D46.5*

Multilinéaire
- Rémission complète ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie *C92.81*
- ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie *C92.8*

Multiloculaire bénin du rein ¬ Kyste *D30.0*

Multinodulaire
- Endémique) lié à une carence en iode ¬ Goitre *E01.1*
- Familial ¬ Syndrome de goitre *E04.2*
- Kystique) SAI ¬ Goitre: *E04.2*
- Non toxique ¬ Goitre *E04.2*
- Rein kystique-polydactylie ¬ Syndrome de goitre *Q87.8*
- Toxique ¬ Thyréotoxicose avec goitre *E05.2*

Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec test de lyse positif dans un sérum acidifié ¬ *D64.4*

Multinuclés-anhydramnios-dysplasie rénale-hypoplasie cérébelleuse-hydranencéphalie ¬ Syndrome de neurones *Q87.8*

Multiparité
- Élevée ¬ Surveillance de grossesse avec *Z35.4*
- ¬ Difficultés liées à une *Z64.1*

Multiple
v./v.a. Type de maladie

Multiple-dents néonatales ¬ Syndrome de stéatocystome *L72.2*

Multiple-hémihyperplasie] ¬ HHML [Syndrome de la lipomatose *Q87.3*

Multiplication des anticorps contre le facteur VIII ¬ Affection hémorragique due à *D68.31*

Multirésistants 3MRGN ¬ Pseudomonas et Acinetobacter *U81.3!*

Multisystem inflammatory syndrome in children temporairement associé COVID-19 ¬
- *U10.90*
- MIS-C [*U10.90*

Multisystématisé
v./v.a. Atrophie multisystématisée
- ¬ Dégénérescence *G23.2*

Multisystémique
- Adulte
- - Associé au COVID-19 ¬ Syndrome inflammatoire *U10.91*
- - Temporellement associé au COVID-19 ¬ MIS-A [Syndrome inflammatoire *U10.91*
- Dysfonctionnement des muscles lisses ¬ Syndrome *I73.8*

Multisystémique *–suite*
- Lié à LAMA5 [laminine-alpha-5] ¬ Syndrome *M79.89*
- Neurologique-endocrine-pancréatique] ¬ IMNEPD [Maladie infantile *Q87.8*
- Précoce associée à STAT3 ¬ Maladie auto-immune *M35.8*
- Syndromique par déficit en Itch ¬ Maladie auto-immune *M35.8*
- ¬
- - Histiocytose
- - - Cellules de Langerhans multifocale et *C96.0*
- - - X *C96.0*
- - Syndrome
- - - Anasarque-acidose lactique-anémie sidéroblastique-défaillance *Q87.8*
- - - Insuffisance hépatique aiguë infantile-manifestations *K72.0*

Münchhausen ¬ Syndrome de *F68.1*

Munk
v./v.a. Haim-Munk

Muqueux
- Anale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la *O70.3*
- Bénin ¬ Pemphigoïde *L12.1*
- Buccal
- - SAI ¬ *C06.0*
- - Sans précision ¬ Lésions de la *K13.7*
- - Stade
- - - 1 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.05†, K93.41**
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.06†, K93.42**
- - - 3 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.07†, K93.43**
- - ¬
- - - Atrophie de la *K13.7*
- - - Carcinome basocellulaire de la *C06.0*
- - - Granulome
- - - - Éosinophile de la *K13.4*
- - - - Lésions pseudo-granulomateuses de la *K13.4*
- - - - Pyogène de la *K13.4*
- - - - Télangiectasique de la *K13.4*
- - - Hyperplasie inflammatoire de la *K13.6*
- - - Maladie due au VIH avec leucoplasie de la *B23.8, K13.2*
- - - Mélanome malin de la *C06.0*
- - - Ulcère de la *K12.1*
- - - Xanthome verruqueux de la *K13.4*
- Clitoris ¬ Mélanome malin *C51.2*
- Col ¬ Polype *N84.1*
- Crête) alvéolaire ¬ *C03*
- Épanchement des glandes salivaires ¬ Kyste *K11.6*
- Grandes lèvres ¬ Mélanome malin de la *C51.0*

Muqueux *–suite*
- Immunodéficience ¬ Inflammation généralisée des *K91.80*
- Joue ¬
- - Carcinome basocellulaire de la *C06.0*
- - Carcinome épidermoïde de la *C06.0*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.52*
- - Tumeur maligne: *C06.0*
- Lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux *C88.41*
- Maladie de Kawasaki] ¬ Syndrome adéno-cutanéo- *M30.3*
- Mastoïdectomie ¬ Kyste *H95.1*
- Nasale ¬ Cicatrice de la *J34.8*
- Naso-sinusienne ¬ Mélanome malin de la *C31.9*
- Nécrotique récidivante ¬ Périadénite *K12.0*
- Petites lèvres ¬ Mélanome malin de la *C51.1*
- Pianiques ¬ Lésions *A66.7*
- Préputiale ¬ Mélanome malin de la *C60.0*
- Psychogène ¬ Colite *F54, K58.8*
- Rectal
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la *O70.3*
- - ¬ Prolapsus de la *K62.3*
- Rétention des glandes salivaires ¬ Kyste *K11.6*
- Sanglante) (séreuse) ¬ Otite moyenne, aiguë et subaiguë: allergique (*H65.1*
- Sinus
- - Ethmoïdal ¬ Mélanome malin de la *C31.1*
- - Frontal ¬ Mélanome malin de la *C31.2*
- - Maxillaire ¬ Mélanome malin de la *C31.0*
- - Sphénoïdal ¬ Mélanome malin de la *C31.3*
- Syphilitique ¬ Plaque *A51.3*
- Syphilitiques congénitales ¬ Plaques *A50.0*
- Urétral
- - Femme ¬ Prolapsus de *N81.0*
- - ¬ Prolapsus de la *N36.3*
- Utérine ¬ Présence congénitale d'épithélium pavimenteux dans la *Q51.8*
- ¬
- - Atteinte de la *L00.1*
- - Infections virales précisées, caractérisées par des lésions cutanéo- *B08.8*
- - Lèvre
- - - Bord libre) (face intérieure) (frein) (*D10.0*
- - - Inférieure
- - - - *C00.4*
- - - - Face: *C00.4*
- - - Sans indication inférieure supérieure
- - - - *C00.5*
- - - - Face: *C00.5*
- - - Supérieure
- - - - *C00.3*
- - - - Face: *C00.3*

Muqueux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Mélanome malin *C43.9*
- - Nævus blanc
- - - *Q38.6*
- - - Spongieux des *Q38.6*
- - Nécrolyse épidermique toxique avec atteinte de la *L51.21*
- - Otite moyenne
- - - *H65.9*
- - - Aiguë et subaiguë: *H65.1*
- - - Chronique: *H65.3*
- - Pemphigoïde des membranes *L12.1*
- - Prolapsus congénital de: vessie (*Q64.7*
- - Syndrome SSS [staphylococcique de peau échaudée] avec atteinte de la *L00.1*
- - Syphilis secondaire de la peau et des *A51.3*

MURCS ¬ Association *Q87.8*

Murday
v./v.a. Lynch-Lee-Murday

Murin
- Typhus mexicain, typhus endémique, tabardillo] ¬ Typhus *A75.9*
- ¬ Typhus *A75.2*

Murray Valley ¬ Encéphalite de la *A83.4*

Muscle
- Abducteurs du larynx associé à un retard mental ¬ Syndrome de paralysie des *J38.00*
- Actes médical
- - Sans précision ¬ Affection du système ostéo-articulaire et des *M96.9*
- - ¬ Autres affections du système ostéo-articulaire et des *M96.88*
- Antérieurs des mains ¬ Myopathie distale avec atteinte des muscles postérieurs des jambes et des *G71.08*
- Associées à des brûlures ¬ Calcification et ossification de *M61.3*
- Biceps brachial ¬ Tendinite du *M75.2*
- Cuisse et de la hanche ¬ Ischémie traumatique des *T79.61*
- Extenseurs des doigts et pouce-polyneuropathie ¬ Aplasie des *G60.0, Q68.1*
- Extra-oculaire ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Jambe ¬ Ischémie traumatique des *T79.62*
- Larynx ¬ Paralysie des *J38.00*
- Lisse ¬ Détection d'anticorps anti- *R76.88*
- Lisses ¬ Syndrome multisystémique de dysfonctionnement des *I73.8*
- Localisation
- - Non précisée ¬ Ischémie traumatique des *T79.69*
- - ¬ Ischémie traumatique des *T79.68*
- Membre supérieur ¬ Ischémie traumatique des *T79.60*
- Oculaire
- - Surnuméraire ¬ *Q10.3*

Muscle *–suite*
- Oculaire *–suite*
- - ¬ Limitation traumatique des mouvements des *H50.6*
- Oculomoteur ¬
- - Fibrose congénitale des *H49.8*
- - Paralysie congénitale de plusieurs nerfs de *H49.9*
- Œil cerveau
- - Leucodystrophie multikystique bilatérale ¬ Syndrome *G71.2, E75.2*
- - ¬ Syndrome *G71.2*
- Papillaire
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture du *I23.5*
- - Non classée ailleurs ¬ Rupture du *I51.2*
- Périnée au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: *O70.1*
- Pied ¬ Ischémie traumatique des *T79.63*
- Plancher pelvien ¬ Déchirure ancienne des *N81.8*
- Postérieurs des jambes et des muscles antérieurs des mains ¬ Myopathie distale avec atteinte des *G71.08*
- Posturaux ¬ Myopathie liée à l'X avec atrophie des *G71.08*
- Précisées ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des *Q68.8*
- Releveur de l'anus ¬ Syndrome du *K59.4*
- S
- - SAI ¬
- - - Arrachement de *T14.6*
- - - Déchirures de *T14.6*
- - - Entorses/foulures de *T14.6*
- - - Lacération de *T14.6*
- - - Lésion traumatique de *T14.6*
- - - Rupture traumatique de *T14.6*
- - - Section de *T14.6*
- - Tendon s
- - - Antérieurs au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de *S86.2*
- - - Péroniers au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de *S86.3*
- - - Postérieurs au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique d'autre(s) *S86.1*
- Sans précision ¬
- - Calcification et ossification d'un *M61.9*
- - Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les *T48.2*
- - Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des *Q79.9*
- Sterno-cléido-mastoïdien ¬
- - Anomalie morphologique congénitale des *Q68.0*
- - Contracture du *Q68.0*
- Strié
- - Bloquants neuromusculaires] ¬ Intoxication: Myorelaxants (*T48.1*

Muscle *–suite*
- Strié *–suite*
- - ¬ Spasticité d'origine rachidienne des *G95.83*
- Surnuméraire ¬ *Q79.8*
- Tendon
- - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S39.0*
- - Adducteurs de la cuisse ¬ Lésion traumatique de *S76.2*
- - Chef long du biceps brachial ¬ Lésion traumatique du *S46.1*
- - Coiffe des rotateurs ¬ Lésion traumatique de *S46.0*
- - Extenseur
- - - Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de *S56.3*
- - - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S66.3*
- - - Niveau
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre *S56.5*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples *S66.7*
- - - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S66.2*
- - - S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de *S56.4*
- - Fléchisseur
- - - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S66.1*
- - - Niveau
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre *S56.2*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples *S66.6*
- - - Pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique du *S56.0*
- - - S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de *S56.1*
- - Hanche ¬ Lésion traumatique de *S76.0*
- - Intrinsèque
- - - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de *S66.5*
- - - Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S96.2*
- - - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de *S66.4*
- - Long
- - - Extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S96.1*
- - - Fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S96.0*
- - Longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S66.0*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles de lésion traumatique de *T93.5*

Muscle *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d'une lésion traumatique de *T92.5*
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de multiples *S56.7*
- - - Cheville pied ¬ Lésion traumatique
- - - - *S96.8*
- - - - Multiples *S96.7*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique des *S16*
- - - Épaule bras ¬ Lésion traumatique
- - - - *S46.8*
- - - - Multiples *S46.7*
- - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique de multiples *S76.7*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique
- - - - *S86.8*
- - - - Multiples *S86.7*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'autres *S66.8*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique des *S29.0*
- - Non précisés
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T13.5*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T11.5*
- - - Niveau
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de *S56.8*
- - - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S96.9*
- - - - Cuisse ¬ Lésion traumatique de *S76.4*
- - - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique de *S46.9*
- - - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un *S86.9*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un *S66.9*
- - - Tronc ¬ Lésion traumatique de *T09.5*
- - Partie du corps non précisée ¬ Lésion traumatique de *T14.6*
- - Parties du biceps brachial ¬ Lésion traumatique du *S46.2*
- - Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques de *T06.4*
- - Postérieurs au niveau de la cuisse ¬ Lésion traumatique de *S76.3*
- - Quadriceps ¬ Lésion traumatique de *S76.1*
- - Tête ¬ Lésion traumatique des *S09.1*
- - Triceps ¬ Lésion traumatique du *S46.3*
- Tissu conjonctif
- - Sans précision ¬ Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des *M95.9*
- - ¬
- - - Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des *Z87.3*

Muscle *–suite*
- Tissu conjonctif *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Déformations acquises précisées du système ostéo-articulaire, des *M95.8*
- Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: *O70.1*
- Vésicale sans substrat neurologique ¬ Hypo- et acontractilité du *N31.81*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Abcès tuberculeux du *A18.8†, M63.09**
- - Absence de: *Q79.8*
- - Calcification
- - - *M61.4*
- - - Ossification paralytiques d'un *M61.2*
- - Infection gonococcique du système ostéo-articulaire et des *A54.4†*
- - Ischémie traumatique d'un *T79.6*
- - Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des *Q79.8*
- - Ossifications d'un *M61.5*
- - Syphilis du *A52.7†, M63.09**
- - Syphilis secondaire du *A51.4†, M63.09**
- - Tuberculose du *A18.8†, M63.09**

Musculaire
v./v.a. Dystrophie musculaire
v./v.a. ostéo-musculaire
- Accru ¬ Tonus *R29.8*
- Anormal ¬ Syndrome de microcéphalie-déficience intellectuelle-surdité neurosensorielle-épilepsie-tonus *Q87.8*
- Atrophie optique ¬ Syndrome d'atrophie cérébrale diffuse précoce-microcéphalie-faiblesse *G31.88*
- Ceintures-dystrophie musculaire ¬ Syndrome de contracture progressive de l'enfance-faiblesse *G71.08*
- Colonne vertébrale ¬
- - Atteinte des insertions ligamentaires ou *M46.0*
- - Lésion des sites d'insertion *M46.09*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres atteintes *M63.8**
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de cubitus court-dysmorphie faciale-hypotonie *Q87.0*
- Déformante ¬ Dystonie *G24.1*
- Dysmorphies faciales et macrocéphalie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle avec hypotonie *Q87.0*
- HANAC] ¬ Syndrome héréditaire d'angiopathie-néphropathie-anévrismes-crampes *Q28.88, Q61.8*
- Hépatomégalie-polyhydramnios ¬ Syndrome d'hypertrophie *Q87.8*
- Hypercontractile généralisée ¬ Syndrome congénital de rigidité *E72.8*
- Hypothyroïdie ¬ Syndrome de pseudohypertrophie *E03.1*

Musculaire *–suite*
- Ischémique
- - Artère intracrânienne durant l'enfance ¬ Infarctus *I63.5*
- - ¬
- - - Paralysie *T79.60*
- - - Syndrome de Volkmann [rétraction *T79.60*
- Liée à la myostatine ¬ Hypertrophie *M62.89*
- Lisse congénital ¬ Hamartome *Q85.8*
- Myopathies avec anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres *G71.2*
- Néonatale sévère associé au PURA avec convulsions et encéphalopathie ¬ Syndrome d'hypotonie *G40.4*
- Neuritique ¬ Atrophie *G58.9†, M63.89**
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Atrophie et fonte *M62.5*
- - Traumatique ¬
- - - Hématome *M62.8*
- - - Infarcissement ischémique *M62.2*
- - Traumatiques) ¬ Autres déchirures *M62.1*
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬ Anomalie du tonus *P94.9*
- - ¬ Autres anomalies du tonus *P94.8*
- Oculaire ¬ Lissencéphalie pavimenteuse sans atteinte *Q04.3*
- Petite taille-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-faiblesse *Q87.1*
- Précisées ¬ Autres atteintes *M62.8*
- Primitive, sans précision ¬ Affection *G71.9*
- Primitives ¬ Autres affections *G71.8*
- Progressive-surdité-retard de développement ¬ Syndrome de cataracte congénitale-hypotonie *G71.3*
- Pseudo-hypertrophique ¬
- - Atrophie *G71.08*
- - Paralysie *G71.08*
- Psychogène en tant que réaction de conversion ¬ Contracture *F44.4*
- Sans précision ¬ Atteinte *M62.9*
- Spinale distale liée à l'X type 3 ¬ Atrophie *G12.1*
- Spinobulbaire de type Kennedy [Maladie de Kennedy] ¬ Atrophie *G12.2*
- Syphilitique ¬ Atrophie *A52.7†, M63.89**
- Trouble sévère du langage-retard cognitif sévère ¬ Syndrome d'hypotonie *Q87.8*
- Type 2 ¬ Myopathie congénitale avec atrophie des fibres *G71.2*
- Werdnig-Hoffmann ¬ Atrophie *G12.0*
- ¬
- - Activité continue familiale de la fibre *G71.1*
- - Carence en carnitine palmityltransférase *E71.3*
- - Contracture *M62.4*
- - Déficit en phosphorylase *E74.0*
- - Diastasis *M62.0*

Musculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fasciculations *R25.3*
- - Filaminopathie *G71.8*
- - Fonte *M62.89*
- - Foulure *M62.6*
- - Glycogénose déficit
- - - Aldolase A *E74.0*
- - - Bêta-énolase *E74.0*
- - - Glycogène phosphorylase *E74.0*
- - - Phosphofructokinase *E74.0*
- - - Phosphorylase kinase hépatique et *E74.0*
- - GSD déficit
- - - Aldolase A *E74.0*
- - - Phosphorylase kinase *E74.0*
- - Hernie *M62.8*
- - Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus *T42.8*
- - Ischémie *M62.29*
- - Myopathie congénitale avec disproportion des types de fibres *G71.2*
- - Rigidité *G25.88*
- - Syndrome
- - - Homme raide [rigidité *G25.88*
- - - Loge *T79.6*
- - - Synostose radio-cubitale-retard de développement-hypotonie *Q87.0*

Musculature
- Abdominale ¬ Aplasie congénitale de la *Q79.4*
- Intrinsèque du larynx ¬ *C32.0*
- Squelettique ¬ Rigidité de la *R29.8*
- Ventre ¬ Absence congénitale de la *Q79.4*

Musculo-contractural ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Mutarotase ¬ Déficit en galactose *E74.2*

Mutase ¬
- Déficit
- - Complet en méthylmalonyl-CoA *E71.1*
- - Partiel en méthylmalonyl-CoA *E71.1*
- Glycogénose par déficit en phosphoglycérate *E74.0†, G73.6**

Mutation
- ADN mitochondrial ¬
- - Cardiomyopathie
- - - Hypertrophique et tubulopathie dues à une *I42.2*
- - - Surdité dues à une *G31.81*
- - Tubulopathie rénale Gitelman-like due à une *N15.8*
- Bialélique du gène BRCA2 ¬ Syndrome de prédisposition héréditaire au cancer dû à une *D61.0*
- C19orf12 ¬ Neurodégénérescence avec surcharge cérébrale en fer liée à des *G23.0*
- CDKN1C ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une *Q87.3*

Mutation *–suite*
- Chaîne alpha de CD8 ¬ Susceptibilité aux infections respiratoires associée à une *D84.8*
- CREBBP ¬ Syndrome de Rubinstein-Taybi dû à des *Q87.2*
- Délétion intragénique de NF1 ¬ Neurofibromatose type 1 par *Q85.0*
- DGAT2 ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 due à une *G60.0*
- Diacylglycérol kinase epsilon ¬ Syndrome hémolytique et urémique avec *D58.8*
- Dominante négative d'IKZF1 ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- Enzyme 1 à l'X, syndrome auto-inflammatoire et somatique] ¬ Syndrome VEXAS [Vacuole, *M35.8*
- Facteur V Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C activée [*D68.5*
- FBLN1 ¬ Syndrome de retard de développement-anomalie du système nerveux central-syndactylie dû à des *Q87.8*
- Gène
- - ABCB4 ¬ Cholélithiase par *K80.80*
- - COL2A1 ¬ Arthrose précoce
- - - Articulation
- - - - Coude avec dysplasie spondyloépiphysaire modérée due à une *Q77.7, M19.92*
- - - - Hanche avec dysplasie spondyloépiphysaire modérée due à une *Q77.7, M19.95*
- - - Dysplasie spondylo-épiphysaire intermédiaire due à une *Q77.7, M19.99*
- - MECP2 ¬ Encéphalopathie congénitale sévère due à une *G93.4, Q02*
- - Prothrombine ¬ *D68.5*
- - Récepteur
- - - Leptine
- - - - Enfant adolescent 3 18 ¬ Obésité
- - - - - *E66.84*
- - - - - Extrême par *E66.85*
- - - - Indice de masse corporelle IMC
- - - - - 60 et plus chez l'adulte ¬ Obésité par *E66.88*
- - - - - Compris entre 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ Obésité par *E66.80*
- - - - - Compris entre 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ Obésité par *E66.86*
- - - - - Compris entre 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ Obésité par *E66.87*
- - - Letpine avec indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ Obésité par *E66.81*
- GRIA3 ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X par *Q87.8*
- GRIN2A ¬ Encéphalopathie épileptique à début précoce et déficience intellectuelle liées à une *G40.4*
- Hétérozygotes du gène THOX2 ¬ Hypothyroïdie congénitale transitoire par *P72.2*

Mutation *–suite*
- KIF5A ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 due à une *G60.0*
- LIS1 ¬ Lissencéphalie par *Q04.3*
- MEIS2 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-cardiopathie congénitale-fente palatine dû à une *Q87.8*
- NSD1 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une *Q87.3*
- Pittsburgh de l'alpha-1-antitrypsine ¬ Hémorragie due à la *E88.08†, D77**
- Ponctuelle
- - DYRK1A ¬ Syndrome de déficience intellectuelle dû à une *Q87.0*
- - JAG1 ¬
- - - Dysplasie artério-hépatique due à une *Q44.7*
- - - Paucité des voies biliaires syndromique due à une *Q44.7*
- - - Syndrome d'Alagille-Watsons dû à une *Q44.7*
- - NOTCH2 ¬ Dysplasie artério-hépatique due à une *Q44.7*
- - ¬ Syndrome
- - - Angelman dû à une *Q93.5*
- - - Dysmorphie cranio-faciale-anomalies squelettiques-cardiopathie-trouble neurologique du développement dû à une *Q87.0*
- - - Létal d'hypoplasie pontocérébelleuse-hypotonie-insuffisance respiratoire dû à une *Q04.3*
- Récepteur
- - Hormone thyroïdien
- - - Alpha ¬ Résistance aux hormones thyroïdiennes par *E03.8*
- - - Bêta ¬ Résistance aux hormones thyroïdiennes par *E05.8*
- - TSH ¬
- - - Hyperthyroïdie familiale par *E05.8*
- - - Hypothyroïdie par *E03.1*
- RNU12 ¬ Ataxie cérébelleuse congénitale due à une *G11.1*
- RORC ¬ Déficit immunitaire primaire
- - *D84.8*
- - Autosomique récessif due à une *D84.8*
- Somatique
- - CEBPA ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec *C92.00*
- - NPM1 ¬ Leucémie myéloïde aiguë associée à des *C92.00*
- SPG11 ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique récessive type 2 due à une *G60.0*
- TECPR2 ¬ Neuropathie héréditaire sensitive et autonomique due à une *G60.8*
- TFG ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 due à une *G60.0*
- TUBA1 ¬ Lissencéphalie due à une *Q04.3*
- TUBB2B ¬ Polymicrogyrie due à une *Q04.3*

Mutation *–suite*
- TUBB3 ¬ Dysgénésie corticale avec hypoplasie pontocérébelleuse due à une *Q04.8*
- VCP ¬ Myopathie distale de l'adulte due à des *G71.08*

Mutchinick ¬ Syndrome de *Q87.8*

Mutilante
- Ichtyose ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Plaques kératosiques péri-orificielles ¬ Kératodermie palmoplantaire *Q82.8*
- ¬
- - Kératodermie aïnhumoïde et *Q82.8*
- - Rhinopharyngite *A66.5*

Mutilation
v./v.a. Antécédent personnel de mutilation génitale féminine
- Génital
- - Féminine ¬ *Z91.70*
- - Féminines ¬ *Z91.70*

Mutisme
- Cérébelleux) postopératoire ¬ *G97.81*
- Électif ¬ *F94.0*
- Hystérique ¬ *F44.4*
- Sélectif ¬ *F94.0*

MUTYH ¬
- PAF
- - Atténuée liée à *D12.6*
- - Polypose adénomateuse familiale] liée au gène *D12.6*
- Polypose
- - Adénomateuse familiale atténuée liée à *D12.6*
- - Associée à *D12.6*

MVOH [Maladie veino-occlusive hépatique] ¬ *K76.5*

MVOP [maladie veino-occlusive pulmonaire] ¬ *I27.08*

Myalgie
- Épidémique ¬ *B33.0*
- Fasciculations-crampes ¬ Syndrome *G71.1*
- Lié au tryptophane ¬ Syndrome d 'éosinophilie- *M35.8*
- ¬ *M79.1*

Myalgique
- Non post-infectieux ¬ Encéphalomyélite *G93.31*
- Post-infectieux ¬ Encéphalomyélite *G93.30*
- ¬ Encéphalomyélite *G93.39*

Myasthenia gravis ¬
- *G70.0*
- Rippling muscle disease avec *G71.8, G70.0*

Myasthénie
- Auto-immune ¬ *G70.0*
- Congénitale et au cours du développement ¬ *G70.2*
- Pseudoparalytique ¬ *G70.0*
- Transitoire néonatale ¬ *P94.0*
- ¬ *G70.0*

Myasthénique
- Congénital ¬ Syndrome *G70.2*
- Cours
- - Hyperthyroïdie ¬ Syndrome *E05.9†, G73.0**
- - Maladie endocrinienne NCA ¬ Syndrome *E34.9†, G73.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Syndrome *G73.3**
- - Maladies endocriniennes ¬ Syndrome *G73.0**
- - Thyréotoxicose ¬ Syndrome *E05.9†, G73.0**
- - Tumeur ¬ Syndrome *D48.9†, G73.2**
- - Tumeur maligne NCA ¬ Syndrome *C80.9†, G73.2**
- Diabète sucré ¬ Syndrome *E14.40†, G73.0**
- Lambert-Eaton ¬ Syndrome *C80.9†, G73.1**
- ¬ Paralysie bulbaire *G70.0*

Myatrophie ¬ Diabète sucré
- *E14.40†, G73.0**
- Type
- - 1 avec *E10.40†, G73.0**
- - 2 avec *E11.40†, G73.0**

Mycétome
- Actinomycètes ¬ *B47.1*
- ¬ *B47.9*

Mycobactérie
- Atypique ¬ Infection pulmonaire tuberculeuse à *A16.2*
- Atypiques
- - Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ *U82.2!*
- - ¬ Infection pulmonaire à *A31.0*
- Non-tuberculeuses ¬ Infection pulmonaire à *A31.0*

Mycobactérien
- Atypique disséminée ¬ Infection *A31.80*
- Déficit
- - Complet
- - - IFNG ¬ Prédisposition génétique sévère aux infections *D84.8*
- - - IFNgammaR1 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- - - IFNgammaR2 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- - - IL12B ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- - - IRF1 ¬ Sévère prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- - - ISG15 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- - - Récepteur bêta 1 de l'interleukine 12 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- - Partiel
- - - Facteur 8 régulateur de l'interféron ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- - - JAK1 ¬ Prédisposition mendélien

Mycobactérien *–suite*
- Déficit *–suite*
- - Partiel *–suite*
- - - JAK1 ¬ Prédisposition mendélien *–suite*
- - - - Autosomique récessive aux infections *D84.8*
- - - - Infections *D84.8*
- - - STAT1 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*
- ¬
- - Infections *A31.88*
- - Maladie due au VIH avec infection *B20, A31.9*
- - Prédisposition mendélienne aux infections *D84.8*

Mycobactériose
- Liée au chromosome X ¬ Prédisposition aux *D84.8*
- SAI ¬ *A31.9*
- ¬ Sensibilité familiale aux *D84.8*

Mycobacterium
- Avium
- - Intracellulare ¬ Maladie due au VIH avec infection à *B20, A31.0*
- - ¬ Infection à *A31.0*
- Battey ¬ Infection à *A31.0*
- Intracellulare ¬ Infection à *A31.0*
- Kansasii ¬ Infection à *A31.0*
- Leprae ¬ Infection
- - *A30*
- - Oculaire à *A30.9†, H58.8**
- Marinum ¬ Infection par *A31.1*
- SAI ¬ Infection atypique à *A31.9*
- Tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ *U82.0!*
- Ulcerans [Ulcère de Buruli] ¬ Infection par *A31.1*
- Xenopi ¬ Infection à *A31.88*
- ¬ Infection
- - Cutanée à *A31.1*
- - Pulmonaire à *A31.0*

Mycophénolate mofétil ¬ Embryopathie au *Q86.88*

Mycoplasma
- Pneumoniae
- - M pneumoniae ¬
- - - *B96.0!*
- - - Bactériémie à *A49.3*
- - ¬
- - - Bronchite aiguë due à *J20.0*
- - - Pneumonie due à *J15.7*
- Siège non précisé ¬ Infection à *A49.3*
- Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.0!*

Mycoplasmes ¬
- Encéphalite à *G04.8, B96.0!*
- Infection uro-génitale à *N39.0, B96.0!*
- Méningite à *G00.8, B96.0!*

Mycoplasmes ¬ *–suite*
- Pneumonie congénitale à *P23.6, B96.0!*

Mycose
- Barbe ¬ *B35.0*
- Candidosique
- - Gland du pénis ¬ *B37.4†, N51.2**
- - Vagin ¬ *B37.3†, N77.1**
- Classées ailleurs ¬ Méningite au cours de *G02.1**
- Intestin ¬ *B49†, K93.8**
- Myosite ¬ *B49†, M63.29**
- Occasionnelle ¬ *B48.7*
- Ongles ¬ *B35.1*
- Opportuniste ¬ *B48.7*
- Oreille ¬ *B36.9†, H62.2**
- Organes génitaux masculins ¬ *B49†, N51.8**
- Poumon ¬ *B49†, J99.8**
- Pulmonaire NCA ¬ *B49†, J99.8**
- Sans précision ¬ *B49*
- Superficielles précisées ¬ Autres *B36.8*
- Urètre ¬ *B49†, N37.0**
- Vaginale ¬ *B37.3†, N77.1**
- Vulve ¬ *B37.3†, N77.1**
- Vulvo-vaginale ¬ *B37.3†, N77.1**
- Yeux ¬ *B49†, H58.8**
- ¬
- - Maladie due au VIH avec *B20, B49*
- - Otite externe cours
- - - *B36.9†, H62.2**
- - - *H62.2**
- - Pneumonie au cours de *J17.2**

Mycosique ¬
- Arthrite *B49†, M01.69**
- Colpite *B37.3†, N77.1**
- Diarrhée *B49†, K93.8**
- Fluor *B37.3†, N77.1**
- Kératite *B49†, H19.2**
- Maladie due au VIH avec rétinite *B20†, H32.0*, B49*
- Méningite *B49†, G02.1**
- Vaginite *B37.3†, N77.1**
- Vulvo-vaginite *B37.3†, N77.1**

Mycosis
- Barbae ¬ *B35.0*
- Capillitii ¬ *B35.0*
- Fongoïde
- - Folliculotrope ¬ *C84.0*
- - ¬ *C84.0*

Mycotica ¬
- Balanitis *B37.4†, N51.2**
- Vulvitis *B37.3†, N77.1**

Mycotoxines contaminant des aliments ¬ Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres *T64*

Myélatélie ¬ *Q06.1*

MyeLDM [Malformation myélique limitée dorsale] ¬ *Q76.0*

Myéline rétiniennes ¬ Fibres à *H47.0*

Myélinisé
- Gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec surdité, déficience intellectuelle et absence de fibres sensitives *G60.0*
- ¬ Fibres nerveuses intrarétiniennes *H47.0*

Myélinoclastique diffuse ¬ Sclérose *G37.0*

Myélinolyse centropontine ¬ *G37.2*

Myélique limitée dorsale ¬
- Malformation *Q76.0*
- MyeLDM [Malformation *Q76.0*

Myélite
- Adénovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Ascendant
- - Aiguë ¬ *G04*
- - Nécrosante sub-aiguë ¬ *G37.4*
- Cours
- - Nægleriase ¬ *B60.2†, G05.2**
- - Rougeole ¬ *B05.0†, G05.1**
- - Rubéole ¬ *B06.0†, G05.1**
- - Syphilis congénitale ¬ *A50.4†, G05.0**
- - Syphilis tardive ¬ *A52.1†, G05.0**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.2†, G05.2**
- Due à zona ¬ *B02.0†, G05.1**
- Encéphalomyélite
- - Cours
- - - Infections
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ Encéphalite, *G05.0**
- - - - Virales classées ailleurs ¬ Encéphalite, *G05.1**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ Encéphalite, *G05.8**
- - - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Encéphalite, *G05.2**
- - Sans précision ¬ Encéphalite, *G04.9*
- - ¬ Autres encéphalites, *G04.8*
- Flasque aiguë [MFA] ¬ *A88.8*
- Funiculaire ¬ *E53.8†, G32.0**
- Nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix-Alajouanine] ¬ *G37.4*
- Oreillons ¬ *B26.2†, G05.1**
- Radique ¬ *G97.88*
- Transverse
- - Aiguë
- - - Anticorps anti-MOG ¬ *G37.3*
- - - Cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central ¬ *G37.3*
- - - SAI ¬ *G37.3*
- - - ¬ *G37.3*
- - Syphilitique ¬ *A52.1†, G05.0**
- Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G05.0**
- Varicelleuse ¬ *B01.1†, G05.1**
- Virus de l'herpès ¬ *B00.4†, G05.1**
- ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, G04.9*

Myéloblastique aiguë
- Associée à une translocation t(8;16)(p11;p13) ¬ Leucémie *C92.00*
- LMA] ¬ Leucémie *C92.0*

Myéloblastique aiguë *–suite*
- Type associée à une translocation t(8;21)(q22;q22) ¬ Leucémie *C92.00*

Myélocèle ¬ *Q05*

Myélocystocèle
- Cervicale ¬ *Q05.5*
- Terminal ¬ *Q76.0*
- Thoracique ¬ *Q05.6*
- ¬ *Q05.9*

Myélocytaire ¬ Réaction leucémoïde de type: *D72.8*

Myélodysplasie
- Excès de blastes ¬ *D46.9*
- Infections-retard de croissance-hypoplasie surrénalienne-anomalies génitales-entéropathie] ¬ Syndrome MIRAGE [Syndrome de *Q87.8*
- Moelle épinière ¬ *Q06.1*
- SAI ¬ *D46.9*
- ¬ Anémie aplasique autosomique dominante associée à une *D61.0, D46.9*

Myélodysplasique
- Agents alkylants ¬ Syndrome *D46.9*
- Associé à une anomalie chromosomique isolée del(5q) ¬ Syndrome *D46.6*
- Cours syndrome
- - Familial de monosomie 7 ¬ Syndrome *D46.9*
- - Prédisposition tumorale liée gène
- - - DDX41 ¬ Syndrome *D46.9*
- - - MBD4 ¬ Syndrome *D46.9*
- Délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] ¬ Syndrome *D46.6*
- Épipodophyllotoxines ¬ Syndrome *D46.9*
- Induit
- - Thérapie, SAI ¬ Syndrome *D46*
- - Traitement ¬ Syndrome *D46.9*
- Inhibiteurs de la topoisomérase II ¬ Syndrome *D46.9*
- Irradiation aux rayons X ¬ Syndrome *D46.9*
- Liés aux radiations ¬ Leucémie aiguë myéloïde et syndromes *C92.00*
- Myéloprolifération non classifiable ¬ Maladie *C94.60*
- Non-classifié ¬ Syndrome *D46.7*
- Sans précision ¬ Syndrome *D46.9*
- ¬
- - Syndrome d'alpha-thalassémie-syndrome *D56.0, D46.9*
- - Syndromes *D46.7*
- - Uroporphyrie érythropoïétique avec syndrome *D46.9, E80.2*

Myélofibreuse ¬ Anémie *D47.4†, D63.0**

Myélofibrose
- Aiguë ¬ *C94.4*
- Chronique idiopathique ¬ *D47.4*
- Début précoce ¬ Thrombocytopénie héréditaire avec *D69.41, D47.4*

Myélofibrose *–suite*
- Pancytopénie-déficience intellectuelle-anomalies neurologiques et ophthalmologiques ¬ Syndrome sévère de *Q87.8*
- Primaire ¬ *D47.4*
- Secondaire à un syndrome myéloprolifératif ¬ *D47.4*
- ¬
- - *D47.4*
- - Ostéosclérose au cours d'une *D47.4*
- - Panmyélose aiguë avec *C94.4*

Myélogène
- Chronique ¬ Leucémie *C92.10*
- ¬ leucémie: *C92*

Myéloïde
v./v.a. Tumeur myéloïde
- Aiguë
- - Altérations du gène MLL ¬ Leucémie *C92.60*
- - Associée
- - - Inv(3)(q21q26.2) ¬ Leucémie *C92.00*
- - - Mutations somatiques de NPM1 ¬ Leucémie *C92.00*
- - - T(3;3)(q21;q26.2) ¬ Leucémie *C92.00*
- - - T(6;9)(p23;q34) ¬ Leucémie *C92.00*
- - - T(9;11)(p22;q23) ¬ Leucémie *C92.00*
- - - T(9;22)(q34.1;q11.2) ¬ Leucémie *C92.00*
- - Cours syndrome
- - - Familial de monosomie 7 ¬ Leucémie *C92.00*
- - - Prédisposition tumorale liée gène
- - - - DDX41
- - - - - Rémission complète ¬ Leucémie *C92.01*
- - - - - ¬ Leucémie *C92.00*
- - - - MBD4 ¬ Leucémie *C92.00*
- - Différenciation minimale ¬ Leucémie *C92.00*
- - Due
- - - Agents alkylants ¬ Leucémie *C92.00*
- - - Inhibiteur de la topoisomérase de type II ¬ Leucémie *C92.00*
- - Dysplasie multilinéaire
- - - Rémission complète ¬ Leucémie *C92.81*
- - - ¬ Leucémie *C92.8*
- - LAM
- - - Rémission complète ¬ Leucémie *C92.01*
- - - ¬ Leucémie *C92.00*
- - M6 a b
- - - Rémission complète ¬ Leucémie *C94.01*
- - - ¬ Leucémie *C94.00*
- - M7
- - - Rémission complète ¬ Leucémie *C94.21*
- - - ¬ Leucémie *C94.20*
- - Maturation) ¬ Leucémie *C92.0*
- - Mégacaryoblastique associée à t(1;22)(p13;q13) ¬ Leucémie *C94.20*

Myéloïde *–suite*
- Aiguë *–suite*
- - Mutations somatiques de CEBPA ¬ Leucémie *C92.00*
- - Réfractaire à un traitement d'induction ¬ Leucémie *C92.00*
- - - ¬ Syndrome des plaquettes familial associé à une prédisposition à la leucémie *D69.1*
- Associée à des anomalies en 11q23 ¬ Leucémie aiguë *C92.60*
- Chronique
- - Atypique BCR/ABL négative
- - - Rémission complète ¬ Leucémie *C92.21*
- - - ¬ Leucémie *C92.20*
- - BCR/ABL positive ¬ Leucémie *C92.10*
- - Chromosome Philadelphie (Ph1) positive ¬ Leucémie *C92.10*
- - LMC
- - - BCR/ABL positive en rémission complète ¬ Leucémie *C92.11*
- - - Chromosome Philadelphie (Ph1) positive en rémission complète ¬ Leucémie *C92.11*
- - - Rémission complète ¬ Leucémie *C92.11*
- - - ¬
- - - - Crise blastique au cours d'une leucémie *C94.8!*
- - - - Leucémie *C92.10*
- - T(9;22) (q34;q11)
- - - Rémission complète ¬ Leucémie *C92.11*
- - - ¬ Leucémie *C92.10*
- Cours de syndrome de déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements ¬ Leucémie aiguë *C92.00*
- Éosinophile médullaire anormaux associée
- - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucémie aiguë *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22) ¬ Leucémie aiguë *C92.50*
- Familiale ¬ Leucémie aiguë *C92.00*
- Lymphatique réarrangement JAK2 associé forme
- - Aiguë ¬ Tumeur mixte *C95.00*
- - Chronique ¬ Tumeur mixte *C95.10*
- Mégacaryocytaire ¬ Hépatosplénomégalie *D47.4*
- Rémission complète ¬ Sarcome *C92.31*
- Sans précision ¬ Leucémie *C92.9*
- Syndromes myélodysplasiques liés aux radiations ¬ Leucémie aiguë *C92.00*
- ¬
- - Leucémies *C92.7*
- - Myélosclérose mégacaryocytaire avec métaplasie *D47.4*
- - Polio-encéphalite bulbaire *A80.9†, G05.1**
- - Poussée blastique au cours de leucémie *C92.10, C94.8!*
- - Sarcome *C92.30*

Myélokathexis
v./v.a. verrues-hypogammaglobulinémie-infections-myélokathexis

Myéloleucodystrophie ¬ *E75.2*

Myélomalacie angiohypertrophique sub-aiguë ¬ *G37.4*

Myélomatose
- Multiple ¬ Ostéoporose au cours de *C90.00†, M82.09**
- Rémission complète ¬ *C90.01*
- ¬ Arthrite au cours de *C90.00†, M36.1**

Myélome
- Monostotique à plasmocytes ¬ *C90.00*
- Multiple
- - Rémission complète ¬ *C90.01*
- - ¬
- - - Arthrite au cours de *C90.00†, M36.1**
- - - Arthropathie au cours de *C90.00†, M36.1**
- - - Glomérulonéphrite au cours de *C90.00†, N08.1**
- - - Glomérulopathie au cours de *C90.00†, N08.1**
- - - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *C90.00†, N16.1**
- - - Pyélonéphrite au cours de *C90.00†, N16.1**
- - - Trouble
- - - - Glomérulaire au cours de *C90.00†, N08.1**
- - - - Tubulo-interstitiel au cours de *C90.00†, N16.1**
- Plasmocytes en rémission complète ¬ *C90.01*
- Solitaire
- - Rémission complète ¬ *C90.31*
- - ¬ *C90.30*

Myéloméningocèle
- Hydrocéphalie ¬ *Q05.4*
- Moelle épinière ¬ *Q05.9*
- ¬
- - *Q05*
- - *Q05.9*

Myélomonocytaire
- Aiguë
- - Rémission complète ¬ Leucémie *C92.51*
- - ¬ Leucémie *C92.50*
- Chronique LMMC
- - Éosinophilie
- - - Rémission complète ¬ Leucémie *C93.11*
- - - ¬ Leucémie *C93.10*
- - Rémission complète ¬ Leucémie *C93.11*
- - ¬ Leucémie *C93.10*
- Juvénile
- - LMMJ
- - - Rémission complète ¬ Leucémie *C93.31*
- - - ¬ Leucémie *C93.30*
- - ¬ Syndrome Noonan-like avec leucémie *Q87.0, C93.30*

Myélopathie
- Associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains ¬ *G04.1*

Myélopathie *–suite*
- Cours
- - Atteinte des disques intervertébraux ¬ *M51.0†, G99.2**
- - Carence en vitamine B12 ¬ *E53.8†, G32.0**
- - Discopathie ¬ *M51.0†, G99.2**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *G99.2**
- - Spondylarthrose
- - - Cervicale ¬ *M47.12†, G99.2**
- - - Lombaire ¬ *M47.16†, G99.2**
- - - Lombosacrée ¬ *M47.17†, G99.2**
- - - Thoracique ¬ *M47.14†, G99.2**
- - Sténose du canal rachidien ¬ *M48.09†, G99.2**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G99.2**
- Dégénérescence des disques intervertébraux NCA ¬ *M51.0†, G99.2**
- Déplacement de disque intervertébral NCA ¬ *M51.0†, G99.2**
- Due à une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 (HTLV-1) ¬ *G04.1*
- Médicamenteuse ¬ *G95.8*
- Nécrotique subaiguë ¬ *G95.18*
- Post-radiothérapie ¬ *G95.8*
- Radiculopathie ¬ Spondylarthrose
- - Cervicale sans *M47.8*
- - Lombo-sacrée sans *M47.8*
- - Thoracique sans *M47.8*
- SAI ¬ *G95.9*
- Spondylogène NCA ¬ *M47.19†, G99.2**
- Vasculaire) ¬ Claudication intermittente médullaire (lors de *G95.18*
- Vasculaires ¬ Autres *G95.18*
- ¬
- - Atteinte d'un disque cervical avec *M50.0†, G99.2**
- - Compression racine nerveux lors atteinte disque intervertébral
- - - *M51.0†, G99.2**
- - - Cervicaux avec *M50.0†, G99.2**
- - Dégénérescence des disques intervertébral
- - - Cervicaux avec *M50.0†, G99.2**
- - - Lombaires avec *M51.0†, G99.2**
- - Hernie du noyau gélatineux avec *M51.0†, G99.2**
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, G95.9*
- - Spondylarthrose
- - - *M47.1*
- - - *M47.99†, G99.2**
- - - Sacrale avec *M47.18†, G99.2**
- - - Sacro-coccygienne avec *M47.18†, G99.2**
- - Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec *M43.3*

Myéloperoxydase ¬
- Déficit en *E80.3*
- Détection d'anticorps cytoplasmiques anti-neutrophiles dirigés contre la *R76.88*

Myéloprolifératif
- Chronique ¬ Maladie *D47.1*
- Non classifiable
- - Rémission complète ¬ Maladie *C94.61*
- - ¬ Maladie
- - - *C94.60*
- - - Myélodysplasique et *C94.60*
- Sans précision ¬ Maladie *D47.1*
- Transitoire ¬ Syndrome *D47.1*
- ¬
- - Myélofibrose secondaire à un syndrome *D47.4*
- - Uroporphyrie érythropoïétique associée à un syndrome *D47.1, E80.2*

Myéloréticulose ¬ *D47.4*

Myéloschisis
- Dorsal limité
- - Non sacculaire ¬ LDM [*Q76.0*
- - Sacculaire ¬
- - - *Q76.0*
- - - LDM [*Q76.0*
- ¬ *Q05.9*

Myélosclérose
- Aiguë ¬ *C94.40*
- Mégacaryocytaire avec métaplasie myéloïde ¬ *D47.4*
- Type Mulcahy] ¬ *D47.4*

Myélose
- Chronique
- - Rémission complète ¬ *D47.1*
- - ¬ *D47.1*
- Érythrémique
- - Aiguë en rémission complète ¬ *C94.01*
- - ¬ *C94.00*
- Funiculaire NCA ¬ Anémie avec *D51.0†, G32.0**
- Mégacaryocytaire chronique ¬ *D47.4*
- Paralytique atrophique aiguë ¬ *A80.3*

Myhre
- Smith ¬ Syndrome de Ruvalcaba- *Q89.8*
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Myiase
- Auriculaire ¬ *B87.4†, H94.8**
- Cavités ¬ *B87.8*
- Cutané
- - Rampante ¬ *B87.0*
- - ¬ *B87.0†, L99.8**
- Furonculoïde
- - Cordylobia anthropophaga ¬ *B87.0*
- - Dermatobia hominis ¬ *B87.0*
- - ¬ *B87.0*
- Intestinale ¬ *B87.8†, K93.8**
- Laryngée ¬ *B87.3*
- Localisations ¬ *B87.8*
- Oculaire ¬ *B87.2†, H58.8**
- Plaies cutanées ¬ *B87.1*
- Rhinopharyngée ¬ *B87.3†, J99.8**

Myiase *–suite*
- ¬ *B87.9*

Myocarde
- Graisseuse ¬ Dégénérescence du cœur ou du *I51.5*
- Infarctus type
- - 1 ¬ Infarctus sous-endocardique aigu du *I21.40*
- - 2 ¬ Infarctus sous-endocardique aigu du *I21.41*
- Localisation non précisée ¬ Infarctus transmural aigu du *I21.3*
- Localisations ¬ Infarctus transmural aigu du *I21.2*
- Méningocoques ¬ Infection du *A39.5†, I41.0**
- Nouveau-né ¬ Ischémie transitoire du *P29.4*
- Paroi
- - Antérieure ¬ Infarctus transmural aigu du *I21.0*
- - Inférieure ¬ Infarctus transmural aigu du *I21.1*
- SAI ¬ Infarctus transmural du *I21.3*
- Sénile ¬ Dégénérescence du cœur ou du *I51.5*
- Spongieux ¬ *I42.88*
- ¬
- - *C79.84*
- - Défaut du *I51.5*
- - Dégénérescence
- - - *I51.5*
- - - Syphilitique du *A52.0†, I52.0**
- - Fibrose du *I51.4*
- - Hémochromatose du *E83.1†, I43.1**
- - Infarctus sous-endocardique aigu du *I21.48*
- - Maladie du *I51.5*
- - Malformation congénitale du: *Q24.8*
- - Syndrome post-infarctus du *I24.1*
- - Syphilis du *A52.0†, I41.0**
- - Tuberculose de *A18.8†, I41.0**

Myocardiopathie
- Alcoolique ¬ *I42.6*
- Congénitale ¬ *I42.4*
- Constrictive SAI ¬ *I42.5*
- Cours
- - Diphtérie ¬ *A36.8†, I43.0**
- - Maladies
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *I43.0**
- - - Métaboliques ¬ *I43.1**
- - - Nutritionnelles ¬ *I43.2**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *I43.8**
- - Puerpéralité ¬ *O90.3*
- Due à des médicaments et d'autres causes externes ¬ *I42.7*
- Hypertrophique
- - Non obstructive ¬ *I42.2*
- - ¬ Autres *I42.2*

Myocardiopathie *–suite*
- Ischémique ¬ *I25.5*
- Nutritionnelle ¬ *E63.9†, I43.2**
- Obstructive hypertrophique ¬ *I42.1*
- Primitive) (secondaire) SAI ¬ *I42.9*
- Restrictive NCA ¬ *I42.5*
- Sans précision ¬ *I42.9*
- Virale ¬ *B33.2†, I43.0**

Myocardique
- Asymptomatique ¬ Ischémie *I25.6*
- Rhumatismal
- - Aiguë ¬ Insuffisance *I01.2*
- - Subaiguë ¬ Insuffisance *I01.2*
- SAI ¬ Insuffisance cardiaque ou *I50.9*
- Syphilitique ¬ Insuffisance *A52.0†, I52.0**

Myocardite
- Aiguë
- - Cours de grippe [Influenza], virus de l'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8†, I41.1**
- - Grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.8*
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- - Sans précision ¬ *I40.9*
- Aiguës ¬ Autres *I40.8*
- Aseptique chez le nouveau-né ¬ *B33.2†, I41.1**
- Aspergillus ¬ *B44.8†, I41.2**
- Candida ¬ *B37.88†, I41.2**
- Chronique (interstitielle) ¬ *I51.4*
- Cours
- - Maladies
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *I41.0**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *I41.2**
- - - Virales classées ailleurs ¬ *I41.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *I41.8**
- - Paludisme ¬ *B50.8†, I41.2**
- - Polyarthrite chronique ¬ *M05.30†, I41.8**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, I41.8**
- - Scarlatine ¬ *A38†, I41.0**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.8†, I41.2**
- - Typhus NCA ¬ *A75.9†, I41.0**
- Cryptocoques ¬ *B45.8*
- Diphtérique ¬ *A36.8†, I41.0**
- Due au typhus épidémique à poux ¬ *A75.0†, I41.0**
- Épidémique chez le nouveau-né ¬ *B33.2†, I41.1**
- Gonocoques ¬ *A54.8†, I41.0**
- Hypertensive ¬ *I11.90†, I41.8**
- Idiopathique à cellules géantes ¬ *I40.8*
- Infectieuse ¬ *I40.0*
- Isolée ¬ *I40.1*
- Lors

Myocardite *–suite*
- Lors *–suite*
- - Arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.30†, I41.8**
- - Grippe Influenza
- - - Virus de la grippe saisonnière identifié ¬ *J10.8†, I41.1**
- - - ¬ *J11.8†, I41.1**
- - Sarcoïde ¬ *D86.8†, I41.8**
- Méningocoques ¬ *A39.5†, I41.0**
- Ourlienne ¬ *B26.8†, I41.1**
- Rhumatismal
- - Aiguë ¬ *I01.2*
- - Subaiguë ¬ *I01.2*
- - Toxique ¬ *I01.2*
- - ¬ *I09.0*
- Rhumatoïde ¬ *M05.39†, I41.8**
- SAI ¬ *I51.4*
- Sans précision ¬ *I51.4*
- Septique ¬ *I40.0*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I41.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.8†, I41.2**
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I41.0**
- Typhoïde ¬ *A01.0†, I41.0**
- Virale chez le nouveau-né ¬ *B33.2†, I41.1**
- Virus Coxsackie ¬ *B33.2†, I41.1**
- Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, I41.1**
- ¬
- - Arthrite rhumatismal
- - - Aiguë avec *I01.2*
- - - Subaiguë avec *I01.2*
- - Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09†, I41.1*, U69.23!*
- - - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09†, I41.1*, U69.22!*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - Rhumatisme articulaire aigu avec *I01.2*

Myoclonica ¬ Dyssynergia cerebellaris *G11.1*

Myoclonie
v./v.a. opsoclonie-myoclonie
- Ataxie cérébelleuse-surdité ¬ Syndrome de *G11.1*
- Corticale familiale ¬ *G25.3*
- Faciale ¬ *G51.3*
- Médicamenteuse ¬ *G25.3*
- Paupières ¬ Épilepsie avec *G40.3*
- Périorale avec absence] ¬ POMA [*G40.3*
- Ramsay-Hunt] ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: *G11.1*
- Taches rouge cerise ¬ Syndrome *E77.1*
- ¬

Myoclonie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *G25.3*
- - Encéphalomyélite progressive avec rigidité et *G25.88*

Myoclonique
- Bénigne
- - Enfance ¬ Épilepsie
- - - *G40.3*
- - - *G40.3*
- - Familiale de l'adulte ¬ Épilepsie *G40.3*
- Encéphalopathies non-progressives ¬ Épilepsie *G40.4*
- Familiale de l'adulte ¬ Épilepsie *G40.3*
- Fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie *G31.81*
- Migrantes et continues ¬ Encéphalopathie progressive précoce avec crises *G40.4*
- Petit mal impulsif] juvénile ¬ Épilepsie (avec): *G40.3*
- Précoce
- - Suppression-bursts» ¬ Encéphalopathie *G40.4*
- - Symptomatique) ¬ Encéphalopathie *G40.4*
- - ¬ Encéphalopathie *G40.4*
- Progressive
- - Associée à PRDM8 ¬ Épilepsie *G40.3*
- - Dystonie ¬ Épilepsie *G40.3, G24.9*
- - Type
- - - 4 ¬ Épilepsie *G40.3*
- - - 5 ¬ Épilepsie *G40.3*
- - ¬
- - - Épilepsie *G40.3*
- - - Syndrome d'amyotrophie spinale proximale-épilepsie *G12.1, G40.3*
- Sévère de l'enfance ¬ Épilepsie avec syndrome *G40.4*
- ¬
- - Crises non spécifiques: *G40.3*
- - Épilepsie
- - - Absences *G40.4*
- - - Crises astato- *G40.4*

Myoclonoastatiques ¬ Épilepsie avec crises *G40.4*

Myoclonus
- Action-insuffisance rénale ¬ Syndrome de *G40.3*
- Dystonie ¬ *G24.1*

Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [*G31.81*

Myocutané ¬
- Échec d'une greffe *T86.59*
- Nécrose d'une greffe *T86.51*
- Perte d'une greffe *T86.52*
- Rejet d'une greffe *T86.59*
- Troubles circulatoires d'une greffe *T86.50*

Myoencéphalopathie mitochondriale ¬ *G31.81*

Myo-endocardite aiguë ou subaiguë ¬ *I33.9*

Myofasciite macrophages

- Région de l'épaule ¬ *M60.81*
- ¬ *M60.89*

Myofibrillaire

- Hypertonique infantile fatale ¬ Myopathie *G71.2*
- Liée
- - Desmine ¬ Myopathie *G71.8*
- - Filamine C ¬ Myopathie *G71.8*
- - ¬
- - Myopathie *G71.8*
- - Syndrome
- - - Autosomique dominant de neuropathie axonale motrice distale avec myopathie *G71.2*
- - - Cyphose-atrophie de la langue-myopathie *G71.8*

Myofibroblastique inflammatoire

- Bénigne
- - Épiploon ¬ Tumeur *D20.1*
- - Mésentère ¬ Tumeur *D20.1*
- - Poumon ¬ Tumeur *D14.3*
- - Rétropéritoine ¬ Tumeur *D20.0*
- Maligne
- - Épiploon ¬ Tumeur *C48.1*
- - Mésentère ¬ Tumeur *C48.1*
- - Poumon ¬ Tumeur *C34.9*
- - Rétropéritoine ¬ Tumeur *C48.0*
- ¬ Tumeur *D48.9*

Myofibrosite ¬ *M79.7*

Myogénique

- Autosomique récessive ¬ Arthrogrypose multiple congénitale *Q74.3*
- ¬ Hémangioendothéliome pseudo- *D48.1*

Myoglobinurie

- Autosomique dominante ¬ *R82.1*
- Récurrente génétique ¬ *R82.1*
- ¬ *R82.1*

Myohyperplasie hémifaciale ¬ *Q67.0*

Myokymie

- Facial ¬
- - *G51.4*
- - Dyskinésie familiale avec *G24.8, G51.4*
- Hémifaciale ¬ *G51.3*

Myomètre ¬

- Carcinofibrome du *C54.2*
- Léiomyosarcome du *C54.2*
- Tumeur maligne: *C54.2*
- Tumeur neuroectodermique primitive du *C54.2*

Myométrite ¬ *N71*

Myonécrose à Clostridium ¬ *A48.0*

Myopathie

v./v.a. Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes

Myopathie *–suite*

- Agrégats tubulaires ¬ *G71.2*
- Alcoolique ¬ *G72.1*
- Amérindienne ¬ *G71.2*
- Anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [*G71.2*
- Autophagie excessive liée à l'X ¬ *G71.8*
- Autosomique
- - Dominante avec surcharge en myosine ¬ *G71.2*
- - Récessive
- - - Ophtalmoplégie externe de l'enfant ¬ *G71.2, H49.8*
- - - Surcharge en myosine ¬ *G71.2*
- Axe central [myopathie à cores centraux] ¬ *G71.2*
- Bethlem ¬ *G71.08*
- Brody ¬ *G71.8*
- Cap ¬ *G71.2*
- Cardioquelettique et neutropénie liée à l'X ¬ *E71.1*
- Cardiosquelettique avec neutropénie et mitochondriopathie ¬ *E71.1*
- Cardiosquelettique-neutropénie ¬ Syndrome de *E71.1*
- Ceinture
- - Pelvienne ¬ *G71.08*
- - Scapulaire ¬ *G71.08*
- Centronucléaire
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *G71.2*
- - - Récessive ¬ *G71.2*
- - Liée X
- - - Anomalies génitales ¬ Syndrome de *G71.2, Q55.9*
- - - Femme porteuse ¬ Forme symptomatique de la *G71.2*
- - - ¬ *G71.2*
- Configuration hexagonale des tubules ¬ *G71.2*
- Congénitale
- - Atrophie des fibres musculaires de type 2 ¬ *G71.2*
- - Bâtonnets ¬ *G71.2*
- - Disproportion des types de fibres musculaires ¬ *G71.2*
- - Type Paradas ¬ *G71.2*
- - ¬ *G71.2*
- Cores centraux] ¬ Myopathie: à axe central [*G71.2*
- Corps
- - Hyalins ¬ *G71.2*
- - Inclusion type 2 ¬ *G71.8*
- - Polyglucosane type
- - - 1 ¬ *E74.0*
- - - 2 ¬ *E74.0†, G73.6**
- - Réducteurs ¬ *G71.2*

Myopathie *–suite*

- Corps *–suite*
- - Zébrés ¬ *G71.2*
- Cours
- - Amylose ¬ *E85.4†, G73.6**
- - Anomalies de stockage du glycogène ¬ *E74.0†, G73.6**
- - Artérite à cellules géantes ¬ *M31.6†, G73.7**
- - Hyperadrénocorticisme ¬ *E24.9†, G73.5**
- - Hyperparathyroïdie NCA ¬ *E21.3†, G73.5**
- - Hyperthyroïdie ¬ *E05.9†, G73.5**
- - Hypoparathyroïdie ¬ *E20.9†, G73.5**
- - Hypopituitarisme ¬ *E23.0†, G73.5**
- - Hypothyroïdie ¬ *E03.9†, G73.5**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, G73.7**
- - Maladie
- - - Addison ¬ *E27.1†, G73.5**
- - - Endocrinienne NCA ¬ *E34.9†, G73.5**
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, G73.4**
- - - Métabolique NCA ¬ *E88.9†, G73.6**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, G73.4**
- - - Stockage des lipides ¬ *E75.6†, G73.6**
- - Maladies
- - - Endocriniennes ¬ *G73.5**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *G73.4**
- - - Métaboliques ¬ *G73.6**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *G73.7**
- - Myxœdème ¬ *E03.9†, G73.5**
- - Périartérite noueuse ¬ *M30.0†, G73.7**
- - Polyarthrite chronique ¬ *M05.30†, G73.7**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, G73.7**
- - Sclérodermie ¬ *M34.8†, G73.7**
- - Syndrome
- - - Sec ¬ *M35.0†, G73.7**
- - - Sjögren ¬ *M35.0†, G73.7**
- - Thyréotoxicose ¬ *E05.9†, G73.5**
- - Tumeur maligne ¬ *C80.9†, M63.89**
- Crétinisme ¬ *E00.9†, G73.5**
- Début précoce-aréflexie-détresse respiratoire-dysphagie] ¬ EMARDD [Syndrome de *G71.2*
- Distale
- - Adulte
- - - Associée à HNRNPA1 ¬ *G71.08*
- - - Due à des mutations de VCP ¬ *G71.08*
- - Associée
- - - ADSSL1 ¬ *G71.08*
- - - DNAJB4 ¬ *G71.08*
- - - PLIN4 ¬ *G71.08*
- - - SMPX ¬ *G71.08*
- - Atteinte
- - - Initiale des membres supérieurs, type finlandais ¬ *G71.08*
- - - Muscles postérieurs des jambes et des muscles antérieurs des mains ¬ *G71.08*

Myopathie *–suite*
- Distale *–suite*
- - Atteinte *–suite*
- - - Respiratoire précoce ¬ *G71.08*
- - Début tardif liée à TARDBP ¬ *G71.08*
- - Débutant au niveau du tibia antérieur ¬ *G71.08*
- - Faiblesse des cordes vocales ¬ *G71.08*
- - Précoce
- - - Associée
- - - - KLHL9 ¬ *G71.08*
- - - - Nébuline ¬ *G71.08*
- - - Type Laing ¬ *G71.08*
- - Scapulohuméropéronière progressive ¬ *G71.08*
- - Tardive
- - - Associée à l'alpha-B cristalline ¬ *G71.08*
- - - Type Markesbery-Griggs ¬ *G71.08*
- - Type
- - - Miyoshi ¬ *G71.08*
- - - Nonaka ¬ *G71.8*
- - - Tateyama ¬ *G71.08*
- - - Welander ¬ *G71.08*
- - Vacuoles bordées ¬ *G71.8*
- - ¬ *G71.08*
- Due
- - Agents toxiques ¬ *G72.2*
- - Surcharge en calsequestrine et SERCA1 ¬ *G71.2*
- Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de malformation de Klippel-Feil- *Q76.1*
- Émaciation ¬ Syndrome d'ophtalmoplégie externe progressive- *G71.3*
- Empreintes digitales ¬ *G71.2*
- Encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [*G31.81*
- Endocrinienne ¬ *E34.9†, G73.5**
- Épargnant le quadriceps ¬ *G71.8*
- Facio-scapulo-humérale ¬ *G71.08*
- Fatale infantile par déficit en cytochrome oxydase C ¬ Cardio-encéphalo- *G31.81*
- Héréditaire
- - Atteinte respiratoire précoce ¬ *G71.8*
- - SAI ¬ *G71.9*
- Inclusion
- - Héréditaire type
- - - 2 ¬ *G71.8*
- - - 3 ¬ *G71.8*
- - - 4 ¬ *G71.8*
- - Maladie de Paget-démence fronto-temporale ¬ Syndrome de *G71.8, G31.0*
- - ¬ *G71.8*
- Inflammatoire, non classée ailleurs ¬ *G72.4*
- Intolérance à l'effort type suédois ¬ *G71.3*
- Létale congénitale type Compton-North ¬ *G71.2*

Myopathie *–suite*
- Liée à l'X avec atrophie des muscles posturaux ¬ *G71.08*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.30†, G73.7**
- Médicamenteuse ¬ *G72.0*
- Métabolique par défaut de transport du lactate ¬ *E74.8†, G73.6**
- Mitochondrial
- - Acidose lactique-surdité ¬ Syndrome de *G71.3*
- - Anémie sidéroblastique ¬ *G71.3*
- - Ataxie cérébelleuse-rétinopathie pigmentaire ¬ Syndrome de *G31.81*
- - Autosomique dominante avec intolérance à l'effort ¬ *G71.3*
- - Déficit réversible en COX ¬ *G71.3*
- - Diabète sucré ¬ Syndrome de *G71.3, E14.90*
- - Encéphalopathie, acidose lactique et épisodes ressemblant à des AVC ¬ *G31.81*
- - Pure ¬ *G71.3*
- - ¬
- - - Ophtalmoplégie externe progressive chronique de l'adulte avec *G71.3, H49.4*
- - - Syndrome de cataracte congénitale-cardiomyopathie hypertrophique- *Q87.8*
- Myofibrillaire
- - Hypertonique infantile fatale ¬ *G71.2*
- - Liée
- - - Desmine ¬ *G71.8*
- - - Filamine C ¬ *G71.8*
- - ¬
- - - *G71.8*
- - - Syndrome
- - - - Autosomique dominant de neuropathie axonale motrice distale avec *G71.2*
- - - - Cyphose-atrophie de la langue- *G71.8*
- Myotubulaire centro-nucléaire ¬ *G71.2*
- Nécrosante à médiation auto-immune ¬ *G72.4*
- Némaline
- - Adulte ¬ *G71.2*
- - Enfant ¬ *G71.2*
- - Type Amish ¬ *G71.2*
- - Typique ¬ *G71.2*
- Oculaire ¬ *G71.08*
- Oculo-pharyngé
- - Distale ¬ *G71.08*
- - ¬ *G71.08*
- Petite taille-hypogonadisme hypogonadotrophique ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.1*
- Précisées ¬ Autres *G72.88*
- Précoce avec cardiomyopathie létale ¬ *G71.8*
- Proximale
- - Déplétion mitochondriale focale ¬ *G71.3*
- - Signes extrapyramidaux ¬ *G71.3, G25.9*

Myopathie *–suite*
- Raucité de la voix-surdité ¬ Syndrome de neuropathie périphérique- *G60.0*
- Réanimation ¬ *G72.80*
- Rétractile-fibrose pulmonaire ¬ Syndrome de poïkilodermie héréditaire fibrosante- *Q82.8*
- Sans précision ¬ *G72.9*
- Scapulo-humérale ¬ *G71.08*
- Spirales cylindriques ¬ *G71.2*
- Surcharge
- - Actine ¬ *G71.2*
- - Desmine et inclusions de corps de Mallory ¬ *G71.8*
- - Myosine ¬ *G71.2*
- Syndrome de Cushing ¬ *E24.9†, G73.5**
- Thyréotoxique ¬ *E05.9†, G73.5**
- Type
- - Mini-core» ¬ *G71.2*
- - Multi-core» ¬ *G71.2*
- Viscérale familiale ¬ *Q87.8*
- ¬
- - Lipodystrophie congénitale généralisée avec *E88.1*
- - NLSDM [Lipidose avec surcharge en triglycérides avec *E75.5†, G73.6**
- - Sclérose systémique avec *M34.8†, G73.7**
- - Syndrome d'atrophie optique-surdité-polyneuropathie- *H47.2*

Myopathique ¬
- Déplétion de l'ADN mitochondrial, forme *G71.3*
- Glycogénose type 4 de l'enfant, forme hépatique et *E74.0*
- Syndrome d'Ehlers-Danlos *Q79.6*

Myopathy mitochondriale létale infantile ¬ *G71.3*

Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [*G31.81*

Myopéricardite rhumatismale chronique ¬ *I09.2*

Myopéricytome
- Bénin
- - Abdomen ¬ *D21.4*
- - Bassin ¬ *D21.5*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *D21.2*
- - - Supérieurs ¬ *D21.1*
- - Tête ¬ *D21.0*
- - Tronc ¬ *D21.6*
- ¬
- - *C49.9*
- - *D21.9*

Myophosphorylase ¬ Maladie glycogénique par déficit en *E74.0*

Myopie
v./v.a. polydactylie-myopie

Myopie *–suite*
- Atrophie choriorétinienne-télécanthus] ¬ Syndrome MMCAT [microcornée- *Q15.8*
- Dégénérative ¬ *H44.2*
- Ectopie du cristallin ¬ Syndrome de blépharoptosis- *Q15.8*
- Forte-surdité neurosensorielle ¬ Syndrome de *H90.5*
- Lié à l'X ¬ Syndrome d'anomalie des cônes avec *H35.5, H52.1*
- Malformation de Dandy-Walker ¬ Syndrome de dysmorphie-macrocéphalie- *Q87.8*
- Maligne ¬ *H44.2*
- Retrusion du visage-surdité neurosensorielle-dysplasie rhizomélique ¬ Syndrome autosomique dominant de *Q87.0*
- Sévère-hyperlaxité articulaire généralisée-petite taille ¬ Syndrome de *Q87.1*
- ¬
- - *H52.1*
- - Syndrome
- - - Aplasie cutanée congénitale- *Q84.8, Q15.8*
- - - Ectopie du cristallin-dystrophie choriorétinienne- *Q15.8*

Myopique ¬ Dégénérescence maculaire *H35.38*

Myorelaxants
- Muscles striés) [bloquants neuromusculaires] ¬ Intoxication: *T48.1*
- ¬ Réaction anaphylactique aux *T88.6*

Myosclérose ¬ *G71.8*

Myosine ¬ Myopathie
- Autosomique
- - Dominante avec surcharge en *G71.2*
- - Récessive avec surcharge en *G71.2*
- Surcharge en *G71.2*

Myosis congénital ¬
- *Q13.2*
- Syndrome d'ataxie- *G11.4*

Myosite
- Bactérienne
- - Avant-bras ¬ *M60.03*
- - Bras ¬ *M60.02*
- - Cuisse ¬ *M60.05*
- - Jambe ¬ *M60.06*
- - Localisations multiples ¬ *M60.00*
- - Main ¬ *M60.04*
- - Pied ¬ *M60.07*
- - Région de l'épaule ¬ *M60.01*
- - Région pelvienne ¬ *M60.05*
- - Tronc ¬ *M60.08*
- - ¬ *M60.09*
- Chevauchement
- - Juvénile ¬ *M33.0*
- - ¬ *M35.1*
- Cours
- - Cysticercose ¬ *B69.8†, M63.19**

Myosite *–suite*
- Cours *–suite*
- - Infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs ¬ *M63.1**
- - Maladies
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *M63.0**
- - - Infectieuses classées ailleurs ¬ *M63.2**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, M63.39**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.8†, M63.19**
- - Trichinellose ¬ *B75†, M63.19**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, M63.29**
- Éosinophile idiopathique
- - Avant-bras ¬ *M60.83*
- - Bras ¬ *M60.82*
- - Cuisse ¬ *M60.85*
- - Jambe ¬ *M60.86*
- - Localisations multiples ¬ *M60.80*
- - ¬ *M60.89*
- Focale
- - Cuisse ¬ *M60.85*
- - Jambe ¬ *M60.86*
- - Tête ¬ *M60.88*
- - ¬ *M60.89*
- Fongique
- - Avant-bras ¬ *M60.03*
- - Bras ¬ *M60.02*
- - Cuisse ¬ *M60.05*
- - Jambe ¬ *M60.06*
- - Localisations multiples ¬ *M60.00*
- - Main ¬ *M60.04*
- - Pied ¬ *M60.07*
- - Région de l'épaule ¬ *M60.01*
- - Région pelvienne ¬ *M60.05*
- - Tronc ¬ *M60.08*
- - ¬ *M60.09*
- Inclusions ¬ *G72.4*
- Infectieuse ¬ *M60.09*
- Interstitielle ¬ *M60.1*
- Ossifiant
- - Associée à des brûlures ¬ *M61.3*
- - Liée à une tétraplégie ou une paraplégie ¬ *M61.2*
- - Traumatique ¬ *M61.0*
- Purulente tropicale ¬ *M60.09*
- Sans précision ¬ *M60.9*
- Secondaire au cours de syphilis ¬ *A51.4†, M63.09**
- Suppurative ¬ *M60.09*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, M63.09**
- Toxoplasma ¬ *B58.8†, M63.19**
- Tropicale ¬ *M60.09*
- Typhoïde ¬ *A01.0†, M63.09**
- Virale
- - Avant-bras ¬ *M60.03*
- - Bras ¬ *M60.02*
- - Cuisse ¬ *M60.05*

Myosite *–suite*
- Virale *–suite*
- - Jambe ¬ *M60.06*
- - Localisations multiples ¬ *M60.00*
- - Main ¬ *M60.04*
- - Pied ¬ *M60.07*
- - Région de l'épaule ¬ *M60.01*
- - Région pelvienne ¬ *M60.05*
- - Tronc ¬ *M60.08*
- - ¬ *M60.09*
- ¬
- - *M60.8*
- - Mycose avec *B49†, M63.29**

Myositis fibrosa generalisata ¬ *G71.8*

Myosphérulose ¬ *T88.8*

Myostatine ¬ Hypertrophie musculaire liée à la *M62.89*

Myotilinopathie distale ¬ *G71.08*

Myotonie
v./v.a. Pseudomyotonie
- Chondrodystrophique ¬
- - *G71.1*
- - *Q78.8*
- Congénitale
- - Dominante [Thomsen] ¬ *G71.1*
- - Récessive [Becker] ¬ *G71.1*
- - SAI ¬ *G71.1*
- Fluctuante ¬ *G71.1*
- Médicamenteuse ¬ *G71.1*
- Permanente ¬ *G71.1*
- Répondant à l'acétazolamide ¬ *G71.1*
- Symptomatique ¬ *G71.1*

Myotonique
v./v.a. Dystrophie myotonique
- ¬
- - Cataracte *G71.1†, H28.2**
- - Paralysie périodique (familiale): *G72.3*

Myotubulaire centro-nucléaire ¬ Myopathie *G71.2*

Myringite
- Aiguë ¬ *H73.0*
- Bulleuse ¬ *H73.0*
- Chronique ¬ *H73.1*
- ¬
- - *H65*
- - *H66*

Myringotomie [diabolo] ¬ Tube(s) de *Z96.2*

MYT1L, avec retard mental et obésité ¬ Retard de développement neurologique lié à *G93.4*

Myxœdémateux
- Nodulaire ¬ Lichen *L98.5*
- ¬
- - Coma *E03.5*
- - Crétinisme endémique (de): type *E00.1*
- - Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type *E00.1*

Myxœdématose lichéniforme

- Papulaire et sclérodermoïde généralisé ¬ *L98.5*
- ¬ *L98.5*

Myxœdème

- SAI ¬ *E03.9*
- ¬
- - Anémie due à un *E03.9†*, *D63.8**
- - Ataxie cérébelleuse au cours de *E03.9†*, *G13.2**
- - Atrophie systémique du système nerveux central au cours de *E03.9†*, *G13.2**
- - Cataracte au cours de *E03.9†*, *H28.1**
- - Dégénérescence cérébrale au cours de *E03.9†*, *G32.8**
- - Myopathie au cours de *E03.9†*, *G73.5**

Myxoïde

v./v.a. Chondrosarcome myxoïde
v./v.a. Liposarcome myxoïde

- Malin ¬ Fibrohistiocytome *C49.9*

Myxomatose liée à l'X associée à FLNA ¬ Dysplasie valvulaire *Q24.8*

Myxome atrial ¬ *D15.1*

Myxopapillaire ¬ Épendymome *D43.2*

N-acétyl-6-sulfatase ¬ Déficit en glucosamine *E76.2*

N-acétylgalactosamine 4-sulfatase ¬ Carence en *E76.2*

N-acetylgalactosamine phosphotransférase ¬ Déficit en dolichyl-phosphate *E77.8*

N-acétylglucosamine-1-phosphotransférase ¬ Déficit en *E77.0*

N-acétylglucosaminyltransférase 2 ¬ Déficit en *E77.8*

N-acétylglutamate synthase ¬

- Déficit en *E72.2*
- Hyperammoniémie par déficit en *E72.2*

N-acétyltransférase ¬ Déficit en héparane-alpha-glucosaminide *E76.2*

N-acyl-L-amino acide amidohydrolase ¬ Déficit en *E72.8*

NADH diaphorase ¬ Déficit congénital en *D74.0*

NADH-coenzyme Q réductase ¬

- Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en *I42.2*
- Déficit isolé en *G31.81*

NADH-CoQ réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en *I42.2*

NADH-méthémoglobine-réductase ¬ Déficit congénital en *D74.0*

NADH-ubiquinone réductase ¬ Déficit isolé en *G31.81*

NADHX

- Déshydratase ¬ Neurodégénérescence par déficit en *E88.8†, G32.8**
- Épimérase ¬ Neurodégénérescence par déficit *E88.8†, G32.8**

NADPHX

- Déshydratase ¬ Neurodégénérescence par déficit en *E88.8†, G32.8**
- Épimérase ¬ Neurodégénérescence due à un déficit en *E88.8†, G32.8**

Naegeli

- Rémission complète ¬ Leucémie monocytaire de *C93.11*
- ¬ Leucémie monocytaire de *C93.10*

Naegeli-Franceschetti-Jadassohn ¬ Syndrome de *Q82.4*

Nægleria ¬

- Infection à *B60.2*
- Méningo-encéphalite à *B60.2†, G05.2**

Nægleriase ¬

- *B60.2*
- Encéphalite au cours de *B60.2†, G05.2**
- Encéphalomyélite au cours de *B60.2†, G05.2**
- Myélite au cours de *B60.2†, G05.2**

Naevoïde linéaire et spiralée ¬ Hypermélanose *L81.4*

Nævomatose basocellulaire ¬ *Q85.8*

Nævus

- Arachnéen ¬ *I78.1*
- Atypiques ¬ Syndrome familial des *D48.5*

Nævus *–suite*

- Becker ¬ Syndrome du *Q87.8*
- Blanc
- - Muqueuses ¬ *Q38.6*
- - Spongieux des muqueuses ¬ *Q38.6*
- Bleu ¬ *D22*
- Cellules ballonnisantes sur la conjonctive ¬ *D31.0*
- Comédonien
- - Paume des mains ¬ *Q82.5*
- - ¬ Syndrome du *Q85.8*
- Congénital non néoplasique ¬ *Q82.5*
- Eccrin porokératotique ¬ *Q82.5*
- Épidermique
- - Papulaires avec couche basale en palissade] ¬ Syndrome PENS [*Q87.8*
- - Verruqueux
- - - Angiodysplasie anévrisme ¬
- - - - *Q87.8*
- - - - Syndrome NEVADA [*Q87.8*
- - - Inflammatoire linéaire ¬
- - - - *Q82.5*
- - - - NEVIL [*Q82.5*
- - ¬ Syndrome SOLAMEN [hypertrophie segmentaire-lipomatose-malformation artério-veineuse- *Q87.8*
- Épidermolytique épidermique ¬ *Q80.3*
- Facial lie de vin ¬ Autisme avec *F84.0, Q82.5*
- Flammeus ¬ *Q82.5*
- Fraise ¬ *Q82.5*
- Ichtyosiforme-anomalies des membres ¬ Syndrome d'hémidysplasie congénitale- *Q87.8*
- Ito ¬ *D22.6*
- Mélanocytaire ¬ *D22*
- Mélanocytes
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *D22.4*
- - Lèvre ¬ *D22.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D22.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D22.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D22.2*
- - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D22.3*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *D22.1*
- - Sans précision ¬ *D22.9*
- - Tronc ¬ *D22.5*
- Non néoplasique ¬ *I78.1*
- Ota sur peau
- - Paupière ¬ *D22.1*
- - Visage (à l'exception des yeux) ¬ *D22.3*
- Panfolliculaire congénital ¬ *Q85.8*
- Pigmentaire
- - Congénital géant ¬ *D22.9*
- - ¬ *D22*
- Pigmentés ¬ Syndrome de progeria - petite taille - *E34.8*

Nævus *–suite*

- Pileux ¬ *D22*
- Poils angora ¬ *Q82.5*
- SAI ¬ *D22*
- Sanguin ¬ *Q82.5*
- Sébacé linéaire ¬ Syndrome du *Q85.8*
- Spitz ¬ *D22.9*
- Stellaire ¬ *I78.1*
- Tache vin
- - Citerne cérébello-médullaire élargie-hydrocéphalie ¬ Syndrome de *Q04.8, Q82.5*
- - Multiples familiaux ¬ *Q82.5*
- - ¬ *Q82.5*
- Vasculaire SAI ¬ *Q82.5*
- Verruqueux
- - Forme linéaire ¬ *Q82.5*
- - ¬ *Q82.5*
- ¬ Cheveux laineux sur *Q82.5*

Naffziger ¬ Syndrome de *G54.0*

Nagashima ¬ Kératodermie palmoplantaire type *Q82.8*

Nager ¬

- Dysostose acrofaciale de *Q75.4*
- Syndrome de *Q75.4*

Nageur ¬

- Crampe des *T75.1*
- Oreille du *H60.3*
- Prurit des *B65.3*

NAGS ¬ Déficit en *E72.2*

Naguib-Richieri-Costa ¬ Syndrome de *Q87.8*

Nail-patella ¬ Syndrome *Q87.2*

Naissance

- 500 à moins de 750 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de *P07.01*
- 750 à moins de 1000 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de *P07.02*
- 1250 à moins de 1500 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: Poids de *P07.11*
- 1500 à moins de 2500 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: Poids de *P07.12*
- Artère coronaire à partir de l'artère pulmonaire ¬ Anomalie de *Q24.5*
- Gémellaire Jumeau
- - Morts-nés ¬ *Z37.4!*
- - Né vivant, l'autre mort-né ¬ *Z37.3!*
- - Nés vivants ¬ *Z37.2!*
- Inférieur à 500 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de *P07.00*
- Multiple SAI ¬ *Z37.9!*
- Multiples
- - Certains enfants nés vivants ¬ Autres *Z37.6!*
- - Enfant nés

Naissance *–suite*
- Multiples *–suite*
- - Enfant nés *–suite*
- - - Hôpital ¬ Autres *Z38.6*
- - - Hors d'un hôpital ¬ Autres *Z38.7*
- - Lieu de naissance non précisé ¬ Autre *Z38.8*
- - Tous
- - - Morts-nés ¬ Autres *Z37.7!*
- - - Nés vivants ¬ Autres *Z37.5!*
- Non précisé ¬
- - Enfant unique, lieu de *Z38.2*
- - Jumeaux, lieu de *Z38.5*
- - Naissances multiples, lieu de *Z38.8*
- Perpuéralité ¬ Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la *O26.68*
- Poids naissance
- - 500 à moins de 750 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la *P07.01*
- - 750 à moins de 1000 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la *P07.02*
- - 1250 à moins de 1500 grammes ¬ Autres poids faibles à la *P07.11*
- - 1500 à moins de 2500 grammes ¬ Autres poids faibles à la *P07.12*
- - Inférieur à 500 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la *P07.00*
- Sans paraplégie ¬ Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la *P11.59*
- Spontanée par voie vaginale d'un enfant unique ¬ *O80*
- Terme ¬ *O48*
- Type Turnpenny ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique-dents de *Q82.8*
- Unique
- - Enfant
- - - Mort-né ¬ *Z37.1!*
- - - Vivant ¬ *Z37.0!*
- - SAI ¬ *Z37.9!*

Najjar
v./v.a. Crigler-Najjar
v./v.a. Mikati-Najjar-Sahli

Najm ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Nakagawa ¬ Angioblastome de *D18.01*

Nakao
v./v.a. Furukawa-Takagi-Nakao

NALD [Adrénoleucodystrophie néonatale] ¬ *E71.3*

Nana ¬ Infection par Hymenolepis *B71.0*

Nance
v./v.a. Casamassima-Morton-Nance

Nance-Horan ¬ Syndrome de *Q87.0*

Nanisme
v./v.a. Peters-nanisme
- Anomalie rénale ¬ Syndrome d'ichtyose-déficience intellectuelle- *Q87.1*
- Atrophie cérébrale ¬ Syndrome de kératose folliculaire- *Q87.1*

Nanisme *–suite*
- Brachydactylie type Mseleni ¬ Syndrome de *Q77.7*
- Chondrodystrophique ¬ *Q77.4*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'alopécie-contractures- *Q87.8*
- Lenz-Majewski ¬ *Q87.1*
- Microcéphalique
- - Ostéodysplasique primordial
- - - Type II ¬ *Q87.1*
- - - Types
- - - - I ¬ *Q87.1*
- - - - III ¬ *Q87.1*
- - Primordial
- - - Résistance à l'insuline ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - - Type
- - - - Dauber ¬ *Q87.1*
- - - - Montréal ¬ *Q87.1*
- - - - Toriello ¬ *Q87.1*
- Mulibrey ¬ *Q87.1*
- Néphrotico-glycosurique avec rachitisme hypophosphatémique ¬ *E72.01†, N16.3**
- Oculo-palato-cérébral ¬ *Q87.1*
- Ostéochondrodysplasique-surdité-rétinopathie pigmentaire ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Parastremmatique ¬ *Q87.1*
- Primordial microcéphalique par déficit en ZNF335 ¬ *Q87.1*
- Tête d'oiseau type Montréal ¬ *Q87.1*
- Thanatophore ¬ *Q77.1*
- ¬ Syndrome
- - Aplasie médullaire-déficience intellectuelle- *Q87.1*
- - Dysplasie osseuse Larsen-like- *Q87.1*

Nanophtalmie ¬ *Q11.2*

Nanophyétiase ¬ *B66.8*

Nanukayami ¬ *A27.8*

Narcissique ¬ Personnalité: *F60.8*

Narcolepsie
- Cataplexie ¬ *G47.4*
- Sans cataplexie ¬ *G47.4*
- Type 1 ¬ *G47.4*
- ¬
- - *G47.4*
- - Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante-surdité- *G11.2*

Narcotiques
- Sans précision ¬ Intoxication: *T40.6*
- Synthétiques ¬ Intoxication: Autres *T40.4*
- ¬
- - Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.5*
- - Intoxication aiguë par *F19.0*

Narine
- Surnuméraire ¬ *Q30.8*
- ¬

Narine *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Corps étranger dans une *T17.1*
- - Rétrécissement syphilitique
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Congénitale de la *A50.5†, J99.8**

NARP [Syndrome de neuropathie-ataxie-rétinite pigmentaire] ¬ *G31.81*

Nasal
v./v.a. cranio-fronto-nasal
v./v.a. oculo-auriculo-fronto-nasal
- Acquise) ¬ Déviation de la cloison (*J34.2*
- Antérieur postérieur ¬
- - Atrésie d'un orifice *Q30.0*
- - Sténose congénitale d'un orifice *Q30.0*
- Choanes ¬ Bord postérieur cloison
- - *C11.3*
- - *D10.6*
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Tuberculose *A15.8*
- Hypoplasie alaire et télécanthus ¬ Syndrome de fente *Q75.1*
- Insuffisance pluriglandulaire résultant d'une anomalie dans le transport mucociliaire] [Immotile cilia syndrome] [triade de Kartagener] ¬ Syndrome de Kartagener [Situs inversus viscerum, bronchectasie, sinusite chronique et polypes *Q89.3*
- SAI ¬ Perforation de la cloison *J34.8*
- Sans précision ¬ Polype *J33.9*
- Sinus
- - Face ¬ Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses *D14.0*
- - Paranasaux ¬ Carcinome épidermoïde des fosses *C30.0*
- Syphilitique congénitale ¬ Difformité *A50.5*
- ¬
- - Absence familiale de cils *Q30.8*
- - Anomalie congénitale de l'os *Q30.9*
- - Cicatrice de la muqueuse *J34.8*
- - Cloison *C30.0*
- - Corps étranger dans un sinus *T17.0*
- - Déviation
- - - Cloison *J34.2*
- - - Congénitale de la cloison *Q67.4*
- - Diphtérie *A36.8*
- - Échancrure *Q30.2*
- - Fente *Q30.2*
- - Fissure *Q30.2*
- - Fosse
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - Ganglioglome *D38.5*
- - Gliome *Q30.8*
- - Kyste dermoïde *Q18.8*
- - Lymphome NK/T extranodulaire type *C86.0*
- - Nécrose du nez et de la cloison *J34.0*
- - Os

Nasal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Os *–suite*
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Ostéoblastome
- - - Cornet *D16.42*
- - - Os *D16.42*
- - Perforation congénitale de la cloison *Q30.3*
- - Phlegmon du nez et de la cloison *J34.0*
- - Plaie ouverte nez
- - - Orifice *S01.22*
- - - Septum *S01.23*
- - Polype des fosses *J33.0*
- - Résultats anormaux de: sécrétions *R84*
- - Sarcome de l'os *C41.02*
- - Septum *C30.0*
- - Syphilis de la cloison *A52.7†, J99.8**
- - Tuberculose *A16.8*
- - Tumeur maligne: Fosses *C30.0*
- - Ulcération du nez et de la cloison *J34.0*
- - Ulcère
- - - Cornet *J34.0*
- - - Variqueux du septum *I86.88*
- - Vestibule des fosses *C30.0*

Nasale
v./v.a. fronto-facio-nasale

Nascimento ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

NASH] ¬ Stéatohépatite non alcoolique [*K75.8*

Nasi ¬ Granulome gangraenescens *C86.0*

Naso
- Alvéolaire] ¬ Kyste (de): naso-labial [*K09.1*
- Frontale ¬ Encéphalocèle *Q01.1*
- Labial [naso-alvéolaire] ¬ Kyste (de): *K09.1*
- Palatin [canal incisif] ¬ Kyste (de): *K09.1*
- Sinusienne ¬ Mélanome malin de la muqueuse *C31.9*

Nasonnée, dysmorphie craniofaciale et anomalies squelettiques ¬ Syndrome de déficience intellectuelle avec voix *Q87.0*

Nasopalpébral colobome-téléthane ¬ Syndrome du lipome *D17.0, Q10.3*

Nasopharyngé
- Bénin ¬ Tératome *D10.6*
- Juvénile ¬ Angiofibrome *D10.6*
- Localisations contiguës ¬ Carcinome *C11.8*
- Malin ¬ Tératome *C11.9*
- ¬
- - Carcinome *C11.9*
- - Tératome *D37.0*

Nasopharynx à localisations contiguës ¬ Tératome malin du *C11.8*

Nasu-Hakola ¬ Maladie de *E75.2*

Natale ¬ Dent: *K00.6*

Natural Killer ¬ Déficit immunitaire primaire autosomique récessif avec un défaut de cytotoxicité spontanée des cellules *D84.8*

Naturalisation ¬ inscription dans: *Z02*

Naturel
- Excessif ¬ Exposition à: Chaleur ou froid *X59.9!*
- ¬
- - Chute d'objets lors de catastrophes *X59.9!*
- - Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice *T98.0*

Naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Plantes et produits de *F55.6*

Naumoff
v./v.a. Verma-Naumoff

Nausées
- Cours
- - Chimiothérapie ¬ *R11, Y57.98!*
- - Radiothérapie ¬ *R11, Y57.98!*
- Vomissements ¬ *R11*

Navajo ¬ Neurohépatopathie type *G31.81, K76.8*

Naviculaire
- Carpien ou tarsien ¬ os *S62.0*
- Pied
- - Scaphoide du tarse] ¬ Fracture :Os *S92.21*
- - ¬
- - - Nécrose aseptique de l'os *M92.6*
- - - Ostéochondrite juvénile, os *M92.6*

Naxos ¬ Maladie de *Q87.8*

NBIA [Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation] Typ 1 ¬ *G23.0*

NCL [Céroïde-lipofuscinose neuronale] ¬ *E75.4*

Nébuline ¬ Myopathie distale précoce associée à la *G71.08*

Nécatorose ¬ *B76.1*

Nécessitant
- Aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie *R13.1*
- Dialyse ¬ Insuffisance rénale chronique, *N18.5*
- Manifestement traitement ¬ Déficience intellectuelle
- - Légère avec trouble du comportement *F70.1*
- - Moyen avec trouble du comportement *F71.1*
- Soins ¬ Parent à charge au domicile, *Z63*
- Surveillance pendant la prise de nourriture ¬ Dysphagie *R13.0*

Nécessité
- Immunisation contre le COVID-19 ¬ *U11.9*
- Vaccination
- - Associée contre
- - - Diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq] ¬ *Z27.1*
- - - Plusieurs maladies infectieuses, sans précision ¬ *Z27.9*

Nécessité *–suite*
- Vaccination *–suite*
- - Contre
- - - Associations de maladies infectieuses ¬ *Z27.8*
- - - Choléra
- - - - Seul ¬ *Z23.0*
- - - - Typhoïde-parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ *Z27.0*
- - - Coqueluche seule ¬ *Z23.7*
- - - COVID-19 ¬ *U11.9*
- - - Diphtérie
- - - - Seule ¬ *Z23.6*
- - - - Tétanos coqueluche
- - - - - Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ *Z27.3*
- - - - - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ *Z27.2*
- - - Encéphalite virale transmise par les arthropodes ¬ *Z24.1*
- - - Fièvre jaune ¬ *Z24.3*
- - - Grippe ¬ *Z25.1*
- - - Hépatite virale ¬ *Z24.6*
- - - Leishmaniose ¬ *Z26.0*
- - - Maladie infectieuse, sans précision ¬ *Z26.9*
- - - Maladies
- - - - Bactériennes uniques ¬ *Z23.8*
- - - - Infectieuses uniques précisées ¬ *Z26.8*
- - - - Virales uniques précisées ¬ *Z25.8*
- - - Oreillons seuls ¬ *Z25.0*
- - - Peste ¬ *Z23.3*
- - - Poliomyélite ¬ *Z24.0*
- - - Rage ¬ *Z24.2*
- - - Rougeole
- - - - Oreillons-rubéole [ROR] ¬ *Z27.4*
- - - - Seule ¬ *Z24.4*
- - - Rubéole seule ¬ *Z24.5*
- - - Tétanos seul ¬ *Z23.5*
- - - Tuberculose [BCG] ¬ *Z23.2*
- - - Tularémie ¬ *Z23.4*
- - - Typhoïde-paratyphoïde seule [TAB] ¬ *Z23.1*
- - SAI ¬ *Z26.9*

Neck
v./v.a. Van Neck

Nécrobiose lipoïdique
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ *E10.60†, L99.8**
- - - 2 ¬ *E11.60†, L99.8**
- - ¬ *E14.60†, L99.8**
- ¬
- - *L92.1*
- - Maladie d'Oppenheim-Urbach [*L92.1*

Nécrobiotique ¬ Xanthogranulome *D76.3*

Nécrolyse épidermique toxique
- Atteinte

Nécrolyse épidermique toxique *–suite*
- Atteinte *–suite*
- - 30% et plus de la surface corporelle ¬ *L51.21*
- - Muqueuse ¬ *L51.21*
- ¬
- - NET [*L51.20*
- - Spectre syndrome de Stevens-Johnson/ *L51.20*

Nécrolytique acral ¬ Érythème *L53.8*

Nécrophilie ¬ *F65.8*

Nécrosante
- Aiguë
- - Cours de scarlatine ¬ Otite moyenne *A38†, H67.0**
- - Enfant ¬ Encéphalopathie *G31.81*
- - Familiale] ¬ ADANE [Encéphalopathie *G93.4*
- - Lors de grippe [Influenza] ¬ Otite moyenne *J11.8†, H67.1**
- Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle ¬ Epidermolyse *L51.20*
- Médiation auto-immune ¬ Myopathie *G72.4*
- Nouveau-né ¬
- - Entérite *P77*
- - Entérocolite *P77*
- Précisées ¬ Autres vasculopathies *M31.8*
- Sans précision ¬ Vasculopathie *M31.9*
- Staphylococcique ¬ Pneumonie *J15.2*
- Sub-aiguë ¬ Myélite ascendante *G37.4*
- Subaiguë syndrome
- - Foix-Alajouanine] ¬ Myélite *G37.4*
- - Leigh] ¬ Encéphalomyélopathie *G31.88*
- ¬
- - Acné miliaire *L70.2*
- - Entérite aiguë *A05.2*
- - Fasciite *M72.69*
- - Granulomatose respiratoire *M31.3*
- - Hépatite *K72.9*
- - Sialométaplasie *K11.8*

Nécrose
- Adipeuse (segmentaire) du sein ¬ *N64.1*
- Artère ¬ *I77.5*
- Cæcum ¬ *K35.8*
- Cornéenne ¬ *H18.8*
- Graisseux
- - Pancréas ¬ *K86.88*
- - Stéato-nécrose] mésentérique ¬ *K65.8*
- Greffe
- - Fascio-cutanée ¬ *T86.51*
- - Lipocutanée ¬ *T86.51*
- - Mammaire avec partie cutanée ¬ *T86.51*
- - Myocutanée ¬ *T86.51*
- - Peau ¬ *T86.51*
- Hémorragique centrale du foie ¬ *K76.2*
- Hépatique ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.1*

Nécrose *–suite*
- Hépatocytes avec insuffisance hépatique ¬ *K72*
- Hyaline de l'aorte ¬ *I71.9*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Mâchoire due à des médicaments ¬ *K10.28*
- Médicamenteux avasculaire secondaire non traumatique
- - Tête du fémur ¬ *M87.15*
- - ¬ *M87.19*
- Mésentérique ¬ Nécrose graisseuse [stéato- *K65.8*
- Moignon d'amputation ¬ *T87.5*
- Nez et de la cloison nasale ¬ *J34.0*
- Pancréas ¬ *K86.88*
- Papillaire stade
- - 1 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.21*
- - 2 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.22*
- - 3 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.23*
- Peau tissu sous-cutané non classée
- - Avant-bras et poignet ¬ *R02.02*
- - Jambe et genou ¬ *R02.06*
- - Localisation non précisée ¬ *R02.09*
- - Main et doigt ¬ *R02.03*
- - Région de l'épaule, bras et coude ¬ *R02.01*
- - Région de la cheville, pied et orteils ¬ *R02.07*
- - Région pelvienne et cuisse ¬ *R02.05*
- - Tête et cou ¬ *R02.00*
- - Tronc ¬ *R02.04*
- Pituitaire post-partum ¬
- - *E23.0*
- - *E23.0*
- Post-traumatique de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs ¬ *R02*
- Poumon ¬ *J85.0*
- Pulpaire ¬ *K04.1*
- Rénale stade
- - 1 ¬ *N17.91*
- - 2 ¬ *N17.92*
- - 3 ¬ *N17.93*
- Semi-lunaire de l'adulte ¬ *M93.1*
- Striatale bilatérale
- - Enfant forme
- - - Familiale ¬ *G23.2*
- - - Sporadique ¬ *G23.2*
- - ¬ Polyneuropathie progressive avec *Q87.8*
- Tuberculeuse
- - Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Os ¬ *A18.0†, M90.09**
- - ¬ *A16.9*
- Tumorale] ¬ Syndrome TRAPS [Syndrome périodique associé au récepteur 1 du facteur de *E85.0*

Nécrose aseptique
- Condyles huméraux ¬ *M92.0*
- Hanche ¬ *M87.95*

Nécrose aseptique *–suite*
- Os naviculaire du pied ¬ *M92.6*
- Pancréas ¬ *K86.88*
- Semi-lunaire ¬ *M92.2*

Nécrose avasculaire
- Familiale de la tête fémorale ¬ *M87.85*
- Hanche ¬ *M87.95*
- Idiopathique
- - Avant-bras ¬ *M87.03*
- - Bras ¬ *M87.02*
- - Colonne vertébrale ¬ *M87.08*
- - Cuisse ¬ *M87.05*
- - Jambe ¬ *M87.06*
- - Main ¬ *M87.04*
- - Pied ¬ *M87.07*
- - Région pelvienne ¬ *M87.05*
- - Région scapulaire ¬ *M87.01*
- - Sièges multiples ¬ *M87.00*
- - ¬ *M87.09*
- Secondaire non traumatique
- - Tête du fémur ¬ *M87.35*
- - ¬ *M87.39*
- Traumatique
- - Avant-bras ¬ *M87.23*
- - Bras ¬ *M87.22*
- - Cuisse ¬ *M87.25*
- - Jambe ¬ *M87.26*
- - Localisations multiples ¬ *M87.20*
- - Main ¬ *M87.24*
- - Pied ¬ *M87.27*
- - Région de l'épaule ¬ *M87.21*
- - Région pelvienne ¬ *M87.25*
- - ¬ *M87.29*

Nécrose corticale
- Aiguë
- - Stade
- - - 1 ¬
- - - - *N17.11*
- - - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.11*
- - - 2 ¬
- - - - *N17.12*
- - - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.12*
- - - 3 ¬
- - - - *N17.13*
- - - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.13*
- - ¬
- - - *N17.1*
- - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.1*
- Rénale
- - Stade
- - - 1 ¬
- - - - *N17.11*
- - - - *N17.13*
- - - 2 ¬ *N17.12*
- - ¬ *N17.1*
- SAI ¬ *N17.1*

Nécrose des tissus
- Membre inférieur SAI ¬ Gelure avec *T34.9*
- SAI ¬ Gelure
- - *T34.9*
- - Multiples, avec *T35.1*
- Tronc SAI ¬ Gelure avec *T34.9*
- ¬ Gelure
- - Bras et de l'avant-bras, avec *T34.4*
- - Cheville et du pied, avec *T34.8*
- - Cou, avec *T34.1*
- - Genou et de la jambe, avec *T34.7*
- - Hanche et de la cuisse, avec *T34.6*
- - Localisations autres et non précisées, avec *T34.9*
- - Paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec *T34.3*
- - Parties multiples du corps, avec *T35.1*
- - Poignet et de la main, avec *T34.5*
- - Tête, avec *T34.0*
- - Thorax, avec *T34.2*

Nécrose médullaire
- Papillaire
- - Aiguë ¬ *N17.2*
- - Rénale ¬ *N17.2*
- - SAI ¬ *N17.2*
- Rénale stade
- - 1 ¬ *N17.21*
- - 2 ¬ *N17.22*
- - 4 ¬ *N17.23*
- Stade
- - 1 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.21*
- - 2 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.22*
- - 3 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.23*
- ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.2*

Nécrose papillaire rénale stade
- 1 ¬ *N17.21*
- 2 ¬ *N17.22*
- 5 ¬ *N17.23*

Nécrose tubulaire
- Aiguë
- - Stade
- - - 1 ¬ *N17.01*
- - - 2 ¬ *N17.02*
- - - 3 ¬ *N17.03*
- - ¬ *N17.0*
- Rénale
- - Stade
- - - 1 ¬ *N17.01*
- - - 2 ¬ *N17.02*
- - - 3 ¬ *N17.03*
- - ¬ *N17.0*
- SAI ¬ *N17.0*
- Stade
- - 1 ¬
- - - *N17.01*
- - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.01*

Nécrose tubulaire *–suite*
- Stade *–suite*
- - 2 ¬
- - - *N17.02*
- - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.02*
- - 3 ¬
- - - *N17.03*
- - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.03*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- ¬ Insuffisance rénale aiguë avec *N17.0*

Nécrotique
- Récidivante ¬ Périadénite muqueuse *K12.0*
- Solitaire du foie ¬ Nodule *K76.8*
- Subaiguë ¬ Myélopathie *G95.18*
- ¬ Œsophagite *K20.9*

Needles
v./v.a. Melnick-Needles

Négatif
v./v.a. Type de maladie

Négligence
- Affective ou autre forme de négligence d'un enfant ¬ *Z62*
- Côté gauche ¬ *R29.5*
- Enfant ¬ Négligence affective ou autre forme de *Z62*
- Hémilatérale ¬ *R29.5*
- Neurologique ¬ *R29.5*
- Sensorielle ¬ *R29.5*
- Soi
- - SAI ¬ *R46.8*
- - ¬ Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de *R63.6*
- Visuo-spatiale ¬ *R29.5*
- ¬
- - *Y09.9!*
- - Corps étranger abandonné dans le corps par *Y69!*
- - Incision, ponction, perforation ou hémorragie due à la *Y69!*

Neige
- Visuelle ¬ Syndrome de *H53.1*
- ¬
- - Dégénérescence vitréo-rétinienne en flocons de *H35.5*
- - Ophtalmie des *H16.1*

Neisseria
- Déficit en facteur D ¬ Infections récurrentes à *D84.1, A49.88*
- Gonorrhoeae ¬ Épididymo-orchite à *A54.2†, N51.1**
- Meningitidis ¬ Méningite à *A39.0†, G01**

Nelson
v./v.a. Emery-Nelson
- ¬ Syndrome de *E24.1*

NEM [Néoplasie endocrinienne multiple] ¬ *D44.8*

Némaline
- Adulte ¬ Myopathie *G71.2*

Némaline *–suite*
- Enfant ¬ Myopathie *G71.2*
- Type Amish ¬ Myopathie *G71.2*
- Typique ¬ Myopathie *G71.2*

Nématodes ¬ Infection à *B80*

Néoformation SAI ¬ *D48.9*

Néonatal
v./v.a. Type de maladie

Neonatal-onset multisystem inflammatory disease] ¬ NOMID [*M35.8*

Néoplasie
- Anale ¬ *D37.78*
- Canal anal ¬ *D37.78*
- Endocrinienne multiple] ¬ NEM [*D44.8*
- Intraépithéliale
- - Bas degré de la prostate [PIN] ¬ *N40*
- - Col de l'utérus NIC stade
- - - I ¬ *N87.0*
- - - II ¬ *N87.1*
- - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ *D06*
- - Haut grade de la prostate [NIP de haut grade] ¬ *D07.5*
- - Vagin NIVA stade
- - - I ¬ *N89.0*
- - - II ¬ *N89.1*
- - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ *D07.2*
- - Vulve
- - - NIV stade
- - - - I ¬ *N90.0*
- - - - II ¬ *N90.1*
- - - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ *D07.1*
- - - Stade III avec dysplasie sévère ¬ *D07.1*
- - - VIN] ¬ *N90.3*
- Intra-épithéliale prostate NIP stade
- - I ¬ *N42.3*
- - II ¬ *N42.3*
- Larynx ¬ *D38.0*
- Maligne ¬ Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une *Z51.82*
- Neuroendocrine
- - Œsophage
- - - Abdominal ¬ *C15.2*
- - - Cervical ¬ *C15.0*
- - - Thoracique ¬ *C15.1*
- - - ¬ *C15.9*
- - Tiers
- - - Inférieur de l'œsophage ¬ *C15.5*
- - - Moyen de l'œsophage ¬ *C15.4*
- - - Supérieur de l'œsophage ¬ *C15.3*
- Œsophagienne ¬ *D37.78*
- Rénale papillaire ¬ Cancer familial papillaire de la thyroïde avec *C73, C64*
- Squameuse de la conjonctive ¬ *D48.7*
- ¬ Lyse (spontanée) des tumeurs (après traitement cytostatique d'une *E88.3*

Néoplasique
- Lors de tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite *C79.3*
- ¬ Nævus
- - Congénital non *Q82.5*
- - Non *I78.1*

Néoplasme neuroendocrine
- Appendice ¬
- - *C18.1*
- - *D12.1*
- Incertain de l'appendice ¬ *D37.3*
- Localisations contiguës de l'œsophage ¬ *C15.8*
- Non neuroendocrine mixte
- - Canal pancréatique ¬ *C25.3*
- - Col du pancréas ¬ *C25.7*
- - Corps du pancréas ¬ *C25.1*
- - Localisations contiguës du pancréas ¬ *C25.8*
- - Pancréas ¬ *C25.9*
- - Queue du pancréas ¬ *C25.2*
- - Tête du pancréas ¬ *C25.0*
- ¬ *C80.9*

Néovaisseaux (de la cornée) ¬ *H16.4*

Néovasculaire
- Autosomique dominante ¬ Vitréo-rétinopathie inflammatoire *H35.2*
- ¬
- - Dégénérescence de la macula liée à l'âge, *H35.30*
- - Glaucome *H40.5*

Néovascularisation
- Choroïdienne ¬ *H31.8*
- Cornéenne ¬ *H16.4*
- Cours rétinopathie diabétique diabète sucré type
- - 1 ¬ Glaucome de *E10.30†, H36.0**
- - 2 ¬ Glaucome de *E11.30†, H36.0**
- Iris ou du corps ciliaire ¬ *H21.1*
- Rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- Rétinopathie diabétique ¬ Glaucome de *E14.30†, H36.0**

Néovessie ¬
- Calcul vésical dans une *N21.0*
- Rupture de *N32.4*
- Sténose du col de la *N32.0*

Néphrétique, sans précision ¬ Colique *N23*

Néphrite
- Aiguë ¬ *N00*
- Anticorps anti-MBG [membrane basale glomérulaire] au cours de syndrome de Goodpasture ¬ *M31.0†, N08.5**
- Artérioscléreuse (chronique) (interstitielle) ¬ *I12*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, N08.0**
- Candida ¬ *B37.4†, N08.0**
- Chronique ¬ *N03*

Néphrite *–suite*
- Cours de lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, N08.5**
- Cryptocoques ¬ *B45.8*
- Évolution rapide ¬ *N01*
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N08.0**
- Goutte ¬ *M10.99†, N29.8**
- Interstitielle
- - Caryomégalique ¬ *N11.8*
- - Infectieuse
- - - Aiguë ¬ *N10*
- - - Chronique ¬ *N11*
- - SAI
- - - Chronique ¬ *N11.9*
- - - ¬ *N12*
- Ourlienne ¬ *B26.8†, N08.0**
- Oxalate de calcium ¬ *E74.8*
- Pendant la grossesse ¬ *O26.81*
- SAI ¬ *N05*
- Scarlatineuse ¬ *A38†, N29.1**
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.5†, N08.0**
- - Précoce ¬ *A51.4†, N08.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, N08.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N29.1**
- Tubulo-interstitiel
- - Aiguë ¬ *N10*
- - Chronique, sans précision ¬ *N11.9*
- - Chroniques ¬ Autres *N11.8*
- - Uvéite] ¬ Syndrome TINU [*N12, H20.9*
- - ¬ Syndrome de Sjögren avec *M35.0†, N16.4**

Néphritique
- Aigu ¬ Syndrome *N00*
- Chronique ¬ Syndrome *N03*
- Évolution rapide ¬ Syndrome *N01*
- Sans précision ¬ Syndrome *N05*

Néphroblastomatose-ascite fœtale-macrosome-tumeur de Wilms ¬ Syndrome de *Q87.3*

Néphroblastome
- Embryonnaire ¬ *C64*
- Épithélial ¬ *C64*
- Mésenchymateux ¬ *C64*
- ¬ *C64*

Néphrocalcinose
- Atteinte oculaire sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec hypercalciurie et *E83.4*
- Indicanurie ¬ Syndrome d'hypercalcémie familiale- *E70.8*
- Sans atteinte oculaire sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec hypercalciurie et *E83.4*
- ¬
- - *E83.58†, N29.8**
- - Hypomagnésémie primaire
- - - Familiale avec hypercalciurie et *E83.4*

Néphrocalcinose *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hypomagnésémie primaire *–suite*
- - - Hypercalciurie et *E83.4*
- - Syndrome
- - - Amélogenèse imparfaite- *K00.5†, N29.8**
- - - Hypoplasie médiofaciale-surdité-elliptocytose- *Q87.0*

Néphrogène ¬ Polycythémie: *D75.1*

Néphrogénique
- Calcifications intracrâniennes-petite taille-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de diabète insipide *Q87.1*
- ¬
- - Diabète insipide *N25.1*
- - Fibrose systémique *M35.8*

Néphrolithiase
- Calcul d'acide urique ¬ *M10.09†, N22.8**
- Congénitale ¬ *Q63.8*
- Goutte ¬ *M10.09†, N22.8**
- Ostéoporose ¬ Hypophosphatémie dominante avec *E83.30†, N22.8*, M81.99*
- Parenchymateuse ¬ *E83.58†, N29.8**
- SAI ¬ *N20.0*
- ¬ Hypophosphatémie dominante avec *E83.30†, N22.8**

Néphrome
- Kystique bénin ¬ *D30.0*
- Mésoblastique congénital ¬ *D41.0*

Néphronophtise
- Familiale de l'adulte-quadriparésie spastique ¬ Syndrome de *Q61.5, G82.49*
- Infantile ¬ *Q61.5*
- Juvénile ¬ *Q61.5*
- Tardive ¬ *Q61.5*
- ¬ *Q61.5*

Néphropathie
v./v.a. surdité-néphropathie
- Amyloïde
- - Familiale ¬ *E85.0†, N08.4**
- - Héréditaire ¬ *E85.0†, N08.4**
- - ¬ *E85.4†, N08.4**
- Anévrismes-crampes musculaires [HANAC] ¬ Syndrome héréditaire d'angiopathie- *Q28.88, Q61.8*
- Balkans ¬ *N15.0*
- Chronique stade
- - 3 ¬ Anémie au cours de *N18.3†, D63.8**
- - 4 ¬ Anémie au cours de *N18.4†, D63.8**
- - 5 ¬ Anémie au cours de *N18.5†, D63.8**
- - Non précisé ¬ Autre *N18.89*
- Cours
- - Drépanocytose ¬ *D57.1†, N08.2**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *N08**
- Due
- - Analgésique ¬ *N14.0*
- - Médicament substance biologique
- - - Sans précision ¬ *N14.2*

Néphropathie *–suite*
- Due *–suite*
- - Médicament substance biologique *–suite*
- - - ¬ *N14.1*
- - Métaux lourds ¬ *N14.3*
- Endémique des Balkans ¬ *N15.0*
- Femme enceinte ¬ Présence d'une hypertension préexistante, due à une *O10.4*
- Full-house non lupique idiopathique ¬ *N05.9*
- Goutte ¬ *M10.99†, N29.8**
- Héréditaire, non classée ailleurs ¬ *N07*
- Hypertensive
- - Insuffisance rénale ¬ *I12.0*
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.2*
- - SAI ¬ *I12.9*
- - Sans insuffisance rénale ¬ *I12.9*
- IgA immunoglobuline A
- - Lésions glomérulaires prolifératives ¬ *N02.8*
- - ¬ *N02.8*
- Kystique acquise associée à un carcinome à cellules rénales ¬ *C64, N28.1*
- Liée à la grossesse ¬ *O26.81*
- Membraneux congénitale
- - Allo-immunisation fœto-maternelle anti-endopeptidase neutre ¬ *P96.0*
- - Anticorps maternels contre l'andopeptidase neutre ¬ *P96.0*
- Oxalate ¬ *E74.8*
- Progressive hypertension autosomique dominante
- - Crise hypertensive ¬ *I15.11*
- - ¬ *I15.10*
- SAI ¬ *N28.9*
- Surdité ¬ Syndrome de paraplégie spastique- *G11.4*
- Toxique, non classée ailleurs ¬ *N14.4*
- Tubulaire ¬ Syndrome d'encéphalopathie-cardiomyopathie hypertrophique- *E88.8*
- Tubulo-interstitiel
- - Autosomique dominante
- - - Associée
- - - - MUC1 ¬ *Q61.5*
- - - - UMOD ¬ *Q61.5*
- - - ¬ *Q61.5*
- - Cours de lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, N16.4**
- Urate ¬ *M10.99†, N29.8**
- ¬
- - Diabète sucré
- - - *E14.20†, N08.3**
- - - Type 2 avec *E11.20†, N08.3**
- - Multikystique: *Q61.4*
- - Ostéolyse carpo-tarsienne multicentrique avec *M89.50, N28.9*
- - Syndrome
- - - Athérosclérose-surdité-épilepsie-diabète- *Q87.8*

Néphropathie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Dyschondrostéose - *Q77.8, N07.9*
- - - Hydrocéphalie-sclérotiques bleues- *Q87.8*

Néphropathie-surdité-hyperparathyroïdie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Néphroptose ¬ *N28.88*

Néphrosclérose
- Cours de cystinose ¬ *E72.0†, N29.8**
- Goutte ¬ *M10.99†, N29.8**
- ¬ *I12*

Néphrose
v./v.a. microcorie-néphrose
- Congénitale finlandaise ¬ *N04.8*
- Cours
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, N08.5**
- - Paludisme ¬ *B52.0†, N08.0**
- Lipoïdique ¬ *N04*
- Osmotique ¬ *N14.2*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, N08.0**

Néphrostomie ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Néphrotico-glycosurique avec rachitisme hypophosphatémique ¬ Nanisme *E72.0†, N16.3**

Néphrotique
- Congénital ¬ syndrome *N04*
- Épidermolyse bulleuse ¬ Syndrome de pneumopathie interstitielle-syndrome *J84.90†, N08.8*, Q81.8*
- Familial
- - Cortico-résistant
- - - Insuffisance surrénalienne ¬ Syndrome *N04.1, E27.4*
- - - Surdité neurosensorielle ¬ Syndrome *N04.1, H90.5*
- - Idiopathique résistant stéroïdes
- - - Hyalinose focale et segmentaire ¬ Syndrome *N04.1*
- - - Lésions minimales ¬ Syndrome *N04.0*
- - - Prolifération mésangiale diffuse ¬ Syndrome *N04.3*
- - - Sclérose mésangiale diffuse ¬ Syndrome *N04.8*
- Idiopathique
- - Cortico-sensible
- - - Glomérulosclérose segmentaire focale ¬ Syndrome *N04.1*
- - - ¬ Syndrome *N04.0*
- - Résistance aux stéroïdes ¬ Syndrome *N04.9*
- - Sporadique cortico-résistant ¬ Syndrome *N04.9*
- Infantile lié à LAMB2 ¬ Syndrome *N04.8*
- Sensible aux stéroïdes avec résistance secondaire ¬ Syndrome *N04.9*

Néphrotique *–suite*
- Surdité neurosensorielle ¬ Syndrome d'épidermolyse bulleuse-syndrome *Q87.8*
- Syphilitique secondaire ¬ Syndrome *A51.4†, N08.0**
- ¬
- - Œdème au cours de syndrome *N04.9*
- - Syndrome
- - - *N04*
- - - Leigh avec syndrome *G31.88†, N08.8**

Nerf
- Abdomen ¬
- - Ganglioneuroblastome des *C47.4*
- - Neuroblastome des *C47.4*
- - Schwannome malin des *C47.4*
- - Tumeur rhabdoïde des *C47.4*
- Abdomino-pelviens ¬ Schwannome malin des *C47.8*
- Acoustique
- - N. stato-acoustique] ¬ *S04.6*
- - ¬ Syphilis du *A52.1†, H94.0**
- Autonomes ¬ Neuroblastome des *C47.9*
- Axillaire ¬ Lésion traumatique du *S44.3*
- Brachial due au déplacement de disque intervertébral ¬ Névrite du *M50.1†, G55.1**
- Bras ¬ Ganglioneuroblastome des *C47.1*
- Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Collatéral
- - Doigt ¬ Lésion traumatique du *S64.4*
- - Pouce ¬ Lésion traumatique du *S64.3*
- Cou
- - Non précisés ¬ Lésion traumatique de *S14.6*
- - ¬
- - - Neuroblastome des *C47.0*
- - - Schwannome malin des *C47.0*
- - - Tumeur triton maligne des *C47.0*
- Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Fémoro-cutané ¬ Syndrome du *G57.1*
- Ganglions sympathiques et parasympathiques ¬ *C47*
- Glossopharyngien
- - IX] ¬ *S04.8*
- - ¬
- - - Affection du *G52.1*
- - - Névralgie du *G52.1*
- Grand hypoglosse
- - Nerf crânien XII] ¬ Affections du *G52.3*
- - XII] ¬ *S04.8*
- Hanche ¬ Schwannome malin des *C47.2*
- Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Médian
- - Niveau

Nerf *–suite*
- Médian *–suite*
- - Niveau *–suite*
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du *S54.1*
- - - Bras ¬ Lésion traumatique du *S44.1*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S64.1*
- - SAI ¬ *S54.1*
- - ¬ Autres lésions du *G56.1*
- Membre
- - Inférieur ¬ Séquelles de lésion traumatique de *T93.4*
- - Supérieur ¬ Séquelles d'une lésion traumatique de *T92.4*
- Membres
- - Inférieurs ¬
- - - Neuroblastome des *C47.2*
- - - Schwannome malin des *C47.2*
- - - Tumeur rhabdoïde des *C47.2*
- - - Tumeur triton maligne des *C47.2*
- - Supérieurs ¬
- - - Neuroblastome des *C47.1*
- - - Schwannome malin des *C47.1*
- - - Tumeur rhabdoïde des *C47.1*
- - - Tumeur triton maligne des *C47.1*
- Moelle épinière
- - Niveau du cou ¬ Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des *T06.0*
- - Plusieurs autres parties du corps ¬ Lésions traumatiques des *T06.1*
- Moteur oculaire
- - Commun
- - - III) ¬ Paralysie du *H49.0*
- - - ¬ Lésion traumatique du *S04.1*
- - Externe
- - - VI) ¬ Paralysie du *H49.2*
- - - ¬ Lésion traumatique du *S04.4*
- Muscles oculomoteurs ¬ Paralysie congénitale de plusieurs *H49.9*
- Musculo-cutané ¬ Lésion traumatique du *S44.4*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique
- - - *S54.8*
- - - Multiples *S54.7*
- - Cheville pied ¬ Lésion traumatique
- - - *S94.8*
- - - Multiples *S94.7*
- - Épaule bras ¬ Lésion traumatique
- - - *S44.8*
- - - Multiples *S44.7*
- - Hanche cuisse ¬ Lésion traumatique
- - - *S74.8*
- - - Multiples *S74.7*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique
- - - *S84.8*

Nerf *–suite*
- Niveau *–suite*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique *–suite*
- - - Multiples *S84.7*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique
- - - *S64.8*
- - - Multiples *S64.7*
- Non
- - Précisé
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T13.3*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T11.3*
- - - Niveau
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un *S54.9*
- - - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S94.9*
- - - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un *S44.9*
- - - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un *S74.9*
- - - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un *S84.9*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un *S64.9*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique d'un *S24.6*
- - Précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S34.8*
- Oculomoteur ¬
- - Paralysie alternante du *G83.8*
- - Paralysie congénitale du *H49.0*
- Olfactif
- - I] ¬ *S04.8*
- - Nerf crânien I] ¬ Tumeur maligne: *C72.2*
- - Premier nerf crânien] ¬ Affections du *G52.0*
- Ophtalmique ¬ Névralgie du *G50.0*
- Paroi abdominale ¬ Tumeur triton maligne des *C47.4*
- Pathétique
- - IV) ¬ Paralysie du *H49.1*
- - ¬ Lésion traumatique du *S04.2*
- Pelviens ¬
- - Neuroblastome des *C47.5*
- - Schwannome malin des *C47.5*
- - Tumeur rhabdoïde des *C47.5*
- - Tumeur triton maligne des *C47.5*
- Péronier ¬ Paralysie du *G57.3*
- Phrénique due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie du *P14.2*
- Plantaire
- - Externe ¬ Lésion traumatique du *S94.0*
- - Interne ¬ Lésion traumatique du *S94.1*
- - ¬ Lésion du *G57.6*
- Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques des *T06.2*

Nerf *–suite*
- Pneumogastrique [X] ¬ *S04.8*
- Racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un *T09.4*
- Radial
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du *S54.2*
- - - Bras ¬ Lésion traumatique du *S44.2*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S64.2*
- - SAI ¬ *S54.2*
- - ¬ Lésion du *G56.3*
- S
- - Partie du corps non précisée ¬ Lésion traumatique de *T14.4*
- - Périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S34.6*
- SAI ¬ Lésions traumatiques multiples de *T06.2*
- Sciatique
- - Due au déplacement de disque intervertébral ¬ Névrite du *M51.1†, G55.1**
- - Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique du *S74.0*
- - Poplité
- - - Externe
- - - - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du *S84.1*
- - - - ¬ Lésion du *G57.3*
- - - Interne
- - - - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du *S84.0*
- - - - ¬ Lésion du *G57.4*
- - ¬ Lésion du *G57.0*
- Sensitif cutané au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un *S54.3*
- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Spinal ¬ Lésion traumatique du *S04.7*
- Splanchnique ¬ *S34.5*
- Tête ¬
- - Schwannome malin des *C47.0*
- - Tumeur rhabdoïde des *C47.0*
- - Tumeur triton maligne des *C47.0*
- Thorax ¬
- - Ganglioneuroblastome des *C47.3*
- - Lésion traumatique d'autres *S24.5*
- - Neuroblastome des *C47.3*
- - Schwannome malin des *C47.3*
- - Tumeur rhabdoïde des *C47.3*
- - Tumeur triton maligne des *C47.3*
- Tibial antérieur
- - Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique du *S94.2*
- - ¬ Branche terminale externe du *S94.2*
- Traumatique SAI ¬

Nerf *–suite*
- Traumatique SAI ¬ *–suite*
- - Lésion d'un *T14.4*
- - Section d'un *T14.4*
- Trijumeau
- - Sans précision ¬ Affection du *G50.9*
- - ¬
- - - Affections du *G50.8*
- - - Anesthésie congénitale du *G50.8*
- - - Lésion traumatique du *S04.3*
- Trochléaire ¬ Paralysie congénitale
- - *H49.1*
- - Familiale du *H49.1*
- Tronc ¬
- - Neuroblastome es *C47.6*
- - Schwannome malin es *C47.6*
- - Tumeur rhabdoïde es *C47.6*
- - Tumeur triton maligne des *C47.6*
- Vestibulocochléaire ¬
- - Névrite syphilitique
- - - *A52.1†, H94.0**
- - - Tardive du *A52.1†, H94.0**
- - Syphilis du *A52.1†, H94.0**
- Vestibulo-cochléaire cours maladie
- - Infectieuse NCA ¬ Névrite du *B99†, H94.0**
- - Parasitaire NCA ¬ Névrite du *B89†, H94.0**
- Voie optique
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du *H48.8**
- - ¬ Lésion traumatique du *S04.0*
- ¬
- - Agénésie d'un *Q07.8*
- - Paralysie
- - - Syphilitique d'un *A52.1†, G59.8**
- - - Syphilitiques multiples des *A52.1†, G63.0**

Nerf auditif
- Cours maladie
- - Infectieuse NCA ¬ Névrite du *B99†, H94.0**
- - Parasitaire NCA ¬ Névrite du *B89†, H94.0**
- Nerf crânien VIII ¬
- - Affections du *H93.3*
- - Tumeur maligne: *C72.4*
- ¬
- - *S04.6*
- - Lésion traumatique du *S04.6*

Nerf cochléaire ¬
- Aplasie du *Q07.8*
- Hypoplasie du *Q07.8*

Nerf crânien
- Cours
- - Maladie
- - - Infectieuse NCA ¬ Paralysie de plusieurs *B99†, G53.1**
- - - Parasitaire NCA ¬ Paralysie de plusieurs *B89†, G53.1**

Nerf crânien *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections des *G53.8**
- - Sarcoïdose ¬ Paralysie de plusieurs *D86.8†, G53.2**
- - Tumeur NCA ¬ Paralysie de plusieurs *D48.9†, G53.3**
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ Lésion des autres *P11.4*
- I] ¬ Tumeur maligne: Nerf olfactif [*C72.2*
- II ¬
- - *S04.0*
- - Lésion traumatique du *S04.0*
- - Tumeur maligne: Nerf optique [*C72.3*
- III ¬ *S04.1*
- IV ¬ *S04.2*
- Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou ¬ Lésions traumatiques du cerveau et des *T06.0*
- Non précisés ¬ Tumeur maligne: *C72.5*
- Paralysies multiples ¬ Syphilis du *A52.1†, G53.1**
- Précisés ¬ Affections d'autres *G52.8*
- SAI ¬ *C72.5*
- Sans précision ¬
- - Affection des *G52.9*
- - Lésion traumatique d'un *S04.9*
- V ¬ *S04.3*
- VI ¬ *S04.4*
- VII ¬
- - *S04.5*
- - Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [*P11.3*
- VIII
- - Vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [inflammation du *H94.0**
- - ¬
- - - *S04.6*
- - - Affections du nerf auditif [*H93.3*
- - - Névrite syphilitique du *A52.1†, H94.0**
- - - Tumeur maligne: Nerf auditif [*C72.4*
- X] ¬ Affections du nerf vagal [*G52.2*
- XI ¬ *S04.7*
- XII] ¬ Affections du nerf grand hypoglosse [*G52.3*
- ¬
- - Affections
- - - Nerf olfactif [premier *G52.0*
- - - Plusieurs *G52.7*
- - Lésion traumatique d'autres *S04.8*
- - Paralysie syphilitique des *A52.1†, G53.8**
- - Séquelles de lésion traumatique de *T90.3*
- - Syndrome de dysfonctionnement hyperactif combiné des *G52.7*
- - Syphilis des *A52.1†, G53.8**
- - Tumeur bénigne: *D33.3*

Nerf crânien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur neuroectodermique primitive d' *C72.5*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D43.3*

Nerf cubital
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du *S54.0*
- - Bras ¬ Lésion traumatique du *S44.0*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S64.0*
- SAI ¬ *S54.0*
- ¬
- - Lésion du *G56.2*
- - Paralysie lente du *G56.2*

Nerf cutané sensitif niveau
- Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S94.3*
- Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un *S44.5*
- Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un *S74.2*
- Jambe ¬ Lésion traumatique d'un *S84.2*

Nerf facial
- Due à un traumatisme obstétrical [nerf crânien VII] ¬ Lésion du *P11.3*
- Sans précision ¬ Affection du *G51.9*
- ¬
- - Affections du *G51.8*
- - Herpès zoster du *B02.2†, G53.0**
- - Lésion traumatique du *S04.5*
- - Syphilis du *A52.1†, G53.8**

Nerf fémoral
- Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique du *S74.1*
- ¬
- - Lésion du *G57.2*
- - Syndrome compressif du *G57.2*

Nerf optique
- Cours
- - Accouchement ¬ Lésion du *P11.4*
- - Maladie Leber ¬ Atrophie
- - - *H47.2*
- - - Héréditaire du *H47.2*
- Nerf crânien II] ¬ Tumeur maligne: *C72.3*
- Non classées ailleurs ¬ Affections du *H47.0*
- Splénomégalie-anhidrose-céphalée migraineuse ¬ Syndrome de dystrophie rétinienne-œdème du *Q87.8*
- ¬
- - Anomalie congénitale de la papille du *Q14.2*
- - Aplasie isolée du *Q07.8*
- - Atrophie syphilitique
- - - *A52.1†, H48.0**
- - - Congénitale du *A50.4†, H48.0**
- - Compression du *H47.0*

Nerf optique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dégénérescence du *H47.0*
- - Gliome du *D33.3*
- - Hémorragie de la gaine du *H47.0*
- - Hypoplasie isolée du *Q07.8*
- - Inflammation du *H46*
- - Médulloépithéliome du *C72.3*
- - Méningiome du *D32.0*
- - Polymicrogyrie avec hypoplasie du *Q04.3*
- - Syphilis du *A52.1†, H48.0**
- - Tuberculose du *A18.5†, H48.8**

Nerf périphérique
- Abdomen ¬ Tumeur maligne: *C47.4*
- Autonome
- - Cours
- - - Amylose ¬ Neuropathie des *E85.4†, G99.08**
- - - Hyperthyroïdie ¬ Neuropathie des *E05.9†, G99.08**
- - - Maladie
- - - - Endocrinienne NCA ¬ Neuropathie des *E34.9†, G99.08**
- - - - Métabolique NCA ¬ Neuropathie des *E88.9†, G99.08**
- - Diabète sucré ¬ Neuropathie des *E14.40†, G99.08**
- - Goutte ¬ Neuropathie des *M10.09†, G63.6**
- Cou ¬ Lésion traumatique des *S14.4*
- Localisations contiguës ¬
- - Neuroblastome des *C47.8*
- - Schwannome malin des *C47.8*
- - Tumeur rhabdoïde des *C47.8*
- - Tumeur triton maligne des *C47.8*
- Membre
- - Inférieur, y compris la hanche ¬ Tumeur maligne: *C47.2*
- - Supérieur, y compris l'épaule ¬ Tumeur maligne: *C47.1*
- Orbite ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- - *D48.7*
- Pelvis ¬ Tumeur maligne: *C47.5*
- Système nerveux autonome
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C47.9*
- - ¬
- - - Tumeur bénigne: *D36.1*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des *C47.8*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D48.2*
- Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur maligne: *C47.0*
- Thorax ¬
- - Lésion traumatique de *S24.3*
- - Tumeur maligne: *C47.3*

Nerf périphérique *–suite*
- Tronc, sans précision ¬ Tumeur maligne: *C47.6*
- ¬
- - Atrophie d'un *G58.9*
- - Compression d'un *G58.9*
- - Irritation d'un *G58.9*
- - Lésion d'un *G58.9*
- - MPNST] Tumeur maligne des gaines des *C47.9*
- - Neuroblastome des *C47.9*
- - Syphilis d'un *A52.7†, G59.8**

Nerf pneumogastrique
v./v.a. Nerf vagal

Nerf sympathique
- Cervicaux ¬ Lésion traumatique des *S14.5*
- Lombaires, sacrés et du bassin ¬ Lésion traumatique des *S34.5*
- Thorax ¬ Lésion traumatique de *S24.4*
- ¬
- - Compression d'un *G90.88*
- - Paralysie du *G90.88*

Nerf vagal [nerf crânien X] ¬ Affections du *G52.2*

Nerveux
- Acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision ¬ Affection du système *G97.9*
- Actes médical ¬
- - Affections du système *G97.8*
- - Maladies du système *G97.88*
- Asymptomatique ¬ Syphilis *A52.2*
- Autonome
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du système *G99.1**
- - Périphérique ¬
- - - Compression du système *G90.88*
- - - Paralysie du système *G90.88*
- - Sans précision ¬
- - - Affection du système *G90.9*
- - - Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système *T44.9*
- - - Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système *C47.9*
- - ¬
- - - Tumeur bénigne: Nerfs périphériques et du système *D36.1*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système *C47.8*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système *D48.2*
- Central
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ Complications impliquant le système *O29.2*
- - - Puerpéralité ¬ Complications intéressant le système *O89.2*

Nerveux *–suite*
- Central *–suite*
- - Anesthésie cours *–suite*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Complications intéressant le système *O74.3*
- - Cours
- - - Maladies classées ailleurs ¬ Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système *G13.8**
- - - Maladies tumorales ¬ Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système *G13.1**
- - - Myxœdème ¬ Atrophie systémique du système *E03.9†, G13.2**
- - - Tumeur NCA ¬ Atrophie systémique du système *D48.9†, G13.1**
- - Due à un traumatisme obstétrical, sans précision ¬ Lésion du système *P11.9*
- - Fœtus ¬ Soins maternels pour malformation (présumée) du système *O35.0*
- - SAI ¬
- - - Gomme (syphilitique) du système *A52.3*
- - - Syphilis (tardive) du système *A52.3*
- - - Syphilome du système *A52.3*
- - - Système
- - - - *D33.9*
- - - - *D43.9*
- - Sans précision ¬
- - - Affection
- - - - Démyélinisante du système *G37.9*
- - - - Système *G96.9*
- - - Tumeur bénigne: Système *D33.9*
- - - Tumeur maligne: Système *C72.9*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Système *D43.9*
- - Surdité-acidose tubulaire-anémie ¬ Syndrome de calcification du système *Q87.8*
- - Syndactylie dû à des mutations de FBLN1 ¬ Syndrome de retard de développement-anomalie du système *Q87.8*
- - ¬
- - - Affections
- - - - Démyélinisantes précisées du système *G37.8*
- - - - Précisées du système *G96.8*
- - - Angéite primaire du système *I67.7*
- - - Carcinome embryonnaire
- - - - Non localisé au système *C80.9*
- - - - Système *C72.9*
- - - Choriocarcinome du système *C72.9*
- - - Cysticercose du système *B69.0†, G99.8**
- - - Dermoïde du système *D33.9*
- - - Fièvre rhumatismale avec atteinte du système *I02.9*
- - - Germinome du système *C72.9*
- - - Gomme syphilitique du système *A52.3†, G07**

Nerveux *–suite*
- Central *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Infection
- - - - Entérovirus du système *A88.8*
- - - - Virale du système *A89*
- - - Infections virales précisées du système *A88.8*
- - - Kyste dermoïde du système *D33.9*
- - - Lymphome
- - - - Diffus à grandes cellules B du système *C83.3*
- - - - Primitif du système *C83.3*
- - - Maladie
- - - - Due au VIH avec affection du système *B22†, G94.8**
- - - - Rire [infection virale atypique du système *A81.8*
- - - - Secousses [infection virale atypique du système *A81.8*
- - - Maladies à prions du système *A81*
- - - Médulloépithéliome du système *C72.9*
- - - Mélanome primitif du système *C72.9*
- - - Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système *G37.3*
- - - Résultat anormaux
- - - - Explorations fonctionnelles du système *R94.0*
- - - - Imagerie diagnostique du système *R90.8*
- - - Séquelle
- - - - Affections inflammatoires du système *G09*
- - - - Tuberculose du système *B90.0*
- - - Syndrome de dysplasie ectodermique-déficience intellectuelle-malformation du système *Q87.8*
- - - Syphilis
- - - - Anévrisme du système *A52.0†, I68.8**
- - - - Juvénile du système *A50.4*
- - - - Vasculaire du système *A52.0†, I68.8**
- - - Syphilis congénitale du système *A50.4*
- - - Tératome
- - - - Bénin du système *D33.9*
- - - - Malin du système *C72.9*
- - - - Système *D43.9*
- - - Tuberculose du système *A17.9†, G99.8**
- - - Tumeur bénigne: Autres parties précisées du système *D33.7*
- - - Tumeur du sac vitellin du système *C72.9*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système *C72.8*
- - - Tumeur mixte des cellules germinales du système *C72.9*
- - - Tumeur neuroectodermique primitive
- - - - PNET) du système *C72.9*
- - - - Système *C72.9*

Nerveux *–suite*
- Central *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres parties du système *D43.7*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Troubles mentaux et maladies du système *O99.3*
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬
- - - Affections
- - - - Dégénératives précisées du système *G32.8**
- - - - Précisées du système *G99.8**
- - - Compression des racines et des plexus *G55.8**
- - Spondylarthrose ¬ Compression des racines *M47.29†, G55.2**
- - Tumeur NCA ¬ Compression des racines *D48.9†, G55.0**
- Intrarétiniennes myélinisées ¬ Fibres *H47.0*
- Lié à ARHGEF10, forme autosomique dominante ¬ Ralentissement de la vitesse de conduction *G60.0*
- Liée à l'alcool ¬ Dégénérescence du système *G31.2*
- Lombaire ¬ Syndrome d'irritation de la racine *M51.1†, G55.1**
- Lors atteinte disque intervertébral
- - Cervicaux avec myélopathie ¬ Compression des racines *M50.0†, G99.2**
- - Myélopathie ¬ Compression des racines *M51.0†, G99.2**
- - ¬ Compression des racines *M51.1†, G55.1**
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Autres affections du système *G98*
- - Précisées ¬ Tumeur maligne secondaire de parties du système *C79.4*
- Organe sens ¬
- - Antécédents personnels de maladies du système *Z86.6*
- - Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système *Z46.2*
- Ostéo-musculaire, autres et non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux systèmes *R29.8*
- Périphérique
- - Due à un traumatisme obstétrical, sans précision ¬ Lésion du système *P14.9*
- - Épreuves sensorielles spéciales ¬ Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système *R94.1*
- - SAI ¬ Affection du système *G64*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Lésions d'autres parties du système *P14.8*
- - ¬
- - - Affections du système *G64*

Nerveux *–suite*
- Périphérique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Maladie démyélinisante du système *G62.88*
- Périphériques ¬ Tumeur bénigne des gaines *D36.1*
- Plexus rachidien du tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la racine *T09.4*
- Précisées ¬ Autres maladies dégénératives du système *G31.88*
- Rachis
- - Cervical ¬ Lésion traumatique d'une racine *S14.2*
- - Dorsal ¬ Lésion traumatique d'une racine *S24.2*
- - Lombaire et sacré ¬ Lésion traumatique de la racine *S34.2*
- SAI ¬
- - Affection du système *G98*
- - Surdité (de): *H90.5*
- - Système *C72.9*
- Sans précision ¬
- - Affection
- - - Dégénérative du système *G31.9*
- - - Racines et des plexus *G54.9*
- - Malformation congénitale du système *Q07.9*
- - Syphilis *A52.3*
- Symptomatique ¬ Syphilis *A52.1*
- Tabétique
- - Juvénile ¬ Syphilis *A50.4*
- - ¬ Syphilis *A50.4*
- Tardive ¬ Syphilis congénitale *A50.4*
- Végétatif du à l'alcool ¬ Dysfonctionnement du système *G31.2*
- ¬
- - Affections
- - - Dégénératives précisées du système *G31.8*
- - - Racines et des plexus *G54.8*
- - Anomalie congénitale SAI du système *Q07.9*
- - Anomalies (de): réponse à une stimulation *R94.1*
- - Asthme *J45.19*
- - Atteinte des disques intervertébraux cervicaux avec compression des racines *M50.1†, G55.1**
- - Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système *T85.1*
- - Complications dues à des prothèses, implants ou greffes internes du système *T85.81*
- - Dégénérescence amyloïde du système *E85.4†, G99.8**
- - Éructation *F45.31*
- - Formes de tuberculose du système *A17.8†*

Nerveux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Gastrite *F54, K29.7*
- - Glioblastome du système *C72.9*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants ou greffes internes du système *T85.72*
- - Lésion congénitale SAI du système *Q07.9*
- - Maladie
- - - Chagas chronique avec atteinte du système *B57.4†, G99.8**
- - - Congénitale SAI du système *Q07.9*
- - Malformations congénitales précisées du système *Q07.8*
- - Mise en observation pour suspicion d'affection du système *Z03.3*
- - Syphilis congénitale *A50.4*
- - Tension *R45.0*
- - Tuberculose
- - - *A17.8†, G59.8**
- - - Système *A17.9†, G99.8**

Nervosa ¬
- Boulimie (bulimia *F50.2*
- Hyperorexia *F50.2*

Nervosité ¬ *R45.0*

Nés
- Avant terme ¬ Autres enfants *P07.3*
- Hôpital ¬
- - Jumeaux, *Z38.3*
- - Naissances multiples, enfants *Z38.6*
- Hors hôpital ¬
- - Jumeaux, *Z38.4*
- - Naissances multiples, enfants *Z38.7*
- Vivant ¬ Naissance
- - Gémellaire, jumeaux *Z37.2!*
- - Multiples
- - - Certains enfants *Z37.6!*
- - - Tous *Z37.5!*
- ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de: mort- *Z35.2*

NESCAV [neurodégénérescence - spasticité - atrophie cérébelleuse - cécité corticale] ¬ Syndrome de *G31.88*

Nestor-Guillermo ¬ Progéria de *E34.8*

NET
- Nécrolyse épidermique toxique] ¬ *L51.20*
- ¬ Intolérance orthostatique par déficit en *I95.1*

Netherton ¬ Syndrome de *Q80.8*

Netter
v./v.a. Weismann-Netter-Stuhl

Nettleship ¬ Syndrome de *Q82.2*

Nettleship-Falls ¬ Albinisme oculaire type *E70.3*

Nettoyage ¬ *Z43*

Neugebauer
v./v.a. Karsck-Neugebauer

Neuhäuser
v./v.a. Boucher-Neuhäuser

Neuhäuser *–suite*
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Neuhauser ¬ Anomalie de *Q25.4*

Neuhauser-Eichner-Opitz ¬ Syndrome de *G93.4*

Neu-Laxova ¬ Syndrome de *Q87.8*

Neural ¬
- Anomalie du tube *Q05.9*
- ROHHADNET [Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide-dysfonctionnement hypothalamique-hypoventilation-dysautonomie-tumeurs *E23.3, C80.9*
- Syndrome de cataracte-cardiopathie congénitale-défaut de fermeture du tube *Q87.0*

Neurasthénie ¬ *F48.0*

Neurexine-3 ¬ Encéphalite limbique avec anticorps *G04.8, M35.9*

Neurilemmome ¬ *D36.1*

Neurilemmosarcome ¬ *C47.9*

Neurinome
- Acoustique ¬ *D33.3*
- ¬ Nodule de Verocay dans le *D36.1*

Neuritique ¬ Atrophie musculaire *G58.9†, M63.89**

Neuro
- Immunologique-dysplasie squelettique par déficit en EXTL3 ¬ Syndrome *Q87.1*
- Oculo-cardio-génito-urinaire] ¬ NOCGUS [Syndrome *Q87.8*
- Uvéo-parotidite ¬ Syndrome de *D86.8*

Neuroacanthocytaire de McLeod ¬ Syndrome *E78.6*

Neuro-avitaminose ¬ *E56.9†, G99.8**

Neuroaxonale
- Infantile [maladie de Seitelberger] ¬ Dystrophie *G31.88*
- ¬ Ostéopétrose infantile avec dysplasie *Q78.2, Q04.0*

Neuroblastome
- Cours de syndrome de déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements ¬ *C74.9*
- Médullosurrénale ¬ *C74.1*
- Nerf
- - Abdomen ¬ *C47.4*
- - Autonomes ¬ *C47.9*
- - Cou ¬ *C47.0*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C47.2*
- - - Supérieurs ¬ *C47.1*
- - Pelviens ¬ *C47.5*
- - Thorax ¬ *C47.3*
- - Tronc ¬ *C47.6*
- Nerf périphérique
- - Localisations contiguës ¬ *C47.8*
- - ¬ *C47.9*
- Olfactif ¬ *C30.0*
- ¬ *C74.9*

Neuroborréliose ¬ *A69.2†, G05.0**

Neurocirculatoire
- Psychogène ¬ Trouble *F45.30*
- ¬ Asthénie *F45.30*

Neurocutané
- Héréditaire ¬ Malformation *D18.08*
- ¬ Mélanocytose *D22.9*

Neurocysticercose ¬ *B69.0†, G99.8**

Neurocytome
- Central ¬ *D43.0*
- Extraventriculaire ¬ *D43.2*

Neurodégénératif
- Déficit de transport cérébral des folates ¬ Syndrome *G31.88*
- Fatale post-virale ¬ Maladie *G04.8, E06.3*
- Filaments intermédiaires associée à PRKAR1B ¬ Démence *G31.88*
- Lié X type
- - Bertini ¬ Syndrome *G31.88*
- - Hamel ¬ Syndrome *G31.88*
- Progressif avec photosensibilité associé à PCNA ¬ Syndrome *G11.3*
- Sévère avec lipodystrophie ¬ Syndrome *G31.88, E88.1*

Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation] Typ 1 ¬ NBIA [*G23.0*

Neurodégénérescence
- Angiomatose cérébrale ¬ Syndrome de fibrose pulmonaire interstitielle- *Q87.8*
- Associée
- - Déficit en pantothénate kinase ¬ *G23.0*
- - Ferritine ¬ *G23.0*
- - Hydroxylase des acides gras ¬ *G23.0*
- - Phospholipase A2 ¬ *G31.88*
- - Protéine
- - - Bêta-propeller ¬ *G23.0*
- - - COASY ¬ *G23.0*
- - - Membrane mitochondriale ¬ *G23.0*
- Début infantile ¬ Syndrome de neuropathie sensitivo-motrice axonale-atrophie optique- *G60.0, H47.2*
- Déficit
- - 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase ¬ *E71.1*
- - NADHX
- - - Déshydratase ¬ *E88.8†, G32.8**
- - - Épimérase ¬ *E88.8†, G32.8**
- - NADPHX déshydratase ¬ *E88.8†, G32.8**
- Due à un déficit en NADPHX épimérase ¬ *E88.8†, G32.8**
- Infantile-spasticité progressive-déficience intellectuelle-lésions de la substance blanche ¬ Syndrome de *G31.88*
- Progressive
- - Associée à CLCN6 avec neuropathie périphérique débutant durant l'enfance ¬ *G31.88*
- - Enfant-cécité-ataxie-spasticité ¬ Syndrome de *G31.88*

Neurodégénérescence *–suite*
- Sévère-lipodystrophie ¬ Syndrome d'encéphalopathie progressive- *G31.88, E88.1*
- Spasticité - atrophie cérébelleuse - cécité corticale] ¬ Syndrome de NESCAV [*G31.88*
- Striatale autosomique dominante ¬ *G23.8*
- Surcharge cérébrale fer
- - Liée à des mutations de C19orf12 ¬ *G23.0*
- - Type 1 ¬ *G23.0*

Neurodéveloppement associé à ZBTB11 ¬ Trouble du *Q87.8*

Neurodéveloppemental
- Déficience intellectuelle
- - Anomalies squelettiques ¬ Syndrome *Q87.5*
- - Ataxie-trouble de l'alimentation lié à DHX30 ¬ Syndrome de retard *G11.8*
- - Sévère-dysmorphie faciale associé à CCNK ¬ Syndrome de trouble *Q87.0*
- Dystonie-épilepsie lié à IRF2BPL ¬ Syndrome de régression *G31.88*
- Malformations cérébrales-anomalies squelettiques-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de retard *Q87.8*
- Sévère-stéréotypies motrices-constipation chronique-trouble du rythme veille-sommeil associé à NRXN1 ¬ Syndrome de trouble *G96.8*

Neuroectodermique
v./v.a. Tumeur neuroectodermique
- Johnson ¬ Syndrome *Q87.8*
- Mélanolysosomale ¬ Maladie *E70.3*
- Type Zunich ¬ Syndrome *Q87.8*

Neuroendocrine
v./v.a. Carcinome neuroendocrine
v./v.a. Tumeur neuroendocrine
- Appendice ¬ Néoplasme
- - *C18.1*
- - *D12.1*
- Incertain de l'appendice ¬ Néoplasme *D37.3*
- L 'oreille moyenne ¬ Tumeur maligne *C30.1*
- Localisations contiguës
- - Œsophage ¬ Néoplasme *C15.8*
- - ¬ Tumeur bronchique *C34.8*
- Métastatique ¬ Tumeur *C80.9*
- Mixte
- - Canal pancréatique ¬ Néoplasme neuroendocrine-non *C25.3*
- - Col du pancréas ¬ Néoplasme neuroendocrine-non *C25.7*
- - Corps du pancréas ¬ Néoplasme neuroendocrine-non *C25.1*
- - Localisations contiguës du pancréas ¬ Néoplasme neuroendocrine-non *C25.8*
- - Pancréas ¬ Néoplasme neuroendocrine-non *C25.9*
- - Queue du pancréas ¬ Néoplasme neuroendocrine-non *C25.2*
- - Tête du pancréas ¬ Néoplasme neuroendocrine-non *C25.0*

Neuroendocrine *–suite*
- Non neuroendocrine mixte
- - Canal pancréatique ¬ Néoplasme *C25.3*
- - Col du pancréas ¬ Néoplasme *C25.7*
- - Corps du pancréas ¬ Néoplasme *C25.1*
- - Localisations contiguës du pancréas ¬ Néoplasme *C25.8*
- - Pancréas ¬ Néoplasme *C25.9*
- - Queue du pancréas ¬ Néoplasme *C25.2*
- - Tête du pancréas ¬ Néoplasme *C25.0*
- Nourrisson
- - Exacerbation aiguë ¬ Hyperplasie des cellules *J84.81*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Hyperplasie des cellules *J84.80*
- Œsophage
- - Abdominal ¬ Néoplasie *C15.2*
- - Cervical ¬ Néoplasie *C15.0*
- - Thoracique ¬ Néoplasie *C15.1*
- - ¬ Néoplasie *C15.9*
- Pulmonaire diffuse idiopathique ¬ Hyperplasie *D14.3*
- Tiers
- - Inférieur de l'œsophage ¬ Néoplasie *C15.5*
- - Moyen de l'œsophage ¬ Néoplasie *C15.4*
- - Supérieur de l'œsophage ¬ Néoplasie *C15.3*
- ¬
- - Néoplasme *C80.9*
- - Tumeur gastro-intestinale *C26.9*

Neuroépithélial
- Dysembryoplasique ¬ Tumeur *D33.2*
- ¬ Tumeur embryonnaire du tissu *C72.9*

Neuroépithéliome ¬ *C71.9*

Neuro-facio-digito-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Neuroferritinopathie ¬ *G23.0*

Neurofibromatose
v./v.a. microdélétion-neurofibromatose
- Syndrome de Noonan ¬ *Q87.1*
- Type
- - 1
- - - Mosaïque ¬ *Q85.0*
- - - Mutation ou délétion intragénique de NF1 ¬ *Q85.0*
- - 2 mosaïque ¬ *Q85.0*
- - 3
- - - Mosaïque ¬ *Q85.0*
- - - ¬ NF3 [*Q85.0*
- - 6 ¬ *Q85.0*
- ¬ *Q85.0*

Neurofibrome
- Conjonctive ¬ *D31.6*
- Malin ¬ *C47.9*
- Mélanotique ¬ *D36.1*
- Plexiforme ¬ *D36.1*
- Systémiques et orbitaux douloureux ¬ Syndrome marfanoïde- *Q87.8*
- ¬ *D36.1*

Neurofibrosarcome ¬ *C47.9*

Neurofilaments ¬ Neuropathie axonale sévère précoce par déficit en chaîne légère des *G60.0*

Neurogène
- Atonique (motrice) (sensorielle) ¬ Vessie *N31.2*
- Autonome ¬ Vessie *N31.2*
- Dénervation afférente chirurgicale ¬ Vessie *N31.2*
- Détrusor/sphincter de la vessie ¬ Dysfonctionnement *N31.88*
- Due
- - Neuropathie autonome ¬ Vessie *N31.2*
- - Syndrome du cortex frontal ¬ Vessie *N31.2*
- Flasque (périphérique), non classée ailleurs ¬ Vessie *N31.2*
- Non
- - Classé ailleurs ¬ Intestin *K59.2*
- - Inhibée, non classée ailleurs ¬ Vessie *N31.0*
- Non-réflexe ¬ Vessie *N31.2*
- Réflexe, non classée ailleurs ¬ Vessie *N31.1*
- SAI ¬ Dysfonctionnement de la vessie *N31.9*
- Syndrome de Shy-Drager] ¬ Hypotension orthostatique *G23.8*
- ¬
- - Atrophie osseuse tabique *A52.1†, M90.29**
- - Diabète insipide *E23.2*
- - Maladie de Sudeck [atrophie osseuse post-traumatique *G90.59*
- - Sarcome *C47.9*
- - Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension orthostatique *G23.8*

Neurogénique
- Type Kaeser ¬ Syndrome scapulo-péronier *G12.1*
- ¬ Arthrogrypose congénitale multiple *Q74.3*

Neurohépatopathie type Navajo ¬ *G31.81, K76.8*

Neurohypophysite infundibulaire ¬ *G04.9, E23.2*

Neuroleptiques
- Dérivés de la phénothiazine ¬ Intoxication: Psycholeptiques et *T43.3*
- Non précisés ¬ Intoxication: Psycholeptiques et *T43.5*
- Type butyrophénone et thioxanthène ¬ Intoxication: *T43.4*
- ¬
- - Intoxication aux *T43.5*
- - Syndrome malin des *G21.0*

Neurolipidose ¬ *E75.4*

Neurolipomatose ¬ *E88.29*

Neurologique
v./v.a. Complication neurologique
- Associé à PRUNE1 ¬ Syndrome *Q07.8*
- Cours
- - Syringobulbie ¬ Spondylopathie *G95.0†, M49.49**

Neurologique *–suite*
- Cours *–suite*
- - Syringomyélie ¬ Spondylopathie *G95.0†, M49.49**
- - Tabès ¬ Spondylopathie *A52.1†, M49.49**
- Cutané et articulaire infantile chronique] ¬ Syndrome CINCA [Syndrome *M35.8*
- Développement
- - Associé
- - - CTCF ¬ Trouble *Q87.8*
- - - PLAA ¬ Trouble *Q02*
- - - RERE ¬ Trouble *Q87.8*
- - - SYT1 ¬ Trouble *Q87.8*
- - Lié à SLC4A10 ¬ Trouble *Q04.8*
- - Malformations cérébrales-dysmorphie facial-brachydactylie ¬ Syndrome de trouble *Q87.0*
- - Mutation ponctuelle ¬ Syndrome de dysmorphie cranio-faciale-anomalies squelettiques-cardiopathie-trouble *Q87.0*
- - Sévère avec troubles de l'alimentation-mouvements stéréotypés des mains-cataracte bilatérale ¬ Trouble *G31.88*
- - ¬ Syndrome
- - - Dysmorphie cranio-faciale-anomalies squelettiques-cardiopathie-trouble *Q87.0*
- - - Oculogastrointestinal-trouble *Q87.8*
- Endocrine-pancréatique] ¬ IMNEPD [Maladie infantile multisystémique *Q87.8*
- Épilepsie-anomalies ophtalmiques-ostéopénie-atrophie cérébelleuse ¬ Retard du développement *E88.8*
- Létal infantile avec cataracte et atteinte cardiaque associé à ITPA ¬ Trouble *G40.4*
- Lié
- - GNAO1 ¬ Retard de développement *G93.4*
- - MYT1L, avec retard mental et obésité ¬ Retard de développement *G93.4*
- - RNU4-2 ¬ Retard de développement *Q87.8*
- Malformations cérébrales et dysmorphie faciale ¬ Retard de développement *Q04.8*
- Microcéphalie, arthrogrypose et anomalies structurelles du cerveau ¬ Trouble du développement *Q87.8*
- Ophthalmologiques ¬ Syndrome sévère de myélofibrose-pancytopénie-déficience intellectuelle-anomalies *Q87.8*
- Progressive ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypogammaglobulinémie-détérioration *Q87.8*
- ¬
- - Arthrite au cours d'une affection *G98†, M14.69**
- - Crétinisme endémique, de type *E00.0*
- - Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat *N31.81*
- - Maladie inflammatoire infantile de l'intestin avec atteinte *K52.8, G31.88*
- - Négligence *R29.5*
- - Spondylopathie *M49.4**
- - Syndrome

Neurologique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Hyperaldostéronisme primitif-épilepsie-anomalies *E26.0†, G99.8**
- - - Insuffisance thyroïdienne congénitale de type *E00.0*
- - - Piébaldisme-anomalies *Q87.8*
- - - Pili torti-retard de développement-anomalies *Q87.8*
- - Vessie instable sans substrat *N31.82*
- - Zona accompagné d'autres manifestations *B02.2†*

Neurolymphomatose
- Lors d'un lymphome non hodgkinien ¬ *C85.9†, G63.1**
- ¬ *C96.9†, G63.1**

Neurométabolique par déficit en sérine ¬ Maladie *E72.8*

Neuromusculaire
- Congénitale ¬ GSD type 4, forme *E74.0*
- Périnatal fatale ¬
- - Glycogénose
- - - Déficit en enzyme branchante, forme *E74.0*
- - - Type 4, forme *E74.0*
- - GSD
- - - Déficit en enzyme branchante, forme *E74.0*
- - - Type 4, forme *E74.0*
- Sans précision ¬ Affection *G70.9*
- Vessie, sans précision ¬ Dysfonctionnement *N31.9*
- ¬
- - Dysfonction vésicale d'origine *N31.88*
- - Glycogénose type 4
- - - Adulte, forme *E74.0*
- - - Enfant, forme *E74.0*
- - Scoliose *M41.4*

Neuromusculaires
- Précisées ¬ Autres affections *G70.8*
- Toxiques ¬ Affections *G70.1*
- ¬ Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants *T48.1*

Neuro-musculosquelettique type chypriote ¬ Syndrome *Q87.8*

Neuromyasthénie
- Épidémique ¬ *G93.30*
- Post-infectieuse ¬ *G93.30*
- ¬ *G93.39*

Neuromyélite optique
- Anticorps
- - Anti-AQP4 ¬ Trouble du spectre de la *G36.0*
- - Anti-MOG ¬ Trouble du spectre de la *G36.0*
- Sans anticorps anti-MOG et sans anticorps anti-AQP4 ¬ Trouble du spectre de la *G36.0*
- ¬ *G36.0*

Neuromyopathie
- Neuropathie paranéoplasiques ¬ *G13.0**
- Paranéoplasique ¬ *D48.9†, G13.0**

Neuromyotonie
- Acquise ¬ *G71.1*
- Hyperhidrose-polyneuropathie ¬ Syndrome d'encéphalite limbique- *G60.8*
- ¬ *G71.1*

Neuronal
- Adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents bloquants *T44.8*
- Adulte ¬ Céroïde-lipofuscinose *E75.4*
- Infantile tardive ¬ Céroïde-lipofuscinose *E75.4*
- Juvénile
- - Associée à ATP13A2 ¬ Céroïde-lipofuscinose *E75.4*
- - ¬ Céroïde-lipofuscinose *E75.4*
- Nodulaire ¬ Hétérotopie *Q04.8*
- Progressive de l'enfant avec maladie du foie ¬ Dégénérescence *G31.88*
- Type
- - 4 ¬
- - - Céroïde lipofuscinose *E75.4*
- - - Maladie CLN4 [Céroïde lipofuscinose *E75.4*
- - 4A ¬ Céroïde lipofuscinose *E75.4*
- - 11 ¬
- - - Céroïde lipofuscinose *E75.4*
- - - Maladie CLN11 [Céroïde lipofuscinose *E75.4*
- - 12 ¬
- - - Céroïde lipofuscinose *E75.4*
- - - Maladie CLN12 [Céroïde lipofuscinose *E75.4*
- - 13 ¬
- - - Céroïde lipofuscinose *E75.4*
- - - Maladie CLN13 [Céroïde lipofuscinose *E75.4*
- - 14 ¬
- - - Céroïde lipofuscinose *E75.4*
- - - Maladie CLN14 [Céroïde lipofuscinose *E75.4*
- Variante épilepsie nordique ¬ Céroïde-lipofuscinose *E75.4*
- ¬
- - Lipofuscinose
- - - *E75.4*
- - - Céroïdes *E75.4*
- - Maladie des inclusions intranucléaires *G31.88*
- - NCL [Céroïde-lipofuscinose *E75.4*

Neurone
- Moteur
- - Inférieur ¬ Paralysie faciale (parésie faciale) (faiblesse faciale) due à une lésion du *G51.0*
- - Supérieur ¬ Paralysie (parésie) (faiblesse) faciale due à une lésion du *G83.6*

Neurone *–suite*
- Moteur *–suite*
- - ¬
- - - Dégénérescence familiale du *G12.2*
- - - Maladies du *G12.2*
- Multinuclés-anhydramnios-dysplasie rénale-hypoplasie cérébelleuse-hydranencéphalie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Neuronite vestibulaire ¬ *H81.2*

Neuronopathie motrice et sensorielle à début facial] ¬ Syndrome FOSMN [*G60.0*

Neuronopathique subaiguë ¬ Maladie de Gaucher *E75.2*

Neurooculaire lié à PRR12 ¬ Syndrome *Q87.8*

Neuro-ophtalmologiques-épilepsie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de retard global de développement-anomalies *Q87.8*

Neuropathie
- Amyloïde autonome ¬ *E85.9†*, *G99.08**
- Aréflexie vestibulaire bilatérale] ¬ CANVAS [Syndrome d'ataxie cérébelleuse avec *G11.8*
- Ataxie héréditaire ¬ *G60.2*
- Ataxique sensorielle aiguë ¬ *G61.0*
- Auditive-atrophie optique] ¬ ANOA [Syndrome de *H90.5*, *H47.2*
- Autonome
- - Périphérique idiopathique
- - - Non précisée ¬ *G90.09*
- - - ¬ Autre *G90.08*
- - ¬
- - - Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une *N31.1*
- - - Vessie neurogène: due à une *N31.2*
- Axonal
- - Congénitale avec encéphalopathie ¬ *G60.0*, *G93.4*
- - Hypogonadisme hypogonadotrope ¬ Syndrome de Mœbius- *Q87.0*
- - Motrice
- - - Aiguë ¬ *G61.0*
- - - Distale avec myopathie myofibrillaire ¬ Syndrome autosomique dominant de *G71.2*
- - Sévère précoce par déficit en chaîne légère des neurofilaments ¬ *G60.0*
- - Type 1 ¬ Syndrome d'ataxie spinocérébelleuse- *G60.2*
- Axones géants ¬ *G60.8*
- Carcinomateuse ¬ *C80.9†*, *G13.0**
- Cours de carence en vitamine B12 ¬ *E53.8†*, *G63.4**
- Diabétique
- - Cœur ¬ *E14.40†*, *G99.08**
- - Diabète sucré de type 1 ¬ *E10.40†*, *G63.2**
- Héréditaire
- - Hypersensibilité à la pression ¬ *G60.0*
- - Motrice et sensorielle, types I-IV ¬ *G60.0*

Neuropathie *–suite*
- Héréditaire *–suite*
- - Petites fibres due à une canalopathie sodique ¬ *G60.8*
- - Sensitif autonomique
- - - Due à une mutation de TECPR2 ¬ *G60.8*
- - - Liée à l'X avec surdité ¬ *G60.8*, *H90.5*
- - - Type
- - - - 4] ¬ NHSA4 [*G60.8*
- - - - 9] ¬ NHSA9 [*G60.8*
- - Sensorielle et autonome avec paraplégie spastique ¬ *G60.8*, *G11.4*
- - Surdité, déficience intellectuelle et absence de fibres sensitives myélinisées de gros calibre ¬ *G60.0*
- - ¬ *G60.9*
- Héréditaires et idiopathiques ¬ Autres *G60.8*
- Hypertrophique de l'enfant ¬ *G60.0*
- Hypomyélinisante-arthrogrypose ¬ Syndrome de *G83.8*, *Q74.3*
- Idiopathique des petites fibres ¬ *G60.8*
- Motrice
- - Distale
- - - Héréditaire
- - - - Associée à COQ7 ¬ *G12.2*
- - - - Type
- - - - - 1 ¬ *G12.2*
- - - - - 2 ¬ *G12.2*
- - - - - 5 ¬ *G12.2*
- - - - - 7 ¬ *G12.2*
- - - - - Jerash ¬ *G12.2*
- - - Tardive ¬ Paralysie périodique avec *G72.3*
- - Héréditaire distale autosomique récessive type 8 ¬ *G12.2*
- - Multifocale ¬
- - - *G61.8*
- - - NMM [*G61.8*
- - ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie-dystonie- *E75.2*
- Nerf périphérique autonome
- - Cours
- - - Amylose ¬ *E85.4†*, *G99.08**
- - - Hyperthyroïdie ¬ *E05.9†*, *G99.08**
- - - Maladie
- - - - Endocrinienne NCA ¬ *E34.9†*, *G99.08**
- - - - Métabolique NCA ¬ *E88.9†*, *G99.08**
- - Diabète sucré ¬ *E14.40†*, *G99.08**
- - Goutte ¬ *M10.09†*, *G63.6**
- Non systémique due à une vascularite ¬ *G61.8*
- Optique
- - Héréditaire de Leber ¬ *H47.2*
- - Inflammatoire chronique récurrente] ¬ CRION [*H46*
- - Ischémique ¬ *H47.0*
- - Non ischémique ¬ *H46*
- Paranéoplasique ¬

Neuropathie *–suite*
- Paranéoplasique ¬ *–suite*
- - *D48.9†*, *G13.0**
- - Neuromyopathie et *G13.0**
- Périphérique
- - Débutant durant l'enfance ¬ Neurodégénérescence progressive associée à CLCN6 avec *G31.88*
- - Héréditaire ¬ *G60.9*
- - Leucodystrophie centrale dysmyélinisante-syndrome de Waardenburg-maladie de Hirschsprung] ¬ PCWH [Syndrome de *Q87.8*
- - Myopathie-raucité de la voix-surdité ¬ Syndrome de *G60.0*
- - Retard global de développement ¬ Syndrome d'atrophie optique-ataxie- *G31.81*
- - Type Fiskerstrand ¬ *G60.1*
- - ¬ Atrophy optique autosomique dominante avec *H47.2*
- Petites fibres due à une canalopathie sodique ¬ *G60.8*
- Poïkilodermie ¬ Syndrome de paraplégie spastique- *G11.4*
- Progressive idiopathique ¬ *G60.3*
- Radiculaire avec atteinte des disques intervertébraux ¬ *M51.1†*, *G55.1**
- SAI ¬ *G62.9*
- Sensitif héréditaire transmission
- - Dominante ¬ *G60.8*
- - Récessive ¬ *G60.8*
- Sensitivo-motrice
- - Axonal
- - - Aiguë ¬ *G61.0*
- - - Atrophie optique-neurodégénérescence à début infantile ¬ Syndrome de *G60.0*, *H47.2*
- - - Complexe ¬ Syndrome de microcéphalie- *G60.0*, *Q02*
- - - Héréditaire avec acrodystrophie ¬ *G60.0*
- - Héréditaire
- - - Hyperélasticité de la peau ¬ *G60.0*
- - - Type
- - - - 5 ¬ *G60.0*
- - - - III ¬ *G60.0*
- - - - Okinawa ¬ *G60.0*
- - - ¬ Syndrome de kératodermie palmoplantaire- *G60.0*, *Q82.8*
- - ¬ Syndrome de dysgénésie gonadique 46,XY avec *Q56.1*, *G60.0*
- Sensorielle et autonome héréditaire avec surdité neurosensorielle et retard général de développement ¬ *G60.8*, *H90.5*
- Sensorimotrice
- - Héréditaire] ¬ NSMH [*G60.0*
- - Périphérique ¬ Syndrome d'hypertrichose cervicale avec *G60.0*, *Q84.2*
- Sérique ¬ *G61.1*
- Thermosensible héréditaire ¬ *G60.0*
- Trouble de l'audition ¬ *G60.8*

Neuropathie *–suite*
- Urémique ¬ *N18.89†, G63.8**
- Viscérale-anomalies cérébrales-dysmorphie-retard du développement ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬
- - Diabète sucré
- - - *E14.40†, G63.2**
- - - Type 2 avec *E11.40†, G63.2**
- - Syndrome
- - - Cataracte congénitale-dysmorphie faciale- *Q87.8*
- - - Paraplégie spastique-atrophie optique- *G11.4*

Neuropathie-ataxie-rétinite pigmentaire ¬
- NARP [Syndrome de *G31.81*
- Syndrome de *G31.81*

Neuropathique
- Cours de syphilis ¬ Arthrite *A52.1†, M14.69**
- Diabète sucré ¬ Arthropathie *E14.60†, M14.69**
- Non syphilitique NCA ¬ Arthrite *G98†, M14.69**
- Sensorielle-dysarthrie-ophtalmoplégie ¬ Syndrome d'ataxie *G31.81, H49.4*
- Tabique ¬ Arthropathie *A52.1†, M14.69**
- ¬
- - Amylose hérédofamiliale
- - - *E85.1*
- - - Non *E85.0*
- - Arthropathie *M14.6**
- - Insensibilité congénitale à la douleur-anosmie-arthropathie *G60.8†, M14.69*, Q07.8*
- - Maladie de Charcot-Marie-Tooth intermédiaire autosomique dominante avec douleurs *G60.0*

Neuropsychiatrique
- Apparition aiguë associé à une infection à streptocoques du groupe A ¬ Syndrome *G25.88, B95.0!, F07.8*
- Auto-immune pédiatrique avec infection streptococcique du groupe A] ¬ PANDAS [Maladie *G25.88, B95.0!, F07.8*
- Pédiatrique à apparition aiguë] ¬ PANS [Syndrome *G25.88, F07.8*

Neurorécidive
- Syphilitique de la rétine ¬ *A52.1†, H36.8**
- ¬ Syphilis de l'oreille interne avec *A52.1†, H94.0**

Neurorétinite
- Idiopathique récurrente ¬ *H30.8*
- Subaiguë unilatérale diffuse ¬ *H30.0*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, H36.8**

Neurorétinopathie aiguë maculaire ¬ [AMNR] *H35.39*

Neurosarcoïdose ¬ *D86.8†, G99.8**

Neurosarcome ¬ *C47.9*

Neurosensoriel
- Aigüe brutale due à un traumatisme acoustique ¬ Perte auditive *H83.3*
- Aiguë due à une surdité brusque ¬ Perte auditive *H91.2*
- Bilatéral ¬ Déficit auditif *H90.3*
- Bilatérale ¬ Surdité *H90.3*
- Cardiomyopathie dilatée ¬ Surdité *H90.5, I42.0*
- Congénitale ¬ Albinisme oculaire avec surdité *E70.3*
- Déficience intellectuelle-amaurose congénitale de Leber ¬ Syndrome de dysplasie spondylo-épiphysaire-surdité *Q87.1*
- Dysmorphie ¬ Syndrome d'hypogonadisme hypogonadotrope-microcéphalie sévère-surdité *Q87.8*
- Dysplasie rhizomélique ¬ Syndrome autosomique dominant de myopie-retrusion du visage-surdité *Q87.0*
- Dystonie ¬ Syndrome de déficiences motrice et intellectuelle sévères-surdité *Q87.8*
- Épilepsie-tonus musculaire anormal ¬ Syndrome de microcéphalie-déficience intellectuelle-surdité *Q87.8*
- Grisonnement précoce-tremblement essentiel ¬ Syndrome de surdité *H90.5, G25.0*
- Liée X ¬ Surdité mixte transmission
- - *H90.3*
- - *H90.8*
- Malformations de la colonne vertébrale ¬ Syndrome de déficit congénital combiné en hormones hypophysaires, associé à une perte auditive *E23.0*
- Mitochondriale non syndromique avec sensibilité accrue aux aminoglycosides ¬ Surdité *H90.5*
- Non syndromique mitochondriale ¬ Surdité *H90.5*
- Postopératoire ¬ Perte auditive *H95.8*
- Progressive-cardiomyopathie hypertrophique ¬ Syndrome de surdité *H90.5, I42.2*
- Retard général de développement ¬ Neuropathie sensorielle et autonome héréditaire avec surdité *G60.8, H90.5*
- SAI ¬
- - Déficit auditif *H90.5*
- - Perte de l'audition *H90.5*
- Sans
- - Altération de l'audition de l'autre oreille ¬ Surdité unilatérale mixte de transmission et *H90.7*
- - Précision ¬ Surdité
- - - *H90.5*
- - - Mixte de transmission et *H90.8*
- Syndromique due à un déficit combiné de la phosphorylation oxydative ¬ Surdité *G31.81, H90.8*
- Tétraplégie spastique-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de surdité *Q87.8*

Neurosensoriel *–suite*
- Thrombocytopénie associé à DIAPH1 ¬ Syndrome de surdité *H90.5, D69.41*
- Unilatéral ¬ Déficit auditif *H90.4*
- Unilatérale sans altération de l'audition de l'autre oreille ¬ Surdité *H90.4*
- ¬
- - Retard de développement associé à SLC12A2 avec déficience intellectuelle et surdité *Q87.8*
- - Surdité bilatérale mixte de transmission et *H90.6*
- - Syndrome
- - - Ataxie cérébelleuse-aréflexie-pieds creux-atrophie optique-surdité *G11.8*
- - - Dysplasie ectodermique-surdité *Q82.8*
- - - Épidermolyse bulleuse-syndrome néphrotique-surdité *Q87.8*
- - - Myopie forte-surdité *H90.5*
- - - Néphrotique familial corticorésistant avec surdité *N04.1, H90.5*

Neuroserpine ¬ Encéphalopathie familiale à corps d'inclusion de *G31.88*

Neurostimulateur ¬ Adaptation et manipulation d'un *Z45.80*

Neurosyphilis
- Adhésive des méninges ¬ *A52.1†, G01**
- Anévrisme cérébral ¬ *A52.0†, I68.8**
- Arachnoïde ¬ *A52.1†, G01**
- Artérite cérébrale ¬ *A52.0†, I68.1**
- Ataxie cérébelleuse ¬ *A52.1†, G99.8**
- Atrophie optique ¬ *A52.1†, H48.0**
- Dure-mère ¬ *A52.1†, G01**
- Hémorragique ¬ *A52.3†, I68.1**
- Juvénile ¬ *A50.4*
- Leptoméninges ¬ *A52.1†, G01**
- Méningite aiguë ¬ *A52.1†, G01**
- Méningo-vasculaire ¬ *A52.1†, G01**
- Thrombose cérébrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- Vasculaire NCA ¬ *A52.0†, I68.8**
- ¬
- - Choriorétinite disséminée au cours de *A52.1†, H32.0**
- - Démence au cours de *A52.1†, F02.8**
- - Méningite au cours de *A52.1†, G01**

Neurosyphilitique ¬ Gomme *A52.3†, G07**

Neurotoxicité associée aux cellules à effecteur immun ¬ Syndrome de *G92.0*

Neurotrophique
- Trijumeau ¬ Syndrome *G50.8*
- ¬
- - Kératoconjonctivite: *H16.2*
- - Kératopathie *B00.5†, H19.1**

Neurovégétatif somatoforme
- Appareil
- - Digestif haut ¬ Dysfonctionnement *F45.31*
- - Uro-génital ¬ Dysfonctionnement *F45.34*
- Organe

Neurovégétatif somatoforme *–suite*
- Organe *–suite*
- - Système non précisé ¬ Dysfonctionnement *F45.39*
- - Systèmes ¬ Dysfonctionnement *F45.38*
- Plusieurs organes et systèmes ¬ Dysfonctionnement *F45.37*
- Système
- - Cardio-vasculaire ¬ Dysfonctionnement *F45.30*
- - Respiratoire ¬ Dysfonctionnement *F45.33*
- Voies digestives basses ¬ Dysfonctionnement *F45.32*

Neutropénie
v./v.a. cardiosquelettique-neutropénie
- Congénitale
- - Sévère
- - - Autosomique
- - - - Dominante ¬ *D70.0*
- - - - Récessive déficit
- - - - - CSF3R ¬ *D70.0*
- - - - - CXCR2 ¬ *D70.0*
- - - - - G6PC3 ¬ *D70.0*
- - - - - JAGN1 ¬ *D70.0*
- - - Déficit
- - - - G6PC3 ¬ *D70.0*
- - - - JAGN1 ¬ *D70.0*
- - - Retard du développement par déficit en SRP54 ¬ Syndrome de *D70.0*
- - ¬
- - - *D70.0*
- - - Agranulocytose et *D70.0*
- Cyclique ¬ *D70.5*
- Idiopathique de l'adulte ¬ *D70.6*
- Liée à l'X ¬ Myopathie cardioquelettique et *E71.1*
- Lors d'hypersplénisme ¬ *D70.6*
- Médicament
- - Non précisées ¬ Agranulocytose et *D70.19*
- - Phase critique
- - - 4 jours
- - - - 7 jours ¬ Agranulocytose et *D70.13*
- - - - ¬ Agranulocytose et *D70.10*
- - - 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et *D70.14*
- - SAI ¬ Agranulocytose et *D70.19*
- - ¬
- - - Agranulocytose et *D70.1*
- - - Formes évolutives d'agranulocytose et *D70.18*
- Mitochondriopathie ¬ Myopathie cardiosquelettique avec *E71.1*
- Néonatale
- - Allo-immune ¬ *P61.5*
- - Transitoire ¬ *P61.5*
- Périodique ¬ *D70.5*
- Phase critique

Neutropénie *–suite*
- Phase critique *–suite*
- - 10 à moins de 20 jours ¬ Agranulocytose et *D70.11*
- - 20 jours ou plus ¬ Agranulocytose et *D70.12*
- Sans précision ¬ *D70.7*
- Sévère congénitale liée à l'X ¬ *D70.0*
- Splénogène (primaire) ¬ *D70.6*
- Traitement ¬ Agranulocytose et *D70.1*
- ¬
- - *D70.6*
- - Anémie dysérythropoïétique liée à l'X avec plaquettes anormales et *D64.4, D70.0*
- - Poïkilodermie avec *Q82.8, D70.0*

Neutropénie-monocytopénie-surdité ¬ Syndrome de *D82.8*

Neutrophile
- Aiguë fébrile [Syndrome de Sweet] ¬ Dermatose *L98.2*
- Associé à CEBPE ¬ Syndrome de déficit immunitaire-auto-inflammation-anomalie des *M35.8*
- Associée à une prédisposition à la parodontite juvénile localisée ¬ Anomalie des granulocytes *D71*
- Atypique chronique-lipodystrophie-fièvre] ¬ Syndrome CANDLE [dermatose *M35.8*
- Déficit en MKL1 ¬ Déficit immunitaire combiné induit par des troubles de la motilité des *D81.8*
- Dirigés contre la myéloperoxydase ¬ Détection d'anticorps cytoplasmiques anti- *R76.88*
- Fébrile [Sweet] ¬ Dermatose *L98.2*
- ¬
- - Anomalies fonctionnelles des granulocytes *D71*
- - Glomérulonéphrite pauci-immune avec ANCA [Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires *N01.7*
- - Leucémie chronique à *D47.1*
- - Syndrome de déficit immunitaire *D71*

Neutrophilie héréditaire ¬ *D72.8*

NEVADA [nævus épidermique verruqueux avec angiodysplasie et anévrismes] ¬ Syndrome *Q87.8*

NEVIL [Nævus épidermique verruqueux inflammatoire linéaire ¬ *Q82.5*

Névralgie
- Amyotrophique ¬ *G54.5*
- Cervicale ¬ Atteinte des disques intervertébraux cervicaux avec *M50.8†, G55.1**
- Crânienne après herpès zoster ¬ *B02.2†, G53.0**
- Faciale paroxystique ¬ *G50.0*
- Fothergill ¬ *G50.0*
- Horton ¬ *G44.0*
- Mammaire de Cooper ¬ *N64.4*
- Migraineuse ¬ *G44.0*

Névralgie *–suite*
- Nerf
- - Glossopharyngien ¬ *G52.1*
- - Ophtalmique ¬ *G50.0*
- Névrite, sans précision ¬ *M79.2*
- Post-zostérienne du trijumeau ¬ *B02.2†, G53.0**
- Quintus ¬ *G50.0*
- Trigéminée post-herpétique ¬ *B02.2†, G53.0**
- Trijumeau ¬ *G50.0*
- ¬
- - *O26.83*
- - Diabète sucré type
- - - 1 avec *E10.40†, G63.2**
- - - 2 avec *E11.40†, G63.2**
- - Herpès zoster avec *B02.2†, G53.0**
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, M79.29*

Névralgique
- Épaule] ¬ Syndrome de Parsonage-Turner [Amyotrophie *G54.5*
- Unilatérale brève avec injection conjonctivale ¬ Céphalée *G44.8*

Névrite
- Acoustique
- - Cours de la syphilis ¬ *A52.1†, H94.0**
- - Inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H94.0**
- Amyloïde ¬ *E85.4†, G63.3**
- Cours d'une hernie du noyau gélatineux ¬ *M51.1†, G55.1**
- Diphtérique ¬ *A36.8†, G59.8**
- Due
- - Atteinte des disques intervertébraux ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Déplacement de disque intervertébral ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Hernie discale ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Rupture discale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Endémique ¬ *E51.1†, G63.4**
- Ganglion géniculé zostérien ¬ *B02.2†, G53.0**
- Gombault ¬ *G60.0*
- Goutteuse ¬ *M10.09†, G63.6**
- Intercostale ¬ *G58.0*
- Nerf
- - Brachial due au déplacement de disque intervertébral ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Sciatique due au déplacement de disque intervertébral ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Vestibulo-cochléaire cours maladie
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, H94.0**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, H94.0**
- Nerf auditif cours maladie
- - Infectieuse NCA ¬ *B99†, H94.0**
- - Parasitaire NCA ¬ *B89†, H94.0**
- Optique

Névrite *–suite*
- Optique *–suite*
- - Isolée
- - - Anticorps anti-MOG ¬ *H46*
- - - Sans anticorps anti-MOG ¬ *H46*
- - ¬
- - - *H46*
- - - Démyélinisation au cours d'une *G36.0*
- Périphérique pendant la grossesse ¬ *O26.83*
- Plexus brachial
- - Due au déplacement de disque intervertébral ¬ *M50.1†, G55.1**
- - ¬ *G54.5*
- Radiculite
- - Brachiale SAI ¬ *M54.1*
- - Dorsale SAI ¬ *M54.1*
- - Lombaire SAI ¬ *M54.1*
- - Lombo-sacrée SAI ¬ *M54.1*
- Rétrobulbaire
- - Cours
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *H48.1**
- - - Sclérose en plaques ¬ *G35.9†, H48.1**
- - Méningocoques ¬ *A39.8†, H48.1**
- - SAI ¬ *H46*
- - Syphilitique
- - - Tardive ¬ *A52.1†, H48.1**
- - - ¬ *A52.1†, H48.1**
- Sans précision ¬ Névralgie et *M79.2*
- Scapulaire ¬ *G54.5*
- Syphilitique
- - Nerf crânien VIII ¬ *A52.1†, H94.0**
- - Nerf vestibulocochléaire ¬ *A52.1†, H94.0**
- - Tardive du nerf vestibulocochléaire ¬ *A52.1†, H94.0**
- - ¬ *A52.1†, G59.8**
- Zoster ¬ *B02.2†, G53.0**
- ¬
- - Dégénérescence des disques
- - - *M51.1†, G55.1**
- - - Intervertébraux cervicaux avec *M50.1†, G55.1**
- - Diabète sucré type
- - - 1 avec *E10.40†, G63.2**
- - - 2 avec *E11.40†, G63.2**
- - Hernie cervicale du noyau gélatineux avec *M50.1†, G55.1**
- - Hernie cervico-thoracique du noyau gélatineux avec *M50.1†, G55.1**
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, M79.29*

Névrodermite
- Atopique ¬ *L20.8*
- Circonscrite ¬ *L28.0*
- Diffuse ¬ *L20.8*

Névrome
- Interdigital membre
- - Inférieur ¬ *G57.8*
- - Supérieur ¬ *G56.8*

Névrome *–suite*
- Sur moignon d'amputation ¬ *T87.3*

Névrose
- Anankastique ¬ *F42*
- Anxieuse ¬ *F41.1*
- Caractère SAI ¬ *F60.9*
- Cardiaque ¬ *F45.3*
- Compensation ¬ *F68.0*
- Dépressive ¬ *F34.1*
- Gastrique ¬ *F45.3*
- Hypocondriaque ¬ *F45.2*
- Laryngée hystérique ¬ *F44.4*
- Obsessionnelle-compulsive ¬ *F42*
- Professionnelle, y compris crampe de l'écrivain ¬ *F48.8*
- Psychasthénique ¬ *F48.8*
- SAI ¬ *F48.9*
- Sociale ¬ *F40.1*
- Traumatique ¬ *F43.1*

Névrotique
- Précisés ¬ Autres troubles *F48.8*
- Sans précision ¬ Trouble *F48.9*
- ¬
- - Dépression: *F34.1*
- - Excoriation *L98.1*

Newcastle ¬ Conjonctivite à virus de la maladie de *B30.8†, H13.1**

Newcomer
v./v.a. Dahlberg-Borer-Newcomer

Nez
- Bifide
- - Anomalies
- - - Extrémités ¬ Syndrome de trigonocéphalie- *Q87.0*
- - - Membres supérieurs ¬ Syndrome de dysplasie fronto-nasale- *Q87.0*
- - ¬ *Q30.2*
- Cloison
- - Nasal ¬
- - - Nécrose du *J34.0*
- - - Phlegmon du *J34.0*
- - - Ulcération du *J34.0*
- - ¬ *T20*
- Double ¬ *Q30.8*
- Orifice nasal ¬ Plaie ouverte du *S01.22*
- Partie non précisée ¬ Plaie ouverte du *S01.20*
- Parties ou parties multiples du nez ¬ Plaie ouverte du *S01.29*
- Peau externe du nez ¬ Plaie ouverte du *S01.21*
- Plus ¬ Syndrome EVEN [dysplasie épiphysaire-vertébrale-oreilles- *Q87.8*
- SAI ¬
- - *C76.0*
- - *D36.7*
- - *T17.1*
- - Lésion traumatique de: *S09.9*

Nez *–suite*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale du *Q30.9*
- Selle attribuable à la syphilis ¬ *A50.5*
- Septum nasal ¬ Plaie ouverte du *S01.23*
- Sinus nez ¬
- - Kyste et mucocèle du *J34.1*
- - Maladies précisées du *J34.8*
- Surnuméraire ¬ *Q30.8*
- ¬
- - *Z90.0*
- - Abcès, furoncle et anthrax du *J34.0*
- - Absence congénitale du *Q30.1*
- - Agénésie du *Q30.1*
- - Blessure superficielle du *S00.3*
- - Carie tuberculeuse du *A18.0†, M90.08**
- - Cartilage
- - - *C30.0*
- - - *D14.0*
- - - *D38.5*
- - Déformation
- - - Acquise du *M95.0*
- - - Syphilitique tardive du *A52.7†, J99.8**
- - Dysplasie sus-apicale médiane du *Q18.8*
- - Écrasement ou déviation congénital(e) du *Q67.4*
- - Fistule du dos du *Q18.8*
- - Fracture
- - - Os du *S02.2*
- - - Ouverte des os du *S02.2, S01.87!*
- - Gomme du *A52.7†, J99.8**
- - Hémorragie du *R04.0*
- - Hypertrophie des cornets du *J34.3*
- - Hypoplasie du *Q30.1*
- - Kyste
- - - Embouchure du *K09.1*
- - - Mucocèle du nez et des sinus du *J34.1*
- - Luxation de la cloison du *S03.1*
- - Maladies précisées du nez et des sinus du *J34.8*
- - Malformations congénitales du *Q30.8*
- - Mettre les doigts dans le *F98.88*
- - Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre supérieure et le *C44.0*
- - Perforation syphilitique du *A52.7†, J99.8**
- - Plaie ouverte nez
- - - Parties ou parties multiples du *S01.29*
- - - Peau externe du *S01.21*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire de l'intérieur du *C30.0*
- - Saignement de *R04.0*
- - Syphilis du *A52.7†, J99.8**
- - Syphilis tardive du *A52.7†, J99.8**
- - Trichofolliculome de la peau du *D23.3*

Nézelof ¬ Syndrome de *D81.4*

NF1 ¬ Neurofibromatose type 1 par mutation ou délétion intragénique de *Q85.0*

NF3 [Neurofibromatose type 3] ¬ *Q85.0*

NFAT [facteur nucléaire des lymphocytes T activés]-5 ¬ Haploinsuffisance de *D84.8*

NF-Kappa-B-inducing kinase] ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en NIK [*D81.8*

NFPA [Adénome hypophysaire non fonctionnel] ¬ *D35.2*

NFS1-ISD11 ¬ Acidose lactique néonatale sévère par déficit en complexe *E87.2*

NGLY1 ¬ Anomalie congénitale de la biosynthèse des glycoprotéines induite par déficience *E77.8*

N-glycosylation des protéines ¬ Trouble de la *E77.8*

NHSA4 [Neuropathie héréditaire sensitive et autonomique type 4] ¬ *G60.8*

NHSA9 [Neuropathie héréditaire sensitive et autonomique de type 9] ¬ *G60.8*

NIC stade

- I ¬ Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [*N87.0*
- II ¬ Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [*N87.1*
- III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [*D06*

NICH [Hémangiome congénital non involutif] ¬ *D18.00*

Nickel ¬ *L23.0*

Nicolaides-Baraitser ¬ Syndrome de *Q87.8*

Nicolas-Favre ¬ Maladie de (Durand-) *A55*

Nicolau ¬ Syndrome de *T80.1*

Nicotine ¬ Effet toxique: Tabac et *T65.2*

Nicotinique

- Dérivés) ¬ Acide *T46.7*
- Palais ¬ Leucokératose *K13.2*
- Pellagre] ¬ Carence en acide *E52*
- Tryptophane) ¬ Carence en: acide *E52*
- ¬ Démence au cours de carence en acide *E52†, F02.8**

Nid vide ¬ Syndrome du *Z60*

Nielsen
v./v.a. Gamborg-Nielsen
v./v.a. Lange-Nielsen

Niemann Pick ¬ Splénomégalie de *E75.2*

Niemann-Pick

- Type A/B ¬ Maladie de *E75.2*
- ¬ Dégénérescence cérébrale au cours de maladie de *E75.2†, G32.8**

Nievergelt ¬ Dysplasie mésomélique type *Q78.8*

Nigra ¬

- Microsporosis *B36.1*
- Pityriasis *B36.1*
- Tinea *B36.1*

Nigricans

- Cheveux anormaux ¬ Syndrome de leuconychie totale-lésions de type acanthosis *Q84.4, L83*
- Palmaris ¬ Keratomycosis *B36.1*

Nigricans *–suite*

- Résistance à l'insuline-crampes-hypertrophie acrale ¬ Syndrome d'acanthosis *Q87.8*
- ¬
- - Acanthosis *L83*
- - Syndrome d'achondroplasie sévère-retard de développement-acanthosis *Q77.4*

Niikawa-Kuroki ¬ Syndrome de *Q87.5*

Nijmegen

- Breakage ¬ Syndrome *Q87.8*
- ¬ Maladie apparentée au syndrome de *Q87.8*

NIK [NF-Kappa-B-inducing kinase] ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Nikolic
v./v.a. Levic-Stefanovic-Nikolic

Nile

- Occidental ¬ Fièvre du *A92.3*
- ¬ Fièvre due au virus West- *A92.3*

NIP

- Haut grade] ¬ Néoplasie intraépithéliale de haut grade de la prostate [*D07.5*
- Stade
- - I ¬ Néoplasie intra-épithéliale de la prostate (*N42.3*
- - II ¬ Néoplasie intra-épithéliale de la prostate (*N42.3*

Nipah ¬ Maladie à virus *A85.8*

NISCH [Syndrome néonatal d'ichtyose-cholangite sclérosante] ¬ *K83.00, Q80.8*

Nishimura ¬ Dysplasie spondylo-épiphysaire type *Q77.7*

Nitidus ¬ Lichen *L44.1*

Nitrile ¬ Intoxications au *T65.0*

Nitriques ¬ Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters *T65.5*

Nitroaminés du benzène et de ses homologues ¬ Effet toxique: Dérivés aminés et *T65.3*

Nitrobenzène ¬ *T65.3*

Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques ¬ Effet toxique: *T65.5*

NIV stade

- I ¬ Néoplasie intraépithéliale de la vulve [*N90.0*
- II ¬ Néoplasie intraépithéliale de la vulve [*N90.1*
- III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale de la vulve [*D07.1*

NIVA stade

- I ¬ Néoplasie intraépithéliale du vagin [*N89.0*
- II ¬ Néoplasie intraépithéliale du vagin [*N89.1*
- III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale du vagin [*D07.2*

Njovera ¬ *A65*

NKAP ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie facial-habitus marfanoïde-scoliose associé à *Q87.0*

NKX6-2 ¬ Leucodystrophie hypomyélinisante autosomique récessive associée à *E75.2*

NLRC4 ¬ Syndrome d'activation des macrophages associé à *M35.8*

NLSDM [Lipidose avec surcharge en triglycérides avec myopathie] ¬ *E75.5†, G73.6**

NMC ¬ *C80.9*

NMDA [N-méthyl-D-aspartate] ¬ Encéphalite limbique paranéoplasique avec anticorps anti-récepteur *G04.8, C80.9*

N-méthyl-D-aspartate ¬

- Encéphalite limbique
- - Anticorps anti-récepteur *G04.8*
- - Paranéoplasique avec anticorps anti-récepteur NMDA [*G04.8, C80.9*
- Encéphalite post-infectieuse à anticorps anti-NMDAr [*G04.8*

NMM [neuropathie motrice multifocale] ¬ *G61.8*

Nocardia

- Résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ Mycobactéries atypiques ou *U82.2!*
- ¬ Infection à *A43.9*

Nocardiose

- Cutanée ¬ *A43.1*
- Poumon ¬ *A43.0†, J99.8**
- Pulmonaire ¬ *A43.0*
- ¬
- - *A43.9*
- - Formes de *A43.8*
- - Pneumonie au cours de *A43.0†, J17.0**

NOCARH [cytopénie-auto-inflammation-éruption cutanée-épisodes de lymphohistiocytose hémophagocytaire à début néonatal] ¬ Syndrome *D76.1*

NOCGUS [Syndrome neuro-oculo-cardio-génito-urinaire] ¬ *Q87.8*

Nocif
v./v.a. Usage nocif

- Absorbée par le biais d'aliment, sans précision ¬ Effet toxique: Substance *T62.9*
- Maternel, sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un effet *P04.9*
- Maternels ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets *P04.8*
- Précisées absorbées par le biais d'aliments ¬ Effet toxique: Autres substances *T62.8*

Nocturne

- Ainsi que diurne ¬ Énurésie *F98.02*
- Anomalies squelettiques-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de cécité *Q87.8*
- Autosomique dominante] ¬ ADNFLE [Épilepsie frontale à crises *G40.1*
- Bénigne de l'enfance ¬ Hémiplégie alternante *G81.9*
- Fréquente ¬ Miction *R35.2*
- Paroxystique ¬ Hémoglobinurie *D59.5*
- Stationnaire congénitale ¬ Cécité *H53.6*
- ¬

Nocturne *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Cécité *H53.6*
- - Dysplasie chondroectodermique avec cécité *Q77.6*
- - Énurésie *F98.00*
- - Hémoglobinurie
- - - *D59.5*
- - - Paroxystique *D59.5*
- - Polyurie *R35.2*
- - Sueurs *R61.9*
- - Terreurs *F51.4*

Nodal
- Auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (*I47.1*
- Zone marginale ¬ Lymphome *C83.0*
- ¬
- - Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- - Trouble du rythme (du): *I49.8*

Nodosa ¬
- Artérite *M30.0*
- Ophtalmia *H16.2*

Nodosités
- Bouchard (avec arthropathie) ¬ *M15.2*
- Heberden (avec arthropathie) ¬ *M15.1*
- PLACK] ¬ Syndrome de peau déciduale-leuconychie-kératose acrale ponctuée-chéilite- *Q84.8*

Nodulaire
v./v.a. Lymphome nodulaire
- Chronique de l'hélix ¬ Chondrodermite *H61.0*
- Focale
- - Télangiectasique du foie ¬ Hyperplasie *D13.4*
- - ¬ Hyperplasie hépatique *K76.8*
- Foyer ¬ Maladie toxique du foie avec: hyperplasie *K71.88*
- Hyde ¬ Prurigo *L28.1*
- Lié à une carence en iode ¬ Goitre *E01.1*
- Non toxique) SAI ¬ Goitre: *E04.9*
- Périventriculaire ¬ Hétérotopie *Q04.8*
- Pigmentée primaire ¬ Maladie adrénocorticale *E24.8*
- Pulmonaire ¬ Hyperplasie lymphoïde *J84.80*
- Régénérative du foie ¬ Hyperplasie *K76.8*
- Riche en lymphocytes ¬ Lymphome de Hodgkin *C81.4*
- SAI ¬ Lymphome, *C82.9*
- Sous-corticale ¬ Hétérotopie *Q04.8*
- Sous-épendymaire ¬ Hétérotopie *Q04.8*
- Toxique SAI ¬ Goitre *E05.2*
- Tubéreuse) ¬ Cordite (fibrineuse) (*J38.2*
- Ulcéré) ¬ Pian tardif *A66.4*
- ¬
- - Amylose cutanée *E85.4†, L99.0**
- - Fasciite *M72.4*

Nodulaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hétérotopie neuronale *Q04.8*
- - Histiocytose progressive *D76.3*
- - Lésion tendineuse *M65.3*
- - Lichen myxœdémateux *L98.5*
- - Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose *C81.1*
- - Paragranulome *C81.0*
- - Réticulolymphosarcome *C82.9*
- - Réticulosarcome *C96.9*
- - Urticaire pigmentaire *Q82.2*

Nodularité extensive ¬ Médulloblastome à *C71.6*

Nodule
- Actinomycosique ¬ *A42.9*
- Chanteur ¬ *J38.2*
- Colloïde (kystique) (thyroïdien) ¬ *E04.1*
- Congénital médian de la lèvre supérieure ¬ *Q38.0*
- Cordes vocales ¬ *J38.2*
- Juxta-articulaire au cours de syphilis ¬ *A52.7†, M14.89**
- Juxta-articulaires pianiques ¬ *A66.7*
- Laryngés ¬ *J38.2*
- Nécrotique solitaire du foie ¬ *K76.8*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*
- Pulmonaire SAI ¬ *R91*
- Rhumatoïde ¬ *M06.3*
- S) mammaire(s) SAI ¬ *N63*
- Schmorl ¬ *M51.4*
- Sous-cutanés (localisés) (superficiels) ¬ *R22*
- Thyroïdien
- - Ectopiques ¬ Thyréotoxicose due à des *E05.3*
- - Kystique) SAI ¬ *E04.1*
- - Simple non toxique ¬ *E04.1*
- Trayeurs] ¬ Pseudovaccine [*B08.0*
- Verocay dans le neurinome ¬ *D36.1*

Noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des structures *E88.21*

Nodulose-arthropathie] ¬ Spectre MONA [ostéolyse multicentrique- *Q87.5*

Noël ¬ Cataracte en sapin de *G71.1†, H28.2**

Nœud
- Atrio-ventriculaire ¬ Arythmie du *I49.8*
- Cordon ¬ *O69.2*
- Cordon ombilical ¬ *P02.5*
- Sinusal
- - Forme familiale ¬ Maladie du *I49.5*
- - ¬ Syndrome de dysfonctionnement sinusal [maladie du *I49.5*
- Syphilitique à proximité de l'articulation ¬ *A52.7†, M14.89**

Noir
- Piedra nigra] ¬ Piedra *B36.3*
- Villeuse ¬ Langue
- - *K14.3*
- - *K14.3*
- ¬
- - Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*
- - Dermatose papuleuse *L82*
- - Œil au beurre *S00.1*

Noix ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*

Noma ¬ *A69.0*

Nombre
- Chromosomes X ¬ Mosaïque chromosomique, lignées avec divers *Q97.2*
- Faible
- - Cellules B et T ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec *D81.1*
- - Normal de cellules B ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec *D81.2*
- Fonction des lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du *D83.0*
- Lymphocytes T auxiliaire
- - CD4+) non précisé ¬ *U61.9!*
- - Maladie due VIH Catégorie
- - - 1 ¬ *U61.1!*
- - - 2 ¬ *U61.2!*
- - - 3 ¬ *U61.3!*
- Ostia coronaires ¬ Anomalie de *Q24.5*
- Réduit lymphocytes
- - CD4 ¬ *R72*
- - CD8 ¬ *R72*
- ¬ Maladie du virus Sin *B33.4†, J17.1**

Nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop *Z76.2*

NOMID [Neonatal-onset multisystem inflammatory disease] ¬ *M35.8*

Non hodgkinien
- Angio-immunoblastique ¬ Lymphome *C86.5*
- Diffus non folliculaire ¬ Lymphome *C83.9*
- Grandes cellules ¬ Lymphome *C85.9*
- Indifférencié ¬ Lymphome *C83.9*
- Petites cellules clivées ¬ Lymphome folliculaire *C82.9*
- ¬
- - Lymphome centroblastique *C83.3*
- - Lymphome immunoblastique *C83.3*

Non magnétique
v./v.a. Type de maladie

Non traumatique
v./v.a. Type de maladie

Nonaka ¬ Myopathie distale type *G71.8*

Non-Burkitt, indifférencié ¬ Lymphome de type *C83.3*

Non-compaction
- Ventriculaire gauche

Non-compaction *–suite*
- Ventriculaire gauche *–suite*
- - Convulsions-hypotonie-cataracte-retard de développement ¬ Syndrome létal de *G31.81*
- - ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-macrocéphalie- *Q87.0*
- Ventricule gauche associé à des crises d'épilepsie, une hypotonie, une cataracte et un retard de développement ¬ Syndrome létal de cardiomyopathie par *G31.81*

Non-disjonction
- Méïotique ¬
- - Monosomie d'un chromosome entier, *Q93.0*
- - Trisomie
- - - 13, *Q91.4*
- - - 18, *Q91.0*
- - - 21, *Q90.0*
- - - Chromosome entier, *Q92.0*
- Mitotique ¬
- - Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (*Q93.1*
- - Trisomie
- - - 13 mosaïque chromosomique
- - - - *Q91.5*
- - - - *Q91.5*
- - - 18 mosaïque chromosomique
- - - - *Q91.1*
- - - - *Q91.1*
- - - 21, mosaïque chromosomique (*Q90.1*
- - - Chromosome entier mosaïque chromosomique
- - - - *Q92.1*
- - - - *Q92.1*

Non-engagement de la tête ¬ *O32.4*

Non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres *U81.6!*

Non-Herlitz
- JEB-nH] ¬ Épidermolyse bulleuse jonctionnelle type *Q81.8*
- Localisé] ¬ EBJ-nH loc [Épidermolyse bulleuse jonctionnelle type *Q81.8*

Non-implantation de l'œuf ¬ *N97.2*

Noninsulinome ¬ Hypoglycémie hyperinsulinémique persistante de l'adulte *E16.1*

Nonne-Milroy ¬ Lymphœdème de *Q82.09*

Non-observance d'un traitement médical et d'un régime ¬ Antécédents personnels de *Z91.1*

Non-réflexe ¬ Vessie neurogène: *N31.2*

Non-tuberculeuses ¬ Infection pulmonaire à mycobactéries *A31.0*

Noonan
v./v.a. Saldino-Noonan
- ¬
- - Neurofibromatose-syndrome de *Q87.1*

Noonan *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome de *Q87.1*

Noonan-like
- Cheveux anagènes caducs ¬ Syndrome *Q87.1*
- Leucémie myélomonocytaire juvénile ¬ Syndrome *Q87.0, C93.30*

Noradrénaline ¬ Déficit en *G90.88*

Norbury
v./v.a. Woods-Black-Norbury

Normal
- Hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque *D80.6*
- ¬
- - Anhidrose isolée généralisée avec glandes sudoripares *L74.4*
- - Thrombocytopénie héréditaire avec plaquettes *D69.41*

Norman-Landing ¬ Maladie de *E75.1*

Norman-Roberts ¬ Lissencéphalie type *Q04.3*

Normocalcémie ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec normocalciurie et *E83.4*

Normocalciurie et normocalcémie ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec *E83.4*

Normokaliémique
- Familiale ¬ Paralysie périodique *G72.3*
- ¬ Paralysie périodique
- - *G72.3*
- - Familiale): *G72.3*

Normomorphique ¬ Sialidose *E77.1*

Normophosphatémique familiale ¬ Calcinose tumorale *E83.38*

Norovirus ¬
- Entérite à *A08.1*
- Gastroentérite aiguë à *A08.1*

Norrbotten ¬ Kératodermie palmoplantaire diffuse autosomique dominante type *Q82.8*

Norrie
- Atypique due à une microdélétion Xp11.3 ¬ Maladie de *Q15.8*
- ¬ Maladie de *Q15.8*

North
v./v.a. Compton-North

Norum ¬ Maladie de *E78.6*

Nosocomial ¬
- Choc septique
- - *R57.2, U69.84!*
- - Non *R57.2, U69.83!*
- Septicémie
- - *A41.9, U69.81!*
- - Non *A41.9, U69.80!*

Nosophobie ¬ *F45.2*

NOTCH2 ¬ Dysplasie artério-hépatique due à une mutation ponctuelle de *Q44.7*

Nothnagel] ¬ Acroparesthésie: vasomotrice [type *I73.8*

Notochorde ¬ Syndrome d'agénésie sacrée-ossification anormale des corps vertébraux-persistance de la *Q79.8*

Noueux
- PAN] ¬ Polyartérite *M30.0*
- ¬
- - Affections apparentées à la périartérite *M30.8*
- - Arthropathie au cours d'érythème *L52†, M14.89**
- - Démence au cours de périartérite *M30.0†, F02.8**
- - Érythème *L52*
- - Glomérulonéphrite au cours de périartérite *M30.0†, N08.5**
- - Maladie glomérulaire au cours de périartérite *M30.0†, N08.5**
- - Myopathie au cours de périartérite *M30.0†, G73.7**
- - Périartérite *M30.0*
- - Polyneuropathie au cours de périartérite *M30.0†, G63.5**
- - Trichorrhexie *L67.0*

Nourrisson
v./v.a. Fœtus
v./v.a. Nouveau-né
- Âge ¬ Mort subite
- - *R96.0*
- - Inexpliquée (mort subite du *R96.0*
- Avant âge ¬ Mort subite
- - *R95.9*
- - Inexpliquée (mort subite du *R95*
- Crise
- - Complexes focales ¬ Épilepsie bénigne du *G40.08*
- - Généralisées secondaires ¬ Épilepsie partielle bénigne du *G40.1*
- Dysgénésie des testicules ¬ Syndrome de mort subite du *R95.9, Q55.2*
- Enfant
- - Bonne santé ¬ Surveillance médicale et soins médicaux d'autres *Z76.2*
- - ¬
- - - Pica du *F98.3*
- - - Surveillance de la croissance du *Z00.1*
- Exacerbation aiguë ¬ Hyperplasie des cellules neuroendocrines du *J84.81*
- Exsiccose ¬ Gastroentérite du *A09.9, E86*
- Irritable ¬ *R68.1*
- Mention d'autopsie ¬ Syndrome de la mort subite du *R95.0*
- SAI ¬ Syndrome de la mort subite du *R95.9*
- Sans mention
- - Autopsie ¬ Syndrome de la mort subite du *R95.9*
- - Exacerbation aiguë ¬ Hyperplasie des cellules neuroendocrines du *J84.80*
- Watanabe] ¬ Épilepsie bénigne du *G40.08*
- ¬

Nourrisson *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dermatite exfoliatrice staphylococcique du *L00.0*
- - Dermite fessière du *L22*
- - Épilepsie partielle migrante maligne du *G40.4*
- - Érythème annulaire du *L53.3*
- - Érythroblastopénie
- - - *D61.0*
- - - Pure) (du): *D61.0*
- - Événement aigu constituant un risque vital chez le *R06.80*
- - Hypertriglycéridémie transitoire et stéatose hépatique du *E78.1, K76.0*
- - Hypogammaglobulinémie transitoire du *D80.7*
- - Maladie due au VIH avec retard de développement chez le *B22, P05.9*
- - Pleurs excessifs du *R68.1*
- - Quasi-syndrome de mort subite du *R06.80*
- - RDS [Respiratory distress syndrome] du *P22.0*
- - Respiratory distress syndrom du *P22.0*
- - Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les *R75*
- - Symptômes non spécifiques propres au *R68.1*
- - Syndrome
- - - Détresse respiratoire du *P22.0*
- - - Mort subite du *R95.9*

Nourriture
- Boisson
- - Suite de négligence de soi ¬ Prise insuffisante de *R63.6*
- - ¬ Prise insuffisante de *R63.6*
- Brûlante ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- ¬
- - Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de *R13.0*
- - Privation de *T73.0*

Nouveau-né
- Affecté
- - Anhydramnios ¬ *P01.2*
- - Hépatite aiguë de la mère ¬ *P00.2*
- - Infection
- - - Appareil génital de la mère et autres infections localisées ¬ Fœtus ou *P00.8*
- - - COVID-19 de la mère ¬ *P00.2*
- - Lupus érythémateux disséminé de la mère ¬ Fœtus ou *P00.8*
- - Maladie à virus Zika contractée par la mère ¬ *P00.2*
- - Malformation du placenta ¬ *P02.2*
- - Radiologie chez la mère ¬ Fœtus ou *P00.7*
- - Salpingo-oophorite de la mère pendant la grossesse ¬ *P00.8*
- Affectés
- - Accouchement

Nouveau-né *–suite*
- Affectés *–suite*
- - Accouchement *–suite*
- - - Césarienne ¬ Fœtus et *P03.4*
- - - Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et *P03.3*
- - - Extraction par le siège ¬ Fœtus et *P03.0*
- - - Forceps ¬ Fœtus et *P03.2*
- - - Précipité ¬ Fœtus et *P03.5*
- - Affection maternelle, sans précision ¬ Fœtus et *P00.9*
- - Affections
- - - Cordon ombilical, autres et sans précision ¬ Fœtus et *P02.6*
- - - Maternelles ¬ Fœtus et *P00.8*
- - Alcoolisme de la mère ¬ Fœtus et *P04.3*
- - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et *P04.0*
- - Anomalie des membranes, sans précision ¬ Fœtus et *P02.9*
- - Anomalies
- - - Membranes ¬ Fœtus et *P02.8*
- - - Morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision ¬ Fœtus et *P02.2*
- - Béance du col ¬ Fœtus et *P01.0*
- - Chorio-amniotite ¬ Fœtus et *P02.7*
- - Complication
- - - Précisées du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et *P03.8*
- - - Travail et de l'accouchement, sans précision ¬ Fœtus et *P03.9*
- - Complication de la grossesse mère
- - - Sans précision ¬ Fœtus et *P01.9*
- - - ¬ Fœtus et *P01.8*
- - Contractions anormales de l'utérus ¬ Fœtus et *P03.6*
- - Effet nocif maternel, sans précision ¬ Fœtus et *P04.9*
- - Effets nocifs maternels ¬ Fœtus et *P04.8*
- - Exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ Fœtus et *P04.6*
- - Formes
- - - Compression du cordon ombilical ¬ Fœtus et *P02.5*
- - - Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ Fœtus et *P02.1*
- - Grossesse extra-utérine ¬ Fœtus et *P01.4*
- - Grossesse multiple ¬ Fœtus et *P01.5*
- - Hydramnios ¬ Fœtus et *P01.3*
- - Intervention
- - - Chirurgicale chez la mère ¬ Fœtus et *P00.6*
- - - Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et *P00.7*
- - Maladies
- - - Circulatoires et respiratoires de la mère ¬ Fœtus et *P00.3*

Nouveau-né *–suite*
- Affectés *–suite*
- - Maladies *–suite*
- - - Infectieuses et parasitaires de la mère ¬ Fœtus et *P00.2*
- - - Rénales et des voies urinaires de la mère ¬ Fœtus et *P00.1*
- - Médicaments absorbés par la mère ¬ Fœtus et *P04.1*
- - Mort de la mère ¬ Fœtus et *P01.6*
- - Oligoamnios ¬ Fœtus et *P01.2*
- - Placenta praevia ¬ Fœtus et *P02.0*
- - Présentation
- - - Anormale avant le travail ¬ Fœtus et *P01.7*
- - - Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et *P03.1*
- - Procidence du cordon ombilical ¬ Fœtus et *P02.4*
- - Rupture prématurée des membranes ¬ Fœtus et *P01.1*
- - Syndromes de transfusion placentaire ¬ Fœtus et *P02.3*
- - Tabagisme de la mère ¬ Fœtus et *P04.2*
- - Toxicomanie de la mère ¬ Fœtus et *P04.4*
- - Traumatisme de la mère ¬ Fœtus et *P00.5*
- - Troubles
- - - Hypertensifs de la mère ¬ Fœtus et *P00.0*
- - - Nutritionnels de la mère ¬ Fœtus et *P00.4*
- - Utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ Fœtus et *P04.5*
- Anaérobies ¬ Sepsis du *P36.5*
- Bonne santé SAI ¬ *Z38.2*
- Centrale ¬ Apnée du sommeil chez le *P28.3*
- Due
- - Augmentation de l'apport en iode ¬ Hypothyroïdie transitoire du *P72.2*
- - Environnement ¬ Hyperthermie du *P81.0*
- - Lait de vache ¬ Hypocalcémie du *P71.0*
- Enterobacter ¬ Sepsis du *P36.8*
- Escherichia coli ¬ Sepsis du *P36.4*
- Hémorragie liée à un vasa praevia ¬ Lésions chez le *P50.0*
- Hypoglycémie) ¬ Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le *P70.1*
- Obstructive ¬ Apnée du sommeil chez le *P28.3*
- SAI ¬
- - Apnée du sommeil chez le *P28.3*
- - Fièvre du *P81.9*
- - Ophtalmie du *P39.1*
- Sans
- - Hémorragie légère ¬ Omphalite du *P38*
- - Précision ¬
- - - Affection

Nouveau-né *–suite*
- Sans *–suite*
- - Précision ¬ *–suite*
- - - Affection *–suite*
- - - - Cérébrale du *P91.9*
- - - - Respiratoire du *P28.9*
- - - - Téguments spécifiques du fœtus et du *P83.9*
- - - Anomalie
- - - - Endocrinienne transitoire du *P72.9*
- - - - Métabolique transitoire du *P74.9*
- - - - Tonus musculaire du *P94.9*
- - - - Transitoire métabolisme
- - - - - Calcium et du magnésium du *P71.9*
- - - - - Glucides chez le fœtus et le *P70.9*
- - - Atélectasies du *P28.1*
- - - Détresse respiratoire du *P22.9*
- - - Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du *P52.9*
- - - Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du *P52.3*
- - - Hémorragie ombilicale du *P51.9*
- - - Hypothermie du *P80.9*
- - - Maladie hémolytique du fœtus et du *P55.9*
- - - Occlusion intestinale du *P76.9*
- - - Problème alimentaire du *P92.9*
- - - Sepsis bactérien du *P36.9*
- - - Trouble de la régulation thermique du *P81.9*
- Staphylocoque
- - Dorés ¬ Sepsis du *P36.2*
- - Sans précision ¬ Sepsis du *P36.3*
- Streptocoques, autres et sans précision ¬ Sepsis du *P36.1*
- Transfusion fœto-fœtale ¬ Lésions chez le *P02.3*
- Vitamine K ¬ Carence du *P53*
- ¬
- - Acidose métabolique tardive du *P74.0*
- - Affections
- - - Précisées des téguments spécifiques du fœtus et du *P83.8*
- - - Respiratoires précisées chez le *P28.8*
- - Alimentation
- - - Lente du *P92.2*
- - - Sein difficile chez le *P92.5*
- - Anomalies
- - - Électrolytiques transitoires du *P74.4*
- - - Endocriniennes transitoires précisées du *P72.8*
- - - Équilibre
- - - - Potassique du *P74.3*
- - - - Sodique du *P74.2*
- - - Métaboliques transitoires du *P74.8*
- - - Tonus musculaire du *P94.8*
- - - Transitoires métabolisme
- - - - Calcium et du magnésium du *P71.8*

Nouveau-né *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anomalies *–suite*
- - - Transitoires métabolisme *–suite*
- - - - Glucides chez le fœtus et le *P70.8*
- - Apnée
- - - *P28.4*
- - - *P28.4*
- - - Obstructive du *P28.4*
- - - Primitive du sommeil chez le *P28.3*
- - Atélectasie primitive du *P28.0*
- - Baisse de l'activité cérébrale du *P91.4*
- - Blennorrhée chez le *A54.3†, H13.1**
- - Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le *P60*
- - Coma du *P91.5*
- - Contusions du fœtus ou du *P54.5*
- - Convulsions du *P90*
- - Coryza
- - - *P28.8*
- - - Syphilitique du *A50.0†, J99.8**
- - Craniotabès du *P96.3*
- - Crises de cyanose du *P28.2*
- - Dermolyse bulleuse transitoire du *Q81.2*
- - Déshydratation du *P74.1*
- - Détresse
- - - Respiratoire du *P22.0*
- - - Respiratoires du *P22.8*
- - Diarrhée infectieuse chez le *A09.0*
- - Ecchymoses du fœtus ou du *P54.5*
- - Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du *P91.6*
- - Engorgement du sein chez le *P83.4*
- - Entérite nécrosante du *P77*
- - Entérocolite nécrosante du *P77*
- - Érythème toxique du *P83.1*
- - États mentionnés sans précision cause mortalité morbidité soin supplémentaire
- - - *P07*
- - - Fœtus ou du *P08*
- - Flutter auriculaire idiopathique du *P29.1*
- - Formes d'hypothermie du *P80.8*
- - Glaucome du *Q15.0*
- - Gonorrhée de l'œil chez le *A54.3†, H13.1**
- - Hématome
- - - Subdural de cause non traumatique chez le *P52.8*
- - - Superficiel du fœtus ou du *P54.5*
- - Hémorragie
- - - Cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du *P52.6*
- - - Ombilicales du *P51.8*
- - - Sous-épendymaire envahissement intraventriculaire degré
- - - - 2, du *P52.1*
- - - - 3, du *P52.2*
- - - Ventriculaire

Nouveau-né *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hémorragie *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Légère à modérée de moins de 50 % du volume ventriculaire, du *P52.1*
- - - - Sévère de 50 % ou plus du volume ventriculaire du *P52.2*
- - Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du *P52.4*
- - Hémorragie intracrânienne non
- - - Traumatique degré 1
- - - - *P52.0*
- - - - Fœtus et du *P52.0*
- - - Traumatiques) du fœtus et du *P52.8*
- - Hémorragie ombilicale massive du *P51.0*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du *P52.5*
- - Hydrocéphalie
- - - *Q03*
- - - *Q03.9*
- - - Acquise du *P91.7*
- - - Post-hémorragique du *P91.7*
- - Hyperammoniémie transitoire du *P74.8*
- - Hypertension pulmonaire (persistante) du *P29.3*
- - Hypoalbuminémie du *P74.8*
- - Hypocalcémies du *P71.1*
- - Hypoglycémie transitoire du *P70.4*
- - Hypothermie légère du *P80.8*
- - Ictère
- - - Néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au *P58.4*
- - - Nucléaire du *P57.9*
- - Iléus transitoire du *P76.1*
- - Insuffisance respiratoire du *P28.5*
- - Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le *P96.4*
- - Irritabilité cérébrale du *P91.3*
- - Ischémie transitoire du myocarde du *P29.4*
- - Iso-immunisation
- - - ABO du fœtus et du *P55.1*
- - - Rhésus du fœtus et du *P55.0*
- - Kystes périventriculaires acquis du *P91.1*
- - Maladie
- - - Hémorragique du fœtus et du *P53*
- - - Membranes hyalines du *P22.0*
- - Maladies hémolytiques du fœtus et du *P55.8*
- - Mastite non infectieuse du *P83.4*
- - Myocardite
- - - Aseptique chez le *B33.2†, I41.1**
- - - Épidémique chez le *B33.2†, I41.1**
- - - Virale chez le *B33.2†, I41.1**
- - Occlusions intestinales précisées du *P76.8*

Nouveau-né *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du *P83.3*
- - Ophtalmie gonorrhéique chez le *A54.3†*, *H13.1**
- - Pemphigus épidémique du *L00*
- - Perforation intestinale spontanée du *P78.0*
- - Pétéchies du fœtus ou du *P54.5*
- - Polycythémie du *P61.1*
- - Polype ombilical du *P83.6*
- - Poumon de ventilation du *P27.8*
- - Problèmes alimentaires du *P92.8*
- - Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du *P93*
- - Reflux œsophagien chez le *P78.8*
- - Régurgitation et mérycisme du *P92.1*
- - Sclérème du *P83.0*
- - Sepsis bactériens du *P36.8*
- - Sous-alimentation du *P92.3*
- - Suralimentation du *P92.4*
- - Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le *P96.2*
- - Syndrome
- - - Défibrination du fœtus ou du *P60*
- - - Détresse respiratoire du *P22.0*
- - - Enfermement et syndrome apallique chez le *P91.80*
- - - Gris dû à l'administration de chloramphénicol au *P93*
- - - Hypothermique du *P80.0*
- - Syphilis du *A50.9*
- - Tachycardie ventriculaire incessante du *I47.2*
- - Tachypnée transitoire du *P22.1*
- - Thrombose de la veine rénale chez le *P29.8*
- - Troubles
- - - Cérébraux précisés chez le *P91.88*
- - - Précisés de la régulation thermique du *P81.8*
- - Tyrosinémie transitoire du *P74.5*
- - Ulcère gastro-duodénal du *P78.8*
- - Urémie du *P96.0*
- - Urticaire du *P83.8*
- - Volvulus chez le *P76.8*
- - Vomissements du *P92.0*

Novo
- Effort ¬ Angine: de *I20.0*
- Transplantation rénale ¬ Microangiopathie thrombotique de *M31.1*, *Z94.0*

Novy
- Poux ¬ Fièvre récurrente de *A68.0*
- Tiques ¬ Fièvre récurrente de *A68.1*

Noyade
- Disparition ¬ *X59.9!*
- Submersion non mortelle ¬ *T75.1*

Noyau
- Céphalique fémoral ¬ Anomalie du *Q72.4*
- Gélatineux
- - Myélopathie ¬ Hernie du *M51.0†*, *G99.2**
- - Névrite ¬
- - - Hernie cervicale du *M50.1†*, *G55.1**
- - - Hernie cervico-thoracique du *M50.1†*, *G55.1**
- - Radiculopathie ¬
- - - Hernie
- - - - Cervico-thoracique du *M50.1†*, *G55.1**
- - - - Lombosacrée du *M51.1†*, *G55.1**
- - - - Thoracique du *M51.1†*, *G55.1**
- - - - Thoraco-lombaire du *M51.1†*, *G55.1**
- - - Hernie cervicale du *M50.1†*, *G55.1**
- - - Hernie lombaire du *M51.1†*, *G55.1**
- - ¬ Névrite au cours d'une hernie du *M51.1†*, *G55.1**
- Gris centraux
- - Cervelet] ¬ H-ABC [Hypomyélinisation avec atrophie des *E75.2*
- - Sans précision ¬ Maladie dégénérative des *G23.9*
- - ¬
- - - Calcification des *G23.8*
- - - Carcinome embryonnaire des *C71.0*
- - - Germinome des *C71.0*
- - - Maladies dégénératives précisées des *G23.8*
- Rouge inférieur ¬ Syndrome du *I66.8†*, *G46.3**

NPM1 ¬ Leucémie myéloïde aiguë associée à des mutations somatiques de *C92.00*

NSIP] ¬ Pneumonie interstitielle non spécifique [*J84.10*

NSMH [neuropathie sensorimotrice héréditaire] ¬ *G60.0*

NSTEMI
- Infarctus de type 1 ¬ Infarctus sans élévation du segment ST [*I21.40*
- ¬ Infarctus sans élévation du segment ST [*I21.48*

Nuageuse centrale de François ¬ Dystrophie *H18.5*

Nuchae] ¬ Acné chéloïde [Folliculite sclerotisans *L73.0*

Nück, congénital ¬ Kyste (du): canal de *Q52.4*

Nucléaire
- Capsulaire postérieure ¬ Cataracte cortico- *H26.88*
- Interne et des cellules ganglionnaires ¬ Dystrophie rétinienne avec anomalies de la couche *H35.5*
- Iso-immunisation ¬ Ictère *P57.0*
- Lymphocytes T activés]-5 ¬ Haploinsuffisance de NFAT [facteur *D84.8*
- Nouveau-né ¬ Ictère *P57.9*
- Sous-capsulaire postérieure ¬ Cataracte cortico- *H26.88*

Nucléaire *–suite*
- ¬
- - Cataracte cortico- *H26.88*
- - Cataracte sénile *H25.1*
- - Formes précisées d'ictère *P57.8*
- - Ictère *P57.9*
- - Sclérose *H25.1*

Nuclear protein in testis
- Base de la langue ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C01*
- Cou ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C76.0*
- Médiastin
- - Antérieur ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C38.1*
- - Postérieur ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C38.2*
- - ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C38.3*
- Rein ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C64*
- Rhinopharynx ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C11.9*
- Sinus
- - Ethmoïdal ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C31.1*
- - Frontal ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C31.2*
- - Sphénoïdal ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C31.3*
- Thorax ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C76.1*
- Vessie ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C67.9*
- Vulve ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C51.9*
- ¬ Carcinome de la ligne médiane NUT [*C80.9*

Nucléides transuraniens de métaux lourds ¬ Intoxication par des *T66*

Nucléoside phosphorylase [PNP] ¬ Déficit en purine *D81.5*

Nucléotidase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en pyrimidine 5' *D55.3*

Nucléotides ¬ Anémie due à des anomalies du métabolisme des *D55.3*

Nuisibles
- Bruit sur l'oreille interne ¬ Effets *H83.3*
- ¬ Recherche acceptation intervention
- - Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et *Z64.8*
- - Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et *Z64.8*

Nummulaire ¬
- Dermite *L30.0*
- Kératite: *H16.1*
- Kératodermie palmoplantaire *Q82.8*
- Psoriasis: *L40.0*

Nus ¬ Syndrome des lymphocytes *D81.6*

NUT Nuclear protein in testis
- Base de la langue ¬ Carcinome de la ligne médiane *C01*
- Cou ¬ Carcinome de la ligne médiane *C76.0*
- Médiastin
- - Antérieur ¬ Carcinome de la ligne médiane *C38.1*
- - Postérieur ¬ Carcinome de la ligne médiane *C38.2*
- - ¬ Carcinome de la ligne médiane *C38.3*
- Rein ¬ Carcinome de la ligne médiane *C64*
- Rhinopharynx ¬ Carcinome de la ligne médiane *C11.9*
- Sinus
- - Ethmoïdal ¬ Carcinome de la ligne médiane *C31.1*
- - Frontal ¬ Carcinome de la ligne médiane *C31.2*
- - Sphénoïdal ¬ Carcinome de la ligne médiane *C31.3*
- Thorax ¬ Carcinome de la ligne médiane *C76.1*
- Vessie ¬ Carcinome de la ligne médiane *C67.9*
- Vulve ¬ Carcinome de la ligne médiane *C51.9*
- ¬ Carcinome de la ligne médiane *C80.9*

Nutrition
- Inadaptée ¬ Difficultés nutritionnelles et *R63.3*
- Parentérale ¬ Cholestase liée à la *K91.88*
- ¬ Examen spécial de dépistage des troubles de la *Z13.2*

Nutritionnel
- Connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions physiques, chimiques ou *Z64.8*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles *P00.4*
- Métabolique
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies endocriniennes, *O99.2*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies *E90**
- - ¬
- - - Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, *Z83.4*
- - - Antécédents personnels de maladies endocriniennes, *Z86.3*
- - - Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, *M14.5**
- - - Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, *H28.1**
- - - Glaucome au cours de maladies endocriniennes, *H42.0**
- - - Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, *N08.4**
- Non précisée ¬ Séquelles d'une carence *E64.9*
- Nutrition inadaptée ¬ Difficultés *R63.3*
- Précisées ¬

Nutritionnel *–suite*
- Précisées ¬ *–suite*
- - Anémies *D53.8*
- - Carences *E63.8*
- Précisés ¬ Carence en autres éléments *E61.8*
- Sans précision ¬
- - Anémie *D53.9*
- - Carence
- - - *E63.9*
- - - Élément *E61.9*
- - ¬
- - Anémie mégaloblastique *D52.0*
- - Carence en plusieurs éléments *E61.7*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques *P04.5*
- - Insuffisance staturale *E45*
- - Maladie due au VIH avec maladie due à une carence *B22, E63.9*
- - Marasme *E41*
- - Myocardiopathie
- - - *E63.9†, I43.2**
- - - Cours de maladies *I43.2**
- - Séquelles d'autres carences *E64.8*

Nycthéméral ¬ Inversion psychogène du rythme (du): *F51.2*

Nycturie ¬ *R35.2*

NYHA
- I ¬
- - Insuffisance cardiaque droite primaire, stade *I50.00, I50.02!*
- - Stade *I50.11*
- II ¬
- - Insuffisance cardiaque droite
- - - Primaire, stade *I50.00, I50.03!*
- - - Stade *I50.01, I50.03!*
- - Stade *I50.12*
- III ¬
- - Insuffisance cardiaque droite
- - - Primaire, stade *I50.00, I50.04!*
- - - Stade *I50.01, I50.04!*
- - Stade *I50.13*
- IV ¬
- - Insuffisance cardiaque droite
- - - Primaire, stade *I50.00, I50.05!*
- - - Stade *I50.01, I50.05!*
- - Stade *I50.14*

Nyhan
v./v.a. Lesch-Nyhan

Nymphomanie ¬ *F52.7*

Nyong
v./v.a. O'nyong-nyong

Nystagmus
- Anomalies des mouvements oculaires ¬ *H55*

Nystagmus *–suite*
- Apraxie oculomotrice ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique récessive-signes pyramidaux- *G11.1*
- Central ¬ *H81.4*
- Congénital ¬ *H55*
- Défaut d'usage ¬ *H55*
- Dissocié ¬ *H55*
- Horizontal ¬ *H55*
- Latent ¬ *H55*
- Microduplication 2q31.1 ¬ Syndrome de syndactylie- *Q92.3*
- Obésité ¬ Syndrome de paraplégie spastique-déficience intellectuelle- *G11.4*
- SAI ¬ *H55*
- Ulcère ¬ Syndrome de tremblement essentiel- *Q87.8*

O'nyong-nyong ¬ Fièvre due au virus *A92.1*
O'Sullivan-McLeod ¬ Syndrome d' *G12.8*
Oasthouse ¬ Syndrome de *E72.1*
Obésité
- Adulte ¬ Diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- Colite-hypothyroïdie-hypertrophie cardiaque-retard de développement ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Déficit
- - CEP19
- - - Enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.84*
- - - Indice de masse corporelle IMC compris
- - - - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ *E66.80*
- - - - 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ *E66.81*
- - - - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ *E66.86*
- - - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ *E66.87*
- - - ¬ *E66.89*
- - Congénital
- - - CEP19 avec indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus chez l'adulte ¬ *E66.88*
- - - Leptine
- - - - Enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.84*
- - - - Indice de masse corporelle IMC
- - - - - 60 et plus chez l'adulte ¬ *E66.88*
- - - - - Compris entre 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ *E66.86*
- - - - - Compris entre 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ *E66.87*
- - - - ¬ *E66.89*
- - Prohormone convertase I
- - - Enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.84*
- - - ¬ *E66.89*
- - Pro-opiomélanocortine
- - - Enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.84*
- - - Indice de masse corporelle IMC
- - - - 60 et plus chez l'adulte ¬ *E66.88*
- - - - Compris
- - - - - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ *E66.80*
- - - - - 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ *E66.81*
- - - - - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ *E66.86*
- - - - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ *E66.87*
- - - ¬ *E66.89*
- - Récepteur
- - - Leptine ¬ *E66.89*
- - - Mélanocortine 4
- - - - Enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.84*

Obésité *–suite*
- Déficit *–suite*
- - Récepteur *–suite*
- - - Mélanocortine 4 *–suite*
- - - - Indice de masse corporelle IMC
- - - - - 60 et plus chez l'adulte ¬ *E66.88*
- - - - - Compris entre 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ *E66.80*
- - - - - Compris entre 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ *E66.81*
- - - - - Compris entre 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ *E66.86*
- - - - - Compris entre 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ *E66.87*
- - - - ¬ *E66.89*
- - SIM1
- - - Enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.84*
- - - Indice de masse corporelle IMC
- - - - 60 et plus chez l'adulte ¬ *E66.88*
- - - - Compris
- - - - - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ *E66.80*
- - - - - 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ *E66.81*
- - - - - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ *E66.86*
- - - - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ *E66.87*
- - - ¬ *E66.89*
- Due
- - Excès calorique
- - - Enfant et l'adolescent ¬ *E66.04*
- - - Indice de masse corporelle IMC
- - - - 40 et moins de 50 ¬ *E66.06*
- - - - 50 et moins de 60 ¬ *E66.07*
- - - - 60 et plus ¬ *E66.08*
- - - - Compris
- - - - - 30 et moins de 35 ¬ *E66.00*
- - - - - 35 et moins de 40 ¬ *E66.01*
- - Résistance congénitale leptine
- - - Enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.84*
- - - Indice de masse corporelle IMC
- - - - 60 et plus chez l'adulte ¬ *E66.88*
- - - - Compris
- - - - - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ *E66.80*
- - - - - 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ *E66.81*
- - - - - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ *E66.86*
- - - - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ *E66.87*
- - - ¬ *E66.89*
- Endogène
- - Enfant et l'adolescent ¬ *E66.84*
- - Grade
- - - I (OMS) ¬ *E66.80*

Obésité *–suite*
- Endogène *–suite*
- - Grade *–suite*
- - - II (OMS) ¬ *E66.81*
- - - III (OMS) ¬ *E66.89*
- - Indice de masse corporelle IMC
- - - 40 et moins de 50 ¬ *E66.86*
- - - 50 et moins de 60 ¬ *E66.87*
- - - 60 et plus ¬ *E66.88*
- - - Compris
- - - - 30 et moins de 35 ¬ *E66.80*
- - - - 35 et moins de 40 ¬ *E66.81*
- Enfant et l'adolescent ¬ *E66.94*
- Exogène SAI ¬ *E66.9*
- Extrême
- - Déficit
- - - CEP19 chez l'enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.85*
- - - Congénital en leptine chez l'enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.85*
- - - Prohormone convertase 1 chez l'enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.85*
- - - Pro-opiomélanocortine chez l'enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.85*
- - - Récepteur de la mélanocortine 4 chez l'enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.85*
- - - SIM1 chez l'enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.85*
- - Due
- - - Excès calorique chez l'enfant et l'adolescent ¬ *E66.05*
- - - Résistance congénitale à la leptine chez l'enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.85*
- - Hypoventilation alvéolaire chez l'enfant et l'adolescent ¬ *E66.25*
- - Indice de masse corporelle IMC
- - - 40 et moins de 50 ¬ *E66.86*
- - - 50 et moins de 60 ¬ *E66.87*
- - - 60 et plus ¬ *E66.88*
- - Mutations du gène récepteur à la leptine chez l'enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.85*
- - ¬ *E66.89*
- Grade
- - I OMS
- - - Due à un excès calorique ¬ *E66.00*
- - - Hypoventilation alvéolaire ¬ *E66.20*
- - - ¬ *E66.90*
- - II OMS
- - - Due à un excès calorique ¬ *E66.01*
- - - Hypoventilation alvéolaire ¬ *E66.21*
- - - ¬ *E66.91*
- - III OMS
- - - Due à un excès calorique ¬ *E66.09*
- - - Hypoventilation alvéolaire ¬ *E66.29*

Obésité *–suite*
- Grade *–suite*
- - III OMS *–suite*
- - - ¬ *E66.99*
- Hypogénitalisme-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microphtalmie colobomateuse- *Q87.8*
- Hypogonadisme ¬ Syndrome d'hydrocéphalie- *Q87.8*
- Hypothalamique acquise ¬ *E23.3, E66.89*
- Hypoventilation [SOH] ¬ Syndrome *E66.2*
- Hypoventilation alvéolaire
- - Enfant et l'adolescent ¬ *E66.24*
- - Indice de masse corporelle IMC
- - - 40 et moins de 50 ¬ *E66.26*
- - - 50 et moins de 60 ¬ *E66.27*
- - - 60 et plus ¬ *E66.28*
- - - Compris
- - - - 30 et moins de 35 ¬ *E66.20*
- - - - 35 et moins de 40 ¬ *E66.21*
- Indice de masse corporelle IMC
- - 40 et moins de 50 ¬ *E66.96*
- - 50 et moins de 60 ¬ *E66.97*
- - 60 et plus ¬ *E66.98*
- Infantile installation rapide dysfonctionnement hypothalamique hypoventilation dysautonomie
- - Tumeurs neurales] ¬ ROHHADNET [Syndrome d' *E23.3, C80.9*
- - ¬ ROHHAD [Syndrome d' *E23.3, E66.29*
- Malformations cérébrales-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- Maturité ¬ Diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- Médicamenteux
- - Enfant et l'adolescent ¬ *E66.14*
- - Extrême chez l'enfant et l'adolescent ¬ *E66.15*
- - Grade
- - - I (OMS) ¬ *E66.10*
- - - II (OMS) ¬ *E66.11*
- - - III (OMS) ¬ *E66.19*
- - Indice de masse corporelle IMC
- - - 40 et moins de 50 ¬ *E66.16*
- - - 50 et moins de 60 ¬ *E66.17*
- - - 60 et plus ¬ *E66.18*
- - - Compris
- - - - 30 et moins de 35 ¬ *E66.10*
- - - - 35 et moins de 40 ¬ *E66.11*
- - ¬ *E66.19*
- Monogénique due à une anomalie de la voie leptine-mélanocortine ¬ *E66.89*
- Mutation gène récepteur
- - Leptine
- - - Enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ *E66.84*
- - - Indice de masse corporelle IMC
- - - - 60 et plus chez l'adulte ¬ *E66.88*

Obésité *–suite*
- Mutation gène récepteur *–suite*
- - Leptine *–suite*
- - - Indice de masse corporelle IMC *–suite*
- - - - Compris
- - - - - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ *E66.80*
- - - - - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ *E66.86*
- - - - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ *E66.87*
- - Letpine avec indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ *E66.81*
- Non cétosique ¬ Diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- Petite taille ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-hypogonadisme-ichtyose- *Q87.8*
- Précoce-hyperphagie-retard du développement sévère ¬ Syndrome d' *E66.89*
- Prognathisme-anomalies oculaires et cutanées ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Retard global de développement ¬ Syndrome de petite taille-brachydactylie- *Q87.1*
- Sans
- - Obésité
- - - Adulte ¬ Diabète (sucré) (avec *E11*
- - - Maturité ¬ Diabète (sucré) (avec *E11*
- - - Non cétosique ¬ Diabète (sucré) (avec *E11*
- - - Stable ¬ Diabète (sucré) (avec *E11*
- - Précision ¬ *E66.9*
- Stable ¬ Diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- Tronc-dystrophie rétinienne-micropénis] ¬ Syndrome MORM [déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Valvulopathie ¬ Syndrome de surdité-encéphaloneuropathie- *G31.81*
- ¬
- - *E66.8*
- - Choroïdérémie avec surdité et *Q87.8*
- - Retard de développement neurologique lié à MYT1L, avec retard mental et *G93.4*
- - Syndrome
- - - Aniridie-ptosis-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - - Cardiopulmonaire au cours d' *E66.29*
- - - Déficience intellectuelle-épilepsie-macrocéphalie- *Q87.8*
- - - Hypomagnésémie primaire-crises généralisées-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - - Hypoventilation associée à l' *E66.29*
- - - Paraplégie spastique-déficience intellectuelle-nystagmus- *G11.4*

Objet
- Animés ¬ Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d' *W64.9!*
- Brûlants ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Examen bactériologique histologique ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse n'ayant pas fait l' *A16.1*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse n'ayant pas fait l' *A16.1*
- - Pneumonie tuberculeuse n'ayant pas fait l' *A16.1*
- - Tuberculose pulmonaire n'ayant pas fait l' *A16.1*
- Inanimés ¬ Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d' *W49.9!*
- Jeté) (tombant) ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- Lors de catastrophes naturelles ¬ Chute d' *X59.9!*

Oblique ¬
- Fente faciale *Q18.8*
- Hernie inguinale: *K40*
- Présentation: *O32.2*
- Soins maternels pour position transverse et *O32.2*

Obliterans] ¬ Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica *N48.0*

Oblitérante
- Balanitis xerotica obliterans] ¬ Balanite scléreuse *N48.0*
- Buerger] ¬ Thrombo-angéite *I73.1*
- Cérébrale ¬ Artériopathie *I66.9*
- Chronique
- - Subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ Bronchiolite *J68.4*
- - ¬ Bronchiolite *J44.89*
- Fibreuse ¬ Bronchiolite *J44.89*
- Membres inférieurs
- - AOMI
- - - SAI ¬ Artériopathie *I70.29*
- - - Sans précision du stade (de Leriche et Fontaine) ¬ Artériopathie *I70.29*
- - ¬
- - - AOMI [artériopathie *I70.29*
- - - Claudication intermittente avec artériopathie *I70.29*
- Non liée transplantation
- - VEF1
- - - 35
- - - - 50 % de la norme ¬ Bronchiolite *J44.81*
- - - - Norme ¬ Bronchiolite *J44.80*
- - - 50 % et < 70 % de la norme ¬ Bronchiolite *J44.82*
- - - 70 % de la norme ¬ Bronchiolite *J44.83*
- - ¬ Bronchiolite *J44.89*
- Organisation pneumonique
- - BOOP] avec exacerbation aiguë ¬ Bronchiolite *J84.01*
- - ¬ Bronchiolite *J84.00*
- Post-greffe ¬ Bronchiolite *J95.88*

Oblitérante *–suite*
- Trouble ventilatoire obstructif ¬ Bronchiolite *J44.89*
- Type
- - Bassin
- - - Cuisse ¬
- - - - AO [artériopathie *I70.29*
- - - - Artériopathie *I70.29*
- - - ¬
- - - - AO [artériopathie *I70.29*
- - - - Artériopathie *I70.29*
- - Cuisse ¬
- - - AO [artériopathie *I70.29*
- - - Artériopathie *I70.29*
- - Jambe ¬ Artériopathie *I70.29*
- Vaisseau cérébral ¬ Endartérite syphilitique *A52.0†, I68.1**
- ¬
- - AO [artériopathie *I70.29*
- - Artériopathie *I70.29*
- - Douleurs ischémiques dans le cadre d'une artériopathie *I70.29*
- - Endartérite: déformante ou *I70*
- - Otosclérose intéressant fenêtre ovale
- - - *H80.1*
- - - Non *H80.0*
- - Syndrome d'artériopathie *I70.29*
- - Thrombo-angéite *I73.1*

Oblitération
- Artère
- - Extrémité inférieure ¬ *I74.3*
- - Jambe ¬ *I74.3*
- - Pied ¬ *I74.3*
- - ¬ *I74.9*
- Artère périphérique ¬ *I74.4*
- Artère poplitée ¬ *I74.3*
- Uretère avec infection ¬ *N13.67*
- Vaisseaux lymphatiques suite à mastectomie ¬ *I97.2*
- Veine du cou ¬ *I82.88*

Oblongata dorso-latéral ¬ Syndrome *I66.3†, G46.3**

Obrinsky ¬ Syndrome d' *Q79.4*

Obsédantes
- Comportements compulsifs ¬ Forme mixte, avec idées *F42.2*
- Premier plan ¬ Avec idées ou ruminations *F42.0*

Observation
- Accident
- - Transport ¬ Examen et mise en *Z04.1*
- - Travail ¬ Examen et mise en *Z04.2*
- - ¬ Examen et mise en *Z04.3*
- Activité répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en *Z03.2*
- Blessures dues à une agression ¬ Examen et mise en *Z04.5*

Observation *–suite*
- Comportement asocial sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en *Z03.2*
- Hospitalisation soin obstétrical y compris
- - Césarienne avant début travail ¬ lorsqu y a mise
- - - *O32*
- - - *O34*
- - Interruption grossesse ¬ lorsqu y a mise
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- Pyromanie sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en *Z03.2*
- Raison non précisée ¬ Examen et mise en *Z04.9*
- Raisons précisées ¬ Examen et mise en *Z04.8*
- SAI ¬ Mise en *Z04.9*
- Sans complications ¬ Soins et mise en *Z39.0*
- Suspicion
- - Affection du système nerveux ¬ Mise en *Z03.3*
- - Affections cardio-vasculaires ¬ Mise en *Z03.5*
- - Effet
- - - Indésirable d'un médicament ¬ Mise en *Z03.6*
- - - Toxique de substances ingérées ¬ Mise en *Z03.6*
- - Infarctus du myocarde ¬ Mise en *Z03.4*
- - Intoxication ¬ Mise en *Z03.6*
- - Maladie, sans précision ¬ Mise en *Z03.9*
- - Maladies ¬ Mise en *Z03.8*
- - Troubles mentaux et du comportement ¬ Mise en *Z03.2*
- - Tuberculose ¬ Mise en *Z03.0*
- - Tumeur maligne ¬ Mise en *Z03.1*
- Vol à l'étalage sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en *Z03.2*

Observés au niveau du sein ¬ Autres signes et symptômes *N64.5*

Obsessionnel
- Compulsif
- - Sans précision ¬ Trouble *F42.9*
- - ¬
- - - Névrose: *F42*
- - - Troubles *F42.8*
- Premier plan ¬ Avec comportements compulsifs [rituels *F42.1*

Obstacle ¬ Polyurie de levée d' *R35.0*

Obstétrical
- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Y compris accouchement SAI ¬
- - - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie *O75.4*
- - ¬ Autres complications d'un acte de chirurgie *O75.4*
- Caillot sanguin ¬ Autre embolie *O88.28*
- Cause non précisée ¬ Mort d'origine *O95*
- Chirurgicale ¬ Infection d'une plaie d'origine *O86.0*
- Col de l'utérus ¬ Déchirure *O71.3*
- E ¬
- - Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne) *O71.6*
- - Écartement traumatique de la symphyse (pubienne) *O71.6*
- - Lésion du coccyx *O71.6*
- Foie ¬ Traumatisme *P15.0*
- Grave ¬ Asphyxie *P21.0*
- Intéressant les articulations et les ligaments pelviens ¬ Lésions *O71.6*
- Légère ou modérée ¬ Asphyxie *P21.1*
- Nerf crânien VII] ¬ Lésion du nerf facial due à un traumatisme *P11.3*
- Non précisé ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme *P11.59*
- Organes pelviens ¬ Autres lésions *O71.5*
- Paraplégie
- - Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme *P11.50*
- - Chronique ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme *P11.51*
- Pathologiques et difficultés à procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents *Z35.2*
- Périnée
- - Deuxième degré ¬ Déchirure *O70.1*
- - Premier degré ¬ Déchirure *O70.0*
- - Quatrième degré ¬ Déchirure *O70.3*
- - Sans précision ¬ Déchirure *O70.9*
- - Troisième degré ¬ Déchirure *O70.2*
- - ¬
- - - Hématome *O71.7*
- - - Rupture d'une suture *O90.1*
- Persistente du plexus brachial ¬ Lésion traumatique *P14.3*
- Plus 42 jours mais accouchement ¬ Mort Séquelle relevant
- - Directement d'une cause *O96.0*
- - Indirectement d'une cause *O96.1*
- Précisés ¬ traumatisme
- - *O71.8*
- - *P15.8*
- Rate ¬ Traumatisme *P15.1*
- SAI ¬ Embolie *O88.28*

Obstétrical *–suite*
- Sans précision
- - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles relevant d'une cause *O96.9*
- - ¬
- - - Asphyxie *P21.9*
- - - Lésion
- - - - Cuir chevelu due à un traumatisme *P12.9*
- - - - Squelette due à un traumatisme *P13.9*
- - - - Système nerveux
- - - - - Central due à un traumatisme *P11.9*
- - - - - Périphérique due à un traumatisme *P14.9*
- - - Mort de séquelles relevant d'une cause *O97.9*
- - - Traumatisme
- - - - *O71.9*
- - - - *P15.9*
- Urètre ¬ Lésion *O71.5*
- Vagin ¬ Hématome *O71.7*
- Vaginale haute isolée ¬ Déchirure *O71.4*
- Vessie ¬ Lésion *O71.5*
- Vulve ¬ Hématome *O71.7*
- Y compris
- - Césarienne avant début travail ¬ lorsqu y a mise observation hospitalisation soin
- - - *O32*
- - - *O34*
- - Interruption grossesse ¬ lorsqu y a mise observation hospitalisation soin
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- ¬
- - Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme *P15.6*
- - Céphalhématome dû à un traumatisme *P12.0*
- - Choc *O75.1*
- - Congestion faciale due à un traumatisme *P15.4*
- - Déchirure
- - - Hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme *P10.9*
- - - Hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme *P10.8*
- - - Tente du cervelet due à un traumatisme *P10.4*
- - Embolie
- - - *O88.8*
- - - Gazeuse *O88.0*
- - - Graisseuse, *O88.8*
- - - Pulmonaire *O88.20*
- - - Pyohémique et septique, *O88.3*
- - États mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins *O98*
- - Fracture

Obstétrical *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fracture *–suite*
- - - Clavicule due à un traumatisme *P13.4*
- - - Crâne due à un traumatisme *P13.0*
- - - Rachis due à un traumatisme *P11.5*
- - Glaucome traumatique dû (due) à un traumatisme *P15.3*
- - Hématome
- - - Chignon dû à un traumatisme *P12.1*
- - - Pelvien d'origine *O71.7*
- - - Plaie *O90.2*
- - - Sous-dural (localisé) dû à un traumatisme *P10.0*
- - - Sous-galéal dû à un traumatisme *P12.2*
- - Hémorragie
- - - Épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme *P12.2*
- - - Sous-conjonctivale dû (due) à un traumatisme *P15.3*
- - Hémorragie cérébrale due à un traumatisme *P10.1*
- - Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme *P10.2*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme *P10.3*
- - Hémorragie sous-durale due à un traumatisme *P10.0*
- - Lésion
- - - Cérébrale non précisée, due à un traumatisme *P11.2*
- - - Faciale due à un traumatisme *P15.4*
- - - Fémur due à un traumatisme *P13.2*
- - - Nerfs crâniens due à un traumatisme *P11.4*
- - - Œil due à un traumatisme *P15.3*
- - - Organes génitaux externes due à un traumatisme *P15.5*
- - - Os longs due à un traumatisme *P13.3*
- - - Sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme *P15.2*
- - Lésions
- - - Cérébrales précisées, dues à un traumatisme *P11.1*
- - - Crâne dues à un traumatisme *P13.1*
- - - Cuir chevelu dues à un traumatisme *P12.8*
- - - Parties
- - - - Squelette dues à un traumatisme *P13.8*
- - - - Système nerveux périphérique dues à un traumatisme *P14.8*
- - - Plexus brachial dues à un traumatisme *P14.3*
- - Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme *P12.3*
- - Mort Séquelle relevant
- - - Directement d'une cause *O97.0*
- - - Indirectement d'une cause *O97.1*
- - Œdème cérébral dû à un traumatisme *P11.0*

Obstétrical *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Paralysie
- - - Dejerine-Klumpke due à un traumatisme *P14.1*
- - - Duchenne-Erb due à un traumatisme *P14.0*
- - - Faciale due à un traumatisme *P11.3*
- - - Nerf phrénique due à un traumatisme *P14.2*
- - Rupture
- - - Foie due à un traumatisme *P15.0*
- - - Rate due à un traumatisme *P15.1*

Obstructif
v./v.a. Type de maladie

Obstruction
- Artère basilaire ¬ *I65.1*
- Artère carotide ¬ *I65.2*
- Artère cérébelleuse ¬ *I66.3*
- Artère cérébrale
- - Antérieure ¬ *I66.1*
- - Moyenne ¬ *I66.0*
- - Postérieure ¬ *I66.2*
- Artère rénale ¬ *N28.0*
- Artère vertébrale ¬ *I65.0*
- Calculeuse
- - Infection du rein ¬ Hydronéphrose avec *N13.64*
- - Rénale
- - - Infection du rein ¬ Hydronéphrose avec *N13.62*
- - - ¬ Hydronéphrose avec *N13.20*
- - Urétéral
- - - Infection du rein ¬ Hydronéphrose avec *N13.63*
- - - ¬ Hydronéphrose avec *N13.21*
- Canal lacrymal-surdité] ¬ HPPD [Syndrome d'hypertélorisme-sinus pré-auriculaire- *Q87.0*
- Canal pancréatique ¬ *K86.82*
- Col de la vessie ¬ *N32.0*
- Côlon ¬ *K56.4*
- Complète
- - Artère basilaire ¬ *I65.1*
- - Artère carotide ¬ *I65.2*
- - Artère cérébelleuse ¬ *I66.3*
- - Artère cérébrale
- - - Antérieure ¬ *I66.1*
- - - Moyenne ¬ *I66.0*
- - - Postérieure ¬ *I66.2*
- - Artère vertébrale ¬ *I65.0*
- Congénitale
- - Aqueduc de Sylvius ¬ *Q03.0*
- - Intestin grêle ¬ *Q41.9*
- - Œsophage sans fistule ¬ *Q39.0*
- Duodénum ¬ *K31.5*
- Fécale ¬ *K56.4*
- Hépato-biliaire ¬ *K83.1*

Obstruction *–suite*
- Intestin ¬ Autres *K56.4*
- Jonction
- - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- - Pyélo-urétéral ¬
- - - Hydronéphrose avec *N13.0*
- - - Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Mécanique dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI ¬ *Q41*
- Œsophage ¬ *K22.2*
- Partielle
- - Artère basilaire ¬ *I65.1*
- - Artère carotide ¬ *I65.2*
- - Artère cérébelleuse ¬ *I66.3*
- - Artère cérébrale
- - - Antérieure ¬ *I66.1*
- - - Moyenne ¬ *I66.0*
- - - Postérieure ¬ *I66.2*
- - Artère vertébrale ¬ *I65.0*
- Pelvi-urétérale ¬ *N13.5*
- Prostatique SAI ¬ *N40*
- Pyélo-urétérale avec infection du rein ¬ Hydronéphrose avec *N13.60*
- Pylore
- - Adulte ¬ *K31.18*
- - ¬ *K31.18*
- Rétrécissement congénitaux du côlon ¬ occlusion, *Q42*
- Sinusoïdale
- - Toxique ¬ Syndrome d' *K71.80*
- - ¬ SOS [Syndrome d' *K76.5*
- Supravésicale ¬ *N13.5*
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.1*
- Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Urinaire SAI ¬ *N13.9*
- Vaginale congénitale ¬ *Q52.4*
- Veine porte ¬ *I81*
- Vessie ¬ *N32.8*
- Voie respiratoire
- - Alvéolite allergique ¬ *J67.90*
- - Consécutive à une trachéotomie ¬ *J95.02*
- Voie respiratoire créée par la trachéotomie ¬ *J95.02*
- Voies aériennes supérieures] ¬ CHAOS [Syndrome congénital d' *Q34.8*
- Voies biliaires ¬ *K83.1*
- ¬ Bronchite aiguë avec *J20.9*

Obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) *R13.1*

Obtention du permis de conduire ¬ inscription dans: *Z02*

Obturante de l'oreille externe (conduit) ¬ Kératose *H60.4*

Obturateur septal ¬ Infection due à un *T82.71*

Obturation
- Côlon ¬ *K56.4*
- Retardée du canal artériel ¬ *P29.3*
- ¬ *Z43*

Obturatrice ¬ hernie: *K45*

Occidental ¬ Fièvre du Nile *A92.3*

Occipital
v./v.a. Lobe occipital
- Dysplasie squelettique ¬ Syndrome létal d'encéphalocèle *Q87.5*
- Isolée ¬ Plagiocéphalie *Q67.3*
- Parasagittale bilatérale ¬ Polymicrogyrie pariéto- *Q04.3*
- Photosensible ¬ Épilepsie *G40.8*
- ¬
- - *S02.1*
- - Encéphalocèle *Q01.2*
- - Épilepsie
- - - Bénigne à paroxysmes *G40.08*
- - - Pointes *G40.08*
- - Lobe
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Os: *D16.41*
- - Ostéoblastome de l'os *D16.41*
- - Pachygyrie et polymicrogyrie *Q04.3*
- - Sarcome de l'os *C41.01*
- - Syndrome de la corne *E83.0*

Occipito
- Iliaque ¬ Dystocie due à la persistance en position: *O64.0*
- Postérieure
- - Persistante ¬ Présentation *P03.1*
- - ¬ Dystocie due à la persistance en position: *O64.0*
- Sacrée ¬ Dystocie due à la persistance en position: *O64.0*
- Transverse ¬ Dystocie due à la persistance en position: *O64.0*

Occlusale
- Dentaire (antérieure) (postérieure) ¬ Béance *K07.2*
- Dents ¬ Usure: *K03.0*

Occlusif
v./v.a. veino-occlusif
- Artériel ¬ Diabète sucré
- - MOA [maladie *E14.50†, I79.2**
- - Type
- - - 1 avec MOA [maladie *E10.50†, I79.2**
- - - 2 avec MOA [maladie *E11.50†, I79.2**
- Infantile ¬ Artériopathie *Q28.88*
- SAI ¬ Iléus *K56.6*
- Syphilitique ¬ Maladie artérielle *A52.0†, I79.8**

Occlusion
- Acquise de l'œsophage ¬ *K22.2*

Occlusion *–suite*
- Anus avec fistule ¬ *Q42.2*
- Aqueduc de Sylvius ¬ Hydrocéphalie par *Q03.0*
- Artère
- - Centrale de la rétine ¬ *H34.1*
- - Coronaires n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*
- - Rétine ¬ Autres *H34.2*
- - ¬ *I74.9*
- Artère basilaire ¬ *I65.1*
- Artère carotide ¬ *I65.2*
- Artère cérébrale ¬ *I66.9*
- Artère iliaque ¬ *I74.5*
- Artère rénale ¬ *N28.0*
- Artère vertébrale ¬ *I65.0*
- Artères précérébrales ¬ *I65.9*
- Artériel
- - Aiguë
- - - Bras ¬ *I74.2*
- - - Jambe ¬ *I74.3*
- - Jambe ¬ *I74.3*
- - Périphérique aiguë ¬ *I74.4*
- - Rétinienne
- - - Branche ¬ *H34.2*
- - - Partielle ¬ *H34.2*
- Bilatérale
- - Artère carotide ¬ *I65.3*
- - Artère vertébrale ¬ *I65.3*
- - Artères précérébrales ¬ *I65.3*
- Canal biliaire, sans calcul ¬ *K83.1*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul ¬ *K82.0*
- Col vésical congénital(e) ¬ *Q64.3*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.6*
- Congénitale
- - Aorte ¬ *Q25.3*
- - Intestin grêle ¬ *Q41.9*
- - Jonction pyélo-urétérale ¬ *Q62.1*
- - Œsophage ¬ *Q39.0*
- - Orifice vésico-urétéral ¬ *Q62.1*
- - Uretère ¬ *Q62.1*
- Congénitales de l'anus ¬ *Q42.3*
- Due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire ¬ *T81.5*
- Embolique
- - Artérielle périphérique ¬ *I74.4*
- - ¬ *I74*
- Gangrène ¬
- - Hernie abdominale
- - - Non précisée, sans *K46.9*
- - - Précisées, sans *K45.8*
- - Hernie crurale
- - - Bilatérale, sans *K41.2*
- - - Unilatérale
- - - - *K41.40*

Occlusion *–suite*
- Gangrène ¬ *–suite*
- - Hernie crurale *–suite*
- - - Unilatérale *–suite*
- - - - Sans précision, sans *K41.9*
- - Hernie diaphragmatique, sans *K44.9*
- - Hernie épigastrique sans *K43.90*
- - Hernie incisionnelle sans *K43.2*
- - Hernie inguinale
- - - Bilatérale, sans *K40.2*
- - - Unilatérale ou sans précision, sans *K40.9*
- - Hernie ombilicale, sans *K42.9*
- - Hernie parastomale, sans *K43.5*
- - Hernie paroi abdominale antérieure
- - - Non précisées sans *K43.99*
- - - Sans *K43.98*
- Intestin par calculs biliaires ¬ *K56.3*
- Intestinale
- - Distale ¬ Syndrome d' *E84.1*
- - Due à un lait épaissi ¬ *P76.2*
- - Nouveau-né, sans précision ¬ *P76.9*
- - Postopératoire ¬ *K91.3*
- - Sans hernie ¬ Iléus paralytique et *K56*
- - ¬
- - - Adhérences péritonéales (brides), avec *K56.5*
- - - Hernie avec *K46.0*
- Intestinales
- - Précisées du nouveau-né ¬ Autres *P76.8*
- - Sans précision ¬ *K56.6*
- Lésion Cameron
- - Érosive aiguë
- - - Hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - - *K44.0, K29.0*
- - - - Sans *K44.9, K29.0*
- - - ¬ Hernie diaphragmatique
- - - - *K44.0, K29.1*
- - - - Sans *K44.9, K29.1*
- - Ulcéreux
- - - Aiguë
- - - - Hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - - - *K44.0, K25.0*
- - - - - Sans *K44.9, K25.0*
- - - - Sans hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - - - *K44.0, K25.3*
- - - - - Sans *K44.9, K25.3*
- - - Chronique
- - - - Hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - - - *K44.0, K25.4*
- - - - - Sans *K44.9, K25.4*
- - - - Sans hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - - - *K44.0, K25.7*
- - - - - Sans *K44.9, K25.7*
- - - ¬ Hernie diaphragmatique

Occlusion *–suite*
- Lésion Cameron *–suite*
- - Ulcéreux *–suite*
- - - ¬ Hernie diaphragmatique *–suite*
- - - - *K44.0, K25.9*
- - - - Sans *K44.9, K25.9*
- Linguale postérieure des dents inférieures ¬ *K07.2*
- Obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon ¬ *Q42*
- Pupillaire ¬ *H21.4*
- Rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI ¬ obstruction, *Q41*
- Sans gangrène ¬
- - Hernie
- - - Interstitielle provoquant une *K46.0*
- - - Intestinale provoquant une *K46.0*
- - - Intra-abdominale provoquant une *K46.0*
- - - Paroi abdominale antérieure
- - - - *K43.68*
- - - - Non précisées avec *K43.69*
- - - Provoquant une *K46.0*
- - Hernie abdominale
- - - Non précisée, avec *K46.0*
- - - Siège précisé, avec *K45.0*
- - Hernie crurale
- - - Bilatérale, avec *K41.0*
- - - Unilatérale
- - - - Provoquant une *K41.3*
- - - - Sans précision, avec *K41.3*
- - Hernie diaphragmatique
- - - *K44.0*
- - - Provoquant une *K44.0*
- - Hernie incisionnelle avec *K43.0*
- - Hernie inguinale
- - - Bilatérale, avec *K40.0*
- - - Unilatérale
- - - - Provoquant une *K40.3*
- - - - Sans précision, avec *K40.3*
- - Hernie ombilicale
- - - *K42.0*
- - - Provoquant une *K42.0*
- - Hernie parastomale avec *K43.3*
- - Hernie ventrale causant une *K43.69*
- Sténose
- - Artère basilaire ¬ *I65.1*
- - Artère carotide ¬ *I65.2*
- - Artère cérébrale
- - - Antérieure ¬ *I66.1*
- - - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.5*
- - - Moyenne ¬ *I66.0*
- - - Multiples et bilatérales ¬ *I66.4*
- - - Postérieure ¬ *I66.2*
- - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ *I63*

Occlusion *–suite*
- Sténose *–suite*
- - Artère cérébrale *–suite*
- - - Sans précision ¬ *I66.9*
- - - ¬ *I66.8*
- - Artère perforante ¬ *I66.8*
- - Artère précérébrale
- - - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.2*
- - - Multiples et bilatérales ¬ *I65.3*
- - - Sans précision ¬ *I65.9*
- - - ¬ *I65.8*
- - Artère vertébrale ¬ *I65.0*
- - Artères cérébelleuses ¬ *I66.3*
- Thrombotique ¬ *I74*
- Transitoire de l'artère de la rétine ¬ *H34.0*
- Tronc brachio-céphalique ¬
- - *I65.8*
- - Infarctus cérébral par *I63.2*
- Tubaire ¬ *N97.1*
- Vasculaire rétinienne, sans précision ¬ *H34.9*
- Vasculaires rétiniennes ¬ Autres *H34.8*
- Veine
- - Centrale rétinienne ¬ *H34.8*
- - Coronaires n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*
- - Hépatiques ¬
- - - *I82.0*
- - - Syndrome de Budd-Chiari [Syndrome d' *I82.0*
- - Rétine
- - - Branche ¬ *H34.8*
- - - Centrale ¬ *H34.8*
- - - Débutante ¬ *H34.8*
- - - Partielle ¬ *H34.8*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.0*
- ¬
- - Adhérences de l'intestin [brides] avec *K56.5*
- - Hernie crurale
- - - Récidivante, avec *K41.31*
- - - Unilatérale récidivante, avec *K41.31*
- - Hernie de la ligne médiane
- - - *K43.68*
- - - Causant une *K43.68*
- - Hernie de Spiegel
- - - *K43.68*
- - - Causant une *K43.68*
- - Hernie épigastrique
- - - *K43.60*
- - - Causant une *K43.60*
- - Hernie hiatale avec *K44.0*
- - Hernie hypogastrique causant une *K43.68*
- - Hernie incisionnelle provoquant une *K43.0*
- - Hernie parastomale
- - - *K43.3*

Occlusion *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hernie parastomale *–suite*
- - - Provoquant une *K43.3*
- - Hernie sous-xiphoïdienne
- - - *K43.68*
- - - Causant une *K43.68*

Occulta ¬ Spina bifida *Q76.0*

Occulte
- Externe zonale aiguë] ¬ AZOOR [Rétinopathie *H30.8*
- Selles ¬ Sang *R19.5*
- ¬ Dystrophie maculaire *H35.5*

Ochoa ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Ochronose
- Chloasma de la paupière ¬ *E70.2†, H03.8**
- Endogène ¬ *E70.2*
- Héréditaire ¬ *E70.2*
- ¬
- - *E70.2*
- - Affection systémique du tissu conjonctif au cours d' *E70.2†, M36.8**
- - Arthrite au cours d' *E70.2†, M14.59**

Oculaire
v./v.a. Albinisme oculaire
v./v.a. Complication oculaire
v./v.a. rétro-oculaire
v./v.a. Spondylo-oculaire
- Anomalies congénitales multiples ¬ Syndrome de microcéphalie-dysmorphie faciale-anomalies *Q87.0*
- Avitaminose A ¬ Autres manifestations *E50.7*
- Cardiopulmonaires et squelettiques ¬ Syndrome de mèches blanches avec dysmorphies faciales et malformations *Q87.8*
- Cérébrales ¬ Hypopigmentation linéaire avec asymétrie cranio-faciale et anomalies acrales, *Q87.0*
- Chronique stade
- - 1 ¬ Maladie GVH *T86.05†, H58.21**
- - 2 ¬ Maladie GVH *T86.06†, H58.22**
- - 3 ¬ Maladie GVH *T86.07†, H58.23**
- Cicatricielle ¬ Pemphigoïde *L12.1†, H13.3**
- Commun
- - III) ¬ Paralysie du nerf moteur *H49.0*
- - ¬ Lésion traumatique du nerf moteur *S04.1*
- Congénital ¬ Kyste *Q15.8*
- Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du globe *S05.5*
- Cours
- - Herpès zoster ¬ Maladie *B02.3†, H58.8**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du corps vitré et du globe *H45.8**
- Cutanées ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-obésité-prognathisme-anomalies *Q87.8*

Oculaire *–suite*
- Décompensé ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec complications *E11.31†, H58.8**
- Due au virus de l'herpès simplex ¬ Affections *B00.5†, H58.8**
- Excroissance préauriculaire-polythélie ¬ Syndrome de lipodermoïde du globe *Q18.2*
- Externe
- - VI) ¬ Paralysie du nerf moteur *H49.2*
- - ¬ Lésion traumatique du nerf moteur *S04.4*
- Hyperthyroïdienne ¬ Maladie *E05.9†, H58.8**
- Imperforation du canal lacrymonasal ¬ Syndrome de microtie-colobome *Q15.8, Q17.2*
- Limité-absence de point lacrymal ¬ Syndrome de ptosis-mouvement *Q87.0*
- Mycobacterium leprae ¬ Infection *A30.9†, H58.8**
- Protrusion ou perte de tissu intraoculaire ¬ Lacération et rupture *S05.2*
- Psychogènes ¬ Troubles *F45.8*
- SAI ¬ Pénétration *S05.6*
- Sans
- - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du globe *S05.6*
- - Précision ¬ Affection du globe *H44.9*
- - Protrusion ou perte de tissu intraoculaire ¬ Lacération *S05.3*
- Sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale hypercalciurie néphrocalcinose
- - Atteinte *E83.4*
- - Sans atteinte *E83.4*
- Surnuméraire ¬ Muscle *Q10.3*
- Thyréotoxique ¬ Maladie *E05.9†, H58.8**
- Tissus de l'orbite ¬ Contusion du globe *S05.1*
- Virus de l'herpès ¬ Affections *B00.5†, H58.8**
- ¬
- - Affections
- - - Dégénératives du globe *H44.3*
- - - Globe *H44.8*
- - Albinisme: cutanéo- *E70.3*
- - Atrophie du globe *H44.5*
- - Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe *T26.2*
- - Cataracte (au cours de): secondaire à des affections *H26.2*
- - Complication mécanique d'autres prothèses, implants ou greffes *T85.3*
- - Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe *T26.7*
- - Cysticercose *B69.1†, H45.1**
- - Dégénérescence du globe *H44.5*
- - Diabète sucré
- - - Maladie *E14.30†, H58.8**
- - - Type
- - - - 1 avec maladie *E10.30†, H58.8**

Oculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Diabète sucré *–suite*
- - - Type *–suite*
- - - - 2 avec maladie *E11.30†, H58.8**
- - Douleur *H57.1*
- - Dystrophie *G71.08*
- - Dystrophie musculaire *G71.08*
- - Glaucome secondaire
- - - Affections *H40.5*
- - - Traumatisme *H40.3*
- - Globe
- - - *C69.9*
- - - *D31.9*
- - Hypertension *H40.0*
- - Limitation traumatique des mouvements des muscles *H50.6*
- - Lissencéphalie pavimenteuse sans atteinte musculaire ou *Q04.3*
- - Luxation du globe *H44.8*
- - Maladie de Basedow avec maladie *E05.0†, H58.8**
- - Mélanocytome du globe *D31.9*
- - MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec complications *E11.30†, H58.8**
- - Myiase *B87.2†, H58.8**
- - Myopathie *G71.08*
- - Nystagmus et autres anomalies des mouvements *H55*
- - Œdème *H57.9*
- - Phtisie du globe *H44.5*
- - Rétention (ancienne) de corps étranger magnétique dans: paroi postérieure du globe *H44.6*
- - Syndrome
- - - Ataxie cérébelleuse autosomique récessive-saccade *G11.8*
- - - Caractérisé par des anomalies de l'oreille, une fente labio-palatine et des anomalies *Q87.0*
- - Tuberculose *A18.5*
- - Tularémie *A21.1*

Ocularis ¬ Pemphigus *L12.1†, H13.3**

Oculo
v./v.a. cérébro-oculo-facio-squelettique
- Cardio-génito-urinaire] ¬ NOCGUS [Syndrome neuro- *Q87.8*
- Cérébro-rénal de Lowe ¬ Syndrome *E72.0*
- Dento-digitale ¬ Dysplasie *Q87.0*
- Faciale congénitale ¬ Paralysie *Q87.0*
- Oto-dentaire] ¬ Syndrome OOD [*Q87.0*
- Oto-radial ¬ Syndrome *Q87.8*
- Synovial
- - Localisations multiples ¬ Syndrome urétro- *M02.30*
- - ¬
- - - Conjonctivite au cours de syndrome urétro- *M02.39*

Oculo *–suite*
- Synovial *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Kératodermie au cours de syndrome urétro- *M02.39†, L86**
- Urétro-articulaire ¬ Syndrome *M02.39*

Oculo-auriculaire type Schorderet ¬ Syndrome *Q87.0*

Oculo-auriculo-fronto-nasal ¬ Syndrome *Q87.0*

Oculo-auriculo-vertébral
- Anomalies radiales ¬ Spectre *Q87.0*
- ¬ Spectre *Q87.0*

Oculo-auriculo-vertebralis] ¬ Syndrome de Goldenhar [Dysplasia *Q87.0*

Oculo-cérébral
- Hypopigmentation, type Preus ¬ Syndrome *E70.3*
- Primitif non hodgkinien ¬ Lymphome *C83.3*

Oculo-cérébro-cutané ¬ Syndrome *Q87.8*

Oculo-cérébro-facial type Kaufman ¬ Syndrome *Q87.0*

Oculo-cérébro-rénale ¬ Dystrophie *E72.0*

Oculo-cutané
v./v.a. Albinisme oculo-cutané
- ¬
- - Syndrome d'ostéoporose-hypopigmentation *Q87.1*
- - Tyrosinémie *E70.2*

Oculo-dentaire de Rutherfurd ¬ Syndrome *Q87.8*

Oculo-gastro-intestinale ¬ Dystrophie musculaire *Q43.8*

Oculogastrointestinal-trouble neurologique du développement ¬ Syndrome *Q87.8*

Oculo-glandulaire ¬
- Listériose *A32.8*
- Tularémie *A21.1*

Oculogramme [EOG] ¬ Anomalies (de): électro- *R94.1*

Oculo-mandibulaire ¬ Dysostose *Q75.5*

Oculo-maxillo-faciale ¬ Dysostose *Q75.1*

Oculomoteur ¬
- Fibrose congénitale des muscles *H49.8*
- Paralysie alternante du nerf *G83.8*
- Paralysie congénitale
- - Nerf *H49.0*
- - Plusieurs nerfs de muscles *H49.9*

Oculomotrice
- Mouvements hyperkinétiques-retard de développement ¬ Syndrome d'hypotonie infantile-anomalies *Q87.8*
- Type
- - 1] ¬ AOA1 [Syndrome d'ataxie-apraxie *G11.3*
- - 2] ¬ AOA2 [Syndrome d'ataxie-apraxie *G60.2*
- - 4] ¬ AOA4 [Syndrome d'ataxie-apraxie *G11.1*
- - Cogan ¬ Apraxie *H51.8*

Oculomotrice *–suite*
- ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique récessive-signes pyramidaux-nystagmus-apraxie *G11.1*

Oculo-ostéo-cutané ¬ Syndrome *Q87.5*

Oculo-palato-cérébral ¬ Nanisme *Q87.1*

Oculopathie
- Cours
- - Syphilis secondaire précoce ¬ *A51.4†, H58.8**
- - Syphilis tardive ¬ *A52.7†, H58.8**
- Syphilitique
- - Congénitale tardive ¬ *A50.3†, H58.8**
- - Précoce ¬ *A51.4†, H58.8**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, H58.8**
- - ¬ *A52.7†, H58.8**
- Toxoplasma ¬ *B58.0†*
- ¬ Syphilis congénitale précoce avec *A50.0†, H58.8**

Oculo-pharyngé
- Distale ¬ Myopathie *G71.08*
- ¬
- - Dystrophie musculaire *G71.08*
- - Myopathie *G71.08*

Oculo-réno-cérébelleux ¬ Syndrome *Q87.8*

Oculo-squeletto-dentaire ¬ Syndrome *Q87.1*

Oculo-tricho-anal ¬ Syndrome *Q87.8*

Oculo-tricho-dysplasie ¬ *Q82.8, H35.5*

Oculo-urétro-synovial
- Avant-bras ¬ Syndrome *M02.33*
- Bassin ¬ Syndrome *M02.35*
- Bras ¬ Syndrome *M02.32*
- Cheville ¬ Syndrome *M02.37*
- Colonne vertébrale ¬ Syndrome *M02.38*
- Cuisse ¬ Syndrome *M02.35*
- Jambe ¬ Syndrome *M02.36*
- Main ¬ Syndrome *M02.34*
- Pied ¬ Syndrome *M02.37*
- Région scapulaire ¬ Syndrome *M02.31*
- ¬ Syndrome *M02.39*

Ocytocique ¬
- Échec du déclenchement (du travail) (par): *O61.0*
- Intoxication: *T48.0*

Oddi ¬ Spasme du sphincter d' *K83.4*

Odeur
- Expectoration ¬ Anomalie de: *R09.3*
- Poisson ¬ Syndrome de l' *E88.8*
- Sirop d'érable ¬ Maladie des urines à *E71.0*

Odontoclasie ¬ *K02.4*

Odontodysplasie
- Généralisée ¬ *K00.4*
- Régionale ¬ *K00.4*

Odontogène
- Kératokystique
- - Mandibule ¬ Tumeur *D16.5*
- - Maxillaire ¬ Tumeur *D16.42*

Odontogène *–suite*
- Mandibule ¬
- - Carcinome *C41.1*
- - Fibrosarcome *C41.1*
- - Sarcome *C41.1*
- - Tumeur maligne *C41.1*
- Maxillaire
- - Supérieur ¬ Fibrosarcome *C41.02*
- - ¬ Kératokyste *D16.42*
- ¬
- - Fibrosarcome *C41.1*
- - Kératokyste *D16.5*
- - Kystes dentaires liés au développement (*K09.0*

Odontogénèse
- Sans précision ¬ Troubles de l' *K00.9*
- ¬ Autres troubles de l' *K00.8*

Odontogenesis imperfecta ¬ *K00.5*

Odonto-maxillaire segmentaire ¬ Dysplasie *K00.4*

Odonto-micronychiale ¬ Dysplasie ectodermique *Q82.8*

Odonto-onychiale-alopécie ¬ Syndrome de dysplasie *Q84.8*

Odonto-onychodermique ¬ Dysplasie *Q82.8*

Odontosarcome
- Améloblastique de la mandibule ¬ *C41.1*
- Mandibule ¬ *C41.1*
- Maxillaire supérieur ¬ *C41.02*

Odonto-trichomélique ¬ Syndrome *Q87.8*

Odonto-tricho-unguéo-digito-palmaire ¬ Syndrome *Q82.8*

Odorat goût
- Non précisés ¬ Troubles de l' *R43.8*
- ¬ Troubles associés de l' *R43.8*

Œdémateuse ¬ Laryngite (aiguë): *J04.0*

Œdème
v./v.a. Angio-œdème
- Aigu) du poumon dû à des agents chimiques ¬ *J68.1*
- Angioneurotique
- - Familial ¬ *D84.1*
- - Héréditaire ¬
- - - *D84.1*
- - - Urticaire avec *D84.1*
- - ¬ *T78.3*
- Augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.22*
- Canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Cérébral
- - Traumatique ¬ *S06.1*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P11.0*
- - ¬ *G93.6*

Œdème *–suite*
- Chaleur ¬ *T67.7*
- Conjonctive ¬ *H11.4*
- Cornée ¬ Autre *H18.2*
- Cours de syndrome néphrotique ¬ *N04.9*
- Épithélium buccal, y compris la langue ¬ Leuco- *K13.2*
- Famine ¬ *E43*
- Fœtal généralisé ¬ *P83.2*
- Généralisé ¬ *R60.1*
- Gestationnel
- - Protéinurie ¬ *O12.2*
- - ¬ *O12.0*
- Glotte ¬ *J38.4*
- Hypsarythmie, et atrophie optique] ¬ Syndrome PEHO [encéphalopathie progressive avec *G31.88*
- Larynx ¬ *J38.4*
- Localisé ¬ *R60.0*
- Macula ¬ Diabète sucré avec *E14.30†, H36.0**
- Maculaire cystoïde héréditaire dominant ¬ *H35.5*
- Moelle cervicale ¬ Contusion et *S14.0*
- Moelle dorsale ¬ Contusion et *S24.0*
- Moelle épinière ¬ *G95.18*
- Moelle lombaire [Conus medullaris] ¬ Contusion et *S34.0*
- Nerf optique-splénomégalie-anhidrose-céphalée migraineuse ¬ Syndrome de dystrophie rétinienne- *Q87.8*
- Niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- Oculaire ¬ *H57.9*
- Orbite ¬ *H05.2*
- Palpébral ¬ *H02.8*
- Papillaire
- - Sans précision ¬ *H47.1*
- - Syphilitique ¬ *A52.1†, H48.0**
- Périodique héréditaire ¬ *D84.1*
- Périphérique ¬ *R60.0*
- Pharynx ou du rhinopharynx ¬ *J39.2*
- Poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ *J68.1*
- Protéinurie - hypertension] ¬ Gestose EPH [*O14.9*
- Pulmonaire
- - Aigu
- - - Mention de maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque ¬ *I50.1*
- - - ¬ *J81*
- - Haute altitude ¬ *T70.2*
- - ¬ *J81*
- Quincke
- - Héréditaire ¬ *D84.1*
- - ¬ *T78.3*
- SAI ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.28*
- Sans précision

Œdème *–suite*
- Sans précision *–suite*
- - Spécifiques du fœtus et du nouveau-né ¬ *P83.3*
- - ¬ *R60.9*
- Sous-glottique ¬ *J38.4*
- Stade non précisé ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.28*
- Substance blanche ¬ Leucoencéphalopathie avec ataxie cérébelleuse modérée et *E75.2*
- Surface cutané
- - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.21*
- - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.20*
- Sus-glottique ¬ *J38.4*
- Traumatique de la moelle épinière ¬ *T09.3*

Œil
- Annexe
- - Actes médical
- - - Sans précision ¬ Affection de l' *H59.9*
- - - ¬ Autres affections de l' *H59.8*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections précisées de l' *H58.8**
- - Partie non précisée ¬
- - - Brûlure de l' *T26.4*
- - - Corrosion de l' *T26.9*
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H57.9*
- - ¬
- - - Affections précisées de l' *H57.8*
- - - Brûlure d'autres parties de l' *T26.3*
- - - Corrosion d'autres parties de l' *T26.8*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l' *C69.8*
- Artificiel ¬
- - *Z97.8*
- - Mise en place et ajustement d'un *Z44.2*
- Beurre noir ¬ *S00.1*
- Cerveau
- - Leucodystrophie multikystique bilatérale ¬ Syndrome muscle- *G71.2, E75.2*
- - ¬ Syndrome muscle- *G71.2*
- Chat ¬ Syndrome des *Q92.8*
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ Fond d' *E10.30†, H36.0**
- - - 2 ¬ Fond d' *E11.30†, H36.0**
- - ¬ Fond d' *E14.30†, H36.0**
- Due
- - Toxoplasmes ¬ Affection des *B58.0†, H58.8**
- - Traumatisme obstétrical ¬ Lésion de l' *P15.3*

Œil *–suite*
- Exsudatif ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- Implant ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- Kystique ¬ *Q11.0*
- Nouveau-né ¬ Gonorrhée de l' *A54.3†, H13.1**
- Orbite
- - Non précisée ¬ Lésion traumatique de l' *S05.9*
- - ¬
- - - Lésions traumatiques de l' *S05.8*
- - - Séquelles de lésion traumatique de l' *T90.4*
- Oreille ¬
- - Anomalies du membre supérieur, de l' *Q87.8*
- - Examen spécial de dépistage des affections des *Z13.5*
- Parasitaire ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- Parties de la face, de la tête et du cou ¬ *T20*
- Poisson ¬ Maladie des *E78.6*
- Rudimentaire ¬ *Q11.2*
- SAI ¬
- - Anomalie congénitale de l' *Q15.9*
- - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- - Lacération de l' *S05.3*
- - Lésion traumatique de l' *S05.9*
- - Rétinopathie (avec)(de): fond de l' *H35.0*
- Sans précision ¬
- - Corps étranger dans la partie externe de l' *T15.9*
- - Malformation congénitale
- - - *Q15.9*
- - - Chambre
- - - - Antérieure de l' *Q13.9*
- - - - Postérieure de l' *Q14.9*
- - Tumeur bénigne: *D31.9*
- - Tumeur maligne: *C69.9*
- Secs ¬ Syndrome des *H04.1*
- Vision ¬ Examen des *Z01.0*
- ¬
- - *D48.7*
- - *Z90.0*
- - Affections de plusieurs structures de l' *H44*
- - Agénésie de l' *Q11.1*
- - Aplasie de l' *Q11.1*
- - Arrachement de l' *S05.7*
- - Artériosclérose du fond de l' *I70.8†, H36.8**
- - Candidose de l' *B37.88†, H58.8**
- - Carcinoma in situ: *D09.2*
- - Colobome du fond de l' *Q14.8*
- - Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l' *T15.8*
- - Cysticercose de l' *B69.1†, H45.1**

Œil *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Décompensation de greffe de cornée de l' *T86.83*
- - Dysplasie de l' *Q11.2*
- - Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de cornée de l' *T86.83*
- - Glaucome secondaire à une inflammation de l' *H40.4*
- - Gliome malin de l' *C69.9*
- - Gonorrhée de l' *A54.3*
- - Herpès simplex de l' *B00.5†, H58.8**
- - Hypoplasie de l' *Q11.2*
- - Hypotonie de l' *H44.4*
- - Infection gonococcique de l' *A54.3*
- - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- - Maladie virale de l' *B33.8†, H58.8**
- - Malformation congénitale
- - - Chambre
- - - - Antérieure de l' *Q13.8*
- - - - Postérieure de l' *Q14.8*
- - - Précisées de l' *Q15.8*
- - Mycose des *B49†, H58.8**
- - Nævus d'Ota sur la peau du visage (à l'exception des *D22.3*
- - Rejet
- - - Aigu de greffe de cornée de l' *T86.83*
- - - Chronique de greffe de cornée de l' *T86.83*
- - Rétention (ancienne) de corps étranger magnétique dans: chambre antérieure de l' *H44.6*
- - Sidérose de l' *H44.3*
- - Syndrome
- - - Diarrhée intraitable-atrésie choanale-anomalie des *Q87.8*
- - - Hypoplasie de la fovéa avec anomalie du chiasma optique et dysgénésie du segment antérieur de l' *Q15.8*
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, H58.8**
- - Thrombose de la veine centrale de l' *H34.8*
- - Tuberculose de l' *A18.5*
- - Tumeur bénigne caronculaire de l' *D31.0*
- - Tumeur maligne caronculaire de l' *C69.0*

Œsophage
v./v.a. brachy-œsophage
- Abdominal
- - Type glande salivaire ¬ Carcinome de l' *C15.2*
- - ¬
- - - Adénocarcinome de l' *C15.2*
- - - Carcinome épidermoïde de l' *C15.2*
- - - Carcinome indifférencié de l' *C15.2*
- - - Néoplasie neuroendocrine de l' *C15.2*
- - - TSGI [Tumeur stromale gastro-intestinale] de l' *C15.2*
- - - Tumeur maligne: *C15.2*
- Acquis) ¬ Ptérygion de l' *K22.2*

Œsophage *–suite*
- Anomalies rénales et des membres] ¬ Syndrome de VACTERL [anomalies vertébrales, atrésie anale, anomalies cardiaques, fistule trachéo-œsophagienne avec atrésie de l' *Q87.2*
- Barrett ¬
- - Dysplasie de haut grade chez les patients présentant un *D00.1*
- - Endobrachyœsophage [*K22.7*
- - Œsophagite par reflux avec *K21.0, K22.7*
- Casse-noisettes ¬ *K22.4*
- Cervical
- - Œsophage cervical ¬ Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l' *S11.22*
- - Pharynx ¬ Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l' *S11.21*
- - Type glande salivaire ¬ Carcinome de l' *C15.0*
- - ¬
- - - *S10.0*
- - - Carcinome épidermoïde
- - - - *C15.0*
- - - - *C15.1*
- - - Carcinome indifférencié de l' *C15.0*
- - - Néoplasie neuroendocrine de l' *C15.0*
- - - Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: *S11.22*
- - - TSGI [Tumeur stromale gastro-intestinale] de l' *C15.0*
- - - Tumeur maligne: *C15.0*
- Congénital) ¬ Diverticule de l' *Q39.6*
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de l' *K23.8**
- Distal ¬
- - Carcinome de l' *C15.5*
- - Spasme de l' *K22.4*
- Dysplasie rénale et du radius] ¬ Syndrome de VATER [anomalies vertébrales, atrésie anale, anomalies cardiaques, fistule trachéo-œsophagienne avec atrésie de l' *Q87.2*
- Estomac ¬ *C16.0*
- Fistule broncho-œsophagienne ¬ Atrésie de l' *Q39.1*
- Fistule trachéo-œsophagienne ¬ Atrésie de l' *Q39.1*
- Fongique ¬ Ulcère de l' *K22.1*
- Hypercontractile ¬ *K22.4*
- Ingestion
- - Médicaments ¬ Ulcère de l' *K22.1*
- - Produits chimiques ¬ Ulcère de l' *K22.1*
- Partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.83*
- Peptique ¬ Ulcère de l' *K22.1*
- SAI ¬ Atrésie de l' *Q39.0*
- Sans
- - Fistule ¬
- - - Atrésie de l' *Q39.0*
- - - Obstruction congénitale de l' *Q39.0*

Œsophage *–suite*
- Sans *–suite*
- - Précision ¬
- - - Maladie de l' *K22.9*
- - - Malformation congénitale de l' *Q39.9*
- - - Tumeur maligne: *C15.9*
- Thoracique
- - Type glande salivaire ¬ Carcinome de l' *C15.1*
- - ¬
- - - Carcinome indifférencié de l' *C15.1*
- - - Néoplasie neuroendocrine de l' *C15.1*
- - - Plaie ouverte de l' *S27.83, S21.83!*
- - - TSGI [Tumeur stromale gastro-intestinale] de l' *C15.1*
- - - Tumeur maligne: *C15.1*
- Tire-bouchon ¬ *K22.4*
- Tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments ¬ Maladie de Crohn de l' *K50.82*
- Tubulaire ¬ Troubles de la motilité de l' *K22.4*
- Type
- - 1 selon Vogt ¬ Atrésie de l' *Q39.0*
- - 2 selon Vogt ¬ Atrésie de l' *Q39.0*
- - 3a selon Vogt ¬ Atrésie de l' *Q39.1*
- - 3b selon Vogt ¬ Atrésie de l' *Q39.1*
- - 3c selon Vogt ¬ Atrésie de l' *Q39.1*
- - Glande salivaire
- - - Localisations contiguës ¬ Carcinome de l' *C15.8*
- - - ¬ Carcinome
- - - - *C15.9*
- - - - Tiers
- - - - - Inférieur de l' *C15.5*
- - - - - Moyen de l' *C15.4*
- - - - - Supérieur de l' *C15.3*
- ¬
- - *D37.78*
- - Abcès de l' *K20.8*
- - Absence de l' *Q39.8*
- - Achalasie
- - - *K22.0*
- - - Idiopathique de l' *K22.0*
- - - Primitive de l' *K22.0*
- - Adénocarcinome
- - - *C15.9*
- - - Tiers inférieur de l' *C15.5*
- - Atrésie de l' *Q39.0*
- - Blessure cervicale de l' *S19.9*
- - Brûlure de l' *T28.1*
- - Carcinoma in situ: *D00.1*
- - Carcinome
- - - *C15.9*
- - - Localisations contiguës de l' *C15.8*
- - - Tiers
- - - - Inférieur de l' *C15.5*
- - - - Moyen de l' *C15.4*

Œsophage *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carcinome *–suite*
- - - Tiers *–suite*
- - - - Supérieur de l' *C15.3*
- - Carcinome épidermoïde
- - - *C15.9*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C15.8*
- - - Tiers
- - - - Inférieur de l' *C15.5*
- - - - Moyen de l' *C15.4*
- - - - Supérieur de l' *C15.3*
- - Carcinome indifférencié
- - - *C15.9*
- - - Localisations contiguës de l' *C15.8*
- - - Tiers
- - - - Inférieur de l' *C15.5*
- - - - Moyen de l' *C15.4*
- - - - Supérieur de l' *C15.3*
- - Cardiospasme de l' *K22.0*
- - Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes à l' *T85.50*
- - Compression de l' *K22.2*
- - Constriction de l' *K22.2*
- - Corps étranger dans l' *T18.1*
- - Corrosion de l' *T28.6*
- - Dédoublement de l' *Q39.8*
- - Déplacement congénital de l' *Q39.8*
- - Dilatation congénitale de l' *Q39.5*
- - Diverticule acquis de l' *K22.5*
- - Double arc aortique avec constriction circulaire de la trachée et de l' *Q25.4*
- - Duplication tubulaire de l' *Q39.8*
- - Dyskinésie de l' *K22.4*
- - Érosion de l' *K20.8*
- - Fistule de l' *K22.80*
- - Hémorragie de l' *K22.81*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- - Maladie de Crohn de l' *K50.81*
- - Maladies précisées de l' *K22.88*
- - Malformations congénitales de l' *Q39.8*
- - Néoplasie neuroendocrine
- - - *C15.9*
- - - Tiers
- - - - Inférieur de l' *C15.5*
- - - - Moyen de l' *C15.4*
- - - - Supérieur de l' *C15.3*
- - Néoplasme neuroendocrine à localisations contiguës de l' *C15.8*
- - Obstruction de l' *K22.2*
- - Occlusion
- - - Acquise de l' *K22.2*
- - - Congénitale de l' *Q39.0*
- - Œsophagite reflux
- - - Hémorragie de l' *K21.0, K22.81*

Œsophage *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Œsophagite reflux *–suite*
- - - Sténose de l' *K21.0, K22.2*
- - - Ulcère de l' *K21.0, K22.1*
- - Perforation de l' *K22.3*
- - Ptérygion congénital de l' *Q39.4*
- - Rétrécissement
- - - *K22.2*
- - - Syphilitique
- - - - *A52.7†, K23.8**
- - - - Congénitale de l' *A50.5†, K23.8**
- - Rupture de l' *K22.3*
- - Spasme
- - - *K22.4*
- - - Diffus de l' *K22.4*
- - Sténose
- - - *K22.2*
- - - Congénitaux de l' *Q39.3*
- - - Rétrécissement congénitaux de l' *Q39.3*
- - - Syphilitique
- - - - *A52.7†, K23.8**
- - - - Congénitale de l' *A50.5†, K23.8**
- - Syndrome
- - - Anophtalmie-atrésie de l' *Q11.1, Q39.0*
- - - Microphtalmie-atrésie de l' *Q11.2, Q39.0*
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, K23.8**
- - TSGI Tumeur stromale gastro-intestinale
- - - *C15.9*
- - - Tiers
- - - - Inférieur de l' *C15.5*
- - - - Moyen de l' *C15.4*
- - - - Supérieur de l' *C15.3*
- - Tuberculose de *A18.8†, K23.0**
- - Tumeur bénigne: *D13.0*
- - Tumeur maligne
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C15.8*
- - - Tiers
- - - - Inférieur de l' *C15.5*
- - - - Moyen de l' *C15.4*
- - - - Supérieur de l' *C15.3*
- - Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] à localisations contiguës de l' *C15.8*
- - Ulcère de l' *K22.1*

Œsophagien
v./v.a. laryngo-trachéo-œsophagienne
- Acquise ¬ Poche *K22.5*
- Anti-reflux ¬ Complication mécanique d'un dispositif *T85.50*
- Congénitale ¬ Poche *Q39.6*
- Estomac ¬
- - Carcinome épidermoïde de l'orifice *C16.0*
- - Orifice *C16.0*
- Gastrique cours maladies classées chapitres
- - Mention d'hémorragie ¬ Varices *I98.3**

Œsophagien *–suite*
- Gastrique cours maladies classées chapitres *–suite*
- - Sans indication d'hémorragie ¬ Varices *I98.2**
- Hémorragiques ¬ Varices *I85.0*
- Kystique ¬ Duplication *Q39.8*
- Non hémorragiques ¬ Varices *I85.9*
- Nouveau-né ¬ Reflux *P78.8*
- Répondant aux inhibiteurs de la pompe à protons ¬ Eosinophilie *K20.0*
- SAI ¬
- - Reflux *K21.9*
- - Varices *I85.9*
- ¬
- - Atrésie de l'œsophage avec fistule broncho- *Q39.1*
- - Cirrhose
- - - Alcoolique foie
- - - - Hémorragie par rupture des varices *K70.3†, I98.3**
- - - - Varices *K70.3†, I98.2**
- - - Foie
- - - - Hémorragie par rupture des varices *K74.6†, I98.3**
- - - - Varices *K74.6†, I98.2**
- - - Toxique foie
- - - - Hémorragie par rupture des varices *K71.7†, I98.3**
- - - - Varices *K71.7†, I98.2**
- - Glissement du cardia à travers le hiatus *Q40.1*
- - Néoplasie *D37.78*
- - Plexus: *S24.4*
- - Poche *Q39.6*

Œsophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de Raynaud-troubles moteurs *M34.1*

Œsophagite
- Alcaline ¬ *K20.8*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, K23.8**
- Candida ¬ *B37.81*
- Chimique ¬ *K20.8*
- Cours d'herpès ¬ *B00.8†, K23.8**
- Due
- - Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K23.8**
- - Irradiation ¬ *K20.1*
- Éosinophiles [EoE] ¬ *K20.0*
- Infectieuse ¬ *K20.9*
- Nécrotique ¬ *K20.9*
- Peptique ¬ *K21.0*
- Postopératoire ¬ *K20.9*
- Radique ¬ *K20.1*
- Reflux
- - Hémorragie de l'œsophage ¬ *K21.0, K22.81*
- - Œsophage de Barrett ¬ *K21.0, K22.7*
- - Sténose de l'œsophage ¬ *K21.0, K22.2*

Œsophagite *–suite*
- Reflux *–suite*
- - Ulcère de l'œsophage ¬ *K21.0, K22.1*
- - ¬ *K21.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, K23.0**
- Ulcéreuse ¬ *K22.1*
- Virale ¬ *K20.8*
- Virus d'Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K23.8**
- ¬
- - *K20.9*
- - Reflux gastro-œsophagien
- - - *K21.0*
- - - Sans *K21.9*

Œsophago
- Bronchique ¬ Fistule *J86.05*
- Gastrique ¬
- - Adénocarcinome de la jonction *C16.0*
- - Carcinome épidermoïde de la jonction *C16.0*
- - Jonction: *C16.0*
- Pleural ¬
- - Fistule *J86.04*
- - Pyothorax avec fistule *J86.04*
- Pulmonaire ¬ Fistule *J86.05*
- Trachéal
- - Consécutive à une trachéotomie ¬ Fistule *J95.03*
- - ¬ Pyothorax avec fistule *J86.03*

Œsophago-pleuro-cutanée ¬ Fistule *J86.05*

Œsophagostomose] ¬ Infection par: Oesophagostomum [*B81.8*

Oesophagostomum [œsophagostomose] ¬ Infection par: *B81.8*

Œstrogènes
- Progestatifs ¬ Intoxication: Autres *T38.5*
- ¬
- - Diminution des *E28.3*
- - Syndrome de résistance aux récepteurs des *E34.8*

Œuf
- Clair et môle non hydatiforme ¬ *O02.0*
- Fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de tentative d'implantation d'un *N98.2*
- Helminthes NCA ¬ Granulome du péritoine dû à des *B83.9†, K67.8**
- Pathologique ¬ *O02.0*
- ¬ Non-implantation de l' *N97.2*

OFCD ¬ Syndrome *Q87.0*

OFD] ¬ Syndrome oro-facio-digital [*Q87.0*

Ofuji ¬ Maladie d' *L73.8*

Ogata
v./v.a. Kagami-Ogata

Ogden ¬ Syndrome d' *Q87.0*

Ogilvie ¬ Syndrome d' *K56.0*

Ogival ¬ Palais *Q38.5*

Ogna ¬ Épidermolyse bulleuse simple type *Q81.0*

Oguchi ¬ Maladie d' *H53.6*

Ogur
v./v.a. Zlotogora-Ogur

Ohaha ¬ Syndrome *G11.1*

Ohdo ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Ohtahara ¬ Syndrome d' *G40.3*

Ol
- Ostéogenèse imparfaite] ¬ *Q78.0*
- ¬ Dents opalescentes sans *K00.5*

Oignon ¬ *M20.1*

Oiseau type Montréal ¬ Nanisme à tête d' *Q87.1*

Oiseleurs
- Exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.21*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.20*
- ¬ Poumon des *J67.20*

Okamoto ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Okihiro ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Okinawa ¬ Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire type *G60.0*

Okur-Chung ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Olécrâne ¬ Fracture
- Ouverte de l' *S52.01, S51.87!*
- Partie supérieure du cubitus: *S52.01*

Olécrânienne ¬ Bursite *M70.2*

Oley ¬ Syndrome d' *Q82.8*

Olfactif
- I] ¬ Nerf: *S04.8*
- Nerf crânien I] ¬ Tumeur maligne: Nerf *C72.2*
- Premier nerf crânien] ¬ Affections du nerf *G52.0*
- ¬
- - Bulbe
- - - *C72.2*
- - - *D33.3*
- - Neuroblastome *C30.0*

Olfactive ¬ Intolérance *R44.8*

Olfacto-génitale de Kallmann-De Morsier ¬ Dysplasie *E23.0*

Oligo pauci articulaire
- Articulation
- - Cheville ¬ Arthrite chronique juvénile, forme *M08.47*
- - Coude ¬ Arthrite chronique juvénile, forme *M08.42*
- - Genou ¬ Arthrite chronique juvénile, forme *M08.46*
- Colonne vertébrale ¬ Arthrite chronique juvénile, forme *M08.48*
- Évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante *M08.3*
- Main ¬ Arthrite chronique juvénile, forme *M08.44*
- Pied ¬ Arthrite chronique juvénile, forme *M08.47*
- Poignet ¬ Arthrite chronique juvénile, forme *M08.43*

Oligo pauci articulaire *–suite*
- Région pelvienne ¬ Arthrite chronique juvénile, forme *M08.45*
- Région scapulaire ¬ Arthrite chronique juvénile, forme *M08.41*
- Sièges multiples ¬ Arthrite chronique juvénile, forme *M08.40*

Oligoamnios
- Sans mention de rupture des membranes ¬ *O41.0*
- ¬
- - *O41.0*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par un *P01.2*

Oligoarthrite
- Étendue] ¬ Arthrite juvénile chronique à début oligoarticulaire à évolution polyarticulaire [*M08.3*
- Juvénile ¬ *M08.49*

Oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended *M08.3*

Oligoarticulaire
- Évolution polyarticulaire [oligoarthrite étendue] ¬ Arthrite juvénile chronique à début *M08.3*
- ¬ Arthrite juvénile idiopathique *M08.49*

Oligoastrocytaire
v./v.a. Tumeur oligoastrocytaire

Oligoastrocytome
- Anaplasique
- - Cerveau ¬ *C71.0*
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - ¬ *C71.9*
- Cerveau ¬ *C71.0*
- Cervelet ¬ *C71.6*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*
- Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- ¬ *C71.9*

Oligocône trichromatie ¬ *H35.5*

Oligodactylie
- Post-axiale tétramélique ¬ *Q73.8*
- ¬ Syndrome de séquence de Pierre Robin- *Q87.0*

Oligodendrogliale
- Cervelet ¬ Tumeur *C71.6*
- Encéphale ¬ Tumeur *C71.0*

Oligodendrogliale *–suite*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Tumeur *C71.8*
- Lobe frontal ¬ Tumeur *C71.1*
- Lobe occipital ¬ Tumeur *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ Tumeur *C71.3*
- Lobe temporal ¬ Tumeur *C71.2*
- Tronc cérébral ¬ Tumeur *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬ Tumeur *C71.5*
- ¬ Tumeur *C71.9*

Oligodendrogliome
- Anaplasique
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Encéphale ¬ *C71.0*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Quatrième ventricule ¬ *C71.7*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Cerveau ¬ *C71.0*
- Cervelet ¬ *C71.6*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*
- Quatrième ventricule ¬ *C71.7*
- Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- ¬ *C71.9*

Oligodontie
v./v.a. surdité-oligodontie
- ¬
- - *K00.0*
- - Syndrome
- - - Fente palatine-anomalies carpo-tarsales- *Q87.8*
- - - Prédisposition au cancer- *K00.0*

Oligoméganéphronie ¬ *Q60.4*

Oligoménorrhée
- Primaire ¬ *N91.3*
- Sans précision ¬ *N91.5*
- Secondaire ¬ *N91.4*

Oligophrenia phenylpyruvica ¬ *E70.0*

Oligosaccharidose ¬ *E77.1*

Oligospermie SAI ¬ *N46*

Oligozoospermie ¬ Infertilité masculine monogénique avec *N46*

Oligurie
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*

Oligurie *–suite*
- ¬ Anurie et *R34*

Oliver
v./v.a. Adams-Oliver

Oliver-McFarlane ¬ Syndrome d' *Q87.1*

Olivo-ponto-cérébelleuse
- Familiale ¬ Dégénérescence *G23.3*
- Héréditaire ¬ Dégénérescence *G23.3*
- Surdité ¬ Syndrome d'atrophie *G23.3, H90.5*
- ¬ AOPC [atrophie *G23.3*

Ollendorff
v./v.a. Buschke-Ollendorff

Ollier ¬ Maladie d' *Q78.4*

OLLP] ¬ Ossification du ligament longitudinal postérieur [*M48.8*

Olmsted ¬ Syndrome d' *Q82.8*

Olszewski ¬ Maladie de Steele-Richardson- *G23.1*

Ombilic ¬
- *L02.2*
- *L03.3*
- Mélanome malin de l' *C43.59*
- Syndrome d'hydrocéphalie-implantation basse de l' *Q87.8*

Ombilical
v./v.a. Cordon ombilical
- Nouveau-né ¬
- - Hémorragies *P51.8*
- - Polype *P83.6*
- SAI ¬ Glissement de la ligature *P51.8*
- ¬
- - Diphtérie *A36.3*
- - Métastase *C79.2*
- - Périphlébite *I80.88*
- - Phlébite *I80.88*
- - Thrombose des vaisseaux *O69.5*
- - Tuméfaction diffuse ou généralisée: *R19.0*

Ombilicale
v./v.a. Artère ombilicale
v./v.a. Hernie ombilicale

Omenn ¬ Syndrome d' *D81.8*

Omodysplasie ¬ *Q78.8*

Omoplate
- Acromion ¬ Fracture de l' *S42.12*
- Ailée-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'incurvation latérale sévère du tibia-petite taille- *Q87.1*
- Apophyse coracoïde ¬ Fracture de l' *S42.13*
- Cavité glénoïde et col de l'omoplate ¬ Fracture de l' *S42.14*
- Corps ¬ Fracture de l' *S42.11*
- Humérus ¬ Fractures multiples de la clavicule, de l' *S42.7*
- Multiples ¬ Fracture de l' *S42.19*
- Os longs membre supérieur ¬
- - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.0*
- - Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: *C40.0*

Omoplate *–suite*
- Partie non précisée ¬ Fracture de l' *S42.10*
- SAI ¬ *S42.10*
- ¬
- - *T84.10*
- - Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- - Chondrosarcome de l' *C40.0*
- - Fracture de l'omoplate: Cavité glénoïde et col de l' *S42.14*
- - Luxation de l' *S43.3*
- - Ostéoblastome de l' *D16.0*
- - Ostéosarcome de l' *C40.0*
- - Raccourcissement congénital du ligament transverse supérieur de l' *Q68.8*
- - Région de l' *S41.80*
- - Sarcome d'Ewing de l' *C40.0*
- - Sarcome de l ' *C40.0*
- - Surélévation de l' *Q74.0*

Omphalite
- Nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère ¬ *P38*
- ¬ Tétanos au cours d'une *A33*

Omphalocèle
- Familial avec dysmorphie faciale ¬ Syndrome *Q87.1*
- Fente palatine ¬ Syndrome létal d' *Q87.8*
- Shprintzen-Goldberg ¬ Syndrome *Q87.8*
- ¬ *Q79.2*

Omphalocèle-macroglossie-gigantisme ¬ Syndrome d' *Q87.3*

Omphalo-mésentérique ¬
- Kyste *Q43.0*
- Persistance du canal *Q43.0*

OMS
- Due excès calorique ¬ Obésité grade
- - I (*E66.00*
- - II (*E66.01*
- - III (*E66.09*
- Hypoventilation alvéolaire ¬ Obésité grade
- - I (*E66.20*
- - II (*E66.21*
- - III (*E66.29*
- ¬ Obésité
- - Endogène grade
- - - I (*E66.80*
- - - II (*E66.81*
- - - III (*E66.89*
- - Grade
- - - I (*E66.90*
- - - II (*E66.91*
- - - III (*E66.99*
- - Médicamenteux grade
- - - I (*E66.10*
- - - II (*E66.11*
- - - III (*E66.19*

Omsk ¬ Fièvre hémorragique d' *A98.1*

Onchocercose ¬
- *B73*
- Infestation des paupières au cours de l' *B73†, H03.0**

Oncocytaire au cours de syndrome de Birt-Hogg-Dubé ¬ Adénome *D36.9, Q85.8*

Oncogénique ¬ Ostéomalacie *M83.89*

Oncovirus ¬ *B97.3!*

Onde
- Centrales pendant le sommeil ¬ Épilepsie focale infantile bénigne avec pointes- *G40.01*
- Continues pendant le sommeil lent] ¬ POCS [CSWS] [pointes *G40.01*
- Pression ¬ Effet d'une *T70.9*
- Q ¬ Infarctus du myocarde sans *I21.48*

Ondine ¬ Syndrome d' *G47.32*

Ondulante
- Maladie de Bang] ¬ Fièvre *A23.1*
- ¬ Fièvre (de): *A23*

Ongle
- Autosomique
- - Dominante ¬ Dysplasie des *L60.3*
- - Récessive ¬ Dysplasie des *Q84.6*
- Cheveux ¬ Dysplasie ectodermique pure des *Q82.8*
- Congénitale) ¬ Hypertrophie des *Q84.5*
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Maladies des *L62.8**
- Doigts ¬ Onychomatricome des *D21.1*
- Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de maladie de Hirschsprung-hypoplasie des *Q87.8*
- Fried ¬ Syndrome dent et *Q82.8*
- Incarné ¬ *L60.0*
- Jaune ¬
- - Lymphœdème avec *L60.5*
- - Syndrome des *L60.5*
- Orteil ¬
- - Infection fongique d'un *B35.1*
- - Matricome onychocytique d'un *D23.7*
- - Onychomatricome des *D21.2*
- SAI ¬ Malformation congénitale des *Q84.6*
- Sans précision ¬ Maladie des *L60.9*
- ¬
- - Candidose de la peau et des *B37.2*
- - Coloration anormale de l' *L60.8*
- - Contusion
- - - Doigt s
- - - - Lésion de l' *S60.1*
- - - - Sans lésion de l' *S60.0*
- - - Orteil s
- - - - Lésion de l' *S90.2*
- - - - Sans lésion de l' *S90.1*
- - Dermatophytose de l' *B35.1*
- - Doigt (*T23*
- - Dystrophie
- - - *L60.3*
- - - Vingt *L60.3*

Ongle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Épidermolyse bulleuse dystrophique dominante isolée des *Q81.2*
- - Hippocratisme des *R68.3*
- - Infection
- - - *L03.0*
- - - Fongique d'un *B35.1*
- - - Purulente de l' *L03.01*
- - Inflammation purulente de l' *L03.01*
- - Maladie due au VIH avec candidose de la peau et des *B20, B37.2*
- - Maladies des *L60.8*
- - Malformations congénitales des *Q84.6*
- - Matricome onychocytique de l' *D23.6*
- - Mycose des *B35.1*
- - Plaie ouverte
- - - Doigt s
- - - - Lésion de l' *S61.1*
- - - - Sans lésion de l' *S61.0*
- - - Orteil s
- - - - Lésion de l' *S91.2*
- - - - Sans lésion de l' *S91.1*
- - Pouce (*T23*
- - Syndrome CHAND [cheveux frisés-ankyloblépharon-dysplasie des *Q82.4*
- - Teigne de l' *B35.1*

Onirophrénie ¬ *F23.2*

Onychiale ¬ Dysplasie ectodermique trichoodonto- *Q82.8*

Onychie ¬ *L03.0*

Onycho
v./v.a. oto-onycho-péronéal
- Cutané [LOC] ¬ Syndrome laryngo- *Q81.8*

Onychoclasie ¬ *L60.3*

Onychocytique
- Ongle
- - Orteil ¬ Matricome *D23.7*
- - ¬ Matricome *D23.6*
- ¬ Matricome *D23.9*

Onycho-digito-mammaire ¬ Syndrome *Q87.2*

Onychodysplasie
- Congénitale ¬ *Q84.6*
- Dysmorphie faciale-hypotrichose ¬ Syndrome de petite taille- *Q87.1*
- ¬ Syndrome
- - BOD [brachymorphie- *Q87.1*
- - Pili torti- *Q82.8*

Onychodystrophie
- Autosomique dominant] ¬ Syndrome DDOD [surdité- *Q87.8*
- Totalis ¬ *L60.3*

Onychogryphose] ¬ Onychogrypose [*L60.2*

Onychogrypose [Onychogryphose] ¬ *L60.2*

Onycholyse ¬ *L60.1*

Onychomatricome ongle
- Doigts ¬ *D21.1*

Onychomatricome ongle *–suite*
- Orteils ¬ *D21.2*

Onychomycose ¬ *B35.1*

Onycho-ostéodysplasie ¬ *Q87.2*

Onychophagie ¬ *F98.88*

Onychose congénitale ¬ *Q84.5*

Onyxis
- Candida ¬ *B37.2*
- Dermatophytique ¬ *B35.1*

OOD [oculo-oto-dentaire] ¬ Syndrome *Q87.0*

OPA2] ¬ Atrophie optique type 2 [*H47.2*

OPA7 ¬ Atrophie optique autosomique récessive type *H47.2*

Opacification d'un cristallin ¬ *T85.2*

Opacité
- Congénitale
- - Cornée ¬ *Q13.3*
- - Corps vitré ¬ *Q14.0*
- Cornéen
- - Centrales ¬ Autres *H17.1*
- - Sans précision ¬ Cicatrice et *H17.9*
- - ¬
- - - Cicatrices et *H17.8*
- - - Syndrome de cataracte congénitale-microcornée- *Q13.8*
- Corps vitré ¬ Autres *H43.3*
- Cristallines du corps vitré ¬ *H43.2*
- Glaucomateuses (sous-capsulaires) ¬ *H26.2*

Opalescentes sans OI ¬ Dents *K00.5*

Opamine bêta-hydroxylase] ¬ Déficit en DBH [*G90.88*

Opération
- Antérieure d'un rétrécissement urétral ¬ Récidive de rétrécissement urétral après *N99.10*
- Anus ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Appareil digestif ¬ Sténose consécutive à une *K91.84*
- Esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une *U69.10!*
- Estomac ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Intestin ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Œsophage ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Organes du système digestif ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Pancréas ¬ Insuffisance
- - Anastomose
- - - *K91.82*
- - - Sutures après *K91.82*
- - Suture après *K91.82*
- Plastique
- - Extrémités inférieures ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.4*

Opération *–suite*
- Plastique *–suite*
- - Extrémités supérieures ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.3*
- - Parties
- - - Corps ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.8*
- - - Tronc ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.2*
- - Sans précision ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.9*
- - Sein ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.1*
- - Tête et du cou ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.0*
- Prophylactique
- - Facteur risque Tumeur maligne opération prophylactique
- - - Organes ¬ *Z40.08*
- - - Ovaire ¬ *Z40.01*
- - - Sein ¬ *Z40.00*
- - Organes ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: *Z40.08*
- - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: *Z40.01*
- - Sans précision ¬ *Z40.9*
- - Sein ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: *Z40.00*
- Prophylactiques ¬ Autres *Z40.8*
- Rectum ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Réparation d'un tissu cicatriciel ¬ *Z42*
- Shirodkar avec ou sans mention de béance du col ¬ Soins maternels pour: *O34.3*
- Trachée, des bronches et des poumons ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *J95.82*
- Vésicule et des voies biliaires ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.81*
- ¬ Inflammation localisée purulente d'une plaie d' *T81.4*

Opercule rétinien sans décollement ¬ *H33.3*

Ophiase ¬ *L63.2*

Ophryogène ¬ Ulérythème *L66.4*

Ophtalmia nodosa ¬ *H16.2*

Ophtalmie
- Diphtérique ¬ *A36.8†, H13.1**
- Gonorrhéique chez le nouveau-né ¬ *A54.3†, H13.1**
- Neiges ¬ *H16.1*
- Néonatale à gonocoques ¬ *A54.3†, H13.1**
- Nouveau-né SAI ¬ *P39.1*
- Sympathique ¬ *H44.1*

Ophtalmique
- Ostéopénie-atrophie cérébelleuse ¬ Retard du développement neurologique-épilepsie-anomalies *E88.8*

Ophtalmique *–suite*
- Squelettiques ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-épilepsie-hypophosphatasie-anomalies *Q87.8*
- ¬
- - Anti-infectieux *T49.5*
- - Névralgie du nerf *G50.0*
- - Zona *B02.3*

Ophtalmoblennorrhée ¬ *A54.3†, H13.1**

Ophtalmologique
v./v.a. neuro-ophtalmologique
- Dysmorphie faciale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'anomalies *Q87.0*
- ¬
- - Diabète sucré de type 1 avec manifestation *E10.30†, H58.8**
- - Intoxication: Médicaments et préparations *T49.5*

Ophtalmo-mandibulo-mélique ¬ Dysplasie *Q87.8*

Ophtalmopathie endocrinienne ¬ *E05.0†, H06.2**

Ophtalmoplégie
v./v.a. Arthro-ophtalmoplégie
- Associée] ¬ Syndrome de Kearns-Sayre [*G31.81*
- Calcification cardio-vasculaire ¬ Syndrome de maladie de Gaucher- *E75.2*
- Déficience intellectuelle-langue scrotale ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Diabétique ¬ *E14.30†, H58.8**
- Externe
- - Enfant ¬ Myopathie autosomique récessive avec *G71.2, H49.8*
- - Progressive
- - - Autosomique
- - - - Dominante ¬ *H49.4*
- - - - Récessive ¬ *H49.4*
- - - Chronique
- - - - Adulte avec myopathie mitochondriale ¬ *G71.3, H49.4*
- - - - Transmission maternelle ¬ *H49.4*
- - - Myopathie-émaciation ¬ Syndrome d' *G71.3*
- - - Scoliose ¬ *H49.4*
- - - ¬ *H49.4*
- - SAI ¬ *H49.8*
- - ¬ Syndrome de macrostomie-anomalies préauriculaires- *Q87.0*
- Interne (complète) (totale) ¬ *H52.5*
- Internucléaire ¬ *H51.2*
- Supranucléaire progressive ¬ *G23.1*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, H58.8**
- Totale (externe) ¬ *H49.3*
- ¬ Syndrome d'ataxie neuropathique sensorielle-dysarthrie- *G31.81, H49.4*

Ophtalmoplégique ¬ Migraine: *G43.8*

Ophthalmicus NCA ¬ Herpes zoster *B02.3†, H58.8**

Ophthalmologiques ¬ Syndrome sévère de myélofibrose-pancytopénie-déficience intellectuelle-anomalies neurologiques et *Q87.8*

Opiacé
- Sang ¬ Présence d' *R78.1*
- Tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et intoxications dues à des *P04.0*
- ¬
- - Intoxication: Analeptiques et antagonistes des *T50.7*
- - Traitement de substitution aux *Z51.83*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d' *F11*

Opioïde
- Antipyrétique
- - Antirhumatismal, sans précision ¬ Intoxication: Analgésique non *T39.9*
- - Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres analgésiques non *T39.8*
- ¬ Intoxication
- - *T40.2*
- - Analgésiques non *T39.9*

Opisthorchis
- Felineus ¬
- - Distomatose hépatique à *B66.0†, K77.0**
- - Infection par *B66.0*
- Tenuicollis ¬ Infection par *B66.0*
- Viverrini ¬ Infection par *B66.0*

Opitz
v./v.a. Bohring-Opitz
v./v.a. Herrmann-Opitz
v./v.a. Neuhauser-Eichner-Opitz
v./v.a. Smith-Lemli-Opitz

Opitz-Frias ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Opitz-Kaveggia ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Opitz-trigonocéphalie ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Opium ¬ Intoxication: *T40.0*

Oppenheim
v./v.a. Erb-Oppenheim-Goldflam
v./v.a. Schwalbe-Ziehen-Oppenheim
v./v.a. Ziehen-Oppenheim
- ¬ Dystonie d' *G24.1*

Oppenheim-Urbach
- Nécrobiose lipoïdique] ¬ Maladie d' *L92.1*
- ¬ Maladie d' *E14.60†, L99.8**

Opportuniste ¬
- HIGM avec susceptibilité aux infections *D80.5*
- Mycose *B48.7*
- Syndrome hyper-IgM
- - Sans susceptibilité aux infections *D80.5*
- - Susceptibilité aux infections *D80.5*

Oppositionnel avec provocation ¬ Trouble *F91.3*

Opsismodysplasie ¬ *Q78.8*

Opsoclonie-myoclonie ¬ Syndrome
- *B99†, G99.8**
- Paranéoplasique d' *C80.9†, G99.8**

Optique
v./v.a. Atrophie optique
v./v.a. Nerf optique
v./v.a. Voie optique
- Anticorps
- - Anti-AQP4 ¬ Trouble du spectre de la neuromyélite *G36.0*
- - Anti-MOG ¬ Trouble du spectre de la neuromyélite *G36.0*
- Autosomique dominante avec neuropathie périphérique ¬ Atrophy *H47.2*
- Colobomateuse-atrophie maculaire-choriorétinopathie ¬ Syndrome de papille *Q14.8*
- Dysgénésie du segment antérieur de l'œil ¬ Syndrome d'hypoplasie de la fovéa avec anomalie du chiasma *Q15.8*
- Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations *H47.5*
- Héréditaire de Leber ¬ Neuropathie *H47.2*
- Idiopathique ¬ Périnévrite *H46*
- Inflammatoire chronique récurrente] ¬ CRION [Neuropathie *H46*
- Ischémique ¬ Neuropathie *H47.0*
- Isolée
- - Anticorps anti-MOG ¬ Névrite *H46*
- - Sans anticorps anti-MOG ¬ Névrite *H46*
- Non ischémique ¬ Neuropathie *H46*
- Sans anticorps anti-MOG et sans anticorps anti-AQP4 ¬ Trouble du spectre de la neuromyélite *G36.0*
- ¬
- - Affections
- - - Chiasma *H47.4*
- - - Papille *H47.3*
- - Anomalie acquise de la papille *H47.3*
- - Chiasma *S04.0*
- - Colobome congénital de la papille *Q14.2*
- - Démyélinisation au cours d'une névrite *G36.0*
- - Druses de la papille *H47.3*
- - Excavation
- - - Familiale de la papille *Q14.2*
- - - Papille *H47.2*
- - Malformation congénitale de la papille *Q14.2*
- - Neuromyélite *G36.0*
- - Névrite *H46*
- - Pâleur temporale de la papille *H47.2*
- - Papillite *H46*
- - Syndrome de microphtalmie-rétinite pigmentaire-fovéoschisis-drusen de la papille *Q15.8*

Ora serrata ¬ Kyste (de): *H33.1*

Oral
- Antidiabétiques] ¬ Intoxication: Insuline et hypoglycémiants *T38.3*
- Autosomique récessive due à un déficit en méthanethiol oxydase ¬ Halitose extra-*E88.8*
- Oropharyngé

Oral *–suite*
- Oropharyngé *–suite*
- - Induite par des rayonnements ¬ mucite (*K12.3*
- - Médicamenteuse ¬ mucite (*K12.3*
- - SAI ¬ mucite (*K12.3*
- - Virale ¬ mucite (*K12.3*
- Purulente ¬ Infection *K12.28*
- Ulcéreuse) ¬ Mucosite *K12.3*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde de la cavité *C06.9*
- - Intoxication: Contraceptifs *T38.4*
- - Kératose *K13.2*
- - Lèvre
- - - Inférieure: face: *C00.4*
- - - Sans indication si inférieure ou supérieure: face: *C00.5*
- - - Supérieure: face: *C00.3*
- - Mucinose focale *K13.7*
- - Périodes off de la maladie de Parkinson ne répondant pas aux traitements par voie *G20.91*
- - Sels de réhydratation *T50.3*

Oram ¬ Syndrome de Holt- *Q87.2*

Orange ¬ Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*

ORAS [Syndrome auto-inflammatoire associé à OTULIN] ¬ *M35.8*

Orbitaire ¬
- Léiomyome *D31.6*
- Région *S00.2*

Orbital
- Douloureux ¬ Syndrome marfanoïde-neurofibromes systémiques et *Q87.8*
- ¬ Os *C41.0*

Orbite
- Cours maladies classées ailleurs ¬
- - Affections de l' *H06.3**
- - Infection parasitaire de l' *H06.1**
- Non précisée ¬ Lésion traumatique de l'œil et de l' *S05.9*
- SAI ¬ *S02.8*
- Sans
- - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante de l' *S05.4*
- - Précision ¬
- - - Affection de l' *H05.9*
- - - Tumeur bénigne: *D31.6*
- ¬
- - Abcès de l' *H05.0*
- - Affections
- - - *H05.8*
- - - Inflammatoires chroniques de l' *H05.1*
- - Atrophie de l' *H05.3*
- - Carie tuberculeuse des *A18.0†, M90.08**
- - Cellulite de l' *H05.0*
- - Contusion du globe oculaire et des tissus de l' *S05.1*

Orbite *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Déformation de l' *H05.3*
- - Echinococcose de l' *B67.9†, H06.1**
- - Exostose de l' *H05.3*
- - Fracture du plancher de l' *S02.3*
- - Gomme des *A52.7†, H06.3**
- - Granulome de l' *H05.1*
- - Hémorragie de l' *H05.2*
- - Infection parasitaire de l' *B89†, H06.1**
- - Inflammation aiguë de l' *H05.0*
- - Kyste de l' *H05.8*
- - Lésions traumatiques de l'œil et de l' *S05.8*
- - Malformation congénitale de l' *Q10.7*
- - Médulloépithéliome de l' *C69.6*
- - Méningiome de l' *D32.0*
- - Nerf périphérique
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - - *D48.7*
- - Œdème de l' *H05.2*
- - Os
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - Ostéoblastome des os de l' *D16.41*
- - Ostéomyélite de l' *H05.0*
- - Périostite de l' *H05.0*
- - Plaie ouverte de l' *S05.9*
- - Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l' *H05.5*
- - Rhabdomyosarcome
- - - *C69.6*
- - - Embryonnaire des *C69.6*
- - Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l' *T90.4*
- - Syphilis secondaire de l' *A51.4†, H06.3**
- - Syphilis tardive des *A52.7†, H06.3**
- - Tissu conjonctif
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - Toit de l' *S02.1*
- - Tuberculose des *A18.5*
- - Tumeur maligne: *C69.6*

Orbitopathie endocrinien
- Ésotropie ¬ Maladie de Basedow avec *E05.0†, H06.3**
- Euthyroïdienne ¬ *E05.0†, H06.2**
- Hypotropie ¬ Maladie de Basedow avec *E05.0†, H06.3**
- Pseudoglaucome ¬ *E05.0†, H06.2**
- Rétraction de paupière ¬ Maladie de Basedow avec *E05.0†, H06.3**
- ¬ Maladie de Basedow avec *E05.0†, H06.3**

Orchite
v./v.a. Épididymo-orchite
- Blennorragique aiguë ¬ *A54.2†, N51.1**

Orchite *–suite*
- Chlamydia ¬ *A56.1†, N51.1**
- Cours de parotidite épidémique ¬ *B26.0†, N51.1**
- Due au virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N51.1**
- Épididymite épididymo-orchite
- - Abcès ¬ *N45.0*
- - Sans abcès ¬ *N45.9*
- Gonocoques ¬ *A54.2†, N51.1**
- Gonorrhéique
- - Aiguë ¬ *A54.2†, N51.1**
- - Chronique ¬ *A54.2†, N51.1**
- - ¬ *A54.2†, N51.1**
- Oreillons ¬ *B26.0†, N51.1**
- SAI ¬ *N45.9*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, N51.1**

Ordonnance
- Appareil ¬ Renouvellement d'une *Z76.0*
- Lunettes ¬ Renouvellement d'une *Z76.0*
- Médicaments ¬ Renouvellement d'une *Z76.0*
- ¬ Renouvellement d'une *Z76.0*

Ordre publique ¬ Lésion due à des troubles de l' *Y36.9!*

Oreille
- Anormal ¬ Syndrome de syndactylie-polydactylie-lobe d' *Q74.8, Q17.8*
- Anormale-paralysie faciale ¬ Syndrome de surdité- *Q87.8*
- Apophyse mastoïde actes médical
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H95.9*
- - ¬ Autres affections de l' *H95.8*
- Appareil auditif
- - Canal auditif
- - - Externe ¬ Plaie ouverte de l' *S01.34*
- - - ¬ Plaie ouverte de l' *S01.35*
- - Oreille interne ¬ Plaie ouverte de l' *S01.38*
- - Osselets ¬ Plaie ouverte de l' *S01.36*
- - Partie non précisée ¬ Plaie ouverte de l' *S01.30*
- - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif ¬ Plaie ouverte de l' *S01.39*
- - Pavillon de l'oreille ¬ Plaie ouverte de l' *S01.31*
- - Tragus ¬ Plaie ouverte de l' *S01.33*
- - Tympan ¬ Plaie ouverte de l' *S01.37*
- - ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l' *S01.39*
- Atteinte de l'audition, sans précision ¬ Malformation congénitale de l' *Q16.9*
- Audition ¬ Examen des *Z01.1*
- Changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau ¬ Effets sur l' *T70.0*
- Chou-fleur» ¬ *M95.1*
- Conduit auditif externe ¬
- - Abcès pavillon de l' *H60.0*

Oreille *–suite*
- Conduit auditif externe ¬ *–suite*
- - Anthrax pavillon de l' *H60.0*
- - Carcinoma in situ: Peau de l' *D04.2*
- - Furoncle pavillon de l' *H60.0*
- - Mélanome
- - - In situ de l' *D03.2*
- - - Malin de l' *C43.2*
- - Nævus à mélanocytes de l' *D22.2*
- - Tumeur bénigne: Peau de l' *D23.2*
- - Tumeur maligne: Peau de l' *C44.2*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections précisées de l' *H94.8**
- Due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite vésiculaire de: *B00.1*
- Externe
- - Conduit) ¬ Kératose obturante de l' *H60.4*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de l' *H62.8**
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H61.9*
- - ¬
- - - Abcès de l' *H60.0*
- - - Affections précisées de l' *H61.8*
- - - Cellulite phlegmoneuse de l' *H60.1*
- - - Cholestéatome de l' *H60.4*
- - - Érysipèle de l' *A46†, H62.0**
- - - Herpès simplex de l' *B00.1†, H62.1**
- - - Impétigo de l' *L01.0†, H62.4**
- - - Microtie de l' *Q17.2*
- - - Périchondrite de l' *H61.0*
- Fente labio-palatine et des anomalies oculaires ¬ Syndrome caractérisé par des anomalies de l' *Q87.0*
- Geyser ¬ *H90.8*
- Interne
- - Neurorécidive ¬ Syphilis de l' *A52.1†, H94.0**
- - Sans précision ¬ Maladie de l' *H83.9*
- - ¬
- - - *C30.1*
- - - Absence congénitale de l' *Q16.5*
- - - Anomalie de l' *Q16.5*
- - - Conséquences du bruit sur l' *H83.3*
- - - Effets nuisibles de bruit sur l' *H83.3*
- - - Maladies précisées de l' *H83.8*
- - - Malformation congénitale de l' *Q16.5*
- - - Otosclérose de l' *H80.2*
- - - Plaie ouverte
- - - - *S01.38*
- - - - Oreille et de l'appareil auditif: *S01.38*
- - - Syphilis de l' *A52.7†, H94.8**
- - - Tuberculose de l' *A18.6*
- Moyenne
- - Apophyse mastoïde
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections précisées de l' *H75.8**
- - - Sans précision ¬ Affection de l' *H74.9*

Oreille *–suite*
- Moyenne *–suite*
- - Apophyse mastoïde *–suite*
- - - - ¬ Autres affections précisées de l' *H74.8*
- - Fosses nasales et sinus de la face ¬ Tumeur bénigne: *D14.0*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de l' *Q16.4*
- - - ¬
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - - Anomalie congénitale de l' *Q16.4*
- - - Cholestéatome
- - - - *H71*
- - - - Congénital de l' *H71*
- - - Diphtérie de l' *A36.8†, H67.0**
- - - Écoulement aigu et subaigu de l' *H65.0*
- - - Maladie adhésive de l' *H74.1*
- - - Malformations congénitales de l' *Q16.4*
- - - Polype de l' *H74.4*
- - - Syphilis de l' *A52.7†, H75.8**
- - - Tuberculose de l' *A18.6†, H67.0**
- - - Tumeur maligne
- - - - *C30.1*
- - - - Neuroendocrine de l ' *C30.1*
- - - Tumeur neuroendocrine
- - - - Bénigne de l' *D14.0*
- - - - Incertain de l' *D38.5*
- Nageur ¬ *H60.3*
- Nez]-plus ¬ Syndrome EVEN [dysplasie épiphysaire-vertébrale- *Q87.8*
- Petite taille ¬ Syndrome de fente palatine-grandes *Q87.1*
- Pointues ¬ *Q17.3*
- Proéminentes ¬ *Q17.5*
- SAI ¬
- - *S01.30*
- - Absence congénitale de l' *Q16.9*
- - Anomalie congénitale de l' *Q17.9*
- - Lésion traumatique de: *S09.9*
- Sans précision ¬
- - Affection de l' *H93.9*
- - Malformation congénitale de l' *Q17.9*
- Surnuméraire ¬ *Q17.0*
- Toute partie] ¬ *T20*
- ¬
- - Absence congénitale
- - - Lobe de l' *Q17.8*
- - - Pavillon de l' *Q16.0*
- - Affections
- - - Non infectieuses du pavillon de l' *H61.1*
- - - Précisées de l' *H93.8*
- - - Vasculaires et dégénératives de l' *H93.0*
- - Amputation traumatique de l' *S08.1*
- - Anomalie
- - - Congénitale
- - - - Osselets de l' *Q16.3*

Oreille *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anomalie *–suite*
- - - Congénitale *–suite*
- - - - Pavillon de l' *Q17.8*
- - - - Position du pavillon de l' *Q17.4*
- - - Position
- - - - *Q17.4*
- - - - Congénitale des osselets de l' *Q16.3*
- - Anomalies du membre supérieur, de l'œil et de l' *Q87.8*
- - Appendices de l' *Q17.0*
- - Barotraumatisme de l' *T70.0*
- - Blessure superficielle de l' *S00.4*
- - Carcinome à cellules de Merkel de la peau de l' *C44.2*
- - Cellulite phlegmoneuse du: pavillon de l' *H60.1*
- - Corps étranger dans l' *T16*
- - Déformation
- - - *Q17.3*
- - - Acquise: pavillon de l' *H61.1*
- - Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des *Z13.5*
- - Fistule congénitale du pavillon de l' *Q17.8*
- - Hématome non traumatique du pavillon de l' *H61.1*
- - Hypoplasie
- - - *Q17.2*
- - - Pavillon de l' *Q17.2*
- - Malformation congénitale
- - - Pavillon de l' *Q17.3*
- - - Précisées de l' *Q17.8*
- - Mycose de l' *B36.9†, H62.2**
- - Perçage d' *Z41.8*
- - Périchondrite: pavillon de l' *H61.0*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Pavillon de l' *S01.31*
- - Position basse de l' *Q17.4*
- - Surdité
- - - Neurosensorielle unilatérale sans altération de l'audition de l'autre *H90.4*
- - - Unilatérale
- - - - Mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l'audition de l'autre *H90.7*
- - - - Transmission sans altération de l'audition de l'autre *H90.1*
- - Syndrome de retard de langage-asymétrie faciale-strabisme-incisure du lobe de l' *Q87.0*
- - Syphilis de l' *A52.7†, H94.8**
- - Tissu conjonctif
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Tissu mou: *C79.88*
- - Trichodiscome multiple familial de la peau de l' *D23.2*

Oreille *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Trichofolliculome du lobe de l' *D23.2*
- - Tuberculose de l' *A18.6*

Oreillette
- Auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Thrombose de l' *I23.6*
- Droite ¬ Dilatation idiopathique familiale de l' *Q20.8*
- Gauche
- - Sinus coronaire ¬ Abouchement de la veine cave supérieure gauche dans l' *Q26.1*
- - Via le sinus coronaire ¬ Persistance de la veine cave supérieure gauche avec abouchement dans l' *Q26.1*
- - ¬
- - - Abouchement veine cave supérieure
- - - - Droite dans l' *Q26.8*
- - - - Gauche dans le toit de l' *Q26.1*
- - - Drainage anormal de la veine cave inférieure dans l' *Q26.8*

Oreillons
- Complications ¬ *B26.8*
- Rubéole
- - ROR] ¬ Nécessité d'une vaccination contre rougeole- *Z27.4*
- - ¬ Déficit immunitaire primaire avec infection virale disséminée post-vaccination de la rougeole, des *D84.8, B05.9*
- Sans complication ¬ *B26.9*
- Seuls ¬ Nécessité d'une vaccination contre les *Z25.0*
- Vaccination ¬ Maladie ressemblant aux *T88.1*
- ¬
- - Encéphalite des *B26.2†, G05.1**
- - Encéphalomyélite des *B26.2†, G05.1**
- - Glomérulopathie au cours de *B26.8†, N08.0**
- - Hépatite des *B26.8†, K77.0**
- - Méningite des *B26.1†, G02.0**
- - Méningo-encéphalite des *B26.2†, G05.1**
- - Myélite des *B26.2†, G05.1**
- - Orchite des *B26.0†, N51.1**
- - Ovarite des *B26.8†, N74.8**
- - Pancréatite des *B26.3†, K87.1**

Orf [dermatite pustuleuse contagieuse ovine] ¬ *B08.0*

Organe
- Appareils
- - Tissus ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres *R89*
- - ¬
- - - Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres *M05.3†*
- - - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres *R94.8*
- Bassin ¬ Lésion traumatique: autre *S37.88*

Organe *–suite*
- Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Donné ¬ examen de routine limité à un *Z01*
- Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Intra-abdominal non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *S36.9*
- Intrathoracique
- - Non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *S27.9*
- - Sans précision ¬ Tumeur bénigne: *D15.9*
- Multiples ¬ Sarcome de Kaposi d' *C46.8*
- Niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ Inscription effectuée pour transplantation d' *Z75.7*
- Précisés ¬ Tuberculose d'autres *A18.8*
- S
- - Intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) ¬ Lésion traumatique d' *S39.6*
- - Pelvien(s) ¬ Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et *S39.6*
- - ¬ Amylose limitée à un ou plusieurs *E85.4*
- Sans niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ Inscription effectuée pour transplantation d' *Z75.6*
- Sens ¬
- - Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des *Z86.6*
- - Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les *Z46.2*
- Seule partie du corps ¬ douleur ne pouvant être rapportée à un seul *R52*
- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Structurel intrathoracique
- - Précisées ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Autres *S27.88*
- - Précisés
- - - Canal thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.82*
- - - Diaphragme ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.81*
- - - Œsophage, partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.83*
- - - Organes et structures intrathoraciques précisées ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.88*
- - - Thymus ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.84*
- - - ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.8*
- Système
- - Digestif ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations d'autres *K91.83*

Organe *–suite*
- Système *–suite*
- - Non précisé ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: *F45.39*
- Systèmes ¬
- - Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres *Z85.8*
- - Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme
- - - *F45.38*
- - - Plusieurs *F45.37*
- Tissu
- - Greffé
- - - Greffe de cornée de l'œil ¬ Échec et rejet d'autres *T86.83*
- - - Organes ou tissus greffés ¬ Échec et rejet d'autres *T86.88*
- - - ¬ Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres *T86.88*
- - Non précisés ¬ Donneur d' *Z52.9*
- - Pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Lésions des *O08.6*
- - Remplacé par greffe hétérologue ou homologue ¬ *Z94*
- - Sans précision ¬ Status post greffe d' *Z94.9*
- - ¬
- - - Donneur d'autres *Z52.88*
- - - État consécutif à la transplantation d'autres *Z94.88*
- - - Examen d'un donneur éventuel d' *Z00.5*
- Titre prophylactique ¬ Admission pour ablation d'un *Z40.0*
- Voies urinaires ¬ Absence acquise d'autres *Z90.6*
- ¬
- - Absence acquise d'autres *Z90.8*
- - Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et *Z80.8*
- - Entérocolite Clostridium difficile sans mégacôlon
- - - Complications au niveau des *A04.71*
- - - Sans complications au niveau des *A04.70*
- - Examen de suivi après transplantation d' *Z09.80*
- - Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres *B57.5*
- - Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique d'autres *Z40.08*
- - Séquelles de tuberculose d'autres *B90.8*
- - Toxoplasmose avec atteinte d'autres *B58.8*
- - Tuberculose affectant plusieurs *A18.8*

Organe de Corti ¬
- Absence congénitale de l' *Q16.5*
- Anomalie de l' *Q16.5*
- Hypoplasie de l' *Q16.5*

Organe digestif
- Évolution imprévisible inconnue
- - Organes digestifs ¬ Tumeur de la cavité buccale et des *D37.78*
- - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des *D37.70*
- Non précisés ¬ Tumeur maligne secondaire des *C78.8*
- Précisés
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes d'autres *K93.8**
- - ¬ Carcinoma in situ: Autres *D01.7*
- SAI ¬
- - Duplication des *Q45.8*
- - Malposition congénitale des *Q45.8*
- Sans précision ¬ Carcinoma in situ: *D01.9*
- ¬
- - Antécédents familiaux de tumeur maligne des *Z80.0*
- - Antécédents personnels de tumeur maligne des *Z85.0*
- - Duplication des *Q45.8*
- - Tuberculose des *A18.3†, K93.0**
- - Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D37.78*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D37.7*

Organe génital
- Appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès ¬ Infection des *A60.0*
- Cours
- - Grossesse ¬ Varices des *O22.1*
- - Puerpéralité ¬ Varices des *O87.8*
- Externes
- - Due à un traumatisme obstétrical ¬ Lésion des *P15.5*
- - Femme SAI ¬ *C51.9*
- - Non précisés ¬ Plaie ouverte des *S31.5*
- - ¬
- - - Amputation traumatique des *S38.2*
- - - Brûlure de degré 2b des *T21.85*
- - - Contusion des *S30.2*
- - - Corrosion de degré 2b des *T21.95*
- - - Corrosion du troisième degré des *T21.75*
- - - Écrasement des *S38.0*
- Féminins ¬
- - Douleurs des *N94.8*
- - Kératose des *N94.8*
- - Thrombose des *N94.8*
- Femme
- - Cycle menstruel
- - - Sans précision ¬ Affection des *N94.9*
- - - ¬ Autres affections précisées des *N94.8*
- - Non précisés ¬ Carcinoma in situ: *D07.3*
- - Précisés ¬
- - - Tumeur bénigne: Autres *D28.7*
- - - Tumeur maligne: Autres *C57.7*

Organe génital *–suite*
- Femme *–suite*
- - Sans précision ¬
- - - Malformation congénitale des *Q52.9*
- - - Tumeur bénigne: *D28.9*
- - - Tumeur maligne: *C57.9*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D39.9*
- - ¬
- - - Malformations congénitales précisées des *Q52.8*
- - - Peau
- - - - *D28*
- - - - *D39.7*
- - - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les *R87*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des *C57.8*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D39.7*
- Homme
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections des *N51.8**
- - Non précisés ¬ Carcinoma in situ: *D07.6*
- - Précisés ¬ Tumeur maligne: Autres *C63.7*
- - Sans précision ¬
- - - Affection des *N50.9*
- - - Malformation congénitale des *Q55.9*
- - - Tumeur bénigne: *D29.9*
- - - Tumeur maligne: *C63.9*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D40.9*
- - ¬
- - - Affections
- - - - Précisées des *N50.8*
- - - - Vasculaires des *N50.1*
- - - Anomalie congénitale SAI des *Q55.9*
- - - Hématocèle SAI des *N50.1*
- - - Hémorragie des *N50.1*
- - - Inflammation de localisations multiples des *N49.8*
- - - Malformation congénitale
- - - - *Q55*
- - - - Précisées des *Q55.8*
- - - Peau
- - - - *D29*
- - - - *D40.7*
- - - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les *R86*
- - - Thrombose des *N50.1*
- - - Tumeur bénigne: Autres *D29.7*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des *C63.8*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D40.7*
- Masculins
- - Précisés ¬ Maladies inflammatoires d'autres *N49.88*
- - ¬

Organe génital *–suite*
- Masculins *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Mycose des *B49†, N51.8**
- - - Tuberculose des *A18.1†, N51.8**
- Non précisés homme ¬
- - Abcès des *N49.9*
- - Affection inflammatoire des *N49.9*
- - Anthrax des *N49.9*
- - Furoncle des *N49.9*
- - Phlegmon des *N49.9*
- Précisés de l'homme ¬ Affections inflammatoires d'autres *N49.8*
- ¬
- - Abcès tuberculeux des *A18.1*
- - Absence acquise des *Z90.7*
- - Ambiguïté des *Q56.4*
- - Antécédents familiaux de tumeur maligne des *Z80.4*
- - Antécédents personnels de tumeur maligne des *Z85.4*
- - Atrophie sénile des *N95.8*
- - Mélanome in situ des *D03.8*
- - Tuberculose des *A18.1*
- - Tumeur maligne secondaire des *C79.82*

Organe génito-urinaire
- Internes ¬
- - Brûlure des *T28.3*
- - Corrosion des *T28.8*
- ¬ Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres *A56.1*

Organe hématopoïétique
- Certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du sang et des *O99.1*
- Certains troubles système immunitaire ¬
- - Antécédents familiaux de maladies du sang et des *Z83.2*
- - Antécédents personnels de maladies du sang et des *Z86.2*
- - Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des *Z13.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres maladies du sang et des *D77**
- Sans précision ¬ Maladie du sang et des *D75.9*
- ¬
- - Maladie due au VIH avec maladie des *B23.8, D75.9*
- - Maladies précisées du sang et des *D75.8*

Organe interne
- Sans précision ¬
- - Brûlure des *T28.4*
- - Corrosion des *T28.9*
- ¬ Dextrocardie avec situs inversus total des *Q89.3*

Organe intra-abdominal
- Pelviens ¬ Séquelles de lésion traumatique d' *T91.5*
- ¬
- - Lésion traumatique
- - - *S36.88*
- - - Multiples *S36.7*
- - Tumeur lipomateuse bénigne des *D17.5*

Organe intrathoracique
- Intra-abdominaux ou des organes intrathoraciques et pelviens ¬ Lésions traumatiques des *T06.5*
- Pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et intra-abdominaux ou des *T06.5*
- Précisés ¬ Tumeur bénigne: Autres *D15.7*
- ¬
- - Lésions traumatiques multiples des *S27.7*
- - Séquelles de lésion traumatique d' *T91.4*
- - Tumeur lipomateuse bénigne des *D17.4*

Organe pelvien
- Cloison
- - Recto-vaginale ¬ Localisation empiétant sur plusieurs *C76.3*
- - Recto-vésicale ¬ Localisation empiétant sur plusieurs *C76.3*
- Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Infection de l'appareil génital et des *O08.0*
- Féminins ¬ Inflammation tuberculeuse des *A18.1†, N74.1**
- Lors
- - Accouchement ¬ Malformation des *O34.9*
- - Grossesse ¬ Malformation des *O34.9*
- Mère ¬ Dystocie due à une anomalie des *O65.5*
- Sans précision ¬ Soins maternels pour anomalie d'un *O34.9*
- Urinaire
- - Non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *S37.9*
- - ¬ Lésions traumatiques de multiples *S37.7*
- ¬
- - Échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des *O07.0*
- - - Sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des *O07.5*
- - Lésions obstétricales des *O71.5*
- - Soins maternels pour d'autres anomalies des *O34.8*

Organe respiratoire
- Digestifs ¬ Tumeur maligne secondaire des *C78*
- Intrathoracique ¬
- - Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres *Z80.2*
- - Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres *Z85.2*

Organe respiratoire *–suite*
- Intrathoracique ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des *C39.8*
- Non précisés ¬ Tumeur maligne secondaire des *C78.3*
- Supérieurs streptocoque ¬
- - Infection des *J06.9, B95.5!*
- - Maladie des *J06.9, B95.5!*
- ¬
- - Absence congénitale d' *Q34.9*
- - Anomalie SAI congénitale d' *Q34.9*
- - Charbon des *A22.1†, J17.0**
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D38.5*

Organe urinaire
- Génital ¬
- - Abcès tuberculeux des *A18.1*
- - Infection à Chlamydia des *A56.2†, N29.1**
- Non précisés ¬
- - Carcinoma in situ: *D09.1*
- - Tumeur maligne secondaire de la vessie et des *C79.1*
- Sans précision ¬
- - Tumeur bénigne: *D30.9*
- - Tumeur maligne: *C68.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D41.9*
- ¬
- - Complication mécanique d'une greffe d' *T83.2*
- - Infection tuberculeuse des *A18.1*
- - Tumeur bénigne: Autres *D30.7*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des *C68.8*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D41.7*

Organes sexuels féminins ¬ Hématome des *N94.8*

Organique
v./v.a. Type de maladie

Organismes se développant dans les systèmes de ventilation ¬ Alvéolite allergique due aux *J67.70*

Organomégalie] ¬ Syndrome de TAFRO [thrombocytopénie-anasarque-fièvre-insuffisance rénale- *D89.8*

Organo-phosphorés et carbamates ¬ Effet toxique: Insecticides *T60.0*

Orgasme
- Femme ou chez l'homme ¬ Inhibition de l' *F52.3*
- ¬ Crises induites par l' *G40.8*

Orgasmique ¬ Dysfonctionnement *F52.3*

Orgelet
- Inflammations profondes de la paupière ¬ *H00.0*
- Paupière ¬ *H00.0*

Orient ¬ Infection à coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen- *B34.2*

Orientale ¬ Encéphalite équine *A83.2*

Orientation

- Matière de sexualité ¬ Conseils relatifs aux attitudes, comportement et *Z70*
- Mode de vie ¬ Difficultés liées à l' *Z73*
- Sexuelle égodystonique ¬ *F66.1*
- Tiers en matière de sexualité ¬ Conseil relatif au comportement ou à l' *Z70*

Orifice

- Cardiaques
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des cavités et des *Q20.9*
- - ¬ Autres malformations congénitales des cavités et des *Q20.8*
- Col utérin ¬ Atrésie de l' *Q51.8*
- Hyménal étroit ¬ *N89.6*
- Lacrymal ¬ Absence d' *Q10.4*
- Nasal
- - Antérieur postérieur ¬
- - - Atrésie d'un *Q30.0*
- - - Sténose congénitale d'un *Q30.0*
- - ¬ Plaie ouverte du nez: *S01.22*
- Naturel ¬ Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un *T98.0*
- Œsophagien estomac ¬
- - *C16.0*
- - Carcinome épidermoïde de l' *C16.0*
- Piriformes ¬ Sténose congénitale isolée des *Q30.8*
- Trompe d'Eustache ¬ *C11.2*
- Urétéral
- - Infection ¬
- - - Contraction de l' *N13.67*
- - - Rétrécissement de l' *N13.67*
- - ¬
- - - Carcinome à petites cellules de l' *C67.6*
- - - Carcinome épidermoïde pur de l' *C67.6*
- - - Carcinome non papillaire à cellules transitionnelles de l' *C67.6*
- - - Déplacement de l'uretère ou de l' *Q62.6*
- - - Déviation de l'uretère ou de l' *Q62.6*
- - - Ectopie de l'uretère ou de l' *Q62.6*
- - - Implantation anormale de l'uretère ou de l' *Q62.6*
- - - Tumeur maligne: *C67.6*
- Uretère ¬ Sténose congénitale de l' *Q62.1*
- Urétral
- - Interne ¬ *C67.5*
- - ¬ Atrésie de l' *Q64.3*
- Valve mitrale ¬ Double *Q23.8*
- Vésico
- - Urétéral ¬ Occlusion congénitale de: *Q62.1*
- - Urétral congénital(e) ¬ Rétrécissement de: *Q64.3*
- Vessie
- - Urétéral ¬ *D30.3*
- - Urétral ¬ *D30.3*

Origine

- Achondroplastique ¬ Insuffisance staturale d' *Q77.4*
- Alimentaire
- - Précisées ¬ Autres intoxications bactériennes d' *A05.8*
- - ¬
- - - Infection
- - - - Listeria d' *A32.9*
- - - - Listérienne d' *A32*
- - - Listériose d' *A32.9*
- Anormale ¬ Artère pulmonaire d' *Q25.7*
- Artère coronaire
- - Droite ¬ Anomalie d' *Q24.5*
- - Gauche ¬ Anomalie d' *Q24.5*
- Artère pulmonaire ¬ Anomalie de l' *Q25.7*
- Biliaire ¬ Pancréatite aiguë d' *K85.1*
- Branchial ¬
- - Fissure, fistule et kyste d' *Q18.0*
- - Malformations d' *Q18.2*
- Cardiaque ¬ Sclérose du foie d' *K76.1*
- Centrale ¬
- - Fièvre d' *R50.88*
- - Vertige d' *H81.4*
- - Vessie désinhibée d' *N31.0*
- Cérébrale ¬ Instabilité du détrusor d' *N31.0*
- Cervicale ¬ Stérilité d' *N97.3*
- Chimique
- - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- Dysplasique, bilatérale ¬ Coxarthrose d' *M16.2*
- Endocrinien femme
- - Ovulation ¬ Stérilité d' *N97.8*
- - Sans anovulation ¬ Stérilité d' *N97.0*
- Essentiellement non médicinale ¬ Séquelles d'effets toxiques de substances d' *T97*
- États précisés ¬ Maladie par VIH à l' *B23.8*
- Extrinsèque ¬ Asthme bronchique intrinsèque d' *J45.89*
- Fœtale avec fœtus normal ¬ Disproportion: d' *O33.5*
- Génétique ¬

Origine *–suite*

- Génétique ¬ *–suite*
- - Anomalie du développement sexuel 46,XX d' *Q99.1*
- - Panhypopituitarisme d' *E23.0*
- Hypophysaire ¬ Diabète insipide d' *E23.2*
- Inconnue
- - Accouchement ¬ Hyperthermie d' *O86.4*
- - ¬ Tumeur primaire maligne d' *C80.0*
- Infectieuse
- - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' *R65.1!*
- - Exsiccose ¬
- - - Diarrhée, probablement d' *A09.0, E86*
- - - Entérite, probablement d' *A09.0, E86*
- - - Gastroentérite, probablement d' *A09.0, E86*
- - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' *R65.0!*
- - ¬
- - - Gastroentérites et colites autres et non précisées d' *A09.0*
- - - Kératite épithéliale d' *B00.5†, H19.1**
- - - Méthodes spéciales pour l'exploration de: maladies intestinales d' *Z11*
- Maladies infectieuses et parasitaires ¬ Immunodéficience humaine virale [VIH], à l' *B20*
- Maternelle du chromosome 1 ¬ Disomie uniparentale d' *Q99.8*
- Médicamenteux ¬
- - Antécédents personnels de fibrose pulmonaire d' *Z87.0*
- - Constipation d' *K59.02*
- - Fibrose d' *M79.89*
- - Insuffisance hépatique d' *K71.1, Y57.98!*
- - Pneumopathie
- - - *J70.4*
- - - Aiguë d' *J70.2*
- - - Chronique d' *J70.3*
- - Ulcère
- - - Duodénal d' *K26.9, Y57.98!*
- - - Estomac d' *K25.9, Y57.98!*
- - - Peptique d' *K27.9, Y57.98!*
- Mixte
- - Maternelle et fœtale ¬ Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d' *O33.4*
- - ¬ Delirium d' *F05.8*
- Neuromusculaire ¬ Autre dysfonction vésicale d' *N31.88*
- Non
- - Infectieuse
- - - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' *R65.3!*

Origine *–suite*
- Non *–suite*
- - Infectieuse *–suite*
- - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' *R65.2!*
- - Organique ¬
- - - Ataxie d' *F44.4*
- - - Dysbasie d' *F44.4*
- - - Dyskinésie d' *F44.4*
- - - Énurésie: (primaire) (secondaire) d' *F98.0*
- - - Incontinence
- - - - Fécale d' *F98.1*
- - - - Urinaire d' *F98.0*
- - Précisée
- - - Survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité ¬ Décès de la mère d' *O95*
- - - ¬
- - - - Gastroentérites et colites autres et non précisées d' *A09.9*
- - - - Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d'origine rhumatismale ou d' *I08.0*
- - Pyogène ¬ Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d' *G95.18*
- - Traumatique ¬
- - - Paraparésie
- - - - Flasque avec paraplégie incomplète aiguë d' *G82.01*
- - - - Paraplégie incomplète aiguë d' *G82.21*
- - - - Spastique avec paraplégie incomplète aiguë d' *G82.11*
- - - Paraplégie
- - - - Flasque avec paraplégie complète aiguë d' *G82.00*
- - - - Paraplégie complète aiguë d' *G82.20*
- - - Paraplégie spastique avec paraplégie complète aiguë d' *G82.10*
- - - Tétraparésie
- - - - Flasque avec paraplégie incomplète aiguë d' *G82.31*
- - - - Paraplégie incomplète aiguë d' *G82.51*
- - - - Spastique avec paraplégie incomplète aiguë d' *G82.41*
- - - Tétraplégie
- - - - Flasque avec paraplégie complète aiguë d' *G82.30*
- - - - Paraplégie complète aiguë d' *G82.50*
- - - - Spastique avec paraplégie complète aiguë d' *G82.40*
- Obstétrical
- - Cause non précisée ¬ Mort d' *O95*
- - Chirurgicale ¬ Infection d'une plaie d' *O86.0*
- - ¬ Hématome pelvien d' *O71.7*
- Organique ¬
- - États délirants et états délirants et hallucinatoires d' *F06.2*
- - Impuissance d' *N48.4*

Origine *–suite*
- Organique ¬ *–suite*
- - Tics médicamenteux et autres tics d' *G25.6*
- Pancréatique ¬ Insuffisance staturale d' *K86.88*
- Paternelle
- - Chromosome
- - - 1 ¬ Disomie uniparentale d' *Q99.8*
- - - 11 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une disomie uniparentale d' *Q87.3*
- - Mosaïque ¬ Syndrome de disomie uniparentale d' *Q99.8*
- - ¬ Syndrome de Prader-Willi dû à une délétion 15q11q13 d' *Q87.1*
- Placentaire ¬ Perte de sang fœtal d' *P50.2*
- Post-traumatique ¬ Insuffisance hypophysaire d' *E23.6*
- Principalement non médicinale
- - Liquide céphalorachidien ¬ Taux anormal de substances d' *R83.3*
- - ¬ Taux anormal dans les urines de substances d' *R82.6*
- Professionnelle ¬ Affections des tissus mous d' *M70*
- Pulpaire ¬ Périodontite apicale aiguë d' *K04.4*
- Rachidien
- - Muscles striés ¬ Spasticité d' *G95.83*
- - ¬ Vessie réflexe d' *G95.80*
- Rénale ¬
- - Hyperparathyroïdie secondaire d' *N25.8*
- - Insuffisance staturale d' *N25.0*
- Rhumatismal
- - Origine non précisée ¬ Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d' *I08.0*
- - ¬ Précisées
- - - *I07*
- - - *I08*
- Sauf substances médicamenteuses ¬ Métaux de toutes *T56*
- Situe période périnatal
- - Sans précision ¬ Affection dont l' *P96.9*
- - ¬
- - - Affections précisées dont l' *P96.8*
- - - Antécédents personnels de certaines affections dont l' *Z87.6*
- Soins obstétricaux ¬ les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l' *O98*
- Traumatique ¬ Emphysème sous-cutané d' *T79.7*
- Tubaire ¬ Stérilité d' *N97.1*
- Tumorale ¬ Rachitisme d' *E83.38*
- Utérine ¬ Stérilité d' *N97.2*
- Vertébrale ¬ Céphalée d' *M54.2*
- Virale ¬ Verrues d' *B07*
- Wolffienne ¬ Tumeur annexielle maligne d' *C57.4*
- ¬

Origine *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Soins maternels pour disproportion d'autres *O33.8*
- - Stérilité de la femme d'autres *N97.8*
- - Toutes *T58*

Oris ¬ Cancrum *A69.0*

Ormond ¬ Maladie d' *K66.2*

Ornithine
- Aminotransférase ¬ Déficit en *E72.4*
- Carbamoyltransférase ¬ Déficit en *E72.4*
- Transcarbamylase ¬ Déficit en *E72.4*
- ¬ Hyperaminoacidurie provoquée par l' *E72.4*

Ornithinémie ¬ *E72.4*

Ornithose
- Pneumonie ¬ *A70†, J17.8**
- Pulmonaire ¬ *A70*
- ¬ *A70*

Oro-facial
- Anomalies cardiaques-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de fente *Q87.0*
- ¬
- - Dyskinésie généralisée à début infantile avec atteinte *G24.8*
- - Malocclusion dentaire due à un dysfonctionnement *K07.5*

Oro-facio-digital
- OFD] ¬ Syndrome *Q87.0*
- Type
- - 3 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - 4 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - 5 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - 6 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - 8 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - 9 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - 10 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - 11 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - 12 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - 13 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - 14 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - 18 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - I ¬ Syndrome *Q87.0*
- - II ¬ Syndrome *Q87.0*

Oromandibulaire ¬ Dystonie *G24.4*

Oropharyngé
- Induite par des rayonnements ¬ mucite (orale) (*K12.3*
- Médicamenteuse ¬ mucite (orale) (*K12.3*
- SAI ¬ mucite (orale) (*K12.3*
- Virale ¬ mucite (orale) (*K12.3*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde *C10.9*
- - Infection herpétique *B00.2*
- - Télangiectasie cutanée familiale et syndrome de prédisposition au cancer *L81.7*

Oropharynx
- Anomalies costovertébrales ¬ Syndrome d'imperforation de l' *Q38.8, Q78.8*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C10.9*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde
- - - Localisations contiguës de l' *C10.8*
- - - Paroi
- - - - Latérale de l' *C10.2*
- - - - Postérieure de l' *C10.3*
- - Carrefour pharyngo-laryngé de l' *C10.8*
- - Tumeur bénigne: Autres parties de l' *D10.5*
- - Tumeur maligne
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C10.8*
- - - Paroi
- - - - Latérale de l' *C10.2*
- - - - Postérieure de l' *C10.3*

Oropouche ¬ Fièvre d' *A93.0*

Orotacidurie congénitale ¬ *E79.8*

Orotacidurique ¬ Anémie (par): *D53.0*

Oroticacidurie ¬ *E79.8*

Orotidylique ¬ Déficit en décarboxylase *E79.8*

Orotique héréditaire ¬ Acidurie *E79.8*

Orstavik-Lindemann-Solberg ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Orteil
- Bifide-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'aphonie-surdité-dystrophie rétinienne-gros *Q87.0*
- Bilatérale ¬ Macrodactylie des *Q74.2*
- Larges ¬ Ankylose de l'étrier avec pouces et *Q87.8*
- Longs-épiphyses surnuméraires multiples ¬ Syndrome de grande taille-gros *Q87.3*
- Lymphangite ¬
- - Infection purulente
- - - *L03.02*
- - - Pied (à l'exception des *L03.11*
- - Inflammation purulente
- - - *L03.02*
- - - Pied (à l'exception des *L03.11*
- Marteau, congénital ¬ *Q66.8*
- Niveau cheville pied ¬ Lésion traumatique muscle tendon long
- - Extenseur d'un *S96.1*
- - Fléchisseur d'un *S96.0*
- Pectus excavatum sévère ¬ Syndrome d'hyperphalangie des doigts de la main-anomalies des *Q79.8*
- Plus ¬ Amputation traumatique de deux *S98.2*
- S
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ Luxation d'un (des) *S93.12*
- - - Métatarsophalangienne ¬ Luxation d'un (des) *S93.11*

Orteil *–suite*
- S *–suite*
- - Bilatérale ¬ *Z89.4*
- - Lésion ongle ¬
- - - Contusion d'un (des) *S90.2*
- - - Plaie ouverte d'un (des) *S91.2*
- - Marteau (acquis) ¬ Autre(s) *M20.4*
- - Parties du pied ¬ Amputation traumatique d'un (des) *S98.3*
- - SAI ¬
- - - Contusion d'un (des) *S90.1*
- - - Plaie ouverte d'un (des) *S91.1*
- - Sans
- - - Lésion ongle ¬
- - - - Contusion d'un (des) *S90.1*
- - - - Plaie ouverte d'un (des) *S91.1*
- - - Précision ¬
- - - - Déformation acquise(s) d'(es) *M20.6*
- - - - Luxation d'un (des) *S93.10*
- - Surnuméraire(s) ¬ *Q69.2*
- - ¬
- - - *T25*
- - - Absence congénitale du pied et d'un (des) *Q72.3*
- - - Déformations (acquises) d'(es) *M20.5*
- - - Écrasement d'un (des) *S97.1*
- - - Entorse et foulure d'un (des) *S93.5*
- Sans synostose ¬ Simple syndactylie des *Q70.3*
- Surnuméraire ¬ Gros *Q69.2*
- Synostose ¬ Syndactylie complexe des *Q70.2*
- Unilatérale ¬ Macrodactylie des *Q74.2*
- ¬
- - Amputation traumatique d'un *S98.1*
- - Arthroplastie métatarsophalangienne du gros *Z96.68*
- - Articulation basale du gros *T84.08*
- - Brachydactylie des *Q72.8*
- - Coalescence des *Q70.2*
- - Déformations (acquises) du gros *M20.3*
- - Fibromatose infantile digitale de l' *M72.87*
- - Fracture
- - - *S92.5*
- - - Gros *S92.4*
- - Hypertrophie congénitale des *Q74.2*
- - Infection fongique d'un ongle d' *B35.1*
- - Macrodactylie
- - - *Q74.2*
- - - *Q74.2*
- - Matricome onychocytique d'un ongle d' *D23.7*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la cheville, pied et *R02.07*
- - Onychomatricome des ongles d' *D21.2*
- - Ostéoblastome des *D16.3*
- - Palmure des *Q70.3*

Orteil *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Phlegmon
- - - *L03.02*
- - - Doigts et des *L03.0*
- - Polydactylie
- - - Centrale des *Q69.2*
- - - Postaxiale des *Q69.2*
- - - Préaxiale des *Q69.2*

Orthodontique ¬ Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.4*

Orthographe
- Sans trouble de la lecture) ¬ Retard spécifique de l' *F81.1*
- ¬ Trouble spécifique de l'acquisition de l' *F81.1*

Orthopédique
- Internes
- - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant ou d'une greffe *T84.9*
- - ¬
- - - Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes *T84.4*
- - - Complications de prothèses, implants ou greffes *T84.8*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes *T84.7*
- Partiel) (total) ¬ Présence d'un implant articulaire *Z96.6*
- Précisés ¬ Autres soins de contrôle *Z47.8*
- S ¬
- - Armature *Z46.7*
- - Ceinture *Z46.7*
- - Chaussures *Z46.7*
- - Corset *Z46.7*
- Sans
- - Précision ¬ Soin de contrôle *Z47.9*
- - Précisions ¬ Présence d'autres prothèses articulaires *Z96.68*
- ¬
- - Fracture osseuse après retrait d'un implant *M96.6*
- - Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.7*

Orthopnée ¬ *R06.0*

Orthopoxvirus ¬
- Infection
- - *B08.0*
- - Humaine à l' *B08.0*
- Infections à *B08.0*

Orthoptique] ¬ Education de la vision [*Z50.6!*

Orthostatique
- Déficit en NET ¬ Intolérance *I95.1*
- Neurogène
- - Syndrome de Shy-Drager] ¬ Hypotension *G23.8*

Orthostatique *–suite*
- Neurogène *–suite*
- - ¬ Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension *G23.8*
- Primaire ¬ Tremblement *G25.0*
- Sans précision ¬ Protéinurie *N39.2*
- Symptomatique ¬ Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension *G23.8*
- ¬
- - Hypotension *I95.1*
- - Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension *G23.8*

Ortolani ¬ Phénomène d' *R29.4*

Os
- Alvéolaire ¬ Plaie ouverte dans la zone de l' *S01.59*
- Articulation
- - Non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: Métatarsien (*S93.34*
- - ¬ Séquelles de tuberculose des *B90.2*
- Avant-bras ¬ Kyste solitaire des *M85.43*
- Bassin ¬ Ostéoblastome des *D16.8*
- Bras ¬ Kyste solitaire des *M85.42*
- Carpe
- - Articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (*S93.31*
- - Carpe, sans précision ¬ Fracture d'autre(s) *S62.10*
- - Grand os ¬ Fracture d'autre(s) *S62.16*
- - Os
- - - Crochu ¬ Fracture d'autre(s) *S62.17*
- - - Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) *S62.13*
- - - Pyramidal ¬ Fracture d'autre(s) *S62.12*
- - - Semi-lunaire ¬ Fracture d'autre(s) *S62.11*
- - - Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) *S62.14*
- - - Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) *S62.15*
- - Surnuméraire ¬ *Q74.0*
- - ¬
- - - Fracture d'autres ou de plusieurs *S62.19*
- - - Ostéoblastome des *D16.1*
- Cartilage articulaire
- - Bassin, sacrum et coccyx ¬ Tumeur bénigne des *D16.8*
- - Clavicule ¬
- - - Tumeur bénigne des *D16.72*
- - - Tumeur maligne des *C41.32*
- - Côté
- - - Sternum et clavicule ¬ Tumeur bénigne des *D16.7*
- - - ¬
- - - - Tumeur bénigne des *D16.70*
- - - - Tumeur maligne des *C41.30*
- - Cranio-facial ¬
- - - Tumeur bénigne des *D16.41*
- - - Tumeur maligne des *C41.01*
- - Mandibule ¬ Tumeur maligne des *C41.1*

Os *–suite*
- Cartilage articulaire *–suite*
- - Maxillaire inférieur ¬ Tumeur bénigne des *D16.5*
- - Maxillofacial ¬
- - - Tumeur bénigne des *D16.42*
- - - Tumeur maligne des *C41.02*
- - Membre, sans précision ¬ Tumeur maligne: *C40.9*
- - Membres ¬ Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des *C40.8*
- - Omoplate os longs membre supérieur ¬
- - - Tumeur bénigne des *D16.0*
- - - Tumeur maligne des *C40.0*
- - Os
- - - Courts membre
- - - - Inférieur ¬
- - - - - Tumeur bénigne des *D16.3*
- - - - - Tumeur maligne des *C40.3*
- - - - Supérieur ¬
- - - - - Tumeur bénigne des *D16.1*
- - - - - Tumeur maligne des *C40.1*
- - - Crâne et de la face ¬ Tumeur bénigne des *D16.4*
- - - Longs membre inférieur ¬
- - - - Tumeur bénigne des *D16.2*
- - - - Tumeur maligne des *C40.2*
- - Pelvis ¬ Tumeur maligne des *C41.4*
- - Rachis ¬
- - - Tumeur bénigne des *D16.6*
- - - Tumeur maligne des *C41.2*
- - Sans précision ¬
- - - Tumeur bénigne: *D16.9*
- - - Tumeur maligne: *C41.9*
- - Sternum ¬
- - - Tumeur bénigne des *D16.71*
- - - Tumeur maligne des *C41.31*
- - - ¬
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des *C41.8*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D48.0*
- Colonne vertébrale ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres *T84.20*
- Courts
- - Membre
- - - Inférieur ¬
- - - - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.3*
- - - - Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: *C40.3*
- - - Supérieur ¬
- - - - Chondrosarcome des *C40.1*
- - - - Fibrome chondromyxoïde des *D16.1*
- - - - Ostéoblastome des *D16.1*
- - - - Ostéosarcome des *C40.1*

Os *–suite*
- Courts *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur ¬ *–suite*
- - - - Sarcome d 'Ewing squelettique des *C40.1*
- - - - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.1*
- - - - Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: *C40.1*
- - Membres inférieurs ¬
- - - Chondrosarcome des *C40.3*
- - - Fibrome chondromyxoïde des *D16.3*
- - - Ostéoblastome des *D16.3*
- - - Ostéosarcome des *C40.3*
- Crâne
- - Face
- - - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q75.9*
- - - ¬
- - - - Fractures d'autres *S02.8*
- - - - Malformations congénitales précisées des *Q75.8*
- - - - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.4*
- - ¬
- - - Absence congénitale d' *Q75.8*
- - - Anomalie de suture des *Q75.0*
- - - Chondrosarcome de l' *C41.01*
- - - Chordome de l' *C41.01*
- - - Dépressions des *Q67.4*
- - - Hyperostose d' *M85.8*
- - - Ostéoblastome des *D16.41*
- - - Ostéosarcome de l' *C41.01*
- - - Sarcome de l' *C41.01*
- - - Syndrome de Paget juvénile, *M88.0*
- Cranio-facial ¬ Tumeur maligne d'un *C41.01*
- Crochu ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.17*
- Cuboïde ¬ Fracture de l' *S92.22*
- Cuisse ¬ Kyste solitaire des *M85.45*
- Cunéiforme intermédiaire
- - Latéral) (médian) ¬ Fracture: *S92.23*
- - ¬ Ostéochondrose juvénile de l' *M92.6*
- Ethmoïde ¬
- - *D16.41*
- - Ostéoblastome de l' *D16.41*
- - Sarcome de l' *C41.01*
- Face
- - Partie non précisée ¬ Fracture du crâne et des *S02.9*
- - SAI ¬ Anomalie de: *Q75.9*
- - Sans précisions ¬
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - ¬
- - - Fractures multiples du crâne et des *S02.7*

Os *–suite*
- Face *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ostéoblastome de l' *D16.42*
- - - Ostéolyse massive de Gorham des *M89.58*
- - - Sarcome d'Ewing des *C41.01*
- - - Sarcome de l' *C41.02*
- - - Séquelles d'une fracture du crâne ou des *T90.2*
- - - Tumeur maligne des *C41.02*
- Frontal ¬
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- - Ostéoblastome de l' *D16.41*
- - Sarcome de l' *C41.01*
- Hanche ¬ Ostéoblastome des *D16.8*
- Hyoïde ¬ *S12.8*
- Iliaques ¬ *D16.8*
- Jambe ¬ Kyste solitaire des *M85.46*
- Localisations contiguës ¬ Sarcome d'Ewing de l' *C41.8*
- Long ¬ Sarcome d'Ewing d'un *C40.9*
- Longs
- - Due à un traumatisme obstétrical ¬ Lésion d'autres *P13.3*
- - Membre
- - - Inférieur ¬
- - - - Incurvation congénitale des *Q68.5*
- - - - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.2*
- - - - Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: *C40.2*
- - - Inférieurs ¬ Ostéosarcome des *C40.2*
- - - Supérieur ¬
- - - - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: Omoplate et *D16.0*
- - - - Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: Omoplate et *C40.0*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬
- - - - Adamantinome des *C40.2*
- - - - Chondrosarcome des *C40.2*
- - - - Fibrome chondromyxoïde des *D16.2*
- - - - Ostéoblastome des *D16.2*
- - - Supérieurs ¬
- - - - Adamantinome des *C40.0*
- - - - Fibrome chondromyxoïde des *D16.0*
- - - - Ostéoblastome des *D16.0*
- - Rachis
- - - Sans précision ¬ Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des *Q77.9*
- - - ¬ Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des *Q77.8*
- - ¬
- - - Adamantinome des *C40.9*
- - - Incurvation congénitale des *Q68.8*

Os *–suite*
- Main ¬ Kyste solitaire des *M85.44*
- Malaire
- - Maxillaire ¬ Fracture de l' *S02.49*
- - ¬ Fracture
- - - *S02.42*
- - - Arcade zygomatique des *S02.41*
- - - Enfoncement des *S02.42*
- Maxillofacial ¬ Tumeur maligne d'un *C41.02*
- Membre
- - Avant-bras ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.12*
- - Bras ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.11*
- - Cheville et pied ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.16*
- - Jambe ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.15*
- - Main ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.13*
- - Os précisés d'un membre ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.18*
- - Région pelvienne et cuisse ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.14*
- - Région scapulaire ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.10*
- Membres, à localisations contiguës ¬ Chondrosarcome des *C40.8*
- Métacarpe
- - Base ¬ Fracture d'un autre *S62.31*
- - Col ¬ Fracture d'un autre *S62.33*
- - Diaphyse ¬ Fracture d'un autre *S62.32*
- - Partie non précisée ¬ Fracture d'un autre *S62.30*
- - Tête ¬ Fracture d'un autre *S62.34*
- Métatarse ¬
- - Fracture d' *S92.3*
- - Ostéochondrite juvénile, *M92.7*
- Moelle osseuse ¬ Tumeur maligne secondaire des *C79.5*
- Nasal ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - Anomalie congénitale de l' *Q30.9*
- - Ostéoblastome de l' *D16.42*
- - Sarcome de l' *C41.02*
- Naviculaire
- - Carpien ou tarsien ¬ *S62.0*
- - Pied
- - - Scaphoide du tarse] ¬ Fracture : *S92.21*
- - - ¬
- - - - Nécrose aseptique de l' *M92.6*
- - - - Ostéochondrite juvénile, *M92.6*
- Nez ¬ Fracture
- - *S02.2*
- - Ouverte des *S02.2, S01.87!*

Os *–suite*
- Occipital ¬
- - *D16.41*
- - Ostéoblastome de l' *D16.41*
- - Sarcome de l' *C41.01*
- Orbital ¬ *C41.0*
- Orbite ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - Ostéoblastome des *D16.41*
- Os précisés ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres *T84.28*
- Pariétal ¬
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- - Ostéoblastome de l' *D16.41*
- - Sarcome de l' *C41.01*
- Pétreux ¬
- - Suppuration aiguë de l' *H70.2*
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, M90.28**
- Pied ¬ Kyste solitaire des *M85.47*
- Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.13*
- Précisés
- - Membre ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: autres *T84.18*
- - ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: autres *T84.28*
- Pubien ¬ Ostéoblastome de l' *D16.8*
- Pyramidal ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.12*
- SAI ¬ Infection de l' *M86.9*
- Sarcome d'Ewing] ¬ Endothéliome diffus des *C41.9*
- Scaphoïde de la main ¬ Fracture de l' *S62.0*
- Semi-lunaire ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.11*
- Sphénoïde ¬
- - *D16.41*
- - Ostéoblastome de l' *D16.41*
- - Sarcome de l' *C41.01*
- Talon ¬ *S92.0*
- Tarse
- - Sans précision ¬ Fracture: Un ou plusieurs autres *S92.20*
- - ¬ Fracture: autres *S92.28*
- Temporal
- - Écaille temporale ¬ *S02.0*
- - ¬
- - - *D16.41*
- - - Ostéoblastome de l' *D16.41*
- - - Sarcome de l' *C41.01*
- Thorax
- - Partie non précisée ¬ Fracture des *S22.9*
- - ¬ Fractures d'autres parties des *S22.8*
- Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.14*

Os *–suite*
- Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.15*
- Verre ¬ Maladie des *Q78.0*
- Wormien ¬ Dysplasie cranio-métadiaphysaire type *Q78.8*
- Zygomaticum ¬
- - *D16.42*
- - Ostéoblastomed e l' *D16.42*
- Zygomatique ¬
- - *C41.02*
- - Sarcome de l' *C41.02*
- ¬
- - Abcès tuberculeux des *A18.0†*, *M90.09**
- - Amyotrophie spinale prénatale avec fractures congénitales des *G12.2*, *Q74.8*
- - Complication mécanique d'autres appareils, implants ou greffes des *T84.3*
- - Donneur d' *Z52.2*
- - Dysplasie fibreuse des *M85.09*
- - Échinococcose kystique des *B67.2†*, *M90.29**
- - Fracture d'autre(s) os du carpe: Grand *S62.16*
- - Gomme de l' *A52.7†*, *M90.29**
- - Granulome éosinophilique des *C96.6*
- - Kyste
- - - Anévrismal des *M85.5*
- - - Solitaire des *M85.4*
- - Lymphome primitif des *C85.7*
- - Maladie de Paget d'autres *M88.8*
- - Nécrose tuberculeuse des *A18.0†*, *M90.09**
- - Osteodystrophia deformans au cours de tumeur maligne de l' *C41.9†*, *M90.69**
- - Plasmacytome primaire de l' *C90.30*
- - Primo-infection tuberculeuse des *A18.0†*, *M90.09**
- - Syphilis de l' *A52.7†*, *M90.29**
- - Syphilis secondaire des *A51.4†*, *M90.29**
- - TBC [Tuberculose] des *A18.0†*, *M90.09**

Oscillopsie ¬ *H53.8*

Osgood-Schlatter ¬ Maladie d' *M92.5*

OSLAM [ostéosarcome-anomalies des membres-macrocytose érythroïde] ¬ Syndrome *C41.9*, *Q74.9*

Osler
v./v.a. Rendu-Osler-Weber

Osler-Vaquez ¬ Maladie d' *D45*

Osselets
- Auditifs accessoires ¬ *Q16.3*
- Oreille ¬ Anomalie
- - Congénitale des *Q16.3*
- - Position congénitale des *Q16.3*
- ¬
- - Ankylose des *H74.3*
- - Anomalies acquises des *H74.3*
- - Coalescence congénitale des *Q16.3*
- - Dissociation et dislocation des *H74.2*

Osselets *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Malformation congénitale des *Q16.3*
- - Perte partielle des *H74.3*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.36*

Osseux
v./v.a. tricho-dento-osseux
- Accélérée-dysmorphie faciale-retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation *Q87.3*
- Anévrismal
- - Avant-bras ¬ Kyste *M85.53*
- - Bras ¬ Kyste *M85.52*
- - Clavicule ¬ Kyste *M85.51*
- - Colonne vertébrale ¬ Kyste *M85.58*
- - Cuisse ¬ Kyste *M85.55*
- - Jambe ¬ Kyste *M85.56*
- - Main ¬ Kyste *M85.54*
- - Pied ¬ Kyste *M85.57*
- Avancé-arthrose précoce ¬ Syndrome de petite taille-âge *Q79.8*
- BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse auditive à ancrage *Z96.2*
- Canal rachidien ¬ Rétrécissement *M99.3*
- Colonne vertébrale ¬ Hémangiome de la partie *D18.07*
- Congénitale ¬ Scoliose congénitale due à une malformation *Q76.3*
- Contractures-rupture artérielle-surdité ¬ Syndrome de fragilité *Q87.5*
- Cours de maladies tumorales ¬ Fracture *D48.0†*, *M90.79**
- Déficit du métabolisme de l'hormone thyroïdienne ¬ Petite taille-retard d'âge *E03.1*
- Diabétique ¬ Altération *E14.60†*, *M90.89**
- Due à l'aluminium ¬ Maladie *M83.4*
- Echinococcus granulosus ¬ Infection *B67.2†*, *M90.29**
- Face ¬ Syndrome de camptodactylie-raideur articulaire-anomalies *Q87.0*
- Floride
- - Mandibule ¬ Dysplasie *D16.5*
- - Maxillaire supérieur ¬ Dysplasie *D16.42*
- - ¬ Dysplasie *D16.42*
- Larsen-like-nanisme ¬ Syndrome de dysplasie *Q87.1*
- Létale type Holmgren-Forsell ¬ Dysplasie *Q78.8*
- Liée à FGFR2 ¬ Dysplasie *Q79.8*
- Mastoïde] ¬ Ostéite mastoïdienne [carie *H70.1*
- Médullaires) de lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ Foyers *C79.5*
- Membres courts-déficit immunitaire combiné sévère ¬ Syndrome de dysplasie *D82.2*
- Mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture *M96.6*

Osseux *–suite*
- Ostéosclérotique létale ¬ Dysplasie *Q78.2*
- Paget
- - Sans précision ¬ Maladie *M88.9*
- - ¬ Ostéosarcome au cours de maladie *C41.9†*, *M90.69**
- Pian (tardif) ¬ Gomme *A66.6*
- Post-traumatique neurogène] ¬ Maladie de Sudeck [atrophie *G90.59*
- Précisées ¬ Autres maladies *M89.8*
- Prématuré ¬ Syndrome marfanoïde-hernie inguinale-vieillissement *Q87.0*
- Primaire ¬ Malformation veineuse *D18.08*
- Progressive
- - Avant-bras ¬ Hétéroplasie *M61.53*
- - Bras ¬ Hétéroplasie *M61.52*
- - Cuisse ¬ Hétéroplasie *M61.55*
- - Jambe ¬ Hétéroplasie *M61.56*
- - Localisations multiples ¬ Hétéroplasie *M61.50*
- - Main ¬ Hétéroplasie *M61.54*
- - Pied ¬ Hétéroplasie *M61.57*
- - Région scapulaire ¬ Hétéroplasie *M61.51*
- - Tronc ¬ Hétéroplasie *M61.58*
- - ¬ Hétéroplasie *M61.59*
- Rachidien non tuberculeux ¬ Abcès *M46.29*
- Retardé
- - Fusion ou arthrodèse ¬ Guérison *M96.82*
- - Ostéotomie ¬ Guérison *M96.82*
- Retrait
- - Implant orthopédique ¬ Fracture *M96.6*
- - Plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture *M96.6*
- - Prothèse articulaire ¬ Fracture *M96.6*
- Sans précision ¬
- - Anomalie
- - - Continuité *M84.9*
- - - Densité et de la structure *M85.9*
- - Maladie *M89.9*
- - Malformation congénitale du thorax *Q76.9*
- Sclérosante mixte avec manifestations extra-squelettiques ¬ Dystrophie *Q87.5*
- Solitaire de la mâchoire ¬ Kyste *K09.2*
- Sudeck-Leriche ¬ Atrophie *G90.5*
- Tabique neurogène ¬ Atrophie *A52.1†*, *M90.29**
- Tardive ¬ Syphilis *A52.7†*, *M90.29**
- Tendineux ¬ Présence d'autres implants *Z96.7*
- Terminale-défauts de pigmentation ¬ Syndrome de dysplasie *Q87.2*
- Von Recklinghausen] ¬ Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie *E21.0†*, *M90.89**
- ¬
- - Anomalies
- - - Continuité *M84.8*
- - - Précisées de la densité et de la structure *M85.8*
- - Appareil acoustique de conduction *Z96.2*

Osseux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Atrésie ou rétrécissement du méat auditif *Q16.1*
- - Carie *A18.0†, M90.09**
- - Cryptococcose *B45.3†, M90.29**
- - Fibrosarcome *C41.9*
- - Fracture ouverte de la mandibule avec défaut *S02.60, S01.87!*
- - Fragilité *Q78.0*
- - Hypertrophie *M89.3*
- - Kystes *M85.6*
- - Lésions de la voûte crânienne en forme de beignet avec fragilité *Q78.8*
- - Malformation veineuse *D18.08*
- - Malformations congénitales du thorax *Q76.8*
- - Pian avec lésion *A66.6†, M90.29**
- - Prothèse (de): conduction *Z45.3*
- - Réaction du ciment *T84.8*
- - Rejet de greffe *T86.88*
- - Sarcome *C41.9*
- - Status post greffe *Z94.6*
- - Tabès *A52.1†, M90.29**
- - Troubles de la croissance et du développement *M89.2*

Ossifiant
- Associée à des brûlures ¬ Myosite *M61.3*
- Familial
- - Mâchoire supérieure ¬ Fibrome *D16.42*
- - Maxillaire inférieur ¬ Fibrome *D16.5*
- Liée à une tétraplégie ou une paraplégie ¬ Myosite *M61.2*
- Progressive
- - Bras ¬ Fibrodysplasie
- - - *M61.12*
- - - *M61.13*
- - Cou ¬ Fibrodysplasie *M61.18*
- - Cuisse ¬ Fibrodysplasie *M61.15*
- - Jambe ¬ Fibrodysplasie *M61.16*
- - Main ¬ Fibrodysplasie *M61.14*
- - Pied ¬ Fibrodysplasie *M61.17*
- - Région scapulaire ¬ Fibrodysplasie *M61.11*
- - Sièges multiples ¬ Fibrodysplasie *M61.10*
- - ¬ FOP [Fibrodysplasie *M61.19*
- Traumatique ¬ Myosite *M61.0*

Ossification
- Anormale
- - Corps vertébraux-persistance de la notochorde ¬ Syndrome d'agénésie sacrée- *Q79.8*
- - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'arachnodactylie- *Q87.8*
- Crâne membraneux ¬ Retard d' *Q75.8*
- Ligament longitudinal postérieur [OLLP] ¬ *M48.8*
- Muscle

Ossification *–suite*
- Muscle *–suite*
- - Associées à des brûlures ¬ Calcification et *M61.3*
- - Sans précision ¬ Calcification et *M61.9*
- - ¬ Autres *M61.5*
- Paralytiques d'un muscle ¬ Calcification et *M61.2*
- Retard psychomoteur ¬ Syndrome d'anomalies de l' *Q79.8*
- Sous-périostique post-traumatique ¬ *M89.8*
- Subluxation ¬ Rétrécissement des espaces intervertébraux par *M99.6*

Ostéite
- Alvéolaire ¬ *K10.3*
- Avant-bras ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec *M86.33*
- Bras ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec *M86.32*
- Cheville ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec *M86.37*
- Colonne vertébrale ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec *M86.38*
- Condensante
- - Iléon ¬ *M85.35*
- - Médiane de la clavicule ¬ *M85.31*
- - Région pelvienne ¬ *M85.35*
- - Sacrum ¬ *M85.38*
- - ¬ *M85.3*
- Cours d'une affection de la glande parathyroïde ¬ *E21.0†, M90.89**
- Cystoïde multiple
- - Type
- - - Fleischner ¬ *D86.8*
- - - Jüngling ¬ *D86.8*
- - ¬ *D86.8*
- Fibreux
- - Circonscrite ¬ *M85.09*
- - Disséminée ¬ *Q78.1*
- Fibrokystique généralisée
- - Maladie osseuse de von Recklinghausen] ¬ *E21.0†, M90.89**
- - ¬ *E21.0†, M90.89**
- Jambe ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec *M86.36*
- Localisations multiples ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec *M86.30*
- Mâchoire
- - Aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*
- - ¬ *K10.28*
- Main ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec *M86.34*
- Mastoïdienne [carie osseuse de la mastoïde] ¬ *H70.1*
- Ostéite
- - Avant-bras ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose- *M86.33*

Ostéite *–suite*
- Ostéite *–suite*
- - Bras ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose- *M86.32*
- - Cheville ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose- *M86.37*
- - Colonne vertébrale ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose- *M86.38*
- - Jambe ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose- *M86.36*
- - Localisations multiples ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose- *M86.30*
- - Main ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose- *M86.34*
- - Région de l'épaule ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose- *M86.31*
- - Région pelvienne ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose- *M86.35*
- Périostite gommeuse du pian (tardif) ¬ *A66.6*
- Perthes-Jüngling ¬ *D86.8*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*
- Région de l'épaule ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec *M86.31*
- Région pelvienne ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec *M86.35*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.0†, M90.29**
- - Tardive ¬ *A52.7†, M90.29**

Ostéo
v./v.a. angio-ostéo-hypertrophique
v./v.a. oculo-ostéo-cutané
- Arthrose
- - Érosive ¬ (*M15.4*
- - Primaire généralisée ¬ (*M15.0*

Ostéoarthrite
- Généralisée SAI ¬ *M15.9*
- Vertébrale ¬ arthrose ou *M47*

Ostéoarthropathies hypertrophiantes ¬ Autres *M89.4*

Osteoarthrosis deformans alkaptonurica ¬ *E70.2†, M36.8**

Ostéo-articulaire
- Muscle
- - Actes médical
- - - Sans précision ¬ Affection du système *M96.9*
- - - ¬ Autres affections du système *M96.88*
- - Précisées ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales *Q68.8*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale du système *Q79.9*
- - Tissu conjonctif
- - - Sans précision ¬ Déformation acquise du système *M95.9*
- - - ¬

Ostéo-articulaire *–suite*
- Muscle *–suite*
- - Tissu conjonctif *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Antécédents personnels de maladies du système *Z87.3*
- - - - Déformations acquises précisées du système *M95.8*
- - ¬
- - - Infection gonococcique du système *A54.4†*
- - - Malformations congénitales du système *Q79.8*
- Pianiques ¬ Lésions *A66.6*
- Suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire ¬ Instabilité du système *M96.88*
- ¬ Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse *M96.88*

Ostéoblastique ¬ Sarcome *C41.9*

Ostéoblastome
- Acétabulum ¬ *D16.8*
- Atlas ¬ *D16.6*
- Axis ¬ *D16.6*
- Calcanéum ¬ *D16.3*
- Clavicule ¬ *D16.72*
- Coccyx ¬ *D16.8*
- Cornet nasal ¬ *D16.42*
- Côte ¬ *D16.70*
- Cubitus ¬ *D16.0*
- Doigts de la main ¬ *D16.1*
- Fémur ¬ *D16.2*
- Humérus ¬ *D16.0*
- Ilion ¬ *D16.8*
- Ischion ¬ *D16.8*
- Main ¬ *D16.1*
- Mandibule ¬ *D16.5*
- Maxillaire
- - Supérieur ¬ *D16.42*
- - ¬ *D16.42*
- Métacarpiens ¬ *D16.1*
- Métatarsiens ¬ *D16.3*
- Omoplate ¬ *D16.0*
- Orteils ¬ *D16.3*
- Os
- - Bassin ¬ *D16.8*
- - Carpe ¬ *D16.1*
- - Courts
- - - Membre supérieur ¬ *D16.1*
- - - Membres inférieurs ¬ *D16.3*
- - Crâne ¬ *D16.41*
- - Ethmoïde ¬ *D16.41*
- - Face ¬ *D16.42*
- - Frontal ¬ *D16.41*
- - Hanche ¬ *D16.8*
- - Longs membres
- - - Inférieurs ¬ *D16.2*
- - - Supérieurs ¬ *D16.0*

Ostéoblastome *–suite*
- Os *–suite*
- - Nasal ¬ *D16.42*
- - Occipital ¬ *D16.41*
- - Orbite ¬ *D16.41*
- - Pariétal ¬ *D16.41*
- - Pubien ¬ *D16.8*
- - Sphénoïde ¬ *D16.41*
- - Temporal ¬ *D16.41*
- Péroné ¬ *D16.2*
- Phalanges de la main ¬ *D16.1*
- Pouce ¬ *D16.1*
- Rachis ¬ *D16.6*
- Radius ¬ *D16.0*
- Rotule ¬ *D16.3*
- Sacrum ¬ *D16.8*
- Squelette ¬ *D16.9*
- Sternum ¬ *D16.71*
- Tarse ¬ *D16.3*
- Tibia ¬ *D16.2*
- Vertèbre ¬ *D16.6*
- Vomer ¬ *D16.42*
- ¬ *D16.9*

Ostéoblastomed e l'os zygomaticum ¬ *D16.42*

Ostéocalcine ¬ Taux accru d' *R79.8*

Ostéochondrite
- Condyles huméraux ¬ *M92.0*
- Disséquant
- - Familiale, localisations multiples ¬ *M93.20*
- - Genou ¬ *M93.26*
- - ¬ *M93.29*
- Juvénile
- - Acétabulum ¬ *M91.0*
- - Antérieure ¬ Déformation de la hanche due à une *M91.2*
- - Apophyse tibiale externe ¬ *M92.6*
- - Astragale ¬ *M92.6*
- - Bassin ¬ *M91.0*
- - Calcanéum ¬ *M92.6*
- - Cinquième métatarsien ¬ *M92.7*
- - Corps patellaire ¬ *M92.4*
- - Crête iliaque [Buchanan] ¬ *M91.0*
- - Deuxième métatarsien ¬ *M92.7*
- - Épiphyse
- - - Inférieure du cubitus [Burns] ¬ *M92.1*
- - - Supérieure du tibia ¬ *M92.5*
- - Hanche et du bassin, sans précision ¬ *M91.9*
- - Humérus ¬ *M92.0*
- - Ischio-pubienne [van Neck] ¬ *M91.0*
- - Main ¬ *M92.2*
- - Métatarse ¬ *M92.7*
- - Os
- - - Métatarse ¬ *M92.7*
- - - Naviculaire du pied ¬ *M92.6*

Ostéochondrite *–suite*
- Juvénile *–suite*
- - Péroné ¬ *M92.5*
- - Pointe de la rotule ¬ *M92.4*
- - Radius et du cubitus ¬ *M92.1*
- - Réduction d'une luxation congénitale de la hanche ¬ *M91.8*
- - Rotule ¬ *M92.4*
- - Sans précision ¬ *M92.9*
- - Scaphoïde tarsien ¬ *M92.6*
- - Semi-lunaire [Kienböck] ¬ *M92.2*
- - Symphyse pubienne [Pierson] ¬ *M91.0*
- - Tarse ¬ *M92.6*
- - Tête
- - - Fémur [Legg-Calvé-Perthes] ¬ *M91.1*
- - - Humérus [Haas] ¬ *M92.0*
- - - Métacarpiennes [Mauclaire] ¬ *M92.2*
- - - Radiale [Brailsford] ¬ *M92.1*
- - Tibia ¬ *M92.5*
- - Tubercule tibial ¬ *M92.5*
- Juvéniles
- - Hanche et du bassin ¬ Autres *M91.8*
- - Membre supérieur ¬ Autres *M92.3*
- - Précisées ¬ Autres *M92.8*
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*
- Semi-lunaire
- - Adulte ¬ *M93.1*
- - ¬ *M92.2*
- Syphilitique
- - Congénitale précoce ¬ *A50.0†, M90.29**
- - ¬ *A50.0†, M90.29**
- Vertébral
- - Adulte ¬ *M42.1*
- - Juvénile ¬ *M42.0*
- - Sans précision ¬ *M42.9*

Ostéochondrodysplasie
- Anomalies croissance os longs rachis
- - Sans précision ¬ *Q77.9*
- - ¬ Autres *Q77.8*
- Hypertrichotique type Cantu ¬ *Q87.3*
- Précisées ¬ Autres *Q78.8*
- Sans précision ¬ *Q78.9*

Ostéochondrodysplasique-surdité-rétinopathie pigmentaire ¬ Syndrome de nanisme *Q87.1*

Ostéochondrodystrophie ¬ *E76.3*

Ostéochondromatose
- Carpo-tarsienne ¬ *Q78.4*
- Synoviale ¬ *D48.1*

Ostéochondromes multiples ¬ *Q78.6*

Ostéochondropathie
- Précisées ¬ Autres *M93.8*
- Sans précision ¬ *M93.9*
- Syphilitique congénitale

Ostéochondropathie *–suite*
- Syphilitique congénitale *–suite*
- - Précoce ¬ *A50.0†, M90.29**
- - Tardive ¬ *A50.5†, M90.29**
- ¬ Autres *M93*

Ostéochondrosarcome ¬ *C41.9*

Ostéochondrose
- Calcanéum chez l'adulte ¬ *M93.87*
- Déformante du tibia ¬ *M92.5*
- Diaz ¬ *M92.6*
- Disséquant
- - Articulation du coude ¬ *M93.22*
- - Cheville ¬ *M93.27*
- - Familiale
- - - Articulation
- - - - Coude ¬ *M93.22*
- - - - Genou ¬ *M93.26*
- - - - Hanche ¬ *M93.25*
- - - Cheville ¬ *M93.27*
- Haglund ¬ *M92.6*
- Iselin ¬ *M92.7*
- Juvénile de l'os cunéiforme intermédiaire ¬ *M92.6*
- Köhler de la rotule ¬ *M92.4*
- Larsen-Johansson ¬ *M92.4*
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*
- Syphilitique congénitale précoce ¬ *A50.0†, M90.29**
- Tarse ¬ *M92.6*

Ostéoclastique
- Col pancréas ¬
- - Carcinome indifférencié à cellules géantes de type *C25.7*
- - Tumeur à cellules géantes *C25.7*
- Corps du pancréas ¬ Carcinome indifférencié à cellules géantes de type *C25.1*
- Localisations contiguës ¬ Carcinome indifférencié du pancréas à cellules géantes de type *C25.8*
- Pancréas
- - Localisations contiguës ¬ Tumeur à cellules géantes *C25.8*
- - ¬ Carcinome indifférencié à cellules géantes de type *C25.9*
- Queue pancréas ¬
- - Carcinome indifférencié à cellules géantes de type *C25.2*
- - Tumeur à cellules géantes *C25.2*
- Tête du pancréas ¬ Carcinome indifférencié à cellules géantes de type *C25.0*
- ¬ Carcinome indifférencié du pancréas à cellules géantes de type *C25.9*

Ostéoclastome
- Malin ¬ *C41.9*
- ¬ *D48.0*

Ostéocraniosténose ¬ *Q78.8*

Ostéodysplasie
v./v.a. Auriculo-ostéodysplasie
v./v.a. Onycho-ostéodysplasie
- Familiale type Anderson ¬ *Q75.1*

Ostéodysplasique
v./v.a. endocrino-cérébro-ostéodysplasique
- Microcéphalique type Saul-Wilson ¬ Dysplasie *Q87.5*
- Primordial
- - Type II ¬ Nanisme microcéphalique *Q87.1*
- - Types
- - - I ¬ Nanisme microcéphalique *Q87.1*
- - - III ¬ Nanisme microcéphalique *Q87.1*
- ¬ Gérodermie *Q82.8*

Osteodystrophia deformans au cours de tumeur maligne de l'os ¬ *C41.9†, M90.69**

Osteodystrophia fibrosa osteoplastica ¬ *E21.0†, M90.89**

Ostéodystrophie
- Azotémique ¬ *N25.0*
- Cours d'une affection de la glande parathyroïde ¬ *E21.0†, M90.89**
- Fibreuse disséminée ¬ *Q78.1*
- Héréditaire
- - Albright - pseudohypoparathyroïdie de type 1A ¬ Syndrome d' *E20.1*
- - Allbright ¬ *E20.1*
- Rénale ¬
- - *N25.0*
- - Ostéopathie au cours d' *N25.0†, M90.89**
- SAI ¬ *Q78.9*
- Secondaire au cours d'une affection de la glande parathyroïde ¬ *E21.1†, M90.89**

Ostéofibreux
- Péroné ¬ Dysplasie *D16.2*
- Tibia ¬ Dysplasie *D16.2*
- ¬ Dysplasie *D16.9*

Ostéofibrome ¬ *D16.9*

Ostéogène ¬ Sarcome *C41.9*

Ostéogenèse imparfaite
- Microcéphalie-cataracte ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Rétinopathie-épilepsie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- ¬
- - *Q78.0*
- - OI [*Q78.0*
- - Syndrome d'Ehlers-Danlos- *Q79.6, Q78.0*

Ostéoglophonique ¬ Dysplasie *Q87.1*

Ostéolyse
- Carpo-tarsien multicentrique
- - Néphropathie ¬ *M89.50, N28.9*
- - ¬ *M89.50*
- Distale-petite taille-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d' *Q87.1*
- Expansive familiale
- - Avant-bras ¬ *M89.53*
- - Bras ¬

Ostéolyse *–suite*
- Expansive familiale *–suite*
- - Bras ¬ *–suite*
- - - *M89.52*
- - - *M89.55*
- - Jambe ¬ *M89.56*
- - Main ¬ *M89.54*
- - Pied ¬ *M89.57*
- - Région de l'épaule ¬ *M89.51*
- - Sièges multiples ¬ *M89.50*
- - ¬ *M89.59*
- Idiopathique massive ¬ *M89.59*
- Main ¬ *M89.54*
- Massive
- - Gorham
- - - Avant-bras ¬ *M89.53*
- - - Bras ¬ *M89.52*
- - - Colonne vertébrale ¬ *M89.58*
- - - Cuisse ¬ *M89.55*
- - - Jambe ¬ *M89.56*
- - - Localisations multiples ¬ *M89.50*
- - - Main ¬ *M89.54*
- - - Os de la face ¬ *M89.58*
- - - Pied ¬ *M89.57*
- - - Région de l'épaule ¬ *M89.51*
- - - Région pelvienne ¬ *M89.55*
- - - ¬ *M89.59*
- - Progressive ¬ *M89.59*
- Multicentrique-nodulose-arthropathie] ¬ Spectre MONA [*Q87.5*
- Périodontite-kératodermie palmoplantaire [HOPP] ¬ Syndrome d'hypotrichose- *Q82.8*
- Phalangienne transitoire ¬ *M89.54*
- Talo-patello-scaphoïde ¬ *M89.50*
- Type Kirghize ¬ Dermato- *Q82.8, M89.59*
- ¬ *M89.5*

Ostéolytique non traumatique ¬ Lésion *M89.59*

Ostéomalacie
- Adulte
- - Consécutive à une malabsorption post-chirurgicale ¬ *M83.2*
- - Due à la malnutrition ¬ *M83.3*
- - Malabsorption ¬ *M83.2*
- - Sans précision ¬ *M83.9*
- - ¬ Autres *M83.8*
- Infantile ¬ *E55.0*
- Juvénile ¬ *E55.0*
- Médicamenteuses de l'adulte ¬ Autres *M83.5*
- Oncogénique ¬ *M83.89*
- Puerpérale ¬ *M83.0*
- Résistante à la vitamine D ¬ *E83.30†, M90.89**
- Sénile ¬ *M83.1*

Ostéome choroïdien ¬ *D31.3*

Ostéomésopycnose ¬ *Q78.2*

Ostéo-musculaire
- Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et *R29.8*
- ¬
- - Anomalie du système *Q79.9*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système *R93.7*

Ostéomyélite
- Aiguës ¬ Autres *M86.1*
- Chronique
- - Fistule de drainage ¬ *M86.4*
- - Multiple ¬ *M86.3*
- Chroniques ¬ Autres *M86.6*
- Due à échinocoques ¬ *B67.2†, M90.29**
- Gonocoques ¬ *A54.4†, M90.29**
- Hématogène
- - Aiguë ¬ *M86.0*
- - Chroniques ¬ Autres *M86.5*
- Multifocale chronique récurrente
- - Avant-bras ¬ *M86.33*
- - Bras ¬ *M86.32*
- - Colonne vertébrale ¬ *M86.38*
- - Cuisse ¬ *M86.35*
- - Jambe ¬ *M86.36*
- - Main ¬ *M86.34*
- - Pied ¬ *M86.37*
- - Région pelvienne ¬ *M86.35*
- - Région scapulaire ¬ *M86.31*
- - ¬ *M86.30*
- Néonatale) de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*
- Orbite ¬ *H05.0*
- Salmonella ¬ *A02.2†, M90.29**
- Sans précision ¬ *M86.9*
- Stérile multifocale avec périostéite et pustulose ¬ *M86.30*
- Subaiguë ¬ *M86.2*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.0†, M90.29**
- - ¬ *A52.7†, M90.29**
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M90.09**
- Typhique ¬ *A01.0†, M90.29**
- Vertébral
- - Région
- - - Cervicale ¬ *M46.22*
- - - Sacrale ¬ *M46.28*
- - - Sacro-coccygienne ¬ *M46.28*
- - ¬ *M46.2*
- ¬ Autres *M86.8*

Osteomyélofibrose généralisée idiopathique ¬ *D47.4*

Ostéomyéloréticulose ¬ *D47.4*

Ostéomyélosclérose
- Mégacaryocytaire ¬ *D47.4*
- ¬ *D47.4*

Ostéonécrose
- Aseptique
- - Idiopathique ¬ *M87.09*
- - Tête fémorale médiale] ¬ Maladie d'Ahlbäck [*M87.05*
- - ¬ *M87.99*
- Avasculaire
- - Idiopathique ¬ *M87.09*
- - ¬ *M87.99*
- Cours
- - Hémoglobinopathie NCA ¬ *D58.2†, M90.49**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *M90.5**
- Due à un traumatisme antérieur ¬ *M87.29*
- Induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*
- Mâchoire
- - Due à l'irradiation ¬ *K10.28*
- - ¬ *K10.28*
- Maladie des caissons ¬ *T70.3†, M90.39**
- Médicamenteux
- - Avant-bras ¬ *M87.13*
- - Avasculaire, secondaire, non traumatique, localisations multiples ¬ *M87.10*
- - Bras ¬ *M87.12*
- - Colonne vertébrale ¬ *M87.18*
- - Cuisse ¬ *M87.15*
- - Jambe ¬ *M87.16*
- - Localisations multiples ¬ *M87.10*
- - Main ¬ *M87.14*
- - Pied ¬ *M87.17*
- - Région de l'épaule ¬ *M87.11*
- - Région pelvienne ¬ *M87.15*
- - ¬ *M87.19*
- Secondaires ¬ Autres *M87.3*
- ¬
- - *M87.8*
- - *M87.99*

Ostéopathie
- Condensante disséminée ¬ *Q78.8*
- Consécutive à une poliomyélite ¬ *M89.6*
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ *M90.8**
- - Maladies infectieuses classées ailleurs ¬ *M90.2**
- - Ostéodystrophie rénale ¬ *N25.0†, M90.89**
- Striée-sclérose crânienne ¬ Syndrome d' *Q87.5*

Ostéopénie
- Anomalies ectodermiques ¬ Syndrome de retard de développement- *Q87.8*
- Atrophie cérébelleuse ¬ Retard du développement neurologique-épilepsie-anomalies ophtalmiques- *E88.8*

Ostéopétrose
- Acidose tubulaire rénale ¬ *Q78.2, N25.8*
- Autosomique

Ostéopétrose *–suite*
- Autosomique *–suite*
- - Dominante type
- - - 1 ¬ *Q78.2*
- - - 2 ¬ *Q78.2*
- - Récessive type 7 ¬ *Q78.2, D80.1*
- Hypogammaglobulinémie ¬ Syndrome d' *Q78.2, D80.1*
- Infantile avec dysplasie neuroaxonale ¬ *Q78.2, Q04.0*
- Intermédiaire ¬ *Q78.2*
- Lymphœdème ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique anhidrotique-déficit immunitaire- *Q87.8*
- Maligne autosomique récessive ¬ *Q78.2*
- Microphtalmie-macrocéphalie-albinisme-surdité] ¬ Syndrome COMMAD [colobome- *Q87.8*

Ostéophyte
- Facette articulaire ¬ *M47.99*
- ¬ *M25.7*

Ostéoplastique ¬ Sarcome *C41.9*

Ostéopoïkilose
- Isolée ¬ *Q78.8*
- ¬
- - *Q78.8*
- - Mélorhéostose avec *Q78.8*
- - Syndrome de dacryocystite- *Q78.8, H04.3*

Ostéoporose
- Consécutive malabsorption post-chirurgical
- - Fracture pathologique ¬ *M80.3*
- - ¬ *M81.3*
- Cours
- - Maladie endocrinienne NCA ¬ *E34.9†, M82.19**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *M82.8**
- - Myélomatose multiple ¬ *C90.00†, M82.09**
- Fracture pathologique
- - Sans précision ¬ *M80.9*
- - ¬ Autres *M80.8*
- Hypopigmentation oculo-cutanée ¬ Syndrome d' *Q87.1*
- Idiopathique
- - Fracture pathologique ¬ *M80.5*
- - Liée grossesse
- - - Fracture
- - - - Colonne vertébrale ¬ *O99.8, M80.58*
- - - - ¬ *O99.8, M80.59*
- - - ¬ *O99.8, M81.59*
- - ¬ *M81.5*
- Inactivité
- - Fracture pathologique ¬ *M80.2*
- - ¬ *M81.2*
- Juvénile idiopathique ¬ *M81.5*
- Liée X
- - Fracture pathologique
- - - Avant-bras ¬ *M80.53*
- - - Bras ¬ *M80.52*

Ostéoporose *–suite*
- Liée X *–suite*
- - Fracture pathologique *–suite*
- - - Colonne vertébrale ¬ *M80.58*
- - - Fémur ¬ *M80.55*
- - - Jambe ¬ *M80.56*
- - - Localisations multiples ¬ *M80.50*
- - Fractures ¬ *M80.59*
- Localisée [Lequesne] ¬ *M81.6*
- Macrocéphalie-cécité-hyperlaxité articulaire ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Médicamenteux
- - Fracture pathologique ¬ *M80.4*
- - ¬ *M81.4*
- Ovariectomie
- - Fracture pathologique ¬ *M80.1*
- - ¬ *M81.1*
- Post-ménopausique
- - Fracture pathologique ¬ *M80.0*
- - ¬ *M81.0*
- Primaire associée à LRP5 ¬ *M81.59*
- Sans précision ¬ *M81.9*
- Sénile ¬ *M81.8*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, M90.29**
- Transitoire ¬ *M81.6*
- ¬
- - *M81.8*
- - Encéphalopathie épileptique et développementale associée à l' *G40.4*
- - Hypophosphatémie dominante
- - - *E83.30, M81.99*
- - - Néphrolithiase et *E83.30†, N22.8*, M81.99*

Ostéoporose-pseudogliome ¬ Syndrome d' *Q87.5*

Ostéoporotiques ¬ tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, *M80*

Ostéopsathyrose ¬ *Q78.0*

Ostéoradionécrose de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*

Ostéosarcome
- Anomalies des membres-macrocytose érythroïde] ¬ Syndrome OSLAM [*C41.9, Q74.9*
- Chondroplasique ¬ *C41.9*
- Clavicule ¬ *C41.32*
- Colonne vertébrale ¬ *C41.2*
- Côte ¬ *C41.30*
- Cours de maladie osseuse de Paget ¬ *C41.9†, M90.69**
- Cubitus ¬ *C40.0*
- Fémur ¬ *C40.2*
- Fibroblastique ¬ *C41.9*
- Juxtacortical ¬ *C41.9*
- L 'humérus ¬ *C40.0*
- Localisations contiguës ¬ *C41.8*
- Maxillaire
- - Inférieur ¬ *C41.1*

Ostéosarcome *–suite*
- Maxillaire *–suite*
- - Supérieur ¬ *C41.02*
- Membres
- - Inférieurs, à localisations contiguës ¬ *C40.8*
- - Supérieurs, à localisations contiguës ¬ *C40.8*
- Omoplate ¬ *C40.0*
- Os
- - Courts
- - - Membre supérieur ¬ *C40.1*
- - - Membres inférieurs ¬ *C40.3*
- - Crâne ¬ *C41.01*
- - Longs du membre inférieurs ¬ *C40.2*
- Pelvis ¬ *C41.4*
- Péroné ¬ *C40.2*
- Radius ¬ *C40.0*
- Rotule ¬ *C40.3*
- Sacrum ¬ *C41.4*
- Sternum ¬ *C41.31*
- Tibia ¬ *C40.2*
- ¬ *C41.9*

Ostéosclérose
- Acquise ¬ *M85.8*
- Autosomique dominante type Worth ¬ *Q78.2*
- Congénitale ¬ *Q77.4*
- Cours d'une myélofibrose ¬ *D47.4*
- Ichtyose-insuffisance ovarienne précoce ¬ Syndrome d' *Q87.5*
- Retard de développement-craniosynostose ¬ Syndrome d' *Q87.5*
- ¬ Leucémie associée à une *D47.4*

Ostéosclérotique
- Létale ¬ Dysplasie osseuse *Q78.2*
- ¬ Dysplasie métaphysaire *Q78.5*

Ostéose fluorée ¬ *M85.1*

Ostéosynthèse
- Interne ¬ Infection péri-implantaire par dispositif d' *T84.6*
- ¬ Fracture osseux
- - Mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d' *M96.6*
- - Retrait d'une plaque d' *M96.6*

Ostéotomie ¬ Guérison osseuse retardée après *M96.82*

Ostia coronaire ¬ Anomalie
- Nombre des *Q24.5*
- Position des *Q24.5*

Ostiale coronaire
- Congénitale ¬ Sténose *Q24.5*
- ¬
- - Atrésie *Q24.5*
- - Sténose *Q24.5*

Ostitis tuberculosa ¬ *A18.0†, M90.09**

Ostium
- Primum

Ostium *–suite*
- Primum *–suite*
- - Type I) ¬ Persistance de l' *Q21.2*
- - ¬ CIA type *Q21.2*
- Secondum ¬ CIA de type *Q21.1*
- Secundum ¬
- - Anomalie du septum atrial type *Q21.1*
- - ASD type *Q21.1*
- - Perméabilité de l' *Q21.1*
- - Persistance de l' *Q21.1*
- Urétral ¬ Sténose de l' *N35.9*

Ota sur peau
- Paupière ¬ Nævus d' *D22.1*
- Visage (à l'exception des yeux) ¬ Nævus d' *D22.3*

Otalgie ¬ *H92.0*

OTC ¬ Déficit en *E72.4*

Oticus ¬ Herpès zoster *B02.2†, H94.0**

Otite
- Adhésive ¬ *H74.1*
- Aiguë externe
- - Actinique ¬ *H60.5*
- - Chimique ¬ *H60.5*
- - Contact ¬ *H60.5*
- - Eczématoïde ¬ *H60.5*
- - Réactionnelle ¬ *H60.5*
- - SAI ¬ *H60.5*
- Chronique externe SAI ¬ *H60.8*
- Externe
- - Aiguë, non infectieuse ¬ *H60.5*
- - Cours
- - - Aspergillose ¬ *B44.8†, H62.2**
- - - Candidose ¬ *B37.2†, H62.2**
- - - Érysipèle ¬ *A46†, H62.0**
- - - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ *B00.1†, H62.1**
- - - Maladie
- - - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, H62.3**
- - - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, H62.3**
- - - - Virale NCA ¬ *B34.9†, H62.1**
- - - Maladies
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *H62.0**
- - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H62.3**
- - - - Virales classées ailleurs ¬ *H62.1**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *H62.4**
- - - Mycose ¬
- - - - *B36.9†, H62.2**
- - - - *H62.2**
- - - Zona ¬ *B02.8†, H62.1**
- - Diffuse ¬ *H60.3*
- - Hémorragique ¬ *H60.3*
- - Impétigo ¬ *L01.0†, H62.4**
- - Maligne ¬ *H60.2*
- - Pseudomonas aeruginosa ¬ *H60.2, B96.5!*
- - Sans précision ¬ *H60.9*

Otite *–suite*
- Externes
- - Infectieuses ¬ Autres *H60.3*
- - ¬ Autres *H60.8*
- Grippale [Influenza] ¬ *J11.8†, H67.1**
- Moyenne
- - Aiguë
- - - SAI ¬ *H66.9*
- - - Subaiguë
- - - - Allergique (muqueuse) (sanglante) (séreuse) ¬ *H65.1*
- - - - Muqueuse ¬ *H65.1*
- - - - Non suppurée SAI ¬ *H65.1*
- - - - Sanglante ¬ *H65.1*
- - - - Séromuqueuse ¬ *H65.1*
- - - Suppurée ¬ *H66.0*
- - Allergique ¬ *H65.9*
- - Barotraumatique ¬ *T70.0*
- - Catarrhale ¬ *H65.9*
- - Chronique
- - - Allergique ¬ *H65.4*
- - - Attico-antrale suppurée ¬ *H66.2*
- - - Épanchement (non purulent) ¬ *H65.4*
- - - Exsudative ¬ *H65.4*
- - - Muqueuse ¬ *H65.3*
- - - Non suppurée SAI ¬ *H65.4*
- - - SAI ¬ *H66.9*
- - - Sécrétoire ¬ *H65.3*
- - - Séromuqueuse ¬ *H65.4*
- - - Transsudative ¬ *H65.3*
- - Cours
- - - Maladie virale NCA ¬ *B34.9†, H67.1**
- - - Maladies
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *H67.0**
- - - - Virales classées ailleurs ¬ *H67.1**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *H67.8**
- - - Rougeole ¬ *B05.3†, H67.1**
- - Épanchement (non purulent) ¬ *H65.9*
- - Exsudative ¬ *H65.9*
- - Mucoïde chronique ¬ *H65.3*
- - Muqueuse ¬ *H65.9*
- - Nécrosante aiguë
- - - Cours de scarlatine ¬ *A38†, H67.0**
- - - Lors de grippe [Influenza] ¬ *J11.8†, H67.1**
- - Non suppurée, sans précision ¬ *H65.9*
- - Purulente SAI ¬ *H66.4*
- - SAI ¬ *H66.9*
- - Sans précision ¬ *H66.9*
- - Sécrétoire ¬ *H65.9*
- - Séreux
- - - Aiguë ¬ *H65.0*
- - - Chronique ¬ *H65.2*
- - - ¬ *H65.9*
- - Séromuqueuse ¬ *H65.9*
- - Suppurée

Otite *–suite*
- Moyenne *–suite*
- - Suppurée *–suite*
- - - Chronique
- - - - Bénigne ¬ *H66.1*
- - - - SAI ¬ *H66.3*
- - - - Tubo-tympanique ¬ *H66.1*
- - - Sans précision ¬ *H66.4*
- - Transsudative ¬ *H65.9*
- - Tuberculeuse ¬ *A18.6†, H67.0**
- - Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, H67.1**
- - ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09†, H67.1*, U69.23!*
- - - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une *J09†, H67.1*, U69.24!*
- Moyennes
- - Aiguës, non suppurées ¬ Autres *H65.1*
- - Chroniques, non suppurées ¬ Autres *H65.4*
- - Suppurées chroniques ¬ Autres *H66.3*
- Mucoïde ¬ *H65.3*
- Scarlatineuse ¬ *A38†, H67.0**
- Virus de la grippe saisonnière identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J10.8†, H67.1**

Oto
v./v.a. branchio-oto-rénal
- Radial ¬ Syndrome oculo- *Q87.8*

Otocéphalie ¬ *Q18.2*

Oto-dentaire ¬ Syndrome
- *Q87.0*
- OOD [oculo- *Q87.0*

Oto-facio-cervical ¬ Syndrome *Q87.0*

Otogène
- Disséminée pNCA ¬ Encéphalite *H66.4†, G05.8**
- ¬
- - Abcès (embolique) (du): *G06.0*
- - Vertige: *H81.3*

Otologiques et audiologiques ¬ Présence d'implants *Z96.2*

Otomycose
- Cours
- - Aspergillose ¬ *B44.8†, H62.2**
- - Candidose ¬ *B37.88†, H62.2**
- - Moniliase ¬ *B37.88†, H62.2**
- Diffuse ¬ *B36.9†, H62.2**
- ¬ *B36.9†, H62.2**

Oto-onycho-péronéal ¬ Syndrome *Q87.5*

Oto-palato-digital ¬ Syndrome *Q87.0*

Oto-rhino-laryngologie ¬ Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en *T49.6*

Oto-rhino-laryngologiques ¬ Anti-infectieux *T49.6*

Otorragie ¬ *H92.2*

Otorrhée ¬ *H92.1*

Otosclérose
- Cochléaire ¬ *H80.2*
- Intéressant
- - Capsule labyrinthique ¬ *H80.2*
- - Fenêtre
- - - Ovale
- - - - Non oblitérante ¬ *H80.0*
- - - - Oblitérante ¬ *H80.1*
- - - Ronde ¬ *H80.2*
- Oreille interne ¬ *H80.2*
- Sans précision ¬ *H80.9*
- ¬ Autres *H80.8*

Oto-spondylo-mégaépiphysaire
- Autosomique récessive ¬ Dysplasie *Q77.7*
- ¬ Dysplasie *Q77.7*

Otospongiose ¬ *H80*

Ototoxicité ¬ Perte de l'audition par *H91.0*

Otten
v./v.a. Sengers-Hamel-Otten

OTULIN ¬
- ORAS [Syndrome auto-inflammatoire associé à *M35.8*
- Syndrome auto-inflammatoire infantile associé à *M35.8*

Ouïe
- Syphilitique congénitale ¬ Problèmes d' *A50.0†, H94.8**
- Syphilitiques ¬ Problèmes d' *A52.1†, H94.8**
- ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos de type cyphoscoliose avec problèmes d' *Q79.6*

Ouraque
- Congénital ¬ Kyste de l' *Q64.4*
- Congénitale ¬ Fistule de l' *Q64.4*
- Persistant ¬ *Q64.4*
- ¬
- - Carcinome à petites cellules de l' *C67.7*
- - Carcinome non papillaire à cellules transitionnelles de l' *C67.7*
- - Diverticule de l' *Q64.4*
- - Fistule de l' *Q64.4*
- - Kyste de l' *Q64.4*
- - Malformation de l' *Q64.4*
- - Persistance de l' *Q64.4*
- - Prolapsus de l' *Q64.4*
- - Sinus de l' *Q64.4*

Ourlien
- SAI ¬ Parotidite *B26.9*
- ¬
- - Arthrite *B26.8†, M01.59**
- - Myocardite *B26.8†, I41.1**
- - Néphrite *B26.8†, N08.0**

Ourlien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Polynévrite *B26.8†, G63.0**

Outils ¬ Accident dû à: *W49.9!*

Ouvert
v./v.a. Type de maladie

Ouverture cavité cœur ¬ Déchirure cardiaque
- *S26.83*
- Sans *S26.82*

Ouvrier ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique récessive type *G60.0*

Ouvrier-Billson ¬ Syndrome d' *G96.8, H51.8*

Ovaire
- Associée à une ovulation induite ¬ Hyperstimulation des *N98.1*
- Bandelette ¬
- - 46,XX avec *Q99.1*
- - 46,XY avec *Q99.1*
- Cours syndrome
- - Déficit constitutionnel de la réparation des mésappariements ¬ Carcinome de l' *C56*
- - Héréditaire du cancer du sein et de l'ovaire ¬ Carcinome de l' *C56*
- - Lynch ¬ Carcinome de l' *C56*
- Faible potentiel malignité ¬ Tumeur
- - Mucineuse de l' *C56*
- - Papillaire mucineuse de l' *C56*
- Limite malignité ¬
- - Cystadénome mucineux de l' *C56*
- - Tumeur épithéliale de l' *C56*
- Lors
- - Induction de l'ovulation ¬ Hyperstimulation de l' *N98.1*
- - Insémination artificielle ¬ Hyperstimulation de l' *N98.1*
- Pédicule ovarien et de la trompe de Fallope ¬ Torsion de l' *N83.5*
- Résistant aux gonadotrophines ¬ Syndrome de l' *E28.3*
- S) ¬ Absence congénitale d' *Q50.0*
- SAI ¬
- - Hyperstimulation des *N98.1*
- - Malformation congénitale de l' *Q50.3*
- Sans précision ¬ Kystes de l' *N83.2*
- Surnuméraire ¬ *Q50.3*
- Trompe de Fallope
- - Ligament large ¬ Autres affections non inflammatoires de l' *N83.8*
- - ¬
- - - Atrophie acquise de l' *N83.3*
- - - Prolapsus et hernie de l' *N83.4*
- ¬
- - Abcès (de): *N70*
- - Absence acquise de l' *Z90.7*
- - Adénocarcinome
- - - *C56*
- - - Cellules claires de l' *C56*
- - - Endométrioïde de l' *C56*

Ovaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Adénocarcinome *–suite*
- - - Mucineux de l' *C56*
- - - Papillaire
- - - - *C56*
- - - - Kystique de l' *C56*
- - - Pseudo-mucineux de l' *C56*
- - Cancer de l' *C56*
- - Carcinome
- - - Embryonnaire de l' *C56*
- - - Endométrioïde de l' *C56*
- - - Ovaire au cours du syndrome héréditaire du cancer du sein et de l' *C56*
- - Carcinome à petites cellules de l' *C56*
- - Carcinome papillaire kystique de l' *C56*
- - Cystadénocarcinome
- - - Endométrioïde de l' *C56*
- - - Mucineux de l' *C56*
- - - Papillaire de l' *C56*
- - - Pseudo-mucineux de l' *C56*
- - Dysgerminome de l' *C56*
- - Endométriose de l' *N80.1*
- - Gonorrhée de l' *A54.2†, N74.3**
- - Hyperstimulation des *N98.1*
- - Kyste
- - - Folliculaire
- - - - *N83.0*
- - - - Hémorragique (de l' *N83.0*
- - - Rétentionnel de l' *N83.2*
- - - Simple de l' *N83.2*
- - Lésion traumatique de l' *S37.4*
- - Malformations congénitales de l' *Q50.3*
- - Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique de l' *Z40.01*
- - Polyembryome de l' *C56*
- - Séminome de l' *C56*
- - Syndrome héréditaire de prédisposition au cancer du sein et de l' *C56, C97!, C50.9*
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, N74.2**
- - Tératome malin de l' *C56*
- - Torsion congénitale de l' *Q50.2*
- - Tuberculose de l' *A18.1†, N74.1**
- - Tumeur bénigne de l' *D27*
- - Tumeur ectopique sécrétrice d'aldostérone de l' *D39.1, E26.0*
- - Tumeur germinale
- - - Dysgerminomateuse maligne de l' *C56*
- - - Maligne
- - - - Mixte de l' *C56*
- - - - Non dysgerminomateuse de l' *C56*
- - Tumeur maligne
- - - *C56*
- - - Mixte müllérienne de l' *C56*
- - - Secondaire de l' *C79.6*
- - - Sertoli-Leydig de l' *C56*

Ovaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D39.1*

Ovale
- Non oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la fenêtre *H80.0*
- Oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la fenêtre *H80.1*
- ¬
- - Paludisme à Plasmodium *B53.0*
- - Perméabilité ou persistance de: foramen *Q21.1*

Ovalocytose
- Asie du Sud-Est ¬ *D58.1*
- Congénitale ¬ *D58.1*

Ovariectomie
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose après *M80.1*
- ¬ Ostéoporose après *M81.1*

Ovarien
v./v.a. Insuffisance ovarienne
- 46,XX-petite taille ¬ Syndrome de dysgénésie *Q96.8*
- Cours du développement ¬ Kyste *Q50.1*
- Dermoïde avec transformation maligne ¬ Tumeur *C56*
- Enfant ¬ Cystadénome *D27*
- Hyperandrogénie ¬ Dysfonction *E28.1*
- Hyperœstrogénie ¬ Dysfonction *E28.0*
- Malin immature ¬ Tératome embryonnaire *C56*
- Polykystique] ¬ SOPK [Syndrome *E28.2*
- Primitif non gestationnel ¬ Choriocarcinome *C56*
- Résiduel ¬ Syndrome dû à la présence de tissu *N99.8*
- SAI ¬ Hyperfonction *E28.8*
- Sans précision ¬ Dysfonction *E28.9*
- Sclérokystique ¬ Syndrome (de): *E28.2*
- Trompe de Fallope ¬ Torsion de l'ovaire, du pédicule *N83.5*
- Tuberculeux ¬ Kyste *A18.1†, N74.1**
- ¬
- - Aplasie *Q50.3*
- - Artère ou veine: *S35.88*
- - Cystadénome *D27*
- - Dysfonctions *E28.8*
- - Fibrome *D27*
- - Fibrothécome *D27*
- - Grossesse *O00.2*
- - Hypersécrétion des androgènes *E28.1*
- - Kyste de la frange *Q50.4*
- - Saignement *N83.8*
- - Salpingo- *C57.8*
- - Utéro- *C57.8*

Ovarite
- Aiguës ¬ Salpingite et *N70.0*
- Chroniques ¬ Salpingite et *N70.1*

Ovarite *–suite*
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N74.3**
- Oreillons ¬ *B26.8†, N74.8**
- Sans précision ¬ Salpingite et *N70.9*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N74.1**

Overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue ¬ Prise excessive (*X49.9!*

Overlap syndrome ¬ *M35.1*

Overriding
- Valve mitrale ¬ *Q23.8*
- Valve tricuspide ¬ Straddling ou *Q22.8*

Oviducte ¬ *C57.0*

Ovine ¬
- Encéphalomyélite *A84.8*
- Orf [dermatite pustuleuse contagieuse *B08.0*

Ovotesticulaire développement sexuel
- 46,XX ¬ Anomalie *Q56.0*
- Caryotype de type 46,XY ¬ Anomalie *Q56.0*

Ovotestis ¬ *Q56.0*

Ovulation
- Induite ¬ Hyperstimulation des ovaires: associée à une *N98.1*
- ¬
  - Hyperstimulation de l'ovaire lors d'induction de l' *N98.1*
  - Saignements de l' *N92.3*
  - Stérilité d'origine endocrinienne chez la femme avec *N97.8*

Ovules ¬ Admission pour prélèvement ou implantation d' *Z31.2*

Owren ¬ Maladie d' *D68.22*

OX40 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Oxacilline
- Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l' *U80.10!*
- Méticilline
  - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré résistant à l' *U80.00!*
  - MRSA] ¬ Staphylocoque doré résistant à l' *U80.00!*
    - ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l' *U80.01!*
  - ¬ Streptococcus pneumoniae résistant
  - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l' *U80.11!*
  - Pénicilline ou à l' *U80.10!*

Oxalate
- Calcium ¬ Néphrite à *E74.8*
- ¬ Néphropathie à *E74.8*

Oxalaturie ¬ *E74.8*

Oxalose ¬ *E74.8*

Oxalurie ¬ *E74.8*

Oxazolidine
- Diones ¬ Intoxication: Succinimides et *T42.2*
- ¬ Intoxication à l' *T42.2*

Oxazolidinones
- Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux *U80.21!*
- Non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux *U80.01!*
- Streptogramines
  - Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ Enterococcus faecium résistant aux *U80.31!*
  - Nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux *U80.11!*
  - ¬
    - Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et aux *U80.20!*
    - Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et aux *U80.30!*
    - Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline et le cas échéant aux macrolides,aux *U80.10!*
  - ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline et le cas échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux *U80.00!*

Oxo thiolase ¬ Carence en 3- *E71.1*

Oxoacide CoA transférase ¬ Déficit en succinyl-CoA:3- *E71.3*

Oxoglutarique ¬ Acidurie *E88.8*

Oxoprolinase ¬
- Déficit en 5- *E72.8*
- Oxoprolinurie liée à un déficit en *E72.8*

Oxoprolinurie liée à un déficit en oxoprolinase ¬ *E72.8*

OXPHOS combiné ¬ Déficit *E88.8*

Oxycéphalie
- Non syndromique ¬ *Q75.0*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, M90.28**
- ¬ *Q75.0*

Oxydase
v./v.a. sulfite-oxydase
- Acide homogentisique ¬ Déficit en *E70.2*
- C
  - Type franco-canadien ¬ Déficit en COX [cytochrome *G31.88*
  - ¬ Cardio-encéphalo-myopathie fatale infantile par déficit en cytochrome *G31.81*
- Déficit cofacteur molybdène
  - Type A ¬ Déficit en sulfite *E72.1*
  - ¬ Déficit en sulfite *E72.1*
- Type A ¬ Déficit combiné en sulfite oxydase, xanthine déshydrogénase et aldéhyde *E72.1*

Oxydase *–suite*
- Xanthine déshydrogénase et aldéhyde oxydase type A ¬ Déficit combiné en sulfite *E72.1*
- ¬
  - Déficit
    - 18- *E27.4*
    - Acyl-CoA *E71.3*
    - Combiné en xanthine déshydrogénase et xanthine aldéhyde *E79.8*
    - Glutaryl-CoA *E72.3*
    - Isolé en sulfite *E72.1*
    - Proline *E72.5*
    - Protoporphyrinogène *E80.2*
    - Pyridoxamine 5'-phosphate *G40.8*
    - Xanthine *E79.8*
  - Encéphalopathie par déficit en sulfite *E72.1*
  - Halitose extra-orale autosomique récessive due à un déficit en méthanethiol *E88.8*

Oxydation des acides gras et du métabolisme des corps cétoniques ¬ Trouble de l' *E71.3*

Oxydative
- Associé
  - QRSL1 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*
  - WARS2 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
- Type
  - 1 ¬ Hépatoencéphalopathie par déficit combiné de la phosphorylation *E88.8, K72.79!*
  - 2 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
  - 3 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
  - 4 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
  - 6 ¬ Encéphalomyopathie mitochondriale due à un déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
  - 7 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
  - 8 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*
  - 9 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*
  - 10 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*
  - 11 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
  - 12 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
  - 13 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
  - 14 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
  - 15 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
  - 16 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*

Oxydative *–suite*
- Type *–suite*
- - 17 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*
- - 18 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
- - 20 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
- - 21 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
- - 23 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*
- - 24 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
- - 25 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
- - 26 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *E88.8*
- - 27 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
- - 28 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*
- - 29 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
- - 30 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *E88.8*
- - 39 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*
- ¬
- - Déficit combiné de la phosphorylation *E88.8*
- - Surdité neurosensorielle syndromique due à un déficit combiné de la phosphorylation *G31.81*, *H90.8*

Oxydes d'azote ¬ Effet toxique: *T59.0*

Oxydoréductase ¬
- Déficit en xanthine *E79.8*
- Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en cytochrome P450 *E25.08*
- Trouble du transport d'électrons par carence en flavoprotéine-ubiquinone *E71.3*

Oxydoréduction des alcools d'acides gras ¬ Déficit d' *Q87.1*

Oxygénase-1 ¬ Déficit en hème *E88.8*

Oxygénation systémique due
- Faible teneur en oxygène de l'air ambiant ¬ Insuffisance d' *T71*
- Gêne mécanique à la respiration ¬ Insuffisance d' *T71*

Oxygène
- Air ambiant ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible teneur en *T71*
- ¬
- - *T41.5*
- - Intoxication à l' *T41.5*

Oxytoca multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Klebsiella *U81.02!*
- 3MRGN ¬ Klebsiella *U81.22!*
- 4MRGN ¬ Klebsiella *U81.42!*

Oxyures ¬
- Infection à *B80*
- Vaginite au cours de l'infection par des *B80†*, *N77.1**
- Vulvite au cours de l'infection par des *B80†*, *N77.1**
- Vulvo-vaginite au cours de l'infection par des *B80†*, *N77.1**

Oxyurose ¬ *B80*

Ozène ¬ *J31.0*

Pacemaker ¬ Syndrome de *I97.1*

Pachycéphalie isolée ¬ *Q67.4*

Pachydermie

- Larynx ¬ *J38.7*
- Vorticellé primaire
- - Essentielle du cuir chevelu ¬ *Q82.8*
- - ¬ *Q82.8*

Pachydermopériostose

- Hippocratisme digital ¬ *M89.49†, L62.0**
- ¬ *M89.49*

Pachygyrie

- Déficience intellectuelle-épilepsie ¬ Syndrome de *Q04.3*
- Fronto-temporale autosomique récessive ¬ *Q04.3*
- Polymicrogyrie occipitales ¬ *Q04.3*
- ¬ *Q04.3*

Pachyméningite

- Associée à IgG4 ¬ *G03.8*
- Bactérienne ¬ *G00*
- Due à des causes autres et non précisées ¬ *G03*
- Tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**

Pachyonychie

- Congénitale] ¬ PC [*Q84.5*
- ¬ *Q84.5*

Pacificum ¬ Infection due à une forme adulte de Diphyllobothrium *B70.0*

Pacman ¬ Dysplasie de *M89.50*

PADMAL [Microangiopathie cérébrale pontine autosomique dominante avec leucoencéphalopathie] ¬ *I67.88, G93.4*

Paediatric inflammatory multisystem syndrome temporairement associé COVID-19 ¬

- *U10.90*
- PIMS [*U10.90*

PAF

- Atténuée liée à MUTYH ¬ *D12.6*
- Polypose adénomateux familiale
- - Liée au gène MUTYH ¬ *D12.6*
- - ¬ *D12.6*

PAFA [Polypose adénomateuse familiale atténuée] ¬ *D12.6*

Paget

- Crâne ¬ Maladie de *M88.0*
- Démence fronto-temporale ¬ Syndrome de myopathie à inclusions-maladie de *G71.8, G31.0*
- Extramammaire ¬ Maladie
- - *C21.0*
- - *C44.50*
- Juvénile
- - Localisations multiples ¬ Maladie de *M88.80*
- - Os du crâne ¬ Syndrome de *M88.0*
- - ¬ Maladie de *M88.99*
- Os ¬ Maladie de *M88.8*
- Sans précision ¬ Maladie osseuse de *M88.9*

Paget *–suite*

- ¬
- - Maladie de *C50.0*
- - Ostéosarcome au cours de maladie osseuse de *C41.9†, M90.69**
- - Syndrome de paraplégie spastique-maladie de *G11.4, M88.99*

Pagétoïde localisée ¬ Réticulose *C84.0*

PAGOD ¬ Syndrome *Q87.8*

Pagon
v./v.a. Palmer-Pagon

Pai ¬

- Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*
- Syndrome de *Q87.8*

Painful legs and moving toes]-Syndrom ¬ PLMT [*G25.88*

PAIS] ¬ Insensibilité partielle aux androgènes [*E34.50*

Pakistani
v./v.a. Kreiborg-Pakistani

- ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Palacos ¬ Réaction de *T84.8*

Palagonia ¬ Dysostose acrofaciale type *Q75.4*

Palais

- Diastèmes multiples-dysmorphie faciale-retard de développement ¬ Syndrome d'anomalies du *Q87.0*
- Fente labial
- - Bilatérale ¬ Fente
- - - Voile du *Q37.2*
- - - Voûte
- - - - *Q37.0*
- - - - Voile du *Q37.4*
- - SAI ¬ Fente
- - - Voile du *Q37.3*
- - - Voûte
- - - - *Q37.1*
- - - - Voile du *Q37.5*
- - Unilatérale ¬ Fente
- - - Voile du *Q37.3*
- - - Voûte
- - - - *Q37.1*
- - - - Voile du *Q37.5*
- Fumeur ¬ *K13.2*
- Mou ¬ Tuberculose du *A18.8†, K93.8**
- Non classées ailleurs ¬ Malformations congénitales du *Q38.5*
- Ogival ¬ *Q38.5*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q38.5*
- Sans précision ¬
- - Fente du *Q35.9*
- - Tumeur maligne: *C05.9*
- ¬
- - *S02.8*
- - Carcinome basocellulaire du voile du *C05.1*
- - Fente

Palais *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Fente *–suite*
- - - *Q35.9*
- - - Médiane du voile du *Q35.3*
- - - Voile du *Q35.3*
- - - Voûte
- - - - *Q35.1*
- - - - Voile du *Q35.5*
- - Fissure du *Q35.9*
- - Gomme du voile du *A52.7†, K93.8**
- - Leucokératose nicotinique du *K13.2*
- - Malformation de la fente de la voûte et du voile du *Q35.5*
- - Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du voile du *C11.3*
- - Perforation
- - - Congénitale du *Q35.9*
- - - Syphilitique du *A52.7†, K93.8**
- - - Voile du *Q35.3*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.55*
- - Sarcome de Kaposi du *C46.2*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, K93.8**
- - Tumeur maligne
- - - Lésion à localisations contiguës du *C05.8*
- - - Voile du *C05.1*
- - Ulcère du *K12.1*

Palatin

- Ankyloglossie liées à l'X ¬ Fente *Q38.6*
- Anomalies carpo-tarsales-oligodontie ¬ Syndrome de fente *Q87.8*
- Canal incisif] ¬ Kyste (de): naso- *K09.1*
- Excès de peau ¬ Syndrome de dysmorphie faciale-fente *Q87.0*
- Grandes oreilles-petite taille ¬ Syndrome de fente *Q87.1*
- Hallux valgus ¬ Syndrome de colobome maculaire-fente *Q87.8*
- Mutation de MEIS2 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-cardiopathie congénitale-fente *Q87.8*
- Petite taille-anomalies vertébrales ¬ Syndrome de fente *Q87.0*
- Pigmentation rétinienne anormale ¬ Syndrome de microcéphalie-fente *Q87.8*
- Sans précision fente labial
- - Bilatérale ¬ Fente *Q37.8*
- - Unilatérale ¬ Fente *Q37.9*
- Submuqueuse ¬ Fente *Q35.9*
- Synéchies latérales ¬ Syndrome de fente *Q87.8*
- Vélaire médiane ¬ Fente *Q35.5*
- ¬
- - Amygdale
- - - *C09.9*
- - - *D10.4*

Palatin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carcinome basocellulaire de la voûte *C05.0*
- - Perforation syphilitique congénitale de la voûte *A50.5†, K93.8**
- - Syndrome
- - - Ankyloblépharon filiforme-fente *Q87.0*
- - - Déficience intellectuelle-cardiopathie congénitale-fente *Q87.8*
- - - Létal d'omphalocèle-fente *Q87.8*
- - - Macrosomie-microphtalmie-fente *Q87.0*
- - - Microtie bilatérale-surdité-fente *Q87.0*
- - - Syngnathie-fente *Q67.4, Q35.9*
- - Tératome *D37.0*
- - Torus: *K10.0*
- - Tumeur maligne: Voûte *C05.0*

Palato
v./v.a. cérébro-palato-cardiaque
v./v.a. génito-palato-cardiaque
v./v.a. oculo-palato-cérébral
v./v.a. oto-palato-digital

Palatoschisis ¬ *Q35.9*

Pâleur
- Temporale de la papille optique ¬ *H47.2*
- ¬ *R23.1*

Palindromique ¬ Rhumatisme *M12.3*

Palinopsie ¬ *F06.0*

Palissade ¬
- Dégénérescence rétinienne: en *H35.4*
- Syndrome PENS [nævus épidermiques papulaires avec couche basale en *Q87.8*

Palliatifs ¬ Soins *Z51.5*

Palliation
- Interventionnelles d'une malformation cardiaque congénitale ¬ Antécédents personnels de correction et *Z92.80*
- Malformation cardiaque congénitale ¬
- - État après intervention de chirurgie cardiaque visant la correction et *Z98.80*
- - Examen de contrôle après correction et *Z09.81*

Pallidale pigmentaire ¬ Dégénérescence *G23.0*

Pallido
v./v.a. dentato-rubro-pallido-luysienne

Pallido-pyramidal ¬ Syndrome *G20.90*

Pallidum SAI ¬ Infection due à Treponema *A53.9*

Pallister W ¬ Syndrome de *Q87.8*

Pallister-Hall ¬ Syndrome de *D33.0*

Pallister-Killian ¬ Syndrome de *Q99.8*

Palm
v./v.a. Pfeiffer-Palm-Teller

Palmaire
v./v.a. odonto-tricho-unguéo-digito-palmaire
- Anormaux ¬ Plis *Q82.8*
- Dupuytren] ¬ Fibromatose de l'aponévrose *M72.0*
- Héréditaire ¬ Érythème *Q27.8*

Palmaire *–suite*
- Plantaire
- - Acquise ¬ Kératose [kératodermie] *L85.1*
- - Précoce) (tardive), due au pian ¬ Hyperkératose *A66.3*
- - ¬
- - - Kératose ponctuée (*L85.2*
- - - Pustulose *L40.3*
- Profond ¬ Lésion traumatique de l'arc *S65.3*
- Superficiel ¬ Lésion traumatique de l'arc *S65.2*
- ¬
- - *S63.4*
- - Ligament: cubito-carpien (*S63.3*
- - Papillome pianique plantaire ou *A66.1*

Palmaris ¬ Keratomycosis nigricans *B36.1*

Palmé ¬ Cou *Q18.3*

Palmer-Pagon ¬ Syndrome de *Q87.8*

Palmitoyltransférase
- I hépatique ¬ Déficit en carnitine *E71.3*
- IA ¬ Déficit en carnitine *E71.3*

Palmityltransférase musculaire ¬ Carence en carnitine *E71.3*

Palmoplantaire
- Alopécie congénitale autosomique
- - Dominante ¬ Kératodermie *Q82.8*
- - Récessive ¬ Hyperkératose *Q82.8, Q84.0*
- Ambiguïté sexuelle XX-prédisposition au carcinome spinocellulaire ¬ Syndrome de kératodermie *Q56.0, Q82.8*
- Aquagénique ¬ Kératodermie *L85.8*
- Carcinome de la peau ¬ Syndrome d'anomalie de pigmentation-kératodermie *C44.9, Q82.8*
- Cardiomyopathie arythmogène ¬ Syndrome
- - Hyperkératose *Q87.8*
- - Kératodermie *Q87.8*
- Circonscrite ¬ Hypokératose *L98.8*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypohidrose-hypoplasie de l'émail-kératodermie *Q87.8*
- Diffuse
- - Acrocyanose ¬ Syndrome de kératodermie *Q82.8*
- - Autosomique dominante type Norrbotten ¬ Kératodermie *Q82.8*
- - Type Botnien ¬ Kératose *Q82.8*
- Disséminée ¬ Porokératose *Q82.8*
- Dyskératose laryngée ¬ Syndrome de dyskératose intraépithéliale de la cornée avec hyperkératose *Q82.8*
- Érythrodermique diffuse type Voerner ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Focale
- - Gingivale ¬ Hyperkératose *Q82.8*
- - Kératose localisée aux articulations ¬ Kératodermie *Q82.8*
- - Non épidermolytique
- - - Autosomique dominante avec atteintes bulleuses ¬ Kératose *Q82.8*

Palmoplantaire *–suite*
- Focale *–suite*
- - Non épidermolytique *–suite*
- - - Isolée ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Héréditaire
- - Type Gamborg-Nielsen ¬ Kératodermie *Q82.8*
- - ¬ Kératose *Q82.8*
- HOPP] ¬ Syndrome d'hypotrichose-ostéolyse-périodontite-kératodermie *Q82.8*
- Mutilante avec plaques kératosiques péri-orificielles ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire ¬ Syndrome de kératodermie *G60.0, Q82.8*
- Non épidermolytique associée à KRT1 ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Nummulaire ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Paralysie spastique ¬ Kératose *Q82.8, G11.4*
- Ponctuée type
- - 1 ¬ Kératodermie *Q82.8*
- - 2 ¬ Kératodermie *Q82.8*
- - 3 ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Striée ou en bandes ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Surdité ¬ Syndrome de kératodermie *Q82.8*
- Transgrediens et progrediens ¬ Kératodermie *Q82.8*
- Type Nagashima ¬ Kératodermie *Q82.8*
- ¬
- - Érythrodysesthésie *L27.1*
- - Syndrome
- - - Cheveux laineux-kératodermie *Q82.8*
- - - Fragilité cutanée-cheveux laineux-hyperkératose *Q82.8*
- - - Leucoencéphalopathie-kératose *G93.4, Q82.8*
- - - Paraplégie-déficience intellectuelle-hyperkératose *Q87.8*

Palmo-plantaire avec clinodactylie du cinquième doigt ¬ Kératose *Q82.8, Q68.1*

Palmoplantaire-périodontopathie ¬ Syndrome de kératodermie *Q82.8*

Palmoplantaire-périodontopathie-onychogrypose ¬ Syndrome d'hyperkératose *Q82.8*

Palmoplantaris transgrediens de Siemens ¬ Keratosis *Q82.8*

Palmure
- Congénitale du larynx ¬ *Q31.0*
- Doigts ¬ *Q70.1*
- Orteils ¬ *Q70.3*

Palpébral ¬
- Ectropion *H02.1*
- Œdème *H02.8*
- Troubles affectant la fonction *H02.5*

Palpitations ¬ *R00.2*

Paludéen ¬ Foie *B54*

Paludisme
- Cérébral ¬ *B50.0†, G94.8**

Paludisme *–suite*
- Confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs ¬ Autres *B53.8*
- Congénital
- - Plasmodium falciparum ¬ *P37.3*
- - ¬ Autres formes de *P37.4*
- Diagnostiqué cliniquement, sans confirmation parasitologique ¬ *B54*
- Hémoglobinurique ¬ *B50.8*
- Plasmodies simiennes ¬ *B53.1*
- Plasmodium
- - Falciparum
- - - Complication
- - - - Cérébrale ¬ *B50.0†, G94.8**
- - - - ¬ *B50.8*
- - - ¬ *B50.9*
- - Malariae
- - - Atteinte rénale ¬ *B52.0†, N08.0**
- - - Complications ¬ *B52.8*
- - - Sans complication ¬ *B52.9*
- - - ¬ *B52.9*
- - Ovale ¬ *B53.0*
- - Vivax
- - - Complications NCA ¬ *B51.8*
- - - Rupture de la rate ¬ *B51.0†, D77**
- - - Sans complication ¬ *B51.9*
- Récurrent ¬ *B54*
- ¬
- - *B54*
- - Anémie due au *B54†, D63.8**
- - Cachexie au cours du *B54*
- - Fièvre
- - - Intermittente au cours du *B54*
- - - Intestinale au cours du *B54*
- - Hépatite au cours de *B54†, K77.0**
- - Myocardite au cours de *B50.8†, I41.2**
- - Néphrose au cours de *B52.0†, N08.0**
- - Splénomégalie au cours de *B54†, D77**

Pampiniforme ¬ Thrombose du plexus *I80.88*

PAN ¬
- Polyartérite noueuse [*M30.0*
- Syndrome de Du *Q73.8*

Panacinaire ¬ Emphysème *J43.1*

Panaris herpétique ¬ *B00.8†, L99.8**

Panbronchiolite diffuse ¬ *J44.89*

Pancardite (aiguë) (chronique) ¬ *I51.8*

Pancolite
- Indéterminée ¬ *K52.30*
- Ulcéreuse (chronique) ¬ *K51.0*

Pancréas
- Annulaire ¬ *Q45.1*
- Atrésie intestinale-hypoplasie de la vésicule biliaire ¬ Syndrome d'hypoplasie du *Q45.8*
- Atteinte intestin grêle ¬ Insuffisance
- - Anastomoses au *K91.82*
- - Suture au *K91.82*

Pancréas *–suite*
- Canal pancréatique
- - SAI ¬ Malformation congénitale du *Q45.3*
- - ¬ Autres malformations congénitales du *Q45.3*
- Cellule géante type ostéoclastique
- - Localisations contiguës ¬ Carcinome indifférencié du *C25.8*
- - ¬ Carcinome indifférencié du *C25.9*
- Corps ¬ Lésion traumatique du *S36.22*
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Atteinte du *K87.1**
- - Syndrome Lynch
- - - Localisations contiguës ¬ Carcinome du *C25.8*
- - - ¬ Carcinome
- - - - *C25.9*
- - - - Corps du *C25.1*
- - - - Queue du *C25.2*
- - - - Tête du *C25.0*
- Endocrine
- - Polypeptide
- - - Intestinal vaso-actif ¬ Hypersécrétion du *E16.8*
- - - Pancréatique ¬ Hypersécrétion du *E16.8*
- - Releasing factor» de l'hormone de croissance [SRH] [GHRH] ¬ Hypersécrétion du *E16.8*
- - Somatostatine ¬ Hypersécrétion du *E16.8*
- - ¬
- - - Tumeur bénigne: *D13.7*
- - - Tumeur maligne: *C25.4*
- Holoprosencéphalie ¬ Syndrome d'agénésie du *Q04.2, Q45.0*
- Hypersécrétion de glucagon ¬ Hyperplasie des cellules endocrines du *E16.3*
- Localisations contiguës ¬
- - Carcinome familial du *C25.8*
- - Tumeur à cellules géantes ostéoclastiques du *C25.8*
- Partie non précisée ¬ Lésion traumatique du *S36.20*
- Parties et parties multiples ¬ Lésion traumatique du *S36.29*
- Queue ¬ Lésion traumatique du *S36.23*
- SAI ¬ Hyperplasie des cellules (des): endocrines du *E16.9*
- Sans précision ¬
- - Maladie du *K86.9*
- - Tumeur maligne: *C25.9*
- Sécrétrice de sérotonine ¬ Tumeur neuroendocrine du *C25.4*
- Surnuméraire ¬ *Q45.3*
- Tête ¬ Lésion traumatique du *S36.21*
- ¬
- - *D01.7*
- - *Z94.88*
- - Aberration du *Q45.3*

Pancréas *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Absence congénitale du *Q45.0*
- - Adénome du *D13.6*
- - Agénésie, aplasie et hypoplasie du *Q45.0*
- - Atrophie du *K86.88*
- - Blastome
- - - Col du *C25.7*
- - - Corps du *C25.1*
- - - Queue du *C25.2*
- - - Tête du *C25.0*
- - Calcification du *K86.88*
- - Carcinome
- - - Familial
- - - - Col du *C25.7*
- - - - Corps du *C25.1*
- - - - Queue du *C25.2*
- - - - Tête du *C25.0*
- - - Intracanalaire papillaire mucineux du *C25.3*
- - - Pseudo-papillaire solide
- - - - *C25.9*
- - - - Col du *C25.7*
- - - - Corps du *C25.1*
- - - - Localisations contiguës du *C25.8*
- - - - Queue du *C25.2*
- - - - Tête du *C25.0*
- - Carcinome à cellules acineuses
- - - *C25.9*
- - - Col du *C25.7*
- - - Corps du *C25.1*
- - - Localisations contiguës du *C25.8*
- - - Queue du *C25.2*
- - - Tête du *C25.0*
- - Carcinome épidermoïde
- - - *C25.9*
- - - Col du *C25.7*
- - - Corps du *C25.1*
- - - Localisations contiguës
- - - - *C18.8*
- - - - *C25.8*
- - - Queue du *C25.2*
- - - Tête du *C25.0*
- - Carcinome indifférencié Cellule géante type ostéoclastique
- - - *C25.9*
- - - Col du *C25.7*
- - - Corps du *C25.1*
- - - Queue du *C25.2*
- - - Tête du *C25.0*
- - Carcinome neuroendocrine
- - - *C25.4*
- - - Cellules insulaires du *C25.4*
- - Cirrhose du *K86.88*
- - Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes au *T85.54*

Pancréas *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Congestion du *K86.88*
- - Cystadénocarcinome
- - - Mucineux
- - - - *C25.9*
- - - - Col du *C25.7*
- - - - Corps du *C25.1*
- - - - Localisations contiguës du *C25.8*
- - - - Queue du *C25.2*
- - - - Tête du *C25.0*
- - - Séreux
- - - - *C25.9*
- - - - Col du *C25.7*
- - - - Corps du *C25.1*
- - - - Localisations contiguës du *C25.8*
- - - - Queue du *C25.2*
- - - - Tête du *C25.0*
- - Cystadénome à cellules acineuses du *D13.6*
- - Déformation acquise du *K86.88*
- - Dégénérescence du *K86.88*
- - Échec de greffe de *T86.82*
- - Fibrose
- - - *K86.88*
- - - Kystique du *E84.88†, K87.1**
- - Glucagonome bénin du *D13.7*
- - Hémorragie du *K86.88*
- - Hyperfonctionnement du *K86.88*
- - Iléus méconial en l'absence reconnue de fibrose kystique du *P76.0*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants ou greffes internes dans le système hépatobiliaire et le *T85.75*
- - Insuffisance
- - - Anastomose
- - - - Opérations du *K91.82*
- - - - Sutures après opérations du *K91.82*
- - - Suture après opérations du *K91.82*
- - Insulinome bénin du *D13.7*
- - ITPN [Carcinome intracanalaire tubulopapillaire du *C25.3*
- - Kyste
- - - *K86.2*
- - - *K86.2*
- - Malformation artério-veineuse du *Q27.3*
- - Nécrose
- - - *K86.88*
- - - Graisseuse du *K86.88*
- - Nécrose aseptique du *K86.88*
- - Néoplasme neuroendocrine non neuroendocrine mixte
- - - *C25.9*
- - - Col du *C25.7*
- - - Corps du *C25.1*
- - - Localisations contiguës du *C25.8*
- - - Queue du *C25.2*

Pancréas *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Néoplasme neuroendocrine non neuroendocrine mixte *–suite*
- - - Tête du *C25.0*
- - Pancréatoblastome à localisations contiguës du *C25.8*
- - Pseudokyste du *K86.3*
- - Rejet de greffe de *T86.82*
- - Rupture non traumatique du *K86.88*
- - Sclérose du *K86.88*
- - Somatostatinome du *C25.4*
- - Sténose pylorique de l'adulte par tumeurs au *K31.12*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, K87.1**
- - TIPMP [Carcinome intracanalaire papillaire mucineux du *C25.3*
- - Tuberculose du *A18.8†, K87.1**
- - Tumeur
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.70*
- - - Cellule géante ostéoclastique
- - - - Col du *C25.7*
- - - - Queue du *C25.2*
- - - GRF [facteur de libération de l'hormone de croissance] du *C25.4*
- - Tumeur bénigne: *D13.6*
- - Tumeur maligne
- - - Cellules G du *C25.4*
- - - Corps du *C25.1*
- - - Lésion à localisations contiguës du *C25.8*
- - - Parties du *C25.7*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - *C25.4*
- - - Non fonctionnelle
- - - - *C25.4*
- - - - *D13.7*

Pancréatectomie ¬ Hyperglycémie après *E89.1*

Pancréatico-duodénal ¬
- Fistule *K86.84*
- Tumeur *D37.70*

Pancréatique
v./v.a. Type de maladie

Pancréatite
- Aiguë
- - Alcoolique ¬ *K85.2*
- - Idiopathique ¬ *K85.0*
- - Médicamenteuse ¬ *K85.3*
- - Origine biliaire ¬ *K85.1*
- - Sans précision ¬ *K85.9*
- - Secondaire à des calculs biliaires ¬ *K85.1*
- Aiguës ¬ Autres *K85.8*
- Auto-immun
- - AIP] ¬ *K86.10*
- - Type

Pancréatite *–suite*
- Auto-immun *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 1 ¬ *K86.10*
- - - 2 ¬ *K86.10*
- Calcifiante ¬ *K86.18*
- Chronique
- - Alcoolique ¬ *K86.0*
- - Héréditaire
- - - Autosomique
- - - - Dominante ¬ *K86.11*
- - - - Récessive ¬ *K86.11*
- - - ¬ *K86.11*
- - Idiopathique ¬ *K86.18*
- - Infectieuse ¬ *K86.18*
- - Rechutes ¬ *K86.18*
- - Récidivante ¬ *K86.18*
- - ¬ *K86.18*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.2†, K87.1**
- Due à la toxoplasmose ¬ *B58.8†, K87.1**
- Fibreuse chronique ¬ *K86.18*
- Génétique ¬ *K86.11*
- Héréditaire ¬ *K86.11*
- Interstitielle chronique ¬ *K86.18*
- Kystique chronique ¬ *K86.18*
- Oreillons ¬ *B26.3†, K87.1**
- Syphilitique ¬ *A52.7†, K87.1**
- Tropicale ¬ *K86.18*

Pancréatoblastome
- Localisations contiguës du pancréas ¬ *C25.8*
- ¬ *C25.9*

Pancréatocholangite folliculaire ¬ *K83.09, K85.90*

Pancréatogène sans insulinome ¬ Syndrome d'hypoglycémie *E16.1*

Pancréatoprive ¬ Diabète sucré *E13.90*

Pancystite [Cystite parenchymateuse] ¬ *N30.88*

Pancytopénie
- Déficience intellectuelle-anomalies neurologiques et ophthalmologiques ¬ Syndrome sévère de myélofibrose- *Q87.8*
- Fanconi ¬ *D61.0*
- Malformations ¬ *D61.0*
- Médicamenteuse ¬ *D61.1*
- Progressive congénitale-déficit immunitaire en cellules B-dysplasie squelettique ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Retard de développement ¬ Syndrome de *D61.0*
- ¬ Syndrome d'ataxie- *G11.1, D61.0*

PANDAS [Maladie neuropsychiatrique auto-immune pédiatrique avec infection streptococcique du groupe A] ¬ *G25.88, B95.0!, F07.8*

Pandysautonomie aiguë ¬ *G61.0*

Panencéphalite
- Rubéoleuse ¬ *B06.0†, G05.1**

Panencéphalite *–suite*
- Sclérosante subaiguë] ¬ PSS [*A81.1*

Panfolliculaire congénital ¬ Nævus *Q85.8*

Panhypophysite ¬ *G04.9*

Panhypopituitarisme
- Origine génétique ¬ *E23.0*
- Post-partum ¬ *E23.0*
- ¬ *E23.0*

Panique
- Anxiété épisodique paroxystique] ¬ Trouble *F41.0*
- Foule ¬ Être pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de *W64.9!*
- ¬
- - Agoraphobie
- - - Sans mention de trouble *F40.00*
- - - Trouble *F40.01*
- - Attaque de *F41.0*
- - État de *F41.0*

Panlobulaire ¬ Emphysème *J43.1*

Panmyélopathie ¬ *D61.9*

Panmyélophtisie ¬ *D61.9*

Panmyélose aiguë avec myélofibrose ¬ *C94.4*

Panner ¬ Maladie de *M92.0*

Panneuritis endemica ¬ *E51.1†, G63.4**

Panniculite
- Affectant le cou et le dos ¬ *M54.0*
- Dermatose ¬ Syndrome infantile de fièvre récurrente- *M35.8*
- Histiocytaire cytophagique ¬ *M35.8*
- Infantile avec uvéite et granulomatose systémique ¬ *M35.8*
- Lupique ¬ *L93.2*
- Récidivante
- - Weber-Christian] ¬ *M35.6*
- - ¬ *M35.6*
- Sans précision ¬ *M79.3*
- ¬
- - Lipodystrophie localisée induite par une *E88.1*
- - Lymphome sous-cutané à cellules T de type *C86.3*
- - Lymphome T sous-cutané type *C86.3*

Pannus
- Cornée) ¬ *H16.4*
- Trachomateux ¬ *A71.1*

Panophtalmie ¬ *H44.0*

PANS [Syndrome neuropsychiatrique pédiatrique à apparition aiguë] ¬ *G25.88, F07.8*

Pansement
- Chirurgicaux ¬ Surveillance des sutures et *Z48.0*
- ¬ Changement de *Z48.0*

Pansinusite
- Aiguë ¬ *J01.4*
- Chronique ¬ *J32.4*

Pansinusite *–suite*
- SAI ¬ *J32.4*
- Tuberculeuse
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*
- ¬ Sinusite
- - Aiguë de plus d'un sinus mais sans *J01.8*
- - Chronique) de plus d'un sinus mais sans *J32.8*

Pansynostose non syndromique ¬ *Q75.0*

Pantin hilare ¬ Syndrome du *Q93.5*

Pantothénate kinase ¬ Neurodégénérescence associée à un déficit en *G23.0*

Pantothénique ¬ Carence en: acide *E53.8*

Panuvéite
- Idiopathique ¬ *H44.1*
- Infectieuse ¬ *H44.1*

PAP idiopathique ¬ *J84.00*

PAPA [d'arthrite purulente-pyoderma gangrenosum-acné] ¬ Syndrome *M35.8*

Papanicolaou au niveau du col de l'utérus ¬ Frottis de *Z01.4*

Papas
v./v.a. Bartsocas-Papas

PAPASH [arthrite pyogénique-pyoderma gangrenosum-acné-hidradénite suppurée] ¬ Syndrome *M35.8*

Papavérine ¬ *T44.3*

Papillaire
v./v.a. Carcinome papillaire
v./v.a. Nécrose papillaire rénale
- Accrue ¬ Syndrome de cicatrices chéloïdes lié à l'X avec mobilité articulaire réduite et excavation *Q87.8*
- Aiguë ¬ Nécrose médullaire [*N17.2*
- Bien différenciée
- - Péritoine ¬ Tumeur mésothéliale *D19.1*
- - Plèvre ¬ Tumeur mésothéliale *D19.0*
- Cellule transitionnelle
- - Col vésical ¬ Carcinome non *C67.5*
- - Dôme de la vessie ¬ Carcinome non *C67.1*
- - Orifice urétéral ¬ Carcinome non *C67.6*
- - Ouraque ¬ Carcinome non *C67.7*
- - Paroi
- - - Antérieure de la vessie ¬ Carcinome non *C67.3*
- - - Latérale de la vessie ¬ Carcinome non *C67.2*
- - - Postérieure de la vessie ¬ Carcinome non *C67.4*
- - Trigone de la vessie ¬ Carcinome non *C67.0*
- Cellules claires ¬ Carcinome rénal *C64*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture du muscle *I23.5*
- Kystique
- - Ovaire ¬ Adénocarcinome *C56*
- - ¬ Tumeur *D37.78*

Papillaire *–suite*
- Mucineux
- - Ovaire à faible potentiel de malignité ¬ Tumeur *C56*
- - Pancréas ¬
- - - Carcinome intracanalaire *C25.3*
- - - TIPMP [Carcinome intracanalaire *C25.3*
- Non classée ailleurs ¬ Rupture du muscle *I51.2*
- Ovaire ¬
- - Adénocarcinome *C56*
- - Cystadénocarcinome *C56*
- Primitif du péritoine ¬ Carcinome séreux/ *C48.2*
- Région pinéale ¬ Tumeur *D44.5*
- Rénal héréditaire ¬ Cancer *C64*
- Rénale ¬ Nécrose médullaire [*N17.2*
- SAI ¬ Nécrose médullaire [*N17.2*
- Sans précision ¬ Œdème *H47.1*
- Stade
- - 1 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.21*
- - 2 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.22*
- - 3 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.23*
- Syphilitique ¬ Œdème *A52.1†, H48.0**
- Thyroïde
- - Néoplasie rénale papillaire ¬ Cancer familial *C73, C64*
- - ¬ Cancer *C73*
- Type pseudoxanthome élastique ¬ Elastolyse dermique *L90.8*
- Vessie à cellules transitionnelles ¬ Carcinome non *C67.9*
- ¬
- - Cancer familial papillaire de la thyroïde avec néoplasie rénale *C73, C64*
- - Carcinome rénal *C64*
- - Colobome *Q14.2*
- - Hémangiome *D18.01*
- - Méningiome *D42.9*
- - Pseudo-œdème *H47.3*
- - Tumeur glioneuronale *D43.2*

Papille
- Foliées ¬ Hypertrophie des *K14.3*
- Langue ¬ Atrophie des *K14.4*
- Linguales ¬ Hypertrophie des *K14.3*
- Nerf optique ¬ Anomalie congénitale de la *Q14.2*
- Optique
- - Colobomateuse-atrophie maculaire-choriorétinopathie ¬ Syndrome de *Q14.8*
- - ¬
- - - Affections de la *H47.3*
- - - Anomalie acquise de la *H47.3*
- - - Colobome congénital de la *Q14.2*
- - - Druses de la *H47.3*
- - - Excavation

Papille *–suite*
- Optique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Excavation *–suite*
- - - - *H47.2*
- - - - Familiale de la *Q14.2*
- - - Malformation congénitale de la *Q14.2*
- - - Pâleur temporale de la *H47.2*
- - - Syndrome de microphtalmie-rétinite pigmentaire-fovéoschisis-drusen de la *Q15.8*
- ¬ Fossette colobomateuse de la *Q14.2*

Papillifère
- Peau
- - Cou ¬ Syringocystadénome *D23.4*
- - Tête ¬ Syringocystadénome *D23.4*
- - Tronc ¬ Syringocystadénome *D23.5*
- - Visage ¬ Syringocystadénome *D23.3*
- ¬ Syringocystadénome *D23.9*

Papillite optique ¬ *H46*

Papillomatose
- Confluente et réticulée [Gougerot-Carteaud] ¬ *L83*
- Respiratoire récurrente ¬ *D14.4*

Papillomavirus humain
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.7!*
- ¬ Vaccination contre le *Z25.8*

Papillome
- Atypique des plexus choroïdes ¬ *C71.5*
- Col de l'utérus ¬ *D26.0*
- Multiples et pian plantaire humide (pian-crabe) ¬ *A66.1*
- Pianique plantaire ou palmaire ¬ *A66.1*
- Plexus
- - Choroïdes ¬ *D33.0*
- - Choroïdien du quatrième ventricule ¬ *D33.1*

Papillon ¬
- Dystrophie maculaire en ailes de *H35.5*
- Fracture en *S32.7*
- Gliome *C71.9*

Papillon-Léage-Psaume ¬ Syndrome de *Q87.0*

Papillon-Lefèvre] ¬ SPL [Syndrome de *Q82.8*

Papillo-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Papovavirale, siège non précisé ¬ Infection *B34.4*

Pappataci ¬ Fièvre à *A93.1*

Papulaire
- Couche basale en palissade] ¬ Syndrome PENS [nævus épidermiques *Q87.8*
- Micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo- *A66.2*
- Papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro- *A66.2*
- Sclérodermoïde généralisé ¬ Myxœdématose lichéniforme *L98.5*

Papulaire *–suite*
- ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (*A66.2*

Papule
- Gottron ¬ *L94.4*
- Initiale) de la pinta [caraté] ¬ *A67.0*

Papuleux
- Acrale persistante ¬ Mucinose *L98.5*
- Infantile ¬ Mucinose *L98.5*
- Noire ¬ Dermatose *L82*
- ¬
- - Atrichie avec lésions *Q84.0*
- - Elastorrhexie *L94.8*
- - Mucinose *L98.5*
- - Urticaire *L28.2*
- - Xanthome *D76.3*

Papulo squameux
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Lésions *L45**
- Précisées ¬ Autres lésions *L44.8*
- Sans précision ¬ Lésion *L44.9*

Papulosa ¬ Iritis *A52.7†, H22.0**

Papulose
- Atrophiante
- - Bénigne ¬ *I77.88*
- - Maligne ¬ *I77.88*
- - ¬ *I77.88*
- Fibreuse blanche du cou ¬ *L90.8*
- Lymphomatoïde ¬ *C86.6*

Papyracé ¬ Fœtus *O31.0*

Paquet hémorroïdaire
- Thrombose ¬ *K64.8*
- ¬ *K64.9*

Para-albuminémie ¬ *E88.08*

Paraamyloïde ¬ Dépôt de *E85.88*

Paraamyloïdose ¬ *E85.88*

Paracétamol ¬ Intoxication au *T39.1*

Parachute ¬ Valve tricuspide en *Q22.8*

Paracoccidioïde ¬ Granulome *B41.8*

Paracoccidioides ¬ Septicémie à *B41.70*

Paracoccidioïdomycose
- Disséminée ¬ *B41.78*
- Pulmonaire ¬ *B41.0†, J17.2**
- Viscérale ¬ *B41.8*
- ¬ Autres formes de *B41.8*

Paracorporelle ¬
- Adaptation d'une pompe *Z45.02*
- Pompe
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*

Paradas ¬ Myopathie congénitale type *G71.2*

Paradice
v./v.a. Game-Friedman-Paradice

Paraffine ¬ *T52.0*

Parafolliculaire
- Pénétrant dans la peau [Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et *L87.0*

Parafolliculaire *–suite*
- Thyroïde ¬ Carcinome *C73*

Paragangliome
- Familial ¬ Phéochromocytome
- - *C74.1*
- - *C75.5*
- - *D35.0*
- Non sécrétant ¬ *D44.7*
- Sécrétant sporadique ¬ Phéochromocytome
- - *C74.1*
- - *D35.0*
- Somatostatinome-polycythémie ¬ Syndrome de *D75.1, D44.7*

Paraganglions ¬
- Tumeur bénigne: Glomus aortique et autres *D35.6*
- Tumeur maligne: Glomus aortique et autres *C75.5*
- Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres *D44.7*

Paragonimus
- Westermani ¬ Infection à *B66.4*
- ¬ Infection par l'espèce *B66.4*

Paragranulome
- Hodgkinien ¬ *C81.0*
- Nodulaire ¬ *C81.0*

Paragrippaux ¬
- Bronchite aiguë due aux virus *J20.4*
- Pneumonie due aux virus *J12.2*

Paragroupes ¬ Allergie des *T78.4*

Paragueusie ¬ *R43.2*

Parahaemolyticus ¬ Intoxication alimentaire à Vibrio *A05.3*

Parahémophilie ¬ *D68.22*

Parainfluenza ¬ Infection à virus *B34.88*

Parakératose des cordes vocales ¬ *J38.3*

Paralysante au cours de syphilis ¬ Démence *A52.1†, F02.8**

Paralysie
v./v.a. Tabo-paralysie
- Alternante du nerf oculomoteur ¬ *G83.8*
- Amyotrophique ¬ *G12.2*
- Brown-Séquard ¬ *G83.8*
- Côlon ¬ *K56.0*
- Complète unilatérale du larynx ¬ *J38.02*
- Conjugaison du regard ¬ *H51.0*
- Cordes vocales ¬ Syndrome de ptosis- *J38.03, Q10.0*
- Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical ¬ *P14.1*
- Deux membres
- - Inférieurs SAI ¬ *G82.2*
- - Supérieurs ¬ *G83.0*
- Diaphragme ¬ *J98.6*
- Duchenne
- - Cours de dystrophie musculaire ¬ *G71.00*
- - Erb due à un traumatisme obstétrical ¬ *P14.0*

Paralysie *–suite*
- Facial
- - Bell SAI ¬ *G51.0*
- - Centrale ¬ *G83.6*
- - Congénitale héréditaire
- - - Isolée ¬ *Q07.8*
- - - Surdité variable ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Due à un traumatisme obstétrical ¬ *P11.3*
- - Liée à l'infection par le virus varicelle zona ¬ *B02.2†, G53.0**
- - Parésie faciale) (faiblesse faciale due à une lésion du neurone moteur inférieur ¬ *G51.0*
- - Périphérique récurrente familiale ¬ *G51.0*
- - ¬
- - - *G51.0*
- - - Syndrome de surdité-oreille anormale- *Q87.8*
- Générale juvénile ¬ *A50.4*
- Glotte ¬ *J38.0*
- Hystérique
- - Accommodation ¬ *F44.88†, H58.1**
- - ¬ *F44.4*
- Idiopathique du visage ¬ *G51.0*
- Intestin ¬ *K56.0*
- Iris due à la diphtérie ¬ *A36.8†, H22.8**
- Ischémique de Volkmann en tant que complication de blessure ¬ *T79.60*
- Jackson ¬ *G83.8*
- Laryngée congénitale ¬ *J38.00*
- Larynx
- - Due à la diphtérie ¬ *A36.2*
- - ¬ *J38.00*
- Lente du nerf cubital ¬ *G56.2*
- Médullaire ¬ *G83.8*
- Membre
- - Inférieur ¬ *G83.1*
- - Supérieur ¬ *G83.2*
- Mésencéphalique/tegmentale ¬ *G83.8*
- Millard-Gubler-Foville ¬ *I67.9†, G46.3**
- Moelle épinière ¬ *G83.8*
- Multiples ¬ Syphilis du nerf crânien avec *A52.1†, G53.1**
- Muscle
- - Abducteurs du larynx associé à un retard mental ¬ Syndrome de *J38.00*
- - Larynx ¬ *J38.00*
- Musculaire
- - Ischémique ¬ *T79.60*
- - Pseudo-hypertrophique ¬ *G71.08*
- Nerf
- - Moteur oculaire
- - - Commun (III) ¬ *H49.0*
- - - Externe (VI) ¬ *H49.2*
- - Pathétique (IV) ¬ *H49.1*
- - Péronier ¬ *G57.3*
- - Phrénique due à un traumatisme obstétrical ¬ *P14.2*

Paralysie *–suite*
- Nerf sympathique ¬ *G90.88*
- Oculo-faciale congénitale ¬ *Q87.0*
- Parésie) (faiblesse) faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur ¬ *G83.6*
- Partielle
- - Bilatérale du larynx ¬ *J38.03*
- - Unilatérale du larynx ¬ *J38.01*
- Paupière supérieure ¬ *H02.5*
- Périodiques ¬ *G72.3*
- Pharyngée diphtérique ¬ *A36.0†, G99.8**
- Plexus brachial
- - Inférieur ¬ *P14.1*
- - Supérieur ¬ *P14.0*
- Plongeurs ¬ *T70.3*
- Plusieurs Nerf crânien cours
- - Maladie
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, G53.1**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, G53.1**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, G53.2**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G53.3**
- Post-épileptique de Todd ¬ *G83.8*
- Progressive ¬ Psychose syphilitique au cours de *A52.1†, F02.8**
- Saturnine ¬ *T56.0*
- Spinale
- - Infantile ¬ *A80.3*
- - ¬ *G83.8*
- Supranucléaire progressive-acinésie pure avec freezing de la marche ¬ Syndrome de *G23.1*
- Syphilitique
- - Nerf ¬ *A52.1†, G59.8**
- - Nerfs crâniens ¬ *A52.1†, G53.8**
- Syphilitiques multiples des nerfs ¬ *A52.1†, G63.0**
- Système nerveux autonome périphérique ¬ *G90.88*
- Tegmentale ¬ *G83.8*
- Todd (post-ictale) ¬ *G83.8*
- Transitoire) traumatique SAI ¬ *T14.4*
- Urémique ¬ *N18.89†, G99.8**
- Vasomotrice NCA ¬ *G90.88*
- Vésical lésion
- - Périphérique [LMNL] ¬ *G95.81*
- - Supranucléaire [UMNL] ¬ *G95.80*
- Volkmann ¬ *T79.60*

Paralysie agitante ¬
- *G20*
- Démence
- - *F02.3**
- - Cours de *G20.90†, F02.3**

Paralysie bulbaire
- Infantile ¬ *A80.3*
- Myasthénique ¬ *G70.0*
- Progressive
- - Enfant ¬ *G12.1*

Paralysie bulbaire *–suite*
- Progressive *–suite*
- - ¬ *G12.2*
- ¬ Poliomyélite avec *A80.3*

Paralysie cérébrale
- Ataxique ¬ *G80.4*
- Athétosique ¬ Syndrome de microbrachycéphalie sévère-déficience intellectuelle- *Q87.0*
- Dyskinétique ¬ *G80.3*
- Dystonique ¬ *G80.3*
- Sans précision ¬ *G80.9*
- Spastique
- - Diplégique ¬ *G80.1*
- - Quadriplégique ¬ *G80.0*
- - SAI ¬ *G80.1*
- - ¬ Tétraplégie au cours de *G80.0*
- ¬ Syndromes mixtes de *G80.8*

Paralysie congénitale
- Familiale du nerf trochléaire ¬ *H49.1*
- Nerf
- - Oculomoteur ¬ *H49.0*
- - Trochléaire ¬ *H49.1*
- Plusieurs nerfs de muscles oculomoteurs ¬ *H49.9*
- Unilatérale complète des cordes vocales ¬ *J38.02*

Paralysie périodique
- Familiale
- - Hypokaliémique ¬ *G72.3*
- - Myotonique ¬ *G72.3*
- - Normokaliémique ¬ *G72.3*
- Hyperkaliémique familiale ¬ *G72.3*
- Hypokaliémique ¬ *G72.3*
- Neuropathie motrice distale tardive ¬ *G72.3*
- Normokaliémique
- - Familiale ¬ *G72.3*
- - ¬ *G72.3*
- Thyrotoxique ¬ *G72.3*

Paralysie spastique
- Cérébrale) congénitale ¬ *G80.1*
- Infantile ascendante héréditaire] ¬ IAHSP [*G12.2*
- Tétraplégique congénitale (cérébrale) ¬ *G80.0*
- ¬ Kératose palmoplantaire avec *Q82.8, G11.4*

Paralytique
- Aiguë
- - Associée au virus vaccinal ¬ Poliomyélite *A80.0*
- - ¬ Poliomyélites *A80.3*
- Atrophique aiguë ¬ Myélose *A80.3*
- Cours de syndrome de Kearns-Sayre ¬ Strabisme *H49.8*
- Muscle ¬ Calcification et ossification *M61.2*
- Occlusion intestinale sans hernie ¬ Iléus *K56*

Paralytique *–suite*
- Précisés ¬ Autres syndromes *G83.8*
- Sans précision ¬ Strabisme *H49.9*
- Virus sauvage
- - Importé ¬ Poliomyélite *A80.1*
- - Indigène ¬ Poliomyélite *A80.2*
- ¬
- - Démarche *R26.1*
- - Iléus *K56.0*
- - Poliomyélite
- - - Aiguë non *A80.4*
- - - Non *A80.4*
- - Strabismes *H49.8*
- - Uvéo-parotidite *D86.8*

Paramètre
- Fonctionnement d'une pompe à médicaments ¬ Contrôle des *Z45.1*
- Précisé aigu ¬ Abcès de: *N73.0*
- ¬ Tumeur maligne: *C57.3*

Paramétrite
- Phlegmon pelvien
- - Aigus ¬ *N73.0*
- - Chroniques ¬ *N73.1*
- - Sans précision ¬ *N73.2*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*

Paramolaire
- Causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- ¬
- - *K00.1*
- - Tubercule *K00.2*

Paramyotonie congénitale [Maladie d'Eulenburg] ¬ *G71.1*

Parana ¬ Syndrome de *L91.8*

Paranasaux ¬ Carcinome épidermoïde des fosses nasales et des sinus *C30.0*

Paranéoplasique
- Anticorps
- - Anti-LGI1 ¬ Encéphalite limbique *G04.8, C80.9*
- - Anti-récepteur NMDA [N-méthyl-D-aspartate] ¬ Encéphalite limbique *G04.8, C80.9*
- Isolée du tronc cérébral ¬ Encéphalite *C80.9†, G05.8**
- Opsoclonie-myoclonie ¬ Syndrome *C80.9†, G99.8**
- ¬
- - Anémie *C80.9†, D63.0**
- - Carcinome bronchique à petites cellules avec rétinopathie *C34.9†, H36.8**
- - Dégénérescence cérébelleuse *C80.9†, G32.8**
- - Encéphalopathie limbique *D48.9†, G13.1**
- - Neuromyopathie
- - - *D48.9†, G13.0**
- - - Neuropathie *G13.0**
- - Neuropathie *D48.9†, G13.0**

Paranéoplasique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pemphigus *D48.9†, L14**
- - Uvéite *C80.9†, H22.1**

Paranoïa
- Quérulente ¬ *F22.8*
- ¬ *F22.0*

Paranoïaque
- Induit ¬ Trouble: *F24*
- Involution ¬ État *F22.8*
- Psychogène ¬ Psychose *F23.3*
- ¬
- - État *F22.0*
- - Psychose *F22.0*
- - Réaction *F23.3*
- - Trouble personnalité
- - - *F60.0*
- - - *F60.0*
- - - Expansive- *F60.0*
- - - Sensitive *F60.0*

Paranoïde ¬
- Démence sénile, forme dépressive ou *F03*
- Schizophrénie *F20.0*

Paraovarien ¬ Kyste (de): *Q50.5*

Paraparésie
- Flasque paraplégie incomplète
- - Aiguë d'origine non traumatique ¬ *G82.01*
- - Chronique ¬ *G82.03*
- Paraplégie incomplète
- - Aiguë d'origine non traumatique ¬ *G82.21*
- - Chronique ¬ *G82.23*
- Spastique
- - Cataracte-retard de langage ¬ Syndrome de *G82.13, Q12.0*
- - Paraplégie incomplète
- - - Aiguë d'origine non traumatique ¬ *G82.11*
- - - Chronique ¬ *G82.13*
- - Tropicale ¬ *G04.1*

Paraparétique du syndrome de Guillain-Barré ¬ Variant *G61.0*

Parapertussis ¬ Coqueluche à Bordetella *A37.1*

Parapharyngé
- Cervicale ¬ Abcès sous-mandibulaire
- - Indication d'extension médiastinale, *K12.22*
- - Sans indication d'extension médiastinale, *K12.21*
- Rétropharyngé ¬ Abcès *J39.0*

Paraphilies ¬ *F65*

Paraphimosis ¬ Hypertrophie du prépuce, phimosis et *N47*

Paraphrénie (tardive) ¬ *F22.0*

Paraphrénique ¬ Schizophrénie *F20.0*

Paraplégie
- Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec *P11.50*
- Chronique ¬
- - *G82*
- - Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec *P11.51*
- Déficience intellectuelle-hyperkératose palmoplantaire ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Flasque paraplégie complète
- - Aiguë d'origine non traumatique ¬ *G82.00*
- - Chronique ¬ *G82.02*
- Fonctionnelle ¬ *F44.4*
- Hystérique ¬ *F44.4*
- Inférieure) SAI ¬ *G82.2*
- Paraplégie complète
- - Aiguë d'origine non traumatique ¬ *G82.20*
- - Chronique ¬ *G82.22*
- Traumatique en phase aiguë ¬ *T09.3*
- ¬
- - Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la naissance, sans *P11.59*
- - Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une *M61.2*
- - Syndrome de macrocéphalie-petite taille- *Q87.1*

Paraplégie complète
- Aiguë origine non traumatique ¬
- - Paraplégie
- - - *G82.20*
- - - Flasque avec *G82.00*
- - Paraplégie spastique avec *G82.10*
- - Tétraplégie
- - - *G82.50*
- - - Flasque avec *G82.30*
- - - Spastique avec *G82.40*
- Chronique ¬
- - Paraplégie
- - - *G82.22*
- - - Flasque avec *G82.02*
- - Paraplégie spastique avec *G82.12*
- - Tétraplégie
- - - *G82.52*
- - - Flasque avec *G82.32*
- - - Spastique avec *G82.42*

Paraplégie incomplète
- Aiguë origine non traumatique ¬
- - Paraparésie
- - - *G82.21*
- - - Flasque avec *G82.01*
- - - Spastique avec *G82.11*
- - Tétraparésie
- - - *G82.51*
- - - Flasque avec *G82.31*
- - - Spastique avec *G82.41*

Paraplégie incomplète *–suite*
- Chronique ¬
- - Paraparésie
- - - *G82.23*
- - - Flasque avec *G82.03*
- - - Spastique avec *G82.13*
- - Tétraparésie
- - - *G82.53*
- - - Flasque avec *G82.33*
- - - Spastique avec *G82.43*

Paraplégie spastique
- Atrophie optique-neuropathie ¬ Syndrome *G11.4*
- Autosomique type 72 ¬ *G11.4*
- Complexe autosomique récessive par dysfonctionnement de la voie de Kennedy ¬ *G11.4*
- Déficience intellectuelle-nystagmus-obésité ¬ Syndrome de *G11.4*
- Dysmorphie ¬ Syndrome de macrocéphalie- *Q87.8*
- Familiale ¬ *G11.4*
- Glaucome-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *G11.4*
- Héréditaire
- - Associée
- - - ADAR ¬ *G11.4*
- - - IFIH1 ¬ *G11.4*
- - - RNASEH2B ¬ *G11.4*
- - ¬
- - - *G11.4*
- - - Syndrome de cyphoscoliose-atrophie de la langue- *G11.4*
- Liée X type
- - 1 ¬ *G11.4*
- - 2 ¬ *G11.4*
- - 16 ¬ *G11.4*
- - 34 ¬ *G11.4*
- Maladie de Paget ¬ Syndrome de *G11.4, M88.99*
- Mitochondriale associée à MT-AP6 ¬ *G11.4*
- Néphropathie-surdité ¬ Syndrome de *G11.4*
- Neuropathie-poïkilodermie ¬ Syndrome de *G11.4*
- Paraplégie complète
- - Aiguë d'origine non traumatique ¬ *G82.10*
- - Chronique ¬ *G82.12*
- Progressive ¬ Déficience intellectuelle sévère et *G11.4*
- Retard de développement sévère-épilepsie ¬ Syndrome de *G11.4*
- Transmission maternelle ¬ *G11.4*
- Type 7 ¬ *G11.4*
- ¬
- - Atrophie optique infantile avec chorée et *E71.1*
- - Neuropathie héréditaire sensorielle et autonome avec *G60.8, G11.4*

Paraplégie spastique autosomique dominante type
- 3 ¬ *G11.4*
- 4 ¬ *G11.4*
- 6 ¬ *G11.4*
- 8 ¬ *G11.4*
- 9 ¬ *G11.4*
- 9A ¬ *G11.4*
- 9B ¬ *G11.4*
- 10 ¬ *G11.4*
- 12 ¬ *G11.4*
- 13 ¬ *G11.4*
- 17 ¬ *G11.4*
- 19 ¬ *G11.4*
- 29 ¬ *G11.4*
- 30 ¬ *G11.4*
- 31 ¬ *G11.4*
- 36 ¬ *G11.4*
- 37 ¬ *G11.4*
- 38 ¬ *G11.4*
- 41 ¬ *G11.4*
- 42 ¬ *G11.4*
- 73 ¬ *G11.4*
- 80 ¬ *G11.4*

Paraplégie spastique autosomique récessive type
- 5A ¬ *G11.4*
- 7 ¬ *G11.4*
- 9B ¬ *G11.4*
- 11 ¬ *G11.4*
- 14 ¬ *G11.4*
- 15 ¬ *G11.4*
- 18 ¬ *G11.4*
- 20 ¬ *G11.4*
- 21 ¬ *G11.4*
- 23 ¬ *G11.4*
- 24 ¬ *G11.4*
- 25 ¬ *G11.4*
- 26 ¬ *G11.4*
- 27 ¬ *G11.4*
- 28 ¬ *G11.4*
- 30 ¬ *G11.4*
- 32 ¬ *G11.4*
- 35 ¬ *G11.4*
- 39 ¬ *G11.4*
- 43 ¬ *G11.4*
- 44 ¬ *G11.4*
- 45 ¬ *G11.4*
- 46 ¬ *G11.4*
- 48 ¬ *G11.4*
- 49 ¬ *G11.4*
- 53 ¬ *G11.4*
- 54 ¬ *G11.4*
- 55 ¬ *G11.4*
- 56 ¬ *G11.4*
- 57 ¬ *G11.4*

Paraplégie spastique autosomique récessive type *–suite*
- 58 ¬ *G11.4*
- 59 ¬ *G11.4*
- 60 ¬ *G11.4*
- 61 ¬ *G11.4*
- 62 ¬ *G11.4*
- 63 ¬ *G11.4*
- 64 ¬ *G11.4*
- 66 ¬ *G11.4*
- 67 ¬ *G11.4*
- 69 ¬ *G11.4*
- 70 ¬ *G11.4*
- 71 ¬ *G11.4*
- 74 ¬ *G11.4*
- 75 ¬ *G11.4*
- 76 ¬ *G11.4*
- 77 ¬ *G11.4*
- 78 ¬ *G11.4*
- 81 ¬ *G11.4*
- 82 ¬ *G11.4*
- 83 ¬ *G11.4*
- 84 ¬ *G11.4*
- 85 ¬ *G11.4*
- 86 ¬ *G11.4*
- 87 ¬ *G11.4*

Paraplégique) ¬ Syndrome d'immobilité (*M62.3*

Parapsoriasis
- Grandes plaques ¬ *L41.4*
- Petites plaques ¬ *L41.3*
- Rétiforme ¬ *L41.5*
- Sans précision ¬ *L41.9*
- ¬ Autres *L41.8*

Paraquat ¬ Intoxication par le *T60.3*

Parasitaire
- Barbe ¬ Sycosis *B35.0*
- Classées ¬
- - Affections
- - - Choriorétiniennes au cours de maladies infectieuses et *H32.0**
- - - Rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et *N29.1**
- - Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et *M01.8**
- - Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et *K77.0**
- - Cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et *I52.1**
- - Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et *H13.1**
- - Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et *G05.2**
- - Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et *N08.0**
- - Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et *H22.0**

Parasitaire *–suite*
- Classées ¬ *–suite*
- - Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et *H19.2**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et *N16.0**
- - Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et *H75.0**
- - Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et *I43.0**
- - Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et *I41.2**
- - Myopathie au cours de maladies infectieuses et *G73.4**
- - Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et *H94.0**
- - Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et *H62.3**
- - Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et *I32.1**
- - Polynévrite au cours de maladies infectieuses et *G63.0**
- - Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et *M49.3**
- - Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et *I98.1**
- - Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et *N77.0**
- - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et *N77.1**
- Congénitale, sans précision ¬ Maladie infectieuse ou *P37.9*
- Congénitales précisées ¬ Autres maladies infectieuses et *P37.8*
- Mère
- - Compliquant grossesse accouchement puerpéralité
- - - Sans précision ¬ Maladie infectieuse ou *O98.9*
- - - ¬ Autres maladies infectieuses et *O98.8*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et *P00.2*
- Orbite
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Infection *H06.1**
- - ¬ Infection *B89†*, *H06.1**
- Paupière
- - Cours
- - - Leishmaniose ¬ Infection *B55.1†*, *H03.0**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ Infection *H03.0**
- - ¬ Infestation *B89†*, *H03.0**
- Précisées
- - Classées ailleurs ¬ Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et *G02.8**
- - ¬ Séquelles d'autres maladies infectieuses et *B94.8*
- Protozoaires classées ailleurs ¬ Myosite au cours d'infections *M63.1**
- Rétine SAI ¬ Kyste (de): *H33.1*
- SAI ¬ Endophtalmie *H44.1*

Parasitaire *–suite*
- Sans précision ¬ Séquelles de maladie infectieuse ou *B94.9*
- ¬
- - Antécédents familiaux de maladies infectieuses et *Z83.1*
- - Antécédents personnels de maladies infectieuses et *Z86.1*
- - Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et *I68.1**
- - Arthrite au cours de maladie *B89†*, *M01.89**
- - Conjonctivite au cours de maladie *B89†*, *H13.1**
- - Encéphalite au cours de maladie *B89†*, *G05.2**
- - Épilepsie *B71.9†*, *G94.8**
- - Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et *Z11*
- - Hydrocéphalie au cours de maladie *B89†*, *G94.0**
- - Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et *B20*
- - Iridocyclite au cours de maladie *B89†*, *H22.0**
- - Kératite au cours de maladie *B89†*, *H19.2**
- - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: *H21.3*
- - Maladie due VIH
- - - Infection *B20*, *B89*
- - - Maladie *B20*, *B99*
- - Mastoïdite au cours de maladie *B89†*, *H75.0**
- - Méningite au cours de maladie *B89†*, *G02.8**
- - Méningo-encéphalite *B89†*, *G05.2**
- - Myopathie au cours de maladie *B89†*, *G73.4**
- - Névrite
- - - Nerf auditif au cours de maladie *B89†*, *H94.0**
- - - Nerf vestibulo-cochléaire au cours de maladie *B89†*, *H94.0**
- - Otite externe au cours de maladie *B89†*, *H62.3**
- - Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladie *B89†*, *G53.1**
- - Pneumonie au cours de maladies *J17.3**
- - Polyneuropathie au cours de maladie *B89†*, *G63.0**
- - Sycosis *B35.0*

Parasites
- Peau SAI ¬ *B88.9*
- ¬ Infestation des paupières par des *B89†*, *H03.0**

Parasitologique
- Non classés ailleurs ¬ Autres paludismes, confirmés par examen *B53.8*
- ¬ Paludisme diagnostiqué cliniquement, sans confirmation *B54*

Parasitose
- Intestinale, sans précision ¬ *B82.9*
- Sans précision ¬ *B89*

Parasomnie et apnée obstructive du sommeil ¬ Encéphalopathie auto-immune avec *G04.8*

Parastremmatique ¬ Nanisme *Q87.1*

Parastrongylus cantonensis ¬
- Angiostrongyloïdose à *B83.2*
- Méningo-encéphalite à *B83.2†*, *G05.2**

Parastrongylus costaricensis ¬ Angiostrongyloïdose due à *B81.3*

Parasuicide ¬ *Z91.8*

Parasympathiques ¬ nerfs et ganglions sympathiques et *C47*

Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents *T44.3*

Parasympathomimétiques [cholinergiques] ¬ Intoxication: Autres *T44.1*

Paratesticulaire
- Lésion à localisations contiguës ¬ Adénocarcinome *C63.8*
- ¬ Adénocarcinome *C63.9*

Parathormone ¬ Hypoparathyroïdie secondaire due à un défaut de sécrétion de *E20.8*

Parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde- *Z27.0*

Parathyréoprive ¬ Tétanie *E89.2*

Parathyroïde
v./v.a. Glande parathyroïde
- Thymus ¬ Aplasie des *D82.1*
- ¬
- - Adénome à cellules principales de la *D35.1*
- - Hyperplasie primaire de la *E21.0*
- - Tumeur bénigne: *D35.1*
- - Tumeur maligne: *C75.0*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D44.2*

Parathyroïdien
- Cellule eau de roche ¬
- - Adénocarcinome *C75.0*
- - Adénome *D35.1*
- - Carcinome *C75.0*
- Dérivés ¬ Hormones *T50.9*
- Familial ¬ Adénome *D35.1*
- ¬ Tétanie *E20.9*

Parathyroïdite
- Cryptocoques ¬ *B45.8*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†*, *E35.8**

Paratrachome ¬ *A74.0†*, *H13.1**

Paratyphi
- A ¬ Infection à Salmonella *A01.1*
- B ¬ Infection à Salmonella *A01.2*
- C ¬ Infection à Salmonella *A01.3*
- ¬ Infection à Salmonella *A01.4*

Paratyphoïde
v./v.a. Fièvre paratyphoïde
- A ¬ *A01.1*
- B ¬ *A01.2*
- C ¬ *A01.3*
- DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde- *Z27.2*
- Seule [TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde- *Z23.1*
- ¬ *A01.4*

Paravaccinia NCA ¬ Infection à *B08.0*

Paraveineuse pigmentée ¬ Atrophie rétino-choroïdienne *H35.8*

PARC ¬ Syndrome *Q87.8*

Parcheminée ¬ Syndrome de la peau *L98.8*

Parenchymateux
- Gestationnelle ou puerpérale ¬ Mastite: *O91.2*
- ¬
- - Goitre congénital (non toxique): *E03.0*
- - Néphrolithiase *E83.58†, N29.8**
- - Pancystite [Cystite *N30.88*

Parenchyme
- Pancréatique ¬ Hypofonctionnement du *K86.88*
- Pinéal à différenciation intermédiaire ¬ Tumeur du *D44.5*
- Pulmonaire ¬ Pyothorax avec fistule du *J86.00*
- Rate ¬ Rupture massive du *S36.04*
- Rénal ¬ Rupture totale du *S37.03*
- ¬ Déchirure
- - Capsule de la rate, sans atteinte plus importante du *S36.02*
- - Rate, avec atteinte du *S36.03*

Parent
- Beaux-parents ¬ Difficultés dans les rapports avec les *Z63*
- Charge au domicile, nécessitant des soins ¬ *Z63*
- ¬
- - Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux- *Z63*
- - Surveillance et contrôle inadéquats de la part des *Z62*

Parentale
- Atypique ¬ Situation *Z60*
- Inappropriée et autres défauts de l'éducation ¬ Pression *Z62*
- ¬ Surprotection *Z62*

Parentérale ¬ Cholestase liée à la nutrition *K91.88*

Parésie
- Accommodation ¬ *H52.5*
- Cérébrale athetotique ¬ *G80.3*
- Faciale) (faiblesse faciale) due à une lésion du neurone moteur inférieur ¬ Paralysie faciale (*G51.0*

Parésie *–suite*
- Faiblesse) faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur ¬ Paralysie (*G83.6*
- Juvénile
- - Progressive ¬ *A50.4*
- - Syphilitique ¬ *A50.4*
- Spastique-puberté précoce ¬ Syndrome de *G11.4*

Paresseuse ¬ Vessie *N31.81*

Paresthésie
- Cutanée ¬ *R20.2*
- Syndrome Guillain-Barré ¬ Variant diplégie faciale avec *G61.0*

Paresthésique ¬ Méralgie *G57.1*

Pariétal
v./v.a. Lobe pariétal
- Cœur ¬ Anévrisme (*I25.3*
- Fibroplastique Löffler
- - Hyperéosinophilie ¬ Endocardite *I42.3*
- - ¬ Endocardite *I42.3*
- Hypoplasie claviculaire ¬ Foramen *Q74.0*
- Non syndromique ¬ Craniosynostose fronto- *Q75.0*
- Pelvien) ¬ Péritoine (*C45.1*
- ¬
- - Fistule: utéro- *N82.5*
- - Lobe
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Mésothéliome du péritoine *C45.1*
- - Os
- - - *D16.41*
- - - *S02.0*
- - Ostéoblastome de l'os *D16.41*
- - Péritoine: *C48.1*
- - Sarcome de l'os *C41.01*
- - Syndrome d'hypogonadisme hypergonadotrope-alopécie fronto- *E23.0, L65.9*

Parietalia
- Permagna ¬ Foramina *Q75.8*
- ¬ Foramina *Q75.8*

Pariéto
- Alvéolaire ¬ Pneumopathie *J84.00*
- Occipitale parasagittale bilatérale ¬ Polymicrogyrie *Q04.3*

Paris
- Trousseau ¬ Syndrome *Q93.5, D69.41*
- ¬ Participation à des jeux de hasard ou des *Z72.8*

Parker
v./v.a. Stratton-Parker

Parkes Weber ¬ Syndrome de *Q87.2*

Parkinson
v./v.a. Guam-Parkinson
- Début précoce
- - Fluctuation de l'effet ¬ Maladie de *G20.91*
- - Handicap

Parkinson *–suite*
- Début précoce *–suite*
- - Handicap *–suite*
- - - Léger
- - - - Fluctuation de l'effet ¬ Maladie de *G20.01*
- - - - Sans fluctuation de l'effet ¬ Maladie de *G20.00*
- - - Lourd
- - - - Fluctuation effet ¬ Maladie
- - - - - *G20.11*
- - - - - *G20.21*
- - - - Sans fluctuation effet ¬ Maladie
- - - - - *G20.10*
- - - - - *G20.20*
- - ¬ Maladie de *G20.90*
- Démence ¬ Maladie de *G20.90†, F02.3**
- Handicap modéré à lourd ¬ Maladie de *G20.1*
- Héréditaire
- - Début tardif ¬ Maladie de *G20.90*
- - Tardif
- - - Fluctuation de l'efficacité ¬ Syndrome de *G20.91*
- - - Handicap
- - - - Léger
- - - - - Fluctuation de l'efficacité ¬ Syndrome de *G20.01*
- - - - - Sans fluctuation de l'efficacité ¬ Syndrome de *G20.00*
- - - - Lourd
- - - - - Fluctuation de l'efficacité ¬ Syndrome de *G20.11*
- - - - - Fluctuation de l'efficacité ¬ Syndrome de *G20.21*
- - - - - Sans fluctuation de l'efficacité ¬ Syndrome de *G20.10*
- - - - - Sans fluctuation de l'efficacité ¬ Syndrome de *G20.20*
- Idiopathique ¬ Syndrome parkinsonien ou maladie de *G20*
- Lourd handicap ¬ Maladie de *G20.2*
- Non précisé ¬ Maladie de *G20.9*
- Primitif(ve) ¬ Syndrome parkinsonien ou maladie de *G20*
- Répondant pas aux traitements par voie orale ¬ Périodes off de la maladie de *G20.91*
- SAI ¬ Syndrome parkinsonien ou maladie de *G20*
- Sans handicap ou avec un handicap léger ¬ Maladie de *G20.0*
- Syphilitique ¬ Syndrome de *A52.1†, G22**
- Vasculaire ¬ Maladie de *G21.4*
- ¬ Démence au cours de maladie de *G20.90†, F02.3**

Parkinsonien
- Cours
- - Hypotension orthostatique
- - - Neurogène ¬ Syndrome *G23.8*
- - - Symptomatique ¬ Syndrome *G23.8*

Parkinsonien *–suite*
- Cours *–suite*
- - Hypotension orthostatique *–suite*
- - - ¬ Syndrome *G23.8*
- - Maladies classées ailleurs ¬ Syndrome *G22**
- Dus à des médicaments ¬ Autres syndromes secondaires *G21.1*
- Maladie Parkinson
- - Idiopathique ¬ Syndrome *G20*
- - Primitif(ve) ¬ Syndrome *G20*
- - SAI ¬ Syndrome *G20*
- Post-encéphalitique ¬ Syndrome *G21.3*
- Secondaire
- - Agents externes ¬ Syndrome *G21.2*
- - Sans précision ¬ Syndrome *G21.9*
- Secondaires ¬ Autres syndromes *G21.8*
- Spasticité liés à l'X ¬ Syndrome *G20.90*
- ¬
- - AMS-P [atrophie multisystématisée de type *G23.2*
- - Atrophie multisystématisée de type *G23.2*

Parkinsonien-pyramidal ¬ Syndrome *G20.90*

Parkinsonisme
- Atypique
- - Caraïbes ¬ *G21.2*
- - Juvénile
- - - Fluctuation de l'effet ¬ *G20.91*
- - - Handicap
- - - - Léger
- - - - - Fluctuation de l'effet ¬ *G20.01*
- - - - - Sans fluctuation de l'effet ¬ *G20.00*
- - - - Lourd
- - - - - Fluctuation de l'effet ¬ *G20.11*
- - - - - Fluctuation de l'effet ¬ *G20.21*
- - - - - Sans fluctuation de l'effet ¬ *G20.10*
- - - - - Sans fluctuation de l'effet ¬ *G20.20*
- - - ¬ *G20.90*
- Dystonie par intoxication au cyanure ¬ *G21.2*
- Polyneuropathie ¬ *G20.90, G62.9*
- Post-encéphalitique ¬ *G21.3*
- Précoce-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *G23.8*
- Secondaire ¬ *G21*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G22**
- ¬
- - Démence dans: *F02.3**
- - Syndrome de retard développemental-troubles du language-dystonie dopa-sensible- *G25.88*

Parnas
v./v.a. Wagner-Parnas

Parodontal ¬
- Abcès: *K05.2*
- Syndrome d'Ehlers-Danlos *Q79.6*

Parodonte, sans précision ¬ Affection des dents et du *K08.9*

Parodontite
- Agressive ¬ *K05.4*
- Juvénile
- - Localisée ¬ Anomalie des granulocytes neutrophiles associée à une prédisposition à la *D71*
- - ¬ *K05.4*

Parodontose
- Juvénile ¬ *K05.4*
- ¬ *K05.4*

Paroi
- Alvéolaires ¬ Lésion des *J84.00*
- Antérieure
- - Rhinopharynx ¬
- - - Tératome malin de la *C11.3*
- - - Tumeur maligne: *C11.3*
- - SAI ¬
- - - Antérieur [de la *I22.0*
- - - Infarctus transmural (aigu): de la *I21.0*
- - - Prolapsus vaginal (*N81.1*
- - Vessie ¬
- - - Carcinome à petites cellules de la *C67.3*
- - - Carcinome épidermoïde pur de la *C67.3*
- - - Carcinome non papillaire à cellules transitionnelles de la *C67.3*
- - - Rhabdomyosarcome embryonnaire de la *C67.3*
- - - Tumeur maligne: *C67.3*
- - ¬
- - - Infarctus du myocarde à répétition, de la *I22.0*
- - - Infarctus transmural aigu du myocarde, de la *I21.0*
- Cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture de la *I23.3*
- Diaphragmatique ¬
- - Infarctus répété (aigu) (de): *I22.1*
- - Infarctus transmural (aigu) (de): *I21.1*
- Extérieure de l'utérus ¬ Adhérences de la *N73.6*
- Gastrique
- - Antérieure
- - - Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de la *C16.8*
- - - ¬ Carcinome épidermoïde de la *C16.8*
- - Postérieure
- - - Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de la *C16.8*
- - - ¬ Carcinome épidermoïde de la *C16.8*
- Inférieure ¬
- - Infarctus du myocarde à répétition, de la *I22.1*
- - Infarctus transmural aigu du myocarde, de la *I21.1*
- Latérale
- - Oropharynx ¬
- - - Carcinome épidermoïde de la *C10.2*
- - - Tumeur maligne: *C10.2*

Paroi *–suite*
- Latérale *–suite*
- - Rhinopharynx ¬
- - - Tératome malin de la *C11.2*
- - - Tumeur maligne: *C11.2*
- - SAI ¬ Infarctus transmural (aigu): de la *I21.2*
- - Vessie ¬
- - - Carcinome à petites cellules de la *C67.2*
- - - Carcinome épidermoïde pur de la *C67.2*
- - - Carcinome non papillaire à cellules transitionnelles de la *C67.2*
- - - Rhabdomyosarcome embryonnaire de la *C67.2*
- Postérieur SAI ¬
- - Infarctus répété (aigu) (de): la *I22.1*
- - Infarctus transmural (aigu) (de): postérieur [de la *I21.1*
- Postérieure
- - Globe oculaire ¬ Rétention (ancienne) de corps étranger magnétique dans: *H44.6*
- - Hypopharynx ¬
- - - Carcinome épidermoïde de la *C13.2*
- - - Tumeur maligne: *C13.2*
- - Oropharynx ¬
- - - Carcinome épidermoïde de la *C10.3*
- - - Tumeur maligne: *C10.3*
- - Rhinopharynx ¬
- - - Tératome malin de la *C11.1*
- - - Tumeur maligne: *C11.1*
- - Vessie ¬
- - - Carcinome à petites cellules de la *C67.4*
- - - Carcinome épidermoïde pur de la *C67.4*
- - - Carcinome non papillaire à cellules transitionnelles de la *C67.4*
- - - Rhabdomyosarcome embryonnaire de la *C67.4*
- - - Tumeur maligne: *C67.4*
- - ¬ Prolapsus vaginal de la *N81.6*
- Rhinopharyngé
- - SAI ¬ *C11.9*
- - Supérieure) (postérieure) du voile du palais ¬ *C11.3*
- SAI ¬
- - Infarctus du myocarde, à répétition (aigu): latéral (*I22.8*
- - Infarctus répété (aigu): antérieur (*I22.0*
- - Infarctus transmural (aigu) (de): inférieur (*I21.1*
- Sinus de la face ¬ Anomalie congénitale de la *Q30.8*
- Supérieure
- - Rhinopharynx ¬
- - - Tératome malin de la *C11.0*
- - - Tumeur maligne: *C11.0*
- - Vagin après hystérectomie ¬ Prolapsus de la *N99.3*
- Thoracique
- - Antérieure

Paroi *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Antérieure *–suite*
- - - SAI ¬ Douleur de la *R07.3*
- - - ¬
- - - - Décollement sous-cutané de la *S20.36*
- - - - Lésions traumatiques superficielles de la *S20.3*
- - - - Plaie ouverte de la *S21.1*
- - Postérieure ¬
- - - Décollement sous-cutané de la *S20.46*
- - - Lésions traumatiques superficielles de la *S20.4*
- - - Plaie ouverte de la *S21.2*
- - Région génitale ¬ Tête cou
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - SAI ¬
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- - - Anomalie morphologique congénitale de la *Q67.8*
- - ¬
- - - *I97.88*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - - Abcès de la *L02.2*
- - - Décollement sous-cutané de la *S20.86*
- - - Fistule de la *J86.02*
- - - Mélanome malin de la *C43.59*
- - - Phlegmon de la *L03.3*
- - - Plaies ouvertes multiples de la *S21.7*
- - - Pyothorax avec fistule de la *J86.02*
- Vessie ¬ Abcès de la *N30.80*

Paroi abdominale
v./v.a. Hernie de la paroi abdominale
- Antérieure
- - Gangrène
- - - Non précisées ¬ Hernies de la *K43.7*
- - - ¬ Autres hernies de la *K43.78*
- - Non précisées
- - - Gangrène ¬ Hernies de la *K43.79*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernies de la *K43.69*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernies de la *K43.99*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres hernies de la *K43.68*
- - SAI ¬ Hernies de la *K43.99*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres hernies de la *K43.98*
- Lombes bassin
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.3*
- - ¬ Gelure superficielle de la *T33.3*

Paroi abdominale *–suite*
- ¬
- - *C49.4*
- - *R02.04*
- - *T21*
- - Abcès de la *L02.2*
- - Adhérence de la *K66.0*
- - Anthrax de la *L02.2*
- - Basaliome de la *C44.59*
- - Carcinome de la peau de la *C44.59*
- - Contusion de la *S30.1*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans de la *C44.59*
- - Furoncle de la *L02.2*
- - Malformations congénitales de la *Q79.5*
- - Mélanome malin de la *C43.59*
- - Phlegmon de la *L03.3*
- - Plaie ouverte de la *S31.1*
- - Tumeur triton maligne des nerfs de la *C47.4*

Parole
- Dysmorphie cranio-faciale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-autisme-apraxie de la *Q87.0*
- Langage ¬
- - Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la *Z50.5!*
- - Troubles du développement de la *F80.8*
- ¬
- - Apraxie primaire progressive de la *G31.0*
- - Défaut de la *R47.8*
- - Syndrome d'épilepsie rolandique-dyspraxie de la *G40.08, R48.2*
- - Trouble de la *R47.8*

Paronychie
- Tuberculeuse primaire ¬ *A18.4*
- ¬ *L03.0*

Parorexie
- Psychogène ¬ *F50.8*
- ¬ *F50.8*

Parosmie ¬ *R43.1*

Parotide
v./v.a. Glande parotide
- ¬ Tumeur épithéliale bénigne des glandes *D11.0*

Parotidien
- Subchronique ¬ Fièvre uvéo- *D86.8*
- ¬ Calcul du canal *K11.5*

Parotidite
- Épidémique ¬
- - *B26*
- - Orchite au cours de *B26.0†, N51.1**
- Infectieuse ¬ *B26*
- Ourlienne SAI ¬ *B26.9*
- Paralytique ¬ Uvéo- *D86.8*
- ¬
- - Syndrome de neuro-uvéo- *D86.8*
- - Uvéo- *D86.8*

Paroxysmal extreme pain disorder] ¬ PEPD [*G90.88*

Paroxysmes occipitaux ¬ Épilepsie bénigne à *G40.08*

Paroxystique
- A frigore ¬ Hémoglobinurie (de): *D59.6*
- Ataxie épisodique et spasticité ¬ Choréoathétose dystonique *G24.8*
- Atriale ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Auriculoventriculaire [AV] SAI ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Bénigne ¬ Péritonite *E85.0*
- Bénin de l'enfant ¬ Torticolis *G24.3*
- Chronique ¬ Hémicrânie *G44.0*
- Cours d'une fibrillation auriculaire ¬ Tachyarythmie complète *I48.0*
- Familiale ¬
- - Ataxie *G11.8*
- - Péritonite *E85.0*
- Induite effort
- - Crampe de l'écrivain ¬ Syndrome d'épilepsie rolandique-dystonie *G40.08*
- - ¬ Dyskinésie *G24.8*
- Jonctionnelle ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Kinésigénique ¬ Dyskinésie *G24.8*
- Maligne ¬ Tachycardie ventriculaire *I47.2*
- Nocturne ¬ Hémoglobinurie *D59.5*
- Nodale ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Regard avec ataxie ¬ Déviation tonique *G96.8, H51.8*
- Sans précision ¬ Tachycardie *I47.9*
- Syphilitique ¬ Tachycardie *A52.0†, I52.0**
- ¬
- - Bradyarythmie complète *I48.0*
- - Dyskinésie
- - - *G24.8*
- - - Non kinésigénique *G24.8*
- - Fibrillation auriculaire, *I48.0*
- - Flutter auriculaire *I48.9*
- - Hémoglobinurie nocturne *D59.5*
- - Névralgie faciale *G50.0*
- - Syndrome
- - - Douleur extrême *G90.88*
- - - Épilepsie généralisée-dyskinésie *G40.3, G24.8*
- - Tachyarythmie complète
- - - *I48.0*
- - - *I48.1*
- - Trouble panique [anxiété épisodique *F41.0*
- - Vertige bénin *H81.1*

Parrot ¬ Pseudo-paralysie de *A50.0†, M90.23**

Parrot-Kaufmann ¬ Maladie de *Q77.4*

Parry-Romberg ¬ Syndrome de *G51.8*

Pars flaccida ¬ Perforation de la *H72.1*

Parsonage-Turner [Amyotrophie névralgique de l'épaule] ¬ Syndrome de *G54.5*

Partenaire ¬ Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le *Z63*

Participation à des jeux de hasard ou des paris ¬ *Z72.8*

Partiel
v./v.a. Type de maladie

Partington ¬ Syndrome de *Q87.8*

Parvovirale, siège non précisé ¬ Infection *B34.3*

Parvovirus
- B19 ¬ Infection au *B08.3*
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.6!*
- ¬ Embryopathie à *P35.8*

Pascoe
v./v.a. Forney-Robinson-Pascoe

Pascual-Castroviejo type 2 ¬ Syndrome de *Q28.88*

PASH [pyoderma gangrenosum-acné-hidradénite suppurée] ¬ Syndrome *M35.8*

Pasini et Pierini ¬ Atrophodermie de *L90.3*

PASS [pyoderma gangrenosum-acné-hidradénite suppurée-spondylarthrite ankylosante] ¬ Syndrome *M35.8*

Passage
- Sonde ou de bougie ¬ *Z43*
- Transplacentaire d'anticorps anti-récepteur de la TSH ¬ Hypothyroïdie congénitale par *P72.2*

Passarge
v./v.a. Schöpf-Schulz-Passarge

Passwell-Goodman-Siprkowski ¬ Syndrome de *Q87.1*

Pasteurella tularensis ¬ Infection à *A21.9*

Pasteurellose ¬ *A28.0*

Patau
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q91.7*
- ¬ Syndrome de *Q91.7*

Patellaire
v./v.a. génito-patellaire
v./v.a. ischio-patellaire
- Familiale ¬ Chondromalacie *M22.4*
- ¬
  - Maladies fémoro- *M22.2*
  - Ostéochondrite juvénile du corps *M92.4*

Patello
v./v.a. talo-patello-scaphoïde

Paterson ¬ Syndrome de Kelly- *D50.1*

Pathétique
- IV) ¬ Paralysie du nerf *H49.1*
- ¬ Lésion traumatique du nerf *S04.2*

Pathogène
v./v.a. Agent pathogène
- ¬
  - Coronavirus en tant qu'agents *B97.2!*
  - Staphylocoques en tant qu'agents *B95.8!*

Pathologique
v./v.a. Type de maladie

Patient
- Complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un *Y84.9!*
- Itinérant ¬ *F68.1*
- Présentant un œsophage de Barrett ¬ Dysplasie de haut grade chez les *D00.1*
- Subi une greffe de cellules-souches hématopoïétiques avec une immunosuppression actuelle ¬ Infection à adénovirus chez un *B34.0, Z94.81*
- ¬ Vaccination non effectuée raison raisons indépendantes
  - *Z28*
  - *Z53*

Patterson
- Lowry ¬ Dysplasie rhizomélique de *Q78.8*
- ¬ Pseudolepréchaunisme de *E34.8*

Patterson-Stevenson ¬ Syndrome de *Q87.0*

Pauci
- Articulaire
  - Articulation
    - Cheville ¬ Arthrite chronique juvénile, forme oligo(*M08.47*
    - Coude ¬ Arthrite chronique juvénile, forme oligo(*M08.42*
    - Genou ¬ Arthrite chronique juvénile, forme oligo(*M08.46*
  - Colonne vertébrale ¬ Arthrite chronique juvénile, forme oligo(*M08.48*
  - Évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(*M08.3*
  - Main ¬ Arthrite chronique juvénile, forme oligo(*M08.44*
  - Pied ¬ Arthrite chronique juvénile, forme oligo(*M08.47*
  - Poignet ¬ Arthrite chronique juvénile, forme oligo(*M08.43*
  - Région pelvienne ¬ Arthrite chronique juvénile, forme oligo(*M08.45*
  - Région scapulaire ¬ Arthrite chronique juvénile, forme oligo(*M08.41*
  - Sièges multiples ¬ Arthrite chronique juvénile, forme oligo(*M08.40*
- Immun
  - ANCA [Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles] ¬ Glomérulonéphrite *N01.7*
  - ¬ Glomérulonéphrite *N01.7*

Paucité Voie biliaire syndromique due
- Monosomie 20p12 ¬ *Q44.7*
- Mutation ponctuelle de JAG1 ¬ *Q44.7*

Paume
- Main ¬
  - *S61.80*
  - Nævus comédonien de la *Q82.5*
- ¬ *T23*

Paupière
- Cours
  - Impétigo ¬ Atteinte de la *L01.0†, H03.8**
  - Leishmaniose ¬ Infection parasitaire de la *B55.1†, H03.0**
  - Loase ¬ Infestation des *B74.3†, H03.0**
  - Maladies classées ailleurs ¬
    - Atteinte de la *H03.8**
    - Infection parasitaire de la *H03.0**
  - Maladies infectieuses classées ailleurs ¬ Atteinte de la *H03.1**
  - Onchocercose ¬ Infestation des *B73†, H03.0**
  - Phtiriase ¬ Infestation des *B85.3†, H03.0**
  - Zona ¬ Atteinte de la *B02.3†, H03.1**
- Due
  - Espèce Demodex ¬ Dermatite des *B88.0†, H03.0**
  - Virus de l'herpès ¬ Dermite de la *B00.5†, H03.1**
- Gomme ¬ Syphilis tardive de la *A52.7†, H03.1**
- Hyperthyroïdie ¬ Chloasma des *E05.9†, H03.8**
- Inférieure ¬ Colobome de la *Q10.3*
- Parasites NCA ¬ Infestation des *B89†, H03.0**
- Région périoculaire
  - Sans atteinte des voies lacrymales ¬ Plaie ouverte de la *S01.1*
  - ¬
    - Affections dégénératives des *H02.7*
    - Brûlure de la *T26.0*
    - Contusion de la *S00.1*
    - Corrosion de la *T26.5*
    - Lésions traumatiques superficielles de la *S00.2*
    - Plaie ouverte de la *S01.1*
- Sans précision ¬
  - Affection des *H02.9*
  - Inflammation de la *H01.9*
- Supérieure ¬
  - Colobome de la *Q10.3*
  - Paralysie de la *H02.5*
- Surnuméraire ¬ *Q10.3*
- Y compris canthus ¬
  - Carcinoma in situ: Peau de la *D04.1*
  - Mélanome
    - In situ de la *D03.1*
    - Malin de la *C43.1*
  - Nævus à mélanocytes de la *D22.1*
  - Tumeur bénigne: Peau de la *D23.1*
  - Tumeur maligne: Peau de la *C44.1*
  - ¬
    - Abcès de la *H00.0*
    - Absence ou agénésie de: *Q10.3*
    - Affections précisées des *H02.8*
    - Anomalie congénitale des *Q10.3*

Paupière *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Atrophie de la *H02.5*
- - Carcinome à cellules de Merkel de la *C44.1*
- - Carcinome sébacé de la *C44.1*
- - Chancre des *A51.2†*, *H13.1**
- - Chloasma de la *H02.7*
- - Colobome de la *Q10.3*
- - Dermatoses non infectieuses de la *H01.1*
- - Dermite
- - - Allergique de la *H01.1*
- - - Contact de la *H01.1*
- - - Eczémateuse de la *H01.1*
- - Douleur de la *H02.8*
- - Épilepsie avec myoclonie des *G40.3*
- - Furoncle de la *H00.0*
- - Herpès simplex de la *B00.5†*, *H03.1**
- - Herpès zoster de la *B02.3†*, *H03.1**
- - Hypertrichose des *H02.8*
- - Infestation parasitaire des *B89†*, *H03.0**
- - Inflammations précisées de la *H01.8*
- - Lupus érythémateux discoïde de la *H01.1*
- - Lupus vulgaire de *A18.4†*, *H03.1**
- - Madarosis de la *H02.7*
- - Maladie de Basedow avec orbitopathie endocrinienne et rétraction de *E05.0†*, *H06.3**
- - Malformation congénitale de la *Q10.3*
- - Mélanome malin familial de la *C43.1*
- - Molluscum contagiosum de la *B08.1†*, *H03.1**
- - Nævus d'Ota sur la peau de la *D22.1*
- - Ochronose avec chloasma de la *E70.2†*, *H03.8**
- - Orgelet
- - - *H00.0*
- - - Inflammations profondes de la *H00.0*
- - Ptosis de la *H02.4*
- - Rétention de corps étranger dans la *H02.8*
- - Rétraction congénitale des *Q10.3*
- - Tissu conjonctif
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Tissu mou: *C79.88*
- - Tuberculose des *A18.4†*, *H03.1**
- - Variole bovine de la *B08.0†*, *H03.1**
- - Vitiligo de la *H02.7*
- - Xanthélasma de la *H02.6*
- - Xérodermie de la *H01.1*

Pauvreté extrême ¬ *Z59*

Pavillon
- Cervical ¬ *Q18.2*
- Congénitale ¬ Fistule (du): *Q18.1*
- Oreille
- - Conduit auditif externe ¬

Pavillon *–suite*
- Oreille *–suite*
- - Conduit auditif externe ¬ *–suite*
- - - Abcès *H60.0*
- - - Anthrax *H60.0*
- - - Furoncle *H60.0*
- - ¬
- - - Absence congénitale du *Q16.0*
- - - Affections non infectieuses du *H61.1*
- - - Anomalie congénitale
- - - - *Q17.8*
- - - - Position du *Q17.4*
- - - Cellulite phlegmoneuse du: *H60.1*
- - - Déformation acquise: *H61.1*
- - - Fistule congénitale du *Q17.8*
- - - Hématome non traumatique du *H61.1*
- - - Hypoplasie du *Q17.2*
- - - Malformation congénitale du *Q17.3*
- - - Périchondrite: *H61.0*
- - - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.31*
- Surnuméraire ¬ *Q17.0*

Pavimenteux
- Canal cervical ¬ Présence congénitale d'épithélium *Q51.8*
- Muqueuse utérine ¬ Présence congénitale d'épithélium *Q51.8*
- Sans atteinte musculaire ou oculaire ¬ Lissencéphalie *Q04.3*
- ¬ Dégénérescence rétinienne: *H35.4*

PBS] (aiguë) ¬ Péritonite bactérienne spontanée [*K65.00*

PBX1 ¬ Syndrome d'anomalies congénitales du rein et des voies urinaires associé à *Q64.9*

PC [Pachyonychie congénitale] ¬ *Q84.5*

PCCA [Atrophie cérébello-cérébrale progressiv] ¬ *G31.88*

PCT [Porphyrie cutanée tardive] ¬ *E80.1*

PCU
- Classique ¬ *E70.0*
- Phénylcétonurie] ¬ *E70.1*

PCWH [Syndrome de neuropathie périphérique-leucodystrophie centrale dysmyélinisante-syndrome de Waardenburg-maladie de Hirschsprung] ¬ *Q87.8*

PDE4D ¬ Syndrome par haploinsuffisance de *Q93.5*

PEAG [pustulose exanthématique aiguë généralisée] ¬ *L27.0*

Pearson
v./v.a. Herlitz-Pearson
v./v.a. McArdle-Schmidt-Pearson
- ¬ Syndrome de *D64.0*

Peau
- Anale ¬
- - *D03.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*

Peau *–suite*
- Anale ¬ *–suite*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- - Carcinome de la *C44.50*
- - Mélanome malin de la *C43.50*
- Associé syndrome prédisposition tumorale liée
- - BAP1 ¬ Mélanome malin de la *C43.9*
- - MITF ¬ Mélanome malin de la *C43.9*
- Autologue ¬ Status post greffe de *Z94.5*
- Cou ¬
- - Carcinome à cellules de Merkel de la *C44.4*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans de la *C44.4*
- - Dyskératome verruqueux de la *D23.4*
- - Pilomatrixome de la *D23.4*
- - Syndrome de Brooke-Spiegler de la *D23.4*
- - Syringocystadénome papillifère de la *D23.4*
- - Trichodiscomes multiples familiaux de la *D23.4*
- - Trichofolliculome de la *D23.4*
- Cours
- - Accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*
- - Trouble métabolique NCA ¬ Maladie de la *E88.9†*, *L99.8**
- Crapaud ¬ *E50.8†*, *L86**
- Cuir chevelu
- - Cou ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.4*
- - - Tumeur bénigne: *D23.4*
- - - Tumeur maligne: *C44.4*
- - ¬ Carcinome lympho-épithélial-like de la *C44.4*
- Cultivateur ¬ *L57.8*
- Déciduale
- - Acrale ¬ Syndrome de *Q80.8*
- - Généralisée ¬ *Q80.8*
- - Leuconychie-kératose acrale ponctuée-chéilite-nodosités [PLACK] ¬ Syndrome de *Q84.8*
- Derme] et au tissu sous-cutané ¬ Déficit tissulaire limité à la *I70.24*
- Dos ¬
- - Carcinome de la *C44.59*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans de la *C44.59*
- Due
- - Exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision ¬ Modification de la *L57.9*
- - Rayons ultraviolets, sans précision ¬ Modification aiguë de la *L56.9*
- Échaudée
- - Atteinte de la muqueuse ¬ Syndrome SSS [staphylococcique de *L00.1*
- - Syndrome SSS

Peau *–suite*
- Échaudée *–suite*
- - Syndrome SSS *–suite*
- - - Atteinte 30% surface corporel
- - - - Plus ¬ Syndrome staphylococcique de *L00.1*
- - - - ¬ Syndrome staphylococcique de *L00.0*
- - - SAP ¬ Syndrome staphylococcique de *L00.0*
- - - ¬ Syndrome staphylococcique de *L00.0*
- Exposition chronique aux rayonnements non ionisants ¬ Autres modifications de la *L57.8*
- Externe du nez ¬ Plaie ouverte du nez: *S01.21*
- Face
- - Parties autres et non précisées ¬ Tumeur maligne: *C44.3*
- - ¬
- - - Carcinome à cellules de Merkel de la *C44.3*
- - - Carcinome pilomatriciel de la *C44.3*
- - - Syndrome de Brooke-Spiegler de la *D23.3*
- - - Trichofolliculome de la *D23.3*
- Fesse ¬ Carcinome de la *C44.59*
- Flasque affaissé
- - Perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ *L98.7*
- - SAI ¬ *L98.7*
- Froide et moite ¬ *R23.1*
- Glabre ¬ Teigne de la *B35.4*
- Goudrons ¬ Cancer de *C44.9*
- Hanche ¬ Carcinome à cellules de Merkel de la *C44.7*
- Intacte ¬ Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la *L89.0*
- Intestin ¬ Maladie inflammatoire néonatale de la *D84.9*
- Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la *L87.0*
- L 'épaule ¬ Carcinome à cellules de Merkel de la *C44.6*
- Lésion à localisations contiguës de la peau ¬ Dermatofibrosarcoma protuberans de la *C44.8*
- Lèvre ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.0*
- - Tumeur bénigne: *D23.0*
- Mammaire ¬ Mélanome malin de la *C43.59*
- Marin ¬ *L57.8*
- Médicament ¬ Exanthème toxique dû au contact de la *L24.4*
- Membre
- - Inférieur y compris hanche ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.7*
- - - Tumeur bénigne: *D23.7*
- - - Tumeur maligne: *C44.7*
- - Supérieur
- - - Y compris épaule ¬
- - - - Carcinoma in situ: *D04.6*

Peau *–suite*
- Membre *–suite*
- - Supérieur *–suite*
- - - Y compris épaule ¬ *–suite*
- - - - Tumeur bénigne: *D23.6*
- - - - Tumeur maligne: *C44.6*
- - - ¬ Carcinome à cellules de Merkel de la *C44.6*
- Membres
- - Inférieurs ¬
- - - Carcinome à cellules de Merkel de la *C44.7*
- - - Dermatofibrosarcoma protuberans de la *C44.7*
- - - Dyskératome verruqueux de la *D23.7*
- - Supérieurs ¬
- - - Dermatofibrosarcoma protuberans de la *C44.6*
- - - Dyskératome verruqueux de la *D23.6*
- - - Pilomatrixome de la *D23.6*
- - ¬ Plis circulaires bénins multiples de la *Q82.8*
- Muqueuses ¬ Syphilis secondaire de la *A51.3*
- Nez ¬ Trichofolliculome de la *D23.3*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Ulcérations chroniques de la *L98.4*
- - Précisées ¬ Modifications de la *R23.8*
- Ongle ¬
- - Candidose de la *B37.2*
- - Maladie due au VIH avec candidose de la *B20, B37.2*
- Oreille
- - Conduit auditif externe ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.2*
- - - Tumeur bénigne: *D23.2*
- - - Tumeur maligne: *C44.2*
- - ¬
- - - Carcinome à cellules de Merkel de la *C44.2*
- - - Trichodiscome multiple familial de la *D23.2*
- Organe génital
- - Femme ¬
- - - *D28*
- - - *D39.7*
- - Homme ¬
- - - *D29*
- - - *D40.7*
- Parcheminée ¬ Syndrome de la *L98.8*
- Paroi abdominale ¬ Carcinome de la *C44.59*
- Parties face non précisées ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.3*
- - Tumeur bénigne: *D23.3*
- Paupière
- - Y compris canthus ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.1*

Peau *–suite*
- Paupière *–suite*
- - Y compris canthus ¬ *–suite*
- - - Tumeur bénigne: *D23.1*
- - - Tumeur maligne: *C44.1*
- - ¬ Nævus d'Ota sur la *D22.1*
- Périanal ¬
- - *D03.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- - Herpès de la *A60.1*
- - Mélanome malin de la *C43.50*
- Périnée ¬ Carcinome de la *C44.50*
- Phanères
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q84.9*
- - ¬ Autres malformations congénitales précisées de la *Q84.8*
- Pileux bord libre lèvre
- - Inférieure et le sillon mentolabial ¬ *C44.0*
- - Supérieure et le nez ¬ *C44.0*
- Rayons ultraviolets ¬ Autres modifications aiguës précisées de la *L56.8*
- Ridée ¬ Syndrome de la *Q82.8*
- SAI ¬ Parasites de la *B88.9*
- Sans précision ¬
- - Affection
- - - Atrophique de la *L90.9*
- - - Hypertrophique de la *L91.9*
- - Carcinoma in situ: *D04.9*
- - Malformation congénitale de la *Q82.9*
- - Mélanome malin de la *C43.9*
- - Tumeur bénigne: *D23.9*
- - Tumeur maligne de la *C44.9*
- - Vascularite limitée à la *L95.9*
- Scrotum ¬
- - *C63.2*
- - *D29.4*
- Sèche ¬ Dermite avec *L85.3*
- Sein ¬
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- - Mélanome malin de la *C43.59*
- Sièges ¬ Carcinoma in situ: *D04.8*
- Stade
- - 1 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.05†, L99.21**
- - 2 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.06†, L99.22**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.07†, L99.23**
- Stries ¬ Atrophie
- - Maculaire syphilitique de la *A52.7†, L99.8**

Peau *–suite*
- Stries ¬ Atrophie *–suite*
- - Syphilitique de la *A52.7†, L99.8**
- Tête ¬
- - Syndrome de Brooke-Spiegler de la *D23.4*
- - Syringocystadénome papillifère de la *D23.4*
- Tissu cellulaire sous-cutané
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de la *O99.7*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections précisées de la *L99.8**
- - Liée à une irradiation, sans précision ¬ Affection de la *L59.9*
- - Liées à une irradiation ¬ Autres affections précisées de la *L59.8*
- - Niveau
- - - Cou ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.1*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.4*
- - - - Supérieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.3*
- - - Tête ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.0*
- - - Tronc ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.2*
- - Sans précision ¬
- - - Affection de la *L98.9*
- - - Infection localisée de la *L08.9*
- - - Kyste folliculaire de la *L72.9*
- - - Lésion granulomateuse de la *L92.9*
- - - Tuméfaction et masses localisées de la *R22.9*
- - Sièges multiples ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.7*
- - ¬
- - - Affections précisées de la *L98.8*
- - - Antécédents familiaux de maladies de la *Z84.0*
- - - Antécédents personnels de maladies de la *Z87.2*
- - - Formes de kyste folliculaire de la *L72.8*
- - - Infections localisées précisées de la *L08.8*
- - - Lésions
- - - - Granulomateuses de la *L92.8*
- - - - Infiltrantes de la *L98.6*
- - - Résultat radiologique anormal de la *R93.8*
- Tissu mou) ¬ Sein (*D03.5*
- Tissu sous-cutané
- - Excédentaire et flasque ¬ *L98.7*
- - Membres ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.2*
- - Non classée
- - - Avant-bras et poignet ¬ Nécrose de la *R02.02*
- - - Jambe et genou ¬ Nécrose de la *R02.06*

Peau *–suite*
- Tissu sous-cutané *–suite*
- - Non classée *–suite*
- - - Localisation non précisée ¬ Nécrose de la *R02.09*
- - - Main et doigt ¬ Nécrose de la *R02.03*
- - - Région de l'épaule, bras et coude ¬ Nécrose de la *R02.01*
- - - Région de la cheville, pied et orteils ¬ Nécrose de la *R02.07*
- - - Région pelvienne et cuisse ¬ Nécrose de la *R02.05*
- - - Tête et cou ¬ Nécrose de la *R02.00*
- - - Tronc ¬ Nécrose de la *R02.04*
- - - ¬ Nécrose post-traumatique de la *R02*
- - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.3*
- - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.0*
- - Tronc ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.1*
- Tronc ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.5*
- - Carcinome à cellules de Merkel de la *C44.59*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans de la *C44.59*
- - Dyskératome verruqueux de la *D23.5*
- - Syndrome de Brooke-Spiegler de la *D23.5*
- - Syringocystadénome papillifère de la *D23.5*
- - Trichodiscomes multiples familiaux de la *D23.5*
- - Tumeur bénigne: *D23.5*
- - Tumeur maligne: *C44.5*
- Verge SAI ¬ *C60.9*
- Visage
- - Exception des yeux) ¬ Nævus d'Ota sur la *D22.3*
- - Perte de poids ¬ Affaissement de la *L98.7*
- - ¬ Syringocystadénome papillifère de la *D23.3*
- ¬
- - Abcès amibien de la *A06.7*
- - Accident dû à: Pénétration d'un corps étranger à travers la *W49.9!*
- - Affections
- - - Atrophiques de la *L90.8*
- - - Hypertrophiques de la *L91.8*
- - Anomalie congénitale de la *Q82.9*
- - Antécédents familiaux de tumeur maligne de la *Z80.8*
- - Cicatrice: adhérente (*L90.5*
- - Complication d'une greffe de *T86.59*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans de la peau, lésion à localisations contiguës de la *C44.8*
- - Dermite
- - - Allergique contact due
- - - - Aliments en contact avec la *L23.6*

Peau *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dermite *–suite*
- - - Allergique contact due *–suite*
- - - - Médicaments en contact avec la *L23.3*
- - - Contact sans précision due
- - - - Aliments en contact avec la *L25.4*
- - - - Médicaments en contact avec la *L25.1*
- - - Irritant contact due
- - - - Aliments en contact avec la *L24.6*
- - - - Médicaments en contact avec la *L24.4*
- - Desquamation de la *R23.4*
- - Difformité de la cicatrice (*L90.5*
- - Donneur de *Z52.1*
- - Échec d'une greffe de *T86.59*
- - Exfoliation de la *R23.4*
- - Gelure avec atteinte partielle des couches de la *T33*
- - Gomme de la *A52.7†, L99.8**
- - Gonorrhée de la *A54.8†, L99.8**
- - Hémangiome
- - - Hobnail de la *D18.01*
- - - Microveinulaire de la *D18.01*
- - Induration de la *R23.4*
- - Infection
- - - Greffe de *T86.59*
- - - Néonatale de la *P39.4*
- - Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la *C43.8*
- - Maladie due au VIH avec maladie de *B23.8, L98.9*
- - Malformations congénitales précisées de la *Q82.8*
- - Mélanome malin familial, lésion à localisations contiguës de la *C43.8*
- - Nécrose d'une greffe de *T86.51*
- - Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec hyperélasticité de la *G60.0*
- - Perte d'une greffe de *T86.52*
- - Rejet d'une greffe de *T86.59*
- - Sarcoïdose de la *D86.3*
- - Sarcome de Kaposi de la *C46.0*
- - Status post greffe de *Z94.5*
- - Syndrome
- - - Anomalie de pigmentation-kératodermie palmoplantaire-carcinome de la *C44.9, Q82.8*
- - - Dysmorphie faciale-fente palatine-excès de *Q87.0*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, L99.8**
- - Troubles circulatoires d'une greffe de *T86.50*
- - Tuberculose de la *A18.4*
- - Tumeur maligne
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C44.8*
- - - Secondaire de la *C79.2*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D48.5*

Peau *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ulcère amibien de la *A06.7*
- - Vascularites limitées à la *L95.8*
- - Xanthome disséminé de la *E78.2*

Pectoro-mammaire avec partie cutanée ¬ Rejet d'une mammoplastie par lambeau *T86.59*

Pectus carinatum-laxité ligamentaire ¬ Syndrome de dysmorphie- *Q79.8*

Pectus excavatum
- Macrocéphalie-dysplasie unguéale ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Sévère ¬ Syndrome d'hyperphalangie des doigts de la main-anomalies des orteils- *Q79.8*

Pédiatrique
- Apparition aiguë] ¬ PANS [Syndrome neuropsychiatrique *G25.88, F07.8*
- Infection streptococcique du groupe A] ¬ PANDAS [Maladie neuropsychiatrique auto-immune *G25.88, B95.0!, F07.8*
- ¬
- - Gastrite collagène *K29.3*
- - Sclérose en plaques *G35.9*

Pédicule
- Arc de l'axis ¬ Fracture bilatérale de la *S12.1*
- Ovarien et de la trompe de Fallope ¬ Torsion de l'ovaire, du *N83.5*

Pédiculose
- Acariase et à d'autres infestations ¬ Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.7*
- Due Pediculus humanus
- - Capitis ¬ *B85.0*
- - Corporis ¬ *B85.1*
- Phtiriase ¬ Infestation mixte, *B85.4*
- Sans précision ¬ *B85.2*

Pediculus humanus
- Capitis ¬ Pédiculose due à *B85.0*
- Corporis ¬ Pédiculose due à *B85.1*

Pédo-carpien ¬ Spasme *R29.0*

Pédophilie ¬ *F65.4*

Pedum ¬ Tinea manuum et *B35.8*

Peeling skin syndrome type
- A ¬ *Q80.8*
- B ¬ *Q80.8*

PEG ¬
- Complication mécanique de sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [sonde *T85.51*
- Infection dues à une sonde *T85.74*
- Réaction inflammatoire dues à une sonde *T85.74*

PEHO [encéphalopathie progressive avec œdème, hypsarythmie, et atrophie optique] ¬ Syndrome *G31.88*

PEHO-like ¬ Syndrome *G31.88*

Peinture
- Teintures, non classées ailleurs ¬ Effet toxique: *T65.6*

Peinture *–suite*
- ¬ Intoxication par la *T65.6*

PEJ ¬
- Complication mécanique de sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde *T85.52*
- Infection dues à une sonde *T85.74*
- Réaction inflammatoire dues à une sonde *T85.74*

Pel ¬ Syndrome de *A52.1†, H58.8**

Pelade
- Généralisée ¬ *L63.1*
- Sans précision ¬ *L63.9*
- ¬ Autres formes de *L63.8*

Pelger-Huët ¬
- Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: *D72.0*
- Syndrome de petite taille-atrophie optique-anomalie de *Q87.1*

Péliose hépatique ¬
- *K76.4*
- Maladie toxique du foie avec: *K71.88*

Pelizaeus-Merzbacher
- Femmes porteuses ¬ Maladie de *E75.2*
- Forme
- - Classique ¬ Maladie de *E75.2*
- - Néonatale ¬ Maladie de *E75.2*
- - Transitoire ¬ Maladie de *E75.2*
- ¬
- - Leucodystrophie sudanophile de *E75.2*
- - Maladie de *E75.2*
- - Sclérose cérébrale de *E75.2*

Pelizaeus-Merzbacher-like ¬ Maladie de *E75.2*

Pellagre
- Alcoolique ¬
- - *E52*
- - *E52*
- Déficit en vitamine B ¬ *E52*
- ¬
- - Carence en acide nicotinique [*E52*
- - Cheilose au cours de *E52†, K93.8**
- - Démence au cours de *E52†, F02.8**
- - Glossite au cours de *E52†, K93.8**
- - Polyneuropathie au cours de *E52†, G63.4**

Pellagreuse ¬
- Dermatite *E52*
- Encéphalopathie *E52†, G32.8**
- Gingivite *E52†, K93.8**

Pelle ¬ Incisive déformée en forme de *K00.2*

Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du ligament latéral interne du genou [*M76.4*

Pellizzari ¬ Anétodermie de Jadassohn- *L90.2*

Pellucide ¬
- Dégénérescence marginale *H18.4*
- Infertilité féminine par défaut de la zone *N97.8*

Pelure de pomme ¬ Syndrome de la *Q41.1*

Pelvi
- Calicielle-surdité ¬ Syndrome de dysmorphie rénale *Q63.8, H90.5*
- Péritonéal
- - Actes médicaux ¬ Adhérences *N99.4*
- - Femme ¬ Adhérences *N73.6*
- - Organes génito-urinaires ¬ Infection à Chlamydia, *A56.1*

Pelvipéritonite
- Aiguë chez la femme ¬ *N73.3*
- Chronique chez la femme ¬ *N73.4*
- Femme, sans précision ¬ *N73.5*
- Gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques ¬ *A54.2*

Pelvis
- Hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ *Q87.8*
- ¬
- - Angiosarcome du *C49.5*
- - Chondrosarcome du *C41.4*
- - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des tissus mous du *C49.5*
- - Dysplasie de l'épaule et du *Q87.5*
- - Fibrome chondromyxoïde du *D16.8*
- - Fibromyxosarcome des tissus mous du *C49.5*
- - Fibrosarcome du *C49.5*
- - Hémangioendothéliome kaposiforme du *C49.5*
- - Liposarcome bien différencié des tissus mous du *C49.5*
- - Liposarcome dédifférencié des tissus mous du *C49.5*
- - Liposarcome des tissus mous du *C49.5*
- - Liposarcome myxoïde des tissus mous du *C49.5*
- - Liposarcome pléiomorphe des tissus mous du *C49.5*
- - Ostéosarcome du *C41.4*
- - Rhabdomyosarcome
- - - Alvéolaire des tissus mous du *C49.5*
- - - Pléomorphe des tissus mous du *C49.5*
- - - Tissus mous du *C49.5*
- - Sarcome
- - - *C41.4*
- - - Tissu conjonctif du *C49.5*
- - Sarcome alvéolaire des tissus mous du *C49.5*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des tissus mous du *C49.5*
- - Sarcome des tissus mous du *C49.5*
- - Sarcome épithélioïde des tissus mous du *C49.5*
- - Sarcome synovial des tissus mous du *C49.5*

Pelvis *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur desmoplastique à petites cellules rondesdes des tissus mous du *C49.5*
- - Tumeur maligne
- - - *C76.3*
- - - Nerfs périphériques du *C47.5*
- - - Os et du cartilage articulaire: *C41.4*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du *C49.5*
- - Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des tissus mous du *C49.5*
- - Tumeur rhabdoïde des tissus mous du *C49.5*

Pelvi-urétérale ¬
- Jonction *C65*
- Obstruction *N13.5*
- Pyélonéphrite chronique associée
- - Anomalie de jonction *N11.1*
- - Coudure de jonction *N11.1*
- - Obstruction de jonction *N11.1*
- - Rétrécissement de jonction *N11.1*

Pemphigoïde
- Anti-p200 ¬ *L12.8*
- Bulleux ¬ *L12.0*
- Cicatriciel ¬ *L12.1*
- Gravidique ¬ *O26.4*
- Membranes muqueuses ¬ *L12.1*
- Muqueux bénin ¬ *L12.1*
- Oculaire cicatricielle ¬ *L12.1†, H13.3**
- Sans précision ¬ *L12.9*
- ¬ Autres *L12.8*

Pemphigus
- Aigu
- - Fébrile ¬ *L00.0*
- - Sévère ¬ *L00.0*
- Bénin chronique familial ¬ *Q82.8*
- Brésilien] ¬ Fogo selvagem [*L10.3*
- Conjunctivae ¬ *L12.1†, H13.3**
- Épidémique du nouveau-né ¬ *L00*
- Érythémateux ¬ *L10.4*
- Foliacé ¬ *L10.2*
- Herpétiforme ¬ *L10.2*
- IgA ¬ *L10.8*
- Médicamenteux ¬ *L10.5*
- Ocularis ¬ *L12.1†, H13.3**
- Paranéoplasique ¬ *D48.9†, L14**
- Sans précision ¬ *L10.9*
- Séborrhéique ¬ *L10.4*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, L99.8**
- Végétant ¬
- - *L10.1*
- - Syndrome d'Hallopeau [*L10.1*
- Vulgaire ¬ *L10.0*
- ¬ Autres formes de *L10.8*

Pénal ¬
- Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou *Z65*
- Poursuites *Z65*

Pena-Shokeir type II [Syndrome cérébro-oculo-facio-squelettique (autosomique récessif)] ¬ Syndrome de *Q87.8*

Pendred ¬ Syndrome de *E07.1†, H94.8**

Penduleux (ventre en besace) ¬ Soins maternels pour: abdomen *O34.8*

Pénétrant
- Aorte [UPA] ¬ Ulcère *I77.80*
- Globe oculaire
- - Corps étranger ¬ Plaie *S05.5*
- - Sans corps étranger ¬ Plaie *S05.6*
- Orbite
- - Sans corps étranger ¬ Plaie *S05.4*
- - ¬ Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie *H05.5*
- Peau [Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et parafolliculaire *L87.0*
- SAI ¬ Plaie: punctiforme avec corps étranger (*T14.1*
- ¬ Hyperkératose folliculaire *L87.0*

Pénétration
- Corps étranger à travers la peau ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- Oculaire SAI ¬ *S05.6*

Pénétré dans un orifice naturel ¬ Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant *T98.0*

Pénible ¬ Rythme de travail *Z56*

Pénicilline
- Oxacilline
- - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae résistant à la *U80.10!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae résistant
- - - *U80.10!*
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la *U80.11!*
- ¬
- - Allergie à la *T88.7*
- - Antécédents personnels d'allergie à la *Z88.0*
- - Intoxication: *T36.0*

Pénicilliose ¬ *B48.4*

Pénien ¬
- Écoulement *R36*
- Hypospadias *Q54.1*

Pénis
- Latérale) ¬ Courbure du *Q55.6*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q55.6*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Absence acquise du *Z90.7*
- - Absence congénitale du *Q55.5*

Pénis *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Agénésie du *Q55.5*
- - Aplasie du *Q55.5*
- - Candidose du gland du *B37.4†, N51.2**
- - Fracture du *S39.80*
- - Gomme du *A52.7†, N51.8**
- - Herpès du *A60.0†, N51.8**
- - Hypoplasie du *Q55.6*
- - Lésion de la tunique albuginée du corps caverneux du *S39.80*
- - Malformations congénitales du *Q55.6*
- - Mélanome malin du *C60.9*
- - Mycose candidosique du gland du *B37.4†, N51.2**
- - Plaie ouverte du *S31.2*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, N51.8**
- - Tuberculose du *A18.1†, N51.8**

Pénitentiaire ¬ inscription dans: établissement *Z02*

Pénoscrotal ¬
- Hypospadias *Q54.2*
- Transposition *Q55.8*

PENS [nævus épidermiques papulaires avec couche basale en palissade] ¬ Syndrome *Q87.8*

Pensées suicidaires ¬ *R45.8*

Pensionnaires d'établissements de soins ¬ Autres *Z76.4*

Pentalogie de Fallot ¬ *Q21.80*

Pentasomie X ¬ *Q97.1*

Penta-X ¬ *Q97.1*

Pentoses-phosphates ¬ Trouble du métabolisme des *E74.8*

Pentosurie essentielle ¬ *E74.8*

Penttinen ¬ Syndrome de vieillissement prématuré type *E34.8*

PEPD [Paroxysmal extreme pain disorder] ¬ *G90.88*

Peptides C ¬ Concentration réduite de *R79.8*

Peptique
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens ¬ Ulcère *K27.9, Y57.98!*
- Érosion
- - Anastomotique ¬ ulcère (*K28*
- - Gastro-colique ¬ ulcère (*K28*
- - Gastro-intestinal(e) ¬ ulcère (*K28*
- - Gastro-jéjunal(e) ¬ ulcère (*K28*
- - Jéjunal(e) ¬ ulcère (*K28*
- - Marginal(e) ¬ ulcère (*K28*
- - Stomal(e) ¬ ulcère (*K28*
- Origine médicamenteuse ¬ Ulcère *K27.9, Y57.98!*
- SAI ¬ Ulcère: *K27*
- ¬
- - Œsophagite *K21.0*
- - Ulcère de l'œsophage: *K22.1*

Peptostreptococcus ¬ Bactériémie à *A49.87*

Per- et postopératoire ¬ Anémie après hémorragie *D62*

Perçage d'oreilles ¬ *Z41.8*

Perception
- Auditif
- - Anormales ¬ Autres *H93.2*
- - ¬ Trouble de l'élaboration et de la *F80.20*
- Battements cardiaques ¬ *R00.2*
- Générales, autres et non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux *R44.8*
- Hypoglycémie cours
- - Diabète sucré
- - - Type 2 ¬ Trouble de la *E11.60, U69.74!*
- - - ¬ Trouble de la *E14.60, U69.74!*
- - Diabète sucré de type 1 ¬ Trouble de la *E10.60, U69.74!*
- Non syndromique autosomique
- - Dominante type DFNA ¬ Surdité de *H90.3*
- - Récessive type DFNB ¬ Surdité de *H90.3*
- SAI ¬ Surdité (de): *H90.5*
- Simultanée sans fusion ¬ *H53.3*
- ¬ Syndrome
- - Anémie mégaloblastique sensible à la thiamine-diabète sucré-surdité de *Q87.8*
- - Dystrophie cornéenne-surdité de *H18.5, H90.5*

PERCHING ¬ Syndrome de *Q87.8*

Perchloréthylène ¬ *T53.3*

Percin
v./v.a. Malik-Percin

Percreta
- Saignement du post-partum ¬ Placenta *O43.21, O72.0*
- Sans saignement ¬ Placenta *O43.21, O73.0*
- Tant complication de l'accouchement
- - Sans saignement ¬ Placenta *O43.21, O73.0*
- - ¬ Placenta *O43.21*
- ¬ Placenta increta ou *O43.21*

Percussion anormale thoracique(s) ¬ *R09.8*

Pereira
v./v.a. Richieri-Costa-Pereira

Perez ¬ Syndrome cérébrorénale, type *G31.88*

Perforant
- Plantaire syphilitique ¬
- - Mal *A52.1†, L99.8**
- - Tabès avec mal *A52.1†, L99.8**
- - Tabo-paralysie avec mal *A52.1†, L99.8**
- Réactionnelle familiale ¬ Collagénose *L87.1*
- Sclérotique ¬ Blessure non *S05.8*
- Serpigineux ¬ Elastome *L87.2*
- Verruciforme ¬ Collagénome *L87.1*
- ¬
- - Granulome annulaire *L92.0*
- - Insuffisance des veines *I87.20*

Perforante
v./v.a. Artère perforante

Perforation
v./v.a. rupture
- Abcès
- - Indication saignement ¬
- - - Diverticulite de l'intestin grêle sans *K57.12*
- - - Diverticulose de l'intestin grêle sans *K57.10*
- - Saignement ¬
- - - Diverticulite
- - - - Côlon
- - - - - *K57.23*
- - - - - Sans *K57.33*
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec *K57.03*
- - - - - Grêle et du côlon avec *K57.43*
- - - - - Grêle et du côlon sans *K57.53*
- - - - - Grêle sans *K57.13*
- - - - - Siège non précisé, avec *K57.83*
- - - - - Siège non précisé, sans *K57.93*
- - - Diverticulose
- - - - Côlon sans *K57.31*
- - - - Grêle et du colon sans *K57.51*
- - - - Intestin
- - - - - Grêle sans *K57.11*
- - - - - Siège non précisé, sans *K57.91*
- - - Maladie diverticulaire
- - - - Colon avec *K57.23*
- - - - Intestin
- - - - - *K57.83*
- - - - - Grêle avec *K57.03*
- - - - - Grêle et du côlon avec *K57.43*
- - Sans indication saignement ¬
- - - Diverticulite
- - - - Côlon
- - - - - *K57.22*
- - - - - Sans *K57.32*
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec *K57.02*
- - - - - Grêle et du côlon avec *K57.42*
- - - - - Grêle et du côlon sans *K57.52*
- - - - - Siège non précisé, avec *K57.82*
- - - - - Siège non précisé, sans *K57.92*
- - - Diverticulose
- - - - Côlon sans *K57.30*
- - - - Intestin
- - - - - Grêle et du côlon sans *K57.50*
- - - - - Siège non précisé, sans *K57.90*
- - ¬ Maladie diverticulaire
- - - Côlon avec *K57.22*
- - - Intestin
- - - - *K57.82*
- - - - Grêle
- - - - - *K57.02*
- - - - - Côlon avec *K57.42*
- Accidentelle

Perforation *–suite*
- Accidentelle *–suite*
- - Nerf
- - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - Organe
- - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - Vaisseau sanguin
- - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- Bulbe sans protrusion ¬ *S05.6*
- Centrale du tympan ¬ *H72.0*
- Cloison nasale SAI ¬ *J34.8*
- Congénitale
- - Cloison nasale ¬ *Q30.3*
- - Palais ¬ *Q35.9*
- Déchirure
- - Accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ¬ *T81.2*
- - Lésions origine chimique
- - - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- Due
- - Drainage ¬ *T81.2*
- - Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- - S) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire ¬ *T81.5*
- Hémorragie due à la négligence ¬ Incision, ponction, *Y69!*
- Intestin (non traumatique) ¬ *K63.1*

Perforation *–suite*
- Intestinale
- - Périnatale ¬ *P78.0*
- - Spontanée du nouveau-né ¬ *P78.0*
- Marginales du tympan ¬ Autres *H72.2*
- Œsophage ¬ *K22.3*
- Pars flaccida ¬ *H72.1*
- Rupture ¬ Appendicite aiguë péritonite
- - Généralisée (diffuse) après *K35.2*
- - Localisée
- - - *K35.31*
- - - Sans *K35.30*
- S
- - Multiples du tympan ¬ *H72.8*
- - Totale du tympan ¬ *H72.8*
- Syphilitique
- - Congénitale de la voûte palatine ¬ *A50.5†, K93.8**
- - Luette ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Nez ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Palais ¬ *A52.7†, K93.8**
- Traumatique de la vessie ¬ *S37.22*
- Tympan
- - Partie attique ¬ *H72.1*
- - Post-inflammatoire ¬ *H72*
- - Post-traumatique persistante ¬ *H72*
- - Sans précision ¬ *H72.9*
- - ¬ Autres *H72.8*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.2*
- Voies biliaires ¬ *K83.2*
- Voile du palais ¬ *Q35.3*

Perforé
- Tardive de la luette ¬ Syphilis *A52.7†, K93.8**
- ¬ Ulcère
- - Cornée: *H16.0*
- - Syphilitique *A52.7†, L99.8**
- - Typhoïdique *A01.0*

Performance ¬ Baisse de *R53.9*

Perfusion
- Injection thérapeutique ou transfusion ¬ Choc septique après *T80.2, R57.2*
- Transfusion
- - Sans précision ¬ Complication consécutive à une injection thérapeutique, une *T80.9*
- - ¬
- - - Complication
- - - - Consécutives à une injection thérapeutique, une *T80.8*
- - - - Vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une *T80.1*
- - - Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une *T80.0*
- - - Infection consécutif(ve) à injection thérapeutique, *T80.2*
- - - Infections consécutives à une injection thérapeutique, une *T80.2*
- - - Phlébite consécutive à injection thérapeutique, *T80.1*

Perfusion *–suite*
- Transfusion *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réaction
- - - - Due au facteur Rh à l'occasion d'une *T80.4*
- - - - Incompatibilité de groupes sanguins lors d'une *T80.3*
- - - Septicémie consécutif(ve) à injection thérapeutique, *T80.2*
- - - Thrombo-embolie consécutive à injection thérapeutique, *T80.1*
- - - Thrombophlébite consécutive à injection thérapeutique, *T80.1*
- ¬
- - *T80*
- - Ajustement et entretien d'une pompe à *Z45.1*
- - Infection due à un cathéter de *T80.2*
- - Sepsis dû à un cathéter spinal de *T85.72*
- - Septicémie due à un cathéter de *T80.2*

Périadénite muqueuse nécrotique récidivante ¬ *K12.0*

Péri-ampullaire ¬ Carcinome *C26.9*

Périamygdalien ¬
- Abcès *J36*
- Phlegmon *J36*

Périanal
- Cause non traumatique ¬ Hématome *K64.5*
- Tuberculeux ¬ Abcès *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Abcès *K61.0*
- - Carcinome *C44.50*
- - Fistule *K60.3*
- - Hématome *K64.5*
- - Hémorragie *K62.50*
- - Herpès de la peau *A60.1*
- - Infection herpétique *A60.1*
- - Marisques *K64.4*
- - Mélanome malin de la peau *C43.50*
- - Peau
- - - *D03.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Thrombose veineuse *K64.5*

Périapical
- Fistule ¬ Abcès *K04.6*
- SAI ¬ Abcès: *K04.7*
- Sans
- - Fistule ¬ Abcès *K04.7*
- - Précision ¬ Maladies de la pulpe et des tissus *K04.9*
- ¬
- - Granulome apical ou *K04.5*
- - Kyste: *K04.8*

Périartérite
- Atteinte pulmonaire ¬ *M30.1*
- Juvénile ¬ *M30.2*
- Noueux ¬
- - *M30.0*
- - Affections apparentées à la *M30.8*
- - Démence au cours de *M30.0†, F02.8**
- - Glomérulonéphrite au cours de *M30.0†, N08.5**
- - Maladie glomérulaire au cours de *M30.0†, N08.5**
- - Myopathie au cours de *M30.0†, G73.7**
- - Polyneuropathie au cours de *M30.0†, G63.5**

Périarthrite
- Épaule ¬ *M75.0*
- Gonorrhéique ¬ *A54.4†, M73.89**
- Poignet ¬ *M77.2*
- SAI ¬ *M77.9*

Périaxiale ¬ Encéphalite *G37.0*

Péri-axiale concentrique ¬ Encéphalite *G37.5*

Péribronchite tuberculeuse
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.5*
- ¬ *A16.4*

Péricarde
- Hernie diaphragmatique congénitale ¬ Anomalie congénitale du *Q24.8, Q79.0*
- Méningocoques ¬ Infection du *A39.5†, I32.0**
- Rhumatismale ¬ Adhérence du *I09.2*
- Sans précision ¬ Maladie du *I31.9*
- ¬
- - *C38.0*
- - Absence congénitale du *Q24.8*
- - Adhérence
- - - *I31.0*
- - - Focale post-infectieuse du *I31.88*
- - - Tuberculeuse du *A18.8†, I32.0**
- - Anomalie congénitale
- - - Complète du *Q24.8*
- - - Partielle du *Q24.8*
- - Calcification du *I31.1*
- - Gomme du *A52.0†, I32.0**
- - Malformation congénitale
- - - *Q24.8*
- - - *Q24.8*
- - Mésothéliome du *C45.2*
- - Rupture du *I21.9*
- - Tuberculose de *A18.8†, I32.0**
- - Tumeur maligne secondaire du *C79.83*

Péricardique
- Aigu ¬ épanchement *I30*
- Focale ¬ Adhérence *I31.88*
- Non inflammatoire) ¬ Épanchement *I31.3*
- Primitif ¬ Mésothéliome *C45.2*
- ¬

Péricardique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Épanchement *I31.3*
- - Fibrose *I31.88*
- - Induration *I31.88*
- - Mésothéliome *C45.2*
- - Tamponnade *I31.80*

Péricardite
- Adhésif
- - Chronique ¬ *I31.0*
- - ¬ Médiastino- *I31.0*
- Aiguë
- - Sans précision ¬ *I30.9*
- - ¬ Autres formes de *I30.8*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, I32.1**
- CACP] ¬ Syndrome de camptodactylie-arthropathie-coxa vara- *M12.80*
- Chronique) SAI ¬ *I31.9*
- Constrictive chronique ¬ *I31.1*
- Cours
- - Lupus érythémateux disséminé
- - - Enfant ¬ *M32.1†, I32.8**
- - - ¬ *M32.1†, I32.8**
- - Maladies
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *I32.0**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *I32.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *I32.8**
- - Polyarthrite séropositive chronique ¬ *M05.30†, I32.8**
- Gonocoques ¬ *A54.8†, I32.0**
- Idiopathique aiguë non spécifique ¬ *I30.0*
- Infectieuse ¬ *I30.1*
- Leucémique ¬ *C95.90†, I32.8**
- Méningocoques ¬ *A39.5†, I32.0**
- Pneumocoques ¬ *I30.1, B95.3!*
- Purulente ¬ *I30.1*
- Récurrente idiopathique ¬ *I09.2*
- Rhumatismal
- - Chronique ¬
- - - *I09.2*
- - - Médiastino- *I09.2*
- - ¬ *I01.0*
- Staphylocoques ¬ *I30.1, B95.8!*
- Streptocoques ¬ *I30.1, B95.5!*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I32.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I32.0**
- Urémique ¬ *N18.89†, I32.8**
- Virale ¬ *I30.1*
- Virus Coxsackie ¬ *B33.2†, I32.1**
- ¬
- - Arthrite rhumatismal
- - - Aiguë avec *I01.0*
- - - Subaiguë avec *I01.0*
- - Rhumatisme articulaire avec *I01.0*

Péricholangiolite ¬ *K83.09*

Périchondrite
- Auriculaire ¬ *H61.0*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Oreille externe ¬ *H61.0*
- Pavillon de l'oreille ¬ *H61.0*
- Syphilitique tardive du larynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tuberculeuse avec confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.5*
- ¬ Syphilis du larynx avec *A52.7†, J99.8**

Péricoronarite
- Aiguë ¬ *K05.2*
- Chronique ¬ *K05.3*

Péri-endocardite aiguë ou subaiguë ¬ *I33.9*

Périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ Folliculite et *L66.3*

Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens] ¬ Maladie de Hoffmann [folliculitis et *L66.3*

Périhépatite
- Chlamydia ¬ *A74.8†, K67.0**
- Gonorrhéique ¬ *A54.8†, K67.1**

Péri-implantaire par dispositif d'ostéosynthèse interne ¬ Infection *T84.6*

Périlymphatique ¬ Surdité mixte liée à l'X avec fistule *H90.8*

Périmandibulaire ¬ Abcès *K12.28*

Périménopause
- Sans précision ¬ Trouble de la ménopause et de la *N95.9*
- ¬ Autres troubles précisés de la ménopause et de la *N95.8*

Périnatal
- Accouchement ¬ Infection d'une suture: *O86.0*
- Appareil digestif, sans précision ¬ Affection *P78.9*
- Fatale ¬
- - Glycogénose
- - - Déficit en enzyme branchante, forme neuromusculaire *E74.0*
- - - Type 4, forme neuromusculaire *E74.0*
- - GSD
- - - Déficit en enzyme branchante, forme neuromusculaire *E74.0*
- - - Type 4, forme neuromusculaire *E74.0*
- Intéressant
- - Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Légère au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Lèvres au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Peau au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Vulve au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- Létale ¬ Maladie de Gaucher *E75.2*

Périnatal *–suite*
- O70
- - 0 intéressant
- - - Muscle
- - - - Périnée au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.1*
- - - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.1*
- - - Plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.1*
- - 1 intéressant
- - - Cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.2*
- - - Sphincter
- - - - Anal au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.2*
- - - - SAI au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.2*
- - 2 intéressant muqueux
- - - Anale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.3*
- - - Rectale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.3*
- Précisées de l'appareil digestif ¬ Autres affections *P78.8*
- Sans précision ¬
- - Affection
- - - Cardio-vasculaire survenant pendant la période *P29.9*
- - - Dont l'origine se situe dans la période *P96.9*
- - - Hématologique de la période *P61.9*
- - Infection spécifique de la période *P39.9*
- Tuberculeuse ¬ Fistule *A18.1†, N37.8**
- ¬
- - Affections
- - - Apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période *P25.8*
- - - Cardio-vasculaires survenant pendant la période *P29.8*
- - - Hématologiques précisées de la période *P61.8*
- - - Précisées dont l'origine se situe dans la période *P96.8*
- - Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période *Z87.6*
- - Douleur pelvienne et *R10.2*
- - Emphysème interstitiel survenant pendant la période *P25.0*
- - Fistule: urétro- *N36.0*
- - Hémorragie pulmonaire
- - - Massive survenant pendant la période *P26.1*
- - - Non précisée survenant pendant la période *P26.9*
- - - Survenant pendant la période *P26.8*
- - Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période *P26.0*

Périnatal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hypoxie *P21.9*
- - Infections spécifiques précisées de la période *P39.8*
- - Insuffisance *N81.8*
- - Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période *P27.9*
- - Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période *P27.8*
- - Malformation anorectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec fistule *Q42.2*
- - Perforation intestinale *P78.0*
- - Pneumomédiastin survenant pendant la période *P25.2*
- - Pneumopéricarde survenant pendant la période *P25.3*
- - Pneumothorax survenant pendant la période *P25.1*

Périnéal ¬ Hypospadias *Q54.3*

Périnée
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: muscles du: *O70.1*
- Deuxième degré ¬ Déchirure obstétricale du *O70.1*
- Malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du *Q87.8*
- Premier degré ¬ Déchirure obstétricale du *O70.0*
- Quatrième degré ¬ Déchirure obstétricale du *O70.3*
- Rigide ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- Sans précision ¬
- - Affection non inflammatoire de la vulve et du *N90.9*
- - Déchirure obstétricale du *O70.9*
- Troisième degré ¬ Déchirure obstétricale du *O70.2*
- Vagin et de vulve au cours de la grossesse ¬ Varices de *O22.1*
- Vulve ¬ Soins maternels pour: intervention chirurgicale antérieure sur le *O34.7*
- ¬
- - *C49.5*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *S31.0*
- - *T21*
- - Affections non inflammatoires précisées de la vulve et du *N90.8*
- - Basaliome du *C44.50*
- - Carcinome de la peau du *C44.50*
- - Déchirure secondaire du *O90.1*
- - Hématome obstétrical de: *O71.7*
- - Mélanome malin du *C43.59*
- - Rupture suture

Périnée *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Rupture suture *–suite*
- - - Déchirure du *O90.1*
- - - Obstétricale du *O90.1*
- - Soin maternels
- - - Anomalies de la vulve et du *O34.7*
- - - Fibrose du *O34.7*

Périnéo-vaginale ¬ Fistule: *N82.5*

Périnéphrétique
- Shunt pulmonaire] ¬ Syndrome TEMPI [télangiectasie-érythrocytose-gammopathie monoclonale-épanchements *D47.2*
- Tuberculeux ¬ Abcès *A18.1†, N29.1**

Périneuriome
- Extraneural ¬ *D36.1*
- Intraneural ¬ *D36.1*
- Réticulé ¬ *D36.1*
- Sclérosant ¬ *D36.1*

Périnévrite optique idiopathique ¬ *H46*

Périoculaire
v./v.a. Région périoculaire

Période
- Attente pour investigation et traitement ¬ Autre *Z75.2*
- Croissance rapide de l'enfance ¬ Examen à la *Z00.2*
- Dilatation] ¬ Prolongation de la première *O63.0*
- Expulsion] ¬ Prolongation de la deuxième *O63.1*
- Néonatale ¬ Autres affections transitoires de la coagulation pendant la *P61.6*
- Off de la maladie de Parkinson ne répondant pas aux traitements par voie orale ¬ *G20.91*
- Périnatal
- - Sans précision ¬
- - - Affection
- - - - Cardio-vasculaire survenant pendant la *P29.9*
- - - - Dont l'origine se situe dans la *P96.9*
- - - - Hématologique de la *P61.9*
- - - Infection spécifique de la *P39.9*
- - ¬
- - - Affections
- - - - Apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la *P25.8*
- - - - Cardio-vasculaires survenant pendant la *P29.8*
- - - - Hématologiques précisées de la *P61.8*
- - - - Précisées dont l'origine se situe dans la *P96.8*
- - - Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la *Z87.6*
- - - Emphysème interstitiel survenant pendant la *P25.0*
- - - Hémorragie pulmonaire
- - - - Massive survenant pendant la *P26.1*

Période *–suite*
- Périnatal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hémorragie pulmonaire *–suite*
- - - - Non précisée survenant pendant la *P26.9*
- - - - Survenant pendant la *P26.8*
- - - Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la *P26.0*
- - - Infections spécifiques précisées de la *P39.8*
- - - Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la *P27.9*
- - - Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la *P27.8*
- - - Pneumomédiastin survenant pendant la *P25.2*
- - - Pneumopéricarde survenant pendant la *P25.3*
- - - Pneumothorax survenant pendant la *P25.1*
- Vie ¬ Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes *Z60*
- ¬
- - Eclampsie, sans précision quant à la *O15.9*
- - Hémorragie de la délivrance (troisième *O72.0*

Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS] ¬ *G25.80*

Périodontal
- Latéral ¬ Kyste: *K09.0*
- Localisée ¬ Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection *K08.1*
- Sans précision ¬ Maladie *K05.6*
- ¬
- - Abcès: *K05.2*
- - Kyste: apical (*K04.8*
- - Maladies *K05.5*

Périodontite
- Aiguë ¬ *K05.2*
- Apical
- - Aiguë
- - - Origine pulpaire ¬ *K04.4*
- - - SAI ¬ *K04.4*
- - Chronique ¬ *K04.5*
- - SAI ¬ *K04.5*
- Chronique ¬ *K05.3*
- Complexe ¬ *K05.3*
- Kératodermie palmoplantaire [HOPP] ¬ Syndrome d'hypotrichose-ostéolyse- *Q82.8*
- SAI ¬ *K05.3*
- Simple ¬ *K05.3*

Périodontopathie
v./v.a. palmoplantaire-périodontopathie
v./v.a. palmoplantaire-périodontopathie-onychogrypose

Périonyxis
- Candida ¬ *B37.2*
- ¬ *L03.0*

Périorale
- Absence] ¬ POMA [Myoclonie *G40.3*
- ¬ Dermite *L71.0*

Périoste ¬
- Syphilis congénitale du *A50.0†, M90.19**
- Syphilis secondaire du *A51.4†, M90.19**
- Syphilis tardive du *A52.7†, M90.19**

Périostéite et pustulose ¬ Ostéomyélite stérile multifocale avec *M86.30*

Périostite
- Cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs ¬ *M90.1**
- Gommeuse du pian (tardif) ¬ Ostéite ou *A66.6*
- Gonorrhéique ¬ *A54.4†, M90.19**
- Hypertrophique) du pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*
- Mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*
- Orbite ¬ *H05.0*
- SAI ¬ *M86.9*
- Syphilitique
  - Congénitale
    - Précoce ¬ *A50.0†, M90.19**
    - ¬ *A50.0†, M90.19**
  - Secondaire ¬ *A51.4†, M90.19**
  - Tardive ¬ *A52.7†, M90.19**
  - ¬ *A52.7†, M90.19**
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M90.09**

Péripapillaire
- Hélicoïdale ¬ Dégénérescence choriorétinienne *H31.2*
- ¬
  - Dystrophie choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée) (*H31.2*
  - Staphylome *H15.8*

Péripharyngé ¬ Abcès *J39.0*

Périphérique
v./v.a. Type de maladie

Périphlébite
- Ombilicale ¬ *I80.88*
- ¬ *I80*

Péri-radiculaire ¬ Kyste *G54.8*

Périrectal
- Tuberculeuse ¬ Fistule *A18.3†, K93.0**
- Tuberculeux ¬ Abcès *A18.3†, K93.0**
- ¬ Abcès *K61.1*

Périrénal ¬ Abcès *N15.11*

Périsplénite ¬ *D73.8*

Péristaltisme apparent ¬ *R19.2*

Périsylvienne ¬ Polymicrogyrie bilatérale *Q04.3*

Péritoine
- Œufs d'helminthes NCA ¬ Granulome du *B83.9†, K67.8**
- Pariétal
  - Pelvien) ¬ *C45.1*
  - ¬

Péritoine *–suite*
- Pariétal *–suite*
  - ¬ *–suite*
    - *C48.1*
    - Mésothéliome du *C45.1*
- Pelvien ¬
  - *C48.1*
  - Endométriose du *N80.3*
  - Mésothéliome du *C45.1*
- Sans précision ¬
  - Maladie du *K66.9*
  - Tumeur maligne: *C48.2*
- ¬
  - *D17.7*
  - Abcès tuberculeux du *A18.3†, K67.3**
  - Carcinome séreux/papillaire primitif du *C48.2*
  - Inflammation gonorrhéique du *A54.8†, K67.1**
  - Kyste chyleux du *I89.8†, K67.8**
  - Lésion traumatique: *S36.81*
  - Maladies précisées du *K66.8*
  - Mésothéliome kystique du *D19.1*
  - Syphilis congénitale du *A50.0†, K67.2**
  - Syphilis du *A52.7†, K67.2**
  - Tératome du *D48.4*
  - Tumeur
    - Adénomatoïde du *D19.1*
    - Fibreuse solitaire bénigne du *D20.1*
    - Mésothéliale papillaire bien différenciée du *D19.1*
  - Tumeur bénigne
    - *D20.1*
    - Tissu mésothélial du *D19.1*
  - Tumeur desmoplastique à petites cellules du *C48.2*
  - Tumeur maligne
    - Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du *C48.8*
    - Parties précisées du *C48.1*
    - Secondaire du rétropéritoine et du *C78.6*
  - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D48.4*

Péritonéal
v./v.a. rétro-péritonéal
- Actes médicaux ¬ Adhérences pelvi- *N99.4*
- Brides), avec occlusion intestinale ¬ Adhérences *K56.5*
- Cours de maladies infectieuses classées ailleurs ¬ Autres atteintes *K67.8**
- Disséminée ¬ Léiomyomatose *D20.1*
- Femme ¬ Adhérences pelvi- *N73.6*
- Malin ¬ Mésothéliome *C45.1*
- Organes génito-urinaires ¬ Infection à Chlamydia, pelvi- *A56.1*
- Primaire ¬ Carcinome *C48.2*
- Tuberculose bovine contagieuse ¬ Bacillose *A18.3†, K93.0**

Péritonéal *–suite*
- ¬
  - Abcès: *K65.09*
  - Adhérence
    - *K66.0*
    - Brides] congénitales: *Q43.3*
  - Appendicite aiguë avec abcès *K35.32*
  - Carcinomatose *C78.6*
  - Dialyse *Z49.2*
  - Épanchement *R18*
  - Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse *T85.71*
  - Mésothéliome *C45.1*
  - PMP [Pseudomyxome *C78.6*
  - Résultats anormaux de: liquide *R85*
  - Tuberculose
    - *A18.3†, K93.0**
    - Ganglions lymphatiques *A18.3†, K93.0**

Péritonite
- Aiguë
  - Éosinophiles ¬ *K65.09*
  - Généralisée ¬ *K65.0*
  - Pelvienne, chez l'homme ¬ *K65.09*
  - Sans précision ¬ *K65.09*
  - Septique ¬ *K65.0*
  - Sous-phrénique ¬ *K65.09*
- Aseptique ¬ *T81.6*
- Bactérienne spontanée [PBS] (aiguë) ¬ *K65.00*
- Candida ¬ *B37.88†, K67.8**
- Candidosique ¬ *B37.88†, K67.8**
- Chimique ¬ *T81.6*
- Chlamydia ¬ *A74.8†, K67.0**
- Diphtérique ¬ *A36.8†, K67.8**
- Due
  - Bile ¬ *K65.8*
  - Prolifération chronique ¬ *K65.8*
  - Urine ¬ *K65.8*
- Éosinophiles ¬ *K65.8*
- Généralisée
  - Diffuse) après perforation ou rupture ¬ Appendicite (aiguë) avec *K35.2*
  - ¬ Appendicite aiguë avec *K35.2*
- Gonocoques ¬ *A54.8†, K67.1**
- Localisée
  - Généralisée ¬ Appendicite aiguë, sans mention de *K35.8*
  - Perforation ou rupture ¬ Appendicite aiguë avec *K35.31*
  - Sans perforation ni rupture ¬ Appendicite aiguë avec *K35.30*
- Méconiale ¬ *P78.0*
- Néonatale
  - SAI ¬ *P78.1*
  - ¬ *P78.1*
- Néonatales ¬ Autres *P78.1*
- Paroxystique

Péritonite *–suite*
- Paroxystique *–suite*
- - Bénigne ¬ *E85.0*
- - Familiale ¬ *E85.0*
- Pelvienne survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Prolifération chronique ¬ *K65.8*
- Sans précision ¬ *K65.9*
- Syphilitique
- - Congénitale
- - - Précoce ¬ *A50.0†, K67.2**
- - - ¬ *A50.0†, K67.2**
- - Tardive ¬ *A52.7†, K67.2**
- - ¬ *A52.7†, K67.2**
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K67.3**
- Typhoïdique ¬ *A01.0*
- ¬
- - *K65.8*
- - Diverticulite du côlon et de l'intestin grêle, avec *K57.4*

Périurétral
- Atteinte de l'urètre ¬ Déchirure *O71.5*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture des tissus *O70.0*
- Glandes annexes ¬ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès *A54.1*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): tissu *O08.6*
- Tant que lésion due à l'accouchement chez la mère ¬ Lacération du tissu *O70.0*
- ¬ Abcès (de): *N34.0*

Périvasculaires ¬ Tumeur des cellules épithélioïdes *D48.1*

Périvascularite
- Rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- Rétinienne idiopathique ¬ *H35.0*

Périventriculaire
- Acquis du nouveau-né ¬ Kystes *P91.1*
- Néonatale ¬ Leucomalacie *P91.2*
- ¬
- - Hétérotopie nodulaire *Q04.8*
- - Syndrome d'Ehlers-Danlos avec hétérotopie *Q79.6*

Périvésical ¬ Abcès *N30.88*

Perlèche
- Cours de carence en vitamine B2 ¬ *E53.0†, K93.8**
- ¬ *K13.0*

Perles d'Epstein ¬ *K09.8*

Perlman ¬ Syndrome de *Q87.3*

Perméabilité
- Canal artériel ¬ *Q25.0*
- Canal de Botal ¬ *Q25.0*
- Ostium secundum ¬ *Q21.1*
- Persistance de: foramen ovale ¬ *Q21.1*

Perméables ¬ Utérus bicorne bicervical avec col et vagin *Q51.3*

Permis de conduire ¬ inscription dans: obtention du *Z02*

Pernicieuse
v./v.a. Anémie pernicieuse

Pérodactylie-séquence de Robin ¬ Syndrome d'extrasystoles ventriculaires avec syncopes- *Q87.8*

Péroné
- Cubitus-anomalies rénales ¬ Syndrome d'hypoplasie *Q87.8*
- Impliquant
- - Cheville ¬ *S82.6*
- - Malléole ¬ *S82.6*
- Polydactylie en miroir du pied ¬ Syndrome de duplication du *Q74.8*
- Seul
- - Diaphyse ¬ Fracture du *S82.42*
- - Multiple ¬ Fracture du *S82.49*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Fracture du *S82.40*
- - - Proximale ¬ Fracture du *S82.41*
- Toute partie ¬ Fracture
- - Diaphyse du tibia: Avec fracture du *S82.21*
- - Extrémité inférieure du tibia: Avec fracture du *S82.31*
- - Extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du *S82.11*
- ¬
- - Dysplasie ostéofibreuse du *D16.2*
- - Extrémité inférieure de: *S93.0*
- - Incurvation congénitale du tibia et du *Q68.4*
- - Ostéoblastome du *D16.2*
- - Ostéochondrite juvénile du *M92.5*
- - Ostéosarcome du *C40.2*
- - Raccourcissement longitudinal du *Q72.6*
- - Sarcome d'Ewing du *C40.2*
- - Sarcome du *C40.2*

Péroné-brachydactylie ¬ Syndrome d'aplasie du *Q73.8*

Péroné-ectrodactylie ¬ Syndrome d'aplasie du *Q73.8*

Péronéo
v./v.a. fémoro-péronéo-cubital

Péronier
- Collatéral
- - Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament externe [Lig. *M23.94*
- - ¬
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament externe [Lig. *M23.54*
- - - Lésions internes du genou: Ligament externe [Lig. *M23.84*
- Ligament latéral ¬ Entorse foulure Ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral *S83.43*
- - Distorsion du ligament latéral *S83.41*
- Neurogénique type Kaeser ¬ Syndrome scapulo- *G12.1*

Péronier *–suite*
- Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) *S86.3*
- Type axonal) (type hypertrophique) ¬ Amyotrophie *G60.0*
- ¬
- - Agénésie *Q72.6*
- - Hémimélie *Q72.6*
- - Paralysie du nerf *G57.3*
- - Syndrome scapulo- *G71.08*
- - Tendinite *M76.7*

Peroxysomale
- Associée
- - DNM1L ¬ Encéphalopathie par défaut de fission mitochondriale et *G31.81*
- - MFF ¬ Encéphalopathie par défaut de fission mitochondriale et *G31.81*
- ¬
- - Anomalie de la bêta-oxydation *E71.3*
- - Déficit en alanine-glyoxylate aminotransférase *E74.8*
- - Encéphalopathie par défaut de fission mitochondriale et *G31.81*
- - Syndrome de Zellweger-like sans anomalies *Q87.8*

Perpuéralité ¬ Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la *O26.68*

Perrault
- Type
- - 1 ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - 2 ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Perroquets ¬ Fièvre des *A70*

Perruches ¬ Poumon des éleveurs de *J67.20*

Perry ¬ Syndrome de *G20.90*

Persécution ¬ Cible d'une discrimination ou d'une *Z60*

Persistance
- Arc aortique droit ¬ *Q25.4*
- Canal
- - Omphalo-mésentérique ¬ *Q43.0*
- - Thyréoglosse ¬ *Q89.2*
- - Vitellin ¬ *Q43.0*
- Canal artériel
- - Bicuspidie valvulaire aortique-anomalie des mains ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - Familiale ¬ *Q25.0*
- - ¬
- - - *Q25.0*
- - - Syndrome d'agénésie de la valve pulmonaire-septum ventriculaire intact- *Q22.3, Q25.0*
- Canaux de Müller ¬ Syndrome de *Q55.8*
- Cinquième arc aortique ¬ *Q25.4*
- Circulation fœtale ¬ *P29.3*
- Cloaque ¬ *Q43.7*
- Convolution de l'arc aortique ¬ *Q25.4*
- Familiale hémoglobine fœtale

Persistance *–suite*
- Familiale hémoglobine fœtale *–suite*
- - Bêta-thalassémie ¬ Syndrome de *D56.4*
- - Drépanocytose ¬ Syndrome de *D56.4, D57.1*
- Foramen ovale ¬ Perméabilité ou *Q21.1*
- Héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF] ¬ *D56.4*
- Kyste de la poche de Blake ¬ *Q03.1*
- Lanugo ¬ *Q84.2*
- Lobulations spléniques ¬ *Q89.08*
- Notochorde ¬ Syndrome d'agénésie sacrée-ossification anormale des corps vertébraux- *Q79.8*
- Ostium
- - Primum (type I) ¬ *Q21.2*
- - Secundum ¬ *Q21.1*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Position occipito
- - Iliaque ¬ Dystocie due à la *O64.0*
- - Postérieure ¬ Dystocie due à la *O64.0*
- - Sacrée ¬ Dystocie due à la *O64.0*
- - Transverse ¬ Dystocie due à la *O64.0*
- Réflexes tendineux ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: *G11.1*
- Sinus uro-génital
- - Femme ¬ *Q52.8*
- - Homme ¬ *Q55.8*
- Tronc artériel ¬ *Q20.0*
- Veine
- - Cardinale postérieure gauche ¬ *Q26.8*
- - Cave supérieure gauche
- - - Abouchement dans l'oreillette gauche via le sinus coronaire ¬ *Q26.1*
- - - ¬
- - - - *Q26.1*
- - - - Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec communication interatriale, séquence de Robin et *Q87.8*

Persistant
v./v.a. Type de maladie

Personnalité
- Affective ¬ *F34.0*
- Agressive ¬ (Trouble de la) *F60.30*
- Amorale ¬ *F60.2*
- Anankastique ¬ *F60.5*
- Antisociale ¬ *F60.2*
- Anxieuse [évitante] ¬ *F60.6*
- Asociale ¬ *F60.2*
- Captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment ¬ Modification de la *F62.0*
- Comportement
- - A une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision ¬ Trouble organique de la *F07.9*
- - Adulte
- - - Sans précision ¬ Trouble de la *F69*
- - - ¬ Autres troubles précisés de la *F68.8*

Personnalité *–suite*
- Comportement *–suite*
- - Dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux ¬ Autres troubles organiques de la *F07.8*
- Compulsive ¬ (Trouble de la) *F60.5*
- Conduite d'échec ¬ Trouble de la *F60.7*
- Cycloïde ¬ *F34.0*
- Cyclothymique ¬ *F34.0*
- Dépendant
- - Asthénique) ¬ Trouble de la *F60.7*
- - ¬ *F60.7*
- Dépressive ¬ *F34.1*
- Désastres ¬ Modification de la *F62.0*
- Dyssociale ¬ *F60.2*
- Émotionnellement labile
- - Type
- - - Borderline ¬ *F60.31*
- - - Impulsif ¬ *F60.30*
- - ¬ *F60.3*
- Excentrique ¬ *F60.8*
- Expansive-paranoïaque ¬ (Trouble de la) *F60.0*
- Expérience
- - Camp de concentration ¬ Modification de la *F62.0*
- - Catastrophe ¬ Modification durable de la *F62.0*
- Exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la *F62.0*
- Fanatique ¬ (Trouble de la) *F60.0*
- Histrionique ¬ *F60.4*
- Hystérique ¬ (Trouble de la) *F60.4*
- Immature ¬ *F60.8*
- Inadéquate ¬ Trouble de la *F60.7*
- Irritable (explosive) ¬ (Trouble de la) *F60.30*
- Liée à un syndrome algique chronique ¬ Modification durable de la *F62.80*
- Maladie psychiatrique ¬ Modification durable de la *F62.1*
- Multiple ¬ (Trouble de) *F44.81*
- Narcissique ¬ *F60.8*
- Paranoïaque ¬ Trouble
- - *F60.0*
- - *F60.0*
- Passive
- - Agressive ¬ *F60.8*
- - ¬ Trouble de la *F60.7*
- Pathologique SAI ¬ *F60.9*
- Pseudopsychopathique organique ¬ *F07.0*
- Psycho-infantile ¬ (Trouble de la) *F60.4*
- Psycho-névrotique ¬ *F60.8*
- Psychopathique ¬ *F60.2*
- Quérulente ¬ (Trouble de la) *F60.0*
- Sans précision ¬
- - Modification durable de la *F62.9*

Personnalité *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Trouble de la *F60.9*
- Schizoïde ¬ *F60.1*
- Schizotypique ¬ *F21*
- Sensitive paranoïaque ¬ (Trouble de la) *F60.0*
- Sociopathique ¬ *F60.2*
- Torture ¬ Modification de la *F62.0*
- Troubles de la personnalité ¬ Troubles mixtes de la *F61*
- Type «haltlose» ¬ Trouble de la *F60.8*
- ¬
- - Accentuation de certains traits de la *Z73*
- - Modification durables
- - - *F62.8*
- - - *F62.88*
- - Trouble organique de la *F07.0*
- - Troubles
- - - Mixtes de la personnalité et autres troubles de la *F61*
- - - Spécifiques de la *F60.8*

Personne
- Âgée
- - 0-3 points ¬ DIA-S [Échelle de dépression] chez la *U54.01*
- - 4 points et plus ¬ DIA-S [Échelle de dépression] chez la *U54.11*
- - ¬ Tendance aux chutes chez la *R29.6*
- Âgées ¬ Lymphome B diffus à grandes cellules positif au virus Epstein-Barr [EBV] chez les *C83.3*
- Atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une *Z29.0*
- Attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté ¬ *Z75.8*
- Bonne santé accompagnant un sujet malade ¬ *Z76.3*
- Consultant pour le compte d'un tiers ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- Dépendante pendant un congé de ses proches ¬ Prise en charge d'une *Z75.8*
- Donne soin
- - Sans précision ¬ Difficulté liée à une dépendance envers la *Z74.9*
- - ¬ Autres difficultés liées à une dépendance envers la *Z74.8*
- Léser ou de tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre *Y09.9!*
- Vivant seule ¬ *Z60*

Perte
- Appétit
- - Psychogène ¬ *F50.8*
- - ¬ *R63.0*
- Auditif
- - Brutale SAI ¬ *H91.2*

Perte *–suite*
- Auditif *–suite*
- - Due au bruit ¬ *H83.3*
- - Neurosensoriel
- - - Aigüe brutale due à un traumatisme acoustique ¬ *H83.3*
- - - Aiguë due à une surdité brusque ¬ *H91.2*
- - - Malformations de la colonne vertébrale ¬ Syndrome de déficit congénital combiné en hormones hypophysaires, associé à une *E23.0*
- - - Postopératoire ¬ *H95.8*
- Audition
- - Conduction SAI ¬ *H90.2*
- - Neurosensorielle SAI ¬ *H90.5*
- - Ototoxicité ¬ *H91.0*
- - Sans précision ¬ *H91.9*
- Connaissance
- - 30 minutes
- - - 24 heures lors d'un traumatisme cranio-cérébral ¬ *S06.9, S06.71!*
- - - Lors d'un traumatisme cranio-cérébral ¬ *S06.9, S06.70!*
- - Coma lors traumatisme cranio-cérébral
- - - 30 minutes
- - - - 24 heures ¬ *S06.71!*
- - - - ¬ *S06.70!*
- - - Durée non précisée ¬ *S06.79!*
- - - Plus 24 heures
- - - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ *S06.72!*
- - - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ *S06.73!*
- - Lors de traumatisme cranio-cérébral ¬ *S06.9, S06.79!*
- - Plus 24 heures
- - - Retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un traumatisme cranio-cérébral ¬ *S06.9, S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un traumatisme cranio-cérébral ¬ *S06.9, S06.73!*
- - ¬ *R55*
- Conscience SAI ¬ *R40.2*
- Cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec *L89.1*
- Dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée ¬ *K08.1*
- Désir sexuel ¬ Absence ou *F52.0*
- Emploi ¬ Menace de *Z56*
- Entérales de protéines ¬ *K92.8*
- Estime de soi pendant l'enfance ¬ Événements ayant entraîné la *Z61*
- Fonction du labyrinthe ¬ *H83.2*
- Force ¬ *R53.9*
- Greffe
- - Fascio-cutanée ¬ *T86.52*
- - Lipocutanée ¬ *T86.52*
- - Mammaire avec partie cutanée ¬ *T86.52*

Perte *–suite*
- Greffe *–suite*
- - Myocutanée ¬ *T86.52*
- - Peau ¬ *T86.52*
- Hydrique ¬ Épuisement dû à la chaleur avec *T67.3*
- Hydrosodées par la chaleur ¬ Syndrome de *T67.8*
- Irréversible de la fonction cérébrale ¬ *G93.88*
- Isolée de magnésium par les reins ¬ *E83.4*
- Membre
- - Intervention chirurgicale ¬ *Z89*
- - Post-traumatique ¬ *Z89*
- Mémoire épisodique ¬ Leucoencéphalopathie à *G93.4*
- Partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique ¬ *Z90*
- Partielle des osselets ¬ *H74.3*
- Poids
- - Anormale ¬ *R63.4*
- - Chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou affaissée: après une *L98.7*
- - ¬
- - - Affaissement de la peau du visage après une *L98.7*
- - - Anorexie mental
- - - - Mesures de *F50.01*
- - - - Sans mesures de *F50.00*
- - - Maladie due au VIH avec *B22, R64*
- Précisées de l'audition ¬ Autres *H91.8*
- Protéine ¬
- - Entéropathie avec *K90.4*
- - Syndrome CHAPLE [hyperactivation du complément-thrombose-entéropathie avec *D84.1*
- Relation affective pendant l'enfance ¬ *Z61*
- Sang
- - Chronique) ¬ Anémie par carence en fer secondaire à une *D50.0*
- - Fœtal
- - - Due
- - - - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ *P50.0*
- - - - Rupture du cordon ¬ *P50.1*
- - - Niveau de la section du cordon d'un jumeau ¬ *P50.5*
- - - Origine placentaire ¬ *P50.2*
- - - Sans précision ¬ *P50.9*
- - - ¬
- - - - *P50.8*
- - - - Anémie congénitale par *P61.3*
- Sel
- - Eau) ¬ Prostration due à la chaleur avec *T67.4*
- - ¬
- - - Épuisement dû à la chaleur avec *T67.4*

Perte *–suite*
- Sel *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase classique avec *E25.00*
- - - Syndrome adrénogénital avec *E25.0*
- Subite de la vision ¬ *H53.1*
- Tissu intraoculaire ¬ Lacération
- - Oculaire sans protrusion ou *S05.3*
- - Rupture oculaires avec protrusion ou *S05.2*
- Vitalité ¬ *R53.9*
- Voix ¬ *R49.1*

Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé- *M91.1*

Perthes-Jüngling ¬
- Maladie de *D86.8*
- Ostéite de *D86.8*

Perturbation
- Activité et de l'attention ¬ *F90.0*
- Iris et du corps ciliaire ¬ Autres adhérences et *H21.5*
- Physiologiques et à des facteurs physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés associés à des *F59*
- Psychologique ¬
- - Hyperphagie associée à d'autres *F50.4*
- - Vomissements associés à d'autres *F50.5*

Pertussis
- Bordetella pertussis ¬ *A37.0*
- ¬
- - *A37.1*
- - Coqueluche à Bordetella *A37.0*
- - Pertussis à Bordetella *A37.0*

Pes
- Planus] (acquis) ¬ Pied plat [*M21.4*
- Transversus acquis ¬ *M21.63*

Pessaire
- Contraceptif (intra-utérin) ¬ *Z97.8*
- ¬ Ulcère du vagin dû à un *N89.8*

Peste
- Abortive ¬ *A20.8*
- Asymptomatique ¬ *A20.8*
- Bubonique ¬ *A20.0*
- Cutanée ¬ *A20.1*
- Méningée ¬ *A20.3†, G01**
- Mineure ¬ *A20.8*
- Pulmonaire ¬ *A20.2*
- Septicémique ¬ *A20.7*
- ¬
- - *A20.9*
- - Formes de *A20.8*
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.3*

Pesticide
- Sans précision ¬ Effet toxique: *T60.9*
- ¬

Pesticide *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Effet toxique: Autres *T60.8*
- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- - Intoxication par *T60.9*

Pestis [Yersinia pestis] ¬ Infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. *A20*

Pétéchiale due à un syndrome de sensibilisation aux érythrocytes ¬ Hémorragie *D69.2*

Pétéchies
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- ¬ *R23.3*

Peter ¬ Anomalie de *Q13.4*

Peters plus ¬ Syndrome de *Q13.4*

Peters-nanisme ¬ Syndrome d'anomalie de *Q13.4*

Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire] ¬ Poïkilodermie généralisée type *L94.5*

Petges-Cléjat-Jacobi ¬ Syndrome de *M33.1*

Péthidine ¬ *T40.4*

Petite taille
- Âge gestationnel ¬ *P05.1*
- Âge osseux avancé-arthrose précoce ¬ Syndrome de *Q79.8*
- Anomalies
- - Ectodermiques-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de dysplasie cranio-faciale- *Q87.0*
- - Hypophysaires et cérébelleuses-selle turcique anormale ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - Membres associé à DONSON ¬ Spectre microcéphalie- *Q87.1*
- - Vertébrales ¬ Syndrome de fente palatine- *Q87.0*
- Associé au gène CDKN1C ¬ Syndrome de retard de croissance intra-utérin avec *E34.8*
- Associée à SHOX ¬ *Q87.1*
- Atrésie des choanes-déficience intellectuelle lié à l'X limité à la femme ¬ Syndrome de dysmorphie faciale- *Q87.0*
- Atrophie optique-anomalie de Pelger-Huët ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Brachydactylie
- - Microsphérophakie ¬ Syndrome d'ichtyose- *Q87.1*
- - Obésité-retard global de développement ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Cyphose, épiphyses hypoplasiques en forme de cône et dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Déficience intellectuelle
- - Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.1*
- - ¬ Syndrome
- - - Ostéolyse distale- *Q87.1*
- - - Rétinite pigmentaire-cataracte juvénile- *Q87.1*
- Déficit
- - GHR ¬ *E34.3*

Petite taille *–suite*
- Déficit *–suite*
- - Immunitaire ¬ Syndrome des pouces absents- *D82.8, Q87.1*
- - Primaire en sous-unité acide labile ¬ *E34.3*
- - Récepteur des secrétagogues de l'hormone de croissance ¬ *E34.3*
- - RTTN ¬ Malformations corticales microcéphaliques- *Q87.1*
- Diabète sucré associé au gène CDKN1C ¬ Syndrome de retard de croissance intra-utérin avec *E34.8, E10.90*
- Dysmorphie facial
- - Hypogonadisme hypergonadotrope ¬ Maladie de Moyamoya- *Q87.1*
- - ¬ Syndrome
- - - Déficience intellectuelle-faiblesse musculaire- *Q87.1*
- - - Diabète insipide néphrogénique-calcifications intracrâniennes- *Q87.1*
- - - Résistance à l'arginine vasopressine-calcifications intracrâniennes- *Q87.1*
- - - Rétinite pigmentaire-surdité-vieillissement prématuré- *Q87.0*
- Épilepsie associé à MTHFS ¬ Syndrome de retard de développement-microcéphalie- *G31.88*
- Hypermobilité articulaire-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'anomalies cardiaques- *Q87.8*
- Hyperpigmentation-microcéphalie ¬ Syndrome d'extrasystoles- *Q87.1*
- Hypertélorisme ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Hypogonadisme hypogonadotrophique ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-myopathie- *Q87.1*
- Laxité ligamentaire ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-cardiopathie congénitale- *Q87.1*
- Liée à l'X ¬ Syndrome de microphtalmie colobomateuse-microcéphalie-déficience intellectuelle- *Q87.1*
- Nævus pigmentés ¬ Syndrome de progeria - *E34.8*
- Omoplate ailée-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'incurvation latérale sévère du tibia- *Q87.1*
- Onychodysplasie-dysmorphie faciale-hypotrichose ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Paraplégie ¬ Syndrome de macrocéphalie- *Q87.1*
- Quatrième métatarsien court-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de dysplasie spondylo-épimétaphysaire progressive- *Q87.1*
- Retard d'âge osseux par déficit du métabolisme de l'hormone thyroïdienne ¬ *E03.1*
- Rétinite pigmentaire ¬ Syndrome de brachydactylie- *Q87.1*
- Rhizomélique et dysmorphie faciale ¬ Syndrome de retard de croissance intra-utérine avec micrognathie, *Q87.1*

Petite taille *–suite*
- Surdité-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de dentinogenèse imparfaite- *Q87.8*
- Surpoids ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Troubles du comportement-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère- *Q87.8*
- Type Bruxelles ¬ *Q87.1*
- Valvulopathie cardiaque-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.1*
- ¬
- - Syndrome
- - - Blépharophimosis-ptosis-ésotropie-syndactylie- *Q87.8*
- - - Déficience intellectuelle liée à l'X-hypogonadisme-ichtyose-obésité- *Q87.8*
- - - Dysgénésie ovarienne 46,XX- *Q96.8*
- - - Dysplasie ectodermique- *Q82.8, E34.3*
- - - Dystrophie des cônes et des bâtonnets- *H35.5, E34.3*
- - - Fente palatine-grandes oreilles- *Q87.1*
- - - FILS [dysmorphie faciale-déficit immunitaire-livedo- *Q87.1*
- - - GEMSS [glaucome-ectopie du cristallin-sphérophakie-raideur articulaire- *Q87.1*
- - - Goniodysgénésie-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - - Microtie-anomalies squelettiques- *Q87.1*
- - - Myopie sévère-hyperlaxité articulaire généralisée- *Q87.1*
- - - Sténose subaortique- *Q87.1*
- - - Surdité-dysplasie épiphysaire- *Q87.8*
- - Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une *Q87.1*

Pétreux ¬
- Suppuration aiguë de l'os *H70.2*
- Syphilis tardive de l'os *A52.7†, M90.28**

Pétrole
- Lampant] ¬ Kérosène [*T52.0*
- ¬
- - Effet toxique: Produits dérivés du *T52.0*
- - Ether de *T52.0*

Pétrosite] ¬ Apexite [*H70.2*

Petty-Laxova-Wiedemann ¬ Syndrome de *E34.8*

Petzetakis ¬ Maladie de *A28.1*

Peur
- Dysmorphie corporelle ¬ *F45.2*
- ¬ Réaction de *F41.1*

Peutz-Jeghers ¬ Syndrome de: *Q85.8*

PEX [glaucome pseudo-exfoliatif] ¬ Glaucome *H40.10*

PEX10 ¬ Ataxie autosomique récessive par déficit en *G11.8*

PEX16 ¬ Ataxie autosomique récessive par déficit en *G11.8*

PEX2 ¬ Ataxie autosomique récessive par déficit en *G11.1*

Peyronie ¬ Maladie de La *N48.6*

Pezzi
v./v.a. Laubry-Pezzi

PFAPA [fièvre périodique-stomatite aphteuse-pharyngite-adénopathie] ¬ Syndrome *M35.8*

Pfaundler-Hurler] ¬ Idiotie à dysostose [syndrome de *E76.0*

Pfeifer-Weber-Christian ¬ Lipogranulome au cours de syndrome de *M35.6*

Pfeiffer
v./v.a. Reinhardt-Pfeiffer
- Type
- - 1 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - 2 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - 3 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Weber-Christian ¬ Syndrome de *M35.6*
- ¬
- - Maladie de *B27*
- - Syndrome
- - - *Q87.0*
- - - Cardio-crânien type *Q87.8*

Pfeiffer-Palm-Teller ¬ Syndrome de *Q87.1*

PGM3 ¬ Anomalie congénitale de la glycosylation associée à *E77.8*

Ph1 positive
- Rémission complète ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], chromosome Philadelphie (*C92.11*
- ¬ Leucémie myéloïde chronique, chromosome Philadelphie (*C92.10*

PHACE ¬ Syndrome *Q28.88*

Phacoanaphylactique ¬ Uvéite *H20.2*

Phacocèle [hernie du cristallin] ¬ *H27.8*

Phacomatose
- Cesioflammea ¬ *Q85.8*
- Cesiomarmorata ¬ *Q85.8*
- Non classées ailleurs ¬ Autres *Q85.8*
- Pigmento-kératosique ¬ *Q85.8*
- Pigmento-vasculaire
- - Type
- - - II ¬ *Q85.8*
- - - III ¬ *Q85.8*
- - - V ¬ *Q85.8*
- - ¬ *Q85.8*
- Sans précision ¬ *Q85.9*

Phaeohyphomycosique sous-cutané ¬
- Abcès *B43.2†, L99.8**
- Kyste *B43.2†, L99.8**

Phagédénique ¬ Pyodermite *L88*

Phagocytes mononucléés ¬ Histiocytoses de *D76.1*

Phakolitique ¬ Glaucome *H40.5*

Phalange
- Distale ¬ Fracture
- - Doigt: *S62.63*
- - Pouce: *S62.52*
- Knuckle pads] ¬ Coussinet des *M72.1*
- Main

Phalange *–suite*
- Main *–suite*
- - 2-5 ¬ Hypodactylie unilatérale des *Q71.8*
- - ¬ Ostéoblastome des *D16.1*
- Médiane ¬ Fracture d'un autre doigt: *S62.62*
- Proximale ¬ Fracture
- - Doigt: *S62.61*
- - Pouce: *S62.51*
- SAI ¬ Coalescence des *Q70.9*
- Surnuméraire ¬ *Q74.8*
- ¬
- - Pouce à trois *Q74.0*
- - Syndrome de déficience intellectuelle sévère-épilepsie-anomalies anales-hypoplasie des *Q87.8*

Phalangien
v./v.a. métatarsophalangien
- Idiopathique ¬ Acroostéolyse *M89.58*
- Transitoire ¬ Ostéolyse *M89.54*
- ¬ Syndactylie mésoaxiale synostosique avec réduction *Q70.4*

Phalango-épiphysaire en ailes d'anges [ASPED] ¬ Dysplasie *Q78.8*

Phanères
- SAI ¬
- - Anomalie SAI des téguments/ *Q84.9*
- - Déformation SAI des téguments/ *Q84.9*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale de la peau et des *Q84.9*
- ¬ Autres malformations congénitales précisées de la peau et des *Q84.8*

Phantosmie ¬ *R44.2*

Pharyngé
- Diphtérique ¬ Paralysie *A36.0†, G99.8**
- Entravé ¬ Réflexe *J39.2*
- ¬
- - Diphtérie *A36.0*
- - Poche *Q38.7*

Pharyngien ¬
- Amygdale *D10.6*
- Carcinome des amygdales *C11.1*
- Récessus *C11.2*

Pharyngite
- Adénopathie] ¬ Syndrome PFAPA [fièvre périodique-stomatite aphteuse- *M35.8*
- Aiguë
- - Due à d'autres micro-organismes précisés ¬ *J02.8*
- - Gangréneuse ¬ *J02.9*
- - Infectieuse SAI ¬ *J02.9*
- - SAI ¬ *J02.9*
- - Sans précision ¬ *J02.9*
- - Suppurée ¬ *J02.9*
- - Ulcéreuse ¬ *J02.9*
- - ¬ Laryngo- *J06.0*
- Chronique
- - Atrophique ¬ *J31.2*
- - Granuleuse ¬ *J31.2*

Pharyngite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Hypertrophique ¬ *J31.2*
- - ¬ *J31.2*
- Cytomégalovirus ¬ *J02.8, B97.8!*
- Due au virus de l'herpès ¬ *B00.2*
- Fusospirochètes ¬ *A69.1*
- Gonococcique ¬ *A54.5*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.1*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: *J10.1*
- Lymphonodulaire à entérovirus ¬ *B08.8*
- Pneumocoques ¬ *J02.8, B95.3!*
- Staphylocoques ¬ *J02.8, B95.8!*
- Streptocoques ¬ *J02.0*
- Syphilitique congénitale précoce ¬ *A50.0†, J99.8**
- Tuberculeuse
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*
- Vésiculaire due à un entérovirus ¬ *B08.5*
- Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J10.1*
- Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09, U69.23!*
- - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09, U69.22!*
- - Zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une *J09, U69.24!*

Pharyngo
- Amygdalite due au virus de l'herpès ¬ Gingivo-stomatite et *B00.2*
- Laryngé de l'oropharynx ¬ Carrefour *C10.8*

Pharyngo-cervico-brachial du syndrome de Guillain-Barré ¬ Variant *G61.0*

Pharyngo-conjonctivale épidémique ¬ Fièvre *B30.2†, H13.1**

Pharyngo-conjonctivite
- Virale ¬ *B30.2†, H13.1**
- ¬ *B30.2†, H13.1**

Pharynx
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Tuberculose du *A15.8*
- Œsophage cervical
- - Œsophage cervical ¬ Plaie ouverte avec atteinte du *S11.22*
- - Pharynx ¬ Plaie ouverte avec atteinte du *S11.21*
- Rhinopharynx ¬
- - Kyste du *J39.2*
- - Œdème du *J39.2*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q38.8*
- Sans précision ¬

Pharynx *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Tumeur bénigne: *D10.9*
- - Tumeur maligne: *C14.0*
- ¬
- - *S10.0*
- - Abcès du *J39.1*
- - Blessure
- - - *S19.88*
- - - *S19.9*
- - Brûlure de la bouche et du *T28.0*
- - Carcinoma in situ: Lèvre, cavité buccale et *D00.0*
- - Corps étranger dans le *T17.2*
- - Corrosion de la bouche et du *T28.5*
- - Diverticule du *Q38.7*
- - Gomme du *A52.7†, J99.8**
- - Infection
- - - Chlamydia du *A56.4*
- - - Phlegmoneuse du *J39.1*
- - Maladies du *J39.2*
- - Malformations congénitales du *Q38.8*
- - Phlegmon du *J39.1*
- - Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: *S11.21*
- - Spasme hystérique du *F45.33*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, J99.8**
- - Tératome du *D37.0*
- - Tuberculose du *A16.8*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du *C14.8*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et *D37.0*

Phase
- 1 ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.11*
- 2 ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.12*
- 3 ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.13*
- 4 ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta, *B18.14*
- Active
- - Trachome ¬ *A71.1*
- - Travail ¬ Arrêt de la *O62.1*
- Aiguë ¬ Paraplégie traumatique en *T09.3*
- Critique
- - 4 jours
- - - 7 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: *D70.13*
- - - ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: *D70.10*
- - 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: *D70.14*
- - 10 à moins de 20 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie: *D70.11*

Phase *–suite*
- Critique *–suite*
- - 20 jours ou plus ¬ Agranulocytose et neutropénie: *D70.12*
- Immunotolérance ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta: *B18.11*
- Initiale du trachome ¬ *A71.0*
- Latence ¬ Inertie utérine pendant la *O62.0*
- Sommeil ¬ Syndrome de retard des *G47.2*
- Suivi ¬ Lacération due à un avortement, en *O08.6*

PHAVER ¬ Syndrome *Q87.8*

Phelan-McDermid ¬ Syndrome de *Q93.5*

Phénobarbital ¬ Embryopathie au *Q86.88*

Phénol
- Homologues du phénol ¬ Effet toxique: *T54.0*
- ¬ Effet toxique: Phénol et homologues du *T54.0*

Phénomène
- Embrasement thérapeutique (flare phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ *T88.7*
- Ortolani ¬ *R29.4*
- Rappel d'irradiation ¬ *T78.8*
- Secondaire) de Raynaud ¬ *I73.0*

Phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ Phénomène d'embrasement thérapeutique (flare *T88.7*

Phénothiazine ¬ Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la *T43.3*

Phénotype
- Féminin
- - Sans précision ¬ Anomalie des chromosomes sexuels, *Q97.9*
- - ¬
- - - Anomalies précisées des chromosomes sexuels, *Q97.8*
- - - Syndrome du triple X avec *Q97.0*
- Hermine ¬ Albinisme cutané- *E70.3*
- Masculin
- - Caryotype
- - - 46,XX ¬ Autre *Q98.3*
- - - 47,XYY ¬ *Q98.5*
- - Sans précision ¬ Anomalie des chromosomes sexuels, *Q98.9*
- - ¬ Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, *Q98.8*
- Mixte
- - Associé
- - - T(9;22)(q34.1;q11.2) ¬ Leucémie aiguë de *C95.00*
- - - T(v;11q23.3) ¬ Leucémie aiguë de *C95.00*
- - ¬ Leucémie aiguë de *C95.00*
- TCR gamma/delta ¬ Lymphome T cutané primitif de *C84.5*

Phénoxyéthanol ¬ Hypersensibilité au 2- *T78.4*

Phénylalanine hydroxylase ¬ Déficit en *E70.1*

Phénylcétonurie
- Classique ¬ *E70.0*
- Maternelle ¬ *E70.1*
- Modérée ¬ *E70.1*
- Type 2 ¬ *E70.1*
- ¬ PCU [*E70.1*

Phénylcétonurique ¬ Embryopathie *E70.1*

Phenylpyruvica ¬ Oligophrenia *E70.0*

Phéochromocytome paragangliome
- Familial ¬
- - *C74.1*
- - *C75.5*
- - *D35.0*
- Sécrétant sporadique ¬
- - *C74.1*
- - *D35.0*

Philadelphie Ph1 positive
- Rémission complète ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], chromosome *C92.11*
- ¬ Leucémie myéloïde chronique, chromosome *C92.10*

Phimosis et paraphimosis ¬ Hypertrophie du prépuce, *N47*

PhK ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Phlébectasie
- Congénitale ¬ *Q27.4*
- Diffuse réelle ¬ *Q27.4*
- Membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée ¬ *I83.9*

Phlébite
- Bleue ¬ *I80.28*
- Consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion ¬ *T80.1*
- Gestationnelle SAI ¬ *O22.9*
- Ombilicale ¬ *I80.88*
- Profonde
- - Cuisse ¬ *I80.28*
- - Jambe ¬ *I80.28*
- Puerpérale SAI ¬ *O87.9*
- Sein ¬ *I80.88*
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Suppurée ¬ *I80*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I98.8**
- Thrombophlébite
- - Intracrâniennes et intrarachidiennes ¬ *G08*
- - Intrarachidiennes, d'origine non pyogène ¬ *G95.18*
- - Localisation non précisée ¬ Thrombose, *I80.9*
- - Localisations ¬ Thrombose, *I80.88*
- - Membres inférieurs, sans précision ¬ Thrombose, *I80.3*
- - Vaisseaux profonds des membres inférieurs ¬ Thrombose, *I80.28*
- - Veine
- - - Axillaire ¬ Thrombose, *I80.81*
- - - Basilaire ¬ Thrombose, *I80.80*

Phlébite *–suite*
- Thrombophlébite *–suite*
- - Veine *–suite*
- - - Céphalique ¬ Thrombose, *I80.80*
- - - Fémorale ¬ Thrombose, *I80.1*
- - - Profondes des membres supérieurs ¬ Thrombose, *I80.81*
- - - Sous-clavière ¬ Thrombose, *I80.81*
- - - Superficielles membres
- - - - Inférieurs ¬ Thrombose, *I80.0*
- - - - Supérieurs ¬ Thrombose, *I80.80*
- Ulcéreuse profonde du membre inférieur ¬ *I80.28*
- Veine
- - Hépatique ¬ *I80.88*
- - Pelviennes ¬ *I80.20*
- - Poplitée ¬ *I80.28*
- - Porte ¬ *K75.1*

Phlébopathie
- Gestationnelle SAI ¬ *O22.9*
- Puerpérale SAI ¬ *O87.9*

Phlébothrombose profonde
- Cours
- - Grossesse ¬ *O22.3*
- - Puerpéralité ¬ *O87.1*
- Cuisse ¬ *I80.28*
- Extrémité inférieure ¬ *I80.28*
- Jambe ¬ *I80.28*
- Membre inférieur ¬ *I80.28*

Phlébotome ¬ Fièvre à *A93.1*

Phlegmon
- Abcès
- - Bouche, sans autre précision ¬ *K12.29*
- - Buccal ¬ Autres *K12.28*
- Bouche (plancher) ¬ *K12.20*
- Clostridium ¬ *A48.0*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.2*
- Doigt
- - Orteils ¬ *L03.0*
- - ¬ *L03.01*
- Éosinophiles [Wells] ¬ *L98.3*
- Face ¬ *L03.2*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Localisations ¬ *L03.8*
- Membre
- - Inférieure ¬ *L03.11*
- - Supérieure ¬ *L03.10*
- Nez et de la cloison nasale ¬ *J34.0*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Orteils ¬ *L03.02*
- Paroi abdominale ¬ *L03.3*
- Paroi thoracique ¬ *L03.3*
- Pelvien
- - Aigus ¬ Paramétrite et *N73.0*

Phlegmon *–suite*
- Pelvien *–suite*
- - Chroniques ¬ Paramétrite et *N73.1*
- - Femme précisé aigu ¬ *N73.0*
- - Sans précision ¬ Paramétrite et *N73.2*
- Périamygdalien ¬ *J36*
- Pharynx ¬ *J39.1*
- Régions anale et rectale, avec ou sans fistule ¬ *K61*
- Sans précision ¬ *L03.9*
- Tronc ¬ *L03.3*

Phlegmoneuse
- Aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ Dacryocystite (*H04.3*
- Conduit auditif externe ¬ Cellulite *H60.1*
- Oreille externe ¬ Cellulite *H60.1*
- Pavillon de l'oreille ¬ Cellulite *H60.1*
- Pharynx ¬ Infection *J39.1*

Phlyctène
- Non
- - Chaleur) multiples SAI ¬ *T00.9*
- - Due à la chaleur) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: *S30.82*
- Remplie de liquide séreux) (ouverte) (percée) ¬ Ulcère [escarre] de pression avec *L89.1*
- ¬ Formation tuberculeuse de *A18.5†, H19.2**

Phlycténulaire
- Tuberculeuse ¬ Kératoconjonctivite *A18.5†, H19.2**
- ¬ Kératoconjonctivite: *H16.2*

Phobie
- S
- - Animaux ¬ *F40.2*
- - Simple ¬ *F40.2*
- SAI ¬ *F40.9*
- Sociales ¬ *F40.1*
- Spécifiques (isolées) ¬ *F40.2*

Phobique
- Enfance ¬ Trouble anxieux *F93.1*
- SAI ¬ État *F40.9*
- Sans précision ¬ Trouble anxieux *F40.9*
- ¬
- - Réaction *F41.1*
- - Troubles anxieux *F40.8*

Phocomélie
- Membre(s) non précisé(s) ¬ *Q73.1*
- Membres
- - Inférieurs ¬ *Q72.1*
- - Supérieurs ¬ *Q71.1*
- SAI ¬ *Q73.1*
- ¬ *Q73.1*

Phonocardiogramme ¬ Anomalies (de): *R94.3*

Phonologique ¬ Trouble: du développement (de): *F80.0*

Phosphatase
v./v.a. glucose-6-phosphatase

Phosphatase *–suite*
- Acide
- - Lysosomale ¬ Déficit en *E83.38*
- - ¬
- - - Anomalies des taux de: *R74.8*
- - - Déficit en *E83.38*
- Alcaline ¬ Anomalies des taux de: *R74.8*
- Complexe pyruvate déshydrogénase ¬ Déficit en *E74.4*
- Forme
- - Infantile ¬ Déficit en 3-phosphosérine *E72.8*
- - Juvénile ¬ Déficit en 3-phosphosérine *E72.8*
- Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme du phosphore et de la *E83.39*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme du phosphore et de la *E83.38*
- - Déficit en 3-phosphosérine *E72.8*
- - Rachitisme lors de carence en *E83.38†, M90.89**

Phosphate
v./v.a. carbamoyl-phosphate
v./v.a. dolichyl-phosphate
v./v.a. fructose-1-phosphate
v./v.a. galactose-1-phosphate
v./v.a. glucose-6-phosphate
v./v.a. pentose-phosphate
- Isomérase ¬ Anémie (due à): déficit en: triose- *D55.2*
- Oxydase ¬ Déficit en pyridoxamine 5'- *G40.8*
- Pyridoxal ¬ Convulsions sensibles au *G40.8*
- ¬ Hypotonie et ichtyose par déficit en dolichol *E77.8*

Phosphaté ¬
- Diabète *E83.30*
- Tubulopathies avec fuite *N25.0*

Phosphatides ¬ Thésaurismose des *E75.2*

Phosphoénolpyruvate ¬ Déficit en: carboxykinase *E74.4*

Phosphoéthanolaminurie ¬ *E83.38*

Phosphofructokinase
- Musculaire ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*
- ¬ Déficit en *E74.0*

Phosphoglucomutase
- 1 ¬ Déficit en *E74.0*
- ¬ GSD [Glycogénose] par déficit en *E74.0*

Phosphogluconate déshydrogénase ¬ Anémie due à un déficit en 6- *D55.1*

Phosphoglucose isomérase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.2*

Phosphoglycérate
- Kinase
- - 1 ¬ Maladie glycogénique par déficit en *E74.0*
- - ¬ GSD par déficit en *E74.0*
- Mutase ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0†, G73.6**

Phosphoglycerate déshydrogénase ¬ Déficit en 3- *E72.8*

Phosphoglycéromutase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.2*

Phosphoinositide 3 kinase delta type

- 1 ¬ APDS [Syndrome d'activation de la *D81.8*
- 2 ¬ APDS [Syndrome d'activation de la *D81.8*

Phosphokinase ¬ Elévation isolée asymptomatique de la créatine *R74.8*

Phospholipase A2

- Alpha cytosolique] ¬ Anomalie plaquettaire associée à PLA2G4A [*D69.1*
- ¬ Neurodégénérescence associée à la *G31.88*

Phospholipides ¬ Lithiase biliaire à faible niveau de *K80.80*

Phospholipidose ¬ *E75.5*

Phosphomannomutase 2 ¬ Déficit en *E77.8*

Phosphomannose isomérase ¬ Déficit en *E77.8*

Phosphore

- Composés ¬ Effet toxique: *T57.1*
- Phosphatase
- - Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme du *E83.39*
- - ¬ Autres anomalies du métabolisme du *E83.38*

Phosphorés et carbamates ¬ Effet toxique: Insecticides organo- *T60.0*

Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase ¬ Déficience en *E79.8*

Phosphoribosylpyrophosphatase synthétase ¬ Activité accrue de la *E79.8*

Phosphoribosylpyrophosphate

- Synthétase ¬ Déficit en *E79.8*
- Transférase ¬ Déficit en *E79.8*

Phosphoribosyltransférase

- Grade
- - I ¬ Déficit en hypoxanthine-guanine *E79.8*
- - IV ¬ Déficit en hypoxanthine guanine *E79.1*
- ¬ Déficit en adénosine *E79.8*

Phosphorylase

- Hépatique ¬
- - Déficit en *E74.0*
- - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- Kinase
- - Hépatique et musculaire ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - Musculaire ¬ GSD par déficit en *E74.0*
- - ¬
- - - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - - GSD par déficit en *E74.0*
- Musculaire ¬
- - Déficit en *E74.0*
- - Glycogénose par déficit en glycogène *E74.0*
- PNP] ¬ Déficit en purine nucléoside *D81.5*

Phosphorylation oxydative

- Associé
- - QRSL1 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - WARS2 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- Type
- - 1 ¬ Hépatoencéphalopathie par déficit combiné de la *E88.8, K72.79!*
- - 2 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 3 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 4 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 6 ¬ Encéphalomyopathie mitochondriale due à un déficit combiné de la *G31.81*
- - 7 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 8 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 9 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 10 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 11 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 12 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 13 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 14 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 15 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 16 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 17 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 18 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 20 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 21 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 23 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 24 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 25 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 26 ¬ Déficit combiné de la *E88.8*
- - 27 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 28 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 29 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - 30 ¬ Déficit combiné de la *E88.8*
- - 39 ¬ Déficit combiné de la *G31.81*
- - ¬
- - Déficit combiné de la *E88.8*
- - Surdité neurosensorielle syndromique due à un déficit combiné de la *G31.81, H90.8*

Phosphosérine

- Aminotransférase
- - Forme
- - - Infantile ¬ Déficit en *E72.8*
- - - Juvénile ¬ Déficit en *E72.8*
- - ¬ Déficit en *E72.8*
- Phosphatase
- - Forme
- - - Infantile ¬ Déficit en 3- *E72.8*
- - - Juvénile ¬ Déficit en 3- *E72.8*
- - ¬ Déficit en 3- *E72.8*

Phosphotransférase

v./v.a. N-acétylglucosamine-1-phosphotransférase

- ¬ Déficit en dolichyl-phosphate N-acetylgalactosamine *E77.8*

Photoallergique à un médicament ¬ Réaction *L56.1*

Photocontact [dermite de breloque] ¬ Dermite de *L56.2*

Photokératite ¬ *H16.1*

Photophobie ¬ *H53.1*

Photosensibilité

- Associé à PCNA ¬ Syndrome neurodégénératif progressif avec *G11.3*
- Cutanée-colite létale ¬ Syndrome de *K52.8, L57.8*

Photosensible ¬ Épilepsie

- *G40.8*
- Occipitale *G40.8*

Phototoxique à un médicament ¬ Réaction *L56.0*

Phrénique due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie du nerf *P14.2*

Phrynodermie ¬ *E50.8†, L86**

Phthirus pubis ¬ Infestation par: *B85.3*

Phtiriase

- Infestation par poux du pubis] ¬ *B85.3*
- ¬ Infestation
- - Mixte, pédiculose et *B85.4*
- - Paupières au cours de *B85.3†, H03.0**

Phtisie

- Globe oculaire ¬ *H44.5*
- ¬ *A16.9*

Phycomycose ¬ *B46.9*

Phyilippinensis ¬ Infection à Capillaria *B81.1*

Phyllode

- Maligne de la prostate ¬ Tumeur *C61*
- Malin ¬ Cystosarcome *C50.9*
- Prostate ¬ Tumeur *D40.0*
- Sein ¬ Tumeur *D48.6*
- Tumeur de Brodie] ¬ Cystosarcome *D48.6*

Phylloïde

- Bénigne ¬ Tumeur *D24*
- Bénin ¬ Cystosarcome *D24*
- ¬ Fibroadénome *D24*

Physiologique

- Attendu ¬ Retard de: stade de développement *R62.0*
- Facteurs physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations *F59*
- Intense) (prolongé) SAI ¬ Ictère *P59.9*
- Psychogène SAI ¬ Dysfonctionnement *F59*
- Sans précision ¬ Retard du développement *R62.9*
- ¬ Autres retards du développement *R62.8*

Physique

- Chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions *Z64.8*
- Infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de possibles sévices *Z61*
- Malnutrition ¬ Retard de développement *E45*
- Mental, non précisé ¬ Stress *Z73*

Physique *–suite*
- Raisons psychologiques ¬ Majoration de symptômes *F68.0*
- Soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit *F68.1*
- ¬
- - Automutilation et autres blessures *Z91.8*
- - Déclin *R53.9*
- - Dépistage prénatal
- - - Malformations par échographie et autres méthodes *Z36.3*
- - - Retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes *Z36.4*
- - Difficultés liées à l'environnement *Z58*
- - Épuisement *R53.9*
- - Examen périodique (annuel) (*Z00.0*
- - Facteurs psychologiques influençant une affection *F54*
- - Manque d'exercice *Z72.8*
- - Retard (de): *R62.8*
- - Sévices *T74.1*
- - Surmenage *T73.3*
- - Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs *F59*
- - Thérapies *Z50.1!*
- - Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection *F06.9*
- - Troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection *F06.8*
- - Violence *R45.6*

Phytose ¬ *B48.88*

Phytostérolémie
- Homozygote ¬ *E75.5*
- ¬ *E78.0*

PIA] ¬ Pneumonie interstitielle aiguë [*J84.10*

Pian
- Bouba] ¬ *A66*
- Crabe) ¬ Papillomes multiples et pian plantaire humide (*A66.1*
- Cutané, moins de cinq ans après l'infection ¬ *A66.2*
- Latent ¬ *A66.8*
- Lésion
- - Articulaire ¬ *A66.6†, M14.89**
- - Osseuse ¬ *A66.6†, M90.29**
- Mère ¬ *A66.0*
- Plantaire humide (pian-crabe) ¬ Papillomes multiples et *A66.1*
- Précoce tardif ¬
- - Hydarthrose du *A66.6*
- - Nodule du *A66.6*
- - Ostéite du *A66.6*
- - Périostite (hypertrophique) du *A66.6*
- Récent

Pian *–suite*
- Récent *–suite*
- - Cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ *A66.2*
- - ¬ Framboeside du *A66.2*
- Sans signes cliniques, avec sérologie positive ¬ *A66.8*
- Tardif
- - Nodulaire (ulcéré) ¬ *A66.4*
- - ¬
- - - Gomme osseuse du *A66.6*
- - - Ostéite ou périostite gommeuse du *A66.6*
- ¬
- - Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au *A66.3*
- - Lésions
- - - Cutanées précoces du *A66.2*
- - - Initiales du *A66.0*
- - Manifestations du *A66.7*

Pianides plantaires hyperkératosiques et trichophytoïdes ¬ *A66.3*

Pianique
- Plantaire ou palmaire ¬ Papillome *A66.1*
- ¬
- - Chancre *A66.0*
- - Gommes et ulcères *A66.4*
- - Hyperkératose *A66.3*
- - Lésions
- - - Muqueuses *A66.7*
- - - Ostéo-articulaires *A66.6*
- - Nodules juxta-articulaires *A66.7*

Pianome ¬ *A66.1*

Pica
- Adulte ¬ *F50.8*
- Nourrisson et de l'enfant ¬ *F98.3*

Piccardi
v./v.a. Little-Piccardi-Lassueur

Pick
v./v.a. Niemann-Pick
- ¬
- - Démence de la maladie de *G31.0†, F02.0**
- - Maladie de *G31.0*
- - Splénomégalie de Niemann *E75.2*

Pickwick ¬ Syndrome de *E66.29*

Picotements ¬ *R20.2*

Pics centro-temporaux [Rolando] ¬ Épilepsie bénigne à *G40.08*

Piébaldisme
- Anomalies neurologiques ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬ *E70.3*

Pied
v./v.a. avant-pied
v./v.a. main-pied-utérus
- 2ème degré sans précision ¬
- - Brûlure
- - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.20*

Pied *–suite*
- 2ème degré sans précision ¬ *–suite*
- - Brûlure *–suite*
- - - Région malléolaire et du *T25.20*
- - Corrosion
- - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.60*
- - - Région malléolaire et du *T25.60*
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.81*
- Affaissé
- - Acquis ¬ *M21.63*
- - Valgus acquis ¬ *M21.63*
- Articulation
- - Médiotarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.32*
- - Tarsométatarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.33*
- Athlète ¬ *B35.3*
- Bifide ¬ *Q72.7*
- Cheville
- - Unilatérale ¬ Absence acquise de *Z89.4*
- - ¬ Absence congénitale du *Q72.3*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.84*
- Creux
- - Acquis ¬
- - - *M21.60*
- - - *M21.60*
- - Atrophie optique-surdité neurosensorielle ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse-aréflexie- *G11.8*
- - Valgus acquis ¬ *M21.63*
- - ¬
- - - *Q66.7*
- - - Syndrome de télécanthus-hypertélorisme-strabisme- *Q87.8*
- Décollement sous-cutané (fermé) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.86*
- Degré
- - 2a ¬
- - - Brûlure
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.20*
- - - - Région malléolaire et du *T25.20*
- - - Corrosion de la région malléolaire et du *T25.60*
- - 2b ¬
- - - Brûlure
- - - - Hanche jambe sauf région malléolaire
- - - - - *T24.21*
- - - - - *T24.61*
- - - - Région malléolaire et du *T25.21*
- - - Corrosion
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.60*
- - - - Région malléolaire et du *T25.61*

Pied *–suite*
- Degré *–suite*
- - Non précisé ¬
- - - Brûlure
- - - - Cheville et du *T25.0*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.0*
- - - Corrosion
- - - - Cheville et du *T25.4*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.4*
- Diabétique
- - Décompensé ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec syndrome du *E11.75*
- - ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec syndrome du *E11.74*
- Équin, acquis ¬ *M21.62*
- Étalé en eventail, acquis ¬ *M21.63*
- Exception orteil lymphangite ¬
- - Infection purulente du *L03.11*
- - Inflammation purulente du *L03.11*
- Fendu ¬ Syndrome d'aplasie cubitale- *Q73.8*
- Fendus
- - Polydactylie mésoaxiale] ¬ SFMMP [Syndrome de *Q74.8*
- - Surdité ¬ Syndrome de mains et *Q87.2*
- Flexion dorsale, acquis ¬ *M21.68*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.82*
- Immersion ¬ Main et *T69.0*
- Main
- - Bouche ¬ Syndrome *B08.4*
- - ¬ Symbrachydactylie des *Q73.8*
- Membre inférieur [tout niveau, sauf le pied] ¬ Amputation traumatique d'un *T05.4*
- Métatarsien (os), articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.34*
- Metatarsus varus, acquis ¬ *M21.68*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la cheville et du *T34.8*
- Niveau
- - Cheville ¬ Amputation traumatique du *S98.0*
- - Non précisé ¬ Amputation traumatique du *S98.4*
- Orteil
- - S) ¬ Absence congénitale du *Q72.3*
- - ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la cheville, *R02.07*
- Os) carpe, articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.31*
- Partie non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.30*

Pied *–suite*
- Plat
- - Congénital ¬ *Q66.5*
- - Contracté ¬ *Q66.5*
- - Pes planus] (acquis) ¬ *M21.4*
- - Spastique (en valgus) ¬ *Q66.5*
- - Valgus acquis ¬
- - - *M21.61*
- - - *M21.61*
- - - *M21.63*
- Présent ¬ Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, *Q72.1*
- Pronation ¬ *M21.68*
- SAI ¬
- - Écrasement du *S97.8*
- - Plaie ouverte
- - - *S91.3*
- - - Malléole et du *S91*
- Sans précision ¬
- - Anomalie morphologique congénitale du *Q66.9*
- - Fracture du *S92.9*
- - Lésion traumatique
- - - Cheville et du *S99.9*
- - - Superficielle de la cheville et du *S90.9*
- - Polydactylie (main ou *Q69.9*
- SAP ¬ *L03.11*
- Scaphoide du tarse] ¬ Fracture :Os naviculaire du *S92.21*
- Seuls] ¬ jambe [toute partie, sauf cheville et *T24*
- Tombant (acquis) ¬ Poignet ou *M21.3*
- Tranchées ¬ *T69.0*
- Valgus ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du *Q66.6*
- Varus ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du *Q66.3*
- ¬
- - Absence congénitale
- - - Bilatérale de la jambe et du *Q72.2*
- - - Jambe et du *Q72.2*
- - Agénésie de la jambe et du *Q72.2*
- - Amputation traumatique
- - - Deux *T05.3*
- - - Orteil(s) et d'autres parties du *S98.3*
- - - Parties du *S98.3*
- - - Pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le *T05.4*
- - Anomalie congénitale du *Q74.2*
- - Anomalies morphologiques congénitales du *Q66.8*
- - Arthrite chronique juvénile
- - - Début systémique, *M08.27*
- - - Forme oligo(pauci)- articulaire, *M08.47*
- - Arthrite juvénile idiopathique
- - - *M08.97*
- - - Associée aux enthésopathies, *M08.87*
- - - Indéterminée, *M08.87*

Pied *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Brûlure
- - - Premier degré
- - - - Cheville et du *T25.1*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.1*
- - - Troisième degré
- - - - Cheville et du *T25.3*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.3*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: cheville et *T84.16*
- - Contusion de parties autres et non précisées du *S90.3*
- - Corrosion du premier degré
- - - Cheville et du *T25.5*
- - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.5*
- - Corrosion du troisième degré
- - - Cheville et du *T25.7*
- - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.7*
- - CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium dihydraté], *M11.17*
- - Déformations acquises de la cheville et du *M21.68*
- - Dermatophytose du *B35.3*
- - Dysplasie fibreuse monostotique, *M85.07*
- - Dystocie due à une présentation par les *O64.1*
- - Écrasement d'autres parties de la cheville et du *S97.8*
- - Embolie artérielle du *I74.3*
- - Enthésopathie
- - - *M77.5*
- - - Membre inférieur, sauf le *M76.8*
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S93.6*
- - Fibrodysplasie ossifiante progressive, *M61.17*
- - Fibromatose aponévrotique juvénile, *M72.87*
- - Fibromatose pseudo-sarcomateuse, *M72.47*
- - Fracture ouverte du *S92.9, S91.87!*
- - Fractures multiples du *S92.7*
- - Gelure superficielle de la cheville et du *T33.8*
- - Hétéroplasie osseuse progressive, *M61.57*
- - Ischémie traumatique des muscles du *T79.63*
- - Kyste
- - - Osseux anévrismal du *M85.57*
- - - Solitaire des os, *M85.47*
- - Lésion
- - - Tissu mou stade
- - - - I lors fracture

Pied *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Tissu mou stade *–suite*
- - - - I lors fracture *–suite*
- - - - - Fermée ou de luxation du *S91.84!*
- - - - - Ouverte ou de luxation du *S91.87!*
- - - - II lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation du *S91.85!*
- - - - - Ouverte ou de luxation du *S91.88!*
- - - - III lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation du *S91.86!*
- - - - - Ouverte ou de luxation du *S91.89!*
- - - Traumatique
- - - - Artère dorsale du *S95.0*
- - - - Artère plantaire du *S95.1*
- - - - Multiples
- - - - - Muscles et tendons au niveau de la cheville et du *S96.7*
- - - - - Nerfs au niveau de la cheville et du *S94.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du *S95.7*
- - - - Muscle tendon
- - - - - Intrinsèques au niveau de la cheville et du *S96.2*
- - - - - Long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du *S96.1*
- - - - - Long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du *S96.0*
- - - - - Niveau de la cheville et du *S96.8*
- - - - - Non précisés, au niveau de la cheville et du *S96.9*
- - - - Nerf
- - - - - Niveau de la cheville et du *S94.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la cheville et du *S94.9*
- - - - - Tibial antérieur au niveau de la cheville et du *S94.2*
- - - - Nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du *S94.3*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - Niveau de la cheville et du *S95.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la cheville et du *S95.9*
- - - - Veine dorsale du *S95.2*
- - Lésions traumatiques
- - - Multiples de la cheville et du *S99.7*
- - - Précisées de la cheville et du *S99.8*
- - - Superficielles
- - - - Cheville et du *S90.88*
- - - - Multiples de la cheville et du *S90.7*
- - Luxation
- - - Ouverte du *S93.30, S91.87!*
- - - Parties autres et non précisées du *S93.38*
- - Maladie de Still de l'adulte, *M06.17*
- - Malformation acquise du *M21.68*
- - Malformation du *M21.68*

Pied *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Mélorhéostose du *M85.87*
- - Myosite
- - - Bactérienne, *M60.07*
- - - Fongique, *M60.07*
- - - Virale, *M60.07*
- - Nécrose aseptique de l'os naviculaire du *M92.6*
- - Nécrose avasculaire
- - - Idiopathique, *M87.07*
- - - Traumatique, *M87.27*
- - Oblitération d'une artère du *I74.3*
- - Ostéochondrite juvénile, os naviculaire du *M92.6*
- - Ostéolyse
- - - Expansive familiale du *M89.57*
- - - Massive de Gorham du *M89.57*
- - Ostéomyélite multifocale chronique récurrente, *M86.37*
- - Ostéonécrose médicamenteuse, *M87.17*
- - Plaie ouverte
- - - Multiples de la cheville et du *S91.7*
- - - Partie de la malléole et du *S91.80*
- - - Parties du *S91.3*
- - Psoriasis avec arthrite juvénile du *L40.5†, M09.07**
- - Pyomyosite, *M60.07*
- - Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du *S93.2*
- - Séquelles d'une fracture du *T93.2*
- - Syndrome
- - - Duplication du péroné avec polydactylie en miroir du *Q74.8*
- - - Felty, *M05.07*
- - - Oculo-urétro-synovial, *M02.37*
- - - Symphalangie-anomalies multiples des mains et des *Q74.8*
- - Synovite villonodulaire pigmentée, *M12.27*
- - Teigne du *B35.3*
- - Trichophytie du *B35.3*

Pied bot
- Asymétrique ¬ *Q66.8*
- E) ou en griffe acquis(e) ¬ Main et *M21.5*
- Familial
- - Anomalies des membres inférieurs ¬ *Q66.0, Q74.2*
- - Sans anomalies des membres inférieurs ¬ *Q66.0*
- SAI ¬
- - *Q66.0*
- - *Q66.8*
- Talus
- - Valgus ¬ *Q66.4*
- - Varus ¬ *Q66.1*
- Varus équin ¬ *Q66.0*
- ¬ Syndrome

Pied bot *–suite*
- ¬ Syndrome *–suite*
- - Pierre Robin-malformations cardiaques- *Q87.8*
- - Séquence de Pierre Robin-malformations cardiaques- *Q87.8*

Piedra
- Blanche [Piedra alba] ¬ *B36.2*
- Noire [Piedra nigra] ¬ *B36.3*

Piedra alba] ¬ Piedra blanche [*B36.2*

Piedra nigra] ¬ Piedra noire [*B36.3*

Piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un *U69.10!*

Pierini ¬ Atrophodermie de Pasini et *L90.3*

Pierpont ¬ Syndrome de *Q87.0*

Pierre
- Xanthine ¬ *E79.8†, N22.8**
- ¬ Maladie de l'homme de *M61.19*

Pierre Robin
- Anomalie facio-digitale ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Contractures-retard de développement ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Déficience intellectuelle-brachydactylie ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Isolé ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Malformation cardiaque Pied bot ¬ Syndrome
- - *Q87.8*
- - Séquence de *Q87.8*
- Oligodactylie ¬ Syndrome de séquence de *Q87.0*

Pierson
- Microcorie-néphrose congénitale) ¬ Syndrome de *N04.1, Q13.8*
- ¬ Ostéochondrite juvénile (de): symphyse pubienne [*M91.0*

Piéton ¬ Accident de *V99!*

Pigeons ¬ Maladie des éleveurs de *J67.20*

PIGG ¬ Anomalie congénitale de la glycosylation par déficit en *E77.8*

PIGM ¬ Anomalie congénitale de la glycosylation par déficit en *E77.8*

Pigmentaire
- Cataracte juvénile-petite taille-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de rétinite *Q87.1*
- Congénital géant ¬ Nævus *D22.9*
- Congénitale ¬ Rétinopathie *H35.5*
- Cristallin ¬ Inclusions *H26.88*
- Déficience intellectuelle surdité
- - Hypogénitalisme ¬ Syndrome de rétinite *Q87.8*
- - Hypogonadisme ¬ Syndrome de rétinite *Q87.8*
- Fovéoschisis-drusen de la papille optique ¬ Syndrome de microphtalmie-rétinite *Q15.8*
- Nodulaire ¬ Urticaire *Q82.2*

Pigmentaire *–suite*
- Plaques ¬ Urticaire *Q82.2*
- Ponctuée albescente) (vitelliforme) ¬ Dystrophie: rétinienne (*H35.5*
- Primaire résiduel ¬ Glaucome *H40.18*
- Résiduel ¬ Glaucome *H40.18*
- Rétine ¬
- - Dégénérescence *H35.5*
- - Hamartome combiné de l'épithélium *D31.2*
- Rétinien
- - Simulant le fundus flavimaculatus) ¬ Dystrophie tachetée multifocale de l'épithélium *H35.5*
- - ¬
- - - Décollement de l'épithélium *H35.7*
- - - Dystrophie réticulée de l'épithélium *H35.5*
- Sans pigmentation ¬ Rétinite *H35.5*
- Surdité-vieillissement prématuré-petite taille-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de rétinite *Q87.0*
- ¬
- - Dégénérescence
- - - Iris (*H21.2*
- - - Pallidale *G23.0*
- - Dégénérescence rétinienne *H35.5*
- - Dermatopathie réticulaire *Q82.4*
- - Dystrophie choroïdienne centrale aréolaire de l'épithélium *H31.2*
- - Dystrophie rétinienne *H35.5*
- - Glaucome
- - - *H40.18*
- - - Dispersion *H40.18*
- - Leucoencéphalopathie autosomique récessive-infarctus cérébraux-rétinite *Q87.0*
- - Lichen plan *L43.8*
- - Nævus: *D22*
- - NARP [Syndrome de neuropathie-ataxie-rétinite *G31.81*
- - Pseudosarcome hémorragique *C46.9*
- - Rétinite *H35.5*
- - Rétinopathie *H35.5*
- - Syndrome
- - - Ataxie du cordon postérieur-rétinite *G11.1*
- - - Brachydactylie-petite taille-rétinite *Q87.1*
- - - Déficience intellectuelle liée à l'X-rétinite *Q87.8*
- - - Dyskinésie ciliaire primitive-rétinite *Q34.8, H35.5*
- - - Hypogonadisme hypogonadotrope-rétinite *E23.0, H35.5*
- - - Myopathie mitochondriale-ataxie cérébelleuse-rétinopathie *G31.81*
- - - Nanisme ostéochondrodysplasique-surdité-rétinopathie *Q87.1*
- - - Neuropathie-ataxie-rétinite *G31.81*
- - - Pseudoxanthome élastique-like avec rétinite *Q82.8, H35.5*

Pigmentaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Tétraplégie spastique-déficience intellectuelle-rétinite *Q87.8*

Pigmentation
- Conjonctive ¬ *H11.1*
- Dent
- - Extrinsèque SAI ¬ *K03.6*
- - SAI ¬ *K03.6*
- Dépôts cornéens ¬ *H18.0*
- Ferrique ¬ *L81.8*
- Gaine capillaire
- - Sans précision ¬ Anomalie de la *L67.9*
- - ¬ Autres anomalies de la *L67.8*
- Intrinsèque des dents SAI ¬ *K00.8*
- Kératodermie palmoplantaire-carcinome de la peau ¬ Syndrome d'anomalie de *C44.9, Q82.8*
- Minime ¬ Albinisme oculo-cutané type 1 avec *E70.3*
- Mouchetée ¬ Épidermolyse bulleuse simple avec *Q81.0*
- Réticulée liée
- - Chromosome X ¬ *Q82.8*
- - X associée à une amylose cutanée ¬ *Q82.8, E85.4*
- Rétinienne anormale ¬ Syndrome de microcéphalie-fente palatine- *Q87.8*
- Sans précision ¬ Anomalie de la *L81.9*
- Tatouage ¬ *L81.8*
- Type taches de rousseur ¬ Acrokeratodermie ponctuée avec *L85.8*
- ¬
- - Anomalies précisées de la *L81.8*
- - Rétinite pigmentaire sans *H35.5*
- - Syndrome
- - - Dysplasie osseuse terminale-défauts de *Q87.2*
- - - Hypoplasie du pouce-alopécie-anomalie de la *Q87.1*

Pigmenté
- Articulation du genou ¬ Synovite villonodulaire *M12.26*
- Avant-bras ¬ Synovite villonodulaire *M12.23*
- Bras ¬ Synovite villonodulaire *M12.22*
- Colonne vertébrale ¬ Synovite villonodulaire *M12.28*
- Cuisse ¬ Synovite villonodulaire *M12.25*
- Fixe ¬ Érythème *L27.1*
- Jambe ¬ Synovite villonodulaire *M12.26*
- Main ¬ Synovite villonodulaire *M12.24*
- Pied ¬ Synovite villonodulaire *M12.27*
- Primaire ¬ Maladie adrénocorticale nodulaire *E24.8*
- Région pelvienne ¬ Synovite villonodulaire *M12.25*
- Région scapulaire ¬ Synovite villonodulaire *M12.21*

Pigmenté *–suite*
- Sièges multiples ¬ Synovite villonodulaire *M12.20*
- ¬
- - Atrophie rétino-choroïdienne paraveineuse *H35.8*
- - Atrophodermie *Q82.1*
- - Dermatose purpurique *L81.7*
- - Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à sphéroïdes axonaux et cellules gliales *E75.2*
- - Schwannome *D36.1*
- - Syndrome de progeria - petite taille - nævus *E34.8*
- - Synovite villonodulaire *M12.29*
- - Urticaire *Q82.2*

Pigmenti ¬ Incontinentia *Q82.3*

Pigmento-kératosique ¬ Phacomatose *Q85.8*

Pigmentosum
- Syndrome de Cockayne] ¬ Complexe XP/CS [Xeroderma *Q87.1*
- ¬
- - XP [Xeroderma *Q82.1*
- - XPV [Variant du xeroderma *Q82.1*

Pigmento-vasculaire
- Type
- - II ¬ Phacomatose *Q85.8*
- - III ¬ Phacomatose *Q85.8*
- - V ¬ Phacomatose *Q85.8*
- ¬ Phacomatose *Q85.8*

Pilaire ¬
- Kyste *L72.1*
- Lichen plano- *L66.1*
- Pityriasis rubra *L44.0*

Pileux
- Bord libre lèvre
- - Inférieure et le sillon mentolabial ¬ Peau *C44.0*
- - Supérieure et le nez ¬ Peau *C44.0*
- Non cicatricielle, sans précision ¬ Raréfaction du système *L65.9*
- ¬
- - Développement excessif du système *L68*
- - Formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système *L65.8*
- - Inflammation de la glande du follicule *L73.9*
- - Kyste *L72.1*
- - Nævus: *D22*
- - Tumeurs bénignes de: follicules *D23*

Pili
- Bifurcati ¬ *L67.8*
- Multigemini ¬ *L67.8*
- Torti
- - Onychodysplasie ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - Retard de développement-anomalies neurologiques ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Syndactylie cutanée ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique- *Q82.8*

Pili *–suite*
- Torti *–suite*
- - ¬ *Q84.1*
- Trianguli et canaliculi ¬ *Q84.1*

Pilier amygdale
- Antérieur) (postérieur) ¬ Tumeur maligne: *C09.1*
- ¬ *D10.5*

Pilocytique
- Bénin ¬ Astrocytome *D33.1*
- Cerveau ¬ Astrocytome *C71.0*
- Cervelet ¬ Astrocytome *C71.6*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Astrocytome *C71.8*
- Lobe frontal ¬ Astrocytome *C71.1*
- Lobe occipital ¬ Astrocytome *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ Astrocytome *C71.3*
- Lobe temporal ¬ Astrocytome *C71.2*
- Quatrième ventricule ¬ Astrocytome *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬ Astrocytome *C71.5*
- ¬ Astrocytome *C71.9*

Pilo-dentaire avec défaut de réfraction ¬ Syndrome de dysplasie *Q82.8, H52.7*

Pilomatriciel
- Cou ¬ Carcinome *C44.4*
- Membres supérieurs ¬ Carcinome *C44.6*
- Peau de la face ¬ Carcinome *C44.3*
- Tête ¬ Carcinome *C44.4*
- Tronc ¬ Carcinome *C44.59*
- ¬ Carcinome *C44.9*

Pilomatrixome
- Face ¬ *D23.3*
- Peau
- - Cou ¬ *D23.4*
- - Membres supérieurs ¬ *D23.6*
- ¬ *D23.9*

Pilomyxoïde
- Cerveau ¬ Astrocytome *C71.0*
- Cervelet ¬ Astrocytome *C71.6*
- Hypothalamus ¬ Astrocytome *C71.0*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Astrocytome *C71.8*
- Lobe frontal ¬ Astrocytome *C71.1*
- Lobe occipital ¬ Astrocytome *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ Astrocytome *C71.3*
- Lobe temporal ¬ Astrocytome *C71.2*
- Quatrième ventricule ¬ Astrocytome *C71.7*
- Tronc cérébral ¬ Astrocytome *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬ Astrocytome *C71.5*
- ¬ Astrocytome *C71.9*

Pilon tibial ¬ Fracture du *S82.5*

Pilonidal
- Abcès ¬ Sinus *L05.0*
- E ¬
- - Fistule coccygien(ne) ou *L05*
- - Kyste coccygien(ne) ou *L05*
- Malin ¬ Kyste *C44.59*

Pilonidal *–suite*
- SAI ¬ Kyste *L05.9*
- Sans abcès ¬ Sinus *L05.9*

Pilosité accrue ¬ *L68.9*

Pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs ¬ Renouvellement d'une prescription de *Z30.4*

PIMS [Paediatric inflammatory multisystem syndrome] temporairement associé au COVID-19 ¬ *U10.90*

PIN] ¬ Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la prostate [*N40*

Pince de homard ¬ Main en *Q71.6*

Pinéal
v./v.a. Glande pinéale
- Différenciation intermédiaire ¬ Tumeur du parenchyme *D44.5*
- ¬
- - Carcinome embryonnaire de la région *C75.3*
- - Germinome de la région *C75.3*
- - Tumeur
- - - Papillaire de la région *D44.5*
- - - Sac vitellin de la région *C75.3*
- - Tumeur mixte des cellules germinales de la région *C75.3*

Pinéoblastome ¬ *C75.3*

Pinéocytome ¬ *D44.5*

Pingelap ¬ Cécité de *H53.5*

Pinheiro-Freire-Maia-Miranda ¬ Syndrome de *Q82.8*

Pinkus ¬ Alopécie mucineuse de *L65.2*

Pinta
- Caraté ¬
- - Chancre (initial) de la *A67.0*
- - Hyperkératose de la *A67.1*
- - Lésions
- - - Cutané
- - - - Achromique
- - - - - *A67.2*
- - - - - Lésions cutanées hyperchromiques de la *A67.3*
- - - - Cicatricielles de la *A67.2*
- - - - Dyschromiques de la *A67.2*
- - - Hyperchromiques de la *A67.1*
- - Papule (initiale) de la *A67.0*
- - Plaques érythémateuses de la *A67.1*
- ¬ Lésions
- - Initiales de la *A67.0*
- - Intermédiaires de la *A67.1*
- - Mixtes de la *A67.3*
- - Tardives de la *A67.2*

Pintides ¬ *A67.1*

Pipe électronique ¬ Trouble de la santé en lien avec l'utilisation d'une *U07.0!*

Pipécolinémie ¬ *E72.3*

Pipécolique ¬ Acidémie *E72.3*

Pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association *U81.6!*

Piqueur ¬ Syndrome de: marteau- *T75.2*

Piqûre
- Insecte
- - Non venimeux
- - - Multiples SAI ¬ *T00.9*
- - - ¬
- - - - *W64.9!*
- - - - Lésion traumatique superficielle
- - - - - Membre inférieur, niveau non précisé: Morsure ou *T13.03*
- - - - - Membre supérieur, niveau non précisé: Morsure ou *T11.03*
- - - - - Partie du corps non précisée: Morsure ou *T14.03*
- - - - - Tronc, niveau non précisé: Morsure ou *T09.03*
- - - - Lésions traumatiques superficielles
- - - - - Abdomen, des lombes et du bassin: Morsure ou *S30.83*
- - - - - Avant-bras: Morsure ou *S50.83*
- - - - - Cheville et du pied: Morsure ou *S90.83*
- - - - - Épaule et du bras: Morsure ou *S40.83*
- - - - - Hanche et de la cuisse: Morsure ou *S70.83*
- - - - - Jambe: Morsure ou *S80.83*
- - - - - Poignet et de la main: Morsure ou *S60.83*
- - Venimeux ¬ Morsure d'animal ou *X29.9!*
- Morsure d'insecte venimeux ¬ *T63.4*
- Scorpion ¬ Envenimation suite à la *T63.2*
- ¬ Sensation de *R20.2*

Piriforme ¬
- Carcinome épidermoïde du sinus *C12*
- Récessus *C12*
- Sténose congénitale isolée des orifices *Q30.8*

Piroplasmose ¬ *B60.0*

Piry ¬ Maladie virale de *A93.8*

Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.13*

Pitt-Hopkins ¬ Syndrome de *Q87.8*

Pittsburgh de l'alpha-1-antitrypsine ¬ Hémorragie due à la mutation *E88.08†, D77**

Pituicytome ¬ *D44.3*

Pituitaire
- Isolé familial ¬ Adénome *D35.2*
- Post-partum ¬ Nécrose
- - *E23.0*
- - *E23.0*
- ¬ Insuffisance staturale *E23.0*

Pityriasis
- Alba ¬ *L30.5*
- Lichénoïde

Pityriasis *–suite*
- Lichénoïde *–suite*
- - Chronique ¬ *L41.1*
- - Varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] ¬ *L41.0*
- Nigra ¬ *B36.1*
- Rosé de Gibert ¬ *L42*
- Rubra
- - Hebra) ¬ *L26*
- - Pilaire ¬ *L44.0*
- Streptogène ¬ *L30.5, B95.5!*
- Versicolor ¬ *B36.0*

Piussan-Lenaerts-Mathieu ¬ Syndrome de *Q87.2*

PKAN ¬ *G23.0*

PKI [Pneumatose kystique intestinale] ¬ *K63.8*

PKRAD [polykystose rénale autosomique récessive] ¬ *Q61.1*

PKU
- Maternelle ¬ *E70.1*
- Modérée ¬ *E70.1*

PLA2G4A [phospholipase-A2 alpha cytosolique] ¬ Anomalie plaquettaire associée à *D69.1*

PLAA ¬ Trouble neurologique du développement associé à *Q02*

PLAAT3 ¬ Syndrome de lipodystrophie associé à *E88.1*

Placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: attente d'une famille adoptive ou d'un *Z76.2*

Placenta
- Adhaerens
- - Saignement ¬ *O43.20, O72.0*
- - Sans saignement ¬ *O43.20, O73.0*
- - ¬ *O43.20*
- Amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical ¬ Lésion du *P02.1*
- Anomalie de la coagulation ¬ Décollement prématuré du *O45.0*
- Anormal SAI ¬ *O43.1*
- Circumvallata ¬ *O43.1*
- Cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du *P02.3*
- Hémorragie actuelle ¬
- - Descente du *O44.10*
- - Placenta praevia et descente du *O44.1*
- Increta
- - Percreta ¬ *O43.21*
- - Sans saignement ¬ *O43.21, O73.0*
- - Tant complication de l'accouchement
- - - Sans saignement ¬ *O43.21, O73.0*
- - - ¬ *O43.21*
- - ¬ *O43.21*
- Membrane

Placenta *–suite*
- Membrane *–suite*
- - Sans hémorragie ¬ Rétention partielle du *O73.1*
- - ¬ Hémorragie associée à la rétention partielle du *O72.2*
- Percreta
- - Saignement du post-partum ¬ *O43.21, O72.0*
- - Sans saignement ¬ *O43.21, O73.0*
- - Tant complication de l'accouchement
- - - Sans saignement ¬ *O43.21, O73.0*
- - - ¬ *O43.21*
- Praevia
- - Descente placenta
- - - Hémorragie actuelle ¬ *O44.1*
- - - Sans
- - - - Hémorragie (actuelle) ¬ *O44.0*
- - - - Précisions ¬ *O44.0*
- - Hémorragie actuelle ¬ *O44.11*
- - Sans hémorragie (actuelle) ¬ *O44.01*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par *P02.0*
- SAI ¬ Rétention du *O72.0*
- Sans
- - Hémorragie
- - - Actuelle ¬
- - - - Descente du *O44.00*
- - - - Placenta praevia et descente du *O44.0*
- - - ¬ Rétention du *O73.0*
- - Précision ¬
- - - Anomalie du *O43.9*
- - - Décollement prématuré du *O45.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du *P02.2*
- - Précisions ¬ Placenta praevia et descente du *O44.0*
- Tant que complication de l'accouchement sans saignement ¬ Adhérence du *O43.20, O73.0*
- ¬
- - Anomalies du *O43.8*
- - Complication de l'accouchement par une anomalie d'implantation du *O44.00*
- - Décollement
- - - Prématuré du *P02.1*
- - - Prématurés du *O45.8*
- - Dysfonctionnement du *O43.8*
- - Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du *O72.0*
- - Malformation du *O43.1*
- - Nouveau-né affecté par une malformation du *P02.2*
- - Tumeur maligne du *C58*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D39.2*

Placenta accreta
- Sans saignement ¬ *O43.20, O73.0*
- Tant complication de l'accouchement

Placenta accreta *–suite*
- Tant complication de l'accouchement *–suite*
- - Sans saignement ¬ *O43.20, O73.0*
- - ¬ *O43.20*
- ¬ *O43.20*

Placentaire
v./v.a. rétroplacentaire
- Voie vaginale) ¬ Prélèvement *Z36.0*
- ¬
- - Césarienne au cours d'insuffisance *O36.5*
- - Dysfonction *P02.2*
- - Effets non tératogènes de substances transmises par voie *P04*
- - Fœtus nouveau-né affectés
- - - Formes de décollement et d'hémorragie *P02.1*
- - - Syndromes de transfusion *P02.3*
- - Grossesse compliquée par une anomalie d'insertion *O44.00*
- - Infarctus
- - - *O43.8*
- - - *P02.2*
- - Insuffisance *P02.2*
- - Perte de sang fœtal d'origine *P50.2*
- - Polype *O90.8*
- - Tumeur trophoblastique *D39.2*

Placentite ¬
- *O41.1*
- *P02.7*

PLACK] ¬ Syndrome de peau déciduale-leuconychie-kératose acrale ponctuée-chéilite-nodosités [*Q84.8*

Placoïde persistante ¬ Maculopathie *H35.38*

Plafond du rhinopharynx ¬ *C11.0*

Plagiocéphalie
- Frontale isolée ¬ *Q67.3*
- Occipitale isolée ¬ *Q67.3*
- Synostotique antérieure non syndromique ¬ *Q67.3*
- ¬ *Q67.3*

PLAID ¬ *M35.8*

Plaie
- Actes médicaux ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- Cutanées ¬ Myiase des *B87.1*
- Épisiotomie ¬ Infection d'une *O86.0*
- Intraabdominale ¬ Plaie ouverte communicant avec une fracture, une luxation ou *S31*
- Non classée ailleurs ¬ Infection post-traumatique d'une *T79.3*
- Obstétricale ¬ Hématome d'une *O90.2*
- Opération ¬ Inflammation localisée purulente d'une *T81.4*
- Origine obstétricale chirurgicale ¬ Infection d'une *O86.0*
- Ouverte SAI ¬ *T14.1*
- Pénétrant
- - Globe oculaire

Plaie *–suite*
- Pénétrant *–suite*
- - Globe oculaire *–suite*
- - - Corps étranger ¬ *S05.5*
- - - Sans corps étranger ¬ *S05.6*
- - Orbite
- - - Sans corps étranger ¬ *S05.4*
- - - ¬ Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une *H05.5*
- Punctiforme
- - Corps étranger (pénétrant) SAI ¬ *T14.1*
- - Multiples SAI ¬ *T01.9*
- Superficielle du coude ¬ Autre *S50.88*
- Thoracique ouverte sans précision ¬ *S21*
- ¬
- - Cicatrisation secondaire d'une *T89.03*
- - Résultats anormaux de: sécrétions au niveau d'une *R89*
- - Séquelles d'infection post-traumatique d'une *T98.2*

Plaie opératoire
- Non classée ailleurs ¬ Désunion d'une *T81.3*
- Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une *T81.5*
- ¬
- - Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une *T81.5*
- - Déhiscence d'une *T81.3*
- - Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une *T81.5*
- - Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une *T81.5*
- - Rupture d'une *T81.3*

Plaie ouverte
- Abdomen
- - Lombes et du bassin ¬ Plaies ouvertes du thorax avec *T01.1*
- - Région lombosacrée et du bassin SAI ¬ *S31*
- Associations de parties du corps ¬ *T01.8*
- Associée fracture luxation
- - Lésion
- - - Intracrânienne ¬ *S01*
- - - Intrathoracique ¬ *S21*
- - ¬
- - - *S51*
- - - *S61*
- - - *S71*
- - - *S81*
- Atteinte
- - Pharynx œsophage cervical
- - - Œsophage cervical ¬ *S11.22*
- - - Pharynx ¬ *S11.21*
- - Thyroïde ¬ *S11.1*

Plaie ouverte *–suite*
- Avant-bras
- - Partie non précisée ¬ *S51.9*
- - SAI ¬ *S51*
- Bras ¬ *S41.1*
- Cheville ¬ *S91.0*
- Communicant fracture luxation
- - Plaie intraabdominale ¬ *S31*
- - ¬
- - - *S11*
- - - *S41*
- - - *S91*
- Corps étranger (avec ou sans infection) ¬ Complications d'une *T89.01*
- Cou
- - Partie non précisée ¬ *S11.9*
- - SAI ¬ *S11*
- - Tronc ¬ Séquelles de lésion traumatique superficielle et de *T91.0*
- - ¬ Plaies ouvertes de la tête avec *T01.0*
- Coude ¬ *S51.0*
- Cuir chevelu ¬ *S01.0*
- Cuisse ¬ *S71.1*
- Doigt s
- - Lésion de l'ongle ¬ *S61.1*
- - SAI ¬ *S61.0*
- - Sans lésion de l'ongle ¬ *S61.0*
- Épaule
- - Bras SAI ¬ *S41*
- - ¬ *S41.0*
- Épiglotte ¬ *S11.01*
- Genou ¬ *S81.0*
- Hanche
- - Cuisse SAI ¬ *S71*
- - ¬ *S71.0*
- Infection ¬ Complications d'une *T89.02*
- Jambe
- - Partie non précisée ¬ *S81.9*
- - SAI ¬ *S81*
- Joue région temporo maxillaire
- - Joue ¬ *S01.41*
- - Parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ *S01.49*
- - Région maxillaire
- - - Inférieure ¬ *S01.43*
- - - Supérieure ¬ *S01.42*
- Lèvre cavité buccal
- - Bouche, partie non précisée ¬ *S01.50*
- - Gencive (processus alvéolaire) ¬ *S01.53*
- - Langue et plancher de la bouche ¬ *S01.54*
- - Lèvre ¬ *S01.51*
- - Muqueuse de la joue ¬ *S01.52*
- - Palais ¬ *S01.55*
- - Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ *S01.59*
- Lombes et du bassin ¬ *S31.0*
- Malléole et du pied SAI ¬ *S91*

Plaie ouverte *–suite*
- Membre
- - Inférieur
- - - Niveau non précisé ¬ *T13.1*
- - - ¬ Séquelles de *T93.0*
- - S) inférieur(s) ¬ Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec *T01.6*
- - Supérieur
- - - Niveau non précisé ¬ *T11.1*
- - - ¬ Séquelles de *T92.0*
- Multiples
- - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S31.7*
- - Avant-bras ¬ *S51.7*
- - Cheville et du pied ¬ *S91.7*
- - Cou ¬ *S11.7*
- - Épaule et du bras ¬ *S41.7*
- - Hanche et de la cuisse ¬ *S71.7*
- - Jambe ¬ *S81.7*
- - Paroi thoracique ¬ *S21.7*
- - Poignet et de la main ¬ *S61.7*
- - Sans précision ¬ *T01.9*
- - Tête ¬ *S01.7*
- N'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique ¬ *S21.83!*
- Nez
- - Orifice nasal ¬ *S01.22*
- - Partie non précisée ¬ *S01.20*
- - Parties ou parties multiples du nez ¬ *S01.29*
- - Peau externe du nez ¬ *S01.21*
- - Septum nasal ¬ *S01.23*
- Non précisée
- - Partie
- - - Cou ¬ *S11.80*
- - - Thorax ¬ *S21.80*
- - Parties
- - - Avant-bras ¬ *S51.80*
- - - Jambe ¬ *S81.80*
- - - Non précisées de la ceinture scapulaire ¬ *S41.80*
- - - Poignet et de la main ¬ *S61.80*
- - - Tête ¬ *S01.80*
- Œsophage thoracique ¬ *S27.83, S21.83!*
- Orbite ¬ *S05.9*
- Oreille
- - Appareil auditif
- - - Canal auditif
- - - - Externe ¬ *S01.34*
- - - - ¬ *S01.35*
- - - Oreille interne ¬ *S01.38*
- - - Osselets ¬ *S01.36*
- - - Partie non précisée ¬ *S01.30*
- - - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif ¬ *S01.39*
- - - Pavillon de l'oreille ¬ *S01.31*

Plaie ouverte *–suite*
- Oreille *–suite*
- - Appareil auditif *–suite*
- - - Tragus ¬ *S01.33*
- - - Tympan ¬ *S01.37*
- - Interne ¬ *S01.38*
- Organes génitaux externes, autres et non précisés ¬ *S31.5*
- Orteil s
- - Lésion de l'ongle ¬ *S91.2*
- - SAI ¬ *S91.1*
- - Sans lésion de l'ongle ¬ *S91.1*
- Paroi abdominale ¬ *S31.1*
- Paroi thoracique
- - Antérieure ¬ *S21.1*
- - Postérieure ¬ *S21.2*
- Partie
- - Corps non précisée ¬ *T14.1*
- - Malléole et du pied ¬ *S91.80*
- Parties
- - Non précisées
- - - Abdomen ¬ *S31.80*
- - - Ceinture du bassin ¬ *S71.80*
- - Pied ¬ *S91.3*
- Paupière région périoculaire
- - Sans atteinte des voies lacrymales ¬ *S01.1*
- - ¬ *S01.1*
- Pénis ¬ *S31.2*
- Pied SAI ¬ *S91.3*
- Plusieurs parties membre s
- - Inférieur(s) ¬ *T01.3*
- - Supérieur s
- - - Plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s) ¬ *T01.6*
- - - ¬ *T01.2*
- Poignet main
- - Partie non précisée ¬ *S61.9*
- - SAI ¬ *S61*
- Pouce ¬ *S61.0*
- Région de la mâchoire ¬ *S01.80*
- Sans précision ¬ Complications d'une *T89.00*
- Scrotum et des testicules ¬ *S31.3*
- Sein ¬ *S21.0*
- Tête
- - Partie non précisée ¬ *S01.9*
- - Plaies ouvertes du cou ¬ *T01.0*
- - SAI ¬ *S01*
- - ¬
- - - *S01.9*
- - - Séquelles de *T90.1*
- Thorax
- - Partie non précisée ¬ *S21.9*
- - Plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ *T01.1*
- Toute partie

Plaie ouverte *–suite*
- Toute partie *–suite*
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale ¬ *S31.83!*
- - Tête) associée à une lésion intracrânienne ¬ *S01.83!*
- Trachée, partie cervicale ¬ *S11.02*
- Tronc, niveau non précisé ¬ *T09.1*
- Vagin et de la vulve ¬ *S31.4*
- Zone de l'os alvéolaire ¬ *S01.59*
- ¬ Complications d'une *T89.03*

Plaisir sexuel ¬ Aversion sexuelle et manque de *F52.1*

Plakophiline ¬ Épidermolyse bulleuse simple par déficit en *Q81.0*

Plan
- Actinique ¬ Lichen *L43.3*
- Annulaire
- - Atrophique ¬ Lichen *L43.8*
- - ¬ Lichen *L43.8*
- Atrophique ¬ Lichen *L43.8*
- Bulleux ¬ Lichen *L43.1*
- Cours de syphilis congénitale ¬ Condylome *A50.0*
- Folliculaire ¬ Lichen *L66.1*
- Hypertrophique ¬ Lichen *L43.0*
- Linéaire ¬ Lichen *L43.8*
- Pigmentaire ¬ Lichen *L43.8*
- Sans précision ¬ Lichen *L43.9*
- Subaigu (actif) ¬ Lichen *L43.3*
- Tropical ¬ Lichen *L43.3*
- Tropicalis ¬ Lichen *L43.3*
- ¬
- - Comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier *F42.1*
- - Idées ou ruminations obsédantes au premier *F42.0*
- - Lichens *L43.8*

Plancher
- Antérieur bouche ¬
- - Carcinome basocellulaire du *C04.0*
- - Tumeur maligne: *C04.0*
- Bouche
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C04.9*
- - ¬
- - - Carcinome basocellulaire, lésion à localisations contiguës du *C04.8*
- - - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et *S01.54*
- - - Tumeur bénigne: *D10.2*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du *C04.8*
- Buccal ¬ Kyste du *K11.6*
- Latéral bouche ¬
- - Carcinome basocellulaire du *C04.1*
- - Tumeur maligne: *C04.1*
- Orbite ¬ Fracture du *S02.3*

Plancher *–suite*
- Pelvien
- - Cicatriciel ¬ Soins maternels pour: *O34.8*
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: *O70.1*
- - Rigide ¬ Soins maternels pour: *O34.8*
- - ¬ Déchirure ancienne des muscles du *N81.8*
- Rhinopharynx ¬ *C11.3*
- ¬ Phlegmon de la bouche (*K12.20*

Planification familiale SAI ¬ *Z30.0*

Plano-pilaire ¬ Lichen *L66.1*

Planovalgus ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-hypotonie-strabisme-traits grossiers du visage- *Q87.8*

Plantaire
v./v.a. Artère plantaire
- Acquise ¬ Kératose [kératodermie] palmaire et *L85.1*
- Clinodactylie du cinquième doigt ¬ Kératose palmo- *Q82.8, Q68.1*
- Externe ¬ Lésion traumatique du nerf *S94.0*
- Humide (pian-crabe) ¬ Papillomes multiples et pian *A66.1*
- Hyperkératosiques et trichophytoïdes ¬ Pianides *A66.3*
- Interne ¬ Lésion traumatique du nerf *S94.1*
- Palmaire ¬ Papillome pianique *A66.1*
- Précoce) (tardive), due au pian ¬ Hyperkératose palmaire ou *A66.3*
- Syphilitique ¬
- - Mal perforant *A52.1†, L99.8**
- - Tabès avec mal perforant *A52.1†, L99.8**
- - Tabo-paralysie avec mal perforant *A52.1†, L99.8**
- ¬
- - Contraction du fascia *M72.2*
- - Érythème *L53.8*
- - Fasciite *M72.2*
- - Fibromatose de l'aponévrose *M72.2*
- - Kératose ponctuée (palmaire et *L85.2*
- - Lésion du nerf *G57.6*
- - Pustulose palmaire et *L40.3*

Plante
- Non venimeuse) ¬ Lésion due à une *W64.9!*
- Produits de naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.6*
- Remèdes populaires ¬ Abus de: préparations à base de *F55*
- Veineux
- - Animaux venimeux ¬ Accident dû au contact avec des *X29.9!*
- - ¬
- - - Consommation d'animaux venimeux ou de *X49.9!*
- - - Intoxication par des *T62.2*
- - - Lésion due à des *X29.9!*

Planus] (acquis) ¬ Pied plat [pes *M21.4*

Plaque
- Crânienne ¬ *Z96.7*
- Hollenhorst ¬ *H34.2*
- Muqueuse syphilitique ¬ *A51.3*
- Ostéosynthèse ¬ Fracture osseux
- - Mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une *M96.6*
- - Retrait d'une *M96.6*
- Pleural
- - Asbestose ¬ *J92.0*
- - SAI ¬ *J92.9*
- - Sans asbestose ¬ *J92.9*
- Prothèse interne de fixation ¬ Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une *Z47.0*
- ¬ Enlèvement de: *Z47.0*

Plaques
- Épicardiques ¬ *I31.88*
- Érythémateuses de la pinta [caraté] ¬ *A67.1*
- Kératosiques péri-orificielles ¬ Kératodermie palmoplantaire mutilante avec *Q82.8*
- Muqueuses syphilitiques congénitales ¬ *A50.0*
- ¬
- - Atrophie blanche (en *L95.0*
- - Parapsoriasis
- - - Grandes *L41.4*
- - - Petites *L41.3*
- - Urticaire pigmentaire en *Q82.2*

Plaquettaire
- Associée à PLA2G4A [phospholipase-A2 alpha cytosolique] ¬ Anomalie *D69.1*
- Delta ¬ Déficit isolé de stockage des granules *D69.1*
- P2Y12 de l'ADP [adénosine diphosphate] ¬ Trouble de la coagulation dû à une anomalie du récepteur *D69.1*
- Québec ¬ Syndrome *D69.1*
- Sans hémorragie ¬ Traitement continu par des antiagrégants *Z92.2*
- ¬
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des antiagrégants *D69.80*
- - Thrombocytopénie autosomique dominante avec défaut de sécrétion *D69.41*
- - Troubles hémorragiques dus à des antiagrégants *D69.80*

Plaquettes
- Anormales et neutropénie ¬ Anémie dyserythropoïétique liée à l'X avec *D64.4, D70.0*
- Congénitale autosomique récessive ¬ Thrombocytopénie à petites *D69.1*
- Familial associé à une prédisposition à la leucémie myéloïde aiguë ¬ Syndrome des *D69.1*
- Grises ¬ Syndrome des *D69.1*
- Normales ¬ Thrombocytopénie héréditaire avec *D69.41*
- Sanguines géantes ¬ Syndrome des *D69.1*

Plaquettes *–suite*
- ¬ Modifications qualitatives des *D69.1*

Plasma
- Liquide extracellulaire ¬ Déplétion du volume du *E86*
- ¬ Succédané du *T45.8*

Plasmablastique ¬ Lymphome diffus à grandes cellules B *C83.3*

Plasmacytoïdes dendritiques blastiques [TCPDB] ¬ Tumeur à cellules *C86.4*

Plasmacytome
- Extramédullaire en rémission complète ¬ *C90.21*
- Primaire de l'os ¬ *C90.30*

Plasmatique
- Anormale ¬ Viscosité *R70.1*
- Non classées ailleurs ¬ Anomalies du métabolisme des protéines *E88.0*
- PTA] ¬ Déficit en précurseur de thromboplastine *D68.1*
- Sans précision ¬ Anomalie des protéines *R77.9*
- ¬
- - Anomalies
- - - Métabolisme des protéines *E88.08*
- - - Précisées des protéines *R77.8*
- - Modifications précisées des taux de protéines *R77.88*
- - Polycythémie: due à: chute du volume *D75.1*

Plasminogène
- Type 1 ¬ Déficit en *D68.8*
- ¬ Déficit congénital en inhibiteur 1 de l'activateur du *D68.8*

Plasmique ¬ Défaut du transporteur de carnitine à travers la membrane *E71.3*

Plasmoblastique ¬ Lymphome *C83.3*

Plasmocytaire
- Rémission complète ¬ Leucémie *C90.11*
- ¬
- - Leucémie *C90.10*
- - Lymphome *C83.0*

Plasmocytes
- Localisée SAI ¬ Tumeur maligne à *C90.3*
- Rémission complète ¬
- - Leucémie à *C90.11*
- - Myélome à *C90.01*
- ¬ Myélome monostotique à *C90.00*

Plasmocytome
- Médullaire en rémission complète ¬ *C90.01*
- Rémission complète ¬
- - Arthropathie au cours de *C90.01†, M36.1**
- - Maladie
- - - Glomérulaire au cours de *C90.01†, N08.1**
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de *C90.01†, N16.1**
- SAI ¬ *C90.3*
- Solitaire ¬ *C90.30*

Plasmocytome *–suite*
- ¬
- - *C90.30*
- - Arthropathie au cours de *C90.00†, M36.1**
- - Glomérulopathie au cours de *C90.00†, N08.1**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *C90.00†, N16.1**

Plasmocytose
- Cutanée primitive ¬ *D47.9*
- ¬ *D72.8*

Plasmodies simiennes ¬ Paludisme à *B53.1*

Plasmodium
- Exception Plasmodium falciparum
- - Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de *B52*
- - ¬ infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de *B51*
- Falciparum
- - Complication
- - - Cérébrale ¬ Paludisme à *B50.0†, G94.8**
- - - ¬ Paludisme à *B50.8*
- - Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de *B52*
- - Toute autre espèce de Plasmodium ¬ Infections mixtes à *B50*
- - ¬
- - - Infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de *B51*
- - - Paludisme
- - - - *B50.9*
- - - - Congénital à *P37.3*
- Malariae
- - Atteinte rénale ¬ Paludisme à *B52.0†, N08.0**
- - Complications ¬ Paludisme à *B52.8*
- - Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à *B52*
- - Sans complication ¬ Paludisme à *B52.9*
- - ¬
- - - Glomérulonéphrite à *B52.0†, N08.0**
- - - Paludisme à *B52.9*
- Ovale ¬ Paludisme à *B53.0*
- Vivax
- - Complications NCA ¬ Paludisme à *B51.8*
- - Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum ¬ infections mixtes à *B51*
- - Rupture de la rate ¬ Paludisme à *B51.0†, D77**
- - Sans complication ¬ Paludisme à *B51.9*
- - ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de *B52*
- ¬ Infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre espèce de *B50*

Plastie
- Correction ¬ Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, avec *Z91.70*
- Glissement sans partie cutanée ¬ Rejet d'une mammoplastie par *T86.84*
- Vasculaire périphérique, SAI ¬ État consécutif à une *Z95.88*

Plastique
v./v.a. Linite plastique
- Corps caverneux ¬ Induration *N48.6*
- Correctrice pour cicatrice après traumatisme ¬ chirurgie *Z42*
- Extrémités inférieures ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.4*
- Extrémités supérieures ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.3*
- Motifs cosmétiques ¬ Chirurgie *Z41.1*
- Parties
- - Corps ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.8*
- - Tronc ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.2*
- Sans précision ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.9*
- Sein ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.1*
- Tête et du cou ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.0*
- ¬
- - *L23.5*
- - Bronchite *J20.9*

Plat
- Congénital ¬ Pied *Q66.5*
- Contracté ¬ Pied *Q66.5*
- Pes planus] (acquis) ¬ Pied *M21.4*
- Spastique (en valgus) ¬ Pied *Q66.5*
- Valgus acquis ¬ Pied
- - *M21.61*
- - *M21.61*
- - *M21.63*
- ¬
- - Condylome *A51.3*
- - Syndrome du dos *M40.3*

Plateau tibial ¬
- *S82.1*
- Fracture du *S82.18*

Platine ¬
- Asthme dû à la *J45.09*
- Réaction allergique
- - Contact d'un composé du *T78.4*
- - Traitement avec un composé du *T88.7*

Plâtre
- Utilisé à des fins thérapeutiques ¬ Ulcère dû au *L89*
- ¬ Changement, vérification ou enlèvement de: *Z47.8*

Platybasie ¬ *Q75.8*

Platyspondylie sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*

Platyspondylique type Torrance ¬ Dysplasie *Q77.8*

PLCG2 [APLAID] ¬ Syndrome auto-inflammatoire-dérèglement avec déficit immunitaire lié à *M35.8*

PLEC ¬ Epidermolyse bulleuse simple intermédiaire sans manifestations extra-cutanées associée à *Q81.0*

Pléiomorphe
v./v.a. Liposarcome pléiomorphe

Pléomorphe
v./v.a. Sarcome pléomorphe indifférencié
- Cerveau ¬ Xanthoastrocytome *C71.0*
- Cervelet ¬ Xanthoastrocytome *C71.6*
- Glande parotide ¬ Adénome *D11.0*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Xanthoastrocytome *C71.8*
- Lobe frontal ¬ Xanthoastrocytome *C71.1*
- Lobe occipital ¬ Xanthoastrocytome *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ Xanthoastrocytome *C71.3*
- Lobe temporal ¬ Xanthoastrocytome *C71.2*
- Quatrième ventricule ¬ Xanthoastrocytome *C71.7*
- Taille petite à moyenne CD4+ ¬ Lymphome T cutané à cellules *C84.4*
- Tissu mou
- - Abdomen ¬ Rhabdomyosarcome *C49.4*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ Rhabdomyosarcome *C49.8*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ Rhabdomyosarcome *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ Rhabdomyosarcome *C49.1*
- - Pelvis ¬ Rhabdomyosarcome *C49.5*
- - Tête ¬ Rhabdomyosarcome *C49.0*
- - Thorax ¬ Rhabdomyosarcome *C49.3*
- - Tronc ¬ Rhabdomyosarcome *C49.6*
- Ventricule cérébral ¬ Xanthoastrocytome *C71.5*
- ¬
- - Rhabdomyosarcome *C49.9*
- - Xanthoastrocytome *C71.9*

Pléonostéose de Léri ¬ *Q68.8*

Pleural
- Asbestose ¬ Plaque *J92.0*
- Chyliforme ¬ Épanchement *J94.0*
- Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.6*
- Cours
- - Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Épanchement *J10.1*
- - Maladies classées ailleurs ¬ Épanchement *J91**
- - Tumeur maligne secondaire de la plèvre ¬ Épanchement *C78.2†, J91**
- Fibreux ¬ épaississement *J92*
- Fistule ¬
- - Abcès *J86.09*
- - Empyème *J86.09*
- Grippal

Pleural *–suite*
- Grippal *–suite*
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ Épanchement *J11.1*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: épanchement *J10.1*
- - ¬ Épanchement *J11.1*
- Non classé ailleurs ¬ Épanchement *J90*
- Précisées ¬ Autres affections *J94.8*
- SAI ¬ Plaque *J92.9*
- Sans
- - Asbestose ¬ Plaque *J92.9*
- - Précision ¬ Affection *J94.9*
- Tuberculeuse NCA ¬ Fistule *A16.5*
- Tuberculeux
- - Primaire, confirmé par analyse bactériologique ou histologique ¬ Épanchement *A15.7†, J91**
- - ¬ Épanchement *A16.5†, J91**
- Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec épanchement *J09*
- ¬
- - Abcès
- - - *J86*
- - - *J86.9*
- - Adhérence
- - - *A16.5*
- - - *J94.8*
- - Amylose *E85.4†, J99.8**
- - Calcification *J94.8*
- - Calcinose *E83.58†, J99.8**
- - Empyème *J86.9*
- - Épanchement *J90*
- - Fistule
- - - *J86.09*
- - - Hépato- *J86.08*
- - - Œsophago- *J86.04*
- - - Trachéo- *J86.01*
- - Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à un épanchement *J09, U69.23!*
- - - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à un épanchement *J09, U69.22!*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à un épanchement *J09, U69.24!*
- - Mésothéliome de la plèvre avec épanchement *C45.0†, J91**
- - Pyothorax avec fistule œsophago- *J86.04*
- - Résultats anormaux de: liquide *R84*

Pleurésie
- Aspergillus ¬ *B44.8*
- Carcinomateuse ¬ *C78.2*
- Épanchement tuberculeux NCA ¬ *A16.5†, J91**

Pleurésie *–suite*
- Fibrino-purulente ¬ *J86.9*
- Purulente
- - Fistule ¬ *J86.09*
- - ¬ *J86.9*
- Septique avec fistule ¬ *J86.09*
- Tuberculeuse
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.6*
- - Primaire avec épanchement, confirmée par analyse bactériologique ou histologique ¬ *A15.7†, J91**
- - ¬ *A16.5*

Pleurite
- Épanchement ¬ *J90*
- Tuberculeuse
- - Épanchement, avec confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.6†, J91**
- - Primaire ¬ *A16.7*

Pleurocutané
- Tuberculeuse NCA ¬ Fistule *A16.5*
- ¬ Fistule *J86.02*

Pleurodynie épidémique ¬ *B33.0*

Pleuroparenchymateuse idiopathique ¬ Fibroélastose *J84.10, J94.1*

Pleuro-péricardiques ¬ Kystes *Q24.8*

Pleuropéritonéal
- Tuberculeuse NCA ¬ Fistule *A16.5*
- ¬ Fistule *J86.08*

Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO] ¬ *B96.0!*

Pleuropneumonie septique ¬ *J18.8*

Pleuropulmonaire
- Cours de syndrome de prédisposition tumorale DICER1 ¬ Blastome *C34.9, C38.4*
- Idiopathique ¬ Fibroélastose *J84.10, J94.1*
- Lobe
- - Inférieur du poumon ¬ Blastome *C34.3, C38.4*
- - Moyen du poumon ¬ Blastome *C34.2, C38.4*
- - Supérieur du poumon ¬ Blastome *C34.1, C38.4*
- Type
- - 1
- - - Lésion à localisations contiguës ¬ Blastome *C34.8, C38.4*
- - - Lobe
- - - - Inférieur du poumon ¬ Blastome *C34.3, C38.4*
- - - - Moyen du poumon ¬ Blastome *C34.2, C38.4*
- - - - Supérieur du poumon ¬ Blastome *C34.1, C38.4*
- - - ¬ Blastome *C34.9, C38.4*
- - 2
- - - Lésion à localisations contiguës ¬ Blastome *C34.8, C38.4*
- - - Lobe

Pleuropulmonaire *–suite*
- Type *–suite*
- - 2 *–suite*
- - - Lobe *–suite*
- - - - Inférieur du poumon ¬ Blastome *C34.3, C38.4*
- - - - Moyen du poumon ¬ Blastome *C34.2, C38.4*
- - - - Supérieur du poumon ¬ Blastome *C34.1, C38.4*
- - 3
- - - Lésion à localisations contiguës ¬ Blastome *C34.8, C38.4*
- - - Lobe
- - - - Inférieur du poumon ¬ Blastome *C34.3, C38.4*
- - - - Moyen du poumon ¬ Blastome *C34.2, C38.4*
- - - - Supérieur du poumon ¬ Blastome *C34.1, C38.4*
- - - ¬ Blastome *C34.9, C38.4*
- ¬ Blastome *C34.9, C38.4*

Pleurs
- Excessifs du nourrisson ¬ *R68.1*
- Isolée ¬ Asymétrie faciale des *Q18.8*

Plèvre
- Confirmation bactériologique histologique ¬
- - Calcification tuberculeuse de la *A15.6*
- - Primo-infection tuberculeuse de la *A15.7*
- - Tuberculose de la *A15.6*
- Épanchement pleural ¬ Mésothéliome de la *C45.0†, J91**
- ¬
- - Anomalie de la *Q34.0*
- - Épanchement pleural au cours d'une tumeur maligne secondaire de la *C78.2†, J91**
- - Inflammation de la *R09.1*
- - Lésion traumatique de la *S27.6*
- - Primo-infection tuberculeuse de la *A16.7*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, J99.8**
- - Tuberculose de la *A16.5*
- - Tumeur
- - - Adénomatoïde de la *D19.0*
- - - Mésothéliale papillaire bien différenciée de la *D19.0*
- - Tumeur bénigne: Tissu mésothélial de la *D19.0*
- - Tumeur maligne
- - - *C38.4*
- - - Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la *C38.8*
- - - Secondaire de la *C78.2*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D38.2*

Plexiforme ¬ Neurofibrome *D36.1*

Plexopathie radio-induite plexus
- Brachial ¬ *G54.0, G97.88*
- Lombosacré ¬ *G54.1, G97.88*

Plexus
- Brachial
- - Due au déplacement de disque intervertébral ¬ Névrite du *M50.1†, G55.1**
- - Inférieur ¬ paralysie du *P14.1*
- - Supérieur ¬ paralysie du *P14.0*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Autres lésions du *P14.3*
- - ¬
- - - Affections du *G54.0*
- - - Anomalie du *Q07.8*
- - - Compression du *G54.0*
- - - Lésion traumatique
- - - - *S14.3*
- - - - Obstétricale persistente du *P14.3*
- - - Névrite du *G54.5*
- - - Plexopathie radio-induite du *G54.0, G97.88*
- Cardiaque ¬ *S24.4*
- Choroïde
- - Forme infantile ¬ Calcifications du *G93.88*
- - ¬
- - - Carcinome des *C71.5*
- - - Papillome
- - - - *D33.0*
- - - - Atypique des *C71.5*
- Choroïdien du quatrième ventricule ¬ Papillome du *D33.1*
- Cœliaque ¬ Ganglion ou *S34.5*
- Hémorroïdaires ¬ Thrombose des *K64.5*
- Hypogastrique ¬ *S34.5*
- Lombosacré ¬
- - Affections du *G54.1*
- - Plexopathie radio-induite du *G54.1, G97.88*
- Lombo-sacré ¬ Lésion traumatique du *S34.4*
- Mésentérique (inférieur) (supérieur) ¬ *S34.5*
- Nerveux
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Compression des racines et des *G55.8**
- - Sans précision ¬ Affection des racines et des *G54.9*
- - ¬ Autres affections des racines et des *G54.8*
- Œsophagien ¬ *S24.4*
- Pampiniforme ¬ Thrombose du *I80.88*
- Pulmonaire ¬ *S24.4*
- Rachidien du tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du *T09.4*

PLG ¬ Angio-œdème héréditaire C1Inh normal
- Lié à *D84.1*
- Non associé à F12 ni *D84.1*

Pli
- Anal hypertrophié ¬ *K64.4*
- Articulations ¬ Anonychie avec hyper et hypopigmentation des *Q84.3*

Pli *–suite*
- Circulaires bénins multiples de la peau des membres ¬ *Q82.8*
- Flexion ¬
- - Eczéma (de): *L20.8*
- - Psoriasis des *L40.8*
- Interdigital distalisé ¬ *Q70.1*
- Membrane de Descemet ¬ *H18.3*
- Palmaires anormaux ¬ *Q82.8*
- S) glosso-épiglottique(s) ¬ *C10.1*
- ¬ Dermatose réticulée des *L81.8*

Plicaturée ¬ Langue *K14.5*

PLIN1 ¬ Lipodystrophie partielle familiale associée à *E88.1*

PLIN4 ¬ Myopathie distale associée à *G71.08*

PLMS] ¬ Periodic Limb Movements in Sleep [*G25.80*

PLMT [Painful legs and moving toes]-Syndrom ¬ *G25.88*

Plomb
- Composés ¬ Effet toxique: *T56.0*
- ¬
- - Cachexie due au *T56.0*
- - Effet toxique du *T56.0*
- - Effets toxiques de composés de *T56.0*
- - Intoxication au *T56.0*

Plongeurs ¬ Paralysie des *T70.3*

Ploski
v./v.a. Lenk-Ploski

Plumes ¬ Allergie aux *J30.3*

Pluriendocrinienne ¬ Adénomatose *D44.8*

Pluriglandulaire
- Auto-immun ¬
- - Atrophie *E31.0*
- - Insuffisance *E31.0*
- Résultant d'une anomalie dans le transport mucociliaire] [Immotile cilia syndrome] [triade de Kartagener] ¬ Syndrome de Kartagener [Situs inversus viscerum, bronchectasie, sinusite chronique et polypes nasaux] [insuffisance *Q89.3*
- Sans précision ¬
- - Dysfonctionnement *E31.9*
- - Tumeur maligne: Atteinte *C75.8*
- ¬
- - Dysfonctionnements *E31.8*
- - Hyperfonctionnement *E31.1*
- - Syndrome *D44.8*
- - Tumeur bénigne: Atteinte *D35.8*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Atteinte *D44.8*

PM] ¬ Polymyosite [*M33.2*

PMLD ¬ *E75.2*

PMP [Pseudomyxome péritonéal] ¬ *C78.6*

PMP2 ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth type 1 associée à *G60.0*

PMSE [polyhydramnios-mégalencéphalie-épilepsie symptomatique] ¬ Syndrome *Q87.0*

PMUBD [Prolifération mélanocytaire uvéale bilatérale diffuse] ¬ *C80.9†, H32.8**

PNCA ¬ Encéphalite otogène disséminée *H66.4†, G05.8**

PNET) du système nerveux central ¬ Tumeur neuroectodermique primitive (*C72.9*

Pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur *P03.3*

Pneumatose kystique intestinale] ¬ PKI [*K63.8*

Pneumoblastome ¬ *C34.9*

Pneumoconiose
- Associée à la tuberculose ¬ *J65*
- Due
- - Amiante
- - - Mention d'exacerbation aiguë ¬ *J61.1*
- - - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J61.0*
- - - ¬ *J61.0*
- - Bagasse ¬ *J67.10*
- - Béryllium ¬ *J63.2*
- - Fibre minérale
- - - Mention d'exacerbation aiguë ¬ *J61.1*
- - - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J61.0*
- - Poussière
- - - Inorganiques précisées ¬ *J63.8*
- - - Silice ¬ *J62.8*
- - - Talc ¬ *J62.0*
- - Silicates ¬ *J62.8*
- Mineurs de charbon ¬ *J60*
- Sans précision ¬ *J64*

Pneumocoques
- Septicémie ¬ Pneumonie à *J13*
- ¬
- - Amygdalite à *J03.8, B95.3!*
- - Angine aiguë à *J03.8, B95.3!*
- - Arthrite et polyarthrite à *M00.1*
- - Conjonctivite à *H10.8, B95.3!*
- - Endocardite à *I33.0, B95.3!*
- - Infection à *A49.15*
- - Méningite à *G00.1*
- - Méningo-encéphalite à *G04.2, B95.3!*
- - Péricardite à *I30.1, B95.3!*
- - Pharyngite à *J02.8, B95.3!*
- - Rhinite à *J00, B95.3!*
- - Septicémie à *A40.3*
- - Trachéite à *J04.1, B95.3!*

Pneumocystis
- Carinii ¬
- - Infection à *B48.5†, J17.2**
- - Maladie due au VIH avec pneumonie à *B20†, J17.2*, B48.5*
- - Pneumonie
- - - *B48.5†, J17.2**
- - - Due à: *B48.5†*
- Jirovecii ¬ Pneumonie

Pneumocystis *–suite*
- Jirovecii ¬ Pneumonie *–suite*
- - *B48.5†, J17.2**
- - Due à: *B48.5†*
- - ¬ Pneumonie à *B48.5†, J17.2**

Pneumocystose
- Interstitielle ¬ *B48.5†, J17.2**
- - ¬ *B48.5†, J17.2**

Pneumogastrique [X] ¬ Nerf: *S04.8*

Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale ¬ *P25.2*

Pneumonia alba ¬ *A50.0†, J17.0**

Pneumoniae
- Agent pathogène ¬ Klebsiella *B96.2!*
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptococcus *B95.3!*
- Influenzae ¬ bronchopneumonie due à des bactéries autres que S. *J15*
- M pneumoniae ¬
- - Bactériémie à Mycoplasma *A49.3*
- - Mycoplasma *B96.0!*
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Klebsiella *U81.01!*
- - 3MRGN ¬ Klebsiella *U81.21!*
- - 4MRGN ¬ Klebsiella *U81.41!*
- Résistant
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus *U80.11!*
- - Pénicilline oxacilline
- - - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus *U80.10!*
- - - ¬ Streptococcus *U80.10!*
- ¬
- - Bactériémie à Mycoplasma pneumoniae [M. *A49.3*
- - Bronchite aiguë due à Mycoplasma *J20.0*
- - Bronchopneumonie à S. *J13*
- - Infection
- - - Klebsiella *A49.82*
- - - Streptococcus *A49.15*
- - Mycoplasma pneumoniae [M. *B96.0!*
- - Pneumonie congénitale à Klebsiella *P23.6, B96.2!*
- - Pneumonie due
- - - Klebsiella *J15.0*
- - - Mycoplasma *J15.7*
- - - Streptococcus *J13*
- - Septicémie à Streptococcus *A40.3*

Pneumonie
- Adénovirale ¬ *J12.0*
- Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ Bronchite et *J68.0*
- Allergique due aux poussières organiques NCA ¬ *J67.80*
- Ascaris ¬ *B77.8†, J17.3**

Pneumonie *–suite*
- Bactérienne, sans précision ¬ *J15.9*
- Bactériennes ¬ Autres *J15.8*
- Candida ¬ *B37.1†, J17.2**
- Candidosique ¬ *B37.1†, J17.2**
- Chimique aspiration due anesthésie
- - Cours
- - - Grossesse ¬ *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.0*
- - ¬ *J95.4*
- Cholestérol
- - Poussée aiguë ¬ *J84.81*
- - Sans mention de poussée aiguë ¬ *J84.80*
- Classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l'admission à l'hôpital ¬ *U69.01!*
- Cours
- - Ascaridose ¬ *B77.8†, J17.3**
- - Coccidioïdomycose
- - - Aiguë ¬ *B38.0†, J17.2**
- - - Chronique ¬ *B38.1†, J17.2**
- - Coqueluche ¬ *A37.9†, J17.0**
- - Fièvre Q ¬ *A78†, J17.8**
- - Fièvre typhoïde ¬ *A01.0†, J17.0**
- - Gonorrhée ¬ *A54.8†, J17.0**
- - Histoplasmose
- - - Aiguë ¬ *B39.0†, J17.2**
- - - Chronique ¬ *B39.1†, J17.2**
- - Infection à spirochètes ¬ *A69.8†, J17.0**
- - Maladies
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *J17.0**
- - - Parasitaires ¬ *J17.3**
- - - Virales classées ailleurs ¬ *J17.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *J17.8**
- - Mycoses ¬ *J17.2**
- - Nocardiose ¬ *A43.0†, J17.0**
- - Rougeole ¬ *B05.2†, J17.1**
- - Rubéole ¬ *B06.8†, J17.1**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.3†, J17.3**
- - Tularémie ¬ *A21.2†, J17.0**
- - Varicelle ¬ *B01.2†, J17.1**
- - Ventilation articielle ¬ *J95.88*
- Crète ¬ *A78†, J17.8**
- Cryptocoques ¬ *B45.0†, J17.2**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.0†, J17.1**
- Due
- - Aliments et des vomissements ¬ *J69.0*
- - Amibes ¬ *A06.5†, J17.3**
- - Bactérie
- - - Aérobies) à Gram négatif SAI ¬ *J15.6*
- - - Gram négatif ¬
- - - - *A49.88*
- - - - *J15.6*
- - - Gram positives ¬ *A49.88*
- - Candidose ¬ *B37.1†, J17.2**
- - Chlamydia ¬ *J16.0*

Pneumonie *–suite*
- Due *–suite*
- - Escherichia coli ¬ *J15.5*
- - Fibres minérales ¬ *J61.0*
- - Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- - Huiles et des essences ¬ *J69.1*
- - Infection à Pseudomonas aeruginosa ¬ *J15.1*
- - Inhalation de sang ¬ *J69.8*
- - Klebsiella pneumoniae ¬ *J15.0*
- - Metapneumovirus humain ¬ *J12.3*
- - Micro-organismes infectieux ¬ *J16.8*
- - Mycoplasma pneumoniae ¬ *J15.7*
- - Pneumocystis
- - - Carinii ¬ *B48.5†*
- - - Jirovecii ¬ *B48.5†*
- - Pseudomonas ¬ *J15.1*
- - Serratia marcescens ¬ *J15.6*
- - Staphylocoques ¬ *J15.2*
- - Streptococcus pneumoniae ¬ *J13*
- - Streptocoque
- - - Groupe B ¬ *J15.3*
- - - ¬ *J15.4*
- - Substances solides et liquides ¬ *J69.8*
- - Systèmes
- - - Conditionnement de l'air ¬ *J67.70*
- - - Humidification de l'air ¬ *J67.70*
- - Virus
- - - Paragrippaux ¬ *J12.2*
- - - Respiratoire syncytial [VRS] ¬ *J12.1*
- Embolique ¬ *I26.9†, J17.8**
- Éosinophile
- - Idiopathique
- - - Aiguë ¬ *J82*
- - - ¬ *J82*
- - ¬ *J82*
- Gonocoques ¬ *A54.8†, J17.0**
- Grippale [Influenza], virus de l'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.0*
- Huileuse ¬ *J69.1*
- Hypostatique, sans précision ¬ *J18.2*
- Infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement ¬ *P23*
- Légionnaire ¬ *A48.1*
- Lipidique endogène ¬ *J84.80*
- Lobaire, sans précision ¬ *J18.1*
- Lymphoïde interstitielle ¬ Maladie due au VIH avec *B22, J84.90*
- Méconiale ¬ *P24.0*
- Micro-organisme non précisé ¬ Autres *J18.8*
- Miliaire ¬ *J18.8*
- Nécrosante staphylococcique ¬ *J15.2*
- Néonatale résultant d'une aspiration ¬ *P24*
- Pneumocoques, avec septicémie ¬ *J13*
- Pneumocystis
- - Carinii ¬

Pneumonie *–suite*
- Pneumocystis *–suite*
- - Carinii ¬ *–suite*
- - - *B48.5†, J17.2**
- - - Maladie due au VIH avec *B20†, J17.2*, B48.5*
- - Jirovecii ¬ *B48.5†, J17.2**
- - ¬ *B48.5†, J17.2**
- Post-infectieuse NCA ¬ *B99†, J17.8**
- Présente lors de l'admission ou survenue dans les 48 heures après l'admission ¬ *U69.04!*
- Pseudomonas pseudomallei ¬ *A24.1*
- Rickettsies ¬ *A79.9†, J17.0**
- Rubéole congénitale ¬ *P35.0*
- Salmonella
- - Typhi ¬ *A01.0†, J17.0**
- - ¬ *A02.2†, J17.0**
- Sans précision ¬ *J18.9*
- Septique ¬ *J18.9*
- Survenue plus de 48 heures après l'admission ¬ *U69.01!*
- Syphilitique congénitale précoce ¬ *A50.0†, J17.0**
- Toxoplasmes ¬ *B58.3†, J17.3**
- Virus
- - Influenza
- - - Saisonnière identifié ¬ Influenza avec *J10.0*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- - Non identifié ¬ Grippe avec *J11.0*
- Virus d'Epstein-Barr ¬ *B27.0†, J17.1**
- Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe avec *J10.0*
- Virus de l'herpès ¬ *B00.8†, J17.1**
- ¬
- - Abcès amibien du poumon avec *A06.5†, J17.3**
- - Abcès poumon
- - - *J85.1*
- - - Sans *J85.2*
- - Actinomycose avec *A42.0†, J17.0**
- - Aspergillose
- - - *B44.1†, J17.2**
- - - Invasive avec *B44.0†, J17.2**
- - Charbon avec *A22.1†, J17.0**
- - Fièvre rhumatismale avec *I00†, J17.8**
- - Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09, U69.23!*
- - - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à une *J09, U69.22!*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une *J09, U69.24!*
- - Infection
- - - COVID-19
- - - - *J12.8, U07.2!*

Pneumonie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Infection *–suite*
- - - COVID-19 *–suite*
- - - - Virus identifié, associé à une *J12.8, U07.1!*
- - - Legionella pneumophila sans *A48.2*
- - Maladie
- - - Due au VIH avec *B20, J18.9*
- - - Légionnaires
- - - - *A48.1*
- - - - Sans *A48.2*
- - Mélioïdose avec *A24.1†, J17.0**
- - Ornithose avec *A70†, J17.8**
- - Psittacose avec *A70†, J17.8**
- - Rhumatisme avec *I00†, J17.8**
- - Varicelle avec *B01.2†, J17.1**

Pneumonie congénitale
- Chlamydia ¬ *P23.1*
- Due
- - Agent viral ¬ *P23.0*
- - Agents bactériens ¬ *P23.6*
- - Micro-organismes ¬ *P23.8*
- Escherichia coli ¬ *P23.4*
- Haemophilus influenzae ¬ *P23.6, B96.3!*
- Klebsiella pneumoniae ¬ *P23.6, B96.2!*
- Mycoplasmes ¬ *P23.6, B96.0!*
- Pseudomonas ¬ *P23.5*
- Sans précision ¬ *P23.9*
- Staphylocoques ¬ *P23.2*
- Streptocoques, groupe B ¬ *P23.3*
- Toxoplasmose ¬ *P37.1†, J17.3**
- Virus respiratoire syncytial [VRS] ¬ *P23.0*

Pneumonie interstitielle
- Aiguë
- - Exacerbation aiguë ¬ *J84.11*
- - PIA] ¬ *J84.10*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J84.10*
- - ¬ *J84.10*
- Exacerbation aiguë ¬ *J84.91*
- Non spécifique [NSIP] ¬ *J84.10*
- SAI ¬ *J84.9*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J84.90*
- Usuelle
- - Exacerbation aiguë ¬ *J84.11*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J84.10*
- - ¬ *J84.10*

Pneumonie par aspiration
- Aliments (régurgités) ¬ *J69.0*
- Due anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.0*
- Lait ¬ *J69.0*

Pneumonie par aspiration *–suite*
- SAI ¬ *J69.0*
- Sécrétions gastriques ¬ *J69.0*
- Vomissements ¬ *J69.0*

Pneumonie tuberculeuse
- Confirmation bactériologique ¬ *A15.0*
- Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- Confirmée par examen microscopique de l'expectoration et par culture ¬ *A15.0*
- N'ayant pas fait l'objet d'un examen bactériologique ou histologique ¬ *A16.1*
- Sans confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A16.0*
- ¬ *A16.2*

Pneumonie virale
- Sans précision
- - Virus spécifique non identifié ¬ (Broncho) *J11.0*
- - ¬ *J12.9*
- - ¬
- - *J12.8*
- - Maladie due au VIH avec *B20, J12.9*

Pneumonique
- BOOP] avec exacerbation aiguë ¬ Bronchiolite oblitérante avec organisation *J84.01*
- ¬ Bronchiolite oblitérante avec organisation *J84.00*

Pneumopathie
- Aiguë d'origine médicamenteuse ¬ *J70.2*
- Alvéolaire ¬ *J84.00*
- Chronique
- - Enfance ¬ *J84.00*
- - Idiopathique à éosinophiles ¬ *J82*
- - Origine médicamenteuse ¬ *J70.3*
- Cours de l'ascaridose ¬ *B77.8†, J17.3**
- Due
- - Bagasse ¬
- - - *J67.1*
- - - *J67.10*
- - Toxoplasmose ¬ *B58.3†, J17.3**
- Grippale, virus d'influenza saisonnière identifié ¬ (Broncho) *J10.0*
- Hypersensibilité ¬ *J67.90*
- Interstitielle
- - Déficit
- - - ABCA3 ¬ *J84.80*
- - - Protéine C du surfactant ¬ *J84.80*
- - Exacerbation aiguë ¬ *J84.91*
- - Lymphocytaire ¬ *J84.10*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J84.90*
- - Syndrome néphrotique-épidermolyse bulleuse ¬ Syndrome de *J84.90†, N08.8*, Q81.8*
- - ¬ Bronchiolite respiratoire avec *J68.4*
- Irradiation ¬ *J70.0*

Pneumopathie *–suite*
- Liée
- - Climatisation] ¬ Pneumopathie liée à la ventilation [*J67.70*
- - Ventilation [Pneumopathie liée à la climatisation] ¬ *J67.70*
- Lymphoïde interstitielle ¬ VIH avec *B22, J84.90*
- Néonatale d'aspiration ¬ *P24.9*
- Organisée cryptogénique
- - POC
- - - Exacerbation aiguë ¬ *J84.01*
- - - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J84.00*
- - ¬ *J84.00*
- Origine médicamenteuse ¬ *J70.4*
- Pariéto-alvéolaire ¬ *J84.00*

Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale ¬ *P25.3*

Pneumo-péritonéale ¬ Fistule *J86.08*

Pneumophila
- Sans pneumonie ¬ Infection à Legionella *A48.2*
- ¬ Infection à Legionella *A48.1*

Pneumo-pleurale ¬ Fistule *J86.00*

Pneumo-rénal hémorragique ¬ Syndrome *M31.0*

Pneumothorax
- Iatrogène ¬ *J95.80*
- Sans précision ¬ *J93.9*
- Spontané
- - Familial ¬ *J93.1*
- - Pression positive ¬ *J93.0*
- Spontanés ¬ Autres *J93.1*
- Survenant pendant la période périnatale ¬ *P25.1*
- Traumatique ¬ *S27.0*
- Tuberculeux
- - Confirmation bactériologique ¬ *A15.0*
- - Confirmé
- - - E) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- - - Examen microscopique de l'expectoration et par culture ¬ *A15.0*
- - Sans confirmation bactériologique
- - - Biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*
- - - Histologique ¬ *A16.0*
- - ¬ *A16.2*
- ¬
- - *J93.8*
- - Blessure ouverte avec *S27.0, S21.83!*

PNP] ¬ Déficit en purine nucléoside phosphorylase [*D81.5*

PNPO ¬ Encéphalopathie épileptique néonatale associée à *G40.8*

POC
- Exacerbation aiguë ¬ Pneumopathie organisée cryptogénique [*J84.01*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Pneumopathie organisée cryptogénique [*J84.00*

Poche
- Blake ¬ Persistance du kyste de la *Q03.1*
- Branchiale ¬ Syndrome de la *D82.1*
- Œsophagien
- - Acquise ¬ *K22.5*
- - Congénitale ¬ *Q39.6*
- - ¬ *Q39.6*
- Pharyngée ¬ *Q38.7*
- Pompe ¬ Sérome dû à la *T85.88*
- Rathke ¬ Déficit hypophysaire associé à un kyste de la *E23.6*
- ¬ Incontinence fécale liée à une anastomose iléo-anale avec *R15, K91.88*

Poche-intestin ¬ Fistule *N32.1*

POCS [CSWS] [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] ¬ *G40.01*

POEMS ¬ Syndrome *D47.2*

POIC] ¬ Pseudo-obstruction intestinale chronique [*K59.8*

Poids
- Âge gestationnel ¬ Faible *P05.0*
- Anormale ¬
- - Perte de *R63.4*
- - Prise de *R63.5*
- Chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou affaissée: après une perte de *L98.7*
- Cours de la grossesse ¬ Faible prise de *O26.1*
- Excessive au cours de la grossesse ¬ Prise de *O26.0*
- Extrêmement faible naissance Poids naissance
- - 500 à moins de 750 grammes ¬ *P07.01*
- - 750 à moins de 1000 grammes ¬ *P07.02*
- - Inférieur à 500 grammes ¬ *P07.00*
- Faibles naissance Poids naissance
- - 1250 à moins de 1500 grammes ¬ Autres *P07.11*
- - 1500 à moins de 2500 grammes ¬ Autres *P07.12*
- Moléculaire ¬ Déficit congénital en kininogène de haut *D68.8*
- Naissance
- - 500 à moins de 750 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: *P07.01*
- - 750 à moins de 1000 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: *P07.02*
- - 1250 à moins de 1500 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: *P07.11*
- - 1500 à moins de 2500 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: *P07.12*
- - Inférieur à 500 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: *P07.00*
- ¬

Poids *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Affaissement de la peau du visage après une perte de *L98.7*
- - Anorexie mental
- - - Mesures de perte de *F50.01*
- - - Sans mesures de perte de *F50.00*
- - Maladie due au VIH avec perte de *B22, R64*

Poignet
- Articulation
- - Carpienne ¬ Entorse et foulure du *S63.51*
- - Carpo-métacarpien ¬
- - - Entorse et foulure du *S63.53*
- - - Luxation du *S63.04*
- - Ligament) radiocarpien ¬ Entorse et foulure du *S63.52*
- - Médiocarpienne ¬ Luxation du *S63.03*
- - Radiocarpienne ¬ Luxation du *S63.02*
- - Radio-cubitale ¬ Luxation du *S63.01*
- Carpe ¬ Rupture traumatique de ligament du *S63.3*
- Main
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure
- - - - *T23.20*
- - - - Épaule et du bras, sauf *T22.2*
- - - Corrosion
- - - - *T23.60*
- - - - Épaule et du bras, sauf *T22.6*
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.81*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.84*
- - Décollement sous-cutané (fermé) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.86*
- - Degré
- - - 2a ¬
- - - - Brûlure
- - - - - *T23.20*
- - - - - Épaule et du bras, sauf *T22.2*
- - - - Corrosion
- - - - - *T23.60*
- - - - - Épaule et du bras, sauf *T22.6*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure
- - - - - *T23.21*
- - - - - Épaule et du bras, sauf *T22.8*
- - - - Corrosion
- - - - - *T23.61*
- - - - - Épaule et du bras, sauf *T22.9*
- - - Non précisé ¬
- - - - Brûlure
- - - - - *T23.0*
- - - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.0*

Poignet *–suite*
- Main *–suite*
- - Degré *–suite*
- - - Non précisé ¬ *–suite*
- - - - Corrosion
- - - - - *T23.4*
- - - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.4*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.82*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.83*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.5*
- - Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique du *S68.9*
- - Partie non précisée ¬ Plaie ouverte du *S61.9*
- - SAI ¬ Plaie ouverte du *S61*
- - Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S69.9*
- - - Superficielle du *S60.9*
- - Seuls] ¬ bras [toute partie, sauf *T22*
- - ¬
- - - Amputation traumatique
- - - - Associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du *S68.3*
- - - - Parties du *S68.8*
- - - Brûlure
- - - - Premier degré
- - - - - *T23.1*
- - - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.1*
- - - - Troisième degré
- - - - - *T23.3*
- - - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.3*
- - - Contusion d'autres parties du *S60.2*
- - - Corrosion du premier degré
- - - - *T23.5*
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.5*
- - - Corrosion du troisième degré
- - - - *T23.7*
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.7*
- - - Écrasement de parties autres et non précisées du *S67.8*
- - - Fracture de parties autres et non précisées du *S62.8*
- - - Gelure superficielle du *T33.5*
- - - Lésion
- - - - Tissu mou stade
- - - - - I lors de fracture fermée ou de luxation du *S61.84!*
- - - - - I lors de fracture ouverte ou de luxation du *S61.87!*
- - - - - II lors de fracture fermée ou de luxation du *S61.85!*

Poignet *–suite*
- Main *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lésion *–suite*
- - - - Tissu mou stade *–suite*
- - - - - II lors de fracture ouverte ou de luxation du *S61.88!*
- - - - - III lors de fracture fermée ou de luxation du *S61.86!*
- - - - - III lors de fracture ouverte ou de luxation du *S61.89!*
- - - - Traumatique
- - - - - Artère cubitale au niveau du *S65.0*
- - - - - Artère radiale au niveau du *S65.1*
- - - - - Multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du *S66.7*
- - - - - Multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du *S66.6*
- - - - - Multiples nerfs au niveau du *S64.7*
- - - - - Multiples vaisseaux sanguins au niveau du *S65.7*
- - - - - Muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du *S66.9*
- - - - - Muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du *S66.3*
- - - - - Muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du *S66.2*
- - - - - Muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du *S66.1*
- - - - - Muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du *S66.0*
- - - - - Muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du *S66.5*
- - - - - Muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du *S66.4*
- - - - - Muscles et tendons au niveau du *S66.8*
- - - - - Nerf cubital au niveau du *S64.0*
- - - - - Nerf médian au niveau du *S64.1*
- - - - - Nerf non précisé, au niveau du *S64.9*
- - - - - Nerf radial au niveau du *S64.2*
- - - - - Nerfs au niveau du *S64.8*
- - - - - Vaisseau sanguin non précisé, au niveau du *S65.9*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau du *S65.8*
- - - Lésions traumatiques
- - - - Multiples du *S69.7*
- - - - Précisées du *S69.8*
- - - - Superficielles
- - - - - *S60.88*
- - - - - Multiples du *S60.7*
- - - Plaie ouverte
- - - - Multiples du *S61.7*
- - - - Non précisée d'autres parties du *S61.80*
- - - Séquelles d'une fracture au niveau du *T92.2*
- Partie

Poignet *–suite*
- Partie *–suite*
- - Non précisée ¬
- - - Entorse et foulure du *S63.50*
- - - Luxation du *S63.00*
- - ¬ Entorse et foulure du *S63.58*
- Pied tombant (acquis) ¬ *M21.3*
- Unilatéral ¬ Absence acquise de main et *Z89.1*
- Unilatérale ¬ Absence acquise du membre supérieur au-dessus du *Z89.2*
- ¬
- - *L03.10*
- - Amputation traumatique
- - - Coude et le *S58.1*
- - - Main au niveau du *S68.4*
- - Arthrite chronique juvénile
- - - Début systémique, *M08.23*
- - - Forme oligo(pauci)- articulaire, *M08.43*
- - Articulation du *T84.12*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du *T84.03*
- - CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium dihydraté], *M11.13*
- - Dermato-arthrite lipoïdique, articulation du *E78.88†, M14.33**
- - Épanchement de l'articulation du *M25.43*
- - Fracture ouverte du *S62.8, S61.87!*
- - Latéral, *S63.3*
- - Luxation du *S63.08*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: avant-bras et *R02.02*
- - Périarthrite du *M77.2*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.63*
- - Psoriasis avec arthrite juvénile du *L40.5†, M09.03**
- - Rhumatisme fibroblastique du *M06.83*
- - Ténosynovite sèche de la main et du *M70.0*
- - Tuberculose du *A18.01†, M01.13**

Poïkilocytose ¬ *R71*

Poïkilodermie
- Acrokératosique congénitale ¬ *Q82.8*
- Civatte ¬ *L57.3*
- Généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire] ¬ *L94.5*
- Héréditaire fibrosante-myopathie rétractile-fibrose pulmonaire ¬ Syndrome de *Q82.8*
- Neutropénie ¬ *Q82.8, D70.0*
- Rothmund-Thomson ¬ *Q82.8*
- Sclérosante héréditaire de Weary ¬ *Q82.8*
- ¬ Syndrome de paraplégie spastique-neuropathie- *G11.4*

Poils angora ¬ Nævus à *Q82.5*

Point
- Plus ¬

Point *–suite*
- Plus ¬ *–suite*
- - DIA-S [Échelle de dépression] chez la personne âgée 4 *U54.11*
- - GDS-15 [Échelle de dépression gériatrique 15] 6 *U54.12*
- - GDS-5 [Échelle de dépression gériatrique 5] 2 *U54.13*
- - MoCA [Montreal Cognitive Assessment] 17 *U51.03*
- ¬
- - CHARMI Charité Mobility Index
- - - 0-4 *U53.30*
- - - 5 *U53.20*
- - - 6-8 *U53.10*
- - - 9-10 *U53.00*
- - DEMMI De Morton Mobility Index
- - - 0-30 *U53.31*
- - - 33-36 *U53.21*
- - - 39-53 *U53.11*
- - - 57-100 *U53.01*
- - DIA-S [Échelle de dépression] chez la personne âgée 0-3 *U54.01*
- - FIM cognitif
- - - 5-10 *U51.21*
- - - 11-29 *U51.11*
- - - 30-35 *U51.01*
- - FIM moteur
- - - 13-30 *U50.51*
- - - 31-42 *U50.41*
- - - 43-58 *U50.31*
- - - 59-68 *U50.21*
- - - 69-84 *U50.11*
- - - 85-91 *U50.01*
- - GDS-15 [Échelle de dépression gériatrique 15] 0-5 *U54.02*
- - GDS-5 [Échelle de dépression gériatrique 5] 0-1 *U54.03*
- - Index de Barthel
- - - 0-15 *U50.50*
- - - 20-35 *U50.40*
- - - 40-55 *U50.30*
- - - 60-75 *U50.20*
- - - 80-95 *U50.10*
- - - 100 *U50.00*
- - Index de Barthel élargi
- - - 0-15 *U51.20*
- - - 20-65 *U51.10*
- - - 70-90 *U51.00*
- - MMSE
- - - 0-16 *U51.22*
- - - 17-23 *U51.12*
- - - 24-30 *U51.02*
- - MoCA Montreal Cognitive Assessment
- - - 0-8 *U51.23*
- - - 9-16 *U51.13*
- - SPPB Short Physical Performance Battery

Point *–suite*
- ¬ *–suite*
- - SPPB Short Physical Performance Battery *–suite*
- - - 3-6 *U53.12*
- - - 7-12 *U53.02*

Point lacrymal ¬
- Corps étranger dans le *T15.8*
- Eversion du *H04.5*
- Syndrome de ptosis-mouvement oculaire limité-absence de *Q87.0*

Pointe
- Bord latéraux langue ¬
- - Carcinome épidermoïde de la *C02.1*
- - Tumeur maligne: *C02.1*
- Langue ¬ *C02.1*
- Rotule ¬ Ostéochondrite juvénile de la *M92.4*

Pointues ¬ Oreilles *Q17.3*

Poirier-Bienvenu
- Crises tonico-cloniques généralisées ¬ Syndrome de *G40.3*
- ¬ Syndrome de *G40.8*

Poisson
- Coquillages ¬ Autres intoxications par *T61.2*
- Exacerbation aiguë ¬ Poumon des travailleurs de préparations alimentaires à base de *J67.81*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des travailleurs de préparations alimentaires à base de *J67.80*
- Scombridés ¬ Intoxication par *T61.1*
- ¬
- - Allergie au *T78.1*
- - Effet toxique d'un contact avec des *T63.5*
- - Hypersensibilité aux protéines de *T78.1*
- - Infection à cestodes de *B70.0*
- - Maladie des yeux de *E78.6*
- - Poumon des travailleurs de préparations alimentaires à base de *J67.80*
- - Syndrome de l'odeur de *E88.8*

Poitrine
- Angiospastique ¬ Angine de *I20.1*
- Due à un spasme ¬ Angine de *I20.1*
- Instable ¬ Angine de *I20.0*
- Prinzmetal ¬ Angine de *I20.1*
- SAI ¬ Angine de *I20.9*
- Sans précision ¬ Angine de *I20.9*
- Spasme coronaire vérifié ¬ Angine de *I20.1*
- Variable ¬ Angine de *I20.1*
- ¬
- - Basaliome de la *C44.59*
- - Fibroadénomes multiples de la *D24*
- - Formes d'angine de *I20.8*

Polaire
- LL)] ¬ Lèpre lépromateuse [Lépromateuse *A30.5*

Polaire *–suite*
- Sous-capsulaire (antérieure) (postérieure) ¬ Cataracte sénile: *H25.0*
- TT ¬
- - Lèpre tuberculoïde [Tuberculoïde *A30.1*
- - Tuberculoïde *A30.1*

Poland ¬ Syndrome
- *Q79.8*
- Dysplasie cranio-fronto-nasale-anomalie de *Q87.8*

Pôle
- Postérieur ¬
- - Cicatrice (post-inflammatoire) (post-traumatique) de la macula (*H31.0*
- - Dégénérescences de la macula et du *H35.38*
- - Druses (dégénératives) au *H35.38*
- Rein ¬ Vaisseau accessoire d'un *Q27.8*

Polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCoq + *Z27.3*

Polio-encéphalite
- Bulbaire
- - Myéloïde ¬ *A80.9†, G05.1**
- - ¬ *A80.9†, G05.1**
- Lors grippe Influenza
- - Virus de la grippe saisonnière identifié ¬ *J10.8†, G05.1**
- - ¬ *J11.8†, G05.1**
- Virus de la grippe aviaire zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [Influenza] avec *J09†, G05.1**
- ¬ *A80.9†, G05.1**

Polio-encéphalomyélite
- Aiguë ¬ *A80.9*
- Béribéri ¬ *E51.2†, G32.8**

Polio-encéphalopathie
- Supérieure hémorragique ¬ *E51.2†, G32.8**
- Wernicke ¬ *E51.2†, G32.8**

Poliomyélite
- Abortive ¬ *A80.4*
- Aiguë
- - Non paralytique ¬ *A80.4*
- - ¬ *A80.9*
- Coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la *Z27.8*
- DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et *Z27.3*
- Non paralytique ¬ *A80.4*
- Paralysie bulbaire ¬ *A80.3*
- Paralytique
- - Aiguë
- - - Associée au virus vaccinal ¬ *A80.0*
- - - ¬ *A80.3*
- - Virus sauvage
- - - Importé ¬ *A80.1*
- - - Indigène ¬ *A80.2*

Poliomyélite *–suite*
- Spinale aiguë ¬ *A80.9*
- ¬
- - *A80.9*
- - Encéphalite due au virus de la *A80.9†, G05.1**
- - Méningite due virus
- - - *A80.9†, G01**
- - - *A80.9†, G02.0**
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.0*
- - Ostéopathie consécutive à une *M89.6*
- - Séquelles de *B91*

Poliose
- Circonscrite, acquise ¬ *L67.1*
- SAI ¬ *L67.1*

Pollakiurie ¬ *R35.1*

Pollen
- Asthme ¬ Allergie aux *J45.09*
- ¬
- - Allergie SAI due au *J30.1*
- - Rhinopathie allergique due au *J30.1*

Pollinose ¬ *J30.1*

Pollution
- Air ¬ *Z58*
- Eau ¬ *Z58*
- Sol ¬ *Z58*

POLR ¬ Leucodystrophie hypomyélinisante associée à *E75.2*

Polyangéite
- Atteinte
- - Pulmonaire ¬ Granulomatose avec *M31.3†, J99.1**
- - Rénale ¬ Granulomatose avec *M31.3†, N08.5**
- Extensive ¬ Syndrome de *M30.8*
- GPA] ¬ Granulomatose avec *M31.3*
- ¬
- - Glomérulonéphrite au cours de granulomatose avec *M31.3†, N08.5**
- - Glomérulopathie au cours de granulomatose avec *M31.3†, N08.5**
- - Granulomatose éosinophilique avec *M30.1*
- - Maladies respiratoires lors de granulomatose avec *M31.3†, J99.1**

Polyangite microscopique] ¬ MPA [*M31.7*

Polyarteriitis nodosa secondaire à une infection virale ¬ *B34.9, M30.0*

Polyartérite
- Atteinte pulmonaire ¬ *M30.1*
- Juvénile ¬ *M30.2*
- Microscopique ¬ *M31.7*
- Noueuse [PAN] ¬ *M30.0*

Polyarthrite
- Bactéries précisées ¬ Arthrite et *M00.8*
- Chronique
- - Juvénile type adulte
- - - Facteur rhumatismal ¬ *M08.00*

Polyarthrite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Juvénile type adulte *–suite*
- - - Sans facteur rhumatismal ¬ *M08.00*
- - - ¬ *M08.00*
- - Manifestation pulmonaire ¬ *M05.10†, J99.0**
- - ¬
- - - Cardite au cours de *M05.30†, I52.8**
- - - Myocardite au cours de *M05.30†, I41.8**
- - - Myopathie au cours de *M05.30†, G73.7**
- - - Polyneuropathie au cours de *M05.30†, G63.6**
- Épidémique exanthémateuse ¬ *B33.1*
- Juvénile
- - Chronique ¬ *M08.3*
- - Facteur rhumatoïde ¬ *M08.00*
- - Sans facteur rhumatoïde
- - - Facteurs anti-nucléaires ¬ *M08.3*
- - - ¬ *M08.3*
- Pneumocoques ¬ Arthrite et *M00.1*
- Rhumatismal
- - Aiguë ¬ *I00*
- - Subaiguë ¬ *I00*
- Rhumatoïde
- - Atteinte d'autres organes et appareils ¬ *M05.3†*
- - Précisées ¬ Autres *M06.8*
- - Sans précision ¬ *M06.9*
- - Séronégative ¬ *M06.0*
- - Séropositive
- - - Sans précision ¬ *M05.9*
- - - ¬ Autres *M05.8*
- Sans précision ¬ *M13.0*
- Séropositive chronique ¬ Péricardite au cours de *M05.30†, I32.8**
- Staphylocoques ¬ Arthrite et *M00.0*
- Streptocoques ¬ Autres arthrites et *M00.2*

Polyarthropathie
- Chronique avec atteinte cardiaque NCA ¬ *M05.30†, I52.8**
- Inflammatoire ¬ *M06.4*

Polyarthrose
- Post-traumatique ¬ *M15.3*
- Sans précision ¬ *M15.9*
- ¬ Autres *M15.8*

Polyarticulaire
- Extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution *M08.3*
- Oligoarthrite étendue] ¬ Arthrite juvénile chronique à début oligoarticulaire à évolution *M08.3*
- ¬
- - Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme *M08.3*
- - Arthrite juvénile à début *M08.3*

Polychondrite récidivante ¬ *M94.1*

Polyclonale
- Persistante ¬ Lymphocytose B *D72.8*
- SAI ¬ Gammapathie *D89.0*
- ¬
- - Hypergammaglobulinémie *D89.0*
- - Syndrome d'hyperviscosité *R70.1*

Polycythaemia rubra vera ¬ *D45*

Polycythémie
- Acquise ¬ *D75.1*
- Due
- - Altitude ¬ *D75.1*
- - Chute du volume plasmatique ¬ *D75.1*
- - Érythropoïétine ¬ *D75.1*
- - Stress ¬
- - - *D75.1*
- - - *D75.1*
- Émotive ¬ *D75.1*
- Gémellaire ¬ Séquence anémie- *O43.0*
- Hypermanganésémie ¬ Syndrome de cirrhose-dystonie- *E83.8*
- Hypoxémique ¬ *D75.1*
- Néphrogène ¬ *D75.1*
- Nouveau-né ¬ *P61.1*
- Polyglobulie
- - Bénigne ¬ *D75.0*
- - Familiale ¬ *D75.0*
- Primaire familiale ¬ *D75.0*
- Relative ¬ *D75.1*
- SAI ¬ *D75.1*
- Secondaire
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *D75.1*
- - - Récessive type non Chuvash ¬ *D75.1*
- - ¬ *D75.1*
- Tchouvachie ¬ *D75.1*
- ¬
- - *D75.1*
- - Ictère néonatal dû à une *P58.3*
- - Syndrome de paragangliome-somatostatinome- *D75.1, D44.7*

Polydactylie
- Centrale
- - Orteils ¬ *Q69.2*
- - ¬
- - - *Q69.0*
- - - *Q69.9*
- Index ¬ *Q69.0*
- Kyste arachnoïdien ¬ Syndrome de tibia absent- *Q79.8, G93.0*
- Lobe d'oreille anormal ¬ Syndrome de syndactylie- *Q74.8, Q17.8*
- Main ou pied), sans précision ¬ *Q69.9*
- Mésoaxiale ¬
- - *Q69.9*
- - SFMMP [Syndrome de pieds fendus- *Q74.8*
- Miroir

Polydactylie *–suite*
- Miroir *–suite*
- - Pied ¬ Syndrome de duplication du péroné avec *Q74.8*
- - Segmentation vertébrale-anomalies des membres ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - ¬ *Q69.9*
- Postaxiale
- - Anomalies
- - - Antéhypophysaires-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - - Dentaires et vertébrales ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - Orteils ¬ *Q69.2*
- - Type
- - - A ¬ *Q69.0*
- - - B ¬ *Q69.0*
- - ¬ Syndrome
- - - Dandy-Walker *Q87.8*
- - - Malformations cérébrales-cardiopathie congénitale- *Q87.8*
- Post-axiale-hydrocéphalie] ¬ Syndrome MPPH [mégalencéphalie-polymicrogyrie- *Q04.8*
- Pouce
- - Biphalangé ¬ *Q69.1*
- - Triphalangé ¬ *Q69.1*
- Préaxiale
- - Colobomes et déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.2*
- - Hypertrichose du haut du dos ¬ Syndrome autosomique dominant de *Q69.9, Q84.2*
- - Orteils ¬ *Q69.2*
- Sans précision ¬ *Q69.9*
- Surdité ¬ Syndrome de maladie de Hirschsprung- *Q87.8*
- ¬ Syndrome
- - Alopécie circonscrite- *Q87.2*
- - Cécité corticale-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - Dérivés mülleriens-lymphangiectasies- *Q87.8*
- - Ectrodactylie- *Q73.8, Q69.9*
- - Goitre multinodulaire-rein kystique- *Q87.8*

Polydactylie-myopie ¬ Syndrome de *Q87.2*

Polydipsie ¬ *R63.1*

Polydystrophie sclérosante progressive d'Alpers ¬ *G31.88*

Polyembryome
- Ovaire ¬ *C56*
- Testicule
- - Descendu ¬ *C62.1*
- - Non descendu ¬ *C62.0*
- ¬ *C80.9*

Polyendocrinopathie
- Auto-immun
- - Type

Polyendocrinopathie *–suite*
- Auto-immun *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 1 ¬ *E31.0*
- - - II (APS2) ¬ Syndrome de *E31.0*
- - ¬ *E31.0*
- Entéropathie lié à l'X ¬ Syndrome de dérèglement immunitaire- *E31.0*

Polyendocrinopathie-polyneuropathie ¬ Syndrome de *E31.8, G62.9*

Polyglandulaire
- Auto-immun
- - Type
- - - 1 ¬ Syndrome *E31.0*
- - - 2 ¬ Syndrome *E31.0*
- - ¬
- - - APS [Syndrome *E31.0*
- - - Insuffisance *E31.0*
- ¬ Syndrome *D44.8*

Polyglobulie
- Bénigne ¬ Polycythémie [*D75.0*
- Essentielle ¬ *D45*
- Familiale ¬ Polycythémie [*D75.0*

Polyglucosane
- Adulte ¬ Maladie des corps de *E74.0*
- Type
- - 1 ¬ Myopathie à corps de *E74.0*
- - 2 ¬ Myopathie à corps de *E74.0†, G73.6**

Polygone de Willis ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une rupture d'anévrisme du *I60.6*

Polyhydramnios
- Mégalencéphalie-épilepsie symptomatique] ¬ Syndrome PMSE [*Q87.0*
- ¬ Syndrome d'hypertrophie musculaire-hépatomégalie- *Q87.8*

Polykystique
- Autosomique dominant ¬ Rein *Q61.2*
- Congénitale du poumon ¬ Maladie *Q33.0*
- Sans précision ¬ Rein *Q61.3*
- Type
- - Adulte ¬ Dégénérescence de rein *Q61.2*
- - Infantile ¬ Rein *Q61.1*
- ¬ SOPK [Syndrome ovarien *E28.2*

Polykystose
- Hépatique
- - Autosomique dominante ¬ *Q44.6*
- - Congénitale ¬ *Q44.6*
- - Isolée ¬ *Q44.6*
- Rénale
- - Autosomique
- - - Dominante
- - - - Type 1 avec sclérose tubéreuse ¬ *Q61.2, Q85.1*
- - - - ¬ ADPKD [*Q61.2*
- - - Récessive] ¬ PKRAD [*Q61.1*
- - Potter type

Polykystose *–suite*
- Rénale *–suite*
- - Potter type *–suite*
- - - I ¬ *Q61.1*
- - - III ¬ *Q61.2*
- - ¬ Syndrome de diabète néonatal-hypothyroïdie congénitale-glaucome congénital-fibrose hépatique- *Q87.8*

Poly-L) glycoprotéine ¬ Thrombophilie héréditaire due au déficit congénital en histidine-rich (*D68.5*

Polymalformatif létal type Boissel ¬ Syndrome *Q87.8*

Polymastie ¬ *Q83.1*

Polyménorrhée ¬ *N92.0*

Polymérase III ¬ Leucodystrophie associée à la *E75.2*

Polymerase proofreading associated polyposis] ¬ PPAP [*D12.6*

Polymicrogyrie
- Agénésie du corps calleux ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q02, Q04.0*
- Bilatérale
- - Frontopariétale ¬ *Q04.3*
- - Périsylvienne ¬ *Q04.3*
- - ¬ *Q04.3*
- Due à une mutation TUBB2B ¬ *Q04.3*
- Frontale bilatérale ¬ *Q04.3*
- Généralisée bilatérale ¬ *Q04.3*
- Hypoplasie du nerf optique ¬ *Q04.3*
- Occipitales ¬ Pachygyrie et *Q04.3*
- Pariéto-occipitale parasagittale bilatérale ¬ *Q04.3*
- Polydactylie post-axiale-hydrocéphalie] ¬ Syndrome MPPH [mégalencéphalie- *Q04.8*
- Unilatérale
- - Focale ¬ *Q04.3*
- - Hémisphérique ¬ *Q04.3*
- - ¬ *Q04.3*
- ¬ Syndrome
- - Dysmorphie faciale avec retard général de développement, hypotonie et *Q04.8*
- - Ehlers-Danlos vasculaire- *Q79.6, Q04.3*
- - Mégalencéphalie-malformation capillaire- *Q87.3*

Polymorphe
- Bulleux ¬ Érythème *L51.1*
- Catécholaminergique ¬ Tachycardie ventriculaire *I47.2*
- Douloureuse de Brocq ¬ Dermatite *L13.0*
- Grossesse ¬ Éruption *O26.88*
- Non bulleux ¬ Érythème *L51.0*
- Rémission
- - Complète ¬ Maladie lymphoprolifération post-transplantation *C88.71*
- - Partielle ¬ Maladie lymphoprolifération post-transplantation *C88.70*
- Sans

Polymorphe *–suite*
- Sans *–suite*
- - Mention de rémission ¬ Maladie lymphoprolifération post-transplantation *C88.70*
- - Précision ¬ Érythème *L51.9*
- - Symptômes schizophréniques ¬ Trouble psychotique aigu *F23.0*
- Symptômes schizophréniques ¬ Trouble psychotique aigu *F23.1*
- ¬
- - Arthropathie au cours d'érythème *L51.9†, M14.89**
- - Dystrophie postérieure *H18.5*
- - Formes d'érythème *L51.8*
- - Lucite *L56.4*
- - Réticulose *C86.0*

Polymyalgie
- Rhumatismal ¬
- - *M35.3*
- - Artérite à cellules géantes avec *M31.5*
- ¬ *M35.3*

Polymyosite
- Atteinte pulmonaire ¬ *M33.2†, J99.1**
- Hémorragique ¬ *M33.2*
- Juvénile ¬ *M33.2*
- PM] ¬ *M33.2*
- Wagner ¬ *M33.1*

Polyneuropathie
v./v.a. polyendocrinopathie-polyneuropathie
- Amyloïde
- - Portugaise ¬ *E85.1*
- - Type portugais ¬ *E85.1†, G63.3**
- - ¬ *E85.1†, G63.3**
- Associée à une gammopathie monoclonale IgM ayant une activité anti-MAG ¬ *D47.2†, G63.1**
- Axonal gammopathie monoclonal
- - IgA ¬ *D47.2†, G63.1**
- - IgG ¬ *D47.2†, G63.1**
- - IgM ¬ *D47.2†, G63.1**
- Béribéri ¬ *E51.1†, G63.4**
- Cours
- - Amylose familiale ¬ *E85.1†, G63.3**
- - Anémie par carence alimentaire en vitamine B12 ¬ *D51.3†, G63.4**
- - Anémie pernicieuse ¬ *D51.0†, G63.4**
- - Avitaminose NCA ¬ *E56.9†, G63.4**
- - Carence vitamine
- - - B ¬ *E53.9†, G63.4**
- - - B12 ¬ *E53.8†, G63.4**
- - - ¬ *E56.9†, G63.4**
- - Collagénose NCA ¬ *M35.9†, G63.5**
- - Diphtérie ¬ *A36.8†, G63.0**
- - Hypoglycémie ¬ *E16.2†, G63.3**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, G63.5**
- - Maladie

Polyneuropathie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Endocrinienne NCA ¬ *E34.9†, G63.3**
- - - Infectieuse NCA ¬ *B99†, G63.0**
- - - Métabolique NCA ¬ *E88.9†, G63.3**
- - - Parasitaire NCA ¬ *B89†, G63.0**
- - Mononucléose infectieuse ¬ *B27.9†, G63.0**
- - Pellagre ¬ *E52†, G63.4**
- - Périartérite noueuse ¬ *M30.0†, G63.5**
- - Polyarthrite chronique ¬ *M05.30†, G63.6**
- - Porphyrie ¬ *E80.2†, G63.3**
- - Tuberculose ¬ *A17.8†, G63.0**
- - Tumeur maligne NCA ¬ *C80.9†, G63.1**
- - Tumeur NCA ¬ *D48.9†, G63.1**
- - Urémie ¬ *N18.89†, G63.8**
- Décompensé ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.41†, G63.2**
- Déficience intellectuelle-acromicrie-ménopause prématurée ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Diabétique diabète sucré type
- - 1 ¬ *E10.40†, G63.2**
- - 2 ¬ *E11.40†, G63.2**
- Due au sérum antitétanique ¬ *G61.1, Y59.9!*
- Héréditaire ¬ *G60.9*
- Liée à l'alimentation NCA ¬ *E63.9†, G63.4**
- Myopathie ¬ Syndrome d'atrophie optique-surdité- *H47.2*
- Précisées ¬ Autres *G62.88*
- Progressive avec nécrose striatale bilatérale ¬ *Q87.8*
- Réanimation ¬ *G62.80*
- Sensitivo-motrice néonatale létale autosomique récessive ¬ *G60.0*
- Syphilitique
- - Congénitale tardive ¬ *A50.4†, G63.0**
- - Tardive ¬ *A52.1†, G63.0**
- ¬
- - Aplasie des muscles extenseurs des doigts et pouce- *G60.0, Q68.1*
- - Diabète sucré
- - - *E14.40†, G63.2**
- - - Type 1 avec *E10.40†, G63.2**
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, G62.9*
- - MODY [Maturity onset diabetes of young people] avec *E11.40†, G63.2**
- - Parkinsonisme avec *G20.90, G62.9*
- - Sclérose systémique avec *M34.8†, G63.5**
- - Syndrome
- - - Encéphalite limbique-neuromyotonie-hyperhidrose- *G60.8*
- - - Mitchell (*G37.8*

Polynévrite
- Alcoolique ¬ *G62.1*
- Cours

Polynévrite *–suite*
- Cours *–suite*
- - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ *M35.9†, G63.5**
- - Carence en vitamine NCA ¬ *E56.9†, G63.4**
- - Maladie de Lyme ¬ *A69.2†, G63.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *G63.8**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *G63.0**
- Crânienne ¬ *G52.7*
- Diphtérique ¬ *A36.8†, G63.0**
- Due
- - Agents toxiques ¬ *G62.2*
- - Irradiation ¬ *G62.8*
- Endémique ¬ *E51.1†, G63.4**
- Érythrœdème ¬ *T56.1*
- Inflammatoire
- - Sans précision ¬ *G61.9*
- - ¬ Autres *G61.8*
- Lors
- - Arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.30†, G63.6**
- - Maladie de Feer ¬ *T56.1*
- Médicamenteuse ¬ *G62.0*
- Ourlienne ¬ *B26.8†, G63.0**
- Périphérique symétrique ¬ *G61.9*
- Post-herpétique ¬ *B02.2†, G63.0**
- Post-zostérienne ¬ *B02.2†, G63.0**
- Sans précision ¬ *G62.9*
- Syphilitique congénitale tardive ¬ *A50.4†, G63.0**
- Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G63.0**

Polynévritique ¬ Hérédopathie ataxique *G60.1*

Polynucléaires neutrophiles] ¬ Glomérulonéphrite pauci-immune avec ANCA [Anticorps anti-cytoplasme des *N01.7*

Polyomavirus ¬ Infection à *B34.4*

Polyorchidie ¬ *Q55.2*

Polyostotique
- Fibreuse ¬ Dysplasie *Q78.1*
- ¬ Syndrome de Jaffe-Lichtenstein *Q78.1*

Polyotie ¬ *Q17.0*

Polype
- Adénomateux ¬ *D28*
- Anal ¬ *K62.0*
- Appareil génital de la femme, sans précision ¬ *N84.9*
- Choanes ¬ *J33.0*
- Col ¬ Soins maternels pour: *O34.4*
- Col de l'utérus ¬ *N84.1*
- Côlon ¬ *K63.5*
- Cordes vocales et du larynx ¬ *J38.1*
- Corps utérus ¬
- - *N84.0*
- - Soins maternels pour: *O34.1*
- Endocervical ¬ *N84.1*
- Endomètre ¬ *N84.0*

Polype *–suite*
- Estomac et du duodénum ¬ *K31.7*
- Fosses nasales ¬ *J33.0*
- Hyperplasique ¬
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Inflammatoires du côlon ¬ *K51.4*
- Intestin grêle ¬ *K63.8*
- Intestinal ¬ *K63.8*
- Lèvres ¬ *N84.3*
- Malin de l'intestin ¬ *C26.0*
- Muqueux du col ¬ *N84.1*
- Nasal
- - Insuffisance pluriglandulaire résultant d'une anomalie dans le transport mucociliaire] [Immotile cilia syndrome] [triade de Kartagener] ¬ Syndrome de Kartagener [Situs inversus viscerum, bronchectasie, sinusite chronique et *Q89.3*
- - Sans précision ¬ *J33.9*
- Ombilical du nouveau-né ¬ *P83.6*
- Oreille moyenne ¬ *H74.4*
- Parties de l'appareil génital de la femme ¬ *N84.8*
- Placentaire ¬ *O90.8*
- Rectal ¬ *K62.1*
- Rhinopharyngé ¬ *J33.0*
- SAP ¬
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Sinus
- - Ethmoïdal ¬ *J33.8*
- - Face ¬ *J33.8*
- - Maxillaire ¬ *J33.8*
- - Sphénoïdal ¬ *J33.8*
- - ¬ Autres *J33.8*
- Utérus SAI ¬ *N84.0*
- Vagin ¬ *N84.2*
- Vulve ¬ *N84.3*

Polypeptide
- Intestinal vaso-actif ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: *E16.8*
- Pancréatique ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: *E16.8*

Polypeptidome pancréatique] ¬ Ppome [*D37.70*

Polypeux
- Angle
- - Droit du côlon ¬ Carcinome héréditaire non *C18.3*
- - Gauche du côlon ¬ Carcinome héréditaire non *C18.5*
- Cæcum ¬ Carcinome héréditaire non *C18.0*
- Côlon ascendant ¬ Carcinome héréditaire non *C18.2*
- Côlon descendant ¬ Carcinome héréditaire non *C18.6*
- Côlon sigmoïde ¬ Carcinome héréditaire non *C18.7*

Polypeux *–suite*
- Côlon transverse ¬ Carcinome héréditaire non *C18.4*
- Côlon, à localisations contiguës ¬ Carcinome héréditaire non *C18.8*

Polyphagie ¬ *R63.2*

Polyploïdie ¬ Triploïdie et *Q92.7*

Polypoïde ¬ Hyperplasie de l'endomètre: *N85.0*

Polypose
- Adénomateux
- - Associée
- - - AXIN2 ¬ *D12.6*
- - - MSH3 ¬ *D12.6*
- - - NTHL1 ¬ *D12.6*
- - Familiale
- - - Atténué
- - - - Associée
- - - - - MSH3 ¬ *D12.6*
- - - - - NTHL1 ¬ *D12.6*
- - - - Liée
- - - - - APC ¬ *D12.6*
- - - - - MUTYH ¬ *D12.6*
- - - - ¬ PAFA [*D12.6*
- - - Liée au gène MUTYH ¬ PAF [*D12.6*
- - - ¬ PAF [*D12.6*
- Associée à MUTYH ¬ *D12.6*
- Gastro-intestinale juvénile ¬ *D12.6*
- Héréditaire) du côlon ¬ *D12.6*
- Hyperplasique ¬ *D12.6*
- Intéstinale ¬ *D12.6*
- Intestinale familiale ¬ *D12.6*
- Juvénile ¬ Syndrome de *D12.6*
- Lymphomateuse maligne ¬ *C83.1*
- Mixte héréditaire ¬ *D12.6*
- Proximale de l'estomac] ¬ GAPPS [Adénocarcinome gastrique et *C16.9*
- Rhino-sinusienne déformante ¬ *J33.1*
- ¬
- - Cap *D12.6*
- - Syphilis gastrique tardive avec *A52.7†, K93.8**

Polyposique [HNPCC] ¬ Cancer du côlon héréditaire non *C18.9, Z80.0*

Polyradiculoneuropathie gammapathie monoclonal
- IgA sans anticorps connus ¬ *D47.2†, G63.1**
- IgG sans anticorps connus ¬ *D47.2†, G63.1**
- IgM sans anticorps connus ¬ *D47.2†, G63.1**

Polyradiculonévrite
- Aiguë (post-)infectieuse ¬ *G61.0*
- Démyélinisante inflammatoire aiguë ¬ *G61.0*
- Dysimmunitaire subaiguë ¬ *G61.8*
- Guillain-Barré ¬ *G61.0*

Polyrhinie ¬ *Q30.8*

Polysérite tuberculeuse
- Aiguë ¬ *A19.1*

Polysérite tuberculeuse *–suite*
- Chronique ¬ *A19.8*
- ¬ *A19.9*

Polysérosite récurrente
- Bénigne ¬ *E85.0*
- ¬ *E85.0*

Polysorbate 20 ¬ Hypersensibilité au *T78.4*

Polysplénie ¬
- *Q89.08*
- Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou *Q20.6*

Polysyndactylie
- Croisée ¬ *Q70.4*
- Malformation cardiaque ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Pouce triphalangé ¬ Syndrome d'hémimélie tibiale- *Q87.2*
- Préaxiale ¬ Syndrome d'hallux varus congénital- *Q66.3, Q70.4*
- ¬
- - *Q70.4*
- - Syndrome d'anomalie cardiaque-hamartome de la langue- *Q87.8*

Polythélie
- Isolée ¬ *Q83.3*
- ¬
- - *Q83.3*
- - Syndrome de lipodermoïde du globe oculaire-excroissance préauriculaire- *Q18.2*

Polytrichie ¬ *L68.3*

Polyurie
- Levée d'obstacle ¬ *R35.0*
- Nocturne ¬ *R35.2*
- ¬ *R35.0*

Polyvésiculaire sac vitellin
- Femme ¬ Tumeur *C56*
- Homme ¬ Tumeur *C62.9*

POMA [Myoclonie périorale avec absence] ¬ *G40.3*

POMK ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.08*

Pomme ¬ Syndrome de la pelure de *Q41.1*

Pommette ¬ Fracture ouverte de la *S02.42, S01.87!*

Pompe
- Extracorporel ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Adaptation d'une *Z45.02*
- Insuline ¬ *Z96.4*
- Intracorporelle ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Adaptation d'une *Z45.02*
- Médicament
- - Implantée ¬
- - - Ajustement d'une *Z45.1*

Pompe *–suite*
- Médicament *–suite*
- - Implantée ¬ *–suite*
- - - Entretien d'une *Z45.1*
- - ¬ Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une *Z45.1*
- Paracorporelle ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Adaptation d'une *Z45.02*
- Perfusion ¬ Ajustement et entretien d'une *Z45.1*
- Protons ¬ Eosinophilie œsophagienne répondant aux inhibiteurs de la *K20.0*
- ¬
- - Maladie de *E74.0*
- - Sérome dû à la poche d'une *T85.88*

Pompholyx] ¬ Dyshidrose [*L30.1*

Poncet ¬ Maladie de *A18.0†, M01.19**

Ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence ¬ Incision, *Y69!*

Ponctuée
v./v.a. Type de maladie

Ponctuel complication oculaire diabétique
- Diabète type
- - 1 ¬ Saignement *E10.30†, H58.8**
- - 2 ¬ Saignement *E11.30†, H58.8**
- ¬ Saignement *E14.30†, H58.8**

Pondéral
v./v.a. staturo-pondéral

Pont
- Atrophie cérébrale ¬ Syndrome à début précoce d'encéphalopathie progressive-surdité-hypoplasie du *G31.88*
- Varole ¬ Lésion syphilitique du *A52.1†, G94.8**

Pontage
- Aorto-coronaire ¬ Présence d'un *Z95.1*
- Coronarien
- - Greffe valvulaire cardiaque ¬ Complication mécanique d'un *T82.2*
- - ¬ Infection due à un *T82.71*
- Ventriculaire ¬ Hypotension intracrânienne suite à un *G97.2*
- ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de vaisseaux de *I25.15*

Pontique ¬ Dysplasie du tegmentum *Q04.8*

Ponto-cérébelleux ¬
- Chordome
- - Angle *D43.1*
- - Bénin de l'angle *D33.1*
- - Malin de l'angle *C71.6*
- Kyste dermoïde de l'angle *D33.1*

Poplité
v./v.a. Artère poplitée
- Autosomique dominant ¬ Syndrome des ptérygiums *Q87.8*
- Baker] ¬ Kyste synovial *M71.2*
- Externe

Poplité *–suite*
- Externe *–suite*
- - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du nerf sciatique *S84.1*
- - ¬ Lésion du nerf sciatique *G57.3*
- Interne
- - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du nerf sciatique *S84.0*
- - ¬ Lésion du nerf sciatique *G57.4*
- ¬
- - Déchirure d'un kyste *M66.0*
- - Lésion traumatique de la veine *S85.5*
- - Phlébite de la veine *I80.28*
- - Syndrome des ptérygiums *Q87.8*
- - Thrombophlébite de la veine *I80.28*
- - Thrombose de la veine *I80.28*

Popliteal artery entrapment syndrome ¬
- *I77.1*
- Syndrome de l'artère poplitée piégée [*I77.1*

Populaires ¬ Abus de: préparations à base de plantes ou remèdes *F55*

Population ¬ Examen sanitaire au cours d'enquêtes de *Z00.8*

Porak et Durante ¬ Maladie de *Q78.0*

Porc
- Sanglier ¬ Brucellose du *A23.2*
- ¬
- - Infection par cestodes du *B68.0*
- - Rouget du *A26.0*

Porcine
- Aviaire
- - Associée
- - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza *J09, U69.24!*
- - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza *J09, U69.24!*
- - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza *J09, U69.24!*
- - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza *J09, U69.24!*
- - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza *J09, U69.24!*
- - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza *J09†, I41.1*, U69.24!*

Porcine *–suite*
- Aviaire *–suite*
- - Associée *–suite*
- - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza *J09, U69.24!*
- - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza *J09, U69.24!*
- - - ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - ¬ Grippe Influenza virus influenza zoonotique pandémique identifié
- - - Associée à une encéphalite, à l'exception du virus de l'influenza *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - Exception du virus d'influenza *J09, U69.24!*
- Zoonotique pandémique identifié
- - Associée
- - - Encéphalite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, G94.31*, U69.22!*
- - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.22!*
- - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.22!*
- - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.22!*
- - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.22!*
- - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.22!*
- - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, I41.1*, U69.22!*
- - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.22!*
- - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.22!*
- - - ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.22!*

Porencéphalie
- Hypoplasie cérébelleuse-malformations internes ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Microcéphalie-cataracte bilatérale congénitale ¬ Syndrome de *Q04.8, Q12.0*
- ¬ *Q04.6*

Porencéphalique
- Acquis ¬ Kyste: *G93.0*
- ¬ Kyste *Q04.6*

Poretti-Boltshauser ¬ Syndrome de *G11.1*

Porocéphalose ¬ *B88.8*

Porokératose
- Actinique superficielle disséminée ¬ *Q82.8*
- Mibelli ¬ *Q82.8*
- Palmoplantaire et disséminée ¬ *Q82.8*
- ¬ Syndrome de craniosynostose-anomalies anales- *Q87.8*

Porokératotique ¬ Nævus eccrin *Q82.5*

Porphyrie
- Aiguë intermittente
- - Hépatique) ¬ *E80.2*
- - ¬ *E80.2*
- Cutanée tardive] ¬ PCT [*E80.1*
- Déficit en delta-aminolévulinate déshydratase ¬ *E80.2*
- Doss ¬ *E80.2*
- Érythropoïétique congénitale] ¬ CEP [*E80.0*
- Hépatique aiguë ¬ *E80.2*
- Hépato-cutanée ¬ *E80.1*
- SAI ¬ *E80.2*
- Sud-africaine ¬ *E80.2*
- Variegata ¬ *E80.2*
- ¬
- - *E80.2*
- - Polyneuropathie au cours de *E80.2†, G63.3**

Port ¬
- Infection due à un *T82.75*
- Inflammation due à un *T82.75*
- Septicémie due à un système de chambre implantable [*T82.75*
- Système
- - *Z45.20*
- - *Z95.81*

Portal
- Anormal ¬ Retour veineux *Q26.5*
- APAH] ¬ Hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale, affection du tissu conjonctif et hypertension *I27.01*
- Non cirrhotique familiale à début précoce ¬ Hypertension *K76.6*
- ¬
- - Cirrhose (du foie): *K74.6*
- - Hypertension *K76.6*
- - Hypertonie artérielle pulmonaire associée à une hypertension *I27.01*

Porte
- Artère hépatique (congénitale) ¬ Fistule entre la veine *Q26.6*
- Due à la syphilis ¬ Thrombose de la veine *A52.0†, I98.0**
- Non cirrhotique ¬ Thrombose de la veine *I81*
- ¬
- - Lésion traumatique de la veine *S35.3*
- - Obstruction de la veine *I81*
- - Phlébite de la veine *K75.1*

Porte *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syphilis de la veine *A52.0†, I98.0**
- - Thrombose de la veine *I81*

Porteous ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Porteur
- Antigène de surface du virus de l'hépatite B [AgHBs] ¬ *B18.13*
- Blénorragie ¬ Sujet *Z22.4*
- Diphtérie ¬ Sujet *Z22.2*
- Hépatite B ¬ Infection aiguë par agent delta d'un sujet *B17.0*
- Immunoglobulines ¬ Agammaglobulinémie: avec lymphocytes B *D80.1*
- Infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1] ¬ Sujet *Z22.6*
- Maladie
- - Bactérienne due
- - - Méningocoques ¬ Sujet *Z22.3*
- - - Staphylocoques ¬ Sujet *Z22.3*
- - - Streptocoques ¬ Sujet *Z22.3*
- - Infectieuse, sans précision ¬ Sujet *Z22.9*
- Maladies
- - Bactériennes précisées ¬ Sujet *Z22.3*
- - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel ¬ Sujet *Z22.4*
- - Infectieuses ¬ Sujet *Z22.8*
- - Intestinales infectieuses ¬ Sujet *Z22.1*
- Syphilis ¬ Sujet *Z22.4*
- Typhoïde ¬ Sujet *Z22.0*
- ¬ sujet suspecté *Z22*

Porteuse ¬
- Forme symptomatique
- - Dystrophie musculaire
- - - Becker de la femme *G71.08*
- - - Duchenne de la femme *G71.00*
- - Myopathie centronucléaire liée à l'X de la femme *G71.2*
- - Syndrome
- - - Coffin-Lowry de la femme *Q87.0*
- - - X fragile de la femme *Q99.2*
- Maladie de Pelizaeus-Merzbacher chez les femmes *E75.2*

Portion
- Cervicotrochantérienne ¬ *S72.05*
- Intracrânienne ¬ Anévrysme de l'artère carotide interne dans sa *I67.10*
- Vaginal col de l'utérus ¬
- - Adénocarcinome de la *C53.1*
- - Atrésie de la *Q51.8*

Porto-cave ¬ Encéphalopathie *K72.9, K72.79!*

Portosinusoïdale ¬ Maladie vasculaire *K76.8*

Portosystémique
- Congénital ¬ Shunt *Q26.5*
- Congénitale ¬ Fistule *Q26.5*

Porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un shunt *Z95.88*

Portugais ¬ Polyneuropathie amyloïde
- *E85.1*
- Type *E85.1†, G63.3**

Posaconazole ¬ Aspergillus fumigatus résistant au *U83.3!*

Positif
v./v.a. Type de maladie

Position
- Anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec *K07.3*
- Basse de l'oreille ¬ *Q17.4*
- Congénitale des osselets de l'oreille ¬ Anomalie de *Q16.3*
- Couchée ¬ Syndrome hypotensif en *O26.5*
- E] ¬ FRAXE [Syndrome de l'X fragile - *F70.9*
- Instable
- - Avant le travail ¬ *P01.7*
- - ¬ Soins maternels pour *O32.0*
- Occipito
- - Iliaque ¬ Dystocie due à la persistance en *O64.0*
- - Postérieure ¬ Dystocie due à la persistance en *O64.0*
- - Sacrée ¬ Dystocie due à la persistance en *O64.0*
- - Transverse ¬ Dystocie due à la persistance en *O64.0*
- Oreille ¬ Anomalie de *Q17.4*
- Ostia coronaires ¬ Anomalie de *Q24.5*
- Pavillon de l'oreille ¬ Anomalie congénitale de la *Q17.4*
- Présentation anormales
- - Sans précision ¬ Dystocie due à une *O64.9*
- - ¬ Dystocie due à d'autres *O64.8*
- Rate ¬ Anomalie congénitale de la *Q89.08*
- Sein ¬ Anomalie congénitale de la *Q83.88*
- Thyroïde ¬ Anomalie congénitale de la *Q89.2*
- Transverse
- - Oblique ¬ Soins maternels pour *O32.2*
- - ¬ Arrêt en profondeur en *O64.0*
- Vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et *P03.1*

Posner-Schlossmann [glaucome cyclitique] ¬ Syndrome de *H40.4*

Possession ¬ États de transe et de *F44.3*

Possible
- Sévices
- - Physiques infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de *Z61*
- - Sexuels infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de *Z61*
- ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément réductible, réintroduction manuelle *K64.2*

Post-antibiothérapie ¬ Diarrhée *K52.1*

Post-cardiotomie ¬
- Insuffisance cardiaque droite *I97.1*
- Syndrome *I97.0*

Post-chirurgical
- Anse borgne ¬ Syndrome *K91.2*
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose consécutive à une malabsorption *M80.3*
- Glaucome ¬ Cicatrisation *H59.8*
- Non classée ailleurs ¬ Malabsorption *K91.2*
- Précisés ¬ Autres états *Z98.8*
- ¬
- - Asplénie *D73.0*
- - Hypoinsulinémie *E89.1*
- - Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption *M83.2*
- - Ostéoporose consécutive à une malabsorption *M81.3*

Post-cholécystectomie ¬ Syndrome *K91.5*

Post-commotionnel ¬ Syndrome *F07.2*

Post-COVID-19 ¬
- État *U09.9!*
- Infection *U09.9!*
- Syndrome *U09.9!*

Post-dysentérique ¬ Arthrite *M02.1*

Post-encéphalitique ¬
- Parkinsonisme *G21.3*
- Syndrome
- - *F07.1*
- - Parkinsonien *G21.3*

Post-épileptique de Todd ¬ Paralysie *G83.8*

Postérieur
v./v.a. Type de maladie

Postéro-basal ¬
- Infarctus du myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- Infarctus transmural (aigu): *I21.2*

Postérocricoïde ¬ Carcinome épidermoïde de l'hypopharynx *C13.0*

Postéro-inférieur ¬
- Infarctus répété (aigu) (de): *I22.1*
- Infarctus transmural (aigu) (de): *I21.1*

Postéro-latéral ¬
- Infarctus du myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- Infarctus transmural (aigu): *I21.2*

Postéro-septal ¬
- Infarctus du myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- Infarctus transmural (aigu): *I21.2*

Post-gastrectomie ¬ Syndrome (de): *K91.1*

Post-gonorrhéique ¬
- Spermatocystite *A54.2†, N51.8**
- Vésiculite *A54.2†, N51.8**

Post-hémorragique
- Aiguë ¬ Anémie *D62*
- Chronique) ¬ Anémie *D50.0*
- Nouveau-né ¬ Hydrocéphalie *P91.7*

Post-herpétique
- Ganglion géniculé ¬ Atteinte *B02.2†, G53.0**
- ¬
- - Névralgie trigéminée *B02.2†, G53.0**
- - Polynévrite *B02.2†, G63.0**

Posthite
v./v.a. Balano-posthite

Post-hypoglycémique ¬ Encéphalopathie *E16.1†, G94.30**

Post-ictale) ¬ Paralysie de Todd (*G83.8*

Post-infectieux
v./v.a. Type de maladie

Post-inflammatoire
- Post-traumatique) de la macula (pôle postérieur) ¬ Cicatrice (*H31.0*
- ¬
- - Fibrose pulmonaire *J84.10*
- - Hyperpigmentation *L81.0*
- - Perforation du tympan: *H72*

Post-laminectomie, non classé ailleurs ¬ Syndrome *M96.1*

Post-leucotomie ¬ Syndrome (des): *F07.0*

Postlinguale ¬ Surdité génétique non syndromique *H90.5*

Postmaturité SAI ¬ *P08.2*

Post-méningococcique ¬ Arthrite *A39.8†, M03.09**

Post-ménopausique
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose *M80.0*
- ¬
- - Ostéoporose *M81.0*
- - Saignements *N95.0*
- - Urétrite: *N34.2*
- - Vaginite atrophique *N95.2*

Post-morbilleuse ¬ Méningite *B05.1†*

Post-natal
- Hypotonie infantile-diplégie spastique-dysarthrie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microcéphalie *Q87.8*
- Prénatale) ¬ Hypoplasie de l'émail (néonatale) (*K00.4*
- Progressive ¬
- - Atrophie cérébrale et cérébelleuse infantile avec microcéphalie *G31.9, Q02*
- - Syndrome tétraplégie spastique-corps calleux fin-microcéphalie *Q02*

Post-nécrotique ¬ Cirrhose (du foie): *K74.6*

Post-opératoire
v./v.a. Type de maladie

Post-ostéotomie ¬ Pseudarthrose *M96.0*

Post-partum
v./v.a. Type de maladie

Post-phlébitique
- Membres inférieurs ¬ Ulcération *I87.01*
- SAI ¬ Syndrome *I87.00*
- Sans ulcération ¬ Syndrome *I87.00*
- Ulcération ¬ Syndrome *I87.01*

Post-poliomyélitique ¬ Syndrome *G14*

Post-pylorique ¬ ulcère: *K26*

Post-radiothérapie ¬
- Encéphalopathie *G93.88*
- Myélopathie: *G95.8*

Post-radique ¬ Encéphalopathie *G93.88, W91.9!*

Post-rhumatismale [Jaccoud] ¬ Arthropathie chronique *M12.0*

Post-schizophrénique ¬ Dépression *F20.4*

Post-thrombotique
- SAI ¬ Syndrome *I87.00*
- Sans ulcération ¬ Syndrome *I87.00*
- Ulcération ¬ Syndrome *I87.01*
- ¬ Ulcère de jambe *I83.0*

Post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux ¬ Défauts de la transformation *E77.0*

Post-transfusionnelle ¬ Hépatite *B19.9*

Post-transplant lymphoproliferative disease polymorph
- Rémission complète ¬ PTLD [*C88.71*
- Sans mention de rémission complète ¬ PTLD [*C88.70*
- ¬ PTLD [*C88.70*

Post-transplant lymphoproliferative disorder], lésion précoce ¬ PTLD [*D47.7*

Post-transplantation
- Hyperplasie folliculaire floride ¬ Maladie lymphoprolifération *D47.7*
- Lésion précoce ¬ Maladie lymphoprolifération *D47.7*
- Polymorphe
- - Rémission
- - - Complète ¬ Maladie lymphoprolifération *C88.71*
- - - Partielle ¬ Maladie lymphoprolifération *C88.70*
- - Sans mention de rémission ¬ Maladie lymphoprolifération *C88.70*
- ¬
- - Hyperlipidémie *E78.5*
- - Lymphome *D47.9*

Post-traumatique
v./v.a. Type de maladie

Post-TVT
- Tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ¬ Rétention urinaire postopératoire *T83.8*
- ¬ Érosion postopératoire *T83.4*

Posttyphoïdique ¬ Abcès *A01.0*

Posturale
- PoTS] ¬ Syndrome de tachycardie *G90.80*
- ¬
- - Cyphose *M40.0*
- - Hypotension *I95.1*
- - Lordose: *M40.4*
- - Scoliose congénitale: *Q67.5*

Posturaux ¬ Myopathie liée à l'X avec atrophie des muscles *G71.08*

Posture anormale ¬ *R29.3*

Post-vaccinal ¬
- Arthrite *M02.2*
- Encéphalite *G04.0*
- Encéphalomyélopathie *G04.0*
- Thrombocytopénie *D69.58, Y59.9!*

Post-vaccination
- ROR ¬ Déficit immunitaire primaire avec infection virale disséminée *D84.8, T88.0*
- Rougeole, des oreillons et de la rubéole ¬ Déficit immunitaire primaire avec infection virale disséminée *D84.8, B05.9*
- ¬ Leucoencéphalite hémorragique aiguë *G04.0*

Post-vagotomie ¬ Syndrome (de): *K91.1*

Post-varicelleuse ¬ Encéphalite *B01.1†*

Post-viral
- Chronique ¬ Syndrome de fatigue *G93.30*
- ¬ Maladie neurodégénérative fatale *G04.8, E06.3*

Post-zostérien
- Trijumeau ¬ Névralgie *B02.2†, G53.0**
- ¬ Polynévrite *B02.2†, G63.0**

Potasse] ¬ Hydroxyde de: potassium [*T54.3*

Potassique du nouveau-né ¬ Anomalies de l'équilibre *P74.3*

Potassium
- K ¬
- - Déficit en *E87.6*
- - Excès de *E87.5*
- - Surcharge en *E87.5*
- Potasse] ¬ Hydroxyde de: *T54.3*
- ¬ Déséquilibre du métabolisme du *E87.8*

Potion SAI ¬ Somnifères: *T42.7*

Potocki-Shaffer ¬ Syndrome de *Q93.5*

PoTS] ¬ Syndrome de tachycardie posturale [*G90.80*

Pott ¬ Mal de *A18.0†, M49.09**

Pott-Buckel ¬ Syndrome de *A18.0†, M49.09**

Potter
- Fente-cardiopathie ¬ Syndrome de séquence de *Q87.8*
- Type
- - I ¬ Polykystose rénale de *Q61.1*
- - II] ¬ Dysplasie rénale multikystique [*Q61.4*
- - III ¬ Polykystose rénale de *Q61.2*
- ¬ Syndrome de *Q60.6*

Pottique ¬ Gibbosité *A18.0†, M49.09**

Pouce
- Absents-petite taille-déficit immunitaire ¬ Syndrome des *D82.8, Q87.1*
- Adduction-arthrogrypose type
- - Christian ¬ Syndrome des *Q87.0*
- - Dundar ¬ Syndrome des *Q79.6*
- Adduction-spasticité-hydrocéphalie] ¬ Syndrome CRASH [hypoplasie du corps calleux-retard mental- *Q04.8*
- Alopécie-anomalie de la pigmentation ¬ Syndrome d'hypoplasie du *Q87.1*
- Biphalangé ¬ Polydactylie d'un *Q69.1*

Pouce *–suite*
- Complète) (partielle) ¬ Amputation traumatique du *S68.0*
- Long-brachydactylie ¬ Syndrome de *Q87.2*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs et abducteurs du *S56.3*
- - - Fléchisseurs du *S56.0*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs du *S66.2*
- - - Intrinsèques du *S66.4*
- - - Longs fléchisseurs du *S66.0*
- Ongle) ¬ *T23*
- Orteils larges ¬ Ankylose de l'étrier avec *Q87.8*
- Partie non précisée ¬ Fracture du *S62.50*
- Phalange
- - Distale ¬ Fracture du *S62.52*
- - Proximale ¬ Fracture du *S62.51*
- Polyneuropathie ¬ Aplasie des muscles extenseurs des doigts et *G60.0, Q68.1*
- Quervain] ¬ Ténosynovite chronique sténosante du *M65.4*
- S
- - Doigt(s) ¬ Écrasement du *S67.0*
- - Surnuméraire(s) ¬ *Q69.1*
- Triphalangé
- - Brachyectrodactylie ¬ Syndrome de *Q74.8*
- - Hypospadias-progénie ¬ Syndrome d'hypoplasie du radius- *Q87.2*
- - ¬
- - - Polydactylie d'un *Q69.1*
- - - Syndrome
- - - - Agénésie pulmonaire-anomalie cardiaque- *Q87.8*
- - - - Hémimélie tibiale-polysyndactylie- *Q87.2*
- Trois phalanges ¬ *Q74.0*
- Unilatérale ¬ Absence acquise de doigt(s) [y compris le *Z89.0*
- ¬
- - Absence congénitale du *Q71.3*
- - Aplasie du *Q71.3*
- - Déformation congénitale du *Q68.1*
- - Hypoplasie congénitale du *Q71.8*
- - Lésion traumatique
- - - Nerf collatéral du *S64.3*
- - - Vaisseau(x) sanguin(s) du *S65.4*
- - Macrodactylie du *Q74.0*
- - Mégalodactylie du *Q74.0*
- - Ostéoblastome du *D16.1*
- - Plaie ouverte du *S61.0*
- - Succion du *F98.88*

Pouch colon
- Congénital ¬ « *Q43.8*

Pouch colon *–suite*
- ¬ Malformation anorectale non syndromique avec « *Q42.3, Q43.8*

Pouchite ¬ *K91.88*

Poulet ¬ Allergie aux protéines de *T78.1*

Pouls
- Faible ¬ *R09.8*
- Non classée ailleurs ¬ Activité électrique sans *R00.3*

Poumon
- Abcès cérébral ¬ Abcès amibien du *A06.6†, G07**
- Acquise) ¬ Maladie (du): kystique du *J98.4*
- Agent chimique
- - Émanations, des fumées et des gaz ¬ Œdème du *J68.1*
- - ¬ Œdème (aigu) du *J68.1*
- Champignonnistes
- - Exacerbation aiguë ¬ *J67.51*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J67.50*
- - ¬ *J67.50*
- Due
- - Bauxite ¬ Fibrose (du *J63.1*
- - Graphite ¬ Fibrose (du *J63.3*
- Écorceurs érable
- - Exacerbation aiguë ¬ *J67.61*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J67.60*
- Éleveurs de perruches ¬ *J67.20*
- Entamoeba histolytica ¬ Abcès du *A06.5†, J99.8**
- Faneur ¬ *J67.00*
- Fermier
- - Épisodes aigus ¬ *J67.01*
- - Sans mention d'épisodes aiguë ¬ *J67.00*
- - ¬
- - - *J67.00*
- - - Fibrose pulmonaire avec *J67.00*
- Fourreurs
- - Exacerbation aiguë ¬ *J67.81*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J67.80*
- - ¬
- - - *J67.8*
- - - *J67.80*
- Kystique congénital ¬ *Q33.0*
- Laveurs fromage
- - Exacerbation aiguë ¬ *J67.81*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J67.80*
- - ¬
- - - *J67.8*
- - - *J67.80*
- Localisations contiguës ¬ Tumeur à GRF [facteur de libération de l'hormone de croissance] du *C34.8*
- Malteurs

Poumon *–suite*
- Malteurs *–suite*
- - Exacerbation aiguë ¬ *J67.41*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J67.40*
- - ¬ *J67.40*
- Manipulateurs de liège ¬ Maladie ou *J67.3*
- Médicamenteuse ¬ Fibrose du *J70.4*
- Mineurs de charbon ¬ *J60*
- Moissonneurs ¬ *J67.00*
- Niveau urgence
- - HU [High Urgency]] ¬ Inscription pour transplantation cœur- *U55.32*
- - U [Urgency] ¬ Inscription pour transplantation cœur- *U55.31*
- Oiseleurs
- - Exacerbation aiguë ¬ *J67.21*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J67.20*
- - ¬ *J67.20*
- Partie de] ¬ Absence acquise de *Z90.2*
- Petites cellule
- - Bronche souche ¬ Cancer du *C34.0*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ Cancer du *C34.8*
- - ¬ Cancer du *C34.9*
- Pneumonie ¬
- - Abcès amibien du *A06.5†, J17.3**
- - Abcès du *J85.1*
- SAI ¬
- - Abcès du *J85.2*
- - Maladie (du): *J98.4*
- Sans
- - Niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour transplantation cœur- *U55.30*
- - Pneumonie ¬ Abcès du *J85.2*
- - Précision ¬
- - - Lésion traumatique du *S27.38*
- - - Malformation congénitale du *Q33.9*
- - - Tumeur maligne: Bronche ou *C34.9*
- Sarcoïdose des ganglions lymphatiques ¬ Sarcoïdose du *D86.2*
- Stade
- - 1 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.06†, J99.21**
- - 2 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.07†, J99.22**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.07†, J99.23**
- Thyroïde ¬ Syndrome cerveau- *E03.1†, J99.8*, G25.5*
- Torréfacteurs café
- - Exacerbation aiguë ¬ *J67.81*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J67.80*
- - ¬ *J67.80*
- Travailleurs
- - Liège ¬ Maladie ou *J67.3*

Poumon *–suite*
- Travailleurs *–suite*
- - Préparation alimentaire base poisson
- - - Exacerbation aiguë ¬ *J67.81*
- - - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J67.80*
- - - ¬ *J67.80*
- Ventilation du nouveau-né ¬ *P27.8*
- ¬
- - *T17.8*
- - Abcès amibien
- - - *A06.5†, J99.8**
- - - Cerveau (et du foie) (et du *A06.6†*
- - - Foie et du *A06.5†, J99.8**
- - Abcès aspergillaire du *B44.1*
- - Absence congénitale de *Q33.3*
- - Adénocarcinome fœtal bien différencié lobe
- - - Moyen du *C34.2*
- - - Supérieur du *C34.1*
- - Agénésie du *Q33.3*
- - Aluminose (du *J63.0*
- - Amibiase du *A06.5†, J99.8**
- - Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des *Z80.1*
- - Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des *Z85.1*
- - Aspergillose invasive du *B44.0†, J99.8**
- - Blastome
- - - Pleuropulmonaire
- - - - Lobe
- - - - - Inférieur du *C34.3, C38.4*
- - - - - Moyen du *C34.2, C38.4*
- - - - - Supérieur du *C34.1, C38.4*
- - - - Type
- - - - - 1 du lobe inférieur du *C34.3, C38.4*
- - - - - 1 du lobe moyen du *C34.2, C38.4*
- - - - - 1 du lobe supérieur du *C34.1, C38.4*
- - - - - 2 du lobe inférieur du *C34.3, C38.4*
- - - - - 2 du lobe moyen du *C34.2, C38.4*
- - - - - 2 du lobe supérieur du *C34.1, C38.4*
- - - - - 3 du lobe inférieur du *C34.3, C38.4*
- - - - - 3 du lobe moyen du *C34.2, C38.4*
- - - - - 3 du lobe supérieur du *C34.1, C38.4*
- - - Pulmonaire lobe
- - - - Inférieur du *C34.3*
- - - - Moyen du *C34.2*
- - - - Supérieur du *C34.1*
- - Blastomycose primaire du *B40.0†, J99.8**
- - Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les *T27.1*
- - Calcification du *J98.4*
- - Candidose des *B37.1†, J99.8**
- - Carcinoïde du *C34.9*
- - Carcinoma in situ: Bronches et *D02.2*
- - Carcinome lympho-épithélial-like du *C34.9*

Poumon *–suite*
- ¬ *–suite*
- - CCAM [Malformation adénomatoïde kystique du *Q33.0*
- - Collapsus du *J98.18*
- - Contusion et hématome du *S27.31*
- - Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les *T27.5*
- - Cryptococcose des *B45.0†, J99.8**
- - Déchirure
- - - *S27.32*
- - - Aiguë du *S27.32*
- - Donneur de *Z52.80*
- - Dysplasie
- - - *Q33.6*
- - - Thymus-rein-anus- *Q87.8*
- - Échec greffe
- - - *T86.81*
- - - Cœur- *T86.3*
- - Échinococcose kystique du *B67.1†, J99.8**
- - Fibrose silicotique (massive) du *J62*
- - Gangrène du *J85.0*
- - Granulome éosinophilique des *C96.6*
- - Hile (du *C34.0*
- - Histoplasmose
- - - Aiguë du *B39.0†, J99.8**
- - - Chronique du *B39.1†, J99.8**
- - Hypertension pulmonaire lors de maladie du *I27.22*
- - Hypoplasie et dysplasie du *Q33.6*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la trachée, des bronches et des *J95.82*
- - Kyste hydatique du *B67.9†, J99.8**
- - Lésion traumatique
- - - *S27.38*
- - - Vaisseaux sanguins du *S25.4*
- - Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des *M32.1†, J99.1**
- - Lymphangioléiomyomatose du *D38.1*
- - Lymphome MALT [Mucosa Associated Lymphoid Tissue] du *C88.40*
- - Maladie
- - - Due au VIH avec candidose des *B20, B37.1*
- - - Kystique congénitale du *Q33.0*
- - - Polykystique congénitale du *Q33.0*
- - Malformations congénitales du *Q33.8*
- - Mésothéliome du *C45.7*
- - Mycose du *B49†, J99.8**
- - Nécrose du *J85.0*
- - Nocardiose du *A43.0†, J99.8**
- - Rejet greffe
- - - *T86.81*
- - - Cœur- *T86.3*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R91*
- - Sarcoïdose du *D86.0*

Poumon *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Status post greffe
- - - *Z94.2*
- - - Cœur et *Z94.3*
- - Syphilis des *A52.7†, J99.8**
- - Tératome du *D38.1*
- - Torulose des *B45.0†, J99.8**
- - Toxoplasmose du *B58.3†, J17.3**
- - Tumeur
- - - Carcinoïde productrice de mucus des *C34.9*
- - - Glomus du *D18.08*
- - - GRF facteur libération hormone croissance
- - - - *C34.9*
- - - - Lobe
- - - - - Inférieur du *C34.3*
- - - - - Moyen du *C34.2*
- - - - - Supérieur du *C34.1*
- - - Myofibroblastique inflammatoire
- - - - Bénigne du *D14.3*
- - - - Maligne du *C34.9*
- - Tumeur bénigne: Bronches et *D14.3*
- - Tumeur maligne
- - - Lésion à localisations contiguës des bronches et du *C34.8*
- - - Lobe
- - - - Inférieur, bronches ou *C34.3*
- - - - Moyen, bronches ou *C34.2*
- - - - Supérieur, bronches ou *C34.1*
- - - Secondaire du *C78.0*
- - Tumeur neuroendocrine du *C34.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et *D38.1*
- - Zygomycose du *B46.0†, J99.8**

Poupée de son» ¬ Syndrome non spécifique du bébé « *P94.2*

Poursuite
- Grossesse
- - Avortement d'un ou plusieurs fœtus ¬ *O31.1*
- - Mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus ¬ *O31.2*
- Pénales ¬ *Z65*

Poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule ¬ Être pressé ou *W64.9!*

Poussée
- Aiguë ¬
- - Maladie pulmonaire due systèmes
- - - Conditionnement air
- - - - *J67.71*
- - - - Sans mention de *J67.70*
- - - Humidification air
- - - - *J67.71*
- - - - Sans mention de *J67.70*
- - Pneumonie cholestérol
- - - *J84.81*

Poussée *–suite*
- Aiguë ¬ *–suite*
- - Pneumonie cholestérol *–suite*
- - - Sans mention de *J84.80*
- Blastique au cours de leucémie myéloïde ¬ *C92.10, C94.8!*

Poussées
- Exacerbation aiguë ¬ Sclérose en plaques de l'enfant rémittente (évolution par *G35.11*
- Mention d'exacerbation aiguë ou de progression ¬ Sclérose en plaques rémittente (évolution par *G35.11*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression ¬ Sclérose en plaques rémittente (évolution par *G35.10*
- ¬ Sclérose en plaques
- - Aiguë de Marburg rémittente (évolution par *G35.10*
- - Enfant rémittente (évolution par *G35.10*
- - Rémittente (évolution par *G35.1*

Poussière
- Coton ¬ Affection des voies aériennes due aux *J66.0*
- Impuretés dans l'air ¬ *Z57*
- Inorganiques précisées ¬ Pneumoconiose due à d'autres *J63.8*
- Maison avec asthme ¬ Allergie à la *J45.09*
- Organiques
- - Exacerbation aiguë ¬ Alvéolite allergique due aux *J67.91*
- - Précisées ¬ Affection des voies aériennes due à d'autres *J66.8*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Alvéolite allergique due aux *J67.90*
- - ¬
- - - Alvéolite allergique due à autres *J67.8*
- - - Pneumonie allergique due aux *J67.80*
- Silice ¬ Pneumoconiose due à d'autres *J62.8*
- Talc ¬ Pneumoconiose due à la *J62.0*

Pouteau-Colles ¬ Fracture de *S52.51*

Poux
- Pubis] ¬ Phtiriase [Infestation par *B85.3*
- Rickettsia prowazekii ¬ Typhus épidémique à *A75.0*
- ¬
- - Fièvre récurrente
- - - *A68.0*
- - - Novy à *A68.0*
- - Infestation
- - - Chevelure par des *B85.0*
- - - Corps par des *B85.1*
- - Maladie de Brill à *A75.1*
- - Myocardite due au typhus épidémique à *A75.0†, I41.0**
- - Typhus
- - - *A75.0*
- - - Épidémique à *A75.0*

Powassan ¬ Maladie virale de *A84.8*

Powell-Venencie-Gordon ¬ Syndrome de *Q82.8, G11.4*

PPA] ¬ Aphasie progressive primaire [*G31.0†, F02.0**

PPAP [Polymerase proofreading associated polyposis] ¬ *D12.6*

PPARG ¬ Lipodystrophie partielle familiale associée à *E88.1*

PPLO] ¬ Pleuro-pneumonia-like-organism [*B96.0!*

Ppome [Polypeptidome pancréatique] ¬ *D37.70*

PR court ¬ Tachyarythmie atriale avec intervalle *I45.6*

PRAAS [Syndrome auto-inflammatoire lié au protéasome] ¬ *M35.8*

Prader-Labhart-Willi ¬ Syndrome de *Q87.1*

Prader-Willi
- Délétion 15q11q13 d'origine paternelle ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Like
- - Associé
- - - MAGEL2 ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - - SIM1 ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - ¬ Syndrome de *Q87.1*
- ¬ Syndrome de *Q87.1*

Praecox ¬ Lymphoedema *I89.09*

Praevia
- Descente placenta
- - Hémorragie actuelle ¬ Placenta *O44.1*
- - Sans
- - - Hémorragie (actuelle) ¬ Placenta *O44.0*
- - - Précisions ¬ Placenta *O44.0*
- Hémorragie actuelle ¬ Placenta *O44.11*
- Sans hémorragie (actuelle) ¬ Placenta *O44.01*
- ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par placenta *P02.0*

Prasugrel ¬ Hypersensibilité au *T88.7*

Prata-Liberal-Goncalves ¬ Syndrome de *Q74.9, Q76.0*

Pratique sportive ¬ inscription dans: *Z02*

Praxis ¬ Crises induites par *G40.8*

PRCA [Pure red cell aplasia] congénitale ¬ *D61.0*

PRDM8 ¬ Épilepsie myoclonique progressive associée à *G40.3*

Préauriculaire
- Ophtalmoplégie externe ¬ Syndrome de macrostomie-anomalies *Q87.0*
- Polythélie ¬ Syndrome de lipodermoïde du globe oculaire-excroissance *Q18.2*
- ¬
- - Appendice *Q17.0*
- - Fistule et kyste *Q18.1*
- - Syndrome de déficience intellectuelle avec hypoplasie du corps calleux et appendices *Q87.8*

Pré-auriculaire-obstruction du canal lacrymal-surdité] ¬ HPPD [Syndrome d'hypertélorisme-sinus *Q87.0*

Préaxiale
- Colobomes et déficience intellectuelle ¬ Syndrome de polydactylie *Q87.2*
- Doigts de la main ¬ Brachydactylie et syndactylie *Q74.0*
- Hallux varus ¬ Syndrome de brachydactylie *Q73.8, Q66.3*
- Hypertrichose du haut du dos ¬ Syndrome autosomique dominant de polydactylie *Q69.9, Q84.2*
- Orteils ¬ Polydactylie *Q69.2*
- Temtamy ¬ Syndrome de brachydactylie *Q87.2*
- ¬ Syndrome d'hallux varus congénital-polysyndactylie *Q66.3, Q70.4*

Prébêtalipoprotéinémie ¬ Hyperbêtalipoprotéinémie avec *E78.2*

Précalicielle ¬ Ectasie canaliculaire *Q61.5*

Précautions aseptiques ¬ Mesures insuffisantes de *Y69!*

Précédant accouchement
- Anomalie de la coagulation ¬ Hémorragie *O46.0*
- Associée
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) *O46.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie (importante) *O46.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie (importante) *O46.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) *O46.0*
- Sans précision ¬ Hémorragie *O46.9*
- ¬ Autres hémorragies *O46.8*

Précérébral
v./v.a. Artère précérébrale
v./v.a. Vaisseau précérébral
- Multiples et bilatéraux ¬ Accident ischémique transitoire de territoires artériels *G45.2*
- Y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères cérébrales et *I63*

Précipité ¬
- Bredouillement [langage *F98.6*
- Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement *P03.5*

Préclimatérique ¬ Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Précoce
v./v.a. Type de maladie

Précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale chez l'homme ¬ *E25*

Précordial ¬
- Douleur *R07.2*
- Frottement *R01.2*

Précurseur
v./v.a. Cellule précurseur
- B
- - Rémission complète ¬ B-ALL [Leucémie aiguë lymphoblastique à *C91.01*
- - ¬

Précurseur *–suite*
- B *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - B-ALL [Leucémie aiguë lymphoblastique à *C91.00*
- - - Leucémie aiguë lymphoblastique à *C91.00*
- - - Lymphome à *C83.5*
- T
- - Rémission complète ¬ Leucémie aiguë lymphoblastique à *C91.01*
- - ¬ Leucémie aiguë lymphoblastique à *C91.00*
- Thromboplastine plasmatique [PTA] ¬ Déficit en *D68.1*

Prédiabète ¬ *R73.08*

Prédisposition
- Cancer
- - Hématologiques associé à DDX41 ¬ Syndrome de *Q99.8*
- - Oligodontie ¬ Syndrome de *K00.0*
- - Oropharyngé ¬ Télangiectasie cutanée familiale et syndrome de *L81.7*
- - Sein et de l'ovaire ¬ Syndrome héréditaire de *C56, C97!, C50.9*
- Carcinome rénal et mélanome associé à MITF ¬ Syndrome de *Q99.8*
- Carcinome spinocellulaire ¬ Syndrome de kératodermie palmoplantaire-ambiguïté sexuelle XX- *Q56.0, Q82.8*
- Cardiomyopathies ¬ Examens liés à une *Z01.81*
- Développement de tumeurs liée à BAP1 ¬ *Q99.8*
- Dysrythmies malignes ¬ Examens liés à une *Z01.80*
- Génétique sévère aux infections mycobactériennes par déficit complet en IFNG ¬ *D84.8*
- Héréditaire au cancer dû à une mutation bialélique du gène BRCA2 ¬ Syndrome de *D61.0*
- Infections
- - Bactériennes par trouble de la signalisation par les TLR ¬ *D84.8*
- - Fongiques invasives par déficit en CARD9 ¬ *D84.8*
- Leucémie myéloïde aiguë ¬ Syndrome des plaquettes familial associé à une *D69.1*
- Mendélien
- - Autosomique récessive aux infections mycobactériennes par déficit partiel en JAK1 ¬ *D84.8*
- - Infections mycobactérien
- - - Déficit
- - - - Complet
- - - - - IFNgammaR1 ¬ *D84.8*
- - - - - IFNgammaR2 ¬ *D84.8*
- - - - - IL12B ¬ *D84.8*
- - - - - IRF1 ¬ Sévère *D84.8*
- - - - - ISG15 ¬ *D84.8*

Prédisposition *–suite*
- Mendélien *–suite*
- - Infections mycobactérien *–suite*
- - - Déficit *–suite*
- - - - Complet *–suite*
- - - - - Récepteur bêta 1 de l'interleukine 12 ¬ *D84.8*
- - - - Partiel
- - - - - Facteur 8 régulateur de l'interféron ¬ *D84.8*
- - - - - JAK1 ¬ *D84.8*
- - - - - STAT1 ¬ *D84.8*
- - - ¬ *D84.8*
- Mycobactérioses liée au chromosome X ¬ *D84.8*
- Parodontite juvénile localisée ¬ Anomalie des granulocytes neutrophiles associée à une *D71*
- Tumeur rhabdoïde ¬ Tumeur rhabdoïde
- - Rein au cours de syndrome de *C64*
- - Tératoïde au cours de syndrome de *C80.9*
- Tumorale
- - DICER1 ¬ Blastome pleuropulmonaire au cours de syndrome de *C34.9, C38.4*
- - Lié à DICER1 ¬ Syndrome de *Q99.8*
- - Liée
- - - BAP1 ¬ Mélanome malin de la peau associé au syndrome de *C43.9*
- - - Gène
- - - - BAP1 ¬ Carcinome à cellules rénales associé au syndrome de *C64*
- - - - DDX41
- - - - - Rémission complète ¬ Leucémie myéloïde aiguë au cours de syndrome de *C92.01*
- - - - - ¬ Leucémie myéloïde aiguë au cours de syndrome de *C92.00*
- - - - - ¬ Syndrome myélodysplasique au cours de syndrome de *D46.9*
- - - - MBD4 ¬
- - - - - Leucémie myéloïde aiguë au cours de syndrome de *C92.00*
- - - - - Syndrome myélodysplasique au cours de syndrome de *D46.9*
- - - MITF ¬
- - - - Carcinome à cellules rénales associé au syndrome de *C64*
- - - - Mélanome malin de la peau associé au syndrome de *C43.9*

Prédominance
- Allergique qualifié
- - Bien contrôlé
- - - Non sévère ¬ Asthme à *J45.00*
- - - Sévère ¬ Asthme à *J45.03*
- - Non contrôlé
- - - Non sévère ¬ Asthme à *J45.02*
- - - Sévère ¬ Asthme à *J45.05*
- - Partiellement contrôlé
- - - Non sévère ¬ Asthme à *J45.01*
- - - Sévère ¬ Asthme à *J45.04*

Prédominance *–suite*
- Corticale ¬ Démence à *F01.1*
- Gauche ¬ Cardiomyopathie ventriculaire arythmogène familiale isolée avec *I42.88*
- Lymphocytaire-histiocytaire ¬ Lymphome de Hodgkin à *C81.0*
- Ventriculaire droite ¬ Cardiomyopathie arythmogène isolée familiale à *I42.80*

Prédominant
- Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies *D83.1*
- Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies *D83.0*
- Production anticorps
- - Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec déficit *D80.9*
- - ¬ Autres déficits immunitaires avec déficit *D80.8*
- SII-C] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec constipation *K58.2*
- SII-D] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée *K58.1*

Prééclampsie
- Greffée lors d'hypertension ¬ *O11*
- Grossesse ¬ *O14.9*
- Légère ¬ *O14.0*
- Modérée ¬ *O14.0*
- Sans précision ¬ *O14.9*
- Sévère puerpérale ¬ *O14.1*
- Surajoutée
- - États hypertensifs préexistants ¬ *O11*
- - Hypertension SAI ¬ *O11*
- - ¬
- - - *O11*
- - - Hypertension
- - - - Chronique avec *O11*
- - - - Essentielle préexistante au cours de la grossesse, avec *O11*
- - - - Préexistante avec *O11*
- ¬ *O14.9*

Prééclamptique ¬
- Protéinurie *O14.9*
- Toxicose *O14.9*

Pré-excitation ¬ Syndrome de *I45.6*

Pré-excitée ¬ Conduction auriculoventriculaire: *I45.6*

Préexistant
v./v.a. Type de maladie

Préférence sexuel
- Sans précision ¬ Trouble de la *F65.9*
- - ¬ Troubles
- - *F65.8*
- - Multiples de la *F65.6*

Prégabaline ¬
- Abus de *F13.1*
- Dépendance à la *F13.2*
- Troubles liés à l'usage de *F13.1*

Préinfarctus ¬ Syndrome (de): *I20.0*

Preiser ¬ Syndrome de *M87.24*

Prékallicréine ¬ Déficit congénital en *D68.8*

Préleucémie (syndrome de) SAI ¬ *D46.9*

Prélèvement

- Effectués sur
- - Appareil
- - - Digestif et la cavité abdominale ¬ Résultats anormaux de *R85*
- - - Respiratoire et le thorax ¬ Résultats anormaux de *R84*
- - Organe génital
- - - Femme ¬ Résultats anormaux de *R87*
- - - Homme ¬ Résultats anormaux de *R86*
- - Organes, appareils et tissus ¬ Résultats anormaux de *R89*
- Gorge ¬ Résultats anormaux de: *R84*
- Implantation d'ovules ¬ Admission pour *Z31.2*
- Placentaire (par voie vaginale) ¬ *Z36.0*

Prélinguale ¬ Surdité génétique non syndromique *H90.5*

Prématuré
v./v.a. Type de maladie

Prématurité
v./v.a. ichtyose-prématurité

- SAI ¬ *P07.3*
- ¬
- - Anémie de la *P61.2*
- - Hyperbilirubinémie de la *P59.0*
- - Rétinopathie de la *H35.1*

Préménopause ¬ Saignements abondants de la *N92.4*

Préménopausique ¬ Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Prémenstruelle ¬ Syndrome de tension *N94.3*

Prémolaire-canine ¬ En avant de la jonction *C04.0*

Prénatal
v./v.a. Examen prénatal systématique de la mère

- Amniocentèse ¬ Autres dépistages *Z36.2*
- Anomalies chromosomiques ¬ Dépistage *Z36.0*
- Fractures congénitales des os ¬ Amyotrophie spinale *G12.2, Q74.8*
- Insuffisants ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins *Z35.3*
- Iso-immunisation ¬ Dépistage *Z36.5*
- Malformations par échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage *Z36.3*
- Retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage *Z36.4*
- Sans précision ¬ Dépistage *Z36.9*
- Taux élevé d'alpha-fœtoprotéines ¬ Dépistage *Z36.1*
- ¬
- - Dépistages *Z36.8*

Prénatal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Hypoplasie de l'émail (néonatale) (post-natale) (*K00.4*
- - Kératite gonorrhéique *A54.3†, H19.2**

Préoccupation exagérées pour les événements sources de tension ¬ Inquiétude et *R46.6*

Préparation

- Alimentaire base poisson
- - Exacerbation aiguë ¬ Poumon des travailleurs de *J67.81*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des travailleurs de *J67.80*
- - ¬ Poumon des travailleurs de *J67.80*
- Base
- - Foie et autres substances anti-anémiantes ¬ *T45.8*
- - Plantes ou remèdes populaires ¬ Abus de: *F55*
- Capillaires ¬ Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et *T49.4*
- Contenant une seule et plusieurs substances ¬ *T38.4*
- Dialyse et traitement ¬ *Z49*
- Ophtalmologiques ¬ Intoxication: Médicaments et *T49.5*
- Utilisés en oto-rhino-laryngologie ¬ Intoxication: Médicaments et *T49.6*

Préparatoires

- Traitement ultérieur, non classés ailleurs ¬ Soins *Z51.4*
- Vue d'une dialyse ¬ Soins *Z49.0*

Prépatellaire ¬ Bursite *M70.4*

Pré-psychotique ¬ Schizophrénie: *F21*

Prépuce

- Adhérent ¬ *N47*
- Congénital ¬ Méga- *Q55.6*
- Phimosis et paraphimosis ¬ Hypertrophie du *N47*
- Serré ¬ *N47*
- ¬
- - Adénocarcinome du *C60.0*
- - Carcinome épidermoïde du *C60.0*
- - Gonorrhée du *A54.0†, N51.2**
- - Mélanome malin du *C60.0*
- - Tuberculose du *A18.1†, N51.8**
- - Tumeur maligne: *C60.0*

Prépuciale ¬ Mélanome malin de la muqueuse *C60.0*

Prépylore ¬

- *C16.4*
- Carcinome épidermoïde du *C16.4*

Prérénale ¬

- Insuffisance rénale aiguë *N17*
- Urémie *R39.2*

Presbyacousie ¬ *H91.1*

Presbytie ¬ *H52.4*

Prescription

- Moyens contraceptifs ¬ Première *Z30.0*
- Pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs ¬ Renouvellement d'une *Z30.4*

Présénile

- Cours de maladie d'Alzheimer ¬ Démence *G30.0†, F00.0**
- SAI ¬
- - Démence: *F03*
- - Psychose: *F03*
- Type Alzheimer ¬ Démence *F00.0**
- ¬
- - Cataracte infantile, juvénile et *H26.0*
- - Démence
- - - Cours
- - - - Atrophie cérébrale *G31.88†, F02.8**
- - - - Sclérose *G30.0†, F00.0**
- - - Dégénérative primaire type Alzheimer
- - - - Apparition *G30.0†, F00.0**
- - - - Début *F00.0**
- - Formes sénile et *G30†*
- - Maladie due au VIH avec démence *B22†, F02.4**
- - Syndrome d'hypoplasie fovéale-cataracte *H35.8†, H28.2**

Présent ¬ Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied *Q72.1*

Présentant

- Œsophage de Barrett ¬ Dysplasie de haut grade chez les patients *D00.1*
- Risque d'abus ¬ Intoxication: Psychostimulants *T43.6*

Présentation

- Anormale
- - Avant le travail ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.7*
- - Fœtus, sans précision ¬ Soins maternels pour *O32.9*
- - Plusieurs fœtus ¬ Soins maternels pour grossesse multiple avec *O32.5*
- Anormales
- - Fœtus ¬ Soins maternels pour d'autres *O32.8*
- - Sans précision ¬ Dystocie due à une position et une *O64.9*
- - ¬ Dystocie due à d'autres positions et *O64.8*
- Complexe ¬
- - Dystocie due à une *O64.5*
- - Soins maternels pour *O32.6*
- Épaule ¬ Dystocie due à une *O64.4*
- Face
- - Avant le travail ¬ *P01.7*
- - Front et du menton ¬ Soins maternels pour *O32.3*
- - ¬ Dystocie due à une *O64.2*
- Front ¬ Dystocie due à une *O64.3*
- Menton ¬ *O64.2*
- Oblique ¬ *O32.2*

Présentation *–suite*
- Occipito-postérieure persistante ¬ *P03.1*
- Pieds ¬ Dystocie due à une *O64.1*
- Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P03.1*
- Siège
- - Avant le travail ¬ *P01.7*
- - ¬
- - - Dystocie due
- - - - *O64.1*
- - - - *O64.1*
- - - Soins maternels pour *O32.1*
- Tête ¬ Accouchement spontané avec *O80*
- Transverse
- - Avant le travail ¬ *P01.7*
- - ¬
- - - *O32.2*
- - - *P03.1*

Préservée] ¬ HFpEF [Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche *I50.19*

Pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule ¬ Être *W64.9!*

Pression
- Atmosphérique
- - Ambiant
- - - Eau ¬ Effets sur l'oreille des changements de la *T70.0*
- - - ¬ Effets sur les sinus des changements de la *T70.1*
- - Élevée ou basse (sans relation avec les conditions météorologiques) ¬ Exposition à une *W94.9!*
- - Pression eau
- - - Sans précision ¬ Effet de la *T70.9*
- - - ¬ Autres effets de la *T70.8*
- - ¬ Accident dû à un changement de *W94.9!*
- Cérébrale lors d'une lésion cranio-cérébrale couverte grave ¬ Compression du cerveau, hémorragie et *S06.21, S01.83!*
- Eau
- - Sans précision ¬ Effet de la pression atmosphérique et de la *T70.9*
- - ¬ Autres effets de la pression atmosphérique et de la *T70.8*
- Explosion, n.c.a. ¬ Blessure par la *T70.8*
- Groupe ¬ Vaccination non effectuée raison
- - *Z28*
- - *Z53*
- Industrielle) ¬ Injection traumatique de fluide à haute *T70.4*
- Intracrânienne ¬ Elévation de la *G93.2*
- Intraoculaire
- - Due à un glaucome résiduel ¬ Augmentation modérée de la *H40.18*
- - ¬ Glaucome sans augmentation de la *H40.18*

Pression *–suite*
- Normale
- - Idiopathique ¬ Hydrocéphalie à *G91.20*
- - Non précisée ¬ Hydrocéphalie à *G91.29*
- - Secondaire ¬ Hydrocéphalie à *G91.21*
- - ¬ Glaucome à *H40.18*
- Parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation ¬ *Z62*
- Peau par ailleurs intacte ¬ Zone de pression avec rougeur persistante à la *L89.0*
- Perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de *L89.1*
- Phlyctène (remplie de liquide séreux) (ouverte) (percée) ¬ Ulcère [escarre] de *L89.1*
- Positive ¬ Pneumothorax spontané avec *J93.0*
- Rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte ¬ Zone de *L89.0*
- Sans indication de stade ¬ Ulcère [escarre] de *L89.9*
- Télédiastolique ventriculaire gauche ¬ Augmentation pathologique de la *R94.3*
- Veineuse épisclérale élevée ¬ Glaucome secondaire à une *H40.5*
- ¬
- - Effet d'une onde de *T70.9*
- - Effets des fluides à haute *T70.4*
- - Incontinence de *N39.42*
- - Lipoatrophie localisée due à la *E88.1*
- - Neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la *G60.0*

Présyncope ¬ *R42*

Préterminale ¬ Insuffisance rénale *N18.4*

Prétibiale ¬ Épidermolyse bulleuse dystrophique *Q81.2*

Preus ¬ Syndrome oculo-cérébral d'hypopigmentation, type *E70.3*

Prévisible) médicamenteuse ¬ lésion hépatique: toxique (*K71*

Priapisme
- SAP ¬ *N48.39*
- Type
- - High-flow ¬ *N48.31*
- - Low-flow ¬ *N48.30*
- ¬ Autre *N48.38*

Prieto-Badia-Mulas ¬ Syndrome de *Q87.8*

Primaire
v./v.a. Type de maladie

Primigeste
- Âgée ¬ Surveillance d'une *Z35.5*
- Jeune ¬ Surveillance d'une *Z35.6*

Primitif
v./v.a. Type de maladie

Primo-infection tuberculeuse
- Appareil
- - Génito-urinaire ¬ *A18.1*
- - Respiratoire ¬ *A16.7*
- Ganglion
- - Hilaire

Primo-infection tuberculeuse *–suite*
- Ganglion *–suite*
- - Hilaire *–suite*
- - - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.7*
- - - ¬ *A16.7*
- - Intrathoracique
- - - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.7*
- - - ¬ *A16.7*
- - Médiastinal
- - - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.7*
- - - ¬ *A16.7*
- - Trachéo-bronchique
- - - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.7*
- - - ¬ *A16.7*
- Gastro-intestinale ¬ *A18.3†, K93.0**
- Médiastin ¬ *A16.7*
- Os ¬ *A18.0†, M90.09**
- Plèvre
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.7*
- - ¬ *A16.7*
- ¬ *A16.7*

Primordial
- Microcéphalique par déficit en ZNF335 ¬ Nanisme *Q87.1*
- Résistance à l'insuline ¬ Syndrome de nanisme microcéphalique *Q87.1*
- Type
- - Dauber ¬ Nanisme microcéphalique *Q87.1*
- - II ¬ Nanisme microcéphalique ostéodysplasique *Q87.1*
- - Montréal ¬ Nanisme microcéphalique *Q87.1*
- - Toriello ¬ Nanisme microcéphalique *Q87.1*
- Types
- - I ¬ Nanisme microcéphalique ostéodysplasique *Q87.1*
- - III ¬ Nanisme microcéphalique ostéodysplasique *Q87.1*
- ¬ Kyste: *K09.0*

Primrose ¬ Syndrome de *Q87.8*

Primum
- Type I) ¬ Persistance de l'ostium *Q21.2*
- ¬ CIA type ostium *Q21.2*

Principale
- Accessoires ¬ Glandes salivaires *D37.0*
- Parathyroïde ¬ Adénome à cellules *D35.1*
- Sans précision ¬ Tumeur bénigne: Glande salivaire *D11.9*
- ¬
- - Glande de Bartholin [glande vestibulaire *C51.0*
- - Tumeur bénigne: Autres glandes salivaires *D11.7*

Principale *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires *C08.8*

Prinzmetal ¬ Angine de poitrine (de): *I20.1*

Prion
- Familiale Alzheimerlike ¬ Maladie à *A81.9*
- Système nerveux central ¬ Maladies à *A81*
- ¬ Amylose systémique à protéine *E85.88*

Prionopathie de sensibilité variable aux protéases ¬ *A81.8*

Prise
- Charge d'une contraception ¬ Autres *Z30.8*
- Voie interne ¬ Dermite due à d'autres substances *L27.8*

Prise en charge
- Adapté ¬ Personne attendant d'être admise dans un établissement de *Z75.8*
- Contraception, sans précision ¬ *Z30.9*
- Normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la *Z76.2*
- Personne dépendante pendant un congé de ses proches ¬ *Z75.8*
- Sécrétions ¬ Dépendance (de longue durée) envers: appareils de *Z99.0*

Prison ¬ Difficultés liées à une libération de *Z65*

Pritzker
v./v.a. Hashimoto-Pritzker

Privation
- Affective ¬ Psychopathie de *F94.2*
- Dus à la toxicomanie de la mère ¬ Symptômes néonatals de *P96.1*
- Eau ¬ *T73.1*
- Liberté ¬ Emprisonnement et autres formes de *Z65*
- Nourriture ¬ *T73.0*
- Sans précision ¬ Effet dû à une *T73.9*
- Sommeil ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- Utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né ¬ Symptômes de *P96.2*
- ¬ Autres effets dus à une *T73.8*

PRKAR1B ¬ Démence neurodégénérative avec filaments intermédiaires associée à *G31.88*

PRKCD ¬ Maladie lymphoprolifératives associée à l'EBV [virus Epstein-Barr] par déficit en *D82.3*

PRL ¬ Adénome hypophysaire à *D35.2*

Proaccélérine ¬
- Carence en *D68.22*
- Déficit héréditaire en *D68.22*

Problème
- Alimentaire nouveau-né
- - Sans précision ¬ *P92.9*
- - ¬ Autres *P92.8*
- Développement psychosexuel ¬ *F66.9*

Problème *–suite*
- Langage ¬ *R47.8*
- Ouïe
- - Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, H94.8**
- - Syphilitiques ¬ *A52.1†, H94.8**
- - ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos de type cyphoscoliose avec *Q79.6*
- Sexuel relationnel ¬ *F66.2*
- Sociaux ¬ Grossesse à risques liée à des *Z35.8*

Proboscis latéral ¬ *Q30.8*

Procédé biologie moléculaire ¬
- Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*
- Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*
- Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*

Procédure
- Garde ou d'entretien d'enfants ¬ *Z65*
- Spéciales pour le dépistage du SARS-CoV-2 ¬ *Z11, U99.0!*

Procès
- Civil ou pénal ¬ Condamnation, sans emprisonnement, après *Z65*
- ¬ *Z65*

Processus
- Alvéolaire ¬
- - Fente (du *K08.8*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (*S01.53*
- Condylien de la mandibule ¬ Hyperplasie ou hypoplasie unilatérale du *K10.8*
- Styloïde allongé ¬ Syndrome du *M77.9*
- Xiphoideus ¬ Fracture du sternum: *S22.23*

Proche
- Niveau d'un moignon d'amputation ¬ Contracture (flexion) (de l'articulation la plus *T87.6*
- ¬ Prise en charge d'une personne dépendante pendant un congé de ses *Z75.8*

Procidence
- Bras ¬ *O64.4*
- Cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P02.4*
- Effort spontanément réductible
- - Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec *K64.2*
- - ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec *K64.1*
- Réintroduction manuelle impossible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec *K64.3*
- SAI ¬ *N81.3*
- Vaisseaux du cordon ¬ *P02.6*
- ¬ Hémorroïdes (avec saignement) sans *K64.0*

Proconvertine ¬
- Carence en *D68.23*
- Déficit
- - Acquis en facteur *D68.4*
- - Constitutionnel en *D68.23*
- - Héréditaire *D68.23*

Procréation ¬
- Conseils et avis généraux en matière de *Z31.6*
- Recherches et tests en vue d'une *Z31.4*

Procréative
- Sans précision ¬ Mesure *Z31.9*
- ¬ Autres mesures *Z31.8*

Procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à *Z35.2*

Proctalgie fugace ¬ *K59.4*

Proctite
- Aiguë amibienne ¬ *A06.8*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Due au virus de l'herpès ¬ *A60.1†, K93.8**
- Radique ¬ *K62.7*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**

Proctorragie ¬ *K62.50*

Prodromique ¬ Schizophrénie: *F21*

Production
- Anticorps
- - Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la *D80.9*
- - ¬ Autres déficits immunitaires avec déficit prédominant de la *D80.8*
- Ectopique d'ACTH [hormone adrénocorticotrope] ¬ Syndrome de Cushing dû à la *E24.3*
- IgM
- - Rémission complète ¬ Lymphome lymphoplasmocytaire avec *C88.01*
- - ¬ Lymphome lymphoplasmocytaire avec *C88.00*
- Intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ *F68.1*

Productrice mucus
- Appendice ¬ Tumeur carcinoïde *C18.1*
- Poumons ¬ Tumeur carcinoïde *C34.9*

Produisant du cortisol ¬ Syndrome de Cushing dû à un adénome du cortex surrénalien *D35.0, E24.8*

Produit
- Agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique ¬ Intoxication: *T50.3*
- Anormal de la conception, sans précision ¬ *O02.9*
- Anormaux de la conception, précisés ¬ Autres *O02.8*
- Chimique ¬
- - Dermite
- - - Allergique de contact due à d'autres *L23.5*

Produit *–suite*
- Chimique ¬ *–suite*
- - Dermite *–suite*
- - - Contact, sans précision, due à d'autres *L25.3*
- - - Irritante de contact due à d'autres *L24.5*
- - Sclérose systémique due à des médicaments et des *M34.2*
- - Ulcère de l'œsophage: dû à l'ingestion de: *K22.1*
- Conception
- - Accouchement, sans hémorragie ¬ Rétention de *O73.1*
- - SAI, après l'accouchement ¬ Rétention de *O72.2*
- Conservation du bois ¬ *T60*
- Contenant amphétamine méthamphétamine ¬
- - Consommation non intraveineuse de *U69.34!*
- - Utilisation intraveineuse de *U69.33!*
- Cosmétiques ¬ Allergie aux *L23.2*
- Dérivés du pétrole ¬ Effet toxique: *T52.0*
- Désintoxication alcoolique ¬ *T50.6*
- Exogènes ¬ Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres *E03.2*
- Médicaux ¬ Incidents dus à des appareils ou à des *Y82.8!*
- Médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de *Y82.8!*
- Naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Plantes et *F55.6*
- Protection du bois ¬ Intoxication par des *T60.9*
- Sang ¬ Sang entier et *T45.8*
- Stéroïdien dans le sang ¬ Présence d'un *R78.6*
- Système immunitaire ¬ Hémophilie due aux inhibiteurs *D68.38*

Proéminentes ¬ Oreilles *Q17.5*

Professionnel
- Dents ¬ Abrasion: *K03.1*
- Facteurs de risque ¬ Exposition *Z57*
- Non classées ailleurs ¬ Ergothérapie et rééducation *Z50.7!*
- SAI ¬
- - Dermite de contact (*L25.9*
- - Eczéma de contact (*L25.9*
- Y compris crampe de l'écrivain ¬ Névrose: *F48.8*
- ¬
- - Affections des tissus mous d'origine *M70*
- - Érosion des dents: *K03.2*

Profond
v./v.a. Type de maladie

Profondeur en position transverse ¬ Arrêt en *O64.0*

Profunda ¬ Trichophytia *B35.8*

Progénie ¬ Syndrome d'hypoplasie du radius-pouces triphalangés-hypospadias- *Q87.2*

Progéria
- Adulte ¬ *E34.8*
- Nestor-Guillermo ¬ *E34.8*
- Petite taille - nævus pigmentés ¬ Syndrome de *E34.8*
- ¬ *E34.8*

Progéroïde
v./v.a. hypoplasie mandibulaire-surdité-apparence progéroïde-lipodystrophie
- Cardio-cutané lié à LMNA ¬ Syndrome *E34.8*
- Fontaine ¬ Syndrome *Q87.8*
- Marbach-Rustad ¬ Syndrome d'apparence *E34.8*
- Marfanoïde-lipodystrophie ¬ Syndrome d'apparence *E88.1*
- Type
- - 1 ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos *Q79.6*
- - 2 ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos *Q79.6*
- ¬
- - EDS type *Q79.6*
- - Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Progestatifs ¬ Intoxication: Autres œstrogènes et *T38.5*

Prognathie (mandibulaire) (maxillaire) ¬ *K07.1*

Prognathisme
- Anomalies oculaires et cutanées ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-obésité- *Q87.8*
- Autosomique dominant ¬ *K07.1*
- Cryptorchidie ¬ Syndrome lié à l'X de microcéphalie-retard de croissance- *Q87.8*

Programme de recherche clinique ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un *Z00.6*

Progrediens ¬ Kératodermie palmoplantaire transgrediens et *Q82.8*

Progressif
v./v.a. Type de maladie

Progression ¬ Sclérose en plaques
- Progressive emblée chronique progressive primaire
- - Mention d'exacerbation aiguë ou de *G35.21*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ou de *G35.20*
- Rémittente
- - Évolution poussées
- - - Mention d'exacerbation aiguë ou de *G35.11*
- - - Sans mention d'exacerbation aiguë ou de *G35.10*
- - Progressive (chronique, secondairement progressive), avec mention d'exacerbation aiguë ou de *G35.31*

Prohormone convertase
- 1 chez l'enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ Obésité extrême par déficit en *E66.85*
- I

Prohormone convertase *–suite*
- I *–suite*
- - Enfant et l'adolescent de 3 ans à moins de 18 ans ¬ Obésité par déficit en *E66.84*
- - ¬ Obésité par déficit en *E66.89*

Prolactine ¬
- Adénome hypophysaire à *D35.2*
- Déficit familial isolé en récepteur de la *E22.1*
- Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*

Prolactinome ¬ *D35.2*

Prolapsus
- Anal ¬ *K62.2*
- Canal anal ¬ *K62.2*
- Col SAI ¬ *N81.2*
- Congénital
- - Méat urinaire ¬ *Q64.7*
- - Urètre ¬ *Q64.7*
- - Vessie (muqueuse) ¬ *Q64.7*
- Cordon ¬ Travail et accouchement compliqués d'un *O69.0*
- Corps vitré ¬ *H43.0*
- Discal ¬ Radiculite
- - Cervicale due à un *M50.1†, G55.1**
- - Due à un *M51.1†, G55.1**
- Génital
- - Sans précision ¬ *N81.9*
- - ¬ Autres *N81.8*
- Hémorroïdes
- - Externes ¬ *K64.5*
- - Internes ¬ *K64.9*
- Hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope ¬ *N83.4*
- Membranes ¬ Suivi de la mère en cas de *O34.31*
- Mitral] ¬ Syndrome de Barlow [*I34.1*
- Muqueux
- - Rectale ¬ *K62.3*
- - Urétral
- - - Femme ¬ *N81.0*
- - - ¬ *N36.3*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Paroi supérieure du vagin après hystérectomie ¬ *N99.3*
- Prolapsus utérin de 1er ou 2e degré ¬ *N81.2*
- Rectal ¬ *K62.3*
- Urétéral avec fermeture et infection ¬ *N13.67*
- Urètre
- - Femme ¬ *N81.0*
- - Homme ¬ *N36.3*
- - ¬ *N36.3*
- Utérin
- - 1er ou 2e degré ¬ Prolapsus (de): *N81.2*
- - 3e et 4e degré ¬ *N81.3*
- - SAI ¬ *N81.4*
- Utéro vaginal
- - Complet ¬ *N81.3*

Prolapsus *–suite*
- Utéro vaginal *–suite*
- - Partiel ¬ *N81.2*
- - Sans précision ¬ *N81.4*
- Utérus gravide ¬ Soins maternels pour: *O34.5*
- Vaginal paroi
- - Antérieure) SAI ¬ *N81.1*
- - Postérieure ¬ *N81.6*
- Valve mitrale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypogonadisme- *Q87.8*
- Valvulaire mitral familial ¬ *I34.1*
- Valvule) mitral(e) ¬ *I34.1*

Prolidase ¬ Déficit en *E72.8*

Prolifèrant
- Décollement de la rétine ¬ Vitréo-rétinopathie *H33.4*
- ¬
- - Rétinopathies *H35.2*
- - Vitréo-rétinopathie *H35.2*

Prolifération
- Blastes en transformation) ¬ Anémie réfractaire avec crise blastique (*C92.0*
- Épithéliale ¬ Mastopathie kystique avec *N60.3*
- Mélanocytaire uvéale bilatérale diffuse] ¬ PMUBD [*C80.9†, H32.8**
- Mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux stéroïdes avec *N04.3*
- Tumorale SAI ¬ *D48.9*

Prolifèrative
- Cérébrale ¬ Angiopathie *I67.88*
- Chronique ¬ Péritonite
- - *K65.8*
- - Due à): *K65.8*
- Diffuse au cours de lupus érythémateux disséminé ¬ Glomérulonéphrite *M32.1†, N08.5**
- ¬
- - Néphropathie à IgA [Immunoglobuline A] avec lésions glomérulaires *N02.8*
- - Rétinopathie drépanocytaire *D57.8†, H36.8**

Proliferum) ¬ Infection à: Sparganum (S.mansoni) (S. *B70.1*

Proline oxydase ¬ Déficit en *E72.5*

Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact ¬ *R46.7*

Prolongation
- Deuxième période [expulsion] ¬ *O63.1*
- Première période [dilatation] ¬ *O63.0*

Prolongement axillaire sein
- Type glande salivaire ¬ Carcinome du *C50.6*
- ¬
- - Adénocarcinome
- - - Apocrine du *C50.6*
- - - Tubulaire du *C50.6*
- - Angiosarcome du *C50.6*

Prolongement axillaire sein *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carcinome héréditaire du *C50.6*
- - Carcinome métaplasique du *C50.6*
- - Carcinome mucineux du *C50.6*
- - Tumeur maligne: *C50.6*

Prolymphocytaire
- Cellule B
- - Rémission complète ¬ Leucémie *C91.31*
- - ¬ Leucémie *C91.3*
- Cellules T en rémission complète ¬ Leucémie *C91.61*

Prométaphase ¬
- Délétions vues seulement à la *Q93.6*
- Duplications vues seulement à la *Q92.4*

Promyélocytaire
- Aiguë
- - Rémission complète ¬ Leucémie *C92.41*
- - ¬ Leucémie *C92.40*
- Cellules T ¬ Leucémie *C91.60*

Pronation ¬
- Cheville en *M21.68*
- Pied en *M21.68*

Pro-opiomélanocortine
- Enfant adolescent 3 18 ¬ Obésité
- - Déficit en *E66.84*
- - Extrême par déficit en *E66.85*
- Indice de masse corporelle IMC
- - 60 et plus chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.88*
- - Compris
- - - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.80*
- - - 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.81*
- - - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.86*
- - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.87*
- ¬ Obésité par déficit en *E66.89*

Propanétriol ¬ Trinitrate de 1,2,3- *T65.5*

Propanol ¬
- Alcool: propylique [1- *T51.3*
- Effet toxique: 2- *T51.2*

Properdine ¬ Déficit en *D84.1*

Prophylaxie
- Antibiotique de l'endocardite ¬ *Z29.21*
- Avant exposition au VIH ¬ *Z29.22*
- Endocardite ¬ *Z29.21*
- Locale par des antibiotiques ¬ *Z29.20*
- Médicamenteuse systémique ¬ *Z29.21*

Propionibactéries ¬
- *B95.91!*
- Bactériémie à *A49.87*

Propionique ¬
- Acidémie: *E71.1*
- Acidurie *E71.1*

Propionyl-CoA carboxylase ¬ Déficit en *E71.1*

Propofol ¬ Dépendance au *F19.2*

Propos
- Consanguinité ¬ Conseil: à *Z71*
- Tabagisme ¬ Conseil: à *Z71*
- VIH [virus de l'immunodéficience humaine] ¬ Conseil: à *Z71*

Propres au nourrisson ¬ Symptômes non spécifiques *R68.1*

Propriétaire ¬ Désaccord avec les voisins, les locataires et le *Z59*

Proptose au cours de thyréotoxicose ¬ *E05.9†, H06.2**

Propyle ¬ Allergie au gallate de *T78.4*

Propylique [1-propanol] ¬ Alcool: *T51.3*

Propylthiouracile ¬ Embryofœtopathie au *Q86.88*

Prosaposine ¬ Encéphalopathie par déficit en *E75.2*

Prostaglandines ¬ Échec du déclenchement (du travail) (par): *O61.0*

Prostate
- Annexe, utérus ¬ Région génitale, vessie, *I97.87*
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Affections de la *N51.0**
- - Syndrome de Lynch ¬ Carcinome de la *C61*
- IDC-P] ¬ Carcinome intracanalaire de la *C61*
- NIP
- - Haut grade] ¬ Néoplasie intraépithéliale de haut grade de la *D07.5*
- - Stade
- - - I ¬ Néoplasie intra-épithéliale de la *N42.3*
- - - II ¬ Néoplasie intra-épithéliale de la *N42.3*
- PIN] ¬ Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la *N40*
- PSA] ¬ Modification du taux d'antigène spécifique de la *R77.80*
- SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la *Q55.4*
- Sans précision ¬ Affection
- - *N42.9*
- - Inflammatoire de la *N41.9*
- Trichomonas ¬ Infection de la *A59.0†, N51.0**
- ¬
- - Abcès
- - - *N41.2*
- - - Gonorrhéique de la *A54.2†, N51.0**
- - Absence acquise de la *Z90.7*
- - Absence ou aplasie de: *Q55.4*
- - Affections
- - - Inflammatoires de la *N41.8*
- - - Précisées de la *N42.8*
- - Atrophie de la *N42.2*
- - Calcul de la *N42.0*

Prostate *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Cancer familial de la *C61*
- - Carcinoma in situ: *D07.5*
- - Coccidioïdomycose de la *B38.8†, N51.0**
- - Dysplasie
- - - *N42.3*
- - - Bas grade de la *N42.3*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur de la *Z12.5*
- - Gonorrhée de la *A54.2†, N51.0**
- - Hyperplasie
- - - *N40*
- - - Adénomateuse de la *N40*
- - - Bénigne) de la *N40*
- - Hypertrophie (bénigne) de la *N40*
- - Lésion traumatique: *S37.82*
- - Malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la *Q55.4*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire de la *C61*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, N51.0**
- - Trichomonase de la *A59.0†, N51.0**
- - Tumeur bénigne: *D29.1*
- - Tumeur maligne de la *C61*
- - Tumeur phyllode
- - - *D40.0*
- - - Maligne de la *C61*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D40.0*

Prostatique
- SAI ¬ Obstruction *N40*
- ¬
- - Barre moyenne [barrière de Mercier] (*N40*
- - Congestion et hémorragie *N42.1*
- - Granulome *N42.8*
- - Lésion traumatique de l'urètre: Partie *S37.33*
- - Lithiase *N42.0*
- - Résultats anormaux de: sécrétions *R86*
- - Tuberculose *A18.1†, N51.0**

Prostatite
- Aiguë ¬ *N41.0*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, N51.0**
- Candida ¬ *B37.4†, N51.0**
- Chronique ¬ *N41.1*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, N51.0**
- Due au virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N51.0**
- Gonocoques ¬ *A54.2†, N51.0**
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.0**
- SAI ¬ *N41.9*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N51.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N51.0**

Prostato-cystite ¬ *N41.3*

Prostration due chaleur
- Perte de sel (et d'eau) ¬ *T67.4*

Prostration due chaleur *–suite*
- SAI ¬ *T67.5*

Protanomalie ¬ *H53.5*

Protanopie ¬ *H53.5*

Protéases ¬
- Prionopathie de sensibilité variable aux *A81.8*
- Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de *U85!*

Protéasome] ¬ PRAAS [Syndrome auto-inflammatoire lié au *M35.8*

Protecteurs ¬ Intoxication: Emollients, calmants et *T49.3*

Protection du bois ¬ Intoxication par des produits de *T60.9*

Protée ¬ Syndrome de *Q87.3*

Protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour *Z29.0*

Protéinase ¬ Déficit en inhibiteur d'Alpha-1 *E88.00*

Protéine
v./v.a. alpha-fœto-protéine
- Alimentaires] ¬ SEIPA [Syndrome d'entérocolite induite par les *K52.2*
- B du surfactant ¬ Détresse respiratoire aiguë néonatale par déficit en *P22.0*
- Bêta-propeller ¬ Neurodégénérescence associée à une *G23.0*
- Bœuf ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*
- C
- - Activée [mutation du facteur V Leiden] ¬ Résistance à la la *D68.5*
- - Surfactant ¬ Pneumopathie interstitielle par déficit en *J84.80*
- - ¬
- - - Carence en: *D68.5*
- - - Thrombophilie
- - - - Autosomique récessive due au déficit congénital en *D68.5*
- - - - Héréditaire sévère due au déficit congénital en *D68.5*
- Cacahuètes ¬ Allergie aux *T78.1*
- COASY ¬ Neurodégénérescence associée à la *G23.0*
- Codées par l'ADN mitochondrial ¬ Insuffisance hépatique infantile aiguë par défaut de synthèse des *K72.0*
- C-réactive ¬ Augmentation pathologique du taux de *R77.88*
- Dibasiques avec lysinurie] ¬ LPI [Intolérance aux *E72.0*
- E. coli ¬ Hypersensibilité aux *T78.4*
- FNIP1 ¬ Agammaglobulinémie syndromique par déficit en *D80.0*
- Liaison
- - Facteur de croissance ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la *R77.88*
- - Glycosylphosphatidylinositol HDL 1] ¬ Déficit familial en GPIHBP1 [*E78.3*

Protéine *–suite*
- Membranaire intégrale 2B] ¬ Amylose ITM2B [*E85.4†, I68.0**
- Membrane mitochondriale ¬ Neurodégénérescence associée à la *G23.0*
- Mitochondriales ¬ Maladie mitochondriale par défaut de synthèse des *E88.8*
- Plasmatique
- - Non classées ailleurs ¬ Anomalies du métabolisme des *E88.0*
- - Sans précision ¬ Anomalie des *R77.9*
- - ¬
- - - Anomalies
- - - - Métabolisme des *E88.08*
- - - - Précisées des *R77.8*
- - - Modifications précisées des taux de *R77.88*
- Poisson ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*
- Poulet ¬ Allergie aux *T78.1*
- Prion ¬ Amylose systémique à *E85.88*
- R ¬ Carence en *E53.8*
- RAC2 ¬ Maladie infantile de type DAL [déficit d'adhésion leucocytaire] par déficit en *D71*
- S ¬
- - Carence en: *D68.5*
- - Déficit acquis en *D68.8*
- - Thrombophilie
- - - Autosomique récessive due au déficit congénital en *D68.5*
- - - Héréditaire sévère due au déficit congénital en *D68.5*
- Transfert des esters de cholestérol ¬ Déficit en *E78.4*
- Transport ¬ Anomalie de *E88.08*
- Trifonctionnelle mitochondrial
- - DPTFM] ¬ Déficit en *E71.3*
- - ¬ Déficit en *E71.3*
- ZIP7 ¬ Agammaglobulinémie syndromique par déficit en *D80.0*
- ¬
- - Anémie par carence en *D53.0*
- - Entéropathie avec perte de *K90.4*
- - Pertes entérales de *K92.8*
- - Syndrome CHAPLE [hyperactivation du complément-thrombose-entéropathie avec perte de *D84.1*
- - Trouble de la N-glycosylation des *E77.8*

Protéino énergétique
- Grave
- - E43
- - - Forme intermédiaire ¬ Malnutrition *E42*
- - - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition *E42*
- - Sans précision ¬ Malnutrition *E43*
- Légère ¬ Malnutrition *E44.1*
- Modérée ¬ Malnutrition *E44.0*
- SAI ¬ Déséquilibre *E46*
- Sans précision ¬ Malnutrition *E46*
- ¬

Protéino énergétique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Retard de développement après malnutrition *E45*
- - Séquelles de malnutrition *E64.0*

Protéinose alvéolaire
- Exacerbation aiguë ¬ *J84.01*
- Pulmonaire
- - Auto-immune ¬ *J84.00*
- - Congénitale ¬ *J84.00*
- - Début infantile avec hypogammaglobulinémie ¬ *J84.00, D80.0*
- - Idiopathique ¬ *J84.00*
- - Secondaire ¬ *J84.00*
- - Sévère par déficit en MARS à début précoce ¬ *J84.00*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J84.00*
- ¬ *J84.00*

Protéinose lipoïde ¬ *E78.88*

Protéinurie
v./v.a. cobalamine-protéinurie
- Bence Jones ¬ *R80*
- Gestationnelle ¬ *O12.1*
- Hypertension] ¬ Gestose EPH [œdème - *O14.9*
- Isolée
- - Lésions morphologiques précisées ¬ *N06*
- - ¬ *R80*
- Orthostatique, sans précision ¬ *N39.2*
- Persistante, sans précision ¬ *N39.1*
- Prééclamptique ¬ *O14.9*
- Préexistante ¬ Les états mentionnés avec *O10*
- SAI ¬ *R80*
- ¬
- - Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la vitamine B12 avec *D51.1*
- - Œdème gestationnel avec *O12.2*

Protéique coatomère] ¬ Syndrome COPA [sous-unité alpha du complexe *M35.8*

Proteus
- Mirabilis
- - Agent pathogène ¬ *B96.2!*
- - Multirésistant
- - - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.07!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.27!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.47!*
- - ¬ Infection à *A49.82*
- Morganii
- - Agent pathogène ¬ *B96.2!*
- - ¬ Infection à *A49.82*
- Vulgaris ¬ Infection à *A49.82*
- ¬
- - Bactériémie à *A49.82*
- - Infection à *A49.82*

Proteus-like ¬ Syndrome *Q87.3*

Prothèse
v./v.a. Complication d'une prothèse
- Artère coronaire ¬ Présence de *Z95.5*
- Articulaire
- - Interne ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une *T84.5*
- - Plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une *M96.6*
- - ¬
- - - Fracture osseuse après retrait d'une *M96.6*
- - - Présence d'une *Z96.68*
- Articulaires orthopédiques sans précisions ¬ Présence d'autres *Z96.68*
- Auditif
- - Ancrage osseux [BAHA] ¬ Présence d'une *Z96.2*
- - Implantée ¬ Ajustement et entretien d'une *Z45.3*
- Cardiaque ¬
- - Défaillance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une *I97.1*
- - Insuffisance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une *I97.1*
- Cheville ¬ Présence d'une *Z96.66*
- Cochléaire ¬ *Z45.3*
- Conduction osseuse ¬ *Z45.3*
- Coude ¬ Présence d'une *Z96.61*
- Dentaire
- - Complète)(partielle) ¬ *Z97.8*
- - ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z46.3*
- Disque intervertébral ¬ Présence d'une *Z96.67*
- Épaule ¬ Présence d'une *Z96.60*
- Externe
- - Non précisé ¬ Mise en place et ajustement d'un appareil de *Z44.9*
- - Sein ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z44.3*
- - ¬ Mise en place et ajustement d'autres appareils de *Z44.8*
- Genou ¬ Présence d'une *Z96.65*
- Hanche ¬ Présence d'une *Z96.64*
- Implant
- - Cardiaques et vasculaires ¬ Complication mécanique d'autres *T82.5*
- - Greffe
- - - Appareil
- - - - Génital ¬
- - - - - Complication mécanique d'autres *T83.4*
- - - - - Infection et réaction inflammatoire dues à une *T83.6*
- - - - Urinaire ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une *T83.5*
- - - Cardiaques vasculaires ¬
- - - - Complications précisées de *T82.8*
- - - - Douleur due à *T82.8*
- - - - Embolie due à *T82.8*

Prothèse *–suite*
- Implant *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Cardiaques vasculaires ¬ *–suite*
- - - - Fibrose due à *T82.8*
- - - - Hémorragie due à *T82.8*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres *T82.7*
- - - - Sténose due à *T82.8*
- - - - Thrombose due à *T82.8*
- - - Internes
- - - - Non classées ailleurs ¬ Autres complications dues à des *T85.88*
- - - - Partie du tractus gastro-intestinal ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres *T85.76*
- - - - Système
- - - - - Hépatobiliaire et le pancréas ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à des *T85.75*
- - - - - Nerveux ¬ Autres complications dues à des *T85.81*
- - - - - Nerveux ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à des *T85.72*
- - - - ¬ Infection et réaction inflammatoire due à d'autres *T85.78*
- - - Oculaires ¬ Complication mécanique d'autres *T85.3*
- - - Œsophage ¬ Complication mécanique de *T85.50*
- - - Orthopédiques internes ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres *T84.7*
- - - Pancréas ¬ Complication mécanique de *T85.54*
- - - Parties du tractus gastro-intestinal supérieur ¬ Complication mécanique de *T85.51*
- - - Tractus gastro-intestinal inférieur ¬ Complication mécanique de *T85.52*
- - - Voies biliaires ¬ Complication mécanique de *T85.53*
- - Mammaire ¬
- - - Complication mécanique d'une *T85.4*
- - - Complications dues à une *T85.83*
- - - Fibrose capsulaire du sein due à une *T85.82*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à une *T85.73*
- - Urinaires ¬ Complication mécanique d'autres *T83.1*
- Interne
- - Fixation ¬ Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre *Z47.0*
- - Non précisée ¬ Ajustement et entretien d'une *Z45.9*
- Ostéo-articulaire ¬ Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une *M96.88*
- Poignet ¬ Présence d'une *Z96.63*
- Temporo-mandibulaire ¬ Présence d'une *Z96.68*

Prothèse *–suite*
- Tête radiale ¬ Présence d'une *Z96.62*
- Valvulaire cardiaque ¬
- - Complication mécanique d'une *T82.0*
- - Déplacement dû (due) à une *T82.0*
- - Fuite dû (due) à une *T82.0*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une *T82.6*
- - Malposition dû (due) à une *T82.0*
- - Obstruction mécanique dû (due) à une *T82.0*
- - Perforation dû (due) à une *T82.0*
- - Protrusion dû (due) à une *T82.0*
- - Rupture (mécanique) dû (due) à une *T82.0*
- Valvule cardiaque ¬ Présence de *Z95.2*
- Vasculaire non classée ailleurs ¬ Présence d'une *Z95.88*
- ¬
- - Hyperplasie par irritation de la crête édentée (due à une *K06.2*
- - Stomatite: due à une *K12.1*

Prothrombine ¬
- Carence héréditaire en *D68.21*
- Mutation du gène de *D68.5*

Protides ¬ Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*

Protons ¬ Eosinophilie œsophagienne répondant aux inhibiteurs de la pompe à *K20.0*

Protoplasmique
v./v.a. Astrocytome protoplasmique

Protoporphyrie
- Dominante liée à l'X ¬ *E80.0*
- Érythropoïétique
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *E80.0*
- - - Récessive ¬ *E80.0*
- - ¬
- - - *E80.0*
- - - ERP [*E80.0*

Protoporphyrinogène oxydase ¬ Déficit en *E80.2*

Protozoaires
- Classées ailleurs ¬ Myosite au cours d'infections parasitaires et à *M63.1**
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies à *O98.6*
- Sang ¬ Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres *T37.2*
- ¬
- - Colite à *A07.9*
- - Diarrhée à *A07.9*
- - Dysenterie à *A07.9*
- - Encéphalopathie au cours de sepsis à *B60.80†, G94.32**
- - Glomérulopathie au cours de sepsis à *B60.80†, N08.0**
- - Maladie
- - - Intestinale à *A07.9*

Protozoaires *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de sepsis à *B60.80†, N16.0**
- - Maladies intestinales précisées, à *A07.8*
- - Septicémie à *B60.80*

Protozooses et helminthiases ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: *Z11*

Protrusion
- Acétabulaire ¬ *M24.7*
- Due) à une prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Hémorroïdes
- - Externes ¬ *K64.5*
- - Internes ¬ *K64.9*
- Maxillaire antérieure-strabisme-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Membre inférieur ¬ Dystocie due à une *O64.1*
- Perte tissu intraoculaire ¬ Lacération
- - Oculaire sans *S05.3*
- - Rupture oculaires avec *S05.2*
- ¬ Perforation du bulbe sans *S05.6*

Protuberans
v./v.a. Dermatofibrosarcoma protuberans

Proud ¬ Syndrome de *Q87.8*

Provocation ¬ Trouble oppositionnel avec *F91.3*

Provoquant
- Occlusion
- - Sans gangrène ¬
- - - Hernie
- - - - *K46.0*
- - - - Interstitielle *K46.0*
- - - - Intestinale *K46.0*
- - - - Intra-abdominale *K46.0*
- - - Hernie crurale (unilatérale): *K41.3*
- - - Hernie diaphragmatique: *K44.0*
- - - Hernie inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - - Hernie ombilicale: *K42.0*
- - ¬
- - - Hernie incisionnelle *K43.0*
- - - Hernie parastomale *K43.3*
- Rupture destruction globe oculaire ¬
- - Brûlure *T26.2*
- - Corrosion *T26.7*
- Transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical *P02.3*

Prowazekii ¬
- Infection à Rickettsia *A75.0*
- Typhus épidémique à poux dû à Rickettsia *A75.0*

Prower
v./v.a. Stuart-Prower

Prowerr
v./v.a. Stuart-Prowerr

Proximal
v./v.a. Type de maladie

Proximal femoral focal deficiency ¬ *Q72.4*

PRPP synthétase ¬ Hyperactivité de la *E79.8*

PRR12 ¬ Syndrome neurooculaire lié à *Q87.8*

Prune belly ¬ Syndrome *Q79.4*

PRUNE1 ¬ Syndrome neurologique associé à *Q07.8*

Prurigineuse ¬ Épidermolyse bulleuse dystrophique *Q81.2*

Prurigo
- Actinique ¬ *L56.4*
- Besnier ¬ *L20.0*
- Hebra ¬ *L28.2*
- Mitis ¬ *L28.2*
- Nodulaire de Hyde ¬ *L28.1*
- SAI ¬ *L28.2*
- ¬ Autres formes de *L28.2*

Prurit
- Anal ¬ *L29.0*
- Ano-génital, sans précision ¬ *L29.3*
- Gale ¬ *B86*
- Nageurs ¬ *B65.3*
- Pendant la grossesse ¬ *O26.88*
- Psychogène ¬ *F45.8*
- Sans précision ¬ *L29.9*
- Scrotal ¬ *L29.1*
- Urémique ¬ *L29.8*
- Vulvaire ¬ *L29.2*
- ¬
- - *L29.8*
- - Diabète sucré
- - - *E14.60†, L99.8**
- - - Type
- - - - 1 avec *E10.60†, L99.8**
- - - - 2 avec *E11.60†, L99.8**

PSA] ¬ Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [*R77.80*

Psammomateux ¬ Méningiome *D32.9*

PsAPASH [arthrite psoriasique-pyoderma gangrenosum-acné-hidradénite suppurée] ¬ Syndrome *M35.8*

Psaume
v./v.a. Papillon-Léage-Psaume

PSC [Cholangite sclérosante primitive] ¬ *K83.00*

Pseudallescheria boydii ¬ Infection à *B48.2*

Pseudarthrose
- Congénitale
- - Clavicule ¬ *Q74.0*
- - Membres ¬ *Q74.8*
- - Tibia ¬ *Q74.2*
- - Ulna ¬ *Q74.0*
- Fusion ou arthrodèse ¬ *M96.0*
- Post-ostéotomie ¬ *M96.0*
- ¬ Fracture non consolidée [*M84.1*

Pseudoachondroplasie ¬ *Q77.8*

Pseudo-adrénoleucodystrophie
- Néonatale ¬ *E71.3*
- ¬ *E71.3*

Pseudo-ALDN [adrénoleucodystrophie néonatale] ¬ *E71.3*

Pseudoaldostéronisme
- Crise hypertensive ¬ *I15.11*
- ¬ *I15.10*

Pseudo-aminoptérine ¬ Syndrome *Q87.0*

Pseudoanodontie-hypoplasie maxillaire-genu valgum ¬ Syndrome de *K07.8, Q74.1*

Pseudocamptodactylie
v./v.a. trismus-pseudocamptodactylie

Pseudocholinestérase ¬ Déficit
- *E88.08*
- Héréditaire en *E88.08*

Pseudocoxalgie ¬ *M91.3*

Pseudodébilité organique ¬ *F07.0*

Pseudodiastrophique ¬ Dysplasie *Q78.8*

Pseudo-encéphalopathie supérieure hémorragique ¬ *E51.2†, G32.8**

Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, *G31.81*

Pseudo-exfoliatif ¬ Glaucome
- *H40.10*
- PEX [glaucome *H40.10*

Pseudo-exfoliation
- Cristallin ¬ Glaucome primaire capsulaire résiduel avec *H40.10*
- Cristallinienne ¬ Glaucome
- - *H40.10*
- - Capsulaire avec *H40.10*
- - Primitif capsulaire avec *H40.10*
- ¬ Cataracte au cours de syndrome de *H26.80*

Pseudofolliculite de la barbe ¬ *L73.1*

Pseudoglaucome ¬ Orbitopathie endocrinienne avec *E05.0†, H06.2**

Pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale ¬ Granulome et lésions *K13.4*

Pseudohémophilie
- Bernuth ¬ *D68.09*
- Héréditaire ¬ *D68.00*
- Type
- - A ¬ *D69.88*
- - B ¬ *D68.09*
- Vasculaire ¬ *D69.88*
- ¬ *D68.09*

Pseudo-hermaphrodisme
- Féminin
- - Non classé ailleurs ¬ *Q56.2*
- - SAI ¬ *Q56.2*
- - ¬ *Q56.2*
- Masculin
- - Déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase type 3 ¬ *E29.1*

Pseudo-hermaphrodisme *–suite*
- Masculin *–suite*
- - Non classé ailleurs ¬ *Q56.1*
- - Résistance aux androgènes ¬ *E34.5*
- - SAI ¬ *Q56.1*
- - ¬ *Q56.1*
- Sans précision ¬ *Q56.3*
- Surrénalien chez la femme ¬ *E25*

Pseudo-hermaphroditisme
- Féminin dû à un trouble corticosurrénal ¬ *E25.8*
- Masculin) ¬ Déficit en 5-alpha-réductase (avec *E29.1*

Pseudohyperaldostéronisme type
- 1
- - Crise hypertensive ¬ *I15.11*
- - ¬ *I15.10*
- 2
- - Crise hypertensive ¬ *I15.11*
- - ¬ *I15.10*

Pseudohyperkaliémie familiale ¬ *D58.8*

Pseudohypertrophie musculaire-hypothyroïdie ¬ Syndrome de *E03.1*

Pseudo-hypertrophique ¬
- Atrophie musculaire *G71.08*
- Dystrophie musculaire *G71.08*
- Paralysie musculaire *G71.08*

Pseudohypoaldostéronisme
- Transitoire ¬ *N25.8*
- Type
- - 1
- - - Autosomique
- - - - Dominant ¬ *N25.8*
- - - - Récessif ¬ *N25.8*
- - - Rénal ¬ *N25.8*
- - - ¬ *N25.8*
- - 2
- - - Crise hypertensive ¬ *I15.11*
- - - ¬ *I15.10*
- - 2A
- - - Crise hypertensive ¬ *I15.11*
- - - ¬ *I15.10*
- - 2B
- - - Crise hypertensive ¬ *I15.11*
- - - ¬ *I15.10*
- - 2C
- - - Crise hypertensive ¬ *I15.11*
- - - ¬ *I15.10*
- - 2D
- - - Crise hypertensive ¬ *I15.11*
- - - ¬ *I15.10*
- - 2E
- - - Crise hypertensive ¬ *I15.11*
- - - ¬ *I15.10*

Pseudohypoparathyroïdie
- Type 1A ¬ Syndrome d'ostéodystrophie héréditaire de Albright - *E20.1*

Pseudohypoparathyroïdie *–suite*
- ¬ *E20.1*

Pseudo-inflammatoire de Sorsby ¬ Dystrophie *H35.5*

Pseudokyste
- Pancréas ¬ *K86.3*
- Rétine ¬ *H33.1*

Pseudo-Lennox ¬ Syndrome *G40.00*

Pseudolepréchaunisme de Patterson ¬ *E34.8*

Pseudoleucémie infantile ¬ *D64.8*

Pseudolymphome cutané ¬ *L98.8*

Pseudo-maladie de von Willebrand ¬ *D69.1*

Pseudomallei ¬
- Infection
- - Burkholderia *A24.4*
- - Malleomyces *A24.4*
- - Pseudomonas *A24.4*
- Pneumonie à Pseudomonas *A24.1*

Pseudo-Meigs ¬ Syndrome *D39.1*

Pseudoméningocèle
- Actes médicaux ¬ *G97.88*
- Post-traumatique ¬ *G96.1*

Pseudomonas
- Acinetobacter multirésistants 3MRGN ¬ *U81.3!*
- Aeruginosa
- - Multirésistant
- - - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.10!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.30!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.50!*
- - ¬
- - - *B96.5!*
- - - Bactériémie à *A49.85*
- - - Infection à *A49.85*
- - - Otite externe à *H60.2, B96.5!*
- - - Pneumonie due à une infection à *J15.1*
- Bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.5!*
- Mallei ¬ Infection à *A24.0*
- Pseudomallei ¬
- - Infection à *A24.4*
- - Pneumonie à *A24.1*
- ¬
- - Arthrite à *M00.89, B96.5!*
- - Choc septique à *A41.52, R57.2*
- - Infection
- - - *A49.85*
- - - Voies urinaires à *N39.0, B96.5!*
- - Pneumonie congénitale à *P23.5*
- - Pneumonie due à *J15.1*
- - Septicémie: *A41.52*

Pseudo-mucineux ovaire ¬
- Adénocarcinome *C56*
- Cystadénocarcinome *C56*

Pseudo-musculaire ¬ Hypertrophie *G71.08*

Pseudo-myogénique ¬ Hémangioendothéliome *D48.1*

Pseudomyotonie ¬ *G71.1*

Pseudomyxome péritonéal] ¬ PMP [*C78.6*

Pseudo-névrotique ¬ Schizophrénie: *F21*

Pseudo-obstruction
- Colique aiguë ¬ *K56.0*
- Intestinale chronique [POIC] ¬ *K59.8*

Pseudo-œdème papillaire ¬ *H47.3*

Pseudo-papillaire solide
- Col du pancréas ¬ Carcinome *C25.7*
- Corps du pancréas ¬ Carcinome *C25.1*
- Localisations contiguës du pancréas ¬ Carcinome *C25.8*
- Pancréas ¬ Carcinome *C25.9*
- Queue du pancréas ¬ Carcinome *C25.2*
- Tête du pancréas ¬ Carcinome *C25.0*

Pseudo-paralysie
- Parrot ¬ *A50.0†, M90.23**
- Syphilitique congénitale précoce ¬ *A50.0†, M90.23**

Pseudoparalytique ¬ Myasthénie *G70.0*

Pseudo-parkinsonien ¬ Syndrome *G21.4*

Pseudo-pelade de Brocq ¬ *L66.0*

Pseudo-Pelger-Huët ¬ Syndrome de retard global de développement-déficience intellectuelle-dysmorphie faciale-anomalie *Q87.0*

Pseudophakie ¬ *Z96.1*

Pseudopolyarthrite de la hanche et de l'épaule] ¬ Maladie de Forestier [*M35.3*

Pseudopolydystrophie de Hurler ¬ *E77.0*

Pseudoprogéria ¬ *Q87.8*

Pseudopseudohypoparathyroïdie ¬ *E20.1*

Pseudo-psychopathique ¬ Schizophrénie: *F21*

Pseudopsychopathique organique ¬ Personnalité *F07.0*

Pseudo-ptérygion ¬ *H11.8*

Pseudo-puberté
- Hétérosexuelle précoce chez la femme ¬ *E25*
- Isosexuelle précoce chez l'homme ¬ *E25*

Pseudorhumatoïde progressive ¬ Dysplasie *Q77.7*

Pseudo-sarcomateux
v./v.a. Fibromatose pseudo-sarcomateuse

Pseudosarcome hémorragique pigmentaire ¬ *C46.9*

Pseudosclérose
- Spastique avec démence ¬ *A81.0†, F02.1**
- Westphal-von-Strümpell ¬ *E83.0†, G99.8**

Pseudostreptocoques ¬ *B95.91!*

Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool ¬ *E24.4*

Pseudothalidomide ¬ Syndrome *Q87.8*

Pseudo-TORCH ¬ Syndrome *Q87.8*

Pseudo-trisomie 13 ¬ Syndrome *Q87.8*

Pseudotuberculosis
- Subsp. pestis [Yersinia pestis] ¬ Infection à Yersinia *A20*
- ¬ Infection à Yersinia *A28.2*

Pseudotumeur
- Cérébrale ¬ *G93.2*
- Inflammatoire du foie ¬ *K75.8*

Pseudotyphus de la Californie ¬ *A79.8*

Pseudo-unicorne ¬ Utérus *Q51.4*

Pseudovaccine [nodule des trayeurs] ¬ *B08.0*

Pseudovitamine D ¬ Déficit en *E83.31*

Pseudoxanthome élastique
- Acquis ¬ *L94.8*
- Associée à un déficit en facteurs de coagulation vitamine K-dépendants ¬ Maladie de type *D68.28, Q82.8*
- Like avec rétinite pigmentaire ¬ Syndrome *Q82.8, H35.5*
- PXE] ¬ *Q82.8*
- ¬ Elastolyse dermique papillaire, type *L90.8*

Psilocine ¬
- *T40.9*
- Intoxication à la *T40.9*

Psilocybine ¬
- *T40.9*
- Intoxication à la *T40.9*

Psittaci ¬ Infection à Chlamydia *A70*

Psittacose
- Pneumonie ¬ *A70†, J17.8**
- ¬ *A70*

Psoas ¬
- Abcès du *M60.05*
- Tendinite du *M76.1*

Psoriasiforme ¬
- Rash fessier *L22*
- Syndrome de microcéphalie-cataracte congénitale-dermatite *Q87.8*

Psoriasique
- Axiale ¬ Arthrite *L40.5†, M07.2**
- Distale interphalangienne ¬ Arthropathie *L40.5†, M07.09**
- Pyoderma gangrenosum-acné-hidradénite suppurée] ¬ Syndrome PsAPASH [arthrite *M35.8*
- ¬
- - Arthrite *L40.5†, M07.39**
- - Arthropathie *L40.5†, M07.39**
- - Dermatite séborrhéique-like avec des éléments *L21.8*
- - Spondylarthrite *L40.5†, M07.2**
- - Spondylite *L40.5†, M07.2**

Psoriasis
- Arthrite juvénile
- - Articulation
- - - Coude ¬ *L40.5†, M09.02**
- - - Genou ¬ *L40.5†, M09.06**
- - Colonne vertébrale ¬ *L40.5†, M09.08**
- - Localisations multiples ¬ *L40.5†, M09.00**

Psoriasis *–suite*
- Arthrite juvénile *–suite*
- - Main ¬ *L40.5†, M09.04**
- - Pied ¬ *L40.5†, M09.07**
- - Poignet ¬ *L40.5†, M09.03**
- - Région de l'épaule ¬ *L40.5†, M09.01**
- - Région pelvienne ¬ *L40.5†, M09.05**
- Exfoliatif ¬ *L40.8*
- Goutte ¬ *L40.4*
- Guttata modéré à sévère ¬ *L40.4, L40.70!*
- Inversa modéré à sévère ¬ *L40.8, L40.70!*
- Modéré à sévère ¬ *L40.70!*
- Nummulaire ¬ *L40.0*
- Plis de flexion ¬ *L40.8*
- Pustuleux généralisé
- - Forme de von Zumbusch ¬ *L40.1*
- - GPP] ¬ *L40.1*
- Sans précision ¬ *L40.9*
- Vulgaris
- - Modéré à sévère ¬ *L40.0, L40.70!*
- - ¬ *L40.0*
- ¬
- - *L40.8*
- - Arthrite juvénile idiopathique associée au *L40.5†, M09.09**
- - Degré de gravité du *L40.7!*
- - Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-épilepsie- *Q87.8*

Psoriatica ¬ Arthritis mutilans *L40.5†, M07.19**

PSS [Panencéphalite sclérosante subaiguë] ¬ *A81.1*

Psychalgie ¬ *F45.40*

Psychasthénie ¬ *F48.8*

Psychasthénique ¬ Névrose: *F48.8*

Psychiatrique
- Évident ¬ Mise observation
- - Activité répréhensible en bande sans trouble *Z03.2*
- - Comportement asocial sans trouble *Z03.2*
- - Pyromanie sans trouble *Z03.2*
- - Vol à l'étalage sans trouble *Z03.2*
- Général
- - Demande des autorités ¬ Examen *Z04.8*
- - Non classé ailleurs ¬ Examen *Z00.4*
- ¬ Modification durable de la personnalité après une maladie *F62.1*

Psychique
- Troubles du comportement ¬ Maladies *Z13.8*
- ¬
- - Antécédent
- - - Traumatisme *Z91.8*
- - - Troubles *Z86.5*
- - Choc *F43.0*
- - Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et *F45.41*
- - Traumatisme *Z91.8*

Psycho
- Actives
- - Voie intraveineuse ¬ Consommation d'autres substances *U69.32!*
- - ¬
- - - Antécédents personnels d'abus de substances *Z86.4*
- - - Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances *F04*
- - - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances *F19*
- Infantile ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.4*
- Sociales ¬ Difficultés liées à d'autres situations *Z65*

Psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et sans précision ¬ Intoxication: *T40.9*

Psychogène
v./v.a. Type de maladie

Psycholeptiques neuroleptiques
- Dérivés de la phénothiazine ¬ Intoxication: *T43.3*
- Non précisés ¬ Intoxication: *T43.5*

Psychologique
- Comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs ¬ Facteurs *F54*
- Connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions comportementales et *Z64.8*
- Influençant une affection physique ¬ Facteurs *F54*
- Sans précision ¬ Trouble du développement *F89*
- Trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit *F68.1*
- ¬
- - Hyperphagie associée à d'autres perturbations *F50.4*
- - Majoration de symptômes physiques pour des raisons *F68.0*
- - Sévices *T74.3*
- - Troubles du développement *F88*
- - Vomissements associés à d'autres perturbations *F50.5*

Psychomoteur
v./v.a. Retard psychomoteur
- Dissociatif ¬ Trouble *F44.4*
- Strabisme-défaut du septum cardiaque ¬ Syndrome d'hypotonie sévère-retard de développement *Q87.8*
- ¬ Trouble *F44.4*

Psychomotrice bénigne [crises de terreur] ¬ Épilepsie *G40.02*

Psycho-névrotique ¬ Personnalité: *F60.8*

Psycho-organique
- Aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ syndrome: *F05*
- ¬ SPO [syndrome *F07.9*

Psychopathie
- Autistique ¬ *F84.5*
- Privation affective ¬ *F94.2*

Psychopathique
v./v.a. pseudopsychopathique
- ¬ Personnalité: *F60.2*

Psychose
- Affective SAI ¬ *F39*
- Aiguë cours trouble
- - Endocrinien ¬ *F05.8*
- - Métabolique ¬ *F05.8*
- Allure schizophrénique au cours d'une épilepsie ¬ *F06.2*
- Cycloïde
- - Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ *F23.0*
- - Symptômes schizophréniques ¬ *F23.1*
- Dépressive
- - Psychogène ¬ épisode
- - - Isolés de: *F32.3*
- - - Récurrents sévères de: *F33.3*
- - Réactionnel ¬ épisode
- - - Isolés de: *F32.3*
- - - Récurrents sévères de: *F33.3*
- Désintégratif ¬
- - *F84.3*
- - *F84.3*
- Épileptique SAI ¬ *F06.8*
- Hallucinatoire chronique ¬ *F28*
- Hystérique ¬ *F44*
- Infantile atypique ¬ *F84.1*
- Infectieuse aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ *F05*
- Lactation ¬ *F53.1*
- Macroorchidie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Maniaco dépressive
- - Forme dépressive
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- - - Symptômes psychotiques ¬ *F33.3*
- - ¬ *F31*
- Non organique, sans précision ¬ *F29*
- Organique
- - Aiguë
- - - Cours d'une maladie infectieuse ¬ *F05.9*
- - - Post-traumatique ¬ *F05.8*
- - Due à la maladie de Creutzfeldt-Jakob ¬ *A81.0†, F02.1**
- - SAI ¬ *F09*
- - Subaiguë post-traumatique ¬ *F05.8*
- Paranoïaque
- - Psychogène ¬ *F23.3*
- - ¬ *F22.0*
- Petite enfance ¬ *F84.0*
- Post-avortement ¬ *F53.1*
- Post-partum ¬ *F53.1*
- Présénile SAI ¬ *F03*
- Réactionnel

Psychose *–suite*
- Réactionnel *–suite*
- - Brève) SAI ¬ *F23.9*
- - ¬ *F23.9*
- SAI
- - Schizophréniforme ¬ *F20.8*
- - ¬ *F29*
- Schizo-affectif
- - SAI ¬ *F25.9*
- - Type
- - - Dépressif ¬ *F25.1*
- - - Maniaque ¬ *F25.0*
- Schizophréniforme
- - Courte durée ¬ *F23.2*
- - Type
- - - Dépressif ¬ *F25.1*
- - - Maniaque ¬ *F25.0*
- Schizophrénique
- - Affective mixte ¬ *F25.2*
- - Type affectif ¬ *F25.9*
- Sénile SAI ¬ *F03*
- Subaiguë cours
- - Maladie infectieuse ¬ *F05.9*
- - Trouble endocrinien ¬ *F05.8*
- Symbiotique ¬ *F84.3*
- Symptomatique SAI ¬ *F09*
- Syndrome de Korsakov non alcoolique ¬ *F04*
- Syphilitique au cours de paralysie progressive ¬ *A52.1†, F02.8**
- ¬
- - Sénescence sans mention de *R54*
- - Vieillesse sans mention de *R54*

Psychosexuel
- Sans précision ¬ Trouble du développement *F66.9*
- ¬
- - Problème de développement *F66.9*
- - Troubles du développement *F66.8*

Psychosocial ¬
- Difficultés liées à certaines circonstances *Z64.8*
- Insuffisance staturale: *E34.3*

Psychosomatique
- Indifférencié ¬ Trouble *F45.1*
- Multiple ¬ Trouble *F45.0*
- SAI ¬ Trouble *F45.9*
- ¬ Gastrite *F54, K29.7*

Psychosomatogène ¬ Dermatose *F54, L98.9*

Psychostimulants présentant un risque d'abus ¬ Intoxication: *T43.6*

Psychosyndrome
- Épilepsie du système limbique ¬ *F07.0*
- Organique ¬
- - *F07.9*
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, F07.9*

Psychothérapie
- Non classée ailleurs ¬ *Z50.4!*
- ¬
- - Convalescence après *Z54.3!*
- - Examen de contrôle après *Z09.3*

Psychotique
- Aigu
- - Allure schizophrénique ¬ Trouble *F23.2*
- - Essentiellement délirant ¬ Autre trouble *F23.3*
- - Polymorphe
- - - Sans symptômes schizophréniques ¬ Trouble *F23.0*
- - - Symptômes schizophréniques ¬ Trouble *F23.1*
- - Transitoire, sans précision ¬ Trouble *F23.9*
- Aigus et transitoires ¬ Autres troubles *F23.8*
- Congruents à l'humeur ¬ Manie avec symptômes *F30.2*
- Induit ¬ Trouble: *F24*
- Lors de démence ¬ Symptômes *U63.0!*
- Non
- - Congruents à l'humeur ¬ Manie avec symptômes *F30.2*
- - Organiques ¬ Autres troubles *F28*
- ¬
- - Dépression
- - - Agitée épisode isolé sans symptômes *F32.2*
- - - Endogène
- - - - Sans symptômes *F33.2*
- - - - Symptômes *F33.3*
- - - Majeur
- - - - Épisode isolé sans symptômes *F32.2*
- - - - Récurrente, sans symptômes *F33.2*
- - - Vital
- - - - Épisode isolé sans symptômes *F32.2*
- - - - Récurrente, sans symptômes *F33.2*
- - Épisode
- - - Dépressif sévère
- - - - Sans symptômes *F32.2*
- - - - Symptômes *F32.3*
- - - Isolés dépression
- - - - *F32.3*
- - - - Majeure avec symptômes *F32.3*
- - - Récurrents sévères dépression
- - - - *F33.3*
- - - - Majeure, avec symptômes *F33.3*
- - Manie
- - - Sans symptômes *F30.1*
- - - Symptômes *F30.2*
- - Psychose maniaco dépressive forme dépressive
- - - Sans symptômes *F33.2*
- - - Symptômes *F33.3*
- - Syndrome: cérébral post-traumatique, non *F07.2*
- - Trouble

Psychotique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Trouble *–suite*
- - - Affectif bipolaire épisode actuel
- - - - Dépression sévère
- - - - - Sans symptômes *F31.4*
- - - - - Symptômes *F31.5*
- - - - Maniaque
- - - - - Sans symptômes *F31.1*
- - - - - Symptômes *F31.2*
- - - Dépressif récurrent épisode actuel sévère
- - - - Sans symptômes *F33.2*
- - - - Symptômes *F33.3*

Psychotrope
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres médicaments *T43.8*
- Sang ¬ Présence d'une substance *R78.5*
- Sans précision ¬ Intoxication: Médicament *T43.9*

PTA] ¬ Déficit en précurseur de thromboplastine plasmatique [*D68.1*

PTEN ¬ Syndrome tumoral hamartomateux associé à *Q85.8*

Ptérygion
- Congénital de l'œsophage ¬ *Q39.4*
- Larynx
- - Glottique ¬ *Q31.0*
- - SAI ¬ *Q31.0*
- - Sous-glottique ¬
- - - *Q31.0*
- - - *Q31.0*
- - ¬ *Q31.0*
- Œsophage (acquis) ¬ *K22.2*

Ptérygium
- Antécubital ¬ Syndrome du *Q87.2*
- Familial de la conjonctive ¬ *H11.0*
- Multiples
- - Autosomique
- - - Dominant ¬ Syndrome des *Q87.1*
- - - Récessif
- - - - Non létal ¬ Syndrome des *Q87.1*
- - - - ¬ Syndrome des *Q87.1*
- - Hyperthermie maligne ¬ Syndrome des *Q87.8*
- - ¬ Forme létal
- - - Liée à l'X du syndrome des *Q87.8*
- - - Syndrome des *Q87.1*
- Poplité
- - Autosomique dominant ¬ Syndrome des *Q87.8*
- - ¬ Syndrome des *Q87.8*
- ¬ Syndrome des *Q87.1*

Pterygium colli ¬ *Q18.3*

PTLD
- Post-transplant lymphoproliferative disease polymorph
- - Rémission complète ¬ *C88.71*

PTLD *–suite*
- Post-transplant lymphoproliferative disease polymorph *–suite*
- - Sans mention de rémission complète ¬ *C88.70*
- - ¬ *C88.70*
- Post-transplant lymphoproliferative disorder], lésion précoce ¬ *D47.7*

Ptose
- Gastrique ¬ *K31.8*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, H03.1**

Ptosis
- Congénital ¬ *Q10.0*
- Déficience intellectuelle-obésité ¬ Syndrome d'aniridie- *Q87.8*
- Dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'épaississement de la suture métopique- *Q87.0*
- Ésotropie-syndactylie-petite taille ¬ Syndrome de blépharophimosis- *Q87.8*
- Fente labiale ¬ Syndrome de microbrachycéphalie- *Q87.8*
- Mouvement oculaire limité-absence de point lacrymal ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Paralysie des cordes vocales ¬ Syndrome de *J38.03, Q10.0*
- Paupière ¬ *H02.4*
- Sourcil ¬ *L98.7*
- Strabisme-pupilles ectopiques ¬ Syndrome de *Q15.8*

PTT Purpura
- Thrombopénique thrombotique] ¬ *M31.1*
- Thrombotique thrombocytopénique
- - Acquis ¬ *M31.1*
- - Congénital ¬ *M31.1*

Ptyalisme ¬ *K11.7*

Pubarche prématurée ¬ *E30.8*

Puberté
- Hypophysaire précoce ¬ *E22.8*
- Précoce
- - Centrale
- - - Génétique
- - - - Fille ¬ *E22.8*
- - - - Garçon ¬ *E22.8*
- - - Primaire du garçon ¬ *E22.8*
- - - Secondaire
- - - - Fille ¬ *E22.8*
- - - - Garçon ¬ *E22.8*
- - - ¬ *E22.8*
- - Dépendante des gonadotropines ¬ *E22.8*
- - Familiale limitée aux garçons] ¬ FMPP [*E30.1*
- - Rare ¬ *E30.1*
- - ¬ Syndrome de parésie spastique- *G11.4*
- Retardée ¬ *E30.0*
- Sans précision ¬ Anomalie de la *E30.9*
- Surrénalienne précoce ¬ *E27.0*
- ¬
- - A la *Z00.3*

Puberté *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anomalies de la *E30.8*
- - Hypertrophie mammaire: massive de la *N62*
- - Ménorragie de la *N92.2*
- - Menstruation trop abondante à la *N92.2*
- - Saignements de la *N92.2*

Pubien
- Cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ Subluxation de la symphyse (*O26.7*
- Obstétrical e ¬
- - Arrachement du cartilage interne de la symphyse (*O71.6*
- - Écartement traumatique de la symphyse (*O71.6*
- Pierson] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): symphyse *M91.0*
- Van Neck] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): ischio- *M91.0*
- ¬
- - Dysfonctionnement de la symphyse *M25.55*
- - Ostéoblastome de l'os *D16.8*
- - Région *S31.1*
- - Rupture traumatique de la symphyse *S33.4*
- - Tuberculose de la symphyse *A18.0†, M01.15**

Pubis ¬
- Fracture du *S32.5*
- Infestation par: Phthirus *B85.3*
- Phtiriase [Infestation par poux du *B85.3*

Publique ¬ Lésion due à des troubles de l'ordre *Y36.9!*

Puce-chique ¬ Infestation par *B88.1*

Puces ¬
- Maladie de Brill à *A75.2*
- Tabardillo à *A75.2*

Pudendum femininum ¬ *C51.9*

Pudlak
v./v.a. Hermansky-Pudlak

Puerpéral
v./v.a. Type de maladie

Puerpéralité
- Lactation ¬ états mentionnés cours grossesse
- - *O91*
- - *O92*
- Non classés ¬ Troubles mental comportement
- - Associés à la *F53.8*
- - Légers associés à la *F53.0*
- - Sévères associés à la *F53.1*
- Sans précision ¬
- - Complication de l'anesthésie au cours de la *O89.9*
- - Complication veineuse au cours de la *O87.9*

Puerpéralité *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.9*
- - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.9*
- - Trouble mental de la *F53.9*
- - ¬
- - Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.0*
- - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la *O89.2*
- - Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la *Z87.5*
- - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O89.1*
- - Cardiomyopathie au cours de la *O90.3*
- - Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.3*
- - Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.1*
- - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la *O89.4*
- - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - Complication
- - - Anesthésie au cours de la *O89.8*
- - - Cardiaques de l'anesthésie au cours de la *O89.1*
- - - Intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la *O89.2*
- - - Mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la *O89*
- - - Pulmonaires de l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la *O89.5*
- - - Veineuses au cours de la *O87.8*
- - Cours
- - - Accouchement et de la *O24*
- - - Travail, de l'accouchement et de la *O87*
- - Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la *O95*
- - Échec ou difficulté d'intubation au cours de la *O89.6*
- - Eclampsie au cours de la *O15.2*
- - Embolie
- - - Grossesse, de l'accouchement ou de la *O88*
- - - Pulmonaire au cours de la *O88.20*
- - Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.2*
- - Hémorroïdes au cours de la *O87.2*

Puerpéralité *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.4*
- - Hypertension
- - - Essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.0*
- - - Secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.4*
- - Infection généralisée dans la *O85*
- - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O89.1*
- - Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.7*
- - Maladies
- - - Affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.8*
- - - Appareil
- - - - Circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.4*
- - - - Digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.6*
- - - - Respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.5*
- - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.3*
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.2*
- - - Infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.8*
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.7*
- - - Protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.6*
- - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.1*
- - - Virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.5*
- - Malnutrition au cours de l'accouchement et de la *O25*
- - Myocardiopathie au cours de la *O90.3*
- - Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.2*
- - Phlébothrombose profonde au cours de la *O87.1*
- - Pneumonie chimique d'aspiration dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - Pneumonie par aspiration dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la *O89.3*
- - Septicémie au cours de la *O85*

Puerpéralité *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la *O94*
- - Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la *O26.7*
- - Syndrome de Mendelson dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.1*
- - Thrombophlébite superficielle au cours de la *O87.0*
- - Thrombose
- - - Sinus veineux cérébral au cours de la *O87.3*
- - - Veineuse cérébrale au cours de la *O87.3*
- - Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.3*
- - Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.0*
- - Varices des organes génitaux au cours de la *O87.8*

Pugilistique ¬ Démence *F07.2*

Puissance sexuelle ¬ Déficience organique de la *N48.4*

Pulmonaire
v./v.a. Artère pulmonaire
v./v.a. broncho-pulmonaire
v./v.a. Type de maladie

Pulpaire ¬
- Calcifications *K04.2*
- Dégénérescence *K04.2*
- Gangrène *K04.1*
- Granulome *K03.3*
- Nécrose *K04.1*
- Périodontite apicale aiguë d'origine *K04.4*

Pulpe
- Rouge à petites cellules B ¬ Lymphome splénique diffus de la *C83.0*
- Tissus périapicaux, autres et sans précision ¬ Maladies de la *K04.9*
- ¬
- - Carie avec exposition de la *K02.5*
- - Formation anormale de tissus dentaires durs dans la *K04.3*

Pulpite
- Aiguë ¬ *K04.0*
- Chronique (hyperplasique) (ulcéreuse) ¬ *K04.0*
- Irréversible ¬ *K04.0*
- Réversible ¬ *K04.0*
- SAI ¬ *K04.0*
- ¬ *K04.0*

Pulpolithes ¬ *K04.2*

Pulseless disease ¬ *M31.4*

Pulseurs pour aérosols ¬ *T59*

Pulvérulente ¬ Cataracte *Q12.0*

Pulverulentus ¬ Fundus *H35.5*

Pumphrey
v./v.a. Bart-Pumphrey

Punctiforme
- Corps étranger (pénétrant) SAI ¬ Plaie: *T14.1*
- Multiples SAI ¬ Plaies *T01.9*
- ¬ Cataracte sénile: *H25.0*

Pupillaire
- Miotique ¬ Kyste *H21.2*
- ¬
- - Dégénérescence de: rebord *H21.2*
- - Glaucome dû à un blocage *H40.2*
- - Membranes *H21.4*
- - Occlusion *H21.4*
- - Séclusion *H21.4*

Pupille
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies fonctionnelles de la *H58.0**
- Ectopiques ¬ Syndrome de ptosis-strabisme- *Q15.8*
- Horner ¬ *G90.2*
- ¬
- - Anomale congénitale des la *Q13.2*
- - Anomalies fonctionnelles de la *H57.0*
- - Atrésie de la *Q13.2*

PURA avec convulsions et encéphalopathie ¬ Syndrome d'hypotonie musculaire néonatale sévère associé au *G40.4*

Pure red cell aplasia
- Congénitale ¬ PRCA [*D61.0*
- ¬ RCPA [*D60.9*

Purine
- Nucléoside phosphorylase [PNP] ¬ Déficit en *D81.5*
- Pyrimidine
- - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme de la *E79.9*
- - ¬ Autres anomalies du métabolisme de la *E79.8*
- ¬ Anomalie du métabolisme de la *E79.9*

Purple gloves syndrome ¬ *T88.7*

Purpura
- Allergique ¬ *D69.0*
- Anaphylactique ¬ *D69.0*
- Arthritique ¬ *D69.0†, M36.4**
- Cours de scorbut ¬ *E54†, D77**
- Due à une fragilité capillaire idiopathique ¬ *D69.88*
- Fibrinolytique ¬ *D65.2*
- Fulminans
- - Acquis ¬ *D65.9*
- - ¬ *D65*
- Hypergammaglobulinémique bénin [de Waldenström] ¬ *D89.0*
- Non thrombopénique
- - Hémorragique ¬ *D69.0*
- - Idiopathique ¬ *D69.0*
- - ¬ Autres *D69.2*

Purpura *–suite*
- Rhumatoïde ¬ *D69.0*
- SAI ¬ *D69.2*
- Schoenlein-Henoch ¬
- - Arthropathie au cours de *D69.0†, M36.4**
- - Glomérulonéphrite au cours de *D69.0†, N08.2**
- - Maladie glomérulaire au cours de *D69.0†, N08.2**
- Schönlein-Henoch ¬ Arthrite au cours de *D69.0†, M36.4**
- Sénile ¬ *D69.2*
- Simple ¬ *D69.2*
- Thrombocytopénique thrombotique ¬ Glomérulopathie au cours de *M31.1†, N08.5**
- Thrombopénique
- - Idiopathique ¬ *D69.3*
- - Thrombotique] ¬ PTT [*M31.1*
- Thrombotique thrombocytopénique
- - Acquis ¬ PTT [*M31.1*
- - Congénital ¬
- - - *M31.1*
- - - PTT [*M31.1*
- Thrombotique-thrombocytopénique ¬ Glomérulonéphrite au cours de *M31.1†, N08.5**
- Vasculaire ¬ *D69.0*

Purpurique
- Brésil ¬ Fièvre *A48.4*
- Pigmentée ¬ Dermatose *L81.7*

Purulent
v./v.a. Type de maladie

Pustule maligne ¬ *A22.0*

Pustuleux
- Contagieuse ovine] ¬ Orf [dermatite *B08.0*
- Éosinophilique classique ¬ Folliculite *L73.8*
- Érosive du cuir chevelu ¬ Dermatose *L30.8*
- Généralisé
- - Forme de von Zumbusch ¬ Psoriasis *L40.1*
- - GPP] ¬ Psoriasis *L40.1*
- Sous-cornée ¬ Dermatose *L13.1*
- ¬
- - Bactéride *L40.3*
- - Pyoderma gangrenosum, type *L88*

Pustulose
- Exanthématique aiguë généralisée ¬
- - *L27.0*
- - *L27.1*
- - PEAG [*L27.0*
- Hyperostose ostéite ostéite
- - Avant-bras ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné- *M86.33*
- - Bras ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné- *M86.32*
- - Cheville ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné- *M86.37*

Pustulose *–suite*
- Hyperostose ostéite ostéite *–suite*
- - Colonne vertébrale ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné- *M86.38*
- - Jambe ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné- *M86.36*
- - Localisations multiples ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné- *M86.30*
- - Main ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné- *M86.34*
- - Région de l'épaule ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné- *M86.31*
- - Région pelvienne ¬ Syndrome SAPHO [Synovite-acné- *M86.35*
- Palmaire et plantaire ¬ *L40.3*
- Sous-cornée ¬ *L13.1*
- Varicelliforme de Kaposi ¬ *B00.0*
- ¬ Ostéomyélite stérile multifocale avec périostéite et *M86.30*

PUVA lentigines ¬ *L81.4*

PXE] ¬ Pseudoxanthome élastique [*Q82.8*

Pycnoachondrogenèse ¬ *Q78.8*

Pycnodysostose ¬ *Q78.8*

Pycnolepsie idiopathique ¬ *G40.3*

PYCR2 ¬ Microcéphalie avec leucoencéphalopathie progressive associée à *Q87.0*

Pyélite
- Aiguë ¬ *N10*
- Chronique ¬ *N11*
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N29.1**
- Kystique ¬ *N28.88*
- Lithiasique avec hydronéphrose ¬ *N13.64*
- SAI
- - Chronique ¬ *N11.9*
- - ¬ *N12*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N29.1**

Pyélonéphrite
- Aiguë ¬ *N10*
- Candida ¬ *B37.4†, N16.0**
- Candidosique ¬ *B37.4†, N16.0**
- Chronique
- - Associée
- - - Anomalie
- - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - - Pyélo-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - Uretère ¬ *N11.1*
- - - Coudure
- - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - - Pyélo-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - Uretère ¬ *N11.1*
- - - Obstruction
- - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - - Pyélo-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - Uretère ¬ *N11.1*

Pyélonéphrite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Associée *–suite*
- - - Reflux (vésico-urétéral) ¬ *N11.0*
- - - Rétrécissement
- - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - - Pyélo-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - Uretère ¬ *N11.1*
- - Non obstructive SAI ¬ *N11.8*
- - ¬ *N11*
- Cours
- - Brucellose ¬ *A23.9†, N16.0**
- - Cryoglobulinémie ¬ *D89.1†, N16.2**
- - Cystinose ¬ *E72.0†, N16.3**
- - Diphtérie ¬ *A36.8†, N16.0**
- - Leucémie NCA ¬ *C95.90†, N16.1**
- - Lymphome NCA ¬ *C85.9†, N16.1**
- - Maladie
- - - Glycogénique ¬ *E74.0†, N16.3**
- - - Wilson ¬ *E83.0†, N16.3**
- - Myélome multiple ¬ *C90.00†, N16.1**
- - Rejet de greffe ¬ *T86.9†, N16.5**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, N16.2**
- - Syphilis ¬ *A52.7†, N16.0**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.8†, N16.0**
- Due à un sepsis NCA ¬ *A41.9†, N16.0**
- Lithiasique avec hydronéphrose ¬ *N13.64*
- Non obstructive chronique associée à un reflux ¬ *N11.0*
- Obstructive chronique ¬ *N11.1*
- SAI
- - Chronique ¬ *N11.9*
- - ¬ *N12*
- Salmonella ¬ *A02.2†, N16.0**
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, N16.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N29.1**

Pyélophlébite ¬ *I80.88*

Pyélo-urétéral
- Infection du rein ¬ Hydronéphrose avec obstruction *N13.60*
- ¬
- - Hydronéphrose avec obstruction de la jonction *N13.0*
- - Occlusion congénitale de: jonction *Q62.1*
- - Pyélonéphrite chronique associée
- - - Anomalie de jonction *N11.1*
- - - Coudure de jonction *N11.1*
- - - Obstruction de jonction *N11.1*
- - - Rétrécissement de jonction *N11.1*

Pyélo-urétérite kystique ¬ *N28.88*

Pygopages ¬ *Q89.4*

Pyknolepsie ¬ *G40.3*

Pyle ¬ Syndrome de *Q78.5*

Pyléphlébite ¬ *K75.1*

Pyléphlébitique ¬ Abcès hépatique: *K75.0*

Pylore
- Adulte ¬
- - Obstruction du *K31.18*
- - Rétrécissement du *K31.18*
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome du *C16.4*
- Cryptorchidie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-hypotonie-brachycéphalie-sténose du *Q87.0*
- Non classé ailleurs ¬ Spasme du *K31.3*
- Type 1 ¬ Tumeur neuroendocrine familiale maligne du *C16.4*
- ¬
- - Carcinome épidermoïde du *C16.4*
- - Carcinome héréditaire diffus du *C16.4*
- - Carcinome indifférencié du *C16.4*
- - Constriction congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- - Épidermolyse bulleuse simple avec atrésie du *Q81.0*
- - Formes psychogènes de: spasme du *F45.3*
- - Hypertrophie
- - - *K31.10*
- - - Congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- - Linite plastique du *C16.4*
- - Obstruction du *K31.18*
- - Rétrécissement
- - - Congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- - - Hypertrophique du *K31.10*
- - Spasme congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- - Sténose
- - - Congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- - - Hypertrophique congénitale du *Q40.0*
- - Tumeur maligne: *C16.4*
- - Tumeur neuroendocrine maligne du *C16.4*
- - Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] du *C16.4*

Pylori
v./v.a. Helicobacter pylori
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Helicobacter pylori [H. *B98.0!*

Pylorique
- Adulte
- - Compression ¬ Sténose *K31.12*
- - Infiltration ¬ Sténose *K31.12*
- - Tumeur
- - - Duodénum ¬ Sténose *K31.12*
- - - Estomac ¬ Sténose *K31.12*
- - - Pancréas ¬ Sténose *K31.12*
- Congénitale ¬ Duplication *Q40.2*
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de l'antre *C16.3*
- Hypertrophique de l'adulte ¬ Sténose *K31.10*
- Inflammatoire de l'adulte ¬ Sténose *K31.11*
- ¬
- - Canal *C16.4*
- - Carcinome épidermoïde

Pylorique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carcinome épidermoïde *–suite*
- - - Canal *C16.4*
- - - l'antre *C16.3*
- - Carcinome indifférencié de l'antre *C16.3*
- - Épidermolyse bulleuse jonctionnelle avec atrésie *Q81.8, Q40.8*
- - Sténose *K31.18*
- - Tumeur maligne: Antre *C16.3*
- - Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l'antre *C16.3*
- - Ulcère: *K25*

Pyocystite ¬ *N30.88*

Pyoderma gangrenosum
- Acné
- - Hidradénite suppurée
- - - Spondylarthrite ankylosante] ¬ Syndrome PASS [*M35.8*
- - - ¬ Syndrome
- - - - PAPASH [arthrite pyogénique- *M35.8*
- - - - PASH [*M35.8*
- - - - PsAPASH [arthrite psoriasique- *M35.8*
- - ¬ Syndrome PAPA [d'arthrite purulente- *M35.8*
- Type
- - Bulleux ¬ *L88*
- - Pustuleux ¬ *L88*
- - Ulcéreux ¬ *L88*
- - Végétatif ¬ *L88*

Pyodermia fistulans sinifica ¬ *L73.2*

Pyodermite
- Gangréneuse ¬ *L88*
- Néonatale ¬ *P39.4*
- Phagédénique ¬ *L88*
- ¬ *L08.0*

Pyogène
- Disque intervertébral ¬ Infection (*M46.3*
- Muqueuse buccale ¬ Granulome: *K13.4*
- SAI ¬ Méningite: *G00.9*
- Sans précision ¬ Arthrite à bactéries *M00.9*
- Sinus veineux intracrânien ¬ Thrombose non *I67.6*
- Système veineux intracrânien ¬ Thrombose non *I67.6*
- Veine cérébrale ¬ Thrombose non
- - *I67.6*
- - *I67.6*
- ¬
- - Discite *M46.39*
- - Granulome: gingival *K06.8*
- - Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non *I63.6*
- - Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non *G95.18*
- - Thyroïdite: *E06.0*

Pyogénique
- Pyoderma gangrenosum-acné-hidradénite suppurée] ¬ Syndrome PAPASH [arthrite *M35.8*
- ¬
- - Arthrite spinale *M46.59*
- - Granulome *L98.0*

Pyohémique
- Septique, obstétricale ¬ Embolie *O88.3*
- Staphylocoques ¬ Embolie *A41.2*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*

Pyohydronéphrose ¬ *N13.65*

Pyométrie ¬ *N71*

Pyomyosite
- Avant-bras ¬ *M60.03*
- Bras ¬ *M60.02*
- Cuisse ¬ *M60.05*
- Jambe ¬ *M60.06*
- Localisations multiples ¬ *M60.00*
- Main ¬ *M60.04*
- Pied ¬ *M60.07*
- Région de l'épaule ¬ *M60.01*
- Région pelvienne ¬ *M60.05*
- Tronc ¬ *M60.08*
- Tropicale ¬ *M60.0*

Pyonéphrose
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬ *N13.68*

Pyopéricardite ¬ *I30.1*

Pyopneumothorax
- Fistule ¬ *J86.09*
- Tuberculeux
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.6*
- - ¬ *A16.5*

Pyorrhée-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'alopécie-épilepsie- *Q87.8*

Pyosalpinx
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N74.3**
- ¬ *N70*

Pyothorax
- Fistule
- - Bronches ¬ *J86.01*
- - Œsophago
- - - Pleurale ¬ *J86.04*
- - - Trachéale ¬ *J86.03*
- - Parenchyme pulmonaire ¬ *J86.00*
- - Paroi thoracique ¬ *J86.02*
- - Trachée ¬ *J86.01*
- - ¬ *J86.09*
- Sans fistule ¬ *J86.9*
- Tuberculeux
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.6*
- - ¬ *A16.5*
- ¬ *J86.9*

Pyo-uretère tuberculeux ¬ *A18.1†, N29.1**

Pyramidal
- Nystagmus-apraxie oculomotrice ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique récessive-signes *G11.1*
- ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.12*

Pyrazolés ¬ Intoxication: Dérivés *T39.2*

Pyrexie
- Cours du travail, non classée ailleurs ¬ *O75.2*
- SAI ¬ *R50.9*

Pyrgocéphalie ¬ *Q75.0*

Pyridoxal ¬ Convulsions sensibles au phosphate de *G40.8*

Pyridoxamine 5'-phosphate oxydase ¬ Déficit en *G40.8*

Pyridoxine ¬
- Anémie sidéroblastique: réagissant à la *D64.3*
- Carence en *E53.1*

Pyridoxino-dépendante ¬ Épilepsie *G40.8*

Pyrimidine
- 5' nucléotidase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.3*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme de la purine et de la *E79.9*
- ¬
- - Anomalie du métabolisme de la *E79.9*
- - Anomalies du métabolisme de la purine et de la *E79.8*

Pyrimidinémie familiale ¬ *E79.8*

Pyroglobulinémie NCA ¬ *E88.08*

Pyromanie
- Sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- ¬ Tendance pathologique à allumer des incendies [*F63.1*

Pyrophosphate calcium dihydraté
- Articulation
- - Coude ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de *M11.12*
- - Genou ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de *M11.16*
- Articulation de l'épaule ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de *M11.11*
- Colonne vertébrale ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de *M11.18*
- Main ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de *M11.14*
- Pied ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de *M11.17*
- Poignet ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de *M11.13*
- Région pelvienne ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de *M11.15*
- Sièges multiples ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de *M11.10*
- ¬ CPPD familiale [Maladie des dépôts de *M11.19*

Pyrophosphokinase ¬ Encéphalopathie de l'enfant par déficit en thiamine *E51.8†, G94.30**

Pyrosis ¬ *R12*

Pyrroline-5-carboxylate déshydrogénase ¬ Déficit en 1- *E72.5*

Pyruvate

- Carboxylase ¬ Déficit en: *E74.4*
- Déshydrogénase
- - E1-alpha ¬ Déficit en *E74.4*
- - E1-bêta ¬ Déficit en *E74.4*
- - E3 ¬ Déficit en *E74.4*
- - ¬ Déficit
- - - *E74.4*
- - - Phosphatase du complexe *E74.4*
- Gluconéogenèse ¬ Anomalies du métabolisme du *E74.4*
- Kinase
- - Érythrocytaire ¬ Déficit en *D55.2*
- - Globule rouge ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.2*
- - ¬
- - - Anémie hémolytique congénitale non sphérocytaire due à un déficit en *D55.2*
- - - Anémie par déficit en: *D55.2*
- ¬
- - Déficit en transporteur mitochondrial du *G31.81*
- - Trouble du métabolisme du *E74.4*

Pyruvoyl-tétrahydroptérine synthase ¬ Hyperphénylalaninémie par déficit en 6- *E70.1*

Qazi
v./v.a. Krasnow-Qazi
Qazi-Markouizos ¬ Syndrome de *Q87.8*
QRS ¬ Allongement du complexe *R94.3*
QT
- Court
- - Congénital ¬ Syndrome du *I49.8*
- - Familial ¬ Syndrome du *I49.8*
- Long
- - Familial ¬ Syndrome du *I49.8*
- - Type
- - - 7 ¬ Syndrome du *I49.8, Q79.8*
- - - 8
- - - - Type
- - - - - 1 ¬ LQT8 [Syndrome du *I49.8*
- - - - - 2 ¬ LQT8 [Syndrome du *I49.8*
- - - - ¬ Syndrome du *I49.8*
- - - Romano-Ward ¬ Syndrome du *I49.8*
- Surdité ¬ Syndrome de long *I49.8*
- ¬ Syndrome du *I49.8*
Quadrant
- Externes du sein ¬ Carcinome métaplasique des deux *C50.8*
- Inféro-externe sein
- - Type glande salivaire ¬ Carcinome du *C50.5*
- - ¬
- - - Adénocarcinome
- - - - Apocrine du *C50.5*
- - - - Tubulaire du *C50.5*
- - - Angiosarcome du *C50.5*
- - - Carcinome héréditaire du *C50.5*
- - - Carcinome métaplasique du *C50.5*
- - - Carcinome mucineux du *C50.5*
- - - Tumeur maligne: *C50.5*
- Inféro-interne
- - Inféro-interne du sein ¬ Angiosarcome du *C50.3*
- - Sein
- - - Type glande salivaire ¬ Carcinome du *C50.3*
- - - ¬
- - - - Adénocarcinome
- - - - - Apocrine du *C50.3*
- - - - - Tubulaire du *C50.3*
- - - - Carcinome héréditaire du *C50.3*
- - - - Carcinome métaplasique du *C50.3*
- - - - Carcinome mucineux du *C50.3*
- - - - Tumeur maligne: *C50.3*
- Internes du sein ¬ Carcinome métaplasique des deux *C50.8*
- Supéro-externe sein
- - Type glande salivaire ¬ Carcinome du *C50.4*
- - ¬
- - - Adénocarcinome
- - - - Apocrine du *C50.4*
Quadrant *–suite*
- Supéro-externe sein *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Adénocarcinome *–suite*
- - - - Tubulaire du *C50.4*
- - - Angiosarcome du *C50.4*
- - - Carcinome héréditaire du *C50.4*
- - - Carcinome métaplasique du *C50.4*
- - - Carcinome mucineux du *C50.4*
- - - Tumeur maligne: *C50.4*
- Supéro-interne
- - Glande mammaire ¬
- - - Angiosarcome du *C50.2*
- - - Carcinome métaplasique du *C50.2*
- - Sein
- - - Type glande salivaire ¬ Carcinome du *C50.2*
- - - ¬
- - - - Adénocarcinome
- - - - - Apocrine du *C50.2*
- - - - - Tubulaire du *C50.2*
- - - - Carcinome héréditaire du *C50.2*
- - - - Carcinome mucineux du *C50.2*
- - - - Tumeur maligne: *C50.2*
- ¬
- - Anopsie d'un *H53.4*
- - Syndrome des *G90.88*
Quadriceps ¬
- Lésion traumatique de muscles et de tendons du *S76.1*
- Myopathie épargnant le *G71.8*
Quadricuspidie valvulaire aortique ¬ *Q23.8*
Quadrilatérale ¬ Fièvre *A78*
Quadriparésie spastique ¬ Syndrome
- Déficience intellectuelle liée à l'X-agénésie du corps calleux- *Q87.8*
- Néphronophtise familiale de l'adulte- *Q61.5, G82.49*
Quadriplégie
- Chronique ¬ *G82*
- SAI ¬ *G82.5*
- Spastique congénitale ¬ *G80.0*
Quadriplégique ¬ Paralysie cérébrale spastique *G80.0*
Quadritronculaire ¬ Maladie coronarienne *I25.14*
Quadruplés ¬ *O30.2*
Quantité
- Expectoration ¬ Anomalie de: *R09.3*
- Urine ¬ Augmentation de la *R35.0*
Quasi-syndrome de mort subite du nourrisson ¬ *R06.80*
Québec ¬ Syndrome plaquettaire du *D69.1*
Queensland ¬ Fièvre à tiques du *A77.3*
Quérulente ¬
- Paranoïa *F22.8*
- Trouble de la) personnalité: *F60.0*
Quervain ¬
- Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de *M65.4*
- Thyroïdite (à) (de): de *E06.1*
Queue
- Cheval
- - Complet ¬ Syndrome de la *G83.40*
- - Incomplet ¬ Syndrome de la *G83.41*
- - Non précisé ¬ Syndrome de la *G83.49*
- - ¬
- - - Gomme de la *A52.1†, G07**
- - - Lésion autre et non précisée de la *S34.38*
- - - Malformations congénitales de la *Q06.3*
- - - Syndrome traumatique
- - - - Complet de la *S34.30*
- - - - Incomplet de la *S34.31*
- - - Tumeur maligne: *C72.1*
- Pancréas
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de la *C25.2*
- - ¬
- - - Blastome de la *C25.2*
- - - Carcinome
- - - - Familial de la *C25.2*
- - - - Pseudo-papillaire et solide de la *C25.2*
- - - Carcinome à cellules acineuses de la *C25.2*
- - - Carcinome épidermoïde de la *C25.2*
- - - Carcinome indifférencié à cellules géantes de type ostéoclastique de la *C25.2*
- - - Cystadénocarcinome
- - - - Mucineux de la *C25.2*
- - - - Séreux de la *C25.2*
- - - Néoplasme neuroendocrine-non neuroendocrine mixte de la *C25.2*
- - - Tumeur à cellules géantes ostéoclastiques de la *C25.2*
- ¬ Lésion traumatique du pancréas: *S36.23*
Queyrat
- Lèvres génitales ¬ Maladie de *D07.1*
- SAI ¬ Érythroplasie de *D07.4*
- ¬ Érythroplasie de *D07.4*
Quincke
- Héréditaire ¬ Œdème de *D84.1*
- ¬ Œdème de *T78.3*
Quinolones
- Amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux *U81.6!*
- Streptogramines oxazolidinones
- - Non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux *U80.01!*
- - ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline et le cas échéant aux glycopeptides,aux *U80.00!*

Quinquaud ¬ Folliculite décalvante de *L66.2*

Quintane ¬ Fièvre *A79.0*

Quintus ¬ Névralgie de *G50.0*

Quotidienne NCA ¬ Thérapie concernant les activités de la vie *Z50.8!*

Raas
v./v.a. Al Awadi-Raas-Rothschild

Rabson-Mendenhall
- Décompensé ¬ Syndrome de *E13.91*
- ¬ Syndrome de *E13.90*

RAC2 ¬ Maladie infantile de type DAL [déficit d'adhésion leucocytaire] par déficit en protéine *D71*

Raccourcis et irréguliers entre les règles ¬ Intervalles *N92.1*

Raccourcissement
- Acquise du métatarse ¬ *M21.68*
- Congénital
- - Fémur ¬ *Q72.4*
- - Ligament transverse supérieur de l'omoplate ¬ *Q68.8*
- - Membre s
- - - Inférieur(s) ¬ *Q72.8*
- - - Supérieur(s) ¬ *Q71.8*
- - Radius ¬ *Q71.4*
- Longitudinal
- - Cubitus ¬ *Q71.5*
- - Fémur ¬ *Q72.4*
- - Membre(s) non précisé(s) ¬ *Q73.8*
- - Péroné ¬ *Q72.6*
- - Radius ¬ *Q71.4*
- - Tibia ¬ *Q72.5*
- Membre
- - Inférieur, sans précision ¬ *Q72.9*
- - S
- - - Inférieur(s) ¬ Autres *Q72.8*
- - - Non précisé(s) ¬ Autres *Q73.8*
- - - Supérieur(s) ¬ Autres *Q71.8*
- - Supérieur, sans précision ¬ *Q71.9*
- SAI d'un (des) membre(s) SAI ¬ *Q73.8*

Racémase ¬ Déficit en alpha-méthylacyl-CoA *K76.8*

Racémeux
- Rétine ¬ Hémangiome *D18.06*
- Rétinien isolé ¬ Hémangiome *D18.06*

Rachialgies dorsales ¬ *M54.6*

Rachianesthésie anesthésie épidural cours
- Grossesse ¬
- - Céphalée provoquée par une *O29.4*
- - Complications d'une *O29.5*
- Puerpéralité ¬
- - Céphalée provoquée par une *O89.4*
- - Complications d'une *O89.5*
- Travail accouchement ¬
- - Céphalée provoquée par une *O74.5*
- - Complications d'une *O74.6*

Rachicentèse ¬
- Écoulement de liquide céphalorachidien après *G97.0*
- Réaction secondaire à une *G97.1*

Rachidien
v./v.a. Canal rachidien
v./v.a. Hémorragie rachidienne

Rachidien *–suite*
- Cervicales ¬ Lésion traumatique des méninges *S19.80*
- Dorsales ¬ Lésion traumatique des méninges *S29.80*
- Lombosacrées ¬ Lésion traumatique des méninges *S39.81*
- Muscles striés ¬ Spasticité d'origine *G95.83*
- Non tuberculeux ¬ Abcès osseux *M46.29*
- Tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus *T09.4*
- ¬
- - Adhérences méningées (cérébrales) (*G96.1*
- - Astrocytome de la moelle allongée [bulbe *C71.7*
- - Hydroméningocèle (*Q05*
- - Mélanocytose leptoméningée diffuse des méninges *D42.1*
- - Mélanome primaire des méninges *C70.1*
- - Méningiome des méninges *D32.1*
- - Méningocèle (*Q05*
- - Trouble des fonctions vésicales du à un choc *G95.82*
- - Tumeur bénigne: Méninges *D32.1*
- - Tumeur maligne méninge
- - - *C70.1*
- - - *C70.1*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges *D42.1*
- - Vessie réflexe d'origine *G95.80*

Rachis
- Cervical
- - E) ¬ *S12*
- - SAI ¬ Fracture de: *S12.9*
- - ¬
- - - Entorse et foulure du *S13.4*
- - - Lésion traumatique d'une racine nerveuse du *S14.2*
- Dorsal ¬
- - Entorse et foulure du *S23.3*
- - Fractures multiples du *S22.1*
- - Lésion traumatique d'une racine nerveuse du *S24.2*
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ Fracture du *P11.5*
- Lombaire
- - Bassin
- - - Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du *S32.82*
- - - Ischion ¬ Fracture de parties autres et non précisées du *S32.81*
- - - ¬
- - - - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S33.7*
- - - - Fractures multiples du *S32.7*
- - - - Luxation de parties autres et non précisées du *S33.3*

Rachis *–suite*
- Lombaire *–suite*
- - Sacré ¬ Lésion traumatique de la racine nerveuse du *S34.2*
- - ¬ Fracture ouverte du *S32.00, S31.87!*
- Moelle épinière due traumatisme obstétrical
- - Non précisé ¬ Lésion du *P11.59*
- - Paraplégie
- - - Aiguë ¬ Lésion du *P11.50*
- - - Chronique ¬ Lésion du *P11.51*
- Niveau non précisé ¬ Fracture du *T08*
- Non associées à une scoliose ¬ Autres malformations congénitales du *Q76.4*
- Sans précision
- - Non associée à une scoliose ¬ Malformation du *Q76.4*
- - ¬ Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du *Q77.9*
- ¬
- - Anomalie morphologique congénitale du *Q67.5*
- - Chordome chondroïde du *C41.2*
- - Fibrome chondromyxoïde du *D16.6*
- - Ostéoblastome du *D16.6*
- - Ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du *Q77.8*
- - Séquelles d'une fracture du *T91.1*
- - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.6*
- - Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: *C41.2*

Rachischisis
v./v.a. Cranio-rachischisis
- ¬ *Q05*

Rachitisme
- Cours de scorbut ¬ *E54†, M90.89**
- Évolutif ¬ *E55.0*
- Hypocalcémique vitamine D-dépendant ¬ *E83.31*
- Hypophosphatémique
- - Autosomique
- - - Dominant ¬ *E83.30*
- - - Récessif ¬ *E83.30*
- - Familial ¬ *E83.30*
- - Héréditaire avec hypercalciurie] ¬ HHRH [*E83.30, E83.58*
- - ¬ Nanisme néphrotico-glycosurique avec *E72.0†, N16.3**
- Lors de carence en phosphatase ¬ *E83.38†, M90.89**
- Origine tumorale ¬ *E83.38*
- Résistant à la vitamine D de type II ¬ *E83.30†, M90.89**
- ¬
- - Cyphose en tant que conséquence tardive du *E64.3, M40.19*
- - Dos voûté en tant que conséquence tardive du *E64.3, M40.29*
- - Séquelles de *E64.3*

Racine
- Dentaire
- - Laissée en place ¬ *K08.3*
- - ¬ Présence d'implants maxillaires et sur *Z96.5*
- Fusionnées d'Ackerman ¬ Syndrome de molaires avec *Q87.8*
- Nerveux
- - Cours
- - - Spondylarthrose ¬ Compression des *M47.29†, G55.2**
- - - Tumeur NCA ¬ Compression des *D48.9†, G55.0**
- - Lombaire ¬ Syndrome d'irritation de la *M51.1†, G55.1**
- - Lors atteinte disque intervertébral
- - - Cervicaux avec myélopathie ¬ Compression des *M50.0†, G99.2**
- - - Myélopathie ¬ Compression des *M51.0†, G99.2**
- - - ¬ Compression des *M51.1†, G55.1**
- - Plexus rachidien du tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la *T09.4*
- - Rachis
- - - Cervical ¬ Lésion traumatique d'une *S14.2*
- - - Dorsal ¬ Lésion traumatique d'une *S24.2*
- - - Lombaire et sacré ¬ Lésion traumatique de la *S34.2*
- - ¬ Atteinte des disques intervertébraux cervicaux avec compression des *M50.1†, G55.1**
- Plexus nerveux
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Compression des *G55.8**
- - Sans précision ¬ Affection des *G54.9*
- - ¬ Autres affections des *G54.8*

Radial
v./v.a. Artère radiale
- Aplasie tibiale ¬ Syndrome d'aplasie *Q73.8*
- Atrésie des choanes ¬ Syndrome d'hypoplasie du rayon *Q71.8, Q30.0*
- Brailsford] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête *M92.1*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S54.2*
- - Bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S44.2*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du nerf *S64.2*
- SAI ¬ Nerf *S54.2*
- ¬
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: tête *T84.02*
- - Dislocation congénitale de la tête *Q68.8*
- - Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral *S53.41*
- - Fracture
- - - Deux diaphyses, cubitale et *S52.4*
- - - Ouverte de la diaphyse *S52.30, S51.87!*
- - Hémimélie *Q71.4*

Radial *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion du nerf *G56.3*
- - Luxation de la tête *S53.0*
- - Main bote *Q71.4*
- - Méromélie longitudinale *Q71.4*
- - Présence d'une prothèse de tête *Z96.62*
- - Spectre oculo-auriculo-vertébral avec anomalies *Q87.0*
- - Syndrome
- - - Craniosynostose-aplasie *Q75.0*
- - - Oculo-oto- *Q87.8*

Radiation
- Ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie-retard de croissance-sensibilité aux *D81.1*
- Optiques de Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps genouillés et des *H47.5*
- ¬
- - Accident de *W91.9!*
- - Leucémie aiguë myéloïde et syndromes myélodysplasiques liés aux *C92.00*

Radiculaire
- Atteinte des disques intervertébraux ¬ Neuropathie *M51.1†, G55.1**
- Cervicales, non classées ailleurs ¬ Affections *G54.2*
- Lombosacrées, non classées ailleurs ¬ Affections *G54.4*
- Thoraciques, non classées ailleurs ¬ Affections *G54.3*
- ¬
- - Kyste
- - - *K04.8*
- - - Résiduel *K04.8*
- - Stimulateur sacré *Z45.80*

Radiculite
- Brachiale SAI ¬ Névrite ou *M54.1*
- Cervicale due
- - Déplacement de disque intervertébral ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Prolapsus discal ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Rupture discale ¬ *M50.1†, G55.1**
- Dorsale SAI ¬ Névrite ou *M54.1*
- Due
- - Atteinte des disques intervertébraux ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Dégénérescence discale ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Déplacement de disque intervertébral ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Prolapsus discal ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Rupture discale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Lombaire SAI ¬ Névrite ou *M54.1*
- Lombo-sacrée SAI ¬ Névrite ou *M54.1*
- Maladie due au VIH ¬ *B23.8, M54.19*
- SAI ¬ *M54.1*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G99.8**

Radiculomyélite toxique à Corynebacterium diphtheriae ¬ *A36.8†, G05.0**

Radiculopathie
- Région dorsale ¬ *M54.14*
- ¬
- - *M54.1*
- - Atteinte disque
- - - Cervical avec *M50.1*
- - - Lombaire avec *M51.1†, G55.1**
- - Dégénérescence des disques
- - - *M51.1†, G55.1**
- - - Intervertébral
- - - - Cervicaux avec *M50.1†, G55.1**
- - - - Thoraciques avec *M51.1†, G55.1**
- - Hernie
- - - Cervico-thoracique du noyau gélatineux avec *M50.1†, G55.1**
- - - Lombosacrée du noyau gélatineux avec *M51.1†, G55.1**
- - - Thoracique du noyau gélatineux avec *M51.1†, G55.1**
- - - Thoraco-lombaire du noyau gélatineux avec *M51.1†, G55.1**
- - Hernie cervicale du noyau gélatineux avec *M50.1†, G55.1**
- - Hernie lombaire du noyau gélatineux avec *M51.1†, G55.1**
- - Spondylarthrose
- - - *M47.2*
- - - Cervicale sans myélopathie ou *M47.8*
- - - Lombo-sacrée sans myélopathie ou *M47.8*
- - - Thoracique sans myélopathie ou *M47.8*

Radio
- Rénal ¬ Syndrome *Q87.1*
- Ulnaire
- - Bilatérale ¬ Synostose *Q74.0*
- - Microcéphalie-scoliose ¬ Syndrome de synostose *Q02, Q77.8*
- - Unilatérale ¬ Synostose *Q74.0*
- - ¬ Synostose *Q74.0*

Radio-carpien ¬
- Entorse et foulure du poignet: (Articulation) (Ligament) *S63.52*
- Ligament: *S63.3*
- Luxation du poignet: (Articulation) *S63.02*

Radio-cubital
- Retard de développement-hypotonie musculaire ¬ Syndrome de synostose *Q87.0*
- ¬
- - Luxation du poignet: (Articulation) *S63.01*
- - Synostose *Q74.0*

Radiodermite
- Aiguë ¬ *L58.0*
- Chronique ¬ *L58.1*
- Sans précision ¬ *L58.9*
- ¬ *L59.8*

Radiographique thoracique ¬ Contrôle *Z01.6*

Radio-humérale ¬ Articulation *S53.0*

Radio-isotopes [radionucléides] ¬ résultats anormaux de: épreuves de fixation de *R94*

Radiologie chez la mère ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par la *P00.7*

Radiologique
- Anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ Résultat *R93.8*
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.4*
- Non classé ailleurs ¬ Examen *Z01.6*
- ¬ Spondylarthrite axial
- - *M45.09*
- - Non *M45.09*

Radionucléides] ¬ résultats anormaux de: épreuves de fixation de radio-isotopes [*R94*

Radiosensibilité-déficit immunitaire-dysmorphie-difficultés d'apprentissage] ¬ Syndrome de RIDDLE [*D82.8*

Radio-Tartaglia ¬ Syndrome de *Q87.8*

Radiothérapie
- Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.1*
- Chimiothérapie
- - Mesures immunosuppressives ¬ Immunocompromission après *D90*
- - Néoplasie maligne ¬ Cure combinée de *Z51.82*
- Médicamenteuse) de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ Ostéonécrose (induite par la *K10.2*
- Tumeur maligne ¬ Examen de contrôle après *Z08.1*
- ¬
- - *Z92.3*
- - Convalescence après *Z54.1!*
- - Envie de vomir sous *R11, Y57.98!*
- - Nausées au cours de *R11, Y57.98!*
- - Phénomène d'embrasement thérapeutique (flare phenomenon) dû à la *T88.7*
- - Rétrécissement urétral secondaire à *N99.18*
- - Séance de *Z51.0*
- - Vomissements au cours de *R11, Y57.98!*

Radioulnaire-thrombocytopénie amégacaryocytique ¬ Syndrome de synostose *Q87.2*

Radius
- Anomalies ano-génitales ¬ Syndrome d'absence de *Q87.2*
- Col ¬ Fracture de l'extrémité supérieure du *S52.12*
- Combinée ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du *S52.6*
- Cubitus ¬ Ostéochondrite juvénile du *M92.1*
- Distal ¬ Fracture
- - Extension du *S52.51*
- - Flexion du *S52.52*
- - Ouverte du *S52.50, S51.87!*
- Fracture en flexion ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S52.52*

Radius *–suite*
- Luxation de la tête du cubitus ¬ Fracture distale de la diaphyse du *S52.31*
- Partie non précisée ¬ Fracture
- - Diaphyse du *S52.30*
- - Extrémité supérieure du *S52.10*
- Parties parties multiples ¬ Fracture
- - Extrémité inférieure du *S52.59*
- - Extrémité supérieure du *S52.19*
- Pouces triphalangés-hypospadias-progénie ¬ Syndrome d'hypoplasie du *Q87.2*
- Proximal ¬ Fracture ouverte du *S52.10, S51.87!*
- SAI ¬
- - *S52.30*
- - Partie proximale du *S52.10*
- Sans autre précision ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S52.50*
- TAR] ¬ Thrombopénie avec absence de *Q87.2*
- Tête ¬ Fracture de l'extrémité supérieure du *S52.11*
- ¬
- - Déficit congénital longitudinal du *Q71.4*
- - Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du *S52.21*
- - Ostéoblastome du *D16.0*
- - Ostéosarcome du *C40.0*
- - Raccourcissement
- - - Congénital du *Q71.4*
- - - Longitudinal du *Q71.4*
- - Sarcome d'Ewing du *C40.0*
- - Sarcome du *C40.0*
- - Syndrome de VATER [anomalies vertébrales, atrésie anale, anomalies cardiaques, fistule trachéo-œsophagienne avec atrésie de l'œsophage, dysplasie rénale et du *Q87.2*

RAG1 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit partiel en *D81.8*

RAG1/2 ¬ Déficit immunitaire combiné
- Déficit en *D81.1*
- Sévère par déficit complet en *D81.1*

Rage
- Citadine ¬ *A82.1*
- Rues ¬ *A82.1*
- Sylvatique ¬ *A82.0*
- ¬
- - *A82.9*
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.2*
- - Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.3*

Ragge
v./v.a. Bakrania-Ragge

Rahman ¬ Syndrome de *Q87.0*

Raide [rigidité musculaire] ¬ Syndrome de l'homme *G25.88*

Raideur articulaire
- Anomalies osseuses de la face ¬ Syndrome de camptodactylie- *Q87.0*
- Contracture ¬ *M24.5*
- Limitation
- - Complète des mouvements ¬ *M25.69*
- - Partielle des mouvements ¬ *M25.69*
- Non classée ailleurs ¬ *M25.6*
- Petite taille] ¬ Syndrome GEMSS [glaucome-ectopie du cristallin-sphérophakie- *Q87.1*

Raine ¬ Syndrome de *Q78.2*

Raines
v./v.a. Thomas-Jewtt-Raines

Rajab ¬ Calcification cérébrale type *Q04.8*

Rajab-Spranger ¬ Syndrome de *Q87.8*

Rakeb
v./v.a. Kufor-Rakeb

Ralentie ¬ Miction *R39.1*

Râles ¬ *R09.8*

Rallison
v./v.a. Wolcott-Rallison

Rambam-Hasharon ¬ Syndrome de *D84.8*

Rambaud-Gallian ¬ Syndrome de *E78.88*

Ramifié ¬
- Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne *E71.2*
- Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne *E71.1*
- Cétoacidurie à chaînes *E71.0*
- Déficit en 2-cétoacide déshydrogénase des chaînes *E71.0*
- Syndrome d'autisme-épilepsie par déficit en kinase déshydrogénase des cétoacides à chaînes *E71.1*
- Trouble du métabolisme des acides aminés non *E72.8*

Ramon ¬ Syndrome de *Q87.8*

Ramos
v./v.a. Lisker-Garcia-Ramos

Ramos-Arroyo ¬ Syndrome de *Q87.8*

Rampante ¬
- Dermatite *L40.2*
- Myiase cutanée *B87.0*

Ramsay-Hunt] ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: myoclonies [*G11.1*

RAPADILINO ¬ Syndrome *Q87.1*

Rapamycine ¬ Hypersensibilité aux dérivés de *T88.7*

Rapidité de l'expulsion ¬ *P03.5*

Rapport
- Admission hôpital ¬
- - Choc septique au moment de survenue incertain par *R57.2, U69.85!*
- - Septicémie au moment de survenue incertain par *A41.9, U69.82!*
- Albumine-globuline ¬ Inversion du *E88.08*
- Arcades dentaires ¬ Anomalies de *K07.2*
- Conjoint ou le partenaire ¬ Difficultés dans les *Z63*

Rapport *–suite*
- Mâchoires et la base du crâne ¬ Anomalies de *K07.1*
- Parents et les beaux-parents ¬ Difficultés dans les *Z63*
- Sexuels ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: infections principalement transmises lors des *Z11*
- Sommeil ¬ Troubles de l'alimentation en *F51.3*
- Système nerveux et les organes des sens ¬ Mise en place et ajustement d'autres appareils en *Z46.2*

Rare
v./v.a. Type de maladie

Raréfaction système pileux
- Non cicatricielle, sans précision ¬ *L65.9*
- ¬ Autres formes non cicatricielles précisées de *L65.8*

RASA1 ¬ Malformation capillaire-malformation artérioveineuse associées à *Q27.3*

RASGRP1 ¬ Maladie lymphoprolifératives associée à l'EBV [virus Epstein-Barr] par déficit en *D82.3*

Rash
- Éruptions cutanées non spécifiques ¬ *R21*
- Fessier psoriasiforme ¬ *L22*

Rasmussen ¬
- Anévrisme de *A16.2*
- Encéphalite de *G04.8*

Rasmussen-Johnsen-Thomsen ¬ Syndrome de *Q87.8*

Rat
- Spirochaeta morsus muris ¬ Fièvre causée par morsure de *A25.0*
- ¬
- - Fièvre
- - - Due aux morsures de *A25.9*
- - - Spirillum minus causée par morsure de *A25.0*
- - - Streptobacillaire causée par morsure de *A25.1*
- - - Streptobacilles causée par morsure de *A25.1*
- - Infection par cestodes du *B71.0*
- - Typhus à *A75.2*

Ratajczak
v./v.a. Czarny-Ratajczak

Rate
- Accessoire ¬ *Q89.08*
- Amibes ¬ Abcès de la *A06.8†, D77**
- Atteinte du parenchyme ¬ Déchirure de la *S36.03*
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ Rupture de la *P15.1*
- Non traumatique ¬ Rupture de la *D73.5*
- Sagou ¬ *E85.4†, D77**
- SAI ¬
- - Fibrose de la *D73.8*
- - Lésion de la *S36.00*

Rate *–suite*
- Sans
- - Atteinte plus importante du parenchyme ¬ Déchirure de la capsule de la *S36.02*
- - Précision ¬ Maladie de la *D73.9*
- Surnuméraire ¬ *Q89.08*
- ¬
- - *D13.9*
- - Abcès de la *D73.3*
- - Aberration de la *Q89.08*
- - Absence de *Q89.01*
- - Agénésie de la *Q89.01*
- - Angiosarcome de la *C26.1*
- - Anomalie
- - - *Q89.08*
- - - Congénitale de la position de la *Q89.08*
- - Atrophie de la *D73.0*
- - Calcification d'artère de la *I70.8*
- - Déformation congénitale de la *Q89.08*
- - Fibrosarcome de la *C26.1*
- - Hypoplasie de la *Q89.08*
- - Infarctus de la *D73.5*
- - Infection purulente aiguë de la *D73.8*
- - Inflammation
- - - Purulente aiguë de la *D73.8*
- - - Syphilitique de la *A52.7†, D77**
- - Kyste
- - - *D73.4*
- - - Hydatique de la *B67.9†, D77**
- - Lésion de la *S36.08*
- - Maladie amyloïde de la *E85.4†, D77**
- - Maladies de la *D73.8*
- - Malformation artério-veineuse de la *Q27.3*
- - Malformation congénitale
- - - *Q89.08*
- - - *Q89.08*
- - Paludisme à Plasmodium vivax avec rupture de la *B51.0†, D77**
- - Rupture massive du parenchyme de la *S36.04*
- - Syphilis de la *A52.7†, D77**
- - Thrombose artérielle de la *I74.8*
- - Torsion de la *D73.5*
- - Traumatisme obstétrical de la *P15.1*
- - Tuberculose de la *A18.8†, D77**
- - Tumeur de la *D37.78*
- - Tumeur maligne: *C26.1*

Rathbun] ¬ Hypophosphatémie familiale [hypophosphatasie] [syndrome de *E83.38*

Rathke ¬ Déficit hypophysaire associé à un kyste de la poche de *E23.6*

Rauch-Steindl ¬ Syndrome de *Q87.0*

Raucité de la voix-surdité ¬ Syndrome de neuropathie périphérique-myopathie- *G60.0*

Rautenstrauch
v./v.a. Wiedemann-Rautenstrauch

Rauwolfia ¬ *T46.5*

Ravine ¬ Syndrome *G31.88*

Rawnsley
v./v.a. Morse-Rawnsley-Sargent

Raynaud
- Troubles moteurs œsophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de *M34.1*
- ¬
- - Gangrène de *I73.0*
- - Maladie de *I73.0*
- - Phénomène (secondaire) de *I73.0*
- - Syndrome de *I73.0*

Rayonnement
- DPAH] ¬ Hypertension artérielle pulmonaire induite par des médicaments, des drogues, des toxines et des *I27.02*
- Non ionisants
- - Sans précision ¬ Modification de la peau due à une exposition chronique aux *L57.9*
- - ¬ Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux *L57.8*
- Sans précision ¬ Effets de *T66*
- Thermique ¬ Cataracte due au *H26.88*
- ¬
- - *Z57*
- - *Z58*
- - Hypertension artérielle pulmonaire induite des *I27.02*
- - Mucite (orale) (oropharyngée) induite par des *K12.3*

Rayons
- Ultraviolets
- - Sans précision ¬ Modification aiguë de la peau due aux *L56.9*
- - ¬ Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux *L56.8*
- X ¬
- - Brûlure par les *T30.0*
- - Exposition à : irradiation aux *W91.9!*
- - Syndrome myélodysplasique dû à irradiation aux *D46.9*
- ¬
- - Cataracte due à des *H26.88*
- - Maladie des *T66*

RB-ILD] ¬ Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease [*J68.4*

RCC [Carcinome rénal] ¬ *C64*

RCPA [Pure red cell aplasia] ¬ *D60.9*

RDS [Respiratory distress syndrome] du nourrisson ¬ *P22.0*

Réaction
- Aiguë
- - Crise ¬ *F43.0*
- - Facteur de stress ¬ *F43.0*
- - Stress ¬ *F43.0*
- - Substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.6*
- Allergique

Réaction *–suite*
- Allergique *–suite*
- - Contact d'un composé du platine ¬ *T78.4*
- - Due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.7*
- - SAI ¬ *T78.4*
- - Traitement avec un composé du platine ¬ *T88.7*
- Anaphylactique
- - Myorelaxants ¬ *T88.6*
- - SAI ¬ *T78.2*
- Anormale
- - Patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de *Y84.9!*
- - Test à la tuberculine ¬ *R76.1*
- Anxieuse ¬ *F41.1*
- Ciment osseux ¬ *T84.8*
- Conversion ¬
- - *F44*
- - Contracture musculaire psychogène en tant que *F44.4*
- Dépôts d'iode ¬ Inflammation des glandes salivaires au cours d'une *K11.2*
- Dépressive
- - Courte durée au cours d'un trouble de l'adaptation ¬ *F43.2*
- - F32.0, F32.1, F32.2) ¬ épisodes isolés de: *F32*
- - Prolongée au cours d'un trouble de l'adaptation ¬ *F43.2*
- - ¬ épisodes récurrents de (F33.0 ou F33.1): *F33*
- Deuil ¬ *F43.2*
- Due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion ¬ *T80.4*
- Facteur stress sévère
- - Sans précision ¬ *F43.9*
- - ¬ Autres *F43.8*
- Greffon contre l'hôte ¬ *T86.09*
- Hémolytique à la transfusion ¬ Ictère dû à une *T80.8*
- Hyperkinétique de l'enfance ou de l'adolescence SAI ¬ *F90.9*
- Hypersensibilité
- - Classées ailleurs ¬ Arthropathie au cours de *M36.4**
- - Voies respiratoires supérieures, localisation non précisée ¬ *J39.3*
- - ¬ Arthrite au cours de *T78.4†, M36.4**
- Incompatibilité
- - ABO ¬ *T80.3*
- - Groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ *T80.3*
- - Rh ¬ *T80.4*
- Inflammatoire
- - Appareil de fixation interne [toute localisation] ¬ Infection et *T84.6*

Réaction *–suite*
- Inflammatoire *–suite*
- - Due
- - - Cathéter de dialyse péritonéale ¬ Infection et *T85.71*
- - - Prothèses, implants ou greffes internes ¬ Infection et *T85.78*
- - Prothèse
- - - Articulaire interne ¬ Infection et *T84.5*
- - - Implant
- - - - Greffe
- - - - - Appareil génital ¬ Infection et *T83.6*
- - - - - Appareil urinaire ¬ Infection et *T83.5*
- - - - - Cardiaques et vasculaires ¬ Infection et *T82.7*
- - - - - Internes dans le système hépatobiliaire et le pancréas ¬ Infection et *T85.75*
- - - - - Internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal ¬ Infection et *T85.76*
- - - - - Internes du système nerveux ¬ Infection et *T85.72*
- - - - - Orthopédiques internes ¬ Infection et *T84.7*
- - - - Mammaire ¬ Infection et *T85.73*
- - - Valvulaire cardiaque ¬ Infection et *T82.6*
- - Sonde
- - - Jéjunostomie endoscopique percutanée ¬ *T85.74*
- - - PEG ¬ *T85.74*
- - - PEJ ¬ *T85.74*
- - ¬ Cholestéatome avec *H71*
- Intolérance alimentaire, non classées ailleurs ¬ Autres *T78.1*
- Intoxication
- - Médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né ¬ *P93*
- - Opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ *P04.0*
- Leucémoïde type
- - Lymphocytaire ¬ *D72.8*
- - Monocytaire ¬ *D72.8*
- - Myélocytaire ¬ *D72.8*
- Lichénoïde médicamenteuse ¬ *L43.2*
- Maniaco-dépressive ¬ *F31*
- Médicament SAI ¬ *T88.7*
- Médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques ¬ *T88.7*
- Négative dans le liquide céphalorachidien ¬ Syphilis congénitale tardive latente, avec *A50.6*
- Organique aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ *F05*
- Palacos ¬ *T84.8*
- Paranoïaque ¬ *F23.3*
- Peur ¬ *F41.1*
- Phobique ¬ *F41.1*
- Photoallergique à un médicament ¬ *L56.1*
- Phototoxique à un médicament ¬ *L56.0*

Réaction *–suite*
- Schizophrénique
- - Latente ¬ *F21*
- - ¬ *F23.2*
- Secondaire à une rachicentèse ¬ Autre *G97.1*
- Sériques ¬ Autres *T80.6*
- Toxique
- - Anesthésie locale cours
- - - Puerpéralité ¬ *O89.3*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.4*
- - Cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse ¬ *O29.3*
- Transfusion SAI ¬ *T80.9*
- Wassermann faussement positive ¬ *R76.2*

Réactionnel
- Attachement de l'enfance ¬ Trouble *F94.1*
- Brève) SAI ¬ Psychose *F23.9*
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Arthrite *M03.6**
- Dysfonction des voies respiratoires ¬ Syndrome *J68.3*
- Familiale ¬ Collagénose perforante *L87.1*
- Sans précision ¬ Arthrite *M02.9*
- ¬
- - Arthrite
- - - *M02.8*
- - - Infectieuse [arthrite *M02.99*
- - Épisode
- - - Isolés
- - - - Dépression: *F32*
- - - - Psychose dépressive: *F32.3*
- - - Récurrents
- - - - F33.0 ou F33.1): dépression: *F33*
- - - - Sévères de: psychose dépressive: *F33.3*
- - Otite aiguë externe: *H60.5*
- - Psychose *F23.9*

Réactivation immune ¬ Syndrome de *D89.3*

Réactive
- Non
- - Induite par les médicaments ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- - Spécifique ¬ Hépatite *K75.2*
- ¬ Hépatite B *B18.14*

Réactivité ¬ Lenteur et manque de *R46.4*

Réadaptation ¬
- Antécédents de mesures de *Z92.8*
- Antécédents personnels de *Z92.88*

Réagissant à la pyridoxine NCA ¬ Anémie sidéroblastique: *D64.3*

Réanimation
- Sans succès ¬ Arrêt cardiaque, *I46.9*
- ¬
- - Myopathie de *G72.80*
- - Polyneuropathie de *G62.80*

Réanimé avec succès ¬ Arrêt cardiaque *I46.0*

Reardon ¬
- Dysplasie mésomélique type *Q78.8*
- Dysplasie spondylo-épiphysaire type *Q77.7*

Reardon-Baraitser ¬ Syndrome de *Q87.8*

Réarrangement
- Autosomique équilibré chez un sujet anormal ¬ *Q95.2*
- Complexes ¬
- - Délétions avec autres *Q93.7*
- - Duplications avec autres *Q92.5*
- Équilibré marqueur structurel
- - Sans précision ¬ *Q95.9*
- - ¬ Autres *Q95.8*
- FGFR1 ¬
- - Tumeur lymphoïde associée à un *C91.70*
- - Tumeur myéloïde associée à un *C92.70*
- JAK2
- - Associé forme
- - - Aiguë ¬ Tumeur mixte myéloïde/lymphatique avec *C95.00*
- - - Chronique ¬ Tumeur mixte myéloïde/lymphatique avec *C95.10*
- - Forme
- - - Aiguë ¬
- - - - Tumeur lymphoïde associée à un *C91.00*
- - - - Tumeur myéloïde associée à un *C92.00*
- - - Chronique ¬
- - - - Tumeur lymphoïde associée à un *C91.10*
- - - - Tumeur myéloïde associée à un *C92.10*
- - ¬ Tumeur myéloïde associée à un *C92.70*
- JAK2c ¬ Tumeur lymphoïde associée à un *C91.70*
- MYC
- - BCL2
- - - BCL6 ¬ Lymphome B d 'évolution agressive avec un *C83.8*
- - - ¬ Lymphome B d 'évolution agressive avec un *C83.8*
- - BCL6 ¬ Lymphome B d 'évolution agressive avec un *C83.8*
- PDGFRA ¬
- - Tumeur lymphoïde associée à un *C91.70*
- - Tumeur myéloïde associée à un *C92.70*
- PDGFRB ¬
- - Tumeur lymphoïde associée à un *C91.70*
- - Tumeur myéloïde associée à un *C92.70*
- Sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal ¬ *Q95.3*

Rebord pupillaire ¬ Dégénérescence de: *H21.2*

Récepteur
- 1
- - Facteur de nécrose tumorale] ¬ Syndrome TRAPS [Syndrome périodique associé au *E85.0*
- - Interféron gamma ¬ MSMD autosomique
- - - Dominante par déficit partiel en *D84.8*

Récepteur *–suite*
- 1 *–suite*
- - Interféron gamma ¬ MSMD autosomique *–suite*
- - - Récessive par déficit partiel en *D84.8*
- - TNF ¬ Syndrome périodique associé au *E85.0*
- 2 de l'interféron gamma ¬ MSMD autosomique dominante par déficit partiel en *D84.8*
- Alpha et bêta-adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi bien les *T44.9*
- Bêta 1 de l'interleukine 12 ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en *D84.8*
- Cellules T] alpha ¬ Déficit en cellules TCR [*D81.8*
- Collagène ¬ Troubles hémorragiques par déficit en *D69.1*
- Histaminiques H2 ¬ Intoxication: Inhibiteurs des *T47.0*
- Hormonal
- - Périphériques ¬ Anomalies des *E34.5*
- - Positifs ¬ Carcinome mammaire invasif à *C50.9*
- Hormone thyroïdien
- - Alpha ¬ Résistance aux hormones thyroïdiennes par mutations du *E03.8*
- - Bêta ¬ Résistance aux hormones thyroïdiennes par mutation du *E05.8*
- Insuline ¬ Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en *E16.1*
- Interleukine-1] ¬ DIRA [Déficit de l'antagoniste du *M86.39*
- Leptine
- - Enfant adolescent 3 18 ¬ Obésité
- - - Extrême par mutations du gène *E66.85*
- - - Mutations du gène *E66.84*
- - Indice de masse corporelle IMC
- - - 60 et plus chez l'adulte ¬ Obésité par mutations du gène *E66.88*
- - - Compris
- - - - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ Obésité par mutations du gène *E66.80*
- - - - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ Obésité par mutations du gène *E66.86*
- - - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ Obésité par mutations du gène *E66.87*
- - ¬ Obésité par déficit en *E66.89*
- Letpine avec indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ Obésité par mutations du gène *E66.81*
- Mélanocortine 4
- - Enfant adolescent 3 18 ¬ Obésité
- - - Déficit du *E66.84*
- - - Extrême par déficit du *E66.85*
- - Indice de masse corporelle IMC
- - - 60 et plus chez l'adulte ¬ Obésité par déficit du *E66.88*
- - - Compris

Récepteur *–suite*
- Mélanocortine 4 *–suite*
- - Indice de masse corporelle IMC *–suite*
- - - Compris *–suite*
- - - - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit du *E66.80*
- - - - 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit du *E66.81*
- - - - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit du *E66.86*
- - - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit du *E66.87*
- - ¬ Obésité par déficit du *E66.89*
- Membrane cellulaire [CR3] ¬ Déficit en complexe *D71*
- Œstrogènes ¬ Syndrome de résistance aux *E34.8*
- P2Y12 ¬ Troubles hémorragiques par anomalie du *D69.1*
- Plaquettaire P2Y12 de l'ADP [adénosine diphosphate] ¬ Trouble de la coagulation dû à une anomalie du *D69.1*
- Prolactine ¬ Déficit familial isolé en *E22.1*
- Secrétagogues de l'hormone de croissance ¬ Petite taille par déficit en *E34.3*
- Transcobalamine ¬ Acidurie méthylmalonique par déficit en *E71.1*
- TRH ¬ Hypothyroïdie centrale due à un déficit du *E03.1*
- TSH ¬
- - Hyperthyroïdie familiale par mutation du *E05.8*
- - Hypothyroïdie par mutation du *E03.1*
- Vitamine D [Type II] ¬ Anomalie des *E83.31*

Réceptif
- Auditif congénital ¬ Trouble *F80.2*
- Langage ¬ Autres troubles *F80.28*
- ¬ Dysphasie ou aphasie de développement, de type *F80.2*

Receptor] ¬ Déficit immunitaire combiné autosomique récessif par déficit en IL6R [Interleukin 6 *D81.8*

Récessif
v./v.a. Type de maladie

Récession de l'angle iridocornéen ¬ *H21.5*

Récessus
- Pharyngien ¬ *C11.2*
- Piriforme ¬ *C12*

Recherche
- Acceptation intervention
- - Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ *Z64.8*
- - Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ *Z64.8*
- Alcool ou de drogue dans le sang ¬ *Z04.8*
- Clinique ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de *Z00.6*
- Hypersensibilité ¬ Tests (de): cutanés à la *Z01.5*

Recherche *–suite*
- Maladie bactérienne ¬ Tests (de): cutanés à la *Z01.5*
- Soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ *N88.3*
- Tests en vue d'une procréation ¬ *Z31.4*
- VIH chez les nourrissons ¬ Résultat non concluant du test de *R75*

Rechutes ¬ Pancréatite chronique à *K86.18*

Récidivant
v./v.a. Type de maladie

Récidive
- Rétinite à CMV [cytomégalovirus] ¬ Maladie due au VIH avec *B20†, H32.0*, B25.88*
- Rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral ¬ *N99.10*
- Tardive de la fièvre typhoïde ¬ *A75.1*

Réciproques robertsoniennes et équilibrées ¬ translocations et insertions *Q95*

Recklinghausen
v./v.a. von Recklinghausen

Reconstitution immune ¬ Syndrome de *D89.3*

Recours services santé
- Actes médicaux spécifiques, non effectués ¬ Sujets ayant *Z53*
- Circonstances
- - Non précisées ¬ Sujet ayant *Z76.9*
- - Précisées ¬ Sujet ayant *Z76.8*

Recousus ¬
- Complication de membres *T87.2*
- Infection de membres *T87.2*
- Rejet de membres *T87.2*

Recrutement auditif ¬ *H93.2*

Rectal
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse *O70.3*
- Néonatale ¬ Hémorragie *P54.2*
- Sans fistule ¬
- - Abcès des régions anale et *K61*
- - Phlegmon des régions anale et *K61*
- Tuberculeuse ¬ Fistule *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Abcès *K61.1*
- - Ampoule *C20*
- - Dysfonctionnement du sphincter *K59.9*
- - Fistule
- - - *K60.4*
- - - Urétro- *N36.0*
- - - Vésico- *N32.1*
- - Hémorragie du sphincter *K62.51*
- - Marisques *K64.4*
- - Polype *K62.1*
- - Prolapsus
- - - *K62.3*
- - - Muqueuse *K62.3*

Rectal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Rétrécissement syphilitique du sphincter *A52.7†, K93.8**
- - Ténesme *R19.88*
- - Varices *I86.82*

Rectite
- Due à une irradiation ¬ *K62.7*
- SAI ¬ *K62.8*
- Ulcéreuse (chronique) ¬ *K51.2*

Rectobulbaire ¬
- Atrésie congénitale de l'anus avec fistule *Q42.2*
- Malformation anorectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec fistule *Q42.2*

Rectocèle ¬
- *N81.6*
- Soins maternels pour: *O34.8*

Recto-colite
- Hémorragique
- - Colite ulcéreuse] ¬ *K51*
- - Psychogène ¬ *F54, K51.9*
- - Sans précision ¬ *K51.9*
- - ¬
- - - Arthrite au cours de *K51.9†, M07.59**
- - - Arthrite juvénile au cours de *K51.9†, M09.29**
- Hémorragiques ¬ Autres *K51.8*

Recto-cutané
- Atrésie du rectum ¬ Fistule *Q42.0*
- ¬ Fistule *K60.4*

Rectoprostatique ¬ Atrésie congénitale de l'anus avec fistule *Q42.2*

Recto-sigmoïde ¬
- Colite indéterminée du côlon *K52.32*
- Côlon *C19*

Recto-sigmoïdien ¬
- Carcinoma in situ: Jonction *D01.1*
- GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] de la jonction *C19*
- Jonction
- - *D37.5*
- - *T18.5*
- Tumeur bénigne: Jonction *D12.7*

Recto-sigmoïdite ulcéreuse (chronique) ¬ *K51.3*

Recto-urétral
v./v.a. Fistule recto-urétrale

Recto-vaginal
- Congénitale ¬ Fistule
- - *Q52.2*
- - *Q52.2*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: cloison *O70.2*
- Tuberculeuse ¬ Fistule *A18.1†, N74.1**
- ¬
- - Endométriose du septum *N80.4*

Recto-vaginal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fistule *N82.3*
- - Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: cloison *C76.3*
- - Septum *S31.80*

Rectovaginale ¬ Malformation anorectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec fistule *Q42.2*

Recto-vésical ¬
- Abcès *N30.88*
- Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: cloison *C76.3*

Recto-vésicale
- Congénitale ¬ Fistule *Q64.7*
- ¬
- - Atrésie congénitale de l'anus avec fistule *Q42.2*
- - Malformation anorectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec fistule *Q42.2*

Rectum
- Abcès ¬ Tuberculose du *A18.3†, K93.0**
- Anus
- - Canal anal ¬ Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du *C21.8*
- - ¬ Fistule congénitale du *Q43.6*
- Fistule ¬
- - Absence
- - - *Q42.0*
- - - Atrésie et sténose congénitales du *Q42.0*
- - Tuberculose du *A18.3†, K93.0**
- Infection à Chlamydia ¬ Rétrécissement du *A55†, K93.8**
- Lymphogranulome vénérien ¬ Rétrécissement du *A55†, K93.8**
- Remplacement ¬ Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme *N82.80*
- Sans précision ¬ Maladie de l'anus et du *K62.9*
- Sigmoïde
- - Côlon descendant
- - - Côlon transverse ¬ Aganglionose du *Q43.1*
- - - ¬ Aganglionose du *Q43.1*
- - ¬ Aganglionose du *Q43.1*
- Virus de l'herpès ¬ Infection de la marge cutanée de l'anus et du *A60.1*
- ¬
- - Absence congénitale du *Q42.1*
- - Aganglionose du *Q43.1*
- - Atrésie du *Q42.1*
- - Carcinoma in situ: *D01.2*
- - Carcinome épidermoïde du *C20*
- - Corps étranger dans l'anus et le *T18.5*
- - Duplication du *Q43.42*
- - Fistule recto-cutanée avec atrésie du *Q42.0*
- - GIST [Tumeur stromale gastro-intestinale] du *C20*

Rectum *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hémorragie du *K62.51*
- - Herpès du *A60.1†, K93.8**
- - Imperforation du *Q42.1*
- - Infection
- - - Chlamydia de l'anus et du *A56.3*
- - - Gonococcique du *A54.6*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: le *K91.83*
- - Invagination de: *K56.1*
- - Lésion traumatique du *S36.6*
- - Maladie de Crohn [entérite régionale] du: *K50.1*
- - Maladies
- - - Anus et du *K62*
- - - Précisées de l'anus et du *K62.8*
- - Rétrécissement
- - - Syphilitique du *A52.7†, K93.8**
- - - Tuberculeux du *A18.3†, K93.0**
- - Sténose
- - - Anus et du *K62.4*
- - - Congénitale du *Q42.1*
- - Syndrome de l'ulcère solitaire du *K62.6*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, K93.8**
- - Tuberculose du *A18.3†, K93.0**
- - Tumeur bénigne: *D12.8*
- - Tumeur maligne
- - - *C20*
- - - Secondaire du gros intestin et du *C78.5*
- - Tumeur neuroendocrine
- - - Bénigne du *D12.8*
- - - Incertain du *D37.5*
- - - Maligne du *C20*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.5*
- - Ulcère
- - - Anus et du *K62.6*
- - - Solitaire du *K62.6*

Rectus abdominis ¬ Syndrome *G58.0*

Récurrent
v./v.a. Type de maladie

Recurvatum congénital ¬ Genu *Q68.2*

Réductase
v./v.a. NADH-méthémoglobine-réductase
- 1 ¬ Déficit en acyl-CoA *E71.3*
- GGS-R] ¬ Anémie par déficit en glutathion *D55.1*
- ¬
- - Anémie hémolytique due à un déficit en glutathion *D55.1*
- - Anémie mégaloblastique due à un déficit en dihydrofolate *D52.8*
- - Anémie par déficit en glutathion *D55.1*
- - Cardiomyopathie hypertrophique infantile létal déficit
- - - NADH-coenzyme Q *I42.2*
- - - NADH-CoQ *I42.2*

Réductase *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Déficit
- - - 7-déhydrocholestérol *Q87.1*
- - - 17-cétostéroïde *E29.1*
- - - Dihydroptéridine *E70.1*
- - - Isolé
- - - - NADH-coenzyme Q *G31.81*
- - - - NADH-ubiquinone *G31.81*
- - - - Succinate-CoQ *G31.81*
- - - Lysine alpha-cétoglutarate *E72.3*
- - Dystonie dopa-sensible par déficit en sépiaptérine *G24.1*
- - Homocystinurie due à un déficit en méthylène tétrahydrofolate *E72.1*
- - Hyperandrogénie due à un déficit en cortisone *E25.08*

Réducteurs ¬ Myopathie à corps *G71.2*

Réductible
- Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément *K64.2*
- Sans gangrène ¬ Hernie ventrale non *K43.69*
- ¬
- - Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément *K64.1*
- - Hernie de la ligne médiane non *K43.68*
- - Hernie de Spieghel non *K43.68*
- - Hernie épigastrique non *K43.60*
- - Hernie hypogastrique non *K43.68*
- - Hernie sous-xiphoïdienne non *K43.68*
- - Hernie ventrale non *K43.69*

Réduction
- Facteurs de coagulation ¬ *D68.9*
- Luxation congénitale de la hanche ¬ Ostéochondrite juvénile après *M91.8*
- Phalangienne ¬ Syndactylie mésoaxiale synostosique avec *Q70.4*
- Stomatine ¬ Cryohydrocytose héréditaire avec *D58.8*

Rééducation
- Cardiaques ¬ *Z50.0!*
- Drogués et après abus de médicaments ¬ *Z50.3!*
- Professionnelle, non classées ailleurs ¬ Ergothérapie et *Z50.7!*
- SAI ¬ *Z50.9!*
- Sans précision ¬ Soin impliquant une *Z50.9!*
- Tabagisme ¬ *Z50.8!*
- Voix, de la parole et du langage] ¬ Traitement logopédique [*Z50.5!*
- ¬ Soins impliquant d'autres moyens de *Z50.8!*

Réentrée
- Nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par *I47.1*
- ¬
- - Arythmie ventriculaire de *I47.0*

Réentrée *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tachycardie de la jonction AV par *I47.1*

Reese
v./v.a. Cogan-Reese

Réfection ¬ *Z43*

Réflexe
- Alimentation ¬ Épilepsie *G40.8*
- Anormaux ¬ *R29.2*
- Eau chaude ¬ Épilepsie *G40.8*
- Glabellaire anormal ¬ *R29.2*
- Lecture ¬ Crises *G40.8*
- Non classée ailleurs ¬ Vessie neurogène *N31.1*
- Origine rachidienne ¬ Vessie *G95.80*
- Pharyngé entravé ¬ *J39.2*
- Tendineux ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: persistance des *G11.1*
- ¬ Incontinence *N39.40*

Reflux
- Aortique rhumatismal(e) ¬ *I06.1*
- Biliaire ¬ *K29.6*
- Congénital au niveau de la valve pulmonaire ¬ *Q22.2*
- Gastro-œsophagien
- - Associé à STAG1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie faciale- *Q87.0*
- - Œsophagite ¬ *K21.0*
- - Sans œsophagite ¬ *K21.9*
- Hémorragie de l'œsophage ¬ Œsophagite par *K21.0, K22.81*
- Mitral(e) rhumatismal(e) ¬ *I05.1*
- Œsophage de Barrett ¬ Œsophagite par *K21.0, K22.7*
- Œsophagien
- - Nouveau-né ¬ *P78.8*
- - SAI ¬ *K21.9*
- Sans précision ¬ Uropathie obstructive et par *N13.9*
- Sténose de l'œsophage ¬ Œsophagite par *K21.0, K22.2*
- Ulcère de l'œsophage ¬ Œsophagite par *K21.0, K22.1*
- Vésico
- - Urétéral
- - - Cicatrice ¬ *N13.7*
- - - SAI ¬ *N13.7*
- - - ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à un *N11.0*
- - Urétéro-rénal congénital ¬ *Q62.7*
- ¬
- - Iléite de *K51.0*
- - Œsophagite par *K21.0*
- - Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un *N11.0*
- - Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance ou *I06.2*
- - Uropathies obstructives et par *N13.8*

Réfractaire
v./v.a. Anémie réfractaire
- Apparition tardive ¬ État de mal épileptique *G41.8*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypomagnésémie primaire-épilepsie *E83.4*
- Microcéphalie progressive ¬ Syndrome d'atrophie cérébrale et cérébelleuse diffuse-épilepsie *Q02*
- Traitement
- - Fer ¬ Anémie par déficit en fer *D50.8*
- - Induction
- - - Standard ¬ Leucémie, *C95.8!*
- - - ¬ Leucémie myéloïde aiguë *C92.00*
- Transfusion ¬
- - Thrombocytopénie non précisée
- - - Non qualifiée de *D69.61*
- - - Qualifiée de *D69.60*
- - Thrombopénie
- - - Primaires
- - - - Non qualifiées de *D69.41*
- - - - Qualifiées de *D69.40*
- - - Secondaires
- - - - Non qualifiées de *D69.58*
- - - - Qualifiées de *D69.57*
- ¬ Sprue *K90.0*

Réfraction
- Sans précision ¬ Vice de *H52.7*
- ¬
- - Syndrome de dysplasie pilo-dentaire avec défaut de *Q82.8, H52.7*
- - Vices de *H52.6*

Refsum ¬ Maladie de *G60.1*

Refus de manger en tant qu'anomalie du comportement ¬ *F50.8*

Regard
- Ataxie ¬ Déviation tonique paroxystique du *G96.8, H51.8*
- ¬ Paralysie de la conjugaison du *H51.0*

Régénérative du foie ¬ Hyperplasie nodulaire *K76.8*

Régime
- Alimentaire ¬
- - Érosion des dents: due à: *K03.2*
- - Peau flasque ou affaissée: après une perte de poids (chirurgie bariatrique) (*L98.7*
- Habitudes alimentaires inadéquats ¬ *Z72.8*
- ¬ Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un *Z91.1*

Région
- 11p15 ¬ Syndrome
- - Beckwith-Wiedemann dû à un défaut d'empreinte de la *Q87.3*
- - Silver-Russell dû à un défaut d'empreinte de la *Q87.1*
- Anale rectal sans fistule ¬
- - Abcès des *K61*
- - Phlegmon des *K61*

Région *–suite*
- Buccal
- - Non
- - - Classés ailleurs ¬ Autres kystes de la *K09.8*
- - - Liés au développement dentaire ¬ Kystes de la *K09.1*
- - Sans précision ¬ Kyste de la *K09.9*
- Cervicale ¬ Ostéomyélite vertébrale dans la *M46.22*
- Cheville, pied et orteils ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.07*
- Dorsale ¬ Radiculopathie dans la *M54.14*
- Fessière ¬
- - *L02.3*
- - *T21*
- - Tendinite de la *M76.0*
- Iliaque ¬ *S31.1*
- Inguinale ¬ *S31.1*
- Interscapulaire ¬
- - *T21*
- - Mélanome malin de la *C43.59*
- Lombaire ¬ Mélanome malin de la *C43.59*
- Mâchoire ¬ Plaie ouverte dans la *S01.80*
- Maxillaire
- - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: *S01.43*
- - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: *S01.42*
- Omoplate ¬ *S41.80*
- Orbitaire ¬ *S00.2*
- Pinéal ¬
- - Carcinome embryonnaire de la *C75.3*
- - Germinome de la *C75.3*
- - Tumeur
- - - Papillaire de la *D44.5*
- - - Sac vitellin de la *C75.3*
- - Tumeur mixte des cellules germinales de la *C75.3*
- Pubienne ¬ *S31.1*
- Rétro-cricoïdienne ¬ Tumeur maligne: *C13.0*
- Rétromolaire ¬
- - Carcinome basocellulaire de la *C06.2*
- - Carcinome épidermoïde de la *C06.2*
- - Tumeur maligne: *C06.2*
- Rhinopharyngé
- - Postérieure ¬ Carcinome de la *C11.1*
- - ¬ Gomme de la *A52.7†; J99.8**
- Sacrale ¬ Ostéomyélite vertébrale dans la *M46.28*
- Sacré ¬
- - *S31.0*
- - Sténose du canal rachidien dans la *M48.08*
- Sacro-coccygienne ¬ Ostéomyélite vertébrale dans la *M46.28*
- Sus-claviculaire ¬ *S11.80*

Région *–suite*
- Temporale ¬ *T20*
- Temporo maxillaire
- - Joue ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.41*
- - Parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.49*
- - Région maxillaire
- - - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.43*
- - - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.42*
- Temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la joue et de la *S01.49*
- Thyroïdienne ¬ Entorse et foulure de la *S13.5*
- ¬ Abcès (embolique) (du): cerveau [toute *G06.0*

Région costale ¬
- *S20.8*
- Décollement sous-cutané de la *S20.86*
- Fistule de la *J86.02*

Région de l'épaule
- Bras et coude ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.01*
- ¬
- - Dysplasie fibreuse monostotique, *M85.01*
- - Fibromatose pseudo-sarcomateuse, *M72.41*
- - Hyperostose corticale infantile de la *M89.81*
- - Maladie de Still de l'adulte, *M06.11*
- - Myofasciite à macrophages, *M60.81*
- - Myosite
- - - Bactérienne, *M60.01*
- - - Fongique, *M60.01*
- - - Virale, *M60.01*
- - Nécrose avasculaire traumatique, *M87.21*
- - Ostéolyse
- - - Expansive familiale de la *M89.51*
- - - Massive de Gorham de la *M89.51*
- - Ostéonécrose médicamenteuse, *M87.11*
- - Psoriasis avec arthrite juvénile de la *L40.5†; M09.01**
- - Pyomyosite, *M60.01*
- - Syndrome
- - - Felty, *M05.01*
- - - SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec ostéite de la *M86.31*

Région génitale
- Vessie, prostate, annexe, utérus ¬ *I97.87*
- ¬ Tête cou paroi thoracique
- - *I89.03*
- - *I89.04*
- - *I89.05*

Région génitale *–suite*
- ¬ Tête cou paroi thoracique *–suite*
- - *Q82.03*
- - *Q82.04*
- - *Q82.05*

Région lombo-sacrée
- Bassin
- - Associée à une lésion intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la *S31.83!*
- - SAI ¬ Plaie ouverte de l'abdomen, de la *S31*
- - ¬
- - - Lésion traumatique Vaisseau sanguin
- - - - Épiduraux au niveau de l'abdomen, de la *S35.80*
- - - - Sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la *S35.82*
- - - - Sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la *S35.81*
- - - Lésions précisées de l'abdomen, de la *S39.88*
- Membre(s), ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Fractures du thorax, de la *T02.7*
- Membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la *T04.7*
- Sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Malformation congénitale (charnière) de la *Q76.4*
- Thorax bassin ¬
- - Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la *T04.1*
- - Luxations, entorses et foulures du thorax et de la *T03.1*
- - ¬
- - Fractures multiples
- - - Fermées
- - - - Membre, du thorax et de la *T02.70*
- - - - Thorax et de la *T02.10*
- - - Ouvertes
- - - - Membre, du thorax et de la *T02.71*
- - - - Thorax et de la *T02.11*
- - Maladie de la *M53.97*

Région malléolaire
- Pied
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure
- - - - *T25.20*
- - - - Hanche et de la jambe, sauf *T24.20*
- - - Corrosion
- - - - *T25.60*
- - - - Hanche et de la jambe, sauf *T24.60*
- - Degré
- - - 2a ¬
- - - - Brûlure
- - - - - *T25.20*
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf *T24.20*

Région malléolaire *–suite*
- Pied *–suite*
- - Degré *–suite*
- - - 2a ¬ *–suite*
- - - - Corrosion de la *T25.60*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure
- - - - - *T25.21*
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf *T24.21*
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf *T24.61*
- - - - Corrosion
- - - - - *T25.61*
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf *T24.60*
- ¬ *L03.11*

Région pelvienne
- Cuisse ¬
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.14*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.05*
- ¬
- - Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- articulaire, *M08.45*
- - Arthrite juvénile idiopathique
- - - *M08.95*
- - - Associée aux enthésopathies, *M08.85*
- - - Indéterminée, *M08.85*
- - CPPD familiale [Maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium dihydraté], *M11.15*
- - Fibromatose aponévrotique juvénile, *M72.85*
- - Laxité ligamentaire de la *M24.25*
- - Maladie de Still de l'adulte, *M06.15*
- - Myosite
- - - Bactérienne, *M60.05*
- - - Fongique, *M60.05*
- - - Virale, *M60.05*
- - Nécrose avasculaire
- - - Idiopathique, *M87.05*
- - - Traumatique, *M87.25*
- - Ostéïte condensante de la *M85.35*
- - Ostéolyse massive de Gorham de la *M89.55*
- - Ostéomyélite multifocale chronique récurrente, *M86.35*
- - Ostéonécrose médicamenteuse, *M87.15*
- - Psoriasis avec arthrite juvénile de la *L40.5†, M09.05**
- - Pyomyosite, *M60.05*
- - Syndrome
- - - Felty, *M05.05*
- - - SAPHO [Synovite-acné-pustulose-hyperostose-ostéite] avec ostéite de la *M86.35*
- - Synovite villonodulaire pigmentée, *M12.25*

Région périoculaire
- Sans atteinte des voies lacrymales ¬ Plaie ouverte de la paupière et de la *S01.1*

Région périoculaire *–suite*
- ¬
- - Affections dégénératives des paupières et de la *H02.7*
- - Brûlure de la paupière et de la *T26.0*
- - Contusion de la paupière et de la *S00.1*
- - Corrosion de la paupière et de la *T26.5*
- - Lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la *S00.2*
- - Plaie ouverte de la paupière et de la *S01.1*

Région scapulaire ¬
- *T22*
- Arthrite chronique juvénile
- - Début systémique, *M08.21*
- - Forme oligo(pauci)- articulaire, *M08.41*
- Arthrite juvénile idiopathique
- - *M08.91*
- - Associée aux enthésopathies, *M08.81*
- - Indéterminée, *M08.81*
- Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.10*
- Fibrodysplasie ossifiante progressive, *M61.11*
- Fibromatose aponévrotique juvénile, *M72.81*
- Hétéroplasie osseuse progressive, *M61.51*
- Nécrose avasculaire idiopathique, *M87.01*
- Ostéomyélite multifocale chronique récurrente, *M86.31*
- Syndrome oculo-urétro-synovial, *M02.31*
- Synovite villonodulaire pigmentée, *M12.21*

Règles
- Abondantes SAI ¬ *N92.0*
- Irrégulières SAI ¬ *N92.6*
- ¬
- - Fausses *P54.6*
- - Intervalles raccourcis et irréguliers entre les *N92.1*
- - Saignement régulier entre les *N92.3*

Regorgement ¬ Incontinence par *N39.41*

Régression
- Caudale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Cognitive sévère ¬ Épilepsie temporale mésiale infantile avec *G40.2*
- Complète
- - 1 24 heures ¬
- - - Accident ischémique cérébral transitoire avec *G45.92*
- - - Syndrome
- - - - Artère carotide interne avec *G45.12*
- - - - Artère vertébrale avec symptômes de l'artère basilaire avec *G45.02*
- - - - Bilatéral des artères précérébrales avec *G45.22*
- - - - Multiple des artères précérébrales avec *G45.22*
- - Heure ¬
- - - Accident ischémique cérébral transitoire avec *G45.93*

Régression *–suite*
- Complète *–suite*
- - Heure ¬ *–suite*
- - - Syndrome
- - - - Artère carotide interne avec *G45.13*
- - - - Artère vertébrale avec symptômes de l'artère basilaire avec *G45.03*
- - - - Bilatéral des artères précérébrales avec *G45.23*
- - - - Multiple des artères précérébrales avec *G45.23*
- Motrice et cognitive de l'enfance avec syndrome extrapyramidal ¬ Syndrome de *G31.88*
- Neurodéveloppementale-dystonie-épilepsie lié à IRF2BPL ¬ Syndrome de *G31.88*
- Testiculaire ¬ Syndrome de *Q55.0*
- Totale
- - 1 24 heures ¬
- - - Amaurose fugace avec *G45.32*
- - - Amnésie globale transitoire avec *G45.42*
- - Heure ¬
- - - Amaurose fugace avec *G45.33*
- - - Amnésie globale transitoire avec *G45.43*

Régressive ¬
- Dysplasie spondylo-métaphysaire *Q77.8*
- Mucinose cutanée spontanément *L98.5*

Régulateur de l'interféron ¬ Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit partiel en facteur 8 *D84.8*

Régulation
- Cataméniale ¬ *Z30.3*
- Sécrétion pancréatique interne, sans précision ¬ Anomalie de la *E16.9*
- Thermique nouveau-né
- - Sans précision ¬ Trouble de la *P81.9*
- - ¬ Autres troubles précisés de la *P81.8*

Régurgitation
- Mérycisme du nouveau-né ¬ *P92.1*
- Syphilitique
- - Aorte ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Valve pulmonaire ¬ *A52.0†, I39.3**
- Valvule
- - Aortique SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I35.1*
- - Mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf rhumatismale ¬ *I34.0*
- - Non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- - Pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I37.1*
- - Tricuspide, de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I36.1*
- ¬ Sténose mitrale avec insuffisance ou *I05.2*

Régurgités ¬
- Aspiration néonatale de lait et d'aliments *P24.3*
- Pneumonie par aspiration (de): aliments (*J69.0*

Régurgités ¬ *–suite*
- Suffocation par: aliments (*T17*

Rehder
v./v.a. Holzgreve-Wagner-Rehder

Réhydratation orale ¬ Sels de *T50.3*

Reich
v./v.a. Bonnemann-Meinecke-Reich

Reifenstein ¬ Syndrome de *E34.50*

Réimplantation
v./v.a. Complication d'une réimplantation

Rein
- Acquis) (multiple) (solitaire) ¬ Kyste du *N28.1*
- Anus-poumon ¬ Dysplasie thymus- *Q87.8*
- Bassinet ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.0*
- Bilatéral ¬ Absence congénitale de *Q60.1*
- Calcul de l'uretère ¬ Calcul du *N20.2*
- Cause inconnue
- - Bilatéral ¬ Petit *N27.1*
- - Sans précision ¬ Petit *N27.9*
- - Unilatéral ¬ Petit *N27.0*
- Congénital unique ¬ Kyste
- - *Q61.0*
- - *Q61.0*
- Cours
- - Cytomégalie ¬ Maladie des *B25.88†, N29.1**
- - Syndrome de prédisposition aux tumeurs rhabdoïdes ¬ Tumeur rhabdoïde du *C64*
- Développement) ¬ multikystique: *Q61.4*
- Diabète sucré type
- - 1 ¬ Dégénérescence graisseuse du *E10.20†, N29.8**
- - 2 ¬ Dégénérescence graisseuse du *E11.20†, N29.8**
- Ectopique ¬ *Q63.2*
- Éponge ¬ *Q61.5*
- Fer à cheval ¬ *Q63.1*
- Fibrokystique ¬ *Q61.8*
- Goldblatt ¬ *I70.1*
- Hyperplasique et géant ¬ *Q63.3*
- Infection ¬ Rétraction hydronéphrotique des *N13.65*
- Kystique-polydactylie ¬ Syndrome de goitre multinodulaire- *Q87.8*
- Multikystiques liés au développement ¬ *Q61.4*
- Polykystique
- - Autosomique dominant ¬ *Q61.2*
- - Sans précision ¬ *Q61.3*
- - Type
- - - Adulte ¬ Dégénérescence de *Q61.2*
- - - Infantile ¬ *Q61.1*
- Sans précision ¬
- - Maladie kystique du *Q61.9*
- - Malformation congénitale du *Q63.9*
- Scléreux
- - Sans précision ¬ *N26*

Rein *–suite*
- Scléreux *–suite*
- - Tuberculeux ¬ *A18.1†, N29.1**
- Surnuméraire ¬ *Q63.0*
- Triple ¬ *Q63.0*
- Tumeur de Wilms] ¬ Adénosarcome embryonnaire du *C64*
- Unique congénital ¬ *Q60.0*
- Uretère
- - Cours
- - - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du *N29.8**
- - - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Autres affections du *N29.1**
- - Sans précision ¬ Affection du *N28.9*
- - ¬ Autres affections précisées du *N28.88*
- Virus d'Epstein-Barr ¬ Maladie des *B27.0†, N29.1**
- Virus de l'herpès ¬ Maladie des *B00.8†, N29.1**
- Voies urinaires associé à PBX1 ¬ Syndrome d'anomalies congénitales du *Q64.9*
- ¬
- - Abcès tuberculeux du *A18.1†, N29.1**
- - Absence acquise de *Z90.5*
- - Absence congénitale de *Q60.2*
- - Absence unilatérale congénitale de *Q60.0*
- - Angiomyolipome du *D17.7*
- - Angiosarcome du *C64*
- - Artériosclérose du *I12*
- - Blessure ouverte du *S37.00, S31.83!*
- - Calcification tuberculeuse du *B90.1†, N29.1**
- - Calcul du *N20.0*
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] du *C64*
- - Contusion et hématome de *S37.01*
- - Coudure urétéral sans hydronéphrose avec infection du *N13.67*
- - Déchirure
- - - *S37.02*
- - - Capsule et du bassinet du *S37.02*
- - Défaut de remplissage de: *R93.4*
- - Dégénérescence graisseuse du *E14.20†, N29.8**
- - Dégénérescence ou maladie fibrokystique du *Q61.8*
- - Déplacement congénital du *Q63.2*
- - Détérioration fonctionnelle
- - - Aiguë d'une greffe de *T86.10*
- - - Chronique d'une greffe de *T86.11*
- - Donneur de *Z52.4*
- - Échec greffe
- - - *T86.19*
- - - Lors de status post greffe de *T86.19*
- - Fibrose rétripéritonéale idiopathique avec infection du *K66.2*
- - Gomme du *A52.7†, N29.0**

Rein *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Gonorrhée du *A54.2†, N29.1**
- - Hydronéphrose
- - - Infection du *N13.65*
- - - Obstruction
- - - - Calculeuse
- - - - - Infection du *N13.64*
- - - - - Rénale avec infection du *N13.62*
- - - - - Urétérale avec infection du *N13.63*
- - - - Pyélo-urétérale avec infection du *N13.60*
- - - Rétrécissement urétéral avec infection du *N13.61*
- - Hydro-uretère avec infection du *N13.66*
- - Ischémie et infarctus du *N28.0*
- - Kyste
- - - *N28.1*
- - - Médullaire du *Q61.5*
- - - Multiloculaire bénin du *D30.0*
- - Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du *S35.4*
- - Maladie glycogénique du foie et des *E74.0*
- - Maladies kystiques du *Q61.8*
- - Malformation artério-veineuse des *Q27.3*
- - Malformations congénitales précisées du *Q63.8*
- - Malrotation du *Q63.2*
- - Perte isolée de magnésium par les *E83.4*
- - Rejet
- - - Aigu d'une greffe de *T86.10*
- - - Chronique d'une greffe de *T86.11*
- - - Greffe de *T86.19*
- - Reprise retardée de la fonction de la greffe de *T86.12*
- - Rétraction tuberculeuse des *A18.1†, N29.1**
- - Rétrécissement urétéral sans hydronéphrose avec infection du *N13.67*
- - Rupture de *S37.03*
- - Sarcome à cellules claires du *C64*
- - Status post greffe de *Z94.0*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, N29.0**
- - TBC [Tuberculose] du *A18.1†, N29.1**
- - Tumeur bénigne: *D30.0*
- - Tumeur rhabdoïde du *C64*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D41.0*
- - Vaisseau accessoire d'un pôle du *Q27.8*

Réinfection par l 'hépatite B après transplantation hépatique ¬ *B18.14, Z94.4*

Reinhardt-Pfeiffer ¬ Dysplasie mésomélique de *Q78.8*

Réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] ¬ Vérification, *Z30.5*

Reis
v./v.a. Thies-Reis

Reis-Bücklers ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*

Rejet
- 29 jours et plus après la transplantation ¬ *T86.41*
- Aigu greffe
- - Cornée de l'œil ¬ *T86.83*
- - Rein ¬ *T86.10*
- Appareil digestif greffe-contre-hôte stade
- - 1 ¬ Maladie aiguë de *T86.01†, K93.21**
- - 2 ¬ Maladie aiguë de *T86.02†, K93.22**
- - 3 ¬ Maladie aiguë de *T86.02†, K93.23**
- - 4 ¬ Maladie aiguë de *T86.02†, K93.24**
- Autogreffe ¬ *T86.9*
- Chronique greffe
- - Cornée de l'œil ¬ *T86.83*
- - Rein ¬ *T86.11*
- Cutané greffe-contre-hôte stade
- - 1 ¬ Maladie aiguë de *T86.01†, L99.11**
- - 2 ¬ Maladie aiguë de *T86.01†, L99.12**
- - 3 ¬ Maladie aiguë de *T86.01†, L99.13**
- - 4 ¬ Maladie aiguë de *T86.02†, L99.14**
- Greffe
- - Cœur
- - - Poumon ¬ *T86.3*
- - - ¬ *T86.2*
- - Fascio-cutanée ¬ *T86.59*
- - Foie
- - - 29 jours et plus après la transplantation ¬ *T86.41*
- - - Non précisé ¬ Trouble fonctionnel, échec et *T86.49*
- - - Pendant les premiers 28 jours après la transplantation ¬ *T86.40*
- - - ¬ *T86.49*
- - Intestin ¬ *T86.88*
- - Mammaire
- - - Partie cutanée ¬ *T86.59*
- - - Sans partie cutanée ¬ *T86.84*
- - - ¬ *T86.84*
- - Moelle osseuse ¬ *T86.00*
- - Myocutanée ¬ *T86.59*
- - Osseuse ¬ *T86.88*
- - Pancréas ¬ *T86.82*
- - Peau ¬ *T86.59*
- - Poumon ¬ *T86.81*
- - Rein ¬ *T86.19*
- - ¬
- - - *T86.9*
- - - Pyélonéphrite au cours d'un *T86.9†, N16.5**
- Greffe-contre-hôte stade 1 ¬ Maladie aiguë du foie de *T86.01†, K77.11**
- Greffon après transplantation de cellules souches ¬ *T86.00*
- Mammoplastie
- - Augmentation
- - - Partie cutanée ¬ *T86.59*

Rejet *–suite*
- Mammoplastie *–suite*
- - Augmentation *–suite*
- - - Sans partie cutanée ¬ *T86.84*
- - Lambeau pectoro-mammaire avec partie cutanée ¬ *T86.59*
- - Partie cutané ¬
- - - *T86.59*
- - - *T86.84*
- - Plastie de glissement sans partie cutanée ¬ *T86.84*
- - ¬ *T86.84*
- Membres recousus ¬ *T87.2*
- Organe tissu greffé
- - Greffe de cornée de l'œil ¬ Échec et *T86.83*
- - Organes ou tissus greffés ¬ Échec et *T86.88*
- Sociaux ¬ Exclusion ou *Z60*

REL ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en c- *D81.8*

Relâchement diaphragmatique ¬ *J98.6*

Relatif ¬
- Polycythémie: *D75.1*
- Stérilité *N96*

Relation
- Accouchement ¬ Galactorrhée sans *N64.3*
- Affective pendant l'enfance ¬ Perte de *Z61*
- Conditions météorologiques) ¬ Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans *W94.9!*
- Familiales pendant l'enfance ¬ Changements dans le tissu des *Z61*
- Sensitifs ¬ Délire de *F22.0*

Relationnel
- SAI ¬ Trouble: *F68.8*
- ¬ Problème sexuel *F66.2*

RELB ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Releasing factor» de l'hormone de croissance [SRH] [GHRH] ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: « *E16.8*

Releveur de l'anus ¬ Syndrome du muscle *K59.4*

Remèdes populaires ¬ Abus de: préparations à base de plantes ou *F55*

Rémission
- Complète ¬
- - Arthropathie au cours de plasmocytome en *C90.01†, M36.1**
- - B-ALL [Leucémie aiguë lymphoblastique à précurseurs B] en *C91.01*
- - Cancer xanthosus [chlorome] en *C92.31*
- - Chlorome en *C92.31*
- - Érythrémie
- - - *C94.01*
- - - Aiguë en *C94.01*
- - - Chronique en *D45*
- - Érythroblastose chronique type Heilmeyer-Schöner, en *D45*

Rémission *–suite*
- Complète ¬ *–suite*
- - Érythroleucémie
- - - *C94.01*
- - - Aiguë en *C94.01*
- - Érythrose chronique en *D45*
- - Glomérulopathie au cours de macroglobulinémie de Waldenström en *C88.01†, N08.1**
- - HCL-V [variante de la leucémie à tricholeucocytes] en *C91.41*
- - Leucémie
- - - Agressive à cellules NK en *C94.71*
- - - Cellules T de l'adulte (associée au HTLV-1) en *C91.51*
- - - Granulocytique chronique en *C92.11*
- - - Lymphocytaire chronique en *C91.11*
- - - Lymphoplasmocytoïde en *C91.11*
- - - Mastocytes en *C94.31*
- - - Monoblastique aiguë en *C93.01*
- - - Myéloïde
- - - - Aiguë
- - - - - Cours de syndrome de prédisposition tumorale liée au gène DDX41 en *C92.01*
- - - - - Dysplasie multilinéaire en *C92.81*
- - - - - LAM] en *C92.01*
- - - - - M6 (a) (b) en *C94.01*
- - - - - M7 en *C94.21*
- - - - Chronique
- - - - - Atypique, BCR/ABL négative, en *C92.21*
- - - - - LMC] en *C92.11*
- - - - - LMC], BCR/ABL positive en *C92.11*
- - - - - LMC], chromosome Philadelphie (Ph1) positive en *C92.11*
- - - - - T(9;22) (q34;q11) en *C92.11*
- - - Myélomonocytaire
- - - - Aiguë en *C92.51*
- - - - Chronique LMMC
- - - - - *C93.11*
- - - - - Éosinophilie en *C93.11*
- - - - Juvénile [LMMJ] en *C93.31*
- - - Plasmocytaire en *C90.11*
- - - Plasmocytes en *C90.11*
- - - Prolymphocytaire
- - - - Cellules B en *C91.31*
- - - - Cellules T en *C91.61*
- - - Promyélocytaire aiguë en *C92.41*
- - - Tricholeucocytes classique en *C91.41*
- - Leucémie aiguë
- - - Basophiles en *C94.71*
- - - Lignée mixte en *C95.01*
- - - Lymphoblastique à précurseurs T en *C91.01*
- - - Mégacaryocytes en *C94.21*
- - Leucémie lymphoblastique aiguë
- - - *C91.01*

Rémission *–suite*
- Complète ¬ *–suite*
- - Leucémie lymphoblastique aiguë *–suite*
- - - ALL] en *C91.01*
- - Leucémie lymphoïde chronique
- - - *C91.11*
- - - LLC] à cellules B en *C91.11*
- - Leucémie monocytaire
- - - Aiguë en *C93.01*
- - - Naegeli en *C93.11*
- - Leucosarcome en *C85.9*
- - LLA-B à cellules matures de type Burkitt en *C91.81*
- - LLC [Leucémie lymphoïde chronique] en *C91.11*
- - LMA
- - - M3 en *C92.41*
- - - M4 en *C92.51*
- - - M5 en *C93.01*
- - - M5a en *C93.01*
- - - M5b en *C93.01*
- - - T(15;17) en *C92.41*
- - LMMC
- - - 1 en *C93.11*
- - - 2 en *C93.11*
- - Lymphome lymphoplasmocytaire avec production d'IgM en *C88.01*
- - Macroglobulinémie de Waldenström en *C88.01*
- - Maladie
- - - Chaîne lourdes
- - - - Alpha en *C88.31*
- - - - Gamma en *C88.21*
- - - Di-Guglielmo en *C94.01*
- - - Franklin en *C88.21*
- - - Glomérulaire au cours de plasmocytome en *C90.01†, N08.1**
- - - Heilmeyer-Schöner en *D45*
- - - Huppert en *C90.01*
- - - Immunoprolifératif intestin grêle
- - - - In *C88.31*
- - - - Type méditerranéen en *C88.31*
- - - Kahler en *C90.01*
- - - Kahler-Buzzolo en *C90.01*
- - - Lymphoprolifératives post-transplantation polymorphe en *C88.71*
- - - Myéloprolifératives non classifiable en *C94.61*
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de plasmocytome en *C90.01†, N16.1**
- - Myélomatose en *C90.01*
- - Myélome
- - - Multiple en *C90.01*
- - - Plasmocytes en *C90.01*
- - - Solitaire en *C90.31*
- - Myélose
- - - Chronique en *D47.1*
- - - Érythrémique aiguë en *C94.01*

Rémission *–suite*
- Complète ¬ *–suite*
- - Plasmacytome extramédullaire en *C90.21*
- - Plasmocytome médullaire en *C90.01*
- - PTLD Post-transplant lymphoproliferative disease polymorph
- - - *C88.71*
- - - Sans mention de *C88.70*
- - Réticulo-endothéliose leucémique en *C91.41*
- - Sarcome
- - - Granulocytaire en *C92.31*
- - - Myéloïde en *C92.31*
- Partielle ¬ Maladie lymphoproliférative post-transplantation polymorphe en *C88.70*
- ¬
- - Maladie lymphoproliférative post-transplantation polymorphe sans mention de *C88.70*
- - Trouble
- - - Affectif bipolaire, actuellement en *F31.7*
- - - Dépressif récurrent, actuellement en *F33.4*

Rémittente
- Évolution poussées
- - Exacerbation aiguë ¬ Sclérose en plaques de l'enfant *G35.11*
- - Mention d'exacerbation aiguë ou de progression ¬ Sclérose en plaques *G35.11*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression ¬ Sclérose en plaques *G35.10*
- - ¬ Sclérose en plaques
- - - *G35.1*
- - - Aiguë de Marburg *G35.10*
- - - Enfant *G35.10*
- Progressive chronique secondairement progressive
- - Mention d'exacerbation aiguë ou de progression ¬ Sclérose en plaques *G35.31*
- - ¬ Sclérose en plaques *G35.3*

Remplacé par greffe hétérologue ou homologue ¬ organe ou tissu *Z94*

Remplacement ¬
- Fistule vagin
- - Cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de *N82.80*
- - Vessie de *N82.81*
- Présence d'une autre valvule cardiaque de *Z95.4*

Remplissage
- Rein ¬ Défaut de *R93.4*
- Uretère ¬ Défaut de *R93.4*
- Vessie ¬ Défaut de *R93.4*

Rénal
v./v.a. Artère rénale
v./v.a. branchio-oto-rénal
v./v.a. cérébro-hépato-rénal
v./v.a. cranio-facio-cubito-rénal
v./v.a. papillo-rénal
v./v.a. thyro-cérébro-rénal

Rénal *–suite*
v./v.a. Type de maladie
v./v.a. Vésico-rénal

Renalis ¬ Diabetes *E74.8*

Rendu-Osler-Weber ¬ Maladie de *I78.0*

Rénine-angiotensine-aldostérone ¬ Angio-œdème secondaire aux inhibiteurs du système *T78.3*

Réno
v./v.a. cérébro-réno-génito-urinaire
v./v.a. oculo-réno-cérébelleux

Réno-hépato-pancréatique ¬ Dysplasie *Q87.8*

Rénoparenchymateuse ¬ Hypertension *I15.1*

Rénotubulaire ¬ Syndrome de Fanconi primitif *E72.0*

Renouvellement
- Ordonnance
- - Appareil ¬ *Z76.0*
- - Lunettes ¬ *Z76.0*
- - Médicaments ¬ *Z76.0*
- - ¬ *Z76.0*
- Prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs ¬ *Z30.4*

Renpenning ¬ Syndrome de *Q87.8*

Renutrition inappropriée ¬ Syndrome de *E87.8*

Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.5!*

Répandue ¬ Trypanosomiase SAI, en des lieux où la trypanosomiase africaine est *B56.9*

Réparation
- ADN ¬ Ataxie cérébelleuse avec défaut de *G11.3*
- Mésappariements
- - CMMRD] ¬ Glioblastome au cours du syndrome du déficit constitutionnel de la *C71.9*
- - ¬
- - - Carcinome
- - - - Colorectal au cours de syndrome de déficit constitutionnel de la *C19*
- - - - Intestin grêle au cours de syndrome de déficit constitutionnel de la *C17.9*
- - - - Ovaire au cours de syndrome de déficit constitutionnel de la *C56*
- - - Leucémie aiguë myéloïde au cours de syndrome de déficit constitutionnel de la *C92.00*
- - - Médulloblastome au cours de syndrome de déficit constitutionnel de la *C71.6*
- - - Neuroblastome au cours de syndrome de déficit constitutionnel de la *C74.9*
- Tissu cicatriciel ¬ opération *Z42*

Reperfusion (retour absent ou lent dans le corps) ¬ Blessure de *T88.8*

Répétition
- Aigu
- - Latéral
- - - Haut ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*

Répétition *–suite*
- Aigu *–suite*
- - Latéral *–suite*
- - - Paroi) SAI ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Latéro-apical ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Latéro-basal ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Postérieur (vrai) ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Postéro-basal ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Postéro-latéral ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Postéro-septal ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Septal SAI ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- Localisation non précisée ¬ Infarctus du myocarde à *I22.9*
- Localisations ¬ Infarctus du myocarde à *I22.8*
- Non classées ailleurs ¬ Chutes à *R29.6*
- Paroi
- - Antérieure ¬ Infarctus du myocarde à *I22.0*
- - Inférieure ¬ Infarctus du myocarde à *I22.1*
- - ¬
- - Avortements à *N96*
- - Cyclite aiguë, subaiguë ou à *H20.0*
- - Iritis aiguë, subaiguë ou à *H20.0*
- - Soins au cours de la grossesse pour avortement à *O26.2*
- - Uvéite antérieure aiguë, subaiguë ou à *H20.0*

Repli ary-épiglottique
- SAI ¬
- - *C13.1*
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- Versant
- - Hypopharyngé ¬
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - - Tumeur maligne: *C13.1*
- - Laryngé ¬
- - - *C32.1*
- - - *D02.0*
- - - *D38.0*
- Zone marginal ¬
- - *C13.1*
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- ¬ Carcinome épidermoïde du *C13.1*

Réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta AgHBe
- Négatif
- - Activité inflammatoire, forte *B18.14*
- - Sans activité inflammatoire, faible *B18.13*

Réplication ¬ Hépatite virale chronique B sans agent delta AgHBe *–suite*
- Positif
- - Activité inflammatoire, forte *B18.12*
- - Sans activité inflammatoire, forte *B18.11*

Replis endocardiques ¬ Malformation des *Q21.2*

Réponse
- Génitale ¬ Échec de la *F52.2*
- Héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr ¬ Déficit immunitaire avec *D82.3*
- Inflammatoire systémique SIRS
- - Non précisé ¬ Syndrome de *R65.9!*
- - Origine
- - - Infectieuse
- - - - Complications organiques ¬ Syndrome de *R65.1!*
- - - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de *R65.0!*
- - - Non infectieuse
- - - - Complications organiques ¬ Syndrome de *R65.3!*
- - - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de *R65.2!*
- Scotopique supranormale ¬ Dystrophie des cônes avec *H35.5*
- Sexuelle chez la femme ¬ Trouble de: *F52.2*
- Stimulation nerveuse ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Repos
- Loisirs ¬ Manque de *Z73*
- Restless Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) jambes sans *G25.81*
- ¬
- - Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleurs au *I70.23*
- - Insuffisance cardiaque
- - - Droite
- - - - Primaire avec symptôme au *I50.00, I50.05!*
- - - - Symptôme au *I50.01, I50.05!*
- - - Gauche: Avec symptôme au *I50.14*

Répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: activité *Z03.2*

Représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations *F62.0*

Reprise retardée de la fonction de la greffe de rein ¬ *T86.12*

Reptiles ¬ Effet toxique: Venin d'autres *T63.1*

RERE ¬ Trouble neurologique du développement associé à *Q87.8*

Réseau ¬ Dystrophie de (la): cornée: grillagée en *H18.5*

Résidentiel ¬ inscription dans: établissement *Z02*

Résidents d'établissements institutionnels ¬ Examen général en série de: *Z10*

Résistance
- Androgène
- - Sans précision ¬ Syndrome de *E34.59*
- - ¬ Pseudo-hermaphrodisme masculin avec *E34.5*
- Arginine vasopressine
- - Calcifications intracrâniennes-petite taille-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - ¬ *N25.1*
- Congénitale leptine
- - Enfant adolescent 3 18 ¬ Obésité
- - - Due à une *E66.84*
- - - Extrême due à une *E66.85*
- - Indice de masse corporelle IMC
- - - 60 et plus chez l'adulte ¬ Obésité due à une *E66.88*
- - - Compris
- - - - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ Obésité due à une *E66.80*
- - - - 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ Obésité due à une *E66.81*
- - - - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ Obésité due à une *E66.86*
- - - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ Obésité due à une *E66.87*
- - ¬ Obésité due à une *E66.89*
- Facteur de croissance analogue à l'insuline type 1 ¬ Retard de croissance par *E34.3*
- Généralisée aux glucocorticoïdes ¬ Syndrome de *E25.8*
- Hormone thyroïdien mutation récepteur hormone thyroïdien
- - Alpha ¬ *E03.8*
- - Bêta ¬ *E05.8*
- Inférieure à la normale ¬ les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une *M66*
- Insuline
- - Cinquièmes métacarpiens courts ¬ Syndrome de *E14.90*
- - Crampes-hypertrophie acrale ¬ Syndrome d'acanthosis nigricans- *Q87.8*
- - Type A ¬ Syndrome de *E13.60*
- - ¬ Syndrome de nanisme microcéphalique primordial- *Q87.1*
- Médicament de première ligne ¬ Tuberculose avec *A16.9, U82.0!*
- Multiples hormones ¬ Acrodysostose avec *Q75.4*
- Partielle aux androgènes ¬ Syndrome de *E34.50*
- Périphérique aux hormones thyroïdiennes ¬ Hypothyroïdie due à une *E03.8*
- Protéine C activée [mutation du facteur V Leiden] ¬ *D68.5*
- Récepteurs des œstrogènes ¬ Syndrome de *E34.8*
- Secondaire ¬ Syndrome néphrotique sensible aux stéroïdes avec *N04.9*
- Stéroïdes ¬ Syndrome néphrotique idiopathique avec *N04.9*

Résistance *–suite*
- Totale aux androgènes ¬ Syndrome de *E34.51*
- Vancomycine ¬ Infection invasif
- - Enterococcus faecalis avec *A49.13, U80.20!*
- - Enterococcus faecium avec *A49.13, U80.30!*

Résistant
- Aminoglycoside
- - Non résistant glycopeptides ¬
- - - Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement *U80.21!*
- - - Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement *U80.31!*
- - ¬
- - - Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et fortement *U80.20!*
- - - Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et hautement *U80.30!*
- Anidulafungine ¬ Candida glabrata *U83.1!*
- Antifongiques groupe
- - Échinocandines
- - - Non résistant aux triazoles ¬ Candida auris *U83.20!*
- - - Triazoles, résistant au fluconazole ¬ Candida auris *U83.21!*
- - Triazoles
- - - Sauf aspergillus fumigatus résistant au fluconazole seulement ¬ Aspergillus fumigatus *U83.3!*
- - - ¬ Candida albicans *U83.0!*
- Caspofungine ¬ Candida glabrata *U83.1!*
- Diazoxide déficit
- - Kir6.2 ¬ Hyperinsulinisme focal *E16.1*
- - SUR1 ¬ Hyperinsulinisme focal *E16.1*
- Échinocandines ¬ Candida glabrata *U83.1!*
- Fluconazole
- - Seulement ¬ Aspergillus fumigatus résistant aux antifongiques du groupe des triazoles, sauf aspergillus fumigatus *U83.3!*
- - ¬
- - - Candida albicans *U83.0!*
- - - Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines et aux triazoles, *U83.21!*
- Glycopeptides
- - Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecalis *U80.20!*
- - Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecium *U80.30!*
- - Oxazolidinones streptogramines ¬
- - - Enterococcus faecalis *U80.20!*
- - - Enterococcus faecium *U80.30!*
- - Quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré *U80.01!*
- - ¬

Résistant *–suite*
- Glycopeptides *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Enterococcus faecalis
- - - - *U80.20!*
- - - - Résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non *U80.21!*
- - - Enterococcus faecium
- - - - *U80.30!*
- - - - Résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non *U80.31!*
- Gonadotrophines ¬ Syndrome de l'ovaire *E28.3*
- Isavuconazole ¬ Aspergillus fumigatus *U83.3!*
- Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.11!*
- Méthicilline ¬ Staphylocoque doré *U80.0!*
- Micafungine ¬ Candida glabrata *U83.1!*
- Oxacilline méticilline
- - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré *U80.00!*
- - MRSA] ¬ Staphylocoque doré *U80.00!*
- - ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non *U80.01!*
- Oxazolidinones
- - Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ Enterococcus faecalis *U80.21!*
- - Streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ Enterococcus faecium *U80.31!*
- Pénicilline oxacilline
- - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- Plusieurs médicaments de première ligne ¬ Mycobacterium tuberculosis *U82.0!*
- Posaconazole ¬ Aspergillus fumigatus *U83.3!*
- Stéroïdes
- - Hyalinose focale et segmentaire ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique *N04.1*
- - Lésions minimales ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique *N04.0*
- - Prolifération mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique *N04.3*
- - Sclérose mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique *N04.8*

Résistant *–suite*
- Triazoles ¬ Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines, non *U83.20!*
- Virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases ¬ Virus de l'immunodéficience humaine *U85!*
- Vitamine D de type II ¬ Rachitisme *E83.30†*, *M90.89**
- Voriconazole ¬
- - Aspergillus fumigatus *U83.3!*
- - Candida albicans *U83.0!*

Résorption
- Dentaire (externe) ¬ *K03.3*
- Pathologique des dents ¬ *K03.3*
- Sans syndrome de détresse respiratoire ¬ Atélectasie (de): *P28.1*
- ¬ Atélectasie de *J98.18*

Respirateur ¬ Dépendance longue durée
- *Z99.1*
- Envers un *Z99.1*

Respiration
- Bouche ¬ *R06.5*
- Buccale ¬ Malocclusion due à: *K07.5*
- Douloureuse ¬ *R07.1*
- Non précisées ¬ Anomalies de la *R06.8*
- Périodique ¬ *R06.3*
- ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: gêne mécanique à la *T71*

Respiratoire
v./v.a. Type de maladie

Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease [RB-ILD] ¬ *J68.4*

Respiratory distress syndrom du nourrisson ¬ *P22.0*

Respiratory distress syndrome] du nourrisson ¬ RDS [*P22.0*

Ressort ¬
- Doigt «à *M65.3*
- Genou «à *M23.8*
- Hanche «à *R29.4*
- Mâchoire à *K07.6*

Restauration immunitaire [SIRI] ¬ Syndrome inflammatoire de *D89.3*

Reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause *R96.1*

Restless Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) jambes sans repos [*G25.81*

Restreinte ¬ Difficultés liées à: dépendance due à une mobilité *Z74.0*

Restzustand (schizophrénique) ¬ *F20.5*

Résultant
- Acte visée diagnostique thérapeutique ¬
- - Emphysème (sous-cutané) *T81.8*
- - Hémorragie de toute localisation, *T81.0*
- Amniocentèse ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*

Résultant *–suite*
- Anomalie dans le transport mucociliaire] [Immotile cilia syndrome] [triade de Kartagener] ¬ Syndrome de Kartagener [Situs inversus viscerum, bronchectasie, sinusite chronique et polypes nasaux] [insuffisance pluriglandulaire *Q89.3*
- Aspiration ¬ Pneumonie néonatale *P24*
- Biopsie ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*
- Dispositif intra-utérin ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*
- Examens hématologiques ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*
- Intervention chirurgicale intra-utérine ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*
- Listériose ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.8*
- Maladie virale de la mère ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.3*
- Toxicomanie ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.5*
- Toxoplasmose ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.8*

Résultat
- Accouchement, sans précision ¬ *Z37.9!*
- Anormal
- - Constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision ¬ *O28.9*
- - Examens chimiques du sang, sans précision ¬ *R79.9*
- Anormaux
- - Cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Autres *O28.8*
- - Écoulement du mamelon ¬ *R89*
- - Épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides] ¬ *R94*
- - Examen
- - - Cytologique et histologique des urines ¬ *R82.8*
- - - Liquide céphalorachidien ¬ *R83.9*
- - - Microbiologique des urines ¬ *R82.7*
- - - Urines, autres et non précisés ¬ *R82.9*
- - Expectoration ¬ *R84*
- - Exploration fonctionnelles
- - - Cardio-vasculaires ¬ *R94.3*
- - - Endocriniennes ¬ *R94.7*
- - - Hépatiques ¬ *R94.5*
- - - Organes et appareils ¬ *R94.8*
- - - Pulmonaires ¬ *R94.2*
- - - Rénales ¬ *R94.4*
- - - Système nerveux
- - - - Central ¬ *R94.0*
- - - - Périphérique et épreuves sensorielles spéciales ¬ *R94.1*
- - - Thyroïdiennes ¬ *R94.6*
- - Imagerie diagnostique
- - - Appareil urinaire ¬ *R93.4*

Résultat *–suite*
- Anormaux *–suite*
- - Imagerie diagnostique *–suite*
- - - Cœur et de la circulation coronaire ¬ *R93.1*
- - - Crâne et de la tête, non classés ailleurs ¬ *R93.0*
- - - Foie et des voies biliaires ¬ *R93.2*
- - - Membres ¬ *R93.6*
- - - Parties
- - - - Abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal ¬ *R93.5*
- - - - Corps précisées ¬ *R93.8*
- - - - Système ostéo-musculaire ¬ *R93.7*
- - - - Voies digestives ¬ *R93.3*
- - - Poumon ¬ *R91*
- - - Sein ¬ *R92*
- - - Système nerveux central ¬ Autres *R90.8*
- - Lavage bronchique ¬ *R84*
- - Liquide
- - - Péritonéal ¬ *R85*
- - - Pleural ¬ *R84*
- - - Synovial ¬ *R89*
- - Précisés des examens chimiques du sang ¬ Autres *R79.8*
- - Prélèvement
- - - Effectués sur
- - - - Appareil
- - - - - Digestif et la cavité abdominale ¬ *R85*
- - - - - Respiratoire et le thorax ¬ *R84*
- - - - Organe génital
- - - - - Femme ¬ *R87*
- - - - - Homme ¬ *R86*
- - - - Organes, appareils et tissus ¬ *R89*
- - - Gorge ¬ *R84*
- - Salive ¬ *R85*
- - Scintigraphie ¬ *R94*
- - Sécrétion
- - - Frottis
- - - - Col de l'utérus ¬ *R87*
- - - - Vagin ¬ *R87*
- - - - Vulve ¬ *R87*
- - - Nasales ¬ *R84*
- - - Niveau d'une plaie ¬ *R89*
- - - Prostatiques ¬ *R86*
- - Sperme, liquide séminal ¬ *R86*
- - Test de Mantoux ¬ *R76.1*
- Biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.1*
- Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.5*
- Cytologique
- - Anormal du liquide céphalorachidien ¬ *R83.6*
- - Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.2*

Résultat *–suite*
- Échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.3*
- Examen ¬ Conseil et surveillance pour: Consultation pour l'explication de *Z71*
- Faussement positifs au test sérologique de la syphilis ¬ *R76.2*
- Fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie ¬ Mauvais *K91.4*
- Hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.0*
- Histologique
- - Anormal du liquide céphalorachidien ¬ *R83.7*
- - Stade
- - - 1 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec autres *N17.81*
- - - 2 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec autres *N17.82*
- - - 3 ¬ Insuffisance rénale aiguë avec autres *N17.83*
- - ¬ Insuffisance rénale aiguë sans *N17.9*
- Immunologique
- - Anormal du liquide céphalorachidien ¬ *R83.4*
- - Sérique
- - - Sans précision ¬ Anomalie de *R76.9*
- - - ¬ Autres anomalies précisées de *R76.8*
- Microbiologique anormal du liquide céphalorachidien ¬ *R83.5*
- Non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons ¬ *R75*
- Positif au test de Coombs ¬ *R76.88*
- Radiologique
- - Anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *R93.8*
- - Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.4*
- Scolaires ¬ Mauvais *Z55*

Resynchronisation cardiaque ¬ Présence
- Défibrillateur de thérapie de *Z95.0*
- Stimulateur de thérapie de *Z95.0*

Retained medullary cord ¬ *Q76.0*

Retard
- Âge osseux par déficit du métabolisme de l'hormone thyroïdienne ¬ Petite taille- *E03.1*
- Cognitif sévère ¬ Syndrome d'hypotonie musculaire-trouble sévère du langage- *Q87.8*
- Consolidation d'une fracture ¬ *M84.2*
- Croissance ¬ *R62.8*
- Développemental-troubles du language-dystonie dopa-sensible-parkinsonisme ¬ Syndrome de *G25.88*
- Fermeture des sutures crâniennes ¬ *P96.3*
- Glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme ¬ Ictère dû à un *P59.0*
- Moteur

Retard *–suite*
- Moteur *–suite*
- - Retard de langage-anomalies cérébrales-hernie diaphragmatique ¬ Syndrome de microphtalmie- *Q11.2*
- - Verbal associé à TRAF7 ¬ Syndrome d'anomalies cardiaques-anomalies digitales-dysmorphie faciale- *Q87.0*
- Neurodéveloppemental
- - Déficience intellectuelle-ataxie-trouble de l'alimentation lié à DHX30 ¬ Syndrome de *G11.8*
- - Malformations cérébrales-anomalies squelettiques-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Ossification du crâne membraneux ¬ *Q75.8*
- Phases du sommeil ¬ Syndrome de *G47.2*
- Physique ¬ *R62.8*
- Pubertaire-petit taille ¬ Syndrome d'atrésie des choanes-athélie-hypothyroïdie- *Q87.1*
- Spécifique
- - Lecture ¬ *F81.0*
- - Orthographe (sans trouble de la lecture) ¬ *F81.1*
- Stade de développement physiologique attendu ¬ *R62.0*
- Staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse accélérée-dysmorphie faciale- *Q87.3*

Retard de croissance
- Déficience intellectuelle-hépatopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Déficit du facteur de croissance analogue à l'insuline type 1 ¬ *Q87.1*
- Fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de *Z36.4*
- Hypoplasie surrénalienne-anomalies génitales-entéropathie] ¬ Syndrome MIRAGE [Syndrome de myélodysplasie-infections- *Q87.8*
- Intra-utérin
- - Dysplasie métaphysaire-hypoplasie congénitale des surrénales-anomalies génitales] ¬ Syndrome IMAGe [*Q87.1*
- - Multiples taches café-au-lait congénitales et augmentation du taux d'échanges entre chromatides sœurs ¬ Syndrome de *Q02*
- - Petite taille
- - - Associé au gène CDKN1C ¬ Syndrome de *E34.8*
- - - Diabète sucré associé au gène CDKN1C ¬ Syndrome de *E34.8, E10.90*
- - Sélectif ¬ *P05.1*
- Intra-utérine avec micrognathie, petite taille rhizomélique et dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Prognathisme-cryptorchidie ¬ Syndrome lié à l'X de microcéphalie- *Q87.8*
- Résistance au facteur de croissance analogue à l'insuline type 1 ¬ *E34.3*
- Retard de développement modéré-hépatite chronique ¬ Syndrome de *K73.8*

Retard de croissance *–suite*
- Sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie- *D81.1*
- Sévère-strabisme-mélanocytose dermique congénitale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬
- - *R62.8*
- - Syndrome CIMDAG [hypoplasie cérébelleuse-déficience intellectuelle-microcéphalie congénitale-dystonie-anémie- *Q87.8*

Retard de développement
- Acanthosis nigricans ¬ Syndrome d'achondroplasie sévère- *Q77.4*
- Anomalie du système nerveux central-syndactylie dû à des mutations de FBLN1 ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Anomalies neurologiques ¬ Syndrome de pili torti- *Q87.8*
- Associé
- - SLC12A2 avec déficience intellectuelle et surdité neurosensorielle ¬ *Q87.8*
- - TMEM94 ¬ Syndrome d'anomalie cardiaque congénitale-dysmorphie faciale- *Q87.0*
- Ataxie
- - Épilepsie associé à PUM1 ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - Hypotonie-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Constitutionnel ¬ *E30.0*
- Craniosynostose ¬ Syndrome d'ostéosclérose- *Q87.5*
- Déficience intellectuelle
- - Dysmorphie faciale- malformations cardiaques congénitales associé à CDK13 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Trouble du spectre de l 'autisme associés à GRIN2B ¬ *F84.1*
- - ¬ Syndrome d'aplasie cutanée congénitale avec hypoplasie de l'émail dentaire, un *Q87.8*
- Déficit
- - 2-méthylbutyryl-CoA déshydrogénase ¬ *E71.1*
- - Méthylmalonate semialdéhyde déshydrogénase ¬ *E71.1*
- - SRP54 ¬ Syndrome de neutropénie congénitale sévère- *D70.0*
- Dysfonctionnement endocrinien-hypohémoglobinémie associé à MADD ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Dysmorphie faciale-camptodactylie ¬ Syndrome de macrothrombocytopénie-lymphœdème- *Q87.0*
- Épilepsie diabète néonatal
- - Forme intermédiaire ¬ Syndrome DEND [*E10.40*
- - ¬ Syndrome DEND [*E10.40*
- Globale-dysmorphie faciale-appendice caudal ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*

Retard de développement *–suite*
- Hypertrophie gingival ¬ Syndrome
- - Dysmorphie faciale-hypertrichose-épilepsie-déficience intellectuelle/ *Q87.0*
- - FHEIG [dysmorphie faciale-hypertrichose-épilepsie-déficience intellectuelle/ *Q87.0*
- Hypotonie musculaire ¬ Syndrome de synostose radio-cubitale- *Q87.0*
- Immunodéficience-leucoencéphalopathie-hypohomocystéinémie ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Kystes pulmonaires-croissance excessive-tumeur de Wilms ¬ Syndrome de *C64, Q87.3*
- Langage par déficit en SOX5 ¬ *Q93.5*
- Malnutrition protéino-énergétique ¬ *E45*
- Microcéphalie
- - Dysmorphie faciale associé à THOC6 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Petite taille-épilepsie associé à MTHFS ¬ Syndrome de *G31.88*
- Modéré-hépatite chronique ¬ Syndrome de retard de croissance- *K73.8*
- Neurologique
- - Épilepsie-anomalies ophtalmiques-ostéopénie-atrophie cérébelleuse ¬ *E88.8*
- - Lié
- - - GNAO1 ¬ *G93.4*
- - - MYT1L, avec retard mental et obésité ¬ *G93.4*
- - - RNU4-2 ¬ *Q87.8*
- - Malformations cérébrales et dysmorphie faciale ¬ *Q04.8*
- Nourrisson ¬ Maladie due au VIH avec *B22, P05.9*
- Ostéopénie-anomalies ectodermiques ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Physiologique, sans précision ¬ *R62.9*
- Physique dû à la malnutrition ¬ *E45*
- Psychomoteur-strabisme-défaut du septum cardiaque ¬ Syndrome d'hypotonie sévère- *Q87.8*
- Retard de langage-épilepsie-troubles du comportement-dysmorphie craniofaciale associé à ZMYND11 ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Sévère
- - Dysmorphies faciales et une déficience intellectuelle ¬ Syndrome lié à MEF2C caractérisé par des anomalies cérébrales, un *Q87.0*
- - Épilepsie ¬ Syndrome de paraplégie spastique- *G11.4*
- - ¬ Syndrome d'obésité précoce-hyperphagie- *E66.89*
- Surpoids-dysmorphie faciale-troubles du comportement ¬ Syndrome de *F88*
- Trouble du spectre de l'autisme et démarche instable ¬ *F84.1, R26.8*
- Troubles du comportement associé à WAC ¬ Syndrome de dysmorphie faciale- *Q87.0*
- ¬ Syndrome
- - Anomalies du palais-diastèmes multiples-dysmorphie faciale- *Q87.0*

Retard de développement *–suite*
- ¬ Syndrome *–suite*
- - Cataracte congénitale-hypotonie musculaire progressive-surdité- *G71.3*
- - Contractures congénitales des membres et de la face-hypotonie- *Q87.0*
- - Cutis laxa-hyperlaxité ligamentaire- *Q82.8*
- - Dérèglement immunitaire-anomalies craniofaciales-surdité-athélie- *Q87.8*
- - Hypotonie infantile-anomalies oculomotrices-mouvements hyperkinétiques- *Q87.8*
- - Létal
- - - Cardiomyopathie par non-compaction du ventricule gauche associé à des crises d'épilepsie, une hypotonie, une cataracte et un *G31.81*
- - - Non-compaction ventriculaire gauche-convulsions-hypotonie-cataracte- *G31.81*
- - Macrocéphalie- *Q75.3*
- - Microcéphalie progressive-épilepsie-cécité corticale- *Q02*
- - Neuropathie viscérale-anomalies cérébrales-dysmorphie- *Q87.8*
- - Obésité-colite-hypothyroïdie-hypertrophie cardiaque- *Q87.8*
- - Pancytopénie- *D61.0*
- - Pierre Robin-contractures- *Q87.0*
- - SIFD [anémie sidéroblastique congénitale-immunodéficience à cellules B-fièvre périodique- *D64.0, D82.8*

Retard de langage
- Anomalies cérébrales-hernie diaphragmatique ¬ Syndrome de microphtalmie-retard moteur- *Q11.2*
- Asymétrie faciale-strabisme-incisure du lobe de l'oreille ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Dysmorphie faciale-anomalies des lymphocytes T ¬ Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.0*
- Épilepsie-troubles du comportement-dysmorphie craniofaciale associé à ZMYND11 ¬ Syndrome de retard du développement- *Q87.8*
- ¬
- - *R62.0*
- - Syndrome de paraparésie spastique-cataracte- *G82.13, Q12.0*

Retard général de développement
- Hypotonie et polymicrogyrie ¬ Syndrome de dysmorphie faciale avec *Q04.8*
- ¬ Neuropathie sensorielle et autonome héréditaire avec surdité neurosensorielle et *G60.8, H90.5*

Retard global de développement
- Alopécie-macrocéphalie-dysmorphie faciale-anomalies cérébrales structurelles ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Anomalies
- - Neuro-ophtalmologiques-épilepsie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*

Retard global de développement *–suite*
- Anomalies *–suite*
- - Visuelles-atrophie cérébelleuse progressive-hypotonie axiale ¬ Syndrome de *G31.88*
- Déficience intellectuelle-dysmorphie faciale-anomalie pseudo-Pelger-Huët ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬ Syndrome
- - Atrophie optique-ataxie-neuropathie périphérique- *G31.81*
- - Cataracte congénitale-hépatopathie néonatale sévère- *Q87.8*
- - Épilepsie à début précoce-anomalies des membres distaux-dysmorphie faciale- *Q87.0*
- - Petite taille-brachydactylie-obésité- *Q87.1*

Retard mental
- Caractéristiques autistiques ¬ *F84.1*
- Grave
- - Non syndromique
- - - Autosomique récessif ¬ *F72.9*
- - - Lié à X ¬ *F72.9*
- - ¬ *F72*
- Léger
- - Non syndromique
- - - Autosomique récessif ¬ *F70.9*
- - - Lié à X ¬ *F70.9*
- - Sans troubles du comportement ¬ *F70.0*
- - Troubles du comportement ¬ *F70.8*
- - ¬ *F70*
- Mouvements stéréotypés ¬ Hyperactivité associée à un *F84.4*
- Moyen
- - Non syndromique
- - - Autosomique récessif ¬ *F71.9*
- - - Lié à X ¬ *F71.9*
- - Sans trouble du comportement ¬ *F71.0*
- - ¬ *F71*
- Obésité ¬ Retard de développement neurologique lié à MYT1L, avec *G93.4*
- Pouces en adduction-spasticité-hydrocéphalie] ¬ Syndrome CRASH [hypoplasie du corps calleux- *Q04.8*
- Profond
- - Non syndromique
- - - Autosomique récessif ¬ *F73.9*
- - - Lié à X ¬ *F73.9*
- - ¬ *F73*
- Sans précision ¬ *F79*
- ¬
- - Formes de *F78*
- - Syndrome de paralysie des muscles abducteurs du larynx associé à un *J38.00*

Retard psychomoteur
- Atrophie cérébrale progressive-anomalie des ganglions de la base ¬ Syndrome de spasmes infantiles- *E51.8†, G99.8**
- Déficit en S-adénosylhomocystéine hydrolase ¬ *E72.1*

Retard psychomoteur *–suite*
- Dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'hypotonie infantile- *Q87.8*
- ¬ Syndrome
- - Aniridie-agénésie rénale- *Q87.8*
- - Anomalies de l'ossification- *Q79.8*
- - Ataxie cérébelleuse autosomique récessive- *G11.1*

Retardé
- Canal artériel ¬ Obturation *P29.3*
- Deuxième jumeau, triplé, etc. ¬ Accouchement *O63.2*
- Développement physiologique ¬ Autres *R62.8*
- Faisant suite à un traumatisme ¬ Choc (immédiat) (*T79.4*
- Fonction de la greffe de rein ¬ Reprise *T86.12*
- Fusion ou arthrodèse ¬ Guérison osseuse *M96.82*
- Ostéotomie ¬ Guérison osseuse *M96.82*
- Rupture
- - Artificielle des membranes ¬ Accouchement *O75.5*
- - Spontanée ou non précisée des membranes ¬ Accouchement *O75.6*
- SAI ¬ Croissance fœtale *P05.9*
- Sévère
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Hémorragie *O08.1*
- - ¬ Échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une hémorragie *O07.1*
- - - Sans précision, compliqués d'une hémorragie *O07.6*
- ¬
- - Développement sexuel *E30.0*
- - Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel): *H40.2*
- - Guérison *T89.03*
- - Maturation *R62.0*
- - Puberté *E30.0*
- - Traitement *T89.03*

Rétention
- Ancienne
- - Corps étranger
- - - Magnétique
- - - - Chambre antérieure de l'œil ¬ *H44.6*
- - - - Corps
- - - - - Ciliaire ¬ *H44.6*
- - - - - Vitré ¬ *H44.6*
- - - - Cristallin ¬ *H44.6*
- - - - Iris ¬ *H44.6*
- - - - Paroi postérieure du globe oculaire ¬ *H44.6*
- - - Non magnétique
- - - - Corps
- - - - - Ciliaire ¬ *H44.7*

Rétention *–suite*
- Ancienne *–suite*
- - Corps étranger *–suite*
- - - Non magnétique *–suite*
- - - - Corps *–suite*
- - - - - Vitré ¬ *H44.7*
- - - - Cristallin ¬ *H44.7*
- - - - Iris ¬ *H44.7*
- - - Secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite ¬ *H05.5*
- - Intraoculaire corps étranger
- - - Magnétique ¬ *H44.6*
- - - Non magnétique ¬ *H44.7*
- Chylomicrons ¬ Maladie de *E78.6*
- Corps étranger dans la paupière ¬ *H02.8*
- Dentaire [dents temporaires persistantes] ¬ *K00.6*
- Fœtus mort in utero ¬ *O02.1*
- Glandes salivaires ¬ Kyste muqueux: de *K11.6*
- Incarcération ou l'adhérence du placenta ¬ Hémorragie associée à la *O72.0*
- Liquidienne SAI ¬ *R60.9*
- Partielle placenta membrane
- - Sans hémorragie ¬ *O73.1*
- - ¬ Hémorragie associée à la *O72.2*
- Placenta
- - SAI ¬ *O72.0*
- - Sans hémorragie ¬ *O73.0*
- Produit conception
- - Accouchement, sans hémorragie ¬ *O73.1*
- - SAI, après l'accouchement ¬ *O72.2*
- Stérilet au cours d'une grossesse ¬ *O26.3*
- Urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ¬ *T83.8*
- Urine ¬ *R33*
- ¬ Mort fœtale précoce avec *O02.1*

Rétentionnel de l'ovaire ¬ Kyste *N83.2*

Retenu [siège de la tumeur] ¬ Testicule: *C62.0*

Réticulaire
- Déplétion lymphocytaire ¬ Lymphome de Hodgkin classique de type *C81.3*
- Folliculaire ¬ Lymphosarcome *C82.1*
- Pigmentaire ¬ Dermatopathie *Q82.4*
- ¬
- - Angiomatose *C46.9*
- - CRIE [Érythrodermie congénitale ichtyosiforme *Q80.3*
- - Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie *D81.0*
- - Dégénérescence rétinienne: *H35.4*
- - Dysgénésie *D81.0*
- - Érythrodermie congénitale ichtyosiforme *Q80.3*

Réticulocytose maligne ¬ *C85.9*

Réticulo-endothéliose
- Aiguë ¬ *C96.0*
- Cellules épithéloïdes ¬ *D86.9*
- Leucémique en rémission complète ¬ *C91.41*

Réticulohistiocytome (à cellules géantes) ¬ *D76.3*

Réticulohistiocytose multicentrique ¬ *E78.88†, M14.39**

Réticulo-leucémique maligne ¬ Érythrodermie *C84.1*

Réticulolymphosarcome
- Diffus ¬ *C83.9*
- Nodulaire ¬ *C82.9*
- ¬ *C85.9*

Réticulosarcome
- Nodulaire ¬ *C96.9*
- ¬ Maladie due au VIH avec *B21, C83.3*

Réticulose
- Aleucémique ¬ *C96.0*
- Hémophagocytaire familiale ¬ *D76.1*
- Lipomélanique ¬ *I89.8*
- Maligne ¬
- - *C86.0*
- - Arthrite au cours de *C86.0†, M36.1**
- Médullaire histiocytaire ¬ *C96.8*
- Pagétoïde localisée ¬ *C84.0*
- Polymorphe ¬ *C86.0*
- Sézary ¬ *C84.1*

Rétiforme ¬
- Hémangioendothéliome *D48.1*
- Parapsoriasis *L41.5*

Rétine
- Branche ¬ Occlusion de la veine de la *H34.8*
- Centrale ¬ Occlusion de la veine de la *H34.8*
- Cours de rétinite à CMV [cytomégalovirus], VIH positif ¬ Décollement de la *B20†, H32.0*, B25.88*
- Débutante ¬ Occlusion de la veine de la *H34.8*
- Déchirure rétinienne ¬ Décollement de la *H33.0*
- Déficit en arginine vasopressine ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-spasticité des membres-dystrophie de la *Q87.8*
- Diabète insipide ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-spasticité des membres-dystrophie de la *Q87.8*
- Partielle ¬ Occlusion de la veine de la *H34.8*
- Rhegmatogène
- - Autosomique dominant ¬ Décollement de la *H33.0*
- - ¬ Décollement de la *H33.0*
- SAI ¬
- - Décollement de la *H33.2*
- - Kyste (de): parasitaire de la *H33.1*
- Sans

Rétine *–suite*
- Sans *–suite*
- - Déchirure de la rétine ¬ Décollement de la *H33.2*
- - Décollement ¬
- - - Déchirure en fer à cheval de la *H33.3*
- - - Trou rond de la *H33.3*
- Sténose pulmonaire supravalvulaire ¬ Macroanévrisme artériel de la *H35.0, Q25.6*
- Tachetée familiale bénigne ¬ *H35.5*
- VIH ¬ Syndrome de microangiopathie de la *B23.8, H35.0*
- ¬
- - Altérations vasculaires de la *H35.0*
- - Anévrisme congénital de la *Q14.1*
- - Artériosclérose d'un vaisseau de la *I70.8†, H36.8**
- - Décollement
- - - Couches de la *H35.7*
- - - Rétine: sans déchirure de la *H33.2*
- - - Séreux de la *H33.2*
- - - Traction de la *H33.4*
- - Dégénérescence
- - - Partie irienne de la *H21.2*
- - - Pigmentaire de la *H35.5*
- - Hamartome combiné de l'épithélium pigmentaire et de la *D31.2*
- - Hémangiome racémeux de la *D18.06*
- - Hyperornithinémie avec atrophie sinueuse de la choroïde et de la *E72.4*
- - Maladie due au VIH avec altération vasculaire de la *B23.8, H35.0*
- - Malformation capillaire de la *D18.06*
- - Malformation congénitale de la *Q14.1*
- - Médulloépithéliome de la *C69.2*
- - Micro-anévrisme diabétique de la *E14.30†, H36.0**
- - Neurorécidive syphilitique de la *A52.1†, H36.8**
- - Occlusion
- - - Artère
- - - - *H34.2*
- - - - Centrale de la *H34.1*
- - - Transitoire de l'artère de la *H34.0*
- - Pseudokyste de la *H33.1*
- - Sclérose de la *I70.8†, H36.8**
- - Stries angioïdes de la *H35.38*
- - Syndrome de Batten-Kufs de la *E75.4†, H36.8**
- - Syphilis congénitale de la *A50.0†, H32.0**
- - Syphilis secondaire précoce de la *A51.4†, H32.0**
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, H32.0**
- - Tortuosité des artères de la *Q14.1*
- - Tuberculose de la *A18.5†, H32.0**
- - Tumeur bénigne: *D31.2*
- - Tumeur maligne: *C69.2*
- - Vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la *H33.4*

Rétinien
v./v.a. rétine

Rétinite
- Albuminurique ¬ *N18.9†, H32.8**
- Bactérienne ¬ Maladie due au VIH avec *B20†, H32.0*, A49.9*
- Candida ¬ Maladie due au VIH avec *B20†, H32.0*, B37.88*
- CMV cytomégalovirus
- - VIH positif ¬ Décollement de la rétine au cours de *B20†, H32.0*, B25.88*
- - ¬ Maladie due VIH
- - - *B20†, H32.0*, B25.88*
- - - Récidive de *B20†, H32.0*, B25.88*
- Foyer ¬ *H30.0*
- Herpétique ¬ *B00.5†, H32.0**
- Mycosique ¬ Maladie due au VIH avec *B20†, H32.0*, B49*
- Pigmentaire
- - Cataracte juvénile-petite taille-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - Déficience intellectuelle surdité
- - - Hypogénitalisme ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - Hypogonadisme ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Fovéoschisis-drusen de la papille optique ¬ Syndrome de microphtalmie- *Q15.8*
- - Sans pigmentation ¬ *H35.5*
- - Surdité-vieillissement prématuré-petite taille-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - ¬
- - - *H35.5*
- - - Leucoencéphalopathie autosomique récessive-infarctus cérébraux- *Q87.0*
- - - Syndrome
- - - - Ataxie du cordon postérieur- *G11.1*
- - - - Brachydactylie-petite taille- *Q87.1*
- - - - Déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- - - - Dyskinésie ciliaire primitive- *Q34.8, H35.5*
- - - - Hypogonadisme hypogonadotrope- *E23.0, H35.5*
- - - - Pseudoxanthome élastique-like avec *Q82.8, H35.5*
- - - - Tétraplégie spastique-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Ponctuée albescente ¬ *H35.5*
- Rénale ¬ *N18.9†, H32.8**
- SAI ¬ *H30.9*
- Séreuse centrale ¬ *H35.7*
- Syphilitique
- - Centrale récidivante ¬ *A52.7†, H32.0**
- - Congénitale précoce ¬ *A50.0†, H32.0**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, H32.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, H32.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H32.0**
- Virale ¬ Maladie due au VIH avec *B20†, H32.0*, B34.9*
- ¬

Rétinite *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Diabète sucré type
- - - 1 avec *E10.30†, H36.0**
- - - 2 avec *E11.30†, H36.0**
- - Maladie due au VIH avec *B20, H30.9*

Rétinoblastome
- Différencié ¬ *C69.2*
- Héréditaire ¬ *C69.2*
- Indifférencié ¬ *C69.2*
- Non héréditaire ¬ *C69.2*
- Sans rosettes ¬ *C69.2*
- Vraies rosettes ¬ *C69.2*
- ¬ *C69.2*

Rétinocérébelleuse de von Hippel-Lindau ¬ Angiomatose *Q85.8*

Rétino-choroïdienne paraveineuse pigmentée ¬ Atrophie *H35.8*

Rétinochoroïdite
- Foyer ¬ *H30.0*
- SAI ¬ *H30.9*

Rétinochoroïdopathie type birdshot ¬ *H30.1*

Rétino-hépato-endocrinologique ¬ Syndrome *Q87.8*

Rétinoïdes ¬ Embryopathie aux *Q86.88*

Rétinol ¬ Dystrophie rétinienne progressive par déficit de transport du *H35.5*

Rétinopathie
- Altérations vasculaires rétiniennes ¬ Autres *H35.0*
- Associée à un carcinome ¬ *C80.9†, H36.8**
- Athéroscléreuse ¬ *I70.8†, H36.8**
- Coats ¬ *H35.0*
- Diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬
- - - - Décollement tractionnel au cours de *E10.30†, H36.0**
- - - - Glaucome de néovascularisation au cours de *E10.30†, H36.0**
- - - 2 ¬
- - - - Décollement tractionnel au cours de *E11.30†, H36.0**
- - - - Glaucome de néovascularisation au cours de *E11.30†, H36.0**
- - ¬
- - - Décollement tractionnel dans la *E14.30†, H36.0**
- - - Diabète sucré type
- - - - 1 avec *E10.30†, H36.0**
- - - - 2 avec *E11.30†, H36.0**
- - - Glaucome de néovascularisation dans la *E14.30†, H36.0**
- Drépanocytaire proliférative ¬ *D57.8†, H36.8**
- Épilepsie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'ostéogenèse imparfaite- *Q87.8*
- Exsudative ¬ *H35.0*
- Externe annulaire aiguë ¬ *H30.8*

Rétinopathie *–suite*
- Fond de l'œil SAI ¬ *H35.0*
- Hypertensive ¬ *H35.0*
- Occulte externe zonale aiguë] ¬ AZOOR [*H30.8*
- Paranéoplasique ¬ Carcinome bronchique à petites cellules avec *C34.9†, H36.8**
- Pigmentaire
- - Congénitale ¬ *H35.5*
- - ¬
- - - *H35.5*
- - - Syndrome
- - - - Myopathie mitochondriale-ataxie cérébelleuse- *G31.81*
- - - - Nanisme ostéochondrodysplasique-surdité- *Q87.1*
- Prématuré] ¬ ROP [*H35.1*
- Prématurité ¬ *H35.1*
- Prolifférantes ¬ Autres *H35.2*
- SAI ¬ *H35.0*
- Sclérotique ¬ *I70.8†, H36.8**
- Séreuse centrale ¬ *H35.7*
- Solaire ¬ *H31.0*
- ¬
- - Diabète sucré avec *E14.30†, H36.0**
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, H35.0*
- - Syndrome de fente labiale- *Q36.9, H35.5*
- - Thalassémie avec *D56.9†, H36.8**

Rétinoschisis
- Congénital ¬ *Q14.1*
- Juvénile lié à l'X ¬ *Q14.1*
- Kystes rétiniens ¬ *H33.1*

Retour
- Absent ou lent dans le corps) ¬ Blessure de reperfusion (*T88.8*
- Stade connaissance antérieur
- - Lors traumatisme cranio-cérébral ¬ Perte connaissance plus 24 heures
- - - *S06.9, S06.72!*
- - - Sans *S06.9, S06.73!*
- - ¬ Perte connaissance coma lors traumatisme cranio-cérébral Plus 24 heures
- - - *S06.72!*
- - - Sans *S06.73!*
- Veineux
- - Portal anormal ¬ *Q26.5*
- - Pulmonaire
- - - Anormal
- - - - Partiel ¬ *Q26.3*
- - - - Sans précision ¬ *Q26.4*
- - - - Total ¬ *Q26.2*
- - - ¬ Anomalie
- - - - Congénitale
- - - - - *Q26.4*
- - - - - Partielle du *Q26.3*
- - - - Partielle du *Q26.3*
- - - - Totale du *Q26.2*

Retour *–suite*
- Veineux *–suite*
- - ¬ Anomalie congénitale du *Q26.8*

Rétractile
- Épaule ¬ Capsulite *M75.0*
- Fibrose pulmonaire ¬ Syndrome de poïkilodermie héréditaire fibrosante-myopathie *Q82.8*
- ¬ Testicule *Q55.2*

Rétraction
- Congénitale
- - Mamelons ¬ *Q83.88*
- - Paupières ¬ *Q10.3*
- Duane ¬ Syndrome de *H50.8*
- Gingivale ¬ *K06.0*
- Hydronéphrotique des reins avec infection ¬ *N13.65*
- Mamelon ¬ *N64.5*
- Musculaire ischémique] ¬ Syndrome de Volkmann [*T79.60*
- Paupière ¬ Maladie de Basedow avec orbitopathie endocrinienne et *E05.0†, H06.3**
- Tendineuses (gaine) ¬ Autres *M67.1*
- Tuberculeuse des reins ¬ *A18.1†, N29.1**

Retrait
- Gingival (généralisé) (localisé) (post-infectieux) (postopératoire) ¬ *K06.0*
- Implant orthopédique ¬ Fracture osseuse après *M96.6*
- Plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après *M96.6*
- Prothèse articulaire ¬ Fracture osseuse après *M96.6*

Rétréci
- SAI entraînant une disproportion ¬ Bassin *O33.1*
- ¬
- - Bassin *P03.1*
- - Dystocie due à un bassin généralement *O65.1*
- - Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement *O33.1*

Rétrécissement
- Anus (sphincter) ¬ *K62.4*
- Aortique sous-valvulaire ¬ *Q24.4*
- Artériel congénital(e) ¬ *Q27.8*
- Atrésie du vagin ¬ *N89.5*
- Canal biliaire, sans calcul ¬ *K83.1*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul ¬ *K82.0*
- Canal déférent ¬ *N50.8*
- Canal médullaire ¬ *M48.0*
- Canal rachidien
- - Lésion discale ¬ *M99.5*
- - Subluxation ¬ *M99.2*
- - Tissu conjonctif ¬ *M99.4*
- Canal salivaire ¬ *K11.8*
- Caudal ¬ *M48.0*

Rétrécissement *–suite*
- Cavité médiane (bassin) entraînant une disproportion ¬ *O33.3*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.6*
- Conduit auditif externe ¬ *H61.3*
- Congénital
- - Canal lacrymal ¬ Sténose ou *Q10.5*
- - E) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- Congénitaux
- - Côlon ¬ occlusion, obstruction et *Q42*
- - Conduit auditif (externe) ¬ Absence, atrésie et *Q16.1*
- - Intestin grêle ou de l'intestin SAI ¬ obstruction, occlusion et *Q41*
- - Œsophage ¬ Sténose et *Q39.3*
- - Voies biliaires ¬ Sténose et *Q44.3*
- Cordon spermatique ¬ *N50.8*
- Détroit
- - Inférieur
- - - Bassin) entraînant une disproportion ¬ *O33.3*
- - - Cavité moyenne ¬ Dystocie due à un *O65.3*
- - - ¬ Soins maternels pour disproportion due à un *O33.3*
- - Supérieur
- - - Bassin
- - - - Entraînant une disproportion ¬ *O33.2*
- - - - Maternel ¬ Soins maternels pour disproportion due à un *O33.2*
- - - ¬ Dystocie due à un *O65.2*
- Duodénum ¬ *K31.5*
- Espace intervertébral
- - Ossification et subluxation ¬ *M99.6*
- - Tissu conjonctif et discal ¬ *M99.7*
- Généralisé du champ visuel ¬ *H53.4*
- Gonorrhéique de la trompe de Fallope ¬ *A54.2†, N74.3**
- Hypertrophique du pylore ¬ *K31.10*
- Jonction
- - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Méat
- - Auditif osseux ¬ Atrésie ou *Q16.1*
- - Urinaire congénital(e) ¬ *Q64.3*
- Mitral congénital ¬ *Q23.2*
- Œsophage ¬ *K22.2*
- Orifice
- - Urétéral avec infection ¬ *N13.67*
- - Vésico-urétral congénital(e) ¬ *Q64.3*
- Osseux du canal rachidien ¬ *M99.3*
- Pylore chez l'adulte ¬ *K31.18*
- Rectum
- - Infection à Chlamydia ¬ *A55†, K93.8**
- - Lymphogranulome vénérien ¬ *A55†, K93.8**

Rétrécissement *–suite*
- Rhumatismal valvule
- - Aortique ¬ *I06.0*
- - Mitrale ¬ *I05.0*
- Sténose
- - Col ¬ Soins maternels pour: *O34.4*
- - Col de l'utérus ¬ *N88.2*
- Syphilitique
- - Artères coronaires NCA ¬ *A52.0†, I52.0**
- - Bronches ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Congénital des artères coronaires ¬ *A50.5†, I52.0**
- - Congénitale
- - - Larynx ¬ *A50.5†, J99.8**
- - - Narine ¬ *A50.5†, J99.8**
- - - Œsophage ¬ *A50.5†, K23.8**
- - Larynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Narine ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Œsophage ¬ *A52.7†, K23.8**
- - Rectum ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Rhinopharynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Sphincter rectal ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Trachée ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Urètre ¬ *A52.7†, N37.8**
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.1*
- Tuberculeux
- - Rectum ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Trompe de Fallope ¬ *A18.1†, N74.1**
- Tunique vaginale ¬ *N50.8*
- Urétéral
- - Infection du rein ¬ Hydronéphrose avec *N13.61*
- - Non classée ailleurs ¬ Hydronéphrose avec *N13.1*
- - Sans hydronéphrose
- - - Infection du rein ¬ *N13.67*
- - - ¬ Coudure et *N13.5*
- - Tuberculeux ¬ *A18.1†, N29.1**
- - ¬ Hydronéphrose avec *N13.61*
- Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Urétéro-vésical avec infection ¬ *N13.67*
- Urétral
- - Actes médicaux ¬ *N99.18*
- - Cathéter ¬ *N99.18*
- - Opération antérieure d'un rétrécissement urétral ¬ Récidive de *N99.10*
- - Post-infectieux, non classé ailleurs ¬ *N35.1*
- - Post-opératoire ¬ *N99.18*
- - Post-traumatique ¬ *N35.0*
- - Sans précision ¬ *N35.9*
- - Secondaire
- - - Ablation de condylome ¬ *N99.18*
- - - Chirurgie transurétrale ¬ *N99.18*
- - - Circoncision ¬ *N99.18*
- - - Radiothérapie ¬ *N99.18*
- - ¬

Rétrécissement *–suite*
- Urétral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - *N35.8*
- - - Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un *N99.10*
- Urètre
- - Congénital(e) ¬ *Q64.3*
- - Séquelle
- - - Accouchement ¬ *N35.0*
- - - Traumatisme ¬ *N35.0*
- Vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- Vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.8*
- Veineux ¬ *I87.1*

Rétripéritonéale idiopathique avec infection du rein ¬ Fibrose *K66.2*

Rétrobulbaire
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Névrite *H48.1**
- - Sclérose en plaques ¬ Névrite *G35.9†, H48.1**
- Méningocoques ¬ Névrite *A39.8†, H48.1**
- SAI ¬ Névrite *H46*
- Syphilitique
- - Tardive ¬ Névrite *A52.1†, H48.1**
- - ¬ Névrite *A52.1†, H48.1**
- ¬ Tissu
- - *C69.6*
- - *D31.6*

Rétro-cæcal ¬ Abcès: *K65.09*

Rétrocochléaire ¬ Surdité *H90.5*

Rétro-cricoïdienne ¬ Tumeur maligne: Région *C13.0*

Rétroflexion de l'utérus ¬ *N85.4*

Rétrognathie (mandibulaire) (maxillaire) ¬ *K07.1*

Rétrograde ¬ Amnésie *R41.2*

Rétrolentale ¬ Fibroplasie *H35.1*

Rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ Abcès maxillaire sans indication d'extension *K10.20*

Rétromolaire ¬
- Carcinome basocellulaire de la région *C06.2*
- Carcinome épidermoïde de la région *C06.2*
- Tumeur maligne: Région *C06.2*

Rétro-oculaire ¬
- Corps étranger *H05.5*
- Tissu
- - *C69.6*
- - *D31.6*

Rétropéritoine
- Péritoine ¬ Tumeur maligne
- - Lésion à localisations contiguës du *C48.8*
- - Secondaire du *C78.6*
- ¬
- - *D17.7*
- - Léiomyosarcome du *C48.0*

Rétropéritoine *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion traumatique: *S36.83*
- - Lipoblastome du *D17.7*
- - Liposarcome bien différencié du *C48.0*
- - Liposarcome dédifférencié du *C48.0*
- - Liposarcome du *C48.0*
- - Liposarcome myxoïde du *C48.0*
- - Liposarcome pléiomorphe du *C48.0*
- - Mésothéliome du *C45.7*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire du *C48.0*
- - Tumeur
- - - Ectopique sécrétrice d'aldostérone du *D48.3, E26.0*
- - - Myofibroblastique inflammatoire
- - - - Bénigne du *D20.0*
- - - - Maligne du *C48.0*
- - Tumeur bénigne: *D20.0*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D48.3*

Rétropéritonéal ¬
- Abcès: *K65.09*
- Fibrose *K66.2*
- Germinome *C48.0*
- Hernie: *K45*
- Métastase ganglionnaire inguinale *C77.8*
- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace *R93.5*
- Tuberculose *A18.3*

Rétropharyngé
- Tuberculeux avec confirmation bactériologique ou histologique ¬ Abcès *A15.8*
- ¬
- - Abcès parapharyngé et *J39.0*
- - Abcès tuberculeux *A16.8*

Rétroplacentaire
- Hémorragie importante associée
- - Afibrinogénémie ¬ Hématome *O45.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hématome *O45.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hématome *O45.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hématome *O45.0*
- SAI ¬ Hématome *O45.9*
- ¬ Hématome *P02.1*

Retrosa) (non traumatique) ¬ Épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara *M93.0*

Rétroversion utérus
- Gravide ¬ Soins maternels pour: *O34.5*
- ¬ *N85.4*

Rétrovésical ¬ Abcès *N30.88*

Rétrovirus
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.3!*
- Non classées ailleurs ¬ Infections à *B33.3*

Retrusion du visage-surdité neurosensorielle-dysplasie rhizomélique ¬ Syndrome autosomique dominant de myopie- *Q87.0*

Rett
- Atypique ¬ Syndrome de *F84.2*
- ¬ Syndrome de *F84.2*

Réveil ¬ Épilepsie (avec): crises grand mal au *G40.3*

Revenus ¬ Faibles *Z59*

Réversible
- COX ¬ Myopathie mitochondriale avec déficit *G71.3*
- Déficit en SLC13A3 ¬ Leucoencéphalopathie aiguë *E75.2*
- Facteur IIa ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs *D68.35*
- SLEPR) ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie postérieure *G93.6*
- Thrombine ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs *D68.35*
- ¬
- - Pulpite *K04.0*
- - Syndrome
- - - Encéphalopathie postérieure *G93.6*
- - - Vasoconstriction cérébrale *I67.88*

Rêves d'angoisse ¬ *F51.5*

Revesz ¬ Syndrome de *Q87.8*

Reye ¬ Syndrome de *G93.7*

Reynolds ¬ Syndrome de *K74.3, L94.0*

Rh
- Anasarque fœto-placentaire) ¬ Incompatibilité *O36.0*
- Occasion d'une perfusion ou transfusion ¬ Réaction due au facteur *T80.4*
- ¬
- - Anticorps anti-D [*O36.0*
- - Réaction d'incompatibilité *T80.4*
- - Syndrome de déficit *D58.8*

Rhabdoïde
v./v.a. Tumeur rhabdoïde
- ¬ Tumeur rhabdoïde
- - Rein au cours de syndrome de prédisposition aux tumeurs *C64*
- - Tératoïde au cours de syndrome de prédisposition aux tumeurs *C80.9*

Rhabdomyolyse traumatique ¬ *T79.69*

Rhabdomyosarcome
- Alvéolaire tissu mou
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Cou ¬ *C49.0*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Tête ¬ *C49.0*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - Tronc ¬ *C49.6*

Rhabdomyosarcome *–suite*
- Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Embryonnaire
- - Col vésical ¬ *C67.5*
- - Cordon spermatique ¬ *C63.1*
- - Dôme de la vessie ¬ *C67.1*
- - Intérieur du nez ¬ *C30.0*
- - Orbites ¬ *C69.6*
- - Paroi
- - - Antérieure de la vessie ¬ *C67.3*
- - - Latérale de la vessie ¬ *C67.2*
- - - Postérieure de la vessie ¬ *C67.4*
- - Prostate ¬ *C61*
- - Rétropéritoine ¬ *C48.0*
- - Sinus
- - - Ethmoïdal ¬ *C31.1*
- - - Frontal ¬ *C31.2*
- - - Maxillaire ¬ *C31.0*
- - - Sphénoïdal ¬ *C31.3*
- - Tissu mou
- - - Cou ¬ *C49.0*
- - - Tête ¬ *C49.0*
- - Trigone de la vessie ¬ *C67.0*
- - Vessie
- - - Lésion à localisations contiguës ¬ *C67.8*
- - - ¬ *C67.9*
- Endocol ¬ *C53.0*
- Exocol ¬ *C53.1*
- Jonction cervico-vaginale ¬ *C53.8*
- Orbite ¬ *C69.6*
- Pléomorphe
- - Tissu mou
- - - Abdomen ¬ *C49.4*
- - - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- - - Membres
- - - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - - Pelvis ¬ *C49.5*
- - - Tête ¬ *C49.0*
- - - Thorax ¬ *C49.3*
- - - Tronc ¬ *C49.6*
- - ¬ *C49.9*
- Tissu mou
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Cou ¬ *C49.0*
- - Épaule ¬ *C49.1*
- - Hanche ¬ *C49.2*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Tête ¬ *C49.0*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - Tronc ¬ *C49.6*

Rhabdomyosarcome *–suite*
- Type mixte ¬ *C49.9*
- Vessie ¬ *C67.9*
- Vulvo-vaginal ¬ *C57.8*
- ¬ *C49.9*

Rhegmatogène
- Autosomique dominant ¬ Décollement de la rétine *H33.0*
- ¬ Décollement de la rétine *H33.0*

Rhésus du fœtus et du nouveau-né ¬ Iso-immunisation *P55.0*

Rhinite
- Aiguë ¬ *J00*
- Allergique
- - Asthme ¬ *J45.09*
- - Persistante ¬ *J30.3*
- Chronique
- - Atrophique ¬ *J31.0*
- - Granulomateuse ¬ *J31.0*
- - Hypertrophique ¬ *J31.0*
- - Obstructive ¬ *J31.0*
- - Purulente ¬ *J31.0*
- - SAI ¬ *J31.0*
- - Ulcéreuse ¬ *J31.0*
- - ¬ *J31.0*
- Infectieuse ¬ *J00*
- Pneumocoques ¬ *J00, B95.3!*
- Syphilitique
- - Congénitale précoce ¬ *A50.0*
- - Jeune enfant ¬ *A50.0†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tuberculeuse
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*

Rhinocérébrale ¬ Mucormycose *B46.1†, G99.8**

Rhinodiphtérie ¬ *A36.8*

Rhinolithe ¬ *J34.8*

Rhinopathie
- Allergique
- - Due au pollen ¬ *J30.1*
- - Sans précision ¬ *J30.4*
- Allergiques
- - Saisonnières ¬ Autres *J30.2*
- - ¬ Autres *J30.3*
- Vasomotrice ¬ *J30.0*

Rhinopharyngé
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose (de): *A15.8*
- Postérieure ¬ Carcinome de la région *C11.1*
- SAI ¬ Paroi *C11.9*
- Supérieure) (postérieure) du voile du palais ¬ Paroi *C11.3*
- ¬
- - Abcès *J39.1*

Rhinopharyngé *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Diphtérie *A36.1*
- - Gomme de la région *A52.7†, J99.8**
- - Myiase *B87.3†, J99.8**
- - Polype (des): *J33.0*
- - Tuberculose *A16.8*

Rhinopharyngite
- Aiguë [rhume banal] ¬ *J00*
- Chronique ¬ *J31.1*
- Infectieuse SAI ¬ *J00*
- Mutilante ¬ *A66.5*
- SAI ¬ *J00*
- Streptocoques ¬ *J00, B95.5!*

Rhinopharynx
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C11.9*
- ¬
- - *T17.2*
- - Atrésie du *Q34.8*
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] du *C11.9*
- - Kyste du pharynx ou du *J39.2*
- - Œdème du pharynx ou du *J39.2*
- - Plafond du *C11.0*
- - Plancher du *C11.3*
- - Rétrécissement syphilitique du *A52.7†, J99.8**
- - Tératome malin paroi
- - - Antérieure du *C11.3*
- - - Latérale du *C11.2*
- - - Postérieure du *C11.1*
- - - Supérieure du *C11.0*
- - Tumeur bénigne: *D10.6*
- - Tumeur maligne
- - - Lésion à localisations contiguës de *C11.8*
- - - Paroi
- - - - Antérieure du *C11.3*
- - - - Latérale du *C11.2*
- - - - Postérieure du *C11.1*
- - - - Supérieure du *C11.0*

Rhinophyma ¬ *L71.1*

Rhinorrhée
- Aiguë ¬ *J00*
- Spasmodique ¬ *J30*

Rhinoscleromatis ¬ Infection à Klebsiella *A49.82*

Rhino-sinusienne déformante ¬ Polypose *J33.1*

Rhinosporidose ¬ *B48.1*

Rhinovirus ¬ Bronchite aiguë due à des *J20.6*

Rhizarthrose secondaire bilatérale ¬ *M18.4*

Rhizomélique
- Dysmorphie faciale ¬ Syndrome de retard de croissance intra-utérine avec micrognathie, petite taille *Q87.1*
- Patterson-Lowry ¬ Dysplasie *Q78.8*

Rhizomélique *–suite*
- Type
- - 1 ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*
- - 2 ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*
- - 3 ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*
- - 5 ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*
- - Urbach ¬ Syndrome *Q87.1*
- ¬
- - Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*
- - Syndrome
- - - Autosomique dominant de myopie-retrusion du visage-surdité neurosensorielle-dysplasie *Q87.0*
- - - Microphtalmie-colobome-dysplasie *Q87.1*

Rhizopus ¬ Infection à *B46.5*

Rhodesiense ¬ Trypanosomiase à Trypanosoma *B56.1*

RHOH ¬ Déficit immunitaire à cellules T par déficit en *D81.8*

Rhombencéphalite de Bickerstaff ¬ *G61.0*

Rhombencéphalosynapsis ¬
- *Q04.3*
- Syndrome de dysmorphie faciale-déficience intellectuelle- *Q87.0*

Rhomboidalis ¬ Cutis *L57.2*

Rhumatismal
- Aiguë
- - Atteinte cardiaque ¬ Arthrite *I01.9*
- - Endocardite ¬ Arthrite *I01.1*
- - Multiples atteintes cardiaques ¬ Arthrite *I01.8*
- - Myocardite ¬ Arthrite *I01.2*
- - Péricardite ¬ Arthrite *I01.0*
- - Valve aortique
- - - Maladie de la valvule mitrale ¬ Endocardite *I01.1*
- - - ¬ Endocardite *I01.1*
- - Valve cardiaque ¬ Inflammation *I01.1*
- - Valve pulmonaire ¬ Endocardite *I01.1*
- - Valvulite ¬ Arthrite *I01.1*
- - ¬
- - - Artérite coronaire *I01.8*
- - - Arthrite *I00*
- - - Cardiopathie *I01.9*
- - - Endocardite *I01.1*
- - - Hypertrophie cardiaque *I01.8*
- - - Insuffisance cardiaque gauche *I01.8*
- - - Insuffisance myocardique *I01.2*
- - - Myocardite *I01.2*
- - - Polyarthrite *I00*
- - - Valvulite *I01.1*
- Aiguës ¬ Autres cardiopathies *I01.8*
- Atteinte cardiaque
- - Tout type classée en I01.- ¬ Chorée: *I02.0*
- - ¬ Chorée *I02.0*
- Chronique ¬
- - Artérite coronaire *I09.8*

Rhumatismal *–suite*
- Chronique ¬ *–suite*
- - Médiastino-péricardite *I09.2*
- - Myopéricardite *I09.2*
- - Péricardite *I09.2*
- Congénitale ¬
- - Insuffisance valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- - Régurgitation valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- - Sténose valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- - Valvulite (chronique) valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- E ¬ Reflux
- - Aortique *I06.1*
- - Mitral(e) *I05.1*
- Insuffisance
- - Reflux ¬ Sténose aortique *I06.2*
- - ¬ Sténose aortique *I06.2*
- Origine non précisée ¬ Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d'origine *I08.0*
- Précisées ¬ Autres cardiopathies *I09.8*
- SAI ¬ Maladie aortique (valvulaire) *I06.9*
- Sans
- - Atteinte cardiaque ¬ Chorée *I02.9*
- - Précision ¬ Cardiopathie *I09.9*
- Subaiguë
- - Atteinte cardiaque ¬ Arthrite *I01.9*
- - Endocardite ¬ Arthrite *I01.1*
- - Multiples atteintes cardiaques ¬ Arthrite *I01.8*
- - Myocardite ¬ Arthrite *I01.2*
- - Péricardite ¬ Arthrite *I01.0*
- - Valve pulmonaire ¬ Endocardite *I01.1*
- - Valvulite ¬ Arthrite *I01.1*
- - ¬
- - - Arthrite *I00*
- - - Insuffisance myocardique *I01.2*
- - - Myocardite *I01.2*
- - - Polyarthrite *I00*
- Toxique ¬ Myocardite *I01.2*
- Valve aortique ¬ Sclérose *I06.8*
- Valve mitrale ¬
- - Affections non *I34.88*
- - Sclérose *I05.8*
- Valvule
- - Aortique
- - - Sans précision ¬ Maladie *I06.9*
- - - ¬
- - - - Maladies *I06.8*
- - - - Rétrécissement *I06.0*
- - Mitral
- - - Insuffisance mitrale ¬ Sténose non *I34.80*
- - - Sans précision ¬ Atteinte non *I34.9*
- - - ¬

Rhumatismal *–suite*
- Valvule *–suite*
- - Mitral *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Rétrécissement (*I05.0*
- - - - Sténose non *I34.2*
- - Non précisée ¬ Endocardite *I09.1*
- - Pulmonaire ¬ Maladie *I09.8*
- - Tricuspide
- - - Insuffisance ¬ Sténose non *I36.2*
- - - Sans précision ¬ Atteinte non *I36.9*
- - - ¬
- - - - Atteintes non *I36.8*
- - - - Insuffisance non *I36.1*
- - - - Sténose non *I36.0*
- ¬
- - Adhérence du péricarde, *I09.2*
- - Aortite *I01.1*
- - Artérite à cellules géantes avec polymyalgie *M31.5*
- - Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur *M08.0*
- - Cardite
- - - *I09.9*
- - - Aiguë *I01.9*
- - Chorée *I02.9*
- - Endocardite
- - - Chronique) *I09.1*
- - - Verruqueuse non *M32.1†, I39.8**
- - Insuffisance
- - - Mitrale *I05.1*
- - - Valvule
- - - - Aortique SAI ou de cause précisée, sauf *I35.1*
- - - - Mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf *I34.0*
- - - - Pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf *I37.1*
- - - - Tricuspide
- - - - - *I07.1*
- - - - - Cause précisée, sauf *I36.1*
- - Insuffisance aortique *I06.1*
- - Insuffisance cardiaque *I09.9*
- - Myocardite *I09.0*
- - Péricardite *I01.0*
- - Polyarthrite chronique juvénile type adulte
- - - Facteur *M08.00*
- - - Sans facteur *M08.00*
- - Polymyalgie *M35.3*
- - Précisées origine
- - - *I07*
- - - *I08*
- - Régurgitation valvule
- - - Aortique SAI ou de cause précisée, sauf *I35.1*
- - - Mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf *I34.0*

Rhumatismal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Régurgitation valvule *–suite*
- - - Pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf *I37.1*
- - - Tricuspide, de cause précisée, sauf *I36.1*
- - Sténose
- - - Aortique *I06.0*
- - - Valvule) tricuspide (*I07.0*
- - Valvulite (chronique) *I09.1*

Rhumatismale
v./v.a. Fièvre rhumatismale

Rhumatisme
- Articulaire
- - Aigu
- - - Atteinte cardiaque ¬ *I01.9*
- - - Myocardite ¬ *I01.2*
- - - ¬ Présence d'une insuffisance cardiaque gauche au cours de *I01.8*
- - Atteinte cardiaque ¬ *I01.9*
- - Endocardite ¬ *I01.1*
- - Péricardite ¬ *I01.0*
- - Subaiguë ¬ *I00*
- - ¬ *I00*
- Fibroblastique
- - Articulation
- - - Coude ¬ *M06.82*
- - - Genou ¬ *M06.86*
- - Main ¬ *M06.84*
- - Poignet ¬ *M06.83*
- - Sièges multiples ¬ *M06.80*
- - ¬ *M06.89*
- Palindromique ¬ *M12.3*
- Pneumonie ¬ *I00†, J17.8**
- Sans précision ¬ *M79.0*
- Tuberculeux NCA ¬ *A18.0†, M01.19**

Rhumatoïde
v./v.a. Arthrite rhumatoïde
- Atteinte d'autres organes et appareils ¬ Polyarthrite *M05.3†*
- Facteurs anti-nucléaires ¬ Polyarthrite juvénile sans facteur *M08.3*
- Précisées ¬ Autres polyarthrites *M06.8*
- Sans précision ¬ Polyarthrite *M06.9*
- Séronégative ¬ Polyarthrite *M06.0*
- Séropositive
- - Sans précision ¬ Polyarthrite *M05.9*
- - ¬ Autres polyarthrites *M05.8*
- ¬
- - Bursite *M06.2*
- - Cardite *M05.39†, I52.8**
- - Maladie pulmonaire *M05.19†, J99.0**
- - Myocardite *M05.39†, I41.8**
- - Nodule *M06.3*
- - Polyarthrite juvénile
- - - Facteur *M08.00*
- - - Sans facteur *M08.3*

Rhumatoïde *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Purpura *D69.0*

Rhume
- Banal ¬
- - Intoxication: Médicaments contre le coryza [*T48.5*
- - Rhinopharyngite aiguë [*J00*
- Foin
- - Asthme ¬ *J45.09*
- - ¬ *J30.1*
- Iodique ¬ *T88.7*

RHYNS ¬ Syndrome *Q87.8*

Ribbing
v./v.a. Müller-Ribbing-Clément

Riboflavine ¬
- Carence en *E53.0*
- Lésion du fœtus par déficit maternel en *P00.4*

Ribose-5-phosphate isomérase ¬ Déficit en *E74.8*

Ribosidurie ¬ 5-amino-4-imidazole carboxamide *E79.8*

Ricci
v./v.a. Cacchi-Ricci

Rich
- Exacerbation aiguë ¬ Syndrome de Hamman- *J84.11*
- Hémangiome congénital rapidement involutif] ¬ *D18.00*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Syndrome de Hamman- *J84.10*
- ¬ Syndrome de Hamman- *J84.10*

Richardson-Olszewski ¬ Maladie de Steele- *G23.1*

Richards-Rundle ¬ Syndrome de *Q87.8*

Richieri
v./v.a. Naguib-Richieri-Costa

Richieri-Costa-da Silva ¬ Syndrome de *Q87.8*

Richieri-Costa-Pereira ¬ Syndrome de *Q87.8*

Richner-Hanhart ¬ Syndrome de *E70.2*

Richter ¬ Syndrome de *C91.1*

Ricine ¬ Intoxication à la *T62.2*

Rickettsia
- Akari ¬
- - Infection due à *A79.1*
- - Rickettsiose varicelliforme due à *A79.1*
- Conorii ¬ Fièvre pourprée à *A77.1*
- Mooseri ¬ Typhus à *A75.2*
- Orientalis ¬ Infection à *A75.3*
- Prowazekii ¬
- - Infection à *A75.0*
- - Typhus épidémique à poux dû à *A75.0*
- Quintana ¬ Infection à *A79.0*
- Rickettsii ¬ Fièvre pourprée à *A77.0*
- Sibirica ¬ Fièvre pourprée due à *A77.2*
- Tsutsugamushi ¬ Typhus à *A75.3*
- Typhi ¬ Typhus à *A75.2*

Rickettsies
- SAI ¬ Infection à *A79.9*
- ¬
- - Infection à *A79.9*
- - Pneumonie à *A79.9†, J17.0**

Rickettsii ¬ Fièvre pourprée à Rickettsia *A77.0*

Rickettsiose
- Varicelliforme due à Rickettsia akari ¬ *A79.1*
- Vésiculaire ¬ *A79.1*
- ¬ *A79.9*

RIDDLE [radiosensibilité-déficit immunitaire-dysmorphie-difficultés d'apprentissage] ¬ Syndrome de *D82.8*

Riedel ¬
- Maladie de *E06.5*
- Thyroïdite (de): *E06.5*

Rieger ¬
- Anomalie de *Q13.8*
- Glaucome lors de syndrome de *Q13.8†, H42.8**
- Syndrome d'Axenfeld- *Q13.8*

Rieger-Axenfeld ¬ Anomalie de *Q13.8*

Rifamycines ¬ Intoxication: *T36.6*

Riggs
v./v.a. Hall-Riggs

Rigid spine syndrome ¬ *G71.2*

Rigide ¬
- Cataracte due à une lentille *H26.88*
- Soin maternels
- - Périnée *O34.7*
- - Plancher pelvien: *O34.8*

Rigidité
- Hymen ¬ *N89.6*
- Musculaire
- - Hypercontractile généralisée ¬ Syndrome congénital de *E72.8*
- - ¬
- - - *G25.88*
- - - Syndrome de l'homme raide [*G25.88*
- Musculature squelettique ¬ *R29.8*
- Myoclonies ¬ Encéphalomyélite progressive avec *G25.88*

Rigidus ¬ Hallux *M20.2*

Riley
v./v.a. Bannayan-Riley-Ruvalcaba
- Smith ¬ Syndrome de *Q89.8*

Riley-Day ¬ Syndrome de *G90.1*

Rio Bravo ¬ Encéphalite de *A85.8†, G05.1**

Rippling muscle disease
- Myasthenia gravis ¬ *G71.8, G70.0*
- ¬ *G71.8*

Rire [infection virale atypique du système nerveux central] ¬ Maladie du *A81.8*

Risque
- Abus ¬ Intoxication: Psychostimulants présentant un *T43.6*

Risque *–suite*
- Liée à des problèmes sociaux ¬ Grossesse à *Z35.8*
- Précisés, non classés ailleurs ¬ Antécédents personnels d'autres facteurs de *Z91.8*
- Sans précision ¬ Surveillance de grossesse à haut *Z35.9*
- Tué à tout moment ¬ Modification de la personnalité après: captivité prolongée avec *F62.0*
- Tumeur maligne opération prophylactique
- - Organes ¬ Opération prophylactique pour facteur de *Z40.08*
- - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour facteur de *Z40.01*
- - Sein ¬ Opération prophylactique pour facteur de *Z40.00*
- Vital chez le nourrisson ¬ Événement aigu constituant un *R06.80*
- ¬
- - Comportement sexuel à *Z72.8*
- - Exposition professionnelle à des facteurs de *Z57*
- - Surveillance d'autres grossesses à haut *Z35.8*

Ritscher-Schinzel ¬ Syndrome de *Q87.0*

Ritter von Rittershain ¬ Maladie de *L00.0*

Rittershain
v./v.a. Ritter von Rittershain

Rivalité dans la fratrie ¬ *F93.3*

Riziforme intra-articulaire du genou ¬ Corps étranger *M23.4*

RNASEH2B ¬ Paraplégie spastique héréditaire associée à *G11.4*

RNU12 ¬ Ataxie cérébelleuse congénitale due à une mutation de *G11.1*

RNU4-2 ¬ Retard de développement neurologique lié à *Q87.8*

Roberts
v./v.a. Norman-Roberts
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Robertson syphilitique ¬ Signe d'Argyll *A52.1†, H58.0**

Robertsoniennes et équilibrées ¬ translocations et insertions réciproques *Q95*

Robin
v./v.a. Pierre Robin
- Persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec communication interatriale, séquence de *Q87.8*
- ¬ Syndrome d'extrasystoles ventriculaires avec syncopes-pérodactylie-séquence de *Q87.8*

Robinet
v./v.a. Thauvin-Robinet-Faivre

Robinow
- Autosomique
- - Dominant ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - Récessif ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Silverman-Smith ¬ Syndrome de *Q87.1*
- ¬ Syndrome de *Q87.1*

Robinson
v./v.a. Forney-Robinson-Pascoe
v./v.a. Snyder-Robinson

Rocher (aiguë) (chronique) ¬ Inflammation du *H70.2*

Roch-Leri ¬ Lipomatose mésosomatique de *E88.29*

Rocio ¬ Maladie à virus de *A83.6*

Rodenticides ¬ Effet toxique: *T60.4*

Rodríguez ¬ Dysostose acrofaciale type *Q75.4*

Rogers ¬ Syndrome de *Q21.0*

ROHHAD [Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide-dysfonctionnement hypothalamique-hypoventilation-dysautonomie] ¬ *E23.3, E66.29*

ROHHADNET [Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide-dysfonctionnement hypothalamique-hypoventilation-dysautonomie-tumeurs neurales] ¬ *E23.3, C80.9*

Roifman ¬ Syndrome de *Q87.5*

Roifman-Chitayat ¬ Syndrome de *Q87.8*

Rokitansky
v./v.a. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Rolandique
- Dyspraxie de la parole ¬ Syndrome d'épilepsie *G40.08, R48.2*
- Dystonie paroxystique induite par l'effort-crampe de l'écrivain ¬ Syndrome d'épilepsie *G40.08*
- ¬ Épilepsie *G40.08*

Rolando] ¬ Épilepsie bénigne à pics centro-temporaux [*G40.08*

Rôle
- Sexuel SAI ¬ Trouble du *F64.9*
- Social, non classé ailleurs ¬ Conflit de *Z73*

Rolland-Desbuquois ¬ Dysplasie dyssegmentaire type *Q77.7*

Romano-Ward ¬ Syndrome du QT long type *I49.8*

Romberg
v./v.a. Parry-Romberg

Rombo ¬ Syndrome de *Q82.8*

Rompu
v./v.a. Type de maladie

Ronflement ¬ *R06.5*

ROP [Rétinopathie du prématuré] ¬ *H35.1*

Ropers
v./v.a. Bainbridge-Ropers

ROR ¬
- Déficit immunitaire primaire avec infection virale disséminée post-vaccination *D84.8, T88.0*
- Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [*Z27.4*

RORC ¬ Déficit immunitaire primaire
- Autosomique récessif due à une mutation de *D84.8*
- Mutation de *D84.8*

Rosacée
- Sans précision ¬ Acné *L71.9*

Rosacée *–suite*
- ¬
- - Blépharite au cours d'acné *L71.8†*, *H03.8**
- - Blépharo-conjonctivite au cours d'acné *L71.8†*, *H13.2**
- - Conjonctivite au cours d'acné *L71.9†*, *H13.2**
- - Formes d'acné *L71.8*
- - Kératite au cours d'acné *L71.8†*, *H19.3**

Rosaï
v./v.a. Destombes-Rosaï-Dorfman

Rosaï-Dorfman ¬ Maladie de *D76.3*

Rosé de Gibert ¬ Pityriasis *L42*

Rosenberg ¬ Chondrodysplasie métaphysaire type *Q78.5*

Rosenmüller ¬ Fossette de *C11.2*

Rosenthal ¬
- Déficit en facteur *D68.1*
- Syndrome
- - *D68.1*
- - Melkersson- *G51.2*

Rosette
- Lobe pariétal ¬ Tumeur embryonnaire avec *C71.3*
- Pluristratifiées
- - Cervelet ¬ Tumeur embryonnaire avec *C71.6*
- - Encéphale ¬ Tumeur embryonnaire à *C71.0*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Tumeur embryonnaire avec *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ Tumeur embryonnaire avec *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ Tumeur embryonnaire avec *C71.4*
- - Lobe temporal ¬ Tumeur embryonnaire avec *C71.2*
- - Tronc cérébral ¬ Tumeur embryonnaire avec *C71.7*
- - ¬ Tumeur embryonnaire avec *C71.9*
- ¬
- - Rétinoblastome
- - - Sans *C69.2*
- - - Vraies *C69.2*
- - Tumeur glioneuronale formant des *D43.2*

Ross River ¬
- Fièvre de la *B33.1*
- Maladie de la *B33.1*

Rotateurs
- Non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des *M75.1*
- ¬
- - Coiffe des *S43.4*
- - Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des *S46.0*
- - Syndrome de la coiffe des *M75.1*

Rotation
- Absente du cæcum et du côlon ¬ *Q43.3*

Rotation *–suite*
- Incomplète
- - Cæcum et du côlon ¬ *Q43.3*
- - Tête du fœtus ¬ Dystocie due à une *O64.0*
- Insuffisante du cæcum et du côlon ¬ *Q43.3*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*

Rotatoire ¬ Dystonie cervicale principalement *G24.3*

Rotavirus ¬
- Diarrhée à *A08.0*
- Entérite à *A08.0*

Rothmund-Thomson
- Type
- - 1 ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - 2 ¬ Syndrome de *Q82.8*
- ¬
- - Poïkilodermie de *Q82.8*
- - Syndrome de *Q82.8*

Rothschild
v./v.a. Al Awadi-Raas-Rothschild

Rotor ¬
- Hyperbilirubinémie type *E80.6*
- Syndrome
- - *E80.6*
- - *E80.6*

Rott
v./v.a. Schilbach-Rott

Rotule
- Absente ¬ Syndrome d'aniridie- *Q87.8*
- Acromicrie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-calvitie-luxation de la *Q87.8*
- Chondromalacique ¬ *M22.4*
- Rudimentaire ¬ *Q74.1*
- Sans autre précision ¬ Maladie de la *M22.9*
- ¬
- - *S82.0*
- - Absence congénitale de la *Q74.1*
- - Agénésie de la *Q74.1*
- - Fracture de la *S82.0*
- - Lésions de la *M22.3*
- - Luxation
- - - *S83.0*
- - - Récidivante de la *M22.0*
- - Luxation congénitale de la *Q74.1*
- - Maladies de la *M22.8*
- - Ostéoblastome de la *D16.3*
- - Ostéochondrite juvénile
- - - *M92.4*
- - - Pointe de la *M92.4*
- - Ostéochondrose de Köhler de la *M92.4*
- - Ostéosarcome de la *C40.3*
- - Sarcome d'Ewing de la *C40.3*
- - Sarcome de la *C40.3*
- - Subluxation récidivante de la *M22.1*

Rotulien
- Maladie de Hoffa] ¬ Hypertrophie du coussinet graisseux (*M79.4*

Rotulien *–suite*
- ¬
- - Chondropathie *M22.4*
- - Ligament *S76.1*
- - Tendinite *M76.5*

Rouge
- Adulte ¬ Aplasie pure des globules *D60.0*
- Cerise ¬ Syndrome myoclonies-taches *E77.1*
- Déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres *G31.81*
- Inférieur ¬ Syndrome du noyau *I66.8†*, *G46.3**
- Lèvre ¬ Lèvre
- - Inférieure: zone d'application du *C00.1*
- - Supérieure: zone d'application du *C00.0*
- Petites cellules B ¬ Lymphome splénique diffus de la pulpe *C83.0*
- ¬
- - Albinisme oculo-cutané *E70.3*
- - Anémie hémolytique due à un déficit en pyruvate kinase du globule *D55.2*
- - Anomalies des globules *R71*
- - Miliaire *L74.0*

Rougeole
- Complication
- - Intestinales ¬ *B05.4†*, *K93.8**
- - ¬ *B05.8*
- Encéphalite ¬ *B05.0†*, *G05.1**
- Méningite ¬ *B05.1†*, *G02.0**
- Oreillons rubéole
- - ROR] ¬ Nécessité d'une vaccination contre *Z27.4*
- - ¬ Déficit immunitaire primaire avec infection virale disséminée post-vaccination de la *D84.8*, *B05.9*
- Sans complication ¬ *B05.9*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.4*
- ¬
- - Encéphalomyélite au cours de *B05.0†*, *G05.1**
- - Kératite au cours de *B05.8†*, *H19.2**
- - Kératoconjonctivite
- - - Cours de *B05.8†*, *H19.2**
- - - Interstitielles au cours de *B05.8†*, *H19.2**
- - Myélite au cours de *B05.0†*, *G05.1**
- - Otite moyenne au cours de *B05.3†*, *H67.1**
- - Pneumonie au cours de *B05.2†*, *J17.1**

Rouget du porc ¬ *A26.0*

Rougeur
- Excessive ¬ *R23.2*
- Fesses ¬ *L22*
- Persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte ¬ Zone de pression avec *L89.0*
- ¬ *R23.2*

Rousseur ¬
- Acrokeratodermie ponctuée avec pigmentation de type taches de *L85.8*
- Taches de *L81.2*

Roussy ¬ Sarcoïde de Darier- *D86.3*

Roussy-Lévy ¬
- Dystasie aréflexique héréditaire de type *G60.0*
- Syndrome de *G60.0*

Routine
- Cours du post-partum ¬ Contrôle de *Z39.2*
- Enfant ¬ Examen de *Z00.1*
- Entretien de la contraception ¬ Examen de *Z30.4*
- Général) ¬ Examen gynécologique (de *Z01.4*
- Limité à un organe donné ¬ examen de *Z01*
- Sous-population définie ¬ Examen général de *Z10*
- ¬
  - Circoncision rituelle et de *Z41.2*
  - Mammographie de *Z01.6*

Rowell ¬ Syndrome de *L93.1*

RTTN ¬ Malformations corticales microcéphaliques-petite taille par déficit en *Q87.1*

Rubéole
- Complication neurologique ¬
  - *B06.0†, G99.8**
  - *B06.0†, G99.8**
- Complications ¬ *B06.8*
- Congénitale ¬ Pneumonie de la *P35.0*
- ROR] ¬ Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons- *Z27.4*
- Sans complication ¬ *B06.9*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.5*
- ¬
  - Arthrite au cours de la *B06.8†, M01.49**
  - Arthropathie due à la *B06.8†, M01.49**
  - Déficit immunitaire primaire avec infection virale disséminée post-vaccination de la rougeole, des oreillons et de la *D84.8, B05.9*
  - Encéphalite due à *B06.0†, G05.1**
  - Encéphalomyélite au cours de *B06.0†, G05.1**
  - Méningite au cours de *B06.0†, G02.0**
  - Myélite au cours de *B06.0†, G05.1**
  - Pneumonie au cours de *B06.8†, J17.1**
  - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par: virus de la *O35.3*
  - Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.4*

Rubéoleuse ¬
- Méningo-encéphalite *B06.0†, G05.1**
- Panencéphalite *B06.0†, G05.1**

Rubéolique ¬ Émbryofœtopathie *P35.0*

Rubéose
- Diabétique ¬ *E14.60†, L99.8**
- Iris ¬ *H21.1*

Rubeosis diabetica diabète sucré type
- 1 ¬ *E10.60†, L99.8**
- 2 ¬ *E11.60†, L99.8**

Ruber
- Acuminatus ¬ Lichen *L66.1*
- Moniliforme ¬ Lichen *L44.3*

Rubinstein Taybi
- Haploinsuffisance de EP300 ¬ Syndrome de *Q87.2*
- Mutations de CREBBP ¬ Syndrome de *Q87.2*
- ¬ Syndrome de *Q87.2*

Rubra
- Hebra) ¬ Pityriasis *L26*
- Pilaire ¬ Pityriasis *L44.0*
- Vera ¬ Polycythaemia *D45*

Rubro
v./v.a. dentato-rubro-pallido-luysienne

Rudd
v./v.a. Hunter-Rudd-Hoffmann

Rudimentaire ¬
- Œil *Q11.2*
- Rotule *Q74.1*
- Utérus *Q51.8*

Rues ¬ Rage des *A82.1*

Ruijs-Aalfs ¬
- Carcinome hépatocellulaire au cours du syndrome de *C22.0, Q87.8*
- Syndrome de *Q87.8*

Ruminations obsédantes au premier plan ¬ Avec idées ou *F42.0*

Rundle
v./v.a. Richards-Rundle

Rupia
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, L99.8**
- Tertiaire ¬ *A52.7†, L99.8**

Rupture
v./v.a. perforation
- Anévrisme
  - Aorte abdominale descendante ¬ *I71.3*
  - Artère basilaire ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une *I60.4*
  - Artère cérébrale moyenne ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une *I60.1*
  - Artère communicante
    - Antérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une *I60.2*
    - Postérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une *I60.3*
    - ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à la *I60.7*
  - Artère vertébrale ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une *I60.5*
  - Artères précérébrales ¬ *I72.5*
  - Artérioscléreux cérébral ¬ *I60.7*

Rupture *–suite*
- Anévrisme *–suite*
  - Carotidien ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une *I60.0*
  - Polygone de Willis ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une *I60.6*
  - Sinus caverneux ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une *I60.8*
- Anévrisme syphilitique de l'artère cérébrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- Aorte abdominale descendante ¬ *I71.3*
- Aorte SAI ¬ *I71.8*
- Artère ¬ *I77.2*
- Artérielle-surdité ¬ Syndrome de fragilité osseuse-contractures- *Q87.5*
- Artificielle des membranes ¬ Accouchement retardé après *O75.5*
- Bassinet, non traumatique ¬ *N28.80*
- Calice rénal, non traumatique [rupture de fornix] ¬ *N28.80*
- Canal biliaire ¬ *K83.2*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.2*
- Choroïde ¬ Hémorragie et *H31.3*
- Complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique ¬ *M75.1*
- Cordages tendineux
  - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.4*
  - Non classée ailleurs ¬ *I51.1*
- Cordon ¬ Perte de sang fœtal due à une *P50.1*
- Destruction globe oculaire ¬
  - Brûlure provoquant la *T26.2*
  - Corrosion provoquant la *T26.7*
- Discal ¬
  - Névrite due à une *M51.1†, G55.1**
  - Radiculite
    - Cervicale due à une *M50.1†, G55.1**
    - Due à une *M51.1†, G55.1**
- Estomac ¬ *K31.88*
- Foie due à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.0*
- Fornix] ¬ Rupture d'un calice rénal, non traumatique [*N28.80*
- Frein de la langue ¬ *S01.54*
- Grossesse extra-utérine ¬ *O00*
- Ligaments au niveau de la cheville et du pied ¬ *S93.2*
- Massive du parenchyme de la rate ¬ *S36.04*
- Mécanique) dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Membrane
  - Descemet ¬ *H18.3*
  - ¬ Oligoamnios, sans mention de *O41.0*
- Muscle papillaire
  - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.5*
  - Non classée ailleurs ¬ *I51.2*

Rupture *–suite*
- Néovessie ¬ *N32.4*
- Non traumatique du pancréas ¬ *K86.88*
- Oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire ¬ Lacération et *S05.2*
- Œsophage ¬ *K22.3*
- Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.3*
- Péricarde ¬ *I21.9*
- Périnatal
- - Intéressant
- - - Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Légère au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Lèvres au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Peau au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Vulve au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - O70
- - - 0 intéressant
- - - - Muscle
- - - - - Périnée au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.1*
- - - - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.1*
- - - - Plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.1*
- - - 1 intéressant
- - - - Cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.2*
- - - - Sphincter
- - - - - Anal au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.2*
- - - - - SAI au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.2*
- - - 2 intéressant muqueux
- - - - Anale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.3*
- - - - Rectale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.3*
- Plaie opératoire ¬ *T81.3*
- Prématurée membrane
- - Début travail
- - - 1 à 7 jours ¬ *O42.11*
- - - 24 heures ¬ *O42.0*
- - - Plus de 7 jours ¬ *O42.12*
- - Sans précision ¬ *O42.9*
- - Traitement tocolytique
- - - Début travail
- - - - 1 à 7 jours ¬ *O42.21*
- - - - 24 heures ¬ *O42.20*
- - - - Plus de 7 jours ¬ *O42.22*
- - - Sans précision du début du travail ¬ *O42.29*

Rupture *–suite*
- Prématurée membrane *–suite*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par la *P01.1*
- Rate
- - Due à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.1*
- - Non traumatique ¬ *D73.5*
- - ¬ Paludisme à Plasmodium vivax avec *B51.0†, D77**
- Rein ¬ *S37.03*
- Spontanée ou non précisée des membranes ¬ Accouchement retardé après *O75.6*
- Spontanées ligament s genou
- - Ligament
- - - Externe] ¬ Autres *M23.64*
- - - Interne ¬ Autres *M23.63*
- - - Non précisé ¬ Autres *M23.69*
- - Ligament capsulaire ¬ Autres *M23.67*
- - Ligament croisé
- - - Antérieur ¬ Autres *M23.61*
- - - Postérieur ¬ Autres *M23.62*
- - Localisations multiples ¬ Autres *M23.60*
- Suture
- - Césarienne ¬ *O90.0*
- - Déchirure du périnée ¬ *O90.1*
- - Épisiotomie ¬ *O90.1*
- - Obstétricale du périnée ¬ *O90.1*
- Syphilitique de l'aorte ¬ *A52.0†, I79.0**
- Tissus périurétraux au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- Totale du parenchyme rénal ¬ *S37.03*
- Traumatique
- - Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Complexe fibrocartilagineux triangulaire ¬ *S63.3*
- - Disque intervertébral
- - - Cervical ¬ *S13.0*
- - - Dorsal ¬ *S23.0*
- - - Lombaire ¬ *S33.0*
- - Ligament
- - - Doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ *S63.4*
- - - Poignet et du carpe ¬ *S63.3*
- - - SAI ¬ *T14.3*
- - Ligament latéral
- - - Externe du coude ¬ *S53.2*
- - - Interne du coude ¬ *S53.3*
- - Muscle(s) SAI ¬ *T14.6*
- - Symphyse pubienne ¬ *S33.4*
- - TFCC [Complexe fibrocartilagineux triangulaire] ¬ *S63.3*
- - Tympan ¬ *S09.2*
- - Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Trompe (de Fallope), due à la grossesse ¬ *O00.1*
- Trompe de Fallope ¬ *N83.8*
- Utérus

Rupture *–suite*
- Utérus *–suite*
- - Avant le début du travail ¬ *O71.0*
- - Non précisée comme survenant avant le début du travail ¬ *O71.1*
- - Pendant le travail ¬ *O71.1*
- Vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.8*
- Varice
- - Œsophagien ¬ Cirrhose
- - - Alcoolique du foie avec hémorragie par *K70.3†, I98.3**
- - - Foie avec hémorragie par *K74.6†, I98.3**
- - - Toxique du foie avec hémorragie par *K71.7†, I98.3**
- - ¬ *I86.1*
- Vessie
- - Non traumatique ¬ *N32.4*
- - ¬ *S37.22*
- ¬
- - Anévrisme aortique
- - - Abdominal, sans mention de *I71.4*
- - - Localisation non précisée, sans mention de *I71.9*
- - - Thoracique, sans mention de *I71.2*
- - - Thoraco-abdominal(e), sans mention de *I71.6*
- - Appendicite aiguë péritonite
- - - Généralisée (diffuse) après perforation ou *K35.2*
- - - Localisée
- - - - Perforation ou *K35.31*
- - - - Sans perforation ni *K35.30*
- - Dissection
- - - Aorte abdominale
- - - - *I71.06*
- - - - Sans indication de *I71.02*
- - - Aorte localisation non précisée
- - - - *I71.04*
- - - - Sans indication de *I71.00*
- - - Aorte thoracique, avec *I71.05*
- - - Aorte thoraco-abdominale
- - - - *I71.07*
- - - - Sans indication de *I71.03*
- - - Artère coronarienne avec *I21.9*

Russe ¬ Méningo-encéphalite verno-estivale *A84.0*

Russel
v./v.a. Hiss-Russel

Russell
v./v.a. Silver-Russell

Russo-asiatique ¬ Fièvre *A77.2*

Rutherfurd ¬ Syndrome oculo-dentaire de *Q87.8*

Ruvalcaba
v./v.a. Bannayan-Riley-Ruvalcaba
- Myhre-Smith ¬ Syndrome de *Q89.8*
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

RVCL-S] ¬ Vasculopathie rétinienne avec leucoencéphalopathie cérébrale et manifestations systémiques [*Q28.38, Q14.1*

Rythme

- Cardiaque
- - Fœtal ¬ anomalie du *P20*
- - Fœtale ¬ Irrégularité du *O68.0*
- - Fœtus
- - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du *O68.2*
- - - ¬ Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du *O68.0*
- - Lent ¬ *R00.1*
- - Non précisées ¬ Anomalies du *R00.8*
- - Rapide ¬ *R00.0*
- Circadien ¬ Inversion psychogène du *F51.2*
- Différent de 24h ¬ Syndrome du *G47.2*
- Ectopique ¬ Trouble du *I49.8*
- Nodal ¬ Trouble du *I49.8*
- Nycthéméral ¬ Inversion psychogène du *F51.2*
- Sinus coronaire ¬ Trouble du *I49.8*
- Sommeil ¬ Inversion psychogène du *F51.2*
- Travail pénible ¬ *Z56*
- Veille sommeil
- - Associé à NRXN1 ¬ Syndrome de trouble neurodéveloppemental sévère-stéréotypies motrices-constipation chronique-trouble du *G96.8*
- - Non dû à une cause organique ¬ Trouble du *F51.2*
- - ¬ Irrégularité du *G47.2*

Sablier
- Congénital ¬ Estomac en *Q40.2*
- Estomac ¬ Contraction en *K31.8*
- Sténose de l'estomac ¬ Estomac en *K31.2*
- Utérus ¬ Contractions: en *O62.4*

Sabre ¬
- Déformation syphilitique du tibia en lame de *A50.5†, M90.26**
- Lésions en coup de *L94.1*

Sac
- Amniotique
- - Membranes ¬ Infection du *O41.1*
- - Unique ¬ Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un *O69.2*
- Conjonctival ¬
- - Brûlure de la cornée et du *T26.1*
- - Corps étranger dans le *T15.1*
- - Corrosion de la cornée et du *T26.6*
- Lacrymal
- - Chronique ¬ Mucocèle du *H04.4*
- - Lacrymonasal ¬ Sténose du: *H04.5*
- - ¬
- - - *C69.5*
- - - *D31.5*
- Vitellin
- - Femme ¬ Tumeur polyvésiculaire du *C56*
- - Homme ¬ Tumeur polyvésiculaire du *C62.9*
- - Région pinéale ¬ Tumeur du *C75.3*
- - Système nerveux central ¬ Tumeur du *C72.9*
- - Testicule
- - - Descendu ¬ Tumeur du *C62.1*
- - - Non descendu ¬ Tumeur du *C62.0*
- - Ventricule cérébral ¬ Tumeur du *C71.5*

Saccade oculaire ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique récessive- *G11.8*

Saccharase-isomaltase ¬ Déficit
- *E74.3*
- Congénital en *E74.3*

Saccharopine déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.3*

Saccharopinurie ¬ *E72.3*

Saccharose ¬ Intolérance au *E74.3*

Saccharose-isomaltose ¬
- Intolérance congénitale au *E74.3*
- Malabsorption de *E74.3*

Sacculaire
- Forme familiale ¬ Anévrisme intracrânien *Q28.30*
- ¬
- - LDM Myéloschisis dorsal limité
- - - *Q76.0*
- - - Non *Q76.0*
- - Myéloschisis dorsal limité *Q76.0*

Sachs
v./v.a. Tay-Sachs

Sack-Barabas ¬ Syndrome de *Q79.6*

Sacks
v./v.a. Libman-Sacks

Sacré
- Bassin ¬ Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, *S34.5*
- Blépharoptosis ¬ Syndrome de fusions des vertèbres lombo- *Q76.4, Q10.0*
- Hydrocéphalie ¬ Spina bifida *Q05.3*
- Ossification anormale des corps vertébraux-persistance de la notochorde ¬ Syndrome d'agénésie *Q79.8*
- Radiculaire ¬ Stimulateur *Z45.80*
- Sans hydrocéphalie ¬ Spina bifida
- - *Q05.8*
- - *Q05.8*
- ¬
- - Dystocie due à la persistance en position: occipito- *O64.0*
- - Lésion
- - - Traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et *S34.2*
- - - Zone *M53.3*
- - Région *S31.0*
- - Sinus *L05*
- - Sténose du canal rachidien dans la région *M48.08*
- - Syndrome de fente labio-palatine-surdité-lipome *Q87.8*
- - Tuberculose *A18.0†, M49.08**

Sacro-coccygien
- Abcès ¬ Kyste *L05.0*
- Bénin ¬ Tératome *D16.8*
- Fœtus
- - Entraînant une disproportion ¬ Tératome *O33.7*
- - ¬ Dystocie due à: tératome *O66.3*
- Myélopathie ¬ Spondylarthrose *M47.18†, G99.2**
- Non classées ailleurs ¬ Atteintes *M53.3*
- ¬
- - Luxation des articulations sacro-iliaque et *S33.2*
- - Ostéomyélite vertébrale dans la région *M46.28*
- - Tératome
- - - *C41.4*
- - - *D48.0*

Sacro-iliaque
v./v.a. Articulation sacro-iliaque
- Sacro-coccygienne ¬ Luxation des articulations *S33.2*

Sacro-iliéite, non classée ailleurs ¬ *M46.1*

Sacrum
- Coccyx ¬ Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: Bassin, *D16.8*
- Lésion de la moelle épinière ¬ Fracture du *S32.1, S34.18*
- Partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne lombaire et *S32.82*

Sacrum *–suite*
- ¬
- - *C41.4*
- - *D16.8*
- - Carie tuberculeuse du *A18.0†, M49.08**
- - Chordome du *C41.4*
- - Fracture du *S32.1*
- - Ostéïte condensante du *M85.38*
- - Ostéoblastome du *D16.8*
- - Ostéosarcome du *C41.4*
- - Sarcome d'Ewing du *C41.4*
- - Sarcome du *C41.4*
- - Tuberculose du *A18.0†, M49.08**

S-adénosylhomocystéine hydrolase ¬
- Déficit en *E72.1*
- Hyperméthioninémie par déficit en *E72.1*
- Retard psychomoteur par déficit en *E72.1*

Sadisme ¬ *F65.5*

Sado-masochisme ¬ *F65.5*

SADS
- Sudden Adult Death Syndrome] ¬ *R96.0*
- Sudden Arrhythmic Death Syndrome] ¬ *I49.9*

Saethre-Chotzen ¬ Syndrome de *Q87.0*

SAG type 3 forme
- Classique ¬ Déficit en 21-hydroxylase [*E25.00*
- Tardive ¬ Déficit en 21-hydroxylase [*E25.01*

Sagie
v./v.a. Ahn-Lerman-Sagie

Saginata ¬ Infection
- Cestodes adultes (Taenia *B68.1*
- Taenia *B68.1*

Sagliker ¬ Syndrome de *N25.8*

Sagou ¬ Rate *E85.4†, D77**

Saguenay
v./v.a. Charlevoix-Saguenay

Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬
- Acidose lactique congénitale type *G31.88*
- Syndrome de Leigh type *G31.88*

Sahli
v./v.a. Mikati-Najjar-Sahli

Saignement
v./v.a. Hémorragie
- Abondants
- - Ménarche ¬ *N92.2*
- - Préménopause ¬ *N92.4*
- Anormal
- - Ménopause ¬ *N95.0*
- - Utérus et du vagin, sans précision ¬ *N93.9*
- Anormaux précisés de l'utérus et du vagin ¬ Autres *N93.8*
- Capillaire primitif ¬ *D69.88*
- Dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI ¬ *N93.8*
- Hypopharynx ¬ *R04.1*
- Intermenstruels irréguliers ¬ *N92.1*
- Irréguliers SAI ¬ *N92.6*

Saignement *–suite*
- Lors d'un avortement septique ¬ *O06.5, O08.1*
- Nez ¬ *R04.0*
- Ovarien ¬ *N83.8*
- Ovulation ¬ *N92.3*
- Ponctuel complication oculaire diabétique
- - Diabète type
- - - 1 ¬ *E10.30†, H58.8**
- - - 2 ¬ *E11.30†, H58.8**
- - ¬ *E14.30†, H58.8**
- Post-coïtaux et de contact ¬ *N93.0*
- Post-ménopausiques ¬ *N95.0*
- Post-partum ¬ Placenta percreta avec *O43.21, O72.0*
- Procidence
- - Effort spontanément réductible
- - - Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec *K64.2*
- - - ¬ Hémorroïdes (avec *K64.1*
- - Réintroduction manuelle impossible ¬ Hémorroïdes (avec *K64.3*
- Prolongée ¬ Durée de *R79.8*
- Puberté ¬ *N92.2*
- Régulier entre les règles ¬ *N92.3*
- SAI ¬ Hémorroïdes (avec *K64.9*
- Sans
- - Indication du degré ¬ Hémorroïdes (avec *K64.9*
- - Procidence ¬ Hémorroïdes (avec *K64.0*
- Utérin ménopausique anormal ¬ *N95.0*
- Varices gastriques ¬ Cirrhose alcoolique du foie avec *K70.3†, I98.3**
- ¬
- - Adhérence du placenta en tant que complication de l'accouchement sans *O43.20, O73.0*
- - Angiectasie
- - - Duodénum
- - - - *K31.82*
- - - - Sans indication de *K31.81*
- - - Estomac
- - - - *K31.82*
- - - - Sans indication de *K31.81*
- - Angiodysplasie
- - - Côlon
- - - - *K55.22*
- - - - Sans indication de *K55.21*
- - - Estomac duodénum
- - - - *K31.82*
- - - - Sans indication de *K31.81*
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation abcès
- - - - - *K57.23*
- - - - - Sans indication de *K57.22*
- - - - Sans perforation abcès
- - - - - *K57.33*

Saignement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Diverticulite *–suite*
- - - Côlon *–suite*
- - - - Sans perforation abcès *–suite*
- - - - - Sans indication de *K57.32*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation et abcès sans indication de *K57.42*
- - - - - Côlon avec perforation, abcès et *K57.43*
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, avec *K57.53*
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.52*
- - - - - Perforation et abcès, sans indication de *K57.02*
- - - - - Perforation, abcès et *K57.03*
- - - - - Sans perforation , abcès ou indication de *K57.12*
- - - - - Sans perforation ni abcès, avec *K57.13*
- - - - Siège non précisé
- - - - - Perforation et abcès, sans indication de *K57.82*
- - - - - Perforation, abcès et *K57.83*
- - - - - Sans perforation ni abcès, avec *K57.93*
- - - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.92*
- - Diverticulose
- - - Côlon sans perforation abcès
- - - - *K57.31*
- - - - Sans indication de *K57.30*
- - - Grêle et du colon sans perforation ni abcès, avec *K57.51*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.50*
- - - - - Sans perforation , abcès ou indication de *K57.10*
- - - - - Sans perforation ni abcès, avec *K57.11*
- - - - Siège non précisé sans perforation abcès
- - - - - *K57.91*
- - - - - Sans indication de *K57.90*
- - Ictère néonatal dû à un *P58.1*
- - Maladie diverticulaire
- - - Côlon
- - - - *K57.31*
- - - - Perforation, abcès et *K57.23*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - *K57.11*
- - - - - Côlon avec *K57.51*
- - - - - Côlon avec perforation, abcès et *K57.43*

Saignement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie diverticulaire *–suite*
- - - Intestin *–suite*
- - - - Grêle *–suite*
- - - - - Perforation, abcès et *K57.03*
- - - - Perforation, abcès et *K57.83*
- - Placenta
- - - Adhaerens
- - - - *O43.20, O72.0*
- - - - Sans *O43.20, O73.0*
- - - Increta
- - - - Sans *O43.21, O73.0*
- - - - Tant que complication de l'accouchement sans *O43.21, O73.0*
- - - Percreta
- - - - Sans *O43.21, O73.0*
- - - - Tant que complication de l'accouchement sans *O43.21, O73.0*
- - Placenta accreta
- - - Sans *O43.20, O73.0*
- - - Tant que complication de l'accouchement sans *O43.20, O73.0*
- - Syndrome GAVE ectasie vasculaire antrale gastrique
- - - Duodénum
- - - - *K31.82*
- - - - Sans indication de *K31.81*
- - - Estomac
- - - - *K31.82*
- - - - Sans indication de *K31.81*
- - Thérapie à long terme avec anticoagulants sans *Z92.1*

Saint-Louis ¬ Encéphalite de *A83.3*

Saisonnier ¬ trouble dépressif *F33*

Saito-Kuba-Tsuruta ¬ Syndrome de *Q87.8*

Sakati
v./v.a. Sanjad-Sakati
v./v.a. Woodhouse-Sakati

Salaam ¬ Tic de *G40.4*

Salamon ¬ Syndrome de *Q82.8*

Salbutamol ¬ *T48.6*

Salcedo ¬ Syndrome de *N07.1*

Saldino-Mainzer ¬ Syndrome de *Q87.5*

Saldino-Noonan ¬ Syndrome des côtes courte-spolydactylie type *Q77.2*

Salem
v./v.a. Al Gazali-Aziz-Salem

Salicylés ¬ Intoxication: *T39.0*

Salih
v./v.a. Bosley-Salih-Alorainy

Salins et osmotiques ¬ Intoxication: Laxatifs *T47.3*

Salivaire
v./v.a. Canal salivaire
v./v.a. Glande salivaire
- ¬
- - Carcinome de la partie centrale du sein de type *C50.1*

Salivaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Troubles de la sécrétion *K11.7*

Salive ¬ Résultats anormaux de: *R85*

Salla ¬ Maladie de *E77.8*

Salmonella
- Hirschfeldii ¬ Infection à *A01.3*
- Paratyphi
- - A ¬ Infection à *A01.1*
- - B ¬ Infection à *A01.2*
- - C ¬ Infection à *A01.3*
- - ¬ Infection à *A01.4*
- Schottmuelleri ¬ Infection à *A01.2*
- Typhi ¬
- - Infection à *A01.0*
- - Lymphadénite mésentérique à *A01.0*
- - Pneumonie à *A01.0†, J17.0**
- ¬
- - Arthrite à *A02.2†, M01.39**
- - Entérite à *A02.0*
- - Infection
- - - Congénitale à *P37.8, B96.2!*
- - - Localisée à *A02.2*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle à *A02.2†, N16.0**
- - Méningite à *A02.2†, G01**
- - Ostéomyélite à *A02.2†, M90.29**
- - Pneumonie à *A02.2†, J17.0**
- - Pyélonéphrite à *A02.2†, N16.0**
- - Septicémie à *A02.1*

Salmonellose
- Non typhique invasive ¬ *A02.8*
- Typhoïde ¬ *A01.0*

Salpingite
- Chlamydia ¬ *A56.1†, N74.4**
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N74.3**
- Ovarite
- - Aiguës ¬ *N70.0*
- - Chroniques ¬ *N70.1*
- - Sans précision ¬ *N70.9*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, N74.2**
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N74.1**
- Vénérienne ¬ *A54.2†, N74.3**

Salpingo-oophorite de la mère pendant la grossesse ¬ Nouveau-né affecté par une *P00.8*

Salpingo-ovarienne ¬ *C57.8*

Salpingo-ovarite
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N74.3**
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N74.1**
- Vénérienne ¬ *A54.2†, N74.3**
- ¬ *N70*

SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [lymphome *C88.4*

SAM [dermatite sévère-allergies multiples-cachexie métabolique] ¬ Syndrome *Q80.8*

SAMD9L ¬ Syndrome auto-inflammatoire associé à *M35.8*

Sammito
v./v.a. Gurrieri-Sammito-Bellussi

San Luis Valley ¬ Syndrome de *Q99.8*

SANDD [Sinoatrial node dysfunction and deafness] syndrome ¬ *I49.8, H90.5*

Sanders ¬ Syndrome de *B30.0†, H19.2**

Sandhoff ¬ Maladie de: *E75.0*

Sandifer ¬ Syndrome de *G24.8*

Sandrow
v./v.a. Laurin-Sandrow

Sanfilippo type
- B ¬ Maladie de *E76.2*
- C ¬ Maladie de *E76.2*
- D ¬ Maladie de *E76.2*

Sang
- Anomalies du système immunitaire ¬ Glomérulopathie au cours de maladies du *N08.2**
- Chronique) ¬ Anémie par carence en fer secondaire à une perte de *D50.0*
- Entier
- - Produits du sang ¬ *T45.8*
- - ¬ Donneur de *Z52.00*
- Fœtal
- - Due
- - - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ Perte de *P50.0*
- - - Rupture du cordon ¬ Perte de *P50.1*
- - Niveau de la section du cordon d'un jumeau ¬ Perte de *P50.5*
- - Origine placentaire ¬ Perte de *P50.2*
- - Sans précision ¬ Perte de *P50.9*
- - ¬
- - - Anémie congénitale par perte de *P61.3*
- - - Pertes de *P50.8*
- Incompatible ¬ Transfusion de *T80.3*
- Maternel ¬
- - Hématémèse et mélæna néonatals dus à une déglutition de *P78.2*
- - Ictère néonatal dû à une déglutition de *P58.5*
- Occulte dans les selles ¬ *R19.5*
- Organe hématopoïétique
- - Certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du *O99.1*
- - Certains troubles système immunitaire ¬
- - - Antécédents familiaux de maladies du *Z83.2*
- - - Antécédents personnels de maladies du *Z86.2*
- - - Examen spécial de dépistage de maladies du *Z13.0*

Sang *–suite*
- Organe hématopoïétique *–suite*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres maladies du *D77**
- - Sans précision ¬ Maladie du *D75.9*
- - ¬ Autres maladies précisées du *D75.8*
- Sans précision ¬
- - Présence d'une substance non trouvée normalement dans le *R78.9*
- - Résultat anormal des examens chimiques du *R79.9*
- Substances susceptibles d'entraîner une dépendance ¬ Présence dans le *R78.4*
- Troubles du système immunitaire ¬ Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du *N16.2**
- ¬
- - 200
- - - 499 lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par microlitre de *U61.2!*
- - - Lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par microlitre de *U61.3!*
- - 500 lymphocytes T auxiliaires (CD4+) et plus par microlitre de *U61.1!*
- - Arthropathie au cours d'une maladie du *D75.9†, M36.3**
- - Aspiration néonatale de *P24.2*
- - Donneur d'autres composants du *Z52.08*
- - Excès de sel dans le *E87.0*
- - Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du *T37.2*
- - Maladie due au VIH avec maladie du *B23.8, D75.9*
- - Pneumonie due à l'inhalation de *J69.8*
- - Présence
- - - Alcool dans le *R78.0*
- - - Cocaïne dans le *R78.2*
- - - Hallucinogène dans le *R78.3*
- - - Opiacé dans le *R78.1*
- - - Produit stéroïdien dans le *R78.6*
- - - Substance
- - - - Précisées non trouvées normalement dans le *R78.8*
- - - - Psychotrope dans le *R78.5*
- - - Taux anormal de lithium dans le *R78.8*
- - - Taux anormalement élevé de métaux lourds dans le *R78.7*
- - Recherche d'alcool ou de drogue dans le *Z04.8*
- - Résultats anormaux précisés des examens chimiques du *R79.8*
- - Sang entier et produits du *T45.8*
- - Syndrome WT membres- *D61.0*
- - Taux anormal
- - - Gaz du *R79.8*
- - - Minéraux dans le *R79.0*

Sanglant
- Séreuse) ¬ Otite moyenne, aiguë et subaiguë: allergique (muqueuse) (*H65.1*

Sanglant *–suite*
- ¬
- - Expectorations *R04.2*
- - Otite moyenne, aiguë et subaiguë: *H65.1*

Sanglier ¬ Brucellose du porc et du *A23.2*

Sanglot ¬ Spasme du *R06.88*

Sangsues SAI ¬ Infestation par *B88.3*

Sanguin
v./v.a. Vaisseau sanguin
- Durablement acquis ¬ Troubles de la coagulation *U69.11!*
- Géantes ¬ Syndrome des plaquettes *D69.1*
- Lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ Réaction à une incompatibilité de groupes *T80.3*
- Sans mention de diagnostic ¬ Transfusion *Z51.3*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): caillot *O08.2*
- ¬
- - Dermite due à Liponyssoides *B88.0*
- - Embolie obstétricale par caillot *O88.28*
- - Nævus *Q82.5*
- - Trouble provisoire de la coagulation *U69.12!*
- - Vaisseau
- - - *C49*
- - - *D21*

Sanitaire au cours d'enquêtes de population ¬ Examen *Z00.8*

Sanjad-Sakati ¬ Syndrome de *Q87.1*

Sans abri ¬ *Z59*

Santavuori
v./v.a. Hagberg-Santavuori

SAOS [Syndrome d'apnée du sommeil obstructif] ¬ *G47.31*

Saphène
- Externe au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de la veine *S85.4*
- Interne
- - Niveau
- - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique de la veine *S75.2*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique de la veine *S85.3*
- - SAI ¬ Veine *S85.3*

SAPHO
- Synovite acné pustulose hyperostose ostéite ostéite
- - Avant-bras ¬ Syndrome *M86.33*
- - Bras ¬ Syndrome *M86.32*
- - Cheville ¬ Syndrome *M86.37*
- - Colonne vertébrale ¬ Syndrome *M86.38*
- - Jambe ¬ Syndrome *M86.36*
- - Localisations multiples ¬ Syndrome *M86.30*
- - Main ¬ Syndrome *M86.34*
- - Région de l'épaule ¬ Syndrome *M86.31*
- - Région pelvienne ¬ Syndrome *M86.35*

SAPHO *–suite*
- ¬ Syndrome *M86.39*

Sapin de Noël ¬ Cataracte en *G71.1†, H28.2**

SAPL [syndrome des antiphospholipides] ¬ *D68.6*

Saponification mésentérique ¬ *K65.8*

Sarcocèle syphilitique
- Congénitale ¬ *A50.5†, N51.1**
- ¬ *A52.7†, N51.1**

Sarcocystose ¬ *A07.8*

Sarcoglycanopathie
v./v.a. Alpha-sarcoglycanopathie
v./v.a. Bêta-sarcoglycanopathie
v./v.a. Delta-sarcoglycanopathie
v./v.a. Gamma-sarcoglycanopathie

Sarcoïde
- Darier-Roussy ¬ *D86.3*
- ¬ Myocardite lors d'une *D86.8†, I41.8**

Sarcoïdose
- Ganglion lymphatique ¬
- - *D86.1*
- - Sarcoïdose du poumon avec *D86.2*
- Localisations autres et associées ¬ *D86.8*
- Peau ¬ *D86.3*
- Poumon
- - Sarcoïdose des ganglions lymphatiques ¬ *D86.2*
- - ¬ *D86.0*
- ¬
- - *D86.9*
- - Arthrite au cours de *D86.8†, M14.89**
- - Arthropathie de la *D86.8†, M14.89**
- - Cardiomyopathie au cours de *D86.8†, I43.8**
- - Granulomes hépatiques au cours de *D86.8†, K77.8**
- - Iridocyclite de la *D86.8†, H22.1**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *D86.9†, N16.2**
- - Myocardite au cours de *D86.8†, I41.8**
- - Myopathie au cours de *D86.8†, G73.7**
- - Myosite au cours de *D86.8†, M63.39**
- - Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de *D86.8†, G53.2**
- - Pyélonéphrite au cours de *D86.8†, N16.2**

Sarcomatose cutanée idiopathique ¬ *C46.0*

Sarcome
- Améloblastique de la mandibule ¬ *C41.1*
- Cellule dendritique
- - Cellules accessoires) ¬ *C96.4*
- - Folliculaires ¬ *C96.4*
- - Interdigitées ¬ *C96.4*
- - Sans autre spécification ¬ *C96.4*
- Cellules claires du rein ¬ *C64*
- Cellules de Kupffer ¬ *C22.3*
- Cellules de Langerhans ¬ *C96.4*
- Clavicule ¬ *C41.32*
- Coccyx ¬ *C41.4*

Sarcome *–suite*
- Col de l'utérus
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C53.8*
- - ¬ *C53.9*
- Colonne vertébrale ¬ *C41.2*
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Côtes ¬ *C41.30*
- D 'Ewing squelettique des os courts du membre supérieur ¬ *C40.1*
- Embryonnaire indifférencié du foie ¬ *C22.4*
- Endocol ¬ *C53.0*
- Exocol ¬ *C53.1*
- Fémur ¬ *C40.2*
- Foie ¬ Autres *C22.4*
- Granulocytaire
- - Rémission complète ¬ *C92.31*
- - ¬ *C92.30*
- Hémorragique idiopathique multiple ¬ *C46.9*
- Histiocytaire ¬ *C96.8*
- Histiocytaire-lymphocytaire ¬ *C85.9*
- Hodgkin ¬ *C81.3*
- Humérus ¬ *C40.0*
- Immunoblastique
- - Diffus ¬ *C83.3*
- - ¬ Maladie par VIH avec *B21, C83.3*
- L 'omoplate ¬ *C40.0*
- Lymphocytaire ¬ *C85.9*
- Mâchoire supérieure ¬ *C41.02*
- Mandibule ¬ *C41.1*
- Mastocytaire ¬ *C96.2*
- Mastocytes ¬ *C96.2*
- Maxillaire ¬ *C41.1*
- Myéloïde
- - Rémission complète ¬ *C92.31*
- - ¬ *C92.30*
- Neurogène ¬ *C47.9*
- Non différencié du foie ¬ *C22.4*
- Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*
- Os
- - Crâne ¬ *C41.01*
- - Ethmoïde ¬ *C41.01*
- - Face ¬ *C41.02*
- - Frontal ¬ *C41.01*
- - Nasal ¬ *C41.02*
- - Occipital ¬ *C41.01*
- - Pariétal ¬ *C41.01*
- - Sphénoïde ¬ *C41.01*
- - Temporal ¬ *C41.01*
- - Zygomatique ¬ *C41.02*
- Osseux ¬ *C41.9*
- Ostéoblastique ¬ *C41.9*
- Ostéogène ¬ *C41.9*
- Ostéoplastique ¬ *C41.9*
- Pelvis ¬ *C41.4*
- Péroné ¬ *C40.2*
- Radius ¬ *C40.0*

Sarcome *–suite*
- Rotule ¬ *C40.3*
- Sacrum ¬ *C41.4*
- Sternum ¬ *C41.31*
- Thorax SMARCA4-déficient ¬ *C49.3*
- Tibia ¬ *C40.2*
- Tissu conjonctif
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Dos ¬ *C49.6*
- - Épaule ¬ *C49.1*
- - Membres supérieurs ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Tronc ¬ *C49.6*
- Ulna ¬ *C40.0*
- Vomer ¬ *C41.02*
- ¬ Maladie due au VIH avec *B21*

Sarcome alvéolaire tissu mou
- Abdomen ¬ *C49.4*
- Cou ¬ *C49.0*
- Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- Membres
- - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - Supérieurs ¬ *C49.1*
- Pelvis ¬ *C49.5*
- Tête ¬ *C49.0*
- Thorax ¬ *C49.3*
- Tronc ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Sarcome d'Ewing
- Bassin ¬ *C41.4*
- Clavicule ¬ *C41.32*
- Coccyx ¬ *C41.4*
- Colonne vertébrale ¬ *C41.2*
- Côte ¬ *C41.30*
- Cubitus ¬ *C40.0*
- Extraosseux ¬ *C49.9*
- Extrasquelettique
- - Hanche ¬ *C49.2*
- - Tissu mou
- - - Abdomen ¬ *C49.4*
- - - Cou ¬ *C49.0*
- - - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- - - Médiastin
- - - - Antérieur ¬ *C38.1*
- - - - Postérieur ¬ *C38.2*
- - - - ¬ *C38.3*
- - - Membres
- - - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - - Pelvis ¬ *C49.5*
- - - Tête ¬ *C49.0*
- - - Thorax ¬ *C49.3*
- - - Tronc ¬ *C49.6*
- - - ¬ *C49.1*
- - ¬ *C49.9*
- Fémur ¬ *C40.2*

Sarcome d'Ewing *–suite*
- Humérus ¬ *C40.0*
- Mandibule ¬ *C41.1*
- Maxillaire supérieur ¬ *C41.02*
- Membres
- - Inférieurs, à localisations contiguës ¬ *C40.8*
- - Supérieurs, à localisations contiguës ¬ *C40.8*
- Omoplate ¬ *C40.0*
- Os
- - Face ¬ *C41.01*
- - Localisations contiguës ¬ *C41.8*
- - Long ¬ *C40.9*
- Péroné ¬ *C40.2*
- Radius ¬ *C40.0*
- Rotule ¬ *C40.3*
- Sacrum ¬ *C41.4*
- Sternum ¬ *C41.31*
- Tibia ¬ *C40.2*
- Voûte du crâne ¬ *C41.01*
- ¬
- - *C41.9*
- - Endothéliome diffus des os [*C41.9*

Sarcome de Kaposi
- Conjonctive ¬ *C46.7*
- Ganglions lymphatiques ¬ *C46.3*
- Organes multiples ¬ *C46.8*
- Palais ¬ *C46.2*
- Peau ¬ *C46.0*
- Sans précision ¬ *C46.9*
- Sièges ¬ *C46.7*
- Tissu conjonctif ¬ *C46.1*
- Tissus mous ¬ *C46.1*
- ¬ Maladie due au VIH avec *B21, C46.9*

Sarcome de tissu conjonctif
- Hanche ¬ *C49.2*
- Membres inférieurs ¬ *C49.2*

Sarcome des tissus mous
- Abdomen ¬ *C49.4*
- Cellule claire membres
- - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - Supérieurs ¬ *C49.1*
- Cou ¬ *C49.0*
- Dos ¬ *C49.6*
- Épaule ¬ *C49.1*
- Hanche ¬ *C49.2*
- Membres
- - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - Supérieurs ¬ *C49.1*
- Pelvis ¬ *C49.5*
- Tête ¬ *C49.0*
- Thorax ¬ *C49.3*
- Tissus mous, lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- Tronc ¬ *C49.6*

Sarcome des tissus mous *–suite*
- ¬ *C49.9*

Sarcome épithélioïde
- Tissu mou
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Tête ¬ *C49.0*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - Tronc ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Sarcome pléomorphe indifférencié
- Abdomen ¬ *C49.4*
- Épaule ¬ *C49.1*
- Hanche ¬ *C49.2*
- Membre
- - Inférieur ¬ *C49.2*
- - Supérieur ¬ *C49.1*
- Thorax ¬ *C49.3*
- ¬ *C49.9*

Sarcome synovial
- Tissu mou
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Cou ¬ *C49.0*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Tête ¬ *C49.0*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - Tronc ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Sarcopénie ¬ *M62.59*

Sarcosine déshydrogénase ¬ Déficit en complexe *E72.5*

Sarcosinémie ¬ *E72.5*

Sarcosporidiose
- Intestinale ¬ *A07.8*
- ¬ *A07.8*

Sargent
v./v.a. Morse-Rawnsley-Sargent

SARM ¬
- Infection à *A49.00, U80.00!*
- Septicémie à *A41.0, U80.00!*

SARS-CoV-2 ¬ Procédures spéciales pour le dépistage du *Z11, U99.0!*

SASH3 ¬ Déficit immunitaire combiné lié à l'X par déficit en *D81.8*

Satoyoshi ¬ Syndrome de *Q87.8*

Saturnina ¬ Encephalitis *T56.0†, G05.8**

Saturnine ¬
- Colique *T56.0*
- Encéphalopathie *T56.0*

Saturnine ¬ *–suite*
- Goutte *M10.1*
- Paralysie *T56.0*

Saturnisme ¬ *T56.0*

Satyriasis ¬ *F52.7*

Saul-Wilson ¬ Dysplasie ostéodysplasique microcéphalique type *Q87.5*

Sauvage
- Importé ¬ Poliomyélite paralytique, virus *A80.1*
- Indigène ¬ Poliomyélite paralytique, virus *A80.2*

Savarirayan ¬ Dysplasie mésomélique type *Q78.8*

Savon
- Détergents ¬ Effet toxique de *T55*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- ¬ Intoxication au *T55*

Say
v./v.a. Barber-Say

Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson ¬ Syndrome de *Q87.8*

Say-Barber-Miller ¬ Syndrome de *Q87.8*

Say-Meyer ¬ Syndrome de *Q87.0*

Sayre
- Ophtalmoplégie associée] ¬ Syndrome de Kearns- *G31.81*
- ¬
  - Strabisme paralytique au cours de syndrome de Kearns- *H49.8*
  - Syndrome de Kearns- *G31.81*

SCA
- Ataxie spinocérébelleuse] type 27B ¬ *G11.2*
- Syndrome coronaire aigu] ¬ *I24.9*
- Type
  - 1 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 2 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 3 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 4 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 5 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 6 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 7 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 8 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 10 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 11 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 12 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 13 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 14 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 15/16 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 17 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 18 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 19/20 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 20 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 21 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.1*
  - 23 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 25 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 26 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*

SCA *–suite*
- Type *–suite*
  - 27 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.1*
  - 28 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.1*
  - 29 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.0*
  - 30 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 31 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 32 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 34 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 35 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 36 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 37 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 38 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 40 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 41 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 42 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.8*
  - 43 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 44 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 45 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 46 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 47
    - Adulte ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
    - ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 48 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*
  - 49 ¬ Ataxie spinocérébelleuse [*G11.2*

SCAD ¬ Déficit en *E71.3*

SCALP ¬ Syndrome *Q84.8*

Scaphocéphalie
- Familiale type McGillivray ¬ *Q75.0*
- Isolée ¬ *Q75.0*

Scaphoïde
v./v.a. talo-patello-scaphoïde
- Main ¬ Fracture de l'os *S62.0*
- Tarse] ¬ Fracture :Os naviculaire du pied[*S92.21*
- Tarsien ¬ Ostéochondrite juvénile, *M92.6*

Scapulaire
v./v.a. Région scapulaire
- Partie non précisée ¬ Fracture de la ceinture *S42.9*
- SAI ¬
  - Entorse et foulure de la ceinture *S43.7*
  - Luxation de la ceinture *S43.3*
- ¬
  - Dystrophie musculaire de la ceinture *G71.08*
  - Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture *S43.7*
  - Epine *S42.12*
  - Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture *S43.3*
  - Malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture *Q74.0*
  - Myopathie de la ceinture *G71.08*
  - Névrite *G54.5*

Scapulaire *–suite*
- ¬ *–suite*
  - Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture *S41.80*

Scapulo péronier
- Neurogénique type Kaeser ¬ Syndrome *G12.1*
- ¬ Syndrome *G71.08*

Scapulo-humérale ¬ Myopathie *G71.08*

Scapulohuméropéronière progressive ¬ Myopathie distale *G71.08*

Scapulo-iliaque ¬ Dysostose *Q87.5*

Scapulo-péronière
- Bénigne avec contractures précoces (de type Emery-Dreifuss) ¬ Dystrophie musculaire *G71.08*
- Liée à l'X ¬ Dystrophie musculaire *G71.08*
- Tardive associée à MYH7 ¬ Dystrophie musculaire *G71.08*
- ¬
  - Amyotrophie spinale (de): forme *G12.1*
  - Dystrophie musculaire *G71.08*

Scarabiase ¬ *B88.2*

SCARF ¬ Syndrome *Q82.8*

Scarlatine
- Staphylocoques ¬ *A38*
- ¬
  - *A38*
  - Complications de la *A38*
  - Fièvre *A38*
  - Myocardite au cours de *A38†, I41.0**
  - Otite moyenne nécrosante aiguë au cours de *A38†, H67.0**

Scarlatineux ¬
- Albuminurie *A38*
- Angine *A38*
- Cholangite *A38†, K87.0**
- Exanthème *A38*
- Méningite *A38†, G01**
- Néphrite *A38†, N29.1**
- Otite *A38†, H67.0**

Scedosporium ¬ Infection à *B48.2*

Schaaf
v./v.a. Bosch-Boonstra-Schaaf

Schaaf-Yang ¬ Syndrome de *Q87.1*

Schaap-Taylor-Baraitser ¬ Syndrome de *Q87.8*

SCHAD ¬ Déficit en *E71.3*

Schaumann ¬
- Lymphogranulomatose bénigne de *D86.9*
- Maladie de *D86.9*

Scheie ¬ Syndrome de: *E76.0*

Schelley
v./v.a. Johnston-Aarons-Schelley

Schenk ¬ Maladie de *B42.1*

Schepens
v./v.a. Criswick-Schepens

Scherer
v./v.a. van Bogaert-Scherer-Epstein
Scheuermann
- Familiale ¬ Cyphose juvénile de *M42.09*
- ¬ Maladie de: *M42.0*
Schilbach-Rott ¬ Syndrome de *Q87.8*
Schilder
v./v.a. Addison-Schilder
- Addison ¬ Complexe de *E71.3*
- Foix-Heubner ¬ Syndrome de *G37.0*
- ¬
- - Maladie de *G37.0*
- - Syndrome de *G37.0*
Schimke ¬
- Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*
- Dysplasie immuno-osseuse de *Q77.7*, *D82.8*
- Syndrome de *Q77.7*, *D82.8*
Schimmelpenning-Feuerstein-Mims ¬ Syndrome de *Q85.8*
Schindler
- Type
- - 1 ¬ Maladie de *E77.1*
- - 2 ¬ Maladie de *E77.1*
- - 3 ¬ Maladie de *E77.1*
- ¬ Maladie de *E77.1*
Schinzel
v./v.a. Ritscher-Schinzel
Schinzel-Giedion ¬ Syndrome de *Q87.0*
Schisis association ¬ *Q87.8*
Schistosoma
- Haematobium ¬ Schistosomiase due à *B65.0*
- Japonicum ¬ Schistosomiase due à *B65.2*
- Mansoni ¬ Schistosomiase due à *B65.1*
Schistosomiase
- Due Schistosoma
- - Haematobium ¬ *B65.0*
- - Japonicum ¬ *B65.2*
- - Mansoni ¬ *B65.1*
- ¬
- - Calcul urinaire au cours de *B65.0†*, *N22.0**
- - Formes de *B65.8*
- - Varice gastrique
- - - Cours de *B65.9†*, *I98.2**
- - - Indication d'hémorragie, au cours de *B65.9†*, *I98.3**
Schizencéphalie ¬ *Q04.6*
Schizo-affectif
- SAI ¬ Psychose *F25.9*
- Sans précision ¬ Trouble *F25.9*
- Type
- - Dépressif ¬
- - - Psychose: *F25.1*
- - - Trouble *F25.1*
- - Maniaque ¬
- - - Psychose: *F25.0*
- - - Trouble *F25.0*
Schizo-affectif *–suite*
- Type *–suite*
- - Mixte ¬ Trouble *F25.2*
- - ¬ Autres troubles *F25.8*
Schizoïde
- Enfance ¬ Trouble *F84.5*
- ¬ Personnalité *F60.1*
Schizophrénie
- Aiguë (indifférenciée) ¬ *F23.2*
- Atypique ¬ *F20.3*
- Borderline ¬ *F21*
- Catatonique ¬ *F20.2*
- Cénestopathique ¬ *F20.8*
- Chronique indifférenciée ¬ *F20.5*
- Cyclique ¬ *F25.2*
- Début
- - Infantile ¬ *F20.9*
- - Précoce ¬ *F84.5*
- Désorganisée ¬ *F20.1*
- Hébéphrénique ¬ *F20.1*
- Indifférenciée ¬ *F20.3*
- Latente ¬ *F21*
- Paranoïde ¬ *F20.0*
- Paraphrénique ¬ *F20.0*
- Pré-psychotique ¬ *F21*
- Prodromique ¬ *F21*
- Pseudo-névrotique ¬ *F21*
- Pseudo-psychopathique ¬ *F21*
- Résiduelle ¬ *F20.5*
- Sans précision ¬ *F20.9*
- Simple ¬ *F20.6*
- ¬ Autres formes de *F20.8*
Schizophréniforme
- Courte durée ¬
- - Psychose *F23.2*
- - Trouble *F23.2*
- Type
- - Dépressif ¬ Psychose: *F25.1*
- - Maniaque ¬ Psychose: *F25.0*
- ¬
- - Psychose SAI *F20.8*
- - Trouble SAI *F20.8*
Schizophrénique
- Affective mixte ¬ Psychose *F25.2*
- Cours d'une épilepsie ¬ Psychose d'allure *F06.2*
- Latente ¬ Réaction *F21*
- Sans précision ¬
- - Bouffée délirante sans symptômes *F23.0*
- - Psychose cycloïde sans symptômes *F23.0*
- Type affectif ¬ Psychose *F25.9*
- ¬
- - Bouffée délirante avec symptômes *F23.1*
- - Catalepsie *F20.2*
- - Catatonie *F20.2*
- - État résiduel *F20.5*
Schizophrénique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Flexibilité cireuse *F20.2*
- - Psychose cycloïde avec symptômes *F23.1*
- - Réaction *F23.2*
- - Restzustand (*F20.5*
- - Trouble
- - - Délirant organique [d'allure *F06.2*
- - - Psychotique aigu
- - - - Allure *F23.2*
- - - - Polymorphe
- - - - - Sans symptômes *F23.0*
- - - - - Symptômes *F23.1*
Schizotypique ¬
- Personnalité *F21*
- Trouble *F21*
Schlatter ¬ Maladie d'Osgood- *M92.5*
Schlossmann
v./v.a. Posner-Schlossmann
Schmid ¬ Chondrodysplasie métaphysaire type *Q78.5*
Schmidt
v./v.a. McArdle-Schmidt-Pearson
- ¬
- - Dysplasie spondylo-métaphysaire type *Q77.8*
- - Syndrome de *E31.0*
Schmitz-Stutzer ¬ Dysenterie de *A03.0*
Schmorl ¬ Nodules de *M51.4*
Schneckenbecken ¬ Dysplasie *Q77.7*
Schnitzler ¬ Syndrome de *L50.8*
Schnyder ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*
Schoenlein-Henoch ¬
- Arthropathie au cours de purpura de *D69.0†*, *M36.4**
- Glomérulonéphrite au cours de purpura de *D69.0†*, *N08.2**
- Maladie glomérulaire au cours de purpura de *D69.0†*, *N08.2**
Scholte-Begeer-van Essen ¬ Syndrome de *Q87.8*
Schönberg ¬ Syndrome d'Albers- *Q78.2*
Schöner
v./v.a. Heilmeyer-Schöner
Schönlein-Henoch ¬ Arthrite au cours de purpura de *D69.0†*, *M36.4**
Schöpf-Schulz-Passarge ¬ Syndrome de *Q82.8*
Schorderet ¬ Syndrome oculo-auriculaire type *Q87.0*
Schüller
v./v.a. Hand-Schüller-Christian
Schultze] ¬ Acroparesthésie: simple [type *I73.8*
Schulz
v./v.a. Schöpf-Schulz-Passarge
Schuurs-Hoeijmakers ¬ Syndrome de *Q87.0*
Schwalbe-Ziehen-Oppenheim ¬ Syndrome de *G24.1*
Schwannomatose ¬ *Q85.0*

Schwannome
- Bénin ¬ *D36.1*
- Malin
- - Nerf
- - - Abdomen ¬ *C47.4*
- - - Abdomino-pelviens ¬ *C47.8*
- - - Cou ¬ *C47.0*
- - - Hanche ¬ *C47.2*
- - - Membres
- - - - Inférieurs ¬ *C47.2*
- - - - Supérieurs ¬ *C47.1*
- - - Pelviens ¬ *C47.5*
- - - Tête ¬ *C47.0*
- - - Thorax ¬ *C47.3*
- - - Tronc ¬ *C47.6*
- - Nerfs périphériques, à localisations contiguës ¬ *C47.8*
- - ¬ *C47.9*
- Mélanotique ¬ *D36.1*
- Pigmenté ¬ *D36.1*
- Vestibulaire ¬ *D33.3*

Schwartz-Jampel-Aberfeld ¬ Syndrome de *Q78.8*

Schweninger-Buzzi ¬ Anétodermie de *L90.1*

Schwickerath
v./v.a. Meyer-Schwickerath

Sciatique
- Due
- - Déplacement de disque intervertébral ¬ Névrite du nerf *M51.1†, G55.1**
- - Discopathie intervertébrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique du nerf *S74.0*
- Poplité
- - Externe
- - - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du nerf *S84.1*
- - - ¬ Lésion du nerf *G57.3*
- - Interne
- - - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du nerf *S84.0*
- - - ¬ Lésion du nerf *G57.4*
- ¬
- - *M54.3*
- - Hernie: *K45*
- - Lésion du nerf *G57.0*
- - Lumbago avec *M54.4*

SCID
- Déficit immunitaire combiné sévère] ¬ *D81.9*
- T-B- [Déficit immunitaire combiné sévère] ¬ *D81.1*
- T-B+ [Déficit immunitaire combiné sévère] ¬ *D81.2*

Scintigraphie ¬ résultats anormaux de: *R94*

Scintillant ¬ Scotome *H53.1*

Sclère ¬
- Syphilis tardive de la *A52.7†, H19.0**

Sclère ¬ *–suite*
- Tuberculose de la *A18.5†, H19.0**

Sclérectasie ¬ *H15.8*

Sclérème
- Adulte ¬ *M34.8*
- Nouveau-né ¬ *P83.0*

Scléreux
- Atrophique ¬ Lichen *L90.0*
- Oblitérante [balanitis xerotica obliterans] ¬ Balanite *N48.0*
- Sans précision ¬ Rein *N26*
- Tuberculeux ¬ Rein *A18.1†, N29.1**

Sclérite
- Auto-immune ¬ *H15.0*
- Épisclérite au cours de maladies classées ailleurs ¬ *H19.0**
- Idiopathique ¬ *H15.0*
- Infectieuse ¬ *H15.0*
- Purulente ¬ *H15.0*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, H19.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.0**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H19.0**
- ¬ *H15.0*

Sclérocornée isolée congénitale ¬ *Q13.3*

Sclérodactylie
- Télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de Raynaud-troubles moteurs œsophagiens- *M34.1*
- ¬ *L94.3*

Sclérodermie
- Circonscrite ¬ *L94.0*
- Diffuse ¬ *M34.9*
- Généralisée ¬ *M34.9*
- Linéaire ¬ *L94.1*
- Localisée ¬ *L94.0*
- Néonatale ¬ *P83.8*
- Pulmonaire ¬ *M34.8†, J99.1**
- Systémique
- - Cutanée diffuse ¬ *M34.0*
- - ¬ *M34.9*
- ¬
- - *M34.9*
- - Myopathie au cours de *M34.8†, G73.7**
- - Sclérose systémique sans *M34.0*

Sclérodermoïde généralisé ¬ Myxœdématose lichéniforme papulaire et *L98.5*

Sclérœdème
- Adulte ¬ *M34.8*
- Buschke ¬ *M34.8*

Sclérokératite tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.2**

Sclérokystique ¬ Syndrome (de): ovarien *E28.2*

Scléromyxœdème ¬ *L98.5*

Sclérosant
- Cordon postérieur ¬ Syphilis *A52.1†, G32.8**
- Cours

Sclérosant *–suite*
- Cours *–suite*
- - Diabète sucré insulinodépendant ¬ Lobulite lymphocytaire *E14.60, N61*
- - Thyroïdite de Hashimoto ¬ Lobulite lymphocytaire *E06.3, N61*
- Diffuse, sans précision ¬ Glomérulonéphrite *N18.9*
- Glande sous-mandibulaire ¬ Sialadénite chronique *K11.2*
- Héréditaire de Weary ¬ Poïkilodermie *Q82.8*
- IgG4 ¬ Cholangite *K83.01*
- Mixte avec manifestations extra-squelettiques ¬ Dystrophie osseuse *Q87.5*
- Néonatale isolée ¬ Cholangite *K83.00*
- Primitive
- - Hépatite auto-immune ¬ Chevauchement de cholangite *K75.4, K83.00*
- - ¬ PSC [Cholangite *K83.00*
- Progressive d'Alpers ¬ Polydystrophie *G31.88*
- Secondaire ¬ Cholangite *K83.01*
- Subaiguë ¬
- - Leucoencéphalite *A81.1*
- - PSS [Panencéphalite *A81.1*
- Van Bogaert ¬ Leucoencéphalopathie *A81.1*
- ¬
- - Angiocholite *K83.08*
- - Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents *T46.8*
- - NISCH [Syndrome néonatal d'ichtyose-cholangite *K83.00, Q80.8*
- - Périneuriome *D36.1*
- - Syndrome de kératose linéaire-ichtyose congénitale-kératodermie *Q82.8*

Sclérose
- Alcooliques du foie ¬ Fibrose et *K70.2*
- Alzheimer ¬ Démence au cours de *G30.9†, F00.9**
- Artère périphérique ¬ *I70.29*
- Cérébrale
- - Diffuse
- - - Familiale ¬ *E75.2*
- - - ¬ *G37.0*
- - Infantile ¬ *E75.2*
- - Krabbe ¬ *E75.2*
- - Lobaire atrophique ¬ Démence au cours de *G31.0†, F02.0**
- - Pelizaeus-Merzbacher ¬ *E75.2*
- - Syphilitique ¬ *A52.1†, G94.8**
- Choroïde ¬ *H31.1*
- Concentrique
- - Baló] ¬ *G37.5*
- - ¬ Maladie de Greenfield [*G37.5*
- Crânienne ¬ Syndrome d'ostéopathie striée-*Q87.5*
- Endostéale hypoplasie cérébelleuse ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Foie d'origine cardiaque ¬ *K76.1*

Sclérose *–suite*
- Hépatique ¬
- - *K74.1*
- - Fibrose hépatique, avec *K74.2*
- Hippocampe ¬ Épilepsie du lobe mésio-temporal avec *G40.2, G37.8*
- Latérale
- - Amyotrophique
- - - Type 4 ¬ *G12.2*
- - - ¬
- - - - *G12.2*
- - - - Maladie de Charcot [*G12.2*
- - - - SLA [*G12.2*
- - Primitive ¬ *G12.2*
- Media ¬ *I70.29*
- Mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux stéroïdes avec *N04.8*
- Mönckeberg
- - Media) ¬ *I70.2*
- - ¬ *I70.29*
- Myélinoclastique diffuse ¬ *G37.0*
- Nodulaire ¬ Lymphome de Hodgkin (classique) avec *C81.1*
- Nucléaire ¬ *H25.1*
- Pancréas ¬ *K86.88*
- Présénile ¬ Démence au cours de *G30.0†, F00.0**
- Pulmonaire ¬ *J84.10*
- Rénale SAI ¬ *N26*
- Rétine ¬ *I70.8†, H36.8**
- Rhumatismal
- - Valve aortique ¬ *I06.8*
- - Valve mitrale ¬ *I05.8*
- Sphincter vésical ¬ *N32.8*
- Spinale postérieure ¬ *A52.1†, G32.8**
- Tabique du cordon postérieur ¬ *A52.1†, G32.8**
- Tubéreuse ¬
- - *Q85.1*
- - Polykystose rénale autosomique dominante type 1 avec *Q61.2, Q85.1*

Sclérose en plaques
- Aiguë Marburg
- - Progressive primaire
- - - Exacerbation aiguë ¬ *G35.21*
- - - ¬ *G35.20*
- - Rémittente (évolution par poussées) ¬ *G35.10*
- - ¬
- - - *G35.9*
- - - Première manifestation d'une *G35.0*
- Disséminée ¬ *G35*
- Enfant rémittente évolution poussées
- - Exacerbation aiguë ¬ *G35.11*
- - ¬ *G35.10*
- Généralisée ¬ *G35*

Sclérose en plaques *–suite*
- Ichtyose-déficit en facteur VIII ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Moelle épinière ¬ *G35*
- Non précisée ¬ *G35.9*
- Pédiatrique ¬ *G35.9*
- Primaire progressive] ¬ SEP-PP [*G35.20*
- Progressive emblée chronique progressive primaire
- - Mention d'exacerbation aiguë ou de progression ¬ *G35.21*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression ¬ *G35.20*
- - ¬ *G35.2*
- Rémittente
- - Évolution poussées
- - - Mention d'exacerbation aiguë ou de progression ¬ *G35.11*
- - - Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression ¬ *G35.10*
- - - ¬ *G35.1*
- - Progressive chronique secondairement progressive
- - - Mention d'exacerbation aiguë ou de progression ¬ *G35.31*
- - - ¬ *G35.3*
- SAI ¬ *G35*
- Tronc cérébral ¬ *G35*
- ¬
- - Démence au cours de *G35.9†, F02.8**
- - Névrite rétrobulbaire au cours de *G35.9†, H48.1**
- - Première manifestation d'une *G35.0*

Sclérose systémique
- Atteinte pulmonaire ¬ *M34.8†, J99.1**
- Cutané
- - Diffuse ¬ *M34.0*
- - Limitée ¬ *M34.1*
- Due
- - Médicaments et des produits chimiques ¬ *M34.2*
- - Substances chimiques NCA ¬ *M34.2*
- Limitée ¬ *M34.0*
- Médicamenteuse ¬ *M34.2*
- Myopathie ¬ *M34.8†, G73.7**
- Polyneuropathie ¬ *M34.8†, G63.5**
- Progressive ¬ *M34.0*
- Sans
- - Précision ¬ *M34.9*
- - Sclérodermie ¬ *M34.0*
- ¬ Autres formes de *M34.8*

Sclérostéose ¬ *M85.2*

Sclérotique
- Bleue ¬ *Q13.5*
- Bleues-néphropathie ¬ Syndrome d'hydrocéphalie- *Q87.8*
- Cornée au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de la *H19.8**
- Sans précision ¬ Affection de la *H15.9*

Sclérotique *–suite*
- ¬
- - Affections de la *H15.8*
- - Atrophie de la *H15.8*
- - Blessure non perforante de la *S05.8*
- - Rétinopathie *I70.8†, H36.8**
- - Tumeur maligne de la *C69.4*

Scolaires
- Sans précision ¬ Trouble du développement des acquisitions *F81.9*
- ¬
- - Mauvais résultats *Z55*
- - Trouble mixte des acquisitions *F81.3*
- - Troubles du développement des acquisitions *F81.8*

Scolarisation inexistante ou inaccessible ¬ *Z55*

Scolarisés ¬ Examen général en série de: enfants *Z10*

Scoliose
- Adolescent ¬ *M41.1*
- Anomalie dorsale ¬ *M41.3*
- Arachnodactylie ¬ Syndrome de cécité- *Q87.5*
- Associé à NKAP ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie facial-habitus marfanoïde- *Q87.0*
- Congénitale
- - Due à une malformation osseuse congénitale ¬ *Q76.3*
- - Posturale ¬ *Q67.5*
- - SAI ¬ *Q67.5*
- Idiopathique infantile ¬ *M41.0*
- Idiopathiques ¬ Autres *M41.2*
- Irradiation ¬ *M96.5*
- Juvénile idiopathique ¬ *M41.1*
- Macrocéphalie ¬ Syndrome de convulsions- *Q87.8*
- Neuromusculaire ¬ *M41.4*
- Sans précision ¬ *M41.9*
- Secondaire ¬ Autres formes de *M41.5*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - Absence congénitale de vertèbres sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Brachyolmie avec *Q76.3*
- - Cyphose congénitale sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Formes de *M41.8*
- - Hémivertèbre [hémispondylie] sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Lordose congénitale sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Malformation congénitale
- - - Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - - Rachis, non associées à une *Q76.4*
- - Malformation du rachis sans précision ou non associée à une *Q76.4*

Scoliose *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ophtalmoplégie externe progressive et *H49.4*
- - Platyspondylie sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Syndrome
- - - MACS [macrocéphalie-alopécie-cutis laxa- *Q82.8*
- - - Synostose radio-ulnaire-microcéphalie- *Q02, Q77.8*
- - Synostose
- - - Hémivertèbres ou défaut de segmentation avec *Q76.3*
- - - Vertébrale congénitale sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - Vertèbre surnuméraire sans précision ou non associée à une *Q76.4*

Scombridés ¬ Intoxication par poissons *T61.1*

Scopolamine ¬ Hypersensibilité aux dérivés de *T88.7*

Scopulariopsis ¬ Infection
- *B48.7*
- Invasive à *B48.7*

Scorbut ¬
- *E54*
- Arthrite au cours de *E54†, M14.59**
- Inflammation des alvéoles dentaires au cours de *E54†, K93.8**
- Purpura au cours de *E54†, D77**
- Rachitisme au cours de *E54†, M90.89**

Scorbutique ¬
- Anémie *D53.2*
- Gencive *E54†, K93.8**

Scorpion ¬
- Effet toxique du venin de *T63.2*
- Envenimation suite à la piqûre de *T63.2*
- Morsure de *T63.2*

SCOT ¬ Déficit en *E71.3*

Scotome
- Annulaire ¬ *H53.4*
- Arciforme ¬ *H53.4*
- Bjerrum ¬ *H53.4*
- Central
- - Syphilitique ¬ *A52.7†, H58.1**
- - ¬ *H53.4*
- Scintillant ¬ *H53.1*

Scotopique supranormale ¬ Dystrophie des cônes avec réponse *H35.5*

Scott
v./v.a. Aarskog-Scott
v./v.a. Hecht-Scott
- ¬ Syndrome
- - *D69.88*
- - Cranio-digital de *Q87.0*

SCPH] ¬ Syndrome cardio-pulmonaire à virus Hanta [*B33.4†, J17.1**

Scrofuloderme ¬ *A18.4*

Scrofulosorum tuberculeux primaire ¬ Lichen *A18.4*

Scrotal ¬
- Fistule urétro- *N50.8*
- Hernie *K40*
- Kyste *L72.9*
- Langue: *K14.5*
- Prurit *L29.1*
- Syndrome d'ophtalmoplégie-déficience intellectuelle-langue *Q87.8*
- Tératome d'un testicule *C62.1*
- Testicule *C62.1*
- Tumeur germinale non séminomateuse d'un testicule *C62.1*
- Tumeur stromale des cordons sexuels d'un testicule *C62.1*
- Varices *I86.1*

Scrotum
- Châle-hyperlaxité ligamentaire ¬ Syndrome de dysmorphie faciale- *Q87.0*
- Malformation cérébelleuse-dystrophie cornéenne-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'agénésie congénitale du *Q87.0*
- SAI ¬ Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du *Q55.2*
- Testicule
- - Sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du *N50.8*
- - - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du *N50.8*
- - - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du *N50.8*
- - - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du *N50.8*
- - ¬ Plaie ouverte du *S31.3*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Abcès tuberculeux du *A18.1†, N51.8**
- - Absence congénitale du *Q55.2*
- - Adénocarcinome du *C63.2*
- - Affections inflammatoires du *N49.2*
- - Agénésie
- - - *Q55.2*
- - - Congénitale du *Q55.2*
- - Éléphantiasis du *I89.05†, N51.8**
- - Fistule tuberculeuse du *A18.1†, N51.8**
- - Herpès du *A60.0†, N51.8**
- - Hypoplasie du (des) testicule(s) et du *Q55.1*
- - Kyste de glande sébacée du *L72.1*
- - Lymphangiectasie du *I89.09†, N51.8**
- - Malformations congénitales du (des) testicule(s) et du *Q55.2*
- - Peau
- - - *C63.2*
- - - *D29.4*

Scrotum *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, N51.8**
- - Tuberculose du *A18.1†, N51.8**
- - Tumeur bénigne: *D29.4*
- - Tumeur maligne: *C63.2*
- - Ulcère tuberculeux du *A18.1†, N51.8**

Scrub typhus ¬ *A75.3*

SDRA] ¬ Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte [*J80.0*

Séance
- Chimiothérapie pour tumeur maligne ¬ *Z51.1*
- Radiothérapie ¬ *Z51.0*

Seau
- Ménisque
- - Externe ¬ Déchirure «en anse de *S83.2*
- - Interne ¬ Déchirure «en anse de *S83.2*
- SAI ¬ Déchirure «en anse de *S83.2*
- ¬ Déchirure ancienne «en anse de *M23.2*

Sébacé
- Linéaire ¬ Syndrome du nævus *Q85.8*
- Paupière ¬ Carcinome *C44.1*
- Scrotum ¬ Kyste de glande *L72.1*
- Sein ¬ Kyste d'un canal de glande *N60.8*
- ¬
- - Abcès de glande *L02.9*
- - Kyste *L72.1*
- - Tumeur maligne des glandes: *C44*
- - Tumeurs bénignes de: glandes: *D23*

Sébocystomatose ¬ *L72.2*

Séborrhée de la tête ¬ *L21.0*

Séborrhéique
- Infantile ¬ Dermite *L21.1*
- Sans précision ¬ Dermite *L21.9*
- ¬
- - Dermites *L21.8*
- - Eczéma *L21*
- - Kératose *L82*
- - Pemphigus *L10.4*
- - Verrue *L82*

Séborrhéique-like avec des éléments psoriasiques ¬ Dermatite *L21.8*

Sec
- Atteinte pulmonaire ¬ Syndrome *M35.0†, J99.1**
- Kératoconjonctivite ¬ Syndrome *M35.0†, H19.3**
- Main et du poignet ¬ Ténosynovite *M70.0*
- Sens syndrome Sjögren ¬
- - Cheratite *M35.0†, H19.3**
- - Conjonctivite *M35.0†, H13.2**
- - Kératoconjonctivite *M35.0†, H19.3**
- Stade IVa de Leriche et Fontaine ¬ Gangrène *I70.25*
- ¬

Sec *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Alvéolite *K10.3*
- - Béribéri: *E51.1*
- - Dégénérescence maculaire liée à l'âge, *H35.31*
- - Dermite avec peau *L85.3*
- - Laryngite: atrophique (*J37.0*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de syndrome *M35.0†, N16.4**
- - Myopathie au cours de syndrome *M35.0†, G73.7**
- - Syndrome des yeux *H04.1*

Sécheresse de la bouche, sans précision ¬ *R68.2*

Seckel ¬ Syndrome de *Q87.1*

Séclusion pupillaire ¬ *H21.4*

Secondaire
v./v.a. Type de maladie

Secours insuffisants ¬ Couverture sociale et *Z59*

Secousses [infection virale atypique du système nerveux central] ¬ Maladie des *A81.8*

Secrétagogues de l'hormone de croissance ¬ Petite taille par déficit en récepteur des *E34.3*

Sécrétant
- Gastrine ¬ Adénome pancréatique *D13.6*
- Sporadique ¬ Phéochromocytome paragangliome
- - *C74.1*
- - *D35.0*
- ¬ Paragangliome non *D44.7*

Sécrétion
- Anormale
- - Gastrine ¬ *E16.4*
- - Hormone antidiurétique ¬ Syndrome de *E22.2*
- Bronchique ¬ Diminution de la *R09.3*
- Ectopique ACTH ¬ Syndrome
- - *E24.3*
- - Cushingoïde de *E24.3*
- Excessive d'urine ¬ *R35.0*
- Frottis
- - Col de l'utérus ¬ Résultats anormaux de *R87*
- - Vagin ¬ Résultats anormaux de *R87*
- - Vulve ¬ Résultats anormaux de *R87*
- Gastrique
- - S SAI due anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ Inhalation du contenu ou de *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ Inhalation du contenu ou de *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Inhalation du contenu ou de *O74.0*
- - ¬ Pneumonie par aspiration (de): *J69.0*
- Hormonale ectopique, non classée ailleurs ¬ *E34.2*

Sécrétion *–suite*
- IgM ¬ Lymphome lymphoplasmocytaire sans *C83.0*
- Nasales ¬ Résultats anormaux de: *R84*
- Niveau d'une plaie ¬ Résultats anormaux de: *R89*
- Pancréatique interne
- - Sans précision ¬ Anomalie de la régulation de la *E16.9*
- - ¬ Autres anomalies précisées de la *E16.8*
- Parathormone ¬ Hypoparathyroïdie secondaire due à un défaut de *E20.8*
- Plaquettaire ¬ Thrombocytopénie autosomique dominante avec défaut de *D69.41*
- Prostatiques ¬ Résultats anormaux de: *R86*
- PTH ¬ Hypoparathyroïdie isolée familiale par défaut de *E20.8*
- Salivaire ¬ Troubles de la *K11.7*
- ¬ Dépendance (de longue durée) envers: appareils de prise en charge des *Z99.0*

Sécrétoire ¬ Otite moyenne
- *H65.9*
- Chronique: *H65.3*

Section
- Cordon d'un jumeau ¬ Perte de sang fœtal au niveau de la *P50.5*
- Muscle(s) SAI ¬ *T14.6*
- Nerf traumatique SAI ¬ *T14.4*
- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*

Secundum ¬
- Anomalie du septum atrial type ostium *Q21.1*
- ASD type ostium *Q21.1*
- Perméabilité de l'ostium *Q21.1*
- Persistance de l'ostium *Q21.1*

SED type spondylo-cheirodysplasique ¬ *Q79.6*

Sedaghatian ¬ Dysplasie spondylo-métaphysaire type *Q77.8*

Sédatif
- Cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre *O89*
- Hypnotiques
- - Sans précision ¬ Intoxication: Anti-épileptiques, *T42.7*
- - ¬
- - - Intoxication: Autres anti-épileptiques, *T42.6*
- - - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F13*
- ¬ Trouble persistant dû aux *F13.7*

Sédimentation ¬ Accélération de la vitesse de *R70.0*

Sedlackova ¬ Syndrome de *D82.1*

Sédoheptulose kinase ¬ Déficit isolé en *E74.8*

Seegmiller
v./v.a. Kelley-Seegmiller

Seemanova
- Type 2 ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬
- - Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*
- - Microcéphalie-microcornée type *Q87.8*

Segawa autosomique
- Dominant ¬ Syndrome de *G24.1*
- Récessif ¬ Syndrome de *G24.1*

Segment
- Antérieur
- - Autosomique récessive ¬ Dysgénésie du *Q13.8*
- - Œil ¬ Syndrome d'hypoplasie de la fovéa avec anomalie du chiasma optique et dysgénésie du *Q15.8*
- - ¬ Syndrome de cataracte congénitale-dysgénésie du *Q12.0*
- Inférieur de l'utérus ¬ *C54.0*
- ST NSTEMI
- - Infarctus de type 1 ¬ Infarctus sans élévation du *I21.40*
- - ¬ Infarctus sans élévation du *I21.48*
- ¬ Maladie de Crohn de l'œsophage et du tractus gastro-intestinal sur plusieurs *K50.82*

Segmentaire
- Focale ¬ Syndrome néphrotique idiopathique cortico-sensible avec glomérulosclérose *N04.1*
- Lipomatose-malformation artério-veineuse-nævus épidermique] ¬ Syndrome SOLAMEN [hypertrophie *Q87.8*
- Progressive avec hyperplasie fibroadipeuse ¬ Syndrome de croissance *Q87.3*
- Sein ¬ Nécrose adipeuse (*N64.1*
- Somatique ¬ Dysfonctionnement *M99.0*
- ¬
- - Dysgénésie spinale *Q76.4*
- - Dysplasie odonto-maxillaire *K00.4*
- - Hémangiome infantile *D18.00*
- - Médiolyse artérielle *I77.88*
- - Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux stéroïdes avec hyalinose focale et *N04.1*

Segmentation
- Scoliose ¬ Synostose d'hémivertèbres ou défaut de *Q76.3*
- Vertébrale-anomalies des membres ¬ Syndrome de polydactylie en miroir- *Q87.2*

Sein
- Absence mamelon ¬
- - Absence congénitale de *Q83.0*
- - Agénésie de *Q83.0*
- Associé à l'accouchement ¬ Abcès du *O91.1*

Sein *–suite*
- Difficile chez le nouveau-né ¬ Alimentation au *P92.5*
- Due à une prothèse ou un implant mammaire ¬ Fibrose capsulaire du *T85.82*
- Familial ¬ Cancer du *C50.9, Z80.3*
- Gestationnelle ou puerpérale ¬ Lymphangite du *O91.2*
- Héréditaire ¬
- - Cancer du *C50.9*
- - Carcinome du *C50.9*
- Lactation) ¬ Subinvolution du *N64.8*
- Localisations contiguës ¬
- - Adénocarcinome
- - - Apocrine du *C50.8*
- - - Tubulaire du *C50.8*
- - Angiosarcome du *C50.8*
- - Carcinome héréditaire du *C50.8*
- - Carcinome mucineux du *C50.8*
- Non précisées ¬ Lésions traumatiques superficielles du *S20.1*
- Nouveau-né ¬ Engorgement du *P83.4*
- Ovaire ¬
- - Carcinome de l'ovaire au cours du syndrome héréditaire du cancer du *C56*
- - Syndrome héréditaire de prédisposition au cancer du *C56, C97!, C50.9*
- Parties molles ¬ *D24*
- Peau) (tissu mou) ¬ *D03.5*
- S) ¬ Absence acquise de *Z90.1*
- Sans précision ¬
- - Affection du *N64.9*
- - Carcinome in situ du *D05.9*
- - Malformation congénitale du *Q83.9*
- - Tumeur maligne: *C50.9*
- Surnuméraire ¬ *Q83.1*
- Tissu conjonctif ¬ *D24*
- Tubéreux ¬ *Q83.88*
- Type
- - Glande salivaire ¬
- - - Cancer du *C50.9*
- - - Carcinome
- - - - Prolongement axillaire du *C50.6*
- - - - Quadrant
- - - - - Inféro-externe du *C50.5*
- - - - - Inféro-interne du *C50.3*
- - - - - Supéro-externe du *C50.4*
- - - - - Supéro-interne du *C50.2*
- - Salivaire ¬ Carcinome de la partie centrale du *C50.1*
- ¬
- - *T21*
- - Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de: *N61*
- - Absence congénitale du *Q83.88*
- - Adénocarcinome
- - - Apocrine
- - - - *C50.9*

Sein *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Adénocarcinome *–suite*
- - - Apocrine *–suite*
- - - - Corps glandulaire central du *C50.1*
- - - - Prolongement axillaire du *C50.6*
- - - - Quadrant
- - - - - Inféro-externe du *C50.5*
- - - - - Inféro-interne du *C50.3*
- - - - - Supéro-externe du *C50.4*
- - - - - Supéro-interne du *C50.2*
- - - Tubulaire
- - - - *C50.9*
- - - - Corps glandulaire central du *C50.1*
- - - - Prolongement axillaire du *C50.6*
- - - - Quadrant
- - - - - Inféro-externe du *C50.5*
- - - - - Inféro-interne du *C50.3*
- - - - - Supéro-externe du *C50.4*
- - - - - Supéro-interne du *C50.2*
- - Adénofibrome géant du *D24*
- - Adénofibrose du *N60.2*
- - Affections
- - - Inflammatoires du *N61*
- - - Précisées du *N64.8*
- - Angiosarcome
- - - *C50.9*
- - - Prolongement axillaire du *C50.6*
- - - Quadrant
- - - - Inféro-externe du *C50.5*
- - - - Inféro-interne inféro-interne du *C50.3*
- - - - Supéro-externe du *C50.4*
- - Anomalie congénitale de la position du *Q83.88*
- - Antécédents familiaux de tumeur maligne du *Z80.3*
- - Antécédents personnels de tumeur maligne du *Z85.3*
- - Cancer inflammatoire du *C50.9*
- - Carcinome
- - - In situ du *D05.7*
- - - Mucineux
- - - - *C50.9*
- - - - Corps glandulaire central du *C50.1*
- - - - Prolongement axillaire du *C50.6*
- - - - Quadrant
- - - - - Inféro-externe du *C50.5*
- - - - - Inféro-interne du *C50.3*
- - - - - Supéro-externe du *C50.4*
- - - - - Supéro-interne du *C50.2*
- - Carcinome héréditaire
- - - Partie centrale du *C50.1*
- - - Prolongement axillaire du *C50.6*
- - - Quadrant
- - - - Inféro-externe du *C50.5*
- - - - Inféro-interne du *C50.3*

Sein *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carcinome héréditaire *–suite*
- - - Quadrant *–suite*
- - - - Supéro-externe du *C50.4*
- - - - Supéro-interne du *C50.2*
- - Carcinome métaplasique
- - - *C50.9*
- - - Deux quadrant
- - - - Externes du *C50.8*
- - - - Internes du *C50.8*
- - - Partie centrale du *C50.1*
- - - Prolongement axillaire du *C50.6*
- - - Quadrant
- - - - Inféro-externe du *C50.5*
- - - - Inféro-interne du *C50.3*
- - - - Supéro-externe du *C50.4*
- - Comédocarcinome non invasif du *D05.1*
- - Contusion du *S20.0*
- - Cytostéatonécrose du *N64.1*
- - Décollement sous-cutané du *S20.16*
- - Ectopie de tissu du *Q83.88*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur du *Z12.3*
- - Fibrosclérose du *N60.3*
- - Furoncle du *N61*
- - Induration du *N64.5*
- - Kyste
- - - *N60.0*
- - - Canal de glande sébacée du *N60.8*
- - - Solitaire du *N60.0*
- - Lipome du *D17.1*
- - Maladie kystique du *N60.1*
- - Malformations congénitales du *Q83.88*
- - Mélanome malin
- - - *C43.59*
- - - Peau du *C43.59*
- - Métaplasie des glandes apocrines du *N60.8*
- - Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du *Z44.3*
- - Nécrose adipeuse (segmentaire) du *N64.1*
- - Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du *Z40.00*
- - Peau
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Phlébite du *I80.88*
- - Plaie ouverte du *S21.0*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R92*
- - Signes et symptômes observés au niveau du *N64.5*
- - Soins de contrôle comprenant une opération plastique du *Z42.1*

Sein *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tissu conjonctif
- - - *C50*
- - - *D48.6*
- - Tumeur bénigne du *D24*
- - Tumeur maligne
- - - Lésion à localisations contiguës du *C50.8*
- - - Partie centrale du *C50.1*
- - - Prolongement axillaire du *C50.6*
- - - Quadrant
- - - - Inféro-externe du *C50.5*
- - - - Inféro-interne du *C50.3*
- - - - Supéro-externe du *C50.4*
- - - - Supéro-interne du *C50.2*
- - - Secondaire du *C79.81*
- - Tumeur phyllode du *D48.6*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D48.6*

Seip
v./v.a. Berardinelli-Seip

SEIPA [Syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires] ¬ *K52.2*

Seitelberger] ¬ Dystrophie neuroaxonale infantile [maladie de *G31.88*

Séjour et éducation en institution ¬ *Z62*

Sel
- Eau) ¬ Prostration due à la chaleur avec perte de *T67.4*
- Réhydratation orale ¬ *T50.3*
- Sang ¬ Excès de *E87.0*
- ¬
- - Effet toxique: Strychnine et ses *T65.1*
- - Épuisement dû à la chaleur avec perte de *T67.4*
- - Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase classique avec perte de *E25.00*
- - Syndrome adrénogénital avec perte de *E25.0*

Selcen ¬ Dystrophie musculaire type *G71.08*

Sélénium ¬ Carence alimentaire en *E59*

Selle
- Attribuable à la syphilis ¬ Nez en *A50.5*
- Fréquentes ¬ *R19.4*
- Turcique
- - Anormale ¬ Syndrome de petite taille-anomalies hypophysaires et cérébelleuses- *Q87.1*
- - Vide ¬ Déficit hypophysaire associé au syndrome de la *E23.0*
- Volumineuses ¬ *R19.5*
- ¬
- - Mucus dans les *R19.5*
- - Sang occulte dans les *R19.5*

Sémantique ¬ Démence *G31.0†, F02.0**

Semblable à) (classique) ¬ Syndrome de: Morquio (- *E76.2*

Semelaigne
v./v.a. Kocher-Debré-Semelaigne

Semialdéhyde déshydrogénase ¬ Retard de développement par déficit en méthylmalonate *E71.1*

Semi-circulaire ¬ Syndrome de déhiscence du canal *H83.8*

Semi-coma [coma vigile] ¬ *R40.1*

Semi-lobaire ¬ Holoprosencéphalie *Q04.2*

Semi-lunaire
- Adulte ¬
- - Nécrose du *M93.1*
- - Ostéochondrite du *M93.1*
- Kienböck] ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): *M92.2*
- ¬
- - Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.11*
- - Nécrose aseptique du *M92.2*
- - Ostéochondrite du *M92.2*

Séminal
- Prostate
- - SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules *Q55.4*
- - ¬ Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules *Q55.4*
- ¬
- - Absence acquise des vésicules *Z90.7*
- - Adénocarcinome de la vésicule *C63.7*
- - Affections inflammatoires des vésicules *N49.0*
- - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules *N50.8*
- - Gonorrhée
- - - Aiguë de la vésicule *A54.2†, N51.8**
- - - Chronique de la vésicule *A54.2†, N51.8**
- - - Vésicule *A54.2†, N51.8**
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules *N50.8*
- - Lésion traumatique: vésicule *S37.83*
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules *N50.8*
- - Résultats anormaux de: sperme, liquide *R86*
- - Syphilis tardive de la vésicule *A52.7†, N51.8**
- - Trichomonase de la vésicule *A59.0†, N51.8**
- - Tuberculose des vésicules *A18.1†, N51.8**
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules *N50.8*
- - Vésicule
- - - *C63.7*

Séminal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Vésicule *–suite*
- - - *D29.7*

Séminomateuse testicule
- Dystopique ¬ Tumeur germinale non *C62.0*
- Scrotal ¬ Tumeur germinale non *C62.1*
- ¬ Tumeur germinale non *C62.9*

Séminome
- Anaplasique ¬ *C62.9*
- Ovaire ¬ *C56*
- Spermatocytaire
- - Testicule
- - - Descendu ¬ *C62.1*
- - - Non descendu ¬ *C62.0*
- - ¬ *C62.9*
- Testiculaire ¬ *C62.9*
- Testicule
- - Descendu ¬ *C62.1*
- - Non descendu ¬ *C62.0*

Senac
v./v.a. Mononen-Karnes-Senac

Senear-Usher ¬ Syndrome de *L10.4*

Sénescence sans mention de psychose ¬ *R54*

Sengers ¬ Syndrome de *Q87.8*

Sengers-Hamel-Otten ¬ Syndrome de *Q87.8*

Sénile
v./v.a. Type de maladie

Senilis ¬ Cutis laxa *L57.4*

Sénilité ¬ *R54*

Senior-Boichis ¬ Syndrome de *Q61.5†, H36.8*, Q44.6*

Senior-Loken ¬ Syndrome de *Q61.5†, H36.8**

Sens
- Migraine ¬
- - Céphalée unilatérale dans le *G43.9*
- - Hémicrânie dans le *G43.9*
- Syndrome Sjögren ¬
- - Cheratite sèche au *M35.0†, H19.3**
- - Conjonctivite sèche au *M35.0†, H13.2**
- - Kératoconjonctivite sèche au *M35.0†, H19.3**
- ¬
- - Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des *Z86.6*
- - Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des *Z46.2*

Sensation
- Étouffement ¬ *R06.88*
- Malaise ¬ *R53.9*
- Perceptions générales, autres et non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux *R44.8*
- Piqûre ¬ *R20.2*
- Trop-plein ¬ *R19.88*

Sensenbrenner ¬ Syndrome de *Q87.5*

Sensibilisation
- Érythrocyte ¬
- - Hémorragie
- - - Cutanée due à un syndrome de *D69.2*
- - - Pétéchiale due à un syndrome de *D69.2*
- - Syndrome de *D69.2*
- ¬ Tests cutanés de diagnostic et de *Z01.5*

Sensibilité
- Accrue aux aminoglycosides ¬ Surdité neurosensorielle mitochondriale non syndromique avec *H90.5*
- Cutanée, autres et non précisés ¬ Troubles de la *R20.8*
- Familiale aux mycobactérioses ¬ *D84.8*
- Froid auto-immune ¬ *D59.18*
- Non cœliaque au gluten ¬ *K90.4*
- Radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie-retard de croissance- *D81.1*
- UV ¬ Syndrome de *L56.8*
- Variable aux protéases ¬ Prionopathie de *A81.8*

Sensible
- Biotine ¬ Maladie des ganglions de la base *G25.88*
- Diazoxide ¬
- - Hyperinsulinisme diffus *E16.1*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique, forme diffuse *E16.1*
- Glucocorticoïdes ¬ Hypertension *E26.0*
- Gluten ¬ Entéropathie *K90.0*
- SAI ¬ Abdomen *R10.4*
- Stéroïdes
- - Associée thyroïdite auto-immun ¬
- - - Encéphalopathie *G04.8, E06.3*
- - - SREAT [Encéphalopathie *G04.8, E06.3*
- - Résistance secondaire ¬ Syndrome néphrotique *N04.9*
- Thiamine
- - Diabète sucré-surdité de perception ¬ Syndrome d'anémie mégaloblastique *Q87.8*
- - ¬
- - - Encéphalopathie *E51.2, G40.9*
- - - Maladie des urines sirop d'érable, forme *E71.0*
- Vitamine B12
- - Type
- - - CblA ¬ Acidurie méthylmalonique *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidémie méthylmalonique *E71.1*
- - ¬
- - - Acidémie méthylmalonique *E71.1*
- - - Acidurie méthylmalonique *E71.1*

Sensitif
- Autonomique
- - Due à une mutation de TECPR2 ¬ Neuropathie héréditaire *G60.8*
- - Liée à l'X avec surdité ¬ Neuropathie héréditaire *G60.8, H90.5*

Sensitif *–suite*
- Autonomique *–suite*
- - Type
- - - 4] ¬ NHSA4 [Neuropathie héréditaire *G60.8*
- - - 9] ¬ NHSA9 [Neuropathie héréditaire *G60.8*
- Cutané au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S54.3*
- Héréditaire transmission
- - Dominante ¬ Neuropathie *G60.8*
- - Récessive ¬ Neuropathie *G60.8*
- Myélinisées de gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec surdité, déficience intellectuelle et absence de fibres *G60.0*
- Niveau
- - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un nerf cutané *S94.3*
- - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf cutané *S44.5*
- - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un nerf cutané *S74.2*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un nerf cutané *S84.2*
- Paranoïaque ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.0*
- Pur ¬ Syndrome lacunaire *I67.9†, G46.6**
- ¬ Délire de relation des *F22.0*

Sensitivo-motrice
- Axonal
- - Aiguë ¬ Neuropathie *G61.0*
- - Atrophie optique-neurodégénérescence à début infantile ¬ Syndrome de neuropathie *G60.0, H47.2*
- - Complexe ¬ Syndrome de microcéphalie-neuropathie *G60.0, Q02*
- - Héréditaire avec acrodystrophie ¬ Neuropathie *G60.0*
- Héréditaire
- - Hyperélasticité de la peau ¬ Neuropathie *G60.0*
- - Type
- - - 5 ¬ Neuropathie *G60.0*
- - - III ¬ Neuropathie *G60.0*
- - - Okinawa ¬ Neuropathie *G60.0*
- - ¬ Syndrome de kératodermie palmoplantaire-neuropathie *G60.0, Q82.8*
- Néonatale létale autosomique récessive ¬ Polyneuropathie *G60.0*
- ¬ Syndrome de dysgénésie gonadique 46,XY avec neuropathie *Q56.1, G60.0*

Sensoriel
- Aiguë ¬ Neuropathie ataxique *G61.0*
- Autonome
- - Héréditaire avec surdité neurosensorielle et retard général de développement ¬ Neuropathie *G60.8, H90.5*
- - Paraplégie spastique ¬ Neuropathie héréditaire *G60.8, G11.4*
- Début facial] ¬ Syndrome FOSMN [Neuronopathie motrice et *G60.0*

Sensoriel *–suite*
- Dysarthrie-ophtalmoplégie ¬ Syndrome d'ataxie neuropathique *G31.81, H49.4*
- SAI ¬ Surdité (de): *H90.5*
- Spéciales ¬ Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves *R94.1*
- Tardive ¬ Albinisme oculaire avec surdité *E70.3*
- Types I-IV ¬ Neuropathie héréditaire motrice et *G60.0*
- ¬
- - Anesthésie dissociative et atteintes *F44.6*
- - Extinction *R29.5*
- - Négligence *R29.5*
- - Vessie neurogène: atonique (motrice) (*N31.2*

Sensorimotrice
- Héréditaire] ¬ NSMH [neuropathie *G60.0*
- Périphérique ¬ Syndrome d'hypertrichose cervicale avec neuropathie *G60.0, Q84.2*

Séparation
- Divorce ¬ Dislocation de la famille par *Z63*
- Enfance ¬ Angoisse de *F93.0*

SEP-PP [Sclérose en plaques primaire progressive] ¬ *G35.20*

Sepsis
- Acutissima hyperergica fulminans ¬ *A39.1†, E35.1**
- Bactérien du nouveau-né, sans précision ¬ *P36.9*
- Bactérienne du prématuré ¬ *P36.9*
- Bactériens du nouveau-né ¬ Autres *P36.8*
- Brucella ¬ *A23.9*
- Cathéter spinal de perfusion ¬ *T85.72*
- Clostridium difficile ¬ *A41.4*
- Clostridium perfringens ¬ *A41.4*
- Colibacilles ¬ *A41.51*
- Congénitale du prématuré ¬ *P36.9*
- Entérobactéries du prématuré ¬ *P36.8*
- Escherichia coli du prématuré ¬ *P36.4*
- Fongique ¬
- - Encéphalopathie au cours de *B48.80†, G94.32**
- - Glomérulopathie au cours de *B48.80†, N08.0**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *B48.80†, N16.0**
- Fulminant à méningocoques ¬ *A39.2*
- Listeria ¬ *A32.7*
- Méningocoques ¬
- - *A39.4*
- - Apoplexie des surrénales due à un *A39.1†, E35.1**
- - Hémorragie des surrénales due à un *A39.1†, E35.1**
- - Syndrome hémorragique surrénalien dû à un *A39.1†, E35.1**
- Nouveau-né
- - Anaérobies ¬ *P36.5*

Sepsis *–suite*
- Nouveau-né *–suite*
- - Enterobacter ¬ *P36.8*
- - Escherichia coli ¬ *P36.4*
- - Staphylocoque
- - - Dorés ¬ *P36.2*
- - - Sans précision ¬ *P36.3*
- - Streptocoques, autres et sans précision ¬ *P36.1*
- Protozoaires ¬
- - Encéphalopathie au cours de *B60.80†, G94.32**
- - Glomérulopathie au cours de *B60.80†, N08.0**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *B60.80†, N16.0**
- Shigella ¬ *A03.9*
- Shunt ventriculaire intracrânien ¬ *T85.72*
- Staphylocoque
- - Aureus du prématuré ¬ *P36.2*
- - Prématuré NCA ¬ *P36.3*
- Streptocoque
- - Groupe B du prématuré ¬ *P36.0*
- - Prématuré ¬ *P36.1*
- - ¬ Glomérulonéphrite au cours de *A40.9†, N08.0**
- ¬
- - Glomérulonéphrite au cours de *A41.9†, N08.0**
- - Maladie
- - - Due au VIH avec *B20, A41.9*
- - - Glomérulaire au cours de *A41.9†, N08.0**
- - - Rénale tubulo-interstitielle due à un *A41.9†, N16.0**
- - Pyélonéphrite due à un *A41.9†, N16.0**

Septal
- Atrio-ventriculaire intermédiaire ¬ Défaut *Q21.2*
- Auriculaire
- - Type sinus venosus ¬ ASD [défaut *Q21.1*
- - ¬ Dysplasie lymphatique généralisée associée à EPHB4 avec défaut *Q82.09, Q21.1*
- SAI ¬
- - Infarctus du myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- - Infarctus transmural (aigu): *I21.2*
- ¬
- - Infarctus répété (aigu): antéro- *I22.0*
- - Infarctus transmural (aigu): antéro- *I21.0*
- - Infection due à un obturateur *T82.71*

Septicémie
- Actes médicaux ¬ *T81.4*
- Actinomycosique ¬ *A42.7*
- Aspergillus ¬ *B44.70*
- Bactérienne ¬
- - *A41.9*
- - Glomérulopathie au cours de *A41.9†, N08.0**

Septicémie *–suite*
- Bactérienne ¬ *–suite*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *A41.9†, N16.0**
- Blastomyces ¬ *B40.70*
- Candida ¬ *B37.7*
- Charbonneuse ¬ *A22.7*
- Coccidioides ¬ *B38.70*
- Congénitale ¬ *P36*
- Consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion ¬ *T80.2*
- Consécutive à vaccination ¬ *T88.0*
- Cours
- - Morve ¬ *A24.0*
- - Puerpéralité ¬ *O85*
- - Travail ¬ *O75.3*
- Cryptocoques ¬ *B45.70*
- Due
- - Cathéter
- - - Dialyse ¬ *T82.74*
- - - Perfusion, NCA ¬ *T80.2*
- - Greffon artériel, NCA ¬ *T82.73*
- - Système de chambre implantable [port] ¬ *T82.75*
- - Virus de l'herpès ¬ *B00.70*
- Erysipelothrix ¬ *A26.7*
- Escherichia coli [E. coli] ¬ *A41.51*
- Fongique
- - SAI ¬ Encéphalopathie au cours de *B48.80†, G94.32**
- - ¬ *B48.80*
- Gonococcique ¬ *A54.8*
- Greffe de valvule cardiaque ¬ *T82.6*
- Haemophilus influenzae ¬ *A41.3*
- Histoplasma capsulatum ¬ *B39.30*
- Micro-organisme
- - Anaérobies ¬ *A41.4*
- - Gram négatif
- - - SAI ¬ *A41.5*
- - - ¬
- - - - *A41.5*
- - - - *A41.58*
- Moment de survenue incertain par rapport à l'admission à l'hôpital ¬ *A41.9, U69.82!*
- Mucorales ¬ *B46.40*
- Non nosocomiale ¬ *A41.9, U69.80!*
- Nosocomiale ¬ *A41.9, U69.81!*
- Paracoccidioides ¬ *B41.70*
- Pneumocoques ¬ *A40.3*
- Précisées ¬ Autres *A41.8*
- Protozoaires ¬ *B60.80*
- Pseudomonas ¬ *A41.52*
- Salmonella ¬ *A02.1*
- SARM ¬ *A41.0, U80.00!*
- Sporothrix ¬ *B42.70*
- Staphylocoque
- - Coagulase-négatifs ¬ *A41.1*

Septicémie *–suite*
- Staphylocoque *–suite*
- - Dorés ¬ *A41.0*
- - Non précisés ¬ *A41.2*
- - Précisés ¬ *A41.1*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *A40.3*
- Streptocoque
- - Groupe
- - - A ¬ *A40.0*
- - - D, et entérocoques ¬ *A40.2*
- - Groupe B ¬ *A40.1*
- - ¬ Autres *A40.8*
- Toxoplasma ¬ *B58.90*
- Tuberculeuse NCA ¬ *A19.9*
- Virale ¬
- - *B34.80*
- - Encéphalopathie au cours de *B34.80†, G94.32**
- - Glomérulopathie au cours de *B34.80†, N08.0**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *B34.80†, N16.0**
- ¬
- - *A41.9*
- - État après *U70.1!*
- - Pneumonie à pneumocoques, avec *J13*

Septicémique ¬
- Mélioïdose *A24.1*
- Peste *A20.7*
- Tularémie *A21.7*

Septicopyohémique survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): septique ou *O08.2*

Septique
v./v.a. Type de maladie

Septo-préoptique ¬ Holoprosencéphalie *Q04.2*

Septum
- Ancienne communication
- - Interatriale [CIA] ¬ Anomalie acquise du *I51.0*
- - Interauriculaire, auricules ¬ Anomalie acquise du *I51.0*
- - Interventriculaire [CIV] ¬ Anomalie acquise du *I51.0*
- Aortico-pulmonaire ¬ Absence de *Q21.4*
- Aortique ¬ Malformation du *Q21.4*
- Atrial type ostium secundum ¬ Anomalie du *Q21.1*
- Atrio-ventriculaire ¬ Défaut complet du *Q21.2*
- Auriculaire ¬
- - Absence congénitale du *Q21.1*
- - Anomalie du *Q21.1*
- Cardiaque
- - Acquise ¬ Anomalie d'un *I51.0*
- - ¬ Syndrome d'hypotonie sévère-retard de développement psychomoteur-strabisme-défaut du *Q87.8*

Septum *–suite*
- Cardiaques ¬ Autres malformations congénitales des *Q21.88*
- Interauriculaire ¬ Anévrisme du *Q21.0*
- Interventriculaire ¬ Anévrisme du *Q21.1*
- Nasal ¬
- - *C30.0*
- - Plaie ouverte du nez: *S01.23*
- - Ulcère variqueux du *I86.88*
- Recto-vaginal ¬
- - *S31.80*
- - Endométriose du *N80.4*
- Urorectal ¬ Succession de malformations du *Q87.8*
- Utérus ¬ *Q51.2*
- Vaginal sagittal ¬ *Q52.1*
- Ventriculaire intact
- - Persistance du canal artériel ¬ Syndrome d'agénésie de la valve pulmonaire- *Q22.3, Q25.0*
- - ¬ Syndrome d'atrésie pulmonaire- *Q22.0*
- Voies optiques ¬ Dysplasie du *Q04.4*

Séquard
v./v.a. Brown-Séquard

Séquelle
- Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus ¬ *I69.4*
- Accouchement ¬ Rétrécissement de l'urètre comme *N35.0*
- Affections inflammatoires du système nerveux central ¬ *G09*
- Avitaminose A ¬ *E64.1*
- Avitaminose C ¬ *E64.2*
- Brûlure corrosion
- - Classées selon leur étendue sur la surface du corps ¬ *T95.4*
- - Gelure
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ *T95.3*
- - - - Supérieur ¬ *T95.2*
- - - Précisées ¬ *T95.8*
- - - Sans précision ¬ *T95.9*
- - - Tête ou du cou ¬ *T95.0*
- - - Tronc ¬ *T95.1*
- Carence nutritionnelle non précisée ¬ *E64.9*
- Carences nutritionnelles ¬ *E64.8*
- Cataracte ¬ *H26.4*
- Certaines complications précoces d'un traumatisme ¬ *T98.2*
- Complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ *O94*
- Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs ¬ *T98.3*
- Corps étranger dans les voies respiratoires ¬ *T98.0*
- Écrasement amputation traumatiques membre
- - Inférieur ¬ *T93.6*

Séquelle *–suite*
- Écrasement amputation traumatiques membre *–suite*
- - Supérieur ¬ *T92.6*
- Effets
- - Causes externes, autres et sans précision ¬ *T98.1*
- - Dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel ¬ *T98.0*
- - Toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale ¬ *T97*
- Embolie
- - Gazeuse traumatique ¬ *T98.2*
- - Graisseuse traumatique ¬ *T98.2*
- Encéphalite virale ¬ *B94.1*
- Excès d'apport ¬ *E68*
- Fracture
- - Bras et de l'avant-bras ¬ *T92.1*
- - Crâne
- - - Blessure intracrânienne ¬ *T90.2*
- - - Os de la face ¬ *T90.2*
- - Cuisse ¬ *T93.1*
- - Fémur ¬ *T93.1*
- - Jambe ¬ *T93.2*
- - Niveau du poignet et de la main ¬ *T92.2*
- - Pied ¬ *T93.2*
- - Rachis ¬ *T91.1*
- Fractures
- - Membre inférieur ¬ *T93.2*
- - Thorax et du bassin ¬ *T91.2*
- Grippe ¬ *B94.80*
- Hémorragie intracérébrale ¬ *I69.1*
- Hémorragie sous-arachnoïdienne ¬ *I69.0*
- Hémorragies intracrâniennes non traumatiques ¬ *I69.2*
- Hépatite virale ¬ *B94.2*
- Infarctus cérébral ¬ *I69.3*
- Infection post-traumatique d'une plaie ¬ *T98.2*
- Intoxication
- - Alcoolique ¬ *T97*
- - Médicaments et substances biologiques ¬ *T96*
- - Monoxyde de carbone ¬ *T97*
- Lèpre ¬ *B92*
- Lésion traumatique
- - Cou et du tronc, sans précision ¬ *T91.9*
- - Intracrânienne ¬ *T90.5*
- - Membre
- - - Inférieur, sans précision ¬ *T93.9*
- - - Supérieur, sans précision ¬ *T92.9*
- - Moelle épinière ¬ *T91.3*
- - Muscle tendon membre
- - - Inférieur ¬ *T93.5*
- - - Supérieur ¬ *T92.5*
- - Nerf membre
- - - Inférieur ¬ *T93.4*

Séquelle *–suite*
- Lésion traumatique *–suite*
- - Nerf membre *–suite*
- - - Supérieur ¬ *T92.4*
- - Nerfs crâniens ¬ *T90.3*
- - Œil et de l'orbite ¬ *T90.4*
- - Organes intra-abdominaux et pelviens ¬ *T91.5*
- - Organes intrathoraciques ¬ *T91.4*
- - Superficielle
- - - Plaie ouverte du cou et du tronc ¬ *T91.0*
- - - Tête ¬ *T90.0*
- - Tête, sans précision ¬ *T90.9*
- Lésions traumatiques
- - Non précisées selon la partie du corps ¬ *T94.1*
- - Parties multiples du corps ¬ *T94.0*
- - Précisées
- - - Cou et du tronc ¬ *T91.8*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ *T93.8*
- - - - Supérieur ¬ *T92.8*
- - - Tête ¬ *T90.8*
- Luxation entorse foulure membre
- - Inférieur ¬ *T93.3*
- - Supérieur ¬ *T92.3*
- Maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision ¬ *B94.9*
- Maladies
- - Cérébrovasculaires, autres et non précisées ¬ *I69.8*
- - Infectieuses et parasitaires précisées ¬ *B94.8*
- Malnutrition protéino-énergétique ¬ *E64.0*
- Mononucléose
- - Due
- - - Virus d'Epstein-Barr ¬ *B94.81*
- - - Virus de l'herpès gamma ¬ *B94.81*
- - Infectieuse due
- - - Virus d'Epstein-Barr ¬ *B94.81*
- - - Virus de l'herpès gamma ¬ *B94.81*
- Plaie ouverte
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *T93.0*
- - - Supérieur ¬ *T92.0*
- - Tête ¬ *T90.1*
- Poliomyélite ¬ *B91*
- Rachitisme ¬ *E64.3*
- Relevant
- - Cause obstétrical sans précision
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de *O96.9*
- - - ¬ Mort de *O97.9*
- - Directement cause obstétrical
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de *O96.0*
- - - ¬ Mort de *O97.0*

Séquelle *–suite*
- Relevant *–suite*
- - Indirectement cause obstétrical
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de *O96.1*
- - - ¬ Mort de *O97.1*
- Trachome ¬ *B94.0*
- Traumatisme ¬ Rétrécissement de l'urètre comme *N35.0*
- Tuberculose
- - Génito-urinaire ¬ *B90.1*
- - Organes ¬ *B90.8*
- - Os et des articulations ¬ *B90.2*
- - SAI ¬ *B90.9*
- - Système nerveux central ¬ *B90.0*
- - Voies respiratoires et sans précision ¬ *B90.9*

Séquence
- Akinésie fœtale familiale ¬ Syndrome de lissencéphalie type 3- *Q04.3*
- Anémie-polycythémie gémellaire ¬ *O43.0*
- DiGeorge ¬ *D82.1*
- Pierre Robin
- - Malformations cardiaques-pieds bots ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Oligodactylie ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Potter-fente-cardiopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Robin
- - Persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec communication interatriale, *Q87.8*
- - ¬ Syndrome d'extrasystoles ventriculaires avec syncopes-pérodactylie- *Q87.8*
- TRAP [Twin reversed arterial perfusion] ¬ *O43.0*

Séquestration pulmonaire
- Congénitale
- - Extralobaire ¬ *Q33.2*
- - Intralobaire ¬ *Q33.2*
- - ¬ *Q33.2*
- ¬ *Q33.2*

Séquestre du maxillaire ¬ *K10.2*

Séquoïa
- Exacerbation aiguë ¬ Maladie due au *J67.81*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Maladie due au *J67.80*
- ¬ Maladie due au *J67.80*

SERCA1 ¬ Myopathie due à une surcharge en calsequestrine et *G71.2*

Séreux
- Aiguë ¬
- - Chorioméningite lymphocytaire *A87.2†, G02.0**
- - Otite moyenne *H65.0*
- Centrale ¬
- - Choriorétinopathie *H35.7*
- - Rétinite *H35.7*

Séreux *–suite*
- Centrale ¬ *–suite*
- - Rétinopathie *H35.7*
- Chronique ¬ Otite moyenne *H65.2*
- Col du pancréas ¬ Cystadénocarcinome *C25.7*
- Corps du pancréas ¬ Cystadénocarcinome *C25.1*
- L 'endomètre ¬ Carcinome *C54.1*
- Localisations contiguës du pancréas ¬ Cystadénocarcinome *C25.8*
- Ouverte) (percée) ¬ Ulcère [escarre] de pression avec phlyctène (remplie de liquide *L89.1*
- Pancréas ¬ Cystadénocarcinome *C25.9*
- Papillaire primitif du péritoine ¬ Carcinome *C48.2*
- Précisées ¬ Autres affections des bourses *M71.8*
- Queue du pancréas ¬ Cystadénocarcinome *C25.2*
- Rétine ¬ Décollement *H33.2*
- Sans précision ¬ Affections des bourses *M71.9*
- Tête du pancréas ¬ Cystadénocarcinome *C25.0*
- ¬
- - Abcès des bourses *M71.0*
- - Bourse
- - - *C49*
- - - *D21*
- - Chorio-encéphalite *A87.2†, G05.1**
- - Chorioméningite *A87.2†, G02.0**
- - Dépôts calciques dans une bourse *M71.4*
- - Kystes des bourses *M71.3*
- - Lymphome primitif des *C83.8*
- - Otite moyenne
- - - *H65.9*
- - - Aiguë et subaiguë: allergique (muqueuse) (sanglante) (*H65.1*
- - Tuberculose des bourses *A18.0†, M73.89**

Série
- Enfants scolarisés ¬ Examen général en *Z10*
- Équipes sportives ¬ Examen général en *Z10*
- Étudiants ¬ Examen général en *Z10*
- Membres des forces armées ¬ Examen général en *Z10*
- Résidents d'établissements institutionnels ¬ Examen général en *Z10*

Sérine
- Forme
- - Infantile ¬ Déficit de la voie de biosynthèse de la *E72.8*
- - Juvénile ¬ Déficit de la voie de biosynthèse de la *E72.8*
- ¬
- - Maladie neurométabolique par déficit en *E72.8*
- - Syndrome de déficit en *E72.8*
- - Trouble du métabolisme de la *E72.8*

Sérique
- Homologue) ¬ Hépatite sérique (ictère *B19.9*
- Ictère sérique homologue) ¬ Hépatite *B19.9*
- Sans précision ¬ Anomalie
- - Résultats immunologiques *R76.9*
- - Taux d'un enzyme *R74.9*
- ¬
- - Anomalies
- - - Précisées de résultats immunologiques *R76.8*
- - - Taux d'enzymes *R74.8*
- - Éruption *T80.6*
- - Intoxication (par): *T80.6*
- - Maladie *T80.6*
- - Neuropathie *G61.1*
- - Réactions *T80.6*
- - Urticaire *T80.6*

SERKAL ¬ Syndrome *Q87.8*

Sérologie
- Positive ¬ Pian sans signes cliniques, avec *A66.8*
- Syphilitique positive ¬ *A53.0*

Sérologique de la syphilis ¬ Résultats faussement positifs au test *R76.2*

Sérome dû à la poche d'une pompe ¬ *T85.88*

Séromuqueuse ¬ Otite moyenne
- *H65.9*
- Aiguë et subaiguë: *H65.1*
- Chronique: *H65.4*

Séronégative
- Forme polyarticulaire ¬ Arthrite chronique juvénile (*M08.3*
- ¬
- - Arthrite chronique juvénile *M08.3*
- - Polyarthrite rhumatoïde *M06.0*

Séropositive
- Chronique ¬
- - Cardite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.30†, I52.8**
- - Endocardite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.30†, I39.8**
- - Myocardite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.30†, I41.8**
- - Myopathie lors d'arthrite rhumatoïde *M05.30†, G73.7**
- - Péricardite au cours de polyarthrite *M05.30†, I32.8**
- - Polynévrite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.30†, G63.6**
- - Vascularite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.2*
- Sans précision ¬ Polyarthrite rhumatoïde *M05.9*
- ¬ Autres polyarthrites rhumatoïdes *M05.8*

Seropositivité au VIH SAI ¬ *Z21*

Sérotonine ¬
- Déficit du transport vésiculaire cérébral de la dopamine et de la *G25.88*

Sérotonine ¬ *–suite*
- Tumeur neuroendocrine du pancréas sécrétrice de *C25.4*

Sérotoninergique ¬ Syndrome *T88.7*

Serpent
- Marin ¬
- - Effet toxique du venin de *T63.0*
- - Envenimation suite à une morsure de *T63.0*
- ¬
- - Effet toxique du venin de *T63.0*
- - Envenimation suite à une morsure de *T63.0*

Serpigineux ¬
- Angiome *L81.7*
- Choroïdite *H30.8*
- Elastome perforant *L87.2*

Serrata ¬ Kyste (de): ora *H33.1*

Serratia
- Marcescens
- - Multirésistant
- - - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.06!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.26!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.46!*
- - ¬ Pneumonie due à: *J15.6*
- ¬ Bactériémie à *A49.82*

Serré ¬
- Anneau hyménal *N89.6*
- Prépuce: *N47*

Sertoli-Leydig de l'ovaire ¬ Tumeur maligne de *C56*

Sérum
- Acidifié ¬ Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec test de lyse positif dans un *D64.4*
- Antitétanique ¬ Polyneuropathie due au *G61.1, Y59.9!*
- Vaccin ¬ Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.7*
- ¬
- - Choc anaphylactique dû au *T80.5*
- - Intolérance au *T88.1*

Serum prothrombin conversion accelerator] ¬ Déficit en SPCA [*D68.23*

Servelle-Martorell ¬ Syndrome de *Q27.8*

Sésame ¬ Allergie à l'huile de *T78.1*

SETD5 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie faciale par haploinsuffisance de *Q87.0*

Seuil auditif ¬ Modification temporaire du *H93.2*

Sever ¬ Maladie de *M92.6*

Sévère
v./v.a. Type de maladie

Sévices
- Infligés
- - Adulte SAI ¬ Effets de *T74.9*
- - Enfant SAI ¬ Effets de *T74.9*

Sévices *–suite*
- Physique
- - Infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de possibles *Z61*
- - ¬ *T74.1*
- Psychologiques ¬ *T74.3*
- SAI ¬ *Z91.8*
- Sexuel
- - Infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de possibles *Z61*
- - ¬ *T74.2*

Sevrage
- Alcool ¬ *Z50.2!*
- Enfant de mère toxicomane ¬ Syndrome de *P96.1*
- Lors de dépendance médicamenteuse ¬ Syndromes de *F19.3*
- Néonatal ¬ Syndrome de *P96.1*
- ¬ Abus d'alcool avec *F10.3*

Sexe
- Indéterminé, sans précision ¬ *Q56.4*
- ¬ Anémie hypochrome sidéroblastique liée au *D64.0*

Sexualité ¬ conseil
- Relatif au comportement ou à l'orientation de tiers en matière de *Z70*
- Relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de *Z70*

Sexuel
v./v.a. Cordon sexuel
v./v.a. Organe sexuel
- 46,XX
- - Anomalies
- - - Anorectales ¬ Syndrome d'anomalie du développement *Q56.2, Q43.9*
- - - Squelettiques ¬ Syndrome d'anomalie du développement *Q56.2, Q79.9*
- - Origine génétique ¬ Anomalie du développement *Q99.1*
- - ¬ Anomalie
- - - Développement *Q56.2*
- - - Ovotesticulaire du développement *Q56.0*
- - - Testiculaire du développement *Q99.1*
- 46,XY
- - Déficit
- - - 17
- - - - 20-desmolase testiculaire ¬ Anomalie du développement *E29.1*
- - - - Bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase 3 ¬ Anomalie du développement *E29.1*
- - - Isolé en 17,20-lyase ¬ Anomalie du développement *E29.1*
- - Insuffisance surrénalienne par déficit en CYP11A1 ¬ Différence du développement *E25.08*
- Adulte ou l'adolescent, type non transsexuel ¬ Trouble de l'identité *F64.1*
- Allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus *Z04.5*
- Anormal

Sexuel *–suite*
- Anormal *–suite*
- - Sauf iso (Xq) ¬ Caryotype 46,X avec chromosome *Q96.2*
- - ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/ lignées cellulaires avec chromosome *Q96.4*
- Autosomique équilibré chez un sujet anormal ¬ Réarrangement *Q95.3*
- Caryotype de type 46,XY ¬ Anomalie ovo-testiculaire du développement *Q56.0*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement *O98.3*
- Égodystonique ¬ Orientation *F66.1*
- Enfance ¬ Trouble de l'identité *F64.2*
- Excessive ¬ Activité *F52.7*
- Femme ¬ Trouble de: réponse *F52.2*
- Hyperplasie surrénale chez l'homme ¬ précocité *E25*
- Infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de possibles sévices *Z61*
- Localisations ¬ Infection à Chlamydia transmise par voie *A56.8*
- Manque de plaisir sexuel ¬ Aversion *F52.1*
- Non
- - Dus à un trouble ou à une maladie organique ¬ Autres dysfonctionnements *F52.8*
- - Trouble ou à une maladie organique, sans précision ¬ Dysfonctionnement *F52.9*
- Phénotype
- - Féminin
- - - Sans précision ¬ Anomalie des chromosomes *Q97.9*
- - - ¬ Autres anomalies précisées des chromosomes *Q97.8*
- - Masculin
- - - Sans précision ¬ Anomalie des chromosomes *Q98.9*
- - - ¬ Autres anomalies précisées des chromosomes *Q98.8*
- Relationnel ¬ Problème *F66.2*
- Retardé ¬ Développement *E30.0*
- Risques ¬ Comportement *Z72.8*
- SAI ¬
- - Déviation *F65.9*
- - Trouble du rôle *F64.9*
- Sans précision ¬ Trouble
- - Identité *F64.9*
- - Préférence *F65.9*
- Structure anormale ¬ Homme avec chromosomes *Q98.6*
- XX-prédisposition au carcinome spinocellulaire ¬ Syndrome de kératodermie palmoplantaire-ambiguïté *Q56.0, Q82.8*
- ¬
- - Absence ou perte de désir *F52.0*
- - Anhédonie *F52.1*
- - Aversion sexuelle et manque de plaisir *F52.1*

Sexuel *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Baisse du désir *F52.0*
- - Déficience organique de la puissance *N48.4*
- - Homme avec mosaïque des chromosomes *Q98.7*
- - Infections à Chlamydia trachomatis transmises par voie *A56*
- - Maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement *A63.8*
- - Méthodes spéciales pour l'exploration de: infections principalement transmises lors des rapports *Z11*
- - Sévices *T74.2*
- - Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement *Z22.4*
- - Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement *Z20.2*
- - Syndrome de chondrodysplasie-anomalie du développement *Q87.1*
- - Trouble de la maturation *F66.0*
- - Troubles
- - - Identité *F64.8*
- - - Multiples de la préférence *F65.6*
- - - Préférence *F65.8*

Sexuellement transmise, sans précision ¬ Maladie *A64*

Sézary ¬
- Lymphome de *C84.1*
- Réticulose de *C84.1*

SFAF [Syndrome familial auto-inflammatoire au froid] ¬ *L50.2*

SFAF4 [Syndrome familial auto-inflammatoire au froid type 4] ¬ *L50.2*

SFMMP [Syndrome de pieds fendus-polydactylie mésoaxiale] ¬ *Q74.8*

SFTG] ¬ Fièvre sévère avec syndrome de thrombocytopénie [*A93.8*

SH3KBP1 ¬ Déficit immunitaire commun variable lié à l'X par déficit en *D83.0*

Shaffer
v./v.a. Lamb-Shaffer
v./v.a. Potocki-Shaffer

Shaheen ¬ Syndrome de *Q87.8*

Shah-Waardenburg ¬ Syndrome de *Q87.8*

Shalash
v./v.a. Temtamy-Shalash

Shapiro ¬ Syndrome de *G90.88*

Sharma-Kapoor-Ramji ¬ Syndrome de *Q78.8*

Sharp ¬ Syndrome de *M35.1*

Shashi ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Shashi-Pena ¬ Syndrome de *Q87.8*

SHDRA] ¬ Syndrome des malformations cardiaques structurelles-anomalies rénales [*Q87.8*

Sheehan ¬ Syndrome de *E23.0*

Sheffield ¬ Chondrodysplasia punctata type *Q77.3*

Sheldon ¬ Syndrome de Freeman- *Q87.0*

Sheldon-Hall ¬ Syndrome de *Q68.8*

Shiga-Kruse ¬ Dysenterie de *A03.0*

Shigella
- Boydii ¬
- - Dysenterie
- - - *A03.2*
- - - Bacillaire à *A03.2*
- - Infection à *A03.2*
- - Shigellose à *A03.2*
- Dysenteriae ¬
- - Dysenterie à *A03.0*
- - Infection à *A03.0*
- - Shigellose à *A03.0*
- Flexneri ¬
- - Dysenterie à *A03.1*
- - Infection à *A03.1*
- - Shigellose à *A03.1*
- Groupe
- - A ¬
- - - Dysenterie à *A03.0*
- - - Infection à *A03.0*
- - B ¬
- - - Dysenterie à *A03.1*
- - - Shigellose à *A03.1*
- - C ¬
- - - Dysenterie à *A03.2*
- - - Infection à *A03.2*
- - - Shigellose à *A03.2*
- - D ¬
- - - Dysenterie à *A03.3*
- - - Infection à *A03.3*
- - - Shigellose à *A03.3*
- Groupe B ¬ Infection à *A03.1*
- Paradysenteriae ¬ Dysenterie à *A03.1*
- Schmitzii ¬ Infection à *A03.0*
- Shigae ¬ Infection à *A03.0*
- Sonnei ¬
- - Dysenterie à *A03.3*
- - Infection à *A03.3*
- - Shigellose à *A03.3*
- ¬
- - Dysenterie à *A03.9*
- - Infection à *A03.9*
- - Sepsis à *A03.9*

Shigellose
- Shigella
- - Boydii ¬ *A03.2*
- - Dysenteriae ¬ *A03.0*
- - Flexneri ¬ *A03.1*
- - Groupe
- - - B ¬ *A03.1*
- - - C ¬ *A03.2*
- - - D ¬ *A03.3*
- - Sonnei ¬ *A03.3*
- ¬ Entérite à *A03.9*

Shirodkar avec ou sans mention de béance du col ¬ Soins maternels pour: opération de *O34.3*

SHML [Histiocytose sinusale avec adénopathie massive] ¬ *D76.3*

Shohat ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Shokeir
v./v.a. Pena-Shokeir
- ¬ Syndrome de *Q87.8*

Shone ¬ Complexe de *Q23.8*

Short Physical Performance Battery
- 0 point ¬ SPPB [*U53.32*
- 1-2 point(s) ¬ SPPB [*U53.22*
- 3-6 points ¬ SPPB [*U53.12*
- 7-12 points ¬ SPPB [*U53.02*

Short-bowel-syndrom ¬ *K91.2*

SHOX ¬ Petite taille associée à *Q87.1*

SHP [Syndrome de Hermansky-Pudlak] ¬ *E70.3*

Shprintzen
v./v.a. Goldberg-Shprintzen
- ¬ Syndrome de *D82.1*

Shprintzen-Goldberg ¬ Syndrome
- *Q87.8*
- Omphalocèle de *Q87.8*

Shrimpton ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Shulman ¬ Syndrome de *M35.4*

Shunt
- AV autogène ¬ Thrombose d'un *T82.8*
- Dialyse ¬ Syndrome de vol vasculaire après la mise en place d'un *I97.89*
- Portosystémique congénital ¬ *Q26.5*
- Porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un *Z95.88*
- Pulmonaire] ¬ Syndrome TEMPI [télangiectasie-érythrocytose-gammopathie monoclonale-épanchements périnéphrétiques- *D47.2*
- Vasculaire
- - Intrahépatique acquis ¬ *K76.8*
- - ¬
- - - Infection d'un *T82.73*
- - - Inflammation d'un *T82.73*
- Ventriculaire intracrânien
- - Communication) ¬ Complication mécanique d'un *T85.0*
- - ¬ Sepsis dû à un *T85.72*

Shwachman-Diamond ¬ Syndrome de *Q87.8*

Shy-Drager] ¬ Hypotension orthostatique neurogène [syndrome de *G23.8*

Sialadénite
- Chronique sclérosante de la glande sous-mandibulaire ¬ *K11.2*
- IgG4 ¬ Dacryoadénite et *K11.8*

Sialectasie ¬ *K11.8*

Sialidose
- Dysmorphique infantile ¬ *E77.1*
- Mucolipidose I] ¬ *E77.1*

Sialidose *–suite*
- Normomorphique ¬ *E77.1*
- Type
- - 1 ¬ *E77.1*
- - 2
- - - Congénitale ¬ *E77.1*
- - - Juvénile ¬ *E77.1*
- - - ¬ *E77.1*

Sialique libre ¬ Maladie de surcharge en acide *E77.8*

Sialoadénite
- Cryptocoques ¬ *B45.8*
- ¬ *K11.2*

Sialo-adénopathie SAI ¬ *K11.9*

Sialolithiase ¬ *K11.5*

Sialométaplasie nécrosante ¬ *K11.8*

Sialurie type français ¬ *E77.8*

Sibérie ¬ Typhus à tiques de *A77.2*

Sibirica ¬ Fièvre pourprée due à Rickettsia *A77.2*

Sicard ¬ Syndrome de *G52.1*

Sick Sinus Syndrome] ¬ SSS [*I49.5*

SIDA
- ARC] SAI ¬ Complexe relatif au *B24*
- Congénital ¬ *B24*
- Maladies définissant le SIDA) ¬ Présente de maladies indicatrices du *U60.3!*
- SAI ¬ Syndrome d'immunodéficience acquise [*B24*
- ¬
- - Méningite à cryptocoques avec *B20†, G02.1*, B45.1*
- - Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies définissant le *U60.3!*
- - Toxoplasmose cérébrale avec *B20†, G05.2*, B58.2*

SIDA-démence ¬ Complexe *B22†, F02.4**

Siderius ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Sidéroblaste
- Couronne ¬ Anémie hypochrome congénitale sévère avec *D64.0*
- ¬ Anémie réfractaire sans *D46.0*

Sidéroblastique
v./v.a. Anémie sidéroblastique
- Ainsi précisée ¬ Anémie réfractaire non *D46.0*
- Liée au sexe ¬ Anémie hypochrome *D64.0*

Sidéropénique ¬ Dysphagie *D50.1*

Sidérose
- Bantoue ¬ *E83.1*
- Cornée ¬ Anneau de *H18.0, T90.4*
- Œil ¬ *H44.3*
- Superficielle ¬ *I69.0*
- ¬ *J63.4*

SIDS
- Sudden infant death syndrome], après l'âge d'un an ¬ *R96.0*
- ¬ Sudden infant death syndrome [*R95*

Siegler-Brewer-Carey ¬ Syndrome de *Q87.8*

Siemens
v./v.a. Bloch-Siemens
v./v.a. Christ-Siemens-Touraine
- ¬
- - Kératose folliculaire spinulosa decalvans de *Q82.8*
- - Keratosis palmoplantaris transgrediens de *Q82.8*

SIFD [anémie sidéroblastique congénitale-immunodéficience à cellules B-fièvre périodique-retard de développement] ¬ Syndrome *D64.0, D82.8*

Sifflement ¬ *R06.2*

Siffleur ¬ Syndrome de la face du *Q87.0*

Sifrim-Hitz-Weiss ¬ Syndrome *Q87.8*

Sigmoïde
v./v.a. Côlon sigmoïde
v./v.a. recto-sigmoïde
- Côlon descendant
- - Côlon transverse ¬ Aganglionose du rectum, du *Q43.1*
- - ¬ Aganglionose du rectum, du *Q43.1*
- Côlon pelvien] ¬ *C18.7*
- ¬
- - Adénome du *D12.5*
- - Aganglionose du rectum et du *Q43.1*
- - Mucosite *K92.8*

Sigmoïdien
v./v.a. recto-sigmoïdien

Sigmoïdite
v./v.a. recto-sigmoïdite
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*

Signalisation par les TLR ¬ Prédisposition aux infections bactériennes par trouble de la *D84.8*

Signe
- Alerte ¬ Dengue
- - *A97.1*
- - Hémorragique sans *A97.0*
- - Sans *A97.0*
- Alertes ¬ Dengue hémorragique avec *A97.1*
- Argyll Robertson syphilitique ¬ *A52.1†, H58.0**
- Biochimiques de détresse fœtale ¬ Travail et accouchement compliqués de *O68.3*
- Cliniques, avec sérologie positive ¬ Pian sans *A66.8*
- Détresse fœtale
- - Échographiques ¬ *O68.8*
- - Électrocardiographiques ¬ *O68.8*
- - ¬ Travail et accouchement compliqués d'autres *O68.8*
- Extrapyramidaux ¬ Myopathie proximale avec *G71.3, G25.9*
- Généraux précisés ¬ Autres symptômes et *R68.8*
- Hypoxie fœtale ¬ Soins maternels pour *O36.3*

Signe *–suite*
- Kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: avec *E42*
- Maladie ¬
- - Décès sans *R96.1*
- - Infiltrat d'Assmann avec *A16.2*
- Précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire ¬ Autres symptômes et *R09.8*
- Pyramidaux-nystagmus-apraxie oculomotrice ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique récessive- *G11.1*
- Relatifs
- - Absorption d'aliments et de liquides ¬ Autres symptômes et *R63.8*
- - Appareil urinaire, autres et non précisés ¬ Symptômes et *R39.8*
- - Apparence et au comportement ¬ Autres symptômes et *R46.8*
- - Fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés ¬ Symptômes et *R41.8*
- - Humeur ¬ Autres symptômes et *R45.8*
- - Sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés ¬ Symptômes et *R44.8*
- - Systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés ¬ Symptômes et *R29.8*
- Symptômes observés au niveau du sein ¬ Autres *N64.5*

Signification indéterminée
- GMSI] ¬ Gammapathie monoclonale de *D47.2*
- ¬ Cytopénie clonale de *U62.01!*

SII-C] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec constipation prédominante [*K58.2*

SII-D] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée prédominante [*K58.1*

SII-M] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec troubles du transit changeants (mixtes) [*K58.3*

Silencieux ¬ Syndrome du sinus *J34.8*

Silengo
v./v.a. Gardner-Silengo-Wachtel

Silicates ¬ Pneumoconiose due aux *J62.8*

Silice ¬ Pneumoconiose due à d'autres poussières de *J62.8*

Silicose SAI ¬ *J62.8*

Silicotique (massive) du poumon ¬ fibrose *J62*

Sillence ¬ Syndrome de *Q79.8*

Sillon
- Glosso-épiglottique ¬ Tumeur maligne: *C10.0*
- Mentolabial ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre inférieure et le *C44.0*
- Vaginal pendant l'accouchement ¬ Déchirure du *O71.4*

Silva ¬ Syndrome marfanoïde type de *Q87.8*

Silverman-Handmaker ¬ Dysplasie dyssegmentaire type *Q77.7*

Silverman-Smith ¬ Syndrome de Robinow- *Q87.1*

Silver-Russell
- Défaut d'empreinte de la région 11p15 ¬ Syndrome de *Q87.1*
- ¬ Syndrome de *Q87.1*

SIM1
- Enfant adolescent 3 18 ¬ Obésité
- - Déficit en *E66.84*
- - Extrême par déficit en *E66.85*
- Indice de masse corporelle IMC
- - 60 et plus chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.88*
- - Compris
- - - 30 et moins de 35 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.80*
- - - 35 et moins de 40 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.81*
- - - 40 et moins de 50 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.86*
- - - 50 et moins de 60 chez l'adulte ¬ Obésité par déficit en *E66.87*
- ¬
- - Obésité par déficit en *E66.89*
- - Syndrome de Prader-Willi-like associé à *Q87.1*

Simiae ¬
- Encéphalite à virus Herpes *B00.4†, G05.1**
- Encéphalomyélite à virus Herpes *B00.4†, G05.1**

Simiennes ¬ Paludisme à plasmodies *B53.1*

Similaire ¬
- Effet toxique
- - Acides corrosifs et substances *T54.2*
- - Alcalis corrosifs et substances *T54.3*
- Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action *T46.0*

Simmonds ¬ Maladie de *E23.0*

Simons
v./v.a. Barraquer-Simons
- ¬ Syndrome de *E88.1*

Simosa ¬ Syndrome cranio-facial de *Q87.0*

Simple
v./v.a. Type de maladie

Simpson
v./v.a. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson

Simpson-Golabi-Behmel ¬ Syndrome de *Q87.3*

Simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou *F68.1*

Simultanée sans fusion ¬ Perception *H53.3*

Sin Nombre ¬ Maladie du virus *B33.4†, J17.1**

Sinding-Larsen-Johansson ¬ Maladie de *M92.4*

Sinensis ¬
- Distomatose du foie à Chlonorchis *B66.1†, K77.0**
- Infection

Sinensis ¬ *–suite*
- Infection *–suite*
- - Clonorchis *B66.1*
- - Foie à Clonorchis *B66.1*

Singe vert ¬ Maladie du *A98.3*

Singleton-Merten ¬ Syndrome de *Q78.8*

Sino-atrial ¬
- Bloc: *I45.5*
- Bradycardie: *R00.1*

Sinoatrial node dysfunction and deafness] syndrome ¬ SANDD [*I49.8, H90.5*

Sino-auriculaire
- SAI ¬ Tachycardie: *R00.0*
- ¬ Bloc: *I45.5*

Sino-veineuse cérébrale ¬ Thrombose *I67.6*

Sinueux
- Choroïde et de la rétine ¬ Hyperornithinémie avec atrophie *E72.4*
- ¬ Dystrophie de la cornée avec filaments *H18.5*

Sinus
- Carotidien (syncope) ¬ Syndrome du *G90.00*
- Caverneux ¬
- - Anévrysme artério-veineux du *Q28.20*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une rupture d'anévrisme du *I60.8*
- Changements de la pression atmosphérique ambiante ¬ Effets sur les *T70.1*
- Coronaire ¬
- - Abouchement de la veine cave supérieure gauche dans l'oreillette gauche par le *Q26.1*
- - Anomalie congénitale du *Q21.1*
- - ASD type *Q21.1*
- - Atrésie du *Q21.1*
- - Malformation
- - - *Q21.1*
- - - *Q21.1*
- - Persistance de la veine cave supérieure gauche avec abouchement dans l'oreillette gauche via le *Q26.1*
- - Sténose du *Q21.1*
- - Trouble du rythme (du): *I49.8*
- Dermique congénital ¬ *L05.9*
- Épididyme ¬ Tuberculose du *A18.1†, N51.1**
- Ethmoïdal ¬
- - *S02.1*
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] du *C31.1*
- - Carcinome épidermoïde du *C31.1*
- - Mélanome malin de la muqueuse du *C31.1*
- - Polypes du *J33.8*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire du *C31.1*
- Face
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Tuberculose de *A15.8*
- - Localisations contiguës ¬ Carcinome épidermoïde des *C31.8*

Sinus *–suite*
- Face *–suite*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C31.9*
- - ¬
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - - Abcès
- - - - Aigu(ë), d'un *J01*
- - - - Chronique) d'un *J32*
- - - Anomalie congénitale de la paroi des *Q30.8*
- - - Empyème
- - - - Aigu(ë), d'un *J01*
- - - - Chronique) d'un *J32*
- - - Infection
- - - - Aigu(ë), d'un *J01*
- - - - Chronique) d'un *J32*
- - - Inflammation aigu(ë), d'un *J01*
- - - Polypes du *J33.8*
- - - Suppuration
- - - - Aigu(ë), d'un *J01*
- - - - Chronique) d'un *J32*
- - - Tuberculose de *A16.8*
- - - Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et *D14.0*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des *C31.8*
- Frontal
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Abcès tuberculeux du *A15.8*
- - ¬
- - - *S02.1*
- - - Abcès tuberculeux du *A16.8*
- - - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] du *C31.2*
- - - Carcinome épidermoïde du *C31.2*
- - - Mélanome malin de la muqueuse du *C31.2*
- - - Rhabdomyosarcome embryonnaire du *C31.2*
- - - Syndrome de microcornée-glaucome-absence de *Q15.0, Q13.4*
- Mais sans pansinusite ¬ Sinusite
- - Aiguë de plus d'un *J01.8*
- - Chronique) de plus d'un *J32.8*
- Maxillaire ¬
- - Carcinome épidermoïde du *C31.0*
- - Mélanome malin de la muqueuse du *C31.0*
- - Polypes du *J33.8*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire du *C31.0*
- Médian(e) de la face et du cou ¬ *Q18.8*
- Nasal ¬ Corps étranger dans un *T17.0*
- Nez ¬
- - Kyste et mucocèle du nez et des *J34.1*
- - Maladies précisées du nez et des *J34.8*
- Ouraque ¬ *Q64.4*

Sinus *–suite*
- Paranasaux ¬ Carcinome épidermoïde des fosses nasales et des *C30.0*
- Pilonidal
- - Abcès ¬ *L05.0*
- - Sans abcès ¬ *L05.9*
- Piriforme ¬ Carcinome épidermoïde du *C12*
- Pré-auriculaire-obstruction du canal lacrymal-surdité] ¬ HPPD [Syndrome d'hypertélorisme- *Q87.0*
- Sacré ¬ *L05*
- Silencieux ¬ Syndrome du *J34.8*
- Sphénoïdal ¬
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] du *C31.3*
- - Carcinome épidermoïde du *C31.3*
- - Mélanome malin de la muqueuse du *C31.3*
- - Polypes du *J33.8*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire du *C31.3*
- Uro-génital
- - Femme ¬ Persistance du *Q52.8*
- - Homme ¬ Persistance du *Q55.8*
- Valsalva (rompu) ¬ Anévrisme du *Q25.4*
- Veineux
- - Cérébral cours
- - - Grossesse ¬ Thrombose du *O22.5*
- - - Puerpéralité ¬ Thrombose du *O87.3*
- - Intracrânien ¬ Thrombose non pyogène de *I67.6*
- - Veine intracrâniens intrarachidien ¬
- - - Embolie septique des *G08*
- - - Endophlébite septique des *G08*
- - - Phlébite septique des *G08*
- - - Thrombophlébite septique des *G08*
- - - Thrombose septique des *G08*
- - ¬
- - - Anomalie du *Q21.1*
- - - Malformation du *Q21.1*
- Venosus ¬ ASD [défaut septal auriculaire] du type *Q21.1*
- ¬
- - Barotraumatisme des *T70.1*
- - Carcinome épidermoïde des *C31.9*
- - Polypes des *J33.8*

Sinusal
- Adénopathie massive] ¬ SHML [Histiocytose *D76.3*
- Forme familiale ¬ Maladie du nœud *I49.5*
- Maladie du nœud sinusal] ¬ Syndrome de dysfonctionnement *I49.5*
- SAI ¬ Tachycardie: *R00.0*
- Surdité ¬ Dysfonction *I49.8, H90.5*
- ¬
- - Bradycardie: *R00.1*
- - Histiocytose *D76.3*
- - Syndrome dysfonctionnement
- - - *I49.5*

Sinusal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome dysfonctionnement *–suite*
- - - Sinusal [maladie du nœud *I49.5*

Sinusienne ¬ Mélanome malin de la muqueuse naso- *C31.9*

Sinusite
- Aiguë
- - Plus d'un sinus mais sans pansinusite ¬ *J01.8*
- - Sans précision ¬ *J01.9*
- Aiguës ¬ Autres *J01.8*
- Barotraumatique ¬ *T70.1*
- Chronique
- - Plus d'un sinus mais sans pansinusite ¬ *J32.8*
- - Polypes nasaux] [insuffisance pluriglandulaire résultant d'une anomalie dans le transport mucociliaire] [Immotile cilia syndrome] [triade de Kartagener] ¬ Syndrome de Kartagener [Situs inversus viscerum, bronchectasie, *Q89.3*
- - SAI ¬ *J32.9*
- - Sans précision ¬ *J32.9*
- Chroniques ¬ Autres *J32.8*
- Ethmoïdal
- - Aiguë ¬ *J01.2*
- - Chronique ¬ *J32.2*
- - SAI ¬ *J32.2*
- Frontal
- - Aiguë ¬ *J01.1*
- - Chronique ¬ *J32.1*
- - SAI ¬ *J32.1*
- Maxillaire
- - Aiguë ¬ *J01.0*
- - Chronique ¬ *J32.0*
- - SAI ¬ *J32.0*
- Sphénoïdal
- - Aiguë ¬ *J01.3*
- - Chronique ¬ *J32.3*
- - SAI ¬ *J32.3*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tuberculeuse
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*

Sinusoïdale
- Toxique ¬ Syndrome d'obstruction *K71.80*
- ¬ SOS [Syndrome d'obstruction *K76.5*

Siphon carotidien ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du *I60.0*

Siprkowski
v./v.a. Passwell-Goodman-Siprkowski

Sirénomélie ¬ *Q87.2*

SIRI] ¬ Syndrome inflammatoire de restauration immunitaire [*D89.3*

Siris
v./v.a. Coffin-Siris

Sirolimus ¬ Hypersensibilité au *T88.7*

Sirop érable
- Forme
- - Intermédiaire ¬ Maladie des urines *E71.0*
- - Intermittente ¬ Maladie des urines *E71.0*
- - Sensible à la thiamine ¬ Maladie des urines *E71.0*
- ¬ Maladie
- - Menkes l [syndrome du *E71.0*
- - Urines à odeur de *E71.0*

SIRS
- Non précisé ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.9!*
- Origine
- - Infectieuse
- - - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.1!*
- - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.0!*
- - Non infectieuse
- - - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.3!*
- - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.2!*

Sitostérolémie ¬ Xanthomatose avec *E78.0*

Situation
- Anormale ¬ Testicule en *Q53.0*
- Familiale ¬ Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la *Z63*
- Parentale atypique ¬ *Z60*
- Psycho-sociales ¬ Difficultés liées à d'autres *Z65*
- Représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des *F62.0*
- Socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: *Z76.2*

Situs ambiguus ¬ *Q89.3*

Situs inversus
- Complet ¬ *Q89.3*
- Incomplet ¬ *Q89.3*
- Partiel ¬ *Q89.3*
- Total des organes internes ¬ Dextrocardie avec *Q89.3*
- Transversus
- - Abdominal ¬ *Q89.3*
- - Cœur ¬ *Q89.3*
- - Thoracique ¬ *Q89.3*
- - Total des viscères ¬ *Q89.3*
- ¬
- - *Q89.3*
- - Dextrocardie avec *Q89.3*
- - Disposition auriculaire en miroir avec *Q89.3*
- - Lévocardie- *Q24.1*

Situs inversus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome d'agnathie-holoprosencéphalie- *Q87.8*

Situs inversus viscerum, bronchectasie, sinusite chronique et polypes nasaux] [insuffisance pluriglandulaire résultant d'une anomalie dans le transport mucociliaire] [Immotile cilia syndrome] [triade de Kartagener] ¬ Syndrome de Kartagener [*Q89.3*

Siwe ¬ Maladie d'Abt-Letterer- *C96.0*

Sjögren
v./v.a. Gougerot-Sjögren
v./v.a. Marinesco-Sjögren
- Atteinte pulmonaire ¬ Syndrome de *M35.0†, J99.1**
- Kératoconjonctivite ¬ Syndrome de *M35.0†, H19.3**
- Maladie rénale tubulo-interstitielle ¬ Syndrome de *M35.0†, N16.4**
- Néphrite tubulo-interstitielle ¬ Syndrome de *M35.0†, N16.4**
- Primaire ¬ Syndrome de *M35.0*
- ¬
- - Cheratite sèche au sens du syndrome de *M35.0†, H19.3**
- - Conjonctivite sèche au sens du syndrome de *M35.0†, H13.2**
- - Kératoconjonctivite sèche au sens du syndrome de *M35.0†, H19.3**
- - Myopathie au cours de syndrome de *M35.0†, G73.7**
- - Syndrome de *M35.0*

Sjögren-Larsson ¬ Syndrome de *Q87.1*

Skeie
v./v.a. Hapnes-Boman-Skeie

Skraban-Deardorff ¬ Syndrome de *Q87.0*

SLA [Sclérose latérale amyotrophique] ¬ *G12.2*

SLC12A2 avec déficience intellectuelle et surdité neurosensorielle ¬ Retard de développement associé à *Q87.8*

SLC13A3 ¬ Leucoencéphalopathie aiguë réversible par déficit en *E75.2*

SLC16A1 ¬ Hyperinsulinisme par déficit en *E16.1*

SLC35A3-CDG [Congenital disorder of glycosylation] ¬ *E77.8*

SLC39A13 ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos spondylodysplasique lié à *Q79.6*

SLC4A10 ¬ Trouble neurologique du développement lié à *Q04.8*

SLE] ¬ Lupus érythémateux systémique [*M32.9*

SLEPR) ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible (*G93.6*

Slim disease ¬ *B22*

Sly ¬ Maladie de *E76.2*

SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [*D47.0*

SMARCA4-déficient ¬ Sarcome du thorax *C49.3*

SMARD1 ¬ *G12.2*

SMARD2 ¬ *G12.2*

Smeets
v./v.a. Fryns-Smeets-Thiry

Smirin
v./v.a. Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef

Smith
v./v.a. Aase-Smith
v./v.a. Canale-Smith
v./v.a. Clayton Smith-Donnai
v./v.a. Marshall-Smith
- ¬
- - Fracture de *S52.52*
- - Syndrome
- - - Riley- *Q89.8*
- - - Robinow-Silverman- *Q87.1*
- - - Ruvalcaba-Myhre- *Q89.8*

Smith Strang ¬ Syndrome de *E72.1*

Smith-Kingsmore ¬ Syndrome de *Q87.0*

Smith-Magenis ¬ Syndrome de *Q93.5*

Smith-McCort ¬ Dysplasie de *Q77.7*

Smolandiensis ¬ Dystrophia *H18.5*

Smoldering ¬ Mastocytose systémique type *D47.0*

SMPX ¬ Myopathie distale associée à *G71.08*

Snail fever [Bilharziose urinaire] ¬ *B65*

SNC, surdité et cécité ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie progressive à début précoce avec calcification du *G93.88*

Sneddon
- Wilkinson ¬ Maladie de *L13.1*
- ¬ Syndrome de *I77.88*

Snijders Blok-Campeau ¬ Syndrome de *F84.4*

Snijers Blok-Fisher ¬ Syndrome de *Q87.0*

Snyder-Robinson ¬ Syndrome de *Q87.8*

Social
- Enfance
- - Sans précision ¬ Trouble du fonctionnement *F94.9*
- - ¬
- - - Anxiété *F93.2*
- - - Troubles du fonctionnement *F94.8*
- Insuffisantes, non classées ailleurs ¬ Aptitudes *Z73*
- Non classé ailleurs ¬ Conflit de rôle *Z73*
- Secours insuffisants ¬ Couverture *Z59*
- ¬
- - Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs *Z64.8*
- - Difficulté liées
- - - Environnement *Z60*
- - - Situations psycho- *Z65*
- - Exclusion ou rejet *Z60*
- - Grossesse à risques liée à des problèmes *Z35.8*

Social *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Névrose *F40.1*
- - Phobies *F40.1*

Socialisé ¬ Trouble
- Agressif, type mal *F91.1*
- Conduite type
- - *F91.2*
- - Mal *F91.1*

Socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation *Z76.2*

Sociopathique ¬ Personnalité: *F60.2*

Sodé congénitale
- Syndromique ¬ Diarrhée *K90.8*
- ¬ Diarrhée *K90.8*

Sodique
- Nouveau-né ¬ Anomalies de l'équilibre *P74.2*
- ¬ Neuropathie
- - Héréditaire des petites fibres due à une canalopathie *G60.8*
- - Petites fibres due à une canalopathie *G60.8*

Sodium
- Na ¬
- - Déficit en *E87.1*
- - Excès de *E87.0*
- - Surcharge en *E87.0*
- Soude] ¬ Hydroxyde de: *T54.3*

Sodoku ¬ *A25.0*

Soemmering ¬ Anneau de *H26.4*

Soffer
v./v.a. Sohval-Soffer

SOH] ¬ Syndrome obésité hypoventilation [*E66.2*

Sohval-Soffer ¬ Syndrome de *Q87.8*

Soif
- Excessive ¬ *R63.1*
- ¬ Effets de la *T73.1*

Soin
- Béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ Recherche et *N88.3*
- Chirurgicaux médical
- - Non classées ailleurs ¬ Séquelles de complications de *T98.3*
- - Sans précision ¬ Complication de *T88.9*
- Contrôle
- - Chirurgical, sans précision ¬ *Z48.9*
- - Chirurgicaux précisés ¬ Autres *Z48.8*
- - Comprenant opération plastique
- - - Extrémités inférieures ¬ *Z42.4*
- - - Extrémités supérieures ¬ *Z42.3*
- - - Parties
- - - - Corps ¬ *Z42.8*
- - - - Tronc ¬ *Z42.2*
- - - Sans précision ¬ *Z42.9*
- - - Sein ¬ *Z42.1*

Soin *–suite*
- Contrôle *–suite*
- - Comprenant opération plastique *–suite*
- - - Tête et du cou ¬ *Z42.0*
- - Impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation ¬ *Z47.0*
- - Orthopédique
- - - Précisés ¬ Autres *Z47.8*
- - - Sans précision ¬ *Z47.9*
- Cours de la grossesse pour avortement à répétition ¬ *O26.2*
- Domicile non disponibles ¬ *Z75.8*
- Examen
- - Allaitement maternel ¬ *Z39.1*
- - Immédiatement après l'accouchement ¬ *Z39.0*
- Femme
- - Enceinte cours
- - - Herpes gestationis ¬ *O26.4*
- - - Insuffisance fœto-placentaire ¬ *O36.5*
- - Non enceinte ayant eu plusieurs fausses couches ¬ Examen ou *N96*
- Hygiène ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance et de *Z74.1*
- Impliquant
- - Moyens de rééducation ¬ *Z50.8!*
- - Rééducation, sans précision ¬ *Z50.9!*
- Maternels
- - Abdomen penduleux (ventre en besace) ¬ *O34.8*
- - Affection du fœtus, sans précision ¬ *O36.9*
- - Affections précisées du fœtus ¬ *O36.8*
- - Anasarque fœto-placentaire ¬ *O36.2*
- - Anomalie
- - - Chromosomique (présumée) du fœtus ¬ *O35.1*
- - - Lésion fœtale (présumées), sans précision ¬ *O35.9*
- - - Organe pelvien, sans précision ¬ *O34.9*
- - Anomalies
- - - Col ¬ *O34.4*
- - - Lésions fœtales (présumées) ¬ *O35.8*
- - - Organes pelviens ¬ *O34.8*
- - - Utérus gravide ¬ *O34.5*
- - - Vagin ¬ *O34.6*
- - - Vulve et du périnée ¬ *O34.7*
- - Cause connue présumée
- - - Croissance excessive du fœtus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ *O36.6*
- - - Fœtus
- - - - Léger pour l'âge gestationnel ¬ *O36.5*
- - - - Petit pour l'âge gestationnel ¬ *O36.5*
- - Cerclage avec ou sans mention de béance du col ¬ *O34.3*
- - Cicatrice
- - - Due à une césarienne antérieure ¬ *O34.2*
- - - Utérine due à une intervention chirurgicale antérieure ¬ *O34.2*

Soin *–suite*
- Maternels *–suite*
- - Cloisonnement du vagin ¬ *O34.6*
- - Colpocèle ¬ *O34.8*
- - Cours de syndrome de transfusion fœto-fœtale ¬ *O43.0*
- - Croissance excessive du fœtus ¬ *O36.6*
- - Disproportion
- - - Due
- - - - Anomalies du fœtus ¬ *O33.7*
- - - - Bassin maternel généralement rétréci ¬ *O33.1*
- - - - Fœtus
- - - - - Anormalement gros ¬ *O33.5*
- - - - - Hydrocéphale ¬ *O33.6*
- - - - Malformation du bassin de la mère ¬ *O33.0*
- - - - Rétrécissement détroit
- - - - - Inférieur ¬ *O33.3*
- - - - - Supérieur du bassin maternel ¬ *O33.2*
- - - Fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale ¬ *O33.4*
- - - Origines ¬ *O33.8*
- - - Sans précision ¬ *O33.9*
- - Fibrome de l'utérus ¬ *O34.1*
- - Fibrose du périnée ¬ *O34.7*
- - Grossesse abdominale avec fœtus viable ¬ *O36.7*
- - Grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus ¬ *O32.5*
- - Incarcération de l'utérus gravide ¬ *O34.5*
- - Intervention chirurgicale antérieure sur
- - - Col ¬ *O34.4*
- - - Périnée ou la vulve ¬ *O34.7*
- - - Vagin ¬ *O34.6*
- - Iso-immunisation
- - - Anti-Rh ¬ *O36.0*
- - - ¬ *O36.1*
- - Lésions fœtales présumées
- - - Actes à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *O35.7*
- - - Alcoolisme maternel ¬ *O35.4*
- - - Irradiation ¬ *O35.6*
- - - Médicamenteuses ¬ *O35.5*
- - - Résultant
- - - - Amniocentèse ¬ *O35.7*
- - - - Biopsie ¬ *O35.7*
- - - - Dispositif intra-utérin ¬ *O35.7*
- - - - Examens hématologiques ¬ *O35.7*
- - - - Intervention chirurgicale intra-utérine ¬ *O35.7*
- - - - Listériose ¬ *O35.8*
- - - - Maladie virale de la mère ¬ *O35.3*
- - - - Toxicomanie ¬ *O35.5*
- - - - Toxoplasmose ¬ *O35.8*
- - - Suite infection mère
- - - - Cytomégalovirus ¬ *O35.3*
- - - - Virus de la rubéole ¬ *O35.3*

Soin *–suite*
- Maternels *–suite*
- - Maladie héréditaire (présumée) du fœtus ¬ *O35.2*
- - Malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus ¬ *O35.0*
- - Malformation congénitale de l'utérus ¬ *O34.0*
- - Mort intra-utérine du fœtus ¬ *O36.4*
- - Opération de Shirodkar avec ou sans mention de béance du col ¬ *O34.3*
- - Périnée rigide ¬ *O34.7*
- - Plancher pelvien
- - - Cicatriciel ¬ *O34.8*
- - - Rigide ¬ *O34.8*
- - Polype
- - - Col ¬ *O34.4*
- - - Corps de l'utérus ¬ *O34.1*
- - Position
- - - Instable ¬ *O32.0*
- - - Transverse et oblique ¬ *O32.2*
- - Présentation
- - - Anormale du fœtus, sans précision ¬ *O32.9*
- - - Anormales du fœtus ¬ *O32.8*
- - - Complexe ¬ *O32.6*
- - - Face, du front et du menton ¬ *O32.3*
- - - Siège ¬ *O32.1*
- - Prolapsus de l'utérus gravide ¬ *O34.5*
- - Rectocèle ¬ *O34.8*
- - Rétrécissement
- - - Sténose du col ¬ *O34.4*
- - - Vagin ¬ *O34.6*
- - Rétroversion de l'utérus gravide ¬ *O34.5*
- - Signes d'hypoxie fœtale ¬ *O36.3*
- - Spina bifida (présumé(e)) du fœtus ¬ *O35.0*
- - Sténose du vagin (acquise) (congénitale) ¬ *O34.6*
- - Tête haute à terme ¬ *O32.4*
- - Tumeur
- - - Col ¬ *O34.4*
- - - Corps de l'utérus ¬ *O34.1*
- - - Vagin ¬ *O34.6*
- - - Vulve ¬ *O34.7*
- - Utérus
- - - Bicorne ¬ *O34.0*
- - - Double ¬ *O34.0*
- Médical
- - Chirurgicaux, non classées ailleurs ¬ Autres complications précisées de *T88.8*
- - Enfants trouvés ¬ Surveillance médicale et *Z76.1*
- - Infirmiers surveillance médical enfant bonne santé selon circonstances
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ *Z76.2*

Soin *–suite*
- Médical *–suite*
- - Infirmiers surveillance médical enfant bonne santé selon circonstances *–suite*
- - - Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ *Z76.2*
- - - Maladie de la mère ¬ *Z76.2*
- - - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ *Z76.2*
- - Nourrissons et enfants en bonne santé ¬ Surveillance médicale et *Z76.2*
- - Sans précision ¬ *Z51.9*
- Mise en observation, cas sans complications ¬ *Z39.0*
- Obstétrical
- - Y compris
- - - Césarienne avant début travail ¬ lorsqu y a mise observation hospitalisation
- - - - *O32*
- - - - *O34*
- - - Interruption grossesse ¬ lorsqu y a mise observation hospitalisation
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- - ¬ les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de *O98*
- Palliatifs ¬ *Z51.5*
- Prénatals insuffisants ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de *Z35.3*
- Préparatoires
- - Traitement ultérieur, non classés ailleurs ¬ *Z51.4*
- - Vue d'une dialyse ¬ *Z49.0*
- Sans précision ¬ Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les *Z74.9*
- Santé
- - Sans précision ¬ Difficulté liée aux installations médicales et autres *Z75.9*
- - ¬ Autres difficultés liées aux installations médicales et autres *Z75.8*
- Supplémentaire
- - Fœtus ou du nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de *P08*
- - Nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de *P07*
- ¬
- - Difficulté liées
- - - Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les *Z74.2*
- - - Dépendance envers la personne qui donne les *Z74.8*
- - Parent à charge au domicile, nécessitant des *Z63*
- - Pensionnaires d'établissements de *Z76.4*

Sol ¬ Pollution du *Z58*

Solaire ¬
- Dermite *L57.8*
- Kératose: *L57.0*
- Rétinopathie *H31.0*
- Urticaire *L56.3*

SOLAMEN [hypertrophie segmentaire-lipomatose-malformation artério-veineuse-nævus épidermique] ¬ Syndrome *Q87.8*

Solberg
v./v.a. Orstavik-Lindemann-Solberg

Soleil
- Deuxième degré ¬ Coup de *L55.1*
- Premier degré ¬ Coup de *L55.0*
- Sans précision ¬ Coup de *L55.9*
- Troisième degré ¬ Coup de *L55.2*
- ¬
- - Coups de *L55.8*
- - Exposition à: Lumière du *X59.9!*

Solente
v./v.a. Touraine-Solente-Gole

Solitaire
- Agressif ¬ Trouble (des): conduites, type *F91.1*
- Anus ¬ Ulcère *K62.6*
- Bénigne
- - Abdomen ¬ Tumeur fibreuse *D21.4*
- - Péritoine ¬ Tumeur fibreuse *D20.1*
- - Thorax ¬ Tumeur fibreuse *D21.3*
- Bœuf ¬ Ver *B68.1*
- Foie ¬ Nodule nécrotique *K76.8*
- Mâchoire ¬ Kyste osseux *K09.2*
- Os
- - Avant-bras ¬ Kyste *M85.43*
- - Bras ¬ Kyste *M85.42*
- - Cuisse ¬ Kyste *M85.45*
- - Jambe ¬ Kyste *M85.46*
- - Main ¬ Kyste *M85.44*
- - Pied ¬ Kyste *M85.47*
- - ¬ Kyste *M85.4*
- Rectum ¬
- - Syndrome de l'ulcère *K62.6*
- - Ulcère *K62.6*
- Rémission complète ¬ Myélome *C90.31*
- Sein ¬ Kyste *N60.0*
- ¬
- - Kyste du rein (acquis) (multiple) (*N28.1*
- - Myélome *C90.30*
- - Plasmocytome *C90.30*
- - Tumeur fibreuse *D21.9*
- - Ulcère: *K62.6*

Solium ¬ Infection à Taenia *B68.0*

Sollicitation excessif
- Non classée ailleurs ¬ Fracture par *M84.3*
- Sans précision ¬ Affection des tissus mous par *M70.9*
- ¬ Autres affections des tissus mous par *M70.8*

Solvant
- Groupe
- - Cétones ¬ *L24.2*
- - Composés chlorés ¬ *L24.2*
- - Cyclohexane ¬ *L24.2*
- - Ester ¬ *L24.2*
- - Glycol ¬ *L24.2*
- - Hydrocarbures ¬ *L24.2*
- Organique
- - Sans précision ¬ Effet toxique: *T52.9*
- - ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- Organiques ¬
- - Allergie aux *L23.5*
- - Effet toxique: Autres *T52.8*
- Volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F18*
- ¬ Dermite irritante de contact due aux *L24.2*

Somatique
- CEBPA ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec mutations *C92.00*
- NPM1 ¬ Leucémie myéloïde aiguë associée à des mutations *C92.00*
- Psychiques ¬ Douleur chronique où interviennent des facteurs *F45.41*
- ¬
- - Dysfonctionnement segmentaire et *M99.0*
- - Syndrome VEXAS [Vacuole, mutation de l'Enzyme 1 à l'X, syndrome auto-inflammatoire et *M35.8*

Somatisation ¬ *F45.0*

Somatoforme
- Appareil
- - Digestif haut ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.31*
- - Uro-génital ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.34*
- Indifférencié ¬ Trouble *F45.1*
- Organe
- - Système non précisé ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.39*
- - Systèmes ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.38*
- Persistant ¬ Syndrome douloureux *F45.40*
- Plusieurs organes et systèmes ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.37*
- Sans précision ¬ Trouble *F45.9*
- Système
- - Cardio-vasculaire ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.30*
- - Respiratoire ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.33*
- Voies digestives basses ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.32*
- ¬
- - Douleur *F45.40*
- - Troubles *F45.8*

Somatomammotropinome ¬ *D35.2*

Somatomédine-C] et EGF [facteur de croissance épidermique] ¬ Lipodystrophie due à un déficit combiné en insuline, IGF1 [*E88.1*

Somatostatine ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: *E16.8*

Somatostatinome

- Duodénum ¬ *C17.0*
- Pancréas ¬ *C25.4*
- Polycythémie ¬ Syndrome de paragangliome- *D75.1, D44.7*

Somatotrope ¬ Hypersécrétion de l'hormone *E22.0*

Somatropine ¬ Détection d'anticorps anti- *R76.88*

Sommeil

- Anormal ¬ Cycle veille- *Z91.8*
- Associé
  - ANK3 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-troubles du *Q87.8*
  - NRXN1 ¬ Syndrome de trouble neurodéveloppemental sévère-stéréotypies motrices-constipation chronique-trouble du rythme veille- *G96.8*
- Central ¬ Syndrome d'apnée du *G47.30*
- Lent ¬
  - ESES [état de mal épileptique électrique pendant le *G40.01*
  - POCS [CSWS] [pointes ondes continues pendant le *G40.01*
- Non
  - Cause organique ¬ Trouble du rythme veille- *F51.2*
  - Organique, sans précision ¬ Trouble du *F51.9*
  - Organiques ¬ Autres troubles du *F51.8*
  - Précisée ¬ Apnée du *G47.39*
- Nouveau-né
  - Centrale ¬ Apnée du *P28.3*
  - Obstructive ¬ Apnée du *P28.3*
  - SAI ¬ Apnée du *P28.3*
  - ¬ Apnée primitive du *P28.3*
- Obstructif] ¬ SAOS [Syndrome d'apnée du *G47.31*
- SAI ¬ Trouble émotionnel du *F51.9*
- Sans précision ¬ Trouble du *G47.9*
- Somnolence excessive ¬ Troubles du *G47.1*
- ¬
  - Apnées du *G47.38*
  - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: privation de *G40.5*
  - Encéphalopathie auto-immune avec parasomnie et apnée obstructive du *G04.8*
  - Épilepsie focale infantile bénigne avec pointes-ondes centrales pendant le *G40.01*
  - État de mal épileptique bioélectrique pendant le *G40.01*
  - Hypoventilation alvéolaire non obstructive idiopathique du *G47.32*
  - Inversion psychogène du rythme (du): *F51.2*

Sommeil *–suite*

- ¬ *–suite*
  - Irrégularité du rythme veille- *G47.2*
  - Maladie du *B56*
  - Mouvements périodiques des jambes au cours du *G25.80*
  - Syndrome
    - Glaucome-apnée du *H40.9, G47.39*
    - Hypoventilation du *G47.32*
    - Retard des phases du *G47.2*
  - Troubles
    - *G47.8*
    - Alimentation en rapport avec le *F51.3*
    - Cycle veille- *G47.2*
    - Endormissement et du maintien du *G47.0*

Sommer-Hines ¬ Syndrome de *Q73.8*

Somnambulisme ¬ *F51.3*

Somnifères

- Comprimé SAI ¬ *T42.7*
- Intention suicidaire ¬ Intoxication aux *T42.7*
- Médicament SAI ¬ *T42.7*
- Potion SAI ¬ *T42.7*
- ¬ Intoxication aux *T42.7*

Somnolence

- Excessive ¬ Troubles du sommeil par *G47.1*
- ¬ *R40.0*

Sonde

- Bougie ¬ passage de *Z43*
- Cours acte visée diagnostique thérapeutique ¬ Perforation accidentelle
  - Nerf par *T81.2*
  - Organe par *T81.2*
  - Vaisseau sanguin par *T81.2*
- Gastrostomie endoscopique percutanée
  - Sonde PEG] ¬ Complication mécanique de *T85.51*
  - ¬ Infection dues à une *T85.74*
- Jéjunostomie endoscopique percutanée
  - Sonde PEJ] ¬ Complication mécanique de *T85.52*
  - ¬
    - Infection dues à une *T85.74*
    - Réaction inflammatoire dues à une *T85.74*
- PEG ¬
  - Complication mécanique de sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [*T85.51*
  - Infection dues à une *T85.74*
  - Réaction inflammatoire dues à une *T85.74*
- PEJ ¬
  - Complication mécanique de sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [*T85.52*
  - Infection dues à une *T85.74*
  - Réaction inflammatoire dues à une *T85.74*

Sonde *–suite*

- Urinaire (à demeure) ¬ Complication mécanique d'une *T83.0*
- Vésicale ¬ Inflammation due à une *T83.5*

Songo ¬ Fièvre *A98.5†, N08.0**

Sonnei ¬

- Dysenterie à Shigella *A03.3*
- Infection à Shigella *A03.3*
- Shigellose à Shigella *A03.3*

Sonne-Kruse ¬ Dysenterie de *A03.3*

Sonoda ¬ Syndrome de *Q87.8*

SOPK [Syndrome ovarien polykystique] ¬ *E28.2*

Sorsby ¬ Dystrophie pseudo-inflammatoire de *H35.5*

SOS [Syndrome d'obstruction sinusoïdale] ¬ *K76.5*

Sotos 2 ¬ Syndrome de *Q87.3*

Sottas ¬ Maladie de: Déjerine- *G60.0*

Souche

v./v.a. Cellule souche

- ¬
  - Cancer du poumon à petites cellules de la bronche *C34.0*
  - Carcinome bronchique de bronche *C34.0*
  - Tumeur maligne: Bronche *C34.0*
  - Tumeur neuroendocrine de la bronche *C34.0*

Soudé

- Entraînant une disproportion ¬ Jumeaux *O33.7*
- ¬
  - Dystocie due à: jumeaux *O66.3*
  - Jumeaux *Q89.4*

Soude] ¬ Hydroxyde de: sodium [*T54.3*

Soudures vertébrales ¬ Autres *M43.2*

Souffle

- Cardiaque
  - Fonctionnel ¬ *R01.0*
  - Sans précision ¬ *R01.1*
  - Systolique) SAI ¬ *R01.1*
- Cardiaques bénins et anodins ¬ *R01.0*
- Explosion ¬ Syndrome dû au *T70.8*

Souffleur de verre ¬ Cataracte du *H26.88*

Soufre ¬ Effet toxique: Dioxyde de *T59.1*

Soufrés ¬ Anomalies du métabolisme des acides aminés *E72.1*

Soulier

v./v.a. Bernard-Soulier

Soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ Recherche et soins d'une béance cervicale (*N88.3*

Soupçonneux et évasif ¬ Caractère *R46.5*

Soupirs ¬ *R06.88*

Sourcil

- Syndactylie ¬ Syndrome de duplication des *Q82.8, Q70.9*
- ¬
  - *S00.1*

Sourcil *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *S01.0*
- - Ptosis du *L98.7*

Souris
- Articulaire du genou ¬ *M23.4*
- Intra-articulaire
- - Genou ¬ *M23.4*
- - ¬ *M24.0*

Sous-alimentation
- Nouveau-né ¬ *P92.3*
- ¬ Gastrite due à une *E63.9†, K93.8**

Sous-arachnoïdien
v./v.a. Hémorragie sous-arachnoïdienne
- Niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S35.82*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S15.82*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.82*
- Postopératoire ¬ Hémorragie rachidienne *G97.84*

Souscapitale ¬ Fracture du col du fémur: *S72.03*

Sous-capsulaire
- Antérieure) (postérieure) ¬ Cataracte sénile: polaire *H25.0*
- Postérieure ¬ Cataracte
- - *H26.88*
- - Cortico-nucléaire et *H26.88*
- ¬ Opacités glaucomateuses (*H26.2*

Sous-clavière
v./v.a. Artère sous-clavière
- ¬
- - Lésion traumatique
- - - Artère innominée ou *S25.1*
- - - Veine innominée ou *S25.3*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.81*

Sous-cornée ¬
- Dermatose pustuleuse *L13.1*
- Pustulose *L13.1*

Sous-cortical
- Bandes ¬ Hétérotopie *Q04.3*
- ¬
- - Démence vasculaire
- - - *F01.2*
- - - Mixte, corticale et *F01.3*
- - Encéphalopathie artérioscléreuse *I67.3*
- - Hémorragie intracérébrale hémisphérique, *I61.0*
- - Hétérotopie nodulaire *Q04.8*
- - Leucoencéphalopathie mégalencéphalique avec kystes *E75.2*

Sous-cutané
v./v.a. Tissu cellulaire sous-cutané
v./v.a. Tissu sous-cutané

Sous-cutané *–suite*
- Abcès ¬ Chromomycose *B43.2†, L99.8**
- Abdomen ¬ Décollement *S30.86*
- Bassin ¬ Décollement *S30.86*
- Cellules T de type panniculite ¬ Lymphome *C86.3*
- Cou ¬ Décollement *S10.96*
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ Adiponécrose *P15.6*
- Fermé ¬ lésions traumatiques superficielles
- - Abdomen, des lombes et du bassin: Décollement *S30.86*
- - Cheville et du pied: Décollement *S90.86*
- - Épaule et du bras: Décollement *S40.86*
- - Hanche et de la cuisse: Décollement *S70.86*
- - Jambe: Décollement *S80.86*
- - Poignet et de la main: Décollement *S60.86*
- Kyste ¬ Chromomycose *B43.2†, L99.8**
- Localisés) (superficiels) ¬ nodules *R22*
- Lombes ¬ Décollement *S30.86*
- Origine traumatique ¬ Emphysème *T79.7*
- Paroi thoracique
- - Antérieure ¬ Décollement *S20.36*
- - Postérieure ¬ Décollement *S20.46*
- - ¬ Décollement *S20.86*
- Pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et *E88.22*
- Présence d'un corps étranger ¬ Granulome cutané et *L92.3*
- Région costale ¬ Décollement *S20.86*
- Résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Emphysème (*T81.8*
- Sein ¬ Décollement *S20.16*
- Thorax postérieur ¬ Décollement *S20.41*
- Type panniculite ¬ Lymphome T *C86.3*
- ¬
- - Abcès phaeohyphomycosique *B43.2†, L99.8**
- - Kyste phaeohyphomycosique *B43.2†, L99.8**
- - Mucormycose *B46.3†, L99.8**

Sous-diaphragmatique
- Tuberculeux ¬ Abcès *A18.3†, K93.0**
- ¬ Abcès: *K65.09*

Sous-dural
v./v.a. Hémorragie sous-durale
- Chronique non traumatique ¬ Hématome *I62.02*
- Localisé) dû à un traumatisme obstétrical ¬ Hématome *P10.0*
- Niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S35.81*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S15.81*

Sous-dural *–suite*
- Niveau *–suite*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.81*
- Postopératoire ¬ Hémorragie rachidienne *G97.83*
- Sans précision ¬ Abcès extra-dural et *G06.2*
- ¬ Abcès granulome
- - Intracrânien: *G06.0*
- - Intrarachidien: *G06.1*

Sous-endocardique aigu myocarde
- Infarctus type
- - 1 ¬ Infarctus *I21.40*
- - 2 ¬ Infarctus *I21.41*
- ¬ Infarctus *I21.48*

Sous-épendymaire
- Cellules géantes ¬ Astrocytome *D43.2*
- Envahissement intraventriculaire degré
- - 2, du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.1*
- - 3, du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.2*
- Sans envahissement intraventriculaire) ¬ Hémorragie *P52.0*
- ¬
- - Astrocytome *D43.2*
- - Gliome *D43.2*
- - Hétérotopie nodulaire *Q04.8*

Sous-épithéliale mucineuse ¬ Dystrophie cornéenne *H18.5*

Sous-galéal
- Traumatisme obstétrical ¬ Hématome *P12.2*
- ¬
- - Contusion *S00.05*
- - Hématome *S00.05*

Sous-gingival ¬ Tartre (dentaire): *K03.6*

Sous-glottique
- Actes médicaux ¬ Sténose *J95.5*
- Congénitale ¬ Sténose *Q31.1*
- Idiopathique ¬ Sténose *J38.6*
- Larynx ¬ Membrane *Q31.0*
- Obstructive ¬ Laryngotrachéite *J05.0*
- ¬
- - Amylose *E85.4†, J99.8**
- - Carcinome épidermoïde de la partie *C32.2*
- - Laryngite (aiguë): *J04.0*
- - Léiomyosarcome de l'étage *C32.2*
- - Œdème (de la): *J38.4*
- - Ptérygion larynx
- - - *Q31.0*
- - - *Q31.0*
- - Tumeur maligne: Étage *C32.2*
- - Tumeur neuroendocrine maligne de la partie *C32.2*

Sous-hépatique ¬ Abcès: *K65.09*

Sous-mandibulaire
v./v.a. Glande sous-mandibulaire
- Indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ Abcès *K12.22*

Sous-mandibulaire *–suite*
- Sans indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ Abcès *K12.21*

Sous-maxillaire ¬
- Glande
- - *C08.0*
- - *D11.7*
- Tuberculose *A18.8†, K93.8**
- Tumeur épithéliale bénigne de la glande *D11.7*

Sous-muqueux
- Bouche ¬ Fibrose *K13.5*
- Langue ¬ Fibrose *K13.5*
- Utérus ¬ Léiomyome *D25.0*
- Voies respiratoires supérieures ¬ Fibrose *J39.88*

Sous-périostique post-traumatique ¬ Ossification *M89.8*

Sous-phrénique
- Actes médicaux ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- ¬
- - Abcès: *K65.09*
- - Péritonite (aiguë): *K65.09*

Sous-population définie ¬ Examen général de routine d'une *Z10*

Sous-pulmonaire
- Double-committed ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec communication interventriculaire sous-aortique et *Q20.1*
- Non-committed ¬ Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] avec CIV [communication interventriculaire] *Q20.1*
- Sténose pulmonaire ¬
- - VDDI avec communication interventriculaire sous-aortique ou sous-aortique et *Q20.1*
- - Ventricule droit à double issue avec communication interventriculaire sous-aortique ou sous-aortique et *Q20.1*
- ¬
- - Sténose *Q24.3*
- - Ventricule droit à double issue avec communication interventriculaire *Q20.1*

Sous-séreux de l'utérus ¬ Léiomyome *D25.2*

Sous-trochantérienne ¬ Fracture *S72.2*

Sous-type non différencié ¬ Lymphome diffus grandes Cellule B
- *C83.3*
- *C83.3*

Sous-valvulaire
- Mitral ¬ Anomalie de l'appareil *Q23.3*
- Tricuspide ¬ Anomalie de l'appareil *Q22.8*
- ¬ Rétrécissement aortique *Q24.4*

Sous-xiphoïdienne
v./v.a. Hernie sous-xiphoïdienne

Soutien
- Appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé ¬ Dépendance de longue durée envers un appareil de *Z99.9*

Soutien *–suite*
- Appareils médicaux ou appareils auxiliaires ¬ Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de *Z99.8*
- Familial inadéquat ¬ *Z63*

SOX5 ¬ Retard de développement et de langage par déficit en *Q93.5*

Spahr ¬ Chondrodysplasie métaphysaire type *Q78.5*

Sparganose ¬ *B70.1*

Sparganum (S.mansoni) (S. proliferum) ¬ Infection à: *B70.1*

Spasme
- Accommodation ¬ *H52.5*
- Anus ¬ *K59.4*
- Artère cérébrale ¬ *G45.9*
- Artériel ¬ *I73.9*
- Bell ¬ *G51.3*
- Congénital(e) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- Coronaire vérifié ¬ Angine de poitrine avec *I20.1*
- Cryptogénique à début tardif ¬ *G40.8*
- Diffus de l'œsophage ¬ *K22.4*
- Épileptiques infantiles ¬ Syndrome des *G40.4*
- Hémifacial clonique ¬ *G51.3*
- Hystérique
- - Pharynx ¬ *F45.33*
- - ¬ *F44.4*
- Infantiles
- - Retard psychomoteur-atrophie cérébrale progressive-anomalie des ganglions de la base ¬ Syndrome de *E51.8†, G99.8**
- - ¬ *G40.4*
- Laryngé
- - Hystérique ¬ *F44.4*
- - ¬ *J38.5*
- Œsophage
- - Distal ¬ *K22.4*
- - ¬ *K22.4*
- Pédo-carpien ¬ *R29.0*
- Psychogène des voies digestives ¬ *F45.32*
- Pylore
- - Non classé ailleurs ¬ *K31.3*
- - ¬ Formes psychogènes de: *F45.3*
- Sanglot ¬ *R06.88*
- Sphincter d'Oddi ¬ *K83.4*
- Vasculaire ¬ AVC par *I63.8*
- ¬
- - Angine de poitrine (de): due à un *I20.1*
- - Crampe et *R25.2*

Spasmodique ¬
- Rhinorrhée *J30*
- Torticolis *G24.3*

Spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et *T44.3*

Spasmus nutans
- Sans lésion auto-infligée ¬ *F98.40*
- ¬ *F98.49*

Spasticité
- Atrophie cérébelleuse - cécité corticale] ¬ Syndrome de NESCAV [neurodégénérescence - *G31.88*
- Déficience intellectuelle-épilepsie lié à l'X ¬ Syndrome de *G40.4*
- Encéphalopathie épileptique ¬ Syndrome néonatal létal de *G40.4, R09.2*
- Hydrocéphalie] ¬ Syndrome CRASH [hypoplasie du corps calleux-retard mental-pouces en adduction- *Q04.8*
- Hyperglycinémie survenant durant l'enfance ¬ *E72.5, G11.8*
- Hypernatrémie ¬ Syndrome de microcéphalie - malformation cérébrale - *Q04.8*
- Jambes ¬ Hypomyélinisation avec atteinte du tronc cérébral et de la moelle épinière et *E75.2*
- Liés à l'X ¬ Syndrome parkinsonien et *G20.90*
- Membres dystrophie rétine
- - Déficit en arginine vasopressine ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- - Diabète insipide ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X- *Q87.8*
- Origine rachidienne des muscles striés ¬ *G95.83*
- Périphérique et vitréorétinopathie exsudative ¬ Syndrome de déficience intellectuelle avec *Q87.2*
- Progressive-déficience intellectuelle-lésions de la substance blanche ¬ Syndrome de neurodégénération infantile- *G31.88*
- Tardive ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique récessive avec *G11.1*
- ¬
- - Choréoathétose dystonique paroxystique avec ataxie épisodique et *G24.8*
- - Syndrome de neurodégénérescence progressive de l'enfant-cécité-ataxie- *G31.88*

Spastique
v./v.a. Type de maladie

Spatiale ¬ Négligence visuo- *R29.5*

Spatz ¬ Syndrome de Hallervorden- *G23.0*

SPCA [serum prothrombin conversion accelerator] ¬ Déficit en *D68.23*

SPECC1L ¬ Syndrome d'hypertélorisme associé à *Q87.0*

Spécial
v./v.a. Type de maladie

Spécification ¬ Sarcome des cellules dendritiques sans autre *C96.4*

Spécifique
- Acquisition
- - Arithmétique ¬ Trouble *F81.2*
- - Articulation ¬ Trouble *F80.0*
- - Orthographe ¬ Trouble *F81.1*

Spécifique *–suite*
- Atoniques ¬ Crises non *G40.3*
- Bébé «poupée de son» ¬ Syndrome non *P94.2*
- Calcul rénal et hydronéphrose ¬ Urétérite non *N13.20*
- Cloniques ¬ Crises non *G40.3*
- Développement
- - Fonctions motrices, sans précision ¬ Troubles *F82.9*
- - Langage ¬ Trouble *F80.9*
- - Motricité
- - - Buccale ¬ Troubles *F82.2*
- - - Fine et graphique ¬ Troubles *F82.1*
- - - Globale ¬ Troubles *F82.0*
- Fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques *G71.2*
- Fœtus nouveau-né
- - Sans précision ¬ Affection des téguments *P83.9*
- - ¬
- - - Affections précisées des téguments *P83.8*
- - - Œdèmes, autres et sans précision, *P83.3*
- Grossesse multiple ¬ Autres complications *O31.8*
- Isolées) ¬ Phobies *F40.2*
- Lecture ¬
- - Retard *F81.0*
- - Trouble *F81.0*
- Lymphocytes] ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en LCK [tyrosine kinase *D81.2*
- Mixtes du développement ¬ Troubles *F83*
- Myocloniques ¬ Crises non *G40.3*
- Non
- - Classées ¬
- - - Affections articulaires *M24.8*
- - - Arthropathies *M12.8*
- - Effectués ¬ Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux *Z53*
- - Identifié ¬
- - - Broncho)pneumonie virale, sans précision ou virus *J11.0*
- - - Encéphalopathie grippale sans précision ou virus *J11.8*
- - - Épanchement pleural grippal sans précision ou virus *J11.1*
- - - Gastroentérite grippale sans précision ou virus *J11.8*
- - - Infection grippale des voies respiratoires supérieures sans précision ou virus *J11.1*
- - - Laryngite grippale sans précision ou virus *J11.1*
- - - Myocardite (aiguë) grippale sans précision ou virus *J11.8*

Spécifique *–suite*
- Non *–suite*
- - Identifié ¬ *–suite*
- - - Pharyngite grippale sans précision ou virus *J11.1*
- NSIP] ¬ Pneumonie interstitielle non *J84.10*
- Orthographe (sans trouble de la lecture) ¬ Retard *F81.1*
- Période périnatale, sans précision ¬ Infection *P39.9*
- Personnalité ¬ Autres troubles *F60.8*
- Précisées de la période périnatale ¬ Autres infections *P39.8*
- Propres au nourrisson ¬ Symptômes non *R68.1*
- Prostate [PSA] ¬ Modification du taux d'antigène *R77.80*
- Sans précision ¬ Lymphadénite non *I88.9*
- Tension artérielle ¬ Constatation d'une baisse non *R03.1*
- Tonico-cloniques ¬ Crises non *G40.3*
- Toniques ¬ Crises non *G40.3*
- ¬
- - Balano-posthite ulcéreuse *A63.8†, N51.2**
- - Bloc ventriculaire non *I45.4*
- - Grippe
- - - Sans mention d'identification d'un virus *J11*
- - - Virale sans mention d'identification d'un virus *J11*
- - Hépatite réactive non *K75.2*
- - Infection bactérienne *A49.9*
- - Infections récurrentes par déficit en granules *D71*
- - Lymphadénite
- - - Mésentérique non *I88.0*
- - - Non *I88.8*
- - Péricardite idiopathique aiguë non *I30.0*
- - Rash et autres éruptions cutanées non *R21*
- - Urétrite non *N34.1*

Spectrine ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique récessive associée à la *G11.1*

Spermatique
v./v.a. Cordon spermatique
- ¬ Torsion: canal *N44.0*

Spermatocèle ¬ *N43.4*

Spermatocystite
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.8**
- Post-gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N51.8**

Spermatocytaire
- Testicule
- - Descendu ¬ Séminome *C62.1*
- - Non descendu ¬ Séminome *C62.0*
- ¬ Séminome *C62.9*

Spermatogenèse ¬ Infertilité masculine avec une anomalie de la *N46*

Spermatozoïdes anormaux ¬ *R86*

Sperme
- Liquide séminal ¬ Résultats anormaux de: *R86*
- ¬ Donneur de *Z52.88*

Spermicides ¬ *T49.8*

Spermogramme
- Vasectomie ¬ *Z30.8*
- ¬ *Z31.4*

SPG11 ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique récessive type 2 due à une mutation de *G60.0*

SPH] ¬ Syndrome pulmonaire à Hantavirus [*B33.4†, J17.1**

Sphénoïdal
- Aiguë ¬ Sinusite *J01.3*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.3*
- SAI ¬ Sinusite *J32.3*
- ¬
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] du sinus *C31.3*
- - Carcinome épidermoïde du sinus *C31.3*
- - Mélanome malin de la muqueuse du sinus *C31.3*
- - Polypes du sinus (de): *J33.8*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire du sinus *C31.3*

Sphénoïde ¬
- *S02.1*
- Os: *D16.41*
- Ostéoblastome de l'os *D16.41*
- Sarcome de l'os *C41.01*

Sphérocytaire
- Due à un déficit en pyruvate kinase ¬ Anémie hémolytique congénitale non *D55.2*
- Héréditaire ¬ Anémie *D58.0*
- ¬ Ictère hémolytique congénital *D58.0*

Sphérocytique de type I ¬ Anémie hémolytique non *D55.1*

Sphérocytose congénitale ¬ *D58.0*

Sphéroïdes axonaux et cellules gliales pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à *E75.2*

Sphérophakie
- Ectopie du cristallin et mégalocornée ¬ Glaucome secondaire à une *Q15.8*
- Raideur articulaire-petite taille] ¬ Syndrome GEMSS [glaucome-ectopie du cristallin- *Q87.1*
- ¬ *Q12.4*

Sphincter
- Anal
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: *O70.2*
- - ¬
- - - *D37.78*
- - - *S31.80*
- Oddi ¬ Spasme du *K83.4*
- Rectal ¬
- - Dysfonctionnement du *K59.9*

Sphincter *–suite*
- Rectal ¬ *–suite*
- - Hémorragie du *K62.51*
- - Rétrécissement syphilitique du *A52.7†, K93.8**
- SAI au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: *O70.2*
- Urétral) ¬ Syndrome de Fowler (dysfonctionnement du *N36.8*
- Vésical ¬
- - Sclérose du *N32.8*
- - Ulcère du *N32.8*
- Vessie ¬ Dysfonctionnement neurogène du détrusor/ *N31.88*
- ¬ Rétrécissement de l'anus (*K62.4*

Sphingolipidose
- Sans précision ¬ *E75.3*
- ¬
- - *E75.2*
- - *E75.3*
- - Dégénérescence cérébrale au cours de *E75.3†, G32.8**

Sphingomyélinase acide ¬ Déficit en *E75.2*

Sphingomyélinose ¬ *E75.3*

Spieghel
v./v.a. Hernie de Spiegel
- ¬ Hernie incarcérée de *K43.68*

Spiegler
v./v.a. Brooke-Spiegler

Spielmeyer
v./v.a. Stock-Spielmeyer-Vogt
- Vogt ¬ Maladie
- - *E75.4*
- - *E75.4*

Spina bifida
- Aperta
- - Kystique) ¬ *Q05*
- - ¬ *Q05.9*
- Cervical
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.0*
- - Sans hydrocéphalie ¬ *Q05.5*
- Dorsal
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.1*
- - ¬ *Q05.6*
- Dorso lombaire
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.1*
- - ¬ *Q05.6*
- Hydrocéphalie NCA ¬ *Q05.4*
- Hypospadias ¬ Syndrome de *Q05.7, Q54.0*
- Kystique
- - Cervical ¬ *Q05.5*
- - Lombo-sacré ¬ *Q05.7*
- - ¬ *Q05.9*
- Lombaire
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.2*
- - Sans hydrocéphalie ¬ *Q05.7*
- - ¬ *Q05.7*

Spina bifida *–suite*
- Lombo-sacré
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.2*
- - SAI ¬ *Q05.7*
- Occulta ¬ *Q76.0*
- Ouvert
- - Cervical ¬ *Q05.5*
- - Lombo-sacré ¬ *Q05.7*
- Présumé(e)) du fœtus ¬ Soins maternels pour: *O35.0*
- Sacré
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.3*
- - Sans hydrocéphalie ¬
- - - *Q05.8*
- - - *Q05.8*
- Sans précision ¬ *Q05.9*
- Thoracique
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.1*
- - Sans hydrocéphalie ¬
- - - *Q05.6*
- - - *Q05.6*
- ¬ *Q05.9*

Spina ventosa ¬ *A18.0†, M90.09**

Spinal
v./v.a. Type de maladie

Spinobulbaire de type Kennedy [Maladie de Kennedy] ¬ Atrophie musculaire *G12.2*

Spinocellulaire ¬ Syndrome de kératodermie palmoplantaire-ambiguïté sexuelle XX-prédisposition au carcinome *Q56.0, Q82.8*

Spinocérébelleuse
v./v.a. Type de maladie

Spinulosa
- Decalvans de Siemens ¬ Kératose folliculaire *Q82.8*
- ¬ Trichodysplasie *L85.8*

Spirales cylindriques ¬ Myopathie à *G71.2*

Spirillum minus
- Causée par morsure de rat ¬ Fièvre à *A25.0*
- ¬ Infection à *A25.0*

Spirit ¬ White *T52.0*

Spirochaeta morsus muris ¬ Fièvre causée par morsure de rat à *A25.0*

Spirochètes
- Précisées ¬ Autres infections à *A69.8*
- ¬
- - Bronchite à *A69.8†, J99.8**
- - Ictère hémorragique à *A27.0*
- - Infection
- - - *A69.9*
- - - Pulmonaire à *A69.8†, J17.0**
- - Pneumonie au cours d'infection à *A69.8†, J17.0**

Spirochétose ¬ *A69.9*

Spirometra ¬ Infection à: larves de *B70.1*

Spirométrose ¬ *B70.1*

Spitz ¬ Nævus de *D22.9*

SPL [Syndrome de Papillon-Lefèvre] ¬ *Q82.8*

Splanchnique ¬ Nerf *S34.5*

Splénique
- Cellules littorales ¬ Angiome *D13.9*
- Diffus de la pulpe rouge à petites cellules B ¬ Lymphome *C83.0*
- Zone marginale ¬ Lymphome *C83.0*
- ¬
- - Angle: gauche du côlon [*D12.3*
- - Anomalie de: épreuves fonctionnelles (de): *R94.8*
- - Arrachement du hile *S36.04*
- - Embolie et thrombose de la veine *I82.80*
- - Hématome *S36.01*
- - Lésion traumatique de la veine *S35.3*
- - Lymphome de la zone marginale *C83.0*
- - Malformation veineuse *Q27.8*
- - Persistance de lobulations *Q89.08*
- - Thrombose *I82.80*
- - Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [*C18.5*

Splénite
- Aspergillus ¬ *B44.8*
- SAI ¬ *D73.8*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, D77**

Splénogène (primaire) ¬ Neutropénie *D70.6*

Splénogonadique
- Anomalie transversale des membres-micrognathie ¬ Syndrome de fusion *Q87.8*
- Isolée ¬ Fusion *Q89.08*

Splénomégalie
- Anhidrose-céphalée migraineuse ¬ Syndrome de dystrophie rétinienne-œdème du nerf optique- *Q87.8*
- Congénitale ¬ *Q89.00*
- Congestive chronique ¬ *D73.2*
- Cours de paludisme ¬ *B54†, D77**
- Gaucher
- - Adulte ¬ *E75.2*
- - Infantile ¬ *E75.2*
- - ¬ *E75.2*
- Leucopénie ¬ Arthrite rhumatoïde avec adéno- *M05.00*
- Myélophtisique ¬ *D47.4*
- Niemann Pick ¬ *E75.2*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ *R16.1*
- - Classées ailleurs ¬ Hépatomégalie avec *R16.2*
- SAI ¬ *R16.1*
- Syphilitique congénitale
- - Précoce ¬ *A50.0†, D77**
- - ¬ *A50.0†, D77**
- ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, R16.1*

Split-Cord, type mixte ¬ Malformation de *Q06.2*

SPO [syndrome psycho-organique] ¬ *F07.9*

Spolydactylie
- Type

Spolydactylie *–suite*
- Type *–suite*
- - Beemer-Langer ¬ Syndrome des côtes courte- *Q77.2*
- - Majewski ¬ Syndrome des côtes courte- *Q77.2*
- - Saldino-Noonan ¬ Syndrome des côtes courte- *Q77.2*
- - Verma-Naumoff ¬ Syndrome des côtes courte- *Q77.2*
- ¬ Syndrome des côtes courte- *Q77.2*

SPONASTRIME ¬ Dysplasie *Q77.7*

Spondylaire ¬ Syndrome de croissance excessive-modelage métaphysaire réduit-dysplasie *Q87.3*

Spondylarthrite
- Ankylopoïétique ¬ *M45.09*
- Ankylosante
- - Juvénile ¬ *M08.19*
- - Sièges multiples de la colonne vertébrale ¬ *M45.00*
- - ¬
- - - Iridocyclite au cours de *M45.09†, H22.1**
- - - Syndrome PASS [pyoderma gangrenosum-acné-hidradénite suppurée- *M35.8*
- - - Troubles respiratoires au cours de *M45.09†, J99.8**
- Axial
- - Juvénile ¬ *M08.19*
- - Non radiologique ¬ *M45.09*
- - Radiologique ¬ *M45.09*
- - ¬
- - - *M45.09*
- - - Iridocyclite au cours de *M45.09†, H22.1**
- - - Trouble respiratoire au cours de *M45.09†, J99.8**
- Psoriasique ¬ *L40.5†, M07.2**

Spondylarthrose
- Cervicale
- - Sans myélopathie ou radiculopathie ¬ *M47.8*
- - ¬ Myélopathie au cours de *M47.12†, G99.2**
- Lombaire ¬ Myélopathie au cours de *M47.16†, G99.2**
- Lombosacrée ¬ Myélopathie au cours de *M47.17†, G99.2**
- Lombo-sacrée sans myélopathie ou radiculopathie ¬ *M47.8*
- Myélopathie ¬
- - *M47.1*
- - *M47.99†, G99.2**
- Radiculopathie ¬ Autres *M47.2*
- Sacrale avec myélopathie ¬ *M47.18†, G99.2**
- Sacro-coccygienne avec myélopathie ¬ *M47.18†, G99.2**
- Sans précision ¬ *M47.9*
- Thoracique

Spondylarthrose *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Sans myélopathie ou radiculopathie ¬ *M47.8*
- - ¬ Myélopathie au cours de *M47.14†, G99.2**
- - ¬
- - - *M47.8*
- - - Compression des racines nerveuses au cours de *M47.29†, G55.2**

Spondylite
- Ankylosante
- - Atteinte pulmonaire ¬ *M45.09†, J99.8**
- - ¬ Iridocyclite au cours de *M45.09†, H22.1**
- Cours
- - Brucellose ¬ *A23.9†, M49.19**
- - Tuberculose ¬ *A18.0†, M49.09**
- Due à une infection intestinale bactérienne ¬ *A04.9†, M49.29**
- Gonocoques ¬ *A54.4†, M49.39**
- Infectieuse NCA ¬ *M46.59*
- Psoriasique ¬ *L40.5†, M07.2**
- Syphilitique ¬ *A52.7†, M49.39**
- Typhique ¬ *A01.0†, M49.29**
- ¬ *M46.99*

Spondylo
- Carpo-tarsienne ¬ Synostose *Q78.8*
- Mégaépiphysaire-métaphysaire ¬ Dysplasie *Q77.7*
- Périphérique-cubitus court ¬ Syndrome de dysplasie *Q77.7*

Spondylo-camptodactylie ¬ Syndrome *Q77.8*

Spondylo-cheirodysplasique ¬ SED type *Q79.6*

Spondylo-costale
- Atrésie anale-malformation génito-urinaire ¬ Syndrome de dysostose *Q87.8*
- Autosomique
- - Dominante ¬ Dysostose *Q76.8*
- - Récessive ¬ Dysostose *Q76.8*
- Hypospadias-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de dysostose *Q87.1*

Spondylodiscite
- Corps vertébral
- - Cervicale ¬ *M46.42*
- - Lombaire ¬ *M46.46*
- - Thoracique ¬ *M46.44*
- ¬ *M46.49*

Spondylodysplasique
- Lié
- - B3GALT6 ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos *Q79.6*
- - B4GALT7 ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos *Q79.6*
- - SLC39A13 ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos *Q79.6*
- ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos *Q79.6*

Spondylo-enchondrale ¬ Dysplasie *Q77.7*

Spondylo-épimétaphysaire
v./v.a. Dysplasie spondylo-épimétaphysaire

Spondylo-épiphysaire
v./v.a. Dysplasie spondylo-épiphysaire

Spondylogène
- Moelle épinière ¬ Compression *M47.19†, G99.2**
- ¬ Myélopathie *M47.19†, G99.2**

Spondylolisthésis
- Congénital ¬ *Q76.21*
- ¬ *M43.1*

Spondylolyse
- Congénitale ¬ *Q76.22*
- ¬ *M43.0*

Spondylo-métaphysaire
v./v.a. Dysplasie spondylo-métaphysaire
- ¬ Syndrome de leucodystrophie hypomyélinisante avec chondrodysplasie *E75.2, Q77.8*

Spondylo-oculaire syndrome ¬ *Q87.5*

Spondylopathie
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ *M49.8**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *M49.3**
- Inflammatoire, sans précision ¬ *M46.9*
- Neurologique
- - Cours
- - - Syringobulbie ¬ *G95.0†, M49.49**
- - - Syringomyélie ¬ *G95.0†, M49.49**
- - - Tabès ¬ *A52.1†, M49.49**
- - ¬ *M49.4**
- Sans précision ¬ *M48.9*
- Traumatique ¬ *M48.3*

Spondylopathies
- Infectieuses ¬ Autres *M46.5*
- Inflammatoires précisées ¬ Autres *M46.8*
- Précisées ¬ Autres *M48.8*

Spongieux
- Muqueuses ¬ Nævus blanc *Q38.6*
- Subaiguë ¬ Encéphalopathie *A81.0*
- ¬
- - Lésion traumatique de l'urètre: Partie *S37.32*
- - Myocarde *I42.88*

Spongiforme bovine] ¬ Forme atypique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à ESB [Encéphalopathie *A81.0*

Sporothrix
- Schenckii ¬ Infection à *B42.9*
- ¬ Septicémie à *B42.70*

Sporotrichose
- Disséminée ¬ *B42.78*
- Généralisée ¬ *B42.78*
- Lympho-cutanée ¬ *B42.1*
- Pulmonaire ¬ *B42.0†, J99.8**
- ¬
- - Arthrite au cours de *B42.8†, M01.69**

Sporotrichose *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Formes de *B42.8*
- - Maladie des voies respiratoires au cours de *B42.0†, J99.8**
- - Méningite au cours de *B42.8†, G02.1**

Sport ¬ Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en *X59.9!*

Sportive ¬
- Examen général en série de: équipes *Z10*
- Inscription dans: pratique *Z02*

Sporulants
- Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies *B96.7!*
- Précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes anaérobies à Gram positif non *B95.91!*

SPPB Short Physical Performance Battery
- 0 point ¬ *U53.32*
- 1-2 point(s) ¬ *U53.22*
- 3-6 points ¬ *U53.12*
- 7-12 points ¬ *U53.02*

Spranger
v./v.a. Rajab-Spranger

Sprengel ¬
- Malformation congénitale de *Q74.0*
- Syndrome d'hydrocéphalie-dysplasie costovertébrale-anomalie de *Q87.8*

Sprue
- Non tropicale ¬ *K90.0*
- Réfractaire ¬ *K90.0*
- SAI ¬ *K90.1*
- Tropicale ¬ *K90.1*

Squameux
- Conjonctive ¬ Néoplasie *D48.7*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Lésions papulo- *L45**
- Multiple spontanément curable ¬ Épithéliome *D23.9*
- Précisées ¬ Autres lésions papulo- *L44.8*
- Sans précision ¬ Lésion papulo- *L44.9*
- Unilatérale non syndromique ¬ Craniosynostose *Q75.0*

Squelette
- Due à un traumatisme obstétrical, sans précision ¬ Lésion du *P13.9*
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésions d'autres parties du *P13.8*
- ¬
- - Ostéoblastome du *D16.9*
- - Syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du *Q87.5*

Squelettique
v./v.a. cérébro-oculo-facio-squelettique
v./v.a. facio-cutanéo-squelettique
v./v.a. microcéphalie-facio-cardio-squelettique
v./v.a. vélo-facio-squelettique

Squeletto
v./v.a. oculo-squeletto-dentaire

SRAS], sans précision ¬ Syndrome respiratoire aigu sévère [*U04.9*

SREAT [Encéphalopathie sensible aux stéroïdes associée à une thyroïdite auto-immune] ¬ *G04.8, E06.3*

SRH] [GHRH] ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: «releasing factor» de l'hormone de croissance [*E16.8*

SRP54 ¬ Syndrome de neutropénie congénitale sévère-retard du développement par déficit en *D70.0*

SSADH ¬ Déficit en *E72.8*

SSS
- Atteinte 30% surface corporel
- - Plus ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome *L00.1*
- - ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome *L00.0*
- SAP ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome *L00.0*
- Sick Sinus Syndrome] ¬ *I49.5*
- Staphylococcique de peau échaudée] avec atteinte de la muqueuse ¬ Syndrome *L00.1*
- ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome *L00.0*

SSSS [Staphylococcal scalded skin syndrome] ¬ *L00.0*

ST3GAL3-CDG [Congenital disorder of glycosylation] ¬ *E77.8*

Stabilisant
- Fibrine ¬
- - Carence en facteur *D68.26*
- - Déficit héréditaire en facteur *D68.26*
- Membrane ¬ Intoxication aiguë par les médicaments avec effet *T50.9*

Stabilisée ¬ Carie dentaire *K02.3*

Stable ¬
- Angor *I20.8*
- Carence en facteur *D68.23*
- Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): *E11*

Stafne ¬ Kyste (de): *K10.0*

STAG1 ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-dysmorphie faciale-reflux gastro-œsophagien associé à *Q87.0*

Stähli ¬ Ligne de *H18.0*

Standard ¬ Leucémie, réfractaire au traitement d'induction *C95.8!*

Stanescu
v./v.a. Maroteaux-Stanescu-Cousin
- ¬
- - Dysostose type *Q78.8*
- - Dysplasie spondylo-épiphysaire, type *Q77.7*

Stannose ¬ *J63.5*

Staphylococcal scalded skin syndrome] ¬ SSSS [*L00.0*

Staphylococcique
- Nourrisson ¬ Dermatite exfoliatrice *L00.0*
- Peau échaudée
- - Atteinte de la muqueuse ¬ Syndrome SSS [*L00.1*
- - Syndrome SSS
- - - Atteinte 30% surface corporel
- - - - Plus ¬ Syndrome *L00.1*
- - - - ¬ Syndrome *L00.0*
- - - SAP ¬ Syndrome *L00.0*
- - - ¬ Syndrome *L00.0*
- ¬
- - Pneumonie nécrosante *J15.2*
- - Syndrome de Lyell *L00*

Staphylococcus aureus
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.6!*
- ¬
- - Choc septique à *A41.0, R57.2*
- - Infection
- - - *A49.00*
- - - Cutanée locale à *L08.9, B95.6!*

Staphylocoque
- Aureus du prématuré ¬ Sepsis à *P36.2*
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.7!*
- Coagulase-négatif ¬
- - Choc septique à *A41.1, R57.2*
- - Infection à *A49.08*
- - Septicémie à *A41.1*
- Doré ¬
- - Sepsis du nouveau-né à *P36.2*
- - Septicémie à *A41.0*
- Langue ¬ Abcès à *K14.0, B95.8!*
- Moelle épinière ¬ Abcès à *G06.1, B95.8!*
- Non
- - Précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.8!*
- - Précisés ¬ Septicémie à *A41.2*
- Précisés ¬ Septicémie à d'autres *A41.1*
- Prématuré NCA ¬ Sepsis à *P36.3*
- Sans précision ¬ Sepsis du nouveau-né à *P36.3*
- Siège non précisé ¬ Infection à *A49.0*
- Tant qu'agents pathogènes ¬ *B95.8!*
- ¬
- - Amygdalite à *J03.8, B95.8!*
- - Angine aiguë à *J03.8, B95.8!*
- - Arthrite et polyarthrite à *M00.0*
- - Bactériémie à *A49.09*
- - Choc septique à *A41.2, R57.2*
- - Embolie pyohémique à *A41.2*
- - Entérite à *A04.8, B95.8!*
- - Impétigo à *L01.0*

Staphylocoque *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Infection
- - - Cutanée locale à *L08.9, B95.8!*
- - - Généralisée à *A41.2*
- - Intoxication alimentaire à *A05.0*
- - Méningite à *G00.3*
- - Méningo-encéphalite à *G04.2, B95.8!*
- - Péricardite à *I30.1, B95.8!*
- - Pharyngite à *J02.8, B95.8!*
- - Pneumonie congénitale à *P23.2*
- - Pneumonie due à des *J15.2*
- - Scarlatine à *A38*
- - Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des: *Z22.3*

Staphylocoque doré
- Résistant
- - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ *U80.01!*
- - Méthicilline ¬ *U80.0!*
- - Oxacilline méticilline
- - - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ *U80.00!*
- - - MRSA] ¬ *U80.00!*
- ¬ Endocardite à *I33.0, B95.6!*

Staphylome
- Cornée ¬ *H18.7*
- Équatorial ¬ *H15.8*
- Péripapillaire ¬ *H15.8*
- Postérieur] ¬ Syndrome MRCS [microcornée-dystrophie des cônes et des bâtonnets-cataracte- *Q15.8*
- Syphilitique ¬ *A52.7†, H19.8**

STAR ¬
- Hyperplasie congénitale lipoïde des surrénales par déficit en *E25.08*
- Syndrome *Q87.8*

Stargardt ¬
- Dégénérescence maculaire de *H35.5*
- Maladie de *H35.5*

Stase SAI ¬ Dermite de *I83.1*

STAT1 ¬
- Déficit en *D84.8*
- Prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit partiel en *D84.8*
- Syndrome d'entéropathie et endocrinopathie auto-immunes-susceptibilité aux infections chroniques associé à *D82.8*

Stato-acoustique] ¬ Nerf acoustique [N. *S04.6*

Staturale
v./v.a. Insuffisance staturale

Stature constitutionnelle ¬ Haute *E34.4*

Staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse accélérée-dysmorphie faciale-retard *Q87.3*

Status post
- Arthrodèse ¬ *Z98.1*
- Dérivation ou anastomose intestinale ¬ *Z98.0*
- Greffe
- - Cœur
- - - Poumon ¬ *Z94.3*
- - - ¬ *Z94.1*
- - Cornée ¬ *Z94.7*
- - Foie ¬
- - - *Z94.4*
- - - Échec de greffe lors de *T86.49*
- - Organe ou de tissu, sans précision ¬ *Z94.9*
- - Osseuse ¬ *Z94.6*
- - Peau
- - - Autologue ¬ *Z94.5*
- - - ¬ *Z94.5*
- - Poumon ¬ *Z94.2*
- - Rein ¬
- - - *Z94.0*
- - - Échec de greffe lors de *T86.19*
- Infection COVID-19 ¬ *U09.9!*

Stéatocystome multiple-dents néonatales ¬ Syndrome de *L72.2*

Stéatohépatite
- Alcoolique ¬ *K70.1*
- Non alcoolique [NASH] ¬ *K75.8*
- ¬ *K75.8*

Stéatokystose multiple ¬ *L72.2*

Stéato-nécrose] mésentérique ¬ Nécrose graisseuse [*K65.8*

Stéatorrhée
- Idiopathique ¬ *K90.0*
- Pancréatique ¬ *K90.3*
- Tropicale ¬ *K90.1*

Stéatose hépatique
- Aiguë de la grossesse ¬ *O26.68*
- Non alcoolique ¬ *K76.0*
- Nourrisson ¬ Hypertriglycéridémie transitoire et *E78.1, K76.0*

Steel ¬ Syndrome de *Q79.8*

Steele-Richardson-Olszewski ¬ Maladie de *G23.1*

Stefanovic
v./v.a. Levic-Stefanovic-Nikolic

Steiner
v./v.a. Wiedemann-Steiner

Steinert
v./v.a. Curschmann-Batten-Steinert
- Adulte ¬ Dystrophie myotonique de *G71.1*
- Début
- - Juvénile ¬ Dystrophie myotonique de *G71.1*
- - Tardif ¬ Dystrophie myotonique de *G71.1*
- Forme
- - Congénitale ¬ Dystrophie myotonique de *G71.1*

Steinert *–suite*
- Forme *–suite*
- - Infantile ¬ Dystrophie myotonique de *G71.1*
- ¬ Maladie de *G71.1*

Steinfeld ¬ Syndrome de *Q87.8*

Stein-Leventhal ¬ Syndrome (de): *E28.2*

Stellaire
- Multiforme] ¬ CASM [Choroïdopathie amélanotique *H31.8*
- ¬
- - Ganglion: *S24.4*
- - Kératite: *H16.1*
- - Nævus: *I78.1*
- - Téléangiectasie [angiome *I78.1*

Sténocardie ¬ *I20.8*

Sténopéique] SAI ¬ Méat en trou d'épingle [*N35.9*

Sténosante
- Pouce [de Quervain] ¬ Ténosynovite chronique *M65.4*
- ¬ Angiocholite *K83.08*

Sténose
- Acquise
- - Choanes ¬ *J34.8*
- - Conduit auditif externe ¬ *H61.3*
- Anus et du rectum ¬ *K62.4*
- Aorte (congénitale) ¬ *Q25.3*
- Aortique
- - Congénitale ¬ *Q23.0*
- - Isthmique atypique ¬ *Q25.1*
- - Rhumatismal
- - - Insuffisance
- - - - Reflux ¬ *I06.2*
- - - - ¬ *I06.2*
- - - ¬ *I06.0*
- - Supravalvulaire ¬ *Q25.3*
- - Valvulaire congénitale ¬ *Q23.0*
- Aqueduc de Sylvius ¬
- - *Q03.0*
- - Hydrocéphalie avec *Q03.0*
- Artère ¬ *I77.1*
- Artère basilaire ¬
- - *I65.1*
- - Occlusion et *I65.1*
- Artère carotide ¬
- - *I65.2*
- - Occlusion et *I65.2*
- Artère cérébelleuse ¬
- - *I66.3*
- - Occlusion et *I66.3*
- Artère cérébrale
- - Antérieure ¬
- - - *I66.1*
- - - Occlusion et *I66.1*
- - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou *I63.5*

Sténose *–suite*
- Artère cérébrale *–suite*
- - Moyenne ¬
- - - *I66.0*
- - - Occlusion et *I66.0*
- - Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et *I66.4*
- - Postérieure ¬
- - - *I66.2*
- - - Occlusion et *I66.2*
- - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et *I63*
- - Sans précision ¬ Occlusion et *I66.9*
- - ¬
- - - *I66.9*
- - - Occlusion et *I66.8*
- Artère perforante ¬ Occlusion et *I66.8*
- Artère précérébrale
- - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou *I63.2*
- - Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et *I65.3*
- - Sans précision ¬ Occlusion et *I65.9*
- - ¬
- - - *I65.9*
- - - Occlusion et *I65.8*
- Artère pulmonaire ¬ *Q25.6*
- Artère vertébrale ¬
- - *I65.0*
- - Occlusion et *I65.0*
- Bilatérale
- - Artère carotide ¬ *I65.3*
- - Artère précérébrale ¬
- - - *I65.3*
- - - *I65.3*
- - Artère vertébrale ¬ *I65.3*
- Bronches ¬ *J98.0*
- Bronchique congénitale ¬ *Q32.3*
- Canal biliaire, sans calcul ¬ *K83.1*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul ¬ *K82.0*
- Canal lacrymal, lacrymonasal ¬ *H04.5*
- Canal pancréatique ¬
- - *K86.82*
- - Calcul canal pancréatique
- - - *K86.81*
- - - Sans *K86.80*
- Canal rachidien
- - Région sacrée ¬ *M48.08*
- - ¬
- - - Claudicatio spinalis au cours de *M48.09†, G55.3**
- - - Myélopathie au cours de *M48.09†, G99.2**
- Canal salivaire ¬ *K11.8*
- Canalicule lacrymal, lacrymonasal ¬ *H04.5*
- Col
- - Néovessie ¬ *N32.0*

Sténose *–suite*
- Col *–suite*
- - ¬ Soins maternels pour: rétrécissement ou *O34.4*
- Col de l'utérus ¬ Rétrécissement et *N88.2*
- Col vésical (acquise) ¬ *N32.0*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.6*
- Congénital(e) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- Congénitale
- - Artère pulmonaire ¬
- - - *Q25.6*
- - - *Q25.6*
- - Artère rénale ¬ *Q27.1*
- - Duodénum ¬ *Q41.0*
- - Iléon ¬ *Q41.2*
- - Intestin grêle ¬ *Q41.9*
- - Isolée des orifices piriformes ¬ *Q30.8*
- - Jéjunum ¬ *Q41.1*
- - Larynx NCA ¬ *Q31.8*
- - Orifice
- - - Nasal (antérieur) (postérieur) ¬ *Q30.0*
- - - Uretère ¬ *Q62.1*
- - Rectum ¬ *Q42.1*
- - Trachée ¬ *Q32.1*
- - Urètre et du col vésical ¬ Autres formes d'atrésie et de *Q64.3*
- - Valve pulmonaire ¬ *Q22.1*
- - Valvule
- - - Aortique ¬ *Q23.0*
- - - Tricuspide ¬ *Q22.4*
- - Veine
- - - Cave
- - - - Inférieure) (supérieure) ¬ *Q26.0*
- - - - ¬ *Q26.0*
- - - Pulmonaires ¬ *Q26.8*
- Congénitales
- - Anus ¬ *Q42.3*
- - Côlon, sans précision de localisation ¬ Absence, atrésie et *Q42.9*
- - Duodénum ¬ Absence, atrésie et *Q41.0*
- - Intestin SAI ¬ Absence, atrésie et *Q41.9*
- - Localisations
- - - Côlon ¬ Absence, atrésie et *Q42.8*
- - - Précisées de l'intestin grêle ¬ Absence, atrésie et *Q41.8*
- - Rectum, avec fistule ¬ Absence, atrésie et *Q42.0*
- Congénitaux de l'œsophage ¬ *Q39.3*
- Consécutive
- - Intervention par endoscopie de l'appareil digestif ¬ *K91.84*
- - Opération de l'appareil digestif ¬ *K91.84*
- Due à prothèses, implants ou greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Duodénum ¬ *K31.5*
- Effet hémodynamique ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sans *I25.10*
- Estomac ¬ Estomac en sablier et *K31.2*

Sténose *–suite*
- Fibromusculaire de l'artère rénale ¬ *I77.3*
- Hypertrophique congénitale du pylore ¬ *Q40.0*
- Infundibulum pulmonaire ¬ *Q24.3*
- Insuffisance des voies lacrymales ¬ *H04.5*
- Isthme de l'aorte] ¬ ISTA [*Q25.1*
- Larynx ¬ *J38.6*
- Lombaire du canal rachidien ¬ Claudicatio spinalis au cours de *M48.06†, G55.3**
- Médullaire diaphysaire-histocytome fibreux ¬ Syndrome de *Q78.8, C49.9*
- Mitral
- - Congénitale ¬ *Q23.2*
- - Insuffisance
- - - Régurgitation ¬ *I05.2*
- - - ¬ *I05.2*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I39.0**
- - ¬ *I05.0*
- Multiples d'artères précérébrales ¬ *I65.3*
- Non rhumatismal valvule
- - Mitral
- - - Insuffisance mitrale ¬ *I34.80*
- - - ¬ *I34.2*
- - Tricuspide
- - - Insuffisance ¬ *I36.2*
- - - ¬ *I36.0*
- Œsophage ¬
- - *K22.2*
- - Œsophagite par reflux avec *K21.0, K22.2*
- Ostiale coronaire
- - Congénitale ¬ *Q24.5*
- - ¬ *Q24.5*
- Ostium urétral ¬ *N35.9*
- Post-opératoire des voies biliaires ¬ *K91.84*
- Primaire des veines pulmonaires ¬ *Q26.8*
- Pulmonaire
- - Dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec *Q21.3*
- - Supravalvulaire ¬ Macroanévrisme artériel de la rétine et *H35.0, Q25.6*
- - ¬
- - - VDDI avec communication interventriculaire sous-aortique ou sous-aortique et sous-pulmonaire et *Q20.1*
- - - Ventricule droit à double issue avec communication interventriculaire sous-aortique ou sous-aortique et sous-pulmonaire et *Q20.1*
- Pylore-cryptorchidie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle-hypotonie-brachycéphalie- *Q87.0*
- Pylorique
- - Adulte
- - - Compression ¬ *K31.12*
- - - Infiltration ¬ *K31.12*
- - - Tumeur
- - - - Duodénum ¬ *K31.12*

Sténose *–suite*
- Pylorique *–suite*
- - Adulte *–suite*
- - - Tumeur *–suite*
- - - - Estomac ¬ *K31.12*
- - - - Pancréas ¬ *K31.12*
- - Hypertrophique de l'adulte ¬ *K31.10*
- - Inflammatoire de l'adulte ¬ *K31.11*
- - ¬ *K31.18*
- Rétrécissement
- - Congénital du canal lacrymal ¬ *Q10.5*
- - Congénitaux
- - - Œsophage ¬ *Q39.3*
- - - Voies biliaires ¬ *Q44.3*
- Sac lacrymal, lacrymonasal ¬ *H04.5*
- Sinus coronaire ¬ *Q21.1*
- Sous-aortique congénitale ¬ *Q24.4*
- Sous-glottique
- - Actes médicaux ¬ *J95.5*
- - Congénitale ¬ *Q31.1*
- - Idiopathique ¬ *J38.6*
- Sous-pulmonaire ¬ *Q24.3*
- Spinale cervicale congénitale ¬ *M48.02*
- Stents ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec *I25.16*
- Stomie
- - Consécutive
- - - Colostomie ¬ *K91.4*
- - - Entérostomie ¬ *K91.4*
- - - Trachéotomie ¬ *J95.02*
- - Post-gastrostomie ¬ *K91.84*
- Subaortique
- - Fibromusculaire modérée ¬ *Q24.4*
- - Hypertrophique ¬ *I42.1*
- - Membraneuse modérée ¬ *Q24.4*
- - Petite taille ¬ Syndrome de *Q87.1*
- - Tunnel ¬ *Q24.4*
- Supravalvulaire de l'artère pulmonaire ¬ *Q25.6*
- Syphilitique
- - Aorte ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Bronches ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Congénitale
- - - Larynx ¬ *A50.5†, J99.8**
- - - Œsophage ¬ *A50.5†, K23.8**
- - Larynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Œsophage ¬ *A52.7†, K23.8**
- - Trachée ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Valve aortique ¬ *A52.0†, I39.1**
- Trachéal
- - Acquise
- - - SAI. ¬ *J39.80*
- - - ¬ *J39.80*
- - Actes médicaux ¬ *J95.81*
- - Tuberculeuse ¬ *A16.4*
- Tricuspidien

Sténose *–suite*
- Tricuspidien *–suite*
- - Insuffisance ¬ *I07.2*
- - ¬ *I07.0*
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.1*
- Tronc brachio-céphalique ¬
- - *I65.8*
- - Infarctus cérébral par *I63.2*
- Tronc commun de l'artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.14*
- Tubaire ¬ *N97.1*
- Uretère ¬ Atrésie et *Q62.1*
- Urétrale post-opératoire ¬ *N99.18*
- Vagin
- - Acquise) (congénitale) ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- - ¬ *N89.5*
- Vaisseaux de pontage ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec *I25.15*
- Vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.8*
- Valvulaire pulmonaire congénitale ¬ *Q22.1*
- Valvule
- - Aortique
- - - Insuffisance ¬ *I35.2*
- - - ¬ *I35.0*
- - Non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- - Pulmonaire
- - - Insuffisance ¬ *I37.2*
- - - ¬ *I37.0*
- - Tricuspide (rhumatismale) ¬ *I07.0*
- Veines hépatiques ¬ *I82.0*
- Vulve ¬ *N90.5*

Stenotrophomonas
- Non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, *U81.6!*
- ¬
- - *B96.5!*
- - Bactériémie à *A49.85*

Stent
- Coronaire ¬ Infection due à un *T82.71*
- ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de *I25.16*

Stercolithe
- Appendice ¬ *K38.1*
- ¬ *K56.4*

Stercoral ¬ Ulcère: *K62.6*

Stéréoscopique ¬ Fusion avec anomalie de la vision *H53.3*

Stéréotypés
- Lésion auto-infligé ¬ mouvement
- - *F98.41*
- - *F98.41*
- Mains-cataracte bilatérale ¬ Trouble neurologique du développement sévère avec troubles de l'alimentation-mouvements *G31.88*

Stéréotypés *–suite*
- Sans
- - Lésion auto-infligé ¬ mouvement
- - - *F98.40*
- - - *F98.40*
- - Précision d'une lésion auto-infligée ¬ Mouvements *F98.49*
- - ¬
- - Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements *F84.4*
- - Trichotillomanie au cours de mouvements *F98.40*

Stéréotypies
- Comportements répétitifs ¬ *F98.4*
- Motrice
- - Constipation chronique-trouble du rythme veille-sommeil associé à NRXN1 ¬ Syndrome de trouble neurodéveloppemental sévère- *G96.8*
- - ¬ *F98.49*

Stérilet
- Cours d'une grossesse ¬ Rétention d'un *O26.3*
- ¬ Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [*Z30.5*

Stérilisation ¬
- *Z30.2*
- Tuboplastie ou vasoplastie après *Z31.0*

Stérilité
- Associée à une anovulation ¬ *N97.0*
- Femme
- - Associée à des facteurs relevant de l'homme ¬ *N97.4*
- - Origines ¬ *N97.8*
- - SAI ¬ *N97*
- - Sans précision ¬ *N97.9*
- Homme ¬ *N46*
- Origine
- - Cervicale ¬ *N97.3*
- - Endocrinien femme
- - - Ovulation ¬ *N97.8*
- - - Sans anovulation ¬ *N97.0*
- - Tubaire ¬ *N97.1*
- - Utérine ¬ *N97.2*
- Relative ¬ *N96*
- ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de *Z35.0*

Stern
v./v.a. Guérin-Stern
v./v.a. Kaler-Garrity-Stern

Sterni ¬ Fracture sternum
- Corpus *S22.22*
- Manubrium *S22.21*

Stern-Lubinsky-Durrie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Sterno mastoïdien
- Congénitale) ¬ Tuméfaction *Q68.0*
- ¬ Torticolis congénital (*Q68.0*

Sterno-claviculaire ¬
- Articulation *T84.10*
- Entorse et foulure de l'articulation *S43.6*
- Luxation de l'articulation *S43.2*
- Tuberculose de l'articulation *A18.0†, M01.11**

Sterno-cléido-mastoïdien
- Due à un traumatisme obstétrical ¬ Lésion *P15.2*
- ¬
- - Anomalie morphologique congénitale des muscles *Q68.0*
- - Contracture du muscle *Q68.0*

Sterno-costo-claviculaire isolée ¬ Hyperostose *M85.81*

Sternum
- Bifide ¬ *Q76.7*
- Bifidum ¬ *Q76.7*
- Clavicule ¬ Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: Côtes, *D16.7*
- Corpus sterni ¬ Fracture du *S22.22*
- Laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique ¬ *M96.80*
- Manubrium sterni ¬ Fracture du *S22.21*
- Processus xiphoideus ¬ Fracture du *S22.23*
- ¬
- - *T84.28*
- - Absence congénitale de *Q76.7*
- - Anomalies congénitales du *Q76.7*
- - Entorse et foulure des côtes et du *S23.4*
- - Fibrome chondromyxoïde du *D16.71*
- - Ostéoblastome du *D16.71*
- - Ostéosarcome du *C41.31*
- - Sarcome d'Ewing du *C41.31*
- - Sarcome du *C41.31*
- - Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.71*
- - Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: *C41.31*

Stéroïdes
- Associée thyroïdite auto-immun ¬
- - Encéphalopathie sensible aux *G04.8, E06.3*
- - SREAT [Encéphalopathie sensible aux *G04.8, E06.3*
- Déshydrogénase-anomalies dentaires ¬ Syndrome de déficit en *K76.8*
- Hormone ¬
- - Abus de: *F55*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.5*
- Hyalinose focale et segmentaire ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux *N04.1*
- Lésions minimales ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux *N04.0*
- Prolifération mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux *N04.3*

Stéroïdes *–suite*
- Résistance secondaire ¬ Syndrome néphrotique sensible aux *N04.9*
- Sclérose mésangiale diffuse ¬ Syndrome néphrotique familial idiopathique résistant aux *N04.8*
- Sulfatase ¬ Déficit en *Q80.1*
- ¬
- - Acné due aux *L70.8*
- - Syndrome néphrotique idiopathique avec résistance aux *N04.9*
- - Taux urinaires élevés de: *R82.5*

Stéroïdien
- AINS] ¬ Intoxication: Autres anti-inflammatoires non *T39.3*
- SAI ¬ Tumeur maligne à cellules *C56*
- Sang ¬ Présence d'un produit *R78.6*
- ¬ Ulcère
- - Estomac dû aux anti-inflammatoires non *K25.9, Y57.98!*
- - Gastro-duodénal dû aux anti-inflammatoires non *K27.9, Y57.98!*
- - Peptique dû aux anti-inflammatoires non *K27.9, Y57.98!*

Stérol
- 27-hydroxylase ¬ Déficit en *E75.5*
- C5-désaturase ¬ Déficit en *Q87.8*

Stevens-Johnson
- Nécrolyse épidermique toxique ¬ Spectre syndrome de *L51.20*
- ¬
- - Dermatostomatite type *L51.1*
- - Syndrome de *L51.1*

Stevenson
v./v.a. Beare-Stevenson
v./v.a. Patterson-Stevenson
- ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Stickler
v./v.a. Suarez-Stickler
- Autosomique récessif ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Type
- - 1 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - 2 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - 3 ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬ Syndrome de *Q87.0*

Stieda] ¬ Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini- *M76.4*

Stiff baby ¬ Syndrome *G25.88*

Stiff man» congénital ¬ Syndrome « *G25.88*

Stigmates syphilitiques congénitaux ¬ *A50.5*

Still
- Adulte
- - Articulation de la cheville ¬ Maladie de *M06.17*
- - Avant-bras ¬ Maladie de *M06.13*
- - Bras ¬ Maladie de *M06.12*
- - Colonne vertébrale ¬ Maladie de *M06.18*
- - Cuisse ¬ Maladie de *M06.15*

Still *–suite*
- Adulte *–suite*
- - Jambe ¬ Maladie de *M06.16*
- - Localisations multiples ¬ Maladie de *M06.10*
- - Main ¬ Maladie de *M06.14*
- - Pied ¬ Maladie de *M06.17*
- - Région de l'épaule ¬ Maladie de *M06.11*
- - Région pelvienne ¬ Maladie de *M06.15*
- - ¬ Maladie de *M06.10*
- Juvénile ¬ Maladie de *M08.29*
- SAI ¬ Maladie de *M08.2*
- ¬ Syndrome de Chauffard- *M08.29*

Stilling-Türk-Duane ¬ Syndrome de *H50.8*

Stimmler ¬ Syndrome de *Q87.1*

Stimulant
- Bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques ¬ Médicaments *T44.9*
- Hors caféine ¬
- - Consommation non intraveineuse d'autres *U69.36!*
- - Utilisation intraveineuse d'autres *U69.35!*
- Y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres *F15*
- ¬ Intoxication: Laxatifs *T47.2*

Stimulateur
- Cardiaque
- - Implanté ¬
- - - Adaptation et manipulation d'un *Z45.00*
- - - Infection due à un *T82.70*
- - ¬
- - - Changement
- - - - *Z45.00*
- - - - Générateur d'un *Z45.00*
- - - Contrôle d'un *Z45.00*
- - - Infection due à *T82.70*
- - - Présence de: *Z95.0*
- Diaphragmatique ¬ Adaptation et manipulation d'un *Z45.81*
- Électronique du système nerveux ¬ Complication mécanique de l'implantation d'un *T85.1*
- Gènes de l'Interféron] ¬ Vasculopathie de l'enfant associée à STING [*M35.8*
- Sacré radiculaire ¬ *Z45.80*
- Thérapie de resynchronisation cardiaque ¬ Présence de: *Z95.0*

Stimulation
- Excessive par des médicaments déclencheurs de contractions ¬ Hyperactivité de l'utérus due à une *O62.8, Y57.98!*
- Nerveuse ¬ Anomalies (de): réponse à une *R94.1*

STING [Stimulateur des Gènes de l'Interféron] ¬ Vasculopathie de l'enfant associée à *M35.8*

STK4 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Stocco Dos Santos ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Stockage
- Esters du cholestérol ¬ Maladie de *E75.5*
- Glycogène ¬
- - Cardiomyopathie hypertrophique congénitale létale par maladie de *E74.0†, I43.1**
- - GSD [Maladie de *E74.0*
- - Myopathie au cours d'anomalies de *E74.0†, G73.6**
- Graisses ¬ *E75.6*
- Granules plaquettaires delta ¬ Déficit isolé de *D69.1*
- Lipides
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E75.6*
- - ¬
- - - Anomalie
- - - - *E75.6*
- - - - *E75.6*
- - - Anomalies du *E75.5*
- - - Dystrophie rétinienne au cours de maladie de *E75.6†, H36.8**
- - - Myopathie au cours de maladie de *E75.6†, G73.6**

Stock-Spielmeyer-Vogt ¬ Syndrome de *E75.4*

Stokes ¬
- Dyspnée de Cheyne- *R06.3*
- Maladie d'Adams- *I45.9*

Stoll ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Stoll-Alembik-Finck ¬ Syndrome de *Q87.8*

Stoll-Lévy-Francfort ¬ Syndrome de *Q87.2*

Stomal(e) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*

Stomatine
- Normale ¬ Cryohydrocytose héréditaire avec *D58.8*
- ¬ Cryohydrocytose héréditaire avec réduction de *D58.8*

Stomatite
- Affections apparentées ¬ *K12*
- Allergique ¬ *K12.1*
- Angulaire due carence vitamine
- - B NCA ¬ *E53.9†, K93.8**
- - B2 ¬ *E53.0†, K93.8**
- Aphteuse
- - Majeure) (mineure) ¬ *K12.0*
- - Pharyngite-adénopathie] ¬ Syndrome PFAPA [fièvre périodique- *M35.8*
- Candida ¬ *B37.0*
- Diphtérique ¬ *A36.8*
- Due à une prothèse ¬ *K12.1*
- Fusospirochètes ¬ *A69.1*
- Gangréneuse ¬ *A69.0*
- Geotrichum ¬ *B48.3*
- Herpétiforme ¬ *K12.0*
- Pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès ¬ Gingivo- *B00.2*

Stomatite *–suite*
- SAI ¬ *K12.1*
- Ulcéreuse ¬ *K12.1*
- Ulcéro-nécrotique
- - Aiguë) ¬ Gingivo- *A69.1*
- - ¬ *A69.0*
- Vésiculaire
- - Exanthème, due à un entérovirus ¬ *B08.4*
- - Virale [fièvre de l'Indiana] ¬ *A93.8*
- Vésiculeuse ¬ *K12.1*
- ¬ Autres formes de *K12.1*

Stomatocytose
- Héréditaire avec hématies hyperhydratées ¬ *D58.8*
- ¬ *D58.8*

Stomie
- Appareil
- - Digestif ¬
- - - Présence d'une autre *Z93.4*
- - - Surveillance d'autres *Z43.4*
- - Urinaire ¬
- - - Mauvais fonctionnement de *N99.5*
- - - Présence d'une autre *Z93.6*
- Consécutive
- - Colostomie ¬ Sténose de la *K91.4*
- - Entérostomie ¬ Sténose de la *K91.4*
- - Trachéotomie ¬ Sténose de la *J95.02*
- Non précisée ¬ Surveillance d'une *Z43.9*
- Post-gastrostomie ¬ Sténose de *K91.84*
- Sans précision ¬ Présence d'une *Z93.9*
- Voies urinaires ¬ Surveillance d'autres *Z43.6*
- ¬
- - Existence d'autres *Z93.88*
- - Surveillance d'autres *Z43.88*

Stormorken ¬ Syndrome de *D69.1*

Stout
v./v.a. Gorham-Stout

Stovin
v./v.a. Hughes-Stovin

Strabisme
- Adhérences ¬ *H50.6*
- Concomitant SAI ¬ *H50.4*
- Convergent
- - Concomitant ¬ *H50.0*
- - Intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Ésotropie [*H50.3*
- Défaut du septum cardiaque ¬ Syndrome d'hypotonie sévère-retard de développement psychomoteur- *Q87.8*
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de protrusion maxillaire antérieure- *Q87.8*
- Divergens] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Exotropie [*H50.3*
- Divergent concomitant ¬ *H50.1*
- Incisure du lobe de l'oreille ¬ Syndrome de retard de langage-asymétrie faciale- *Q87.0*
- Latent ¬ *H50.5*
- Mécanique ¬ *H50.6*

Strabisme *–suite*
- Mélanocytose dermique congénitale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de retard de croissance sévère- *Q87.8*
- Paralytique
- - Cours de syndrome de Kearns-Sayre ¬ *H49.8*
- - Sans précision ¬ *H49.9*
- - ¬ Autres *H49.8*
- Pied creux ¬ Syndrome de télécanthus-hypertélorisme- *Q87.8*
- Précisés ¬ Autres *H50.8*
- Pupilles ectopiques ¬ Syndrome de ptosis- *Q15.8*
- Sans précision ¬ *H50.9*
- Traits grossiers du visage-planovalgus ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-hypotonie- *Q87.8*
- Vertical ¬ *H50.2*
- Visage grimaçant-doigts longs ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-trouble du langage- *Q87.8*
- ¬
- - Amblyopie: avec *H53.0*
- - Syndrome de déficience intellectuelle- *Q87.8*

Straddling ou overriding de la valve tricuspide ¬ *Q22.8*

Strandberg
v./v.a. Groenblad-Strandberg

Strangulation
- Intestin due à une hernie avec gangrène ¬ *K46.1*
- ¬
- - Iléus par *K56.2*
- - Suffocation (par *T71*

Strangurie ¬ *R30.0*

Stratakis
v./v.a. Carney-Stratakis

Stratton-Garcia-Young ¬ Syndrome de *Q87.8*

Stratton-Parker ¬ Syndrome de *Q87.1*

Strauss
v./v.a. Churg-Strauss

Streiff
v./v.a. Hallermann-Streiff-like

Streptobacillaire causée par morsure de rat ¬ Fièvre (de): *A25.1*

Streptobacilles causée par morsure de rat ¬ Fièvre à *A25.1*

Streptobacillus moniliformis ¬ Infection à *A25.1*

Streptococcique du groupe A] ¬ PANDAS [Maladie neuropsychiatrique auto-immune pédiatrique avec infection *G25.88, B95.0!, F07.8*

Streptococcus pneumoniae
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.3!*
- Résistant
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ *U80.11!*

Streptococcus pneumoniae *–suite*
- Résistant *–suite*
- - Pénicilline oxacilline
- - - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ *U80.10!*
- - - ¬ *U80.10!*
- ¬
- - Infection à *A49.15*
- - Pneumonie due à *J13*
- - Septicémie à *A40.3*

Streptocoque
v./v.a. Pseudostreptocoque
- Groupe
- - A
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.0!*
- - - ¬
- - - - Infection à *A49.10*
- - - - Septicémie à *A40.0*
- - - - Syndrome neuropsychiatrique à apparition aiguë associé à une infection à *G25.88, B95.0!, F07.8*
- - B du prématuré ¬ Sepsis à *P36.0*
- - C
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.41!*
- - - ¬ Infection à *A49.12*
- - D
- - - Entérocoques
- - - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.2!*
- - - - ¬ Septicémie à *A40.2*
- - - ¬ Infection à *A49.13*
- - G
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.42!*
- - - ¬ Infection à *A49.14*
- Groupe B
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.1!*
- - ¬
- - - Infection à *A49.11*
- - - Pneumonie congénitale à *P23.3*
- - - Pneumonie due à des *J15.3*
- - - Septicémie à *A40.1*
- Moelle épinière ¬ Infection à *G04.8, B95.5!*
- Non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.5!*
- Prématuré ¬ Sepsis à *P36.1*
- Sans précision ¬ Sepsis du nouveau-né à *P36.1*
- Sauf groupe B ¬ *P23.6*
- Spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.48!*
- ¬
- - Amygdalite à *J03.0*
- - Angine à *J02.0*
- - Arthrites et polyarthrites à *M00.2*

Streptocoque *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Bactériémie
- - - *A49.15*
- - - *A49.19*
- - Bronchite aiguë due à des *J20.2*
- - Choc septique à *A40.9, R57.2*
- - Endocardite
- - - *I33.0, B95.5!*
- - - Valvule aortique à *I33.0, B95.5!*
- - Glomérulonéphrite au cours de sepsis à *A40.9†, N08.0**
- - Infection
- - - *A49.09*
- - - *A49.19*
- - - Congénitale à *P37.8, B95.48!*
- - - Cutanée locale à *L08.9, B95.5!*
- - - Organes respiratoires supérieurs à *J06.9, B95.5!*
- - Laryngite à *J04.0, B95.5!*
- - Laryngotrachéite à *J04.2, B95.5!*
- - Maladie des organes respiratoires supérieurs à *J06.9, B95.5!*
- - Méningite à *G00.2*
- - Méningo-encéphalite à *G04.2, B95.5!*
- - Péricardite à *I30.1, B95.5!*
- - Pharyngite à *J02.0*
- - Pneumonie due à d'autres *J15.4*
- - Rhinopharyngite à *J00, B95.5!*
- - Septicémies à *A40.8*
- - Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des: *Z22.3*
- - Trachéite à *J04.1, B95.5!*

Streptogène ¬ Pityriasis *L30.5, B95.5!*

Streptogramines
- Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux *U80.31!*
- Nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux *U80.11!*
- Oxazolidinones
- - Non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux *U80.01!*
- - ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline et le cas échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux *U80.00!*
- ¬
- - Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux *U80.20!*
- - Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux *U80.30!*

Streptogramines *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline et le cas échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux *U80.10!*

Streptomycine ¬
- *T36.5*
- Hypersensibilité à la *T88.7*

Stress
- Excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au *X59.9!*
- Non classé ailleurs ¬ *Z73*
- Physique ou mental, non précisé ¬ *Z73*
- Post-traumatique ¬ État de *F43.1*
- Sévère
- - Sans précision ¬ Réaction à un facteur de *F43.9*
- - ¬ Autres réactions à un facteur de *F43.8*
- ¬
- - Cardiomyopathie de *I42.88*
- - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- - Érythrocytose liée au *D75.1*
- - Fracture vertébrale de *M48.4*
- - Incontinence urinaire d'effort [incontinence de *N39.3*
- - Polycythémie due
- - - *D75.1*
- - - *D75.1*
- - Réaction aiguë
- - - *F43.0*
- - - Facteur de *F43.0*

Stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements *X59.9!*

Striatonigrique ¬ Dégénérescence *G23.2*

Striatum syphilitique ¬ Atrophoderma maculatum et *A52.7†, L99.8**

Stricture des vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.8*

Stridor
- Congénital (laryngé) SAI ¬ *P28.8*
- ¬ *R06.1*

Striduleux) ¬ Laryngisme (*J38.5*

Strié
- Bandes ¬ Kératodermie palmoplantaire *Q82.8*
- Bloquants neuromusculaires] ¬ Intoxication: Myorelaxants (muscles *T48.1*
- Sclérose crânienne ¬ Syndrome d'ostéopathie *Q87.5*
- ¬
- - Kératite: *H16.1*
- - Langue: *K14.5*
- - Lichen *L44.2*
- - Spasticité d'origine rachidienne des muscles *G95.83*

Stries
- Angioïdes
- - Angioid streaks] ¬ *H35.38*
- - Choroïde ¬ *H35.38*
- - Macula ¬ *H35.38*
- - Rétine ¬ *H35.38*
- - ¬ *H35.38*
- Atrophiques
- - Syphilitiques ¬ *A52.7†, L99.8**
- - ¬ *L90.6*
- ¬ Atrophie
- - Maculaire syphilitique de la peau en *A52.7†, L99.8**
- - Syphilitique de la peau en *A52.7†, L99.8**

Striopallidodentée bilatérale ¬ Calcinose *G23.8*

Strohl
v./v.a. Guillain-Barré-Strohl

Strom
v./v.a. Eng-Strom

Stroma ¬ Tumeur testiculaire des cordons sexuels et du *C62.9*

Stromal
v./v.a. Tumeur stromale
- Congénitale ¬ Dystrophie cornéenne *H18.5*
- Herpes simplex ¬ Kératite *B00.5†, H19.1**
- Herpétique ¬ Kératite *B00.5†, H19.1**
- ¬
- - Dystrophie cornéenne *H18.5*
- - Kératite *H16.3*
- - Syndrome EDICT [dystrophie endothéliale-hypoplasie de l'iris-cataracte congénitale-amincissement *Q13.8*

Stromme ¬ Syndrome de *Q87.8*

Strongyloïdose ¬
- *B78.9*
- Glomérulonéphrite au cours de *B78.9†, N08.0**
- Maladie
- - Due au VIH avec *B20, B78.9*
- - Glomérulaire au cours de *B78.9†, N08.0**

Structure
- Anormale ¬ Homme avec chromosomes sexuels de *Q98.6*
- Dentaire, non classées ailleurs ¬ Anomalies héréditaires de la *K00.5*
- Osseux
- - Sans précision ¬ Anomalie de la densité et de la *M85.9*
- - ¬ Autres anomalies précisées de la densité et de la *M85.8*

Structurel
- Aide ¬ Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres *Z75.8*
- Anomalies rénales [SHDRA] ¬ Syndrome des malformations cardiaques *Q87.8*
- Cerveau ¬ Trouble du développement neurologique avec microcéphalie, arthrogrypose et anomalies *Q87.8*

Structurel *–suite*
- Intrathoracique
- - Précisées ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Autres organes et *S27.88*
- - Précisés
- - - Canal thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.82*
- - - Diaphragme ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.81*
- - - Œsophage, partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.83*
- - - Organes et structures intrathoraciques précisées ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.88*
- - - Thymus ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.84*
- - - ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.8*
- Noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des *E88.21*
- Œil ¬ les affections de plusieurs *H44*
- Sans précision ¬ Réarrangement équilibré et marqueur *Q95.9*
- ¬
- - Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies *G71.2*
- - Réarrangements équilibrés et marqueurs *Q95.8*
- - Syndrome de retard global de développement-alopécie-macrocéphalie-dysmorphie faciale-anomalies cérébrales *Q87.8*

Strudwick ¬ Dysplasie spondylo-épimétaphysaire type *Q77.7*

Struma lingual ¬ *Q89.2*

Strumite lymphomateuse ¬ *E06.3*

Strümpell-Lorrain ¬ Maladie de *G11.4*

Strychnine et ses sels ¬ Effet toxique: *T65.1*

Stuart ¬ Déficit congénital en facteur *D68.24*

Stuart-Bras ¬ Syndrome
- *K76.5*
- Toxique de *K71.80*

Stuart-Prowerr ¬ Déficit en facteur *D68.24*

Stuhl
v./v.a. Weismann-Netter-Stuhl

Stupeur
- Catatonique ¬ *F20.2*
- Dissociative ¬ *F44.2*
- Maniaque ¬ *F30.2*
- Récurrente idiopathique ¬ *R40.1*
- ¬ *R40.1*

Sturge-Weber(-Dimitri) ¬ Syndrome de: *Q85.8*

Sturge-Weber-Krabbe ¬ Angiomatose de *Q85.8*

Stutzer
v./v.a. Schmitz-Stutzer

Stüve-Wiedemann ¬ Syndrome de *Q78.8*

Styloïde
- Allongé ¬ Syndrome du processus *M77.9*
- Cubitus ¬ Apophyse *S52.8*

Suarez-Stickler ¬ Syndrome de *Q79.8*

Subaigu
v./v.a. Type de maladie

Subaortique
- Fibromusculaire modérée ¬ Sténose *Q24.4*
- Hypertrophique ¬ Sténose *I42.1*
- Membraneuse modérée ¬ Sténose *Q24.4*
- Petite taille ¬ Syndrome de sténose *Q87.1*
- Tunnel ¬ Sténose *Q24.4*

Subaréolaire gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ Abcès: *O91.1*

Sub-condylienne ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.62*

Subdural cause non traumatique
- Nouveau-né ¬ Hématome *P52.8*
- ¬ Hématome spinal *G95.10*

Sub-épendymome ¬ *D43.2*

Subérose
- Exacerbation aiguë ¬ *J67.31*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ *J67.30*
- ¬ *J67.3*

Subinvolution
- Sein (après lactation) ¬ *N64.8*
- Utérus ¬ *N85.3*

Subit
v./v.a. Mort subite
- Décrite ainsi ¬ Mort cardiaque *I46.1*
- Fièvre des trois jours] ¬ Exanthème *B08.2*
- Vision ¬ Perte *H53.1*

Subjectifs de la vision ¬ Troubles *H53.1*

Sublingual
v./v.a. Glande sublinguale
- ¬
- - Glande: *D11.7*
- - Varices *I86.0*

Subluxable ¬ Hanche: *Q65.6*

Subluxation
- Articulaires récidivantes ¬ Luxation et *M24.4*
- Atloïdo-axoïdiennes récidivantes ¬ Autres *M43.4*
- Complexe (vertébrale) ¬ *M99.1*
- Congénitale hanche
- - Bilatérale ¬ *Q65.4*
- - Sans précision ¬ *Q65.5*
- - Unilatérale ¬ *Q65.3*
- Pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs ¬ Luxation et *M24.3*
- Récidivante
- - Atloïdo-axoïdienne avec myélopathie ¬ *M43.3*
- - Rotule ¬ *M22.1*

Subluxation *–suite*
- Symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ *O26.7*
- Traumatique
- - Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Vertébrales récidivantes ¬ Autres *M43.5*
- ¬ Rétrécissement
- - Canal rachidien par *M99.2*
- - Espaces intervertébraux par ossification et *M99.6*

Submandibulaire associée à IgG4 ¬ Maladie de la glande *K11.2*

Submersion non mortelle ¬ Noyade et *T75.1*

Submuqueuse ¬ Fente palatine *Q35.9*

Suboccipitale ¬ Malum vertebrale *A18.0†, M49.01**

Subsepsis hyperergica sive allergica ¬ *M08.29*

Substance
- Agissant essentiellement sur
- - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ Intoxication: *T48.7*
- - Muscles, autres et sans précision ¬ Intoxication: *T48.2*
- - Système cardio-vasculaire, autres et sans précision ¬ Intoxication: *T46.9*
- - Tractus gastro-intestinal
- - - Sans précision ¬ Intoxication: *T47.9*
- - - ¬ Intoxication: Autres *T47.8*
- Anti-anémiantes ¬ Préparation à base de foie et autres *T45.8*
- Antivariqueuses, y compris les agents sclérosants ¬ Intoxication: *T46.8*
- Appropriée et correctement administrée ¬ Choc anesthésique dû à une *T88.2*
- Biologique
- - Actives
- - - Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres *Y59.9!*
- - - ¬
- - - - Complications dues à des vaccins ou à des *Y59.9!*
- - - - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Médicament, drogues et autres *X49.9!*
- - Sans précision ¬
- - - Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une *Z88.9*
- - - Intoxication: Médicaments et *T50.9*
- - - Néphropathie due à un médicament ou une *N14.2*
- - ¬
- - - Antécédent personnel allergie médicament
- - - - *Z88.8*
- - - - *Z91.0*

Substance *–suite*
- Biologique *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de *R82.5*
- - - Néphropathie due à d'autres médicaments et *N14.1*
- - - Séquelles d'intoxications par médicaments et *T96*
- Blanche
- - Agénésie du corps calleux-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypoplasie de la *Q04.8*
- - SAI ¬ Affection de la *R90.8*
- - ¬
- - - Leucoencéphalopathie avec ataxie cérébelleuse modérée et œdème de la *E75.2*
- - - Syndrome de neurodégénération infantile-spasticité progressive-déficience intellectuelle-lésions de la *G31.88*
- Cérébrale ¬ Défaut congénital d'une partie de la *Q04.3*
- Chimique
- - Environnement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des *P04.6*
- - Nutritionnelles ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de *P04.5*
- - ¬ Sclérose systémique due à des *M34.2*
- Contaminées ¬ *Y69!*
- Corrosive, sans précision ¬ Effet toxique: *T54.9*
- Essentiellement
- - Systémique et hématologique, sans précision ¬ Intoxication: *T45.9*
- - Systémiques et hématologiques ¬ Intoxication: Autres *T45.8*
- Étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Réaction aiguë à une *T81.6*
- Ingérées ¬ Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de *Z03.6*
- Médicamenteux
- - Approprié correctement administrée ¬
- - - Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une *T88.6*
- - - Effet indésirable dû (due) à une *T88.7*
- - - Hypersensibilité dû (due) à une *T88.7*
- - - Idiosyncrasie dû (due) à une *T88.7*
- - - Réaction allergique dû (due) à une *T88.7*
- - ¬ Métaux de toutes origines, sauf *T56*
- Minérale NCA ¬ Taux anormal de: *R79.0*
- N entraînant dépendance
- - Analgésiques ¬ Usage nocif de *F55.2*
- - Antiacides ¬ Usage nocif de *F55.3*
- - Antidépresseurs ¬ Usage nocif de *F55.0*
- - Laxatifs ¬ Usage nocif de *F55.1*
- - Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage nocif de *F55.6*

Substance *–suite*
- N entraînant dépendance *–suite*
- - Stéroïdes et hormones ¬ Usage nocif de *F55.5*
- - Substance
- - - Non précisée ¬ Usage nocif de *F55.9*
- - - ¬ Usage nocif de *F55.8*
- - Vitamines ¬ Usage nocif de *F55.4*
- Nocif
- - Absorbée par le biais d'aliment, sans précision ¬ Effet toxique: *T62.9*
- - Précisées absorbées par le biais d'aliments ¬ Effet toxique: Autres *T62.8*
- Non
- - Organique, sans précision ¬ Effet toxique: *T57.9*
- - Organiques précisées ¬ Effet toxique: Autres *T57.8*
- - Précisée
- - - Prise par voie interne ¬ Dermite due à une *L27.9*
- - - ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.9*
- - Trouvée normalement dans le sang, sans précision ¬ Présence d'une *R78.9*
- Origine
- - Essentiellement non médicinale ¬ Séquelles d'effets toxiques de *T97*
- - Principalement non médicinale
- - - Liquide céphalorachidien ¬ Taux anormal de *R83.3*
- - - ¬ Taux anormal dans les urines de *R82.6*
- Précisées
- - Non trouvées normalement dans le sang ¬ Présence d'autres *R78.8*
- - ¬ Effets toxiques d'autres *T65.8*
- Prises par voie interne ¬ Dermite due à d'autres *L27.8*
- Psycho actives
- - Voie intraveineuse ¬ Consommation d'autres *U69.32!*
- - ¬
- - - Antécédents personnels d'abus de *Z86.4*
- - - Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres *F04*
- - - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres *F19*
- Psychotrope dans le sang ¬ Présence d'une *R78.5*
- Radioactives ¬ Application thérapeutique de *Z51.0*
- Sans précision ¬ Effet toxique d'une *T65.9*
- Similaire ¬ Effet toxique
- - Acides corrosifs et *T54.2*
- - Alcalis corrosifs et *T54.3*
- Solides et liquides ¬ Pneumonie due à d'autres *J69.8*
- Susceptibles d'entraîner une dépendance ¬ Présence dans le sang d'autres *R78.4*
- Toxiques agricoles et industrielles ¬ *Z57*

Substance *–suite*
- Transmises par voie placentaire ¬ effets non tératogènes de *P04*
- ¬
- - Préparations contenant une seule et plusieurs *T38.4*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Autres *F55.8*

Substitution
- Méthadone ¬ Traitement de *Z51.83*
- Opiacés ¬ Traitement de *Z51.83*

Substituts synthétiques, autres et sans précision ¬ Intoxication: Hormones et leurs *T38.8*

Substrat neurologique ¬
- Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans *N31.81*
- Vessie instable sans *N31.82*

Subtélomérique 1p36 ¬ Délétion *Q93.5*

Subtotale ¬ Colite
- Indéterminée *K52.30*
- Ulcéreuse (chronique) *K51.0*

Subvalvulaire ¬ Anomalie de l'appareil mitral *Q23.8*

Succédané du plasma ¬ *T45.8*

Succès ¬ Arrêt cardiaque
- Réanimation sans *I46.9*
- Réanimé avec *I46.0*

Succession de malformations du septum urorectal ¬ *Q87.8*

Succinate-CoQ réductase ¬ Déficit isolé en *G31.81*

Succinate-semi-aldéhyde déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.8*

Succinimide
- Oxazolidine-diones ¬ Intoxication: *T42.2*
- ¬
- - Hypersensibilité aux *T88.7*
- - Intoxication au *T42.2*

Succinyl-CoA
- 3
- - Cétoacide CoA transférase ¬ Déficit en *E71.3*
- - Oxoacide CoA transférase ¬ Déficit en *E71.3*
- Acétoacétate transférase ¬ Déficit en *E71.3*

Succion du pouce ¬ *F98.88*

Sucrase ¬ Déficit en *E74.3*

Sucrose ¬ Intolérance au *E74.3*

Sud-africaine ¬ Porphyrie *E80.2*

Sudanophile
- Pelizaeus-Merzbacher ¬ Leucodystrophie *E75.2*
- ¬ Leucodystrophie *E75.2*

Sudden Adult Death Syndrome] ¬ SADS [*R96.0*

Sudden Arrhythmic Death Syndrome] ¬ SADS [*I49.9*

Sudden infant death syndrome
- Âge d'un an ¬ SIDS [*R96.0*
- Avant l'âge d'un an ¬ *R95.9*
- SIDS] ¬ *R95*

Sudeck
- Atrophie osseuse post-traumatique neurogène] ¬ Maladie de *G90.59*
- Leriche ¬ Atrophie osseuse de *G90.5*

Sudoripare
v./v.a. Glande sudoripare
- ¬
- - Tumeur maligne des glandes: *C44*
- - Tumeurs bénignes de: glandes: *D23*

Sueurs nocturnes ¬ *R61.9*

Suffocation
- Aliments (régurgités) ¬ *T17*
- Mucus ¬ *T17*
- Strangulation) ¬ *T71*
- ¬ Gasping syndrome (syndrome de *T51.9*

Suffodien
- Hoffmann] ¬ Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et *L66.3*
- ¬ Maladie de Hoffmann [folliculitis et perifolliculitis capitis abscedens et *L66.3*

Sugarman ¬ Brachydactylie de *Q73.8*

Suicidaire ¬
- Idées [tendances] *R45.8*
- Intoxication aux somnifères avec intention *T42.7*
- Pensées *R45.8*

Suicide
- Moyens non précisés ¬ Effets non précisés de: lésion auto-infligée délibérée (*T76*
- Tentative) ¬ *X84.9!*
- ¬ Tentative de *Z91.8*

Suis ¬
- Brucellose à Brucella *A23.2*
- Infection à Brucella *A23.2*

Suisse ¬ Agammaglobulinémie
- Autosomique récessive (type *D80.0*
- Type *D80.0*

Sulfamidase ¬ Déficit en héparane *E76.2*

Sulfamides
- Utilisés comme un médicament approprié à l'indication et correctement administrés ¬ Anurie due aux *R34, Y57.98!*
- ¬
- - Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.2*
- - Intoxication: *T37.0*

Sulfatase
v./v.a. N-acétyl-6-sulfatase
- ¬
- - Carence en N-acétylgalactosamine 4- *E76.2*
- - Déficit
- - - *E75.2*
- - - Iduronate 2- *E76.1*

Sulfatase *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Déficit *–suite*
- - - Multiple en *E75.2*
- - - Stéroïde *Q80.1*

Sulfate de l'entérocyte ¬ Déficit congénital en héparane *K63.8*

Sulfatidose
- Juvénile type Austin ¬ *E75.2*
- ¬ Lipidose *E75.2*

Sulfhémoglobinémie ¬
- *D74.8*
- Méthémoglobinémie acquise avec *D74.8*

Sulfite oxydase
- Déficit cofacteur molybdène
- - Type A ¬ Déficit en *E72.1*
- - ¬ Déficit en *E72.1*
- Xanthine déshydrogénase et aldéhyde oxydase type A ¬ Déficit combiné en *E72.1*
- ¬
- - Déficit isolé en *E72.1*
- - Encéphalopathie par déficit en *E72.1*

Sulfite-oxydase
- Déficit cofacteur molybdène type
- - B ¬ Déficit en *E72.1*
- - C ¬ Déficit en *E72.1*
- ¬ Déficit en *E72.1*

Sulfocystinurie ¬ *E72.1*

Sulfure
- Carbone ¬ Effet toxique: *T65.4*
- Hydrogène ¬ Effet toxique: *T59.6*

Sulfurique ¬ Acide: *T54.2*

Sulfurtransferase ¬ Déficit en 3-mercaptopyruvate *E72.1*

Sullivan
v./v.a. O'Sullivan-McLeod

Sulzberger
v./v.a. Bloch-Sulzberger

Summitt ¬ Syndrome de *Q75.1*

Sumner
v./v.a. Lewis-Sumner

Superficiel
v./v.a. Type de maladie

Supérieur
v./v.a. Type de maladie

Supplémentaire
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins *P08*
- Nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins *P07*
- ¬
- - Chromosomes marqueurs *Q92.6*
- - Dents *K00.1*

Supposé) d'un membre de la famille ¬ Disparition ou décès (*Z63*

Suppression de la lactation ¬ *O92.5*

Suppression-bursts» ¬ Encéphalopathie myoclonique précoce avec « *G40.4*

Suppuration
- Aigu(ë), d'un sinus de la face ¬ *J01*
- Aiguë de l'os pétreux ¬ *H70.2*
- Chronique) d'un sinus (de la face) ¬ *J32*

Suppurative ¬ Myosite *M60.09*

Suppuré
v./v.a. Type de maladie

Supra-alvéolie (antérieure) (postérieure) ¬ *K07.2*

Supracondylaire ¬ Fracture extrémité inférieure
- Fémur: *S72.43*
- Humérus: *S42.41*

Supra-gingival ¬ Tartre (dentaire): *K03.6*

Supra-glottique ¬ Tumeur neuroendocrine maligne de la partie *C32.1*

Supranucléaire
- Progressive
- - Acinésie pure avec freezing de la marche ¬ Syndrome de paralysie *G23.1*
- - ¬ Ophtalmoplégie *G23.1*
- UMNL] ¬ Paralysie vésicale en cas de lésion *G95.80*

Suprasellaire ¬
- Germinome *C71.9*
- Tumeur germinale mixte *C71.9*

Supratentoriel
- SAI ¬ *C71.0*
- ¬
- - Tumeur bénigne: Encéphale, *D33.0*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, *D43.0*

Supravalvulaire
- Artère pulmonaire ¬ Sténose *Q25.6*
- Mitral ¬ Anneau *Q23.2*
- ¬
- - Macroanévrisme artériel de la rétine et sténose pulmonaire *H35.0, Q25.6*
- - Sténose aortique *Q25.3*

Supraventriculaire ¬
- Extrasystoles *I49.4*
- Tachycardie *I47.1*

Supravésicale ¬ Obstruction *N13.5*

SUR1 ¬ Hyperinsulinisme
- Autosomique
- - Dominant par déficit en *E16.1*
- - Récessif par déficit en *E16.1*
- Focal résistant au diazoxide par déficit en *E16.1*

Suractivité ¬ *R46.3*

Surajouté
v./v.a. Type de maladie

Suralimentation
- Nouveau-né ¬ *P92.4*
- SAI ¬ *R63.2*

Surcharge
- Acide sialique libre ¬ Maladie de *E77.8*
- Actine ¬ Myopathie avec *G71.2*
- Calsequestrine et SERCA1 ¬ Myopathie due à une *G71.2*
- Cérébrale fer
- - Liée à des mutations de C19orf12 ¬ Neurodégénérescence avec *G23.0*
- - Type 1 ¬ Neurodégénérescence avec *G23.0*
- Desmine et inclusions de corps de Mallory ¬ Myopathie avec *G71.8*
- Fer ¬ Syndrome cérébro-cutané avec *G31.88*
- Graisseuse ¬ Syndrome de *T80.8*
- Hépatique en fer ¬ Anémie microcytaire avec *D50.8*
- Lipides neutres cardiomyovasculopathie ¬ Maladie
- - Idiopathique de *E75.5†, I43.1**
- - Primaire de *E75.5†, I43.1**
- Lipidique
- - Atteinte cardiovasculaire sévère ¬ Maladie à *E75.5†, I43.1**
- - Cardiomyovasculopathie ¬ Maladie à *E75.5†, I43.1**
- Liquidienne ¬ *E87.7*
- Mucopolysaccharides ¬ Maladie de *E76.3*
- Myosine ¬ Myopathie
- - *G71.2*
- - Autosomique
- - - Dominante avec *G71.2*
- - - Récessive avec *G71.2*
- Potassium [K] ¬ *E87.5*
- Sodium [Na] ¬ *E87.0*
- Triglycéride
- - Ichtyose ¬ Lipidose avec *E75.5*
- - Myopathie] ¬ NLSDM [Lipidose avec *E75.5†, G73.6**
- - ¬ Lipidose avec *E75.5*

Surdi-mutité
- Non classée ailleurs ¬ *H91.3*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0†, H94.8**

Surdité
v./v.a. cataracte-ataxie-surdité
v./v.a. Diabète-surdité
v./v.a. hypoplasie mandibulaire-surdité-apparence progéroïde-lipodystrophie
v./v.a. néphropathie-surdité-hyperparathyroïdie
v./v.a. neutropénie-monocytopénie-surdité
- Acidose tubulaire-anémie ¬ Syndrome de calcification du système nerveux central- *Q87.8*
- Anomalies génitales-synostoses métacarpiennes et métatarsiennes ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Aplasie du labyrinthe, microtie et microdontie ¬ *Q16.5*
- Athélie-retard de développement ¬ Syndrome de dérèglement immunitaire-anomalies craniofaciales- *Q87.8*

Surdité *–suite*
- Atrophie optique-létalité ¬ Syndrome d'ataxie- *E79.8*
- Bilatérale
- - Mixte de transmission et neurosensorielle ¬ *H90.6*
- - Transmission ¬ *H90.0*
- Brusque
- - Idiopathique ¬ *H91.2*
- - ¬
- - - *H91.2*
- - - Perte auditive neurosensorielle aiguë due à une *H91.2*
- Cardiopathie-dysmorphie cranio-faciale ¬ Syndrome d'atrésie des choanes- *Q87.8*
- Cataracte-anomalies squelettiques ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Cécité
- - Hypopigmentation, type Yémen ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie progressive à début précoce avec calcification du SNC, *G93.88*
- Centrale SAI ¬ *H90.5*
- Congénitale
- - Associée à une leucoencéphalopathie progressive de l'adulte ¬ *G31.88*
- - ¬
- - - *H90.5*
- - - Syndrome de Duane avec *H50.8, H90.5*
- Déficience intellectuelle
- - Absence de fibres sensitives myélinisées de gros calibre ¬ Neuropathie héréditaire avec *G60.0*
- - Lié à l'X ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - ¬ Syndrome
- - - Dentinogenèse imparfaite-petite taille- *Q87.8*
- - - Microcéphalie- *Q87.8*
- Diabète sucré ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse et périphérique combinée- *E10.60, G31.88*
- Dysmorphie facial
- - Déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.0*
- - ¬ Syndrome de dysplasie épiphysaire- *Q87.0*
- Dysplasie épiphysaire-petite taille ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Dystonie ¬ Syndrome d'anomalies du développement- *Q87.8*
- Dystrophie rétinienne-gros orteil bifide-déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'aphonie- *Q87.0*
- Elliptocytose-néphrocalcinose ¬ Syndrome d'hypoplasie médiofaciale- *Q87.0*
- Encéphaloneuropathie-obésité-valvulopathie ¬ Syndrome de *G31.81*
- Encéphalopathie] ¬ Syndrome MEGDEL [Syndrome Leigh-like-acidurie 3-méthylglutaconique- *G31.88*

Surdité *–suite*
- Épilepsie-diabète-néphropathie ¬ Syndrome d'athérosclérose- *Q87.8*
- Fente palatine ¬ Syndrome de microtie bilatérale- *Q87.0*
- Génétique non syndromique
- - Bilatérale ¬ *H90.3*
- - Postlinguale ¬ *H90.5*
- - Prélinguale ¬ *H90.5*
- - ¬ *H90.5*
- Hypogénitalisme ¬ Syndrome de rétinite pigmentaire-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Hypogonadisme ¬ Syndrome
- - *H90.6, E29.1*
- - Rétinite pigmentaire-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Hypoplasie du pont-atrophie cérébrale ¬ Syndrome à début précoce d'encéphalopathie progressive- *G31.88*
- Idiopathique soudaine ¬ *H91.2*
- Infertilité ¬ Syndrome de *Q93.5*
- Ischémique transitoire ¬ *H93.0*
- Liée à l'X type 2 ¬ *H90.8*
- Lipome sacré ¬ Syndrome de fente labio-palatine- *Q87.8*
- Microtia syndrome ¬ Mastocytose cutanée- *Q87.8*
- Mixte
- - Liée à l'X avec fistule périlymphatique ¬ *H90.8*
- - Transmission neurosensoriel
- - - Liée X ¬
- - - - *H90.3*
- - - - *H90.8*
- - - Sans précision ¬ *H90.8*
- Mutation de l'ADN mitochondrial ¬ Cardiomyopathie- *G31.81*
- Narcolepsie ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante- *G11.2*
- Nerveuse SAI ¬ *H90.5*
- Neurosensoriel
- - Bilatérale ¬ *H90.3*
- - Cardiomyopathie dilatée ¬ *H90.5, I42.0*
- - Congénitale ¬ Albinisme oculaire avec *E70.3*
- - Déficience intellectuelle-amaurose congénitale de Leber ¬ Syndrome de dysplasie spondylo-épiphysaire- *Q87.1*
- - Dysmorphie ¬ Syndrome d'hypogonadisme hypogonadotrope-microcéphalie sévère- *Q87.8*
- - Dysplasie rhizomélique ¬ Syndrome autosomique dominant de myopie-retrusion du visage- *Q87.0*
- - Dystonie ¬ Syndrome de déficiences motrice et intellectuelle sévères- *Q87.8*
- - Épilepsie-tonus musculaire anormal ¬ Syndrome de microcéphalie-déficience intellectuelle- *Q87.8*

Surdité *–suite*
- Neurosensoriel *–suite*
- - Grisonnement précoce-tremblement essentiel ¬ Syndrome de *H90.5, G25.0*
- - Mitochondriale non syndromique avec sensibilité accrue aux aminoglycosides ¬ *H90.5*
- - Non syndromique mitochondriale ¬ *H90.5*
- - Progressive-cardiomyopathie hypertrophique ¬ Syndrome de *H90.5, I42.2*
- - Retard général de développement ¬ Neuropathie sensorielle et autonome héréditaire avec *G60.8, H90.5*
- - Sans précision ¬ *H90.5*
- - Syndromique due à un déficit combiné de la phosphorylation oxydative ¬ *G31.81, H90.8*
- - Tétraplégie spastique-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Thrombocytopénie associé à DIAPH1 ¬ Syndrome de *H90.5, D69.41*
- - Unilatérale sans altération de l'audition de l'autre oreille ¬ *H90.4*
- - ¬
- - - Retard de développement associé à SLC12A2 avec déficience intellectuelle et *Q87.8*
- - - Syndrome
- - - - Ataxie cérébelleuse-aréflexie-pieds creux-atrophie optique- *G11.8*
- - - - Dysplasie ectodermique- *Q82.8*
- - - - Épidermolyse bulleuse-syndrome néphrotique- *Q87.8*
- - - - Myopie forte- *H90.5*
- - - - Néphrotique familial corticorésistant avec *N04.1, H90.5*
- Obésité ¬ Choroïdérémie avec *Q87.8*
- Onychodystrophie autosomique dominant] ¬ Syndrome DDOD [*Q87.8*
- Oreille anormale-paralysie faciale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Partielle totale
- - Fréquences
- - - Basses ¬ *H91.9*
- - - Hautes ¬ *H91.9*
- - SAI ¬ *H91.9*
- Perception
- - Non syndromique autosomique
- - - Dominante type DFNA ¬ *H90.3*
- - - Récessive type DFNB ¬ *H90.3*
- - SAI ¬ *H90.5*
- - ¬ Syndrome
- - - Anémie mégaloblastique sensible à la thiamine-diabète sucré- *Q87.8*
- - - Dystrophie cornéenne- *H18.5, H90.5*
- Polyneuropathie-myopathie ¬ Syndrome d'atrophie optique- *H47.2*
- Psychogène ¬ *F44.6*

Surdité *–suite*
- Retard de développement ¬ Syndrome de cataracte congénitale-hypotonie musculaire progressive- *G71.3*
- Rétinopathie pigmentaire ¬ Syndrome de nanisme ostéochondrodysplasique- *Q87.1*
- Rétrocochléaire ¬ *H90.5*
- Sensoriel
- - SAI ¬ *H90.5*
- - Tardive ¬ Albinisme oculaire avec *E70.3*
- Syndrome cranio-facial ¬ Syndrome de *Q87.0*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.0†, H94.8**
- - ¬ *A52.1†, H94.8**
- Transmission
- - Malformation cardiaque ¬ Syndrome de dysmorphie- *Q87.8*
- - Sans précision ¬ *H90.2*
- Unilatérale
- - Mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l'audition de l'autre oreille ¬ *H90.7*
- - Transmission sans altération de l'audition de l'autre oreille ¬ *H90.1*
- Variable ¬ Syndrome de paralysie faciale congénitale héréditaire- *Q87.0*
- Verbale ¬ *F80.2*
- Vieillissement prématuré-petite taille-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de rétinite pigmentaire- *Q87.0*
- ¬
- - Dysfonction sinusale et *I49.8, H90.5*
- - HPPD [Syndrome d'hypertélorisme-sinus pré-auriculaire-obstruction du canal lacrymal- *Q87.0*
- - Neuropathie héréditaire sensitive et autonomique liée à l'X avec *G60.8, H90.5*
- - Syndrome
- - - Ataxie cérébelleuse autosomique récessive-cécité- *G11.1*
- - - Atrophie olivopontocérébelleuse- *G23.3, H90.5*
- - - Dysmorphie rénale pelvi-calicielle- *Q63.8, H90.5*
- - - Dysostose métaphysaire-déficience intellectuelle- *Q87.2*
- - - Fente labio-palatine-dysmorphie cranio-faciale-cardiopathie congénitale- *Q87.0*
- - - Fibromatose gingivale- *H90.3*
- - - Fragilité osseuse-contractures-rupture artérielle- *Q87.5*
- - - Kératodermie palmoplantaire- *Q82.8*
- - - Lipodystrophie-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- - - Long QT- *I49.8*
- - - Mains et pieds fendus- *Q87.2*
- - - Maladie de Hirschsprung-polydactylie- *Q87.8*
- - - Myoclonie-ataxie cérébelleuse- *G11.1*

Surdité *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome *–suite*
- - - Myopathie mitochondriale-acidose lactique- *G71.3*
- - - Neuropathie périphérique-myopathie-raucité de la voix- *G60.0*
- - - Paraplégie spastique-néphropathie- *G11.4*

Surdité-néphropathie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Surdité-oligodontie ¬ Syndrome de *Q87.0*

Surdité-vitiligo-achalasie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Surélévation de l'omoplate ¬ *Q74.0*

Surface
- Corporel
- - Plus ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS] avec atteinte de 30% de la *L00.1*
- - ¬
- - - Epidermolyse nécrosante avec atteinte de moins de 30% de la *L51.20*
- - - Nécrolyse épidermique toxique avec atteinte de 30% et plus de la *L51.21*
- - - Syndrome
- - - - Lyell avec atteinte de 30% et plus de la *L51.21*
- - - - Staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la *L00.0*
- Corps ¬
- - Brûlure couvrant
- - - 10 et 19% de la *T31.1!*
- - - 10% de la *T31.0!*
- - - 20 et 29% de la *T31.2!*
- - - 30 et 39% de la *T31.3!*
- - - 40 et 49% de la *T31.4!*
- - - 50 et 59% de la *T31.5!*
- - - 60 et 69% de la *T31.6!*
- - - 70 et 79% de la *T31.7!*
- - - 80 et 89% de la *T31.8!*
- - - 90 % ou plus de la *T31.9!*
- - Corrosion couvrant
- - - 10 et 19% de la *T32.1!*
- - - 10% de la *T32.0!*
- - - 20 et 29% de la *T32.2!*
- - - 30 et 39% de la *T32.3!*
- - - 40 et 49% de la *T32.4!*
- - - 50 et 59% de la *T32.5!*
- - - 60 et 69% de la *T32.6!*
- - - 70 et 79% de la *T32.7!*
- - - 80 et 89% de la *T32.8!*
- - Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la *T32.9!*
- - Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la *T95.4*
- Cutané

Surface *–suite*
- Cutané *–suite*
- - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec *E88.21*
- - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec *E88.20*
- Virus de l'hépatite B [AgHBs] ¬ Porteur de l'antigène de *B18.13*

Surfactant
- Inactivité excessive ¬ Syndrome de carence en *P22.0*
- Primaire ¬ Syndrome de carence en *P22.0*
- Secondaire ¬ Syndrome de carence en *P22.0*
- ¬
- - Carence en *P22.0*
- - Détresse respiratoire aiguë néonatale par déficit en protéine B du *P22.0*
- - Pneumopathie interstitielle par déficit en protéine C du *J84.80*

Surinfecté ¬ Eczéma *L30.3*

Surmenage
- Burn-out] ¬ *Z73*
- Physique ¬ *T73.3*
- ¬ *R53.9*

Surnombre de la trompe de Fallope ou du ligament large ¬ Présence en *Q50.6*

Surnuméraire
- Causant un rapprochement des dents ¬ Dent *K07.3*
- Cervicale ¬ Côte *Q76.5*
- Multiples ¬ Syndrome de grande taille-gros orteils longs-épiphyses *Q87.3*
- S ¬
- - Doigt(s) *Q69.0*
- - Orteil(s) *Q69.2*
- - Pouce(s) *Q69.1*
- Sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Vertèbre *Q76.4*
- ¬
- - Canal hépatique *Q44.5*
- - Côte *Q76.6*
- - Dents *K00.1*
- - Foie *Q44.7*
- - Glandes ou canaux salivaires *Q38.4*
- - Gros orteil *Q69.2*
- - Lobe pulmonaire *Q33.1*
- - Lobule *Q17.0*
- - Mamelon *Q83.3*
- - Muscle
- - - *Q79.8*
- - - Oculaire *Q10.3*
- - Narine *Q30.8*
- - Nez *Q30.8*
- - Oreille *Q17.0*

Surnuméraire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Os du carpe *Q74.0*
- - Ovaire *Q50.3*
- - Pancréas *Q45.3*
- - Paupière *Q10.3*
- - Pavillon *Q17.0*
- - Phalange *Q74.8*
- - Rate *Q89.08*
- - Rein *Q63.0*
- - Sein *Q83.1*
- - Torsion (de): trompe *N83.5*
- - Uretère: *Q62.5*
- - Urètre *Q64.7*
- - Vessie *Q64.7*

Surocclusion
- Horizontale ¬ *K07.2*
- Profonde ¬ *K07.2*
- Verticale ¬ *K07.2*

Surplomb ¬ *K07.2*

Surpoids
- Dysmorphie faciale-troubles du comportement ¬ Syndrome de retard du développement- *F88*
- ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-petite taille- *Q87.8*

Surproduction d'adénosine désaminase ¬ Anémie hémolytique due à une *D55.3*

Surprotection parentale ¬ *Z62*

Surrénale
v./v.a. Glande surrénale
- Aiguë ¬ Insuffisance *E27.2*
- Anomalies génitales] ¬ Syndrome IMAGe [retard de croissance intra-utérin-dysplasie métaphysaire-hypoplasie congénitale des *Q87.1*
- Congénitale ¬ Hyperplasie *E25.0*
- Déficit
- - 3-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.08*
- - 11-bêta-hydroxylase ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.08*
- - 17-alphahydroxylase ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.08*
- - 21 hydroxylase classique
- - - Perte de sel ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.00*
- - - ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.00*
- - Cytochrome P450 oxydoréductase ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.08*
- - STAR ¬ Hyperplasie congénitale lipoïde des *E25.08*
- Due sepsis méningocoques ¬
- - Apoplexie des *A39.1†, E35.1**
- - Hémorragie des *A39.1†, E35.1**
- Homme ¬ précocité sexuelle avec hyperplasie *E25*
- Hypofonctionnement cortical ¬ Syphilis des *A52.7†, E35.1**
- Liée à l'X ¬ Hypoplasie des *Q89.1*

Surrénale *–suite*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C74.9*
- ¬
- - Adénocarcinome du cortex de la *C74.0*
- - Atrophie des *E27.8*
- - Crise d'insuffisance *E27.2*
- - Hémorragie de la *E27.4*
- - Hyperplasie médullaire des *E27.5*
- - Infarctus de la *E27.4*
- - Lésion traumatique: *S37.81*
- - Malformations congénitales des *Q89.1*
- - Syndrome de Cushing dû à une hyperplasie macronodulaire des *E24.8*
- - Syphilis des *A52.7†, E35.1**
- - Thrombose d'une veine *I82.88*
- - Tuberculose des *A18.7†, E35.1**
- - Tumeur bénigne: *D35.0*
- - Tumeur maligne
- - - *C74*
- - - Cortex de la *C74.0*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D44.1*

Surrénalien
- Aiguë ¬ Insuffisance *E27.2*
- Anomalies génitales-entéropathie] ¬ Syndrome MIRAGE [Syndrome de myélodysplasie-infections-retard de croissance-hypoplasie *Q87.8*
- Bilatéral) ¬ Hyperaldostéronisme primaire dû à un adénome *E26.0*
- Congénitale cytomégalique ¬ Hypoplasie *Q89.1*
- Déficit en CYP11A1 ¬ Différence du développement sexuel 46,XY-insuffisance *E25.08*
- Familiale sans LH [hormone lutéinisante] ¬ Hypoplasie *E27.1*
- Femme ¬ pseudo-hermaphrodisme *E25*
- Héréditaire isolée par déficit partiel en CYP11A1 ¬ Insuffisance *E27.1*
- Néonatale ¬ Hémorragie *P54.4*
- Précoce ¬ Puberté *E27.0*
- Produisant du cortisol ¬ Syndrome de Cushing dû à un adénome du cortex *D35.0, E24.8*
- Sepsis à méningocoques ¬ Syndrome hémorragique *A39.1†, E35.1**
- Unilatérale primitive ¬ Hyperplasie *E26.0*
- ¬
- - Basophilie cortico- *E24.0*
- - Mélanose *E27.1*
- - Syndrome
- - - Méningococcique *A39.1†*
- - - Néphrotique familial corticorésistant avec insuffisance *N04.1, E27.4*

Surrénalisme tuberculeux ¬ *A18.7†, E35.1**

Surrénalite
- Auto-immune ¬ *E27.1*
- Hémorragique à méningocoques ¬ *A39.1†, E35.1**

Sursaut ¬
- Épilepsie *G40.8*
- Maladie familiale du *G25.88*

Surveillance
- Abus de médicaments ou toxicomanie ¬ Conseil et *Z71*
- Alcoolisme ¬ Conseil et *Z71*
- Allaitement ¬ *Z39.1*
- Colostomie ¬ *Z43.3*
- Conseil
- - Médical, sans précisions ¬ Conseil et *Z71*
- - Surveillance diététiques ¬ Conseil et *Z71*
- Consultation pour l'explication de résultats d'examen ¬ Conseil et *Z71*
- Contraceptifs ¬ *Z30.4*
- Contrôle inadéquats de la part des parents ¬ *Z62*
- Croissance du nourrisson ou de l'enfant ¬ *Z00.1*
- Cystostomie ¬ *Z43.5*
- Diététiques ¬ Conseil et surveillance pour: Conseil et *Z71*
- Dispositif contraceptif (intra-utérin) ¬ *Z30.5*
- Électronique continue ¬ Lésion du cuir chevelu liée à une *P12.4*
- Gastrostomie ¬ *Z43.1*
- Grossesse
- - Antécédent
- - - Avortement ¬ *Z35.1*
- - - Môle
- - - - Hydatiforme ¬ *Z35.1*
- - - - Vésiculaire ¬ *Z35.1*
- - - Mort
- - - - Néonatales ¬ *Z35.2*
- - - - Nés ¬ *Z35.2*
- - - Obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer ¬ *Z35.2*
- - - Soins prénatals insuffisants ¬ *Z35.3*
- - - Stérilité ¬ *Z35.0*
- - Haut risque
- - - Sans précision ¬ *Z35.9*
- - - ¬ *Z35.8*
- - Multiparité élevée ¬ *Z35.4*
- - Normale ¬ *Z34*
- Iléostomie ¬ *Z43.2*
- Médical
- - Enfant bonne santé selon circonstances
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou *Z76.2*
- - - Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou *Z76.2*
- - - Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou *Z76.2*
- - - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou *Z76.2*

Surveillance *–suite*
- Médical *–suite*
- - Soin médical
- - - Enfants trouvés ¬ *Z76.1*
- - - Nourrissons et enfants en bonne santé ¬ *Z76.2*
- - Traitement ¬
- - - *Z08*
- - - *Z09*
- Pendant la prise de nourriture ¬ Dysphagie nécessitant une *R13.0*
- Permanente ¬ Difficultés liées à: Besoin d'une *Z74.3*
- Personne consultant pour le compte d'un tiers ¬ Conseil et *Z71*
- Primigeste
- - Âgée ¬ *Z35.5*
- - Jeune ¬ *Z35.6*
- Stomie
- - Appareil digestif ¬ *Z43.4*
- - Non précisée ¬ *Z43.9*
- - Voies urinaires ¬ *Z43.6*
- - ¬ *Z43.88*
- Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) ¬ Conseil et *Z71*
- Sutures et pansements chirurgicaux ¬ *Z48.0*
- Thoracostomie ¬ *Z43.80*
- Trachéostomie ¬ *Z43.0*
- Vagin artificiel ¬ *Z43.7*

Susac ¬ Syndrome de *I67.7*

Susceptibilité infections
- Chroniques associé à STAT1 ¬ Syndrome d'entéropathie et endocrinopathie auto-immunes- *D82.8*
- Opportuniste ¬
- - HIGM avec *D80.5*
- - Syndrome hyper-IgM
- - - *D80.5*
- - - Sans *D80.5*
- Respiratoires associée à une mutation de la chaîne alpha de CD8 ¬ *D84.8*

Susceptibles d'entraîner une dépendance ¬ Présence dans le sang d'autres substances *R78.4*

Sus-claviculaire ¬
- Métastase ganglionnaire *C77.0*
- Région *S11.80*
- Tuberculose des ganglions *A18.2*

Sus-épineux
- Coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou incomplète) du *M75.1*
- ¬ Syndrome *M75.1*

Sus-glottique ¬
- Léiomyosarcome de l'étage *C32.1*
- Œdème (de la): *J38.4*
- Tumeur maligne: Étage *C32.1*

Sus-hyoïdien
- SAI ¬ Epiglotte (partie *C32.1*

Sus-hyoïdien *–suite*
- ¬ épiglotte partie
- - *D02.0*
- - *D14.1*
- - *D38.0*

Suspecté
- Conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, *U69.10!*
- Porteur ¬ sujet *Z22*

Suspicion
- Affection du système nerveux ¬ Mise en observation pour *Z03.3*
- Affections cardio-vasculaires ¬ Mise en observation pour *Z03.5*
- Effet
- - Indésirable d'un médicament ¬ Mise en observation pour *Z03.6*
- - Toxique de substances ingérées ¬ Mise en observation pour *Z03.6*
- Infarctus du myocarde ¬ Mise en observation pour *Z03.4*
- Infection COVID-19 ¬ *U07.2!*
- Intoxication ¬ Mise en observation pour *Z03.6*
- Maladie, sans précision ¬ Mise en observation pour *Z03.9*
- Maladies ¬ Mise en observation pour *Z03.8*
- Troubles mentaux et du comportement ¬ Mise en observation pour *Z03.2*
- Tuberculose ¬ Mise en observation pour *Z03.0*
- Tumeur maligne ¬ Mise en observation pour *Z03.1*

Sutcliffe ¬ Dysplasie spondylo-métaphysaire type *Q77.8*

Sutherland-Haan ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Sutton
v./v.a. White-Sutton

Suture
- Actes médicaux ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- Césarienne ¬
- - Infection d'une *O86.0*
- - Rupture d'une *O90.0*
- Coronal suture
- - Métopique ¬ Synostose bilatérale non syndromique de la *Q75.0*
- - Sagittale ¬ Synostose bilatérale non syndromique de la *Q75.0*
- Crâniennes ¬ Retard de fermeture des *P96.3*
- Déchirure du périnée ¬ Rupture d'une *O90.1*
- Épisiotomie ¬ Rupture d'une *O90.1*
- Lambda associée à une synostose de la suture sagittale] ¬ BLSS [Synostose bilatérale de la *Q87.0*
- Métopique
- - Ptosis-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'épaississement de la *Q87.0*

Suture *–suite*
- Métopique *–suite*
- - ¬ Synostose bilatérale non syndromique de la suture coronale et de la *Q75.0*
- Obstétricale du périnée ¬ Rupture d'une *O90.1*
- Opération
- - Anus ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Estomac ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Intestin ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Œsophage ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Organes du système digestif ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Pancréas ¬ Insuffisance
- - - *K91.82*
- - - Anastomoses et *K91.82*
- - Rectum ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Trachée, des bronches et des poumons ¬ Insuffisances d'anastomoses et *J95.82*
- - Vésicule et des voies biliaires ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.81*
- Os du crâne ¬ Anomalie de *Q75.0*
- Pancréas avec atteinte de l'intestin grêle ¬ Insuffisances de *K91.82*
- Pansements chirurgicaux ¬ Surveillance des *Z48.0*
- Périnéale après accouchement ¬ Infection d'une *O86.0*
- Sagittale ¬
- - BLSS [Synostose bilatérale de la suture lambda associée à une synostose de la *Q87.0*
- - Synostose
- - - Bilatérale non syndromique de la suture coronale et de la *Q75.0*
- - - Précoce de la *Q75.0*
- ¬ Ablation de *Z48.0*

Sweet ¬ Dermatose neutrophile
- Aiguë fébrile [Syndrome de *L98.2*
- Fébrile [*L98.2*

Swyer ¬ Syndrome de *Q99.1*

Sycosis
- Barbe ¬ *L73.8*
- Parasitaire
- - Barbe ¬ *B35.0*
- - ¬ *B35.0*
- ¬ Dermatophytose avec *B35.0*

Sydenham ¬
- Chorée de *I02*
- Syndrome de *I02.9*

Sylvatique ¬
- Fièvre jaune *A95.0*
- Rage *A82.0*

Symbiotique ¬ Psychose: *F84.3*

Symblépharon ¬ *H11.2*

Symbolique non
- Classés ailleurs ¬ Dyslexie et autres troubles de la fonction *R48*
- Précisés ¬ Troubles de la fonction *R48.8*

Symbrachydactylie des pieds et des mains ¬ *Q73.8*

Sympathique
v./v.a. Nerf sympathique
- Cervical postérieur ¬ Syndrome *M53.0*
- Parasympathiques ¬ nerfs et ganglions *C47*
- Thoracique ¬ Ganglion: *S24.4*
- ¬
- - Ophtalmie *H44.1*
- - Trouble de l'équilibre du *G90.88*
- - Uvéite *H44.1*

Sympathoblastome ¬ *C47.9*

Symphalangie-anomalies multiples des mains et des pieds ¬ Syndrome de *Q74.8*

Symphysaire ¬ Grossesse avec dysfonctionnement *O26.7*

Symphyse
- Maxillaire ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.66*
- Pubien
- - Cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ Subluxation de la *O26.7*
- - Obstétrical e ¬
- - - Arrachement du cartilage interne de la *O71.6*
- - - Écartement traumatique de la *O71.6*
- - Pierson] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*
- - ¬
- - - Dysfonctionnement de la *M25.55*
- - - Rupture traumatique de la *S33.4*
- - - Tuberculose de la *A18.0†, M01.15**

Symptomatique
- Définis localisation focale partielle crise partielles
- - Complexes ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques *G40.2*
- - Simples ¬ Épilepsie et syndromes épileptiques *G40.1*
- Due au VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C ¬ Maladie *U60.2!*
- Dystrophie musculaire
- - Becker de la femme porteuse ¬ Forme *G71.08*
- - Duchenne de la femme porteuse ¬ Forme *G71.00*
- Hémochromatose type 1 ¬ Forme *E83.1*
- Leucoderme ¬ Syphilis tardive *A52.7†, L99.8**
- Myopathie centronucléaire liée à l'X de la femme porteuse ¬ Forme *G71.2*
- SAI ¬ Psychose: *F09*
- Sans précision ¬ Trouble mental organique ou *F09*
- Stade avancé ¬ Syphilis congénitale *A50.5*

Symptomatique *–suite*
- Syndrome
- - Coffin-Lowry de la femme porteuse ¬ Forme *Q87.0*
- - X fragile de la femme porteuse ¬ Forme *Q99.2*
- ¬
- - Anémie hémolytique auto-immune *D59.18*
- - Encéphalopathie myoclonique précoce (*G40.4*
- - Formes tardives
- - - Syphilis *A52.7*
- - - Syphilis congénitale, *A50.5*
- - Lymphocytose (*D72.8*
- - Monocytose (*D72.8*
- - Myotonie: *G71.1*
- - Syndrome
- - - Parkinsonien au cours d'hypotension orthostatique *G23.8*
- - - PMSE [polyhydramnios-mégalencéphalie-épilepsie *Q87.0*
- - Syphilis nerveuse *A52.1*

Symptôme
- Affectif
- - Lors de démence ¬ *U63.1!*
- - ¬ Épilepsie partielle bénigne à *G40.02*
- Anxieux lors de démence ¬ *U63.2!*
- Artère basilaire régression complète
- - 1 à 24 heures ¬ Syndrome de l'artère vertébrale avec *G45.02*
- - Heure ¬ Syndrome de l'artère vertébrale avec *G45.03*
- Bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ *N95.1*
- Effort
- - Important ¬ Insuffisance cardiaque
- - - Droite
- - - - *I50.01, I50.03!*
- - - - Primaire avec *I50.00, I50.03!*
- - - Gauche: Avec *I50.12*
- - Léger ¬ Insuffisance cardiaque
- - - Droite
- - - - *I50.01, I50.04!*
- - - - Primaire avec *I50.00, I50.04!*
- - - Gauche: Avec *I50.13*
- Hémorroïdaires ¬ *K64.9*
- Incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de *F68.1*
- Néonatals de privation dus à la toxicomanie de la mère ¬ *P96.1*
- Non spécifiques propres au nourrisson ¬ *R68.1*
- Observés au niveau du sein ¬ Autres signes et *N64.5*
- Physiques pour des raisons psychologiques ¬ Majoration de *F68.0*
- Précis du système digestif et de l'abdomen ¬ Autres *R19.88*

Symptôme *–suite*
- Privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né ¬ *P96.2*
- Psychotique
- - Congruents à l'humeur ¬ Manie avec *F30.2*
- - Lors de démence ¬ *U63.0!*
- - Non congruents à l'humeur ¬ Manie avec *F30.2*
- - ¬
- - - Dépression
- - - - Agitée épisode isolé sans *F32.2*
- - - - Endogène
- - - - - *F33.3*
- - - - - Sans *F33.2*
- - - - Majeur
- - - - - Épisode isolé sans *F32.2*
- - - - - Récurrente, sans *F33.2*
- - - - Vital
- - - - - Épisode isolé sans *F32.2*
- - - - - Récurrente, sans *F33.2*
- - - Épisode
- - - - Dépressif sévère
- - - - - *F32.3*
- - - - - Sans *F32.2*
- - - - Isolés de: dépression: majeure avec *F32.3*
- - - - Récurrents sévères de: dépression: majeure, avec *F33.3*
- - - Manie
- - - - *F30.2*
- - - - Sans *F30.1*
- - - Psychose maniaco dépressive forme dépressive
- - - - *F33.3*
- - - - Sans *F33.2*
- - - Trouble
- - - - Affectif bipolaire épisode actuel
- - - - - Dépression sévère avec *F31.5*
- - - - - Dépression sévère sans *F31.4*
- - - - - Maniaque avec *F31.2*
- - - - - Maniaque sans *F31.1*
- - - - Dépressif récurrent épisode actuel sévère
- - - - - *F33.3*
- - - - - Sans *F33.2*
- Repos ¬ Insuffisance cardiaque
- - Droite
- - - *I50.01, I50.05!*
- - - Primaire avec *I50.00, I50.05!*
- - Gauche: Avec *I50.14*
- Sans autre explication ¬ Décès survenant moins de 24 heures après le début des *R96.1*
- Schizophrénique
- - Sans précision ¬
- - - Bouffée délirante sans *F23.0*
- - - Psychose cycloïde sans *F23.0*
- - ¬

Symptôme *–suite*
- Schizophrénique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Bouffée délirante avec *F23.1*
- - - Psychose cycloïde avec *F23.1*
- - - Trouble psychotique aigu polymorphe
- - - - *F23.1*
- - - - Sans *F23.0*
- Signe
- - Généraux précisés ¬ Autres *R68.8*
- - Précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire ¬ Autres *R09.8*
- - Relatifs
- - - Absorption d'aliments et de liquides ¬ Autres *R63.8*
- - - Appareil urinaire, autres et non précisés ¬ *R39.8*
- - - Apparence et au comportement ¬ Autres *R46.8*
- - - Fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés ¬ *R41.8*
- - - Humeur ¬ Autres *R45.8*
- - - Sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés ¬ *R44.8*
- - - Systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés ¬ *R29.8*
- Stade précoce ¬ Syphilis congénitale avec *A50.0*
- Systémiques ¬ Réaction médicamenteuse avec éosinophilie et *T88.7*
- ¬ Insuffisance cardiaque
- - Droite
- - - Primaire sans *I50.00, I50.02!*
- - - Sans *I50.01, I50.02!*
- - Gauche: Sans *I50.11*

Syncope
- Collapsus ¬ *R55*
- Due à la chaleur ¬ *T67.1*
- Mictionnelle ¬ *R55*
- Pérodactylie-séquence de Robin ¬ Syndrome d'extrasystoles ventriculaires avec *Q87.8*
- Psychogène ¬ *F48.8*
- ¬ Syndrome du sinus carotidien (*G90.00*

Syncytial
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Virus respiratoire *B97.4!*
- VRS ¬
- - Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire *J21.0*
- - Bronchite aiguë due au virus respiratoire *J20.5*
- - Pneumonie congénitale à virus respiratoire *P23.0*
- - Pneumonie due au virus respiratoire *J12.1*
- - Vaccination contre le virus respiratoire *Z25.8*
- ¬ Infection due au virus respiratoire *J12.1*

Syndactylie
v./v.a. aphalangie-syndactylie-microcéphalie
v./v.a. cryptophtalmie-syndactylie

Syndactylie *–suite*
- Cenani-Lenz ¬ *Q74.8*
- Complexe
- - Doigts avec synostose ¬ *Q70.0*
- - Orteils avec synostose ¬ *Q70.2*
- Cutané ¬ Syndrome dysplasie ectodermique
- - Hyperhidrose- *Q82.8*
- - Pili torti- *Q82.8*
- Doigt
- - Sans synostose de type 3 ¬ *Q70.1*
- - Synostose de type 3 ¬ *Q70.0*
- Dysplasie ectodermique
- - 1] ¬ EDSS1 [Syndrome de *Q82.8*
- - 2] ¬ EDSS2 [Syndrome de *Q82.8*
- Mésoaxiale synostosique avec réduction phalangienne ¬ *Q70.4*
- Mutations de FBLN1 ¬ Syndrome de retard de développement-anomalie du système nerveux central- *Q87.8*
- Nystagmus dû à une microduplication 2q31.1 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- Orteils sans synostose ¬ Simple *Q70.3*
- Petite taille ¬ Syndrome de blépharophimosis-ptosis-ésotropie- *Q87.8*
- Polydactylie-lobe d'oreille anormal ¬ Syndrome de *Q74.8, Q17.8*
- Préaxiales des doigts de la main ¬ Brachydactylie et *Q74.0*
- Sans précision ¬ *Q70.9*
- Simple
- - Complète des doigts ¬ *Q70.1*
- - Partielle des doigts ¬ *Q70.1*
- Type
- - 1 ¬ *Q70.4*
- - 2 ¬ *Q70.4*
- - 3 ¬ *Q70.1*
- - 4 ¬ *Q70.4*
- - 5 ¬ *Q70.4*
- - 6 ¬ *Q70.4*
- - 8 ¬ *Q70.0*
- - Malik-Percin ¬ *Q70.4*
- - Zhao ¬ Brachydactylie- *Q73.8, Q70.2*
- ¬ Syndrome de duplication des sourcils- *Q82.8, Q70.9*

Syndrome
v./v.a. Nom propre
v./v.a. Pseudosyndrome

Syndrome 5q- ¬ *D46.6*

Syndrome morning glory ¬ *Q14.2*

Synéchie
- Iris
- - Antérieures ¬ *H21.5*
- - Postérieures ¬ *H21.5*
- - SAI ¬ *H21.5*
- Latérales ¬ Syndrome de fente palatine- *Q87.8*
- Utérine ¬ *N85.6*

Syngamose ¬ *B83.3*

Syngnathie
- Congénitale isolée ¬ *Q67.4*
- Fente palatine ¬ Syndrome de *Q67.4, Q35.9*

Synophtalmie ¬ *Q87.0*

Synostose
- Bilatérale
- - Non syndromique suture coronal suture
- - - Métopique ¬ *Q75.0*
- - - Sagittale ¬ *Q75.0*
- - Suture lambda associée à une synostose de la suture sagittale] ¬ BLSS [*Q87.0*
- Cervicale ¬ *Q76.1*
- Hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose ¬ *Q76.3*
- Huméro-radiale ¬ *Q74.0*
- Huméro-radio-ulnaire ¬ *Q74.0*
- Huméro-ulnaire
- - Bilatérale ¬ *Q74.0*
- - Unilatérale ¬ *Q74.0*
- - ¬ *Q74.0*
- Métacarpiennes et métatarsiennes ¬ Syndrome de surdité-anomalies génitales- *Q87.8*
- Multiples ¬ Syndrome des *Q78.8*
- Précoce de la suture sagittale ¬ *Q75.0*
- Radio ulnaire
- - Bilatérale ¬ *Q74.0*
- - Microcéphalie-scoliose ¬ Syndrome de *Q02, Q77.8*
- - Unilatérale ¬ *Q74.0*
- - ¬ *Q74.0*
- Radio-cubital
- - Retard de développement-hypotonie musculaire ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - ¬ *Q74.0*
- Radioulnaire-thrombocytopénie amégacaryocytique ¬ Syndrome de *Q87.2*
- Sagittale
- - Isolée ¬ *Q75.0*
- - Non syndromique ¬ *Q75.0*
- Spondylo-carpo-tarsienne ¬ *Q78.8*
- Suture sagittale] ¬ BLSS [Synostose bilatérale de la suture lambda associée à une *Q87.0*
- Tibio-fibulaire ¬ *Q74.2*
- Type 3 ¬ Syndactylie doigt
- - *Q70.0*
- - Sans *Q70.1*
- Unicornale non syndromique ¬ *Q67.3*
- Vertébrale congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- ¬
- - Simple syndactylie des orteils sans *Q70.3*
- - Syndactylie complexe
- - - Doigts avec *Q70.0*
- - - Orteils avec *Q70.2*
- - Syndrome de mésomélie- *Q78.8*

Synostosique
- Antérieure non syndromique ¬ Plagiocéphalie *Q67.3*
- Réduction phalangienne ¬ Syndactylie mésoaxiale *Q70.4*

Synovial
v./v.a. oculo-urétro-synovial
v./v.a. Sarcome synovial
- Localisations multiples ¬ Syndrome urétro-oculo- *M02.30*
- Non classée ailleurs ¬ Hypertrophie *M67.2*
- Poplité [Baker] ¬ Kyste *M71.2*
- SAI ¬ Kyste *M71.3*
- Tendon
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres atteintes de la *M68.8**
- - Sans précision ¬ Atteinte de la *M67.9*
- - ¬ Autres atteintes précisées de la *M67.8*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Conjonctivite au cours de syndrome urétro-oculo- *M02.39*
- - Déchirure
- - - *M66.1*
- - - Kyste de la *M66.1*
- - Kératodermie au cours de syndrome urétro-oculo- *M02.39†, L86**
- - Ostéochondromatose *D48.1*
- - Résultats anormaux de: liquide *R89*
- - Syphilis de la membrane *A52.7†, M68.09**

Synovite
- Acné pustulose hyperostose ostéite ostéite
- - Avant-bras ¬ Syndrome SAPHO [*M86.33*
- - Bras ¬ Syndrome SAPHO [*M86.32*
- - Cheville ¬ Syndrome SAPHO [*M86.37*
- - Colonne vertébrale ¬ Syndrome SAPHO [*M86.38*
- - Jambe ¬ Syndrome SAPHO [*M86.36*
- - Localisations multiples ¬ Syndrome SAPHO [*M86.30*
- - Main ¬ Syndrome SAPHO [*M86.34*
- - Région de l'épaule ¬ Syndrome SAPHO [*M86.31*
- - Région pelvienne ¬ Syndrome SAPHO [*M86.35*
- Articulaire tuberculeuse ¬ *A18.0†, M01.19**
- Cours
- - Syphilis ¬ *A52.7†, M68.09**
- - Syphilis tardive ¬ *A52.7†, M68.09**
- Gonocoques ¬ *A54.4†, M68.09**
- Gonorrhéique ¬ *A54.4†, M68.09**
- Infectieuses ¬ Autres (téno) *M65.1*
- Syphilitique congénitale ¬ *A50.0*
- Ténosynovite
- - Cours de maladies bactériennes classées ailleurs ¬ *M68.0**
- - Sans précision ¬ *M65.9*
- - ¬ Autres *M65.8*

Synovite *–suite*
- Toxique ¬ *M67.3*
- Transitoire ¬ *M67.3*
- Tuberculeuse
- - Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - ¬ *A18.0†, M68.09**
- Villonodulaire
- - Pigmenté
- - - Articulation du genou ¬ *M12.26*
- - - Avant-bras ¬ *M12.23*
- - - Bras ¬ *M12.22*
- - - Colonne vertébrale ¬ *M12.28*
- - - Cuisse ¬ *M12.25*
- - - Jambe ¬ *M12.26*
- - - Main ¬ *M12.24*
- - - Pied ¬ *M12.27*
- - - Région pelvienne ¬ *M12.25*
- - - Région scapulaire ¬ *M12.21*
- - - Sièges multiples ¬ *M12.20*
- - - ¬ *M12.29*
- - ¬ *M12.29*

Syntélencéphalie ¬ *Q04.2*

Synthase
- Hépatique ¬
- - Déficit en glycogène *E74.0*
- - GSD par déficit en glycogène *E74.0*
- Non lié à CYP11B2 ¬ Déficit en aldostérone *E27.4*
- Type cblG ¬ Déficit fonctionnel en méthionine *E72.1*
- ¬
- - Déficit
- - - Aldostérone *E27.4*
- - - Bêta-alanine *E79.8*
- - - Fonctionnel en méthionine *E72.1*
- - - GM3 *E77.8*
- - - N-acétylglutamate *E72.2*
- - - Uridine monophosphate *E79.8*
- - Hyperammoniémie par déficit en N-acétylglutamate *E72.2*
- - Hyperphénylalaninémie par déficit en 6-pyruvoyl-tétrahydroptérine *E70.1*

Synthèse
- Acide biliaire
- - Cholestase et malabsorption ¬ Défaut de *K76.8*
- - ¬
- - - Déficit congénital de *K76.8*
- - - Malabsorption idiopathique par défaut de *K90.8*
- Protéine
- - Codées par l'ADN mitochondrial ¬ Insuffisance hépatique infantile aiguë par défaut de *K72.0*
- - Mitochondriales ¬ Maladie mitochondriale par défaut de *E88.8*
- Thromboxane ¬ Troubles hémorragiques par déficit de *D69.88*

Synthèse *–suite*
- Vitamine D [Type I] ¬ Anomalie de la *E83.31*

Synthétase
- I ¬ Déficit en carbamoyl-phosphate *E72.2*
- ¬
- - Activité accrue de la phosphoribosylpyrophosphatase *E79.8*
- - Déficit
- - - 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA *E71.3*
- - - Acide lipoïque *E88.8*
- - - Asparagine *E72.8*
- - - Carbamoyl-phosphate *E72.2*
- - - Glutathion *D55.1*
- - - Héréditaire en glutamine *E72.8*
- - - Holocarboxylase *D81.8*
- - - Leucotriène-C4 *E88.8*
- - - Phosphoribosylpyrophosphate *E79.8*
- - Dysgénésie cérébrale congénitale par déficit en glutamine *E72.8*
- - Hyperactivité de la PRPP *E79.8*

Synthétiques
- Sans précision ¬ Intoxication: Hormones et leurs substituts *T38.8*
- ¬ Intoxication
- - Glucocorticoïdes et analogues *T38.0*
- - Narcotiques *T40.4*

Syphilide néonatale ¬ *A50.0*

Syphilis
- Acquise) SAI ¬ *A53.9*
- Adhésive de l'arachnoïde ¬ *A52.1†, G01**
- Aiguë des méninges ¬ *A51.4†, G01**
- Alopécie ¬ *A51.3†, L99.8**
- Amygdales ¬ *A52.7†, J99.8**
- Anale primaire ¬ *A51.1*
- Anévrisme du système nerveux central ¬ *A52.0†, I68.8**
- Anus ¬ *A52.7†, K93.8**
- Aorte ¬ *A52.0†, I79.1**
- Aorte abdominale ¬ *A52.0†, I79.1**
- Aorte thoracique ¬ *A52.0†, I79.1**
- Artères hépatiques ¬ *A52.0†, I79.8**
- Artères pulmonaires ¬ *A52.0†, I98.0**
- Articulaire de Charcot ¬ *A52.1†, M14.69**
- Bronchique
- - Tardive ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- Canal auditif ¬ *A52.7†, H94.8**
- Cardio-vasculaire
- - Tardive ¬ *A52.0†, I98.0**
- - Tertiaire ¬ *A52.0†, I98.0**
- - ¬
- - - *A52.0†*
- - - *A52.0†, I98.0**
- - - *I98.0**
- Cérébrale
- - Arachnoïde ¬ *A52.1†, G01**
- - ¬ *A52.1†, G94.8**

Syphilis *–suite*
- Cérébrovasculaire ¬ *A52.0†, I68.8**
- Cloison nasale ¬ *A52.7†, J99.8**
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.1*
- Cornée ¬ *A52.7†, H19.2**
- Cristallin ¬ *A52.7†, H28.8**
- Cutanée congénitale précoce ¬ *A50.0†, L99.8**
- Dure-mère ¬ *A52.1†, G01**
- Endémique ¬ *A65*
- Enfant de moins de 2 ans, NCA ¬ *A50.2*
- Épididyme ¬ *A52.7†, N51.1**
- Estomac ¬ *A52.7†, K93.8**
- Foie ¬ *A52.7†, K77.0**
- Gastrique tardive avec polypose ¬ *A52.7†, K93.8**
- Génitale primaire ¬ *A51.0*
- Glandes lacrymales ¬ *A52.7†, H06.0**
- Hypophyse ¬ *A52.7†, E35.8**
- I ¬ *A51.0*
- II ¬ *A51.4*
- Intestin grêle ¬ *A52.7†, K93.8**
- Intestinale tardive ¬ *A52.7†, K93.8**
- Juvénile du système nerveux central ¬ *A50.4*
- La crosse de l'aorte ¬ *A52.0†, I79.1**
- Larynx
- - Périchondrite ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- Latente
- - Non précisée précoce ou tardive ¬ *A53.0*
- - SAI ¬ *A53.0*
- Leucoderme ¬ *A51.3†, L99.8**
- Membrane synoviale ¬ *A52.7†, M68.09**
- Méninges ¬ *A52.1†, G01**
- Méningo-vasculaire
- - Cérébrale ¬ *A52.1†, G01**
- - Congénitale ¬ *A50.4†, G01**
- Muscle ¬ *A52.7†, M63.09**
- Myocarde ¬ *A52.0†, I41.0**
- Nerf
- - Acoustique ¬ *A52.1†, H94.0**
- - Vestibulocochléaire ¬ *A52.1†, H94.0**
- Nerf crânien
- - Paralysies multiples ¬ *A52.1†, G53.1**
- - ¬ *A52.1†, G53.8**
- Nerf facial ¬ *A52.1†, G53.8**
- Nerf optique ¬ *A52.1†, H48.0**
- Nerf périphérique ¬ *A52.7†, G59.8**
- Nerveux
- - Asymptomatique ¬ *A52.2*
- - Sans précision ¬ *A52.3*
- - Symptomatique ¬ *A52.1*
- - Tabétique
- - - Juvénile ¬ *A50.4*
- - - ¬ *A50.4*

Syphilis *–suite*
- Nez ¬ *A52.7†, J99.8**
- Non vénérienne ¬ *A65*
- Nouveau-né NCA ¬ *A50.9*
- Oreille
- - Interne
- - - Neurorécidive ¬ *A52.1†, H94.0**
- - - ¬ *A52.7†, H94.8**
- - Moyenne ¬ *A52.7†, H75.8**
- - ¬ *A52.7†, H94.8**
- Os ¬ *A52.7†, M90.29**
- Osseuse tardive ¬ *A52.7†, M90.29**
- Perforée tardive de la luette ¬ *A52.7†, K93.8**
- Péritoine ¬ *A52.7†, K67.2**
- Poumons ¬ *A52.7†, J99.8**
- Précoce, latente ¬ *A51.5*
- Primaire d'autres localisations ¬ *A51.2*
- Pulmonaire tardive ¬ *A52.7†, J99.8**
- Rate ¬ *A52.7†, D77**
- Sclérosante du cordon postérieur ¬ *A52.1†, G32.8**
- Spinale de l'arachnoïde ¬ *A52.1†, G01**
- Surrénale
- - Hypofonctionnement cortical ¬ *A52.7†, E35.1**
- - ¬ *A52.7†, E35.1**
- Symptomatique ¬ Autres formes tardives de *A52.7*
- Système squelettique ¬ *A52.7†, M90.29**
- Tardive) du système nerveux central SAI ¬ *A52.3*
- Tertiaire ¬ Aphasie au cours de *A52.1†, G94.8**
- Testicule ¬ *A52.7†, N51.1**
- Trachée ¬ *A52.7†, J99.8**
- Trompe d'Eustache ¬ *A52.7†, J99.8**
- Urètre ¬ *A52.7†, N37.0**
- Vasculaire
- - Cerveau ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Système nerveux central ¬ *A52.0†, I68.8**
- - ¬ *A52.0†, I98.0**
- Veine porte ¬ *A52.0†, I98.0**
- Veineuse ¬ *A52.0†, I98.0**
- Viscéral
- - Congénitale précoce ¬ *A50.0*
- - Secondaire NCA ¬ *A51.4*
- ¬
- - Arthrite neuropathique au cours de *A52.1†, M14.69**
- - Arthropathie de Charcot au cours de *A52.1†, M14.69**
- - Craniotabès au cours de *A50.5*
- - Crise gastrique au cours de *A52.7†, K93.8**
- - Démence paralysante au cours de *A52.1†, F02.8**
- - Hémorragie cérébrale due à la *A52.0†, I68.8**

Syphilis *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Kératoconjonctivite interstitielles au cours de *A50.3†, H19.2**
- - Maladie
- - - Endocarde au cours de *A52.0†, I39.8**
- - - Glomérulaire au cours de *A52.7†, N08.0**
- - - Voies respiratoires au cours de *A52.7†, J99.8**
- - Méningite au cours de *A52.1†, G01**
- - Myosite secondaire au cours de *A51.4†, M63.09**
- - Névrite acoustique au cours de la *A52.1†, H94.0**
- - Nez en selle attribuable à la *A50.5*
- - Nodule juxta-articulaire au cours de *A52.7†, M14.89**
- - Pyélonéphrite au cours de *A52.7†, N16.0**
- - Résultats faussement positifs au test sérologique de la *R76.2*
- - Sujet porteur de: *Z22.4*
- - Synovite au cours de *A52.7†, M68.09**
- - Ténosynovite au cours de *A52.7†, M68.09**
- - Thrombose
- - - Cardiaque due à la *A52.0†, I52.0**
- - - Cérébrale due à la *A52.0†, I68.8**
- - - Coronaire due à la *A52.0†, I52.0**
- - - Murale due à la *A52.0†, I52.0**
- - - Veine porte due à la *A52.0†, I98.0**

Syphilis congénitale
- Cœur ¬ *A50.5†, I52.0**
- Latente au stade précoce ¬ *A50.1*
- Nerveux
- - Tardive ¬ *A50.4*
- - ¬ *A50.4*
- Périoste ¬ *A50.0†, M90.19**
- Péritoine ¬ *A50.0†, K67.2**
- Précoce
- - Cutanéo-muqueuse ¬ *A50.0*
- - Latente ¬ *A50.1*
- - Oculopathie ¬ *A50.0†, H58.8**
- - ¬
- - - *A50.0*
- - - *A50.2*
- Rétine ¬ *A50.0†, H32.0**
- Symptomatique
- - Stade avancé ¬ *A50.5*
- - ¬ Autres formes tardives de *A50.5*
- Symptômes de stade précoce ¬ *A50.0*
- Système nerveux central ¬ *A50.4*
- Tabès ¬ *A50.4*
- Tardive
- - Cardiovasculaire ¬ *A50.5†, I98.0**
- - Latente
- - - Réaction négative dans le liquide céphalorachidien ¬ *A50.6*
- - - ¬ *A50.6*

Syphilis congénitale *–suite*
- Tardive *–suite*
- - ¬ *A50.7*
- - ¬
- - *A50.9*
- - Arthrite au cours de *A50.5†, M03.19**
- - Condylome plan au cours de *A50.0*
- - Dents de Hutchinson dues à une *A50.5*
- - Encéphalite au cours de *A50.4†, G05.0**
- - Encéphalomyélite au cours de *A50.4†, G05.0**
- - Gomme due à la *A50.5*
- - Kératite au cours de *A50.3†, H19.2**
- - Kératoconjonctivite au cours de *A50.3†, H19.2**
- - Méningite au cours de *A50.4†, G01**
- - Myélite au cours de *A50.4†, G05.0**

Syphilis secondaire
- Choroïde ¬ *A51.4†, H32.0**
- Corps ciliaire ¬ *A51.4†, H22.0**
- Foie ¬ *A51.4†, K77.0**
- Iris ¬ *A51.4†, H22.0**
- Muscle ¬ *A51.4†, M63.09**
- Orbite ¬ *A51.4†, H06.3**
- Os ¬ *A51.4†, M90.29**
- Peau et des muqueuses ¬ *A51.3*
- Périoste ¬ *A51.4†, M90.19**
- Précoce
- - Ganglion lymphatique ¬ *A51.4*
- - Rétine ¬ *A51.4†, H32.0**
- - ¬ Oculopathie au cours de *A51.4†, H58.8**
- Tractus uvéal ¬ *A51.4†, H22.0**
- Viscères ¬ *A51.4†, K93.8**
- Vulve ¬ *A51.3†, N77.1**
- ¬ *A51.4*

Syphilis tardive
- Amygdales linguales ¬ *A52.7†, J99.8**
- Appareil lacrymal ¬ *A52.7†, H06.0**
- Bouche ¬ *A52.7†, K93.8**
- Bourse ¬ *A52.7†, M73.19**
- Canal déférent ¬ *A52.7†, N51.8**
- Col de l'utérus ¬ *A52.7†, N74.2**
- Côlon ¬ *A52.7†, K93.8**
- Cornée ¬ *A52.7†, H19.2**
- Corps
- - Ciliaire ¬ *A52.7†, H22.0**
- - Vitré ¬ *A52.7†, H45.8**
- Épididyme ¬ *A52.7†, N51.1**
- Épiglotte ¬ *A52.7†, J99.8**
- Ganglion lymphatique ¬ *A52.7†, I98.8**
- Glande thyroïde ¬ *A52.7†, E35.0**
- Hémorragie du corps vitré ¬ *A52.7†, H45.0**
- Intestin ¬ *A52.7†, K93.8**
- Langue ¬ *A52.7†, K93.8**
- Larynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- Latente ¬ *A52.8*

Syphilis tardive *–suite*
- Lèvre ¬ *A52.7†, K93.8**
- Lymphadénite ¬ *A52.7†, I98.8**
- Médiastin ¬ *A52.7†, J99.8**
- Nez ¬ *A52.7†, J99.8**
- Œil ¬ *A52.7†, H58.8**
- Œsophage ¬ *A52.7†, K23.8**
- Orbites ¬ *A52.7†, H06.3**
- Os pétreux ¬ *A52.7†, M90.28**
- Ovaire ¬ *A52.7†, N74.2**
- Palais ¬ *A52.7†, K93.8**
- Pancréas ¬ *A52.7†, K87.1**
- Paupière avec gomme ¬ *A52.7†, H03.1**
- Peau ¬ *A52.7†, L99.8**
- Pénis ¬ *A52.7†, N51.8**
- Périoste ¬ *A52.7†, M90.19**
- Pharynx ¬ *A52.7†, J99.8**
- Plèvre ¬ *A52.7†, J99.8**
- Prostate ¬ *A52.7†, N51.0**
- Rectum ¬ *A52.7†, K93.8**
- Rein ¬ *A52.7†, N29.0**
- Rétine ¬ *A52.7†, H32.0**
- Sclère ¬ *A52.7†, H19.0**
- Scrotum ¬ *A52.7†, N51.8**
- Symptomatique avec leucoderme ¬ *A52.7†, L99.8**
- Tendon ¬ *A52.7†, M68.09**
- Thymus ¬ *A52.7†, E35.8**
- Trachée ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tractus uvéal ¬ *A52.7†, H22.0**
- Trompe de Fallope ¬ *A52.7†, N74.2**
- Tubéreuse ¬ *A52.7†, L99.8**
- Tunique vaginale ¬ *A52.7†, N51.8**
- Urètre ¬ *A52.7†, N37.0**
- Utérus ¬ *A52.7†, N74.2**
- Vagin ¬ *A52.7†, N77.1**
- Vésicule
- - Biliaire ¬ *A52.7†, K87.0**
- - Séminale ¬ *A52.7†, N51.8**
- Vessie urinaire ¬ *A52.7†, N33.8**
- Voies respiratoires ¬ *A52.7†, J99.8**
- Vulve ¬ *A52.7†, N77.1**
- ¬
- - Arthropathie au cours de *A52.7†, M03.19**
- - Choriorétinite au cours de *A52.7†, H32.0**
- - Encéphalite au cours de *A52.1†, G05.0**
- - Encéphalomyélite au cours de *A52.1†, G05.0**
- - Myélite au cours de *A52.1†, G05.0**
- - Oculopathie au cours de *A52.7†, H58.8**
- - Synovite au cours de *A52.7†, M68.09**
- - Ténosynovite au cours de *A52.7†, M68.09**

Syphilitica ¬ Keratitis punctata *A50.3†, H19.2**

Syphilitique
v./v.a. Type de maladie

Syphilitique tardif
v./v.a. Type de maladie

Syphilome
- Cardiovasculaire ¬ *A52.0†, I98.0**
- Système
- - Circulatoire ¬ *A52.0†, I98.0**
- - Nerveux central SAI ¬ *A52.3*

Syringobulbie ¬
- Spondylopathie neurologique au cours de *G95.0†, M49.49**
- Syringomyélie et *G95.0*

Syringocystadénome papillifère
- Peau
- - Cou ¬ *D23.4*
- - Tête ¬ *D23.4*
- - Tronc ¬ *D23.5*
- - Visage ¬ *D23.3*
- ¬ *D23.9*

Syringomyélie
- Primaire ¬ *Q06.4*
- Syringobulbie ¬ *G95.0*
- ¬
- - Arthropathie au cours de *G95.0†, M14.69**
- - Spondylopathie neurologique au cours de *G95.0†, M49.49**

Syringomyélique de Charcot ¬ Arthropathie *G95.0†, M49.49**

Syringomyélocèle ¬ *Q05*

Systémique
v./v.a. Type de maladie

Systolique) SAI ¬ Souffle cardiaque (*R01.1*

SYT1 ¬ Trouble neurologique du développement associé à *Q87.8*

TAB ¬ Nécessité vaccination contre
- Choléra et la typhoïde-parathyphoïde [choléra + *Z27.0*
- Diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + *Z27.2*
- Typhoïde-paratyphoïde seule [*Z23.1*

Tabac
- Médicaments ou de drogues ¬ Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de *Z72.0*
- Nicotine ¬ Effet toxique: *T65.2*
- ¬
- - Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F17*

Tabagisme
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par le *P04.2*
- ¬
- - Conseil: à propos du *Z71*
- - Rééducation après *Z50.8!*

Tabardillo
- Puces ¬ *A75.2*
- ¬ Typhus murin [typhus mexicain, typhus endémique, *A75.9*

Tabatznik ¬ Syndrome de *Q87.2*

Tabès
- Juvénile ¬ *A50.4*
- Mal perforant plantaire syphilitique ¬ *A52.1†, L99.8**
- Osseux ¬ *A52.1†, M90.29**
- ¬
- - *A52.1*
- - Spondylopathie neurologique au cours de *A52.1†, M49.49**
- - Syphilis congénitale avec *A50.4*

Tabes mesenterica ¬ *A18.3†, K93.0**

Tabétique
- Juvénile ¬ Syphilis nerveuse *A50.4*
- ¬
- - Arthropathie *A52.1†, M14.69**
- - Syphilis nerveuse *A50.4*

Tabique
- Charcot ¬ Arthropathie *A52.1†, M14.69**
- Cordon postérieur ¬ Sclérose *A52.1†, G32.8**
- Neurogène ¬ Atrophie osseuse *A52.1†, M90.29**
- ¬
- - Arthrite *A52.1†, M03.19**
- - Arthropathie neuropathique *A52.1†, M14.69**

Tabo-paralysie
- Articulation de Charcot ¬ *A52.1†, M14.69**
- Mal perforant plantaire syphilitique ¬ *A52.1†, L99.8**

TAC
- Tachyarythmie complète] ¬ *I48.9*
- ¬ Tronc artériel commun [*Q20.0*

Tache
- Aveugle ¬ Elargissement de la *H53.4*
- Bitot
- - Jeune enfant ¬ *E50.1*
- - Xérosis conjonctival ¬ Avitaminose A avec *E50.1†, H13.8**
- Blanches [caries initiales] ¬ *K02.0*
- Café lait
- - Congénitales et augmentation du taux d'échanges entre chromatides sœurs ¬ Syndrome de retard de croissance intra-utérin avec multiples *Q02*
- - ¬
- - - *L81.3*
- - - Maladie familiale des *L81.3*
- Émail non associées à la fluorose ¬ *K00.3*
- Rouge cerise ¬ Syndrome myoclonies-*E77.1*
- Rousseur ¬
- - *L81.2*
- - Acrokeratodermie ponctuée avec pigmentation de type *L85.8*
- Séniles ¬ *L81.8*
- Vin
- - Citerne cérébello-médullaire élargie-hydrocéphalie ¬ Syndrome de nævus en *Q04.8, Q82.5*
- - Multiples familiaux ¬ Nævus en *Q82.5*
- - ¬ Nævus: en *Q82.5*

Tacheté
- Familiale bénigne ¬ Rétine *H35.5*
- Multifocale de l'épithélium pigmentaire rétinien (simulant le fundus flavimaculatus) ¬ Dystrophie *H35.5*
- ¬
- - Dents *K00.3*
- - Dysplasie diaphysaire *Q77.3*
- - Émail *K00.3*

Tachyarythmie
- Absolue persistante au cours de fibrillation auriculaire ¬ *I48.1*
- Atrial
- - Intervalle PR court ¬ *I45.6*
- - Trouble de conduction cardiaque infra-Hisienne familiales ¬ *I45.8*
- Complète
- - Paroxystique
- - - Cours d'une fibrillation auriculaire ¬ *I48.0*
- - - ¬
- - - - *I48.0*
- - - - *I48.1*
- - Permanente au cours d'une fibrillation auriculaire ¬ *I48.2*
- - ¬
- - - *I48.9*
- - - TAC [*I48.9*
- Cours d'une fibrillation auriculaire ¬ *I48.9*
- ¬ *I49.8*

Tachycardie
- Atriale chaotique ¬ *I47.1*
- Bradycardie ¬ Syndrome de *I49.5*
- Fœtale ¬ *O68.0*
- Hisienne ¬ *I47.1*
- Jonction AV par réentrée ¬ *I47.1*
- Jonctionnelle ectopique ¬ *I47.1*
- Paroxystique
- - Atriale ¬ *I47.1*
- - Atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ *I47.1*
- - Auriculoventriculaire [AV] SAI ¬ *I47.1*
- - Jonctionnelle ¬ *I47.1*
- - Nodale ¬ *I47.1*
- - Sans précision ¬ *I47.9*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- Posturale [PoTS] ¬ Syndrome de *G90.80*
- Sans précision ¬ *R00.0*
- Sinoauriculaire SAI ¬ *R00.0*
- Sinusale SAI ¬ *R00.0*
- Supraventriculaire ¬ *I47.1*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I52.0**
- Ventriculaire
- - Incessante du nouveau-né ¬ *I47.2*
- - Paroxystique maligne ¬ *I47.2*
- - Polymorphe catécholaminergique ¬ *I47.2*
- - ¬ *I47.2*

Tachypnée transitoire du nouveau-né ¬ *P22.1*

TACI ¬ Déficit immunitaire commun variable par déficit en *D83.0*

Taenia
- Saginata ¬ Infection
- - *B68.1*
- - Cestodes adultes (*B68.1*
- Sans précision ¬ Infection à *B68.9*
- Solium ¬ Infection à *B68.0*

TAFRO [thrombocytopénie-anasarque-fièvre-insuffisance rénale-organomégalie] ¬ Syndrome de *D89.8*

Taïga transmise par des tiques ¬ Encéphalite de la *A84.0*

Taille
- Gros orteils longs-épiphyses surnuméraires multiples ¬ Syndrome de grande *Q87.3*
- Hyperlaxité ¬ Syndrome d'hydrocéphalie-grande *Q87.8*
- Petite à moyenne CD4+ ¬ Lymphome T cutané à cellules pléomorphes de *C84.4*
- ¬ Syndrome d'atrésie des choanes-athélie-hypothyroïdie-retard pubertaire-petit *Q87.1*

Takagi
v./v.a. Furukawa-Takagi-Nakao

Takahara ¬ Maladie de *E80.3*

Takayasu ¬
- Artérite de *M31.4*
- Maladie de *M31.4*

Takenouchi
v./v.a. Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim
Takenouchi-Kosaki ¬ Syndrome *Q87.0*
Takeshita
v./v.a. Yoshimura-Takeshita
Tako-Tsubo ¬ Cardiomyopathie *I42.88*
Talabani
v./v.a. Al-Gazali-al-Talabani
Talaromycose ¬ *B48.4*
Talc ¬ Pneumoconiose due à la poussière du *J62.0*
Talipes equinovarus avec communication interatriale, séquence de Robin et persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome TARP (*Q87.8*
Talo-crurale ¬ Syndrome d'empiètement de l'articulation *M24.87*
Talon ¬
- *S91.3*
- Malformation acquise du *M21.68*
- Os du *S92.0*
Talo-patello-scaphoïde ¬ Ostéolyse *M89.50*
Talus
- Bipartite ¬ *Q66.8*
- Valgus ¬ Pied bot *Q66.4*
- Varus ¬ Pied bot *Q66.1*
Tamoxifène ¬ *T38.6*
Tampon ¬ Syndrome du choc toxique avec utilisation de *A48.3*
Tamponnade
- Cardiaque ¬ *I31.80*
- Péricardique ¬ *I31.80*
- Vésicale ¬ *N32.8*
Tanapox ¬ Syndrome du virus de *B08.8*
Tangier ¬ Maladie de *E78.6*
TANGO2 ¬ Syndrome d'encéphalopathie métabolique-arythmie associé à *G31.88*
Tapétochoroïdienne ¬ Dystrophie *H31.2*
Tapéto-rétinien
- Leber ¬ Amaurose *H35.5*
- ¬
- - Dystrophie: *H35.5*
- - Syndrome
- - - Ataxie-dégénérescence *G11.9, H35.5*
- - - Hypoplasie cérébelleuse-dégénérescence *Q04.3*
TAR
- Syndrome ¬ *Q87.2*
- ¬ Thrombopénie avec absence de radius [*Q87.2*
TARDBP ¬ Myopathie distale à début tardif liée à *G71.08*
Tardif
v./v.a. Type de maladie
TARP (Talipes equinovarus avec communication interatriale, séquence de Robin et persistance de la veine cave supérieure gauche) ¬ Syndrome *Q87.8*
Tarsal kink ¬ Syndrome *Q10.2*
Tarsale
- Oligodontie ¬ Syndrome de fente palatine-anomalies carpo- *Q87.8*
- ¬ Coalescence *Q66.8*
Tarse
- Sans précision ¬ Fracture: Un ou plusieurs autres os du *S92.20*
- ¬
- - Fracture Os
- - - *S92.28*
- - - Naviculaire du pied[scaphoide du *S92.21*
- - Ostéoblastome du *D16.3*
- - Ostéochondrite juvénile, *M92.6*
- - Ostéochondrose du *M92.6*
Tarsien
v./v.a. cranio-carpo-tarsien
v./v.a. médiotarsien
- ¬
- - Abcès des glandes *H00.0*
- - Coalition *Q66.8*
- - Ligament: *S93.6*
- - Os naviculaire carpien ou *S62.0*
- - Ostéochondrite juvénile, scaphoïde *M92.6*
- - Syndrome du canal *G57.5*
Tarsite
- Syphilitique ¬ *A52.7†, H03.1**
- Tuberculeuse ¬ *A18.4†, H03.1**
Tarsocarpienne ¬ Syndrome de coalition *Q74.8*
Tarso-métatarsien ¬
- Ligament: *S93.6*
- Luxation de parties autres et non précisées du pied: (Articulation) *S93.33*
Tartre dentaire
- Sous-gingival ¬ *K03.6*
- Supra-gingival ¬ *K03.6*
Tarui ¬ Maladie de: *E74.0*
Tassement vertébral
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *M49.5**
- Non classé ailleurs ¬ *M48.5*
- SAI ¬ *M48.5*
- Vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques ¬ *M80*
Tateyama ¬ Myopathie distale type *G71.08*
Tatouage
- Piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un *U69.10!*
- ¬ Pigmentation: par *L81.8*
Tatton-Brown-Rahman ¬ Syndrome de *Q87.3*
Taurodontisme ¬ *K00.2*
Taussig-Bing ¬ Syndrome de *Q20.1*
Taux
- Accru
- - Ammoniaque ¬ *R79.8*
- - Ostéocalcine ¬ *R79.8*
Taux *–suite*
- Amylase ¬ Anomalies des *R74.8*
- Anormalement élevé de métaux lourds dans le sang ¬ Présence d'un *R78.7*
- Anticorps ¬ Augmentation du *R76.0*
- Antigène spécifique de la prostate [PSA] ¬ Modification du *R77.80*
- Échanges entre chromatides sœurs ¬ Syndrome de retard de croissance intra-utérin avec multiples taches café-au-lait congénitales et augmentation du *Q02*
- Élevé d'alpha-fœtoprotéines ¬ Dépistage prénatal d'un *Z36.1*
- Enzyme sérique
- - Sans précision ¬ Anomalie du *R74.9*
- - ¬ Anomalies d'autres *R74.8*
- Immunoglobulines ¬ Augmentation du *R76.88*
- Lipase [triacylglycerol lipase] ¬ Anomalies des *R74.8*
- Médicaments et de substances biologiques ¬ Augmentation dans les urines du *R82.5*
- Phosphatase
- - Acide ¬ Anomalies des *R74.8*
- - Alcaline ¬ Anomalies des *R74.8*
- Protéine
- - C-réactive ¬ Augmentation pathologique du *R77.88*
- - Plasmatiques ¬ Autres modifications précisées des *R77.88*
- Réduit
- - Glutathion ¬ *R79.8*
- - Protéine de liaison du facteur de croissance ressemblant à l'insuline ¬ *R77.88*
- Transaminase et d'acide lactique déshydrogénase ¬ Augmentation des *R74.0*
Taux anormal
- Alanine aminotransférase ¬ *R74.8*
- Aspartate aminotransférase ¬ *R74.8*
- Cobalt ¬ *R79.0*
- Cuivre ¬ *R79.0*
- Enzymes du liquide céphalorachidien ¬ *R83.0*
- Fer ¬ *R79.0*
- Gaz du sang ¬ *R79.8*
- Hormones du liquide céphalorachidien ¬ *R83.1*
- Lithium dans le sang ¬ Présence d'un *R78.8*
- Magnésium ¬ *R79.0*
- Métaux lourds dans les urines ¬ *R82.6*
- Minéraux dans le sang ¬ *R79.0*
- Substance
- - Minérale NCA ¬ *R79.0*
- - Origine principalement non médicinale du liquide céphalorachidien ¬ *R83.3*
- Urines de substances d'origine principalement non médicinale ¬ *R82.6*
- Zinc ¬ *R79.0*

Taux urinaire élevés
- 17-cétostéroïdes ¬ *R82.5*
- Acide indol-acétique ¬ *R82.5*
- Catécholamines ¬ *R82.5*
- Stéroïdes ¬ *R82.5*

Tawil
v./v.a. Andersen-Tawil

Taybi
- Haploinsuffisance de EP300 ¬ Syndrome de Rubinstein- *Q87.2*
- Mutations de CREBBP ¬ Syndrome de Rubinstein- *Q87.2*
- ¬ Syndrome de Rubinstein- *Q87.2*

Taylor
v./v.a. Schaap-Taylor-Baraitser

Tay-Sachs
- Forme
- - Adulte
- - - Variante B ¬ Maladie de *E75.0*
- - - ¬ Maladie de *E75.0*
- - Infantile
- - - Variante B ¬ Maladie de *E75.0*
- - - ¬ Maladie de *E75.0*
- - Juvénile
- - - Variante B ¬ Maladie de *E75.0*
- - - ¬ Maladie de *E75.0*
- Variante B1 ¬ Maladie de *E75.0*
- ¬ Maladie de *E75.0*

Tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/ *U81.6!*

T-B-
- Déficit immunitaire combiné sévère] ¬ SCID *D81.1*
- ¬ Déficit immunitaire combiné sévère *D81.1*

T-B+
- Déficit
- - Immunitaire combiné sévère] ¬ SCID *D81.2*
- - JAK3 ¬ Déficit immunitaire combiné sévère *D81.2*
- Lié à l'X ¬ Déficit immunitaire combiné sévère *D81.2*
- ¬ Immunodéficience combinée sévère *D81.2*

TBC tuberculose
- Articulaire ¬ *A18.0†, M01.19**
- Articulation du genou ¬ *A18.0†, M01.16**
- Cerveau ¬ *A17.8†, G07**
- Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- Hanche ¬ *A18.0†, M01.15**
- Intestin ¬ *A18.3†, K93.0**
- Méninges ¬ *A17.0†, G01**
- Os ¬ *A18.0†, M90.09**
- Rein ¬ *A18.1†, N29.1**

TBCK ¬ Syndrome
- Déficience intellectuelle associé à *Q87.0*

TBCK ¬ Syndrome *–suite*
- Encéphalopathie-hypotonie sévère-dysmorphie craniofaciale associé à *Q87.0*

TCF12 ¬ Craniosynostose syndromique liée à *Q87.0*

Tchouvachie ¬ Polycythémie de *D75.1*

TCPDB] ¬ Tumeur à cellules plasmacytoïdes dendritiques blastiques [*C86.4*

TCR
- Gamma/delta ¬ Lymphome T cutané primitif de phénotype *C84.5*
- Récepteur des cellules T] alpha ¬ Déficit en cellules *D81.8*

TD [Dysplasie thanatophore] ¬ *Q77.1*

TDAH [trouble du déficit de l'attention / hyperactivité] ¬ *F90.0*

TECPR2 ¬ Neuropathie héréditaire sensitive et autonomique due à une mutation de *G60.8*

Teebi
v./v.a. Kennedy-Teebi
- ¬ Hypertélorisme de *Q87.0*

Teebi-Kaurah ¬ Syndrome de *Q87.8*

Teebi-Shaltout ¬ Syndrome de *Q87.0*

Teevan ¬ Fracture crânienne de *S02.0*

Tegmentale ¬ Paralysie
- *G83.8*
- Mésencéphalique/ *G83.8*

Tegmentum pontique ¬ Dysplasie du *Q04.8*

Tégument
- Phanères SAI ¬
- - Anomalie SAI des *Q84.9*
- - Déformation SAI des *Q84.9*
- Spécifique fœtus nouveau-né
- - Sans précision ¬ Affection des *P83.9*
- - ¬ Autres affections précisées des *P83.8*

Teigne
- Barbe ¬ *B35.0*
- Crurale] ¬ Teigne inguinale [*B35.6*
- Cuir chevelu ¬ *B35.0*
- Imbriquée ¬ *B35.5*
- Inguinale [teigne crurale] ¬ *B35.6*
- Main ¬ *B35.2*
- Ongle ¬ *B35.1*
- Peau glabre ¬ *B35.4*
- Pied ¬ *B35.3*
- SAI ¬ *B35.9*
- Tondante ¬ *B35.0*
- ¬ *B35.0*

Teinte des tissus dentaires durs après l'éruption ¬ Modification de la *K03.7*

Teintures
- Non classées ailleurs ¬ Effet toxique: Peintures et *T65.6*
- ¬
- - *L24.8*
- - Dermite
- - - Allergique de contact due aux *L23.4*

Teintures *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dermite *–suite*
- - - Contact, sans précision, due aux *L25.2*

Tel Hashomer ¬ Camptodactylie de *Q79.8*

Télangiectasie
v./v.a. Ataxie-télangiectasie-like
- Cutanée familiale et syndrome de prédisposition au cancer oropharyngé ¬ *L81.7*
- Érythrocytose-gammopathie monoclonale-épanchements périnéphrétiques-shunt pulmonaire] ¬ Syndrome TEMPI [*D47.2*
- Essentielle ¬ *L81.7*
- Glomérulonéphrite membranoprolifération ¬ Syndrome d'hypotrichose-lymphœdème- *Q87.8*
- Hémorragique héréditaire ¬ *I78.0*
- Maculaire
- - Idiopathique type
- - - 1 ¬ *H35.0*
- - - 3 ¬ *H35.0*
- - ¬ *H35.0*
- Parafovéale ¬ *H35.0*
- Rétinienne
- - Congénitale ¬ *H35.0*
- - ¬ *H35.0*
- ¬
- - Syndrome
- - - Calcinose-maladie de Raynaud-troubles moteurs œsophagiens-sclérodactylie- *M34.1*
- - - Épilepsie- *Q87.0*
- - Variant de l'ataxie- *G11.3*

Télangiectasique
- Foie ¬ Hyperplasie nodulaire focale *D13.4*
- Muqueuse buccale ¬ Granulome *K13.4*
- Périphériques ¬ Masses *D31.2*
- ¬
- - Adénome hépatocellulaire *D13.4*
- - Ataxie *G11.3*
- - Mastocytose cutanée maculeuse *Q82.2*

Telangiectatica
- Congenita ¬
- - Cutis marmorata *Q27.8*
- - Syndrome
- - - Macrocéphalie-cutis marmorata *Q87.3*
- - - Mégalencéphalie-cutis marmorata *Q87.3*
- Congenitale] ¬ Syndrome de Van Lohuizen [Cutis marmorata *Q27.8*

Téléangiectasie [angiome stellaire] ¬ *I78.1*

Télécanthus
- Hypertélorisme-strabisme-pied creux ¬ Syndrome de *Q87.8*
- ¬ Syndrome
- - Fente nasale avec hypoplasie alaire et *Q75.1*
- - MMCAT [microcornée-myopie avec atrophie choriorétinienne- *Q15.8*

Télédiastolique ventriculaire gauche ¬ Augmentation pathologique de la pression *R94.3*

Téléthane ¬ Syndrome du lipome nasopalpébral colobome- *D17.0, Q10.3*

Teller
v./v.a. Pfeiffer-Palm-Teller

Télogène ¬ *L65.0*

TEMF] ¬ Fibrose endomyocardique tropicale [*I42.3*

Témoin ¬ Décès sans *R98*

Température
- Ambiante ¬ Hypothermie, non associée à une baisse de la *R68.0*
- Extrême ¬ *Z57*
- Sans précision ¬ Effet d'une baisse de la *T69.9*
- ¬ Autres effets précisés d'une baisse de la *T69.8*

TEMPI [télangiectasie-érythrocytose-gammopathie monoclonale-épanchements périnéphrétiques-shunt pulmonaire] ¬ Syndrome *D47.2*

Temple
v./v.a. Houlston-Ironton-Temple
- ¬ Syndrome de *Q87.1*

Temple-Baraitser ¬ Syndrome de *Q87.0*

Temporaire
- Persistantes] ¬ Rétention dentaire [dents *K00.6*
- Seuil auditif ¬ Modification *H93.2*
- ¬ Chute prématurée des dents *K00.6*

Temporal
v./v.a. Lobe temporal
- Droite ¬ Démence fronto-temporale, variante d'atrophie *G31.01†, F02.0**
- Écaille temporale ¬ Os: *S02.0*
- EEG ¬ Épilepsie bénigne de l'enfance avec pointes centro- *G40.08*
- Exclusion de l'écaille temporale ¬ *S02.1*
- Familiale ¬ Épilepsie *G40.2*
- Juvénile ¬ Artérite *L95.8*
- Mésiale
  - - Familiale
    - - - Bénigne ¬ Épilepsie *G40.2*
    - - - Convulsions fébriles ¬ Épilepsie *G40.2*
  - - Infantile avec régression cognitive sévère ¬ Épilepsie *G40.2*
- Papille optique ¬ Pâleur *H47.2*
- ¬
  - - Artérite *M31.6*
  - - Lobe
    - - - *D33.0*
    - - - *D43.0*
  - - Os
    - - - *D16.41*
    - - - Temporal, écaille *S02.0*
  - - Ostéoblastome de l'os *D16.41*
  - - Région *T20*
  - - Sarcome de l'os *C41.01*

Temporal *–suite*
- ¬ *–suite*
  - - Syndrome auriculo- *G50.8*
  - - Temporal, à l'exclusion de l'écaille *S02.1*

Temporo-mandibulaire
v./v.a. Articulation temporo-mandibulaire
- ¬
  - - Ankylose congénitale *K07.6*
  - - Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la joue et de la région *S01.49*
  - - Présence d'une prothèse *Z96.68*

Temps
- Coagulation prolongé ¬ *R79.8*
- Thromboplastine prolongé ¬ *R79.8*

Temtamy ¬ Syndrome de brachydactylie préaxiale de *Q87.2*

Temtamy-Shalash ¬ Syndrome de *Q87.8*

Tendance
- Chute
  - - Due à d'autres affections peu claires ¬ *R29.6*
  - - Personne âgée ¬ *R29.6*
- Pathologique
  - - Allumer des incendies [pyromanie] ¬ *F63.1*
  - - Commettre des vols [kleptomanie] ¬ *F63.2*
- Suicidaires ¬ Idées [*R45.8*

Tendineux
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture des cordages *I23.4*
- Gaine) ¬ Autres rétractions *M67.1*
- Nodulaire ¬ Lésion *M65.3*
- Non classée ailleurs ¬ Rupture des cordages *I51.1*
- ¬
  - - Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: persistance des réflexes *G11.1*
  - - Présence d'autres implants osseux et *Z96.7*

Tendinite
- Calcifiante
  - - Épaule ¬ *M75.3*
  - - ¬ *M65.2*
- Gonorrhéique ¬ *A54.41†, M68.09**
- Insertion ¬ *M77.9*
- Muscle biceps brachial ¬ *M75.2*
- Péronière ¬ *M76.7*
- Psoas ¬ *M76.1*
- Région fessière ¬ *M76.0*
- Rotulienne ¬ *M76.5*
- SAI ¬ *M77.9*
- Tendon d'Achille ¬ *M76.6*
- Tibiale postérieure ¬ *M76.8*
- Trochantérienne ¬ *M70.6*

Tendon
- Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S39.0*

Tendon *–suite*
- Achille ¬
  - - Brièveté du *M67.0*
  - - Bursite du *M76.6*
  - - Lésion traumatique du *S86.0*
  - - Tendinite du *M76.6*
- Adducteurs de la cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.2*
- Chef long du biceps brachial ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S46.1*
- Coiffe des rotateurs ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S46.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres atteintes de la synoviale et du *M68.8**
- Extenseur
  - - Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S56.3*
  - - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S66.3*
  - - Niveau
    - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre *S56.5*
    - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et *S66.7*
  - - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S66.2*
  - - S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S56.4*
  - - ¬ Déchirure spontanée des *M66.2*
- Fléchisseur
  - - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S66.1*
  - - Niveau
    - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre *S56.2*
    - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et *S66.6*
  - - Pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S56.0*
  - - S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S56.1*
  - - ¬ Déchirure spontanée des *M66.3*
- Gaine ¬
  - - *C49*
  - - *D21*
- Hanche ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.0*
- Intrinsèque
  - - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S66.5*
  - - Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S96.2*
  - - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S66.4*
- Long

Tendon *–suite*
- Long *–suite*
- - Extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S96.1*
- - Fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S96.0*
- Longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S66.0*
- Membre
- - Inférieur ¬ Séquelles de lésion traumatique de muscles et de *T93.5*
- - Supérieur ¬ Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de *T92.5*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et *S56.7*
- - Cheville pied ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et *S96.7*
- - - Muscles et *S96.8*
- - Cou ¬ Lésion traumatique des muscles et des *S16*
- - Épaule bras ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et *S46.7*
- - - Muscles et *S46.8*
- - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et *S76.7*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et *S86.7*
- - - Muscles et *S86.8*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'autres muscles et *S66.8*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique des muscles et des *S29.0*
- Non précisés
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *T13.5*
- - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *T11.5*
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S56.8*
- - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S96.9*
- - - Cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.4*
- - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique de muscle et de *S46.9*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S86.9*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S66.9*
- - Tronc ¬ Lésion traumatique de muscle et de *T09.5*
- Partie du corps non précisée ¬ Lésion traumatique de muscles et de *T14.6*
- Parties du biceps brachial ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S46.2*

Tendon *–suite*
- Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques de muscles et de *T06.4*
- Postérieurs au niveau de la cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.3*
- Quadriceps ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.1*
- S
- - Antérieurs au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de muscle(s) et de *S86.2*
- - Péroniers au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de muscle(s) et de *S86.3*
- - Postérieurs au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et *S86.1*
- Sans précision ¬
- - Atteinte de la synoviale et du *M67.9*
- - Déchirure spontanée d'un *M66.5*
- Tête ¬ Lésion traumatique des muscles et des *S09.1*
- Triceps ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S46.3*
- ¬
- - Abcès de la gaine du *M65.0*
- - Absence de: *Q79.8*
- - Atteintes précisées de la synoviale et du *M67.8*
- - Brièveté congénitale d'un *Q79.8*
- - Déchirure spontanée d'autres *M66.4*
- - Syphilis tardive d'un *A52.7†, M68.09**

Ténesme
- Rectal ¬ *R19.88*
- Vésical ¬ *R30.1*
- ¬ *R19.88*

Teneur en oxygène de l'air ambiant ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible *T71*

Tennis elbow ¬ *M77.1*

Téno)synovites infectieuses ¬ Autres (*M65.1*

Ténonite ¬ *H05.0*

Ténosynoviale Cellule géante
- Articulation
- - Cheville ¬ Tumeur *M12.27*
- - Coude ¬ Tumeur *M12.22*
- - Genou ¬ Tumeur *M12.26*
- - Hanche ¬ Tumeur *M12.25*
- Articulation de l'épaule ¬ Tumeur *M12.21*
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ Tumeur *M12.28*
- Main ¬ Tumeur *M12.24*

Ténosynovite
- Chronique sténosante du pouce [de Quervain] ¬ *M65.4*
- Cours
- - Maladies bactériennes classées ailleurs ¬ Synovite et *M68.0**
- - Syphilis ¬ *A52.7†, M68.09**
- - Syphilis tardive ¬ *A52.7†, M68.09**
- Gonocoques ¬ *A54.4†, M68.09**

Ténosynovite *–suite*
- Gonorrhéique ¬ *A54.4†, M68.09**
- Sans précision ¬ Synovite et *M65.9*
- Sèche de la main et du poignet ¬ *M70.0*
- Tuberculeuse
- - Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - ¬ *A18.0†, M68.09**
- ¬ Autres synovites et *M65.8*

Tension
- Artériel
- - Élevée ¬ *I10*
- - Sans diagnostic d'hypertension ¬ Constatation d'une élévation de la *R03.0*
- - ¬
- - - Constatation d'une baisse non spécifique de la *R03.1*
- - - Mesure de la *Z01.3*
- Épisodique ¬ Céphalée (de): *G44.2*
- Nerveuse ¬ *R45.0*
- Prémenstruelle ¬ Syndrome de *N94.3*
- SAI ¬ Céphalée (de): *G44.2*
- Sans précision ¬ État de choc émotionnel et *R45.7*
- ¬
- - Céphalée
- - - Chronique dite de *G44.2*
- - - Dite de *G44.2*
- - Glaucome à basse *H40.18*
- - Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de *R46.6*
- - Rétention urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans *T83.8*

Tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ¬ Rétention urinaire postopératoire post-TVT [*T83.8*

Tentative
- Avortement
- - Médical
- - - Complications autres et non précisées ¬ Échec d'une *O07.3*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ Échec d'une *O07.2*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Échec d'une *O07.1*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Échec d'une *O07.0*
- - - SAI ¬ Échec d'une *O07.4*
- - - Sans complication ¬ Échec d'une *O07.4*
- - SAI ¬ Échec d'une *O07.9*
- - Sans précision
- - - Complications autres et non précisées ¬ Échecs d'une *O07.8*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ Échecs d'une *O07.7*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Échecs d'une *O07.6*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Échecs d'une *O07.5*

Tentative *–suite*
- Avortement *–suite*
- - Sans précision *–suite*
- - - Sans complication ¬ Échecs d'une *O07.9*
- Implantation
- - Embryon en cas de transfert d'embryon ¬ Complications de *N98.3*
- - Œuf fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de *N98.2*
- Suicide ¬ *Z91.8*
- ¬ Suicide (*X84.9!*

Tente
- Cervelet due à un traumatisme obstétrical ¬ Déchirure de la *P10.4*
- ¬ Méningiome de la *D32.0*

Ter Haar
v./v.a. Frank-Ter Haar

Tératogènes de substances transmises par voie placentaire ¬ effets non *P04*

Tératoïde
- Atypique
- - Cerveau ¬ Tumeur rhabdoïde *C71.0*
- - Cervelet ¬ Tumeur rhabdoïde *C71.6*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ Tumeur rhabdoïde *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ Tumeur rhabdoïde *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ Tumeur rhabdoïde *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ Tumeur rhabdoïde *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ Tumeur rhabdoïde *C71.2*
- - Tronc cérébral ¬ Tumeur rhabdoïde *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ Tumeur rhabdoïde *C71.5*
- - ¬ ATRT [Tumeur rhabdoïde *C72.9*
- Cours de syndrome de prédisposition aux tumeurs rhabdoïdes ¬ Tumeur rhabdoïde- *C80.9*

Tératome
- Amygdale ¬ *D37.0*
- Bénin
- - Cerveau ¬ *D33.2*
- - Système nerveux central ¬ *D33.9*
- Cavité crânienne ¬ *D48.0*
- Crâne ¬ *D48.0*
- Croissant ¬ Syndrome du *D48.9*
- Embryonnaire ovarien malin immature ¬ *C56*
- Épignathe ¬ *Q89.4*
- Épiphyse ¬ *C40.9*
- Extragonadique ¬ *D48.9*
- Hépatique
- - Mature adulte bénin ¬ *D13.4*
- - ¬ *C22.7*
- Hypophyse ¬ *D44.3*
- Malin
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Encéphale ¬ *C71.0*
- - Géantes de l'encéphale ¬ *C71.9*

Tératome *–suite*
- Malin *–suite*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Nasopharynx à localisations contiguës ¬ *C11.8*
- - Ovaire ¬ *C56*
- - Paroi
- - - Antérieure du rhinopharynx ¬ *C11.3*
- - - Latérale du rhinopharynx ¬ *C11.2*
- - - Postérieure du rhinopharynx ¬ *C11.1*
- - - Supérieure du rhinopharynx ¬ *C11.0*
- - Système nerveux central ¬ *C72.9*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- Nasopharyngé
- - Bénin ¬ *D10.6*
- - Malin ¬ *C11.9*
- - ¬ *D37.0*
- Palatin ¬ *D37.0*
- Péritoine ¬ *D48.4*
- Pharynx ¬ *D37.0*
- Poumon ¬ *D38.1*
- Sacro-coccygien
- - Bénin ¬ *D16.8*
- - Fœtus
- - - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- - - ¬ Dystocie due à: *O66.3*
- - ¬
- - - *C41.4*
- - - *D48.0*
- Système nerveux central ¬ *D43.9*
- Testiculaire
- - Adulte bénin à cellules matures ¬ *D29.2*
- - Bénin ¬ *D29.2*
- - Nature indéterminée ¬ *D40.1*
- Testicule
- - Dystopique ¬ *C62.0*
- - Mal descendu ¬ *C62.0*
- - Scrotal ¬ *C62.1*
- Thyroïde ¬ *D44.0*
- ¬ *D48.9*

Tératozoospermie ¬ Infertilité masculine monogénique avec *N46*

Terminal
- Cône ¬ Lipome spinal extramédullaire *Q76.0*
- ¬
- - Lipome du filum *Q76.0*
- - Myélocystocèle *Q76.0*

Terminale
- Défauts de pigmentation ¬ Syndrome de dysplasie osseuse *Q87.2*

Terminale *–suite*
- Externe du nerf tibial antérieur ¬ Branche *S94.2*
- ¬
- - Atrophie rénale (*N26*
- - Iléite: *K50.0*
- - Insuffisance rénale *N18.5*
- - Syndrome de délétion 6q *Q93.5*

Ternidens
- Deminutus ¬ Infestation par: *B81.8*
- Diminutus [ternidensiase] ¬ Infection par: *B81.8*

Ternidensiase] ¬ Infection par: Ternidens diminutus [*B81.8*

Terreur
- Nocturnes ¬ *F51.4*
- ¬ Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de *G40.02*

Terrien ¬ Dégénérescence marginale de *H18.4*

Terrifiante pendant l'enfance ¬ Expérience personnelle *Z61*

Territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux ¬ Accident ischémique transitoire de *G45.2*

Terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du *F62.0*

Terroristes ou de tortures ¬ Victime d'un crime, d'actes *Z65*

Tertiaire ¬
- Aphasie
- - Cours de syphilis *A52.1†, G94.8**
- - Syphilitique *A52.1†, G94.8**
- Hyperparathyroïdie *E21.2*
- Rupia *A52.7†, L99.8**
- Syphilis cardiovasculaire *A52.0†, I98.0**

Tessier ¬ Fente facial
- 4 de *Q18.8*
- 5 de *Q18.8*
- 6 de *Q18.8*

Test
- Allergie ¬ *Z01.5*
- Coombs ¬ Résultat positif au *R76.88*
- COVID-19 négatif ¬ *Z03.8*
- Cutané
- - Diagnostic et de sensibilisation ¬ *Z01.5*
- - Recherche
- - - Hypersensibilité ¬ *Z01.5*
- - - Maladie bactérienne ¬ *Z01.5*
- Grossesse ¬ Examen et *Z32*
- Laboratoire
- - Négatif ¬ COVID-19 exclu par un *Z03.8*
- - ¬ COVID-19 identifié par un *U07.1!*
- Lyse positif dans un sérum acidifié ¬ Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec *D64.4*
- Mantoux ¬ Résultats anormaux au *R76.1*

Test *–suite*
- Recherche du VIH chez les nourrissons ¬ Résultat non concluant du *R75*
- Sérologique de la syphilis ¬ Résultats faussement positifs au *R76.2*
- Tuberculine ¬ Réaction anormale au *R76.1*
- Vue d'une procréation ¬ Recherches et *Z31.4*

Test des 2 questions de Whooley
- 0 point ¬ *U54.04*
- 1 point ou plus ¬ *U54.14*

Testiculaire
- Actes médicaux ¬ Hypofonctionnement *E89.5*
- Adulte bénin à cellules matures ¬ Tératome *D29.2*
- Bénin ¬ Tératome *D29.2*
- Cause non traumatique ¬ Lésion *E29.9*
- Cordons sexuels et du stroma ¬ Tumeur *C62.9*
- Développement sexuel 46,XX ¬ Anomalie *Q99.1*
- Nature indéterminée ¬ Tératome *D40.1*
- SAI ¬
- - Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène *E29.1*
- - Hypogonadisme *E29.1*
- Sans précision ¬ Dysfonction *E29.9*
- Syndrome) ¬ Féminisation *E34.51*
- Unilatérale ou bilatérale ¬ Ectopie *Q53.0*
- ¬
- - Anomalie du développement sexuel 46,XY par déficit en 17,20-desmolase *E29.1*
- - Dysfonctions *E29.8*
- - Hyperfonction *E29.0*
- - Hypersécrétion d'hormones *E29.0*
- - Hypofonction *E29.1*
- - Mésothéliome *C62.9*
- - Séminome *C62.9*
- - Syndrome de régression *Q55.0*

Testicule
- Canal déférent ¬ Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du *N49.1*
- Descendu ¬
- - Carcinome embryonnaire d'un *C62.1*
- - Polyembryome d'un *C62.1*
- - Séminome
- - - *C62.1*
- - - Spermatocytaire d'un *C62.1*
- - Tumeur du sac vitellin d'un *C62.1*
- - Tumeur germinale mixte d'un *C62.1*
- - Tumeur maligne: *C62.1*
- Dystopique ¬
- - Tératome d'un *C62.0*
- - Tumeur germinale non séminomateuse d'un *C62.0*
- - Tumeur stromale des cordons sexuels d'un *C62.0*

Testicule *–suite*
- Ectopique [siège de la tumeur] ¬ *C62.0*
- Épididyme au cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections du *N51.1**
- Mal descendu ¬ Tératome d'un *C62.0*
- Non descendu ¬
- - Carcinome embryonnaire d'un *C62.0*
- - Polyembryome d'un *C62.0*
- - Séminome
- - - *C62.0*
- - - Spermatocytaire d'un *C62.0*
- - Tumeur du sac vitellin d'un *C62.0*
- - Tumeur germinale mixte d'un *C62.0*
- Retenu [siège de la tumeur] ¬ *C62.0*
- Rétractile ¬ *Q55.2*
- S scrotum
- - SAI ¬ Malformation congénitale du (des) *Q55.2*
- - ¬
- - - Hypoplasie du (des) *Q55.1*
- - - Malformations congénitales du (des) *Q55.2*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C62.9*
- Sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du *N50.8*
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du *N50.8*
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du *N50.8*
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du *N50.8*
- Scrotal ¬
- - *C62.1*
- - Tératome d'un *C62.1*
- - Tumeur germinale non séminomateuse d'un *C62.1*
- - Tumeur stromale des cordons sexuels d'un *C62.1*
- Situation anormale ¬ *Q53.0*
- Tunique) vaginale ¬ hydrocèle du cordon spermatique, du *N43*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Abcès de l'épididyme ou du *N45.0*
- - Abcès tuberculeux du *A18.1†, N51.1**
- - Absence acquise du *Z90.7*
- - Absence et aplasie du *Q55.0*
- - Atrophie du *N50.0*
- - Carcinome embryonnaire du *C62.9*
- - Éléphantiasis du *I89.05*
- - Fibrose syphilitique chronique du *A52.7†, N51.1**
- - Fongus bénin du *A18.1†, N51.8**
- - Fusion des *Q55.1*
- - Migration du *Q55.2*
- - Plaie ouverte du scrotum et des *S31.3*

Testicule *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome de mort subite du nourrisson-dysgénésie des *R95.9, Q55.2*
- - Syphilis du *A52.7†, N51.1**
- - Torsion
- - - *N44.0*
- - - *N44.0*
- - Tuberculose des *A18.1†, N51.1**
- - Tumeur bénigne: *D29.2*
- - Tumeur ectopique sécrétrice d'aldostérone du *D40.1, E26.0*
- - Tumeur germinale
- - - Mixte du *C62.9*
- - - Non séminomateuse des *C62.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D40.1*

TET2 ¬ Maladie lymphoprolifération associée à l'EBV [virus Epstein-Barr] par déficit en *D82.3*

Tétanie
- Néonatale
- - SAI ¬ *P71.3*
- - Sans carence en calcium ou magnésium ¬ *P71.3*
- Parathyréoprive ¬ *E89.2*
- Parathyroïdienne ¬ *E20.9*
- Pendant la grossesse ¬ *A34*
- ¬
- - *R29.0*
- - Syndrome axial de *R29.0*

Tétaniques ¬ Contractions: *O62.4*

Tétanos
- Accouchement ¬ *A34*
- Céphalique ¬ *A35*
- Convulsions ¬ *A35*
- Coqueluche
- - DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie- *Z27.1*
- - Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie- *Z27.3*
- - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie- *Z27.2*
- Cours
- - Avortement ¬ *A34*
- - Omphalite ¬ *A33*
- Néonatal ¬ *A33*
- Poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le *Z27.8*
- Puerpéral ¬ *A34*
- Seul ¬ Nécessité d'une vaccination contre le *Z23.5*
- ¬
- - *A35*
- - Formes de *A35*
- - Infection par *A35*

Tête
- Associée à une lésion intracrânienne ¬ Plaie ouverte (toute partie de la *S01.83!*
- Cou
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure de la *T20.20*
- - - Corrosion de la *T20.60*
- - Degré
- - - 2a ¬
- - - - Brûlure de la *T20.20*
- - - - Corrosion de la *T20.60*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure de la *T20.21*
- - - - Corrosion de la *T20.61*
- - - Non précisé ¬
- - - - Brûlure de la *T20.0*
- - - - Corrosion de la *T20.4*
- - Paroi thoracique région génitale ¬
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - Sans précision ¬ Gelure de la *T35.2*
- - ¬
- - - Absence acquise d'une partie de la *Z90.0*
- - - Brûlure
- - - - Premier degré de la *T20.1*
- - - - Troisième degré de la *T20.3*
- - - Corrosion du premier degré de la *T20.5*
- - - Corrosion du troisième degré de la *T20.7*
- - - Dislocations multiples au niveau de la *T03.0*
- - - Lymphadénite aiguë de la face, de la *L04.0*
- - - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.00*
- - - Œil avec d'autres parties de la face, de la *T20*
- - - Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la *T95.0*
- - - Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la *Z42.0*
- Cubitus ¬
- - *S52.8*
- - Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la *S52.31*
- Dus à l'histamine ¬ Maux de *G44.0*
- Écrasement du cou ¬ Écrasement de la *T04.0*
- Face cou ¬
- - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la *D21.0*
- - Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la *D17.0*
- - Tumeur maligne
- - - *C76.0*

Tête *–suite*
- Face cou ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne *–suite*
- - - Ganglions lymphatiques de la *C77.0*
- - - Nerfs périphériques de la *C47.0*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous de la *C49.0*
- Fémoral
- - Coxa vara retrosa) (non traumatique) ¬ Épiphysiolyse de la *M93.0*
- - Médiale] ¬ Maladie d'Ahlbäck [ostéonécrose aseptique de la *M87.05*
- - ¬ Nécrose avasculaire familiale de la *M87.85*
- Fémur
- - Legg-Calvé-Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la *M91.1*
- - SAI ¬ *S72.08*
- - Type Meyer ¬ Dysplasie de la *Q78.8*
- - ¬
- - - Nécrose avasculaire, secondaire, non traumatique de la *M87.35*
- - - Nécrose médicamenteuse avasculaire, secondaire, non traumatique de la *M87.15*
- Fœtus ¬ Dystocie due à une rotation incomplète de la *O64.0*
- Fractures cou ¬ Fractures multiples
- - Fermées de la *T02.00*
- - Ouvertes de la *T02.01*
- Haute à terme ¬ Soins maternels pour *O32.4*
- Humérale ¬ Fracture de deux à quatre fragments de la *S42.21*
- Humérus [Haas] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.0*
- Lésions traumatiques superficielles du cou ¬ Lésions traumatiques superficielles de la *T00.0*
- Luxations, entorses et foulures du cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la *T03.0*
- Métacarpiennes [Mauclaire] ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): *M92.2*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.0*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la *S09.0*
- - Classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la *R93.0*
- - Précisée ¬ Amputation traumatique d'une partie de la *S08.9*
- Oiseau type Montréal ¬ Nanisme à *Q87.1*
- Pancréas
- - Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome de la *C25.0*
- - ¬
- - - Blastome de la *C25.0*
- - - Carcinome
- - - - Familial de la *C25.0*
- - - - Pseudo-papillaire et solide de la *C25.0*

Tête *–suite*
- Pancréas *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Carcinome à cellules acineuses de la *C25.0*
- - - Carcinome épidermoïde de la *C25.0*
- - - Carcinome indifférencié à cellules géantes de type ostéoclastique de la *C25.0*
- - - Cystadénocarcinome
- - - - Mucineux de la *C25.0*
- - - - Séreux de la *C25.0*
- - - Néoplasme neuroendocrine-non neuroendocrine mixte de la *C25.0*
- Partie non précisée ¬
- - Blessure superficielle de la *S00.9*
- - Écrasement de la *S07.9*
- - Plaie ouverte de la *S01.9*
- Plaies ouvertes du cou ¬ Plaies ouvertes de la *T01.0*
- Radial
- - Brailsford] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.1*
- - ¬
- - - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.02*
- - - Dislocation congénitale de la *Q68.8*
- - - Luxation de la *S53.0*
- - - Présence d'une prothèse de *Z96.62*
- Radius ¬ Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la *S52.21*
- SAI ¬ Plaie ouverte de la *S01*
- Sans précision ¬
- - Lésion traumatique de la *S09.9*
- - Séquelles de lésion traumatique de la *T90.9*
- Toute partie face ¬
- - *L02.8*
- - *L03.8*
- ¬
- - *S82.1*
- - *S82.41*
- - Accouchement spontané avec présentation en *O80*
- - Amputation traumatique d'autres parties de la *S08.8*
- - Blessure
- - - Superficielle d'autres parties de la *S00.8*
- - - Superficielles multiples de la *S00.7*
- - Carcinome pilomatriciel de la *C44.4*
- - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des tissus mous de la *C49.0*
- - Déformations acquises de la *M95.2*
- - Écrasement d'autres parties de la *S07.8*
- - Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la *S03.5*
- - Fibromatose hyaline juvénile de la *M72.88*

Tête *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fibrome chondromyxoïde de la *D16.41*
- - Fibromyxosarcome des tissus mous de la *C49.0*
- - Fibrosarcome de la *C49.0*
- - Fracture
- - - Extrémité supérieure
- - - - Humérus: *S42.21*
- - - - Radius: *S52.11*
- - - Os du métacarpe: *S62.34*
- - - Premier métacarpien: *S62.24*
- - Gelure superficielle de la *T33.0*
- - Hémangioendothéliome
- - - Épithélioïde des tissus mous de la *C49.0*
- - - Kaposiforme de la *C49.0*
- - Lésion
- - - Tissu mou stade
- - - - I lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation de la *S01.84!*
- - - - - Ouverte ou de luxation de la *S01.87!*
- - - - II lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation de la *S01.85!*
- - - - - Ouverte ou de luxation de la *S01.88!*
- - - - III lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation de la *S01.86!*
- - - - - Ouverte ou de luxation de la *S01.89!*
- - - Traumatique
- - - - Muscles et des tendons de la *S09.1*
- - - - Pancréas: *S36.21*
- - Lésions traumatiques
- - - Multiples de la *S09.7*
- - - Précisées de la *S09.8*
- - Liposarcome bien différencié des tissus mous de la *C49.0*
- - Liposarcome dédifférencié des tissus mous de la *C49.0*
- - Liposarcome des tissus mous de la *C49.0*
- - Liposarcome myxoïde des tissus mous de la *C49.0*
- - Liposarcome pléiomorphe des tissus mous de la *C49.0*
- - Luxation de parties autres et non précisées de la *S03.3*
- - Maladie de Kimura des tissus mous de la *D21.0*
- - Mouvements anormaux de la *R25.0*
- - Myopéricytome bénin de la *D21.0*
- - Myosite focale, *M60.88*
- - Non-engagement de la *O32.4*
- - Plaie ouverte
- - - *S01.9*
- - - Multiples de la *S01.7*
- - - Non précisée d'autres parties de la *S01.80*
- - Rhabdomyosarcome
- - - Alvéolaire des tissus mous de la *C49.0*

Tête *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Rhabdomyosarcome *–suite*
- - - Embryonnaire des tissus mous de la *C49.0*
- - - Pléomorphe des tissus mous de la *C49.0*
- - - Tissus mous de la *C49.0*
- - Sarcome alvéolaire des tissus mous de la *C49.0*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des tissus mous de la *C49.0*
- - Sarcome des tissus mous de la *C49.0*
- - Sarcome épithélioïde des tissus mous de la *C49.0*
- - Sarcome synovial des tissus mous de la *C49.0*
- - Schwannome malin des nerfs de la *C47.0*
- - Séborrhée de la *L21.0*
- - Séquelle
- - - Lésion traumatique superficielle de la *T90.0*
- - - Lésions traumatiques précisées de la *T90.8*
- - - Plaie ouverte de la *T90.1*
- - Syndrome de Brooke-Spiegler de la peau de la *D23.4*
- - Syringocystadénome papillifère de la peau de la *D23.4*
- - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la *R22.0*
- - Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des tissus mous de la *C49.0*
- - Tumeur rhabdoïde
- - - Nerfs de la *C47.0*
- - - Tissus mous de la *C49.0*
- - Tumeur triton maligne des nerfs de la *C47.0*

Tête tombante idiopathique ¬ Syndrome de la *G72.88*

Tétra X ¬ *Q97.1*

Tétra-amélie ¬ *Q73.0*

Tétrachloréthylène ¬ Effet toxique: *T53.3*

Tétrachloroéthène ¬ *T53.3*

Tétrachlorométhane ¬ *T53.0*

Tétrachlorure de carbone ¬ Effet toxique: *T53.0*

Tétracyclines ¬ Intoxication: *T36.4*

Tétracycliques ¬
- Hypersensibilité aux antidépresseurs *T88.7*
- Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et *T43.0*

Tétrahydrobioptérine ¬
- Déficit en *E88.8*
- Hyperphénylalaninémie par déficit en *E70.1*

Tétrahydrofolate réductase ¬ Homocystinurie due à un déficit en méthylène *E72.1*

Tétralogie Fallot
- Absence du canal artériel ¬ Syndrome d'agénésie de la valve pulmonaire- *Q24.8, Q25.8*
- ¬ Atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire au cours de *Q21.3*

Tétramélique ¬ Oligodactylie post-axiale *Q73.8*

Tétraparésie
- Flasque paraplégie incomplète
- - Aiguë d'origine non traumatique ¬ *G82.31*
- - Chronique ¬ *G82.33*
- Paraplégie incomplète
- - Aiguë d'origine non traumatique ¬ *G82.51*
- - Chronique ¬ *G82.53*
- Spastique paraplégie incomplète
- - Aiguë d'origine non traumatique ¬ *G82.41*
- - Chronique ¬ *G82.43*

Tétraplégie
- Chronique ¬ *G82*
- Cours de paralysie cérébrale spastique ¬ *G80.0*
- Embolique en tant qu'événement en cours ¬ *I63.4, G82.52*
- Flasque paraplégie complète
- - Aiguë d'origine non traumatique ¬ *G82.30*
- - Chronique ¬ *G82.32*
- Paraplégie ¬ Myosite ossifiante liée à une *M61.2*
- Paraplégie complète
- - Aiguë d'origine non traumatique ¬ *G82.50*
- - Chronique ¬ *G82.52*
- Spastique
- - Corps calleux fin-microcéphalie post-natale progressive ¬ Syndrome *Q02*
- - Déficience intellectuelle
- - - Rétinite pigmentaire ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - - ¬ Syndrome de surdité neurosensorielle- *Q87.8*
- - Héréditaire ¬ *G80.0*
- - Paraplégie complète
- - - Aiguë d'origine non traumatique ¬ *G82.40*
- - - Chronique ¬ *G82.42*
- - ¬ Syndrome d'ichtyose congénitale-déficience intellectuelle- *Q87.8*
- Thrombotique en tant qu'événement en cours ¬ *I63.3, G82.52*
- ¬ Syndrome d'ichtyose congénitale-microcéphalie- *Q87.8*

Tétraplégique congénitale (cérébrale) ¬ Paralysie spastique *G80.0*

Tétraploïdie ¬ *Q92.7*

Tétrasomie
- 5p ¬ *Q99.8*
- 9p ¬ *Q99.8*
- 11q24.1 ¬ *Q99.8*
- 12p

Tétrasomie *–suite*
- 12p *–suite*
- - Mosaïque ¬ *Q99.8*
- - ¬ *Q99.8*
- 16p12.1p12.3 ¬ *Q99.8*
- 18p ¬ *Q99.8*
- X ¬ *Q97.1*

Texas ¬ Maladie hémorragique de l'est du *D68.28*

TFCC
- Complexe fibrocartilagineux triangulaire] ¬ Rupture traumatique du *S63.3*
- ¬ Complexe fibrocartilagineux triangulaire [*S63.3*

TFG ¬ Maladie de Charcot-Marie-Tooth autosomique dominante type 2 due à une mutation de *G60.0*

TFR2 ¬ Hémochromatose liée à *E83.1*

TFRC ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

T-gamma ¬ Maladie lymphoprolifération de type *D47.9*

Thakker-Donnai ¬ Syndrome de *Q87.8*

Thalamiques symétriques ¬ Calcifications *G93.88*

Thalamus ¬
- Astrocytome du *C71.0*
- Germinome du *C71.0*

Thalassémie
v./v.a. Alpha-thalassémie
v./v.a. Bêta-thalassémie
- Bêta) mineure ¬ *D56.3*
- Intermédiaire moyenne ¬ *D56.1*
- Majeure ¬ *D56.1*
- Mixte) (avec autre hémoglobinopathie) (sans précision) ¬ *D56.9*
- Rétinopathie ¬ *D56.9†, H36.8**
- Sans précision ¬ *D56.9*
- ¬
- - *D56.8*
- - Arthrite au cours de *D56.9†, M36.3**

Thalassemie à hématies falciformes ¬ Béta- *D57.2*

Thalassémique ¬ Trait *D56.3*

Thalidomide ¬ Embryopathie due à la *Q86.80*

Thallium ¬ *T56.8*

Thanatophore ¬
- Insuffisance staturale *Q77.1*
- Nanisme *Q77.1*
- TD [Dysplasie *Q77.1*

Thauvin-Robinet-Faivre ¬ Syndrome de *Q87.3*

Thélarche prématurée ¬ *E30.8*

Thélaziose ¬ *B83.8*

Thermophiles ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes *J67.70*

Thermoplégie ¬ *T67.0*

Thermosensible
- Héréditaire ¬ Neuropathie *G60.0*

Thermosensible *–suite*
- ¬ Albinisme oculo-cutané type 1 *E70.3*

Thésaurismose
- Cystinique ¬ *E72.0†, N29.8**
- Gangliosides ¬ *E75.1*
- Phosphatides ¬ *E75.2*

Thiamine
- Diabète sucré-surdité de perception ¬ Syndrome d'anémie mégaloblastique sensible à la *Q87.8*
- Pyrophosphokinase ¬ Encéphalopathie de l'enfant par déficit en *E51.8†, G94.30**
- Sans précision ¬ Carence en *E51.9*
- ¬
- - Encéphalopathie sensible à la *E51.2, G40.9*
- - Maladie des urines sirop d'érable, forme sensible à la *E71.0*
- - Manifestations de la carence en *E51.8*

Thiel-Behnke ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*

Thiemann ¬ Maladie de *M92.3*

Thies-Reis ¬ Syndrome de *H74.3*

Thiobarbituriques ¬
- *T41.1*
- Intoxication aux *T41.1*

Thiolase
- Mitochondriale ¬ Déficit en acétoacétyl-CoA *E71.1*
- ¬
- - Carence en 3-oxo *E71.1*
- - Déficit en alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA *E71.1*

Thiopurine méthyltransférase) ¬ Déficit congénital en TPMT (*E88.8*

Thiourée ¬ Hypersensibilité à la *T78.4*

Thioxanthène ¬ Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et *T43.4*

Thiry
v./v.a. Fryns-Smeets-Thiry

THOC6 ¬ Syndrome de retard de développement-microcéphalie-dysmorphie faciale associé à *Q87.0*

Thomas ¬
- Atrophie de Déjerine- *G23.3*
- Syndrome de *Q87.8*

Thomas-Jewtt-Raines ¬ Syndrome de *Q87.8*

Thompson
v./v.a. Hunter-Jurenka-Thompson
v./v.a. Hunter-Thompson

Thomsen
v./v.a. Rasmussen-Johnsen-Thomsen
- ¬
- - Myotonie: congénitale: dominante [*G71.1*
- - Syndrome de *G71.1*

Thomson
v./v.a. Rothmund-Thomson

Thong-Douglas-Ferrante ¬ Syndrome de *Q87.1*

Thoracique
v./v.a. Aorte thoracique

Thoracique *–suite*
- Antérieure
- - SAI ¬ Douleur de la paroi *R07.3*
- - ¬
- - - Décollement sous-cutané de la paroi *S20.36*
- - - Lésions traumatiques superficielles de la paroi *S20.3*
- - - Plaie ouverte de la paroi *S21.1*
- Asphyxiante ¬ Dystrophie *Q77.2*
- Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Tuberculose *A15.9*
- Fistule ¬ Abcès *J86.09*
- Hydrocéphalie ¬
- - Spina bifida *Q05.1*
- - Syndrome de dysplasie *Q87.8*
- Ischémique ¬ Douleur *I20.9*
- Larynx ¬ Trachée *S11.01*
- Lésion de la moelle épinière ¬ Fracture des vertèbres *S22.00, S24.10*
- Musculosquelettiques ¬ Douleurs *R07.3*
- Non classées ailleurs ¬ Affections radiculaires *G54.3*
- Noyau gélatineux avec radiculopathie ¬ Hernie *M51.1†, G55.1**
- Ouverte sans précision ¬ Plaie *S21*
- Postérieure ¬
- - Décollement sous-cutané de la paroi *S20.46*
- - Lésions traumatiques superficielles de la paroi *S20.4*
- - Plaie ouverte de la paroi *S21.2*
- Radiculopathie ¬ Dégénérescence des disques intervertébraux *M51.1†, G55.1**
- Région génitale ¬ Tête cou paroi
- - *I89.03*
- - *I89.04*
- - *I89.05*
- - *Q82.03*
- - *Q82.04*
- - *Q82.05*
- Respiratoire ¬ Douleur *R07.1*
- Rompu ¬ Anévrisme aortique *I71.1*
- S ¬
- - Frottements *R09.8*
- - Percussion anormale *R09.8*
- - Tympanisme *R09.8*
- SAI ¬
- - *C76.1*
- - Anomalie morphologique congénitale de la paroi *Q67.8*
- - Paroi
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- Sans
- - Hydrocéphalie ¬ Spina bifida
- - - *Q05.6*
- - - *Q05.6*

Thoracique *–suite*
- Sans *–suite*
- - Mention de rupture ¬ Anévrisme aortique *I71.2*
- - Myélopathie ou radiculopathie ¬ Spondylarthrose: *M47.8*
- - Précision ¬ Douleur *R07.4*
- Type glande salivaire ¬ Carcinome de l'œsophage *C15.1*
- ¬
- - Abcès
- - - *J86*
- - - Paroi *L02.2*
- - Carcinome indifférencié de l'œsophage *C15.1*
- - Cavité *T27.2*
- - Chondrosarcome d'une vertèbre *C41.2*
- - Contrôle radiographique *Z01.6*
- - Décollement sous-cutané de la paroi *S20.86*
- - Douleurs *R07.3*
- - Endométriose *N80.8*
- - Fistule
- - - *J86.09*
- - - Paroi *J86.02*
- - Ganglion: sympathique *S24.4*
- - Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive intervention chirurgicale
- - - *J95.1*
- - - Non *J95.2*
- - Lésion traumatique
- - - Organe structurel intrathoracique précisés
- - - - Canal *S27.82*
- - - - Œsophage, partie *S27.83*
- - - Trachée *S27.5*
- - Mélanome malin de la paroi *C43.59*
- - Myélocystocèle *Q05.6*
- - Myélopathie au cours de spondylarthrose *M47.14†, G99.2**
- - Néoplasie neuroendocrine de l'œsophage *C15.1*
- - Paroi
- - - *I97.88*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - Phlegmon de la paroi *L03.3*
- - Plaie ouverte
- - - Multiples de la paroi *S21.7*
- - - Œsophage *S27.83, S21.83!*
- - Pyothorax avec fistule de la paroi *J86.02*
- - Situs inversus ou transversus *Q89.3*
- - Spondylodiscite de corps vertébral *M46.44*
- - Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale *M96.80*
- - Thorax instable après intervention chirurgicale *M96.81*
- - Transposition des viscères *Q89.3*

Thoracique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Traumatisme *S29.9*
- - TSGI [Tumeur stromale gastro-intestinale] de l'œsophage *C15.1*
- - Tuberculose *A16.9*
- - Tumeur maligne: Œsophage *C15.1*

Thoraco-abdominal
v./v.a. Aorte thoraco-abdominale
- Rompu ¬ Anévrisme aortique *I71.5*
- Sans mention de rupture ¬ Anévrisme aortique *I71.6*
- ¬
- - Duplication entérique *Q43.49*
- - Fistule *J86.08*

Thoracobrachiale [TOS] ¬ Syndrome de traversée *G54.0*

Thoraco-lombaire du noyau gélatineux avec radiculopathie ¬ Hernie *M51.1†, G55.1**

Thoracomélique ¬ Dysplasie *Q77.8*

Thoracopages ¬ *Q89.4*

Thoracostomie ¬
- Existence d'une *Z93.80*
- Surveillance d'une *Z43.80*

Thorax
- Abdomen
- - Lombes bassin
- - - Sans précision ¬ Gelure du *T35.3*
- - - ¬ Lésions traumatiques superficielles du *T00.1*
- - Membre(s) ou du thorax, de la région lombosacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du *T04.7*
- - Thorax et de la région lombosacrée ou du thorax et du bassin ¬ Écrasement du *T04.1*
- Antérieure ¬ Abrasion du *S20.31*
- Bassin
- - Membre s ¬
- - - Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombosacrée et de(s) membres, ou du *T04.7*
- - - Fractures du thorax, de la région lombosacrée et de(s) membre(s), ou du *T02.7*
- - ¬
- - - Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombosacrée ou du *T04.1*
- - - Fractures multiples
- - - - Fermées
- - - - - *T02.10*
- - - - - Membre, du *T02.70*
- - - - Ouvertes
- - - - - *T02.11*
- - - - - Membre, du *T02.71*
- - - Luxations, entorses et foulures du thorax et de la région lombosacrée ou du *T03.1*

Thorax *–suite*
- Bassin *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Séquelles d'autres fractures du *T91.2*
- Carène congénital ¬ *Q67.7*
- Communiquant avec une lésion intrathoracique ¬ Plaie ouverte (n'importe quelle partie du *S21.83!*
- Côtes ¬ Déformation acquise du *M95.4*
- Entonnoir congénital ¬ *Q67.6*
- Instable après intervention chirurgicale thoracique ¬ *M96.81*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.2*
- Osseux
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale du *Q76.9*
- - ¬ Autres malformations congénitales du *Q76.8*
- Partie non précisée ¬
- - Fracture des os du *S22.9*
- - Plaie ouverte du *S21.9*
- Plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Plaies ouvertes du *T01.1*
- Postérieur ¬ Décollement sous-cutané du *S20.41*
- Région lombo-sacrée
- - Membre(s), ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Fractures du *T02.7*
- - Membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du *T04.7*
- - Thorax bassin ¬
- - - Écrasement du thorax et de l'abdomen, du *T04.1*
- - - Luxations, entorses et foulures du *T03.1*
- - ¬ Fractures multiples
- - - Fermées
- - - - *T02.10*
- - - - Membre, du *T02.70*
- - - Ouvertes
- - - - *T02.11*
- - - - Membre, du *T02.71*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique du *S29.9*
- SMARCA4-déficient ¬ Sarcome du *C49.3*
- ¬
- - Abrasion du *S20.81*
- - Amputation traumatique d'une partie du *S28.1*
- - Angiosarcome du *C49.3*
- - Anomalies morphologiques congénitales du *Q67.8*
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] du *C76.1*
- - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des tissus mous du *C49.3*
- - Contusion du *S20.2*
- - Dissection transversale de: *T05.8*
- - Écrasement du *S28.0*

Thorax *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S23.5*
- - Fibromyxosarcome des tissus mous du *C49.3*
- - Fibrosarcome du *C49.3*
- - Fracture ouverte du *S22.9, S21.87!*
- - Fractures d'autres parties des os du *S22.8*
- - Ganglioneuroblastome des nerfs du *C47.3*
- - Gelure superficielle du *T33.2*
- - Hémangioendothéliome kaposiforme du *C49.3*
- - Lésion
- - - Tissu mou stade
- - - - I lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation du *S21.84!*
- - - - - Ouverte ou de luxation du *S21.87!*
- - - - II lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation du *S21.85!*
- - - - - Ouverte ou de luxation du *S21.88!*
- - - - III lors fracture
- - - - - Fermée ou de luxation du *S21.86!*
- - - - - Ouverte ou de luxation du *S21.89!*
- - - Traumatique
- - - - Muscles et des tendons au niveau du *S29.0*
- - - - Nerf
- - - - - *S24.5*
- - - - - Non précisé du *S24.6*
- - - - Nerfs périphériques du *S24.3*
- - - - Nerfs sympathiques du *S24.4*
- - - - Superficielle de parties autres et non précisées du *S20.8*
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - - *S25.88*
- - - - - Épiduraux au niveau du *S25.80*
- - - - - Non précisé du *S25.9*
- - - - - Sous-arachnoïdiens au niveau du *S25.82*
- - - - - Sous-duraux au niveau du *S25.81*
- - Lésions traumatiques
- - - Multiples
- - - - *S29.7*
- - - - Vaisseaux sanguins du *S25.7*
- - - Précisées du *S29.88*
- - - Superficielles multiples du *S20.7*
- - Liposarcome bien différencié des tissus mous du *C49.3*
- - Liposarcome dédifférencié des tissus mous du *C49.3*
- - Liposarcome des tissus mous du *C49.3*
- - Liposarcome myxoïde des tissus mous du *C49.3*
- - Liposarcome pléiomorphe des tissus mous du *C49.3*
- - Luxation de parties autres et non précisées du *S23.2*

Thorax *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lymphangiomatose kaposiforme du *C49.3*
- - Neuroblastome des nerfs du *C47.3*
- - Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du *S21.80*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le *R84*
- - Rhabdomyosarcome
- - - Alvéolaire des tissus mous du *C49.3*
- - - Pléomorphe des tissus mous du *C49.3*
- - - Tissus mous du *C49.3*
- - Sarcome alvéolaire des tissus mous du *C49.3*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des tissus mous du *C49.3*
- - Sarcome des tissus mous du *C49.3*
- - Sarcome épithélioïde des tissus mous du *C49.3*
- - Sarcome pléomorphe indifférencié du *C49.3*
- - Sarcome synovial des tissus mous du *C49.3*
- - Schwannome malin des nerfs du *C47.3*
- - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du *D21.3*
- - Tumeur desmoplastique à petites cellules rondes des tissus mous du *C49.3*
- - Tumeur fibreuse solitaire bénigne du *D21.3*
- - Tumeur maligne
- - - *C76.1*
- - - Nerfs périphériques du *C47.3*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du *C49.3*
- - Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des tissus mous du *C49.3*
- - Tumeur rhabdoïde
- - - Nerfs du *C47.3*
- - - Tissus mous du *C49.3*
- - Tumeur triton maligne des nerfs du *C47.3*

Thréonine ¬ Trouble du métabolisme de la *E72.8*

Thrombasthénie
- Glanzmann ¬ *D69.1*
- Hémorragique) (héréditaire) ¬ *D69.1*

Thrombine ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs réversibles de la *D68.35*

Thrombo-angéite oblitérante
- Buerger] ¬ *I73.1*
- ¬ *I73.1*

Thrombocytaire hémorragipare ¬ Dystrophie *D69.1*

Thrombocytémie
- Essentiel ¬
- - *D47.3*
- - *D47.3*
- Hémorragique idiopathique ¬ *D47.3*
- Primaire ¬ *D47.3*

Thrombocytes ¬ *Z52.08*

Thrombocytopénie
v./v.a. hémangiome-thrombocytopénie
- Amégacaryocytaire congénitale ¬ *D69.41*
- Amégacaryocytique ¬ Syndrome de synostose radioulnaire- *Q87.2*
- Anasarque-fièvre-insuffisance rénale-organomégalie] ¬ Syndrome de TAFRO [*D89.8*
- Anémie dysérythropoïétique congénitale ¬ *D69.41, D64.4*
- Associé à DIAPH1 ¬ Syndrome de surdité neurosensorielle- *H90.5, D69.41*
- Autosomique dominante avec défaut de sécrétion plaquettaire ¬ *D69.41*
- Déficit immunitaire primaire par déficit en TPP2 ¬ Syndrome d'anémie hémolytique autoimmune avec *D69.3, D82.9*
- Eczéma ¬ Déficit immunitaire avec *D82.0*
- Héparino-induite ¬ *D69.52*
- Héréditaire
- - Myélofibrose à début précoce ¬ *D69.41, D47.4*
- - Plaquettes normales ¬ *D69.41*
- Immune ¬ *D69.3*
- Liée à l 'X ¬ Bêta-thalassémie- *D69.41, D56.1*
- Maternelle idiopathique ¬ Thrombopénie néonatale due à: *P61.0*
- MLT] ¬ Lymphangioendothéliomatose multifocale avec *D18.19, D69.61*
- Non précisée
- - Non qualifiée de réfractaire aux transfusions ¬ *D69.61*
- - Qualifiée de réfractaire aux transfusions ¬ *D69.60*
- Petites plaquettes congénitale autosomique récessive ¬ *D69.1*
- Post-vaccinale ¬ *D69.58, Y59.9!*
- Sévère à Haemaphysalis longicornis ¬ Syndrome de fièvre avec *A93.8*
- SFTG] ¬ Fièvre sévère avec syndrome de *A93.8*
- Syndromique liée à MYH9 ¬ *D69.41*
- Thrombotique immunitaire induite par un vaccin] ¬ TTIV [*D69.58*
- White ¬ *D69.1*
- ¬ Syndrome de fièvre périodique-immunodéficience- *D72.0*

Thrombocytopénique
v./v.a. thrombotique-thrombocytopénique
- Acquis ¬ PTT [Purpura thrombotique *M31.1*
- Congénital ¬
- - PTT [Purpura thrombotique *M31.1*
- - Purpura thrombotique *M31.1*
- Thrombotique ¬ Glomérulopathie au cours de purpura *M31.1†, N08.5**

Thrombocytose
- Essentielle ¬ *D47.3*
- Familiale ¬ *D68.8*
- Héréditaire avec anomalie réductionnelle transverse des membres ¬ *D75.8, Q73.8*

Thromboembolie
- Artère pulmonaire
- - Cœur pulmonaire ¬ *I26.0*
- - ¬ *I26.9*
- Chronique ¬ Hypertension pulmonaire en présence d'une *I27.20*
- Consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion ¬ *T80.1*
- Pulmonaire ¬ *I26.9*
- Veine pulmonaire
- - Cœur pulmonaire ¬ *I26.0*
- - ¬ *I26.9*
- ¬ Antécédents personnels de *Z86.7*

Thrombomoduline ¬
- Anomalies familiale de la *D68.5*
- Maladie hémorragique liée à la *D68.5*

Thrombopathie
- Bernard-Soulier ¬ *D69.1*
- Constitutionnelle ¬ *D68.00*
- Von Willebrand ¬ *D68.09*
- ¬ *D69.1*

Thrombopénie
- Absence de radius [TAR] ¬ *Q87.2*
- Induite héparine
- - Auto-immune ¬ *D69.53*
- - Type
- - - I ¬ *D69.52*
- - - II ¬ *D69.53*
- Materno-fœtale et néonatale allo-immune ¬ *P61.0*
- May-Hegglin ¬ *D72.0*
- Néonatale
- - Due
- - - Exsanguino-transfusion ¬ *P61.0*
- - - Iso-immunisation ¬ *P61.0*
- - - Thrombocytopénie maternelle idiopathique ¬ *P61.0*
- - Transitoire ¬ *P61.0*
- Primaires
- - Non qualifiées de réfractaires aux transfusions ¬ Autres *D69.41*
- - Qualifiées de réfractaires aux transfusions ¬ Autres *D69.40*
- Secondaire
- - Sans précision ¬ *D69.59*
- - ¬ Maladie due au VIH avec *B23.8, D69.58*
- Secondaires
- - Non qualifiées de réfractaires aux transfusions ¬ Autres *D69.58*
- - Qualifiées de réfractaires aux transfusions ¬ Autres *D69.57*
- ¬
- - Maladie due au VIH avec *B23.8, D69.61*
- - Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une *O14.2*

Thrombopénique
- Hémorragique ¬ Purpura: non *D69.0*

Thrombopénique *–suite*
- Idiopathique ¬ Purpura
- - *D69.3*
- - Non *D69.0*
- Thrombotique] ¬ PTT [Purpura *M31.1*
- ¬ Autres purpuras non *D69.2*

Thrombophilie
- Autosomique récessive due déficit congénital protéine
- - C ¬ *D68.5*
- - S ¬ *D68.5*
- Héréditaire
- - Due déficit congénital
- - - Antithrombine ¬ *D68.5*
- - - Histidine-rich (poly-L) glycoprotéine ¬ *D68.5*
- - Sévère due déficit congénital protéine
- - - C ¬ *D68.5*
- - - S ¬ *D68.5*
- Primaire ¬ *D68.5*
- ¬ Autres *D68.6*

Thrombophlébite
- Consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion ¬ *T80.1*
- Intracrâniennes et intrarachidiennes ¬ Phlébite et *G08*
- Intrarachidiennes, d'origine non pyogène ¬ Phlébite et *G95.18*
- Localisation non précisée ¬ Thrombose, phlébite et *I80.9*
- Localisations ¬ Thrombose, phlébite et *I80.88*
- Membres inférieurs
- - Cours de la grossesse ¬ *O22.2*
- - Sans précision ¬ Thrombose, phlébite et *I80.3*
- Migratrice ¬ *I82.1*
- Pelvienne post-partum ¬ *O87.1*
- Profonde
- - Cuisse ¬ *I80.28*
- - Jambe ¬ *I80.28*
- - Membre inférieur ¬ *I80.28*
- Rénale ¬ *I80.88*
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Superficielle cours
- - Grossesse ¬ *O22.2*
- - Puerpéralité ¬ *O87.0*
- Vaisseaux profonds des membres inférieurs ¬ Thrombose, phlébite et *I80.28*
- Veine
- - Axillaire ¬ Thrombose, phlébite et *I80.81*
- - Basilaire ¬ Thrombose, phlébite et *I80.80*
- - Céphalique ¬ Thrombose, phlébite et *I80.80*
- - Fémorale ¬ Thrombose, phlébite et *I80.1*
- - Hépatique ¬ *I80.88*
- - Pelviennes

Thrombophlébite *–suite*
- Veine *–suite*
- - Pelviennes *–suite*
- - - Avant l'accouchement ¬ *O22.3*
- - - ¬ *I80.20*
- - Poplitée ¬ *I80.28*
- - Profondes des membres supérieurs ¬ Thrombose, phlébite et *I80.81*
- - Sous-clavière ¬ Thrombose, phlébite et *I80.81*
- - Superficielles membres
- - - Inférieurs ¬ Thrombose, phlébite et *I80.0*
- - - Supérieurs ¬ Thrombose, phlébite et *I80.80*

Thromboplastine
- Plasmatique [PTA] ¬ Déficit en précurseur de *D68.1*
- Prolongé ¬ Temps de *R79.8*

Thrombose
- Ancienne
- - Apicale ¬ *I51.3*
- - Auriculaire ¬ *I51.3*
- - Auricule ¬ *I51.3*
- - Ventriculaire ¬ *I51.3*
- Aorte abdominale ¬ Embolie et *I74.0*
- Artère
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ Embolie et *I74.3*
- - - Supérieurs ¬ Embolie et *I74.2*
- - Non précisées ¬ Embolie et *I74.9*
- - ¬ Embolie et *I74.8*
- Artère basilaire ¬ *I65.1*
- Artère carotide ¬ *I65.2*
- Artère cérébelleuse ¬ *I66.3*
- Artère cérébrale
- - Antérieure ¬ *I66.1*
- - Moyenne ¬ *I66.0*
- - Postérieure ¬ *I66.2*
- - ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.3*
- Artère iliaque ¬ Embolie et *I74.5*
- Artère intracrânienne durant l'enfance ¬ Accident vasculaire cérébral ischémique dû à une *I63.3*
- Artère mésentérique
- - Supérieure ¬ *K55.0*
- - ¬ *K55.0*
- Artère précérébrale ¬
- - *I65.9*
- - Infarctus cérébral dû à une *I63.0*
- Artère pulmonaire
- - Cœur pulmonaire ¬ *I26.0*
- - ¬ *I26.9*
- Artère rénale ¬ *N28.0*
- Artère vertébrale ¬ *I65.0*
- Artères distales, sans précision ¬ Embolie et *I74.4*
- Artériel

Thrombose *–suite*
- Artériel *–suite*
- - Moelle épinière ¬ *G95.18*
- - Rate ¬ *I74.8*
- Bulbe de la veine jugulaire ¬ *I82.81*
- Cardiaque
- - Due à la syphilis ¬ *A52.0†, I52.0**
- - N'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*
- Cérébrale
- - Due à la syphilis ¬ *A52.0†, I68.8**
- - ¬ Neurosyphilis avec *A52.0†, I68.8**
- Conjonctivale ¬ *H11.4*
- Coronaire due à la syphilis ¬ *A52.0†, I52.0**
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.8*
- Due à prothèses, implants ou greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Entéropathie avec perte de protéines] ¬ Syndrome CHAPLE [hyperactivation du complément- *D84.1*
- Gestationnelle SAI ¬ *O22.9*
- Hémorroïdaire stade III ¬ *K64.2*
- Hémorroïdes
- - Externes ¬ *K64.5*
- - Internes ¬ *K64.8*
- Hépatique ¬ *I82.0*
- Intracardiaque, non classée ailleurs ¬ *I51.3*
- Membre inférieur SAI ¬ Embolie ou *I80.3*
- Murale due à la syphilis ¬ *A52.0†, I52.0**
- Non pyogène
- - Sinus veineux intracrânien ¬ *I67.6*
- - Système veineux intracrânien ¬ *I67.6*
- - Veine cérébrale ¬
- - - *I67.6*
- - - *I67.6*
- Oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.6*
- Organe génital
- - Féminins ¬ *N94.8*
- - Homme ¬ *N50.1*
- Parties de l'aorte, autres et non précisées ¬ Embolie et *I74.1*
- Phlébite thrombophlébite
- - Localisation non précisée ¬ *I80.9*
- - Localisations ¬ *I80.88*
- - Membres inférieurs, sans précision ¬ *I80.3*
- - Vaisseaux profonds des membres inférieurs ¬ *I80.28*
- - Veine
- - - Axillaire ¬ *I80.81*
- - - Basilaire ¬ *I80.80*
- - - Céphalique ¬ *I80.80*
- - - Fémorale ¬ *I80.1*
- - - Profondes des membres supérieurs ¬ *I80.81*
- - - Sous-clavière ¬ *I80.81*
- - - Superficielles membres

Thrombose *–suite*
- Phlébite thrombophlébite *–suite*
- - Veine *–suite*
- - - Superficielles membres *–suite*
- - - - Inférieurs ¬ *I80.0*
- - - - Supérieurs ¬ *I80.80*
- Plexus
- - Hémorroïdaires ¬ *K64.5*
- - Pampiniforme ¬ *I80.88*
- Profonde
- - Cuisse ¬ *I80.28*
- - Extrémité inférieure ¬ *I80.28*
- - Jambe ¬ *I80.28*
- - Membre inférieur ¬ *I80.28*
- - ¬ *I80.28*
- Puerpérale SAI ¬ *O87.9*
- Pulmonaire ¬ *I26.9*
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Shunt AV autogène ¬ *T82.8*
- Sino-veineuse cérébrale ¬ *I67.6*
- Sinus veineux cérébral cours
- - Grossesse ¬ *O22.5*
- - Puerpéralité ¬ *O87.3*
- Splénique ¬ *I82.80*
- Syphilitique
- - Artère de la moelle épinière ¬ *A52.0†, I79.8**
- - Artères coronaires ¬ *A52.0†, I52.0**
- Tronc brachio-céphalique ¬
- - *I65.8*
- - Infarctus cérébral par *I63.0*
- Vaisseaux ombilicaux ¬ *O69.5*
- Veine
- - Abdominale ¬ *I82.88*
- - Anales ¬ *K64.5*
- - Cave ¬ Embolie et *I82.2*
- - Centrale de l'œil ¬ *H34.8*
- - Iliaque ¬ *I80.20*
- - Jugulaire ¬
- - - *I82.81*
- - - Embolie et *I82.81*
- - Méninges ¬ *I67.6*
- - Mésentérique ¬ *K55.0*
- - Non précisée ¬ Embolie et *I82.9*
- - Pelvienne ¬ *I80.20*
- - Poplitée ¬ *I80.28*
- - Porte
- - - Due à la syphilis ¬ *A52.0†, I98.0**
- - - Non cirrhotique ¬ *I81*
- - - ¬ *I81*
- - Précisées ¬ Embolie et *I82.88*
- - Pulmonaire
- - - Cœur pulmonaire ¬ *I26.0*
- - - ¬ *I26.9*
- - Rénale

Thrombose *–suite*
- Veine *–suite*
- - Rénale *–suite*
- - - Fœtus ¬ *P29.8*
- - - Nouveau-né ¬ *P29.8*
- - - ¬ Embolie et *I82.3*
- - Splénique ¬ Embolie et *I82.80*
- - Surrénale ¬ *I82.88*
- Veineuse
- - Bras ¬ *I80.88*
- - Cérébrale
- - - Cours
- - - - Grossesse ¬ *O22.5*
- - - - Puerpéralité ¬ *O87.3*
- - - Non pyogène ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.6*
- - Hépatique ¬ *I82.0*
- - Périanale ¬ *K64.5*
- - Profonde
- - - Avant l'accouchement ¬ *O22.3*
- - - Post-partum ¬ *O87.1*
- - - SAI ¬ *I80.28*
- - SAI ¬ *I82.9*
- - ¬
- - Paquet hémorroïdaire avec *K64.8*
- - Syndrome de l'intestin court dû à une *K91.2, K55.0*

Thrombotique
- Immunitaire induite par un vaccin] ¬ TTIV [Thrombocytopénie *D69.58*
- Novo après transplantation rénale ¬ Microangiopathie *M31.1, Z94.0*
- Tant événement cours ¬
- - Hémiplégie *I63.3, G81.9*
- - Monoplégie *I63.3, G83.3*
- - Tétraplégie *I63.3, G82.52*
- Thrombocytopénique
- - Acquis ¬ PTT [Purpura *M31.1*
- - Congénital ¬
- - - PTT [Purpura *M31.1*
- - - Purpura *M31.1*
- Veineuse profonde de l'extrémité inférieure ¬ Inflammation *I80.28*
- ¬
- - Glomérulopathie au cours de purpura thrombocytopénique *M31.1†, N08.5**
- - Infarctus: *I74*
- - Microangiopathie *M31.1*
- - Occlusion: *I74*
- - PTT [Purpura thrombopénique *M31.1*

Thrombotique-thrombocytopénique ¬ Glomérulonéphrite au cours de purpura *M31.1†, N08.5**

Thromboxane ¬ Troubles hémorragiques par déficit de synthèse de la *D69.88*

Thygeson ¬ Kératite ponctuée superficielle de *H16.1*

Thymique
- Bien différencié ¬ Carcinome neuroendocrine *C37*
- Grandes Cellule B ¬ Lymphome médiastinal
- - *C85.2*
- - *C85.2*
- ¬
- - Alymphoplasie *D82.1*
- - Aplasie *D82.1*
- - Basophilie *E24.0*
- - Carcinome *C37*
- - Epithélioma *D15.0*
- - Tumeur *D38.4*

Thymoblastome ¬ *D15.0*

Thymome
- Bénin ¬ *D15.0*
- Malin
- - Type
- - - A ¬ *C37*
- - - AB ¬ *C37*
- - - B ¬ *C37*
- - ¬ *C37*
- ¬
- - *D15.0*
- - Encéphalite limbique avec anticorps anti-CASPR2 et *G04.8, C37*
- - Érythroblastopénie (acquise) (adulte) (avec *D60*

Thymus
- Rein-anus-poumon ¬ Dysplasie *Q87.8*
- Sans précision ¬ Maladie du *E32.9*
- ¬
- - Abcès du *E32.1*
- - Aplasie des parathyroïdes et du *D82.1*
- - Carcinome lympho-épithélial-like du *C37*
- - Dysfonction du *E32.9*
- - Hyperfonction du *E32.8*
- - Hyperplasie persistante du *E32.0*
- - Hypertrophie du *E32.0*
- - Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.84*
- - Maladies du *E32.8*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, E35.8**
- - Tuberculose du *A18.8†, E35.8**
- - Tumeur bénigne: *D15.0*
- - Tumeur maligne du *C37*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D38.4*

Thyréoglosse ¬
- Kyste *Q89.2*
- Persistance du canal *Q89.2*

Thyréostimuline] ¬ Hypothyroïdie congénitale par déficit isolé en TSH [*E03.1*

Thyréotoxicose
- Due à des nodules thyroïdiens ectopiques ¬ *E05.3*
- Factice ¬ *E05.4*

Thyréotoxicose *–suite*
- Goitre
- - Diffus ¬ *E05.0*
- - Multinodulaire toxique ¬ *E05.2*
- - Uninodulaire toxique ¬ *E05.1*
- Maladie cardiaque ¬ *E05.9†, I43.8**
- Néonatale ¬ *P72.1*
- Sans précision ¬ *E05.9*
- Transitoire ¬ Thyroïdite chronique avec *E06.2*
- ¬
- - *E05.8*
- - Arthropathie au cours de *E05.9†, M14.59**
- - Exophtalmie au cours de *E05.0†, H06.2**
- - Myopathie au cours de *E05.9†, G73.5**
- - Proptose au cours de *E05.9†, H06.2**
- - Syndrome myasthénique au cours de *E05.9†, G73.0**

Thyréotoxique
- Aiguë ¬ Crise *E05.5*
- ¬
- - Insuffisance cardiaque *E05.9†, I43.8**
- - Maladie
- - - Cardiaque *E05.9†, I43.8**
- - - Oculaire *E05.9†, H58.8**
- - Myopathie *E05.9†, G73.5**

Thyréotrope ¬
- Adénome *D35.2*
- Exophtalmie *E05.0†, H06.2**

Thyréotropine ¬ Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*

Thyrocalcitonine ¬ Hypersécrétion de *E07.0*

Thyro-cérébro-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Thyroglobuline ¬ Anomalie de la *E07.8*

Thyroïde
v./v.a. Glande thyroïde
- Acquise) ¬ Atrophie de la *E03.4*
- Echinococcus granulosus ¬ Infection de la *B67.3†, E35.0**
- Familial ¬ Cancer médullaire de la *C73*
- Glandes endocrines ¬ Carcinoma in situ: *D09.3*
- Linguale ¬ *Q89.2*
- Néoplasie rénale papillaire ¬ Cancer familial papillaire de la *C73, C64*
- Sans précision ¬ Affection de la *E07.9*
- ¬
- - Abcès de la *E06.0*
- - Absence congénitale de la *E03.1*
- - Affections précisées de la *E07.8*
- - Agénésie de la *E03.1*
- - Angiosarcome de la *C73*
- - Anomalie congénitale de la position de la *Q89.2*
- - Aplasie de la *E03.1*
- - Atrophie congénitale de la *E03.1*
- - Blessure de la *S19.9*
- - Cancer

Thyroïde *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Cancer *–suite*
- - - Anaplasique de la *C73*
- - - Folliculaire de la *C73*
- - - Médullaire de la *C73*
- - - Papillaire de la *C73*
- - Carcinome
- - - *C73*
- - - Non médullaire familial de la *C73*
- - - Parafolliculaire de la *C73*
- - Cartilage
- - - *S12.8*
- - - *S13.5*
- - Hémiagénésie de la *E03.1*
- - Hémorragie de la *E07.8*
- - Hyperplasie des cellules C de la *E07.0*
- - Hypoplasie de la *E03.1*
- - Infarctus de la *E07.8*
- - Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou *Q89.2*
- - Plaie ouverte avec atteinte de la *S11.1*
- - Syndrome cerveau-poumon- *E03.1†, J99.8*, G25.5*
- - Tératome de la *D44.0*
- - Tuberculose de la *A18.8†, E35.0**
- - Tumeur bénigne de la *D34*
- - Tumeur de la *D44.0*
- - Tumeur maligne de la *C73*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D44.0*

Thyroïdien
v./v.a. Insuffisance thyroïdienne
- Alpha ¬ Résistance aux hormones thyroïdiennes par mutations du récepteur aux hormones *E03.8*
- Apparentées liées à une carence en iode ¬ Autres affections *E01.8*
- Bêta ¬ Résistance aux hormones thyroïdiennes par mutation du récepteur aux hormones *E05.8*
- Dérivés ¬ Intoxication: Hormones *T38.1*
- Ectopiques ¬ Thyréotoxicose due à des nodules *E05.3*
- Exophtalmie ¬ Trouble de la fonction *E05.0†, H06.2**
- Kystique) SAI ¬ Nodule: *E04.1*
- Mutation récepteur hormone thyroïdien
- - Alpha ¬ Résistance aux hormones *E03.8*
- - Bêta ¬ Résistance aux hormones *E05.8*
- Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies néonatales de la fonction *P72.2*
- Normale ¬ Goitre congénital transitoire avec fonction *P72.0*
- Simple non toxique ¬ Nodule *E04.1*
- ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage *Q31.8*

Thyroïdien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage *Q31.8*
- - Articulation (ligament): crico- *S13.5*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage *Q31.8*
- - Dyshormonosynthèse *E03.0*
- - Ectopie *E03.1*
- - Entorse et foulure de la région *S13.5*
- - Fissure (de): cartilage *Q31.8*
- - Goitre *Q89.2*
- - Hypothyroïdie due à une résistance périphérique aux hormones *E03.8*
- - Lymphome *C85.9*
- - Nodule: colloïde (kystique) (*E04.1*
- - Petite taille-retard d'âge osseux par déficit du métabolisme de l'hormone *E03.1*
- - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.6*

Thyroïdite
- Aiguë ¬ *E06.0*
- Aspergillus ¬ *B44.8†, E35.0**
- Auto-immun ¬
- - *E06.3*
- - Encéphalopathie sensible aux stéroïdes associée à une *G04.8, E06.3*
- - SREAT [Encéphalopathie sensible aux stéroïdes associée à une *G04.8, E06.3*
- Cellules géantes ¬ *E06.1*
- Chronique
- - Fibreuse ¬ *E06.5*
- - SAI ¬ *E06.5*
- - Thyréotoxicose transitoire ¬ *E06.2*
- Chroniques ¬ Autres *E06.5*
- Cryptocoques ¬ *B45.8*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, E35.0**
- Granulomateuse ¬ *E06.1*
- Hashimoto ¬
- - *E06.3*
- - Lobulite lymphocytaire sclérosante au cours de *E06.3, N61*
- Ligneuse ¬ *E06.5*
- Lymphocytaire ¬ *E06.3*
- Médicamenteuse ¬ *E06.4*
- Non suppurée ¬ *E06.1*
- Post-partum ¬ *O90.5*
- Pyogène ¬ *E06.0*
- Quervain ¬ *E06.1*
- Riedel ¬ *E06.5*
- Sans précision ¬ *E06.9*
- Subaiguë ¬ *E06.1*
- Suppurée ¬ *E06.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, E35.0**

Thyrotoxique ¬ Paralysie périodique *G72.3*

Thyrotrophine ¬
- Hyperproduction de *E05.8*
- Hypothyréose par déficit isolé en TRH [hormone de libération de la *E03.1*

Tibia
- Absent-polydactylie-kyste arachnoïdien ¬ Syndrome de *Q79.8, G93.0*
- Antérieur ¬ Myopathie distale débutant au niveau du *G71.08*
- Aplastique-ectrodactylie ¬ Syndrome de *Q73.8*
- Fracture péroné toute partie ¬ Fracture
- - Diaphyse du *S82.21*
- - Extrémité inférieure du *S82.31*
- - Extrémité supérieure du *S82.11*
- Impliquant
- - Cheville ¬ *S82.5*
- - Malléole ¬ *S82.5*
- Isolé ¬ Partie proximale du *S82.18*
- Isolée ¬
- - Diaphyse du *S82.28*
- - Fracture distale du *S82.38*
- Lame de sabre ¬ Déformation syphilitique du *A50.5†, M90.26**
- Péroné ¬ Incurvation congénitale du *Q68.4*
- Petite taille-omoplate ailée-dysmorphie faciale ¬ Syndrome d'incurvation latérale sévère du *Q87.1*
- Proximal ¬ Luxation
- - Antérieure du *S83.11*
- - Genou Luxation
- - - Latérale du *S83.14*
- - - Médiane du *S83.13*
- - - Postérieure du *S83.12*
- SAI ¬
- - *S82.28*
- - Diaphyse du *S82.28*
- - Fracture distale du *S82.38*
- - Partie proximale du *S82.18*
- Vara ¬ *M92.5*
- ¬
- - Adamantinome du *C40.2*
- - Condyles latéral ou médial du *S82.1*
- - Dysplasie ostéofibreuse du *D16.2*
- - Extrémité inférieure de: *S93.0*
- - Fracture
- - - Diaphyse du *S82.28*
- - - Extrémité inférieure du *S82.38*
- - - Extrémité supérieure du *S82.18*
- - Ostéoblastome du *D16.2*
- - Ostéochondrite juvénile
- - - *M92.5*
- - - Épiphyse supérieure du *M92.5*
- - Ostéochondrose déformante du *M92.5*
- - Ostéosarcome du *C40.2*
- - Pseudarthrose congénitale du *Q74.2*
- - Raccourcissement longitudinal du *Q72.5*

Tibia *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Sarcome d'Ewing du *C40.2*
- - Sarcome du *C40.2*

Tibial
v./v.a. Artère tibiale
- Adolescent ¬ Apophysite *M92.5*
- Antérieur
- - Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique du nerf *S94.2*
- - ¬ Branche terminale externe du nerf *S94.2*
- Antérieure ¬ Syndrome de la loge *M76.8*
- Collatéral
- - Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [Lig. *M23.93*
- - ¬
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament interne [Lig. *M23.53*
- - - Lésions internes du genou: ligament interne [Lig. *M23.83*
- Externe ¬ Ostéochondrite juvénile, apophyse *M92.6*
- Ligament médian ¬ Entorse foulure Ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral *S83.44*
- - Distorsion du ligament latéral *S83.42*
- Polysyndactylie-pouce triphalangé ¬ Syndrome d'hémimélie *Q87.2*
- Postérieure ¬ Tendinite *M76.8*
- ¬
- - Agénésie *Q72.5*
- - Dystrophie musculaire *G71.08*
- - Fracture
- - - Pilon *S82.5*
- - - Plateau *S82.18*
- - Hémimélie *Q72.5*
- - Ostéochondrite juvénile du tubercule *M92.5*
- - Plateau *S82.1*
- - Syndrome d'aplasie radiale-aplasie *Q73.8*

Tibio-fibulaire ¬ Synostose *Q74.2*

Tibiométacarpienne ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*

Tibio-péronier
- Antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et foulure de la cheville: Ligament *S93.43*
- Supérieure et ses ligaments ¬ Articulation *S83.6*
- ¬ Articulation *S83.1*

Tic
- Douloureux de la face ¬ *G50.0*
- Médicamenteux et autres tics d'origine organique ¬ *G25.6*
- Moteur
- - Syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et *F95.2*
- - Vocal chronique ¬ *F95.1*
- Origine organique ¬ Tics médicamenteux et autres *G25.6*

Tic *–suite*
- Psychogène ¬ *F95.9*
- Salaam ¬ *G40.4*
- Sans précision ¬ *F95.9*
- Transitoire ¬ *F95.0*
- Vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant *F95.2*
- ¬ Autres *F95.8*

Ticlopidine ¬ Hypersensibilité à la *T88.7*

Tierce bénigne ¬ Anémie due à la fièvre *B54†, D63.8**

Tiers
- Antérieurs langue
- - Face
- - - Inférieure ¬ Deux *C02.2*
- - - Supérieure ¬ Deux *C02.0*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: Deux *C02.3*
- Inférieur œsophage
- - Type glande salivaire ¬ Carcinome du *C15.5*
- - ¬
- - - Adénocarcinome du *C15.5*
- - - Carcinome du *C15.5*
- - - Carcinome épidermoïde du *C15.5*
- - - Carcinome indifférencié du *C15.5*
- - - Néoplasie neuroendocrine du *C15.5*
- - - TSGI [Tumeur stromale gastro-intestinale] du *C15.5*
- - - Tumeur maligne: *C15.5*
- Latéral ¬ Fracture de la clavicule: *S42.03*
- Matière de sexualité ¬ Conseil relatif au comportement ou à l'orientation de *Z70*
- Médian ¬ Fracture de la clavicule: *S42.01*
- Moyen
- - Langue SAI ¬ *C02.3*
- - Œsophage
- - - Type glande salivaire ¬ Carcinome du *C15.4*
- - - ¬
- - - - Carcinome du *C15.4*
- - - - Carcinome épidermoïde du *C15.4*
- - - - Carcinome indifférencié du *C15.4*
- - - - Néoplasie neuroendocrine du *C15.4*
- - - - TSGI [Tumeur stromale gastro-intestinale] du *C15.4*
- - - - Tumeur maligne: *C15.4*
- - Vagin pendant l'accouchement ¬ Déchirure du *O71.4*
- - ¬ Fracture de la clavicule: *S42.02*
- Postérieur de la langue ¬ *C01*
- Supérieur
- - Œsophage
- - - Type glande salivaire ¬ Carcinome du *C15.3*
- - - ¬
- - - - Carcinome du *C15.3*
- - - - Carcinome épidermoïde du *C15.3*

Tiers *–suite*
- Supérieur *–suite*
- - Œsophage *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Carcinome indifférencié du *C15.3*
- - - - Néoplasie neuroendocrine du *C15.3*
- - - - TSGI [Tumeur stromale gastro-intestinale] du *C15.3*
- - - - Tumeur maligne: *C15.3*
- - Vagin pendant l'accouchement ¬ Déchirure du *O71.4*
- ¬ Conseil et surveillance pour: Personne consultant pour le compte d'un *Z71*

Tietz ¬ Syndrome de *E70.3*

Tietze] ¬ Syndrome des articulations chondro-costales [*M94.0*

Tige ¬ Enlèvement de: *Z47.0*

Timbre SAI ¬ Changement de *R49.8*

Timed Up and Go
- 18
- - 33 secondes ¬ TUG [*U53.13*
- - Secondes ¬ TUG [*U53.03*
- Impossible à réaliser ¬ TUG [*U53.33*
- Plus de 33 secondes ¬ TUG [*U53.23*

Timori ¬
- Éléphantiasis à Brugia *B74.2*
- Filariose à Brugia *B74.2*

Timothy
- Type
- - 1 ¬ Syndrome de *I49.8*
- - 2 ¬ Syndrome de *I49.8*
- ¬ Syndrome de *I49.8*

Tinea
- Axillaris ¬ *B35.8*
- Capillitii ¬ *B35.0*
- Faciei ¬ *B35.0*
- Flava ¬ *B36.0*
- Genitalis ¬ *B35.8*
- Manuum et pedum ¬ *B35.8*
- Nigra ¬ *B36.1*
- Tonsurans ¬ *B35.0*
- Versicolor ¬ *B36.0*

Tinea blanca ¬ *B36.2*

Tinschert
v./v.a. Braun-Tinschert

TINU [Néphrite tubulo-interstitielle et uvéite] ¬ Syndrome *N12, H20.9*

TIPMP [Carcinome intracanalaire papillaire mucineux du pancréas] ¬ *C25.3*

TIPS] ¬ Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [*Z95.88*

Tiques
- Colorado ¬ Fièvre à *A93.2*
- Haemaphysalis longicornis ¬ Fièvre à *A93.8*
- Queensland ¬ Fièvre à *A77.3*
- SAI ¬ Typhus à *A77.9*
- Sibérie ¬ Typhus à *A77.2*

Tiques *–suite*
- ¬
- - Borréliose
- - - Fièvre tropicale récurrente] à *A68.1*
- - - Maladie de Lyme] à *A69.2*
- - Encéphalite
- - - *A84.9*
- - - Europe centrale transmise par des *A84.1*
- - - Taïga transmise par des *A84.0*
- - - Virale transmise par des *A84.9*
- - Fièvre récurrente
- - - *A68.1*
- - - Novy à *A68.1*
- - Lésions dues aux *B88.8*
- - Méningo-encéphalite virale transmise par des *A84*

Tire-bouchon ¬ Œsophage en *K22.4*

Tissu
v./v.a. Nécrose des tissus
- Accessoire tricuspide ¬ *Q22.8*
- Adénoïde
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ Tuberculose du *A15.8*
- - ¬
- - - *C11.1*
- - - Tuberculose du *A16.8*
- Cérébral
- - SAI ¬ Atteinte limitée ou circonscrite du *S06.30*
- - ¬
- - - Atteinte limitée ou circonscrite du *S06.3*
- - - Grosse atteinte du *S06.2*
- Cicatriciel ¬ opération réparation d'un *Z42*
- Conjonctif orbite ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Cutané
- - Lymphome SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux *C88.4*
- - Sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du *E88.22*
- - ¬ Modifications du *R23.4*
- Ectopique intrapulmonaire (congénital) ¬ *Q33.5*
- Greffé
- - Greffe de cornée de l'œil ¬ Échec et rejet d'autres organes et *T86.83*
- - Organes ou tissus greffés ¬ Échec et rejet d'autres organes et *T86.88*
- - ¬ Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes ou *T86.88*
- Hématopoïétique NCA ¬ Maladie due au VIH avec tumeur maligne du *B21, C96.9*
- Intraoculaire ¬ Lacération
- - Oculaire sans protrusion ou perte de *S05.3*

Tissu *–suite*
- Intraoculaire ¬ Lacération *–suite*
- - Rupture oculaires avec protrusion ou perte de *S05.2*
- Lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite néoplasique lors de tumeur des *C79.3*
- Lymphoïde hématopoïétique apparentés
- - Évolution imprévisible inconnue
- - - Sans précision ¬ Tumeur des *D47.9*
- - - ¬ Autres tumeurs précisées des *D47.7*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne des *C96.9*
- - ¬
- - - Antécédents familiaux d'autres tumeurs des *Z80.7*
- - - Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des *Z85.7*
- - - Tumeurs malignes précisées des *C96.7*
- Mésothélial
- - Péritoine ¬ Tumeur bénigne: *D19.1*
- - Plèvre ¬ Tumeur bénigne: *D19.0*
- - Sans précision ¬ Tumeur bénigne: *D19.9*
- - Sièges ¬ Tumeur bénigne: *D19.7*
- Neuroépithélial ¬ Tumeur embryonnaire du *C72.9*
- Non précisés ¬ Donneur d'organe ou de *Z52.9*
- Orbite ¬ Contusion du globe oculaire et des *S05.1*
- Ovarien résiduel ¬ Syndrome dû à la présence de *N99.8*
- Pelvien lors
- - Accouchement ¬ Anomalie du *O34.9*
- - Grossesse ¬ Anomalie du *O34.9*
- Pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Lésions des organes et *O08.6*
- Périapicaux, autres et sans précision ¬ Maladies de la pulpe et des *K04.9*
- Périurétral
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture des *O70.0*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- - Tant que lésion due à l'accouchement chez la mère ¬ Lacération du *O70.0*
- Relations familiales pendant l'enfance ¬ Changements dans le *Z61*
- Remplacé par greffe hétérologue ou homologue ¬ organe ou *Z94*
- Rétrobulbaire ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Rétro-oculaire ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Sans précision ¬ Status post greffe d'organe ou de *Z94.9*
- Sein ¬ Ectopie de *Q83.88*

Tissu *–suite*
- Valvulaire mitral accessoire ¬ *Q23.8*
- - ¬
- - Donneur d'autres organes et *Z52.88*
- - État consécutif à la transplantation d'autres organes ou *Z94.88*
- - Examen d'un donneur éventuel d'organe et de *Z00.5*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et *R89*

Tissu adipeux ¬
- *C49*
- *D21*

Tissu cellulaire sous-cutané
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de la peau et du *O99.7*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections précisées de la peau et du *L99.8**
- Liée à une irradiation, sans précision ¬ Affection de la peau et du *L59.9*
- Liées à une irradiation ¬ Autres affections précisées de la peau et du *L59.8*
- Niveau
- - Cou ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.1*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.4*
- - - Supérieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.3*
- - Tête ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.0*
- - Tronc ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.2*
- Sans précision ¬
- - Affection de la peau et du *L98.9*
- - Infection localisée de la peau et du *L08.9*
- - Kyste folliculaire de la peau et du *L72.9*
- - Lésion granulomateuse de la peau et du *L92.9*
- - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.9*
- Sièges multiples ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.7*
- - ¬
- - Affections précisées de la peau et du *L98.8*
- - Antécédents familiaux de maladies de la peau et du *Z84.0*
- - Antécédents personnels de maladies de la peau et du *Z87.2*
- - Formes de kyste folliculaire de la peau et du *L72.8*
- - Hémangiome
- - - Cellules fusiformes du *D18.01*
- - - Congénital
- - - - Non involutif du *D18.01*
- - - - Partiellement involutif du *D18.01*
- - - - Rapidement involutif du *D18.01*

Tissu cellulaire sous-cutané *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Infections localisées précisées de la peau et du *L08.8*
- - Lésions
- - - Granulomateuses de la peau et du *L92.8*
- - - Infiltrantes de la peau et du *L98.6*
- - Résultat radiologique anormal de la peau et du *R93.8*
- - Tuberculose du *A18.4*

Tissu conjonctif
v./v.a. Sarcome de tissu conjonctif
- Abdomen ¬ Sarcome du *C49.4*
- Cours
- - Hypogammaglobulinémie ¬ Maladie systémique du *D80.1†, M36.8**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Atteintes systémiques du *M36.8**
- - Ochronose ¬ Affection systémique du *E70.2†, M36.8**
- Discal ¬ Rétrécissement des espaces intervertébraux par *M99.7*
- Dos ¬ Sarcome du *C49.6*
- Épaule ¬ Sarcome du *C49.1*
- Hypertension portale [APAH] ¬ Hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale, affection du *I27.01*
- Membres supérieurs ¬ Sarcome du *C49.1*
- Oreille ¬
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Paupière ¬
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Pelvis ¬ Sarcome du *C49.5*
- Sans précision ¬
- - Affection localisée du *L94.9*
- - Atteinte systémique du *M35.9*
- - Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du *M95.9*
- Sein ¬
- - *C50*
- - *D48.6*
- Stade
- - 1 ¬ Maladie GVH chronique du *T86.05†, M36.51**
- - 2 ¬ Maladie GVH chronique du *T86.06†, M36.52**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique du *T86.07†, M36.53**
- Tissu mou
- - Abdomen ¬
- - - Tumeur bénigne: *D21.4*
- - - Tumeur maligne: *C49.4*
- - Bassin ¬ Tumeur bénigne: *D21.5*

Tissu conjonctif *–suite*
- Tissu mou *–suite*
- - Cou ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.85*
- - Membre
- - - Inférieur y compris hanche ¬
- - - - Tumeur bénigne: *D21.2*
- - - - Tumeur maligne: *C49.2*
- - - Supérieur y compris épaule ¬
- - - - Tumeur bénigne: *D21.1*
- - - - Tumeur maligne: *C49.1*
- - Membres ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.86*
- - Pelvis ¬ Tumeur maligne: *C49.5*
- - Sans précision ¬
- - - Tumeur bénigne: *D21.9*
- - - Tumeur maligne: *C49.9*
- - Sièges précisés ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.88*
- - Tête face cou ¬
- - - Tumeur bénigne: *D21.0*
- - - Tumeur maligne: *C49.0*
- - Thorax ¬
- - - Tumeur bénigne: *D21.3*
- - - Tumeur maligne: *C49.3*
- - Tronc sans précision ¬
- - - Tumeur bénigne: *D21.6*
- - - Tumeur maligne: *C49.6*
- - ¬
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du *C49.8*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D48.1*
- Tronc ¬ Sarcome du *C49.6*
- ¬
- - Affections localisées précisées du *L94.8*
- - Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du *Z87.3*
- - Atteintes systémiques précisées du *M35.8*
- - Déformations acquises précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du *M95.8*
- - Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du *N08.5**
- - Hypertension artérielle pulmonaire associée a une affection du *I27.01*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du *N16.4**
- - Polynévrite au cours d'affections disséminées du *M35.9†, G63.5**
- - Rétrécissement du canal rachidien par *M99.4*
- - Sarcome de Kaposi du *C46.1*
- - Sein: *D24*
- - Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du *J99.1**
- - Tuberculose systémique du *A18.8†, M36.8**

Tissu dentaire durs
- Éruption ¬ Modification de la teinte des *K03.7*
- Pulpe ¬ Formation anormale de *K04.3*
- Sans précision ¬ Maladie des *K03.9*
- ¬ Autres maladies précisées des *K03.8*

Tissu lymphoïde associés
- Bronches [lymphome BALT] ¬ Lymphome des *C88.4*
- Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des *C88.41*
- Tissus cutanés [lymphome SALT] ¬ Lymphome des *C88.4*

Tissu mou
v./v.a. Sarcome des tissus mous
- Abdomen ¬
- - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des *C49.4*
- - Fibromyxosarcome des *C49.4*
- - Liposarcome bien différencié des *C49.4*
- - Liposarcome dédifférencié des *C49.4*
- - Liposarcome des *C49.4*
- - Liposarcome myxoïde des *C49.4*
- - Liposarcome pléiomorphe des *C49.4*
- - Rhabdomyosarcome
- - - *C49.4*
- - - Alvéolaire des *C49.4*
- - - Pléomorphe des *C49.4*
- - Sarcome alvéolaire des *C49.4*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C49.4*
- - Sarcome épithélioïde des *C49.4*
- - Sarcome synovial des *C49.4*
- - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.4*
- - Tumeur desmoplastique à petites cellules rondes des *C49.4*
- - Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.4*
- - Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des *C49.4*
- - Tumeur rhabdoïde des *C49.4*
- Bassin ¬ Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.5*
- Cou ¬
- - Hémangioendothéliome épithélioïde des *C49.0*
- - Liposarcome dédifférencié des *C49.0*
- - Maladie de Kimura des *D21.0*
- - Rhabdomyosarcome
- - - *C49.0*
- - - Alvéolaire des *C49.0*
- - - Embryonnaire des *C49.0*
- - Sarcome alvéolaire des *C49.0*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C49.0*
- - Sarcome synovial des *C49.0*
- - Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres *C79.85*

Tissu mou *–suite*
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Autres affections des *M73.8**
- Épaule ¬
- - *C79.86*
- - Rhabdomyosarcome des *C49.1*
- Hanche ¬
- - *C79.86*
- - Rhabdomyosarcome des *C49.2*
- Lésion localisations contiguës ¬
- - Angiosarcome des *C49.8*
- - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des *C49.8*
- - Fibromyxosarcome des *C49.8*
- - Fibrosarcome des *C49.8*
- - Liposarcome bien différencié des *C49.8*
- - Liposarcome dédifférencié des *C49.8*
- - Liposarcome des *C49.8*
- - Liposarcome myxoïde des *C49.8*
- - Liposarcome pléiomorphe des *C49.8*
- - Rhabdomyosarcome
- - - *C49.8*
- - - Alvéolaire des *C49.8*
- - - Pléomorphe des *C49.8*
- - Sarcome alvéolaire des *C49.8*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C49.8*
- - Sarcome des tissus mous des *C49.8*
- - Sarcome épithélioïde des *C49.8*
- - Sarcome synovial des *C49.8*
- - Tumeur rhabdoïde des *C49.8*
- Localisations contiguës ¬ Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des *C49.8*
- Maternels ¬ Anomalies des *P03.8*
- Médiastin
- - Antérieur ¬ Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C38.1*
- - Postérieur ¬ Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C38.2*
- - ¬ Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C38.3*
- Membre
- - Inférieur y compris hanche ¬
- - - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.2*
- - - Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.2*
- - Supérieur y compris épaule ¬
- - - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.1*
- - - Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.1*
- Membres
- - Inférieurs ¬
- - - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des *C49.2*
- - - Fibromyxosarcome des *C49.2*

Tissu mou *–suite*
- Membres *–suite*
- - Inférieurs ¬ *–suite*
- - - Hémangioendothéliome épithélioïde des *C49.2*
- - - Liposarcome bien différencié des *C49.2*
- - - Liposarcome dédifférencié des *C49.2*
- - - Liposarcome des *C49.2*
- - - Liposarcome myxoïde des *C49.2*
- - - Liposarcome pléiomorphe des *C49.2*
- - - Rhabdomyosarcome
- - - - *C49.2*
- - - - Alvéolaire des *C49.2*
- - - - Pléomorphe des *C49.2*
- - - Sarcome alvéolaire des *C49.2*
- - - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C49.2*
- - - Sarcome épithélioïde des *C49.2*
- - - Sarcome synovial des *C49.2*
- - - Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des *C49.2*
- - - Tumeur rhabdoïde des *C49.2*
- - Supérieurs ¬
- - - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des *C49.1*
- - - Fibromyxosarcome des *C49.1*
- - - Hémangioendothéliome épithélioïde des *C49.1*
- - - Liposarcome bien différencié des *C49.1*
- - - Liposarcome dédifférencié des *C49.1*
- - - Liposarcome des *C49.1*
- - - Liposarcome myxoïde des *C49.1*
- - - Liposarcome pléiomorphe des *C49.1*
- - - Rhabdomyosarcome
- - - - *C49.1*
- - - - Alvéolaire des *C49.1*
- - - - Pléomorphe des *C49.1*
- - - Sarcome alvéolaire des *C49.1*
- - - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C49.1*
- - - Sarcome épithélioïde des *C49.1*
- - - Sarcome synovial des *C49.1*
- - - Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des *C49.1*
- - - Tumeur rhabdoïde des *C49.1*
- - ¬ Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres *C79.86*
- Oreille ¬ *C79.88*
- Origine professionnelle ¬ Affections des *M70*
- Paupière ¬ *C79.88*
- Pelvis ¬
- - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des *C49.5*
- - Fibromyxosarcome des *C49.5*
- - Liposarcome bien différencié des *C49.5*
- - Liposarcome dédifférencié des *C49.5*
- - Liposarcome des *C49.5*

Tissu mou *–suite*
- Pelvis ¬ *–suite*
- - Liposarcome myxoïde des *C49.5*
- - Liposarcome pléiomorphe des *C49.5*
- - Rhabdomyosarcome
- - - *C49.5*
- - - Alvéolaire des *C49.5*
- - - Pléomorphe des *C49.5*
- - Sarcome alvéolaire des *C49.5*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C49.5*
- - Sarcome épithélioïde des *C49.5*
- - Sarcome synovial des *C49.5*
- - Tumeur desmoplastique à petites cellules rondesdes des *C49.5*
- - Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.5*
- - Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des *C49.5*
- - Tumeur rhabdoïde des *C49.5*
- Présence d'un corps étranger non classé ailleurs ¬ Granulome d'un *M60.2*
- Sans précision ¬
- - Affection des *M79.9*
- - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.9*
- - Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.9*
- Sièges précisés ¬ Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres *C79.88*
- Sollicitation excessif
- - Sans précision ¬ Affection des *M70.9*
- - ¬ Autres affections des *M70.8*
- Stade
- - I lors fracture
- - - Fermée luxation
- - - - Avant-bras ¬ Lésion des *S51.84!*
- - - - Bras ¬ Lésion des *S41.84!*
- - - - Cou ¬ Lésion des *S11.84!*
- - - - Hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.84!*
- - - - Jambe ¬ Lésion des *S81.84!*
- - - - Pied ¬ Lésion des *S91.84!*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.84!*
- - - - Tête ¬ Lésion des *S01.84!*
- - - - Thorax ¬ Lésion des *S21.84!*
- - - Luxation
- - - - Fermée de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.84!*
- - - - Ouverte de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.87!*
- - - Ouverte luxation
- - - - Avant-bras ¬ Lésion des *S51.87!*
- - - - Bras ¬ Lésion des *S41.87!*
- - - - Cou ¬ Lésion des *S11.87!*
- - - - Hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.87!*

Tissu mou *–suite*
- Stade *–suite*
- - I lors fracture *–suite*
- - - Ouverte luxation *–suite*
- - - - Jambe ¬ Lésion des *S81.87!*
- - - - Pied ¬ Lésion des *S91.87!*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.87!*
- - - - Tête ¬ Lésion des *S01.87!*
- - - - Thorax ¬ Lésion des *S21.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée luxation
- - - - Avant-bras ¬ Lésion des *S51.85!*
- - - - Bras ¬ Lésion des *S41.85!*
- - - - Cou ¬ Lésion des *S11.85!*
- - - - Hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.85!*
- - - - Jambe ¬ Lésion des *S81.85!*
- - - - Pied ¬ Lésion des *S91.85!*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.85!*
- - - - Tête ¬ Lésion des *S01.85!*
- - - - Thorax ¬ Lésion des *S21.85!*
- - - Luxation
- - - - Fermée de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.85!*
- - - - Ouverte de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.88!*
- - - Ouverte luxation
- - - - Avant-bras ¬ Lésion des *S51.88!*
- - - - Bras ¬ Lésion des *S41.88!*
- - - - Cou ¬ Lésion des *S11.88!*
- - - - Hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.88!*
- - - - Jambe ¬ Lésion des *S81.88!*
- - - - Pied ¬ Lésion des *S91.88!*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.88!*
- - - - Tête ¬ Lésion des *S01.88!*
- - - - Thorax ¬ Lésion des *S21.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée luxation
- - - - Avant-bras ¬ Lésion des *S51.86!*
- - - - Bras ¬ Lésion des *S41.86!*
- - - - Cou ¬ Lésion des *S11.86!*
- - - - Hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.86!*
- - - - Jambe ¬ Lésion des *S81.86!*
- - - - Pied ¬ Lésion des *S91.86!*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.86!*
- - - - Tête ¬ Lésion des *S01.86!*
- - - - Thorax ¬ Lésion des *S21.86!*
- - - Luxation
- - - - Fermée de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.86!*
- - - - Ouverte de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.89!*

Tissu mou *–suite*
- Stade *–suite*
- - III lors fracture *–suite*
- - - Ouverte luxation
- - - - Avant-bras ¬ Lésion des *S51.89!*
- - - - Bras ¬ Lésion des *S41.89!*
- - - - Cou ¬ Lésion des *S11.89!*
- - - - Hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.89!*
- - - - Jambe ¬ Lésion des *S81.89!*
- - - - Pied ¬ Lésion des *S91.89!*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.89!*
- - - - Tête ¬ Lésion des *S01.89!*
- - - - Thorax ¬ Lésion des *S21.89!*
- Tête
- - Face cou ¬
- - - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.0*
- - - Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.0*
- - ¬
- - - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des *C49.0*
- - - Fibromyxosarcome des *C49.0*
- - - Hémangioendothéliome épithélioïde des *C49.0*
- - - Liposarcome bien différencié des *C49.0*
- - - Liposarcome dédifférencié des *C49.0*
- - - Liposarcome des *C49.0*
- - - Liposarcome myxoïde des *C49.0*
- - - Liposarcome pléiomorphe des *C49.0*
- - - Maladie de Kimura des *D21.0*
- - - Rhabdomyosarcome
- - - - *C49.0*
- - - - Alvéolaire des *C49.0*
- - - - Embryonnaire des *C49.0*
- - - - Pléomorphe des *C49.0*
- - - Sarcome alvéolaire des *C49.0*
- - - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C49.0*
- - - Sarcome épithélioïde des *C49.0*
- - - Sarcome synovial des *C49.0*
- - - Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des *C49.0*
- - - Tumeur rhabdoïde des *C49.0*
- Thorax ¬
- - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des *C49.3*
- - Fibromyxosarcome des *C49.3*
- - Liposarcome bien différencié des *C49.3*
- - Liposarcome dédifférencié des *C49.3*
- - Liposarcome des *C49.3*
- - Liposarcome myxoïde des *C49.3*
- - Liposarcome pléiomorphe des *C49.3*
- - Rhabdomyosarcome
- - - *C49.3*
- - - Alvéolaire des *C49.3*

Tissu mou *–suite*
- Thorax ¬ *–suite*
- - Rhabdomyosarcome *–suite*
- - - Pléomorphe des *C49.3*
- - Sarcome alvéolaire des *C49.3*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C49.3*
- - Sarcome épithélioïde des *C49.3*
- - Sarcome synovial des *C49.3*
- - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.3*
- - Tumeur desmoplastique à petites cellules rondes des *C49.3*
- - Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.3*
- - Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des *C49.3*
- - Tumeur rhabdoïde des *C49.3*
- Tronc
- - Sans précision ¬
- - - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.6*
- - - Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.6*
- - ¬
- - - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des *C49.6*
- - - Fibromyxosarcome des *C49.6*
- - - Liposarcome dédifférencié des *C49.6*
- - - Liposarcome des *C49.6*
- - - Liposarcome myxoïde des *C49.6*
- - - Liposarcome pléiomorphe des *C49.6*
- - - Rhabdomyosarcome
- - - - *C49.6*
- - - - Alvéolaire des *C49.6*
- - - - Pléomorphe des *C49.6*
- - - Sarcome alvéolaire des *C49.6*
- - - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C49.6*
- - - Sarcome épithélioïde des *C49.6*
- - - Sarcome synovial des *C49.6*
- - - Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des *C49.6*
- - - Tumeur rhabdoïde des *C49.6*
- ¬
- - Affections précisées des *M79.8*
- - Corps étranger résiduel dans un *M79.5*
- - Liposarcome bien différencié des *C49.6*
- - Sarcome alvéolaire des *C49.9*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des *C49.1*
- - Sarcome de Kaposi des *C46.1*
- - Sein (peau) (*D03.5*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres *C49.8*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres *D48.1*

Tissu sous-cutané
- Épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le *E88.21*
- Excédentaire et flasque ¬ Peau et *L98.7*
- Membres ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.2*
- Non classée
- - Avant-bras et poignet ¬ Nécrose de la peau et du *R02.02*
- - Jambe et genou ¬ Nécrose de la peau et du *R02.06*
- - Localisation non précisée ¬ Nécrose de la peau et du *R02.09*
- - Main et doigt ¬ Nécrose de la peau et du *R02.03*
- - Région de l'épaule, bras et coude ¬ Nécrose de la peau et du *R02.01*
- - Région de la cheville, pied et orteils ¬ Nécrose de la peau et du *R02.07*
- - Région pelvienne et cuisse ¬ Nécrose de la peau et du *R02.05*
- - Tête et cou ¬ Nécrose de la peau et du *R02.00*
- - Tronc ¬ Nécrose de la peau et du *R02.04*
- - ¬ Nécrose post-traumatique de la peau et du *R02*
- Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.3*
- Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.0*
- Tronc ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.1*
- Uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée lisse, avec *E88.20*
- ¬
- - Déficit tissulaire limité à la peau [derme] et au *I70.24*
- - Maladie due au VIH avec maladie du *B23.8, L98.9*
- - Tumeur du glomus du *D18.01*

Tissulaire
- Infiltrante ¬ Malformation lymphatique microkystique *D18.19*
- Limité à la peau [derme] et au tissu sous-cutané ¬ Déficit *I70.24*
- ¬ Maladie systémique due aux mastocytes *D47.0*

Titre prophylactique ¬ Admission pour ablation d'un organe à *Z40.0*

TLR ¬ Prédisposition aux infections bactériennes par trouble de la signalisation par les *D84.8*

T-lymphotrope humain de type I ¬ Dermatite infectieuse associée au virus *L30.3*

TMEM94 ¬ Syndrome d'anomalie cardiaque congénitale-dysmorphie faciale-retard du développement associé à *Q87.0*

TNFAIP3 ¬ Syndrome autoinflammatoire à début précoce lié à *M35.8*

Tocolytique
- Début travail
- - 1 à 7 jours ¬ Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.21*
- - 24 heures ¬ Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.20*
- - Plus de 7 jours ¬ Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.22*
- Sans précision du début du travail ¬ Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.29*

Todd
- Post-ictale) ¬ Paralysie de *G83.8*
- ¬
- - Cirrhose de *K74.3*
- - Paralysie post-épileptique de *G83.8*

Toit
- Orbite ¬ *S02.1*
- Oreillette gauche ¬ Abouchement de la veine cave supérieure gauche dans le *Q26.1*

Tokelau ¬ *B35.5*

Tokita
v./v.a. Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

Tolérance glucose
- Réduite ¬ *R73.08*
- ¬
- - Anomalie de l'épreuve de *R73.08*
- - Diminution de la *R73.08*
- - Faible *R73.08*

Tolosa-Hunt ¬ Syndrome de *H49.0*

Toluène
- Méthylbenzène] ¬ *T52.2*
- ¬ Embryopathie au *Q86.88*

Tombant
- Acquis) ¬ Poignet ou pied *M21.3*
- ¬ Accident dû à: Objet (jeté) (*W49.9!*

Toms River ¬ Hémoglobinopathie *D58.2*

Tondante ¬ Teigne *B35.0*

Toni Debré Fanconi ¬ Syndrome
- *E72.0*
- *E72.0*

Tonico clonique
- Généralisées ¬ Syndrome de Poirier-Bienvenu avec crises *G40.3*
- ¬
- - Crises non spécifiques: *G40.3*
- - État de mal épileptique *G41.0*

Tonique paroxystique du regard avec ataxie ¬ Déviation *G96.8, H51.8*

Toniques ¬ Crises non spécifiques: *G40.3*

Tonsilles ¬ Infection purulente chronique des *J35.0*

Tonsurans ¬
- Herpes *B35.0*
- Tinea *B35.0*

Tonus musculaire
- Accru ¬ *R29.8*

Tonus musculaire *–suite*
- Anormal ¬ Syndrome de microcéphalie-déficience intellectuelle-surdité neurosensorielle-épilepsie- *Q87.8*
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬ Anomalie du *P94.9*
- - ¬ Autres anomalies du *P94.8*
- ¬ Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du *T42.8*

Tönz
v./v.a. Kohlschütter-Tönz

Tooth
v./v.a. Charcot-Marie-Tooth

Tophus goutteux du cœur ¬ *M10.09†, I43.8**

Topique
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage *T49.0*
- Sans précision ¬ Intoxication: *T49.9*
- ¬
- - Glucocorticoïdes à usage *T49*
- - Intoxication
- - - *T49.8*
- - - Médicaments dentaires à usage *T49.7*

Topoisomérase
- II ¬ Syndrome myélodysplasique dû à des inhibiteurs de la *D46.9*
- Type II ¬ Leucémie myéloïde aiguë due à un inhibiteur de la *C92.00*

Toriello
v./v.a. Kapur-Toriello
- ¬
- - Chondrodysplasie ponctuée type *Q77.3*
- - Nanisme microcéphalique primordial type *Q87.1*

Toriello-Carey ¬ Syndrome de *Q87.8*

Toriello-Lacassie-Droste ¬ Syndrome de *Q84.8, D31.4*

Torpille ¬ Maculopathie en *H35.8*

Torrance ¬ Dysplasie platyspondylique type *Q77.8*

Torréfacteurs café
- Exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.81*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.80*
- ¬ Poumon des *J67.80*

Torsades de pointes à couplage court ¬ Syndrome des *I47.2*

Torsion
- Canal spermatique ¬ *N44.0*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.2*
- Congénitale de l'ovaire ¬ *Q50.2*
- Cordon ombilical ¬ *P02.5*
- Début précoce ¬ Dystonie de *G24.1*
- Épididyme ¬ *N44.0*
- Hydatide
- - Morgagni ¬ *N83.5*
- - ¬ *N44.1*
- Ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope ¬ *N83.5*

Torsion *–suite*
- Rate ¬ *D73.5*
- Testicule ¬
- - *N44.0*
- - *N44.0*
- Trompe surnuméraire ¬ *N83.5*
- ¬ Dystonie de *G24.1*

Torti
- Onychodysplasie ¬ Syndrome de pili *Q82.8*
- Retard de développement-anomalies neurologiques ¬ Syndrome de pili *Q87.8*
- Syndactylie cutanée ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique-pili *Q82.8*
- ¬ Pili *Q84.1*

Torticoli hystérique ¬ *F44.4*

Torticolis
- Chéloïdes-cryptorchidie-dysplasie rénale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Congénital (sterno-mastoïdien) ¬ *Q68.0*
- Paroxystique bénin de l'enfant ¬ *G24.3*
- Psychogène ¬ *F45.8*
- Spasmodique ¬ *G24.3*
- ¬ *M43.6*

Tortuosité
- Artères de la rétine ¬ *Q14.1*
- Artérielle ¬ Syndrome de *I77.1*

Torture ¬
- Modification de la personnalité après: *F62.0*
- Victime d'un crime, d'actes terroristes ou de *Z65*

Torula histolytica ¬
- Méningo-encéphalomyélite à *B45.1†, G05.2**
- Méningomyélite à *B45.1†, G05.2**

Torulose
- Poumons ¬ *B45.0†, J99.8**
- ¬
- - *B45.9*
- - Encéphalite au cours de *B45.1†, G05.2**
- - Méningite due à une *B45.1†, G02.1**

Torus
- Mandibulaire ¬ *K10.0*
- Palatin ¬ *K10.0*

TOS] ¬ Syndrome de traversée thoracobrachiale [*G54.0*

Toselano
v./v.a. Fenton-Wilkinson-Toselano

Touffe
- Syndromique ¬ Entéropathie congénitale en *K90.8*
- ¬ Angiome en *D18.01*

Touraine
v./v.a. Christ-Siemens-Touraine

Touraine-Solente-Gole ¬ Syndrome de *M89.49*

Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la *F95.2*

Toutain
v./v.a. Isidor-Toutain

Toux
- Chronique ¬ *R05, U69.6!*
- Convulsive ¬ *A37.9*
- Hémorragie ¬ *R04.2*
- ¬
- - *R05*
- - Dépendance (de longue durée) envers: insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la *Z99.0*
- - Formes psychogènes de: *F45.3*

Towey ¬ Maladie de *J67.60*

Townes-Brocks ¬ Syndrome de *Q87.8*

Toxémie gravidique ¬ *O14.9*

Toxicité
- Enzalutamide ¬ *T38.6*
- Méthotrexate ¬ *T45.1*
- ¬ Dépression médullaire due à une *D61.9*

Toxicomane ¬ Syndrome de sevrage chez un enfant de mère *P96.1*

Toxicomanie
- Mère ¬
- - Fœtus et nouveau-né affectés par *P04.4*
- - Symptômes néonatals de privation dus à la *P96.1*
- ¬
- - Conseil et surveillance pour: abus de médicaments ou *Z71*
- - Insuffisance hépatique par *K71.1, Y57.98!*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de *O35.5*

Toxicose prééclamptique ¬ *O14.9*

Toxines
- Rayonnements [DPAH] ¬ Hypertension artérielle pulmonaire induite par des médicaments, des drogues, des *I27.02*
- Transmis par la mère ou administrés au nouveau-né ¬ Ictère néonatal dû à des médicaments ou des *P58.4*
- ¬
- - Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des *D64.2*
- - Hypertension artérielle pulmonaire induite par des *I27.02*

Toxique
v./v.a. Type de maladie

Toxocarose ¬
- *B83.0*
- Endophtalmie au cours de *B83.0†, H45.1**

Toxoplasma
- Gondii ¬
- - Infection
- - - *B58*
- - - *B58.98*
- - Maladie due au VIH avec infection à *B20, B58.98*
- ¬
- - Choriorétinite à *B58.0†, H32.0**
- - Hépatite à *B58.1†, K77.0**
- - Méningo-encéphalite à *B58.2†, G05.2**

Toxoplasma *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Myocardite à *B58.8†, I41.2**
- - Myosite à *B58.8†, M63.19**
- - Oculopathie à *B58.0†*
- - Septicémie à *B58.90*

Toxoplasme ¬
- Affection des yeux due à des *B58.0†, H58.8**
- Hypophysite à *B58.2†, G05.2**
- Pneumonie à *B58.3†, J17.3**
- Vasculite à *B58.8†, I98.1**

Toxoplasmose
- Atteinte d'autres organes ¬ *B58.8*
- Cérébrale
- - SIDA ¬ *B20†, G05.2*, B58.2*
- - ¬ *B58.2†, G05.2**
- Congénitale ¬
- - *P37.1*
- - Hydrocéphalie due à une *P37.1*
- Hépatique ¬ *B58.1†, K77.0**
- Poumon ¬ *B58.3†, J17.3**
- Pulmonaire ¬ *B58.3†, J17.3**
- ¬
- - *B58.98*
- - Choriorétinite congénitale à *P37.1†, H32.0**
- - Encéphalite congénitale à *P37.1†, G05.2**
- - Encéphalomyélite au cours de *B58.2†, G05.2**
- - Hépatite
- - - Acquise à *B58.1†, K77.0**
- - - Congénitale à *P37.1†, K77.0**
- - Hydrocéphalie congénitale due à la *P37.1*
- - Lymphadénopathie congénitale due à la *P37.1*
- - Maladie
- - - Due au VIH avec *B20, B58.98*
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de *B58.8†, N16.0**
- - Méningo-encéphalite
- - - Acquise au cours de *B58.2†, G05.2**
- - - Congénitale à *P37.1†, G05.2**
- - Méningo-encéphalomyélite
- - - Acquise au cours de *B58.2†, G05.2**
- - - Congénitale à *P37.1†, G05.2**
- - Microcéphalie congénitale due à la *P37.1*
- - Microphtalmie congénitale due à la *P37.1*
- - Myélite au cours de *B58.2†, G05.2**
- - Myocardite au cours de *B58.8†, I41.2**
- - Myosite au cours de *B58.8†, M63.19**
- - Pancréatite due à la *B58.8†, K87.1**
- - Pneumonie au cours de *B58.3†, J17.3**
- - Pneumonie congénitale à *P37.1†, J17.3**
- - Pneumopathie due à la *B58.3†, J17.3**
- - Pyélonéphrite au cours de *B58.8†, N16.0**
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.8*

Toxoplasmose *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Uvéite
- - - Acquise au cours de *B58.0†, H22.0**
- - - Congénitale à *P37.1†, H22.0**

TPMT (thiopurine méthyltransférase) ¬ Déficit congénital en *E88.8*

TPP2 ¬ Syndrome d'anémie hémolytique autoimmune avec thrombocytopénie autoimmune et déficit immunitaire primaire par déficit en *D69.3, D82.9*

Traboulsi ¬ Syndrome de *Q87.0*

Trachéal
- Acquise
- - SAI. ¬ Sténose *J39.80*
- - ¬ Sténose *J39.80*
- Actes médicaux ¬ Sténose *J95.81*
- Consécutive à une trachéotomie ¬ Fistule œsophago- *J95.03*
- Partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule *R13.1*
- Tuberculeuse ¬ Sténose *A16.4*
- ¬
- - Adaptation et manipulation d'un extenseur *Z45.85*
- - Anomalie du cartilage *Q32.1*
- - Présence d'un extenseur *Z96.81*
- - Pyothorax avec fistule œsophago- *J86.03*

Trachéamycose ¬ *B49†, J99.8**

Trachée
- Bronche poumon ¬
- - Antécédents familiaux de tumeur maligne de la *Z80.1*
- - Antécédents personnels de tumeur maligne de la *Z85.1*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la *J95.82*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D38.1*
- Confirmation bactériologique
- - Biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de: *A15.5*
- - Histologique ¬ Tuberculose de la *A15.5*
- Œsophage ¬ Double arc aortique avec constriction circulaire de la *Q25.4*
- Partie cervicale ¬ Plaie ouverte de la *S11.02*
- Poumon ¬
- - Brûlure comprenant le larynx et la *T27.1*
- - Corrosion comprenant le larynx et la *T27.5*
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- - ¬ *S11.02*
- Thoracique
- - Larynx ¬ *S11.01*
- - ¬ Lésion traumatique de la *S27.5*
- ¬
- - *S10.0*

Trachée *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *S12.8*
- - Agénésie de la *Q32.1*
- - Atrésie de la *Q32.1*
- - Blessure de la partie cervicale de la *S19.9*
- - Brûlure du larynx et de la *T27.0*
- - Carcinoma in situ: *D02.1*
- - Corps étranger dans la *T17.4*
- - Corrosion du larynx et de la *T27.4*
- - Dilatation congénitale de la *Q32.1*
- - Écrasement du larynx et de la *S17.0*
- - Fracture des anneaux cartilagineux de la *S12.8*
- - Gomme de la *A52.7†, J99.8**
- - Kyste de la *J39.88*
- - Malformation congénitale
- - - *Q32.1*
- - - *Q32.1*
- - Pyothorax avec fistule de la *J86.01*
- - Rétrécissement syphilitique de la *A52.7†, J99.8**
- - Sténose
- - - Congénitale de la *Q32.1*
- - - Syphilitique de la *A52.7†, J99.8**
- - Syphilis de la *A52.7†, J99.8**
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, J99.8**
- - Tuberculose de la *A16.4*
- - Tumeur bénigne: *D14.2*
- - Tumeur maligne de la *C33*

Trachéite
- Aiguë
- - Catarrhale ¬ *J04.1*
- - Laryngite (aiguë) ¬ *J04.2*
- - SAI ¬ *J04.1*
- - ¬
- - - *J04.1*
- - - Laryngo- *J04.2*
- Aspergillus ¬ *B44.8*
- Candida ¬ *B37.88*
- Chronique
- - Laryngite ¬ *J37.1*
- - ¬
- - - *J42*
- - - Laryngite chronique avec *J37.1*
- - - Laryngo- *J37.1*
- Diphtérique ¬
- - *A36.8*
- - Laryngo- *A36.2*
- Due à une candidose ¬ *B37.88*
- Pneumocoques ¬ *J04.1, B95.3!*
- SAI ¬
- - Bronchite: avec *J40*
- - Laryngo- *J04.2*
- Streptocoques ¬ *J04.1, B95.5!*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.7†, J99.8**

Trachéite *–suite*
- Tuberculeuse
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.5*
- - ¬ *A16.4*
- Virale ¬ *J04.1, B97.8!*
- ¬ Bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*

Trachéo
v./v.a. laryngo-trachéo-œsophagienne
- Pleurale ¬ Fistule *J86.01*

Trachéo-bronchique
- Confirmation bactériologique
- - Biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A15.4*
- - Histologique ¬
- - - Primo-infection tuberculeuse des ganglions *A15.7*
- - - Tuberculose *A15.5*
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A16.3*
- Survenant pendant la période périnatale ¬ Hémorragie *P26.0*
- Tuberculeuse primaire avec confirmation bactériologique ou histologique ¬ Lymphadénopathie *A15.7*
- ¬
- - Collapsus *J98.0*
- - Dyskinésie *J98.0*
- - Lymphadénopathie *R59.0*
- - Primo-infection tuberculeuse des ganglions *A16.7*
- - Tuberculose
- - - *A16.4*
- - - Ganglionnaire *A16.3*
- - - Glandes *A16.3*

Trachéo-bronchite
- Aiguë ¬ *J20*
- Aspergillus ¬ *B44.1†, J99.8**
- Bordetella bronchiseptica ¬ *A37.8*
- Chronique ¬ *J42*
- Congestion ¬ *J42*
- Francisella tularensis ¬ *A21.8*
- Obstructive chronique ¬ *J44*
- SAI ¬ *J40*

Trachéobronchomégalie congénitale ¬ *Q32.1*

Trachéo-bronchopathie chondro-ostéoplastique ¬ *J98.0*

Trachéocèle congénitale ¬ *Q32.1*

Trachéodiphtérie ¬ *A36.8*

Trachéomalacie congénitale ¬ *Q32.0*

Trachéo-œsophagien
v./v.a. Fistule trachéo-œsophagienne

Trachéostome ¬
- Complication due à un *J95.09*
- Dysfonctionnement d'un *J95.09*
- Fonctionnement défectueux d'un *J95.09*

Trachéostome ¬ *–suite*
- Infection du *J95.01*

Trachéostomie
- Nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur *R13.1*
- ¬
- - Présence d'une *Z93.0*
- - Surveillance de *Z43.0*

Trachéotomie ¬
- Fistule
- - *J95.08*
- - Œsophago-trachéale consécutive à une *J95.03*
- Fistule trachéo-œsophagienne consécutive à une *J95.03*
- Hémorragie au niveau de la *J95.00*
- Obstruction
- - Voie respiratoire créée par la *J95.02*
- - Voies respiratoires consécutive à une *J95.02*
- Sténose de la stomie consécutive à une *J95.02*

Trachoma dubium ¬ *A71.0*

Trachomateux ¬
- Conjonctivite
- - Folliculaire *A71.1*
- - Granuleuse (*A71.1*
- Pannus *A71.1*

Trachomatis transmises par voie sexuelle ¬ Infections à Chlamydia *A56*

Trachome ¬
- Phase
- - Active du *A71.1*
- - Initiale du *A71.0*
- Séquelles du *B94.0*

Trachyonychie idiopathique ¬ *L60.3*

Traction
- Normale et traduisant une résistance inférieure à la normale ¬ les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en *M66*
- Rétine ¬ Décollement par *H33.4*
- Vitréo-maculaire ¬ *H35.38*
- ¬ Changement, vérification ou enlèvement de: appareils externes de fixation ou de *Z47.8*

Tractionnel
- Cours rétinopathie diabétique diabète sucré type
- - 1 ¬ Décollement *E10.30†, H36.0**
- - 2 ¬ Décollement *E11.30†, H36.0**
- Rétinopathie diabétique ¬ Décollement *E14.30†, H36.0**

Tractus
- Cranio-pharyngien ¬ Tumeur maligne: *C75.2*
- Gastro-intestinal
- - Inférieur ¬ Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le *T85.52*

Tractus *–suite*
- Gastro-intestinal *–suite*
- - Sans précision ¬ Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le *T47.9*
- - Supérieur ¬ Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans d'autres parties du *T85.51*
- - Sur plusieurs segments ¬ Maladie de Crohn de l'œsophage et du *K50.82*
- - ¬
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du *T85.76*
- - - Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le *T47.8*
- - - Malformation artério-veineuse du *Q27.3*
- Uvéal ¬
- - Syphilis secondaire du *A51.4†, H22.0**
- - Syphilis tardive du *A52.7†, H22.0**

Tragus
- Accessoire ¬ *Q17.0*
- ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.33*

Train ¬ Accident de *V99!*

Trait
- Grossiers du visage-planovalgus ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-hypotonie-strabisme- *Q87.8*
- Hb-S ¬ *D57.3*
- Maladie des hématies falciformes [drépanocytaire] ¬ *D57.3*
- Personnalité ¬ Accentuation de certains *Z73*
- Thalassémique ¬ *D56.3*

Traitement
- Affection, sans précision ¬ Examen de contrôle après *Z09.9*
- Affections ¬ Examen de contrôle après d'autres *Z09.8*
- Anticoagulant ¬ Hématurie sous *D68.35*
- Cellules CAR-T ¬ Syndrome de libération de cytokines lié au *D76.4*
- Chirurgical
- - Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.0*
- - Décollement ¬ Cicatrices choriorétiniennes après *H59.8*
- - Tumeur maligne ¬ Examen de contrôle après *Z08.0*
- Combinés
- - Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.7*
- - Tumeur maligne ¬ Examen de contrôle après *Z08.7*
- - ¬ Convalescence après *Z54.7!*
- Composé du platine ¬ Réaction allergique au *T88.7*
- Continu
- - Antiagrégants plaquettaires, sans hémorragie ¬ *Z92.2*
- - Coumariniques, sans hémorragie ¬ *Z92.1*
- - Héparines, sans hémorragie ¬ *Z92.1*

Traitement *–suite*
- Cytostatique
- - Maladies non malignes ¬ *Z51.2*
- - Néoplasie) ¬ Lyse (spontanée) des tumeurs (après *E88.3*
- - ¬
- - - Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un *D61.10*
- - - Leucopénie après un *D70.19*
- Falithrom ¬
- - Hématome de la gaine des grands droits lors d'un *D68.33, M62.88*
- - Hémorragie sous *D68.33*
- Fer ¬ Anémie par déficit en fer réfractaire au *D50.8*
- Fracture ¬
- - Convalescence après *Z54.4!*
- - Examen de contrôle après *Z09.4*
- Héparine ¬ Hémorragie sous *D68.34*
- Induction
- - Standard ¬ Leucémie, réfractaire au *C95.8!*
- - ¬ Leucémie myéloïde aiguë réfractaire à un *C92.00*
- Inhalation ¬ Complication d'un *T81.8*
- Logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage] ¬ *Z50.5!*
- Maladies ¬ Examen de suivi après autre *Z09.88*
- Marcoumar ¬ Hémorragie sous *D68.33*
- Marcumar ¬ Hématome de la gaine des grands droits lors d'un *D68.33, M62.88*
- Médecine intensive ¬ État après un *U70.0!*
- Médical
- - Précisés ¬ Autres *Z51.88*
- - Régime ¬ Antécédents personnels de non-observance d'un *Z91.1*
- - Sans précision ¬ Antécédents personnels de *Z92.9*
- - ¬ Antécédents personnels d'autres *Z92.8*
- Médicamenteuse) ¬ Akathisie (induite par le *G25.88*
- Non précisé ¬ Convalescence après un *Z54.9!*
- Retardé ¬ *T89.03*
- Sans précision ¬ Syndrome dû à de mauvais *T74.9*
- Substitution
- - Méthadone ¬ *Z51.83*
- - Opiacés ¬ *Z51.83*
- Tocolytique
- - Début travail
- - - - 1 à 7 jours ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.21*
- - - 24 heures ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.20*
- - - Plus de 7 jours ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.22*
- - Sans précision du début du travail ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.29*

Traitement *–suite*
- Tumeur maligne
- - Sans précision ¬ Examen de contrôle après *Z08.9*
- - ¬ Examen de contrôle après d'autres *Z08.8*
- Ultérieur, non classés ailleurs ¬ Soins préparatoires pour *Z51.4*
- Visuel ¬ Trouble cérébral du *H47.6*
- Voie orale ¬ Périodes off de la maladie de Parkinson ne répondant pas aux *G20.91*
- ¬
- - Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.1*
- - Arrêt prématuré du *Y69!*
- - Convalescence après un autre *Z54.8!*
- - Déficience intellectuelle
- - - Légère avec trouble du comportement nécessitant manifestement un *F70.1*
- - - Moyen avec trouble du comportement nécessitant manifestement un *F71.1*
- - Mauvais *Y09.9!*
- - Période d'attente pour investigation et *Z75.2*
- - Préparation d'une dialyse et *Z49*
- - Surveillance médical
- - - *Z08*
- - - *Z09*
- - Syndrome myélodysplasique induit par un *D46.9*
- - Syndromes dus à de mauvais *T74.8*

Tram ¬ Accident de *V99!*

Tranchées ¬
- Fièvre des *A79.0*
- Pied des *T69.0*

Tranebjaerg
v./v.a. Mohr-Tranebjaerg

Tranquillisants
- Administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et intoxications dues à des opiacés et *P04.0*
- ¬ Intoxication par *T43.5*

Transaldolase ¬ Déficit en *E74.8*

Transaminase
- Acide
- - Gamma-aminobutyrique ¬ Déficit en *E72.8*
- - Lactique déshydrogénase ¬ Augmentation des taux de *R74.0*
- ¬ Déficit en GABA *E72.8*

Transcarbamylase ¬ Déficit en ornithine *E72.4*

Transcervicale
- Ouverte du col du fémur ¬ Fracture *S72.04, S71.87!*
- SAI ¬ *S72.04*

Transcobalamine
- I ¬ Déficit en *E53.8*
- II ¬ Carence en *D51.2*
- ¬ Acidurie méthylmalonique par déficit en récepteur de la *E71.1*

Transcondylaire (en T ou en Y) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.45*

Transcortine ¬
- Anomalie de la *E27.8*
- Déficit en *E27.8*

Transducer ¬ Déficit immunitaire combiné autosomique
- Dominant par déficit partiel en IL6ST [Interleukin 6 signal *D81.8*
- Récessif déficit
- - Complet en IL6ST [interleukin 6 signal *D81.8*
- - Partiel en IL6ST [Interleukin 6 signal *D81.8*

Transe et de possession ¬ États de *F44.3*

Transépidermique
- Sans précision ¬ Anomalie de l'élimination *L87.9*
- ¬ Autres anomalies de l'élimination *L87.8*

Transférase
- 1 ¬ Déficit en lipoyl *E88.8*
- 2 ¬ Déficit en lipoyl *E78.88*
- ¬ Déficit
- - Phosphoribosylpyrophosphate *E79.8*
- - Succinyl-CoA
- - - 3
- - - - Cétoacide CoA *E71.3*
- - - - Oxoacide CoA *E71.3*
- - - Acétoacétate *E71.3*

Transfert
- Cytosolique du groupement méthyle ¬ Anomalie du *E72.1*
- Embryon ¬ Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de *N98.3*
- Esters de cholestérol ¬ Déficit en protéine de *E78.4*

Transformation
- Maligne ¬ Tumeur ovarienne dermoïde avec *C56*
- Post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux ¬ Défauts de la *E77.0*
- ¬ Anémie réfractaire
- - Crise blastique
- - - Cours de *C92.00*
- - - Prolifération de blastes en *C92.0*
- - Excès de blastes en *D46.2*

Transformé en bouc émissaire ¬ Hostilité envers un enfant *Z62*

Transfusion
- Fœto-fœtal ¬
- - Lésions chez le nouveau-né dues à une *P02.3*
- - Soins maternels au cours de syndrome de *O43.0*
- - Syndrome de *P02.3*
- Fœto-maternelle ¬ *O43.0*
- Jumeau
- - Jumeau ¬
- - - *O43.0*

Transfusion *–suite*
- Jumeau *–suite*
- - Jumeau ¬ *–suite*
- - - *O43.0*
- - Transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une *P02.3*
- Materno-fœtale ¬ *O43.0*
- Placentaire ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de *P02.3*
- SAI ¬ Réaction à une *T80.9*
- Sang incompatible ¬ *T80.3*
- Sanguine, sans mention de diagnostic ¬ *Z51.3*
- Sans précision ¬ Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une *T80.9*
- Transplacentaire
- - Mère ¬ Syndrome de *O43.0*
- - ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre *P02.3*
- ¬
- - Choc septique après perfusion, injection thérapeutique ou *T80.2, R57.2*
- - Complication
- - - Consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une *T80.8*
- - - Vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une *T80.1*
- - Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une *T80.0*
- - Hyperimmunisation anti-HLA post *T80.6*
- - Ictère
- - - *T80.8*
- - - Réaction hémolytique à la *T80.8*
- - Infection consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et *T80.2*
- - Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une *T80.2*
- - Phlébite consécutive à injection thérapeutique, perfusion et *T80.1*
- - Réaction
- - - Due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou *T80.4*
- - - Incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une *T80.3*
- - Septicémie consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et *T80.2*
- - Thrombocytopénie non précisée
- - - Non qualifiée de réfractaire aux *D69.61*
- - - Qualifiée de réfractaire aux *D69.60*
- - Thrombo-embolie consécutive à injection thérapeutique, perfusion et *T80.1*
- - Thrombopénie
- - - Néonatale due à: exsanguino- *P61.0*
- - - Primaires

Transfusion *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Thrombopénie *–suite*
- - - Primaires *–suite*
- - - - Non qualifiées de réfractaires aux *D69.41*
- - - - Qualifiées de réfractaires aux *D69.40*
- - - Secondaires
- - - - Non qualifiées de réfractaires aux *D69.58*
- - - - Qualifiées de réfractaires aux *D69.57*
- - Thrombophlébite consécutive à injection thérapeutique, perfusion et *T80.1*

Transit
- Changeants (mixtes) [SII-M] ¬ Syndrome de l'intestin irritable, avec troubles du *K58.3*
- Colique ¬ Constipation lors d'un trouble du *K59.00*
- Intestinal ¬ Modification du *R19.4*
- Lent ¬ Constipation à *K59.00*

Transitionnelle
v./v.a. Carcinome à cellules transitionnelles

Transitions entre les différentes périodes de vie ¬ Difficultés d'ajustement aux *Z60*

Transitoire
v./v.a. Type de maladie

Transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par voie *Z95.88*

Transketolase ¬ Déficit en *E74.8*

Translocase ¬ Déficit
- Carnitine-acylcarnitine *E71.3*
- G6P *E74.0*

Translocation
- 2q37 ¬ Syndrome de croissance excessive avec *Q87.3*
- 11p15 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une *Q87.3*
- Famille MiT ¬ Carcinome rénal associé à une *C64*
- Insertion
- - Équilibrée chez un sujet normal ¬ *Q95.0*
- - Non équilibrées ¬ *Q92*
- - Réciproques robertsoniennes et équilibrées ¬ *Q95*
- T(8;16)(p11;p13) ¬ Leucémie myéloblastique aiguë associée à une *C92.00*
- T(8;21)(q22;q22) ¬ Leucémie myéloblastique aiguë type associée à une *C92.00*
- ¬
- - Syndrome de Down, *Q90.2*
- - Trisomie
- - - 13, *Q91.6*
- - - 18, *Q91.2*
- - - 21, *Q90.2*

Translucidité de l'iris ¬ *H21.2*

Transmissible
- Non précisée ¬ Sujets en contact avec et exposés à une maladie *Z20.9*

Transmissible *–suite*
- ¬ Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies *Z20.8*

Transmission
- Dominante ¬ Neuropathie sensitive héréditaire à *G60.8*
- Est essentiellement sexuel
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies dont le mode de *O98.3*
- - ¬
- - - Maladies précisées dont le mode de *A63.8*
- - - Sujet porteur de maladies dont le mode de *Z22.4*
- - - Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de *Z20.2*
- Malformation cardiaque ¬ Syndrome de dysmorphie-surdité de *Q87.8*
- Maternelle ¬
- - CPEO de *H49.4*
- - Diabète-surdité de *E14.72*
- - Dystonie mitochondriale de *G71.3*
- - Maladie de Leigh de *G31.88*
- - Ophtalmoplégie externe progressive chronique de *H49.4*
- - Paraplégie spastique de *G11.4*
- Neurosensoriel
- - Liée X ¬ Surdité mixte
- - - *H90.3*
- - - *H90.8*
- - Sans
- - - Altération de l'audition de l'autre oreille ¬ Surdité unilatérale mixte de *H90.7*
- - - Précision ¬ Surdité mixte de *H90.8*
- - ¬ Surdité bilatérale mixte de *H90.6*
- Récessive ¬ Neuropathie sensitive héréditaire à *G60.8*
- Sans
- - Altération de l'audition de l'autre oreille ¬ Surdité unilatérale de *H90.1*
- - Précision ¬ Surdité de *H90.2*
- ¬ Surdité bilatérale de *H90.0*

Transmural ¬ Infarctus non *I21.48*

Transpeptidase ¬ Déficit en gamma-glutamyl *E72.8*

Transpiration
- Induite par le froid ¬ Syndrome de la *G90.88*
- ¬ Dysréflexie autonome manifestée par des crises de *G90.41*

Transplacentaire
- Anticorps anti-récepteur de la TSH ¬ Hypothyroïdie congénitale par passage *P72.2*
- Mère ¬ Syndrome de transfusion *O43.0*
- ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion *P02.3*

Transplant
- Cardiaques ou vasculaires ¬ Présence d'autres implants ou *Z95.88*
- Cellule souche hématopoïétique
- - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un *T86.0*
- - ¬ Échec d'un *T86.00*

Transplantation
- Capillaire ¬ *Z41.8*
- Cardiaque
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency] ¬ Inscription pour *U55.12*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription pour *U55.11*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour *U55.10*
- Cellule souche
- - Hématopoïétique
- - - Immunosuppression actuelle ¬ État consécutif à une *Z94.81*
- - - Sans immunosuppression actuelle ¬ État consécutif à une *Z94.80*
- - ¬ Rejet de greffon après *T86.00*
- Cœur poumon
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency]] ¬ Inscription pour *U55.32*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription pour *U55.31*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour *U55.30*
- Hépatique ¬ Réinfection par l 'hépatite B après *B18.14, Z94.4*
- Organe
- - Niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ Inscription effectuée pour *Z75.7*
- - Sans niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ Inscription effectuée pour *Z75.6*
- - Tissus ¬ État consécutif à la *Z94.88*
- - ¬ Examen de suivi après *Z09.80*
- Pulmonaire
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency] ¬ Inscription effectuée pour *U55.22*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription effectuée pour *U55.21*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription effectuée pour *U55.20*
- Rénale ¬ Microangiopathie thrombotique de novo après *M31.1, Z94.0*
- VEF1
- - 35
- - - 50 % de la norme ¬ Bronchiolite oblitérante non liée à une *J44.81*
- - - Norme ¬ Bronchiolite oblitérante non liée à une *J44.80*
- - 50 % et < 70 % de la norme ¬ Bronchiolite oblitérante non liée à une *J44.82*
- - 70 % de la norme ¬ Bronchiolite oblitérante non liée à une *J44.83*
- ¬

Transplantation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Bronchiolite oblitérante non liée à une *J44.89*
- - Détérioration fonctionnelle
- - - 29 jours et plus après la *T86.41*
- - - Greffe foie
- - - - 29 jours et plus après la *T86.41*
- - - - Pendant les premiers 28 jours après la *T86.40*
- - Encéphalite limbique aiguë après *T85.78†, G05.1**
- - Rejet
- - - 29 jours et plus après la *T86.41*
- - - Greffe foie
- - - - 29 jours et plus après la *T86.41*
- - - - Pendant les premiers 28 jours après la *T86.40*

Transplantés hépatiques ¬ Manifestations hépatiques récurrentes causées par le virus de l 'hépatite C chez les *B18.2, Z94.4*

Transport
- Acides aminés ¬ Trouble de l'absorption et du *E72.0*
- Aérien ¬ Accident de *V99!*
- Cérébral des folates ¬ Syndrome neurodégénératif dû au déficit de *G31.88*
- Électrons carence
- - Flavoprotéine ¬ Trouble du *E71.3*
- - Flavoprotéine-ubiquinone oxydoréductase ¬ Trouble du *E71.3*
- Glucose ¬ Anomalie du *E74.8*
- Glutamate-aspartate ¬ Défaut de *E72.0*
- Lactate ¬ Myopathie métabolique par défaut de *E74.8†, G73.6**
- Mucociliaire] [Immotile cilia syndrome] [triade de Kartagener] ¬ Syndrome de Kartagener [Situs inversus viscerum, bronchectasie, sinusite chronique et polypes nasaux] [insuffisance pluriglandulaire résultant d'une anomalie dans le *Q89.3*
- Rétinol ¬ Dystrophie rétinienne progressive par déficit de *H35.5*
- Vésiculaire cérébral de la dopamine et de la sérotonine ¬ Déficit du *G25.88*
- ¬
- - Accident de *V99!*
- - Anomalie de protéine de *E88.08*
- - Examen et mise en observation après un accident de *Z04.1*
- - Mal des *T75.3*

Transporteur
- 1 de monocarboxylate ¬ Cétoacidose par déficit en *E88.8*
- ATP-binding cassette A1 ¬ Déficit du *E78.6*
- Carnitine à travers la membrane plasmique ¬ Défaut du *E71.3*
- Créatine lié à l'X ¬ Déficit en *E88.8*
- Folate 1 ¬ Anémie mégaloblastique-immunodéficience par déficit en *D52.8*
- Mitochondrial

Transporteur *–suite*
- Mitochondrial *–suite*
- - Aspartate-glutamate 1 ¬ Déficit en *E72.0*
- - Pyruvate ¬ Déficit en *G31.81*

Transposition
- Appendice ¬ *Q43.8*
- Cœur
- - Inversion totale des viscères ¬ *Q89.3*
- - ¬ *Q24.0*
- Côlon ¬ *Q43.8*
- Complète des grosses artères ¬ *Q20.3*
- Congénitale complète d'un gros vaisseau ¬ *Q20.3*
- Congénitalement
- - Corrigée des gros vaisseaux ¬ *Q20.5*
- - Non corrigée gros vaisseau
- - - Coarctation ¬ *Q20.3*
- - - Malformation cardiaque ¬ *Q20.3, Q24.9*
- - - ¬ *Q20.3*
- Corrigée
- - Gros vaisseau ¬ *Q20.5*
- - ¬ *Q20.5*
- Estomac avec inversion totale des viscères ¬ *Q89.3*
- Gauche ¬ *Q20.5*
- Gros vaisseau
- - Complète) ¬ *Q20.3*
- - ¬ *Q20.3*
- Grosses artères ¬ *Q20.3*
- Intestin ¬ *Q43.8*
- Isolée congénitalement non corrigée des grosses artères ¬ *Q20.3*
- Pénoscrotale ¬ *Q55.8*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*
- Viscères
- - Abdominale ¬ *Q89.3*
- - Thoracique ¬ *Q89.3*

Transsexualisme ¬ *F64.0*

Transsexuel ¬ Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l'adolescent, type non *F64.1*

Transsudative ¬ Otite moyenne
- *H65.9*
- Chronique: *H65.3*

Transthyrétine
- Héréditaire] ¬ h-ATTR [Amylose à *E85.2*
- Wild type ¬ Amyloïdose à *E85.80*
- ¬ Cardiopathie amyloïde de la *E85.4†*, *I43.1**

Transtrochantérienne ¬ *S72.10*

Transuraniens de métaux lourds ¬ Intoxication par des nucléides *T66*

Transurétrale ¬ Rétrécissement urétral secondaire à chirurgie *N99.18*

Transversal
- Abdomen ¬ Dissection *T05.8*
- Complète
- - Moelle cervicale ¬ Lésion *S14.11*
- - Moelle dorsale ¬ Lésion *S24.11*

Transversal *–suite*
- Complète *–suite*
- - Moelle lombaire ¬ Lésion *S34.10*
- Incomplète
- - Moelle lombaire ¬ Lésion *S34.11*
- - ¬ Lésion centrale
- - - Moelle cervicale (lésion *S14.12*
- - - Moelle dorsale (lésion *S24.12*
- Incomplètes
- - Moelle cervicale ¬ Autres lésions *S14.13*
- - Moelle dorsale SAI ¬ Lésions *S24.12*
- Membres-micrognathie ¬ Syndrome de fusion splénogonadique-anomalie *Q87.8*
- Thorax ¬ Dissection *T05.8*
- ¬ Vagin cloisonné *Q52.1*

Transverse
v./v.a. Côlon transverse
- Aiguë
- - Anticorps anti-MOG ¬ Myélite *G37.3*
- - Cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central ¬ Myélite *G37.3*
- - SAI ¬ Myélite *G37.3*
- - ¬ Myélite *G37.3*
- Avant le travail ¬ Présentation (de): *P01.7*
- Cervical(e) ¬ apophyse: *S12*
- Dorsal(e) ¬ apophyse: *S22*
- Lombo-sacré(e) ¬ apophyse: *S32*
- Membres ¬ Thrombocytose héréditaire avec anomalie réductionnelle *D75.8, Q73.8*
- Oblique ¬ Soins maternels pour position *O32.2*
- Supérieur de l'omoplate ¬ Raccourcissement congénital du ligament *Q68.8*
- Syphilitique ¬ Myélite *A52.1†*, *G05.0**
- ¬
- - Arrêt en profondeur en position *O64.0*
- - Dystocie due à la persistance en position: occipito- *O64.0*
- - Présentation
- - - *O32.2*
- - - *P03.1*

Transversus
- Abdominal ¬ Situs inversus ou *Q89.3*
- Acquis ¬ Pes *M21.63*
- Cœur ¬ Situs inversus ou *Q89.3*
- Thoracique ¬ Situs inversus ou *Q89.3*
- Total des viscères ¬ Situs inversus ou *Q89.3*

TRAP [Twin reversed arterial perfusion] ¬ Séquence *O43.0*

Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.14*

Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.15*

TRAPS [Syndrome périodique associé au récepteur 1 du facteur de nécrose tumorale] ¬ Syndrome *E85.0*

Trauma chronique ¬ Encéphalite par *F07.2*

Traumatique
v./v.a. Amputation traumatique
v./v.a. Type de maladie

Traumatisme
- Accouchement ¬ Fracture proximale de l'humérus en tant que *P13.3*
- Acoustique ¬
- - *H83.3*
- - Perte auditive neurosensorielle aigüe brutale due à un *H83.3*
- Ancien
- - Corne
- - - Antérieure ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.24*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.21*
- - - Postérieure ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.25*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.22*
- - Localisations multiples ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.20*
- - Ménisque SAI ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.29*
- - Partie partie non précisée ménisque
- - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.26*
- - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.23*
- Antérieur ¬ Ostéonécrose due à un *M87.29*
- Canal lacrymal ¬ *S05.8*
- Cérébral SAI ¬ *S06.9*
- Crânien ¬ *S09.9*
- Cranio-cérébral
- - 1er degré ¬ *S06.0*
- - 30 minutes
- - - 24 heures ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.71!*
- - - ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.70!*
- - Durée non précisée ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.79!*
- - Non ouvert ¬ *S06.9*
- - Plus 24 heures
- - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.73!*
- - ¬
- - - Antécédents personnels de *Z87.8*
- - - Perte connaissance
- - - - 30 minutes
- - - - - 24 heures lors d'un *S06.9, S06.71!*
- - - - - Lors d'un *S06.9, S06.70!*
- - - - Lors de *S06.9, S06.79!*
- - - - Plus 24 heures

Traumatisme *–suite*
- Cranio-cérébral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Perte connaissance *–suite*
- - - - Plus 24 heures *–suite*
- - - - - Retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un *S06.9, S06.72!*
- - - - - Sans retour au stade de connaissance antérieur, lors d'un *S06.9, S06.73!*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P00.5*
- Obstétrical
- - Foie ¬ *P15.0*
- - Nerf crânien VII] ¬ Lésion du nerf facial due à un *P11.3*
- - Non précisé ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un *P11.59*
- - Paraplégie
- - - Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un *P11.50*
- - - Chronique ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un *P11.51*
- - Précisés ¬
- - - *O71.8*
- - - *P15.8*
- - Rate ¬ *P15.1*
- - Sans précision ¬
- - - *O71.9*
- - - *P15.9*
- - - Lésion
- - - - Cuir chevelu due à un *P12.9*
- - - - Squelette due à un *P13.9*
- - - - Système nerveux
- - - - - Central due à un *P11.9*
- - - - - Périphérique due à un *P14.9*
- - ¬
- - - Adiponécrose sous-cutanée due à un *P15.6*
- - - Céphalhématome dû à un *P12.0*
- - - Congestion faciale due à un *P15.4*
- - - Déchirure
- - - - Hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un *P10.9*
- - - - Hémorragies intracrâniennes dues à un *P10.8*
- - - - Tente du cervelet due à un *P10.4*
- - - Fracture
- - - - Clavicule due à un *P13.4*
- - - - Crâne due à un *P13.0*
- - - - Rachis due à un *P11.5*
- - - Glaucome traumatique dû (due) à un *P15.3*
- - - Hématome
- - - - Chignon dû à un *P12.1*
- - - - Sous-dural (localisé) dû à un *P10.0*
- - - - Sous-galéal dû à un *P12.2*
- - - Hémorragie
- - - - Épicrânienne sous-aponévrotique due à un *P12.2*

Traumatisme *–suite*
- Obstétrical *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hémorragie *–suite*
- - - - Sous-conjonctivale dû (due) à un *P15.3*
- - - Hémorragie cérébrale due à un *P10.1*
- - - Hémorragie intraventriculaire due à un *P10.2*
- - - Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un *P10.3*
- - - Hémorragie sous-durale due à un *P10.0*
- - - Lésion
- - - - Cérébrale non précisée, due à un *P11.2*
- - - - Faciale due à un *P15.4*
- - - - Fémur due à un *P13.2*
- - - - Nerfs crâniens due à un *P11.4*
- - - - Œil due à un *P15.3*
- - - - Organes génitaux externes due à un *P15.5*
- - - - Os longs due à un *P13.3*
- - - - Sterno-cléido-mastoïdienne due à un *P15.2*
- - - Lésions
- - - - Cérébrales précisées, dues à un *P11.1*
- - - - Crâne dues à un *P13.1*
- - - - Cuir chevelu dues à un *P12.8*
- - - - Parties
- - - - - Squelette dues à un *P13.8*
- - - - - Système nerveux périphérique dues à un *P14.8*
- - - - Plexus brachial dues à un *P14.3*
- - - Meurtrissure du cuir chevelu due à un *P12.3*
- - - Œdème cérébral dû à un *P11.0*
- - - Paralysie
- - - - Dejerine-Klumpke due à un *P14.1*
- - - - Duchenne-Erb due à un *P14.0*
- - - - Faciale due à un *P11.3*
- - - - Nerf phrénique due à un *P14.2*
- - - Rupture
- - - - Foie due à un *P15.0*
- - - - Rate due à un *P15.1*
- Oculaire ¬ Glaucome secondaire à un *H40.3*
- Psychique ¬
- - *Z91.8*
- - Antécédents de *Z91.8*
- Sans précision ¬ Complication précoce d'un *T79.9*
- Thoracique ¬ *S29.9*
- ¬
- - Antécédents de *Z91.8*
- - Chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après *Z42*
- - Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un *T79.4*
- - Complications précoces d'un *T79.8*
- - Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, associées à un *K06.2*

Traumatisme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de: *N35.0*
- - Séquelles de certaines complications précoces d'un *T98.2*

Travail
- 1 7 jours ¬ Rupture prématurée membrane
- - Début du *O42.11*
- - Traitement tocolytique, début du *O42.21*
- 24 heures ¬ Rupture prématurée membrane
- - Début du *O42.0*
- - Traitement tocolytique, début du *O42.20*
- 37ème semaine entière de gestation ¬ Faux *O47.1*
- Accouchement
- - Compliqué
- - - Anomalie
- - - - Cordon ombilical, sans précision ¬ *O69.9*
- - - - Rythme cardiaque fœtus
- - - - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ *O68.2*
- - - - - ¬ *O68.0*
- - - Anomalies du cordon ombilical ¬ *O69.8*
- - - Brièveté du cordon ¬ *O69.3*
- - - Circulaire du cordon, avec compression ¬ *O69.1*
- - - Détresse fœtale, sans précision ¬ *O68.9*
- - - Forme d'enchevêtrement du cordon ¬ *O69.2*
- - - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ *O69.4*
- - - Lésions vasculaires du cordon ¬ *O69.5*
- - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ *O68.1*
- - - Prolapsus du cordon ¬ *O69.0*
- - - Signe
- - - - Biochimiques de détresse fœtale ¬ *O68.3*
- - - - Détresse fœtale ¬ *O68.8*
- - Due à l'administration de médicaments ¬ détresse fœtale au cours du *O68*
- - Puerpéralité ¬
- - - Cours du *O87*
- - - Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du *O95*
- - Sans précision ¬
- - - Complication de l'anesthésie au cours du *O74.9*
- - - Complication du *O75.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du *P03.9*
- - ¬
- - - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du *O74.3*
- - - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.2*

Travail *–suite*
- Accouchement *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du *O74.5*
- - - Choc pendant ou après le *O75.1*
- - - Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du *O74.1*
- - - Complication
- - - - Anesthésie au cours du *O74.8*
- - - - Cardiaques de l'anesthésie au cours du *O74.2*
- - - - Intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du *O74.3*
- - - - Précisées du *O75.8*
- - - - Pulmonaires de l'anesthésie au cours du *O74.1*
- - - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du *O74.6*
- - - Échec ou difficulté d'intubation au cours du *O74.7*
- - - Épuisement maternel au cours du *O75.0*
- - - Fœtus nouveau-né affectés
- - - - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du *P04.0*
- - - - Complications précisées du *P03.8*
- - - - Présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du *P03.1*
- - - Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le *P20.1*
- - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.0*
- - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.2*
- - - Pneumonie chimique d'aspiration dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.0*
- - - Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du *O74.0*
- - - Réaction
- - - - Intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le *P04.0*
- - - - Toxique à une anesthésie locale au cours du *O74.4*
- - - Syndrome
- - - - Hépato-rénal consécutif au *O90.4*
- - - - Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.0*
- Avant 37 semaines entières de gestation ¬ Faux *O47.0*
- Chirurgie ¬ Échec du déclenchement (du *O61.1*
- Difficiles ¬ Conditions de *Z56*
- Équipe ¬ *Z56*
- Hypertonique ¬ *P03.6*
- Incoordonné ¬ *O62.4*
- Irrégulier ¬ *O62.2*

Travail *–suite*
- Moyens mécaniques ¬ Échec du déclenchement (du *O61.1*
- Non classée ailleurs ¬ Pyrexie au cours du *O75.2*
- Ocytocique ¬ Échec du déclenchement (du *O61.0*
- Pénible ¬ Rythme de *Z56*
- Plus 7 jours ¬ Rupture prématurée membrane
- - Début du *O42.12*
- - Traitement tocolytique, début du *O42.22*
- Prématuré
- - Accouchement
- - - SAI ¬ *O60.1*
- - - Terme ¬ *O60.2*
- - Induit ¬ *O60.0*
- - Sans accouchement ¬ *O60.0*
- - Spontané
- - - Accouchement
- - - - Prématuré
- - - - - Césarienne ¬ *O60.1*
- - - - - ¬ *O60.1*
- - - - Terme par césarienne ¬ *O60.2*
- - - ¬ *O60.0*
- Prolongé, sans précision ¬ *O63.9*
- Prostaglandines ¬ Échec du déclenchement (du *O61.0*
- Provoqué ¬ *P03.8*
- SAI ¬ Lenteur du *O63.9*
- Sans précision ¬
- - Anomalie des forces en jeu au cours du *O62.9*
- - Échec
- - - Déclenchement du *O61.9*
- - - Épreuve de *O66.4*
- - Faux *O47.9*
- Spontané ¬ Accouchement prématuré
- - Césarienne, sans *O60.3*
- - Sans *O60.3*
- Suivi d'une césarienne ¬ Échec de l'épreuve de *O66.4*
- Trop rapide ¬ *O62.3*
- ¬
- - Anomalies des forces en jeu au cours du *O62.8*
- - Arrêt de la phase active du *O62.1*
- - Échec déclenchement
- - - *O61.8*
- - - Instrumental du *O61.1*
- - - Médical du *O61.0*
- - Eclampsie au cours du *O15.1*
- - Examen
- - - Médecine du *Z10*
- - - Mise en observation après un accident du *Z04.2*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le *P01.7*

Travail *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du *P20.0*
- - Infections au cours du *O75.3*
- - Lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris césarienne avant début
- - - *O32*
- - - *O34*
- - Mauvaise adaptation au *Z56*
- - Position instable avant le *P01.7*
- - Présentation
- - - Face avant le *P01.7*
- - - Siège avant le *P01.7*
- - - Transverse avant le *P01.7*
- - Rupture
- - - Prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du *O42.29*
- - - Utérus
- - - - Avant le début du *O71.0*
- - - - Non précisée comme survenant avant le début du *O71.1*
- - - - Pendant le *O71.1*
- - Septicémie au cours du *O75.3*
- - Version externe avant le *P01.7*

Travailleurs
- Liège ¬ Maladie ou poumon des: *J67.3*
- Préparation alimentaire base poisson
- - Exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.81*
- - Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Poumon des *J67.80*
- - ¬ Poumon des *J67.80*
- Secteur céréalier ¬ Maladie des *J67.00*
- Sociaux ¬ Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les *Z64.8*

Travers
- Hiatus œsophagien ¬ Glissement du cardia à *Q40.1*
- Membrane plasmique ¬ Défaut du transporteur de carnitine à *E71.3*
- Peau ¬ Accident dû à: Pénétration d'un corps étranger à *W49.9!*

Traversée thoracobrachiale [TOS] ¬ Syndrome de *G54.0*

Travestisme
- Bivalent ¬ *F64.1*
- Fétichiste ¬ *F65.1*
- ¬ Fétichisme avec *F65.1*

Trayeurs] ¬ Pseudovaccine [nodule des *B08.0*

Treacher Collins] ¬ Syndrome de Franceschetti [Syndrome de *Q75.4*

Trèfle
- Anomalies congénitales multiples ¬ Syndrome de crâne en *Q87.8*
- Isolé ¬ Crâne en *Q75.0*

Tréhalase ¬ Diarrhée et vomissements dus à un déficit en *E74.3*

Trélat ¬ Maladie de Leser- *L82*

Tremblement

- Dus au mercure ¬ *T56.1*
- Essentiel
- - Nystagmus-ulcère ¬ Syndrome de *Q87.8*
- - Progressif-trouble sévère du langage-dysmorphie faciale-déficience intellectuelle-trouble du comportement ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - ¬
- - - *G25.0*
- - - Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: *G11.1*
- - - Syndrome de surdité neurosensorielle-grisonnement précoce- *H90.5, G25.0*
- Familial ¬ *G25.0*
- Hystérique ¬ *F44.4*
- Intentionnel ¬ *G25.2*
- Médicaments ¬ *G25.1*
- Orthostatique primaire ¬ *G25.0*
- Sans précision ¬ *R25.1*
- ¬ Autres formes précisées de *G25.2*

Trénaunay
v./v.a. Klippel-Trénaunay
v./v.a. Klippel-Trénaunay-Weber

Treponema pallidum SAI ¬ Infection due à *A53.9*

TRH

- Hormone de libération de la thyrotrophine] ¬ Hypothyréose par déficit isolé en *E03.1*
- ¬ Hypothyroïdie centrale due à un déficit du récepteur de la *E03.1*

Triacylglycerol lipase] ¬ Anomalies des taux de: lipase [*R74.8*

Triade

- Acnéique ¬ *L73.2*
- Carney ¬ *C26.9, D48.7*
- Horner ¬ *G90.2*
- Hutchinson ¬ *A50.5*
- Kartagener] ¬ Syndrome de Kartagener [Situs inversus viscerum, bronchectasie, sinusite chronique et polypes nasaux] [insuffisance pluriglandulaire résultant d'une anomalie dans le transport mucociliaire] [Immotile cilia syndrome] [*Q89.3*

Trianguli et canaliculi ¬ Pili *Q84.1*

Triatrial

- Droit ¬ Cœur *Q24.2*
- Gauche ¬ Cœur *Q24.2*
- ¬ Cœur *Q24.2*

Triazole ¬ Allergie aux dérivés du *T88.7*

Triazoles

- Résistant au fluconazole ¬ Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines et aux *U83.21!*
- Sauf aspergillus fumigatus résistant au fluconazole seulement ¬ Aspergillus fumigatus résistant aux antifongiques du groupe des *U83.3!*

Triazoles *–suite*

- ¬
- - Candida albicans résistant aux antifongiques du groupe des *U83.0!*
- - Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines, non résistant aux *U83.20!*

Triceps ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon du *S46.3*

Trichiasis ¬ *H02.0*

Trichilemmal proliférant ¬ Kyste *L72.1*

Trichilemmaux-dystrophie ciliaire] ¬ Syndrome FLOTCH [Leukonychie totale familiale-kystes *Q84.4*

Trichinellose ¬

- *B75*
- Myosite au cours de *B75†, M63.19**

Trichinose ¬

- *B75*
- Encéphalite au cours de *B75†, G05.2**

Trichiuria ¬ Infection à Trichuris *B79*

Trichloréthylène ¬ Effet toxique: *T53.2*

Trichloroéthène ¬ *T53.2*

Trichlorométhane ¬ *T53.1*

Tricho
v./v.a. odonto-tricho-unguéo-digito-palmaire

Trichocéphale (infection) (maladie) ¬ *B79*

Trichocéphalose ¬ *B79*

Tricho-dentaire ¬ Syndrome *Q82.8*

Tricho-dento-osseux ¬ Syndrome *Q82.8*

Trichodiscome multiple familial

- Peau de l'oreille ¬ *D23.2*
- Visage ¬ *D23.3*

Trichodiscomes multiples familiaux

- Peau
- - Cou ¬ *D23.4*
- - Tronc ¬ *D23.5*
- ¬ *D23.9*

Trichodysplasie

- Amélogenèse imparfaite ¬ Syndrome de *Q82.8*
- Spinulosa ¬ *L85.8*
- Xérodermie ¬ Syndrome de *Q84.2, L85.3*

Trichofolliculome

- Lobe de l'oreille ¬ *D23.2*
- Peau
- - Cou ¬ *D23.4*
- - Face ¬ *D23.3*
- - Nez ¬ *D23.3*
- ¬ *D23.9*

Tricho-hépato-entérique ¬ Syndrome *Q43.8*

Tricholeucocytes

- Classique
- - Rémission complète ¬ Leucémie à *C91.41*
- - ¬ Leucémie à *C91.40*
- Rémission complète ¬ HCL-V [variante de la leucémie à *C91.41*
- ¬ Leucémie à *C91.40*

Tricholeucoplasie ¬ *K13.3*

Trichomégalie isolée familiale ¬ *Q84.2*

Trichomonas

- Vaginalis ¬
- - Fluor à *A59.0†, N77.1**
- - Leucorrhée (vaginale) à *A59.0*
- - ¬
- - Balanite à *A59.0†, N51.2**
- - Cervicite à *A59.0†, N74.8**
- - Cystite à *A59.0†, N33.8**
- - Infection
- - - Col de l'utérus à *A59.0†, N74.8**
- - - Prostate à *A59.0†, N51.0**
- - - Urètre à *A59.0†, N37.0**
- - - Vaginale à *A59.0†, N77.1**
- - - Vulve à *A59.0†, N77.1**
- - Leucorrhée à *A59.0†, N77.1**
- - Prostatite à *A59.0†, N51.0**
- - Urétrite à *A59.0†, N37.0**
- - Vaginite à *A59.0†, N77.1**
- - Vésiculite à *A59.0†, N51.8**
- - Vulvite à *A59.0†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite à *A59.0†, N77.1**

Trichomonase

- Prostate ¬ *A59.0†, N51.0**
- Urètre ¬ *A59.0†, N37.0**
- Uro-génitale ¬ *A59.0*
- Vagin ¬ *A59.0†, N77.1**
- Vésicule séminale ¬ *A59.0†, N51.8**
- Vessie ¬ *A59.0†, N33.8**
- Vulve ¬ *A59.0†, N77.1**
- ¬ Autres localisations de *A59.8*

Tricho-odonto-onychiale ¬ Dysplasie *Q82.8*

Trichoodonto-onychiale ¬ Dysplasie ectodermique *Q82.8*

Trichophytia

- Capitis ¬ *B35.0*
- Profunda ¬ *B35.8*

Trichophytie

- Main ¬ *B35.2*
- Parties découvertes du corps ¬ *B35.4*
- Pied ¬ *B35.3*

Trichophytoïdes ¬ Pianides plantaires hyperkératosiques et *A66.3*

Trichophyton ¬ Infections causées par les espèces appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et *B35*

Trichophytosis unguium ¬ *B35.1*

Trichopoliodystrophie ¬ *E83.0*

Tricho-rhino-phalangien type

- 1 ¬ Syndrome *Q87.1*
- 2 ¬ Syndrome *Q87.8*
- 3 ¬ Syndrome *Q87.1*

Trichorrhexie noueuse ¬ *L67.0*

Trichostrongylose ¬ *B81.2*

Trichothiodystrophie ¬ Ichtyose avec *L67.8*

Trichotillomanie
- Cours de mouvements stéréotypés ¬ *F98.40*
- ¬ *F63.3*

Trichromatie ¬ Oligocône *H35.5*

Trichuris trichiuria ¬ Infection à *B79*

Tricot
v./v.a. Degos-Delort-Tricot

Tricuspide
- Cause précisée sauf rhumatismal ¬
- - Insuffisance (de la valvule) *I36.1*
- - Régurgitation (de la valvule) *I36.1*
- Combinées ¬ atteinte valve
- - Aortique et *I08.2*
- - Mitral
- - - *I08.1*
- - - Aortique et *I08.3*
- Congénitale ¬ Malformation *Q22.9*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la valvule *I39.2**
- Insuffisance ¬ Sténose non rhumatismale (de la valvule) *I36.2*
- Parachute ¬ Valve *Q22.8*
- Rhumatismal ¬
- - Insuffisance (de la valvule) *I07.1*
- - Sténose (de la valvule) *I07.0*
- SAI ¬ Atteinte de la valvule *I07.9*
- Sans précision ¬
- - Atteinte non rhumatismale de la valvule *I36.9*
- - Maladie de la valvule *I07.9*
- - Malformation congénitale de la valvule *Q22.9*
- ¬
- - Agénésie des valves *Q22.4*
- - Anomalie
- - - Appareil sous-valvulaire *Q22.8*
- - - Congénitale de la valvule *Q22.9*
- - - Ebstein de la valve *Q22.5*
- - Atrésie de la valvule *Q22.4*
- - Atteintes non rhumatismales de la valvule *I36.8*
- - Dysplasie congénitale de la valve *Q22.8*
- - Endocardite tuberculeuse de la valve *A18.8†, I39.2**
- - Inflammation syphilitique de la valve *A52.0†, I39.2**
- - Insertion anormale des cordages de la *Q22.8*
- - Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) *I36.1*
- - Maladies de la valvule *I07.8*
- - Malformations congénitales de la valvule *Q22.8*
- - Sténose
- - - Congénitale de la valvule *Q22.4*
- - - Non rhumatismale (de la valvule) *I36.0*
- - Straddling ou overriding de la valve *Q22.8*
- - Tissu accessoire *Q22.8*

Tricuspide *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Valvulite syphilitique de la valve *A52.0†, I39.2**

Tricuspidien
- Insuffisance ¬ Sténose *I07.2*
- ¬
- - Insuffisance *I07.1*
- - Sténose *I07.0*

Tricycliques
- Tétracycliques ¬ Intoxication: Antidépresseurs *T43.0*
- ¬ Intoxication par les antidépresseurs *T43.0*

Trifasciculaire ¬ Bloc *I45.3*

Trifonctionnelle mitochondrial
- DPTFM] ¬ Déficit en protéine *E71.3*
- ¬ Déficit en protéine *E71.3*

Trigémellaire ¬ Grossesse: *P01.5*

Trigéminale après herpès zoster ¬ Ganglionite *B02.3†, H58.8**

Trigéminée post-herpétique ¬ Névralgie *B02.2†, G53.0**

Triglycéride
- Ichtyose ¬ Lipidose avec surcharge en *E75.5*
- Lipase pancréatique ¬ Déficit en *K90.3*
- Myopathie] ¬ NLSDM [Lipidose avec surcharge en *E75.5†, G73.6**
- ¬ Lipidose avec surcharge en *E75.5*

Trigone
- Vésical ¬ Carcinome épidermoïde pur du *C67.0*
- Vessie ¬
- - Carcinome à petites cellules du *C67.0*
- - Carcinome non papillaire à cellules transitionnelles du *C67.0*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire du *C67.0*
- - Tumeur maligne: *C67.0*

Trigonite ¬
- *N30.3*
- Urétro- *N30.3*

Trigonocéphalie
v./v.a. Opitz-trigonocéphalie
- Nez bifide-anomalies des extrémités ¬ Syndrome de *Q87.0*
- ¬ *Q75.0*

Trijumeau
- Sans précision ¬ Affection du nerf *G50.9*
- ¬
- - Affections du nerf *G50.8*
- - Anesthésie congénitale du nerf *G50.8*
- - Lésion traumatique du nerf *S04.3*
- - Névralgie
- - - *G50.0*
- - - Post-zostérienne du *B02.2†, G53.0**
- - Syndrome neurotrophique du *G50.8*

Triloculaire biauriculaire ¬ Cœur *Q20.4*

TRIM22 ¬ Maladie inflammatoire de l'intestin associée à *K52.8*

Trimalléolaire ¬ Fracture *S82.82*

Triméthadione ¬ Embryopathie à la *Q86.88*

Triméthylaminurie
- Sévère primaire ¬ *E88.8*
- ¬ *E88.8*

Trinitrate de 1,2,3-propanétriol ¬ *T65.5*

Trinitrotoluène ¬ *T65.3*

Triose-phosphate isomérase ¬ Anémie (due à): déficit en: *D55.2*

Triphalangé
- Brachyectrodactylie ¬ Syndrome de pouce *Q74.8*
- Hypospadias-progénie ¬ Syndrome d'hypoplasie du radius-pouces *Q87.2*
- ¬
- - Polydactylie d'un pouce *Q69.1*
- - Syndrome
- - - Agénésie pulmonaire-anomalie cardiaque-pouce *Q87.8*
- - - Hémimélie tibiale-polysyndactylie-pouce *Q87.2*

Triple
- X avec phénotype féminin ¬ Syndrome du *Q97.0*
- ¬
- - Rein *Q63.0*
- - Syndrome *E72.4*

Triplé ¬
- *O30.1*
- Accouchement retardé du deuxième jumeau, *O63.2*

Triplégie ¬ *G83.8*

Triploïdie et polyploïdie ¬ *Q92.7*

Trismus néonatal ¬ *A33*

Trismus-pseudocamptodactylie ¬ Syndrome
- *Q68.8*
- Complexe de Carney- *Q87.8*

Trisomie
- 1 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 1q partielle ¬ *Q92.2*
- 2 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 3 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 4 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 4p ¬ *Q92.2*
- 5 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 5p ¬ *Q92.3*
- 6pter ¬ *Q92.3*
- 7 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 7q11.23 distale ¬ *Q92.3*
- 8 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 8p ¬ *Q92.2*
- 8q partielle ¬ *Q92.2*
- 9 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 9p
- - Partielle ¬ *Q92.2*
- - ¬ *Q92.2*

Trisomie *–suite*
- 10 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 10p ¬ *Q92.2*
- 10q partielle ¬ *Q92.3*
- 12 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 12p ¬ *Q92.3*
- 13
- - Mosaïque chromosomique non-disjonction mitotique ¬
- - - *Q91.5*
- - - *Q91.5*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q91.4*
- - Partielle ¬ *Q91.7*
- - Translocation ¬ *Q91.6*
- - ¬ *Q91.7*
- 13q proximale ¬ *Q91.7*
- 14 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 14qter ¬ *Q92.3*
- 15 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 16 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 17 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- 17p ¬ *Q92.2*
- 18
- - Mosaïque chromosomique non-disjonction mitotique ¬
- - - *Q91.1*
- - - *Q91.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q91.0*
- - Partielle ¬ *Q91.3*
- - Translocation ¬ *Q91.2*
- - ¬ *Q91.3*
- 18p ¬ *Q92.2*
- 20
- - Mosaïque ¬ *Q92.1*
- - P) (q) ¬ *Q92.8*
- 20p ¬ *Q92.2*
- 21
- - Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ¬ *Q90.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q90.0*
- - Partielle ¬ *Q90.9*
- - SAI ¬ *Q90.9*
- - Translocation ¬ *Q90.2*
- - ¬ *Q90.9*
- 22 en mosaïque ¬ *Q92.1*
- Chromosome entier
- - Mosaïque chromosomique non-disjonction mitotique ¬
- - - *Q92.1*
- - - *Q92.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q92.0*
- D1 ¬ *Q91.7*
- Distale
- - 1p36 ¬ *Q92.3*
- - 2p ¬ *Q92.3*
- - 2q ¬ *Q92.3*
- - 3p ¬ *Q92.3*

Trisomie *–suite*
- Distale *–suite*
- - 4q ¬ *Q92.3*
- - 5q ¬ *Q92.3*
- - 6q ¬ *Q92.3*
- - 7p ¬ *Q92.3*
- - 8q ¬ *Q92.3*
- - 9q ¬ *Q92.3*
- - 10q ¬ *Q92.3*
- - 11q ¬ *Q92.3*
- - 13q ¬ *Q91.7*
- - 16p ¬ *Q92.3*
- - 16q ¬ *Q92.3*
- - 17q ¬ *Q92.3*
- - 17q22 ¬ *Q92.3*
- - 18q ¬ *Q91.3*
- - 20q ¬ *Q92.3*
- - 22q ¬ *Q92.3*
- Partielle
- - Autosomes, sans précision ¬ Trisomie et *Q92.9*
- - Majeure ¬ *Q92.2*
- - Mineure ¬ *Q92.3*
- Partielles précisées des autosomes ¬ Autres trisomies et *Q92.8*
- Trisomie
- - Partielle des autosomes, sans précision ¬ *Q92.9*
- - Partielles précisées des autosomes ¬ Autres *Q92.8*
- X ¬ *Q97.0*
- Xq28 distale ¬ *Q99.8*

Tristesse ¬ *R45.2*

Tritanomalie ¬ *H53.5*

Tritanopie
- Congénitale ¬ *H53.5*
- ¬ *H53.5*

Triton
v./v.a. Tumeur triton maligne

Tritronculaire ¬
- Cardiopathie artérioscléreuse: Implication *I25.13*
- Maladie
- - Athéroscléreuse *I25.13*
- - Coronarienne bitronculaire à *I25.13*

TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [*I47.1*

Trochanter
- Sans précision ¬ Fracture du trochanter: *S72.10*
- Trochanter sans précision ¬ Fracture du *S72.10*
- ¬
- - Arrachement apophyse
- - - Grand *S72.10*
- - - Petit *S72.10*
- - Grand *S72.10*

Trochanter *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Petit *S72.10*

Trochantérienne ¬
- Bursite *M70.6*
- Tendinite *M70.6*

Trochléaire ¬ Paralysie congénitale
- Familiale du nerf *H49.1*
- Nerf *H49.1*

Trochlée
- Humérus ¬ Aplasie de la *Q74.0*
- ¬ *S42.49*

Trombiculose ¬ *B88.0*

Trompe
- Fallope
- - Due à la grossesse ¬ Rupture de la *O00.1*
- - Ligaments larges ¬ Autres malformations congénitales des *Q50.6*
- - Vasectomie ¬ Admission pour ligature des *Z30.2*
- Ligaments de l'utérus ¬ Tumeur bénigne: *D28.2*
- Surnuméraire ¬ Torsion (de): *N83.5*
- Utérus ¬ *C57.0*
- ¬
- - Associée à une anomalie congénitale des *N97.1*
- - Tumeur bénigne des *D28.2*
- - Tumeur maligne des *C57.0*

Trompe d'Eustache
- Sans précision ¬ Affection de la *H69.9*
- ¬
- - *C30.1*
- - *Z96.2*
- - Absence de *Q16.2*
- - Affections précisées de la *H69.8*
- - Compression de la *H68.1*
- - Distension de la *H69.0*
- - Obstruction de la *H68.1*
- - Orifice de la *C11.2*
- - Rétrécissement de la *H68.1*
- - Salpingite de la *H68.0*
- - Sténose de la *H68.1*
- - Syphilis de la *A52.7†, J99.8**
- - Tuberculose de la *A18.6†, H75.0**

Trompe de Fallope
- Ligament large
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q50.6*
- - ¬
- - - Absence de la *Q50.6*
- - - Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la *N83.8*
- - - Atrésie de la *Q50.6*
- - - Présence en surnombre de la *Q50.6*
- ¬
- - Abcès (de): *N70*

Trompe de Fallope *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Atrophie acquise de l'ovaire et de la *N83.3*
- - Endométriose de la *N80.2*
- - Gonorrhée de la *A54.2†, N74.3**
- - Grossesse dans une *O00.1*
- - Kyste embryonnaire de la *Q50.4*
- - Lésion traumatique de la *S37.5*
- - Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la *N83.4*
- - Rétrécissement
- - - Gonorrhéique de la *A54.2†, N74.3**
- - - Tuberculeux de la *A18.1†, N74.1**
- - Rupture de la *N83.8*
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, N74.2**
- - Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la *N83.5*
- - Tuberculose
- - - Aiguë de la *A18.1†, N74.1**
- - - Chronique de la *A18.1†, N74.1**
- - Tumeur maligne: *C57.0*

Tronc
- 2ème degré sans précision ¬
- - Brûlure du *T21.2*
- - Corrosion du *T21.6*
- Artériel
- - Commun [TAC] ¬ *Q20.0*
- - ¬ Persistance du *Q20.0*
- Commun de l'artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du *I25.14*
- Degré
- - 2a ¬
- - - Brûlure du *T21.2*
- - - Corrosion du *T21.6*
- - 2b ¬
- - - Brûlure du *T21.8*
- - - Corrosion du *T21.9*
- - Non précisé ¬
- - - Brûlure du *T21.0*
- - - Corrosion du *T21.4*
- Dystrophie rétinienne-micropénis] ¬ Syndrome MORM [déficience intellectuelle-obésité du *Q87.8*
- Niveau non précisé
- - Abrasion ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.01*
- - Contusion ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.05*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.04*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.02*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.03*
- - Type de lésion non précisée ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.00*
- - ¬

Tronc *–suite*
- Niveau non précisé *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Amputation traumatique du *T09.6*
- - - Lésion traumatique
- - - - Non précisée du *T09.9*
- - - - Superficielle du *T09.08*
- - - Lésions traumatiques précisées du *T09.8*
- - - Plaie ouverte du *T09.1*
- Non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du *T09.4*
- SAI ¬
- - Écrasement de: *T04.1*
- - Gelure
- - - *T35.3*
- - - Nécrose des tissus (de): *T34.9*
- - - Superficielle (de): *T33.9*
- Sans précision ¬
- - Séquelles de lésion traumatique du cou et du *T91.9*
- - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du *D21.6*
- - Tumeur maligne
- - - Nerfs périphériques du *C47.6*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du *C49.6*
- ¬
- - Abcès cutané, furoncle et anthrax du *L02.2*
- - Anévrisme et dissection de l'artère basilaire (*I72.5*
- - Angiolipomatose familiale du *D17.1*
- - Angiosarcome du *C49.6*
- - Basaliome du *C44.59*
- - Brûlure
- - - *T21.00*
- - - Premier degré du *T21.1*
- - - Troisième degré du *T21.3*
- - Carcinoma in situ: Peau du *D04.5*
- - Carcinome à cellules de Merkel de la peau du *C44.59*
- - Carcinome pilomatriciel du *C44.59*
- - Chondrosarcome myxoïde extrasquelettique des tissus mous du *C49.6*
- - Corrosion du premier degré du *T21.5*
- - Corrosion du troisième degré du *T21.7*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans de la peau du *C44.59*
- - Dyskératome verruqueux de la peau du *D23.5*
- - Fibromatose aponévrotique juvénile, *M72.88*
- - Fibromatose pseudo-sarcomateuse, *M72.48*
- - Fibromyxosarcome des tissus mous du *C49.6*
- - Fibrosarcome du *C49.6*

Tronc *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hémangioendothéliome kaposiforme du *C49.6*
- - Hétéroplasie osseuse progressive, *M61.58*
- - Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du *T09.5*
- - Lipoblastome du *D17.1*
- - Liposarcome dédifférencié des tissus mous du *C49.6*
- - Liposarcome des tissus mous du *C49.6*
- - Liposarcome myxoïde des tissus mous du *C49.6*
- - Liposarcome pléiomorphe des tissus mous du *C49.6*
- - Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du *T09.2*
- - Lymphadénite aiguë du *L04.1*
- - Mélanome
- - - In situ du *D03.5*
- - - Malin
- - - - *C43.59*
- - - - Familial du *C43.59*
- - Myopéricytome bénin du *D21.6*
- - Myosite
- - - Bactérienne, *M60.08*
- - - Fongique, *M60.08*
- - - Virale, *M60.08*
- - Nævus à mélanocytes du *D22.5*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.04*
- - Neuroblastome es nerfs du *C47.6*
- - Phlegmon du *L03.3*
- - Pyomyosite, *M60.08*
- - Rhabdomyosarcome
- - - Alvéolaire des tissus mous du *C49.6*
- - - Pléomorphe des tissus mous du *C49.6*
- - - Tissus mous du *C49.6*
- - Sarcome alvéolaire des tissus mous du *C49.6*
- - Sarcome d'Ewing extrasquelettique des tissus mous du *C49.6*
- - Sarcome des tissus mous du *C49.6*
- - Sarcome du tissu conjonctif du *C49.6*
- - Sarcome épithélioïde des tissus mous du *C49.6*
- - Sarcome synovial des tissus mous du *C49.6*
- - Schwannome malin es nerfs du *C47.6*
- - Séquelle
- - - Brûlure, corrosion et gelure du *T95.1*
- - - Lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du *T91.0*
- - - Lésions traumatiques précisées du cou et du *T91.8*
- - Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du *Z42.2*
- - Syndrome de Brooke-Spiegler de la peau du *D23.5*

Tronc *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syringocystadénome papillifère de la peau du *D23.5*
- - Trichodiscomes multiples familiaux de la peau du *D23.5*
- - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du *R22.2*
- - Tumeur bénigne: Peau du *D23.5*
- - Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du *D17.1*
- - Tumeur maligne: Peau du *C44.5*
- - Tumeur neuroectodermique primitive périphérique des tissus mous du *C49.6*
- - Tumeur rhabdoïde
- - - Nerfs du *C47.6*
- - - Tissus mous du *C49.6*
- - Tumeur triton maligne des nerfs du *C47.6*

Tronc brachio-céphalique
- Entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (y compris *I63*
- ¬
- - Anévrisme syphilitique du *A52.0†, I79.8**
- - Artérite du *M31.4*
- - Embolie du *I65.8*
- - Infarctus cérébral
- - - Embolie du *I63.1*
- - - Occlusion du *I63.2*
- - - Sténose du *I63.2*
- - - Thrombose du *I63.0*
- - Occlusion du *I65.8*
- - Sténose du *I65.8*
- - Thrombose du *I65.8*

Tronc cérébral
- Moelle épinière
- - Élévation des lactates ¬ Syndrome de leucoencéphalopathie avec atteinte du *G31.81*
- - Spasticité des jambes ¬ Hypomyélinisation avec atteinte du *E75.2*
- SAI ¬ Lésion du *S06.9*
- Type Athabascan ¬ Dysgénésie du *Q87.8*
- ¬
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- - Anomalie fonctionnelle néonatale du *P91.88*
- - Astroblastome du *C71.7*
- - Astrocytome
- - - *C71.7*
- - - Anaplasique du *C71.7*
- - - Diffus du *C71.7*
- - - Fibrillaire du *C71.7*
- - - Gémistocytique du *C71.7*
- - - Pilomyxoïde du *C71.7*
- - Astrocytome protoplasmique du *C71.7*
- - Carcinome embryonnaire du *C71.7*

Tronc cérébral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Compression du cerveau (*G93.5*
- - Encéphalite paranéoplasique isolée du *C80.9†, G05.8**
- - Ganglioglome anaplasique du *C71.7*
- - Glioblastome
- - - *C71.7*
- - - Cellules géantes du *C71.7*
- - Gliome
- - - *C71.7*
- - - Infiltrant du *C71.7*
- - Gliosarcome du *C71.7*
- - Hémorragie intracérébrale du *I61.3*
- - Hernie du *G93.5*
- - Médulloépithéliome du *C71.7*
- - Oligoastrocytome
- - - *C71.7*
- - - Anaplasique du *C71.7*
- - Oligodendrogliome
- - - *C71.7*
- - - Anaplasique du *C71.7*
- - Sclérose en plaques (de): *G35*
- - Syndromes vasculaires du *I67.9†, G46.3**
- - Tératome malin du *C71.7*
- - Tumeur
- - - *D43.1*
- - - Embryonnaire avec rosettes pluristratifiées du *C71.7*
- - - Oligodendrogliale du *C71.7*
- - Tumeur maligne: *C71.7*
- - Tumeur mixte des cellules germinales du *C71.7*
- - Tumeur oligoastrocytaire du *C71.7*
- - Tumeur rhabdoïde tératoïde atypique du *C71.7*

Trophique du col de l'utérus ¬ Ulcère *N86*

Trophoblastique
v./v.a. Tumeur trophoblastique
- SAI ¬ Maladie *O01.9*
- ¬
- - Antécédents personnels de maladie *Z87.5*
- - Maladie *O01.9*

Trophodermatonévrose ¬ *T56.1*

Tropica avec complication cérébrale ¬ Malaria *B50.0†, G94.8**

Tropical
- Pulmonaire) SAI ¬ Eosinophilie *J82*
- Récurrente] à tiques ¬ Borréliose [fièvre *A68.1*
- SAI ¬ Ulcère: *L98.4*
- TEMF] ¬ Fibrose endomyocardique *I42.3*
- Typhus ¬ *A75.3*
- ¬
- - Acné *L70.3*
- - Borréliose [fièvre récurrente *A68.9*
- - Bubon climatique ou *A55*

Tropical *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lichen plan *L43.3*
- - Miliaire *L74.2*
- - Myosite
- - - *M60.09*
- - - Purulente *M60.09*
- - Pancréatite *K86.18*
- - Paraparésie spastique *G04.1*
- - Pyomyosite *M60.0*
- - Sprue
- - - *K90.1*
- - - Non *K90.0*
- - Stéatorrhée *K90.1*
- - Typhus *A75.3*

Tropicalis ¬ Lichen plan *L43.3*

Trou
- Épingle [sténopéique] SAI ¬ Méat en *N35.9*
- Foramen) macula ¬ *H35.38*
- Rond de la rétine, sans décollement ¬ *H33.3*

Trouble
v./v.a. entrée plus spécifique

Trousseau ¬ Syndrome Paris- *Q93.5, D69.41*

Trypanosoma
- Cruzi ¬ infection à *B57*
- Gambiense ¬ Trypanosomiase à *B56.0*
- Rhodesiense ¬ Trypanosomiase à *B56.1*

Trypanosomiase
- Africain
- - Est répandue ¬ Trypanosomiase SAI, en des lieux où la *B56.9*
- - ¬
- - - *B56.9*
- - - Démence au cours de *B56.9†, F02.8**
- Américaine
- - Atteinte cardiaque ¬ *B57.2†, I41.2**
- - ¬ *B57*
- SAI, en des lieux où la trypanosomiase africaine est répandue ¬ *B56.9*
- Trypanosoma
- - Gambiense ¬ *B56.0*
- - Rhodesiense ¬ *B56.1*

Tryptophane ¬
- Anomalies du métabolisme de: *E70.8*
- Carence en: acide nicotinique (*E52*
- Syndrome d 'éosinophilie-myalgies lié au *M35.8*
- Trouble du métabolisme du *E70.8*

Tsao-Ellingson ¬ Syndrome de *Q87.0*

TSGI
- GIST
- - Cardia ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C16.0*
- - Côlon ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C18.9*
- - Corps de l'estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C16.2*

TSGI *–suite*
- GIST *–suite*
- - Estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C16.9*
- - Fundus ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C16.1*
- - Grande courbure de l'estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C16.6*
- - l'antre pylorique ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C16.3*
- - Intestin grêle ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C17.9*
- - Localisations contiguës
- - - Estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C16.8*
- - - Œsophage ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C15.8*
- - Petite courbure de l'estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C16.5*
- - Pylore ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C16.4*
- - ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C48.2*
- Tumeur stromale gastro-intestinale
- - Œsophage
- - - Abdominal ¬ *C15.2*
- - - Cervical ¬ *C15.0*
- - - Thoracique ¬ *C15.1*
- - - ¬ *C15.9*
- - Tiers
- - - Inférieur de l'œsophage ¬ *C15.5*
- - - Moyen de l'œsophage ¬ *C15.4*
- - - Supérieur de l'œsophage ¬ *C15.3*

TSH
- Thyréostimuline] ¬ Hypothyroïdie congénitale par déficit isolé en *E03.1*
- ¬
- - Hyperthyroïdie familiale par mutation du récepteur de la *E05.8*
- - Hypothyroïdie
- - - Congénitale par passage transplacentaire d'anticorps anti-récepteur de la *P72.2*
- - - Mutation du récepteur de la *E03.1*

Tsubo
v./v.a. Tako-Tsubo

Tsuji
v./v.a. Hamanishi-Ueba-Tsuji

Tsukamoto
v./v.a. Hamano-Tsukamoto

Tsuruta
v./v.a. Kozlowski-Tsuruta
v./v.a. Saito-Kuba-Tsuruta

Tsutsugamushi ¬
- Fièvre de *A75.3*
- Typhus à Rickettsia *A75.3*

TT ¬
- Lèpre tuberculoïde
- - Tuberculoïde polaire (*A30.1*
- - Type intermédiaire atypique [lèpre *A30.2*
- Tuberculoïde polaire (*A30.1*

TTIV [Thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par un vaccin] ¬ *D69.58*

TUBA1 ¬ Lissencéphalie due à une mutation de *Q04.3*

Tubaire ¬
- Avortement *O00.1*
- Grossesse *O00.1*
- Imperméabilité *N97.1*
- Insufflation *Z31.4*
- Occlusion *N97.1*
- Sténose *N97.1*
- Stérilité d'origine *N97.1*

Tube
- Appareil digestif SAI ¬ *C26.9*
- Digestif ¬ Infection fongique du *B49†*, *K93.8**
- Neural ¬
- - Anomalie du *Q05.9*
- - Syndrome de cataracte-cardiopathie congénitale-défaut de fermeture du *Q87.0*
- S) de myringotomie [diabolo] ¬ *Z96.2*

Tubercule
- Paramolaire ¬ *K00.2*
- Tibial ¬ Ostéochondrite juvénile du *M92.5*
- ¬
- - *A16.7*
- - Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Grand *S42.24*
- - Petit *S42.29*

Tuberculeux
v./v.a. Arthrite tuberculeuse
v./v.a. Type de maladie

Tuberculide ¬ *A18.4*

Tuberculine ¬ Réaction anormale au test à la *R76.1*

Tuberculoïde
- Polaire TT ¬
- - *A30.1*
- - Lèpre tuberculoïde [*A30.1*
- Tuberculoïde polaire (TT)] ¬ Lèpre *A30.1*
- Type intermédiaire atypique [lèpre TT] ¬ Lèpre *A30.2*

Tuberculome
- Cerveau ¬ *A17.8†*, *G07**
- Méninges ¬ *A17.1†*, *G07**
- Moelle épinière ¬ *A17.8†*, *G07**
- ¬ *A16.9*

Tuberculosa
- Ischiophthisis] ¬ Coxitis *A18.0†*, *M01.15**
- ¬ Ostitis *A18.0†*, *M90.09**

Tuberculose
- Affectant plusieurs organes ¬ *A18.8*
- Aiguë
- - Multiple ¬ *A19.1*
- - Trompe de Fallope ¬ *A18.1†*, *N74.1**
- Amygdale
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*

Tuberculose *–suite*
- Amygdale *–suite*
- - ¬ *A16.8*
- Annexes ¬ *A18.1†*, *N74.1**
- Anus ¬ *A18.3†*, *K93.0**
- Appareil respiratoire
- - Confirmation bactériologique
- - - Biologie moléculaire ou histologique ¬ Autres formes de *A15.8*
- - - Histologique ¬ *A15.9*
- - ¬ *A16.9*
- Appendice ¬ *A18.3†*, *K93.0**
- Arachnoïde ¬ *A17.0†*, *G01**
- Artère cérébrale ¬ *A18.8†*, *I68.1**
- Artères ¬ *A18.8†*, *I79.8**
- Articulaire ¬ TBC [*A18.0†*, *M01.19**
- Articulation
- - Genou ¬ TBC [*A18.0†*, *M01.16**
- - Hanche ¬ *A18.0†*, *M01.15**
- - Sternoclaviculaire ¬ *A18.0†*, *M01.11**
- - ¬ *A18.0†*, *M01.19**
- Articulation de l'épaule ¬ *A18.0†*, *M01.11**
- Articulation sacro-iliaque ¬ *A18.0†*, *M49.08**
- Bassin
- - Féminin ¬ *A18.1†*, *N74.1**
- - ¬ *A18.0†*, *M90.05**
- BCG] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.2*
- Bouche ¬ *A18.8†*, *K93.8**
- Bourses séreuses ¬ *A18.0†*, *M73.89**
- Bovine contagieuse ¬ Bacillose péritonéale par *A18.3†*, *K93.0**
- Bronches avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- Bronchique, avec confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.5*
- Bronchotrachéale ¬ *A16.4*
- Cæcum ¬ *A18.3†*, *K93.0**
- Canal déférent ¬ *A18.1†*, *N51.8**
- Cartilage
- - Intervertébral ¬ *A18.0†*, *M49.09**
- - ¬ *A18.0†*, *M01.19**
- Cérébrale ¬ *A17.8†*, *G07**
- Cérébrospinale ¬ *A17.8†*, *G07**
- Cerveau ¬
- - *A17.8†*, *G07**
- - TBC [*A17.8†*, *G07**
- Cervelet ¬ *A17.8†*, *G07**
- Cheville ¬ *A18.0†*, *M01.17**
- Choroïde ¬ *A18.5†*, *H32.0**
- Chronique de la trompe de Fallope ¬ *A18.1†*, *N74.1**
- Cœur ¬ *A18.8†*, *I43.0**
- Col de l'utérus ¬ *A18.1†*, *N74.0**
- Côlon sigmoïde ¬ *A18.3†*, *K93.0**
- Colonne iliaque supérieure ¬ *A18.0†*, *M90.05**

Tuberculose *–suite*
- Colonne vertébrale ¬ TBC [*A18.0†, M49.09**
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.0*
- Congénitale ¬ *P37.0*
- Cordon spermatique ¬ *A18.1†, N51.8**
- Cornée ¬ *A18.5†, H19.2**
- Corps ciliaire ¬ *A18.5†, H22.0**
- Coude ¬ *A18.0†, M01.12**
- Cul-de-sac de Douglas ¬ *A18.1†, N74.1**
- Diffuse ¬ *A19.9*
- Disque intervertébral ¬ *A18.0†, M49.09**
- Disséminée ¬ *A19*
- Dure-mère
- - Crânienne ¬ *A17.0†, G01**
- - Spinale ¬ *A17.0†, G01**
- Encéphale ¬ *A17.8†, G07**
- Endocarde ¬ *A18.8†, I39.8**
- Endomètre ¬ *A18.1†, N74.1**
- Épididyme ¬ *A18.1†, N51.1**
- Épiglottique
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.5*
- - ¬ *A16.4*
- Épiploon ¬ *A18.3*
- Estomac ¬ *A18.8†, K93.8**
- Fascia ¬ *A18.8†, M73.89**
- Foie ¬ *A18.8†, K77.0**
- Ganglion
- - Axillaires ¬ *A18.2*
- - Cervicaux ¬ *A18.2*
- - Inguinaux ¬ *A18.2*
- - Intrathoracique
- - - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.4*
- - - ¬ *A16.3*
- - Lymphatiques péritonéaux ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Sous-claviculaires ¬ *A18.2*
- - Sus-claviculaires ¬ *A18.2*
- Ganglionnaire
- - Hilaire
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.4*
- - - ¬ *A16.3*
- - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.3*
- - Médiastinal
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.4*
- - - ¬ *A16.3*
- - Trachéo-bronchique
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.4*

Tuberculose *–suite*
- Ganglionnaire *–suite*
- - Trachéo-bronchique *–suite*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.3*
- - - ¬ *A16.3*
- - ¬ *A18.0†, M68.09**
- Gastro-intestinale ¬ *A18.3†, K93.0**
- Généralisée ¬
- - *A19*
- - *A19.9*
- Génito-urinaire ¬ Séquelles de *B90.1*
- Glande
- - Bulbo-urétrales ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Lymphatiques ¬ *A18.2*
- - Mésentériques ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Trachéo-bronchiques ¬ *A16.3*
- Glande de Cowper ¬ *A18.1†, N51.8**
- Glande parathyroïde ¬ *A18.8†, E35.8**
- Glande parotide ¬ *A18.8†, K93.8**
- Glande surrénale ¬ *A18.7†, E35.1**
- Glandes endocrines NCA ¬ *A18.8†, E35.8**
- Glandes salivaires ¬ *A18.8†, K93.8**
- Glotte
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.5*
- - ¬ *A16.4*
- Hanche ¬ TBC [*A18.0†, M01.15**
- Hypopharynx
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*
- Hypophyse ¬ *A18.8†, E35.8**
- Iléo-cæcale hyperplasique ¬ *A18.3†, K93.0**
- Iléon ¬ *A18.3†, K93.0**
- Intestin ¬ TBC [*A18.3†, K93.0**
- Intestinale ¬ *A18.3†, K93.0**
- Iris ¬ *A18.5†, H22.0**
- Ischio-rectale ¬ *A18.3†, K93.0**
- Jéjunum ¬ *A18.3†, K93.0**
- Langue ¬ *A18.8†, K93.8**
- Larynx
- - Confirmation bactériologique
- - - Biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- - - Histologique ¬ *A15.5*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.4*
- - ¬ *A16.4*
- Latente ¬ *Z22.7*
- Leptoméninges ¬ *A17.0†, G01**
- Lèvres ¬ *A18.8†, K93.8**
- Ligament large ¬ *A18.1†, N74.1**
- Luette ¬ *A18.8†, K93.8**
- Mâchoire ¬ *A18.0†, M90.08**

Tuberculose *–suite*
- Mammaire ¬ *A18.8*
- Médiastinal
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*
- Médullaire ¬ *A17.8†, G07**
- Méningée ¬ *A17.0†, G01**
- Méninges ¬ TBC [*A17.0†, G01**
- Mésentérique des ganglions lymphatiques ¬ *A18.3†, K93.0**
- Miliaire
- - Aiguë
- - - Localisation unique et précisée ¬ *A19.0*
- - - Multiple ¬ *A19.1*
- - - ¬ *A19.2*
- - Chronique ¬ *A19.8*
- - Viscères NCA ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *A19.9*
- Moelle épinière ¬ *A17.8†, G07**
- Multifocale ¬ *A18.8*
- Multiple
- - Chronique ¬ *A19.8*
- - ¬ *A19.9*
- Multirésistante [MDR-TB] ¬ *U82.1!*
- Muscle ¬ *A18.8†, M63.09**
- Myocarde ¬ *A18.8†, I41.0**
- Nasal
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*
- Nerf optique ¬ *A18.5†, H48.8**
- Nerveuse ¬ *A17.8†, G59.8**
- Oculaire ¬ *A18.5*
- Œil ¬ *A18.5*
- Œsophage ¬ *A18.8†, K23.0**
- Orbites ¬ *A18.5*
- Oreille
- - Interne ¬ *A18.6*
- - Moyenne ¬ *A18.6†, H67.0**
- - ¬ *A18.6*
- Organe
- - Précisés ¬ *A18.8*
- - ¬ Séquelles de *B90.8*
- Organe génital
- - Masculins ¬ *A18.1†, N51.8**
- - ¬ *A18.1*
- Organes digestifs ¬ *A18.3†, K93.0**
- Os
- - Articulations ¬ Séquelles de *B90.2*
- - ¬ TBC [*A18.0†, M90.09**
- Ovaire ¬ *A18.1†, N74.1**
- Palais mou ¬ *A18.8†, K93.8**
- Pancréas ¬ *A18.8†, K87.1**
- Paupières ¬ *A18.4†, H03.1**
- Peau ¬ *A18.4*

Tuberculose *–suite*
- Pénis ¬ *A18.1†, N51.8**
- Péricarde ¬ *A18.8†, I32.0**
- Péritonéale NCA ¬ *A18.3†, K93.0**
- Pharynx
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - - ¬ *A16.8*
- Plèvre
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.6*
- - - ¬ *A16.5*
- Poignet ¬ *A18.0†, M01.13**
- Prépuce ¬ *A18.1†, N51.8**
- Prostatique ¬ *A18.1†, N51.0**
- Pulmonaire
- - Confirmation
- - - Histologique ¬ *A15.2*
- - - ¬ *A15.3*
- - Confirmée
- - - Analyse bactériologique ¬ *A15.0*
- - - Bactériologiquement et par examen microscopique de l'expectoration ¬ *A15.0*
- - - Culture ¬ *A15.1*
- - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.2*
- - Maladies bactériennes ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: *Z11*
- - Miliaire ¬ *A19.9*
- - N'ayant pas fait l'objet d'un examen bactériologique ou histologique ¬ *A16.1*
- - Primaire
- - - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.7*
- - - ¬ *A16.7*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.2*
- - Sans confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A16.0*
- - ¬ *A16.2*
- Rate ¬ *A18.8†, D77**
- Rectum
- - Abcès ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Fistule ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *A18.3†, K93.0**
- Rein ¬ TBC [*A18.1†, N29.1**
- Résistance au médicament de première ligne ¬ *A16.9, U82.0!*
- Rétine ¬ *A18.5†, H32.0**
- Rétropéritonéale ¬ *A18.3*
- Rhinopharyngé
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*
- Sacrée ¬ *A18.0†, M49.08**
- Sacrum ¬ *A18.0†, M49.08**

Tuberculose *–suite*
- SAI ¬ Séquelles de *B90.9*
- Sclère ¬ *A18.5†, H19.0**
- Scrotum ¬ *A18.1†, N51.8**
- Sinus
- - Épididyme ¬ *A18.1†, N51.1**
- - Face
- - - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - - ¬ *A16.8*
- Sous-maxillaire ¬ *A18.8†, K93.8**
- Surrénales ¬ *A18.7†, E35.1**
- Symphyse pubienne ¬ *A18.0†, M01.15**
- Système
- - Lymphatique ¬ *A18.2*
- - Nerveux
- - - Central ¬
- - - - *A17.9†, G99.8**
- - - - Séquelles de *B90.0*
- - - ¬
- - - - *A17.9†, G99.8**
- - - - Formes de *A17.8†*
- Systémique du tissu conjonctif ¬ *A18.8†, M36.8**
- Testicules ¬ *A18.1†, N51.1**
- Thoracique
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.9*
- - ¬ *A16.9*
- Thymus ¬ *A18.8†, E35.8**
- Thyroïde ¬ *A18.8†, E35.0**
- Tissu adénoïde
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*
- Tissu cellulaire sous-cutané ¬ *A18.4*
- Trachée
- - Confirmation bactériologique
- - - Biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- - - Histologique ¬ *A15.5*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.4*
- - ¬ *A16.4*
- Trachéo-bronchique
- - Confirmation bactériologique ou histologique ¬ *A15.5*
- - ¬ *A16.4*
- Trompe d'Eustache ¬ *A18.6†, H75.0**
- Tunique vaginale ¬ *A18.1†, N51.8**
- Uretère ¬ *A18.1†, N29.1**
- Urètre ¬ *A18.1†, N37.0**
- Utérus ¬ *A18.1†, N74.1**
- Uvée ¬ *A18.5†, H22.0**
- Uvule ¬ *A18.8†, K93.8**
- Vagin ¬ *A18.1†, N77.1**
- Verruqueuse ¬ *A18.4*

Tuberculose *–suite*
- Vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- Vésicule
- - Biliaire ¬ *A18.8†, K87.0**
- - Séminales ¬ *A18.1†, N51.8**
- Vessie ¬ *A18.1†, N33.0**
- Voies respiratoires et sans précision ¬ Séquelles de *B90.9*
- Vulve ¬ *A18.1†, N77.1**
- ¬
- - *A16.9*
- - Déformation de la colonne vertébrale due à la *A18.0†, M49.09**
- - Encéphalite au cours de *A17.8†, G05.0**
- - Maladie due au VIH avec *B20, A16.9*
- - Mise en observation pour suspicion de *Z03.0*
- - Pneumoconiose associée à la *J65*
- - Polyneuropathie au cours de *A17.8†, G63.0**
- - Spondylite au cours de *A18.0†, M49.09**
- - Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.1*
- - Ulcère de la vulve au cours de *A18.1†, N77.0**

Tuberculosis
v./v.a. Pseudotuberculosis
- Résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ Mycobacterium *U82.0!*

Tubéreux
v./v.a. Type de maladie

Tubéro-éruptif ¬ Xanthome: *E78.2*

Tubérosité antérieure ¬ *S82.1*

Tubes collecteurs ¬ Carcinome des *C64*

Tubo-ovarien ¬
- Abcès (de): *N70*
- Affection inflammatoire *N70*

Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation ¬ *Z31.0*

Tubo-tympanique
- Chronique ¬ Catarrhe *H65.2*
- ¬
- - Maladie chronique *H66.1*
- - Otite moyenne suppurée chronique *H66.1*

Tubulaire
v./v.a. Nécrose tubulaire
- Anémie ¬ Syndrome de calcification du système nerveux central-surdité-acidose *Q87.8*
- Cardiomyopathie ¬ Syndrome d'insuffisance rénale *N25.8, I42.0*
- Corps glandulaire central du sein ¬ Adénocarcinome *C50.1*
- Mamelon ¬ Adénocarcinome *C50.0*
- Œsophage ¬ Duplication *Q39.8*
- Prolongement axillaire du sein ¬ Adénocarcinome *C50.6*
- Quadrant
- - Inféro-externe du sein ¬ Adénocarcinome *C50.5*

Tubulaire *–suite*
- Quadrant *–suite*
- - Inféro-interne du sein ¬ Adénocarcinome *C50.3*
- - Supéro-externe du sein ¬ Adénocarcinome *C50.4*
- - Supéro-interne du sein ¬ Adénocarcinome *C50.2*
- Rénale
- - Distale
- - - Autosomique récessive ¬ Acidose *N25.8*
- - - ¬ Acidose *N25.8*
- - Proximale ¬ Acidose *N25.8*
- - Type
- - - 1 ¬ Acidose *N25.8*
- - - 2 ¬ Acidose *N25.8*
- - ¬
- - - Acidose *N25.8*
- - - Dysgénésie *Q63.8*
- - - Ostéopétrose avec acidose *Q78.2, N25.8*
- Sein
- - Localisations contiguës ¬ Adénocarcinome *C50.8*
- - ¬ Adénocarcinome *C50.9*
- ¬
- - Myopathie avec agrégats *G71.2*
- - Syndrome d'encéphalopathie-cardiomyopathie hypertrophique-néphropathie *E88.8*
- - Troubles de la motilité de l'œsophage *K22.4*

Tubules ¬ Myopathie avec configuration hexagonale des *G71.2*

Tubulinopathie ¬ Dysgyrie associée à une *Q04.3*

Tubulo-interstitiel
- Aiguë ¬ Néphrite *N10*
- Autosomique dominante
- - Associée
- - - MUC1 ¬ Néphropathie *Q61.5*
- - - UMOD ¬ Néphropathie *Q61.5*
- - ¬ Néphropathie *Q61.5*
- Chronique, sans précision ¬ Néphrite *N11.9*
- Chroniques ¬ Autres néphrites *N11.8*
- Cours
- - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ Maladie rénale *N16.4**
- - Brucellose ¬ Maladie rénale *A23.9†, N16.0**
- - Cryoglobulinémie mixte ¬ Maladie rénale *D89.1†, N16.2**
- - Cystinose ¬ Maladie rénale *E72.0†, N16.3**
- - Diphtérie ¬ Maladie rénale *A36.8†, N16.0**
- - Leucémie ¬
- - - Maladie rénale *C95.90†, N16.1**
- - - Trouble *C95.90†, N16.1**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ Néphropathie *M32.1†, N16.4**

Tubulo-interstitiel *–suite*
- Cours *–suite*
- - Lymphome NCA ¬ Maladie rénale *C85.9†, N16.1**
- - Maladie
- - - Glycogénique ¬ Maladie rénale *E74.0†, N16.3**
- - - Wilson ¬ Maladie rénale *E83.0†, N16.3**
- - Maladies
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Maladie rénale *N16.0**
- - - Métaboliques ¬ Maladie rénale *N16.3**
- - - Sang et des troubles du système immunitaire ¬ Maladie rénale *N16.2**
- - - Tumorales ¬ Maladie rénale *N16.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Maladie rénale *N16.8**
- - Myélome multiple ¬
- - - Maladie rénale *C90.00†, N16.1**
- - - Trouble *C90.00†, N16.1**
- - Plasmocytome
- - - Rémission complète ¬ Maladie rénale *C90.01†, N16.1**
- - - ¬ Maladie rénale *C90.00†, N16.1**
- - Sarcoïdose ¬ Maladie rénale *D86.9†, N16.2**
- - Sepsis
- - - Fongique ¬ Maladie rénale *B48.80†, N16.0**
- - - Protozoaires ¬ Maladie rénale *B60.80†, N16.0**
- - Septicémie
- - - Bactérienne ¬ Maladie rénale *A41.9†, N16.0**
- - - Virale ¬ Maladie rénale *B34.80†, N16.0**
- - Syndrome sec ¬ Maladie rénale *M35.0†, N16.4**
- - Toxoplasmose ¬ Maladie rénale *B58.8†, N16.0**
- Cytomégalovirus ¬ Maladie rénale *B25.88†, N16.0**
- Due à un sepsis ¬ Maladie rénale *A41.9†, N16.0**
- Précisées ¬ Autres maladies rénales *N15.8*
- Salmonella ¬ Maladie rénale *A02.2†, N16.0**
- Sans précision ¬ Maladie rénale *N15.9*
- Uvéite] ¬ Syndrome TINU [Néphrite *N12, H20.9*
- Virus d'Epstein-Barr ¬ Maladie rénale *B27.0†, N16.0**
- Virus de l'herpès ¬ Maladie rénale *B00.8†, N16.0**
- ¬
- - Lupus érythémateux disséminé avec atteinte rénale *M32.1†, N16.4**
- - Syndrome Sjögren
- - - Maladie rénale *M35.0†, N16.4**
- - - Néphrite *M35.0†, N16.4**

Tubulokystique ¬ Carcinome rénal *C64*

Tubulo-mucineux à cellules fusiformes ¬ Carcinome rénal *C64*

Tubulopapillaire
- Canal pancréatique ¬ Carcinome intracanalaire *C25.3*
- Pancréas] ¬ ITPN [Carcinome intracanalaire *C25.3*

Tubulopathie
- Fuite phosphatée ¬ *N25.0*
- Mutation de l'ADN mitochondrial ¬ Cardiomyopathie hypertrophique et *I42.2*
- Proximale-diabète sucré-ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Rénale
- - Cardiomyopathie dilatée ¬ Syndrome de *N25.8, I42.0*
- - Encéphalopathie-insuffisance hépatique ¬ Syndrome de *G31.81*
- - Gitelman-like due à une mutation de l'ADN mitochondrial ¬ *N15.8*
- - ¬ Déplétion de l'ADN mitochondrial, forme encéphalomyopathique avec *G31.81†, N16.8**
- Sans précision ¬ Affection due à une *N25.9*
- ¬
- - Affections dues à une *N25.8*
- - Syndrome d'histidinurie - *N15.8†, E90**

Tué à tout moment ¬ Modification de la personnalité après: captivité prolongée avec risque d'être *F62.0*

Tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de *Y09.9!*

TUG Timed Up and Go
- 18
- - 33 secondes ¬ *U53.13*
- - Secondes ¬ *U53.03*
- Impossible à réaliser ¬ *U53.33*
- Plus de 33 secondes ¬ *U53.23*

Tularémie
- Abdominale ¬ *A21.3*
- Gastro-intestinale ¬ *A21.3*
- Généralisée ¬ *A21.7*
- Oculaire ¬ *A21.1*
- Oculo-glandulaire ¬ *A21.1*
- Pulmonaire ¬ *A21.2*
- Septicémique ¬ *A21.7*
- Septique ¬ *A21.7*
- Typhoïdique ¬ *A21.7*
- Ulcéro-glandulaire ¬ *A21.0*
- ¬
- - *A21.9*
- - Conjonctivite due à une *A21.1†, H13.1**
- - Formes de *A21.8*
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.4*
- - Pneumonie au cours de *A21.2†, J17.0**

Tularensis
- Francisella tularensis] ¬ Infection à Francisella tularensis subsp. *A21*

Tularensis *–suite*
- Subsp. tularensis [Francisella tularensis] ¬ Infection à Francisella *A21*
- ¬
- - Infection
- - - Francisella
- - - - *A21.9*
- - - - Tularensis subsp. tularensis [Francisella *A21*
- - - Pasteurella *A21.9*
- - Trachéo-bronchite à Francisella *A21.8*

Tuméfaction
- Diffuse généralisée
- - Intra-abdominale SAI ¬ *R19.0*
- - Ombilicale ¬ *R19.0*
- - Pelvienne SAI ¬ *R19.0*
- Ganglionnaire ¬ *R59*
- Mammaire, sans précision ¬ *N63*
- Masse
- - Intra-abdominales et pelviennes ¬ *R19.0*
- - Localisées peau tissu cellulaire sous-cutané
- - - Niveau
- - - - Cou ¬ *R22.1*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *R22.4*
- - - - - Supérieur ¬ *R22.3*
- - - - Tête ¬ *R22.0*
- - - - Tronc ¬ *R22.2*
- - - Sans précision ¬ *R22.9*
- - - Sièges multiples ¬ *R22.7*
- Sterno-mastoïdienne (congénitale) ¬ *Q68.0*

Tumeur
- Adénomatoïde
- - Péritoine ¬ *D19.1*
- - Plèvre ¬ *D19.0*
- Alvéolaires primaires ¬ Multiples *C34.9, C97!*
- Anale ¬ *D37.78*
- Annexielle maligne d'origine wolffienne ¬ *C57.4*
- Appareil respiratoire ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.2*
- Bednar ¬ *C44.9*
- Brenner maligne ¬ *C56*
- Brodie] ¬ Cystosarcome phyllode [*D48.6*
- Bronchique neuroendocrine à localisations contiguës ¬ *C34.8*
- Burkitt ¬ Maladie due au VIH avec *B21, C83.7*
- Calcifiée de Malherbe ¬ *D23.9*
- Canal anal ¬ *D37.78*
- Carcinoïde
- - Héréditaire
- - - Duodénum ¬ *C17.0*
- - - Iléon ¬ *C17.2*
- - - Intestin grêle
- - - - Localisations contiguës ¬ *C17.8*

Tumeur *–suite*
- Carcinoïde *–suite*
- - Héréditaire *–suite*
- - - Intestin grêle *–suite*
- - - - ¬ *C17.9*
- - - Jéjunum ¬ *C17.1*
- - Productrice mucus
- - - Appendice ¬ *C18.1*
- - - Poumons ¬ *C34.9*
- Cardiaque primaire
- - Adulte ¬
- - - *C38.0*
- - - *D15.1*
- - Enfant ¬
- - - *C38.0*
- - - *D15.1*
- Castleman ¬ *D47.7*
- Cavité buccal Organe digestif évolution imprévisible inconnue
- - Organes digestifs ¬ *D37.78*
- - Pancréas ¬ *D37.70*
- Cellule
- - Épithélioïdes périvasculaires ¬ *D48.1*
- - G ¬ *D37.70*
- - Îlots pancréatiques ¬ *D37.70*
- - Insulaires ¬ *D13.7*
- - Plasmacytoïdes dendritiques blastiques [TCPDB] ¬ *C86.4*
- Cellule géante ostéoclastique
- - Col du pancréas ¬ *C25.7*
- - Pancréas, à localisations contiguës ¬ *C25.8*
- - Queue du pancréas ¬ *C25.2*
- Cellules dendritiques indéterminées ¬ *C96.4*
- Cérébrale syphilitique ¬ *A52.1†, G94.8**
- Col ¬ Soins maternels pour: *O34.4*
- Col de l'utérus ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.4*
- Corps de l'utérus ¬ Soins maternels pour *O34.1*
- Desmoïde
- - Abdomen ¬ *D48.1*
- - Extraabdominale ¬ *D48.1*
- - ¬ *D48.1*
- Duodénum ¬ Sténose pylorique de l'adulte par *K31.12*
- Ectopique sécrétrice aldostérone
- - Ovaire ¬ *D39.1, E26.0*
- - Rétropéritoine ¬ *D48.3, E26.0*
- - Testicule ¬ *D40.1, E26.0*
- - ¬ *D48.9, E26.0*
- Embryonnaire
- - Rosette
- - - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - - Pluristratifiées
- - - - Cervelet ¬ *C71.6*
- - - - Encéphale ¬ *C71.0*

Tumeur *–suite*
- Embryonnaire *–suite*
- - Rosette *–suite*
- - - Pluristratifiées *–suite*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - - - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - - - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - - - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - - - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - - - ¬ *C71.9*
- - Tissu neuroépithélial ¬ *C72.9*
- Erdheim ¬ *D44.4*
- Estomac ¬
- - Examen spécial de dépistage de *Z12.0*
- - Sténose pylorique de l'adulte par *K31.12*
- Évolution imprévisible ou inconnue, sans précision ¬ *D48.9*
- Fibreux solitaire
- - Bénigne
- - - Abdomen ¬ *D21.4*
- - - Péritoine ¬ *D20.1*
- - - Thorax ¬ *D21.3*
- - ¬ *D21.9*
- Fœtus
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- - ¬ Dystocie due à: *O66.3*
- Gastro-intestinale neuroendocrine ¬ *C26.9*
- Glioneuronale
- - Formant des rosettes ¬ *D43.2*
- - Papillaire ¬ *D43.2*
- Glomus
- - Poumon ¬ *D18.08*
- - Tissu sous-cutané ¬ *D18.01*
- - ¬ *D18.00*
- GRF facteur libération hormone croissance
- - Intestin grêle ¬ *C17.9*
- - Jéjunum ¬ *C17.1*
- - Lobe
- - - Inférieur du poumon ¬ *C34.3*
- - - Moyen du poumon ¬ *C34.2*
- - - Supérieur du poumon ¬ *C34.1*
- - Pancréas ¬ *C25.4*
- - Poumon
- - - Localisations contiguës ¬ *C34.8*
- - - ¬ *C34.9*
- Histiocytaires à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D47.7*
- Histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue ¬ *D47.0*
- Hypophysaire ¬ *D44.3*
- Intestin ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.1*
- Intestinale ¬ *D37.78*
- Intracrânienne incertaine ¬ Démence au cours d'une *D43.2†, F02.8**
- Klatskin

Tumeur *–suite*
- Klatskin *–suite*
- - Atteinte des voies biliaires intrahépatiques ¬ *C24.8*
- - ¬ *C24.0*
- Liée à BAP1 ¬ Prédisposition au développement de *Q99.8*
- Localisations ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.8*
- Mandibulaire ¬ Syndrome d'hyperparathyroïdie- *E21.0, D16.42*
- Masson ¬ *D18.00*
- Mastocytes SAI ¬ *D47.0*
- Mésothéliale papillaire bien différenciée
- - Péritoine ¬ *D19.1*
- - Plèvre ¬ *D19.0*
- Métanéphrique bénigne ¬ *D30.0*
- Mucineuse de l'ovaire à faible potentiel de malignité ¬ *C56*
- Müllérienne mixte maligne du col de l'utérus ¬ *C53.9*
- Myofibroblastique inflammatoire
- - Bénigne
- - - Épiploon ¬ *D20.1*
- - - Mésentère ¬ *D20.1*
- - - Poumon ¬ *D14.3*
- - - Rétropéritoine ¬ *D20.0*
- - Maligne
- - - Épiploon ¬ *C48.1*
- - - Mésentère ¬ *C48.1*
- - - Poumon ¬ *C34.9*
- - - Rétropéritoine ¬ *C48.0*
- - ¬ *D48.9*
- Neurales] ¬ ROHHADNET [Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide-dysfonctionnement hypothalamique-hypoventilation-dysautonomie- *E23.3, C80.9*
- Neuroendocrinienne métastatique ¬ *C80.9*
- Neuroépithéliale dysembryoplasique ¬ *D33.2*
- Odontogène kératokystique
- - Mandibule ¬ *D16.5*
- - Maxillaire ¬ *D16.42*
- Oligodendrogliale
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Encéphale ¬ *C71.0*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Ovarienne dermoïde avec transformation maligne ¬ *C56*
- Pancréas ¬ Sténose pylorique de l'adulte par *K31.12*

Tumeur *–suite*
- Pancréatico-duodénale ¬ *D37.70*
- Pancréatique ¬ *D37.70*
- Papillaire
- - Kystique ¬ *D37.78*
- - Mucineuse de l'ovaire à faible potentiel de malignité ¬ *C56*
- - Région pinéale ¬ *D44.5*
- Parenchyme pinéal à différenciation intermédiaire ¬ *D44.5*
- Phyllode
- - Maligne de la prostate ¬ *C61*
- - Prostate ¬ *D40.0*
- - Sein ¬ *D48.6*
- Phylloïde bénigne ¬ *D24*
- Polyvésiculaire sac vitellin
- - Femme ¬ *C56*
- - Homme ¬ *C62.9*
- Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue ¬ Autres *D47.7*
- Primaire
- - Inconnue) ¬ Anémie tumorale (*D48.9†, D63.0**
- - Maligne d'origine inconnue ¬ *C80.0*
- Primitive
- - Indéterminée ¬ *C80.0*
- - ¬ *C80.9*
- Prostate ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.5*
- Rare gastro-œsophagienne ¬ *D37.1*
- Rate ¬ *D37.78*
- Rhabdoïde ¬ Tumeur rhabdoïde
- - Rein au cours de syndrome de prédisposition aux *C64*
- - Tératoïde au cours de syndrome de prédisposition aux *C80.9*
- Sac vitellin
- - Région pinéale ¬ *C75.3*
- - Système nerveux central ¬ *C72.9*
- - Testicule
- - - Descendu ¬ *C62.1*
- - - Non descendu ¬ *C62.0*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- SAI ¬ *D48.9*
- Sans précision ¬ Examen spécial de dépistage d'une *Z12.9*
- Secondaires malignes d'autres localisations précisées ¬ Autres *C79.88*
- Sein ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.3*
- Ténosynoviale Cellule géante
- - Articulation
- - - Cheville ¬ *M12.27*
- - - Coude ¬ *M12.22*
- - - Genou ¬ *M12.26*
- - - Hanche ¬ *M12.25*
- - Articulation de l'épaule ¬ *M12.21*

Tumeur *–suite*
- Ténosynoviale Cellule géante *–suite*
- - Articulation temporo-mandibulaire ¬ *M12.28*
- - Main ¬ *M12.24*
- Testiculaire des cordons sexuels et du stroma ¬ *C62.9*
- Thymique ¬ *D38.4*
- Thyroïde ¬ *D44.0*
- Tissu
- - Lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite néoplasique lors de *C79.3*
- - Lymphoïde hématopoïétique apparentés
- - - Évolution imprévisible ou inconnue, sans précision ¬ *D47.9*
- - - ¬ Antécédents familiaux d'autres *Z80.7*
- Traitement cytostatique d'une néoplasie) ¬ Lyse (spontanée) des *E88.3*
- Tronc cérébral ¬ *D43.1*
- Vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- Vessie ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.6*
- Vulve ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- Wilms ¬
- - *C64*
- - Adénosarcome embryonnaire du rein [*C64*
- - Délétion 11p13 avec *C64, Q93.5*
- - Syndrome
- - - Néphroblastomatose-ascite fœtale-macrosome- *Q87.3*
- - - Retard de développement-kystes pulmonaires-croissance excessive- *C64, Q87.3*
- Wolffienne annexielle bénigne ¬ *D28.7*
- ¬
- - Antécédents personnels d'autres *Z86.0*
- - Kyste branchial [siège de la *C10.4*
- - Syndrome myasthénique au cours de *D48.9†, G73.2**
- - Testicule
- - - Ectopique [siège de la *C62.0*
- - - Retenu [siège de la *C62.0*

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue
- Appareil
- - Digestif, sans précision ¬ *D37.9*
- - Respiratoire, sans précision ¬ *D38.6*
- Appendice ¬ *D37.3*
- Atteinte pluriglandulaire ¬ *D44.8*
- Bassinet ¬ *D41.1*
- Canal cranio-pharyngien ¬ *D44.4*
- Côlon ¬ *D37.4*
- Corpuscule carotidien ¬ *D44.6*
- Encéphale
- - Infratentoriel ¬ *D43.1*
- - Sans précision ¬ *D43.2*
- - Supratentoriel ¬ *D43.0*
- Épiphyse [glande pinéale] ¬ *D44.5*

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue *–suite*
- Estomac ¬ *D37.1*
- Foie, vésicule et voies biliaires ¬ *D37.6*
- Glande endocrine, sans précision ¬ *D44.9*
- Glomus aortique et autres paraganglions ¬ *D44.7*
- Hypophyse ¬ *D44.3*
- Intestin grêle ¬ *D37.2*
- Larynx ¬ *D38.0*
- Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ *D37.0*
- Médiastin ¬ *D38.3*
- Méninge
- - Cérébrales ¬ *D42.0*
- - Rachidiennes ¬ *D42.1*
- - Sans précision ¬ *D42.9*
- Moelle épinière ¬ *D43.4*
- Nerfs crâniens ¬ *D43.3*
- Nerfs périphériques et du système nerveux autonome ¬ *D48.2*
- Organe génital
- - Femme
- - - Sans précision ¬ *D39.9*
- - - ¬ *D39.7*
- - Homme
- - - Sans précision ¬ *D40.9*
- - - ¬ *D40.7*
- Organe urinaire
- - Sans précision ¬ *D41.9*
- - ¬ *D41.7*
- Organes digestifs ¬ *D37.7*
- Organes respiratoires ¬ *D38.5*
- Os et cartilage articulaire ¬ *D48.0*
- Ovaire ¬ *D39.1*
- Parathyroïde ¬ *D44.2*
- Parties du système nerveux central ¬ *D43.7*
- Peau ¬ *D48.5*
- Péritoine ¬ *D48.4*
- Placenta ¬ *D39.2*
- Plèvre ¬ *D38.2*
- Prostate ¬ *D40.0*
- Rectum ¬ *D37.5*
- Rein ¬ *D41.0*
- Rétropéritoine ¬ *D48.3*
- Sein ¬ *D48.6*
- Sièges précisés ¬ *D48.7*
- Surrénale ¬ *D44.1*
- Système nerveux central, sans précision ¬ *D43.9*
- Testicule ¬ *D40.1*
- Thymus ¬ *D38.4*
- Thyroïde ¬ *D44.0*
- Tissu conjonctif et autres tissus mous ¬ *D48.1*
- Trachée, bronches et poumon ¬ *D38.1*
- Uretère ¬ *D41.2*
- Urètre ¬ *D41.3*

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue *–suite*
- Utérus ¬ *D39.0*
- Vessie ¬ *D41.4*

Tumeur bénigne
- Amygdale ¬ *D10.4*
- Anus et canal anal ¬ *D12.9*
- Appareil respiratoire, sans précision ¬ *D14.4*
- Atteinte pluriglandulaire ¬ *D35.8*
- Bassinet rénal ¬ *D30.1*
- Bronches et poumon ¬ *D14.3*
- Cæcum ¬ *D12.0*
- Canal cranio-pharyngien ¬ *D35.3*
- Caronculaire de l'œil ¬ *D31.0*
- Choroïde ¬ *D31.3*
- Cœur ¬ *D15.1*
- Col de l'utérus ¬ *D26.0*
- Côlon ascendant ¬ *D12.2*
- Côlon descendant ¬ *D12.4*
- Côlon sigmoïde ¬ *D12.5*
- Côlon transverse ¬ *D12.3*
- Côlon, sans précision ¬ *D12.6*
- Conjonctive ¬ *D31.0*
- Cornée ¬ *D31.1*
- Corps
- - Ciliaire ¬ *D31.4*
- - Utérus ¬ *D26.1*
- Corpuscule carotidien ¬ *D35.5*
- Duodénum ¬ *D13.2*
- Encéphale
- - Infratentoriel ¬ *D33.1*
- - Sans précision ¬ *D33.2*
- - Supratentoriel ¬ *D33.0*
- Épididyme ¬ *D29.3*
- Épiphyse [glande pinéale] ¬ *D35.4*
- Estomac ¬ *D13.1*
- Foie ¬ *D13.4*
- Follicules pileux ¬ *D23*
- Gaines nerveuses périphériques ¬ *D36.1*
- Ganglions lymphatiques ¬ *D36.0*
- Glande
- - Sébacées ¬ *D23*
- - Sudoripares ¬ *D23*
- Glande endocrine
- - Précisées ¬ *D35.7*
- - Sans précision ¬ *D35.9*
- Glande lacrymale et canal lacrymal ¬ *D31.5*
- Glande parotide ¬ *D11.0*
- Glande salivaire principale
- - Sans précision ¬ *D11.9*
- - ¬ *D11.7*
- Glande sublinguale ¬ *D11.7*
- Glomus aortique et autres paraganglions ¬ *D35.6*
- Hypopharynx ¬ *D10.7*
- Hypophyse ¬ *D35.2*

Tumeur bénigne *–suite*
- Jonction recto-sigmoïdienne ¬ *D12.7*
- Langue ¬ *D10.1*
- Larynx ¬ *D14.1*
- Lèvre ¬ *D10.0*
- Médiastin ¬ *D15.2*
- Méninge
- - Cérébrales ¬ *D32.0*
- - Rachidiennes ¬ *D32.1*
- - Sans précision ¬ *D32.9*
- - ¬ *D32*
- Moelle épinière ¬ *D33.4*
- Nerfs crâniens ¬ *D33.3*
- Nerfs périphériques et du système nerveux autonome ¬ *D36.1*
- Œil, sans précision ¬ *D31.9*
- Œsophage ¬ *D13.0*
- Orbite, sans précision ¬ *D31.6*
- Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face ¬ *D14.0*
- Organe génital
- - Femme
- - - Précisés ¬ *D28.7*
- - - Sans précision ¬ *D28.9*
- - Homme
- - - Sans précision ¬ *D29.9*
- - - ¬ *D29.7*
- Organe intrathoracique, sans précision ¬ *D15.9*
- Organe urinaire
- - Sans précision ¬ *D30.9*
- - ¬ *D30.7*
- Organes intrathoraciques précisés ¬ *D15.7*
- Os cartilage articulaire
- - Bassin, sacrum et coccyx ¬ *D16.8*
- - Clavicule ¬ *D16.72*
- - Côté
- - - Sternum et clavicule ¬ *D16.7*
- - - ¬ *D16.70*
- - Cranio-facial ¬ *D16.41*
- - Maxillaire inférieur ¬ *D16.5*
- - Maxillofacial ¬ *D16.42*
- - Omoplate et os longs du membre supérieur ¬ *D16.0*
- - Os
- - - Courts membre
- - - - Inférieur ¬ *D16.3*
- - - - Supérieur ¬ *D16.1*
- - - Crâne et de la face ¬ *D16.4*
- - - Longs du membre inférieur ¬ *D16.2*
- - Rachis ¬ *D16.6*
- - Sans précision ¬ *D16.9*
- - Sternum ¬ *D16.71*
- Ovaire ¬ *D27*
- Pancréas
- - Endocrine ¬ *D13.7*
- - ¬ *D13.6*

Tumeur bénigne *–suite*
- Parathyroïde ¬ *D35.1*
- Parties
- - Bouche, autres et non précisées ¬ *D10.3*
- - Intestin grêle, autres et non précisées ¬ *D13.3*
- - Oropharynx ¬ *D10.5*
- - Précisées du système nerveux central ¬ *D33.7*
- - Utérus ¬ *D26.7*
- Peau
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *D23.4*
- - Lèvre ¬ *D23.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D23.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D23.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D23.2*
- - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D23.3*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *D23.1*
- - Sans précision ¬ *D23.9*
- - Tronc ¬ *D23.5*
- Péritoine ¬ *D20.1*
- Pharynx, sans précision ¬ *D10.9*
- Plancher de la bouche ¬ *D10.2*
- Prostate ¬ *D29.1*
- Rectum ¬ *D12.8*
- Rein ¬ *D30.0*
- Rétine ¬ *D31.2*
- Rétropéritoine ¬ *D20.0*
- Rhinopharynx ¬ *D10.6*
- Scrotum ¬ *D29.4*
- Sein ¬ *D24*
- Sièges
- - Mal définis de l'appareil digestif ¬ *D13.9*
- - Précisés ¬ *D36.7*
- Surrénale ¬ *D35.0*
- Système nerveux central, sans précision ¬ *D33.9*
- Testicule ¬ *D29.2*
- Thymus ¬ *D15.0*
- Thyroïde ¬ *D34*
- Tissu conjonctif tissu mou
- - Abdomen ¬ *D21.4*
- - Bassin ¬ *D21.5*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D21.2*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D21.1*
- - Sans précision ¬ *D21.9*
- - Tête, de la face et du cou ¬ *D21.0*
- - Thorax ¬ *D21.3*
- - Tronc, sans précision ¬ *D21.6*
- Tissu mésothélial
- - Péritoine ¬ *D19.1*
- - Plèvre ¬ *D19.0*
- - Sans précision ¬ *D19.9*

Tumeur bénigne *–suite*
- Tissu mésothélial *–suite*
- - Sièges ¬ *D19.7*
- Trachée ¬ *D14.2*
- Trompe
- - Ligaments de l'utérus ¬ *D28.2*
- - ¬ *D28.2*
- Uretère ¬ *D30.2*
- Urètre ¬ *D30.4*
- Utérus, sans précision ¬ *D26.9*
- Vagin ¬ *D28.1*
- Verge ¬ *D29.0*
- Vessie ¬ *D30.3*
- Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire ¬ *D13.5*
- Vulve ¬ *D28.0*
- ¬ *D36.9*

Tumeur desmoplastique petites cellule
- Péritoine ¬ *C48.2*
- Rondes
- - Tissu mou
- - - Abdomen ¬ *C49.4*
- - - Thorax ¬ *C49.3*
- - ¬ *C49.9*
- Rondesdes des tissus mous du pelvis ¬ *C49.5*

Tumeur épithéliale
- Bénigne
- - Glande
- - - Parotide ¬ *D11.0*
- - - Sous-maxillaire ¬ *D11.7*
- - Glande sublinguale ¬ *D11.7*
- - Glandes salivaires ¬ *D11.9*
- Maligne
- - Glande sous-mandibulaire ¬ *C08.0*
- - Glande sublinguale ¬ *C08.1*
- - Glandes salivaires ¬ *C07*
- Ovaire, à la limite de la malignité ¬ *C56*

Tumeur germinale
- Dysgerminomateuse maligne de l'ovaire ¬ *C56*
- Maligne
- - Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- - Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- - Endocol ¬ *C53.0*
- - Exocol ¬ *C53.1*
- - Jonction cervico-vaginale ¬ *C53.8*
- - L 'endomètre ¬ *C54.1*
- - Mixte
- - - Ovaire ¬ *C56*
- - - ¬ *C80.9*
- - Non dysgerminomateuse de l'ovaire ¬ *C56*
- - Vagin ¬ *C52*
- Mixte
- - Suprasellaire ¬ *C71.9*
- - Testicule

Tumeur germinale *–suite*
- Mixte *–suite*
- - Testicule *–suite*
- - - Descendu ¬ *C62.1*
- - - Non descendu ¬ *C62.0*
- - - ¬ *C62.9*
- Non séminomateuse testicule
- - Dystopique ¬ *C62.0*
- - Scrotal ¬ *C62.1*
- - ¬ *C62.9*

Tumeur lipomateuse bénigne
- Cordon spermatique ¬ *D17.6*
- Organes intra-abdominaux ¬ *D17.5*
- Organes intrathoraciques ¬ *D17.4*
- Peau tissu sous-cutané
- - Membres ¬ *D17.2*
- - Sièges autres et non précisés ¬ *D17.3*
- - Tête, de la face et du cou ¬ *D17.0*
- - Tronc ¬ *D17.1*
- Sans précision ¬ *D17.9*
- Sièges ¬ *D17.7*

Tumeur lymphoïde associée réarrangement
- FGFR1 ¬ *C91.70*
- JAK2 forme
- - Aiguë ¬ *C91.00*
- - Chronique ¬ *C91.10*
- JAK2c ¬ *C91.70*
- PDGFRA ¬ *C91.70*
- PDGFRB ¬ *C91.70*

Tumeur maligne
- Abdomen ¬ *C76.2*
- Affectant à la fois les canaux biliaires intra- et extra-hépatiques ¬ *C24.8*
- Ampoule de Vater ¬ *C24.1*
- Amygdale
- - Linguale ¬ *C02.4*
- - Sans précision ¬ *C09.9*
- Angle gauche du côlon [splénique] ¬ *C18.5*
- Anneau de Waldeyer ¬ *C14.2*
- Annexes de l'utérus, sans précision ¬ *C57.4*
- Antre pylorique ¬ *C16.3*
- Anus, sans précision ¬ *C21.0*
- Appendice ¬ *C18.1*
- Atteinte pluriglandulaire, sans précision ¬ *C75.8*
- Base de la langue ¬ *C01*
- Bassinet ¬ *C65*
- Bouche, sans précision ¬ *C06.9*
- Bronche
- - Poumon, sans précision ¬ *C34.9*
- - Souche ¬ *C34.0*
- Canal biliaire extra-hépatique ¬ *C24.0*
- Cardia ¬ *C16.0*
- Caronculaire de l'œil ¬ *C69.0*
- Cartilage laryngé ¬ *C32.3*
- Cellule

Tumeur maligne *–suite*
- Cellule *–suite*
- - G du pancréas ¬ *C25.4*
- - Stéroïdiennes SAI ¬ *C56*
- Cervelet ¬ *C71.6*
- Choroïde ¬ *C69.3*
- Clitoris ¬ *C51.2*
- Col de l'utérus, sans précision ¬ *C53.9*
- Col vésical ¬ *C67.5*
- Côlon descendant ¬ *C18.6*
- Côlon sigmoïde ¬ *C18.7*
- Côlon, sans précision ¬ *C18.9*
- Commissure des lèvres ¬ *C00.6*
- Conjonctive ¬ *C69.0*
- Cordon spermatique ¬ *C63.1*
- Cornée ¬ *C69.1*
- Corps
- - Ciliaire ¬ *C69.4*
- - Estomac ¬ *C16.2*
- - Pancréas ¬ *C25.1*
- - Utérus, sans précision ¬ *C54.9*
- - Verge ¬ *C60.2*
- Corpuscule carotidien ¬ *C75.4*
- Cortex de la surrénale ¬ *C74.0*
- Cryptorchidie ¬ *C62.0*
- Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision ¬ *C02.3*
- Dôme de la vessie ¬ *C67.1*
- Encéphale
- - Sans précision ¬ *C71.9*
- - Sauf lobes et ventricules ¬ *C71.0*
- Endocol ¬ *C53.0*
- Endomètre ¬ *C54.1*
- Envahissement de la moelle osseuse ¬ *C79.5*
- Épididyme ¬ *C63.0*
- Épiphyse [glande pinéale] ¬ *C75.3*
- Estomac, sans précision ¬ *C16.9*
- Étage
- - Sous-glottique ¬ *C32.2*
- - Sus-glottique ¬ *C32.1*
- Exocol ¬ *C53.1*
- Face
- - Antérieure de l'épiglotte ¬ *C10.1*
- - Cutanée de la lèvre ¬ *C44.0*
- - Dorsale de la langue ¬ *C02.0*
- - Inférieure de la langue ¬ *C02.2*
- Fente branchiale ¬ *C10.4*
- Foie, sans précision ¬ *C22.9*
- Fond de l'utérus ¬ *C54.3*
- Fosse
- - Amygdalienne ¬ *C09.0*
- - Nasales ¬ *C30.0*
- Gaines des nerfs périphériques ¬ [MPNST] *C47.9*
- Ganglion

Tumeur maligne *–suite*
- Ganglion *–suite*
- - Base ¬ *C71.0*
- - Lymphatique
- - - Aisselle et du membre supérieur ¬ *C77.3*
- - - Inguinaux et du membre inférieur ¬ *C77.4*
- - - Intra-abdominaux ¬ *C77.2*
- - - Intrapelviens ¬ *C77.5*
- - - Intrathoraciques ¬ *C77.1*
- - - Sans précision ¬ *C77.9*
- - - Sièges multiples ¬ *C77.8*
- - - Tête, de la face et du cou ¬ *C77.0*
- Gencive
- - Inférieure ¬ *C03.1*
- - Sans précision ¬ *C03.9*
- - Supérieure ¬ *C03.0*
- Gland ¬ *C60.1*
- Glande
- - Sébacées ¬ *C44*
- - Sudoripares ¬ *C44*
- Glande endocrine, sans précision ¬ *C75.9*
- Glande lacrymale et canal lacrymal ¬ *C69.5*
- Glande sous-mandibulaire ¬ *C08.0*
- Glande sublinguale ¬ *C08.1*
- Glande urétrale ¬ *C68.1*
- Glomus aortique et autres paraganglions ¬ *C75.5*
- Grande
- - Courbure de l'estomac, sans précision ¬ *C16.6*
- - Lèvre ¬ *C51.0*
- Hypophyse ¬ *C75.1*
- Iléon ¬ *C17.2*
- Intestin grêle, sans précision ¬ *C17.9*
- Isthme de l'utérus ¬ *C54.0*
- Larynx, sans précision ¬ *C32.9*
- Lésion localisations contiguës
- - Amygdale ¬ *C09.8*
- - Appareil digestif ¬ *C26.8*
- - Bouche, parties autres et non précisées ¬ *C06.8*
- - Bronches et du poumon ¬ *C34.8*
- - Cœur, du médiastin et de la plèvre ¬ *C38.8*
- - Col de l'utérus ¬ *C53.8*
- - Côlon ¬ *C18.8*
- - Corps de l'utérus ¬ *C54.8*
- - Encéphale
- - - Parties du système nerveux central ¬ *C72.8*
- - - ¬ *C71.8*
- - Estomac ¬ *C16.8*
- - Glandes salivaires principales ¬ *C08.8*
- - Hypopharynx ¬ *C13.8*
- - Intestin grêle ¬ *C17.8*
- - Langue ¬ *C02.8*
- - Larynx ¬ *C32.8*

Tumeur maligne *–suite*
- Lésion localisations contiguës *–suite*
- - Lèvre
- - - Cavité buccale et du pharynx ¬ *C14.8*
- - - ¬ *C00.8*
- - Nerfs périphériques et du système nerveux autonome ¬ *C47.8*
- - Œil et de ses annexes ¬ *C69.8*
- - Œsophage ¬ *C15.8*
- - Organe génital
- - - Femme ¬ *C57.8*
- - - Homme ¬ *C63.8*
- - Organes respiratoires et intrathoraciques ¬ *C39.8*
- - Organes urinaires ¬ *C68.8*
- - Oropharynx ¬ *C10.8*
- - Os cartilage articulaire
- - - Membres ¬ *C40.8*
- - - ¬ *C41.8*
- - Palais ¬ *C05.8*
- - Pancréas ¬ *C25.8*
- - Peau ¬ *C44.8*
- - Plancher de la bouche ¬ *C04.8*
- - Rectum, de l'anus et du canal anal ¬ *C21.8*
- - Rétropéritoine et du péritoine ¬ *C48.8*
- - Rhinopharynx ¬ *C11.8*
- - Sein ¬ *C50.8*
- - Sièges autres et mal définis ¬ *C76.8*
- - Sinus de la face ¬ *C31.8*
- - Tissu conjonctif et des autres tissus mous ¬ *C49.8*
- - Verge ¬ *C60.8*
- - Vessie ¬ *C67.8*
- - Voies biliaires ¬ *C24.8*
- - Vulve ¬ *C51.8*
- Lèvre
- - Inférieure
- - - Bord libre ¬ *C00.1*
- - - Face interne ¬ *C00.4*
- - Sans précision
- - - Bord libre ¬ *C00.2*
- - - Face interne ¬ *C00.5*
- - - ¬ *C00.9*
- - Supérieure
- - - Bord libre ¬ *C00.0*
- - - Face interne ¬ *C00.3*
- Ligament large ¬ *C57.1*
- Ligament rond ¬ *C57.2*
- Lobe
- - Inférieur, bronches ou poumon ¬ *C34.3*
- - Moyen, bronches ou poumon ¬ *C34.2*
- - Supérieur, bronches ou poumon ¬ *C34.1*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*

Tumeur maligne *–suite*
- Luette ¬ *C05.2*
- Mamelon et aréole ¬ *C50.0*
- Marge anale ¬ *C44.50*
- Mastocytes ¬ *C96.2*
- Médiastin
- - Antérieur ¬ *C38.1*
- - Partie non précisée ¬ *C38.3*
- - Postérieur ¬ *C38.2*
- Médullosurrénale ¬ *C74.1*
- Membre
- - Inférieur ¬ *C76.5*
- - Supérieur ¬ *C76.4*
- Méninge
- - Cérébrales ¬ *C70.0*
- - Rachidien ¬
- - - *C70.1*
- - - *C70.1*
- - Sans précision ¬ *C70.9*
- Mixte müllérienne de l'ovaire ¬ *C56*
- Moelle épinière ¬ *C72.0*
- Muqueuse de la joue ¬ *C06.0*
- Myomètre ¬ *C54.2*
- Nerf auditif [Nerf crânien VIII] ¬ *C72.4*
- Nerf olfactif [Nerf crânien I] ¬ *C72.2*
- Nerf optique [Nerf crânien II] ¬ *C72.3*
- Nerf périphérique
- - Abdomen ¬ *C47.4*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *C47.2*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *C47.1*
- - Pelvis ¬ *C47.5*
- - Système nerveux autonome, sans précision ¬ *C47.9*
- - Tête, de la face et du cou ¬ *C47.0*
- - Thorax ¬ *C47.3*
- - Tronc, sans précision ¬ *C47.6*
- Nerfs crâniens, autres et non précisés ¬ *C72.5*
- Neuroendocrine de l 'oreille moyenne ¬ *C30.1*
- Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*
- Œil, sans précision ¬ *C69.9*
- Œsophage
- - Abdominal ¬ *C15.2*
- - Cervical ¬ *C15.0*
- - Sans précision ¬ *C15.9*
- - Thoracique ¬ *C15.1*
- Opération prophylactique
- - Organes ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de *Z40.08*
- - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de *Z40.01*
- - Sein ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de *Z40.00*
- Orbite ¬ *C69.6*
- Oreille moyenne ¬ *C30.1*

Tumeur maligne *–suite*
- Organe digestif ¬
- - Antécédents familiaux de *Z80.0*
- - Antécédents personnels de *Z85.0*
- Organe génital
- - Femme
- - - Précisés ¬ *C57.7*
- - - Sans précision ¬ *C57.9*
- - Homme
- - - Précisés ¬ *C63.7*
- - - Sans précision ¬ *C63.9*
- - ¬
- - - Antécédents familiaux de *Z80.4*
- - - Antécédents personnels de *Z85.4*
- Organe respiratoire intrathoracique ¬
- - Antécédents familiaux de *Z80.2*
- - Antécédents personnels de *Z85.2*
- Organe urinaire, sans précision ¬ *C68.9*
- Organes et systèmes ¬ Antécédents personnels de *Z85.8*
- Orifice urétéral ¬ *C67.6*
- Oropharynx, sans précision ¬ *C10.9*
- Os
- - Cartilage articulaire
- - - Clavicule ¬ *C41.32*
- - - Côtes ¬ *C41.30*
- - - Cranio-facial ¬ *C41.01*
- - - Mandibule ¬ *C41.1*
- - - Maxillofacial ¬ *C41.02*
- - - Membre, sans précision ¬ *C40.9*
- - - Omoplate et os longs du membre supérieur ¬ *C40.0*
- - - Os
- - - - Courts membre
- - - - - Inférieur ¬ *C40.3*
- - - - - Supérieur ¬ *C40.1*
- - - - Longs du membre inférieur ¬ *C40.2*
- - - Pelvis ¬ *C41.4*
- - - Rachis ¬ *C41.2*
- - - Sans précision ¬ *C41.9*
- - - Sternum ¬ *C41.31*
- - Cranio-facial ¬ *C41.01*
- - Face ¬ *C41.02*
- - Maxillofacial ¬ *C41.02*
- - ¬ Osteodystrophia deformans au cours de *C41.9†, M90.69**
- Ovaire ¬ *C56*
- Palais, sans précision ¬ *C05.9*
- Pancréas
- - Endocrine ¬ *C25.4*
- - Sans précision ¬ *C25.9*
- Paramètre ¬ *C57.3*
- Parathyroïde ¬ *C75.0*
- Paroi
- - Antérieure
- - - Rhinopharynx ¬ *C11.3*

Tumeur maligne *–suite*
- Paroi *–suite*
- - Antérieure *–suite*
- - - Vessie ¬ *C67.3*
- - Latérale
- - - Oropharynx ¬ *C10.2*
- - - Rhinopharynx ¬ *C11.2*
- - Postérieure
- - - Hypopharynx ¬ *C13.2*
- - - Oropharynx ¬ *C10.3*
- - - Rhinopharynx ¬ *C11.1*
- - - Vessie ¬ *C67.4*
- - Supérieure du rhinopharynx ¬ *C11.0*
- Partie centrale du sein ¬ *C50.1*
- Parties
- - Pancréas ¬ *C25.7*
- - Précisées du péritoine ¬ *C48.1*
- Peau
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *C44.4*
- - Face, parties autres et non précisées ¬ *C44.3*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *C44.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *C44.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *C44.2*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *C44.1*
- - Sans précision ¬ *C44.9*
- - Tronc ¬ *C44.5*
- - ¬ Antécédents familiaux de *Z80.8*
- Pelvienne ¬ *C76.3*
- Pelvis ¬ *C76.3*
- Péritoine, sans précision ¬ *C48.2*
- Petite
- - Courbure de l'estomac, sans précision ¬ *C16.5*
- - Lèvre ¬ *C51.1*
- Pharynx, sans précision ¬ *C14.0*
- Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) ¬ *C09.1*
- Placenta ¬ *C58*
- Plancher
- - Antérieur de la bouche ¬ *C04.0*
- - Bouche, sans précision ¬ *C04.9*
- - Latéral de la bouche ¬ *C04.1*
- Plasmocytes localisée SAI ¬ *C90.3*
- Plèvre ¬ *C38.4*
- Pointe et bords latéraux de la langue ¬ *C02.1*
- Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ¬ Autres *C96.7*
- Prépuce ¬ *C60.0*
- Prolongement axillaire du sein ¬ *C50.6*
- Prostate ¬ *C61*
- Pylore ¬ *C16.4*
- Quadrant

Tumeur maligne *–suite*
- Quadrant *–suite*
- - Inféro-externe du sein ¬ *C50.5*
- - Inféro-interne du sein ¬ *C50.3*
- - Supéro-externe du sein ¬ *C50.4*
- - Supéro-interne du sein ¬ *C50.2*
- Queue de cheval ¬ *C72.1*
- Rate ¬ *C26.1*
- Rectum ¬ *C20*
- Région
- - Rétro-cricoïdienne ¬ *C13.0*
- - Rétromolaire ¬ *C06.2*
- Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé ¬ *C13.1*
- Rétine ¬ *C69.2*
- Rhinopharynx, sans précision ¬ *C11.9*
- SAI ¬
- - *C80.9*
- - Généralisé (secondaire): *C79.9*
- Sans précision ¬
- - *C80.9*
- - Antécédent familial de *Z80.9*
- - Antécédents personnels de *Z85.9*
- - Examen de contrôle après traitement pour *Z08.9*
- Sclérotique ¬ *C69.4*
- Scrotum ¬ *C63.2*
- Secondaire
- - Cerveau et des méninges cérébrales ¬ *C79.3*
- - Foie et des voies biliaires intrahépatiques ¬ *C78.7*
- - Glande surrénale ¬ *C79.7*
- - Gros intestin et du rectum ¬ *C78.5*
- - Intestin grêle ¬ *C78.4*
- - Médiastin ¬ *C78.1*
- - Organe respiratoire
- - - Digestifs ¬ *C78*
- - - Non précisés ¬ *C78.3*
- - Organes digestifs, autres et non précisés ¬ *C78.8*
- - Organes génitaux ¬ *C79.82*
- - Os et de la moelle osseuse ¬ *C79.5*
- - Ovaire ¬ *C79.6*
- - Parties du système nerveux, autres et non précisées ¬ *C79.4*
- - Peau ¬ *C79.2*
- - Péricarde ¬ *C79.83*
- - Plèvre ¬
- - - *C78.2*
- - - Épanchement pleural au cours d'une *C78.2†, J91**
- - Poumon ¬ *C78.0*
- - Rein et du bassinet ¬ *C79.0*
- - Rétropéritoine et du péritoine ¬ *C78.6*
- - Sein ¬ *C79.81*
- - Siège non précisé ¬ *C79.9*

Tumeur maligne *–suite*
- Secondaire *–suite*
- - Tissu conjonctif tissu mou
- - - Cou ¬ *C79.85*
- - - Membres ¬ *C79.86*
- - - Sièges précisés ¬ *C79.88*
- - Vessie et des organes urinaires, autres et non précisés ¬ *C79.1*
- Secondaires du cœur ¬ Autres *C79.84*
- Sein
- - Sans précision ¬ *C50.9*
- - ¬
- - - Antécédents familiaux de *Z80.3*
- - - Antécédents personnels de *Z85.3*
- Sertoli-Leydig de l'ovaire ¬ *C56*
- Siège primitif inconnu
- - Ainsi précisée ¬ *C80.0*
- - ¬ *C80.0*
- Sièges mal définis
- - Appareil
- - - Digestif ¬ *C26.9*
- - - Respiratoire ¬ *C39.9*
- - ¬ *C76.7*
- Sillon glosso-épiglottique ¬ *C10.0*
- Sinus de la face, sans précision ¬ *C31.9*
- Surrénale
- - Sans précision ¬ *C74.9*
- - ¬ *C74*
- Système nerveux central, sans précision ¬ *C72.9*
- Systèmes et organes ¬ Antécédents familiaux de *Z80.8*
- Testicule
- - Descendu ¬ *C62.1*
- - Sans précision ¬ *C62.9*
- Tête, face et cou ¬ *C76.0*
- Thorax ¬ *C76.1*
- Thymus ¬ *C37*
- Thyroïde ¬ *C73*
- Tiers
- - Inférieur de l'œsophage ¬ *C15.5*
- - Moyen de l'œsophage ¬ *C15.4*
- - Supérieur de l'œsophage ¬ *C15.3*
- Tissu
- - Hématopoïétique NCA ¬ Maladie due au VIH avec *B21, C96.9*
- - Lymphoïde hématopoïétique apparentés
- - - Sans précision ¬ *C96.9*
- - - ¬ Antécédents personnels d'autres *Z85.7*
- Tissu conjonctif tissu mou
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *C49.2*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Sans précision ¬ *C49.9*
- - Tête, de la face et du cou ¬ *C49.0*

Tumeur maligne *–suite*
- Tissu conjonctif tissu mou *–suite*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - Tronc, sans précision ¬ *C49.6*
- Trachée
- - Bronche poumon ¬
- - - Antécédents familiaux de *Z80.1*
- - - Antécédents personnels de *Z85.1*
- - ¬ *C33*
- Tractus cranio-pharyngien ¬ *C75.2*
- Trigone de la vessie ¬ *C67.0*
- Trompe de Fallope ¬ *C57.0*
- Trompes ¬ *C57.0*
- Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- Uretère ¬ *C66*
- Urètre ¬ *C68.0*
- Utérus, partie non précisée ¬ *C55*
- Vagin ¬ *C52*
- Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- Verge ¬ *C60.9*
- Vessie, sans précision ¬ *C67.9*
- Vestibule de la bouche ¬ *C06.1*
- Voie urinaire ¬
- - Antécédents familiaux de *Z80.5*
- - Antécédents personnels de *Z85.5*
- Voies respiratoires supérieures, partie non précisée ¬ *C39.0*
- Voile du palais ¬ *C05.1*
- Voûte palatine ¬ *C05.0*
- Vulve, sans précision ¬ *C51.9*
- Zone cloacale ¬ *C21.2*
- ¬
- - Antécédents personnels de chimiothérapie pour *Z92.6*
- - Examen de contrôle
- - - Chimiothérapie pour *Z08.2*
- - - Radiothérapie pour *Z08.1*
- - - Traitement
- - - - *Z08.8*
- - - - Chirurgical d'une *Z08.0*
- - - - Combinés pour *Z08.7*
- - Lymphohistiocytose hémophagocytaire acquise associée à une *C96.9, D76.1*
- - Maladie due VIH
- - - *B21*
- - - Plusieurs *B21*
- - Mise en observation pour suspicion de *Z03.1*
- - Myopathie au cours d'une *C80.9†, M63.89**
- - Polyneuropathie au cours d'une *C80.9†, G63.1**
- - Séance de chimiothérapie pour *Z51.1*
- - Syndrome myasthénique au cours d'une *C80.9†, G73.2**

Tumeur mixte
- Cellule germinal

Tumeur mixte *–suite*
- Cellule germinal *–suite*
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Encéphale ¬ *C71.0*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Région pinéale ¬ *C75.3*
- - Système nerveux central ¬ *C72.9*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- Maligne des canaux de Müller du corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Myéloïde lymphatique réarrangement JAK2 associé forme
- - Aiguë ¬ *C95.00*
- - Chronique ¬ *C95.10*

Tumeur myéloïde
- Associée réarrangement
- - FGFR1 ¬ *C92.70*
- - JAK2
- - - Forme
- - - - Aiguë ¬ *C92.00*
- - - - Chronique ¬ *C92.10*
- - - ¬ *C92.70*
- - PDGFRA ¬ *C92.70*
- - PDGFRB ¬ *C92.70*
- Extramédullaire ¬ *C92.30*

Tumeur NCA ¬
- Anémie au cours d'une *D48.9†*, *D63.0**
- Arthropathie au cours d'une *D48.0†*, *M36.1**
- Ataxie cérébelleuse au cours de *D48.9†*, *G13.1**
- Atrophie systémique du système nerveux central au cours de *D48.9†*, *G13.1**
- Compression des racines nerveuses au cours de *D48.9†*, *G55.0**
- Dégénérescence cérébrale au cours de *D48.9†*, *G32.8**
- Dermatomyosite au cours de *D48.9†*, *M36.0**
- Dermato-polymyosite au cours de *D48.9†*, *M36.0**
- Encéphalopathie au cours de *D48.9†*, *G13.1**
- Fracture pathologique au cours d'une *D48.0†*, *M90.79**
- Hydrocéphalie au cours de *D48.9†*, *G94.1**
- Myélopathie au cours de *D48.9†*, *G99.2**
- Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de *D48.9†*, *G53.3**
- Polyneuropathie au cours de *D48.9†*, *G63.1**

Tumeur neuroectodermique
- Cervelet primitive ¬ *C71.6*
- Périphérique maligne du col de l'utérus ¬ *C53.9*

Tumeur neuroectodermique *–suite*
- Primitive
- - Col de l'utérus
- - - Lésion à localisations contiguës ¬ *C53.8*
- - - ¬ *C53.9*
- - Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- - Encéphale ¬
- - - *C71.0*
- - - *C71.9*
- - Endocol ¬ *C53.0*
- - Exocol ¬ *C53.1*
- - Fond de l'utérus ¬ *C54.3*
- - Isthme de l'utérus ¬ *C54.0*
- - L 'endomètre ¬ *C54.1*
- - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - Moelle épinière ¬ *C72.0*
- - Myomètre ¬ *C54.2*
- - Nerf crânien ¬ *C72.5*
- - Périphérique
- - - Tissu mou
- - - - Abdomen ¬ *C49.4*
- - - - Localisations contiguës ¬ *C49.8*
- - - - Membres
- - - - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - - - Pelvis ¬ *C49.5*
- - - - Tête ¬ *C49.0*
- - - - Thorax ¬ *C49.3*
- - - - Tronc ¬ *C49.6*
- - - ¬ *C49.9*
- - PNET) du système nerveux central ¬ *C72.9*
- - Quatrième ventricule ¬ *C71.7*
- - Système nerveux central ¬ *C72.9*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*

Tumeur neuroendocrine
- Bénigne
- - Angle
- - - Droit du côlon ¬ *D12.3*
- - - Gauche du côlon ¬ *D12.3*
- - Cæcum ¬ *D12.0*
- - Canal anal ¬ *D12.9*
- - Côlon ascendant ¬ *D12.2*
- - Côlon descendant ¬ *D12.4*
- - Côlon sigmoïde ¬ *D12.5*
- - Côlon transverse ¬ *D12.3*
- - Duodénum ¬ *D13.2*
- - Larynx ¬ *D14.1*
- - Oreille moyenne ¬ *D14.0*
- - Rectum ¬ *D12.8*
- Bien différenciée de l 'endomètre ¬ *C54.1*
- Bronche

Tumeur neuroendocrine *–suite*
- Bronche *–suite*
- - Lobaire
- - - Inférieure ¬ *C34.3*
- - - Supérieure ¬ *C34.1*
- - Lobe moyen ¬ *C34.2*
- - Souche ¬ *C34.0*
- Bronchique ¬ *C34.9*
- Cardia ¬ *C16.0*
- Classique de l 'appendice ¬ *D37.3*
- Côlon ¬ *C18.9*
- Estomac
- - Type 1 forme familiale
- - - Lésion à localisations contiguës ¬ *C16.8*
- - - ¬ *D13.1*
- - ¬
- - - *C16.9*
- - - *D13.1*
- Faible grade du corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Familiale maligne
- - Antre de l'estomac de type 1 ¬ *C16.3*
- - Cardia de type 1 ¬ *C16.0*
- - Corps de l'estomac de type 1 ¬ *C16.2*
- - Estomac type 1
- - - Localisations contiguës ¬ *D13.1*
- - - ¬ *C16.9*
- - Fundus de type 1 ¬ *C16.1*
- - Grande courbure de l'estomac de type 1 ¬ *C16.6*
- - Petite courbure de l'estomac de type 1 ¬ *C16.5*
- - Pylore de type 1 ¬ *C16.4*
- Grande courbure de l'estomac ¬ *C16.6*
- Iléon ¬
- - *C17.2*
- - *D13.3*
- Incertain
- - Canal anal ¬ *D37.78*
- - Côlon ¬ *D37.4*
- - Duodénum ¬ *D37.2*
- - Iléon ¬ *D37.2*
- - Jéjunum ¬ *D37.2*
- - Larynx ¬ *D38.0*
- - Oreille moyenne ¬ *D38.5*
- - Rectum ¬ *D37.5*
- Jéjunum ¬
- - *C17.1*
- - *D13.3*
- Larynx ¬ *C32.9*
- Maligne
- - Angle
- - - Droit du côlon ¬ *C18.3*
- - - Gauche du côlon ¬ *C18.5*
- - Antre de l'estomac ¬ *C16.3*
- - Cæcum ¬ *C18.0*
- - Canal anal ¬ *C21.1*

Tumeur neuroendocrine *–suite*
- Maligne *–suite*
- - Côlon ascendant ¬ *C18.2*
- - Côlon descendant ¬ *C18.6*
- - Côlon sigmoïde ¬ *C18.7*
- - Côlon transverse ¬ *C18.4*
- - Côlon, à localisations contiguës ¬ *C18.8*
- - Corps de l'estomac ¬ *C16.2*
- - Duodénum ¬ *C17.0*
- - Estomac, à localisations contiguës ¬ *C16.8*
- - Face postérieure de l'épiglotte ¬ *C32.1*
- - Fundus ¬ *C16.1*
- - Glotte ¬ *C32.0*
- - Intestin grêle ¬ *C17.9*
- - Partie
- - - Sous-glottique ¬ *C32.2*
- - - Supra-glottique ¬ *C32.1*
- - Pylore ¬ *C16.4*
- - Rectum ¬ *C20*
- Non fonctionnelle pancréas ¬
- - *C25.4*
- - *D13.7*
- Pancréas
- - Sécrétrice de sérotonine ¬ *C25.4*
- - ¬ *C25.4*
- Petite courbure de l'estomac ¬ *C16.5*
- Poumon ¬ *C34.9*
- Vésicule biliaire ¬ *C23*

Tumeur oligoastrocytaire
- Cerveau ¬ *C71.0*
- Cervelet ¬ *C71.6*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*
- Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- ¬ *C71.9*

Tumeur rhabdoïde
- Foie ¬ *C22.7*
- Nerf
- - Abdomen ¬ *C47.4*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C47.2*
- - - Supérieurs ¬ *C47.1*
- - Pelviens ¬ *C47.5*
- - Tête ¬ *C47.0*
- - Thorax ¬ *C47.3*
- - Tronc ¬ *C47.6*
- Nerfs périphériques, à localisations contiguës ¬ *C47.8*
- Rein
- - Cours de syndrome de prédisposition aux tumeurs rhabdoïdes ¬ *C64*
- - ¬ *C64*

Tumeur rhabdoïde *–suite*
- Tératoïde
- - Atypique
- - - Cerveau ¬ *C71.0*
- - - Cervelet ¬ *C71.6*
- - - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- - - Lobe frontal ¬ *C71.1*
- - - Lobe occipital ¬ *C71.4*
- - - Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- - - Lobe temporal ¬ *C71.2*
- - - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - - ¬ ATRT [*C72.9*
- - Cours de syndrome de prédisposition aux tumeurs rhabdoïdes ¬ *C80.9*
- Tissu mou
- - Abdomen ¬ *C49.4*
- - Lésion à localisations contiguës ¬ *C49.8*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C49.2*
- - - Supérieurs ¬ *C49.1*
- - Pelvis ¬ *C49.5*
- - Tête ¬ *C49.0*
- - Thorax ¬ *C49.3*
- - Tronc ¬ *C49.6*

Tumeur stromale
- Cordon sexuel testicule
- - Dystopique ¬ *C62.0*
- - Scrotal ¬ *C62.1*
- Microkystique ¬ *D27*

Tumeur stromale gastro-intestinale
- Angle
- - Droit du côlon ¬ GIST [*C18.3*
- - Gauche du côlon ¬ GIST [*C18.5*
- Appendice ¬ GIST [*C18.1*
- Cæcum ¬ GIST [*C18.0*
- Côlon ascendant ¬ GIST [*C18.2*
- Côlon descendant ¬ GIST [*C18.6*
- Côlon sigmoïde ¬ GIST [*C18.7*
- Côlon transverse ¬ GIST [*C18.4*
- Côlon, à localisations contiguës ¬ GIST [*C18.8*
- Diverticule de Meckel ¬ GIST [*C17.3*
- Duodénum ¬ GIST [*C17.0*
- Iléon ¬ GIST [*C17.2*
- Jéjunum ¬ GIST [*C17.1*
- Jonction
- - Duodéno-jéjunale ¬ GIST [*C17.8*
- - Recto-sigmoïdienne ¬ GIST [*C19*
- Œsophage
- - Abdominal ¬ TSGI [*C15.2*
- - Cervical ¬ TSGI [*C15.0*
- - Thoracique ¬ TSGI [*C15.1*
- - ¬ TSGI [*C15.9*
- Rectum ¬ GIST [*C20*

Tumeur stromale gastro-intestinale *–suite*
- Tiers
- - Inférieur de l'œsophage ¬ TSGI [*C15.5*
- - Moyen de l'œsophage ¬ TSGI [*C15.4*
- - Supérieur de l'œsophage ¬ TSGI [*C15.3*
- TSGI GIST
- - Cardia ¬ *C16.0*
- - Côlon ¬ *C18.9*
- - Corps de l'estomac ¬ *C16.2*
- - Estomac ¬ *C16.9*
- - Fundus ¬ *C16.1*
- - Grande courbure de l'estomac ¬ *C16.6*
- - l'antre pylorique ¬ *C16.3*
- - Intestin grêle ¬ *C17.9*
- - Localisations contiguës
- - - Estomac ¬ *C16.8*
- - - Œsophage ¬ *C15.8*
- - Petite courbure de l'estomac ¬ *C16.5*
- - Pylore ¬ *C16.4*
- - ¬ *C48.2*
- ¬
- - *C26.9*
- - *C48.2*

Tumeur triton maligne
- Nerf
- - Cou ¬ *C47.0*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ *C47.2*
- - - Supérieurs ¬ *C47.1*
- - Paroi abdominale ¬ *C47.4*
- - Pelviens ¬ *C47.5*
- - Tête ¬ *C47.0*
- - Thorax ¬ *C47.3*
- - Tronc ¬ *C47.6*
- Nerfs périphériques, à localisations contiguës ¬ *C47.8*

Tumeur trophoblastique
- Épithélioïde ¬
- - *C58*
- - *D39.2*
- Placentaire ¬ *D39.2*

Tumidus ¬ Lupus *L93.2*

Tungland-Bellman ¬ Syndrome de *H90.3, K11.7*

Tungose ¬ *B88.1*

Tunique
- Albuginée du corps caverneux du pénis ¬ Lésion de la *S39.80*
- Intermédiaire artérielle ¬ Dégénérescence de la *I70.29*
- Vaginal
- - Non filarienne) SAI ¬ Chylocèle de la *N50.8*
- - Testicule et du canal déférent ¬ Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la *N49.1*
- - Vésicule séminal ¬

Tunique *–suite*
- Vaginal *–suite*
- - Vésicule séminal ¬ *–suite*
- - - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la *N50.8*
- - - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la *N50.8*
- - - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la *N50.8*
- - - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la *N50.8*
- - ¬
- - - *C63.7*
- - - *D29.7*
- - - Hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (*N43*
- - - Mésothéliome
- - - - *C63.7*
- - - - Malin de la *C45.7*
- - - Rétrécissement de: *N50.8*
- - - Syphilis tardive de la *A52.7†, N51.8**
- - - Tuberculose de la *A18.1†, N51.8**

Tunnel
- Aorto-ventriculaire
- - Droit ¬ *Q20.8*
- - Gauche ¬ *Q20.8*
- - ¬ *Q20.8*
- ¬ Sténose subaortique en *Q24.4*

Turcique
- Anormale ¬ Syndrome de petite taille-anomalies hypophysaires et cérébelleuses-selle *Q87.1*
- Vide ¬ Déficit hypophysaire associé au syndrome de la selle *E23.0*

Türk-Duane ¬ Syndrome de Stilling- *H50.8*

Turner
v./v.a. Wilson-Turner
- Amyotrophie névralgique de l'épaule] ¬ Syndrome de Parsonage- *G54.5*
- ¬
- - Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*
- - Dent hypoplasique de *K00.4*
- - Formes du syndrome de *Q96.8*
- - Syndrome de *Q96.9*

Turner-Kieser ¬ Syndrome de *Q87.2*

Turnpenny ¬ Syndrome de dysplasie ectodermique-dents de naissance, type *Q82.8*

Turnpenny-Fry ¬ Syndrome de *Q87.8*

Turricéphalie ¬ *Q75.0*

TWEAK ¬ Déficit immunitaire commun variable par déficit en *D83.0*

Twin reversed arterial perfusion] ¬ Séquence TRAP [*O43.0*

TYK2 ¬ Syndrome hyper-IgE autosomique récessif par déficit en *D82.4*

Tylose ¬ Hyperostose vertébrale ankylosante avec *M48.19*

Tympan
- Partie attique ¬ Perforation du *H72.1*
- Post-inflammatoire ¬ perforation du *H72*
- Post-traumatique persistante ¬ perforation du *H72*
- Sans précision ¬
- - Affection du *H73.9*
- - Perforation du *H72.9*
- ¬
- - Affections précisées du *H73.8*
- - Cholestéatome du *H71*
- - Défaut du *H72.9*
- - Perforation
- - - *H72.8*
- - - Centrale du *H72.0*
- - - Marginales du *H72.2*
- - - S
- - - - Multiples du *H72.8*
- - - - Totale du *H72.8*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.37*
- - Rupture traumatique du *S09.2*

Tympanisme thoracique(s) ¬ *R09.8*

Tympanite
- Aiguë ¬ *H73.0*
- Chronique ¬ *H73.1*

Tympanosclérose ¬ *H74.0*

Typhi ¬
- Infection à Salmonella *A01.0*
- Lymphadénite mésentérique à Salmonella *A01.0*
- Pneumonie à Salmonella *A01.0†, J17.0**
- Typhus à Rickettsia *A75.2*

Typhique
- Invasive ¬ Salmonellose non *A02.8*
- ¬
- - Ostéomyélite *A01.0†, M90.29**
- - Spondylite *A01.0†, M49.29**

Typhlite tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**

Typhogastrique ¬ Fièvre *A01.0*

Typhoïde
v./v.a. Fièvre typhoïde
- Parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la *Z27.0*
- Paratyphoïde
- - DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et *Z27.2*
- - Seule [TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.1*
- ¬
- - *A01.0*
- - Endocardite *A01.0†, I39.8**
- - Méningite *A01.0†, G01**
- - Myocardite *A01.0†, I41.0**

Typhoïde *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Myosite *A01.0†, M63.09**
- - Salmonellose *A01.0*
- - Sujet porteur de *Z22.0*

Typhoïdique
- Perforé ¬ Ulcère *A01.0*
- ¬
- - État *A01.0*
- - Fistule *A01.0*
- - Infection *A01.0*
- - Péritonite *A01.0*
- - Tularémie *A21.7*
- - Ulcère intestinal *A01.0*

Typhomanie ¬ *A01.0*

Typhosa ¬ Infection à Eberthella *A01.0*

Typhus
- Abdominale ¬ *A01.0*
- Affectant la vésicule biliaire ¬ *A01.0*
- Broussailles ¬ *A75.3*
- Cérébral ¬ *A75.9†, G94.8**
- Classique ¬ *A75.0*
- Encéphale ¬ *A01.0*
- Endémique
- - Tabardillo] ¬ Typhus murin [typhus mexicain, *A75.9*
- - ¬ *A75.0*
- Épidémique
- - Poux
- - - Rickettsia prowazekii ¬ *A75.0*
- - - ¬
- - - - *A75.0*
- - - - Myocardite due au *A75.0†, I41.0**
- - ¬ *A75.0*
- Exanthématique Brilli NCA ¬ *A75.1*
- Hépatique ¬ *A01.0*
- Mexicain, typhus endémique, tabardillo] ¬ Typhus murin [*A75.9*
- Murin
- - Typhus mexicain, typhus endémique, tabardillo] ¬ *A75.9*
- - ¬ *A75.2*
- Poux ¬ *A75.0*
- Pulmonaire ¬ *A01.0*
- Rats ¬ *A75.2*
- Recrudescent ¬ *A75.1*
- Récurrent ¬ *A68*
- Rickettsia
- - Mooseri ¬ *A75.2*
- - Tsutsugamushi ¬ *A75.3*
- - Typhi ¬ *A75.2*
- Tiques
- - SAI ¬ *A77.9*
- - Sibérie ¬ *A77.2*
- Tropical ¬ *A75.3*
- ¬

Typhus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *A75*
- - Arthrite au cours de *A01.0†, M01.39**
- - Méningite cérébrospinale due au *A75.9†, G01**
- - Myocardite au cours de *A75.9†, I41.0**
- - Scrub *A75.3*
- - Tropical *A75.3*

Tyrosine
- Aminotransférase ¬ Tyrosinémie par déficit en *E70.2*
- Hydroxylase ¬
- - Déficit en *G24.1*
- - Dystonie dopa-sensible par déficit en *G24.1*
- Kinase spécifique des lymphocytes] ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en LCK [*D81.2*

Tyrosinémie
- Déficit
- - 4-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase ¬ *E70.2*
- - Tyrosine aminotransférase ¬ *E70.2*
- Hépato-rénale ¬ *E70.2*
- Oculo-cutanée ¬ *E70.2*
- Transitoire du nouveau-né ¬ *P74.5*
- Type
- - 1 ¬ *E70.2*
- - 2 ¬ *E70.2*
- - 3 ¬ *E70.2*
- ¬ *E70.2*

Tyrosinose ¬ *E70.2*

Tyrosinurie ¬ *E70.2*

Tyshchenko ¬ Syndrome de *Q87.8*

Ubiquinone ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique récessive par déficit en *G11.1*

UCP2 ¬
- Hyperinsulinisme par déficit en *E16.1*
- Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en *E16.1*

Ueba
v./v.a. Hamanishi-Ueba-Tsuji

Uehlinger
v./v.a. Von-Meyenburg-Altherr-Uehlinger
- ¬ Syndrome de *M89.49*

Uhl ¬ Anomalie d' *Q24.8*

UIP [Usual interstitial pneumonia] ¬ *J84.10*

Ulbright-Hodes ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Ulcerans [Ulcère de Buruli] ¬ Infection par Mycobacterium: *A31.1*

Ulcération
- Aphteuse récidivante ¬ *K12.0*
- Artérielle ¬ *I77.88*
- Chroniques de la peau, non classées ailleurs ¬ *L98.4*
- Cordon ombilical-atrésie intestinale ¬ Syndrome d' *Q41.9, P02.6*
- Cornée ¬ Avitaminose A avec xérosis et *E50.3†, H19.8**
- Estivales ¬ Vascularite livédoïde avec *L95.0*
- Inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *N77.8**
- Larynx ¬ *J38.7*
- Nez et de la cloison nasale ¬ *J34.0*
- Post-phlébitique des membres inférieurs ¬ *I87.01*
- Traumatique) de la langue ¬ *K14.0*
- Vagin ¬ *N76.5*
- Vulve
  - - Cours
    - - - Maladie de Behçet ¬ *M35.2†, N77.8**
    - - - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *N77.0**
  - - ¬ *N76.6*
  - ¬
    - - Athérosclérose Artère distale Type bassin-jambe
      - - - *I70.24*
      - - - Stade IV selon Fontaine avec *I70.24*
    - - Insuffisance veineuse
      - - - Chronique périphérique
        - - - - *I87.21*
        - - - - Sans *I87.20*
      - - - Membres inférieurs, avec *I87.21*
    - - Stade IV de Leriche et Fontaine, avec *I70.24*
    - - Syndrome
      - - - Post-phlébitique
        - - - - *I87.01*
        - - - - Sans *I87.00*
      - - - Post-thrombotique
        - - - - *I87.01*
        - - - - Sans *I87.00*

Ulcérative ¬ Gingivite (chronique): *K05.1*

Ulcéré
- Membres inférieurs ¬ Varices *I83.0*
- ¬ Pian tardif nodulaire (*A66.4*

Ulcère
- Aigus de l'estomac et du duodénum ¬ *K27.3*
- Amibien de la peau ¬ *A06.7*
- Amygdalien ¬ *J35.8*
- Anus et du rectum ¬ *K62.6*
- Artériel de jambe ¬ *I70.24*
- Bronches ¬ *J98.0*
- Buccaux et génitaux avec chondrite ¬ *M35.2, M94.1*
- Buruli] ¬ Infection par Mycobacterium: ulcerans [*A31.1*
- Canal biliaire ¬ *K83.8*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Chronique cutané SAI ¬ *L98.4*
- Cornée
  - - Annulaire ¬ *H16.0*
  - - Central ¬ *H16.0*
  - - Hypopyon ¬ *H16.0*
  - - Marginal ¬ *H16.0*
  - - Perforé ¬ *H16.0*
  - - SAI ¬ *H16.0*
  - - ¬ *H16.0*
- Cornet nasal ¬ *J34.0*
- Cutané
  - - SAI ¬ *L98.4*
  - - Tuberculeux ¬ *A18.4*
- Décubitus stade
  - - 1 ¬ *L89.0*
  - - 2 ¬ *L89.1*
  - - 3 ¬ *L89.2*
  - - 4 ¬ *L89.3*
- Dieulafoy
  - - Duodénum ¬ *K26.0*
  - - Estomac ¬ *K25.0*
- Digestif, de siège non précisé ¬ *K27*
- Duodénal
  - - Origine médicamenteuse ¬ *K26.9, Y57.98!*
  - - ¬
    - - - *K26*
    - - - Infection à Helicobacter pylori au cours d' *K26.9, B98.0!*
- Duodénum ¬ *K26*
- Escarre pression
  - - Perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ *L89.1*
  - - Phlyctène (remplie de liquide séreux) (ouverte) (percée) ¬ *L89.1*
  - - Sans indication de stade ¬ *L89.9*
- Estomac

Ulcère *–suite*
- Estomac *–suite*
  - - Anti-inflammatoires non stéroïdiens ¬ *K25.9, Y57.98!*
  - - Origine médicamenteuse ¬ *K25.9, Y57.98!*
  - - ¬
    - - - *K25*
    - - - Infection à Helicobacter pylori au cours d' *K25.9, B98.0!*
- Framboesial initial ¬ *A66.0*
- Gastrique
  - - Psychogène ¬ *F54, K25.9*
  - - ¬ *K25*
- Gastro-duodénal
  - - Anti-inflammatoires non stéroïdiens ¬ *K27.9, Y57.98!*
  - - Hémorragique aigu ¬ *K27.0*
  - - Nouveau-né ¬ *P78.8*
  - - SAI ¬ *K27*
- Gastro-jéjunal
  - - Aigu ¬ *K28.3*
  - - ¬ *K28*
- Hémorroïdes
  - - Externes ¬ *K64.5*
  - - Internes ¬ *K64.8*
- Infectieux de jambe ¬ *L97*
- Inflammation ¬ Varice membres inférieurs
  - - *I83.2*
  - - Sans *I83.9*
- Intestin
  - - Cours d'une amibiase chronique ¬ *A06.1*
  - - ¬ *K63.3*
- Intestinal
  - - Tuberculeux ¬ *A18.3†, K93.0**
  - - Typhoïdique ¬ *A01.0*
- Jambe
  - - Insuffisance veineuse ¬ *I87.21*
  - - Mixte de type bassin-jambe ¬ *I70.24*
  - - Non variqueux ¬ *I87.21*
  - - Post-thrombotique ¬ *I83.0*
- Larynx diphtérique ¬ *A36.2*
- Malin para-urétral ¬ *C76.3*
- Membre inférieur, non classé ailleurs ¬ *L97*
- Mooren ¬ *H16.0*
- Muqueuse buccale ¬ *K12.1*
- Œsophage
  - - Fongique ¬ *K22.1*
  - - Ingestion
    - - - Médicaments ¬ *K22.1*
    - - - Produits chimiques ¬ *K22.1*
  - - Peptique ¬ *K22.1*
  - - ¬
    - - - *K22.1*
    - - - Œsophagite par reflux avec *K21.0, K22.1*
- Palais ¬ *K12.1*
- Pénétrant de l'aorte [UPA] ¬ *I77.80*

Ulcère *–suite*
- Peptique
- - Anti-inflammatoires non stéroïdiens ¬ *K27.9, Y57.98!*
- - Érosion
- - - Anastomotique ¬ *K28*
- - - Gastro-colique ¬ *K28*
- - - Gastro-intestinal(e) ¬ *K28*
- - - Gastro-jéjunal(e) ¬ *K28*
- - - Jéjunal(e) ¬ *K28*
- - - Marginal(e) ¬ *K28*
- - - Stomal(e) ¬ *K28*
- - Origine médicamenteuse ¬ *K27.9, Y57.98!*
- - SAI ¬ *K27*
- Pianiques ¬ Gommes et *A66.4*
- Plâtre utilisé à des fins thérapeutiques ¬ *L89*
- Post-pylorique ¬ *K26*
- Primaire de l'intestin grêle ¬ *K63.3*
- Pulmonaire tuberculeux ¬ *A16.2*
- Pylorique ¬ *K25*
- Solitaire
- - Anus ¬ *K62.6*
- - Rectum ¬
- - - *K62.6*
- - - Syndrome de l' *K62.6*
- - ¬ *K62.6*
- Sphincter vésical ¬ *N32.8*
- Stercoral ¬ *K62.6*
- Syphilitique
- - Perforé ¬ *A52.7†, L99.8**
- - Tardif ¬ *A52.7†, L99.8**
- Trophique du col de l'utérus ¬ *N86*
- Tropical SAI ¬ *L98.4*
- Tuberculeux
- - Colonne vertébrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Cornée ¬ *A18.5†, H19.2**
- - Intestin ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Scrotum ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Vessie ¬ *A18.1†, N33.0**
- Typhoïdique perforé ¬ *A01.0*
- Urètre (méat) ¬ *N34.2*
- Vagin dû à un pessaire ¬ *N89.8*
- Variqueux
- - Anus ¬ *K64.8*
- - Externe de l'anus ¬ *K64.5*
- - Interne de l'anus ¬ *K64.8*
- - Membres inférieurs, toute localisation) ¬ *I83.0*
- - Septum nasal ¬ *I86.88*
- Vasculaire mixte de type épaule-bras ¬ *I70.26*
- Veineux de la jambe sans varices ¬ *I87.21*
- Verge ¬ *N48.5*
- Vésical ¬ *N32.8*
- Vulve
- - Cours de tuberculose ¬ *A18.1†, N77.0**

Ulcère *–suite*
- Vulve *–suite*
- - Virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N77.0**
- ¬ Syndrome de tremblement essentiel-nystagmus- *Q87.8*

Ulcéreux
- Aiguë
- - Hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - Occlusion avec lésion de Cameron *K44.0, K25.0*
- - - Sans occlusion avec lésion de Cameron *K44.9, K25.0*
- - Sans hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - Occlusion avec lésion de Cameron *K44.0, K25.3*
- - - Sans occlusion avec lésion de Cameron *K44.9, K25.3*
- Chronique
- - Hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - Occlusion avec lésion de Cameron *K44.0, K25.4*
- - - Sans occlusion avec lésion de Cameron *K44.9, K25.4*
- - Sans hémorragie ¬ Hernie diaphragmatique
- - - Occlusion avec lésion de Cameron *K44.0, K25.7*
- - - Sans occlusion avec lésion de Cameron *K44.9, K25.7*
- - Subtotale ¬ Colite *K51.0*
- - ¬
- - - Pancolite *K51.0*
- - - Rectite *K51.2*
- - - Recto-sigmoïdite *K51.3*
- Profonde du membre inférieur ¬ Phlébite *I80.28*
- Spécifique ¬ Balano-posthite *A63.8†, N51.2**
- ¬
- - Amygdalite (aiguë): *J03.9*
- - Colite tuberculeuse *A18.3†, K93.0**
- - CU [colite *K51.9*
- - Cystite *N30.88*
- - Endocardite (aiguë) (subaiguë): *I33.0*
- - Hernie diaphragmatique
- - - Occlusion avec lésion de Cameron *K44.0, K25.9*
- - - Sans occlusion avec lésion de Cameron *K44.9, K25.9*
- - Laryngite (aiguë): *J04.0*
- - Mucosite orale (*K12.3*
- - Œsophagite *K22.1*
- - Pharyngite (aiguë): *J02.9*
- - Pulpite chronique (hyperplasique) (*K04.0*
- - Pyoderma gangrenosum, type *L88*
- - Recto-colite hémorragique [colite *K51*
- - Rhinite (chronique): *J31.0*
- - Stomatite: *K12.1*

Ulcéro-glandulaire ¬ Tularémie *A21.0*

Ulcéro-nécrotique
- Aiguë ¬
- - Gingivite *A69.1*
- - Gingivo-stomatite *A69.1*
- - GUNA [gingivite *A69.1*
- ¬ Stomatite *A69.0*

Ulcus dendriticum de la cornée à herpès simplex ¬ *B00.5†, H19.1**

Ulérythème ophryogène ¬ *L66.4*

Ullrich
v./v.a. Morquio-Ullrich-Brailsford
- ¬ Dystrophie musculaire congénitale d' *G71.2*

Ulmer
v./v.a. Bindewald-Ulmer-Müller

Ulna ¬
- Dysplasie métaphysaire de l' *Q78.5*
- Fracture de l'épiphyse proximale de l' *S52.00*
- Pseudarthrose congénitale de l' *Q74.0*
- Sarcome de l' *C40.0*

Ulnaire
- Bilatérale ¬ Synostose radio- *Q74.0*
- Microcéphalie-scoliose ¬ Syndrome de synostose radio- *Q02, Q77.8*
- Unilatérale ¬ Synostose radio- *Q74.0*
- ¬
- - Hémimélie *Q71.5*
- - Synostose radio- *Q74.0*

Ultérieur
- Non classés ailleurs ¬ Soins préparatoires pour traitement *Z51.4*
- Sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure ¬ Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication *Y84.9!*

UMNL] ¬ Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [*G95.80*

Uncinariose ¬ *B76*

Unguéal
- Congénital(e) ¬ Hippocratisme *Q84.6*
- ¬ Syndrome de pectus excavatum-macrocéphalie-dysplasie *Q87.1*

Unguéo
v./v.a. odonto-tricho-unguéo-digito-palmaire

Unguis incarnatus ¬ *L60.0*

Unguium ¬ Trichophytosis *B35.1*

Unicervical ¬ Utérus bicorne *Q51.3*

Unicorne ¬ Utérus *Q51.4*

Unicoronale et sagittale non syndromique ¬ Craniosynostose *Q75.0*

Unifocale
- Cellules de Langerhans ¬ Histiocytose *C96.6*
- ¬ Histiocytose X *C96.6*

Unilatéral
v./v.a. Type de maladie

Uninodulaire
- Non toxique ¬ Goitre *E04.1*
- Toxique ¬ Thyréotoxicose avec goitre *E05.1*

Uniparentale
- Maternelle chromosome
- - 2 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 4 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 6 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 9 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 13 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 16 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 20 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 21 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 22 ¬ Disomie *Q99.8*
- - X ¬ Disomie *Q99.8*
- Origine
- - Maternelle du chromosome 1 ¬ Disomie *Q99.8*
- - Paternelle
- - - Chromosome
- - - - 1 ¬ Disomie *Q99.8*
- - - - 11 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une disomie *Q87.3*
- - - Mosaïque ¬ Syndrome de disomie *Q99.8*
- Paternelle chromosome
- - 5 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 6 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 7 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 13 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 20 ¬ Disomie *Q99.8*
- - 21 ¬ Disomie *Q99.8*
- - X ¬ Disomie *Q99.8*

Unipolaire SAI ¬ Dépression *F33.9*

Unique
- Césarienne ¬ Accouchement *O82*
- Congénital ¬ Rein *Q60.0*
- Enfant
- - Mort-né ¬ Naissance *Z37.1!*
- - Vivant ¬ Naissance *Z37.0!*
- Forceps et ventouse ¬ Accouchement *O81*
- Lieu de naissance non précisé ¬ Enfant *Z38.2*
- Né
- - Hôpital ¬ Enfant *Z38.0*
- - Hors d'un hôpital ¬ Enfant *Z38.1*
- Précisée ¬ Tuberculose miliaire aiguë, localisation *A19.0*
- Précisées ¬ Nécessité vaccination contre maladies
- - Infectieuses *Z26.8*
- - Virales *Z25.8*
- SAI ¬ Naissance: *Z37.9!*
- Spontané ¬ Accouchement *O80*
- ¬
- - Artère ombilicale *Q27.0*
- - Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique *O69.2*
- - Kyste rein congénital
- - - *Q61.0*
- - - *Q61.0*

Unique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Naissance spontanée par voie vaginale d'un enfant *O80*
- - Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes *Z23.8*
- - Ventricule *Q20.4*

Unisystémique ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et *C96.5*

Univentriculaire ¬ Cœur *Q20.4*

Universalis ¬ Leukopathia *E70.3*

Universel ¬
- Dyschromatose héréditaire *L81.8*
- Mésentère *Q43.3*

Unna ¬ Hypotrichose type Marie *Q84.0*

Unverricht-Lundborg] ¬ MUL [Maladie de *G40.3*

UPA] ¬ Ulcère pénétrant de l'aorte [*I77.80*

Upington ¬ Maladie d' *Q78.4*

Urate ¬ Néphropathie d' *M10.99†, N29.8**

Urbach
v./v.a. Oppenheim-Urbach
- ¬ Syndrome rhizomélique type *Q87.1*

Urbach-Wiethe ¬ Maladie de *E78.88*

Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Mycoplasma et *B96.0!*

Uréidopropionase
v./v.a. bêta-uréidopropionase

Urémie
- Chronique, sans précision ¬ *N18.9*
- Extrarénale ¬ *R39.2*
- Nouveau-né ¬ *P96.0*
- Prérénale ¬ *R39.2*
- SAI ¬ *N19*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- ¬ Polyneuropathie au cours d' *N18.89†, G63.8**

Urémique
- Atypique
- - Associé à des anticorps anti-facteur H ¬ Syndrome hémolytique et *D58.8*
- - ¬ Syndrome hémolytique et *D58.8*
- Déficit en DGKE ¬ Syndrome hémolytique et *D58.8*
- Diarrhée ¬ Syndrome hémolytique et *D59.3*
- Infection ¬ Syndrome hémolytique et *D59.3*
- Mutation de la diacylglycérol kinase epsilon ¬ Syndrome hémolytique et *D58.8*
- ¬
- - Apoplexie *N18.89†, I68.8**
- - Démence *N18.89†, F02.8**
- - Encéphalopathie *N18.89†, G94.39**
- - Glomérulonéphrite au cours de syndrome hémolytique *D59.3†, N08.2**
- - Maladie glomérulaire au cours de syndrome hémolytique *D59.3†, N08.2**
- - Neuropathie *N18.89†, G63.8**

Urémique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Paralysie *N18.89†, G99.8**
- - Péricardite *N18.89†, I32.8**
- - Prurit *L29.8*
- - Syndrome hémolytique *D59.3*

Uréogenèse ¬ Anomalies du cycle de l' *E72.2*

Urétéral
v./v.a. pelvi-urétérale
- Cicatrice ¬ Reflux vésico- *N13.7*
- Fermeture et infection ¬ Prolapsus *N13.67*
- Infection
- - Rein ¬ Hydronéphrose
- - - Obstruction calculeuse *N13.63*
- - - Rétrécissement *N13.61*
- - ¬
- - - Contraction de l'orifice *N13.67*
- - - Rétrécissement de l'orifice *N13.67*
- Non classée ailleurs ¬ Hydronéphrose avec rétrécissement *N13.1*
- SAI ¬ Reflux vésico- *N13.7*
- Sans hydronéphrose
- - Infection rein ¬
- - - Coudure *N13.67*
- - - Rétrécissement *N13.67*
- - ¬ Coudure et rétrécissement *N13.5*
- Tuberculeux ¬ Rétrécissement *A18.1†, N29.1**
- ¬
- - Calcul *N20.1*
- - Carcinome à petites cellules de l'orifice *C67.6*
- - Carcinome épidermoïde pur de l'orifice *C67.6*
- - Carcinome non papillaire à cellules transitionnelles de l'orifice *C67.6*
- - Déplacement de l'uretère ou de l'orifice *Q62.6*
- - Déviation de l'uretère ou de l'orifice *Q62.6*
- - Ectopie de l'uretère ou de l'orifice *Q62.6*
- - Fistule: utéro- *N82.1*
- - Hydronéphrose
- - - Obstruction calculeuse *N13.21*
- - - Rétrécissement *N13.61*
- - Implantation anormale de l'uretère ou de l'orifice *Q62.6*
- - Occlusion congénitale de: orifice vésico- *Q62.1*
- - Orifice de la vessie: *D30.3*
- - Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico- *N11.0*
- - Tumeur maligne: Orifice *C67.6*

Uretère
v./v.a. mégavessie-méga-uretère
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du rein et de l' *N29.8**

Uretère *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Autres affections du rein et de l' *N29.1**
- Double ¬ *Q62.5*
- Hydronéphrose ¬ Calcul de l' *N13.21*
- Infection ¬ Oblitération de l' *N13.67*
- Orifice urétéral ¬
- - Déplacement de l' *Q62.6*
- - Déviation de l' *Q62.6*
- - Ectopie de l' *Q62.6*
- - Implantation anormale de l' *Q62.6*
- SAI ¬ Anomalie de l' *Q62.8*
- Sans précision ¬ Affection du rein et de l' *N28.9*
- Surnuméraire ¬ *Q62.5*
- ¬
- - Absence d' *Q62.4*
- - Affections précisées du rein et de l' *N28.88*
- - Agénésie de l' *Q62.4*
- - Anomalies obstructives du bassinet et de l' *Q62.3*
- - Antécédents familiaux de maladies rénales et de l' *Z84.1*
- - Atrésie et sténose de l' *Q62.1*
- - Calcul
- - - *N20.1*
- - - Rein avec calcul de l' *N20.2*
- - Carcinome à cellules transitionnelles de l' *C66*
- - Défaut de remplissage de: *R93.4*
- - Dilatation congénitale de l' *Q62.2*
- - Duplication de l' *Q62.5*
- - Gomme de l' *A52.7†, N29.1**
- - Imperméabilité de l' *Q62.1*
- - Lésion traumatique de l' *S37.1*
- - Malformations congénitales de l' *Q62.8*
- - Malposition de l' *Q62.6*
- - Occlusion congénitale de: *Q62.1*
- - Pyélonéphrite chronique associée
- - - Anomalie de *N11.1*
- - - Coudure de *N11.1*
- - - Obstruction de *N11.1*
- - - Rétrécissement de *N11.1*
- - Sténose congénitale de l'orifice de l' *Q62.1*
- - Tuberculose de l' *A18.1†, N29.1**
- - Tumeur bénigne: *D30.2*
- - Tumeur maligne de l' *C66*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D41.2*

Urétérite
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N29.1**
- Kystique ¬
- - *N28.88*
- - Pyélo- *N28.88*
- Non spécifique avec calcul rénal et hydronéphrose ¬ *N13.20*

Urétéro
- Cystite ¬ *N30.88*
- Rénal congénital ¬ Reflux vésico- *Q62.7*
- Vaginale ¬ Fistule: *N82.1*

Urétérocèle congénitale ¬ *Q62.3*

Urétéro-pyélo-hydronéphrose ¬ *N13.66*

Urétérostomie ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Urétéro-vésical avec infection ¬ Rétrécissement *N13.67*

Urethritis candidomycetica ¬ *B37.4†, N37.0**

Urétral
v./v.a. Fistule recto-urétrale
v./v.a. Glande urétrale
- Actes médicaux ¬ Rétrécissement *N99.18*
- Cathéter ¬ Rétrécissement *N99.18*
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement de: orifice vésico- *Q64.3*
- Cours de la grossesse ¬ Infections *O23.2*
- Femme ¬ Prolapsus de muqueuse *N81.0*
- Glande urétrale) ¬ Abcès (de): *N34.0*
- Interne ¬ Orifice *C67.5*
- Opération antérieure d'un rétrécissement urétral ¬ Récidive de rétrécissement *N99.10*
- Postérieure congénitale ¬ Valvule *Q64.2*
- Postérieures congénitales ¬ Valvules *Q64.2*
- Post-infectieux, non classé ailleurs ¬ Rétrécissement *N35.1*
- Post-opératoire ¬
- - Rétrécissement *N99.18*
- - Sténose *N99.18*
- Post-traumatique ¬ Rétrécissement *N35.0*
- Sans précision ¬
- - Rétrécissement *N35.9*
- - Syndrome *N34.3*
- Secondaire
- - Ablation de condylome ¬ Rétrécissement *N99.18*
- - Chirurgie transurétrale ¬ Rétrécissement *N99.18*
- - Circoncision ¬ Rétrécissement *N99.18*
- - Radiothérapie ¬ Rétrécissement *N99.18*
- ¬
- - Abcès *N34.0*
- - Atrésie de l'orifice *Q64.3*
- - Caroncule *N36.2*
- - Diverticule *N36.1*
- - Écoulement *R36*
- - Fausse voie *N36.0*
- - Fistule *N36.0*
- - Méatite *N34.2*
- - Orifice de la vessie: *D30.3*
- - Prolapsus de la muqueuse *N36.3*
- - Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement *N99.10*
- - Rétrécissements *N35.8*

Urétral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Sténose de l'ostium *N35.9*
- - Syndrome de Fowler (dysfonctionnement du sphincter *N36.8*
- - Urétrite et syndrome *N34*

Urètre
- Antérieur ¬ Valve de l' *Q64.7*
- Col vésical ¬ Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l' *Q64.3*
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement de: *Q64.3*
- Cours
- - Cytomégalie ¬ Maladie de l' *B25.88†, N29.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Autres affections de l' *N37.8**
- Femme ¬ Prolapsus de l' *N81.0*
- Homme ¬ Prolapsus de l' *N36.3*
- Méat) ¬ Ulcère de l' *N34.2*
- Partie
- - Membraneuse ¬ Lésion traumatique de l' *S37.31*
- - Prostatique ¬ Lésion traumatique de l' *S37.33*
- - Spongieuse ¬ Lésion traumatique de l' *S37.32*
- - ¬ Lésion traumatique de l' *S37.38*
- SAI ¬ Malformation congénitale de la vessie ou de l' *Q64.7*
- Sans précision ¬
- - Affection de l' *N36.9*
- - Lésion traumatique de l' *S37.30*
- Séquelle
- - Accouchement ¬ Rétrécissement de l' *N35.0*
- - Traumatisme ¬ Rétrécissement de l' *N35.0*
- Surnuméraire ¬ *Q64.7*
- Trichomonas ¬ Infection de l' *A59.0†, N37.0**
- Virus d'Epstein-Barr ¬ Maladie de l' *B27.0†, N29.1**
- Virus de l'herpès ¬ Maladie de l' *B00.8†, N29.1**
- ¬
- - Absence congénitale de la vessie et de l' *Q64.5*
- - Affections précisées de l' *N36.8*
- - Blessure ouverte de l' *S37.1, S31.83!*
- - Calcul de l' *N21.1*
- - Carcinome épidermoïde pur de l' *C68.0*
- - Corps étranger dans l' *T19.0*
- - Déchirure périurétrale avec atteinte de l' *O71.5*
- - Duplication de l' *Q64.7*
- - Fistule tuberculeuse de l' *A18.1†, N37.8**
- - Imperméabilité de l' *Q64.3*
- - Lésion obstétricale de: *O71.5*
- - Malformations congénitales de la vessie et de l' *Q64.7*

Urètre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Mycose de l' *B49†, N37.0**
- - Prolapsus
- - - *N36.3*
- - - Congénital de: *Q64.7*
- - Rétrécissement syphilitique de l' *A52.7†, N37.8**
- - Syphilis de l' *A52.7†, N37.0**
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, N37.0**
- - Trichomonase de l' *A59.0†, N37.0**
- - Tuberculose de l' *A18.1†, N37.0**
- - Tumeur bénigne: *D30.4*
- - Tumeur maligne: *C68.0*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D41.3*

Urétrique ¬ Arthrite *M02.39*

Urétrite
- Candida ¬ *B37.4†, N37.0**
- Chlamydia ¬ *A56.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *N37.0**
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, N37.0**
- Due à une candidose ¬ *B37.4†, N37.0**
- Gonococcique ¬ *A54.0*
- Non
- - Gonococcique ¬ *N34.1*
- - Spécifique ¬ *N34.1*
- - Vénérienne ¬ *N34.1*
- Post-ménopausique ¬ *N34.2*
- SAI ¬ *N34.2*
- Syndrome urétral ¬ *N34*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N37.0**
- Vénérienne NCA ¬ *A64†, N37.0**
- Virus d'Epstein-Barr ¬ *B27.0†, N37.0**
- Virus de l'herpès ¬ *B00.8†, N37.0**
- ¬
- - *N34.2*
- - Cystite et *N21*

Urétro
v./v.a. oculo-urétro-synovial
- Articulaire ¬ Syndrome oculo- *M02.39*
- Oculo synovial
- - Localisations multiples ¬ Syndrome *M02.30*
- - ¬
- - - Conjonctivite au cours de syndrome *M02.39*
- - - Kératodermie au cours de syndrome *M02.39†, L86**
- Périnéale ¬ Fistule: *N36.0*
- Rectale ¬ Fistule: *N36.0*
- Scrotale ¬ Fistule *N50.8*
- Trigonite ¬ *N30.3*
- Vaginale ¬ Fistule: *N82.1*

Urétrocèle
- Congénitale ¬ *Q64.7*

Urétrocèle *–suite*
- Femme ¬ *N81.0*
- Homme ¬ *N36.3*
- ¬ Cystocèle avec *N81.1*

Urétrorrhée ¬ *R36*

Urétrostomie ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Urgence
- HU High Urgency ¬ Inscription
- - Effectuée transplantation
- - - Organe
- - - - Niveau d' *Z75.7*
- - - - Sans niveau d' *Z75.6*
- - - Pulmonaire: Avec niveau d' *U55.22*
- - Transplantation
- - - Cardiaque : Avec niveau d' *U55.12*
- - - Cœur-poumons : Avec niveau d' *U55.32*
- U Urgency
- - HU High Urgency ¬ Inscription
- - - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d' *U55.20*
- - - Transplantation
- - - - Cardiaque : Sans niveau d' *U55.10*
- - - - Cœur-poumons: Sans niveau d' *U55.30*
- - ¬ Inscription
- - - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d' *U55.21*
- - - Transplantation
- - - - Cardiaque : Avec niveau d' *U55.11*
- - - - Cœur-poumons : Avec niveau d' *U55.31*

Urgency
- HU High Urgency ¬ Inscription
- - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [*U55.20*
- - Transplantation
- - - Cardiaque : Sans niveau d'urgence U [*U55.10*
- - - Cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [*U55.30*
- ¬
- - *N31.82*
- - Inscription
- - - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [*U55.21*
- - - Transplantation
- - - - Cardiaque : Avec niveau d'urgence U [*U55.11*
- - - - Cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [*U55.31*

Uricostatiques ¬ *T50.4*

Uricosuriques ¬ *T50.4*

Uridine
- Diphosphate-galactose-4-épimérase ¬ Déficit en *E74.2*
- Monophosphate synthase ¬ Déficit en *E79.8*

Uridine-diphosphate glucuronosyltransférase
- Type
- - 1 ¬ Déficit en bilirubine *E80.5*
- - 2 ¬ Déficit en bilirubine *E80.5*
- ¬ Déficit en bilirubine *E80.5*

Urina spastica ¬ Syndrome d' *R35.0*

Urinaire
v./v.a. cérébro-réno-génito-urinaire
v./v.a. Organe urinaire
v./v.a. Taux urinaire
v./v.a. Voie urinaire
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement de: méat *Q64.3*
- Cours
- - Bilharziose ¬ Calcul *B65.0†, N22.0**
- - Grossesse ¬
- - - Infection non précisée de l'appareil *O23.4*
- - - Infections d'autres parties de l'appareil *O23.3*
- - Schistosomiase ¬ Calcul *B65.0†, N22.0**
- Demeure) ¬ Complication mécanique d'une sonde *T83.0*
- Double ¬ Méat *Q64.7*
- Effort [incontinence de stress] ¬ Incontinence *N39.3*
- Extraurétrale ¬ Incontinence *N39.43*
- Non
- - Précisé ¬ Lésion traumatique d'un organe pelvien ou *S37.9*
- - Précisés ¬ Symptômes et signes relatifs à l'appareil *R39.8*
- Origine non organique ¬ Incontinence *F98.0*
- Postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ¬ Rétention *T83.8*
- Précisée ¬ Autre incontinence *N39.48*
- SAI ¬
- - Appareil
- - - *C68.9*
- - - *D30.9*
- - Congénitale
- - - Anomalie de l'appareil *Q64.9*
- - - Déformation de l'appareil *Q64.9*
- - Fistule: *N36.0*
- - Obstruction *N13.9*
- Sans précision ¬
- - Affection de l'appareil *N39.9*
- - Calcul *N20.9*
- - Incontinence *R32*
- - Malformation congénitale de l'appareil *Q64.9*
- ¬
- - Affections précisées
- - - Appareil *N39.8*
- - - Système *N39.88*
- - Atrésie du méat *Q64.3*
- - Augmentation de l'excrétion *R35.0*
- - Carcinome épidermoïde pur du col de l'appareil *C68.9*

Urinaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Complication mécanique d'autres prothèses ou implants *T83.1*
- - Fistule congénitale utéro-digestive et utéro- *Q51.7*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant ou une greffe de l'appareil *T83.5*
- - Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et *S37.7*
- - Malformation artério-veineuse de l'appareil *Q27.3*
- - Malformations congénitales précisées de l'appareil *Q64.8*
- - Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil *N99.5*
- - Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.6*
- - Présence d'une autre stomie de l'appareil *Z93.6*
- - Prolapsus congénital de: méat *Q64.7*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil *R93.4*
- - Snail fever [Bilharziose *B65*
- - Syphilis tardive de la vessie *A52.7†, N33.8**
- - Troubles du jet *R39.1*

Urine
- Non précisés ¬ Résultats anormaux de l'examen des *R82.9*
- Odeur de sirop d'érable ¬ Maladie des *E71.0*
- Sirop érable forme
- - Intermédiaire ¬ Maladie des *E71.0*
- - Intermittente ¬ Maladie des *E71.0*
- - Sensible à la thiamine ¬ Maladie des *E71.0*
- Substances d'origine principalement non médicinale ¬ Taux anormal dans les *R82.6*
- Taux de médicaments et de substances biologiques ¬ Augmentation dans les *R82.5*
- ¬
- - Augmentation de la quantité d' *R35.0*
- - Cellules et cylindres dans les *R82.9*
- - Extravasation d' *R39.0*
- - Péritonite (due à): *K65.8*
- - Résultat anormaux examen
- - - Cytologique et histologique des *R82.8*
- - - Microbiologique des *R82.7*
- - Rétention d' *R33*
- - Sécrétion excessive d' *R35.0*
- - Taux anormal de métaux lourds dans les *R82.6*

Uriner ¬ Besoin impérieux d' *R35.1*

Urique ¬
- Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide *T50.4*
- Néphrolithiase avec calcul d'acide *M10.09†, N22.8**

Urocanase ¬ Encéphalopathie par déficit en *E70.8*

Uro-génital
- Associé à MYRF ¬ Syndrome cardiaque- *Q87.8*
- Femme ¬ Persistance du sinus *Q52.8*
- Homme ¬ Persistance du sinus *Q55.8*
- Mycoplasmes ¬ Infection *N39.0, B96.0!*
- Post gonorrhée ¬ Syndrome *B94.88*
- Tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur l'appareil *I97.87*
- ¬
- - Candidose d'autres localisations *B37.4*
- - Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil *F45.34*
- - Présence d'implants *Z96.0*
- - Trichomonase *A59.0*

Uro-génitale ¬
- Miasi *B87.8*
- Syndrome de déficit immunitaire en lymphocytes B-anomalie des membres-malformation *Q87.0*

Uro-génitointestinale ¬ Syndrome d'aphalangie-hémivertèbre-dysgénésie *Q87.8*

Uropathie
- Obstructive
- - Infection ¬ *N13.68*
- - Reflux, sans précision ¬ *N13.9*
- Obstructives et par reflux ¬ Autres *N13.8*
- ¬ Syndrome de cataracte-déficience intellectuelle-atrésie anale- *Q87.8*

Uroporphyrie érythropoïétique
- Associée à un syndrome myéloprolifératif ¬ *D47.1, E80.2*
- Syndrome myélodysplasique ¬ *D46.9, E80.2*

Urorectal ¬ Succession de malformations du septum *Q87.8*

Urothélial
- Cours du syndrome de Lynch ¬ Carcinome *C68.9*
- Voies supérieures ¬ Carcinome *C68.9*

Urrets-Zavalia ¬ Syndrome d' *Q10.7*

Urticaire
- Allergique ¬ *L50.0*
- Cholinergique ¬ *L50.5*
- Chronique ¬ *L50.8*
- Contact ¬ *L50.6*
- Familiale au froid] ¬ FCU [*L50.2*
- Géante ¬ *T78.3*
- Idiopathique ¬ *L50.1*
- Nouveau-né ¬ *P83.8*
- Œdème angioneurotique héréditaire ¬ *D84.1*
- Papuleuse ¬ *L28.2*
- Pigmentaire
- - Nodulaire ¬ *Q82.2*
- - Plaques ¬ *Q82.2*
- Pigmentée ¬ *Q82.2*
- Provoquée
- - Froid et la chaleur ¬ *L50.2*

Urticaire *–suite*
- Provoquée *–suite*
- - Vibration ¬ *L50.4*
- Psychogène ¬ *F54, L50.9*
- Récidivante périodique ¬ *L50.8*
- Sans précision ¬ *L50.9*
- Sérique ¬ *T80.6*
- Solaire ¬ *L56.3*
- Vibratoire ¬ *L50.4*
- ¬ Autres formes d' *L50.8*

Urticarien
- Hypocomplémentémique ¬ Vascularite *M31.8*
- ¬ Dermographisme *L50.3*

Usage nocif substance n entraînant dépendance
- Analgésiques ¬ *F55.2*
- Antiacides ¬ *F55.3*
- Antidépresseurs ¬ *F55.0*
- Laxatifs ¬ *F55.1*
- Plantes et produits de naturopathie ¬ *F55.6*
- Stéroïdes et hormones ¬ *F55.5*
- Substance
- - Non précisée ¬ *F55.9*
- - ¬ *F55.8*
- Vitamines ¬ *F55.4*

Usher ¬ Syndrome
- *Q87.8*
- Senear- *L10.4*

USP18 ¬ Déficit en *M35.8†, G32.8**

Usual interstitial pneumonia] ¬ UIP [*J84.10*

Usuelle
- Exacerbation aiguë ¬ Pneumonie interstitielle *J84.11*
- Sans mention d'exacerbation aiguë ¬ Pneumonie interstitielle *J84.10*
- ¬ Pneumonie interstitielle *J84.10*

Usure
- Occlusale des dents ¬ *K03.0*
- Proximale des dents ¬ *K03.0*

Utérin
v./v.a. cervico-utérin
- 1er ou 2e degré ¬ Prolapsus (de): Prolapsus *N81.2*
- 3e et 4e degré ¬ Prolapsus *N81.3*
- Due à une intervention chirurgicale antérieure ¬ Soins maternels pour cicatrice *O34.2*
- Hypertoniques, non coordonnées et prolongées ¬ Contractions *O62.4*
- Ménopausique anormal ¬ Saignement *N95.0*
- Pendant la phase de latence ¬ Inertie *O62.0*
- Post-partum ¬ Hypotonie *O72.1*
- Primitive ¬ Hypotonie *O62.0*
- Rectum de remplacement ¬ Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto- *N82.80*
- SAI ¬

Utérin *–suite*
- SAI ¬ *–suite*
- - Hémorragie (du): post-partum (atonie *O72.1*
- - Hypotonie *O62.2*
- - Inertie *O62.2*
- - Prolapsus *N81.4*
- Secondaire ¬
- - Hypotonie *O62.1*
- - Inertie *O62.1*
- ¬
- - Abcès *N71*
- - Accouchement en présence d'un léiomyome *O34.1*
- - Artère ou veine: *S35.88*
- - Carcinome neuroendocrine mal différencié du corps *C54.9*
- - Colique *N94.8*
- - Douleurs *N94.8*
- - Formes d'inertie *O62.2*
- - Hypertonie *O62.4*
- - Hypoplasie *Q51.8*
- - Inertie *P03.6*
- - Présence congénitale d'épithélium pavimenteux dans la muqueuse *Q51.8*
- - Stérilité d'origine *N97.2*
- - Synéchie *N85.6*

Utero
- Pendant l'accouchement ¬ Pneumonie infectieuse acquise in *P23*
- ¬ Rétention d'un fœtus mort in *O02.1*

Utéro
- Digestive et utéro-urinaire ¬ Fistule congénitale *Q51.7*
- Ovarienne ¬ *C57.8*
- Pariétale ¬ Fistule: *N82.5*
- Urétérale ¬ Fistule: *N82.1*
- Urinaire ¬ Fistule congénitale utéro-digestive et *Q51.7*
- Vaginal
- - Complet ¬ Prolapsus *N81.3*
- - Partiel ¬ Prolapsus *N81.2*
- - Sans précision ¬ Prolapsus *N81.4*
- Vésicale ¬ Fistule: *N82.1*

Utérus
v./v.a. Col de l'utérus
v./v.a. main-pied-utérus
- Avant début
- - Contractions ¬ Déchirure de l' *O71.0*
- - Travail ¬ Rupture de l' *O71.0*
- Bicorne
- - Bicervical
- - - Col et vagin perméables ¬ *Q51.3*
- - - Hémivagin borgne ¬ *Q51.3*
- - Unicervical ¬ *Q51.3*
- - ¬
- - - *Q51.3*
- - - Soins maternels pour *O34.0*

Utérus *–suite*
- Cloisonné total ¬ *Q51.2*
- Col de l'utérus
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de l' *Q51.9*
- - ¬
- - - Hypoplasie de l' *Q51.8*
- - - Malformations congénitales de l' *Q51.8*
- Didelphe ¬ *Q51.2*
- Double
- - Duplication du col et du vagin ¬ *Q51.1*
- - Hémivagin-agénésie rénale ¬ Syndrome d' *Q51.2, Q60.0*
- - ¬ Soins maternels pour *O34.0*
- Due à une stimulation excessive par des médicaments déclencheurs de contractions ¬ Hyperactivité de l' *O62.8, Y57.98!*
- Exclusion col ¬ Affection inflammatoire
- - Aiguë de l' *N71.0*
- - Chronique de l' *N71.1*
- Gravide ¬ soin maternels
- - Anomalies de l' *O34.5*
- - Incarcération de l' *O34.5*
- - Prolapsus de l' *O34.5*
- - Rétroversion de l' *O34.5*
- Hypotrophique ¬ *Q51.8*
- Incision lors d'une intervention chirurgicale ¬ Blessure de l' *T81.2*
- Large) (rond) ¬ Ligament de l' *D28.2*
- Non précisée comme survenant avant le début du travail ¬ Rupture de l' *O71.1*
- Partie non précisée ¬ Tumeur maligne de l' *C55*
- Pendant
- - Accouchement ¬ Déchirure de l' *O71.1*
- - Travail ¬ Rupture de l' *O71.1*
- Pseudo-unicorne ¬ *Q51.4*
- Rudimentaire ¬ *Q51.8*
- SAI ¬
- - Affection de l' *N85.9*
- - Dystocie (de) (par): *O62.4*
- - Fibrose de l' *N85.8*
- - Ligament de l' *C57.3*
- - Polype de: *N84.0*
- Sans précision
- - Exclusion du col ¬ Affection inflammatoire de l' *N71.9*
- - ¬
- - - Affection non inflammatoire de l' *N85.9*
- - - Léiomyome de l' *D25.9*
- - - Tumeur bénigne: *D26.9*
- - - Tumeur maligne
- - - - Annexes de l' *C57.4*
- - - - Corps de l' *C54.9*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- Tant complication de l'accouchement ¬

Utérus *–suite*
- Tant complication de l'accouchement ¬ *–suite*
- - Contraction hypotonique de l' *O62.2*
- - Hypotonie de l' *O62.2*
- Toute partie] ¬ Corps étranger dans l' *T19.3*
- Unicorne ¬ *Q51.4*
- Vagin
- - SAI ¬ Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l' *N93.8*
- - Sans précision ¬ Saignement anormal de l' *N93.9*
- - ¬ Autres saignements anormaux précisés de l' *N93.8*
- ¬
- - Absence acquise de l' *Z90.7*
- - Absence congénitale de l' *Q51.0*
- - Adénosarcome du corps de l' *C54.9*
- - Adhérences de la paroi extérieure de l' *N73.6*
- - Affections non inflammatoires précisées de l' *N85.8*
- - Agénésie et aplasie de l' *Q51.0*
- - Antéversion de l' *N85.4*
- - Associée à une anomalie congénitale de l' *N97.2*
- - Atrophie acquise de l' *N85.8*
- - Carcinofibrome
- - - Corps de l' *C54.9*
- - - Fond de l' *C54.3*
- - - Isthme de l' *C54.0*
- - Carcinome à cellules transitionnelles du corps de l' *C54.9*
- - Carcinome épidermoïde du corps de l' *C54.9*
- - Carcinome papillaire du corps de l' *C54.9*
- - Carcinosarcome du corps de l' *C54.9*
- - Contractions
- - - Non coordonnées de l' *O62.4*
- - - Sablier de l' *O62.4*
- - Duplications de l' *Q51.2*
- - Endométriose de l' *N80.0*
- - Fibromyome de l' *D25*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l' *P03.6*
- - Gonorrhée de l' *A54.2†, N74.3**
- - Gros *N85.2*
- - Hypertrophie de l' *N85.2*
- - Inflammation purulente de l' *N71.9*
- - Inversion
- - - *N85.5*
- - - Post-partum de l' *O71.2*
- - Léiomyome
- - - Intramural de l' *D25.1*
- - - Sous-muqueux de l' *D25.0*
- - - Sous-séreux de l' *D25.2*
- - Léiomyosarcome
- - - *C55*

Utérus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Léiomyosarcome *–suite*
- - - Corps de l' *C54.9*
- - - Fond de l' *C54.3*
- - - Isthme de l' *C54.0*
- - Lésion traumatique de l' *S37.6*
- - Ligament sauf
- - - *C49*
- - - *D21*
- - Malformation artério-veineuse de l' *Q27.3*
- - Malposition de l' *N85.4*
- - Polype du corps de l' *N84.0*
- - Région génitale, vessie, prostate, annexe, *I97.87*
- - Rétroflexion de l' *N85.4*
- - Rétroversion de l' *N85.4*
- - Rhabdomyosarcome du corps de l' *C54.9*
- - Sarcome du corps de l' *C54.9*
- - Segment inférieur de l' *C54.0*
- - Septum de l' *Q51.2*
- - Soin maternels
- - - Fibrome de l' *O34.1*
- - - Malformation congénitale de l' *O34.0*
- - - Polype du corps de l' *O34.1*
- - - Tumeur du corps de l' *O34.1*
- - Subinvolution de l' *N85.3*
- - Syphilis tardive de l' *A52.7†, N74.2**
- - Trompe de l' *C57.0*
- - Tuberculose de l' *A18.1†, N74.1**
- - Tumeur bénigne
- - - Corps de l' *D26.1*
- - - Parties de l' *D26.7*
- - - Trompe et ligaments de l' *D28.2*
- - Tumeur germinale maligne du corps de l' *C54.9*
- - Tumeur maligne
- - - Fond de l' *C54.3*
- - - Isthme de l' *C54.0*
- - - Lésion à localisations contiguës du corps de l' *C54.8*
- - Tumeur mixte maligne des canaux de Müller du corps de l' *C54.9*
- - Tumeur neuroectodermique primitive
- - - Corps de l' *C54.9*
- - - Fond de l' *C54.3*
- - - Isthme de l' *C54.0*
- - Tumeur neuroendocrine de faible grade du corps de l' *C54.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D39.0*

Uterus duplex ¬ *Q51.2*

Utilisation
- Actuelle) à long terme d'anticoagulants ¬ Antécédents personnels d' *Z92.1*
- Alcool ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F10*

Utilisation *–suite*
- Cigarettes électroniques [vapoteuse] ¬ Trouble de la santé en lien avec l' *U07.0!*
- Cocaïne ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F14*
- Dérivés du cannabis ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F12*
- Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F19*
- Hallucinogènes ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F16*
- Hypnotiques ¬ Agitation après *F13.8*
- Inadéquate de drogues SAI ¬ *F19*
- Intraveineuse
- - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ *U69.33!*
- - Stimulants hors caféine ¬ *U69.35!*
- Long terme
- - Antiagrégants plaquettaires ¬ Hémorragie sous *D69.80*
- - Anticoagulants ¬ Hémorragie sous *D68.35*
- - Coumarines (antagonistes de la vitamine K) ¬ Hémorragie sous *D68.33*
- - Héparines ¬ Hémorragie sous *D68.34*
- - Médicaments ¬ Antécédents personnels d' *Z92.2*
- Médias ¬ Trouble lié à l' *F63.8*
- Mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P04.5*
- Opiacés ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F11*
- Pipe électronique ¬ Trouble de la santé en lien avec l' *U07.0!*
- Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F13*
- Solvants volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F18*
- Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F15*
- Substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l' *F19*
- Tabac ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F17*
- Tampon ¬ Syndrome du choc toxique avec *A48.3*
- Thérapeutique
- - Médicaments chez le nouveau-né ¬ Symptômes de privation d'une *P96.2*
- - Vaccins contre le COVID-19 ¬ Effets secondaires indésirables de l' *U12.9!*
- ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur *Y82.8!*

UV ¬ Syndrome de sensibilité aux *L56.8*

Uvéal
- Bilatérale diffuse] ¬ PMUBD [Prolifération mélanocytaire *C80.9†, H32.8**

Uvéal *–suite*
- Congénital ¬ Ectropion *Q10.1*
- Idiopathique ¬ Syndrome d'effusion *H33.2*
- ¬
- - Syndrome d'effusion *H33.2*
- - Syphilis secondaire du tractus *A51.4†, H22.0**
- - Syphilis tardive du tractus *A52.7†, H22.0**

Uvée ¬ Tuberculose de l' *A18.5†, H22.0**

Uvéite
- Acquise au cours de toxoplasmose ¬ *B58.0†, H22.0**
- Antérieure
- - Aiguë, subaiguë ou à répétition ¬ *H20.0*
- - Idiopathique
- - - Aigüe ¬ *H20.0*
- - - Chronique ¬ *H20.1*
- - - ¬ *H20.8*
- - Infectieuse ¬ *H20.9*
- - ¬ *H20.9*
- Congénitale à toxoplasmose ¬ *P37.1†, H22.0**
- Due au virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H22.0**
- Granulomatose systémique ¬ Panniculite infantile avec *M35.8*
- Intermédiaire ¬ *H30.2*
- Paranéoplasique ¬ *C80.9†, H22.1**
- Phacoanaphylactique ¬ *H20.2*
- Postérieure
- - Idiopathique ¬ *H30.9*
- - Maladie de Whipple ¬ *K90.8†, M14.89**
- - ¬ *H30.9*
- Sympathique ¬ *H44.1*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ *A50.0†, H22.0**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, H22.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H22.0**
- ¬
- - *H20.9*
- - Syndrome TINU [Néphrite tubulo-interstitielle et *N12, H20.9*

Uvéo
- Parotidienne subchronique ¬ Fièvre *D86.8*
- Parotidite
- - Paralytique ¬ *D86.8*
- - ¬
- - - *D86.8*
- - - Syndrome de neuro- *D86.8*

Uvule ¬ Tuberculose de l' *A18.8†, K93.8**

Vacances ¬ inscription dans: colonie de *Z02*

Vaccin
- Contre COVID-19 ¬
- - Choc anaphylactique dû au *T88.6, U12.9!*
- - Effets secondaires indésirables de l'utilisation thérapeutique de *U12.9!*
- Substance biologique actives
- - Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des *Y59.9!*
- - ¬ Complications dues à des *Y59.9!*
- ¬
- - Antécédents personnels d'allergie aux sérum et *Z88.7*
- - Infection par le virus de la *B08.0*
- - Intolérance aux *T88.1*
- - Intoxication par *T50.9*
- - TTIV [Thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par un *D69.58*

Vaccinal ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, associée au virus *A80.0*

Vaccination
- Associée contre
- - Diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq] ¬ Nécessité d'une *Z27.1*
- - Plusieurs maladies infectieuses, sans précision ¬ Nécessité d'une *Z27.9*
- Contre
- - Associations de maladies infectieuses ¬ Nécessité d'une *Z27.8*
- - Bacillus anthracis ¬ *Z23.8*
- - Charbon ¬ *Z23.8*
- - Choléra
- - - Seul ¬ Nécessité d'une *Z23.0*
- - - Typhoïde-parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une *Z27.0*
- - Coqueluche seule ¬ Nécessité d'une *Z23.7*
- - COVID-19 ¬ Nécessité d'une *U11.9*
- - Dengue ¬ *Z25.8*
- - Diphtérie
- - - Seule ¬ Nécessité d'une *Z23.6*
- - - Tétanos
- - - - Coqueluche
- - - - - Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une *Z27.3*
- - - - - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une *Z27.2*
- - - - Poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ *Z27.8*
- - Encéphalite virale transmise par les arthropodes ¬ Nécessité d'une *Z24.1*
- - Fièvre jaune ¬ Nécessité d'une *Z24.3*
- - Grippe ¬ Nécessité d'une *Z25.1*
- - Hépatite virale ¬ Nécessité d'une *Z24.6*
- - Leishmaniose ¬ Nécessité d'une *Z26.0*
- - Maladie infectieuse, sans précision ¬ Nécessité d'une *Z26.9*
- - Maladies

Vaccination *–suite*
- Contre *–suite*
- - Maladies *–suite*
- - - Bactériennes uniques ¬ Nécessité d'une *Z23.8*
- - - Infectieuses uniques précisées ¬ Nécessité d'une *Z26.8*
- - - Virales uniques précisées ¬ Nécessité d'une *Z25.8*
- - Oreillons seuls ¬ Nécessité d'une *Z25.0*
- - Papillomavirus humain ¬ *Z25.8*
- - Peste ¬ Nécessité d'une *Z23.3*
- - Poliomyélite ¬ Nécessité d'une *Z24.0*
- - Rage ¬ Nécessité d'une *Z24.2*
- - Rougeole
- - - Oreillons-rubéole [ROR] ¬ Nécessité d'une *Z27.4*
- - - Seule ¬ Nécessité d'une *Z24.4*
- - Rubéole seule ¬ Nécessité d'une *Z24.5*
- - Tétanos seul ¬ Nécessité d'une *Z23.5*
- - Tuberculose [BCG] ¬ Nécessité d'une *Z23.2*
- - Tularémie ¬ Nécessité d'une *Z23.4*
- - Typhoïde-paratyphoïde seule [TAB] ¬ Nécessité d'une *Z23.1*
- - Virus
- - - Chikungunya ¬ *Z25.8*
- - - Respiratoire syncytial [VRS] ¬ *Z25.8*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Autres complications consécutives à *T88.1*
- - Effectuée raison
- - - Contre-indication ¬
- - - - *Z28*
- - - - *Z53*
- - - Croyances ¬
- - - - *Z28*
- - - - *Z53*
- - - Pression groupe ¬
- - - - *Z28*
- - - - *Z53*
- - - Raisons indépendantes patient ¬
- - - - *Z28*
- - - - *Z53*
- - Faite ¬ *Z28*
- Prophylactique contre le COVID-19 ¬ *U11.9*
- SAI ¬ Nécessité d'une *Z26.9*
- Voyageurs ¬ Conseil en matière de *Z71*
- ¬
- - Conseil en matière de *Z71*
- - Éruption consécutive à *T88.1*
- - Infection consécutive à *T88.0*
- - Maladie ressemblant aux oreillons après une *T88.1*
- - Méningite due à la *G03.8, Y59.9!*
- - Septicémie consécutive à *T88.0*

Vaccine
v./v.a. Pseudovaccine

Vaccinia ¬ *B08.0*

Vacciniforme ¬
- Hydroa *L56.4*
- Lymphome à type d'hydroa *C84.5*

Vache ¬
- Allergie au lait de *L27.2*
- Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de *P71.0*
- Variole de la *B08.0*

VACTERL
- Anomalies vertébrales, atrésie anale, anomalies cardiaques, fistule trachéo-œsophagienne avec atrésie de l'œsophage, anomalies rénales et des membres] ¬ Syndrome de *Q87.2*
- ¬ Association *Q87.2*

VACTERL-hydrocéphalie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Vacuole
- Bordées ¬ Myopathie distale à *G71.8*
- Mutation de l'Enzyme 1 à l'X, syndrome auto-inflammatoire et somatique] ¬ Syndrome VEXAS [*M35.8*

Vagabondage lors de démence ¬ *U63.6!*

Vagale ¬ Bradycardie: *R00.1*

Vagin
- Acquise) (congénitale) ¬ Soins maternels pour: sténose du *O34.6*
- Artificiel ¬ Surveillance de *Z43.7*
- Cloisonné transversal ¬ *Q52.1*
- Côlon ¬ Fistule du *N82.3*
- Cours accouchement ¬ Déchirure rupture périnatal
- - Intéressant): *O70.0*
- - O70.0, intéressant aussi: muscles du: *O70.1*
- Cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement ¬ Fistule entre le *N82.80*
- Hystérectomie ¬ Prolapsus de la paroi supérieure du *N99.3*
- Intestin grêle ¬ Fistule du *N82.2*
- NIVA stade
- - I ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N89.0*
- - II ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N89.1*
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale du *D07.2*
- Non classée ailleurs ¬ Dysplasie sévère du *N89.2*
- Pendant accouchement ¬ Déchirure tiers
- - Moyen du *O71.4*
- - Supérieur du *O71.4*
- Perméables ¬ Utérus bicorne bicervical avec col et *Q51.3*
- Pessaire ¬ Ulcère du *N89.8*
- SAI ¬
- - Dysplasie sévère du *N89.2*
- - Malformation congénitale du *Q52.4*
- - Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du *N93.8*

Vagin *–suite*
- Sans précision ¬
- - Affection non inflammatoire du *N89.9*
- - Dysplasie du *N89.3*
- - Saignement anormal de l'utérus et du *N93.9*
- Vessie de remplacement ¬ Fistule entre *N82.81*
- Vulve
- - Cours de la grossesse ¬ Varices de périnée, de *O22.1*
- - ¬
- - - Inflammations précisées du *N76.8*
- - - Maladie inflammatoire précisée du *N76.88*
- - - Plaie ouverte du *S31.4*
- ¬
- - Absence congénitale de *Q52.0*
- - Adénocarcinome du *C52*
- - Adhérences du *N89.5*
- - Affections non inflammatoires précisées du *N89.8*
- - Atrésie congénitale du *Q52.4*
- - Brûlure
- - - 1er degré du *T28.3*
- - - 2e degré du *T28.3*
- - - 3e degré du *T28.3*
- - - Chimique
- - - - 1er degré du *T28.8*
- - - - 2e degré du *T28.8*
- - - - 3e degré du *T28.8*
- - Candidose de la vulve et du *B37.3†, N77.1**
- - Carcinoma in situ: *D07.2*
- - Carcinome épidermoïde du *C52*
- - Corps étranger dans la vulve et le *T19.2*
- - Déchirure ancienne du *N89.8*
- - Dédoublement du *Q52.1*
- - Dysplasie
- - - Légère du *N89.0*
- - - Moyenne du *N89.1*
- - Endométriose du *N80.4*
- - Hématome obstétrical de: *O71.7*
- - Léiomyosarcome du *C52*
- - Leucoplasie du *N89.4*
- - Malformations congénitales du *Q52.4*
- - Mycose candidosique du *B37.3†, N77.1**
- - Polype du *N84.2*
- - Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: *R87*
- - Rétrécissement et atrésie du *N89.5*
- - Saignements anormaux précisés de l'utérus et du *N93.8*
- - Soin maternels
- - - Anomalies du *O34.6*
- - - Cloisonnement du *O34.6*
- - - Intervention chirurgicale antérieure sur le *O34.6*
- - - Rétrécissement du *O34.6*

Vagin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Soin maternels *–suite*
- - - Tumeur du *O34.6*
- - Sténose du *N89.5*
- - Syphilis tardive du *A52.7†, N77.1**
- - Trichomonase du *A59.0†, N77.1**
- - Tuberculose du *A18.1†, N77.1**
- - Tumeur bénigne: *D28.1*
- - Tumeur germinale maligne du *C52*
- - Tumeur maligne du *C52*
- - Ulcération du *N76.5*
- - Utérus double avec duplication du col et du *Q51.1*

Vaginal
v./v.a. cervico-vaginal
v./v.a. recto-vaginal
v./v.a. Voie vaginale
- Col de l'utérus ¬
- - Adénocarcinome de la portion *C53.1*
- - Atrésie de la portion *Q51.8*
- Communicante congénitale ¬ Hydrocèle *P83.5*
- Complet ¬ Prolapsus utéro- *N81.3*
- Congénitale ¬ Obstruction *Q52.4*
- Degré
- - 2a ¬ Brûlure
- - - *T28.3*
- - - Chimique *T28.8*
- - 2b ¬ Brûlure
- - - *T28.3*
- - - Chimique *T28.8*
- Haute isolée ¬ Déchirure obstétricale *O71.4*
- Isolée partielle ¬ Agénésie *Q52.0*
- Néonatale ¬ Hémorragie *P54.6*
- Non filarienne) SAI ¬ Chylocèle de la tunique *N50.8*
- Paroi
- - Antérieure) SAI ¬ Prolapsus *N81.1*
- - Postérieure ¬ Prolapsus *N81.6*
- Partiel ¬ Prolapsus utéro- *N81.2*
- Pendant l'accouchement ¬ Déchirure du sillon *O71.4*
- Postopératoires ¬ Adhérences *N99.2*
- Sagittal ¬ Septum *Q52.1*
- Sans
- - Précision ¬ Prolapsus utéro- *N81.4*
- - Tension] ¬ Rétention urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette *T83.8*
- Tant que complication de l'accouchement ¬ Lacération *O70.0*
- Testicule et du canal déférent ¬ Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique *N49.1*
- Trichomonas
- - Vaginalis) ¬ Leucorrhée (*A59.0*
- - ¬ Infection *A59.0†, N77.1**
- Vésicule séminal ¬

Vaginal *–suite*
- Vésicule séminal ¬ *–suite*
- - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique *N50.8*
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique *N50.8*
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique *N50.8*
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique *N50.8*
- ¬
- - Agénésie *Q52.0*
- - Candidose *B37.3†, N77.1**
- - Diphtérie *A36.8†, N77.1**
- - Entérocèle *N81.5*
- - Érosion de l'épithélium *N89.8*
- - Fistule
- - - Périnéo- *N82.5*
- - - Urétéro- *N82.1*
- - - Urétro- *N82.1*
- - Hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) *N43*
- - Kyste (du): embryonnaire *Q52.4*
- - Mésothéliome
- - - Malin de la tunique *C45.7*
- - - Tunique *C63.7*
- - Muguet *B37.3†*
- - Mycose *B37.3†, N77.1**
- - Rétrécissement de: tunique *N50.8*
- - Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie *O34.30*
- - Syphilis tardive de la tunique *A52.7†, N51.8**
- - Tuberculose de la tunique *A18.1†, N51.8**
- - Tunique
- - - *C63.7*
- - - *D29.7*

Vaginalis ¬
- Fluor à Trichomonas *A59.0†, N77.1**
- Leucorrhée (vaginale) à Trichomonas (*A59.0*

Vaginisme
- Non organique ¬ *F52.5*
- Psychogène ¬ *F52.5*
- ¬ *N94.2*

Vaginite
v./v.a. Cervico-vaginite
- Accouchement ¬ *O86.1*
- Aiguë ¬ *N76.0*
- Atrophique post-ménopausique ¬ *N95.2*
- Blennorhéique ¬ *A54.0†, N77.1**
- Candida ¬ *B37.3†, N77.1**
- Candidosique

Vaginite *–suite*
- Candidosique *–suite*
- - Chronique récidivante ¬ *B37.3†, N77.1**
- - ¬ *B37.3†, N77.1**
- Cours de l'infection par des oxyures ¬ *B80†, N77.1**
- Due
- - Candidose ¬ *B37.3†, N77.1**
- - Virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N77.1**
- Gonorrhéique
- - Abcès ¬ *A54.1†, N77.1**
- - ¬ *A54.0†, N77.1**
- Monilia ¬ *B37.3†, N77.1**
- Mycosique ¬ *B37.3†, N77.1**
- SAI ¬ *N76.0*
- Sénile (atrophique) ¬ *N95.2*
- Subaiguë et chronique ¬ *N76.1*
- Syphilitique
- - Précoce ¬ *A51.0*
- - Tardive ¬ *A52.7†, N77.1**
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N77.1**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N77.1**
- Vénérienne NCA ¬ *A64†, N77.1**
- Vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *N77.1**

Vaginitis candidomycetica ¬ *B37.3†, N77.1**

Vainsel
v./v.a. Guibaud-Vainsel

Vaisseau
- Accessoire d'un pôle du rein ¬ *Q27.8*
- Cérébral ¬ Endartérite syphilitique oblitérante d'un *A52.0†, I68.1**
- Coarctation ¬ Transposition congénitalement non corrigée des gros *Q20.3*
- Complète) ¬ Transposition des gros *Q20.3*
- Cordon ¬ Procidence des *P02.6*
- Coronaires ¬ Malformation des *Q24.5*
- Cutanés ¬ Vascularite des petits *M31.0*
- Ganglion lymphatique
- - Sans précision ¬ Atteinte non infectieuse des *I89.9*
- - ¬ Autres atteintes non infectieuses précisées des *I89.8*
- Lymphatique
- - SAI ¬ Maladie des *I89.9*
- - Suite à mastectomie ¬ Oblitération des *I97.2*
- - ¬
- - - *C49*
- - - *D21*
- Malformation cardiaque ¬ Transposition congénitalement non corrigée des gros *Q20.3, Q24.9*
- Ombilicaux ¬ Thrombose des *O69.5*
- Pontage ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de *I25.15*

Vaisseau *–suite*
- Profonds des membres inférieurs ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres *I80.28*
- Rénal aberrant ¬ *Q27.8*
- Rétine ¬ Artériosclérose d'un *I70.8†, H36.8**
- Rétiniens et chorioïdiens ¬ Anastomose congénitale entre *Q14.8*
- Sanguin ¬
- - *C49*
- - *D21*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale des gros *Q25.9*
- ¬
- - Gros
- - - *C49.3*
- - - *D21.3*
- - L-transposition des gros *Q20.5*
- - Malformations congénitales des gros *Q25.8*
- - Transposition
- - - Congénitale complète d'un gros *Q20.3*
- - - Congénitalement
- - - - Corrigée des gros *Q20.5*
- - - - Non corrigée des gros *Q20.3*
- - - Corrigée d'un gros *Q20.5*
- - - Gros *Q20.3*

Vaisseau cérébral
- Cours de maladies cérébrovasculaires NCA ¬ Syndrome des *I67.9†, G46.8**
- Non précisée ¬
- - Malformation artério-veineuse congénitale des *Q28.29*
- - Malformation congénitale des *Q28.39*
- - ¬
- - Anévrisme artério-veineux congénital des *Q28.20*
- - Anévrisme congénital des *Q28.30*
- - Dégénérescence cérébrale au cours de maladies des *I67.9†, G32.8**
- - Fistule artério-veineuse congénitale des *Q28.21*
- - Fistule congénitale des *Q28.31*
- - Malformations artério-veineuses congénitales des *Q28.28*
- - Malformations congénitales des *Q28.38*

Vaisseau précérébral
- Non précisée ¬
- - Malformation artério-veineuse congénitale des *Q28.09*
- - Malformation congénitale des *Q28.19*
- - ¬
- - Anévrisme artério-veineux congénital des *Q28.00*
- - Anévrisme congénital des *Q28.10*
- - Fistule artério-veineuse congénitale des *Q28.01*
- - Fistule congénitale des *Q28.11*

Vaisseau précérébral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Malformations artério-veineuses congénitales des *Q28.08*
- - Malformations congénitales des *Q28.18*

Vaisseau pulmonaire
- Sans précision ¬ Maladie des *I28.9*
- ¬
- - Fistule artério-veineuse des *I28.0*
- - Maladies précisées des *I28.8*
- - Rétrécissement des *I28.8*
- - Rupture des *I28.8*
- - Sténose des *I28.8*
- - Stricture des *I28.8*

Vaisseau sanguin
- Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Doigt ¬ Lésion traumatique de *S65.5*
- Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Épidural niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S35.80*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de *S15.80*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de *S25.80*
- Iliaque ¬ Lésion traumatique d'un *S35.5*
- Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Intercostaux ¬ Lésion traumatique de *S25.5*
- Intracrânien ¬ Blessure d'un *S06.8*
- Niveau
- - Abdomen lombes bassin ¬ Lésion traumatique
- - - *S35.88*
- - - Multiples *S35.7*
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique
- - - *S55.8*
- - - Multiples *S55.7*
- - Cheville pied ¬ Lésion traumatique
- - - *S95.8*
- - - Multiples *S95.7*
- - Cou ¬ Lésion traumatique
- - - *S15.88*
- - - Multiples *S15.7*
- - Épaule bras ¬ Lésion traumatique
- - - *S45.8*
- - - Multiples *S45.7*
- - Hanche cuisse ¬ Lésion traumatique
- - - *S75.8*
- - - Multiples *S75.7*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique
- - - *S85.8*
- - - Multiples *S85.7*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique
- - - *S65.8*

Vaisseau sanguin *–suite*
- Niveau *–suite*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique *–suite*
- - - Multiples *S65.7*
- Non
- - Précisé
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T13.4*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T11.4*
- - - Niveau
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un *S55.9*
- - - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S95.9*
- - - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un *S45.9*
- - - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un *S75.9*
- - - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un *S85.9*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un *S65.9*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique d'un *S25.9*
- - Précisés niveau
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S35.9*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique de *S15.9*
- Partie du corps non précisée ¬ Lésion traumatique de *T14.5*
- Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques de *T06.3*
- Pouce ¬ Lésion traumatique de *S65.4*
- Poumon ¬ Lésion traumatique de *S25.4*
- Rein ¬ Lésion traumatique des *S35.4*
- SAI ¬
- - Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique de *T14.5*
- - Arrachement de *T14.5*
- - Hématome artériel traumatique de *T14.5*
- - Lacération de *T14.5*
- - Lésion traumatique de *T14.5*
- - Rupture traumatique de *T14.5*
- - Section de *T14.5*
- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Sous-arachnoïdien niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S35.82*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de *S15.82*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de *S25.82*
- Sous-dural niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S35.81*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de *S15.81*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de *S25.81*
- Tête, non classée ailleurs ¬ Lésion traumatique des *S09.0*

Vaisseau sanguin *–suite*
- Thorax ¬
- - Lésion traumatique d'autres *S25.88*
- - Lésions traumatiques de multiples *S25.7*

Valga congénitale ¬ Coxa: *Q65.8*

Valgum
- Congénital ¬ Genu *Q74.1*
- ¬ Syndrome de pseudoanodontie-hypoplasie maxillaire-genu *K07.8, Q74.1*

Valgus
- Acquis ¬
- - Hallux *M20.1*
- - Pied
- - - Affaissé *M21.63*
- - - Creux *M21.63*
- - - Plat
- - - - *M21.61*
- - - - *M21.61*
- - - - *M21.63*
- Dysmorphie ¬ Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-cubitus *Q87.8*
- Non classée ailleurs ¬ Déformation en *M21.0*
- ¬
- - Anomalies morphologiques congénitales du pied en *Q66.6*
- - Metatarsus *Q66.6*
- - Pied bot talus *Q66.4*
- - Pied plat: spastique (en *Q66.5*
- - Syndrome de colobome maculaire-fente palatine-hallux *Q87.8*

Valine ¬ Trouble du métabolisme de la *E71.1*

Valley ¬ Encéphalite de la Murray *A83.4*

Valproate ¬ Embryopathie au *Q86.88*

Valproïque ¬
- Acide *T42.6*
- Intoxication à l'acide *T42.6*

Valsalva (rompu) ¬ Anévrisme du sinus de *Q25.4*

Valve
- Aortique et tricuspide, combinées ¬ Atteintes des *I08.2*
- Cardiaque ¬ Inflammation
- - Rhumatismale aiguë de la *I01.1*
- - Syphilitique de la *A52.0†, I39.8**
- Eustache persistante ¬ *Q26.8*
- Mitral
- - Aortique
- - - Combinées ¬ Atteintes des *I08.0*
- - - Précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée ¬ Lésions des *I08.0*
- - - Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des *I08.3*
- - Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des *I08.1*
- Tricuspide
- - Parachute ¬ *Q22.8*

Valve *–suite*
- Tricuspide *–suite*
- - ¬
- - - Agénésie des *Q22.4*
- - - Anomalie d'Ebstein de la *Q22.5*
- - - Dysplasie congénitale de la *Q22.8*
- - - Endocardite tuberculeuse de la *A18.8†, I39.2**
- - - Inflammation syphilitique de la *A52.0†, I39.2**
- - - Straddling ou overriding de la *Q22.8*
- - - Valvulite syphilitique de la *A52.0†, I39.2**
- Urètre antérieur ¬ *Q64.7*

Valve aortique
- Cours de syndrome d'hypoplasie du cœur gauche ¬ Hypoplasie de la *Q23.4*
- Maladie de la valvule mitrale ¬ Endocardite rhumatismale aiguë de la *I01.1*
- ¬
- - Anomalie congénitale
- - - *Q23.9*
- - - Feuillets de la *Q23.9*
- - Endocardite
- - - Rhumatismale aiguë de la *I01.1*
- - - Syphilitique de la *A52.0†, I39.1**
- - - Tuberculeuse de la *A18.8†, I39.1**
- - Inflammation syphilitique de la *A52.0†, I39.1**
- - Sclérose rhumatismale de la *I06.8*
- - Sténose syphilitique de la *A52.0†, I39.1**
- - Valvulite syphilitique de la *A52.0†, I39.1**

Valve mitrale
- Déficience intellectuelle ¬ Syndrome d'hypogonadisme-prolapsus de la *Q87.8*
- ¬
- - Affection de la *I05.8*
- - Affections non rhumatismales des *I34.88*
- - Double orifice de la *Q23.8*
- - Endocardite
- - - Bactérienne de la *I33.0*
- - - Tuberculeuse de la *A18.8†, I39.0**
- - Inflammation syphilitique de la *A52.0†, I39.0**
- - Overriding de la *Q23.8*
- - Sclérose rhumatismale de la *I05.8*
- - Valvulite syphilitique de la *A52.0†, I39.0**

Valve pulmonaire
- SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q22.3*
- Septum ventriculaire intact-persistance du canal artériel ¬ Syndrome d'agénésie de la *Q22.3, Q25.0*
- Tétralogie de Fallot-absence du canal artériel ¬ Syndrome d'agénésie de la *Q24.8, Q25.8*
- ¬
- - Agénésie des *Q22.3*
- - Atrésie de la *Q22.0*
- - Endocardite
- - - Rhumatismal

Valve pulmonaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Endocardite *–suite*
- - - Rhumatismal *–suite*
- - - - Aiguë de la *I01.1*
- - - - Subaiguë de la *I01.1*
- - - Syphilitique de la *A52.0†, I39.3**
- - - Tuberculeuse de la *A18.8†, I39.3**
- - Inflammation syphilitique de la *A52.0†, I39.3**
- - Insuffisance
- - - Congénitale de la *Q22.2*
- - - Syphilitique de la *A52.0†, I39.3**
- - Malformations congénitales de la *Q22.3*
- - Reflux congénital au niveau de la *Q22.2*
- - Régurgitation syphilitique de la *A52.0†, I39.3**
- - Sténose congénitale de la *Q22.1*
- - Valvulite syphilitique de la *A52.0†, I39.3**

Valvulaire
- Aortique
- - Anomalie des mains ¬ Syndrome de persistance du canal artériel-bicuspidie *Q87.2*
- - Congénitale ¬ Dysplasie *Q23.9*
- - ¬
- - - Atrésie *Q23.0*
- - - Quadricuspidie *Q23.8*
- Cardiaque ¬
- - Complication mécanique
- - - Pontage coronarien et d'une greffe *T82.2*
- - - Prothèse *T82.0*
- - Déplacement dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - Fuite dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse *T82.6*
- - Malposition dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - Obstruction mécanique dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - Perforation dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - Protrusion dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - Rupture (mécanique) dû (due) à une prothèse *T82.0*
- Congénitale ¬
- - Dysplasie *Q24.8*
- - Sténose aortique *Q23.0*
- Mitral
- - Accessoire ¬ Tissu *Q23.8*
- - Chronique) SAI ¬ Atteinte (*I05.9*
- - Familial ¬ Prolapsus *I34.1*
- Multiples
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes *I39.4**
- - ¬ Autres maladies *I08.8*
- Myxomatose liée à l'X associée à FLNA ¬ Dysplasie *Q24.8*
- Pulmonaire

Valvulaire *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Congénitale ¬ Sténose *Q22.1*
- - ¬ Dysplasie *I37.0*
- Rhumatismale SAI ¬ Maladie aortique (*I06.9*
- ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type cardiaque *Q79.6*

Valvule
- Aortique
- - Bicuspide ¬ *Q23.1*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *I39.1**
- - Insuffisance ¬ Sténose (de la *I35.2*
- - Mitral
- - - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q23.9*
- - - ¬ Autres malformations congénitales des *Q23.8*
- - SAI cause précisée sauf rhumatismal ¬
- - - Insuffisance (de la *I35.1*
- - - Régurgitation (de la *I35.1*
- - Sans précision ¬
- - - Atteinte de la *I35.9*
- - - Maladie rhumatismale de la *I06.9*
- - Streptocoques ¬ Endocardite de la *I33.0, B95.5!*
- - ¬
- - - Atteintes de la *I35.8*
- - - Insuffisance
- - - - *I35.1*
- - - - Congénitale de la *Q23.1*
- - - Maladies rhumatismales de la *I06.8*
- - - Rétrécissement rhumatismal (de la *I06.0*
- - - Sténose
- - - - *I35.0*
- - - - Congénitale de la *Q23.0*
- Cardiaque
- - Allogène ¬ Inflammation due à une greffe de *T82.6*
- - Autologue ¬ Inflammation due à une greffe de *T82.6*
- - Remplacement ¬ Présence d'une autre *Z95.4*
- - Xénogène ¬ Inflammation due à une greffe de *T82.6*
- - Xénogénique ¬ Présence d'une *Z95.3*
- - ¬
- - - Présence de prothèse d'une *Z95.2*
- - - Septicémie dues à une greffe de *T82.6*
- Iléo-cæcale ¬ *D12.0*
- Mitral
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *I39.0**
- - E
- - - SAI cause précisée sauf rhumatismal ¬
- - - - Insuffisance (de la *I34.0*
- - - - Régurgitation (de la *I34.0*

Valvule *–suite*
- Mitral *–suite*
- - E *–suite*
- - - ¬ Prolapsus (de la *I34.1*
- - Insuffisance mitrale ¬ Sténose non rhumatismale de la *I34.80*
- - Sans précision ¬
- - - Atteinte non rhumatismale de la *I34.9*
- - - Maladie de la *I05.9*
- - ¬
- - - Endocardite rhumatismale aiguë de la valve aortique avec maladie de la *I01.1*
- - - Insuffisance (de la *I34.0*
- - - Maladies de la *I05.8*
- - - Rétrécissement (rhumatismal) de la *I05.0*
- - - Sténose non rhumatismale (de la *I34.2*
- Non précisée
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Endocardite, *I39.8**
- - SAI cause précisée sauf rhumatismal congénitale ¬
- - - Insuffisance *I38*
- - - Régurgitation *I38*
- - - Sténose *I38*
- - - Valvulite (chronique) *I38*
- - ¬ Endocardite
- - - *I38*
- - - Rhumatismale, *I09.1*
- Pulmonaire
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *I39.3**
- - Insuffisance ¬ Sténose de la *I37.2*
- - SAI cause précisée sauf rhumatismal ¬
- - - Insuffisance de la *I37.1*
- - - Régurgitation de la *I37.1*
- - Sans précision ¬ Atteinte de la *I37.9*
- - ¬
- - - Atteintes de la *I37.8*
- - - Insuffisance de la *I37.1*
- - - Maladie rhumatismale de la *I09.8*
- - - Sténose de la *I37.0*
- Sans précision ¬ Maladie de plusieurs *I08.9*
- Tricuspide
- - Cause précisée sauf rhumatismal ¬
- - - Insuffisance (de la *I36.1*
- - - Régurgitation (de la *I36.1*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *I39.2**
- - Insuffisance ¬ Sténose non rhumatismale (de la *I36.2*
- - Rhumatismal ¬
- - - Insuffisance (de la *I07.1*
- - - Sténose (de la *I07.0*
- - SAI ¬ Atteinte de la *I07.9*
- - Sans précision ¬
- - - Atteinte non rhumatismale de la *I36.9*
- - - Maladie de la *I07.9*

Valvule *–suite*
- Tricuspide *–suite*
- - Sans précision ¬ *–suite*
- - - Malformation congénitale de la *Q22.9*
- - ¬
- - - Anomalie congénitale de la *Q22.9*
- - - Atrésie de la *Q22.4*
- - - Atteintes non rhumatismales de la *I36.8*
- - - Insuffisance non rhumatismale (de la *I36.1*
- - - Maladies de la *I07.8*
- - - Malformations congénitales de la *Q22.8*
- - - Sténose
- - - - Congénitale de la *Q22.4*
- - - - Non rhumatismale (de la *I36.0*
- Urétral
- - Postérieure congénitale ¬ *Q64.2*
- - Postérieures congénitales ¬ *Q64.2*

Valvulite
- Chronique
- - Rhumatismale ¬ *I09.1*
- - Valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- Rhumatismale aiguë ¬ *I01.1*
- Syphilitique
- - Valve aortique ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Valve mitrale ¬ *A52.0†, I39.0**
- - Valve pulmonaire ¬ *A52.0†, I39.3**
- - Valve tricuspide ¬ *A52.0†, I39.2**
- - ¬ *A52.0†, I39.8**
- ¬ Arthrite rhumatismal
- - Aiguë avec *I01.1*
- - Subaiguë avec *I01.1*

Valvulopathie
- Cardiaque-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de petite taille- *Q87.1*
- Mitrale ¬ *I05.8*
- ¬ Syndrome de surdité-encéphaloneuropathie-obésité- *G31.81*

Vampire ¬ Main de *A66.3*

Van Bogaert ¬ Leucoencéphalopathie sclérosante de *A81.1*

Van Bogaert-Scherer-Epstein ¬
- Cholestérose cérébro-tendineuse [*E75.5*
- Syndrome de *E75.5*

Van Creveld
v./v.a. Ellis-van Creveld

Van Creveld von Gierke ¬ Maladie *E74.0*

Van den Ende-Gupta ¬ Syndrome de *Q74.3*

Van Der Aa
v./v.a. Helsmoortel-Van Der Aa

Van der Bosch ¬ Syndrome de *Q87.8*

Van der Hoeve ¬ Syndrome de *Q78.0*

Van der Woude ¬ Syndrome de *Q38.0*

Van Esch ¬ Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*

Van Horick
v./v.a. Verloove-Van Horick-Brubakk

Van Laere
v./v.a. Brown-Vialetto-van Laere

Van Lohuizen [Cutis marmorata telangiectatica congenitale] ¬ Syndrome de *Q27.8*

Van Maldergem ¬ Syndrome de *Q87.0*

Van Neck] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): ischio-pubienne [*M91.0*

Vanadium ¬ Carence en *E61.6*

Vanagaite
v./v.a. Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef

Vancomycine ¬ Infection invasif
- Enterococcus faecalis avec résistance à la *A49.13, U80.20!*
- Enterococcus faecium avec résistance à la *A49.13, U80.30!*

Vandellia cirrhosa ¬ Ichtyoparasitose à *B88.8*

Vanishing-Bone-Disease ¬ *M89.59*

Vapeur
- Brûlante ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Métaux ¬ Fumées et *T56*

Vapoteuse] ¬ Trouble de la santé en lien avec l'utilisation de cigarettes électroniques [*U07.0!*

Vaquez
v./v.a. Osler-Vaquez

Vara
- Congénitale ¬ Coxa: *Q65.8*
- Péricardite [CACP] ¬ Syndrome de camptodactylie-arthropathie-coxa *M12.80*
- Retrosa) (non traumatique) ¬ Épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa *M93.0*
- ¬ Tibia *M92.5*

Varice
- Coliques ¬ *I86.81*
- Congénital(e) ¬ *Q27.8*
- Gastrique
- - Cours de schistosomiase ¬ *B65.9†, I98.2**
- - Indication d'hémorragie, au cours de schistosomiase ¬ *B65.9†, I98.3**
- - ¬
- - - *I86.4*
- - - Cirrhose alcoolique foie
- - - - *K70.3†, I98.2**
- - - - Saignement de *K70.3†, I98.3**
- Grêliques ¬ *I86.80*
- Hémorroïdaires ¬ *K64.9*
- Localisations précisées ¬ *I86.88*
- Membres inférieurs
- - Cours de la grossesse ¬ *O22.0*
- - Inflammation ¬ *I83.1*
- - Sans ulcère ou inflammation ¬ *I83.9*
- - Toute localisation] ou de localisation non précisée ¬ *I83.9*
- - Ulcère et inflammation ¬ *I83.2*
- Œsophagien

Varice *–suite*
- Œsophagien *–suite*
- - Gastrique cours maladies classées chapitres
- - - Mention d'hémorragie ¬ *I98.3**
- - - Sans indication d'hémorragie ¬ *I98.2**
- - Hémorragiques ¬ *I85.0*
- - Non hémorragiques ¬ *I85.9*
- - SAI ¬ *I85.9*
- - ¬ Cirrhose
- - - Alcoolique foie
- - - - *K70.3†, I98.2**
- - - - Hémorragie par rupture des *K70.3†, I98.3**
- - - Foie
- - - - *K74.6†, I98.2**
- - - - Hémorragie par rupture des *K74.6†, I98.3**
- - - Toxique foie
- - - - *K71.7†, I98.2**
- - - - Hémorragie par rupture des *K71.7†, I98.3**
- Organe génital cours
- - Grossesse ¬ *O22.1*
- - Puerpéralité ¬ *O87.8*
- Pelviennes ¬ *I86.2*
- Périnée, de vagin et de vulve au cours de la grossesse ¬ *O22.1*
- Rectales ¬ *I86.82*
- Rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- SAI au cours de la grossesse ¬ *O22.0*
- Scrotales ¬ *I86.1*
- Sublinguales ¬ *I86.0*
- Ulcérées des membres inférieurs ¬ *I83.0*
- Vulvaires ¬ *I86.3*
- ¬
- - Rupture de *I86.1*
- - Ulcère veineux de la jambe sans *I87.21*

Varicelle
- Complications ¬ *B01.8*
- Congénitale ¬
- - *P35.8*
- - Syndrome de *P35.8*
- Pneumonie ¬ *B01.2†, J17.1**
- Sans complication ¬ *B01.9*
- Zona ¬
- - Antécédents personnels d'infection à VZV [virus de la *Z86.1*
- - Paralysie faciale liée à l'infection par le virus *B02.2†, G53.0**
- ¬
- - Keratitis disciformis au cours de *B01.8†, H19.2**
- - Méningite au cours de *B01.0†, G02.0**
- - Pneumonie au cours de *B01.2†, J17.1**

Varicelleuse
- Cornée et de la conjonctive ¬ Infection *B01.8†, H19.2**

Varicelleuse *–suite*
- ¬
- - Encéphalite *B01.1†, G05.1**
- - Encéphalomyélite *B01.1†, G05.1**
- - Méningite *B01.0†, G02.0**
- - Myélite *B01.1†, G05.1**

Varicelleux ¬ Exanthème *B01.8*

Varicelle-zona ¬
- Encéphalite due au VZV [virus *B02.0†, G05.1**
- Méningite due au VZV [virus *B02.1†, G02.0**

Varicelliforme
- Due à Rickettsia akari ¬ Rickettsiose *A79.1*
- Kaposi ¬ Pustulose *B00.0*

Varicocèle ¬ *I86.1*

Variole
- Bovine
- - Paupière ¬ *B08.0†, H03.1**
- - ¬ *B08.0*
- Vache ¬ *B08.0*
- ¬ *B03*

Varioliforme
- Aigu [Maladie de Mucha-Habermann] ¬ Pityriasis lichénoïde et *L41.0*
- ¬ Acné *L70.2*

Variqueux
- Anus ¬ Ulcère *K64.8*
- Externe de l'anus ¬ Ulcère *K64.5*
- Interne de l'anus ¬ Ulcère *K64.8*
- Membres inférieurs toute localisation
- - Localisation non précisée ¬ Veines *I83.9*
- - ¬ Ulcère *I83.0*
- Septum nasal ¬ Ulcère *I86.88*
- ¬
- - Anévrisme: *I77.0*
- - Ulcère de jambe non *I87.21*

Varole ¬ Lésion syphilitique du pont de *A52.1†, G94.8**

Varon
v./v.a. Yunis-Varon

Varum congénital ¬ Genu *Q74.1*

Varus
- Congénital
- - Polysyndactylie préaxiale ¬ Syndrome d'hallux *Q66.3, Q70.4*
- - ¬ Hallux *Q66.3*
- Équin ¬ Pied bot *Q66.0*
- Non classée ailleurs ¬ Déformation en *M21.1*
- ¬
- - Anomalies morphologiques congénitales du pied en *Q66.3*
- - Hallux *M20.3*
- - Pied bot talus *Q66.1*
- - Syndrome de brachydactylie préaxiale-hallux *Q73.8, Q66.3*

Vasa praevia
- Tant que complication de l'accouchement ¬ *O69.4*
- ¬
- - *O69.4*
- - Hémorragie
- - - *O69.4*
- - - Fœtale au cours de *P50.0*
- - - Fœtus au cours de *P50.0*
- - Lésions
- - - Fœtus dues à un *P02.6*
- - - Nouveau-né dues à une hémorragie liée à un *P50.0*

Vasculaire
v./v.a. pigmento-vasculaire
v./v.a. Type de maladie

Vascularite
- Aspergillus ¬ *B44.8*
- Associée aux ANCA ¬ *I77.6*
- Cryoglobulinémique ¬
- - *D89.1*
- - Angéite [*D89.1*
- Déficit en ADA2 ¬ *M30.8*
- IgA ¬ *D69.0*
- Induite par les médicaments ¬ *D69.0*
- Limitée à la peau, sans précision ¬ *L95.9*
- Limitées à la peau ¬ Autres *L95.8*
- Livédoïde avec ulcérations estivales ¬ *L95.0*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.2*
- Non classifiée ¬ *I77.6*
- Petits vaisseaux cutanés ¬ *M31.0*
- Post-infectieuse ¬ *I77.6*
- Rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- Systémique ¬ *I77.6*
- Urticarienne hypocomplémentémique ¬ *M31.8*
- ¬ Neuropathie non systémique due à une *G61.8*

Vasculite
- Allergique ¬ *D69.0*
- Cours d'arthrite juvénile ¬ *M08.7*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88*
- Toxoplasmes ¬ *B58.8†, I98.1**

Vasculopathie
- Cutanée collagène ¬ *M35.8†, L99.8**
- Enfant associée à STING [Stimulateur des Gènes de l'Interféron] ¬ *M35.8*
- Fowler ¬ *Q87.8*
- Livédoïde ¬ *L95.0*
- Nécrosante
- - Précisées ¬ Autres *M31.8*
- - Sans précision ¬ *M31.9*
- Rétinienne avec leucoencéphalopathie cérébrale et manifestations systémiques [RVCL-S] ¬ *Q28.38, Q14.1*

Vasculo-rénale ¬ Hypertension *I15.0*

Vasectomie ¬
- Admission pour ligature des trompes de Fallope ou *Z30.2*
- Spermogramme après *Z30.8*

Vasileiou
v./v.a. Blakemore-Durmaz-Vasileiou

Vaso-actif ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: polypeptide: intestinal *E16.8*

Vasoconstriction cérébrale réversible ¬ Syndrome de *I67.88*

Vasodilatateur
- Coronariens, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T46.3*
- Périphériques ¬ Intoxication: *T46.7*

Vasomotrice
- Type Nothnagel] ¬ Acroparesthésie: *I73.8*
- ¬
- - Paralysie *G90.88*
- - Rhinopathie *J30.0*

Vasoplastie après stérilisation ¬ Tuboplastie ou *Z31.0*

Vasopressine
- Calcifications intracrâniennes-petite taille-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de résistance à l'arginine *Q87.1*
- ¬
- - Déficit en *E23.2*
- - Résistance à l'arginine- *N25.1*
- - Syndrome de déficience intellectuelle liée à l'X-spasticité des membres-dystrophie de la rétine-déficit en arginine *Q87.8*

Vasospasme
- Artères coronaires ¬ *I20.1*
- Cours d'hémorragie sous-arachnoïdienne ¬ *I67.80!*
- Psychogène ¬ *F45.30*
- Traumatique ¬ Syndrome de: *T75.2*

Vasovagal psychogène ¬
- Malaise *F45.30*
- Syndrome *F45.30*

Vater
- Anomalies vertébrales, atrésie anale, anomalies cardiaques, fistule trachéo-œsophagienne avec atrésie de l'œsophage, dysplasie rénale et du radius] ¬ Syndrome de *Q87.2*
- ¬
- - Ampoule
- - - *D01.5*
- - - *D37.6*
- - Carcinome de l'ampoule de *C24.1*
- - Tumeur maligne: Ampoule de *C24.1*

VCP ¬ Myopathie distale de l'adulte due à des mutations de *G71.08*

VDDI avec communication interventriculaire sous-aortique ou sous-aortique et sous-pulmonaire et sténose pulmonaire ¬ *Q20.1*

Vectocardiogramme ¬ Anomalies (de): *R94.3*

VEF1
v./v.a. Type de maladie

Vegetans ¬ Keratosis *Q82.8*

Végétant ¬
- Dermatite *L40.2*
- Pemphigus *L10.1*
- Syndrome d'Hallopeau [pemphigus *L10.1*

Végétatif
- Alcool ¬ Dysfonctionnement du système nerveux *G31.2*
- ¬ Pyoderma gangrenosum, type *L88*

Végétation adénoïde
- SAI ¬ Maladie (chronique) des amygdales et des *J35.9*
- Sans précision ¬ Maladie chronique des amygdales et des *J35.9*
- ¬
- - Carcinome des *C11.1*
- - Hyperplasie des *J35.2*
- - Hypertrophie
- - - *J35.2*
- - - Amygdales et des *J35.3*
- - Maladies chroniques des amygdales et des *J35.8*

Végétaux sauf aliment ¬ Dermite
- Allergique de contact due aux *L23.7*
- Contact, sans précision, due aux *L25.5*
- Irritante de contact due aux *L24.7*

Véhicule
- Aquatique ¬ Accident dû à un *V99!*
- Attelé à un animal ¬ Accident d'équitation ou accident de *V99!*
- Livraison ¬ Accident de *V99!*
- Moteur causé délibérément ¬ Accident de *Y09.9!*
- Spécialisé ¬ Accident dû à un *V99!*

Veille sommeil
- Anormal ¬ Cycle *Z91.8*
- Associé à NRXN1 ¬ Syndrome de trouble neurodéveloppemental sévère-stéréotypies motrices-constipation chronique-trouble du rythme *G96.8*
- Non dû à une cause organique ¬ Trouble du rythme *F51.2*
- ¬
- - Irrégularité du rythme *G47.2*
- - Troubles du cycle *G47.2*

Veine
- Abdominale ¬ Thrombose d'une *I82.88*
- Anales ¬ Thrombose des *K64.5*
- Axillaire
- - Brachiale ¬ Lésion traumatique de la *S45.2*
- - ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: *I80.81*
- Azygos ¬
- - *S25.88*
- - Continuation de la veine cave inférieure dans la *Q26.8*
- Basilaire ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: *I80.80*
- Brachio-céphalique sous-aortique ¬ *Q26.8*

Veine *–suite*
- Cardinale postérieure gauche ¬ Persistance de la *Q26.8*
- Cave
- - Inférieure
- - - Oreillette gauche ¬ Drainage anormal de la *Q26.8*
- - - Supérieure ¬
- - - - Absence de *Q26.8*
- - - - Sténose congénitale de la *Q26.0*
- - - - Syndrome de la *I87.1*
- - - Veine azygos ¬ Continuation de la *Q26.8*
- - - ¬
- - - - Anévrisme primitif de la *I86.88*
- - - - Continuation azygos de la *Q26.8*
- - - - Interruption de la *Q26.8*
- - - - Léiomyosarcome de la *C49.4*
- - - - Lésion traumatique de la *S35.1*
- - - - Malformation congénitale de la *Q26.9*
- - Supérieure
- - - Droite dans l'oreillette gauche ¬ Abouchement de la *Q26.8*
- - - Gauche
- - - - Abouchement dans l'oreillette gauche via le sinus coronaire ¬ Persistance de la *Q26.1*
- - - - Oreillette gauche par le sinus coronaire ¬ Abouchement de la *Q26.1*
- - - - Toit de l'oreillette gauche ¬ Abouchement de la *Q26.1*
- - - - ¬
- - - - - Persistance de la *Q26.1*
- - - - - Syndrome TARP (Talipes equinovarus avec communication interatriale, séquence de Robin et persistance de la *Q87.8*
- - - ¬
- - - - Absence de *Q26.8*
- - - - Anévrisme primitif de la *I86.88*
- - - - Lésion traumatique de la *S25.2*
- - - - Malformation congénitale de la *Q26.9*
- - ¬
- - - Embolie et thrombose de la *I82.2*
- - - Lésion traumatique de la *S25.2*
- - - Sténose congénitale de la *Q26.0*
- Centrale
- - Œil ¬ Thrombose de la *H34.8*
- - Rétinienne ¬ Occlusion de la *H34.8*
- Céphalique ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: *I80.80*
- Cérébrale ¬ Thrombose non pyogène
- - *I67.6*
- - *I67.6*
- Coronaires n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ Occlusion des *I24.0*
- Cou ¬ Oblitération d'une *I82.88*
- Dorsale du pied ¬ Lésion traumatique de la *S95.2*
- Fémoral

Veine *–suite*
- Fémoral *–suite*
- - Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique de la *S75.1*
- - - ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la *I80.1*
- Galien ¬
- - Anévrisme de la *Q28.20*
- - Malformation artério-veineuse de la *Q28.28*
- Hépatique ¬
- - *S35.1*
- - Embolie de la *I82.0*
- - Phlébite d'une *I80.88*
- - Thrombophlébite d'une *I80.88*
- Hépatiques ¬
- - Occlusion de *I82.0*
- - Sténose de *I82.0*
- - Syndrome de Budd-Chiari [Syndrome d'occlusion des *I82.0*
- Hypogastrique ¬ Artère ou *S35.88*
- Iliaque ¬
- - Lésion traumatique de la *S35.5*
- - Thrombose de la *I80.20*
- Innominée
- - Sous-clavière ¬ Lésion traumatique de la *S25.3*
- - ¬ Absence de *Q26.8*
- Intracrâniens intrarachidien ¬
- - Embolie septique des sinus veineux et *G08*
- - Endophlébite septique des sinus veineux et *G08*
- - Phlébite septique des sinus veineux et *G08*
- - Thrombophlébite septique des sinus veineux et *G08*
- - Thrombose septique des sinus veineux et *G08*
- Jugulaire
- - Externe ¬ Lésion traumatique de la *S15.2*
- - Interne ¬ Lésion traumatique de la *S15.3*
- - ¬
- - - Embolie et thrombose de la *I82.81*
- - - Thrombose
- - - - *I82.81*
- - - - Bulbe de la *I82.81*
- Mammaire ¬ Artère ou *S25.88*
- Méninges ¬ Thrombose d'une *I67.6*
- Mésentérique
- - Inférieure ¬ Lésion traumatique de la *S35.3*
- - Supérieure ¬ Lésion traumatique de la *S35.3*
- - ¬
- - - Embolie de la *K55.0*
- - - Lésion traumatique
- - - - *S35.3*
- - - - *S35.3*
- - - Thrombose de la *K55.0*

Veine *–suite*
- Niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'une *S55.2*
- Non précisée ¬ Embolie et thrombose d'une *I82.9*
- Ovarienne ¬ Artère ou *S35.88*
- Pelvienne ¬ Thrombose d'une *I80.20*
- Pelviennes
- - Avant l'accouchement ¬ Thrombophlébite des *O22.3*
- - ¬
- - - Phlébite des *I80.20*
- - - Thrombophlébite des *I80.20*
- Perforantes ¬ Insuffisance des *I87.20*
- Poplité ¬
- - Lésion traumatique de la *S85.5*
- - Phlébite de la *I80.28*
- - Thrombophlébite de la *I80.28*
- - Thrombose de la *I80.28*
- Porte
- - Artère hépatique (congénitale) ¬ Fistule entre la *Q26.6*
- - Due à la syphilis ¬ Thrombose de la *A52.0†, I98.0**
- - Non cirrhotique ¬ Thrombose de la *I81*
- - ¬
- - - Lésion traumatique de la *S35.3*
- - - Obstruction de la *I81*
- - - Phlébite de la *K75.1*
- - - Syphilis de la *A52.0†, I98.0**
- - - Thrombose de la *I81*
- Précisées ¬ Embolie et thrombose d'autres *I82.88*
- Profondes
- - Membre inférieur ¬ Insuffisance des *I87.20*
- - Membres supérieurs ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite des *I80.81*
- Pulmonaire
- - Cœur pulmonaire ¬
- - - Thromboembolie d'une *I26.0*
- - - Thrombose d'une *I26.0*
- - ¬
- - - Infarctus (d'une artère) (d'une *I26*
- - - Thromboembolie d'une *I26.9*
- - - Thrombose d'une *I26.9*
- Pulmonaires ¬
- - Atrésie des *Q26.3*
- - Sténose
- - - Congénitale des *Q26.8*
- - - Primaire des *Q26.8*
- Rénale
- - Fœtus ¬ Thrombose de la *P29.8*
- - Nouveau-né ¬ Thrombose de la *P29.8*
- - ¬
- - - Artère ou *S35.4*
- - - Embolie et thrombose de la *I82.3*
- Rétine

Veine *–suite*
- Rétine *–suite*
- - Branche ¬ Occlusion de la *H34.8*
- - Centrale ¬ Occlusion de la *H34.8*
- - Débutante ¬ Occlusion de la *H34.8*
- - Partielle ¬ Occlusion de la *H34.8*
- Saphène
- - Externe au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de la *S85.4*
- - Interne
- - - Niveau
- - - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique de la *S75.2*
- - - - Jambe ¬ Lésion traumatique de la *S85.3*
- - - SAI ¬ *S85.3*
- Sous-clavière ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: *I80.81*
- Splénique ¬
- - Embolie et thrombose de la *I82.80*
- - Lésion traumatique de la *S35.3*
- Superficielle au niveau de l'épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'une *S45.3*
- Superficielles membres
- - Inférieurs ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite des *I80.0*
- - Supérieurs ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite des *I80.80*
- Surrénale ¬ Thrombose d'une *I82.88*
- Sus-hépatiques ¬ Anomalies des *Q26.8*
- Utérine ¬ Artère ou *S35.88*
- Variqueuses des membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée ¬ *I83.9*
- ¬
- - Absence d'une artère ou d'une *Q27.8*
- - Atrésie d'une *Q27.8*
- - Malformation congénitale
- - - Grandes *Q26.8*
- - - Grosses *Q26.9*

Veinectasie anale ¬ *K64.9*

Veineux
v./v.a. Type de maladie
- Animaux venimeux ¬ Accident dû au contact avec des plantes *X29.9!*
- ¬
- - Consommation d'animaux venimeux ou de plantes *X49.9!*
- - Intoxication par des plantes *T62.2*
- - Lésion due à des plantes *X29.9!*

Veinolobaire pulmonaire congénital ¬ Syndrome *Q26.8*

Veino-occlusif
- Foie ¬ Maladie
- - *K76.5*
- - Toxique *K71.80*
- Hépatique
- - Déficit immunitaire ¬ Syndrome de maladie *D82.8, K76.5*

Veino-occlusif *–suite*
- Hépatique *–suite*
- - ¬ MVOH [Maladie *K76.5*
- Pulmonaire ¬
- - Maladie *I27.08*
- - MVOP [maladie *I27.08*

Vélaire
- Médiane ¬ Fente palatine et *Q35.5*
- ¬ Fente *Q35.3*

Vélamenteuse cordon ¬
- Hémorragie due à une insertion *O69.4*
- Perte de sang fœtal due à une insertion *P50.0*
- Travail et accouchement compliqués par une insertion *O69.4*

Vélo-cardio-facial ¬ Syndrome *D82.1*

Vélo-facio-squelettique ¬ Syndrome *Q87.0*

Vélopharyngienne congénitale ¬ Incompétence *Q38.8*

Venencie
v./v.a. Powell-Venencie-Gordon

Vénérien
- Chlamydia ¬ Lymphogranulomatose *A55*
- SAI ¬ Maladie *A64*
- ¬
- - Arthrite *M02.39*
- - Balanite *A64†, N51.2**
- - Condylomes ano-génitaux (*A63.0*
- - Rétrécissement du rectum dû à un lymphogranulome *A55†, K93.8**
- - Salpingite *A54.2†, N74.3**
- - Salpingo-ovarite *A54.2†, N74.3**
- - Syphilis non *A65*
- - Urétrite
- - - *A64†, N37.0**
- - - Non *N34.1*
- - Vaginite *A64†, N77.1**

Vénézuélienne ¬
- Fièvre équine *A92.2*
- Fièvre hémorragique *A96.8*

Venimeux
- Multiples SAI ¬ Piqûres d'insecte (non *T00.9*
- Plantes vénéneuses ¬ Consommation d'animaux *X49.9!*
- Sans précision ¬ Effet toxique d'un contact avec un animal *T63.9*
- ¬
- - Accident dû au contact avec des plantes vénéneuses ou des animaux *X29.9!*
- - Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux *T63.8*
- - Lésion
- - - Due à une plante (non *W64.9!*
- - - Traumatique superficielle
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non *T13.03*

Venimeux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique superficielle *–suite*
- - - - Membre *–suite*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non *T11.03*
- - - - Partie du corps non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non *T14.03*
- - - - Tronc, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non *T09.03*
- - Lésions traumatiques superficielles
- - - Abdomen, des lombes et du bassin: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S30.83*
- - - Avant-bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S50.83*
- - - Cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S90.83*
- - - Épaule et du bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S40.83*
- - - Hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S70.83*
- - - Jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S80.83*
- - - Poignet et de la main: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S60.83*
- - Morsure animal
- - - Non *W64.9!*
- - - Piqûre d'insecte *X29.9!*
- - Piqûre
- - - Insecte, non *W64.9!*
- - - Morsure d'insecte *T63.4*

Venin
- Amphibien ¬ *T63.8*
- Araignée ¬ Effet toxique: *T63.3*
- Arthropodes ¬ Effet toxique: *T63.4*
- Lézard ¬ *T63.1*
- Reptiles ¬ Effet toxique: *T63.1*
- Scorpion ¬ Effet toxique du *T63.2*
- Serpent
- - Marin ¬ Effet toxique du *T63.0*
- - ¬ Effet toxique du *T63.0*

Venosus ¬ ASD [défaut septal auriculaire] du type sinus *Q21.1*

Ventilation
- Articielle ¬ Pneumonie au cours de la *J95.88*
- Mécanique ¬ Dysfonction diaphragmatique induite par la *J95.88*
- Nouveau-né ¬ Poumon de *P27.8*
- Pneumopathie liée à la climatisation] ¬ Pneumopathie liée à la *J67.70*
- ¬
- - Alvéolite allergique due aux organismes se développant dans les systèmes de *J67.70*
- - Lésion du diaphragme induite par la *J95.88*

Ventilatoire obstructif ¬ Bronchiolite oblitérante avec trouble *J44.89*

Ventosa ¬ Spina *A18.01†, M90.09**

Ventouse
- Forceps
- - Sans précision ¬ Échec de l'application d'une *O66.5*
- - Suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne ¬ Application d'une *O66.5*
- ¬
- - Accouchement unique par forceps et *O81*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [*P03.3*

Ventre
- Besace) ¬ Soins maternels pour: abdomen penduleux (*O34.8*
- ¬ Absence congénitale de la musculature du *Q79.4*

Ventriculaire
v./v.a. atrio-ventriculaire
v./v.a. auriculo-ventriculaire
- Arythmogène familiale isolée
- - Forme biventriculaire ¬ Dysplasie *I42.88*
- - Prédominance à gauche ¬ Cardiomyopathie *I42.88*
- Ballon ¬ Syndrome de l'apex *I42.88*
- Droite
- - Arythmogène
- - - CVDA] ¬ Cardiomyopathie *I42.80*
- - - Familiale isolée ¬ Dysplasie *I42.80*
- - - Isolée familiale ¬ Cardiomyopathie *I42.80*
- - - ¬
- - - - CVDA [Cardiomyopathie *I42.80*
- - - - Dysplasie *I42.80*
- - Isolée ¬ Hypoplasie *Q22.6*
- - ¬ Cardiomyopathie arythmogène isolée familiale à prédominance *I42.80*
- Épicardique ¬ Infection due à un dispositif d'assistance *T82.72*
- Gauche
- - Convulsions-hypotonie-cataracte-retard de développement ¬ Syndrome létal de non-compaction *G31.81*
- - Faiblement réduite] ¬ HFmrEF [Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection *I50.19*
- - Non précisée ¬ Insuffisance *I50.19*
- - Préservée] ¬ HFpEF [Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection *I50.19*
- - Réduite] ¬ HFrEF [Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection *I50.19*
- - ¬
- - - Anévrysme congénital *Q24.8*
- - - Augmentation pathologique de la pression télédiastolique *R94.3*
- - - Hypertrabéculation *I42.88*
- - - Syndrome de déficience intellectuelle-macrocéphalie-non-compaction *Q87.0*
- Idiopathique type
- - Brugada ¬ Fibrillation *I49.8*
- - Non Brugada ¬ Fibrillation *I49.8*

Ventriculaire *–suite*
- Incessante du nouveau-né ¬ Tachycardie *I47.2*
- Intact
- - Persistance du canal artériel ¬ Syndrome d'agénésie de la valve pulmonaire-septum *Q22.3, Q25.0*
- - ¬ Syndrome d'atrésie pulmonaire-septum *Q22.0*
- Intracrânien
- - Communication) ¬ Complication mécanique d'un shunt *T85.0*
- - ¬ Sepsis dû à un shunt *T85.72*
- Légère à modérée de moins de 50 % du volume ventriculaire, du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.1*
- Non spécifique ¬ Bloc *I45.4*
- Nouveau-né ¬ Hémorragie ventriculaire
- - Légère à modérée de moins de 50 % du volume *P52.1*
- - Sévère de 50 % ou plus du volume *P52.2*
- Paroxystique maligne ¬ Tachycardie *I47.2*
- Polymorphe catécholaminergique ¬ Tachycardie *I47.2*
- Prématurée ¬ Dépolarisation *I49.3*
- Réentrée ¬ Arythmie *I47.0*
- Sévère de 50 % ou plus du volume ventriculaire du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.2*
- Syncopes-pérodactylie-séquence de Robin ¬ Syndrome d'extrasystoles *Q87.8*
- ¬
- - Anévrisme: *I25.3*
- - Bandes *C32.1*
- - Canal atrio-ventriculaire complet - hypoplasie *Q21.2*
- - Dilatation *I51.7*
- - Fibrillation et flutter *I49.0*
- - Hyperkinésie *R93.1*
- - Hypotension intracrânienne suite à un pontage *G97.2*
- - Inversion *Q20.5*
- - Laryngocèle *Q31.3*
- - Tachycardie *I47.2*
- - Thrombose (ancienne): *I51.3*

Ventricule
- Cérébral ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Astrocytome
- - - *C71.5*
- - - Anaplasique d'un *C71.5*
- - - Diffus d'un *C71.5*
- - - Fibrillaire d'un *C71.5*
- - - Gémistocytique d'un *C71.5*
- - - Pilocytique d'un *C71.5*
- - - Pilomyxoïde d'un *C71.5*
- - Carcinome embryonnaire d'un *C71.5*
- - Épendymoblastome d'un *C71.5*

Ventricule *–suite*
- Cérébral ¬ *–suite*
- - Épendymome
- - - *C71.5*
- - - Anaplasique d'un *C71.5*
- - Ganglioglíome anaplasique d'un *C71.5*
- - Glioblastome d'un *C71.5*
- - Oligodendroglíome
- - - *C71.5*
- - - Anaplasique d'un *C71.5*
- - Tératome malin d'un *C71.5*
- - Tumeur
- - - Oligodendrogliale d'un *C71.5*
- - - Sac vitellin d'un *C71.5*
- - Tumeur maligne: *C71.5*
- - Tumeur mixte des cellules germinales d'un *C71.5*
- - Tumeur neuroectodermique primitive d'un *C71.5*
- - Tumeur rhabdoïde tératoïde atypique d'un *C71.5*
- - Xanthoastrocytome pléomorphe d'un *C71.5*
- Commun ¬ *Q20.4*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du *I23.6*
- Croisés ¬ *Q24.8*
- Double issue [Double inlet ventricle] ¬ *Q20.4*
- Droit
- - Double issue
- - - Communication interventriculaire
- - - - Sous-aortique ou sous-aortique et sous-pulmonaire et sténose pulmonaire ¬ *Q20.1*
- - - - Sous-pulmonaire ¬ *Q20.1*
- - - Double outlet right ventricle
- - - - CIV [communication interventriculaire] sous-pulmonaire non-committed ¬ *Q20.1*
- - - - Communication interventriculaire sous-aortique
- - - - - Sous-pulmonaire [double-committed ¬ *Q20.1*
- - - - - ¬ *Q20.1*
- - - - ¬ *Q20.1*
- - - ¬ *Q20.1*
- - ¬ Communication interventriculaire
- - - Atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du *Q21.3*
- - - Sténose pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du *Q21.3*
- Gauche
- - Associé à des crises d'épilepsie, une hypotonie, une cataracte et un retard de développement ¬ Syndrome létal de cardiomyopathie par non-compaction du *G31.81*
- - Double issue [Double outlet left ventricle] ¬ *Q20.2*

Ventricule *–suite*
- Gauche *–suite*
- - Lors du syndrome d'hypoplasie du cœur gauche ¬ Malformation congénitale du *Q23.4*
- - ¬
- - - Atrésie aortique congénitale avec hypoplasie de l'aorte ascendante et malformation du *Q23.4*
- - - Cardiopathie coronarienne avec insuffisance fonctionnelle du *I25.19*
- - - Diverticule congénital du *Q24.8*
- Unique ¬ *Q20.4*
- ¬
- - Astrocytome
- - - Pilocytique du quatrième *C71.7*
- - - Pilomyxoïde du quatrième *C71.7*
- - Épendymoblastome du quatrième *C71.7*
- - Épendymome
- - - Anaplasique du quatrième *C71.7*
- - - Quatrième *C71.7*
- - Ganglioglíome anaplasique du quatrième *C71.7*
- - Oligodendroglíome
- - - Anaplasique du quatrième *C71.7*
- - - Quatrième *C71.7*
- - Papillome du plexus choroïdien du quatrième *D33.1*
- - Quatrième
- - - *D33.1*
- - - *D43.1*
- - Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et *C71.0*
- - Tumeur neuroectodermique primitive du quatrième *C71.7*
- - Xanthoastrocytome pléomorphe du quatrième *C71.7*

Ventriculite (cérébrale) SAI ¬ *G04.9*

Ventriculo-artériel
- Concordance atrio-ventriculaire ¬ Discordance *Q20.3*
- Isolée ¬ Discordance *Q20.3*

Ventriculo-auriculaire discordante ¬ Communication *Q20.3*

Ventriculomégalie-maladie des kystes rénaux ¬ Syndrome de *Q04.8, Q61.9*

Ver solitaire du bœuf ¬ *B68.1*

Verbal associé à TRAF7 ¬ Syndrome d'anomalies cardiaques-anomalies digitales-dysmorphie faciale-retard moteur et *Q87.0*

Verbale
- Développement ¬ Dyspraxie *F82.9*
- ¬ Surdité *F80.2*

Verge
- Lésion localisations contiguës ¬
- - Adénocarcinome de la *C60.8*
- - Carcinome épidermoïde de la *C60.8*
- SAI ¬ Peau de la *C60.9*
- Sans précision ¬ Affection de la *N48.9*

Verge *–suite*
- ¬
- - Abcès des corps caverneux et de la *N48.2*
- - Adénocarcinome
- - - *C60.9*
- - - Corps de la *C60.2*
- - Affections
- - - Inflammatoires de la *N48.2*
- - - Précisées de la *N48.8*
- - Anthrax des corps caverneux et de la *N48.2*
- - Atrophie des corps caverneux et de la *N48.8*
- - Cancer de la *C60.9*
- - Carcinoma in situ: *D07.4*
- - Carcinome épidermoïde
- - - *C60.9*
- - - Corps de la *C60.2*
- - Cavernite (de la *N48.2*
- - Furoncle des corps caverneux et de la *N48.2*
- - Hypertrophie des corps caverneux et de la *N48.8*
- - Kraurosis de la *N48.0*
- - Leucoplasie de la *N48.0*
- - Phlegmon des corps caverneux et de la *N48.2*
- - Thrombose des corps caverneux et de la *N48.8*
- - Tumeur bénigne: *D29.0*
- - Tumeur maligne
- - - *C60.9*
- - - Corps de la *C60.2*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C60.8*
- - Ulcère de la *N48.5*

Vergetures ¬ *L90.6*

Vérification
- Dispositif cardiaque (électronique) ¬ Contrôle et *Z45.0*
- Enlèvement
- - Appareils externes de fixation ou de traction ¬ Changement, *Z47.8*
- - Plâtre ¬ Changement, *Z47.8*
- Réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] ¬ *Z30.5*

Vérifié ¬ Angine de poitrine avec spasme coronaire *I20.1*

Verloes ¬ Syndrome de blépharophimosis-déficience intellectuelle type *Q87.8*

Verloes-Bourguignon ¬ Syndrome de *Q76.3, K00.5*

Verloes-Deprez ¬ Syndrome de *Q87.1*

Verloes-Gillerot-Fryns ¬ Syndrome de *Q87.1*

Verloove-Van Horick-Brubakk ¬ Syndrome de *Q87.8*

Verma-Naumoff ¬ Syndrome des côtes courte-spolydactylie type *Q77.2*

Vermiculaire ¬ Adhérences de l'appendice *K66.0*

Vermiforme ¬ Atrophoderma *L66.4*

Vermis

- Cérébelleux
- - Dysmorphie faciale-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de microcéphalie-hypoplasie du corps calleux et *Q87.0*
- - ¬
- - - Absence complète isolée du *Q04.3*
- - - Agénésie
- - - - *Q04.3*
- - - - Complète isolée du *Q04.3*
- - - - Isolée
- - - - - *Q04.3*
- - - - - Partielle du *Q04.3*
- - - Hypoplasie isolée du *Q04.3*
- Kystes de la fosse postérieure ¬ Syndrome d'agénésie partielle du corps calleux-hypoplasie du *Q04.3*

Vernale ¬ Kératoconjonctivite *H16.2*

Verno estival

- Europe centrale] ¬ FSME [Encéphalite *A84.1*
- Russe ¬ Méningo-encéphalite *A84.0*

Verocay dans le neurinome ¬ Nodule de *D36.1*

Verre ¬

- Cataracte du souffleur de *H26.88*
- Maladie des os de *Q78.0*

Verres de contact ¬ Mise en place et ajustement de lunettes et *Z46.0*

Verruca

- Simplex ¬ *B07*
- Vulgaris ¬ *B07*

Verruciforme

- Hopf ¬ Acrokératose *Q82.8*
- ¬
- - Collagénome perforant *L87.1*
- - Epidermodysplasie *B07*

Verrue

- Multiples-déficit immunitaire-lymphœdème-dysplasies ano-génitales [WILD] ¬ Syndrome de *Q82.09*
- Origine virale ¬ *B07*
- Séborrhéique ¬ *L82*

Verrues-hypogammaglobulinémie-infections-myélokathexis] ¬ Syndrome WHIM [*D81.8*

Verruqueux

- Angiodysplasie anévrisme ¬
- - Nævus épidermique *Q87.8*
- - Syndrome NEVADA [nævus épidermique *Q87.8*
- Atypique ¬ Endocardite *M32.1†, I39.8**
- Face ¬ Dyskératome *D23.3*
- Forme linéaire ¬ Nævus *Q82.5*
- Hypertrophique ¬ Lupus érythémateux *L93.2*
- Inflammatoire linéaire ¬
- - Nævus épidermique *Q82.5*
- - NEVIL [Nævus épidermique *Q82.5*

Verruqueux *–suite*

- Löffler ¬ Endocardite *I42.3*
- Muqueuse buccale ¬ Xanthome *K13.4*
- Non rhumatismale ¬ Endocardite *M32.1†, I39.8**
- Peau
- - Cou ¬ Dyskératome *D23.4*
- - Membres
- - - Inférieurs ¬ Dyskératome *D23.7*
- - - Supérieurs ¬ Dyskératome *D23.6*
- - Tronc ¬ Dyskératome *D23.5*
- ¬
- - Dermatite *B43.0*
- - Dyskératome *D23.9*
- - Hémangiome *D18.00*
- - Nævus: *Q82.5*
- - Tuberculose *A18.4*

Versant

- Hypopharyngé ¬
- - Repli ary-épiglottique
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, *C13.1*
- Laryngé ¬ Repli ary-épiglottique
- - *C32.1*
- - *D02.0*
- - *D38.0*

Versicolor ¬

- Pityriasis *B36.0*
- Tinea: *B36.0*

Version externe avant le travail ¬ *P01.7*

Vertébral

v./v.a. Artère vertébrale
v./v.a. Colonne vertébrale
v./v.a. facio-auriculo-vertébral
v./v.a. oculo-auriculo-vertébral

- Adulte ¬ Ostéochondrite *M42.1*
- Ankylosante avec tylose ¬ Hyperostose *M48.19*
- Anomalies des membres ¬ Syndrome de polydactylie en miroir-segmentation *Q87.2*
- Antérieure progressive non infectieuse ¬ Fusion *Q87.5*
- Atrésie anale anomalies cardiaques fistule trachéo-œsophagienne atrésie œsophage
- - Anomalies rénales et des membres] ¬ Syndrome de VACTERL [anomalies *Q87.2*
- - Dysplasie rénale et du radius] ¬ Syndrome de VATER [anomalies *Q87.2*
- Cardiaques-rénales ¬ Syndrome d'anomalies *Q87.8*
- Cervical(e) ¬ arc: *S12*
- Cervicale ¬ Spondylodiscite de corps *M46.42*
- Congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Synostose *Q76.4*
- Cours
- - Arthrite rhumatoïde ¬ Atteinte *M45*

Vertébral *–suite*

- Cours *–suite*
- - Maladies classées ailleurs ¬ Tassement *M49.5**
- Dorsal(e) ¬ arc: *S22*
- Due à une métastase ¬ Fracture *C79.5†, M49.59**
- Fatigue ¬ Fracture *M48.4*
- Juvénile ¬ Ostéochondrite *M42.0*
- Lombaire ¬ Spondylodiscite de corps *M46.46*
- Lombo-sacré(e) ¬ arc: *S32*
- Non
- - Classé ailleurs ¬ Tassement *M48.5*
- - Tuberculeux ¬ Abcès articulaire *M46.59*
- Oreilles-nez]-plus ¬ Syndrome EVEN [dysplasie épiphysaire- *Q87.8*
- Persistance de la notochorde ¬ Syndrome d'agénésie sacrée-ossification anormale des corps *Q79.8*
- Récidivantes ¬ Autres subluxations *M43.5*
- Région
- - Cervicale ¬ Ostéomyélite *M46.22*
- - Sacrale ¬ Ostéomyélite *M46.28*
- - Sacro-coccygienne ¬ Ostéomyélite *M46.28*
- SAI ¬
- - Incurvation *M43.9*
- - Tassement *M48.5*
- Sans précision ¬ Ostéochondrite *M42.9*
- Stress ¬ Fracture *M48.4*
- Thoracique ¬ Spondylodiscite de corps *M46.44*
- Tuberculeux ¬ Bloc *A18.0†, M49.09**
- Vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques ¬ tassement *M80*
- ¬
- - Ankylose d'articulation *M43.2*
- - Artère basilaire carotide
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- - Arthrose ou ostéoarthrite *M47*
- - Céphalée d'origine *M54.2*
- - Dysplasie ischio- *Q78.8*
- - Hémangiome du corps *D18.07*
- - Instabilités *M53.2*
- - Ostéomyélite *M46.2*
- - Soudures *M43.2*
- - Subluxation complexe (*M99.1*
- - Syndrome
- - - Brachy-œsophage congénital-estomac intrathoracique-anomalies *Q87.8*
- - - Fente palatine-petite taille-anomalies *Q87.0*
- - - Polydactylie postaxiale-anomalies dentaires et *Q87.2*
- - Tuberculose *A18.0†, M49.09**

Vertebrale suboccipitale ¬ Malum *A18.0†, M49.01**

Vertèbre
v./v.a. Luxation d'une vertèbre
- Cervicale
- - SAI ¬ Fracture de: *S12.9*
- - ¬ Fracture
- - - *S12.9*
- - - 3ème *S12.21*
- - - 4ème *S12.22*
- - - 5ème *S12.23*
- - - 6ème *S12.24*
- - - 7ème *S12.25*
- - - Deuxième *S12.1*
- - - Première *S12.0*
- Cervicales
- - Lésion de la moelle épinière ¬ Fracture des *S12.9, S14.10*
- - Précisées ¬ Fracture d'autres *S12.2*
- - ¬
- - - Fractures multiples des *S12.7*
- - - Fusion congénitale des *Q76.1*
- - - Syndrome de microcéphalie-fusions des *Q87.8*
- Cunéiforme
- - Ostéoporotiques ¬ tassement vertébral et *M80*
- - SAI ¬ *M48.5*
- Dorsale
- - D1 et D2 ¬ Fracture d'une *S22.01*
- - D11 et D12 ¬ Fracture d'une *S22.06*
- - D3 et D4 ¬ Fracture d'une *S22.02*
- - D5 et D6 ¬ Fracture d'une *S22.03*
- - D7 et D8 ¬ Fracture d'une *S22.04*
- - D9 et D10 ¬ Fracture d'une *S22.05*
- - Niveau non précisé ¬ Fracture d'une *S22.00*
- - Non précisée ¬ *S23.10*
- Lombaire
- - L1 ¬ Fracture d'une *S32.01*
- - L2 ¬ Fracture d'une *S32.02*
- - L3 ¬ Fracture d'une *S32.03*
- - L4 ¬ Fracture d'une *S32.04*
- - L5 ¬ Fracture d'une *S32.05*
- - Niveau non précisé ¬ Fracture d'une *S32.00*
- Lombaires
- - Lésion de la moelle épinière ¬ Fracture des *S32.00, S34.18*
- - SAI ¬ Luxation de *S33.10*
- Lombo-sacré(e) ¬ *S32*
- Lombo-sacrées-blépharoptosis ¬ Syndrome de fusions des *Q76.4, Q10.0*
- Progressive non infectieuse ¬ Fusion des *Q87.5*
- Sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Absence congénitale de *Q76.4*
- Surnuméraire sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Thoracique

Vertèbre *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Lésion de la moelle épinière ¬ Fracture des *S22.00, S24.10*
- - ¬ Chondrosarcome d'une *C41.2*
- ¬ Ostéoblastome d'une *D16.6*

Vertical
- Vertical shear fracture] ¬ Fracture de cisaillement *S32.7*
- ¬
- - Astragale *Q66.8*
- - Strabisme *H50.2*
- - Surocclusion: *K07.2*

Vertical shear fracture] ¬ Fracture de cisaillement verticale [*S32.7*

Verticis gyrata primitif non essentiel ¬ Cutis *Q82.8*

Vertige
- Auriculaire ¬ *H81.3*
- Bénin paroxystique ¬ *H81.1*
- Épidémique ¬ *A88.1†, H82**
- Infra-sons ¬ *T75.2*
- Ménière ¬ Syndrome ou *H81.0*
- Origine centrale ¬ *H81.4*
- Otogène ¬ *H81.3*
- Périphérique
- - Atteinte du labyrinthe ¬ *H81.3*
- - SAI ¬ *H81.3*
- Périphériques ¬ Autres *H81.3*
- SAI ¬ *R42*

Vertigineux
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Syndromes *H82**
- SAI ¬ Syndrome *H81.9*

Vésical
v./v.a. Cervico-vésical
v./v.a. Col vésical
v./v.a. recto-vésical
v./v.a. urétéro-vésical
- Choc rachidien ¬ Trouble des fonctions *G95.82*
- Classique ¬ Exstrophie *Q64.1*
- Cours de la grossesse ¬ Infections *O23.1*
- Instabilité du détrusor due à une neuropathie autonome ¬ Trouble fonctionnel *N31.1*
- Lésion
- - Périphérique [LMNL] ¬ Paralysie *G95.81*
- - Supranucléaire [UMNL] ¬ Paralysie *G95.80*
- Néovessie ¬ Calcul *N21.0*
- Non classée ailleurs ¬ Fistule *N32.2*
- Origine neuromusculaire ¬ Autre dysfonction *N31.88*
- Sans substrat neurologique ¬ Hypo- et acontractilité du muscle *N31.81*
- ¬
- - Aréflexie *G95.81*
- - Atonie *G95.81*
- - Calcul
- - - *N21.0*

Vésical *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Calcul *–suite*
- - - Diverticule *N21.0*
- - Carcinome épidermoïde pur du trigone *C67.0*
- - Dyssynergie du détrusor du col *N32.0*
- - Ectopie *Q64.1*
- - Exstrophie *Q64.1*
- - Fistule: utéro- *N82.1*
- - Inflammation due à une sonde *T83.5*
- - Sclérose du sphincter *N32.8*
- - Tamponnade *N32.8*
- - Ténesme *R30.1*
- - Ulcère
- - - *N32.8*
- - - Sphincter *N32.8*

Vésico
- Intestinale ¬ Fistule *N32.1*
- Rectale ¬ Fistule *N32.1*
- Urétéral
- - Cicatrice ¬ Reflux *N13.7*
- - SAI ¬ Reflux *N13.7*
- - ¬
- - - Occlusion congénitale de: orifice *Q62.1*
- - - Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (*N11.0*
- Urétéro-rénal congénital ¬ Reflux *Q62.7*
- Urétral congénital(e) ¬ Rétrécissement de: orifice *Q64.3*

Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies *Q87.8*

Vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière ¬ Dyssynergie *G95.84*

Vésico-vaginal ¬
- Carcinome *C57.9*
- Fistule *N82.0*

Vésiculaire
- Cérébral de la dopamine et de la sérotonine ¬ Déficit du transport *G25.88*
- Congénitale ¬ Dermatose érosive et *P83.8*
- Due
- - Entérovirus ¬ Pharyngite *B08.5*
- - Virus de l'herpès ¬ Dermite *B00.1*
- Exanthème, due à un entérovirus ¬ Stomatite *B08.4*
- Lèvre due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite *B00.1*
- Oreille due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite *B00.1*
- SAI ¬ Môle *O01.9*
- Virale [fièvre de l'Indiana] ¬ Stomatite *A93.8*
- ¬
- - Emphysème (pulmonaire): *J43.9*
- - Môle *O01.9*
- - Rickettsiose *A79.1*

Vésiculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle: *Z35.1*

Vésicule
- Biliaire
- - Accessoire ¬ *Q44.1*
- - Cholécystite aiguë ¬ Calcul de la *K80.0*
- - Exclue ¬ *R93.2*
- - Forme de cholécystite ¬ Calcul de la *K80.1*
- - Intrahépatique ¬ *Q44.1*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q44.1*
- - Sans
- - - Calcul ¬
- - - - Abcès de la *K81.0*
- - - - Empyème de la *K81.0*
- - - - Gangrène de la *K81.0*
- - - - Occlusion du canal cystique ou de la *K82.0*
- - - - Rétrécissement du canal cystique ou de la *K82.0*
- - - - Sténose du canal cystique ou de la *K82.0*
- - - Cholécystite ¬ Calcul de la *K80.2*
- - - Précision
- - - - Sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: *K80.2*
- - - - ¬ Maladie de la *K82.9*
- - Voie biliaire
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la *K87.0**
- - - Extra-hépatiques ¬
- - - - Adénocarcinome de la *C23, C24.0*
- - - - Carcinome épidermoïde de la *C23, C24.0*
- - ¬
- - - Absence congénitale de la *Q44.0*
- - - Adénocarcinome de la *C23*
- - - Adhérences du canal cystique ou de la *K82.8*
- - - Agénésie de la *Q44.0*
- - - Aplasie de la *Q44.0*
- - - Atrophie du canal cystique ou de la *K82.8*
- - - Carcinome épidermoïde de la *C23*
- - - Cholestérolose de la *K82.4*
- - - Duplication de la *Q44.1*
- - - Dyskinésie du canal cystique ou de la *K82.8*
- - - Exclusion du canal cystique ou de la *K82.8*
- - - Fistule de la *K82.3*
- - - Hypertrophie du canal cystique ou de la *K82.8*
- - - Hypoplasie de la *Q44.0*
- - - Infection purulente aiguë de la *K81.0*
- - - Kyste du canal cystique ou de la *K82.8*
- - - Lésion traumatique: *S36.17*
- - - Maladies précisées de la *K82.8*

Vésicule *–suite*
- Biliaire *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Malformation artério-veineuse de la *Q27.3*
- - - Malformations congénitales de la *Q44.1*
- - - Mucocèle de la *K82.1*
- - - Occlusion de la *K82.0*
- - - Perforation de la *K82.2*
- - - Rupture du canal cystique ou de la *K82.2*
- - - Syndrome d'hypoplasie du pancréas-atrésie intestinale-hypoplasie de la *Q45.8*
- - - Syphilis tardive de la *A52.7†, K87.0**
- - - Tuberculose de la *A18.8†, K87.0**
- - - Tumeur bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et *D13.5*
- - - Tumeur neuroendocrine de la *C23*
- - - Typhus affectant la *A01.0*
- - - Ulcère du canal cystique ou de la *K82.8*
- Cutanées récurrentes ¬ Hypotrichose héréditaire à *Q84.0, R23.8*
- Fraise ¬ *K82.4*
- Non thermiques ¬
- - Lésion traumatique superficielle
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé: Formation de *T13.02*
- - - - Supérieur, niveau non précisé: Formation de *T11.02*
- - - Partie du corps non précisée: Formation de *T14.02*
- - - Tronc, niveau non précisé: Formation de *T09.02*
- - Lésions traumatiques superficielles
- - - Avant-bras: Formation de *S50.82*
- - - Cheville et du pied: Formation de *S90.82*
- - - Épaule et du bras: Formation de *S40.82*
- - - Hanche et de la cuisse: Formation de *S70.82*
- - - Jambe: Formation de *S80.82*
- - - Poignet et de la main: Formation de *S60.82*
- Séminal
- - Prostate
- - - SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des *Q55.4*
- - - ¬ Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des *Q55.4*
- - ¬
- - - *C63.7*
- - - *D29.7*
- - - Absence acquise des *Z90.7*
- - - Adénocarcinome de la *C63.7*
- - - Affections inflammatoires des *N49.0*
- - - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des *N50.8*
- - - Gonorrhée

Vésicule *–suite*
- Séminal *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Gonorrhée *–suite*
- - - - *A54.2†, N51.8**
- - - - Aiguë de la *A54.2†, N51.8**
- - - - Chronique de la *A54.2†, N51.8**
- - - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des *N50.8*
- - - Lésion traumatique: *S37.83*
- - - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des *N50.8*
- - - Syphilis tardive de la *A52.7†, N51.8**
- - - Trichomonase de la *A59.0†, N51.8**
- - - Tuberculose des *A18.1†, N51.8**
- - - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des *N50.8*
- Voie biliaire ¬
- - Carcinoma in situ: Foie, *D01.5*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la *K91.81*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, *D37.6*

Vésiculeuse ¬
- Fièvre *A79.1*
- Stomatite: *K12.1*

Vésiculite
- Cytomégalovirus ¬ *B25.88†, N51.8**
- Due à des amibes ¬ *A06.8†, N51.8**
- Gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.8**
- Post-gonorrhéique ¬ *A54.2†, N51.8**
- SAI ¬ *N49.0*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N51.8**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N51.8**

Vessie
- Automatique SAI ¬ *G95.8*
- Cellules transitionnelles ¬ Carcinome non papillaire de la *C67.9*
- Cours
- - Cytomégalie ¬ Maladie de la *B25.88†, N33.8**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Affections de la *N33.8**
- Désinhibée d'origine centrale ¬ *N31.0*
- Douloureuse ¬ Syndrome de la *N30.1*
- Faible compliance, fixée organiquement ¬ *N31.80*
- Goudrons ¬ Cancer de la *C67.9*
- Hyperactive ¬ *N32.8*
- Instable sans substrat neurologique ¬ *N31.82*
- Lésion localisations contiguës ¬
- - Carcinome à petites cellules de la *C67.8*

Vessie *–suite*
- Lésion localisations contiguës ¬ *–suite*
- - Rhabdomyosarcome embryonnaire de la *C67.8*
- Localisations contiguës ¬ Carcinome épidermoïde pur de la *C67.8*
- Muqueuse) ¬ Prolapsus congénital de: *Q64.7*
- Neurogène
- - Atonique (motrice) (sensorielle) ¬ *N31.2*
- - Autonome ¬ *N31.2*
- - Dénervation afférente chirurgicale ¬ *N31.2*
- - Due
- - - Neuropathie autonome ¬ *N31.2*
- - - Syndrome du cortex frontal ¬ *N31.2*
- - Flasque (périphérique), non classée ailleurs ¬ *N31.2*
- - Non inhibée, non classée ailleurs ¬ *N31.0*
- - Non-réflexe ¬ *N31.2*
- - Réflexe, non classée ailleurs ¬ *N31.1*
- - SAI ¬ Dysfonctionnement de la *N31.9*
- Non
- - Précisée ¬ Lésion de la *S37.20*
- - Traumatique ¬ Rupture de la *N32.4*
- Organes urinaires, autres et non précisés ¬ Tumeur maligne secondaire de la *C79.1*
- Paresseuse ¬ *N31.81*
- Prostate, annexe, utérus ¬ Région génitale, *I97.87*
- Réflexe d'origine rachidienne ¬ *G95.80*
- Remplacement ¬ Fistule entre vagin et *N82.81*
- Sans précision ¬
- - Affection de la *N32.9*
- - Dysfonctionnement neuromusculaire de la *N31.9*
- - Tumeur maligne: *C67.9*
- Spastique ¬
- - *G95.80*
- - *N32.8*
- Surnuméraire ¬ *Q64.7*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- Urétéral ¬ Orifice de la *D30.3*
- Urétral ¬ Orifice de la *D30.3*
- Urètre
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q64.7*
- - ¬
- - - Absence congénitale de la *Q64.5*
- - - Malformations congénitales de la *Q64.7*
- Urinaire ¬ Syphilis tardive de la *A52.7†, N33.8**
- Virus d'Epstein-Barr ¬ Maladie de la *B27.0†, N33.8**
- Virus de l'herpès ¬ Maladie de la *B00.8†, N33.8**
- ¬

Vessie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Abcès
- - - *N30.80*
- - - Paroi de la *N30.80*
- - Affections précisées de la *N32.8*
- - Anomalie de: épreuves fonctionnelles (de): *R94.8*
- - Blessure ouverte de la *S37.20, S31.83!*
- - Calcification de la *N32.8*
- - Calcul de la *N21.0*
- - Carcinoma in situ: *D09.0*
- - Carcinome
- - - Ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] de la *C67.9*
- - - Non papillaire cellule transitionnelle
- - - - Dôme de la *C67.1*
- - - - Paroi
- - - - - Antérieure de la *C67.3*
- - - - - Latérale de la *C67.2*
- - - - - Postérieure de la *C67.4*
- - - - Trigone de la *C67.0*
- - Carcinome à petites cellules
- - - Dôme de la *C67.1*
- - - Paroi
- - - - Antérieure de la *C67.3*
- - - - Latérale de la *C67.2*
- - - - Postérieure de la *C67.4*
- - - Trigone de la *C67.0*
- - Carcinome épidermoïde pur
- - - *C67.9*
- - - Dôme de la *C67.1*
- - - Paroi
- - - - Antérieure de la *C67.3*
- - - - Latérale de la *C67.2*
- - - - Postérieure de la *C67.4*
- - Contusion de la *S37.21*
- - Corps étranger dans la *T19.1*
- - Défaut de remplissage de: *R93.4*
- - Diverticule
- - - *N32.3*
- - - Congénital de la *Q64.6*
- - Dysfonctionnement neurogène du détrusor/sphincter de la *N31.88*
- - Endométriose de la *N80.8*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur de la *Z12.6*
- - Extroversion de la *Q64.1*
- - Hernie congénitale de la *Q64.7*
- - Lacération de la *S37.22*
- - Lésion obstétricale de: *O71.5*
- - Lésions de la *S37.28*
- - Obstruction
- - - *N32.8*
- - - Col de la *N32.0*
- - Perforation traumatique de la *S37.22*
- - Rhabdomyosarcome

Vessie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Rhabdomyosarcome *–suite*
- - - *C67.9*
- - - Embryonnaire
- - - - *C67.9*
- - - - Dôme de la *C67.1*
- - - - Paroi
- - - - - Antérieure de la *C67.3*
- - - - - Latérale de la *C67.2*
- - - - - Postérieure de la *C67.4*
- - - - Trigone de la *C67.0*
- - Rupture de la *S37.22*
- - Trichomonase de la *A59.0†, N33.8**
- - Tuberculose de la *A18.1†, N33.0**
- - Tumeur bénigne: *D30.3*
- - Tumeur maligne
- - - Dôme de la *C67.1*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C67.8*
- - - Paroi
- - - - Antérieure de la *C67.3*
- - - - Postérieure de la *C67.4*
- - - Trigone de la *C67.0*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D41.4*
- - Ulcère tuberculeux de la *A18.1†, N33.0**

Vestibulaire
- Bilatérale] ¬ CANVAS [Syndrome d'ataxie cérébelleuse avec neuropathie et aréflexie *G11.8*
- Central ¬ Syndrome *H81.4*
- Congénitale ¬ Fistule recto- *Q52.2*
- Sans précision ¬ Atteinte des fonctions *H81.9*
- ¬
- - Atteintes des fonctions *H81.8*
- - Malformation ano-rectale (atrésie de l'anus) non syndromique avec fistule recto- *Q42.2*
- - Neuronite *H81.2*
- - Schwannome *D33.3*

Vestibule
- Bouche ¬
- - Carcinome épidermoïde de la *C06.1*
- - Tumeur maligne: *C06.1*
- Fosses nasales ¬ *C30.0*

Vestibulocochléaire
- Cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, *H94.0**
- ¬
- - Névrite syphilitique
- - - Nerf *A52.1†, H94.0**
- - - Tardive du nerf *A52.1†, H94.0**
- - Syphilis du nerf *A52.1†, H94.0**

Vestibulo-cochléaire cours maladie
- Infectieuse NCA ¬ Névrite du nerf *B99†, H94.0**
- Parasitaire NCA ¬ Névrite du nerf *B89†, H94.0**

Vestibulopathie bilatérale idiopathique ¬ *H81.8*

Vestiges branchiaux ¬ *Q18.0*

VEXAS [Vacuole, mutation de l'Enzyme 1 à l'X, syndrome auto-inflammatoire et somatique] ¬ Syndrome *M35.8*

Viable ¬ Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus *O36.7*

Vialetto
v./v.a. Brown-Vialetto-van Laere

Viande rouge ¬ Allergie à la *T78.1*

Vibration ¬
- *Z57*
- Effets des *T75.2*
- Exposition à : *W49.9!*
- Urticaire provoquée par *L50.4*

Vibratoire ¬
- Angio-œdème *L50.4*
- Urticaire *L50.4*

Vibrio
- Cholerae 01 biovar
- - Cholerae ¬ Choléra à *A00.0*
- - El Tor ¬ A *A00.1*
- Parahaemolyticus ¬ Intoxication alimentaire à *A05.3*
- Vulnificus
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B98.1!*
- - ¬
- - - Bactériémie à *A49.81*
- - - Infection à *A49.81*

Vice réfraction
- Sans précision ¬ *H52.7*
- ¬ Autres *H52.6*

Vici ¬ Syndrome de *Q87.8*

Vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions *P03.1*

Victime
- Coupable
- - Blessures dues à une agression ¬ Examen de la *Z04.5*
- - Viol ou un abus sexuel allégué ¬ Examen de la *Z04.5*
- Crime, d'actes terroristes ou de tortures ¬ *Z65*
- Terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être *F62.0*

Vidal] ¬ Lichen simplex chronique [*L28.0*

Vide ¬ Déficit hypophysaire associé au syndrome de la selle turcique *E23.0*

Vie
- Institution ¬ Difficulté liée à la *Z59*
- Quotidienne NCA ¬ Thérapie concernant les activités de la *Z50.8!*
- Sans précision ¬ Difficulté liée au mode de *Z72.9*
- ¬ difficulté
- - Ajustement aux transitions entre les différentes périodes de *Z60*
- - Liées
- - - Mode de *Z72.8*
- - - Orientation de son mode de *Z73*

Vieillesse sans mention de psychose ¬ *R54*

Vieillissement
- Osseux prématuré ¬ Syndrome marfanoïde-hernie inguinale- *Q87.0*
- Prématuré
- - Petite taille-dysmorphie faciale ¬ Syndrome de rétinite pigmentaire-surdité- *Q87.0*
- - Type Penttinen ¬ Syndrome de *E34.8*

Vigile] ¬ Semi-coma [coma *R40.1*

VIH
- Abattement ¬ Maladie due au *B23.8, R53.9*
- Adénopathie ¬ Maladie due au *B23.8, R59.9*
- Affection du système nerveux central ¬ Maladie due au *B22†, G94.8**
- Agranulocytose ¬ Maladie due au *B23.8, D70.3*
- Altération vasculaire de la rétine ¬ Maladie due au *B23.8, H35.0*
- Anémie ¬ Maladie due au *B23.8, D64.9*
- Anémie hémolytique acquise ¬ Maladie due au *B23.8, D59.9*
- Anémie par carence ¬ Maladie due au *B23.8, D53.9*
- Anomalie respiratoire ¬ Maladie due au *B23.8, R06.88*
- Arthrite
- - Infectieuse ¬ Maladie due au *B20, M00.99*
- - Purulente ¬ Maladie due au *B20, M00.99*
- Cachexie ¬ Maladie due au *B22, R64*
- Candidose
- - Bouche ¬ Maladie due au *B20, B37.0*
- - Disséminée ¬ Maladie due au *B20, B37.88*
- - Peau et des ongles ¬ Maladie due au *B20, B37.2*
- - Poumons ¬ Maladie due au *B20, B37.1*
- - ¬ Maladie due au *B20, B37.9*
- Catégorie
- - 1 ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au *U61.1!*
- - 2 ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au *U61.2!*
- - 3 ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au *U61.3!*
- - A ¬ Catégories cliniques de l'infection par le *U60.1!*
- - B ¬ Catégories cliniques de l'infection par le *U60.2!*

VIH *–suite*
- Catégorie *–suite*
- - C ¬ Catégories cliniques de l'infection par le *U60.3!*
- Cécité ¬ Maladie due au *B23.8, H54.0*
- Coccidioïdomycose ¬ Maladie due au *B20, B38.9*
- Coccidiose ¬ Maladie due au *B20, A07.3*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [*O98.7*
- Cryptococcose ¬ Maladie due au *B20, B45.9*
- Cytomégalie ¬ Maladie due au *B20, B25.9*
- Démence
- - Présénile ¬ Maladie due au *B22†, F02.4**
- - ¬ Maladie due au *B22†, F02.4**
- Démyélinisation ¬ Maladie due au *B22†, G94.8**
- Dermatomycose ¬ Maladie due au *B20, B36.9*
- Dermatophytose [dermatophytie] ¬ Maladie due au *B20, B35.9*
- Diarrhée
- - Infectieuse ¬ Maladie due au *B20, A09.0*
- - ¬ Maladie due au *B23.8, K52.9*
- Dyspnée ¬ Maladie due au *B23.8, R06.0*
- Encéphalite ¬ Maladie due au *B22†, G05.1**
- Encéphalomyélite ¬ Maladie due au *B22†, G05.1**
- Encéphalopathie ¬ Maladie due au *B22†, G94.31**
- Éruption cutanée ¬ Maladie due au *B23.8, R21*
- Faible vision ¬ Maladie due au *B23.8, H54.0*
- Fièvre ¬ Maladie due au *B23.8, R50.9*
- Gastroentérite
- - Infectieuse ¬ Maladie due au *B20, A09.0*
- - Non infectieuse ¬ Maladie par *B23.8, K52.9*
- Gonflement des glandes ¬ Maladie due au *B23.8, R59.9*
- Hépatomégalie ¬ Maladie due au *B23.8, R16.0*
- Herpès simplex ¬ Maladie due au *B20, B00.9*
- Histoplasmose ¬ Maladie due au *B20, B39.9*
- Hyperhidrose ¬ Maladie due au *B23.8, R61.9*
- Hypersplénisme ¬ Maladie due au *B23.8, D73.1*
- Hypovolémie ¬ Maladie due au *B23.8, E86*
- Infection
- - Bactérienne NCA ¬ Maladie due au *B20, A49.9*
- - Candida ¬ Maladie due au *B20, B37.9*
- - Cryptosporidium ¬ Maladie due au *B20, A07.2*
- - Fongique ¬ Maladie due au *B20, B49*
- - Isospora ¬ Maladie due au *B20, A07.3*
- - Mycobactérienne ¬ Maladie due au *B20, A31.9*

VIH *–suite*
- Infection *–suite*
- - Mycobacterium avium intracellulare ¬ Maladie due au *B20, A31.0*
- - Parasitaire ¬ Maladie due au *B20, B89*
- - Toxoplasma gondii ¬ Maladie due au *B20, B58.98*
- - Tuberculeuse ¬ Maladie due au *B20, A16.9*
- - Virale ¬ Maladie due au *B20, B34.9*
- - Virus lent ¬ Maladie due au *B20, A81.9*
- Leucoencéphalite multifocale ¬ Maladie due au *B22†, G05.1**
- Leucoplasie de la muqueuse buccale ¬ Maladie due au *B23.8, K13.2*
- Lymphadénite aiguë ¬ Maladie due au *B23.8, L04.9*
- Lymphadénopathie généralisée
- - Persistante) [LPG] ¬ Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au *U60.1!*
- - ¬ Maladie due au *B23.8, R59.1*
- Lymphome
- - Burkitt ¬ Maladie due au *B21, C83.7*
- - Primaire du cerveau ¬ Maladie due au *B21, C85.9*
- - ¬ Maladie due au *B21, C85.9*
- Lymphome non hodgkinien ¬ Maladie due au *B21, C85.9*
- Malabsorption intestinale ¬ Maladie due au *B23.8, K90.9*
- Maladie
- - Due à une carence nutritionnelle ¬ Maladie due au *B22, E63.9*
- - Glandes salivaires ¬ Maladie due au *B23.8, K11.9*
- - Infectieuse ¬ Maladie due au *B20, B99*
- - Organes hématopoïétiques ¬ Maladie due au *B23.8, D75.9*
- - Parasitaire NCA ¬ Maladie due au *B20, B99*
- - Peau ¬ Maladie due au *B23.8, L98.9*
- - Sang ¬ Maladie due au *B23.8, D75.9*
- - Tissu sous-cutané ¬ Maladie due au *B23.8, L98.9*
- Méningite aseptique ¬ Maladie due au *B20, G03.0*
- Mycose ¬ Maladie due au *B20, B49*
- Myélite ¬ Maladie due au *B23.8, G04.9*
- Myélopathie ¬ Maladie due au *B23.8, G95.9*
- N'entrant pas dans la catégorie A ou C ¬ Maladie symptomatique due au *U60.2!*
- Névralgie ¬ Maladie due au *B23.8, M79.29*
- Névrite ¬ Maladie due au *B23.8, M79.29*
- Non précisée ¬ Catégorie clinique de la maladie due au *U60.9!*
- Nourrissons ¬ Résultat non concluant du test de recherche du *R75*
- Origine
- - États précisés ¬ Maladie par *B23.8*
- - Maladies infectieuses et parasitaires ¬ Immunodéficience humaine virale [*B20*

VIH *–suite*
- Perte de poids ¬ Maladie due au *B22, R64*
- Plusieurs tumeurs malignes ¬ Maladie due au *B21*
- Pneumonie
- - Lymphoïde interstitielle ¬ Maladie due au *B22, J84.90*
- - Pneumocystis carinii ¬ Maladie due au *B20†, J17.2*, B48.5*
- - ¬ Maladie due au *B20, J18.9*
- Pneumonie virale ¬ Maladie due au *B20, J12.9*
- Pneumopathie lymphoïde interstitielle ¬ *B22, J84.90*
- Polyneuropathie ¬ Maladie due au *B23.8, G62.9*
- Positif ¬ Décollement de la rétine au cours de rétinite à CMV [cytomégalovirus], *B20†, H32.0*, B25.88*
- Psychosyndrome organique ¬ Maladie due au *B23.8, F07.9*
- Récidive de rétinite à CMV [cytomégalovirus] ¬ Maladie due au *B20†, H32.0*, B25.88*
- Retard de développement chez le nourrisson ¬ Maladie due au *B22, P05.9*
- Réticulosarcome ¬ Maladie due au *B21, C83.3*
- Rétinite
- - Bactérienne ¬ Maladie due au *B20†, H32.0*, A49.9*
- - Candida ¬ Maladie due au *B20†, H32.0*, B37.88*
- - CMV [cytomégalovirus] ¬ Maladie due au *B20†, H32.0*, B25.88*
- - Mycosique ¬ Maladie due au *B20†, H32.0*, B49*
- - Virale ¬ Maladie due au *B20†, H32.0*, B34.9*
- - ¬ Maladie due au *B20, H30.9*
- Rétinopathie ¬ Maladie due au *B23.8, H35.0*
- SAI ¬ Seropositivité au *Z21*
- Sans précision ¬ Immunodéficience humaine virale [*B24*
- Sarcome
- - Immunoblastique ¬ Maladie par *B21, C83.3*
- - ¬ Maladie due au *B21*
- Sarcome de Kaposi ¬ Maladie due au *B21, C46.9*
- Sepsis ¬ Maladie due au *B20, A41.9*
- Splénomégalie ¬ Maladie due au *B23.8, R16.1*
- Strongyloïdose ¬ Maladie due au *B20, B78.9*
- Syndrome de dépérissement ¬ Maladie due au *B22*
- Thrombopénie
- - Secondaire ¬ Maladie due au *B23.8, D69.58*
- - ¬ Maladie due au *B23.8, D69.61*
- Toxoplasmose ¬ Maladie due au *B20, B58.98*
- Trouble

VIH *–suite*
- Trouble *–suite*
- - Hématologique ¬ Maladie par *B23.8*
- - Immunitaire ¬ Maladie par *B23.8*
- Tuberculose ¬ Maladie due au *B20, A16.9*
- Tumeur de Burkitt ¬ Maladie due au *B21, C83.7*
- Tumeur maligne
- - Tissu hématopoïétique NCA ¬ Maladie due au *B21, C96.9*
- - ¬ Maladie due au *B21*
- Virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: *Z11*
- Virus de l'immunodéficience humaine] ¬ Conseil: à propos du *Z71*
- ¬
- - Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [*Z21*
- - Maladie due au *B20, A07.2*
- - Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [*R75*
- - Prophylaxie avant exposition au *Z29.22*
- - Radiculite par maladie due au *B23.8, M54.19*
- - Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [*Z20.6*
- - Syndrome
- - - Infection aiguë par *B23.0*
- - - Microangiopathie
- - - - Conjonctive dû au *B23.8, M31.1*
- - - - Rétine dû au *B23.8, H35.0*

Viljoen
v./v.a. Winship-Viljoen-Leary

Villeuse ¬ Langue noir
- *K14.3*
- *K14.3*

Villonodulaire
- Pigmenté
- - Articulation du genou ¬ Synovite *M12.26*
- - Avant-bras ¬ Synovite *M12.23*
- - Bras ¬ Synovite *M12.22*
- - Colonne vertébrale ¬ Synovite *M12.28*
- - Cuisse ¬ Synovite *M12.25*
- - Jambe ¬ Synovite *M12.26*
- - Main ¬ Synovite *M12.24*
- - Pied ¬ Synovite *M12.27*
- - Région pelvienne ¬ Synovite *M12.25*
- - Région scapulaire ¬ Synovite *M12.21*
- - Sièges multiples ¬ Synovite *M12.20*
- - ¬ Synovite *M12.29*
- ¬ Synovite *M12.29*

Villositaire ¬ Syndrome de diarrhée chronique-atrophie *K52.8*

Vin
- Citerne cérébello-médullaire élargie-hydrocéphalie ¬ Syndrome de nævus en tache de *Q04.8, Q82.5*

Vin *–suite*
- Multiples familiaux ¬ Nævus en tache de *Q82.5*
- ¬
- - Autisme avec nævus facial lie de *F84.0, Q82.5*
- - Nævus: en tache de *Q82.5*
- - Néoplasie intraépithéliale de la vulve [*N90.3*

Vinca-alcaloïdes ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*

Vincent ¬
- Angine de *A69.1*
- Gingivite de *A69.1*
- Infections dites de *A69.1*

Vingt ongles ¬ Dystrophie des *L60.3*

Viol
- Abus sexuel allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un *Z04.5*
- ¬ *Y09.9!*

Violence
- Conjugale SAI ¬ *T74.1*
- Physique ¬ *R45.6*

Violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une mort *R96.1*

VIPome ¬
- *C25.4*
- *D48.9*

Viral
v./v.a. Type de maladie

Virémie ¬ *B34.9*

Virilisme (chez la femme) ¬ *E25*

Virostatiques
- Inhibiteurs de protéases ¬ Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux *U85!*
- ¬ Virus de l'Herpès résistants aux *U84!*

Virus
- BK ¬ Infection à *B34.4*
- Borna ¬ Encéphalite due aux *A85.8†, G05.1**
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B97.8!*
- Chikungunya ¬ Vaccination contre le *Z25.8*
- Coxsackie ¬
- - *B97.1!*
- - Infection SAI à *B34.1*
- Dengue ¬ Maladie à *A97.9*
- Ebola ¬
- - Fièvre hémorragique à *A98.4*
- - Maladie à *A98.4*
- ECHO ¬
- - *B97.1!*
- - Bronchite aiguë due à des *J20.7*
- - Infection SAI à *B34.1*
- - Méningite à *A87.0†, G02.0**
- Gamma ¬ Mononucléose due à herpès *B27.0*

Virus *–suite*
- Grippaux ¬ bronchopneumonie due à des virus autres que des *J12*
- Grippe saisonnière identifié ¬
- - Encéphalite lors de grippe [Influenza], *J10.8†, G05.1**
- - Encéphalopathie lors de grippe [Influenza], *J10.8†, G94.31**
- - Grippe [Influenza] avec otite, *J10.8†, H67.1**
- - Myocardite lors de grippe [Influenza], *J10.8†, I41.1**
- - Polio-encéphalite lors de grippe [Influenza], *J10.8†, G05.1**
- Hanta
- - Hantavirus] avec manifestations rénales ¬ Maladie à *A98.5†, N08.0**
- - Manifestations pulmonaires ¬ Maladie à *B33.4†*
- - SCPH] ¬ Syndrome cardio-pulmonaire à *B33.4†, J17.1**
- - ¬ Syndrome cardio-pulmonaire à *B33.4†, J17.1**
- Hendra
- - Encéphalite ¬ Infection au *A85.8*
- - ¬ Infection à *B33.8*
- Hépatite
- - D ¬ *B17.8*
- - ¬ Infection par le *B19.9*
- Hépatite B [AgHBs] ¬ Porteur de l'antigène de surface du *B18.13*
- Herpes
- - Simiae ¬
- - - Encéphalite à *B00.4†, G05.1**
- - - Encéphalomyélite à *B00.4†, G05.1**
- - Simplex ¬ Encéphalite à *B00.4†, G05.1**
- - ¬ Hépatite due au *B00.8†, K77.0**
- Herpès simplex ¬ Infection disséminée due à des *B00.78*
- Herpétique humain de type 5 ¬ Infection par le *B25.9*
- Humain type 2 alpha HSV-2 ¬ Dermite vésiculaire
- - Lèvre due au *B00.1*
- - Oreille due au *B00.1*
- Identifié
- - Associé à une pneumonie ¬ Infection au COVID-19, *J12.8, U07.1!*
- - ¬
- - - Complications de grossesse avec infection au COVID-19, *O98.5, U07.1!*
- - - COVID-19, *U07.1!*
- - - Grossesse avec infection au COVID-19, *O98.5, U07.1!*
- - - Infection à coronavirus-2019, *U07.1!*
- Immunodéficience humain] et autres maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [*Z11*
- Influenza
- - A, B et C identifié ¬ Grippe [Influenza], *J10.8*

Virus *–suite*
- Influenza *–suite*
- - Aviaire zoonotique pandémique identifié
- - - Associée
- - - - Encéphalite ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, G94.31*, U69.23!*
- - - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.23!*
- - - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.23!*
- - - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.23!*
- - - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.23!*
- - - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.23!*
- - - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, I41.1*, U69.23!*
- - - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, H67.1*, U69.23!*
- - - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.23!*
- - - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.23!*
- - - - ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.23!*
- - B ou C identifié ¬ Grippe [influenza], *J10.8*
- - Porcine
- - - Aviaire
- - - - Associée
- - - - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du *J09, U69.24!*
- - - - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du *J09, U69.24!*
- - - - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du *J09, U69.24!*
- - - - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du *J09, U69.24!*
- - - - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du *J09, U69.24!*
- - - - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - - - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du *J09†, H67.1*, U69.24!*

Virus *–suite*
- Influenza *–suite*
- - Porcine *–suite*
- - - Aviaire *–suite*
- - - - Associée *–suite*
- - - - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du *J09, U69.24!*
- - - - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du *J09, U69.24!*
- - - - - ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - - ¬ Grippe Influenza virus influenza zoonotique pandémique identifié
- - - - - Associée à une encéphalite, à l'exception du *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - - - Exception du *J09, U69.24!*
- - - Zoonotique pandémique identifié
- - - - Associée
- - - - - Encéphalite ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, G94.31*, U69.22!*
- - - - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.22!*
- - - - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.22!*
- - - - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.22!*
- - - - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.22!*
- - - - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.22!*
- - - - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, I41.1*, U69.22!*
- - - - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - - - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.22!*
- - - - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.22!*
- - - - - ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - - ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.22!*
- - Saisonnière identifié ¬
- - - Bronchopneumonie au cours de grippe [Influenza], *J10.0*
- - - Influenza avec pneumonie, *J10.0*
- - - Myocardite aiguë au cours de grippe [Influenza], *J10.8†, I41.1**
- - - Pneumonie grippale [Influenza], *J10.0*
- - - Vraie grippe [Influenza], *J10.1*
- - Zoonotique pandémique identifié
- - - Associée à une encéphalite, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - Exception virus influenza porcine aviaire
- - - - Associée

Virus *–suite*
- Influenza *–suite*
- - Zoonotique pandémique identifié *–suite*
- - - Exception virus influenza porcine aviaire *–suite*
- - - - Associée *–suite*
- - - - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.24!*
- - - - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.24!*
- - - - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.24!*
- - - - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.24!*
- - - - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.24!*
- - - - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - - - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.24!*
- - - - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.24!*
- - - - - ¬ Grippe [Influenza] à *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - - ¬ Grippe [Influenza] à *J09, U69.24!*
- - - ¬ Grippe
- - - - *J09*
- - - - Influenza
- - - - - Entérite, *J09*
- - - - - Épanchement pleural, *J09*
- - - - - Gastroentérite, *J09*
- - - - - Infection respiratoire supérieure, *J09*
- - - - - Laryngite, *J09*
- - - - - Méningisme, *J09*
- - - - - Pharyngite, *J09*
- - - - - Pneumonie, *J09*
- L 'hépatite C chez les transplantés hépatiques ¬ Manifestations hépatiques récurrentes causées par le *B18.2, Z94.4*
- Langat [LGTV] ¬ Encéphalite à *A84.8*
- Lent ¬ Maladie due au VIH avec infection à *B20, A81.9*
- Lymphotrope lymphocytes T humain
- - Type 1 HTLV-1 ¬
- - - Myélopathie due à une infection à *G04.1*
- - - Sujet porteur d'une infection à *Z22.6*
- - ¬ Myélopathie associée à un *G04.1*
- Maladie de Newcastle ¬ Conjonctivite à *B30.8†, H13.1**
- Mengo ¬ Encéphalite à *A85.8†, G05.1**
- Nipah ¬ Maladie à *A85.8*
- Non identifié ¬
- - COVID-19, *U07.2!*
- - Grippe
- - - Manifestation

Virus *–suite*
- Non identifié ¬ *–suite*
- - Grippe *–suite*
- - - Manifestation *–suite*
- - - - *J11.8*
- - - - Respiratoires, *J11.1*
- - - Pneumonie, *J11.0*
- - Grossesse avec infection au COVID-19, *O98.5, U07.2!*
- - Infection à coronavirus-2019, *U07.2!*
- O'nyong-nyong ¬ Fièvre due au *A92.1*
- Paragrippaux ¬
- - Bronchite aiguë due aux *J20.4*
- - Pneumonie due aux *J12.2*
- Parainfluenza ¬ Infection à *B34.88*
- Poliomyélite ¬
- - Encéphalite due au *A80.9†, G05.1**
- - Méningite due
- - - *A80.9†, G01**
- - - *A80.9†, G02.0**
- Précisées ¬ Autres maladies à *B33.8*
- Respiratoire syncytial
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.4!*
- - VRS ¬
- - - Bronchiolite aiguë due au *J21.0*
- - - Bronchite aiguë due au *J20.5*
- - - Pneumonie congénitale à *P23.0*
- - - Pneumonie due au *J12.1*
- - - Vaccination contre le *Z25.8*
- - ¬ Infection due au *J12.1*
- Rocio ¬ Maladie à *A83.6*
- Rubéole ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par: *O35.3*
- SAI ¬
- - Encéphalomyélite à *A86*
- - Méningo-encéphalite à *A86*
- Sauvage
- - Importé ¬ Poliomyélite paralytique, *A80.1*
- - Indigène ¬ Poliomyélite paralytique, *A80.2*
- Sin Nombre ¬ Maladie du *B33.4†, J17.1**
- Spécifique
- - Non identifié ¬
- - - Broncho)pneumonie virale, sans précision ou *J11.0*
- - - Encéphalopathie grippale sans précision ou *J11.8*
- - - Épanchement pleural grippal sans précision ou *J11.1*
- - - Gastroentérite grippale sans précision ou *J11.8*
- - - Infection grippale des voies respiratoires supérieures sans précision ou *J11.1*
- - - Laryngite grippale sans précision ou *J11.1*
- - - Myocardite (aiguë) grippale sans précision ou *J11.8*

Virus *–suite*
- Spécifique *–suite*
- - Non identifié ¬ *–suite*
- - - Pharyngite grippale sans précision ou *J11.1*
- - ¬ Grippe
- - - Sans mention d'identification d'un *J11*
- - - Virale sans mention d'identification d'un *J11*
- Tanapox ¬ Syndrome du *B08.8*
- T-lymphotrope humain de type I ¬ Dermatite infectieuse associée au *L30.3*
- Transmise par des moustiques ¬ Méningo-encéphalite à *A83*
- Vaccinal ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, associée au *A80.0*
- Vaccine ¬ Infection par le *B08.0*
- Varicelle zona ¬
- - Antécédents personnels d'infection à VZV [*Z86.1*
- - Paralysie faciale liée à l'infection par le *B02.2†, G53.0**
- Varicelle-zona ¬
- - Encéphalite due au VZV [*B02.0†, G05.1**
- - Méningite due au VZV [*B02.1†, G02.0**
- Virus grippaux ¬ bronchopneumonie due à des *J12*
- West-Nile ¬ Fièvre due au *A92.3*

Virus Coxsackie
- A24 ¬ Conjonctivite à *B30.3†, H13.1**
- ¬
- - Bronchite aiguë due au *J20.3*
- - Cardite à *B33.2†, I52.1**
- - Endocardite à *B33.2†, I39.8**
- - Hépatite à *B33.8†, K77.0**
- - Méningite à *A87.0†, G02.0**
- - Myocardite à *B33.2†, I41.1**
- - Péricardite à *B33.2†, I32.1**

Virus d'Epstein-Barr
- Déficit
- - CD137 ¬ Maladie lymphoprolifération associée à l'EBV [*D82.3*
- - PRKCD ¬ Maladie lymphoprolifération associée à l'EBV [*D82.3*
- - RASGRP1 ¬ Maladie lymphoprolifération associée à l'EBV [*D82.3*
- - TET2 ¬ Maladie lymphoprolifération associée à l'EBV [*D82.3*
- EBV
- - Personnes âgées ¬ Lymphome B diffus à grandes cellules positif au *C83.3*
- - ¬ Lymphome B diffus à grandes cellules positif au *C83.3*
- Enfant ¬ Maladie lymphoprolifération systémique à cellules T positive au *D82.3*
- ¬
- - Carcinome
- - - Cardia associé au *C16.0*
- - - Corps de l'estomac associé au *C16.2*

Virus d'Epstein-Barr *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carcinome *–suite*
- - - Gastrique associé au *C16.9*
- - Colite à *B27.0†, K93.8**
- - Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au *D82.3*
- - Duodénite à *B27.0†, K93.8**
- - Gastrite à *B27.0†, K93.8**
- - Iléite à *B27.0†, K93.8**
- - Infection congénitale au *P35.8*
- - Maladie
- - - Glomérulaire à *B27.0†, N08.0**
- - - Reins à *B27.0†, N29.1**
- - - Rénale tubulo-interstitielle à *B27.0†, N16.0**
- - - Urètre à *B27.0†, N29.1**
- - - Vessie à *B27.0†, N33.8**
- - Mononucléose due au *B27.0*
- - Œsophagite à *B27.0†, K23.8**
- - Pneumonie à *B27.0†, J17.1**
- - Séquelle mononucléose
- - - Due au *B94.81*
- - - Infectieuse due au *B94.81*
- - Syndrome d'infection chronique au *B27.0*
- - Urétrite à *B27.0†, N37.0**

Virus d'influenza saisonnière identifié ¬
- Broncho)pneumopathie grippale, *J10.0*
- Encéphalopathie grippale à *J10.8*
- Entérite au cours de la grippe [influenza], *J10.8*
- Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], *J10.1*
- Gastroentérite
- - Cours de la grippe [influenza], *J10.8*
- - Grippale à *J10.8*
- Grippe
- - *J10.1*
- - Épanchement pleural grippal à *J10.1*
- - Épidémique [influenza], *J10.1*
- - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à *J10.1*
- - Influenza
- - - *J10.1*
- - - Hautement fébrile, *J10.1*
- - - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, *J10.1*
- - - Laryngite, *J10.1*
- - - Pharyngite, *J10.1*
- - Laryngite grippale à *J10.1*
- - Manifestation
- - - *J10.8*
- - - Respiratoires, *J10.1*
- - Pharyngite grippale à *J10.1*
- - Pneumonie, *J10.0*
- Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à *J10.1*

Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *–suite*
- Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], *J10.8*
- Myocardite (aiguë) grippale à *J10.8*

Virus de l'herpès
- Gamma ¬
- - Hépatite au cours de mononucléose à *B27.0†, K77.0**
- - Hépatomégalie au cours de mononucléose à *B27.0†, K77.0**
- - Séquelle mononucléose
- - - Due au *B94.81*
- - - Infectieuse due au *B94.81*
- Herpes simplex] ¬ Otite externe au cours de l'infection due au *B00.1†, H62.1**
- Résistants aux virostatiques ¬ *U84!*
- Simplex ¬
- - Affections oculaires due au *B00.5†, H58.8**
- - Infection congénitale au *P35.2*
- - Méningite due au *B00.3†, G02.0**
- ¬
- - Affections oculaires dues au *B00.5†, H58.8**
- - Balanite due au *A60.0†, N51.2**
- - Cervicite due au *A60.0†, N74.8**
- - Colite à *B00.8†, K93.8**
- - Conjonctivite due au *B00.5†, H13.1**
- - Dermite
- - - Paupière due au *B00.5†, H03.1**
- - - Vésiculaire due au *B00.1*
- - Duodénite à *B00.8†, K93.8**
- - Encéphalite due au *B00.4†, G05.1**
- - Épididymite due au *A60.0†, N51.1**
- - Formes d'infection due au *B00.8*
- - Gastrite à *B00.8†, K93.8**
- - Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au *B00.2*
- - Iléite à *B00.8†, K93.8**
- - Infection
- - - Appareil génital de l'homme par le *A60.0†, N51.8**
- - - Marge cutanée de l'anus et du rectum, par le *A60.1*
- - - Organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le *A60.0*
- - Iridocyclite due au *B00.5†, H22.0**
- - Iritis due au *B00.5†, H22.0**
- - Kératite due au *B00.5†, H19.1**
- - Kératoconjonctivite due au *B00.5†, H19.1**
- - Maladie
- - - Disséminée due au *B00.78*
- - - Glomérulaire à *B00.8†, N08.0**
- - - Reins à *B00.8†, N29.1**
- - - Rénale tubulo-interstitielle à *B00.8†, N16.0**
- - - Urètre à *B00.8†, N29.1**
- - - Vessie à *B00.8†, N33.8**

Virus de l'herpès *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Méningite due au *B00.3†, G02.0**
- - Méningo-encéphalite à *B00.4†, G05.1**
- - Myélite à *B00.4†, G05.1**
- - Orchite due au *A60.0†, N51.1**
- - Pharyngite due au *B00.2*
- - Pneumonie à *B00.8†, J17.1**
- - Proctite due au *A60.1†, K93.8**
- - Prostatite due au *A60.0†, N51.0**
- - Septicémie due au *B00.70*
- - Ulcère de la vulve dû au *A60.0†, N77.0**
- - Urétrite à *B00.8†, N37.0**
- - Uvéite due au *B00.5†, H22.0**
- - Vaginite due au *A60.0†, N77.1**
- - Vulvite due au *A60.0†, N77.1**
- - Vulvo-vaginite due au *A60.0†, N77.1**

Virus de l'immunodéficience humaine
- Résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases ¬ *U85!*
- VIH
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladie due au *O98.7*
- - ¬
- - - Infection asymptomatique par le *Z21*
- - - Mise en évidence par des examens de laboratoire du *R75*
- - - Sujets en contact avec et exposés au *Z20.6*
- ¬ Conseil: à propos du VIH [*Z71*

Virus de la grippe aviaire zoonotique pandémique identifié ¬ Grippe Influenza
- Encéphalite, *J09†, G05.1**
- Encéphalopathie, *J09†, G94.31**
- Myocardite, *J09†, I41.1**
- Otite moyenne, *J09†, H67.1**
- Polio-encéphalite, *J09†, G05.1**

Virus Hanta
v./v.a. Hantavirus

Virus Zika
- Contractée mère ¬
- - Fœtus affecté par la maladie à *P00.2*
- - Nouveau-né affecté par la maladie à *P00.2*
- ¬
- - Fièvre à *A92.5*
- - Infection à *A92.5*
- - Maladie
- - - *A92.5*
- - - Congénitale à *P35.4*
- - Microcéphalie due à la maladie congénitale à *P35.4*

Vis ¬ Enlèvement de: *Z47.0*

Visage
- Exception des yeux) ¬ Nævus d'Ota sur la peau du *D22.3*
- Grimaçant-doigts longs ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-trouble du langage-strabisme- *Q87.8*

Visage *–suite*
- Perte de poids ¬ Affaissement de la peau du *L98.7*
- Planovalgus ¬ Syndrome de déficience intellectuelle sévère-hypotonie-strabisme-traits grossiers du *Q87.8*
- SAI ¬
- - *S01.80*
- - *S02.9*
- Surdité neurosensorielle-dysplasie rhizomélique ¬ Syndrome autosomique dominant de myopie-retrusion du *Q87.0*
- ¬
- - Gangrène du *A69.0*
- - Paralysie idiopathique du *G51.0*
- - Syringocystadénome papillifère de la peau du *D23.3*
- - Trichodiscome multiple familial du *D23.3*

Viscéral
- Anomalies cérébrales-dysmorphie-retard du développement ¬ Syndrome de neuropathie *Q87.8*
- Congénitale précoce ¬ Syphilis *A50.0*
- Familiale ¬ Myopathie *Q87.8*
- Secondaire NCA ¬ Syphilis *A51.4*
- ¬
- - Herpès *B00.8†, K93.8**
- - Larva migrans *B83.0*
- - Leishmaniose *B55.0*
- - Paracoccidioïdomycose *B41.8*

Viscères
- Abdominale ¬ Transposition des *Q89.3*
- Thoracique ¬ Transposition des *Q89.3*
- ¬
- - Situs inversus ou transversus total des *Q89.3*
- - Syphilis secondaire des *A51.4†, K93.8**
- - Transposition
- - - Cœur avec inversion totale des *Q89.3*
- - - Estomac avec inversion totale des *Q89.3*
- - Tuberculose miliaire des *A18.3†, K93.0**

Viscosité plasmatique anormale ¬ *R70.1*

Visible ¬ Exposition à : lumière artificielle *W91.9!*

Vision
- Binoculaire
- - Non précisée ¬ Atteinte de la *H54.9*
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - Légère de la *H54.3*
- - - - Modérée de la *H54.2*
- - - - Sévère de la *H54.1*
- - - Cécité et forte baisse de la *H54.0*
- - - Disparition de la *H53.3*
- - - Troubles de la *H53.3*
- Couleur ¬
- - Incapacité acquise de la *H53.5*
- - Troubles de la *H53.5*

Vision *–suite*
- Double ¬ *H53.2*
- Floue au cours d'hystérie ¬ *F44.6†, H58.1**
- Monoculaire ¬
- - Atteinte
- - - Moyennement sévère de la *H54.6*
- - - Sévère de la *H54.5*
- - Cécité et forte baisse de la *H54.4*
- Orthoptique] ¬ Education de la *Z50.6!*
- Sans précision ¬ Trouble de la *H53.9*
- Stéréoscopique ¬ Fusion avec anomalie de la *H53.3*
- ¬
- - Examen des yeux et de la *Z01.0*
- - Maladie due au VIH avec faible *B23.8, H54.0*
- - Perte subite de la *H53.1*
- - Troubles
- - - *H53.8*
- - - Subjectifs de la *H53.1*

Visuel
- Atrophie cérébelleuse progressive-hypotonie axiale ¬ Syndrome de retard global de développement-anomalies *G31.88*
- ¬
- - Affections du cortex *H47.6*
- - Anomalies du champ *H53.4*
- - Cortex *S04.0*
- - Hallucinations *R44.1*
- - Halos *H53.1*
- - Rétrécissement généralisé du champ *H53.4*
- - Syndrome de neige *H53.1*
- - Trouble cérébral du traitement *H47.6*

Visuellement ¬ Anomalies (de): potentiels évoqués *R94.1*

Visuo-spatiale ¬ Négligence *R29.5*

Vital
- Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F32.2*
- Fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un danger *F62.0*
- Nourrisson ¬ Événement aigu constituant un risque *R06.80*
- Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F33.2*
- ¬ Diminution de la capacité: *R94.2*

Vitalité ¬ Perte de *R53.9*

Vitamine
v./v.a. Pseudovitamine
- A
- - Cicatrice
- - - Cornée ¬ Carence en *E50.6†, H19.8**
- - - Xérophtalmique de la cornée ¬ Carence en *E50.6†, H19.8**
- - Hypercarotinémie héréditaire ¬ Déficit en *E67.1, E50.9*

Vitamine *–suite*
- A *–suite*
- - Kératite xérotique ¬ Carence en *E50.4†*, *H19.3**
- - Kératose ¬ Carence en *E50.8†*, *L86**
- - Xérophtalmie ¬ Carence en *E50.7†*, *H19.8**
- B ¬
- - Encéphalopathie au cours de carence en *E53.9†*, *G32.8**
- - Glossite de Möller Hunter due à une carence en *E53.9†*, *K93.8**
- - Pellagre par déficit en *E52*
- - Polyneuropathie au cours de carence en *E53.9†*, *G63.4**
- - Stomatite angulaire due à une carence en *E53.9†*, *K93.8**
- B12
- - Due
- - - Carence en facteur intrinsèque ¬ Anémie par carence en *D51.0*
- - - Malabsorption sélective de la vitamine B12 avec protéinurie ¬ Anémie par carence en *D51.1*
- - Protéinurie ¬ Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la *D51.1*
- - Sans précision ¬ Anémie par carence en *D51.9*
- - Type
- - - CblA ¬ Acidurie méthylmalonique sensible à la *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidémie méthylmalonique sensible à la *E71.1*
- - ¬
- - - Acidémie méthylmalonique
- - - - Résistante à la *E71.1*
- - - - Sensible à la *E71.1*
- - - Acidurie méthylmalonique
- - - - Résistante à la *E71.1*
- - - - Sensible à la *E71.1*
- - - Anémie par carence
- - - - *D51.8*
- - - - Alimentaire en *D51.3*
- - - Dégénérescence cérébrale au cours de carence en *E53.8†*, *G32.8**
- - - Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de carence en *E53.8†*, *G32.0**
- - - Démence au cours de carence en *E53.8†*, *F02.8**
- - - Myélopathie au cours de carence en *E53.8†*, *G32.0**
- - - Neuropathie au cours de carence en *E53.8†*, *G63.4**
- - - Polyneuropathie cours
- - - - Anémie par carence alimentaire en *D51.3†*, *G63.4**
- - - - Carence en *E53.8†*, *G63.4**
- B2 ¬
- - Cheilose au cours de carence en *E53.0†*, *K93.8**

Vitamine *–suite*
- B2 ¬ *–suite*
- - Perlèche au cours de carence en *E53.0†*, *K93.8**
- - Stomatite angulaire due à une carence en *E53.0†*, *K93.8**
- B6-dépendante ¬ Épilepsie *G40.8*
- C ¬ Carence en *E54*
- D
- - Dépendant ¬ Rachitisme hypocalcémique *E83.31*
- - Sans précision ¬ Carence en *E55.9*
- - Type
- - - I] ¬ Anomalie de la synthèse de la *E83.31*
- - - II ¬
- - - - Anomalie des récepteurs de la *E83.31*
- - - - Rachitisme résistant à la *E83.30†*, *M90.89**
- - ¬ Ostéomalacie résistante à la *E83.30†*, *M90.89**
- E ¬
- - Ataxie par déficit en *G11.1*
- - Carence en *E56.0*
- K
- - Coagulants ¬ Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, *T45.7*
- - Dépendants ¬ Maladie de type pseudoxanthome élastique associée à un déficit en facteurs de coagulation *D68.28*, *Q82.8*
- - ¬
- - - Carence
- - - - *E56.1*
- - - - Nouveau-né en *P53*
- - - Déficit héréditaire combiné en facteurs de la coagulation dépendants de la *D68.28*
- - - Hémorragie sous utilisation à long terme des coumarines (antagonistes de la *D68.33*
- - - Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la *D68.33*
- Non classées ailleurs ¬ Intoxication: *T45.2*
- ¬
- - Abus de: *F55*
- - Atrophie optique au cours de carence en *E56.9†*, *H48.0**
- - Carence en autres *E56.8*
- - Encéphalopathie au cours de carence en *E56.9†*, *G32.8**
- - Polyneuropathie au cours de carence en *E56.9†*, *G63.4**
- - Polynévrite au cours de carence en *E56.9†*, *G63.4**
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.4*

Vitelliforme
- Adulte ¬ Dégénérescence maculaire *H35.5*
- ¬ Dystrophie: rétinienne (pigmentaire) (ponctuée albescente) (*H35.5*

Vitellin
- Femme ¬ Tumeur polyvésiculaire du sac *C56*
- Homme ¬ Tumeur polyvésiculaire du sac *C62.9*
- Région pinéale ¬ Tumeur du sac *C75.3*
- Système nerveux central ¬ Tumeur du sac *C72.9*
- Testicule
- - Descendu ¬ Tumeur du sac *C62.1*
- - Non descendu ¬ Tumeur du sac *C62.0*
- Ventricule cérébral ¬ Tumeur du sac *C71.5*
- ¬ Persistance du canal *Q43.0*

Vitesse
- Conduction nerveuse lié à ARHGEF10, forme autosomique dominante ¬ Ralentissement de la *G60.0*
- Sédimentation ¬ Accélération de la *R70.0*

Vitiligo
v./v.a. surdité-vitiligo-achalasie
- Paupière ¬ *H02.7*
- ¬ *L80*

Vitré
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Hémorragie du corps *H45.0**
- Globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du corps *H45.8**
- Primaire hyperplasique persistant et colobome ¬ Syndrome microcornéen avec lenticône postérieur, *Q15.8*
- Primitif persistant hyperplasique ¬ *Q14.0*
- Sans précision ¬ Affection du corps *H43.9*
- ¬
- - Abcès du corps *H44.0*
- - Affections du corps *H43.8*
- - Décollement du corps *H43.8*
- - Dégénérescence du corps *H43.8*
- - Hémorragie du corps *H43.1*
- - Hernie du corps *H43.0*
- - Malformation congénitale du corps *Q14.0*
- - Opacité
- - - Congénitale du corps *Q14.0*
- - - Corps *H43.3*
- - - Cristallines du corps *H43.2*
- - Prolapsus du corps *H43.0*
- - Rétention ancienne corps étranger
- - - Magnétique dans: corps: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: corps: *H44.7*
- - Syndrome du corps *H59.0*
- - Syphilis tardive
- - - Corps *A52.7†*, *H45.8**
- - - Hémorragie du corps *A52.7†*, *H45.0**

Vitréo-maculaire ¬ Traction *H35.38*

Vitréo-rétinien
- Flocons de neige ¬ Dégénérescence *H35.5*
- Wagner ¬ Dégénérescence *H35.5*
- ¬ Dystrophie

Vitréo-rétinien *–suite*
- ¬ Dystrophie *–suite*
- - *H35.5*
- - *H35.5*

Vitréo-rétino-choroïdopathie autosomique dominante ¬ *H35.5*

Vitréo-rétinopathie
- Exsudative familiale ¬ *H35.0*
- Inflammatoire néovasculaire autosomique dominante ¬ *H35.2*
- Prolifèrant
- - Décollement de la rétine ¬ *H33.4*
- - ¬ *H35.2*

Vitreuse
v./v.a. Carcinome à cellules vitreuses

Vivant
- Mort-né ¬ Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né *Z37.3!*
- SAI ¬ Enfant né *Z38.2*
- Seule ¬ Personne *Z60*
- ¬ Naissance
- - Gémellaire, jumeaux nés *Z37.2!*
- - Multiples
- - - Certains enfants nés *Z37.6!*
- - - Tous nés *Z37.5!*
- - Unique, enfant *Z37.0!*

Vivax
- Complications NCA ¬ Paludisme à Plasmodium *B51.8*
- Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum ¬ infections mixtes à Plasmodium *B51*
- Rupture de la rate ¬ Paludisme à Plasmodium *B51.0†, D77**
- Sans complication ¬ Paludisme à Plasmodium *B51.9*
- ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium *B52*

Viverrini ¬ Infection par Opisthorchis *B66.0*

VLCADD ¬ *E71.3*

VLDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de très basse densité [*E78.1*

V-MCJ [Maladie de Creutzfeldt-Jakob variante] ¬ *A81.0*

Vocal
- Chronique ¬ Tic moteur ou *F95.1*
- Tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics *F95.2*

Voerner ¬ Kératodermie palmoplantaire érythrodermique diffuse type *Q82.8*

Vogt
v./v.a. Stock-Spielmeyer-Vogt
- ¬
- - Atrésie œsophage type
- - - 1 selon *Q39.0*
- - - 2 selon *Q39.0*
- - - 3a selon *Q39.1*
- - - 3b selon *Q39.1*

Vogt *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Atrésie œsophage type *–suite*
- - - 3c selon *Q39.1*
- - Fistule trachéo-œsophagienne congénitale de type H sans atrésie de type 4 selon *Q39.2*
- - Maladie Spielmeyer
- - - *E75.4*
- - - *E75.4*

Vohwinkel ¬ Syndrome de *Q82.8*

Voie
- Biosynthèse sérine forme
- - Infantile ¬ Déficit de la *E72.8*
- - Juvénile ¬ Déficit de la *E72.8*
- Chirurgicale ¬ Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par *Z95.81*
- Fait agression
- - Agent chimique ¬ *Y09.9!*
- - Armes ¬ *Y09.9!*
- - Médicament ¬ *Y09.9!*
- - ¬ *Y09.9!*
- Générale ¬ Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par *T36.7*
- Génitales, après accouchement ¬ Autres infections des *O86.1*
- Hexose monophosphate HMP ¬ Anémie due déficit enzymatique
- - *D55.1*
- - Excepté G6PD, de la *D55.1*
- Interne ¬ Dermite due substance
- - Non précisée prise par *L27.9*
- - Prises par *L27.8*
- Intraveineuse ¬ Consommation
- - Héroïne par *U69.30!*
- - Substances psycho-actives par *U69.32!*
- Kennedy ¬ Paraplégie spastique complexe autosomique récessive par dysfonctionnement de la *G11.4*
- Leptine-mélanocortine ¬ Obésité monogénique due à une anomalie de la *E66.89*
- Non intraveineuse ¬ Consommation d'héroïne par *U69.31!*
- Orale ¬ Périodes off de la maladie de Parkinson ne répondant pas aux traitements par *G20.91*
- Placentaire ¬ effets non tératogènes de substances transmises par *P04*
- Respiratoire créée par la trachéotomie ¬ Obstruction de la *J95.02*
- Sexuel
- - Localisations ¬ Infection à Chlamydia transmise par *A56.8*
- - ¬ Infections à Chlamydia trachomatis transmises par *A56*
- Supérieures ¬ Carcinome urothélial des *C68.9*
- Transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par *Z95.88*

Voie *–suite*
- Urétrale ¬ Fausse *N36.0*

Voie aérienne
- Due poussière
- - Coton ¬ Affection des *J66.0*
- - Organiques précisées ¬ Affection des *J66.8*
- SAI ¬ Maladie: chronique obstructive des *J44.9*
- Supérieures] ¬ CHAOS [Syndrome congénital d'obstruction des *Q34.8*
- VEF1
- - 35
- - - 50 % de la norme ¬ Maladie chronique obstructive des *J44.91*
- - - Norme ¬ Maladie chronique obstructive des *J44.90*
- - 50 % et < 70 % de la norme ¬ Maladie chronique obstructive des *J44.92*
- - 70 % de la norme ¬ Maladie chronique obstructive des *J44.93*

Voie biliaire
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la vésicule biliaire et des *K87.0**
- Extra-hépatique
- - Vésicule biliaire ¬ Tumeur bénigne: *D13.5*
- - ¬
- - - Adénocarcinome de la *C24.0*
- - - Carcinome épidermoïde des *C24.0*
- Extra-hépatiques ¬
- - Adénocarcinome de la vésicule biliaire et des *C23, C24.0*
- - Carcinome épidermoïde de la vésicule biliaire et des *C23, C24.0*
- Induite par la kétamine ¬ Dilatation des *K83.8, F13.1*
- Intra et extrahépatiques ¬ Carcinome des *C24.8*
- Intrahépatique ¬
- - *D13.4*
- - Adénocarcinome du foie et des *C22.0, C22.1*
- - Carcinome du foie et des *C22.0, C22.1*
- - Carcinome épidermoïde du foie et des *C22.0, C22.1*
- - Carcinome indifférencié du foie et des *C22.9, C22.1*
- - Cystadénome des *D13.4*
- - Tumeur de Klatskin avec atteinte des *C24.8*
- - Tumeur maligne secondaire du foie et des *C78.7*
- SAI ¬ Malformation congénitale des *Q44.5*
- Sans précision ¬ Maladie des *K83.9*
- Syndromique due
- - Monosomie 20p12 ¬ Paucité des *Q44.7*
- - Mutation ponctuelle de JAG1 ¬ Paucité des *Q44.7*
- ¬
- - Atrésie des *Q44.2*

Voie biliaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Carcinoma in situ: Foie, vésicule et *D01.5*
- - Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les *T85.53*
- - Distomiase des *B66.3†, K87.0**
- - Fistule des *K83.3*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la vésicule et des *K91.81*
- - Maladies précisées des *K83.8*
- - Malformations congénitales des *Q44.5*
- - Obstruction des *K83.1*
- - Perforation des *K83.2*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des *R93.2*
- - Sténose
- - - Post-opératoire des *K91.84*
- - - Rétrécissement congénitaux des *Q44.3*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des *C24.8*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et *D37.6*

Voie digestive
- Basses ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: *F45.32*
- Inférieures, n.c.a. ¬ Anomalie congénitale des *Q43.9*
- Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les *T18.9*
- SAI ¬ Absence (complète) (partielle) des *Q45.8*
- Stade
- - 1 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.05†, K93.31**
- - 2 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.06†, K93.32**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.07†, K93.33**
- Supérieures
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q40.9*
- - ¬
- - - Anomalie congénitale
- - - - *Q40.9*
- - - - SAI des *Q40.9*
- - - Malformations congénitales précisées des *Q40.8*
- ¬
- - Brûlure d'autres parties des *T28.2*
- - Corps étranger de localisations autres et multiples dans les *T18.8*
- - Corrosion d'autres parties des *T28.7*
- - Insuffisance d'une anastomose dans les *K91.83*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des *R93.3*
- - Spasme psychogène des *F45.32*

Voie génito-urinaire
- Accouchement ¬ Autres infections des *O86.3*
- Femme SAI ¬ *C57.9*
- Homme SAI ¬ *C63.9*
- Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les *T19.9*
- SAI ¬ Infection puerpérale des *O86.3*
- ¬ Corps étranger de localisations autres et multiples dans les *T19.8*

Voie lacrymale ¬
- Inflammation
- - Aiguë et sans précision des *H04.3*
- - Chronique des *H04.4*
- Lésions des *H04.6*
- Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire avec ou sans atteinte des *S01.1*
- Sténose et insuffisance des *H04.5*

Voie optique
- Corps genouillés et des radiations optiques de Gratiolet ¬ Affections des *H47.5*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du nerf et des *H48.8**
- Sans précision ¬ Affection des *H47.7*
- ¬
- - Affections des autres *H47.5*
- - Dysplasie du septum et des *Q04.4*
- - Gliome des *D33.3*
- - Lésion traumatique du nerf et des *S04.0*

Voie respiratoire
- Actes médicaux ¬ Autres maladies des *J95.88*
- Alvéolite allergique ¬ Obstruction des *J67.90*
- Consécutive à une trachéotomie ¬ Obstruction des *J95.02*
- Cours
- - Sporotrichose ¬ Maladie des *B42.0†, J99.8**
- - Syphilis ¬ Maladie des *A52.7†, J99.8**
- Inférieures
- - Aiguë SAI ¬ Infection respiratoire (*J22*
- - Sans précision ¬ Infections aiguës des *J22*
- - VEF1
- - - 35
- - - - 50 % de la norme ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des *J44.01*
- - - - Norme ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des *J44.00*
- - - 50 % et < 70 % de la norme ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des *J44.02*
- - - 70 % de la norme ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des *J44.03*
- - ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des *J44.0*
- Non classée ailleurs ¬ Infection des *J98.7*

Voie respiratoire *–suite*
- Partie non précisée ¬
- - Brûlure des *T27.3*
- - Corps étranger dans les *T17.9*
- - Corrosion des *T27.7*
- SAI ¬ *C39.9*
- Sans précision ¬
- - Hémorragie des *R04.9*
- - Séquelles de tuberculose des *B90.9*
- Supérieures
- - Affection aiguë ¬ *J06.9*
- - Due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs ¬ Inflammation des *J68.2*
- - Infection SAI ¬ *J06.9*
- - Localisation non précisée ¬ Réaction d'hypersensibilité des *J39.3*
- - Localisations multiples ¬ Autres infections aiguës des *J06.8*
- - Partie non précisée ¬ Tumeur maligne: *C39.0*
- - Précisées ¬ Autres maladies des *J39.8*
- - Sans précision
- - - Virus spécifique non identifié ¬ Infection grippale des *J11.1*
- - - ¬
- - - - Infection des *J06.9*
- - - - Maladie des *J39.9*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬
- - - Grippe
- - - - Infection aiguë des *J10.1*
- - - - Influenza] avec infection aiguë des *J10.1*
- - - Infection aiguë des *J10.1*
- - ¬
- - - Fibrose sous-muqueuse des *J39.88*
- - - Grippe Influenza virus influenza
- - - - Aviaire zoonotique ou pandémique identifié, associée à une infection des *J09, U69.23!*
- - - - Porcine zoonotique ou pandémique identifié, associée à une infection des *J09, U69.22!*
- - - - Zoonotique ou pandémique identifié, à l'exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire, associée à une infection des *J09, U69.24!*
- - - Maladies précisées des *J39.88*
- ¬
- - Brûlure d'autres parties des *T27.2*
- - Corps étranger de localisations autres et multiples dans les *T17.8*
- - Corrosion d'autres parties des *T27.6*
- - Hémorragie d'autres parties des *R04.8*
- - Séquelles de corps étranger dans les *T98.0*
- - Syndrome réactionnel de dysfonction des *J68.3*
- - Syphilis tardive des *A52.7†, J99.8**

Voie urinaire
- Accouchement ¬ Infection des *O86.2*
- Associé à PBX1 ¬ Syndrome d'anomalies congénitales du rein et des *Q64.9*
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Calcul des *N22.8**
- Entérocoques ¬ Infection des *N39.0, B95.2!*
- Escherichia coli ¬ Infection des *N39.0, B96.2!*
- Inférieures
- - Sans précision ¬ Calcul des *N21.9*
- - ¬ Autres calculs des *N21.8*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des *P00.1*
- Pseudomonas ¬ Infection des *N39.0, B96.5!*
- Siège non précisé ¬ Infection des *N39.0*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Infection des *O08.8*
- ¬
- - Absence acquise d'autres organes des *Z90.6*
- - Antécédents familiaux de tumeur maligne des *Z80.5*
- - Antécédents personnels de tumeur maligne des *Z85.5*
- - Infection néonatale des *P39.3*
- - Surveillance d'autres stomies des *Z43.6*

Voie vaginale
- Césarienne ¬ Accouchement par *O75.7*
- Enfant unique ¬ Naissance spontanée par *O80*
- ¬ Prélèvement placentaire (par *Z36.0*

Voile palais
- Fente labial
- - Bilatérale ¬ Fente
- - - *Q37.2*
- - - Voûte et du *Q37.4*
- - SAI ¬ Fente
- - - *Q37.3*
- - - Voûte et du *Q37.5*
- - Unilatérale ¬ Fente
- - - *Q37.3*
- - - Voûte et du *Q37.5*
- ¬
- - Carcinome basocellulaire du *C05.1*
- - Fente
- - - *Q35.3*
- - - Médiane du *Q35.3*
- - - Voûte et du *Q35.5*
- - Gomme du *A52.7†, K93.8**
- - Malformation de la fente de la voûte et du *Q35.5*
- - Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du *C11.3*
- - Perforation du *Q35.3*
- - Tumeur maligne: *C05.1*

Voisins, les locataires et le propriétaire ¬ Désaccord avec les *Z59*

Voiture ¬ Accident de *V99!*

Voix
- Nasonnée, dysmorphie craniofaciale et anomalies squelettiques ¬ Syndrome de déficience intellectuelle avec *Q87.0*
- Non précisés ¬ Troubles de la *R49.8*
- Parole et du langage] ¬ Traitement logopédique [rééducation de la *Z50.5!*
- Surdité ¬ Syndrome de neuropathie périphérique-myopathie-raucité de la *G60.0*
- ¬ Perte de la *R49.1*

Vol
- Étalage sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- Groupe ¬ *F91.2*
- Kleptomanie] ¬ Tendance pathologique à commettre des *F63.2*
- Vasculaire après la mise en place d'un shunt pour la dialyse ¬ Syndrome de *I97.89*

Volaire ¬ Ligament *S63.4*

Volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants *F18*

Volet costal ¬ *S22.5*

Volhynie ¬ Fièvre de *A79.0*

Volkmann
- Rétraction musculaire ischémique] ¬ Syndrome de *T79.60*
- Tant que complication de blessure ¬ Paralysie ischémique de *T79.60*
- ¬ Paralysie de *T79.60*

Volume
- Forme des dents ¬ Anomalies de *K00.2*
- Parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du *E88.22*
- Plasma ou du liquide extracellulaire ¬ Déplétion du *E86*
- Plasmatique ¬ Polycythémie: due à: chute du *D75.1*
- SAI ¬ Anomalie des hématies (de): *R71*
- Ventriculaire nouveau-né ¬ Hémorragie ventriculaire
- - Légère à modérée de moins de 50 % du *P52.1*
- - Sévère de 50 % ou plus du *P52.2*

Volumineuses ¬ Selles *R19.5*

Volvulus
- Nouveau-né ¬ *P76.8*
- ¬
- - *K56.2*
- - Syndrome de l'intestin court dû à un *K91.2, K56.2*

Vomer ¬
- *D16.42*
- Ostéoblastome du *D16.42*
- Sarcome du *C41.02*

Vomissement
- Associés à d'autres perturbations psychologiques ¬ *F50.5*

Vomissement *–suite*
- Compliquant la grossesse ¬ Autres *O21.8*
- Consécutifs à une intervention gastro-intestinale ¬ *K91.0*
- Cours
- - Chimiothérapie ¬ *R11, Y57.98!*
- - Radiothérapie ¬ *R11, Y57.98!*
- Dus
- - Déficit en tréhalase ¬ Diarrhée et *E74.3*
- - Maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse ¬ *O21.8*
- Exsiccose ¬ Diarrhée
- - *A09.9, E86*
- - *A09.9, E86*
- Fécaloïde ¬ *R11*
- Grossesse, sans précision ¬ *O21.9*
- Importants commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ *O21.2*
- Nouveau-né ¬ *P92.0*
- Persistants ¬ Érosion des dents: due à: *K03.2*
- Psychogènes ¬ *F50.5*
- SAI ¬ inhalation de liquides ou de *T17*
- Tardifs de la grossesse ¬ *O21.2*
- ¬
- - Nausées et *R11*
- - Pneumonie due à des aliments et des *J69.0*
- - Pneumonie par aspiration (de): *J69.0*

Von Economo-Cruchet ¬ Maladie de *A85.8†, G05.1**

Von Gierke ¬ Maladie de *E74.0*

Von Hippel-Lindau ¬
- Angiomatose rétinocérébelleuse de *Q85.8*
- Syndrome de: *Q85.8*

Von Recklinghausen ¬
- Maladie de *Q85.0*
- Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de *E21.0†, M90.89**

Von Voss-Cherstvoy ¬ Syndrome de *Q87.8*

Von Willebrand
- Acquis ¬ Syndrome de *D68.01*
- Acquise ¬ Maladie de *D68.01*
- Sans précision ¬ Maladie de *D68.09*
- Type
- - 1 ¬ Maladie de *D68.00*
- - 2 ¬ Maladie de *D68.00*
- - 2A ¬ Maladie de *D68.00*
- - 2B ¬ Maladie de *D68.00*
- - 2M ¬ Maladie de *D68.00*
- - 2N ¬ Maladie de *D68.00*
- - 3 ¬ Maladie de *D68.00*
- ¬
- - Augmentation des anticorps dirigés contre le facteur *D68.32*
- - Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le facteur de *D68.32*
- - Maladie de *D68.09*

Von Willebrand *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pseudo-maladie de *D69.1*
- - Thrombopathie de *D68.09*

Von Zumbusch ¬
- Psoriasis pustuleux généralisé, forme de *L40.1*
- Syndrome de *L40.1*

Von-Bälz ¬ Syndrome de *K13.0*

Von-Graefe ¬ Maladie de *H49.4*

Von-Leyden ¬ Syndrome de Duchenne- *G71.00*

Von-Meyenburg-Altherr-Uehlinger ¬ Syndrome de *M94.1*

Von-Strümpell
v./v.a. Westphal-von-Strümpell

Von-Winiwarter-Buerger ¬ Thromboangéite de *I73.1*

Voriconazole ¬
- Aspergillus fumigatus résistant au *U83.3!*
- Candida albicans résistant au *U83.0!*

Vorticellé primaire
- Essentielle du cuir chevelu ¬ Pachydermie *Q82.8*
- ¬ Pachydermie *Q82.8*

Voss
v./v.a. Von Voss-Cherstvoy

Voûte
- Crâne ¬
- - Fracture de la *S02.0*
- - Sarcome d'Ewing de la *C41.01*
- Crânien
- - Forme de beignet avec fragilité osseuse ¬ Lésions de la *Q78.8*
- - Liée à l'X ¬ Hyperostose de la *M85.2*
- Palais
- - Fente labial
- - - Bilatérale ¬ Fente de la *Q37.0*
- - - SAI ¬ Fente de la *Q37.1*
- - - Unilatérale ¬ Fente de la *Q37.1*
- - ¬ Fente de la *Q35.1*
- Palatin ¬
- - Carcinome basocellulaire de la *C05.0*
- - Perforation syphilitique congénitale de la *A50.5†, K93.8**
- - Tumeur maligne: *C05.0*
- Voile palais
- - Fente labial
- - - Bilatérale ¬ Fente de la *Q37.4*
- - - SAI ¬ Fente de la *Q37.5*
- - - Unilatérale ¬ Fente de la *Q37.5*
- - ¬
- - - Fente de la *Q35.5*
- - - Malformation de la fente de la *Q35.5*

Voûté en tant que conséquence tardive du rachitisme ¬ Dos *E64.3, M40.29*

Voyeurisme ¬ *F65.3*

VPS11 ¬ Leucodystrophie hypomyélinisante autosomique récessive associée à *E75.2*

Vries
v./v.a. Gabriele-de Vries

Vrolik ¬ Syndrome de *Q78.0*

VRS ¬
- Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [*J21.0*
- Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [*J20.5*
- Pneumonie congénitale à virus respiratoire syncytial [*P23.0*
- Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [*J12.1*
- Vaccination contre le virus respiratoire syncytial [*Z25.8*

Vulgaire
- Paupière ¬ Lupus *A18.4†, H03.1**
- ¬
- - Acné *L70.0*
- - Ichtyose *Q80.0*
- - Lupus *A18.4*
- - Pemphigus *L10.0*

Vulgaris
- Modéré à sévère ¬ Psoriasis *L40.0, L40.70!*
- ¬
- - Infection à Proteus *A49.82*
- - Psoriasis *L40.0*
- - Verruca: *B07*

Vulnificus
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Vibrio *B98.1!*
- ¬
- - Bactériémie à Vibrio *A49.81*
- - Infection à Vibrio *A49.81*

Vulvaire ¬
- Prurit *L29.2*
- Varices *I86.3*

Vulve
- Cours
- - Accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*
- - Grossesse ¬ Varices de périnée, de vagin et de *O22.1*
- - Maladie de Behçet ¬ Ulcération de la *M35.2†, N77.8**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Ulcération de la *N77.0**
- - Tuberculose ¬ Ulcère de la *A18.1†, N77.0**
- Grande) (petite) ¬ lèvre de la *T21*
- Lésion localisations contiguës ¬
- - Adénocarcinome de la *C51.8*
- - Carcinome basocellulaire de la *C51.8*
- - Carcinome de la *C51.8*
- - Carcinome épidermoïde de la *C51.8*
- NIV stade
- - I ¬ Néoplasie intraépithéliale de la *N90.0*
- - II ¬ Néoplasie intraépithéliale de la *N90.1*

Vulve *–suite*
- NIV stade *–suite*
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale de la *D07.1*
- Non classée ailleurs ¬ Dysplasie sévère de la *N90.2*
- Périnée
- - Sans précision ¬ Affection non inflammatoire de la *N90.9*
- - ¬
- - - Affections non inflammatoires précisées de la *N90.8*
- - - Soins maternels pour anomalies de la *O34.7*
- SAI ¬ Dysplasie sévère de la *N90.2*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C51.9*
- Stade III avec dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale de la *D07.1*
- Trichomonas ¬ Infection de la *A59.0†, N77.1**
- Vagin ¬
- - Candidose de la *B37.3†, N77.1**
- - Corps étranger dans la *T19.2*
- VIN] ¬ Néoplasie intraépithéliale de la *N90.3*
- Virus de l'herpès ¬ Ulcère de la *A60.0†, N77.0**
- ¬
- - *S31.5*
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Abcès de la *N76.4*
- - Absence congénital(e) de la *Q52.7*
- - Adénocarcinome de la *C51.9*
- - Adhérences de la *N90.8*
- - Atrophie de la *N90.5*
- - Carcinoma in situ: *D07.1*
- - Carcinome basocellulaire de la *C51.9*
- - Carcinome de la ligne médiane NUT [Nuclear protein in testis] de la *C51.9*
- - Carcinome épidermoïde de la *C51.9*
- - Carcinome in situ de la *D07.1*
- - Dysplasie
- - - *N90.3*
- - - Légère de la *N90.0*
- - - Moyenne de la *N90.1*
- - Dystrophie de la *N90.4*
- - Furoncle de la *N76.4*
- - Fusion de la *Q52.5*
- - Hématome obstétrical de: *O71.7*
- - Herpès de la *A60.0†, N77.1**
- - Hypertrophie de la *N90.6*
- - Inflammations précisées du vagin et de la *N76.8*
- - Kraurosis de la *N90.4*
- - Kyste
- - - *N90.7*
- - - Congénital(e) de la *Q52.7*

Vulve *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Leucoplasie de la *N90.4*
- - Maladie inflammatoire précisée du vagin et de la *N76.88*
- - Malformation SAI congénital(e) de la *Q52.7*
- - Malformations congénitales de la *Q52.7*
- - Mycose de la *B37.3†, N77.1**
- - Plaie ouverte du vagin et de la *S31.4*
- - Polype de la *N84.3*
- - Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: *R87*
- - Soin maternels
- - - Intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la *O34.7*
- - - Tumeur de la *O34.7*
- - Sténose de la *N90.5*
- - Syphilis secondaire de la *A51.3†, N77.1**
- - Syphilis tardive de la *A52.7†, N77.1**
- - Trichomonase de la *A59.0†, N77.1**
- - Tuberculose de la *A18.1†, N77.1**
- - Tumeur bénigne: *D28.0*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la *C51.8*
- - Ulcération de la *N76.6*

Vulvite
- Aiguë ¬ *N76.2*
- Blennorragique ¬ *A54.0†, N77.1**
- Candida ¬ *B37.3†, N77.1**
- Candidosique ¬ *B37.3†, N77.1**
- Cours de l'infection par des oxyures ¬ *B80†, N77.1**
- Diabétique ¬ *E14.60†, N77.8**
- Due
- - Candidose ¬ *B37.3†, N77.1**
- - Moniliase ¬ *B37.3†, N77.1**
- - Virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N77.1**
- Gonorrhéique
- - Abcès ¬ *A54.1†, N77.1**
- - ¬ *A54.0†, N77.1**
- SAI ¬ *N76.2*
- Subaiguë et chronique ¬ *N76.3*
- Syphilitique
- - Précoce ¬ *A51.0*
- - Tardive ¬ *A52.7†, N77.1**
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N77.1**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N77.1**
- Vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Vaginite, *N77.1**

Vulvitis
- Diabetica diabète sucré type
- - 1 ¬ *E10.60†, N77.8**
- - 2 ¬ *E11.60†, N77.8**
- Mycotica ¬ *B37.3†, N77.1**

Vulvo-vaginal
- Chronique stade

Vulvo-vaginal *–suite*
- Chronique stade *–suite*
- - 1 ¬ Maladie GVH *T86.05†, N77.21**
- - 2 ¬ Maladie GVH *T86.06†, N77.22**
- - 3 ¬ Maladie GVH *T86.07†, N77.23**
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ Ulcération et inflammation *N77.8**
- ¬
- - Candidomycose *B37.3†, N77.1**
- - Mycose *B37.3†, N77.1**
- - Rhabdomyosarcome *C57.8*

Vulvo-vaginal-gingival ¬ Syndrome *L43.8*

Vulvo-vaginite
- Aiguë ¬ *N76.0*
- Candida ¬ *B37.3†, N77.1**
- Candidomycétique ¬ *B37.3†*
- Candidosique ¬ *B37.3†, N77.1**
- Chlamydia ¬ *A56.0*
- Chronique ¬ *N76.1*
- Cours
- - Infection par des oxyures ¬ *B80†, N77.1**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Vaginite, vulvite et *N77.1**
- Due
- - Amibes ¬ *A06.8†, N77.1**
- - Candidose ¬ *B37.3†, N77.1**
- - Moniliase ¬ *B37.3†, N77.1**
- - Virus de l'herpès ¬ *A60.0†, N77.1**
- Gonocoques
- - Abcès ¬ *A54.1†, N77.1**
- - ¬ *A54.0†, N77.1**
- Herpétique ¬ *A60.0†, N77.0**
- Mycosique ¬ *B37.3†, N77.1**
- SAI ¬ *N76.0*
- Subaiguë ¬ *N76.1*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N77.1**

Vulvovaginitis candidomycetica ¬ *B37.3†, N77.1**

VZV virus
- Varicelle et du zona] ¬ Antécédents personnels d'infection à *Z86.1*
- Varicelle-zona ¬
- - Encéphalite due au *B02.0†, G05.1**
- - Méningite due au *B02.1†, G02.0**

Waardenburg
v./v.a. Klein-Waardenburg
v./v.a. Shah-Waardenburg
- Anomalies des membres ¬ Syndrome de *E70.3*
- Maladie de Hirschsprung] ¬ PCWH [Syndrome de neuropathie périphérique-leucodystrophie centrale dysmyélinisante-syndrome de *Q87.8*
- ¬ Syndrome
- - *E70.3*
- - Anophtalmie de *Q87.2*

Waardenburg-Jonker ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*

Wachtel
v./v.a. Gardner-Silengo-Wachtel

Wagner
v./v.a. Holzgreve-Wagner-Rehder
- ¬
- - Dégénérescence vitréo-rétinienne de *H35.5*
- - Polymyosite de *M33.1*

Wagner-Parnas [Forme hépatique de la glycogénose] ¬ Syndrome de *E74.0*

Wahab ¬ Syndrome de *Q74.8*

Waisman ¬ Syndrome de *G23.8*

Waldenström
- Macroglobulinémie] ¬ Syndrome de *C88.00*
- Rémission complète ¬
- - Glomérulopathie au cours de macroglobulinémie de *C88.01†, N08.1**
- - Macroglobulinémie de *C88.01*
- ¬
- - Glomérulonéphrite au cours de macroglobulinémie de *C88.00†, N08.1**
- - Glomérulopathie au cours de macroglobulinémie de *C88.00†, N08.1**
- - Purpura hypergammaglobulinémique bénin [de *D89.0*
- - Trouble glomérulaire au cours de macroglobulinémie de *C88.00†, N08.1**

Waldeyer ¬ Tumeur maligne: Anneau de *C14.2*

Waldmann ¬ Maladie de *I89.09*

Walker
v./v.a. Dandy-Walker
v./v.a. Marden-Walker

Walker-Dyson ¬ Syndrome de *Q13.1*

Walker-Warburg ¬ Syndrome de *Q04.3*

Wallenberg ¬ Syndrome de *I66.3†, G46.3**

Wallis
v./v.a. Goldblatt-Wallis

Wallis-Zieff-Goldblatt ¬ Syndrome de *Q77.8*

Warburg
v./v.a. Walker-Warburg

Ward
v./v.a. Romano-Ward

Warfarine ¬ Dysmorphisme dû à la *Q86.2*

Warsaw-Breakage ¬ Syndrome de *Q87.0*

WAS [Syndrome de Wiskott-Aldrich] ¬ *D82.0*

Wassermann faussement positive ¬ Réaction de *R76.2*

Watanabe] ¬ Épilepsie bénigne du nourrisson [*G40.08*

Water clefts (fentes) ¬ *H25.0*

Waterhouse-Friderichsen ¬ Syndrome de *A39.1†, E35.1**

Waters-West ¬ Syndrome de *D58.8*

Watson ¬ Syndrome de *Q85.0*

Watsoniase ¬ *B66.8*

Watsons
v./v.a. Alagille-Watsons

Weary ¬ Poïkilodermie sclérosante héréditaire de *Q82.8*

Weaver-Williams ¬ Syndrome de *Q87.8*

Weber
v./v.a. Klippel-Trénaunay-Weber
v./v.a. Mietens-Weber
v./v.a. Pfeifer-Weber-Christian
v./v.a. Rendu-Osler-Weber
v./v.a. Sturge-Weber-Dimitri
v./v.a. Sturge-Weber-Krabbe
- Cockayne ¬ Syndrome de *Q81.0*
- ¬ Syndrome
- - *I67.88†, G46.3**
- - Parkes *Q87.2*

Weber-Christian ¬
- Panniculite récidivante [*M35.6*
- Syndrome de Pfeiffer- *M35.6*

Wegener ¬
- Glomérulonéphrite au cours de granulomatose de *M31.3†, N08.5**
- Glomérulopathie au cours de granulomatose de *M31.3†, N08.5**
- Maladie de *A50.0†, M90.29**

Wegener-Klinger-Churg
- Atteinte pulmonaire ¬ Syndrome de *M31.3†, J99.1**
- ¬ Syndrome de *M31.3*

Weil ¬
- Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de *A27.0*
- Maladie de *A27.0*

Weill
v./v.a. Léri-Weill

Weill-Marchesani ¬ Syndrome
- *Q87.0*
- *Q87.1*

Weismann-Netter-Stuhl ¬ Syndrome de *Q77.8*

Weiss
v./v.a. Jackson-Weiss
- ¬ Syndrome de Mallory- *K22.6*

Weissenbacher-Zweymuller ¬ Syndrome de *Q77.7*

Weiss-Kruszka ¬ Syndrome de *Q87.0*

Welander ¬
- Amyotrophie spinale (de): forme juvénile, type III [Kugelberg- *G12.1*
- Myopathie distale type *G71.08*
- Syndrome de *G12.1*

Wellesley-Carman-French ¬ Syndrome de *Q87.8*

Wells
v./v.a. Hay-Wells
v./v.a. Muckle-Wells
- ¬ Phlegmon à éosinophiles [*L98.3*

Wells-Jankovic ¬ Syndrome de *Q87.8*

Wenckebach ¬ Bloc (de) (du): *I44.1*

Werdnig-Hoffmann ¬ Atrophie musculaire de *G12.0*

Werlhof ¬ Maladie de *D69.3*

Wermer ¬ Syndrome de *D44.8*

Werner
- Atypique ¬ Syndrome de *E34.8*
- ¬ Syndrome de *E34.8*

Wernicke ¬
- Aphasie de développement, de type *F80.2*
- Encéphalopathie de *E51.2†, G32.8**
- Polio-encéphalopathie de *E51.2†, G32.8**

West
v./v.a. Waters-West
- Nile ¬ Fièvre due au virus *A92.3*
- ¬ Syndrome de *G40.4*

Westerhof-Beemer-Cormane ¬ Syndrome de *Q82.8*

Westermani ¬ Infection à Paragonimus *B66.4*

Westphal-von-Strümpell ¬ Pseudosclérose de *E83.0†, G99.8**

Weyers ¬ Dysostose acrofaciale type *Q75.4*

Wharton ¬ Kyste du canal de *K11.6*

WHIM [verrues-hypogammaglobulinémie-infections-myélokathexis] ¬ Syndrome *D81.8*

Whipple ¬
- Arthrite au cours de maladie de *K90.8†, M14.89**
- Maladie de *K90.8†, M14.89**
- Uvéite postérieure dans la maladie de *K90.8†, M14.89**

White
v./v.a. Darier-White
- Spirit ¬ *T52.0*
- ¬ Thrombocytopénie de *D69.1*

White-Sutton ¬ Syndrome de *Q87.0*

Whitmore ¬ Maladie de *A24.4*

Whooley
v./v.a. Test des 2 questions de Whooley

Whyte-Murphy ¬ Syndrome de *Q78.8*

Wieacker-Wolff ¬ Syndrome de *Q74.3*

Wiedemann
v./v.a. Beckwith-Wiedemann
v./v.a. Petty-Laxova-Wiedemann
v./v.a. Stüve-Wiedemann

Wiedemann-Rautenstrauch ¬ Syndrome de *E34.8*

Wiedemann-Steiner ¬ Syndrome de *Q87.1*

Wiethe
v./v.a. Urbach-Wiethe

Wilbrandt
v./v.a. Grayson-Wilbrandt

Wildervanck ¬ Syndrome de *Q75.4*

Wilkie

- Acquis ¬ Syndrome de *I77.88*
- Congénital ¬ Syndrome de *Q27.8*

Wilkinson

v./v.a. Fenton-Wilkinson-Toselano

- ¬ Maladie de Sneddon- *L13.1*

Willi

v./v.a. Prader-Labhart-Willi
v./v.a. Prader-Willi

Williams

v./v.a. Weaver-Williams

Williams-Beuren ¬ Syndrome de *Q93.5*

Williams-Campbell ¬ Syndrome de *Q32.2*

Willis ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne acquise due à une rupture d'anévrisme du polygone de *I60.6*

Wilms ¬

- Adénosarcome
- - *C64*
- - Embryonnaire du rein [tumeur de *C64*
- Délétion 11p13 avec tumeur de *C64, Q93.5*
- Syndrome
- - Néphroblastomatose-ascite fœtale-macrosome-tumeur de *Q87.3*
- - Retard de développement-kystes pulmonaires-croissance excessive-tumeur de *C64, Q87.3*
- Tumeur de *C64*

Wilson

v./v.a. Jirásek-Zuelzer-Wilson
v./v.a. Kimmelstiel-Wilson
v./v.a. Mowat-Wilson
v./v.a. Saul-Wilson

- Dégénérescence hépato-lenticulaire] ¬ Maladie de *E83.0*
- Extracapillaire diabétique
- - Diabète sucré type
- - - 1 ¬ Syndrome de Kimmelstiel et *E10.20†, N08.3**
- - - 2 ¬ Syndrome de Kimmelstiel et *E11.20†, N08.3**
- - ¬ Syndrome de Kimmelstiel et *E14.20†, N08.3**
- Mikity ¬ Syndrome de *P27.0*
- ¬
- - Déficience intellectuelle liée à l'X type *Q87.8*
- - Dégénérescence hépato-lenticulaire de *E83.0*
- - Démence au cours de maladie de *E83.0†, F02.8**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladie de *E83.0†, N16.3**
- - Pyélonéphrite au cours de maladie de *E83.0†, N16.3**

Wilson-Turner ¬ Syndrome de *Q87.8*

Winged» ¬ Déficit en hélice « *D81.2*

Winship-Viljoen-Leary ¬ Syndrome de *Q87.8*

Winter

v./v.a. Baraitser-Winter
v./v.a. Ellis-Yale-Winter
v./v.a. MacDermot-Winter

Wiskott-Aldrich] ¬ WAS [Syndrome de *D82.0*

Witkop ¬ Syndrome de *Q82.8*

Witteveen-Kolk ¬ Syndrome de *Q87.0*

Woakes ¬ Syndrome ou ethmoïdite de *J33.1*

Wolcott-Rallison ¬ Syndrome de *E10.90, Q87.8*

Wolff

v./v.a. Wieacker-Wolff

- Femme ¬ Adénome du canal de *D28.7*
- ¬ Corps ou canal de *C57.7*

Wolff-Hirschorn ¬ Syndrome de *Q93.3*

Wolffienne

- Annexielle bénigne ¬ Tumeur *D28.7*
- ¬ Tumeur annexielle maligne d'origine *C57.4*

Wolff-Parkinson-White ¬ Syndrome de: *I45.6*

Wolff-Zimmermann ¬ Syndrome de *Q87.0*

Wolfgang

v./v.a. Gollop-Wolfgang

Wolfram

- Décompensé ¬ Syndrome de *E10.73*
- ¬ Syndrome de *E10.72*

Wolfram-like

- Décompensé ¬ Syndrome de *E13.73*
- ¬ Syndrome de *E13.72*

Wolman ¬ Maladie de *E75.5*

Woltman

v./v.a. Moersch-Woltman

Wood

v./v.a. Lowry-Wood
v./v.a. Matthew-Wood

Woodhouse-Sakati ¬ Syndrome de *G23.0*

Woods-Black-Norbury ¬ Syndrome de *D82.8, G70.9*

Wormien ¬ Dysplasie cranio-métadiaphysaire type os *Q78.8*

Worster-Drought ¬ Syndrome de *G80.8*

Worth ¬ Ostéosclérose autosomique dominante type *Q78.2*

Woude

v./v.a. Van der Woude

Wright ¬ Syndrome de *G54.0*

WT membres-sang ¬ Syndrome *D61.0*

Wuchereria

- Bancrofti ¬ Filariose due à *B74.0*
- Malayi ¬ Éléphantiasis due à *B74.1*

WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante-épilepsie-déficience intellectuelle par déficit de *G11.1*

Wyatt [cytomégalie congénitale] ¬ Syndrome de *P35.1*

Wyburn-Mason ¬ Syndrome de *Q28.28*

X-ALD [Adrénoleucodystrophie liée à l'X] ¬ *E71.3*

Xanthélasma de la paupière ¬ *H02.6*

Xanthine

- Aldéhyde oxydase ¬ Déficit combiné en xanthine déshydrogénase et *E79.8*
- Déshydrogénase
- - Aldéhyde oxydase type A ¬ Déficit combiné en sulfite oxydase, *E72.1*
- - Xanthine aldéhyde oxydase ¬ Déficit combiné en *E79.8*
- - ¬ Déficit en *E79.8*
- Oxydase ¬ Déficit en *E79.8*
- Oxydoréductase ¬ Déficit en *E79.8*
- ¬ Pierre de *E79.8†*, *N22.8**

Xanthinurie

- Héréditaire ¬ *E79.8*
- Type
- - I ¬ *E79.8*
- - II ¬ *E79.8*

Xanthoastrocytome pléomorphe

- Cerveau ¬ *C71.0*
- Cervelet ¬ *C71.6*
- Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ¬ *C71.8*
- Lobe frontal ¬ *C71.1*
- Lobe occipital ¬ *C71.4*
- Lobe pariétal ¬ *C71.3*
- Lobe temporal ¬ *C71.2*
- Quatrième ventricule ¬ *C71.7*
- Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- ¬ *C71.9*

Xanthogranulome

- Juvénile ¬ *D76.3*
- Nécrobiotique ¬ *D76.3*
- ¬ *D76.3*

Xanthomatose

- Cours d'hypercholestérolémie ¬ *E78.0*
- Sitostérolémie ¬ *E78.0*

Xanthome

- Conjonctival ¬ *E75.5†*, *H13.8**
- Disséminé
- - Peau ¬ *E78.2*
- - ¬ *E78.2*
- Ligamentaire ¬ *E75.5*
- Papuleux ¬ *D76.3*
- Tubéro-éruptif ¬ *E78.2*
- Verruqueux de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*

Xanthopsie ¬ *H53.5*

Xanthosus [chlorome] en rémission complète ¬ Cancer *C92.31*

Xanthurénique ¬ Acidurie *E70.8*

Xénogène ¬ Inflammation due à une greffe de valvule cardiaque *T82.6*

Xénogénique ¬ Présence d'une valvule cardiaque *Z95.3*

Xenopi ¬ Infection à Mycobacterium *A31.88*

Xérocytose héréditaire ¬ *D58.8*

Xeroderma pigmentosum

- Syndrome de Cockayne] ¬ Complexe XP/CS [*Q87.1*
- ¬
- - XP [*Q82.1*
- - XPV [Variant du *Q82.1*

Xérodermie

- Due à l'avitaminose A ¬ *E50.8†*, *L86**
- Paupière ¬ *H01.1*
- ¬ Syndrome de trichodysplasie- *Q84.2*, *L85.3*

Xérophtalmie ¬

- *E50.7†*, *H19.8**
- Carence en vitamine A avec *E50.7†*, *H19.8**

Xérophtalmique cornée ¬

- Avitaminose A avec cicatrices *E50.6†*, *H19.8**
- Carence en vitamine A avec cicatrice *E50.6†*, *H19.8**

Xérosis

- Conjonctival ¬ Avitaminose A
- - *E50.0†*, *H13.8**
- - Taches de Bitot et *E50.1†*, *H13.8**
- Cornéen ¬ Avitaminose A avec *E50.2†*, *H19.8**
- Cutané ¬ *L85.3*
- SAI de la conjonctive ¬ *H11.1*
- Ulcération de la cornée ¬ Avitaminose A avec *E50.3†*, *H19.8**

Xérostomie ¬

- *K11.7*
- Syndrome HELIX [hypohidrose-déséquilibre électrolytique-dysfonctionnement des glandes lacrymales-ichtyose- *Q87.8*

Xerotica obliterans] ¬ Balanite scléreuse oblitérante [balanitis *N48.0*

Xérotique ¬ Carence en vitamine A avec kératite *E50.4†*, *H19.3**

Xia-Gibbs ¬ Syndrome de *Q87.8*

Xiphoideus ¬ Fracture du sternum: Processus *S22.23*

XLF
v./v.a. cernunnos-XLF

XLSA [Anémie sidéroblastique liée à l'X] ¬ *D64.0*

XP [Xeroderma pigmentosum] ¬ *Q82.1*

XP/CS [Xeroderma pigmentosum-syndrome de Cockayne] ¬ Complexe *Q87.1*

XPV [Variant du xeroderma pigmentosum] ¬ *Q82.1*

Xylène [diméthylbenzène] ¬ *T52.2*

Xylitol déshydrogénase ¬ Déficit en *E74.8*

XYLT1-CDG [Congenital disorder of glycosylation] ¬ *E77.8*

Yaba ¬ Fièvre (de): *B08.8*

Yahr ¬

- Stade 5 selon Hoehn et *G20.2*
- Stades
- - 0 à moins de 3 selon Hoehn et *G20.0*
- - 3 à 4 selon Hoehn et *G20.1*

Yale
v./v.a. Ellis-Yale-Winter

Yang
v./v.a. Schaaf-Yang

Yaws ¬ *A66*

Yémen ¬ Syndrome de surdité avec cécité et hypopigmentation, type *Q87.8*

Yersinia

- Enterocolitica ¬
- - Arthrite post-infectieuse au cours d'une entérite à *A04.6†, M03.29**
- - Arthropathie post-infectieuse au cours d'une entérite à *A04.6†, M03.29**
- - Entérite à *A04.6*
- Pseudotuberculosis
- - Subsp. pestis [Yersinia pestis] ¬ Infection à *A20*
- - ¬ Infection à *A28.2*

Yersinia pestis] ¬ Infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. pestis [*A20*

Yoon
v./v.a. Harel-Yoon

Yosef
v./v.a. Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef

Yoshimura-Takeshita ¬ Syndrome de *Q87.8*

You-Hoover-Fong ¬ Syndrome de *Q87.8*

Young
v./v.a. Dyke-Young
v./v.a. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson
v./v.a. Stratton-Garcia-Young

- ¬ Syndrome de *N46, J98.8*

Yq ¬ Isochromosomie *Q98.6*

Yuan-Harel-Lupski ¬ Syndrome *Q92.3, G60.0*

Yunis-Varon ¬ Syndrome de *Q87.5*

ZAP70 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

ZBTB11 ¬ Trouble du neurodéveloppement associé à *Q87.8*

Zébrés ¬ Myopathie à corps *G71.2*

Zechi-Ceide ¬ Syndrome de *Q87.0*

Zellweger-like sans anomalies peroxysomales ¬ Syndrome de *Q87.8*

Zelnick
v./v.a. Bronspiegel-Zelnick

Zeviani
v./v.a. Ghezzi-Zeviani

Zézaiement ¬ *F80.8*

Zhao ¬ Brachydactylie-syndactylie type *Q73.8, Q70.2*

Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim] ¬ Syndrome ZTTK [*Q87.0*

ZIC1 ¬ Craniosynostose syndromique liée à *Q87.0*

Zieff
v./v.a. Wallis-Zieff-Goldblatt

Ziehen
v./v.a. Schwalbe-Ziehen-Oppenheim

Ziehen-Oppenheim ¬ Syndrome de *G24.1*

Zika
v./v.a. Virus Zika

- ¬ *A92.5*

Zimmermann
v./v.a. Wolff-Zimmermann

Zimmermann-Laband ¬ Syndrome de *Q87.8*

Zinc

- Composés ¬ Effet toxique: *T56.5*
- ¬
- - Anémie associée à carence en: *D53.8*
- - Carence alimentaire en *E60*
- - Intoxication au *T56.5*
- - Taux anormal de: *R79.0*

Zinsser
v./v.a. Brill-Zinsser

Zinsser-Engman-Cole ¬ Syndrome de *Q82.8, D61.9*

ZIP7 ¬ Agammaglobulinémie syndromique par déficit en protéine *D80.0*

Ziter
v./v.a. Carey-Fineman-Ziter

Zlotogora-Ogur ¬ Syndrome de *Q87.8*

ZMYND11 ¬ Syndrome de retard du développement-retard de langage-épilepsie-troubles du comportement-dysmorphie craniofaciale associé à *Q87.8*

ZNF341 ¬ Syndrome hyper-IgE autosomique récessif par déficit en *D82.4*

Zona

- Accompagné d'autres manifestations neurologiques ¬ *B02.2†*
- Complications ¬ *B02.8*
- Disséminé ¬ *B02.7*
- Ophtalmique ¬ *B02.3*
- Sans complication ¬ *B02.9*
- ¬
- - *B02*

Zona *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Antécédents personnels d'infection à VZV [virus de la varicelle et du *Z86.1*
- - Atteinte de la Paupière au cours de *B02.3†, H03.1**
- - Encéphalomyélite due à *B02.0†, G05.1**
- - Kératite interstitielle au cours de *B02.3†, H19.2**
- - Kératoconjonctivite interstitielle au cours de *B02.3†, H19.2**
- - Myélite due à *B02.0†, G05.1**
- - Otite externe au cours de *B02.8†, H62.1**
- - Paralysie faciale liée à l'infection par le virus varicelle *B02.2†, G53.0**

Zonana
v./v.a. Bannayan-Zonana

Zone

- Application rouge lèvre ¬ Lèvre
- - Inférieure: *C00.1*
- - Supérieure: *C00.0*
- Cloacale ¬ Tumeur maligne: *C21.2*
- Diffuses ¬ lymphome folliculaire non hodgkinien avec ou sans *C82*
- Marginal
- - Cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la *C88.41*
- - Splénique ¬ Lymphome de la *C83.0*
- - ¬
- - - Lymphome
- - - - B cutané de la *C83.0*
- - - - Nodal de la *C83.0*
- - - - Splénique de la *C83.0*
- - - Lymphome nodulaire à cellules B de la *C83.0*
- - - Repli ary-épiglottique
- - - - *C13.1*
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- Os alvéolaire ¬ Plaie ouverte dans la *S01.59*
- Pellucide ¬ Infertilité féminine par défaut de la *N97.8*
- Postérieure ¬ Inflammation de la *H30.2*
- Pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte ¬ *L89.0*
- Sacrée ¬ Lésion de la *M53.3*
- T ¬ Lymphome de la *C84.4*

Zoonotique pandémique identifié

- Associée
- - Encéphalite
- - - Exception du virus de l'influenza porcine ou aviaire ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - - Aviaire *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - - Porcine *J09†, G05.1*, U69.22!*

Zoonotique pandémique identifié *–suite*

- Associée *–suite*
- - Encéphalopathie ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire *J09†, G94.31*, U69.23!*
- - - Porcine *J09†, G94.31*, U69.22!*
- - Entérite ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire *J09, U69.23!*
- - - Porcine *J09, U69.22!*
- - Épanchement pleural ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire *J09, U69.23!*
- - - Porcine *J09, U69.22!*
- - Infection Voie respiratoire supérieures ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire *J09, U69.23!*
- - - Porcine *J09, U69.22!*
- - Laryngite ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire *J09, U69.23!*
- - - Porcine *J09, U69.22!*
- - Méningisme ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire *J09, U69.23!*
- - - Porcine *J09, U69.22!*
- - Myocardite ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire *J09†, I41.1*, U69.23!*
- - - Porcine *J09†, I41.1*, U69.22!*
- - Otite moyenne ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire *J09†, H67.1*, U69.23!*
- - - Porcine *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - Pharyngite ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire *J09, U69.23!*
- - - Porcine *J09, U69.22!*
- - Pneumonie ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire *J09, U69.23!*
- - - Porcine *J09, U69.22!*
- - ¬ Grippe Influenza virus influenza
- - - Aviaire *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - Porcine *J09†, G05.1*, U69.22!*
- Exception virus influenza porcine aviaire
- - Associée
- - - Encéphalopathie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - Entérite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.24!*
- - - Épanchement pleural ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.24!*
- - - Infection des voies respiratoires supérieures ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.24!*
- - - Laryngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.24!*
- - - Méningisme ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.24!*
- - - Myocardite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, I41.1*, U69.24!*

Zoonotique pandémique identifié *–suite*
- Exception virus influenza porcine aviaire *–suite*
- - Associée *–suite*
- - - Otite moyenne ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - Pharyngite ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.24!*
- - - Pneumonie ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.24!*
- - - ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - ¬ Grippe [Influenza] à virus d'influenza *J09, U69.24!*
- ¬ Grippe
- - Influenza
- - - Encéphalite, virus de la grippe aviaire *J09†, G05.1**
- - - Encéphalopathie, virus de la grippe aviaire *J09†, G94.31**
- - - Entérite, virus d'influenza *J09*
- - - Épanchement pleural, virus d'influenza *J09*
- - - Gastroentérite, virus d'influenza *J09*
- - - Infection respiratoire supérieure, virus d'influenza *J09*
- - - Laryngite, virus d'influenza *J09*
- - - Méningisme, virus d'influenza *J09*
- - - Myocardite, virus de la grippe aviaire *J09†, I41.1**
- - - Otite moyenne, virus de la grippe aviaire *J09†, H67.1**
- - - Pharyngite, virus d'influenza *J09*
- - - Pneumonie, virus d'influenza *J09*
- - - Polio-encéphalite, virus de la grippe aviaire *J09†, G05.1**
- - - Virus influenza
- - - - Aviaire *J09, U69.23!*
- - - - Porcine *J09, U69.22!*
- - Virus d'influenza *J09*

Zoster
v./v.a. Herpès zoster
- Ischiadicus ¬ *B02.2†, G59.8**
- Ophthalmicus NCA ¬ Herpes *B02.3†, H58.8**
- ¬
- - Herpes *B02*
- - Névrite *B02.2†, G53.0**

Zostérien ¬
- Blépharite *B02.3†, H03.1**
- Conjonctivite *B02.3†, H13.1**
- Douleurs *B02.9*
- Encéphalite *B02.0†, G05.1**
- Iritis *B02.3†, H22.0**
- Kératite *B02.3†, H19.2**
- Kératoconjonctivite *B02.3†, H19.2**
- Méningite *B02.1†, G02.0**
- Méningo-encéphalite *B02.0†, G05.1**
- Névrite du ganglion géniculé *B02.2†, G53.0**
- Sclérite *B02.3†, H19.0**

ZTTK [Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim] ¬ Syndrome *Q87.0*

Zuelzer
v./v.a. Jirásek-Zuelzer-Wilson

Zumbusch
v./v.a. von Zumbusch

Zunich ¬ Syndrome neuroectodermique type *Q87.8*

Zunich-Kaye ¬ Syndrome de *Q87.8*

Zweymuller
v./v.a. Weissenbacher-Zweymuller

Zygoma ¬ Fracture du *S02.42*

Zygomaticum ¬
- Os: *D16.42*
- Ostéoblastomed e l'os *D16.42*

Zygomatique
- Os malaires ¬ Fracture de l'arcade *S02.41*
- ¬
- - Fracture de l'arcade *S02.41*
- - Os: *C41.02*
- - Sarcome de l'os *C41.02*

Zygomycose
- Poumon ¬ *B46.0†, J99.8**
- ¬ Autres *B46.8*

Annexe

Tableau des tumeurs

Notes:

1. La liste ci-après indique les numéros de la classification topographique des tumeurs. Pour chaque siège anatomique, cinq codes sont possibles:
   - Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives
   - Tumeur maligne, secondaire ou présumées secondaire
   - Tumeur in situ
   - Tumeur bénigne
   - Tumeur d'évolution imprévisible ou inconnue

La description de la lésion indique souvent quelle colonne utiliser, per exemple: «mélanome malin de la peau», «carcinome in situ du col utérin», «fibro-adénome bénin du sein».

2. Les sièges marqués du signe # (par exemple: face NCA #) seront classés comme tumeur maligne de la peau desdits sièges si la tumeur en question est un carcinome spinocellulaire ou un carcinome épidermoïde, et à tumeur bénigne de la peau, desdits sièges s'il s'agit d'un papillome (quel qu'en soit le type).

3. Sauf s'ils sont intra-osseux ou odontogènes, les carcinomes et adénocarcinomes de sièges marqués du signe ◊ (par exemple ischion ◊) seront considérés comme métastases, siège primitif non précisé; classer à C79.5.

4. Pour les tumeurs du tissu conjonctif (vaisseaux sanguins bourse séreuse, fascia, ligaments, muscles, nerfs périphériques, nerfs parasympathiques et sympathiques, tendons, synoviale, etc.) ou les tumeurs dont le type morphologique indique une participation du tissu conjonctif, coder selon la liste d'après le terme «Tumeur, tissu conjonctif». Pour les sièges qui ne figurent pas dans la liste, choisir le code de la tumeur correspondant à ce siège; par exemple:
   - Fibrosarcome, pancréas C25.9
   - Léiomyosarcome, estomac C16.9.

Les types morphologiques traduisant la participation du tissu conjonctif apparaissent, à la place qui leur revient dans l'index alphabétique, avec la mention «v. tumeur, tissu conjonctif».

5. Pour les néoplasies de la peau, ou lors d'indications morphologiques (histologiques) se rapportant à la peau, coder selon la liste ci-après; pour des localisations qui ne figurent pas dans la liste, coder la néoplasie selon sa localisation, p. ex.
   - Carcinome basocellulaire du palais – codé C05.9

Les indications morphologiques (histologiques) se rapportant à la peau figurent à l'endroit approprié dans l'index alphabétique avec la mention «v. tumeur, peau».

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
tumeur	C80.9	C79.9	D09.9	D36.9	D48.9
– abdomen, abdominal	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– abdominal	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organe	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– – paroi	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – trou	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – viscères	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– abdomino-pelvien	C76.8	C79.88		D36.7	D48.7
– acromion ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– aile du nez (externe)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– aine NCA #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– aisselle – v. tumeur, creux des aisselles					
– alvéolaire					
– – muqueuse	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – procès ou rebord	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – poumon – v. tumeur, poumons					
– – – carcinome	C03.9	C79.88			
– – – – maxillaire	C03.0	C79.88			
– – – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88			
– – – maxillaire	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – maxillaire inférieur	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – muqueuse	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alvéole (dent)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – maxillaire inférieur	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alvéole dentaire NCA	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alvéole pulmonaire – v. tumeur, poumons					
– ampoule de Vater (hépato-pancréatique)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– amygdale pharyngienne	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– amygdales	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – fosse	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – gorge	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – linguale	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – luette	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – pharyngée	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piliers des amygdales (postérieurs) (antérieurs)	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– angle colique					
– – droit	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – gauche	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – hépatique	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – splénique	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– angle ponto-cérébelleux	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– anneau lymphoïde de Waldeyer	C14.2	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– anneau lymphatique NCA – v.a. tumeur, oropharynx	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – amygdale palatine	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – piliers des amydales	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– annexe (utérus)	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– ano-rectale (transition)	C21.8	C78.5	D01.4	D12.9	D37.78
– anus, anal	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – canal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – marge	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – peau	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sphincter	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– aorte (thoracique)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – abdominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– aponévrose – v.a. tumeur, tissu conjonctif					
– – palmaire	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – plantaire	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– appendice cérébrale	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– appendiculaire	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– arachnoïde	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cérébrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– arc palato-glosse	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– arc palato-pharyngien	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– aréole	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– artère – v.a. tumeur, tissu conjonctif					
– – carotide	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– articulation NCA ◊ (v.a. tumeur, os)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acromio-claviculaire ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – bourse séreuse ou synovial de la peau – v. tumeur, tissu conjonctif					
– – costo-vertébrale ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – sterno-costale ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – temporo-mandibulaire ◊	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– arycartilage (cartilages arytaénoïdes)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– Atlas ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– atrium du coeur	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– auditif					
– – conduit (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – interne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nerf	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– avant-bras NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– biliaires	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – canaux ou voies (canal commun) (canal cystique) (extra-hépatique)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – inter-lobulaire	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intra-lobulaire	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intrahépatique	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – – – avec extra-hépatique	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– bourse séreuse – v. tumeur, tissu conjonctif					
– branchial	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– bronchiole	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchique	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carène	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe inférieur	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe moyen	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe supérieur	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – principal	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchique (poumons)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– buccal (cavité)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – muqueuse	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – sillon (inférieur) (supérieur)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– buccale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – angle	C00.6		D00.0	D10.3	D37.0
– – muqueuse NCA	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – plafond	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – plancher	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – partie antérieure	C04.0	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – partie latérale	C04.1	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – plus près concernant une partie NCA	C06.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – vestibule	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– bulbe olfactif	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– caecum	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– canal					
– – anal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – auriculaire (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cholédoque	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – conduit auditif (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cranio-pharyngé	C75.2	C79.88	D09.3	D35.3	D44.4
– – cystique	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – déférent	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – éjaculateur	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – hépatique	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – lacrymo-nasal	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – pancréatique accessoire (de Santorini)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – parotidien	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sublingual	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – submandibulaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – thoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – thyréoglosse, thyroglosse	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– canal cystique	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– canal de Müller					
– – organes génitaux féminins	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – organes génitaux masculins	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– canal de Santorini	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– canal de Stensen (canal de Sténon)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– canal de Wharton	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– canal de Wirsung	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– canal de Wolff (corps)					
– – femme	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – homme	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– canal déférent	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– capillaire – v. tumeur, tissu conjonctif					
– capsule interne	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cardia	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– carène trachéale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– cartilage (articulation) NCA (v.a. tumeur, os)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – anneau	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – ary - (cartilages aryténoïdes)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – aryténoïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – bronche	C34.0	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– – cricoïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cône	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – costal ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – côtes ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – épiglotte	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – laryngé	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nez, nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – oreille (externe)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – paupière	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – semin-lunaire (genou)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – thyroïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – trachée	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– cavité					
– – abdominal	C48.2	C78.6		D20.1	D48.7
– – buccale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – tympanique	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cavité oculaire – v. tumeur, orbite					
– cavité tympanique	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cellules insulaires (pancréas)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– central					
– – substance blanche du cerveau	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – système nerveux – v. tumeur, système nerveux					
– cérébral – v. tumeur, cerveau					
– cerveau NCA	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – frontal	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – infratentoriel	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lobe occipital	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobe pariétal	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobe temporal	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – méninge	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – nerf crânien – v. tumeur, nerf					
– – supratentoriel	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – tronc cérébral	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – ventricule cérébral – v. tumeur, ventricule cérébral					
– cervelet	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– cheville NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– chiasma optique	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– choane	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– choroïde	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
– clavicule ◊	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– clitoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– clivus	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cloaque	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– coccyx ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – glomus coccygien	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – vertèbre ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– coeur (ventricule) (oreillette)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – sac	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– coin de l'oeil (externe) (interne)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– col (col de l'utérus)	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – canal	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – jonction vers le vagin	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – moignon	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– col de l'utérus interne	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– col de l'utérus – v. tumeur, col					
– côlon (v.a. tumeur, intestin, gros, côlon)	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – avec rectum	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– côlon transverse	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– columelle nasale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– commissure					
– – labiale	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – laryngée	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– conduit auditif externe	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– conduits					
– – biliaires	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – intra-hépatiques	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– cône médullaire	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
– cône terminal	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
– conjonctive	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
– cordes vocales (vraies)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – fausses	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cordon spermatique	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– cornée (limbes)	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– corps					
– – calleux	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– – caverneux	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – ciliaire	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– – pancréatique	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – pinéal	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – strié	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – utérus	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – – isthme	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – ventriculaire	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– corpuscule carotidien	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– cortex					
– – cérébral	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerveau	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – glande surénale	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– côtes ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– cou NCA #	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– coude NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– crâne ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– crânienne (chaque fosse)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– creux des aisselles	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – pli cutané	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– crico-pharynx	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– cryptes de Morgagni	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– cubitus (chaque partie) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– cuir chevelu	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– cuisse NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– cul-de-sac					
– – pharyngien	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – cul-de-sac recto-utérin	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – vaginal	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– cutanée – v. tumeur, peau					
– diaphragme	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– diencéphale	C71.7	C79.3		D33.2	D43.1
– disque intervertébral ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– disséminée					
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– diverticule de Meckel	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– doigts NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– dos NCA #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– duodénum	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– dure-mère	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – crânial	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – encéphale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– endocarde	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– endocervicale (glandes) (canal)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endomètre (glande) (Stroma)	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– entérique – v. tumeur, intestin					
– épaule NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– épendyme (cerveau)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– épicarde	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– épididyme	C63.0	C79.82	D07.6	D29.3	D40.7
– épidural	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– épiglotte	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – bord libre	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – cartilage	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – face antérieure	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – supra-hyoïdien	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – surfaces postérieures	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– épipharynx – v. tumeur, rhinopharynx					
– épiphyse (glande pinéale)	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– estomac	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antre	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cardia	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – corps	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – entrée	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – fundus	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – grande courbure NCA	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – paroi NCA	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – antérieur NCA	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – postérieur NCA	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – petite courbure NCA	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – prépylore	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – pylore	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – sortie	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– exocol	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– externe					
– – conduit auditif	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – orifice du col	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– extra-dural	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– extra-rectal	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– faux (du cervelet) (du cerveau)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– fémur (chaque partie) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– fente branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fente de Rathke	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– fesses NCA #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– flanc NCA #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– foie	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – localisation primaire	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– follicule pileux	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– fosse					
– – crânienne (antérieure) (moyenne) (postérieure)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – glosso-pharyngienne	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – glosso-palatine	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – ischio-rectale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – pituitaire	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – ptérygoïde NCA	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – nerfs périphériques	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – système nerveux autonome	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tissu conjonctif	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – tissus moux	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – Rosenmüller	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsillaire	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fosse de Rosenmüller	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– fosse poplitée #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– fosse postérieure	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– fosse supra-claviculaire	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– frein					
– – antérieur des lèvres	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – labial – v. tumeur, lèvre intérieure					
– – lingual	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– frontal	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lobe	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobe frontal cérébral	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – sinus	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– fundus					
– – gastrique	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – utérus	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– ganglion (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – basal	C71.0	C79.88		D33.0	D43.0
– gastro-intestinal (tractus) NCA	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– gencive (alvéolaire) (marginale)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibule	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– gencive – v. tumeur, gencive					
– généralisée					
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– genou NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– gland	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– glande					
– – lacrymale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – parathyroïde	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – pinéale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – pituitaire	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – sous-maxilaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sous-maxillaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – surrénale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – vestibulaire majeure	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– glande de Bartholin	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– glande de Meibom	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– glande de Virchow	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
– glande mammaire (masculine) (féminine) (tissu glandulaire) (parties molles)	C50.9	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – corps glandulaire central	C50.1	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – externes	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – inférieure	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – interne	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – ligne médio-claviculaire	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – mamelon, aréole	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – peau	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – prolongement axillaire	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant inféro-externe	C50.5	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant inféro-interne	C50.3	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant supéro-externe	C50.4	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant supéro-interne	C50.2	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – récessus axillaire	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – siège ectopique	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – supérieure	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– glande parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– glande pinéale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– glande salivaire, glandes salivaires (canal) (principal)	C08.9	C79.88	D00.0	D11.9	D37.0
– – accessoire NCA	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – oreille	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sous-maxillaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– glande(s), (lymphe) (système) v.a. tumeur, lymphatique					
– – endocrinienne NCA	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – para-urétral	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– – salive, tumeur de la glande salivaire					
– glandes bulbo-urétrales	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– glandes de Cowper	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– glandes de Skene..	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– glandes endocrines NCA	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – pluriglandulaire	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– glandes sébacées – v. tumeur, peau					
– glandes sous-linguales	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– glandes sudoripares (sécrétrices), localisation non proche concernant	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– glandes vulvo-vaginales	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– globe oculaire	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– Globus pallidus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– glomus					
– – carotidien	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– – coccygien	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – jugulaire, typanicum	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– glotte	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– grand hémisphère cérébral	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– grands vaisseaux NCA	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– hanches NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– hélix	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– hémisphères cérébraux, cérébral (hémisphère) (substance blanche)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – méninges	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – pédoncule	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – ventricule (troisième) (latéral)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quatrième	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– hépatique	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – angle (côlon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – localisation primaire	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– – voies (biliaires)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– hile du poumon	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– hippocampe	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– humérus (chaque partie) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– hymen	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– hypopharynx, hypopharyngien NCA	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – paroi postérieur	C13.2	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – rétro-cricoïdienne	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– hypophyse (voie) (infundibulum)	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– hypothalamus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– île de Reil	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– iléo-caecum, iléo-caecal (valve)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– iléon	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– iliaque ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ilion ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– îlots de Langerhans	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– immunoprolifératif NCA	C88.90				D47.9
– infraclaviculaire (région) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– infratentoriel	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– insula (de Reil)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– intestin	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
– – grêle	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – duodénum	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– – – iléon	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – jéjunum	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gros	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– – – caecum	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – côlon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – – angle					
– – – – – droit	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – gauche	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – hépatique	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – – splénique	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – ascendant	C18.2	C78.5	D01.0	D12.1	D37.4
– – – – avec rectum	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – – – caecum	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – – descendant	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – droit	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
– – – – gauche	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – pelvien	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – transverse	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – iliéo-caecal	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – tractus NCA	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
– intestin NCA	C76.7	C79.88		D36.7	D48.7
– intra-abdominale	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– intra-crânienne NCA	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– intra-oculaire	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– intra-orbitaire	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– intra-throracique (cavité) (organe NCA)	C76.1	C79.88		D36.7	D48.7
– intrasellaire	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– iris	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– ischion ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– ischio-rectale (fosse)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– isthme utérin	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– jéjunum	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– jonction (entre)					
– – ano-rectale	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – bassinet rénal et uretère	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – cardio-oesophagien	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – col utérin ou vagin	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – duodéno-jéjunal	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gastro-oesophagien	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – iléocaecal	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – palais dur et mou	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pelvi-rectale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – recto-sigmoïdienne	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– jonction pelvi-rectale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– joue	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – extérieure	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – intérieure	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – muqueuse	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pli (supérieur) (inférieur)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– labial (peau)	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – grandes lèvres	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – petites lèvres	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– labiale (v.a. tumeur, lèvre)	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – gouttière (supérieur) (inférieur)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lacrymale					
– – canal	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – canal nasal	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – glande	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – point	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – sac	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– langue	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – amygdale	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – antérieure (deuxième tiers) NCA	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – surface dorsale	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – surface ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – base (surface dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – bords (latéraux)	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – dos	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – frein	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – ligne intermédiaire NCA	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – partie immobile	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – partie mobile NCA	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – pointe	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – postérieure	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – racine (surface dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – surface (dorsale)	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – racine de la langue	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – tiers postérieur	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – zone de jonction	C02.8	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– laryngé – v. tumeur, larynx					
– laryngo-pharynx	C13.9	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– larynx NCA	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilage (ary-) (bassin de Giess) (Kegel) (anneau) (bouclier) (aryténoïde) (Wrisberg)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – commissure (postérieure) (antérieure)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – externe NCA	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – dans la signification d'hypopharynx	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – interne	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – repli ventriculaire laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– lentille	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– lèvre de la vulve – v. tumeur, labiale					
– lèvre	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – Bändchen – v. tumeur, lèvre intérieure					
– – commissure	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – domaine du rouge à lèvre	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieur	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieur	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – extérieur de la lèvre	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieur	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieur	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – extérieure	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieure	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieure	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – inférieures	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – intérieures	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – intérieures	C00.5	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieures	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieures	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – muqueuse – v. tumeur, lèvre, intérieure					
– – peau (commissure) (supérieure) (inférieure)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – région buccale – v. tumeur, lèvre, intérieure					
– – supérieures	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – intérieures	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – trou de la bouche latéral – v. tumeur, lèvre interne					
– ligament (v.a. tumeur, tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – large de l'utérus	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – ligament rond de l'utérus	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – non-utérin – v. tumeur, tissu conjonctif					
– – propre de l'ovaire	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – rond	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – sacro-utérin	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – utéro-sacré	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – utérus	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – vestibulaire	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – vocale	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– ligament utéro-sacré	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– limbe cornéen	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– linguale NCA (v.a. tumeur, langue)	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– lingula pulmonaire gauche	C34.1	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– lobe					
– – frontal	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – frontal du cerveau	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – inférieur du poumon	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – moyen du poumon	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – occipital	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – occipital du cerveau	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – pariétal du cerveau	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – supérieur du poumon	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – temporal du cerveau	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – veine azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– lobe occipital	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– lobe pariétal	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– luette	C05.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lymphatique					
– – faisceaux NCA (v.a. tumeur, tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – ganglion (localisation secondaire)		C77.9		D36.0	D48.7
– – – abdominale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – anneau crural		C77.4		D36.0	D48.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – – aortique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – auriculaire (antérieur) (postérieur)		C77.0		D36.0	D48.7
– – – axillaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – brachial		C77.3		D36.0	D48.7
– – – bronchique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – broncho-pulmonaire		C77.1		D36.0	D48.7
– – – cervicale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cervico-faciale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – Cloquet		C77.4		D36.0	D48.7
– – – coeliaque		C77.2		D36.0	D48.7
– – – côlon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cou		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cubital		C77.3		D36.0	D48.7
– – – diaphragme		C77.1		D36.0	D48.7
– – – épigastrique, inférieur		C77.5		D36.0	D48.7
– – – épitrochléaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – fémorale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – foie		C77.2		D36.0	D48.7
– – – gastriques		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hépatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hile (poumons)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – – splénique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hile du poumon		C77.1		D36.0	D48.7
– – – hile hépatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hypogastrique		C77.5		D36.0	D48.7
– – – iléon et côlon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – iliaque		C77.5		D36.0	D48.7
– – – infra-claviculaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – inguinale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – intercostal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – intestinale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intra-abdominale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intrathoracique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – jugulaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – localisations multiples dans C77.0 - C77.5		C77.8		D36.0	D48.7
– – – lombaire		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mandibulaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – médiastinal (antérieur) (postérieur)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – membre inférieur		C77.4		D36.0	D48.7
– – – membre supérieur		C77.3		D36.0	D48.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – – membres					
– – – – inférieurs		C77.4		D36.0	D48.7
– – – – supérieurs		C77.3		D36.0	D48.7
– – – membres inférieurs		C77.4		D36.0	D48.7
– – – membres supérieurs		C77.3		D36.0	D48.7
– – – mésentérique (inférieur) (supérieur)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mésocôlon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – nucal		C77.0		D36.0	D48.7
– – – nuque		C77.0		D36.0	D48.7
– – – occipital		C77.0		D36.0	D48.7
– – – oesophagien		C77.1		D36.0	D48.7
– – – pancréatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – para-aortique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – para-utérin		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paracervical (col de l'utérus)		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paramètre		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parasternal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – paravaginal		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parotidienne		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pectoral		C77.3		D36.0	D48.7
– – – pelvien		C77.5		D36.0	D48.7
– – – pelvienne		C77.5		D36.0	D48.7
– – – péri-aortique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – péri-pancréatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pli inguinal		C77.4		D36.0	D48.7
– – – poplitée		C77.4		D36.0	D48.7
– – – portale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pré-auriculaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pré-symphyséale		C77.5		D36.0	D48.7
– – – prélaryngien		C77.0		D36.0	D48.7
– – – prétrachéale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – primaire – code d'après un type morphologique, comportement et localisation					
– – – pylore		C77.2		D36.0	D48.7
– – – rate (hile)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – rétro-auriculaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – rétro-sternal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – rétropéritonéale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – rétropharyngé		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sacral		C77.5		D36.0	D48.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – – scalène		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sous-capsulaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sous-claviculaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sous-mandibulaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sous-maxillaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sous-mentonnière		C77.0		D36.0	D48.7
– – – subinguinale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – sublinguale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – supra-claviculaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – tête		C77.0		D36.0	D48.7
– – – thoracique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tibial		C77.4		D36.0	D48.7
– – – trachéal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – trachéo-bronchique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – trou obturateur		C77.5		D36.0	D48.7
– – – veine porte		C77.2		D36.0	D48.7
– – – Virchow		C77.0		D36.0	D48.7
– – – visage		C77.0		D36.0	D48.7
– – – voies biliaires		C77.2		D36.0	D48.7
– – glande – v. tumeur, ganglions lymphatique					
– – vaisseaux (v.a. tumeur, tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– mâchoire	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – carcicome (chaque type) (supérieur) (inférieur)	C76.0	C79.88			
– – os	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – inférieur	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – supérieur	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parties molles	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – – inférieur	C03.1	C79.88		D10.3	D37.0
– – – supérieur	C03.0	C79.88		D10.3	D37.0
– – peau	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – trou	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– main NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– maladie généralisée					
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– mamelon	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– mammaire – v. tumeur, glande mammaire					
– mastoïde (Antre) (trou) (cellules)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os (processus mastoïde) ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– maxillaire	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – alvéolaire					
– – – appendice ou peigne	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – carcinome (muqueuse)	C03.0	C79.88			
– – – muqueuse	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – carcinome	C03.0	C79.88			
– – sinus	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – sinus du nez	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – trou	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– maxillaire inférieur	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – alvéolaire					
– – – appendice ou crête	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – carcinome (muqueuse)	C03.1	C79.88			
– – – muqueuse	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – glandes salivaires	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– médiastin, médiastinal	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
– – antérieur	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– – postérieur	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
– médullaire					
– – bulbe rachidien	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – glande surrénale	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– membre inférieur NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– membre supérieur NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– membres #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inférieures #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – inférieurs	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – supérieures #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– – supérieurs	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– méninges	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cérébrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – cerveau	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – crânienne	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – intra-crânien	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – moëlle épinière	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– méninges rachidiennes	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– méninges – v. tumeur, méninges					
– ménisque, articulation du genou (externe) (interne) (latéral) (médial) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– menton	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– mésentère	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mésentère, mésentérique	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– méso-appendice	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mésocôlon	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mésopharynx – v. tumeur, oropharynx					
– mésosalpinx	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– mésovarium	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– métacarpe (chaque os) ◊	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– métastatique					
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– métatarse (chaque os) ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– moëlle épinière (lombaire) (sacrale) (thoracique) (cervicale)	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– moignon cervical	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– mollet #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– Mont					
– – Vénus, de	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– multiple, maligne (localisations primaires indépendantes l'une de l'autre)	C97!				
– muqueuse					
– – alvéolaire (appendice) (crête)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – bouche NCA	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – joues	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – lèvres – v. tumeur, lèvre intérieure					
– – nez	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– muscles (v. a. tumeur, tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – extra-oculaire	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– muscles extra-oculaires	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– myocarde	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– myomètre	C54.2	C79.82		D26.1	D39.0
– narines	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasal – v. tumeur, nasale					
– nasopharynx (v.a. tumeur, rhinopharynx)	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– nerf optique, chiasme ou tractus	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– nerf, nerfs (ganglion)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – abducens	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – accessoire (spinal)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – auditif	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – autonome NCA (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cochléaire	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – crânien NCA	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – cubital	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – facial	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – fémoral	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – ganglion NCA (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – glosso-pharyngien	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – hypoglosse	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – intercostal	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – lombaires	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – médian	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – moteur oculaire commun	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – obturateur	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – olfactif (bulbe olfactif)	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– – optique	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– – para-sympathique (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – périphérique NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – abdominale ou abdomen	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – abdomino-pelvien	C47.8	C79.88		D36.1	D48.2
– – – auriculaire (oreille)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – avant-bras	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – cou	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – creux des aisselles	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – cuir chevelu	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – doigts	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dos	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – épaule	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – extra-rectal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fémur, supérieur	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fesses	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fosse ischio-rectale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fosse ptérygoïde	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – front	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – genou	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – hanches	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – inguinal (région) (canal)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – intra-thoracique	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – joue	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – main	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – malléole	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – membres	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – – – inférieurs	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – supérieurs	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – membres NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inférieurs	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – supérieurs	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – menton	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – mollet	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – muscle glutéal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – nuque	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ombilicale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – orbite	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – – oreille (externe)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – orteil	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – para-rectal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paraurétral	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paravaginal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paroi abdominale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paupière	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – périnée	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – périrectal (tissu)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – périurétral (tissu)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pied	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – plancher pelvien	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pli du coude, coude	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – poignet	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pouce	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – présacral	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – recto-vésicale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région de l'omoplate	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région de l'os temporal	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région du canal inguinal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région du flanc	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région du sacrum et du coccyx	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région infra-claviculaire	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région sus-claviculaire	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sein, paroi thoracique	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – septum recto-vaginal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – submental	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – talon	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tempe	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – – tête	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – thorax, aine	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tronc	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – vésico-rectale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – visage	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – radial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacré	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – sciatique	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – spinal NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – accessoire	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – sympathique NCA (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – trijumeau	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trochléaire	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – vague	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – vestibulo-cochléaire	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– nerfs autonomes ou système nerveux autonome – v. tumeur, nerf périphérique					
– nerfs crâniens NCA	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– nerfs périphériques NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– nez, nasal	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– – aile (externe)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – cartilage	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cavité	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – choane	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – cornet (muqueuse)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – os ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – externe (peau)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fosse	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – interne	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – muqueuse	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – os du nez ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – peau	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – septum	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – anneau postérieur	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – trou, trous	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – vestibule	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nodule du coccyx – v. tumeur, glomus coccygien					
– Noyaux gris centraux	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– nucleus pulposus ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– odontogènes – v. tumeur, mâchoire, os					
– oeil NCA	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– oesophage	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – partie abdominal	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – partie cervicale	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – partie thoracique	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers distal	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers inférieur	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers moyen	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers proximal	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers supérieur	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– oeufs de Naboth	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– Oliva (cerveau)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ombilicale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– omentum	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– omoplate (chaque partie) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– operculum (cerveau)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– orbite	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– – nerfs autonomes	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – nerfs périphériques	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parties molles	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– oreille moyenne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– oreille, sens auditif (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – canal	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – conduit (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – interne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – lobule	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – moyenne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – muscle	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – peau	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– organe de Zuckerkandl	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– organes génitaux					
– – féminins NCA	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – – plus près concernant la localisation NCA	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – masculins NCA	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – plus près concernant la localisation NCA	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– organes génito-urinaires ou voies urinaires NCA	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – vessie – v. tumeur, vessie					
– orifice					
– – cardiaque	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – urétéral	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– orifice de l'estomac	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– orifice du col					
– – externe	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – interne	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– oropharynx	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – paroi latéral	C10.2	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – paroi postérieur	C10.3	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – région de transition	C10.8	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– orteil NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– os ethmoïdal (trou)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os ou cellules ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– os iliaque ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– os mastoïde ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– os sphénoïde	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – trou (trou de Highmore)	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– os, périoste ◊	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acetabulum	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – acromion (processus)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – astragale	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – Atlas	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – avant-bras	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – axis	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – boîte cranienne, vertex	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – calcanéum	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – calvaria	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – carpe (chaque)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – cartilage NCA	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – clavicule	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– – clivus	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – coccyx	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – côtes, cartilage des côtes	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – coude	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – courts	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – membres inférieurs	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – membres supérieurs	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – crânien	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – cubitus (chaque partie)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – disque intervertébral	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – doigt	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – dos NCA	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – épaule	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – fémur (chaque partie)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – front	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – genou	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – hanches	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – humérus (chaque partie)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – iliaque	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – ischion	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – longs	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – membres inférieurs NCA	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – membres supérieurs NCA	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – mâchoire (maxillaire)	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – inférieure (mandibule)	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – main	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – malléole	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – mandibule	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – membre inférieur NCA	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – membre supérieur NCA	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – membres NCA	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – inférieurs (os longs)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – – os courts	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – supérieurs (os longs)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – – – os courts	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – métacarpe	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – métatarse	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – moëlle NCA	C96.9	C79.5			D47.9
– – nez, nasal	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – occipital	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – omoplate (chaque partie)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – orbite	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – orteil	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – os de la cheville	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – os ethmoïde (cellules)	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os hyoïde	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – os iliaque	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – os pariétal	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os sphénoïde	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os tarsien	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – os temporal	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os zygomatique	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – pelvienne	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – péroné (chaque partie)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – phalange	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – main	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – – pied	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – pied	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – pouce	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – processus xiphoïde	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – pubis	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – radius (chaque partie)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – rotule	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – sacrum	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – selle turcique	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – squelette NCA	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – sternum	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – talon, os du talon	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – tibia (chaque partie)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – vertèbre, colonne vertébrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – – coccyx	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – – sacrum	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – visage	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – vomer	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– ouraque	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– ovaire	C56	C79.6	D07.3	D27	D39.1
– oviducte	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– palais	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – arc	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – dur	C05.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mou	C05.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – bout	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – surface antérieur au naso-pharynx	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – surfaces postérieures	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsille	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – transition entre palais dur et mou	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– palpébrale	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– pancréas	C25.9	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – canal (de Santorini) (pancréatique)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – col.....	C25.7	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – corps	C25.1	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – insulaire	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– – queue	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – tête	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– papille de Vater	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– para-ovarienne	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– para-rectal	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– para-thyroïde	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paraganglion NCA	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – aorte abdominale	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– paramètre	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– paranéphritique	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– parasellaire	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– parathyroïdien	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paraurétral	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – glande	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– paravaginal	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parenchyme, rénal	C64	C79.0	C09.1	D30.0	D41.0
– parodontale NCA	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– parotide (glande) (canal)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parties molles – v. tumeur, tissu conjonctif					
– paupière (peau) (supérieure) (inférieure)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– paupière (supérieure) (inférieure) (glande)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– peau (de type non-mélanome)	**C44.9**	**C79.2**	**D04.9**	**D23.9**	**D48.5**
– – abdominal, paroi abdominale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – aile du nez	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – aine, région de l'aine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – aisselle, pli de l'aisselle	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – anus	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – avant-bras	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – clitoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – coin de l'œil (externe) (interne)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – columelle nasale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – conduit auditif (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cuir chevelu	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – doigts	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – dos	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – épaule	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – fémur, supérieur	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – fesses	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – flanc	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – fosse supra-claviculaire	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – front	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – genou	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – glutéale (musculature) (région)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – hanches	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – hélix	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – joue	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lèvre (supérieure) (inférieure)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – lèvres	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – grandes lèvres	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – petites lèvres	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – mâchoire	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – main, paume	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – malléole	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – membre inférieur	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – membre supérieur	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – membres NCA	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – – inférieurs	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – – supérieurs	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – menton	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – mollet	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – nez (externe)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – ombilicale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – oreille (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – organes génitaux féminins	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – clitoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – lèvres féminines	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – lèvres NCA	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – grandes lèvres	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – petites lèvres	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – vulve	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – organes génitaux masculins	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – pénis NCA	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – prépuce	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – scrotum	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – orteil, orteilles	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – palpébrale	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – paupière	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – paupière (supérieure) (inférieure)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – pavillon de l'oreille	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – pénis NCA	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – périanale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – périnée	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – pied, plante du pied	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – plantaire	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – pli du coude, coude	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – pli sous-mammaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – pouce	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – prépuce	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – région claviculaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région de la nuque	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – région du cou	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – région du sacrum et du coccyx	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région inguinale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région pubienne	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région scapulaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scrotum	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – sein, paroi thoracique	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sourcil	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – subclaviculaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – talon	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – tempe	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – tête NCA	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – thorax, aine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – Tragus	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – tronc	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – type mélanome – v. mélanome					
– – visage NCA	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – vulve	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– peau synoviale – v. tumeur, tissu conjonctif					
– pédoncule cérébral	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pelvien(ne)	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organe	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – os ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – paroi	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – péritonéal	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – plancher	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – rénal	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– pénis	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – corps caverneux	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – gland	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – peau NCA	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– péri-ampullaire (ampoule de Vater)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– péri-pancréatique	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– péri-rectal (tissu)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– péri-rénal (tissu)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– péri-rénale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– périanal (peau)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– péricarde	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– périnée	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– périnéphrique	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– périoste – v. tumeur des os					
– péritoine – voir tumeur, péritonéal					
– péritonéal	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– – pariétale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – pelvien	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – plus près concernant une partie NCA	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – viscérale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– péroné (chaque partie) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– phalanges ◊	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – main	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – pied	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– pharynx	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– pharynx buccal – v. tumeur, oropharynx					
– pharynx, pharyngé	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – amygdales	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – cul-de-sac	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – paroi (postérieur) (latéral)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – récessus	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – région	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– pie-mère	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cérébrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – crânienne	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– pied NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– placenta	C58	C79.82	D07.3	D26.7	D39.2
– plèvre	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plèvre (trou) (pariétale) (pulmonaire) (viscérale)	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plexus (nerveux)					
– – brachial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cervicale	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – choroïde (troisième ventricule) (ventricule latérale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quatrième ventricule	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lumbosacré	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacral	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– plexus brachial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– plexus lombosacré	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– pli ary-épiglottique	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – côté laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – face hypo-pharyngée	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – zone marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– pli nasolabial	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– pluriglandulaire	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– plus près concernant la localisation NCA	C76.7	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– poche recto-utérine	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– poignet NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– pouce NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– poumons	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – bronches principales	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carène trachéale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – hile	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe inférieur	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe lingual du poumon	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe moyen	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe supérieur	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe veine azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– prépuce	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– prépylore	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– présacrale (région)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– processus xiphoïde ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– prostatique	C61	C79.82	D07.5	D29.1	D40.0
– protubérance annulaire	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pubis ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– pudendum feminin	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– pulmonaire (v.a. tumeur, poumons)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– Putamen	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– pylore, pylorique	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antre	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – canal	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– pyramidal (cerveau)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– queue de cheval	C72.1	C79.3		D33.4	D43.4
– radius (chaque partie) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– rate NCA	C26.1	C78.8		D13.9	D37.78
– récessus					
– – pharyngien (Rosenmüller)	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– recto-sigmoïde (côlon) (transition)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rectum (ampoule)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
– – avec côlon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– région					
– – postcricoïde	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – scapulaire #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région cervicale	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– région de l'aine #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région de l'omoplate #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région glutéale #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région rétro-molaire	C06.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– rénal (v.a. tumeur, rénale)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– rénale (parenchym)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– – calice	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – hile	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvien	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– repli					
– – aryépiglottique	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – côté hypopharyngien	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – côté laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – zone marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – glosso-épiglottique	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – vestibulaire	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– respiratoire					
– – organe ou système NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – tractus NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – supérieur	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– rétinienne	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
– rétro-caecale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– rétro-oculaire	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– rétro-péritoine	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– rétro-vésical	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– rétrobulbaire	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– rétropéritonéal (tissu)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– rétropharyngé	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– rhinencéphale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– rhinopharynx	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – paroi	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – antérieur	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – latéral	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – postérieur	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – supérieur	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – plafond	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – plancher	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– rotule ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– sacrum (vertèbre) ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sacrum et coccyx ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – région	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– salpinx	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– sclérotique	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– scrotum	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– sein, paroi thoracique NCA	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– selle turcique, os ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– septum					
– – nez	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – bord postérieur	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – recto-vaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – recto-vésicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – urétro-vaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – vésico-vaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– septum ou paroi recto-vaginal	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– septum recto-vésical	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– sillon glosso-pharyngien	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– sinus (de Highmore) (maxillaire)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – pylorique	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – tympanal	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– sinus (des sinus)	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – ethmoïdal	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – frontal	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – maxillaire	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nasales, paranasales NCA	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – sphénoïdal	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– sinus – v. tumeur, sinus					
– souffle, respiration					
– – organe ou système NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – voies NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – supérieurs	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– sourcil	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– sous-cutanée (tissus) (nodule) NCA – v. tumeur, tissu conjonctif					
– sous-dural	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– sous-glottique	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– sous-pleural	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– sous-sternal	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– sphincter					
– – anal	C21.1	C78.5	D01.3	D21.9	D37.78
– – Oddi	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– squelette NCA ◊	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– sternum ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– Stroma de l'endomètre	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– sublinguale	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– submental	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– substance blanche du cerveau (central) (cérébral)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– supra-glottique	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– suprasellaire (région)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– supratentoriel (cerveau) NCA	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– surrénale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – capsule	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – cortex	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – glande	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – médullaire	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– sympathique, nerf ou système nerveux NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– symphyse pubienne	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– système digestif, système, voie NCA	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– système nerveux (central) NCA	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– – autonome – v. tumeur, nerf périphérique					
– – para-sympathique – v. tumeur, nerf périphérique					

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – sympathique – v. tumeur, nerf périphérique					
– talon NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– tapetum cérébral	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– tarse (chaque os) ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– tempe (peau)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– temporale					
– – lobe	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – région	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– tendon, gaine tendineuse – v. tumeur, tissu conjonctif					
– tentorium cerebral	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– testicule – v. tumeur, testicules					
– testicules	C62.9	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – descandantes	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ectopiques	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – non-descandantes	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – retenues	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – scrotal	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– tête NCA #	C76.0	C79.88	D04.4	D36.7	D48.7
– thalamus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– thorax (trou) (organe NCA) (paroi NCA)	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– thymus	C37	C79.88	D09.3	D15.0	D38.4
– thyroïdien	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– thyroïdienne	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– tibia (chaque partie) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– tissu adénoïde	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tissu adipeux – v. tumeur, tissu conjonctif					
– tissu conjonctif NCA	**C49.9**	**C79.88**		**D21.9**	**D48.1**
– – abdominale ou abdomen	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – abdomino-pelvien	C49.8	C79.88		D21.9	D48.1
– – aisselle	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – auriculaire (oreille)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – avant-bras	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – canal lymphatique thoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – cou	C49.0	C79.85		D21.0	D48.1
– – cuisse	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – diaphragme	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – doigts	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – dos	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – épaule	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – extra-rectal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – extrémités	C 49.9	C 79.86		D21.9	D48.1
– – – inférieurs	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – – supérieurs	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – fesses	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – fosse ischio-rectale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – fosse ptérygoïde	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – front	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – genou, jarret	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – grands vaisseaux NCA	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – hanches	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – hypocondre	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – inguinal (région) (canal)	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – intrathoracique	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – joue	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – mâchoire	C03.9	C 79.88		D10.3	D37.0
– – main	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – malléole	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – membre inférieur	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – membre supérieur	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – membres NCA	C 49.9	C 79.86		D21.9	D48.1
– – – inférieurs	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – – supérieurs	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – menton	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – mollet	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – muscle ilio-psoas	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – muscle psoas	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – muscule glutéal	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – nuque – v. tumeur, tissu conjonctif, cou					
– – ombilicale	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – orbite	C 69.6	C 79.4		D31.6	D48.7
– – oreille (externe)	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – orteil	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – para-rectal	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – para-urétral	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – paravaginal	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – paroi abdominale	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – paroi thoracique	C 49.6	C 79.88		D21.6	D48.1
– – paupière	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – périnée	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – périrectal (tissu)	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – périurétral (tissu)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – pied	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – plancher pelvien	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – pli du coude, coude	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – poignet	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – pouce	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – présacral	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – recto-vésicale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – région de l'omoplate	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – région du canal inguinal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – région du sacrum et du coccyx	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – région infra-claviculaire	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – région sus-claviculaire	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – rétropéritonéal	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– – sein, paroi thoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – septum recto-vaginal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – submental	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – talon	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – tempe	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – tête, cuir chevelu	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – thorax (paroi)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – tronc	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – vésico-rectal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – visage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– tissu hématopoétique NCA	C96.9				D47.9
– tissu péri-urétral	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– tissu périodontal NCA	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– tissu vésico-cervical	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– trachée	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachée (cartilage) (muqueuse)	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachéo-bronchique	C34.8	C78.0	D02.2	D14.2	D38.1
– tractus urogénital					
– – féminin	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – masculin	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– tractus uvéal	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– Tragus (oreille)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– transistion cardio-oesophagienne	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– transition gastro-oesophagienne	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– trigone de la vessie	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– trompe					

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – auditive	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – orifice pharyngé	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – trompe de Fallope	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– trompe d'Eustache	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– tronc cérébral	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– tronc NCA #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– trou péritonéal	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– tubaire	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tubo-ovarienne	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– tunique vaginale	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– uncus	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– union – v. tumeur, transition					
– urétéral – v. tumeur, uretère					
– uretère	C66	C79.1	D09.1	D30.2	D41.2
– – orifice	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– urétral – v. tumeur, urètre					
– urètre, uréthal (glande)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– – orifice interne	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– urétro-vaginal (septum)	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– utéro-ovarien	C57.8	C79.82		D28.7	D39.7
– – ligament	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– utérus	C55	C79.82	D07.3	D26.9	D39.0
– – annexe	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – col (col de l'utérus)	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – col de l'utérus externe	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – col de l'utérus interne	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – corps	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – endocol (canal) (glande)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – exocol	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – fond	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – isthme	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – jonction entre le col (col de l'utérus) et le vagin	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – ligament	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – – large de l'utérus	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– – – rond	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – ligament – voir tumeur de l'utérus ligamenteux					
– – segment inférieur	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – trompes	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– utricule prostatique	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– vagin (arc) (massif)	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– vagin (arc) (paroi)	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– vagino-vésicale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – septum	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vaisseau sanguin – v. tumeur, tissu conjonctif					
– vaisseaux (sanguin) – v.a. tumeur, tissu conjonctif					
– – grands	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vallécule épiglottique	C10.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– valvule iléo-caecale	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– vasculaire – v. tumeur, tissu conjonctif					
– veine cave (abdominale) (inférieure)	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – supérieure	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– veine, veineux – v. tumeur, tissu conjonctif					
– ventricule	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerveau (plancher) (troisième) (latéral)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quatrième	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – coeur (gauche) (droit)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– ventricule cérébral (plancher) (droit) (cervelet) (latéral) (quatrième)	C71.5				
– ventricule laryngé	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– vermis (cérébral)	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– vermis cérébelleux	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– vertèbre, colonne vertébrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – bulbe rachidien	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – coccyx ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – dure-mère	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – méninges	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – méninges rachidiens	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – moëlle épinière	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– – nerf, racine du nerf	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – pie-mère	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – sacro-lombaire ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – sacrum ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– vertex ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– vésical – v. tumeur, vessie					
– vésico-rectale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– vésico-vaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – septum	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vésicule biliaire	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– vésicule séminale	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vessie	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – col	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– – orifice	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – urétéral	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – urétral interne	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – ouraque	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – ouverture	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – paroi	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – antérieur	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – latéral	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – postérieure	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – sphincter	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – trigone de la vessie	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – vertex (dôme de la vessie)	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– vessie et organes génitaux					
– – féminins	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – masculins	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– vestibule					
– – bouche	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– visage NCA #	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– voies biliaires (extra-hépatiques)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – intra-hépatique	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– voies de Gärtner	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– voies optiques	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– voies respiratoires supérieures	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– Vomer ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– vulve	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– zone hémorrhoïdale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78

Toutes les hospitalisations sont saisies dans le cadre du Relevé Séjours stationnaires en hôpitaux (SpiGes).

Ce relevé, effectué par tous les hôpitaux et cliniques, porte sur les données administratives, les informations sociodémographiques des patients, ainsi que les diagnostics et traitements.

Pour saisir ces informations, deux classifications médicales sont utilisées. Il s'agit d'une part de la CIM-10-GM pour les diagnostics et d'autre part de la classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP) pour les traitements. Le codage des diagnostics et traitements est soumis à des directives précises.

Le domaine des Classifications médicales de l'Office fédéral de la statistique (OFS) rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des dites classifications et du soutien des personnes chargées du codage.

La version 2026 de l'index alphabétique de la CIM-10-GM se base sur la version française de l'index systématique de la CIM-10-GM 2026, ainsi que sur une liste d'enrichissements. La version 2026 de la CIM-10-GM entrera en vigueur en Suisse le 1er janvier 2027.

En ligne
www.statistique.admin.ch/asset/1188-2634

Distribution
www.publicationsfederales.admin.ch
No d'art. 317.101.26F

Numéro OFS
1188-2634

ISBN
978-3-303-14396-4